



176

163  
A

# DANIELIS SENNERTI.

VRATISLAVIENSIS,  
DOCTORIS, ET PROFESSORIS  
MEDICINÆ,

IN ACADEMIA WITTEBERGENSI,

*Operum*

## TOMVS SECVNDVS:

QVO CONTINENTVR

{ De Febris, Libri IV. }  
NEC NON  
{ Practicæ Liber I. II. & III. }



LVGDVNI,

Sumptibus IOANNIS ANTONII HVGVE TAN Filij,  
& MARCI ANTONII RAVAVD.

M. DC. L.

CVM PRIVILEGIO REGIS.



Ex Libris ...

DANIELIS

SENNERT

VRATISLAVIENSIS

DOCTORIS ET PROFESSORIS


MEDICINAE

IN ACADEMIA WITTEBERGENSI

Opera

TOMVS SECVNDVS

DUO CONTINENTVR



1. 2.



ILLVSTRISSIMO  
CELSISSIMOQVE  
PRINCIPI AC D. DOMINO  
VVILHELMO,  
DVCI SAXONIÆ, IVLIÆ,  
Cliuiæ & Montium,

LANDGRAVIO THVRINGIÆ,  
MARCHIONI MISNIÆ,  
COMITI DE MARCA ET RAVENSBVRG,  
DOMINO IN RAVENSTEIN, &c.

DOMINO MEO CLEMENTISSIMO,

*Salutem & Felicitatem perpetuam*  
P.



EDICINAM artium omnium esse præstantissimam,  
ILLVSTRISSE AC CELSISSE PRINCEPS,  
DOMINE CLEMENTISSE, multa equidem  
sunt, quæ demonstrant, qui tamen eam in sanitate  
hominum conseruanda & recuperanda occupari di-  
xerit, omnia, quæ in eius laudem dici possent, com-  
prehendisse mihi videtur. Ea enim est sanitatis præ-  
stantia, vt omnia reliqua mortalium bona, honor,  
nobilitas, eruditio, diuitiæ, fortunæque adeò omnes,  
eam, quam habent, gratiam & dignitatem ab hac vnâ mutuari; aut certè,  
si quam ex se habeant, si absque sanitate sit, omnem penitus amittere vi-  
deantur.

————— *Valeat possessor, oportet,*

*Si comportatis rebus bene cogitat vti.*

*Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis, acëscit.*

Qua de re in bonæ valetudinis laudem Ariphronis Sicyonij iucundissi-  
mus & plenissimus gratiarum, magni illius I. C. Scaligeri iudicio, hic Pæan  
exstat.

Υγίεια, πρῶτον μανδρῶν,  
μετὰ οὐ ναίοντι  
τὸ λοιπὸν βιοτᾶς.  
σύ δέ μοι πρῶτον σύννομος ἔσῃ.  
εἰ γὰρ τις ἢ πλεονεχέει χάρις, ἢ τεκνίον,  
τὰς εὐδαίμωνας ἢ ἀνθρώποις  
βασιλῆας ἢ ἀρχαίς, ἢ πόδας.

Ὡς κρυφίως ἀφροδίτης ἄρκυσι θυρεόμας:  
ἢ ὅτις ἀλλὰ θεοῖσιν ἀνθρώποις τέρας,  
ἢ πόνον ἀπνοᾶ πέφανται:  
μετὰ σοῖο; μάκαρ ὕμνῳ,  
τέθνηκε πάντα, καὶ λαμπρὴ χάρις ἔσῃ:  
εἶθι δὲ χρεὶς ἢ εὐδαίμων.



Quem his Anacreonticis Latinè reddidi.

O sanitas beata,  
O sanitas amanda,  
O sanitas colenda,  
Tecum mihi beatè  
Reliquum agitare vitæ  
Liceat ! mihi perennis  
Comes ô adesto vitæ!  
Nam quicquid est bonorum,  
Et quicquid est leporum,  
Et quicquid est honorum,  
Et quicquid est amorum,  
Magnis in auri aceruis.

In liberis venustis,  
In Principum ~~domo~~ <sup>domo</sup> ~~laurore~~ <sup>laurore</sup>,  
In coniugum ~~sanctissimo~~ <sup>sanctissimo</sup> ~~secore~~ <sup>secore</sup>  
Et quicquid est, quod ampli  
Largitur orbis Author,  
Quietis à labore,  
Gaudiique post dolorem,  
Tecum viget, viretque.  
O sanitas beata,  
Tu ver facis suauē  
Fulgere Gratiarum:  
Sine te nihil beatum.

Vt ergo sanitate in hac mortali vita nihil iucundius & gratius cogitari, nihil pretiosius exoptari expetere potest: ita Ars Medica, quæ hanc moderatur, meritò omnium præstantissima habetur, vtpote quæ facit, vt maximo isto sanitatis bono, homini iucundissimè frui liceat, quæque à morborum, quibus homines ex beatissimo in eum quo vix miserior in hoc mortali vita obtingere potest, statum coniiciuntur, molestiis, iniuriis ac tormentis liberat.

In numero autem illo morborum, in quibus depellendis vtilem humano generi operam Medicina nauat, nullus Febre vulgarior & frequentior est. Etenim cum aliorum morborum plerique non omnes ex æquo inuadant, sed alij aliis ætatibus, regionibus, corporumque constitutionibus magis, vel minùs familiares sint, nulla datur ætas, nulla regio, nulla corporis conditio, quæ à febre immunitatem sibi polliceri queat. Et vt frequens morbus Febris est: ita maximè periculosus. Neque sine causa. Occupat enim præcipuè Caloris natiui & viuifici officinam, eamque depopulatur, & nisi maturè igneus ille & præternaturalis calor exstinguatur, natium planè dissipat. Quo vitæ thesauro absumpto, mors præsentissima imminet, vt vix alio morbi genere plures intereant. Qua de causa Romani cum pestibus quibusdam generis humani, quas, vt Plinius, *lib. 2. cap. 24.* scribit, placatas trepido metu cupiebant, aras, & templa exstruerent: febrem præcipuè inter morbos, templis aliquot dicatis, ad minus nocendum venerati sunt, Numinisque loco superstitione coluerunt, vt, præter Plinium, *cit. loco*, Augustinus, *de Ciuit. Dei, lib. 2. cap. 14.* & Valerius Maximus, *lib. 2. cap. 5.* annotarunt.

Ac proinde eorum, qui ad Medicinam animum appulerunt, & olim in depellendis morbis vtilem hominibus operam nauare cogitant, officium est, de Febribus doctrinam inprimis sibi familiarissimam reddere, & omnes febrium differentias, cognitatasque habere; cum earum, vt aliorum plerumque morborum, vnicum genus non sit, sed multiplex, & in plures differentias diffusum. Quos vt & ego, quod professionis meæ ratio à me exigere videbatur, in tam utili & necessaria doctrina, quantum in me est, adiuuarem, superioribus annis in hac Academia vniuersam de Febribus doctrinam in publicis Prælectionibus proposui, & quantum potui, perspicuè explicaui, ac postea ante annos ferè nouem in lucem & publicum produxi.

Cum autem res ipsa necessitatem, secundam editionem adornandi, mihi imponeret: temporis atque operæ aliquid adhuc tractatui huic recensendo impendi,

impendi, eumque non paucis in locis auctiorem reddidi, & præterea Fasciculo Medicamentorum contra Pestilentiam, diuersis temporibus à Clarissimis quibusdam Medicis præscriptorum, locupletavi.

Quia verò, *Illustrissime ac Celsissime Princeps, Domine Clementissime*, cum primum hunc tractatum ederem, eum Illustrissimæ T. Cels. Fratri, Illustrissimo Principi ac Domino, D. Iohanni Ernesto, beatissimæ recordationis, inscripsi, atque ex Illustrissimæ vestræ familiæ nomine, meo huic labori aliquem splendorem conciliare volui; nunc, eo è rebus mortalibus exempto, Illustrissimæ T. Cels. hanc secundam & auctiorem editionem meritò consecrandam putavi. Cum enim in Illustrissimam T. Cels. quodam quasi hereditario iure deriuatus sit erga bonas literas earumque cultores amor & fauor ac insignis beneuolentia, eamque multis ac illustribus documentis hætenus testatam Illustrissima T. Cels. fecerit: planè confido, Illustrissimam T. Cels. hoc quicquid est laboris mei, serenâ fronte suscepturam. Idque vt Illustrissima T. Cels. faciat, submisè oro, Deumque Opt. Max. precor, vt Illustrissimam T. Cels. omnibus bonis augeat, saluamque & florentem diu conseruet. V Vittebergæ, Calend. Septemb. Anno Christi M. MC. XXVIII.

*Illustriss. T. Celsi.*

*Subiectissimus*

DANIEL SENNERTVS;  
D. Medicinæ Profess. & Sereniss.  
Elect. Sax. Medicus.





## LECTORI BENEVOLO S.



*Q*UAE M paucos ante annos (LECTOR BENEVOLE) non ita multis destinaveram laborem, eum iam cum pluribus communico, non quod persuasum habeam, rem literariam & Medicam, in tanta hodie librorum copia, hoc meo de Febris libro carere non posse: sed ut tempori inferuiam. Cum enim in Institutionibus Medicis doctrinam de Febris desiderari, & quosdam hæc qualiacunque describere intelligerem: describendo tamen vitari ac corrumpi animaduertirem: ut iis, qui ex hoc, qualicunque meo labore commodi aliquid ad se redundare posse putant, inferui, ea, quæ tum proposueram, relegere, & typis exscribenda dare volui. Et si enim talia non sint, ut omnium expectationi possint satisfacere, tamen qui norunt, inter quas occupationes molestissimas nata sint, ij facile ijs, quæ minus apta, & rectè scripta videbuntur, ignoscent, & mihi eam, quam viri magni etiam antea meruerunt, veniam dabunt. Consolidaturque me candidum Cardani de Galeno iudicium, dum, libro de Aqua, ita scribit: Galenus multa sic obiter scripsit, non defectu ingenij, memoriæve aut eruditionis, vel etiam iudicij, quibus fuit admirabilis; sed temporis. Ut enim ipsemet fateatur, toto die curandis ægris intentus, per noctem studiis incumbere, atque scribebat. Nec tantum refert temporis angustia, quàm si animus iam curis lassatus se applicet studiis.

Desiderabunt fortasse audi novitatis quidam Chymicorum de febris sententias: verum non video, quid è vulgatis ipsorum libris expectatione dignum afferre potuerim. Nam illud nitro sulphur ad omnes febrium differentias explicandas non satisfacit. Inpersi tamen passim quedam, quæ viris doctis, & quorum animi anticipatis opinionibus præoccupati non sunt, de quibusdam diligentius cogitandi ansam præbent. Neque enim omnia in doctrina febrium ita expedita & plana sunt, ut investigatione, & labore amplius opus non sit; quod qui in praxi versantur, quotidie experiuntur. Et vereor, ne de non paucis, quæ à nonnullis prolixissimis commentarijs hæc de re dicuntur, illud locum habeat, quod Cornelius Gemma de Galeno scribit: Et si, inquit, Galenum exercitissimum fuisse, non dubitemus: plurima tamen non tam ex rerum usu, quàm accurata mentis indagine, vel ratione constituit. Et spero, tandem quosdam ad hanc Naturæ lucem oculos aperturos, & generationis & corruptionis rerum causas diligentius inquisituros, nec saltem in qualitativis primis, & causis remotis hesuros, sed ut proximas cuiusque mutationis causas invenient, laboraturos.

Desiderabunt quoque forsitan nonnulli in medicamentis multa secreta, & præcipuè Chymica: quibus nihil aliud respondendum censeo, quàm quod Clarissimus ille Hieron. Capiuaccius cuiusdam Polono, ut quedam secreta sibi communicaret, impensè roganti, respondisse fertur: Lege meam methodum, & habebis mea secreta. Qui enim materiam Medicam cognitam habet, nec methodum medendi ignorat, ac morbi naturam in ægris è suis signis perspicere novit, illum non facile medicamenta deficient. Qui verò methodo generali neglecta, & simplicium medicamentorum cognitione non instructus, magnum thesaurum se collegisse putat, si multas compositorum medicamentorum formulas collegerit videat, ne olim, ubi ad praxin ventum fuerit, thesaurus iste carbonem sint. Et exstant hodie in publico tot medicamenta Chymica, ut majoris prudentiæ ac industriæ sit, ea seligere, quàm colligere. Neque enim omnia, quæ satis incaute cum magnis elogijs atque inscriptionibus circumferuntur, illas laudes sustinere, & effectu ipso comprobare posse, existimo. Atque doleo illud, quod Galenus, lib. 7. de comp. Medic.

Medic. sec. gener. cap. 4. prudenter monet, negligi. Si quis, inquit, post me æquè studiosus & veritatis amans exstiterit, ne temerè ac subito, vbi bis terve vsus expertus sit, ferat sententiam. Imò persuasum habeo, nonnullos medicamenta non bis terve, quod Galeno tamen non satisfacit, sed vix semel probata, imò à fornace adhuc calentia, magnis verborum preconiis ornare, atque incautis cum multorum periculo obtrudere. Nec Medicina tam in medicamentis, quàm in eorum recto vsu consistit. Audiat hoc à me iuventus nostra: nunquam erit bonus Chymiatrus, qui non bonus fuerit Galenicus, aut (si quem forsan nomen hoc offendit) Dogmaticus. Interim vtilia medicamenta non pauca, cum à me, tum aliis doctis Medicis vsu probata, inserui; et si sine insigni elogio. Quæ omnia Lector Candide, boni consule; & si quæ his meliora habes, mecum, adeoque cum omnibus Artis Medicæ cultoribus liberaliter communica.

ἔς ἀντὶς τῶν δὲ ἰατρῶν.

Witteberga, Idib. April. Anno Christi 1619.







# INDEX LIBRORVM,

## Capitum, & Quæstionum

### TOMI SECUNDI DE FEBRIBVS.



#### LIBRI I.

##### *De febre in genere, & Febre Ephemera,*

Cap.I.	<b>D</b> E natura febris.	pag.1
II.	De causis febrium in genere.	6
III.	De accidentibus & sympt. febrium in genere.	8
IV.	De differentiis febrium in genere.	ibid.
V.	De Curatione febrium in genere.	10
VI.	De febre Ephemera.	11
VII.	De Ephemera plurium dierum, & Synocha sine putredine.	15

#### LIBRI II.

##### *De Febribus putridis,*

Cap.I.	<b>D</b> E febribus putridis in genere.	18
II.	De febrium putridarum differentiis.	25
III.	De signis putridarum in genere.	27
IV.	De Curatione putridarum in genere.	29
V.	De Venæ sectione.	31
VI.	De Purgatione in febribus.	36
VII.	De Coctione & Præparatione humorum.	43
VIII.	De sudoriferis & Vrinam cientibus.	47
IX.	De Dieta in febribus putridis.	49
X.	De febrium putridarum differentiis.	55
XI.	De Febre putrida, continua, primaria, & primò de Synocha.	57
XII.	De Causo seu febre ardente.	62
XIII.	De febribus continuis in genere, & Tertianâ continua.	65
XIV.	De Quotidiana continua.	71
XV.	De Quartana continua.	75
XVI.	De febrib. symptomaticis cōtinuis.	76
XVII.	De febribus Intermittentibus.	82
XVIII.	De Tertianâ Intermittente.	96
XIX.	De Quotidiana Intermittente.	107
XX.	De Quartana Intermittente.	109
XXI.	De Febribus compositis, & Semi-tertiana.	117

#### LIBRI III.

##### *De Febre Hæctica,*

Cap.I.	<b>D</b> E Natura Febris Hæcticæ.	123
II.	De signis diagnosticis Febris Hæcticæ.	126
III.	De Curatione Febris Hæcticæ.	128

#### LIBRI IV.

##### *De Peste, Pestilentibusque ac malignis Febribus,*

Cap.I.	<b>D</b> E Natura Pestilentia.	131
II.	De Causis Pestilentia.	139
III.	De Contagio.	145
IV.	De signis Pestis.	153
V.	De Præseruatione à Pestilentia.	156
VI.	De Curatione Pestilentia.	170
VII.	De Pestilentis ac malignæ febris natura & à peste differentia.	178
VIII.	Ad quod febrium genus Pestilentes & malignæ pertineant.	181
IX.	De Causis febris Pestilentis & malignæ.	183
X.	De Pestilentis febris signis.	ibid.
XI.	De Curatione Februm Pestilentium & malignarum in genere.	185
XII.	De variolis & morbillis.	190
XIII.	De Febribus Petechialibus.	199
XIV.	De Morbo Vngarico.	202
XV.	De sudore Anglico.	207
XVI.	De Febre maligna cum spasmo.	208
XVII.	De Catharro & Tussi Epidemia maligna.	209
XVIII.	De Februm Symptomatibus tollendis.	212



#### LIBRI I. PARTIS I.

##### *De Morbis Capitis,*

Cap.I.	<b>D</b> E Intemperie cerebri sine materia, & primò de calida.	pag.261
II.	De Intemperie cerebri frigida.	267
III.	De	

# Index Caputum.

III.	De Intemperie cerebri humida,	271
IV.	De Intemperie sicca, & intemperie- bus compositis,	272
V.	De Intemperiebus cerebri cum mate- ria in genere,	274
VI.	De Intemperie cerebri cum materia per consensum,	277
VII.	De Intemperie cerebri cum vapore & spiritu flatulento,	281
VIII.	De Intemperie cerebri cum sanguine seu pthora,	283
IX.	De Intemperie cerebri cum bile,	287
X.	De Intemperie cerebri cū pituita,	289
XI.	De Intemperie cerebri cum humore seroso,	295
XII.	De Intemperie cerebri cum humore melancholico,	297
XIII.	De Intemperie cerebri cum bile atra,	300
XIV.	De Venenatis malignis, ac tota substā- tia cerebro contrariis morbis,	302
XV.	De Vitiis spirituum animalium, ibid.	
XVI.	De Morbis compositionis, & primò de morbis figuræ,	304
XVII.	De Morbis meatuum & cavitatum cerebri,	305
XVIII.	De Morbis in numero, & de vermi- bus ac calculis in capite,	307
XIX.	De Morbis magnitudinis in capite,	309
XX.	De Commotione cerebri,	ibid.
XXI.	De Morbis solutæ vnitatis in capite & cerebro; & primò de Contusione capitis,	311
XXII.	De Vulneribus capitis sine cranii, membranarum, & cerebri læsione; & primò de Vulnere sine contu- sione,	313
XXIII.	De Soluta vnitatem & fractura cranii sine meningum & cerebri vulne- re,	315
XXIV.	De Cranii fractura cum meningum ce- rebri læsione, & primò de Vulnere meningis duræ saltem,	326
XXV.	De Fungis cerebri,	332
XXVI.	De Carie cranii,	333
XXVII.	De Tumoribus cerebri; & primò de Cerebri & meningum eius inflam- matione,	ibid.
XXVIII.	De Hydrocephalo.	338

## PARTIS II.

*De Symptomatibus, quæ in sensibus internis  
& cerebro accidunt,*

Cap. I.	De Vigilis nimis,	341
II.	De Somno p. n. ac Comate & Ca- taphora,	352
III.	De insomniis immoderatis,	354
IV.	De Vertigine,	356
V.	De Phantasia, Ratiocinatione, &	

Memoria imminuta atque abolita,  
365

VI.	De Delirio in genere, & de Delirio simplici, Paraphrenitide, ac Temu- lentiâ,	373
VII.	De Phrenitide,	378
VIII.	De Melancholia in genere,	382
IX.	De Prima Melancholiæ specie, quæ fit cerebro primario affecto.	386
X.	De Amore insano.	388
XI.	De Melancholia per consensum cor- dis & totius,	392
XII.	Melancholia hypochondriaca,	397
XIII.	De Melancholia ex vtero,	405
XIV.	De Melancholia errabunda, Arabi- bus Kutubuth dicta, & Attonita,	407
XV.	De Mania.	408
XVI.	De Rabie & hydrophobia,	415
XVII.	De Tarsatis & chorea S. Viti,	421
XVIII.	De Comate vigili, & sopore graui atque ecstático,	423
XIX.	Somnambulis,	425
XX.	De Lethargo,	427
XXI.	De Lassitudine,	433
XXII.	De Pandiculatione & oscitatione,	434
XXIII.	De Inquietudine,	435
XXIV.	De Horrore & rigore.	436
XXV.	De Tremore,	438
XXVI.	De Motus impotentia in genere,	445
XXVII.	De Paralyfi,	447
XXVIII.	De spasmo, seu conuulsione & con- uulsionis moribus,	461
XXIX.	Incubo,	469
XXX.	De Carochæ seu catalepsi,	473
XXXI.	De Epilepsia,	475
XXXII.	De Caro.	498
XXXIII.	De Apoplexia,	500
XXXIV.	De Catarrho, & cerebri excremen- tis retentis,	515

## PARTIS III.

### SECTIONIS PRIMÆ,

*De Tactu lesò,*

Cap. I.	De Stupore & torpore,	526
II.	De dolore in genere,	527
III.	De dolore capitis,	530

## PARTIS III.

### SECTIONIS SECUNDÆ,

*De Morbis & Symptomatibus Oculorum;*



Cap. I.	Continens nomenclaturam Affe- ctionum, quæ oculis accidunt,	534
II.	De	



# Index Caputum.

II.	De Tumore palpebrarum Emphysemate & inflammatione earundem, 535	XL.	tium vitiis, 575	575
III.	De Trachomate, Densitate, Asperitate, Callositate & Scabie palpebrarum, ibid.	XLI.	De Oculi defectu, 576	576
IV.	De Tuberculis, Nouis, & aliis palpebrarum tumoribus, 537	XLII.	De Oculi atrophia, ibid.	ibid.
V.	De Cancro palpebrarum, 538	XLIII.	De Strabismo, 577	577
VI.	De Palpebrarum Inuersione, & Contractione, 539	XLIV.	De Cœcitate & visus debilitate, 578	578
VII.	De Palpebrarum inter se & cum aliis oculorum partibus Coalitu & Cohærentia, 540	XLV.	De Visus deprauatione, 583	583
VIII.	De Pediculis palpebrarum & Ciliorum vitiis, ibid.	XLVI.	De Excretorum ab oculis vitiis, 586	586
IX.	De Palpebrarum Liuore, Contusione & Percussione, Vulneribus, & aliis à causis externis læsionibus, 542	<b>PARTIS III.</b> <b>SECTIONIS TERTIÆ,</b> <i>De Morbis &amp; Symptomatibus Aurium,</i>		
X.	De Symptomatibus, quæ in motu palpebrarum accidunt, 543	Cap. I.	De Intemperie aurium, 588	588
XI.	De Iis, quæ in oculos inciderunt, eximendis, ibid.	II.	De Aurium inflammatione, 590	590
XII.	De Ophthalmia, 544	III.	De Ulcere aurium, 591	591
XIII.	De Ophthalmia sicca, 551	IV.	De Vermibus & aliis quæ p. n. in auribus hærent, extrahendis, 593	593
XIV.	De Vngue oculi, ibid.	V.	De Vulnere aurium, ibid.	ibid.
XV.	De Tunicula annatz, quam vulgo Pannum, Arabes Sebel nominant. 553.	VI.	De Sonitu & tinnitu aurium, 594	594
XVI.	De Albugine & aliis vitiosis corneæ coloribus, 554	VII.	De Graui auditu & surditate, 597	597
XVII.	De Pustulis annatz & corneæ, 555	VIII.	De Aurium dolore, 600	600
XVIII.	De Vlceribus annatz & corneæ, 557	IX.	De Excrementis p. n. & fluxu aurium, 601	601
XIX.	De Cancro corneæ, 558	<b>PARTIS III.</b> <b>SECTIONIS QUARTÆ,</b> <i>De Morbis &amp; Symptomatibus Narium.</i>		
XX.	De Vulneribus oculorum, ibid.	Cap. I.	De Narium vlceribus & ozœnis, 602	602
XXI.	De ruptura corneæ, 559	II.	De Cancro narium, 604	604
XXII.	De Suggillatione oculorum, ibid.	III.	De Polypo & sarcomate, ibid.	ibid.
XXIII.	De Dolore oculorum, 560	IV.	De Angustia narium, 606	606
XXIV.	De Pure sub cornea, 561	V.	De Vulneribus narium, ibid.	ibid.
XXV.	De Vvæ procidentia, 562	VI.	De Læso olfactu, ibid.	ibid.
XXVI.	De Pupillæ dilatatione, ibid.	VII.	De Fœtore narium, 608	608
XXVII.	De Angustia pupillæ, 564	VIII.	De Hæmorrhagia narium, ibid.	ibid.
XXVIII.	De Suffusione, ibid.	IX.	De Sternutatione, 614	614
XXIX.	De Vitiis tunicæ araneæ, 568	X.	De Coryza, ibid.	ibid.
XXX.	De Ægilope & Fistulâ lachrymali, 569	<b>PARTIS III.</b> <b>SECTIONIS QUINTÆ,</b> <i>De Morbis &amp; Symptomatibus Lingue,</i>		
XXXI.	De Encanthide & carnis lacrymalis incremento, 571	Cap. I.	De Lingue asperitate & scabritie, 615	615
XXXII.	De Rhyade, seu carnis lachrymalis diminutione, vel absumptione, ibid.	I.	De Lingue magnitudine nimia, tumore, calculis, ibid.	ibid.
XXXIII.	De Pruritu carunculæ lacrymalis, ibid.	II.	De Lingue vulneribus, 616	616
XXXIV.	De Humoris aquei vitiis, 572	III.	De Ranula sub lingua, ibid.	ibid.
XXXV.	De Humoris crySTALLINI vitiis, ibid.	IV.	De Lingue adstrictione, 617	617
XXXVI.	De Morbis humoris vitrei, 573	V.	De Læso gustatu, ibid.	ibid.
XXXVII.	De Neruorum Opticorum vitiis, ib.	VI.	De Lingue motu læso, 618	618
XXXVIII.	De Spirituum opticorum vitiis, ib.	VII.		
XXXIX.	De Musculorum, oculos mouen-	<b>INDEX</b>		

# INDEX QVÆSTIONVM.

- I.  N in intemperie capitis purgandum? p. 262
- II.  Quot sint signa intemperiei capitis calidæ? 266
- III. An in calida intemperie capitis calida extra applicare liceat? ibid.
- IV. An detur intemperies humida sine materia? 272
- V. An pilulæ commodius, quàm aliæ formæ medicamentorum, ad caput euacuandum vsurpentur? 276
- VI. Quo tempore pilulæ ad caput purgandum sint vsurpandæ? 277
- VII. Cui loco ad caput euacuandum cauteria applicanda sint? ibid.
- VIII. An cerebro consensu partis affecto, dolor & molestia in dextra capitis parte; Lienis in sinistra; Vteri in vertice & syncipite percipiatur? 280
- IX. An coriandrum ad suppressendos vapores è ventriculo adscendentes sit vsurpandum? 283
- X. Quænam vena in capitis affectibus aperienda? 285
- XI. Quæ vena primò aperienda in affectibus capitis à mensium vel hæmorrhoidum suppressione ortis? ibid.
- XII. An arteriæ in affectibus capitis à sanguine secandæ sint? 286
- XIII. An venas narium scalpello, vel hirudinibus aperire liceat? ibid.
- XIV. Cui loco cucurbitulæ reuulsionis gratiæ sint applicandæ? ibid.
- XV. An in intemperie cum humore bilioso etiam locum habeant discutientia & resoluentia? 289
- XVI. An acetum sinapis admiscendum? 295
- XVII. An odorata in intemperie capitis cum pituita conueniant? 295
- XVIII. An acetum melancholicis utile sit? 299
- XIX. An futurarum in capite defectus ad valetudinem conducant? 305
- XX. An cerebri vulnera omnia sint lethalia? 327
- XXI. An opus sit in nostris regionibus tam accuratâ ratione in cranij fracturis? 328
- XXII. An vulnera capitis per agglutinationem seu futuram; an vero per carnis generationem sananda sint? 329
- XXIII. Quo in loco contrassura fiat? 329
- XXIV. An cranium fissum statim & semper radendum sit? 330
- XXV. An duræ meningi denudatæ siccantia,

- an vero humectantia medicamenta medicamenta imponenda sint? 330
- XXVI. An cranio fracto, cute verò integrâ manente, cutis secanda sit? 331
- XXVII. An in cranij fracturâ, etiam internam laminam penetrante, semper cranium aperiendum sit? 332
- XXVIII. An cerebrum inflammari possit? 334
- XXIX. An electiue purgantia in inflammatione cerebri aut membranarum eius conueniant? 336. 338
- XXX. An repellentia in inflammatione cerebri & eius membranarum tepida vel frigida sint adhibenda? 337
- XXXI. An vertici cucurbitulæ affigendæ in cerebri tumoribus? 337
- XXXII. An vini potus in inflammatione cerebri & membranarum eius conueniat? 338
- XXXIII. Quâ vi *ὑπνῶτικὰ* & *ναρκοτικά* somnum concilient? 350
- Quomodo opium præparandum & corrigendum? 351
- XXXIV. Quænam comatis & cataphoræ causa sit? 354
- XXXV. An in vertigine vena secanda? 359 & seq.
- XXXVI. An vomitus in vertigine per consensum à ventriculo conueniat? 363
- XXXVII. An vertiginis, quæ dantur, differentia sint saltem secundum gradus, an vero secundum speciem. 364
- XXXVIII. An intemperies, vel humor sine vapore vertiginem inducere possit? 364
- XXXIX. An repellentia locum habeant in vertigine per consensum partium inferiorum? 365
- XL. Quâ ratione prospectus ab alto & in profundum vertiginem excitet? ibid.
- XLI. Quomodo, & quibus instrumentis actiones animales principes in sanis perficiantur? ibid. & seq.
- XLII. Quid sit Maslach Turcarum? 377
- XLIII. An læsâ phantasiâ ratio salua permanere possit? 379
- XLIV. An in omni phrenitide vena secanda sit? 380
- XLV. An in luce vel tenebris detinendi sint phrenetici? 381
- XLVI. An cerebrum, an vero membranae eius in phrenitide inflammentur? ibid.
- XLVII. An omnis inflammatio membranarum cerebri delirium afferat? ibid.



# Index Quæstionum.

- XLVIII. An Phrenitis fiat solum à membranarum cerebri, an verò etiam ab ipsius cerebri substantiæ inflammatione? 381
- XLIX. An philtrea amorem inducere possint? 390
- L. An Antimonium in curatione Melancholiæ per consensum cordis & totius locum habeat? 396
- LI. An Diuretica in melancholia hypochondriaca conueniant? 401
- LII. Qui fiat, quod maniaci & Melancholici interdum peregrinis linguis loquuntur, & futura prædicunt? 414
- LIII. Qui fiat, quod maniaci cum tot diætarum erroribus tam diu vivant? 415
- LIV. An & alia, præter canes, animalia in rabiem agantur? ibid.
- LV. Cur canis præ reliquis animalibus sæpius in rabiem agatur? 416
- LVI. An venenum Hydrophobiam inducens in corpore humano generari possit? 416
- LVII. Cur rabidi aquam abhorreant? 417
- LVIII. An pars demorsa à cane rabido statim amputanda? 418
- LIX. An balneum & aquæ potus in Hydrophobia conueniant? 420
- LX. Quâ vi venenum animalium rabidorum agat? ibid.
- LXI. An venæsectio in Hydrophobia conueniat? ibid.
- LXII. An Purgantia in Hydrophobia conueniant? 421
- LXIII. An coma & catochus sint iidem affectus? 425
- XLIV. Cur non omnes homines, non singulis noctibus, instar Somnambulatorum in somno ambulent? 426
- LXV. Cur somnambuli ea agant, quæ vigilantes non possunt? 427
- LXVI. Suffitus in Lethargicis ad excitandum ex somno an conueniat? 431
- LXVII. An tremoris vox quandoque etiam pro Rigore accipiatur? 443
- LXVIII. An proxima tremoris causa sit vna, facultatis morticis imbecillitas? ibid.
- LXIX. An tremor ab errore externo quoque provenire possit? 444
- LXX. Quomodo Hydrargyrum tremoris causa sit? ibid.
- LXXI. Qui fiat, ut post Apoplexiam alterum tantum latus resoluatur, altero manente incolumi? 449
- LXXII. An in paralyfi febrem accendere liceat? 458
- LXXIII. An Galenus & Auicennas de causis paralyfis consentiant, & an frigus saltem densando nervos paralyfin inducat? 459
- LXXIV. Qui humores paralyfis causa esse possint? 460
- LXXV. An in nervos humor sese insinuare possit? ibid.
- LXXVI. An sudorifera in paralyfi sint exhibenda? 461
- LXXVII. In spasmo quæ causa musculos contrahat? 463
- LXXVIII. Cur in spasmo pars contracta immobilis maneat; in convulsio verò motu variè agitetur? ibid.
- LXXIX. An convulsi aquâ frigida perfundendi? 467
- LXXX. Quæ sit proxima convulsionis causa? 469
- LXXXI. An febris pro spasmo curando excitanda sit? ibid.
- LXXXII. An spiritus illi, qui sensui & motui inferuiunt; an verò qui sensibus internis; an verò omnes spiritus animales in catalepsi congelentur? 473
- LXXXIII. An solus homo epilepsiæ laboret? 492
- LXXXIV. Quodnam sit subiectum epilepsiæ? ibid.
- LXXXV. Quænam sit epilepsiæ causa proxima? ibid.
- LXXXVI. Quomodo cerebrum in epilepsiâ afficiatur, & quâ de causa omnes sensuum actiones aboleantur? 494
- LXXXVII. An motus convulsivus in epilepsiâ fiat à facultate animali; an verò naturali? ibid.
- LXXXVIII. An sanguis in paroxysmo epilepsiæ sit mittendus? 495
- LXXXIX. An extra paroxysmum sanguis sit mittendus in epilepsiâ? ibid.
- XC. Quænam vena in epilepsiâ sit aperienda? ibid.
- XC I. An vomitus in epilepsiâ conueniat? ibid.
- XC II. An frictiones in paroxysmo epileptico vsus habeant? 496
- XC III. An in paroxysmo epileptico sternutationem ciere liceat? ibid.
- XC IV. An Apium epilepticis sit noxium? ibid.
- XC V. An Cranij humani aliquis in epilepsiâ vsus sit? ibid.
- XC VI. Vtrum amuleta prosint in epilepsiâ. 497
- XC VII. An vsus sanguinis humani conueniat in epilepsiâ? ibid.
- XC VIII. An à solâ intemperie cerebri possit apoplexia generari? 510
- XC IX. An Apoplexia sit morbus hæreditarius? ibid.
- C. An à consumptione spirituum animalium

# Index Quæstionum.

- malium omnimodâ fieri possit? ib.  
 CI. Quæ sit causa apoplexiæ proxima? 511  
 CII. An spiritus animalis & vitalis different essentia. ibid.  
 CIII. In apoplexiâ cur principio nervorum affecto interni sensus lædantur? 512  
 CIV. An à vapore narcotico fiat apoplexia? 513  
 CV. Cur in senibus apoplexiâ in paralyfin mutatâ nihilominus permaneant torpidi sensus interni? ibid.  
 CVI. Apoplexia an à spiritu Vitriolato coagulante producat? ibid.  
 CVII. Apoplexiam an vapores solâ commotione humorum 'excrementitiorum in capite collectorum excitent? ibid.  
 CVIII. Apoplexiâ pueri cur raro corripiantur? ibid.  
 CIX. An aquæ apoplecticæ statim in principio conueniant? ibid.  
 CX. An purgantia sint exhibenda in apoplexiâ? ibid.  
 CXI. An Vomitoria in paroxysmo apoplectico sint exhibenda? ibid.  
 CXII. An repellentia in apoplexiâ conueniant? ibid.  
 CXIII. An Cerota & emplastra è fimo columbino & thapsiâ in catarrho calido conueniant? 525  
 CXIV. Quænam forma decubitus & situs capitis in catarrho esse debeat? 528  
 CXV. An omnis intemperies dolorem inducat? ibid.  
 CXVI. An vini potus vini noxam pellat? 533  
 CXVII. Ophthalmia an à solo sanguine fiat? 544  
 CXVIII. Oculis an semper medicamenta actu frigida apponenda, ut vult Mesue? 546  
 CXIX. Errhina an in ophthalmiâ conueniant? 547  
 CXX. Quo tempore topica in ophthalmiâ applicanda? 549  
 CXXI. An vinum in ophthalmiâ conueniat? 550  
 CXXII. An balneum in ophthalmiâ vtile sit? ibid.  
 CXXIII. An visus ictericis deprauetur? 555  
 CXXIV. An siccitas sit causa dilatationis pupillæ? 563  
 CXXV. Visus quomodo lædatur in angustia pupillæ? 564  
 CXXVI. Crystallinus humor an tenuior fieri possit? 572  
 CXXVII. Crystallinus humor an maior vel minor fieri possit? 573  
 CXXVIII. An vitreus humor, à naturali constitutione deflectens, possit immediatè visionem lædere, an verò saltem quia nocet crystallino? ibid.  
 CXXIX. An nimia spirituum opticorum agitatio differat à vertigine? 574  
 CXXX. An spirituum opticorum vitia perspicillorum usu corrigi possint? ibid.  
 CXXXI. Quomodo visio lædatur vitio spirituum opticorum? 579  
 CXXXII. Siccitas nervorum opticorum an possit esse causa læsæ visionis? ibid.  
 CXXXIII. Cur quidam in tenebris videant? 580  
 CXXXIV. Qua ratione lumen vix in hærens ad visionem nocturnam concurrat? ibid.  
 CXXXV. Topica an visum confortent? 581  
 CXXXVI. Coniunctionis nervorum opticorum quæ sit causa? 583  
 CXXXVII. Cur vapores & humores intra oculum videantur? 586  
 CXXXVIII. An ex intemperie nuda calida, à causâ externa aures affici possint? 590  
 CXXXIX. An sensus acumen sit causa tinnitus aurium? 594  
 CXL. Debilitas auditus an sit causa tinnitus? ibid.  
 CXLI. Cur manu cauâ auri admotâ sonus percipiatur? 595  
 CXLII. An sola intemperies calida sit causa doloris aurium? 600



# Index Caputum.



## Libri II. Partis I.

*De Oris ac Faucium & partium in his Contentarum aegritudinibus,*

Cap. I.	DE Labiorum Tumoribus.	622
II.	De labiorum Fissuris.	623
III.	De labiorum Ulceribus.	624
IV.	De labiis Vulneratis, Leporinis, & Curtis.	625
V.	De Tremore & peruerfione labiorum, Sanguinis fluxu ex iis, & labiis Liuidis	ibid.
VI.	De Oris Apertione læsa.	626
VII.	De Oscitatione.	ibid.
VIII.	De oris Distortione.	627
IX.	De Pryalifmo seu crebra Sputatione & Salivæ defectu.	629
X.	De Dentium Morbis.	630
XI.	De dentium Dolore.	631
XII.	De dentium Stupore & Algore.	638
XIII.	De dentium Stridore.	639
XIV.	De dentibus Nigris, malè Coloratis & Sordidis, vt & de Sanguinis è dentibus fluxu.	ibid.
XV.	De dente Aureo pueri Silefii.	640
XVI.	De Gingivarum Affectionibus.	ibid.
XVII.	De Morbis & Symptomatibus Maxillarum.	643
XIIX.	De Oris vitiis & primò de eius Inflammationibus & ulceribus.	644
XIX.	De Fœtore oris.	648
XX.	De Gurgulionis Laxatione.	ibid.
XXI.	De gurgulionis Inflammatione & Exulceratione.	650
XXII.	De tonsillarum inflammatione & ulceribus.	652
XXIII.	De iis, quæ in Guttur vel Gulam inciderunt, eximendis.	654
XXIV.	De Angina.	655
XXV.	De Strumis in Collo, & Bronchocele ac hydrope Gutturis.	668

### PARTIS II.

*De Asperæ arteriæ, pulmonis, mediastini, diaphragmatis, thoracis præter naturam affectionibus,*

Cap. I.	DE Asperæ arteriæ morbis.	p. 672
II.	De Pulmonis Intemperie.	674
III.	De pulmonis Inflammatione siue Peripneumonia.	676
IV.	De Vasorum pulmonis & primò de asperarum arteriarum Angustia.	681
V.	De Lævium pulmonis arteriarum angustia.	684

VI.	De Apertione vasorum pulmonis.	685
VII.	De Grandine, Calculo & Vermibus in pulmone genitis.	689
VIII.	De Tuberculis pulmonis.	690
IX.	De Hydrope & Hydatidibus pulmonis.	691
X.	De pulmonum cum latere Coalitu.	692
XI.	De pulmonis Vulneribus.	ibid.
XII.	De Ulceribus pulmonum & phthisi.	694
XIII.	De Mediastini Inflammatione.	701
XIV.	De Diaphragmatis tumoribus.	702
XV.	De Vulneribus diaphragmatis.	703
XVI.	De Pleuritide, seu inflammatione pleuræ & Musculorum thoracis.	ibid.
XVII.	De Thoracis Vulneribus.	721
XIIX.	De Fistulis thoracis.	722
XIX.	De Empyemate.	723
XX.	De hydrope Pectoris.	726
XXI.	De Vertebrarum dorsii luxatione & Gibbositate.	728
XXII.	De Fractura Spinæ & Vulneribus.	730
XXIII.	De Tabe dorsali.	ibid.
XXIV.	De Vermibus dorsii.	731
XXV.	De Luxatione & Fractura Costarum.	732
XXVI.	De Mucronatæ Cartilaginis Prolapfu.	733

### PARTIS III.

*De Symptomatibus, quæ Pulmonibus & Thoraci accidunt,*

Cap. I.	DE Respiratione læsa in genere.	736
II.	De Asthemate & Orthopnoea.	738
III.	De Suffocatione, seu Strangulatione.	747
IV.	De Vitiis Vocis & Sermonis.	748
V.	De Tussi.	751
VI.	De Dolore Pectoris.	757
VII.	De Sputo Sanguinis.	759

### PARTIS IX.

*De Morbis ac Symptomatibus cordis,*

Cap. I.	DE Morbis Pericardij.	762
II.	De Cordis Intemperiebus.	763
III.	De reliquis cordis morbis.	765
IV.	De cordis Palpitatione.	766
V.	De Virium Imbecillitate.	770
VI.	De Lipothymia & Syncope.	772

# Index Quæstionum.

## INDEX QVÆSTIONVM.

- I. **A**N salua conglutinationem vul-  
nerum labiorum remoretur.  
pag. 625
- II. An tortura oris & spasmus cynicus  
differant. 627
- III. An spasmus cynicus sit morbus vel  
symptoma. 629
- IV. An cera dentibus cariosis commodè  
indatur. 631
- V. An cauteria tuto in dentibus cario-  
sis adhibenda. ibid.
- VI. An dens lupi gestatus in dentitione  
puerorum aliquid præster. 638
- VII. An in tonsillarum inflammatione re-  
pellentia solū intus applicada. 653
- VIII. An angina à cibis & medicamentis pe-  
culiari vi agentibus induci possit. 656
- IX. An cacochymia primam occasio-  
nem præbeat anginæ. 661
- X. An in angina rectè à Chymicis vo-  
mitoria & antimonialia exhibean-  
tur. ibid.
- XI. An pilulæ in angina exhibendæ cō-  
modè dissoluantur. ibid.
- XII. Quā formā repellentia in angina ex-  
hibenda. ibid.
- XIII. An omnis angina sit ab inflamma-  
tione. 666
- XIV. An humor anginam excitans à ce-  
rebro & capite defluere possit. 667
- XV. An vera angina sit, quæ ab esu fun-  
gorum & similibus venenatis rebus  
oriri dicitur. ibid.
- XVI. An nidus hirundinis aliquem in an-  
gina curanda vsum habeat. ibid.
- XVII. An laryngotomia tuto & utilis sit. 668
- XVIII. An bronchocele & strumâ in guttu-  
re sit idem morbus. ibid.
- XIX. An strumæ & scrophulæ differât. 669
- XX. An strumæ à Mercurio seu aquis ex  
montibus metallorum feracibus  
scaturientibus & Mercurium in se  
continentibus oriantur. 669
- XXI. An vlcera asperæ arteriæ sint sana-  
bilia. 674
- XXII. An in perineumonia hæmorrhagia  
narium utilis sit? 680
- XXIII. An dulcia in peripneumonia con-  
ueniant. 681
- XXIV. Quænam sit causa hydropis, quæ le-  
uium arteriarum obstructione la-  
borantibus superuenire solet. 685
- XXV. Medicamenta grumos sanguinis in  
thorace dissoluentia quo tempore  
sint exhibenda. 687
- XXVI. Qualis aer in apertione vasorū pul-  
monis ab aëre frigido cōueniat. 689
- XXVII. An vlcera pulmonis sint sanabilia. 700
- XXVIII. An in phthisi cochleæ utiles sint. 701
- XXIX. Quæ pars afficiatur in pleuritide. 703
- XXX. An bilis, pituita vel melancholia sola  
pleuritidinē generet. 704
- XXXI. Quales febres sint pleuriticorū. ib.
- XXXII. Quæ vena in pleuritide & quo in la-  
tere aperienda. 709
- XXXIII. An in pleuritide ex vna vena aperta  
simul reuulsio & deriuatio fieri  
possit. ibid.
- XXXIV. Mulieribus mensium suppressione  
laborantibus quænam sit vena se-  
canda in pleuritide. 710
- XXXV. Quando secanda sit vena in pleuri-  
tide. ibid.
- XXXVI. Quantum sanguinis sit mittendū. ib.
- XXXVII. An in omni pleuritide detur inflam-  
matio pleuræ. 714
- XXXVIII. An in pleuritide sola pleura, an verò  
simul pulmo inflammetur. ibid.
- XXXIX. Per quas vias materia in pleuritide ad  
asperam arteriam perueniat, & in-  
de tussi eiiciatur. 715
- XL. Quæ vena in pleuritidis initio ape-  
rienda sit. ibid.
- XLI. Per quas vias è thorace materia ad  
aluum & vesicam peruenire, &  
hinc euacuari possit. 720
- XLII. Qualisnam sit febris, quæ empyema-  
ti coniungitur. 725
- XLIII. Quo in loco sectio thoracis empyi-  
cis instituenda sit. 726
- XLIV. An humor asthmatis causa hæreat  
etiam quandoque extra bronchia  
pulmonum. 744
- XLV. An asthmata frequentius à cathar-  
rho, an verò ab humore crudo è ve-  
nis in pulmones effuso excitetur. ib.
- XLVI. An asthma semper sit sine febre. 745
- XLVII. An purgantia in paroxysmo ad-  
stmatico conueniant. ibid.
- XLVIII. An ius galli decrepiti asthmaticis  
conueniat. ibid.
- XLIX. An arsenicū suffumigiis in asthmati-  
cis curandis rectè admisceatur. 746
- L. An victus attenuans simulque tenuis  
asthmaticis conueniat. ibid.
- LI. An tussis sit solū ab angustia tra-  
chæ arteriæ. 756
- LII. An aliquid in pulmonem ex ore de-  
labatur. 757
- LIII. An in sputo cruento sanguis semper  
è brachio, an verò etiam è talo &  
cruribus, præcipuè in foeminis,  
mittendus sit. 761
- LIV. An Lunatica passio dicta puerorum  
& infantium ex vermibus in peri-  
cardio ortis accidat. 762



# Index Caputum.

## Libri III. Partis I.

### SECTIONIS PRIMÆ,

#### *De Morbis Oesophagi & Ventriculi,*

Cap.I.	DE morbis Oesophagi.	780
II.	De læsa Deglutione.	784
III.	De rebus alienis deglutitis.	785
IV.	De intemperie ventriculi in genere.	786
V.	De frigida intemperie ventriculi.	787
VI.	De calida intemperie ventriculi.	790
VII.	De humida intemperie ventriculi.	791
VIII.	De sicca intemperie ventriculi	792
IX.	De intemperiebus ventriculi com- sipotis.	793
X.	De intemperiebus ventriculi cum materia.	794
XI.	De inflatione ventriculi.	796
XII.	De inflammatione ventriculi.	797
XIII.	De tumoribus ventriculi frigidis.	800
XIV.	De extenuatione, angustia, adstri- ctione, & situ mutato ventriculi.	801
XV.	De rebus præter naturam variis in ventriculo repertis.	ibid.
XVI.	De vulneribus ventriculi.	803
XVII.	De vlceribus ventriculi.	804

### SECTIONIS SECUNDÆ,

#### *De Symptomatibus Ventriculi,*

Cap.I.	DE anorexia & appetitu ventriculi deiecto.	805
II.	De longa à cibo & potu abstinencia.	809
III.	De certorum ciborum fastidio.	817
IV.	De Ingenti fame, canina appetentia & bulimo.	818
V.	De pica & appetitu vicioso.	821
VI.	De potus appetitu læso, & primò de siti deficiente.	824
VII.	De siti nimia.	825
VIII.	De symptomatibus quæ in retentio- ne cibi & potus accidunt.	827
IX.	De chylosi seu coctione ventriculi læsa, & imbecillitate ventriculi.	828
X.	De singultu.	831
XI.	De ructatione.	836
XII.	De nausea & vomitu.	ibid.
XIII.	De cholera & primò de cholera hu- midâ.	841

XIV.	De cholera sicca.	844
XV.	De dolore & anxietate ventriculi.	845
XVI.	De ardore stomachi & ventriculi resolutione ac stupore.	849
XVII.	De excretis p. n. è ventriculo, & eius qualitatibus mutatis.	850

### PARTIS II.

### SECTIONIS PRIMÆ,

#### *De Morbis Intestinorum,*

Cap.I.	DE intemperie intestinorum & pri- mò de frigidâ.	851
II.	De inflammatione intestinorum.	853
III.	De angustia intestinorum.	854
IV.	De Læuitate intestinorum & ma- gnitudine aucta.	856
V.	De rebus p. n. in intestinis repertis.	ibid.
VI.	De situ intestinorum mutato, & de hernia.	863
VII.	De ani procidentia.	867
VIII.	De vulneribus intestinorum.	868
IX.	De vlceribus & sphacelo intestino- rum.	869
X.	De morbis Intestini recti in specie.	ibid.

### SECTIONIS SECUNDÆ,

#### *De Symptomatibus quæ Intestinis accidunt,*

Cap.I.	DE intestinorum actione læsa, & præcipuè de motu intestinorum inuerso & ileo.	873
II.	De dolore colico.	876
III.	De dolore iliaco.	887
IV.	De alui retentione.	ibid.
V.	De alui fluxibus.	889
VI.	De diarrhœa.	894
VII.	De dysenteria.	902
VIII.	De fluxu alui sanguineo & hepa- tico.	930
IX.	De fecum alui per aliena loca ex- cretionem.	933
X.	De rebus variis, alienis & monstro- sis per aluum excretis, & ventris murmure.	ibid.
XI.	De ani paralyfi, stupore & dolore.	935
XII.	De tenesmo.	ibid.
XIII.	De Hæmorrhoidibus.	937

# Index Caputum.

## P A R T I S   I I I .

*De Morbis Mesenterij, Pancreatis & omentis,*

- Cap. I. **D**E Mesenterio & vasis mesaraicis  
venisque lacteis. pag. 942
- II. De intemperie mesenterij. 944
- III. De mesenterij vasorum angustia &  
obstructionibus. 945
- IV. De mesenterij inflammatione. 946
- V. De mesenterij aliis tumoribus, abs-  
cessibus, suppuratione & corru-  
ptione. 947
- VI. De symptomatibus ex humoribus  
in mesenterio cumulatis ortis &  
præcipuè dolore. 949
- VII. De morbis pancreatis. 950
- VIII. De morbis omenti, 951

## P A R T I S   I V .

*De Lienis præter naturam affectibus,*

- Cap. I. **D**E vfulienis & natura humoris me-  
lancholici. 952
- II. De intemperie lienis. 953
- III. De lienis morbis organicis, & præ-  
cipuè obstructione. 956
- IV. De lienis magnitudine vitiosa & in-  
flatione. 958
- V. De lienis inflammatione. ibid.
- VI. De scirrho & duris lienis tumoribus.  
960
- VII. De lienis vulneribus. 963
- VIII. De lienis vlceribus. ibid.
- IX. De actione lienis propria læsa. 964
- X. De lienis doloribus. ibid.
- XI. De ictero nigro. 965

## P A R T I S   V .

SECTIONIS PRIMÆ,

*De Hypochondriaca affectione,*

- Cap. I. **D**E natura affectionis hypochon-  
driacæ. 966
- II. De loco affecto. 967
- III. De causis affectionis hypochon-  
driacæ. 968
- IV. De signis & symptomatibus affe-  
ctionis hypochondriacæ. 972
- V. De prognosticis. 975
- VI. De indicationibus & curatione. ibid.
- VII. De diætâ. 980

SECTIONIS SECUNDÆ,

*De Scorbuto,*

- Cap. I. **D**E scorbuti nominibus & natura.  
982
- II. De subiecto & causa scorbuti. 984
- III. De causis scorbuti remotis, proæ-

- tarcticis & externis. 992
- IV. De signis scorbuti ac morbis & sym-  
ptomatibus quæ scorbutum comi-  
tantur. 995
- V. De prognosticis scorbuti. 1009
- VI. De curatione scorbuti in genere.  
1010
- VII. De curatione affectuum scorbutico-  
rum. 1018
- VIII. De diætâ. 1024
- IX. De præseruatione. 1025

## P A R T I S   V I .

SECTIONIS PRIMÆ,

*De Morbis Epatis.*

- Cap. I. **D**E intemperie epatis. 1026
- II. De obstructione epatis. 1030
- III. De inflatione epatis. 1033
- IV. De inflammatione epatis. 1034
- V. De scirrho aliisque tumoribus epa-  
tis. 1038
- VI. De calculis, vermibus & hydatidi-  
bus in epate natis. 1040
- VII. De vulneribus epatis. ibid.
- VIII. De vlceribus & sphacelo epatis.  
1042
- IX. De vesicæ fellis morbis. 1044

SECTIONIS SECUNDÆ,

*De Symptomatibus quæ Epati accidunt,*

- Cap. I. **D**E sanguinificatione læsa in genere  
& epatis imbecillitate. 1044
- II. De cachexia. 1046
- III. De hydrope ascite. 1048
- IV. De tympanite. 1069
- V. De anasarca. 1072
- VI. De dolore epatis. 1074
- VII. De ictero. ibid.

## P A R T I S   V I I .

SECTIONIS PRIMÆ,

*De Renum & ureterum Morbis,*

- Cap. I. **D**E renum vsu. 1078
- II. De intemperie renum. 1079
- III. De numero renum mutato, aliis-  
quibusdam eorum morbis. 1080
- IV. De vasorum in renibus angustia. ib.
- V. De apertione vasorum in renibus.  
1081
- VI. De calculo renum. ibid.
- VII. De rebus p.n. in renib. genitis. 1088
- VIII. De renum inflammatione. 1089
- IX. De renum tumoribus reliquis &  
eorum



# Index Capitum.

	eorundem tabe.	1090
X.	De vulneribus renum.	1091
XI.	De vlceribus renum.	ibid.
XII.	De vreterum morbis.	1092

## SECTIONIS SECVNDÆ, *De Symptomatibus Renum,*

Cap.I.	DE rerum imbecillitate & feri secretionis læsa.	1093
II.	De diabete.	1094
III.	De dolore nephritico.	1096

## PARTIS IX. SECTIONIS PRIMÆ, *De Vesicæ Morbis,*

Cap.I.	DE intemperie & angustia vesicæ & numero mutato.	pag. 1098
II.	De Calculo vesicæ.	ibid.
III.	De vermibus & aliis p. n. in vesica natis.	1101
IV.	De distensione & inflammatione vesicæ ac situ eiusdē mutato.	ibid.
V.	De vesicæ vulneribus.	1103
VI.	De vesicæ scabie & vlceribus.	ibid.
VII.	De sphincteris vesicæ refrigeratione & duplici meatu vrinario.	1105
VIII.	De meatu vrinarii angustia.	1106
IX.	De caruncula, callo, verrucis & vlceribus meatu vrinarii.	ibid.

## SECTIONIS SECVNDÆ, *De Symptomatibus Vesicæ,*

Cap.I.	DE dolore vesicæ, stupore & resolutione sphincteris vesicæ.	1108
II.	De vrinæ suppressione.	ibid.
III.	De diminuta vrinæ excretionem.	1110
IV.	De stranguria.	ibid.
V.	De dysuria & vrinæ ardore.	1112
VI.	De mictione inuoluntaria & vrinæ incontinentia.	1114
VII.	De vrina rubra, cruēta & nigra.	1115
VIII.	De rebus alienis per vesicam excretionis.	1117
IX.	De vrinæ per aliena loca excretionem.	1118

## PARTIS IX. SECTIONIS PRIMÆ, *De Morbis partium genitalium in viris,*

Cap.I.	DE intemperie testium.	pag. 1119
II.	De testium numero vitioso & calculis in iis repertis.	1120
III.	De testium magnitudine vitiosa, & inflammatione & tumoribus aliis.	ibid.

IV.	De situ testium mutato.	1121
V.	De vulneribus, vlceribus, cancro & gangrænâ testium.	1122
VI.	De scroti morbis.	ibid.
VII.	De hernia & scroti tumoribus.	1123
VIII.	De penis morbis.	1127
IX.	De tuberculis & verrucis penis.	1128
X.	De glande imperforata.	1129
XI.	De vulneribus, vlceribus, fistulis & gangrænâ penis.	ibid.
XII.	De præputii morbis.	1130
XIII.	De hermaphroditis & sexus mutatione.	1132

## SECTIONIS SECVNDÆ, *De Symptomatibus, quæ genitalibus & circa generationem in viris accidunt.*

Cap.I.	DE læsa generatione, seu sterilitate in viris.	1133
II.	De læsa penis erectione & seminis eiactatione.	1137
III.	De salacitate, satyriasi & priapismo.	1139
IV.	De gonorrhæa & seminis profluvio.	1140
V.	De pollutione nocturna.	1143
VI.	De symptomatibus quibusdam in coitu & seminis emissionem accidentibus.	1144
VII.	De rebus alienis per penem excretionis.	1145
VIII.	De testium & penis dolore ac scroti & præputij pruritu.	ibid.

## PARTIS X. & vltimæ, *De Umbilici & Abdominis p. n. Affectionibus,*

Cap.I.	DE umbilici apertione, & per eum variarū rerū excretionem.	p. 1146
II.	De hernia umbilicali.	1147
III.	De umbilici inflammatione, abscessu & vlcere.	1049
IV.	De vermibus & lapidibus in umbilico genitis.	1150
V.	De vulneribus umbilici & vasorum eius abruptione.	ibid.
VI.	De peritonæi morbis.	1151
VII.	De musculorum abdominis inflammatione & abscessibus.	ibid.
VIII.	De spasmo abdominis.	1153
IX.	De abdominis tumoribus.	ibid.
X.	De abdominis vulneribus.	1154
IX.	De fistulis & vitionibus abdominis.	1155

# Index Quæstionum.

## Index Quæstionum. Partis I.

- Q. I. **A**N deglutitio faucium musculis, non  
verò propriis fibris peragatur? 784
- I. I. Qui fiat, quod solida faciliè, liquida ve-  
rò difficulter, & sine, suffocationis me-  
tu dirigantur? 786
- I. I. I. An ea, quæ Hippoc. lib. I. prognost. aph.  
37. 40. & 41. habet, de tumoribus ven-  
triculi, an potius de tumoribus ventris  
sint explicanda? 798
- I. V. Per quas vias acus deglutitæ è corpore  
reddantur? 802
- V. An vulnera ventriculi sint lethalia? 803
- V. I. An inappetentia tam intemperie calidâ,  
quàm frigida fieri possit? 807
- V. I. I. An in reddendis longæ abstinentiæ caus-  
sis statim ad miraculum vel Angelos  
bonos confugiendum sit? 811
- VIII. An corpora illa, quæ longâ abstinentiâ  
laborârunt, reuerâ fuerint viuétia? 812
- I. X. An corpora etiam hæc à Dæmone fue-  
rint obfessa? ibid.
- X. An peculiare cœli influxus longæ absti-  
nentiæ causa sint? ibid.
- X. I. An occultæ qualitates abstinentiæ huius  
causa sint? ibid.
- X. I. I. An consuetudo huius abstinentiæ caus-  
sa esse possit? ibid.
- X. I. I. I. Qua ratione homo venenis assuescat? ib.
- X. IV. An illi, qui diu abstinuerunt, aëre nu-  
triti fuerint? ibid.
- X. V. An solo aëre alatur chameleon, & ma-  
nucodiata? ibid.
- X. V. I. An exhalationibus illi, qui abstinue-  
runt, nutriti fuerint? ibid.
- X. V. I. I. An vita simplicis aquæ potu produci  
possit? 814
- X. I. X. An abstinentes vitam terrâ clam ingestâ  
sustentârunt? ibid.
- X. I. X. I. An pituita in corpore redundans absti-  
nentiæ longæ causa sit? ibid.
- X. X. An colliquamenta quædam partium in-  
ternarum abstinentiæ huius causa  
sint? ibid.
- X. X. I. An humor melancholicus huius sym-  
ptomatis causa sit? 815
- X. X. I. I. An in homine nutriendi functio aliquâ-  
diu cessare possit? ibid.
- X. X. I. I. I. Cur alimenta necessaria sint? ibid.
- X. X. I. V. Cur in nonnullis corporibus nihil dif-  
cutiatur aut absumatur? 816
- X. X. V. Qua ratione humidum radicale ita dis-  
poni possit, vt nihil vel parum de eo  
absumatur? ibid.
- X. X. V. I. Quomodo indi Nicotianâ famem & si-  
tim solentur? 817
- X. X. V. I. I. Quomodo frigus bulimum excitet? 820
- X. X. V. I. I. I. An humor melancholicus & acidus,  
qui appetitum mexcitât, in ventriculo  
naturaliter contineatur? 821
- X. X. I. X. An pica à causa venenata oriatur? 823
- X. X. X. An cibi prauis & alienis à naturâ hominis,  
qui auidè ab ægris eiusmodi appetun-  
tur, sint concedendi? ibid.
- X. X. X. I. An in picâ humori prauo contraria, an  
verò similia appetantur? 824
- X. X. X. I. I. An chylicatio fiat à calore? 831
- X. X. X. I. I. I. An calor vicinarum partium etiam ali-  
quid ad coctionem faciat? ibid.
- X. X. X. I. V. An singultus ad depravatâ respira-  
tionem sit referendus. ibid.
- X. X. X. V. Vnde humorum copia in cholera pro-  
ueniat? 842
- X. X. X. V. I. An clysteres saltem ex intestinis eua-  
cuent? 852
- X. X. X. V. I. I. An dentur lumbrici cucurbitini? 557
- X. X. X. I. X. An duleia ad generandos vermes fa-  
ciant? 859
- X. X. X. I. X. I. An lumbrici geniti alios rursus gene-  
rent? ibid.
- X. L. An lumbrici intestina & ventriculum  
perforare possint? ibid.
- X. L. I. An argentum viuum ad enecandos lu-  
mbricos exhibendum? 861
- X. L. I. I. An causa motus inuersi in tenuibus in-  
testinis consistat? 874
- X. L. I. I. I. An in ilco nihil per aluum excernatur?  
876
- X. L. I. V. An dentur medicamenta, quæ occulta  
propriate colicam tollant? 879
- X. L. V. An humor colicæ causa in cauitate in-  
testinorum, num verò in ipsis intesti-  
norum tunicis hæreat? 882
- X. L. V. I. An colica antiquis nota fuerit? 886
- X. L. V. I. I. An sola intemperies dolorem colicum  
inducere possit? ibid.
- X. L. V. I. I. I. An læsa solum facultate concoctrice  
lienteria generari possit? 890
- X. L. I. X. An aquæ per canales plumbeos de-  
fluentes causæ sint dysentericæ? 905
- L. Cur non dysenteria epidemica corri-  
piantur? 906
- L. I. An in dysenteriâ venæ sectione opus  
sit? 910
- L. I. I. An adstringentia in dysenteria conue-  
niant? 917
- L. I. I. I. An topica in dysenteria vtilia sint? 920
- L. I. V. An balneum dysentericis conueniat? 922
- L. V. Quidnam illud mucosum & album sit,  
quod in dysenteriâ excernitur? 924
- L. V. I. An adamas venenum & causa dysen-  
tericæ sit? ibid.
- L. V. I. I. Ac pinguedo & ramenta intestinorum  
tanta, vt vulgò fertur in dysenteria  
excernantur? 925
- L. I. I. X. An purgantia in dysenteria sint exhi-  
benda? 926
- L. I. X. An

# Index Quæstionum.

- LIX. An lactis vsus in dysenteria conueniat? 927  
 LX. An chalybis vsus in dysenteria conueniat? 928  
 LXI. Quænam fluxus hepatici proxima causa sit? 932  
 LXII. Cur feces intestinis perforatis non in cavitatem abdominis excidant? 933  
 LXIII. Num in apoplecticis ani sphincter resoluatur? 935  
 LXIV. Cur hæmorrhoidibus cæcis dolor excitetur? 937  
 LXV. Qualis sit sanguis qui per hæmorrhoides euacuatur? 940  
 LXVI. An aloë venarum ora aperiat, & hæmorrhoides cieat? 941  
 LXVII. An hirudines hæmorrhoides applicandæ sint? ibid.

## P A R T I S III.

- LXVIII. Vnde venæ lacteæ nomen suum adeptæ sint? 942  
 LXIX. Cur venæ lacteæ tamdiu latuerint? ibid.  
 LXX. Cur veteres viua animalia secuerint? ibid.  
 LXXI. An venæ lacteæ veteribus fuerint notæ? ibid.  
 LXXII. Cur moriente animali venarum lactearum succus euanescat? ibid.  
 LXXIII. Cur venarum lactearum valvulæ foras spectent? 943  
 LXXIV. Per quam viam chylus ad epat & sanguis ab epate & liene ad intestina feratur? ibid.  
 LXXV. Cur mesenterium medicorum dicatur nutricula? 944  
 LXXVI. Cur dolor colicus in paralyfin mutetur? 945  
 LXXVII. Cur helleborus albus in suppositoriis, aut antimonium in clysteribus eadem, quæ ore sumta, symptomata inducat? ibid.  
 LXXVIII. Cur medicamenta purgantia umbilico applicata aluum moueant? ibid.

## P A R T I S IV.

- LXXIX. An vasa à liene prodeuntia nihil è ventriculo trahant? 953  
 LXXX. An serum & ichor differant? ibid.  
 LXXXI. An lien cursoribus excindatur? 963  
 LXXXII. An icterus niger à liene proficiscatur? 965

## P A R T I S V.

- LXXXIII. An affectio hypochondriaca fiat ab obstructionibus venarum? 969  
 LXXXIV. An affect. hypoch. fiat ex inflammatione circa stomachum? ibid.  
 LXXXV. An affectio hypochondriaca fiat ab intemperie sicca? ibid.  
 LXXXVI. An lien causa sit collectionis humorum vitiosorum in affectione hypochondriaca? 970  
 LXXXVII. An lien sanguinem tenuiorem generet? ibid.  
 LXXXVIII. Cur pueros & adolescentes affectio

- hypochondriaca non affligat? 971  
 LXXXIX. Quænam hæmorrhoides in affectione hypochondriaca commodum præstent? 975  
 XC. An chalybs in affectione hypochondriaca utilis sit? 978  
 XCI. Acetum an in affectione hypochondriaca conueniat? 980  
 XCII. An scorbutus solum ab aqueo & tenui humore fiat? 986  
 XCIII. An pulmones in scorbuto primò afficiantur? 994  
 XCIV. Quomodo per contagium scorbutus communicetur? ibid.  
 XCV. Per quas vias humor doloris ventris scorbutici causa ad ventrem feratur? 1000

- XCVI. Quomodo dolor ventris scorbuticus in paralyfin mutetur? 1002  
 XCVII. Beccabunga an in scorbuto vsurpanda? 1013  
 XCVIII. An extracta cochleariæ & nasturtii in scorbuto vsurpanda? ibid.  
 XCVIII. An apud vvierum per *sublimatum* intelligatur & sublimatus; an verò arsenicum sublimatum? 1020

## P A R T I S VI.

- C. An hydrops ascites solo epate læso generetur? 1062  
 CI. Quæ causa prima sit collectionis humoris serosi in ascite? 1064  
 CII. Per quas vias aqua hydropicorum in cavitatem abdominis proueniat? 1067  
 CIII. An rhabarbari vsus in hydrope utilis sit? 1068  
 CIV. Quomodo flatus in tympanite generentur? 1071  
 CV. Per quam viam flatus in Abdominis cavitatem perueniant? ibid.

## P A R T I S VII.

- CVI. An cibi crassi, vt & lac ad generationem calculi faciant? 1088  
 CVII. An potu immutatus planè per vrinam in Diabete reddatur? 1095  
 CVIII. Quænam diabete causa sit? 1096

## P A R T I S IIX.

- CIX. An stranguria etiam à frigiditate & imbecillitate Vesicæ excitetur? 1112

## P A R T I S IX.

- CX. Quæ causa sit, cur scyrrhæ steriles fiant? 1136  
 CXI. An materia seminis è cerebro communicetur testibus? ibid.  
 CXII. An Eunuchi generent? ibid.  
 CXIII. An semper verum semen effluat in gonorrhæa. 1142  
 CXIV. An nomen gonorrhææ omnibus, quæ vulgo recensentur, differentiis, æquè propriè competat? ibid.

## P A R T I S X.

- CXV. An abdominis vstiones sint admittendæ? 1155





LIBER PRIMVS,  
DE FEBRE  
IN GENERE,  
ET  
DE FEBRE EPHEMERA.

CAPVT PRIMVM.

*De Natura Febris.*

*Febris nomen.*



EBREM esse morbum calidum, vel ipsa appellatio, quæ communem notionem & consensum quasi omnium hominum proponit, satis innuit. Græci enim febrim, *ἡ νόσος*, *πυρετός*, & Hippocrates absolute *πῦρ*, inprimis si sit ardentior, nominat. Latinis Febris à Februo dicitur, quod à ferueo deducitur. Februum enim, ut est apud Varro- nem, *de ling. Lat.* Latini purgamentum vocarunt, quodd quæ defuerunt, pura sint. Febris appellatio- nem & germani retinent. Licet enim nonnulli *das Kalte*, nominent, tamen ea appellatio non omnibus febribus competit; (neque enim omnes febricitan- tes à frigore molestantur;) & quibus competit, in iis non tam morbus ipse, quàm frigus, horror & rigor, qui intermittentium febrium paroxysmos antecedere solent, hoc nomine intelligitur.

*Febris na- tura.*

Essentia verò febris non est frigus, sed ut Galenus, *lib. 6. epidem. com. 1. 1. 2.*, habet, Essentia febrium non secundum Hippocratem modò, atque præclarissimos Medicos, sed etiam secundum communem omnium hominum consensum, est præter naturam caliditas, maximè quidem in totum animal effusa; sin minus, at omnino vel in plurimis partibus, vel in nobilissi- mis accensa.

*Febris defi- nitio.*

Verùm cum de natura febris plurimæ ab authoribus controuersia moueri soleant: in naturam atque es- sentiam eius paulò diligentius inquirere placet. Etsi autem alij alias febris definitiones proponant: defi- nitionem tamen, quæ non solum Auicennæ, sed etiam Empedoclis ac Zenonis, necnon plerorumque Hip- pocraticorum est, teste Alexandro Aphrodisiæo, *de febr. cap. 1* proponere & explicare libet. Ita verò illi fe- brem definiunt: *Febris est calor contra naturam, in cor- de accensus, & ex eo mediantibus spiritibus ac sanguine per arterias & venas in totum corpus diffusus, actiones- que naturales ladens.* Seu potius: *Intemperies calida to- tius à calore præter naturam in corde accenso & median- tibus spiritibus & sanguine per venas & arterias in totum corpus diffuso, ortum habens, actionesque naturales ladens.*

Dan. Sennerti, Tom. II.

Primò quidem cum, ut iam dictum, omnium & Medicorum & hominum consensu, febris quidam calor præter naturam sit: facillè hinc patet, febrim ad nullum aliud morbi genus, quàm ad morbos intem- periei referri posse, atque febrim esse intemperiem calidam. Nam quando, seu à Galeno, seu ab aliis Medicis febris calor præter naturam, seu contra natu- ram, seu calor igneus, seu extraneus, quæ omnia vno eodémque sensu dicuntur, appellatur, non simplex qualitas intelligenda est, sed intemperies calida, cuius causa vel pars, est calor præter naturam, ut habet Rondelerius, *lib. de cur. febr.* Calor nimirum, qua calor, non est febris. Hoc enim modo, & prout sensum afficit ad passionem & passibilem qualitatem pertinet. Quatenus verò præter naturam est, atque vitiosus & intemperatus, ac partes præuè disponit, & facit ut ad actiones edendas ineptæ sint, tum demum mor- bus appellatur, ut pluribus in *Instit. lib. 2. part. 1. c. 1.* hac de re dictum est.

*Febris est morbus in- temperiei.*

Falsum igitur est, quod Hor. Augenius, *lib. 1. de febr. c. 10.* scribit, febrim optimè sub duabus speciebus collocari posse, sub habitu ac dispositione, & sub passi- bili qualitate: & paulò post; omnium febrium com- mune genus esse qualitatem passibilem. In quem erro- rem lapsus est, quod non vidit, quâ ratione morbus di- catur dispositio; id quod clarè docuimus, *loc. alleg.*

Neque aliter, quàm hoc modo, de essentia febris sensit Galenus. Etsi enim nonnulli, verba potius, quàm mentem Galeni attendentes, febrim definiant, conuer- sionem caliditatis innatæ in igneam: tamen nec ratione nec autoritate Galeni hoc obtinere possunt. Conuer- sio enim motus est: febris verò motus non est, sed af- fectus corporis, motu atque alteratione inductus: At conuersio ad nullam morbosam *sed à natura* speciem re- ferri potest. Neque Galenus febrim dicit esse conuer- sionem caliditatis innatæ; sed *1. aphor. 14.* & alibi, fe- brem fieri dicit, cum Caliditatis naturæ in igneam sit conuersio: ubi generationem febris explicat, non ge- nus, seu essentiam febris proponit. Generatur quidem febris, cum caliditas natua in igneam conuertitur: sed non in ipsa conuersione caliditatis naturæ febris

*Galeni de Febris natu- ra sententia.*

A

essentia

essentia consistit, verum in illa dispositione & intemperie calida, seu excessu caloris, qui illa conuersione producit.

Notandum & hoc, vt etiam infra dicitur, non quemlibet calorem febrem dici posse, sed illum solum, qui tantus est, vt actiones naturales ledere possit. Hinc momentaneæ illæ calefactiones ex ita, balneo, exercitio aliquo & similibus, Febres non sunt.

Calor febrilis  
quæ,

Cum vero ex eo ipso, quod febris calor præter naturam igneus & extraneus esse dicitur, facile colligere sit, febrem calori naturali opponi: quomodo vterque calor in febricitante se habeat, & quid illa calida intemperies, quæ febris essentiam constituit, sit, videndum. Etsi autem plurimæ hac de re Authorum sententiæ occurrant: reliquis tamen sepositis, duas saltem proponere libet.

1. Opinio.

Alij enim censent, in quolibet febricitante duos specie & numero distinctos calores reperiri: vnum natium, alterum præternaturalem. Atque hos duos calores, licet coniungantur, vnum constituere non posse: cum specie diuersi sint, ac febrem à solo calore præter naturam, qui naturali additur, constitui, & ab eo solum actiones lædi. Et pro hac opinione varias rationes afferunt.

Calidi natii & præternaturalis  
differentia.

Primo quidem naturalem & præternaturalem diuersos esse, neque ex vtroque vnum fieri, hoc modo probant. Diuersa, aiunt, edunt opera etiam eodem tempore. Natius enim calor coquit, alterat, humores vitiosos & excrementa segregat atque expellit: Calor vero præternaturalis contrarium efficit, & naturæ opera impedit. Itaque cum diuersa opera edant hi duo calores, vnius agentis rationem habere non possunt, & proinde vnum ex vtroque calore non fit. Si enim ex vtroque calore vnus fieret, vnicam operandi rationem, sub vnius formæ ratione, haberet. Præterea fit pugna in febricitante à calore naturali contra calorem præternaturalem. At cum nihil in seipsum agat, non videntur hi duo calores sub vnam formalitatem redacti.

Deinde quod solus calor præternaturalis febris rationem obtineat, ita euincere conantur. Primo solus calor, qui actiones lædit, est morbus. At tantum calor præternaturalis & natius superueniens actiones lædit. Ergo solum is est morbus: eundemque tantum calorem Medicus conatur depellere. Deinde cum calorem febrilem medicus tollere debeat, si natius quoque ad eum pertinet, & is tollendus esset, quod absurdum.

2. Opinio.

Alij vero statuunt, febrem non tantum esse calorem additum calori nativo, sed compositum ex vtroque: Idque eo probant, quod in vna parte non possint simul inesse duo accidentia eiudem speciei distincta numero. Specie autem non differre hos duos calores, vel ex eo patet, quod vterque ab vno eodemque contrario vincitur & remittitur.

Controuersia  
applicatio.

Ex hac controuersia vt nos expediamus, obseruandum, aliud esse calidum natium, aliud calorem seu caliditatem. Calidum natium est substantia: Caliditas vero est qualitas, à qua prædominante in animalibus, spiritui insito nomen indiderunt. Illud cum vel celestis & nobilioris, quam elementa, naturæ sit, vel certè suam essentiam à peculiari formâ habeat, à qua etiam nobiliores illæ actiones proueniant, de quo, *lib. 1. Institut. c. 5. & de Chym. cum Aristot. & Galen. conf. & diff. cap. 10.* diximus, facile hinc patet, in febricitantibus quoque suam naturam retinere, & proinde alias, & calori febrili contrarias actiones suo modo edere posse: at si caliditatem saltem naturalem cum præternaturali compares, cum specie non differant, vt à posterioris opinionis assertoribus probatur, atque in vna eademque febre coniungantur, fieri non potest, quin vnum constituent: Quod vel sensus testimonio patet; cum si quis manu tangat febricitantem, vnum sal-

tem calorem deprehendat. Atque tota illa ex vtroque calore conflata intemperies, seu caliditas illa corporis ex naturali & præternaturali caliditate constans, & in vnam simplicem formam redacta, & à gradu caloris superuenientis formalitatem suam habens, seu potius illa præter naturam dispositio, quæ hac intemperie constituitur, & ob quam corpus ad naturales actiones obeundas ineptum redditur, pro febre habetur. Vt enim Cor & reliqua membra omnia actiones suas exerceant, in similibus calor quidam actualis & vegetus, seu temperies quædam calida, ob quam corpus actu calidum redditur, requiritur, atque illa calida temperies pendet ex temperie partibus singulis insita, & calore cum spiritu virali in omnia membra influente. Et ob hunc calorem actualem omnes corporis partes vegetæ, & ad actiones obeundas bene dispositæ esse dicuntur, si ille se rectè habeat, & neque deficiat neque excedat. Si vero hoc commune corporis temperamentum nimis calidum euadat, & caliditas illa actualis intendatur, ob calidum è corde influens: febris accensa in corpore dicitur.

Ex quibus manifestum euadit, calidam illam intemperiem formaliter quidem totam esse supernaturalem & febrilem nominandam; non aliter vt ab vltimâ vnitatem non solum numeri species, sed & appellatio mutatur; materialiter autem (ita enim Iacobus Forliuensis, & Hugo Senensis non malè distinguunt) non esse totam præter naturam. Nisi enim caloris naturalis quidam gradus præexisterent, ille Calor præternaturalis superueniens hunc caloris gradum & excessum constituere non posset. Videatur hac de re & Fernelius, qui, *lib. 4. Pathol. de Febr. cap. 2.* calorem in naturalem & præternaturalem distinguit. Et naturalem rursus duplicem facit, vnum celestem, alterum elementarium, sed & ipsum moderatum, & ex omnium elementorum permixtione temperatum. Illumque primarium functionum opificem constituit; hunc vero adiutantem: Insitumque nunquam exuperare posse docet, nec illius copiam & vbertatem vitio vnquam dari, sed quod fuerit vberior, vt infantium ætate, eò naturales vitæ actiones reddi feliciores. Et proinde in eo consistere febrem nullam posse, sed febris essentiam in calore præternaturali, qui oritur, cum calor elementarius à temperie & mediocritate suâ recedit, consistere, qui tanquam hostis insensus insitæ substantiam semper oppugnet & labefacet, & cuius vi ignea natium calidum dissipetur & pereat.

Ex quibus facile colligi potest, quid ad argumenta pro prior sententiâ allata respondendum sit. Nam Primo si calidum innatum vt substantia consideretur, cum illud non tantum caliditate absoluitur: facile concedimus, in febricitante Spiritum illum insitum, quem in animalibus, ob sensibilem caliditatem, calidum innatum vocamus, calori præternaturali actiones contrarias edere, atque Animam mediante illo Spiritu, in id incumbere, vt caliditas illa præternaturalis depellatur. At si caliditatem solum spectes, calor febrilis non per se, vt frigus, calori naturali est contrarius, sed per accidens, quatenus scilicet ipsum intendendo, eius actiones turbat. Vnde etiam calor naturalis præternaturalem non oppugnat, sed cum vterque in vnam calidam intemperiem coaluerit, vna etiam ab vtroque fit actio, sed vitiosa. Cum enim ille calor nimis intensus sit, coquit quidem, & alia agit, sed ob acrimoniam & excessum, vitiosè.

Ac proinde secundo, si formalitatem spectes, ille calor superueniens quidem causa est, vt non fiat naturalis actio: interim cum tota illa intemperies ad actionem edendam concurrat, vitiosa illa actio toti calori ex naturalis & præternaturalis gradibus conflato ascribenda est; & actio vitiosa vtriusque caloris gradus imitatur & refert, & quidem nunc illum, nunc hunc, magis vel minus, prout hic vel ille magis excedit.

Et

Argumentum  
vnum contra  
riam opinionem  
solutio.

Et cum ille gradus caloris præternaturalis superueniens formalitatem toti intemperiei tribuat: non opus est tertio, ut Medicus, si curare febrem in animo habeat, simul etiam naturalem calorem tollat, sed satis est, si gradum illum præternaturalem, ob quem calor naturalis intensior, & ad actiones recte edendas ineptus redditur, tollat. Eo enim sublato pristina illa, & actionibus exercendis conueniens qualitatum harmonia remanet.

*An febris intemperies sit calida & sicca.*  
Porro cum febrem intemperiem calidam esse dixerimus, atque ex differentiis morborum notum sit, intemperiem aliam esse simplicem, aliam compositam, Quaritur hic atque inter Authores controuertitur; An febris sit intemperies calida tantum, an calida simul & sicca. Nonnulli calidam & siccam intemperiem esse statuunt. Cum enim febris fiat naturalis caloris in igneum conuersione; ignis verò calidus & siccus sit: febrem quoque eadem temperie constare existimant. Præterea cum calor semper exsiccat, & febrilis calor ad siccitatem tendat. Atque id etiam curatio, quæ contrariorum est per contraria, monstrare videtur. De quâ, 1. aph. 16. Hippocrates inquit: Victus humidus febricitantibus omnibus competit, maximè autem pueris, & iis qui tali victu uti consueuerunt, Itaque si contraria contrariorum sunt remedia, & in omnibus febribus victus humidus requiritur: siccum etiam morbum febrem esse, hinc rectè argui purant. Quibus adiungi possunt multæ Galeni autoritates: Nam, 1. de rat. vict. in acut. 1. 18. scribit: si contraria contrariorum remedia existant, febris sanè peculiare remedium ut virtute cum refrigerante tum humectante sit, oportet. Id namque febris naturæ, quæ ut calida & sicca est, contrarium erit. Talis siquidem naturæ est ignis. Idem statuere Galenus videtur, 2. de rat. vict. in acut. 1. 22. 8. m. m. c. 9. 1. de tuend. san. cap. 7. & alibi.

*Siccitas non est de essentia febris.*  
Verum si rem diligentius perpendamus, eorum sententiam, qui statuunt, febrem intemperiem simplicem calidam esse, vero magis consentire putamus. Nam siccitatem non de essentiâ febris esse, vel ex eo constat, quod calor febrilis non semper cum siccitate, sed quandoque cum humiditate coniungitur. Corripiatur enim febris corporis constitutione humidior præditus: Is licet calidâ intemperie laboret, non mox tamen sicca coniungitur. Deinde, licet concedamus, omnem febrem esse effectiue siccam, seu calorem febrilem ad exsiccationem corporis tendere: præterea detur, in corpore aliquo caliditati siccitatem adiungi: non tamen hinc sequitur, siccitatem esse de febris essentiâ. Cum enim non calor, quæ calor, sed qualis quidam calor, seu diuersa quædam vitiosa, consistens in calore nimio & præternaturali, ob quam corpus ad actiones naturales edendas impotens redditur, febris sit, hinc manifestum euadit, etsi detur, vel cum omni, vel cum aliqua febre siccitatem coniungi, non tamen illam morbum & febrem esse, nisi ob eam lædantur actiones, seu corpus ad actiones perficiendas ineptum reddatur: id quod in paucis tantum febribus, hæcticis scilicet & ardentioribus quibundam, accidit. Ex quo apparet, siccitatem non ad febris, quatenus febris, sed tantum speciei cuiusdam febriæ essentiæ pertinere.

Neque aliter intelligendus est Galenus, cum febrem caliditatis naturæ in igneam conuersione fieri, & affectum calidum ac siccum esse dicit. Nihil enim aliud vult, quam calorem febrilem effectiue quidem esse siccum, seu in id tendere, ut consumpto humore corpus exsiccat. Ex quo tamen concludi non potest, siccitatem ad eius essentiæ pertinere. Neque enim subiectum & natura corporis, in quod agit, permittit, ut siccitas morbosa inducatur, sed magna humiditas impedire potest, ne calor siccitatem

illam, quam intendit, inducere possit; atque ita tum sola intemperies calida morbosa est. Quod verò Hippocratis aphorismus 16. sect. 1. attinet, cæ saltem de causâ victum humidum febricitantibus conuenire scribit, ut corpus præseruetur, ne in morbum siccum incidat; non verò quod morbus siccus iam adsit; victumque humidum exhibet, non ut morbus tollatur, sed ut corpus in suo statu conseruetur: id quod vel ex eo patet, quod pueris, & iis qui tali victu uti consueuerunt talem victum maximè vitalem esse dicit.

Atque ex his quodnam genus febris sit etiam *subiectum* euasisse putamus: proximum iam est, ut quodnam *subiectum* febris. subiectum eiusdem sit, videamus. Expressum id in definitione, dum dicitur, febrem esse intemperiem calidam totius. Cum quo consentit Galenus, qui, 6. epid. comm. 1. 1. 29. dicit; essentiæ febrium non modo secundum Hippocratem atque præclarissimos Medicos, sed etiam secundum communem omnium consensum, esse caliditatem præter naturam, maximè quidem in totum animal effusam, sin minus, at omnino vel in plurimis partibus, vel in nobilissimis accensam. Etsi enim de hoc alij aliter doceant & nonnulli Cor, alij totum Corpus, alij aliud quid subiectum febris esse statuunt: tamen ex hac controuersiâ facile nos expediemus, si dicamus, cor quidem esse præcipuum & principale febris subiectum: adæquatum verò totum corpus, aut certè pleraque eius partes. In omni febre cor laborat, ut postea dicetur; id quod vel ex pulsus mutatione apparet, febrisque generari non potest, nisi cor primum incalciscat. Atque hic calor in corde accensus postea in reliquum corpus diffunditur. Itaque etsi primò calorem febrilem in corde accendi negandum non sit, & cor sit primum, quod febrem recipit, ac reliquum corpus, nisi calor à corde illi communicaretur, minimè afficiatur: tamen quia illa intemperies calida, quæ ex calore à corde in corpus reliquum effuso oritur, totius corporis actiones lædit: non immerito etiam illam ad febris essentiæ pertinere dicendum est, neque ea solum pro symptomate intemperiei cordis habenda. Vnde etiam febris morbus vniuersalis nominatur, quod plures aut omnes quoque humani corporis partes occupat, earumque actiones lædit. Hoc tamen cum eâ conditione accipiendum est; nisi aliquid accidat, quod caloris in totum corpus effusionem prohibeat. Sæpe enim accidit, ut in febre aliquæ partes frigida manifestè percipiantur; & non solum in accessionum principio partes extremæ refrigerantur: verum & in non intermittentibus febribus interdum partes extremæ frigida deprehenduntur. Id quod Hippocrates, 4. aph. 48. & 7. aph. 1. malum, & lethale esse dixit. Quod tamen impedimentum non prohibet, quin febris adesse censetur, modo in corde calor febrilis existat, & ut Galenus 6. epid. comm. 1. 1. 29. habet, in plurimas aut nobilissimas partes distribuatur. Calor enim febrilis eiusdem essentiæ est in omnibus partibus, & suapte naturâ talis, ut in vniuersum corpus diffundi possit, si sibi relinquatur, nihilque accidat, quod illam effusionem prohibeat.

Schegkij, lib. de causâ continente, cum aliis quibusdam Medicis, aliter de subiecto febris sentit, & *subiecto* febris sentit, triplex febris subiectum constituit; putridæ, sanguinem; ephemeræ, spiritus; & hæcticæ, solidam cordis substantiam, Morbus enim, inquit, est habitus contra naturam, quo primum impeditur æquitas naturalis: Caterum ut sit expedita æquitas corporis animati, non solum agens corpus, sed etiam patiens secundum naturam affectum: & sanum esse oportebit: quod si ambo sana, etiam ambo morbida esse poterunt. Quis ignorat à Galeno & Aristotele morbidum sanguinem dici? Quis non intelligit, propter spiritum deficientem sæpe languescere vires



vires solidarum partium, quæ sunt nutrimentis & medicamentis reficienda? Ergo si non in continentibus aut solidis duntaxat est causa, ut corpus suas vires exerceat, verum etiam in contentis: quid vetat, quod minus sanguinem *καὶ τὸν δεικτικὸν* putrida dicamus, & ephemera Spiritum? quod si non faciamus, necesse erit, omnem febrem hecticam esse, si morbus, seu febris tantum est in solidis. Contagionem porro hanc caloris, quæ solida partes etiam afficiuntur a febribus contentorum; febrem non esse dicimus, sed intemperiem calidam quandam & imbecillitatem. Hæc Schegkii. Cuius opinionem & alij quidam sequuntur, ut diximus.

Paracelsi  
de febre opi-  
nio.

Finitima quodammodo ei est & Paracelsicorum opinio, qui febrem morbum nitri sulphuris accensi nominant, atque essentiam febris non calorem, sed ardorem sulphuris esse dicunt, eâ de causâ, quod febris frigidis deleri nec possit, nec debeat, ac volunt, ut incendium a calore distinguatur, incendiūque ipsam febrem, calorem verò saltem signum & indicium præsentis incendij esse dicunt.

Schegkij opi-  
nio reuocatur.

Verumenimvero cum sanitas & morbus opponantur, atque eidem subiecto insint: sanitas verò tantum, quibus ad agendum potentia est, attribui possit; tales autem sint saltem partes corporis viuentes, quibus anima inest, & in quibus, ut subiecto facultates, quæ ab animâ fluunt, recipiuntur: hinc patet, solum partes viuentes subiectum febris esse, id quod etiam doctissimi Medici pro principio quasi habent, statuantes, id saltem morbi subiectum esse, quod est facultatum subiectum, & a quo perficiuntur actiones, quod sunt partes viuentes. Cum autem sanguis viuens corporis pars non sit, sed potius corporis viuentis alimentum: pro febris subiecto haberi non potest, verum solidæ & viuentes tantum corporis partes genuinum febris subiectum sunt. Neque humores propriâ vi, sed morbi partis cuiusque interuentu actiones lædunt. Et si citra morbi interuentum actio in aliquâ parte non rectè perficiatur: id tamen non fit læsâ facultate, sed impeditâ saltem, hoc est, propter errorem externum. Itaque etsi, ut Schegkii habet, ut expedita sit corporis *ἐνέργεια*, non solum agens corpus, sed & patiens secundum naturam affectum sit oportet: tamen quia sanitas non pariendi, sed agendi potentiâ æstimatur; sanitas solum agentibus partibus, non verò patientibus tribuitur, & sanguis ut & alia, quibus nulla actiones animati corporis exercendi vis obtigit, non nisi improprie sana dicuntur, & proinde etiam morbi subiectum esse non possunt. Neque si solidis tantum corporis partibus morbum attribuamus, idcirco omnis febris hectica erit. Notandum enim hæc, calorem partibus solidis duobus modis inesse posse, *κατὰ τὸν ὅλον* & *κατὰ τὸ μέρος*. *κατὰ τὸν ὅλον* inest partibus caloris, qui etsi motus terminum attingit, atque eatenus amplius in fieri non est, sed iam factus est, ita tamen inhæret, ut sine causâ conseruante & fouente durare non possit, id quod in febribus. Ephemericis & putridis accidit. *κατὰ τὸ μέρος* verò calor inhære dicitur, qui & terminum motus attingit, & partibus tam firmiter inhæret, ut etiam abique causâ fouente permanere possit, id quod tantum in hecticis contingit.

An cor erit  
sit febris sub-  
iectum.

Ex quâ distinctione etiam facile refutari potest Capivaccij, lib. 2. de febr. cap. 2. opinio, vbi statuit, in febre cor non morbi, sed solum causæ morbi ficæ subiectum esse, ideo quod cordis operationes tantum ob errorem externum lædantur, & quod aliàs omnis febris hectica futura sit. Etenim etsi vbi sanguis in corde solum incaluit, substantia verò cordis nondum intemperiem calidam contraxit, actiones cordis ob errorem externum lædi dicantur, tamen id non accidit in febre. Impossibile enim est, vbi tantus calor in corde accenditur, ut ex eo in totum corpus effusus, omnes totius corporis partes similes

calefacere possit, ut non etiam cordis substantia ab eo incaluit. Neque propterea omnis febris est hectica, quia calor ille non semper, ut dictum, *κατὰ τὸν ὅλον* sed plerumque *κατὰ τὸ μέρος* solum inest.

Paracelsistas verò quod attinet, non distinguunt inter causam morbi & morbum ipsum, atque illud quod in curatione principaliter & primò respiciendum, simpliciter pro morbo ipso habent. Neque Galenici, etsi febris essentiam in calidâ intemperie consistere dicant, idcirco febrem solis refrigerantibus curari statuunt. Febris quidem, quæ febris, refrigerantia indicat: verum cum morbi, si causas a quibus fouentur, habeant, non tollantur nisi causâ ablata, imò causa primo loco tollenda, & cura principaliter ad causæ ablationem dirigenda sit: facillè hinc patet, etiam in febrium curatione ad causæ amotionem primariò in medicamenta dirigenda esse; neque vllus Galenicorum docuit, omnem febrem solis curandam esse refrigerantibus.

Paracelsi  
de febre sen-  
tentia exa-  
minatur.

Quod verò illam ipsam febrilem causam, & nitro sulphur, quod appellant, & Chymicorum de febris naturâ sententiam attinet, febres generari dicunt, dum sulphuri impuro & foetido mucilagines ac spiritus salini nitrosi permiscuntur, atque febris generationem hoc modo fieri opinantur. Statis temporibus, aiunt, germinare incipit, minera nitrosi sulphuris, & primò, dum flores superficiales acetosi, frigidi, mercuriales erumpunt, horrores, rigores, pandiculationes, oscitationes, & similia symptomata inducuntur. His floribus exhaustis, vapores & spiritus sequuntur pingues, inflammabiles sulphuris, qui calorem & reliqua febris symptomata inducunt: donec omnibus resolutis & euacuatis naturæ quies concedatur, sed cum recidiat metu suspecta.

Verumenimvero ex his omnibus facillè patet, Chymicos hic tantum intermittentium febrium generationem, quam suo loco considerabimus, tradere: cum tamen præter intermittentes aliæ adhuc multæ febres sint. Cum ergo in genere de febrium generatione & causâ quaeritur, si ex sententia Chymicorum respondendum: Sulphur accensum febris proximam causam esse, dicendum est. Quæ sententia suo modo tolerari potest, si nimirum dicatur, idem Chymicos sentire, quod Galenicos, dum ex humorum putredine, *ἐκ τῆς δυνάμεως*, accensione, aut ut Galenus scribit, natiui caloris in igneum conuersione febrem generari docent. Et ad mentem Chymicorum locutus est Fernellius, dum, *Physiolog. lib. 4. cap. 3.* scribit: Corpus omne quod inflammari potest, olei cuiusdam est particeps. huiusque solius gratiâ conflagrat; quodcumque autem olei est expers, flammam non alit. Videbor hoc loco magnū quippiam, & veteribus inauditum offundere, sed quod longè sit verissimum, & multis huius seculi experientiis confirmatum. Nullum enim corpus est ad inflammationem propensum, ex quo sincerum oleum arte non elici possit. Non adeps, non cera, non pix, non resina, non terebinthina, non vllum denique ligni stirpisve genus nulla radix, nullus flos, nullus fructus, nullum semen, atque in animalibus nulla pars est, siue os, siue nervus, siue membrana aut caro; nihil denique in stirpium aut animalium genere vitam habuit, quod non possit oleum de se profundere, aliud quidem affluentius, soloque pressu, aliud parcius maioreque industriâ: huius etiam causa, quacumque viuunt, inflammari posse compertum habemus. Quin etiam inanimatorum genus quæ completitur inflammationi subiecta, eadem quoque oleo sunt finitima. Nam Sulphur, quicumque metallorum naturas perscrutantur, terra adipem vel oleum appellant, quod moderato calore coctum cogitur atque concrevit. Ergo quacumque viuunt alunturque corpora, pinguem & olei similem continent humorem. Sed & alia multa, quæ hactenus incombustibilia & non inflammabilia credita sunt, inflammabilia esse, Alchymia monstrat. Quia tamen febrilia symptomata

symptomata à determinatâ causâ deducenda sunt; cum in aliis febribus sint alia: res magis clara & perspicua est, si febrilia symptomata, eorumque generationis modus ex spirituum & humorum calefactione, effluencia & putredine deducatur. Humor tamen natura si clarius è Chymicis explicari potest, id faciendum, ut infra dicetur.

Ut autem hæc, quæ hæcenus de subiecto febris diximus, adhuc clariora euadant, nihilque dubij relinquatur: Quâ ratione Cor & partes similes vniuersi corporis, in quas calor è corde effunditur, subiectum febris fiant, porro inquiramus. Sciendum verò, cum febris morbus vniuersalis sit, ut omnes partes eadem ratione febricitare dicantur, aliquid quod omnibus partibus commune sit, in febre mutari & alterari. At illud nihil aliud est, quam temperamentum corporis viuentis, seu calor ille actualis, qui ex insito & influente quasi conflatur. Hic enim cum in igneum, ut Galenus loquitur, mutatur, & in corde atque vniuerso corpore intensior, quam ad actiones debito modo edendas requiritur, euadit, febris generatur. Licet autem illa actualis seu vniuersalis & communis corporis viuentis calida temperies in omni febre afficiatur, & in omni febricitante, non solum solidæ partes, sed & spiritus atque humores à debitâ temperie discedant, & calidiores reddantur, tamen hoc non in omnibus fit eodem modo, sed ratione variâ; unde febrium differentia oriuntur, ut postea dicetur. Aliquando calor ille in corde accensus solum spiritus corripit, atque in calefacto esse, ut loquuntur, constituit; humores autem & partes solidæ solum calefiunt, caloremque, si incendium illud spirituum desinat, mox deponunt. Aliquando verò non solum spiritus, sed & humores calefacti sunt, qui quidem illum calorem etiam partibus solidis communicant, & actualement partium viuentium caliditatem intendunt, ita tamen, ut calor ille in solidis partibus accensus durare non possit, nisi ab incendio spirituum & humorum foueatur. Aliquando verò ita viuentes corporis partes excalefactæ sunt, ut licet incendium spirituum & humorum desineret, nihilominus illa intemperies partibus ipsis impressa perdurare possit.

Hor. Augenij  
opinio exami-  
natur.

Hoc loco facere non possum, quin Hor. Augenij opinionem examinem, qui Donatum Anton. ab Altomari valde exagitat, & pueriliter lapsum, vel in peruersam ac verè puerilem opinionem incidisse scribit; cum ipse non minus erret. Donatus Anton. ab Altomari, de med. febr. part. 1. cap. 11. febris subiectum esse calidum innatum, ac substantiam calidi innati mutari, alterari, & accidentalem caliditatem, quæ febris est, suscipere scribit. Quæ sententia, si eo quem iam proposuimus, modo explicetur, non video quid falsi contineat. Etsi enim subiectum febris sint partes corporis viuentes: tamen non aliâ ratione febris ipsis inest, nisi quatenus earum temperamentum actuale, quod à calido innato & influente dependet, mutatur, alteratur, & præter naturam in caliditate intenditur. Nam quæ contra Hor. Augenius, lib. 2. de febr. cap. 4. assert, non sunt magni momenti. Licet enim, si ex hypothesi disputet, & quasdam improprias locutiones, quas Altomari cum quibusdam Medicis usurpat, tanquam concessas præsupponat, aliquid eius rationes valeant: tamen si in genere contra calidum natium rectè & dextrè explicatum dirigantur, id quod intenditur, non obtinent.

Calidum in-  
natum quâ  
ratione fe-  
bris subiectum  
fieri queat.

Primo enim calidum innatum pro substantiâ sumptum, subiectum febris esse non posse idèo putat; quia forma sit corporis, aut certè id quod formæ locum tenet, & proximum animæ instrumentum est. Verùm nemo eruditorum Philosophorum vel Medicorum calidum innatum, quod corpus est, animam

vel formam, quæ incorporea est, propriè dixit. Et licet interdum tales locutiones apud Medicos occurrant: quo tamen sensu intelligendæ sint, dictum, lib. 1. Institut. cap. 5. At si pro animæ proximo instrumento accipiat calidum innatum, quid quæio absurdum est, ipsum febris subiectum dicere?

Deinde contra eandem opinionem hoc assert. Sanitas, inquit, & morbus in eodem subiecto sunt: Ergo si febris subiectum est calidum innatum, quod sanè nihil aliud est quam temperamentum cordis, imò totius corporis: sequitur subiectum febris esse temperiem corporis, atque eandem esse subiectum sanitatis; quod absurdissimum est. Verumenimvero quis facile concedat Augenio, calidum innatum esse temperamentum corporis? Ipse enim sapissime eodem in loco, & quidem rectè, dicit calidum innatum esse substantiam, temperamentum verò est qualitas.

Tertiò dicit, si calidum innatum nihil aliud est, quam anima: febris non corpus, sed animam afficiet; ac Medicus non corpori, sed animæ præsidia adhibebit. Verùm ad hoc antea in prima ratione responsum.

Quarta ratio, quâ quærit, An calidum innatum totum sit subiectum febris, an aliqua determinata eius pars, vel spirituosâ, vel carnosâ vel solidâ, satis arguit, Augenio parum perspectam fuisse calidi innati naturam. Nam partes quidem corporis nostri ex solidâ, carnosâ & spirituosâ substantiâ componuntur: at quis calidum innatum ex substantiâ spirituosâ, carnosâ & solidâ componi dixerit? Imò calidum innatum nihil aliud est, quam spirituosâ illa substantia, nobilissima nostri corporis, seu, ut Scaliger, exercit. 280. loquitur, scriptum reliquere sapientes, nihil aliud esse calorem naturalem, quam spiritum, ut etiam loco allegat. docuimus. Et ob huius spiritus insiti, seu potius ob caloris, quem pars ex spiritu seu calido insito & influente habet, rationem, quælibet pars febre corripitur, dum is in igneum mutatur, dicitur.

Quod porro Quintò quærit, cum calidum innatum subiectum febris dicitur, de quo calido id intelligendum sit; de insito, an de influente: ad id facilis est ex iis, quæ dicta sunt, repositio, Dicimus enim, subiectum febris esse calidum illud, quod ex insito & influente componitur; seu potius partes corporis esse subiectum febris, quatenus calorem quendam actualement ex insito & influente conflatum habent, dum scilicet is mutatur & intenditur.

Cæterum ut integra naturæ febris habeatur cognitio, & causa addenda est. Illa autem est calor præter naturam in corde accensus. Nam ut Cor, dum rectè & secundum naturam sese habet, caloris vitalis fons est, eumque in omnia membra diffundit, atque omnium partium temperiem & calorem insitum tuetur ac roborat: ita si præter naturam afficiatur, caloremque alium præternaturalem concipiat, febrilis caloris fons euadit, eundemque facile toti corpori communicare, & temperiem eius naturalem immutare potest. Et ut nullum aliud est membrum, quod temperiem actualement calidam illi tribuere, & vitalem in omnibus membris calorem fouere potest: ita etiam nullum membrum in corpore est, unde possit febris proximè & immediatè accendi, quam Cor. Nam etsi sæpe accidat, ut etiam in aliarum partium inflammationibus, aut humoribus in aliis partibus putrescentibus, febris accendatur, tamen calor ille febrilis non est, priusquam cordi communicetur, è quo deinceps in totum corpus diffunditur. Cuius rei & illud argumentum est, quod in omni febre in pulsu quædam mutatio accidit: quod non fieret, nisi cor & consequenter arteriæ afficerentur. Præterea ex nullo alio membro tanta caliditas in corpus diffundi potest, ob quam omnes eius actiones lædantur, quam ex corde.

Causa febris  
qua.

Cor febrilis  
caloris fons.

*Qualis calor  
ad feb. exci-  
tandam re-  
quiratur.*

Sciendum tamen, ad febrem generandam non sufficere quemcumque calorem in corde genitum, ac reliquo corpori communicatum, sed cum calor, non quatenus calor, febris sit; sed potius præternaturalis in toto corpore dispositio, quam calor ille inducit, & cuius ratione corpus ad actiones naturales ineptum redditur: tanta sit illa caliditas, atque illum terminum attingat oportet, qui ad idem illam præter naturam constituendam atque actiones lædendas sufficit. Hinc calor ex ira concitatus, vel vehementi motu aut balneo accensus, non est pro febre habendus, nisi cum incendiij gradum attingat, ut hominis actiones lædat. Ita interdum aliis de causis quædam intemperies calida in corde accenditur, quæ tamen ipsa quoque febris nomen non meretur; nisi calor ille eum gradum attingat, ut actiones lædat. Vnde etiam Avicenna, atque alij practici peculiari loco tractant de calida cordis intemperie, quæ quidem prævia ad febrem generandam est dispositio, & nisi inhibeatur, in febrem abire potest, tanta tamen nondum est, ut febrem inducat, peculiari etiam loco & seorsim de febribus agunt.

Ne quem autem hic turbet, quod modò dictum, calorem in corde accensum esse causam febris; cum antea calidam cordis reliquarumque partium, quibus corde illa communicatur, intemperiem, febris essentiam constituere dictum sit.

*Febris & calor febrilis differunt.*

Observandum enim, non esse ideam febrem, & calorem præter naturam seu febrilem. Calor enim præter naturam & febrilis ille etiam appellari potest, qui est in humoribus & spiritibus, ac vnus numero in subiectis illis eum deferentibus persistens, in reliquum corpus diffundi potest; qui calor non ipsa febris est, sed febris causa. Febris verò seu intemperies illa calida, quæ febris essentiam constituit, tantum est in viuentibus & solidis corporis partibus; neque eadem numero est cum eâ, quæ in corde accenditur, aut spiritibus & humoribus inest, sed per alterationem à caliditate, quæ in humoribus & spiritibus est, partibus inducitur. Neque enim accidentibus datum est, ut eadem numero à proprio subiecto in aliud migrare valeant.

Media verò, per quæ calor è corde in corpus reliquum diffunditur, sunt spiritus & sanguis. Hæc enim duo semper vnita sunt, & à corde in totum corpus distribuuntur per eorundem canales, arterias scilicet & venas, promptius tamen per arterias. Quamuis enim spiritus & sanguis in vtroque vasorum genere permisceantur, ut nunquam vnum sine altero reperitur; idque ideo, quod arteriæ & venæ vbiq. coniungantur, & vasorum sit quædam conspiratio, ac osculorum communio, calidior tamen, subtilior & spirituosior sanguis in arteriis continetur, quam in venis; unde etiam calor febrilis expeditius per arterias, quam per venas in corpus vniuersum diffunditur.

## CAPUT II.

### De Causis febrium in genere.

*Cognitio  
causarum fe-  
bris produ-  
citur utilitas.*

Atque ex his quænam febris natura sit, clarum euasisse putamus, antequam tamen ad differentias febrium accedamus, prius adhuc in genere quædam de febrium causis & symptomatibus præmittenda sunt. Causarum enim cognitio Medico summe necessaria est. Nam licet vulgò ignotum non sit, ex labore & lassitudine, ex ira, mœrore, æstu frigore, vigiliis, animi nimia intentione, cruditatibus, ebrietate, crapulâ, siti, inediâ, ex consuetis exercitiis omisissis, è corporis plenitudine, cibis prauis, medicamentis calidis, cibisque medicamentosis, & id genus aliis febres accendi; tamen quâ ratione hæc & similes causæ febres generent, non omnibus

notum est. Id itaque Medico inquirendum. Etsi enim ab his ad curationem nulla sumatur indicatio, ut pote quæ iam desierint, tamen cum non vno modo, sed variis febrem hæc causæ producant, ex earum obseruatione inuestigari potest, quænam in corpore ab earum qualibet relinquatur dispositio, quæ febrem gignit & fouet, quam tollere omnino necessarium est: cum morbus tolli non possit, causâ, quæ ipsum produxit, in corpore præsentem. Quæ cum à variis causis diuersa producat, etiam diuersa curandi ratio sæpe instituenda. Nimirum si ephemera sit ab æstu, caput rasum rosæco refrigeratur, atque ita calor ab æstu productus restinguitur. A curis autem constipatione si febris sit, balneo aquæ dulcis, & iis, quæ cutem laxant, vtendum. Verile igitur fuerit, non solum causas manifestas, quæ febres producere solent, nosse, sed modos etiam quibus eas producant, & quas singulæ in corpore dispositiones relinquunt, inuestigare.

Causam communem & proximam omnium febrium esse calorem in corde accensum, cap. præced. dictum est, de quo plura addere opus non est. Id igitur videamus, quænam sint illæ causæ, quæ calorem talem in corde accendunt, & quibus modis id præstent.

Galenus, de caus. morbor. c. 2. & 1. de diff. febr. cap. 3. febris, ut & aliorum morborum calidorum, quinque causas recenset. Motum scilicet, putrefactionem, contactum rei calidæ, corporis constrictionem, seu retentionem calidi effluuij, calidæque euaporationis, denique admixtionem rei calidæ. Quæ tamen causæ non vno & eodem modo febres accendunt, & calorem excitant, sed aliæ per se, aliæ per accidens.

*Causa febris  
& morborum  
calidorum.*

Motus, primò quâ ratione calorem excitet, in genere pluribus disputant Philo.ophi, quæ huius loci non sunt. Quâ verò ratione in corpore humano calorem excitet, res expedita est. Cum enim spiritus & humores in corpore nostro calidi sint, ex horum, pro animi & corporis vario motu, in partem aliquam pro variâ necessitate, concursu, calorem augeri mirum non est. Motus enim & in partes copiosius concitatis & collectis sanguine ac spiritibus, corpori calor intensior ab eorum concursu communicatur. Motus corporis quod attinet, ex eo, si modum excedat, primùm lassitudo solum oritur, si scilicet prius solutur, quam reliquo corpori communicetur. At si diutius duret, & plus ad partes confluerit, quam illæ discutere possint; ac præterea partes illæ ex frequenti collisione, incalecant, calorem maiorem, quam pro naturali habitu concipiunt; qui non solum tendinibus & ligamentis, sed & venis ac arteriis, tandemque *κατὰ συντυχίαν* cordi communicatur, & febris inde producitur. Idem fit in animi affectibus & motibus. In ira enim primò fit quædam caloris in corde efferuescentia, in quâ spiritus commouentur, & quasi tumultuantur, atque ad partes exteriores, vindictæ cupiditate, confertim, feruntur. Ad hanc caliditatem, quæ in illo ipsorum motu accensa est, retinendam si sanguis & spiritus apti sint: accidit, ut etiam si ira & ille feruor sanguinis sedetur, nihilominus caliditas in corde maneat, & ira febris accendatur. Ad quam rem bilis, præcipue si in corpore copiosior sit, non parum facit. Nam per iram ea etiam in venis, arteriis, hepate, folliculo fellis, feruet. Hinc nonnullis ira commotis bilis supra aut infra reicitur. Si verò vehementius commoueat & non euacuetur, febres inde excitantur. In metu & mœrore etsi spiritus potius quiescere, quam violentius & imperuosius moueri videntur; tamen etiam ab ipsis febres excitari, experientia docet; quod sit, quia in his sanguis & spiritus vitalis intrò, versùs cor ferantur, atque ita collecti (nisi ex nimia condensatione sese strangulent

*1. Motus quâ  
ratione calo-  
rem excitet.*



& suffocent; unde homines tristitia ac timore emori solent) cor incendunt, quibus accedit motus spirituum animalium ex perpetua & nimia cogitatione.

2. Putredo.

Secundo, febrem accendere potest putredo in corpore excitata. Omnia enim, ut Aristoteles, 2. sect. problem. 20. habet, quae putrescunt, calidiora fiunt. Nimirum calor internus in putredine ab externo intenditur, calorque internus iam turbata ratione, quam antea ad reliquas mixti qualitates habebat, exiens magis in sensum incurrit. Nam in mixtione ita erat attemperatus, & reliquis qualitatibus amicitia quasi deuinctus, ut ferè non sentiretur: quo fœdere in putrefactione rupto, fit sensibilior, suamque actionem magis liberè exerit. Hæc cum ita sese habeant, cur ex putredine febres oriuntur, facile patet. Attolluntur enim ex corporibus putrescentibus multi calidi vapores, & plures plerumque, quam ut per insensibilem transpirationem discurti possint. Hinc calor accenditur, qui venis, arteriis, & sanguini in iis contento communicatur. Unde tandem *κατὰ τὸ συνίχες* calor in corde accenditur. Id quod non tantum à putredine humorum in vasis, sed etiam extra, atque in inflammationibus, præcipuè dum pus generatur, accidit: in primis si inflammatio sit magna: aut prope arterias maiores. Propterea ab Hippocrate, 2. aph. 47. scribitur: *Δὴν πῦρ conficitur, dolores ac febris accidunt magis, quam dum confectum est.*

3. Rei calida contactus.

Tertiò, contactus & vicinia rei siue actu siue potentia calidæ, si corpori occurrat, id calefacit, donec tandem succedente calefactione caliditas ista cordi communicatur: ut ij, qui in balneis calidis diutius morantur, & qui in Sole aut ad ignem versantur, aut oleis, vnguentis, emplastrisue nimis calidis vtuntur, accidit. Ad quam rem in primis faciunt venæ & arteriæ. Etsi enim partes intermediae omnes non incalescant: tamen modò vna nimis incaluerit, facile per venas & arterias calor cordi communicari potest.

4. Πύκνωσις, seu pororum cutis contractio.

Quartò, ex *πύκνωσις* & pororum cutis contractione, accalidi effluuij retentione febres generari solent. Ita enim in corpore nostro comparatum est ut ex iis, quæ in eo coquantur, halituosa & fuliginosa excrementa colligantur, & per poros cutis, atque insensibilem transpirationem necessariò excernantur. Præter hoc etiam attracto aëre frigido calidum innatum temperandum est. Si itaque pori cutis claudantur, & effluuium illud vaporum, præcipuè acriorum & calidiorum prohibeatur; id quod ab aëre frigido, aut balneo aquæ frigidæ, vel aluminosæ accidere potest: febres & diariæ & putridæ, iuxta vaporis retenti, & corporis ac humorum conditionem atque apparatus, excitantur. Neque enim semper & statim prohibitum hoc effluuium febres accendit, sed tum præcipuè, cum in corporibus accidit minus sanis. Nam si bonus in corpore sanguis fuerit, ex retento illo vaporum effluuiio sanguis non ita facile inquinatur; sed cum vapores illi inanes ac blandi sint, potius ex eorum retentione plethora generatur, & corpus calidius euadit. Cum tamen vapores illi detenti ob ulteriorem calefactionem aciores redduntur, impossibile non est, quin etiam in corpore bene constituto, ob conclusionem pororum cutis, febris generetur. Condensant autem poros cutis refrigerantia, adstringentia, nec non siccantia immodicè.

5. Admixtio rei calidæ.

Tandem permixtio rei calidæ febrem generare potest, videlicet cibus & potus calidus, medicamenta calida assumpta, aër quoque calidus inspiratione & per poros cutis attractus. Hæc enim omnia cum humoribus mixta febrem excitare valent, præcipuè in iis, qui sunt siccioris & calidioris temperamento. Siquidem omnis intemperies à suæ intemperiei

similibus causis promptè intenditur & angetur: iuuatur autem & in meliorem statum deducitur à modico contrariorum usu.

Argenterius equidem alias adhuc causas addendas censet; quæ ad has referri non possint, utpote metum, vigilias, inediam. Sed & hæ causæ ad motum pertinent. In omni enim animi affectu sanguinis & spirituum fit agitatio, siue à corde ad exteriora ferantur, ut in irâ, siue ad cor confugiant, quod fit in metu. In vigiliis etiam spiritus sunt in motu perpetuo, & quiete ipsis denegata incalescunt, & corpus calefaciunt. In fame quoque spiritus incalescunt, cum non habeant, unde reficiantur.

Verumenimverò quamuis hæc omnia ita sese habeant, & hæc omnia modò recensita febres producere possint, an tamen non adhuc aliud requiratur, sine quo motus, putredo, contactus & vicinia rei calidæ, & rei calidæ permixtio, vix febrem inducere possint, nimirum causa illa, quarto loco antea proposita, calidi effluuij retentio seu insensibilis transpirationis inhibitio, perpendendum videtur. Licet enim calidi effluuij retentio inter causas febris quarto loco rectè proposita fuerit, utpote quæ sola absque reliquis, ad febrem inducendam sufficit, tamen reliquæ vix absque hac ad febrem inducendam sufficere videntur. Nam quamuis calor in corpore excitetur: si tamen corpus liberè ventiletur & refrigeretur, vix homo in febrem incidet: contra verò si transpiratio, seu calidarum fuliginum exhalatio, corporisque ventilatio, & per aërem attractum refrigeratio impediatur, facilis in febrem lapsus est. Viuius enim vitam *ψυχικὴν*, id est semper transpirare necesse habemus, calorque noster semper refrigerationem & ventilationem postulat. Si non transpiramus, non *ἀναψυχόμεθα*, si non *ἀναψυχόμεθα*, *ἐμπύρεται*.

Non autem satis est, nouisse causas, quæ vim febres producendi habent. Sed & corporum ad febres recipiendas aptitudo & dispositio inquirenda. In patiente enim disposito agentium actus recipiuntur, ut ait Aristoteles, 2. de an. cap. 2. t. 24. & 26. Et ut Galenus, 1. de differ. febr. cap. 4. habet, nulla causa sine patientis aptitudine agere potest. Hinc fit, ut etiam si plures in eodem aere calido versentur, aut nimium exerceantur, aut cibo & potu calidioris vtantur, aut irâ excandescant, non omnes tamen febre corripiantur, sed vnus vel alter saltem. Post causarum igitur explanationem, videndum, quæ corpora ad febres paratiora sint, seu quæ facilius à causis febrem inducentibus alterentur. Etsi enim causæ enumeratæ, si validæ sint, in quouis corpore febrem accendere valeant: tamen in iis, qui dispositi sunt ad febres, etiam mediocris causarum vis idem præstare potest. Magis autem ad febres in genere atque in vniuersum dispositi sunt, qui plurimo calore acri & fuliginoso abundant. Quæ de causâ iuuenes maximè febribus oportuni sunt; minus senes; deinde pueri. Cum enim febris sit intemperies calida per se, quæ tamen semper ad siccitatem tendit: absolute & in genere ad febrem recipiendam sunt paratiora corpora calida & sicca. Unde Galenus, 8. meth. med. cap. 8. ordinem temperierum, ut ad febres recipiendas magis vel minus dispositæ sunt, ita digessit: *Oportunissima*, inquit, *est ad febres calida & sicca intemperies: Ac nisi quis hanc cibet ocysimè, in eâ mutatur diaria in febrem acutam. Propinqua huic est, præsertim quod ad febrem attinet, quamuis ad alia sit deterior, calida intemperies & humida. Tertia ab his intemperies est simplex illa, in quâ oppositio altera rectè se habet, utiq; quæ ex humido & sicco constat, in alterâ calidum exuperat; quippe opportunior est hac, quam cetera, quæ sequitur, sicut ut in omnibus dictis occasionibus ladatur, tum ex diariis in plurimum dierum febres transeat. Huic proxima est, quæ in calido & frigido debium modum seruat. Ab hac deinceps media omnium, quæ scilicet mediocritatem in*

*Aptitudo & dispositio corporum ad febres recipiendâ.*

utraq; oppositione seruat. Quatuor quæ reliquæ sunt, in-  
temperies neque facile febribus occasione dictarum causa-  
rum patent, neque diariâ censata, si in ediam tolerant, in  
plurimum dierum febrem transeunt: imò aliqua earum, ubi  
redundantiam humorum citra corruptionem contraxere,  
vilitatem ex inedia sentiunt, ac potissimum quæ est fri-  
gida ac humida: Ab hac, quæ humida est, tertio loco, quæ  
frigida; quarto loco, quæ sicca & frigida. Vt totus ordo  
dispositionum ad febres hic sit, 1. calida & sicca, 2. cali-  
da & humida, 3. calida tantum, 4. sicca tantum, 5. tem-  
perata, 6. frigida & sicca, 7. frigida tantum, 8. humida  
tantum, 9. frigida & humida.

Verum cum febrium magna sit diuersitas, neque ho-  
minem in genere febris corripit, sed vel ephemera,  
vel hectica, vel putrida: etsi in genere hòc modo de  
corporum ad febres dispositione loqui possimus: ta-  
men tutius est, in specie ista definire ac dicere, ad  
febres ephemeræ, heclicas & biliosas, corpora calida  
& sicca magis esse disposita; ad pituitosas, frigida &  
humida; ad melancholicas, frigida & sicca; ad san-  
guineas, siue cum putredine, siue sine putredine, cali-  
da & humida.

### CAPVT III.

#### De Accidentibus & Symptomatibus Febris in genere.

**A**ctiones naturales lædi in febribus, in defini-  
tione dictum est. Verum cum magna actionum  
sit varietas, aliæ sint naturales in specie ita dictæ,  
aliæ vitales, aliæ animales; & præterea dum læduntur,  
vel auferantur, vel minuuntur, vel deprauantur: quæ-  
nam actiones in febre, quatenus febris, lædantur, &  
num ei etiam alia symptomata, & accidentium ge-  
nera superueniant, videndum.

*Quæ actiones  
in febre læ-  
dantur.* Febris cum sit intemperies calida, & non alio mo-  
do morbus dicatur, quàm quia partium corporis simi-  
larium temperamentum mutat, & in caliditate inten-  
dit: faciliè hinc patet, eas præcipuè actiones in febre  
lædi, quæ à similaribus partibus, quatenus tales,  
& beneficio temperamenti, nullâ instrumentariæ par-  
tis compositione interueniente, obeuntur.

*Naturalium  
actionum in  
febre læso.* Talis actio cum sit nutritio, coctio, & aliæ quæ  
ad nutritionem perficiendam pertinent: in omni fe-  
bre naturales actiones insigniter læduntur, visio ve-  
rò, & similes actiones non item. Ad naturales enim so-  
lùm temperies concurrat: ad alias verò etsi tempe-  
ries non inutilis sit, pleræque tamen instrumentariam  
potius compositionem ad agendum requirunt. Quia  
tamen instrumenta & organicæ partes ex similaribus  
componuntur: labes illa & actionum offensio ad or-  
ganicas quoque partes deriuatur, & hinc non solum  
naturales, sed consequenter etiam vitales & animales  
actiones offenduntur. Quanquam enim in defini-  
tione dictum; febri actionibus naturalibus nocere,  
tamen sciendum est, naturalis voce interdum genus,  
interdum modum actionis significari. Genus actionis  
significat, dum actiones omnes in corpore in natu-  
rales, vitales & animales distinguuntur. Modum ve-  
rò actionis significat, dum præternaturali opponitur:  
Quâ ratione omnes actiones, siue sint nutritioni di-  
cate, quæ in specie naturales appellantur, siue vitales,  
siue animales, si debito & conuenienti naturæ modo  
exerceantur, naturales esse seu naturaliter fieri & se  
habere dicuntur: In qua posteriori significatione pro-  
cul dubio Auicennas hoc vocabulum in definitione  
vsurpauit, & nihil aliud voluit, quàm à calore febrili  
actiones omnes à naturali statu & modo deturbari.

*Vitalium læ-  
so.* Et quidem vitales actiones in febre lædi, manife-  
stum est. Cum enim febris primariò cor occupet, & per  
arterias in primis corpori reliquo communicetur: in

omni febre pulsus mutari necesse est, id quod expe-  
rientia docet. Et quidem in omni febre pulsus edun-  
tur frequentiores, nec non celeriores. Nam cum vitus *Pulsus febrili-  
les qui.* & necessitas augeatur, primùm editur pulsus creber,  
siue valida, siue debilis virtus sit; cum creber om-  
nium sit facillimus. Quòd si frequentia necessitati non  
satisfaciat, celeritas accedit. Quòd si nec hæc duo sa-  
tisfaciant, accedit magnitudo; modò virtus non sit  
debilis.

Deinde etiam animalis facultas læditur. In febrici-  
tantibus enim totius corporis languor & imbecillitas  
percipitur. Imò sæpè & aliæ actiones offenduntur. *Animalis fa-  
cultas læsa.* Nam licet tales actiones non proximè à similaribus  
partibus edantur, sed ab instrumentariis, quia tamen  
partes organicæ ex similaribus componuntur, secun-  
dariò & ex accidente etiam illæ lædi possunt. Quam-  
uis verò febris quibusdam morbis præsidio esse vi-  
deatur, vt ex Hippocrat. 2. aph. 26. 5. aphor. 5. 6.  
aph. 40. & 73. patet: tamen sit hoc ex accidente, qua-  
tenus humores, morborum causas, absumit. Ipsa ve-  
rò febris per se lædit actiones, quia per eam tempera-  
mentum partium, proximum facultatis in agendo in-  
strumentum, vitiatur.

Quod reliqua symptomata attinet, cum febris sit  
calida intemperies, calor naturæ molestus vel foris,  
vel intus percipitur. Vt enim ab influente calore se-  
cundum naturam sese habente calor quidam suauis &  
blandus in toto corpore excitatur: ita si ille calor in-  
tendatur, & igneam quasi naturam concipiat, in cor-  
pore calor quidam molestus percipitur. Et cum ab  
actionum læsione, vt symptomate primario, reliqua se-  
cundaria, qualitates nimirum mutæ, & excreta mu-  
tata proueniant: læsâ nutritione & coctione à calidi-  
tate febrili, & excreta, & qualitates corporis à febre  
etiam variè mutari posse faciliè patet.

### CAPVT IV.

#### De Febrium differentiis in genere.

**F**ebrium, vt & aliarum rerum differentiarum, aliæ, & *Febrium dif-  
ferentia.* quidem propriæ ac principalissimæ, sumuntur ab  
earum essentia; aliæ verò ab accidentium aliquo. Ac  
quoniam neque horum ipsorum accidentium est  
natura vna, sed nonnulla quidem propinquiora, ac  
magis diuisæ rei propria, nonnulla autem remotiora  
ac magis extranea sunt: idcirco neque earum, quæ ab  
iis accipiuntur, differentiarum est genus vnum, vt  
docet Galenus, 1. de diff. feb. cap. 1. Rectissimè autem  
ij faciunt, qui essentielles differentias, & ex accidenta-  
libus propinquas præcipuè persequuntur.

Equidem cum febris essentia à calore præter natu-  
ram dependeat, tres eius differentiarum inde peti possunt: *Essentiales  
febrium dif-  
ferentia.* quarum vna sumitur ex eo, quod magis & minus est.  
Quo in genere solent Medici magnam & parvam fe-  
brem nominare, non propriè quidem, vt Galenus, loco  
allegato monet, rei quali nomen quanti accommodan-  
tes, hoc tamen facere assueti, non in febribus tantum,  
sed in mille aliis rebus, quæ licet in qualitate subsi-  
stant, magnæ ac parvæ dicuntur. Altera differentia pe-  
titur à caloris modo motuque, quæ reliquis differen-  
tiis dignoscendis maximè inseruit: cuius generis dif-  
ferentias Hippocrates 6. epid. comm. 1. tit. 29. propo-  
nit, dum inquit: *Febrium quidem alia sunt manus & ad  
tactum mordaces; alia mites; alia non mordaces quidem,  
sed post insurgentes: alia acuta, sed quæ à manu vincuntur.*  
Etenim febrilis caliditas tangentibus aliàs mordax, *Mordax.*  
acris & valde molesta apparet, talisque semper ma-  
net; seu mordaces febres sunt, quæ manum tangentis  
mox feriunt, & propter vaporem illum acrem, qui ex  
putrescente materiâ effertur, quasi pungunt & vellit-  
cant, & ita molestæ sunt, vt diu ipsam ferre nequeat.

Mites

Mites.

Mites verò febres sunt, non quæ planè nullam tangentibus molestiam afferunt, sed in comparatione ad alias, quæ magis sunt mordaces, dicuntur mites, quæ calorem ita acrem non habent. Deinde sunt febres aliæ, quarum calor quidem ad primum tactum acer & mordax valde non apparet, sed si diutius manus iniecta retineatur, tandem se prodit, atque acrem & mordacem exhibet. Aliarum contra calor celeriter manui sese offert, sed si manus diutius iniecta teneatur, à manu superatur calor, & paulatim remittitur. De quâ re videatur Vallesius, in *comm. in alleg. locum*. Verum enim verò vix propositum fuit Hippocrati perfectam febrium diuisionem instituere, sed potius febrium quandam diuersitatem & variationem, quæ ad cognitionem febrium faceret, monstrare voluit.

Ideoque cum calor, quæ calor, febris non sit, sed quatenus corpori nostro dispositionem, ob quam ad agendum ineptum redditur, inducit: differentia maximè propria, vt Galenus, *loco alleg.* loquitur, sumuntur à materia, in quâ calor hic præter naturam accenditur. Imò in genere differentia maximè propria & essentialis accidentium sumuntur à subiecto, cui accidit vnumquodque accidens. Accidentium enim esse est inesse: & differentia ab inhærentiâ desumptæ addunt generi conditionem singularem & specificam. Ac licet esse accidentium non varietur ex diuersitate subiecti: variatur tamen existentia, à cuius varietate variæ essentialisque differentia sumuntur; inprimis si addatur causa inhærentiæ. Itaque & hoc loco febris differentias præcipuas petemus ab inhærentiâ in subiecto, non prætermittendâ causâ, ob quam febris subiecto suo inest.

Febrium alia  
ephemera,  
alia putrida,  
alia hectica.

Talis est autem illa famosa, passim vsitata, ac inter reliquas summè utilis ac necessaria diuisio febrium in Ephemeræ, putridas, & hecticas. Verum quomodo febribus essentialis sit, & quodnam eius fundamentum, non omnes rectè explicant; id quod iam videbimus. Primò enim non directè opponuntur hæc tria, ephemera, putrida & hectica. Deinde si calor simpliciter accipiat, dicaturque (quod plurimi faciunt) calorem febrilem aliàs in spiritibus, aliàs in humoribus, aliàs in solidis partibus hære: essentialis ista differentia febris non sunt. Nam calor iste præter naturam, prout simpliciter præter naturam consideratur, & per sua subiecta, spiritus, humores, ac solida diuiditur, non est morbosus, sed in humoribus & spiritibus solum causæ proximæ rationem habet: calor verò, qui morbosam corpori dispositionem inducit vnicus est, saltémque in partibus solidis inhæret, atque ab eo solum febrium differentia petendæ sunt. Etsi enim calor in omni febre solidas corporis partes occupet, & in omni febre partes corporis similes calidâ intemperie laborent, tamen illa calida intemperies alia *ἐκπύη* est, seu in habitu: alia *χρῆμα*, seu in habitudine, vt loquuntur, febrisque alia est *ἐκπύη*, alia *σχῆμα*.

Febria alia  
ἐκπύη, alia  
σχῆμα.

Febria ἐκπύη.

Febria σχῆμα.

Febria *ἐκπύη* est, cum calor ita solidas corporis partes occupauit, & ita iis inhæret, vt nullâ causâ fouente indigeat, id est, etiamsi à spirituum vel humorum incendio non foueretur, nihilominus durare possit. *σχῆμα* est, in quâ quidem etiam est intemperies calida in similaribus corporis partibus; (hæc enim nisi esset, febris non esset) talis tamen quæ ita eas occupauit, vt si ab humorum, aut spirituum incendio non foueatur, per se subsistere non possit; seu in qua spiritus vel humores incensi sunt, in solidis autem partibus intemperies calida tantum in *σχῆμα* est, vt si illud spirituum aut humorum incendium extinguitur, nulla in solidis partibus remaneat febrilis intemperies.

Eodem sensu, sed paulò aliis verbis differentiam hanc febrium tradit Galenus, 1. *de diff. febr. cap. 1.* Vel enim spiritus saltem calor occupauit; humores autem

& solidæ corporis partes excalefactæ nondum sunt, sed calefiunt, quod fit in ephemera febris: vel non solum spiritus, sed etiam humores excalefacti sunt; solida verò substantia tantum calefit; quod accidit in humoralis febris: vel omnes tres istæ substantiæ & potissimum solida, excalefactæ sunt; id quod fit in hectica.

Idem rem hanc exemplis duobus, *loc. allegat.* declarat. Repræsentet lebes, vel olla partes corporis solidas, aqua in eâ, humores. Fingamus itaque aquam calidam infundi in leberem frigidum, vt ab eâ leberis corpus incalescat, sed nondum planè incaluerit: febris putrida seu humoralis exemplum est, in quâ humores accensi & calefacti sunt; partes verò solidæ nondum planè incaluerunt: ab humoribus tamen calidis calorem recipiunt. Fingamus rursus, in leberem calefactum infundi aquam frigidam, atque ab eo incalescere: exemplum febris hecticae est. Vt verò exemplum febris ephemeræ afferat, iubet nos follem imaginari, qui ita arte confectus sit, vt in eo aqua contineri possit. Hic admoueat igni; vt aer calidus in eum attrahatur, quo & aqua, & folliis calefiant. Hoc exemplum est febris diariæ, in qua à spiritibus reliquum corpus incalescit. Alij hanc differentiam exemplo balnei declarant. In balneo enim sunt parietes, aqua, & aer. Si itaque intra parietes calidos aer & aqua frigida effundatur, exemplum hecticae febris est: Si verò parietibus & aere frigidis calida aqua effundatur, exemplum febris putridæ est. Si denique parietibus & aquâ frigidis superueniat aer calidus, febris ephemera repræsentatur. Verum sunt ista similia, quæ idcirco in omnibus etiam non quadrant.

Patet ex his omnibus, calorem febrilem aliàs ex alio incipere, qui accensus postea etiam reliqua calefacit. Facillimus transitus est caliditatis ab humoribus in spiritus. Humores autem à spiritibus non ita promptè accenduntur. Ita partes solidæ facilius calorem impertiuntur humoribus & spiritibus, quam vt eum ab iis recipiant. Quod enim substantia est tenuior & calidior, eò facilius alterationem & calorem suscipit; quod crassior, eò difficilius. Inter hæc tria autem tenuissimus est spiritus: partes solidæ crassæ sunt; mediam naturam humores habent.

Ne quem autem turbet, quod solum in hecticis partes solidas calefactas esse, in reliquis verò febribus tantum calefieri diximus, cum tamen Galenus, *de diff. symp. cap. 1.* doceat, morbum esse affectum; affectum autem eam qualitatem, quæ cessante eo, quod alterabat, in patiente remanet; affectumque esse quid factum, non autem quod adhuc fit. Ex quo videtur sequi, vel hecticam febrem solum morbum esse, vel morbum non solum in partibus viuentibus, verum & humoribus ac spiritibus, vt subiecto, residere.

Obseruandum enim morbos fieri, dupliciter accipi à Medicis. Primò enim fieri dicitur is morbus, qui nondum est, terminumque motus, quem dicitur habere, vt sit morbus, nondum attingit: Factus autem est is, qui iam productus est. Deinde etiam fieri is dicitur, qui quidem secundum priorem significationem iam factus est, & motus terminum attingit, ita tamen, vt sine causa fouente subsistere non possit: Factus autem is est, qui etsi causa, à qua productus est, cessarit; nihilominus potest subsistere, vt *lib. 2. Instit. p. 1. cap. 11.* docuimus. Cum igitur in omni febre cor & similes partes calefactæ esse dicuntur, in prima significatione Factum vsurpatur. Cum verò in hectica febre tantum solidæ partes calefactæ esse dicuntur, in secunda significatione Factum accipitur.

Aliam huius febrium differentia rationem reddit Lud. Mercatus, 1. 2. *de febr.* Necessarium quidem esse dicit, in quavis febris spirituum, humorum & solidorum membrorum calorem alterari, calidumque innatum affici: verum non pari semper ratione, sed maximè eam partem calidi innati affici, cuius natura est febris,

Exempla, quibus febrium differentia explicantur.

Morbus fieri & factus quomodo dicitur.



febris, spirituosam in ephemerâ; humidam, in puerilâ; solidam, in hecticâ: seu ephemeram constitui, cum calidi innati spirituosâ pars in calefacto esse posita est; humoralem, cum humidior; hecticam verò, cum solidior & crassior.

Verumenimverò iam antea monuimus, etsi corpus nostrum tribus hisce spiritibus, humoribus & solidis constituitur, non tamen eadem etiam ad calidi innati constitutionem requiri. Calidum enim innatum nihil aliud est, quàm spiritus insitus, ad cuius essentiam nonnulli etiam humidum radicale pertinere statuerunt. Solidæ verò corporis partes ad constituendam calidi essentiam non pertinent, sed calidum innatum solidis partibus inest, atque per eas diffusum est.

Præter has & alia adhuc est differentia, quæ hoc loco prætereunda non videtur, quâ diuiditur febris in primariam & secundariam, vel symptomaticam. Primaria febris est, quæ nullum alium morbum sequitur, sed à propria causâ dependet. Secundaria vel symptomatica est, quæ ab inflammatione alicuius membri oritur; ut evenit in pleuritide, angina, phrenitide, inflammatione hepatis. Galenus aliter paulò proponit hanc diuisionem, & cum ex suâ, cum ex antiquorum mente febrem diuidit in febrem morbum, & febrem symptoma. Ita enim, 4. aph. 7. 3. scribit: *A febribus malè habere & vexari antiqui dicebant eos, qui sine certa inflammatione, aut abscessu, aut dolore, aut eryspelate, aut ut generatim & vniuersè dicam, absque aliquo membro eximè præ aliis affecto agrotabant. Quòd si vel propter lateris, aut pulmonis, aut alius cuiusdam partis inflammationem febricitarent, non iam febricitantes ipsos appellabant, neque febribus vexari dicebant, sed pleuriticos, aut peripneumonicos, aut hepaticos, aut splenicos, aliisque similibus nominibus nuncupabant.* Et ibid. aphor. 68. *Hippocrates in febribus solet dicere, pro in morbis febrilibus, quando videlicet febris ipsa sunt morbus, non partis alicuius quopiam enumeratorum affectuum laborantis symptoma.* Idem docet, lib. 1. ad Glaucon. cap. 3. & 4. 6. aph. 44. lib. 7. aphor. 42. lib. 1. epid. sect. 3. com. 4. Verùm Auicennas, lib. 4. fen. 1. tract. 1. cap. 1. hanc diuisionem non probare videtur. Quæ res fecit, ut Medici inter se dissentirent, & dubitarent, num rectè dicatur, febrem aliam esse morbum, aliam accidens. Cum enim omnis febris sit eadem naturâ, calida scilicet, intemperies totius in corde accensa, & hinc in reliquum corpus diffusâ, omnem etiam febrem in morborum numero habendam, & nullam inter symptomatica referendam esse nonnulli putant.

Verùm hac de re obseruandum, si accuratè loqui libeat, omnem febrem esse morbum, cum ipsi definitio morbi competat; atque ideo nullam febrem rectè symptoma appellari. Symptomaticas verò febres appellare nihil prohibet, imò distinctionem inter febres primarias & secundarias seu symptomaticas obseruare vtile est. Nam febres primariæ cum à suis propriis causis pendeant, non verò ab aliis morbis proueniant: peculiaria remedia requirunt: Symptomaticæ contra cum ab aliis morbis pendeant, curandi rationem peculiarem ferè non postulant, sed sublato eo, quem sequuntur, morbo, & ipsæ tolluntur. Ita sublata pleuritide seu peripneumoniâ, vnâ febris, quæ illam sequitur, tollitur. Ideoque symptomaticæ hæ febres propter aliquam similitudinem nominantur. Vt enim symptomatica morbos sequuntur, & iis sublati tolluntur: ita hæ febres à suis morbis dependent, atque iis sublati cessant, etsi, si earum essentiam spectes, ipsæ etiam morbi sint.

De symptomaticis tamen febribus notandum, earum quæ ab antiquis omnes pro symptomaticis habitæ sunt, reuerà plurimas primarias esse, & parium, pleuræ, pulmonis, faucium inflammationes potius iis accidere, quàm ut febres ab iis oriantur; quæ fe-

bres non incommode Comitæ nominantur, de quibus, lib. 2. cap. 15. dicitur.

Post febrium differentias nonnulli etiam de signis febrium in genere agunt. Verùm peculiarem tractationem id requirere non videtur. Nam pleraque signa potius differentiarum, quàm generis sunt propria. Et si quæ sunt talia, pauca sunt & ex iis, quæ suprâ, cap. 3. de sympt. & accidentibus febrium in genere diximus, patent.

## C A P V T V.

### De Curatione febrium in genere.

Cum omne, quod præter naturam est, remotio- nem sui indicet, ut est apud Galenum, 8. meth. med. cap. 1. etiam febrem, utpote morbum remotio- nem sui postulare, vulgo quoque notum est, qui eâ ipsâ de causâ Medicorum auxilium implorat. Verùm quâ ratione id præstandum sit, illud Medici est consulere. Principiò autem cum contrariorum contraria sint remedia, & quodcunque mutatur, à contrario mutetur; febris verò intemperies calida sit, & ad exsiccationem corporis tendat: febrem, quâ talis, refrigerationem simulque humectationem requirere, manifestum est. Hinc Galenus, 8. meth. med. cap. 1. *Febris, inquit, intemperies excessus in caloris abundantia est. Hinc ergo ad temperatum via erit per id, quod refrigerat.* Et 11. meth. med. cap. 2. *Quoniam vniuersi febrium generis intemperies est calor, per frigiditatem curabitur.* Et 9. meth. med. cap. 14. *Omnis febris, quâ febris, humectatio refrigeratioque remedia sunt.* Atque id ipsum etiam est, quod Hippocrates, 1. aphor. 16. scribit: *Victus humidus febricitantibus omnibus utilis est; maximè verò pueris, & iis, qui tali victu uti consueverunt.*

Sed quia non hominem in genere, sed Petrum vel Paulum curamus, & febris in hoc vel illo homine curanda est: non satis fuerit, si febris, ut morbo calido, frigida adhibeantur remedia, sed quâ mensurâ id faciendum sit, videndum; ne vel aliquid de morbo relinquatur, si in refrigerando deficias; vel ægrum in contrarium morbum deicias, si modum excedas. Id autem assequi non licet, nisi temperamentum ægri, antequam ægrotauerit, cognoscatur, & aeris status atque alia perpendantur. Hæc enim recessum à naturali statu demonstrant. Itaque si caloris qualitatem respiciamus, quânto intensior erit calor, tantò magis refrigerante auxilio opus erit. Atque hinc calidior corpore præditi, dum febricitant, minùs refrigerantia requirunt: frigidior verò, magis refrigerantia postulant. In his enim maior est recessus à naturali statu, in illis verò minor.

Cætèrùm ut homo in genere non curatur, sed febris in hoc vel illo individuo: ita etiam febris in genere non curatur, sed hæc vel illa febris species, v. g. tertiana, quartana, hecticâ: & propterea de curâ febris in genere multa dicere opus non est; in primis cum propter complicationem sibi inuicem aduersantium morborum, causarum, & symptomatum, non semper omnia, quæ indicantur, contraria adhibere, aut ea simpliciter vsurpare liceat. Nam tunc solum contraria, quæ morbus indicat, ei simpliciter sine vllâ exceptione adhibere licet, cum morbus solus est. Cum verò cum aliis rebus præter naturam complicatus fuerit, non semper id, quod morbus indicat, mox exequi licet, sed alia sæpe antea remouere opus est. Id quod in febribus humoralibus accidit, utpote quæ causam coniunctam habent. In febribus verò ephemeris & hecticis cura febris, quatenus talis, locum magis habet. Vnde Galenus, 9. meth. med. cap. 14. *Si sola sit febris, inquit, ad refrigerandum humectandumque omne Medici consilium, veluti ad finem, dirigatur.*

Febris pri-  
maria &  
symptoma-  
tica.

Febris quid  
indicat.

An omnis  
febris sit  
morbus.

Febres comi-  
tæ.

gatur. Et, i 1. meth. med. cap. 2. scribit: Quoniam uniuersi febris generis intemperies est calor, nimirum per frigiditatem curabitur, sic ut omnes indicationes inter se concordent. Itaque ubi humor febrem pariens in corpore praesens est, is primo loco tollendus erit. In febribus vero ephemeris cum, ut Galenus 1. meth. med. cap. 1. habet, simplex quidam praeter naturam affectus sit: in iis cura febris, quatenus talis, maximè locum habet, & faciendorum indicatio ex ipsa febre maximè petitur. Ac proinde febres Ephemeræ, quæ maximè simplices sunt, & in quibus febris, quatenus febris, curatio maximè elucelcit, primo loco proponemus.

## CAPVT VI.

## De Febre Ephemera.

**D**Vplex esse febrium genus, capite præced. dictum. Vel enim calida intemperies, quæ febris essentiam constituit, κατὰ οὐρανόν, vel κατὰ γῆν corporis partibus inhæret. κατὰ οὐρανόν inhæret, cum febrilis intemperies in viuentibus corporis partibus durare non potest, nisi à causâ aliquâ, quæ continuum calorem suppeditet, foueatur. Hæc autem causa duplex est, vel spirituum, vel humorum incendium. Quæ à spirituum incendio oritur & fouetur febris, ephemera dicitur; quæ ab humorum incendio vel putredine, humoralis vel putrida. Hæctica verò febris est, quæ tali causâ fouente non eget. Atque ita triplex omnino febrium genus est; Ephemeræ, & humores sine putredine, Putridæ, & Hæctica: ad quas omnes febrium species referri possunt.

## De Febris Ephemera naturâ.

Febris ephemera.

De iis igitur ordine iam dicemus, initio factò à febre Ephemerâ. Hæc enim febris breuissima, simplicissima, & curatu facillima est. Nam cum à spiritibus incensus fiat, & propterea calor in materiâ tenui, mobili, & facili dissipabili subsistat, ac facili deferueat: non diu durat hæc febris, sed ferè diei naturalis spatio terminatur; vnde Græcis πυρίτις ἐφίμα, Latinis diaria & ephemera appellatur, nomine non ab essentia eiudem, sed à duratione petito. Essentiam verò si spectes, definiti potest, quod sit febris à spirituum vitalium incendio, seu spiritibus vitalibus calefactis orta & dependens, & spatio vnius diei durans. Licet enim animalis & naturalis spiritus etiam incallescere possint: tamen antea nulla febris oritur, quàm spiritus virales incaluerint. Nonnulli quidem, ut Iac. Fontanus, de Febr. c. 7. nomine spirituum hæc intelligunt spiritus infixos & implantatos partibus solidis. Verum malè. Nam ephemeræ febres non ratione essentiae & subiecto; quod sunt partes similes calido cum insito tum influente præditæ, ab aliis febribus differunt: sed modo inhæSIONIS, & causæ ratione, quæ in ephemeris est calor spirituum vitalium, qui intemperiem calidam in partibus similibus, quæ essentiam febris constituit, fouet.

## De causis Febris ephemera,

Febris ephemera causa continens.

Causa enim ephemeræ febris proxima & continens, à qua proximè calida illa totius corporis intemperies & morbosâ dispositio actiones lædens, ortum habet, est inflammatio; seu caliditas spirituum vitalium in corde accensorum. Hi enim calefacti ubi in reliquum corpus à corde effunduntur, præternaturalem caliditatem illi communicant, & quidem absque omni putredine. Hinc & à putrida & ab hæctica differt. A putridâ quidem quod omnis abest putredo, neque ab humoribus putrescentibus ortum habet: ab Hæctica verò, quod calor ille à spirituum

Febris ephemera à putrida &amp; hæctica differt.

incendio, partibus solidis communicatus nondum in habitum quasi abiit, sed à spirituum incendio continuè fouetur, atque eo extincto ipse etiam euanesceat.

Calor autè ille in spiritibus pluribus de causis excitari potest. Omnes enim causæ illæ euidentes, quæ supra, cap. 2. enumeratæ sunt, exceptâ putredine, potentiam habent spiritus vitales calefaciendi, nunc immediatè nunc mediatè per spiritus animales, vel naturales. Nam ut dictum, aliquando spiritus naturales primùm præter naturam incallescunt, id quod in ebrietate & inedia fieri solet; nonnunquam animales, ut in vigiliis, curis: febris tamen ephemera non dicitur, nisi calor ille etiam spiritui vitali communicatus fuerit.

Causa euidentes febri ephemera.

Primò sæpe ex animi perturbationibus, ut tristitiâ, timore, sollicitudine, irâ, vigiliis nimis, nimiaque animi intentione, hæc febris oritur. Deinde corporis motus nimij, cum spiritus calefaciant, febres has excitant; ut euacuationes nimie, cum spiritus agitent atque inflamment: sicut etiam ex dolore, fame, siti, hæc febris oriri potest; cum ista omnia corpus exsiccare & spiritus imprimis accendere possint. Præter hæc cibus & potus calidus calorem in corpore augment, spiritusque inflamment: ut & ebrietas, ac cruditas in corporibus biliosis. Accidit enim in corporibus duplex cruditas. Vna, in quâ alimenta acidam qualitatem acquirunt, quæ in corporibus biliosis minùs frequens est, & minùs periculosa: Altera, in quâ alimenta in nidorosum & fumosum humorem conuertuntur, quæ in naturis calidis & siccis faciliè spiritus accendit, & febres generat. Præterea ad hanc febrem producendam facit æstus nimius aeris, ad ignem mora, balneum nimis calidum; aut quæ calida effluvia prohibent, ut balnea aluminosa & frigida. Pertinent huc tandem etiam inflammationes adenum & inguinum. Quamuis enim in bubonibus putredo sit, tamen putrida fuligo cordi non communicatur, sed quia materia certo & definito loco conclusa est, caliditas solùm partibus successiue ad cor vsque per alterationem communicatur. Perpendendum tamen hæc Lectori relinquo, an non etiam vapores putridi à bubonibus cordi communicari possint. Non enim ita vapores putridi in bubonibus concludi posse videntur, ut ad cor penetrare non possint. Vnde hæc febres videri possunt symptomaticæ putridæ potiùs quam Ephemeræ. Si v. pars aliqua nobilis, aut cordi vicinior inflammatione laboret, è qua vapor putridus ad cor penetrare possit, id quod in pleuritide, peripneumoniâ & anginâ fieri solet: non Ephemera, sed putrida febris generatur.

Vallesius, l. 5. contron. cap. 19. aliam adhuc causam febris ephemeræ adfert, nimirum putredinem spirituum, atque à spiritibus fieri diarias febres, vel putrescentibus, vel sine putredine statuit. Verumeniuero an spiritus putrescere possint, adhuc in dubio est, diceturque de eo suo loco. Siue enim putrescant spiritus, siue saltem à causa maligna incalcant: tamen febres, quæ tum excitantur, non diariæ sunt, sed malignæ & pestilentes; nisi forsitan nomen quis potiùs, quàm rem spectare velit: & brevis ille morbi terminus est à causa maligna.

An dentur ephemera ex putredine spirituum.

Incidunt autem in ephemeram febrem faciliùs calidi & sicci; cum in iis calidæ & siccæ fulgines colligantur, quæ promptè incenduntur, si vel diutius ieiunent, vel vigilent, vel exerceantur, aut simile quid ipsis accidat, quod spiritus incendere valet. Et si corpus sit cacoehymicum, ephemera faciliè in putridam degenerat, humoribus ob calorem illum præternaturalem putredinem concipientibus. Quod etiam faciliè accidit, si ephemera originem habeat à prohibita transpiratione, neque adhibeantur, quæ obstructiones & constipationes liberant. Hoc modo

Qui ad febri ephemeram sine dispositi.

enim febris prorogatur, & successu temporis humores putredinem concipiunt, atque ita ephemeræ putrida succedit; inprimis si corpus cacochymicum sit, & humores ad putredinem dispositi. Interdum quoque, præcipue si corpus sit siccus & inedia vratur, in hecticam ephemeram degenerat.

### De signis Febris ephemeræ.

Signa febris  
Ephemeræ.

Ne autem hoc accidat, & febris Ephemeræ in putridam vel hecticam abeat, id mox ab initio præcauendum: quod factum difficile non est, modò mox per sua signa cognoscatur hæc febris. Obseruandum autem est, quædam signa appellari inseparabilia, quædam propria, quædam inseparabilia & propria simul. Inseparabilia sunt, quæ affectum significant, & ab eo separari non possunt, & omni, sed non soli competunt, à quibus non licet argumentari affirmatiue, sed solum à negatione talium signorum, ad negationem affectus procedere. Proprium autem signum est, quod soli conuenit, omnibus tamen non conuenit. Proprium & inseparabile est, quod soli & omni conuenit.

Inter signa autem harum febrium Galenus, 1. de differ. febr. cap. 7. Primo loco ponit hoc; incipere à causâ procatactica, euidente & manifestâ. Quod quidem signum inseparabile est harum febrium; verum non proprium: nam & aliæ nonnullæ febres à causâ euidente & procatactica originem habere possunt; & ab iâ, tristitia, vigiliis, motu nimio, similibusque causis non solum febres Ephemeræ, verum nonnunquam putridæ vel hecticæ etiam excitantur. Vnde hic quidem licet argumentari negatiue: Hæc febris non incipit à causâ procatactica & manifestâ: Ergo non est Ephemeræ: sed non affirmatiue: Hæc febris incipit à causâ euidente: Ergo est diaria.

An omnis  
Ephemeræ  
incipiat à  
causâ euidente.

Verum an omnis febris Ephemeræ à primitiua & manifesta causâ incipiat, ab Authoribus in dubium vocatur; cum febres Ephemeræ non solum ab exercitio vehementi, animi perturbationibus, vigiliis, & aliis causis oriantur; sed & propter obstructionem & condensationem pororum cutis, ob cruditates & bubones: quæ omnia ad causas procatacticas & euidentes referri posse non videntur. Aliique aliter hoc dubium soluere conantur. Nos breuiter respondendum putamus; omnem febrem ephemeram quidem à causâ procatactica prouenire: verum non immediate semper & per se, sed nonnunquam per accidens & mediatè, sine putredine tamen. Ita aer frigidus, vel aqua frigida, aut aluminosa causæ manifestæ sunt, sed febrem hanc non generant immediate, sicut æstus vel similes causæ, sed mediatè, pariendo scilicet adstrictionem & occlusionem pororum cutis, quæ causæ manifestæ non sunt. Ita etiam humores, qui febres ephemeræ produciunt, à causis manifestis generantur. Sic enim distinguit Galenus, 4. aph. 55. De Ephemerarum, inquit, numero sunt febres illæ, quæ bubones, id est, in collo, aliis. inguine, & secundum aures glandularum tumores sequuntur, à causis euidentibus ortos. Alios verò bubones, qui sine causâ manifestâ ortum habent, verisimile est, unâ cum viscerum inflammationibus accessiones suas habere, atque idèò febres quoque, quæ cum talibus bubonibus sunt, malas esse necesse est: Deinde & hoc notandum, à Galeno & aliis Medicis inter causas procatacticas, potissimum externas recenseri; quod præcipuè inter illas sint & maxime euidentes. Pertinent tamen ad eas aliæ etiam, quæ sunt in corpore; modò sint euidentes. Euident enim non internæ opponitur, sed latentis & abditæ: de quâ re videatur Insit. lib. 2. par. 2. cap. 1.

Vbi ergo Medicus iam edoctus est, febrem aliquam à causâ euidente & manifestâ incepisse, inseparabilia illa & simul propria signa considerata: quorum

præcipua petuntur ab vrinâ & pulsu. Maxima enim, vt Galenus, 1. ad Glau. cap. 2. habet, in omnibus febricitantibus signa, in pulsibus & vrinis consistunt.

Secundò itaque vrinæ statim in principio talis febris in colore, substantiâ & contentis, vrinis sanorum sunt simillimæ, & mox aut sedimentum bonum, aut enæorema, aut nubeculam exhibent, & omnino bene coloratæ sunt. Nam calor ille præternaturalis præcipue in spiritibus hæret; humores verò corrupti ac accensi non sunt, neque etiam solida corporis partes, à quibus omnes actiones proficiuntur, multum à statu naturali recesserunt. Fieri ergo aliter non potest, quàm vt vrinæ iis, quæ secundum naturam sunt, sint simillimæ, aut certè ab iis non multum recedant; nisi aliud vitium accesserit, quod in Ephemeris, quæ ex cruditate proueniunt, fieri solet. In his enim vrina apparet cruda & albidior; quod tamen non fit ob febrem, sed ob cruditatem & defectum coctionis; ob quem, etsi nulla adesset febris, nihilominus vrina cruda esset. Et tunc nisi calor remittatur, facilè Ephemeræ in putridam degenerat.

Vrina in  
Ephemeris  
qualis.

Tertium signum à pulsu petitur etiam inseparabile est, & proprium. Vt verò vrina in Ephemeræ febre, ita etiam pulsus naturali propior est, quàm in aliis febribus; nisi quòd in magnitudine, celeritate & frequentia intendi solet. Licet enim in Ephemeræ febre diastole maior & celerior sit, quàm systole, eâ de causâ, quòd spiritus saltem inflammatus est, calorque supra modum auctus, & propterea caloris ventilatio ac maior refrigeratio requiratur: tamen cum calor sit purus, nullaque fuliginosorum excrementorum copia adsit, systole non mutatur, & præter celeritatem, magnitudinem, frequentiamque, in diastole nulla inæqualitas adest, & præterea istam æqualitatem toto durationis tempore retinet, quod in nullâ putridâ febre accidit. Si tamen alius concurrat affectus, ea proculdubio in pulsu mutatio coniungeretur, quæ illi affectui propria est. Vt si quis in febrem ephemeram incidat ex nimis vigiliis, labore, fame, quæ omnia virtutem debilitant; proculdubio etiam pulsus minores reddentur; causæ scilicet febri producentis potius, quàm ipsius febris ratione. Vbi verò febris decessit, habet hoc peculiare febris Ephemeræ, vt pulsus mox ad statum naturalem redeat, & talis omnino reddatur, qualis in sanis deprehenditur; quod in nullâ febre putridâ accidit, in quibus etiam intermissionis tempore inæqualitas quædam, putredinis humorum vestigium, animaduertitur.

Pulsus in  
Ephemeris.

Quartum signum, quod etiam inseparabile & proprium est, ab ipsius caloris conditione sumitur. Calor enim in febre Ephemerâ est mitis & suavis, respectu aliarum febrium. Etsi enim, si cum calore naturali compareretur, nonnihil molestus sit, & auctior deprehendatur, talis scilicet, qualis vel in iis, qui laborarunt, vel in ebriis deprehenditur, tamen cum aliis febribus collatus, blandus ac iuuauis est. Residet enim in materiâ tenui minimèque acri.

4.  
Calor in E-  
phemeris  
qualis.

Et quidem in ipso etiam statu & vigore calor moderatior est: vnde non tunc dicitur de iis, seu caloris in vigore benignitas, pro quinto signo habetur: quod licet inseparabile & proprium non sit, neque mox ab initio adsit: tamen in statu ad discernendam Ephemeram ab aliis febribus optimum signum est.

Sextò, etiam modo inuasionis differt ab aliis febribus. Inuadit enim sine frigore, horrore & rigore. Nulla enim adest materia, quæ partes neruolas ac membranosas vellicet. Et licet interdum vapor aliquis acrior horrorem parere possit: is tamen leuis omnino. Deinde in calore & pulsu ascensus & augmentum est liberum & æquale; cum nulla præsens sit materia, quæ inæqualitatem aliquam afferat, calorque ad interiora nec reuocetur, nec opprimatur,

5.

6.



nec in exitu impediatur; id quod in putridis quibusdam accidere solet. Nam etiam in putridis omnibus hoc non euenit, sed in quibusdam, ut in continentibus, calor nunquam recurrit, nec pulsus contractus apparet, neque necessario inæqualis. Vnde hoc signum inseparabile quidem est, sed non proprium.

7. *Septimo*, declinatio huius febris fit cum madore, seu humidâ euaporatione, sudori sanorum simili. Nam cum in hac febre Spiritus, ut & vniuersum corpus, incallescant: ex attenuatis, & ad cutem euocatis humoribus mador aliquis in cute apparet, non aliter, quam ab exercitio paulo maiore in sanis etiam corporibus sudor erumpit. Madorem autem illum perfecta *amputatio* sequitur, ut nullum post declinationem febris relinquatur vestigium, sed pulsus planè sit talis, qualis in iis qui sani sunt deprehenditur, & alia quoque, si quæ adfuerunt, symptomata cessant; id quod, ut etiam antea dictum, in aliis febribus non accidit, cum in iis etiam post declinationem, in pulsu relinquatur vestigium. Imò licet omnia Ephemeræ febris reliqua signa adsint, tamen si sine sudore omni desinat & perfecta *amputatio* non succedat, sed febris aliquod vestigium relinquatur, febrem ephemeram in aliam febrem permutari, indicio est; quod vel errore ægri, vel Medici accidere potest.

Nam si corpus siccior & calidius sit, febrisque à causis exsiccantibus, puta labore, vigiliis & similibus ortum habeat, atque tum victus tenuior exhibeatur, aut etiam corpus non satis humectetur: Ephemera in hecticam transit. Si verò corpus sit plethoricum aut cacochymicum, & cibus copiosior adhibeatur, vel medicamenta adstringentia usurpentur, aut omittantur aperientia, prohibita transpiratione febris putrida excitatur.

Atque hæc sunt febrium ephemerarum signa communia. Verum cum, ut antea de pulsu monuimus, illa interdum nonnihil secundum causarum varietatem varientur, & varietatem causarum ob curandi rationem perspectam habere summopere sit vtilia: signa etiam causarum in specie subiungemus breuiter: cum ex relatione ægri rectissime cognoscantur. Ab animi affectibus si fiat febris Ephemera, communiter vrina est rubicundior. In specie, qui ex ira febricitant, pulsum habent magnum, crebrum & vehementem; calor non est mordax, sed copiosus & blandus. In iâ enim sanguis copiosior cum spiritibus ad exteriora mittitur. Contrarium accidit in iis, qui ex animi tristitia, hac febre corripuntur. Pulsus enim in iis sunt parui, rardi, languidi ac rari: calor est acrior potius, quam copiosior: corpusque extenuatur, atque oculi concaui, redduntur, & insolita quadam decoloratio apparet. Quod etiam in iis, qui ex animi nimia intentione & curis in febrem hanc incidunt, contingit. Verum in his minor, quam in iis, qui ex tristitia febricitant, corporis extenuatio, oculorum cauitas, & decoloratio faciei apparet. Verum ex oculis, sicut etiam in sanis omnes affectus, facile hæc animi pathemata discernuntur; oculique fenestræ quasi sunt aperti. Qui ex vigiliis febricitant, iis facies est humidior, oculorumque motus grauior, ac vix palpebras attollunt, atque in palpebris etiam est humiditas quadam. Qui autem ex lassitudine laborant, eorum cutis est siccior, quam in ephemeris ex aliis causis ortis. Nam ex labore & motu humiditas corporis absorbetur. Et hoc quidem omnibus, qui ex labore nimio & lassitudine in hanc febrem incidunt, commune est usque ad statum. Post statum verò in iis quidem, qui supra modum defatigati non sunt, ex profundo corporis humidus vapor ad ambitum erumpit, vnde cutis humida redditur. Si verò motus nimius fuerit, & maxima humorum copia per eum exhausta sit, siccitas etiam declinante febre permanet. Si ex cutis constrictione

febris oriatur, vel tactu id cognoscere licet. Nam cutis est durior & compactior, calorque primò quidem mitis apparet, ob pororum occlusionem, sed si cutis diutius tangatur, poris patefactis postea augeri animaduertitur. Vrina etiam his rubicundiores sunt, neque moles corporis concidit, neque oculi caui fiunt. Si ex bubonibus febris Ephemera fiat, pulsus sunt maximi, veloces & frequentes, non vero inæquales. Mouendi enim instrumentum impeditum non est, sed solum necessitas & vsus adauctus: Calor est multus & suavis; facies rubet. Quæ tandem ex nimia repletione fiunt febres ephemeræ, habent symptomata, qualia Synocha sine putredine. Eorum enim oculi & facies rubicundior est, pulsus magnus & velox, vrina rubicundior.

### Prognostica.

Sunt autem Ephemeræ omnes suâ naturâ breues, imò ut plurimum breuissimæ, quæ scilicet ultra diem naturalem seu 24. horas non extenduntur: ex se item atque suâ naturâ omni periculo vacant; modò error aliquis non committatur; si scilicet in temperamento calido sicco inedia vel purgatio instituat, si in temperamento calido & humido purgatio vel venæ sectio omittatur, cibus copiosus & acris præbeatur, corpus aëri frigido obiciatur. Pro diuersitate autem causarum, à quibus producuntur, facilius vel difficilius tolluntur: & quæ difficilius tolluntur, in iis metus est, ne in putridam degenerent. Animi affectus subiti ipso tempore cessant: at corporis lassitudo & à caliditate inducta intemperies diutius durat, diutius adhuc cruditates, cutis densitas, & obstructio. Cuius enim hæc non solum simplicem intemperiem calidam excitant, sed & vitiosos humores in corpore, vel generant, vel retinent, & propterea putridam febrem minantur.

Porrò si Ephemera ultra diem naturalem extenditur, nullus sudor erumpit, aut post sudorem 24. horarum terminum excedit, aut si dolor capitis ephemeram comitetur, isque perseueret: vel in Synocham sine putredine, si corpus sit iuuenile, plethoricum, tempus verum; vel in putridam mutatio metuenda, si incidat in corpus cacochymicum. Nisi enim quod vitiosum est, penitus transpiret, ut putrescat, necesse est. In hecticam verò, si corpus sit calidum, siccum, rarum. Atque ipsa etiam febrium signa propria, in quam febrem fiat mutatio, monstrant. Nam si dolor capitis, corporis grauitas, vrina tincta & cruda, & alia putridæ signa perseuerent, in putridam degenerare indicio est. Si verò arteriæ ad tactum cæteris partibus calidiores apparent, febrisque in eodem statu semper manet, & calor post cibum, & dum assumitur cibus, augetur, & in pulsu cum æqualitate durities & paruitas observatur, ac reliqua hecticæ signa adsunt, in hecticam mutari argumento est.

### De Curatione Ephemera.

Ut autem Ephemera rectè curetur, tria Indicantium genera, ut & in omni morbo, perpendenda sunt; Morbus ipse, causa morbi, & virtus; è quibus tamen hinc sola curatoria Indicatio, quæ à morbo petitur, præcipue respicienda. Nam cum febris Ephemera ferè causam internam non habeat, etiam indicatio præseruatoria in eâ locum non habet, febrisque Ephemera simplex quidam affectus est, & in eâ, ut Galenus, 10. meth. med. cap. 1. habet, faciendorum indicatio ex ipsâ febre maximè capienda. Sed cum hinc aliquis dubitare possit, annon etiam hinc indicatio præseruatoria locum habeat; cum febris Ephemera *σχημα* sit, & à spirituum incensorum feruore, ut causâ continente, dependeat: sciendum, cum

Ephemera in aliam febrem degenerantia signa.

Ephemera in hecticam degenerantia signa.

Indicationes in Ephemera.

Indicatio præseruatoria unde potatur.

Febrium Ephemerarum in aliis degeneratio.

Signa causarum in Ephemeris.

*Causa continens indicatorem.*

cum dicitur, à causâ sumi indicationem præservatoriam, id saltem de causâ antecedente esse accipiendum; causa verò continens cum definitionem morbi ingrediatur, & iam præsentem morbum foueat, non verò futurum productura sit, indicationem curatoriam præbet. Nam cum ægrotantia corpora, quando morbo liberantur, curari propriè dicantur; sublata autem causâ continente morbus tollatur, sicut eâ posita ponitur: meritò à causâ continente indicatio curatoria sumi dicitur. Præservatoria autem Indicatio ad causam, quæ morbum facit & auctura est, dirigitur. Calida nimirum intemperies totius cum feruore spirituum coniunctim accipitur; & cum dicitur, febrem ephemeram refrigerantia, & consequenter humectantia indicare, non absolute solum ad intemperiem partium solidarum respicimus, sed coniunctim etiam ad calorem & feruorem spirituum. Causæ verò externæ & euidentiores, si adhuc præsentis sint, opus est ut remoueantur, & æger earum actionem nimiam vitet. Indicationem verò vitalem quod attinet, raro, ut Galenus, *meth. med. cap. ult.* docet, in Ephemeris indicatio à viribus sumitur. Etsi enim ex in hac febre negligendæ planè non sint, tamen plerumque tam robustæ & vegetæ sunt in hoc morbi genere, ut si eas cum morbo conferas, non opus sit, ut Medicus sit valde de iis sollicitus.

Intemperies itaque illa calida totius à feruore spirituum incensorum dependens, in primis hic Medico consideranda, & ad illam curatio dirigenda. Si tamen accadat, ut causâ morbum excitans adhuc præsens in corpore sit, & illa tollenda est; quæ proit varia est; ita varia agenda sunt. Nam si ex calidorum vaporum retentione, ob poros cutis oclusos, febris accendatur, eos aperire oportet. Si causâ sit cruditas, ea concoquentibus tollenda: Si alia, & illa amouenda. Hæc cum ita se habeant, facillè hinc patet, à tali febre multum periculi non imminere, easque facilis curationis esse, quas natura, utpote robustior, plerumque etiam suâ spontee eiicit: vnde raro ad febres hæc curandas vocantur Medici.

Veruntamen licet raro ob febres ephemeræ Medicorum auxilium imploretur, accidit tamen interdum ut viri principes, aut, qui alias suæ sanitatis curam diligentiores gerunt, quamprimum minimâ corporis parte dolent, aut aliquam in corpore mutationem sentiunt, Medicum consulant, cuius officium est, & nôsse, quid remediij hæc febris, si opus sit remediis, requirat, & in primis in id intentum esse, ne, quæ simplex est, in ephemeram plurium dierum abeat, aut in putridam, vel hecticam mutetur, ac ne morbus per se minimè periculosus in grauiorem degeneret.

Proinde ut rem paucis comprehendamus, præsidia quæ ad refrigerandum & humectandum hic utilia sunt, duobus ferè capitibus Antiqui includebant, Victu & Balneo. Remediis verò accuratioribus vix opus est, nec temerè vel purgantibus, vel venæ sectione æger molestandus.

*Victus* ergo sit refrigerans, & humectans; facilis coctionis, boni succi, ut cremor hordei; carnes vitulina & hædinæ, quæ pro occasione lactucæ, acetosæ, buglosæ, succo citri, aceto, alterari possunt. Cauendum est ab oleo & pinguibus, quæ facillè inflàmantur.

Potus sit aqua hordei vel cereuisia tenuis, vinum item colore album, substantiâ tenue, quod coctionem adiunget, & vrinas, & sudores promoueat. Et quidem vigiliis ac curâ confectis, id liberalius concedendum, utpote quibus spiritus exhausti sunt, quos vinum facillè reparat. Quibus tamen caput dolet, ij omnino à vino abstineant; sicut & ij, qui ex irâ in febrem hanc inciderunt, cum magnus in iis sit sanguinis & humorum feruor: nisi omnis illa animi perturbatio iâ sedata sit. Abstineant etiam à vino, qui ex bubone in

hanc febrem inciderunt. Auget enim vinum humorum fluxum.

*Balneum* quod attinet, antiquis quidem, ut apud Galenum passim videre est, illud in hoc morbi genere, ut & pluribus aliis, fuit familiarissimum; sicut hodie quoque Egyptij non solum ad sanitatem tuendam, sed & ad varios morbos sanandos balneo frequentius vtuntur, ut refert Prosper Alpinus, *lib. 3. de med. Egypti. cap. 19.* Verum in balneis parandis non eadem apud nostros adhibetur industria, nec homines nostri ita balneis assueti sunt: præterea maxima hominum pars in victu errores committit; vnde in ventriculo & intestinis crudorum humorum copia cumulat: quâ de causâ tutò, ac si pura essent corpora, balneum adhibere non licet, ne humores in corpore contenti agitentur & inflammentur. Ac proinde loco balnei aliis remediis tutioribus, quæ idem præstare possunt, vtendum.

Cæterum cum causarum, quæ febres ephemeræ excitant, aliqua varietas sit, quæ diuersas etiam dispositiones corporibus inducunt, è quo causarum genere febris ortum habeat, in curatione attendendū, & semper causis euidentibus febrem gignentibus resistendum, v. g. si à nimio aëris calore inducta febris sit, in aërem frigidiorē æger est transferendus, & cibus refrigerans, & humectans offerendus. Si à labore & motu nimio proveniat, quies imperanda, & labore dissipata corporis substantia vberiore cibo, sed cocto facili, reparanda. Et quidem qui temperatura corporis calidiorē sunt, eos statim cibare expedit; ne Ephemera in putridam vel hecticam abeat. Si à vigiliis orta sit febris, somno indulgendum: si à fame, cibus dandus: si ab irâ, tristitiâ, curâ, affectibus ij moderandi, & animus ad contraria deducendus est, victusque refrigerans & humectans iis præscribendus, ut antea dictum. Per quæ, sine omni medicamentorum ope, febris ista, naturæ auxilio sponte discutitur.

Maiorem autem paulo diligentiam requirunt Ephemeræ, quæ ex cutis densitate vel obstructione, aut cruditate ventriculi oriuntur. Hæ enim facillè & leui occasione, sæpe etiam nullo errore commissio, in putridas abeunt. Obstructio primò cutis raro quidem febrē ephemeram, sed plerumque humoralem excitat. Id tamen si fiat, non tam ab ipsâ obstructione curatio inchoanda, quàm à morbo appatu. Et cum obstructio, quæ ephemeram excitat, potius proveniat à copiâ humorū, quàm à cacoehymia (hæc enim si adesset, statim putrida procrearetur) mox sanguis imminuendus est, ut obstructio, vel statim solvatur, vel humores liberius ventilari possint, donec aperiētibus medicamentis obstructio planè tollatur. Verum quia ista febris magnam cū febrium Synocharum curatione cognationē habet, ex earum curatione & huius curatio postea clarior euadet.

Cutis densitas à duabus causis oritur, vel à frigore aut astringente re aliquâ, ut balneo aluminoso, vel à rebus valde siccantibus, quales sunt æstus Solis, calor ignis magnus, labor vehemens. Quæ ex frigore vel adstringente re ortum habet febris ephemera, ea (si nullus adsit in corpore morbosus apparatus, qui venæ sectionem desideret) curatur iis, quæ cutem rarefaciunt & aperiunt, ut, prohibito vaporum effluuiio viâ rursum aperiuntur. Antiqui in hoc febris genere felicissimè utebantur balneo: Verum, ut dictum, nostrorum hominum corpora iis tutò non committuntur. Quapropter, aliis tutioribus auxiliis vtendum, mollibus scilicet frictionibus, oleis tepidis & temperatis corpus inungendum, sudoresque prouocandi. Qui verò ex causâ, quæ vim habet corpus exsiccandi, febre corripitur, cum cibo, tum potu refrigerante & humectante vtantur. Frictio non conuenit, nisi lenis & blanda: corpus fouendum potius oleis temperatis & humectantibus. Corpus etiam bene lectum seruandum, ne aëris frigidioris appulsu pori magis claudantur.

Tandem

*Balneum in Ephemera.*

*Causarum in ephemerâ amotio.*

*Ephemeræ ex cutis aegritudine curatio.*

*Victus in Ephemerâ.*

*Ephemera ex  
cruditate cu-  
ratio.*

Tandem cruditatem quod attinet, duplex illa est: Vna ex calore diminuto, altera ex calore præter naturam aucto: Illam Medici cruditatem acidam; hanc nidorofam appellant. In acida enim cruditate in acidum humorem cibi vertuntur, agri sentiunt acidus ructus, acidumque saporem percipiunt & pituitam vomunt. In nidorofa verò cruditate, nidorofum quid è ventriculo ascendit. Illa, vt dictum, fit ob caloris inopiam, quæ accidit vel ob nimiam cibi copiam, quæ calorem debilitat; vel ex nimia frigiditate. Nidorofa verò fit ob caloris exuperantiam. Alimenta tamen quædam etiam suâ naturâ, præcipuè idoneum nacta ventriculum, faciliè in nidorofum quid abeunt, vt oua frixa, pisces frixi, mel, lac, & similia. Corruptionem etiam faciliè subeunt fructus fugaces; persica, fraga, mora, melones, cucumeres, &c. In hac ventriculus distenditur, caput vaporibus repletur & dolet, corpus ignauum redditur. Acidam cruditatem, quod attinet, ex ea raro quidem, vt Galenus 8. meth. med. cap. 5. docet, febres Ephemeræ accenduntur. Si tamen id accidat, & leuior illa sit, nondumque materia planè aciditatem concepit, sed potius cibus semicoctus & crudus est, & talis, qui à natura in meliorem statum deduci possit, danda est opera, vt cibus ille semicoctus concoquatur. Propterea corpus somno & quieti dandum. A somno cibus facilis coctu dandus, ventræque oleo mastichino, absinthij, menthæ inungendus. Si autem maior cruditaris copia adsit, vt nauscam pariat, aut aliàs æger ad vomitum proclius sit, rectissime fit, si cibus ille crudus vomitu reiiciatur, & postea æger dormiat, atque ab omni cibo absteineat. Ita enim rectissime cruditates illæ corriguntur. At si frigiditas maior sit, atque diffidamus ventriculi calorem cibo concoquendo sufficere: oleis prædictis ventriculus fomentus & panis albus vino odorato irroratus, & puluere cinamomi, vel speciebus aromatici rosati conspersus, vel Zingiber conditum exhibendum; & si opus fuerit, vbi cibus ad intestina descendit, clyster iniici potest. Quod si cruditas eòvsque progressa sit, vt cibus iam in acidum degenerauerit, coctione solâ is non corrigitur, neque bonitatem pristinam recuperare potest. Ergo optimum est, vt vomitu reiiciatur, aut si id faciliè fieri non possit, medicamento saltem primas vias expurgante è corpore excludatur. Febre cessante, postea ventriculus roborandus erit. Quod si cruditas nidorofa fuerit, frigidis sumptis eius concoctioni studendum: quibus si non emendatur, vel vomitu cibus reiiciendus, vel mox antequam in venas distribuatur, manna, Syrup. rosar. vel violar. solutiuo, rhabarbaro vel similibus per aluum euacuandus. Quod si morsus aliquis in ventre adhuc supersit, abstergenda materia absinthio, & ventriculus roborandus rosulis diarrhod. Abbat. Extra verò venter inungendus oleo rosaceo, mastichino, absinthij, &c. Cibi verò succo agrestæ; acetosæ, citri, &c. condiendi.

*Diatrion pi-  
pereon an in  
cruditate co-  
umiat?*

Vnum hoc loco monendum de vsu medicamenti, quod à triplici pipere Diatrion pipereon vocant, & in febribus ephemeris ex cruditate ortis commendant. Vulgatum est illud medicamentum, & hodie etiam notum poratoribus à crapula malè habentibus, & præscripsit illud Galenus, 8. meth. med. cap. 5. Verùm Galenum reprehendit Alexand. Trallianus, lib. 12. cap. 14. & mirari se scribit, quod Galenus calidum medicamentum hoc calido affectu laborantibus & nidorofam cruditatem à calore patientibus præscripserit Ioh. Herculanius, in Auicenna lib. 4. fen. 1. tract. 1. cap. 53. duobus modis dubium hoc soluere conatur. Primum dicit, Galenum & Auicennam hoc medicamento vti, quando cibus corruptus est ad acetosum, & corruptio facta à frigida intemperie. Verùm etsi hoc etiam Alexand. Trallianus fieri

velit, & diatrionpipereon & alia calefacientia medicamenta rectè viurentur, quando non à calidâ sed à frigidâ intemperie cruditas facta: tamen si Galeni mentem attendamus, ille etiam in nidorofa cruditate diatrionpipereon admittit. Aliam igitur solutionem adfert Herculanius, quæ & textui Galeni respondere videtur, nimirum idèò adhiberi, vt si corruptus cibus sit in ventriculo, ac vomitus difficilis sit, corruptus cibus ad inferiora præcipitetur, & per aluum excernatur, ac si quid crudi supersit, coquatur. Verùm tutius forsàn fuerit, aliis commodioribus & minùs calefacientibus cibum illum corruptum ad inferiora promouere.

Quod si accidat, vt venter sponte fluat, (nonnunquam enim diarrhœa ex cruditate oritur) non tamen nimium fluxerit: abstergenda materia illa Syrup. rosar. sol. mannâ, fol. senæ, rhabarb. & hinc ad ventris roborationem per oleum absinthij, mastichinum, Cydonior. &c. deueniendum. Quod si venter iam nimium fluxerit, vt virtus iam sit debilitata, mox ad virium roborationem veniendum. Atque vtile hîc est, intus quoque confortantia ventrem sumere, vt conferuam rosar. antiquam, Syrupum & carnem cydoniorum conditam, ac similia.

Plura qui de hac febre curanda legere cupit, consulat Galenum, 8. meth. med. vbi de febris Ephemeræ, secundum omnium causarum diuersitatem, curatione prolixè agit, & Auicennam, lib. 4. fen. 1. tr. 1. prolixè etiam secundum omnium causarum differentias de febre Ephemerâ agentem, Aërium, tab. 2. Serm. 1. cap. 39. & seqq. Paul. Æginetam lib. 2. cap. 16. Alexand. Trallian. lib. 22. cap. 1. Actuarius. lib. 3. meth. med. cap. 16. Oribas. lib. 6. Synopsis. cap. 6.

## CAPVT VI.

## De Ephemera plurium dierum, &amp; Synochâ sine putredine.

Atque hæc, quæ de Ephemerâ diximus, de legitima & propriè dictâ maximam partem accipienda sunt, id est, de eâ febre, quæ & naturam & nomen ephemeræ propriè habet, Seu quæ à spirituum solum vitalium in corpore incendio, citra alterius rei in corpore mutationem, ortum habuit & propterea vnicum saltem diem durat. Est verò adhuc febris ephemera illegitima, de qua iam dicendum; quæ & ipsa quidem nec hectica est, nec putrida, & propterea ad ephemeræ refertur: quia verò ultra diem extenditur, ab antiquis, appellationis, vt potest, quæ de essentia talium febrium non sit, non ita magnâ habitâ ratione, & in defectu conuenientioris nominis, & ipsa ephemerâ, sed cum adiectione, plurium dierum, nominatur. Vulgò etiam *εὐνοχὴ* *μικρὴν* (de quâ appellatione suo loco dicetur) sed ad differentiam putridarum, sine putredine appellant, quod sine omni remissione aut intensione à principio vsque ad finem perdurat, à putredine verò humorum ortum non habet.

*Ephemera  
plurium die-  
rum.*

Veruntamen aliqua inter febres ephemeræ plurium dierum, & Synochas constitui posse videtur differentia. Ephemera enim plurium dierum quælibet febris appellari potest, quæ neque ad hecticam, neque ad putridam pertinet, & proinde ad primam hanc febrium classem referenda est, ad plures tamen dies extenditur. Tales febres primò sunt, in quibus quidem solum spiritus accensi sunt, & eandem cum febribus ephemeris, quæ nomine etiam tales sunt, planè naturam habent, ob quam rem etiam earum causas præcedente capite inter causas ephemerarum legitimarum recensuimus. Earum tamen causa durabilior est, vel etiam aliquid prius, aut simul cum spiritibus accendit, à



quo postea spirituum incendium ad plures dies continuatur. Tales causæ sunt, obstructio vasorum circa cutem, quæ si in corpus cacochymicum incidat, aut non probè curetur, diariam plurium dierum gignit, vel etiam in putridam degenerat; repletio item & ebrietas, catarrhi, bubones. Omnes enim tales causæ cum non mox, vt reliquæ procatacticz, desinant, incendium etiam spirituum continuò fouent, quod durat, donec causa illa cesset.

Atque hæc febres, ephemeræ plurium dierum propriè quidem appellantur. Verùm Synocha febres non propriè dicuntur.

*Synocha sine putredine.*

Synocharum enim sine putredine alia est ratio, quæ generantur à spirituum incendio, & sanguinis tenuioris effervescentiâ. Dicuntur quoque vulgò hæc febres inflatæ. Dum enim copiosioris sanguinis pars tenuior accenditur, & vaporem copiosum emittit, ægri corpus tumidum & quasi inflatum apparet. Et propterea definiri potest hæc febris, quod sit febris, à spirituum & sanguinis tenuioris effervescentiâ oritur habens, trā vel quatuor, vel non multo plures dies durans. In hac ergo febre cum non solum spiritus, sed & sanguis tenuior incendatur, à reliquis & propriè dictis ephemeris aliquo modo differt. Differt quoque à putridis quod nulla humorum putredo, sed saltem effervescentia adest.

#### Causa.

Continens igitur huius febris causa est feruor spirituum & sanguinis in vasis omnibus, aut certè maioribus. Quia enim duratio huius febris continua est, feruor ille sanguinis in tali loco hæreat oportet, è quo continuus calor cordi communicari possit: quod fieri non potest, nisi sanguis, vel in omnibus, vel maximis vasis effervescat. Vnde definiri potest Synocha sine putredine, quod sit febris continua, nullam, antequam planè desinat, remissionem habens, à spirituum & sanguinis tenuioris portione incensa, orta ac dependens.

*Synocha sine putredine definitio.*

Causam verò quæ feruorem hunc excitat, quod attinet, etsi nonnulli eandem Synochæ huius atque aliarum ephemerarum causas esse statuunt, & causas illas omnes, cum leuiiores fuerint, diariam simpliciter ita dictam; cum vehementiores, Synocham absque putredine producere putent: tamen rectius eos sentire existimamus, qui non à quacumque causa euidente, hanc febrem provenire statuunt, sed tantum à prohibita transpiratione calidi effluuij, ex constrictione & obstructione meatuum cutis. Imò nec ipsa cutis obstructio & constriction, febrem hanc excitabit, nisi sanguis copiosior in corpore adsit, atque id, quod transpirat, sit copiosum & calidum. Si enim adesset quidem obstructio, non verò vnà copia sanguinis, potius putrida, quàm hæc Synocha sine putredine proveniret. Ac propterea etsi obstructio à pluribus causis fieri possit, ab humorum multitudine, crassitie & visciditate: tamen vt in omni Synochâ sanguis abundet, & plenitudo adsit, requiritur. Reliquæ verò causæ, etsi interdum coniungi possint; & si crassior aliqua pituita adiungatur, facilius fiat obstructio: tamen solæ & absque plenitudine hanc febrem producere non possunt, id quod etiam de adstrictione pororum cutis ab adstringentibus & condensantibus dici potest: & si sanguinis copia desit, potius putrida generatur. Si verò in venis sanguinis copia adsit, ab illo etiam vaporum calidorum magnam copiam attolli necesse est, quæ si ob nimiam copiam, siue ob obstructionem aut constrictionem meatuum cutis sufficienter euaporare non possit, feruorem in sanguine à retentis excitari necesse est. Cum verò dicimus ab obstructione, aut adstrictione pororum cutis febrem hanc fieri, non om-

nimoda eorum occlusio, vt nihil planè effluere possit, intelligenda est, sed ita hoc accipiendum, si plus à sanguinis copiâ vaporum calidorum attollatur, quàm euacuari possit, ob meatuum angustiam, calidus ille vapor retentus, & ex retentione calidior redditus, proxima accendit, & corpus quasi inflat, vnde hanc febrem inflatiuam quoque nominari diximus.

Ex quibus patet, ad hanc febrem maximè dispositos esse eos, qui corporis habitu sunt carnosiore, & sanguine abundant, imprimis si accedat corporis densitas. Vnde temporibus verno, ætati iuuenili, ac iis, qui vino, ac cibis boni & multi succi immoderariùs sese replent, & quibus consuetæ aliqua sanguinis per vterum, hæmorrhoides aut nares euacuatio suppressa est, febris hæc familiarior est. In frigidis verò corporibus & parum sanguinis habentibus, sanguis faciliè non effervescit, & proinde febris hæc in iis faciliè non oritur, sicut nec in iis, qui raro sunt corporis habitu, porosque habent patentiores, per quos vapores illi calidi faciliè effluere possunt.

*Qui sine dispositi ad Synocham sine putredine.*

Durat autem hæc febris plures dies. Nam cum proxima & continens, harum febrium causa sit feruor sanguinis & spirituum, neque febris cesset, antequam ille desinat; vaporum verò copia ex sanguine maior sit, quàm in ephemeris simpliciter dicta, ac præterea adsit obstructio, vel adstrictio pororum cutis: vnica die omnes illi vapores discuti non possunt, ac proinde ad tertium vel quartum diem sæpe hæc febris extenditur.

*Curatio synocha.*

Cum verò ex vapore sanguinis accensi hæc febris oriatur, & tamdiu duret, quamdiu accensa noua materia suppeditatur, & tota transpirare non potest: ex proportionem vaporum, qui ex sanguine accenso oriuntur, ad eos, qui transpirant, triplex constituitur huius febris differentia. Si enim, id quod accenditur par est ei, quod transpirat, ac propterea calor inde ortus toto febris decursu æqualis manet, appellatur *synocha* seu *synocha*. Si verò plus accenditur, quàm transpirat, atque ob id calor continuò augetur; *synocha* nominatur. Si tandem plus transpirat, quàm accenditur, & propterea calor à summo vigore incipiens sensum imminuatur: nominatur *synocha*.

*Differentia febris synocha.*

#### Signa.

Signa huius febris ferè eadem sunt, quæ reliquarum ephemerarum; magis tamen euidentia. Calor enim licet & ipse blandus sit: tamen maior paulò, quàm in reliquis ephemeris sentitur. Cutis non est sicca, sed madore quasi perfusa. Vrina & ipsa naturali similis est; crassior tamen & rubicundior. Pulsus vehemens, celer, frequens, plenus & magnus atque æqualis. Facies & totum corpus rubet, ac quasi inflatum apparet. Venæ copiâ sanguinis tument & turgent; Vnde lassitudo tendens oritur. Caput graue est, respiratio difficilior, somnus plerumque profundus, per quem rubra spectra offeruntur.

#### Prognostica.

Febris hæc post ephemeram curatu facilis est, & periculo vacat, soluiturque vt plurimum sudore, aut hæmorrhagiâ intra quartum, aut si longius extendatur, intra septimum. Cum enim eius causa continens sint spiritus incensi, ac sanguis incallescens, virtusque valida sit, faciliè cedit, si rectè tractetur. Etiam si calor febrilis semper augeatur. Facilius tamen tollitur, si similis permanet: Facillimè, dum sensum imminuitur. Si autem vel ægri, vel Medici errore non rectè tractetur, periculosa fieri potest. Ex Synochâ enim sine putredine in putrem facilius transitus. Et si magna adsit sanguinis copia, nisi vel à natura,

natura, vel artis ministerio minuitur, metuendum; ne in phrenitidem, anginam, pleuritidem, aliudve graue ex plethora malum transeat.

## Curatio.

Indicationes  
in Synocha  
sine putredine.

Cum febris Synocha sine putredine ex spirituum & sanguinis tenuioris incendio ac feruore ortum habeat, ob prohibitum illud calidum effluuium: facile patet ad eam curandam, sanguinem euacuantibus, alterantibus, & meatibus corporis aperientibus, opus esse. Et sanguinis quidem euacuationem quod attinet, omnino ea necessaria est: cum febris hæc nullo modo excitari possit, nisi sanguis copiosior in corpore adsit.

Remedia Synocha sine putredine.

Remedia autem, quibus indicationibus satisfaciebant antiqui, duo inprimis erant: sanguinis euacuatio & frigida aquæ potio. Et prius quidem quod attinet, cum, vt antea dictum, sine sanguinis copiâ hæc febris non generetur, sanguinis euacuatio omitti non potest. Et nisi adhibeatur, corporique libera ventilatio restituatur, facile, vt dictum, fieri potest, vt putrida febris excitetur, vel sanguis in aliquam partem decumbat & periculosum morbum excitet. Quare non differenda est venæ sectio, sed quamprimum venâ aperienda, vt immutato sanguine transpiratio corpori libera reddatur, sanguinis feruor remittatur & natura eundem rectè gubernare possit. Neque sine sanguinis missione facile, vel sanguinis feruor temperari, vel obstructions liberari, & corpori transpiratio expedita reddi potest. Etenim etsi quis refrigerantia medicamenta adhibeat; tamen copiam sanguinis non tollunt: quæ verò cutem rarefaciunt, calefaciendo febrem augent. Si tamen cruditas est in ventriculo, differenda est venæ sectio, donec cibus concoctus sit, & ad intestina descendit. Ita Galenus. 9. meth. med. cap. 4. venæ sectionem in adolescente primo die distulit, cum vt certius cognosceret, cuius generis febris esset, tum propter eam, quæ præcesserat, coctionis cruditatem. Si tamen in ventriculo, vel intestinis aliquid vitiosi humoris inhæreat, vtile fuerit, blandis medicamentis, vt cassiâ, mannâ, vel Syrupo infus. multiplic. rosar. aut lenientibus clysteribus prius id tollere. Imò si suspicio sit ad septimum diem morbum posse protrahi, opus est ferola & biliosa excrementa, ob quæ hæc febris in putridam abire posset, euacuare, cassiâ, tamarindis, syrupo ex infusione rosar. violar. rhabarbaro in aquâ cichorij vel endiuiz infuso.

An sanguis  
ad animi deliquium  
miserendus.

Quantitatem sanguinis euacuandi quod attinet, Galenus quidem vsque ad animi deliquium in hac febre sanguinem euacuare solebat. Ità enim loco modo allegato, scribit: *Aufero ab homine eo usque de industria sanguinem, quoad animo linqueretur: maximum plane, ubi valentes vires sunt, continentis febris remedium: Id quod cum ratione, tum experientia didici. Primum namque in statum contrarium agitur corpus celerrimè ex animi defectu refrigeratum. Postmodum in eiusmodi corporibus necessario supervenit alui deiectio, nonnunquam etiam bilis vomitus, quas res statim à toto corpore madores, sudoresve excipiunt. Qua nimirum omnia cum huic quoque contigissent, protinus febrem extinxerunt sic, ut quidam ex iis, qui aderant, iugulasse me febrem per iocum dicerent. Hæc Galenus. Verum etsi in nulla febris specie copiosius sanguinem, quam in hac, detrâhere liceat: tamen videndum, ne dum Galeni exemplo febrem iugulare conamur, ægrum simul iugulemus, & quod ipse Galenus monet, ac tribus Medicis enuisse scribit, lib. de cur. rar. per vena sect. cap. 12. non opinantibus, pro animi deliquio mors adueniat. Licet enim nonnulli hîc distinctione utantur, & licere, dicant sanguinem euacuare vsque ad lipothymiam, non verò vsque ad syncopem, tamen cum syncope & lipothy-*

mia gradu differant, illum terminum attingere, non ita semper in Medici potestate est, atque accidere potest, vt nec opinantibus, vt modò ex Galeno dictum, syncope, atque aded ipsa mors adueniat. Quare cum eodem Galeno statuimus, satius esse, tum copiosis euacuationibus abstinere, ac sanguinis euacuationem partiri, ac primâ vice, quantum visum fuerit detrâhere, & postea, si opus fuerit, venæ sectionem reperere, inprimis cum non semper vires corporis Medico satis perspectæ sint, & nostro seculo ac regionibus homines largis istis sanguinis euacuationibus non sint assueti.

Alterantia verò quod attinet, Galenus inter ea proponit aquam gelidam, quantum ægro bitere libet inprimis si frigida potioni æger assueverit. Verum cum frigida potioni nostri homines rariùs sint assueti: potius aliis auxiliis est vtendum: atque aliàs etiam cautio adhibenda est, & ea incommoda cauenda, quæ intempestiuam frigida potione solent commitari. Nam vt Galenus etiam, allegat. loc. c. 5. hæc proponit; Intempestiuâ frigida potio lentos crassosque humores, siue hi obstructionem, siue putredinem, siue phlegmonem, siue quemcumque alium similem affectum creauerint, attenuari digerique prohibet. Deinde vbi aliqua corporis pars imbecilla fuerit, siue ita ex naturali intemperie se habeat, siue ex vitio adscititio, & vel gula, vel ventriculus, vel pulmo, vel septum transversum, vel renes, vel hepatis se malè habeant: à frigida potione ægri non parum læduntur, & per eam hinc in hydropem, difficultatem spirandi, conuulsiones, tremorèque conici possunt. Quapropter cum conditiones illæ obseruatu difficiles sint, & aquæ frigida potio plurimos læserit, aliis tutioribus ad sanguinem refrigerandum remediis vti licet. Qualia sunt oxymel dilutius, aqua cichorij, endiuiz, violar. vel decoctum hordei cum succo citri, oxysaccharo, spiritu salis, vitrioli, & alia medicamenta ex iis, quæ refrigerandi simulque aperiendi vim habent; qualia sunt inprimis cichoracea parata, è quibus non dulces syrapi fieri, sed potius decocta parari debent: Aut si Iulepi parantur, dilutiores sint.

Alterantia  
in Synocha  
sine putredine.

Incommoda  
intempestiuâ  
potioni frigida.

Vel ℥. Conserva rosar. acetosa, violarum, an. Vnc. i. lactuca Ital. condit. Vnc. 5. spec. diamarg. frig. Drach. 5. Cum syr. acetos. cit. F. Electuarium.

De quo sumat æger cochlear vnum, & bibat cyathum iulepi violarum, vel è succo citri.

Si autem obstructions cutis non solum ex sanguinis copiâ proueniunt, sed cum hac etiam crassi & visciidi quidam humores adsint, qui meatibus corporis obstruant, aut cutis condensata sit, modo, quem præcedente capite proposuimus, etiam illæ tollendæ sunt. Neque serò solum internis ad calorem sanguinis extinguendum remediis vti licet, verum etiam epithermatis refrigerantibus, cordi & hepatis adhibitis. Quæ omnia ex sequentibus clariora fient. Et quia plerumque hæc febris sudore finitur cum adiuuare vtile est.

Vt: ℥. Aq. cichorij, flor. sambuci, fumaria an. 3 i. In iis dissolu. C. C. vsq. præp. Scrup. iv. Coletur. Adde Syr. acetos. citri Vnc. i. Milce.

Vitum quod attinet, cum virtus in hac febre valida sit, & sanguinis corpori alendo idonei magna adsit copiam, tenui & paucò cibo ægri alendi sunt, qui simul vim refrigerandi & humectandi habeat. In quem vsus commodissimus est prissanæ cremor, qui refrigerat, humectat & abstergit, & omnis cibus, qui conditiones, quas morbus & causa requirit, obtinet. Si adsit magna ebullitio, atque ipse sanguis summè tenuis inflammationi obnoxius sit, Auicennas etiam modicè astringentia exhibenda suadet. Porest ergo cibus succus ribium, granatorum acidorum, & similia acida astringentia admisceri. Potus sit decoctum hordei, cereuisia tenuis; vinum, nisi valde tenue aut dilutum non conceditur.

visum in Synocha sine putredine.

*Synocha biliosa.*

Præter hanc febrem Synocham à sanguine ortam Fernelius, *de febr. cap. 5.* alterius adhuc Synochæ ex bile calidorumque humorum agitatione, mentionem facit. Si enim causæ evidentes vehementiores in biliosum corpus aliqui sanum irruant, non modò spiritus calefieri, sed & acres humores exagitari docet, quorum æstu febris accendatur sine putredine: quæ quidem limites ephemeræ egrediatur; non tamen sit Synochus modò exposita; cum illa sanguinis effervescentia, hæc bilis concitatio sit sine putredine: illa in corpus incidat temperatum, benèque habitum; hæc verò in calidum siccum ac planè biliosum. Huius etiam causas non alias esse docet, quàm quæ ephemeræ mouent, maximum dolorem cruciatumque, qualis nephritici aut parturientis est, exercitationem, laboremque immodicum, æstum, balneum, animi exandescientiam. Nullam quoque putredinis notam in pulsu aut vrinâ cerni; verumtamen os amarefcere, deiici appetitum, sitim excruciare, capitis dolorem ac vigilias augeri, in cute aridâ calorem acriorem sentiri. Fecit & ante Fernelium febris ex bile sine putredine mentionem Nicolaus Florentinus, qui *tract. 2. sum. 4. dist. 1. cap. 3.* febrem humoralem sine putredine diuidit in sanguineam & cholicam. Verum quanam sit huius febris natura, omnes eodem modo non explicant. Nicolaus, *loco alleg.* inter generationem febris sanguineæ & cholicæ sine putredine hanc constituit differentiam. Sanguis, inquit, potest febrem facere sine putredine à causâ intrinsecâ & extrinsecâ. Ab intrinsecâ quidem, si sanguis in quantitate, sine vitio qualitatibus ita multiplicetur, ut ab eo in corde caliditas operationes lædens accendatur. A causâ verò extrinsecâ calefaciente, quæ ipsum alterat, eique maiorem, quàm naturaliter habere debet, calorem imprimit. Bilem autem à causâ internâ non posse febrem sine putredine efficere, cum bilis, vel alius humor in corpore à causâ internâ non possit tam multiplicari, ut febrem accendat nisi vitium qualitatibus coniungatur. Omnis enim humor qualitate peccans sibi relictus putredinem concipit. A causâ autem extrinsecâ calefaciente eum caliditatis gradum posse concipere bilem per modum assationis & vstionis statuit, ut possit febrem etiam sine putredine producere. Qualis autem illa sit febris, ibi non

explicat. Alij, ut Vallesius, *lib. 5. controu. c. 9.* etiam admittit febrem à bile vsta sine putredine. Verum ad tertianam febrem eam refert, cum tali febre iuuenem illum tertianarium laborasse scribit, cuius *10. mer. med. cap. 3.* Galenus facit mentionem. Et qui eius sunt opinionis, eam rationem adducunt, quod febres ex aliis, quàm sanguine, humoribus ortæ, omnes sint periodicæ. Verum hac de re etiam aliquid dicitur postea, *lib. 2. cap. 1.* ubi quæstio illa discutietur, an omnes humorales febres ex putredine oriantur.

Verum si ea, quæ, *lib. 1. Instit. cap. 9. p. 64. & seq.* diximus, hic attendamus, non ita difficulter hanc rem expedire possumus. Cum enim eo loci sanguinis partem tenuiorem bilem interdum nominari ab auctoribus dixerimus, & sanguis, qui eâ parte abundat, biliosus dicatur, ac qui talem sanguinem habent, biliosi nominentur: hoc modo si bilis accipiat, admitti potest Fernelij sententia. Si enim in corpore sanguineo & carnoso, ob adstrictionem cutis, sanguinis tenuior pars inflammari potest; Cur non etiam in corpore bilioso, id est, in quo calidior pars sanguinis abundat, ob eandem & alias causas tenuior illa & calidior pars incendi possit? præsertim, cum tale corpus cum calore febrili maiorem cognationem habeat, quàm corpus plethoricum. Si verò de bile propriè dictâ & excrementitiâ sermo sit, nulla alia febris ex eâ oriri potest, quàm periodica; sed an sine putredine id fieri possit, suo loco dicetur.

Ergo cum febris hæc sit Synocha sine putredine ex sanguine bilioso orta, nulla in pulu & vrinis signa putredinis conspiciuntur; os tamen amarefcit, deiicitur appetentia, sitis molesta est, capitisque dolor & vigilie infestant. Hæc, sublatâ causâ euidente, ferè, ut ephemeræ, spontè euanescent: & si quæ medicamenta requiruntur, leniter purgantia bilem, potius, iulepi, victuque, omnia refrigerantia & humectantia, ut in priore usurpentur, quæ tamen frigidiora esse debent, & ad bilis acrimoniam obtundendam magis comparata; atque ad sanguinis ventilationem & refrigerationem venæ sectio institui potest.

Talis febris historiam & curationem describit Amatus Lusitanus, *cent. 3. curat. 27.* Fuit enim mulier illa naturâ gracilis. Hac febre etiam se laborasse refert Forestus, *lib. 1. obseruat. in Schol.*



## LIBER SECVNDVS

DE

# FEBRIBVS PVTRIDIS.

### CAPVT I.

#### De Febris putridis in genere.



**A**BSOLVIMVS prius τὸν γενικὴν febrium genus, in quo calor febrilis à spirituum & partis tenuioris sanguinis incendio ortum habet & fouetur: ad alterum itaque accedimus, quo febres ab humoribus oriuntur, & idcirco humorales vulgò & putridæ nominantur. Atque hoc genus febrium vulgarissimum & frequentissimum est, ac plurimas sub se differentias complectitur: verum simul multis difficultatibus inuolutum est, nullaque de febribus tractationis pars difficilior est quàm hæc de febribus humoralibus & putridis. Nam & antiqui quædam, quæ

ad cognitionem perfectam harum febrium requiruntur, prætermisisse videntur; & recentiores, qui ea, quæ ab antiquis prætermisita erant, supplere debebant, tot controuersis rem hanc inuoluerunt, & ab antiquis scripta in dubium vocarunt, ut se inde explicare difficillimum sit.

Nam etsi hoc extra controuersiam sit, ab humoribus præternaturalem calorem cordi suggeri, & propterea humorum calor præternaturalis, febrilis intemperiei causa proxima & continens sit; sicut in Ephemeris est calor spirituum: tamen quæ caloris illius in humoribus causa sit, maxime controuersum est. Etenim & olim, teste Alexand. Tralliano, *lib. 12. cap. 2.* reperti sunt, qui in vniuersum febrem nunquam à putredine fieri pronuntiabant. Nam humores in venis & σίμηθς, ἀλλ' ἐν καίσιθς, non putrescere, sed inflammari, exardescere, efferverescere, vel aduri dicebant.

*Varia de febribus humoralibus sententia.*



tabant. Quam opinionem & hodie quidam recentiores sequuntur. Alij, licet concedant, putredinem in humorib. excitari, & febres inde generari posse, tamen negant febres ex putredine ortas, esse illas quæ vulgò ita appellantur, verùm febres putridas saltem pestilenciales esse statuunt. Et qui putredinem humorum concedunt, de naturâ putredinis, & quomodo humores putrescant, maximè inter se dissentiunt: vt de ipsâ hac re solum, integra ferè volumina & Medici & Philosophi scripserint. Deinde etiam de humoribus, è quibus febres humorales accenduntur, Authores dissentiunt. Quidam enim tantùm à bile febres fieri statuunt, alij alios quoque humores admittunt. Vt tamen ex re intricatâ nos breuiter expediamus, dabimus operam.

Humores in febribus putrescere, probatur.

Principiò autem ab antiquorum sententiâ non recedendum putamus, qui febres à putredine humorum oriri statuunt. Etenim multa sunt, quæ humores aliquando putrescere non obicure docent. Nam primò à natura humorum alienum non est putrescere posse: cum omni mixto conueniat per putredinem corrupti posse.

Deinde vt actu putredinem humores incurrant, causæ sufficientes sæpenumero præstò sunt, nimirum putridæ rei occursum, id quod accidit, dum aer putridus inspiratione attrahitur, cibis vitiosis corruptus assumitur, aut à putredine abiceisus alicuius partis, vt pulmonis, vel alterius, vapores putridi sanguini miscentur, eum inquinant, & putredinis in eo causa sunt: calidi effluuij prohibita transpiratio calorisque natui destructio.

Tertiò ea quæ per febres vel arte, vel sponte excernuntur, satis putredinem in humoribus indicant. Sæpe enim sanguis per venæ sectionem eductus adeò putrisse cernitur, vt fibris corruptis vix cohæreat. Aliquando per aluum: per vrinam, sudorem, tam foetida excernuntur, vt putredinem abesse nemo iure dicere possit. Quanquam enim Simon Simonius, in *Synopsi de hum. febr. natura cap. 1.* ex foetore putredinem non rectè colligi dicat, quòd multa putrescant absque foetore, multa foeteant absque putredine: tamen id non sufficit. Nam ingrati isti odores, qui sagapeno & alijs quibusdam rebus proprii & naturales sunt, longè alij videntur esse à foetore: qui ex putredine oritur, & res illas non solent naturaliter comitari; sed tum demum iis accidunt, quando corrumpuntur & putrescunt: Et vt ex illo odore qui rebus quibusdam naturaliter inest, putredinem colligi non posse largiri possumus: ita si res aliqua, quæ naturaliter non foetet, foetere incipiat, eam putrescere rectè colligi posse, omnino statuendum censemus. Sciendum tamen foetorem non semper, eundem adesse. Sæpe enim accidit putredo vincente quodammodo naturâ, aut naturâ putridam & corruptam rem corrigente, vbi vel nullus, vel levis foetor adest, vt in pure videmus fieri, quod quo melius à natura elaboratur; eò minorem foetorem habet; quò verò minùs à naturâ elaboratum est, eò magis foetet.

Tandem idem naturæ conatus & opera, curandique ratio ostendit. Nam si citra putredinem febres accenderentur, omnes solis alterantibus curari possent, neque opus esset tot euacuationibus, quæ partim medicamentorum operâ vtiliter perficiuntur, partim à natura rectè agente variis modis instituuntur, quibus putridorum corruptiorumque humorum magna copia non rarò excernitur.

Ex putredine humorum non semper pestilentes febres oriuntur.

Secundò nec Iouerto & Simonio aliisque, qui concedunt quidem humores putrescere, & febres accendere posse, verùm pestilentes & malignas saltem inde procreari statuunt, assentiendum putamus. Nam causa putredinis, signa, atque curandi ratio, & Naturæ opera, quæ modò recensuimus, non solum in malignis & pestilentibus febribus, sed alijs etiam ap-

parent. Præterea malignitatis naturam in putredine non consistere, suo loco dicitur; neque omne pestilens putridum est, sed citra putredinem etiam in corpore humano maligni & venenati aliquid generari potest.

Verùm vt hæc, & quæ dicentur, clariora reddantur, de putredine humorum quædam explicanda iunt. Definit Aristoteles, *libr. 4. Meteor. cap. 1.* putredinem esse corruptionem proprii & naturalis caloris in vnoquoque humido à calore ambientis externo. Opponitur nimirum putredo generationi mixti. Et cum generatio fiat per terminationem humidi cum sicco, calore supra humidum dominante; putredo vt contrario modo sese habeat, necesse est, & proinde putredinis natura in separatione humidi à sicco consistere videtur. Separatio autem humidi à sicco prouenit à caloris natui corruptione. Exeunte enim, vt ipse Aristoteles addit, proprio calido, vnâ euaporat, quod secundum naturam est humidum. Nam vt calor certo modo à frigore temperatus vnit ac terminat siccum: ita si hic calor corrumpatur, causa est vt humidum à sicco separetur. Calor nimirum naturalis ab ambiente calore auctus proportionem, quam ad passibiles qualitates habere debet, amittit, & propterea euaporat; & mixtum deserit. Quo calore tanquam rector destitutæ partes humidæ & siccæ separantur, humidumque cum calore, tanquam eius vehiculo, ad exteriora fertur & euaporat. Corruptio autem caloris prouenit à calore externo ambiente, quicunque is sit, siue aeris, siue aliarum rerum. Totius itaque putredinis modus ita se habet, Aliena caliditas ambientis corpus mixtum calefacit; calefaciendo corpus mixtum relaxat atque aperit; hinc calor internus à simili attractus egreditur, & in mixto secundum quantitatem imminuitur. Exeunte verò proprio & naturali calido, vnâ euaporat & egreditur, quod secundum naturam est humidum. Proprio autem calore à proprio subiecto egrediente interna frigiditas augeri & supra calorem dominari incipit, & iubeinde in eam pro viribus naturalibus agit, ipsamque adeò debilitat, vt amplius humidum cum sicco retinere non possit. Humidum autem similiter effluit, & à sicco separatur: ad quam separationem sequitur mixti corruptio.

Putredinis definitio Aristoteleica.

Putredinis modus.

Vnde etiam Galenus, *11. meth. med. cap. 8.* definit putredinem, mutationem totius substantiæ corporis putrescentis ad corruptionem à calore extraneo. Neque enim Galenus in doctrinâ de putredine ab Aristotele dissentit, sed Aristotelis doctrinam probat, & idem quod Aristoteles, licet paulò alijs verbis, exprimere voluit. Cum enim tria hant in putredine, primò incipiat fieri separatio humidi à sicco, quæ est via ad formæ substantialis interitum; Deinde tanta iam facta sit dissolutio & separatio humidi, vt forma amplius seruari non possit, sed mixtio & materiæ vnio soluitur, sic tamen, vt partes siccæ cum humidis adhuc aliquo modo cohæreant; tandem humidum à calore in vaporem vertatur & exhalet, vt nihil nisi simus remaneat, qui est vltimus corruptionis & putredinis terminus; Totam hanc, putrefactionis naturam vocabulo corruptionis Aristoteles, Galenus verò mutationis ad corruptionem expressit. Materiam verò & subiectum putredinis Aristoteles per humidum explicauit; Galenus verò per totam substantiam corporis putrescentis expressit. Humidum enim natuum cum calore insito & proprio totam rei substantiam à Galeno passim appellari, nemini ignotum est. Atque hoc ipso proculdubio non tam ad commune & adequatum putredinis subiectum, quam ad corpus humanum, Medicæ considerationi subiectum respexit. Quam tamen ob causam reprehensionem non meretur; cum id non faciat, vt Philosophus, sed vt Medicus. In causa efficiente putredinis etiam inter Aristotelem & Galenum nulla est discrepantia.

Putredinis definitio Galenica.

*Putredinis  
differentia.*

Atque hæc quidem communis putredinis natura est, de cuius differentiis multæ & quidem intricatæ ac magnam partem non sat vtilis disputationes apud Authores agitantur. Nos iis omissis, vnam putredinis naturam agnoscimus, cuius tamen aliqua secundum variam mixtorum putrescentium naturam & constitutionem apparet diuersitas. Alia enim secundum totum, alia secundum partem putrescere dicuntur. Perfectè enim & secundum totum putrescunt, quæ planè in elementa, è quibus coaluerunt, resoluntur, ita vt reliquis omnibus elementis euaporantibus, nihil nisi terra remaneat. Atque hanc putredinem, imprimis in definiendo respexit Aristoteles: atque ipsa est mensura & regula quasi alterius. Hoc autem modo putrescunt ea, quæ plurimum terræ obtinent. Imperfectè autem & secundum partem, quæ plus humidi obtinent. Cum enim humidum, quod in his abundat, totum cum calore educi non possit, saltem partes ipsius aliquæ, præcipuè tenuiores & subtiliores, educuntur. Hoc modo Aristoteles tria elementa, aërem, aquam, terram, quatenus non sunt pura, & modo quodam cum aliis mixta, putrescere scribit. Et quidam huius etiam putredinis gradus sunt. Interdum enim tam levis est putredo, seu via potius ad putredinem, vt aliquæ saltem particule corrumpantur, mixtum verò propriam formam retineat: Interdum tanta existit, vt, etsi non fiat perfecta totius mixti in elementa resolutio, forma tamen eius aboleatur, & mixti in aliam speciem fiat conuersio.

*Humoril  
putredo qualis.*

Atque talis putredo, scilicet secundum partem, est etiam ea, quæ humores putrescunt, & febres putridæ fiunt. Si enim humores à calore externo, quacunque de causâ excitato, calefiant, calor ipsorum & cum calore humidum educitur. Verum cum humores fluidi sint, & multâ humiditate abundant, eorum humidum totum, vt in iis, in quibus terra abundat, educi non potest, sed pars aliqua humidi educitur. Atque hanc secundum partem in humoribus putredinem ipse Simon Simonius negare non potest, qui errare eos, qui in febribus vulgo putridis dictis, humores putrescere dicunt, statuit; Nisi tamen, inquit, cap. I. *Synops. de humoral. febr. natura*, eam intelligant isti ὁμοίαν, quam ἰσχυρὸν ἐστὶ τὸν κατὰ μέγεθος, ὁμοίαν, propriè de iis, quæ secundum partem corrumpuntur, dici, & secundum quam elementa excepto igne, putrescere testatum reliquit Aristoteles. Hanc enim ipsam putredinem, qui diligentius hac de re scripserunt, agnoscunt in humoribus Philosophi & Medici.

*Putredo se-  
cundum par-  
tem non est  
solum altera-  
tio, sed cor-  
ruptio.*

Quod verò Simonius porro obiicit, hoc modo non solum Galenum deferi, qui putredinem definit, quod sit totius substantiæ corruptio, & maxime opposita generationi; sed etiam febres ephemeræ & heclicas à putridis non distinguit: cum nihilo plus illa ἰσχυρὸν putredo significet, quàm ἐλαφύς aut refrigerationem, aut humectationem, aut exsiccationem quandam, quæ res præter naturæ suæ modum, ipsâ nihilominus substantiâ integrâ manente, afficiatur: id omnino falsum est. Nam etsi definitio putredinis, & Aristotelica & Galenica, principaliter putredini secundum totum competit: tamen etiam putredo secundum partem vera putredo est, atque in ea quoque non fit solum alteratio, sed & totius substantiæ corruptio; Verum non vniuersi & totius compositi, sed aliquarum eius partium: id quod etiam in putredine elementorum videtur est. Aër, e. g. putrescere dicitur, non dum quocunque modo alteratur, aut impuri aliquid ipsi admiscetur, (aliàs enim ferè semper putridus esset) sed dum aliqua eius partes reuerà corrumpuntur, totius tamen aëris forma non aboletur: Vnde etiam aër nomen suum retinet. Eodem etiam modo humores secundum partem putrescere dicuntur, cum quidem aliqua eorum particule reuera corrumpun-

tur, & formam suam amittunt, totus tamen humor formam suam necessariò non amittit, vnde etiam nomen suum retinet, & corruptis illis partibus, seu artibus, seu naturæ beneficio euacuatis & discussis, ad pristinam naturam redit: nisi corruptio & putredo eò usque progressa sit, vt in aliam speciem fiat mutatio. Atque ita in omni putredine reuerà aliquid corrumpitur, verum corruptionis eius, vt ante dictum, gradus sunt, & nunc plures, nunc pauciores particule corrumpuntur. Nam quod nonnulli dicunt, in omni putredine, seu perfectâ, seu imperfectâ necessarium quidem esse, vt fiat alteratio in accidentibus, non tamen esse necessarium, vt in omni imperfectâ putredine forma quoque substantialis perdat, sed quandoque perdi, quandoque seruari: id, nisi modo iam dicto explicetur, vix admitti potest. Nam cum in imperfectâ putredine forma substantialis quandoque non perire dicitur, id nisi de totius mixti formâ accipiat, verum non est. Nam si id ita accipiat, quasi in putredine imperfectâ interdum solum in qualitatibus alteratio accidat, ita vt nullius etiam particule mixti forma perdat; hoc modo putredo ab alteratione non differet, & febres putridæ ab aliis, quod vult Simonius, non rectè distinguuntur. Verum cum in omnibus febribus putridis aliquid humoris corrumpatur, id quod non fit in aliis febribus: maxima inter eas, & alias febres est differentia.

Nec maioris momenti sunt cætera, quæ à Simonio obiiciuntur. Nam quod primò quærit, an putredo humoribus naturalis sit, cum aliorum mixtorum proprium nō sit: ad id respondendum est, omnem putredinem, non solum humorum, sed quorumcunque etiam aliorum mixtorum, comparatam cum generatione & relatam ad principale institutum naturæ, esse præter naturam. Natura enim miscibilia vniit, vt mixtum constituent, & quodlibet mixtum in tali statu persistere cupit, at respectu, cum principiorum, quæ naturaliter separabilia sunt, tum combustionis, quæ violenta est, naturalis esse ipsis dicitur. Humores enim apti nati sunt, vt si talis ipsis occurrat causa, putredinem concipiant.

*An putredo  
naturalis sit.*

Deinde quod obiicit, humorum calorem per febres potius augeri, quàm imminui: ad id ex Galeno respondemus, ea quæ putrescunt, calidiora fieri aduentitio calore, proprio autem tandem frigidiora. Licet enim ob externum ambientis calorem accedentem, tum etiam ab interno calore exeunte primò rei putrescentis calor maior fiat: tamen in fine propter caloris natiui euaporationem frigidior redditur.

Ita etiam, quod tertio obiicit, etiamsi vaporum ratione calor intus in venis conclusus sit; cum in putredine exire dicatur: tamen ille calor auctus humoribus externus est, eoque ipso humorum insitus calor euocatur.

Tandem quartò, licet frigus, quod Aristoteles ad putredinem concurrere non statuit, concurrere ad humorum putredinem dicatur à Medicis, vbi ab externâ frigiditate transpiratio prohibetur: tamen per accidens solum, non per se tum putredinis causa est, quatenus nimirum calidos vapores retinendo calorem accendit, qui postea internum, vel insitum humoribus calorem euocat.

Quæ verò Laur. Ioubertus, 2. *de acad. parad.* 2. p. 10. suâ opinione, nullas scilicet febres ex putredine oriri, assert, etiam non magno negotio dissoluuntur.

Nam Primò quod obiicit, idèd humores in venis non posse putrescere, quod sint in loco proprio & naturali, amplòque spatio: ad id responderetur, si locus ille naturalis omnes condiciones seruet, & sanguis in venis omnia ea, quæ ad sui conseruationem requiruntur, obtineat, eum non putrescere: verum si eæ condiciones desint, & aliæ causæ, quæ putredinem conciliare solent, de quibus postea dicetur, adsint, tum

*An in suo  
loco putres-  
cere possit.*

rum generatur putredo; & si humorum copia vel qualitas, vel aliud quidpiam obstat, non semper valorum vis ad inhibendam putredinem sufficit.

An fœtor in  
omni putre-  
dine adsit.

Quod verò secundò obiicit, in putredine adesse fœtorem, qui nullus in venis percipiatur in febribus salubribus: de eò iam antè dictum, non necessario in quavis putredine fœtorem æquè adesse, sed prout magis vel minus natura adhuc humoribus dominatur, eò maior vel minor fœtor est. Neque tamen in febribus putridis semper abest fœtor, sed proculdubio sæpe in venis humores fœtidi sunt, id quod ex urinis & sudoribus percipitur.

Deinde nec reliquos humores putrescere in specie probare conatur. Nam primò, inquit: si totus sanguis, ut ex quatuor humoribus constat, in vasis non concrevit, nec putrefit, multò minus seorsim quisque ex dictis humoribus id unquam patietur. Nam quod concretionem attinet, omnium humorum, dempro sanguine, proprium est non gelascere, etsi è venis sinceri fluant: quantò minus in vasis eos putrefieri est verisimile.

Verumenimverò primò id, quod nondum concessum est, præsupponit Ioubertus, sanguinem in venis non putrescere. Deinde à concretionem ad putredinem nulla est consequentia. Putredo enim est affectio, quæ omnibus mixtis, aut certè humidis competit; congelari verò non omnibus mixtis competit, sed iis, quæ admixtam habent substantiam crassam cum parte terrestri: ac sanguis, quia habet fibras, concrevit, quibus cum reliqui humores destituantur, concrevere non possunt.

Quod porro ait, sinceros humores in tumoribus nò putrescere, & propterea multò minus in venis nec in febribus: id falsum est. Sinceri enim humores in tumoribus quidem difficilem reddunt suppurationem, sed non impossibilem.

Verum ne de his prolixiores sumus, si accuratè illa omnia, quæ à Iouberto proferuntur, perpendamus, ipse quoque, ut Simonius, vocabulo putredinis ludit, dum putredinem saltem pro putredine perfectà & secundum totum accipit; cum tamen antea dictum sit, in febribus putredinem saltem secundum partem adesse. Quod vel ex eo patet, quod scribit: *Se putredinem non quæcumque intelligere, sed eam quæ propriè omni dicitur, & quæ dicitur, per quam gangrena gignitur ex inflammationibus; cadavera item aliaque putredine fœtorem acquirunt; aut certe eam quæ talis est, qualis in suppurationibus apparet.* Et postea inquit. *Verum si quis paulò severior contendat, vix vllas humores esse febres, in quibus putredinis quadam nota non adsint: esto, lenior putredo concedatur, at non tanta, ut inde excitari possit febrilis caliditas, quod pestilentibus est peculiare. Aliarum igitur, quæ salubres dicuntur, putredo sit comes duntaxat, pestilentium comes & author.*

Verum quod ultimum hoc attinet, non semper maior est calor in iis, quas salubres appellat, quàm in malignis & pestilentibus. Verum etiam interdum minor: Deinde antea dictum, & postea probabitur malignitatem & pestilentiam non in putredine consistere. Hæc itaque si vera sunt, & levis putredo in febribus salubribus admittatur: Cur non etiam tanta admitti possit, quæ febrilem calorem excitare queat?

An omnes  
humorales  
febres ex pu-  
tredine ori-  
untur.

Atque hoc modo satis monstratum esse arbitramur, dari putredinem in humoribus, & febres humorales ex putredine oriri, illud adhuc explicandum restat. An omnes humorales febres ex putredine oriantur. An verò aliquando sine putredine ex solâ humorum effluencia febris oriri possit. Posterius affirmat Franciscus Vallesius lib. 5. controu. c. 19. Nam cum sint duo motus ad corruptionem; Vitiatio & putredo: quædam ad hanc, quædam ad illam paratiora esse dicuntur. Quæ calidissima sunt, adiuncta potissimum siccitate, & partium tenuitate, ad vitiationem esse paratissima; quæ

verò humore abundant, aut non habent calorem multum, hæc putrescere citius statuit. At cum ex priorum genere sit bilis, vitiatio eam sine putredine febrem producere posse putat. Et tali febre laborasse iuuenem illum existimat, cuius mentionem facit Galenus, 10. meth. med. cap. 5. alioqui, cibum, quem Galenus illi obtulit, magnum damnum illi allaturum fuisse. Atque dari tales febres sine putredine ex sola bilis vitiatio, inde colligi posse existimat, quod crebrò febre laborantibus accidunt vomitus tenues, fluidi, minimè fœtidi.

Neque ab hac sententiâ alienus fuisse videtur, Lud. Mercatus, qui, 1.6. de febr. cap. de tertianis exquisitis, scribit; tertianam exquisitam, vno è duobus modis fieri posse, vel flauâ bile in extremis vasorum effluente, vel putredinem ibi concipiente.

Et tales febres, si dantur, sunt, quarum supra lib. 1. cap. 7. inter synochas ex Fernelio de febr. cap. 5. & Nicol. Florentino sr. 2. ferm. 4. distinct. 1. cap. 3. mentionem fecimus, ubi scilicet in corporibus calidiore sanguine præditis, tenuior eius pars incalescit. Quali febre etiam se laborasse scribit Forestus, lib. 1. obseru. 10. in schol. Ex bile verò excrementitiâ nulla alia, quàm putrida febris accenditur. Etsi enim suo modo sit tenuis: tamen tam tenuis non est, ut spiritus & subtilissima ac tenuissima sanguinis pars, unde etiam à causis euidentibus tantum calorem, qui ad febrem generandam sufficiat, acquirere non potest, nisi putredinem concipiat, id quod in ictero & aliis morbis biliosis videre est. Neque etiam monstrant, quomodo sine putredine bilis feruorem tantum concipere possit. Nec est inepta ad putredinem bilis. Licet enim bilis calida & sicca sit, cum aliis humoribus collata, tamen actualement humiditatem obtinet, ob quam putrescere potest. Præterea rarè sincera est, sed aliis humoribus permixta, qui ad putredinem facilius suscipiendam faciunt. Quamvis enim interdum bilis è corpore eiiciatur, quæ non fœteat: tamen illa bilis, quæ vomitu reicitur, non semper causæ continetis, sed antecedentis rationem habet. Præterea quod antè dictum, humores putridi non necessario, & semper coniunctum habent fœtorem.

Quod verò febricitantem illum iuuenem, 10. meth. med. cap. 13. attinet, nullo modo ille febre biliosa absque putredine laboravit. Cum enim febres hæc ad synochas pertineant, quæ sine intermissione à principio ad finem durant: febris quæ iuuenis hic laboravit, intermittens fuit, & suos paroxysmos habuit, ut manifestè ex Galeno patet. Ideoque sciendum, in curatione morborum non solum ad morbum & causam morbificam, sed etiam ad vires & ingruentia symptomata respiciendum, & sæpe aliquid necessario agendum esse, quod præteritum virium lapsus, aut aliud graue malum auertat.

Cum autem modò dictum sit, putredinem non semper habere coniunctum fœtorem, diuersòque esse putredinis gradus, id rectissimè in generatione puris in tumoribus animaduerti potest, quæ de causâ etiam Galenus, 1. de diff. feb. cap. 6. putredinem, quæ in venis humores putrescunt, cum eâ, quæ in tumoribus humores putrescunt, comparat, & quæ differentia putredinis in tumoribus reperitur, eam etiam in vasis reperiri statuit. Vtrobique enim alia putredo est, quæ vincente naturâ, & calore adhuc superante materiam sit; quæ non, simpliciter putredo existit, sed etiam coniunctam habet coctionem, & potius coctio à vincentis caloris natiui actione dicenda est, quàm putredo, quod in eâ caloris natiui alteratio & actio maior sit, minor verò caloris præter naturam. Alia verò est putredo, quæ fit succumbente calore natiuo, cum putrescens humor ad benignum non mutatur. Atque hæc sunt duæ extremæ alterationes, quæ in morbis contingunt, ex quarum, seu

Putredinis  
differentia.



seu potius causarum efficientium mixtione, medium quoddam exurgit, quod neque aded bonam ostendit putredinem, sicut ea est, quæ apparet naturâ maximâ ex parte dominante; neque aded mala, qualis est ea, quæ fit natura ferè succumbente. Cuius varij gradus sunt, prout ad hoc vel illud extremum magis inclinât. In malâ autem putredine, quæ fit naturâ succumbente, id, quod generatur, speciem non vnam habet, sed varium odorem, colorem, consistentiam. Nam quando natura non vincit humorem, id quod generatur, potius insequitur naturam materiæ, quàm causæ in eam agentis. Cum igitur materia non sit vna, non erit etiam vnum illud quod producitur, sed diuersæ eius partes, & tam diuersæ, quàm diuersæ materiæ. Nam materia alia, est biliosa, alia pituitosa, alia melancholica, alia sanguinea. Quod si natura vincat humorem, id quod generatur, vnam habebit consistentiam, vnum colorem & odorem. Natura enim etsi in alimentum partis materiam illam vertere non potest: tamen quantum fieri potest, simile partibus quid efficit. Quod autem fit in tumoribus & inflammationibus, etiam fit in putredine humorum in vasis. Quemadmodum enim humor putrescens in tumoribus vnam trium recipit mutationem, aut optimam, aut pessimam, aut inter has mediam: ita si in vasis humores putrescant, idem accidit. Et sedimentum in urinâ secretum ab humore putrescente, aut est optimum, purique optimo respondens; aut pessimum, quod est nigrum, aut mediæ constitutionis.

Et ut hæc tandem concludamus, si omnino aliquem vocabulum putredinis offendit: is tamen sciat, solam humorum alterationem ad febrem humoralem generandam non sufficere; sed in omnibus febribus, quas vulgò putridas vocant, esse humorum in essentia mutationem & corruptionem; vnde & illud quod corruptum est, vel à natura euacuatur, vel medicamentorum ope expellendum est. Quod si quis istas corruptiones & humorum degeneraciones putredinem nominare nolit, & illam saltem humorum corruptionem, quæ vehementior est, qualis in malignis febribus apparet, putredinem appellare velit: is alia, quibus commodius nominentur, & diuersæ corruptiones & mutationes humorum distinguantur, vocabula suggerat.

Interim sciat, antiquos vocabulum putredinis latiore longè significatione usurpasse, quam hodie sit: Imò Hippocrati *σύντη* etiam concoquere, & *σύντη* concoctionem significat. Ita, lib. 3. *σύντη* *σύντη*, *σύντη* *σύντη*, alui excrementum concoctum & *σύντη* *σύντη*, aridum excrementum, *ibid.* appellatur: & libello *σύντη* *σύντη*, *σύντη* *σύντη* ventriculus nominatur. Et Empedocles vinum *σύντη* *σύντη* nominat, ut est apud Aristotel. 4. *Topic.* c. 5.

#### Causa putredinis.

Verum ut ad doctrinam de febribus putridis propius accedamus, missis iis, quæ generalius de causis putredinis à Physicis disputari solent, speciatim de causis putredinis in febribus agemus. Et quidem causam proximam putredinis quod attinet, in eo & Philosophi & Medici conveniunt, esse calorem externum, seu à naturâ rei cuiusque alienum. Hic enim in corpore nostro non amplius coquere, sed humores putrefacere & corrumpere solet, humoresque, quotiescunque naturali calore destituuntur, & ab eo amplius non reguntur, corrumpi & putrescere incipiunt: quæ generalis putredinis humorum causa est. Itaque omnia, quæ seu ratione humorum, seu ratione locorum, in quibus humores continentur, seu ratione caloris, seu quocunque alio modo causæ esse possunt, ut calor innatus humores amplius debito modo non regat, illa omnia putredinis humorum, siue propin-

quiores, siue remotiores causæ sunt. Qualia autem illa sint, iam in specie videndum.

Quâ in re maximè apud authores occurrit difficultas, opinionum diuersitas & obscuritas. Et primo quidem loco statim sese explicanda offert quæstio: An sola transpiratio prohibita, & ventilatio humorum impedita ob obstructionem, semper putredinis causa sit. Nam reperies quosdam, qui omnes febres putridas ex prohibita transpiratione ab obstructione fieri, & sine prohibita transpiratione & ventilatione febres putridas accendi non posse statuunt; idèoque in omni febre putridâ obstructiones aperientia exhibent. Atque hi primò mouentur autoritate Galeni, qui 11. *meth. med. cap. 4.* causas putredinis in summam quasi colligens ita scribit: *Ostensum est, ubi morborum causas tradidimus, illa tantum putrescere corpora, quæ cum calida humidaque natura sint, neque perspirata, neque ventilata in calido humidoque loco manent. Quod si in motu sint, ventilenturque ac perspirentur, posse ea non putrida integrâque seruari, potissimum quæ corpora suâ ipsorum natura reguntur. ut animalium & stirpium.* Et mox: *Itaque si quid in eo putrescere debet, diætas transpirationes impeditas esse oportebit.* Deinde idem Gal. 1. *de diff. febr. cap. 3.* hæc habet: *Si corpus vitiosis humoribus plenum fuerit, nulla verò obstructio aliquod ex visceribus obsideat, liberè autem totum animal percutim difficitur ac refrigeretur: sanitate quidem fruetur animal, sed dubiâ ac momentaneâ. Cum autem constringi terminum externum, aut obstrui penitiorum partium meatus contigerit: in constrictionibus quidem febres consequuntur ephemera, in obstructionibus putrida.* Præterea cum morbum ostendat sanatio, si methodum curandi febres putridas videamus, quam tradidit Galenus, 11. *meth. med. cap. 10.* idem inde euinci posse videtur. Nam ibi Galenus febrem deducit à putredine; putredinem à prohibita transpiratione; prohibitam transpirationem ab obstructione; à quâ, ut inter causas primâ, curandi initium facere præcipit. Vtuntur deinde & rationibus. Nam si, inquit, fuligines calidæ, quantum opus erat, euaporare & discuti possent, ad Cor non peruenirent, neque febrem accenderent. Præterea quæ dicuntur putrescere, necessariò caliditatem propriam amittunt. Hoc autem fieri non potest, nisi à calore fortiore: id quod accidere non potest, nisi per transpirationem prohibitam.

Alij contrâ, etiam sine prohibita transpiratione & ventilatione corporis putredinem in humoribus accendi posse statuunt. Atque isti etiam cum auctoritatibus Gal. tum rationibus ad id statuendum adducuntur. Nam primò Galenus, *de caus. morb. cap. 2.* ubi causas morbi calidi recenset, putredinem ab obstructione seiniungit, & ut peculiarem causam affert, quod scilicet putredo etiam sine obstructione & prohibita transpiratione fieri possit. Et 1. *de diff. febr. cap. 2.* & 4. ex aëre putrido & corrupto febrem pestilentem oriri posse docet. Et 2. *de diff. febr. cap. 9.* cum ex sententiâ Aristot. docuisset, ab alienâ caliditate oriri putredinem, addit; calorem extrinsecus sanguini aduenire, & in Solis deustionibus, & pestilenti ac suffocato aëre, & quando in corporis parte sanguis plurimus aceruatus, supraque eiusdem vires effectus corrumpi incipit. Quod cum præcipue fieri dicat, cum in partis vasis propter crassitudinem obstruitur, aut multitudinem impingitur, ab aliis etiam causis fieri posse confiteretur. Imò expresse addit; in eiusmodi affectibus duplicem ob causam corrumpi sanguinem; & quia non diffilatur, & quia à natura non vincitur. *Libro etiam de ineq. intemp. cap. 8.* Accendi, inquit, febrem & citra phlegmonem ex solis humoribus putrescentibus licet. Neque enim ea solum, quæ inculcata sunt, & perspiratu prohibita putrescunt, ceterum putrescunt & alia multa, quæ putredini sunt oportuna. Et *de caus. morb. cap. 8.* non solum

Vocabuli Putredinis apud antiquos vsus.

Causa putredinis.

An putredo in febribus semper ab obstructione sit.

solum transpirationem prohibitam causam putredinis ponit, verum duas adhuc alias addit, nimirum medicamenta, quæ vim habent putrefaciendi, & genita in corpore excrementa. Et si enim Donatus ab Altomari, 1. parte de febr. cap. 46. ut vim huius loci effugiat, respondeat, aliud esse, agere de putredine, de qua loquitur Galenus lib. 1. m. m. aliud de corruptione, quæ non est vera putredo, de qua Galenus agit, allegat. c. 8. lib. de caus. morb. tamen hæc contra mentem Galeni dicuntur. Et Galenum de verâ putredine ibi loqui, cui libet verba Galeni diligentius perpendenti manifestum euadit. Ratio etiam idem euincit. Nam cum, ut de natura putredinis dictum, putredo fiat, quando calor internus euocatur ab externo: si plures causæ, quàm prohibita transpiratio, dantur, quæ calorem externum accendere possint, manifestum inde euadit, plures dari putredinis in febribus, quàm solam transpirationem prohibitam, causas. At dari plures, Galen. de caus. morb. l. 2. & 1. de diff. febr. c. 3. docet, nimirum, præter prohibitam transpirationem, etiam motum, viciniam corporis calidi, assumpta calida, & putredinem. Idem tandem testatur experientia, quâ constat, aquam, ut & res alias extra corpus humanum plurimas, sine prohibita transpiratione putrescere. Cur ergo non idem etiam in corpore humano accidere possit.

Non omnes  
Febres putri-  
da sunt ab  
obstructione.

Et omnino his assentimur, qui sine prohibita transpiratione & obstructione viscerum putredinem in corpore humano excitari posse statuunt, ac eorum opinionem reiicimus, qui in omni febre à putredine ortâ transpirationem prohibitam, & præcipue viscerum & venarum obstructions, putredinis causas ponunt: exagitantque iam olim Auger. Ferretius, in Castigat. pract. medic. c. 14. eos Medicos, qui in febribus continuis nihil nisi viscerum obstructions obloquuntur. Quid enim, ubi febres epidemice, quæ per contagium propagantur, seu continuæ, seu intermittentes grassantur, contagio cum obstructionibus; aut eiusne, qui febre laborat, obstructio in alium, quæ contagio inficitur, deriuatur? certè obstructions non transeunt de indiuiduis in indiuidua: & anne opus est, ut contagium, primum obstructions viscerum inducat, ut febrem possit inducere? Certè contagium & venena humores corrumpere & putrefacere posse, sine omni obstructione viscerum, notissimum est. Et si melaëraicæ semper essent obstructæ, non transiret id ad hepar, & totum corpus, quod transire manifestum est.

Et culpandi merito Medici, qui ubi vrinas turbatas, crassissimas & impurissimas, & quidem satis longo tempore reddi vident, id pro bono signo habendum censent. Obstructions nimirum aperiri, & materiam vitiosam euacuari, dicunt. Quamquam enim non negandum sit, non solum in calculo, sed & in febribus per crisin, vel medicamentorum auxilio turbidas & crassas vrinas cum commodo ægri excerni: tamen tales vrinas rubras, turbatas, quæ sine omni morbi imminutione & longo sæpe tempore excernuntur, potius crudi adhuc & pertinacis morbi indicium, & proinde malum signum esse existimo, & arguere, malam illam dispositionem vitiosos humores generantem, & humorum feruorem & cruditatem adhuc perseuerare, neque dum bonam coctionem, quæ semper claras vrinas suppeditat fieri. Atque rem ita se habere, multa alia in ægris ostendunt.

Et quamquam interdum in febribus diuturnis obstructions, imò & scirrhi viscerum reperiuntur, à quibus febres prolongari extra dubium est: ista tamen potius à febre, ob quam multi crudi & vitiosi humores, facultate naturali debilitatâ, generantur, quàm ut illi febrem primò produxerint. Et longa ac continua sæpe est causarum, morborum & symptomatum catena: & materia, quæ adesse deprehenditur, obstructions, vel alium morbum excitat, ipsa tamen ab alio morbo producta,

Transpiratio verò corporis prohibita seu *adsternu*cia ut Galenus, 11. meth. med. cap. 10. nominat, cum corpus per cutem liberè non ventilatur, longè frequentior causa est putredinis: neque tamen sola est putredinis causa; sed & rerum putridarum occurrit sine transpiratione prohibita putredinem inducere potest; sicut argumenta pro secundâ opinione adducta id rectè probant. Et si non negemus, longè facilius, & promptius, à quacunque etiam causâ, in corpore quod non rectè diffatur, putredinem induci, quàm in eo quod liberè ventilatur.

Si quis tamen statuere velit, sine prohibita transpiratione equidem putredinem excitari posse, sed non febrem, cum eo non contendam, si rectè hanc suam mentem explicet. Nam licet vapores & fuligines à materiâ putrescente eleuentur: si tamen sufficienter discutiantur, febris non excitatur. Potestque huius rei exemplum suppeditare fœmus & stercora animalium. Fœmus si in aëre, à quo ventilatur, iaceat, putrescit; sed sine calore notabili. Si verò cumalatus iaceat, neque ab aëre ventilatur, & fuligines illæ exhalantes concludantur, non solum incalescit vehementer, sed & nonnunquam flammam concipit; sicut Galenus, de morbor. caus. cap. 2. scribit, se vidisse columbarum stercora ob putredinem accensa arsisse. Testanturque id multa, quæ in febribus accidunt. Quæ enim corpora facile sunt transpirabilia, non facile febribus corripiuntur, & contrâ. Et in febrium principiis sudare ægri non possunt, & quamprimum sudant, paroxysmus desinit, & sanationis spes adest. Et causæ reciduarum penè omnes à prohibita insensibili transpiratione dependent. Multa præterea arguunt, putridos humores in corpore aliquandiu latere posse, antequam æger febre corripiatur. Idque vrinæ non raro testantur, tum ante, tum post febres, imò in ipsis febribus intermittentibus, in quibus tempore *ampli*ciæ notæ putredinis satis evidentes in vrinis apparent. Vbi tamen putredo adest, facilius etiam transpiratio prohiberi potest. Ex putridis enim humoribus plurimæ fuligines eleuantur, quæ insensibiliter discuti debent, & longè copiosius eleuantur, quàm in homine sano. Quâ de causâ sit, ut facile in ambitu corporis hæreant: quod etiam facit ipsorum halituum præter naturam se habentium natura & vitium. Ideoque etsi in omni febre putridâ, præter putredinem, aliæ adhuc causæ poros cutis occludentes necessariò non requiruntur: si tamen ex humoribus putridis plures vapores eleuentur, quàm ut omnes per poros cutis etiam patentes transpirare possint, ob eorum partim copiam, partim naturam febris excitatur. Crudi enim humores non ita facile transpirant, ac cocti & boni. Quod si quis *adsternu*ciav nominare velit, cum eo non pugnabo ut dixi: sed erit ea potius febris quàm putredinis causa, ut dictum.

Ut ergo omnes putredinis causas in conspectu habeamus, sciendum, humores, vel ex sua natura & dispositione, vel ab externa agente atque efficiente causâ, putredinem concipere. Nam quamquam omnes humores, cum sint corpora mixta, & quidem humida, ad putredinem recipiendam apti sint: tamen inter ipsos humores quædam differentia est, & alij vel suâ naturâ ad putredinem tendunt, vel à causis putredinem inducentibus facilius vincuntur; alij actioni earundem causarum magis resistunt. Humores autem qui facile putredinem incurrunt, sunt, qui internum aliquod vitium habent, & ex sua natura sensim, vel ubi leuissimam occasionem nacti fuerint, in putredinem prolabantur. Talia verò vitia humores contrahunt ex variis causis. Primò quidem ex prauis cibis, qui vel naturâ suâ tales sunt, prauique succi appellantur, vel propter vetustatem, & quoddam negligenter asseruari fuerint, tales redditi sunt. Deinde vitium hoc humores contrahunt à cibis, qui quidem prau

Putredinis  
causa.

Humorum  
ad putredinem  
dispositio.

pravi non sunt, facile tamen putrescunt, quales sunt ferè omnes fructus; quos *opercula* appellant. Tertio idem vitium concipiunt humores à ciborum praua præparatione, vt cocturâ malâ, aut additamentis minùs conuenientibus; vel quando cibus nouus assumitur, antequam prior est concoctus; vel nimia copiâ ingeditur, vt natura ipsum satis coquere & elaborare non possit; vel quando præpostero ordine cibi assumuntur. Quartò etiam huc facit partium coctioni destinarum aliquod vitium, ob quod etiam bona alimenta inquinantur & corrumpuntur, & multi excrementitij humores cumulantur. Tandem etiam alia quædam ex sex rebus non naturalibus dictis ad vitiosos in corpore humores gignendos faciunt, vt excrementorum euacuatio suppressa, ira, atque aliæ animi perturbationes; & id genus alia.

Quò verò plus humorum excrementitiorum in corpore cumulat, eò facilius putredo gignitur. Nam natura sanguinem bonum, vt familiare corporis alimentum vitæque thesaurum intra venas omni studio conseruat, & tuetur; atque idèò sanguis minùs facile putredinem concipit: humores verò excrementitij, qui corpori alendo idonei non sunt, tanto studio à natura non gubernantur, ideòque promptè putrescunt, atque eò facilius, quò sunt vitiosiores. Sanguis tamen extra venas effusus cum sit extra naturalem locum, & calidæ æ humidæ naturæ, facilius putredinem concipit.

*Putredinis  
causa offi-  
cioris.*

Humores igitur vitiosi, si in corpore colligantur, etsi ad putredinem concipiendam naturâ procliuus sint, & suâ sponte in eam incidere possint: tamen longè facilius id accidit, si aliqua causa externa accedat; quæ tamen leuissima sæpe in corporibus dispositis requiritur, & multò minor, quàm in corpore planè sano, & vitiosis humoribus non referto. In corpore enim sano si putredo oriri debet, maior causæ agentis vis requiritur. Sunt tamen hæc causæ sæpe tam potentes, vt etiam in corpore sano putredinem inducere valeant.

*Prohibita  
transpira-  
tio.*

Inter causas autem has, quæ faciunt, vt humores putredinem concipiant, frequentissima & præcipua est transpiratio & ventilatio corporis prohibita, siue ea accidat ob pororum cutis angustiam, siue ob vasorum & meatuum in corpore penitiorum obstructionem. Angustia meatuum cutis fit, vel ex constrictione à frigore, aut ex adstringentibus, vt balneis aluminosis, aut ex siccitate, vt morâ sub radiis solaribus; vel obstructione, quæ fit aut propter copiam, aut visciditatem, aut crassitiem humorum. Eadem ob causas etiam interni meatus obstruuntur, vt humores liberè ventilari non possint; nimirum ob multitudinem sanguinis, ex cibo nimio, otio, mensibus, hæmorrhoidibus, aut aliâ consuetâ euacuatione suppressâ, vel quacunque aliâ de causâ cumulari. Deinde ex humorum crassitie & visciditate, quæ ex cibis eius generis ortum habet. Quò etiam facit, si humores crassi, crudi & nondum satis elaborati, in minores corporis venas, vel attrahuntur ob intempestiuum & nimium motum, balnea, similesque causas, vel impelluntur, ob potum cibumque tenuem nimis, acrem, & vim diureticam habentem.

*Qui ex pro-  
hibita tran-  
spiratione  
facile in fe-  
bre, putrida  
incidunt.*

Quacunque igitur de causâ transpiratio & ventilatio corporis prohibetur, putredo excitari potest. Calida enim & humida in loco calido, nisi ventilentur, promptè putrescunt. Et licet perspiratione prohibita facilius humores ad putredinem disponi putrescant, tamen tanta huius causæ vis est, vt ob eam etiam boni humores putredinem concipiant: ideòque febres putridæ frequentissimè ab obstructione oriuntur. Ac primò in plethoricis corporibus sæpius febres putridæ excitantur. Obstructiones enim in iis multæ sunt, & corpus liberè non distilatur: inprimis si causæ euidentes antea enumeratæ accedant, motus scilicet, balnea, æstus, aut calidorum multus vsus

post repletionem. Hæc enim omnia crassos & crudos humores in hepar & venas mouent ac trahunt, vnde obstructions fiunt. Quare si quis à cibo, & potissimum copioso, balneo utatur, vel vehementius exerceatur, vel in aère calido versetur, & postea, vbi corpus incaluit, subito frigori sese exponat, efficacissimam febris putridæ causam præsentem habet. Crudi enim humores ad viscera atque meatus alios abripiuntur; meatus autem cutis à calore patentiores redditi à frigore facilius penetrante iam magis condensantur & constringuntur, calidumque effluuium prohibetur.

Deinde non minùs promptè ex prohibita transpiratione febre corripuntur, quibus cum sanguine excrementitij humores mixti sunt, è quibus calidi, acres & mordaces vapores attolluntur. Hinc videmus febres biliosas omnium frequentissimas esse. Generantur autem & attolluntur illi vapores calidi & acres triplici de causâ. Quibusdam enim corpus cacochymicum est, & vitiosis humoribus scatet, è quibus naturaliter tales vapores attolluntur. Quidam malâ vti sunt diætâ, dum tenuius vixerunt, rariùs comederunt, nimium sese exercuerunt, etiam in aère calido, vinum biberunt generosius, cibis calidis nimis, siccis, salis, amaris, acerbis, atque aliis etiam alimentis, quæ prauos succos generare solent, vti sunt, vt allio, cæpis, porro, nasturtio, vrticâ, brassicâ, leguminibus, frumentis corruptis, atque inprimis, si post tales cibos aquam vitiosam, limosam nimirum, lutosam, stagnantem & putridam biberint. Quibusdam denique tales vapores attolluntur, quòd sæpe malè concoxerunt, & cibos in malum alimentum conuerterunt. Ex his itaque causis, si in corpore pravi humores cumulantur, vt docet Galenus, 1. de differ. febr. cap. 3. si nulla adsit in visceribus obstructio, pori quoque cutis pateant, tum febris quidem non sequetur, sanitas tamen erit instabilis, inconstans & lubrica. Facile enim fieri potest, vt aut pori cutis claudantur, aut viscera obstruantur. Nam tum mox humores putredinem concipient, & febres accendentur.

Atque hinc causam reddere difficile non est, cur aliqui, si non bene coquant, cruditatem pariantur, & humores prauos generent, mox febribus corripiantur, alij non. Nam alij prauos humores habent antea in corpore, aut transpirationem non expeditam, corpusque ipsorum non iatis distilatur & ventilatur, aut intempestiuè laborant, aut temerè balneis vtuntur, aut in calido & æstuante aère versantur, aut irâ corripuntur, aut cibo & potu nimio sese replent. In his igitur febres accendi, mirum non est, nam iis quibus diximus modis, pravi humores in totum corpus trahuntur, vnde facile obstructions & viscerum & pororum cutis, atque hinc febres oriri possunt. Alij autem humores bonos habent in venis, corpusque ipsorum liberè ventilatur, non immodicè mouentur, atque hac ratione humores vitiosi in totum corpus non trahuntur, sed solum in ventre retinentur, atque inibi in quiete à calore naturali vincuntur; vnde non ita facile tales febri corripuntur.

Secundò & aliâ, quæ in humoribus calorem præternaturalem accendere, caloremque natium euocare possunt, putredinem excitare valent: in quo genere est febris Ephemera. Nam ex Ephemeris putridas interdum fieri, suprâ diximus, dum calor ille præternaturalis spirituum in Ephemerâ humores accendit, & ita putredinem in iis concitat: quod potissimum fit in calidis & humidis naturis, ac iis in quibus humores iam apri & dispositi sunt ad putredinem. Tunc enim igneus ille & alienus calor in spiritibus hærens etiam humoribus communicatur, caloremque innatum euocat, & humidum in vapores attollit ac dissoluit, atque ita putredinis causa est.

*Causa calo-  
facientes.*

Et quod febrilis calor in Ephemerâ præstare potest, idem etiam calor non febrilis à rebus non naturali-

bus



libus externisque profectus efficere valet. Quales sunt nimia caliditas aeris: calidum balneum, vehemens exercitatio, animi motus nimij, atque alia similes causae, quae licet primò spiritus, propter eorum ad incallescendum promptitudinem, calefaciant: fieri tamen potest, ut vel statim vel paulò post humorum quoque calor intendatur & praternaturalis fiat, ita ut etià sine praecedente febre Ephemerà putrida febris oriri possit.

Putridarum  
rerum occur-  
sus & vici-  
nia.

Tandem etiam putridarum rerum occurfus putredinis humorum causa est: cum id, quod à putrido tangitur, ipsum etiam putrescat, resque putridae occurrentes corpus nostrum inficiant ac inquinent, quod solet contingere inprimis ex aeris putridi, & vaporibus putridis repleti inspiratione, tum conuersatione cum iis, qui putredine contagiosè infecti sunt; id quod malignis febribus accidere solet.

Verum hinc & hoc obseruandum, has causas praecipue in prima febris inuasionè locum habere, & ita etià ad continuas producendas sufficere: In intermittentibus tamè & periodicis febribus cum paroxysmo vno finito multi adhuc redeant, continuata putredinis causa inquirenda est.

Vbi quidem nonnulli statim ad obstructionem, quae tamen saepe nulla est, recurrunt, ut dictum, & postea etiam dicitur. Si verò rem diligentius perpendamus, ex causis propositis duae inprimis locum habent, nimirum partium coctioni destinarum aliquod vitium, ob quod prauis humores generantur, qui postea facile putredinem concipiunt; & putridae rei contactus seu *contactus* aliquod, quod post paroxysmum relinquitur, quod humores, quasi fermentum, corrumpit. Quas causas & Galenus 2. de diff. febr. cap. ult. proposuit, vbi inter cetera haec habet: *Neque existimes in exterioribus istis vasis, in quibus elixatum obsonium nidorosum factum est, quandam relinqui dispositionem, nullam verò in partibus, in quibus humores putruerint.*

Febris putrida definitio.

Atque ex his omnibus, quae haecenus dicta sunt, febris putrida definiti potest, quod sit, *Intemperies calida totius corporis, quae à putredine humorum ortum habet & fouetur: seu febris à vaporibus calidis & putredine humorum excitatis, & cor prater naturam calefacientibus ortum habens.*

## CAPVT II.

### De Februm putridarum differentiis.

Differentiae februm putridarum plurimae quidem passim ab Authoribus recensentur; quae tamen maioris momenti sunt, & ad curationem inprimis utiles, à materia putrescente, & loco, in quo putrescit, petuntur. Primò putrescunt vel ipsae corporis partes solidae, vel humores, vel etiam ipsi spiritus, de quo tamen controuertitur, ut suo loco dicitur. Deinde consideratur in humoribus & putredine modus & qualitas putredinis. Aliàs enim simplex putredo in humoribus adest, quae etiam nullos alios affectus, quam qui putredinem propriè & simpliciter sequi solent edit: talesque febres, quae inde excitantur simpliciter & sine aliquà adiectione, continuae vel intermittentes, huius vel illius generis nominantur. Aliàs verò cum putredine, aliqua maligna & venenata qualitas, ac contagiosum quiddam coniungitur, unde febres malignae, pestilentes, & contagiosae oriuntur, & nominantur.

Tertiò ipsa humorum natura consideratur, concipere enim putredinem possunt omnes humores, tum naturales, tum praternaturales. Nam licet & ante Galeni tempora nonnullorum fuerit opinio, quam nostro tempore reuocant, Iouertus & Simonius, omnes febres humorales ex bile flaua oriri: tamen rectè illi refutantur à Galeno 2. de diff. febr. cap. 1. Et certè rationi atque experientiae est contrarium, nullas

Dan. Sennerti Tom. II.

febres ex pituita, vel melancholia oriri, sed omnes & quotidianas & quartanas, ex flaua bile progigni.

Nam quae per vomitum, alium, sudores excernuntur in febribus, maximè variant: semper tamen humorem suo februm generi peculiarem & proprium attestantur, & biliosa in biliosis, pituitosa in pituitosis, melancholica in quartanis excernuntur. Neque etiam alia quae antecedunt aut simul adsunt, in quotidianis & quartanis febribus, biliosi humoris notas exhibent. Generatur enim bilis flaua à causis calidis & siccis; temperamento calido & sicco; in iuuentute & aetatis vigore, tempore aestatis, aëre & regione calida; vitæ genere laboribus dedito; vigiliis, cibis, & potu parco, calido sicco, aut medicamentis calidis & siccis. Haec omnia, inquam, bilem flauam gignunt. Quotidianae autem contrario modo generantur, à causis pituitam cumulantibus, nimirum in corporibus frigidi & humidi temperamenti; tempore hyberno, aeris constitutione frigida & humida; pueritiâ, senectute; vitâ prius ebriosâ, sedentariâ, somno multo, ita & quartana à causis contrariis & melancholiam generantibus & augentibus oritur, nimirum temperamento frigido & sicco; aetate declinante; vitæ genere tristi, sollicito, solitario; cibo, & potu crasso; tempore autumnali. Denique & alia quaedam, quae febribus adsunt, rigor, pulsus, urina, & similia, diuersitatem humorum in diuersis febribus arguunt; ut ex speciali de singulis febribus doctrinâ manifestum euadet.

Verum tamen haec, quae de differentiis februm secundum humores dicta, rectè accipienda sunt. Nimirum ista, quae iam de humoribus tradita sunt, maximam partem de praternaturalibus excrementitiis humoribus, non de humoribus alimentariis vel naturalibus excrementis accipienda sunt. Alimentares enim omnes humores sunt sanguis, ut saepius, & praecipue Institut. lib. 1. cap. 9. p. 66. dictum. Et quamuis sanguis biliosus facilius in bilem abeat, tamen quatenus talis, febrè non generat; suntque multi temperamento bilioso, seu qui sanguinem calidiorem & sicciorum habent, qui diu febre non laborant; ita alij, sanguinem melancholicum habent, qui nondum quartanam experti sunt: sed ut febris actu in corpore producat, causa accedat necesse est, ob quam humores à statu naturali recedant, & in praternaturales degenerent; aut ut ex alimento assumpto tales, seu alimenti, seu partis concoctis vitio generentur. Atque ad febrem generandam sufficit, si in partem aliquam vitiosa constitutio humores prauos generans, bonosque corrumpens inducta sit, aut inquinamentum, vel causa humores corrumpens in corpus inciderit. Habet enim postea talis vitiosa dispositio seu *dispositio* talis se instar fermenti, & subinde plures vitiosos humores generat, bonosque corrumpit; sicut à parua fermenti quantitate totam massam alterari videmus. Ideoque non necessarium est, ut humores, qui in febribus inueniuntur, & in intermittentibus, singulis paroxysmis euacuantur, ante febres adfuerint; aut ut ad diuersas febres generandas in toto corpore diuersi humores adsint: Sed humores illi, qui in singulis paroxysmis euacuantur, illo ipso tempore; quod hunc & antecedentem paroxysmum intercedit, maximè ex parte generati sunt. Et illa, quae de causis varios in diuersis febribus humores generantibus dicta sunt, potius de generatione humorum excrementitiorum praternaturalium, & fermenti illius putredinalis, ut sic dicam, & dispositionis vitiosae humores praternaturales generantis accipienda sunt, quam de generatione humorum illorum naturalium.

Qui humores  
febrem generant.

Causa efficiens  
februm putridarum.

Quamquam enim non negemus alios humores; aliâque corporis constitutionem ad alias atque alias febres procliuiores apriorè esse: non tamen necessarium est, ut qui diuersis febribus laborant, semper diuerso temperamento praediti sint; cum idem humor diuersis modis ad diuersas febres inducendas

An ad diuersas febres  
diuersi humores & corporis constitutio  
requiratur.

C

corrumpi

corrumpi possit. Videmus enim diuersos homines temperamento, sexu, ætate differentes, ab eadem febre præferrim si epidemia & contagiosa sit, corripì; & à quartanis, quæ ante annos tres & quatuor hîc & in aliis locis epidemice erant, corripiebantur non solum melancholici, sed & bilioli, pituitosi, sanguinei, non solum viri & senes, sed & iuuenes, imò infantes vix nati.

Atque idem non solum cibi testantur, qui iidem in diuersis ventriculis, & bilefcere ac acescere possunt; sed & res aliæ multæ. Idem mel & acescit & amarefcit. In eandem farinam aliam dispositionem & mutationem inducunt feces cereuicis; aliam fermentum acidum. Et hoc casu si accipiat illorum sententia qui febres earumque periodos secundum humores differre negant, & quamlibet febrem ac febris periodum à quolibet humore provenire posse statuunt: non video, cur reiicienda sit. Et proinde magis causa humores corrumpens, aut præternaturales humores generans, quam ipsa naturalis constitutio attendenda: cum causam, quæ humorem illum Quartanæ authorem, etiam in corpus sanguineum, vel biliolum incidere posse, ipsa experientia testetur. Quamquã non negamus, si illud inquinamentum humores corrumpens in corpus introductum sit, sedemque alicubi fixerit, aliquam in Symptomatibus apparere diuersitatem secundum corporis constitutiones naturales & temperamenta varia; vt quamuis Quartanæ labores melancholicus, biliolus, sanguineus, tamen symptomata non parum varient secundum varia hæc corporis temperamenta.

Qua in putredine attendenda, terminus à quo, & præcipue terminus ad quem; & cum humores, qui corrumpuntur, tum id quod corruptione & putredine generatur, perpendendum, neque in solâ putredine acquiescendum, sed cum vnus corruptio sit alterius generatio, finis putredinis addendus, generatio scilicet ad quam corruptio tendit. Quâ in re magna apparet diuersitas; variatque non solum pro diuersitate rei corruptibilis, verum etiam pro diuersitate corruptentium: vt in contagio & venenorum differentiis videre est, cum omne agens sibi patiens, quantum potest, simile reddere labores. Alia enim sit corruptio humorum ex contagio pestilenti, alia ex contagio in variolis, alia in lue venerea; aliterque humores corrumpuntur ex morfu serpentis, aliter ex scorpionis, aliter ex aliorum venenis. Patetque idem in aliis rebus. Sint ex: gr. tria cadauera, bouis, suis & cancri, atque ab eodem aere calido corrumpantur: putredinis triplex differentia ratione subiectorum corruptibilium apparebit; & vspecies viuorum corporum differebant, ita & mortuorum putredo. Sint rursus vnus speciei, e. gr. bouis, tria cadauera, quæ in tribus locis putrescant, vnû in aere, alterum in aquâ, tertium in terrâ defossim: & maxima apparebit putredinis differentia. Patet ista mutatio & in aliis rebus naturalibus omnibus. Ex: gr. Idem vinum variis modis corrumpi & degenerare potest, atque alia est mutatio, cum acescit, & spiritus *ερωξος* mutatur in acerum *αρωξος*, alia cum in vappam mutatur, alia quando lentum & pendulum fit aut feruere incipit. Terminus ergo putredinis præter conuersionem & degenerationem caloris natui in igneum notandus, quod ad curationem instituendam non parum facit. Ita in fluxibus pestilentialibus, quique interdum in febribus malignis accidunt, salios humores crescere, symptomata indicant.

Putredinis diuersitas.

Humoribus differentia.

Atque omnino hîc opera danda ne res diuersæ planè confundantur, humoresque, qui totâ naturâ discrepant, ad idem genus referantur, seu potius confundantur. Quâ in re omnino aliquid in vulgari doctrinâ desiderari videtur. Vnum enim nomen vulgò pluribus humoribus, quorum essentia est diuersissima, tribuitur. Phlegmatis nomen tribuitur humori frigido & humido: eodem tamen humor salis, calidus & siccus appellatur. Ita bilis nomen diuersissimis humoribus in-

ditur; vidique ego & obseruauerunt alij Medici, flauos & planè croceos humores vomitu reiectos fuisse, non amaros, sed potius lactis, aut ferilactis, imò glycyrrhizæ dulcedinem æmulantes, vt ægri affirmarunt. Ita sub melancholice nomine comprehenditur humor frigidus & siccus, deinde atra bilis, humor calidus & siccus erodendi vi præditus; cum tamen effectus testentur, humorem cancri causam & authorem à fece illâ sanguinis insipidâ non minùs differre, quàm bilis in vesiculâ fellis à pituita insipidâ.

Ideoquæ omnino hîc in conspectu habenda est humorum excrementitiorum in naturales & præternaturales distinctio. Naturales sunt illa excrementa, quæ in quouis homine optimè sano generantur, qualis est bilis flaua, fex illa sanguinis, quæ melancholia propriè vocatur, vrina. Præternaturales sunt, qui præter naturam ex cibis, vel reliquis humoribus corruptis generantur, & in nullo homine exactè sano reperiri debent. Illi sunt mixta & composita corpora homini, vel animato propria, quæ merito etiam suis nominibus simpliciter nominanda; sicut & sanguis suo nomine appellatur: quæ cum reiciunt Chymici, merito reprehendendi. Et perinde faciunt, ac qui lixiuium eiusdem cum vrinâ aliquâ saporis, vrinam appellare velit. Aliud enim est liquor, aliud sal in liquore. Humores verò præternaturales non absurdè nominibus à principiis Chymicis petitis nominari posse videntur. Quamuis enim humores illi excrementitij non merus Sal, vel Suphur sint: tamen corruptio eò tendit; & in alio morbo humores amari, in alio acidi augentur, atque in eos reliqui degenerant; quem excessum Hippocrates τὴν χυμῶν ἀκρότητα appellat. Atque ita & in febribus sese res habet, quæ potius à præternaturalibus, quàm naturalibus, excrementitiis ortum habent. Aut si etiam naturales seu præternaturales, seu excrementitij febribus materiam suppeditant, putredine tamen corrumpuntur, & aliâ naturam inducunt.

Ideoquæ commodissimè hîc facerent Medici, si Hippocratem, in lib. de prisc. medic. imitati, diuersos humores, diuersis & suis nominibus indigitarent, atque alios inspidos, alios salios, alios amaros, alios acidos, alios dulces, alios acerbos, aliosque nominibus distinctè nominarent, & singulos ad sua principia reducerent potius, quàm vt tot diuersis rebus & totâ essentia differentibus idem nomen attribuerent. Ita enim cum alij morbi, tum febres in primis ad suas species & causas reducerent, & generationis modo cognito, causis singulos humores generantibus obuiam iri posset. Quâ in re vtilem Chymia operam præstare potest, quæ inuestigare docet, quodnam primum amari, quod acidi, quod aliorum saporum subiectum sit. Ex quâ, reuocatis ad sua atque ea certa & definita principia singulis causis, plus commodi percipiet Medicus, quàm ex Sanctor. Sanctorij phantasia & inanibus speculationibus, qui lib. 7. meth. viand. errorum in Medicinâ, cap. 9. 80084. humorum mixturas possibiles constituit. Quo ipso annon artem medicam incertam & obtrectoribus deridendam exposuerit, penès prudentes Medicos esto iudicium.

Cum autem illa diuersitas humorum, quæ in febribus diuersis apparet, & humorum, qui in corporibus aliâ naturali constitutione & temperamento non parum differentibus iidem reperiuntur, generatio, à causa præternaturali seu *διαβόσι* illâ vitiosa, quæ febriles istos præternaturales humores generat, aliosque humores in sui generis vitiosum corrumpit, pendeat: in qualibet febre ea præternaturalis *διαβόσι* attendenda: cum tota ferè curationis ratio in huius dispositionis ablatione consistat, ac hac perseverante nouosque humores generante, febris non cesset, & frustra purgationes instituatur, ægrique purgatis quod multi faciunt macerentur, nisi hæc dispositio sublata sit; semperque præstet, vitiosos humores non generari, quàm

Humores naturales.

Humores præternaturales.

Humoribus differentia videnda.

Primaria febrium putredinis causa.

quàm genitos euacuari. Habet autem ista dispositio sese instar fermenti, quod totam massam feruere facit, alteratque & mutat. Atque ea in plurimis morbis apparet. Vt iam de venenis non dicam, quorum minima quædam portio insignè peculiariter humores corrumpendi vim habet, vt à serpentibus quibusdam demorfi subito icterici fiant, humoribus in flauum huiusmodi humorem à veneno hoc corruptis: In Cholera & Ileo tanta sæpe humoris flauis copia vomitu reicitur, vt credibile non sit, tantam in corpore latuisse, sed hoc potius probabile est, non solum cibum & potum assumptum, sed & humores in eiusmodi humorem corrumpi. Decuplo enim plus sæpe vomitu reicitur, quàm cibi potusque assumptum sit. Videmusque etiam in aliis partibus omnibus, si non rectè sese habeant, alimentum, quod attrahunt, non sibi rectè assimilare, sed in vitiosum mutare, sicut id in vulneribus manifestum est.

Quænam autem illa dispositio sit, & quâ in parte hæreat, explicare non facile est. Obstructiones à multis hic frustra accusari, supra dictum. Vero non dissentaneum videtur; in quotidianâ in ventriculo; in tertianâ in hepate & melaraicis achepati vicinis locis; in quartanâ in liene & vicinis locis causam consistere. Et quidem in quotidiana pituitam, in tertianâ bilem, in quartanâ melancholiam generari; atque in tertianâ amaros, in quartanâ acidos humores & multiplicari & augeri: Sicut antea dictum, mel & amarefcere & acêscere posse: qui sapes, vt ad Chymicorum principia hæc applicemus, in salibus, quibus primò intunt, quæri debent. Et si enim in vtraque febre calor natiuus in igneum degenerat: tamen per putredinem & fermentationem quasi aliud augetur in tertianis, amarus scilicet humor, salis sui generis respondens: in quartanis acetosus, vitriolo analogus. Atque ægri in tertianis amarorem, in quartanis aciditatem percipiunt, & in ipso Quartanorum sudore aciditas animaduertitur.

Quamquam verò hepar tertianæ, lienem Quartanæ fontem esse credibile est: tamen ventriculus nunquam, aut raro immunis est, sed & ipse, partim à calore febrili, partim ab affluentibus à reliquis visceribus humoribus vitiosis debilitatur, atque hinc malè coquit & cibum corrumpit, & vitiosos humores suppeditat, qui postea ad febrium scaturiginem delati, febri materiam vberem suppeditant, vnde non raro febris prolongatur. Atque ita morbus cum suis causis in circulum redit, & qui à morbo producti fuere humores vitiosi rursus morbum augent. Et hinc causam reddere non est difficile, cur nonnulli ad coniuertum cibum reuersi, aut cibum, quem auidè expetierunt, nacti, febre liberentur. Fit enim hoc eà inprimis de causâ, quòd in ventriculo coctio rectius perficitur, & minus materiz febri suppeditatur. Hinc etiam accidit, vt vulgus nonnunquam spiritu vini cum semine carui vel aromatis sumpro febres depellat. Quamquam enim & sudores talia ciere; humoresque vitiosos dissipare possint: tamen & ventriculus hoc modo roboratur, vitiosique humores, in eo absumuntur. Verum plura hac de re infra, de febrium intermittentium differentiis dicentur.

Quartò locus, in quo putrescunt humores, non semper idem est. Aliquando enim putrescunt humores intra vasa, id est, intra sanguinis perfecti receptacula venas & arterias, aliquando verò extra vasa eadem in venis melaraicis, & aliis locis putredinem concipiunt. Quæ intra vasa sit putredo, vel æqualiter est in omnibus vasis, aut certe maximis, qualia sunt inter alas & inguina, vel est in aliquâ parte priuatâ, venisque, quæ alicui determinato membro peculiare sunt, id quod in pleuritide, anginâ, peripneumoniâ, & similibus inflammationibus accidit.

Dan. Sennerti Tom. I I.

Ex his febrium differentias commodissimè hoc modo elici posse existimamus.

Primò Febres aliæ sunt simpliciter putridæ, sine vlla malignitate & contagio: aliæ verò malignæ, pestilentes, & contagiosæ.

Deinde febres aliæ sunt continuæ, aliæ intermittentes: cuius differentiz causa hæc est. Vapor ille putridus, qui continens febrium putridarum causa est, seu calor ille præter naturam, qui à putrescentibus humoribus oritur, vel continuò cor affligit, caloremque continuum in eo excitat, vnde etiam febrilis calor in vniuersum corpus continuò diffunditur: vel per per internalla quædam. Vtriusque rursus multæ sunt differentiz, quæ, etsi sine aliquarum questionum & controuersiarum discussione perfectè intelligi non possint: tamen vt tota febrium putridarum & sequentis tractationis *subo* quasi ante oculos ponatur, omnes illas hic subiungere, & postea suo loco de singularum causis *dispositio* disquirere placet.

Continuæ sunt duplices. Vel enim putredo in vasis communibus, & extra partes priuatas accenditur, vnde febres oriuntur putridæ continuæ primariæ: Vel è peculiaris alicuius partis inflammatione putredo oritur, è quâ ob continuationem vasorum vapor putridus continuò cordi communicari potest; vnde febres Symptomaticæ dictæ ortum habent, quales in pleuritide, anginâ, peripneumoniâ, phrenitide & similibus inflammationibus conspiciuntur.

Continuæ primariæ iterum sunt duplices. Aliæ enim nullam accessionem, vel augmentum nullamque remissionem habent, sed continuò à principio vique ad finem sine omni remissione aut exacerbatione durant, quas *putredinis* febres continentes nominant: Aliæ verò sunt, quæ quidem nunquam intermittunt planè, aliquam tamen interdum remissionem, & iterum incrementum aliquod caloris obtinent, quæ *anxiosæ* & continuæ; nomine generis, appellantur. Quæ rursus ex remissionis & accessionis diuersitate, in tres species diuiduntur, atque aliæ appellantur tertianæ continuæ, quæ scilicet tertio quòque die quoddam caloris incrementum & intensionem habent: aliæ quotidianæ continuæ, quibus singulis; aliæ quartanæ continuæ, quibus quarto quòque die idem accidit.

Intermittentium similiter sunt plures differentiz. Aliæ enim tertio quolibet die redeunt, & appellantur tertianæ; aliæ singulis, & nominantur quotidianæ; aliæ quarto quòque, & vocantur quartanæ.

Atque hæc omnes simplicium sunt febrium differentiz: Quæ vario modo inter se possunt componi, vnde compositæ febres oriuntur, de quibus suo loco dicetur.

Verum antequam in specie de singulis hisce differentiis earumque causis agamus, de signis febrium putridarum in genere aliquid dicendum est.

### CAPVT III.

#### De Signis febrium Putridarum in genere.

PRIMUM signum, quo febres putridæ ab aliis febribus discernuntur, à qualitate ipsius caloris febrilis sumitur. Febrium enim putridarum calor mordacior est & acrior, quàm aliarum febrium, atque ita ferè afficit, sicut fumus oculos, aut res acris nares: & quidem inprimis in statu & augmento, in quibus febrium putridarum temporibus hoc signum ferè pro proprio & inseparabili haberi potest. In principiis verò accessionum & paroxysmorum calor non mox sese acris tactui offert, sed diutius manum immorari oportet, vt sentiat calor, velut ex profundo emergens. Quoniam in principio



accessionis, dum accenduntur excrementa, calor quasi suffocatur. nec statim liberè foràs erumpere potest. Causa autem caloris acrioris in putridis est fuliginosum quoddam excrementum acre & mordax, è putrefactis humoribus elatum. Hoc enim cum tenuior humoris putrescentis pars sit, etiam conditionem illius monitrat.

Hoc loco monet Argenterius, *lib. de febribus*. Cum in ephemerâ ex inediâ aut vigiliâ, quibus corpus exsiccatur, probabile sit, calorem magis esse mordacem, quàm in pituitosâ putridâ: signum hoc tantum esse verum, si vniuersum genus putridarum aliis generibus febrium compareretur, etsi in aliis generibus quædam reperiiri possint, in quibus calor acrior sit, quàm in quibusdam putridis. Verumenimverò nisi quælibet febris putrida, per hoc signum à quælibet febre ephemerâ vel hecticâ distinguatur, vix pro certo signo illud habendum; cum tamen Galenus id appellet maximum. Ergo sciendum, vix calorem in ephemeris, vel hecticis posse esse tam acrem, in quibus à spirituum substantiæ tenuioris incendio, vel sine vlla causâ continente, ex sola alteratione partium calor accenditur, quàm vbi ex humoribus putridis vapores ad ambitum corporis effunduntur. Et licet humor aliquis sit frigidus, cum aliis comparatus: tamen vbi putrescit, ex putredine calidior eius pars erumpit, quæ calorem tam acrem in cute excitat, qualis in nulla ephemerâ animaduertitur.

Secundum signum, quod à causis petitur, est, quod febres, putridæ incipiunt sine causis procatacticis. Quod signum est proprium, sed non inseparabile. Proprium quidem est: nam quotiescunque aliqua febris absque causâ procatactica & euidente incipit, hinc rectè colligere licet, esse febrem putridam: cum ephemeræ omnes à procatacticis causis incipiant; hecticæ verò cum absque causâ procatactica incipiunt, putridam febrem sequuntur; aliàs à procatactica ortum habent. Inseparabile verò non est: quoniam aliquando corpus ita est ad putredinem dispositum, vt accedente leui aliqua occasione, & causâ externâ humores putredinem concipiant, & homo in febrem putridam prolabatur. Postquam enim causâ procatactica spiritus inflammavit, calor ille humoribus communicatur, & putredo excitatur; vnde diariæ in putridas mutantur, aut etiam statim cum incendio spirituum putredo exoritur. Aliàs, & nisi corpus sit ad putredinem dispositum, magnam vim causæ externæ esse oportet, quæ putredinem gignere debet. Calorem enim, qui putredinem excitare debet, maior sit oportet, & à vehementioribus causis excitatus.

Tertium signum ex vrinis sumitur. Vrinæ enim in febribus putridis initidæ aut crudæ sunt, aut certè obscuras coctionis notas exhibent; nisi ex ephemeris in putridas fiat transitus. Tunc enim vrinæ, quæ primùm apparent, coctæ sunt; quoniam separatio fit ab humore concocto & leuiter alterato. Atque hoc signum, si diuissim accipiatur, quælibet pars signum proprium, non tamen inseparabile exhibet. Proprium quidem signum est; quoniam tantum putridis febribus competit, habere vrinas crudas, vt & obscurè coctas. In ephemeris verò quoniam spiritus inprimis afficiuntur, humores verò leuiter incaluerunt, & parum aded à naturali statu recesserunt, cocta apparet in iis vrina: sicut & in hecticis, in quibus calor exiguus est, nec corruptio in humoribus. Neutrum autem horum signorum est inseparabile. Non enim competit omnibus febribus putridis, habere crudas vrinas, neque etiam omnibus, habere vrinas concoctas; sed in quibusdam sunt crudæ, in quibusdam parum coctæ. Si autem coniunctim sumuntur hæc signa, inseparabile

signum constituunt, Etenim nulla datur febris putrida, in quâ non in principio appareat vrina cruda, aut obscurè cocta: & nisi in principio alicuius febris vrina cruda, vel parum cocta sit, licet inde concludere non esse putridam.

Quartum, Pulsus etiam febres putridas à reliquis <sup>Pulsus febris putridarum quælibet</sup> secernit. Nam si pulsus accidat compressio, seu contractio, & incipiente paroxylimo pulsus fiant parui & inæquales: febris putridæ indicium est. Quod signum est proprium, sed non inseparabile. Inæquales autem sunt pulsus inæqualitate systematicâ, quando nimirum vna pullatio est maior alterâ; quod accidit, tum ob facultatem grauata, & oppressum calorem natium, tum ob viscerum obstructions & confluxum humorum versùs interiora. Non autem inseparabile est hoc signum; cum non in omnibus febribus putridis hoc accidat. Deinde in putridis systole est velocior, quàm diastole. Fuliginosa enim excrementa multa sunt, quæ expulsiorem requirunt, & magis fuliginosorum excrementorum expulsio vrget, quàm refrigeratio: & nulla est febris, in quâ fuliginosa excrementa plus abundant, quàm in putrida. Et quidem id euidentius apparet in augmento; licet etiam minimè obscurum sit in vigore, & initio accessionum. Nam in principio putridi illi vapores nondum copiosè attolluntur: in statu verò etsi adsit copia talium fuliginum, atque etiam contractio sit velox: tamen quia calor etiam tum valde intensus est, diastole quoque est velox, & ita systole non multum diastolen superat.

Quintum signum putridæ febris est, cum rigore incipere; si nimirum non frigus & causâ euidentis præcesserit: quod signum etiam proprium est, sed non inseparabile. Proprium est, cum neque diariis, neque hecticis competat cum rigore incipere. Nam cum rigor ortum habeat à motu materiæ acris & mordacis per partes sentientes: neque in ephemeris, neque in hecticis id accidit: nisi forsan in ephemeris refrigeratio nimia, quod in iis, qui per niuem iter fecerunt, accidit, aut similis causâ præcesserit. Non tamen est inseparabile hoc signum, cum non omnes putridæ cum rigore incipiant; quod in Synochis putridis euenire solet.

Sextum signum putridæ febris est *ἐν τῷ ποσὶ καὶ ἐν τῷ στόματι*, id est, aliquas inuisiones & insultus habere, ac per accessiones repetere. Signum hoc etiam est proprium: Nam nulla alia febris reditûs, atque accessiones habet. Non tamen inseparabile est hoc signum, neque omnibus febribus putridis competit, vt suo loco dicetur.

Tandem etiam ex aliis signis febris putrida ab aliis discernitur. Nam si aliquod symptoma adsit, quod speciei alicui febrium putridarum proprium est, tunc & febris putrida in genere, & etiam species eius significatur. Exempl. gr. Si calor vrens, sitis magna & intolerabilis adsit: non solum febris putrida in genere, sed & species eius, scilicet febris ardens, significatur. Ita si lingua arida, vel nigra sit, delirium, aut simile quid adsit: febris putridæ indicium est. Et talia signa putridæ febris in genere signa sunt propria, sed non inseparabilia; speciei autem propria & inseparabilia; cum non omni putridæ competant, sed certæ eius speciei.

Vt verò hæc omnia in summam quasi colligamus, si Medicus ad febricitantem vocatus fuerit, primò sciscitari poterit, an febris cum rigore inuaserit. Nam si cum rigore inceperit, signum est febris putridæ: modò non ab externo frigore, aut destillatione rigor ortum habeat. Deinde etiam videndum, quid post insultum febris acciderit, an vomitus, an simile aliquid, quod febrem humoralem & putridam arguit. Præterea attendendum, vbi febris desinit, quomodo desinat, an cum sudore, vel aliâ excretionem, &

*Vrina febris putridarum quælibet.*

*Febris putrida cognita.*

& an finito paroxysmo æger ab omni febrili accidente liber sit. Quæret etiam ex ægro, an præcesserit aliqua causâ externa vel euidens. Nam si nihil tale præcesserit, iam suspicio de febre putridâ est; quæ magis confirmabitur, si æger ad febrem putridam fuerit dispositus, ob plenitudinem aut cacochymiam, somnūque habuerit præter solitum longiorem, aut profundiorē, capitis aut totius corporis gravitatem senserit, hypochondria tensa habuerit, deiectionēque appetentiam, vel alia symptomata, quæ pravitatem aut copiam humorum in corpore arguunt; si item vita antea & diætā præcedens talis fuerit, quæ malos humores cumulare, corpūque ad putredinem disponere potuerit: si alia quoque signa, quæ ex colore corporis & aliunde petuntur adsint, quæ in corpore malos humores abundare arguunt. Hinc Medicus pulsum tanget; quem si compressum, inæqualem, aut velociorem in systole, quàm diastole reperiat, aut duriorē; modò non de hecticâ sit suspicio; indicio est, febrem adesse putridam. Quod manifestius fiet ex caloris qualitate; si scilicet acrior & mordacior sit, quàm in reliquis febribus esse solet. Tandem & urinam spectabit Medicus, & an cruda sit vel parùm cocta, vel integras coctionis notas exhibeat, videbit; ex quo de febris genere facillè erudiri poterit. Vbi de febris genere erit certior, postea etiam de specie cognoscendâ erit sollicitus; id quod ex peculiaribus cuiusvis febris signis & naturâ discet: de quo suo loco.

## CAPUT IV.

## De curatione febrium putridarum in genere.

Indicationes  
in febre putridâ.

**F**ebres putridæ inter reliquas frequentissimæ sunt, nec periculo omnes vacant: ac propterea maxime necessarium est, eas curandi methodum Medico esse notissimam. Cum verò putridæ febres ex eorum morborum genere sint, quæ cum suis causis conjunguntur: facillè hinc patet, omne indicationum genus in putridis febribus locum habere; vitalem scilicet, præservatoriam ac curatoriam. Et propterea febris putrida, ut morbi fientes & cum suâ causâ complicati, minùs simplicem, sed mixtam, magis operosam ac difficilem curationem requirit, & aliud *προσλαβειν*, aliud *διαπραγμαιναι* gratiâ est faciendum, & omnes indicationes tum curatoria, tum præservatoria diligenter sunt perpendendæ: quando, ut Galenus, 11. meth. med. cap. 2. scribit, si vel vnam earum prætereat Medicus, ad portionem tum magnitudinis illius, tum facultatis, curatio claudicabit. Cum verò, ut Galenus, 11. meth. med. cap. 2. & 10. scribit, ut præsidia morbo cum causâ suâ complicato inveniuntur, per *ἀνάλογον* causarum indicationes quærendæ sint, & duo omnino agenda; Primò, sumpto initio ab affectu ipso præter naturam, omnes causæ, continuo, quo sese coniequuntur, ordine inuestigandæ sint; Postea verò ab eo, quod in resolutione causarum ultimum est, in curatione ac remediorum inuestigatione inchoandum: etiam nobis in putridarum febrium curatione faciendum, & proinde breuiter omnis series causarum febris putridæ breuiter repetenda & ob oculos ponenda, ut postea singulis propriam ac conuenientem contrarietatis rationem opponamus.

Febris putrida, quia est calida intemperies totius ex vaporibus putridis cordi communicatis, & hinc in totum corpus dispersis orta, quatenus talis, duo indicat. Primò, quatenus intemperies calida, refrigerationem; Secundò, quatenus ille calor à vapore putrido calido, ut causâ continente, pender, eius remotionem postulat. Cæterum quia vapores putridi à materiâ putrescente dependent; non tolli

possunt, sicut nec inde orta intemperies calida, nisi sublata putredine: Putredo tolli non potest, nisi sublata eius causâ. Et quidem in putredine duo spectanda sunt: Primùm ut pars, quæ corrupta est, tollatur: Deinde ut prohibeatur, ne reliqua putredinem concipiat: atque alij humores porro non corripiantur, quod fieri non potest, nisi sublata causâ putredinis, si illa sit præsens. Putredinis autem causam plerique hoc loco solam transpirationem prohibitam, & quidem ab obstructione, ponunt. Vnde plerique curationis febrium putridarum quatuor scopos esse volunt: Febrem, putredinem, prohibitam transpirationem, & obstructionem. Et verum quidem est, frequentem putredinis causam esse prohibitam transpirationem. Nam cum ea putrescant, quæ calida & humida sunt, neque persflantur, neque ventilantur; sed in calido & humido loco manent: hinc facillè patet, in animalibus promptam putredinis causam prohibitam esse transpirationem. Etenim cum natura ob caloris nativi conservationem instituerit respirationem, arteriarum pulsum, & totius corporis *διαιρέσιν*, ut calor ventilari & halituosa excrementa diffari & dissipari possint: si illa transpiratio impediatur, & calidum effluuium retineatur, nativum calorem suffocari necesse est. In cuius caloris locum succedit in omnibus rebus humidis quidam calor præternaturalis, quo res tales humidæ corrumpuntur & putredinem concipiunt. Hæc, inquam, euidens putredinis causa est, quam idcirco non pauci Medici etiam pro vnicâ in putridis febribus causâ agnoscunt. Verumenimverò si rem diligentius perpendamus, vnius huius causæ consideratio non sufficit, & in febrium putridarum curatione, sæpe etiam ad alios scopos, quàm solam transpirationem prohibitam, aut obstructionem respiciendum.

Ergo ne quid mancum in hac doctrinâ relinquatur, causas omnes, quas suprà proposuimus, in conspectu habere oportet, ubi diximus, in putredinis generatione in corpore humano, & ipsam materiæ dispositionem & efficientem causam considerandam esse. Nam primò si humores internum aliquod vitium, aut quasi ad putredinem propensionem habeant, satis causarum, in quocunque etiam corpore, inuenient, ut putredinem concipiant. Vitia autem humores ob plures causas concipiunt, vel ex ciborum ipsorum, qui assumuntur, qualitate malâ & constitutione, vel ex partium coctioni & gubernationi humorum dicatarum vitio, ob quod etiam humores corrumpuntur & inquinantur. Pertinet huc plenitudo, quoad vires appellata. Cum enim illam natura regere non possit, relictis sibi humores tandem corrumpuntur & putredinem concipiunt. Pertinent huc omnia etiam ventriculi, hepatis & aliarum partium vitia, ob quæ, etsi libera sit in corpore transpiratio, & humores qui ad corruptionem proclives sunt, facilius putredinem concipiunt & boni etiam corrumpuntur.

Inter causas efficientes verò, quæ & vitiosis humoribus, ut putredinem facilius concipiant, occasionem præbent & humores etiam bonos corrumpere possunt, est primò, ut dictum, prohibita transpiratio. Hæc rursus suam causam habet meatuum corporis occlusionem. Meatuum occlusio, etsi in partibus internis solum ab obstructione pendeat: tamen in partibus externis fines vasorum non solum obstrui, verum etiam constringi & condensari possunt. Ergo alia hinc indicatio oritur, meatuum nimirum apertio seu obstructionis, vel constrictionis amotio. Eius rei rursus variæ causæ habentur. Obstructio pender, vel à copiâ, vel à crassitie & lentore humorum: constructio & condensatio fit, vel à frigore aut re aliquâ externâ astringente, vel à causâ valde exsiccante.

Putredo quid  
indices.

Putredinis  
causa.

Atque obstructio, quæ ex copiâ fit, non semper ortum habet ab humorum in toto corpore abundantium copiâ, verum etiam accidere potest, ut in partem, vel impellatur, vel attrahatur humor; & vel ob vehemens exercitium & motum, vel balneum, vel iram aut alios animi affectus, vel vini generosi potum, vel diuretica, humores in aliquam partem confertim irruant. Deinde, præter transpirationem prohibitam, & ea quæ calorem naturalem euocare, præternaturalémque excitare possunt, putredinem accendunt, ut sunt febres Ephemeræ, aliæque causæ humoribus calorem præternaturalem inducentes. Tandem rerum putridarum occurfus huc pertinet, quarum vi partes & humores putridi bonos humores corrumpunt. Hoc modo videmus in pestilente constitutione, licet corpus perspirabile sit, ex hausto veneni seminio humores corrumpi. Hoc modo aliæ febres contagiosæ inducuntur. Hoc modo, seu partes, seu humores in corpore putridi & corrupti alios etiam bonos humores corrumpere possunt. Vnde Hippocrat. 2. aphor. 12. Quæ in morbis post crisin relinquuntur, recidivas facere, scriptum reliquit; & quod in intermittentibus post paroxysmum in corpore remanet inquinamentum, humores alios corrumpendo noui paroxysmi causa est. Et quod aer pestilens & venenatum contagium potest, idem etiam putrefacientia medicamenta præstare valent.

Indicationes  
in febribus  
putridis.

Ex quibus omnibus cum satis pateat, plures in febribus putridis causas occurrere, ad plures etiam scopos in curatione respiciendum, & singulæ causæ per sua contraria conuenienti modo amouendæ sunt: atque ita plura sæpe in febribus putridis Medico peragenda sunt: sanguis euacuandus; humores vitiosi expurgandi; materia putrescens & obstruens nonnunquam ventilanda, refrigeranda & exsiccanda; crassa attenuanda, extergenda: præternaturalis humoris generatio, causarum ablatione, impedienda, calefacta & debilitata refrigeranda & roboranda.

Cum autem omnia simul exequi non liceat, & ut Galenus, 11. Method. med. cap. 16. docet, illud, quod in ἀρχαῖς causarum ultimo loco inuentum, in curatione primo loco exequendum sit: etiam in curatione cuiuslibet febris putridæ ab eo inchoandum, quod in ordine causarum vltimum est; verbi gratiâ, materia quæ obstructionem facit, seu sanguis seu alius humor, euacuetur. Nam cum febris non possit tolli manente putredine, illius causâ; neque putredo prohibet transpirationem; neque hæc, præsentem obstructionem vel astrictionem, aut condensationem meatuum: patet hinc, causas illas prohibitæ transpirationis tollendas esse. Cum autem obstructio partim facta sit, partim futura: frustra in eâ, quæ facta est, tollendâ laboratur, nisi antea ea, quæ futura est, prohibeatur. Licet enim eos humores, qui obstructionem faciunt, tollere conetur Medicus, atque etiam obstructionem libet: tamen frustra laborabit, si alij humores rursus affluunt, iterumque obstructionem faciunt. Itaque res omnis eò redit, ut materia abundans primò tollatur, & obstructionis generatio prohibeatur. Idem etiam in aliis causis agendum.

Scopi in  
febribus  
putridis.

Atque ut in summam hæc concludamus, Is rectissime febres putridas curauerit, qui euidentes causas omnes, si aliquæ quæ morbum augere possunt, præsentibus sint, remouerit. 2. Rectam victus rationem morbo isti conuenientem instituerit. 3. Causam antecedentem, & quicquid in corpore est, vel sanguinis superflui, vel vitiosorum humorum, prius, si opus fuerit, ad excretionem præparatum, per conuenientia loca; vel venæ sectione, vel medicamento purgante, vel utroque auxilio euacuauerit. 4. Obstructiones, si quæ ad sunt, soluerit, vel quocunque alio modo transpirationem & humorum ventilationem corpori liberam reddiderit. 5. Partium vitio-

fos humores generantium ac suppeditantium, aut humores acceptos corrumpentium vitia emendauerit. 6. humores ipsos corruptos atque inemendabiles, si qui supersint, nisi natura id præstiterit, aut præstitura sit, e corpore euacuauerit, aut si corrigi possint, correxerit. 7. intemperiem corporis & humorum correxerit; putredini restiterit, & partes tandem intemperie ac materiâ febrili debilitatas ad naturalem temperiem reduxerit ac roborârit.

### Prognostica.

Indicantibus & scopis hoc modo propositis, proximum iam est, ut Medicus perpendat, an omnibus hisce indicationibus possit satisfacere: quod colliget ex comparatione febris & causarum eius cum viribus ægotantis; verbi gratiâ, si obstructions sint multæ & pertinaces, putridi humores plurimi, putredo magna, febris vehemens, inprimis si sit continua: vires verò ægri sunt debiles, ætas puerilis vel senilis, habitus corporis iam extenuatus: facile hinc concludere potest Medicus, vel difficulter, vel nullo modo Indicationibus satisfieri posse. Quapropter etsi spes planè abiicienda non sit, neque æger desendus; & præcipuè in acutis prædictiones incertiores sint, tamen prognostico se munire debet. Si verò contrario modo sese res habeat, salutis spes superest; & propterea de particularibus remediis, quibus scopo cuique satisfaciatur, cogitatio suscipienda.

Prognostica  
febris putridæ.

Atque in hac cogitatione vires, febris, & causa febris conferenda sunt. Nam si indicationes ab iis sumptæ inter se conueniant, promptè & sine cunctatione, id quod indicatur, exequi licet: ut pote si coniciamus, remedia causæ & febris tollendæ necessaria, vires ferre posse, sine morâ id expediendum: si verò inter se pugnant, ea indicatio præferenda, cuius maior est dignitas. At maxima dignitas est virium; cum sine virâ nec sani esse possimus. Si ergo, verbi gratiâ, vacuatione sit opus; vires autem extremâ imbecillitate laborent: non licet id, quod causa morbi postulat, exequi, donec æger aliquid roboris acquisuerit, ut sine insigni læsione vacuationem sustinere possit. Ita & causam & morbum inter se conferre oportet. Et licet putredinis, utpote, quæ febris causa est, prima sit habenda ratio, interim nec febris planè negligenda. Ac si quæ febrem extinguunt & quæ causam tollunt, consentiant; sine morâ id, quod vtriusque consensu indicatur, expediendum. Sin verò febris sanatio causam sit auctura; aut quæ causam tollere valent, febrem augere apta nata sint: diligenti circumspectione opus est. Ac tum ad tria capita Medico respiciendum, ac perpendendum. 1. Febris an sola curanda sit, neglectâ causâ. 2. An causa oppugnanda neglectâ febre. 3. An magis quidem ad alterum horum attendendum, & alteri medicamenta plura adhibenda, ita tamen, ut alterum planè non negligatur.

Primam quæstionem quod attinet, plerumque quidem neglectâ causâ febrem curare non licet; cum si præsidia, quæ febrem oppugnant, causam augent adhibeantur, hac ratione nec generationem eius inhibere, nec magnitudinem imminuere liceat; & plerumque maior vis causæ sit, quàm morbi. Si tamen aliquando accadat, ut tanta sit febris magnitudo, ut nisi ipsi occurratur, præsentem perniciem afferat: tunc necessarium est, ad febrem primùm respicere, causâ quasi neglectâ; deinde ad causam etiam tollendam accedere. Quam sententiam proposuit Auicennas, libro 4. fen. 1. tr. 2. capite 7. Sciatis, inquit, quod febris quandoque est tanta vehementia, ut non liceat uti regimine causa, sed indigeat extremâ refrigeratione.

An febris vel  
causa posterior  
ratio in curatione  
habenda.

De secundâ verò quæstione distinctio est obseruanda. Nam si intolerabilis ægro sit calor, cauendum,



ne per ea, quibus causam tollimus, febris augeatur. Ita enim cum causâ hominem sustulerimus. Quapropter cum aperiencia, & alia medicamenta causâ opposita plurima sint calida, ea eligenda, quæ citra insignem calefactionem, quod opus est, præstant: si verò febris adedò remissa sit, ut quo tempore aduersus febrem pugnamus, vires nullam interim iacturam pati possint, licet aduersus causam solum pugnare.

Tertius modus tutissimus est, cum scilicet ad alterum plus curam dirigimus, ita tamen ut alterum non negligamus. Plerumque autem, ut dictum, major vis causæ est. Itaque hoc semper, & in febribus putridis, & aliis morbis attendendum, ut remedia, quæ morbi, gratiâ adhibentur, causam eius non augeant.

## CAPVT V.

## De Vena sectione.

An in omni  
febre putrida  
vena sit se-  
canda?

**S**ed cum de his omnibus in specie agendum sit, à venæ sectione initium facere placet. Galenus, 1. meth. med. cap. 15. hoc axioma quasi proposuit: *Saluberrimum, inquit, est in febribus venam incidere, non continentibus modò, verum etiam aliis omnibus, quas putrescens humor concitat: ubi præsertim nec ætas, nec vires prohibent.* Eiusque rationem subiungit hoc modo: *Leuata namque, quæ corpus nostrum regit, Natura, exoneratæque eo, quo veluti sarcina premitur, haud agrè, quod reliquum est, vinces.* Itaque proprii muneris haud oblita, & coquet, quod concoqui est habile, & excernit, quod potest excerni. Quam sententiam plurimi fundamenti loco ponentes, in omni omnino febre putridâ, si naturæ vires, & ætas id permittant, venam aperiendam censent.

Verum cum iidem facillè agnoscant, non in omni putridâ febre sanguinem abundare, nec ob sanguinis abundantiam venæ sectionem requiri: alij alias causas recensent; cur in febre putridâ, in qua nulla est sanguinis abundantia, nihilominus venæ sectione opus sit; quas postea recensebimus. Alij contrarium statuunt, & si vel humores biliosi, vel pituitosi, aut serosæ humiditates abundant, venæ sectionem non conuenire statuunt, & solum in febribus cum plenitudine sectione venæ vtendum, in cacochymia verò ab eâ abstinendum suadent.

Verum cum pluribus hac de re in vtramque partem disputare authores soleant, omnia hoc loco recensere operæpretium non est: ex ipsâ potiùs rei naturâ & fundamentis, quid hac de re sentiendum sit, inquiramus. Atque ut hinc faciamus initium, sanguinis vitio conuenire sanguinis euacuationem, ipsa indicationis ratio, & lex contrarietatis dicat. Verum cum & plura sanguinis vitia esse possint, & plures sanguinem euacuandi modi; possitque sanguis non solum per venæ sectionem, sed etiam cucurbitulas, scarificationes, hirudines, & aliis modis euacuari: non cuilibet sanguinis vitio venæ sectio conuenit, sed cum inter affectûs præter naturam & remedia proportio requiratur, venæque sectio, ut & purgatio, magnum remedium sit: non nisi à magno sanguinis vitio venæ sectionem indicari, planum est.

Cum autem sanguinis plura sint vitia possitque, is quantitate, qualitate & motu peccare: videndum, cuius ratione in febribus putridis venæ sectio conueniat. Primum quidem si adsit sanguinis abundantia, virisque id ferant: venam aperiendam esse, nullum dubium, est. Sed cum sæpe accidat, ut nulla insignis adsit in eo corpore, quod febre corripitur, sanguinis abundantia, quæritur: An & tum, & quam ob causam, sanguinem sectâ venâ euacuare liceat. Atque hic primo loco occurrit illa quæstio: *An etiam ob cacochymiam tollendam, vitiososque humores in venis san-*

*guini permixtos, venam aperire liceat: de quo non leuis hodie inter Medicos agitur controuersia.*

Primo qui negant in cacochymia venam secandam esse, nituntur illo communi Medicorum decreto: sanguinis vitium venæ sectione; cacochymiam purgatione tollendam esse. Atque istud axioma, & rationibus & auctoritate stabiliunt. Nam si in cacochymia venæ sectio adhibeatur, indicationis naturam subuertere aiunt. Etenim si cacochymia in venis contineatur, Medici intentio est, eam tollere, non verò sanguinem, qui non peccat. At venæ sectio non illum solum humorem, qui peccat, seorsum, sed omnes confusos euacuat. Purgationis verò munus est, vitiosos sanguini permixtos humores expurgare. Itaque si venæ sectione cacochymiam tollere conamur, eos humores euacuamus, qui euacuandi non sunt: imò maior quantitas humoris boni, quam peccantis euacuatur. Atque id ipsum pluribus in locis docuit Galenus, è quibus saltem duo proferemus. 2. aph. com. 8. hæc habet: *Non hoc tantum loco, sed in aliis quoque suis scriptis Hippocrates, cum iustâ proportionem inter se omnes humores aucti sunt, sanguinis detractione auxilium ferre studet.* Cum verò ex iis unus aliquis redundat, ipsi purgando conueniens medicamentum exhibet. Et 4. meth. med. cap. 6. *Quod ipsum, qui redundat, succum vacuandum esse Hippocrates suadet, alias sanguinis detractionem adhibebit, cum scilicet, is vincit; alias pharmacum, quod ad bilem vel flauam, vel atram, vel pituitam educendam vim habet, dabit.*

Contrà plurimi, qui etiam ad cacochymiam euacuandam sectionem venæ adhibendam esse putant. Fernellius quidem, libro 2. meth. med. capite 4. suam sententiam his verbis exponit: *Simplicem venarum cacochymiam sectâ venâ minnere, tutum est ac vrile; copia tamen ac virium ratione susceptâ.* Licet enim, dum in hac vena secatur, omnes humores aequaliter prodeant, & una eademque, ac antea, restet humorum proportio, quoniam tamen detractâ oneris portione, quo natura premebatur, vires nihilo imbecilliores, sed alacriores plerumque euadunt, quod reliquum est, facilius ferunt, minoremque negotio domant atque consueunt. Et ibid. capite 15. *Quorum morborum causa est plenitudo, aliæque humorum lazes in vasis, ea incipientibus illis, mox sectâ venâ submoueri debet.* Hoc enim pacto quicquid morbi in posterum gignendum est, prohibebitur; quicquid vero genitum & procreatum iam est, facilius natura concoquet, euincet atque profligabit.

Imò sunt nonnulli, qui vulgatam illam sententiam, quâ plethoræ deberi venæ sectionem, purgationem verò cacochymia, statuitur, & à veritate esse alienam & perniciosam statuunt: inter quos princeps est Leonhartus Botallus quo vix, opinor, vllus in mittendo sanguine fuit audacior. Is, libro de Cur. per sanguinis missionem cap. 8. pluribus defendere conatur, in cacochymia necessariam esse sanguinis missionem. Nam, si cacochymia in totum corpus dispergitur, & in omnibus venis totius corporis continetur: alio modo, quam venæ sectione, tolli non potest. Nam stultum est, ait, credere, id fieri posse alui excretionem: stultius etiam, vomitu & vinarum ductione. Non enim ab artubus ad dicta emissaria humorum regressus conceditur; nisi in lethaliibus euacuationibus. Itaque proût in variis locis hæret cacochymia, è variis partibus euacuandam censet: venæ sectione eam, quæ in venis continetur; cutis scarificatione; aut sudoribus, aut insensibili transpiratione, eam quæ cuti adhæret; alui excretionem, quæ cæcum viscera est sita; vomitu, quæ ventriculum; vrinis, quæ renes; excreatu, quæ pulmones aggrauat, tollendam opinatur. Tandemque concludit, cacochymia æquè sanguinis missionem, imò magis, quam purgationem, conferre; cum sit redundantia vitiosi humoris in venoso genere

*Alione sol-  
turi?*

*Negantium  
rationes.*

*Affirmanti-  
um rationes.*

*L. Botalli de  
vena sectione  
opinio.*

*Sanguinis  
euacuatione  
quid indicet.*

*Vena sectione  
quid indicet.*

*An cacochy-  
mia vena se-*

genere existentis, quæ nullâ viâ commodiùs, quàm venâ sectâ educi possit.

*Varia an-  
iborum san-  
ctia de cau-  
sa, ob quam  
in omnibus  
febris pu-  
tridis sit san-  
guis mitten-  
dus.*

Non multum ab hac opinione in febribus curandis absunt alij recentiores, qui in omni putridâ febre venam secandam censent. Alij tamen aliam eius rei causam afferunt. Aliqui idè venam in febribus putridis aperiendam esse putant, quòd Galenus, *l. de curat. per sang. miss. c. 9.* & alibi scripsit: sanguinem esse detrahendum, si morbus sit magnus, ætas florens, & virium robur. Cum enim febris putrida omnis, morbus magnus sit, modò ætas & virium robur consentiant, venam aperiendam esse existimant.

Alij venæ sectionem pariter & purgationem à magnitudine morbi indicari statuunt; delectum autem, & vtrum horum duorum vsurpandum sit, ex vnis præcipuè viribus æstimandum esse docent, & id eligendum, quod præter vtilitatem, quam confert, faciliùs tolerabitur. Tunc autem conferet & faciliùs tolerabitur, si talis perficiatur euacuatio, qualem fieri oportet, iuxta illud Hippocratis, *1. aph. 2. Vasorum inanitio si talis fiat, qualis fieri debet, confert & bene tolerant: sin minus, contra.* Qualis autem fieri debeat, inde æstimandum putant, si præsentem vel imminente morbo magno consideretur, vtrum maior sanguinis, quàm cæterorum humorum, præsertim vitiosorum, sit redundantia. Nam in maiore sanguinis copiâ, quantum ad hanc attinet, venæ sectio magis, purgatio verò minus tolerabitur: redundantibus autem cæteris humoribus, purgatio, quantum in ipsis est, meliùs; venæ sectio autem minus commodè feretur. Hanc tamen sententiam ita limitant, vt non statim sanguine exuperante phlebotomiâ, cæteris autem redundantibus humoribus purgationi locus dandus sit. Etsi enim, quod ipsorum redundantiam attinet, id quidem sic fieri oportebat: quia tamen nonnunquam aliud quid interuenire solet, quod impediendi huius operis vim habeat, limitatione opus esse putant. Atque eam tradidisse Hippocratem, *1. aph. 2.2.* dicunt, cum crudos humores in principiis, nisi turgant, nunquam purgandos esse præcipit. Etenim cum vi huius aphorismi crudos humores in principio purgare non liceat; nihil verò obstat, quò minus tunc venæ sectio instituatur: per tales ægritudines sæpenumerò venæ sectionem purgationi præferendam, atque in eius locum substituendam esse, tanquam ea non minus vitiosi succi, quàm sanguinis copiâ duntaxat peccantis euacuatorium præsidium sit. Atque id ipsum Galenum *9. meth. med. cap. 11.* docuisse ferunt, cum ita scribit, *Quoniam venæ sectio sanguinis euacuandi causâ adhibetur, sanguis autem natura utilis, utique probè hanc administrare conueniet, sic, vt quod natura inutile sit, emittat. Fit autem sanguis natura inutilis bifariam: vel cum propriam qualitatem ad vnguem non seruat, nec ampliùs nutrire, sicut priùs cum utilis esset, potest; vel ita multitudine creuit, vt aut vires premat, aut tum venas, tum arterias vel distendat, vel rumpat, vel obstruat.*

Sunt præter hos & alij, qui & ipsi, etsi sanguis non abundat, in omnibus febribus humoralib, seu putridis sanguinem mittendum censent: sed alij aliam huius rei causam afferunt. Nonnulli refrigerationis seu ventilationis gratiâ mittendum sanguinem putant; & nunc quidem copiosius, nunc parcius, quò febris fuerit intensior vel mitior. Alij hanc causam afferunt, statuuntque, quòd sanguis peccare possit, vt causa sine quâ non: vnde venæ sectione via ad exhibitionem pharmacorum purgantium paranda sit. Nam cum purgantia plerumque ex venis, aut plenioribus, aut obstructis nihil trahere aut pellere citra maximum incommodum possint; præterea purgatio institui sine corporis calefactione non queat: sanguinem priùs imminuendum putant, vt & corpus fluidum atque ad purgationem paratum red-

datur, & ne sanguis incalcescat & corrumpatur. Imò non solum ob purgationem exhibendam, sanguinem euacuandum nonnulli putant: verum & ob medicamenta aperientia, attenuantia, incidentia & abstergentia, si vsurpanda sint, quæ non tutò sine sanguinis euacuatione adhiberi possint.

Tandem sunt & alij, qui sanguinem mittendum censent, quatenus peccat ratione causæ adiuantis, quatenus scilicet in periodo febrium ad focum & partem imbecillam confluat: & tunc sanguinem reuulsio- nis gratiâ mittendum putant.

Ex hac controuersia satis perplexâ, vt nos expedi-  
*Controuersia  
deciso.*  
diamus. Primò istud notandum, venæ sectionem non esse vnum aliquod indicatum, quæ certo indicanti ex contrarietatis lege opponatur, sed esse materiam remedij, quæ pluribus indicationibus utilis sit. Nam cum vnum non nisi vnum indicet, venæ sectio verò diuersis vitiis occurrat: vnum etiam indicatum, quod ab vno aliquo indicante suggeratur, non erit, sed potius materia diuersorum indicatorum. Vfus autem quos habet venæ sectio, si consideremus, generalis vsus venæ sectionis est, humorem quemcunque in venis obuium euacuare. Is autem rursus in plures distribui potest. 1. enim humores in venis contentos euacuando imminuit. 2. Impetum quendam iis conciliare & ad varias partes mouere potest. 3. Denique per accidens refrigerat.

Deinde cum, vt iam dictum, primus venæ sectionis vsus sit humorem quemcunque in venis obuium euacuare, & iam in controuersia positum sit, cuius humoris, an sanguinis solius, an verò aliorum etiam euacuandorum gratiâ eam instituere liceat: sciendum, omnino istas ex contrarietatis lege toties à Galeno propositas, & ab aliis Medicis repetitas indicationes; sanguinis abundantia, sanguinis imminutionem; cachochymia præsentem purgationem deberi, nullo modo reiiciendas aut confundendas esse. Neque enim licet alteram alteri pro libitu substituere, cum sanguinem abundantem nec purgante medicamento, quale etiam nullum datur, imminuere; nec cachochymiam in venis, sanguine emissio, totam eximere possibile sit, nisi totus sanguis simul profundatur. Etenim phlebotomia non linceros humores vitiosos sed sanguini bono permixtos euacuat, & sola nunquam omnem cachochymiam tollit. Licet enim, vt mox diceretur, aliquid cachochymia tollendæ interuire possit venæ sectio: eam tamen totam non tollit; sed opus est, vt quæ superest pars maxima per venas omnes dispersa, nisi à naturâ sponte euacuetur, purgantibus medicamentis, vt conueniente & proprio remedio, tollatur. Venæ sectio verò abundantiam sanguinis, quæcunque ea sit, sola tollere potest.

Tertiò, etsi autem ita sit, vt sanguinis abundantia tollendæ principaliter debeat sanguinis missio, & cachochymia purgatio: aliquo modo tamen cachochymia in venis contenta & sanguini permixta interuire potest venæ sectio; præsertim cum purgatio illa, quæ è venis humores prauos elicere potest, non semper tutò in principiis febrium institui possit; venæ sectio autem tunc rectè locum habeat. Cum enim in venis sanguis & reliqui humores vitiosi, cum adsunt, confusi sint, aperta venâ cum sanguine vitiosi illi humores simul effluunt. Et licet aliquid boni sanguinis simul cum humoribus vitiosis euacuetur: illud tamen non modò ægro non nocere; imò sæpe & prodesse potest. Nam ita Natura aliquâ oneris parte leuatur, vt humores reliquos vitiosos feliciùs concoquere & elaborare, & postea, vel sponte vel medicamentis adiuta, euacuare possit. Quamuis etiam sanguinis copia, quæ adfuit, antequam æger in morbum incideret, illi oneri non erat: tamen cum à morbo & calore febrili æger debilitetur, fieri potest, vt illa mediocris etiam copia ægrum oneratura sit. Et videmus ipsam naturam

*Vena sectio  
nisi vsu.*

*Vena sectio  
sola cachochy-  
miam omnem  
non tollit.*

*Vena sectio  
aliquando in  
cachochymia  
utilis.*

naturam in hæmorrhagiis criticis cum vitiosis humoribus non parum de bono sanguine sæpe effundere. Accedit his & illud: quod natura in febribus plerumque non exiguam portionem materiae vitiosæ ad extrema & ad maiores illas subcutaneas venas propellere solet. Vnde videmus plerumque primâ vice sanguinem deterioiorem effluere, & postea meliorem sequi. Hinc quoque si animaduertamus primo loco sanguinem vitiosum, & qui peccat, effluere, largius sanguinem euacuare licet: parcius verò (nisi plenitudo adsit) si sanguis bonus primùm effluat. Id quod Gal. docuit 1. ad Glau. cap. 11. de curatione quartanæ ita scribens: *Si venâ incisâ, is, qui fuit sanguis, niger videatur & crassus, audacius mittendus est: quod si flauus aut tenuis appareat, statim suppressendus.* Toti tamen caco-chymia e venis tollendæ inferuire non potest venæ sectio, sed id, nisi à Naturâ fiat, medicamentis perficiendum.

Quando ve-  
na sectio in  
febris lo-  
cum habeat.

Ex quibus patet, vt hæc omnia in summam contrahamus, in quibus febribus venæ sectionem euacuationis gratiâ adhibere liceat; nimirum in iis, in quibus, vel sanguinis plenitudo adest; vel in quibus caco-chymia sanguini in venis permixta est. In quibus verò caco-chymia non in venâ cauâ est, sed in primis viis maximâ ex parte hæret, neque adest sanguinis abundantia, abstinendum à venæ sectione; cum illa nihil de causâ febris tollere, verum etiam, sinistrè instituta, vitiosa è primis viis in communes raptare, sanguinemque bonum inquinare, aut è febre intermittente continuam facere possit. Si tamen simul cum illâ caco-chymia, quæ in primis viis est & febrem excitat, plethora adsit, quod ex vrinis crassis, & permanente aliquo post febrem calore, cognoscitur; aut vnâ cum caco-chymia in venis sanguis abundet, vt in cachecticis fieri solet: sanguinem detrahare venâ sectâ licet. Non raro enim accidit, vt ex suppressâ aliquâ euacuatione sanguinis copia, calore nativo oppresso, in caco-chymiam degeneret; quod fit sæpe in Cachexia: atque tum si in tale corpus febris incidat, venam aperire licet.

Atque ex his, quæ posteriore loco diximus (scilicet de iis febribus, in quibus causa in primis viis hæret) facile apparet, cur Galenus, lib. 1. ad Glau. de cur. febr. intermitt. ferè mentionem venæ sectionis non fecerit, & in tertianæ exquisitæ curatione, ne verbo venæ sectionem nominârit; in eâ verò, quæ notha est, nisi oporteat, sanguinem mitti noluerit; atque cur in quartanâ sanguinem non euacuandum censuerit, nisi niger & crassus is effluerit.

Loci Galeni  
ex 11. m. m.  
c. 15. expli-  
catis.

Ex iisdem facile locus Galeni in principio allegatus, è lib. 1. meth. med. cap. 15. explicari potest. Neque enim tam vniuersale est illud axioma, vt in omnibus febribus putridis sanguinem mittere simpliciter præcipiat; neque tam strictè accipiendum, vt non nisi plethorâ præsentem locum habeat. Ipsa enim causa à Galeno addita, satis axioma istud determinat & explicat. Quoties enim natura ab humoribus in venis contentis, ceu onere grauat, venam aperire vtilissimum est. Humores autem illi, qui naturam grauari possunt, non saltem sunt sanguis copiâ peccans: cum dicat, idè partem materiae esse venæ sectione tollendam, vt natura parte oneris leuata, quod reliquum est, facilius vincat, coquat & excernat. Neque enim sanguinem bonum in morbis natura coquit & excernit, sed caco-chymia id debetur.

Atque hæc cum sit vera, vt existimo, de venæ sectione, euacuationis ratione, tam ob plenitudinem, quàm caco-chymiam adhibendâ, sententia: facile quiuis colligere potest, quid de aliorum opinionibus supra enumeratis sentiendum sit.

Non tantum  
ob plethoram  
in febribus  
sanguis mis-  
tendus.

Primò autem qui saltem ob plenitudinem in febribus putridis sanguinem mittendum censent, rem nimis arctè contrahunt. Nam etsi rectè in eo sentiunt, quod principaliter sanguinis abundantia debetur san-

guinis euacuatio; purgatio caco-chymia: in eo tamen errant, quod planè nihil de caco-chymia venæ sectione commodè tolli posse putant. Aliquid enim de eâ, si in venis sanguini permixta sit, venæ sectione tolli potest, vt reliquum facilius à natura coquat & vincatur, ac postea vel à natura, vel per purgantia medicamenta euacuetur.

Atque idipsum inter eos, qui in caco-chymia etiam sanguinem mittendum censent, sentit proculdubio Fernelius, cuius sententia hoc modo explicata facile admitti potest; cum sit eadem cum sententiâ Galeni, 11. meth. med. cap. 15.

Botalli verò opinio admitti non potest, qui caco-chymiam æquè bene, imò melius venæ sectione, quàm purgatione emendari posse existimat. Rationes enim, quas adducit, nullius momenti sunt. Etenim cum doceat, idè venæ sectione caco-chymiam tollendam esse, quod sit redundantia vitiosi humoris per totum genus venosum dispersi: facile patet, si venæ sectione ea tolli deberet, non posse id fieri, nisi vniuersus sanguis, siue id vnâ, siue plurib. vicib. fiat, euacuetur. Quod verò purgatione id perfici non posse dicit, idè quod ad aluum & ventriculum non detur humorum regressus, falsum est, & experientia contrarium, quæ monstrat, non solum, quod ille vult, in lethaliibus euacuationibus, sed & in criticis humorum euacuationibus, vt & iis, quæ per medicamenta fiunt, humores non solum è primis viis, sed & ex venis maioribus per aluum & vomitum euacuari.

Porro eorum opinio, qui idè in omnibus febribus putridis venam aperiendam putant, modò vires & ætas consentiant, quod sit morbus magnus, tam solidè & toties à Capivaccio, Gauasserio, Hor. Augenio, & aliis refutata est, vt nihil planè addendum censeam. Et si quæ sunt aliæ opiniones, quæ in Caco-chymia venam secandam purant, nisi eo, quo dictum, modo explicentur, locum non merentur.

Ex his cum satis manifestum euadat, quod euacuationis gratiâ venæ sectione in putridis vti liceat; iam videndum, An & reliquorum vtiuum, quos præstare potest, gratiâ, venæ sectio, in iisdem adhiberi possit.

Refrigerationem & ventilationem sanguinis quod attinet, venæ sectio per accidens sanguinem refrigerandi vim habet, & quandoque eius rei gratiâ in febribus putridis adhiberi potest. Verum tunc saltem, cum aliud vitium sanguinis, quod venæ sectionem requirit, simul concurrat: & tum venæ sectio est materia remedij præseruatorij & curatorij. Si verò vitium sanguinis venæ sectionem requirens nullum adsit, tutius est refrigerare medicamentis idoneis.

Refrigerati-  
onis gratiâ  
quando ad-  
hibenda ve-  
na sectio.

Quod verò idè nonnulli, præsertim in Intermittentibus, venam aperiendam putant, vt commodius purgantia & alia medicamenta exhiberi possint, id, nisi alia sanguinis vitia venæ sectionem simul requirant, facere non est aded necessarium. Nam si nulla plenitudo adsit, non est opus metuere, ob plenitudinem purgantia officium suum non rectè peractura. Deinde suprâ dictum, ita vni scopo satisfaciendum, vt alterâ ex parte nihil damni ægro inferatur, & propterea ex aperiendis & attenuantibus in febribus minùs calida eligenda esse.

Tandem etiam eorum opinio vix locum habere potest, qui statuunt reuulsionis gratiâ in febribus putridis venam secandam esse, ne materia ad focum putredinis confluat. Nam si sanguis non abundat, non facile fiet aliquis talis affluxus. Si verò metuatur, etiam pauciorum sanguinem affluxurum, non semel solum, sed sæpius venam aperire opus esset.

Ex his omnibus cum pateat, quæ humorum vitia in febribus putridis venæ sectionem requirant: iam porro de permittentibus & prohibentibus eandem, Medicum sollicitum esse decet. Nam cum venæ sectio confertim sanguinem euacuet, spiritusque exhauriat: vires

Permittentia  
vena sectio-  
nem.



vires & in ipsâ venæ sectione præsentés, & tales, quæ etiam post sanguinis missionem sufficere possint, requiruntur. Inprimis verò Vitalis facultatis robur hîc requiritur. Si tamen vires, ob suffocationem spiritûs sanguinis copiâ langueant, venæ sectio conuenit, vt sanguinis copiâ spiritûs suffocans imminuatur.

Si quæ alia ab authoribus permittentia & prohibentia, vt ætas, aërambiens, & similia recensentur: ea omnia ad vires pertinent, & vires ex iis æstimandæ sunt. Itaque quia senes frigidi & sicci, pauciorémque, quàm aliæ ætates, habent sanguinem, & idcirco vires debiliores, venæ sectionem non facîle ferunt. Si tamen accadat, vt senex aliquis adhuc satis sanguine abundet, virésque præterea vegetiores habeat, & morbus id requirat: non omittenda est venæ sectio. Etati tamen tum aliquid est dandum, & parciûs sanguis detrahendus, quàm affectus requirit, & ætate floridiore ferret.

Pueris ante annum 14. ætatis, non solum, quod vires habent debiliores, sed etiam quia corpus ipsorum, quod calidum & humidum est, plurimum dissipatur, cum Galeno lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 14. venam non facîle aperiendam esse, plerique censent. Alij contrà, si morbus id requirat, etiam pueris venam aperire non reformidant; quod non solum olim Auenzoar fecit, sed etiam hodie Ægyptiis planè familiare esse, testatur Prosper Alpinus, lib. 2. de med. Ægypt. Et reuera etiam si in pueris non facîle nec temerè tentanda est venæ sectio: tamen annorum numero vel decimo quarto anno præcipuè vires, quæ ferant venæ sectionem, non definiendæ. Id quod ipse Galenus, 1. ad Glanc. c. 14. docet, dum scribit: *Non numero solum annorum animam aduerter, quod quidam faciunt, sed corporis habitum. Nam sunt qui 60. ætatis anno venæ sectionem non ferunt, cum quidam, qui 70. annos nati sunt, eam perferant.* Et Celsus, l. 2. c. 10. Interest, non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est, aut si mulier, quæ gravida est, parum valet, malè sanguis mittitur. Emoritur enim vis, quæ his supererat, & hoc modo erepta est. At firmus puer & robustus senex & gravida mulier valens, tuto curantur. Et cum Medici sit, naturam imitari, videamûsque, non solum in adultis, sed etiam in pueris sæpe naturam per largas hæmorrhagias morbos soluere: causa nulla est, cur non Medicus, si necessitas requirat, debito modo id imitari possit. Et omnino illud verum est, qui graues morbos experiantur & ferunt, etiam illorum quædam remedia ferre possunt.

Potro, An prægnantibus venam aperire liceat, etiam apud Authores controuertitur. Sunt qui id negant, idè quod, erepto alimento fœtui, facîle abortus sequatur. Vnde & Hippocrates, 5. aphor. 31. scripsit: *Mulieri viro gærenti, si vena secatur, abortus sequitur; præcipuè si sit fœtus grandior.* Nonnulli censent venam esse aperiendam, etsi abortus sequatur, modò mater seruetur. Verum sententia hæc vix admitti potest. Nam si certum sit, venâ sectâ abortum secuturum, nemo matri facîle salutem polliceri potest. Etenim per se periculosis est abortus, & inprimis cum febre, præsertim acutâ. Ij verò meliùs sentiunt, qui grauidis, si necessitas requirat, primis præsertim mensibus, sanguinem detrahi posse sine omni abortûs periculo censent. Nam si febris sit acuta, quæ & matri & fœtui exitium minatur: cur sine omni auxilio & mater & fœtus relinquendus? Et quid in acutâ febre quatuor vel quinque vnciæ sanguinis detracti matri vel fœtui damni inferre possunt? At si tantillam sanguinis quantitatem emissam ægotanti parum commodi afferre posse quis existimet, in promptu est Galeni consilium, qui monet, vbi ingens morbus copiosioris sanguinis euacuationem postulat, quam tamen semel & vnâ vice vires non ferant, partiendam esse sanguinis missio-

nem, ægrumque interea alimentis reficiendum, vt iteratam sanguinis missionem ferre possit. Plerumque tamen vnica sanguinis emissio sufficit, præcipuè posterioribus mensibus. Primis autem mensibus tutius sanguinem copiosius mittere licet, si morbus id postulerit. Tum enim menstruis suppressis humores in corpore redundant, fœtusque adhuc tenellus minus alimenti postulat. Propter quam humorum abundantiam sæpe accidit, vt mulieres post conceptionem capitis dolores, nausæ & alia symptomata primis mensibus infestent, quæ postea crecente fœtu & copiosiore alimento indigente, circa mensem quartum sponte euanescere solent. Ad quorum malorum auersionem & præcautionem nonnullæ fœminæ primis mensibus sanguinem sibi detrahi curant, atque ita non solum ab his symptomatibus immunes manent, sed etiam fœtus sanos & scabiei atque aliis cutis affectibus minus obnoxios se edere persuasum habent. Imò obseruatum, fœminas nonnullas, in quibus copiosior sanguis generatur, abortum aliquoties passas; postea verò post conceptionem sanguine misso, ab abortu se præseruasse. Ergo si tum sine periculo, imò cum commodo sanguis fœminis mittitur, cur non idem faciendum, si præsentis morbi id postulet necessitas? Neque idem periculum à venæ sectione, quod à purgatione, præcipuè antiquis coniecta, imminet. Nam antiquorum purgationes totum corpus valde agitant, vt non mirum fuerit, post eas abortum sæpe secutum fuisse. Verum sanguinis missio, inprimis moderatior, sine omni corporis perturbatione & agitatione vehementi sanguinem superfluum demit, atque onere corpus leuat.

Tandem hîc & illud perpendendum: si accadat, vt venæ sectionem summa quidem postulet necessitas; vires autem, vel mox ab ipso morbi principio, vel sub augmentum eiusdem, neglectâ in principio venæ sectione, summè imbecilles sint, quid faciendum sit. Cornelius Celsus, lib. 2. cap. 10. quidem in tali casu anceps potiùs, quàm nullum experiri remedium suadet. Si nullum, inquit, aliud appareat auxilium, periturusque sit, qui labores, nisi temerariâ quoque via iueris adiutus: in hoc statu boni est Medici, ostendere, quàm nulla spes sine sanguinis detractione sit, saterique, quantum in hac re ipsa sit metus, & tum demum, si exigetur, sanguinem mittere. Verum malim in hac re Galenum sequi, qui suadet, ea auxilia, quæ custodes corporis vires deicere, Medicoque calumniam conciliare possunt, omittere, prælagioque vti, atque artis Medicæ dignitati hoc modo consulere, quàm ancipiti remedio morbum cum vitâ tollere.

Variant & alia quædam robur & vires corporis, vt hominis temperamentum & constitutio, tempus anni, regio, cæli status, vitæ genus; de quibus mox aliquid dicetur, quæ etiam hîc accommodari possunt.

Non solum autem perpendendum, an sanguis euacuandus sit; verum etiam videndum, vt rectè mittatur & venæ sectio debito modo administretur. Quâ in re Primò considerandum, quâ quantitate euacuandus sit. Magnum sanguinis vitium copiosam sanguinis euacuationem postulat: minus verò parciorém. Verum & hîc non solum ad id quod indicatur, sed rursus etiam ad permittentia & prohibentia respiciendum. Itaque & hîc morbi magnitudo & vires inter se conferendæ, & ex earum collatione de sanguinis quantitate euacuandâ statuendum. Si enim vires sunt robustæ, liberaliorem sanguinis euacuationem admittunt; debiliores parciorém saltem ferunt.

Variant autem vires ob plures causas, vt antea dictum; ob temperamentum, constitutionem & habitum corporis, ætatem, anni tempus, regionem, cæli statum, vitæ genus, & alia.

Corporis temperatura iusta, eam quam morbus requirit,

*Sanibus an vena secanda.*

*An pueris venam aperire liceat?*

*An grauidæ venam aperire liceat?*

*An si vires sint debiles, sanguinem mittere liceat.*

*Quantum sanguinis emittendum.*

*Ratione temperaturæ.*

quirit, sanguinis euacuationem facilius fert. Calidum & humidum corpus; qualia puerorum sunt, quia plurimum à calore nativo dissoluuntur, copiosiores sanguinis euacuationem non tolerant: calida & sicca modice corpora, quia latas plerumque venas habent, liberaliorem sectionem ferunt. Et omnino semper habitus durus & siccus facilius fert venæ sectionem, quam molli & rarus. Graciles, si latas habent venas, multo abundant sanguine; si tenues, imbecilles sunt.

Habitus corporis.

Cæterum cum habitum corporis labor & orium, vigilie & somnus ac similia variare possint: in primis ipsæ venæ respiciendæ sunt, quæ si latæ & amplæ sunt, venæ sectionem largiorem faciliè admittunt; angustæ verò eandem non faciliè ferunt. Hinc Græcis, Italis, Hispanis, quia calida corpora habent, venasque amplas, largiores etiam sanguinis euacuationes non faciliè nocent. Narrat Galenus, *l. de cur. rat. per sang. miss. c. 14.* cuidam ad sex vsque libras sanguinis, sine aliquo virium detrimento, detractum fuisse: Italicæ & Hispani sæpe cum commodo suis ægris sanguinem ad lb. ij. vsque emittunt. Quorum exempla si quis in nostris corporibus imitari velit, aded vires debilitabit, vt vel morbo ferendo postea pares non sint, vel si morbum sustineant, longo tempore æger pristinum robur recuperare non possit.

Ætatis.

Deinde ætas media, vtpote cuius robur maius est, copiosiores sanguinis euacuationem facilius fert; iunioribus verò & senibus sanguis parcius demendus.

Anni tempus.

Anni tempus quod attinet, verum liberaliorem sanguinis euacuationem admittit: parcius æstate, autumnus & hyeme mittendus sanguis, & quidem autumnus parce, parcius hyeme, omnium parcissime æstate sanguinem mittendum esse, plerique ex antiquis statuunt. Verum quod ab iis de Græciâ dictum, id ad Germanos & alios Septentrionales populos simpliciter trahendum non est. Nam cum eo tempore liberalior admittatur venæ sectio, quod ad optimum temperamentum proximè accedit: faciliè hinc patet, in Græciâ & finitimis regionibus, si necessitas id postulet, tempore hyberno bonam sanguinis quantitatem detrahi posse. Hyems enim ibi non est aspera; contra verò æstas est calidissima, & proinde tum minus ferunt copiosam sanguinis euacuationem. At in Septentrionalibus regionibus, in quibus frigus est asperum & hyems longa, ac sanguine ad corpus fouendum copiosiore summopere opus est, longè parcius tempore hyberno sanguis est detrahendus, quam æstate, quæ in hiis regionibus sat tolerabilis est, & rarè tantum æstus & feruorem habet quantum frigus hyems.

Regionis ac celi status.

Quod de regione est dictum, idem de celi statu est accipiendum. Temperatus enim celi status largiorem venæ sectionem fert: parcius verò sanguis detrahendus, siue aer nimio frigore horreat, siue squalcat calore.

Vitæ.

Vitæ quoque ratio aliquo modo moderari potest venæ sectionem. Nam qui copiosiore, & boni ac multi alimenti cibo sunt vsi, largiorem venæ sectionem ferunt: contra qui tenuiter vixerunt, corpus multis laboribus, sollicitudinibus, vel aliis modis debilitarunt, iis parcius sanguis est euacuandus.

Symptomatum.

Symptomata etiam quædam, quæ febres comitari solent, sanguinis euacuationem moderari possunt. Nimia enim euacuationes, vigilie pertinaces, vehemens dolor, animi deliquium & similia, parcius sanguinem detrahendum esse monent. Quæ omnia diligenter à Medico perpendenda, atque inde vires non solum præsentis, sed etiam futuræ æstimandæ sunt. Si tamen Medicus virium robur vsque aded exactè perspicere non possit, præstat semper minus detrudere, quam copiosiore euacuatione vires delicere. Neque quis sibi persuadeat, pleniori cibo id, quod nimium detractum est, refarciri posse. Cibus enim copiosior, præsertim in acutis, morbum auget, & incrementum

sumente morbo, non parum nocet.

Tempus venæ sectionis quod attinet: in genere sciendum, sanguinem mittendum esse, cum indicans euacuationis sanguinis adeo nihil verò venæ sectionem prohibet. Ex quo faciliè apparet, in principio febrium commodissime institui venæ sectionem. Tunc enim & indicans, quod requirit venæ sectionem, præsens est, viresque tum adhuc sunt fortes & melius ferunt venæ sectionem. Ac quod morbus velocius ad augmentum properat, eò citius administranda venæ sectio. Vnde in continuis & acutis febribus commodissime mox secundo aut tertio die sanguis mittitur: post quartum verò diem plerumque minus commode & tutò; cum vires, morbo incrementum sumente, iam magis languere incipiant. Neque opus est, in venæ sectione, vt in purgatione, concoctionem humorum & præparationem corporis expectare; cum aperta venâ semper sanguis ad effluendum idoneus sit. Secunda scilicet vena, antequam natura ad coctionem humorum sese accingit: vbi verò natura coctionem humorum aggressa est, quiete opus est, omnisque fugienda humorum agitatio, quæ coctio & separatio humorum turbare possit. In intermittentibus verò & longioribus febribus, in quibus coctiones magis lentæ sunt, in longius tempus differri potest venæ sectio. Vnde etiam Galenus, *lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 20.* in mittendo sanguine vires, non dierum numerum spectare iussit. Potest nimirum in febribus, in quibus plenitudinis & cruditatis signa diutius immorantur, post septimum, imò circa decimum quartum & vigesimum diem sanguis vtiliter mitti.

Non autem de vniuersali solum tempore mittendi sanguinis constare debet, verum etiam vbi Medicus iam de die, quo mittere sanguinem vult, certus est, quædam attendenda sunt. Primum nimirum considerandum, an in ventriculo cibus adhuc nuper sumptus & nondum concoctus hæreat, vel alius excrementis repleta sit. Nam si tale quid accidat, & non summa & vrgens necessitas venæ sectionem maturare iubeat, prius cibus in ventriculo concoquendus, aliusque fecibus liberanda est, ne aliquid crudi vel impuri in venas rapiatur, vnde ægro damnum attrahi possit. Itaque expectandum, donec cibus concoctus sit, antequam venæ sectio instituat, & quiete coctio adiuvanda; alius verò glande, clystere, aut cassiâ, vel manâ vel alio leniente medicamento laxanda. Imò si in ventriculo aut in vicinis locis humor aliquis vitiosus resideat, vtile fuerit, leni aliquo medicamento, quod sine vi aut corporis agitatione id præstat, illum ante venæ sectionem euacuare, aut si ad superiora vergat, leni vomitu illum tollere.

Attendendæ deinde etiam sunt exacerbationes & paroxyimi febrium. Vena enim aperienda tempore mitiori, non circa febris exacerbationem, quo tempore natura & vim ac impetum materiæ morbificæ, & venæ sectionem simul perferre nequit.

Neque symptomata negligenda, vt sunt dolores, orificij ventriculi debilitas. Symptomatibus enim, nisi per venæ sectionem remoueantur, prius occurrendum, atque ea mitiganda sunt.

Cæterum & hoc expendendum; An, si parrienda necessariò sit sanguinis missio, & sæpius repetenda, eodem, an verò diuersis diebus sit repetenda. Quæ in re distinctione opus est. Si enim euacuationis solum gratiâ instituat venæ sectio, eodem die repetenda: si reuulsione causâ, diuersis. Nam vbi euacuandum est, præcipue in acutis, subito corpus in alium statum transferendum est; ac sæpe accidit, vt morbus mox principium percurrat, vt postea venæ sectione commode vti non liceat. In reuulsione verò respicimus ad motum, qui rectius sit, si diuersis vicibus & intervallo interiecto natura contrario motui quasi assuescat, & intervallo temporis incumbens partibus humor regurgitet

Quando secunda vena.

Qua circa vena sectionem in febribus attendenda sint.

Quando reperienda vena sectio.

ret in venas; & iteratâ venæ sectione vtiliter extrahatur.

*Hora venæ sectionis.*

Et si autem ex his, quæ hæcenus diximus, facile de horâ venæ sectionis iudicari possit: tamen adhuc aliquid de eâ addere libet. Sunt nonnulli, qui solum horis matutinis venam secandam esse censent. Sunt alij, qui & in diebus & horis semper benigniores astorum aspectus eligendos esse putant.

Vtrique falluntur. Fieri enim potest, vt tempore matutino febris sit vehementissima, atque tum venam aperire non licet. Astorum aspectus non contemnendos esse, vbi licet, equidem censeo: tamen magis sæpe morbus vrget, vt sine præsentis ægri periculo in aliud tempus venæ sectionem differre non liceat. Itaque ea hora est eligenda ad venæ sectionem, in quâ æger vel à febre liber est, vel in quâ febris est mitissima. In ipso vero febris vehementis impetu sanguinem mittere, vt Cellus ait, hominem ingulare est. Quod si manè febris intermittat vel remittat, ea hora commodissima est; aut si, quod interdum fieri solet, bis vno die, manè scilicet & circa vesperam, accidat febris remissio, vel sit febris synocha, quæ nullam remissionem habet, tempus matutinum eligendum est, quod per se ad hoc negotium accommodatissimum est. Sole enim exorto, & luce per Horizontem diffusâ, omnia vegetiora sunt.

*Quæ venâ aperiendâ.*

Venam ipsam aperiendam quod attinet, cum euacuationis gratiâ venæ sectio hic ferè instituitur, neque nobis de reuulsione aut depiuatione iam sermo sit: commodissime aperiatur venâ in cubito, seu interna seu mediana. Si tamen æger vel ob timiditatem, vel vires nimium deiectas ad lipothymiam valde procliuus sit, venæ manûs incidendæ; etsi id cum minore fructu fiat. Maior verò est vtilitas venæ sectionis in pedibus, præcipue si simul reuellendum sit. Nam si vires sint debiles, & materia caput perat, & capitis dolor ac vigilie infestent, commodissime & cum summâ vtilitate vena in pede aperiatur, quæ euacuat, reuellit, viresque minùs deiecit.

*Post venæ sectionem quid agendum.*

Postquam vena aperta est, quiescat æger, vt spiritus rursus instantentur: id quod rectissime fiet, si æger supinus decumbat. Eo enim sita cuncta viscera in spinam suauiter reclinantur, & hoc modo calor & spiritus facilius in corpus distribuuntur. Imò quod in continuis sæpe accidere solet, si metuamus virium lapsum ægro in lecto nonnihil supino sanguinem mittere licet: aut si sedendo vena aperiatur, & animæ deliquium instare ex pulsûs & coloris faciei mutatione, oscitatione, aurium tinnitu, oculorum caligine vel impetu sanguinis fluentis labescente animaduertatur, mox digito venam comprimere, ægrum supinum reclinare, & si opus sit, supino plus sanguinis detrahere conuenit.

*An dormire liceat post venæ sectionem.*

Post venæ sectionem vulgus somnûm totâ die prohibet, adeo vt piaculum ipsi habeatur, post venæ sectionem dormire: Quam ob causam non video. Licet enim metus esse possit, ne fasciâ forsan, quâ vulnus venæ obligatum est, soluat: tamen hoc mediocri diligentia & astantium curâ præcaueri potest. Aliàs si necessitas sompni requiratur, non video, cur totâ die æger à somno prohibendus sit. Galenus certe somno non prohibuit ægrum, nec eum excitauit, cui sanguinem miserat vsque ad animi deliquium, 9. method. med. cap. 4. Ita enim scribit: *Post duos à sanguinis missione horas paulo nutrimenti datur, ac iusso quiescere, discessi. Quintâ verò horâ reuersus, tam profundo somno detentum inueni, vt tangentem me prorsus non sentiret. Reuersus autem decimâ rursus horâ, etiam tum dormientem inueni. Egressus autem iterum ad alios agros visitandor. redeo horâ noctis primâ, non tamen, vt ante, tacens, sed voce de industria sublatâ; quo ægrum à somno excitarem.*

Porro cum sæpe accidat, vt vires nullo modo ad-

mittant venæ sectionem, sanguinis tamen euacuatione summopere requiratur: Antiqui alios sanguinem euacuandi modos inuenerunt, qui vires minùs debilitant. Sunt autem illi tres, scarificatio; cucurbitulæ scarificatæ, & Hæmorrhoides. Scarificatio & scarificatæ cucurbitulæ differunt, vt lib. 5. Inst. pag. 2. sect. 1. cap. 16. diximus. Estque scarificatio sine cucurbitulis non solum hodie Egyptiis vsitatissima, vt ex Prospero Alpino, de Med. Egypt. l. 3. videre est: Verum etiam antiquis Græcis in vsu fuit; vt ex Oribasij lib. 7. Med. Col. lect. cap. 18. colligere est. Adhibentur autem cum scarificatio, tum cucurbitulæ scarificatæ euacuationis gratiâ, de quâ iam nobis sermo est, in cruribus seu subtis plerumque etsi etiam cucurbitulas in dorso nonnulli adhibeant. Verum qui plura hac de re cognoscere cupit, auctores allegatos consulat, & præter eos, Herculem Saxoniam, lib. 8. pract. cap. 22.

*Scarificatio, & cucurbitula.*

Hæmorrhoides quod attinet, vtilem esse per hæmorrhoides sanguinis euacuationem, omnes concedunt, sed an & quâ ratione aperiri possint, non inter omnes conuenit. Breuiter, vt hac de re aliquid dicamus, in iis, quibus consuetus est hæmorrhoidum fluxus, facile aperiri possunt, & cum fructu; & non solum cum sanguis crassus & ater peccat, verum etiam in aliis morbis: cum cœcum sit, etiam in sanis, non solum crassum, sed & alium, & plerumque ichorosum excerni. In iis autem, qui assueti non sunt huic fluxui, non facile aperiuntur frictione cum foliis patietariæ, ficûs, boraginis, panno aspero & similibus, quæ aliàs in assuetis hæmorrhoides pronocare solent. Sectione seu scalpello vt in tali casu aperiuntur, vix suaserim; cum in corpore huic effluxui non assuetus; & cum venæ istæ non tument, vix effatu dignum aliquid euacuetur; vel si nimium aperiuntur & valde fluant, fluxum non semper Medicus satis moderari possit, & vlcerâ ac fistulâ hoc loco facile excitari queant. Commodissimum in talibus est, & sine periculo, vt si quis eas aperire velit, hirudines applicentur, per quas longè tutius sanguis extrahitur, quàm si scalpello hæmorrhoides aperiuntur.

*Hæmorrhoides.*

## CAPVT VI.

### De purgatione in febris.

Postquam hæc de venæ sectione & sanguinis euacuatione diximus: proximum est, vt de vitiosorum humorum euacuatione iam dicamus. Vt autem humores vitiosi duplices sunt: cum illi, qui proxima febris causa sunt, tum quædam impuritates, quæ in ventriculo, intestinis, venis mesaracis, vel saltem earum extremitatibus continentur: Ita etiam purgantia in genere dicta duplicia sunt, vt lib. 5. Inst. part. 1. cap. 10. dictum, alia aluum lenientia, quæ dictas vias euacuant, & alui feces ac humores in intestinis subsistentes, sine omni corporis agitatione educunt; alia verò & propriè ac in specie dicta purgantia, quæ electiue, vt vocant, purgando ex remotioribus quoque partibus materiam morbificam & febris causam educunt.

*Purgantia duplicia.*

### De Lenientibus.

Lenientia in febrium putridarum initiis omnino necessaria sunt. Cum enim, quando febres ingruunt, prauæ aliquæ dispositiones in corpore præcedant, ob quas concoctio in ventriculo non satis rectè expeditur: facile fieri potest, vt cum chylus prauus & crudus, tum aliæ superfluitates in ventriculo & intestinis cumulentur, quæ putrescentes humores fouere & augere possunt. Materia igitur hæc quamprimum educenda est, quod sit, vel per clysteres & lenientia dicta medicamenta,

*Lenientia.*



dicamenta, vel etiam per vomitum, prout materia vel in crassis intestinis, vel in tenuibus & mesaraicis, ac ventriculi fundo hæret, vel in ventriculo supernat, & nunc versus inferiora, nunc versus superiora inclinationem habet.

Clysteres quod attinet, ij quidem omnes emollientes sint: pro materiæ tamen diuersitate, quæ nunc calidior & acrior est, nunc viscidior crassiorque in intestinis & vicinis locis cumulata est, aliqua diuersitas materiæ esse potest.

Simpliciter emollientes fiunt à malua, althæa, violariâ, parietariâ, hordeo, &c. cum oleo vel communi, vel violaceo.

Si maiori absterfione opus sit, aut materia crassior & viscidior fuerit, addere licet betam, mercurialem, surfur, sacch. rubrum, mel rosatum. Imò licet in hisce addere lenientia medicamenta, cassiam & simpliciter extractam, & pro Clysteribus: Electuarium lenituum, diacatholicum, hieram s. & similia.

Exempla passim obuia sunt.

Alia autem fortiora medicamenta, & quæ à remotioribus partibus attrahere possunt, in tales Clysteres, & qui primas vias euacuandi gratiâ solùm adhibentur, præcipuè in principio, admiscere non licet, ne materia frustra agitetur.

Cum verò Clysteres ad loca superiora non pertingant, lenientia per os exhibentur, quorum magna suppetit copia. Antiqui mercurialem, maluam, betam, aquam mulsam & similia vsurpabant. Hodie in vsu sunt, Cassia, manna, tamarindi, syr. ros. solutius, violarum solut. mel rosat. sol. El. diacassia cum mannâ, El. lenit. s. Ex quibus potiones & boli velelectuaria parari possunt.

In pueris ob humiditatem, præcipuè si vermes timentur, commodior est pulpa tamarindorum, quam Cassia.

Si biliosi & tenues humores abundant, Syr. ros. sol. & viol. sol. conueniens est.

In pituitosis verò corporibus & vbi calor mitior, conueniens est mel ros. sol.

Manna, ne in bilem verratur, cum aquâ hordei, vel aliâ aliquâ, aut decocto refrigerante potest exhiberi, vel etiam in iunculo carnis dissolui.

Ita & Elect. lenitiua vel in liquore conueniente dissolui possunt, vel cum sacch. in bolum formari.

Chymicis hodie in frequenti viu est cremor tartari, cuius ʒb. vel ʒj. pro ætatis & corporis constitutione, in iunculo carnis vel aquæ sine omni nausæa, cum iunculo saltem acidum non ingratum saporem conciliet, sumitur, primæque vias abstergit & clementer purgat: cuius vis si maior postuletur, vno atque altero diagrydij grano acui potest.

Atque talia in principio exhiberi, iam antè dictum. Nam & ob viarum latitudinem, & loci propinquitatem, humores, qui febrem augere possunt, & quibus non remotis alia medicamenta commodè exhiberi non possunt, facillè educere valent. Itaque quamprimùm Medicus accedit ægrum, inquirat, num aliqua vel arte, vel naturâ præcesserit euacuatio, quo victus genere sit vsus, an inedia vel crapula præcesserit, an aliquam granitatem circa stomachum vel ventrem inferiorem sentiat, atque ita, si opus sit, lenientia adhibeat.

Imò & reliquis morbi temporibus Clysteres, præcipuè si alius subsistat, vsurpare licet.

Tempus particulare quod attinet, eligenda est non solum dies, sed & hora intermissionis, vel remissionis, & omnino tempus, cum febris minùs vrget. Neque opus est, vt semper tempore matutino talia exhibeantur; sed si febris manè vrget, etiam circa vesperam vsurpari possunt.

Verùm de lenientibus plura addere non libet, cum passim ea existent, & in aliis morbis plurimis etiam

Dan. Sennerti Tom. II.

adhibeantur, possuntque cum alijs authores de hac re consuli, tum Capinaccius, libro 6. Pract. de febr. cap. 17. Alex. Massaria, libro 7. Pract. à capite 2. ad 14. I. Cæf. Claudin. de ingre. ad infirm. lib. 2. cap. 4.

### De Vomitoriis.

Vnum, cuius supra etiam mentio facta est, non prætereundum, si materia versùs superiora vergat, vomitu posse ex corpore commodè excludi. Quapropter nonnunquam in principio febrium vomitus ciendus, & quidem sæpe accidit, vt magna materiæ copia in ventriculo & vicinis locis contineatur, etiam in malignis febribus, quæ mox per vomitum reicienda est. Nulla enim eius tam copiosa ibi hærentis coctio expectari potest. Et quodcunque ingeritur in humorem ei, qui antè in ventriculo hæret, similem facillè mutatur, peccansque materia augetur. Atque experientia testatur annotauitque idem Fernchius. lib. 3. meth. med. cap. 3. vomitu omnem, quæ in ventriculi capacitate, eiùve tunicis inhæret, illuicem inprimis expurgari, è præcordiorum membranis, è canis iccoris & lienis, & ex pancreate omnis generis supernacuos humores sinceros elici, quos plerumque nec hiera, nec aliud vehementissimum vllum, etiam frequens, pharmacum in aluum extrurbare potest. Et sæpe per vomitum vitiosâ materiâ reiectâ febris in initio tollitur; quod nisi factum fuisset, materia porro in penitiores corporis partes transmissa & sanguini pexmixta longæ febris occasionem præbuisset.

Sunt autem vomitoria alia lenia, alia mediocria, alia fortia, vt lib. 5. Instit. part. 1. cap. 12. dictum. Verùm hîc præcipuè de lenibus sermo est. Nonnunquam tamen ad mediocria ascendere licet.

In calida & biliosa materiâ vulgò faciunt vomitoria ex decocto hordei, cum oleo, vel communi, vel amygdalino. In materiâ crassa vsurpatur oxymel. s. & comp. cum iure pulli, vel decocto sem. anethi autraphani. In materiâ mixta vti licet syr. acetos. cum decocto hordei aut anethi.

Quantitas vomitorij, ad Vnc. xij. ascendere potest. Nam si minore quantitate, præcipuè ex debiliore paratum, sumatur, sæpe retinetur in ventriculo. Et cum aliàs debiliora ista non sint valde efficacia: Recentiores vsurpant vomitoria ex ʒb. vel ʒij. aut ʒj. rad. asari, cum aquâ vel liquore conueniente, vel ex decocto eiùdem.

Chymici hodie vitriolum album in cereuisiâ calidâ cum butyro sumptum commendant. Vt & Salem vitrioli, qui à ʒb. ad ʒj. vel etiam ad ʒb. in iunculo vel conueniente liquore exhibetur. Fortior est, & non solum per vomitum, sed & aluum purgat. Aqua vomitoria seu Benedicta appellata, hodie satis nota, ex ʒ. seu croco metallorum parata. ʒ. croci metallorum ʒj. Aquæ Carduiben. ʒij. vel ʒij. Aqua cinam. ʒb. Macerentur per biduum. Transcolatum vsui serua. Eius dosis est ʒi ʒ. aut ʒij. Verùm cum hoc medicamentum non solum primas vias euacuet, sed & in reliquum corpus penetrat, cautè exhibendum est, & diligenti consideratione opus, in quibus febribus tutò exhiberi possit.

### De Purgatione.

Purgantia propriè & in specie dicta quod attinet, illa à cacoehymia indicari, & humoribus febrè gignentibus expurgandis dicata esse, extra omnem controuersiam est. Illud autem cōtrouertitur, & multorum ingenia fatigauit, acerrimisque altercationibus occasionem præbuit, quo tempore talia purgantia exhibenda sint. Licet enim quando agendum à præsentia indicâris indicetur, & vitiosi humores quouis febris tēpore, antequam soluitur, adsint, atque semper sui remotionē indicent: non tamen quouis

quouis tempore purgatio permittitur. Et de purgationis tempore diuersæ ac dissidentes Authorum opiniones reperiuntur.

*Quo tempore purgandum.*

Primò enim cùm Hippocrates, 1. aphor. 22. scripserit: *Concocta maturaque purgare ac mouere oportet, non cruda: nec per initia, nisi materia turgeat; id quod raro fieri solet*: atque Aphorismum hunc Galenus, 4. de tuenda valet. cap. 5. Oraculum appellauerit: sunt nonnulli, qui eum tam sanctè & religiosè obseruant, & tam accuratè coctionem expectant, vt non solum in febribus continuis & acutis, de quibus tamen Hippocrates præcipuè loquitur, verum etiam in diuturnis & intermittentibus, imò omnibus ferè morbis, non nisi coctione præcedente, vllam purgationem instituendam putant: adeò vt Alex. Mafstarias, lib. 5. *Practica*. cap. 22. eos reprehendat, qui in quartana ad coctionem humorum vtuntur syrupis com. de fumaria, de pomis & epithymo, de polypodio, idè quod cassiam, senam, epithymum, polypodium, & alia huiusmodi medicamenta recipiant, quæ coctionem non solum non iuuent, sed etiam illam maximè turbent & impediunt.

*Incommoda in tempestina purgationis.*

Causam autem, cur cruda & in initio purganda non sint, nisi turgeant, id est, sponte & suo ipse impetu, quasi viam excretionis affectent, vt nisi euacuentur, metuendum sit, ne in membrum aliquod princeps cum vitæ periculo irruant, istam ex Galeno, in *Com. alleg. aphor.* reddunt: Quòd scilicet crudi humores, si in principio non turgeant, & ipsi quasi exitum querant, nec trahenti pharmaco, vtpote nondum à naturâ cocti & separati, facillè cedant, nec natura euacuationi arte institutæ opituleretur. Vnde istas purgationes plurima incommoda sequi necesse sit, Vel enim finem suum non assequuntur purgantia, nihilque aut parum vitiosorum humorum educunt, atque ita eos saltem agitant, turbant, & confundunt; vnde ex materiâ motâ & non euacuatâ in primis viis hærente, tormina, animi deliquia, vertigines, & alia symptomata oriri solent; vel si medicamentum fortius fuerit, cum violentiâ euacuat, corpus liquefacit, vires caloremque natium debilitat, vt natura postea facillè succumbat, & morbum vel planè non, vel non nisi longiore tempore vincat.

*Quando sit purgandum in principia varia sententia.*

Alij etiam aliis morborum temporibus purgandum censent, licet materia non turgeat: qui etsi in eo conueniant, ante coctionem non raro purgandum esse: tamen in quibus casibus hoc faciendum sit, non planè conueniunt.

*Hier. Capiuaccius.*

Hier. Capiuaccius, vbi de curandâ febre agit, in *append. de tempore exhibend. solutin.* ita statuit; tum esse purgandum in principio, vbi materia morbifica magis virget ad purgandum, quàm cruditas prohibere possit. Et primò quidem talem esse turgentem materiam seu furiosam, vt appellat; cùm ex eâ periculum immineat, ne in partem principem aliquam ruat. Deinde, non solum turgente materiâ in principio purgandum statuit, sed & in aliis quibuscumque casibus. Dari enim materiam existimat, quæ non minùs, imò magis virgeat, maiùsque periculum mineretur, quàm furiosa seu turgens. Atque talem materiam duplicem esse statuit, venenatam, & actu ad partem aliquam principem ruentem. Primò enim venenatam, cum cor celeriter occupare & hominem interficere possit, magis virgere, quàm furiosam putat, & proinde statim expurgandam esse. Deinde & materiam, quæ actu ad partem aliquam principem ruit, magis virgere dicit, quàm turgentem, à quâ solum immineat impetus ad partem principem. Imò non hanc solum, verum etiam quæ fluit ad partem talem, quæ principem aliquam in consensum trahere possit, magis virgere dicit.

*Pius Aeneas Caprilus.*

Idem ferè Pius Aeneas Caprilus de febr. putrid. in genere, libro 1. docetque, in febribus putridis ma-

teriam vt excrementitiam indicare purgationem, cruditatem materiæ eandem prohibere, vt causam sine quâ non, materiam furiosam rursus eandem indicare, vt virgens, & plus posse virgens, quàm causam efficientem sine quâ non; cùm periculum sit, ne materia furiosa petat partem aliquam principem. Idem tamen addit, Hippocratis mentem fuisse, si materia rationem virgentis habeat, licet sit cruda, esse euacuandam, & Hippocratem per materiam turgentem intelligere omnes alias materias virgentes. Imò si conferatur materia furiosa cum reliquis materiis virgentibus, minùs virgere materiam furiosam, quàm reliquas materias. Ideoque si quæ minùs virget, tamen plus potest ad indicandum purgans, quàm cruditas ad prohibendum, vbi aderunt materiæ illæ plus virgentes, audaciùs purgandum esse statuit. Materiam autem plus virgentem esse primò venenicam, vtpote, quæ celerimè possit cor occupare & mortem inferre. Deinde mobilem, seu quæ actu mouetur & inclinationem habet ad partem determinatam, vel principem, vel quæ principem in consensum trahere possit; cùm furiosa non habeat determinatum motum.

*Eust. Rudj.*

Cum Capiuaccio & Pio Aeneâ Caprilio consentit ferè Eustachius Rudius, qui, lib. 3. *Pract. cap.* 22. præter turgentem materiam, & in aliis quibuscumque casibus, crudam materiam purgari posse concedit. Primò quidem si actu in partem aliquam principem, aut quæ cum principe maximum consensum habet, ruat, potissimum si purgante medicamento contrarium motum reuulsionemque moliri possumus. Deinde in ancipiti grauique morbo, cuius semper etiam symptomata sæua sint, & incertus exitus, coctionem, quæ forsitan futura non est, non expectandam, sed inter initia purgandum esse, & partem eius detrahendam censet. Tertiò venenatam materiam in principio, & quàm celerimè, strenuèque purgante euacuandam statuit; cùm maius, quàm reliquæ materiæ omnes, periculum afferat. Quartò, dum præter continentem morbi causam, alia quædam materia in ventriculo, aut intestinis, aut vicinis locis hæret, dolore, æstu, nausæa, angore, aliisque signis manifesta.

Alij adhuc latius extendunt hanc materiam, & in Octau. pluribus casibus admittunt purgationem in morbi principio. Octavianus Roboretus, de febr. peric. cap. 16. non solum vbi materia turget, sed & aliàs euacuandam censet. Primò cùm virget materia, cùm scilicet in parte aliquâ vel principali, vel quæ cum principali consensum habet, fixa est, vnde grauiora oriuntur symptomata; qualis est materia praua in ventriculo, à quâ fit lipothymia. Secundò cùm reuulsionis gratiâ, ad præcautionem futuri alicuius ex fluxione morbi, ea opus est, vt in maximis doloribus. Tertiò quando tanta est crudorum humorum copia, vt nisi ea minuat, natura non possit illam concoquere. Quartò cum materia est maligna, vt præ malignitate eam non aggrediatur Natura, vel si tentat eam elaborare, concoquere tamen non possit.

Plures quoque casus habet Herc. Saxonia, in quibus non expectatâ coctione purgandum putat, lib. 8. *Her. Saxonia. Pract. cap.* 26. Et primò quidem vocem, Turgere, à plerisque in nimis angustâ significatione accipi statuit, dum turgentes humores illi vulgò saltem habentur, qui huc atque illuc mouentur, neque determinato loco hærent. Ipse verò turgentem materiam omnem illam esse dicit, quæ cogit nos ad importunam & citam excretionem. Arque hoc posito fundamento, ipse quinque casus adfert, in quibus purgare liceat, non expectatâ coctione. 1. Si humores sint multi: 2. si sint calidi: 3. si sint tenues & ichorosi: 4. Si materia habeat impetum ad locum aliquem nobilem & principem: 5. si humores fuerint prauis, vt

ut suâ qualitate prauâ humores vicinos & partes solidas corrumpere possint.

Hier. Mercurialis.

Hier. Mercurialis, in suâ Practicâ de purgatione, in febre putridâ opportunissimum quidem tempus purgandi, morbi declinationem, iam coctâ materiâ, agnoscit: initio tamen etiam quandoque purgationem institui posse concedit. Et quidem has distinctiones præmittit. Primò distinguit purgationem in perfectam seu eradicatiuam, quâ totam materiam Medicus extirpare conetur; & imperfectam seu minoratiuam, per quam conetur ita minuere materiam, ut faciat pluribus vicibus, quod vnâ vice faceret, si liceret. Deinde distinguit Medici operationes in regularem, quæ ad normam præceptorum accommodatur; & in coactam, quæ illam transgreditur. Hinc concludit, regulari medicatione nunquam in principio crudos humores purgandos; coactâ autem operatione concessam esse in principio purgationem. Et perfectam quidem in duobus casibus; primò turgente materiâ, ob imminens periculum; Secundò in materiâ pestilenti, ob imminentem totius corporis infectionem: Imperfectam verò in duobus casibus; primò in initio febrium acutarum, ubi metus est, ne materia turgeat, præcipuè in regionibus & temporibus calidis; secundò in plenitudine corporis, quando venæ sectionem adhibere prohibemur, ad imminuendam per accidens plenitudinem.

Don. ab Altomari.

Donatus ab Altomari peculiarem tractatum de quaestione hac scripsit, an in principiis morborum, materiâ non turgente, purgante medicamento utendum sit. Atque ipse etiam in quibusdam casibus hoc faciendum putat, sed in acutis tantum morbis. 1. Vbi materia copiosior est, partem eius in principio euacuandam censet, ut exonerata natura, quod relinquatur facilius possit & concoquere & expellere. 2. Si ex malâ seu prauâ qualitate humorum redundantium morbi gignantur. Nam nisi circa eorum initia purgante medicamento quis utatur, par aut ferè maius periculum imminere, ac ex materiâ turgente, existimat. 3. Si humor, etiam absque multitudine aut prauâ qualitate circa quampiam principem partem, aut in earum aliquam decumbat. Purgationem tamen hanc ex præcepto Hippocratis, 1. aphor. 24. cum præmeditatione faciendam censet. Nam si morbus toto genere exitialis sit, nihil nec eo tempore, nec alio mouere oportet. Deplorati enim curandi non sunt, sed eis morbi finem prænunciare licet. Si etiam è diligenti examinatione rectum ac perfectum iudicium in morbo acuto aliquo expectetur, virèque morbo præualere Medicus videat, abique vllò eius auxilio, præterquam conueniente victus ratione institutâ, abstinendum à medicamento purgante in eorum morborum initiis censet. Idem faciendum, si morbus sit diuturnus, existimat: Et proinde tantum in iis morbis initio purgandum, qui quidem periculo non vacant: tamen non sunt ex toto genere perniciosi, ubi nimirum spes est, si medicamento purgante naturæ succurratur, ægrum conualitutum.

Atque hæ sententiæ in eo omnes concordant, quòd vel in initio, si necessitas id requirat, sit purgandum; vel, in quo etiam plerique consentiunt, coctio expectanda, & in fine statûs, si à natura nullam excretionem institui videamus, aut in declinatione, si natura nihil per crisin euacuârit, vel imperfectè euacuârit.

Iodocus Lommius.

Peculiarem opinionem fouet Iodocus Lommius, lib. de cur. feb. contin. sect. 2. qui eos reprehendit qui in febribus, præcipuè acutis, vix vnum diem intermittunt, quo non ægrum medicamenti vel per os sumptis, vel per aluum iniectis sollicitent, naturamque in opere turbent; illos verò prorsus ineptire existimat, qui prius declinationem febris vniuersalem, quam purgent, expectant; cum grauem morbum in vitam, ne-

cessario suspenso præsidio, sœuire permittant; eoque tempore medicinam adhibeant, quod omni periculo vacat. Ipse verò duo tempora purgationi in febribus eligit: Incrementi finem, & statum. Nam cum natura excretionem non antè instituat, quam concoctio & sequestratio vitiosi humoris sit absoluta; id verò tempus, quo absolutâ coctione fit excretio, status agitudinis appelletur: Medicum, ut naturæ ministrum & imitorem, non nisi in statu tuto purgare posse existimat; nisi aliud quid incidat, quod causâ securitatis hanc purgandi regulam vniuersam mutare cogat. Id quod contingat in febribus continuis, per quarum statum impetus symptomatum purgandi locum tollat. In febribus verò intermittentibus, quæ vigorem iam perfectè attigerunt, tuto licere statuit, quo die intermissio est, concoctum humorem medicamento tollerè, naturâ iam tum nullis impeditâ symptomatibus. In continuarum verò statu, quia vigiliæ, deliria, ardores, sitis, inquietudines faciunt, quò minus liceat his ærumnis oppressam naturam medicationum irritamentis laceßere, fugiendum esse istud tempus docet, atque purgationem intermittendam, & in ipsius incrementi prouectiore parte medicamentum dandum esse. Tum enim plurimâ parte iam materia maturuit; neque Symptomata impediunt, quæ nondum sunt maxima. Esse scilicet docet, quæ iuxta iecur, eique assistentes venas, biliosa excrementa utcumque cocta, ductâque aluo subtrahenda existimat: reliquis intra remotiora contentis vasâ, ac fortè nondum prorsus coctis, ipsi relictis naturæ, per proximam semel remouendis euacuationem. Non tamen fortia vult adhiberi purgantia, sed mitia, ne calorem excitent, ac conumptis vitæ spiritibus vires supra modum extenuent: deinde cum non opus sit, ut materiam morbi è toto corpore radicitus extrahant; cum coctio in incremento planè absoluta non sit.

Cum hac opinione in quibusdam conientit Herc. Saxonia, lib. alleg. Primò enim in augmento quandoque purgationem concedit duplici ratione: 1. quòd in augmento humores aequè turgant ac in principio: 2. quia in augmento humor aliquâ ex parte concoctus sit, qui propterea medicamento purgante possit ac debeat euacuari. In statu quoque in tribus casibus purgationem concessam esse statuit, 1. quando febris ortum ducit ex humoribus frigidis vel paucis. Tales enim humores per Crisin non expurgantur, & proinde expurgandi sunt. 2. Vbi natura Crisin tentauit, sed imperfectè, ibi purgandum esse, ex consilio Hippocratis, 1. aph. 21. Quo natura vergit, eò ducere conuenit, per conuenientia loca. 3. quando in statu, iam transacto ex toto ferè die decretorio, in morbis acutis & periculosis, cum maximis Symptomatibus, natura tamen adhuc nihil incipit agere, opus esse dicit naturæ succurrere, & propterea humores educere, ex sententiâ Auicennæ, qui inquit: si natura non mouet, moue tu: horâ tamen motus illius.

Plures Authorum opiniones in medium adducere, aut quid pro iis, quas recensuimus, & contra disputari possit, prolixè recensere, operæ pretium esse non duco. Illud potiùs agam, ut fundamenta pro controuersia hac discutiendâ necessaria adducam, & quomodo inde vera aliqua sententia elici, atque aliorum opiniones examinari possint, monstrem.

Decisio controuersia.

Primò illud notandum, de febribus hîc solum sermonem esse. Nec nugæ hæc sunt, ut putat Pius Aeneas Caprius, qui aphorismum hûc vniuersalissimum esse, & locum habere putat, tam in corpore febricitante, quam non febricitante, & eadem contingere absurda putat, quando cruda euacuatur materia, siue adsit febris, siue non adsit febris. Nam fallitur hîc Caprius. Etenim si antecedentes & sequentes aphorismos



etiam inspiciamus, manifestum inde euadit, eum de febribus & præcipue acutis loqui. Et quæ citra febrem est materia propriè cruda non est, nec coctione indiget, etsi interdum præparatione aliquâ, ut dicitur postea, opus habeat. Vnde & ipse concedit, materiam in hydropse, quia sit separata à bonâ materiâ, statim posse euacuari, quia possit inter costas materias recenseri. Cum tamen nunquam illa materia cocta sit, nec ad statum meliorem reduci possit. Itaque de febribus saltem hîc quæritur, An in principio morborum aliquando purgandum sit. Atque id ipsum voluit Hippocrates, 1. aphor. 22. cum dicit: *Cocta, non cruda, esse purganda, &c.* Non enim hîc de eâ coctione sermo est, quâ alimenta in substantiam corporis vertuntur, & quam Galenus, 2. de nat. facul. cap. 4. & 3. de fac. nat. cap. 7. definit. Nutrientis in propriam qualitatem eius, quod nutritur mutationem; quâ, ut dictum, cum alimenta assumpta, tum dulcis pituita in sanguinem, & hinc in nostri corporis substantiam vertuntur; sed pro humorum excrementitiorum à naturâ elaboratione, & in meliorem, in quæm quidem possunt, statum reductione.

Explicatio  
aphor. 22.  
sect. 1.

Cruditatis &  
coctio quid.

Et quidem coctio & cruditatis, de quâ hîc sermo, propriè competit humoribus putridis. Etsi enim à Medicis vrina, sputum, lippitudines, quin & humores, qui à cerebro per palatum & nares defluunt, excrementa alui, ut omnino omnia excrementa, quæ initio aquea & tenuia sunt, temporis verò progressu crassiora & pauciora euadunt, primò cruda esse, & postea coqui dicantur: tamen cum in Aphor. allegato, cruditatis & coctionis mentio sit, & quæritur, an cruda purganda sint: cruditatis & coctio non omnibus excrementis competit, sed priuatim humoribus putridis; & cruditatis omnino quandam ineptitudinem ad purgationem includit, à putredine profectam, sicut coctio contrâ humores illos putridos ad euacuationem aptos reddit: Quod modò recensitis omnibus non competit. Nam vrina & feces alui æquè coctæ ac crudæ excerni possunt ac debent: quod humoribus, de quibus hîc controuersia, non competit. Coctio igitur, de quâ hîc sermo, tota ad purgationem dirigitur: sicut ob cruditatem humores ad purgationem inepti fiunt. Vocabulum enim cruditatis & coctionis à cruditate & coctione propriè dictâ ad excrementitios humores transfertur. Hi enim etsi in nutrimentum corporis conuerti ampliùs non possunt: dum tamen formam quandam meliorem, quam quidem possunt, acquirunt, & talem quidem, quâ idonei efficiantur ad expulsionem (quod vnice expetitur) coqui dicuntur. Nimirum sicut apostematata adhuc cruda incidere aut purgare non decet, priusquam humor in ipsis contentus in pus laudabile sit mutatus, & bonum à malo separatum: ita nec humor crudus è corpore educendus, sed coctione prius mitigandus, & ad faciliorem purgationem præparandus. Et natura hunc ordinem seruat in criticis expulsionibus, ut noxia primò corrigat, & quantum fieri potest, in meliorem & corpori minùs molestum ac noxium statum deducat, deinde separet à bono & vrili, ac demum è corpore expellat. Quod cum solum fiat in humoribus putridis: hinc apparet, quando quæritur, An cruda & initio purgandum sit: id solum de febribus putridis accipiendum esse. Humores nimirum putridi in febribus solum peculiari coctione ad purgationem à natura præparantur. Nam etiamsi & aliæ quædam humorum ad purgationem præparationes, & in febribus, & citra febres, fiant, quæ ab arte fieri possunt: tamen iis coctionis nomen, ut postea dicetur, non competit, & coctio à præparatione humorum differt, ut lib. 5. Instit. part. 1. sect. 1. cap. 7. dictum.

In quorum  
morborum

Ex quibus secundò obseruandum, duos à plurimis authoribus errores, nisi planè mea me opinio fal-

lit, committi. Primò enim nonnulli ad amplificandum sensum allegati aphor. 22. sect. 1. seu probandam purgationem in morborum principiis, varia Galeni loca adducunt, quibus probare conantur, licere etiam, non surgente materiâ, purgare in principio. Sed præter rem planè: cum loca illa non loquantur de febribus putridis, sed de aliis morbis, in quibus nulla est cruditas, & propterea coctio nulla expectanda, & in quibus, si qui adsunt humores in corpore, qui purgatione indigent, mox expurgari possunt. Talia sunt, quando Galenus, lib. 13. meth. med. cap. 11. in inflammationibus oculorum vnica die purgatione se fluxionem curâsse scribit: quando, eodem lib. cap. 5. in omnibus fluxionibus commendat huiusmodi euacuationem: quando, 6. meth. med. cap. 2. in puncturâ nerui vititur purgatione: quando, lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 8. iubet in omnibus inflammationibus, fluxionibus, ictu vehementi, statim retrahendos esse humores venâ sectâ vel purgatione: quando Hippocrates, 2. de fract. text. 27. in fracturâ cranij statim purgat elleboro albo. Hæc enim loca omnia, & his similia, de talibus casibus loquuntur, in quibus nulla adest febris, & proinde nulla cruditas, de quâ Hippocrates loquitur: Et propterea ad id, cuius gratiâ adducuntur, probandum nihil faciunt. Idque ex ipso Hippocrate patet, qui etsi alleg. loco in fracturâ capitis purgat, tamen, si febris adsit, ibid. textu 20. in latione calcis, cui inflammatio & febris valida accessit, purgare non audet.

principio in  
id purgare  
licet.

Secundò & alij peccant, qui aphorismum hunc, qui tamen solum de febribus loquitur, omnibus morbis applicant, & semper, antequam purgent, humores coquendos esse scribunt. In quorum numero est Massaria, qui, lib. 1. Pract. cap. 13. reprehendit Fuchsum & alios, qui in apoplexiâ, non expectatâ coctione, purgandum cenent. Nulla enim in apoplexiâ est talis cruditas, quæ purgationem prohibeat. Nam licet cum in apoplexiâ, tum in aliis morbis, quidam vitiosi humores, cum in primis viis, tum in venis esse possint: per putredinem tamen non ita sanguini permixti sunt, ut prius à natura separandi sint, sed illi saltem quasi confusi sunt, ut ductum medicamento purgantis non inuiti sequi possint. Quod ipsa experientia in pluribus purgationibus, præseruationis gratiâ institutis, testatur, quarum eadem est ratio, quæ illarum, quæ in morbis, quos nulla febris comitatur, instituuntur. Præparatio quidem aliqua interdum, & viarum apertio, ut suo loco dicetur, necessaria est; non verò ista coctio, de quâ Hippocrates hîc loquitur.

Non in om-  
nium morbo-  
rum princi-  
pio coctione  
opus est.

Hoc tamen etiam hîc non prætereundum, etsi coctio talis fiat in vlceribus & apostematibus: tamen id, quod in iis coctum est, aperto apostemate, extra corpus effunditur, aut à natura sponte, ut in ophthalmia fieri solet, protruditur, non purgatione, de quâ iam nobis sermo, tollitur. Et proinde rectè statutum putamus, inter morbos, quorum causâ proxima purgatione tollitur, solum febres esse, quæ illâ coctione prius indigent.

Tertiò obseruandum, cum coctio separationem vitiosi humoris à bono sanguine, seu includat, seu præcedat: tantum de iis humoribus quæstionem esse, qui continentur in venis & sanguini permixti sunt. Et proinde humores, qui in primis viis extra venas continentur, & omnino qui, ut confiteri necesse habet Caprilius, pag. 99. separati sunt à bona materiâ, rectè sine coctione, vel vomitu, vel purgatione euacuari posse. Hinc rectè ab Eustachio Rudio scriptum putamus; humores, qui in primis seu publicis viis consistunt, extra venas scilicet, & sanguini permixti non sunt, omni tempore vtiliter, adhibita tamen quadam, si opus, præparatione, medicamento purgante deiici posse. Et propterea non solum

Crudi humo-  
res: ubi con-  
sistant.

non solum in febribus intermittentibus, ante statum, materia preparata educi, sed etiam in continuis, si præter continentem febris causam in venis, cuius coctio merito expectatur, alia quædam vitiosa materia in ventriculo, intestinis, aut circa præcordia hæret, quæ dolore, æstu, nausæa, angore, aliisque signis sese manifestat, ea, nullâ etiam apparente coctione, vtiliter expurgari potest. Medicamenta tamen quæ adhibentur, leniora & mitia esse debent; præcipue in continuis & acutis.

Quartò de materiâ verò febrium putridarum in venis, præcipue cauâ, sanguini permixtâ, & quæ propriè cruda esse & coqui dicitur, rectè scriptum putamus ab Hippoc. *cocta purgare oportet, non cruda; neque per initia, nisi materia turgeat*. Cur autem cruda purgare fas non sit, cocta verò purgare liceat, ut & cur turgens materia in principio euacuari debeat; & quænam illa sit: de eo & supra aliquid, & præcipue in *Instit. lib. 5. part. 2. sect. 1. cap. 6.* pluribus dictum est, quæ hic non repetimus. Illud saltem explicandum adhuc videtur, quæ causa sit, cur turgentes humores commodè euacuari possint? Etsi enim mox expurgandi dicantur, quod periculum ab iis imminet, ne in partem aliquam præcipuam ruant, & mobiles & tenues sint, ac faciliè ductum medicamento sequi possent videantur: tamen quomodo hoc fieri possit, dubium adhuc est, cum crudi sint, & nondum à bono sanguine separati, & proinde ad euacuandum inepti. Ego ut meam mentem hic explicem, cum alios hoc dubium soluere non videam, ita sentio. Materia, quæ febre dat originem, initio sæpè exigua est, fermenti tamen instar, in continuis, reliquos humores corrumpendi & putrefaciendi vim habet. In initio tamen sanguini nondum ita exactè permixta est, sed temporis progressu, & quod maior sit humorum ebullitio & effervescencia, magis sanguini miscetur. Ideoque si in principio naturæ valdè molesta sit, eamque stimulet, soler à natura moueri, & si nō è corpore, quod sit in euacuationibus symptomaticis, possit planè exturbari: tamen è visceribus ad partes exteriores & ignobiliores protrudi solet, (id quod in erysipellate & febribus, quas Comitatas dicunt, fieri videmus) & ut naturæ molesta hinc inde agitari solet, itaque talis materia quia non solum mobilis est, sed & actu iam mouetur, & vagabunda hinc inde errat, idque Naturæ eam expellere volentis conatu, neque sanguini tum ad eam exactè permixta sit, non difficulter in principio morbi, si imminens periculum id vrgeat, expurgari potest.

An verò hic aphorismus aliquam ampliacionem patiatur de eo porro videndum. Nos eum non faciliè aliquam ampliacionem pati putamus: cum Hippocrates non in genere, ut vult Capilius, dum crudos humores purgare vetat, omnes vrgentes excipiat, & exempli loco saltem materiam turgentem afferat, etsi sint alij etiam humores crudi plus vrgentes: sed expressè tantum turgentes excipiat; & sicut *aph. 22.* raro crudos humores turgere dicit, ita *aph. 24.* in morbis acutis crudos humores raro, & per initia purgandos esse doceat. Id quod euidentius fiet, si omnes casus, in quibus alij crudam materiam purgandam esse putant, breuiter in specie perpendamus: Cum autem tum solum purgare fas sit, ut est apud Galenum, *1. aph. 24.* cum ex infestorum humorum euacuatione vtilitatem consequi licet maiorem, quam sit detrimentum, quod ex medicamentis purgantibus corpus accipit: in omnibus hisce casibus, qui ab authoribus proponuntur, illud vnicè attendendum, an plus vtilitatis ex institutâ purgatione, quam ex coctione expectatâ, aut incommodi ex eadem institutâ oriri possit.

Humores ad partes mobi-

Primò quod attinet humorum ad partem aliquam principem, seu quæ principem in consensum

trahere possunt, actu ruentium impetum, de eo hoc perpendendum, an æger febricitet, an verò febre liber sit. Nam si nulla addit febris, & proinde nulla cruditas, de quâ hic sermo: tum morbos illos ad hanc quæstionem non pertinere, & tunc in iis purgari posse antea dictum. Habemusque hic non solum præceptum Galeni, qui *lib. de cur. rat. per sang. miss. c. 8.* ita scribit: *In iis, in quibus pars quadam grauiter ista est, aut vtrunque aliter incipientem habet phlegmonem, eam si magnam fore suspicamur, curationem ab inanitione auspicamur, aut purgante medicamento exhibito, aut venâ apertâ, proit nimirum alteri altero magis conuenire putamus*: verum etiam eiusdem & præstantissimorum Medicorum exempla, quæ sequamur, habemus, qui in talibus morbis, sine cunctatione, quæ plerumque locum non habet, non solum venam secant, sed etiam superfluos & vitiosos humores, ne ad partem affectam confluant, medicamento purgante exhibito, è corpore educunt. Si autem febris accedat, & putredo in humoribus accendatur, iam non æquè purgare licet. Etsi enim verum sit, ex materia actu in partem principem ruente maius, quam ex turgente, quæ potentiam tantum irruendi in eam habet, periculum metuendum esse: tamen an istud purgatione auerti possit, & an ista materia tam commodè, ac turgida, purgantibus educi possit, dubitatur. Nam turgida materia non solum irruendi in partem principem potentiam habet, sed etiam promptitudinem exeundi è corpore. Hac cum destituatur materia in partem principem ruens, non minus ex purgatione infeliciter institutâ, quam ex motu ad partem principem, periculum metuendum est. Si enim moueatur saltem materia & non rectè educatur, maiore impetu in partem affectam ruet; id quod sæpè ex insufficiente purgatione in affectibus è fluxione natis fieri experientia testatur. Neque etiam hic saltem ad affectum, qui ex materiâ ad partem principem ruente oritur, respiciendum, sed quoque ad febrem, quæ in primis si vehementior sit, magnum periculum minatur. Vnde, ut antedictum, Hippocrates, *2. de fract. text. 20.* in læsione calcis, cui valida febris successerit, purgare non audet. Et licet purgationem adhibere non liceat: tamen sine auxilio æger relinquendus non est; sed cum in inflammationibus sanguis plerumque reliquorum humorum vehiculum sit, & ipse copiosius irruat, venæ sectio, & aliæ reuulsiones adhiberi possunt: & quidem pro partis, ad quam ruunt, naturâ comparatâ; inter quas etiam clysteres sunt.

Id tamen accipiendum est de eâ inflammatione, quæ febrem præcessit, & à quâ febris oritur. Si verò febris morbus sit primarius, cui accedat inflammatio ex materiâ ad partem aliquam nobilem affluxu, purgatione vti licet. Talis enim materia non immeritò ad turgentem refertur, quam Natura è venis expellere conatur. Etsi enim ad partem determinatam ruit: tamen parti nondum infixâ est, sed mobilis; quod vel ex eo patet, quod quæ primò in hanc partem fertur, mox in aliam moueri incipit, vnde morborum transmutationes fiunt, & ex pleuritide fit angina vel peripneumonia, ex peripneumonia phrenitis. Vnde omnino concedimus, quandoque materiam ad principes partes, vel quæ principes in consensum trahere possunt, ruentem in principio commodè euacuari posse, tum scilicet, ubi quidem ad partem determinatam fluit, fixa tamen nondum est, sed suo modo vaga, & quæ faciliè in aliam partem etiam fluere possit, & quæ propterea turgens non incommodè nominari possit.

Secundò venenatâ materiam quod attinet, licet quidem concedamus, non minus, imò maius, ab eâ periculum imminere, quam à materiâ turgente: tamen rursus quæstio est, an purgante medicamento

Venenata materia ab in principio purganda sit.

è corpore tolli possit. Sui quidem è corpore amotionem materia venenata, utpote toto genere præter naturam, indicat: sed quomodo tolli debeat, de eo accurate dispiciendum. Et primò quidem venenata materia distinguenda est; cum eius aliqua sit diuersitas.

*Venenorum  
ore sumptorum  
curatio.*

Nam primò quædam Venena ore sumuntur. Quod ubi factum, vñ recepta & comprobata curatio est, vt detur opera, vt quamprimùm venenum sumptum ore reiciatur vomitu: deinde per alexipharmaca & ea medicamenta, quæ peculiari vi veneno resistunt, eius vis infringatur. Non verò per purgantia medicamenta per longas ambages ac gyros intestinorum. Venena circumducenda sunt: quod si fiat, facillè contingere potest, vt in penitiores venas sese insinuans venenum hominem iugulet. Venenorum enim vis fortis, & eorum ad cor magnus impetus, qui facillè purgantis medicamenti vim superare potest.

*Venenorum  
ictu ac mor-  
su animalium  
illatorum  
curatio.*

Secundò sunt quædam venena, quæ extrà, morfu & ictu animalium venenatorum corpori nostro inferuntur. Eorum curationem Galenus tradit, *art. med. cap. 19.* quæ in duobus consistit, in alterantibus, id est, iis medicamentis, quæ totà naturà & peculiari vi ipsis sunt aduersa, & attrahentibus, id est foràs venenum euocantibus medicamentis. Ita enim ait: *Alterationes quidem per ea molimur, quæ vel totà substantiâ, vel qualitate vnâ duabusue sint contraria. Euacuabimus autem trahentibus facultatibus.* Quo loco per trahentia medicamenta non purgantia intelligit, sed ea, quæ *intra* aliâ appellat; quod ex aliis locis patet. Nam *13. meth. med. cap. 6.* venenatorum animalium ictus & morsus curari docet alterantibus & vacuantibus, id est, iis, quæ extrà trahant, vt sunt cucurbitulæ, cauteria & caustica medicamenta, ac id genus alia. Et *5. de simp. med. fac. cap. 18.* scribit: *Omne deleterium venenum à foris impositis medicamentis euacuatur, neque aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiæ similitudine.* Purgantia ergò in hisce venenis locum non habent, imò plus nocerent; cum ab ambitu corporis venenum ad interiora traherent.

*An materia  
maligna &  
pestilens in  
principio pur-  
ganda.*

Atque ita restat tertium veneni genus, quod vel in corpore gignitur, vel cum aëre attrahitur, seu contagio communicatur, è quo malignæ & pestilentes febres, atque aded ipsa pestis generari solet. Et de hoc in primis quæritur, an mox in principio purgationem requirat. Vt nos breuiter hîc expediamus, sciendum, ipsam malignitatem, pestilentiam, seu in genere venenositatem, quatenus talis, non purgantia requirere, neque per ea tolli per se, sed per alexipharmaca expugnari, de quo alio loco dictum est, & dicitur de eo suo loco iterum; ac putamus, apud eos, qui rectà ratione æstimare volunt, id extra controuersiam esse. Et quò veneni maior est vehementia, eò citius ad talia alexipharmaca properandum, & efficaciora ex iis exhibenda. Quia tamen sæpe accidit, vt ij, qui talibus febribus aut peste ipsâ corripuntur, pluribus humoribus vitiosis scateant, qui febrem & putredinem, quæ aliàs à veneno illo plerumque inducitur, augere possent, ipsique fomitem idoneum præbere: iam portò quæritur, quid tum in febribus malignis & pestilentibus, ipsâque peste faciendum, & an illa materia statim euacuanda, an verò concoctio expectanda sit.

De hac re in specie suo loco plura dicentur. Hîc in genere monuisse sufficiat, cum fomes & materia, quæ febrem augere possit, plerumque in primis viis consistat, in febribus malignis, imò pestilentibus, & peste ipsâ, non incommode primas vias euacuari. Hoc enim nisi fiat, nec symptomata mitigari, nec malignitas obtundi, nec alia cum fructu & successu aliquo tentari possunt. Præterea vitiosi isti humores à calore febrili agitati in maiores venas facillè sese insinuant, & morbum grauiorem efficiunt. Fomite verò isto sublato, symptomata remittunt, & reliqua felicius peragi possunt. Conueniunt huic rei

syr. rosarum sol. manna, pulpa tamarindor. & cassia cum pulpâ tamarind. mixta. Nonnulli etiam agarico, rhabarbaro & senâ vtuntur, atque in primis in malignis vñsum agarici commendant: Alij verò & ab istis mitioribus, nisi materia turgat, abstinendum censent. Verumenimverò si ista lenia, syrupus rosar. solut. manna, cassia, tamarindi satisfaciant, in iis acquiescere possumus: si autem fortiora sint corpora, aut etiam, quod sæpe accidere solet, maior vitiosi humoris sit copia, talisque eius constitutio, vt lenia ista satisfactura diffidamus, rhabarbaro & agarico vti licet: Neque enim tam fortia sunt hæc, si debita quantitate exhibeantur, vt humores in remotioribus venis valde agitent. Licet quoque istam materiam, si ad superiora vergat, vomitu commodè excludere. A reliquis autem fortioribus purgantibus, omnino abstinendum, nisi materia turgat, & ad excretionem properet. Licet enim materia ista non minus, imò majus periculum, quam turgens minetur: tamen cum à natura non elaborata sit, calorque præter naturam in corpore adhuc dominetur, medicamento purgante non cedit: ideoque frustra ab eo agitur, & potius in summâ quiete detineri debet, donec à natura concoquatur & vincatur. Quamuis enim materia ista venenata sit: non tamen tota venenum est, quod nullam à natura elaborationem suscipiat; sed non rarò à natura vincitur, coquitur, & per crisin euacuatur, aut in abscessus extruditur. Præterea vires in hoc morbo valde sunt debiles, ac propterea omni studio conseruandæ, vt tanto morbo vincendo pares sint.

Tertiò in classem humorum, quos in principio sine coctione purgare liceat, nonnulli referunt copiam humorum, non tamen quamuis, sed ubi morbus grauis, sæuique sit, & metuendum nisi materiam pars subtrahatur, & purgante medicamento mox educatur, naturam morbum non victuram, ægrumque de vira periclitaturum esse.

*An humores  
copiosi in  
principio pur-  
gandi.*

Verum sciendum, si materia illa in primis viis contineatur, (vt sæpe accidit, & æger non minus ob materiam in primis viis, quam in venis contentam periclitetur) de eâ libenter concedimus, & antea concessimus, esse euacuandam in principio multis de causis: sed de hac materiâ propriè quæstio non est. Verum de illâ, quæ in venis continetur, sanguinique permixta est. Huius pars aliqua quomodo initio electiue purgantibus medicamentis, cum ægri emolumento euacuari possit, non videmus. Verum est, à copiâ tantâ materiæ ægro non parum periculi imminere: illud tamen per purgationem in initio morbi institutam auerti non potest. Omnia enim ex tali purgatione sequi possunt incommoda, quæ ex crudæ materiæ purgatione sequi solent. In primis metus est, ne humores saltem tenues, utpote qui ductum medicamento facilius sequuntur, educantur; reliqui qui sunt crassiores, remaneant, & agitati solum, non verò euacuati, obstructions pertinaces pariant morbumque augeant. Neque tamen etiam hîc æger, etsi purgatione non vtatur, omni auxilio destituitur. Nam ubi cacochymia sanguini permixta est, vt natura oneris parte leuata, quod reliquum est facilius concoquat, in omni febre putridâ sanguinem mittere vtilissimum esse, è Galeni consilio supra diximus.

Quartò, Octauianus Roboretus huc retulit materiam, quæ in parte aliquâ principali, vel quæ principalem in consensum trahere possit, fixa, vnde grauiantur Symptomata. Verumenimverò si pars illa sit circa primas vias, vt ipse citato loco, materiam in ventriculo hærentem recenset, cuius causâ oritur li-pothymia, tum facillè admittimus, illam mox in principio euacuandam esse: sed de illâ quæstio non est, verum de eâ, quæ propriè cruda dicitur, quæ si circa aliquam partem loco remotiore sitam hæreat, com-  
modè

*An materia  
in parte ali-  
quâ principa-  
li hæret in prin-  
cipio purgan-  
da.*



modè euacuari non potest. Illis etiam partibus affectis, ad quas in purgatione humores trahuntur, purgare non licet. Sic in inflammatione hepatis à purgantibus abstinendum, quod iis humorum versùs hepar fluxus magis concitetur.

An humores  
acutis in  
principio  
purgandi.

Quintò nonnulli calidos & tenues humores in principio purgandos esse existimant. Quod si verum est, in omnibus ferè acutis febribus, in initio purgandum, cum tamen Hippocrates in acutis raro purgandum esse scribat. Nimirum tenuitas sola ad purgationem non sufficit: Et tenues humores æquè crudi esse possunt, ac alij; & propterea coquendi sunt, id est, à natura vincendi, elaborandi, & à bonis separandi, antequam purgentur; nisi vehemens periculum virgeat, & tale, quod purgatione auerti possit, id est, nisi turgiant.

Hier. Mercurialis opinionem quod attinet, & primò distinctionem illam, quà operationes Medici diuidit in regularem & coactam, nisi ita explicetur, vt regularis illa sit, vbi Medicus id simpliciter, quod indicans iubet, sine aliquo prohibentis interuentu, exequi potest; coactam verò illam, vbi necessitas aliquid aliter, quàm Indicans requirit, agere iubet, admitti non potest. Nunquam enim licet contra regulas methodi medendi peccare. Nihilominus vtraque operatio ista, tam ea, quam regularem, quàm illa, quam coactam appellat, sub legibus methodi medendi continetur, & propterea vtraque regularis est, si propriè loqui libet. Deinde quantum ad casus, in quibus in principio purgandum putat, & primos quidem duos, in quibus perfectè purgare liceat, de iis iam dictum. Casus verò duos, in quibus in principio esse purgandum imperfectè scribit, quod attinet, de primo, vbi scilicet metus est, ne materia turgeat, nullam mentionem facit Hippocrates, & saltem de materià actu turgente loquitur. Et quis Medicorum tam perspicax est, vt *ὁρμασμός* humorum præuidere possit? Humor quidem caliditas & tenuitas in acutis semper adest, vt plurimum tamen eos non turgere dixit Hippocrates. Secundus verò casus, quando scilicet plenitudinem sanguinis, quam, ob aliquod impedimentum, sectâ venâ imminuere non licet, purgatione imminuere iubet, planè ratione destitutus videtur. Purgatio enim solum vitiosos humores euacuat, nullum verò datur, vel in vsu est medicamentum sanguinem purgans. Deinde licet venæ sectio adhiberi non possit, sunt tamen alij modi, quibus sanguinem imminuere licet: cucurbitulæ scarificatæ, malleolorum scarificatio, hæmorrhoidum apertio.

An in au-  
gmento fe-  
brium pur-  
gandum.

Tandem iuperest Iodoci Lommij opinio, qui in intermittentibus in statu, in continuis verò in fine augmenti purgandum esse docet. Verum neutrum commodè facere licet. Augmenti finem quod attinet, se accingit tum inprimis natura ad coctionem & futuram crisin. Cum verò purgantia medicamenta coctionem prohibeant, humoresque a ient, metuendum est, ne ab opere suo abstrahatur, vel ad crisin maturandam infelicitè incitetur & impellatur. Præterea in fine augmenti symptomata satis graua iam sunt; & propterea æger amplius non est molestandus. In statu verò, nisi id in fine eius fiat, commodè etiam non purgatur. Id quod præcipit Hippocrates, 1. Aph. 20. *Qua indicamur & indicata sunt integrè, neque mouere, neque medicamentis, neque aliis irritamentis decet, sed sinere.* Ideoque si natura officium facit vel factura est, etiam in intermittentibus, in opere suo turbanda non est. In fine tamen statûs, si naturam non satis facere videamus, euacuare licet, & naturæ defectum arte supplere.

An in statu  
febrium sic  
purgandum.

Interim, quod obiicit Lommus, non sine omni pæsidio morbum in naturam grassari permittimus, neque vbi extra omne periculum est æger, purgamus.

Nam si naturam onere subleuare volumus, in initio id facimus, secundum præceptum Hippocratis, 2. Aph. 29. *Incipientibus morbis, si quid mouendum videtur, moue.* Deinde licet status præterierit, non semper æger est extra omne periculum. Sæpè enim accidit, vt natura vel nullam excretionem tentet, vel imperfectè purget: Ac tum naturæ defectum Medicus arte supplere debet, ne æger in morbum recidat. *Qua enim in morbis post crisin relinquuntur, recidinas facere consueuerunt, 2. aph. 12.*

De materià tamen & formâ exhibendi purgantia, notandum in febribus biliosis pilulas non esse ita commodas. Cum enim dentur in parua quantitate, necessaria sunt purgantia fortia & calidiora. Aut si fortè exhibeantur, post sumptas pilulas statim exhibeatur potiuncula refrigerans, quâ & pilulæ dissoluantur & earum caliditas temperetur. In febribus tamen pituitosis & melancholicis tutius pilulæ exhiberi possunt. Reliqua quæ de purgatione dici possunt, videantur in Institutionibus.

Atque hæc de purgatione hoc loco in genere dixisse sufficiat. Vnum saltem adhuc monere libet, quod forsan apud antiquos ita non occurrit, nimirum recentiores quosdam purgantibus admiscere sudoriferis medicamentis. Ita Heurnius, lib. de peste cap. 9. cœpam albam excauatam theriacæ 3. j. & modico pulvere rad. tormentillæ ac dictamni replet, & sub cineribus coquit: Eandem postea contundit, effusâ aquâ carduibenedicti, & aceto flor. calendulæ, succumque exprimit, & addit trypheram Persicam, cum confect. hamech, vel electuar. Indo, aut diaphanico, atque id medicamentum purgaturum, & mox quoque sudorem prouocaturum pollicetur. Neque metuit contrarios eodem tempore morûs, eò quod conclamatum sit, nisi ab hoc hoste illicò vius natura vindicetur; & præcipuè cum hæc proba esse docuerit. Ita Rulandus senior, in cent. ex centauro minore, & asari radice, medicamentum, quod vomitum & sudores mouet, componit. Et, cent. 3. cur. 70. aquam exhibet, quæ vomitum, aluum & sudorem mouet. Quod & filius imitatus est, qui in historiis curationum morbi Hungarici radicibus asari cum aq. card. bened. & aceto sæ vomitum & sudorem concitauit.

Medicamen-  
ta vomitum,  
sudorem &  
aluum simul  
cientia.

## CAPVT VII.

## De coctione &amp; præparatione humorum.

Cum ergo non semper, sed rariùs turum sit, in initio febrium purgare: coctio plerumque expectanda est, & proinde videndum, quomodo illa perficiatur. Et si autem coctio solius naturæ opus sit, quæ caloris innati beneficio & viribus humores elaborat, & ad eam, quam recipere apti nati sunt, perfectionem deducit: tamen & medicamenta digestiua, seu concoquentia dantur, quæ quia vel calorem naturæ fouent, & roborant; vel impedimenta, quæ naturam in coctione remorari possunt, remouent, vt coctio feliciùs expediat: concoctio etiam ipsis adscribitur. Egimus autem ea de re diligenter & pluribus, lib. 5. Instit. part. 2. s. 1. cap. 7. quæ ibi legi possunt, nec opus est hîc omnia repetere. Breuiter rem iam hîc complecti liber hoc modo. Concoctio humorum hîc intelligitur non ea elaboratio, & mutatio eorum, quâ idonei corpori nostro alendo redduntur: sed cum ij caloris natiui viribus ita alterantur, & ab vtilibus separantur, vt euacuationi reddantur idonei. Atque ita materiæ febrilis coctionem solius naturæ opus esse diximus. Hæc enim vbi causis morborum fortior fuerit, easque vicerit, humoribus vitiosis, & corpori alendo inutilibus eam, quam recipere possunt, perfectionem inducit, sicut hoc in puris generatione fieri videmus; postea à bonis separat, & tandem per crisin expellit.

Coctio solius  
naturæ opus.

*Cruditas in  
febris  
quid.*

Atque ita Cruditas & Coctio, de quibus in doctrinâ de purgatione loquitur Hip. non alibi locum mihi habere videntur, quàm in febribus. Vnde ij peccant, qui in omnibus morbis, etiam sine omni febre, digestiua quæ vocant, purgantibus præmittenda esse putant. Cum materia ita sæpe sit disposita, ut licet exhiberemus sexcentos syropos (ut loquitur P. Aeneas Caprilius) nunquam major fieret separatio. Cruditas autem in febribus videtur esse humorum quasi quædam ebullitio, fermentatio seu feruor. Nondum enim, ut Gal. id explicat, durante illâ ebullitione, vitiosum à bono separatum est. Videreturque mihi hîc ferre se res habere, sicut in musto & cereuisia. Si quis vel decies colarit, vel per filtrum quoque, quod appellant, destillat, mustum vel cereuisiam nondum defecatam, eam claram non reddet; eam ob causam, quod natura partes heterogeneous nondum separat. Cessante verò illâ ebullitione & fermentatione absolutâ, postea vinum & cereuisia clara redduntur, fecesque subsident: adeo ut etiam agitatione turbentur, feces tamen breui temporis spatio iterum subsideant; aut si in vinum, aut cereuisiam defecatam, puluerem aliquem injicias, is facile vel subsidentia, vel filtratione separetur. Ita antequam humores in venis deferuerunt, nec à naturâ, nec ab arte cum *εὐπορία* & utilitate facile instituitur purgatio: quæ sit postea feliciter, postquam coctione partes heterogeneous separatæ sunt. Id quod & in inflammationibus & vlceribus fieri videmus. Atque ita sese rem habere, ipsa vrinæ subsidia & separatio contentorum docet. Durante enim illâ ebullitione, omnes vrinæ partes, sicut in musto, confunduntur: cessante verò illâ, separantur & subsident quædam.

*Medici in co-  
ctione humo-  
rum officium.*

Quæ autem Medici partes hîc sint, diligenter disquirendum, cum non omnes id satis perspicue explicent. Existimamus autem duplicia esse medicamenta, quæ Medicus ante humorum purgationem exhibere debet. Quædam concoquentia dici possunt, seu alterantia; quædam præparantia. Etsi enim nonnulli plura recenscant: tamen ad hæc capita reduci possunt, & frustra eorum numerus multiplicatur.

Herc. Saxonia habet alterationem, præparationem, & concoctionem: sed cum concoctionem soli naturæ tribuat, nobiscum sentit, & per alterantia non nisi, quæ hîc appellantur coquentia intelligit.

*An digestio  
& coctio dif-  
ferant.*

Donatus ab Altomari quartam operationem addit, digestionem, & pluribus disputat, eos peccare qui digestionem pro concoctione, & concoctionem pro digestionem accipiunt. Ipse verò hoc modo distinguenda censet. Digerere idem est, ait, quod ordinare, dissipare, distribuere, vel distinguere, idemque est, Digero, quod Græcis *διατείνω*, vel *διακρίνω*, vel *διαρίνω*. Hinc *διακρίνω*, separatio: & quod Græci *ἀνέδωκεν* dicunt, nos digestionem appellamus. Et proinde putat primò dici propriè digestionem concocti & perfecti alimenti, ac in sanguinem conuersi in corporis particulas omnes attractionem. Deinde etiam de excrementis, præter naturam in corpore retentis, usurpari vocem digestionis statuit. Et quidè dupliciter: Primò cum natura ipsa post coctionem sensibiliter, per sensibiles canales, aluum videlicet, vrinam, sudorem, ea expellit: Deinde cum eadem non sensibiliter, sed per halitum digerit, dispergit, atque per poros cutis insensibiliter discutit; quod Græcis propriè est *διασπένει*.

Verumenimverò saltem de vocabulis hæc lis est. Scimus equidem vocabulum digerere, propriè sumptum, idem esse, quod in diuerfas partes distribuere, & hinc quoque pro ordinare usurpari. Quæ enim ordinantur, hoc hîc, illud alibi disponitur. Et scimus *ἀνέδωκεν*, & *ἀνέδωκεν* cibi distributionem, ac *διασπένει* humorum insensibilem discussionem esse; & aliud Græcis esse *πέλει*, aliud *ἀνέδωκεν*, aliud *διασπένει*. Interim ubi de præsentī negotio & Latino vocabulo digestionis sermo est, sciendum: superioribus seculis,

minis Latinis, vocabulum Digestionis semper pro coctione usurpatum, imò in frequentiore usu, quàm vocabulum coctionis fuisse. Neque tamen planè barbara est hæc significatio; cum & apud probatos auctores linguæ Latinæ reperiatur. Hic vocabuli usus postea in scholis Medicorum retentus est, & digestio ipsis idem est, quod coctio; & Digestiua medicamenta dicuntur, quæ Concoquentia aliàs nominantur. Etsi enim, ut diximus, Naturæ opus sit concoctio humorum putridorum: tamen vltus hoc obtinuit, ut primò ea medicamenta, quæ calorem, natium fouent ac roborant, ut coctioni humorum facilius sufficiat: deinde, etsi minùs propriè (cum magis propriè alterantia appellantur) quæ impedimenta quædam, quæ naturam in coquendo remorantur, tollunt, & excessus qualitarum ad mediocritatem reducunt, Concoquentia nominentur. In externis partibus & tumoribus per emplastica medicamenta calor quidem commodè fouetur: idem verò in febribus, & in partibus internis, per illa commodè vix tentari potest; sed potiùs quiete, somno, & moderato ciborum temperaturum usu calorem natium fouemus, ac instauramus. Atque ita coctio propriè soli naturæ relinquitur.

Digestiua tamen & concoquentia medicamenta appellari ea usus obtinuit, quæ impedimenta quæ naturam in coctione remorari possunt, tollunt, & quantum quidem licet, naturam in elaborandis humoribus iuuant. Cum enim natura omnia ad mediocritatem deducere tenter, & calor, qui coctionis author est, moderatus esse debeat: omnis qualitarum excessus ad coctionem feliciter expediendam ineptus est. Intensior enim vitis; debiliior ad coctionem perficiendam non sufficit. Et quò quodque magis à mediocritate abest: eò maiore cū labore & difficultate à natura ad eadem deducitur. Medicus ergo naturam iuuat, dum illum qualitarum excessum tollit. Hinc calida sunt refrigeranda; frigida calefacienda; sicca, humectanda; humida, siccanda; crassa attenuanda; tenuia, incrassanda, & si qui alij sunt, qualitarum excessus, ad mediocritatem redigendi sunt. Etsi enim febris per se tantum refrigerantia & humectantia requirat: tamen cū ratione nonnunquam calefacientibus & humectantibus vtendum, & sua cuique humori debetur alteratio.

Bilem primò quod attinet, à qua febres frequentissimè oriuntur, de eius in qualitatibus primis alteratione, nullū est dubiū; de secundis verò variè est disputatū inter Medicos. Nonnulli in ipsâ quoque bile extenuantibus & incidentibus vtendū censent, autoritate Galeni, qui 1. aph. 24. etiam in acutis febribus origano & hyssopo, in aquâ mulsâ coctis, ad extenuationem vtitur. Alij contrà bilem incrassandam esse censent. Alij neutrum horum faciendum putant: neque attenuandam bilem, cum antea sit tenuis; neque incrassandam, cum ad motum reddatur ineptior, sed sine vllâ alteratione purgandam censent.

Vt nos breuiter expediamus, verum quidè est, eos malè sentire, qui putant bilidos humores ampliùs extenuandos esse. Sunt enim antea satis mobiles. Et metuendū, ne eiusmodi calidis medicamentis humores magis incalescant, & maius incendium excitetur; febrisque, & omnia eius symptomata augeantur. Et quod Galenus, *allegato loco*, hyssopo & origano vtitur, non ob bilem id facit, sed ob meatūs, qui ab humore crasso obstructi sunt; neque ante coctionem bilis id faciendum. Deinde illi quoque nō rectè sentire videtur, qui nullā præparatione & alteratione bilem indigere putant. Etsi enim bilis sat mobilis sit: tamen eiusdem magnus est feruor, & acrimonia; & propterea qualitates hæ ad mediocritatem aliquam deducendæ sunt, ne si ita calida & acris purgetur, in internis visceribus magnum aliquod damnum excitent. Ergo rectissimè biliosi humores frigidis medicamentis attemperandi, & tenuitas eorum, si sit nimia, ad mediocritatem aliquam deducen-

*Digestiua &  
concoquentia  
medicamenta  
qua.*

*Bilem conco-  
quentia.*

deducenda est, vt, qui prius calore & acrimoniâ nimia corpus turbabant, nunc refrigeratione mirescentes, ac veluti domiti, naturæ manûs dent, & ab eâ facilius vincantur, atque istâ elaboratione ad mediocritatem aliquam reducti postea commodius euacuentur. Cum tamen, vt postea dicetur, semper videndum sit, vt meatûs, per quos humores euacuari debent, pateant, ea rectissime tum adhibentur, quæ simul refrigerant, & leniter abstergunt; insigni autem adstrictione carent. Interim pro conseruando robore partium, præcipue hepatis, leniter adstringentia vtilia. Dantur autem talia medicamenta, quæ vim aperienti habent, aliquâ tamen adstrictione non destituuntur. Talia sunt: *Cichorium, Endiuia, Sonchus, Scariola, Chondrilla & omnia cichoracea*. Bili etiam temperandæ inseruiunt, *Hordeum, Borrage, Buglossum, semina refrigerantia maiora & minora dicta, succus citri, granatorum, ribes*, E quibus & decocta fiunt, & aquæ destillantur, quibus postea Syrupi ex iisdem parati, *Syrupus acetosus f. oxymel f. oxyssacchara f. Syrupus acetosus citri*, præcipue si adsit suspicio malignitatis, de succo acetosa, granatorum, violarum, & si bilis sit crassior, *Syrupus de endiuia compositus, byzantinus f. & alij admiscuntur*. Licet quoque aliquot guttas spiritûs viuiol. vel  $\Theta$  admiscere. Ex seminibus etiam possunt cum liquoribus conuenientibus fieri Emulsiones. Liquida enim ista facilius se in venas insinuant & calidos humores attemperant. Possunt tamen etiam ex herbis & floribus fieri conseruæ; radicibus & fructibus condita; vnde rursum Electuaria parantur.

In febribus *Pituitosis* cum humores magis crassi & lenti sint, & natura in coctione illos quoque ad quandam mediocritatem redigere conetur, opus est incidentibus & attenuantibus. Qualia sunt: *radices aperientes vulgò dictæ, capillus ♀, hyssopus, betonica, agrimonia, Syrupus acetosus, & oxymel f. Syrupus byzantinus f. & compos. Oxymel compositum & scilliticum, Syr. de duab. radic. Syr. de 3. radicibus, de betonica, & similes*. Incipiendumque à mitioribus, postea ad validiora progrediendum.

**Melancholiâ preparantia.** In humore *Melancholico* vsurpentur attenuantia quidem, sed quæ simul vim humectandi habent. Melancholicus enim humor frigidus, siccus & crassus est. Atra bilis cum sit calida sicca, crassa: frigida, humectantia & attenuantia postulat. Hinc in febribus ex his humoribus natis vsurpantur, *borrago, buglossum, polypodium, viola, scolopendrium, ceterach, cortices amarisci, capparium, glycyrrhiza, & similia*. Et composita: *Syr. byzantinus f. borraginis, buglossi, fumaria, de scolopendrio, de lupulo, oxyssacchara composita & similia*.

Cautus tamen sit Medicus in iis medicamentis adhibendis, quæ frigidi humores requirunt, & febrem propterea augere possunt, qualia sunt, quæ validè attenuant; atque attendat, ne per ea febris augeatur. Contrâ & hoc attendendum, ne infrigidantibus humores nimis incrassentur, & transpiratio, quam in omni febre rectè se habere vtilissimum est, impediatur. Vnde Galenus non sine causâ 1. aph. 14. etiam in acutis febribus origano & hyssopo in aquâ mulsâ coctis vitur.

**Putredinem humorum inhibentia.** Cæterum cum omnibus humoribus his, quatenus febrem generant, putredo & corruptio quadam insit, eâ ratione omnibus his febribus, quæ putredini resistunt, conueniunt. Imò cum putredo sæpe nondum integra & perfecta sit, vt illa inhibeatur, refrigeratione, exsiccatione & calidi natiui roboratione opus est. Huic operi & fini vtilia sunt, *acetum, & Syr. acetosus, succus limonum, citri, granatorum; cichoreum, endiuia, acetosa, pentaphyllum, tormentilla*. Verum de his plura in febrium curatione speciali dicentur.

**Humorum præparatio.** Atque hæc est humorum coctio seu alteratio, quæ ab Arte proficiscitur, quâ medicamentorum ope Naturæ aliquo modo opitulatur Medicus, & impedimenta quæ naturam in coquendo remorantur, remouet.

Præter hanc & alia humorum præparatio necessaria est; licet jam cocti humores sint: imò & in iis humoribus ea plerumque adhibenda, vbi nulla adest cruditas, & coctio illa, de quâ modò egimus, non requiritur. Nam cum, vt purgatio feliciter expediat, & vias, & per quas moueri debent humores, libet eas esse oporteat, vt & humores ipsos, qui expurgari debent, mobiles, non crassos & tenaces: duo sunt, quæ humorum purgationi felici, etiam coctione absolutâ, obstat possunt; viarum obstructio, & humorum crassities ac lentor. Hinc Hippocrates iubet, corpora, quæ quis purgare vult, *εὐρα πρὶν*. Humores nimirum crassi & lenti medicamentis attenuantibus attenuandi, visceri detergenti, atque omnes, per quas transire debent, viæ, vt venæ mesaraicæ & intestina, aperiendæ & ab impedimentis liberandæ sunt. Nonnulli priorem illam humorum præparationem, quæ fit vt humor crudus facilius & citius concoquatur, Præparationem primam appellant: hanc verò, quæ fit, quando naturâ alimentum ab excremento, malum à bono jam separauit, Præparationem secundam appellant: Et quidem secundam hanc præparationem Pius Aencas Caprius non solum, vt dictum in materiæ viscidæ deterfione, crassæ attenuatione, sed & in materiæ acris refrigeratione consistere docet. Verum commodius videtur, acris materiæ refrigerationem & mitigationem ad primam præparationem referre. Eiusmodi enim naturæ molestæ qualitates coctione temperantur.

Atque hinc patet, in omnibus ferè febribus vtilissimum esse, medicamenta aperientia & detergentia exhibere.

Ex iisdem etiam clarum faciliè euadit, quo tempore quodlibet ex his medicamentis vsurpandum sit. Post primarum viarum euacuationem & venæ sectionem mox, nisi quid prohibeat, adhiberi debent medicamenta obstructiones, si adsint, liberantia. Obstructiones verò aperientia, respectu reliquorum medicamentorum, plerumque habent rationem causæ sine quâ non. Neque enim possibile est, aut putredinem præsentem tollere, aut futuram præcauere; neque medicamenta alterantia & concoctionem iuuantia liberè in corpus penetrare possunt; neque humores, siue id in principio, siue alio morbi tempore fiat, feliciter expurgari possunt; nisi obstructiones tollantur.

Ideoque primò obstructiones liberantia adhibenda, & perspiratio libera corpori reddenda. Hinc humores semiputridi corrigendi, & ad meliorem statum reducendi, corrupti coquendi, & tandem corpore euacuandi sunt. Semper tamen ad id, quod magis vrget, respiciendum. Sæpe enim accidit, vt putredo & calor valde vrgeant; obstructiones verò non ad id insignes sint: ac tum non solum ad id, quod habet rationem causæ, sed etiam ad id, quod magis vrget, respiciendum. Atque id est quod Auicennas monet, febrem nonnunquam tantæ esse vehementiæ, vt regimine causæ vti non liceat, sed summa refrigeratio mox requiratur.

Quantum tamen fieri potest, reliqua non negligenda sunt: commodissimumque est, medicamentis vti, quæ pluribus scopis inseruiunt: quod factum difficile non est, cum & simplicia, quæ plures vires habent, dentur, & composita, si hæc desint, concinnare liceat, e.g. Syrupus acetosus f. & oxymel f. aperiunt, citra caliditatem tamen. Imò nonnihil refrigerant, attenuant, detergent. Ideoque in omnibus febribus putridis iis vti licet. Si tamen febris sit vehementior & humor biliosus, tutius est vti syrupo acetoso simplici: in humore verò pituitoso commodius est, oxymel exhibere. Succus & Syrupus citri & acetosæ putredini resistunt, cor peculiari vi roborant, intemperiem febrilem corrigunt, aperiendique vim habent. Cichorium refrigerat; & calorem febrilem mitigat, Hepar qualitate peculiari & leni adstrictione roborat, amaritudine

*Obstructiones aperientia.*

*Syr acetosus f. oxymel f.*



tudine leniter abstergit & aperit, bilemque omnino ad mediocritatem deducit. Decoctum hordei refrigerat, abstergit & aperit. Lactuca refrigerat & incrassat. Betonica calefacit leniter & siccatur, aperit & adstringit nonnihil, & membra nutritioni dicata, ac cor ipsum roborat & pituitam bene concoquit. Ex quibus patet, & vnicum medicamentum sæpe pluribus intentionibus satisfacere posse, aut si talia desint, plura componere licet. Syrupi autem plerumque aquis vel decoctis diluuntur. Vbi de decoctis, ut vulgo parantur, notandum, incommoda esse, cum omnia simul coquantur, cum alia breuiem, alia longiorem coctionem desiderent: quo fit, ut quæ facile coquantur, planè corruptantur, & omnes vires amittant. Commodissimum ergo est, si in vase clauso in balneo, horis 10. vel 12. infundantur.

Spir. ☉ &  
vitr. v. s. m.

Inter *πολύχρηστα* non immerito recensentur spiritus ☉ & vitriol. in febribus putridis maximi vsus, qui insignem vim habent attenuandi, incidendi, obstructions aperiendi, putredini resistendi, inflammationem humorum prohibendi, sitim sedandi.

Spir. tartari  
compos.

Pertinet huc & mixtura illa, seu spiritus ille compositus ex spiritu tartari correcto, aqua theriacali camphorata, & spiritu vitriol. quem male è recentioribus quidam sibi vendicat, cum tamen descriptio integra extet in Ioh. Guinterio Andernaco, de noua & veteri Medicina, part. 2. pag. 657. & eius rudimenta etiam in Paracelsi inueniantur. Estque spiritus hic in putridis simplicibus plurimis (non omnibus tamen, nam in biliosis puris ob aquam theriacalem non ita conuenit) præcipue malignis vitilis; cum, præter dictas spir. vitriol. vires, & malignitati resistendi, ac vim diaphoreticam habeat, ut ex iis, è quibus comparatur, medicamentis facile animaduertere est.

Componitur autem ex spir. tartari correcti partibus iiij. aqua theriacalis camphorata part. v. spir. vitriol. part. j. Quanquam pro diuersitate morborum vnus vel alterius spiritus dosi minui vel augeri possit. Spir. scilicet tartari ex tartaro crudo per retortam destillatur, rectificatur & quantum fieri potest, à fœtore liberatur. Spir. theriacalis camphoratus ita paratur.

℥. Spiritus vini rectif. ℥. x. Theriac. Andromach. ℥. v. myrrha rubra. ℥. ij. β. Croci Oriental. ℥. β.

Omnia indantur cucurbita erecta, impositioque alembico, in quo ℥. ij. camphora ponantur, clausisque exactè iuncturis, stent in B. per dies iiij. ut nihil vel parum destillet: postea lento primum igne, hinc fortiore destillentur, spiritusque, qui exstillant, materia iterum affundatur, & digerendo & destillando labor hic ter repetatur.

Spiritus vitriol. sumatur vel vulgari modo præparatus, & rectificatus; vel qui paratur ex vitr. depurato cum Spir. vini, si scilicet vitriol. depuratum indatur cucurbitæ vitreæ satis ampli orificij luto obductæ, & affundatur spir. vini optimus, ut fiat pasta, appositioque alembico, clausisque iuncturis cucurbita ponatur in furno in aperto igne, & applicetur recipiens satis amplum, atque instituaturn destillatio, primò lentissimo igne, ut spiritus vini destillet; mox augeatur magis ignis, ut phlegma quoque ascendat; tandem incipientibus appareant spiritibus siccis, ignis sensim augeatur ita ut vitrum liquefcere incipiat. Rectificatur postea, & in balneo separatur spiritus primò, hinc phlegma, tandem spiritus vitriol. in arenâ destillatur.

Hi ergo tres spiritus dictâ proportionem mixti, in vitro angustij orificij, in balneo, vel hypocausto calido, trium septimanarum spatio digerantur.

Potentissimum quoque in febribus ad putredinem sistendam & inflammationem humorum prohibendam medicamentum est, Nitrum, etiam crudum.

Ut autem ista medicamenta efficacius operentur, vacuo ventriculo, duabus scilicet vel tribus horis ante cibum, & præcipue, si licet, tempore matutino offerenda sunt; Paroxysmorum tamen & temporis exhi-

bendi cibi habenda ratio. Etenim si tempus matutinum vel cibo exhibendo sit dandum, vel imminet aut adsit paroxysmus, in tempus vespertinum differenda, nihilque obstat, quò minus post ea sumpta dormire liceat. Et commodum est, ut vno sumpto medicamento eius operationi tempus, & Naturæ quies aliqua detur, nec mox aliud ingeratur. Continuanda autem tam diu, quam diu materiæ conditio id requirit.

Itaque hæc quæ de cruditate & coctione humorum dicta sunt, præcipue in febribus continuis & acutis locum habent. Id quod ex ipso Hippocrate patet, qui *sect. 1. aph. 22. mox aph. 24.* subiungit: *In morbis acutis raro & per initia purgante medicamento utendum.* Et *aph. 29.* scribit. *Incipientibus morbis si quid mouendum, moue: vigentibus vero quiescere præstat.* Nimirum si materia turgat, in acutis, statim in principio euacuanda. Quod si non turgat, coctio expectanda est. Quæ peracta Natura ipsa sæpissime humores vitiosos expellere solet, ut raro purgantibus opus sit. Eadem tamen cruditas & coctio etiam in intermittentibus locum habet: Etenim cum causæ earum sedes sit in venis mesaraicis, venæ verò mesaraicæ etiam sanguinem sui generis elaborant & contineant: si sanguini illi alicubi humores vitiosi permisceantur ac putrescere incipiant, atque inde febris excitetur: cruditas adesse dicitur; ubi verò iam ita à natura victi & præparati sunt, ut facile separari possint, coctio peracta est. Et si verò in intermittentibus in singulis paroxysmis materiæ aliquid euacuetur; non tamen humor febrium talium fomes prius totus euacuatur, quàm coctio humoris absoluta sit, sed ut Galenus 2. de differ. febr. cap. ult. docet, & infra cap. 16. dicitur, ob superfluitates in parte, in quâ febris fomes continetur, relictas, ipsamque partis debilitatem inde contractam, nouus humor generatur, qui noui paroxysmi causa est. Itaque & in intermittentibus coquentibus opus est, quæ sic vitiosas materiæ relictæ qualitates tollant, ut facilius à naturâ coqui possit, illamque vitiosam dispositionem in parte, in quâ fomes mali hæret, tollant & emendent. Exem. gr. in febre biliosa medicamenta refrigerantia & humectantia requiruntur, ac dispositio *χολοεινική* seu bilis generatiua tollenda est. Quod cum non pauci negligant, & vel ad obstructions, quæ tamen sæpe nullæ adsunt, vel ad ad humoris nondum cocti purgationem medicamenta dirigant, non raro febres prolongant, imo augent. Et si enim humor vitiosus purgantibus tollatur, tamen nisi à bonis separatus iam sit, aut ita à natura præparatus, ut facile separari possit, purgatio non feliciter succedit, & à malâ dispositione partis tantundem eius iterum generatur; imò nonnunquam plus: cum medicamenta purgantia dispositionem illam vitiosam augere possint, ut quanto plus purgetur, tantum purgandum restet. Sarius ergo est humores vitiosos non generari, quàm genitos euacuari. Et proinde ea medicamenta exhibenda, quæ cuiuscunque humoris vitiosas qualitates emendant, & eius generationem prohibent. De quo suo loco in specie dicitur. Concoquentia autem seu præparantia illa, sint quidem & ipsa alterantia, ut dictum, quæ scilicet & putredinem corrigant, vitiosasque humorum qualitates remittant, atque ita symptomata mitiora & leuiora reddant: maximâ tamen ex parte incidentia & aperientia. Non quòd obstructions aperiunt semper opus sit; sed quòd hæc medicamenta humores excretioni aptos reddant, & ad attenuationem, & fermenti putredinalis per vrinas expulsionem aliquid faciant, & præterea naturam & meatuum ac viarum organa ad excretionem extiment & extergant. Præterea partes, quæ maximè laborant, & humorem vitiosum suppeditant, roborent.

Ad hanc enim classem pertinent proculdubio, & ab alterantibus hisce parum discrepant confortantia ac roborantia dicta. Quid verò in genere Medici appellant roboran

roborantia, lib. 5. *Institut. cap. 4.* dictum, agitque de roborantibus Lud. Mercatus, in fine lib. secundi de re-  
cto presidiorum usu. Cum autem in febribus Medici ro-  
borantia & confortantia nominant, præcipue ea intel-  
ligere videntur, quæ cor inprimis & hepar roborant,  
caloremque nativum & spiritus confortant, & vires  
reficiunt. In quem finem eliguntur plerumque talia,  
quæ & sapore delectant & reficiunt. Qualia sunt ma-  
nus Christi perlata, morsuli de succo & corticibus ci-  
tri, rotulæ de succo ribium vel berberorum, diamargari-  
ti frigidi, diatrion santalon, diarrhodon, conserua ro-  
sar. violar. & similia, quæ ab alterantibus antea propo-  
sitis parum differunt: atque ita roborantia hæc nihil  
aliud esse videntur, quam alterantia appropriata.

## CAPVT VIII.

## De Sudoriferis &amp; urinam cientibus.

Sudorifera.

Cum Natura materiam, febris causam, & in con-  
tinuis in declinatione vniuersali, & in intermit-  
tentibus in particulari declinatione sæpius per sudo-  
rem expellere soleat, & vix vlla febris perfecte sine su-  
dore curetur aut cesset: merito Medicus naturam imi-  
tatur, & ipse quoque medicamenta sudorifera præ-  
scribit, quibus proxima febris causa tollatur. Anti-  
qui quomodo id præstiterint, patet ex 11. *method. med.*  
*cap. 9.* Vbi Galenus hæc habet: *Sanè totum corpus, prius-*  
*quam id euacuaueris, rarefacere non expedit: ubi vacua-*  
*rum est, utique licebit medicamento aliquo, cui calor re-*  
*pidus insit, rarefacias, cuiusmodi est, quod ex chama-*  
*melo conficitur. In hoc tempore si vinum quoque aquosum*  
*bibatur, id omnes vacuationes promouerit. Idem facit &*  
*temperatum aqua dulcis lauacrum. Cæterum ubi magni-*  
*tudo febris obstat, nec vino utendum est, nec lauacro, nec*  
*is qua habitum rarefaciunt inunctionibus, sed aqua fri-*  
*gida potio in his est aptissima; nisi tamen quid eorum, qua*  
*in synochâ sine putredine dicta sunt, hanc quoque probi-*  
*beat.* Ex quibus patet, duobus modis Antiquos sudo-  
res concitasse, externis & internis medicamentis. Ex-  
trâ quæ adhibebantur, talia erant, quæ temperatâ ca-  
liditate aperiente & leniter trahente humores ad exte-  
riora proliciunt. Id quod vnctione cum oleo chamæ-  
melino, tum fomentatione ex eadem aquâ calidâ cum  
spongiis, vel lineis pannis eâ madidis læpius dorso &  
pectori appositis fiebat.

Verum balneorum antiquis vsitata ratio, tum etiam  
illæ frictiones hodie ferè in vsu non sunt: & sæpius  
magnitudo febris obstat, vt commodè adhiberi non  
possint.

Ergo hodie internis sæpe vtimur, quæ humores at-  
tenuando & liquando, eos ad ambitum corporis pro-  
pellunt. In quem finem adhibentur; cardui benedi-  
cti puluis, aqua, syrupus, extractum, sal, fumaria,  
scabiosa, tormentilla, buglossum, centaurium minus,  
Zedoaria, sal absinthij, C. C. rob sambuci, imò, nisi  
calor obstat, theriaca & mithridatium. Antiqui in con-  
tinuis febribus, iis qui frigida assueti erant, sanæque  
viscera habebant, sine obstructione & aliis caulis,  
quæ aquæ frigida potum prohibent, apparentibus  
signis coctionis, siti urgente, aquam frigidam copio-  
se bibendam dabant, quæ nisi vomitu aut per aluum  
reiciatur, sudores mouere solet, si æger stragulis be-  
ne cooperiatur. Adhibentur autem sudorifera post co-  
ctionem humorum, & reliquis præmissis euacuatio-  
nibus. Nisi enim corpus antea purgatum sit, metuen-  
dum, ne, materiâ agitatâ, obstructiones augeantur.  
Inprimis verò an crisis aliqua & qualis immineat, con-  
siderandum. Nam si per alui fluxum, aut vomitum,  
aut hæmorrhagiam narium febrem iudicandam spere-  
mus; si sudorifera exhiberentur, Natura in instituto  
& motu suo impediretur. Etsi verò crisis aliqua præ-

cesserit; tamen non inutile fuerit, sudorifera exhibe-  
re. Vix enim febris aliqua integrè sine sudore finitur;  
& nemo febricitantium perfectam sanationem sibi fa-  
cilè polliceatur, qui sudare non potest. Hoc de sudo-  
riferis obseruandum, vt sufficientia sint, & materiam  
non saltem agitent, sed etiam e corpore expellant.  
Nam nisi sudent ægri post sumpta medicamenta sudo-  
rifera plerumque vehementius postea febricitant. Dein-  
de vt non semel saltem, sed quoties opus, repetantur.  
Vnica enim sudatio totam materiam semper exhauri-  
re non potest, sed si in eâ subsistatur, agitur potius  
materia, quam vt perfectè euacuetur. Et natura per  
repetita sudorifera est assuefacienda, vt & ipsa sponte  
& semper, quod excernendum est, excernat. Vnde si  
sudorifera non rectè exhibeantur, sæpe accidit, vt  
febres, quæ antea simplices erant, duplices red-  
dantur.

Tertiò in electione sudoriferorum delectus aliquis  
adhibeatur, ne in febribus, præcipue ubi calor magnus  
adest, & nulla malignitas, ea adhibeantur, quæ calidio-  
ra sunt & *φλογικά*.

Obseruandum quoque tempus particulare exhiben-  
di sudorifera. Eo enim tempore commodissimè exhi-  
bentur, quando materia est mobilis, & ipsa natura  
excretionem tentat. Ideoque sudores copiosi, vel sta-  
tim ante paroxysmum, vel in fine accessionis febrem  
rectissime tollunt.

Vnum hæc monendum cenfeo, vulgus sæpe, quam-  
primùm paroxysmum aliquem febrilem ingruere sen-  
tiunt, mox sudoriferis vt, ex carduo benedicto, rob  
sambuci, aq. zedoaria, theriaca, &c. quod nec, Medi-  
ci quidam improbant cum experientia testetur, ingruen-  
tes febres hoc modo nonnunquam præcaueri. Cuius  
rei ratio si queratur, causa illa mihi esse videtur, quòd  
inquinamentum illud, seu *μίασμα*, aut quomodocun-  
que appellare libet, quod in humoribus putredinem  
& corruptionem instar fermenti excitare incipit, hoc  
modo statim discutitur & dissipatur, corpusque venti-  
latur: quod si in corpore relinqueretur, indices pro-  
culdubio maiorem putredinem excitaret. Præterea su-  
dorifera corpus reddunt transpirabile & ad sudores dis-  
ponunt.

In omnibus tamen corporibus tutò non adhiberi,  
& non nisi in principio vsurpari rectè puto. Nam si  
humorum vitiorum magna adsit in corpore copia,  
vel putredo & humorum corruptio iam aliquòd vsque  
progressa sit, vix sudorifera aliquid proficiunt; nisi,  
quod Rulandum in centuriis facere videmus; fortio-  
ribus sudoriferis aliquoties continuatis materiam dis-  
cutere animus sit.

Interim vrile & necessarium est, toto morbi tempo-  
re, ea medicamenta exhibere, quæ corpus ad sudores  
disponunt, liberamque corpori transpirationem præ-  
stant: cum, vt suprâ. *cap. 1. huius libri*, dictum, *ἀδυναμία*  
proxima febris causa constituenda videatur. Et cum in  
omni febre, exceptâ hecticâ, plurimùm sudores pro-  
sint, *ἀδυναμία* verò multò plus euacuetur & diffletur  
quàm sudore: quantum libera & copiosa *διαπνοή* &  
*ἀδυναμία* possint, facile colligere est. Et obseruare  
licet quotidie, in febribus minùs periculose decumbe-  
re, quibus cutis est humida; quibus verò arida & sicca  
est, vix conualescere: Et quibus corpus non imminui-  
tur, rarò euadere. Cuius rei causa nulla est alia, quàm  
facilis aut difficilis, magna aut parua *διαπνοή* vel *ἀδυνα-*  
*μία*.

Cum ergo *διαπνοή* & *ἀδυναμία* tanti momenti  
sint in febribus: *διαπνοή* verò seu transpirationis ra-  
tionem diligentissimè & magno labore obseruauerit  
Sanctorius, aliquot aphorismos ex libello eius de Sta-  
ticâ Medicinâ hic apponere libet; qui etiam ad ea, quæ  
suprà, *cap. 1. libri huius*, dicta sunt, rectius intelligen-  
da facient. Ita autem ille: *Perspiratio insensibilis solet*  
*esse longè plenior, quàm omnes sensibiles simul vnita.*  
sect. 1.

De Transpi-  
ratione aphorif-  
mi Sanctory.

Sudorifera.

sect. 1. aph. 4. Si cibus & potus unius diei sit ponderis octo librarum, transpiratio insensibilis ascendere solet ad quinque libras circiter. sect. 1. aph. 6. Si corporis pondus plus solito augeri incipiat, sine maiori cibi vel potus additione, vel sensibilibus excrementorum retentione, facta est adiapneustia, sect. 1. aph. 9. Si ex staticis deprehendatur, impeditam esse perspirationem, diebus sequentibus, vel succedet plenior perspiratio, vel aliqua euacuatio sensibilis plenior, vel cachexia vestigium, vel febris. sect. 1. aph. 11. Perspiratio, qua salubriter aufert à corpore multum, idque inutile pondus, non est qua cum sudore fit, sed ille habitus invisibilis, qualis hyeme vno die naturali ad quinquaginta uncias, & ultra exhalare potest. sect. 1. aph. 21. Corpus ob externa errata non labitur in morbum, nisi antea aliquod viscus habeas preparatum: preparatio hac cognoscitur ex solito maiori, seu minori pondere, non sine aliquâ precedenti molestiâ acquisito. sect. 1. 39. Natura dum in perspirandi officio est impedita, incipit statim in multis deficere. sect. 1. aph. 40. Dum caput dolore gravatur, statim corpus incipit minus perspirare, & ponderosius reddi. sect. 1. aph. 41. Prima morborum femina tutius cognoscuntur ex alteratione insolita perspirationis, quam ex laesis officiis. sect. 1. aph. 42. Si ex ponderatione videris, consuetum perspirabile retineri, & in sudorem, vel lotium post aliquot dies non facessere, inde cognosces, reventum prænuntiare futuram putredinem. sect. 1. aph. 43. Si perspirabile neque à natura, neque à calore febrili resolveretur corpus illico ad malignam febrem prepararetur. sect. 1. aph. 46. Febricitantes in petus aquæ incidunt, si à Medico imperito medicamentis importunè exhibitis illorum perspiratio diuertatur, ac si ab erratis agrotantium. sect. 1. aphor. 47. Magis occulta, & insensibilis perspiratio nos subleuat, quam omnes sensibiles simul unita. A somno enim ante excretionem sensibilibus excrementorum quisque sentit se leniorem, quia reuera factus est lenior solito tribus libris circiter. sect. 1. aph. 58. Spatio unius noctis sexdecim uncia lotij plus minusve, quatuor coëctorum excrementorum per alium, quadraginta & ultra per occultam perspirationem euacuari ut plurimum solent: sect. 1. aph. 59. Pluribus unicâ die naturali per insensibilem perspirationem tantum euacuatur, quantum per alium quindecim dierum cursu. sect. 1. aph. 60. Si aëri æstivo frigui superueniet, illâ die, suppositâ eadem bibendi libertate, tertiâ partem circiter perspirationis exire prohibet, qua nisi fiat sensibilis, facile ad putredinem, vel ad cachexiâ disponit. sect. 2. aphor. 9. Ob aërem frigidum superuenientem calori, vestibus denudatus, minus duabus libris circiter diei cursu perspirare solet, nullâ ab ipso animaduersâ, molestiâ. sect. 2. aph. 11. Æstate corpora temperata sunt minoris pōderis, quam hyeme, tribus libris circiter. sect. 2. aph. 23. Æstivo calori superueniente frigore eodem die libra circiter excrementorum insensibilium magna ex parte diffusiari prohibetur. sect. 2. aph. 29. Ab æquinoctio autumnali ad solstitium hyemale quolibet die minus libram circiter perspiramus; inde usque ad æquinoctium vernale incipimus liberius perspirare. sect. 2. aph. 41. Perspirabile retentum, ut acie, febres & erysipelata; ut copiosum apostemata, destillationes, vel cachexiam facit. sect. 2. aphor. 51. Stomachus cibo referius si inter dormiendum absoluat primam coctionem, illius noctis perspiratio magnâ ex parte ascendit ad quadraginta uncias; si non absoluat, ad octodecim circiter. sect. 3. aphor. 1. Cibi multum nutrientes, exceptâ carne vernecinâ, à cenâ ad prandium non solent perspirare ultra octodecim uncias. sect. 3. aphor. 4. Cibi copiosi, sed tenuis nutrimenti, noctis spatio in plurimis ultra quadraginta uncias perspirare possunt. sect. 3. aph. 5. Caro vernecina facile coquitur, & est vaporosa. Perspirat enim noctis spatio trientem libra magis, quam cetera solida edulia. sect. 3. aph. 8. Non solum incoctus cibus, ut quantum reddis corpus ponderosius, sed etiam ut qualis; quatenus scilicet perspirationem impedit. sect. 3. aph. 17. Vfus carnis suilla, & boletorum malus, tum quia hac non perspirant, tum quia hac non per-

mittunt cetera edulia simul ingesta perspirare. sect. 3. aph. 22. Ex usu carnis suilla, & boletorum triente minus solito corpus magnâ ex parte perspirat. sect. 3. aph. 23. Melones adeo paucillum perspirant, ut quadrantem circiter auferant perspirationis consueta. sect. 3. aph. 24. Edulia apertissima perspirationi non corrumpuntur, imò post nocturnas vigilas hominem conseruant sine lassitudine & gravitate. sect. 3. aph. 59. Edulia non perspirantia obstructiōnes, corruptelas, lassitudines, mœsticias, & pondus efficere. sect. 3. aph. 60. In homine uscente moderato victu perspiratio nocturna aliquando ascendit ad tres libras; in utente plenissimo, stomacho præexistente vacuo & robusto, potest ascendere ad quinque libras. sect. 3. aph. 68. Dormiens septem horarum spatio occultè, salubriter, & sine violentiâ perspirare solet duplo magis quam vigilans. sect. 4. aph. 2. A somno nocturno corpus sentitur minoris pōderis, tum ob vires auctas, tum ob exhalationē saltem trium librarum circiter excrementorum. sect. 4. aph. 4. Somnus inquietus impedire solet trientem solita perspirationis. sect. 4. aph. 5. Duplo magis dormiens perspirat vigilante. Hinc illud famosum: Dua hora quietis in vigilante perinde iuuant, ac una somni. sect. 4. aph. 19. Perspirationem insensibilem cursu septem horarum in dormiente inueni, in multis esse quadraginta unciarum circiter, in vigilante viginti. sect. 4. aphor. 20. Somno solito breuiore semper aliquid perspirationis prohibetur, quod nisi sequentibus diebus plenior perspiratione compensetur, imminet febris periculum. sect. 4. aphor. 31.

Ex quibus aphorismis, quos cuilibet tamen perpendendos relinquimus, cum alia multa, tum hoc colligi potest; Transpirationis insufficientis seu *adynamia*; causam (licet & aliâ interdum accedere possint) in febribus præcipuam esse ipsius humoris cruditatem, à quo vapores ad transpirandū inepti eleuantur. Si enim quidam sunt cibi, ut caro suilla, boleti, melones, vnae & ficus recentes, qui non solum ipsi non rectè transpirant, sed ut alij cibi parum perspirent faciunt; cur non erudi humores idem præstare possint? Etenim in omni cruditate est defectus *πνευματώσεως*, de quâ etiam in libro de Chymic. cum Ar. & Gal. consensu & dis. dictum. Alimenta enim assumpta coctione spiritua sunt quasi, ut sic dicam, adeo quidem, ut licet multum salis fixi in cibus assumatur, in corpore secundum naturam sese habente minimum salis fixi reperiatur. Et fermentatione cibus ac potus, ut spirituosior fiat & facilius concoquatur, præparatur: qui autem non fermentatus est difficilius concoquitur; & cibus incoctus, non solum ut quantus, sed & ut qualis transpirationem impedit, ut modò ex Sanct. aphor. 7. sect. 3. dictum.

Nonnunquam & per vrinam euacuantia medicamentâ adhibere licet. Nam & illa partem materiæ per vrinam deducunt, & ad sudorem eandem quasi præparant, Est autem quædam Diureticorum differentia, ut lib. 5. Instis. part. 1. cap. 13. & ibidem part. 2. f. 1. capite 13. dictum. Frigida quæ sunt, etiam maturius vsurpari possunt; cum vim habeant alterandi intemperiem calidam & humorum & partium, partemque humorum ad vias vrinæ ducant. Reliqua diuretica propriè sic dicta, in primis fortia, non nisi concoctâ materiâ & ubi calor febrilis mitigatus est, conueniunt. Ex iis tamen quæ sunt moderatiora, ut agrimonia, capillus ♀, betonica, asparagus, &c. si corpus crassis humoribus abundat, viæque vrinæ obstructæ sint, ad incidendum, & ut crassi humores à viis vrinæ amoueantur, semper comode adhiberi possunt. Exemplum diurectici, quod in omnibus ferè febribus locum habet; hoc esto.

℞. Radic. petroselini Vnc. j. capill. ♀. virid. si habeatur M. s. ceterach. p. j. Infundantur in Aq. hordei lb. jß.

Colentur. Cum colaturâ clarâ. F. Emulsio, ex sem. melon. Vnc. ij Adde inleib. violar. Vnc. j. Misc.

Ad medicamenta, quæ causam febris tollunt, pertinent & medicamenta quædam, quæ extrâ corpori, præcipuè

Vrinæ citia.

Externa medicamenta contra febris.



præcipuè regioni pulsus in carpo applicantur, qualia parantur ex telis araneorum cum vnguento populeo vel terebinthinâ, apio vel rutâ minutim contusâ, capâ theriaca repletâ, & sub cineribus coctâ, foliis burlæ pastoris cum sale & aceto tritis; fuliginè è furno cum saluâ, allio, vel capis mixtâ, ranunculi foliis, atque vesicatoriis, quæ non solum in tertianis & quartanis intermittentibus, sed & continuis malignis nonnunquam non malo successu applicantur; vt suo loco in specie dicitur. Etsi de vi, quâ iuuent, non satis constet. Credibile est, talia medicamenta seu acrimoniâ suâ naturam ad excretionem stimulare, seu occultâ vi & proprietate inquinamentum illud, quod humores corrumpit, extrahere: sicut & natura sponte nonnunquam simile quid tentat, dum vlcusculis circa labia & nares erumpentibus febres desinunt.

## CAPVT IX.

## De diata in febribus putridis.

Diata in febribus necessaria.

Cum à tribus classibus Auxiliorum materiæ petantur; Chirurgiâ, Pharmaciâ, & Dietâ; & præcedentibus capitibus, quâ ratione per venæ sectionem & medicamenta febre laborantibus succurri possit, dictum sit: proximum iam est, vt & dietam febricitantibus præscribamur, quæ nisi rectè obseruatur, aliis auxiliis parum proficitur: cum nullum efficax possit esse remedium, cui victus ratio contraria resistit.

Diata quid.

Duo autem mox in principio notanda sunt. Primum per dietam non solum cibum & potum, sed & reliquas res non naturales dictas, Aërem scilicet, Somnum & Vigiliâs, Motum & Quietem, Inanitionem & Repletionem, atque Animi pathemata intelligi: vt lib. 5. inst. part. 2. sect. 3. cap. 2. dictum.

Alimentum duplex.

Secundò circa cibum & potum hoc obseruandum, dupliciter alimentum considerari: aliàs vt tantum alimentum; quo respectu nullum qualitarum excessum habet, sed solum vim nutriendi obtinet: aliàs vt cibum medicamentoſum; quo respectu, præter nutriendi vim, aliquem in qualitatibus excessum habet, per quem morbo & causæ morbificæ aduerſatur. Cum autem pauca dentur alimenta, quæ planè temperata sint; & ægris illa, quæ per potum & cibum fit medicatio longè gravior sit, quàm quæ per sola medicamenta instituitur: merito etiam victu, utroque modo considerato, vtendum est.

Victus quid indicet.

Quid autem victum indicet, in Inst. lib. 5. part. 2. sect. 3. cap. 2. dictum est, nimirum vt Galenus, 1. de viſt. rat. in ac. 1. 44. habet, ob facultatis vitalis custodiam & sani edunt & bibunt, & propter eandem ægri ad potum & cibum accedunt; idque dum potum & cibum sumimus, agimus, vt vires conseruemus & instauremus. Sicut tamen ea, quæ à morbo vel causâ morbi indicantur, ob vires non semper exequi licet, sed vires ea vel permittunt vel prohibent: ita & causa morbi in primis victum permittit vel prohibet. Nam cum cibus offertur, natura occupatur à coctione & euacuatione materiæ ad coctionem cibi. Ergo cum maxime naturæ in causæ morbificæ coctione vel euacuatione laborandum est: eo tempore natura ab illo opere ad aliam actionem auocanda non est. Et partes intemperie febrili debilitatæ cibum tam feliciter, ac dum sanæ erant, concoquere non possunt. Iraque nunquam plus cibi dandum, quàm quantum virtus tum debilis & in causâ febrili vincendâ occupata, concoquere possit. Hinc illi aphorismi Hippocratis, 1. aph. 8. Quando vis morbi est maxima, tenuissimo victu vtendum. Et 1. aph. 11. in ipsis paroxysmis cibum adimere oportet: nam præbere, noxium. Et cum per circuitum redeunt morbi, in ipsis ac-  
tensionibus abstinendum.

Cibum quid prohibeat.

Quæ in cibo in febribus obseruanda.

In cibo verò in febribus obseruando quatuor spectari debent. Forma ipsius victus, quæritas, qualitas, & tēpus.

Dan. Sennert Tom. II.

Victus autem seu dietæ Forma triplex est; crassa, mediocris, tenuis. Cum enim plus substantiæ corporis apponitur, quàm quotidie absumitur, virisque non solum conseruare, sed & augere studemus: crassus victus appellatur. Cum verò tantum substantiæ, quantum deperditum est, apponere conamur, victus mediocris vocatur. Cum minus corpori apponitur, quàm deperditum est, atque ita vires cōseruantur, non nihil tamen imminuat, victus tenuis & minuens nominatur: non quod nutrimentum ex se vires imminuat, sed quia non tantum corpus reficit, quantum opus erat, pro eo, quod amissum erat, refaciendo.

victus forma triplex. Crassus.

Mediocris.

Tenuis.

Crassa seu *ἀσπα* rursus alia simpliciter talis est, quam antiqui in febricitantibus per integram seu totam ptisanam hordeaceam instituebant, eamque copiam maiorem exhibitam: alia paulò crassior, quæ pisces & oua concedebat: alia *ἀσποτόμη*, quæ carnes pullo- rum & castratorum admittebat.

Crassa Diata triplex.

Tenuis quoque alia *ἀπλῶς* talis est, quæ per ptisanam integram fiebat, exiguâ quantitate exhibitam: alia *ἀσπρω*, quæ per chylum seu cremorem ptisanæ; alia tenuissima simpliciter, quæ fiebat per aquam mul- sam, alia extremè tenuissima Dieta erat, quæ constabat abstinentiâ ab omni cibo.

Tenuis Diata quatuorplex.

Verum hæc cibandi ratio Græcis & Italis præscrita, Septentrionalibus populis edacioribus minùs conuenit: imò nec hac ætate Italis conuenire Itali censent, quia scilicet pleniori victui homines, quàm olim, assueti sunt. Vnde hodie licet loco inediæ integræ melicrato vel iusculo aliquo, vel quod æquipolleat his, vti; loco ptisanæ colatæ, integrâ ptisanâ, imò loco ptisanæ piscibus, ouis, carnibus vti licet.

Quâ in re tamen rursus Nationum & Naturarum diuersitas attendenda. Nam Septentrionalibus populis omnibus non eadem est victus ratio, sed alij aliis voraciores sunt. Et in eadem regione alij pleniori, alij tenuiori victui adſueuerunt. Ideoque iis, qui pleniori victu, dum sani essent, vti solebant, etiam ægris victus plenior paulò, quàm aliis, qui tenuiore dietâ vsi sunt, concedi potest.

Antequam autem quibus febribus, quæ victus ratio competat, explicemus; in genere quædam de alimentorum & potulentorum in febribus vtilium materiâ dicendum est: Et vt à ptisanâ hordeaceâ, decantatissimo illo febricitantium cibo, incipiamus, parabatur illa antiquis ex hordeo selectissimo, quod, vt Galenus, libro de alim. fac. cap. 9. docet, manibus aut panno aspero fricabant, donec cortex exterior seu gluma auferretur: nisi quis ptisanam magis abstergentem conficere velit, tunc enim vtilius est, hordeum ipsum integrum coquere. Pilis hodie idem præstatur, quod antiqui manibus fricando efficiebant. Ptisanam hoc modo excorticatam in s. q. aquæ coquebant, donec ius pulticulæ tenuis speciem repræſentaret.

Ptisana quid.

Ptisanam ita præparatam & coctam duplici modo ægris offerebant. Quæ tota cocta offerebatur, eam simpliciter ptisanam, vel ptisanam integram, vel ptisanam non colatam appellabant. Si verò succus saltem percolatus exhibebatur, ptisanam colatam vel succum aut cremorem ptisanæ nominabant.

Ptisana hoc modo parata valde in febribus acutis commendatur. Ptisana, inquit Hippocrates, de viſt. rat. in ac. comm. 1. r. 18. Frumentaceis edulis rectè præferri mihi videtur in morbis acutis, cōſque, qui eam prætulerunt, laudo. Nam viscositas eius levis, continua, in- cunda, lubrica & mediocriter humens; sitim minimè in- fert; ea, quæ ablutione indigent, probè abluat, non adstringit, non mole turbat, neque in ventre intumescit, nam inter coquendum, quò ad maximum potuit, intumuit. Et addit Galenus, in comm. Quacunque ad morborum acutorum sanationem insunt bona, nulli alteri cibo ita inesse comperies. Atque id prolixè probat.

Contra Pti- sana vsum valde

Ex quibus manifestum euadit, antiquis quidem valde

E

usum ratio-  
nis Manardi.

valde familiarem & laudatum in febris, præsertim acutis, fuisse cibum ptisanam. An verò hodie conveniat, in dubium vocavit Manardus, l. epist. 25. ob has rationes: Primò, inquit, antiqui in integrâ valetudine ptisanâ vti consueverant, vnde & in morbis illâ commodius utebantur. Contrâ nostro tempore cum apud sanos nullus illius usus sit, nec ægris facillè offerenda. Secundò, Ptisanam alimentum insuave & nauseabundum esse dicit, & propterea ex consilio Hippoc. 2. aph. 38. ab eâ abstinendum. Tertiò, Antiqui in acutis saltem morbis adhibebant: at apud nos rarò dantur acuti morbi, qui diem decimum quartum non transeant. Quartò, ait hodie saltem ad brutorum, non hominum eam hordeum coli, & propterea non habere eas conditiones, quas Galen. in eo requirit, è quo ptisana parari debeat. Quintò, putat nullum inveniri hodie, qui ptisanam, vt antiqui solebant, præparare sciat. Sextò, tandem addit, tanto tempore indigere illius præparationem, vt occasio nutriendi ægrum, quæ in acutis est præceptum, facillè præterire possit, antequam ptisana pareatur.

Solutio  
carnum.

Verùm istæ rationes tanto Medico dignæ non sunt. Primò quidem quid apud Italos vel alias nationes fiat, non curiose inquiri: Itali tamen Medici alij referunt, ptisanâ etiam sanos, præsertim in ætate, familiariter vti & delectari. Apud Germanos certè satis frequens edulium est. Et posito, quòd sani eâ non utantur: ad insueta tamen progressus, præsertim in morbis, non est prohibitus. Deinde insuavem & nauseabundam esse, concedi non potest; nisi forsân ægris quibuscumque, qui omnes alios quoque suauissimos & delicatissimos cibos auerantur. Tertiò non tantum in acutissimis morbis, sed etiam in aliis acutis adhibere licet, qui apud nos nulli non sunt. Quartò magnâ curâ hodie hordeum, præsertim in Germaniâ ad cerevisiam coquendam, colitur. Quintò nec ratio eius præparandi hodie ignota. Imò dixerim, diligentius ac maiori curâ atque artificio hodie in Germaniâ in nonnullis locis parari, quàm olim antiqui solebant: quæ, in primis integra, hodie multis in frequenti vñ est, atque integra per se, tum cum iure carnis bubulæ vel gallinæ, gratum alimentum præbet. Sextò, & hordeum glutinis & cortice exteriori jam liberatum quouis tempore in promptu hodie habetur, vt, quando lubet, coqui possit.

Ptisana  
cremor.

Ptisana colatam seu cremorem hordei quod attinet, fateor non ita vt ptisanam integram, nostris familiarem esse; sed cremor ex auenâ excorticatâ in satis frequenti vñ apud Germanos est. Ad eius modum si quis ptisanam hordeaceam paret, cremorem seu ptisanam colatam hordei habebit, quam ita simpliciter sumere licet, vel etiam cum modico salis & butyro condire, & aliquid quoque panis albi, vt in auenatis fieri solet, addere; cum & antiqui parum olei & salis ei admiscerint.

Hordeata tamen, quæ hodie Itali & Galli parant ex succo ptisanæ percolato, non multum à cremore ptisanæ antiquo differunt, nisi quòd saccharum addere solent. Plura qui de ptisanâ legere cupit, consulat Hippocrat. de vict. rat. in ac. & Galenum in comm. Eundem 1. de alim. fac. c. 9. tum peculiarem libellum, qui Galeno ascribitur, & inter recentiores Cardanum, de tuend. san. lib. 2. c. 7. & Iulium Alexandrinum, salubrium lib. 8. cap. 7.

Ptisana etsi inter alios cibos primas obtineat: tamen cum & ægrorum palato inserviendum sit nonnunquam, & varietas delectet; alij quoque cibi admitti possunt. In vñ frequenti apud Italos est Panatella dictum edulium, & apud nos etiam panis cum aquâ coctus & butyro conditus; cui sorbitioni & ouum interdum additur, Milcerur & panis cum iure pulli & gallinæ vel carnis bubulæ. Est & gratus, ac paulò plenioris alimentum cibus, insculum carnis bubulæ vel gallinæ vel

caponis, in quo ouum dissolutum & coctum sit. Fiunt & ex cerevisiâ, quæ si tenuior sit, convenientior est, cum pane inicula, quæ sale & butyro condiuntur. Possunt & amygdalata parari, quibus refrigerationis gratiâ semina 4. fig. maiora excorticata addi possunt, & somni causâ, semen papauer. albi & lactucæ. Commodius autem est, si in aquâ, quâ amygdalata parantur, aliquid furfuris, hordei, vel tritici, aut radices petroselinæ vel fœniculi ebullierit.

Fructus an febricitantibus conueniant, non adeò planum videtur. Auicenn. lib. 4. rr. 2. c. 7. simpliciter omnes fructus prohibere videtur, cum scribit: omnes fructus nocere febricitantibus, ebullitione suâ & corruptione in stomacho. Et Galenus, lib. de cib. boni & mali succi c. 8. nullum fructum ferè esse boni succi scribit; fugaces verò planè malum succum habere, adeò vt nescitò excernantur, vel si in ventriculo corruptantur, generent succum veneno non absimilem. Alij contrâ plurimos fructus, præcipuè refrigerantes, vt angurias, melones & similes indulgent. Verùm sciendum, si qui fructus conceduntur, potiùs concedi vt medicamentum, quàm vt alimentum. Et negari non potest, plerisque facillè corrumpi, in primis in ventriculo calore febrili malè affecto, atque inde vitiosos humores generari, qui febrem valde augent. Et quòd fructus aliis corruptioni magis obnoxii est, eò faciliùs in febris corruptione transpirant, & transpirationem impediunt, vt capite præcedente, de melonibus dictum. Atque ideò si quid omnino ægris delicatis indulgendum, permittendum potiùs, vt degustent talia, vt est apud Galenum, 1. ad Glauc. cap. 9. quàm vt liberaliùs comedant. Aliàs vt ibidem, Galenus habet, si ægri non sint delicati, iis talis victus instituendus est, qualè præscripsit Hippocrates, ex succo scilicet ptisanæ vsque ad crisin, aut certè, qui huic non sit absimilis. Acida tamen faciliùs ad sitim nimiam & calorem restringendum concedi possunt, vt sunt mala aut succus granatorum, citri, limonum, berber. ribes, cerasa: quæ tamè omnia potiùs sunt medicamenta, quàm alimenta.

Dubitarur & de piscibus, An in febris conueniant. Nonnulli eos, vt pote qui facillè putrescant, planè reiiciunt; alij admittunt. Sed etiam febrium & pucium distinctione hic opus est. Commodius enim exhibentur pisces in febris biliosis. ij tamen semper eligendi sunt, qui melius alimentum præbent, quales sunt lucij, funduli, saxatiles & alij bonæ notæ pisces.

Oua quoque nonnulli in febris putridis prohibent; scribitque Herc. Saxonia, piaculum esse Venetiis, ova febricitantibus præbere. Verùm simpliciter febricitantibus prohiberi non possunt. Facilis enim coctionis sunt, & bonum dant alimentum; modò sint recentia & rectè cocta. Et licet antiqui in febris paulò acutioribus plerumque ptisanâ aut eius succo contenti fuerint vsque ad crisin: tamen nostri homines tenui illi victui minùs assueti ova vel illorum vitellos facillè tolerant, nec ea febrim quidquam obesse possunt, neque etiam naturam à coctione auocant, si in minori copiâ & non alieno tempore exhibeantur. Hoc tamen attendendum, ne ventriculus & hepar vitiosis, & præcipuè biliosis humoribus referta sint; cum facillè corruptantur.

Carnes etiam aliqui reiiciunt, eò quod facillè putrescant, & obseruatum sit, febricitantes, qui in Cretâ & aliis Græciæ locis carnes comedunt, mori. Verùm etiam si in Græcia, ob calorem illum insignem, & quia homines tenuem victum ibi facillè tolerant, ægri carnes vix sine damno edunt in febris: non tamen ideò populis Septentrionalibus, huic victui assuetis, carnes subtrahendæ sunt. Ex carnibus autem conueniunt capi, gallinæ, pulli, perdices, hædi, vituli: quæ coctæ cum succo malorum granatorum, citri, limonum condiri possunt. Nonnunquam ex carne capi, gallinarum vel vituli sine aquâ, in vase duplici, vt vocant,

An pisces in  
febris con-  
ueniant.

Oua an fe-  
bricitantibus  
conueniant.

Carnes an fe-  
bricitantibus  
concedenda.

vocant, coctâ, contusâ, & colatâ, ius conficitur, quod vulgò consummatum vocant, quod insignes vires alendi habet, & minore labore in ventriculo coquitur. Verùm cùm victum pleniorē suppedient talia, ubi tenuiore opus est, non satis commodè exhibentur, nisi forsan minore copiâ. Nonnulli horum decoctorum loco aquasè carnibus stillatitiâs exhibent. Verùm sine ratione & commodo id fieri docuimus, lib. 5. *Inst. part. 3. sect. 3. cap. 5.*

Qua victus ratio quibus febribus conveniat.

Cùm has jam de materiâ alimentorum diætæ formas subiecerimus, quæ victûs ratio & forma, quibus febribus conveniat, explicandum. Victûs ratio conveniens invenitur ex consideratione virium, quæ victu conferuandæ sunt, & collatione earundem cum causâ morbificâ, quæ eundem prohibet. Primò enim videndum quid cibi, virtus concoquere valeat. Nam ut quæ Galenus, 7. meth. med. cap. 6. scribit, huc transferamus, si alimentum ipsum se concoqueret, ac in partes digereret, præterea alendis partibus assimilaret, & quibus alimento plurimo opus est, adhæresceret, proculdubio is cibus dandus esset, quem vires requirunt. Verùm quoniam non aliud est, quod alimentum desiderat, aliud quod ipsum conficit, sed quod nutriendum est, ipsum sibi & alimentum attrahit, & mutat, & concoquit & assimilât: ad duo in cibo offerendo spectandum est, ipsam scilicet cibi naturam & vires corporis alendi. Deinde semper videndum, an vires plus possint ad cibum indicandum, quàm morbus ad prohibendum, vel contrâ. Quantò enim natura magis in causâ morbificâ oppugnandâ est occupata, tantò minus cibo oneranda. Quantò verò minus est occupata, tantò facilius cibum concoquit. Tantò autem magis natura occupatur in morbo debellando, quantò status est propior. Tantò verò minus est occupata, quantò est remotior.

In cibo exhibendo qua spectanda.

In statu tenuissimo videndum.

Hinc in ipso statu victu tenuissimo (respectu scilicet victûs totius morbi) est utendum. Et in morbis acutis tenuis victus requiritur, & quod morbus est acutior, eò tenuiore victu opus est; in febribus verò longis victu mediocri aut pleniorē utendum, & tantò pleniorē, quò morbus est diuturnior. Docuit hæc omnia Hippoc. 1. aphor. 8. scribens; *Quando morbus in vigore fuerit, tum vel tenuissimo victu vii necesse est.* Qui aphorismus in omnibus febribus, tam chronicis, quàm acutis locum habet. Et si enim in diuturnis febribus pleniorē victu utendum sit: tamen in vigore de eo aliquid subtrahendum. Tenuissimūque victum hîc appellat non simpliciter, sed præcedentium morbi temporum respectu, quibus paulò plus cibi fuit agro datum. Et, 1. aphor. 7. scribit: *Cum morbus peracutus est, statim extremos labores obinet, & extremè tenuissimo victu utendum.* Cùm verò non est, sed pleniorē victum exhibere licet, tantum de extremè tenuis victûs ratione remittendum, quantò morbus ipse ab extremo fuerit remotior. Qui ergo morbi statim, hoc est, primis tribus vel quatuor diebus sæuissima symptomata habent, in iis extremè tenuissimo victu utendum. Qui verò ad septimum diem perveniunt, iis simpliciter tenuissimus victus convenit. Quoniam enim, ut dictum, natura cum morbo pugnat, natura ab hoc opere ad cibi concoctionem auocanda non est. Deinde cùm status tempus in acutis febribus sit breue, in subiequente mox declinatione virium lapsus, quem victus, tenuior excitavit, faciliè reparari potest; cùm & morbus tum remittat, & pleniorē victu uti liceat. Qui verò morbi post septimum ad vigorem perveniunt, in his tenuissimo victu uti non oportet, sed paulò plenius ægrum alere licet; & quidem hac lege, ut quantò longius febris qualibet abest à vigore, tantò liberalius plenior cibus offeratur, quò æger usque ad statum perdurare possit. Itaque si morbus sit acutus simpliciter, & quidem duplici, qui scilicet die decimo quarto ad summum terminetur; in eo tenuis exquisitè victus convenit: si

non sit duplici, talis, sed ad vigesimum extendatur, tenuis simpliciter exiguâ quantitate dandus est. Si denique febris sit acuta ex decidentia, mediocrem cibum requirit. Docuit hoc Hippocrates, 1. aph. 10. *Quibus statim vigor futurus est, inquit, statim tenuiter nutrirî oportet. Quibus autem posterius: in ipso vigoris tempore & paulò ante ipsum de victu detrahendum, priorè verò tempore plenius nutriendū, ut sustinere æger queat.*

De virium verò robore Hippocrat. 1. aphor. 9. Si mul verò & coniecturam facere de agrotante oportet; virum sufficere tali diætâ possit usque ad morbi vigorem. Et nunquid ille desiturus prius sit, nec satis futurum ferenda illi diætâ, an futurum, ut morbus prius deficiat & obtundatur. Nam si vires cum morbo Medicus conferat, duo colliget, aut quòd vires cum morbo pari robore consistere possint usque ad statum, & tum in tenuissimo victu persistendum; aut quòd vires ægri ante vigorem morbi defecturæ sint; atque tum æger, ne succumbat, paulò liberalius nutriendus est per principium & incrementum, sensimque postea de cibo detrahendum, quo magis status morbi appropinquat. Atque hoc ex naturâ ægri, ætate & similibus cognoscitur. Nam si corpus sit calidum & siccum, & bile, præsertim circa ventriculum, abundet, tenuem diætâ aut inediam non feret. Faciliè enim talia corpora resolvuntur. De ætate Hipocrat. 1. aph. 13. scribit: *Jejunium senes ferunt faciliè; secundum hos, qui ætatem consistentem agunt; minus adolescentes, minimè omnium pueri, atque inter eos maxime, qui vinidiores sunt corpore.* Nam ut est in seq. aph. 14. *Qui crescunt, nativum calidum habent plurimum, atque copiosiore alimento indigent, & propterea abundè ipsis suppeditare oportet; alioquin corpus consumitur. In senibus verò calidi inest parum, & paucio propterea pabulo indigent; multo enim extinguuntur.*

Victus quomodo secundum vires moderandus.

Consuetudo quoque & vitæ institutum multum hîc potest. Qui enim pluribus alimentis assueti sunt, non faciliè paucioribus sunt contenti. Et contrâ qui paucioribus sunt assueti, faciliè jejunium perferunt. Ita qui laboribus & magnis exercitiis sunt dediti, non faciliè ferunt tenuem victum: contrâ qui vitam otiosam agunt, pauciorē victu sunt contenti. Et ut in summam hæc contrahamus: quò vires sunt robustiores, eò plenior victus est exhibendus, ille scilicet quem Medici inclinantem ad plenum appellant. Qualis sit ex iusculo & pane & modicâ carne. Vires enim & calor fortis plus alimenti concoquere possunt. Virtuti autem debili minus alimenti exhibendum. Virtus enim debilis non potest multum cibi concoquere.

Distinguendum tamen hîc est, An vires sint debiles ex inanitione, vel suffocatione aut morbi vehementia. Etenim si virtus sit debilis ex inanitione seu copiosâ aliqua evacuatione, convenit victus ad pleniorē accedens, & plus hîc ad vires respiciendum, quàm ad causam febrilem. Nam si spirituum, humorum, vel etiam solidarum corporis partium aliquando magnus est defectus, plus alimenti præbere oportet, ut spiritûs, humores, & ipsæ etiam solidæ corporis partes instaurantur. Quando verò nullus in spiritibus, humoribus, & solidis partibus est defectus, vel etiam abundantia, eorundem adest, virisque debiles sunt ex suffocatione: tenui victu opus est duplici de causâ. Primò, ut plenitudo imminuatur. Secundò, ut natura coctioni humorum rectius incumbere possit.

Non autem solum ipsam Victûs formam considerare oportet, sed & quantitatem seu dosin. Siue enim crassius, siue tenuis, siue medius victus exhibendus sit, potest nunc maximâ, nunc minimâ, nunc mediâ copiâ exhiberi. Dosis verò ex virtute & causâ morbificâ inter se collatis colligitur. Quamvis enim virtus, quantò est robustior, maiorem copiam nutrimenti indicet; tanto verò minorem, quò est imbecillior: attramen non sola virtutis & caloris nativi abundantia ac robur consideranda, sed cum ipso morbo aut potius causâ morbi

Quantitas cibi exhibendi.



morbificā conferenda. Causa enim febrilis victus quantitatem minuendam indicat. Vt enim se habet alimentum crassum ad tenue: ita maior quantitas ad minorem, & maior quantitas difficilius à natura coquitur; facilius minor. Itaque magna & mediocri cibi quantitas à robusta vel etiam mediocri virtute indicatur; à parua autem causā febrilis vi permittitur. Parua verò quantitas à magnā debilitate praescribitur. Ergo cum in statu morbi pugna naturæ & morbi sit maxima, & natura in vincendā causā morbificā sit maximè occupata: minima quantitas cibi, quæ febrī conuenit, tum est exhibenda. In principio autem quia nondum in eā valde occupata est, ideo victum, qui febrī competit, tum in maximā quantitate exhibere licet; in augmento autem, quia natura, jam pugnam aggreditur, aliquid detrahendum.

Qualitatem cibi quod attinet, consideratur cibus vel quatenus cibus vel quatenus cibus medicinalis. Si quatenus cibus, consideretur, tantum nutritionis gratiā & ad vires conseruandas exhibetur. Ij itaque cibi sunt tum eligendi, qui coctu sunt faciles, boni succi, facili distributionis & minimè excrementitij: quales sunt iura ex carnibus gallinarum & carne bubulā, ouā, panis triticeus bene fermentatus & coctus, carnes pullorum, gallinarum, hœdina, vitulina, perdicum, Nec veruecina improbanda videtur: de quā Sanctorius, *Secl. 3. Stat. Medic. aph. 8.* scribit: *Caro veruecina facile coquitur, & est vaporosa. Perspirat enim noctis spatio trientem libra magis, quam cetera edulia.* Si autem cibus consideretur, vt medicinalis, qualis est praisana, multa, vel respectu febris, vel causæ febrilis consideratur. Si febris respectu, de eo scripsit Hippocrates, *1. aph. 16.* *Victus humidus omnibus febricitantibus conuenit; maximè pueris, & aliis, qui tali victu vti consueverunt.* Cum enim victus medicinalis iis, quæ p.n. sunt, contrarius, iis verò quæ s. n. sunt, similis esse debeat, merito febricitantibus victus frigidus & humidus praescribendus; cum febris omnis calidus morbus sit, & ad siccitatem tendat. Humidi tamen saltem fecit mentionem Hippocrates, cum nec apud vulgus dubium sit, febricitantes refrigeratione indigere. Ex quo patet, praisanam hordeaceam valde conuenientem, respectu febris, cibum esse. Possunt & alij cibi, qui medicinales non sunt, plantis & succis refrigerantibus condiri, vt medicati fiant. Ratione autem causæ in febribus putridis non semper cibus frigidus & humidus admittitur. Illi enim, quod magis virget, semper maximè resistendum. Ideoque in putridis victu attenuante, incidente & abstergente sæpe opus est. Et quod humor est crassior, eò etiam cibus maiore vi attenuandi & incidendi sit praeditus. Vnde in febribus à materiā frigida dependentibus sæpe calidis opus est, possuntque cibi condiri petroselino, hyssopo, fœniculo, cappariibus, &c.

Tempus cibi  
exhibendi.

Tempus cibi exhibendi commodissimum est illud, in quo Indicans, nimirum virtus, quæ cibo instaurari & conseruari postulat, praesens est: Nihil verò adest quod illum prohibere possit. Ex quo patet, oportunitatem tempus particulare exhibendi cibum in febribus esse, cum cibus, qui prius est assumptus, concoctus est. Tum enim natura nouum alimentum desiderat. Et cum à natura potest coqui, seu cum nihil adest, quod naturam in coctione remorari & impedire possit. Itaque in continuis planè febribus tempus consuetum cibi assumendi est obseruandum. Natura enim tum facilius cibum tolerat & conficit. Si verò febris quidem continua sit, sed quæ manifestam habeat remissionem & exacerbationem, accedente declinatione cibus offerendus. Si verò febris sit intermittens, tempore *απορρηξίας* atque interualli commodissimè exhibetur cibus, & quidem longè ante paroxysmum. Si autem interuallum tam breue sit, vt ante sequentem paroxys-

smum cibus assumptus nequeat concoqui, in ipsā declinatione cibus exhibendus. Id quod docuit Hippocrates. *1. aph. 11.* *In accessionibus abstinere oportet. Cibum enim dare non oportet. Et quibus per circuitum sunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.*

¶ Inualuit non solum apud vulgus, sed & Medicos nonnullos, falsa quædam opinio, satis esse, si ægri tres vel quatuor horas ante accessionem paroxysmi à cibo abstineant; quo modo multæ febres, quæ citius curari poterant, prolongantur & protrahuntur. Atque vt id statuatur, videtur eos adduxisse locus Galeni, *8. meth. mod. cap. 4.* vbi scribit, satis esse, si tres horæ aquinoctiales quatuorue inter balneum, accessionisque tempus interponantur. Verum ita simpliciter hoc temporis spatium definiri non potest. Hæc quidem generalis regula est, attendendum esse, vt antequam paroxysmus adueniat, cibus in ventriculo concoctus sit; quam etiam tradit Auicenna, *1. 4. tr. 1. cap. 8.* in febribus ita cibandum esse, vt vacuo ventriculo occurrant, atque nititur ea firma ratione, quod scilicet natura simul cibi & morbi coctioni, & febrī expellendæ, vacare non possit, & propterea à morbi profligatione & coctione in paroxysmo, ad cibi coctionem auocanda non sit; quod si fiat, & morbus prolongatur, & mala symptomata oriuntur, quæ Hippocrates & Galenus, *4. de rat. vict. in acut. text. 39.* enumerant: nimirum venter calet, fastidiunt cibum, intenduntur hypochondria, iactatur corpus propter internam turbationem; mens fixa non est, dolet æger, lancinatur, vomere affectat, & cum mala euomuerit, dolet: & quod praecipuum est, & è quo reliqua omnia consequuntur, cibus concoquitur, sed corrumpitur, atque ita non corpori, sed febrī alimentum præbetur.

Spatium tamen hoc, quod inter cibum sumptum & paroxysmum intercedere debet, variat pro ratione corporum, cibi, & febrium. Nam primò corpora alia habent calorem fortiozem, vel à morbo minus debilitata sunt; quæ ideo cibum facilius concoquunt; iisque propterea breuiore, ante inuasionem febris, tempore cibum exhibere licet. Alia contra ventriculum vel ex se debilem; vel à morbo debilitatum habent; & propterea longiore tempore ad cibi coctionem indigent. Atque ea de causâ iis cibus longiore ante paroxysmum interuallo exhibendus. Secundò cibi alij aliis facilius, & breuiore tempore coquuntur; alij difficilius, & longius ad coctionem spatium requirunt; & propterea illos breuiore ante paroxysmum interuallo sumere licet; hos non nisi longiore. In victu nimirum planè tenui horæ tres sufficere possunt, in tenui quoque sex præterpropter, pro ventriculi robore, & febris ratione. Nam tertio in febribus aliis humores calidi, in aliis frigidi, in aliis biliosus, in aliis calida cruditas peccat; atque ab illis coctio minus, ab istis magis turbatur. Vnde in febribus biliosis cibus facilius coquitur, difficilius in quartanis. Et experientia docet, in quartanis sæpe cibum, qui sex vel septem horarum spatio ante paroxysmi inuasionem assumptus est, nihilominus crudum planè in paroxysmo, vel etiam in fine paroxysmi, vomitu reijci. Accedit hoc, quod in febribus tempus illud inuasionis & *ἐπιπρασίας* non semper æquale est, neque demum tam, cum paroxysmus agrum manifestè inuadit, natura morbum aggreditur, sed sæpe diu ante latentes id agit. In febribus quidem biliosis *ἐπιπρασία* & inuasio illa breuior est; at in quartanis ante manifestam inuasionem diu ante natura materiam aggreditur; & propterea cum iam ante manifestam inuasionem in morbo debellando natura occupata sit, etiam longiore ante paroxysmum interuallo cibus non exhibendus, ne natura à suo instituto auocetur. Vnde in quartana turcissimum est, sæpe tota die ante accessionem nullum cibum capere. Locum verò illum Galeni, *8. meth. mod. cap. 4.* quod attinet; lo-

Quot horæ in  
febris ante  
accessionem à  
cibo sit possi-  
bile non sum.  
Error vulgi  
ac quorundam  
Medicorum.

Spatium cor-  
porum defini-  
ri non potest.

In febribus  
biliosis cibus  
facilius con-  
coquitur,  
quàm in  
quartanis.

quitur

quitur ibi Galenus de victu tenuissimo, Quæ aliàs Galeni hac de re mens fuerit, patet ex eo, quod mox addit: Si verò circa vesp̄eram, aut duabus horis citius, accessio innadat, tum lauisse manē licet, tum cibasse.

An in paroxysmo cibum exhibere liceat.

Ab istâ tamen decibandi tempore normâ quandoque deflectendum est, & ipso instante paroxysmo cibum exhibendus: Si nimirum virtus summè imbecillis sit ex resolutione. Vt enim suprâ dictum, vires debiles esse possunt vel ex resolutione & alimenti penuriâ, vel ex suffocatione aut morbi vehementia. Si ob posteriores causas virtus sit debilis, commodissimum tempus cibi exhibendi est declinatio vel interuallum, vt dictum. Si autē priore de causâ virtus sit labefactata, & per insignem aliquam euacuationem sit debilitata, aut ob inediam collabatur: nonnunquam ante accessionem, vel in ipso paroxysmi principio, vel etiam in statu cibum exhibere conuenit.

Reliqua, quæ ad cibum moderandum pertinent, proposuit Hip. 1. aph. 17. dum inquit. *Quibus etiam semel & bis, & plus minùsue, & gradatim præbere cibum conueniat, spectandum. Dandum verò aliquid tempori, regioni, ætati, & consuetudini.*

Cum enim virtus nonnunquam sit debilis, nonnunquam medio modo se habeat, nonnunquam sit robusta; morbus etiam aut cum humorum defectu aut copiâ, aut corruptione coniunctus sit: vires fortes copiosum alimentum tolerant, debiles paucum, mediocres mediocre; & humorum defectus copiosum alimentum, vt instaureretur, requirit; copia verò paucum, & corruptio humorum, vt malitia eorum temperetur, plenius alimentum postulat. Hinc si vires ægri sint debiles, cum defectu humorum vel corruptione, parum alimenti, sed sæpius præbendum est. Si verò vires sint debiles, nullus autem humorum defectus, neque corruptio insignis adsit, sed humores moderatè secundum naturam sese habeant vel etiam abundant, raro & parcius tales nutriendi sunt, & multò magis, si cum virium robore humores abundant. Si autem cum humorum defectu vel corruptione vires adhuc fortes sint, tunc copiosius & sæpe alendum est. Quod si accessiones non permiserint, & sæpius cibandi occasio non sit, rariùs plura alimenta exhibebimus.

Potus in febribus.

Non minor, imò ferè maior, per febres POTVS, quàm cibi cura habenda est. Nam cibos plerumque febricitantes auersantur, & non nisi inuiti sumunt: potum autem auidè expetunt, & in febre plerumque perit fames, crescit sitis. Qua de causâ etiam potus liberalior, quàm cibus, concedi potest. Ex cibo enim plerumque ad morbi materiam aliquid accedit; & proinde cibus semper à morbo prohibetur. Ex potu autem refrigerante mitescit calor, siccitas prohibetur: Faciliùs quoque potulenta concoquuntur, quàm cibi; celerius reficiunt, & minùs grauunt.

Modus in potu seruandus. In continuis.

In potu tamen etiam modus adhibendus, ne nimio humore natura oneretur, cruditas augeatur, & coctio materiæ impediatur. Itaque in continuis febribus primis diebus parcius potus dandus; posterioribus autem temporibus, vbi æstus, sitis, & virium debilitas valde vrgent, plus potùs dandum. Valde enim ij peccant, qui ægris ardentissimâ febre laborantibus, & potum auidissimè expetentibus omnem denegant, & hoc modo natium humidum absumi, corpusque ærescere & exsiccari permittunt. Etenim in continuis febribus materia in venis cōtinèter manens magno illo æstu corpus vrit, vt nisi potulentorum refrigeratione temperetur, non parum damni inde ægro imminet. Talibus ergo laborantibus frigidū potum præbere licet. Sicut enim ardor hoc modo temperatur, natura reficitur, & si coctio præcessit, materia morbi vel sudore, vel vomitu, vel per aluum euacuatur.

In intermittentibus.

In intermittentibus verò, quantum fieri potest, in paroxysmo à potu abstinendum, ægrique monendi, paroxysmo desinente sitim quoque desitutam,

Dan. Sennertii Tom. II.

longioremque ex potu futurum paroxysmum, & omnino citius desinere sitire eum, qui non bibit, quàm qui bibit. Quod enim putrescit, & corruptum est, in paroxysmo separari & excludi debet, quod opus humor multus remoratur. Instante tamen sudore potus ad sudores promouendos concedi potest. Atque ita in potu permittendo in febribus continuis magis ad morbum, calorem scilicet febrilem, respiciendum: in intermittentibus sæpe calidum potius, quàm frigidum bibere præstat; cum citius sudent, minùsque lædantur, si calidum, quàm si frigidum biberint. In vtrisque tamen neutrum negligendū.

Potus autem, qui febricitantibus conuenit, est aqua, decoctum hordei, cereuisia tenuis, vinum & alia quædam, de quibus breuiter dicemus.

Potus duplex.

Hoc tamen priùs monendum, potum, vt & cibum, considerari vel simpliciter vt potum, vel vt potum medicinale, Potus, quatenus potus, idè expetitur, vt eius vehiculo cibus rectè distribuatur, vt corpus frigiditate ac humiditate temperetur, ac præterea etiam vires corporis instaurentur & conleruentur. Atque adèd potus, qui has condiciones habent, in primis sunt vinum & cereuisia, & quæ his cognata sunt. Potus autem si vt medicinalis consideretur, non solùm, vehiculum cibo præstare, ac vires, vbi opus est, conseruare, sed & morbo ac causæ morbificæ aduersari debet. Hinc fit, vt in febribus aliis, vt & aliis temporibus, alij potùs eligendi sint. Quò enim morbus est acutior & citius ad vigorem peruenit, tenuiore ac liquidior cibo, sorbitionibusque vtitur, & propterea tum minore potùs copiâ ob cibi distributionem opus habemus, cum sorbitiones per se promptè distribuuntur, & cibi potùsque vicem gerant. Accidit tamen sæpe, vt ob febrem, quæ humiditatem consumit & sitim auget, plus adhuc potùs exhibendum sit. Quantò verò vires fuerint imbecilliores, tantò magis reficiente ac nutriente potu vtendū. Quantò, autē causa febrilis magis vrget, tantò minùs nutriente potu opus. Quò febris fuerit intensior, putredo maior, eò magis calidior potum vitabimus, & frigidior vrsurpabimus, & quidem ratione febris humidioris; ratione autem putredinis siccioris. Si autem contrariis qualitatibus materia febrilis sit prædita, contrarium faciemus. Hinc si respicimus ad causam febrilem, sæpe incidente, aperiante, abstergente potu opus est, qui propterea alterandus hyslopo, melle & similibus. Quantò materia febrilis crudior est: tantò minùs nutriente potu, ne naturam in coctione remoremur, vtitur; modò non natura concoquens potu instaurari & roborari summè desideret. Si materia alicui parti valde impacta est, refrigerantem potum non admittit. Ad discussionem enim hoc modo ineptior redditur.

Ex quibus facile colligere est, qui potus quibus febribus conueniat: de singulis tamen in specie, vt promissimus, dicemus.

Aquam simplicem quod attinet, eius potum, cum venæ sectione, duo maxima in acutis febribus esse remedia, scribit Galenus: sentiunt tamen de eâ alij aliter. Nonnulli eam planè reiiciunt. Sed parum rectè, cum ad febrilem calorem mitigandum summam vim habeat; neque facile visceribus damni aliquid inferri possit, cum magno calore & æstu occupantur. Alij toto morbi decursu aquam frigidam concedunt: qui & ipsi peccant. Coctioni enim humorū officit, & difficulter coquitur, diuque in ventre, antequàm per corpus distribuatur, hæret, neque incidit, neque abstergit, neque per se alium ducit, neque urinam ciet. Et licet refrigeret: tamen refrigeratio rectius ab iis petitur, quæ simul refrigerandi & meatûs aperiendi vim habent. Imò ne refrigerare quidè satis poterit, si exigua quantitate propinetur. Si verò copiosè propinetur, meatûs obstruet, & cruditate auctâ morbum longè deteriore efficiet. Et propterea nō nisi in acutis in statu, coctione absolutâ, concedenda,

Aqua potus an in febribus conueniat.

*Frigidè ex-  
hibendi mo-  
dus.*

Alij in modo propinandi errant, qui aquæ frigida parum ægris propinant. Hoc enim modo æstum febrilem non temperant, sed potius accendunt & augent. Paucior enim aqua à maximo febrili æstu superatur. Itaque Græci authores jubent in statu cùm febris acuta, ebullitio humorum, sitis, inquietudo, cordis & arteriarum pulsatio est vehementissima, ægerque avidissime eam expetit, aquam frigidam copiose exhibere. Ita enim minus à frigiditate læduntur viscera, & acrior fit inter febrem aquamque pugna, & copiosior vel per vomitum, vel aluum, vel sudorem, imò per plures vias sæpe euacuatio. Idè ubi venter fluxit, aut vomitus erupit post frigidam potum in acutis, stragulis deinde corpus diligenter tegendum, donec sudor eruperit. Atque hoc modo Antiqui frigidam, ut potum medicinale, semel in statu propinabant; non verò quotidianæ potionis gratiâ, neque antea eam concedebant, quàm materia cocta euacuationi apta esset.

In febribus tamen supra modum ardentibus, ac corpus liquantibus, interdum necessitas cogit per initia & augmentum frigidam propinare, ut caloris feruor restinguatur, & præternaturalis sitis mitigetur, præstatque, sumptâ frigidâ febrem paulò producere, quæ tamen curari possit; quàm permittere, ut æger magnitudine febris superetur. Hoc tamen rursus obseruandum, nostris hominibus ardentissimas illas febres ex tenuissima & sincerâ bile natas, raro accidere, & proinde necessitatem, frigidam exhibendi tantam non esse.

*In aquâ ex-  
hibenda ob-  
seruanda.*

In aquâ tamen bibendâ quædam obseruanda, ob quæ nunc confidentius eam propinare licet; nunc verò cautiùs & parciùs illa bibenda, interdum etiam planè ab eâ abstinendum est. Confidentius propinari potest, ubi febris est magna; ætas iuuenilis, corpus boni habitûs, sana viscera, & vires adhuc firmæ sunt, ætas adest, & in primis si æger potui aquæ est assuetus. Periculosum verò est frigidam propinare iis, quibus adhuc obstructio in visceribus hæret, tumor & dolor, aut imbecillitas, maxime ventriculi, lienis & hepatis adest. Obseruatum enim est, frigidâ potione gulam nonnullis ita læsam fuisse, ut vix deglutire potuerint; aliis ventriculum, aut iecur, aut pulmonem grauiter offensum.

Ergò cùm aquæ frigida potus in febribus acutis sua habeat commoda & incommoda, videndum, utrum plus commodi, an damni ex eius potu proueniat. Nam si damnum ex potu frigida sit futurum exiguum, confidente propinari potest. Si verò damnum sit magnum, abstinendum ab eâ, & potiùs aliis auxiliis vtendum. Atque hæc omnia de febribus acutis saltem dicta sunt.

*Frigida potus  
inter mirren-  
tibus non co-  
nuenit.*

In iate mittentibus febribus verò frigida potus nunquam conuenit; in primis si ex crasso & tenaci humore procreentur. Crassa enim materia, quamuis cocta nec promptè nec tuto frigida potu ad excretionem impellitur. Et faciliè viscera tanto æstu, ut in continuis febribus, non laborantia frigida potu offenduntur.

*Aqua electio.*

Eligenda est autem aqua, quæ neque limi, neque mali saporis, aut odoris, aut alterius laus sit particeps; neque in ventriculo diu hæreat, eum inflet, & grauet; sed quæ facile alteretur: quod ex iis, quæ in eâ coquuntur, cognoscitur. Nam in bonis aquis res omnes faciliè elixantur; in prauis verò tardius. Si autem aqua naturalis sua talis non sit, priùs coquenda est, post coctionem verò, quod graue est, ubi aqua refrigerata fuerit, iubet. Nonnulli destillatam potiùs, quàm coquendam aquas crudas corrigunt. Interdum, ne statibus repleatur ventriculus, animum, fœniculum, cinamomum, aut piper, exiguâ tamen quantitate, ne febris intendatur, in aquâ coquitur. Nonnunquam exiguam vini quantitatem admiscere licet, ut aqua & gustui gratior reddatur & faciliùs distribuatur.

Verum cùm aquæ nec omnes sint assueti, nec eadem omnibus grata sit, de potionibus ægris iucundis aliis, Medici sunt solliciti. Nam, ut Aetius, *teirab. 2.*

*serm. 1. cap. 132.* habet, duplex robur, & admirandum simul auxilium exhibet id, quod etiam naturæ, ob iucunditatem, gratum existit. Venter enim, ubi quod blandum est, iucepit & in se complexus est, tenet & probè concoquit pro virilius, maxime si fuerit quantitate moderatum. Excitatur enim sæpe natura, & actiones ab affectuum sentare miserè afflictas suscitatur, ac morbo repugnat duplici modo, ipsum quidem morbum palam contrarietatis naturâ castigans, vires autem animal gubernantes consolans & excitans ac fortificans ad superandum morbum.

Frequenter alteratur aqua hordeo quæ inde decoctum hordei, vel aqua hordei appellatur. Coquitur nimirum hordeum, donec turgescat & rumpatur; quod decoctum magis nutrit, quàm aqua simplex, simulque attenuat, incidit, & sudores ac vrinam mouet. Verum quia flatulenta est, & in ventriculo faciliè acescit, alteratur plerumque pallulis, glycyrrhizâ, iem. anisi, fœnic. cinamomo, saccharo; ut *℞. decocti hordei s. lb. iij. sacch. 3. j. cinamomi 3. j. M.*

Fit & ex aquâ admixtione sacch. vel syrupi, potus diluor, quem Iulebum vulgò appellant. E. g. *℞. aq. coct. lb. iij. sacch. 3. j. B. cinamomi 3. ij. vel. iij. Coq. & per manicam Hip. traiciantur. Vel aquæ coctæ aut destillatis aquis syrupus acetosus s. Oxymel. Iulebus rosarum vel violarum, vel succus citri, pro febris ratione, admiscetur: interdum etiam spir. vitriol. ad gratam aciditatem additur. Potest & salis nitri seu præparati, seu, ut aliis non sine causâ videtur, crudi purissimi momentum in Aquâ dissolui. De quo vide Andr. Libanum. *Apoc. Hermetica part. prior. cap. 17.* Fiunt & ex conseruis Iulebi grati. V. G.*

*℞. Conseru. rosar. 3. j. B. violar. 3. j. B. uulso. 3. B.*

Dissolu. in aq. coctâ vel aquâ hordei s. additis etiam, si liber, aquis endiuizæ, aceto, & cardui benedicti: colentur & per manicam Hipp. traiciantur, ut fiat potus clarus; cui aliquot guttas spir. vitriol. addere licet. Videantur etiam *Instit. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 7.*

Aetius allegato loco plures etiam portiones proponit, quæ ita videri possunt.

Paratur ex melle & aquâ, mulla dicta, quæ vires habet incidendi, & obstruções aperiendi, sed ob melle, febrem accendere potest, adeoque saltem conuenit in febribus pituitosis, non verò in acutis & biliosis. Quando autem magis aquosa est & minus mellis habet, eò minus calefacit.

Ex melle, aceto & aquâ paratur oxymel, potus febribus commodior, quàm hydromel seu aqua mulla. Acetum enim, ut Hip. *3. de rat. viit. in ac. 1. 30.* scribit, damnum, quod ex melle prouenire potest, corrigit, & ne in bilem faciliè mutetur, prohibet. Verum cùm de oxymelite pluribus dictum sit, *lib. 5. Inst. p. 3. sect. 3. cap. 4.* actum hoc loco agere nolo. Potest loco oxymelitis, syrupus acetosus s. substitui, & conueniente liquore dilui, ut formam Iulepi acquirat.

Fiunt & ex sem. frigidis maioribus dictis Emulsiones appellatæ, cum decocto hordei vel furfurum vel aquis destillatis; in quibus interdum rad. petroselin. vel fœniculi concoquere prius licet. Adduntur saporis gratiâ amygd. dulces, vel iomni causâ, semina papau. albi: dulcoratur emulsio facta, si opus est, rotulis manûs Christi, vel iulebo rosar. aut viol. E. G.

*℞. Amygd. dulc. excori. 3. B. Sem. 4. frig. mai. excori. 3. j. B. Aqua hordei cum sacch. & cinamomo. lb. ij. F. l. a. Emulsio. Vel aquæ hordei loco sumatur decoctum furfurum, & Emulsio dulcoratur iulebo rosar. vel violar.*

Nonnunquam etiam Cornu Cerui ac margaritæ, propter opus est, admiscuntur.

Cereuisia, potus populis Septentrionalibus vltimissimus, etiam in febribus conuenit, in primis hordeacea. Cùm verò magna eius sit differentia, eligenda est in calidioribus febribus, tenuis; in longis verò medio-

*Decoctum  
hordei.*

*Inieci.*

*Aqua mulla*

*Oxymel.*

*Emulsiones*

*Cereuisia.*



cris consistentiæ, semper verò bene defecata, & quæ in visceribus non diu hæret.

Neque incommodus potus in febribus est serum lactis, inprimis caprinum. Refrigerat enim ob partes aquosas, quibus abundat: abstergit tamen arque aluum mouet, ob quasdam salias partes, quarum est participes. Quia autem est flatulentum, semine anisi aut cinnamomo corrigi potest.

De Vino, An in febribus conueniat, controuersia est. Verum ad istam quæstionem simpliciter respondere non potest; cum sit magna & febrium & vini differentia: nec omne vinum omnibus febribus, nec aliquod omnibus, aut nullum nullis, sed aliquod aliquibus solummodo conuenit. Febres enim, & humores à quibus febres procreantur, alij aliis sunt calidiores; nunc cocti, nunc crudi: vires nunc debiles, nunc fortes. Vinum aliud est potens, aliud tenue, aliud mediocriter. Vinum, quò potentius est, eo magis nutrit, & spiritus celeriter reficit: sed calefacit, febrē & sitim auger, caput petir: Quod genus vini propterea nulli febri cōperit. Austera quoque vina putridis febribus non competunt, cum adstrictionē febres putridæ non ferat.

Qualia verò vina esse debeant, quæ in febribus putridis admitti possunt, docet Gal. 3. de vict. rat. in ac. 1. 8. Aquosum vinum est febricitantibus maximè idoneum. Hoc autem colore est album, consistentiā tenue, nullamque insignem earum, quæ cæteris vinis insunt, qualitatem habet, neque austeritatem, neque dulcedinem, neque odorem. Huic enim soli, inter omnia vina, datum est, ut aquæ & vini mala effugiat. Talia enim vina humectant, & si non refrigerant, tamen parum calefaciunt. Ac propterea febrili siccitati medentur, & coctionem adiuuant. Et tale vinū si habeatur, in intermittentibus, in assuetis potissimum, circa coctionē, si opus sit, admitti potest. Id quod Gal. etiam docuit, 1. ad Glauc. cap. 9. qui in exquisitā tertianā, incipiente coctione, vini tenuis & aquosi modicum concessit; procedente verò coctione eius quātitatem auxit. Vinum enim tale celerius, quàm aqua distribuitur, excretionem promouet, vires roborat, bonum sanguinem suppeditat. Et quò humor, qui febrem generat, est frigidior, eò tutius vinum exhiberi potest. Vnde in quartanis, diuturnis scilicet febribus, vinum citius cōcedi potest: cum ad humoris sicci humectationem, crassi attenuationē faciat, vitēsque, quæ in longitudine morbi deliciuntur, custodiat. In continuis verò quia calor magis vrget, tutius est coctionem & manifestam declinationem expectare, antequam vinum propinetur; nisi forsitan summa virium imbecillitas magis vrgeat, quàm febris.

Verum quia talia vina non vbiuis obuia, & semper in promptu sunt; & Septentrionales nostri plerumque magis ceruicis, quàm vino sunt assueti: antequā manifesta coctionis signa adfuerint, nec in intermittentibus vinum facile concedi debet, & illud quidem αλγος, aut aquā dilutum.

In febribus autem continuis, etsi declinatio adsit, si tamen calor adhuc sit intensior, & corpus calidum ac siccum, à vino abstinere tutius est; nisi insignis virium debilitas id requirat. Tria enim semper in continuis febribus, ut vinum propinetur, requiruntur, ut virium imbecillitas adsit, ut calor febrilis non sit intensus, ut materiæ cruditas id non prohibeat; e quibus conditionibus si vna desit, tutò vinum non permittitur. Sicut nec si deliria, capitis dolor, vel similes affectiones adsint. Vinum enim suā tenuitate & caliditate crudā materiam per vniuersum corpus deducit, febrem auger, & inprimis caput petir. Verum qui plura legere cupit de vtu vini in febribus, consular prolixè hac de re disputantem Ioh. Bapt. Syluaticum, contr. 12.

Post cibum & potum in diæta maxima ratio habenda est Aeris, utpote quem cōtinuò spiritu ducimus, & quo ne momento carere possimus. Cum autē aer &

calorem nostrum temperet, & materiam spiritibus præbeat, primò eligendus est aer purus & nullis vaporibus impuris inquinatus. Deinde qualitatem eius quod attinet, cauendum, ne aer, quem attrahunt febricitantes, sit calidior, præsertim tempore æstivo, ne febrilem intemperiem augeat; sed sit potius frigidus, ut febri aduerletur. Atque si talis aer à natura nobis non suppeditatur, præparandus est arte, domusque & cubacula eligenda, quæ versùs septentrionem spectant; pauimenta frigida conspergenda, & per eadem flores & herbar frigida spargenda. Tempore hyberno temperatus sit. Illud tamen cauendum, ne aer, si frigidior sit, corpori nudo occurrat, eius poros claudat, diffusionem vaporum putridorum prohibeat, calorem ad interiora propellat, sudoresque impediat: id potius æger stragulis leuibus tegendus est, ut calor ad ambitum corporis trahatur, & fuliginosis excrementis per patentem poros liber exitus pateat.

Somnus in febribus putridis summe utilis. Multum enim ad coquendos humores vitiosos facit, calorem naturæ auger, virēsque roborat. Non tamen sit nimis, ne calor naturæ obruatur, & excrementorum dissipatio ac euacuatio impediatur. Cum autem in somno calor ad interna reuocetur, in initio paroxysmi à somno abstinendum, ne calor naturæ, humoribus ad interiora nimis retractis, obruatur.

Quies febri putrida laborantibus commodissima est, & iis non nisi levis æmbulatio, aut frictiones cōueniunt, reprehenditque iure Hippocrates Prodicum, 6. epid. comm. 3. 1. 3. quod febricitantes cursibus, & similibus exercitiis nimis interfecerit.

Danda quoque opera est, ne excrementa, quæ expelli debent, præter naturam retineantur, sed debito modo & tempore expellantur. Retenta enim calorem naturæ suffocant. Contrà videndum, ne immodica aliqua euacuatio vires exhauriat.

Affectus denique animi tranquilli sint in febribus, iucundisque rebus febricitantium animus recreandus, ut spiritus virales erigantur, tristitia autem, & ira inprimis, tanquam hostes infensissimi, vitandi.

## CAPVT. X.

## De Febrium putridarum differentiis.

Atque hæc de febribus putridis in genere dicta sint: iam in specie de iis agendum. Quot autem earum sint differentie supra breuibus dictum, quæ ut clariora euadant, paulò pluribus earum ratio reddenda & vnde ea pendeant, videndum. Perueniunt autem præcipue & ad curationem maximè utiles differentie à materiæ putrescente, & loco putredinis.

Materiam quod attinet, dictum est supra, febres oriri vel à sanguine, vel bile, vel pituita, vel melancholia: vbi tamen serum seu ichorem potius includimus. Equidem in omni corpore aliquid humoris aquei sanguini permixtum est, quod οχμα τροπὴ est: verum si illud abundet, & præcipue si prauæ ac tenuis alicuius humiditatis aliquid ei admisceatur, præter naturam est, & malum, sanguinemque talem ichorodē appellat Hippocrates, 6. epid. comm. 2. 1. 38. Et quidem, ut Galenus in comment. addit, ab Hippocrate non simpliciter tenuis & aquosus sanguis ichorodēs nominatur, sed qui prauam ac tenuem humiditatem obinet, qui ichor propterea malus est, febribusque facile occasionem præbet. Humidum enim aqueum est maximè putredini obnoxium, resque, quæ eo abundant, putredini obnoxias reddit; quæ verò eo destituuntur, & in quibus humiditas aquea exsiccata est, nō ita facile putrescunt. Vnde etiam is sanguis facilius putrescit.

Imò ut hoc iis, quæ supra de febribus ephemeris dicta sunt, addamus, Carolus Piso in eā est sententiā, etiam febres, quæ ephemeræ dicuntur, & vulgè à sero & aqua, &

Somnus in febribus putridis.

Febrilis materia differentia.

Serum febrilis causa.

Febris ephemeræ mora an à sero & aqua.

Serum lactis.

Vini assuetudine febricitantibus conueniat.

Air qualem in febribus esse debet.

an verd à  
spirituum in-  
censione fiat.

Spiritibus accensis prouenire statuuntur, omnes à serosa sanguinis venoli aut arterioli parte ebulliente, & multo magis synocham sine putredine ortum habere, etsi spiritus virales succendiculi siue causæ internæ rationem habere possint, quæ principium feruoris seroso humori suppeditet. Quam suam sententiam probat his rationibus, Primò quia in febre diariâ calor quidam blandus & halituosus deprehenditur, quæ calor lenitas subiecti halituosi, & vaporosi, aquei putredine, non ignei index est. Deinde pullus parum mutatur, scilicet in magnitudine, celeritate & crebriore, in aliis verò naturalem æqualitatem seruat: quod fieri non posset, si spiritus ita incalescerent, & quod fieri necesse est, insigniter dissiparentur. Tertiò quia nulla grauius symptomata in diariis accidunt, quod indicio est, non spiritus, sed humorem aliquem tenuem & benignum solum incalescere, qualis serosus est. Quarto id etiam testatur vrina, quæ sanorum similes sunt, quæ morbis à pleonexia serosa excitatis propriæ sunt, teste Galeno 2. de Crisi. capite 3. cum à spirituum incendio vrina quasi fulgorem & flammeum colorem accipiant. Quintò idem solutio febrium diariarum probat, quæ cum sudore & madore quodam fit, quod non spirituum incensorem, sed humoris aquei effervescentis indicium est. Idem causæ, quæ febrem ephemeram inducunt, euincere videntur, quæ omnes euidentes aut manifestæ sunt, quæ spiritus agitant, vnâ tamen etiam sanguinem, & præcipue ferociam eius partem afficiunt. Et proinde quia spiritus in perpetuâ generatione sunt, etsi, qui præsentis sunt, calefiant, v. g. ab ira; tamen qui postea generantur sedato animi motu minus feruidi sunt; atque ita calor præter naturam ab ira accensus per diem naturalem durare posse non videtur, sed aliam quandam substantiam, quæ à spirituum feruore calefacta calorem integro die retinere possit, incalescere credibile est. Quæ omnia confirmant ephemeræ plurium dierum, & quæ erysipelata comitantur.

synocharum  
febrium cau-  
sa.

Idem febres illas synochas seu continentes dictas, quæ nullas periodos & exacerbationes atque remissiones habent, omnes ab humore seroso seu sanguine seroso prouenire statuit, copiosius scilicet redundante & vehementius incalescente: & quidem in synochâ non putri absque putredine, in synochâ putri cum putredine. Nam Synocha non putris oritur à causis vehementioribus, quàm quas habet ephemeræ simplex. Ideoque incidere in eam docet corpora, quæ sanguine seroso abundant, & ab iis causis, quæ plethoram serosam inducere possunt & arguunt: ideo quod facilius sanguis serosus ac tenuis feruorem concipere potest, eundemque rursus deponere, quàm sanguinis massa crassior. Nam febris hæc & lassitudo ipsi coniuncta, vel per *diaphoresin* vel per sudorem sine insigni aliqua euacuatione soluitur.

Si verò vis causæ maior sit, & venarum obstructio & constipatio maior, vt effluuium fuliginosum copiosius cumuletur, synocham putridam excitari docet, serosâ præcipue sanguinis parte putredinem concipiente. Vnde calor est mitior, & similis calori, qui in balneo concitatur. Hæcque febres lassitudines & varij dolores, externum sæpe corporis habitum occupantes, comitantur. Humores enim tenues ac serosi in extremitates vasorum pelluntur, & ulterius progredi non valentes ibi sistuntur, unitatemque in partibus membranosis soluendo dolorem excitant.

Atque ita omnes febres, seu breues sint, seu diutius protrahantur, quæ continuitatem quandam æqualem feruant, & nec singulis, nec alternis, nec quarto die exacerbantur (etsi obscuros quodam morus, Lunæ moribus, imperium in humores aquosos habentis respondentem obseruent) ab humore aquoso & seroso, seu putrescente, seu non putrescente oriri docet.

Verum etsi cuilibet de hac C. Pisonis opinione

suum iudicium relinquamus: tamen non ad eam verò consentaneum videtur, febres ephemeræ & synochas sine putredine ab inflammatione & accensione fieri prouenire. Etenim cum serum sit humor aqueus, salidas quædam partes admixtas habens, non video quomodo tam promptus ad inflammationem & accensionem esse possit. Et si quid omnino probant rationes C. Pisonis, hoc potius probant, ephemeræ à fuliginibus quibusdam subtilibus & pinguibus sanguinis accensis oriri. A quibus potius quàm à spiritibus vitalibus si quis deducere voluerit febres ephemeræ, cum eo multum non litigabo.

Ita etiam verò consentaneum non est, Synochas non putres prouenire à sanguine seroso: cum in tales febres incidant corpora plethorica, in quibus bonus, non serosus sanguis abundat.

Hoc magis probabile est, serum vel ichoré, seu sanguini, seu aliis humoribus permixtū ad putredinem facilius suscipiendā occasionem præbere; præcipue si sit impurius.

Sed his, quæ de Car. Pisonis sententiâ diximus, misiss, febrium putridarum differentias explicemus. Differentiam ratione materiæ quod attinet, omnes febres, seu breues sint, seu diutius protrahantur, quæ continuitatem quandam æqualem seruant, & nec singulis, nec alternis, nec quarto die exacerbantur, à sanguine putrescente ortum habent.

Quæ verò febres ab humore bilioso, pituitoso vel melancholico oriuntur, eæ omnes suas periodos habent, seu continuæ sint, seu intermittentes; & statis temporibus vel planè intermittunt, vel exacerbantur & remittunt.

Præter febres tamen has, quæ à sanguine, bile, pituitâ, melancholiâ, oriuntur, dantur adhuc aliæ, quæ & ipsæ sunt continuæ, sed quia nec à bile, nec à pituitâ, nec à melancholiâ, à quibus humoribus ortæ febres periodos habent, proueniunt, periodos certas nullas habent, & licet exacerbentur quandoque, nullo tamen certo ordine id accidit. Tales febres non solum sunt symptomaticæ illæ, quæ à partis aliquius inflammatione, vel ulcere aut fistulâ ac putredine ortum habent; sed & quæ à vermibus, lacte corrupto in infantibus, sanguine concreto extra vasa putrescente oriuntur, sicut eius rei exemplum habet Zechius, consul. 46. in quodam infante nobili, qui febre continuâ cum grauissimis symptomatibus ex sanguine, dum linguæ frenum sectione ipsi laxaretur, in ventriculū illapto, ibique putrescente, correptus fuit. Imò consentaneum videtur, sicut sanguis dum in venâ cauiâ putrescit, febrium synocharum, quæ nullas periodos habent, causa est, ita sanguinem illum imperfectiorē, si in venis mearaicis putrescat, febres continuas, nunc lentas, nunc etiam grauib. symptomatibus molestas, pro modo corruptionis, excitare; quæ febres etsi ob locum à corde remotiorem interdum non nihil exacerbantur, vel remittere videantur, nullas tamen periodos certas obseruant, sed inordinati sunt illi morus. Tales febres si lætæ sunt & diuturnæ, sæpe pro hecticis, sed falsò habentur. Talis procul dubio fuit illa febris, quæ Zechius, consul. 2. pro hecticâ habet, sed malè. Neque enim credibile est, hecticam posse esse in corporis habitu molli & laxo, & qui in œdema vniuersale quasi, vel loquitur, degenerat.

Atque hæc sunt febrium differentia à materiæ diuersitate petita. Locum verò quod attinet, febrium equidem putridarum causa proxima est vapor putridus calidus sanguini & spiritibus permixtus, omnesque corporis partes calefaciens, & omnino nihil est in toto corpore, quod id vniuersum calefacere possit, nisi prius sanguinem & spiritus calefaciat. His enim calefactis, partibus solidis calor communicatur.

Materia autem à qua vapores putridi generantur, vel continetur in vasis, vel extra vasa. Vasorum sunt duo genera, Vena Cava & arteria cum suis ramis in vniuersū corpus

Febrium putridarum differentia ratione mater.

Febrium putridarum differentia ratione loci.

Materia in vasis putrescentis.

corpus distributis, & venæ melsaraicæ, quæ sanguinem imperfectiorem è chylo modò elaboratum continent, quæ ventriculo, intestinis, mesenterio ac reliquis partibus vicinis inseruntur. Et si verò hæc duo vasorum genera per insignes *divasquæ* consentiant: tamen ita inuicem separata sunt, vt ex vno vasorum genere in aliud sanguis confertim fluere non possit, nisi feruorem quendam conceperit, aut naturæ irritatæ operâ id fiat. Vapores tamen & fuligines è melsaraicis in cauam non ita difficulter penetrare possunt. In venâ cauâ dum sanguis putrescit, febres continuas omnes excitat, quarum aliæ synochæ seu continentes, aliæ continuæ nomine generis, & continuæ periodicæ nominantur. Vbi verò putredo est in venis melsaraicis, sanguis in venâ cauâ non primò afficitur, sed per consensum saltem sanguinis illius in venis melsaraicis putrescentis incalescit, & non ipse putrescit, sed putridos saltem vapores & humorum putridorum aliquid permixtum habet, quod tempore paroxysmi iterum discutitur.

Humores autem excrementitij in venis melsaraicis putrescentes febrium intermittentium causa sunt. Verum non absurdum videtur, continuas etiam sanguine in venis melsaraicis putrescente excitari posse. Nam & sanguis in venis melsaraicis aptus est æquè ad putredinem, & forsan magis, quàm qui in venâ cauâ continetur. Neque causæ putredinis, obstructions scilicet venarum & aliæ, desunt. Itaque & sanguinem illum imperfectiorem in iis putrescentem febres continuas excitare posse credibile. Verum quia locus ille à corde remotior est, nec vapores continuè eadem copiâ semper ad cor penetrare possunt, calor ille etiam non ita æqualis est, febresque sunt magis lentæ, vt antea dictum.

Intermittentes verò febres magis notæ sunt, quæ oriuntur, cum humores bilioli, melancholici, pituitosi sanguini illi imperfectiori in venis melsaraicis permixti putrescunt. Si nimirum in venis portæ hepaticæ cumuletur bilis & ibi putrescat, tertianæ intermittentes oriuntur: si verò in ramis portæ splenicæ humor melancholicus putrescat, quartana inde excitatur.

Cur autem tertianæ sint breuiores, paucioresque habeant paroxysmos, quàm quartanæ, & cur paroxysmi in intermittentibus reuertantur, hanc causam affert Car. Piso, quia ramus portæ hepaticæ insignes septem sint, & sanguine ac febris causâ in vno ex illis ramis putredine absumptâ febris extinguitur: quia tamen sanguis; qui in proximo vase latet, incalescit & inde putredinem concipit, die tertio iterum redeat febris. Quia verò sanguis in liene confectus per portam splenicam diffunditur in multò plures ramos, gastricos scilicet, epiploicos, gastrepiploicos & alios, statuit, si humor in vno ramo putredine absumptus intermissionem facit, putredinem etiam proximis vasibus communicari, sed longiore tempore, propter resistantiam humoris maiorem: hinc qui recurrunt paroxysmi, numerosos quidem esse, multitudini vasorum, in quibus sanguis successiuè putrescit, respondentes, sed intervallum longum, hoc est plurium dierum. Verum malo hîc aliis Medicis, & inter eos etiam Pio Æn. Capriliio assentiri, qui statuunt, etiam in pluribus paroxysmis humorem febris causam in vno loco putrescere, docentque simplices febres, verb. gr. tertianas excitari, quando ex vno fomite materia febrilis protruditur; duas vel tres, quando ex duobus vel tribus. Neque enim numerus venarum portæ hepaticæ respondet semper numerus paroxysmorum tertianæ, neque quartanæ paroxysmi numero ramorum portæ splenicæ. Videmusque ex febre simplici duplicem vel triplicem reddi posse, si intempestiuo purgantium vel sudoriferorum visu causâ febris, quæ in vno loco continebatur, mora saltem & non euacuata in plura loca distribuatur. Necque recurrit, cum causâ febr-

lis, quæ vno in loco continetur, in paroxysmis non planè excutitur, sed *πρὸς τὴν αἷμα συνάδου* relinquitur, quod noui paroxysmi causa est.

Extra verò vasa materia putrescens etiam febres excitat, dum ex iis vapores putridi venis & arteriis communicantur. Sunt autem hæc febres omnes continuæ, nec statas periodos habent. Tales febres sunt omnes symptomatice in genere dictæ, & primò symptomatice in specie dictæ, quæ ex partium certarum inflammationibus proueniunt, in quibus etsi pars aliqua in vasis capillaribus parti inflammata insertis continetur, pars tamen etiam in spatia partis effunditur. Deinde quæ lentæ dicuntur, ex pertinacibus viscerum obstructionibus ortæ. Tertio quæ ex putredine alicuius partis proueniunt. Quarto quæ ex lacte corrupto in infantibus, ex vermibus, sanguine extra vasa putrescente, quod interdum in contusionibus capitis, vt & aliis locis accidit, originem habent, quæ item puerperis accidunt, vt & quæ catarrhos comitantur & catarrhales dicuntur. Possunt tamen etiam Catarrhales febres fieri, dum natura stimulata materiæ partem per hanc viam expellit.

Sciendum enim hîc, adhuc aliud continuarum genus dari, quod Platerus Comitatas appellat, quæ sunt, vbi putredine in venis excitatâ & febre accensâ, Natura partem vitiosorum humorum vel è corpore expellere, vel è vasis maioribus in minores & ambitum corporis vel in partem determinatam depellere solet. È corpore expellere nititur Natura materiam in diarrhœâ, dysenterîâ, Catarrhis, qui morbi cum febribus suis epidemij ferè esse solent. Ad ambitum corporis in febribus expellit Natura materiam in variolis, morbillis, petechiis, doloribus vagis. Ad determinatas partes in pleuritide, anginâ, peripneumoniâ, phrenitide, erysipelate seu Rosâ, Arthrit. Atque hæc febres nunc sunt synochæ, neque vllam exacerbationem vel remissionem habent, nunc statis periodis exacerbantur, pro peccantis humoris ratione, etsi ad *ἀντιπύρετον* non deueniant.

Hiscæ, quæ de febrium putridarum differentiis paulò fusiùs docere volumus, vnum adhuc, quod iis, quæ suprâ de symptomatibus febrium putridarum diximus, addendum censemus, subiungere liber: Cur nimirum febribus lethaliibus correpti ante mortem habeant pulsûs ordinationes, & à febre quasi liberi deprehendantur, & ad mentem, quâ antea delirantes erant alienati, redeant. Accidit hoc ob sanguinis & spirituum in venis & arteriis absumptionem. Nam refert Ioh. Argentarius, in Gal. in lib. 1. de feb. ad Glaucon. cap. 2. in cuiusdam febre extincti cadanere ne guttam sanguinis in venis fuisse repertam. Ita scribit Adr. Spigelius, de semiser. lib. 1. cap. 15. in quodam febre extincto venas maiores circa hepar sanguine euacuatas repertas fuisse. Et ibid. cap. 16. venam cauiam & arteriam magnam sic vacuum fuisse sanguine, vt non opus fuerit filo venam cauiam & portæ truncum, dum exenteraretur, intercipere.

## CAPVT XI.

## De febre putrida, continua primaria; &amp; primò de Synocha.

SEd vt iam in specie de febribus putridis, & quidem primò de continuis primariis agamus: febris continua primaria est, quæ ad *ἀντιπύρετον*, antequam planè soluitur, non peruenit. Ortum habet ex putredine humorum in venæ cauæ & arteriæ vasis maioribus continuâ. Vt enim febrium putridarum in genere continens causa est vapor putridus, seu calor ille ex putredine humorum ortus caloremque cordis igneum reddens: ita in specie continens causa continuarum est

Materia extra vasa putrescens.

Febres Comitatas.

Sanguis interdum in febricitantibus in venis absumitur.

Cur tertiana sint breuior, quàm quartana.

Febris putrida continua primaria.



est calor ex humoribus in vasis maioribus putrescentibus natus continuus. Nam si in hilce amplis & per totum corpus dispersis ac cordi continuatis vasis humores putrescant, & inde vapores putridi, vel etiam humoris putridi portiones aliqua assidue ad cor mittantur, etiam calor continuus excitatur; neque febris ad ἀμπύξια peruenit, antequam quicquid putridi & vitiosi est in humoribus, absumptum & euacuatum sit.

*Febris continua ab intermittente differentia.*

Atque hanc febrem ab intermittentibus discernere non difficile est. Antequam enim planè soluitur, ad ἀμπύξια nunquam peruenit. Deinde neque singulis, neque alternis diebus, neque longiore periodo cum rigore aut refrigeratione, vt intermittentes, aduenit: Neque etiam singulae accessiones vomitibus, sudoribus, aut aliis euacuationibus, id quod fit in intermittentibus, sed ferè tandem critica euacuatione finiuntur. Accidere quidem potest, vt etiam in febribus continuis, præcipue in earum initio, vomitus contingant; id quod euenit, cum in ventriculo, & vicinis corrupta alimenta & vitiosi humores continentur, qui, etsi febris primaria causa non sunt, à calore tamen febrili commoti eam augent, aut certe symptomatibus quibusdam, vt nausæ, vomitu, angustia cordis eam exasperant. Verum in morbi progressu vomitus isti cessant. Ac licet in quibusdam febribus, quæ continuæ videntur, rigor & horror statis diebus redire soleant: tamen illæ febres simpliciter continuæ non sunt, sed compositæ, & ex intermittentibus ac continuis complicatæ, vt suo loco dicitur.

*Febres continuæ primariæ duplices.*

Febrim autem putridarum continuarum primariam duplex est differentia. Aliæ sine vlla remissione vel exacerbatione à principio vsque ad finem continuè durant: Aliæ sunt, in quibus quidem calor febrilis, antequam febris integrè soluitur, nunquam planè intermitteat, certis tamen periodis excandescit & intenditur. Nomina quod attinet, de iis Galenus, 1. epid. comm. 3. lit. 2. monet, non semper iisdem nominibus fuisse appellatas, dum ita scribit: *Bisariam veteres vti videntur continui nomine & intermittentiis. Nam continuas vocant febres quandoque omnes, quæ nullum tempus liberum habent accessione; quandoque non omnes, quæ accessione nunquam vacant, sed solas præcipue illas, quæ omni carent vsque ad iudicium mutatione. Ita intermittentes appellant solas illas, quæ accessionem perpetuam non habent; interdum eas, quarum non recedit accessio, sed insignes faciunt mutationes singularum accessionum in initium, incrementum, vigorem, & remissionem. At Medici quidam iuniores, quæ non magnam mutationem habent, non continuas, id est, συνεχεις, sed συνεχεις nominant. Continuas autem has solas, quæ non veniunt ad integritatem, & intermittunt singulis accessionibus. Has vocant antiqui interdum continuas, interdum continentes. Nam sunt ferè inter continuas & desinentes in ἀμπύξια media. Proinde rectè, cum συνεχεις conferuntur, intermittentes appellantur; cum ad integritatem venientibus, continua. Ex quo Galeni loco apparet, febres συνεχεις, id est, continuas, in specie ita dictas, ab antiquis modò continuas, modò intermittentes fuisse appellatas. Ex eodem etiam manifestum euadit, τὸ συνεχεις nomen Hippoc. & antiquis Medicis non fuisse in vsu, sed iuniorum potius post Hippocratem inuentum, qui, vt idem Galenus, 9. meth. med. cap. 2. docet, nomine quidem Græco vsi non sunt, cæterum solæcismum potius committendum rati, quàm formam ipsam sine nomine relinquendam. Atque ista appellatio à recentioribus Medicis inuenta, à posterioribus omnibus accepta, & usurpata est; & proinde hodie febres, quæ sine omni caloris intensione & remissione vsque ad finem durant, συνεχεις πρῶτον, continentes febres: quæ verò quidem continuè durant; sed tamen aliquam caloris intensiorem & remissionem habent, continuæ seu συνεχεις nomine generis, appellantur.*

### De Febribus Synochis.

Vt autem primo loco de febribus Synochis seu continetibus agamus, est *febris Synocha putrida continua, quæ sine omni remissione & intensione periodicà à principio vsque ad finem affligit, à sanguinis in venâ canâ putredine oria*. Est enim huius febris, communi Medicorum sententiâ, causa putredo humorum in vasis omnibus, aut certè maioribus & cordi vicinis. Nam cum in hac febre nulla remissio sentiatur, necessarium est vapores putridos pari impetu & vehementia continuè cordi communicari: id quod fieri non potest, nisi humores vel in omnibus vasis putrescant æqualiter, vel certè in vasis cordi vicinioribus.

*Febris Synocha.*

Disputat quidem hac de re Hercules Saxonia, lib. 8. pract. cap. 6. & pluribus probare nititur, febres continentes posse fieri, non tantum ex vasis communibus, sed etiam ex vasis determinatis, atque aliquando febres continuas ab inflammatione vel erysipelate, vel abscessu, vel scirrho, vel putredine partis determinatæ proficisci: quia scilicet venæ pulmonis, oris ventriculi, & hepatis sint cordi propinquæ, & continuè vapores putridi, sine omni remissione, inde ad cor mitti possint. Deinde plurima Galeni loca allegat, in quibus febres continentes ex vteri, ventriculi, hepatis, membranarum, cerebri inflammatione & erysipelate fieri docet: Et proinde quando solas febres continentes ex putredine humorum in vasis communibus & maximis fieri dicit, intervalla maxima etiam vasa pulmonis, hepatis, ventriculi, & vteri reponenda censet.

*An febris Synocha vasis determinatis ortum habuerit.*

Verumenimverò prolixa hac de re disputatione opus esse non videtur. Nam vix aliquis, opinor Medicorum est, qui neget, ex inflammatione partium, quibus maiora vasa obtrigerunt, tales febres oriri posse: Verum eas Symptomaticas esse, de quibus suo loco dicitur, non autem primarias, de quibus iam agimus, antea dictum est, & morbus tum non tam à febre, quàm ab ipsâ parte affectâ denominationem sortitur. Sed præter has sunt aliæ febres, quas Platerus rectè Comitatas potius, quàm Symptomaticas dicendas putat, de quibus infra in febribus Symptomaticis dicemus, quæ non oriuntur ex partis determinatæ inflammatione, sed quæ potius inflammationi in parte aliquâ causam præbent, cum scilicet Natura partem aliquam humoris in quampiam partem effundit, vnde in eâ parte nouus morbus excitatur. Et si omnino sint febres aliqua continentes, quæ ex partis determinatæ vitio oriuntur, quales Synochæ, quæ puerperis ex vteri vitio accidunt, esse videntur: tamen pars illa determinata saltem inquinamentum aliquod suggerit, occasionemque præbet, vt sanguis totus in venis maioribus putredinem concipiat; atque ita quamuis ex priuata partis vitio & occasione sanguis putredinem concipiat: tamen putredo parte determinatâ amplius non concluditur, sed in reliquum sanguinem diffunditur. Verum febres continuæ & partium determinatarum vitio ortæ sunt plerumque periodicæ. Et si etiam in Synochis quædam conspiciantur, quæ putredinem quoque in primis viis contestantur, vt sunt verminum vomitus, & alia: non tamen putredo in venis ob id neganda, & Symptomata eiusmodi potius effectus sunt febris illius continuæ, quàm causa. Putredine enim & febre in corpore excitatæ, vt antea quoque dictum, quicquid vitiosum in corpore est, commouetur, & languente calore naturali in Synochis etiam prima coctio vitiat, & ex vitiosa materiâ vermes ibi generantur; vnde rursum febris augeri grauiorque reddi potest. Nec rarum est in febribus vt causa & effectus, sese mutuo foueant & augeant.

Cæterum putredo illa in vasis magnis oritur plerumque à vehementi, ab impactis, multis, crassis, viscidisque humoribus, obstructione, non solum in

cute,

cutē, sed etiam interioribus hepatis & aliarum partium venis, ob quam corpus liberè non ventilari, neque aer frigidior satis attrahi, neque calidæ & acres fuligines expelli possunt. Vnde humores in vasīs, etiam si aliās boni sunt, putrescere necesse est. Atque hæc simplex Synocha putris est. Nihil tamen obstat, quin etiam à contagio humores infici, corrumpi & putrescere queant, atque hinc febris oriri possit. Ambiensque nos aer, putridis exhalationibus refertus, continuā inspiratione attractus, sanguinem inquinare, eique vitium suum communicare potest. Verum ut dictum modò, hæc febres malignitatis expertes non sunt.

Atque ex his, quæ de loco, in quo humores putrescunt, dicta sunt, etsi aliquo modo causa continuitatis harum febrium reddi possit: ipsa tamen humoris putrescentis consideratio adhuc addenda, quæ non minoris momenti videtur; cum varij humores in iisdem vasīs possint putrescere, neque tamen idem febris genus excitent. Rectè autem statuitur, febrium continentium proximam causam esse sanguinem vel esse humores alimentarios, & nutriendo corpori dicatos, & qui in hepate iam formam sanguinis acceperint, ut antea dictum. Cum enim hi perpetuò in corpore suppetant: non mirum est, si putredinem concipiant, quòd continuò vapores putridos ad cor mittunt, calorēque continuum excitant. Et cum id, quod putredine corruptum est, in principio à bono sanguine nondum separatum sit, sed cruditas adsit, & sanguinis partes bonæ cum vitiosis corruptis permixtæ sint: (non secus ac in musto, vel cerevisiâ recenti antequam deferbuit, sese res habet) Natura nullam excretionem instituit, antequam materiam coxerit, id est, vitiosum à bono separauerit. Itaque inuadit hæc febris non corpora frigida, sed eos, qui sanguine abundant & corpulenti sunt; unde fit, ut nec in senili ætate, nec in frigido temperamento exciteetur hæc febris.

Verum an ex sanguine, quem per humorem alimentarium intelligimus, putrescente, febris hæc oriri possit, & qualis sit, apud Authores non adèd planum est. Nam & alij hac de re dubitant, & Galenum etiam dubium fuisse nonnulli affirmant. Imò Auicennas, lib. 4. fen. 1. tract. 2. cap. 44. Galenum reprehendit, quasi negantem, dari febrem à putredine sanguinis, & statuentem, febrem, quæ ex sanguine putrescente fit, biliosam esse, non sanguineam; cum sanguis putrescens in bilem mutetur. Atque hanc Galeni sententiam & Hippocrati, & veritati contrariam esse, plurimūque erroris in se continere statuit.

Verumenimurò hi Galeni mentem non satis percipiunt, & hæc febris tot exemplis & autoritatibus Galeni, præcipuè 9. meth. med. tum etiam rationibus confirmata est, ut de eâ dubitandum non sit. Nam cum omnes concedant, hanc febrem oriri à sanguine, id est, mafsâ illâ humorum, quæ in venis continetur, corporique alendo destinata est: nulla certè evidens ratio nos dubitare iubet, ex eius putredine febrem accendi posse. Nam sanguinem putrescere posse, satis, opinor, manifestum est. Etenim cum videamus sanguinem extra venas in quamcunque capacitatem in corpore effusum putrescere: non est, quod dubitemus, si vehemens aliqua causa occurrat, etiam in venis eum putrescere posse. Vbi enim calor ille familiaris & proprius sanguinem conseruans, præternaturalis & igneus euadit, neque ampliùs, ut priùs, moderatus est, ut coquere & conseruare sanguinem possit, sed immoderatus: putredo sequitur. Quòd etiam non mox accidat, sed lapsius triduo aut quadriduo sanguis tantum sit calefactus, nondum verò putrescat: tandem tamen à calore illo externo ipsum corrumpi & putrescere necesse est. Atque illa putredo sæpe non obsecutis indiciis in sanguine, qui venâ apertâ emittitur,

sese prodit; cum interdum, fibris omnibus putredine corruptis, coherere ampliùs sibi non potest, Et in inflammatione hepatis non solum putridus, sed & purulentus sæpe apparet.

Quæ etiam, ut existimo, non adèd dubia sint, hoc tamen adhuc declaratione indiget; an febris illa, quæ ex putredine sanguinis oritur, rectè sanguinea appellari possit; cum Auicennas, ut dictum, Galeno imputet, quasi sentiat, sanguinem, dum putrescit, statim in bilem mutari, & propterea febrem, quæ ex putredine sanguinis oritur, potius biliosam dicendam esse. Verum omnino hæc febris sanguinea rectè dici potest, nihilque obstat, quin sanguis sub propriâ formâ, id est antequam in alium humorem degeneret, putrescat, neque opus est, ut priùs bilis naturam induat, si putrescere debet. Si enim in inflammationibus in pus abit, non in bilem mutatus, cur idem etiam in venis fieri non possit? Et licet pars tenuior & pinguior calore illo ex putredine accenso in bilem, crassior in atram mutari possit: tamen putredo ipsius sanguinis jam præcessit; neque opus est, ut totus sanguis in bilem, quæ postea biliosam febrem accendat, mutetur; sed & in aliud quid sanguinis substantia putredine mutari potest. Vbi tamen pars aliquam multa sanguinis in bilem mutatur, febris quoque, si non cesset, non parum degenerat, & quandoque Synocha si protrahantur, in causum mutantur. Si verò sanguis jam in alium humorem abierit, febris, quæ inde accenditur, non est sanguinea, sed biliosa vel melancholica.

Quando autem sanguinem dicimus causam esse febrem Synocha putridæ, intelligimus omnem illum humorem, qui in venis ad corpus nutriendum in corpore quocunque continetur, modo ad corpus nutriendum adhuc aptus sit. Neque enim sanguis in omnibus corporibus eiusdem bonitatis est, sed in aliis exactè bonus est, in aliis ab illa bonitate declinat; unde etiam alimentum non æquè bonum omnibus supeditatur. Et cum sanguis raro uo sero destituatur, non malè illi sentire videntur, qui statuunt, harum febrium causam præcipuè esse ichorem sanguinis, atque ob ichorem in primis sanguinem putredine corripit. Excrementitij enim humores magis sunt corruptioni obnoxij, neque Natura eos tanto studio tueatur, ut alimentarios. Gignitur autem ichor in corporibus plethoricis, cum fuligines & vapores, qui per poros cutis transpirare debebant, impedita transpiratione retinentur. Impedita transpiratio ex causis iis prouenit, de quibus antea dictum; omnesque causæ, quæ Synocham non putrem excitant, etiam Synocham cum putredine gignere valent: verum ad Synocham cum putredine causa potentior requiritur. Cum etiam sanguis in hisce febribus putrescere dicitur, non ita accipiendum id est, quasi vniuersus putrescat (nisi forsitan ad extremam corruptionem peruenit, morbusque lethalis sit) sed quod partes quædam eius, præcipuè ichorosæ, putrescant, ut in putredine secundum partem fieri solet, remanentibus eius quibusdam partibus integris, quæ vel seorsim à putri alicubi consistunt, vel etiam putridis permixtæ sunt & præter naturam ab iis incaluerunt, quæ tamen, ubi putridæ partes euacuatae & discussæ fuerint, ad pristinam naturam redeunt.

De totâ autem ratione putredinis in hisce febribus insignis locus est Fernelij, qui hinc non prætereundus videtur. Ita autem ille, libro 4. pathol. capite 6. Cum putredo venas communes inuadat, licet earum sanguinem, non tamen omnes eius partes æquè occupat. Cum enim non omnino simplex sit sanguis, sed ex multorum humorum permixtione compositus & sero multo perfusus, primò quidem illius portionem putredini magis obnoxiamprehendit; ab hac deinde aliam ipsi permixtam atque confusam, quæ minùs, quàm illa, sit vitiosa: hocque modo sensim obrepens simul cum calore præter naturam augetur & inualefcit,

Sanguinis in febre Synocha diuisione.

Quis humor putrescat in synochis.

An sanguis putrescens Synocha causam sit.

inualescit, nec antea desinit, quam omnes sanguinis partes putredini obnoxias absumpserit. Et mox: Omnibus, qua putrescere apta fuerunt, absumptis, putredo calorque febrilis cessat: manet tamen pars sanguinis melior, qua quoniam minus erat putredini obnoxia, huic inuiolata resistit, eaque licet putrida permisceretur, illius tamen contagione minimè computruit, sed duntaxat incaluit; restincta proinde sedatæque putredine in pristinam illam puritatem redit. Atque tum urina pura ac prorsus laudabiles apparent, qua crassa, turbida, ac sine sedimento fuerant. Itaque eâ putredine, ( nisi fortè extremo exirio fuerit ) neque sanguis uniuersus, neque totum labefactatur. Nam soluta febre non omnino exhausta vena manent, sed aliquid etiamnum in his inesse deprehenditur, idque vile & alendo corpori idoneum, quod tamen olim miscebatur putredini. Hæc Fernelius.

### Differentia.

Synocha putrida differentia.

Differentias autem harum febrium quod attinet, triplex febrium harum est differentia, Synochus enim vel est *ὀξυρροή* seu *αἷμαστος*: cum scilicet febris hæc in eodem statu manet, & neque crescit, neque decrescit; quod fit, quando tantum humoris putrescit atque accenditur, quantum discutitur; vel *ἀναγκαστος*, seu *ἐπικυραστος*, cum febris continuè accrescit & augetur; quod accidit, cum plus materiæ corrumpitur, quam discutitur: vel *συνεπικυραστος*, cum semper decrescit; cum scilicet plus discutitur, quam corrumpitur.

Deinde diuersitas humoris in venis putrescentis differentiam quandam iuppeditat. Nam cum massa sanguinea quatuor humoribus constet, seu in sanguineâ malisâ quadruplices partes animaduerti possint: Si eæ debitam proportionem inter se seruent, ita scilicet, ut temperationis sanguinis partis, quæ in specie sanguis nominatur, maior copia sit, quæcunque etiam reliquarum partium sit proportio, atque massa illa sanguinea putredinem concipiat: Synocha sanguinea in ipse nominatur. Si autem massa sanguinea non debitam humorum proportionem habeat, sed tenuior eius pars, quæ propter tenuitatem & caliditatem flauæ bilis naturam æmulatur, & propterea sanguis biliosus nominatur, putredine corripitur; Synocha biliosa dicitur. Fecit huius febris mentionem Galenus, 2. de diff. feb. cap. 2. cum scribit; *Continuarum; quæ ex bile flauâ proueniunt, unam esse speciem, quæ à continuo feruore Synocha appellantur, quarum uniuersum tempus unâ accessione consumitur.*

An etiam ex bile, pituitâ, melancholiâ, oriuntur febres Synochæ.

Alij, ut Donat. Anton. ab Altomari, part. 2. cap. 6. de febr. aliter hac de re docent, atque non solum Synocham à bile, sed etiam à pituitâ & melancholiâ fieri, & tot esse febrium continuarum, quot intermitterentium differentias, dicunt. Et Synocham quidem biliosam fieri statuunt, quando sanguis biliosus paruum excessum habens, & simul cum sanguine copioso permixtus putrescit in maioribus venis. Ita etiam à pituitâ & melancholiâ fieri dicunt Synocham, cum exiguum excessum habent, & cum redundantia temperati sanguinis commixti fuerunt. Et licet frequentius febres Synochas excitari concedit Altimarus, cum æquabiliter adaucti omnes humores putrescant, aut solus sanguis, ut quarta substantia, excedit, tamen etiam non rarè ex bile cum copioso sanguine putrescente calidè oriri statuit; rarissime verò ex bile nigra aut pituitâ cum eodem sanguine copioso permixtis. Atque hinc etiam Galenum has ex pituitâ & melancholiâ Synochas febres præterisse existimat; quod scilicet eorum mentionem faciat, quæ sæpius accidunt, parui facieps ea, quæ rarè aut rarissime contingunt. Difficulus enim hi humores, cum frigidi sint, intra vasa putrescunt; & si putrescunt, difficulter eorum putredo per uniuersa vasa confestim & citò porrigi potest, sed potius in quibusdam paruis minusque cali-

dis vasis detenti ac impacti ob crassitiem & tenacitatem putrescunt.

Verumenimverò non videtur Altimarus rectè naturam Synochæ biliosæ explicasse, cum statuit, Synocham biliosam oriri, prævalente sanguinis parte optimâ & sinceriore, & post eam saltem biliosâ aliquomodo excedente. Hoc enim si accidit, non est Synocha biliosa, sed sanguinea; cum ab eo, quod redundat, meritò fiat denominatio. Ut enim tertiaria notha, in quâ bilis & pituita simul putrescunt, bilis tamen præ pituitâ abundat, febris biliosa nominatur: ita & hic meritò si sanguis ille temperatior bilioso præualet, febris sanguinea esset nominanda. Eadem ratio est Synochæ pituitosæ & melancholicæ, quas introducit Altimarus, & cum sanguine abundante fieri statuit. A pituita autem & melancholiâ abundante febrem Synocham prouenire non posse, ipsi facile agnoscunt. Nam, ut rectè Galenus, 9. meth. med. cap. 3. habet, hæc febris non accenditur in corpore frigido, sed in iis, qui sanguine plurimo abundant: idque eâ de causâ, quod febris hæc gigni non potest, nisi id, quod transpirare debet, & copiosum sit & calidum, & nisi putredo in omnes, quæ inter inguina & alas sunt, venas æquabiliter ac citò porrigatur: id quod in frigido corporis habitu fieri non potest. Quod verò dicunt, Galenum Synochæ ex pituitâ & melancholiâ idèd mentionem non fecisse, quod rarè accidat: id admitti non potest. Cum enim aliarum febrium, quæ rarissimæ sunt, mentionem fecerit, etiam has, si eas dari animaduertisset, non prætermisisset in tot locis, in quibus de febribus agit.

Itaque alias febres Synochas non agnoscimus, quam sanguineam & biliosam. Sanguinea quidem cum omnibus plethoræ differentiis accidere potest, cum scilicet vel sanguis ille solus in specie dictus reliquos humores superat, vel omnes humores debitâ proportionem seruata æquabiliter augentur, vel vnus mediocrem excessum, cum sanguine tamen copiosiore, habuerit. Biliosa verò Synocha est, cum sanguis biliosus & tenuior putrescit.

### Signa diagnostica.

Signa autem quædam vtrique Synochæ sunt communia; quædam verò huic vel illi peculiaris. Primò enim hæc omnium Synocharum communis quasi idèa est, ut vnâ accessionem à principio usque ad finem habeant, nullaque in iis mutatio, nullus circuitus appareat. Deinde causas communes habent, proueniuntque principaliter à cutis hepatisque à crassis & viscidis humoribus obstructione. Pullius etiam non solum est magnus, sed & vehemens, celer, frequens, & ut in aliis putridis inæqualis & inordinatus.

Signa Synochæ putridæ.

Peculiaris verò signa sunt hæc: In Synochâ, quæ à sanguine bono abundante ortum habet, signa redundantis sanguinis apparent, facies rubet, venæ tument, lassitudo tenuia adest; exoritur febris in corpore calido & humido, ætate iuuenili, tempore verno, & tum in primis, cum consueta aliqua euacuatio suppressa est. Calor tangenti multus & vaporosus, minusque molestus & acris apparet, quam in aliis febribus. Nam in biliosis calor non est mitis, halituosus & multus, sed acer & mordax. Calor verò in pituitosis febribus, est primò mitis videatur, tamen si manus diutius admora teneatur, paulò post mordax & ardens quasi tactui apparet. Alia etiam signa, quæ in Synochâ non putri conspiciuntur, adsunt.

Verumtamen sunt & notæ, quibus Synocha hæc putris à non putri distinguitur. Etenim licet calor in Synochâ putri, si cum aliis febribus putridis conferatur, sit mitior, tamen si cum Synochâ non putri comparetur, calor in putri est acrior, quam in non putri.

Signa Synochæ putridæ à non putrida differentia.

Deinde



Deinde in putri Synochâ urina est rubra, crassa ac turbida, sine sedimento, cruda, aut saltem leuiter cocta in principio. Pulsus præterea putredinis notas, ut in aliis putridis febribus exhibet. Tandem & Symptomata omnia alia sunt vehementiora, quam in non putri, ut maior est dolor capitis, inquietudo, vigiliæ, & siquæ alia accidere solent.

Synocha putrida biliosa signa.

Biliosa verò Synocha suis quoque signis à sanguinea discernitur. Nam primò corripit hæc febris eos, qui sunt graciles, biliosi, & sanguine copioso, ac carne ita non abundans, qui vitam laboribus deditam agunt, corpusque multum exercent, & curis vexantur, qui in Sole & æstu diutius versantur, aut cibis, & medicamentis calidis sunt usi; & in genere, in quibus causæ præcesserunt, quæ sanguinem biliosum generare solent. Calor præterea, quam in sanguinea, est acrior & vehementior, sitisque magis vexat, urinae sunt tenuiores atque aciores, atque alia signa conspiciuntur, quæ febribus biliosis sunt affinia.

### Prognostica.

Prognostica Synocha putrida.

Est ea inter febres putridas simplicissima, & si pura sit & rectè tractetur, curatu facillima. Pura autem raro transit septimum diem; notha ad decimum-quartum extenditur, citiusque vel tardius finitur, quò scilicet signa coctionis citius vel tardius apparent. Quotò ergo urina in initio est rubicundior: tantò citius terminatur cum signis bonis ad bonum, cum malis ad malum. Urina autem alba in Synochis mala est, & plerumque mortem prædicat. Omnium saluberrima est, quæ ab initio mox decreuit, & *ἡ ἀναστροφὴ αἵματος* dicta: post hanc consistens, *ἀναστροφὴ αἵματος*: periculosissima est, quæ perpetuò increfcit, *ἐπὶ ἀναστροφῇ αἵματος* nominata. Si aliquandiu duret hæc febris, facillè in *ἡσυχίαν* degenerat. Quò mitiora habet symptomata, eò maior salutis spes est: malum verò est, ubi plura symptomata accidunt, qualia sunt, ægros magnâ inquietudine aut dyspnœâ fatigari, ventrem inflari aut rugire, pustulas nigras aut liuidas apparere.

### Indicationes.

Tota eius curatio consistit in causæ ablatione, & caloris febrilis temperatione. Sanguis quia in hac febre semper peccat, imminuendus, causæ etiam reliquæ per sua contraria tollendæ. Si nimirum ex causâ frigidâ corporis meatûs constipati sint, ij reserandi, corpusque rarefaciendum. Si ex obstructione id accadat, hæc aperienda. Videndum autem, à quâ causâ obstructio proueniat. Si enim ex abundantia humorum pendeat, ij minuendi: si ex crassitie, attenuandi. Et quidem cum in hac febre, ut dictum, semper sanguinis copia adsit: à sanguinis missione incipere conuenit. Sanguine imminuto, ad humorum, si crassi sint, extenuationem accedendum, & corpus, si constipatum sit, rarefaciendum est. Fernor quoque & æstus sanguinis temperandus. Atque has quidem indicationes causa suppeditat. Morbus verò, seu febris, refrigerationem postulat. Vitalem indicationem quod attinet, si vires, quod plerumque accidit, valentiores sint, statûsque breui sit futurus: tenuissimo victu usque conuenit: si vires iam imminutæ, aliquid adiiciendum. Eadem virium in hac febre plerumque constantia, vacuationes, quas causa postulat, permittit.

### Curatio.

Vitium in Synochâ putrida.

Quâ autem ratione ista expedienda sint, breuiter dicemus; cum pleraque ex curatione Synochæ non putris pateant.

Dan. Sennersi Tom. I I.

Victus ergo, ut ab hoc incipiamus, in hac febre tenuis requiritur: cum quia sanguis abundat, tum quia morbus est breuior. Et quidem refrigerans ac humectans. Vnde conuenit aqua hordei, & iuscula pulli, herbis vel succis refrigerantibus alterata. A vino autem & carnibus abstinendum, & aliis, quæcunque sanguinem multum generant & calefaciunt. Ad causas autem si respicias, aqua mulsâ, ad crassos succos attenuandos & viscidos detergendos, ad excrementa promouenda, commoda est in iis Synochis, quæ à putredine ex habitu corporis condensato & poris obstructis proueniunt. Quatenus tamen calorem auget, nocet. Quare si calor sit maior, abstinendum ab aquâ mulsâ. Et si obstructiones contumaces sint, oxymelite vtendum. Sed de his mox plura in pharmacîâ.

In auxiliis reliquis adhibendis nihil cunctandum, citòque naturæ succurrendum est, ne vel suffocatio, vel syncope accedat, vel febris ista in *ἡσυχίαν* degeneret. Itaque quamprimum, præmissio tamen, si opus sit, clystere, vena aperienda est. Duo enim, ut Galenus 9. *meth. med. cap. 5.* habet, maxima continentium febrium remedia sunt; sanguinis detractio copiosior, & potio frigida. De quantitate autem sanguinis, & an ad animi deliquium usque emitti debeat, antea dictum. Tutius nimirum est, ut infra subsistatur, & venæ sectio paulò post repetatur, quam ut ancipiti euentu ad lipothymiam usque sanguis euacuetur, simulque forsitan cum febre homo iuguletur. Conditiones enim istæ omnes, quæ ad sanguinis tam copiosam euacuationem requiruntur, raro in vno corpore reperiuntur; præsertim in nostris regionibus, ita scilicet, ut plenitudo quoad vasa sit pura & legitima, vires planè fortes, putredo non aded magna. Audaciùs tamen in hac febre, quam vllâ aliâ sanguinem mittere licet ad 3. xii. vel etiam plures. Eligenda verò vena est in cubito.

Vena sectio in Synochâ putrida.

### Pharmacîa.

Sanguine pro morbi vehementia & virium robore sufficienter euacuato, si febris non cesset aut mitigetur, suspicandum est, sanguinis aliquam partem in bilem degenerare, aut bilem coniunctam esse, à qua febris fomentum accipiat. Itaque ad ea medicamenta accedendum, quæ febris, sanguinis, & bilis calorem temperant, putredinemque inhibent. Et proinde, quod medicamenta attinet, ferè tractanda est hæc febris, ut biliosa. Itaque si purgatione opus sit, & aliquid sanguinis in bilem degenerauerit, eligenda sunt ea medicamenta, quæ humorem biliosum euacuant, & minùs calefaciunt: quem in vsum rhabbarbarum, tamarindi, Syrupus rosarum & violarum, vel succus eorundem commodus est.

Purgantia in Synochâ putrida.

Vt *℞. Rhab. opt. Drach. ii. cinnamom. Scr. i. flor. cichor. cordial. an. P. i. spice. Scr. β. Infund. inf. q. aq. cichorij vel endiu. vel feri lactis. Colat. ℞. Vnc. iii. β. Add. pulpa tamarind. Drach. vi. vel Vnc. i. Syr. rosar. sol. vel viol. sol. Vnc. β. vel Vnc. j. Aut in Colaturâ dissolu. manna. Drach. vi. vel Vnc. j. pro ratione ætatis; iterumque coletur.*

Verum plerumque materiæ euacuatio usque ad tempus crisis expectanda, ubi à naturâ cocta & victa faciliùs eiicitur. Si tamen in primis viis aliquid subsistat, clystere vel lenientibus medicamentis, ut pulpâ tamarindorum, syr. rosar. & violar. solutiuo euacuandum.

### Alterantia.

Ut autem coctio faciliùs absoluetur, vtendum iis, Alterantia quæ calorem temperant, obstructiones liberant, in Synochâ & putredinem inhibent; ut Syrupo de limonibus, de acetositis citri, de succo acetosæ, violarum, acetoso s. oxysacchar. s. spiritu vitriol. cum aquâ hordei,

hordei, endiuia, acetosæ, cichorij. Profunt & sem. 4. frigida maiora: sicut & condita vel electuaria, parata ex conf. rosar. acetosæ, acetosellæ, violarum, buglossi.

Vt *℥. Conserua rosar. acetosell. cichorij, citri, an. Vnc. i. lactuc. italic. condit. Vnc. β. santal. citrin. spec. diamar. gar. fr. an. Scr. i. Spir. vitriol. Scr. β. Cum syr violar. F. Electuar.*

*Frigida potus  
in Synoch.  
putrid.*

Coctione perfecta, Antiqui aquam frigidam propinabant, tantumque eius offerebant, quantum ægro liberet bibere, ut eam non solum calor febrilis exstingueretur, sed & materia iam cocta per vomitum, vel aluum, vel sudores euacuaretur. Sed de frigida potu antea in curatione febrium generali dictum. Cautè certè in nostris corporibus, frigida potioni raro assuetis, vsurpanda: cum plurima, quæ enumerauimus antea, inde possint oriri mala: & obseruatum sit, quosdam paulò post ex eius vsu in hydropem incidisse. Nunquam autem aqua concedi potest potus quotidiani, & alimentum distribuendi gratia; cum fluctuet & innatet in ventriculo, tardè descendat, coctioni resistat, hypochondria inflent: sed remedij saltem causâ, in quibus nulum ex eius vsu incommodum timetur, absolutâ coctione, semel concedatur iis, ut diximus, qui ei assueti sunt.

*Balneum  
aqua frigida  
in Synochis  
putrida.*

Antiqui etiam in hac febre, si æger esset *εὐσπαρῶς*, iuuenis, cæli status æstuans, febris vehementissima, in frigida natationem permittebant. Qui eam utebantur, protinus omnes iudabant, & nonnullis alius biliosa reddebatur. Verum cum nostri natationibus illis & balneis Antiquis vsitatis assueti non sint, ac præterea raro solum sanguis abundans sine cacochymia aliquâ reperiatur, metuendumque sit, ne à frigore balnei eiusmodi, habitu corporis densato, vapores putridi intus coëreantur, & putredo augeatur: non tutò hodiè balnea eiusmodi permittuntur.

Quod si absolutâ coctione naturam *νεκρὴν* quocunque modo instituere videamus, Medicus quiescat, secundum aph. Hippocr. 20. f. 1. *Qua decernuntur, decretaque sunt rectè, nec mouere, nec aliud quippiam nouare, seu medicamentis seu aliis irritamentis conuenire, sed sinere.* Si autem natura suum officium non rectè faciat, quod restat, medicamentis tollendum, ut mox in febribus ardentibus dicitur.

*Augerij Ferrerij de curandis synochis aduersionis.*

Vnum saltem adhuc addere libet, de quo Augerius Ferrerius, in *castigationibus practica medicina cap. 14.* monet; ut suprâ etiam iam diximus, quod non de nihilo esse videtur, præcipuè in hisce Synochis febribus. Is Medicos reprehendit, qui in continentibus & continuis febribus semper hepatis & lienis obstructions putredinis causam esse existimant, cutisque obstructions & constipationes, quæ impeditâ transpiratione putredinem excitant, negligunt; & propterea non oxymel Hippocratis & Galeni facillè paratu remedium, nec Arabum Iulepos, sed recentium apozemata ad viscerum internorum obstructions parant. Præter rem enim existimat eos facere, cum ad internas obstructions confugiunt, dum causa putredinis est fuliginosorum excrementorum retentio, quæ retinentur in corpore, cum aut insensibiles cutis meatibus ab externâ aliquâ causâ constipantur, aut crasso lentoque humore obstruuntur; & intempestiuam præstare eos diligentiam putat, qui ex tot aperientibus herbis & radicibus toties decocta ægris propinant. Laudat contrâ Antiquos, qui id inprimis agebant, ut, vacuatâ multitudine, crassos lentosque humores meatibus cutis infarctos attenuarent & detergerent. Neque id præstare posse decocta illa aperientia; cum radices illæ & herbæ aperientes visceribus ac meatibus vrinariis peculiariter dicatæ sint, ad cutem verò non penetrent, aut si penetrent, deficiant, vel minùs potenter agant, quàm longinquæ obstructionis natura postularer. Commodius hunc in finem Antiquos Oxymelite vel mulsâ vsos censet, quæ tum

evidenti qualitate, tum familiaritate naturæ, quam habent cum substantia corporis nostri, ad extremas quocunque particulas feruntur: cum contrâ verendum sit, ne insuauitas illarum decoctionum molestiam afferat, ac distributionem impediat. Ingrata enim remedia appetitum deiciunt & ventriculum subuertunt, facultates suas integrè vix impertiuntur; cum ob molestiam à naturâ repulsam patiantur. Medicos ergo Antiquos commendat, qui è tantâ remediorum syluâ paucula quædam selegerunt & renouarunt in vsum, quæ suauitate naturam allicerent, & oblectatione suas vires altius imprimerent. Et licet vehiculi vel condimenti loco saccharum eiusmodi in decoctis adiiciatur, tamen tot rerum confusione insuauia & nauseabunda euadere dicit, ut aut illud vehiculum exstinguant, aut id efficiant, ut repulsam à naturâ patiantur. Præterea intempestiuè talia in principio vel augmento febrium acutarum propinari statuit; cum vrinæ moueant, quæ tamen non nisi coctâ materiâ, vel inclinante morbo conueniant. Imò præter rem esse existimat, tanto labore ac sumptu insuane ac incerti effectus parare remedium, cum facili decocto, & leuibus expensis, ea, quæ à veteribus probata sunt, summâ cum securitate & voluptate non mediocri vsurpare liceat. Ipse itaque in continuis, omissis eiusmodi decoctis, mulsâ aut oxymelite vtendum censet, quæ ad tenuandos tergendosque crassos ac lentos, qui cutem obstruunt, succos satisfacere possint. Oxymel nimirum putredini resistit, crassitudinem attenuat, lentorem abstergit, ad cutem etiam penetrat, nec febres accendit. Mulsâ quoque concedi potest iis, in quibus non facillè bile scit. Nec nocumenta illa mordendi intestina, & tussis excitandi verenda putat; cum subtractione ponderis aceti & additione mellis salubriter præparari possit, ut neque rodat, neque tussis molestas excitet, neque nervosas partes offendant. Oxymeliti si mulsâ additur, mitius efficitur; si saccharum, aut hydrosaccharum, omninò delicatum. Quod si in Melancholicis & mulieribus, quarum vterus facillè offenditur melle & aceto, oxymelitis vsus suspectus sit, mulsâ vtendum docet, quæ si bile scere videtur, dilutissima parari potest ex aquis cichorij, endiuia, scariolæ, vel mellis loco purissimum saccharum cum aquâ decoquere licet, ut mulsæ loco hydrosaccharum præbeatur. Terger enim istud, & inter mulsam & oxymel mediam quasi naturam sortitum est. Dulcedinem autem tantillo aceti mitigare & infringere licet.

*Oxymeli  
& mulsæ  
vsus in Synochis  
putrida.*

## CAPVT XII.

### De Causa seu febre ardente.

Q Via verò hoc loco Causi seu febris ardentis solet ab Authoribus mentio fieri, etiam de eâ aliquid addendum est. *Καύσος* autem non est febris aliqua differentia, quales sunt biliosa, pituitosa, melancholica: verum modum potius & qualitatem caloris febrilis innuit. Quæ verò febres illam qualitatem participant, & quæ propriè ardentes seu *καύσος* dicantur, Causæ seu febri ardens. non adeò planum est; Galenûsque ipse non eodem semper modo hac de re locutus videtur. Nam interdum affirmat, febrem ardentem oriri ex bile in vniuersi corporis venis putrescente; aliquando causum fieri concedit non solum in vniuerso corpore, verum etiam in aliquâ eius parte, ut ventriculo, pulmone, ieiuno intestino, imò etiam extra venas maiores in carne alicuius particularis membri, quocunque nimirum biliosus humor attractus est, adeò, ut vniuersalem & particularem causum constituere videatur. Nonnunquam causum non solum ex bile flauâ, verum etiam ex falsâ pituitâ gigni dicit. Interdum tertianam intermit-

causum nominat, interdum verò tertianam ab ardente febre distinguit, quod nimirum in ardentibus intra vasa; in tertianâ verò intermittente extra vasa humores putrescant. Ita enim, 2. de cris. cap. 3. *Ardentes febres à tertianis differunt, quamvis eundem, qui eas facit, habeant humorem, quod in his quidem intra venas continetur, in illis verò, cum vehementer moueatur, per singulas corporis partes disseminatur.* Et 4. aph. 59. *Tertianâ febris ab ea, quæ ardens nominatur, humore faciente non differt. Viraque enim à flauâ bile fit. Differt autem, quod febris ardens habet in venis unâ cum sanguine flauam bilem redundantem & ebullientem. Tertianâ verò eandem bilem habet in totum corpus delatam & motam.* Et 2. de cris. cap. 6. *Exquisita febris ardens cum omnia alia seruet exquisita tertiana indicia, eo solo differt, quod neque cum rigore incipit, neque ad infibricationem desinit.* 4. verò de vict. rat. in ac. 1. 1. vbi Hippocrates hæc habet: *καὺσθ febris ardens sit, cum venula tempore æstiuo exsiccata acres & biliosas, quæ tennes sunt, trahunt ad se humiditates, quas ichores vocant: addit Galenus: καὺσθ propriè dictus non caliditatis, quæ in totum corpus fit, præstat modò vehementiâ, verum quoque & sitis. Nam sitis in eo vehemens est & incompescibilis.* Et paulò post: *Nempe in unâ corporis parte interdum καὺσθ gignitur, interdum & in toto corpore. Verum cum in toto sit corpore, sitis omninopariet; cum verò in unâ parte, non de necessitate, nisi pars ipsa sitis pariat: omnium autem primùm & maximè id facit os ventriculi; deinde ventriculus, post pulmo, & subinde ieiunum intestinum.* Et lib. de tremore & palpit. cap. 7. scribit: *Tertianâ exquisita καὺσθ est genere, tantò altero causo continuo inferior, quantò calor febris & flammæus & perurens deficit.*

Causi nomen quod modis usurpatur.

Quæ res facit, vt alij etiam Medici aliter de causo sentiant & loquantur. Vt autem res omnis expedita reddatur, Obseruandum, Causi nomen interdum generaliter & minùs propriè, interdum verò specialiter & magis propriè accipi. Generaliter si vsurpatur nomen causi, pro quacunque febre, id quod nomen innuit, cuius calor est vehementior, vsurpatur, ex quacunque etiam causâ calidâ & siccâ, & quocunque in loco putrescente, is excitetur. In specie verò causus appellatur febris, quæ duo pathognomonica signa habet, vt Galenus, 3. epid. comment. 3. t. 34. docet, calorem scilicet ingentem, & sitim magnam atque inextinguibilem, quantumvis biberint: quod etiam habet, 4. de vict. rat. in acut. 13. Et quidem in causo in specie dicto requirit Galenus, vt signa ista, sitis nimirum & calor vrens continuò affligant & molestant. Ita enim, allegato loco 3. epid. comm. 3. t. 34. scribit: *Videtur Hippocrates febrem ardentem assidue cognoscere suis, calorisque exurentis; sicut phrenitim perpetuo delirio. Sicut enim quamvis non perinde sitiant agri, neque valde exurantur, per totum autem morbum dicta duo symptomata adsint, febris ardens esse dicitur morbus; existitque alia febris hac calidior, vt & corpus fundat, reddatque deiectiones biliosas & colligatius; sed non appellatur ardens febris, nisi adiuncta perpetuò habeat per totum morbum paulò antè commemorata duo, irrequiescent sitim, quantumvis biberint, & ardentem calorem.* Quibus manifestè innuit, vt febris ardens propriè dicatur, hæc duo requiri, sitim irrequiescentem, & calorem ardentem, & quidem vtrumque perpetuò molestantem.

Causus propriè dictus duplex.

Hic autem causus propriè & in specie dictus duplex est, legitimus seu exquisitus, & nothus, vt ex loco iam citato colligere est, vbi in omni ardente febre non eandem vehementiam sitis & caloris esse innuit; manifestius verò traditur, 4. de rat. vict. in ac. 1. 13. vbi diuisionem Causi in legitimum & nothum ipse proponit, legitimumque seu exquisitum causum eum nominat, qui ista duo symptomata semper & euidenter coniuncta habet; nothum autem,

Dan. Sennerti Tom. 11.

in quo illa symptomata sunt minùs vehementia nec corpus ita vritur. Et 1. epid. comm. 1. text. 9. appellat febres ardentes quasi germanas, id est, non exactè exquisitas, quæ quidem fiunt à bile sincerâ, non tamen tempore æstiuo, & aère calido & sicco. Nam si aliqua conditio ex iis, quæ ad febrem ardentem legitimam sunt necessariae, quales sunt, temperatura corporis, ætas, aër, & alia ad bilis generationem necessaria, desit, febris quidem ardens est legitima, sed non exactè talis.

Ex quibus omnibus clarum euadit febres ardentes propriè & in specie tantum esse febres continuas, & quidem eas, quarum calor vrens est, quæque sitim incompescibilem coniunctam habent. Ideoque et si febres intermittentes ex bile ortæ generaliter ardentes nominari possint, vt Galenus tertianæ intermittenti exquisitæ interdum hoc nomen tribuat; prætereaque ex pituitâ falsâ καὺσθ hoc modo dictus gigni possit, tamen propriè dictus & legitimus causus, qui à Gal. etiam οξύμαθ & καυσώδης καὶ πυρετός nominatur, non nisi ex bilioso humore intra vasa putrescente, caloremque continuum cordi suggerente oriri potest. Et tales febres possunt esse tam continuæ, quam symptomatice, ex inflammatione præcipuè ἐν τοῖς ἐντέροις partium internarum ortæ. Verum cum antiqui, vt ex 42. aphor. sect. 7. patet, tales affectus, qui ex inflammatione visceris alicuius oriuntur, febres non appellarent, sed nomine inflammationis illarum partium, peripneumonias, phrenitides, &c. Si has febres excipias, καὺσθ seu febris ardens propriè dicta est tertiana continua, quæ ex sincerâ bile oritur, & de quâ modò egimus, Synocha biliosa, quæ non solum verus & legitimus causus est, verum etiam inter legitimos præcipuus. Quamvis enim Argenterius, lib. de feb. eos errare scribat, qui causi nomen etiam Synochis tribuunt; idque ideò, quod talem calorem Synochæ non habeant qualis est in ardentibus: tamen id solum de Synochâ sanguineâ non verò de Synochâ biliosâ concedendum est. Quod verò postea addit; in causo quædam esse intensiones & remissiones, quæ non sint in Synochâ: id solum affirmat, sed non probat de naturâ ardentium esse, vt habeant quædam intensiones & remissiones.

Febres ardentes quæ propriè.

Ac proinde quæ sint causæ febrium ardentium, ex iis quæ de Synochâ biliosâ dicta sunt, & quæ de tertianâ continuâ dicuntur, patet. Hoc saltem addimus, cum suprâ, in initio capitis 11. dixerimus, febres continuas ortum habere ex putredine humorum in venarum caua & arteriarum valis maioribus: id quod de arteriis dicitur, in febribus ardentibus accidere, & sanguinis in arteriis putredinem febres ardentissimas excitare. Equidem sanguis arteriosus cum sit spirituosus & calidus faciliè incalescit, sed non putrescit: cum sit purissimus & calidissimus. Si tamen putredo in venis accendatur, & semina putredinis ac vapores putridi arteriis etiam communicentur, putredinem eum concipere posse non impossibile est.

Corripit proinde febris hæc temperaturâ calidos & siccos vt iuuenes & ætate consistentes; inprimis si præcessit talis aëris constitutio: senes verò non faciliè.

### Signa diagnostica.

Signa pathognomonica esse calorem vrentem, & sitim inextinguibilem, iam dictum est; quæ tamen maiora sunt in causo legitimo, quam in notho. De sitis hoc notandum est, si accedat tussis leuicula, sitim non nihil retundi, vt eam pro febris magnitudine ægri non sentiant. Humor enim motu ex locis vicinis attrahitur, & partibus illis affunditur, vnde minùs siticulosi fiunt. Præter signa ista pathognomonica alia adhuc habet Hip. 4. de rat. vict. in acut. text. 4. quæ Galen. in com. ουσΩδης πύον nominat, qualia sūt: lingua sicca, aspera & nigra, vëtris

signa causi.



morbus, deiectiones pallidæ, vigiliæ, interdum quoque desipientia. Lingua quidem arefcit, quod tota corporis affectio sicca sit & calida, febrisque ipsa talis. Ventris verò morbus propter tenuium humiditatum, quæ illuc confluunt, acrimoniam oritur. Vigiliæ ob siccitatem: desipientia autem fit ab eâ, quæ ad caput recurrit, bile, & ob temperaturæ caliditatem siccitatemque. Respiratio quoque est difficilis, densa & magna, efflantque continenter os aperiendo, ut calidi spiritus efflatione leuentur. Quæ quidem symptomata omnia vehementiora sunt in legitimo, quam in notho caulo.

### Prognostica.

Prognostica  
febr. ardent.

Febres hæ, si puræ sint, non diu durant. Natura enim calorem tam vrentem, ac vehementia, quæ hanc febrem comitantur, symptomata ferre non potest. Nothæ verò, quia mitiorem habent calorem & symptomata, longiores sunt. Puræ ardentes plerumque se primo die terminantur interdum 9. 11. 14. Omnes autem periculosa sunt, ut scribit Hippoc. 4. aph. 43. *Febres quacunque non intermittentes tertio die fortiores fiunt, magis periculosa sunt. Quocunque autem modo intermittant, periculum abesse significant.* Aliæ tamen aliis sunt periculosiores, pro caloris & symptomatum vehementiâ ac virium robore. Febris habetur vehementior, pro maiori à statu naturali recessu. Ergo si contingat, quod tamen raro accidit, ut senex ardente febre corripiatur, id lethale est, ut habet Gal. 1. aph. 74. Non minus periculose decumbunt, qui in aëre frigido valde vruntur: Qui si nec vires validas habeant, nec signa coctionis appareant, fieri non potest, ut ferveant, ut idem Gal. 11. meth. med. cap. 9. ait. Quibus si accedant symptomata vehementia, eò periculosior morbus redditur; siue illa sint pathognomonica, siue superuenientia. Pathognomonica calorem vehementem & sitim inextinguibilem esse diximus: quæ quod sunt vehementiora, eò morbus est periculosior. Non tamen minus periculi denotat, si lingua sit arida, absit sitis. Alterutrum hoc significat, ut docet Gal. 3. Epid. comm. 1. tit. 5. vel ægrum delirio teneri, vel appetentem ventriculi facultatem emori. Exemplum febris ardentis periculosa proposuit Hippoc. 1. Epid. comm. 2. in descriptione tæpestatis tertiat. 75. *At cum febres ardentes inciperent, inquit, annuntiabant, quibus exitum immineret. Siquidem statim ab initio febris acuta eos corripiebat, à qua parum rigeant, insomnes erant, grauius angebantur, subundi, fastidiosi, paululum in fronte ac clauiculis exsudabant, sed nemo per totum corpus, Multa delirabant; timores, mæstitia aderant, extremitates subfrigida, ut summi pedes, magisque manūs.* Urinæ etiam periculum denotant, Nigrescentes enim malæ sunt, ut & tenues & crudæ, vel alia mala indicia habentes, de quibus alibi dictum.

Observatio  
de Urinæ,  
caussa frequen-  
tis deli-  
rij in fe-  
bris acutis.  
De Urinâ.

[ Equidem bonum est, urinas etiam in ægris sanorum similes esse; sed tum demum id bonum est, cum naturæ robore accidit. Possunt enim interdum urinæ ægrotorum urinæ sanorum similes esse, & apparere, cum ægri damno. Nam quod Hippocrates, 5. Coac. sect. 2. aph. 69. (secundum distinctionem Hollerij, sed 415. secund. Foëlij) de peripneumonia in specie scribit: *Quibus in peripneumonia initio urina crassa sunt, deinde ante diem quartum tenues fiunt, lethale;* id in omnibus febribus acutis, præcipue cum internis inflammationibus coniunctis, verum est. Urinæ enim, quæ antè crassæ erant, tenues & sanorum similes (tenues enim hic dicuntur non absolute tales, sed in comparatione cum crassioribus) euadunt tribus modis: primo cum urinæ, quæ ob materiæ copiam crassæ erant, naturæ robore vincuntur, & materiâ vitiosa seu per renes, seu per sudores euacuata, tenuiores, & sanorum similes fiunt: qui modus solum bonus est & criticus, Secundo tenues ex crassis fiunt

Urina tribus  
modis tenues  
fiunt.

urinæ, ob materiæ inæqualitatem, & virtutis debilitatem, quæ materiam modò vincit, modò ab ea vincitur, unde urinæ modò tenues, modò crassæ apparent; qui modus malus est. Tertiò adhuc peior est modus, cum urina, quæ antè crassa erat, subito attenuatur, ob materiæ & bilis ad caput, & aliam partem inflammata translationem. Quod cum accidit in febribus acutis & malignis, instantis delirij & phrenitidis indicium est; id quod sexcenties obseruavi, & cuilibet in febribus acutis obseruare promptum est & facile, ac diligenter obseruandum. Non raro enim accidit, ut non solum vulgus, sed & Medici non satis periti, si urinas meliores & sanorum similes fieri incipiunt, id pro bono habeant, spe tamen suâ fallantur. Ideoque attendendum, an, si tale quid accidat, critica aliqua euacuatio præcesserit, & an melius æger habere incipiat. Tum enim solum ista urinarum in statum sanorum similem mutatio, bonum signum est. Si verò nulla crisis præcessit, & æger non modò non melius, sed & deterius habere incipiat, tum id pessimum, & plerumque lethale signum est. Materia enim tum ad cerebrum rapitur, ibique inflammationem & phrenitidem, quæ frequentissime lethalis, & hanc consequentia symptomata, vigilias perpetuas, ac deliria excitar. Interdum tamen accidit, ut aliarum partium etiam, pulmonis, hepatis, pleuræ, inflammationes hoc modo excitentur.

Cur autem potissimum, & tam frequenter, in febribus acutis materia ad caput rapiatur, & deliria, imò phrenitis, excitentur, consideratione dignum. Causa autem huius rei in ipso cerebro & capite quaerenda est. Etenim primò venæ & arteriæ plurimæ cerebrum ingrediuntur, & in idem desinunt, pro nutritione, vitæ conseruatione, & spirituum animalium generatione. Nec dantur vasa ac viæ magnæ, quæ naturaliter euacuant, & aliorum materiam transuehant, sicut in ventriculo, liene, hepate, corde, pulmone. Secundo reliqua membra vapores communicatos facile dimittunt, quia perspirabilia & porosa. Cerebrum autem cranio conclusum durior & minus peruius, vapores detinere cogitur, donec incrassati, sub alia excrementitij humoris forma tandem defluant. Tertiò cerebri substantia mollis vapores & humores eò delatos facile immittit, & difficulter discutit, ob temperamentum frigidum. Quarto cerebri actiones continuæ sunt, & reliquo etiam corpore in ægris quiescente, animales in cerebro actiones in perpetuo sunt exercitio, ut in vigiliis, quæ febribus acutis familiares esse solent: quo exercitio cum spiritus animales absumentur, continuò nouum sanguinem arteriosum ad eorum refecctionem affluere necesse est, qui secum vapores calidos, quibus arteriæ repletæ sunt in febribus acutis, ad cerebrum vehit, unde id calefiat necesse est. Quibus accedit alimenti & sanguinis, qui ad cerebrum affluit, conditio. Etenim alimentum & spiritus, quæ ad cerebrum confluunt, pro visceris huius nobilissimi nutritione, & spirituum animalium tenuissimorum generatione, proportionata esse conuenit, nempe tenuia. Sanguis ergo tenuis, & spiritus vitales subtilles accalidi, non ipsi solum facile incalescunt, cerebrumque inflammant, sed & tenues & calidi vapores ipsis permiscuntur: quod non accidit in partibus, quæ crasso succo nutriuntur, & non tantâ copîa spirituum vitalium opus habent.]

Bonum autem signum est, si æger morbum facile ferat, si non admodum æstuet, nec nimia siti detineatur, nec grauius angatur; si facile spiret; si nullam partem internam dolere sentiat; si dormiat; si somno iuuetur; si corpus æqualiter calidum sit ac molle; si lingua non sit adeo arida, nigra & aspera; si urina bona. Tutum enim morbum & breuem significat, si statim appareat. Quod si iam signis coctionis apparentibus, cum virium robore, in die critico, larga à naribus hæmorrhagia accidat, procul dubio æger euadet. Est enim proprium, si quid aliud, ut Galenus, 1.

Epid.

*Epid. comm. 1. 2. 4. ait, exquisitarum febrium ardentium, ut per sanguinis eruptionem iudicentur. Iudicantur tamen nonnunquam & per sudores & alui reiectiones, & vomitum & abfceffus. Vide Institut. lib. 3. part. 3.*

[ Zacutus Lusitanus, de Prax. Med. Adm. lib. 3.

*obs. 110. ex annotatione D. Anton. Gomez, Prof. Med. in Acad. Conimbr. refert, feminam quandam candidam & rubicundam, cui menses ad annum trigessimum recte fluxerant, ab anno vigesimo, aduentante tempore verno, caufa correptam fuisse: quæ cum moritura videretur, sudore copioso leuabatur, post quem tubercula purpurea per corporis ambitum erumpebāt, amygdalarum formā, mollia & pruriginosa, quæ omnia cessabant, hæmorrhagia excitata per porum iuxta radicem pollicis pedis dextri, in interna parte; quo loco, aperto exiguo foramine, spatio quatuor horarum, sanguis rituli instar, quantitate duarum librarum, emanabat, quo euacuato, & à febre, & à tumoribus liberabatur. Varia remedia & ad causam, & ad hæmorrhagiam istam auertendam fuere tentata, sed natura suum cursum nunquam interrupit.]*

De Curatione Febris ardentis in specie aliquid hinc addere opus non est. Cum enim, ut antea dictum, Causus non peculiaris aliqua febris differentia sit, sed potius modus saltem, & tertiana continua legitimus & propriè dictus Causus sit: quæ curandi ratio debeatur, febribus ardentibus, ex curatione Biliosæ seu Tertianæ continuæ postea satis patebit.

## CAPVT XIII.

## De Febris continuis in genere, &amp; de Tertiana continua.

**C**um ea, quæ naturam, differentias, causas, signa & curationem earum febrium putridarum, quæ vnicâ duratione sine vllâ exacerbatione & remissione absoluuntur, & *αἰματὶς πυρετὶς* seu febres continentes appellantur, concernunt, absoluerimus, iam ad alterum febrium putridarum continuarum primarum genus accedimus, quæ continuæ in specie appellantur, & quidem etiam continuè durant, certis tamen interuallis & periodicis exacerbationes habent; vnde à nonnullis continuæ proportionales, seu proportionatæ & periodicæ nominantur, quod exacerbationes quasdam, quæ proportionem periodicis febrium intermittentium respondent, habeant. Febres enim hæc eo quidem cum continentibus conueniunt, quod vapores ex putridis humoribus continuè cordi communicantur, idque præter naturam calefaciunt: verum in eo differunt, quod vapores illi non æquali impetu continenter cordi, sed inæqualiter, nunc scilicet maiore, nunc minore copiâ communicantur, vnde caloris quædam remissio arque intensio oritur.

Causam continuitatis vulgò eam afferunt, quod humores putrescant in venis, vnde calor putridique vapores continuè possunt cordi communicari. Quod verò febres hæc continuitatem retineant, & ad *ἀντιπύρετον* non deueniant, Galenus, 2. de differ. febr. cap. ult. hanc causam reddit, quod ob crassitiem ac visciditatem humoris, facultatis expultricis debilitatem & viarum angustiam; Natura superflua expellere non possit. Quod verò inæquali copia, & impetu vapores putridi ad cor ferantur, eam causam reddunt, quod materia in venis paruis contineatur, à quibus vapores, propter eam, quam habent à corde distantiam, non possunt æqualiter semper illud calefacere, sed nunc magis nunc minus, prout putredo intenditur aut remittitur. Per venas autem minores hinc intelligunt non minimas & capillares, sed medias inter magnas & capillares, furculos scilicet & ramos venarum

*Dan. Sennerti Tom. 11.*

magnarum. Nam cum continuæ periodicæ non fiant, nili quod materia non simul tota præsens est, sed transmittitur aut attrahitur, vnde continua ad coreffumatio, non tamen tam facilis, quàm in Continentibus: ad id venas medias has commodissimas esse statuunt; cum si in magnis venis materia putrescat, ob loci amplitudinem & cordis vicinitatem, febris continens exciteretur in minoribus verò intermittens.

Alij aliter hac de re sentiunt, censentque non solum ad locum, sed etiam ad materiam putrescentem esse respiciendum, atque ex hoc potius petendam esse causam periodorum, tam in febribus continuis his periodicis, quàm in Intermittentibus. Materiam autem hanc esse humorem excrementitium. Ut enim à materiâ alimentali seu sanguine febres continentes fiunt: ita periodicas fieri statuunt ab humore excrementitio, qui cum naturæ molestus sit, atque à facultate expultrice moueatur, motu suo periodos efficiat. Nam ut Galenus, cap. ult. lib. 2. scribit: *Quæcumque per circuitus aliquot egritudinum accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus oritur habent, quæ scilicet membra vel mittunt, vel suscipiunt, vel generant vel attrahunt superfluitates.* Nam vel partes robustiores ad debiliores sua excrementa expellere solent; vel partes ipsæ ob dolorem aut calorem, aliunde materiam attrahunt; vel partes excrementa, quæ in iis generantur, ob imbecillitatem aut etiam obstructionem nequeunt expellere, quæ deinde in iis putrescunt.

Verumenimvero, ut ex hac controuersia nos expediamus, tota huius rei ratio à materiæ febrem producens natura & dispositione pendere, atque ab eâ discrimen inter continuas omnes, seu periodum habeant, seu eâ destituantur, & intermittentes oriri mihi videtur. Continentium enim febrium causam sanguinem corpori nutriendo dicatum esse, iam diximus. Continuæ verò periodicæ & intermittentes ab humore excrementitio & cacochymico oriuntur; vnde & febrium harum non parua est cognatio. Hæc tamen est differentia, quod materia intermittentium causa in primâ coctione, & circa hepar generatur, ibique vitium concipit & corrumpi incipit. Materia verò, quæ continuarum, periodicarum causa est, in secundâ coctione, quæ fit in liene & hepate, generatur; & proinde Sanguini perfectæ & alimentario permixta est. Siue enim chyli causa, cuius in prima coctione contractum vitium, in secundâ coctione corrigi non potest, siue ipsius hepatis vitio, quod malè dispositum etiâ ex bono chylo malum sanguinem generat, id contingat: quod vitium in secundâ coctione generatur, maximâ ex parte sanguini permixtum in venas mittitur, atque cacochymia in venis originem præbet. Nisi sonan humores isti vitiosi in melaraicis generentur, & hinc ad hepar deducantur & cum sanguine in omnes venas distribuuntur, ibique cumulati putrescant. Hoc excrementa retenta, præcipuè fuliginosa illa & serosa, faciunt: aut si quid aliud adhuc est, quod sanguinem bonum in venis corrumpere & in vitiosum & excrementitium humorem conuertere potest.

Atque hinc continuitatis periodorum & intermissionis ratio reddi potest. Etenim cum in Intermittentibus materia non sanguis sit, nec vnquam sanguinis formam habuerit, sed in primâ coctione generata sit: idè etsi in venas effundatur, tamen sanguini in venis non permiscetur, sed saltem confunditur, & propterea à Naturâ rectè agente, ut heterogenea expellitur: quæ expulsâ intermissio caloris & *ἀντιπύρετον* sequitur.

In continuis verò materia vitiosa non solum sanguini confusa, sed verè permixta est, habetque se sanguis putrescens instar musti aut ceruicis feruētis. Ideoque natura prius excretionem non instituit, antequam materia cocta, id est, vitiosa à bono separatum sit.

Atque hæc causa vero magis consentanea est, quàm quod, ob humorum crassitiem & visciditatem, facultas

*Continentium, continuarum, & Intermittentium discrimen.*

*Cur in sanguine paroxysmus fiat expulsio in Intermittentibus.*

*Cur eadem in continuis periodicis non fiat.*

tatis expultricis debilitatem, & viarum angustiam, naturam superflua expellere non posse, statuunt. Multæ enim febres continuæ dantur, in quibus materia non est crassa & viscida, sed tenuis; virtus non adeò debilis, & quæ postea in crisi ac statu ad expellendum sufficiat; viz etiam non sunt obstructæ.

*Periodi in  
continuis fe-  
bris dicuntur  
causa.*

Quæ autem periodorum sit causa in hisce febribus, & quomodo à continentibus differant, explicare non facile est, & quæ authorum dissentientes hac de re opiniones sint, antea dictum. Dicitur verò de periodorum causis postea pluribus in Intermittentibus; cum periodi febrium in Intermittentibus manifestissimæ sint. Vt verò breuiter hîc in re difficili, quid mihi probabile videatur, dicam: Omnino ubi nouus est paroxysmus, ibi nouam materiam suppeditari necesse est. Fieri autem hoc ideò, paroxysmumque intendi quidam docent, ubi materia putrescens maiore copiâ, quàm ante, cumulata est, & ad cor fertur. Non autem æquali semper copiâ vapores putridos ad cor ferri ideò statuunt, quòd vasa, in quibus sanguis putrescit, non nihil sint à corde remotiora, & propterea ob viarum ambages non possint æquali semper copiâ ad cor perferri. Cum enim maiore copiâ materia putrida ad cor peruenit, calor inde augetur & paroxysmus excitatur: qui vapores cum non nihil discussi sunt, febris remittit, etsi non planè cesset, cum adhuc vapores putridi, etsi non æquali copiâ, cordi comunicentur. Alij verò docent, à membris secundæ coctionis, hepate scilicet & liene, materiam nouam statas periodos obseruantem statis temporibus communicari, & quidem plerumque ab hepate, vnde etiam tertianæ continuæ sunt frequentissimæ. Quæ sententia posterior satis probabilis & veritati consentanea videtur & proculdubio in continuis, quæ certas periodos obseruant, locum habet. Verumtamen nec prior sententia planè reiicienda videtur, potestque locum habere in iis febribus continuis periodicis, quæ ita exacte periodos non obseruant, sed nunc vno die bis, nunc singulis diebus semel, nunc longiore, sed non ita certo spatio exacerbantur, prout ex vasis, in quibus sanguis præcipue putrescit, tardius vel citius vapores illi putridi & calidi cordi communicantur. Si tamen certum & statum tempus paroxysmus obseruet, etsi vno die bis recurrat, illud etiam ex hepate materiam nouam suppeditante fieri potest; cum multi venarum rami per eius corpus dispersi sint. Verum ubi de periodorum ratione in Intermittentibus dicitur, hæc clariora fient.

#### Signa.

*Signa conti-  
nuarum perio-  
dicarum.*

Signa harum febrium in genere patent, quòd scilicet nunquã ad *arripit* planè deueniunt; certis tamen interuallis, scilicet vel alternis, vel singulis, vel quarto die exacerbantur & remittunt. Nullum verò frigus, rigor aut horror exacerbationem antecedit, nec remissionem sequitur sudor. Et si putredo est in vasis à corde paulò remotioribus, iis in locis ubi consistit, vt & vicinis, grauitas, dolor & ardor percipitur.

#### Differentia.

Sunt autem harum febrium tres species. Aliæ enim alternis diebus exacerbantur, & à bile ortu habent, & tertianæ continuæ nominantur: Aliæ singulis diebus intenduntur, quæ à pituita proueniunt, & quotidianæ continuæ appellantur: Aliæ à melancholia oriuntur, & quarto quòque die exacerbantur, ac quartanæ continuæ nominantur. Vbi tamen, de quo postea dicitur, febres non dierum & paroxysmorum, sed ipsis causis, & humorum, à quibus proueniunt, varietate æstimandas & discernendas esse, obseruandum est.

#### De Tertianâ Continua.

Tertianâ nimirum Continua est febris putrida, à

sanguine cacochoymico bilioso in venâ causâ putrescente ortum habens; continua quidem, sed tertio quòque die magis affligens.

#### Causa.

Causa nimirum huius febris est bilis excrementitia. Etsi enim quidam statuunt, etiam ex bile alimentali febres has prouenire posse: tamen quia illa nihil aliud est, quàm sanguinis calidior pars, non continuam periodicam, sed synocham biliosam generat. Sola ergo bilis excrementitia sanguini permixta tertianam continuam parit. Et quidem bilis illa excrementitia vel generatur ex tenuiore & calidior sanguinis parte, quam alij bilem alimentalem nominant, vel à primo ortu fuit excrementitia, & vt excrementum secundæ coctionis in hepate generatum fuit. Quæ ipsa bilis varij generis esse potest, flaua, vitellina, porracea, æruginosa, ichorosa. Arque hæc bilis colligi potest non solum in venis magnis publicis, verum etiam iis, quæ sunt in parte aliqua, vt hepate, pulmone, vtero.

Causæ verò remotiores sunt omnia illa, quæ humorem hunc multiplicare possunt. Hepatis vel totius corporis intemperies calida & sicca, ætas iuuenilis, alimentâ calida & sicca, inedia, aut victus tenuis & parcius, exercitatio corporis vehemens & frequens, æstus aeris, siue à regione, siue à tempore anni, siue ab alia causâ ortu habens, vigilæ nimix, cogitationes attentæ, & similes.

*Causa remota.*

#### Signa diagnostica.

Signa huius febris sunt primò ea, quæ omnibus febribus continuis sunt communia. Deinde hîc adsunt febrium ardentium Signa pathognomonica, qualia diximus esse calorem vrentem, & sitim inexhaustam, quæ tamen pro causæ ratione nunc vehementia sunt, nunc minùs vehementia. Reliqua etiam Signa *quædam* dicta ardentis febris, & alia signa, bilem arguentia in tertianâ continuâ conspiciuntur, qualia sunt vigilæ, aut somnus levis, insomnia iram præ se ferentia, deliria, oris amaritudo, linguæ siccitas & similia.

Prognostica quod attinet, de iis cum capite præcedente latis dictum sit, ea hîc repetere opus non est.

#### Curatio Tertianæ continuæ febrisque ardentis.

Et cum eò loci febrem hanc periculo non vacare dixerimus: curationem præsentem postulat, nulla; hic cunctatio admittitur. Et quidem cum in eâ calor sit maximus, à quo & nomen sæpe habet, vt ardens appellatur, refrigerationem maximam postulat, eamque non solum febris, sed & causa febrilis, quæ est bilis, indicat. Ipsa enim cum sit naturâ suâ calida & sicca, refrigeratione & humectatione opus habet. Et quidem in febre hac magis refrigerantia & humectantia, quàm in vllâ aliâ, requiruntur. Humor quoque peccans, nisi à naturâ euacuetur, aut euacuari possit, commodè euacuandus est. Si autem febris sit notha, aliisque humor admixtus, tam medicamenta & alterantia ac concoquentia, quàm euacuantia humorem, qui cum bile peccat, respicere debent. Symptomata quoque aliqua, si valde vrgeant, vires deiciant, ipsa curationem ad se trahunt, & nisi iis, quæ causæ & morbo aduersantur simul tolli possent, mitiganda sunt. Victum quod attinet, cum hæc febris acuta sit, tenuem victum requirit, & quò morbi vigor propior vel remotior est, eò magis vel minùs tenuem. Idem, si vt medicinalis consideretur, frigidus & humidus sit, eandemque, quam medicamenta, intentionem habeat.

Quibus autem auxiliis ista perfici queant, porro videndum. Et primò quidem occurrit controuersia de venæ sectione, atque disputatur inter Medicos, An li-

*Vena sectio in febre ardente locum habet.*



ceat in febre ardente venam aperire. Sunt qui in ardentibus febribus à venæ sectione abstinendum censent: quod Galenus aliquoties in humoribus à sanguinis naturâ longè recedentibus à venæ sectione abstinendum moneat. Hinc Auicennas, 4. primi doctrina §. c. 20. metuendum putat, ne æger deducatur ad periculum cholericum, seu bilis ebullitionem sanguine bono euacuato. Verumenimvero si illa, quæ supra in genere de venæ sectione & explicatione quæstionis, An in caco-chymia vena sit secanda, dicta sunt, diligenter perpendamus: in ardente quoque, modò vires id permittant, venam aperiendam esse patebit. Nam causa morbi continetur in hac febre in ramis venæ causæ, biliosusque humor sanguini permixtus est; unde apertâ venâ non exigua vitiosi humoris quantitas cum sanguine euacuatur, ut natura postea reliquum facilius vincere & coquere possit. Inprimis cum natura meliorem sanguinis partem circa nobiliora viscera & in maioribus venis detineat; prauos autem humores, expultricem stimulantem & naturæ molestos, ad remotiores & extremas venas propellere soleat: unde accidit, ut apertâ venâ sanguis deterior plerumque primo loco effluat. His accedit quod maximâ refrigeratione in his febribus opus sit, quam commodissimè præstat venæ sectio, dum vnâ operâ & pars materiæ peccantis tollitur, & sanguis ventilatur ac refrigeratur; imò à nobilioribus partibus reucllitur. Et ipsa experientia ac natura nobis quasi viam ad hoc auxilium capeffendum monstrat: cum ij, quibus copiosior sanguinis per nares euacuatio à natura fit, minùs periclitentur. Testatur Hippocrates, 1. Epid. comm. 2. §. 68. eos à febribus ardentibus euasisse, quibus sanguis è naribus effluebat, reliquis quibus id non accidisset, pereuntibus. Quinimò minùs periclitabantur mulieres; quippe, ut Galenus addit, quæ ingenitum auxilium habebant, purgationem menstruam. Vnde nonnullis & sanguinem è naribus, & menstrua fluxisse Hippocrates scribit; ac nullam earum, quibus aliquid horum ritè euenit, mortuam vidit.

Neque vlla bilis ebullitio, sanguine, à quâ temperabatur, detracta, metuenda. Hæc enim tunc fieret, si sanguis solum bonus detraheretur, & bilis in venis relinqueretur. Cum verò sanguis cum bile, ut in venis mixtus continetur, venâ apertâ effluat: eadem manet sanguinis & humorum reliquorum in venis proportio, quæ antea. Imò si, ut paulò ante diximus, maior humoris vitiosi, seu bilis, in venis externis, quàm internis copia detineatur, sanguinis boni maior copia in venis relinquitur.

Vena autè quamprimum & mox in principio morbi aperienda. Si tamen initio neglecta sit, etiam in augmento admittitur. Et quidem satis copiosè sanguinem in hac febre euacuare licet: non tamen tam copiosè, ut in Synochâ; cum nec ea in hisce febribus adsit sanguinis copia, nec vires, ut in Synochâ; tam fortes sint.

Medicamenta quod attinet, ea respiciunt vel causam vel morbum. Morbus alterantia requirit: causa cum alterantia & præparantia, cum euacuantia. Et primo quidem loco summè necessarium est, ut aliud & primæ viæ euacuentur; cum ut venæ sectio rectius institui, tum reliqua medicamenta adhiberi possint, tum ne biliosa & putrida excrementa in primis viis hærentia, calorem & symptomata febrilia, inprimis capitis dolorem, augeant. Sint autem ista medicamenta frigida & humida, vel certè temperata ac humida, ac vi abstergendi prædita, non autem calefaciant. In hunc finem, & quidem mox ante venæ sectionem, commodissimè clyster injicitur, qui & citò operatur, ut ejus causâ venæ sectionem differre diu opus non sit, & sine omni aliorum humorum perturbatione aut calefactione primas vias abstergit & eluit. E. g.

℞. Malua, violar. endiu. lactuce, an M. j. parietar. mercurialis, bordei, an M. ss. sem. 4. frig. mai. an. 3. j. endinia 3. j. prunor. num. viij. Coqu. in f. q. a. f. Colat.

℞. lb. i. Adde Cassia vel El. lenitia f. 3. j. vel 3. j. B. ol. viol. 3. ij. mell. viol. vel sacch. rub. 3. j. salis 3. ss. F. Clyster.

Vel si corpus sit pituitosius, calorque febrilis minor, talis parari potest.

℞. Kad. alth. 3. j. malua, parietaria, mercurialis, branca vrsine, an M. j. surfuris in petiâ lig. M. ss. flor. chamam. p. j. sem. frig. mai. an. 3. ss. fenic. 3. j. Coqu. in f. q. a. f. Colat. ℞. lb. j. elect. diacatholic. 3. j. ol. chamam. viol. an. 3. j. B. mel. ros. col. 3. j. salis 3. ss. F. Clyster.

Post clysterem, vel si æger clysterem non admittit, Lenientia dicta medicamenta variis formis adhiberi possunt. Vt:

℞. Pulpa tamarind. 3. vj. cass. extr. 3. B. Cum sacch. F. Bolus.

Vel ℞. El. lenit. f. 3. vj. Pulpa tamarind. 3. iij. Cum sacch. F. Bolus.

Potest & sacchari loco in bolis formandis saccharum rosatum tabularum vsurpari, vel saccharo aliqua pars sacch. ros. tabulari admisceri. Habet & hic Cremor Tartari locum.

Vel si forma potabilis placet, ℞. Manna opt. 3. i. B. vel 3. ii. Dissolu. in prunorum, & tamarindorum decocto, Et colentur.

Vel: ℞. Pulpa tamarind. cassie extr. an. 3. B. syr. ros. fol. violar. fol. an. 3. j. aq. endiu. q. s. F. Haustus.

Si corpus sit robustius, etiam elect. diacatholicum vsurpare licet.

Massarias monet, in hac febre abstinendum esse à mannâ, syrupo rosar. & violar. fol. & aliis medicamentis, quæ ex melle & saccharo præparantur, imò ipsâ cassiâ, cum facile in bilem conuertantur. Verum, quod ipse diffiteri non potest, facile hoc præcaueri potest, si admisceatur pulpa tamarindorum, quam ipse insignem in hac febre prærogatiuam habere dicit, vel etiam admixtione frigidarum aquarum, decocti prunorum acidorum, vel feri lactis.

Si humores excrementitij in ventriculo hæreant, inprimis si vomitus & nausea vrgeant, vomitu rescindendi sunt, vel irritando fauces, vel exhibitio vomitorio, de quibus supra, de Curatione febrium putridarum in genere, dictum.

Venâ sectâ, si materia turgeat, vel etiam si materia in primis viis sit copiosior, aut natura robusta, ut istis humoribus non facile irriteretur, ad paulò fortiora ascendendum. Plerumque tutius est, ut lenientia illa antea numerata in maiore dosi exhibeantur. Scammoniata autem & similia calida purgantia vix vsurpanda, ne humores reliqui nimis agitentur, corpus incalcescat, vel diarrhœa aliqua, quod in biliosis corporibus facile accidere solet, exoriat. Rhabarbarum quidem conuenit, ut & Myrobalani: verum non in substantiâ; cum hoc modo exhibita adstringant, sed potius in infusione aut decocto, cum aquis refrigerantibus aut sero lactis caprini.

Si tamen fluxus alui adsit, in substantiâ exhiberi potest. E. g.

℞. Tamarind. 3. B. prunor. Damasc. iunibar. sebesten. an. num. x. flor. cordial. an. P. j. cichor. P. j. sem. 4. frig. mai. an. 3. B. endinia 3. j. Coqu. in f. q. decoct. bord. f. lq. Colat. f. q. Infunde rhabar. opt. 3. i. B. vel 3. ii. spica Scr. B. Colat. 3. iii. adde syr. rosar. aut viol. fol. Vnc. i. vel manna aut cassia aut diaprunis compos. lenitini (quod commodum in acutis est medicamentum) Vnc. B. F. Haustus.

Vel: ℞. Syr. ros. fol. diasereos. aq. acerosa Vnc. i. B. Misce.

Vel ℞. Syr. ros. vel viol. fol. an. Vnc. ii. diasereos Vnc. i. Misce.

Tenuioris fortunæ & robustioris naturæ habitui Elect. diacatholicum, ut dictum, concedi potest, cui stimuli loco addere licet Elect. è prunis compos. laxatiu. rosati Mesuæ, de succo ros. de psyllio.

Plurimi, nec sine causâ, serum lactis caprinum commendant, ut in quacunque febre biliosa continuâ præstantissimum remedium, quod & temperare ac

Serum lactis.

Quando vena aperienda.

Remedia toriana continua & febris ardens. Alium loquuntur.

evacuare humores biliosos possit & viscera roborare. Infundunt in cyatho vno seri lactis caprini, rhab. Drach. i. vel Drach. i. sem. aut addunt syr. rosar. solut. Vnc. ii. vel Vnc. iii. & postea alias duas libras, ne totum serum sapore medicamento inficiatur; ebibendas propinant. Et omnino utilis est in febre potus seri lactis, præcipue cum oxymelite, quod separat serum à lacte crasso. Ideoque si meruatur fluxus alui, omitti potest rhabarbarum, & saltem syr. rosar. solut. Vnc. ii. in decocto tamarindor. dissoluti exhiberi, & hinc serum lactis propinari.

### Alterantia.

*Alterantia.*

Reliqui humores, ut rectius à natura vincantur, coquantur, & postea suo tempore expellantur, alterandi & præparandi sunt: quod quæ præstant, vnâ operâ calorem febrilem mitigare possunt.

Conueniunt ergo refrigerantia & humectantia, putredini resistentia, aperientia, & viscera roborantia. Inferuiunt huic rei syr. acetosus s. oxymel s. dilutus; oxysacchara s. syr. acetos. s. citri, granator. acidor. endivia, cicchorij, acetosa, violarum. Conueniunt etiam semina 4. frigida maiora, portulaca, lactuca, s. nymphae, santalum.

*Delectum medicamentorum alterantium.*

Delectu tamen aliquo interdum opus est. Monent enim hic nonnulli, ne syrup. violar. solus detur, cum laxet stomachum, & proinde semper aliquid acetosi admittendum esse censent, ut & facilius penetret in venas & calori febrili resistat. Quod si non fiat, tales syrupi, antequam in venas, penetrant, calore ventriculi conuertuntur in vaporem calidum qui postea maiorem sitim inducit. Ita si venter sit laxior, potius rosæ quam violæ conueniunt. Ita si bilis sit pura, acrior & tenuis, talia refrigerantia & humectantia eligenda, quæ renuitatem bilis, sine adstrictione tamen, nonnihil remittunt: Ideoque tum conueniunt syr. rosar. simpl. infusionis, portulacæ, acetosæ, ribium. Si verò pituita aliqua adsit, aliquam partem eorum, quæ aperiant & attenuant, adiicimus. Qualia sunt radic. petroselini, fœniculi, asparagi, syr. de 2. radic. byzantinus. E. g.

℞. Rad. acetosa, graminis, an. Vnc. sem. endivia, lactuca, acetosa, an. M. sem. sem. 4. frig. mai. an. 3. i. santal. omn. an. 3. sem. flor. violar. nymph an. P. ii. tamarind. Vnc. sem. Coqu. in f. q. aq. hordei s. Colat. clarificata ℞. Vnc. vi. Adde vini granat. vel syrup. granat. acidorum Vnc. ii. vel Vnc. iij. Misce.

Vel: ℞. Aq. endiu. acetosa an. Vnc. iij. nymphae Vnc. ii. vini granat. acidor. aceti vini albi an. vnc. i. sem. sacchar. albi. Vnc. ii. F. Iulebus.

Vel: ℞. Syr. acetos. f. Vnc. ii. violar. endiu. an. Vnc. i. aq. cicchorij, acetosa, an. Vnc. iij. Misce. Potest etiam spir. Vitriol. vel Salis addi.

Vel: ℞. Iulebi violar. rosar. an. Vnc. i. aque hordei vel cich. lb. sem. spiritus vitriol. rectif. q. s. ad gratam aciditatem. Misce.

Vel: ℞. Oxysacch. s. Vnc. iij. aq. endivia, acetosa, an. Vnc. iij. sem. Misce.

Vel: ℞. Syr. de nymphae, de portulaca, deribes, an. 3. i. aq. nymphae, acetosa, lactuca, an. 3. iij. s. spiritus salis gutt. viii. Misce.

Vel: ℞. Aq. fontana purissima lb. i. s. sacchar. candi alb. dr. v. Bulliant leniter atque colentur. Colaturæ adhuc feruida adde santali rubri pulu. 3. iij. s. citrini 3. i. spir. vitriol. rectif. Scr. s. succ. citri 3. i. aq. cin. gutt. xii. Misce.

Potest & tinctura rosar. iuleb. rosar. violar. syr. de succo ribes, vel etiam plus spiritus vitriol. addi.

In febre continuâ biliosâ, præcipue ex bile porraceâ & æruginosâ. Io. Langius, lib. 3. epistol. 1. c. 4. hunc syrupum commendat.

℞. Crystalli purissimi in porphyrio subtilissimè triti, 3. s. Derur cum decocto aut stillaricio liquore portulacæ, oxalidis, endivia & syr. acetos. citri, vel de succo limonum.

Est enim crystallus, addit Langius, alexipharmacum portaceæ & æruginosæ bilis, ac dysenteriae antiodorus, totâ substantiâ & qualitate manifesta, ut Petrus Apennensis in suo de aquis libello testatur experienciâ scindit.

Reprehendit hoc loco Massarias illos, qui syrupos dilutiores ex aquis frigidis destillatis & Syrupis paratos, sitis leniendæ & extinguendi caloris gratiâ, continuo ferè quacunque diei horâ ægris propinant, monetque tales porciones, etsi sitis & calori extinguendo sint dicata & viles, non quacunque tamen horâ, nec sæpissimè de die exhibendas esse, sed tantum vacuo ventriculo propinandas. Quod nisi fiat, coctionem turbare dicit, tantumque abesse, ut sitim leniant, ut eam potius augeant.

Monet idem Massarias, ut à syrupo de acetositæ citri, de portulacâ, de limonibus, vel granatis & similibus planè abstinemus: cum insigniter adstringant, ac propterea impeditâ perspiratione, obstructionem, morbum, & causam morbi possint augere. Verum non simpliciter id admitti potest. Nam primò omnia acida non adstringunt, neque acida, ut acida, adstringunt. Itaque Syrupi ex succo acetosæ, acetositæ citri, de limonibus, aciditatem quidem omnes habent, non tamen necessariò adstrictionem, aut siquæ ipsis inest adstrictio lenis est, quæ & saccharo temperatur. Cum autem aciditatis ratione & suâ naturâ valde in hitce febribus viles sint: leuis illa adstrictio multum obesse non potest. Nam calorem si respiciamus, refrigerant; si putredinem, exsiccant; si obstructionem, incidunt; si adsit malignitas, peculiari facultate ei aduersantur: & proinde plus commodi afferunt, quàm leui adstrictione nocere possunt. Imò si nimia adsit humorum tenuitas, acrimonia & mobilitas, leuis aliqua adstrictio & humores temperabit, & partes roborabit. Verum de quæstionibus hisce, an adstringentia in putridarum febrium curatione conueniant, & an acida suâ naturâ adstringant, videatur Io. Baptista Syluaricus, Contron. 50. & 51.

Non solum autem decoctis, Iulepis, syrupis & eiusmodi potionibus calorem temperare licet, sed & Electuaria ad calorem febrilem remittendum, & viscera roboranda vtilia sunt, cuiusmodi supra in curat. synochæ putris proposui.

Vel. ℞. Conseru. viol. acetosa, acetosella, an. Vnc. j. rosar. vitriol. rob ribium, an. Vnc. j. s. spec. diamarg. frig. Drach. j. lactuca Ital. condita. rad. cich. condit. an. Vnc. s. Cum syr. acetosa. F. Electuar.

Si libet, potest crystall. tenuissimè puluer. addi Vnc. s.

Vel. ℞. Conseru. rosar. nymph. acetosa, borrag. an. Vnc. j. rob ribium Drach. vj. spec. diamarg. frig. Drach. s. spir. vitriol. gutt. vij. Cum syr. acetos. citri q. s. F. Electuar.

Possunt & conseruæ aquis dilui. Vt.

℞. Conseru. rosar. violar. acetosella, an. Vnc. j. aq. acetosa. violar. hordei an. Vnc. iij. Parum calefiant & colentur, atque addatur succi citri & Oxysacch. s. an. Vnc. j.

Maximopere hodie commendatur & in frequenti usu Chymicis est nitrum albißimum, in conueniente liquore dissolutum.

Ægyptij, quibus febres illæ ardentes familiares sunt, potiones etiam aliquas peculiare parant, quas pro secretis auxiliis habent, quas descripsit Prosper Alpinus, libro 4. de medic. Ægypti. cap. 15. Propinant nimirum aquam stillaticiam anguriz, cucumeris, melonum. Inprimis ipsis vîitata est potio, quam Idem lib. eod. cap. 3. describit, quæ in ardentibus febribus & lateris inflammationibus, præstantissimum habetur remedium, cum sitim exstinguat, caloremque febrilem minuat, & non minus urinam prouocet.

℞. sem. melon. Vnc. iij. anguria, cucurbita, cucumeris, an. Vnc. j. s. glycyrrh. rasa sacch. cand. an. Vnc. j. s. sem. fenic. Drach. iij.

*Contra in refrigeranti. huc exhibenda obseruanda.*

*An syrup. acetos. citri de limon. granat. & c. in febribus his conueniant.*

*Medicamentum Ægypti vîitata.*

*Crystalli purissimi.*

Quæ

Quæ omnia in mortario contundunt, & in peria parua ligant, ex qua aqua rosacea irrorata lac expriment, quod ægris propinant. Atque hoc potionis genus communiter parant, cuius facultates variant, variis additis medicamentis, prout variorum morborum & causarum usus poscere videtur. In ardentibus enim febribus, in quibus maiore refrigeratione opus est, prædictis addunt semina endiuia, lactuca, psyllij, portulacæ, albique papaueris. Usurpant & familiariter decoctum vel infusum berber. cui pulpam tamarindorum vel alia semina, prout morbi ratio postulare videtur, addunt.

Parant & hanc potionem: In aqua multâ saccharum dissoluunt, eique admiscunt tantum succi limonum, quantum aquam modicè acidam reddere queat. Atque hunc potum & sanis pro siti extinguendâ exhibent. Pro ægris eundem parant ex aqua endiuia, & si febris non careat malignitate, cum aqua rosarum. Posset ad eundem modum cum spir. vitriol. parari.

Topica in febribus ardentibus.

Ad calorem temperandum & Topica conueniunt, vt Epithemata, olea, vnguenta, quæ cordi, hepati, dorso applicantur; in quorum tamen usu cautione opus est, Cum enim calor nullam, per quam expiret, viam habeat, nisi poros cutis: videndum, ne frigidis ii occludantur & hoc modo magis incendium excitetur. Ideo præsentè plenitudine, temerè admonenda non sunt, & vix ante statum conueniunt. Et in febribus, quæ per periodos infestant, commodissimè applicantur in vigore paroxysmi. Caliditate enim per totum corpus expansâ, reliqua quæ circa viscera est, facilius extinguitur. Ingruente autem paroxysmo, non applicanda sunt, aut si adsint non remouenda. Cordi autem inprimis, utpote quod maximè à colore febrili afficitur, ea ad-mouenda: si tamen, quod in febribus, quæ aliquas remissiones habent, accidit; in venis alicuius partis materia hæreat, vt in hepate, pulmonibus, & illi succurrendum.

℞. Aq. ros. opt. Vnc. iiii. acetosa, nymphaea, an. Vnc. i. aceti ros. Drach. vi. spec. diamarg. frig. santali citrin. an. Drach. β. camphora Scr. β. croci gr. vi. cort. citri Scrup. i. f. Epithema cordis.

Quod tamen calidum potius quàm frigidum applicandum est. Nam si frigida actu applicantur talia, calor versùs interiora repellitur & collectus magis vrit, & medicamentorum vis, clausis poris, minùs ad interiora penetrat. Si autem calida applicantur, faciliè ad interiora penetrant, & per poros cutis patentes calor febrilis faciliùs exhalat & expirat.

Vel ℞. Vnguenti rosac. rec. Vnc. i. flor. ros. rub. siccat. Drach. β. santali citr. flor. nymph. luteæ, an. Drach. i. ligni aloës Scrup. β.

Parum calefiant, & vbi vnguentum vires ex puluere attraxit, colentur, & addantur camphoræ gr. vi. f. Linimentum.

Vel ℞. Flor. cordial. an. M. β. spec. diamarg. frig. Drach. i. santal. omn. an. Drach. i. ligni aloës Scrup. i. camph. Scrup. β. f. Sacculus pro corde cum serico rubro.

Hepati potest tale Epithema adhiberi.

℞. Aq. ros. endiu. an. Vnc. iiii. portulacæ, aceti rosac. an. Vnc. i. santalorum omn. an. Scrup. i. spodi ex ebore, camphora an. Scrup. β. Misce.

Si magnus ardor circa pectus sit, pectus, & inprimis spina dorsali, tali linimento inungatur.

℞. Vnguenti infrig. Galen. ol. viol. mucilag. sem. psyllij, aq. ros. extractæ an. Vnc. sem. f. Linimentum.

Concoctâ materiâ, naturæ motus attendendus, & num illa eam expulsiua sit, obseruandum.

Aqua frigida potum in febribus ardentibus.

Antiqui hoc tempore, & vt naturam ad expulsi-onem stimularent, & roborarent, aquam frigidam copiose bibendam exhibebant. Vt enim Galenus, 9. meth. med. c. 5. scribit: Potio frigida extinguit febre, naturam robustam reddit, vt deinceps per aluum & sudorem expel-

lat, quæcunque noxia sunt: Testaturque 4. de rat. vict. in ac. 2. 12. frigida potum in causo biliosos humores vel perfectè euacuare, vel extinguere adeo; vt ex innumeris illis, quibus eam prebuit tempore opportuno, nemo unquam mortuus fuerit. Imò in hac febre leni aliquo coctionis principio apparente, confidentiùs, quàm in aliis, potus frigide admitti potest. Tanta enim est in eâ humorum efferuescentia, vt nisi plurimum refrigeres, parum proficias. Ideoque non solum, vt dictum, aqua frigida, coctione factâ; sed ad coctionem iuuandam & humores alterandos refrigerantia copiosius & inter hæc allue-tis aquam frigidam adhibere oportet, ne spiritus nimio calore dissipentur, aut solidæ partes exsiccantur, & æger in marasimum incidat. Licet etiam aquis admiscere ea, quæ vim aperiendi & obstructions referandi, ac in corpus penetrandi habent, vt succum citri, spiritum vitriol. & suauitatis gratiâ saccharum.

Usurpabant antiqui quoque coctione absolutâ bal-neum aquæ dulcis: quod non solum refrigerat & hu-mectat, sed & aliquid bilis educit, De quâ re Galenus, lib. de mar. c. 7. Febrim, quæ ex putrescentibus humoribus accenduntur, balneum remedium est, si post coctionem hu-morum adhibeatur: Et 7. aph. 42. Non tamen, ubi inflam-matio aliqua aut sine inflammatione humoris putredo igneum excitans calorem adest, balnea sunt vtilia; nisi prius euacuatis & concoctis humoribus noxiis. Verùm deest illa ratio balneorum antiquis vistorum hodie: Ideo potius hypochondria, & inprimis dextrum, fo-uendum aquis & decoctis refrigerantibus, atque extrâ applicanda, quæ antea exposita sunt.

#### Purgantia.

Si autem natura officium suum non faciat, humo-rumque concoctum non expellat, Medicus exhibitis medicamentis id præstare debet. Galenus in tertianâ exquisitâ tantum absinthij mentionem facit, summum-que esse remedium dicit inordicationum ventriculi à bile. Verùm id de tertianâ Intermittente potius, quàm continuâ accipiendum est. Commodissimè autem in hac febre vtimur rhabarbaro, syr. rosar. & viol. solutino, pulpâ tamarindorum, cassiâ, mannâ, paranturque ex iis medicamenta, quorum exempla antea allata sunt, in-ter quæ etiam est Tryphera Perfica. Ad medicamenta verò, quæ scammonium recipiunt in hac febre non fa-cile ascendendum. Duo tamen sunt è compositis vul-gò-vsitatis, quæ minore cum periculo, præcipuè in fortioribus corporibus, exhiberi possunt; Electuarium rosatum Mesuræ, & de succo rosarum: Quibus addi potest electuarium de psyllio, & diaprunum soluti-um. E.g.

℞. Elect. rosati Mes. vel de succo ros. Drach. ii. pul-pa tamar. Drach. v. Cum sacch. f. Bolus.

Vel ℞. Elect. de succo ros. Drach. iiii. syr. ros. sol. Vnc. ii. aq. endiu. q. β. Misce.

Vel ℞. Elect. diacathol. Drach. vj. rosat. Mes. de psyllio an. Drach. i. Dissolve super igne lento in aqua en-diuia, acetosa an. Vnc. j. β. Colaturæ adde succi rosar. Drach. ii. vel Drach. iiii. Misce.

Potest etiam materia per vrinas euacuari. In quem vsum in hisce febribus est commodissimum serum la-ctis caprinum, additâ emulsione seminum melonum; quæ cum decocto rad. petrosel. parata sit. vel emul-sio 4. sem. frig. maior. cum aquâ hordei vel frago-rum facta.

Ad sudorem prouocandum Antiqui balneo, vt di-ctum, utebantur. Commodiùs hodie usurpantur deco-cta ex hordeo, radicibus tormentillæ, pentaphylli, ace-tosæ, C. C. & similia, quæ infra, in malignis præcipuè febribus, proponuntur.



## Dieta.

Cibus ac  
potus.

Victum quod attinet, vt antea in genere dictum, prout morbi vigor fuerit propior vel remotior, sit tenuior vel crassior. Quod si statim in morbi initio febris naturam & exitum non satis cognoscere & perspicere liceat, satis tenui victu vti licet, inprimis si vires validæ sint. Nam in morbis, qui statim ad vigorem perueniunt, etsi valde tenuis victus exhibeatur, vt Galenus, i. ad Glauco. cap. 8. habet, haud magnum detrimentum parit. Cibus autem, vt & potus inprimis refrigeret & humectet: vnde conuenit pristinæ cremor, cibi lactucæ, acetosæ, succo citriorum & granatorum malorum conditi. Nonnunquam, si vires sint debiles, carnes pullo- rum & gallinarum concedendæ. Porus loco conuenit aqua hordei, vel aqua cocta admixto succo granato- rum, vel citri & saccharo. Aegyptij, vt refert Prosper Alpinus, libro 4. de med. Aegypti. capite 3. potum talem parant.

℥. Furfuris tritici P. iij. abluunt aquâ ter, eamque ab- iiciunt, nouâque aquâ rursum lauant, eamque additâ ali- quâ aqua rosar. quantitate & sacchari candi modico, co- quunt, & calidam in cenâ ac prandio exhibent, vel etiam manè loco Syrupi vel Iulepi propinant. Aliqui etiam va- ria semina addunt. Abstergit hic potus, refrigerat, ape- rit, sitimque extinguit, & nonnihil alit. Commoda est & hæc aqua hordeata.

℥. hordei lori Vnc. iij, samali albi, citrini an. Drach. iij. fruct. berber. sacch. Canariens. an. Vnc. ii. β.

Indantur vasi, & affundantur canthari duo aquæ fontanæ. Vas diligenter luto claudatur. Coq. horis 4. postea spontè refrigerentur & colentur.

Vel ℥. Radic. plantagin. Vnc. iij. Concisis adde sacchari albi Vnc. iij. fruct. berber. sicc. Vnc. β. cerasor. acidorum sicc. num. 20.

Vase diligenter clauso Coq. in B. tribus horis. Postea colentur. Colaturæ adde succum limonis vni.

Exhibent Aegyptij, vt idem, eodem libro cap. 15. re- fert, etiam aquam multam, in quâ tamarindi, berberis, prunique Damasceni fructus per diem cum paucis se- minibus anisi infusi manerint. Exhibent & aquam me- lonis vel anguriz. Et omnino refrigerantia liberalius eaque validiora exhibent, ob regionis & loci squalo- rem ac æstum insignem, quæ in nostris regionibus om- nia imitari fas non erit.

Idem & potum quædam ex fermento & aquâ rosa- faceâ parant: qui in memoriam mihi reuocat potum & iuscula, quæ Silesij, Poloni, & quidam finitimi populi ex fermento parare solent. Ex brancâ vrsinâ & fermento talem conficiunt, & Bariksch appellant. Folia Bran- cæ vrsinæ siccata coquunt in Aquâ eâ quantitate & modo, vt decoctum saltem colorem flauum, non pu- niceum, contrahat. Decocto fermenti acidi aliquid, vel panis ex puluere brancæ vrsinæ cum fermento panis bi- scocti parati, addunt, & in loco tepido aliquot diebus efferuiscere & fermentari permittunt, donec saporem gratum acidiusculum contrahat. Quo decocto non so- lum potus loco, sed inprimis ad iuscula conficienda vtuntur. Quod sanè seu edulij seu potus genus adeò incommodum in febribus fermentioribus non videbi- tur ei, qui & brancæ vrsinæ & fermenti acidi vires dili- genter perpenderit.

Alterum saltem tempore ieiunij Quadragesimalis parant, ex farinâ, fermento acido, & Aquâ cum sem. carni, quæ simul fermentari & feruere in loco tepido permittunt, donec saporem acidiusculum contrahant; atque inde iuscula non ingrati saporis conficiunt.

Si simul & refrigerare & alium lenire (quod sæpe opus) placeat, syrup. viol. & rosar. cum aquâ coctâ vel hordei, instar Iulepi, potus loco propinari potest: vel in aquâ coctâ aut hordei, tamarindi aut pruna Damasce- na infundantur vel coquantur. Ita enim aliis semper Iubrica manet.

Aër sit frigidus, & si talis non sit naturâ, arte pa- retur, vt antea dictum. Vtile etiam est odoramentum tale.

℥. Aq. rosar. Vnc. iij. nymphaeæ Vnc. ii. aceri ros. Vnc. j. β. vel penetrationis gratiâ, vini. Vnc. i. samali. omni. an. Drach. β. cori. citri Drach. β. Camph. Scr. β.

Misceantur & agitata odoramenti loco sæpe vsur- pentur. Odoramentum etiam vtile præstant flores ro- sar. viol. purpur. nymphaeæ luteæ.

Quâ ratione symptomatibus, quæ huic febre con- iungi solent, succurri possit, suo loco dicetur peculia- riter.

## Tertiana Continua notha.

Quæ ex pituitâ falsâ vel pituitâ cum bile mixtâ oritur febris ardens, notha est, & ferè eandem curatio- nem habet, quam tertiana intermittens notha. Sanguis nimirum mittendus est parcius. In præparatione hu- morum ea, quæ pituitam attenuant, simul admiscenda: vt Syrup. de 2. radicibus, Byzantinus f. Oxymel f. Capil- lus ♀, Petroselinum, fœniculum, Asparagus, betonica. Purgantibus admiscendus est agaricus. Verum de his plura suo loco.

Atque hæc de curâ febrium Continentium & con- tinuarum biliosarum sufficiant. Vnum saltem addere libet, quâ ratione ex febribus continuis conualescentes regendi sint. Nisi enim hoc debito modo fiat, vel re- cidiuam patiuntur, vel alios periculosos morbos in- currunt.

Si febris continua euacuatione criticâ perfecta so- luta sit, medicamentis amplius natura molestanda non est, secundum præceptum Hippocratis, 1. aph. 20. Quæ decernantur, decretae sunt, nec mouere, nec aliud quic- quam nouare, seu medicamentis seu aliis irritamentis, sed omittere conuenit. Et tum saltem recta victus ratio insti- tuenda, ciboque vires instaurandæ sunt; & viçera, quæ morbo fuerunt debilitata, roborandæ: & si quæ re- liquiæ ac vestigia caloris febrilis supersint, ea tollenda. Itaque cibus sit coctu facilis, boni lucci, temperatus, aut si quis calor supersit, nonnihil frigidus: qualem præbet caro gallinarum & caponum, pullorum, hædi- na, vitulina, ptisanæ hordeaceæ. Eâ tamen quantitate cibus offerendus, ne copiâ naturam oneret. Qui enim cibum nimis copiosum sumunt, tantum abest, vt inde corpus reficiatur, vt in recidiuam vel nouam febrem, nisi abstinentiâ aut inanitione id præcaueatur, incur- rant. Itaque ἀκοπὴ τροφῆς, quam Hippocrates commen- dat, hic maximè conuenit. Et nunquam conualescen- tes eiusmodi ad plenam satietatem edere, sed durante adhuc aliquo cibi desiderio, ab edendo desistere debent. Quia autem corpus tum morbo, tum tenuiore victu ex- tenuatum, alimentum copiosius requirit: cibus qui- dem paucus, sed sæpius exhibendus. Et quod propior iam pristinae veletudini redditur conualescens, plus ci- bi & rarioribus intervallis concedendum, dum planè pristinae sanitati & diætæ restituitur.

Potus sit Cereuisiâ probè cocta & bene defecata, vi- num album, tenue: ab aquæ verò potu, cum visceribus extenuatis valde noceat, planè abstineant conuales- centes.

Somnus conualescentibus utilissimus noctu post cenam, qui hoc modo initus corpus exsiccatum valde humectat, instaurat ac spiritus reficit. Vigiliæ verò ex febribus continuis conualescentibus noxiæ sunt.

Inanitio conualescentibus nunquam conuenit, nisi ventris deiectio, quæ si subsistat, ἐκκοπὴ τροφῆς & lenien- tibus medicamentis interdum sollicitanda. Vfus ta- men lenientium, præcipuè eorum, quæ per os assu- muntur, non sit nimium frequens, ne crebrâ deiectione alimentum cum medicamento corpori subducatur. Inprimis conualescentibus Venus inimica. Animi affectus

Tertiana  
continua  
nothaConualescen-  
tes vt regen-  
di.

Cibus.

Potus.

Somnus.

Potus ex  
brancâ ur-  
sinâ.

affectus sint moderati, & ad hilaritatem dispositi.

Viscera iis, quæ moderatè refrigerant & adstringunt, roboranda sunt. Cui rei vrile est Electuarium vel rotula diarrhodon, trôchisci de rosas, conserua rosar. cichorii: Et vbi calor amplius non adest, aromaticum rosatum.

Quibus autem imperfecta crisis accidit, & cum parte relictæ materiæ symptomata quædam supersunt, ij ex alimentis etiam commodè assumptis parum reficiuntur. Itaque reliquæ humorum medicamento euacuandæ sunt, ne abscessus aut recidua fiat. Hic sæpe vrilia sunt medicamenta, quæ per vrinas euacuant. Nonnulli venam iis aperiendam esse censent: sed perperam. Vires enim morbo & præcedentibus euacuationibus debilitatæ eam non ferunt. Victus his probatur tenuior, donec euacuato humore vitioso felicioris nutritionis indicia appareant. Rectè enim Hippocrates, 2. aph. 10. *Impura corpora, quo plus nutritur, eo plus laferis.* Vbi reliquæ vitiosorum humorum euacuatae sunt, tractandi sunt, vt alij conualescentes, de quibus modò dictum.

## CAPVT XIV.

## De Quotidiana continua.

Quotidiana continua.

**Q**uotidiana continua verò, quæ barbaris latica, quoddam latentem & absconditum habeat calorem, appellatur, est febris perpetuò quidem durans, & nunquam ad *ἀμυξία* deueniens, singulis tamen diebus exacerbationes suas habens à pituita sanguini permixta. Incidunt hæ febres in ætatem, naturam & corpus humidum; vnde iuuenem biliosâ & siccâ naturâ præditum tali febre correptum Galenus se non vidisse scribit: sed pueri atque inprimis infantes propter *ἀμυξία* & lactis vsum, vt & senes, ac qui habitu sunt corporis crassiore & otio ac crapulæ dediti, & longiore somno indulgent, & loca humida incolunt, talibus febribus corripiuntur. Hinc fit, vt frequens non sit hæc febris.

## Signa diagnostica.

Signa quotidiana continua.

Signa quotidianæ continuæ sunt, quoddam calor continuò durat, & nunquam ad intermissionem planè venit, singulis tamen diebus, & quidem plerumque circa vespèram, quo tempore pituita magis moueri solet, exacerbatur & intenditur. Verum, vt in aliis continuis, sine frigore aut horrore calor intenditur, & remittit sine vllo sudore. Calor primò quidem attractu mitis apparet; paulò post tamen acrior sentitur, laxatis poris cutis manûs tepore. Tardè enim accenditur pituita, & quidem inæqualiter; cum aliæ partes sint crassiores, aliæ tenuiores, adeò vt modò delitescere, modò rursus augeri calor videatur.

Pulsus, vt in aliis continuis, non sunt ita celeres & frequentes. Vrina quoque, vt in aliis continuis, non ita ignea est & rubra, sed crassa potius. Sitis etiam, nisi pituita falsa adsit, vt & alia symptomata, non sunt ita vehementia: atque alia signa, quæ in quotidianâ intermittente animaduertuntur, huic febre sunt communia. Neque enim magna est materiæ, quæ continuas facit, & eius, quæ intermittentes perducit, diuersitas. Nisi quoddam intermittens causa in primâ coctione generatur, & ibi corrumpi ac putrescere incipit: In continuis verò etsi materia in primis viis non corrumpatur, sed ad hepar, ibi ampliorem elaborationem susceptura, mittatur, tamen vitium coctionis primæ non potest corrigi in secundâ: aut si hepar non rectè sese habeat, pro sanguine bono pituitosus & cacoehymicus generatur, qui vbi putredinem concipit, hanc febrem producit.

Cum autem hæc febris lenta & longa sit, hecticæ

similis apparet. Quapropter quâ ratione discerni possint dicendum. In hecticâ calor est semper æqualis, ac nonnisi post sumptum cibum aliquomodo intenditur. In quotidiana continua singulis diebus, & præcipue circa vespèram, etsi æger nihil cibi antè assumpserit, augeri calor incipit, & circa mediam ferè noctem maximus est, ac postea iterum sensim remittit. Pulsus in hecticâ est durus & strictus: in hac mollis & laxus. Cutis in hecticâ est squalida & arida; in continuâ autem quotidiana mollis. Causis etiam, quæ præcesserunt, planè differunt. Hecticam enim præcesserunt causæ calefacientes & siccantes: continuam verò quotidianam causæ refrigerantes & humectantes, ac pituitam generantes.

## Prognostica.

Febris hæc ob humoris crassitiem est longa & curatu difficilis, ac propterea periculo non vacat. Ac quòd pituita est crassior & contumacior, eò febris est pertinacior & longior. Vnde quotidiana non terminatur ante diem quadragesimum, aliis ad sexagesimum extenditur, nonnunquam longius protrahitur. Hinc principium ante 20. diem vix absoluitur. Minus tamen diu durat, in quâ plures euacuationes contingunt. Longior etiam est pura, quàm quæ bilem admixtam habet. Est quoque continua periculosior, quàm intermittens: cum ægrum magis affligat: Quæ quòd peiora habet symptomata, eò est periculosior. Si enim virtus sit ab initio statim debilis, & appetitus deiectus, lethale signum est. Nam virtus ad statum non perdurabit. Ita si paroxysmus sit longus, virtus debilis, appetitus prostratus, somnus profundus, ægrum de vitâ periclitari indicat. Quæ si abfuerint, salutem spondent. Inprimis autem ventriculus in hac febre laborat & debilitatur, & ob huius debilitatem hepatis & lienis obstructions oriuntur.

Vnde ægri tandem cachexiam & hydropem incurrun. Terminatur eadem febris sæpè in hecticam. Diurna etiam quotidiana periculosior, quàm nocturna; cum tempus remedij adhibendi commodum desit. Nam de die ob paroxysmum remedia adhibere non licet: si verò quo tempore ægro dormiendum est, medicamenta adhibeantur, & æger vigilet, quies turbatur & vires deiciuntur.

## Curatio.

Indicationes, quibus curatio dirigitur, vt in aliis febribus putridis, petantur à morbo, causâ morbi & viribus. Morbum & causam morbi quod attinet, contrario modo in hac febre res sese habet ac in tertianâ. In hac enim febre neque morbus, calida scilicet intemperies, quæ nõ est magna; neque causa, quæ est pituita, humor scil. frigidus, refrigerationem postulant, & magis periculum hic metuendum ex humoris naturâ, quàm ex calore eiusdem; atque ideò in hac febre minimè humectandum aut refrigerandum. Pituita enim humor frigidus, crassus, tenax & lentus est, ideòque ad coctionem & euacuationem præparandus calefacientibus & mediocriter siccantibus, incipientibus & attenuantibus: quæ tamen initio febris sint mitiora, & hinc paulatim ad calidiora ascendatur. Si autem pituita minùs frigida, crassa & viscida sit, vt est pituita falsa, & pituita cum bile mixta, mitiora medicamenta requiruntur, & calefacientibus aliquid refrigerantium addendum, eodémque ferè modo, vt in tertianâ nothâ procedendum. Materia deinde cocta & præparata euacuanda est: & inprimis ventriculus ac alia viscera roboranda, viriumque omnino, quæ valde in hac febre vrgent, habenda est ratio; & symptomata, si quæ infestent lenienda.

Indicationes.

Aluum

*Alum laxantia.*

Primò ergò, quod in aliis febribus rectè sit, nec in hac omittatur, ac principio ventriculus ac primæ viæ euacuentur. Exempli gratiâ.

℞. *Mercurialis beta, fursur. in petiâ lig. flor. chamem. an. M. i. meliloti M. b. sem. lini. ʒ. b. Coqu. in f. q. a. f. Colat. ℞. ℥. i. In qua dissolue Elect. diacathol. Vnc. b. diaphanici hiera s. an. Drach. iij. mell. ros. sol. Vnc. i. cl. Chamamel. vel communis, Vnc. ii. vel iij. salis Drach. i. F. Clyster.*

Inter medicamenta verò, quæ per os assumuntur, commodissimum est mel rosatum solutiuum.

Potest & cassia usurpari, cui ʒ. b. femin. anisi vel fœnic. addi potest, vel aliquid de pulu. mechoac. in bolo; vel diacatholicum. Imò interdum aliquid diaphanici, sed in exigua quantitate, reliquis lenientibus in fortioribus corporibus addere licet. Aliàs fortiora illa purgantia post coctionem differenda.

Materia, quæ ventriculo inhæret, proximâ viâ vomitu, excludi potest, vomitoriis supra recensitis. Conueniens hîc est raphanus, cuius vel decoctum, vel succus, vel infusum in oxymelitis ʒ. iij. vel plurimum pondere propinatur. Licet & alia addere, vt sem. atriplicis, aneth. fl. chamæm. vt,

℞. *Sem. raph. atriplicis, an. Vnc. sem. flor. chamamel. P. j. Coq. in aq. f. Col. ℞. Vnc. v. Adde oxymel. f. Vnc. j. sem. Milce.*

*Vena sectio.*

Aluo ita euacuatâ, an venæ sectione opus sit, videndum. Græci in hac febre venæ sectionis mentionem non faciunt: ideòque plurimi ab eâ abstinendum putant, cum & ratio id iubere videatur. Nam sanguis in hac febre non peccat, sed pituita, quæ est frigidus & crassus humor, qui sanguine detracto magis crudus euadet. Auicennas contra, capite proprio, & qui eum sequuntur, in hac febre admittunt venæ sectionem, si vrina sit crassior & rubicundior. Et omnino in hac febre continuâ interdum locum habet venæ sectio: sed ne id temerè fiat, quando & quam ob causam venæ sectio institui debeat, videndum. Massarias quidem, magnitudine morbi & virium robore præsentem, semper admittit venæ sectionem; & propterea in omni febre putridâ mittendum esse sanguinem censet. Verum falsitas huius opinionis alibi refutata est. Et quæ Galeni sententia sit, cum inquit, in omni febre putridâ saluberrimum esse mittere sanguinem, satis apparet ex ratione, quam Galenus addit; cum ideo sanguinem in febribus putridis mittendum esse dicit, vt natura parte oneris, quâ tanquam sarcinâ premitur, leuetur, vt postea, quod reliquum est, & coqui potest, concoquat facilius, & quod expelli potest expellat.

Ergo tum solum & in quotidianâ, & in omnib. febribus putridis sanguis emittendus, vbi sanguinis euacuatione natura oneris parte leuari potest; id quod fieri potest in quotidianâ continuâ, cum humor peccans in venis sanguini permisceatur, & ita sanguine detracto pars vitiosi humoris detrahatur. Vnde Auicennas, cum vrinæ sunt crassiores & rubicundiores, sanguinem mittere iubet. Eâ tamen conditione, quam Galenus ipse addit, sanguis mittendus, si vires & ætas consentiant; id quod rarò in hac febre accidit. Nam cum hæc febris ferè incidat in ætatem senilem vel puerilem, tempus anni frigidum, & febris ipsa ab humere crudo proueniat: rarò vires consentiunt. Iisdem de causis sanguis, vbi venam aperire licet, non copiosè, sed parcè euacuandus.

*Concoquentia, & alterantia.*

Sectâ, si opus sit, venâ, ad materiæ præparationem & concoctionem accedendum. Et primò attenuantibus, quæ non valdè calefaciunt, vtendum, ne si in primis viis vel venis crudi humores hæreant, valentiorum medicamentorum vi in penitiores corporis partes tra-

ducantur. Quapropter in principio vtendum syr. acetoso s. melle roiato, oxymelite s. syrupo de betonica, hyssopo, cum decocto vel aquis capill. ♀, fœniculi, asparagi, graminis, hyssopi, chamædii yos: quibus adduntur syrupus endiuiz s. & compositus. Inseruiunt huic fini & conserua betonica, hyssopi, cardui benedicti, el eius generis extracta. Exempli gratiâ.

℞. *Aq. agrimon. beton. fœnic. an. Vnc. ii. syr. de 2. rad. acetosi f. an. Vnc. i. end. Vnc. b. F. Haustus pro ii. dosibus.*

Vel ℞. *Rad. graminis. asparagi an. Vnc. b. capilli. ♀. chamædr. hyssop. fœnic. an. M. j. sem. fœnic. Drac. i. Coq. in f. q. a. f. Colat. Vnc. ix. Adde syr. de 2. rad. Vnc. ii. byzantini f. Vnc. i. spiritus vitriol. Scrup. b. F. potus pro tribus dosibus.*

Vbi aliqua coctionis signa apparuerunt, mitius aliquod purgans pituitam exhibendum. In morbis enim ex crassis humoribus natis perfecta & integra, quæ requiritur, purgatio semel institui non potest, sed per vices humores concoquere & euacuare oportet. Et primò vtrumque mitioribus faciendum; hinc ad fortiora ascendendum.

Leni ergo isti purgationi inseruit agaricus, aut pilulæ alephanginæ cum tertiâ parte agarici: In pituita salia aliquid rhabarbari vel etiam foliorum senæ addi potest. Et est tum commodus vsus diacatholici, vt:

℞. *Agarici troch. Scrup. iv. diagridij gr. i. vel ii. Cum melle rosar. F. Pil. XXV.*

Vel ℞. *Elect. diacathol. Vnc. b. agaric. troch. Scrup. ii. Cum sacch. F. Bolus.*

Vel ℞. *Decocti aperient. q. f. Coq. in eo fol. senæ. el. agarici trochisc. an. Drach. ii. rhab. elect. Scrup. i. Zingiberis, galange an. Scrup. b. Colat. ℞. Vnc. iij. Adde mellis rosar. solui. Drach. x. Misce.*

Vel ℞. *Decocti communis aut aperient. Vnc. iij. Dissoluantur in his super igne. Elect. diacathol. Drach. vi. diaphanici Drach. iij. Colentur. Adde mell. ros. sol. Drach. x. Misce.*

Vel ℞. *Pil. alephang. Scr. ii. b. agarici troch. Scrup. i. trochisc. alhand. gr. ii. vel iii. cum melle ros. sol. F. Pilulæ mediocres.*

Inde ad fortiora præparantia & purgantia deuenientium: quæ tamen admodum calefaciunt & siccant, vitanda sunt. Et quia rarò admodum datur quotidiana exquisita, ideò in nothâ, ea quæ humorem biliosum vel melancholicum respiciunt, admiscenda.

Itaque etiam medicamenta, quæ indiuiduis conueniunt, ita exactè præscribi non possunt: ac proinde formulas, quas proponemus, pro cuiusque ægri & morbi ratione variare & mutare licebit.

Inter præparantia tum conuenit syrupus de 2. rad. de 5. oxymel. compos. syr. byzantinus compos. cum aq. vel decocto hyssopi, petroselinæ, betonica.

Si pituita salia fuerit, curatur ferè vt tertiana notha; addi potest syrupus de fumaria, aqua eiusdem, borraginis, buglossi.

Vt: ℞. *Mellis ros. col. Vnc. i. oxymel. compos. Vnc. b. aq. hyssop. fœn. an. vnc. ix. vel Vnc. x. F. Haustus, qui aliquoties repetatur.*

Vel ℞. *Syr. de 5. rad. oxymel compos. an. Drach. vj. aq. hyss. & chamædr. an. ʒ. i. b. Misce.*

Vtile & hic est decoctum aperiens in pharmacopoliis vsitatum.

Vel ℞. *Rad. aperientium aceto prepar. an. Drach. vj. Hyssopi, betonic. chamædr. capill. ♀ an. M. i. sem. fœn. Drach. i. b. Coq. in f. iij. aq. Ad dimidiæ partis consumptionem. Colat. adde mellis Vnc. ix. aceti Vnc. iij. Coq. f. a. F. Syrupus.*

Vel ℞. *Rad. graminis. asparagi, fœniculi an. Vnc. i. agrimon. capilli ♀, betonic. an. M. i. cardui benedicti. sem. endiu. anisi an. Drach. ii. cicer. rub. M. sem. fl. genista P. ii. Coq. in f. q. hydromelitis pro f. j. Colat. adde mell. ros. col. oxymel. compos. an. Vnc. vi. aq. cinam. Vnc. b. vel Drach. vi. F. potus pro 4. dosibus.*

Vel

*Alterantia  
& præparan-  
tia in Quoti-  
diana comi-  
nua.*



Vel *℞. Oxymel. scillit. mell. ros. col. an. Vnc. ij. aq. fenic. petrosel. an. Vnc. i. v. F. potus pro 2. dosibus.*

Commodus etiam hic est vius spir. Vitriol. & *Θ.* qui in iuculis carniū vel alio conueniente liquore ad humores attenuandos & putredinem inhibendam exhibeantur.

In phlegmate falso & bilis permixtione, atque vbi calor febrilis maior est, talia præparantia conueniunt.

*℥. Syr. endiu. fumar. acetosi f. an. Vnc. i. sem. aq. fenic. absinth. buglossi an. Vnc. ii. sem. F. potus pro 3. dos.*

Vel *℞. Syrup. bysantini f. Vnc. ii. acetosi f. Vnc. i. aq. graminis, asparagi an. Vnc. ii. sem. F. Potus.*

Vel *℞. Conf. borrag. cichor. beton. fumar. an. Vnc. i. cortic. citri condit. rad. condit. cichor. an. Vnc. sem. spec. diar. rhod. abb. Scrup. ii. Cum syrup. buglossi F. Electuarium.*

### Purgantia.

Postea iterum ad purgantia, & quidem paulò fortiora accedendum, vt pilulas aggregatiuas, addito agarico trochiscato, vel de hiera cum agarico: In pituita falsa pilulæ de fumaria addi possunt.

Vel *℞. fol. sene el. Vnc. ii. agar. trochisc. Drach. vi. hermodactyl. turkish el. mechoacan. an. Drach. ii. zingiberis Drach. i. sem. spica Scrup. i. sem. fenic. anis an. Drach. i. Infund. in f. q. decocti aperientis vel hydromelitis. Colat. add. mell. anthosati, oxymel. scillit. an. Vnc. i. sem. sacch. albiss. q. f. Syrupus, de quo quinto vel sexto quòque die capiat *℥. ii.* vel *℥. iii.* vel per se, vel cum decocto cicer. rubr. aut hyssopi, aut alio liquore conueniente. Hoc enim quod suprà etiam dictum, hic iterum repetendum, in hac febre, vt in omnibus morbis, qui à crassis humoribus ortum habent, humores peccantes, licet concocti sint, non vnica vice & semel, sed per intervalla & partitis vicibus commodè euacuari.*

Vel *℥. Extract. mechoac. Scrup. i. vel *℥. B. panchy- magogi Scrup. B. F. Pilulæ.**

Vel: *Dissolu. in mellis ros. sol. *℥. i. B. vel ii.**

Vel: *℥. El. diacathol. *℥. B. diaphanici *℥. iii. Cum sacch. F. Bolus.***

Vel: *℥. Elect. diaphanici Indi. an. *℥. B. vel *℥. v.* Ebulliant semel in f. q. decocti communis aut aq. conuenientis, & colentur. F. Haustus.**

Vel: *℥. Specier. diaturb. cum rhab. *℥. i. mechoac. Scr. sem. F. Puluis.**

Vel: *℥. Mechoac. Scr. ii. vel Scr. ii. B. specier. diaphanici, diaturbish. cum rhab. an. Scr. B. Diagalang. gr. v. F. Puluis.*

Post euacuationem per aluum & vomitum, materia per vrinas quoque educi potest, atque vrinam mouentia medicamenta, præmissis generalibus euacuationibus, in febribus pituitosis insignem vsum præstant. Attenuant enim humores, & quia tunc crudi sunt, eos præparant, & sensim per vias vrinæ educunt. Exempli gratiâ.

*℥. Rad. aperient. *℥. B. asari *℥. ii. capill. ♀. betonica, hyssopi an. M. i. sem. petrosel. fenic. an. *℥. ii. sem. 4. frig. maj. an. *℥. i. B. Cicer. rubr. *℥. B. Coqu. in f. q. a. f. Colat. dulcoratur saccharo.******

Verum de his medicamentis suprà dictum.

Tandem & materia persudores discuti potest. Nonnulli in hac febre ad fortiora, vt lignum guaiacum, sassafras, radicem Chinæ ascendunt. Commendatur etiam hic sal absinthij vel cardui benedicti, Scrui. i. vel *℥. B. pondere cum pauillo theriaca, vel rob sambuci, vel conueniente liquore sumptum.*

Post vsum medicamentorum horum communium, id diligenter attendendum, vt membra principalia roborentur. Diuturnitate enim morbi ventriculus & hepar debilitantur, & hinc cum prima tum secunda coctio vitatur, vnde lien, hepar & crura intumescunt, & cachexia, ac non rarò hydrops imminet. Huic rei infer-

Dan. Sennerti Tom. I I.

uit in primis vsus trochiscorum de rhabarbaro, de absinthio, de rosis, de eupatorio, qui cum syrups & succis inspissatis & extractis cardui bened. gentianæ, centaureij minor. & aliis conuenientibus in pilulas formantur, quæ vel solæ, vel cum aliquo syrupo, decocto, aut alio liquore conueniente exhibentur. Vtiles etiam sunt species & rotulæ aromatici rosati, dialaccæ, diaxyloaloes.

Extra quoque ventriculo Roborantia adhibeantur, Cerotum stomachicum, &c. Vel potest tale fomentum parari.

*℥. Absinthij, mentha, ros. rub. an. M. i. mastiches. cortic. citri. Cinamom. macis. an. *℥. ii. garyophyl. galang. ligni aloës, an. *℥. i. Santal. omn. an. *℥. B.****

F. cum linteo albo tres sacculi, quorum duo madefiant in vino calido & per vices calidi ventriculo applicentur, tertius postea siccus apponatur: vel post fomentationem emplastrum vel cerotum idoneū applicetur, vel tali vnguento ventriculus illinatur.

*℥. Ol. absinth. *℥. ii. nardini, mastichini, an. *℥. i. garyophyll. macis, rosar. rubr. nuc. mosch. specier. aromat. rosati, an. *℥. sem. Vini optimi *℥. ii.*****

Coqu. lento igne ad vini consumptionem, postea colentur & exprimantur:

Hinc addatur *ladani Drach. ii. cere parū F. linimentum.*

Valde efficacia sunt, si addantur, olea destill. absinthij, menthæ, garyophyl. nuc. moschatæ.

### Diata.

Victus ratio tota sit attenuans, incidens & abstergens. Cibi ergo sint boni succi, facili coctionis, pauci excrementi: atque hinc viles sunt carnes pullorū, gallinarum, caro hœdina, oua, &c. Pisces in hac febre minùs conueniunt. Cibi condiantur attenuantibus & incidētibz, vt radicibus petroselinij, fœniculi, hyssopo, thymo, saturejâ, roremarino, cinamomo. Vtiles quoque sūt cappares aceto cōditi. Panis sit optimè fermētatus, paucosale adjecto. Licet eidem & aliquid seminis anisi, fœniculi, cumini, vel carui adijcere. Proūt tamen humor, à quo febris accenditur, magis vel minùs frigidus fuerit: ita magis & minùs calefacientia & attenuantia adijcienda sunt; Et primis diebus mitiora, in progressu morbi fortiora.

De tempore & quantitate cibi administrandi non idē sentire videntur Græci & Arabes. Hippocr. & Galen. i. aph. 10. & alibi docent, in morbis, quibus status statim futurus est, tenuiter in principio cibari oportere; quibus autem posterius, & in ipsō vigoris tēpore & paulò sub ipsum de victu demendū, antè verò plenius alendū esse, vt ægrotus perferre queat. Auicēnas contra primis diebus tenuē victū & dietam instituire & in ediam adhibere iubet. Hippocratē & Auicennā cōciliare nititur Massarias, dū dicit: Auicennam id facere sperando, quòd status febris sit futurus propinquior, propter subtilitatem & paucitatem materiæ: Quòd si cōtrā status futurus esset diuturnior, primò crassiore, deinde tenuiore victu vtendū esse. Verum hæc in speciē dissensio hoc modo non conciliatur. Omnis enim febris quotidiana longa est, & in nullā quotidianā sperandum, statum breui futurū. Ideoque secūdum Hippocratē in omni quotidiana principio plenius alendum, vt ægrotus ad statum perdurare possit, postea verò statu appropinquante de victu sensim detrahendū. Interim & Auicennæ præceptum locum habet, qui non hoc sentit, vt toto morbi principio victus tenuior, quàm in augmento, præscribatur, sed hoc saltem vult, vt primis tribus diebus cibo pauciore, aut etiam inediâ æger vtatur, vt cruditates in ventriculo & primis viis absumantur, & concoquantur: ceterum idem sentit cum Hippocrate, & in principio pleniorē victu vtendum censet, de quo postea sensim detrahendum sit.

Præfana & ipsa, vt in aliis febribz, ita & in hac conuenit; cum attenuet, abstergat, aluum leniat; sed quia

quia humor est frigidus, alteretur panca cinamomi vel piperis quantitate adiecta.

Norandum autem hic, cum in hac febre, ut & in aliis diurnis, æger plerumque adstrictam habeat aluum, quam tamen solutam esse expedit, nonnullos quotidie, ut aluum lubricam conferuent, pruna exhibere: verum cum in talibus morbis diuturnis ventriculus frigidus & debilis esse soleat, omnino à talibus frigidis fructibus abstinendum, & potius melle ros. solut. & huiusmodi aliis aluum lubricantibus vtendum.

In principio æger à vino abstineat, & aqua mulsâ eius loco vtatur: si tamen vires vel consuetudo id possulet, vtatur vino tenui & aquoso. Conuenit & cereuisia tenuis. Apparente autem concoctione, vinum tutius & commodius vsurpatur. Concoctio enim eius vsu adiuuatur, ventriculus roboratur, & humores per viam educuntur.

### De Febre Epiala.

Febri Epiala

Cum autem pituitæ variæ sint species, etiam febris huius, pro variis pituitæ generibus quadam differentia deprehenditur. Inter illas verò differentias insignis est ea, quæ Græcis *πυρίδος ἐπιπλά*, febris epiala nominatur, vel *ἐπὶ τῇ νύκτι* vnde interpretes blandas & lenes febres vertunt, vel à rigore quod *ἐπιπλά* Articis rigorem, qui febres præcedit, significet. De eius autem naturâ & causis variæ controuersie occurrunt, quæ hoc loco inter pituitosas & quotidianas febres explicanda videntur. E Quotidianarum genere esse Epialam omnes concedunt: An sit autem continua vel intermittens dubium. Inter continuas refert Gal. 6. epid. comm. 1. 1. 29. cum scribit: *Continuarum aliam semitercianam, aliam ardentem, aliam gelidam, aliâ succensam, aliam pestilentem, aliam Epialam dicimus.* Alij autem hoc factum putant ob imperfectam intermissionem. Atque hæc febris insignem, quâ à reliquis quotidianis discernitur, habet differentiam. Eodem enim febris tempore ægri simul, & rigorem & calorem percipiunt. Verum quomodo illud fiat authores non consentiunt. Gal. quidem de ineq. intemp. cap. 8. & 4. de diff. febr. cap. 6. Epialam febrem fieri docet, quando ægri simul febricitant & rigent, atque eodem tempore in toto corpore vtrumque sentiunt affectum; seu quando calidum & frigidum simul per minimas corporis particulas dispersum est. Auicennas verò, quem Arabes plerique sequuntur, lib. 4. fen. 1. 1. 2. cap. 50. aliter hac de febre loquitur, & Epialam fieri dicit, cum in toto paroxysmo interna frigent, exteriora calent. Verum hanc febrem, ut quidem ab Auicennâ & Arabibus describitur, plerique figmentum esse putant; cum impossibile videatur, ut externa caleant, interna verò frigeant; siquidem febrilis calor à corde incipit, atque hinc in totum corpus diffunditur. Conatur quidem Costæus, in comm. in locum allegatum, Auicennam defendere, & quâ ratione hæc febris dari possit, monstrare, dum dicit: pituitam vitream, dum putrescit, intra venas præcipuè putrescere: cum verò actu frigidus hic sit humor, fieri putat, ut partes, quas tægit, reddat frigidas; cum verò putrescat, ex concepta putredine calidos vapores excitari, qui cum per vniuersum corpus ferantur, illud calefaciant, solis iis partibus, in quibus pituita residet, ob illius contractum frigescentibus. Verum ex hac difficultate se hoc modo non euoluit. Nam cum febris non fiat, nisi calor primò cordi communicetur, si vapores è pituitâ putrescente attolluntur, impossibile est, ut ab iis calor febrilis exterioribus communicetur, nisi prius ille in corde accensus fuerit. At ubi calor in corde accenditur: certè prius interioribus, utpote magis cordi vicinis, quàm exterioribus, & à corde remotioribus communicatur. Neque pituitæ, & quidem putrescentis, frigiditas potest esse tanta, ut calorem illum

planè obrundat, præcipuè in venis, in quibus et Costæi sententiâ continetur pituita vitrea: neque, cum crassus admodum & viscidus humor sit, ferri per musculos & extra venas facile possit. Quapropter vnicam saltem Epialæ speciem cum Galeno agnoscimus, ubi scilicet eodem tempore per vniuersi corporis minimas particulas calor & frigus sentitur. Et si verò vnâ eademque pars alterationibus contrariis moueri eodem tempore non possit; & propterea non rectè à Galeno dictum esse alicui videri posset, quod eodem tempore tum calidum, tum frigidum; per minimas particulas dispersum sit: tamen id de minimis particulis, quoad sensum, non verò reuerà minimis accipiendum est. Sensus enim nequit discernere partem illam, in quâ calor, ab eâ in quâ frigus percipitur.

### Causa.

De Epialæ quoque causâ Authores, ut & Galidem Epialam docere non videntur. Nam Gal. lib. 2. de diff. febr. sa. cap. 6. febrem epialam à pituitâ acidâ & vitreâ fieri docet, dum ita scribit: *acida & vitrea si per sentientes corporis partes moueatur, sine febre rigores generat. Quod si modica aliqua in iis fiat putrefactio, febrem epialam appellatam inducit.* Lib. verò de ineq. intem. cap. 8. addere videtur bilem amaram, dum inquit. *Si pituitosus humor, qui frigidus est, quemque Praxagoras vitreum appellat, & amara bilis, qua calida est, simul abundent, ac per sensibilia membra moueantur: nihil mirum est, vtrumque ab agro pari modo sentiri.* Et mox: *in febribus, quas epialas vocant, vniuersum corpus ambo sentire videtur. Cum enim tenuissimis particulis aspersum per corpus, cum calidum sit, tum frigidum, nullam sensibilem alterius portionem ita paruum desumas, in quâ non sit alterum comprehensum.* Verum à contradictione hic Galenus liberari potest, si dicatur, Epialam aliam esse legitimam, aliam spuriam: legitimam; quæ ex solâ pituita fit, spuriam verò, quæ ex pituita cum bile gignitur.

Quam ob causam autem calor & frigus, ac rigor simul percipiantur, Authores etiam dissentiant. Vbi pituita & bilis amara est permixta, calorem & frigus simul percipi docet Galenus, alleg. loc. de ineq. intemper. quia simul calidum & frigidum per vniuersum corpus dispersum est. Cum verò ex sola pituitâ vitreâ & acidâ Epiala prouenit, Galenus 2. de differ. febr. cap. 6. causam hanc reddit, quod id, quod ex pituita putrescit, calorem accendat; reliquum verò, quod nondum putrescit, rigorem excitet. Vitrea enim pituita est humor crassus, lentus & tenax, ac omnino frigidissimus, nec promptè putrescit, sed dum putredine modicè corripitur, aliâ parte putrescit, aliâ non; vnde per sentientes corporis partes delata pars quæ nondum putrescit, utpote frigidissima, vehementem rigorem; reliqua verò, quæ iam putredinem concepit, calorem efficit. Atque ita corpus vniuersum eodem tempore calorem ac frigus percipit. Quod si vehementius & æqualiter, quod tamen non facile fit, putrescit, tunc cum rigore inuadit, postea superatâ frigiditate calor superuenit.

Verum hæc sententia non placet Eustachio Rudio, qui, lib. 3. pract. cap. 28. aliam causam reddit. Nimirum calorem prouenire à causâ positiuâ, vaporibus scilicet putridis, per vniuersum corpus distributis, & à putrescente humore eleuari; rigorem autem habere causam priuatiuam, nempe caloris ad internas partes retractionem. Et omnino potius ad intermittentes, quàm continuas referenda hæc febris videtur. Neque enim credibile, in venis humorem tam frigidum coacervari posse. Et si quis inter continuas referre velit, potius ad symptomaticas quàm primarias referenda videtur, ubi in primis viis, humores crudi & pituitosi è debili ventriculi coctione & cruditate cumulantur & putrescunt. Quod tamen ipsum Platero difficile videtur

Cur calor & frigus simul percipiantur.

videtur, qui neque credibile putat, humorem tam frigidum putrescere posse. Ipse itaque Epialas ad Intermitteutes refert, ac in eâ est sententiâ; eas generari, cum Intermitteutes febres eodem die conincidunt, frigusque vnius, antequam calor alterius febris cessarit, incipit: vel etiam quando intermitteutes cum continuâ concurrunt; cum in continuâ calor semper perseveret, & intermittente febre accedente, horror quidam & frigus in principio simul infestet.

#### Curatio.

Rara est ista febris, & vbi excitatur, vix talis ad finem perdurat, & putrescente pituitâ & calore agente in eam, in aliam febrem degenerat. Curationem eius quod attinet, ea à curatione aliarum febrium pituitosarum non est diuersa: ad humoris tamen peculiarem naturam est respiciendum. Cum enim maior sit humoris, ex quo hæc febris oritur, frigiditas & cruditas, quam in aliis febribus pituitosis: tantò fortiora medicamenta calefacientia, attenuantia & incidentia in hac febre requiruntur, quantò hæc pituitæ species est frigidior & crudior. Vires in hac febre valde sunt debiles, ideòque etsi à contumaci & rebelli humore fortiores purgationes indicentur; vires tamen debiles eas non ferunt: ideòque frequentia supplendum est id, quod vnâ vice fortiore medicamento exequi non licet.

#### De Febre syncopali.

Febri syncopali.

Ad febres pituitosas reuerà etiam referenda est febris Syncopalis humorosa appellata. Auicennas enim & eius interpretes vulgò duas febres syncopalis species statuunt: Vnam quæ ab humore bilioso, tenui, pauco, sed corrupto & venenato oritur, quam syncopalem minutam appellant: alteram, quæ à pituitosorum & crudorum humorum copiâ proveniat, quam syncopalem humorosam nominant. Atque hæc omnino ad febres pituitosas pertinet, & ab aliis non differt, nisi quia pituitosorum & crudorum humorum in hac maior, quam in aliis febribus pituitosis, est copia, & præterea coniuncta est oris ventriculi debilitas, vnde ægri faciliè, in primis febre ingruente, in syncopen incidunt, vnde & febris ista nomen habet. Febris ista curatu difficilis est. Etsi in hac febre vacuantia necessaria sint: tamen ægri neque sanguinis missionem neque purgationem sustinent, ob virium imbecillitatem, & quòd faciliè in syncopen incidunt. Ac propterea si pulsus fuerit parvus, debilis & valde inæqualis, æger in summo periculo versatur. Ergo Galen. 12. meth. med. cap. 3. nullam aliam commodiorem vacuandi rationem se potuisse inuenire statuit, quam quæ fiat per frictiones; ideòque ibi quas partes fricare, & quâ ratione oporteat, docet. Licet tamen & clysteribus lenioribus uti. Imò nostro seculo multa innotuerunt medicamenta, quæ nullâ vi naturæ illatâ, aluum solum laxant, citra omnem humorum reliquorum, qui in venoso genere sunt, perturbationem; qualia sunt mel rosatum solutivum, manna, cremor tartari, & ex his confecta alia medicamenta.

Imminutâ hoc modo humorum in ore ventriculi & primis viis existentium copiâ, & ita syncopes causâ sublatâ, operta danda est, vt humores reliqui crudi in venis concoquantur, cui inseruit hydromel cum hyssopo & cinamomo paratum, cui aliquot diebus exactis modicum oxynelitis addici potest. His ita peractis, vt iam de præcipiti virium lapsu amplius metus non sit, purgatio humorum, vt in reliquis pituitosis perficienda.

De Dietâ inter authores non conuenit. Galenus totam ferè curationis spem in frictionibus, quiete, inedia & tenui victu constituit: Alexander verò Tral-

Dan. Sennerti Tom. II.

lianus id reprehendit, atque impossibile esse putat, vt cum exquisitâ inediâ tam vehementes frictiones æger sustinere possit: Cum secundum Hippocratem, 2. aph. 16. vbi fames, laborandum non sit. Masfarias Galenum defensurus respondet, pituitam attenuatione & longiore coctione in sanguinem conuertere posse, vt ex animalibus nonnullis videre est, quæ tempore hyberno sine assumpto alimento ex sola pituitâ nutriantur. Ex quibus concludit, pituitosâ tali febre laborantes famem non pati, cum humor ille pituitosus frictionibus & moderatâ caliditate attenuetur & in alimentum conuertatur. Quæ responsio quidem locum haberet: si pituita, à qua hæc febris oritur, semper talis naturæ esset, vt in alimentum verti possit; cum potius corrupta sit: & nisi syncope in hac febre metuehda esset. Quam ob causam tutissimum est, hac febre laborantes roborare alimentis paucissimis & minimè pituitam generantibus, sed quæ sint tenuis substantiæ & coctu facilia; atque ea sæpius præbenda: quales cibi sunt; vitelli onorum, iuscula carniû, cinamomo, garyophyllis, ligno aloës & similibus condita. Potus sit vinum, quod vim nutriendi, calefaciendi, attenuandi habet, nec pituitam vllò modo auget. Vitale est & hydromel, in quo hyssopus ebullierit. Et quia ob Syncopen ægri valde debilitantur, ea quæ ad syncopen destinata sunt medicamenta, tam externa, quam interna adhibenda, de quibus alibi.

### C A P V T X V.

#### Quartana Continua.

Quartana denique continua est febris putrida, cuius calor quidem continuò durat, quarto tamen quòque die intenditur, à sanguine melancholico cacochymico; in venæ cauæ ramis putrescente ortum habens. Causa nimirum huius febris est melancholia putrescens. Vnde omnia, quæ melancholiam generare & putredinem eius excitare valent, huius febris causa esse possunt.

Quartana continua.

#### Signa diagnostica.

Signa eius sunt, quòd calor quarto quolibet die inualefcit, sine tamen frigore, horrore, aut rigore præcedente, vel sudore subsequente. Quâ ratione ab intermitteutes differt. Aliàs enim signa omnia iis communia sunt; cum ab eadem ferè materiâ proveniant. Etenim si humor melancholicus multus in primâ coctione ac venis mesaraicis, quibus à liene attrahi debet, vt purus sanguis in hepate ex reliquo generetur, colligatur, ibique putrescat ac corrumpatur, intermittens generatur: si verò ad hepar deferatur, vel etiam hepatis vitio pro bono & temperato crassius ac feculentus sanguis generetur, & cacochymia talis in venis cumuletur, tandèque putredinem concipiat; Quartana continua oritur. Reliquis verò diebus remittit hæc febris, nò tamen planè ad ἀνρπερίαν peruenit. Pulsus initio est parvus, tardus & submersus, postea magnus, plenus & celerior, quàm in intermitteute, qui in statu magis intenditur.

Signa Quartana contin.

#### Prognostica.

Est autem hæc febris omnium rarissima, verùm satis periculosa & intermittente longè periculosior, cum vires magis deiciat. Quandoque quartanæ intermitteutes intempestiuo medicamentorum vtu in eam mutantur, atque tunc ægri vix euadunt. Extenditur hæc febris sæpe ad diem quadragesimum & vltra.

Prognostica.



## Curatio.

Curatio ferè cum intermittente convenit. Et primò quidem, præmissis iis, quæ primas vias euacuant, omnino mox in initio veræ sectio instituenda est; cum humor melancholicus in venis maioribus sanguini permixtus sit. Sanguine euacuato materia præparanda & coquenda. In continuis autem parcius calefacere & attenuare convenit; plus verò humectare oportet, quàm in intermittente, & addenda, quæ feruorem humorum mitigant, qualia sunt Syrupus violarum, de endiuia, acetosa. Vt:

*℞. Rad. bugloss. polypod. q. graminis, fœniculi, asparagi, an. Vnc. β. summit. lupuli, cuscuta, capill. ♀, fumariæ, an. M. j. flor. borragin. bugloss. violar. an. M. β. sem. 4. frig. maior. an. Drach. j. endiuia, fœnic. basilici, an. Scr. ii. Coquantur in aq. hordei ad remanentiam lb. i. Colaturæ add. Syr. de pomis, violar. an. Vnc. ij. tunicis, acetosi f. a. Vnc. j. aq. cinam. Vnc. β. Milce. Dosis. Vnc. iiii.*

Vel *℞. Aq. borragin. bugloss. asparag. endiuia, an. Vnc. ij. syr. byzant. f. endiuia, violar. acetosi. citri. an. Vnc. j. Milce. pro tribus dosibus.*

Vel *℞. Conserv. flor. borrag. bugloss. meliss. violar. tunicis, an. Vnc. i. cortic. citri condit. flor. citri condit. an. Vnc. β. specier. diamarg. fr. Scr. i. Cum syr. de pomis. F. Electuar.*

Præparato humore instituat purgatio.

*℞. Rad. polypod. q. Vnc. β. fumariæ, cuscuta, capill. ♀. an. M. β. flor. bugloss. violar. an. P. i. epithymi, Vnc. β. fol. sena el. Drach. v. In decocti Vnc. iiii. β. dissolu. electu. lenissimi Drach. vi. vel diacathol. Vnc. β. Iterum coletur; Adde syr. de pomis vel viol. sol. Vnc. β. F. Haustus, qui sumatur post tridie exacerbationis febrilis.*

Etsi natura nullam crisin molitur, ad fortiora post coctionem accedendum.

Licet & post coctionem vrinam cientia & sudorifera exhibere: verùm minus calida sint in hac febre, quàm in Intermittentibus. Et cum vires in hac febre valde laborent, confortantia medicamenta, ex conservâ borraginis, buglossi, violar. melissæ, tunicis, anthos, vel Syrupis eiusdem generis, acetos. citri, è corticibus citri, cõfectione alchermes, spec. elect. de gémis, diamarg. frigidi, & similibus paranda sunt. Reliqua ex Curatione Quartanæ Intermittentis patebunt.

## Dieta.

Dieta.

In continuis Quartanis cibis parcius nutriat, magis refrigeret, quàm in Intermittentibus. Maior enim calor est, & status propior: nec tamen is sit nimis tenuis, præcipuè extra exacerbationis dies. Vini vsus sit parcius, quàm in Intermittentibus. sitque illud *ὀλίγον ποτόν*. Imò interdum, si calor sit vehementior, planè, à vino abstinendum.

## CAPVT XVI.

## De Febribus continuis Symptomaticis.

Febres symptomaticæ.

**H**Actenus enumeratæ & explicatæ sunt omnes febrium primariarum continuarum differentia, quæ scilicet nullo alio præcedente morbo oriuntur. Restant adhuc aliæ febres continuæ, quæ Symptomaticæ & accidentales nominantur, quæque alterius cuiusdam morbi primarij occasione hominem inuadunt. Etsi enim omnis febris morbus sit, putà intemperies calida; tamen idè quædam Symptomaticæ & accidentales appellantur, & à nonnullis, vt habet Auicenna, lib. 4. can. 1. r. 1. f. en. c. 1. febris in febrem morbū, & accidens diuiditur, quoddam febres cum symptomaticis cognitionem habent. Nam vt Symptoma morbum sequitur; tolliturque ad morbi ablationem: ita & febres istæ non primariò excitantur, sed alios mor-

bos sequuntur, & proinde nō per se sed sublati morbis, quos sequuntur, euanescent. Ideoque vel ob curationem has febres ab aliis discernere vtile est. Nam primariæ febres habent principales Indicationes à febris essentiâ & causâ petitas. Harum verò febrium tota curandi ratio ferè pendet à morbo, à quo accenduntur, vnde etiam Antiqui affectus illos non à febre, sed à morbo; quem febris sequitur, denominabant, vt videre est apud Galenum, 4. aph. 73. Vbi in comm. hæc habet: *A febribus malè habere & vexari Antiqui dicebant eos, qui sine certâ inflammatione, aut abscessu, aut dolore, aut eryspelate, aut, vt generatim & vniuersim dicam, absque aliquo membro eximie præ aliis affecto agrotabant. Quod si vel propter lateris, aut pulmonis, aut alterius cuiusdã partis inflammationem febricitabāt: non iam febricitantes ipsos appellabant, neque febribus vexari dicebant: Sed pleuriticis, aut peripneumonicos, aut hepaticos, aut similibus aliis nominibus nuncupabant.*

Sunt autem febrium Symptomaticarum plura genera. Præcipuum & frequentissimum Symptomaticarum febrium genus vulgò istud censetur, quod ab humorum putredine extra venas oritur; cuius generis sunt febres omnes, quæ interiorum cordique vicinarum partium inflammationem, calidiorque tumores sequuntur. Sic secundum vulgatam sententiam in phrenitide, angina, peripneumoniâ, pleuritide, hepaticide, talis febris oritur, eoque vehementior, quòd pars inflammata nobilior est, cordique vicinior.

Atque has febres à primariis ita discernere docet Fern. de febr. c. 7. Quod vtrique acuta sit & putredinis notas exhibeat, sed Symptomatica nullis statis periodis exacuatur, vrina nullum putredinis indicium habeat, nisi ex affectâ sede putredo sensim obrepit venas; si non statim initio, mox tamen inflammatæ sedis indicia sese proferant; raro vel 7. vel 14. die, aliusve decretoriis iudicio soluantur; cum in febre continuâ primariâ hisce contraria appareant omnia.

Verùm à vulgatâ istâ doctrinâ dissentit Felix Platerus, Clarissimus & experientissimus ille Basilienſium Medicus. Cum enim vulgò has febres omnes à partium interiorum & aliarum inflammatione oriri statuât; & putridas esse affirmet: ille contrà inflammationes & tumores illos calidos à febre potius oriri statuit, & potius comitatas, quàm symptomaticas appellandas censet, quodd scilicet hæ febres inflammationem alicuius partis tanquam comitem sibi adfiscant. Deinde cum vulgò istæ febres pro putridis habeantur: Ille contrà simplices has & puras adhuc, non putridas nominat.

Nam primò etsi concedat, sanguine, non è venis, causâ febris præcedentis excidente, sed aliam ob causam, veluti calorem dolorémue commoto, in partem influente, id quod sæpe in vulneratis partibus accidit illique vel intemperiem solam, vel inflammationes, aut eryspelata accedente, febres eiusmodi procreari: tamen non omnes tales esse admittit, sed pleraque febres, quas vulgò pro symptomaticis habent; & inflammationibus, & calidis tumoribus superuenire statuunt, esse primarias, quibus cœu comites tales inflammationes postea adueniant, asserit, vnde illas Synochas primarias sed comitatas, appellat. Sæpiſſimè enim fieri statuit, vt sanguis, quandoque ob copiam vel feruorem & tenuitatem, vel etiam impuritatem aliquam naturæ grauem in venis subsistere nequit, vel statim in primâ febris inuasionem, vel mox postea vi naturæ propulsus, & tum in partem aliquam effundatur, & tum in parte, ad quam fertur, nouum morbum excitet, inflammationem scilicet, ob quam febris appellanda comitata, non symptomatica, vt hætenus creditum; cum morbum non sequatur, sed illum præcedat, illiusque causa sit: quod vel ex eo patere potest, quodd hæ febres, antequam doloris aut inflammationis alicuius partis indicia sese exhibent, cum

horror

horrore & subsequente calore inuadant, & quandoque horis aliquot praueant.

Talique febres sapissime generari solent, cum scilicet in viscera interiora aliqua, praesertim carnosa, & sanguinea, venisque copiosis referta, & cordi vicina, tales influxus sunt. Id quod ob situm & constitutionem ad influxum humorum recipiendum aptum frequentissime fit in pulmonibus, unde peripneumonia & pleuritis. Idem etiam fieri potest in hepar & lienem sanguine effuso; quandoque etiam in cerebrum, ac tum phrenitis febris copulatur. Idem etiam accidere potest in ventriculo, intestinis, vtero, vesica: sicut & in collis musculis ac glandulis; unde angina. Verum & arthricos tumores & dolores ejusmodi febres praecedere statuit, Naturam sanguinem & humores in articularum sedes propellente. Quinetiam in febribus hisce Synochis materiam in corporis superficiem interdum effundi existimat, unde rubores, ardores, pustulae, tumores, & ex his frequenter Carbunculi ac bubones excitantur. Frequentissime autem sanguine in crurum inferiores partes descendente, erysipelas oritur. Atque his omnibus erumpentibus febrem remittere plerumque solere, non verò tunc primum incipere, atque illorum affectuum sobolem esse docet.

Deinde febres istas non putridas, sed simplices & puras esse, contra vulgatam opinionem statuit.

Atque isti Medici hujus experientissimi sententiae in eo quidem non sine causa ad stipulamur, quod statuit, febres plerasque, quae vulgò pro symptomaticis habentur, & a partium certarum inflammatione excitari creduntur, primarias esse, & non ab inflammationibus provenire, sed contra inflammationes producere; ob causas supra allatas, ipsiusque experientiae testimonium. Qui enim ea, quae in febribus eueniunt, diligenter perpendere velit, animaduertet, Naturam vitiosorum humorum onere grauata illos, quantum potest, è vasis majoribus, quasi regia & publica sede, ad minores venas & determinatas corporis partes depellere. Imò saepe materiam ex vnâ parte depulsam in aliam transire; unde morborum commutationes fiunt. Et tales febres comitatae praecipue quidem sunt, quae inflammationem alicujus partis habent comitem: possunt tamen & ea ita appellari, quibus alia mala perpetuò conjunguntur, nimirum dysenteria, variolae, morbilli, petechiae, dolores vagi, arthritidis, cathatri ferè epidemij. Haec enim mala omnia oriuntur, vbi natura onere vitiosorum humorum grauata partem aliquam vitiosi humoris è vasis majoribus protrudit, siue eam è corpore planè expellat, siue in partem aliquam deponat.

Hujus generis etiam febris est, quam erysipelas, Germanis Rola, comitatur. Non enim ex *φλογος* & incendio partis externae febris oritur, sed febriū malum hoc comitatur. De quo postea dicetur. Ideoque licet in hoc tractatu communem loquendi consuetudinem secuti fuerimus & febres, quae pleuritidem, anginam & similes affectus sequantur, symptomaticas appellauerimus: tamen omnino censemus, plerosque tales morbos potius febrem sequi, quam vt febres ipsas accedant.

Verum in eo Platero non assentimur, quod febres has omnes simplices & puras continuas absque putredine esse statuit. Vt enim jam alia indicia, quae putredinem satis arguunt, taceamus, vrinae in pleuritide, angina, reliquisque viscerum inflammationibus ejusmodi satis monstrant, adesse putredinem. Crudae enim principio apparent; hinc per coctionem indies in salubribus meliores euadunt, id quod putridorum humorum proprium est. Et cerè rationi contentaneum non videtur, febres, à quibus erysipelas, carbunculi, ecchymata, excitantur, ab humore puro & non putri excitari. Tanta enim in materia, quae in superficiem corporis expellitur, corruptio apparet, vt illa aliunde facile, quam ex putredine provenire non possit. Deinde, cum, vt ipse Platerus docet, febres eph-

merae & synochae simplices purae non putridae, subitâ excretionem, quam crisin vocant, non terminentur, sed sensim per occultam transpirationem vel madorem sudoremque desinant: in febribus his contrarium accidit. Nam natura non solum quantitate (neque enim materia, quae è venis in corporis superficiem expellitur, semper benigna est, vt solum copia molesta esse possit,) sed & qualitate materiae, quae cacochymiae propria est, stimulata, illud, quod molestum est, nunc symptomaticè, mox initio, nunc etiam criticè, vt in bubonibus & erysipelatibus non raro videre est, excernit: id quod natura non nisi in putridis humoribus tentare solet; unde & horrores ac rigores tales febres & excretionem praecedere solent.

Imò sum in eâ sententiâ, febres illas à bubonibus ortas, quas Gal. saltem per alterationem & caloris communicationem, siue putredinis in venis accensione oriri statuit, quasque supra etiam, lib. primo, capite quinto, ex ejus mente inter febres Ephemeræ retulimus, potius putridas esse: id quod tum vrinae, tum alia satis docent. Et per vasa, per quae materia ad bubones affluit, per eadem etiam vapores putridi remeare & ad eas penetrare possunt.

Est autem febrium harum, siue ex propriè dictae symptomaticae sint, siue quae partium aliquarum inflammationem tanquam comitem sibi adsciscunt, quaedam differentia. Si enim inflammatio vera & pura sit, & ex sanguine, copia maximam partem peccante excitetur, *φλεγμονώδης πυρετός* & febres appellantur. Si verò viscus aliquod erysipelate, aut inflammatione *έρυσιπελατώδης* laboret, & in primis, si hepar tale quid patiatur, *πυρετός πυρετός* nominatur.

*Febrium symptomaticarum differentia.*

*Febris typhodes.*

*Λιγυρίας πυρετός* etiam huc pertinet, quae est febris *Lyppria febrilis* valde ardens & vehemens, in qua interiora omnia quasi vruntur, exteriora verò frigent, & quidem toto morbi decursu: atque ortum habet à magnâ & vehementi visceris alicujus in corporis parte profundâ inflammatione, vt & erysipelate praecipue ventriculi. Nam calor ille vehemens in interioribus sanguinem & spiritum ad locum inflammatum tanquam cucurbitula trahit; unde incendium in interioribus intenditur, extrema verò calore & sanguine destituta frigent.

Alterum febrium symptomaticarum genus est, quod lentam appellant. Ejus vnâ differentiam vulgò esse statunt, quae oriatur, vt habet Fern. de febr. cap. 8. non ex visceris partisque cujuscumque inflammatione, sed è latente obstructione & putredine, quae visceri contumaciter adhærescit, impactaque est aded, vt substantia visceris plerumque labefactetur. Putredinis portio tunc nonnunquam in venas effundatur, & sanguini permisceatur, febrem excitat, sed omnium mitissimam, quae nullo graui symptomate ægro molesta est, aded vt æger vix se ægrotare putet. Putredinis tamen aliqua notæ in vrina & pulsu apparent. Vires ægri collabuntur, vt æger vix præ imbecillitate progredi possit, nihilque ex alimento reficiuntur, sed corpus sensim contabescit & absumitur. Diuturnior est, & non prius desinit, quam impacta visceri materia putredine absumitur, quod saepe non fit ante diem quadragesimum. Hujus itaque febris cum suspicio aliqua est, omnes corporis partes diligenter peruestigare jubet Fernelius, atque in primis hypochondria & hypogastrium, vtrum in his tumoris aliquis sensus deprehendatur.

*Febris lenta.*

Atque huius febris quandam differentiam constituit Eustachius Rudius. Nunc enim eam oriri docet, cum humor in vasis impuri & imperfecti sanguinis, quae venae chyli ab Arabibus appellantur, putrescit, ita tamen, vt in vnâ quapiam parte fixus & immobilis principium, progressum, atque finem putredinis assequatur. Nunc verò excitari ab humore in vasis non quidem communibus, sed viscerum & organicarum partium propriis, putrescente.

Verum enimverò circa hanc, quae vulgò à plerisque traditur,

*Febres Comitatae an sint absque putredine.*

traditur, de primo febrium lentarum genere doctrinā, illud explicandum videtur, quid per latentes & contumaces obstructions intelligendum sit. Nam si, ut Rudius & plerique explicare videntur, vel de mesaraicarum venarum, vel de vasorum alicui visceri propriorum obstructione explicetur, dubitatione non caret hæc doctrina. Nam si in mesaraicis putrescat materia, non impossibile videtur, ut natura illud, quod putrescit, expellat, unde intermittentes potius febres etsi diuturnæ quàm continuæ symptomatice oriuntur. Si vero in vasis cordi continuatis materia putrescat, citra ullam partis aut visceris inflammationem, aliūmque affectum, non video, cur non putrida continua primaria excitari debeat. Itaque per latentem & contumacem, ac visceri alicui impactam obstructionem & putredinem ea, quæ in spatiis saltem partium, aut certe in capillaribus venis per substantiam visceris alterius dispersis consistit, intelligenda est. Et proinde cum Platero potius has febres generari statuo, cum extra vasa, hoc est, venas & arterias materia putrescit, unde tantā copiam, sicut cum in vasis patentioribus continetur, eoque ordine, ad cor transmitti nequit, sed portio saltem aliqua per vasa ad cor transmittitur, unde febris lenta excitatur, quæ febres propterea plerumque inæquales sunt, cum materia extra vasa consistens, ut dictum, tantā copiam, sicut cum in vasis hæret, atque eo ordine ad cor transmitti nequeat.

Fernelius ad hoc genus febrium refert eam etiam, quæ eos, qui cachexiā afficiuntur, & virgines leucophlegmaticas molestat, eamque ex serosa pituita in corpus effusæ leni putredine provenire statuit.

Tertium symptomatice febris genus est adhuc longè peius, quod ex visceris alicujus putredine & corruptione oritur, è quo per venas visceri insertas putridi & calidi vapores ad cor expirant, eiusque calorem igneum reddunt, febrēque continuam lentam excitant, quā ægri vires valde deiciuntur, corpusque sensim extenuatur & contabescit.

Sæpiissime febris talis excitatur ex pulmonum ulcere in phthisicis, quam vulgò plerique hecticam vocant. Verum monet Fernelius, potius putridam esse, quàm hecticam, utpote quæ ortum habeat ex putrescente pulmonum substantiā, è qua continuo vapores putridi ob vicinam cordi communicantur, qui illud calefaciunt. Eadem febris generatur, si hepatis lienisque substantia putredinem concipiat, quam *ατρωσία* & *καρχία* sequitur. Ita & circa mesenterium, omentum & uterum sæpe putredo incidit, quæ quia lenta est, talem etiam lentam febrem producit. Accidit quoque, ut interdum factus vna cum secundinā, sæpe etiam sola secundina in utero putrescat. Unde febres pro ratione putredinis diversā vario modo excitantur, nunc acutæ, nunc lentæ. Eodem modo è fistulis ad interiora penetrantibus, febre lentā excitatā, non pullos contabuisse observatum est.

Quartum febrium symptomatarum genus est, cum vel ex lacte corrupto, quod sæpe in infantibus accidit, vel ex sanguine alicubi extra vasa putrescente, vel ex vermibus putridi vapores cordi communicantur, illudque calefaciunt, & febrem excitant. Huc referri potest & febris illa ex cruditate, quæ infantibus ex *αδυναμία* familiaris est, cum hypochondriorum tumore & inflatione, quam Germani *das Hertzgeßan* nominare solent, ex colluvie crudorum humorum in ventriculo & vicinis locis collectorum, qui putrescere incipiunt, & in flatūs mutantur.

Sed queritur jam, an præter hæc continuas symptomatice aliæ dentur intermittentes. Symptomáticas febres omnes continuas esse equidem communis Medicorum sententia est. Ab eā tamen recedit Adrian. Spigel. de febre semitert. l. 1. capite 18. Qui quidem concedit, eas febres symptomáticas quæ in phrenitide, anginā, pleuritide, peripneumoniā, magnis jecoris lie-

nisque inflammationibus proveniunt, esse continuas; si verò ex etiam febres pro symptomáticas habentur, quæ ab obstructionibus partium, à quavis partis alicuius inflammatione fiunt, negat eas esse continuas.

Verum enimvero de obstructionibus res manifesta est; cum ab iis intermittentes fieri possint. Etsi quandoque etiam continuæ symptomáticas ab iis proveniunt, quæ lentæ dicuntur. Sed de iis, quæ ab inflammationibus partium proveniunt, quæstio est. Vbi vulgatæ Medicorum sententiæ subscribimus, statuimusque omnes eas febres continuas esse. Si enim inflammatio sit tanta, ut febrem accendere possit, durat ea febris tamdiu, quamdiu durat inflammatio. Neque quæ probationis loco adducit, contrarium demonstrant. Nam quod ex Donati Marcelli *histor. mirab. lib. 5. c. 4.* affert, de quodam in musculo temporali vulnerato, qui septimā die superuenientibus rigoribus vsque ad quadragesimum quintum diem riguit, & quotidie fere semper sudavit alternatim rigoribus succedentibus sudoribus, hoc non probat. Neque enim ea febris intermittens fuit, sed continua, quod ex eo apparet, quod septimo demum die rigor superuenit. Ideoque huic calui non competit, quem allegat, *aphorif. 63. sect. 4.* sed potius alter è coacis, Febres in suppuratione intermittentes, multæ exsudantes *εφιδρωτες* sunt. Vbi, ut rectè Iacotius, in *Commentario* monet, per febres *διαλείποντες*, intermittentes haudquaquam intelligendum est, quasi ex ad *απυρεξίαν* perveniant, sed dicuntur intermittentes, quod aliquam caloris intensiorem & remissionem & cum horrore vel rigore accessionem habent. Fiunt illi rigores quoties inflammatio vel novam partem occupat, vel in pus mutatur, vel dum abscessus rumpitur. Neque etiam sudor criticus est, qui in hac febre accidit, sed *εφιδρωσις*, ab evaporatione vel halitu puris cum cordis compressione, cum ex infirmitate partium solidarum, quæ alimentum in poris contentum effluere sinunt. Neque febris illa intermittens tertiana, si modò fuerit verè intermittens in ischiade, ex ischiade ortum habet, sed ischiadicus morbus febrem istam comitatus est.

#### Signa diagnostica.

Cum autem non parva in curandis hisce febribus occurrat diuersitas, omnino ut signis suis discernantur, laborandum. Cognoscuntur autem febres symptomáticas propriè dictæ ex eo, quod partium privatarum affectus sequuntur. Et primum quidem genus harum febrium ex eo patet, quod sequitur privatarum partium inflammationes; atque inflammatio prius apparet: contrarium verò accidit in febribus Comitatis, quæ ante inflammationem plerumque cum horrore vel rigore inuadunt, & inflammationem sæpe satis longo spatio præcedunt. Accedit his & hoc, quod in hisce Comitatis febribus criticus q. naturæ motus est: (etsi imperfectus, cum natura vitiosum humorem non è corpore expellat, sed in alium locum deponat) unde cum naturæ ille motus cum aliquā corporis perturbatione fiat, symptomata etiam in hisce febribus longè apparent grauiora, quàm in symptomáticas febribus.

Lentæ autem illæ febres cognoscuntur ex calore lento, cum quo notæ putredinis in urinā & pulsu apparent. Vires sunt imbecillæ, ut æger vix progredi possit, corpusque sensim contabescit, febrisque diu & ultra 40. diem plerumque protrahitur. Exasperatur purgantium usu. Vbi autem causa harum febrium lateat, sæpe difficulter cognoscitur, ideoque Hypochondria & aliæ partes internæ diligenter perlustrandæ, & an aliquis tumor vel dolor appareat, inquirendum. Quæ verò ex partis alicuius putredine oriuntur, facilius cognoscuntur. Neque enim partis corruptio facile latere potest, nisi sit planè ignobilis.

Signa quibus  
symptomati-  
cæ & comi-  
tata febres  
discernun-  
tur.

Phthisico-  
rum febris  
qualis.

An dentur  
symptomati-  
cæ intermis-  
sentes.



Ita quæ ex lacte vel sanguine corrupto oritur Febris symptomatice, etiam suis lignis facile cognoscitur. Vt & illa, quæ ex triditate oritur, ex Hypochondriorum inflatione & intumescentiâ, & nausæa patet.

### Prognostica.

Febres autem hæc etiam si ferè sui ratione non sint periculosæ, quia sunt mites: tamen causarum ratione, à quibus pendent, an sint periculosæ, necne, æstimandum. Vt & an sint longæ vel breues. Quæ enim partis affectæ alicuius inflammationem sequuntur, breues sunt; cum & inflammatio ipsa longa esse non possit. Periculum autem earum ex inflammatione pender.

### Curatio.

Curatio non tam ad febrem quàm ad causam, à quâ ea pendet, dirigenda est. Si ergo febris symptomatice ab inflammatione alicuius partis dependet; curatio præcipuè ad ipsam inflammationem dirigenda. Curatâ enim inflammatione, febris & ipsa cessat. Et pleraque remedia, quæ inflammationis causâ adhibentur, ut venæ sectio, alui lenitio, etiam febri occurrere possunt. Febris tamen non planè negligatur. Ideoque Alterantia, & quæ putredinem inhihent, hæc etiam ipsius febris gratiâ exhibenda sunt. Ita tamen illa moderanda sunt, ne parti affectæ & morbo primatio noceant.

Lentæ febres, cum ex pertinaci obstructione viscerum ortum habeant, aperientibus, attenuantibus & detergentibus opus est. Et eligenda medicamenta, quæ cuilibet parti appropriata sint, viscerumque tonum, qui plerumque labefactatur, roborent. Per intervalla tamen lenis purgatio interjicienda. Nec negligenda suo tempore diuretica. Extrâ quoque, si locus affectus id ferat, Topica emollientia & discutientia applicanda.

Si ex partis alicujus corruptione & putredine febris symptomatice proveniat, curatio ea instituenda, quæ partium internarum ulceribus & fistulis conuenit.

Si ex lacte vel sanguine corrupto, vermibus, vel cibis crudis & corruptis ortum habeat, danda opera, ut earum causæ conuenienti modo, vel vomitu, vel abluentibus & euacuantibus medicamentis tollantur, simulque putredini & calori febrili resistatur.

Februm verò, quæ inflammationes & alios morbos producant, curandi ratio alio modo sese habet. In hisce enim febribus, quas Platerus Comitatas appellat, non minùs ad ipsam febrem curatio dirigenda; quàm ad morbum, qui febri succedit. Et imprimis cum motus hic naturæ sit, non impediendus. Etsi enim melius fuisset, si natura humorem illum planè è corpore expulisset; & quandoque ob partem priuatim affectam grauius inducantur symptomata: tamen si humor in venis & interioribus corporis partibus reclusus fuisset, longè maius periculum induxisset, quod etiam interdum accidit, si materia in corpus retrocedat, ut in erysipellate, & arthritide critica videre est. Aut si incipientem inflammationem prohibere, ob grauitatem symptomatum, quæ interdum accidunt, necesse sit: talia sunt auxilia, quæ humorem malicautam, simul è corpore tollant. Hoc enim nisi fiat, metus est, ne natura eundem ad alium locum non minore cum periculo pellat. Ergo imprimis danda opera, ut materia, quæ naturam grauatur & ad expellendum stimulat, euacuetur, putredo inhihentur, parti quæ affectæ prospiciatur. Euacuatio commodissimè fit plerumque venæ sectione; cum materia, quæ ad partem aliquam ruit, in venis contineatur, & venæ sectione non solum reuelli, sed & euacuari possit.

Euacuandæ sunt & primæ viæ; cum non rarò materia talis in iis colligatur. Et cum materia plerumque tenuis sit, sæpissimè ad ambitum corporis tendit, &

non rarò malignitatis particeps, commodissimè per sudores expellitur. Illud enim malignum, quod naturam stimulat, tum in venis ad expulsionem, tum in parte, in quam propellitur, acrimoniâ & malignitate, dolorem ciēt, inflammationem parit & auger. Ita pleuritides tales non infeliciter venâ sectâ, & sudoriferis ex carduo mariæ, carduo benedicto, papauere rhœade, scabiosâ & similibus curantur; non tamen neglectâ parte affectâ, aliisque, si opus sit, euacuationibus, & alterationibus.

Verum cum, ut dictum, materia tales febres generans rarò malignitatis expers sit, sed ab eâ stimulata natura tales motus instituat: curandi tales febres ratio ex curatione febrium malignarum clarior fiet. Exempli gratiâ, vnam tantum febrem talem, cui erysipelas seu rosa vulgò dicta conjungitur, proponere libet.

### De Erysipellate seu Rosa.

Quod malum nostris Rosa, à roseo colore & rubore, quo cutis perfunditur, item *das Rothlauff*, ex rubore citò incidente, aut etiam ex vnâ parte in aliam migrante, nominatur: Græcis *ἐρύσιπelas* dicitur, quod vocabulum alij deriuant *πυρε* τὸ ἐρύειναι ἐπὶ τὸ πύλας, quod serpat ad vicina, vnde etiam à nonnullis appellatur *das Flogfever*: alij *ἐρύθρον* deriuant, à colore rubro: antiqui enim pro *ἐρύθρον*, *ἐρύσιπ* dicebant: Est enim morbus hic febris continua, à sanguinis parte tenuiore corruptâ & inflammatâ originem habens: quâ ut Natura se liberet, eam in corporis aliquam partem externam expellit, in quâ tumor aut potius (cum tumor adeò notabilis sæpè non appareat) macula rubra, lata, dispersa, quam Erysipelas, vulgò Rosam appellant, oritur.

Quæ autem hujus mali causa sit, non omnes idem sentiunt. Ex pituitâ, Melancholiâ, aut sero salso hunc tumorem excitari, nemo ut opinor, est, qui crediderit, aut credat; præcipua de sanguine & bile lis est. Vulgò quidem creditur, Erysipelas à bile flauâ ortum habere: verum sunt ex recentioribus, qui huic sententiæ contradicunt, atque Erysipelas non ex flauâ bile, sed potius ex sanguine tenui oriri asserunt, has ob causas. Primò enim ipse color sanguinis potius, quàm bilis indicium est, qui ruber est; vnde etiam nomina huic malo à Germanis indita sunt: cum si à flauâ bile esset, ut aliquibus creditur, pallido aut flauo colore potius, ut in Ictero fieri consuevit, pars affecta tingi deberet. Quanquam verò interdum ex rubro nonnihil ad albedinem vergit color: tamen is color non omni Rosæ, sed saltem alicui ejus differentię competit. Insuper quanquam calor satis vehemens sit: tamen non est tam acer, ut in affectibus à bile flauâ. Vnde non tam frequenter exulceratur hic tumor, ut Herpes & alij tumores ex bile nati. Et cum exulceratur Erysipelas, id non tam ex ipsius naturâ est, quàm ex transmutatione: Idem etiam hoc testatur, quod ij qui calido & sicco temperamento sunt, ut macri, fusci, nigri, quod flauæ bili generandæ accommodatissimum est rariùs, quàm sanguinei & alij, ut obesi, carnosii, ruffi, hoc malo infestantur: & quod carnosæ corporis partes, ut femora, crura, facies, collum, mammæ, & similes crebriùs, quàm aliæ occupantur. Atque inuadit hic morbus plerumque ab anno 30. ad 40. quanquam & aliquos ante vel post hos annos infestet: circa annum verò 35. plurimum sanguinis in corpore esse scribit Galenus, 1. *progn.* 33.

Etsi autem verum sit potius à sanguinis tenuiore parte oriri hunc morbum, quàm à bile flauâ: tamen à verâ inflammatione etiam differt, quod minùs tumear, minùs pulset, minùs renitatur & tendatur; non tamen minùs, sed etiam magis rubeat & caleat. In verâ enim inflammatione sanguis crassior est, & in muscutorum cavitatem & spatia effunditur, hincque faciliùs suppuratur, quàm discutitur; contrâ verò in Erysipellate

Erysipelas seu Rosa.

Erysipelatis causa.

seu Rosâ sanguis est tenuior, calidior, & ex capillari-  
bus venis per poros in cutem dispersus, vnde & faci-  
lius discenditur, quàm suppuratur.

Rectissime tamen ij sentire videntur, qui non in ple-  
thoram simpliciter, & copiam sanguinis, sed potius de-  
prauatam & peculiarem qualitatem, quæ à sanguinis  
tenuioris putrefactione & corruptione prouenit, cau-  
sam hujus mali referunt. Malignâ enim illâ qualitate  
Natura stimolata humorem vitiosum ad ambitum cor-  
poris expellit.

*Erysipelatis  
causa.*

Est autem hoc malum nostris regionibus satis fami-  
liare, quod nonnullos post menstrua, alios post trime-  
stria, aut semestria, aut longiora etiam intervalla in-  
uadit: vbi nimirum sanguis, inprimis qualitate, pec-  
cat, atque calidior & biliosior, & peculiari modo  
Naturæ infestus collectus est. Hic enim, si quale-  
cunque initium motus seu in corpore seu extra corpus  
nactus fuerit, utpote ambientis aeris caliditatem, la-  
borem, vigilias, vini potentis liberaliorem potum,  
inediam, ciborum acrium, calidiorum vsum, inpri-  
mis iram, terrorem (quæ ipsa tamen non solum hu-  
mores mouere, sed & corrumpere possunt) in venis  
agitatur, atque ex iis à naturâ ejectus ad superficiem  
corporis erumpit. Sanguinis hoc vitium proficiscitur  
ab intemperie Hepatis, sine controuersia calidiore, at-  
que aliquo modo humida; non autem simpliciter  
humidâ, sed humiditate, quæ à siccitate quodam-  
modo sic temperata & castigata, ut sanguinem calidio-  
rem, pinguiorem & mobiliorem producere possit. Si  
enim siccum sit hepar, vix talem humorem, qui Ro-  
sam excitat, sed sanguinem potius crassiores genera-  
bit, eumque parciorem & habitum corporis sicciores  
efficiet, quem huic malo minùs esse obnoxium expe-  
rientia docet. Atque hæc temperatura hepatis cum hæ-  
reditario quasi jure à parentibus in liberos transeat,  
non raro etiam hoc malum à parentibus in liberos pro-  
pagari solet. Decumbit autem hic tumor in carnosarum  
partium superficiem, ut crura, vbera, faciem,  
brachia, & similes partes, modò in hanc, modò in il-  
lam, prout hæc vel illa imbecillior est ex vulnere, fra-  
cturâ, contusione, luxatione, vlcere, aliisque de causis, ut  
calefactione, fatigatione, dolore. Quò facit etiam si-  
tus, vnde plerumque crura occupantur; ut & raritas &  
mollities membri, vnde nonnullis in facie vel mam-  
mis Erysipelas oboritur.

Inter Erysipelata meritò etiam refertur affectus qui  
Plinio lib. 26. cap. 11. *ζώνη* seu Zona appellatur, qui à  
cruribus vsque ad lumbos seu locum cincturæ serpit,  
& rubedine veluti fasciâ iniectâ, eas partes cingit, sic-  
que, vbi medium hominem ambit, enecat.

*Signa Erysi-  
pelatis.*

Malum hoc cum his regionibus satis familiare  
sit, à vulgo etiam non solum præsens, sed imminens  
agnoscitur. Dum enim materia glandulas & emuncto-  
ria sub axillis & inguinibus inuadit, aliquid agitari hu-  
moris ibi hæreere solet, vnde vel in inguinibus, si ad  
crura materia tendit, vel sub alis aliquis dolor aut tu-  
mor percipitur, ut etiam in peste fieri consuevit; & à  
loco dolente vel tumente macula quædam rubea se-  
cundum rectum ductum ad crura conspicitur. Et ferè  
inuadit hoc malum ut pestilentia, cum horrore & in-  
sequente calore febrili, ita ut qui malum hoc antea  
non sunt passi, ejusque crebrioribus paroxysmis non  
sunt assueti, existiment, huc pestiferâ se corripit, donec  
 tandem in crure aut alio loco sese affectus prodat. Vbi  
enim præsens est, facile agnoscitur calore insigni, do-  
lore, colore roseo. Quia tamen, ut antea etiam di-  
ctum, valde cognatum malum est ipsi inflammationi,  
distinguenda sunt hæc duo tumorum genera. 1. digi-  
to applicato supra Erysipelas, pars exalbescit, refu-  
gente sanguine; qui tamen mox redit; quod non  
fit in phlegmone, nisi pars prematur, utpote in quâ  
major est materię copia, ejusdem crassities, atque  
inde major *inflatio*. Quâ de causâ etiam Erysipelas

magis in cute hæret; phlegmone verò ipsam carnem  
quoque occupat. Quòd si in Erysipelate major sit tu-  
mor, id Erysipelas potius nothum est, quàm exquisitum  
& purum. 2. In Erysipelate major calor est, quàm in  
phlegmone, vnde non raro cutis ita adurit, ut vesi-  
culæ excitentur & pars exulceretur, quod in phleg-  
mone nunquam accidit; & febres in Erysipelate sunt  
maiores, quàm in phlegmone. 3. Erysipelas habet  
colorem rubicundiorum & igneam rubedinem cum  
aliquâ interdum citrinitate, in phlegmone verò est co-  
lor rubeus, sed ad nigrum aut fuscum vergens, propter  
sanguinem crassiores. 4. dolor est major in inflama-  
tione, utpote in quâ non solum est intemperies, sed  
etiam tensio; minor in Erysipelate. Denique Erysi-  
pelas serpendo ad vicina progreditur & crescit: infla-  
matio verò in vno loco fixa manet, & nunquam ab eo  
dimouetur.

Erysipelas seu Rosa etsi plurimos sapius sine vlllo *Prognosis.*  
periculo inuadere soleat; tamen danda est opera, ut  
diligens curatio adhibeatur, ne aliud malum inde pro-  
creetur. Nam ut est, 6. *aphor.* 25. Erysipelas ab exte-  
rioribus ad interiora conuerti, malum est; sicut contrâ  
ab interioribus ad exteriora, bonum. Ex materię  
enim illius ad interiora recursum, siue à prauâ curatione,  
ut medicamentis repellentibus, siue aeris frigore id  
accidat, ægri etiam in maximum periculum sæpe con-  
jici solent. Malum etiam est, ut docet Hippocr. 7.  
*aphor.* 2. ab Erysipelate putredo & suppuratio. Qua-  
propter, ut dictum, in curatione diligentia adhiben-  
da; quæ tutius è Germanorum nostrorum experientiâ  
& obseruatione, quàm exterorum libris peti potest.

Quantum itaque curationem attinet, vñratum est *Curatio.*  
vulgò, vbi paroxysmus inuadit, & Rosa emicat, medi-  
camenta assumere, quibus naturæ motum adjuuant,  
& materiam ab interioribus ad exteriora excutunt, ac,  
ut loquuntur *die Rose vom hertzen treiben*: in quem  
finem solent theriacam aut mithridatium, vel aquam  
Sambuci, aut Rob Sambuci exhibere. Aliqui nucem  
moschatam obuolutam lino aut canabe sub cineribus  
calidis assant, atque cum semine Aquilegiæ itidem  
tosto in vino albo tenui, aut aquâ scabiosæ exhibent,  
& huic medicamento hanc laudem tribuunt, ut eum,  
qui semel, morbo incipiente, eo vñs fuerit, ab hoc  
morbo in posterum tutum reddere possit. Hæc medi-  
camenta, quæ per sudorem & transpirationem insensi-  
bilem, materiam excutunt, etsi meritò laudentur, &  
hac in parte antiquorum cura manca sit; atque etiam  
sæpe mox ab initio, vbi humorum copia, venæ sectio-  
ne aut purgatione tollenda, non vrget, possint adhiberi:  
Medicus tamen non semper mox à talibus inchoa-  
re debet. Quanquam enim methodus jubeat, primò  
causam antecedentem tollere, postea ipsum affectum  
curare; & ad causæ discussionem etiam illa sudorifera  
faciant; tamen si animaduertatur copiam humoris  
adesse, ne ejus nimia copia ad locum affectum con-  
fluat, primò ejus pars aliqua aliis rationibus euacuanda  
est.

In principio itaque si sanguis simul abundet, & Ery- *Vena sectio.*  
sipelas sit *φλεγμονώδης*, ut fieri plerumque in Corpori-  
bus plethoricis & crassioribus solet, venam hepaticam *Purgatio.*  
aut medianam aperire vtile est. Si autem sanguis non  
abundet, purgatione vtendum, sed tali, quæ humores  
non inflamet, & membra non siccet, sed serofos, acres  
ac tenues humores educat, ac post refrigerationem  
quandam relinquat, & tonum membrorum conseruet.  
In hunc vñum adhibetur Rhabarbarum, Syrupus rosar.  
& violar. solutius, pulpa tamarindorum, & cortices  
interiores radicis frangulæ. v. g.

℞. Tamarind. ʒ. vi. flor. cordial. an. P. i. Coqu. in s. q.  
aq. endiniae. In colaturâ Infund. per noctem rhabarbari  
el. ʒ. ii. spica. Scr. ʒ. Colaturæ. ℞. ʒ. iii. ʒ. In quibus dis-  
solu. syr. rosar. sol. de cichor. c. rhab. an ʒ. vi. Misc.

Purgato iâ, si opus est, corpore, ut reliquum materię *Sudorifera.*  
peccantis,

peccantis, & vapores illi in corpore fluctuantes expellantur, ac naturæ expellenti subueniatur, danda opera. Verè enim aliquid malignitatis videtur hæc materia habere. In hunc finem ea possunt vsurpari, quæ iam suprà recensuimus. Solenander hoc Electuar. quo etiam in peste vtitur, commendat.

*℞. Theriac. opt. ℥. i. i. terr. sigillat. vel boli armeni. ℥. i. B. granorum Iuniperi recent. radic. tormentilla. sem. cardui bened. an. ℥. β. spec. Electuar. de gemmis, diamargar. frigid. an. Scr. i. off. de corde cerui, sem. acetosa, coralloꝝ rubr. prepar. an. ℥. β. Cum Syrupi de acetositat. citri. quantitat. F. Electuarium liquidius, cuius ℥. i. vel ℥. ii. cum ℥. iii. aut v. aque cichorii, scabiosa, fl. sambuci aut Cardui benedicti propinetur. Vvicius vtitur hac potione.*

*℞. Aq. flor. sambuci ℥. iii. sem. apij. ℥. β. terra sigillata Scr. β. Milce.*

Interim etiam illa ipsa intemperies calida humorū non negligenda, sed per conueniētia medicamenta alteranda, parata è cichorio, taraxaco, endiuia, violis, rosis, sambuco, scabiosa, citro, ribes & similibus.

Vbi hoc modo causa amota, & febri prospectum est, iam ad ipsam partem extrà affectam accedendum: quā in re cautione non leui opus est. Antiqui & plurimi Chirurgiæ scriptores adhibent valde refrigerantia ipsam quoque aquam frigidissimam, imò etiam adstringentia & stupefacientia admiscunt, vt hyoscyamum, mandragoram, opium, cicutam.

Verū antiquis & chirurgorum libris vulgatam ac familiarem hanc curam non sine ratione & experientia suffragio reprehendunt recentiores. Cum enim materia Rosam excitans acris sit, & plerumque non sine omni malignitate, quod inuasio & alia symptomata docent: si illis valde refrigerantibus, adstringentibus, & repellentibus eius exitus prohibeatur, ad interiora, quod vt ex Hippocrate dictum, malum est, regreditur, & membra interiora & nobilia occupat, atque ægrum etiam in vitæ periculum præcipitare potest. Vnde si Erysipelas sit in capite, & per refrigerantia ac repercutientia ad interiora repellatur, Erysipelas in cerebro & phrenitis, vel Angina; si ad cor pellatur, febris ardens; ad hepar, eius inflammatio vel Erysipelas excitari potest. Deinde in ipsa parte affecta materia per eadem medicamenta concluditur; vnde putredo & suppuratio, quæ & ipsa secundum Hippocratem mala, non raro Gangræna & membri *væpans* oritur, vt ipsa experientia testatur. Quod cum ex Græcorum & Arabum curatione non raro acciderit, monent illi, vt pars non diu nimis refrigeretur, sed solum vsque ad caloris remissionē, quam ex ægri relatione, qui faretur, se non amplius tam insignem calorem sentire, ex tactu & colore rubicundo remisso, ac qui in liuidum mutari incipiat, agnoscere iubent. Sed facili fieri potest, vt antequam satis cautionis hinc adhibeatur, enumerata pericula & incommoda iam præstò sint. Quapropter hinc res non multum aliter se habere videtur, quā in ambustis. Si enim membrum aliquod ambustum aquæ frigidaë immergatur, aut aliàs valde refrigeretur, nihil aliud agitur, nisi vt calor, qui in parte ambusta est excitatus, cōcludatur, atque ita dolor augeatur, & alia pericula accersantur: sed tum commodius calida adhibentur, quæ cutem laxent, poros referent, serolos humores, qui pustulis causam præbent, resoluant ac dissipent, & calorem in parte excitatum extrahant. Eodem modo & hinc illa intemperies in parte tollitur, non solum si intemperiei per refrigerantia obuiam eatur, sed imprimis si ipsa causa tollatur. Nam & hoc modo parti sua temperies restituitur. Itaque etsi frigida omnia simpliciter non reiciamus, sed, si moderata sint, etiam adhiberi possint: tamen cum absente Medico, ægri, astantes, chirurgi illa temporum & morbi discrimina non satis intelligant, non sine periculo sæpe illa adhibentur.

Tutiora verò sunt à recentioribus vsu probata medicamenta.

*Vt ℞. Lixiuij facti ex cineribus fagi lb. iii. album ouorum iij. camphora Drach. ii.*

His mixtis linei panni mundi imbuantur, & in vmbra exsiccantur, atque vnus ad ignem calefactus parti applicetur, atque per diem ter aut quater mutetur.

*Vel ℞. Sapon. alb. Vnc. i. Dissoluatur in aq. cōmunis, aut quod melius, sambuci, vel scabiosa lb. iij. & ebulliat.*

In decocto imbuantur panni linei, repidè parti affectæ applicentur, ac quotiescunque fuerint exsiccati renouentur. Alij eosdem prius exsiccant, & exsiccatos admouent.

Ex vulgo multi parte affectā sufficium ex mastiche, thure & hyperico excipiunt, & lineum pannum nondum locum apponunt.

Alij corticem sambuci abrasum parti circumcirca applicant, & de die ter immutant. Commendant & hoc.

*℞. Theriaca Drach. i. aq. sambuci Vnc. v. M. & in eo panni linei immergantur, atque nonnihil expressi parti affectæ repidè applicentur.*

Feliciter etiam adhibetur mixtura è lixiuio & oleo rosato, aut, quod commodius, sambucino, quam *lac aureum* nominant. Vsurpant & nonnulli stercus vaccae, & vel cum dimidiâ parte saponis, vel cum albuminibus ouorum & panis bolæ miscunt. Alij potius aquam è stercore bubulo mense Majo destillatam applicant. Possunt & furfures macri, imprimis hordei, cum lactucâ coqui & applicari. In vsu etiam vni cortex interior tiliæ prius per noctem in aquâ Sambuci maceratus. Secretum ad rosam Vvicius esse scribit fel carpionis piscis, si pennâ repidè membro affecto illinatur, & postea pannus lineus mundus fucus imponatur.

Si tamen omnino frigidis vti libet, accipe aliquot folia fabariæ seu crassulæ maioris, & exteriori foliorum parti pellicula detrahatur, & partem folij, quæ pellicula detracta est, cuti imponatur. Calorem enim & dolorem mitigat.

*Vel ℞. Folia solani, semperuiui, an. partem i. dentis Leonis. fabaria, an. part. ii.*

Contundantur cum pauxillo aceti, aq. plantaginis & solani, ac succus exprimatur, quo linteamina imbuantur, & frequenter mutantur.

Nonnulli aquam destillatam ex foliis quercus cum succo Lactucæ applicant.

Vbi tamen per hæc calor iam deferbuit, suprà enumerata applicanda, vt materia discutatur & resoluatur. Ab vinctuosis & vim emplasticam habentibus omninò abstinendum, ne acres vapores detineantur.

Interim etiam victus ratio habenda est qui sit refrigerans & humectans, sed tamen simul incrassans, non qui multum aquosi & serosi humoris generat. Quapropter vitentur calida & sicca, & omnia, quæ sanguinem calidiorem & sicciorē generant, vt aromatica, acris, salsa, pinguis, oleosa, dulcia, buryi multus vsus, porrum, cape, raphanus, sinapi, sale macerata & fumo indurata. Abstinendum etiam à vino potentiorē, cereuisiâ crassâ, carne suillâ, anserinâ. Sit contrà vsus frequens cichorei, prisanæ hordeaceæ, & omnium ex hordeo paratorum: conueniē & oryza, lactuca, acetosa, portulaca, endiuia, quæ in acetariis adhibentur, aut cibis reliquis misceantur. Acetum ipsum quoque admittitur; sed sit passulatum, rosaceum vel sambucinum. Vtilis quoque est agresta, succus ribium, berber. cydoniorum, cerasorum. Nec serum lactis inutile est. Conceditur & vinum absinthites. In omni autem potu aurum ignitum extinguere commodum nonnullis videtur. Viscera enim hisce roborantur & nimia fluxilitas sanguinis tollitur, atque stabilitas quasi quædam ipsi conciliatur. In alijs etiam rebus non naturalibus consideratio adhibenda. Vitandus est corporis



corporis & animi motus nimius. Somnus, si in cruribus sit Erysipelas, sit mediocris: si verò in facie sit, quantum fieri potest, à somno temperandum est.

*Præcautio.*

Non solum autem sciendum, quâ ratione præsens hic morbus tollendus sit, sed etiam laborandum, ut in posterum præcaueatur. Solet enim hic morbus nonnullis familiaris & quasi hæreditarius esse, eosque sæpius inuadere. Adquam cautionem imprimis facit, si circa Equinoctium vernum & autumnale corpus à superfluis humoribus venæ sectione aut purgatione, prout opus est liberetur. Sint autem purgantia talia, quæ biliosos humores purgent, simul viscera temperent ac roborent, ut sunt Rhabarbarum, Tamarindi, Myrobalani citrini, Symplicium rosarum solutius, passulæ purgantes cum Rhabarb. Postea ad præseruationem hoc medicamentum valde commendatur.

*℞. Cimarum absinthij parum, aliquot folia taraxaci, chamædrys vulgaris tantundem.*

Ex his recentibus & manè collectis ac minutim concisis, cum duobus ouis recentibus ac paucò butyri coquantur placentula mollis.

Hac si quis singulis nouè mensibus Maij diebus (forasan non inutile esset, non solum primis nouem, sed singulis Maij diebus tali placentulâ uti) manè velcatur, per integrum annum ab hoc morbo præseruari scribitur. Neque rationibus destituitur hoc medicamentum. Nam hepatis laxitatem nonnihil cohibet & constringit, eius obstructions liberat, superfluas humiditates absumit, biliosa excrementa abstergit, atque ita hepatis moderatam quandam temperiem conciliat.

Alij & hoc laudant.

*℞. Flor. sambuci recentium, vel cum non habentur, rectè siccatorum M. j. Lactis vacca (rubram quidam eligunt) Vnc. viij.*

Lac bibatur manè, quoties Luna decrescit, bis, ter, quater, vel per integrum etiam, si libet, annum singulis mensibus. Hoc modo si quis utatur lacte isto, planè in posterum immunem ab hoc malo reddi scribunt. Ab hoc malo eos etiam præseruari tradunt, qui singulis mensibus semel aut bis, vel potius singulis septimanis semel, in principio mensæ aut potius manè, 5. aut. 6. glandes non rancidas edunt, aut haustum aquæ è tenerioribus foliis quercûs destillatæ bibunt. Superflua enim humiditates in sanguine absumuntur: Vnde minùs fluxilis redditur. Hepatisque tonus conseruatur. Maximè commodus est acidularum potus. Obstructions enim tollunt, hepar refrigerant, atque ad talia ex fluxionibus mala imprimis viles sunt.

Interim etiam partis recipientis habenda est ratio, quæ propterea lauetur aquâ chalybeatâ, in quâ plantago, verbascum, Taraxacum & parum aluminis coctum sit.

Inprimis verò ad præcautionem Erysipelatis, facit rectam rationem victûs obseruare, talem nempe, qualis in curatione descripta est. Abstinentum à pinguibus, oleosis, salsis, acerbis; vel iis parcissimè utendum. Contrà usurpanda subaustera, subacida, amariuscula, acetosa; talia tamen, quæ obstructions non pariant, sed hepatis obstructions liberent, illud mediocriter refrigerent & siccant, acrimoniam & tenuitatem humorum temperent, sanguinisque nimiam mobilitatem tollant: quæ omnia repetere opus non est.

## CAPVT XVII.

### De Febribus Intermittentibus.

**A**tque ista de febribus continuis dicenda videbantur. Iam ad doctrinam de Intermittentibus accedimus. Vbi illud mox ab initio rursus monendum videtur, quod etiam suprâ monuimus. Antiquos nomen febris intermittens latius, quàm hodie sit, extendisse. Ij enim omnes febres, quæ aliquam in calore

mutationem certis interuallis habent, & nunc exasperantur, nunc remittunt, Intermittentes nominabant, omnesque febres, Synochis seu continentibus exceptis, intermittentes appellabant, & eas quoque hoc nomine complectebantur, quæ calorem continuum habent, modò caloris in iis fiat intensio & remissio, ut ex Galeno. 1. epid. com. 3. t. 2. patet. Iam verò vicius obtinuit, ut ex solum febres intermittentes propriè dicantur, quæ aliquando desinunt, tempusque aliquod habent per se accessione vacuum, quod ἀπυρεσία, infabricitationem, seu febris vacuitatem nominant.

Ut autem, quæ sit harum febrium natura, manifestum fiat, illud imprimis querendum. Quænam sit causa, cur intermittentes dictæ febres non continuum calorem habeant, sed tempus aliquod calore vacuum, quod ἀπυρεσία Græci nominant. Verum id inuestigare non facile est, & ut Galenus, 2. de differ. febr. cap. 1. i. habet, difficilius est earum febrium, quæ per circuitus accessionem faciunt, causam inuenire, quàm earum, quæ Synochæ dicuntur.

Ut verò continuarum febrium proxima & continens causa sunt, putridi vapores continuè ad cor missi; idque præter naturam calefacientes: ita febrium Intermittentium causa sunt vapores putridi non continuè, sed per interualla quædam & periodos cor affligentes. Quæ autem fiat, quòd vapores putridi in Intermittentibus non continuè, ut in Continuis, ad cor mittantur, porro inquirendum est. Hoc quidem certum est, intermissionem fieri propterea, quòd humor putridus expellitur singulis paroxysmis, neque tantum eius suppetit, ut continuum incendium fouere possit. Sed cur hoc fiat, An materia sit causa, an locus, an vtrumque non satis inter Authores conuenit. Cum tamen id cognitum habere, ad curationem rectè instituendam vtile sit, diligenter causa inquirenda. Et quia cognitio loci, in quo humores febrem excitantes continentur, summopere ad rei huius explanationem facit, primò omnium dicendum videtur.

### De loco, in quo continentur Humores, Febrium Intermittentium causa.

Primò autem hoc monendum, differre subiectum Febris à loco putrescentis humoris. Subiectum enim omnis febris totum corpus & præcipuè cor esse, suprâ monstratum. Locum verò putredinis, vnde febris accenditur, à subiecto distinguit Galenus, 1. ad Glauc. cap. 5. eumque focum seu fomitem nominat, 2. de differ. febr. c. ult. & 15. meth. med. c. 4. Qui focus in diuersis febribus alius atque alius est, & omnino explicatu difficillimus, ob dissidentes Authorum hac de re sententias: cognitu tamen vtilissimus; cum ad ipsam febrium intermittendum, quæ frequentissimæ sunt, curationem plurimum faciat. De eo itaque paulò exactius agere libet, & plerasque Medicorum opiniones recensere & expendere.

Galen. 2. de cris. c. 6. febres continuas & intermittentes hoc modo discernit. Quæ, inquit, ob flauam bilem febris accenditur, sine aliquo visceris affectu, siquidem manente adhuc intra vasa bile accendatur, exquirat febris ardens nuncupatur, si verò per totum corpus deferatur, tertiana. Sic si ab atra bile sit febris, cum per totum corpus delata fuerit, quartana efficitur; cum immobilis illa, quæ quarto quòque die excrefcit. Sicuti si ex pituitâ ortum habeant febres vel quotidiana sunt, vel quæ singulis diebus accenduntur. Nam quæ ad infabricitationem desinunt febres tertiana, quartana & quotidiana, eandem habent hypotesin cum continuis, vno saltem inter se differunt, quòd per venas vel per totum corpus in eis deferantur humores. Et 4. aphor. 59. Tertiana febris, inquit, quòd ad humorem morbum facientem non differt ab ardente, sed eo mutuo inter se differunt, quòd ardens in venis

*Απυρεσία.*

*Intermissio-  
nis causa in  
Intermittentibus.*

*Galenus de  
loco putredinis  
in intermittentibus  
sententia.*

venis una cum sanguine flavam bilem abundantem & feruentem habeat; in intermittente verò eadem bilis toto feratur corpore. Ex quibus locis apparet, Galeni mentem esse, febres continuas fieri, cum humores intra vasa quieti putrescunt; Intermittentes verò, cum per corpus mouentur. Quà de re prolixè & ex professo agit, l. 2. de diff. febr. cap. vii. vbi tandem summam quasi rem ita concludit, *Quicunque circuitibus quibusdam accidunt morbi, partium superueniunt dispositionibus vel mittentium, vel suscipientium, vel gignentium, vel attrahentium excrementa. Quæ verò nullum circuitum habent, in his nulla est pars corporis, quæ præcipuè sit offensa, sed humores in venis & arteriis omnibus, maximèque maximis & calidissimis sunt.*

Nonnulli hoc discrimen non admittunt, & vt Alex. Trallianus, lib. 12. cap. 2. refert, Intermittentes etiam febres intra vasa consistere, quemadmodum & continentes, arbitrantur, ac nihil prorsus loco, sed quantitatis ac qualitatis ratione differre. Etenim in continuis & multam, & crassam esse materiam, atque ideo neque extra vasa emitti posse; intermittentium verò tenuiorem, & vt in extremam cutem efferatur, magis idoneam existimabant.

Anicennas, lib. 4. fen. 1. tr. 2. cap. 1. febres continuas & intermittentes ita discernit; *Puredo sanguinis, inquit, facit continuam, & locus eius est intra vasa; Cholera autem & phlegma & melancholia quandoque putrescunt intra venas: Et quandoque putrescunt extra venas: si non est causa alia, neque est puredo in apostemate intrinseco, quod det cordi putredinem continuam, faciunt periodos, quas diximus. Et quando putrescunt intra venas, faciunt febres assiduas.*

Et tribuitur plerisque antiquis Medicis ista sententia, & vt Fernel, lib. de febr. cap. 9. habet, verus iam opinio increbuit, humorem, qui continens & proxima est intermittentis febris materia, in solo corporis habitu, & extra venas computrescere; hunc accessionis initio è venis maioribus, in quibus conditus erat, sanguini permixtus, in minores, ex hisque in corporis habitum propelli. Hoc impetu summas corporis partes, quatum exquisitior est sensus, ferientis humoris occursum vel inhorrescere, vel rigere. Eum mox sensim illic incalciscere, inflammari ac putrescere: tum demum extenuatum caloris vi vniuersum dissipari in sudores; sic accessionem finire, dum noua similiter recurrat.

Ipsè verò Fernelius hanc opinionem reiecit, & cap. seq. Intermittentes tum materià, tum materiæ situ & foco à continuis læcèrnat. *Tertiana, inquit, materia bilis est flaua, affinis ei, quæ in fellis cisti conditur. Quartana bilis atra in lienem refusa. Quotidiana (si quæ vera est) pituita mucosa & superuacanea, quæ in ventriculo, intestinisque plurima colligitur. Omnium propria sedes & origo in primâ est corporis regione, circum præcordia circa ventriculum, diaphragma, iecoris caua, lienem, pancreas, omentum aut mesenterium.*

Donatus ab Altomari, de med. febr. part. 2. c. 3. Galeni sententiam ita explicat: Humores, qui à Galeno per totum corpus ferri dicuntur in intermittentibus, statuit in sentientibus corporis partibus, seu vniuerso corporis habitu contineri, ibique putrescere; idque tribus modis. Vel enim accessionis tempore humores ex vasis primò maioribus ad minora protrudi; deinde ex istis ad reliqua, quoad extrâ ad sentientes corporis partes propellantur; vel sentientes corporis partes, carnes scilicet seu partes solidas, dolore aut immodico calore affectas, humores vitiosos trahere è venis; vel denique neque attrahere, neque suscipere excrementa partes sentientes, sed in se ipsis eadem generare.

Simon Simonius, in synopsi de nat. febr. hum. cap. 4. Intermittentis causam statuit materiam, quæ ardet, prius discussam, quàm noua vel generetur vel affluat

ad incendij locum: Continuationis verò fomitem, qui suâ vel copiâ, quæ non tam citò potest absumi, vel crassitie, quæ dissipationis resistat, vel visciditate nutrire febrem tam diu possit, donec iterum alia superueniat, quâ continuetur incendium. Adhucque tam posse intermittentem excitari, cum materia in corde primò accenditur, quàm continuam, cum aliunde, id est, ex aliquo alio vilcere accensa defertur.

Platerus in vasis melaraicis sanguinis putredinem causam febrium putridarum intermittentium statuit. In venis enim melaraicis si humor putrescat, etsi ex cordi non sint continuæ, quia tamen cum venæ caua ramis, interueniente hepatis substantiâ, communionem habent, huius causâ accidere putat, vt vapores putridi in venis melaraicis excitari cor petant, febresque putridas excitent, non tamen continuas, sed statim temporibus intermittentes & redeunt: Idque quod materia putris non solum procul à corde sit dissita, sed quoque ob viarum interclusionem aliquam. Tamdiu enim intermittere febres, quamdiu materia putris in suo quasi foco coercetur: Vbi verò veluti turgens & excedens multum de sese vaporem emittere incipit, natura irritata in venæ caua ramos & arterias eam expellit, per quos ad cor penetrans, febres accendit, tamdiu durantes, donec quicquid è foco excussum est, calore dissipetur.

Hor. Auger. l. 3. de febr. c. 4. ipse quidem etiam concedit humores putridos in febribus intermittentibus maiori ex parte moueri in partibus intrinsecis, quas primas vias nominamus; id quod ex vomitu, oscitatione, oris amaritudine, caloris & sanguinis retractione ad viscera colligi possit: aliquando tamen & raro in corporis ambitu coerceri. Et quidem instante accessione per profundas corporis partes deferri; in declinatione verò vaporis specie per ambitum corporis discuti. Ipsam enim humoris putrefacti substantiam ad superficiem corporis deferri non concedit; quandoquidem, si ipse humor putridus per venas transfret, totam sanguinis massam coinquinaret, & exitia symptomata excitaret.

In extrinsecis verò partibus humores contineri docet, primò in corporibus biliosis, in quibus vapores acres & fuliginosi solent per cutaneos meatus expurgari. Meatus enim illi, si obstruantur, bilis multa colligitur, vt tertiana generetur. Deinde si eadem partes vel nimis calefactæ, vel dolore affectæ excrementa ad se trahant; quæ tamen vel propter illorum copiam, vel visciditatem, vel crassitiam, vel imbecillitatem facultatis expultricis, expellere non valent. Si autem porro quærat, à quibus partibus humores transmittantur ad sensibiles istas corporis partes: docet, quod ab iisdem partibus sensibilibus fluxio fiat, cum sensibiles partes vim quandam habere possint generandi in se huiusmodi humores, qui postea putrefacti & moti paroxysmum febrilem efficiant: deinde statuit, quod à venis deduci possint putrefacti & ad sensibiles corporis partes tam intrinsecas quàm extrinsecas appellere.

Hercul. Saxonia, lib. 8. præf. med. cap. 6. causam periodorum, & recessus ac reditus in febribus esse materiam non alimentalem, sed excrementitiam statuit, quæ scilicet facultati expultricis grauis est & molesta; & quidem tertiarum coctionis, quæ fit & augetur à quacunque corporis parte determinatâ. Locum verò quod attinet, eum duplicem ille constituit; Vnum in quo continetur materia antecedens, quæ est excrementum tertiarum coctionis antequam corruptatur; alterum, in quo materia conclusa est, quæ actu facit febrem putridam intermittentem. Priorem locum esse posse docet quacunque corporis nostri partem, internam & externam, communem & determinatam, omnes partes vno verbo, cum omnis pars possit excrementa generare & colligere

Plateri.

Hor. Auger.

Hercul. Saxonia.

Alex. Trallianus.

Anicennas.

Fernelij.

Don. Ant. ab Altomari.

Sim. Simonij.

colligere ac suscipere. Verumtamen hominem non semper collecto excremento febricitare, sed colligere posse hoc excrementum absque febre. Locum verò, in quo materia putrida actu febrem faciens continetur, quod attinet, statuit, materiam febris intermittens nunquam esse in carnibus seu parenchymate viscerum; cum si materia in ipso parenchymate hæreat, non in loco aperto contineatur, & potius inflammationem pariat, neque tum virtus ad expellendum sit satis robusta. Deinde nec in ambitu corporis putrescere statuit. Aliàs enim in scabie & leprâ materia in ambitu putrescens febrem faceret, & febris hæc solo blanco, frictionibus & cucurbitulis curaretur. Præterea venæ sectio, vomitus, alui dejectio, essent perniciosissima. Insuper si transmissâ materiâ à venis extra venas in ambitum corporis febris tollitur; non generabitur eodem modo.

Ipse verò statuit primò in omni febre intermittente materiam conjunctam in principio, augmento & statu putrescere intra venas, quod probat primò ex urinis, quæ in omnibus febribus etiam intermittentibus, coctionem vel cruditatem in humoribus ostendunt. Secundo idem probat ex naturâ temporum febris. In principio enim paroxysmi moventur humores à circumferentiâ ad centrum; in augmento & statu à centro ad circumferentiam; in declinatione discutuntur per insensibilem halitum vel sudores. At hic motus non fit, nisi per venas, neque possunt moveri humores à visceribus ad ambitum corporis nisi per venas. Tertio probat id ex euacuationibus, quæ contingunt vno & eodem die in febribus intermittentibus; quod fieri non posset, si materia contineretur vel in sola corporis ambitu, vel in carne viscerum.

Secundo statuit materiam hanc, quæ continetur in venis, in principio transmitti etiam aliquâ parte extra venas, membranas scilicet viscerum, vel carnem totius corporis; quia rigor & horror non potest fieri, nisi materiâ stimulantem carnes viscerum & totius corporis.

Tandem materiam hanc, quæ febris intermittens causa est, docet nunquam totam simul esse collectam in venis. Si enim materia simul sit in venis collecta, fieri continuam; neque intermittentes fieri ex materiâ genitâ, retentâ & corruptâ in vno eodemque loco: sed intermittentem fieri ex materiâ attractâ vel transmissâ à loco ad locum.

*Id. Caesar  
Claudius.*

Julius Cæs. Claudinus in *respons. med. resp.* I. ita continuas proportionatas & intermittentes distinguit, & febres continuas periodicas seu proportionatas oriri statuit ex materia putrescente in venis remotis à corde, quæ mediæ inter magnas & capillares dici possunt; Intermittentes verò partim ex materia in venis capillaribus, partim in mesaraicis putrescente ortum habere existimat. Atque huius suæ assertionis hæc ponit fundamenta: Illa, inquit, vasa sunt locus putredinis in febre continuâ proportionatâ, in quibus materia collecta, ob fluxionem motumque transiissionis, vel attractionis à venis magnis pendentem, inculcatur, transpirationeque prohibita propter obstructionem putrescit, putrefacta non expurgatur, fuliginisque continuò, sed non ita commodè ac statim ad cor transmittit. Febres autem continuas periodicas non aliâ de causâ accessiones habere statuit, nisi quia in iis materia non simul tota adest, sed fit eius aut attractio, aut transmissio, quæ singulas accessiones facit, & non excernitur, sed retinetur, unde febris continua, & perpetua in cor effusio, sed non ita subita, nec ita facilis, sicut in continente. A venis enim remotis non ita facile & subito cordi suppeditatur fuligo. At talia vasa esse venas medias statuit. Sicut enim in his venis colligi potest materia vel per transiissionem, vel per

attractionem: ita in iisdem venis potest materia detineri & putrescere, quæ non euacuata continuò serpit, novamque materiam inficit, vnaque continuò cordi communicatur, sed non statim, neque ita commodè, ob causam supra adductam.

Febres verò intermittentes fieri tradit, partim ex putredine humorum in venis capillaribus, partim ex putredine humorum in vasis partium in præcordiis existentium, puta ventriculi, cavæ partis hepatis, lienis, pancreatis, omenti, intestinorum, metenterij. In iis nimirum febribus, quæ sunt cum fluxione & motu materiæ, pro sede putredinis constituit venas minores per particularum carnes, & habitum corporis disperfas. Ex his autem & facile egredi humores putrescentes, & ab iis non patere aditum fuliginibus, ut cor facile petant. Verum febres, quæ sine motu & fluxione humorum sunt, habere locum in præcordiis, ut dictum, eas nimirum febres, in quibus nullus sit rigor ac horror, nulla extremorum frigiditas observatur, quæ citra sudorem finiuntur, & incipiunt cum oscitationibus, præcordiorum distensionibus, naseâ, vomitu.

Atque has authorum opiniones recensere volui, ut & difficultatem huius doctrinæ quisque agnoscat, & de eâ diligentius cogitandi materiam habeat. Quæ verò singuli pro suis sententiis & contra aliorum opiniones prolixè afferunt, omnia hic recensere, operæpretium non puto. Id potius dabo operam, ut quàm brevissimè, in re tam obscurâ & tot dissentientibus opinionibus intricatâ, veram, quantum poterò, sententiam proponam.

I. Primò autem discrimen Synocharum, continuarum periodicarum, & intermittentium in conspectu habendum. In Synochis humores, qui febrem excitant, toti simul in venis continentur, eorumque putredine & coctione tota febris Synochæ periodus absolvitur. In intermittentibus, singulis paroxysmis materia, febris causa, absimitur vel excernitur, & rursus nova, quæ putrescat, novumque paroxysmum inducat, subnascitur. In continuis periodicis partim aliquid, quod continuò putrescit febrémque continuam facit, in ortu ipsius febris adfuit, partim novi aliquid, quod exacerbationis causa est, subnascitur & suppeditatur. Verum nondum ex hoc patet, quid fiat, quod in aliis febribus materia singulis paroxysmis expellitur; in aliis verò euacuatio maximâ ex parte usque ad integram morbi solutionem differtur. Causa itaque huius rei inquirenda erit.

II. Secundo ergò diligenter hoc annotandum, in Intermittentibus triplicem locum considerari posse. Primò illum, in quo materia febris causa futura generatur: secundo eum, qui materiam proximam & continentem febris in paroxysmo causam continet, quem etiam venas & arterias esse statuimus: tertio eum, in quem materia à venis expellitur, quem extra venas esse putamus, ambitum corporis, ventriculum, intestina, renes: Cum in hæc loca omnia venæ terminentur, & materiam in paroxysmis febrium per has vias euacuari videamus.

III. Primò locum, qui materiam febris causam primum suppeditat, quemque focum & fomitem febris appellant, eum venas mesaraicas esse statuimus. Et si verò à plurimis statuatur, in Intermittentibus extra venas humores putrescere: id tamen de venâ causâ accipiendum est, quæ interdum absolutè vena appellatur, & in qua putrescentes humores febres continuas pariunt. Ex venis mesaraicis autem, etsi nullus ductus ad cor pertingat: tamen interueniente hepatis substantiâ, in quam vena portæ inseritur, & varios ramos spargit, cum venâ causâ communionem habent, atque idèd mediante causâ materiam putridam cordi communicare possunt. Idèdque etiam fit per arterias, quæ

*Controuers.  
explicatio.*

*Continuâ,  
& intermit-  
tentium di-  
scrimen.*

*Triplex locum  
materia fe-  
bris in in-  
termittenti-  
bus.*

*Quo in locum  
materia in  
febribus in-  
termittenti-  
bus generatur.*



quæ à corde progressæ in liene, ventriculo & intestinis, venis mesaraicis coniunguntur. Etsi verò vapores ex putredine humorum in venis mesaraicis excitati, per ductus venæ cauæ in arteriæ ramos cordi communicantur, caloremque inde excitant: tamen non perseuerantem, vt in continuis febribus, sed statis periodis recurrentem calorem excitare possunt. Quod accidit non tam ob loci distantiam, sed quòd materia, quæ febris causa est, vbi in loco effervescere incipit, naturamque irritat, ab eâ excutitur, & in vapores resoluta, vel sensibilibiter vel insensibilibiter discutitur, & inde calor ac febris cessat, quæ tum demum recurrit, vbi noua materia non solum generata est, sed & putrescere, ac iam veluti turgens & effervescens iterum putridos vapores per venæ cauæ & arteriæ ramos ad cor mittere incipit.

*Sedes materia in febribus intermittentibus.*

In Intermittentibus autem originem materiæ febrilis in primis vis seu primâ corporis regione, quæ quasi corporis sentina est, & in qua plurima excrementa trimæ & secundæ coctionis cumulantur, hære, omnia, quæ circa intermittentes vel semper vel plurimum accidunt, satis euidenter docent. Nausea scilicet, vomitus, cardialgia, præcordiorum tensio & dolor, circa ventriculum intumescencia, oris amaritudo, appetitus deiectus, singultus, atque alia symptomata, quæ materiam in iis locis generari ostendunt. In intermittentiis enim febrium initiis sæpè bilis citrina, prasina, cæruleaue sincera vomitu reiecitur; eaque reiectâ febris cessat; quod indicium est, & bilem illam febris causam, & in primis vis collectam fuisse. Nam è venis tam sincera & tam copiosa sine ægri damno per has vias euacuari non potest. Et biliosam talem materiam circum iecoris cana libræ pondo post mortem febricitantis iuventam esse; Fernelius obseruauit. Idem & hoc arguit, quòd si initio accessionis fomenta hypochondriis imponantur: horror & rigor & alia symptomata postea leniora fiunt.

Ex loci ratione faciliè etiam ipsorum humorum Febres Intermittentes excitantium natura patet. Elaboratur enim, & continetur in venis mesaraicis sanguis non adeò purus & perfectus, vt in venâ cauâ, sed adhuc excrementitiis humoribus, qui etiam naturaliter in primâ coctione generari solent, quique demum in secundâ coctione in liene & hepate separantur, permixtus, quales humores sunt bilis, quæ in vesiculam postea colligitur & per aluum euacuatur, tum etiam humor melancholicus, qui cum chyli parte crassiore ad lienem transit; quibus & pituitosi aliquid nonnunquam permiscetur. Hi humores etsi sint excrementitij: tamen si moderatâ quantitate generentur, & generati in secundâ coctione separentur, nihil mali procreant: si verò vel coctionis primæ vitio qualicumque copiosius generantur, vel non suo loco & tempore excernuntur, variorum morborum tum etiam febrium esse causa possunt. Neque enim statim hi humores febrem excitant, sed sæpè diu in corpore latent, donec tandem putredinem concipiunt, febrémque excitant.

*Causa remotior.*

Atque ex his etiam faciliè patet, quanam sint causæ remotiores febrium intermittentiis, nimirum ea omnia, quæ vel ad generationem vel cumulationem dictorum humorum excrementitiorum faciunt, vel in genitis & coaceruatis putredinem accendunt.

Causæ nimirum remotiores, & quæ ad istorum humorum in venis mesaraicis generationem faciunt, sunt cibus & potus non boni succi, aut qui faciliè corrumpuntur. Ii enim chylum vitiosis humoribus perfusum præbent: qui si non separentur, in venis mesaraicis collecti tandemque putrescentes, febres sibi respondentés accendunt.

Facit deinde huc & ipsius ventriculi praua dispositio,

*Dan. Sennert. Tom. II.*

in quo cibi assumpti, præsertim ad id dispositi, nunc aciescunt, nunc bileiscunt & amarescunt, vt postea dicitur. Ad quam rem facit constitutio corporis, non temperata satis; anni & cæli constitutio & ipsa intemperata, & aliæ causæ euidentes. Hinc tertianæ æstare, quartanæ autumnis sunt frequentiores, imò nonnunquam & epidemice.

Nonnulli hic nihil nisi obstructions accusant. Verum ad generationem humorum vitiosorum sola obstructio non sufficit. Quamuis enim obstructio adesse possit: tamen obstructio, quatenus talis, generationis illius & corruptionis humorum, quæ singulis paroxysmis accidit, sola causa non est, sed *ἐνεργια* aliquid requiritur, quod etiam absque obstructione adesse potest; obstructionesque & in febribus ac plurimis aliis morbis non rarè ignorantia pallium, & veritatis inuestigandæ obstaculum sunt. Et si obstructions vel etiam scirrhi adsint, non inde oritur, sed fouetur febris, & putredinis fermentum ita infarctum, & quasi impactum difficilius loco moueri & euacuari potest. Vnde febres prolongantur, & sæpè hydrops oritur. Causa ergo (si vitium non sit in ipso cibo) *ἐνεργια* requiritur.

Atque ex his, quæ de loco putredinis ac materiæ febrium intermittentiis dicta sunt, faciliè, quodnam inter Synochas & periodicas, item inter continuas periodicas & intermittentes sit discrimen patet. Nam ratione loci, in quo materia, paroxysmi & exacerbationis causa generatur, quem focum appellant, synochæ à periodicis differunt. Synochæ enim tali loco destituuntur, nec aliunde iis materia febrilis submittitur, sed tota in venis continetur: in periodicis verò in singulis paroxysmis noua materia suggeritur. Nimirum materia, quæ periodicis continuis originem præbet, in secunda coctione generatur, sanguinique bono & alimentario permiscetur; Ideoque nulla fit expulsio & crisis, antequam coctio & humoris vitiosi à bono separatio facta sit. Vt verò febris statis temporibus exacerbetur & intendatur, noua, quæ transmittitur, præcipuè ab hepate, materia facit. In intermittentiis verò materia in prima coctione generatur, & hinc in venas transmittitur, è quibus etiam, vt aliena & heterogenea, singulis paroxysmis expellitur.

*Discrimen inter febres putridas.*

IV. Verum etiam si in mesaraicis venis primò materia febrium causa generetur, non tamen semper in iis continetur, sed subinde aliquid in perpetuo illo, qui est ab iis in eam meatu, in venam cauam derivari credibile est. Vnde à Galeno, 1. de crisib. cap. 7. & aliis passim Medicis *febris passio venenosa generis appellatur*. Neque enim fidem meretur Horat. Augenij sententia, quâ Galeni & Medicorum communem doctrinam, quâ traditur, febrem esse affectionem venenosi generis, ita explicat, quòd in omnibus febribus venæ & arteriæ per vniuersum corpus calorem febrilem deferant. Nam certè hoc ipso putridæ febres ab ephemeris differunt, quòd in ephemeris solum calor sine putredine per venas & arterias cordi communicatur: in putridis ipsi vapores putridi ad cor feruntur.

*Quo in loco causa putridarum febrium proxima continetur.*

Quia verò materiam, quæ febrium intermittentiis causa est, in venis contineri multi negant, paucis id probandum est.

Primò autem materiam febrilem è mesaraicis in cauam transmitti ex eo patet, quòd cruditas & coctio humorum non solum in continuis, sed etiam intermittentibusprehenditur, atque ex vrinis animaduertitur.

*Causa febris in intermittentibus in venis continetur.*

Deinde motus humorum, qui fit in intermittentibus, idem docet. Nam in principio accessionis mouentur humores à circumferentia ad centrum; in augmento & statu à centro ad circumferentiam; in declinatione discutuntur per insensibilem transpirationem

H vel

vel sudorem. Is verò motus non potest fieri, nisi mediantibus venis & arteriis.

Imò ea, quæ motum humorum in Intermittentibus præcedere solent, satis testantur, in venis moueri materiam. Nam in Intermittentibus febribus, instante paroxysmo, quod materia nondum extra oscula venarum expulsa est, neque dum rigor ac febrilis calor adest, sed materia febrem factura in venis quasi turgēt, signis quibusdam instans motus materiæ & paroxysmi percipitur; vnde illud tempus ἐπιπνοῖα Græcis dicitur. In membris enim extremis spontaneæ lassitudines pulliūmque compressio percipitur; quod non fieret, nisi in vasis illis communibus, venâ cauâ scilicet & arteriis, materia paroxysmum febrilem q. parituriens etiam contineretur, nullūmque signum futuri paroxysmi ex pulsu & arteriis haberi posset, si materia extra illa vasa contineretur; sicut nec lassitudinis causa dari posset.

Præterea docet Galenus, atque experientia ei adstipulatur, non rarò in Intermittentibus eodem die materiam per plures vias euacuari, & simul intrò forasque ferri, vt eodem in paroxysmo vomitus, deiectiones alui & sudores fiant: quod fieri non posset, si materia vel in solo ambitu corporis, vel alibi extra venas contineretur.

Indicio est & istud materiam in venis contineri, quod in Intermittentibus vrinæ tempore paroxysmi meliores plerumque apparent, quàm extra paroxysmum; & quæ extra paroxysmum valdè crassæ aut turbidæ conspiciebantur, minùs extinctæ, clariore, & laudabiliores in paroxysmo conspiciantur. Denique in paroxysmis intermittentiū febrium vrinæ non rarò copiosæ redduntur & per eas materia febrilis euacuatur: quod fieri non posset, nisi materia per venam cauam transiret. Apparet hoc etiam ex sanguine, qui in Intermittentibus febribus, venâ sectâ emittitur, & in morbi progressu plerumque non bonus est, sed vitiosos humores admixtos habet. Vnde etiam obseruatum, venâ sectâ febrem cessasse, cuius rei exemplum annotauit Arianus Spigelius, lib. 1. de Febre semiterriana, cap. 15. Docetque idem scabies, quæ erumpente febres intermittentes solui, iterūmque eā euanescēte febres eadem recurrere solent.

Neque difficile diluitur illud, quod hîc ex Fernelio contra hanc sententiam obiici potest. Quo pacto, inquit Fernelius, tam repentē possit noxiū humor sanguini permixtus, præsertim verò crassâ lentâque pituita, aut bilis atra à puriore sanguine prorsus secerni, & quasi momento in extremas corporis partes protinus extrudi. Nam etsi prima origo humorum, qui intermittentiū febrium causa sunt, non sit in venis, sed in primis viis: tamen hinc in venas effunduntur. Et proinde respondemus ex Hippocrate: Non statim morbi homines apprehendunt, sed paulatim generati subitò apparent. Humor scilicet facturus suâ putredine paroxysmum sensim & paulatim, & quidem extra venam cauam in primis viis colligitur, & hinc, præcipuè instante paroxysmo, in venas transmittitur, semper in deterius labitur, & paulatim ante paroxysmum succenditur, quod Galenus ἐπιπνοῖα appellat, & loco mouetur in venis; quando autem paroxysmus appropinquat, magis ac magis turgēt. Instante verò paroxysmo celerrimè motu expellentis facultatis extra oscula venarum euomitur quasi, ac magis magisque protruditur, facultate excretrice irritatâ, & subitò extra venas propellitur, vel in habitum corporis, vel etiam loca interiora. Venæ enim cauæ rami non solum in exteriora, sed etiam interiora terminantur, ac per oscula sua eructare possunt excrementitios & putridos humores.

Obiicit deinde & hoc Fernelius: Cùm, inquit, in continuis febribus peccans materia in vasis maioribus tota consistat, cur non eius portio quoque in corporis

molem effunditur, quæ sæpe rigorem efficiat? Et quamquam ad hoc respondeant nonnulli, exilium venarum obstructionem in his, quàm in Intermittentibus, maiorem esse, atque tantam, vt omnem humorem intus cohibeat, tamen hoc diuerticulum saltem esse putat. Nam plurimæ continuæ à rigore vel horrore inuadunt: quod si ipso statim initio bilis in corporis summa effundebatur, cur non etiam deinceps, quoties inardescit, aut motu nouo incandescit, eodem similiter infilire? Turtior & vero similior responsio est, quæ ex suprâ propositis cap. 12. huius libri petitur: In continuis materiam febris causam totam simul in venis contineri, & sanguini non solum confusam, sed & permixtam esse, neque ante coctionem separari, ideoque nisi coctione, quæ quidem vnicâ quasi fermentatione continuè perficitur, absolutâ, eius expulsionem vix vtiliter tentari. In intermittentibus verò materiam sanguini non verè permixtam esse, nec totam simul esse in venis, sed in primis viis genitam, per interualla & periodos inde transmitti, saltem in venas deriuari & propterea singulis paroxysmis, dum statis temporibus quasi effertur, & naturam ad expulsionem irritat, ab eadem expellitur, Cuius rei exempla & in aliis morbis habentur. Et quamquam natura nonnunquam initio febrium continuarum, vel etiam alio tempore, prauitate aut multitudine materiæ stimulata, extremo conatu insurgat, humorēque vitiosum depellere annitens, rigoris causa sit: tamen conatus ille propter cruditatem materiæ plerumque est irritus, & nulla crisis sequitur.

Neque hæc sententia Galeno aduersatur, vt plurimi existimant, quod materiam febrilem in Intermittentibus per carnes deferri pronunciauit. Concedimus hoc libenter, humores per ambitum corporis moueri, sed fomitem seu focum febris ibi esse negamus, neque id à Galeno affirmatum videmus. Est enim, vt dictum, in Intermittentibus triplex locus considerandus, Primò ille, qui materiam suppeditat; Secundò is, qui febris proximam causam continet: Tertiò, in quem materia è venis expellitur. Neque est, quod hîc cum Augenio, si humor putridus in venis contineretur, easque transiret, totius sanguineæ massæ coinquinationem & exitialia symptomata metuamus. Hoc quidem verum est, in febribus hisce sanguinem etiam coinquinari ab admixtis humoribus putridis; vnde illa etiam symptomata, quæ febricitantes molestant, ortum habent. Verum ea necessariò exitialia non sunt. Nam materia sanguini non permixta sed saltem confusa, & ad expulsionem apta est, virtusque satis fortis. Itaque in declinatione vt sanguis, quantum potest, ab illis excrementitiis humoribus depuretur, & natura isto onere leuetur, solet ea illos vitiosos humores expellere.

Nec illud obstat, quod statuit Augenius, in venis contineri nihil, nisi sanguinē: verum bilem flauā & cæteros humores, quos excrementitios nūcupamus, extra venas propriis quibusdā receptaculis recondi. Nam hoc quidē libenter Augenio concedimus, in sanis ita sese re habere. At in corpore agro etiam vitiosi humores sanguini permiscuntur: qui & in sanguine per venæ sectionem effuso apparent, & per purgationem tam sponte quàm arte institutam è venis expurgantur. Neque etiam hoc modo tollitur discrimen febrium continuarum & intermittentiū, vt antea iam dictum.

Atque ita sententiam eorum admittere non possumus, qui statuunt saltem in primis viis hære materiam febrium intermittentiū. Si enim Fernelij opinionem ita interpretantur, vt per præcordia ac viscera primas illas vias intelligant, rationes Fernelij, & ipsorum nihil aliud concludunt, nisi aliquam in venis illis putredinem humorum consistere, atque ita humores, qui febrium intermittentiū causa sunt, ibi generari, atque etiam initium putredinis concipere. Interim

non

Galeni sententia de loco putredinis in intermittentiis ex-  
plicitur.

Causa febrium in Intermittentibus non tantum in primis viis hæret.

non sequitur, non posse eandem materiam venis communibus communicari. Nisi enim hoc fieret, neque lassitudinis, neque mutationis pulsus, neque aliorum symptomatum, quæ in *ἐννοουμένη* fiunt, causa, ut dictum, reddi, neque coctio humorum ex sanguine cognosci, aut ex eo emissio aliquid iudicari posset. Idem hic distinguimus inter locum, in quo generatur materia & causa antecedens febrem factura, & locum, in quo materia continetur, quæ actu facit febrem putridam intermittentem; & illum quidem circa viscera & primas illas vias admittimus, & in locis illis multas superfuitates colligi & contineri concedimus, imò etiam ibi initium putredinis concipere non negamus: febrem tamen generari non statuimus ex materia tantum in illis locis putrescente; sed materiam vitiosam & superfuitates illas, vel in venas communes transire, atque ibi putrescere, vel si putredinem ibi concipiat, venis communibus tamen communicari putamus.

Deinde & ab iis dissentimus, qui statuunt, materiam in intermittentibus tantum extra venas in habitu corporis & carnibus putrescere. Nam quomodo ex hac opinione vomitus, oscitationis, amaritudinis oris aliorumque, quæ in febribus intermittentibus accidunt, symptomatum causa reddi posset, si materia in habitu corporis tantum putresceret? & quomodo ex habitu corporis ad vasa iterum retraheretur?

Paroxysmus in intermittenti causa.

V. Tandem locum, in quem in ipso paroxysmo materia à natura protruditur, quod attinet, Vbi humor in primis viis cumalutus putrescere & efferuescere incipit, Natura ab eo stimulata & lacessita eum expellere incipit, idque per varias sæpe vias, initio quidem per vomitum & aluum, postea verò per sudores & urinas sensibiliter, euacuat, Vt & per poros cutis ac insensibilem transpirationem in vapores & halitus resolutum discutit. Cum enim humor ille vitiosus sanguini exactè permixtus non sit, sed saltem confusus, Natura eum facile à bono sanguine separare potest, & propterea eum singulis paroxysmis excutit.

Neque opus est hic cum Fernelio ad cæcos ductus, per quos vapores, isti ad cor & illinc quoquoersum per arterias effundantur, confugere: cum ductus satis manifesti sint. Cum enim venæ portæ rami in hepatis substantiam inferantur, & horum oicula cum ramis venæ causæ communionem habeant; & arteriæ à corde progressæ in ventriculo, intestinis, liene & alibi venis melaraicis coniungantur vapores putridi in venis melaraicis excitati facillimè in venæ causæ & arteriarum ramos proximos irumpere, & hinc ad cor & totum corpus diffundi possunt. Atque extant huius non solum vaporum, sed & humorum è primis viis in venam cauam transitus exempla etiam in aliis morbis, & præcipue in erysipellate, quod Germani Rosam nominant, & paralyti illa, quæ Colicam nonnunquam sequitur, de qua, lib. 2. *Instit. part. 3. sect. 2. cap. 5.* dictum, ut & in dysenteria, quæ nonnunquam intempestiuè suppressa pleuritidem & alios morbos generat. Et si cui hoc ignotum est, is saltem, quæ in scorbuticis & hypochondriacis accidunt, diligenter perpendat; & animaduertat, quàm varij effectus & mala ex *υπερσφό* materiæ & vitiosorum humorum è primis viis in venam cauam & reliquum corpus oriantur.

Paroxysmus causa.

Materia quocunque etiam modo discussa, paroxysmus cessat, & calor febrilis desinit tandiu, donec noua materia, quæ similiter suo tempore putrescit & efferuescit, genita sit. Accidit autem hoc ob vitiosam in parte dispositionem, & *υπερσφό* seu inquinamentum, quod relictum post paroxysmum instar fermenti humores inquinat & corrumpit, & ut suo tempore putrescant & efferuescant, in causa est. Id quod docet Galenus, 2. de diff. febr. cap. ult. Sed cum, inquit, in parte maneat affectus, necessarium est, in ipsa superfuitatem aliam generari; cum id, quod denuò ad ipsum alimentum attrahitur, non totum exquisitè conuincatur: quæ rursus à

putridis superfuitatibus in parte relictis, ac proprio ex vitio putredinis principium accipit, ac cum satis caluerit, rursus ad ipsum influit, quemadmodum sanguis ex aliis partibus animalis. Atque eodem rursus modo principium, ascensus, consistentia, declinatio alterius fit accessionis. Neque hoc per circuitum desinit fieri, donec in primâ particulâ superfuitates generante seruetur affectus. Est verò duplex eiusmodi affectus: alter quidem imbecillitas partis, ex qua fiunt superfuitates; alter verò, qui ex eisdem quotidie genitis acceruat. Neque enim existimes, in exterioribus istis vasis, in quibus elixatum obsonium nidorosum factum est, quandam relinqui dispositionem, nullam autem in partibus, in quibus humores putruerunt.

Qui locus omnino consideratione dignus est, cum totam generationis febrium Intermittentium rationem, & recursus paroxysmorum causam contineat. Estque in generatione materiæ, febris intermittens causæ, duplex διαύσεως obseruanda; una ἡ μὲν περὶ ἀσθενείαν τῆς μορίου καὶ ἢ γυνάται τὰ ἀσθενήματα: altera, quæ prouenit ὑπὸ τῶν ἐγκαταλελειμένων τῶν μορίων σπινθηρίων ἀσθενήματων. Nimirum ob partis ἀσθενείαν seu debilitatem ἀσθένεια seu excrementitius humor generatur, qui partim proprio vitio, ὑπὸ οἰκίαις καὶ ἐνρίαις, partim ab inquinamento & putredinali fetimento, seu μείσματι, seu, ut Galenus appellat, ὑπὸ τῶν ἐγκαταλελειμένων σπινθηρίων ἀσθενήματων initium putredinis concipit. Ac quamdiu ista in parte dispositio nouos vitiosos humores generans, & putredini causam præbens manet; tam diu paroxysmi recurrunt. Vero tamen simile etiam videtur humorem febris intermittens causam non totum de nouo in singulis paroxysmis generari; (id quod vel ex eo patet, quod in primis aliquot paroxysmis sæpe multum bilis vomitu reicitur, postea verò vomitus cessat) sed quæ in principio aderat, nō totam simul putrescere in primo paroxysmo, sed eam eius partem, quæ putredini aptior est, in reliquis reliquā, donec totus absumatur. Prius tamē etiam non negandum, scilicet partis ab humore excrementitio inductam debilitatem ad humoris similis generationem multum facere, eamque continuationis paroxysmorum in febribus, diuturnis præcipuè, causam esse.

Quocunque autem modo & tempore generatur materia febris causa, non prius febris cessat, quàm ea tota sublata sit; quod fit, vel dum in vapores resoluta per poros cutis seu insensibiliter seu sensibiliter per sudores discutitur, vel vomitu, alui fluxu, seu à naturâ, seu arte instituto, vel per urinas, vel per hæmorrhoides euacuatur. Sæpe etiam, & præcipuè crassior materiæ pars, in ambitum corporis protruditur, & febre desinente scabies excitatur; quæ propterea etiam, si ad interiora recurrat, Recidiam parit.

Atque hæc quidem est causa paroxysmorum & recursus febrium intermittentium ratio. Quæ autem causa sit, quod statis temporibus febres redeant, aliæ citius, aliæ tardiùs: alia iam quæstio est; & proinde iam occurrit intricatissima illa, & quam multi mouerunt, nemo pro voto omnium forsan satis explicauit, controuersia.

#### De causis Periodorum in Febris.

Est enim iam causa reddi possit, Cur febres quædam intermittant & reuertantur: tamen nondum explicatum est; Cur hoc statutis temporibus fiat, & cur in aliis febribus, singulis diebus, in aliis alternis; in aliis quarto quodque die nouus paroxysmus redeat. Quamquam verò etiam id ipsum periodicis continuis conueniat: tamen quia periodorum ratio manifestior est in Intermittentibus, hoc loco de iis agere placer. Est verò nec mihi, multò minùs aliis, me satisfacturum confidam: non prætereunda tamen ista fuit quæstio.

Variæ autem hac de re variorum fuerunt sententiæ, Astrologi quidem, quos sequitur Petrus Aponensis, Astrologi-

De causis periodorum in febribus varia sententia.



Conciliator dictus *diff.* 88. eiusmodi ordinem circuituum in astra retulerunt. Sicut enim illi aliarum rerum motum in hiisce sublunariis, ut maris, menstrui femininarum fluxus, partus, referunt in astra: ita & ordinatorum circuituum in febribus, quem periodum nominant, causam ex astris petendam censent. Verum plurimis hæc causa nimis remota videtur; imò nec satis explicatur, quæ aut quomodo astra periodos, & quidem diuersas efficiant.

*Galenus,*

Medici itaque plerique causam in ipso corpore humano quæsiuerunt. Galenus, *de diff. febr. cap. ult.* causam quidem generalem periodorum tradidit, cum periodos refert in dispositiones membrorum, quæ vel mittunt, vel suscipiunt, vel generant, vel attrahunt superfluitates. Ut si ex Galeni sententiâ de causâ periodorum quærat, hoc respondendum sit: febres alias singulis, alias alternis, alias quarto quodque die redire, prout partes affectæ excrementa putrescentia & paroxysmum facientia, vel singulis, vel alternis diebus, vel quarto quoque die, aut transmittant, aut generent. Verum et si ex his causâ, cur paroxysmi redeant, satis clara dari possit. Nimirum quod ex partis alicuius priuata vitio, & malâ dispositione noui humores vitiosi noui paroxysmi causa producantur: tamen ex iisdem de diuersitate periodorum aliquid certi colligi posse aut causam euidentem dari, cur aliæ febres singulis, aliæ alternis, aliæ quarto quolibet die demum redeant, plerique negant; & idcirco ulterius inuestigandum sibi proposuerunt, cur non omnes humores vel singulis, vel alternis, vel quarto die moueantur, & paroxysmum nouum faciant, sed pituitosi singulis, biliosi tertio, melancholici quarto die moueantur, & paroxysmum faciant.

*Ex humorum & partium dispositione periodos deducendum sententia.*

Nonnulli itaque sunt, qui de dispositionibus membrorum mittentium & suscipientium & generantium humores ita periodorum causas inuestigare posse putant. Si pars, inquit, quæ mittit aliquâ intemperie laborauerit, alimentum corrumpet; quod postea, ubi copiam vel præuitate eius grauiabitur, transmittet in aliud. Quod si præterea etiam alimentum ipsum, quod in partem deferretur, vitiosum sit, multo magis excrementa in eo colligentur, quæ postea in partem, quæ imbecillior est, transmissa & putrescentia nouum paroxysmum faciant. Si autem in parte mittente aliquâ vitium non sit, sed in ipsâ parte generante, quæ nimirum id, quod in ipsam deferretur alimentum corrumpit atque definitis temporibus & quantitate coaceruat, ut ibidem putrescens paroxysmum inducat, dispositionem partis in se generantis & congerentis excrementum, periodorum sequetur ratio.

Pituita igitur cum sit magna in corpore copia, eam citius coaceruari & putrescere; aut in parte aliquâ colligi, & inde ad alias mitti atque ibi putrescere, & ita singulis diebus exacerbationes inducere aiunt. Bilis autem cum non sit tanta in corpore copia, neque tam citò in parte siue mittente, siue generante, colligatur, eam etiam tardius ad excretionem stimulare, & non singulis, sed alternis diebus paroxysmum facere, existimant. Melancholiam denique, partim quia pauca sit in corpore, partim quia ineptior sit ad putredinem, tardiusque putrescat, quarto saltem die naturam irritando, paroxysmi causam esse; atque periodorum rationem ita continuari, quamdiu hæc membrorum & humorum dispositiones non variant, & victus ratio, omneque causæ reliquæ eadem manent; variari autem & mutari, dum hæc mutantur, statuunt.

Verum hanc sententiam alij reiciunt: neque enim ista proportio humorum, quam isti præsupponunt, semper in corpore datur. Et licet concedatur, in sanis corporibus istâ analogiâ sese habere humores: tamen corporibus ægris modò plus bilis, modò pituitæ, modò melancholiæ accumulatur. Quod cum ita sese habeat, causam reddere nequeunt, cur pituita, si pau-

ca putrescat, quotidie tamen moueatur; bilis verò flaua, quod sæpe accidit, si copiosior vno in loco colligatur, non tamen citius, quam tertio die, moueatur. Sæpe enim accidit, ut bilis sit pauca in tertianæ declinatione, contra melancholia multa in Quartanæ principio; nihilominus ibi tertiana, hic Quartana periodus obieruatur.

Alij itaque aliter hæc de re sentiunt. Nam nonnulli nullam periodorum in febribus causam agnoscunt, quam naturam humorum. Cum enim pituita sit frigida, humida, crassa, lenta & tenacis consistentiæ, quæ idcirco ægrè accenditur, tardè mouetur, & facilius in viis hæret, & accensâ antequam deferueat, longum tempus consumit: statuunt, & paroxysmos, qui à pituita proueniunt, esse longiores, & eam in declinatione exactè expurgari non posse, sed plurimas eius reliquias remanere, quæ iterum succentia, mox sequenti die noui paroxysmi causæ sint. Flaua autem bilis cum calida, sicca & tenuis sit, accensa propter subtilitatem tota ferè deferuet, & deflagrat, & minus reliquiarum, quam pituita relinquit. Vnde & intermissio eius purior est, neque tam citò nouus paroxysmus, sed tertio demum die, excitatur. Melancholia verò cum etiam copiosius euacuetur, utpotè, quæ minus lenta & tenax est, quam pituita, & ubi accenditur, minus reliquiarum post se relinquit, idcirco tardius quoque, quam pituita, nouum paroxysmum inducit; sed cum eadem etiam frigida & sicca naturæ sit, ac terreæ substantiæ, difficiliorque, quam flaua bilis putrescat, tardius adhuc, quam flaua bilis nouum paroxysmum facit, quarto nimirum demum die.

Verum enim uero hæc opinio saltem generalem periodorum causam, non verò specificam & determinatam, quæ quæritur, reddere videtur. Neque semper in crassitie, lentore, tenacitate, tenuitate, & similibus qualitatibus eodem modo sunt humores dispositi.

Alij ergo fuere, qui ex solâ putredinis naturâ causam periodorum petendam censent. Cum enim intermissio fiat febrium, dum humor, qui paroxysmi causa fuit, per halitum diuulsus, aut etiam alio modo euacuatus est, atque ea eò usque duret, donec noua materia putrescere incipiat, ex humorum ad putredinem maiore vel minore aptitudine periodorum causas colligunt. Nam cum humidiora facilius putrescant; pituita verò omnium humidissima sit idcirco breuiore tempore, nimirum saltem vnius diei interuallo eam rursum putredinem concipere dicunt. Bilem cum sicca sit, longius tempus requirere; nimirum dierum duorum spatium. Melancholiam denique, cum humor sit frigidus & siccus, maxime omnium resistere putredini, & trium dierum interuallo solam putredinem concipere.

Hæc opinio, Et si probabilis sit, animum tamen veritatis audium non planè fatiat. Pituitam quidem citius, quam bilem; & hanc citius, quam melancholiam, putrescere docet: verum cur hoc istis terminis & temporum interuallis fiat, cur pituita die vno elapso, bilis, duobus elapsis; melancholia, quarto demum die putrescat, non monstrat.

Itaque cum hæc omnia quibusdam non satisfaciant, & cum hic determinatus & definitus effectus sit, qui in omnibus indiuiduis se se eodem modo habet, statimque planè periodis paroxysmi redeant, determinatâ & definitâ ac in omnibus eodem modo sese habentē causam requirendam censent. Talis autem cum non possit esse membrorum dispositio, humoris qualitas, crassities, visciditas, tenacitas, ad putredinem aptitudo, & reliqua, quæ hæcenus allata sunt; utpotè quæ infinitis modis, & in diuersis indiuiduis, & in eodem ægroto, diuerso morbi répoze variare possint: ad occultam proprietatem confugiendū existimant. Cum enim ex nullâ manifestâ qualitate satis euidēs & firma causa dari possit, cur in omnibus indiuiduis humor biliosus, cuiuscumque etiam sit speciei,

*Ex natura humorum.*

*Ex putredine.*

*Ex occultis proprietatibus.*

speciei, in quo nō parua manifestarum qualitarum differētia occurrit, tertio quōque die, & eodem modo pituita ac melancholia accessiones faciant: id in peculiariē & propriam conditionem ac occultam proprietatem referunt. Et alij quidem causam periodorum simpliciter è natura specificā humorum petunt; sicut attractionis ferri in magnete à formā specificā eiusdem. Verū cū occultæ qualitates à formā pendēant; formæ verò in putredine intereant: in occultam proprietatem causam simpliciter reiici non posse, nonnullis videtur. Itaque alij non simpliciter ad formam humoris respiciunt, sed putredinem coniungunt, dicuntque, si humor aliquis putrescat, hoc tanquam inseparabile & proprium accidens eius naturam sequi, habere certas quasdam & statas periodos: pituitam nimirum dum putrescit, hanc occultam naturam & proprietatem habere, vt singulis; bilem, vt alternis; melancholiam, vt quarto quolibet die moueatur & paroxysmum concitet. Imò alij locum adhuc addunt, dicuntque, si humor extra venas putrescat, hanc occultam qualitatem acquirere.

Verū nec hoc aliis satisfacit. Cū enim, vt ipse Fernellius, qui hanc sententiam tueretur, docet, *lib. de febr. cap. 10.* obseruatum sit, tertianam diuturnam atque quartanam in atrocem cruciatum colico immaniorē definere, qui nonnunquam, & in articulorum dolores, & in paralyfin facessit; atque hic dolor tamen consueto accessionis tempore ferè exacuatur & excandescat, pristinumque circuitum retineat: hinc manifestum euadit, etiam circuitus illos sine febre & putredine esse, ac proinde à putredine non prouenire. Præterea si ab occultā humoris proprietate periodi fiunt, numerus typorum numero humorum respondere debet. At tres sunt tantum humores causæ februm periodicarum. Ergo tantum tres debebant esse periodi: cū tamen obseruatum sit, esse longè plures, quintanas, sextanas & alias. Et ij ipsi authores in eodem, quos vitare volunt, scopulos incidere videntur, dum, quod Fernellius facit, anticipationem & postpositionem paroxysmorum in auctam & imminutam materiam referunt.

Sanctorius Sanctorius, *lib. 6. de vitandis error. in arte Med. cap. 5.* aliam adhuc habet sententiam, & causam periodorum petit, à locorum & partium affectarum situ ac distantia à corde. Quod enim idem humor diuerfos pariat morbos, à loco pendere, & locum, non humorem dare esse specificum morbis, & periodicis morbos consequentibus, docet. Atque hinc statuit, si humores biliosi sint in loco proximo cordi, naturam adoriri malos humores sine circuitu; quia agens proximum patienti non impeditum semper agit, & patiens reagit. Quando verò peccantes humores sunt magis in loco distante & remoto à corde, tunc cor vicinis partibus circumseptum exemplo in humores non agit, nec humores in illud reagunt, sed solum per circuitum. Hinc sequitur, quod quantò maior sit distantia loci affecti à corde, tantò periodus erit longior. Pituitam itaque facientem quotidianam intermittentem, semper suam sedem habere in ventriculo statuit; qui quia proximus cordi, idè quoridie mouetur: Bilem verò facientem tertianam esse modò in hepate, modò in mesenterio, modò in variis partibus hypochondriorum: Melancholiam tandem, quia sit in liene, causare quartanam.

Verū contra hanc opinionem multa, quæ contra præcedentes dicta sunt, afferri possent, illudque etiam in dubium vocari, an ventriculus hepate vel liene sit cordi propior, & quomodo ex variis partib. (quod ipse concedit, cū dicit bilem facientem tertianas, modò esse in hepate, modò in mesenterio, modò in variis partib. hypochondriorum) vna periodus fieri possit: hoc saltem præterire non possumus: si locus & distantia partium à corde causa suf-

ficiens est periodorum, quid opus est humores coniungere? & an non potest pituita etiam in mesenterio & variis hypochondriorum partibus colligi? Quod si fiat, & illa faciet tertianam periodum. Sicut & illud dubium est, quod expulsionem, quæ fit in febris, cordi tribuere videtur, & non partibus, in quibus continentur humores vitiosi.

Platerus duas saltem febrium intermittentium differentias admittit, vnam à bile tenui, alteram à crassa seu atrā: tenuique putredinem, antequam eò deueniat, vt febrem excitare possit, ad triduum vique ex sua naturā, ab eo tempore, quo iam prior illius putredo discussa est, supputando, se. è extendi: crassiorem verò ac veluti adustam bilem, quia tardius putrescit, antequam eò deueniat, vt febrem excitare possit, longius tempus quōque requirere, & proinde ad quartum diem vique paroxysmum protrahi docet.

Ridiculam Paracelsistarum & Scheunemanni opinionem de periodicis febrium, de *Chymic. cum Aristot. & Galen. conf. & diff. c. 6.* proposui, quam, cū nec minimam probabilitatem habeat, hic repetere non libet.

Verū alij adhuc sunt, qui omnes, quas recensuimus, opiniones, & omnes omninò, quotquot dari possunt de quæstione, cur pituita singulis; bilis, alternis; melancholia, quarto quolibet die moueatur, vnicò modo simpliciter damnant, atque istos Authores omnes à ianuā aberrare, & in inquirendā causā illius effecti, quod & nullum, & nunquam, & nusquam fuit, sese frustra torquere dicunt. Falsum enim esse, quod vulgò creditur, pituitam singulis, bilem alternis, melancholiam quarto quolibet die moueri: cū quilibet humor moueri subinde quocunque tempore vel celerius, vel tardius, vel frequentius, vel rarius pro variis occasionibus possit. Et proinde ab vno humore plures typos, quotidianos, tertianos, quartanos, quintanos, & si qui sint alij, oriri posse asserunt. Quā de re ita scribit Simon Simonius, *cap. 5. synopsis de humoral. febr. nat. Præfari*, inquit ille, *hic libet: in tota Medicina arre fraudulentiorē permiciosiorēque opinionem humano generi nullam viguisse hactenus illā, quā periodici morbi, qui per febres apparent, occulta, vel etiam celesti nescio cui, secundum quam quisque moueatur humor, potestati attribuantur. Hodie autem (addit idem in fine capitis illius) practici nostri, ita scilicet edocti ac persuasi, cū ad agrotantes ventum est, obseruato duntaxat circuitus ordine, quem nōsse non est difficile, tanquam certā & immota quadam ratiocinatione deprehensum iam tenere se peccantem humorem opinantur, pro quo deinde scopos curationis constituent, præscribuntque remedia: cū tamen in quotidianis, tertianis, quartanisque accessionibus haud paucis symptomatum à Galeno propositorum vel nullum, vel vix vnum aut alterum integrum vestigium sese illis offerat, imò & causarum, cū externarum, tum internarum series atque connexio, & signorum concursus alius, quā ipsi querunt, humoris præsentiam effectūque demonstrant.*

Atque huius assertionis has asserunt rationes. Si, inquit, humoribus attribuendæ sunt periodi, siue ex eorum naturā, proprietate, qualitate, siue quocunque alio modo causā periodorum petatur, tres saltem erunt typi, tribus humoribus respondentes; quotidianus nimirum, pituitæ; tertianus, bili, quartanus melancholiæ. At dantur plures, quintanus, sextanus, aliique, & ab Hippocrate, & ab aliis Medicis animaduersi atque annotati. Ergo ex humoribus non potest causa reddi periodorum. Si quis verò vni humori plures circuitus attribuere velit; id quod nonnulli in melancholiā faciunt, & periodum quintanam & sextanam in melancholiam referunt: is causam reddat oportet, cur solum humor melancholicus, non verò etiam alij plures periodos pariant. Itaque singulas periodos singulis humoribus

Platerus.

Periodos humorum negantium sententia.

Sanctorij opinio.

ascribendas non censent, sed quamlibet à quolibet proficisci posse statuunt. Notas enim omnes sin- ceræ bilis aliquando, vt & non rarò pituitæ, in quar- tanâ febre æquæ ac melancholia deprehendi: Tem- periem nimirum, ætatem iuuenilem, mores, ratio- nem victûs, anni tempus & constitutionem, urinam & alia excrementa, pulsus, iuuantia, lædencia, bilem potiùs, aut pituitam, quàm melancholiam de- monstrare. Et contrà in tertianis etiam pituitæ potiùs aut melancholiæ, quàm bilis indicia animad- uerti. Plurimos certè quartanâ, largâ pituitæ vom- itione, vel per aluum deiectione liberatos esse sæ- pe obseruatum est, & aliæ quartanæ vomitione bilis cum pituitâ solutæ sunt. Itaque si verum est, inquit, quod Hippocrates scribit; sanatio morbos indicat: dubium non videtur, ab iisdem humoribus istas febres ortas fuisse, post quorum euacuationem sublata illæ sunt. Ita in pueris & mulieribus, aliis- que corporibus pituitosis, in quibus melancholici humoris nulla suspicio, sed potiùs pituitæ certa indi- cia, febres quartanæ sæpius excitantur. Vnde Ni- colaus Piso, *lib. de febr. cap. 12.* scribit: Pituita ipsa crassa multum consistentiâ melancholici humoris naturam induit. Quare circuitus interdum quarta- nos facit. Ex hac pituitâ in his regionibus sunt quar- tanæ quàm plurimæ, pueris, mulieribus, & aliis melan- cholicum nihil ostendentibus, sed candidis, pituitam vomentibus & deicientibus lentam & crassam. Ob- seruatum etiam, non solum tertianas in quartanas, sed contrà quartanas in tertianas mutatas fuisse: quod certè non fieret, nisi idem humor plures periodos ex- citare posset. Neque enim humoris natura mutatur, etsi periodus mutetur, neque ex melancholiâ bilem fieri credibile est. Imò, ipsa accessio, anticipatio & post- positio idem suadere videtur. Nam si ab humoris quan- titate, crassitie, acrimoniâ, tenuitate, & similibus con- ditionibus sunt accessionum anticipationes & post- positiones: ab iisdem causis auctis vel imminutis, vno die illas accelerari aut retardari posse impossi- bile non est. Si enim, quod sæpe accidit, aliquam ob causam per 12. horas sit paroxysmi anticipa- tio: Cur non ab eadem causâ auctâ possit fieri per viginti horas anticipatio, & ita quotidiana perio- dus? Et cur non parciore pituitæ prouentus reditum febris in tertium aut quattum diem remorari possit? Siquæ melancholiæ crassitie & paucitati ascribendos censent quintanos & sextanos typos: Cur non etiam pituitæ tertianus & quartanus ascribi possit?

Quæ res, ipsa grauissimos Authores adegit, vt fate- rentur, typum tertianæ ab alio etiam quàm bilioso; quotidianæ, ab alio quàm pituitoso; quartanæ, ab alio quàm melancholico humore prouenire. Hippocra- tes certè febrium circuitus secundum humorum dif- ferentiam non videtur distinguere. Alex. Trallianus febrem quartanam aliam à melancholiâ, aliam à bile facit. Auicennas, *lib. 4. fen. 1. r. 2. cap. 1.* phlegma, vt mul- tum, solum facere quotidianam scribit. Idque etiam alij Medici faciunt.

Itaque hi nihili faciunt argumentum Valeriolæ, quod demonstrationis loco habet, in *app. loc. comm. cap. 1.* Qui, inquit Valeriola, effectus in vno quopiam rerum genere inueniuntur, qui perpetuò rei conueniunt, & paribus modis fiunt, in quodcumque tandem corpus aut tempus inciderint, hi ad propriam substantiam eius, & quo fiunt, sunt referendi. Atqui per certos quosdam dies recursus facere, accessionesque prouocare, & per- petuò humoribus conuenire, & recursus huiusmodi pari- bus semper intervallis (nisi aliunde ordinis periodorum peruersio consequatur) fiunt. Itaque ex humorum tali vel tali naturâ erit, vt recursus eiusmodi fiant. Minorem enim propositionem, simpliciter negant, & quotidia- num, tertianum, ac quartanum circuitum non solum à singulis, sed pluribus & diuersis humoribus fieri as-

serunt, ipsamque experientiam & diligentem ægro- tantium inspectionem testem citant.

Et proinde hi ex Galeno, 2. *de febr. cap. ult.* non aliunde causas periodorum in febribus petendas cen- sent, quàm ex partis tam excrementum febrium ge- nerantis & transmittentis, quàm recipientis, vel in- ipsâ se procreantis & sibi retinentis vario & mu- tabili statu, nec non ex humoris transmissi vel col- lecti copîâ, naturâ & conditione multiplici. Cum enim causa vniuersalis particularibus omnibus effe- ctibus sit communis, & ad quemlibet particulari- ter restringi oporteat; si vniuersalis periodorum causa est humorum coaceruatio: etiam quotidiana, tertianæ, quartanæ, & reliquæ vniuersalem causam certis conditionibus circumscriptam, de- finitam, & determinatam habebunt; Quotidia- næ nimirum periodi causa erit humor quicumque, qua- litate & quantitate naturæ molestâ ita auctus, vt ultra diem contineri in corpore non possit: tertianæ verò periodi causa erit humor quicumque tertio die talem vel qualitatem, vel quantitatem acquirat: quartanæ, qui quarto die ad eam qualitatem vel quantitatem per- uenit.

Neque istos ab hac sententiâ deducit periodorum constantia, & per definita temporum intervalla cer- tus febrium reditus. Nam non semper statis horis febres intermittentes redire, sed anticipare & postpo- nere; neque etiam in anticipatione & postpositione certa tempora semper obseruari, ob variam causarum dispositionem, ex quotidiana febrium obseruatione constat. Et non impossibile esse existimant, si causæ illæ eodem in statu permaneant, quod non solum in diebus, sed & horis circuituum eadem ratio & qua- litas obseruari possit. Videmus hoc vel in alui ege- stione, quæ in hominibus sanis, moderatè cibo & po- tu vtentibus, nullumque errorem in diætâ committen- tibus, certis & definitis horis, bis vel semel singulis diebus accidere solet. Ac si qua in victu vel reliquâ diætâ mutatio contingat, etiam ille excernendi circuitus non planè obseruatur.

Etsi verò, quæ inter tot dissentientes opiniones ve- rior sit perspicere difficile sit; imò difficillimum omni- no, vt Mercurialis ait, vel ex Galeno, vel alio scriptore irrefutabilem rationem afferre; & proinde in tenebris ignorantie humano generi communibus, & me hîc versari non diffitear, tamen, vt & in hac parte, quan- tum possumus, veritatem, si non assequamur, sectemur, laborabimus.

Primò autem de illo omnino constet necesse est; An, quod à Simonio & aliis in dubium vocatur, singuli hu- mores suas periodos habeant; an verò quilibet humor quacumque periodo, pro variis occasionibus, moueri possit; ne in effectus, qui nullus, & nunquam, & nusquam fuit, aut erit, causâ reddendâ frustra labo- remus.

Esse autem tales humorum periodos ipsa experien- tia satis testatur, inprimis in epidemiis constitutioni- bus, vbi ab vnâ causâ geniti humores eiusdem generis, nunc tertianæ, nunc quartanæ typum obseruant, & adeò exactè, vt regularitate non rarò cum automatis horologicis certent.

Neque quæ obiciuntur, tanti momenti sunt, vt contrarium persuadeant. Etenim etsi plures videan- tur periodi, quàm humores: tamen sciendum, humo- res eiusdem generis plures habere seu species, seu gra- dūs, à quibus diuersæ periodi proficiuntur. Neque enim humor, qui bilis nomine appellatur, omnis eius- dem generis est. Ideoque Andr. Cæsalpinus, *art. med lib. 2. cap. 15.* quintanas ad bilem; septimanas ad melancholiam refert, scribitque, se sæpius vidisse con- uersam quintanam in tertianam; aliquando longam mensibus septem ex erraticis ortam in autumnno; & tales rariores typos species esse simplicium typorum, interpo-

Contraria explicatio.

Humores con- stituti periodis morborum.



interpolatâ vnâ accessione aut pluribus : & accidere idem, quod in menstribus, quæ deficientia vno mense, non moueantur tempore intermedio, sed expectent consuetum tempus. Quintanam nempe esse tertianæ speciem, in quâ dies tertianæ est sine accessione : septimanam esse quartanæ speciem interpolatâ accessione diei quarti.

Deinde quod dicunt humores, qui per sua signa deprehenduntur, non respondere periodis : id si de omnibus omnino signis intelligatur, admitti non potest. Sit enim quartanas ( quod post illum hisce regionibus insolitum æstatis calorem & squalorem, Anno 1616. cum epidemiæ essent quartanæ, accidit, ) non solum senes & melancholicos, sed & iuuenes, imò infantes; biliosos, sanguineos corripere : tamen causam posse esse tam vehementem, qualis est insignis in aëris qualitatibus excessus, aut contagium, quæ etiam in puerili & sanguineo corpore humores adurere, exsiccare, ac ita corrumpere possit, vt inde quartana generetur, negandum non est.

Præterea quamuis Quartanâ laborantes sæpe pituitam vomitu reiiciant : non tamen necessario ea Quartanæ causa est, sed potius effectus. Cum enim in Quartana ventriculus valdè debilitetur, crudos in eo humores generari necessarium est : qui ipsi etsi febrem fouere & diuturniorem reddere possint : non tamen proxima periodi causa sunt.

Neque periodorum mutatio aliud persuadet; cum humores degenerare posse notissimum sit; & ex bile humorater fiat, ynde & sæpissime tertianæ autumnum attingentes in Quartanas mutantur.

Ac proinde argumentum Valeriolæ suprà propositum adhuc constare opinor, nec quemlibet typum à quolibet humore prouenire posse, statuendum censo.

Interim etsi hæc ita sese habeant : in eo tamen libenter Simonio assentior, eos medicos peccare, qui circuitûs ordine obseruato, tanquam certâ & immotâ quadam ratiocinatione deprehensum iam tenere se peccantem humorem opinantur, pro quo deinde scopos curationis constituent, præscribantque remedia. Etenim cum dentur febres nothæ, dentur complicatæ & compositæ : non statim, si febris singulis diebus inuadat, pituitosa æstimanda; cum duplex biliosa seu tertiana, & triplex quartana esse possit. Ideoque Medici prudentis est, non solum ex dierum numero, sed potius ex signis omnibus, causis scilicet & effectibus, illique quæ præcesserunt & adsunt, naturam humoris febrem patientis dignoscere, ac ad eum curam dirigere.

Atque ita, cum certum sit, humores singulos habere suas periodos, iam porro, quomodo periodi ab iis pendeant, inquiramus. Vbi primò statim distinguendum inter recursum febris & periodum, vt & inter causam, ob quam febres intermittentes redeunt, & causam ob quam statis temporibus, tertio scilicet vel quartodie, reuertuntur. Equidem Galenus præcipuè recursus febrium causam reddit, dum, 2. de diff. feb. cap. vlt. scribit: *Quæcunque per circuitûs aliquos ægritudinum accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent, quæ scilicet vel mittunt, vel suscipiunt, vel attrahunt superfluitates*: febriumque, quæ per intervalla repetunt, causas ex professo ibi inuestigat: cum tamen nullam mentionem quotidiani, tertiani, aut quartani circuitûs fecerit: eo loco periodorum causam non ita manifestè reddidit.

Quia tamen distinguit Galenus eo loci inter causam collectionis nouæ superfluitatis, eamque appellat, partis superfluitates generantis *ασθένεια* & debilitatem: & causam corruptionis & putredinis, quam statuit esse *ἐγχεταλκτική* τῶν υγρῶν *συνπύκνυναι* *καὶ* *συντείνειν*; à quibus generatæ superfluitates initium putredinis accipiunt: etiam hinc causam periodorum erui posse videtur.

Nimirum periodorum causam esse naturam humoris, & quidem non simpliciter eam, quam à membro debili, in quo fuit generatus; sed quam ex putredine, seu corruptione & fermentatione quasi accepit; seu inquinamentum, *μίανσις*, & *πύκνυναι* *συνπύκνυναι* in putredine humorum genitum, quod instar fermenti esse habet. Vt enim videmus, fermentum massæ farinæ vel liquori alicui admixtum facere, vt massa illa seu liquor effervescente incipiat: ita illud putredinale fermentum in corpore post paroxysmum relictum initium effervescentiæ & putredinis dat, facitque vt materia, quæ antea in suo quasi foco coercita quiescebat, iam, vt Plateri verbis utar, veluti turgens & exardescens & multum de se & tetrum vaporem diffundat: qui cum ob copiam & aduersam qualitatem subsistere nequeat naturamque irriter, ab eâ quoque impulsus in venæ cauæ & arteriarum vicinos ramos irrumpens & ad cor usque penetrans, febrem accendit tamdiu durantem, donec quicquid è foco excussum est, dissipetur & discutatur. Vt autem fermentorum varia sunt genera: ita & res, quæ fermenta illa participant, citius vel tardius effervescente incipiunt, & breuiore vel longiore temporis spatio fermentationem absoluunt. Præbet huius rei exemplum euidenter mustum, quod, quod vix sunt maturiores, eò citius feruere incipit: ex vix verò immaturis quod exprimitur, tardius feruere incipit. Idem in aliis liquoribus qui ex plantis earumque fructibus exprimuntur, videre est, quorum alij, prout dulciores, acidiores, acerbiores sunt, citius vel tardius feruere incipiunt, & breuiore etiam vel longiore temporis spatio deferunt. Quæ res non parum declarat, cur humor biliosus citius; melancholicus tardius putrescere & effervescente incipiat. Nimirum qualis est natura illius *συνπύκνυναι* *καὶ* *συντείνειν* aut *μίανσις*, & vt clarissime dicam, fermenti: ita citius vel tardius humor paroxysmi causa effervescente & putrescere incipit. Etsi verò istud putredinale fermentum humori ipsi respondeat, cum ex simili humore generatum primò sit; & in omnibus tertianis bilem, in quartanis melancholiam peccare rectè dicamus: tamen in diuersis corporibus humorum esse aliquam differentiam, & humorem qui quartanam facit, secundum corporum & temperamentorum diuersitatem nonnihil differre, non diffitemur. Illud tamen fermentum putredinale in omnibus est idem, & facit, vt certo & definito tempore humores, secundum indiuidua nonnihil differentes, putrescere & effervescente incipiant.

Atque ita singulæ periodi suos humores, à quibus oriuntur, habent, neque ex humoris transmissi vel allekti copiâ saltem aut aliâ conditione proueniunt: Id quod duplices tertianæ & quartanæ euidenter demonstrant, in quibus licet ea sit humoris copia, etsi in diuersis locis, vt duplicem febrem producere possit: quilibet tamen suam seruat periodum, neque ob copiam humoris, febris in aliam speciem, nisi & ipse humor aliam formam assumat, degenerat, sed tertiani vel quartani circuitûs statis diebus, imò horis, sibi semper respondent. Neque enim compositæ illæ differentiæ, quibus duplices tertianæ, duplices & triplices quartanæ constituuntur, simpliciter reiiciendæ sunt, & quæ duplices aut triplices febres vocantur, quotidianæ nominandæ. Nam etsi, si diem spectes, ita nominari possint: tamen, cum sæpe accidat, vt in diuersis locis generentur & putrescant humores, pro complicatis illæ potius, quàm simplicibus meritò habentur. Quæ etiam eo signo discernuntur, quod plerumque tertianæ accessio in duplici tertianâ primæ, in horâ reditus & symptomatibus; quarta, secundæ; quinta, tertiar; sexta, quartæ; septima, quintæ, & sic consequenter respondeat. Sic in quartanâ triplici in horâ reditus, duratione, vehementiâ paroxysmi & cæteris symptomatibus quartus paroxysmus respondebit primo; quintus, secundo;

cundo; sextus, tertio; septimus, quarto, octauus, quinto. Quanquam nihil obstat, quin etiam duplices vel triplices febres eandem horam in periodo obseruare possint. Contra etsi materię copia decreseat, quod fit in declinatione; ac paroxysmi fiant breuiiores, nihilominus statim tempore recurrunt.

Si quis tamen etiam cœlestes causas coniungere velit, non planè obstat. Quanquam enim periodi à suis humoribus dependant: tamen ad primam febris & fermenti illius putredinalis generationem, causę etiam cœlestes aliquid facere posse videntur. Videmus enim multum in febribus & has posse, ac circa solstitia & æquinoctia febres quartanas atque alias diuturniores incipere & terminari, & raro, quamuis magna diligentia adhibeatur, ante eos terminos cessare, & vix vllam quartanam post solstitium hybernũ incipere; sicut circa æquinoctium autumnale incipiunt frequentissime.

Longitudinem verò, breuitatem, atque ordinem paroxysmorum quod attinet, pendent hæc omnia ex humoribus, viribus, & corporis constitutione. Humor enim copiosus longioris paroxysmi causa est, quam paucus. Ita quoque crassus longiorem paroxysmum facit, quàm tenuis. Nam citius discuti potest humor paucus & tenuis quàm multus & crassus. Si vires sunt robustę, breuior est paroxysmus, quàm si languidę. Validior enim virtus citius id quod molestum est, potest expellere, quàm debilis. Corporis denique constitutio rarior, causa est paroxysmi breuioris; densior, longioris. In habitu enim raro, vię per quas humores vitiosi in paroxysmis euacuari debent, sunt patentiores; in denso verò angustiores & magis conclusę. Atque vbi omnes causę, quę breuem paroxysmum efficiunt, concurrunt, fit is breuissimus: vbi omnes, quę longum producunt, adsunt, fit longissimus: vbi quędam causę, quę paroxysmum breuem efficiunt, adsunt, quędam deficiunt, fit paroxysmus medio modo sese habens.

Est & in ordine periodorum quędam differentia. Nam interdum paroxysmus eodem planè tempore reddit: Aliquando sequens paroxysmus citius, quàm prior, recurrit; qui typus appellatur *πρὸληπτικός*. Aliquando verò sequens paroxysmus tardiùs, quàm prior reddit, & nominatur *ὕστερπτικός* typus. Et quidem nunc per totum morbi decursum talis typus obseruatur, & sæpe à principio febris vsque ad integram solutionem omnes paroxysmi anticipant vel postponunt; nunc verò in aliquibus saltem accessionibus fit anticipatio, in aliquibus postpositio.

Accidere autem anticipationem plerique dicunt, cum humores ob aliquod in victu erratum augmentur, aut mouentur medicamentis, irā, motu & similibus causis. Tardiùs autem redire, dum materia imminuitur, vel crassior redditur. Quod quidem, vbi typus consuetus mutatur, ita fieri posse, vt non negamus: Ita cum febris aliquem typum vel *πρὸληπτικὸν* vel *ὕστερπτικὸν* semper obseruat, causa potiùs ex humoris diuersitate petenda videtur. Etsi enim bilis suo modo corrupta, tertianę periodi; melancholia, quartanę causa sit: tamen bilis & melancholia secundum corporum & temperamentorum diuersitatem nonnihil sæpe variant. Hinc etiam accidit, velicet illud fermentum putredinale, vel qualiras occulta bili inducta, sit causa tertiani circuitus; melancholię inducta, quartani: tamen secundum humoris differentiam fieri potest, vt horis aliquot citius vel tardiùs illa humorum effluuiescentia accidat. Ordo verò accessionum variatur, vbi vel humores mutantur, & in aliam naturam abeunt, vel errata in victu committuntur.

Solet & hoc loco ab Authoribus pluribus disputari de rigore & horrore: verum cum eā de re alibi sit dictum pluribus, breuiter rem complectemur. Est rigor, à quo Horror (saltem magnitudine causę differt,

vt Galenus, lib. 2. de sympt. caus. cap. 6. & 14. meth. med. cap. 4. docuit, expultricis facultatis validus motus, à re molestā eam stimulante excitatus. Etsi verò varię de Rigoris naturā & causis disputationes moueri soleant: tamen ex iis facilè se expediet, qui distinguet inter subiectum rigoris; causamque eius proximam & causas rigoris remotas. Subiectum nimirum rigoris sunt externę corporis partes, quę præter naturam concutiuntur & vibrantur. Causa proxima est, quicquid partes in ambitu corporis vniuersi sentientes subito & confestim vellicare, usque molestiæ sensum exhibere potest. Id enim vt amoliatur natura, partes illas concutere & vibrare solet, & vt ipse rigore illarum partium concussio, ita causam proximam ibidem consistere necesse est. Causę verò remotiores alibi etiā consistere possunt. Et vt de aliis, quas in Inst. l. b. 2. part. 3. s. 2. cap. 5. & lib. 1. praxi. p. 1. cap. 24. exposuimus, nihil dicamus, in febribus rigor accidit, cum vel materia acris ex putrescentibus humoribus ad ambitum corporis delata sufficienter exhalare non potest, & per partes sentientes ibi confestim & subito delata eas vellicat; vel cum partes internę ab humoribus acris vellicantur. Sunt enim partes internę ventris inferioris pleręque membranosę, vel membranis inuestiuntur, quę sensu exquisito præditę sunt. Hęc ergo si afficiantur, vniuersi corporis partes in consensum trahuntur: hinc calore subito ad eas recurrente non solum externę partes subito refrigerantur, sed & à sanguinis ac caloris ad interiora recursum, tenues acresque humores & vapores, qui sunt in ambitu corporis, subito mouentur, usque agitati sentientes ibi partes vellicant.

Atque hæc de causę proximę, quę febres intermittentes excitat, naturā, loco & motu dicta sint. Causas verò remotiores, & quę ad istius materię in venis melaericis generationem faciunt supra explicauimus. Sunt nimirum eę, vt supra iam dictum, præcipuè cibus & potus non boni succi, sed humoribus vitiosis suę naturę respondentibus materiam præbentes, ventriculi praua dispositio, ob quam cibi bilescunt vel acescunt; Aeris constitutio intemperata. Atque est causarum illarum, præcipuè aeris nos ambientis, & victus ea sæpe vis, vt quoscunque humores etiam in corpore inuenit, eos nihilominus corrumpere, & ad certam febris speciem inducendam determinare possit, vnde non solum continuę, sed & intermittentes sæpe populariter grassantur; & nunc tertianę, nunc quartanę frequentiores vel rariores grassantur.

Etsi enim in diuersis diuersi temperamenti corporibus, in quibus diuersi etiam humores naturaliter generantur, diuersi quoque plerumque morbi, cuiusvis constitutioni & temperamento familiares producantur: tamen si magna sit causarum euentium vehementia, etiam in diuersi temperamenti corporibus iidem morbi producantur, dum diuersi humores eandem corruptionem incurrunt. Et in eiusdem temperamenti corporibus diuersi morbi produci possunt, prout diuersę causę iis occurrunt, quę diuerso modo humores corrumpunt. Ideoque plerumque potiùs ad causarum agentium vim, quàm ad corpora ipsa respiciendum. Etsi enim agens agat in subiectum dispositum: tamen ea sæpe est causarum vehementia, vt nullum corpus ab eā sibi immunitatem polliceri possit. Et hinc diuersitas effectus diuersitatem causę arguit; & contra identitas effectus identitatem causę indicat.

#### De differentia Februm Intermittentium.

Differunt autem Intermittentes inter se maximè humorum, à quibus ortum habent, varietate. Tot enim sunt februm Intermittentium species, quot humorum, à quibus producantur. Sunt autem humores, ex quibus oriuntur, tres illi extremi, Bilis, Pituita, Melancholia, atque ita tres februm Intermittentium

Longitud.  
paroxysmo-  
rum caus.

Ordo paro-  
xysmorum.

Anticipa-  
tionis &  
postpositionis  
causa.

Rigor &  
horroris  
causa.

Februm  
Intermit-  
tentium dif-  
ferentia.

mittentium species, Biliosa, Pituitosa & Melancholica; quas differentias, tertianam Intermittentem, quartanam Intermittentem, & quotidianam Intermittentem nominare solemus. Verum si humores non semper sinceri sunt, sed sæpe mixti: hinc rursus febrium quædam differentia oritur. Nam quæ ex sincerâ bile ortum habet febris, vulgò tertiana pura, aut febris biliosa pura intermittens nominatur: quæ verò à bile flauâ cum alio humore oritur, tertiana notha seu spuria appellatur, & ita de reliquis.

Verum vulgata hæc doctrina à quibusdam in dubium vocatur, & præcipuè de pituitosis febribus ambigitur. Fernellius quidem hanc omnium rarissimam esse, & vix ex sexcentis vna obringat: sed cum laborans quotidie febre conflictatur, id ferè à duplici tertiana fieri scribit. Platerus verò planè has febres negat, & duo saltem febrium intermittentiũ genera constituit: Tertianam è bile tenuiore; Quartanam verò ex crassiore & vehemè adustâ: pituitosam verò seu Quotidianam intermittentem non admittit. Et Platero ea, quæ Galenus, 8. meth. med. capite quinto, tradit, non parum fauere videntur. Etenim cum eo loci duplicem cruditatem saltem constituat, vnam nidorofam, alteram acidam, & vtramque febribus originem præbere posse doceat: duplices saltem erant febres, vna ex nidorosa, altera ex acidâ cruditate originem habens, aut certè hæ febres erunt frequentiores. Quia tamen ex cruditate illâ, quæ nidorosa opponitur, etiam pituita generatur, & pituitosos humores, à bile & melancholiâ diuersos, in primis viis sæpe cumulari certum est, neque eos putrescere posse est planè impossibile: etiam Quotidianæ febres dari videntur. Quia tamen pituita est frigida, vix sola putredinem concipit, atque ita, vt Fernellius scribit, è sexcentis febribus vix vna erit quotidiana intermittens è pituitâ.

Chymici illam geminam cruditatem nidorofam & acidam, per sal amarum & acidum explicare conantur. Cum Natura in coctione in animalibus quandam *συνμάτωσιν* intendat, & fermentationem quasi quandam instituat: in animalis coctione rectè sese habente vix vllus sal fixus generatur. Si verò in coctione aliquod vitium accadat, humores nunc amari, nunc acidi, atque ita sale fixo abundantes generantur. Vt enim in fructibus, vino, & cereuisiâ, vbi in coctione & fermentatione aberratur, atque aliqua sit corruptio, aliter atque aliter, quæ producuntur, sese habent: ita & cum in nostro corpore natura in suis operibus aberrat, sese res habet. Et si eas quæ vomitu, per aluum, per cutim excernuntur, consideremus: in tertianâ quid amarum, in quartanâ acidum quid abundare animaduertemus. Est autem maior fixitas in sale acetoso quàm amaro. Atque hinc accidit, vt tertiana citius soluiatur Quartanâ, & paroxysmi breuioribus redeant interuallis. Qui enim aliarum rerum extra corpus humanum, præcipuè vini, cereuisiæ & musti ex pyris, pomis & aliis fructibus facti fermentationem & feruorem (cui meritò putredo febrilis assimilatur,) considerare voluerit, animaduertet, alia ad acetositatem, alia ad amaritudinem transire: & quæ ad amaritudinem tendunt, citius feruorem concipere; acida tardius effervescent: amaritudinis item motum breuiorem esse, acetositatis longiorem; licet amaritudinis calor maior sit. Hinc etiam accidit, vt ob salis acetosi fixitatem & coipulentiam, Quartanæ facilius transeant in hydropem, quàm tertianæ. Neque enim, vt Paracelsus sibi imaginantur, ex sale resolutio fit hydrops, sed si ex Chymicorum principiis hac de re loqui libet, abundat & excedit Salis *συνμάτωσιν*. Verum etsi hoc modo è Chymicorum principiis febrium intermittentiũ differentia explicari possint: hoc tamen monendum, cum sal ad putredinem & inflammationem aptus non sit, aliquid in vtroque humore præterea requiri, ob quod ad inflam-

mationem & putredinem aptus sit, sulphureum scilicet & *φλογιστόν*.

Ad bilem ergo amaram & atram seu acidam, aut quomodocunque appellare libeat, differentia febrium & earum periodi non ita incommode referuntur: & ex humore atro, & ialem acidum, aut certè fixum nimium continente, Quartana; ex bile seu amaro humore tertiana deducitur. Cum tamen horum humorum, & præcipuè bilis, aliqua differentia appareat, & nunc flaua, nunc viridis, nunc æruginosa vomitu reiciatur: si quis vni harum specierum etiam quotidianum circuitum tribuere velit, per me id licet; cum non parua sit inter eas differentia. Non tamen à pituitâ, aut certè pituitæ admixtione eam fieri impossibile est.

Verum an alij adhuc, quàm hi tres dentur Typi, Medici dissentiant. Galen. lib. 1. de differ. febr. cap. 8. negat, se vllam febrem, quæ vltra quartanum circuitum extenderetur, obseruasse: Et idem cum eo plurimi alij negant. Hippoc. verò, 1. Epid. comm. 3. text. 2. 7. & 17. talium febrium mentionem facit. In t. 2. enim scribit: *Nonnulla febres semiteretiana sunt, tertiana, quartana, quintana, septimana, nonana.* t. 7. *septimana longa est, verum non lethalis: nonana hac longior etiam, at non lethalis:* t. 17. *Præterea erratica febres, quartana, quintana, septimana & nonana quibus indicentur circuitibus, considerandum.*

Hoc verò nonnulli ita explicant, fieri quidem posse, vt aliqua febris, quæ prius quarto die semper redierit, ex inordinato viuendi modo, aut aliâ de causâ, non quarto, sed quinto, aut septimo die semel redeat: non tamen tales febres peculiarem atque integram periodum obseruare.

Verum referunt doctissimi Medici, de quorum fide non est quod dubitemus, se febres vidisse, quæ non semel saltem, sed per longum temporis spatium periodos quartanis longiores obseruârunt, Auicenna, lib. 4. fen. 1. tract. 2. cap. 68. scribit: *Retulit mihi siacilis quidam se vidisse nonanam. Quintanam verò nos multoties vidimus.* Nicolaus Florentinus, serm. 2. tract. 2. summâ 4. dist. 5. c. 9. refert, Gentilem vidisse febrem, quæ de decimo quinto in decimum quintum inuadebat. Cornel. Gemma, lib. 1. Cosmocrutica cap. 1. se vidisse quintanam & septimanam febrem refert. Franciscus Vallesius, lib. 5. contr. cap. 25. scribit, se multo antè, quàm Medicinæ studere cœperit, febrem octanam, in quodam sene, quæ multos annos durauit, conspexisse. Petrus Salius Diuersus, cap. 12. annot. in Alimmarum ita scribit: *Experientia mihi bis testata est, dari certò octanum circuitum, & octanam febrem. Alteram enim vidi in nobili Equite, non vltra 25. annum agente. Alteram in muliere quinquagenariâ.* Eiusdem rei exemplum etiam Amatus Lusitanus annotauit: Et Petrus Forestus, lib. 3. de febr. obs. 43. exemplum habet febris quintanæ.

Itaque etsi ipsi tales febres non viderimus: viris tamen fide dignis, qui eas se vidisse referunt, credendum. Vita enim brevis, ars longa; vt habet Hippoc. 1. aph. 1. neque facillè vni homini omnia morborum genera curanda obueniunt.

Porro de causis harum periodorum multi anxie disputant, atque illud eos maximè torquet, quomodo, cum tres tantum sint humores, plures possint dari circuitus. Ergo variam hinc humoris melancholicum aliis mixturam afferunt. Andréas Cæsalpinus, vt suprâ dictum, lib. 2. art. medica cap. 15. quintanas ad bilem, septanas ad melancholiam refert, statuitque tales rariores typos esse species simplicium typorum interpolatâ vnâ accessione aut pluribus; quintanam nimirum esse tertianæ speciem, in quâ tertia dies est sine accessione, septanam esse Quartanæ speciem interpolatâ accessione quarti diei: & accidere hinc idem, quod in menstruis,

An dentur  
febres pitui-  
tosæ inter-  
mitt.

An dentur  
febres quin-  
tana, septa-  
na, &c.

Chymico-  
rum princi-  
piis inter-  
mittentiũ  
differentia  
explicata.



fruits, quæ deficientia vno mense non moueantur tempore intermedio, sed expectant consuetum tempus. Quæ opinio etsi satis sit probabilis: tamen typorum horum causa non incommode ad humorem melancholicum referri potest. Sunt enim hæc febres omnes longæ, & tempore autumnali, ferè vt quartanæ, oriuntur. Non tamen peculiari humoris melancholici cum aliis mixturâ opus est; cum nullus humor detur, qui longiorem typum, quàm melancholia, excitare possit: sed iussit ipsa humoris melancholici diuersitas, qui, vt bilis etiam, non semper est eiusdem generis, & propterea etiam corruptio, quam patitur, non semper eadem. Vt mirum non sit, si ei ea proprietas induci potest, vt quarto die moueatur, etiam eam induci posse, vt longiore intervallo moueatur. Et vt in morbis epidemiis interdum raræ & mirandæ humorum corruptiones accidunt: ita in febribus intermittentibus talia quædam interdum accidere posse, absurdum non est.

Signa fe-  
brium in-  
termittentium.

Antequam autem ad species has febrium Intermittentium accedamus, in genere adhuc quædam de Intermittentibus monenda videntur. Et primò signa harum febrium quod attinet, docent plerique ex Galeno, 1. ad Glauco. capite 5. 2. de cris. capite 3. 2. de differ. feb. cap. 3. quod febres, quæ cum rigore inuadunt, ex eorum numero sunt, quæ per circuitum infestant: & ex hoc primò à biliosâ continuâ periodicâ intermittente distinguendas censent; quia continuæ cum rigore non incipiunt; in Intermittentibus autem fiat rigor, cum tertianis, tum quartanis. Verùm in tertianis in primo insultu cum vehementia rigorem accidere; quartanam verò non cum vehemente rigore incipere, sed post tempus magnitudinem illi aduenire docent. Et quidem per rigorem, cum quo tertiana inuadit, corpora quasi pungi videri, in quartanâ autem adesse magnum refrigerationis sensum. Quotidianam autem neque statim in primo paroxysmo, neque etiam post rigorem habere, sed solum refrigerationem aut horrorem antecedere. Et proinde tertianam notham etiam, cum non à bile solâ, sed à bile cum pituita aut melancholia mixtâ oriatur, non inuadere cum rigore, sed cum horrore.

Verùm contradicit huic sententiæ Simon Simonius, qui in Synopsi de humoral. febr. naturâ, capite 8. ita scribit: *Etsi in continuâ assiduo igne concalescente partes, minus priuari calore vel sentire malitiam commoti humoris possint: attamen continuas haud sanè paucas, tum priore accessione suâ, tum sequentibus exacerbationibus, non obscuri horrores indicia, propter largioris videlicet copiosiorisque, aut etiam malignioris humoris in cor vel circum præcordia motum conturbationem, præter vomitus molestiam, afferentes; vt contra tertianas quotidianasque & quartanas febres intermittentes aliquot, quæ nullo, vel aliquo illo quidem rigore, sed exiguo frigoris sensu, absque vomitu, & citra omnem corporis perurbationem, aggredi solebant ægrum, in ἀνυψία τamen aliquando puram illam; aliquando paulò minus integram desinentes, nostris nos auditoribus multoties, ex arteria corporisque tactu aliorumque omnium diligenti circumspectione obseruandas exhibuimus. Vt illud Galeno largimur, quod libro 2. de diff. febr. capite 8. docuit: Continuum febrem vt continuam, non habere rigorem aut horrorem necessariò adiunctum; ita febrium intermittentium propria indicia ista dici debere, quasi pathognomonica sint, quæque ex necessitate omnibus solisque eiusmodi febribus adsint, constanter denegamus. Et paulò post: Continuarum febrium ἀνυψία frigore & horrore succedentis paroxysmi non raro excipitur: Et contra intermittentes, quæ in perfectam ἀνυψίαν terminantur, multa absque euidente frigoris, ne dicam horrores, sensu, etiam ipsius ægri confessione rediisse visæ sunt. Hæc Simonius.*

Verum enim uero hæc quidem non sunt de nihilo, &

si quis ea, quæ in praxi quotidie occurrunt, diligenter obseruare & annotare velit, comperiet, plurimas dari febres, quæ videntur Intermittentes, tertianas & quartanas, quæ non solum absque rigore & horrore, sed sæpissime etiam sine frigoris aliquo sensu inuadunt.

Verùm sæpe febres tales potius continuæ sunt, vt facile ex pulu patet, quàm Intermittentes: & si sunt Intermittentes, non puræ illæ febres sunt, quarum Galenus ideam quasi proposuit, sed nothæ. In continuis verò natura quoque interdum, quod molestum est, mox in principio tentat expellere, atque eâ de causâ rigor excitatur; sed cum id assequi non possit, quia materia in venis cum probo sanguine adhuc permixta est, sæpe etiam viâ non patent, ab opere desistit, atque in reliquis accessionibus nullus rigor accidit; nisi forsan coctâ iam vel euictâ materiâ, & humoribus putridis ab utilibus separatis, vel etiam malitiâ materiæ stimolata natura iterum ad expellendum insurgat. Præterea videntur nonnunquam febres continuæ, quæ tales suâ naturâ non sunt, sed ex accidente; cum scilicet antequam vnus paroxysmus absolutus est, nouus succedit.

Deinde in genere quædam de curatione Febrium Intermittentium tradi posse videntur. Etsi enim materiâ, & proxima causâ discrepent, & eatenus qualibet peculiarem curationem desideret: tamen cum loco, in quo materia generatur & putrescit, & præterea solutione, quæ fit singulis paroxysmis, conueniant: non pauca sunt, in quibus curandi febres has ratio conuenit. Etenim in primâ corporis regione & venis mesaraicis ac vicinis locis materia febrem produciens primò colligitur, putredinem concipit, & hinc in venas & totum corpus diffunditur, tandemque per sudores aut insensibilem transpirationem discutitur, atque ita paroxysmus cessat. Relinquitur verò post paroxysmum, vt Galenus, 2. de diff. febr. cap. vlt. tradit, duplex in corpore vitiosa διαβροσις; vna inquinamentum quoddam aut σπυρσώδες σπέρμα, ex humore in præcedente paroxysmo relictum; altera membri excrementitios humores generantis debilitas. Hinc accidit vt pars hæc ob debilitatem superfuitates generet; quæ & ab innato vitio, & à putredine solò inquinamento seu fermento à priore paroxysmo relictò, initium putredinis concipiunt, atque ita nouus paroxysmus oritur. Idque tamdiu durat, donec & illa dispositio ac partis debilitas, excrementitios humores generans, sublata, & fermentum illud ac σπυρσώδες σπέρμα, humores inquinans, planè discussum sit.

Ex his ergò omnibus apparet, cum initium generationis & corruptionis humorum febrem producentium sit in primis viis, commodissimè fieri, si humoris, qui primum vitium concipit, expurgetur, antequam reliquum sanguinem corrumpat, & vitiosam dispositionem ac debilitatem parti inducat, quod fit rectissimè per aluum purgantibus & vomitoriis. Atque experientia testatur, nonnunquam vnico medicamento purgante, vel vomitu, seu à natura seu arte concitato, vitiosis humoribus reiectis, febrem planè cessasse.

Imò vulgus non raro statim in primâ inuasionem interdum sudorifera exhibere solet, & curandi istâ ratione, etsi non satis cautâ, interdum febres, dum hoc modo σπέρμα illud σπυρσώδες discutitur, tollere obseruatum est. Verùm cautè in istis euacuationibus procedendum, cum non omnium febrium intermittentium eadem sit ratio. Nam cum humor ille vitiosus & excrementitios febris causa in mesaraicis sanguini permixtus sit, etiam cruditas & coctio quædam suo modo necessaria est, quâ humores vitiosi à bonis separantur, & ad euacuationem apti reddantur. Idque sæpe breui tempore in febribus biliosis accidit, & humor biliosus aliàs ad motum satis aptus est. In quartanis

Curatio febrium intermittentium in genere.

tanis verò, in quibus humor contumacior est, de Galeni quidem consilio, 1. ad Glauco. cap. 11. nullum forte medicamentum ab initio facillè exhibendum, & Quartana ab initio leniter tractanda. Si tamen signa bona adsint initio, vomitu & alui purgationibus Celsus, lib. 3. cap. 16. periculum facit, antequam inualescat. Et omnino sudorifera tutò non exhibentur, nisi prius euacuationes præcesserint. Si enim multi vitiosi & excrementitij humores adhuc in primis viis consistant, facillè fieri potest, ut sudoriferis intempestivè exhibitis ad alias nobiliores partes detrudantur, & malorum granium, & quæ plus periculi, quàm ipsa febris afferant, causa fiant: obleruatũrque quotidie à Medicis, atque annotavit illud D. Iacobus Oetheus, in observ. Schenck. lib. 6. obs. 60. multos, necessariis euacuationibus in principio intermittentium neglectis, plurima incommoda sibi attraxisse, & in varios abscessus, maxime verò coxendicium dolores, in impetigines fœdas, in icteritiam cum hydropo coniunctam, in insanabiles colicos dolores, quos tandem epilepsia & paralyse, aut arthritides secutæ sunt, item in tabem ac convulsionem incidisse.

Venæsectionem quod attinet, dicitur de eâ in specie postea suo loco. In genere tamen hoc notandum, à causâ febrium intermittentium primariâ, quæ in venis melsaraicis generatur, & maximam partem hæret, eam non indicari; cum venarum, quas secamus, nulla ex iis euacuet: quia tamen interdum sanguis in venâ causâ simul abundat, qui facillè corrumpi, ac vitiosis humoribus inquinari, & à naturâ febre debilitatâ satis regi, si copiosior sit, non potest, & progressu morbi subinde aliquid peccantis materiæ in venam causam transit, ac sanguini permiscetur: habet quandoque locum venæ sectio, quæ tamen non mox initio & ante primarum viarum euacuationem instituenda est.

Euacuationibus his si febris non tollatur, danda opera, ut causâ recursus paroxysmorum tollantur, & propterea duo omnino agenda, ut illa dispositio & debilitas partis vitiosos humores generans tollatur; quod fit alterantibus, quæ simul & humoris vitium emendant: & inquinamentum illud ac *μίσμα* ex humorum putredine relictum discutiat. Et si ea, quæ in febribus hisce accidunt, obleruemus, videtur illud *μίσμα* & *πρίττωμα σπινδυνώδες* sæpè quidem esse mole exiguum, sed vi maximum, vtpote quod primaria paroxysmi causa est, & quo discusso paroxysmus cesset. Id quod interdum à naturâ fieri solet, quæ id è venis expellit, dum circa labia, nares, & alias faciei partes pustulæ excitantur, *Vuenn der Mund oder die Nasen aufschleget*, quæ etiam à vulgo, quem experientia id docuit, febris iam cessaturæ indicium habetur. Imò non solum circa labia & nasum ac in facie, sed & in aliis partibus interdum eiusmodi pustulæ erumpunt. Ita memini studiosum febre tertianâ liberatum, dum pustulæ tales parvæ in toto digito tertio seu maiore erumperent.

Tollitur autem id *μίσμα* commodissimè sudoriferis: Vnde apud Germanos nostros plures pulveres ex carduo benedicto, dictamno, tormentillâ, pimpinellâ, cornu cerui, gentianâ & similibus, & alia sudorifera sunt in usu, quæ procul dubio nihil aliud faciunt, nisi quòd illud inquinamentum, fermentum & *πρίττωμα σπινδυνώδες*, seu in melsaraicis seu in venâ causâ contentum, discutiant. Et frustra purgantibus sæpè ægri macerantur; nisi dispositio & debilitas partis humorum vitiosum generantis, ac inquinamentum illud humores corrumpens tollatur. Sempèrque præstat, vitiosos humores non generari, quàm genitos euacuari.

*Febrifuga.* Dantur tamen & alia quædam medicamenta, quæ & à Medicis & à vulgo nonnunquam vsurpantur, quæ paroxysmos Febriles tollunt & propterea Febrilia, &

*πρίττωμα* & specifica febrifuga appellantur, quæ tamen sudores non mouent, sed aliò procul dubio modo illud *μίσμα* & per consequens paroxysmum tollunt: qualia vulgò sunt, pulvis è cochlearum testis à Crollio descriptus, & mulierculis etiam dudum notus, inprimis pulvis è conchis margaritifera seu matre perlarum calcinata, à Scrup. j. ad Scrup. iij. Pulvis è canceris fluuiatilibus vstis, & præcipuè ex oculis dictis paratus. Quis autem ille modus sit, ab authoribus non explicatur. Ut quod mihi videtur dicam, talia medicamenta præcipitatione quadam vim illam effertescendi, & paroxysmum excitandi in humoribus tollere videntur. Cuius rei documenta passim occurrunt. Ut iam non dicam de eo, quod cerevisiæ aculentis vitium cretâ iniectâ à vulgo emendatur, & acetum aciditatem cretâ iniectâ amittit, ac Spiritus vitriol. cum sale tartari mixtus aciditatem perdit: manifestum huius rei argumentum est in ardore stomachi, quem Germani *den Godt* nominant, cum à bilis in ventriculo ebullitione vapor quidam & flatus ardens attollitur, & dolorem ac ardorem in orificio ventriculi & œsophago excitat. Ad quem affectum tollendum cretam, oculos cancri, bolum armenum & similia, quæ acris & acutis liquoribus acrimoniam præcipitatione quadam adimunt, vsurpari, vulgo etiam notum est.

Tutò tamen talia non exhibentur, nisi humores vitiosi, & qui causâ antecedentis rationem habere possunt, prius tollantur. Aliàs enim, qui à naturâ in paroxysmo stimulatâ expelli poterant, in corpore relinquuntur & postea cachexiæ, hydropis, icteri, doloris colici, & aliorum granium malorum causa esse possunt.

Applicantur & extrâ quædam medicamenta ad intermittentes febres tollendas, ex telis araneorum, & oleo araneorum & vesicatoribus quibusdam & similibus, quæ postea de tertianâ proponuntur, quæ procul dubio id quod præstant, *μίσμα* seu inquinamentum illud febrile extrahendo & euacuando præstant, de quibus postea in specie diceretur. Et cum, ut Scalig. exercit. 218. sect. 6. docet: In Zeilam fluvius Arotan pisces habeat, è quorum numero vnum, si quis manu capiat, continuo febre corripitur, amisso pisce statim liberatur: quidni etiam talia dari possint, quæ *μίσματα* illa febrilia è corpore euacuare possint?

Est è recentioribus Chymicis Angelus Sala, qui, in *ternario bezoard. cap. 22.* in eâ est sententiâ, materiam, quæ febris quartanæ causa est, (eadem ratio esset tertianæ) primò quidem in stomacho & primis viis cumulari; in quartanâ verò confirmatâ in venis hospitari, non in primis viis; eâ de causâ, quòd quartana confirmata tollatur medicamentis externis, ex telis araneorum, apio, rurâ, & similibus, quæ carpis imponuntur; internisque ut theriacâ, mithridatio, spiritu vini cum zinzibere, pipere & similibus, quæ sanguinem agitant, spiritus alterant, & sudorem cient. Non verò consistere in primâ corporis regione, idè quòd epithemata ista pulsibus applicata ad profundas istas corporis partes penetrare non possint; ac quòd purgantia medicamenta Quartanas confirmatas non tollant.

Quâ re persuasus ipse in principio quidem humores vitiosos, antequam massam sanguinis coinquinarent, purgare iubet. Si verò inueterata iam sit quartana, primis viis leniter euacuat, iis quæ meatus cutis aperiunt, sudorẽque cient, curam absoluendam putat.

Verumenimverò, si per istam subtilem & in sanguine hospitantem materiam, cuius motu paroxysmi efficiantur, intelligit illud inquinamentum, quod post paroxysmum relinquitur; & Galenus *σπινδυνώδες πρίττωμα* nominat, atque etiam *σπινδυνώδες* fermentum appellare possumus: in eo non malè loquitur. Putridos

tridos enim humores in venis etiam in Intermittentibus contineri, antea etiam docuimus, testanturque id cum alia, tum sudores in declinatione erumpentes, & sanguis venæ sectione emissus: & fomitem illum, à materia, quæ præteritâ accessione computruit, etiam in ipsis venis relinqui, docet vrina, è quâ post paroxysmum de coctione & cruditate, & ex eius sedimento de actione naturæ in materiam febrilem præcedente paroxysmo factâ iudicare licet. Testantur idem & pulvis, qui in febribus Intermittentibus etiam post paroxysmum inæqualitatem retinent, de quâ Galen. 1. ad Glau. c. 5. & alibi.

Verum non tota tamen ibi semper continetur materia: sed plerumque multo maxima pars, & quod crassius est, in venis mesaraicis & locis vicinis hæret: id quod dolores hypochondriorum, inflationes & tumores, & in febribus diuturnis subsequentes cachexia & hydropes satis docent.

Quapropter concedimus quidem, nonnunquam in declinatione febrium id accidere posse, atque & à me & ab aliis Medicis plurimis obseruatum, externis eiusmodi apposis febrem finiri: non tamen semper hoc accidit. Euenire nimirum potest, vt illa dispositio vitiosum humorem generans sublata sit: neque etiam amplius in primis viis aliquid de *stomacho* illo inquinamento & fermento hæreat, sed in venis aliquid eius adhuc reliquum sit: tum ergo medicamenti eiusmodi extrâ applicatis illud euocari, & febris cessare potest: sicut & à natura nonnunquam idem tentari videmus, dum vlcusculis, vt antea dictum, circa labia erumpentibus febris finitur. Et hæreere tandem materiam febris causam etiam in ipsis venis, vel ex eo patet, quod venâ sectâ quandoque paroxysmus statim tollitur: cuius rei exemplum habet And. Spigel. lib. 1. de semit. c. 15. Idem docet Scabies, quæ si erumpat, febres & tertiana & quartana cessare solent; Scabiæque euanescente Recidivæ fiunt. Vbi certa materia è venâ cauâ in cutem protruditur, & vbi Scabies euanescit, non credibile est, materiam illam ad venas vsque mesaraicas, sed solum ad cauam recurrere. Et *videtur* talia in venis & reliquo corpore diu contineri, & certis interuallis moueri & paroxysmorum authores esse posse, epilepsia, venenum canis rabidi, vt & inquinamenta post alia venena in corpore relicta, satis testantur, quæ & ipsa sæpe statis periodis moventur. Verum si materia febris, adhuc copiosa in venis mesaraicis & vicinis locis hæreat & suppeditetur, frustra talia externa, vt & sudorifera, exhiberi; ipsa experientia testatur. In primis nihil talibus proficitur, si accedant pertinaces viscerum obstructions, à quibus febres prolongari posse, iam antea dictum.

## CAPVT XVIII.

### De Tertianâ Intermittente.

*Tertianâ  
intermittens.*

**F**ebres biliosæ frequentissimæ sunt, adeo vt nonnulli in eam sententiam venerint, omnes febres à bile ortum habere. Sunt autem duorum generum. Aliæ quidem continuæ, quæ ardentes & tertianæ continuæ vulgò nominantur, de quibus suprâ dictum. Aliæ intermittentes, de quibus iam agendum est, quæ quia plerumque tertianam periodum obseruant, vulgò tertianæ Intermittentes nominantur. Cum autem dicimus à bile has febres prouenire, non intelligimus sanguinem biliosum, seu quartam illam massæ sanguineæ partem, quæ ob tenuitatem, caliditatem & siccitatem, atque ita conuenientiam, quam cum bile excrementitiâ habet, vulgò etiam bilis appellatur: sed humorem excrementitium, & de quâ etiam iam diximus. Hæc enim in primis viis collecta, vt à naturali calore amplius gubernari & conseruari non pos-

sit, putrescit, & febrem hanc excitat.

Est autem quædam harum febrium differentia. Nam primò bilis, è quâ febres hæc generantur, non est eiusdem generis. Interdum enim est bilis naturali illi, quæ in vesiculâ fellis colligitur, similis; aliquando verò præternaturalis, viridis vel æruginosa, qualis etiam in febricitantibus interdum per vomitum vel aluum reiiicitur. Deinde bilis vel sola putrescit, vel alium humorem habet admixtum, pituitam vel melancholiam. Illa puram, hæc notham tertianam constituit. Differunt etiam ratione durationis. Nam si paroxysmi ultra 12. horas non extendantur, tertianæ puræ solent nominari; si verò paroxysmus ultra 12. horas extendatur, non amplius tertianæ exquisitæ, sed vel tertianæ simpliciter, vel nothæ appellantur. Et quantum paroxysmus ultra 24. horas extenditur, tertianæ extenæ dicuntur. Accidit autem hoc ob humoris vel tenuitatem aut crassitatem, vel copiam aut paucitatem. Quod enim bilis est tenuior vel paucior, eo citius discutitur: quod verò crassior, aut cum crassis humoribus magis mixta, vel copiosior, eo diutius durat paroxysmus.

Verum de humorum cum bile permixtione authores dissentiunt. Galenus enim tantum tertianam ex bile cum pituita mixtâ nominat, neque in lib. de diff. febr. neque 1. ad Glau. neque in 2. de cris. neque passim in Hippocratis expositione alterius mentionem facit. Verum recentiores plerique etiam tertianam ex bile cum melancholia mixtâ proponunt. Si enim, inquiunt, bilis potest misceri cū pituita: cur non etiam cū melancholiâ permisceri possit. Sed hæc sese opponunt alij, & Galenum non oscitantiam aut negligentiam quadam has febres præterisse putant, sed ideo quod nullæ vnquam dari possint. Primò enim dicunt flaua bilis & melancholia in diuersis, imò oppositis partibus locum habere: hæc in liene, in sinistro hypochondrio; illa verò in dextro, in folliculo fellis. Idcoque ita facile misceri non possunt. Pituita verò facile bili misceri potest; cum omnes illas partes, in quibus bilis solet colligi, in primis hepatis cauum & mesenterium, permeet & præterlabatur. Deinde febres illæ nothæ sunt, cum duo humores ita permiscantur, vt ex iis vnus humor fiat, (nisi enim hoc fieret, vnica periodus non fieret, sed potius duæ febres.) Cum autem mixtio sit miscibilium alteratorum vnio: impossibile esse putant, vt inter omnium crassissimum & tenuissimum succum talis intercedat vnio, sicut prolixè hac de re disputat Eust. Rud. l. 3. pra. c. 27.

Verumenimverò impossibile non videtur hosce duos humores misceri, quamuis rariùs à bile cum melancholia mixtâ, quàm à bile cum pituita mixtâ febres proueniant. Nam etsi hepar & lien locis distendant: tamen, vt Hippoc. habet, est mutuus confluxus & consensus partium, & præcipuè in febribus humores ex parte vnâ in alteram facile transire videmus. Et licet diuersas habeant qualitates bilis & melancholia: tamen ambo humores sunt, id est, talem naturam habent, quæ facile misceretur.

Vbi autem ista bilis generetur, authores non idem sentire videntur. Nonnulli enim legitimas tertianas ex bile, naturali illi quæ in vesiculâ fellis colligitur, simili fieri statuunt; quæ verò à præternaturali, qualis est vitellina, porracea & æruginosa fiunt, nothas appellant. Verumenimverò cum bilis illa naturalis non tam generetur in secundâ coctione, quàm, vt inutilis ad alendum corpus, separetur: non negandum, ex cibis humori bilioso generando aptis, vt & ex ventriculi, in quo cibi bilescunt, vitio, mox in mesaraicis ob copiam talem humorem colligi. Cur verò febres, quæ à viridi & æruginosa bile proueniunt, nothas appellare debeamus, causam non video, cum nullum alienum humorem admixtum habeant; imò febres longè ardentiores, quàm bilis flaua, generent. Dubitant quidem nonnulli,

*Tertianâ  
intermittens  
purâ  
ferens.*

*Tertianâ  
nothâ.*



nonnulli, an ex bile vitellina, porracea & præcipue æruginosa Febris Intermittens fieri possit, ut videre est apud Conciliatorem, *differ. 91.* cum bilis æruginosa quali venenum sit, quod hominem subito jugulet. Verum testatur ipsa experientia, talium humorum, vel per vomitum, vel per aluum reiectione interdum ægros à febribus tertianis liberari. Verum febres, quæ ab iis excitantur, longè grauiores sunt, quàm quæ à bile flaua fiunt, & sunt pleræque febres ex ardentes, de quibus pluribus agit Franc. Valeriolæ, *lib. 4. enarrat. 33.* ubi ipsa experientia & suis obseruationibus probat, dari tales febres è bile porracea & æruginosa, & bilem hanc vtramque non solum in ventriculo è prauis alimentis, sed etiam in hepate & venis ab earum calore nimio generari, simulque rationem curandi has febres tradit, quæ cum iis, quæ supra de febre ardente diximus, conferri possunt.

Causa febri  
tertiana.

Causæ ergo febrium biliosarum Intermittentium sunt, quæ bilem excrementitiam generare valent; intemperies nimirum corporis, inprimis hepatis & ventriculi, calida & sicca, ætas iuuenilis, ætas ac calida & squalida aëris constitutio, vigilie, curæ, ira, inedia, ciborum calidorum & biliosos humores generantium, potus calidi, ut & medicamentorum calefacientium nimius usus, labor & exercitia nimia. Cum autem plures bilis species esse dixerimus, flaua bilis inprimis in hepate calidiore & sicciore colligitur, & hinc in primas vias regurgitat: non tamen impossibile esse, etiam in metastasis, ob ciborum vel ventriculi vitium, colligi, modò diximus. Porracea autem & æruginosa etsi in vasis, etiam ob nimium calorem: tamen & in ventriculo ex prauis cibis producit. Inter causas autem febrium harum non solum numerandæ sunt eæ, quæ bilem generare & multiplicare, sed etiam quæ genitam in mesenterium vel attrahere vel impellere possunt. Vnde febrium tertianarum differentia oritur, prout ex hac vel illa causâ, fortiore vel debiliore, & ex hac vel illa bilis specie oriuntur.

Causa ter-  
tiana notha.

Causis bilem generantibus si conjungantur causæ pituitam & melancholiam gignentes, fiunt tertianæ nothæ. Ut enim sit exactè pura tertiana, omnes causæ bilem generantes concurrant necesse est, corpus calidum & siccum, ætas iuuenilis & consistens, aër ambiens calidus, victus ratio calefaciens & siccans: quarum si vna deficiat, febris non erit exactè pura. Hinc si causæ bilem generantes incidant in senem, hominem habitus crassioris, in otio viuentem, crapulæ deditum, aut qui quacunque de causâ crudos humores in ventriculo, intestinis, pancreate, cumularit, fiunt nothæ febres biliosæ. Quæ ideo etiam diutius durant & protrahuntur, quod fomitem ab illis crudis humoribus suscipiunt. Itæ sæpe tempore ætatis crudi humores ex defectu caloris interni, vel copiâ potus, vel crudorum fructuum usu generantur, qui bili mixti nothas biliosas pariunt. Sic autumnus, etsi alias affectus melancholicos soleat generare: tamen quia ætatem excipit, tertianas non raro generat: vnde ab Hippocrate scriptum, *3. aph. 22. Autumno plurimi æstius morbi sunt*; manente scilicet, ut Galen. *in com.* habet; per id temporis adhuc humore æstiuo, nimirum flaua bile: cui accedens melancholicus humor facit nothas eas febres. Atque ita etiam à naturis biliosis, vel victus ratione, vel aliâ de causâ, aliquid humoris pituitosi aut melancholici colligi potest. Vnde tertianæ exquisitæ admodum raræ sunt: & quæ ab Antiquis describitur, Idea exquisitæ tertianæ est, ad quam quæ propius accedit febris, pro tertianâ exquisitâ habetur: quæ longius abest, pro nothâ.

### Signa diagnostica.

Signa tertianæ Intermittentis exquisitæ quod attinet, egit de iis diligenter Galenus, *2. de sympt. caus. cap. 5. 2. de differ. febr. cap. 3. 2. de crisib. cap. 1. & 1. ad Glauc. cap. 5.* Primò febres hæ statim cum vehementi rigore carnem quasi pungente incipiunt. Quo ipso non solum à continuis, sed & aliis intermittentibus differre, cap. præcedenti diximus. In quotidianis fortis rigor non accidit, sed levis horror aut frigiditas: In quartanâ primâ die rigor fortis non accidit, sed in progressu augetur. Itaque ubi in primâ accessione animaduertitur vehemens rigor, certò affirmari potest, esse febrem tertianam intermittentem puram & legitimam. Accidere tamen potest, ut in initio tertianæ etiam puræ sit rigor exiguus, ubi scilicet materia non confestim mouetur, & est in minore copiâ. Quod si accidat, non statim pronunciandum, non esse puram tertianam, sed etiam reliqua signa perpendenda. Non enim vnum signum sufficit, sed tota signorum syndrone consideranda.

Signa tertiana  
Intermittentis.

Deinde ubi rigor cessat, mox oritur calor multus, acer & mordax, atque in vigore æqualiter quoquo versum extenditur. Si tamen manus diutius admoveatur, calor, qui primo occurso acer & mordax sentiebatur, mitior apparet, & manu superatur. Bilis enim flaua, cum tenuis sit, statim discutitur, & mox ad summum vigorem peruenit. Hinc laborantes ita exuruntur, ut corpus nudent, spirandi difficultatem sentientes, magnum multumque spiritum ducant, siti crucientur, & frigidam subinde expectant, vigilis, sæpe etiam capitis doloribus, & præcipue circa statum deliriis infestentur.

Pulsus, cum paroxysmi inuadant, sunt parui, debiles tardi, ac rari; non tamen parum à pulsu quartanæ differunt. In quartanæ enim principiis arteria videtur quasi alligata esse, atque ad interiora retracta, neque liberum habere ascensum, & quamuis æger sit iuuenis, talis tamen est motus arteriæ, qualis est senum: In tertianâ verò nihil tale percipitur, tarditasque ferè similis est ei qui secundum naturam est, motui. In crescente jam paroxysmo pulsus mox vehementes, veloces, frequentes, atque alio modo duri euadunt, omnisque inæqualitatis, præterquam febrilis, experies, ob tenuitatem materiæ, quæ facile inflammatur, & quia non minor est refrigerij per diastolen, quàm expellendarum fuliginum per systolen necessitas. Quod si ubi jam febris remiserit, illa febrium propria in arteria, tum motu inæqualitas relinquatur, certissimum est tertianæ seu febri biliosæ intermittentis signum. Oritur autem hæc inæqualitas febrium propria, in quâ nimirum dilatatio contractione arteriarum velocior est, ex caliditate illâ præternaturali, quâ prædita est portio illa biliosi humoris, quæ post paroxysmum in foco putredinis relinquatur, & tertio die rursum noni paroxysmi causa futura est. Cum enim hæc caliditas successiue reliquis humoribus communicetur, & ita ad cor perueniat; inæqualitas illa febrilis in pulsu remanet eò usque, donec ex caliditate rursum noua putredinis quoddam principium apparet. Tunc enim pulsus in oppositam transit inæqualitatem, in quâ contractio velocior est. De hac inæqualitate putredinis propriâ scribit Galenus, *de differ. febr. cap. 3.* quod tempus intermissionis in hac febre nullum habet humoris putrescentis ex pulsu perceptibile signum, in die ac nocte, quæ consequitur paroxysmum; cum verò parumper succenditur, vix agnoscitur potest in primis diei ac noctis subinde sequentis partibus; manifestius proximâ, quæ accessionis diem ac noctem antecedit. In illâ verò jam signum euidentius apparet, ac multò etiam magis accessione incipiente, atque adhuc magis plus jam incalcescente febre. Cum verò iam consistit, minus, quàm cum augebatur; multo verò

Pulsus in  
tertiana.

minus, ubi jam declinat. Post quotidianam autem febrem paroxysmum, quia brevissimum habet interval- lum, & semper aliquod putredinis vestigium remanet: inaequalitas non ita febrium, sed putredinis propria in pulu relinquitur. Post quartanam vero intermissionem inaequalitas febrilis in pulu non relinquitur, quia humor natura sua frigidus est, & vix perceptibilis ex pulsu est illa caliditas, quae in foco relinquitur, & post longum tempus inentibilis demum euadit.

Vbi jam ad statum paroxysmi peruenit, tum jam bibendi tempus adest, & post potum vapor plurimus percutem erumpit, superuenit bilis vomitus, qui ta- men saepius mox post rigorem accidere solet, venter soluitur, biliosa minguntur, horum etiam plura eno- niunt. Sudor jam incipit vaporosus & calidus, qualis in balneis, sudatque totum corpus aequaliter, pulsus- que talis est, qualis in iis, qui cum sani & validi sunt, exercentur, balneo vtuntur, velox nimirum, magnus & vehemens.

*Urina.*

Urina est subrufa aut subflaua, consistentia medio- cris, & paulo post vel nebulam albam vel enzorema habet, quae tum etiam ultra quatuor paroxysmos non durat. Si autem urina sit rubicundior, & neque nebula primo circuitu appareat, neque sublime ali- quid, seu suspensio aliqua: ad septimum vsque circuitum extenderetur.

Quae autem omnia supradicta signa, ac mox primo die in urina subsidentiam lauem & aequalem habue- rit, ea exquisita est, & ultra tertium paroxysmum non extenderetur.

Ex causis etiam, quae praecesserint, sumuntur signa. Accidunt tertianae frequenter tempore anni aestivo, & regione ac coeli constitutione calida, aetate iuveni- li, eosque inuadunt potius, qui exercentur, quam qui vitam otiosam & quietam agunt; sicut & eos, qui diu vigilant, aut in ediam patiuntur.

Paroxysmi tempus ultra horas duodecim non du- rat. Nonnunquam nouem aut septem horis, aut etiam citius terminatur, proit causa breuioris vel longio- ris paroxysmi adfuerit.

Denique in hac febre etiam reliqua adsunt signa, quae ipsi cum continuo biliosis sunt communia, vt vi- gilae, oris amaritudo, & siccitas, sitis, appetitus deje- ctio, & similia.

*Signa terria-  
nam ex iust.  
tam a septu-  
d. s. oruentia.*

Vt febris tertiana notha ab exquisita differt causis: ita etiam signis. Inuadit enim febris haec notha cor- pora ea, quae plane biliosa non sunt, & sinceram bilem non cumulant. Hinc quamuis adolescentes fre- quenter inuadat: tamen non eos, qui biliosi sunt, sed qui inordinata dicta vtuntur, ex qua eibi non bene coquantur, & humores pituitosi aut melancholici vna colliguntur. Inuadit etiam non solum aestate, verum frequenter vere, autumno, imò etiam hyeme. Ca- lor quoque non similis est exquisitae sed minor: ne- que etiam confectum per vniuersum corpus diffundi- tur. Non soluitur hac febris flauae bilis vomitu, ne- que per sudores, sed humidi quidam vapores pauci exeunt in declinatione, ex quibus febris remit- tit, ac vix intermittit. In hac enim febre bili admix- ti sunt crassiores humores, qui neque per superiora facile rejici, neque etiam per angustos cutis meatus discuti possunt. Sudores quidem interdum accidunt in paroxysmis, sed ij vel vniuersales non sunt, vel si vniuersales sunt, parum tamen iuuant, & fe- brem non tollunt. Interdum tamen, sed rarius atte- nuatis illis crassis humoribus, & expurgato corpore, sudores critici accidunt. Urina non est adeo tenuis & ignea, vt in exquisita, neque in ea tam cito coctionis signa apparent, vt in exquisita, sed demum post septi- mum paroxysmum. Pulsus initio est durus, & durities illa indies augetur, saepe vsque ad septimum, vbi ad magnam duritiem peruenit. Deinde sensim mollior euadit, minoresque sunt accessiones, & urinae magis

coctae apparent, mediocremque subsistentiam ha- bent. Ex eadem etiam causa, quia humores crassi te- nuibus permixti sunt, paroxysmi in hac febre sunt longiores, & saepe 12 horas excedunt, & ad horas 18. imò quoque plures extenduntur. Terminantur non septem periodis, sed aliquando vsque ad 14. aliquan- do vsque ad 20. pertingunt.

Hoc autem loco quaeritur à nonnullis, an etiam nothae tertianae, seu biliosae febris paroxysmi horis 10. 11. vel 12, terminari possint. Nonnulli quidem plane impossibile esse existimant, tertianam notham intra horas 12. terminari. Verum & experientia id testatur, & rationes euidentes suadent. Nam cum breuitas pa- roxyimorum accidat ex paucitate & tenuitate mate- riae, ac virtutis robore; si humor putrescens sit pau- cior, virtus fortis, nihil ob stare videtur quin paroxys- mus horis 5. 7. 10. 12. pro varietate harum causarum, terminari possit.

Considerandum etiam est, in quo loco praecipue generetur bilis. Si enim in hepate generatur, ade- runt signa hepatis calidioris, & urina magis tincta apparet, neque error aliquis in victu praecessit, ob quam bilis porracea in ventriculo generari potuerit. Si vero in ventriculo generatur bilis, vel ob eius caliditatem, vel ob alimenta, quae in bilem facile degenerant, aderit vomitus bilis, urina ratione calo- ris febrilis etiam intensioris non ita tincta est.

Et si vero semper à venis mesaraicis aliquid materiae febrilis per venas in ambitum corporis propellitur: ta- men interdum etiam magna ejus portio per alias vias ejicitur, id quod ex urina, vomitu, & alui deje- ctione cognoscitur. Interdum etiam magna pars ma- teriae in venis mesaraicis subsistit, nec in paroxysmo euacuatur. Nam si materia per venas maximè ex par- te euacuatur, non fit vomitus, aut si fit, non copio- sus, nec paroxysmus per eum minuitur, urinaeque ra- tione febris mutantur. Si vero materia tota non in ve- nas transmittitur, accidunt vomitus, alui dejectio- nes, atque inde paroxysmus minuitur, urinae etiam non mutantur pro ratione febris. Quod si materiae ma- gna pars in venis mesaraicis subsistit, nec rigor, nec vomitus, nec sudor apparet, & febricitantes circa praecordia angustiam & dolores percipiunt, vnde saepe etiam inflammationes iis in locis excitantur.

### Prognostica.

Signa Prognostica quod attinet, sunt haec febres fe- brium putridarum ferè frequentissimae, eademque se- curissimae. Vnde Hippocrates, 4. aph. 43. scribit: *Quaecunque febres non intermittentes tertio die fortiores sunt, magis periculose sunt: quocunque autem modo in- termiserint, periculum abesse significant.* Neque etiam diu durant. Nam quae legitimae sunt, vt Hippocrat. 4. aph. 59. habet, septem circuitibus ad summum judi- cantur. Et quidem ad summum dicit Hippocrates. Si enim materia sit tenuior aut paucior, nonnunquam in tribus aut quatuor periodis absimitur. Hoc tamen in- telligendum est, si rectè curentur, & error nullus ab aegro committatur. Nam si error aliquis committatur, non solum curatu difficiles fiunt, sed & in morbos le- thales degenerare possunt. Cuius rei exemplum pro- ponit Galenus, 1. ad Glauc. cap. 9. dum refert, quen- dam deprauato iudicio balneis vsus, extenuato cor- poris habitu, in tabem lethalem coniectum fuisse.

Tertianae vero nothae, vt sunt frequentes, ita sunt periculosiores. Nam intervallum plerumque est bre- uius, vnde aegri magis affliguntur. Difficilius quoque curantur propter bilis vel pituitae admixtionem. Hu- mores enim hi non solum crassiores sunt, & difficilius remediis cedunt, sed & indicationes praebent con- trarias. Cum enim ratione bilis refrigerare & hume- ctare oporteat, calefacere & siccare oportet ratio- ne

*An notha  
tertiana in  
12 h. terminari  
possit.*

ne pituitæ, calefacere & attenuare ratione melancholiz. Febres etiam ipsæ longius durant; raro quatuordecim periodis judicantur, sed sæpe ad 40. diem extenduntur; nonnunquam durant ad menses sex, & deficiunt in vitia hepatis vel lienis, vel etiam à virtutis hepatis vel lienis fouentur & diuturnitatem inde accipiunt. Sunt tamen ex nothis tertianis quædam, quæ quinto vel septimo paroxysmo terminantur: si nimirum materia sit paucior, & vtilia medicamenta tempestiue exhibeantur, vt modò dictum. Et licet Galenus, 2. prognostic. tex. 8. peiores affectiones esse dicat, quæ oriuntur ab humore sincero, quàm quæ à mixto: tamen id saltem verum est de symptomatibus. Hæc enim, vt etiam Auicennas, in cap. de tertianâ nothâ, testatur, sunt mitiora in tertianâ nothâ, quàm in purâ; cum pituita calorem & acrimoniam bilis obrundat. Longior tamen & curatu difficilior est tertiana nothâ, quàm pura.

Verum licet tertianas febres Intermittentes omnium putridarum breuissimas & securissimas esse, vulgò tradatur: quia tamen Ludouicus Mercatus, lib. de febr. 6. experienciâ sibi compertum scribit, etiam tertianas nonnunquam periculo non carere, & febres etiam Intermittentes inopinatò ægros non paucos perdidisse, breuiter complecti libet, quæ ille annotauit.

### De Tertiana perniciofa.

Pluribus autem modis Tertianam periculosam, imò lethalem fieri posse statuit.

Primò, si humor, quem natura è vasis extra vasa mittit, in membrum aliquod præcipuum decumbat. Quod quidem euenit, vbi vel vasorum corporis extremitates aded vel obstructæ, aut oppressæ sunt, vt natura per eas liberè humores vitiosos non possit expellere, vel virtus est debilis. Vnde accidit, vt quem è vasis maioribus conatur humorem natura depellere, ad partes internas per proxima vasa transmittat, nunc in venas juxta cor, nunc ad orificium ventriculi, nunc ad caput, nunc ad hepar; id quod ex signis membra illa affecta demonstrantibus constat.

Secundò, quando humor, qui è venis rejicitur, tenuis admodum est & summè putridus, qualis est bilis copioso ichore plena. Vnde accidit, vt qui tali febre laborant, frequenter syncope corripiantur, sudore nimio dissoluantur, & facillè virium jacturam patiantur. Itaque tales ægri vel leui corporis motione animo deficiunt, animique deliquium præcedit tenebrosa vertigo, facillè sudant, nihilque inde leuantur, pulsum habent paruum, debilem ac frequentissimum.

Tertiò, perniciosas fieri Tertianas tradit, ob humorum prauitatem, ex prauis alimentis contractam, aut ob vitionem & peculiare vitium, quale est in bile vitellinâ, porraceâ & æruginosâ. Humores enim hi per se prauis sunt, & si accedat putredo, deteriores euadunt, vt in quamcumque partem ferantur, mala inducant symptomata. Tales febres oriuntur plerumque media ætate, ob humorum resolutionem & nimiam exustionem; præsertim si homo irâ, aut aliis vehementibus animi pathematis percellatur. Mox à rigore febres hæ vehementer crescunt, humorésque statim inflammantur, à quâ inflammatione sitis & linguæ asperitas ac nigredo, sitisque inexhausta oritur. Oculi ob magnam spirituum resolutionem canuantur, homo redditur anxius & inquietus, ac toto corpore dolorem quasi vlcerosum percipit. Vrina ignea & veluti lixiuium apparet, ac pauca est. Alui dejectiones bilis vitellinæ, porraceæ ac æruginosæ naturam referentes, nonnunquam etiam dysenteriam efficientes. Vomitus eisdem humores æmulantur colore, cum maximâ angustia. Ægri parum sudant, quod crassior sit materia.

Quartò fit tertiana perniciofa ex mixtione crassorum

Dan. Sennersi Tom. I I.

humorum cum tenuibus. Cum enim humor crassus, quem mouet ac secum ducit biliosus ac tenuis humor, ad extremas venas effunditur, non protinus simul incalefcit, & succenditur, sed paulatim, tum quod copiosus sit, tum quod inæqualis. Quo fit, vt tenuior pars primò succendatur, & ex crassioribus, quæ primò transmittitur, & reliquæ sic successiue, vt natura pellit. Præterea cum mox tenues partes succendantur, quæ crassæ sunt, simul incalefcunt & rariores fiunt. Quo fit, vt ea humorum copia, quæ in vasis maioribus non erat magna, nunc in extremis vasis liquata & fusa, maxima fiat, grâuis & molesta; ex quo metus, ne vniversi corporis calor suffocetur, aut æger syncope corripiatur. Cognoscitur verò febrem ex humoribus inæqualiter crassis prouenire, quod lenrè ac cum diuturno rigore incipiunt, quem nonnunquam calor quidam interruptit, velut flamma exurgens, quem iterum rigor compescit, ita vt per intervalla rigeant ægri & calore afficiantur. Æger etiam tardè toto corpore incalefcit, calorque diu durat; & licet mitis appareat, anxium tamen reddit ægrum & debilem toto morbi tempore, vt vix sese mouere possit. Totum corpus tumere quasi, & livido colore præditum videtur: Vrina est aquosa & subalbida, cum copioso & crasso sedimento. Pulsus in paruitate & magnitudine inæqualis est, aliquando interceptus. Sæpe animo deficiunt ægri; respiratio est frequens & cum suspirio. In febris declinatione ægri maximâ cum inquietudine ab umbilico ad caput sudant. Tandem nec augmentum, nec status, nec declinatio in tali febre æqualiter fit, sed in augmento sæpe aliqua fit inclinatio; vnde potu exhibito, aut etiam sine ipso, febris rursus increfcit.

Quintò redduntur perniciosæ febres non ex propriâ naturâ & conditione, sed ex aliquo accidente, quod illis superuenit, ob quod periculosæ efficiuntur, licet naturâ suâ tales non sint. Id fieri potest, 1. si in paroxysmo crassus humor à calore fusus in aliquam partem decumbat, & suffocatiuum catarrhum, vel difficilem respirationem, vel articulorum dolores excitet. Obseruatum enim sæpe est, vt ij, qui caput habent humidius & fluxionibus obnoxium, si tertianâ febre corripiantur, & in paroxysmo pituita à calore fusa copiosè defluat, aut suffocationis metum, aut dolores lateris grauissimos pleuritidi similes incurrant. Ita qui asthmatici sunt obnoxij, & quibus vasa thoracis à crassis & viscidis humoribus obsidentur, ij febre tertianâ laborantes ob humores illos fufos & motos non rarò grauissimâ orthopnæâ tentantur. Ita qui arthriticis doloribus sunt obnoxij, etiam per tertianas iis aliquando tentantur. Atque hæc symptomata omnia, finito paroxysmo, aliquando planè cessant, si scilicet calor humores, quos fudit, quoque absumat: aliquando aliquid mali relinquitur, quod sequentem paroxysmum periculosum fore arguit. Malum enim malo succrefcit. 2. periculosæ fiunt hæ febres, si calor febrilis vterum in consensum trahat, humorésque corruptos in eo hærentes moueat; quibus motis ea symptomata accidunt, quæ hystericeis fœminis accidere solent. Facillè hæc febris ab aliis distinguitur, & non difficile est cognoscere, non accidere talia symptomata ob humores febriles, sed ab aliis potius humoribus, quàm qui tertianam efficiunt.

Tandem redditur perniciofa tertiana ob pestilentem ac malignam, & contagiosam humoris, qui tertianam efficit, qualitatem. Verum de hoc, & an dentur febres Intermittentes malignæ & pestilentes, suo loco plura dicentur.

### Curatio.

Sed vt ad curationem accedamus, vnâ operâ Tertianæ exquisitæ & Nothæ curationem proponere

I 2 &



& quomodo pro humorum permixtione febris hæc tractanda sit, monstrare placet.

Superiorum seculorum Medici, quos hodie Barbaros appellant, tam consiliam, ut Platerus hac de re scribit, & multiplicem curandarum febrium descripserunt tractationem, tamque varios purgationum pro humorum diversitatibus, à quibus febres nasci crediderunt, modos proposuerunt, quibus scaterent integra febrium curandarum volumina, ut si quis ea imitari vellet, ægro curam incertiore redderet, quam si totum negotium naturæ committeret, quæ per se sola ad febres tales sanandas sufficit.

*Indicationes.*

Ut rem igitur brevibus complectamur, curatio, ut in aliis febribus, ad febrem, causam & virtutem dirigenda. Febris, ut antea dictum, refrigerantia & humectantia indicat. Eadem etiam bilis, quæ febribus causa est, requirit, simulque ut euacuantibus idoneis tollatur, postulat. Et si febris non exquisita sit, sed notha, cum concoquentia seu alterantia, tum euacuantia humorem cum bile mixtum respicere debent. In quibus tamen expediendis simul ad locum affectum attendendum.

Et quia, ut antea in generali febrium Intermittentium Curatione dictum, in primis viis & venis mesaraicis febris causa colligitur, primò per vomitoria aut aluum ducentia, antequam reliquos humores inquinet, euacuanda. Hinc bilis alteranda, & partis, vitiosos humores generantis dispositio contrariis tollenda, ac bilis generatio prohibenda. Ideoque si ventriculi sit calida constitutio, ob quam cibi bile scunt ac amarescunt, aut, quod in tertianâ plerumque fieri solet, hepar sit calidius, quod multam bilem suppeditat: ejus intemperies calida alteranda. Si autem tertiana notha sit, & ex pituitâ admixtâ ortum habeat, ventriculi imbecillitati succurrendum; si melancholia adjuncta sit, lieni quoque subueniendum: Tandemque illud inquinamentum ac fermentum putredinosum sudoriferis discutiendum.

*Purgatio.*

Principiò ergò in febre tertianâ Intermittente primæ viæ euacuari debent. Nisi enim materia, quæ in venis mesaraicis & vicinis locis collecta est, euacuata sit, reliqua medicamenta cum commodo non exhibentur. Et refrigerantia saltem ob calorem adhibere, neque materiam caloris febrilis fomitem prius euacuare, est symptoma curare, & morbum deteriore reddere.

Inseruiunt huic rei clysteres: & quidem in tertianis legitiimis ij conveniunt, qui antea in continuis propoliti fuere. Si verò pituita vel melancholia admixta sit, tales parari possunt.

*℞. Rad. alihæ Vnc. i. malva, parietaria, beta, an. M. i. centaury min. flor. chamameli. furfuris, an. M. B. sem. 4. frig. mai. an. 3. B. senic. 3. i. prunor. num. x. Coqu. in s. q. a. f. Colaturæ ℞. lb. i. In quâ dissolue El. lenit. s. vel cass. pro clyst. Vnc. i. diaphanici 3. ii. mell. ros. col. Vnc. i. ol. chamamel. violac. an. 3. i. B. salis 3. B. F. Clyster.*

Verum cum materia plerumque copiosior in hisce febribus in primis viis & locis superioribus circa ventriculum hæreat, clysteres soli non sufficiunt. Ideoque medicamenta per aluum purgantia propinare, aut vomitoria, præsertim si æget cardialgiâ, nausæ & desiderio vomendi molesteretur, exhibere convenit. Si tertiana sit legitima, ea medicamenta idonea sunt, quæ antea in tertianæ continuæ curatione enumeravimus. Si verò pituitæ admixta sit, Agaricus; si melancholiæ, folia senæ adjungenda sunt: ideoque ubi melancholia admixta est, commodissimus est vltus diacatholici. Exempli saltem gratiâ vnam arque alteram formulam addere libet. Neque enim (quod semel hic monere libet) quæ omnibus individuis accommodata sunt, hic præscribi possunt: sed qui methodi medendi gnarus est, materiam medicam ac methodum componendi medicamenta cognitam habet, præscriptis formulis non indiget, sed pro re natâ

commodas & morbo atque ægro præsentem aptas concinnare valet.

*℞. Aq. endivia, vel decocti tamarindor. & radic. cichorij vel taraxaci 3. iiiij. Infunde in iis rhabar. 3. i. B. spica Scr. B. In colat. dissolu. manna el. 3. i. Iterum Colat. & add. syr. rosar. vel violar. solut. 3. B. vel 3. i. vel horum loco 3. ii. vel q. s. elect. de psyllio aut de succo rosar. aut rosati Mes. dissolue. M.*

Vel: *℞. Radic. taraxaci, cichorij. an. 3. B. asari 3. i. B. endivia. M. i. centaury minor. cardui bened. an. M. B. fol. sena elect. 3. B. rhabarb. 3. i. flor. cordial. p. i. Zingib. cinam. an. Scrup. i. Infundantur in s. q. aq. f. Postea leniter coquant. & colentur. In Col. 3. iii. B. dissolu. manna 3. B. 3. vi. vel 3. i. pro ægri naturâ.*

Vel: *℞. Flor. cassia, 3. i. rhabarb. 3. i. spica gr. vi. Cum sacch. F. Bolus. In nothâ verò tertianâ*

*℞. Flor. cassia 3. x. spec. hiera, Scr. i. Cum sacch. F. Bolus.*

Vel: *℞. Rhabar. opt. 3. i. cinam. Scr. i. Spica gr. vi. Infundantur in s. q. aq. endivia. Item agaric. alb. Scr. iiiij. Zingiber. Scr. i. Infundantur in oxymel. s. q.*

*℞. Colat. utriusque 3. i. 3. vi. & addatur elect. rosar. Mes. 3. i. vel 3. ii.*

Verum talia multa è radicibus cichorij, taraxaci, polypod. q. asari, endiviâ, carduo benedicto, centaury minor. absinthio, centumnodâ, pilosellâ, scolopendr. betonicâ, Rhabarbaro, foliis senæ, agarico, mannâ, elect. diacatholico, rosato Mes. de psyllio, de succo rosar. Syr. rosar. & violar. solutiuo, melle rosato solutiuo, & similibus in rem præsentem parari poterunt. Habet & inter hæc medicamenta locum tartarum, quod commodè & decoquendis rebus addi, & cremor eius decoctis atque aliis admisceri potest.

Vomitoria suprà de curatione febrium putridarum in genere sunt proposita. Sint autem in puris tertianis mitiora, & vim temperandi bilis acrimoniam habentia, parata ex aq. hordei tepidâ & syr. acetoso-f. In nothis autem febribus etiam fortiora locum habent. Inter quæ asarum primas ferè obtinet. Chymici vtuntur vomitoriis ex 3. ij floribus, croco, vitro: quæ ut materiam in primis viis stabulantem nonnunquam feliciter euacuant: ita prudentem & peritum, qui ea exhibeat, Medicum requirunt. Aliàs sunt culter acutus in manu infantis, aut gladius in manu furiosi. Et quamvis in ipso paroxysmo non facile aliquid mouendum: tamen necessitatis gratia in ipso etiam paroxysmo vomitoria, præcipue illa leniora, exhibere licet. Vbi enim bilis seu flaua, seu prassina, seu alia circa ventriculum hæret, & initio paroxysmi angustia & dolores circa præcordia percipiuntur, vnde ægri interdum in Lipothymiam incidunt, licet vomitoria exhibere, vnde non solum angustia illa tollitur, sed & paroxysmus imminuitur.

Neque medicamenta, quæ paulò quàm lenientia fortiora sunt, rejicienda sunt. Rectè enim hac de re scribit Ludouicus Mercatus: Si in primis viis, aut locis iis proximis subsistat flaua bilis, vtendum est purgatione, quæ nec omninò sit selegente pharmaco facta, ne plus, quàm par sit, ipsius flauæ bilis ad communes vias è venis trahatur; nec omninò leui, ut aliquid agere possit. Quippe eo tempore habemus naturam adminiculantem mouentemque materiam ad loca euacuationis sibi conuenientia; vnde in principio febrium vomitus & alui fluxus non rarò oriuntur. Et plerumque materiæ in primis viis maior est copia, aut lentos humores ea admixtos habet, ut lenissimis illis, Syrupis ros. & viol. solutiuo; mannâ, cassiâ, tamarindis & similibus vix loco moueri & euacuari possit. Neque coctionem expectare opus est, cum materia

*Vomitoria.*

tertia

teria illa in primis viis hæreat, ad expulsionem irriter, & ad euacuationem plerumque apta sit.

Euacuata alio ac primis viis, Medicus de venæ sectione sit sollicitus: de qua inter Medicos non plane conuenit. Reddidit verò non paucos dubios Galenus, qui vbi, 1. ad Glau. cap. 9. de curatione tertianæ exquisitè agit, venæ sectionis nullam mentionem facit; cum tamen postea in curatione tertianæ nothæ eius meminerit. Hinc enim aliqui autoritate Gal. ducti venæ sectionem in tertiana Intermitte exquiritè omittendam censent. Alij verò, qui eam admittunt, varias causas afferunt, cur Galenus mentionem venæ sectionis non fecerit. Nonnulli putant, eum ideo omisisse venæ sectionem, quòd eam, tanquam quiddam clarum & extra dubium, præsupposuerit, vel breuitatis studio omiserit. Quod tamen vix locum habet, cum aded clarum non sit, à quo indicetur venæ sectio in febre tertianâ intermittente, & postea in tertianâ nothâ eius mentionem fecerit, neque necessaria præsidia breuitatis studio omittenda sunt. Alij putant, ided eum omisisse, quòd in hac febre id quod maximè ad venæ sectionem desideratur, non adsit, virium scilicet robur. In tertianâ enim exquisitè omnia, ætas, tempus anni, regio, temperamentum, ad calidum & siccum vergunt, & proinde tale corpus viribus valentibus, esse non potest.

Verum etsi concedamus, vt postea dicetur, si ista omnia concurrant, venæ sectionem vix locum habere: tamen rarò ista omnia concurrunt, & sæpè in his febribus, quæ aliàs securæ sunt, vires satis robustæ inueniuntur, vt pereas, si illà opus sit, venæ sectio facillè permitti possit.

Ideoquæ illa potiùs huius rei causa esse videtur, quòd in tertianâ exquisitè non semper indicans venæ sectionis adsit, de quo suprà dictum. Nam accidere potest, vt in tertianâ exquisitè neque sanguinis copia adsit, neque cum sanguine vitiosus humor in venis permisceatur. Imò cum bilis maximâ ex parte in primis venis contineatur, metuendum, ne venis sanguine detracto inanitis, ea in venas superiores rapiatur, atque inde febris periculosior reddatur. Ideoquæ in tertiana exquisita omni sanguis non mittendus est. Neque enim temper, vt dictum, indicans adest, sanguis scilicet abundans, vel bilis in venis communibus sanguini permixta. Neque etiam vires eam semper ferunt. Nam si quis temperamento biliosissimus, ætate & regione calidâ, ex fame, vigiliis, laboribus & defatigatione in febrem inciderit, sanguis mittendus non est. Vires enim hoc modo debilitatæ venæ sectionem non admittunt. Ac proinde cum febris ista naturâ suâ periculosa non sit, si quis de sanguinis vitio aut virium robore dubitet, ac propterea venæ sectionem omittat; in primis signis coctionis iam apparentibus, is non peccabit; modò bilis euacuationem per eas vias, ad quas vergit, adiuerit. Imò venæ sectio intempestiuè adhibita plus nocere, quàm omisa potest.

Si autem tertiana non sit exactè pura, interdum vena secanda est, interdum non. Nam si vires sint fortes: adsitque sanguinis abundantia & bilis in hepate generetur, & hinc facillè sanguini in venis permisceatur, id quod ex corporis constitutione, vrinisque rubicundis ac crassis, ac calore aliquo post paroxysmum remanente cognoscimus, venam secare licet; cum hoc modo & copia sanguinis minuat, & humor peccans euacuetur. Si verò in ventriculo & locis vicinis bilis generetur & subsistat, neque adsit insignis aliqua sanguinis abundantia, vena secanda non est; cum per eam saltem bonus sanguis euacuaretur, & facillè fieri posset, vt bilis in venas deduceretur. Si tamen accadat, vt progressu temporis bilis sanguini permisceatur; id quod frequenter accidit: Siquidem cum cibo & potu & chylo inde generato, in primâ

corporis regione contenta bilis facillè in venas penetrare potest, & ex vitiosis humoribus in prima regione, secunda regio afficitur & inquinatur, neque adsit sanguinis penuria, venam secare licet; quæ simul corpus ventilat & refrigerat, humoris vitiosi aliquid cum sanguine euacuat.

De tempore venæ sectionis instituendæ, authores non conueniunt. Plerique Medici & Auicenna lib. 4. 11.2. cap. 29. non ante tertium paroxysmum venam aperiendam censent, idque ideo, quòd in hisce febribus bilis non in venis supra hepar, sed in venis primis contineatur, & propterea metuendum sit, ne venis sanguinis missione inanitis, in superiores venas rapiatur, & inde febris continua excitetur. Quod damnum evitari possit, si post tertium demum paroxysmum vena secetur. Nam in tribus primis paroxysmis bilis magna pars per vomitum, vt & per aluum purgatur, magnusque in primis paroxysmis est materiæ motus, vt ex rigoris vehementia apparet; cum bilis tum sit copiosior, calidior, tenuior & acrior, quæ post primos paroxysmos à naturâ domatur, & mitior redditur. Cui rei accedit & hoc, quod primis paroxysmis sanguini demum bilis permisceatur, sanguisque inde vitiosus redditur, vt hoc modo plus de materiâ peccante post primos paroxysmos tolli possit, quàm si mox à principio vena aperiatur vbi mixtio bilis cum sanguine nodum facta est. Et monent hic Medici, ægro prædicendum esse paroxysmum, qui venæ sectionem sequetur, quartum scilicet, grauissimum futurum, vtpote in quem morbi vigor incidit: ne venæ sectionis causâ atque errore aliquo id contigitur videatur.

Hæc etsi non negat Mercurius, atque in eo casu, vbi bilis in primis venis, & iis qui prope hepar sunt ductibus hæret, ægrumque nauseabundum reddit, non statim in principio, cum scilicet nondum sanguini bilis permixta est, esse venam aperiendam, sed prius purgatione factâ, & post tertium paroxysmum venam aperiendam esse, concedit: tamen si bilis mox in principio sanguini permixta sit, sibi illam versionem Auicennæ, quæ legit, ante tres periodos, omisâ negatione, non magis aridere scribit.

Et certè, si rem perpendamus diligenter, hoc quidem vero consentaneum esse comperiemus, non mox initio, & ante primarum viarum euacuationem, venæ sectionem commodè institui posse: illud tamen minus verisimile est, sectionem venæ post tertium paroxysmum in tertianâ legitimâ differendam esse. Etsi enim in tertianâ nothâ id locum habere possit: tamen quia in exquisitè tertianâ post tertium paroxysmum status morbi, vel adest vel instat: melius est, eo tempore quiescere, quàm remedio tam generoso naturam molestare. Et in summâ, in tempore venæ sectionis eligendo non tam respiciendum ad paroxysmorum numerum, quàm ad præsentiam Indicantium & permittentium sanguinis missionem. Nam si adsint sanguinis missionem Indicantia, & vires permittant, maturè instituenda venæ sectio, antequam vires deiciantur.

In minore autem copiâ sanguis educendus in tertiana legitima; cum, vt in continuis, is non sit primarium indicans, & maiorem copiam euacuari vires vix ferant. Tutius autem & maiori copiâ potest sanguis mitti in tertianâ nothâ. Cum enim in tertiana nothâ, vel calidum & siccum corporis temperamentum, vel regio, vel anni tempus, vel victus ratio præcedens, vel aliquid aliud ex iis, quæ in tertianis puris requiruntur, absit; atque ea præcesserint, quæ non solum bilis, sed & aliorum humorum generationem iuuare possunt: sanguinis euacuatio facilius admitti potest, in primis si vrinæ crassæ & rubræ appareant. Ac proinde 3. iiii. v. vel vi. pro corporis naturâ, enitti possunt.

Instituitur commodissimè venæ sectio die *ἀνυπνίας*, seu tempore quietis. Quamvis enim venæ sectio, si circa paroxysmi principium fiat, cum vel retardare

vel impedire possit, tamē impedit naturæ motum, quo partem materię excutere solet, & vires, sequente mox venæ sectionem paroxysmo, non parum debilitat.

Preparantia  
& concoquentia.

Post venæ sectionem preparantia & concoquentia adhibeantur, id est, talia medicamenta, quæ & humoris biliosi qualitates excedentes, quibus naturæ molestus est, emendent, dispositionemque in parte vitiosos & excrementitios humores generantem corrigant, ipsique inquinamento à putredine relicto contraria sint: qualia in hac febre sunt refrigerantia & humectantia: quæ tamen simul vim aperiendi habeant; non quod semper (et si sæpè hoc accidat,) obstructions adfint, verum ut præcaueatur, ne humores in primis viis hæreant, sed extergantur, & ad excretionem apti reddantur, & humorum illa fermentatio, ac putredo impediatur.

Talia autem quæ in legitimâ conueniunt, sunt *cichorium, taraxacum, endivia, acetosa, hordeum, semina frigida maiora & minora, succus citri, ribes, &* ex his parata, *syr. acetosa, acetosus simplex, Oxyfaccb. de cichor. de endiu. de acetosu. citri cum aq. & decoctis eorundem.* Quib. in nothis tertianis addere licet, quæ pituitam vel melancholiam respiciunt, *radices fœniculi, graminis, asparagi, asarum, polypodium, carduum benedict. centaurium minus, absinthium, scolopendrium betonicam,* utilis est etiam spiritus salis & vitrioli, & alia suprà. cap. 13. propofita.

*℥. Syr. acetosa, de endiu. an. Drach. vj. aq. cich. Vnc. iij. vel iij. spir. vitrioli. gutt. iij. vel vj. Misc.*

Vel *℥. Syr. acetos. f. Vnc. j. de cichor. f. Vnc. β. decoctis vel aq. cichor. Vnc. iij. Misc.*

Conuenit & serum lactis vel solum & simplex, vel cum emulsione sem. 4. frig. maiorum.

Vel *℥. Radic. taraxaci, Drach. vj. endivia, M. j. hepatica, M. β. flor. violar. bugloss. an. P. j. Sem. 4. frig. maior. an. Drach. j. F. decoctio.*

Colaturæ *℥. lb. j. Adde Syr. acetosi f. oxyfaccb. an. Vnc. ij. Misc. pro iij. dosibus.*

Vel coquantur hordeum & rad. cichorij eâ quantitate, quæ agro ob amaritudinem nauseam non conciliet, & colat. lb. ij. adde sacchari *℥. ij. aceti, succi ribium maturor. vel spir. vitrioli. q. s. ad gratam aciditatem:* Fiat potus, quem æger aliquot vicibus exhauiat.

Vel radic. cichorij decoctum cum conferuæ rosar. vel violar. f. q. per manicam Hippocratis trahi potest; ut fiat potus gravior.

Vel *℥. Hordei M. j. sem. endivia, acetosa, plantagin. an. Drach. ii. Sem. 4. frig. maior. an. Drach. j. β. Coqu. in aq. pura. Colaturæ ℥. lb. i. Adde vini granator. Vnc. ii. β. Syr. acetosi. citr. sacch. candi. an. Vnc. i. β. Ad ignem denuo bulliant in formam iulebi.*

In horum autem medicamentorum vñu obseruandum: Primò ut illa, alterantia sapius exhibeantur & sufficiente quantitate, ac continuentur. Nam si toto die vel etiam biduo *℥. iij.* exhibeantur, facillè conicere est, per totum corpus dispersum tantillum liquorem parum illud afficere posse. Deinde notandum, ut in principio & augmento febris magis refrigerantia dentur: Instante verò tempore purgationis ea, quæ mediocriter aperiunt, & incidunt, adiungenda sunt.

In nothâ tertianâ cum refrigerantibus & bilem præparantibus ea commiscenda, quæ pituitam & melancholiam respiciunt, & attenuant ac detergunt; ut *oxymel. f. syr. acetosus compos. mel rosatum. Syr. de betonica, de endivia comp. de 2. radic. de 5. rad. byzantinus, de carduo benedicto, cum aquis vel decoctis radic. fœnic. apij, betonica, capill. ♀. sem. fœnic. viridis.* Semen enim fœniculi siccum, ut hoc obiter moneam, & alia fortiora semina, adurunt humores: Ideoque si adhibentur, siccitas illorum mitigari potest glycyrrh. feminib. frig. maj. passulis. Et quidem semper à mitioribus incipiendum, ne fortiorum aperiendum vñu materia, in primis viis adhuc contenta, in venas remotiores mouea-

tur, & sic obstructions augeantur: ut si primis diebus tribus vel quatuor exhibeatur *Syr. acetosus* s. sequentibus diebus compositus detur, ut:

*℥. Rad. cichor. fœnic. an. Vnc. i. endivia, capill. ♂. byssopi, agrimonia, an. M. β. Sem. 4. frig. maj. an. Drach. i. petrosel. Drach. β. passul. Vnc. i. Coqu. in f. q. a. f.*

Colaturæ *℥. Vnc. viii. Adde Syr. de 2. rad. acetos. f. an. Vnc. i. β. Misc. pro iij. dosibus.*

Vel *℥. Oxymel. f. Syr. byzantini f. an. Drach. vi. aq. cichor. asparagi, an. Vnc. i. β. Misc. pro haustu.*

Vel *℥. Rad. asparagi, rusci, an. Vnc. i. β. endivia, scariola, hepatica, agrimon. Cardui bened. an. M. β. Sem. 4. frig. maj. an. Drach. β. glycyrrh. passul. an. Drach. vi. Coqu. in f. q. a. f. Colat. addantur aceti Vnc. ii. mellis vel sacch. alb. q. s.*

*F. Syrup. qui cum iisdem aquis, destill. dilui potest.*

In humoris melancholici admixtione talia vñu pari possunt.

*℥. Rad. cichorij, polypod. q. an. Vnc. i. fol. endivia, Capill. ♀, fumaria, summit. lupuli, an. M. β. Fl. cichor. bugloss. Borrag. an. P. i. tartari, passul. an. Vnc. β. Coqu. in f. q. a. f.*

Colat. Clarif. *℥. Vnc. viii. Adde Syr. byzant. f. Vnc. iii. Misc.*

Vel *℥. Rad. cichor. asparagi, an. Drach. vi. Cort. rad. capp. Drach. ii. endiu. cichor. an. M. β. Ceterach, fumar. an. P. i. Sem. 4. frig. maior. scariola, an. Drach. β. flor. cordial. an. P. i. passular. Vnc. β. Coq. in f. q. a. f.*

Colaturæ *℥. Vnc. viii. Atque in calidâ adhuc infundantur specier. diarrhod. abb. Drach. i. conferuæ cichorij, borrag. an. Vnc. sem.*

Colentur & depurentur, & *spir. vitrioli. vel ☉ aliquot gutt. addantur.*

Post poriones eiusmodi aliquot rotulæ diarrhodi abbatis, vel diatronfantal. vel aromar. ros. fumantur, quæ sunt gratiores, si aliquot guttis Spir. Vitrioli. vel ☉, conspergantur.

Inter ista autem medicamenta sunt quædam, quæ appropriata quasi in febribus tertianis habentur, inter quæ plerique primo loco habent taraxacum in tertiana febre, præcipuè Infantium, si detur nutriti, vel temperetur cum saccharo & lacte amygd. dulc.

Deinde commendatur ad tertianas Chamæmelum, Chamæmeli de quo Galenus 3. de s. m. fac. c. 10. ita scribit: *Chamæmelum febres, quæ citra visceris alicuius inflammationem infestant, discutit dissoluitque, ac præsertim, quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate proueniunt. Quæ de re & ab Egyptiorum sapientioribus Soli consecratum est, febriumque omnium putatur remedium. Verum hac quidem in re à veritate aberrant. Solas autem eas, quas dixi, febres sanare potest, easque percoctas: licet reliquas etiam adiunget, quæ melancholica sunt aut pituitosa, aut ex viscerum inflammatione procreata. Nam & harum remedium est strenuissimum Chamæmelum, ubi concoctis adhibetur scilicet. Quapropter & hypochondriis, ut si quid aliud, gratum existit. Ex quo loco apparet, ex sententiâ Galeni, Chamæmelum, præparatâ & coctâ materiâ, ad euacuandam potiùs materiam & discutendam adhibendum esse. Scribit tamen Ioan. Anglicus, cap. propr. se Chamæmelum & ante & post digestionem exhibuisse & contulisse: additque, à se frequenter exhibitum Chamæmelum pauperibus, senibus, & aliis non valde delicatis, religiosisque, qui viuunt ex piscibus & similibus cibis frigidis. Recipit nimirum succum Chamæmeli colatum, clarificatum ad pondus lb. β. vel lb. j. eumque dulcem reddit saccharo vel glycyrrhizâ, exhibitque per tres dies continuos, manè ad pondus quartarii vñus vel dimidij. Et quia Chamæmelum parum succi habet, infundit in lacte amygdalarum dulcium, vel prisanâ hordei, & sic etiam è floribus Chamæmeli exsiccatis succum*

Appropriata  
in tertiana.

Taraxacum.

Chamæmeli  
in tertiana  
vñu.

In seminum  
calidiorū vñu  
notandum.



succum exprimit. In nothâ tamen potius, quàm legitimâ locum habet. Laudatur & centaurium minus, quod & febrifuga inde appellatur. Commendant in tertiana nonnulli etiam plantaginem & morsum diaboli.

E Chymicis medicamentis hîc imprimis commendantur in febribus longioribus & obstructionibus viscerum, Spiritus vitriol.  $\Theta$ , aliquot guttarum quantitate, in iusculo carnis vel alio conueniente liquore exhibitus, præcipuè verò tartarum vitriolatum.

Non autem solum formâ potabili, etsi ea commodior sit, cum facilius penetrent liquida, sed & aliis medicamenta ad præparandum & alterandum humores viurpari possunt, vt conseruatum formâ, conditorum, electuorum, rotularum, morsulorum, puluerum, de quibus postea dicetur, cum monstrabitur, quâ ratione viscera in hisce febribus roboranda.

Purgantia. *An liceat die paroxysmi purgare.*  
Præparatâ materiâ, nisi febris cesset, rursus ad purgationem accedendum. Imò si febris sit pertinacior & diuturnior, pluribus vicibus præparatio & purgatio vitiosorum humorum repetenda. Hic autem occurrit quæstio; An liceat die paroxysmi purgationem instituere. Plerique id negant cum Auicennâ; qui hoc loco scribit: Et non moueas in die paroxysmi, quantum est possibile. Afferuntque huius rei hanc rationem; quod natura aliâs die paroxysmi sit afflicta, ideòque amplius medicamentis non sit molestanda. Et cum venæ sectionem non liceat instituere die paroxysmi, eandem rationem purgationis esse dicunt; cum hæc non minorem naturæ molestiam afferat. Præterea dicunt, medicamentum purgans trahere à circumferentiâ ad centrum; cum ex parte alterâ natura in paroxysmo à centro ad circumferentiam pellat: atque ita institui duos motus contrarios, quos natura sine damno ferre non possit. Insuper si natura in paroxysmo per sudorem euacuationem instituere velit, motus iste naturæ per purgationem impeditur. Aut si natura moliretur purgationem per aluum, Medicusque eodem tempore exhiberet purgationem, metuendum, ne ex utroque motu immoderata sequeretur purgatio.

Alij contrarium sentiunt, idque has ob rationes. Primò, inquit, natura vtiliter euacuat die paroxysmi, ac die paroxysmi ferè semper crisis instituit. Ergò & Medicus, qui minister est naturæ, eam imitari debet; & quidem iure. Nam humores tum temporis mouentur & agitantur, ac natura cum motu, tum onere humorum irritata euacuationem adiuvabit. Testatur quoque Petrus Monauius, in *Epist. à Laurentio Scolizio editis, Epistola 22.* tali curandi ratione plures, & longissimis febribus laborantes multò citius, quàm aliâs liberatos se animaduertisse. Et refert Prosper Alpinus, de *Medicina Aegypt. lib. 4. cap. 15.* Aegyptiis planè familiare esse vnâ vel binis horis ante accessionem, agarici vel rhabbari Drach. i. cum decocto chamædryos vel absinthij exhibere, & pro singulari secreto apud quosdam celebrari potionem quandam ante accessionem, per binas horas oblatam, quam parant ex mannâ, pulpâ cassiæ, tamarindorum, an. 3. iiii. quæ in aquæ endiuiz vel communis lb. i. vsque ad consumptionem duarum partium coquunt, colaturæque miscent olei sesamini Vnc. ii.

*Quæstionis explicatio.*  
De quâ quæstione vt nostram sententiam breuiter addamus, motum naturæ, & locum, in quo materia continetur, attendendum cenfeo. Nam si materia instante paroxysmo ad ventriculum inclinât, iubent præstantissimi Medici plerique, instante paroxysmo medicamentum vomitorium, non tamen adeò forte, quod naturam multum debilitare posset, exhibere. Ita si materia ad aluum inclinât, & materia pluri-

aliquâ purgatione die etiam paroxysmi educitur, ita tamen vt ante initium paroxysmi purgationis motus absoluat. Hoc modo enim futuro paroxysmo materia subtrahitur, & naturam adminiculantem in purgatione habemus. Atque hoc si fiat, non metuendum, vt vel contrarij motus instituantur, vel sudores impediuntur, vel nimia purgatio accidat. Neque tamen medicamenta illa nimis fortia esse debent, vt naturam valde debilitent. Aegyptiorum verò medicandi ratio tota ad naturam stimulandam comparata videtur. Venæ sectionis quoque longè alia est ratio, quæ & plus spirituum exhaurit, & materiam proximè paroxysmum instantem parituram non subtrahit; id quod medicamentum purgans facere potest. Quòd si die paroxysmi non detur occasio purgandi, aut naturam in hoc motu adiutricem non habeamus, aut materia loco remotiore sita sit, vt aliquo mitiore medicamento euacuari ante paroxysmum non possit: potius die quietis & *anxiæ* instituenda est purgatio.

In purgatione autem instituendâ videndum, per quam viam materia facilius educi possit. Nam si materia circa intestinorum venas hæreat, purgatione per aluum educenda: Si autem circa ventriculum vel superiores venas mesaraicas contineatur, vomitu eiicienda; inprimis si nausea aut cardialgia adsit; & æger ad vomitum non sit difficilis. Licet enim vomitus proximè solum è ventriculo videatur euacuare: tamen sæpe magnam bilis copiam in venis mesaraicis & vasis remotioribus contentam excutit, febrémque causâ ac motu sublato, vel tollit, vel mitigat; & quas purgationes sæpius sanare non potuerunt febres, vomitiones repetitæ sanant.

Potest autem vomitus vel die quietis, post sumptum cibum, vel instante paroxysmo institui: & quidem qui die quietis post sumptum cibum instituitur, causam antecedentem, & materiam, causam antecedentem aucturam, tollit: qui verò instante paroxysmo ciatur, materiam paroxysmum facturam, atque ita ipsum paroxysmum minuit. Vomitoria autem supra proposita sunt, & magis exquisitis conueniunt. In febribus autem nothis & diuturnioribus paulò fortiora ex iis adhibenda sunt. Hodie apud multos in vsu, vt & supra dictum est, asarum, cuius folia vel radices vel totum 3. ss. vel 3. iiii. pondere coquuntur, & decocti 3. iiii. vel 3. v. propinantur; vel pulueris radicis asari 3. ss. cum conueniente liquore exhibetur. Nonnulli commendant aquam nucum iuglandium, cum aceto destillatam, 3. iiii. pondere.

Genistæ etiam semen, flores & radicem cortices satis potenter vomitum ciunt, si in aquâ decoquantur: sed leuior sit illa decoctio. Reliqua supra sunt proposita.

Hoc tamen de omnibus fortioribus vomitoriis obseruandum, vt antequam exhibeantur, & humores & corpus præparentur, crassi scilicet & visciidi humores attenuentur & incendantur, ac ita ad motum aptiores reddantur; ipsum verò corpus bene antea humectetur.

Purgantia per aluum tertianæ Intermittenti ex-*Purgantia.*  
quisitæ conuenientia ferè eadem sunt, quæ capite præcedente & hoc ipso iam explicauimus. Commodissimum est rhabbarum 3. i. vel 3. ii. si in aquâ vel decocto cichorij, endiuiz, vel sero lactis, cum spicæ & schœnanthi 3. ss. infundatur, & colat. expressæ pulpæ tamarindorum, vel mannæ & syr. ros. sol. f. q. addatur.

Vel 4. Extr. rhab. Drach. ss. vel 3. ii. syr. ros. vel viol. sol. Vnc. i. ss. Misce.

Robustioribus Electuarium de succ. ros. rosatum Mesues; de psyllio exhiberi potest.

Galenus, 1. ad Glau. cap. 9. signis coctionis apparentibus cum fiduciâ absinthium exhibet, idque alio-

*in ipso paroxysmo, m. d. i. p. Jan. laxativa propinatur succ. ros.*

*Absinthij v. m.*

quin summum remedium in mordicatione stomachi, quæ à bile provenit, esse scribit; si præsertim ex ipsius comâ sufficiens quantitas melicrato immergatur, & colatum exhibeatur. Detergit enim & ad inferiora detrudit biliosam materiam, & plus prodest contra bilem, quàm pituitam. Nam pituita propter crassiciem & visciditatem non ita cedit absinthio.

In Nothis febribus ea purgantia conueniunt, quæ non solum bilem, sed & pituitam, vel melancholiam admixtam euacuare valent, quorum formulæ passim existant.

Et quia humores excrementitij in primis viis sæpius colliguntur, etiam in progressu morbi lenientia repetere vtile est. Quia tamen materia lenientibus medicamentis non semper cedit, fortiora addere oportet, vt in pituitâ.

*℞. Flor. cassia Drach. vi. spec. diatrib. cum rhabarb. Drach. β. Cum sacch. Fiat Bolus.*

In Melancholiâ. *℞. Cassia Vnc. β. elect. diacathol. Drach. iii. pulu. sena preparat. Drach. β. Cum sacchar. F. Bolus.*

Et omninò necessarium est, vt in hac febre sæpius purgetur.

Vtiles sunt, præter medicamenta suprâ proposita, trochisci de absinthio, de rosis, de rhabarbaro, de caparibus, inprimis cum febris in cachexiam declinare videtur: qui commodissime in pilulas formantur, cum succo absinth. agrimonie, centaur. min. fumaria, extracto absinthij, cardui bened. scolopendr. syr. de cichor. cum rhabarb.

Si post sumptas pilulas syrupus vel aliquis liquor sumatur, facilius ad interiora penetrant.

Longè verò commodissimum est, vt in febribus hisce nothis, & præsertim longis, quæ repetitis præparationibus aut euacuationib. opus habent, ea medicamenta, quæ materiam simul præparare, viasque aperire, & simul euacuare valent, exhibeantur: quæ si opus sit, per aliquot dies continuari possunt; & post eorum vsum medicamentum purgans paulò fortius commodè propinatur. Ac talia decocta & syrupi plerumque ad omnes tres humores excrementitios diriguntur, quia in febribus istis aliquid bilis, ob febris ardorem, in humorem atrum degenerat.

Vsuales tales syrupi sunt: syrupus de cichorio cum rhabar. diaferos, & in humore melancholico admixto, de fumariâ compositus, & oxymel helleboratum.

Vel potest tale decoctum fieri: *℞. Rad. cichor. fœnicul. taraxaci, an. Vnc. β. asari Drac. i. sem. endiu. agrimon. capill. ♀, an. M. sem. passul. Vnc. sem. Coqu. in f. q. aq. f. In colatura infund. fol. sena el. Vnc. sem. rhabarb. opt. Drac. sem. cinam. turbith. el. an. Scrup. j. flor. cordial. 2. P. i.*

Colaturæ *℞. Vnc. iii. sem. Adde syr. de cichor. cum rhab. mell. ros. fol. an. Vnc. i. Drac. vi. vel drachmam vnâ* atque alteram de conueniente purgante electuario. F. Haustus, qui si opus sit; aliquoties repeti potest.

Vel *℞. Rad. cichor. asparagi, graminis, fœnicul. taraxaci, oxylapathi, polypod. q. an. Vnc. sem. endiu. capill. ♀, hepaticæ, chamedryos, cardui bened. an. M. i. sem. 4. frig. mai. an. Drach. ii. fœnicul. genista, an. Drach. i. sem. passul. Vnc. i. Coqu. in f. q. aq. f. In colat. lb. i. Infund. per noctem fol. sena el. Vnc. i. sem. rhabarb. opt. Drach. i. agar. albiss. turbith. el. an. Drach. sem. zingiberis Drach. i. cinam. Drach. sem. spica Scrup. i. flor. cordial. an. P. i. Col. adde syr. de cichor. c. rhabarb. vel diaferos, rosar. fol. endiu. comp. an. Vnc. i. sem.*

F. Potus, de quo alternis diebus manè dentur 3. iiii. vel 3. iiii. β. Aut Colat. addatur sacch. albi q. f. & coqu. lento igne ad fyr. liquidioris consist ac lub finem syr. de cichorij cum rhab. aut diaferos affundatur, & F. syrupus, qui aromatizetur spec. diatriodi abbat. in nodulo suspensar. 3. i. De quo cochlearia duo aut plura, seu quantum opus, exhibeantur. Vti-

le est in febribus diuturnioribus & Tartarum, atque ex eo parata medicamenta, quæ & sola vsurpantur, vel aliis adduntur; dum scilicet decoctis & potionibus parandis ipsum tartarum; paratis cremor tartari, vel tartarum vitriolatum, vel Sal tartari admiscuntur.

In decoctis autem talibus longis, vt & syrupis, qui minùs crassam habent consistentiam, hoc obseruandum; cum optima clarificatio sit, quæ fit per subsidentiam, vt inclinatione id quod clarum, à fecibus sæpius separetur, clarumque, si opus, rursus calefiat. Hoc enim modo sitis & corruptio præcauetur.

Sitis, quod plerumque fieri solet, si sit molesta, sedetur iis medicamentis, quæ infrâ lib. 4. cap. 16. proponuntur. Inprimis hic vtile est decoctum hordei cum radic. fœniculi, si ad M. iiii. radic. fœniculi Vnc. β. addatur, & ad remanentiam lb. iiii. coquatur, qui potus largiter exhiberi potest, cum non solum febrim sedet, sed & sudorem ac vrinam promoueat.

Post purgationes si febris non cesset, ad reliquias humorum euacuandas vtilia medicamenta vrinam mouentia. Vnde nonnulli in eâ sunt sententiâ, Galenum absinthium potius vrinam ciendi, quàm purgandi gratiâ (cum vtramque vim habeat) propinasse.

Sunt autem è diureticis vel frigida vsurpanda, vt emulsiõ sem. 4. frig. maior. facta cum sero lactis caprini, vel aquâ graminis, fragorum, cichorij, asparagi, hordei: vel è calidis, quæ non sunt valdè calida, vt decoctum rad. graminis, asparagi, fœniculi, capillorum ♀, cicer. rubrorum, absinthij, cuscute, flor. chamæmeli, sem. genistæ, Syrupus acetosus compositus, de duabus radicibus.

Possunt his diureticis addi aliquot guttæ spiritûs vitriol. vel  $\Theta$ , aut aliquid tartari.

Inseruiunt etiam huic rei aquæ, spiritûs, extracta, ac sales ex plantis huic vsui accommodatis; Item trochisci de absinthio, de rhabarbaro, de eupatorio.

Discutitur quoque materia febrilis per sudores; id quod natura ipsa plerumque facit in fine paroxysmi, quam Medicus rectè imitari potest. Licet autem & post paroxysmum & ante ipsum sudores institueret. Et cum, vt suprâ dictum, inquinamentum illud ac omni modò nec mpt / aqua, post paroxysmum relictum, reliquos humores iterum inquinet ac corrumpat, illud discutiendum & è corpore expellendum est, quod commodissime fit per sudorifera. Ideoque vix aliqua febris integrè & perfectè, ac sine recidiuæ metu sine sudore curatur ac soluitur.

In tertianis legitimis sufficit, si natura, quæ aliàs in fine paroxysmi sudores mouere solet, adiunetur, & detur opera, vt materia biliosa per sudorem planè discutiatur. Quâ in re interdum in hisce febribus à Medicis peccatur, qui ægro omnem planè potum interdiciunt, atque hoc modo in febribus calidioribus in causâ sunt, vt corpus valde incalescat, exsicceretur, ægerque minùs sudet, vnde metuendum ne æger in hecticam incidat. Ergo tum propinanda ægro aqua hordei, vel destillata acetosæ, buglossi, borraginis, cichorij, quibus aliquid aquæ cardui bened. fumariæ, scabiosæ addi potest, cum syr. vel Iulepo violar. syr. acetoso f. oxylaccharâ f. syr. acetosus. citri. Antiqui ad sudores mouendos balnea vsurpabant, quæ in desuetudinem venisse iam aliquoties dictum est. Iidem & inunctionibus quibuidam sudores ciebant; quod & hodie Egyptij faciunt, teste Prospero Alpino, de medic. Egypt. lib. 4. cap. 15. qui inunctionibus cum oleo rutæ aut amygdal. amararum aut chamæmelino, aut iuniperino, aut nitro rubro, cum leuibus perfriktionibus administratis, sudores cient. Verum cum inunctionibus

num harum vsus maximus sit in malignis, dicitur de ijs infra, in Curatione febrium malignarum.

In Nothis tertianis, calidioribus sudoriferis ut licet, utraq; vel decocto cardui bened. centaur. min. scabiosæ, chamæmel. fumariz; sale absinthij, cardui benedicti: extracto cardui benedicti, & similibus; imò nonnunquam ipsa theriaca & mithridatio. Atque illa ipsa interdum tribus, 4. 5. vel 6. horis ante paroxysmum adhibentur, ut materia paroxysmum paritura per sudores discutiatur: quorum vsu sæpe accidit, ut paroxysmus planè tollatur & auertatur. Hic scopis & hæc aqua interuere potest.

*℞. Cardui bened. centaurij min. absinthij an. M. i. radic. gentiane. Vnc. ii. Infundantur in f. q. aq. cardui bened. & bugloss. horis 24. postea destillantur. Aqua hæc & sola, & cum alijs vsurperur.*

Commendatur & verbenæ cum radice in vina cocta, si haustus ante paroxysmum exhibeatur: vel si verbenæ cum carduo benedicto & asaro in vitro coquatur, & haustus ante paroxysmum propinetur.

Et quia ipsa experientia Germanos docuit, felicissimè sudoriferis febres expugnari, ac sine ijs vix tolli: plurimi apud eos circumferuntur pulueres & alia medicamenta, quibus ante paroxysmum exhibitis, sudore concitato, febres tolluntur: quorum aliquot hic adscribere libet.

*℞. Diſtamni, tormentilla, an. ʒ. ii. C. C. vſti Drach. i. ſuccini albi ʒ. i. F. Puluis, qui D. Brambachio adſcribitur.*

Alius *℞. Centaurij minor. diſtamni albi, an. ʒ. i. radic. tormetill. ʒ. i. sem. cardui bened. ʒ. i. cortic. aurantior. ʒ. ii. F. Puluis, & addantur ſacchar. albi Drach. iii. pro iii. doſibus. Adſcribitur hic D. Bormanno.*

Alius *℞. Diſtamni, tormentill. an. Drach. ii. pimpinell. Vnc. sem. C. C. Drach. ii. F. Puluis.*

Alius *℞. Ariſtolo. rotunda, gentiana, diſtamni albi, calam. aromat. zingiber, an. Drach. i. piperis longi, radic. pimpinell. an. Drach. sem. F. Puluis, Doſ. Drach. i.*

Alius *℞. Rad. diſtamni, petasit. zedoaria, gentiana, ſol. ſcordij, cardui bened. sem. cardui maria, an. Drach. ii. F. Puluis. Alius, D. G. Leuſchneri.*

*℞. Ocul. ʒ. preparat. Vnc. ii. nuc. moſch. Vnc. sem. Fol. cardui bened. Drach. i. rad. pimpinell. diſtamni alb. an. Vnc. i. Carab. alb. prepar. Vnc. sem. F. Puluis ſubtiliſſimus. Alius eiufdem.*

*℞. Ocul. ʒ. preparat. herb. cardui ben. an. ʒ. i. rad. diſtamni alb. Scrup. ii. pimpinell. ſlor. ſiliginis, ſpangia ſambuci, nuc. moſch. an. Scrup. i. Myrrha gr. vi. F. Puluis ſubtiliſſimus. Doſis ʒ. i. in aceto calido ante paroxysmum.*

Imò sunt, ut ſuprà etiam diximus, qui mox in principio febrium talibus ſudoriferis vtuntur: hæc tamen lege, ut humores è primis viis priùs euacuentur. Hoc modo enim illud inquinamentum & fermentum putredinis diſcutitur, eoque ſublato nullus paroxysmus alius ſubſequitur.

*Ægyptij, referente Proſp. Alpino, de Medicinâ Ægypti. lib. 4. cap. 8. ad tertianas nothas & febres quotidianas pro ſecreto habent, ante acceſſionem, pulueris chamædryos ʒ. i. ex jure pulli, vel ex herbâ paratum decoctum cum ſacchar. multis diebus exhibere.*

Roborantia.

Roborantia etiam non negligenda. Et quauis corpus euacuatum ſit, aut febris ceſſet, non ſtatim à medicamentorum vsu deſiſtendum; cum facile fieri poſſit, ut remanens aliqua in viſceribus intemperies calida bilem rursus generet, è qua febris iterum accendi poſſit, Itaque hepatis & ventriculo ſuccurrendum medicamentis cum internis tum externis ex roſis, cichorio & ſimilibus.

Quòd ſi febris ſit pertinacior, procul dubio viſcus aliquod vitium contraxit, febrilem materiam ſupeditat. Quapropter membri illius cura habenda, &

quidem pro variâ membri naturâ varia. In intermittentibus enim hoc obſeruandum, ut ad membrum mandans inprimis reſpiciatur. In tertianâ Intermitte Hepar ſi malè affectum accalidius ſit, copioſe bilem generat, quam non ſemper in ſe retinet, cum membra nobiliora, quantum poſſunt, ſe ab humoribus vitioſis liberent, eoſque ad partes ignobiliores mittere ſoleant; ſed eam ad pancreas, meſenterium & alia hypochondriorum loca mittit: Hepar autem ob plures cauſas ad bilem generandam aptum redditur. Primò dum calefactum eſt: Deinde dum à craſſâ bile obſtruitur: tertio dum in ejus vaſis bilis abundat, à quâ chylus inquinatur & facile in bilem mutatur. Itaque ſi tale aliquid animaduertatur ex ſiti, quam æger patitur, aut vrinâ bilioſâ, ex colore volæ manûs, ex dolore, duritie, tumore hepatis, aut totius corporis pallente colore: Hepati in primis proſpiciendum eſt. Vnde rectè ſcribit Gal. 1. ad Glanc. cap. 9. ſemper oportet contrarias qualitates illis, quæ præter naturam inualuerunt, opponere. Et hæc alteratio plus iuuat, quàm crebra euacuatio. Licet enim frequentibus purgationibus æger moleſteretur, tamen niſi cauſa bilem generans tollatur; fruſtra æger purgantibus affligitur. Ergo ſi hepar & viſcera intemperie calidâ laborent, refrigerantia & roborantia conueniunt, tum quæ ſuprà ſunt propoſita, tum quæ parantur ex ejus generis conſeruis, conditis, ſpeciebus; exempli gratiâ, conſerua cichorij, violar. acetosæ, radic. condit. cichorij. ſpec. diarrhod. abb. diatrionſantal. ſpir. ſalis, vitrioli, & ſimilibus.

Si autem Hepar obſtructum ſit, aut bilis in ejus viis hæreat, medicamenta vsurpanda, quæ vias hepatis aperiant, & bilem per vrinas educunt, tum etiam per aluum leniter euacuant. Atque hæc eſt cauſa, cur Galen. aded absinthium in hiſce febribus commendat. Vim enim habet bilem detergendi, & eam cum per aluum, tum per vrinam educendi. Vtile etiam eſt decoctum hordei & radicum cichorij dilutius, & ſaccharo dulcoratum: ut & conſerua roſarum recens cum decocto hordei, vel radic. cichorij.

Mindererus, de calcantio cap. 9. in omnibus jecoris, meſenterij, hepatis ac venarum obſtructionibus Syrupum hunc, quo plurimi per diuturnas febres in cachexias ac hydropes deuoluti priſtinam ſanitatem rursus ſint adepti, commendat.

*℞. Succ. radic. cichorij, pimpin. depuratorum an. lb. i. fumariz, lupuli: an. ʒ. vi. petroſelini, ſeniculi, an. ʒ. iii. rad. apij, enula, aſparagi, eryngij, vincetoxici, an. ʒ. i. herbarum agrimoniz, Sanctæ Kunegundis ſeu Eupatorij Auicennæ, agerati, an. M. i. ſlor. centaurij min. ſol. ceterach. adiantij albi & nigri, cuſcuta, cardui benedicti, comarum abſinthij Pontici, an. M. lb. granorum alkekengi ʒ. i. aqua fontana lb. vi. aceti ſcillitici lb. ii.*

Arida omnia ex prædictis ſex libris aquæ coque, vſque dum ſuperſint libræ duæ, has tranſcola diligenter, & cum ſuccis & Aceto Scillitico, additis Sacchari albi libris tribus, coque in Syrupum juſtæ conſiſtentiz.

Huius Syrupi adjiciatur vel admiſceatur tantum olei Calchanthi ſeu vitrioli, quantum ſapor tolerare poſſe videbitur, ut aſſumpturo grata obuenerit aciditas. Huius tria porridge cochlearia ægro ante jentaculum, totidèmq; ante prandium & cœnam.

Extra etiam Topica adhibenda ſunt hepatis, qualia paſſim exſtant.

Et quia in febribus nothis materia plerumque difficilius concoquitur, ac præterea ab affecto Hepate crudas in eo & ſanguis frigidior generatur, vnde tumor pedum & oculorum oriri ſolet: Ideò & extra talia hepatis adhibenda, quæ illud roborant, vias aperiunt, partes dilatant & humores fundunt, ex endiuia, cichorio,

Hepar ut curandum.

Absinthij vſus in febribus.

Topica.



rio, taraxaco, agrimonîa, rosis, absinthio, spicâ, schzantho, chamamelo & similibus.

*Lienis cura.*

Lienis similiter ratio habenda est, qui in febribus diuturnioribus frequenter obstrui & duritiem contrahere solet: de quo in curatione Quartanæ dicitur.

*Ventriculi cura.*

Inprimis verò in febribus longioribus habenda est ratio ventriculi. Solet enim is à calore febrili debilitari: debilitatus verò malè coquit: vnde vitiosus chylus prouenit, qui in secundâ coctione non corrigitur, sed vberem potius febri materiam suppeditat. Hoc si animaduertamus, vtilissimum est bis in septimanâ id quod crudum est, ex alimento in ventriculo, & primis viis vomitu euacuare. Quo remedio pertinacissimas febres longè felicius, quàm villo alio remedio tolli, omnes Medici consentiunt. Et quidem die quietis, vomitus post cibum, materiæ antecedentis tollendæ gratiâ, commodè instituitur. Nam, vt etiam suprà de vomitu instituendo dictum, duplex est occasio vomitus instituendi. Vna, quâ commodissimè materia antecedens & quæ materiam antecedentem auctura est, tollitur; & secundum hanc occasionem rectissimè instituitur vomitus die quietis post sumptum cibum: Altera, quâ fit vomitus ob instantem paroxysmum, qui vt imminuatur, paulò ante ipsum vomitus instituitur. Deinde fouendus ventriculus. Exempli gratiâ.

℞. Ros. rubrar. absinthij, menha. an. M. ℞. spica hardi, ʒ. ij. mastiches, ʒ. ℞. cyperi, ʒ. i. flor. chamamel. melilosi, an. M. ℞.

Coq. in f. q. aq. vel vini albi, ac spongiâ decocto calido madidâ ventriculus foueatur; vel herbæ sacculo insuantur, qui coquatur & calidus ventriculo applicetur. Post forum ventriculus irrigetur oleo absinthij, mastich. cydoniorum, nardino, nucis moschatæ expresso; vel applicetur cerorum stomachale, & talia, quæ aliàs ventriculo debili conueniunt, atque alibi explicantur.

*Scorbuti moratio.*

Sæpe quoque accidit in hisce regionibus, vt in febribus diuturnis & tertianis & quartanis scorbutus cōjungatur. Materia enim febrilis & vitiosa in melsaracis collecta & diutius hærens, tandem dispositionem scorbuticam induit; vnde febres curatu difficiliiores redduntur, imò non curantur, nisi simul medicamenta, quæ scorbutus requirit, adhibeantur. Verùm de scorbuto, peculiari tractatu.

*Externa medicamenta in tertiana.*

Præter ista medicamenta omnia quædam adhuc occurrunt, quæ vulgò extrâ corpori ad febrem tollendam applicantur, nec omnia à Medicis improbantur. Inter quæ à plurimis commendatur emplastrum ex telis aranearum & vnguento populeo. De quo Abraham Seilerus, in Epistolis à Scholæzio collectis, epist. 3. ita scribit: *Expertus sum, si ante accessionem febrilem tela aranea cum vnguento populeo incorporata carpo & temporibus, ubi pulsus deprehenditur, apposita fuerint, plurimum contulisse.*

Alij idem medicamentum ita parant:

℞. Vrtica min. M. i. tela aranearum ʒ. ℞. Salis communis cochlear. i. Contundendo & addendo aceti cochlear. i. M. pro Emplastro, quod ad pulsus vtriusque manus per duas horas ante paroxysmum applicetur.

Alij folia burse pastoris cum sale & aceto trita carpis applicant. Alij fuliginem è furno, & saluam conculsam & cum albumine oui mixtam: Alij eandem fuliginem cum allio, capis & oui albumine ac aceto mixtam carpis alligant. Nonnulli contundunt anserinam cum sale & aceto, ac carpis applicant.

Alij & quæ vesicas excitant, & hoc sine folia ranunculi recentia contusa vel allium & capas carpis applicant. Alij recipiunt corticum interiorum nucis samorum q. s. macerant in aceto & carpis applicant; quo remedio se feliciter vsum Platerus scribit.

Nonnulli hoc emplastrum toti abdomini ante in-

uasionem apponunt, & ibi relinquunt, donec exsiccentur, idque die altero renouant.

℞. Farina q. s. oua nu. iiii. succi verbenæ plantaginis, radic. vrticæ Rom. an. q. s. Et ad formam Cataplasmatidis redigantur.

Ægyptij, vt refert Prosp. Alpinus, de medic. Ægypt. lib. 4. cap. 15. audaciores in hoc genere sunt, dum vnguentum parant ex araneis vnâ cum suis telis contulis & cum oleo rosaceo ad modum linimenti mixtis vel araneis in oleo rosarum coctis; quo calido carpum vtriusque manus inungunt.

De modo si quærat, quo hæc medicamenta agant, vix alia quàm hæc ratio reddi potest, quod ab istiusmodi medicamentis putridus vapor à corde & suo foco reuocatur & reuellitur: ac præcipuè inquinamentum illud ac *μάσµα* humores corrumpens euocatur, maxime si pauca ampliùs putredo restet, & febris in declinatione sit, de quo cap. præcedente dictum.

Habet interdum vulgus & Empirici alia quædam, quibus paroxysmum impediunt. Verùm nisi adhibeantur purgatâ materia, non tutò adhibentur; cum si materia in corpore relinquatur, licet febris cesset, grauiora mala sæpe inde sequantur, vt dolor colicus, cachexia, hydrops, icterus: Aut nisi medicamentum simul vim diaphoreticam & confortandi habeat, qualis anodyno Bannisterij tribuitur, quod describit Andr. Libanius, in *Synagmate arcan. Chymicor. in fine*: item Laudano opiato, quod VVilh. Pithopæus miris modis commendat, & hoc modo parat.

℞. Quinta essentia opij ʒ. i. ℞. essentia croci Drach. vi. essentia quinta lapid. pretiosor. magisterij corallorum, rubr. cum auro, perlarum, an. Drach. ii. lapid. bezoartic. orient. ʒ. ii. gr. v. auri diaphoret. siue potabil. ʒ. ℞. ambra grysea ʒ. ii. gr. v. moschi Scr. sem. ol. cinam. cariophyll. succini, an. gut. ii. Misceantur f. a. & in vitro satis capaci digerantur, atque interea semel atque iterum agitentur. Dosis gr. ii.

Victus tandem ratio in hac febre etiam diligens habenda: cum natura in exquisitâ tertianâ modò victus ratio rectè instituatur, sæpe morbo abigendo sola sufficiat.

In purâ igitur tertianâ victus ratio requiritur eadem ferè, de qua in continuâ biliosâ diximus. Cibus nimirum sit refrigerans & humectans ejus quantitas tanta, quantam natura rectè concoquere potest. Inprimis conuenit prisana & reliqui cibi, qui sunt boni succi & facili coctionis, simulque refrigerant. A melle autem & dulcibus, sinapi, salis & acribus omnino abstinendum, cum facili in bilem degenerent. Vinum, antequam materia coquatur, non exhibendum. At ubi concoqui cœperit, dandum est tenue, aquosum ac purum. Circa declinationem verò liberaliùs potest offerri.

Exhibendus verò cibus est extra accessiones: nisi virium ratio, spirituum dissolutio & imminens Syncope contrarium suadeat: id quod in siccis & calidis naturis fieri solet. Calidis enim & siccis naturis aduersissima est inedia, & febrium causâ præsentissima: vnde Galenus, vt ex 10. meth. med. c. 5. videre est, nonnunquam tales, ne syncope periclitentur, in paroxysmorum principio cibare coactus est.

In nothis verò tertianis ad duo inprimis in victu præscribendo attendendum, curandumque, ne vel morbus augeatur, vel vires, quæ in morbo longiore diu sufficere debent, periclitentur. Quorum vtrumque exactè præstare non ita facile est. Inedia enim quantum prodest ad morbi coctionem, tantum vires labefactat: Cibus contrâ, quantum vires augeat, tantum coctionem materiæ febrilis impedit. Ergo morbi & virium magnitudo diligenter inter se comparanda est. Victu tenui enim valentibus viribus & materiâ coctu difficiliore audaciùs vtimur; largiore autem cibo vtendum, cum vires sunt imbecilliores, atque materia non admodum coctu difficilis. Copiosiore tamen omninò cibo

cibo opus est in tertianâ nothâ , quàm purâ ; cum morbus sit diuturnior. Cibus verò porrigatur in primis die Intermittionis. Verùm cum non omnes naturæ id ferant , vt tertio solum quodque die cibum sumant , & præcipuè ob potûs necessitatem : Ideò & die paroxysmi aliquid cibi , sed qui sit omninò facilis coctu , post paroxysmum , aut pluribus horis ante paroxysmum præbendum , sed omninò minus , quàm in tertianâ purâ ; cum paroxysmus longius protrahatur : die verò quietis solidior cibus & maiore copiâ , quàm in tertianâ purâ exhiberi potest , vt carnes pullorum , gallinarum , hædinæ , virulinæ. In nostris regionibus commo- diffusus est potus cereuisia tenuior. Cibus autem non solum refrigeret & humectet , vt in exquisitis , sed etiam non nihil attenuet & incidat. Vinum tamen etiam album tenue concedi potest. Galenus prisanæ succo vtitur , adjecto pipere ; & loco potûs aquâ mulsâ , in quâ origanum vel hyssopus cocta fuerint. Verùm alij hæc sine periculo ferri posse non putant , præsertim si pituita pauca admixta sit , & corpus sit calidius. Et satius esse censent , prisanâ vti cum apio , petroselino & cinamomo decoctâ. Quâ in re tamen ad mixtionem humorum attendendum. Si enim parum pituitæ admixtum sit , etiam parum calidorum admiscere oportet ; si verò febris multum à tertiana pura declinet , plus admiscere licet. Potest tamen illud *χαλδæ* in melle , aceto addito facile emendari. Aliàs , vt dictum , consuetus & vtilis potus est cereuisia tenuior , quæ & ipsa , si opus sit , commodis & idoneis plantis condiri potest.

## CAPVT XIX.

## De Quotidiana Intermittente.

Secunda febris Intermittentis species est , quæ è pituita oritur ; quæ quia singulis diebus inuadit , quotidiana communiter nominatur. Hanc Fernelius , *lib. de febr. capite* 12. omnium febrium esse rarissimam , & quæ vix ex sexcentis vna obtingat , scribit. Platerus verò eam dari planè negat , & quamuis multi quotidie febris conflictentur , id tamen non à quotidiana , sed duplici tertianâ , vel etiam triplici quartanâ fieri. Et ita reuera sese res habet. Plerique enim , qui singulis diebus febris corripiuntur , febriçant ob humorem biliosum aut melancholicum ; raro ob pituitosum. Atque tales febres potiùs duplices tertianæ , aut triplices quartanæ nominandæ sunt. Simon Simonius quidem planè istas differentias compositas , & appellationes duplicis aut triplicis tertianæ ac quartanæ rejicere videtur : Verùm planè & per omnia illi non assentimur. Si simili typo non inuadat quotidie febris , & primus paroxysmus tertio , secundus quarto & sic consequenter ; aut primus quarto , secundus quinto , & sic deinceps respondeat : tales febres non iniuriâ tertianas duplices , vel triplices quartanas nominari posse statuimus ; id quod præcipuè ex duplici quartanâ apparet. Hoc tamen semper obseruandum censemus : nomina quotidianæ , tertianæ , quartanæ , non constituere febrium differentias , sed humores. Itaque jam de quotidianâ intermittente agimus , non eâ , quæ à bile fit , & quotidie recurrit , sed de eâ , quæ à pituitâ.

Generatur hæc febris raro citrà ventriculi aut hepatis offensionem. In his enim duobus locis pituita generatur , nimirum in hepate , ex frigidioris chyli parte ; in primis verò ex alimentis ac præcipuè pituitosis in ventriculo. Et cum hæc febris à pituita fiat , omnia ea , quæ faciunt , vt pituita in corpore colligatur , huius febris causa esse possunt. Ista autem ad tria capita commodè reducuntur , nimirum ad debilem & imminutum viscerum calorem ; ad alimentorum frigidam & humidam naturam , & eorum copiam atque abundantiam. Hinc colligitur pituita in iis , quibus hepar

& ventriculus aut etiam tota corporis constitutio est frigida & humida : quibus nimirum habitus corporis est obesior , albicans , venæ & arteriæ angustæ. Ætas ad pituitæ generationem apra est senilis , ob nativæ caloris paucitatem ; & puerilis , ob voracitatem. Sexus verò muliebris & vita otiosa etiam facit ad pituitæ generationem , victus plenior & liberalior ; aeris constitutio , siue ratione temporis anni , siue cœli , siue loci , frigida & humida ; somnus longus , præsertim mox à cibo initus ; refrigerantium medicamentorum usus.

## Signa diagnostica.

Signa febris Intermittentis pituitosæ petuntur , tum ex iis , quæ præcesserunt , quales sunt , causâ pituitam generantes & cumulantés modò enumeratæ ; tum ex iis , quæ pituitæ in corpore copiam arguunt , tum propriis Symptomatis. Pituitæ copiam indicant faciei corporisque color albicans , nonnunquam pallidus aut liuidus , moles eiusdem ampla ac mollis , & ad tactum frigidior ; mens & sensus sunt hebetiores , somnus profundus , insomnia de aquis , pluuiis , niue , submerlione. Pulsus est parvus , tardus ac mollis. Urina alba vel pallida , nunc tenuis , nunc crassa , cum multo sedimento. Quod si putredinem jam concipiat pituita , & inde febris excitetur , tempore nocturno ea præcipuè affligere solet ; vnde apud Hippocratem , 3. *epid.* per nocturnas febres pituitosas intelligendas esse aliqui existimant.

Non enim hic prætereundum quosdam monere , si- gna febrium humorisque peccantis aliqua etiam , haberi posse ex horâ inuasionis , & cuique humori suam horam tribuere. Sanguinem moueri nimirum ab horâ nonâ noctis vsque in horam diei tertiam dicunt : ab horâ diei tertiâ ad horam diei nonam bilem : ab horâ diei nonâ ad horam tertiam noctis , melancholiam ; ab horâ tertiâ noctis vsque ad horam nonam noctis pituitam dominari.

Inuadit autem hæc febris non subito , sed sensim cum extremitatum saltem refrigeratione aut horrore. Rigor autem , vt Galenus scribit , eam non antecedit , neque initio , neque in progressu. Cum enim materia hæc ( de legitimâ pituitosâ hoc intelligendum ) benigna sit & naturæ non aded infensa , & calor ex putredine remissus , minus quoque naturam laceffit , & propterea calor non cum impetu , sed leuiter ad interiora reuocatur.

Calor post refrigerationem cum difficultate accenditur , & tardè inualefcit , ac cum magnâ inæqualitate , quâ modò calor , modò frigus sentitur. Humor enim pituitosus est frigidus , humidus ac crassus : accensus verò calor non est acris , sed halituosus primùm occurrit , quasi ex accensis lignis viridibus vapor sublatus , & quidem inæqualiter manum ferit , vt veluti per cribrum transmitti videatur , vt docet Galenus. At si manus diutius admora teneatur , aliquantum mordax & acris apparet. Calor postea per totum corpus diffusus illud non valdè vrit , neque denudare membra , & tegumenta abjicere cogit , neque multum aut frequenter respirare , potumque appetere. Qui enim hac febre laborant , minus sitiunt , tantumque abest , vt lingua sicca sit , vt etiam humiditate perfundatur. Cum etiam febre incipiunt , præcordia intumescunt , inflantur ac distenduntur : color iis est pallidus ; etiam cum paroxysmus ad statum peruenit , faciesque ferè subliuida & subrumida ; corporis adest grauitas , & maxima ad somnum inclinatio. In paroxysmi initio , non raro accidit lipothymia , potissimum ob os ventriculi , quod in hac febre afficitur.

Urinæ in primis diebus tales sunt , quales in quartanis incipientibus , albæ , tenues & crudæ , ob materiæ copiam , quæ & meatûs obstruit , & calorem naturæ obruit. In principio morbi etiam plerumque in fundo matulæ apparet & residet aliquid sedimento simile ,

Signa quoddam Inter-  
mittentis.

Signa febris  
ex horâ in-  
uasionis.

Calor quoddam  
dianarum.

Urina.

simile, quod tamen verum sedimentum non est, neque ullam coctionis notam exhibet, sed est humoris crudi adhuc peccantis portio, & propterea cruditatem materię potius, & principium morbi, quàm coctionem ostendit. Postea verò, cum materia concoquitur, eiusque nonnihil per vrinas expurgatur, crassiores sunt & turbidæ, sæpè etiam rubræ. Verum & alui dejectiones crudæ sunt & pituitosæ: quia corpus frigidis & crudis humoribus refertum est. Quà de causâ etiam primis diebus non sudant; progrediente verò tempore in declinatione paroxysmi parum sudoris emittunt.

Pulsus, ut hac de re Galenus scribit, tantò minor est pulsu quartanæ, quantò quartanæ pulsus tertianæ pulsu minor est. Pulsus item arior, quàm tertianæ & quartanæ; æquè verò rarus. Quotidianæ ergò est minimus, rarus, tardissimus; tertianæ maximus, velocissimus & frequentissimus; quartanæ parvus, tardissimus & rarissimus. Cuius rei causa est, quia cum in tertianâ magis urgeat vsus, quàm in quartanâ, & in hac rursus magis, quàm in quotidiana: mirum non est, maiorem esse in vnâ, quàm in aliâ. Celeritas verò in quotidiana & quartanâ par est, etsi maior sit calor in quartanâ, quàm in quotidiana: quia id, quod magnitudine in quartana adimpletur, in quotidiana mediante maiore celeritate fit. Itaque est quartanæ pulsus tantò rarior quotidiana: quantò tertianæ frequentior quotidiana, ob fuliginum copiam & acrimoniam in tertiana.

Paroxysmus ad horas 18. extenditur; unde intermissio & interuallum est saltem 6. horarum: quæ etiam raro integra & pura est sed solum ad sensum, & humoris putrefacti in calore & pulsibus semper relinquitur indicium. Imò sæpè ad 24. horas extenditur; unde continuæ similis apparet. Calor enim in hac febre est similis calori in lignis viridibus accenso, qui & tardè deflagrat, & multum fumorum relinquit.

Quæ quidem signa omnia in exquisitis pituitosis seu quotidianis inueniuntur. In nothis verò non omnia, sed quædam ipsorum adsunt, quædam desunt; atque alia in febre à pituita acidâ, alia à pituita falsâ adsunt. Vnde Galenus, *de plenit. cap. 11*. scribit, à falsâ siticulosi, ab acidâ famelici, à dulci somnolenti, ab insipidâ inappetentes fiunt. Ita quæ ab acidâ & pituita vitreâ ortum habent febres, teste Galeno, 2. *de differ. febr. capite 6*. rigorem conjunctum habent.

### Prognostica.

*Prognostica.* Febris hæc, cum ex humore pertinaci generetur, ac longa sit, periculo non caret: & cum in eâ viscera, ventriculus & hepar præcipuè, afficiantur, facile qui eâ derinentur, in cachexiam, hydropem, atque alios graues ac periculosos affectus, ut carum, ac similes labuntur. Et quò pituita crudior, eò febris diuturnior & periculosior est. Et quò exquisitior est quotidiana, eò est diuturnior & periculosior; duratque ad dies quadraginta; nonnunquam ad menses tres, imò nonnunquam plures.

Breuitatem autem vel longitudinem morbi ostendent signa coctionis in vrinâ, quæ quò citius vel tardius apparebunt, eò morbus erit longior vel breuior. Paroxysmorum quoque longitudo vel breuitas idem ostendent. Sicut & si in paroxysmi initio vomitus siue sudor appareat, breuiorem morbum ostendit. Indicium enim est materiam non admodum esse crassam & viscosam, & actionem naturæ non planè respuere. Contrarium sequitur, si nulla euacuatio accadat, morbusque in eodem statu permaneat. Ideoque si vires & appetitus valdè deiciantur, accessiones sint longæ, cum nullo sudore: parua salutis spes superest.

Etsi verò hæc febris noctu inuadit, tamen inter-

dum interdum etiam inuadere solet. Diurna verò nocturna est periculosior, & ad tabem plerumque deducit, cum aliis de causis, tum quòd tempus medicationi non suppetit. Etenim cum interdum in paroxysmo medicamenta commodè offerri non possint: vel si ne medicamentis æger relinquendus: vel tempus quòd somno & quieti dandum erat, medicationi tribuendum. Quæ res vires dejicit, corpusque tabefacit.

### Curatio.

Curationem autem hujus febris quod attinet, de eâ multâ dicere opus non est; cum ea, quæ suprà de curatione Quotidianæ continuæ dicta sunt, facile Intermittenti applicari possint.

Primæ viæ euacuentur clystere parato ex decocto mercurialis, parietariæ, betæ, flor. chamæmel. summit. anethi, sem. anisi, fœniculi, carthami, fursur. cum Elect. diaphœnic. mell. rosato col. & similibus.

Venæ sectio in hisce febribus puris vix locum habet; cum venâ incisâ sanguis bonus emittatur, & vitio si ac crudi humores in primis viis hærentes in venas attrahantur.

Vtilis verò est vomitus, ut vix in vllâ febre sit vtilior; cum ventriculus, qui in hac febre maximè afficitur, in primis euacuet: & quidem is, per interualla sæpius instituendus. Cautione tamen in hac re opus est, ne ventriculus, qui aliàs, ut dictum, in hac febre laborat, fortioribus vomitoriis debilitetur. Etsi autem vulgò feratur, ventriculus prius roborandum esse: tamen nec id satis tutum videtur. Etenim si ventriculus roboretur, non facilis erit ad vomitum. Ergò distinctione hac in re opus est. Nam si ex hepate & venoso genere præcipuè materia febris suppeditetur, non facile, & non nisi fortioribus vomitoriis materia euacuatur, quibus ventriculus non parum debilitatur. Si verò ventriculus pituitosos humores suppeditat, tunc commodius vomitus instituitur. Cum autem pituitosi humores in ventriculo, quia causa sunt, ut alimenta assumpta non rectè concoquantur, sed potius in pituitosos humores conuertantur, plerumque crassi & viscidissimi sint, humores illi prius præparandi sunt, hydromelite, in quo folia origani vel hyssopi macerata sint, additâ parte aliquâ oxymelitis, ut facilius postea vomitu rejici possint.

Est autem in vomitu ciendo hîc conueniens raphanus, cujus vel decoctum, vel succus, vel infusum cum oxymelite 3. iiii. vel plurimum pondere propinari potest. Licet & alia addere, ut semen atriplicis, anethi, flores genistæ, chamæmeri; quibus & 3. i. agarici addi potest, ut:

*℞. Sem. raphani, atriplicis, anethi, an. 3. B. flor. genistæ, chamæm. an. P. i. Coqu. in s. q. aq. pro 3. v. Col. adde oxymel. s. 3. i. Misce.*

Efficax est & hîc in fortioribus extractum Esulæ. Verum de vomitoriis jam aliquoties satis dictum.

Postea materia præparetur medicamentis alterantibus, incidentibus & detergentibus; initio quidem mitioribus, hinc fortioribus, ex radicibus aperientibus, hyssopo, origano, betonica, agrimoniâ, capillis ♀. chamædry, chamæmelo, calamintâ; quibus & cichoracea, admiscere licet ob carorem febrilem: cum Syrup. acetoso s. melle rosaceo, oxymel. simp. & comp. Syr. byz. ant. s. & composito, de endiuia comp. de hyssopo, de duabus radicibus, de quinque radicibus, oxymel. scillitic. elaborato Gesneri, Spir. vitriol. ☉.

Materia præparata conuenientibus medicamentis expurganda, ut agarico, mechoacanâ; quæ in hac febre commodissima est: cum non solum pituitam educat, sed & resoluat absque exsiccat, & temperatè ventriculum calefaciat ac roborat: turbit, trochisci alhandal, elect. Indum, diaphæn. diacarthamum, extractum pachymagogum & esulæ, pilulæ de hierâ cum agarico, de agarico.

Sudorem



Sudorifera.

Sudorem quoque & vrinam cientia hæcenus proposita non negligenda; & quidem fortiora in hac febre vsurpanda, ex fæniculo, carduo benedicto, salsa parillâ, ligno sancto, sassafras, theriacâ, sale cardui benedicti, ebuli. Inprimis ad sudorem ciendum & febrem quotidianam depellendam commendatur radix caua, quæ 3. i. vel 3. iiii. pondere ante paroxysmum in haustu vini ter vel quater exhibeatur, vt æger sudet. Tandemque vt pituitosi humoris generatio prohibeatur, viicera, & inprimis ventriculus roborandus, cum externis tum internis medicamentis, vt:

*℞. Conferua hyssopi, betonica, anthos, an. 3. i. cortic. citri condit. 3. 8. rad. condit. helenij, pimpinella. an. 3. iiii. spec. aromatici rosati 3. 8. spir. viuiol. 3. 8. Cum syrup. conseruat. calami aromatici, vel zingiberis in Chinâ conditi. F. Electuar.*

## CAPVT XX.

## De quartana Intermittente.

Quartana  
Intermis-  
sionis.

**T**ertia Febrium Intermittentium species est, quæ ab humore melancholico oritur, quæ quod quartanam periodum obseruat, quartana appellatur: Febris nimirum putrida, intermittens, quarto quodquodie recurrens, ab humore melancholico in primis viis collecto & putredinem concipiente ortum habens.

Melancholia  
differensia.

Melancholicus autem humor non est vnus generis, sed plures humores sub melancholiæ nomine comprehenduntur. Alius nimirum dicitur esse humor melancholicus naturalis, alius præternaturalis. Naturalis primò est crassior sanguinis pars, quæ cum sanguine in venis continetur. Sed hic rectius sanguis melancholicus, quàm melancholia dicitur, neque huius febris causa est. Deinde melancholia, & quidem propriè dicitur humor excrementitius, qui tamen secundum naturæ leges generatur, & secundum vulgatam opinionem in lienem secedit. Melancholia autem præternaturalis aut potius atra bilis (ita enim proprio nomine appellatur) est, quæ ex adustione aliorum humorum fit. Huius differentias quatuor constituit Auicennas. Alia enim ex adustione & torrefactione quasi bilis flauæ: alia ex pituitæ; alia ex sanguinis; alia ex melancholiæ naturalis adustione fit.

Vnde cum Auicennas eiusque interpretes scribunt, dari Quartanam biliolam, sanguineam, & pituitosam, id non aliter intelligendum est, quàm has febres fieri ab atra bile, generatâ ex adustione vel sanguinis, vel bilis vel pituitæ falsæ. Et quidem ex bile immediate atra bilis generatur; cum verò ex sanguine tenuiore & pituitâ falsa fit humor ater, prius in bilem, & ex bile in humorem atrum mutari credibile est.

Quinam hu-  
mor melan-  
cholicus  
Quartana  
causa sit.

Cum autem tot sint humoris melancholici differentie: quæritur iam; An à qualibet eius differentiâ febris excitari possit: de quâ re alij aliter sentiunt. Alij enim ex his humoribus omnibus febres quartanas oriri statuunt, alij ex melancholiâ solum naturali febres quartanas prouenire posse; ex iis verò differentiis, quæ ex humorum aliorum adustione & torrefactione proueniunt, nullas febres prouenire posse existimant. Cum enim atrâ bile nullus humor sit perniciosior, & omnes partes, quas transit, erodat & exulceret, si febrem excitaret, eam non diuturnam, qualis est quartana, sed acutam faceret; tum etiam pessima symptomata inueheret, qualia non apparent in quartanâ. Imò putant, tantam esse huius humoris malignitatem, vt si in corpore generetur, prius hominem iugulet, quàm putrescat, aut febrem excitet. Vnde etiam Galenum solum quartanæ, quæ ex humore melancholico naturali fit, mentionem facere censent.

Videreturque Galenus hoc expressè non decidisse, quo nomine & à Tralliano, lib. 12. cap. 8. reprehenditur, quasi vnam saltem Quartanæ curationem tradiderit, lib. 1. ad Glauco. cap. 11. cum tamen Quartanæ febris non vna sit species, sed alia ex bile flauâ nimium adustâ, alia ex feculento sanguine nascatur, quæ curationis modo etiam differant. Nam eam, quæ ab humore melancholico creatur, calefacientibus humectantibusque iuuari: quæ verò ex nimia bilis adustione prouenit, humectantibus & refrigerantibus. Miraturque Trallianus, quomodo Gal. in omnibus quartanis non alium victum, quàm qui calefacere & siccare possit, præcipiat; ab iis verò, quæ refrigerant & humectant, abstinere iubeat. Ipse verò diuersam curam præscribit quartanæ à melancholiâ. Nam si æger naturâ calidus sit & siccus, ætate vicens, anni tempus sit æstium, curæ, vigiliæ, tristitia, ira, acrium medicamentorum vsus præcellerint; etiam valdè refrigerantia adhibet.

Verumenimverò etsi possit concedi, quartanam legitimam, seu febrem melancholicam puram tantum prouenire ab humore melancholico naturali: tamen impossibile non est, quin etiam febris quædam Quartana ex humore adusto fieri possit, inprimis si alij humori permisceatur. Tum enim is ita malignus non est: neque etiam semper eiusdem gradus est humor adustus. Et tales febres quartanæ sunt pleræque eæ, quæ à principio hominem non inuadunt, sed aliis febribus & morbis succedunt. Atque ita se rem habere, signa & symptomata docent, atque illud inprimis, quod aliquoties quartanas in scabiem, eamque scabiosissimam lepræ non dissimilem terminari vidimus.

Neque planè hoc indeterminatum reliquit Galen. cum, 3. aph. 22. atram bilem, ex quâ Quartanæ ortum habent, geminam fortiri generationem, vnam ex flauâ bile retorridâ & perustâ, alteram ex crasso sanguine scribat, quod & 3. prognost. aphor. 27. docet.

Neuter tamen hic humor Quartanam producit, antequam putrescat; sed sæpe diu in corpore cumulat, antequam putrescat. Itaque proxima febris Quartanæ causa est humor melancholicus, in primis viis, circa lienem & vicina viscera, putredinem concipiens.

Causa  
Quartana  
proxima.

Remoræ verò sunt ea omnia, quæ ad humoris melancholici & attri generationem faciunt. Vbi enim humores à causâ calidâ quacunque aduruntur, accidit, vt vbi feruor ille desit, quasi cineres quidam relinquuntur, nunc planè frigidi & sicci, nunc caloris alius adhuc participes. Hinc euenit, vt quartanæ potius post quadragesimum annum, quàm ante, & præcipue autumnò accidant, & tertianæ in Quartanas mutantur. Nam ætate iuuenili & in ætate, inprimis, calidâ & per febres tertianas humores aduruntur, quorum quasi cineres postea accedente ætate & tempore frigidiore in corpore retinentur, tandemque putredinem concipientes Quartanam generant. Generatur nimirum humor melancholicus in iis præcipue, qui corpus calidum & siccum habent, lienem tumidum, obstructum & imbecilem. In talibus enim crassi & terrei quasi humores colliguntur, & in lienem & vicinis locis cumulantur, vel etiam in totum corpus effunduntur. Cumulantur verò ex crassorum ciborum vsu, quales sunt carnes bubulæ, ceruinæ, aprugnæ, sale conditæ & fumo induratæ; pisces ex limosis aquis, olera & legumina, panis non fermentatus, vinum crassum, cereuisia feculenta. Vt enim vinum, cereuisia, aut alius succus crassus & feculentus, dum fermentatur & digeritur, multum fecis deponit: ita & ex crasso & impuro chylo & chymo, dum coquitur, multum feculentæ materiæ separatur.

Remota.

Acetum etiam melancholico humori generando aptissimum est, ob vires & qualitates melancholiæ similes. Est enim melancholia & præcipue atra bilis

K

aceto

aceſco perſimilis , quod inſignis acrimonia oſtendit , præterquam quod exſiccac ſimul & refrigerat. Et diximus antea , in Quartanâ fieri humorum in acidum mutationem : neque aliter fieri è vino acetum , quam ex ſanguine melancholiam , Gal. 3. de ſympt. cauſ. c. 2. innuit. Quâ de cauſâ & Hippoc. 3. de vict. rat. in acut. 1. 38. melancholicis acetum noxium eſſe docet : ſiquidem ſiue temperiem ſiue generationis modum ſpectes , acetum melancholiæ pabulum eſt. Et omnino locus iſte Hippoc. conſideratione dignus eſt , cum anſam cogitandi de fermentatione & generatione humorum ſalſorum in corpore noſtro præbere poſſit : ſiquidem non in alteratione qualitatũ primarum Hippocrat. ſubſiſtit ; ſed acidi , amari , fermentationis , exaltationis mentionem facit. Reuera enim hîc non tam ad qualitates primas , quàm ad diuerſas ſalium naturas reſpiciendum , quibus multas mutationes perfici Chymia docere poteſt. Ita autem ille : αἰ σπο δὲ οὖρον δὲ ὑπὸ πυρρῶν οὖρον μᾶλλον , ἢ μελαγχολικῶν συμπερῶν. Τὰ μὲν γὰρ πικρὰ δαλνύει καὶ φλεγματώται , μεταωριζόμενα ὑπὸ αὐτῶν , τὰ δὲ μίλανα ζυμύται , καὶ μεταωρίζεται καὶ πολλὰ πικρὰ σῆντοι , ἀναγῶν γὰρ μίλανων δὲ οὖρον , id eſt , *Aceti aciditas bilioſis naturis magis confert , quàm melancholicis. Amara enim diſſoluntur , & in pituitam tranſeunt , dum ab ipſo in ſublime attolluntur.* Nigra verò fermentantur & in ſublime attolluntur , & multis partibus augentur. Acetum namque nigra exaltat. Vbi malè redditum vulgò puto : *Educit nigra acetum* : cum potiùs verti debeat : *Exaliat nigra acetum.*

Ætas generationi melancholiæ apta eſt conſiſtens & iam inclinans : vita curis ac triſtitia occupata & ſtudiis ac grauioribus occupationibus dedita. Nulli tamen ætati parciť Quartana , & ætatis rationem non habet , vt ſcribit Aëtius , lib. 5. cap. 38. Eſt enim ætas conſiſtens demum melancholico temperamento eſſe incipiat : tamen , præter temperamentum , cauſæ externæ & rerum non naturalium vitia & errores tam potentes ſunt , vt etiam in ſanguineo , vel alio corpore humorem melancholicum generare poſſint.

Tempus , quo maximè generatur melancholia , eſt Autumnus ; vnde etiam Autumno frequentiores ſunt quartanæ. Præſertim ſi calidam æſtatem excipiat , quæ nimio æſtu humores aduſſit ; aut Saturnius influxus ac vis accedat : quod anno 1616. accidit ; cum Quartanæ ferè toti Germaniæ eſſent epidemiæ , & Vvicebergæ hîc tam familiares , vt etiam infantes modò natos corripere , quod filio meo tres menſes nato tum etiam accidit , & vix domus aliqua eſſet , in quâ non Quartanarius vnus vel etiam plures decumberent. Quæ Quartanæ etſi à communi aëris conſtitutione ortum haberent : accedebat tamen contagium , quo ſeminaria febris in alia corpora transferebantur.

Faciunt etiam hûc ſuppreſſæ euacuationes , qualis eſt præcipuè , quæ per hæmorrhoides fieri ſolet.

Aduſta autem melancholia ſenſim ac paulatim generatur ab intemperie calidâ & ſiccâ , de quâ Galeſus , de attr. bile , cap. 4. & 6. Confertim verò à febrili calore. Per febres enim humor melancholicus & ater contrahitur , vt Galen. 3. de loc. affect. cap. 7. & 3. prognostic. cap. 27. docet. Nam humores febrili calore aduruntur , ac quod de bile reſtinctum eſt quodammodo , in atrum humorem vertitur. Hinc ardentes & tertianæ febres , præcipuè ſi autumnum attingant , in Quartanas deſinunt ; quod frequentiffimè eodem anno accidiffe , notiffimum eſt. Si enim aduſtorum humorum quaſi cineres non excernantur , ſed permaneant in corpore & incaleſcant , putrem quandam diſpoſitionem recipiunt. Hinc Aëtius , lib. 2. cap. 22. Conualeſcentes à febribus melanagogo egere ſcribit , vt humoris corrupti ſex per aſſationem craſſior reddita expurgetur.

### Signa diagnostica.

Signa huius febris quod attinet , primò ſumuntur ea à cauſis , quæ præceſſerunt & modò enumeratæ ſunt. Deinde ex illis , quæ præſentem melancholiam arguunt , & humoris melancholici in corpore abundantiam indicant : qualia ſunt , faciei , totiùſque corporis color fulcus & nigricans , interdum æqualis , & per totum corpus interdum maculis quibuſdam ſaltem , conſpicuus : Habitus corporis ſiccus & macilentus ; aſpectus triſtior ; mœſtitia , amor ſolitudinis : ſomnus turbulentus ; inſomnia de rebus nigris , fumis , morte , cadaueribus , ſepulchris & ſimilibus triſtibus. Vrina , ſi nihil melancholiæ vnâ excernatur , eſt tenuis , alba : Si verò melancholia vnâ excernatur , craſſa , liuida & nigra.

Atque hæc ſigna melancholiam in corpore arguunt , etſi febris non adſit. Verùm vbi iam melancholia putredinem concepit , & febrem generat , inuadit ea primò cum oſcillatione , pandiculatione , & moleſtâ quadam totiùſ corporis inæqualitate , quam rigor ſequitur , qui initio paruus eſt , vel locò eius ſolùm refrigeratio & horror. Progreſſu verò temporis ſenſim fit maior , donec fiat vehementiſſimus ; qui talis eſt , qualis accidit iis , qui tempore hyberno refrigerantur , ſenſumque exhibet non rei pungentis , ſed grauantis & quaſi contudentis & confrigentis oſſa , quos dolores Græci οσκώπεις vocant. Cum enim materia ſit craſſior , primò cum impetu moueri non poteſt : poſtea verò ſenſim attenuatur , vaporéſque ab humore melancholico craſſi ſunt , frigidi & ſicci , oſſiumque , quæ craſſiore ſanguine nutriuntur , membranas ferientes , hos dolores excitant.

Caloris etiam modus ab aliis febribus differt. Succenditur paulatim , neque , vt in tertianis , velut adurens eſt & æſtuoſus , ſed ſubmiſſus. Materia enim craſſa eſt & frigida , quæ difficulter putreſcit , ac tardè accenditur. Declinatio eſt cum purâ , ſimplici & longâ ἀπυρεξία , adèd vt plerique ægri tempore intermiſſionis poſſint ad conſuetas operas redire.

Pulſus in melancholicâ intermittente febre toto morbi progreſſu rarus eſt ; in principio tamen valde rarus. Quâ ratione ab omnibus febribus differt , neque vlla alia febris eſt , quæ pulſum tam tardum ac rarium habeat. Nam arteria videtur quaſi ad interiora retracta , neque liberum habere alceſum ; quale nihil apparet in tertianis. Et licèt , cum augetur paroxyſmus & increſcit , fiant pulſûs frequentes & veloces : tamen & tum ſeruatur ipſorum tarditas ac rarietas ; & ſi comparetur pulſus tertianæ in vigore , multò velocioreſ & frequentioreſ apparebunt pulſûs in tertiana , quàm in quartana. Et licèt , vt ſuprà etiam dictum , æger ſit iuuenis : tamen pulſum habet talem , qualis eſt in ſenibus. Bilem non vomunt , qui hac febre laborant , vt qui bilioſâ febre afficiuntur. Sudores etſi primis diebus non multi ſunt : tamen progreſſu morbi , attenuatâ materiâ , fiunt ſudores copioſiſſimi. Vrina in principio alba eſt , tenuis & aquoſa. Humores enim tum adhuc crudi ſunt , & quia hic humor reliquis eſt longè craſſior , magnas obſtructiones facit , vt vix tenuior pars penetrare poſſit. Morbo procedente , coloratiores & craſſioreſ redduntur vrinæ , quia materia coquitur , & obſtructiones reſerantur : & quidem ſæpe color & contenta mutantur ; quia materia non rarè varia eſt , eiùſque modò parum , modò multum ad vias vrinæ penetrat. Paroxyſmi tempore durationis ferè ſunt ſimiles paroxyſmĩs tertianæ ; nonnunquam etiam longioreſ. Siſis non eſt admodum magna ; minor quidem , quàm in tertianâ , maior autem , quàm in quotidianâ. Lien vt plurimum afficitur , & ad eiùſ affectûs quartana plerumque ſequitur. Atque hæc ſigna in legitimâ febre melancholicâ intermittente omnia manifeſta ſunt. In

noctâ autem seu spuria etiam humoris admixti, seu ad quem humor præternaturalis declinat, notæ apparent, adustumque humorem indicant grauiora symptomata, calor, sitis, vigiliæ, & symptomata omnia grauiora & periculosa, quàm in eâ, quæ à naturali melancholiâ ortum habet, & semper paroxysmi referunt aliquomodo & sapiunt reliquias humoris, ex quo melancholia adusta genita est.

#### Prognostica.

*symptoma.*

Quartana autem omnium febrium longissima est, & sæpe non solum ad aliquot menses, sed & plures annos extenditur. Aëstiuæ tamen sunt breuiiores; autumnales verò longæ, maximè, quæ non procul absunt ab hyeme, 2. aph. 25. Primus terminus est proximum solstitium vel æquinoctium, id est, quarti mensis initium; quo si non soluitur, extenditur ad alterum, siue septimum mensem. Inueteratæ Quartanæ raro soluntur, nisi vere, scribit Celsus, lib. 3. cap. 16. propter aëris temperiem & sanguinis dominium, qui melancholiæ planè aduersatur. Si tamen non accidat in eâ error, non addit ultra annum, ait Auicenna. Verum nonnunquam ad triennium, imò annos duodecim, pluresque durasse, obseruatum est; & adhuc hodiè inter vulgus reperiuntur, qui ab epidemiâ illâ superiorum annorum quartanâ nondum liberati sunt. Refert Massarias, se vidisse matronam Venetiis, quæ 22. annis quartanâ laborauerat. Et quidem quæ à puro succo melancholico oritur, etsi minùs molesta sit; longior tamen est, quàm quæ à bile admixtâ vel adustâ originem habet: cum in tertianâ contrarium fiat.

Est porro Quartana febris quidem tutissima, & periculo carens; Dat enim naturæ inducias sese colligendi diebus intermissionis. Vnde Phauorinus apud Gel. lib. 17. cap. 12. fortunatiorem vocat hanc biduo mediò interuallatam febrem, in quâ *uisa sunt pueri, & adun-  
tipes.* Si tamen sit legitima, & sine alicuius visceris affectu hominem inuadit, tuta est. Nam quæ ab atrâ bile prouenit, longè periculosior est; & quæ cum visceris alicuius, hepatis puta aut lienis, grauiore affectu coniungitur, plerumque periculo non vacat, & ægros tandem in hydropem lethalem aut in contumacem scorbutum coniecit. Simplex quoque toleratur facilius, quàm duplex vel triplex. Senibus quoque, quibus morbi diurni commoriantur, 2. aph. 39. periculosa & plerumque lethales sunt hæ febres; quòd calor debilis humorem tam pertinacem vincere nequeat. Sicca etiam corpora ad hecticam ac tabem deducit, eoque facilius, quòd humor magis adustus est.

Vulgò de eadem etiam traditur, eundem hominem bis quartanâ non affici. Veràm experientia contrarium docet, quâ compertum habetur, eundem hominem bis vel ter quartanâ laborasse.

Quartana tandem homines liberat ab aliis morbis, & qui quartanâ laborant, magno morbo non corripiuntur, & si prius corripiantur, ac quartana superueniat, liberantur, vt testatur Hippocrat. 1. epidem. com. 5. 1. 3. Et 5. aphor. 70. *A quartana correpti non admodum conuulsionibus corripiuntur, aut si corripiantur, ac quartana superueniat, liberantur.* Dum enim materia melancholica ad hypochondria & ignobiliores partes vergit, neque amplius cum sanguine per venas miscetur, morbi isti soluantur, aut ægri in eos non incidunt. Præterea vomitu multi mali humores euacuantur: calore etiam febrili diuturniore humores crassi, morborum multorum causæ, attenuantur & absumentur.

#### Curatio.

Cum ergo febris hæc sit longa & pertinax, vt etiam vulgò Medicorum opprobrium & scandalum dicatur, Dan. Sennerti Tom. 11.

Medicus in eâ curandâ eò maiorem diligentiam adhibeat, arque in id attendat, ne medicamentis importunè datis duplex, vel triplex efficiatur. Id etiam ægro prædicendum, breui febrem hanc curari non posse, & sat citò curari, si sat bene. Rectè autem curabit Medicus Quartanam, si curationem secundum Indicationes curatorias dirigat. Petuntur verò Indicationes inprimis ab ipsâ causâ morbificâ, quæ est humor melancholicus maximam partem, qui & coqui & euacuari postulat.

Is igitur quia crassus, attenuandus; quia frigidus *Indicatio-  
nes.* & siccus, calefaciendus & humectandus; vt crassus, incidendus; vt putridus corrigendus, aut si adustus sit, aliquo modo refrigerandus; quod ex parte docet Al. Trallianus, libro 12. capite 8. distinctè verò Auicennas, lib. 4. fen. 1. tract. 2. cap. 64. 65. 66. Galenus verò, 1. ad Glauco. cap. 11. tantum exquisitè Quartanæ Curationem tradit. Deinde medicamentis idoneis euacuandus est. Causæ etiam ipsum gignentes & cumulant tollendæ; vnde inprimis lienis habenda ratio, qui si obstructus sit, aperiendus; si intemperatus, alterandus; si imbecillus, roborandus. Et omnino *di-  
stans* humorem istum generans; & inquinamentum humores corrumpens tollendum; cum per contraria alterantia, & nec alius acidus humor generetur, prohibentia; tum per discurrentia ac sudorifera. Si verò Quartana notha sit, & reliquorum humorum habenda est ratio. Febris ipsa refrigerantia & humectantia iudicat. Vires equidem in hac febre plerumque satis fortes sunt. Earum tamen habenda est ratio, ne nimis citò deficient, sed ad finem morbi, qui satis diuturnus est, durare possint. Si quoque febris scorbutus, hepatis vel lienis obstructio, aut alius morbus adiungatur, & is secundum artem tollendus: cum eiusmodi causis & morbis præsentibus, febris tolli non possit.

Et quidem ab initio leniter tractanda est hæc febris, vt Galenus, 1. ad Glauco. cap. 11. monet, nullumque forte medicamentum primò exhibendum. Qui enim fortioribus medicamentis vruntur, vt Galenus, loco allegato, docet, ex simplici Quartanâ non raro duplices aut triplices reddunt. Quanquam enim materia sit in primis viis: eius tamen alia longè ratio est, quàm in tertianâ, cuius materia bilis est, humor mobilis, & qui faciliè ductum medicamentorum sequitur. Humor verò melancholicus lentâ quasi fermentatione sanguini magis permixtus est; ideoque coctione ac separatione longiore opus habet. Si tamen signa bona apparuerint initio, aut febris ex causâ euidente incipiat, nec humores adhuc valde inquinati sint, ac dispositio interna humorum & corporis humori melancholico non multum consentiant, Celsi consilium lib. 3. cap. 16. non negligendum, qui vomitoriis, purgantibus & aliis periculum initio facit, an febris, ac primò conceptum humoris vitium corrigi, tolli & expugnari possit, antequam reliquum sanguinem inficiat. Vnde etiam Hercules Saxonia statim ab initio in hac febre vomitum tentandum, censet, non semel tantum, sed bis, ac ter. Imò existimat. L. Iouettus, vt postea dicetur, in principio Quartanæ valentiora purgantia esse adhibenda, quàm in augmento & statu.

Si verò Curatio hoc modo non succedit, & febris nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum curationis genus, vt idem Celsus, *ibid.* ait, idque agendum, vt quod diu sustinendum est, corpus faciliè sustineat.

Ergo quod in aliis febribus fieri solet ac debet, venter primò emolliendus, & primæ viæ euacuandæ, vel medicamentis leuibus per os assumptis, vel clysteribus. Medicamenta ista antè satis nota sunt, atque usurpari possunt cassia, el. lenit. manna, syr. viol. solutiuus, arque ea vel sola, vel cum aquis bor-



rag. buglossae ubi materia adusta est, in primis cum ferro lactis. Clyster talis fieri potest.

℞. Rad. althae, polypod. q. an. Vnc. β. malua, mercurialis, parietar. veronica, beta, an. M. i. summit. anethi, flor. chamem. an. M. β. Ficus nu. vi. Colaturæ

℞. lb. i. Adde Elect. diacathol. Vnc. i. ol. lilior. alb. chan. amel. an. Vnc. i. sem. salis Drach. i. F. Clyster.

Aut exhibeantur medicamenta è mannâ, cassiâ, electuario diacatholico, syr. de pomis Saboris Regis, foliis senæ. Fortiora verò locum facile non habent. Minus tamen periculi est in vomitoriis, quæ postea proponuntur.

Vbi primæ viæ euacuata fuerint, venam, si cum humore melancholico sanguis abundet, Galenus & Auicennas aperire iubent, quos Medici plerique alij sequuntur. Et monet Galenus, illud attendendum esse, an sanguis, qui fluit, sit crassus & niger, qualis in liene colligitur. Si enim talis deprehendatur, expedit illum copiosè fluere. Nam cum lien non rectè sese habet, non attrahit ad se, vt debet, sanguinem melancholicum: & proinde non parua eius portio reliquo sanguini permiscetur, qui commodè venâ sectâ euacuatur. Idem etiam fieri potest cum Quartana à melancholico sanguine aut sanguine adusto oritur. In talibus enim febribus materia adusta ex sanguine maximam partem in venis maioribus continetur, & propterea venæ sectione magna eius pars euacuari potest. Licet enim tunc proxima Quartanæ Intermittentis causa in dictis hypochondriorum locis consistat: præter eam tamen non exigua quoque melancholiæ portio in supremas venas diffusa est, quam venâ apertâ educere vrile & necessarium est, ne materiam peccantem & obstructiones in hypochondriis augeat & foueat. Sin autem sanguis effluens tenuis & flauus appareat, statim suppressendus est. Tunc enim humor melancholicus & peccans circa lienem, hepar & in ramis venæ portat atque hypochondriis continetur, qui venâ in brachio apertâ educi non potest.

Tempus venæ sectionis.

De tempore venæ sectionis non omnes Medici idem docent. Plurimi simpliciter cum Galeno in principio post primarum viarum euacuationem venam aperire iubent, vt euacuata parte materiæ, quod reliquum manet, facilius concoquere possit; reprehenduntque Auicennam, quasi sentientem post statum morbi & coctionem humorum venam aperiendam esse. Verum vix puto Auicennam id sensit se, vt post statum demum morbi in declinatione venæ sectio instituatur; sed potius rem distinctè proposuisse videtur, hoc modo. Si sanguis in venis abundet, sanguinisque aliqua euacuatio suppressa sit, venæ sint turgidæ, corpus graue, & alia ad sint, quæ sanguinis euacuationem requirunt: commodissimum est, vt à principio, euacuatæ tamen prius primis viis, venæ sectio instituatur; sin autem quartana ortum habeat à melancholiâ melancholicâ purâ, vt Auicennas loquitur, id est, si absque sanguinis abundantia, causa febris tota ferè circa lienem & in venis melsaraicis continetur, tum non mox à principio vena est secanda; cum hoc modo de causâ morbificâ nihil tollatur, sed potius humor melancholiæ contrarius, bonus scilicet & laudabilis sanguis, temerè & sine causâ educatur, & crassus ac vitiosus in primis viis relinquatur; sed tempore digestionis, vt docet Auicennas, id est in progressu morbi & coctione iam apparente. Non quòd ad venæ sectionem coctio humorum requiratur, sed quòd materia per coctionem aliquo modo attenuata & in superiores venas deducta sanguini permisceatur. Quo tempore etiam vrinæ crassiores apparere incipiunt. Hoc enim modo venæ sectione pars materiæ febrilis

tollitur, vt natura reliquam partem facilius superare possit.

De venâ quoque aperiendâ non omnes idem sentiunt. Galen. basilicam vel medianam brachij sinistri aperire iubet, quem plerique sequuntur. Aëtius verò, *tetrab. 2. serm. 1. cap. 84.* distinctionem adhibet, & liene affecto in sinistro brachio, si verò hepar afficiatur, in dextro brachio venam aperire iubet. Quam distinctionem breuitatis studio Galenum omisisse putant nonnulli. Sunt alij, qui Aëtium reprehendunt, & Galen. defendunt, eumque non breuitatis studio dextri brachij mentionem non fecisse, sed studiosè eam omisisse putant: cum in dextro brachio vena commodè in quartanâ aperiiri non possit, sed solum in sinistro aperiiri debeat. Atque ita istâ de re sentiunt. Ea semper vena aperiiri debet, quæ ex loco, in quo sanguis, qui naturam tanquam onus premit, proximè, quantum fieri potest, euacuat: At in Quartanâ locus, in quo melancholicus sanguis abundat, est circa lienem. Etsi enim accidere possit, vt hepar sit calidum & siccum, sanguinemque naturâ crassum gignat: tamen ille in hepate, venisque illi propioribus non remanet, sed ad lienem transmittitur. Atque eâ de causâ semper in omni Quartanâ in sinistro brachio venam aperiendam cum Galeno censent.

Verum si rem diligenter perpendamus, & ea, quæ ex Thaddæo Duno, in *Institur. pag. 95* r. proposuimus, neutra opinio planè satisfacit. Etsi enim vena aperienda sit, quæ ex loco, in quo sanguis vitiosus collectus est, plurimum & proximè eum exhaurit; & hoc etiam negari non possit, lienem sanguini defecando inseruire, & in quartanâ laborare: tamen de hoc adhuc quæstio est: An vena in sinistro brachio aperta propior sit lieni, & plus ex eo euacuet, quàm venâ dextri brachij aperta; cum, vt hoc ipso loco rectè ait Hercul. Saxonia, venæ omnes ex hepate ortum ducant, & lien cum venâ cauâ non nisi mediante hepate connexionem habeat. Præterea licet accadat, vt lien obstructus aut sanguine melancholico nimis repletus suum officium non faciat, sanguinemque feculentum non recipiat, atque is eâ de causâ in venâ cauâ sanguini reliquo permisceatur: tamen causa nulla est, cur potius sanguis ille melancholicus saltem reliquo sanguini in venis sinistri brachij, non verò quoque in ramis dextri brachij permisceri debeat. Neque aliquam euidenter aliam causam video, cur sinistri potius, quàm dextri brachij vena eligenda sit: nisi forsân quis hîc non tam ad manifestos venæ causæ ductus, quàm simpliciter ad *ὀψοπία* & illud *ἔν τῇ* atque occultos meatus, per quos dextra dextris, sinistra sinistris consentiant, respicere velit.

Deinde plerique sectionem saluatellæ seu venæ minimo digito proximæ in sinistro brachio commendant. Ista sententia cum aliis minùs proberetur, & eam examinare libet. Galeno ista opinio ignota non fuit: eam tamen saltem recitat, non approbat. Ita enim, *lib. 3. de administrat. anat. cap. 5.* scribit: *Reliqua pars vena, quæ paruum digitum adit, dum obliquum cubiti perrepat, ramum quendam exilem ad posteriora medi digiti transmittit: mox bifariam scissa, alterâ parte mediam digiti medi & annularis regionem ingreditur, quam nonnulli in sinistrâ manu secantes, sinentisque sanguinem ex eâ effluere, quousque vtrò sistatur, lienem ex tali euacuatione inuari censent.* Et, de curand. rat. per sangu. miss. c. 24. *Sicut nec si quis summâ in manu aut pede venam secet, quemadmodum putant, qui lienem curari aiunt à vena ad secundum paruum digitum sita sectione.* Atque alibi, vbi ex professo de curatione lienis agit, nullam huius venæ mentionem facit, sed solam venam in cubito aperire iubet. Vt ita Galenus sectionem

De Saluatella sectione.

nem saluatellæ neglexisse videatur. Eandem sectionem & ratio dissuadere videtur. Nam sanguis melancholicus crassus est, ut per tam exilem ramum commodè euacuari non possit. Deinde nullum iste ramus cum liene peculiarem consensum habet.

Contrariam verò sententiam qui defendunt, rationibus destituuntur, & vix aliud, quod afferant in medium habent, nisi experientiam. Verum nec ista ad hanc sententiam defendendam sufficit, & satis firma est. Nam primò, cum ratio huius venæ aperiendæ nulla dari possit, necessarium est, ut occulta aliqua proprietates vel in ipsâ venâ, vel in sanguine, qui in eâ continetur, insit: quorum neutrum sine temeritate affirmari potest. Deinde nec experientia satis certa est. Nam antiqui Medici plerique omnes de aperiendâ hac venâ nullam mentionem faciunt, ut & doctissimi ex iis, qui superioribus seculis vixerunt. Licet igitur nonnulli liene affectis huius venæ sectionem profuisse dicant: tamen istis hoc primò cum Galeno, 3. aph. 11. opponendum: *Etsi*, inquit Galenus, *expertus fuerit sex vel septem homines aliquâ medicinâ purgatos, dicere non poterit, quod omnes postea homines eâ ex necessitate purgabuntur.* Et 7. de comp. med. ses. gen. cap. 4. *Quare*, inquit, *si quis post me aequè studiosus & veritatis amator fuerit, ne temerè ac subitò, ubi bis terque usus expertus fuerit, ferat sententiam.* Deinde ut sit certa experientia, & ut omnis effectus alicui auxilio adscribatur, ipsum solum vsurpatum fuisse necessarium est. Nam si plura simul in vsu trahantur auxilia, atque aliquis effectus inde subsequatur, cui is tribuendus sit, dubium est. Id quod etiam in sectione saluatellæ locum habet. Nam si alia plura præcesserunt remedia, & postea saluatella quoque aperiatur, atque æger inde melius habeat, certè soli saluatellæ apertæ effectus is assignari non potest. Vnde autem opinio ista de venâ saluatellâ originem habeat, ex Aretæo colligere licet, qui lib. 2. de acut. morb. cur. cap. 2. ita scribit: *Sin à liene sanguis feratur, sinistra manus venam illam, quæ inter minimum annularèque digitum sita est, rescinditur: quandoquidem nonnulli Medicorum, eam ad lienem usque perungere arbitrantur.* Verum opinio ista falsa est; cum & iste ramus à cubiti venis propagetur. Et licet apud Hippocratem, Galenum, aliòque Medicos plurimis in locis in lienis affectibus venam in manu sinistra aperiendam esse legatur: tamen manus nomine brachium intelligunt. Consuetum enim est Medicis, ut manus nomine, si id absolute & sine additione summæ seu extremæ ponatur, totum brachium intelligatur, ut ex lib. 3. de admin. anat. cap. 5. & 6. tum aliis locis videre est. Vnde & Auicennas, 4. primi doctrina 5. cap. 20. sex manus venas aperiri dixit, & tres inter eas præcipuas supra brachij curuaturam.

Preparantia  
& conco-  
quentia.

Sanguine euacuato, materia præparanda & concoquenda est. Quibus autem medicamentis hoc fieri debeat, non adeò planum est. Galenus calidis & siccis vitur, ut medicamento è tribus piperibus, & quod diaspoliticum appellatur. Recentiores plerique longè aliis vtuntur, nimirum humectantibus & calefacientibus, ut borragine, bugloss. Syr. de pomis. Imò Alexander Trallianus, lib. 12. cap. 8. Galenum reprehendit, quòd sine discrimine talia calefacientia adhibeat. Etsi autem humor melancholicus frigidus sit: non tamen necessariò etiam siccantibus indigere scribit; cum frigidus & siccus sit: sed potius calefacientibus & humectantibus. Nam calefacientia & exsiccantia terrestres magis & multò quàm prius crassiores efficiunt humores, dum humiditatem, quæ in iis est, exsugunt absorbuntque, ut natura ideo recrementa tardius excoquat. Ipse verò distinctione vtitur, & eam quartanam, quæ ab humore melancholico procreatur, calefacientibus & humectantibus curat: eam verò, quæ ex nimia bilis adustione pro-

uenit, humectantibus & refrigerantibus inquat. Ne ergò in hac parte peccetur, diligenter humoris, qui peccat, natura peruestiganda est. Nam si quartana ex melancholiâ naturali solâ vel admixtâ bile atq; quoque ortum duxerit, primò ferè saltem humectantia adhibenda sunt; cum id siccissima huius humoris natura requirat. In actiuis verò qualitatibus leniora omninò in principio adhibenda sunt, neque fortiter vel calefaciendum vel refrigerandum, sed temperata potius vel temperatis proxima eligenda. Et imprimis si adusti humores abundant, non valde calefaciendum; cum tales humores potius refrigerantia, aut saltem attemperationem desiderent. In morbi verò progressu, ubi humores iam coqui incipiunt, ut facilius educi possint, incidentibus, & attenuantibus opus est. Vbi autem humor pituitosus admixtus est, etiam ab initio aliquid attenuantium & incidentium admiscendum est. Et omninò in pituitæ admixtione audaciùs calefacere & incidere licet.

Ex quibus patet, quòd licet siccantia admisceantur, non tamen ea ideo adhibentur, ut siccet, sed quia cum siccitate coniuncta est vis incidendi & abstergendi; ideoque talibus semper humectantia, qualia sunt borrago, buglossum glycyrrhyza, &c. addimus, & vix à præparantibus humectantia abesse possunt. In refrigeratione autem aliqua obseruanda est differentia, proiit materia alicuius vel nullius caliditatis est particeps, & propterea in materiâ adustâ biliosâ copiosius refrigerantia adhiberi debent.

Talia sunt; borrago, buglossum, viola, melissa, capitulus ♀, endinia, cichorium, fumaria, radic. glycyrrhyza, althæa, filicis, cichorij, ceterach, lingua ceruina, chamadrys, chamapitys, carduus benedictus, radices aperientes, polypodij, cortices tamarisci, capparum, radic. centaury maioris, flor. & sem. genista, viticis, fraxini, citri, ocymi, radix gentiana. Atque hinc parati Syrupi, aquæ, conseruæ, decocta, extracta; & ubi pertinaciores obstructions sunt, limatura & tinctura chalybis, ammoniacum, extract. splenis bouis, medicamenta è tartaro parata adiunguntur. Quibus in morbi progressu, ob metum scorbuti, meritò additur cochlearia, bekabunga, nasturtium, & alia medicamenta scorbutu conuenientia, ut:

℞. Syr. borrag. byzantini s. an. Drach. vi. Aq. endinia, borrag. an. Vnc. i. sem. Milce.

Vel ℞. Rad. cichor. borrag. an. Vnc. sem. cortic. tamarisci, Drach. i. Coqu. in insculo Gallina. detur haustus, qui aliquoties repetatur.

Aut ubi calor coniunctus est.

℞. Aq. cichor. fragor. borrag. an. Vnc. i. Syr. endin. byzantini. s. an. 3. vi. Milce.

Repetantur talia per octiduum, vel quamdiu opus est.

Possunt & ista medicamenta formâ Electuaria exhiberi, ut:

℞. Conf. borragin. Vnc. ii. cichorij. Vnc. 3. rad. condit. cichor. Drach. vi. Cori. citri condit. Vnc. 3. specier. diarrhodi abb. latisc. Galeni, an. Scrup. i. Cum Syrupo borrag. tunicis, vel violarum. F. Electuarium.

Postea interiecto leni purgante ad fortiora accedendum. Nam in morbis talibus diuturnis per vices humores concoquere & euacuare oportet.

Vt ℞. Rad. polypod. q. aperientium, an. Vnc. 3. Cortic. tamarisci, rad. cappar. an. Drach. ii. lingua ceruina, chamapit. ceterach, Capill. ♀, fumaria, flor. borraginis, violar. an. M. 3. genista P. ii. sem. 4. frig. mai. an. Drach. i. Passularum Drach. vi. Coqu. in s. q. aq. Colaturæ clarificata. ℞. lb. i. Adde Syr. byzantini s. de scolopendr. de fumaria, de succo borraginis, an. Vnc. i. 3. Milce.

Dosis Vnc. iii. manè, digbus intermissionis.

Medicamen-  
ta alterantia  
in quartana.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. aperient. an. Vnc.  $\beta$ . bugloss. Drach. vi. cichor. Vnc.  $\beta$ . polypod. q. Drach. vi. Cortic. tamarisci. Vnc.  $\beta$ . Ceterach, chamadr. chamapit. borrag. fumaria, cardui benedicti, an. M. i. cortic. citri, Vnc.  $\beta$ . flor. borrag. buglossi, genista, an. M. sem. epithymi Vnc.  $\beta$ . Passul. Drach. vi. glycyrrh. Vnc.  $\beta$ . Coqu. in s. q. a. Colaturæ clarificatæ Adde sacch. alb. q. s. F. Syrupus, cuius Vnc. i. vel Vnc. i.  $\beta$ . cum aquâ vel decocto conueniente propinari potest.

Vbi ad scorbutum morbus declinare incipit.

$\mathcal{L}$ . Cortic. tamarisci, radic. cappar. fraxini, polypod. q. an. Vnc. ii. radic. aperient. Vnc. i. chamadryos, chamapitios, ceterach, Cardui bened. flor. genista, centaurij min. sambuci, bugloss. an. M. ii. epithymi Vnc. sem. Macerentur omnia in feri lactis caprini lb. i. vini albi lb. ii. Deinde colentur & exprimantur. Colat. adde succi fumarie, nasturtij aquatici, cochlearia, an. lb. sem. trochisc. de cappar. de laccâ, an. Drach. vi. Destillentur. In destillato cremor vel crytalli tartari dissoluantur.

Radices iuglandis,

Steghiius ad Quartanam & alias febres longas valde commendat decoctum radicum iuglandis, cum aliis conuenientibus herbis paratum. Easdem & alij laudant, & in aceto scillitico macerant, decoctatque cum syr. ros. solutio exhibent. Habent enim vim attenuandi, abstergerendi & viscera roborandi.

Commendatur etiam valde; coctione iam appropinquante, Syrupus de pomis Regis Sabor.

Laudatur & oxymel elleboratum Gesneri.

$\mathcal{L}$ . Oxymel. elleborat. Gesneri Drach. vi. Syrupi borraginis. Vnc. sem. Aq. endiuia, borrag. an. Vnc. i. sem. Milce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Trochisc. de capp. Drach. i. de absinthio Scrup. ii.

Cum succo fumarie vel endiuie, aut extracto vel succo gentiane F. Pilulæ, quæ diuidantur in partes duas, & exhibeantur diebus intermissionis.

Commendantur hic & crytalli ac cremor tartari, & tartarum vitriolatum.

Est & vtile hoc decoctum.

$\mathcal{L}$ . Tartari albißimi loti. Vnc. iii. Radic. cichorij, polypod. q. cortic. tamarisc. rad. capp. an. Drach. vi. sem. genista Vnc. sem. cuscute, capil.  $\mathcal{Q}$ , chamadryos. flor. bugloss. borrag. an. M. i.

Contundantur grosso modo: adde mellis  $\mathcal{Z}$ . iiij. Aq. pluuiæ destillatæ vel feri lactis lb. iii. vel q. s. Destillentur in vitro per arenam ad medietatem, & colentur.

Colat. refrigeratæ & filtratæ adde spiritum destillatum, & si libet, etiam salem ex remanentiâ f. artem paratum.

Laudatur à Libanio, lib. 7. Syntag. arc. Chymic. Antimelancholicum hoc.

$\mathcal{L}$ . Tartari albißimi Vnc. sem. Coqu. in aquâ chalybeatâ aut vino per infusionem chalybis medicato lb. ii. aut circiter, donec soluantur. Colaturæ adde Spiritus vitrioli Drach. i. oxymelit. scillit. lb. sem. Syr. violar. Vnc. iii. vel. iiiij.

Detur cyathus ad præparationem & alterationem factâ euacuatione.

Raporum decoctum.

Ioan. Crato decoctum raporum commendat è consilio Guainerij, qui se Abbatem quendam feliciter rapis, quam aliis medicamentis curasse scribit. Sic autem Crato decoctum hoc exhibet. Primum corticem exteriorum detrahi iubet; deinde coquit; jus primum abiicit, aliam aquam affundit, & iterum ad molliem coquit. Hinc succum exprimit, & butyrum f. s. cum saccharo addit. Si flatulentus sit æger, addit caryophyllos incisos. Matutinis horis dat v. nucleos persicorum mundatos; atque in istâ curatione diebus 15, plerumque persistit.

Materiæ coctio & euacuatio per vices & interualla repetenda est, & quidem purgatio die ante paroxys-

mum instituenda, vt materia paroxysmum factura tollatur. Omnes autem Medici iuadent, vt initio leniora purgantia adhibeantur, postea fortiora: Iouertus tamen, de cur. quartan. interm. exquisita, contrarium sentit, & in principio Quartanæ valentiora purgantia adhibenda esse docet, in augmento & statu mitiora; eâ de causâ, quod cocta iam attenuataque materia suâ sponte ductum medicamento purgantis facile sequatur, imò sæpe à solâ naturâ feliciter absque medicamentorum ope expellatur: Deinde quod in principio mitiora sint symptomata, virisque magis integræ; contra morbo procedente vires magis debilitentur. Verumenimvero cum Medicus naturæ imitator esse debeat, quæ prius coquit, & postea expellit: merito & Medicus in principio, & vbi adhuc materia parum cocta est, imitari naturam debet, & mitiore saltem aliquo medicamento illud, quod coctum est, euacuare; non fortiore totam materiam crudam turbare. Postea verò, vbi materia iam concocta & motui apta est, vt rectè & perfectè euacuetur, Medicus valentioribus medicamentis vti debet. Et licet per vires in principio purgare liceat; tamen cruditas materiæ id prohibet. In morbi progressu verò quamuis vires debiliores sint; tamen purgatio ipsis parum incommodi affert; cum debito modo subtractâ materiâ febris remittat, atque ipsa purgatio die quietis instituat.

Leniora igitur sunt, syrupus de pomis Regis Sabor, de epithymo, de foliis senæ, de fumarie compositus.

Vt  $\mathcal{L}$ . Rad. polypod. q. Vnc. i.  $\beta$ . Ceterach M.  $\beta$ . flor. borrag. bugloss. an. P. i. epithymi. passul. an. Vnc.  $\beta$ . fol. senæ. Drach. vi. Cortic. citri. Drach. i. Infund. in s. q. aq. Colat.  $\mathcal{L}$ . Vnc. iiiij. Adde. Syr. de pomis Regis Sabor, vel de epithymo Vnc.  $\beta$ . tartari vitriolati  $\mathcal{G}$ . v. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Cassia rec. extr. Drach. vi. pulu. senæ præpar. Drach.  $\beta$ . cremor. tartari Scrup.  $\beta$ . Cum sacch. F. Bolus.

Vel  $\mathcal{L}$ . Pulu. senæ præpar. Drach. i. viol. purpur. Scrup. i. Zingiber. glycyrrh. an. Scrup.  $\beta$ . F. Puluis.

Detur cum iure carnis, vel alio conuenienti liquore.

Vbi fortioribus locusest, vtilis est Syrupus de pomis cum elleboro nigro Ioan. Cratonis, & oxymel. helleboratum Gesneri.

$\mathcal{L}$ . Succi pomor. dulc. lb. i.  $\beta$ . borrag. melissa, an. lb.  $\beta$ . flor. borrag. violar. an. P. i. fol. senæ, epithymi. Cortic. ellebori nigri præparat. an. Vnc.  $\beta$ . Coqu. lento igne: Cum sacch. F. Syrupus. In quo suspendatur nodulus ex cinamom. caryophill. croci, specier. aromat. rosati, diamoschi dulc. an.  $\mathcal{D}$ .  $\beta$ . Huius  $\mathcal{Z}$ . ii. vel iii. Addatur manna elect.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . vel  $\mathcal{Z}$ . i. ac parum insculi gallina. & propinerur 3, horis ante prandium.

Vel  $\mathcal{L}$ . Succi pom. dulc. lb.  $\beta$ . Infund. fol. senæ el.  $\mathcal{Z}$ . ix. cortic. elleb. nig. præpar.  $\mathcal{Z}$ . vi. sem. ocymi contusi  $\mathcal{Z}$ . ii. Colat. adde sacch. q. s. F. Syrupus.

Cuius cochl. i. atque alterum pluribus diebus assumatur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. borrag.  $\mathcal{Z}$ . vi. polypod. q.  $\mathcal{Z}$ . i. glycyrrh. rasa  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . corr. rad. capparum, tamarisci, an. Drach. ii. fumarie, ceterach, lingua ceruina, cuscute, cichorij, an. M.  $\beta$ . sem. fenic. Drach. i. citri Drach.  $\beta$ . 4. frig. mai. Drach.  $\beta$ . fol. senæ el. Vnc. ii. rad. elleb. nigri præpar.  $\mathcal{Z}$ . i.  $\beta$ . epithymi Vnc. sem. Zingiber. Drach. i. cortic. citri  $\mathcal{Z}$ . ii. flor. borrag. bugloss. genista. an. M. sem.

Stent in infusione per noctem: postea lento igne Coquant. Colat.  $\mathcal{L}$ . lb. i. quæ aromatizetur cinam. Drach. i. sem. Eius  $\mathcal{L}$ .  $\mathcal{Z}$ . iii. Adde Syr. de pomis, de succa borrag. de fumarie, Drach. iii. F. Haustus.

In robustioribus naturis confect. Hamech & diascena reliquis purgantibus addi potest: Conceduntur & pilulæ de lap. lazuli.

Vel



Vel  $\mathcal{L}$ . Extr. elleb. nigri Drach. sem. syr. de pomis regie Sabor  $\mathcal{Z}$ . sem. aq. horrag.  $\mathcal{Z}$ . i. sem. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Pil. aggregat.  $\mathcal{D}$ . i. vel.  $\mathcal{D}$  sem. pro virium robore. Extr. panchymagogi, ellebor. nigri. an.  $\mathcal{D}$ . sem. F. Pilulæ xviii.

Syrupum P. Andr. Matthioli, in quo fere omnia medicamenta huic morbo conuenientia coaceruata sunt, Vide lib. 3. Epist.

Efficacissimæ sunt in melancholicis affectibus & pilulæ, quas Querceranus tartareas melanagogas appellat, & cap. 14 pharmacop. restit. describit.

Sunt & vtilis pilulæ illæ de ammoniaco.

$\mathcal{L}$ . Aloës  $\mathcal{Z}$ . ii. gummi ammoniac. aceto dissoluti, myrrhæ, an. Drach. ii. mastiches, spec. diatrionisantal. an. Scr. ii. croci Scr. i. trochisc. de cappar. Scr. ii. salis fraxini, absinthij, an. Scr. i. Cum succo rosar. F. massa pilularum. Platerus has commendat.

$\mathcal{L}$ . Aloës Drach. ii. myrrhæ Drach. sem. epishym. Drach. ii. rad. gentianæ, asari, an. Drach. sem. gummi ammoniaci aceto dissol. Scr. ii. sem. petrosel. Drach. sem. rhabarb. el. Drach. i. sem. spica Scr. i. cum succo absinthij F. massa, de qua exhibeantur Scrup. ii. vel plus, si opus:

Verum hæc in genere satis describi non possunt, sed pro præsentis ægri statu, & humorum, qui abundant, ratione, medicamenta necessaria præscribenda.

Et quia morbus hic diuturnus est & pertinax, & continuo medicamentorum vsu vires debilitantur, vtile est, nonnunquam aliquandiu quiescere & naturæ negotium committere, & postea rursus ad præparantia & purgantia accedere.

Vtilis & in his febribus est vomitus, qui, vt supra dictum est, nunc post cibum sumptum ad causam antecedentem tollendam, nunc ante paroxysmum ad materiam paroxysmum facturam tollendam instituendus est. Scribitque Herc. Saxonia, se nihil præstantius inuenisse in Quartanâ, quàm ipsam vomitionem, atque illam se non prætermisisse in principio, aduentantæque statu repetiisse, ac præbuisse decoctum radicum raphani cum oxymelit. & scilicito, & singulis accessionibus vel saltem alternis excitasse vomitum à cibo, & postea præbuisse  $\mathcal{Z}$ . i. theriacæ. Quod ad imitationem Galeni fecisse videtur, qui, lib. de theriac. ad Pison. cap. 15. die ante paroxysmum à cœnâ vomitorium exhibet, postridie manè iuccum seu dilutum absinthij, & duabus horis ante paroxysmum theriacam.

Vomitiorum autem materia supra fuit enumerata. Si mitiora placent, poterit propinari decoctum sem. raphani & anethi  $\mathcal{Z}$ . v. pondere, cum oxymelitis  $\mathcal{Z}$ . i. Fortiora fiunt ex asaro & gratiolâ. Antiqui Elleborum album propinabant: sed nimis forte est medicamentum. Tutiùs licet vti vitro  $\mathcal{G}$ .  $\mathcal{G}$ . iiii. vel plurium pondere in vino infuso, vel croco metallorum appellato, vel floribus  $\mathcal{G}$ , vel floribus è vitro  $\mathcal{G}$ , paratis: quibus remediis non raro, pertinaces quartanæ tolluntur.

Post vomitum ventriculorum roborantia exhibenda.

Plurimum verò commodi ex hæmorrhoidibus apertis sperandum est. Nam cum Medicus Naturam imitari debeat: natura verò in iis, qui succum melancholicum accumulare consueuerunt, hæmorrhoides aperire solear, fluxusque harum venarum à multis morbis ex humore melancholico & adusto natis præseruet & liberet: Medicus naturam imitari & operam dare debet, vt hæmorrhoides aperiantur; quod fit cum aliis modis, tum per hirudines. Commodissimè verò in hunc finem vsurpantur, quæ lienem aperiunt, quæ antea sunt proposita: inter quæ principem facillè locum hîc obtinent chalybs & aloë.

De medicamentis vrinam cientibus in specie aliquid addere opus non est. Præparantia enim & aperientia illa fortiora, quæ antea proposita sunt, idem præreapta nata sunt.

Tandem post institutas purgationes per aluum & vomitum, calida quædam medicamenta exhiberi solent, quæ reliquias humorum dissipant, calore & partium tenuitate augmentum frigoris prohibent, humoremque febris causam, iam effluere incipientem, discutunt & consumunt, atque hoc modo paroxysmum vel imminuunt, vel, si materia paucior sit, prorsus tollunt. Vnde horâ vnâ atque alterâ ante paroxysmum talia exhibentur. Eadem intemperiem longo morbo contractam corrigunt, habitum corporis malum emendant, & ventriculorum ac omnia viscera diuturnitate morbi debilitata roborant. Galeno duo inprimis sunt in vsu; medicamentum ex succo Cyrenaico & theriaca. Medicamentum ex succo Cyrenaico describit Aëtius, terrab. 2. lib. 8. cap. 84.  $\mathcal{L}$ . nimirum succi cyrenæici, piperis, myrræ Trogloditica, fol. ruta virid. an. p. aq. Singula seorsim leuissimè teruntur & rursâ cum melle rursâ excipiuntur, fiuntque pilulæ, de quibus aliis obulus unus, aliis duo exhibentur.

Cum autem dubitetur, An succus Cyrenaicus sit benzoe seu asa dulcis appellata hodie, aut quid omnino medicamenti apud antiquos fuerit: tutius Theriaca, vel, quod aliis, qui theriacam magis venenis appropriatam putant, magis arridet, mithridatium Drach. vnius pondere cum vino albo tribus vel pluribus horis ante paroxysmum, semel in septimanâ, exhibetur.

Est etiam efficax & longo viu iam probata radix gentianæ. Nonnulli tribus horis ante paroxysmum exhibent castorei & myrrhæ an. Drach. sem. cum vini albi aquâ borrag. dilut.  $\mathcal{Z}$ . iiii. & quartanas hoc modo plurimas fuisse sanatas scribunt, si tribus vel quinque vicibus assumatur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Myrrhæ, castorei, opopanax, gentianæ, absinthij, an. Scr. i. cum mithridatio & succo gentianæ. F. Pilulæ xxviii. de quibus per horas 2. ante paroxysmum æger septem deglutiat.

Gejnerus ad Quartanas laudat Antidorum Saxoniam. Aliqui commendant decoctum clinopodij Matthioli ex vino: alij septem semina calendulæ in vino albo propinant. Vtilis est omnino, vt dictum, in his febribus iuccus, aqua & extractum gentianæ. Carduus quoque benedictus, quocunque modo exhibitus, seu indecocto, seu puluere, seu extracto, seu sale, seu syrupo seu aquâ, in Quartanâ & aliis febribus longis maxime prodest, sicut & absinthium.

Huc pertinent & sudorifera. Quanquam enim nonnulli in Quartana, quod melancholia sit humor crassior, quàm vt in vapores resolui queat, sudorifera exhibenda non censent: tamen quia melancholici sero abundant, & Quartanarum in declinatione fere sudore tantum non distillant: Natura omnino in hoc motu imitanda, & sudorifera etiam exhibenda; qualia sunt plurima ex iam propositis, theriaca, mithridatium, carduus benedictus, antidorus Saxonica, sal & extract. cardui ben. absinth. puluis & extr. gentianæ, & eius generis plurima passim nota. Inter ea laudatur & hoc.

$\mathcal{L}$ . Mithridatij Scr. iiii. succi plantag. depurati  $\mathcal{Z}$ . ii. M. Detur ante accessionem.

Inprimis verò commendatur asarum, si folia cum radice in puluerem redigantur, & pulueris huius  $\mathcal{D}$ . iiii. cum aliquot granis piperis horâ vnâ ante paroxysmum cum vino generoso exhibeantur, ægerque in lecto stragulis coopertus vomitum & sudorem expectet; Quin & finito paroxysmo plerumque alius delicitur. Idque bis vel ter repetatur. Proposuit hoc medicamentum Pedemontanus, in lib. 1. secretorum, his verbis: Sume vini Cretici poculum vnum, & asari pulueris  $\mathcal{Z}$ . ii. Misce, biba calidè, & in lectum ingredito, pannisque te inuolutis, vt optime sudare possis. Cum autem sudaueris, sumito saluæ, ruta, bursa pastoris an. P. i. aceti albi parum, omnia optime confusa supra brachij pulsus ligentur, & cum sic per diem integrum relictæ fuerint, remoueantur, ac tertio iterentur, præsertim febris accessione instante. Quibus factis fieri

feri non potest, quin gratia Dei liberetur ager perfectè. Quidam enim cum semel tantum hoc fecissent, fuerant restituti, quidam cum secundo remedia administrarent, omnino liberati.

Hæc tamen omnia, ut dixi, cum cautione adhibenda, scilicet post statum, & coctionem peractâ, ac humore satis euacuato, ut id, quod reliquum est, attenuetur & discutatur. Nam si humore adhuc crudo, crasso & copioso existente talia medicamenta exhibeantur, liquabunt quidem & mouebunt humores, sed cum eos plane discutere non possint: ex simplici duplicem aut triplicem Quartanam efficiunt.

Appropriata  
Quartana.

Huc pertinent pleraque etiam, quæ à proprietate prodesse dicuntur; cum tamen plerorumque ratio non incommode reddi possit ex eo, quod reliquias humorum discutiant, attenuent & viscera roborent. Sic succus absinthij cum aceto commendatur & satis efficax deprehenditur; succus item verbenæ cum vino. Nonnulli propinant radic. Imperatoriz 3. i. cum vino horâ vnâ ante paroxysmum. Alij laudant plantaginis radic. quatuor, vel pentaphylli folia 4. cum vino sumpta. Verbenæ item lupinæ quartum à terrâ geniculum cum adiacentibus folijs; quod tamen superstitiosum videtur. Laudatur & hoc,

℥. Succus absinthij recentis 3. ii. theriacæ 3. i. vini albi potent. 3. i.

Misce & da ægro tribus horis ante inuasionem, quod fer vel quater repere. Chymici hæc commendant saleam ammoniacum sublimatum à gr. iii. ad ix. cum cereuisiâ calidâ exhibitum. Egyptij, ut refert Alpinus de Medicina Agypt. lib. 4. cap. 15. ante accessionem exhibent drachmam pilularum, quas parant ex agarici, gentianæ, castorei myrrhæ, ruta, an. 3. ii. piperis longi, calami aromatici, croci, an. 3. iiii. theriacæ antiquæ 3. iiii. cum syr. de granatis dulcibus. Alij ex iis exhibent drachmam agarici cum myrrhæ scrupulo dissolutam in decocto pulegij. Crollij specificum è cochlearum testis etiam mulierculis nostris diu notum fuit. Sed an id, quod ei adscribitur, præster, cuiuslibet experiri facile est. Nonnulli commendant haustum aquæ rosarum ante paroxysmum. Verum monet & annotauit Forestus, lib. 3. obs. 32. & 35. quod, nisi vomitu reiciatur insignem dolorem & angustiam circa præcordia excitare soleat. Commendatur & tanquam singulare secretum & experimentum, in Epist. à Laur. Scholizio collectis, epist. 245. & ab alijs, cor leporis. Verum non semper prodesse experientia ipsa me & alios docuit.

Cor leporis.

An paroxysmum impedire liceat.

Sunt qui & opiata ac narcotica ante paroxysmum exhibent. Sed nisi eadem & aliâ facultate prædita sint, non tutò exhibentur. Etenim cum facultatem expultricem sopiant saltem & obtundant, instantem paroxysmum & materię ac naturæ motum quidem inhibere possunt, sed non sine periculo ac ægri damno; cum humores vitiosi in corpore retineantur, atque obstructions pertinaces, atque alios periculosos morbos generent.

Interim semper etiam prospiciendum visceribus, & danda opera, ut illa roborentur. Ac propterea ea exhibenda, quæ coctionem iuuant humoremque melancholicum alterant. In principio conueniunt rotulæ diarrhodi abb. aromatici rosati, diamargariti, Conserua borrag. bugloss. anthos; postea confectio diaxyloaloës, lætificans Galeni, alchermes; tandem diatrionpiperon, diaspoliticum, diagalanga, theriaca, mithridatium. Commendantur & trochisci de capparibus, de absinthio, de rhabarbaro, quorum antea facta est mentio.

Scorbuti curatio.

Et cum non rarò scorbutus quartanis, ut & tertianis diurnæ hæc febres felicissimè medicamentis scorbuto dicatis curantur, de quibus suo loco dictum.

Rigorem mitigantia.

Ad Symptomata, & in primis rigorem & horrorem, qui sæpe magnus est, & ægrum valde molestat, mithridatij vel theriacæ, aut similibus, quæ modò recensui-

mus, aliquid ante paroxysmum exhibetur.

Extra verò spina dorsi inungenda oleo chamæmeli, anethino, tollino, rutaceo, irino, de piperibus, laurino cum thetæac. mithridatio. Vt

℥. Theriac. Vnc. 8. caryophil. Drach. i. castorei Scr. i. Ol. Laurini, chamamel. an. Vnc. i. F. linimentum.

Addi etiam potest aliquid spiritus vini rectificati. Vel ℥. Nivum dissolu. in oleo chamamel. anethino, amygdalar. amar. castorei, Inungatur eo spina dorsi.

Cætera Topica quod attinet, applicanda ea sunt illis partibus, quæ febrem præcipue fouent.

Emplastrum ad abdomen.

Commendatur tale emplastrum,

℥. Absinthij puluerisari, picis, pinguedinis porci an. lb. i.

Pix & pinguedo dissoluantur super prunis, & admisceatur absinthium, ut inde emplastrum fiat; Quod illicitum linteo imponatur stomacho & toti abdomini, & ante dies quinque non amoueatur.

Topica ad lienum.

In primis verò lienis habeatur ratio, cui idonea formula, inunctiones & emplastra, ex racibus althææ, cortic. radic. cappar. tamarisci. flor. & sem. genistæ, semine agni casti, lini, summit. anethi. flor. chamamel. meliloti, ol. de cappar. lilior. albor. amygdal. amarar. ammoniac. bdellio, emplastro de meliloto & similibus, applicentur.

Vtilis est valde in hoc genere Genista.

℥. Flor. genistæ q. v.

Immergantur in ol. chamamel. vel de cappar. f. q. & stent in sole vel loco calido per dies aliquot: postea calefiant super igne, & colentur, atque additâ cera f. q. fiat vnguentum.

Si efficacius habere cupis; oleo, post primam infusionem colato; noui flores immergantur, atque iterum aliquandiu macerentur & colentur.

Vel ℥. Flor. genistæ q. f. & coq. ad molliorem, misceanturque cum vnguento dialthææ.

Licet etiam addere ammoniacum aceto dissolutum.

Tandem & ea medicamenta, quæ supra in curatione tertianæ carpis & pulsuum loco applicari diximus, hæc non sine commodo nonnunquam applicantur. Et meminisse ipse ante biennium hæc ciuem, cum toto autumno & hyeme quartanâ laborasset, tandemque acutissimos in sinistra scapulâ dolores perciperet, mulieris cuiusdam persuasû, ranunculum carpo applicasse, & pustulâ excitatâ, à febre & dolore liberatum fuisse. Cæteris quoque membris, si opus sit, prospiciendum.

[Anno 1620. in Autumno, inuasit iuuenem habitum melancholicum quartana, quæ totum annum durauit, & tandem sextuplex facta est in Autumno, anni 1621. ut singulis diebus bis ferè laboraret, manè, hora nona vsque post meridiem, & vesperi, hora octaua. Quæ autem tot paroxysmorum vnus febris causæ sint, è generali doctrina de duplici & triplici quartana, superius tradita, pater. Si enim materia febrium intermittentium causâ, quam in primis viis generari, atque initium etiam putredinis ibi concipere, supra, cap. 17. docuimus, vno in loco hæreat, atque ita vnus febris formes sit vel locus, è quo materia prodit, simplex tertiana vel quartana excitatur. Si verò pluribus in locis materia contineatur, & putrescat, totidem etiam tertianæ & quartanæ oriri possunt, quot illa loca sunt. Vnde accidere potest, ut non solum tertiana singulis diebus inuadat, verum etiam vno die semel, altero bis, imò utroque bis, atque ita quadruplex fiat, & quartana non solum duobus diebus affligat, vno intermittente, quæ duplex quartana est, sed etiam singulis diebus semel inuadat, quæ triplex quartana est; imò singulis diebus bis, quæ sextuplex est quartana, qualis in nostro ægro fuit. Nimirum quot fomites vel foci sunt, in quibus materia, febris intermittens causâ, generatur, & putrescit, & ubi putrescere incipit, paroxysmum

Dns de Quartana servati. Febri parana just. plex. Quomodo fiat?

xyfimum excitat, tot febres fiunt.

Quartana ex  
scabie imo  
recidit.

Rationi.

Eodem anno 1621. iuuenis quindecim annorum scabie foeda, sed in manibus tantum, laborabat. Hunc quotiescunque scabies cessabat, febris quartana corripiebat. Vbi rursum scabies fumaria, helenio, pimpinella, & similibus viurpatis erumpebat, quartana euanescebat. Causa huius rei etiam ex iis, quæ de loco materia febre excitantis in intermittentibus, supra cap. 17. dicta sunt, patet. Etsi enim locus, qui causam febribus primò suppeditat, quem focus & fomitem febbris appellant, in venis melaëicis sit, & circa viscera ventris inferioris: tamen à natura ex eo loco materia non solum in venam cauam, sed & porro in externas corporis partes detruditur, & si natura tam potens sit, ut eam planè ex fomite expellere possit, febris cessat. Vnde si pustula & vlcuscula circa os & labra oriuntur, febris tertiana cessat: quartana sæpe scabie terminatur; quod & in iuvene isto accidit, in quo vbi natura præcipue medicamenti adiuta, materiam febbris causam, ad manus protrudit, febris cessauit; vbi verò natura tam potens non fuit, ut materiam è fomite illo, & ad consueta loca expellere potuerit, febris rediit.

### Dieta.

Dieta.

Dietam in hac febre quod attinet, cibi sint boni succi, cocti faciles, & qui minimum humoris melancholici generent; imò melancholiæ generationi aduersentur. Aliàs victus sit humectans: qui tamen simul vim attenuandi habeat, & obstructionibus resistat. Vt enim medicamenta calida & humida solum exhibita non possunt superare crassitiem humoris: ita & victui extenuandi vis necessaria est. Vbi humor adustus admiscetur, cibis magis inclinet ad refrigerandum & humectandum; ita tamen ut vi crassa attenuandi non destituatur.

Cibi.

Conueniunt ergo oua forbilia, pulli gallinacei & gallinæ, caro hædina, vitulina, perdices, pisces saxatiles, lucius, amygdalæ dulces, vna passæ, poma dulcia, pruna, prifana hordeacea, rapum item diligenter coctum. Cibi condiantur borragine, buglossa, radice feniculi, petroselini, capparibus, cinamomo, croco. Acetum etsi vim incidendi & attenuandi habeat: tamen, quia atram bilem & melancholiam fermentare solet, non conuenit.

Abstinentum verò à cibis, qui crassum & viscidum succum generant, quales sunt carnes porcina, bubula, pisces plerique, caro fumo indurata, legumina, panis furfuraceus & crassus, ac similia.

Auicennas monet, ut primis tribus aut quatuor paroxysmis victu tenuiore ager utatur; cum in principio morbi materia copiosior sit & crassior. Deinde, secundum præceptum Hippocratis, victus paulò crassior, ob statum remotiorem, concedatur, & hinc versus statum tenuior præbeatur. Distinctione tamen hac in re opus. Nam considerandum, an quartana ex se inceperit; an verò febrem vel alium morbum infecuta sit. Etenim si per se sine morbo præcedente inceperit Quartana, hæc victus ratio conuenit. Si verò quartana post alium morbum prouenerit, simpliciter secundum Hippocratis præceptum, primò victus crassior exhibendus, atque sensim versus statum de eo aliquid detrahendum. Non enim consultum est, ut vires præcedente morbo debilitatas tenuiore diætâ ab initio institutâ magis debilitemus. Si æger id ferre possit, commodissimum est, ut die paroxysmi nihil cibi sumat: qui tamen inediæ assueti non sunt, & ieiunium facile non ferunt, iis aliquid cibi liquidi & facilis coctionis post paroxysmum exhibendum.

Ad cibi in-  
labres ægro  
concedendi.

Cum verò ægri in morbo tam longo exactæ diætæ pertæsi interdum cibos quosdam, non satis aliàs commodos auidè expectant, & vulgò feratur, vitum ciborum, etsi prauæ substantiæ, sed auidè expectitorum, à quarta-

na nonnullos liberasse: Quæritur, An à medico tales cibi ægris concedendi sint. Sciendum verò etsi per accidens fieri possit, ut talium ciborum esu ægri à febre liberentur, quia sc. natura, quæ auidè appetit, facilius concoquit, & ex cibis recte concoctis pauciora excrementa generantur; vel quia cibus, qui appetitur & copiose sumitur, melancholiæ est contrarius & minimum melancholici succi generat; vel quia cibo copiosius sumpto onerata natura per vomitum, ad quem copiâ cibi incitatur, vnâ causam morbosam excludit: tamen cum eundem effectum nemò sibi certò polliceri possit, & accidere queat, ut natura grauata cibum illum non bene concoquat, indeque plus excrementi generetur, morbusque augeatur: non facile tale aliquid ægro indulgendum est.

Tempus cibi exhibendi id obseruandum, quod in genere omnibus intermittentibus Hippocrates, 1. aph. 11. præscribit: *In ipsis exacerbationibus cibum adimere oportet: nam præbere noxium. Et cum per circuitum redeunt morbi, in ipsis accessionibus abstinendum.* Et ibid. aph. 19. *Quibus per statos circuitus accessiones fiunt, nihil dare, nec cogere, sed demere ante indicationes oportet.* Etenim perpetuum est, ut Cellus, lib. 3. cap. 5. habet, cibum quàm maximè semper ab accessione futurâ reducere, & hoc saluo dare quàm integerrimo corpori. Ideoque danda opera, ut paroxysmus ingruens, imò morbus & effluuientia humorum, quæ ante sensibilem paroxysmum sæpe satis diu antecedere solet, vacuum ventriculum inueniat. Nam qui cibi tunc dantur, non corpori, sed febri alimentum sunt. Multæque & tertianæ & quartanæ prolongantur, non suâ naturâ, sed diætæ erroribus, atque isto in primis, quod ægri instante paroxysmo, cibo non abstinant.

Potus.

Potus sit vinum album, tenue, maturum, non austerrum; aut cereuisia probè defecata, quæ ventriculum non inflet, nec terrestribus fecibus aut crassitie obstruat. Condiatur eadem, ut & vinum, melissâ, linguâ ceruinâ, veronicâ, rosmarino, atque in primis absinthio.

Atque hæc de curatione quartanæ febris sufficiant. Licet enim pleraque intermittentem exquisitam respiciant: tamen eadem facile quoque nothis accommodari possunt. Vbi bilis admixta est, aut febris ab adusto humore prouenit, borrago, buglossum, endiuia, fumaria, capillus ♀, epithymum, serum lactis caprini conuenit. In purgantibus rhabarbarum additur. In quartanâ, quæ pituitam admixtam habet, calefaciendum, ut in aliis quartanis; sed minus humectandum. Conueniunt nimirum radices aperientes, syrup byzantinus, de duabus radicibus, de 5. radicibus, de corticibus citri, &c.

Quantum tandem ad Quintanas, sextanas, septimanas febres, & alias, quæ periodos, quàm quartana, longiores habent; cum omnes seu ab humore melancholico, seu certè qui in humorem atrum & adustum iam degenerat, aut humorem atrum admixtum habet proueniant, non aliter, quàm quartanæ, curantur, & propterea de iis in specie nihil addimus. Hoc enim semper obseruandum, in curatione febrium plus semper ad naturam humoris peccantis, quàm ad periodum respiciendum esse, & ad humorem ex suis signis cognitum, curationem dirigendam.

## C A P V T X X I.

### De Febribus compositis & Semitertiana.

Atque hæc sunt febrium simplicium differentia, præter quas compositæ quædam reperiuntur. Nihil hoc loco dicemus de complicatione febrium cum aliis morbis, vbi scilicet febri alius morbus non febrilis coniungitur; quod sit, cum vel febris alij morbo succedit, vel cum febris alium morbum quasi comitem sibi adsciscit, ut cum febris pleuritidi coniungitur, vel cum febri nouus aliquis morbus succedit, ut cum febri hydrops



drops coniungitur: sed solum de eâ compositione, cum febris cum febre connectitur; quod fit variis modis. Nam febres aliæ appellantur ab Autoribus confusæ, aliæ implicite.

*Compositio-  
nes febrium  
modi.  
Febres confu-  
sæ.*

*Confusæ* sunt, quando duæ febres eodem tempore incipiunt, & desinunt, ut vix discerni possint. Ortum habent ex febres ex humoribus diuersis inter se confusis; ita tamen, ut licet eodem loco contineantur, simulque putrescant, quilibet propriam naturam seruet. Vnde etiam hæ febres omnia symptomata & signa confusâ habent, ut neque caloris modo, neque aliis symptomatibus discerni possint. Verum non sine causâ dubitatur, an dentur tales febres; cum vix credibile sit, humores diuersos confusos in eodem loco putrescere posse, ut vterque suam naturam retineat. Fernelius libro de febr. capite 2. ad confusas febres etiam nothas refert, v.g. tertianam notham, quæ ex bile & pituitâ pariter corruptis fiat. Verum febres nothæ non sunt compositæ. Nam licet notha febris ex duobus humoribus eodem tempore & loco putrescentibus oriri possit: ita tamen illi duo humores sunt mixti, ut vnum mixtum constituent, & vnâ formâ contineantur: vnde etiam cum mixtus ille & ex duobus aggregatus humor putrescit, simplex febris est, mixtam tamen ac mediam naturam quasi referens. Si autem humores duo ita in eodem loco coniungantur & putrescant, ut confusi potius, quam verè mixti sint, & vterque suam naturam, ut vulgò docetur, obtineat, febris confusa oritur.

*Febres impli-  
citæ.*

Implicitæ autem febres sunt, quæ ita coniunguntur & concurrunt, ut vtriusque natura seorsum, & vtriusque symptomata ac signa peculiariter animaduerti possint. Complicatio autem illa fit pluribus modis. Nam primò putrida cum non putridâ coniungitur, ut dum hæctica putrida complicatur. Deinde putrida cum putridâ; & id quidem rursum pluribus modis. Nam continua continui misceri potest. Fernelius quidem, de febr. c. 15. hoc negat, & continuam cum continuâ saltem confundi, non autem complicari posse docet; & absurdum esse existimat, quod Auicennas scribit, vnius continuæ putredinem ex vno loco, alterius ex altero effundi, cum reuera in vtrâque humores putrescant in venis maioribus, in hisque agitati permisceantur. Idem alij etiam docent, & si humor aliquis in venis putrescat, per reliquum vniuersum, qui in venis continetur, putredinem serpere censent; cum & venæ sint continuæ, & humores in iis contenti sibi continui. Verum contrâ alij hanc opinionem, neque sine causâ, reiciunt. Nam licet venæ sibi continuæ sint, & v.g. bilis, quæ in iis putrescit, sibi continua sit: tamen supra dictum est, periodicas febres, quales etiam sunt continuæ, fieri partibus determinatis affectis. Vnde mirum non est, materiam, quæ febribus continuis materiam suppeditat, ex diuersis locis effundi, hanc ex vno, illam ex alio. Fieri etiam potest, ut omnes partes bilis ad putredinem suscipiendam æquè aptæ non sint, atque accidere, ut duæ partes bilis locis seiunctæ, ad putredinem dispositæ sint; ea autem portio bilis, quæ medium inter has locum occupat, ad suscipiendam putredinem apta non sit, atque ita si duæ illæ partes putrescant, duæ etiam fient febres continuæ, & accidere potest; ut cum febris, quæ ex vnâ parte bilis accensa est, nonnihil iam remittit, altera ex aliâ parte bilis putrescente incipiat. Et quod de bile diximus, idem de aliis humoribus dici potest; ut nimirum in diuersis locis materia contineatur, atque vnius corruptio ex vno loco, alterius ex alio effundatur.

Deinde implicantur Intermittentes cum Intermittentibus; & quidem Intermittentes vel eiusdem generis, vel diuersi complicantur. Eiusdem generis complicantur, quando plures ex vnâ specie humoris, diuersis tamen in locis putrescentis, ortæ ægrum inuadunt, quæ paroxysmi quidem tempore variant, symptomatibus tamen ferè conueniunt. Tales febres sunt duplices vel triplices Tertianæ, duplices Quotidianæ, duplices

vel triplices Quartanæ. Deinde implicantur febres Intermittentes diuersi generis, sed rariùs, ut Tertianâ intermittens cum Quotidianâ intermittente, quâ qui laborant, singulis quidem diebus febricitant; altero tamen semel, altero bis. Ita obseruatum est, tertianam Intermittentem coniunctam fuisse quartanæ Intermittenti, quâ febre mixtâ qui laborant, tertio & quarto quodque die febricitant. Tertio implicatur continua cum intermittentibus. Continuarum autem cum Intermittentibus complicatio duplex est. Aut enī implicatur tertiana Intermittens quotidianæ continuæ; aut intermittens quotidiana miscetur tertianæ continuæ, & vtræque appellatur *πυρεδὸς ἡνυπνιτῆς*, seu febris semitertriana, de quâ postea in specie.

Istam doctrinam, ut supra etiam diximus non vndiquaque approbat Simon Simonius. Ita enim, in *Synopsi de humoral. febr. nat.* scribit: *Scripti Gal. lib. de typis c. 1. Idiotarum hoc esse, ut cum viderint aliquem quolibet die accessionem experiri, imaginationem quandam periodi quotidianæ concipiant. Nos tamen longè melius sapere, & acutius cernere opinamur idiotas istos, quàm eos, quos cum febrem simili typo quotidie accedentem viderint, aut dissimili, duarum tertianarum, vel trium quartanarum, aut nescio, cuius monstri hemirritæ ex abunda phantasia subii.* Verum enim uero, ut libenter concedimus Simonio, in febrium naturâ definiendâ non tam ad periodos, quàm ad humoris naturam respiciendum esse, & febri, quæ quotidianas habet exacerbationes, quotidianam nominari posse: tamen omnes febres, quæ quotidie affigunt, simplices esse, non concedimus; atque ipse diffiteri non potest, ubi febris non vnius humoris genium & naturam præ se tulerit, rectè implicatam appellari. Imò etsi vnus humor specie sit: tamen si in diuersis locis putrescat, & periodos per vices sibi respondentes habeat, & illa febris rectè composita nominari potest. Id quod in quartanâ manifestè apparet, quæ quandoque, cum triplex est, singulis diebus inuadit; hinc, cum vno die intermitte, duobus diebus affligit, vno quietis die interiecto; tandem planè simplex reditur.

Potèrò compositionis febrium modos Auicennas, *prima quart. c. 4. cap. 16.* tres ponit, & compositarum febrium triplicem differentiam constituit, Subintrantes, Coalternas, & Communicantes. *Subintrantes* febres appellat eas, cum alterius paroxysmus incipit, antequam prioris paroxysmus definit: *Coalternas* nominat illas, cum vno paroxysmo finito, mox post breue intervallum alius incipit *Communicantes* denique eas quarum vnius paroxysmus mox post alterius paroxysmum incipit.

De his febrium compositarum modis obseruandum, secundum Intermittentium proprium; reliquos autem duos continuos cum Intermittentibus communes esse. Subintrantes verò febres etsi plerumque ex tertianarum Intermittentium implicatarum numero sint: tamen etiam continuæ sæpe tales esse possunt. Nam cum sanguini multi vitiosi humores sæpe admisceantur: cum in eo accenditur putredo, primò id, quod ad putredinem suscipiendam magis aptum est, putrescit, à quo deinde putredo in reliqua sensim propagatur; & quia humores vitiosi sæpe vno in loco non continentur, neque eodem tempore putrescere incipiunt, sed alij prius, alij deinceps, prout magis aut minus ad putredinem dispositi sunt: & ita plures febrium insultus, ac, ut appellant, introitus fiunt, sic ut vnâ nondum sublata, alia exoritur. In quo etiam ob focum materiæ diuersum dissimilia symptomata concipiuntur; aliaque magis per lumbos molestia percipitur, alia præcordia magis æstuant, alia lipothymia infestat, alia capitis dolor, vigiliæ, deliria, prout in hac vel illâ parte magis humor putrescit. Hinc & fallaces sæpe prædictiones fiunt. Nam quamuis vnâ parte humorum concoctâ, vrinae iam coctæ & bonæ appareant: tamen paulò post aliâ parte

parte humoris putrescente, post coctas vrinas alia crudiore sequuntur.

Foret autem longius, nec operæ pretium, si ista omnes composita differentia explicanda essent, cum ex simplicibus composita facile pateant; & nonnulla sint rarissima. Itaque exempli loco saltem de semitertiana, & de duplici ac triplici tertiana, de duplici ac triplici quartana, & quotidiana duplici aliquid dicemus.

Signa compositorum febrium.

Signa tamen compositorum differentiarum in genere quod attinet, ex signis quidem simplicium cognoscere compositas adeo operosum non est; in primis tamen compositas arguit reditus rigoris, horroris aut frigoris post eius quietem. Quod si planè continua & simplices videantur febres, attendendum, an post rigorem sudor subsequatur. Nam si in febre, quæ continua videtur, rigor fiat, & sudor non subsequatur, aut fortè post plures rigores vnus sudor, signum est, febrem illam non esse simplicem, sed compositam. Nam in Synochâ rigor non apparet, nisi crisis tempore, quem sudor sequitur. Deinde etiam pulsus febris compositæ indicium exhibet. Nam quamuis febres quædam continuæ videantur: si tamen sæpius fiat pulsus contractio, illa noui paroxyfmi, motusque materiæ noui indicium est.

### De Semitertiana.

Semitertiana.

Quia autem inter Febres compositas præcipuè notabilis est semitertiana, de eâ diligentius paulò dicemus. Febris, quæ Græcis *πυρετός ημικτήτης* dicitur, eodem nomine etiam à Latinis antiquis appellata fuit; vt ex Q. Sereni versib. apparet:

*Mortiferum magis est, quod Græcis Hemitritan m:*

*Vulgatur verbis: hac nostrâ dicere linguâ.*

*Non potuere ulli, puto nec voluere parentes.*

Posteriores tamen Latini Semitertianam nominant. Dicitur etiam *πυρετός ημικτήτης*, id est, febris horrida, non quod cum horrore incipiat, quod multis febribus commune est, sed quod, vt postea etiam dicitur, toto durationis tempore horrores ipsi sint familiares. De nomine autem hoc notandum, non ita esse appellatam hanc febrem, quasi dimidia tertiana sit: sic enim vulgò dictio *Semis* additur iis quibus integra deest perfectio, atque ita dicitur semuncia, semicirculus, semihora: sed in semitertiana integra adest tertiana, atque symptomatum multitudine & vehementia longè deteriore est, quàm tertiana. Verum ita appellata est, respectu ad totius febris compositionem, cuius scilicet pars dimidia tertiana, dimidia quotidiana. Atque ita dici semitertianam censent, sicuti dicitur semibos, semiasinus, semiuir: Verum neque in semiasino integra asini natura est, neque in semiboue & in semiuiro integra viri & bonis natura. In semitertiana verò febre & integra tertiana, & integra quotidiana adest & ex vtraque febris hæc componitur, vt communis est sententia.

Vnde dicta.

Verumenimverò quænam sit febris huius natura obscurissimum est; cum nec antiqui nec Recentiores hac de re consentiant. Agathinus enim, vt Gal. 2. de febr. cap. 8. testatur, omnes febres tertianas intermittentes, quæ producuntur ad horas 24. vel 36. hemitrichæos appellat. Cui assentitur Celsus, lib. 3. cap. 9. Archigenes etiam tertianis & quotidianis intermittentibus idem nomen tribuit, vt *ibid.* Galenus docet. Galenus verò statuit, semitertianam continuam esse, quæ ex duabus febribus, tertiana & quotidiana, alterutra intermittente vel continuâ, copulata constat, quem posteriores Medici plerique sequuntur. Verum & de semitertiana etiam hoc modo acceptâ, sunt quædam controuersia.

Semitertiana qualis febris.

Primò enim de hac febre dubitatur, an sit complicata vel confusa; & nonnulli quidem confusam esse censent, eò quod in vasis vterque humor confundatur, ac neque propria tertianæ, neque quotidianæ signa appareant, sed ex duplici harum febrium genere veluti

quoddam mixtum & confusum oriatur. Verum rectius sentiunt ii, qui implicitam esse febrem statuunt; cum tertianæ natura integra & non confusa ex paroxyfimis tertio quolibet die inuadentibus appareat. Cum autem febris biliosa cum pituitosa, quatuor modis possit commisceri, & quotidiana continua cum tertiana continuâ, aut intermittens cum intermittente, aut continua tertiana cum intermittente quotidiana, aut intermittens tertiana cum quotidiana continuâ coniungi possit: solum tertiana intermittens mixta quotidianæ continuæ, verè & propriè dictam semitertianam parit. Nam cum Hippoc. 1. epid. comm. 1. s. 23. febres semitertianas appellet horrificas seu horridas, ex duabus continuis non componetur. Tales enim febres complicatae non erunt horridæ: cum febres continuæ vix rigorem vel horrorem habeant. Appellat verò Hippocr. febres horrificas seu horridas, non quòd initio solum accessionis horror appareat, sed quòd toto durationis tempore horrores vigeant. Necesse est itaque vt febris semitertiana ex duabus febribus componatur, quarum altera sit continua, altera intermittens. Etsi verò ex tertiana continuâ & quotidiana intermittente etiam febris fiat continua & horrida, quæ continuitatem ex bile, horrorem ex pituita habet: non tamen verè & propriè dicta erit semitertiana; quamuis etiam suo modo semitertiana appellari possit: sed propriè dicta semitertiana oritur ex quotidiana continuâ & tertiana intermittente; continuitatemque ex pituita, horrorem verò ex bile habet. Nomen verò à tertiana potius accepit, quòd manifestiora sint tertianæ symptomata.

Febres horridæ.

Propriè verò dicta semitertiana tribus modis fieri potest. Nam vel pituita excedit bilem, vel bilis superat pituitam, vel par est vtriusque copia: atque hæc vltima non solum propriè dicta, sed & legitima ac maximè exquisita semitertiana est, ac symptomata quasi media habet. Si verò alter humor abundet, etiam febris ex illo humore ortæ maior vis erit, & symptomata omnia huius humoris naturam magis redolebunt. Vt si bilis abundet, rigor potius adest, quàm horror, calor feruidior erit, magisque ad æmulum festinabit, sitis & vigilæ erunt maiores, aliquid etiam per vomitum vel sudores euacuabitur. Si autem pituita prædominabitur, frigus potius aderit, quàm horror. Pulsus sunt quodammodo contracti, & tardi, febris tardius inualescit, neque inde quicquam notatu dignum excernitur.

Semitertiana quod modis fiat.

Etsi verò etiam in tertiana nothâ bilis & pituita simul putrescit: tamen inter eas est differentia. In tertiana nothâ ex vtroque humore vna humoris forma emergit, & in vno loco ille humor mixtus putrescit: in semitertiana verò vterque humor seorsim putrescit. Itaque vt hæc summatim complectamur, est ex vulgatâ sententiâ semitertiana febris, ex continuâ quotidiana & tertiana intermittente composita; quâ de causâ nunquam ad æmpeziar peruenit: tertio tamen quolibet die cum horrore inuadit. Rigor enim in horrorem, degenerat, quòd flaua bilis à pituita remittitur.

Semitertiana & tertiana notha differentia.

Deinde etsi hæc ita vulgò doceatur: tamen quia non solum antiqui & Recentiores de febris huius naturâ non planè conueniunt, verum etiam mixtura illa febris tertianæ & quotidianæ, bilisque ac pituitæ non semper locum habere videtur, multoque grauiora in hac febre adfunt symptomata, maiusque periculum, quàm quod solum ex pituita & bilis mixtione prouenire possit: ego quæ mea hac de re sit sententia, liberè proponam, suum cuique tamen liberum iudicium relinquo. Equidem non negauerim, febres tales ex continuis & intermittentibus complicatas dari posse, libenterque concedo cum Platero, simul & eodè tempore in venis mesaraicis & venâ cauâ humores putrescere posse, ac quidem vario modo, & diuersitate materiæ, vel tertianas vel quartanas simplices aut duplices, nothas, aut legitimas cum continuâ complicari, febresque, quæ varias exacer

rimas cum continuâ complicari, febrésque, quæ varias exacerbationes & mutationes in symptomatibus habent, excitari posse. Modò hoc obseruetur, non necessarium esse, vt vna harum febrium semper sit Quotidiana. Sunt enim Quotidianæ febres raræ omnino & semper longæ: cum semitertianæ sæpè sint satis frequentes, imò interdum epidemice, & non semper diuturnæ. Ideò sufficit, vt vna sit intermittens, altera continua, cuiuscunque etiam generis: quo modo illæ de variis differentiis & gradibus controuersiæ tolluntur. Verùm his omnibus concessis, sum in eâ sententiâ, etiam febres naturâ suâ intermittentes, tertianas præcipuè, seu simplices, seu duplices, seu triplices, vel etiam, si cui ita libet, quotidianas, Semitertianas dici posse. Eas scilicet, in quibus causæ morbificæ pars aliqua ad ventriculum, intestina, ac vicina loca detrusa inflammationem, atque inde febrem symptomaticam excitat, vt ita hæc febris ratione intermittens febris sit horrida, ratione symptomaticæ continua. Vt enim natura in continuis febribus interdum partem materiæ ad partes aliquas priuatas, pleuram, pulmonem, fauces deponit: ita non est impossibile, eandem etiam in intermittentibus partem materiæ cum sanguine ad intestina & ventriculum ac vicina loca depellere, quæ ibi hærens inflammationem excitet; vnde etiam hæc febres tam periculosæ sunt.

Atqui ita rem se habere; obseruationes aliquæ ex Adriano Spigelio de *Semitertianâ* docent. Is enim, lib. 1. de *Semitertianâ*, cap. 15. refert, quendam ex graui dysenteria in semitertianam spuriam incidisse, quæ postea febris intermittens facta fuerit. Egro sexagesimo die mortuo, & corpore aperto inuenta est interna ventriculi tunica leni erysipelate inflammatorio affecta. Venæ mesaraicæ & quæ ad ventriculum tendebant, atque omentum crasso nigroque sanguine refertæ erant; imò omentum semipurificatum ab inflammatione erysipelate, quæ in omnibus venæ portæ ramis minoribus inerat.

Idem cap. 16. eiusdem libri, scribit: Se plures, qui febre quotidie sese exacerbante, præcipuè circa vesperam aut statim post meridiem, in modum duplicis tertianæ continuæ vel semitertianæ perierunt, secuisse, & in his putredinem non in venâ cauâ, sed inflammato alicuius primæ regionis viscere, vel aliâ aliquâ reconditâ parte inflammationem paulò minorem, quàm vt dolore ab ægro, vel tactu hypochondriorum à Medico & ægro cognosceretur,prehendisse. Idem, capit. 14. scribit: In dissectis semitertianâ mortuorum cadaueribus se reperisse inflammationes ex sanguine biliolo & pituitoso factas circa iecoris cauam partem, in ventriculo, intestinis, tam crassis, quàm tenuibus, mesenterio, omento, liene, & sæpius in vnâ partium commemoratarum, aut pluribus, aliquando etiam in omnibus, quæ celeris mortis causa erant, superueniente gangrænâ vel sphacelo. Additque in plurimis dolores in ventre immanes, vel continuos, qui certis horis plerumque exacerbabantur, vel intermittentes eos aliquando affligebant, ortos fuisse, ex facto abscessu; sanie ac pure, aut bile saniosâ & concoctâ per secessum vel vomitum redditis.

Persuadet istud & hoc, quòd febres hæc sint frequentiores, quando dysentericæ contagiosæ grassantur, vt testatur idem Adrianus Spigelius, lib. 2. de *Simetert.* capite 10. Materiam enim ad intestina imperus est in utroque malo. Idemque, eodem libro capite 11. scribit: Rarissimè Semitertianâ laborare, qui firmis sunt visceribus, sed eos, qui distillationibus laborant, iecur habent obstructum aut lienem, aut mesenterium, pulmones malè affectos, per longa intervalla colicis doloribus infestantur. Additque se nullius eorum, qui à semitertianâ perierant, cadauer inspexisse, in quo pulmones & iecur non malè haberent, vel vnâ cum his caput, lien, renes, mesenterium, intestina magnâ ex parte inflammata, & in aliquâ parte gangrænâ correpta erant, præsertim quo loco iléum cælo iungitur. Atque eius rei

historiam habet, refertque c. 16. se in quodam iuvene Belgâ, qui post dysenteriam in semitertianam incidit, & die vigesimo mortuus est, reperisse intestina tenuia inflammata, iléum, quâ parte colo & cæco adhererebat, sphacelatum. *Ibidem* recenset aliam historiam adolescentis cuiusdam Galli, qui etiam semitertianâ correptus 27. die mortuus est: in cuius cadauere dissecto tenuia intestina inflammata fuerunt deprehensa, & olei portio magna versùs colum sphacelata, iecoris etiam cauæ partis portio inflammata fuit.

Accedit his & illud, quòd febres hæc soluuntur doloribus colicis, alui fluxu, dysenteria, quæ omnia humorem ad intestina impetum habere indicant; & vt Adrian. Spigel. lib. 2. de *Semitertianâ*, cap. 14. docet, aliquando in momentaneam Apoplexiam & Paralyfin mutantur, quæ procul dubio ex primis viis ortum habet, estque talis, qualis colicam quandoque sequi solet; quòd vel ex eo patet, quòd febris hæc ex Paralyfi superueniente, dolore colico quandoque solui solet. Scribitque Adrian. Spigelius, se longo vsu edoctum, dolores hosce colicos post duplices tertianas & tales febres sequi, quòd ortum habeant tales febres ab abscessu plerumque consistente in pancreate, mesenterio, vel cauo iecoris, è quibus materia ad intestina depellatur.

Ex quibus omnibus apparet, materiam semitertianæ non semper in venâ cauâ, quòd Spigelius concedit, sed in venis mesaraicis etiam contineri, & proinde febrem semitertianam ex febre primariâ & symptomaticâ componi; & primò quidem naturâ suâ intermittentem febrem esse, cui postea continuus calor accedit ex inflammatione ventriculi, intestinorum & vicinarum partium, ex sanguine ac humoribus vitiosis in ea loca & extremitates vicinorum vasorum mesaraicorum eò desinentium confluentibus excitata. Vnde ipse Galen. lib. de *typis* scribit, non semper continuas, sed etiam intermittentes reperiri semitertianas, id est, vt Spigelius explicat, non omnibus morbi totius temporibus. Nam primò potest intermittens esse tertiana sola, huic postea accedit alicuius visceris inflammatio; quâ sedatâ nihilominus potest febris intermittens remanere. Imò fieri potest, vt sæpius hoc modo febris mutetur, proiit sæpius noua alicuius partis inflammatio accedit.

Atque ex his causa horroris & rigoris, & cur in febre hac continuâ toto morbi decursu horrores & rigores toties redeant; febrésque hæc *opisthotica* appellentur, reddi potest. Fit hoc primò ordinate, & nunc sæpius nuncrari pro febris intermittens naturâ, quæ potest esse tertiana simplex, duplex, triplex, vel etiam forsitan quotidiana: deinde inordinate, eum inflammatio nouam partem occupat, vel dum pus fit, secundum Hippocratem, 2. aph. 47. Sunt enim hæc partes quas inflammari diximus, membranosa, & proinde iis affectis facillè rigor vel horror excitari potest.

Neque ex rigore vel horrore semper initium nouæ febris colligere licet, sed sunt rigores & horrores etiam inflammationibus proprii, vt modò ex Hippoc. 2. aph. 47. dictum; qui etiam in *Coacis* scribit. *Qui subinde exudant, rigentque, lethale, ac sub finem morbi suppurationem habere deprehenduntur, aliosque perturbari.* Ita *ibidem* Rigor in Phreniticis accidit. Et habentur in *Coacis* plures aphorismi, qui docent, Rigores non solum in initiis febrium accidere, sed aliàs etiam ex materiæ commotione. Et experientia id confirmat. Refert enim Marcel. Donatus, de *historia medic. mirab.* lib. 5. cap. 5. cuidam in musculo temporali vulnerato septimâ die superuenisse rigorem, eumque ad quadagesimum quintum diem riguisse, & quotidie ferè semper sudasse, alternatim rigoribus succedentibus sudoribus. Et ipse vidi ægrum inflammatione auris, quæ tandem ad suppurationem peruenit, laborantem, eodem die ter riguisse, idque aliquoties accidisse, etsi per intervalla longiora. Et omninò facilius ex hiis, quæ diximus,

Causa rigoris  
& semitertianæ.



diximus, omnium, quæ in semitertianâ accidunt, causam reddere licet, quàm ex difficili illâ, & non semper probabili febris intermittens & continuæ mixtione, præcipuè si hoc præsupponamus, quod supra diximus, & à doctissimis Medicis approbatur, nimirum eundem hominem posse pluribus tertianis laborare, si in diuersis & pluribus ramis malaricis causâ febris contineatur. Hinc enim fieri potest, vt non solum antequam vna febris soluat, alius paroxysmus inuadat, sed & accedens inflammatio calorem præcipuè continuat, vnde febris est continua. Toties verò rigor & horror inuadit, quot numero sunt tertianæ. Neque enim duplici vel triplici saltem tertianâ, sed quatuor, vel quinque tertianis homo laborare potest, prout materiæ febrilis sedes in tot locis consistit.

## De Causis.

Causa semitertiana.

Ex his facile etiam patet, quænam sint semitertianæ causæ. Nam si ea ex continuâ quotidianâ tertianâ intermittenti, vel alio modo complicatâ continuâ & intermittente constet, etiam causæ vtriusque febris adfint necesse est. Si verò sit tertiana cum inflammatione alicuius partis, causæ illæ omnes, quæ tertianam constituere possunt, locum habent, si nimirum materia in pluribus venarum malaricarum ramis colligatur & putrescat, parsque eius effusa ad intestina vel ventriculum vel alia loca vicina ea inflammaret. Habet tamen humor hic procul dubio peculiarem Qualitatem, ob quam ad hæc loca fertur, sicut & in dysenteria humor peculiarem Qualitatem, quâ intestinis infestus est, obtinet. Vnde & epidemice sæpe ac contagiosæ sunt semitertianæ. Imò nonnullis locis familiares sunt Hemitritæ, sicut Galenus Romæ, & in Æthiopiâ, totoque littore, tractuque terræ, vbi cælum est calidius cum aduentitiâ humiditate, frequentem esse scribit. Vnde sicut anginæ & pleuritides sæpe sunt epidemice & malignæ, ita & semitertianæ plerumque prauitatem aliquam conjunctam habent. Et in primis ad humores semitertianæ gignendæ aptos facit constitutio cæli humida, vt ex Hippocr. 1. epid. sect. 2. videre est, quâ de causâ etiam Anno 1621. in Italia frequentes fuere semitertianæ, vt testatur Adr. Spigelius, de febr. semit. libro 2. capite 1.

## Signa diagnostica.

Signa diagnostica.

Signa huius febris quod attinet, & illius quidem quæ vulgò describitur, cum ex bile & pituitâ simul putrescentibus hæc febris accendatur, vtriusque humoris Signa apparent. Alter enim humor quotidie affert paroxysmum, alter verò tertio quolibet die, & ita altera dies duos habebit paroxysmos, altera verò vnum tantum: nisi paroxysmorum tempora in vnam horam conueniant. Tunc enim ita tempora paroxysmorum confundentur, vt neque quotidianæ, neque tertianæ formam præ se ferant, Atque vt cum Galeno signa hemitritæ exemplo declaremus, Corripiatur, exempl. grat. quis febre circa primam diei horam cum rigore, per quem carnes ægri, quasi pungi videntur; adfint alia febris tertianæ intermittens signa; accidat vomitus, tandemque incipiat febris declinare circa horam diei nonam cum sudoribus, vt spes sit, circa diei horam vndecimam febrem planè intermissuram: sed tum subito febris retineatur, curisque densetur, aut etiam horreat, atque ita principium febris quotidianæ continuæ cognoscemus. Hoc enim si fiat, ex eo jam possumus colligere, duplicem causam, duplicemque febrem adesse, mixtamque esse tertianam intermittentem cum quotidianâ continuâ. Secundo die circa horam diei nonam iterum accessio fiat, tertioque die circa horam diei primam iterum paroxysmus adueniat, & hora nona se-

cundi diei sese habeat, vt hora nona primi diei, ac hora prima tertij diei, vt hora prima primi diei: semitertianam eam febrem esse facile colligimus. Fieri tamen potest, vt vtrique aut altera anticipet, aut vtriusque paroxysmus in vnam horam conueniat, quæ omnia perspicuè planè & prolixâ satis oratione explicat Galenus, lib. 2. de diff. febr. cap. 7.

Quod autem eam semitertianam attinet, quam esse tertianam intermittentem simplicem, vel duplicem cum inflammatione alicuius visceris diximus, febris ipsa quidem intermittens suum typum obseruat, siue sit simplex siue composita; calor tamen ob inflammationem est continuus, eaque etiam suis signis se prodit; adfuntque vomitus, dolores ventris, alui fluxus, clysteres injecti nihil fecis educunt; sed mera clysteris materia sine excrementis, prout injecta erat, statim vel modico post injectionem tempore exit, quod signum inflammationis intestinorum in eiusmodi febribus frequentissimum esse solet.

Malignitas si adsit, etiam suis signis, quæ de febribus malignis proponuntur, sese prodet.

## Prognostica.

Febres semitertianæ omnes periculosæ sunt. Nam, vt Hippocrates 6. epid. sect. 3. scribit, in eâ accidunt acuti morbi, & est maximè lethalis, & vt Galenus, in lib. de typis, habet, non os ventriculi solummodo ac neruosas partes & summatim media attingit, sed & veternosas caraphoras, vigiliæque cum delirio, & diaphoreses cum syncope infert. Linguam præterea valde exsiccatur, & animi defectiorem efficit, vehementer, quæ in profundo sunt commouens, & omnino, vt Galenus, lib. de typis scribit, ferum typum habet hæc febris. Quorum omnium vt quisque de semitertianâ sentit, ita rationem reddit. Nos periculum huius morbi à quatuor causis procedere putamus. Prima est, quod febris hæc non simplex est, sed vel ex continuâ & intermittente, vel ex pluribus tertianis constans. Et præcipuè hæc febres sunt curatu difficiliore, quæ ex diuersis specie humoribus componuntur. Licet enim febris vnus morbus naturâ sit: tamen ex causis specie diuersis generatur, ex flauâ bile & pituitâ. Ideoque remedia, quæ vni humori conueniunt, alteri sunt incommoda. Secunda, quod sæpe etiam inflammationem visceris alicuius in ventre inferiore coniunctam habet. Tertia, quod ipsi plerumque mala grauissima & per se periculosissima superueniunt, vnde, vt etiam ante dictum, Hippocrat. 1. epid. sect. 3. Semitertianam præ cæteris lethalem esse dicit, in quâ eueniunt morbi acuti, utpote apoplexia, epilepsia, conuulsiones. Quarta, quod plerumque maligna est, contagiosa, epidemia, & sæpe non secus ac ipsa pestis plurimos inuadit ac iugulat.

Est verò non solum morbus acutus, sed quandoque morbus longus, & Auicennas scribit, aliquando hanc febrem excedi usque ad septem menses. Quod quomodo verum esse possit, miratur Adrianus Spigelius, & quodammodo humanam intelligentiam superare scribit, continuam febrem tamdiu durare posse. Verum præsupponit ille ex vulgari sententiâ, febres has esse per se continuas; cum tamen sæpe potius sint subintrantes, vel continuitatem habent ex inflammatione. Si tamen tamdiu extendantur, credibile est, inflammationem vel nullam vel lenem adfuisse, febrem verò ipsam ex tertianarum diuturnarum genere esse, quæ soluitur raro quadragesimo; frequentius sexagesimo, frequentissime octogesimo die.

Soluitur autem hæc febris per fluxum alui, dysenteriam, dolores colicos. Interdum mutatur in tertianas

tianas intermittentes vel simplices vel duplices, vel etiam Quartanas.

### Curatio.

Curatio.

Et si febris hæc non rara sit, eaque satis periculosa: pauca tamen de eius curatione apud antiquos extant, forsitan eâ de causâ, quod eius, utpote febris compositæ curationem è simplicium febrium curatione patere posse putauerunt. Et omnino primò si hæc febris ex tertianâ intermittente & quotidianâ cõtina cõstet, Curatio ejus tota dependet ex cognitione curationis simplicis tertianæ intermittētis, & quotidianæ cõtinue. Hoc tamen obseruandum, ut quæ febris magis vrget, eius præcipua habeatur ratio; reliqua tamen non planè negligatur. Quod quomodo fieri possit, non ita clarû est. Nonnulli censent, ut medicamenta vtramque febrè respicientia simul dentur, non tamen fermentata, ut natura quodlibet suo contrario opponere possit. Verum alij hunc modum non admittunt. Mixta enim hoc modo medicamenta si offerantur, neutri morbo satisfier. Et mixta medicamenta locum habent commodissimè, cum causâ ad vnâ formam quasi redacta est, sicut hoc fit in nothis febribus. Cum ergo hîc humores sint dispersi, commodius esse putant, ut diuersis temporibus diuersa medicamenta exhibeantur, atque vno die vni, altero alteri humori medicamentum opponatur, vel primò ad illum cura dirigatur, qui magis vrget. Ita cum in semitertianâ primò & facilius bilis coquatur: medicamenta purgantia, quæ primò exhibeantur, præcipuè bilem spectare debent; Pituitosi verò humores diutius præparandi, & tardiùs euacuandi sunt. Itaque in semitertianâ, alium lenientia præcipuè bilem spectare debent, quæ in primis viis in hac febre magis abundat & facilius ductum medicamenti sequitur: aliquid tamen etiam de medicamentis pituitæ destinatis admisceri debet. Nullum autem forte medicamentum, seu purgans, seu quodcunque aliud, in principio exhibeatur, ne agitata in venis materia vel ad caput, vel ad thoracem, vel ad nobiliorem aliam partem ruat, & periculosum aliquem morbum vel symptomata inducat.

Leniora autem illa, ut syr. rosar. fol. manna, Cassia, agaricus, folia senæ, rhabarb. locum habent; scribitque Adrianus Spigelius, de semitertianâ lib. 3. cap. 7. se vsu quotidiano edoctum fuisse, rhabarbarum, agaricum, senam, atque aloën in initio huius febris datâ, plurimum profuisse, castigata refrigerantibus, & viscera aperientibus permixtis, ut cichorio, gramine, soncho, borragine, chondrillâ, endiuia, sero caprino, & in malignis scordio accarduo benedicto, additque, *ibid.* Rusticos, qui altos Mocauia montes incolunt, & in hac febre, & in quotidianâ ac tertianâ duplici non alio sibi remedio mederi, quàm agarico, cuius in substantiâ 3. i. vel 3. ii. sumunt.

Venæ sectio etiâ instituenda est: verum parciùs sanguis emittendus; cum crudi succi in venis, & biliosi humores in primis viis abundant. Imò si talis sit semitertiana, ut pituita abundet, venæ sectio omittenda. Hinc humores præparandi sunt, flauæ bilis feruor mitigandus, pituita verò incidenda & attenuanda est: Et danda opera, ut alter, quamprimùm fieri potest, euacuari possit.

Et consultissimum est, quod in aliis febribus longis fieri solet, ut & in hac fiat, ut materia primò coquatur, hinc paulatim euacuetur; atque iterum coquatur & euacuetur, donec tandem, cõctione absolutâ, perfectâ purgatio fortioribus paulo medicamentis, ut rhabarbaro, senâ, agarico instituatur.

Ex gr. *℥. Radic. syraminis, taraxaci, cichorij an. Drach. ii. endiuia, ag. imonia, capill. ♀. an. p. i. fol. sena*

el. Vnc. *℥. agaric. trochisc. Drach. i. flor. cordial. p. i. zingib. Scrip. i. passul. Vnc. ℥. Infundantur in f. q. aq. f. vel sero lactis caprini. In Col. Vnc. iii. ℥. dissolu. manna Drach. vi. Coletur. F. Haustus.*

Ad fortiora verò non facilè ascendendum, atque ut rectè Adrianus Spigelius de Semitertianâ, lib. 3. cap. 8. ait, in acutis febribus paulò leniore, medicamento securior medela est, quàm paulò fortiori. Et licet nouem curentur eiusmodi fortibus medicamentis ( loquitur de antimonio ) & vnus in mortem præcipitetur, cum perpetuâ Medici & Artis ignominiâ id coniunctum est. Vbi morbus iam ad statum properat. Auicennas commendat decoctum absinthij. Aperit enim, & bilem, ac aquosam tenuemque pituitam euacuat, simulque membra roborat & appetitum excitat.

Victus ratio sit temperata, & ad frigidum ac humidum declinet, bile dominante. Initio, ut in quartanâ, per dies tres victus sit tenuior, ut humores craf- si absumantur: deinde victus, ut moris est, in principio sit plenior, versus statum verò aliquid de eo detrahatur.

Secundò, si verò hæc febris è tertianâ vnâ vel pluribus, atque inflammatione visceris alicuius atque inde dependente febre continuâ constet; & ad febrem & ad inflammationem cura dirigenda est. Et quidem in principio statim venæ sectio instituenda. Et si enim alia causâ non adesset, quæ venæ sectionem indicaret: tamen ob inflammationem visceris alicuius ea necessaria est.

Si tandem malignitas coniuncta sit, cautè in venæ sectione procedendum, & diligenter perpendendum, an locum habeat, de quo in febribus malignis dicitur. Aperiatur autem vena statim in initio, cum vires statim in hac febre soleant concidere.

Purgationem quod attinet, de eâ dubitari potest, vbi inflammatio coniuncta est; cum per locum affectum purgandum non videatur. Verum eodem modo sese res habet, ut in dysenteria. Nam nisi materia lenioribus medicamentis educatur, facilè fieri potest, ut ad locum affectum confluat atque inflammationem augeat. Neque necesse est, ut materia per locum affectum tota educatur, cum adhuc aliæ viæ sint.

Reliqua etiam curatio, ut tertiana eam exigit, instituenda, nisi quod semper inflammationis habenda est ratio. Ideoque illa medicamenta, quæ refrigerant simulque obstructions aperiunt, commodissima hîc sunt. Non inutile quoque fuerit, extra è regione partium earum, quæ inflammationem patiuntur, topica applicare, ut epithemata ex aquâ cichorij, endiuia, sonchi, aceto rosaceo, vnguenta & emplastra, ut rosatum Mesuræ, & refrigerans Galeni, cataplasmata ex farinâ hordei, pulu. rosar. chamæmeli, absinthij, cum aq. endiuia, rosar. oleo rosaceo.

Tertiò si malignitas coniuncta sit, eius etiam habenda est ratio, & curatio instituenda, sicut de febribus malignis dicitur.

### De duplici ac triplici Tertiana, de duplici Quotidiana, & de duplici ac triplici Quartana.

Duplex vel triplex tertiana fit ex bile duobus aut tribus locis putrescente. Si enim bilis, ex gr. putrescat in duobus locis: fiunt duæ febres, quæ ægrum inuadunt vel singulis diebus semel, vel vno die bis, ut altero die æger à febre sit liber. Atque recentiores nonnulli distinguunt duas tertianas à duplici tertianâ; & duas tertianas nominant, cum tertio quolibet die bis febris affligit, secundus verò dies liber est à febre. Duplicem autem

Febres intermittentes duplices ac triplices.

Duplex tertiana.

autem nominant, cum singulis diebus febris intermit-  
tens ex bile affligit. Alij tamen contrā duplicem ter-  
tiamam nominant, quando duo sunt loca, è quibus  
eodem die protruditur materia : duas verò tertianas,  
quando causa morbifica prodit è duobus locis, sed non  
eodem die, verum vno die ab vno, altero verò die ab  
altero. Verum hæc distinctio magni momenti non est.  
Etsi, quam illi appellant, duplex tertiana sit frequen-  
rior, febris nimirum ex bile in diuersis locis putres-  
cente orta, singulis diebus affligens, sed plerumque  
nec par, nec iisdem horis. Ferè enim quæ diebus  
imparibus accessiones fiunt, similes inter se sunt, &  
iis dissimiles, quæ paribus diebus accidunt. Quam-  
uis autem, ratione periodi, quotidianam videan-  
tur : tamen quotidianam, id est, quæ ex pituita fiunt,  
non sunt, habentque symptomata, & omnia signa,  
quæ arguunt bilem, non pituitam. Nam inuadunt  
cum rigore, soluuntur sudore, adest sitis, oris ama-  
ritudo, vigilie, & reliqua signa pleraque in sim-  
plici biliosa conspicua. Ex quibus à quotidianam seu  
pituitosam eam discernere non est difficile. Neque  
enim circuitu solum, sed ex propria naturâ febres dis-  
cernendæ sunt.

Tertiana tri-  
plex.

Idem  
vni plu-  
ries.

Si materia tribus in locis putrescat, fit inde ter-  
tiana triplex, quæ duorum dierum spacio ter affli-  
git, vno scilicet semel, altero bis. Tali febre labora-  
bat adolescens, cuius mentionem facit Galenus, lib.  
2. de cris. cap. 9. qui cum primùm circa horam diei  
quintam cœpisset febricitare, vna cum rigore breui,  
& paululum sudasset multo vespere, mox circa horam  
septimam noctis, priusquam exactè febris desineret,  
febricitare rursus cœpit cum rigore breui : deinde  
paulum sudauit secundo die, ac circa decimam ite-  
rum accessionem habuit, ac similiter sudauit in no-  
cte. Rursus tertio die hora secundâ (nam antici-  
pabat febris) cœpit similiter cum rigore febricitare,  
antequam prioris diei declinatio in quietem  
desineret. Et si pluribus in locis materia contineatur  
& putrescat, totidem etiam tertianæ fiunt. Et si pos-  
sibile est, vt vno die febris semel, altero bis affli-  
gat : etiam possibile est, vt vtroque die bis inuadat.  
Imò censet P. Aeneas Capilius, de febris putridis  
libro secundo, posse in eodem ægro octo tertianas dari.

Duplex.  
Quotidiana.

Quotidiana  
duplex.

Duplex Quotidiana singulis 24. horis bis inuadit,  
ortumque habet ex pituita duobus in locis putres-  
cente, & cognoscitur ex signis quotidianam simpli-  
cem aliàs indicantibus. Verum rarissima est hæc fe-  
bris.

Quartana  
duplex &  
triplex.

Frequentior est Quartana duplex, quæ fit ex hu-  
more melancholico duobus in locis putrescente, &  
qui hac febre laborant vnum diem febre vacuum ha-

bent, sequentibus diebus duobus febre laborant.  
Ex quo non solum, verum etiam, & quidem præ-  
cipue ex signis Quartanæ simplicis hanc febrem co-  
gnoscere licet. Imò interdum accidit triplex quar-  
tana, quâ qui laborant, singulis quidem diebus  
febricitant : ex propriis tamen febris melancholicæ  
signis cognosci potest, eam neque quotidianam,  
neque duplicem tertianam esse. Talisque febris non  
rarò excitatur intempestiuo theriacæ & aliorum cali-  
dorum medicamentorum in principio febris quar-  
tanæ exhibitorum vsu, quibus materia cruda sal-  
tem agitur, non verò coquitur aut euacuatur,  
quod euenisse Eudemo Peripatetico tradit Galenus,  
lib. de predict. c. 2. cui quartanâ simplici laboranti  
cum in principio, materiâ adhuc crudâ, Medici  
exhiberent theriacam, ex quartanâ simplici tripli-  
cem effecerunt ; quam eiusdem theriacæ suo tempo-  
re exhibitæ vsu Galenus curauit. Si enim materia  
per medicamenta sudorifera non discutatur, sed  
saltem agitur, quod de loco quidem mouetur,  
& non discutitur, alibi quasi nouum fermentum  
spargitur & seminatur, atque ita febrilis materia vtro-  
bique multiplicatur, & febris duplicatur.

### De Curatione febrium compositarum.

Cum febres compositæ è pluribus humoribus or-  
tum habeant : de earum curatione in specie multa  
addere opus non est ; cum è simplicium febrium cu-  
ratione, compositarum curatio facile patere possit.  
Itaque in compositis febribus non tam ad periodum,  
quàm humoris febrem excitantis naturam respiciend-  
um est.

Ergo si solam bilem peccare, è signis eius cognos-  
catur, siue febris alternis diebus, quæ est tertiana  
simplex ; siue singulis, quæ est tertiana duplex, in-  
uadit ; siue bidui spacio ter infestat ; quæ triplex est  
tertiana : curanda est, vt febris biliosa seu tertiana.  
Hoc saltem obseruandum, vt & cibi & medicamen-  
ta, respectu paroxysmi, iusto tempore exhibeantur.

Tertiana du-  
plex & tri-  
plex cura-  
tio.

Ita si febrem à Melancholiâ prouenire suis signis  
cognitum habeatur, siue quarto quòque die infe-  
stet, quæ est Quartana simplex ; siue diem vnum in-  
termittat, & postea biduo inuadat, quæ est Quar-  
tana duplex ; siue singulis diebus ægrum affligat, quæ  
Quartana est triplex : curanda est, vt Quartana. Si-  
mulque semper hoc attendendum, An humor,  
qui febrem, quacunque etiam periodo redeuntem,  
excitat, simplex sit, an cum alio mixtus, & tunc  
vel vt exquisita & pura, vel vt nothæ febres cu-  
randum.

Quartana  
duplex &  
triplex cu-  
ratio.

## LIBER TERTIVS

### DE

# FEBRE HECTICA.

### CAPVT I.

#### De Natura Febris Hecticæ.



V P L E X febrium genus esse, supra di-  
ximus, in quorū altero *κατὰ σκέαν* solum  
calor febrilis partibus viuētib. inhaeret,  
qui, nisi, vel ab incendio spirituum, vel  
humorum foueatur, durare non potest :  
in altero verò *κατὰ σκέαν* inest, ita vt causâ fouēte nō in-

Dan. Sennerti Tom. II.

digeat. De priori genere, Ephemeris nimirum & humo-  
ralibus febribus, dictum est hactenus : restat alterū, He-  
cticæ scilicet, in quibus intemperies febrilis quasi in  
habitum transiit, & ita partes corporis nostri viuētes  
occupant, vt etsi à nullâ causâ foueatur, nihilomi-  
nus subsistere possit ; quæ vera est febris huius ratio.  
Nam quod nonnulli idè febres hecticas dictas pu-  
tant, quod calor ille præter naturam non præcipue,  
vt in aliis febribus, in spiritibus aut humoribus,  
sed in ipso habitu corporis, id est, partibus solidis

Febris hec-  
tica unde di-  
ta.



inhæreat, simpliciter admitti non potest. Etenim in omnibus febribus calor præter naturam, qui febris essentiam constituit, partibus solidis inhæret, & omnis intemperiei febrilis subiectum sunt partes hæ. Itaque à modo potius inhærendi, quàm à subiecto, hæcæ denominantur, & quidem his est modus, quem iam explicauimus. Nam quod aliqui ideò hæcticam febrem dici putant, quod suapte naturâ difficiliter tollatur; cum verò calorem præter naturam, qui facilius dissipatur, & tollitur, nomen habitualis caloris & hæcticæ febris non mereri dicunt: id vndiquaque verum non est. Nam ab omnibus Medicis affirmatur, hæcticam incipientem cognitu esse difficilem, curatu verò facilem.

### Causa.

Causa.

Hæcticæ autem febres ab omnibus aliis causis, ob quas reliquæ febres generantur, etiam induci possunt: verum id efficiunt eæ causæ certo quodam & determinato modo. Eæ enim solùm causæ hæcticam febrem efficere aptæ natæ sunt, quæ vel plurimum humidæ substantiæ in membris solidis absumere, vel maximum calorem excitare, vel vtrumque præstare possunt. Ad quam rem inprimis, facit subiecti ad calorem præter naturam recipiendum promptitudo & dispositio, ac continua & vehemens causarum calefacientium actio.

Disponunt autem corpora ad febrem hanc facilius suscipiendam omnia ea, quæ humidum natium in partibus absumunt, cuius generis sunt diurnæ atque insignes euacuationes, siue per aluum fiant, vt in dysenteria, & fluxibus colliquatiuis, siue per sudores, aut alias vias. Continua verò caloris cum corde communicatio idem præstat, qualis fit ex vlceribus, quæ sunt in pulmone, thorace, vtero, renibus, aut aliis partibus. Inedia item, labores, mœror, curæ & tristitia, omnia diurna: sicut & calor febrium ardentium atque acutarum, aut febres aliæ etiam diurnæ. Et omnino corporis calidior & siccior habitus, siue is naturâ talis sit, siue ex morbo talis euaserit, ad hanc febrem suscipiendam aptior est. Inprimis si concurrat aëris & loci constitutio calida & sicca.

Duplex hæctica generatio modus.

Porro generantur febres hæcticæ duobus modis. Aut enim alios morbos sequuntur, atque ex iis suam originem habent: aut statim per se, & ex causis externis vel eidentibus, vt febres ephemeræ, incipiunt. Si primo modo fiant, ex ardentibus febribus proueniunt, quæ diu durant, & protrahuntur, vt tandem calor solidas corporis partes penitus occupet, ita vt licet amplius, sicut ab initio, ab humorum putredine; non foueatur, nihilominus consistere possit. Idem aliæ febres diuturniores, & aliqui acuti morbi, ac hepatis, ventriculi, pulmonis, atque aliorum viscerum, imò omnes diuturnæ inflammationes efficere valent. Nam & Galenus, 1. de differ. febr. cap. 9. scribit, se ex coli intestini inflammatione diuturnâ, vt & renum ac vesicæ similibus affectibus, hæcticam febrem ortam vidisse; & Forestus, lib. 23. obseru. i. 5. ex fistulâ valde sinuosâ in ano latente quandam ad hæcticam deuenisse, & tabefactum obiisse, annotauit.

Fiunt autem ex ardentibus febribus & inflammationibus partium internarum febres hæcticæ, ob caloris vehementiam & diuturnitatem, qui partes omnes peruat, earumque humidum absumit; sæpe etiam ob errorem aliquem in diætâ & medicamentis exhibendis excitantur, dum nimirum ægris victus nimis tenuis præscribitur, aut refrigerantia & humectantia non adhibentur, vel ob aliquod prohibens, e.g. materiæ cruditatem non satis rûtè adhiberi possunt. Fernelius hæcticas illas, quæ ex inflammatione viscerum oriuntur, hæcticas veras esse negat, ac potius

lentas & curatu difficiles putridas esse affirmat. Verumenimverò vt non negamus, tales febres puras hæcticas non esse, sed ex putredine viscerum lentam putridam: adesse ita contrâ negari non potest, cum talibus putridis hæcticas tandem conjungi posse. Fieri quoque potest, vt in acutis febribus putridi humores vel per crisin expellantur, vel medicamentorum ope educantur, atque ita putrida desinat, & sola hæctica maneat.

Quæ autem per se & à principio inuadunt febres hæcticæ, à causis eidentibus eodem modo, quo ephemeræ, vt à labore, & exercitio nimio, irâ, tristitiâ, vigiliis nimis, inedia, & id generis aliis originem trahunt. Hæ enim causæ, si leuiore fuerint, ephemeram; si vehementiores, hæcticam producant. Eos autem, vt dictum, qui naturâ sunt calidiores & sicciores, inuadunt facilius hæ febres: inprimis tempore & constitutione aëris calidâ & siccâ. Nullus autem eorum, qui habitu corporis sunt humidiores, statim ab initio febre hæcticâ corripitur.

Sed hoc loco quæstio moueri solet; An febris hæctica à causâ eidente possit incipere sine ephemerâ; seu, An causæ istæ eidentes hæcticam intemperiem in partes solidas possint inducere, vt non simul inflammantur spiritus, atque ita possit à causis eidentibus hæctica oriri, quam neque præcesserit, neque comiteretur ephemerâ. Auicennas quidem, Fernelius, Mercatus & alij defendere conantur, posse hæcticam sine ephemerâ incipere. Nam, inquiunt, in actionibus non indistinctè quodlibet fit ex quolibet, sed determinatum ex determinato, quale scilicet est id, quod magis dispositum est. At possibile est, humoribus & spiritibus secundum naturam existentibus, cordis substantiam, ob prægressam aliquam causam, sicciorē esse; ideoque fit, vt calorem facilius susceperet. Nam si cui mœrorē & curis contabefacto causa calefaciens accedat, credibile est, promptius cordis substantiam solidam calorem susceperam, quàm spiritus & humores, qui secundum naturam existunt. Atque hoc supposito possibile esse existimant, ad eò vehementis actionis causas externas & eidentes corpori obtingere posse, vt tum ex agentis efficacità, tum verò ex passi promptitudine facile sequatur, vt solidiores partes succendantur potius, quàm humores & spiritus.

Verumenimverò frustra ista omnia dicuntur. Nam ratio sufficiens dari non potest, cur causa eidentis calefaciens solidas corporis partes incendat, non tamen simul spiritus. Sine putridâ quidem hæcticam produci posse, res manifesta est; cum ad putredinem peculiaris dispositio requiratur: sed quod calor hæcticus in partes solidas induci possit, vt spiritus non simul inflammantur, causa dari non potest. Nam quæ ab ipsis affertur ratio, sufficiens non est. Neque enim concedi potest, ad calorem febrilem & hæticum suscipiendum magis dispositas esse partes solidas, quàm spiritus & humores. Etenim spiritus ad calorem suscipiendum longè aptiores sunt & propterea facilius accenduntur, quàm partes solidæ.

Præsupponitur præterea id, quod impossibile est. Nam vt causa aliqua præcedat, v.g. curæ, tristitiæ, & similis alia, cordisque substantia patiatur & exsicceretur, secundum naturam manentibus spiritibus & humoribus, impossibile est. Cum enim spiritus ad illas actiones etiam requirantur, omnino vnâ afficiuntur, & quidem facilius, cum magis dispositi sint ad pariendum, quàm partes solidæ. Et si quoque in partibus solidis semel concepta caliditas diutius retineatur: tamen in spiritibus longè facilius, quàm in solidis recipitur, vtpote quæ sunt corpora calidissima, tenuissima, & ad calorem suscipiendum aprissima.

Quapropter statuimus, si causa calefaciens sit debilis; ephemeram; si vehemens, simul & calorem in spiritibus & solidis accendi: aut si ephemerâ sola incipit, paulò

An febris hæctica à causâ eidente sine ephemerâ induci possit.

paulò post etiam hecticam à vehementià causâ induci, modò corpus ad hecticam recipiendam dispositum fuerit. Atque ita nunquam datur hectica, quæ per se incipit, & ad putridas non sequitur, quam non à principio febris ephemera comiteretur.

Neque obstat, quòd hîc affert Mercatus. Licet concedi possit, simul & aliquando citius à causâ externâ humores & spiritûs calorem suscipere: illum calorem tamen esse fientem, & antequam in iis substantiis factus sit, factum in membris solidis excitari. Nam primò nihil contra nostram sententiam facit, siue ille calor in spiritibus & humoribus factus sit, siue fient: modò hoc obtineamus, siue calore in spiritibus accenso non posse induci calorem hecticum in solidis. Primò scilicet spiritûs calefiunt à causis euidentibus, qui calorem in solidis accendunt, & fouent, qui febris ephemera essentiam constituit. Si ramen disquirere placet, an calor ille, qui accenditur in spiritibus sit fient vel factus: omninò respondendum est, in partibus solidis calorem in ephemeris esse in fieri, ut pote qui pendet & fouetur à calore spirituum; in ipsis verò spiritibus esse factum. Cessante enim euidente causâ, quæ eum produxit, nihilominus aliquandiu durare potest.

### Differentia febrium hecticarum.

*Differentia.* Differentias febrium hecticarum quod attinet, vtiliter rectè intelligantur, sciendum, partiû solidarum substantiam ex tribus componi. Primò enim est humiditas quædam, quæ per minima & vacua spatia partiû similarium, veluti ros quidam, dispergitur; vnde etiam à Medicis Ros hæc pars appellatur. Secundo est pars, quæ ex humore concreto constat, & à Galeno substantia carnosa & adiposa dicitur. Tertiò est pars vel substantia membranosa & fibrosa, quæ in specie solida appellatur.

*Partes solidæ quibus componitur.* Itaque febris hectica duplex constitui potest, vel enim est cū tabe, vel sine tabe. Hectica sine tabe est quædo rorida humiditas partium nondum absumpta est, seu ut Galen. 1. de differ. febr. cap. 9. habet, cū naturalis cordis temperies primò euerri incipit, neque nativa humiditas, quæ in vnoquoque dispergitur corpore, in spatiis partium similarium intermediis planè abolita est, sed cum eâ veluti ebullit & effervesceat, vnde eius exsiccatione atque absumptione iam periculum imminet, nondum verò facta est exsiccatio. Atque hic gradus seu species hæc febris est vsque perdurat, dum aliqua huius humiditatis pars reseruetur.

*Hectica sine tabe.* Cum tabe verò hectica est, quando res eò deuenit, ut humiditas illa iam absumpta & exsiccata sit. Ac tum hectica *μαρσμός* nominatur; tandemque ipse *μαρσμός* est ultimus terminus, ad quem hectica peruenit, quem si attingit, curari amplius non potest. Licet enim solidæ corporis partes non sint separatae; sed ita iunctæ, ut vna sine alterâ vix videatur posse accendi: tamen dubium non est, quin pro variâ earum dispositione aliæ facilius absumantur, aliæ difficilius.

*Hectica cum tabe.* Alij hinc tres gradûs huius febris constituunt. Primus est cū rorida humiditas absumitur & exsiccatur. Secundus, cū carnosa & adiposa substantia iam perit: Tertius, cū etiam fibrosa colliquatur & exsiccatur. Ut enim in solidarum partium nutritione hic ordo obseruatur, ut rorida humiditas primò generetur ex sanguine, deinde carnosa, adiposa & fibrosa substantia: Ita & in hectica idem ordo obseruatur. Nam cū hæ tres substantiæ non parum differant, quæ tenuior est, primò accenditur & absumitur. Tenuioris autem substantiæ est rorida illa humiditas, quàm genus carnosum, adiposum & fibrosum. Carnosa autem & adiposa substantia cū tenuior sit, quàm fibrosa & membranosa, ea roridâ absumptâ primò absumitur. Tandem & ultimo loco calor ipsas etiam membranas & fibrosas partes inuadit.

Dan. Sæueri Tom. I I.

Ex quibus manifestum euadit nec plures nec pauciores esse hecticæ febris seu species, seu differentias, seu gradûs. Vt enim appelles, non multum refert.

An hectica febris species habeat.

Disputant nonnulli; An febris hectica in species diuidi possit: Et cū sit species specialissima, & proinde non patitur veram diuisionem in alias species, idè differentias illas potius partes, quàm species appellandas censent; cū potius ex vnâ eademque caloris præter naturam actione in varia subiecta prodeant, quàm ex diuersitate causæ, aut habitûs caloris, qui vicem morbi præstat; cū vnus & idem sit, æquali intentione præditus ab initio hecticæ, vsque ad lethalem marasimum.

Galenus nominat tempora. Vbi enim rorida humiditas effervesceat & absumitur, primum tempus est & hecticæ principium: secundum tempus seu incrementum est, cū iam carnosæ & adiposæ partes calor depascitur. Quod si his exsiccatis & absumptis calor ad partes fibrosas & solidas in specie sic dictas exsiccandas iam progreditur, status est. Declinatio autem est, quando illa exsiccatio iam cessat, & ultra non progreditur, sed partes rursus refici & humectari incipiunt. Si verò hæc exsiccatio etiam ultra ad substantiam fibrosam progrediatur, & calor illam quoque depopuletur, status & vigor summus est. Nulla autem tum est declinatio. Nam hectica cum tabe exquisitâ nullam curationem admittit, & proinde nullam declinationem habet.

Hectica temporum.

Obseruandum autem hoc loco ex supra dictis, in hecticis febribus cū æqualis sit intemperies, & in omnibus partibus calor æqualiter factum esse obtineat, eas ratione caloris nulla tempora habere, cū qualis est in principio, etiam in aliis partibus morbi sit calor: sed solum secundum modum siccitatis, quem indies maiorem acquirit.

Deinde & hoc notandum, non eandem esse dispositionem, febrem hecticam *μαρσμός* & ipsum *μαρσμόν*. *Μαρσμός* enim, Latinis marcor, est illa viuientis corruptio ob siccitatem; quæ quidem omnibus viuentibus lege Naturæ euenire solet, etiam si causæ præternaturales & morbi non concurrant, sed ex actione Naturæ necessario sequitur, & inuitabilis est; cū calor innatus humidum illud innatum & radicale perpetuò depascatur & depopuletur, atque id, quod succedit ei, quod dissoluitur, bonitate par non sit. Ita enim humidum natium indies sensim imminuitur, marcorque ille sequitur, seu frigida & sicca corporis constitutio, quæ senectus appellatur, quam tandem, deficiente planè nativo humido & calore, mors naturalis sequitur.

μαρσμός.

Est & alius marcor, qui præter naturam accidit, & à causarum præternaturalium violentiâ dependet, quæ nonnulli senium ex morbo appellare solent, qui non solum senibus, sed & iuuenibus ac viris accidere potest. Hic aliquando etiam sine febre oritur, ex alimenti defectu, calorisque natui extinctione, aliquando has, de quibus agimus, febres hecticas sequi solet. Nam quando, ut dictum, ipsæ partes solidæ & fibrosæ absumi & exsiccari incipiunt, hectica *μαρσμός* appellatur; quæ vbi eò vsque processerit, ut calor iam deficiat, ob alimentum absumptum, tum verus *μαρσμός* oritur; similis illi, qui extremam senectutem sequitur, & naturalem mortem proximè antecedit.

Atque hæ differentiæ in primis ob curationem obseruandæ sunt; cū prima faciliè curetur, secunda difficilius, tertia nunquam. Reliquæ, quæ ab aliis afferuntur, differentiæ propriæ non sunt, sed potius modi quidam quorum tamen aliquos etiam obseruare non inutile est: ut quando dicitur, hecticam aliam stomachi, aliam hepatis, aliam renum, aliam intestinorum esse. Ad curationem enim instituendam non inutile est, cognitum habere, ex quâ parte hæc febris originem habeat.

Tandem & hoc non prætereundum, cuius etiam supra

suprà facta est mentio, hecticam aliam esse simplicem, quæ scilicet cum nullâ aliâ febre coniungitur; aliam quæ putridis connectitur; quod ipsum quoque ob curationem obseruare, non inutile est; cum remedia, quæ in simplici hecticâ prosunt, in hecticâ cum putridâ obesse possint.

## CAPVT II.

*De Signis diagnosticis febris hecticæ.*

**S**igna febris hecticæ quod attinet, primò recensimus signa omnium febrium hecticarum communia; quæ cognoscere vtilissimum est, vt mox à principio has febres, ab aliis discernere, & quò vsque progressæ sint, iudicare possimus. Nam etsi in principio ita difficiles curatu non sint: tamen, vbi altè radices egerunt, periculosæ sunt, multique ex iis moriuntur; quod non fieret, si mox à principio cognoscerentur.

1. Primum autem signum à calore sumitur. Calor nimirum huius febris nullum dolorem, nullamque molestiam infert: quod idè euenit, quia calor in istâ febre est æqualis & hecticus: Alterationes verò dum fiunt, dolorem inferunt: id autem, quod iam factum est, & veluti in naturam conuersum, ampliùs dolorem & molestiam non efficit. Hinc fit, vt ægri se febricitare vix sentiant.

2. Secundum, calor debilis primò apparet, propter subiectum siccum, & vaporum ac exhalationum fumarum defectum. Parum enim est, quod ex solidis partibus euaporet. In putridis verò febribus ex humoribus plures vapores attolluntur. Si autem manus diutius admota teneatur, calor acer & mordax euadit, ob subiecti siccitatem & soliditatem, aut potius, quòd cutis per manûs longiorem contactum quasi rarior facta aliquid sub specie tenuis vaporis emittit, quod mordacitatis & acrimoniæ sensum exhibet.

3. Tertium, in arteriis maior calor apparet, quàm in reliquis partibus; quia arteriæ à calore cordis propter communionem, maiorem calorem, quàm reliquæ partes, suscipiunt, aut quia in putridis vapores per vniuersum corpus dispersi in omnibus partibus magnam caliditatem excitant. At in hecticis in sanguine non est tam magnus calor, ideòque partibus vicinis non ita communicari potest; sed solum arterias partibus vicinis calidiores reddit. Manifestè autem hoc apparet, cum lori aut alio quouis modo calefacti sumus. Tum enim in aliis partibus calor sentitur remissior: in arteriis verò nihilo minor sentitur.

4. Quartum, proprium & inseparabile huius febris signum est, si vnâ aut alterâ horâ post cibum, sumptum calor augeatur, & pulsus ad magnitudinem & velocitatem mutetur; ita tamen, vt illa ἀνάστασις & ἐμνούσις, ascensus caloris & quasi cuiusdam febrilis significatio, ἀλυσίτης; libera & incompressa sit, vt dum calor augeri videtur, & incrementi signum præ se fert, neque frigus, neque horror, neque rigor aliquis, neque oscitatio aut pandiculatio, neque aliquid aliud instantis paroxysmi signum adsit. Vt enim in aliis febribus per paroxysmum calor augeri solet: ita in his febribus incrementum calor vnâ atque alterâ post assumptum cibum horâ; quacunque horâ cibum exhibeas. Vt ergo certius de hac febre iudicari possit, hora cibi per aliquot dies est mutanda, & si calor à cibo increuerit primâ, secundâ, terciâ, quartâ die, horis cibi sumendi mutatis: tunc nullum dubium est, ægrum hecticâ laborare. Cui & illud adiungere licet, quòd caloris & pulsûs mutatio rarisper durat: donec alimentum distributum sit; deinde omnia cessant, & homo ad pristinum statum reuertitur, cum scilicet, in quo fuerat, antequam alimentum assumeret. Ratio huius symptomatis est, quòd cum hecticarum calor in par-

tibus solidis sit, non multum est, quod ab his euaporare possit, ob earum siccitatem: cum verò alimentum humidum sit substantiæ, ex ipso calore plus pabuli suppeditatur, & ita plures vapores attolluntur.

Galenus modum hunc per calcem viuam explicat. Nam si quis calci viuæ aquam affundat, vapor multus & calor inde excitatur; aut si quis lapidibus ignitis in balneo aquam affundat, tum copiosus calor, aquâ in calidos vapores resolutâ, per totum balneum diffunditur, qui à lapidibus illis siccis diffundi non potuisset. Alij tamen hunc modum non probant, Nam primò impossibile esse putant, viuo animali tantam inesse siccitatem, quæ calcis naturam æmuletur: secundò quia partes, quæ in hecticis incallescunt, sunt partes solidæ, ad quas alimentum non peruenit, nisi transactis ad minimum sex horis; cum tamen hectici mox à cibo incalescant. Verumenimverò quòd calcem viuam attinet, exemplum est, neque opus est, vt tanta in corpore sit caliditas & siccitas, qualis in calce est; modò partes solidæ, subministrato humore, calorem maiorem possint excitare. Deinde etsi ad integram nutritionem plurium horarum spatium sit necessarium: tamen tenuiores quasdam alimenti partes breviori tempore in omnia membra distribui, impossibile non est, à quibus hoc in omnibus partibus caloris incrementum accidit. Hoc itaque signum si diligenter in conspectu habeatur, facile per id hecticam ab aliis febribus omnibus discernere licet. Quamuis enim in aliquibus febribus libera caloris inuasio fiat, quam neque horror, neque frigus, aut simile quid præcedat: tamen hoc caloris augmentum sine cibo etiam accidit. At in hecticis febribus omnibus nullo alio tempore calor augetur, quàm post cibum assumptum, quocunque etiam tempore ille exhibeatur.

5. Quintum signum ex pulsu sumitur. Nam cum in hac febre vires valdè debilitentur, extra dubium est, pulsus in eâ esse paruos; & ob vsum auctum crebros ac modicè celeres. Vehemens verò vel magnus pulsus in hac febre non est; & si in aliquâ febre pulsus est magnus ac vehemens, ea hectica non est. Vehemens esse non potest, quia in hisce febribus facultas vitalis imbecilla est, propter eam intemperiem, quæ iam in corde facta est. Semper enim imbecillitas facultatis cordis intemperiem, inprimis si vehemens sit, comitari solet. Eadem quoque de causâ magnus esse non potest. Magnus enim pulsus esse non potest, si facultas sit imbecillis, & proinde multo minus, si præter imbecillitatem etiam instrumentum, ob siccitatem, quòd fit in hecticis, resistat & non obtemperet.

6. Sextò, quòd vrinam attinet, ex eâ nullum de hecticâ signum desumi posse, docet Galenus; quòd de colore & substantiâ intelligendum est. Color enim non est modo à naturali alienus. Differentiarum tamen Hecticæ non obscura signa ex vrinis petuntur, de quibus paulo post.

Atque ex his signis diligenter consideratis, non adeò difficile est, febrem hecticam ab aliis omnibus febribus discernere. A putridis enim plerisque discernitur, quòd Hectica interuallum nullum & remissionem habet, sicut neque incrementum, sed calor semper æqualis manet, quòd non fit in putridis plerisque, in quibus calor increfcit in augmento & vigore, minuitur in declinatione. A Synochis verò, quæ & ipsæ perpetuò calorem æqualem habent, differt hectica, quòd in illis calor longè est vehementior & maior, in hac verò obscurus & remissus. Vnde etiam in illis pulsus sunt maximi, velocissimi, frequentissimi, qui hic sunt parui & debiles. Ab aliis verò febribus accessiones liberas & ἀλυσίτης habentibus discernitur, quòd illæ inæqualitatem quandam habent, post alimentū paulò ante paroxysmum exhibitum: in hecticâ verò post cibum, quacunque horâ assumptum, veluti quædam accessio



accessio æqualis sentitur, calorque augeri, & pulsus velocior animaduertitur.

Signa differentiarum, incipientis hecticæ signa.

Sed iam ad signa differentiarum accedamus. Et quidem incipientem hecticam quod attinet, eius peculiaris signa multa recensere opus non est; cum signa quæ omnibus hecticis sunt communia, eam satis indicare possint. Aliqua tamen hic reperemus. Et quidem de signis hecticæ cum putridâ inuadentis postea dicemus. Iam de hecticâ cum ephemera incipiente agamus. Incidat aliquis in febrem, qui calidâ & siccâ est temperie, ex causis evidentibus (nam hæc conditio si desit, hecticæ ex se incipientis nullus metus est,) ut vigiliis, laboribus, inediâ, curis & similibus causis, & iis quidem ita vehementibus, præsertim tempore & statu aëris calido & sicco, ut primò quidem omnia febris ephemeræ signa adsint; extendatur autem ultra diem, neque calor magis inualecat, sed corpus reddi siccius videatur, tum hecticam incipere, magna suspicio est. Quod si ad tertium usque diem extendatur, æger horâ minis suspectâ cibum sumat, & si calor nihil nisi ex cibo assumpto, augeatur vel immutetur, sed quædam quasi febris reliquiæ permaneant, cum ariditate corporis & calore; qui primo tactu mitis sentitur, postea verò acris & mordax percipitur: illa de hecticâ suspicio valde confirmatur. Ut autem omnino certus sis de hecticâ, offeratur ægro cibus, & quidem eo tempore, quo nulla de inuasionem febrili suspicio est. Si enim hectica adest, statim vnâ aut duabus post sumptum cibum horis, caliditas augebitur, ut quicumque tetigerit ægrum, accessionem febris, seu paroxysmum adesse opinetur. Illa tamen *ἀνάλωτος & ἐμπροσθεν* erit *ἀδύνατος*, incompressa & libera; nihilque præcedet eorum, quæ putridarum febrium paroxysmos præcedere solent. Et ut planè sis certus, sequentibus diebus horis planè diuersis cibum exhibeas. Semper enim eodem modo, vnâ atque alterâ horâ post cibum assumptum, calorem augeri, aliis verò temporibus perpetuò æqualem manere, animaduertes.

Secundi hecticæ gradus signa.

Secundus Hecticæ gradus cum mediis sit quasi inter eam hecticam, quæ sine tabe est, & illam, quæ absolutum ferè marasimum coniunctum habet, ac latitudinem satis amplam, maioris & minoris ratione, obtineat: sicciore iam in eâ, atque inopiâ alimenti exsiccæ corporis partes redduntur. Et quantum siccitas inualecit, tantum etiam virtus fit debilior. Vnde accidit, ut quamuis pulsus paruus, durus, debilis ac frequens sit: minis tamen talis sit, quàm in extremo marasimo; magis autem, quàm in hecticâ sine tabe. Suppeditant quoque huius secundi gradus signa vrinæ. Vrina nimirum est oleaginosa, seu pinguedo, araneorum telis similis vrinæ innatat. Et si enim in aliis etiam affectibus sine hecticâ pinguedo in vrinâ conspici possit: tamen si iam ex aliis signis cognitum ac perspectum habeamus adesse hecticam, tum talis vrinâ apparens inseparabile hecticæ secundi gradus signum est. Adiposæ enim accarnosæ substantiæ colliuationem significat. In genere tamen etiam aliquod de hecticâ ex vrinâ colligere licet, si hæc obseruemus. Vrina, in quâ pinguedo telis aranearum similis innatat, semper colliuationem significat, vel eius pinguedinis, quæ cum sanguine est in venis, vel adipis renum, vel adiposæ & carnosæ substantiæ totius corporis, atque ita hecticæ secundi gradus. Hæc autem discerni possunt: si sanguis copiosus sit, & bonus in sano corpore, talis pinguedo interdum in vrinâ apparet, & supra vrinam quid innatat, quale in lacte summo colligitur, ac quale in refrigeratis iusculis summa parte coëscit, quod Græcis *γρᾶν* dicitur. Habet enim sanguis partem quandam pinguiorem, de quâ aliquid interdum cum vrinâ etiam percolatur, nimirum vbi maior eius in corpore est copia; præsertim si corpus incalescat. Si autem pinguedine renum colliquatâ hoc accadat, *ἀδύνατος* & confertim, ac cum dolore & ardore

renum contingit. Si autem paulatim defluat, reliquo corpore ægrotante, colliquatio hæc fit ob hecticam febrem, quæ vel sola est, vel cum aliâ febre coniungitur. Si sola hectica sit, illud quod innatat, paucum est. Calorem enim hecticarum febrium est debilior, & corpora ad hecticam disposita sicca sunt, & parum adipis ac pinguis substantiæ habent. Si autem alia febris coniungatur, copiosior pinguedo cum vrinâ emittitur: cum calor illarum febrium, quæ hecticis iunguntur, sit maior; & sæpe in eâ corpora incidat, quæ succulenta sunt; & adipis magnam copiam habent. Febres autem illæ, cum quibus hecticæ coniunguntur, sunt putridæ, & ardentes, nonnunquam & pestilentes. Per ardentes autem febres nonnullas à calore vehementissimo non solum alimentum simularium partium, sed & carnosæ ac adiposæ substantiæ colliquatur & absumitur (vnde & febres illæ colliquantes & colliquariæ dicuntur) ut adiposum & pingue aliquid interdum per aluū, interdum per vrinam eiiciatur. Hoc itaque signum si adsit, hecticam cum putridâ coniungi significat. In nonnullis verò pestilentibus febribus etiam habitus corporis corrumpitur & colliquatur, quæ similiter cum hecticâ coniunctæ sunt. Verum cum vrinæ oleaginosæ non tantum ex dicantur, quæ oleosi quid in superficie natans habent, sed & quæ substantiâ oleum referunt; de his videantur ea, quæ lib. 3. Inst. part. 1. f. 2. capite 6. diximus. Ad secundum gradum etiam istud referunt, quod ægri ob imbecillitatem oculorum palpebras atollere nequeunt. Nam quod in febribus acutis defectus clausulæ oculorum in dormientibus denotat: id in hecticâ per impotentiam aperiendi oculos denotat. Verum forsitan hoc signum rectius ad tertium gradum refertur.

Tertij autem gradus signa sunt facilia & euidentia de quibus tamen hoc notandum, esse ferè eadem, quæ

Tertij hecticæ gradus signa.

1. Prognost. ab Hippocrate in facie Hippocraticâ dictâ describuntur; & esse ea signa morbis acutis & diuturnis, ac omni causæ emacianti cum hecticâ marasmode communia. Ad marasimum enim & extremam tabem plures morbi deducere possunt. Quapropter ex his hectica non simpliciter indicatur. Verum si antea ex aliis signis de eâ constet, de gradu ac specie eius indicia desumuntur. Signa autem hæc sunt: Oculi sunt valde concaui, & in quibusdam quasi foueis reconditi; qui & ipsi minores sunt, exsiccatis & ex parte absumptis in iis humoribus, & adipe, qui plurimus est circa oculos, cōsumpto. Ossa genæ vtriusque, imò totius oculi orbitæ limbus eminentior apparet, ob oculum intrò conditum, inprimis verò ob cutis & carnis circa hæc ossa exsiccationem. Sordes quædam circa oculos apparent. Nam illa exigua etiam, quæ superest, alimenti portio, ob naturalis facultatis imbecillitatem, retineri & concoqui non potest, sed diffluit, & à calore febrili siccatur. Perit viuidus ille faciei color, seu, ut Græci loquuntur, *τὸ ῥόδον τὸ ζωτικὸν ἐνθ*, viuidus ille flos coloris, ob sanguinem, spiritum & calorem natium deficientem, & cadauerosam quasi facies apparet. Quamquam autem squalor & siccitas in totâ facie, imò in toto corpore conspiciatur: tamen in fronte manifestius apparet. Nam in hac sana cutis subiecto musculo connata carnosior est: iam autem per hecticam tabidam, exsiccato & cōsumpto ferè carnosio genere, cutis hæc arida, & intenta quasi cernitur, non ut in senibus, rugosa. Palpebræ ob siccitatem contractæ apparent, & attolli non possunt, motusque earum est imbecillis, & trementi similis, ut modò attolli, modò claudi videantur, non aliter, ac in dormituriensibus, neque tamen dormire valentibus euenit, præsertim ex labore lassus: ita ut in somnum propensius videantur: quæ tamen ad somnum propensio nulla est, cum ob caliditatem & siccitatem maximè vigiles sint, sed potius morticis imbecillitas. Carnes circa tempora cōsumptæ sunt & contabescunt, ut tempora col-

lapſa & ſpatia illa circa tempora quaſi concaua eſſe videantur. Et ſi totum corpus perpendas, nihil niſi oſſa & cutis reliqua eſſe videntur, adeò vt ſi ventrem inferiorem (nam ſuperior, ſcilicet thorax, ob oſſium & coſtarum ſoliditatem ita ſubſidere non po- teſt, etſi in eo viſcera, pulmones, & cor, non minùs, quàm reliquæ partes, emaciata & conſumpta ſint) nudes & detegas: vix aliquid inteſtinorù & viſcerum ſuper-eſſe videatur: & partes illæ valde verſus thoracè contractæ appareant. Quod ſi iam cutem tangas, arida eſt adeò, vt pellem quandam tangere videaris.

*Heſtica cum putrida ſigna.*

Reſtant adhuc ſigna heſticae cum putrida coniun- ctæ. Coniungitur autem heſtica cum putrida, quæ vel eam antecedit, vel ſimul cum eà oritur, vel heſtica iam præſente producit. Ex febre acutâ vel ardente poteſt tandem etiam heſtica fieri, & ita quidem, vt putrida cum heſtica aliquandiu duret. Fieri etiam poteſt, vt ſi corpus ſit biliolum valde à cauſa proca- ta heſtica nimium calefaciente ſimul & heſtica produ- catur, & humores bilioli caleſcant ac putredinem con- cipiant, atque ita & heſtica & putrida ſimul accendan- tur; quarû tamen altera ab alterâ non dependet, ſed vtra- que ab eadem cauſa ortum habet. Poteſt denique poſt heſticam oriri putredo. Nam cum vt de aliis ni- hil dicamus, heſtici lacte vt plurimum alantur, & cor- pori extrâ frigida applicentur, ex lacte corrupto, & po- rorum cutis obſtructione poteſt oriri putredo.

Negant quidem nonnulli, heſticam cum putrida coniungi poſſe; Verùm ſine cauſâ. Etſi enim exi- ſtimate, à putrida heſticam prouenire non poſſe, vt putrida maneat; cum calor, qui erat in putrida in ſic- ri, mutetur in factum, & proinde ceſſet & abolea- tur putrida, & in heſticam tranſeat: tamen hoc minùs rectè docent. Nam dum à putrida febre heſtica ac- cenditur, non totus calor, qui à putredine excitatur, tranſit in factum, ſed maxima pars manet in fieri, quæ etiam poſtea, ceſſante putredine, euaneſcit. Quod vel experientia teſtatur, quæ manifeſtè docet; dum heſtica cum putrida coniungitur, calorem multò eſſe maiorem, quàm vbi putrida ceſſante ſola heſtica ma- net. Neque etiam concludit, quod dicunt, qui con- trarium ſentiunt, putridam heſticâ ſuperuenire non poſſe idèò, quòd cum heſtica calor ſit factus, quicun- que calor ſubiecto ita diſpoſito ſuperuenit, etiam in facto eſſe conſtituitur. Nam verum non eſt, quòd omnis calor ex humoribus putreſcentibus, præſente iam heſtica, excitatus, ipſe etiam heſticus euadat. Permanet enim, quamdiu putredo humorum adest, calor ille inæqualis, & à cauſâ ſuâ, nimirum humorû putredine, fouetur; quâ ceſſante, ipſe etiam ceſſat, vt experientia teſtatur; quod non fieret, ſi heſticus eſ- ſet. Itaque etſi in talibus febribus vnus eſt calor præ- ternaturalis: tamen, vna pars eſt *ἐκ πυρὸς*, altera *ἐκ πύρρῃς*, à putredine humorum pendens.

*Heſtica cum Intermittente ſigna.*

Cum itaque conſtet, heſticam cum putrida inter- dum coniungi poſſe, diligens danda eſt opera, vt diſcernere poſſimus, an heſtica ſit ſimplex, an cum putrida coniuncta; cum ad curationem rectè institu- dam iſtud ſummè ſit neceſſarium. Poteſt autem con- iungi heſtica cum putrida vel Intermittente vel continuâ. Si cum intermittente coniungitur, minùs difficulter cognoscitur. Nam inclinante acceſſione, ſi- ue per ſudores, ſiue per alui excretionem, ſi calor ni- hilominus aliquis relinquatur, is tamen remiſſus, ita vt æger ſe febricitare non ſentiat, adſitque magnus vi- rium languor, aut præceſſerit pinguis excretio vel ſu- dor diaphoreticus iam penitiùs & fixiùs febrem ſe in- ſinuafſe, indicio eſt. Quibus illud accedit: quòd finito paroxyſmo, reliquæ omnes partes temperatiores appa- rent, arteriarum ſolùm loca calidiora ſunt, pulſûque celeritatem & frequentiam non amittit: æger quidem cibum accipit, nihil tamen inde roboratur, ſed corpus ſenſim contabefcit.

Verùm ſi heſtica cum putrida continuâ coniunga- tur, longè difficilior eſt eam cognoscere. Nam he- ctica, quæ cum intermittente coniungitur, tempore *ἀνιπνεΐας* ſola manet, vt non ita difficulter cognosci poſſit, ſed quæ cum continuâ coniungitur, nunquam ſola eſt. Primò autem ſicca caliditas remanet per totum corpus poſt finem declinationis, vel totius pu- tridæ febris, vel eius periodorum; quamvis forſan ſudor febrem ſoluens copioſus ſuperueniat. Hocque indicat, præter illum calorem, qui cum ſudore eu- anuit, etiam alium adhuc calorem in membris fixiùs hære. Secundò corpus plus extenuatur & emacia- tur, quàm aliàs per tales febres putridas fieri ſolet. At- que id etiam argumento eſt, alium adhuc ſubſeſſe ca- lorem, quàm ex putredine, qui membra ita colliquet & abſumat. Tertiò vrina oleaginosa apparet. Tandem ſi de heſtica conſteat, de putrida autem ſuſpicio ſit, putredinem indicat *ἀνάκασις* & *ἐμπνοαία* caloris *ἀλ- πύος*, inuaſio caloris non libera & impedita, ita vt calor non ſe mox liberè diffundat, ſed ad interiora repulſus ſubmergatur.

*Heſtica cum continuâ ſigna.*

### Prognostica.

Etſi verò heſticas in principio curare non admo- dum difficile eſt: tamen eaſdem in principio cognos- cere, eſt difficile: cum clam & occultè ſeſe hæc febris inſinuet, vt incurabilior indies reddatur. Quò enim tibi propinquior hæc febris euadit, eo curatu magis im- poſſibilis. Non autem hîc principium dierum nume- ro, ſed ipſius diſpoſitionis qualitate metiri oportet, & gradûs huius febris ſuprà deſcripti attendendi ſunt. Primæ enim ſpeciei ſeu gradûs heſtica inter reliquas facile curatur, ſi ſimplex ſit, neque putredinem con- iunctam habeat. Secundi gradûs & ipſa curatur; ſed difficilior. Tertiij gradûs ſanari non poteſt; cum hu- midum illud radicale abſumptum & exſiccatum ſit, partesque ſimilares abſumptæ refici non poſſint. Quæ putridæ coniungitur heſtica, curatu difficilis eſt, & plerumque lethalis, ob indicationes inter ſe pugnan- tes, & propterea tandem in tabem tranſit.

*Prognostica.*

## CAPVT III.

### De Curatione Febris Heſticae.

Cum febris hæc, niſi dum incipit, cauſâ careat. *Indicationes.* Indicationes ſumuntur ab ipſo morbo & viribus. Et quidem vtraque indicatio in idem recidit. Nimi- rum quicquid humidi & ſolidarum partium abſumptû & exſiccatum eſt, id, quantum fieri poteſt, humectan- tibus reſtituere oportet. Quòd dum ſit, vires ſimul conſeruantur & augentur: ſimul tamen calida intem- peries refrigerationem poſtulat. Et quidem in cura- tione ſumma diligentia adhibenda eſt; cum nec leuiſſi- mum errorem toleret heſtica. Itaque in refrigeranti- bus adhibendis id cauendum, ne calorem natium iam debilem & abſumptum nimia refrigeratione extingua- mus: Et proinde vtilius eſt, ſenſim potiùs, quàm ſu- bitò refrigerare. Humectantia verò in hac febre ſemper tutiora & vtiliora ſunt, quàm refrigeran- tia. Humectantia enim lentè & tardè ſuas operationes exequantur. Refrigerantia verò ſunt efficaciora, at- que idèò etſi calorem febrilem potentiùs tollant, me- tuendum tamen eſt, ne, corpore inprimis extenuato, calorem natium vnâ extinguant. Præterea & hoc obſeruandum, inter refrigerantia & humectantia ea eligenda, quæ ita refrigerant, vt non ſiccant, & ita humectant, vt non calefaciant. Nam quæ refrigeran- tia ſimul exſiccant, vel humectantia calefaciunt, febri huic curandæ parum conueniunt. Atque hæc omnia de heſtica ſimplici intelligenda ſunt.

Si verò hec̃tica febrem putridam, aut visceris aliquius inflammationem coniunctam habeat: non tollitur, nisi morbo priore, seu causâ, sublato. Si tamen hec̃tica nimis urgeat, ne vires sumat & incurabilis reddatur omnino præcauendum. Et quia hec̃tica inducias dat, quas putrida non concedit, interim obstructions aperiendâ, humorêsque putridi sensim euacuandi sunt, atque ita putredo primò tollenda.

In hec̃ticâ ergo simplici quia adjectione & humectatione opus est, nec euacuatio sanguinis, nec aliæ purgationes instituendâ, sed potius, cum medicamentis, tum diatâ corpus humectandum. Medicamenta autem duplicia sunt, quæ intra corpus assumuntur, & quæ extrâ adhibentur. Quæ assumuntur medicamenta, inprimis humectare & simul refrigerare debent, qualia ex violis, borragine, buglossò, nymphæâ, rosis, endiuia, cichorio, sem. 4. frigidis maioribus, papau. amygdalis parantur. Hinc conueniunt Iuleb. & syrupus violar. rosar. syrupus borrag. nymphææ. Inprimis verò vitilia sunt semina 4. frigida maiora, è quibus emulsiones, morsuli & alia medicamenta parantur.

Vt: *℞. Amygdal. dulc. Vnc. ij. sem. 4. frig. mai. excor. tic. an. 3. j. papauer. albi. Drach. ij. F. Cum aq. borrag. violar. vel hordei s. q. Emulsio.*

Quæ dulcoretur rotulis manûs Christi perlatis, vel additâ sacch. s. q. misceantur super igne, & F. Saponæa.

Ad eadem medicamenta pineæ quoque, pistacia. spec. diamargariti frig. diatragaçathi frig. addi possunt.

Vel. *℞. Conseru. cichori. bugloss. borrag. an. Vnc. j. spec. diamarg. frig. Drach. j. santali citrini Drach. ss. Cum syr. violar. F. Electuar.*

Valde à nonnullis commendatur solutio seu magisterium Margaritarum.

Vtiles sunt & rotulæ diamarg. frigidi & diatragaçanthi frigidi.

Vel. *℞. Sacch. albissimi lb. j. B. amyli subtiliss. puluerisat. 3. iij. ol. amygdal. dul. recens expressi. Vnc. iij. Dissolu. saccharum super igne cum aq. ros. vel violar. & cum inceperit inspissari, adde nunc amyllum, nunc oleum amygdal. dulc. & cû spatulâ continuò agitetur. Fiâtq; mixtura.*

Infundere quoque licet in aquâ conueniente, vt borraginis, buglossi, rosarum, species diamarg. frigidi, santalum, & postea colare, colaturamque cum syr. conueniente aut rotulis manûs Christi perlat. dulcorare.

Talia plurima habentur apud Guainerium, c. proprio, & passim apud practicos.

Ioh. Anglicus hunc syrupum commendat & aureum appellat.

*℞. Ungulam caballinam. umbilicum ♀, capillos ♀, lentunculam palustrem, endiuia, hepaticam, cichorium, violariam, lactucam, semen lactuce, papaueris albi, portulacæ. 4. frig. maior. malua, ficus, vnae passas, pineas, amygdalas, santalorum omnia genera, flores violarum, rasuram Eboris, pruna damascena, cassiam fistular. glycyrrhizam.*

Ex quibus singulorum q. s. coquit in aq. s. q. vel hordei, & cum sacchar. albiss. s. q. parat syrupum, quem ægro manè & vespere propinat.

In vsu tamen horum medicamentorum istud obseruandum, vt nunc magis, nunc minùs refrigerantia adhibeantur, prout febrilis calor intensior vel remissior fuerit.

Inter ea, quæ extrâ corpori applicantur, inprimis laudatur balneum aquæ dulcis. Quod si rectè administretur, refrigerat & humectat & propterea conuenientissimum est, cum nulla febris putrida adest.

Antiqui, vt cum ex aliis locis, tum ex Gal. 10. meth. med. videre est, miram in iis administrandis adhibeant diligentiam. Et quidem Balneum antiquorum, secundum nonnullos, tribus, secundum alios quatuor partibus erat distinctum.

Primò enim in loco nonnihil calido loturi exuebantur, & in aère calido tamdiu morabantur, donec corpus nonnihil incalesceret. Deinde in aquam cali-

dam immergebantur. Tertiò è balneo calido egressi in frigidam se conferebant; & quartò sudores abstergebant. Atque has partes antiqui eâ de causâ discerniebant, vt primò pori corporis in aère calido aperirentur, deinde in balneo aquæ dulcis calidæ corpus humectaretur, tandem ne corpus calore exsolueretur, aut calor intenderetur, calor frigiditate temperabatur.

Laborans autem febre hec̃ticâ lauandus est ex præscripto Galeni, sine omni labore, ne vires exsoluantur. Id quâ ratione fieri debeat, satis exactè & curiosè Galenus docet. Iubet nimirum, vt æger in balneum in lectulo transportetur, paratamque ad manûs habeat calentem sindonem, quâ in primam domum balnei à quatuor hominibus transportetur: hinc in secundâ oleo tepido perfundatur; postea in ipsum solum aquæ calidæ deducatur. In solio verò aquæ calidæ mediocriter moretur, ne calor natiuus & humiditas corporis discutiatur: & quidem sindone in aquam mergatur. Hinc in frigidam semel, & quidem breuissimo spatio, mergatur. Postea iterum in lecto collocetur, primò spongiis, hinc mollibus linteis detergetur: tandem vinctus & vestitus domum reducatur ac nutriatur. Idèò autem post balneum inungi iubet Galenus ægrum, vt pori cutis obstruantur, & ne corpus plus iusto dissoluatur, sed humiditas ex balneo inducta intrò pellatur & retineatur. De quibus pluribus agentem Galenum consulere licet, 10. meth. med. cap. 10.

Cum verò balneorum antiquis vsitatorum structura & diligentia in desuetudinem venerit; præterea non sine causâ metuendum sit, ne frigidæ occursum corpus lædatur, ægerque subitum contrariarum qualitarum occursum ferre non possit; ac facile fieri queat, vt ex leui errato in frigidâ adhibendâ maius damnum oriatur, quàm ex recto vsu commodum: Arabes, & qui eos sequuntur Medici aliam compendiosiore hec̃ticos lauandi rationem instituunt. In ægri cubiculo, cuius aër sit tepidior, vt primæ parti balnei Antiquis vsitati, respondeat, labrum aquâ moderatè calidâ plenum prope lectum disponi iubent, vt in eam æger sine labore descendat, & quidem manè, post leuem ex virellis ouorum aut iusculo carnis cibum. In aqua æger blandè manibus tractetur, & tamdiu in aquâ immoretur, donec sponte tepescat. Cum enim Galeno & plerisque Medicis frigidæ post balneum calidum tanta necessitas visa fuerit, vt calidum balneum sine frigidâ parum prodesse putetur: frigidæ vices suppleantur, si æger tamdiu in balneo donec spontè tepescere aut refrigerari incipiat. Aut si nimis tardè conuenientem teporem acquirere videatur, vt ægrum balnei tedium capere incipiat, affusâ frigidâ, balneum faciliè iusto modo tepescere & refrigerari poterit. Hoc modo cum triplex balnei qualitas haberi possit, calida, tepida & frigida: in calidâ parum moretur; diutius in tepidâ; in frigidâ minimum. Atque ista ratione, nullum ex frigidâ incommodum sentiet. Quod facile fieri potest, si subitò ex calidâ in frigidam immergatur. Alij quidem duo labra in ægri cubiculo constituunt, alterum calidâ, alterum frigidâ plenum, atque in priore primùm ægrum immergere iubent tamdiu, quamdiu ægri virtus id perferre potest, ita vt corpus non nimium incalcescat; postea in frigidam demittunt, & iterum aliquândiu in eâ morari iubent. Verùm propter eandem rationem prior ratio balnei videtur esse commodior.

Vt verò balneum plus humectet, in aquâ coqui possunt, malua, viola, branca vrsina, & similes humectantes plantæ.

Inprimis vile esset balneum ex lacte dulci tepido paratum, quale & Egyptiis hodie in vsu esse refert Prosper Alpinus. Verùm cum sumptûs istos ferre omnes non possint, suadent aliqui Medici, vt lactis aliquot lagenæ calefiant, & linco triplicato æger inuoluatur,

Modus lauandi hec̃ticos, Gal.

Medicamenta hec̃tica.

Externa. Balneum aquæ dulcis.

Balnei partes apud antiquos.



uoluatur, ac postea lacte tepido perfundatur, tandemque spongia, vel panno lineo molli abstergetur.

*Inunctiones  
post balneum.*

Post balneum quocunque modo institutum, vtile est, corpus inungere oleo dulci, violarum, amygdalarum dulcium, nymphææ, rosarum, &c. Inprimis spina dorsi tali linimento inungenda:

*℞. Mucilag. sem. psylli, cydonior. aqua violarum extracta, an. Vnc. j. ol. violarum, lactis muliebris, an. Drach. vi. butyri rec. s. aqua violar. loti, Vnc. β. camphora Scrup. β. cere q. s. F. Linimentum ad spinam dorsi.*

Non solum autem toti corpori ad refrigerandum & humectandum medicamenta topica applicantur, sed priuatis quibusdam partibus, inprimis iis, quæ præcipue afficiuntur.

Sunt autem ad hunc usum ea eligenda, quæ refrigerant citra ullam adstrictionem. Talia sunt ex rosis, violis, acetosâ, portulacâ, lactucâ, lenticulâ palustri, &c.

*Cordis regio-  
ni applican-  
da.*

Inprimis autem talia cordi commodissime, utpote quod maxime afficitur, applicantur. Galenus, 10. meth. cap. 9. cerotum rosaceum commendat, & thoraci applicat.

Vel *℞. Aq. rosar. Vnc. iij. nymphææ. Vnc. ij. borrag. acetosæ, an. Vnc. i. β. santalor. omnium an. Drach. β. Misce.*

Possunt etiam admisceri succi acetosæ, endiuæ.

Vel *℞. Vnguenti ros. Mes. rec. Vnc. β. spec. diamarg. frig. santali citrini, an. Scrup. j. Camphora gr. vj. Cum oleo rosar. odorato, F. Limentum.*

Hepati quoque & renibus refrigerantia adhibeantur, qualia supra proposuimus.

Guainerius jubet, ut hepati frustum cucurbitæ imponatur, quæ valde refrigerat & humectat.

#### *Dieta.*

*Dieta.  
Aër.*

Maxima verò curationis spes in Diatâ consistit. Aër ergo, si naturâ suâ sit vel temperatus, vel mediocriter frigidus, tali vtendum: Si verò valde vel calidus, vel frigidus, ad mediocritatem artereducendus.

*Cibus.*

Inprimis verò Cibi magna est habenda ratio. Sit autem cibus refrigerans & humectans, facilis coctionis, boni succi, paucorum excrementorum, & qui non mox discutitur. Tales autem cibi sunt prîsana, vel eius cremor, oua recentia, pulli gallinacei, caro hædina, pisces optimæ notæ, amygdalæ, aut puls talis.

*℞. Farin. hordei pura M. j. Amyli M. β. Coq. ad pultē in lacte amygdalino. Adde oua recentia conquassata ij. sacchari penidij Drach. vj. Misce.*

Cibi autem condiantur lactucâ, endiuâ, seminibus frigid. maioribus, papaueris.

*Lac.*

Inprimis verò Lac conuenit, & vix quicquam ad curandam hæcticam eo est conuenientius, quod non solum alit, sed etiam medicamenti rationem habet. Est enim, ut Galenus, 4. de simpl. med. fac. cap. 17. docet, frigidum & humidum, facilis coctionis, optimi nutrimenti, ac summam vim habet substantiam corporis nostri humectandi & reficiendi.

Inter lactis autem genera, commendatur primo loco humanum, utpote quod nostræ naturæ sit familiarissimum: secundo loco constituunt Medici lac Asininum, quod tennis est substantiæ, & facile in totum corpus distribuitur; tertio caprinum; quarto vaccinum.

In propinando autem lacte primò obseruandum, ut lac optimum eligatur, quod scilicet nullam alienam qualitatem vel gustui vel olfactui confert, sed suo genere dulcissimum sit, & genuinum lactis colorem habeat. Deinde videndum, ne in ventriculo coaguletur: Quâ de causâ lacti aliquid mellis, aut, quod commodius est, sacchari aut salis, admiscendum est. Præterea lac, quantum fieri potest, mox ab vbere calidum dandum, & quidem tribus horis ante reliquum cibum: Et à principio non plus cyatho, postea verò licet cyatho mensuram augere, rursusque alium deinde adjicere,

donec conueniens viribus ægri mensura detur, quæ scilicet à ventriculo ægri recte possit concoqui, ut in eo neque fluctuet, neque corrumpatur, neque vires omnino grauet.

De cochlearum usu in hæcticâ inter Medicos non planè conuenit. Medici superiorum seculorum vix aliud magis commendant, quàm cochleas, & in iis totam ferè salutis spem ponunt. Vnde nò solum cochlearum carnes ægris comedendas exhibent, sed & destillata, electuaria instauratiua appellata, morsulos, syrupos, & plurima alia inde conficiunt. Verum apud Antiquos de his nulla sit mentio. Et Galenus passim inter alimenta crassum succum generantia eas ponit. Atque alij quidam Medici eas improbant, eâ de causâ, quòd difficulter concoquantur, & vix à sanis, multò minùs ab ægris recte confici possint, crassum terrestre & mali succi alimentum generent, ac multa excrementa supeditent. Quod cum non sit de nihilo, eo modo saltem cochleæ vsurpandæ sunt; de quo Institut. l. 4. part. 1. cap. 3. dictum, ut nimirum non caro earum, quæ ab ægris cõcoqui nò potest, sed jus tantum ægris præbeatur.

Nonnulli cancos in lacte caprino coquunt, atque additis herbis conuenientibus aquam-bilem Phthificis parant. Quæ eadem etiam, plantis conuenientibus additis, pro hæcticis parari potest, & rotulis manûs Christi dulcorari.

Guainerius ranas virides, quæ in arboribus viuunt, capitibus abscissis, & visceribus abiectis, tamdiu in aquâ coquit, ut caro ab ossibus separetur, deinde cum farinâ hordei & carne ac brodio illo facit pastam, quâ gallinas & pullos nutrit, eoque hoc modo nutritos mirabiliter dicit conferre hæcticis. Sumit etiam loco ranarum anguillas. Possent & cancris ac cochleis hoc modo nutrirî pulli & gallinæ, quæ procul dubio alimentum conuenientius hæcticis præberent, quàm ipsa cancorum aut cochlearum caro comesta.

Nonnulli, ut alimentum parent, quod non difficile coquatur, facile distribuatur, agglutinetur, nec à calore solidarum partium statim discutitur, sumunt carnem vel cancorum, vel cochlearum, eamque sale fricant & diligenter abluunt, ac postea in aquâ purâ, donec ferè liquecant, decoquunt: postea prîsanam hordeaceam semicoctam addunt, iterumque, donec perfectè cocta sit, coquunt, & tandem per seraceum aut linteum colant, ac prîsanam hoc modo paratam præbent. Alij cancos coquunt in lacte (præsertim caprino) postea contundunt carnem, per seraceum trajiciunt, & addito lacte caprino, vel amygdal. & sacchari sufficiente quantitate, coquunt ad spissitudinem. Quâ ratione etiam, si cui liber, cochleæ præparari possunt.

Nonnulli hoc loco commendant aquas destillatas è carnibus animalium. Verum quantum iis tribuendum sit, dictum, l. 5. Instit. part. 3. sect. 3. cap. 5. Plus nutrit jus instaurans dictum, & succus è carnibus assis animalium expressus. Jus instaurans tale fieri potest.

*℞. Gallinam vel caponem, Cinamomi, macis an. Drach. j. vel ij. santali citrini Drach. β.*

Concisa caro coq. in vase duplici, donec caro ob ossibus separetur. Hinc succus exprimatur, qui in frigore concreuit. A concreto pinguedo detrahitur, & ægro de jusculo calefacto cochlear vnum vel alterum, vel solum, vel cum jusculo alterius carnis exhibetur. Potest etiam addi inter coquendum caro vitulina vel bubula. Vide Instit. ib. cap. secundo.

Conuenientes quoque cibi parantur hæcticis ex amygdalis, nucleis pini, pistaceis cum seminibus frigidis & papaueris albi, cum aqua rosarum & saccharo, atque inde iuscula, mazæ panis, aliique cibi fiunt. Ægyptiis, ut refert Prosper Alpinus, lib. 4. de Medic. Ægypt. c. ult. familiarissimæ sunt sorbitiones maglub atque mastahaleb vocatæ, quæ ex variis seminibus vim refrigeratorem & humectatorem habentibus parantur: semine scilicet lactucæ, endiuæ, son chi,

sonchi, maluz, psyllii, papaueris albi: melonum, cucurbitæ, anguriæ, hordei, pistaciorum, amygdalarum dulcium; singulorum scilicet æqualibus partibus, quæ omnia in mortario marmoreo contundunt, ac lac cum aquâ endiuivæ vel hordei exprimunt, adduntque modicum aquæ rosaceæ & sacchari candi violacei.

In omni autem cibo exhibendo observandum est, ægros quidem plurimo indigere alimento; ob virium tamen inbecillitatem illud concoquere non posse: ideo parum cibi, sed sæpius exhibendum est. Et quoniam omnis attrahendi & coquendi vis in hæcticis est debilis, liquidiora alimenta ipsis conveniunt, cum faciliè distribuuntur & coquantur.

*Putr.* Potus in nostris regionibus conveniens est cerevisia, in primis triticea. Potest & usurpari decoctum hordei, in quo pruna, glycyrrhiza, & momentum cinnamom. aut sem. coriandri coctum sit. A vino autem, nisi illud aquosum, album aut dulce sit; abstinendum, sicut à mulsa.

Galenus, 10. *meth. med. cap. 5. & 6.* aquam frigidam quoque exhibet, & scribit, se hoc modo multos à marasmo præservasse. Sed frigida saltem in eminente hæctica; aut eius principio, & quidem in assuetis locum habet, & ubi corpus adhuc sanguine abundat, ad marasimum præcauendum. Quod autem corpus magis extenuatum & tabes maior fuerit, eo minus convenit frigida potio. Faciliè enim ab eâ calor innatus, qui restat paucus, extinguatur, & partes extenuate valde lædi possunt.

*Somnus.* Somnus in hac febre fit moderatus, vel etiam consueto longior, qui corpus & vires miro modo reficit.

*Hæctica cum putrida est.* Si hæctica cum putrida febre copulatur, & vel ad inflammationem, aut vlcus alicuius visceris sequitur, vel cuicunque putridæ conjungitur, curatio diffi-

cilis est. Faciliè enim, dum vni prodesse studemus, alteri nocere possumus. Imò eadem febris non faciliè cognoscitur. Itaque si corporis maior extenuatio, quam pro ratione febris subsequatur, omnia signa diligenter perpendenda sunt; & si febris intermittens, in primis attendendum, an pulsus tempore æmper sit adhuc febrilis sit.

Vt ergo talis febris curetur, primò causam hæctica, quæ est calor febris putridæ, nisi hæctica nimium virgeat, tollere studebimus; ita tamen, ne hæcticam planè negligamus. Nam si soli putridæ febri curandæ idonea medicamenta exhibere velimus, augebitur hæctica: aut si soli hæcticæ intenti sumus, augebitur febris putrida.

Ergò in præparandâ materiâ, obstructionibus aperiendis, vt & purgantibus, aliquid addendum, quod hæcticam respiciat, ex endiuivâ, violis, portulacâ: Et quidem alterantia hæc efficaciter humectare debent, ideo omnibus medicamentis admisceantur.

Purgantia sint leniora, ex syrupo ros. sol. violar. solutiuo, mannâ, cassiâ. Potestque iis materia lentè evacuari, & per vices corpus iterum refici. E.g. In tertianâ cum hæctica coniunctâ.

*℥. Cassia Vnc. i. spec. diamarg. frig. 3. s. f. Bolus.*  
*Vel. ℥. Rad. cichor. polypod. eryngii an. Drach. ii. endiuivæ M. s. flor. violar. borrag. bugloss. an. P. i. sem. 4. frig. mai. an. Drach. s. tamarind. passul. an. Vnc. s. iunibar. sebesten. an. nu. vi. Coqu. in s. q. aq. hordei s. In Colaturâ infundantur. rhab. opt. Drach. i. s. spica, Schœnanthi. an. gr. vi. Colaturæ ℥. Vnc. iii. In quibus dissolu. manne el. 3. s. vel q. s. Colentur. Adde syr. violar. solut. Vnc. s. f. Haustus.*

Epithemata quoque refrigerantia & humectantia cordi, pulsibus, & hepati apponantur, de quibus antea dictum.

## LIBER QVARTVS.

### DE

## PESTE, PESTILENTIBVSQVE AC MALIGNIS FEBRIBVS.

### CAPVT I.

#### De Natura Pestilentia.



Vm differentias febrium essentielles, vt appellant, eas scilicet, quas Galenus in libris de febr. diff. tractat, hæcenus absoluerimus: atque inter accidentales, vulgarissima & cognitu maximè necessaria sit ea, quæ febres pestilentes malignasque complectitur; atque ipsa Pestilentia tam frequenter cum febribus complicitur, vt plurimi, iique non vulgares Medici, in eam venerint sententiam, pestilentiam nihil aliud esse, quam febrem summè putridam, ac putredinis quodam gradu excellentiore solum ab aliis putridis differentem: operæ pretium fuerit, & ordinis ratio id postulat, vt iam de pestilentia, pestilentibusque ac malignis febribus agamus.

Etsi verò per febres malignas & pestilentes, quasi per gradus quosdam, ad ipsam pestilentiam ascendatur, & summus corruptionis gradus, vt postea dicitur, sit in pestilentia: atque ita à malignis & pestilentibus febribus inchoandum videatur: tamen cum malignitas & venenositas in peste sit maxima, & maxi-

mè perspicua, ab eâ initium facere libet.

Et vt primò in naturam pestilentia inquiramus, de hoc quidem apud omnes constat, Pestilentiam esse morbum quendam perniciosum & periculosum, quo qui laborant, plurimi pereunt, & alios inficiunt. Vnde etiam pestis appellatio ad alias res periculosas & perniciosas traducta & translata est; pestilentemque inuidiam; Senec. in Hippol. pestiferum amorem, idem in Thebaide; ciues, Cicer. 1. de orat. tribunatum, idem pro domo sua, frugum, ventos, Horat. 3. carm. Od. 23. seditiosos ciues & malos consules Rerum publ. Cicero pro Sylla; milites imperij, Livius lib. 2. adulatores iuventutis, Terent. in Adelph. pestes dixerunt. Aut potius pestis nomen, quod in genere rem quamcumque perniciosam significat, in specie malo omnium periculosissimo & perniciosissimo tributum est. In quâ tamen significatione pestilentia & pestis nomen duo complectitur. Primò & præcipuè morbum omnium perniciosissimum, de quo iam nobis agendum; deinde etiam statum & constitutionem, quâ talis morbus grassatur; quo modo tum alibi, tum 6. epid. com. 1. r. 29. Galenus hac voce utitur.

Quâ in re verò pestilentia essentia consistat, dubium est, & de eo variæ ac polix apud Medicos occurrunt

De Pestilentia natura

varia an-  
torum sen-  
tentia.

occurrunt controuersis. Nam cum pestis cum febre putrida plerumque coniungatur, eadem contagiosa sit, & subito disseminetur, pluresque iugulandi vim habeat; non omnes, quomodo hæc ad pestem pertineant, an eius naturam constituent, an verò alio modo ad pestem referantur, perspexerunt. Atque hinc pestilentiam alij febrem epidemiam periculosam & perniciosam, alij aliquid aliud esse dixerunt.

Ne igitur à ianuâ, quod dicitur, aberremus, primò in quo pestis natura consistat, inquirendum, & quidem rationis & experientie ductu. Etsi enim à Præceptorum & Magistrorum in arte Medicâ celebrium placitis, non sine graui causâ recedendum, sed eorum vestigiis, quantum licet, insistendum censeamus, seruiem tamen animum Alex. Massariæ sequi non placet, qui, de *Peste lib. 1.* scribit, sibi iam dudum constitutum esse, Galenum perpetuò imitari, & ab illo, ne latum quidem vnguem discedere, ac se male cum eo errare, quàm cum istis (recentiores intelligit) vera sentire.

An pestis cer-  
tum morbi  
genus sit.

At vt hinc faciamus initium, Massarias, & cum eo quidam alij, pestem nullum certum morbi esse genus dixerunt, neque vnam nostri corporis partem petere, sed omnes in vniuersum & omnis generis morbos pestilentes esse, imò ipsam pestem constituere dixerunt, modò sint vulgares, & maiorem hominum partem interficiant. Atque hanc esse causam putat Massarias, cur neque Hippocrates, neque Galenus peculiarem aliquem de peste tractatum scripserint. Idque eo confirmare conantur, quòd si omnes, omnium temporum pestilentias studiosè memoriâ reperamus, atque singula vniuscuiusque tum symptomata, tum morbos accuratè animaduertamus, illa tam multa, varia, inter se differentia, ac sæpe numero contraria fuisse deprehendimus, vt vno morbi genere comprehendere ac coarctari facile non possint.

Atque huius etiam sententiae Galenum fuisse aiunt, cum alibi, tum præcipuè 3. *epid. comm. 3. t. 20.* vbi hæc habet: *Non est certi morbi nomen vulgare vel pestilens. Ceterum quicumque in vno loco multos simul inuadit, vulgaris hic vocatur; qui si simul hoc habeat, vt multos perimat, pestis est.*

Verum enim uerò etsi negandum non sit, cum peste plurima morborum genera & symptomata coniungi posse; febres, deliria, vigilias, somnum profundum, capitis dolorem, aphthas & oris vlcera, anginam, pleuritidem, vomitum, diarrhoeas, icterum, bubones, carbunculos, macularum varia genera, & plurima alia, quæ ab Hippocrate, in *lib. epid.* & aliis passim recensentur; & hæcenus verum esse non diffiteamur, quod modò ex Galeno dictum est, non esse certum morbi genus, vulgare vel pestilens, id est, in peste non vnum genus morbi vel symptomatum grassari, sed plurima, atque in hac ista, in aliâ alia: tamen in illis morbis omnibus pestis essentia constituenda non est, sed talia solum sunt, quæ pestem vel sequuntur, vel comitantur; ipsa verò, quatenus talia, nullam perniciositatem, quæ pestis naturam constituit, obtinent, neque, quatenus talia, hominem iugulant. Et proinde ulterius querendum, cur illi morbi pestilentes dicantur interdum, cum sæpe tales non sint. Verbi gratia febris, quæ cum peste coniungitur, sæpe mitis est, & ab eâ nullum ægro periculum imminet, qui tamen moritur, & à veneno pestilenti, quod cum febre illa coniunctum est, interimitur. Ita angina sæpe cum peste copulatur; quæ licet neque suffocando, neque per febrem hominem iugulet, æger nihilominus non conualescit ob pestilens venenum; vnde & angina illa pestilens nominatur. Ita alui profluuium interdum pestem comitantur, quæ ex se non sunt lethalia, sed cum peste perniciofa sunt.

Cur Pesti tot

Quod autem tam vtriusque morbi pesti coniunguntur,

id tum ex veneni varietate, & causarum diuersitate, quæ non semper planè eadem sunt, proficiscitur, tum ex diuersitate corporum, in quæ pestilens causa incidit. Id quod docet Galen. 3. *epid. comm. 3. t. 70.* Hæc tempestas, inquit videtur humores acernasse & repleuisse caput, idque omnibus morbis commune fuisse, sed fuisse suo quemque morbo, alium alio correptum, pro sua cuiusque naturâ; alui fluxionibus, acerbis deiectionibus pinguibusque biliosos. Rubicundi verò, inquit, & ad melancholiam dispositi non ininriâ sunt phrenitide & febre ardenti correpti; vt & crasso biliosoque sanguine pradii, & cruentis dysenteris. Quæ autem essent natura frigidiores tantum, vel frigidiores simul & humidiores, hæc par erat, vt quæ nec facile febribus, nec biliosis affectibus sunt obnoxia, in solas incidisse capitis deffillationes.

Ex quibus omnibus apparet: Primò, illud perniciosum, quod pestis naturam constituit, non in tot differentibus morbis, sed in peculiari morborum genere querendum esse, cum quo quicumque alij morbi coniunguntur, ij merito pestilentes dicuntur.

Deinde & illud hinc manifestum euadit, differre τὸ ἐνδημῶν & τὸ λοιμῶδες, aliudque esse pestilens, aliud vulgare. Vt enim morbus vulgaris sit, hoc saltem requiritur, vt plurimos in aliquâ regione vel ciuitate inuadat: non tamen est necessarium, vt omnes vel plurimos iugulandi vim obtineat. Ita annotauit Forest. *lib. 6. obseru. 3.* anno 1580. sex septimanarum spatio, tussim & catarrhum quendam epidemium vniuersam planè Europam peruasisse; ita vt integræ familiæ eo malo corripere: tantum verò abfuit, vt id malum lethale esset & pestilens, vt etiam vix millesimus eo interierit. Pestilens verò morbus is est, qui plerosque ex iis, quos corripit, iugulat.

Vt verò pestilens morbus etiam sit vulgaris, ad essentiam eius non pertinet, sed accidens quoddam pestis est, eius vel causam communem, vel præter causam, pestilentis morbi effectum, contagium scilicet, sequens. Etsi enim vnus saltem in vrbe aliquâ peste corripatur, eum peste laborare negandum non est, ideo, quòd solus eâ laboraret, sufficitque, in plurimos passim sese diffundendi potentiam habere, etsi nondum actu epidemius sit ille morbus.

Obijcitur quidem hic à quodam, à me confundi actum primum cum secundo. Quemadmodum enim, inquit, lethalis dicitur hic morbus, non quòd omnes, quos inuasit, iugulet, sed quòd semper vitam oppugnet, & extinguere possit: ita quoque contagiosum & Epidemium dici potest, non quòd semper actu per contagium in alium pluresue se diffundat, & multiplicet, sed quòd diffundere & multiplicare possit. Quandoquidem istud de necessitate sit pestis & naturâ; ad illud verò plures circumstantiæ & patientis dispositio requirantur.

Verum hic confunditur Contagiosum & Epidemium, & malè statuitur, morbum aliquem potentiam epidemium esse posse. Non enim idem est Epidemium & Contagiosum, sed omninò peculiaris est morbi differentia, quâ in sporadicos & epidemios; & rursum peculiaris, quâ in contagiosos & non contagiosos diuiditur. Et contagiosum aliquid esse libenter concedimus, quòd nondum plures infececit; contagiūque ipsam morbi seu causæ morbificæ essentiam proximè consequitur. At quòd morbus aliquis est epidemius, pluresque corripit, id non semper ex naturâ morbi vel contagio habet, sed id sæpe solum ex causâ communi, aëris scilicet vel victus vitio dependet; neque omnes illi morbi pestilentes sunt. Talis morbus epidemius procul dubio fuit, cuius Forestus, *lib. 6. obs. 2.* facit mentionem, qui non per contagium, sed subito vnico fere tempore omnes inuadebat, afflatu quodam irruens, & post septimum aut vndecimum diem neminem ampliùs

Et tam vni  
morbi ac  
symptomata  
contagiosa  
sunt.

Pestis vni  
morbi genus  
est.

Morbus Epi-  
demius &  
pestilens dif-  
ferunt.

An esse Epi-  
demium ad  
pestis essen-  
tiam perti-  
neat.

Obiectio.

Solutio.  
Morbus Epi-  
demius &  
Contagiosus  
differunt.



amplius aggredi visus est. Ita non non raro febres epidemiae grassantur, quae tamen neque contagiosae, neque pestilentes sunt.

Itaque concedimus quidem, aliquid contagiosum actu primo & potestate saltem esse posse, quod tale non sit actu secundo: definiemusque postea pestem potestate alios inficiendi, non ipso actu secundo, aut effectu, quem non ignoramus multis modis impediri posse. Verum epidemius seu vulgaris morbus nullus potentia dicitur, sed is solum proprie talis est: qui reuera & ipso actu plures corripit; quamdiu vero intra paucos continetur, epidemius non est.

An pestis sit  
etiam Endemius morbus.

Vt vero pestem quamlibet, cum omnis contagiosa sit, in vulgus facile disseminari posse concedimus: ita non abs re quaeritur; An pestis tantum sit in morborum Epidemiorum numero: An vero aliqua pestis morbus Endemius esse possit. Sunt quidem nonnulli in ea opinione, reperiri pestilentes morbos Endemios, quales dicunt esse illos, qui Syriam & Aegyptum saepe exercent, ac plerumque Cairum & Byzantium affligunt.

Verum concedendum non videtur, dari tales Endemios pestilentes morbos. Nam cum, ut Galenus recte, *1. epid. in proem.* docet, ab Endemiis Epidemij ita differant, quod hi per aliquod tempus aliquam regionem peruadunt; illi vero incolae, ac si cognati essent, nullo non tempore comitantur: homines & vita humana cum causa pestilenti perpetuo coniuncta durare non possent, neque regio aut ciuitas homines alere, quae causam pestilentem vernaculam habeat, & domi suae alat. Nam pestilentia illa in Syria & Aegypto ac Byzantio non sunt perpetuae, sed interdum cessant; neque etiam statas plane periodos observant, sed satis inordinate, pro varietate & inconstantia causarum, inuadunt. Et alibi etiam observatur, in populosis vrbibus, atque vbi magnus est hominum confluxus, pestilentiam frequenter aliunde eo transferri, & sensim ac clanculum propagari. Ac quod Cairum in specie attinet, satis clare Prosper Alpinus, *lib. 1. de medic. Aegyptiorum c. 15.* docet, Cur pestis ei vrbis sit familiarior, & sauius in ea grassetur. Refert enim, rarius ex aeris vitio vel domesticis causis pestem ibi nasci, sed aliunde, praecipue ex Syria, Graecia & Barbaria, eo adportari, atque incuriam incolarum subito propagari. Persuasum enim, inquit, Turcae Aegyptique sibi habent, singulis a Deo praedestinatum esse exitium exitique qualitatem, ita ut in bello morituros nullo pacto a peste interimiri posse arbitrentur, & solum peste eos mori posse, quibus quidem ab ipsa exitium praefixum est. Quam vanam credulitatem omnes pestiferum morbum negligunt atque parui faciunt, nihilque ab eo timent, pro certo credentes, si vitam eo morbo finiendam esse destinatum sit, quin eo moriantur, nullo pacto se effugere posse, neque in bello, neque in mari, neque alio modo mortem sibi pertimescendam. Atque hinc peste Aegyptum depopulante, vrbemque Cairum saevissime depascente, nemo ipsorum fugam arripit, neque cum peste infectis conuersari timet, neque vestibus aliisque laneis lineisque pannis pestis contagio infectis vti abhorret. Vestes enim aliaque peste interfectorum supellex subito in emporiis publice venditur, & quisque eam emit absque vilo pestilentis contagij timore.

Cum ergo morbi reliqui, qui cum peste coniunguntur, essentiam pestis non constituent, & per se pestilentes non sint; neque etiam per se pestis definiri possit: iam in quo pestis natura consistat, porro quaerendum. Atque ut ab iis, quae nota & ab omnibus concessa sunt, incipiamus, Omnes homines, ut etiam supra dictum, pestilentiam in aliquo loco grassari dicunt, cum plurimi simul vno aliquo morbo corripiuntur, eodemque pereunt, aliique inficiuntur. Ex quo

concludimus, eius partis necessario morbum esse pestilentiam, a qua vita maxime pendet, & qua laesa, homo de vita summopere periclitatur, Cordis scilicet; atque ita in pestilentia Cor vitae fontem, calorisque vitalis officinam maxime affici, eoque affecto homines tam subito vitam priuari. Idque nemini dubium esse debet, qui ea quae in pestilentia accidunt, perpendit. In omni enim peste animaduertitur subitaneus virtutis vitalis lapsus, summaque virium debilitas. Animalis vero facultas in peste ad finem vitae usque non raro integra persistit; sicut & Naturalis facultas nonnunquam adeo insigniter non labefactatur.

Pestis cordis morbus.

Sunt quidem nonnulli, qui hanc contrarium sentiunt, & non solum cordi, sed & aliis partibus venenum pestilens aduersari statuunt, imò pestem euenire posse, cerebro vicinisque membris primum infectam, quae & necare possit, antequam vis venefica cor contingat, aut spiritus vitales, saltem grandi iniuria parti animali illata, ut scribit Andreas Libanius, *tract. de venen. cap. 11.* eo modo, quo in magnis cerebri vulneribus, apoplexia, & similibus affectibus homo moritur cerebro primo affecto. Idque eo probare conantur, quod non omnia venena primo cordi aduersa sint, sed alia pulmonibus, ut lepus marinus; alia vesicae, ut cantharides; alia cerebro, ut hyoscyamus: atque differentiam etiam istam & diuersitatem in pestilentia ex varietate symptomatum & effectuum apparere, cum in peste varij & diuersarum partium morbi & symptomata conspiciantur, carbunculi, bubones, nunc in his, nunc in aliis partibus, phrenitides, ossium denudationes.

Verumenimvero si concedamus sane, esse venena, quae non cordi primo, sed aliis partibus aduersa sint: tamen pestilens tale non esse, ex summa facultatis vitalis in peste laesione, & subita atque inopinata morte, qua peste correpti extinguuntur, apparet. Et quamquam non in omnibus eadem pars affici videatur: tamen id accidit, partim quia, ut Galenus, *3. epid. com. 3. t. 17.* habet, ab eodem statu genitus prauus humor non easdem partes insidet, quia scilicet nec per naturam omnium in eadem constitutione corpus esset in eodem statu, sed esset alia aliis pars infirmior: vnde accidit, ut nunc ad hanc, nunc ad illam partem venenum pestilens protrudatur: partim quia contagium non semper per eandem partem recipitur, sed nunc per aerem, quem inspiramus, nunc per poros cutis, nunc alio modo; vnde eam partem, quae primo illud recipit, primo loco etiam affici credibile est: sicut Paræo, *lib. 1. de peste, cap. 12.* pestilentem halitum per nares in cerebrum attrahenti accidit. Facile enim concedimus, venenum pestilens ita corpori nostro aduersum esse, ut omnes partes summopere laedat: tamen primario cordi aduersum esse, vis illa insignis facultatem vitalem ledendi, & hominem subito iugulandi satis docet. Nec in peste, sicut in apoplexia, cerebri vel alterius partis laesa interuentu cor afficitur, sed licet & aliae partes in ea afficiantur: tamen cor semper maxime laedi, symptomata, cordis affecti signa indicant, ut & antidota, quae omnia veneno pestilenti sunt aduersa, cor vero roborandi vim habent, & propterea non ad alias partes diriguntur. Hinc quamquam Paræus per nares vaporem pestilentem primum hauserit, atque venenum ibi etiam procul dubio haeserit, & postea per haemorrhagiam & sternutationem excussum sit: tamen ab eodem cor affectum esse, illa ipsa lipothymia, in quam incidit, arguit. Neque enim opus est, ut venenum pestilens humorelique corrumpens & putrefaciens semper & primario in corde resideat: sed nunc has, nunc alias partes occupat. Ita Pauli Aeginetae tempore in colica illa pestilenti, quae totam Italiam aliasque regiones plurimas deuastauit,

stauit, in intestinis materiâ pestilens præcipuè sedem habuit: ita nonnunquam pleuritides, nonnunquam lethargi, phrenitides, & alij pestilentes morbi animaduerti sunt: in quibus tamen omnibus quocunque loco hærens materia peculiarem cum corde *an-  
malis*, habuit. Sicut id in epilepsiâ videre est, quæ et si sit proprius cerebri affectus, tamen non semper oritur per primarium affectum, sed nonnunquam per consensum, vapore epilepsiam causante à pede, vtero, vel aliunde ad cerebrum ascendente. Atque mori hominem in pestilentibus istis malis, non corde tantum malorum istorum vehementia in consensum tracto, sed proprio morbo, ex eo patet; quod homo subito sæpe & multo citius, quam pro mali istius, cum quo coniungitur, naturâ pereat.

Qui autem morbus in peste Cor præcipuè oppugnet, de eo Authores non consentiunt. Omnes tamen in tres classes redigi posse videntur. Alij enim saltem ex putredine pestem oriri existimant. Atque qui hanc sententiam sequuntur, ij plerique pesti febrem coniungunt. Al. Massarias tamen immediatam pestilentia causam putredinem esse docet, & nihilominus defendit, pestilentiam aliquando sine febre esse posse. Quod an fieri possit, hic non disputo.

*De pestilentiâ  
veneni  
naturâ varia  
opinionibus.*

Alij à malignâ, venenatâ & occultâ qualitate Cor infestari existimant, & peste infectos morbo totius substantiæ, quem vulgò appellant, seu potius occultæ qualitatibus laborare statuunt.

Mediam inter hos opinionem tueri videntur Eustachius Rudius & Raimundus Mindererus; sed diuerso modo. Eustachius Rudius quidem, *lib. 3. præf. cap. 30.* in putredinem & simul in rem putrescentem causam pestis refert. Statuit enim in pestilenti febre in humano corpore venenatam aliquam materiam reperiri, quæ putredinem tempore ac ratione præcedat, atque deinde putrescens, dum putredinis vi eius venenosa qualitas concitatur, actiones suas promat: atque ita prout putrescit & extraneum calorem accendit, febrem gignat; quatenus verò venenata est, cor lacestat, & pestilentiam producat. Raimundus verò Mindererus, *in lib. de pestil.* concedit: in omni peste venenum adesse; idque, & rectè, ex effectibus morbi huius, cuiusque sæuitiâ, celeritate, ac inuadendi modo, nec non lethali symptomatum multitudine ac prauitate, imò & iudicij ipsius seu *an-  
locus* difficultate perspicere docet. Cum verò venenorum varia sint genera, atque in peste etiam quædam varietas appareat: omne pestilens venenum solâ ferè putrefaciendi vi nocere, ac septicum omnino seu putrefactiuum esse, & septicâ vi potissimum omnem cladem perficere existimat.

*An pestilentiâ  
vera in pu-  
tredine con-  
sistat.*

Has opiniones iam examinemus necesse est, ut veritatem eruamus. Qui in omni peste putredinem atque inde ortam febrem adesse statuunt, ij, ut id credant, præcipuè adducuntur eo, quod vident illos qui peste corripiuntur, primò horrorem sentire, quem postea calor excipit, non aliter quam in febribus putridis fieri solet, eisdemque ciborum fastidio, capitis doloribus, inquietudine, linguæ ariditate, oris siccitate, siti, bubonibus, carbunculis corripui, & similes morbos atque symptomata, quæ putredinem ac febrem arguunt in iis apparere. Verum enim verò ut concedamus, ista plerumque in peste fieri; (nam semper non accidunt) tamen de eo iam controuersia est. 1. An in peste solùm putredo adsit; seu, An à solâ putredine pestis natura pendeat. 2. An in omni peste putredo & febris animaduertatur.

Primum quod attinet eorum opinionem, qui ex solâ putredine pestem dependere existimant, agnoscunt ij ipsi, dum huius inuadendi modum, sæuitiam, celeritatemque, & hominem ingulandi vim, & medicamenta, quibus curatur, perpendunt, ex putredine simpliciter causam huius morbi dari non posse. Si enim ex putredine simpliciter, & quatenus talis, pestis

natura penderet: omnes febres putridæ essent pestilentes. Itaque in determinandâ & definiendâ putredine varic laborarunt, atque in varias partes secesserunt. Et quidem alij ex ipsâ putredine, alij ex putrescentis materiæ diuersitate: alij ex loco differentiam quandam ab aliâ febrium putredine querere conati sunt. Fracastorius quidem putredinem illam statuit esse profundam & sordidam: Hor. Augenius illam excellentiore corruptione explicat, & febrem pestilentem generari scribit, cum maxima & excellens putredo fuerit: ita ut potius corruptio per putredinem, quam putredo simpliciter appellanda sit, cum neque alterari, neque concoqui, neque euinci adeo possit, quod in hac febre putrescit, ut ad pristinam naturam redire queat. Non multum ab hac opinione discrepat Thom. Minadous, qui duplicem putredinem statuit. Vnam secundum quid, quæ non simpliciter adhuc putredo sit, sed alicuius adhuc coctionis particeps; Aliam, quæ putredo simpliciter appellari possit, eò quod nihil omnino contineat coctionis. Atque ex priore statuit oriri alias febres putridas: ex putredine verò simpliciter dictâ & perfectâ ortum habere malignas. Antonius Portus plura coniungit, putredinemque pestis authorem, largam, profundam, sordidam, conclusam, ad minima elaboratam, & in lentore constitutam esse dicit. Alex. denique Massarias peculiarem terminum & gradum putredinis, quem nemo forsitan satis explicare possit, hic comminiscitur.

*Opinio  
Fracast.  
Hor. Aug.  
Minadous.*

*Th. Minadous.*

*Ant. Portus.*

*Al. Massarias.*

Alij non in putredinem per se, sed in rem putrescentem causam discriminis transferunt, & pestilentes febres ab aliis ita discernunt, quod in pestilentibus putredo depopuletur vniuersam sanguinis massam, atque in primis alimentalem eius portionem; cum in aliis putridis putrescant potius partes illius excrementitiæ.

Alij tandem in malignis & pestilentibus febribus focum putredinis esse in substantiâ cordis statuunt; cum in aliis febribus focus putredinis sit extra cor, & quo fuligines & vapores putridi ad cor mittantur.

Verum ut primò in genere has opiniones impugnemus, quocunque modo illi putredinem describant, & explicent, ad pestilentiam constituendam non sufficit. Nam nisi aliquid aliud addatur putredini, differentia illæ à putredine sumptæ saltem secundum magis & minus sunt, neque variant speciem: atque ita non esset opus, pestem à reliquis putridis seiungere. Et in pestilentibus febribus magnitudo febris & mos eiusdem non distinguerentur. Atque ita si putredinis magnitudo, excellentia, vehementia febris magnitudinem simulque *an-  
non ferè* producat nulla erit differentia inter magnitudinem morbi & morem eiusdem; quam tamen omnes Medici agnoscunt: rectèque Galenus scriptum reliquit, *3. de cris. cap. 4.* Debiles quidem & parue febres quandoque valde malignæ sunt; & aliæ calidæ atque æstuosæ, ut stomacho angustiam, & calorem ac sitim intolerabilem afferant, nihil tamen habent nonnunquam periculosum.

*Putredo  
essentiam  
non  
constituit.*

Deinde pestis secundum suam essentiam & per se lædit modo toto genere diuerso, & secundum vehementiam, & secundum perniciem ab eo, quo putredo & reliquæ putridæ febres hominem afficiunt; & proinde toto genere pestis à putredine & putridis febribus diuersa est: cum operationes essentialiter diuersæ formas, à quibus proueniunt essentialiter diuersas arguant. Etenim pestis, ut Galenus, *de theriac. ad Pison. cap. 16.* docet, seu ferè quædam venenata non paucos aliquos miserè perdit; verum totas ciuitates depopulatur. Immutat enim aërem malo quodam modo; unde homines, qui sine aëre respirare non possunt, contagium miserè euadere nequeunt. Attrahunt enim in seipsos aërem illum infectum, tanquam præsentaneum aliquod venenum. Hinc de quodam febri pestilente extincto Galen. *3. epid. com. 3. s. 75.* scribit: *Itaque ut veneno lethali opoto quidam postridie vel*

*Pestilentiâ  
veneni vi.*

tertio die moriuntur, qualitate eius, non copia, mortem afferente: ita & hic quoque ager (phreneticus) statim tertio die censendus est obfisse à qualitate succorum virulentorum, non phrenitide peremptus. At phrenitis illum est subsecuta symptomatis vice. Memento scilicet, sese ferè exerit, & perniciosos effectus edit pestilentia, stupendo planè modo sese propagat ac diffundit, ac tantillum veneni pestilentis vel in aëre diffusum, vel in fomite aliquo latens, diutissimè integrum conseruari potest, & postea in corpus receptum, tantà celeritate tam grauiam producit symptomata, vt à nullà manifesta qualitate tale aliquid prouenire possit. In putredine verò, quocunque etiam modo determinetur, nihil nisi manifestarum qualitarum actio apparet; & nulli alij morbi è putredine excitantur, nisi qui in qualitarum primarum & manifestarum excessu consistunt, ac in primis calore excedere lædit putredo, dum calorem natium in igneum mutat. In phthificis certè non leuis putredo est, quā pulmones interdum vltra dimidium absumuntur, ex quā sine dubio vapores putridi cordi communicantur: multos tamen annos sæpe viuunt phthifici, neque peste extinguuntur, sed lentà morte pereunt. Imò obseruatum est, non solum pericardium computruisse, sed & in ipsà cordis substantiā vlcera & apostemata inuenta fuisse, vt videre est, apud Schenckium, lib. 2. obseru. 202. & seqq. quæ tamen nihil pestilens induxerunt, sed diuturnorum potius morborum causa fuerunt. Et si pestilentia per solam putredinem, calorem scilicet natium in igneum mutando, & ita intemperie calidà læderet: in ardentibus febribus longè maior perniciēs appareret, quàm in pestilentibus; cum in ardentibus calor longè maximus conspiciatur; pestilentes verò omnes calorem vehementem non habeant.

Alexipharmaca in peste necessaria.

Præterea si pestilentia in solâ putredine, & non in venenatâ qualitate aliquâ consisteret, eo etiam modo, quo aliæ febres putridæ, curaretur. Verum longè alia est ratio, & præseruandi à pestilentia & eandem curandi, quàm aliarum febrium putridarum: nimirum alexipharmaca, & in præseruatione, & in curatione pestis adhibentur. Atque ij ipsi, qui acerrimè defendunt, totam pestis curationem in putredine amouendâ consistere, vbi tandem ad pestis curationem & præseruationem ventum est, alexipharmaca adhibent, bolum armenum, terram sigillatam, scordium, tormentillam, theriacam, & similia.

Et licet quidem hic effugium nonnulli quærant, dum docent, ea non adhiberi, quatenus alexipharmaca, sed quatenus siccant, viscerum obstructions aperiunt, partemque roborant, ac tonum eius conseruant, & omnino putredini contraria sunt: tamen hoc modo vim argumenti non effugiunt. Nam si hoc sine solùm ista medicamenta adhiberentur, non opus esset, alexipharmaca quærere, sed plurima alia inuenire liceret, quæ hisce indicationibus in peste satisfacere possent: Quæ tamen à nemine in peste adhibentur. Neque opus esset ex Lemno, & Armeniâ, Indiâ, Silesiâ, bolos, terras & lapides in distantissimas regiones aduehere, si siccandi solùm gratiâ & ob qualitates manifestas solùm terra Lemnia, sigillata, bolus Armenus, lapis bezoar vsurparentur: cum in qualibet terrâ medicamenta, quæ eadem qualitates manifestas habeant, inueniantur. Et si medicamenta, quæ in peste exhibentur, saltem ad putredinem inhibendam dantur: Cur non etiam in aliis febribus vsurpantur? Quis verò est, qui in febre tertianâ, vel continuâ, vel intermittente, bolum Armenum, terram sigillatam, vel similia, quæ potius obstruendi, quàm aperiendi vim habent, adhibeat?

Insuper cum putredo omnibus mixtis communis affectio sit, vbi in pestilenti & à communi aëris constitutione pestis prouenit, cur non omnia animalia æquè periclitantur; sed modò homines, modò fues,

modò boues? Quod ipsum iam olim author libri de flatibus l. 20. annotauit. Non omni, inquit, animalium generi eadem aut non conferunt, aut commoda sunt: sed sunt alia aliis magis conuenientia. Quando igitur aër huiusmodi inuasi, id est, inquinamenti plenus est, quibus natura humana offenditur, homines ægrotant; quando verò alteri cuiuspiam generi aër inconueniens est, tum morbus illud genus corripit. Quod certè fieri non deberet, cum omnia animalium genera ad putredinem apta sint. Quanquam enim vnum individuum, imò etiâ vnum animalium genus, alio ad putredinem aptius sit: tamen nulla putredo dari potest, quæ vni (saltem animalium generi) aduersa sit; sed omnia putredinem concipere apta sunt, præsertim si causa sit vehementior: cum tamen sæpe obseruatum sit, animalia ad putredinem concipiendam aptiora, à peste tuta vixisse, cum alia minus ad putredinem prona eadem laborarent. Sicut & illud interdum annotatum est, in aëris constitutione ad putredinem augendam aptiore, v. g. austrinâ, pestem minus grassatam fuisse, quàm sub aliâ, quæ putredini aduersatur magis, v. g. Aquiloniâ.

Tandem cum, quod à re abesse potest, etque ex accidenti accedit, de eius essentiâ non sit, febris autem in omni peste non adsit: facilè hinc colligere est putredinem & hinc dependentem febrem, non esse de essentiâ pestis. Verum cum hac de re non omnes idem sentiant, & disputeretur inter Medicos; An in omni peste febris adsit, quæstio hæc hoc loco discutienda est. nonnulli in eâ sunt sententiâ, nullam dari pestem, quæ non febrem coniunctam habeat. Idque præcipuè, vt suprâ etiam dictum, ex modo inuasionis & symptomatibus, quæ pestem comitantur, colligunt. Nam, inquit, qui peste corripuntur, primâ statim inuasionem horrorem sentiunt, quem postea calor excipit, non aliter, quàm in tertianis febribus fieri solet. Comitantur pestem vigilæ, linguæ ariditas, oris siccitas, & multa alia symptomata, quæ putredinem & febrem arguere solent. Deinde afferunt quædam ex Hippocrate & Galeno loca. Hippocrates, lib. de flat. ita scribit: Sunt autem febrium duo genera, quorum alterum, commune omnibus, pestis appellatur; alterum propter malam dietam primariam his contingit, qui eâ viuunt. Galenus etiam, 6. epid. com. 1. s. 29. idem statuere videtur.

An in omni peste febris adsit.

Verumenimverò etsi concedendum omnino sit, plerumque cum pestilentia febrem coniungi, aut si mox inter initia non adsit, tamen tandem accedere; tamen necessariò & semper febrem cum peste coniungi negamus. Nam si historicos, qui pestilentias insigniores descripserunt, consulamus, inueniemus, omnino pestilentias aliquas fuisse, quibus febris coniuncta non fuit. Thucydides celebrem illam pestilentiam Atticam adèd accuratè describit, vt etiam minima quæque non prætermittat: febris tamen non meminit. Et Hippocrates, 3. epid. com. 3. t. 25. de pestilenti quadam cõstitutione ita scribit. Quorum caput, inquit, horum quid tentaret, his caput totum glabrescebat, & mentum, ossaque denudabantur, decidebantque ac multa extiterunt fluxiones. His adiuncta erat aliquando febris, aliquando non erat. Et t. 55. Excrementa biliosa, pingua, tenuia, aquosa, atque ipse morbus multis eò erumpit, citra febrem & in febre. Et Galenus, 9. de simpl. med. fac. §. de bolo seu terrâ Armeniâ, ita scribit: Bibitur (bolus armenus) ex vino albo, consistentiâ tenui, modicè diluto, si aut planè febre careant, aut leuiter eâ teneantur. Sin grauius febriant, admodum aqueo. Etsi enim nonnulli hunc locum aliter interpretari conentur: tamen frustra laborant. Quidam enim aiunt. Galenum loqui de sanis, qui sint sine febre; iisque præseruationis gratiâ bolum exhibendum esse. Verum hæc interpretatio manifestè contra Galeni mentem est, qui de curatione loquitur, cum mox addat, Quotquot hoc medicamentum biberunt, celeriter curati sunt: at quibus non profuit, omnes interiit. Mercurialis, de peste,



*cap. 47.* Galenum, ut & Hippocratem, in locis suprà allegatis intelligendum putat, de febre exigua, ac vix sensibili. Verum nec hæc interpretatio Galeni menci congruit. Galenus enim expressè triplicem eorum, quibus bolus propinari debet differentiam facit; Vnam eorum, qui febre planè carent; alteram illorum, qui leuiter eâ tenentur; & denique tertiam eorum, qui grauiter eâ laborant. Annotant quoque alij Authores, pestilentias sine febre spectatas fuisse. Testatur Iacob. de Partibus, in *primâ quartâ Auenenna, capite de febr. pestilent.* quosdam tempore pestis cum vrinis ad se venisse, quos tangebant & inueniebat sine omni febre, sine vilo graui symptomate; qui tamen statim antequam discederent, aut paulò post moriebantur. Sic refert Alex. Benedictus, quosdam subitò sine febre inter domesticas & forenses actiones, vel publica negotia, decem horarum spatio, sine pulsûs & vrinæ certo signo, in templis, in viâ, insperatò mortuos esse. Ita testatur Valeriola, *locor. comm. libro. 3. capite 18.* In peste, quæ anno 1553. in Galliâ Narbonensi grassata est, homines, ut videbatur, sanos & loquentes, & incedentes, statim tanquam fulmine ictos, periisse. Quæ etiam in peste Venetâ & Patavinâ euenisse refert Hieron. Mercurialis, *de peste capite 18.* Quâ de re videantur & Capiuac. *Pract. lib. 6. c. 36.* Forestus, *lib. 6. de obseruat. 20.* Paræus, *de peste, cap. 10.* Petr. Salius Diuersus, *de febr. pestilent. cap. 4. 5. 7.* Gerhardus Columba, *de febr. pestilent. libro 1. ap. 27. 32.*

Quæ verò pro contrariâ sententiâ adferuntur, facile refutari possunt. Primò enim, quod ex inuasionis modo atque actionibus colligunt cum peste febrem coniungi, id plerumque quidem verum esse, concedimus: Verum tamen contrarium aliquando euenisse, merito Authoribus grauissimis testantibus fidem habemus. Neque sequitur: Si in hac pestilenti constitutione febris coniuncta fuit, & talia accidentia apparuerunt. Ergò in omni ita sese res habet. Neque ratio impossibile esse monstrat, pestilentiam sine febre inueniri posse. Cum enim pestis, ut partim monstratum est hætenus, partim amplius demonstrabitur, non in putredine consistat, sed venenorum aliorum more, imò ut venenum longè perniciosissimum, hominem iugulet: quid obstat, quo minùs tanta huius veneni possit esse vehementia, ut hominem iugulet, antequam putredo in corpore, & hinc febris exciteretur; Putredo enim, præsertim tam magna ut eam describunt, tam subitò generari non potest. At venenum aliquod subitò cor perere, hominemque breuissimo temporis spatio interimere potest.

Quod deinde locum, *ex lib. de flat.* attinet, primò nonnulli docti Medici librum illum Hippocratis esse negant; cum quadam dogmata veritati parùm consentanea continere videatur. Deinde sit liber iste Hippocratis: in illo tamen textu, quo dicitur, febrium duo esse genera, alterum commune: quod dicitur pestis, alterum priuatum, nihil aliud continetur, quàm diuisio febris, ut morbi communissint in duo genera, & alteram quidem omnibus communem pestem vocari, alteram, quæ ex ratione victûs prouenit, cuique propriam esse. Emerguntque ex illâ diuisione hæc propositiones: Aliqua febris est pestis seu cum peste; Aliqua febris non est pestis, seu non cum peste. Non vero licet à particulari affirmatiuâ ad suam conuersam vniuersalem argumentando hinc concludere: Ergò omnis pestis est cum febre. Neque cum peste conuertitur febris communis. Sunt enim multæ febres communes sine peste, ut ex lectione librorum Epidemiorum Hippocratis, & ipsâ experientiâ apparet. Nimirum non est diuisio per differentias essentielles facta. Neque conuertibiliter verum est, omnem febrem communem esse pestem. Dantur enim, ut dictum, febres communes, quæ pestilentes non sunt.

Porro ut in specie etiam istas opiniones perpendamus: Qui in putredine tantum pestis essentiam constituant, frustra omnes laborant in putredinis naturâ determinandâ. Primo enim Fracastorij opinionem quod attinet, qui profundam & sordidam putredinem esse dicit, manifestum est, plurimas res putridissimas nihil pestilentie continere, neque vilo modo corpora humana peste inficere, febresque plurimas, in quibus maxima est humorum putredo, pestilentes non esse. Contrâ verò in peste sæpe exiguas vel nullas putredinis nothas apparere, neque foetorem semper, quem ipsemet Fracastorius in sordidâ & magnâ putrefactione animaduerti dicit, deprehendi.

Eadem ferè contra Hor. Augenij sententiam faciunt, ut & Antonii Porti opinionem. Sequitur enim ex opinionibus illis omnibus, plurimas febres pestilentes esse debere, quæ tamen tales non animaduertuntur. Nam non in pestilentia tantum & pestilentibus febribus tanta est humorum corruptio, ut amplius concoqui, elaborari, & ad pristinam naturam redire non queant; sed eadem in aliis quoque febribus non pestilentibus apparet, in quibus humores ita corrumpuntur, ut ad pristinam naturam amplius redire non possint, ut patet ex Galeno, 2. *aph. 17. & 11. meth. med. capite 8.* vnde & euacuationes in febribus putridis & à naturâ fiunt, & ab arte instituuntur, ut quod corruptum planè est & amplius emendari non potest, è corpore tollatur. Imò eâ de causâ febribus putridis laborantes interdum moriuntur, quòd tanta sit humorum corruptio, ut natura eam nullo modo emendare possit. Contrâ in pestilentia sæpe non magna est putredo. Etenim sæpissimè, quamprimum pestilentia homo corripitur, cor statim summo perè alligitur, & actio pestilentis qualitatatis manifeste sese exerit; quod à putredine esse non potest, quæ vel nondum adest, vel primùm incipit. Neque enim putredo in momento simul incipere, & summa euadere, atque excellens, profunda, sordidaque fieri, & gradum illum, à quo pestilentiam constitui volunt, attingere potest.

Et si tanta putredo esset in peste, cerè febris vehemens semper excitaretur. Quanquam enim hic nonnulli dicant, falsum esse, ubi magna est putredo, ibi quoque magnum esse calorem; & respondeant, ad putredinem generandam vel fouendam non quemuis calorem aptum existere, sed solum humidum: tamen scrupulum hunc non tollunt. Concedimus quidem calorem vehementem non putrefacere, sed adurere; solum verò humidum calorem putrefacere: id tamen non concedimus, ex magnâ putredine non sequi magnum calorem; sed statuimus, licet calor, qui putredinem excitat, magnus semper non sit: tamen si magna putredo, præsertim in corporibus animalium inde exciteretur, necessariò magnum calorem inde generari.

Massarias verò, dum in peculiari & *aperta* quodam gradu ac putredinis termino pestilentiam constituit, effugium saltem querit. Si enim per putredinis gradum & terminum tale aliquid intelligit, quod putredinis naturâ ac limitibus adhuc continetur: tunc contra eum pugnant illa omnia, quæ hætenus contra putredinem simpliciter dictam, & quatenus talis, attulimus. Si verò vel ille vel alius quicumque per inexplicabilem illum terminum, aut excellentem putredinem, occultam aliquam qualitatem, vel tale aliquid accipit, quod non qualitate vllâ manifestâ, sed intrinsecâ sui naturâ atque aded innato quodam sibi substantiæ modo exitiale ac noxium sitis nostræ sententiæ iam accedit, ut postea amplius diceretur.

Quod verò eorum opinionem attinet, qui ex putredine totius massæ sanguineæ, & præcipuè alimentalis portionis, pestem & febres pestilentes oriri statuunt, ij videant, quid causæ afferre possint, cur febres Synochæ omnes pestilentes non sint; & cur febres, quæ pesti coniunguntur, omnes Synochæ non sint. Nam

Fracastorij  
opinio per  
penditur.

Hor. Augenij  
& Ant.  
Porti.

Massaria

è lectione librorum Epidemiorum Hippocratis patet, & ipsa experientia docet, febres, quæ pesti coniunguntur, non omnes Synochas esse, sed plerasque alterius generis.

Nec ij rem expediunt, qui inter pestem & alias febres putidas hoc discrimen constituunt, quod in peste & pestilentibus febribus focus putredinis sit in corde: in aliis verò extra cor. Etenim si focus putredinis in ipso corde esset, fieri non posset, quin calor vehementior in totum corpus dispergeretur; qui tamen in peste & pestilentibus febribus semper non percipitur.

Mediam inter has opiniones eorum esse diximus, qui venenum & putredinem in peste coniungunt, Eustachij Rudij & Raimundi Mindereri: qui tamen in eo discrepant. quod Rudius ex veneno putrescente pestem fieri statuit; Mindererus verò à veneno putredinem excitari putat. Rudij opinionem quod attinet, frustra ille putredinem veneni commiscitur, neque naturam veneni satis considerasse videtur. Venena enim peculiarem ex se habent cum corde *analogiam*, vt illud oppugnare, & hominem extinguere, etiam sine putredine, ex sua natura possint. Et quomodo generabitur ex aëre pestilenti pestis secundum hanc opinionem? Primum necesse erit, vt humores in venenum mutantur; hoc deinde putrescat, & pestem constituat. Cum tamen contrarium fieri, res ipsa satis doceat. Quæ enim ex aëre inspirato sit pestis, subito sese exerit, neque per has ambages generatur. Imo videntur, vt paulò antè dictum, & animaduertuntur sapissimè veneni effectus, antequam febris accedit. Et licet febris sæpe pesti coniungatur: tamen non hoc modo producit; sed verior est eorum sententia; qui statuunt, febrem ideo pesti accedere, quod venenum pestilens habeat vim humores corrumpendi & putrefaciendi.

Itaque inter has opiniones, quas hactenus in medium attulimus & examinauimus, veriorẽ Mindereri sententiam esse statuimus, qui venenum in peste admittit. Cui in eo quoque libenter assentimur, in plerisque pestilentibus constitutionibus pestem febri coniungi: neque aliud in peste, quæ superioribus annis hic aliquoties grassata est, obseruauit: interim ex eo, quod vel ego vel alius quispiam obseruauit, non licet concludere, in omni pestilenti constitutione hoc euenire; sed Medicis Clarissimis, qui contrarium obseruauerunt & annotauerunt, fidem habemus. Inprimis cum rationes euidenter doceant, febrem ad pestilentia essentiam non pertinere, & putredinem saltem pestilentis veneni effectum esse, & à veneno hominem iugulari posse, antequam febris inducatur. Est deinde in hac opinione & illud dubium, an omne pestilens venenum septicum sit, & putrefactoria vi potissimum omnem cladem perficiat. Veneni enim pestilentis magna est varietas, & vt ipsemet statuit, aliud dipladis, aliud viperæ, aliud cicutæ, aliud napelli, aliud alterius exhibitæ toxici naturam æmulatur. Vnde etiam non eadem symptomata ab eo inducuntur. Et hoc quidem libenter concedimus, quodlibet pestilens venenum habere vim humores corrumpendi: an verò putredine id semper fiat, dubitamus, de quo dictum in Instit. lib. 2. part. 2. capite 12.

Et quod dicebatur, pestem inuadere, vt reliquas febres putidas, & symptomata plurima, quæ in putridis aliis apparent, in peste etiam animaduerti: libenter concedimus, plerumque ita se rem habere: necessariò verò id semper fieri, negamus: & exempla contraria ex Iacob. de Partibus, Alex. Benedicto & Valeriolà allata sunt. Quanquam enim hic nonnulli respondeant, tales mortuos fuisse febre pestilenti ephemera: tamen hoc modo sese non extricant. Hoc quidem concedimus, quod illud venenum pestilens singularem analogiam habuerit ad Spi-

Dan. Sennerti Tom. II.

ritus, eos subito corruerit, atque ita spiritibus corruptis homines repente enecarit. Verum quod necessarium fuerit, vt ephemera prius excitaretur, & spirituum calor in igneum, in quo essentia febris consistit; mutaretur, non concedimus: neque experientia id testata est; cum ægri calorem illum in spiritibus præternaturalem & igneum facillè percipere potuissent; siquidem cum planè sani sibi viderentur, subito conciderunt, & mortui sunt.

Hæc omnia, cum ita se habeant, eorum tandem sententia accedimus, qui statuunt, à materia venenatâ occultâ totâque naturâ cordi aduersa qualitate præditâ, pestem prouenire, & reliquorum venenorum more hominem occidere; id quod effectus veneni pestilentis satis docet. Etenim, vt rem summam dicam, si modum agendi, ac vim & vehementiam veneni pestilentis perpendamus, omninò eius tales sunt actiones, quæ à qualitate primâ nullâ proficisci possunt. Tam subito enim quod nulla qualitas prima facit, vim suam in corpora alia imprimit, vt si quis peste infectum sudantem paulisper saltem contingat, mox inficiatur. Et quidem tam breui tempore hominem iugulat, vt Ant. Portus, lib. 3. de peste c. 8. narret, anno 260. Romæ vno tantum die 5000. hominum peste interiisse; Et Spangenbergius, in Chroniq. referat, anno Christi 1348. pestem Erphordia grassantem, circa diem Laurentij, viginti quatuor horarum spatio, 1500. homines enecasse.

Quæ omnia arguunt, veneni huius vim non à Qualitat. primis dependere, sed in spiritali quadam essentia consistere, quæ promptissimè ad interiora corporis penetrat, inprimis ad ipsum cor, cui malignam suam qualitatem imprimit, spiritus occulto modo dissipat, accorrupt, calorem natium, proximum animæ instrumentum, pessundat, humoresque inquinat & corrumpit: vnde periculossimorum symptomatum agmen suboritur, febris, vomitus, alui profluvia, syncope, dolores capitis, vigilie, deliria & plurima alia grauissima mala. Neque vllus alius morbus est, qui tantam in genere humano stragem edat, ac pestilentia. Refert enim Procopius, li. 11. de bello Persico, sub Iustiniano Imperatore, Byzantij, & finitimis in locis tantâ perniciè pestem sæuissimè, vt singulis diebus 5000. & quod ferè incredibile videtur, 10000. hominum exinixerit. Niceph. lib. 17. histor. Eccles. c. 17. narrat, Pestem ex Æthiopia vniuersum penè orbem peruasisse, ita vt neminem ferè hominum intactum reliquerit, & totas ciuitates incolis vacuas fecerit. Platina, in vita Clementis VI. refert, olim in Italiâ pestilentiam tam atrocem sæuissimè, vt ex millesimo vix decimus euaserit. Et in Annalibus Francia annotatum Anno 1374. peste per vniuersam Galliam & Germaniam grassante penè tertiam humani generis partem extinctam fuisse. Et Quercetanus refert in Alexicaco, cap. 4. Anno 1400. Florentiæ paucis diebus 30000. hominum è viuis excessisse. Ita Michael Saxo, in vitâ Friderici III. Imperatoris narrat, An. 1453. Erphordia pestilentiam 28000. hominum extinxisse.

Vnum restat adhuc explicandum; Quomodo Contagium sese ad pestem habeat. Pestem contagiosam esse, pro dolor! omnes ij satis superque experiuntur, quos pestis affligit. Sæpè enim accidit, vt primo vno atque altero saltem peste laborante ea per Contagium breuissimo tempore per tota oppida & vrbes, imò prouincias disseminetur. Petrus Salius Diuersus quidem, de febre pestilenti, c. 11. dari nonnullas pestes & morbos pestilentes absque Contagio sentit, idque conatur probare ex historiis. Quoniam, inquit, Hippocrat. & Galen. cæterique tum temporis Medici, dum nonnullæ pestes maximè sæuirent, indiscriminatim nullâque habita contagij ratione, ad inuendos & curandos ægros accedebant,

M 3 atque

Controuersia  
decisa.

Veneri pesti-  
lentia via.

An omnis pe-  
stis sit conta-  
giofa.

atque laborantes eâ ne vitarent ipsi, nec vitare alios monuerunt: vtpote quod nullum morbis, qui tum vagabantur, Contagium coniunctum erat. Deinde hodie etiam in Ægypto, Syriâ, & Asiâ minore vagari dicit pestilentes morbos, in quibus nulla contagij suspicio vel timor adsit, cum incolæ eorum locorum nefandum scelus existiment, vitare consuetudinem peste ægrotantium. Et si verò non negemus, pestilentes morbos alios aliis esse contagiosiores: tamen ut pestilentias illas antiquorum contagiosas non fuisse credamus, adduci non possumus. Hippocrat. certè, lib. 2. de nat. hum. 1. 4. *ποσπὶς ἐπιπορεύσας, morbos effundit*, Et, lib. 6. de stat. *μασμάτων* meminit, quæ nil aliud sunt, quàm Contagij semina. Et Galenus 1. de differenti. febr. capite secundo, hæc habet. *Quod aëris pestilens status febrem asferre consueverit, nemo dubitavit. Sicut & pestilenti morbo laborantium conversatio periculosa, ne inde contagium contrahatur; quemadmodum ex scabie, & lippitudine.* Atque, ibid. c. 4. docet, pestem Atticam ex Æthiopîâ per contagium fuisse propagatam: Et Thucydides de illâ ipsâ peste testatur, cum nonnulli, qui amicorum paulò studiosiores, laborantibus opitularentur, ac eodem morbo correpti & ipsi enecarentur, alij pusillanimes contagij formidine suos deseruerunt. Et pestem in Syriâ, Ægypto & Cairo quod attinet, non idè sine timore peste infecti ab aliis visitantur, quod pestes istæ contagiosæ non sint, sed quod falsò sibi persuasum habeant illi homines, neminem peste mori posse, nisi cui hoc morbi genus à fati destinatum sit; sicut supra ex Prospero Alpino docuimus.

Contagium  
est de pe-  
stis essentia.

Et si itaque omnem pestem contagiosam esse statuamus: tamen de naturâ & essentia pestis contagium non est, neque ad eius formalem rationem pertinet, sed est accidens, naturam pestilentiae sequens; tale tamen, quod omni quidem, sed non soli competit. Plures enim alij morbi, ut lepra, lues venerea, phthisis, scabies, atque alij quidam contagiosi sunt, id est, vapor seu halitus quidam ex corpore tali morbo laborante effluere potest, qui in alio corpore receptus, similem in eo morbum producit. Verùm de contagij naturâ paulò post plura.

Pestilentia  
definitio.

Atque cum ex hisce pateat, quænam sit proxima morbi pestilentis causa, materia scilicet venenata, & totâ sui naturâ cordi aduersa, ac quælibet causa morbi sibi congenerem per se inducat, calidum, frigidum: meritò hinc concludimus: *Pestilentiam esse morbum cordis venenosum, à materiâ venenatâ, cordique totâ substantiâ peculiariter aduersâ, contagiosaque genitum, & proinde ipsum contagiosum, omnesque cordis actiones subito & ἀπὸς ἁπλῆς lationem, maximè acutum, lethalem, omnisque generis perniciofa symptomata inducentem.*

Causa pesti-  
lentis vis.

Ex quo iam apparet, in pestilenti materiâ maximam esse agendi vim. Est enim hoc veneni, & eorum, quæ occultâ qualitate agunt, proprium, ut ad exercendas suas actiones non magnâ corporis mole semper, sicut ea, quæ qualitatibus primis agunt, opus habeant, sed etiam in minimâ mole maximam agendi vim obrineant. Quod Galenus docuit, lib. de sem. cap. 16. *Minima, inquit, portiuncula lethalium venenorum, ubi animalis corpus ingressa fuerit, totum id momento temporis immutat, similique sibi affectione alterat.* Scorpionis, phalangij, & aliorum venenatorum animalium morsus & ictus sæpè vix tantum sui vestigium relinquunt, quod oculis conspici possit: in tantillâ tamen portiunculâ veneni per tantillum foramen injecti tanta vis est, ut brevi tempore, omnes ferè in corpore humores corrumpat, & sibi simili qualitate inficiat. Idem apparet in purgantibus, colocynthide, scammonio, helleboro, antimonio, &c. quorum pauca grana, in corpus assumpta, omnes humores perturbant & agitant. Tali etiam modo se habet pe-

stilens venenum, cuius minima portiuncula vel aëri permixta & in corpus inspiratione attracta, vel per poros, admissa, breui temporis spatio vires suas exerit, & humores corrumpit; ut ex vomitu, diarrhœis, carbunculis, bubonibus, maculis variis, atque aliis, quæ pestem comitantur, & corruptorum humorum indicia sunt, videre est, ipsumque hominem breui iugulat.

Verùm venenorum varia sunt genera; & peculiariter, non solum cum variis speciebus sed etiam specierum indiuiduis, imò certis indiuiduorum membris, habent antipathias. Sic cicuta sturni innoxie vescuntur, quæ homini venenum est: sic helleboro coturnices, quo homo itidem læditur: nuce vomica ad venenena depellenda etiam homines innoxie vtuntur, quæ tamen plerisque brutis lethalis est: sic cantharides solum vesicam exulcerant; lepus marinus, pulmones. Idem etiam in peste animaduertitur. Non enim eadem pestilentia in omnia animalia grassatur, sed alia oues, alia equos, alia boues, alia homines iugulat.

Qualis autem sit specifica pestilentis veneni natura, & quomodo ab aliis differat, nemo forsitan satis explicauerit. Nonnulli effectus, quos certa venena, tum ab animalibus, & plantis, tum à mineralibus profecta edunt, perpendentes, etiam venena, quæ in homines incidunt, appellant alia viperina, alia dipsadica, alia scorpiaca, alia salamandrina, alia tithymallina, alia aconitica, alia arsenicalia, alia mercurialia, alia antimonialia. Et plerique pestem inter venena Mercurialia & arsenicalia referunt. Idque non simpliciter reprehendimus, & corruptiones humorum venenis, quæ in animalibus, plantis & mineralibus sunt, analogas reperiri posse non inficiamur, neque opus est, ut in peste ipsissimum illud minerale arsenicum, eiusque omnes effectus in peste appareant. Ut enim in animalium corporibus sal ille esculentus suas mutationes subit & animalis redditur: ita & talia suas fermentationes & mutationes accipiunt, & animalibus proportionata fiunt. Qualis tamen sit pestilentialis veneni natura, & quæ eius in qualibet pestilenti constitutione differentia, nemo hætenus satis explicauit. *Talia sunt hæc, ut I. Cæsar. Scarig. Exerc. 218. §. 8. ait, quæ latent animos temperatos; illudunt curiosos.*

In summâ, ut mihi videtur, & ut de pestilentis veneni naturâ & generatione sententiam, quam mihi experientia suggessit, exponam. Pestilentia est supremus corruptionis gradus, quam quidem humores in corpore nostro recipere possunt, ad quem per multas alterationes, mutationes, & fermentationes, perueniunt, & in quem morbi, qui præcesserunt, tandem degenerant, & abeunt.

Etenim primò Pestilentia grassante, quod quin- *Pestis gen-  
ratio.*  
quies, dum hîc VVittebergæ Medicinam profiteor & facio, hîc accidit, hoc inter alia obseruaui, quod alij morbi Sporadici & benigni peste grassante omnes ferè silent, imò qui præcesserunt Epidemij, cessant. Anno 1626. quo pestis hîc plures occidit, quàm vnquam (quantum quidem, qui in viuis sunt, meminerunt,) factum, vix integro mense vnus ad sepulturam elatus est, qui alio, quàm peste, morbo perierit: cum ante vix dies abierit, quin vnus vel alter sepeliretur. Equidem cum præcedentis veris & æstatis constitutionem illam siccam, cum eâ, quæ Anno 1616. erat, conferrem, persuasum habebam, febres illas epidemias, quæ Anno 1616. grassabantur, & tandem sub finem æstatis Quartanas vulgariter grassaturas: verùm postquam pestis inuadit, reliqui omnes morbi quieuerunt, paucis Quartanis exceptis. Relatum tamen est ad nos publicis litteris, febres illas epidemias & quartanas in Hispaniâ eo anno grassatas fuisse, ad eum planè modum, quem



quem Anno 1616. hic experti sumus, & supra lib. 2. c. 20. descripsimus. Vbi & hoc notandum, quod raro ij qui Quartana laborant, peste corripiuntur.

Deinde & hoc certum, quod pestis non semper à contagio incipit, sed sæpe, quod in exercitibus & obsidionibus accidit, ex victu prauo & similibus causis oritur. Sicut hæc ipsa pestis, quæ hic & in vicinis locis grassata est, in castris primum exorta, & hinc longè latèrue per contagium dispersa est.

Tertio & hoc extra dubium est, quod variolæ, morbilli, dysenteria, febres malignæ tandem in pestem degenerant.

Quarto nec hoc prætereundum, quod ex imaginatione, terrore, & metu, eoque sæpe leui nonnulli peste corripiuntur, cuius rei exempla plurima anno 1626. hic obseruauimus. Et memini peste correptos, qui currum illum, quo peste extincti ad sepulturam vehuntur, è longinquo extra urbem conspexerunt; alios, qui domo inclusi eum non viderunt, sed strepitum saltem eius audierunt. Imò etiam nobis relatum est & ex insomniis de peste, nonnullos peste correptos fuisse, qui cum nullo peste infecto conuersati fuerant, & quos certum erat, per contagium pestem non hausisse.

Tandem & hoc cuilibet obseruare promptum est, habere pestem, vt & alios morbos Epidemios, suas periodos, quibus peractis cessat. Idque anno 1626. obseruauimus, in oppidis vicinis, vt Iessæ, Kembergi, vbi citius pestis coeperat, citius etiam, & sub finem Octobris desisse; hic verò, vbi tardiùs incipit, etiam longiùs protractam fuisse; quod & alibi accidit.

Ex quibus omnibus colligo, quod pestis supremus, qui humoribus & spiritibus accidere potest, corruptionis gradus est, quo nullus peior & perniciosior datur, ad quem per longas alterationes & fermentationes, vt sic dicam, q. gradus peruenitur, qui cum ab astorum influxu, tum aëris qualitatibus & excessibus, tum erroribus in victu inducuntur. Cum enim quotidie in corporibus nostris ab influxibus stellarum minùs commodis, tum etiam aëris excessibus, vt & victus erratis mutationes accidunt, & quod maior est actio istarum causarum, eò maior fiat humorum corruptio: Hinc varij morbi cum sporadici, tum epidemij, & imprimis febres ortum habent. Verum quia humores prauis, quod diutius in corpore nostro retinentur, eò deteriores fiunt, præcipuè si externarum causarum dispositio corpori nostro inimica accedat: hinc adeò fit, vt humorum illa corruptio, quæ febres tertianas publicè grassantes, vel variolas, morbillos, dysenteriam, febres malignas, catarrhos epidemios, & similes morbos induxit, summum corruptionis tandem gradum accipiat, vnde pestis generatur. Quam prauam diathesin vbi humores acquisierunt, non mirum est, alios morbos quiescere & filere. Hinc etiam euenit, vt pestilentes constitutiones nunc citius nunc tardiùs reuertantur, prout causæ istæ, puta victus errores in annonæ caritate, in exercitibus, aëris magna anomalia, astorum positus infasti, nunc citius nunc tardiùs reuertuntur. Et sicut morbi in singulis indiuiduis sua habent tempora, initium, augmentum, statum, declinationem: Ita etiam cum alij morbi epidemij, tum pestis sua vniuersalia in qualibet regione, imò oppido, & pago tempora habet. Dysenteria plerumque Iunio incipit, Septembri cessat. Pestis etsi non ita certum initium & finem habet, sed quouis tempore incipere & desinere possit: tamen plerumque Nouembri & Decembri desinere solet. Sicut hæc ipsa pestis, quæ anno 1626. totâ æstate & autumnò hic grassata est, Decembri desit; etsi multis diebus aër potius vernus, quàm autumnalis fuerit, & perpetuæ pluuiæ: ita contra ante mensem, cum frigus esset intensum; parum intermitteret, Et quod citius ab initio grassari incipit, eò etiam citius plerumque desinere solet. In

pago Schtalah 4. miliaribus hinc distante, eo anno citò incipit, & dimidiam hominum partem supra 100. ibi iugulauit, sed ipso Augusto, quod mirum, cessauit.

## CAPVT II.

## De Causis Pestilentia.

Cum alius morbus nullus sit, qui genus humanum affligat acerbius & vehementius, quam pestis, in causâ eius inuestigandâ supra aliorum morborum causas ascendendum esse, tacitus ferè omnium hominum consensus probauit. Neque enim solum veri Dei cultores calamitatem hanc à Deo, hominum peccata plecente prouenire agnouerunt: sed Ethnici quoque & Idolorum cultores idem professi sunt. Hinc Homerus 1. *Iliad.* in bello Troiano ob filiam Sacerdotis stupratam, Græcorum exercitui pestem immisam esse ab Apolline, scribit. Hinc passim ab Ethnicis victimæ diis oblata, preces & supplicationes, pestilentia auertendæ gratiâ, instituta leguntur. Sacrae verò litteræ non solum exemplis, sed & monitis, idem nobis multo rectius persuadent, vt patet ex *Leuit. cap. 25. v. 36. Num. 14. v. 12. Deut. cap. 26. v. 21. 2. Reg. cap. 24.*

De modo autem, quo Pestilentia à Deo hominibus immittitur, An Angelorum bonorum vel malorum ministerio, vel alio modo, non pluribus disputamus, sed Theologis id explicandum relinquimus. Vnum saltem hic monemus, quod Deus non solum secundum ordinariam potestatem & virtutem, per medias causas naturales, verum etiam secundum absolutam potestatem, non concurrentibus causis secundis ordinariis, pestem hominibus immittere possit.

Ioh. Pistorius quidem, *lib. de peste*, scribit, discessisse Deum à creatione & naturam dedisse, quæ res omnes laberentur & consisterent; vim autem agendi ipsum accommodasse. Deum igitur in Naturâ causam effectricem esse primam omnium, sed interiectam, tanquam median, naturam esse, vt illud quod hodie Deum facere dicimus, posteriorum causarum effectio sit.

Verumenimverò etsi hoc plerumque verum sit: Deo tamen agenti liberrimo absoluta potestas adimenda non est. Et si hoc verum esset, omnia miracula tollerentur. Et pestem à Deo immediatè immitti, vel ex *lib. 2. Reg. cap. 24.* apparet. Cum enim Dauid numerando populum, iram Dei in se concitasset, & ex tribus pœnis, quas Dominus ipsi per prophetam Gad proposuerat, pestilentiam elegeret, mox ea exorta est, & tribus diebus per Angelum percussorem 70000. hominum occidit.

Verum, quod Medicorum est, ad naturalium causarum inuestigationem, accedamus. Pestilentia cum morbus communis sit, à causâ etiam communi, seu quæ omnes afficere possit, ortum habeat necesse est. Etsi verò nonnulli sint, qui à victu communi, vt infra dicetur, pestem prouenire posse negent: tamen plerique duas pestilentia causas statuunt, aërem & victum communem. Verum neque hoc sufficere putamus, sed præter aërem & victum, alias quoque causas pestem excitare posse existimamus. Inter eas est primò contagium. Etsi enim hoc verum sit, si in genere & simpliciter de pestis primâ origine quæramus, eam vel in aëris vitium vel victum prauum, quibus cælestis influxus forsan addi potest, referendam necessariò esse: tamen sæpe accidit, vt in aliquâ ciuitate vel regione nullum in aëre perse vitium sit, neque etiam incolæ eius loci prauo victu vsi sint; ex alio tamen loco per contagium eò pestilentia deferatur; vel for-

An Deum sine causis secundis quandoque pestem inducat.

Causa pestilentia.

mes aliquis diu latens excussus pestem propaget, & ita pestis primò paucis communicata, postea in plures se diffundat, ut iam toti oppido vel regioni epidemium malum reddatur: cuius rei sæpissimè exempla occurrunt. Deinde etiam hoc negari non potest, plurimos solà imaginatione & terrore eundem sibi morbum attrahere.

*F. Plateri  
de pestis  
origine  
opinio.*

Fel. Platerus peculiarem de peste habet opinionem, eamque nunquam primitus generari, sed saltem per contagium propagari putat. Quemadmodum enim reliqua venena in corporibus certis ab origine mundi innata hærent: Sic & pestilens hoc venenum non tantum in hominum quorundam, qui iam peste ægrotant, sed & aliorum nondum ægrotantium corporibus, & vestibus quoque, aliisque quibuscunque delitescere posse, & de corpore in corpus non solum mutuo contactu, sed & intermedio aëre, illa venenata semina ab vno suscipiente & in aliud deriuante, transferri statuit, existimatque semina hæc pestis, ut & alia venena, in aliquâ mundi plagâ semper in quibusdam corporibus residere, atque ab eâ in alia loca propagari. Et licet nihil de eâ, ubi vigeat, audiamus: non tamen credendum esse putat, eam tunc penitus extinctam & e medio sublatam esse, & cum redit, in aëte de nouo genitam fuisse: sed tum alicubi terrarum corporibus quibusdam inherere, atque inde suo tempore in alia deriuari.

Verum in omnibus hisce viro Clariss. assentiri non possumus. Licet enim primò facile credamus, vix unquam pestem ita planè cessare, ut nullus in toto mundo locus sit, in quo pestis non grassetur: tamen quando alicubi pestis exoritur, eam semper aliunde illuc transferri non concesserim. Sit, ut alicubi, quod tamen sæpe ignotum, pestis grassetur: tamen locus ille ab eo, in quo pestis exoritur, sæpe tam remotus est, nullaque inter vtriusque incolas commercia sunt, ut ex illo in hunc pestem translatam esse, planè incredibile sit; id quod sæpe in obsidionibus & exercitiis accidit. Deinde longè alia est ratio aliorum venenorum & veneni pestilentis. Nam venena pleraque alia ad res naturales pertinent, neque ex corruptione saltem prodeunt: & licet homini venenum sint; tamen ad aliarum rerum naturam & essentiam pertinent, ut in napello, cicuta, scorpio, viperâ & aliis videre est. Venenum verò pestilens hoc modo creatum esse, sicut napellum, cicutam, &c. non dixerim, sed illud totum ex corruptione aliarum rerum oritur, quæ à naturâ suâ degenerantes veneni huius naturam induunt; sicut videmus sanguinem & semen corruptum venenorum, licet non pestilentium, homini tamen noxiorum, naturam induere; & in canem rabiosum venenum generari. Itaque si rabiem in canem, aut venenum epilepticum in homine in primâ origine mundi creatum non dicimus, sed per certas causas humores corruptos in canem vel homine huius veneni naturam induere: quid obstat, quò minus ex causarum peculiarium constitutione talis rerum aliquarum fiat corruptio, ut pestilentem naturam induant? Et fieri hoc historiarum satis testantur, conspiratque in hoc omnium Medicorum & Historicorum consensus, post annonæ caritatem insignem, victumque, ob melioris inopiam, prauum, pestes grauissimas, in obsidionibus urbium atque aliis etiam, exortas fuisse: Quales etiam accidisse post insignes temporum anni *anomaliæ*, Hippocrates, in *epidemiis*, annorauit.

Neque obstat, quæ hic obiicit Platerus. Nam licet interdum post magnas eiusmodi diuque durantes tempestates alij quidem morbi, nulla verò pestis exoritur: id tamen ideo accidit, quòd causæ illæ nondum sufficientes ad pestem inducendam fuerint. Nam neque gradum illum & constitutionem causarum, quæ ad pestem excitandam necessaria est, facile quis explicauerit; neque pestis generatio solum & principaliter

à manifestis qualitatibus dependet. Nec sequitur, si post hanc temporum anni *anomaliæ* aut tempestates nulla pestis secuta fuit: Ergo nullam dari posse, quæ eam generare valeat. Deinde licet sæpe pestis grassetur, ubi nemo facile, quæ vel in sideribus vel in aëre causa fuerit, explicare possit: non tamen sequitur, nullam omnino causam fuisse. Ut enim veneni huius natura nobis incognita est: ita etiam causarum hanc inducere valentium peculiarem & definitam naturam nemo facile explicabit. Et quid mirum est, pestilentiarum causas inuestigare non posse, cum, quantum in causis tempestatum reddendis Astrologi hæreant & fallantur, omnibus notum sit. Præterea concedimus, non semper à siderum positu vel aëre pestem oriri, sed sæpe vel ex victu prauo, vel etiam solo contagio prouenire. Tandem licet pestis suam originem ex aëre habeat, non tamen est necessarium, ut omnes eâ corripiantur & intereant. Nam videmus etiam cum peste infectis plurimos conuersari: non tamen omnes infici, sed in nonnullis fortiolem ad resistendum veneno pestilenti naturam esse, alios eidem succumbere. Interim hoc certum est, ubi vitium in aëre est, longè plures peste & corripit & interire, quàm ubi solum per contagium eadem diffunditur. Verum hæc clariora fient ex iis, quæ iam de pestis causis dicentur.

De quibus hoc primò monendum videtur, causas alias esse pestem generantes, alias propagantes, quæ contagij ratione comprehenduntur. Cum enim, ut modò dictum, Plateri opinio locum habere non possit, qui statuit, semper pestis semina alicubi latere, & tantum per contagium propagari, omnino causas dari necesse est, à quibus pestis, quæ alicubi grassari incipit, si per contagium aliunde delata non sit, ortum habeat, quæ postea per contagium facile propagatur. Atque ita causæ pestis omnes in duas classes referuntur, in causas pestem generantes, & contagium. In priore classe sunt Aër, & quæ faciunt, ut aër pestilentem constitutionem acquirat, deinde stellæ, terribi victus communis, quartò veneficia, nisi forsitan ad contagium ista referantur, quintò imaginatio & terror. In alterâ contagium, de quibus causis iam ordine dicemus.

Ut ergo ab aëre initium faciamus, cum aër non solum contagium ex aliis corporibus infectis recipiat, atque in alia transferat, verum etiam absque contagio, quod suscipit, pestis causa euadat: videndum, quo modo aër ad generationem pestis concurrat. Vbi mox in principio quæstio discutienda occurrit: an aër, quando pestilentia grassatur, atque vitium ex aëre pendere dicitur, pestilentiarum seminaria in se contineat & venenatus reddatur? An verò saltem aptus reddatur, ut venenum in corporibus dispositis generet. Prius negat, posterius affirmat Hier. Mercurialis, *lib. de peste, cap. 7.* idque ob has rationes: Primò, inquit, aër est plenus multo igne: Ignis autem à se venena, ut & alias res repellit. Deinde Natura, cum studeat animalium naturam conseruare, semper id intendere solet, ut venena in paucâ copiâ gignantur. At si aër fieret venenatus, copiosissimus esset veneni prouentus, & cum omnia animalia aërem continuò inspiratione attrahant, si vel tantillum aër esset venenatus, perderet statim omnia animalia. Ipse verò statuit, aërem eo potissimum modo concurrere ad venenorum generationem in corporibus nostris, quoniam in corporibus præparatis inducit quendam calorem præternaturalem, naturali inimicum, qui cum calorem natium expugnet, fieri postea, ut omnes humores nostri corporis priuati custodiâ caloris natiui putrescant, & consequenter naturam veneni induant.

Verumenimverò etsi concedamus & admittamus, hunc primum modum esse, quo aër ad pestem generandam concurrat, quando scilicet vitiosâ constitutione suâ ad corruptionem humorum in corpore nostro facit, atque hoc modo sæpe pestilentiam excitat, statum;

*Aër,*

*An aër euadat pestilentis.*

*Quibus modis aër pestilentia causa sit.*

tuamus; tamen semper hoc fieri, concedere non possumus: sed secundo statuimus, nonnunquam in ipso quoque aëre pestilentia semina hærere. Atque id docet subita & inopinata mors eorum, qui aërem illum attrahunt. Tam subito enim tum nonnulli moriuntur, ut venenum in corpore per aëris constitutionem; eo modo, quem describit Mercurialis, genitum esse, credibile non sit. Non tamen est necessarium; ut totus aer venenatus sit, aut veneni naturam induat; sed sufficit, si pestilentia semina hinc inde dispersa sint. Neque etiam omnes, qui semina illa pestis attrahunt, eâ necessariò corripiuntur, ut modò dictum. Hoc tamen, ut etiam iam dictum: certum est, pestilentes has constitutiones esse longè grauiiores & periculosiores iis, ubi saltè ex corporibus infectis semina pestilentia in aërem aliàs purum sparguntur. Ex quo ad id, quod Mercurialis obiicit, in aëre scilicet tali animalia viuere non posse, expedita est responsio. Quod verò ex Aristotele affert, aërem multo igne esse plenum, id sano modò intelligendum est. Calidi quidem vapores hinc inde dispersi sunt, sed plures tamen hoc, pauciores illo tempore; neque ij tantâ copîâ, ut omnem aliam materiam in aëre absumere possint. Addamus tamen & hoc, utrumque simul fieri posse interdum, ut scilicet & aer vitiosus sit ac venenatus, & in corporibus animalium ex vitiosa aëris constitutione vitiosi humores generentur. Nam ab eâ, quæ in aëre est, constitutione, præcipuè si sit diuturnior, corpora animalium necessariò afficiuntur.

Cum ergo aer in seipso pestilentia semina aliqua contineat, ut hoc modo pestis causa esse dicatur, duo iam explicanda sunt: Primò, quodnam in aëre vitium requiratur, ut pestilens euadat; Deinde, unde illud vitium aer contrahat.

Quomodo  
aer pestilens  
euadat.

Primum quod attinet, nonnulli in eâ sunt opinione, vitium illud à mutatione primarum qualitatuum provenire, dum scilicet in qualitatibus primis aer ita alteratur, ut putredinem concipiat, in primis si caliditatem & humiditatem nimiam obtineat. Quà de re Galenus, 1. de differ. febr. c. 4. ita scribit: *Pestilentes morbos oriri est necessarium, cum aëris temperatura à naturali habitu ad caliditatem & humiditatem immoderatam fuerit conuersa.*

Talem aëris constitutionem describit Hippocrates, præcipuè 3. epid. com. 3. *Annus, inquit, austrinus, pluvius, à ventis in totum silens, cum paulo superioribus anni temporibus squalores præcessissent: sub arcturum flatus austrini; multum pluit. Autumnus nimbius, nubilus, largè pluens. Hyems erat austrina, humida, lenis. Multò post solis reuersionem circa æquinoctium Boreas spiravit & nixit non ita diu. Ver rursus austrinum sine ventis: pluit multum & continenter usque ad canem. Est. u. serena erat & calida, magni erant aestus: Eresia parua dispersim spirabant: sub arcturum rursus spirante Boreâ multum pluit.* Cum itaque esset annus austrinus, humidus, pestem sæuissimam peperit, quâ vix alia sæuior, quam accuratè Hippocrates describit.

Humida &  
calida aëris  
constitutio  
quomodo pe-  
stilentiam  
inducat.

Verum etsi concedimus, tales constitutiones ad pestem inducendam valere: tamen duo monenda censemus. Primò illam humidam & calidam constitutionem non causam adæquatam esse, cur pestilens venenum in aëre vel in corporibus animalium generetur, sed saltè causam præparantem, & quæ alias proximas excitat. Neque enim pestilentis causæ ratio consistit in caliditate & humiditate, vel ab hac proveniente putredine, sed potiùs aliæ causæ ab illâ humidâ & calidâ constitutione mouentur. Vbi enim multæ pluiæ dantur, multos etiam vapores eleuari necesse est, qui in illa continuatâ humidâ constitutione aëris discuti non possunt, sed putrescunt & corrumpuntur, tandemque venenatam naturam induunt. Præterea calida & humida aëris cōstitutio in corporibus insignem corruptionem inducere valet.

Ergò aliam adhuc addamus causam, quæ quandoque etiam sine calidâ & humida constitutione pestem excitare valeat. Ut enim Fernelius, lib. 2. de abd. rer. caus. cap. 12. Platerius, atque alij Medici testantur, animaduersum est; pestilentes constitutiones hyeme atque æstate, sicco & pluuioso cælo, benè temperato ac inæquali, nullâ præcedente temporum anni mutatione insigni accidisse, cum tamen impossibile sit, ab omnibus hisce constitutionibus putredinem induci. Præterea si à solâ aëris putredine pestilens constitutio dependeret, vix fieri posset, ut pestilens aliqua constitutio toti Orbi ferè communis esset, cum locus à loco, regio à regione valdè differant. Huius tamen generis duas sub Marco Antonino fuisse referunt, quibus maxima humani generis pars extincta fuit; & qualem fuisse anno 1450. commemorant, quæ in Asiâ excitata, per Illyriam, Dalmatiâque venit in Italiam, per Germaniam verò in Hispaniâ & Galliam, pluribusque annis grassata est, ut tertiam hominum partem eâ deletam esse ferant. Vbi certè in solam aëris putredinem causa referri non potest; cum talis vix dari possit, quæ continuò in aëre hæreat: & si talis esset, ea procul dubio aliis quoque animalibus noxia esset. Verum supra prolixiùs explicatum est, putredinem solam ad pestem inducendam & constituendam non sufficere. Quapropter & hic ad proprietates occultas omninò confugere necessarium est. Ideòque pestem statuimus generari dum aer nò solum in qualitatibus primis mutatur; sed etiam dum sine putredine occulta quædam semina & inquinamenta totâ naturâ nobis aduersa in eo generantur.

Atque hic fortasse locum habere potest τὸ αἰὸν Hippocratis: cuius cum plerique in tractatione de pestilentia mentionem faciant; de eo etiam hic aliquid addere libet. Hippoc. 1. prognost. 1.4. hæc habet: *Cum homines intereant, alij priusquam adhibeant Medicum ex vi morbi, nonnulli adhibentes Medicum, statim moriantur, quidam unum diem viuentes, aut paulo plus temporis, antequam Medicus arte repugnet: oportet agnoscere talium naturam affectionum, quantum supra corporis vires sent. pariter & si quid in morbis diuinum habeatur, illius quoque ediscere prouidentiam.* Quid igitur hic nomine diuini intelligat Hippocrates, alij aliter sentiunt. Fuerunt iam olim Hippocratis interpretes, qui morbos ab irâ deorum immisos τὸ αἰὸν appellare censuerunt; & apud nos in Theologiâ Christianâ rectè institutos extra dubiū est, morbos à Deo mortalibus immitti. Verum cum, ut rectè monet Galenus, officium boni interpretis sit, non simpliciter per commentarios dicere, quid nobis verum videatur, sed quæ sit sententia scriptoris, quem enarramus, etiam si falsa sit: atque ipse Hippocrates, in lib. de morbo sacro, multa scripserit, quæ docent, Hippocratem non sensisse, morbos à Deo hominibus immitti: quid per diuinum intellexerit, ponò quærendum.

Galenus, in Comm. nihil aliud per τὸ αἰὸν hic intelligere Hippocratem censet, quàm aëris nps ambientis conditionem, de quâ Hippocr. in sententiis ita scripserit: *si hyems squalida & æquilonia fuerit, Ver verò pluuium & australe: febris acuta fieri æstate necesse est.* Verum nisi Gal. peculiarem aliquam aëris constitutionem intelligat, non facillè causam reddet, cur Hippocr. aëris constitutionem omnem hoc nomine dignatus sit. Plerique igitur interpretes, postquam hac de re ultro citroque disputarunt, concedunt, per τὸ αἰὸν, aëris cōstitutionem intelligendam, sed talem, quæ occulto modo & totâ naturâ nobis aduersa est; Hippocratemque hoc monuisse; Medico esse perpendendum, an morbus aliquis proveniat ab occultis aëris qualitatibus, eiùsque secundum totam substantiam mutatione, quæ à cælo proveniat, vel certè aliàs admiratione digna sit. Quæ enim à cælo proveniunt, vel occulta & admirabilia sunt, diuina vocari non inusitatum est. Ita Arist. 2. de gen. animal. capite 3. omnem animæ vim, corpus aliud



aliud participare, idque magis diuinum, quàm elementa scribit. Et Gal. loco citato, ait: *non quæcunque causas habent abditas & obscuras, diuina vocamus: sed ubi admirabilia videntur duntaxat.*

Porro cum aërem & putrescere & totâ substantiâ nobis aduersum reddi posse dictum sit: dubitare aliquis possit, quomodo aëri, qui corpus simplex est, talia, quæ mixtorum potius sunt, attribui possint. Ergo obseruandum, aërem dupliciter considerari posse, vel ut corpus simplex & purum putum elementum, vel prout varios ex inferioribus elcuatos vapores & exhalationes in se continet. Priori modo ad pestis generationem non concurrit. Verum secundo modo, prout scilicet variis vaporibus est permixtus, corrumpi & totâ substantiâ nobis aduersum reddi potest. Et quidem duplici modo. Nam primò vapores illi, qui aëri permiscuntur, puri nondumque corrupti esse possunt, ob causas tamen expositas & exponendas corrumpi possunt. Deinde & corrupti aëri permiscuntur. Et utroque modo aër corruptus & nobis totâ substantiâ aduersum dici potest.

Alterum iam restat explicandum, vnde aër venenositatem illam, qualitatēque pestilentem acquirat. Plurimi inter causas pestis naturales hic primo loco cælum & sidera constituunt. Verum aliis hoc affirmare durum videtur, putantque nonnulli, cum corpora cælestia sint longè nobilissima & perfectissima, omnique boni in hisce inferioribus authores, fieri non posse, ut tam perniciosum quid ab iis generetur. Et plurimi pro hac suâ opinione Platonis aliorumque authorum sententias afferunt, qui affirmant, astra esse abique omni pernecie, cunctis animalibus commoda præbere, stellas omnes esse bonas, nec quicquam mali facere: ex quibus concludunt, cælum & stellas conseruare, regere, continere ac fouere hæc inferiora, & proinde ab iis venena, morbosque venenatos & contagiosos provenire non posse.

Verumenimvero cum sublunaria hæc secundum indiuidua perpetua non sint, sed in speciebus habeant suam perpetuitatem, & proinde in iis generatio & corruptio accidat, ac, ut rectè docet Aristoteles *1. meteor. cap. 2.* Mundus hic inferior superioribus motibus sit contiguus, & omnis eius virtus inde regatur & gubernetur: tam corruptionem, quàm generationem à cælo provenire necessarium est. Ideoque etsi astra per se neque mala sint, neque mali quid simpliciter intendunt: tamen per accidens ab ipsis id fit. Corruptum nimirum per accidens, ut generent per se: per accidens destrunt, ut per se conseruent. Atque ita tam generationis, quàm corruptionis actio, quæ à cælo provenit, est per se bona, & ad vniuersi perfectionem ac conseruationem instituta. Præterea actiones, quæ à cælo proueniunt, non omnes simpliciter è cæli naturâ, sed ex mundi inferioris dispositione sunt æstimandæ. Perpendamus, e. g. saltem calorem & frigus ac quatuor anni tempora, quæ omnia per se mala non sunt, sed ad vniuersalis naturæ conseruationem omnia necessaria. Indiuidua tamen si consideremus, tam à frigore, quàm à calore plurima lædi & plurimos morbos excitari, extra dubium est. Calor nimirum æstius per se & simpliciter bonus est ac necessarius, ac nisi sit intensior, nec fruges, nec vina, nec alij fructus matureſcunt: ab eodem tamen in corpore impuro vel disposito febris excitatur; idque non ex intentione astrorum, sed ex dispositione corporis alicuius. Ita vbi tempore verno calor omnibus rebus inferioribus recreandis necessarius augetur, eius actionem ad bonum naturæ vniuersalis tendere omnes concedunt: ab eodem tamen in corpore, quod per hyemem vitiosos humores cumulauit, febres & alij morbi excitantur. Itaque sicut æstas & ver idè simpliciter pro re malâ non habentur, quod vitiosi humores ab eorum constitutione in corpore agentur, & ampliùs corrumpantur,

& hinc non solum morbi excitentur, sed etiam multi de virâ periclitentur: ita & astra, etsi alterationes & mutationes in corporibus nostris excitent, pro malis habenda non sunt. Contrarietas enim quæ inter res naturales est, non simpliciter mala est. Nam & in plantis & in aliis rebus, tam inter se, quam cum homine, contrarietas deprehenditur, quæ ad mundi ornatum pertinet, & sapientissimi Creatoris sapientissima dispositio est. Et cum homo post sidera conditus sit, facillimum fuisse Creatori omnipotenti hominem ita condere, ut saltem Iouis aut Solis radiis fuisset affectus; Saturni autem vel Martis non plus sensisset, quàm lapis aliquis: Verum hoc sapientiæ Creatoris non placuit; & propterea diuersorum siderum & rerum naturalium operationes, quas homo percipit, omnes per se bonæ habendæ sunt, & homini non plus nocent, quàm bilis flaua vel atra, si debito modo in corpore generetur.

Atque ut hæc pestilentia applicemus, illa ex cælo non simpliciter prouenit: verum sicut cælum agendo in hæc inferiora, ventos, pluuias, niues, nebulas & alia excitat, vapores ex globo terreno elcuando: Ita etiam fieri potest, ut in abditis terræ cauernis & abyssis latentes pestilentes, sulphureæ atque arsenicales auræ, quarum venenositatem Metallici suo malo sæpe experiuntur, à stellis agentur; atque in aërem eleuentur, aut vapores, qui continuo aëri permiscuntur, ab iis ita corrumpantur, ut veneni naturam induant, à quibus postea pestilentia inducatur.

De modo autem, quo pestis ab astris excitatur, iam antea aliquid dictum. Nimirum non solum, quatenus in manifestis qualitatibus aëris constitutionem mutant, & pluuias ac ventos excitant, verum etiam, quatenus occulto modo hæc inferiora afficiunt, pestem inducunt. Videmus etiam sæpe, nullâ manifestâ aëris mutatione apparente, nunc plantas, nunc bruta, nunc homines periclitari, reliquis nihil damni patientibus. Et pestilentem constitutionem induci à cælo, non solum, dum intemperiem manifestarum qualitarum in aërem inducit, sed imprimis per peculiare & occultas influentias, quas hominis valetudini perinde, ut notos illos in calore, frigore, siccitate & humiditate excessus, non omnes æquè salutare & commodas esse, credibile est; illud persuadet, quod, ut annotauit Fernelius, *libro 2. de abdit. rerum caus. capite 12.* & testatur etiam P. Salius Diuersus, pestilens constitutio hyeme ac æstate, siccò ac pluuioso cælo, benè temperato & inæquali, nullâ præcedente temporum anni mutatione, nullis præsentibus corruptis vel putridis exhalationibus, aliisque euidentibus causis inuadit; animaduersumque, æstatem feruentissimam nullum pestilentia genus produxisse; interdum pestilentiam hyemè initium cœpisse, quæ æstate mediâ vel autumnò soluta sit.

Itaque sciendum, stellas non solum lumine & motu, sed etiam peculiari quadam influentiâ ac occultis viribus in hæc inferiora agere. Nam si stellæ solum lumine ac motu hæc inferiora afficerent, quid opus fuisset tanto numero stellarum, magnitudine, motu & situ differentium? Ad illuminanda enim hæc inferiora solus sol sufficeret: Luna nocti illuminandæ satis esset; ad temporum vicissitudines motus Lunæ, Solis & primi mobilis sufficeret, ac esset otiosus tantus numerus reliquarum stellarum, loco, magnitudine ac motu differentium. Quod certè allerendum non est. Deinde multa in profundissimis terræ cauernis, non sine cælestium corporum vi, generantur, quod nec motus nec lumen astrorum pertingit. Quare etiam alias vires & peculiare, quas vocant, influentias, præter motum & lumen, singulis stellis attribuimus, à quibus nimirum illæ operationes admirandæ quas in hæc inferiora à cælo prouenire animaduertimus, quæque motui ac lumini adscribi non possunt, nulliusque corporis

Vnde aër  
pestilentem  
naturam  
acquirat.

Cælum an  
pestis causa  
sit.

Quomodo  
stellæ pestem  
excitant.

Stellæ non  
solum lumine  
& motu  
in hæc inferiora  
agunt.

poris interuentu ac densitate impediri possunt, ortum habent; dicimusque cum Alclepio, *lib. 1. ad Ammonem*; τὸ πᾶν ἀγαθὸν ἐνέργειαι ἐμὴν ἐν ἐρατῇ καὶ αἰερί, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ γῆς εἰς πύλιν καὶ ὡς τὸν βυθὸν καὶ ἀβύσσον διήκουν. Solis & cæterorum astrorum bonæ operationes non solum in celo & aëre, sed etiam supra terram in profundissimas terras cauernas & in abyssum penetrant.

His ita se habentibus, quomodo etiam sine putredine pestis gigni possit à cælo, non adeo difficile est inuenire. Nam sicut propter generationum & corruptionum vicissitudinem necessarium est, non solum calorem blandum & moderatum à cælo excitari, sed etiam intensum & vrentem; & præterea frigus: ita etiam, ob eandem causam, occultæ; quæ in hisce inferioribus excitantur, qualitates per occultas influentias, non omnes sunt eiusdem generis, neque etiam omnes nobis æquæ gratae & conuenientes, sed aliæ magis, aliæ minùs: omnes tamen per se necessariae. Et sicut, ut dictum est, ex calore & frigore, minùs conueniente tempore & loco, imò etiam quocunque, si modum excedant, quod non raro fit, à corporibus cælestibus excitato, varij morbi, præsertim in corporibus dispositis, oriuntur: Ita credibile est, ex occultis illis influentiis quandoque longè grauissimos & pestilentes morbos excitari. Nimirum mundus hic inferior, & inferiores hominis atque aliorum animalium facultates, ita à Deo conditæ & comparatæ sunt, ut non solum visu corporum cælestium colorem, vel tactu calorem sentirent: verum etiam occultas influentias, sine rationis discursu; (id quod solum animæ rationalis est,) sed vi quadam insitâ perciperent, ac iis afficerentur, delectarentur, confortarentur & vegetiores redderentur, ut ad eas, quas à Creatore acceperunt, vires exercendas fierent vegetiores & alacriores, aut contrario modo se haberent: sicut videmus Musicæ planè rudes & ignaros, vnde harmonia & vocum illa, consonantia aut dissonantia proueniat, à Musicâ affici. Atque obiecta hæc, à quibus inferiora hæc afficiuntur à cælo, Recentiores ingeniosè ex harmoniis Musicis, è Geometriâ & Arithmetica, & ex proportionibus, quæ ex cursu duorum radiorum oriuntur, petunt.

Et hæc est procul dubio Pythagorica illa astrorum chorea & concentus, de quo Plato, in *Epinomide*, scribit: εἰς αὐτὴν τὸ ἄστρον ἐκ τῆς ἰδέας καὶ καλίστης πορείας ὅ καὶ χρῆται πάντων χρόνῳ καλίστης καὶ μεγαλοπρεπέστερης καὶ χρῆται, πᾶσι τοῖς ζῴσι τὸ δῖον ἀπειλεῖν. Astrorum naturam visu quidem pulcherrimam, progressu & choreâ optimâ vrentem, omniumque chorearum decentissimam & magnificentissimam, quæ cunctis animalibus commoda præbet. Inprimis autem in peste producendâ Saturnum plurimum valere, omnes Astrologi sentiunt, obseruatumque ab iis, has regiones Septentrionales potissimum peste infici, quando Saturnus triplicitatis igneæ signa Arietis, Capricorni & Sagittarij transit; de quâ re plura tradunt Astrologi.

*Aura & halitus venenati.* Verum præter cælum aliæ etiam plures causæ dantur, à quibus aëri pestilentia communicatur, atque ipse inde pestilens redditur. Primò scilicet aër venenatus & pestilens redditur, cum venenatæ in infimis terræ cauernis diu contentæ auræ copiosius aëri permiscuntur. Halitus illi venenati gignuntur ex aëre diu concluso, & venenatis antris metallicis mixto, stagnantibus aquis alicubi conclusis & putrescentibus. Commouentur autem illi halitus venenati, iisque exitus sapè patefit à terræ motu; extrantque passim in historiis exempla terræ motuum, quos grauissimæ pestes secutæ sunt. Plerique etiam huc referunt meteora ignita, ut quæ exhalationum copiam magnam suppedient: verum illa ignita meteora potius vaporum è terrâ copiosius exhalantium pestemque generantium indicia sunt. Pertinet huc & illud, quod apud Iul. Capitolinum, in *Vero*, & alios annotatum reperitur, in Babylonâ quandam miræ vetustatis arcam adaperitam fuisse,

se, à quâ tam perniciosus halitus expirauit, ut inde pestis ad Parthos vsque grassâs sit subsecuta. Ita in Campaniâ è puteo quodam aperto, ab aëre qui diutius inclusus latuerat, exhalante, adstantes subito peremptos fuisse, scribit Guainerius, de peste, cap. 1. Præterea à lacubus & stagnis, æstatis tempore calore Solis corruptis & fœtidis, exhalationes exspirantes pestem excitare possunt; sicut & ex sentinis nauium. Insuper à cadaueribus interfectorum insepultis, & locustarum mortuarum copiâ aër pestilens reddi potest; quod accidisse scribit Augustinus, libro 3. de ciuit. Dei, cap. 31. vbi tantam ex iis pestilentiam ortam fuisse scribit, ut in solo regno Massanißæ 80000, hominum perierint, & Vtica ex triginta millibus iuniorum militum, qui ibi erant, decem remanserint. Atque his modis aër ad pestem generandam concurrere solet.

Secundò etsi stellæ aërem corrumpendo pestilentia causæ esse possunt, dum eum ita corrumpunt, ut pestilentia illa, quæ in eo contineretur *μάστιγμα* homini communicata pestem in eo excitent, quæ pestes longè grauissimæ sunt, & in plurimos grassantur: tamen etiam alio modo & per se corpus ipsum humanum afficiendo pestem excitare valent, dum vel ipsum aërem ita disponunt, ut seu manifestis seu occultis qualitatibus corpori humano conseruando aptus non sit, sed humores in eo corrumpat, ita ut pestilentem naturam induant, vel etiam proximè atque immediatè occultis influentiis corpus humanum & præcipuè humores ac spiritus in eo corrumpant. Etsi enim astrorum influentiæ omnes bonæ sint & ad vniuersum Naturæ cursum conseruandum necessariae: fieri tamen potest, ut huic vel illi animalium speciei aduerse sint; sicut videmus calorem æstium equidem ob fruges maturandas & vniuersalem naturæ cursum conseruandum esse maximè necessarium: interim fieri potest, ut ab eo æstu aliqua individua vel etiam species lædantur. Qui autem ille stellarum positus sit, antea dictum, & de eo Astrologi consulendi.

Tertiò à victu communi quandoque pestis oritur. Etsi autem Donatus ab Altomati, & Hor. Augenius id negent: tamen cum iis sentimus, qui à victu prauo communi non minùs, quàm ab aëre, pestem excitari posse existimant. Id quod ipsa ratio, experientia, & illustrium Medicorum autoritas nobis persuadet. Etsi enim plerumque victus aliorum alia sit ratio: tamen ea interdum incidunt tempora, ut in annonæ caritate, in castris, in obsidionibus diuturnis omnibus, aut certè plerisque eodem victu, eoque prauo, vtendum sit. Cibus nimirum & aquis corruptis, famis sitisque explendæ causâ, non minùs quàm eodem aëre vtendum. Vnde prauos humores generari necesse est qui, cum diu à natura regi non possint, tandem corrumpuntur, & pestilentem naturam induunt. Tale exemplum proponit Galen. lib. 2. de nat. hum. 1. 3. & lib. de cibis bonis & malis succi c. 1. vbi pestis mentionem facit, quæ in multis Romano Imperio subditas gentes multis annis sauiens ex annonæ caritate & prauorum ciborum usu ortum habuit. *λοιμός* enim (ut hoc obiter moneamus,) id est, pestis, non *λίμς*, id est, fames legendum est. Ut enim in allegato loco habetur, pestilentia illa diu sauiit, ut apparet, ex lib. 3. de presag. ex puls. c. 4. & 3. Epid. com. 3. 1. 57. Fames verò non fuit multorum annorum, sed per vnius anni hyemem & ver præcipuè durauit, ut ex loco allegato patet. Atque occurrunt huius rei alia exempla in historicis, apud Iosephum, de bello Iudaico, Hegesippum, de bello Hierosol. & alios passim. Resque hæc tam nota est, ut etiam prouerbio occasionem dederit: *ὁ λιμός ὁ λοιμός*. Vnde etiam Galen. lib. 2. de nat. human. 1. 3. authorem eius libri reprehendit, quod in vnum aërem omnes communes morbos retulerit.

Quæ verò in contrarium adducuntur ab Altimaro & Augenio, non magni momenti sunt. Nam quod dicunt, morbos hos fuisse sporadicos, non vulgares,

*Victus communis prauus an causa pestis sit.*

gares, neque pestem; cum diuersi diuersis fuerint correpti: falsum est. Pestis enim, quâ tunc laborabant, omnib. communis fuit: symptomata verò & morbi, qui pesti coniungi solent, vt in omnibus iidem appareant, non est necessarium, vt supra dictum. Et consulantur saltem historiæ, quæ facile controuersiam hanc diriment & docebunt, an morbi, qui annonæ caritatem & vñum ciborum corruptorum secuti sunt, fuerint saltem sporadici, non epidemij ac verè pestilentes. Præterea nec hoc verum est, quòd morbi omnes, qui tum viguerunt, fuerint singulares seu priuati planè, sed singuli pluribus communes fuerunt.

Est deinde & illud falsum, quòd dicunt, eos morbos epidemios, qui à vitioso cibo potuque fuerunt orti, non fuisse veram pestem, sed pesti similes, vt pote qui plures occiderint, vnde etiam pestis nomine appellentur. Nam si idèd pesti nomen inditum est, quòd affectus sit perniciosus, qui plurimos inuadit & occidit; cur morbos holce epidemios, qui non minùs lethales & perniciosi fuerunt, quàm pestis ex aëris vitio orta, vt ex historiæ monumentis patet, pestis nomine non indigemus? Nam opinari, dari morbos peste perniciosiores, absurdum est, communique hominum opinioni, qui pestem meritò pro morbo perniciosissimo habent, aduersatur, ipsique Galen. qui in præmio in 1. Epid. dicit; morborum communium perniciosissimos esse, qui pestilentes vocantur.

Hoc tamen concedendum, vitium humorum ex victu prauo contractum, facilius sese exerere, vbi ex aëre occasio aliqua accedit. De quâ re Gal. lib. 1. de differ. febr. s. 4. scribit: *In pestilenti aëris statu inspiratio vt plurimum causa est*, (quibus verbis non semper, sed vt plurimum in aëre morborum pestilentium causam ponit.) *Fit enim aliquando*, (quo manifestè concedit, interdum eisdem à victu prauo prouenire) *ob eos, qui sunt in corpore humores, ad putrescendum paratos, cum breuem aliquam occasionem* (quibus verbis in aëre non primariam, sed paruam pestis causam ponit, quam non solum occasionem, sed breuem & leuem quandam occasionem nominat) *ad febris originem ab aëre ambientis accepit animans.*

Veneficia.

Quartò cognata sunt contagio vnguenta & pulueres venenati sparsi. Historiæ enim testantur, malitiam & perfidiam quorundam sceleratorum hominum eò vique progressam fuisse, vt per vnguenta & pulueres sparsos pestem disseminarint. Cuius rei exempla habentur apud Liuium, *decad. 1. lib. 8.* Petrum Droetum, *de pestil. c. 10.* Anton. Portum, *de pestilentia.* Vvierum, *de venefic. lib. 3. cap. 37.* Hor. Aug. *tom. 1. Epistolarum, lib. 4. Epistola 1. lib. 1. de peste cap. 3.* Herc. Saxoniam, *de plicâ, cap. 11. & 12.* Thomam Iordanum, *de pestis phænomenis tract. 1. cap. 18.* & ante annos non ita multos, anno nimirum, si rectè memini, 1606. suppeditauit Vratislavia & Francosteinium in Silesia, vbi vespillones quidam tale facinus ausi sunt, sed deprehensi supplicio, quòd meruerunt, publicè affecti sunt: cuius scelestissimi facinoris historiam annorauit Nicolaus Polius, in *Hemerolog. Silesia.* Si tamen quis ista veneficia ad contagium referre velit, cum eo non litigabo.

Hoc loco alterius, miræ quidem, sed quam, ob fide dignorum Authorum testimonium, in dubium vocare non ausim, causæ mentio facienda est: Nimirum à maleficis & sagis iam defunctis & humatis pestes induci, quæ prius non cessent, quàm cadauera illa veneficorum capitibus truncentur. Quòd cum alicui fabulosum videri possit, malo Herculis Saxoniae, *lib. de plicâ, cap. 11.* verbis, quàm meis hac de re aliquid in medium asferre. Ita ergo ille: *Habebam sanè maximum ad hanc rem confirmandam argumentum: sed quia mihi omnem videbatur superare credulitatem, illud proferre non audebam, videlicet in Polonia atque Germania non raro induci pestem à maleficis quibusdam mulieribus, cum*

*primùm defuncta & humata sunt. Neque illam desinere, quàm inueniatur cadauer, quòd vel propria spolia & vestimenta, vel alia propinqua mordicus ore teneret, quasi esuriens escam auidè quærat. Hac, quæ mihi omnem mentis captum superare videbantur, scribere non audebam. Cum verò multiplici iam testimonio mihi confirmata sint, nunc autem potissimum à Doctissimo Dn. Ioh. Vrsino Leopoliensi, idèd ea proferre non dubitavi. Rem itaque Dominus Vrsinus propriis oculis intuitus sic se habere inquit: Anno Domini 1572. peste per vniuersam Poloniam grassante, cum mulier quadam defuncta ex pago Rzesna dicto in suburbanum Leopoliense aduecta ad adem Exaltationis S. Crucis sepulta fuisset, & ex illo die pestis maximè circa illud templum, sauire cœpisset; qui sepeliendorum mortuorum curam habebant, non temerè suspicantes, villanam aliquot ante diebus sepultam maleficam esse, cadauer eius effodiunt, quòd cum nudum, & in ore reliquias suarum vestium deuoratarum habens, reperissent, caput, vt moris est palâ, praacuto ferro obductâ, absciderunt, & iterum terrâ obruerunt, ac pestis cessauit. Atque in huius rei testimonium Saxonia etiam aliorum illustrium virorum autoritatem, & fidem adducit. Cuius rei causam cum reperire facile non sit, est animi veritatis auidi, eam diligenter perpendere, & in eiusmodi narrationum, quæ vbiuis ferè locorum obuiæ sunt, veritatem inquirere. Et quid interdum venefici etiam post mortem præstent, satis testatur tragœdia illa & turbæ, quas excitauit post mortem futor ille Strigoniensis in Silesia, quam historiam integrè & prolixè descripsit Martinus Vveinrichius, quæ pro æmij loco *Dialogus de Indificatione Daemonum Ioh. Fr. Pici Miranulanani* præposita, & omnino lectione digna est.*

Tandem inter causas pestilentiam generantes non omittenda est Imaginatio, & Terror ac Timor. Experientia enim sæpè docuit, quosdam, vbi ex improviso aliquem peste infectum ad nosocomium, vel mortuum ad sepulchrum deferri viderent, aut aliquis è domo infecta, licet ipse non infectus, efferretur, inde consternatos ac perterritos in pestem incidisse; licet in aëre pestilentiae semen non hæreret, neque etiam ab aliquo contagium suscepissent. Cuius rei ratio expedita & manifesta etsi facile reddi non possit: tamen experientiae manifestæ idcirco repugnandum non est. Et aliàs etiam patet, quantum imaginatio & affectus in afficiendo corpore possint. Stigmata & nauios infantibus imaginatione matris imprimi, cuilibet notum est, & exempla vbiuis obuiæ sunt. Memorabile inter ea illud est, quòd Anno 1610. die 17. Iulij Praga accidit. Natus enim ibi fuit puer, quoad alias partes sanus; verum intestinis, hepate, ventriculo, liene extra abdomen, cuius tamen cutis diuulsa non fuit, propendentibus. Cuius deprauatæ conformationis causa fuit imaginatio, quam mater concepit tribus aut quatuor ante partum mensibus, cum vituli mactati intestina & viscera ex abdomine aperto propendere vidisset. Non dissimile ante biennium hîc vidimus in infante, cui labia superiora, cum parte palati superiore, usque ad fauces penitiores diuisa erant; id quòd euenerat, quòd mater grauida à lanio suis mactatæ caput ita diuidi viderat. De repentinâ canitie, è matre & timore subortâ, exempla collegit Marcellus Donatus *de hist. med. mirab. lib. 1. cap. 1. & Schenck. obs. 1. 1. obs. 1.* Et imaginationis miros effectus recenset idem Marcellus Donatus *lib. 2. c. 4.* Illud hoc loco prætereundum non est, quòd Thomas à Vegâ, in *com. super Galen. art. med. cap. 84.* habet, & insigne documentum continet, quantum imaginatio in mutandis & alterandis corporis nostri humoribus possit. Quidam, inquit, ex ardenti febre decumbens & delirans postulauit, vt sibi in stagno illo (monstrauit autem cubilis parimentum) natari liceret: constare enim sibi, se ex natatione illâ quamprimum conualiturum, & à febre liberatum iri. Ergo cum Medico annuente aliquandiu cum summâ iucundità

Imaginatio & timor.



*in iucunditate supra pavementum hinc inde se voluisset, ait, iam sibi aquam accedere ad genua, optare se tamen, ut altius ascendat. Paulo post latior, iam, inquit, attingit inguina; sicque iuxta imaginationis conceptum ad guttur usque paulatim aqua ascendente, hilari facie gestit, seque iam sanum esse & à febre liberum euasisse pronunciat. Id quod reuera etiam euenit.*

*Quomodo  
imaginatio  
pestem indu-  
cat.*

De modo, quo hæc fiant, alij aliter sentiunt, Nos saltem hic de pestilentia agemus. Paracelsus, *de pestil.* tract. 2. statuit; cum quis attentè de peste cogitat, & de eadè sibi metuit, ipso intuitu & visu Lunam inficere, non secus ac speculum mulier menstruo laborans, & ab eadem Luna quasi reflexis radiis hominè rursus infici.

Verùm absurda hæc & hominis ad pleraque saniora dogmata irridenda nati somnia esse, quis non videret? Sit, ut Luna possit hoc modo ab hominis intuitu infici: tamen necessarium esset; pestilentiae semina in homine antea, ut in basilisco quodam, fuisse, & eadem etiam sine Lunæ operâ in actum imaginatione duci potuisse.

Alij igitur statuunt, pestilentiae semina aliquandiu in corpore delitescere posse, & attentiore de peste cogitatione & metu illa excitari & in actum deduci: sicut terrore & attentiore de rabie cogitatione, rabiei igniculos & semina quasi sopita excitantur in iis, qui à rabidis animalibus demorsu sunt. Cujus rei exempla occurrunt in libello Germanico, *de luporum rabie* Iohan. Bauhini. Quam sententiam etiam admittimus & utrūque concedimus, nimirum pestilentiae semina in corpore aliquandiu delitescere, eademque imaginatione atque terrore excitari posse: an tamen hoc semper fiat, & an ij, qui ex imaginatione & terrore pestem concipiunt, prius semper semina pestilentiae hauserint, dubitamus; imò contrarium diligenti exemplorum observatione facile probari posse arbitramur. Hoc aliquis addere posset. In pestilenti constitutione à causis superioribus dispositionem aliquam ad pestem in omnibus corporibus induci (quod forsitan aliorum morborum cessatio monstrat) quæ postea ab imaginatione ac timore & terrore in actum deducatur.

Utrū sit, & licet modum, quo hæc fiant, facile inuestigare non possumus: hoc tamen primò certum est, humores ab affectibus vario modo agitari & corrumpi posse. Deinde & hoc certum est, Imaginationem semper ad peculiarem & determinatam mutationem tendere, sicut hoc in imaginatione gravidarum videre est. Vnde etiam accidit eos, qui pestilentiae metu terrentur, nihilque nisi pestem metuunt & cogitant, imaginatione & metu illo determinatam hanc corruptionem humoribus inducere; sicut gravida ad sanguinem effusum territa sanguineum nœuum infanti inducit; nigra aliquà re perterrefacta, nigrum. Atque hæc præcipua causa est, cur vespillones, clinicæ mulieres, chirurgi & alij, qui animo præsentè & alacri peste infectis & mortuis suas operas locant, raro peste inficiantur; alij verò, qui animo minùs præsentè ad easdem operas accedunt, subito inficiantur & peste extinguantur. Ac certum est, si quis seminarium pestis hauriat atque simul timeat, & de periculo sit attentius sollicitus, eum in præsentissimum vitæ periculum conjici & raro conualescere, quamvis omnis in curatione diligentia adhibeatur. Altrè enim ad cordis penetralia venenum hoc modo deducitur, vnde vix euocari potest. Nec ipsa virtus vitalis ad expellendum illud alacris est; sed penitus ferè succumbit.

### C A P V T III.

#### De Contagio.

**A**Tque hæc sunt causæ, quæ pestilens venenum generare possunt: ut verò illud postea in plurimos propagetur, natura ejus contagiosa in causâ est. Neque

*Dan. Sennerti Tom. I I.*

enim ubi in aliquo loco pestis exoritur, causa semper vel in cælo, vel in aëre, vel in victu præcedente quærenda est; Verùm sæpe ex aliis locis per fomitem aliquem pestilentem defertur; & licet primò in paucos contagium sese diffundat: tamen postea in plures disseminatur, ita ut pestem per contagium non solum alicui civitati, sed toti regioni communicari posse, experientia sæpe docuerint. Iam ergo etiam de Contagio dicendum.

Et si contagium in aliis morbis etiam animaduertatur: tamen cum nullus omnino peste contagiosior sit, & contagium maximè in peste elucescat: non abs re fuerit, si de naturâ contagij, antequam ad alia accedamus, aliquid seorsum dicamus. Admiratione verò non indignum est, cum contagium in pestilentia tam manifestum sit, ut nemo illud ignorare possit, & præter pestem etiam lepra, phthisis, alique morbi contagiosi animaduertantur, quod antiquis proculdubio ignotum non fuit: qui tamen factum sit, ut de contagio nihil ferè scriptis tradiderint. Et si enim Hippocrates nominat *vorapè & morpè* & Galenus ac Hippocrates *pidemata*: tamen rem ipsam non explicant. Terruit ipsos proculdubio, quicquid alij etiam dicant, rei gravitas, cum viderent, ut effectus contagij manifestissimi sunt, ita naturam & causam ejus inuenire esse difficillimum. Fracastorius superiore seculo primus ferè hanc difficultatem aggressus est, quem postea plurimi alij viri docti secuti sunt.

Contagium, quod à contactu aut antiquo verbo *Contagium quid significet.* contago, quod est contingo, dici, extra controuersiam est, pluribus modis usurpatur: Primò pro ipso contactu duorum corporum, cuius ratione similis morbus gignitur, seu quo vnum corpus aliud corpus inficit; atque in hac significatione contagium in prædicamento situs est. Secundò sumitur contagium pro actione, quâ corpus vnum aliud contingens ipsi morbum, quo laborat, communicat. Tertiò pro affectione præter naturam, quæ alteri corpori communicatur. Quartò pro *vorapè & morpè* aut *pidemata* seu seminario, vapore aut spiritu, aut quocunque alio corpore, per quod affectio illa præter naturam alteri corpori communicatur.

Hinc aliter ab aliis definitur. Petrus Salius Diuersus *Contagij varia definitio- nes.* definit contagium, contactum duorum corporum, cuius ratione similis in altero per alterum morbus producit. Alij, productionem similis affectionis in alio; seu morum quandam à morbo corpore in aliud analogum, quo ei labes similis, qualis in primo est, per contactum eiusdem communicatur. Alij, affectionem præter naturam, quæ alteri corpori à corpore præter naturam similiter affecto communicatur. Alij, inquinamentum, quo corpori alicui similis affectus, quo aliud corpus laborat, communicatur.

Primò autem rectè accipiendum est, quomodo similis affectionis in alio corpore productio contagium dicatur. Neque enim quæcunque similis affectionis in alio corpore productio contagium est; e.g. dum calidum aliud corpus calefacit, aut frigidum aliud frigidum reddit, contagium propriè non dicitur. Sic licet serpens aut scorpio morsu vel ictu suum homini venenum communicet: Contagio tamen id facere non dicitur.

Itaque sciendum, contagiosum esse, corporis morbo saltem affectionem esse. Id enim solum contagiosum dicitur, quod morbo aliquo laborat, aut certè causam morbo in se continet, eandemque alteri communicare potest.

Deinde nec hæc communicatio quocunque modo fieri debet. Nam si sola aliqua qualitas communicetur, quæ ad affectum aliquem recipiendum disponat saltem, non est contagium. Verùm contagium sit per aliquod seminium, quod specificum & suæ naturæ proprium

*Pestis morbus contagiosissimus.*

*Contagium quid significet.*

*Contagij varia definitio- nes.*

*Quomodo Contagium similis affectionis productio sit.*

*Contagiosum quid.*

proprium edit effectum, & citra sensibilem aliquam alterationem, & præmissam dispositionem, speciem sibi similem in corpore analogo producit. Est enim in re contagiosa tam prava conditio, ut semen seu *μίασμα* ex se emittere possit, quod in corpus idoneum receptum illud inficere, mutare, corrumpere, similisque effectus in eo producere potest.

Contagium  
quid.

Vnde definimus Contagium esse *μίασμα* seu seminum vitiosum, è corpore ægro emissum, quod in analogo corpore receptum, similem in eo morbum gignere & producere aptum natum est. Vel affectionem præter naturam, quæ corpori à corpore præter naturam affecto per peculiare *μίασμα* communicatur. Vel; productionem affectus præter naturam in corpore, per semen & *μίασμα* ex alio corpore ægro emissum.

Quæ ad con-  
tagium re-  
quirantur.

Tria autem, ut contagij natura rectè cognoscatur, perpendenda sunt, 1. corpus contagiosum, quod alia inficit. 2. morbus & *μίασμα*, quod alteri communicatur, & per quod aliud inficitur, 3. corpus, quod inficitur.

Contagiosum  
quid.

Primum quod attinet, iam antè dictum, non quodlibet, quod alicui eam, quam ipsum habet, affectionem communicat, contagiosum esse, sed solum corpus morbosum, & tale, quod affectu aliquo præter naturam præditum est. Hic nonnulli quærent: An corpus præter naturam constitutum contagiosum sit ratione morbi; an verò causæ morbificæ. Vtiusque ratione contagiosum esse respondemus. Ipse enim morbus, ut iam dicitur, ut accidens, de subiecto suo non egreditur & alteri communicatur, sed illud, quod egreditur è corpore morbofo, & ab alio recipitur, corpus est, causæ morbificæ rationem habens: ut ita causa proximè contagiosa sit: tamen ad talis materiæ generationem & multiplicationem in corpore ipse etiam morbus, ac vitiosa præter naturam in corpore dispositio facit. Causa autem illa, cuius ratione corpus contagiosum redditur, vel aliunde corpori aduenit, & ab aliquo corpore malè affecto communicatur; vel in corporibus nostris, ex vitiata coctione, siue ratione alimenti, siue ob aliam causam, generatur, à quo deinde in ipsis partibus solidis consimilis morbus introducit, & partis actio vitiatur, ut simile excrementum multiplicet, eidemque facultatem sibi simile producendi imprimat, ut postea in aliud corpus translatum similem sibi morbum producat. Atque ita mutuis quidam ab huiusmodi causâ ad talem morbum; & contrà à tali morbo ad talem causam progressus & circulus quasi esse videtur. Nam non solum corpus aliquod contagiosum fieri potest, cui extrâ causa aliqua maligna & contagiosa obuenit: sed etiam quando in corpore, ferè semper ob errorem externum, talis vitiosus humor generatur.

Contagiosa  
materia ori-  
gi.

Quacunque autem ratione & modo talis materia corpori obueniat, siue in eo generetur, siue aliunde ipsi communicetur: fieri potest, ut antequam morbum, qualem producere apta nata est, corpori inducat, aliud externum corpus inficiat. Materiæ contagiosæ in corpore genitæ præbent exemplum mulieres, præsertim vetulæ, quæ menses reventos, & corruptos vitiososque humores in corpore habent; ab his enim, etsi ipsæ nondum actu ægrotent, vel solo aspectu tenellos infantes infici & falcinari posse, ab omnibus ferè receptum est. De materiâ contagiosâ corpori communicatâ habetur exemplum in lue venereâ. Si quis enim cum muliere alioquin sanâ, quæ tamen cum aliquo lue Gallicæ infecto rem paulò ante habuerit, congregiatur: fieri potest, atque experientia id sæpe testata est, ut talis à muliere illâ inficiatur, & luem veneream contrahat. Verùm tunc saltem per eam partem, quâ ipsum causam contagiosam hausit, alios inficere potest tale corpus infectum: Vbi autem iam altius radices egit malum, per quamcunque ferè partem alios contaminare potest. Post-

quam enim materia contagiosa iam solidas partes occupauit, earumque naturalem constitutionem vitiauit: tum à solidis partibus omnes iterum humores & spiritus inficiuntur, qui in alia corpora translati, earum naturalem constitutionem euertendi vim similem habent.

Verùm ut ad rem propius accedamus, cum non quodlibet corpus morbosum contagiosum sit, neque qui arthritide laborat, eam alteri per contagium communicare possit: iam videndum, quænam sit propria corporis contagiosi natura; & secundo loco vñà operâ explicandum, quid sit illud, per quod affectus, quo corpus contagiosum laborat, alteri communicatur; & quomodo in corpore contagioso generetur *μίασμα*.

Illud, quod è corpore contagioso alteri communi- Contagij se-  
minum. catur, non est ipse morbus, quo prior infectus est, sed corpus quoddam è corpore contagioso effluens, & in alio receptum similem morbum in eo excitare valens. Neque enim morbus idem numero de contagioso corpore in aliud transfit, sed idem specie in eo generatur. Græci illud, quod effluit, vocant *ποταὶς ἀπορρίπτει*, & *ἀπορρίπτει*, *μιάσματα*, *σπέρματα*: Latini inquinamenta, & semina ac seminaria contagij non incommode appellant. Sicut enim semen è corpore viuentis decilum animatum specie simile illi, à quo decilum, producere potest; ita contagiosus humor vel vapor è corpore infecto emissus, atque in aliud corpus receptus, similem illi morbum inducere potest. Habetque *μίασμα* hoc se instar fermenti, quod alteri massæ non fermentatæ mixtum facit, ut & ipsa effervescat.

Semen hoc corpus quoddam est, sed nunc spirituale, nunc etiam humoris naturâ præditum; sicut hæc differentia in pestilentia, lue venereâ, scabie, ophthalmiâ apparet.

Requiruntur autem in hoc semine contagij pesti- Conditio  
seminis co-  
tagij. lentis (de hoc enim hic agere nobis propositum) peculiare aliquæ conditiones. Nam videmus, contagij seminaria non solum velociter sese insinuare, sed etiam tenacissime inhærere, & postea calore vel alio modo agitata sese exerere, & corporibus aliis communicari, ac non solum vestimenta, sed ligna & domos etiam inficere posse, ut vix maximâ diligentia purificari queant. Imò in aëre, licet ventis agitato aut Solis ardoribus æstuante, satis diu durare, ac in loca etiam longinqua ac dissita, salua atque integra vehi posse, animaduersum est. Etenim ex omnibus quidem corporibus morbofis aliquid exhalare extra dubium est; imò in plerisque morbis non contagiosis longè maius est effluuium, maiorque *ἀπορροή*, quàm in contagiosis aliquibus: Verùm illud plerumque vel tam facile resoluitur & dissipatur, vel tam exiguum agendi vim habet, ut in corpore, in quo recipitur, similem morbum efficere non possit. Requiritur ergo in seminatio contagij, ut validissimam habeat constitutionem, ut dum è corpore contagioso exhalat, non facile vel ambientis aëris, vel aliarum causarum occursum vincatur & euascat, sed sese contra omnis generis externas iniurias tueri possit. Plerique omnes visciditatem quandam ac lentorè & tenuitatem in eo requirunt, ut in minimas partes diuidi, in iis tamen suam essentiam retinere, & corpora, à quibus recipitur, facile penetrare & inficere possit: eam nimirum compositionem auctores plerique in contagij seminio esse statuunt, qualis in rebus oleosis est. Verùm exacta mixtio & spirituositas potius causa esse videtur; cum talia multa videamus, quæ in minimâ quantitate suas vires integras retinent, nec tamen lenta sunt.

Cum autem contagij semina peculiarem in minimâ quoque mole corporis agendi vim habeant: facile hinc secundò apparet, præter manifestas qualitates; aliquam occultiore requiri, quæ secundum variam, quam habet ad diuersas corporis partes, vel humores, vel spiritus, contrarietatem, corpora peculiariter

culiariter inficit. Hæc autem qualitas à formâ etiam peculiari, plerumque veneficæ & malignæ qualitati conjunctâ, & totâ sui naturâ substantiæ nostræ vel alicui determinatæ parti inimicâ, fuit. Arque hinc fit, ut proût forma illa in semine contagij non semper eadem est: ita etiam eadem *modus* non omnia, sed saltem certa corpora inquinandi vim habeant. Hinc videmus, vaporem exhalantem è boue peste laborante non hominem, sed bouem inficere; & qui halitus è pulmone phthifici emittitur, non cutem inficit & scabiem generat, sed solum pulmones inficit: Contrâ scabiolus cutem alterius, non pulmones inficit.

Ex quibus omnibus apparet, saltem æquiucatione ludere Pet. Salium Diuersum, dum scribit, Contagij nullam ad morborum procreationem veram & positivam esse actionem. *Cum enim, inquit, contagium nec substantia sit, nec qualitas, quorum proprium est agere, verè ipsi non competis actio; quare nec in aliquo genere efficientis causæ reperi poterit, sed tantum contagium ad hoc concurrerit tanquam causa sine quâ non.* Etenim dictum suprâ, aliter ab aliis vocabulum contagij vsurpari; & licet, si primam originem vocis spectes, nihil nisi contractum seu situm duorum corporum, contagium significet: tamen vsus obtinuit, ut pro ipso corpore, in quo latet vis alia inficiendi, aut pro qualitate alios inficiente vsurpetur. Frustra igitur sejungere videtur contagium ac malignam & venenatam morborum contagiosorum qualitatem. Ita enim docet hac de re: *Cum febrës pestilentes sunt contagiosæ, actio quidem, quâ ab uno alteri communicantur, non contagij erit, sed eius tantum prava qualitas, quæ cor laceffit, quæ insidet in materiâ corruptâ. Ab hac enim materiâ corruptâ sicut excitantur & eleuantur intra corpus ipsum vapores mali, qui cor petentes eius omnes vires perniciosas labefactant qualitate: ita & alij extra corpus mittuntur, qui contagio præfente consimilem in altero possunt pravam qualitatem causare.*

Verumenimurò iterum hæc luditur saltem æquiucatione vocabuli contagij, quod ille solum pro situ sumit. Verum si sumatur contagium, siue pro actione, siue pro qualitate, siue pro ipso *modus*, non opus est à subjectis venenatam qualitatem & contagium sejungere. Hoc quidem verum est, quod alia est ratio venenositatis in illâ materiâ, alia contagij. Licet enim omnis morbus malignus & venenatus contagiosus sit: non tamen omnis contagiosus malignus est; sed malignum esse, est proprietas alicujus tantum speciei morbi contagiosi, illius scilicet qui præter vim ac proprietatem sese multiplicandi in alio, etiam peculiarem cum corpore nostro *modus* habet. Verum ubi in eodem morbo malignitas & contagium conjunguntur, non est opus, ea subjectis disjungere, sed cum utraque qualitas est in eodem subjecto, atque eadem materia ob peculiarem formam sæpe est contagiosa & venenata, neque venenata aliqua materia è corpore egreditur, & demum extra corpus contagio, ut causa sine qua non, junctâ aliud inficit, sed una & eadem materia est è corpore exhalans, & quæ alios inficiendi & malignâ ac venenatâ qualitate offendendi vim habet.

Quâ ratione autem istud contagij seminum in corpore contagioso generetur & quomodo in aliis suam actionem exercent, de eo non omnes idem statuunt. Nonnulli in eâ sunt sententiâ, contagiosam *modus* non nisi à re putrescente effluere, & per putredinem solum generari statuunt. Verumenimurò si actionem rerum contagiosarum perpendamus, & sine putredine contagium generari, & sine eadem actionem suam perficere posse, facile videbimus. Nam cum ad putredinem inducendam longius spatium & præuiæ alterationes requirantur: videmus contrâ, quamprimum contagij semen haustum est, hominem infici,

& tantam sæpe inesse efficaciam, ut homo à veneno, quod contagio conjunctum est, juguletur, antequam vlla putredo in corpore excitetur; eundemque hominem nihilominus alios inficere rursum. Per corruptionem quidem contagij seminarium generatur: sed per putredinem ut fiat, non est necessarium. Siquidem præter putredinem alia etiam corruptionis generantur, & tales occultas causas à totâ formâ magis, quàm manifestis qualitibus agere, iam sæpius probatum est.

Et ad fermentationem quandam omninò rectius reducit contagium, quàm ad putredinem. Fermenti enim quanta vis sit, & quàm breui spatio alia corpora in sibi similem naturam mutet, panis fermentatio, & feces cerevisiæ, quibus eadem cerevisia fermentatur, satis docent, ubi exiguum quid, & quod nullius momenti videbatur, ut cerevisia efferveat, facit. Atque eadem ratione venena agunt, quæ tamē nec putredine generantur, nec essentiam suam in putredine habent, quorum minimum quid in corpore receptum humoribus similem qualitatem & naturam inducit: quæ tamen actiones venenorum omnes non à putredine, sed alio, qui talis datur, agendi modo pendent. Et quanquam concedamus, in corporibus, quæ vel peste, vel alio veneno inficiuntur & corrumpuntur, tandem putredinem excitari: hoc tamen fit per consequens saltem. Dum enim calor innatus ita destruitur, ut humores in corpore amplius regere non possit, & humores ipsi, qui calidi & humidi sunt, à contagio & veneno corrumpantur: tandem putredo subsequatur, necesse est. Vnde præter rem fecisse puramus Lud. Mercatum, qui statuit, duplex esse contagium, aliud verum & legitimum; atque id solum per putredinem produci; aliud illegitimum & spurium, quod etiam sine putredine gigni possit. Nullam enim causam reddit, neque etiam reddere potest, cur illud contagium, quod sine putredine per alium corruptionis modum generatum est, minùs proprium contagium sit, quàm illud, quod cū putredine conjunctum est.

Nonnulli, ut causam reddant, cur morbi putridi alij contagiosi sint, alij non contagiosi, duplicem constituunt putredinem: vnam quidem simplicem, quâ sola fiat mixti solutio, nullâ tamen novâ generatione hanc subsequente; aliam verò præter hanc putredinem esse dicunt, quâ non solum mixtum corrumpitur & interit, sed etiam novum generatur, quomodo pulices, vermes & similia generari dicunt. Atque per istam putredinem contagium generari statuunt. Verum ut illud libenter acceptamus, quod hi concedunt, à priori putredine non semper gigni contagium, sed ea solum, in quâ talia seminaria generantur, quæ forti mixtione ita temperata sint, ut postquam è corpore ægro emanarunt, haud facile pereant ab externis causis debilitata, sed peculiari firmitate freta diu perdurent perseverentque, & spirituosâ essentiâ in corpora alia penetrent facilius, pertinaciùsque adhaereant; ita an ad istam generationem contagij vlla sæpe putredo necessaria sit, non sine causâ dubitamus. Habet se contagium, ut antea etiam dictum, fermenti instar, quod in corpore analogo receptum similem dispositionem illi inducit; quod tamen non per putredinem, sed peculiarem fermentationem, digestionem & mixtionem generatum est.

Atque ut per putredinem non generantur necessario ista contagij seminaria; Ita etiam per eandem non necessario suas actiones exercent, sed ubi portiuncula aliqua materiæ contagiosæ, è corpore ægro emissâ, ab alio sano recepta est, occultâ quadam vi, & à totâ substantiâ, ut vocant, potius in illud agit, quàm manifestis tantum qualitibus putrefaciendo. Id quod ex iis, quæ suprâ de naturâ pestis dicta sunt, apparet, & in aliis etiam morbis animaduertitur, qui in corporibus infectis se exerunt, ubi nulla adhuc putredo adest.

Quâ vi contagium agat.

Degeneratione contagij.

An solum putredine generetur contagium.



Quomodo  
contagium  
diffeminatur.

Non vno autem modo ac viâ è corporibus infectis contagij seminum exit. Aliquando enim per expirationem & halitum; aliquando per poros cutis & *ἐκ τῶν διανομένων* exhalat, sicut videmus halitûs acres & mordaces ex rapis, raphano maiore exeuntes, & ex rebus incensis vapores etiam res longè distitas afficere & inficere. Principium motionis partim à se habent, vt est vaporis omnis sursum ferri: partim ab aliis, à quibus in latus seu deorsum trahuntur. Fit hoc vel ab aere, vel à solido corpore aliquo, à quo repelluntur. Aliquando per sudores sordēsque curi adhærentes; per pus & saniem è bubonibus & carbunculis effluentem, pannis aliisque vestimentis & stragulis communicantur, quibus mediantibus alia postmodum corpora inficiuntur.

Vtrum cor-  
pora viuen-  
tia, an verò  
cadauera  
magis conta-  
gioſa sint.

Hoc loco non sine causâ quaeritur: *Quanam corpora infecta magis contagiosa sint, plûsque seminis pestilentis expirant, viuentia, an verò mortua?* Rondeletius, de cur. feb. in eâ est sententiâ, corpora peste mortuorum nullum ampliùs venenum conjunctum habere, mortuòque animali perire omne venenum; & si aliquando contagium ab iis contrahatur, hoc potiùs ab illorum pannis, quàm ipsis contrahi; narratque secuisse se aliquando corpora mortuorum ex peste, multis spectantibus studiosis, sine omni damno. Quæ sententiâ eo præcipuè nititur fundamento, quòd cadauera nihil vel parùm expirationis de se emittant.

Alij quidem non planè venenum cadaueribus adiungunt, verùm viuentia corpora infecta longè cadaueribus contagiosiora esse statuunt, atque afferunt pro hac sententiâ Thomas Iordanus, de pestis phenomenon tr. 1. cap. 18. præter alias, quæ pro Rondeletij sententiâ afferri possunt, rationes, eam; quòd halitûs, qui è corpore viuente peste infecto exhalant, maiorem habeant cum spiritibus corporum viuentium, quæ inficiuntur; cognationem & similitudinem, quàm cum vaporibus è cadauere exhalantibus, habeant spiritûs animales; magisque conuenire viuentem cum viuente, quàm viuentem hominem cum cadauere; contagium autem fieri inter similia.

Laurentius Ioubertus, lib. de pest. cap. 3. contrâ statuit; longè majus contagionis periculum imminere à cadaueribus peste interfectorum, quàm viuentibus: & longè periculosius esse peste sublatum, quàm etiamnum ægrotantem, attingere. In corpore enim viuente à calore nativo venenum hebetari quodammodo, & quantum fieri potest, retundi; extincto verò calore nativo, nullo obistente: vniuersum corpus à veneno occupari, venenumque in eo longè ferocius, quàm antea grassari; ipsamque quæ mortem sequitur, putredinem venenum augere & exasperare. Videnturque omnes ferè Medici, qui de peste præcauendâ scripserunt, à Rondeletio dissentire, dum præcipiunt, peste interemptorum cadauera quamprimùm terræ esse mandanda, & quidem altius effodienda esse sepulchra. Quod etiam in omnibus benè constitutis Rebus, obseruatur, refertque Thucydides, in peste Atticâ, cum multa cadauera hominum insepulta iacerent, ea vel non attigisse bruta, quæ cadaueribus vitare solent, quæ verò attigerant, periisse.

Controuerſa  
deciso.

Ex hoc dubio vt nos exoluamus, principio distinguendum putamus inter eos peste laborantes, quorum morbus in salutem & vitam terminatur, & inter eos, quorum morbus lethalis est. Eos, qui peste laborant, & de vitâ non periclitantur, minùs contagiosos esse, quàm pleraque peste interfectorum cadauera, existimo. Atque in hisce corporibus verum esse credo, quòd Ioubertus dicit, calorem vitalem, cui opitulatur & alexipharmaca, sese veneno non tantùm opponere, illudque hebetare ac retundere, sed tandem etiam, victoriâ potitum, planè infringere ac abolere. Ac quantum quidem ego memini, non obseruatum puto, in eâ, quæ superioribus annis hic grassata est pestilentia,

quemquam ab iis, qui conualuerunt, infectum fuisse. Hoc certè sæpius obseruari, si primus, qui in domo aliquâ peste infectus fuit, conualuit, neminem præterea in eâ domo infectum fuisse. Vbi verò æger de vitâ periclitatur, & tandem moritur, contrario modo sese res habet. A tali enim corpore, præcipuè jam morituro homine, quando scilicet venenum, deuicto calore vitali, triumphat quasi, plus periculi imminere, quàm à cadauere puto. Et experientia testatur, quòd plures in ciuitate vel domo aliquâ conualescunt, eò meliorem è salubri statu recuperando spem esse: Contrâ verò quòd plures moriantur, eò pestem sæuiorem euadere.

Rectè ramen, quæ dicta sunt, accipienda: à viuenti corpore, quòd, venenum ita corrumpit, vt nihil nisi pestilens ex eo exhalare possit, calor nativus reliquus, quantum quidem potest, omni conatu venenum expellit; & per se, ex tali corpore, cuius humores corrupti sunt, vapores & halitûs per omnes vias ac spiracula, inprimis per expirationem, exhalant. Ideoque cum homine tali iam morituro periculosissima est conuersatio. Verùm vbi homo mortuus est, cadauerque calore vitali extincto iam refrixit, porique clauduntur, & inprimis exspiratio per pulmones cessat, minùs, vt rectè in hoc Rondeletius statuit, vaporum exhalat, & tum minùs periculi à tali cadauere imminere concedi potest; inprimis si accedat frigus externum vehementius. Non tamen nihil expirare, ipse odor cadaueris testatur: atque id quòd expirat, non nisi pestilens esse potest; cum omnes talis corporis humores pestilentem naturam induerint, neque per mortem eam deposuerint. Et si in vestibus & simili suppellectili pestilentie semina asseruari queant; cur non etiam in humoribus & corporis partibus, quas occuparunt, aliquandiu hæreant? Et si alia venena in cadaueribus aliquandiu delitescunt, cur non & pestilentis veneni reliquæ in cadauere aliquandiu remanere possint, quæ postea expirent, & alia corpora inficiant? Fernellius, libro 2. de abdit. rer. caus. capite 14. refert, venatores quosdam lupum sæuiorem trucidatum in varia obsoniorum genera apparauisse & coxisse, & eos omnes quicunque carnes, esurarunt, non multo post tempore rabie correptos, alios periisse, alios, sociorum morte prudentes sibi prospexisse. Et Ioh. Bauhinus, in tract. de luporum rabie. è Lycosthene tradit, in Ducatu VVirtembergensi olim hospitem quendam scelestum carnes porci à cane rabido, morsu conuiuis edendas apposuisse, à quarum esu rabidi facti mutuis moribus se miserandum in modum dilaniauerunt. Idem ex epistola quadam Theobaldi Fetrichij refert: rusticum prope Francofurtum suam rabidam occidisse, occisamque minùs altè in terram defodisse, quam cum tempore hyberno vulpes olfecissent, erutamque vorassent, in rabiem eas actas fuisse, & pecora alia, atque homines morsu impetiuisse, & rabiem ita disseminasse.

Verùm vbi cadauer putredinem concipit, ibi maxima vaporum copia ex eo exhalat, quòd vel fœtor ostendit: qui cum ex corpore pestilenti exhalent, nò nisi pestilentes & contagiosi esse possunt: imò venenum per illam putredinem procul dubio exasperatur. Vnde, vt antea dictum, prudenter Medici & Magistratus faciunt, qui peste mortuos quamprimùm, antequam scilicet cadauera putredinem concipiant, efferrî, & altius effodi sepulchra præcipiunt, ne illi pestilentes halitûs alios contaminent, & aërem inficiant.

Nam quòd hic scribit Thomas Iordanus, vim pestiferam vnâ cum calore solum vertere atque euanescere, nouamque putredinem à priore planè differentem succedere; idque ex eo patere, quòd ex putredine pestilenti nullum animal generari queat, cum tamen ex peste interemptorum cadaueribus, vt ex aliis, vermes generentur: in eo non parùm fallitur. Nam vt illud prætereamus, quòd malè totam contagij

Thom. Iordanus  
ni sententia  
exterminatur.

& pestilentiae naturam ex nescio quâ fictitiâ & à vulgari diuersâ putredine deducit, nullam causam reddit, cur necessarium sit ut cum calore vniuersum venenum euanesceat. Cum enim in aliis corporibus diu contagij semina latere posse videamus: quidni etiam in humoribus, in quibus generata sunt, aliquandiu subsistere possint? Et fieri hoc, maculae & alia plurima, quae etiam post mortem contingunt, atque in cadaueribus conspiciuntur, & pestilentiae signa in defunctis habentur, satis docent.

De pestilenti putredine animalia generantur.

Deinde falsum est, à pestilenti seu putredine seu corruptione nullum animal generari. Docet enim experientia, & à pluribus annotatum est Medicis, in peste & pestilentibus febribus vermes non solum per aluum deiectos, sed & vomitu reiectos fuisse. Et si post bella, militum, qui bene valebant, dum occidebantur, cadauera insepulta putrescentia pestem inducere valent: cur non multo magis peste interemptorum cadauera, praecipue putrescentia, contagiosa sint? Nam nullius momenti est, quod hic responderet Thomas Iordanus: illic aëri aliàs sincero & puro virus contagiosum à putrescentibus cadaueribus communicari; in peste verò aërem iam antea esse contagiosum, & propterea amplius pollui non posse, & superuacuum esse, infecta cadauera pestem afferre, iam antea in aërem à quauis causâ introductam. Quasi verò id, quod sordidum est, amplius defecari ac pollui, ac venenositas augeri nequeat? Deinde non in qualibet constitutione pestilenti vitium in aëre haeret, sed saepissime aër purus est, pestisque saltem per contagium propagatur. Quo in casu & aërem pestilentiae semina à cadaueribus recipere, & viuentes à cadaueribus ea haurire, non impossibile est.

Nec illud vllum habet pondus aut rationem probabilitatis, quod scribit: Quemadmodum venena, alimenta, pharmaca, in cadauere, ob caloris actualis migrationem, nullius vsus sunt & efficaciae: ita etiam lucem contagiosam nec in cadauere latere, actuari, aut aliquid roboris viriumque habere à semetipsâ, neque affectionem in alium transmittere posse. Concedimus, non cadaueribus venena esse venena, sed viuentibus; & sicut purgantia remedia non cadauera purgant, sed viuentem hominem: Ita etiam venena non in cadauere utpote cui non aduersantur, sed viuentem hominem, vim suam exercere. Interim cur in cadauere latere non possint, causam nullam video. Si enim in ligno aut lanâ, ubi omnis viuentis calor deest, vires suas retinere possunt & diu delitescere: cur non etiam in cadauere possint? Sicut & illud nos non mouet, quod dicit, viuentibus corporibus cum viuentem, quam cum cadauere, esse maiorem similitudinem. Verum hoc est: sed quid ad rem? Ergone arsenicum aut alia venena, quia non viuunt, hominem non iugulant? sed de hoc postea.

Ferè eiusdem momenti est, quod scribit, venenum, ubi calore natium, cui totâ substantiâ aduersatur, deuicerit, vnâ commori. Quae enim causa est, cur agens, ubi suum contrarium vicit, & ipsum interire debeat? Ab actione quidem cessat, sed non interit. Neque fidem meretur, quo hic effugere conatur, dum dicit veneni illud seminarium, quamdiu in vestibus latet, enerue ac languidum esse; à calore autem vires suas accipere. Falsum enim hoc est: virisque suas omnes retinet in fomite semen contagij, sed in quâ eas exerat, tum non habet: at in corpus viuens receptum, utpote cui contrarium est, mox eas exurit: ad quâ actionem an calore actuare opus habeat, non parum dubito.

Narrationem Rondeletij quod attinet, in dubio adhuc est, an cadauera illa peste interfectorum fuerint. Nulla enim signa ex iis, quae euidentia sunt pestilentiae in iis apparuerunt: Et ignotum sibi interfectionem fuisse, an cadauera illa peste interemptorum fuerint ipse refert, neque addit, vnde postea illud re-

Dan. Sennertii Tom. II.

sciuerit. Et fuerint sanè interfectorum peste illa cadauera: fieri tamen potuit, ut in cadaueribus illis à frigore hyberno vehementiore contagiosa vis extincta fuerit; sicut videmus eandem in aliis fomitibus frigore hyberno aboleri.

Porro semina contagij, si alteri corpori communicari debent, nisi illud immediatè contingant, id quod in lue venerea, scabie, & similibus accidit, medio aliquo seu vehiculo opus habent, quo ab vno corpore in aliud transferantur. Hoc autem vehiculum duplex est, aër scilicet & fomes, quem appellant.

Aërem quod attinet, testatur experientia, non solum à vicinis locis, sed & interdum remotioribus, semina illa contagij pestilentis deferri & propagari posse: id quod in famosa illâ peste Atticâ accidit, quae, ut testatur Thucydides & Lucretius, ex Aethiopiâ usque Athenas peruenit. Est autem paratior & commodior ad deferendum & conseruandum semina contagij aër, si omnis qualitatatis, actiuae inprimis, sit expertus. Aliàs enim vis illa *pestilens* extinguitur, id quod potissimum in hyberno frigore fieri videmus.

Fomitis rationem habere potest, quicquid ad contagionis semina & excipienda & retinenda, donec iterum alteri corpori communicentur, aptum est. Talia sunt omnia; quae rara, laxa & porosa sunt subeuntésque fumos & vapores, *smog* & *vapor*: *smog* promptè excipiunt, ac diu retinent: linum, gossypium, plumæ, pelles pilosae animalium, & quae ex his conficiuntur vestes. Annotatque Fracastorius, de morb. contag. lib. 2. capite septimo. Anno 1511. Veronae ex vnâ veste pelliceâ 25. Germanos milites obiisse, dum vno defuncto alius indueret illam vestem. Hanc ob causam & ob pilos Cardanus lib. 1. de venen. cap. 14. huc refert canes & feles, qui susceptum pilis venenum saepe transportant in alias aedes easque inficiunt. Quamquam & ex terrore quo, conspecto fele vel cane à domo infectâ egresso, percelluntur, nonnullos pestem contraxisse, obseruatum sit. Forestus, l. 6. obseru. 2. peste correptum narrat quendam adolescentem, cui, cum manum in scrinium quoddam inuississet, tela araneae in manum incidit, à quâ pestilens pustula oborta est. Quin & parietes & muros contagium suscipere posse experientia docuit. Quod apud Iudaeos frequens fuisse, ea, quae in Sacris de leprosis aedibus dignoscendis & purgandis leguntur, docent. Tanta enim erat illa leproe contagio apud Iudaeos & tam profundè in ipsos lapides & parietes se insinuabat, ut non solum muros radi & nouâ calcis crustâ induci oportuerit, sed saepe tota aedificia destrui necesse esset. Cōtrâ verò quae solida & densa sunt, cum vapores & *vapor* nō facillè admittant, ad contagium etiam recipiendum & seruandum minùs apta sunt; qualia sunt lapides solidiores & metalla. Hinc Hier. Mercur. de peste cap. 12. An moneta contagium suscipere possit.

Fomes autem, quicumque demum sit, diutius ista semina pestis retinet, si in loco sit neque calido neque frigido nimis, neque tali, qui aëri libero & ventorum flatibus est expositus. Aliàs enim vel ab excessu qualitarum actiuarum vis veneni infringitur, vel ventorum flatu dissipatur.

Porro ubi talis fomes vel mouetur, vel excutitur, vel nonnihil incalescit excussum quasi è latebris venenū in obuium quemque transferrur, & idem tunc efficit, quod fecisset, quāprimū ex corpore agro exhalauit. Ita saepe cōpertū est à cōclusis, multosque annos reseruatis vestimentis aut lectis infectis, dū iā innoxie tractari posse crederetur, totas familias, imò ex iis tota oppida infecta fuisse.

N;

Narrat

Narrat Alex. Benedictus, *de peste cap. 3.* ex culcitra cū contragium suspectū, atque in remotiores adium partes abiectā, post septennium iterum agitatā pestem excitatam fuisse. Et apud Trincauellum, *lib. 3. Consil. 17.* Francanzanus narrat, Iustinopoli post maximam pestem funes, quibus ægri portabantur, mortuique ad sepulchrum deferreantur, post capsam quandam abiectos fuisse, atque ibi per annos 20. aut plures latuisse; quos cū seruus loco postea moueret, incidit in pestilentialem febrem, contagiūque illius reliqui infecti sunt, ut 10000. homines hac occasione mortui fuerint.

Anno 1542. Vratisslauiæ peste 5900. intra 22. septimanas mortui sunt, pestilensque contragium in linceo annis 14. conclusū habuit, è quo anno 1553. Laubani explicatū pestē excitauit, quæ per contragium iterū Vratisslauiam delata est, & hinc Goldbergam; Goldbergā per vestes à vigili in turri Lignitium deportata, & postea per columbam è turri delapsam, ac à custode portæ exceptam hinc inde per urbem disseminata est.

Verū hūc queritur, an quis vestibibus suis contragium possit sine noxa circumferre, & ipse non læsus aliis id communicare. Ad quod respondemus, si primò tali in loco contragij seminum in alicuius veste hæreat, ut cutem eius attingere, & per poros cutis in corpus admitti non possit, quamdiu tale *quiescens* quietum manet, nullum circumferenti damnum inferet. Quod si iam excutiat, & in aërem spargatur, fieri quidem potest, ut ipse, qui illud circumtulit, spiritu, quē ducit, in corpus admittat: accidere tamen etiam potest pro variā aëris agitatione, quā & illa *quiescens* hinc inde mouentur, ut alius illud attrahat; non ille, in cuius veste aliquandiu delituit. Eius rei in cā, quæ superioribus annis hūc grassabatur, pestilentia, aliquot exēpla habuimus, ubi aliquot ex incautā cum vespillonibus & aliis, qui ex officio infectos visitant, conuersatione peste infecti & mortui sunt.

Maiores verò difficultatis est quæstio, quā controuertitur, An semen contragij ab homine haustum in eius corpore aliquandiu latere possit, antequam se prodar; an verò necessarium sit, ut suas vires exerat. Dissentiunt hac de re Medici, atque inter eos Octavian. Roboretus, & Hier. Mercurialis ac Ioan. Ant. Sarracenus. Statuit Octau. Roboretus, *de febre peticul. cap. 19.* venenum hoc non solum per multos sæpe dies, etiam in fruiore peste, sed & per menses, more veneni, quod morsu canis rabidi infertur, latere posse; sibi que ipsi, cū de infectione suspectus esset, atque per dies decem à consortio aliorum se subtraxisset, vix iterum postea egresso, bubonem erupisse scribit: existimatque, summā cum ratione in bene constitutis ciuitatibus lege sancitum esse, ut qui ex peste infectis locis veniunt, tamdiu ab aliorum consortio semoueantur, donec omnis contragij suspicio sit abolita; quod 40. diebus ad summum euenire putat. Ioan. verò Ant. Sarracenus, cum quo consentit Hier. Mercurialis, concedit quidem, aliquandiu hoc pestilens seminarium corpore circumferri posse, sed non tot dierum hebdomadibus, vestibibus mutatis, & corpore loto ac raso; duriusque illud, quod laudat Roboretus, statutum, quā ex æquo & bono esse existimat.

Verū priori sententiæ potius subscribimus eorum, qui semina pestilentia in corpore, antequam vim suam manifestè exerant, non solum dierum, sed & septimanarū vnius atque alterius spatio latere posse existimant. Atque ut id credamus, neque pro re impossibili habeamus, inprimis illud nos mouet, quod videmus aha venena, antequam in actum erumpant, aliquandiu in corpore humano delitescere posse. Disputatur inter Medicos, an dentur venena, quæ intra corpus assumpta, non statim, sed post aliquod temporis interuallum homini noceant, & sese exerant. Et licet de ea alij aliter sentiant, atque

illud adeo facile probari non possit, venena esse, quæ definitis planè mensium & annorum spatiis tandem hominem iugulent: hoc tamen certum est, malitiam hominum talia venena inuenisse, quæ hominibus propinata, primò se nullo modo produnt, sed post aliquod tempus sese exerere incipiunt, hominemque lentā morte enecant. Quā de re Cardanus, *lib. 1. de venenis cap. 26.* Et de canis rabidi veneno res extra omnem controuersiam posita est, illud diu, antequam sese prodar, in corpore humano latere posse: annotatumque est à Medicis, illud non solum per menses sex, sed & annos duodecim, imò longè plures in corpore delituisse. Si igitur in aliis venenis hoc fieri potest, cur in pestilenti id sit planè impossibile? Nimirum seminis pestilentis non eadem est semper potentia, sed ab exiguo initio maximas vires acquirit, & ut Galenus, *lib. 6. de loc. aff. cap. 5.* de spuro rabidi canis docet, ab exiguo initio, & venenatā qualitate praua quādā in corpore dispositio sensim augeatur, tandemque ad excellentem magnitudinē exurgit.

Quæ omnia cū talia sint, ut negari non possint, ipsa nimirum experientiā attestante, venena plurima in corpore aliquandiu delitescere posse; in hoc nonnulli, inter quos est Ioh. Antonius Sarracenus, *de peste c. 6.* laborant, ut monstrarent dissimilitudinem inter venenum pestilens, & alia venena, inprimis canis rabidi. Ita enim Sarracenus: *Huius, inquit, atque illius diuersa est substantia, nec sedes eadem. Huius enim (canis rabidi) vis hebetior ac in crassiore & densiore materia inhaerescens, quā de causā cohibetur, nec nisi caloris natui, eiusque copiosi, magnā vi excitatur. Quin id ipsum, ut imbecille admodum, ne rara quidē epidermis alius penetrare sinat, nisi forsan vel scissa, vel alioquin lacera sit. Illud (pestilens sc.) contra multo tenuius, acrimus, eiusque vis ac efficacia ea, ut non modo emdepudat, sed & cutem ipsam, quantumvis validam ac densam, ocysimè permeet, penisque intro subeat.*

Verumenimvero hæc nostræ sententiæ parum officiunt. Si enim quædam inter hæc venena differentia, & concedamus, quod libenter facimus, tamdiu, quamdiu canis rabiosi venenum pestilens in corpore latere non possit: interim ex his nullo modo sequitur, quin pestilens non dies aliquot occultari in corpore possit. Est nimirum venenorum in agendo efficacia non eadem; tum etiam patientis nunc minor, nunc maior ad resistendum vis. Stet itaque hoc adhuc firmum, si alia venena, atque inter ea venenum rabidi canis, quod non minus, quā pestilens, homini lethale est, latere potest: aliquandiu & pestilens delitescere posse, non impossibile est. Neque idē tamdiu in corpore latet venenum canis rabidi, quod calore natui copioso demum exciretur, sed, ut ex Galeno dictum, ab exiguo initio, spuri scilicet rabidi canis prauā qualitate, praua quædam in corpore dispositio sensim augeatur, tandemque ad excellentem magnitudinē exurgit. Ita etiam si semen pestilentia in corpus assumptum non satis forte & efficax sit, corpusque resistendi magnam vim habeat, impossibile non est, venenum illud pestilens quasi occultum latere, sensimque humores corrumpere, tandemque, ubi incrementum accepit, vim suam pestiferam prodere.

Ut verò ex his manifestum euadit, non impossibile esse, venenum pestilens aliquandiu in corpore humano delitescere posse: Ita non pauca sunt, quæ satis docent, sæpius hoc ita contigisse. Nam non raro accidit, ut peste aliquis corripere, qui tamen nullam omnino recentis infectionis causam dare potuit; sed confiteri necesse habuit, semina pestis sese ante plures dies excepisse. Testatur Octavianus Roboretus, *de febr. peticulari c. 9.* sibi hoc Constantinopoli accidisse: & in qualibet pestilentia, ubi causa non primariò est in aëre, sed per contragium

An contragij  
semina qui  
in vestibus  
sine noxa cir-  
cumferre  
possint

An contragij  
aliquandiu  
in homine  
delitescere  
possit

Veneri pesti-  
lenti ali-  
quandiu in  
corpore lat-  
ere docum-  
ta.



gium saltem pestis propagatur, observari potest. Sæpe enim accidit, quopiam in domo aliquâ peste extincto, licet reliqui in alia conclavia fugiant, & omnem suppellectilem, quam infectam esse vel suspicantur, studiosè vitent, nihilominus post aliquod temporis intervallum alium eadem corripit. Imò observatum, cum à me, tum ab aliis certis periodis, nunc 14. dierum, nunc plurium intervallum sese exeruisse hoc venenum. Imò & hoc observatum, quosdam, saluti suæ fugâ consulturos, ex locis infectis in tutiora alia se contulisse, nihilque suppellectilis infectæ secum abstulisse, nihilominus post temporis aliquod intervallum, peste, etiam in locis istis, ubi tunc ea non grassabatur, correptos fuisse.

Neque sententiam nostram inuertit, quod obicitur venenum homini pestilens esse insensibilissimum, & in corpore calido foueri; ac proinde fieri non posse, ut sine damno & manifestâ actionum mox per initia læsione in corpore contineatur. Nam & alia venena homini infecta sunt, & æquè in calido corpore continentur: nihilominus non mox & per initia, ubi vires corpus laceßendi nondum sufficientes habent, homini sensibiliter molesta sunt, sed per cuniculos quasi remagunt, & tandem subito sese produnt. Ita etiam venenum pestilens in corpus receptum, nisi mox vel à calore nostro vincatur, vel per media expellatur, nunquam quidem oriosum est: verum si sit debilius, eius efficacia non mox deprehenditur, sed sensim sese multiplicat, & humores corrumpit, tandemque ubi vires sumpserit, sese prodit; ubi scilicet natura ab hoste iam potentiore laceßita, sese ei opponit & ex pugna illâ veneni & naturæ manifesta in corpore Symptomata excitantur.

*Corpora ad recipiendum contagium disposita.*  
Tertio in contagio perpendendum est corpus, quod illud recipit, seu patiens. Ut enim in aliis actionib. non quodlibet in quodlibet agere videmus: sic & in contagio præcipuè pestilenti, idem accidere animaduertimus. Nam non omnis pestis omnibus animalibus contagiosa est, sed quæ ex homine in homines derivatur, eadem non sues & boues inficit, & contrâ. Et à peste, quæ hominibus contagiosa est, non omnes eodem modo lædi videmus. Et si enim tanta veneni pestilentis in agendo sit potentia, ut nemo ab eo sibi immunitatem facillè polliceri queat, atque id omnis generis corpora omni loco & tempore inficiat, iuvenes, senes, viros, feminas, sanos, ægros; vere, ætate, autumno, hyeme; in locis calidis & frigidis: tamen corpora alia faciliùs, alia difficiliùs id admittunt. Animaduersum enim est sapissime, nonnullos leui de causâ, & cum vix cum vno infecto obiter conuersati fuissent, infectos fuisse, alios verò infectos & viuentes & mortuos plurimos tractasse, nihilominus à peste immunes euasisse.

*In quo consistat.*  
Causam huius rei non omnes reddunt eandem. Plerique omnes dicunt hoc fieri ob peculiarem similitudinem & ἀναλογίαν, quam habeat contagium cum corpore, quod inficitur; cum simile facillè simile recipiat, & similia promptè iungantur. Verum hæc opinio veritati consentanea non est. Omnis enim actio est inter contraria: & agens, dum agit in patiens, agit in illud, ut id sibi simile reddat. Et quamuis similia faciliùs coniungantur: tamen eo fine fit id, ut vnum ab altero conseruetur; quod in contagio locum habere non potest, ubi corpus, quod inficitur à contagio, ut sibi simili & amico, non conseruetur, sed ut à contrario corrumpitur & destruitur. Octavianus Roboretus ergo, lib. de febr. peticulari, cap. 9. aliter rem hanc explicat, docetque in contagio tria reperiri. 1. terminum à quo, seu corpus, quod primò infectum est, atque alia rursus inficit; 2. terminum ad quem, seu corpus quod per contagium inficitur; 3. Ipsum affectum, qui per contagium communicatur. Similitudinem igitur in contagio qui-

dem concedit; sed non inter contagium & patiens, quæ potius dissimilia & contraria, quam similia statuit: verum inter terminum à quo & inter terminum ad quem, seu inter corpus, quod primò infectum fuit, & illud quod deinde inficitur; existimaturque, affectionem præter naturam, quæ vni alicui corpori facillè communicatur, alteri quoque, priori simili, facillè communicari posse: rationemque hanc addit; quia sicut affectio illa præter naturam priori est inimica, ut illud lædere possit, ita alteri priori simili quoque erit aduersa, & proinde æquè illud lædet.

Quam opinionem ut non reprehendimus: cum veræ sententiæ fundamentum contineat: ita non proximam huius rei causam explicare putamus. Nam etsi verum sit, quod contagium, quod aliquod corpus primò inficit, alteri quoque huic simili faciliùs, quam alteri dissimili, communicari possit: tamen cum, ut antè dictum, actionis fundamentum non in similitudine, sed in contrarietate consistat, omnisque actio contrarietatem præsupponat: quaeritur porro; Cur hoc contagium vtrumque horum inficiendi vim habeat & non alia diuersa, v. g. Cur pestis hæc tantum homines, & non simul boues iugulet; Et cur eadem illa inter homines non omnes eodem modo inficiat. Hic verum est illud, quod addit; quod affectio præter naturam, quæ priori ita contraria fuit, ut illud potuerit lædere, alteri quoque huic simili aduersa futura sit. Atque ita actio in contagio potius à peculiari ἀναιδία, quam similitudine cum patiente erit petenda. Nam cum, sicut se duo similia habent ad aliquod tertium, ita illud tertium habeat se ad vtrumque illorum: sic contagium, dum corpora duo æquè inficiendi vim habet, non solum necesse est, ut duo illa corpora inter se similitudinem habeant, sed & hoc requiritur, ut contagium vtrumque æquè inficiendi potentiam oblineat: id quod pender à peculiari ἀναιδία, quam certa venena habent ad certa animalia, & animalium partes, de quo supra dictum. Ut enim non quodlibet venenum cuilibet animali venenum est: ita etiam res contagiosa non omnibus contagiosa est.

Sicut verò nemo facillè explicauerit, quæ sit pestilentis veneni ratio & essentia, & vnde eius differentia pendeant: ita quoque nemo facillè explicauerit, in quo ἀναιδία hæc veneni pestilentis cum certis animalium speciebus & specierum indiuiduis consistat. Hoc quidem certum est, in manifestâ aliquâ qualitate eam non esse quaerendam: quæ tamen sit illa occulta qualitas, cur pestis hæc huic saltem animalium speciei sit aduersa, & non omnia eiusdem indiuidua æquè inficiat, in hac naturæ caligine, & formarum ac qualitarum occulrarum inde pendentium ignorance, obscurum est.

Vnde omnino frustra laborant ii, qui in caliditate, frigiditate, humiditate, siccitate, ætate, sexu, pororum amplitudine, vel angustia, corporum puritate vel impuritate, illam dispositionem quaerunt. Hoc quidem verum est, eos, qui quocunque modo ad putredinem aptiores sunt, grauius ac periculosius febre affici: ad pestem verò recipiendam talia facere, experientia non consentit.

Itaque existimamus, dispositionem illam nihil aliud esse, quam peculiarem aliquam cordis proprietatem, cuius ratione veneno pestilenti repellendo minimè par est. Neque enim pestis admittitur, antequam cor de naturali statu deiciatur. Observatum enim est, multos, cum impune cum plurimis peste infectis, cum quibus sanguinis nexu deuincti non erant, conuersati essent, postea ex leui cum aliquo sanguine iuncto conuersatione infectos fuisse. Quæ autem illa sit in corde dispositio, explicare facile non est. Si pestilentis veneni ratio, atque

inprimis antidotorum natura nobis nota esset, & verbis commodè explicari posset, facillimum esset, explicare illam ad pestem recipiendam dispositionem. Alexipharmaca enim illa opponuntur morbo; naturæ verò amica sunt. Talis itaque dispositio in corde eius, qui pesti resistere possit, esse debet, qualis in alexipharmacis est: Illà verò facultate qui destituitur, facile venenum admittit, & peste corripitur, ac nisi antidotis ipsi succurratur, veneno succumbit & moritur.

Addimus tamen & hoc, quod, cum illa venenata qualitas non sine subiecto è corpore infecto in aliud transferatur, facilius sese insinuabit, eundemque effectum edet, si in corpus analogum & simile recipiatur: vnde accidit, vt consanguinei facilius, quàm alij inficiantur, & sæpe integræ familiæ pestiferà luc delectantur: obseruatumque est, multos, cum impune cum multis peste infectis, quibus sanguinis cognatione deinceps non erant, conuersari essent, postea à consanguineo aliquo infecto leui occasione infectos fuisse. Nam cum consanguinei similem quandam naturæ proprietatem habeant, accidit, vt pestilens venenum, quod vni noxium est, alteri etiam sit aduersum.

Sunt tandem & alia quædam, quæ vt pestis facilius in corpus admittatur, faciunt. Cum enim aërem, in quo dispersa continentur pestilentia semina, per os & nares attrahamus, & inde ille per trachæam arteriam in cor admittatur; ac per externa etiam corporis spiracula seu poros ad arterias via pateat: ij, qui quacunque de causâ copiosius inspirant, vt sit post magnum motum & exercitia, quique poros cutis habent amplos & patentes, facilius semina pestilentia & in aëre & in fomite aliquo hærentia admittunt. Quæ verò de regione & tempore anni dicuntur, quod scilicet loca maritima, austro obiecta, calida & humida, peste magis infestentur, & magis circa finem æstatis & autumnum eadem grassetur: illud potius ad causas pestem generantes, quàm dispositionem in corpore ad pestem suscipiendam pertinet.

Cur nonnulli  
cum peste in-  
fecti sine pe-  
riculo conuer-  
sentur.

Hoc loco illud meritò explicandum est: Quæ fiat, quod nonnulli, inprimis vespillones, Chirugi atque alij, qui ministeria sua peste infectis destinant, sine vilo damno cum innumeris ferè peste infectis conuersentur. Sentiant hac de re alij aliter. Nonnullis, à quorum sententiâ non alienus est Alex. Massariæ, tota hæc res suspecta est, dubitantque ij, an ita sese habeat, vt scilicet isti, tanquam caduceatores, incolumes inter pestifera tela versari possint. Verum quidem est, plurimos ex hoc etiam hominum genere (cum non pauci, parum ad resistendum huic veneno apti, luci & rapinæ auditate, huius generis seruitia aliis locent) interire: obseruatum tamen etiam est, plurimos in plurimis pestilentis sine vilo damno ægris plurimis ministrasse.

An idem ho-  
mo bis peste  
corripitur.

Massariæ hanc causam affert, quod plerique antea peste laborarint: neminem autem bis pestilenti affici morbo. Verum falsa hæc sunt. Primò enim dubium est, an omnes illi vespillones, Chirugi & similes peste laborarint. Deinde experientia sæpius testata est, nonnullos non solum bis, sed & ter peste laborasse; imò nonnullos cum primò euassent, iterum peste correptos, mortuos esse.

Alij in nescio quæ secreta remedia, quibus instructi illi sint, causam huius rei referunt. Verum vnde illi rudes plerique homines habeant illa secreta remedia, quæ Medici diligentissimi summo labore consequi non potuerunt? Cum prudentissimi Medici fateantur, verum & specificum pestilentis veneni remedium homines latere. Et sæpe compertum, secreta illa remedia, à talibus hominibus aliis communicata, parum ipsis profuisse, & paucos à talibus hominibus interdum sanari.

Probabilius igitur hac de re statuunt; qui docent, in quibusdam indiuiduis esse peculiare corporis atque cordis dispositiones, qualitatesque occultas, quibus pestilenti veneno resistere possint. Etsi enim istas occultas proprietates cum alij, tum Alex. Massariæ, reiciat, & dispositionem ad pestem facilius vel difficilius recipiendam referant in corpora, quæ modò excrementis referta sunt, modò iisdem libera: tamen experientia testatur, vespillones illos, & alios huius farinae homines, præ aliis corpora puriora non habere, sed sæpe vitiosis humoribus scatere, crapulæ, ebrietati, aliisque, quæ vitiosos humores cumulant, deditos esse. Et dari tales naturas, quæ peculiare venenis quibusdam resistendi vires habent, sæpe obseruatum est. Et purgantia saltem remedia id satis ostendunt, quæ sine vilo incommodo in eâ copiam, quæ omnem dosim vulgarem excedit, assumpta à quibusdam fuisse Medici annotarunt. Narrat. Ant. Musa Brasauolus, de simpl. medic. examine pag. 459. se vidisse quendam in officina Iacobi à Columna Pharmacopolæ, qui drachmas duas scammonii præter noxam comedit, quater vel quinquies aluum deiciens. Et Fallopius, de simpl. remediis purgant. cap. 48. scribit, se vidisse Ferrariæ Germanum Scholasticum, qui in Apothecâ à pineâ accipiebat vnciam vnam scammonii, & non soluebat. Talis ergo & veneno pestilenti resistendi vis in quibusdam indiuiduis esse potest.

Etsi verò tanta contagij pestilentis vis sit, vt nemo ab eo immunitatem sibi facile polliceri possit: accedere tamen huic, de qua diximus modò, causæ quæ adhuc possunt. Primò animus præsens, & qui nullo periculi metu terreatur, quem in præseruatione à pestilentia, si quid aliud plurimum posse, ipsa experientia docet. Deinde consuetudo quædam, dum tales homines ex crebra cum ægris conuersatione veneno pestilenti quasi affuescunt. Atque id planè impossibile non esse, alia venena docent. Nota est historia de elegantis formæ puellâ, quæ veneno nutrita Alexandro Magno dono missa est. Et Cælius Rhodigin. lib. 11. lect. antiq. cap. 15. narrat, Coloniæ Agrippinæ puellam fuisse, quæ araneas, in quas incidebat, sine omni damno deuorauit. Et de anu quadam Atheniensi refert Galenus, lib. 3. de simpl. med. fac. cap. 18. quæ ab exigua cicuta portione auspicata nullo detrimento ad magnam progressa est copiam.

Ex his, quæ hætenus dicta sunt, facile est colligere, Quænam sint contagij differentiæ. Plerique Medici, Fracastorium secuti, triplex contagij genus statuunt, docentque, alia inficere solum per contactum; alia per fomitem; alia nec contactu solum vel fomite inficere, sed etiam ad id, quod distans est, contagium transferre. Atque ita triplex contagium esse; per contactum, per fomitem, & ad distans. Verum non rectè opponitur contagium ad distans ei, quod per fomitem sit, cum & quod per fomitem inficit, res longè distantes inficere possit, & in loca longè distata transferri queat. Sed vtrique opponitur contagium per contactum, & in vtroque hoc contagio, sine contactu corporis contagiosi, per *μυσμα* & *καρπὸν πνέον* affectus præter naturam transferri potest. Modus saltem diuersus est, & vehiculum semini non idem, nunc scilicet fomes aliquis, nunc verò aër saltem.

Commodius igitur contagium diuidi potest in duo genera: in contagium immediatum, seu quod per contactum solum inficit, & contagium mediatum, seu ad distans. Immediatum, seu quod contactu tantum inficit contagium est, quando per mutuum corporum duorum contactum affectio præter naturam ab vno alteri communicatur. Atque ab hoc appellatio desumpta, cum sc. corpus contagio

Contagij dif-  
ferentia.

Contagium  
immediatum.

contagiosum aliud corpus, quod inficitur, immediate corpore suo tangit. Huius contagij seminaria in crassiore resident materia, & solum per sudores & fordes corpori adherentes alteri corpori communicantur, nec tam potentia sunt, ut sese longius diffundere possint. Contagium verò mediatum seu ad distans est, quando, aliquo interueniente, duo corpora sese proxime non contingentia se tangunt, & per effluuium quoddam seu *μυσμα* affectio præter naturam à contagioso corpori sano communicatur. Hic enim causa contagiosa tam potens est, ut corporum contactum mutuum non requirat, sed subtile ac spirituale aliquid de se emittit, per quod corpora, quæ id excipiunt, inficiuntur, similèque labem contrahunt. Ideoque, ut supra dictum necessarium est, ut *μυσμα* illud fortem & solidam compositionem habeat, ut sese aliquandiu integrum conseruare, & tandem in corpus viuens receptum vires suas adhuc integras exercere possit.

Hoc autem fit duplici modo: vel enim *μυσμα* in fomite aliquo, quem appellant, ut lanà, lino & reliquis, quæ supra explicata, recipitur; vel in aërem solum dispergitur, & per eum in alia transfertur. Vbi per fomitem contagium communicatur, spirituosum illud, aut corpuscula illa insensibilia & visum effugientia se in poros rerum aliarum insinuant, tandemque excussa aliis viuentibus communicantur. Nonnulli putant semina illa facilius lædere, si insectorum manibus res illæ, quæ fomitem præstant, fuerint pertractatæ. Verum cum halitu viuentium & iam morientium, & per poros aliarum partium æquè *μυσματα* illa hinc inde dispergi, & à fomite etiam ab ægro nonnihil remoto recipi possunt.

Hoc contagium mediatum an per eadem principia ac causas fiat, à quibus contagium per contactum immediatum, nonnulli dubitant, & sunt aliqui, qui hoc per substantiam quandam communicaram; contagium verò, quod ad distans, per species immateriales, aut qualitates solum fieri statuunt. Verum enim uerò, etsi contagium per contactum immediatum à materia crassiore, quæ humoris aut ichoris formam habeat, fiat: reliqua tamen contagij genera, siue per fomitem, siue per aërem transferantur, non solum in qualitate consistere, sed & ipsa substantias esse statuendum; cum accidens non agat, nisi vi substantiæ; qualitatèque substantias præsupponant, & suis subiectis insint. Itaque hac quidem in parte nulla est inter contagij species differentia: nisi quod immediatum corpus crassius; mediatum & ad distans subtilius corpus participet, & spirituale sit.

## CAPVT IV.

## De Signis Pestis.

**P**orro cum Medicus non eo fine de pestis natura tractet, ut quid Pestis sit, sciat, sed ut imminetentem præcaueat, & præsentem tollat; id verò præstare non possit, nisi & imminetentem præuideat, & præsentem agnoscat, & quid de euentu sperandum sit, sciat: necessarium est, signa pestilentia tum imminetentis tum præsentis tradere, & quid de euentu sperandum sit, docere.

## Signa diagnostica.

*Signa pestis imminetentis.* Petuntur autem pestis imminetentis signa primò à causis, quæ pestilentiam generare solent, seu præfentes sint, seu præcesserint. Inter quas cum primo loco posuerimus contagium, pestis meritò metuenda est, cum in vicinis locis grassatur; quæ, nisi diligenter præcaueatur, per aërem & ventorum flatus, per commercia & varios fomites in vicina loca

deriuari potest: atque tunc quilibet illud sibi dictum existimet.

*Tunc tua res agitur, paries cum proximo ardet.*

Quid & quantum Astrologi ex vario stellarum positu & aspectu, ex eclipsibus, Cometis & similibus de peste futura prædicere possint; ipsorum arti permittimus: hoc loco signa, quæ ex causis inferioribus petuntur, persequamur.

Si causa, quæ aërem inficere possunt, præcesserint, tetri nimirum vapores è terræ cauernis exhalauerint, terra mouerit, maligni vapores in nubes densari, iterumque delapsi lata, arbores, herbasque infecerint & corruerint, cadauera hominum plurima infepulta, vel etiam locustarum iacuerint, similèque quas antè recensuimus, causæ præcesserint pestem imminere meritò quis suspicabitur. Idem ex annonæ caritate, prauorumque ciborum usu vulgò frequentato colligitur, adeò ut Prouerbio feratur; *μὴ λίμνη λουμὸς*.

Verum cum pestilens venenum occultum sit, & causæ illæ, quæ pestem inferre dicuntur, occulto modo id faciant, obseruatumque sit, post hyemem etiam asperissimam secutam pestem in æstate, & ad tempora anni valdè sicca & æqualia pestem ortam esse: rectè à Fernelio dictum est, 2. de abdit. rer. caus. cap. 12. atque experientia etiam id testatur, pestilentiam plerumque adeò obscure, & furtim inuadere, ut sensu internosci, causarumque eam producentium vis primò vix deprehendi possit, & pestilentia semina adeò esse occulta; ut nos fugiant, inopinataque feriant, nec nisi effectis & euentis deprehendi possint.

Quapropter secundo loco ex effectibus ferè petita, & quæ, cum pestilens venenum sese exercere incipit, apparere solent, signa subjungemus. Imminetentis nimirum pestis indicia sunt, si fungorum, boletorum nimia est copia; si plantæ marcescunt, putrescunt, & in herbâ quasi suffocantur; si vermium tinearumque copiæ eroduntur; si ranarum, bufonum, muscarum, araneorum, papilionum, blattarum, locustarum, erucarum, scarabæorum, atque similibus reptilium & insectorum soboles frequentior est; si aues nidos & pullos deserunt, aëremque salubriorem quærunt; si talpæ, mures, & quæ in cauernis terræ delitescunt animalia, cubilia & sua latebras deserunt; si pisciculi vel ranæ extinctæ vel exanimes aquis supernatare conspiciuntur; si oues, sues, boues passim pereunt. Etsi enim pestis illa, quæ boues vel sues enecat, rarò hominibus exitialis sit: tamen venenum illud pestilens tandem ad eam sæpe malignitatem peruenit, ut hominibus etiam noxium sit. Idem & hæc indicant: Si panis aëri nocturno sub dio expositus mucetcat facili; si carnes breuiore, quàm fieri assolet, tempore corrumpantur ac putrescant, si prægnantes leuissimâ ex occasione frequenter abortiant. Ista enim omnia indicant, halitus venenatos & malignos vel è locis superioribus in hæc inferiora demitti, vel ex terræ cauernis, vel ex aquis exspirare: qui paulò post pestilentia causæ enadere possunt.

Atque jam malignitatem in corpora humana serpente argumento est, si *ἐξανθήματα* & *ἐκθύματα*, variole atque morbilli, non modò infantes, sed & adultiores corripunt, pluresque interimunt; si anthraces & carbunculi frequentius erumpunt. Dictum enim supra est, pestilentiam esse summum corruptionis humorum gradum, atque eam alios morbos, in quibus minor humorum corruptio, insequi. Et præcipuè morbi Epidemij, utpote causam communem habentes, in pestilentiam tandem degenerant, compertumque, non solum post febres petechiales, variolas & morbillos, sed & post dysenterias & pleuritides epidemias tandem pestem secutam fuisse. Quod enim diutius humores vitiosi in corpore latent, eò magis corrumpuntur & perniciosiores fiunt. Atque quò signorum istorum; de quibus pluribus agit Ant.



Ant. Gallus de peste fascic. 3. à cap. 9. usque ad 17. plura cōcurrunt, & quod grauiora ac vehemētiore sunt, eō magis calamitosius ac pestilens annus metuendus est.

Pestis signa.

Signa diagnostica quod attinet, etsi, vt modò dictum, pestis sine febre quandoque reperiatur: tamen cum frequenter ei febris coniungatur, symptomata, quæ à veneno pestilenti prodeunt, cum symptomatibus, quæ à putredine dependent, permiscentur, & ita pestilentia signa non rarò obscurantur. Quapropter laborandum, vt pestis signa seorsim cognita habeantur.

Primo autem hoc monendum, pestem, cum iam plures occupat, & per oppidum vel regionem aliquam dispersa est, non difficulter agnosci; inprimis cum morbi, qui cum pestilentia aliqua signa communia habent, omnes ferè tum cessent. Verum antequam peste plures inficiantur, vix vllum pathognomicum signum, etiam è pluribus collectum, datur, è quo quis primum illum, qui peste corripitur, peste laborare cerò affirmare possit. Nam licet, vt iam dicitur, à pestilentis veneni naturà desumpta signa inseparabilia sint, quòd scilicet pestis pleròque ex iis, quos corripit, jugulat, & summè contagiosa est: tamen hi effectus deprehendi non possunt, dum malum in vno saltem latet; sed tum demum deprehenduntur, vbi in plures sese diffundit. Reliqua verò signa omnia ferè etiam in aliis, & præcipue febribus malignis dictis, reperiri possunt. Hinc legimus interdum præstantissimos Medicos de morbis talibus dissensisse. Id quod accidit in peste, quæ Anno 1576. Venetias & Patavium infestauit. Nam, vt in libro de verà curandi bubonis atque carbunculi pestilentis ratione, Ioh. Baptista Gemma, & alij etiam Medici referunt, qui in Patavinà Academià tum temporis primum locum obtinebant, Medici constanter affirmabant, eos tumores, qui à principio circa emunctoria conspiciantur, non esse pestilentes; cum nulla pestilens aëris constitutio animaduertetur: Alij contrà assueverant, à Tridentinà peste, mediante contagio, Venetias pestem fuisse translata, & tumores hos omnino pestilentes esse: quod & euentus comprobauit, & Hier. Mercurialis, de peste, c. 4. defendit. Ita idem Gemma refert, Græcij Styrorum, an. 1589. controuersiam de iuvene quodam ægrotante exortam fuisse inter Medicos Archiduciales, cum alij eum peste laborare affirmarent, alij negarent: Euentus tamen postea docuit, peste eum infectum fuisse.

Vbi verò pestis iam in aliquo loco grassari & in plures se diffundere incipit, sequentibus signis non difficulter ita agnosci potest. Imò si in pluribus locis pestis grassetur, & pleraque illorum in aliquo conspiciantur, etsi nullus adhuc eo loci peste interierit: non leuis suspicio pestis tunc præbetur. Et præstat tum nimis cautum & suspicacem esse, quàm temerarium; cum nisi talibus morbis in principio obuiam eatur, facillè se in plures diffundant.

1. Pestis plurimos, quos corripit, interimit.

I. Itaque cum pestis venenata, maligna atque tota substantia cordi inimica naturà agat: Signum pestis proprium & inseparabile ab ejus essentia desumptum est, quod multos inuadit, & pleròque ex iis jugulat. Quod nos docet Hippocrat. qui 3. epid. com. 3. t. 22. dum eos morbos, qui tum grassabantur, pestilentes fuisse, monstrare vult, ita scribit: *Ex qualibet morborum, quæ supra recensuimus, specie, complures ægritabant & moriebantur. Quæ verba Gal. ita interpretatur; cum dicit; & complures moriebantur; pestilentes fuisse morbos, qui vagabantur, demonstrat.*

2. Pestis est contagiosa.

II. Eandem causam sequitur contagium; morbi que pestilentes ab vno in alium per contagium facillè deriuantur. Inseparabile tamen hoc signum solum est, non proprium, & quod non soli conuenit. Etsi enim omnes morbi pestilentes contagiosi sint: non tamen quicquid contagiosum est, etiam pestilens est; aliique

morbi contagiosi dantur, qui pestilentes non sunt.

III. Etsi plurima in peste in omni genere symptomata appareant: tamen cum venenum pestilens inprimis cordi aduersetur, & pestilentia cordis morbus sit, inprimis virtus vitalis, plusquam in vlllo alio morbi genere, languescit; acceditque cordis palpitatio, lipothymia, syncope, & omnino summa angustia, ob quam quiescere nequeunt, sed de latere in latus corpus volunt, sapiusque situm mutant. Et quidem hæc virium defectio sit nullà præcedente manifestà causà, non ali-quà insigni euacuatione, non vigiliis, non doloribus, aliisque, quæ vires frangere & labefactare solent.

IV. Ex illa ipsa causà etiam pulsus fiunt parui, languidi, frequentes & inæquales. Cum enim alteratio à qualitate maligna adhuc in fieri est, & pugna inter causam venenatam & naturam; interdum pulsus fiunt magni & celeres; mox iterum obscuri atque intercedentes. Vbi verò venenum vires sumpsit, & cor expugnauit, pulsus fiunt parui & languidi: frequentia tamen aliqua, vtpote quæ facilior est, seruatur, nec non aliqua velocitas. Postquam autem venenum planè jam inualuit, velocitas & ipsa aboletur: etsi propter paruitatem & frequentiam falsam celeritatis speciem præ se ferant. Ex quo patet, solam frequentiam harum febrium esse propriam: Major enim est, quàm pro ratione aucti caloris.

V. Si morbus aliquò vsque protrahatur, nec mox veneni vehemētià vires prosterantur, venenum sese penitus in humores & corpus insinuat, ac labes serpit, humoresque putrescunt ac corrumpuntur, atque omnis generis morbi & symptomata inde excitantur, inprimis verò febris. Hæ febres etsi semper non sint ejusdem generis, sed sæpe pro rei occasione extrà & intus ardentes: pleræque tamen extrà sunt mites. Imò nares, aures & extrema pedum nonnunquam ad tactum non sunt calida, vel saltem, non vt aliæ partes, calent: intus maximus sentitur æstus, ita vt neque vestimenta & lintea sibi injici pariantur. Vnde de peste Atticà refert Thucydides, jucundissimum fuisse pluribus, in gelidam aquam se conjicere, multosque quibus custodes defuissent, in puteos sese præcipitasse.

VI. Ex istà humorum corruptione plerumque exanthemata rubra, pallida, nigra, aliorumque colorum, bubones & carbunculi apparent. Atque hoc loco prætereunda non est, sed discutienda quæstio; An tumores isti, bubones scilicet & carbunculi, perpetuò pestis signa sint. Quod cognitum quidem habere utilissimum est, ne Medicus hac de re consultus pestilentia suspitione aliquos prægrauet; aut ex alterà parte in culpa sit, vt pestis, quæ diligenti adhibita præcautione præcaueri posset, disseminetur; inprimis cum non omnium eadem hac de re videatur esse sententia. Nam refert Ioh. Baptista Gemma, in Italià & Venetiis potissimum sæpissimè grassari febres lenticulares vel particulares, nihilominus Medicis non interdici, vt eos visitent, sed cum apparere incipiunt isti tumores, tum domos ægrotantium claudi, & non solum Medicis sed & aliis prohiberi sub capitali pœnà, ne tales ægrotos visitent. Contrà certum est, bubones omnes pestilentes non esse, neque etiam carbunculos: etsi hi sine malignitate vix reperiuntur.

Ex hac re vt nos expeditamus. Primo hoc sciendum, de bubonibus quidem rem esse expeditiorem. Qui enim bubones pestilentes non sunt, neque lethales existunt, neque grauiora, qualia in peste conspiciuntur symptomata conjuncta habent. Et licet interdum in principio Erysipelatis, Rosam vulgò vocant, antequam natura materiam ad pedes protrudat, primum in inguine indicia bubonis, cum suspectis quibusdam symptomatibus, appareant: tamen paulò post, erysipelate sese prodente, etiam pestis suspicio tollitur.

Carbunculi verò cum omnes maligni sint, & periculo non careant: quatenus pestilentia sint indicia, magis

3. Pestis vires subito præsternit.

4. Pulsus in p.

5. Febris.

6. Exanthemata, bubones, carbunculi. An bubones & carbunculi pestis signum sint perpetuum.

Bubones non pestilentes.

Carbunculi non pestilentes.

*carbunculi  
pepiliensis.*

Non in om-  
nibus peste  
infectis appa-  
rent exan-  
themata, bu-  
bones, car-  
bunculi.

Animalis  
facultatis  
lase Sympto-  
mata in pe-  
te.

Naturalis  
facultas  
symptomata

Confluente etiam materiâ prauâ ad ventriculum, & à malignitate virtute naturali ferè extinctâ, ventriculus valde labefactatur, vnde in nonnullis accidit inappetentia, nauſea, vomitus & ſimilia mala.

*Symptoms in excretion.*  
*Urina.*

**Sudor.**

Alui deie-  
die.

*In mortuis  
pestis signa.*

Hoc tandem monendum, non necessarium esse, ut hæc signa, quæ iam recensuimus, & passim à Medicis & Thucydide in peste Atticâ & graphicè à Lucretio, lib. 6. describuntur, in qualibet peste omnia appareant, sed nunc hæc, nunc illa, nunc pauciora, nunc plura, pro veneni pestilentis & corporis, quod inficitur, ratione apparent.

## Prognostica.

## Prognostica.

Quantum verò ad Prognostica attinet; si vllò in morbo verum est, quod Hippocrates, 2. aph. 19. scribit: *ἢ ὁ ζῶν νοσημάτων ἐν πάμπαν ἀσφαλές αἰ ποδὶ ἀπορρίπτει, ἢ τὸ πρὸς τὸν θάνατον, ἢ τὸ πρὸς τὴν ὑγίαν*: id in pestilentia verissimum est. Nullus enim morbus homines magis ex insidiis aggreditur, & dum maximè blanditur, maximè nocet; & tæpe, cum omnia rectè se habere videntur, mors insperatò occupat: contra quì sæpe mortis addicti videbantur, præter spem euadunt.

Aliquam tamen de futuro hinc coniecturam sumere licet. Aegrum euasurum spes est, si tumores subito & confestim erumpant; & ad locum non periculosum; atque post eorum eruptionem symptomata remittant. Etsi enim tumores magni magnam veneni copiam significant: tamen simul interiorum principumque partium, & expellentis facultatis ac naturæ magnum robur significant; atque indicio sunt, vix aliquid materiæ venenatæ reliquum esse, quod non à naturâ victum fugatumque sit. Ita & minus periculum significant bubones plures, modò promineant, atque ad suppurationem mox tendant, si exanthemata sint boni coloris, atque itidem cum symptomatum remissione: si medicamenta, eaque recta & tempori vsurpentur; neque vomitu reiiciantur: si cibi item & potus non euomantur: si per sudores materia discutiatur.

Contrà verò periculum summum adesse, mortemque adeò imminere significatur: si tumores tardius erumpant, minoresque sint: si carbunculi cordi proximi sint, aut guttur occupent: si tumores iterum delitescant, atque ad interiora materia recurrat. Est etiam obseruatum, carbunculos plures paucioribus esse periculosiores; cum contrà in bubonibus se res habere credatur. Si alienatio mentis continuò perseuerauerit: si conuulsio, perpetuæ vigiliæ, coma, si post somnum labor adfuerit: si æger omnia fœtere dixerit: si tremor cordis & animi deliquia adsint: si vomitu omnia reiiciantur: si extrema frigeant: si sudor sit frigidus. Si aluus varia, nigra, fœtida reiiciat: atque ita si alia symptomata enumerata pejora & vehementiora apparuerint: plerumque ægri moriuntur.

Siue autem ad salutem siue ad mortem terminetur pestis, morbus acutus est, & præcipuè quando lethalis est, hominem citò iugulat, nunc 24. horarum spatium, nunc die tertio, nunc quarto, nunc quinto, septimo, rarius ultra decimum quartum extenditur.

## CAPVT V.

## De Praservatione à Pestilentia.

Qvod circa alios morbos officium gerit Medicus: id vt inprimis in peste diligenter exequatur, operam dare debet. Ideoque non solum in eo occupetur Medici diligentia, vt peste correptos ab eâ liberet, sed & à peste homines sanos præseruet & custodiat. Et proinde nos hoc loco primum de pestis præseruatione, deinde de curatione eiusdem dicemus.

Primo autem cum pestilentia Dei ob scelera hominum irati flagellum sit: eius iræ non thura, non hostias, sed preces & vitæ emendationem opponemus, atque ita sub vmbra alarum eius securi non timebimus à timore noctis; à sagitta, quæ volauerit per diem; à peste, quæ in caligine ambulat; à peste, quæ vastat meridiem. De quibus plura dicere cum Theologorum partes sint: nos nostras hîc agamus.

Tota autem præseruandi ratio in duobus consistit. Primum est, vt causæ illæ, quæ pestem inducere valent, vitentur & remoueantur: Deinde cum causas illas fugere aut tollere non semper in nostrâ sit potestate, & non raro vel nolentibus, vel ignorantibus offerantur,

atque ex improbitis homines adoriantur: vt causarum illarum vis infringatur, & inprimis corpora ad suscipiendam pestem minus apta, ad resistendum verò fortia reddamus, sedulo laborandum.

Primo ergo cum alibi pestis grassatur, omnia cùm eius loci incolis commercia vitanda sunt, nihilque mercium & supellectilis, quod de contagio suspectum sit, importandum. Quod quâ ratione fieri possit, Magistratus est dispicere, & ordinare.

Deinde si pestis alicubi grassari incipiat, cum totius Reipubl. salutem id concernat, cauendum ne in plures disseminetur. Quod sæpe fieri potest, si diligentia, vt par erat, adhiberetur. Itaque si primò vnum vel alterum peste correptum esse constat, infectum cum omni supellectile infectâ & suspectâ extra urbem in locum commodum transferre, atque ibi curare, & mox, cautè tamen, domum infectam, per hos, quibus id officij demandatum est, expurgare, & à contagio pestilenti mundare conuenit. Quod si ob certas rationes & circumstantias (quod tamen commodissimum esset,) fieri non possit, vt æger extra ædes transferatur: ædes illæ occludendæ sunt, vicinisque, ne quid contagij ex domo infectâ hauriant, vt domicilium aliquandiu mutant, mandandum. Et licet ex peste ægri conualescant: ad plures tamen septimanas à conuersione cum sanis arce, & ante sex septimanas ad consortium sanorum non admittendi sunt.

Etsi verò infra etiam, Quâ ratione ædes infectæ mundandæ sint, doceri potest: tamen hoc loco id monstrare placet. Conclauē infectum, patentibus omnibus fenestris, ab omnibus sordibus, & telis aranearum scopis diligenter mundetur, mœsæ & scamna ac reliqua in conclauē supellex aquâ cum aceto acerrimo mixtâ semel atque iterum lauetur. Hinc fenestris clausis suffitus idonei excitentur. Commodum est calcem viuam in conclauē aquâ perfundere, atque eo vix aliud est efficacius. Nonnulli suffitus ex baccis iuniperi, foliis rutæ, quercus, absinthij, quidam etiam ex rebus foetidis, vt cornu hirci & similibus excitant.

Vtilis est hic puluis:

℥. Virioli, nitri, an. lb. ℞. baccar. lauri, iuniperi, an. Vnc. j. ℞. myrrha Vnc. ij. alumin. ℞. ℞. F. Puluis.

Vel aceto rosaceo, rutaceo, aut alio bezoartico aceto lateres igniti perfundantur.

Vel: ℥. Myrrha ℞. i. virioli ℞. iiii. baccar. lauri ℞. i. F. Puluis.

De quo cochlear vnum lateri ignito injiciatur, & affundatur, aliquid de aceto rutaceo, aut rosaceo.

Valde commendatur & iste puluis, & in pluribus pestilentibus constitutionibus ad infectas domos mundandas utilis inuentus est; imò ad domos à peste custodiendas summopere laudatur, si manè & vespere ad suffitum vsurpetur.

℥. Baccar. iuniperi, M. iiii. rutæ, radic. helenij, cortic. exteriorum betule, sabina, cornu hirci, an. M. ii. folior. quercu, myrrha, an. ℞. i. F. Puluis.

Vtilis est & hic puluis ad suffitum parandum.

℥. Myrrha, iburis, sulphur. vini, an. ℞. i. resina, picis nigre, an. ℞. x. baccar. iuniperi, lauri, an. ℞. i. ℞. rad. angelic. valeriana, petasit. Zedoaria, diētamni albi, an. ℞. v. ruta, absinthij, salvia, mentha, ocymi, rosmarini, maiorana, an. ℞. ℞. camphora ℞. i.

Omnibus dilig. puluerisatis. Addè olei spica, ℞. v. petrolei, ℞. ℞. F. Puluis.

Non inutilis est & puluis bōbardicus cautè accesus. Facto suffitu postridie fenestras omnes aperiantur, vt à vento conclauē liberè ventilati & perfari possit.

Nec inutile est, vt suffitus odorati repetantur.

Tandem vtilissimum est, conclauis parietes nouâ calce dealbare.

Vestes lineæ aquâ & lixiuio mudentur. Quæ comode aquæ immergi nō possunt, aëre vtriusque diu exponantur, diligenter excutiantur, & aliquoties suffumigetur.

An



Modum ex-  
plorandi an  
ades perfectè  
purgata sint.

An autem conclaue perfectè ab omni veneno libera-  
tum sit, quidam ita experiri iubent. Panes recentes  
de furno extracti & calentes adhuc in duas vel plures  
partes diuidantur, & hastæ seu perricæ affigantur, &  
in loco, qui infectus erat, 24. horis detineantur. Si  
adhuc venenum in conclauis latuerit, eo temporis spa-  
tio putrescere illum panem dicunt, & propterea postea  
cautè vel aquis immergendum vel altè sepeliendum  
esse.

Aliqui concutere iubent aliquot onarecentia, & in  
conclauis in patellâ posita 24. horis relinquere. Si  
quid veneni superfuerit, intra illud tempus oua cor-  
rumpentur, summumque fœtorem contrahent.

Imò sunt, qui existimant, si inter infectum & sa-  
num oua ita conquassata ponantur, cōtagium non ho-  
mini sano communicatum iri, sed oua illud susceptura;  
atque hoc modo qui peste infectos visitant, se ab eâ  
præseruare posse. Et vt contagium ad adstantes non  
deferatur, vel ædes non inficiantur, nonnulli sua-  
dent, vt morientis ori crusta panis calida vel ca-  
lesfacta imponatur, vt in illum venenum sese infi-  
nuet. Aliqui iubent, vt in ægri mortui cubiculo ali-  
quot vasa aquâ calidâ plena ponantur, vt venenum  
pestilens in illa sese infinuet. Nonnulli in eandem  
aquam M. i. vitriol. & lateres calefactos iniiciunt.  
Aliqui in aquam frigidam vitriol. coniciunt, & hinc  
lateres ignitos toties in eam immergunt vt inde aqua  
valde calefiat.

Si verò, An aliquis peste laboret, adeò planum nō  
sit, vt quamprimum id rectè cognoscatur, laboran-  
dum, & danda diligens opera, ne quid vel per igno-  
rantiam, vel per malitiam occulteretur. Et si quis de  
peste suspectus sit, etsi signa demonstratiua planè  
non adsint: præstat tamen, hac in re nimis cautum &  
meticulosum esse, quàm temerarium. Et cum to-  
tius Reipub. salus hic agatur, est Magistratûs, potius  
de totius Reipub. quàm vnius priuati priuato, quod  
ex pestis diffamatione periclitari posset, commodo  
esse sollicitum; & Christiana charitas in singulis id  
requirit, potius etiam in suspitione pestis saltem ali-  
quandiu se domi continere, quàm vel ignorantia, vel  
remeritate in plures, aut totâ Remp. seu per ignoratiâ,  
seu malitiâ hoc fiat, malum tã perniciosum spargere.

Si vero iam pestilentia in plures disseminata sit, &  
contagium hoc publicè serpat: tutissimum est, si  
per pietatem & honestatem id licet, fugere, & lo-  
cum mutare, iuxta vulgatum versiculum: *Mox longè,  
tardè, cede, recede, redi*. Nisi enim mox is, cui fugere li-  
bet & licet, ex loco infecto recedat, facillè accidere po-  
test, vt etiam inscius cōtagium aliquod recipiat, è quo  
postea in peregrino loco in pestem incidat. Longius  
etiam recedendum, cum in vicina loca contagium pro-  
pagari possit. Tardèque & non nisi omni pestilentia  
metu sublato, redeundum. Qui enim peste nondum  
extinctâ redeunt, magis periclitantur, quàm ij, qui  
nunquam abierunt.

Cum autem omnium rationes non ferant, vt pe-  
stilentem locum cum salubri mutent: quâ ratione hi  
pestem cauere possint, dicendum. Et licet tutum sit,  
omnem cum infectis conuersationem vitare seque  
quantum fieri potest, domi continere, neque po-  
puli cœtibus se immiscere: tamen cum non semper  
integrum sit, omnium hominum consortium fuge-  
re, imò sæpe infecti vel ignorantibus occurrant,  
& facillè fieri possit, vt aliquid, contagij per æ-  
rem dispergatur, & sedulo etiam cauentibus offerat-  
ur: Quâ ratione contra illud se homo munire possit  
diligenter perspicendum.

Hoc autem quicquid sibi primò persuasum habeat,  
post Deum Optimi Maximi, à se aliâ nullâ  
quemquam sibi maiorem securitatem in peste polli-  
ceri posse, quàm ab Alexipharmacis. Ea ipsa nimi-  
rum, quæ pestilentiam curant, ab eâ quoque præser-  
uant.

*Dav. Sennertii Tom. II.*

Itaque nec quæ exsiccant, nec quæ euacuant,  
nec venæ sectio, nec diata immunitatem à peste  
nobis polliceri possunt; cum omnia illa, si quid præ-  
stant, vt mox diceretur, non per se sed per aliud id fa-  
ciant. Sed cum aërem continuò inspirando attrahamus,  
ac cum eo à nescientibus etiam aliquid contagij dis-  
persi attrahi possit: opus est ita corpus roborare, ne  
à pestilenti contagio offendantur. Idque Mithridatis Re-  
gis exemplo, qui crebro alexipharmacis à se nomi-  
nari vsu ita corpus aduersus venena roborauit, vt  
cum vellet postea veneno sibi mortem consciscere,  
non potuerit. Si quis verò, neglectis alexipharma-  
cis, in aliis securitatis spem ponit, is in magno versa-  
tur periculo.

Atque hinc recentiori cuidam Medico per omnia  
assentiri non possum, qui eos reprehendit, qui  
vnum se à peste præseruandi modum, vnamque  
omnibus in vniuersum indiscriminatim periculum  
effugiendi viam monstrare conantur, eâ de causâ,  
quod magna sit temperamentorum diuersitas, &  
quodlibet temperamentum peculiari conditione &  
tractari & conseruari postulet. Et proinde quæ calidis  
naturis commoda existunt, ea frigidas lædere, & quæ  
humidis conueniunt, siccis non profutura scribit.

Verumenimverò concedendum quidem est, in  
medicamentis, quæ à peste præseruandi gratiâ exhiben-  
tur, in qualitatibus primis aliquod esse discrimen, &  
proinde secundum temperiei, ætatis, sexus, anni tem-  
poris, cœli statûs & similibus conditionem, in iis  
exhibendis aliquod discrimen esse obseruandum, atque  
operam dandam, vt cuiuslibet corporis naturale tem-  
peramentum conseruetur & foueatur. Verum quia  
pestilentia non in recessu à qualitatibus primis consi-  
stit, neque alexipharmaca, quatenus talia, primis  
qualitatibus agunt: in hoc vno omnia ista alexi-  
pharmaca conueniunt; quod peculiari ac occulta  
qualitate veneno pestilenti resistunt. Et proinde  
eius qualitatis respectu vnus præseruandi modus est;  
licet inter ista medicamenta ob alias primas & secun-  
das qualitates: pro diuersitate temperamentorum, me-  
ritò quidam delectus haberi debeat & exempli gratiâ,  
tempore hyberno calidiora tutius, quàm æstate,  
vsurpare liceat; quod & de ætate, sexu, & aliis circum-  
stantiis accipiendum est.

[ Pestilentiam morbum occultum, malignum &  
venenatum esse, extra dubium esse puto. Etsi enim  
eam quidam ad qualitates primas reducere conati sint,  
frustra tamen laborarunt. Cum verò alia venena plera-  
que habeant sua peculiaria & specifica antidota, expe-  
rientiâ inuenta & probata, etiam de peste quæritur,  
annon eius venenum peculiare aliquod & proprium  
habeat antidotum. Vt verò status controuersiæ rectè  
formetur, non quæstio est, an à Deo, à quo pestilentia  
sæpe immittitur hominibus, auxilium sit implorandû;  
an causæ omnes, quæ ad pestis generationem & pro-  
pagationem faciunt, sint remouendæ; de quibus su-  
pra dictum; sed de hoc quæstio est, An in natura de-  
tur aliquod seu simplex, seu compositum remedium, quod  
occulta proprietate pestilenti veneno repugnet, vt in  
qualibet pestilenti constitutione ab omnibus, cuiuscum-  
que constitutionis hominibus, tam ad cor contra pesti-  
lens venenû muniendum, quàm ad id expugnandum, &  
e corpore expellendum, tuto vsurpari possit, & in quo homo  
diuina accedente benedictione, certam salutis spem ponere  
queat. De qua re diuersæ Medicorum sunt sententiæ,  
dum alij affirmant, alij negant id, & verique pro sua  
sententia rationes & autoritates adferunt.

Qui affirmatiuam defendunt, primò, adducunt di-  
ctum Syracidæ, cap. 33, vbi scribitur, quod Deus opera  
sua ita constituerit, vt duo sint contra duo, & vnum  
contra vnum. Ex quo concludunt, & pesti contra-  
rium aliquod in natura esse oppositum remedium. Id-  
que porro etiam arguere videntur alia venena, quorû  
singula

Alexiphar-  
maca.

An omnib.  
eadem alexi-  
pharmaca  
conueniant.

An detur  
proprium &  
specificum pe-  
stilentia re-  
medium: si-  
ne,  
An venenû  
pestilentiali;  
eius habeat  
proprium  
antidotum.

Status con-  
trouersus.

Rationes pro  
affirmatiua.

singula ferè habent sua specifica antidota.

Secundò, Dei bonitatè prædicant & obtendunt, qui etiam morbis homines affligit: tamen etiam remedia còtra eisdem benignè concessit, & ita quidem, vt singula propemodum regiones contra morbos, quibus familiariter affliguntur, sua habeant remedia.

Tertiò, nisi certum daretur contra pestilentiam remedium, frustranei & irriti tot Medicorum, Principum & Regū labores fuissent, qui in inuenienda contra pestè remedia tantum operæ, temporis & sumptuum impenderunt. Quantum in eo genere laborauerit Mithridates, Ponti, & Attalus, Pergami Rex, è Galeno, 1. de antid. c. 1. & aliis Autoribus notum. Imò non solum in iis inueniendis laborarūt, sed & inuenta posteris tradiderunt, & Mithridates suæ compositioni suum nomē præscripsit. Et extant aliorum quorundam Græcorum, Nicandri, Andromachi, Damocratis, & aliorum in hoc genere poemata.

Quartò, Et nisi certa haberentur contra pestem remedia, frustra ea contra pestem à Medicis exhiberētur. At non frustra exhiberi ea, experientià constat, quæ docet, medicamentorum ope & multos se contra pestè munivisse, & plurimos ab ea curatos fuisse. Cuius generis medicamenta multa, hocce lib. & in Fascicul. medicam. contr. pest. libris his de febribus adiuncto, & passim apud Autores alios plurima exstant.

Quòd verò tam pauci à peste conualescunt, causam esse putat Fallopius, lib. 1. de decret. cap. 185. non quòd remedia idonea desint, sed quòd non rectè exhibentur, & quòd omnes ab affectis ferè aufugiunt, vel æger planè deseritur, vel cura imperitis barbitonioribus, vel aliis hominibus committitur. Et inprimis pusillanimitatem Medicorum reprehendit Fallopius, qui ob metum peste infectos curandos suscipere nolunt. Cui ferè assentitur Palmarius, qui, in Praef. libb. de Febr. pestil. prolixè hac de re differens videatur.

Contrà alij negant, vllum vniversale & proprium medicamentum contra pestem adhuc inuentum esse. Inter eos est Contr. Gesnerus, qui lib. 1. Epist. ult. scribit: *Remedia certa aduersus pestem nulla habemus. Fortè etiam non placet Deo, vt contra flagellum suum, peccatis nostris debitum, vllum certum presidium habeamus.* Et Ioan. Crato, Ciuis meus, conf. 266. scribit: *Verum pestis antidotum soli Deo notum esse, non est dubium.* & Epist. 131. *Antidotus vera pestilentis veneni in Diuina manu est, nec Medicis explorata.* Et Iul. Palmarius, de febr. pestil. cap. 17. dari quidem in natura pestilentis veneni remedium statuit, & eum, qui pestilentis veneni nulum alexiterium esse contendit, naturalis Philosophiæ principia subuertere scribit, quibus omne ex contrarietate per contraria fieri, humanarumque rerum vicissitudinem atque instabilitatem ex principiorum repugnantia & dissidio pendere constat. Sed alexiterium illud adhuc in naturæ sinu delitescere putat, existimātque, proprium ac peculiare pestilentis veneni alexipharmacum nos ignorare, & verisimile esse, Maiores nostros obscuritate causæ ab eius remedij inuestigatione deterritos, nihil de peculiari pestis curatione litterarum monumentis ex professo commississe, verèdumque esse, ne inscrutabili Dei Opt. Max. consilio nobis illius cognitio denegata sit, vt hoc insanabili morbo, tanquam flagello, in homines animaduertèret. Ideoque nonnulli suadent, & necessarium esse existimant, vt Medici Doctissimi hac in re sua consilia còmunicent, & sua experimenta in commune conferant, ac de cætro contra pestem inueniendo remedio còiunctis viribus laborent. Fr. Vlmus, lib. 3. de occultis in re medic. proprietat. cap. 9. pestis equidem exitium certum esse, remedium tamen nullum inueniri, quod certò seruare possit, scribit, cum venenorum quocunque genus sua peculiaria habeat alexipharmaca, à quibus opportunè adhibitis maligna vis obtundatur

& superetur, & in peste, licet quardam fortassis inueniant incerta tamen sint omnia. Vnde etiam experientissimi Medici sæpe peste tolluntur. De quo etiam Ouidius, *Metamorph. lib. 7. fab. 26.*

*Nec moderator adest, inque ipsos sana Medentes.*

*Erumpit clades, obsuntque Autoribus artes.*

Rationes quod attinet, ex modò allatis prima ratio esse potest, quòd scilicet nulla pestis inuenta fuerit, in qua non plurimi ipsique etiam Medici, licet optima fuerint adhibita remedia, iugulati sint.

Secunda, quòd in remediis non solum ad qualitates occultas, sed & manifestas respiciendum sit. De quo Platerus, *prax. iract. 2.* Quæ assumuntur antidota, cum præter proprietatem illam quæ venenis resistunt, alia insuper sint vehemèter calida, alia minùs, alia frigida potiùs, quàm temperata, habità ratione ætatis & constitutionis, hæc illæue potiùs eligenda, nec temerè quæuis, calidissima illa præsertim, vt euphorbium, & aquæ vitæ quæ sinistrè vsurpatæ aquæ mortis nonnumquam fiunt, iuuenibus potissimum, exhibenda.

Tertia ratio est, quæ ex hac sequitur, quòd, vt Doctissimi Medici censent, nullum sit remedium, quod omnibus anni temporibus & constitutionibus in hoc morbo præscribi possit.

Verumenimurò vt de quæstione hac nostram sententiam exponamus, negatiuam sententiam rectè explicatam pro veriore habemus, atque statuimus, nulum simplex inueniri medicamentum, quod omni pesti propriè & specificè opponatur, & quidè talis in specie; composita verò inueniri quidem contra multa venena vtilia, quæ sæpe etiam in peste profuerunt, nullà tamen ex iis, quod semper vtile, & satis efficax inuentum fuerit, adhuc inuentum esse; idque rationes pro parte negatiua allatæ satis probant, & ex contrariarum rationum solutione & explicatione id magis patebit.

Rationes enim pro parte affirmante quod attinet, & primò dictum Syracidæ c. 33. accipiendum id est saltè de rebus naturalibus, quas ita còstituit Deus, vt certæ inter eas sint sympathiæ & antipathiæ. Et si quis etiam ad venena hæc extèdere velit, mox de eo dicetur.

Secundò Deus equidem, vt ex iustitia sua hominibus morbos immisit, ita bonitate etiam suà contra creauit remedia. Pestis tamen, quia inter eas pœnas est, quibus singulariter ob peccata homines affligere solet Deus, contra eā non tã efficacia & certa, vt contra alios morbos, extare voluit remedia, vt hoc modo homines ad pœnitentiam, & vnus Dei auxilium reuocarentur. Et longè alia est aliorum venenorum, alia pestilentis ratio. Venena reliqua, vt animalium & plantarum, sunt simplicia, & ipsis plantis ac animalibus congenita & ipsis non aduersa, sed homini saltem inimica, & napelli venenum, vt & aspidis, ac serpentis, & viperæ, & scorpionis, & tarantulæ, semper est eiusdem naturæ, ideoque remedium, quod contra aliquod venenum vtile & efficax repertum est, semper contra idem vsurpari potest. Verum pestilentis ratio longè diuersa est, & licet omnis pestis hominem iugulandi vim habeat: tamen qualibet pestis peculiare quid habet; id quod ex generatione eius, symptomatibus, & curatione patet. Etenim pestis, cum sit summus corruptionis humorum gradus, & per varias humorum corruptiones ad eam fiat progressus, vt antea dictum, humorum verò varietas pro ciborum, aëris, constitutionis, & similium sit varietate, non mirum etiam, tandem illum vltimum, ad quem pertingit, gradum, non semper eiusdem esse naturæ, sed, vt rectè scribit Mindererus, de pestil. cap. 3. experientià constat, venenum pestis esse adeò variū & diuersum vt singulæ propemodū pestis sua sit peculiaris iuncta malicia, inferendæ neci sufficiens; quæ tamen cuiuslibet pestis specifica natura sit ignoratur. Equidè nonnulli ad varia venenorum genera differentias illas reducere conantur, dicuntque, venenum pestilentis modò dispadis,

Cur & pauci  
à peste con-  
ualescant, sè-  
rentia Fallo-  
pij.

Palmarij.

Pro Negati-  
ua.  
Autoritates.

Rationes.  
1.

2.

3.

Serètia Au-  
thorū.

Serètia ratio,  
nū pro affe-  
rmatiua.

2.

dipsadit, modò viperæ, modò circutæ, aut alterius veneni naturam æmulari. Sed analogiam quandam talia habent, ipsam pestis naturam, & specificam differentiam non satis explicant. Nimirum, vt Iul. Cæs. Scaliger, exerc. 2. l. 8. sect. 8. ait: Talia sunt hæc, quæ latent animos temperatos, illudunt curiosis. Vnde etiam accidit, vt quælibet ferè pestis sua peculiaria habeat symptomata: Sudor Anglicus auorum memoriâ semel accidit, posthac ampliùs visus non est. Neque etiam è Medicorum & Historicorum scriptis eum antea grassatum fuisse, notum. Hinc tandem etiam euenit, vt non semper eadem remedia in omni peste profint, sed sæpe obseruatum sit remedia, quæ in vna peste multum profuerunt, in altera parum profuisse. Quæ omnia cum ita sese habeant, facillè hinc patet, nullum simplex medicamentum dari posse, quod omni pestilentia aduersetur, sed tutius esse cõpositis medicamentis potiùs, quàm simplicibus confidere, vt pote quæ è variis medicamentis contra varia venena vtilibus cõponuntur & constât.

3. Vnde tertio non frustra laborarunt & Principes & Medici Doctissimi, in componendis variis medicamentis contra pestem. Cum enim viderent, vix vnum simplex medicamentum ad omnia pestis genera sufficere, ex omnis generis alexipharmacis composita quædã adornarunt, qualia à Galeno, in lib. de anti-d. recensentur, & passim extant: & qualia etiam, hoc ipso lib. recensēbimus.

4. Quarto. Neque etiam medicamenta talia frustra exhibentur. Eiusmodi enim medicamentorum vsu multos & pestem præcauisse, & curasse, notissimū est. Hoc tamen certè non diffitendum est talia medicamēta nec votis Medicorum semper respondere. Vnde Iohan. Boerkehus Medicus Hamburgensis, de peste, lib. 1. cap. 1. refert, cum Anno 1565. pestis vehementer grassaretur Hamburgi, accitū Lubeca à Senatu Hamburgensi fuisse Ioh. Paludarium, Virū senem, & Medicum expertum ac in curanda peste felicem, Physicum Ordinarium vrbis Lubecæ, & se coniunctū cum D. Paludario operā sedulo ægris, præsentē etiam, inservisse, & omnē in iis curandis diligentia adhibuisse. Verum eos etiā sæpe mortuos esse, quos conualituros certo sibi persuaserant; atq; ita, quacunque etiam diligentia adhibita, paucos seruatos fuisse, & hinc D. Paludarium in hæc verba erupisse: *Hæc pestis videt nos & pharmaca nostra.*

Interim nec hoc subtrahendum, quod tã pauci in peste conualescunt, non semper medicamentorum, sed sæpe vrentium culpā fieri. Et proinde non negligenda medicamenta, quæ sæpe profuerunt, sed de eorum vsu recto dispiciendum esse. Quod autem finem suum non assequuntur medicamenta, culpā in primis (vt de adstātium imperitiā & negligentia nihil dicā) ægrorum & Medicorum accidit. Primò enim cum vix alius morbus sit, qui citius in corpus penetret, idque de naturali statu deiciat, quàm pestilentia; omnino ei maturè occurrendum. Quod tamen sæpe negligitur, dum ij, qui peste corripiuntur, nescio quos alios morbos primò incusant, & ita necessariā agendi occasione, quæ præceps est, negligunt. Non rarò ægri etiā idoneis, quæ in tēpore exhibeant, & maturè viurpent, medicamentis destituantur, & iis ad quamlibet occasionem instructi non sunt. Et omnino sum in ea sententia, multos, qui peste moriuntur, seruari potuisse, si medicamenta necessaria maturè usurpassent, & quoties opus, repetiuisent. Quamprimum enim quis signum aliquod infectionis percipit, statim, & sine vlla mora alexipharmaca assumere, & sudare debet, atq; ea diei spatio vel ter repetere. Medicorum verò culpā non pauci intereunt, dum (de quo & Fallopius & Palmarius conqueruntur) ægri ignaris & imperitis Barbitionforibus curandi committuntur, qui purgando, venam secando, & alia remedia intempestiue adhibendo, plures ingulant, quàm seruant.

Cum autem Fallopius hinc etiam timiditatem Medi-

Dan. Sennerti Tom. II.

corum accuset, quæritur, an cuiusvis Medici officium sit, peste infectos visitare & curare. Equidem si quis Medicorum eā est confidentia & animo, vt pestem non metuat, & indicia etiam quædam habeat, sibi non facillè à peste periculum imminere, & operam suā ægris peste infectis curandis locare velit, is rectè facit, & si prouinciam hanc in se suscepit, officium suum fideliter facere, & Dei auxilio in viis vocationis suæ confidere debet. Si quis verò minùs animosus, & timidior sit, vel ob alias causas istud munus in se suscipere non velit, nec is culpandus. Cum enim hic morbus longè aliter, quàm alij, comparatus sit, & nullum, vt modò dictum, certum contra pestem remedium vlli Medico adhuc innotuerit, si quis periculo huic, & dubiæ fortunæ sese exponere nolit, is non reprehendendus; cum charitas à seipso incipiat, & quilibet Medicus non minùs suam & suorum valetudinem curare debeat, quàm aliorū. Præterea cum alij etiam ægri, qui peste non laborant, Medico curandi offerantur, eos, si peste infectos visitaret, & cum iis conuersaretur, commodè non curare, sed facillè etiam inficere posset. Ex quo ipso etiam apparet, quod pestis inter pœnas diuinæ sit, vt pote cum De vs etiā necessaria auxilia subtrahit, dum nemo Medicorum sine suæ salutis (quam negligere, temerarium, & in se crudele est) periculo, cum ægris conuersari potest. Quale genus pœnæ olim apud Iudæos & lepra fuit, cum De vs leprosos ab omni aliorum hominum consortio excludere voluit. Equidem apud multas nationes, & præcipuè apud Turcas, nullus metus pestis est, sed sani cum ægris & infectis liberè conuersantur, verum sæpe magno cum suo malo. Cum enim Turcæ, vt Prosper Alpinus, lib. 1. de Med. Egypt. c. 15. refert, sibi persuasum & pro certo habeant, singulis hominibus vitæ finem, mortisque qualitatem, à Deo præstitutam esse, vt in bello moriturum nullo pacto à peste interimi posse arbitrentur: hinc fit, vt pestē planè negligent, nihilque ab ea mali timeant, persuasi, si ab ea vitæ finiendam esse à Deo determinatum sit, eā se nullo pacto effugere; contra, si alius vitæ finis prædestinatus sit, pestem sibi nihil nocere posse. Atque hinc peste Cærum & Egyptum depopulante, nemo eorum fugam arripit, neque cum peste infectis conuersari timet, neque vestibus contagio infectis vti abhorret, sed vestes peste infectorum statim publicè venduntur. Verum hinc accidit, vt pestis subito per vniuersū orbē disseminetur, ingentemque stragem edat, vt anno 1580. sex vel septem mensium spatio 500000. hominum è medio sustulerit. Interim etsi Medici omnes non obligati sunt, vt peste infectos præsentēs curent; magistratūs tamen officium est, curare, ne ægri, qui omnino ab aliorum consortio separandi sunt, necessariis auxiliis destituantur, sed vt sint adstātes, qui ipsis inferuiant, tū Medici, qui eos curent, vel certè Chirurgi, qui ipsis necessaria auxilia, secundum Medicorum præscriptum, & medicamenta exhibeant, & administrent.

Cum ergo ex his, quæ hætenus dicta sunt, pateat, nullum medicamentum dari, in quo in omni pestilentia fiducia poni possit, multò minùs nouiter inuentis multum fidendum, sed omnino medicamenta longo vsu probata usurpanda, de quo infra hoc cap. ampliùs monebimus, quod efficacissima, & vsu probata semper medicamenta eligenda sint; cum periculum hinc facere sine periculo non liceat, & in peste inefficacia & inutilia remedia in vitæ discrimen coniciant, atque exitiales affectus ne leuissimum quidem errorem ferant, vt est apud Galenum lib. 10. meth. med. c. 11. Ideoque quantis nonnulli sua nouiter inuenta medicamēta sūmis laudibus extollāt: tamē antiquis non facillè præferenda, sed medicamenta amicorū in modū habenda sunt, è quibus non decet nouos anteferre veteribus, nouitatis gratiā, sed si qui noui accedant, vtendo priùs probare conuenit.

O 2

Inprimis

Medici sit, peste infectos visitare.

Turcæ pestē nō metuit.

Nō nouis, sed longo vsu probatis remediis in peste utendum.

Vel Medicorum.

De cuiusvis.



Probatæ autē  
experimenta  
non occultan-  
da.

In primis verò Medicorum est experimenta sua (cū ratio in talibus medicamentis inueniendis parum præster) in medium conferre, & si quis aliquod vñ probatum contra pestem remedium habeat, id non occultare, & posteritati inuidere, sed liberaliter in commune conferre. Contra quod multi peccant, & suam conscientiam lædunt. Contra quos Plinius lib. 25. c. 1. scribit: *Nihil intentatum in expertumque priscis fuit, nihil deinde occultatum, quod non prodesse posteris vellet. At nos elaborata iis abscondere atque suppressere cupimus, & fraudare vitam etiam alienis bonis. Ita certe reconduunt, qui pauca aliqua nouere, inuidentes aliis: & neminem docere, in auctoritatem scientia est. Tantum ab excogitandis nouis, ac inuanda vita mores absunt, summumque opus ingeniorū diu iam hoc fuit, ut intra unumquemque recte facta veterum perirent.* Recte etiam, imò Christiane, scribit Colleg. Med. Augustanor. in *Præfat. sue Pharmacop.* In aprico sunt omnes nostræ compositiones, & patet etiam ad magnalia liber aditus. Celari enim illa non possunt, dū Christiani sumus, quibus proximo bene fit.

An alexi-  
pharmaca in  
forma subtili  
an crassa sint  
exhibenda?

Sententia nō  
nullorum.

Hoc loco etiam non prætereunda quæstio: An medicamenta alexipharmaca potius in forma spirituosa & subtilissima, an verò crassiore sint exhibenda? Nonnulli subtilissima & spirituosa præferunt, utpote quæ in corpus vniuersum citò penetrant, & venenum subito, quod necessarium est, aggrediuntur. Alij contrā talia medicamenta non simpliciter approbāt, cū ob diuersitatem temperamētorum, ætatum, temporum anni, & regionum, talia calida omnibus non comperant. De quo, ut antea etiam dictum, Platerus, *Pr. ir. 2.* scribit: Quæ assumuntur antidota, cū propter proprietatem illam alia insuper sint vehementer calida, alia minus; alia frigida potius, quàm temperata, habitū ratione ætatis & constitutionis, hæc illave potius eligenda, nec temerè quæuis, calidissima illa præferim, ut euphorbiū, & aquæ vitæ, quas sinistrè vsurparas aquas mortis nonnunquam faciunt, iuuenibus potissimum, exhibenda. Talia enim calida & spirituosa humores at spiritus accendunt, febres pariunt & augent, humores ad caput rapiunt, vnde deliria excitantur. In primis verò infantibus & teneris corporibus talia medicamenta non conueniunt. Præterea cū pestilens venenum sit viscidæ & tenacis naturæ, quod corporibus pertinaciter adhæret & diu, ut ex contagio apparet, non solum subito penetrans in corpus remedium requiritur, sed tale etiam, inter quod & patiens sit proportio, quod scilicet aliquandiu in corpore hæreat, donec venenum omne expulsum sit. Medicamenta verò spirituosa subito quidem in corpus penetrant, sed statim etiam dissipantur.

Autoria.

Ergo ut meam sententiam aperiam, omnino cenſeo, talia medicamenta esse exhibenda, quæ in totum corpus facile penetrant, & veneno pestilenti se statim opponunt. Nec diffiteor, è vulgo multos esse, qui spiritum vini & frumentorum quotidie potare assueverunt, & non dissuadeo iis, ut alexipharmaca cum spiritu vini præparata, præseruationis gratiā, vsurpent. Verum cū multi sint, qui spiritibus istis ardentibus non assueuerunt, imò quibus sine periculo exhiberi non possunt, omnino statuendum, raro illas aquas vitæ solas vsurpari posse tuto, ob rationes antea allatas, aut si libeat eas exhibere, acidis diluendas esse. Ideoque alia potius, quæ *alleg. loc.* proposita sunt, medicamenta vsurpanda sunt. Et dantur multa talia medicamenta, quæ licet non sint cum spiritu vini parata, tamen satis efficaciacia sunt: qualia sunt extracta theriacalia, elixir pestilentielle Crollij, & similia alia, *loc. alleg.* enumerata. Et si quæ ex iis minus penetrantia, sed crassiora videntur, qualia sunt pulueres, cum liquore aliquo conuenienti, aquis bezoardicis, ut & aceto, exhibenda sunt. Imò illæ ipsæ aquæ bezoardicæ ac theriacales commodius parantur, si pro spiritu vini affundatur vel acetum solum, vel aceti & vini partes æquales, vel alia, conuenienti

proportione: siquidem acetum summam figendi, & putredini in febribus resistendi vim habet, & ita omnibus venenis resistit, nimiam caliditatem & inflammabilitatem medicamentorum alexipharmacorum infringit, vapores calidos ad caput ascendentes supprimit, sudores potenter mouet.

Hinc in nostro Pharmacopolio talis Aqua theriacalis proſtat: *Rad. tormentilla, bardana, seu lappa maior, pimpinella, succisa, valeriana, an. ʒ. iij. imperatoria, angelica, gentiana, serpentaria, an. ʒ. j. nucum recentium nondum planè maturarum lb. j. folior. ruia cum flor. acetosa, calēdula, cardui bened. verbenæ, scordij, an. M. ii. camphor. in spir. vini dissoluta ʒ. j. theriaca, mithridatij, an. ʒ. j. B. diascordij Fracaſtor. ʒ. j. aceti rosæ. vini alb. præstantiss. an. q. s. Destillentur.*

Aqua Theriacalis  
sebergensis.

Ad præseruationem etiam habetur Syrupus bezoardicus satis efficax, & in præseruatione, & in curatione: *ʒ. spec. liberant. Austr. q. l.* Affunde aceti q. s. Stent in infusione diebus aliquot loco calido, donec omnis vis extracta fuerit: Postea colentur. Colaturæ sacchari ad instam consistentiam costi s. q. affundatur. F. Syrupus dilutior. Aurum tamen, & si quæ sunt alia, quæ acetum non soluit, in confectioe tamen vsurpari possunt, omittere licet. Syrupus iste vel solus in præseruatione, vel in curatione cum aq. theriacali, aut puluere aliquo bezoardico vsurpari potest. Acida tamen feminis, quæ affectibus vterinis obnoxie, cautiùs, & aliis mixta, sunt exhibenda.]

Syrup. Bezoardicus.

Præter istam tamen primariam curam & altera merito suscipienda, ut nimirum corpora ita præparemus, ut pestilens venenum non facile recipiant, sed potius ei resistent. Id quod fiet præcipue quidem, si alexipharmacis illa ut dictum, roboremus. Non tamen etiam huc parum facit, si detur opera, ut corpora munda sint, ac quàm optime constituta. Ita enim & pestilens contagium minimè recipient, & alexipharmaca vires suas in iis faciliùs & liberiùs exerent.

Ergo summa præseruationis hæc est. Primò & præcipue, ut quemadmodum Gal. *de theriac. ad Pisonem cap. 16.* scribit, sanus frequenter alexipharmacis vtratur, ut exterius occurrentibus iniuriis & contagio corpus resistat, & si quando passum aliquid fuerit, ad sanitatem facile reducat. Deinde ut corpus mundum & ab omnibus excrementis liberum sit, atque in naturali statu & vegetum conseruetur.

Atque ut à posteriore incipiamus, Primò danda opera, ut si quæ in corpore sunt excrementa, ea tollantur: deinde videndum, ne noua cumulentur: quod fiet recta diætæ institutione. In quâ ordinandâ in genere obseruandum, si quid alexipharmaci vel cibo vel potui, vel quocunque modo admisceri potest, id non prætermittatur. Hoc enim modo ea in penitiores corporis partes sese faciliùs insinuant.

Et primò quidem Purgationem quod attinet, purgatione, quam aliàs sana corpora, monente Hippoc. *2. aph. 36.* non sine damno ferunt, præsertim per fortiora medicamenta, temerè corpus debilitandum non est. Si quid tamen vitiosorum humorum in corpore fuerit, ne alexipharmacorum vis ab iis hebetetur, nec venenum pestilens in corpore facile radices agat, & postea corruptis humoribus grauiùs affligat: lenioribus purgantibus sensim illud euacuandum est.

Purgatio.

In vñ frequenti sunt & commendantur, ac per aliquor secula iam experientia, medicamentorum probatricis, censuram sustinuerunt Pilulæ, ab vñ, pestilenciales, à numero simplicium, è quibus componuntur, de tribus, & ab authore, pilulæ Ruffi appellatæ; licet formâ potionis seu *ποτισμα* ille hoc medicamentum exhibuerit. Componebat autem id ex aloës partibus ii. ammoniaci thymiamatis partibus ii. myrrhæ parte i. & cum vino odorato exhibebat, ac de eo prædicat Ruffus, citante eius verba Paulo *Æginetâ, lib. 2. cap. 36.* se haud scire, an sit quis, qui

Pilula Ruffi seu pestilenciales.

ex potu hoc non in peste immunis euaserit.

*Pilula pesti-*  
*lent. Ara-*  
*bum.*  
Arabes pro ammoniaco crocum substituerunt, componuntque hoc medicamentum ex aloës partibus ii. myrrhæ parte i. croci parte s. & cum vino odorato pilulas inde conficiunt. Atque istæ hodie in communi vsu sunt; vnde & Communes appellantur.

*Ammonia-*  
*cum thymia-*  
*ma.*  
Cur autem Arabes Ruffi compositionem mutaerint, causâ fortasse est, quod verum ammoniacum thymiamia Ruffi vel non habemus, vel ignoramus. Ammoniacum quidem appellatur, quod in Lybiâ ad Iouis Ammonis templum nasceretur. Cum autem à Paulo & Aëtio plerumque thymiamia nominetur, quod Antiqui pro parandis suffutibus eo vterentur; idque non comperat ei medicamento, quod gummi ammoniacum appellamus: aliud procul dubio fuit Ammoniacum thymiamia, quàm est gummi ammoniacum. Atque eâ de causâ sine dubio pro ammoniaco thymiamate crocum substituerunt Arabes, atque etiam hoc modo pilulas ad pestem præcauendam satis efficaces præpararunt. Aloë enim ventriculum & intestina à vitiis humoribus sine omni corporis agitatione liberat: eadem, sicut & myrrha, corpora à putredine & corruptione præseruat: crocus cor roborat & Spiritus vegetiores reddit. Atque de his pilulis ter in septimanâ 3. i. vel 3. s. horâ vnâ ante cibum exhibere licet. Hoc tamen obseruandum, vt senibus & grauidis, ac quibus hæmorrhoides fluunt, cautè hoc medicamentum exhibeatur.

Ex iisdem simplicibus, è quibus pilulæ pestilentiales Arabum constant, componitur Elixir proprietatis Paracelsi, nisi quod oleum sulphuris additur, & proinde in eundem vsum adhiberi potest.

Vbi aloë locum non habet, vtilia sunt, vt dictum, syrupus & succus rosar. solutius, rhabarbarum; sicut & agaricus. Et proinde quibus aloë & myrrha non conueniunt, ac si hepar calidius ista non fert, hæ rotulæ parari possunt:

*℞. Extrac. rhabarb. Drach. i. rhabarb. aq. cinamom. aspersi. conferv. rosar. an. Drach. iiii. sacch. albiss. in aq. ros. dissol. 3. iiii. F. rotulæ vel morsuli pondere Drach. iiii. Vel exhiberi potest confectio rhabarbari. Interdum rhabarbarum cum aloë coniungitur, vt:*

*℞. Aloës rosatæ Drach. iiii. rhabarb. aq. cinamom. aspersi Drach. i. s. agaric. trochisc. Drach. i. myrrhæ Scr. ii. mastiches Scr. i. Cum syr. acetos. citri; F. Pilulæ: Dosis Drach. i. Andreas Gallus, fasciculo de peste 5. cap. 5. laudat pilulas Ioannis Damasceni, ex betonica, pimpinel. lã, chamædry, cum myrrhã, aloë, croco.*

Recentiores ex his operosius nobiliores quasdam compositiones præparant, inprimis cum sulphure, quod & ipsum à putredine valde præseruat & exsiccat.

*℞. sulphur. lb. i. vitriol. salis gemma. an. Vnc. v. aloës, thuris, myrrhæ, an. Vnc. iiii. Sublimentur, s. ar. flores.*

Postea *℞. Flor. utorum lb. i. Iterum tantum vitriol. myrrhæ, thuris, aloës addatur, & secundâ vice fiat utorio: idque quater vel quinquies repetatur. Tandem,*

*℞. flor. horum Vnc. x. myrrhæ, croci, an. Vnc. i. s. aloës Vnc. i. F. Puluis de quo exhibeatur Drach. i.*

Cuius vsu 24. horis hominem à peste & omnibus pestilentibus morbis tutum esse scribunt.

Efficacius procul dubio fiet medicamentum, si floribus sulphuris diligenter utoris addatur balsamus aloës & myrrhæ ac tinctura croci: & adhuc efficacius, si balsamus sulph. paretur cum spiritu vini terebinthinato (addere licet & ol. iuniperi) & camphorato, cui postea essentia croci, myrrhæ & aloës admisceatur.

Grauidis verò medicamenta ex sulph. parata non conueniunt, ne iis abortus concilietur. Itaque potest iis dari extractum rhabarbari, idque vel cum syrupo aliquo, vel succo rosar, & saccharo in tabulas redigi.

Nonnulli tincturam rhabarbari, additâ s. q. aquæ cinam. cum aquâ rosar. extrahunt, extractamque ad dimidium lentissimo igne coquunt, & additâ s. q. sac-

Dan. Sennerti Tom. II.

chari, syrupum parant, in quam rhabarbari tabulas coniiciunt, cuius cochlear vnum atque alterum etiam infantibus dari potest. Nam non solum à peste præseruat, sed & lumbricos necat: atque exturbat. Iidem passulæ laxatiuæ cum cremore tartari, vel rotulæ purgantes idoneæ dentur.

Quidam etiam terebinthinam commendant. Laudatur & triphera Persica, quæ vel sola 3. s. vel 3. vj. pondere, aut aliis admixta dari potest. Vtilis est & hæc potio.

*℞. Rad. distamni, pimpinel. an. Drach. ii. acetosa, scordij, cardui bened. an. M. s. flor. cordial. an. P. i. sem. citri Scr. i. rhabarb. agaric. albiss. an. Drach. i. s. spica Scr. s. cinam. Zedoaria, zingiberis, an. Scr. i. Infundantur in aq. s. q. Colat. Clarificat. ℞. Vnc. ii. s. Adde extr. panchymagogi Scr. s. vel Scr. i. (pro corporis constitutione) cremor. tartari Scr. i. syr. rosar. sol. Drach. vi. Misce. Vel F. tale Clareum.*

*℞. fol. sena el. Vnc. i. s. mechoacan. Vnc. s. zedoaria, cortic. citri, galanga, an. Drach. i. flor. cordial. P. i. sacch. Vnc. i. Affunde vini Rhenani q. s. & stent in infusione diem integrum, Postea colentur, vt fiat potus clarus, de quo Vnc. iiii. vel q. s. exhibeantur.*

A fortioribus autem purgantibus & vehementibus abstinendum; cum in pestilenti constitutione leui occasione humores comoueantur & ad ventrè confluant.

Similiter venæ sectione corpus temerè non debilitandum, spiritusque dissipandi sunt. Si tamen aliqua plethora adsit, quæ periculum minetur, aliquid, sed parcè, sanguinis detrahendum.

Deinde danda opera, vt corpus, quod idoneis medicamentis ab excrementitiis humoribus mundatum est, tale conseruetur, eaque victus ineunda ratio, quæ excrementitios & vitiosos humores nullos in corpore non solum cumulet, sed & medicamentosi aliquid habeat, atque alexipharmacis ita condita sit; vt pestilenti veneno resistere & cor aduersus illud roborare possit.

Decibus multa à multis scrupulosè præcipiuntur, quæ ramen à paucis obseruari possunt. Ideò rectè dictum existimamus ab authore, libr. 2. de natura human. text. 4. victum in peste, (nisi forsan prauus sit) temerè mutandum non esse; quoniam pestis causâ non est, neque, quatenus cibus, pesti resistit. Itaque si quis cibo alicui assuevit, atque inde nullam vel grauitatem vel læsionem sentit, eum non facilè mutet, nec ad aliud victus genus temerè transeat. Quorum tamen ratio id fert, ii cibos, quantum fieri potest, optimos eligant; prauos verò cibos omnes fugiant. Et quoniam inter cibos panis reliquorum quasi basis est, sit ille ex optimo frumento, fermentatus & modico sale conditus.

Carnes sint facilis coctionis, paucorum excrementorum, & quæ non facilè corrumpantur ac putrescant. Oua recentia & mollia vtilia sunt. Lac plerique parum probant, quod corpora lactis vsu humidiora reddantur. Pisces & ipsi bonæ notæ sint. Cibi verò, qui prauum succum generant, vt terræ tubera & vniuersum fungorum genus, fugiendi, Minus etiam conueniunt fructus fugaces, & qui facilè corrumpuntur, vt persica, cucumeres, citrulli, pruna recentia, & similes. Nuces iuglandes, maximè si cum ficibus, rutâ & sale misceantur, pro alexipharmaco habentur.

De allio & capis controuersia est, an in peste conueniant. Galen. 1. de differ. febr. c. 3. inter cibos prauis succi allium & capas refert, atque alij etiam Medici eorum vsum improbant, quod humores calidos & acres augent, febriumque causâ hoc modo esse possint. Contra ab ipso Galeno allium rusticorum theriaca appellatur, & contra morsum canis rabidi, serpentum & aliorum venenosorum animalium prodesse docetur.

Verum controuersia hæc componi potest, si dicamus, capas & allium vtilia esse, non vt alimentum sed vt medicamentum. Vt enim certum est, non satis

O 3. bonum

*Flor. sulph.*  
*compositi.*

*Syrupus rha-*  
*barbari.*

*Venasectio.*

*Diana.*

*Cibus.*

*An allium*  
*& capas in*  
*peste conue-*  
*niant.*

bonum præstare nutrimentum : ita & illud extra dubium , contra venena plurimum valere , ac proinde allium , vt & cæpæ , non magnâ copiâ sumendum , vt cibi loco esse possit. Sic enim prauos & acres humores in corpore cumulet : Sed in parâ quantitate , vt saltem medicamenti loco sit , & ad pestem præcauendam sufficiat. Nec absurdum est , vt aliquid ratione medicamenti vtilissimum sit ; prauum verò alimentum præbeat , sicut in cibis medicamentosis multis videre est. Ita Ocymum Galenus , 1. de diff. feb. cap. 3. inter cibos prauis succi numerat : ad medicinam tamen vtile est ; sicut eo nomine contra Chrysippum defendit Ocymum Plinius , lib. 20. cap. 12.

Potus.

Potus sit cereuisia tenuis & benè defecata : Vinum item bonum & purum moderatè sumptum.

Temperantia.

Non solum autem in cibo & potu eligendo , sed etiam in vsurpando summa diligentia adhibenda ; atque inprimis iucundæ salubrisque vitæ mater temperantia colenda : Neque inediâ aut siti vires deiiciendæ sunt ; neque plus cibi ingerendum , quàm natura desiderat. Vbi enim , vt Hippocrates , 2. aph. 17. habet , cibis præter naturam copiosior ingeritur , morbum inde creari , indicat sanatio. Atque in conspectu habendum est Socratis exemplum , qui , vt est apud A. Gellium , lib. 2. cap. 1. in illius pestilentie vastitate , quæ in bello Peloponnesiaco inprimis Atheniensem ciuitatem depopulara est , temperantiâ salubritatem corporis retinuit , vt nequaquam fuerit communi omnium cladi obnoxius. Itaque hoc loco reiicienda est illorum sententia , qui persuasum habent , crapulâ & ebrietate aliquem à peste præseruari posse. Nam alterutrum ex nimio cibo potiusque assumpto fieri necesse est , vt scilicet vel natura à nimia cibi potiusque copiâ onerata eum non rectè concoquere & distribuere possit , vnde calor natiuus obruitur , excrementa in corpore cumulantur , obstructions & intemperies in visceribus gignuntur. Vel si natura cibo illi potiusque coquendo par sit , plethora inde gignitur , quam Hippocrates , 1. aph. 3. vt periculosam , protinus soluendam esse monuit.

Fontanella.

Et cum facile fieri possit , vt ex cibo etiam moderatè sumpto aliquid excrementorum in corpore cumuletur , per leuia purgantia , vt dictum , illud sæpius detrahendum. Cui fini inserviunt etiam Fontanellæ dictæ , quibus nonnulli nihil vtilius aut melius ad præseruandam pestem esse dicunt : non quod fontanellæ veneno pestilenti resistent , sed quod vitiosos & excrementitios humores è corpore sensim tollant , atque hoc modo apparatus ad pestem suscipiendam demant : referuntque Medici in grauissimis quibusdam pestilentibus plurimos cauteriorum vsu ab omni damno fuisse seruatos. Nemo tamen velim in iis solis aut præcipuè , neglectis alexipharmacis , spem securitatis collocet. Tanta enim vis & efficacia est huius veneni , vt pura quæque & munda corpora inuadere possit.

Naturarum quoque in cibo administrando aliqua habenda est ratio. Cum enim , qui calidioris humidiorisque naturæ sunt , maximè putredini contagioque suscipiendo apti sint : talia corpora refrigerare & exsiccare conuenit. Vnde cibi iis condiendi acidis , & embammata acida cum cibis apponenda ex succo citri , malorum aurantiorum , acetosâ , ribes , acetos. rosacco.

Cibi quomodo condiendi.

Omnes verò omnino , quantum fieri potest , cibi & potus iis , quæ pesti aduersantur , condiendi sunt : Naturarum tamen respectu habito & temperamentorum , vt frigidioribus naturis & temporibus calidiora , calidioribus frigidiora adhibeantur. Conueniunt autem poma citri , aurantia , acetosa , borrago , buglossum , fructus ribes , macis , crocus , salvia , ruta , pimpinella , bacca iuniperi , absinthium , helenium , Zedoaria , &c. Exempli gratiâ , potus talis pareretur.

℞. Absinthij , dictamni Cretic. an. M. ℞. scordij , cardui

bened. an. M. i. cortic. citri Vnc. ℞. Zedoaria Drach. ii. radic. pimpinel. Vnc. ℞. helenij , Drach. ii.

Concidantur crasso modo , & cum linteo albo fiat nodulus vel sacculus , qui suspendatur in vino , de quo singulis diebus sumatur manè haustus post ientaculum , vel in prandio. Pauperes eundem in cereuisiâ suspendant & macerent.

Cibi conspergantur pulueribus , aut cum iis sumantur pulueres conuenientes ; quales suppeditant santalum , macis , crocus , margaritæ , corallia , cortices citri , radices angelicæ.

Mediocritas quoque in aliis rebus ad diætam pertinentibus , nimirum in motu & quiete , somno & vigiliâ , atque inprimis Venere & animi affectibus seruanda est , & certò statuendum , illud Hippocratis : πέν το πολύ πολέμιον τῇ φύσει ; etiam in peste esse verissimum. Atque inprimis metus atque intensior de inter necio hoc morbi genere cogitatio intermittenda ; cum certum sit , atque experienciâ probatum , imaginatione talem posse fieri in corpore impressio-nem , humorumque mutationem , vt eâ ipsâ de causâ multi peste correpti sint. Contrâ quantum præsens animus possit , vel ex vespillonibus , Chirurgis & aliis , qui peste infectis & mortuis operas suas locant , videre est. Itaque , spe in Deum positâ , animus pius sibi persuasum habeat , licet pestilentia cadant à latere mille , & decem millia à dextrâ , sibi tamen illam non appropinquaturam.

Atque hætenus , quâ ratione corpori prouidendum sit dictum , ne vitiosi humores in eo cumulentur , sed potius illud in naturali & optimo statu conseruetur. Duo tamen præterea adhuc ad pestem præcauendam necessaria sunt. Primum , ne venenatus & pestilens aer seminiûmque contagij attrahatur. Deinde si vel ignorantibus accidat , vt contagium , siue per aërem , siue alio modo corpori comunicetur , vt corpus aduersus illud muniatur , ne quid detrimenti ab eo patiatur.

Primum quod attinet , detur opera , vt aer , in quo versandum est , priuatim & publicè , quantum fieri potest purus sit , & à pestilenti contagio mundus. Vt enim rectè Author libri de flatibus scribit : mortalibus vitæ & ægris morborum causa aer est : tantaque omnibus corporibus spiritus existit necessitas , vt siquidem ab omnibus alimentis abstineat homo , neque cibum sumat , neque potum , possit tamen dies duos , vel tres , vel plures vitam ducere : si verò spiritus in corpus via intercipitur , in breui parte vnus diei intereat. Itaque cum tanta aëris sit necessitas : nullâ re facilius , quàm per aërem , contagium pestilens corpori communicari potest.

Et proinde primò Magistratûs officium est , curare , vt plateæ , quantum fieri potest , ab omnibus sordibus mundæ sint ; inprimis à stercore suillo & anserino , quod propter foetorem cerebro & spiritibus insensum , præ cæteris ad contagium propagandum multum facit. Vrina , præsertim infectorum , atque aliæ sordes in publicas vias & plateas non proiciendæ. Et omnino omnia ex publico amouenda , quæ semina contagij augere , fouere , vel excitare possunt. Quanquam enim pestilentis veneni natura in putredine non consistat : tamen contagium pestilens sordida eiusmodi facile excipiunt fouentque , & ipsa tandem malignitatem concipiunt ; sicut ex corporibus putridis interdum pestem oriri , experientia sæpius docuit.

Neque sibi quispiam persuadeat , foetores eiusmodi rerum putridarum & corruptarum veneno resistere , & venenum veneno pelli posse. Neque velim aliquem imitari Sarmatas , de quibus Alexand. Benedictus , de peste hæc habet : *Quidam nobilis mercator Cretensis , cum in Dauricâ regione negotiaretur , & saevissima pestis aeris vicio orta esset , quâ finis moriendi non erat , retulit , in eâ hominum summâ strage à se Medicum visum , loci eius incolam , qui canes interemptos passim per*



per vias, perque vicos omnes abiici iussit, qui putridi terro odore aerem replerent, eoque remedio statim ciuitatem sanitati restitutam esse. Putatque Alex. Benedictus carnes putrescentes aeris, qui hominib. saltem exitialis erat, naturam immutasse, & venenum à veneno debellatum fuisse.

*An fœtores in pestilentia ualidas sint.*  
Verumenimvero, etsi quis de istâ ex barbaro loco alata experientiâ, & quomodo ista omnia acta sint, dubitare posset: tamen posito, rem istam ita gestam fuisse, nihilominus ut tale quid imitemur, suadendum non est. Licet enim accidere possit, ut venenum veneno contrarium sit; & eadem pestis non omnibus animalibus, imò nec hominibus quidem sit exitialis, sicut Cardanus, lib. 2. de rerum variet. refert, pestem quandam Basilæ grassatam fuisse, in qua solum Heluetij, non verò Hispani, Itali aut Galli, qui in eadem ciuitate erant, affligebantur: Et fortasse tum singularem quandam pestem fuisse, & à singulari aeris vitio ortum traxisse, cui occultâ aliquâ qualitate putrescentium canum vapores contrarij fuerint, tamen cum pestilentia magna sit varietas, nec vnica ista è loco remoto experientia pluribus & variis exemplis sit confirmata, non tutum est, fœtida talia in publicis locis relinquere; cum facile fieri possit, ut aeris vitium foueant & augeant.

*Ignis aerem mundat.*  
Sed cum longâ experientiâ cõstet, igne putridum & venenatum aerem maximè corrigi, Hippocratis potius aliorumque Medicorum prudentissimorum exemplum, quàm barbarorum barbaram istam consuetudinem imitati, igne in locis publicis accenso aeris vitia corrigere studeamus. Insuper hinc inprimis lignum iuniperi, quercus, pinus, picca, laurus, atque aliæ plantæ odoratæ. Ad aerem quoque puriorem reddendum multum valet; si tormenta bellica præsertim maiora, & præcipuè versùs eam partem, à quâ malum maximè imminet, sub vesperam & auroram displodantur. Non enim saltem vehementer aerem commouent atque agitant, sed & sulphur ac nitrum maximam vim eum alterandi habet.

*Quâ ratione quisque priuatim se adueritum contagium pestilentis munire debeat.*  
Priuatim verò quisque, quantum licet, hominum frequentiam vitet; cum non semper constet, qui infecti sint. Qua de causâ rectè à Magistratu conuentus illi solemnes & frequentiores in nuptiis, choreis publicis, balneis, scholis, nundinis prohibentur. Aut si omnino cum his, qui infecti sunt, aut in suspicionem infectionis venerunt, conuersandum sit: fiat hoc ore aliquantum auerso, & vento secundo, non aduerso. Inprimis per fenestras in aëdes infectas inspicere periculo non vacat. Nemo etiam in publicum facile prodeat, nisi horâ vnâ atque alterâ post Solis ortum, donec aer caliginosus & vapores nonnihil discutiantur. Et omnino sine alexipharmacis, vel etiam cibo aliquo sumpto, nemo in publicum progrediatur. Et cum aer per os & nares præcipuè attrahatur, quisque in publicum egressurus naribus odoramenta admoueat, poma scilicet odorata, nodulos, vnguenta, linimenta ex rebus odoratis, atque iis inprimis, quæ peculiarem vim veneno pestilenti resistendi habent. Nares nimirum vngantur theriacâ, oleo vel balsamo rutæ, Zedoariæ, Angeliçæ, succini, corticum citri, iuniperi, caryophyllorum, nucis moschatæ; vel aceto aliquo aut aquâ bezoarticâ, vel spongiæ tali aceto madidæ, pyxidibus ligneis inclusæ, aut poma ambra dicta manibus gestentur, & frequentius naribus admoueantur. Dentes theriacâ illinantur. In ore teneantur angelica, Zedoaria, cortices citri, &c.

Det etiam operam quilibet, ut in ædibus suis puro aëre fruatur, & pestilentem excludat atque exterminet. Itaque claudantur fenestrate versùs domos infectas; iisdem clausis aer nocturnus excludatur, & demum Sole exorto conclaue radiis Solaribus illustrandum fenestris apertis exponatur: Aer in ædibus imbuatur iis rebus, quæ veneno pestilenti resistendi & corroborandi vim habent. Sufficiunt scilicet excitentur è ligno iuniperi, fraxi-

ni, querno, baccis iuniperi, lauri, rutæ, saluiæ, absinthio, foliis quercus, aceto bezoartico lateribus ignitis affuso, vel aquis conuenientibus. Vestes quoque & lintheamina in scriniis contra pestilentem infectionem muniantur sacculis ex bene olentibus & veneno resistentibus plantis compositis.

Extant alia composita passim, quæ partim naribus admoueri, partim ore teneri, partim accendi & carbonibus iniici, aut lateribus ignitis affundi possunt: pauca saltem, ex. gr. è tantâ varietate eligere libet.

In horum tamen omnium vfu obseruandum, cum fœminæ, quæ ad suffocationem vteri proclines sunt, suaueolentia non ferant, loco ambra & moschi admiscenda esse castoreum, galbanum, rutam & similia.

Poma ambra, quæ appellant, parantur ex ladano, benzoë, seu asâ dulci, styrace calamitâ, radice iridis, rosolis, ligno aloës, corticibus citri, santalis, caryophyllis, camphorâ, ambra, moscho, zibetho. Fiuntque efficaciora, si iis addantur olea destillata, citri, rutæ, angelicæ, caryophyllorum, macis cinamomi, &c. Exempli gratiâ:

℞. Ladani puriss. Drach. ii. Radic. ireos Drach. i. Pulu. caryophyll. nucis mosch. cinam. an. Drach. β. camphora Scrup. sem. ol. destill. ruta gut. vii. ol. angelica gut. v. caryophyllorum gut. iii. nucis mosch. expressi 3. β. moschi, zibethi, ambra, an. gr. iii. iiii. vel plura.

Cum mucilag. tragacanth. aquâ rosar. factâ, F. massa pro pomis.

Tempore æstiuo talem componere licet:

℞. Ros. rubrar. Drach. i. flor. violar. P. β. santali citrini, styracis calam. an. Drach. β. cortic. citr. macis, an. Scr. i. camphora Scrup. sem. ol. destill. ruta, gut. vi. Zibethi, moschi, ambra an. gr. vi.

Cum mucilag. tragacanth. aquâ rosar. factâ, F. massa.

Linimenta ad nares talia vsurpare licet:

℞. Theriac. opt. mithridat. el. an. Drach. i. myrrha, benzoës, styr. calamita, ol. destill. ruta an. Scrup. i. angelica. camphora in aq. bezoarticâ dissoluta, an. Scr. β. ol. amygd. dulc. parum. F. Linimentum.

*Linimenta ad nares.*

Vel ℞. Theriac. opt. mithridat. an. Drach. i. myrrha, benzoës, styrac. calam. an. Drach. β. santali citrini, cortic. citr. caryophyll. an. Scrup. i. camphora Scrup. sem. aque rosarum, aceti scordij, vel bezoartici. an. q. s. M. in formam Linimenti.

Vel balsamum seu linimentum, quo nares, tempora, pulsus & regio cordis inungatur, tale parari potest.

℞. Ol. distill. ruta Scrup. i. citri, angelica an. Scrup. β. lauendula, caryophyll. an. gut. vi. Olei baccar. iuniperi Scrup. β. moschi, ambra, zibethi an. gr. iiii. ol. nucis moschat. expressi. q. s. F. Linimentum.

In primis commendatur oleum Scorpionum secundum descriptionem Matthioli paratum, si carpis, temporibus, vel etiam regioni cordis inungatur.

Laudatur & oleum viperarum magni ducis Hetruriae: sicut & linimentum ex adipe serpentum, succo citri & theriacâ.

Est qui istum balsamum commendat, & æthereum nominet, quemque non solum à peste hominem præseruare, si semel de die aliquid carpis & cordis regioni illinatur, verum etiam venenatorum animalium morsus curare pollicetur.

*Balsamum.*

℞. Pingued. serpentum, ol. rubetorum, scorpionum, an. 3. β. ranar. viridium Drach. iiii. balsami ruta, angelica, succini an. Drach. β. nucis mosch. Drach. i. citri, imperatoria, saluia, cinamomi, caryophyll. castorei, an. Drach. β. elixir proprietatis Paracel. 3. i. M.

Acetum, quo vel nares inungi, aut s. o. g. i. a. olfaciendæ imbui, vel filices aut lateres igniti perfundi possunt, quodque tum ad pestem præseruandam, tum curandam

*Acetum.*

mandam propinari potest, hoc modo parare licet.

℞. Flor. calendula M.i. scordij, ruta, rosar. rubr. an. P.j. rad. angelica, valeriana, baccar. iuniperi, an. Drach. ii. Zedoaria, cortic. citri, myrrha an. Drach. i. camphora Scrup. i. aceti rosacei ℥b. ii. vel plures. M. & vsui seruentur.

Vel ℞. Fol. ruta, scordij, scabiosa, morsus diaboli, cardui bened. absinthij, an. M.i. Rad. angelica, zedoaria, distamni albi, imperatoria, valeriana, pimpinella, tormentilla, granor. iuniperi, an. Vnc. β. cortic. citri Drach. iii. caryophyll. myrrha an. Drach. i. camphora Drach. β. Affundatur aceti rosacei q. s. & seruentur vsui.

Vel ℞. Scordij M. ii. ruta M. β. summit. absinthij, Drach. ii. theriaca Vnc. β. myrrha Drach. ii. camphora Drach. i. zedoaria, caryophyll. macis, castorei, angelica an. Drach. β. baccar. iuniperi Vnc. β. Affundatur aceti rosacei canth. ij.

Et consentiunt in hoc doctissimi quique Medici, aceti, præcipue in quo medicamenta alexiteria macerata fuerint, cum extra adhibiti, tum propinati, maximam vim esse ad præseruandum corpus à pestilentis veneni corruptione. Quib. tamen siccus est cerebrum, & qui vigiliis molestantur, ii aceti odore parcius omnino vtantur, aut etiam plane ab eo abstineant.

*Pulueres ad sufficiendum.* Puluis ad sufficiendum ita paratur.

℞. Ligni iuniperi, Vnc. iii. baccar. iuniperi, lauri an. Vnc. i. succini, thuris, myrrha, styrac. calamita, benzoës an. Vnc. β. Puluis.

Nonnulli addunt etiam flores sulph.

Vel ℞. Baccar. iuniperi M. ii. cortic. baccar. lauri M. i. thuris ℥b. β. fol. absinthij, ruta, quercus, an. M. ii. scobis ligni iuniperi. M. iii. succini. Vnc. i. F. Puluis pro pauperibus.

Est & magna in discutiendis & absumendis venenatis vaporibus pulueris bombardici accensi vis.

Pro ditioribus talis fieri potest.

℞. Baccar. lauri ℥b. i. thuris. Vnc. iii. styrac. calam. benzoës, an. Vnc. i. β. santali citrini. Vnc. β. ligni aloës Drach. ii. fol. lauri Vnc. i. flor. laudula, rosar. rubr. an. Drach. ii. F. Puluis.

*Candela pro fumo.* Candela pro fumo tales fieri possunt.

℞. Ladani, styrac. calam. benzoës an. Drach. i. myrrha, thuris, an. Drach. β. rad. angelica Scrup. i. granor. iuniperi Drach. ii. caryophyll. Drach. ii. carbon. tilia q. s. Incorporentur cum mucilagine tragacanth. aquar. rosar. facta. F. candela vel trochisci.

Pro diutius tales fieri possunt.

℞. Ladani, flor. Stachad. Arab. an. Drach. i. β. Styrac. calam. Vnc. β. rad. iridis Florentina. Drach. i. β. benzoës Vnc. sem. Sacch. cand. Drach. v. moschi ḡ. v. Scrup. β. vel q. libet, mucilag. tragacantha aqua rosar. facta parum. F. Massa, e qua formentur orbiculi parui.

*Aqua odorata.* Aqua odorata pro ditioribus, qua facies, manus, chirotheca conspergi possunt, aut qua in olla super carbonibus in vapores resolui, & in aërem dispergi potest.

℞. Aq. rosar. fragrantiss. ℥b. i. benzoës, styracis calamit. cinamomi, macis, caryophyll. cortic. citri an. Vnc. sem. camphora Drach. sem. (qua si aliquib. molesta est, omitti potest.) Coq. vase clauso in B. M. aliquandiu, postea colentur, & addatur, zibethi, moschi, ambr. an. Scrup. β. Seruentur in vase clauso ad vsu.

Vel ℞. Styrac. calamit. ligni aloës, an. Vnc. sem. benzoës Drach. ii. iridis Florent. Drach. i. sacch. Vnc. β.

Singula seorsim pulueriscentur, misceantur: quibus adde moschi, ambr. an. Drach. β. zibethi, Scr. i.

Seruentur ad vsu vase clauso. Postea, quando libet, sume, pulueris pauxillum, affunde in patellâ aquam rosarum fragrantissimam, & ad lentum carbonum ignem in hâlicum resoluatur, qui suauissimum odorem de se spirabit: qui tamen foeminiis vteri affectionibus obnoxii non conuenit.

Trochisci sub lingua tenendi.

℞. Zedoaria, Vnc. β. rad. pimpin. angel. an. Drach. i. ligni aloës, cinamom. cortic. citri, an. Drach. β. macis Scr. i. sacch. albiss. Vnc. iii. Cum s. q. gummi tragacantha in aq. ros. dissolui. Fiant trochisci sub lingua tenendi.

In his tamen omnibus obseruandum, vt aëris constitutionis habeatur ratio, & præterea alexipharmacis potius, quam solis odoribus gratis fidamus, quæ idcirco aliis odoratis admisceri possunt. Sunt etiam quidam in eâ sententiâ, eiusmodi odorifera sola pestiferum halitum ad cor potius allicere, quam à corde remouere. Et cum in sano non defectus aliquis sit in spiritibus, ob quem eorum instauratio per talia odorifera requiratur: idè prouidendum potius censent, ne Spiritus pestifero contagio inficiantur. Et cum contagium pestilens summam vim putrefaciendi habeat, potius iis vtendum putant, quæ vim illam retundant. Sicut videmus intenso frigore contagiū extinguī; augeri verò & intendi in aëre calido.

Verumenimvero etsi in sanis defectus adhuc non sit spirituum: vtile tamen est, semper spiritus esse maxime vegetos. Ad quod plurimum possunt suaueolentia, quæ ipsâ experienciâ teste, miris modis spiritus recreant atque instaurant, & iamiam morituros sæpe ad vitam renocant. Itaque rebus suaueolentibus, (præcipue si medicamenta pesti aduersantia admixta sint) spiritus vegetiores redditi sese alacrius & fortius pesti opponunt. Et quanquam spiritus gratos odores auide attrahant & arripiant: non tamen sequitur, quod simul etiam venenatos vapores admittant.

Sacculus, qui in scriniis vestibus apponi potest.

℞. flor. laud. rosar. rubr. an. M. i. violar. nymphaea, melissa, basilici, an. Vnc. i. ruta, M. sem. rorismarini, P. ii. cortic. citri, santali citrini, an. Vnc. sem. rad. ireos, Drach. ii. caryophyll. macis, asa dulcis, an. Drach. β. moschi. gr. i. v. vel q. s. (omittatur pro foeminis.) F. Sacculus.

Sacculus regioni cordis applicandus,

℞. Flor. buglossi, rosar. rub. violar. an. P. ii. melissa vtri- usque, rorismar. an. P. i. cinamomi, caryophyll. cortic. citri, ligni aloës, santali citrini, rad. angelic. valeriana, ireos Florent. an. Drach. i. β. sem. ruta, Off. de C. C. an. Scrup. i. croci, camph. an. Scrup. β. ambr. moschi, an. gr. i. v. F. Puluis, qui excipiat syndone rubro, & f. a. Fiat sacculus.

Verum talia multa describuntur ab Horat. Augenio, lib. de peste, cap. 26. & 28. Ant. Porto, lib. 2. de peste, c. 46. & 49. Andr. Gallo, de peste, fasciculo 5. cap. 19. 20. 22. & aliis.

Præter ista, quæ Hactenus recensuimus, medicamenta, & alia quædam, de quib. inter Medicos omnes non conuenit, à nonnullis valde commendantur, qualia sunt sacculi & massæ, quæ e rebus venenatis, vt arsenico, puluere bufonum, argento viuo & similibus fiunt, & extrâ, ad præseruandum à pestilentia, corpori e regione cordis appenduntur.

Amuleta ex Arsenico plurimi commendant; & sunt, qui iurati asserant, nullos peste fuisse infectos ex iis, qui talia ad cordis regionem gestarunt. Tali autem modo parantur.

℞. Arsenici crystall. q. v. Cum albumine oui vel mucilagin. gummi Arabici, aut tragacantha. Fiant massæ seu placenta, quæ in vmbrâ siccantur, & sacculo sericeo inclusa regioni cordis applicentur. Nonnulli & alia addunt; vt

℞. Pulu. bufon. exsiccati. Vnc. i. β. arsenici citrini, crystallini, an. Drach. v. i. pulu. distamni, tormentilla, an. Drach. i. β. margar. prapar. santali citrini, an. Scrup. ii. croci, Drach. sem. hyacinthi, smaragdi, an. Scrup. i. Cum mucilagine gummi tragacantha vel Arabici. F. massa.

Vel ℞. Arsenici crystallini, Vnc. ii. Zedoaria. Drach. ii. croci Scrup. i. camphora, Drach. β. Cum gummi Arabico aq. ros. dissol. F. Pastilli.

Iohan. Rhenaſus hoc, tanquam perfectum Amule- tum,

rum, commendat, quo non solum pestilens contagium, sed & cœlestes impressiones auerantur:

*℞. Pulv. buson. exsiccator. Vnc. ii. arsenici crystallini, citrini, an. Vnc. sem. Mercur. ☿. i. farina tritici, radic. dictamni vel tormentill. an. Drach. iii. croci, hyacinthi, smaragdi, an. Scrup. i. Omnibus pulverisatis, cum mucilagine iragacantha aq. ros. facta, Fiat massa, è qua fiant pastilli, de collo suspendendi.*

Si autem cœlestes impressiones auertere debeant, hoc modo porro præparandos esse docet. Capsulæ cordis figuram referentes è chalybe formentur, vt massæ istius 3. i. b. excipere possit: In istis capsulis, vbi Luna caput Draconis attigerit, insculpere iubet signum serpentis, instar cochleæ in gyrum sese voluentis: in alterâ parte, lunâ in scorpio existente, formam scorpij insculpit: postea, lunâ in scorpione existente, capsulam istam replet massâ prædictâ, eamque siccitam cordis regioni applicat. Atque id etiam de peculiari huius amuleti vsu monet Rhenanus, pastillos illos maderieri, si venenum pestilens præstò fuerit; ideòque igni tum admouendos esse. Ita enim venenum euanesce.

Eiusdem generis ferè est Zenexon Paracelsi à Crollio descriptum.

Alij commendant argentum viuum testæ nucis auellanae inclusum. Atque istud remedium potissimum anno 1552. & 1553. in obsidione Metensi vsurpatum & commendatum fuit; vt refert Petrus Droërtus, *Consil. de pestilent. c. 8.* & Iac. Theodor. Tabernæmontanus, in *tract. de pestilent. Germanico*. Et est, qui referat, sibi notos esse aliquot, quibus, cum peste corripenter per contagium, disruptæ illo ipso momento testæ auellanae fuerint, quæ hydrargyrum continebant.

De amuleto-  
rum vis.

Sed quo fine talia adhibeantur, & vnde sit ista efficacia, ipsi illi authores, qui talia vsurpant & commendant, dissident.

Sunt, qui existimant, arsenicum venenum siccum esse, & siccitate suâ prauos humores absumere, atque inquinamentum discutere.

Sunt, qui hoc modo venenis cor assuescieri, & consuetudine faciliorem veneni tolerantiam comparari putant, vt qui arsenico assuescant, sine noxâ etiam in pestilenti aëre versentur.

Petrus Droërtus, in *consil. de pestil.* alexipharmacum arsenicum esse dicit, atque ad motum cor roborare scribit, quamuis aliàs erodendo noceat.

Heurnius, *de peste, cap. 8.* scribit, Cor, dum qualitatem arsenici percipit, sese contrahere, atque inde eius systolem fieri fortiolem diastole, ita vt validius eo motu à se expellat, quàm attrahat.

Verum quis istas rationes parum probabiles esse non videt? Li probabiliora dicunt, qui totius substantiæ similitudine talia venenum pestilens ad se attrahere dicunt. Nam sicut à scorpione percussus ab eodem imposito sanatur: ita procul dubio seu olea & vnguenta, seu massæ & trochisci, qui amuleti loco gestantur, & ex venenosis rebus parantur, si quid præstant in hoc genere, occultâ qualitate venenum pestilens ad se attrahunt. Et quidem dupliciter, vel venenum pestilens, quod homini appropinquat, antequam in corpus recipiatur, peculiari *symplicia* ad se alliciunt; Vel si quocunque modo in corpus receptum sit, eadem *symplicia* ad se euocant. Ideòque quidam non sine causâ monent, ne alia medicamenta arsenico misceantur, ne eorum admixtione vis eius frangatur. Monent quoque, ne motu incallescant sacculi vel massæ, ne per poros cutis vis illa veneni cordi communicetur.

Verum ab his dissentiunt Horat. Augenius, Gerardus Columba, & Hercules Saxonia, aliique Medici non pauci, qui statuunt, tantum abesse, vt talia venena hominem præseruent, vt etiam præsens damnum ipsi inferre possint. Cum enim sint naturæ nostræ aduersissima, si supra cor posita incallescant, vaporisque ad cor penetrent, maximè nocere. Et quamuis multi sint, qui

talìa sine periculo gestarint, id ideò factum esse existimant, quòd non incaluerint. Contra verò obseruatum esse, si motu incallescant, hominem in syncopem, & damna, atque adeò vitæ discrimen conici, neque inde liberari, nisi sacculo amoto.

Imò sunt, inter quos Hercul. Saxon. *lib. de plicâ, cap. 53.* & Io. Baptista Gemma, *de rat. cur. bubones pestil.* qui illam præseruandi vim in istis, quam plurimi ita prædicant, in dubium vocant. Testaturque vterque se certò scire, cum in pestilentia Parauina, Anno 1576. Hieron. Capiuaccius multis hæc adhibuisset, nihil egregij præstitisse.

Quapropter, cum adhuc de experientia dubitetur, & cum, vt rectè Horat. Augenius, *lib. 3. de pest. cap. 27.* scribit, multa fiant, quæ diuersam habent causam, quàm vulgò creditur; atque ad experientiæ habitum non vnum vel alterum experimentum, sed hominum fide dignorum, magni iudicij, & prudentum longa obseruatio requiratur, rationesque quibus causam huius effectus reddere conantur, non firmæ sint; vt loca allegata legenti patent: cum eodem Hercule Saxoniâ, remedio hoc quemque, pro suo arbitratu vt permittimus: modò ne reliqua maioris momenti, atque in primis alexipharmaca prætermittat: deinde ne quid damni inde accipiat; quod fiet, si curabit, ne incalescat.

Plus tribuit Saxonia argento viuo, atque existimat, ipsum & minus periculosum esse, atque etiam non calescentem crassam materiam discutere posse, atque ad exitum parare: quo fine quoque, scilicet crassum sanguinem, qui ob crassitiem in venas & glandulas mammarum penetrare non poterat, attenuando, lactis defectum emendare posse, atque eam ob causam Parauinas mulieres, non infelici successu, hydrargyrum auellanae inclusum collo appendere, vt lac restitueretur: quamuis, vt refert Th. Iordanus, *de peste phenom. tract. 3. cap. 9.* ideò superstitiosè id adhibeant, quòd contra fascinum, quo lactantibus lac adimatur, proficit.

Argentum  
vium.

Verum maxima salutis, & securitatis spes, vt antea Alexipharmaca. quoque dictum, in alexipharmacis consistit. Eadem enim, quæ pestem curant, ab eadem præseruant. Cum verò omnia illa alexipharmaca experientiâ potiùs, quàm ratione inuenta sint: nemo suam salutem gloriosis nonnullorum promissis concedat, neque nouis medicamentis, nisi fidâ experientiâ antea probata sint, facillè fidem adhibeat, sed iis, quæ diu à multis probata fuere, maximè confidat.

Simplicia sunt: *Angelica, Valeriana, tormentilla, carduus benedictus, acetosa, dictamnus Creticus, & albus, ruta, vincetoxicum, scabiosa, morsus diaboli, pimpinella, olsenichium, veronica, scorzonera, calendula, absinthium, Zedoaria, imperatoria, gentiana, bacca iuniperi, nuxes inglandes, C. C. Os de C. C. bolus Armenus, terra sigillata, smaragdus, hiacynthus.*

Simplicia.

De lapide Bezoar dicitur postea, Nam de eo varia sunt iudicia. Aliqui summopere eum laudant: Nonnulli parum ei in hoc genere tribuunt. Imò sunt, qui oculos seu lapides cancrorum ei præferunt. Sunt qui nec Opium omittendum censent. Cum enim summam vim condensandi habeat, si alexipharmacis misceatur, in feruore spirituum extinguendo multum potest, ac spiritus contagiosi motum sistit, vt ita medicamentum facilius eum à corde propellere possit. Sunt quidem aliqui, qui ex his medicamentis quædam suspensa habent, vt radices pimpinellæ, quòd nimis commoueant & calefaciant humores; radicem tormentillæ, quòd nimis adstringat; Bolus Armenus, quòd obstruat, & hoc modo putredinem excitare possit; Baccas iuniperi & alia plurima, quia nimis calefaciant & spiritus accendant: Verum modò vim veneno resistendi habeant, qualitatum primarum excessus aliorum admixtione facillè corrigi potest.

Ex compositis vltatissima & longo vsu iam comprobata sunt Mithridatium, Theriacà Andromachi, Confe

De Theriaca.



Confectio liberantis. Et ex his inprimis Theriaca (à qua & multa alia medicamenta, quæ occultâ vi ac totâ substantiâ venenis resistunt, Theriacalia nominantur) cuius vim insignem cum obseruasset antiquitas, ad hunc usque diem in bene constitutis Pharmacopoliis & Rebuspub. communis salutis gratiâ asseruatur: atque Ægyptij, vt refert Prosper Alpinus, *de medicin. Ægyptiorum lib. 4. c. 8.* licet in aliorum medicamentorum compositione negligentiores sint: tamen iussu Turcarum Imperatoris singulis annis, præsentibus omnibus Medicis, in templo vrbis Cæyri, Theriacam summâ diligentia componunt.

Et si autem & alios effectus habeat, quos recenset Galenus, *de Theriaca ad Pison. cap. 16.* tamen inter omnes effectus, & cuius gratiâ potissimum inuenta videtur, atque vnde etiam nomen accepit, est, quod à veneno præseruat, & à veneno læsos pristina sanitati restituit. Atque hæc eius efficacia omnibus temporibus perspecta & cognita est. Et vt de aliis venenis nihil dictam, quantâ in pestilentia eius sit efficacia, omnes medici fatentur. Galenus, *de Theriaca ad Pamphilian. refert*, se ex Eliano Meccio, omnium, quos, audiuerat, verustissimo, audiisse, Italiam olim pestem inuasisse, quæ celeriter multos interimebat. Tentatis igitur omnibus, vt sit, authorem se fuisse, vt solâ theriacâ vterentur; cum cætera nihil conferrent. Tunc itaque ex iis, qui ægrotabant, quàm plurimos assumptâ theriacâ conualuisse; paucos in quibus vis morbi inualuerat, occidisse; reliquos omnes, quos pestis nondum occupauerat, non modò periculum euasisse, sed ne in morbum quidem incidisse. Et, *de Theriacâ ad Pison. cap. 16.* docet, Theriacam, instar ignis cuiusdam purgatorij, illos, qui ipsam biberunt, non permittere, vt pestilentia prorsus capiantur; illos autem, qui iam ægrotant, sanare posse; cum aëris inspirati malignitatem commutando, tum corporis temperiei corruptionem prohibendo. Atque ob nobiles hos effectus, theriaca & summis Imperatoribus in vfu frequenti fuit; præcipuè iis, qui sibi de veneno metuebant. Suetonius, *in Nerone, c. 34.* refert, Neronem, monstrum illud hominis, matrem ter tentasse veneno, sed frustra; cum se antidoti (proculdubio Theriacâ) præmunisset, & proinde aliam eius interimendâ viam postea iniisse.

Et si verò hodie eas, quas Galenus, aliique prædicant, vires non semper experiamur: falsi tamen aliquid eos scripsisse, non existimamus: sed si quid non responderet, id aut inde euenit, quod quædam eorum, è quibus Theriaca componitur, vel ignota sunt hodie, vel ad nos non apportantur; aut quod, qui eam componunt, non eam, quam debebant, diligentiam adhibent, atque vel ignorantia peccant, vel publica commoda priuatis suis metuantur. Olim in Theriacâ componendâ tanta diligentia adhibita fuit, quâ maior vix potuit; cum ipsi Imp. Romani curam de conficiendâ Theriacâ ad se pertinere existimarent; quod præcipuam imperandi partem arbitrarerentur communis salutis procuracionem: nullique sumptui, vt quàm diligentissimè componeretur, parcerent. Testatur Galenus, *lib. 1. de antidoto, cap. 2.* Apportari sibi lectissima quæque ad theriacæ compositionem, quædam ex magnâ Syriâ, quædam è Palæstinâ, quædam ex Ægypto, nonnulla ex Cappadocia, ex Ponto aliâ, pleraque è Macedoniâ, nonnulla ex Hispaniâ, Galliâ, Mauritanîâ. Quorum exemplum superiore tempore imitatus est Henricus Galliarum Rex, qui, ad Fernelij petitionem, literas dedit ad Turcarum Imperatorem, vt herbarium medicum mitteret, qui optima & lectissima medicamenta, Regis impensis, ad Mithridatij compositionem afferret. Inprimis verò, quod sæpius Theriaca non satis efficax fuit, eâ de causâ ferè accidit, quod viperini trochisci, qui basis sunt huius antidoti, vel non è veris viperis parentur, vel effecti, corrupti & viribus exhausti adhiberentur. Patrum certè memoriâ ad annos quingentos ita ignoratæ viperæ

creduntur, vt à cæteris serpentibus non discerni possent, & aliud sæpe serpentis genus adhiberetur, vel etiam planè omitterentur, atque alia in earum locum, vt tormetilla, dictamnus substituerentur, vt refert Barthol. Marantha *de Theriaca cap. 4.* donec tandem Nicolai Leonici, aliorumque industriâ veræ viperæ in lucem reuocatae sunt.

Cæterum cum medicorum doctissimorum diligentia hodiè effectum sit, vt genuina ad theriacam componendam simplicia omnia verè iam nota sint; effectus tamen non planè respondeat, vnus adhuc & quidem præcipui medicamenti defectum causam esse puto, cuius effectus non edat hodie theriaca, ad quos à veteribus tantoperè commendata est, defectum scilicet Opobalsami, cuius vsui, vt Prosper Alpinus, *de Medicinâ Ægyptiorum, refert*, plus fidunt hodie etiam Ægyptij, quàm aliis auxiliis, Neque oleum destillatum caryophyllorum, cinamomi, nucis moschatæ, vel aliud defectum cum supplere potest.

Non rarò etiam non tam remediorum vis imbecilla accusanda est, quàm non rectè vtentium imprudentia, Maximè enim in administrandis & vsurpandis hisce alexipharmacis peccatur. Non obseruatur tempus exhibendi, non modus, non numerus. Primò enim plerumque tardius Theriaca propinatur, & tum deinceps, vbi venenum iam altius in corpus illapsum radices egit, principesque partes labefactauit. Deinde & in eo grauissimè peccatur, quod contra expressum Galeni præceptum, nimis parca plerumque manu, nec toties, quoties opus erat, exhibetur. In præseruatione quidem parcius vsurpanda est: sed liberalius in curatione, vt docet Galenus, *1. de antidoto, cap. 2. Portio Antidoti, inquit, quæ prius semel hausta, tutum à morte quempiam facile præstitisset, eadem post venenum sumpta, non nisi quadrupla, quintuplaue, nec tum temporis semel modò, sed etiam bis terne, quoad videl. veneni vis fracta videlicetque omnino sit diebus singulis hausta, quicquam iuuat.*

Et vt de causis, & quibus viribus Theriaca nobiles istos effectus edat, potè dicamus; dependent Theriacæ effectus omnes à duplicibus viribus; aliis notis, manifestisque, quæ à caliditate & siccitate proueniunt; aliis occultis & peculiari proprietate veneno aduersis. De illa vi calefaciendi & siccandi, & quæ hanc sequuntur, vt notis, & cum aliis plurimis Theriacæ communibus, nò opus multis verba facere: sed vnde illa vis venenis resistendi Theriacæ insit, inquirere operæ pretium est, præcipuè cum alij aliter de eo sentiant.

Nonnulli idèò Theriacam omnibus venenis resistere autumant, quod constet & componatur ex medicamentis calidis, frigidis, humidis, siccis. Verumtamen uerò cum venena non calore, non frigore, non humiditate, non siccitate, sed occultâ & peculiari malignitate, vt alibi monstratum est, noceant, alexipharmaca non ex notis qualitatibus, sed occultis æstimanda sunt. Et quidem talia medicamenta multa, vt Opobalsamum præcipuè, scordium, dictamnus, gentiana, valeriana, & alia theriacæ vt & Mithridatio, insunt; sed cur Andromachus iis non contentus carnem viperarum seu trochiscos viperinos addiderit, indagare non inutile fuerit.

Barthol. Maranta, quem sequitur Thom. Iordanus, & alij, eo fine viperarum carnes admisceri docent, vt alexipharmaca ad venenum, quod expelli debet, quasi manu ducant. Cum enim res per similitudinem, naturâ duce, coniungantur, & quasi naturali instinctu sese mutuo appetant, vt venenum, quod in corpus ingressum est, eiici possit, existimant, aliud venenum propinandum esse, quod illud appetat, atque ad aliud tendat, & ex inopinato veluti succenturiata & inuoluta secum rapiat illa venenum expugnantia medicamenta. Si verò alexiterium aliquod solum adhibeatur, metuunt, ne ad interiora venenum, vt contrarium suum fugiens, repellat, vnde, priusquam vis eò perueniret antidoti, homo

Theriaca  
vbi.

Cur Theriaca  
hodie non  
usum, quæ  
vis  
habeat.

Vnde Theriaca  
vires  
oriuntur.

Cur caro vi-  
perarum  
Theriaca ad-  
miscetur.

uno extingueretur. Verum his assentiendum non putamus: docentque id tum alia, tum ii effectus, quos etiam præseruando edit Theriaca, vbi adhuc nullum in corpore venenum præsens est. Nam si eo fine admiscetur caro viperarum, vt tanquam venenum reliqua medicamenta ad venenum sibi simile ducat: locum saltem haberet in curatione Theriaca, vbi venenum iam præsens est in corpore, vbi verò veneni nihil adest in corpore, frustra, & non tutò, exhiberetur; atque præseruationis gratiâ, solum alexipharmaca propinanda essent, tutiusque esset in præseruando Mithridatium, quàm theriaca. Atque Carnem viperarum loco veneni non adhiberi, inde etiam patet, quòd Andromachus & alij, qui de Theriacæ compositione scripserunt, partes venenosas diligenter ac studiosè abscindere & remouere iubent.

Esse venenosam viperam quidem extra controuersiam est: non tamen omnes eius partes necessariò venenosæ sunt, quod in aliis animalibus videre est, in quorum plurimis venenum saltem in vnâ parte hæret, reliquis nihil veneni habentibus. Draconi marino spina in dorso planè venenosa est: reliqua tamen caro iucundissimum cibum exhibere fertur. Pastinaca marina in radio saltem venenum habet, non in toto corpore. Ita & in felis capite venenum esse creditur, non in reliquâ carne. Habet suum pungentem, & venenatum aculeum apis; licet totum illius corpus plenum sit & diffusetur dulci illo & vtilissimo liquore, qui certissimum est ictus, qui ab eâ infertur, remedium. Ita & vipera non in toto corpore, sed in quibusdam saltem partibus venenum habet. Obseruatum est autem, venenum in vi-

Vipera venenum in quâ parte hæret.

peris hæere præcipuè in capite, & in eo maximè in dentibus & gingiuis, tum etiam in vesiculâ fellis. Et qui maius studium in viperarum naturâ inuestigandâ adhibuerunt, duplex viperis venenum inesse existimant: alterum fixum & firmiter à primo ortu dentibus inhærens, quod in mortuis quoque supersit, adedò vt si quis ab emortuæ viperæ dentibus tangatur, periculosum id esse animaduersum sit; alterum spirituosum, quod in gingiuis tumentibus seu dentium vesiculis hæret, & ex vesiculâ fellis duobus meatibus ad eos deriuatur, quod, vbi ictu viperæ corpori immittitur, tanquam ignis per animantis corpus defertur, & celerrimè cor petit; atque hoc morte extingui atque expirare existimant. Generari autem ex animalibus venenosis, quibus viperæ victitant. Cum enim viperæ etiam rebus venenosis, scorpionibus terrestribus, vt docet Aristoteles, 6. de historiâ animalium. capite 29. & similibus viuant: statim feces venenosæ per aluum deiiciuntur, & si quid relinquitur veneni, id à cæteris membris ad vesiculam fellis, ad id constitutam amandatur, è quâ ad gingiuas & dentes per peculiare meatûs deducitur, vnde etiam vis illa venenosa in dentibus redditur potentior. In felis autem hæere venenum, inde coniicitur, quòd viperæ ictui illitum similitudine substantiæ venenum ad cor repens retrahit, & ad se trahit, non minùs quàm ipsum caput viperæ impositum. Carnes autem nihil veneni in se continere, tum alij asserunt, tum experimento se didicisse testatur Baldus Angelus, Abbatius. Cum enim canibus & felibus fel obicisset, celeriter interiisse: si verò cor, hepar vel carnes, nihil mali sensisse refert.

Viperarum carnis vis.

Non solum autem non venenosas viperæ carnes esse, sed etiam ad expellenda venena comparatas, ex iis, quæ dicuntur, patebit. Galenus in libro 11. de simplic. medic. facultat. & libro de subfiguratione Empiricâ, capite 12. summum in viperis contra Elephantiasim, aliis remediis incurabilem, inesse remedium docet, idque historiis & exemplis insignibus probat. Erat, inquit, in Asia in pago Elephantiasii vir laborans, cui, cum aliquot iam contagio inquinasset in edito loco prope pagum tabernaculum habitandum pagani struxerant. Aestate circa canis ortum colonis vicinam metentibus segetem minister vini lagenam, quam attulerat, prope agri marginem di-

mittens abiit. Coloni labore functi cum ad pocula accessissent, ac quidam eorum vinum in craterem funderet, ecce! exanimata vipera sunul elapsa bibituros consternauit. Ac ipsi quidem aquam potantes, vinum egrosanti attulerunt, humaniter se acturos existimantes, si tantam viri calamitatem morte redimerent, quam ex eo veneni haustu planè futuram arbitrabantur. At ille nouo prorsusque admirando euentu ab hoc ipso potu sanatus est. Excidit enim tota cutis dura & velut lapidosa, non secus, ac si cancris locustisue aut cæteris huiusmodi crustaceis animalibus testam, quâ continguntur, abstraxeris. Nec dissimile in Mysia Asia accidit. Vir erat pradiues Elephanticus: hic ancillam suam formosam deperibat; contra illa fœdum hominem odio habebat. Accesserat ager inde sibi promissâ salutis spe ad quosdam calidarum aquarum fontes, vbi multa viperarum vis ob loci squalorem erat. In vini igitur lagenam parum diligenter seruata viperâ irrepsit, quam cum suffocatam deprehendisset ancilla, rata fore, vt odiosus herus eo veneno facillè interiret, cœnanti alacriter vinum istud obtulit: eueniuntque omnia eadem, quæ pagano illi. Hos casus postea Galenus imitatus, Philosopho cuidam hoc morbo vehementer laboranti, vt idem remedium vsurparer, author fuit: qui & vinum ita medicatum bibens, ab Elephantiasii liberatus est. Alteri etiam suasisit, vt viperarum carnes anguillarum modo, coctas ederet: quod vbi fecisset, ægritudo discussa est. Tot igitur experimentis confirmatus Galenus, certam spem concepit sanandi Elephantiasim Theriacâ, sale viperino, & ipsâ viperarum, capitibus & caudis amputatis, carne. Quæ Galeni Elephanticos curandis ratio ab Oribasio, Aëtio, Æginetâ, aliisque Græcis & Latinis Medicis approbatur & confirmatur.

Est & hoc notatu dignum, quòd vinum corruptum à viperâ viuâ in dolium coniectâ & suffocatâ restitui assumatur: factumque hoc esse Romæ in cellâ vinariâ Cardinalis Vrini, multorum testimoniis & colloquiis se accepisse, refert Baldus Angelus Abbatius, de viperæ naturâ & facultatibus, capite 11.

Verum quâ vi viperarum carnes hos effectus edant, quâ vi vinum non dum satis liquet. Si ea intrucamur, quæ Galenus, 11. de simplic. medic. facultatibus habet de carne viperarum, nihil occulti, sed solum notas & manifestas qualitates ipsis tribuere videtur. Ita enim eo loci docet, Caro viperarum exsiccat, vehementer digerit, mediocriter calefacit; Properat autem eius vis ad cutem, per eam videlicet, quæ in corpore sunt recrementa, exigens. Author libri de Theriacâ ad Pisonem, c. 9. vbi præcipuus de vi venenum expellendi sermo est, facultatem illam non definit, sed saltem viperarum carnem ἐμψυλον ὀρεῖς, ὡς ἂν δυνάμει & ὡς τὸ βονδὸν ἰσχυρὸν habere scribit.

Sed si quis effectus carnis viperinæ diligenter perpendit, & in mentem sibi reuocauerit, quod à Paulo Æginetâ dictum est; contagiosum hunc morbum esse, non minùs quàm ipsissimam pestem; & simul considerauerit, ab aliis saltem qualitatibus primis agentibus nihil tale præstari posse: is facillè intelliget, non saltem vi siccandi vel digerendi, sed inprimis alexiteriâ præditas esse viperarum carnes, atque eâ ratione Theriacæ admisceri, non vt venenum sint, sed vt præcipuum alexipharmacum venenum oppugnent atque expugnent; atque animaduertat, simulque mirabitur, & in viperis verum esse, quod Ecclesiastici capite 33. scriptum est; Intruere opera Altissimi, & bina quæque videbis, quorum alterum repugnat alteri.

Itaque & hic meritò recurrimus ad salutare illud, ignorantiaæ asylum, vt appellatur à Iulio Cesare Scaligero, occultas qualitates.

Commendatur & illa Antidotos, quæ Regi Mithridati ascribitur; de quâ Plinius lib. 23. cap. 8. ita scribit; In sanctuariis Mithridatis maximi Regis deuicti Pompeius inuenit peculiari commentario ipsius manu compositionem antidoti è duabus nucibus siccis & ficis toridem, & rursâ folijs 20. simul tritis, addito salis grano. Et qui hoc

ieiunium sumat, nullum venenum nociturum ei illo die. Istam tamen compositionem Recentiores postea, variis additis medicamentis, non parum mutarunt, ut ex formulis, quæ passim extant videre est.

Extat & Theriaca Diatessaron, item sales quidam theriacales, in hoc morbo præservando & curando utiles apud Galenum, de theriacâ ad Pisonem.

Et si quis plures antiquis vsitatas antidotos cognoscere cupit, legat duos Galeni libros de antidotis, in primis verò secundum librum, in quo maxime celebria antiquorum Alexipharmaca à Galeno describuntur.

Recentiores plurima addiderunt, suntque celebria: *Electuarium de croco siue de ovo dictum, Diascordium Fracastorii, Pulvis Saxonicus, Antidotus Guidonis de Cautiaco, Pulvis Casaris rubens, & gryseus, Electuarium Camphoratum Kegleri*: atque alia plurima, quæ passim describuntur, in primis à Langio, lib. 3. epist. medicin. Epistolâ 1. Horat. Augenio. l. 3. de peste, c. 13. Petro Sibylleno, de peste, Andriâ Gallo, de peste, fasciculo 5. Cratone, in Consil. de pestil. Platero, parte secundâ praxeos, in curat. feb. pestil. & passim aliis authoribus pluribus. Rari enim sunt, qui, ut & ipsi non minus quàm antiqui sapere videantur, non aliquid novi medicamenti hic cõponant, cum præstaret sapere, bene inuentis ac probatis vti, quàm noua componere. Ut omnino maioris industriæ sit, è talibus selectiora aliqua eligere, quàm mulea colligere.

Vnum tamen atque alterum medicamentum addere licet. Et primò quidem Theriacam Germanorum Iacobi Theodori Tabernæmontani, cuius vires theriacæ Andromachi non inferiores sibi compertas esse testatur.

℞. Glandium quercus gentiana. an. lb. β, rad. ireos, helenij, rad. angelica, pimpinella, an. Vnc. iiii. lenistici, eryngij, vincetoxici, plantag. tormentill. an. Vnc. iiii. imperator sem. anisi, fenic. an. Vnc. ii. radic. Chelidonia, salvia Romana, rad. petasita, farsafa, calami arom. an. Vnc. i. β. aristoloch. dictamni albi, rubia tinctor. pentaphylli, Cortic. aurantior. an. Vnc. i. Cardui-benedicti, centaurij minor. an. M. iiii. summit. pastinaca sylvestris, verbena, Chamapyt. hyperici, scabiosa succisa, an. M. iiii. alsines, agrimonia, origani, pulegij, serpilli, fol. Lauri, lingua ceruina, salvia an. M. ii. Coq. omnia in aquæ f. q. f. a. Colentur cum forti expressione in torculari. Remanentiis affundantur xii. mensuræ vini, atque iterum coquantur & colentur. Colat. misceantur. Postea

℞. Baccar. iuniperi el. lb. xx. Sambuci lb. iiii.

His affunde decoctum colatum, & coquantur ad consumptionem medietatis: postea perstaceum trahantur.

Huic adde succi cortic. ingland. virid. ruta an. lb. iiii, brassica, absinthij, acetosa, borrag. an. lb. ii. rad. valeriana, belonica, interioris germinis Raparum, (dashertz) marrubij, sonchi, buglossi, veronica, mariscaria an. lb. i. Sapa & mellis despumati an. lb. iiii. Coq. in formam Opiatæ.

Quâ ratione vulgarem theriacam in nobiliorem formam redigi posse putet Quercetanus, videatur in eius Pharmacopœa restituta lib. 1. cap. 13.

Nōnulli hoc medicamentum valde commendant,

℞. Spirit. vitii optimi mensur. i. theriaca, opt. Vnc. vi. Myrrha el. Vnc. ii. rad. Petasita, Vnc. iiii. Spermat. ceti, terra sigillat. hirundinaria an. Vnc. i. dictamni albi, pimpinella, valeriana an. Vnc. ii. Camphora Drac. i.

Concisa & contrusa misceantur, de qua mixtura, si interdum 3. i. in vino sumatur, magnam vim à peste præservandi habet.

Ægyptij, ut Prosp. Alpinus. lib. 4. de medic. Ægypt. cap. 15. refert, plurimum in huius Electuarij vsu confidunt, quod componunt,

Ex terra sigillata Drach. ii. sem. citri, acetosa an. 3. i. β. boli Armeni, aristolochia rotunda, scordij, zedoaria, dictamni cretici an. 3. i. theriaca antiq. cornu cerui vsti an. 3. i. β. margaritar. Smaragdi, hyacinthi, camphora, croci an. 3. i.

ii. santalor. omn. corallor. rubr. albor serici vsti an. 3. β.

Quæ omnia in puluerem redacta cum syrupo acetosif. citri miscent: Cuius dosis est ab 3. sem. ad 3. i.

In primis verò apud Turcas atque Ægyptios nobiles, opobalsami visus est frequentissimus, & ut à pestis contagio sese defendant, plus huius liquoris vini fiunt, quàm aliis auxiliis: cum succus iste aduersus omnem humorum putredinē præstet, ut etiam eo inuncta cadauera diu imputria seruet, hominis colorem naturalem foueat & augeat, membra præcipua roborer, atque citissimè totum corpus penetret. Exhibent autem cum aq. è succo aut floribus citri destillatâ, vel vino albo, aut iure pulli. Aut quod valde celebre apud eos secretum in peste habetur, opobalsami vnciis duabus miscent myrrhæ, carpobalsami, ligni aloës, terræ sigillatæ, boli armeni, margaritarum, lapidis bezoar, croci, an. 3. i. sumuntque huius compositi singulis diebus manè drachmam vnam.

Electuarium cardiacum satis operosum videri potest apud Libanum, in Alchymia pharmaceuticâ, pag. 222. Est & hoc efficax.

℞. Rad. tormentilla 3. i. zedoaria, scordij, cardui bened. acetosa an. 3. sem. sem. citri, acetosa an. 3. i. C. C. vsti prepar. 3. sem. terra sigill. Siles. oculor. & prepar. boli Armeni veri, off. de corde cerui an. 3. i. F. Pulvis.

Vel ℞. Rad. angelica, valeriana, vincetoxici, tormentilla, helenij, olsenichij, zedoaria an. 3. i. dictamni cretici, terra sigillata Sil. C. C. an. 3. sem.

Pulueriscentur subtilissimè & incorporantur, cum rosambuci, iuniperi, nucum, mellis despumati an. f. q. addendo sub finem: conferva acetosa, cardui bened. scordij, rosarum, an. 3. sem. ol. è baccis iuniperi 3. sem. balsami sulphur. 3. sem. myrrha. Drach. i. Misce. F. Electuar.

Quâ ratione ex balsamo sulphur. rotulæ ad pestem præcauendam utiles parari possint, dictum est in Institutionibus. Quæ efficaciores reddi possunt, si iis extractum helenij vel angelicæ, aut vtrumque addatur, & saccharum in aquâ rosarum optimâ soluat. V. g.

℞. Extr. angelica, helenij, an. Drach. i. balsami sulphur. 3. sem. sacch. albi in aq. scabiosa & rosar. diss. Vnc. vi. F. rotulæ.

Io. Baptista Gemina de rat. cur. bubonis & carbunculi pestil. hanc compositionem pro summo secreto à Rege Hispaniæ haberi scribit.

℞. Myrrha el. Mastiches, boli Armeni, terra sigill. ligni aloës, caryophyll. macis, croci, part. aq. F. Pulvis, de quo singulis diebus manè Drach. sem. vel q. f. sumatur.

Crato eundem ita describit:

℞. Myrrha, ligni aloës, terra sigill. boli Armeni, an. Vnc. β. macis aceto prepar. croci, an. Drach. ii. F. Pulvis.

Commendatur etiâ maxime pulvis cordialis Banisteri pretiosus; & ad pestem, febres pestilentes, & malignas utilis.

℞. Succin. albi prepar. 3. ii. terra lemnia vera 3. i. sem. C. C. Vnc. sem. rasura eboris, Drach. v. corall. alb. prepar. margarit. prepar. lap. Bezoar. santal. citrin. sem. citri an. Vnc. sem. cornu Vnicor. Drach. i. sem. cortic. citri Drac. iiii. ambr. gryf. Scir. i. fol. auri & argens. an. 3. sem. moschi gr. viii. F. Pulvis. subtiliss. Dos. ʒ. v. vel x.

Ut & alius Rubeus Alexiterius, cuius descriptionem vide apud Libanum, Tom. 1. Syntagm. p. 169.

Hennici Stapedij, qui ob dexteritatem in curandâ peste celebris est, medicamenta aliquot circumferuntur.

℞. Sulph. opt. vel flor. sulphur. 3. ii. camphora Drach. i. sem. Spiritus terebinthina, Vnc. iiii.

In cucurbitâ vitreâ liquecant, & f. Mixtura.

Efficacius sit medicamentum, si post digestionem in retortâ vitreâ eliciatur oleum, cuius gutt. ii. vel iiii. cum vino vel liquore aliquo propinari possunt:

℞. Balsami huius Vnc. ii. Theriaca Drach. ii. croci Drach.



Drach. i. M. & digerantur per dies 14. quo vngantur arteriæ in carpis & temporibus, & loca sub axillis.

Commendatur & hæc eius aqua:

℞. Theriac, mithridatij, an. Vnc. vi. pulu. Electuarij de bolo Iuberti, Bezoartici apud Nicolaum, an. Drac. ii. spirit. vin. opt. vini maluatici, aceti rosacei an. lb. i. succi radic. pimpinella, limonum, an. Vnc. vi.

Destillantur in B. Liquori qui extillauit, iterum admiscetur theriacæ 3. vi. ad vsum seruantur.

Pro pauperibus idem hoc vsurpauit.

℞. Granor. iuniperi Vnc. vi. caricar. pingu. num. xii. nucl. nucij iugland. Vnc. viii. conferv. fl. borrag. bugloss. an. Vnc. iiii. theriacæ, mithridatij, an. Vnc. ii. radic. tormentill. gentiana, pimpinella, angelica, Zedoaria, an. Vnc. i. Cum syr. de limonibus F. Electuarium. Item:

℞. Condit. vel electuarij huius lb. vi. Spiritus vini re-Elificati, vini maluatici, aceti rutacei, succi radic. pimpinella, limonum, an. lb. i.

Destillantur in B. destillato liquori adde Theriacæ Vnc. iiii.

Est & efficax Elixir pestilentielle à Crollio descriptū.

Nonnulli sequens miris modis commendant:

℞. Boli Armeni, terra sigillata, sigilli Salomonis, rad. helenij, tormentilla, pimpinella, angelica, imperatoria, sem. eruca, an. 3. sem. caryophyll. cinamom. ligni aloës an. Drach. i. santali rubri Scr. i. Theriac. opt. Vnc. i.

Affundatur Spiritus vini mēl. i. Huius mixturæ si manē guttæ aliquot fumantur, 24. horis hominem à peste præseruare ea prædicatur: Infecto verò cochlear. i. ad sudore in ciendum propinandum.

Vel ℞. Theriacæ Vnc. i. Mithridatij, radic. tormentill. fol. dictamn. cretici, scordij, an. Drac. sem. rad. dictamn. alb. Scr. ii. boli Armeni, terra sigill. an. Drac. i. C. C. vsti. ramentor. Unicornu, an. 3. lb. sem. acet. citri, sancti an. Scr. i. camphora Drach. sem.

Puluerisanda pulueriscentur, & cum syrup. acetosif. citri, F. Elect.

Ferdinandi Imperat. Electuarium contra pestem hoc celebratur.

℞. Boli Armeni Vnc. sem. rasura C. C. sem. cit. auran-  
tior. an. Drac. i. dictamn. alb. cinam. an. Drac. i. sem. rad. an-  
gelica, tormentill. scabiosa, gentiana, aristoloch. spec. Elect.  
de gemmis, margarit. præp. ras. eboris, camphor. off. de C. C.  
corallor. præp. nucis mosch. an. Drac. sem. santalor. omnium  
Drac. ii. cort. citri. condit. 3. sem. Cum syr. acet. citri. F. Elect.  
Crebra etiam fit mentio apud authores Electuarij cam-  
phorati Kegleri, quod ita paratur.

℞. Rad. torment. ii. dictamn. alb. nuc. vomic. an. 3. i. C. C.  
præp. Drac. ii. camphor. sacch. can. an. 3. sem. Zingib. albiss.  
Vnc. i. theriac. Androm. 3. ii. Misc. pro electuario.

Alij sic parant: ℞. Rad. tormentill. dictamn. nuc. vomic.  
off. de C. C. C. C. præp. zedoar. boleti ceru. an. Drac. ii. cam-  
phor. aq. vit. destill. 3. sem. sacch. cand. Vnc. i. Zing. Vnc. ii.  
theriac. Androm. Vnc. v. syr. acet. citri. parum F. s. a. Elect.

Antidotus hæc quoque à Recentioribus laudatur.

℞. Theriacæ lb. i. Extrahatur aqua bezoartica, vel spi-  
ritu iuniperi tinctura. Feces calcinentur, & cum aquâ  
cardui bened. sal extrahatur, liquoriq; qui essentia The-  
riacæ attraxit, misceatur. Hinc liquor per balneū destil-  
letur, vt in fundo essentia seu extractum theriacæ ma-  
neat, Syrupi consistentiâ. Liquor, qui extillauit, est aqua  
bezoartica satis efficax. Extracto adde essentiam corallo-  
rum, perlar. an. Drac. ii. lapid. bezoar. veri, unicornu veri,  
an. Drac. i. lb. ambra, essentia è trochiscis vipera, myrrhe, an.  
Drach. i. Super igne lentissimo misceantur. Vltimò ad-  
dantur Olei citri gutt. vi. camphor. gutt. ii. Misc.

De hac antidoto, præseruandi gratiâ, particula pifi  
magnitudine darur. In curatione Drac. 3. cum aquâ ali-  
quâ bezoartica.

Casp. Bauhinus, in fine lib. de lapide bezoar. antido-  
tum bezoardicam describit ex Francisco Ponâ, Medi-  
co Veronensi, diuturnis cogitationibus ab eo concin-  
natam, & experimentis euidentibus comprobata,

Dan. Sennerti Tom. II.

& quâ nulli locus ad præstantiorem excogitandum re-  
lictus sit. Quæ ad Drach. ii. (quæ est summa dosis,) Infantibus  
commoda  
medicamen-  
ta.  
contra omnia venena efficacissima sit, scrupuli verò  
vnius pondere confectio quodque die sumpta aduersus  
omnia venena tueatur.

Descriptio autem eius hæc est.

℞. Lap. Bezoar. Orient. legitim. Pauonij sine Thaos,  
Malacensis ex felle hystricis, unicornu legitim, an. Drach.  
3. margar. Orient. præp. Drac. v.

Et hæc multiplicentur deficiente Thaos & lapide Ma-  
lacenfi pondere eorum. fol. aur. num. L. terra sigill. legiti.  
boli Arm. lutei Orient. corall. rubr. præp. smaragdi præp. an.  
Dra. ii. rad. scorzon. Hispan. Drac. vi. tormentill. munda re-  
centis, anthora, bistorta, pentaphyll. contra bierna, angelica,  
pimpinella, eryngij, an. Drach. ii. cortic. citri. matur. flor. citri.  
nonduin exolutor. in umbrâ siccator. sem. citri. recens. præp.  
an. Drac. ii. 3. baccar. lauri, iuniperi, an. Drac. iii. ruta, car-  
dij bened. dictamn. cretic. calaminth. montan. scordij veri  
Cretens. an. Dra. 3. agalloch. legitimi, zedoaria, galang. mi-  
noris, cinam. lecti, caryophyll. select. croci opt. an. Scr. ii. sem.  
ocym. caryophyll. amomi veri, ruta, an. Drac. ii. hyperic. al-  
thea, an. Dra. iii. opobalsami legitimi, theriacæ Androma-  
chi, mithridatij, elect. alcherm. de hyacinth. an. Vnc. 3. mel-  
lis Attici despumati lb. ii. Vnc. iiii. Misc. F. Elect. s. a.

Sunt alij, qui non minùs pretiosas & operosas com-  
positiones adornant; & qui que suam prædicat. Mate-  
ria illorum sunt; Extracta ferè ex omnibus vegetabili-  
bus pesti aduersantibus; Olea eorundem destillata; So-  
lutiones ac magisteria margaritarum, gemmarum &  
corallorum; atque alia tam à mineralibus, quàm ani-  
malibus petita. Exempli gratiâ.

℞. Extracti ægelica, valeriana, helenij, granor. iuniperi  
zedoaria, tormentilla, an. Dra. i. croci Scr. 3. lactis sulphuris  
Scr. i. ossis de corde cerui Dra. 3. solution. perlar. corallor. la-  
pidis bezoar. salis ruta, absinthij, an. Scr. i. ol. destill. citri  
Scr. 3. confect. alchermes Drac. i. conferva rosar. buglossi, iu-  
nicis, an. Vnc. i. Cum syr. acet. citri. vel tunicis q. s. admiscen-  
dum: de quo singulis diebus sumatur portio, quæ ii. pisa  
magnitudine æquet. Minus operosa & pretiosa ex vno  
atque altero extracto parantur: vt

℞. Extr. cardui bened. scord. olfenichij, an. Dra. 3. ol. dest.  
angelica, Scr. 3. sacchar. in aq. scordij dissol. q. s. F. rotulæ.

Alij, nec sine causâ, aceto extracta parant. Vt:

℞. Rad. angelica, valeriana, olfenichij, zedoaria, scor-  
zonera, tormentilla, an. Vnc. i. fol. scordij, cardui bened. di-  
ctamni. veronica, ruta, an. Vnc. 3. cortic. citri, baccar. iuni-  
peri, an. Vnc. i. sem. citri Vnc. 3. Affunde aceti destill. q. s.  
F. Extractū. Cui adde ol. destill. citri. Scr. 3. salis fraxin, ab-  
sinth. an. Drac. i. Dosis à Drac. 3. ad Drac. i.

Cum verò infantibus vehementer siccantia, vt & Infantibus  
commoda  
medicamen-  
ta.  
theriacam ac Mithridatium exhibere non liceat, iis  
conuenient pulueres ex radicibus tormentillæ, C. C.  
margaritis ac similibus. Vt:

℞. C. C. vsti, crudi, boli Armeni, an Vnc. sem. terra si-  
gill. Drac. ii. corall. rubr. præp. margarit. præp. an. Drach. i.  
spec. liberant. s. aloë, Drac. sem. Cum sacch. F. puluis vel ro-  
tulæ. Vel tales rotulæ pueris parari possunt:

℞. Sem. sancti Drach. ii. cortic. citri, rad. tormentill. an.  
Drac. 3. boli Armeni, terra sigill. an. Dra. i. corall. rubr. præp.  
off. de C. C. an. Drach. sem. sacch. in aq. scabiosa vel card.  
bened. dissol. q. s. F. Rotulæ.

Pro grauidis, quæ & ipsæ fortia medicamenta non Grauidis  
utilia medi-  
camenta.  
ferunt, tale parari potest.

℞. Rasura eboris, Vnc. sem. corall. rubr. præp. margar.  
præp. an. Dra. ii. C. C. vsti præp. spec. diamarg. cal. confect.  
cordial. temp. an. Dra. 3. Zedoaria, nucis mosch. an. Drach. i.  
F. Puluis, vel cum sacch. rosar. tabulæ.

Vel ℞. Conseru. borrag. bugloss. ros. an. Vnc. i. cort. citri  
condit. Vnc. sem. spec. diamarg. frig. Dra. sem. cordial. sem-  
peras. Scr. i. fragm. lapid. pretios. an. Scr. 3. boli Armeni, zed-  
oaria, tormentill. an. Dra. sem. croci Scr. i. Cum syr. de cort.  
citri. s. moscho & syr. de acetositate citri. F. Electuarium.

Vel ℞. Aq. cydonior. recens destillat. lb. i. sem.

in quâ bulliant vase clauso *radic. tormentill.* Drac. iij. in colaturâ dissolu. *conserua flor. tunici.* Vnc. ij. *rosar.* Vnc. i. Iterum colentur. Adde *syr. de cortic. citr. acetos. citri.* an. Vnc. i. sem. F. potio clara.

De usu calidorum medicamentorum contra pestem admodum.

Verum cum talia passim extent plurima, in his immorandum non est. Duo saltem adhuc monenda censemus. Primum, licet ut antea quoque dictum, medicamenta præseruantia in qualitate, quâ pestilenti veneno resistunt, conueniant: In primis tamen qualitatibus, quæ occultis illis coniunguntur, non paruum esse discrepantiam; Ideoque temporis & ætatis in iis eligendis habendam esse rationem. Experimenta enim docuit, eos, qui tempore æstiuo & calido, grassante peste, nimis calidis medicamentis, in primis ipsi calidioris naturæ, frequentius vsi sunt, in autumno, in graues tertianas & quartanas febres aliisque periculosos morbos incidisse. Quapropter vsus calidorum eiusmodi medicamentorum moderatus sit. Et temperata medicamenta omnibus naturis & temperiebus magis accommodata sunt. E quorum numero hoc esse potest.

*℞. C. C. vsti prapar.* Drac. i. off. de C. C. rasura eboris, an. Drach. β. *terra sigill.* Drac. i. *unicornu, margarit. prapar.* an. Drach. β. *fragm. hyacinth. smaragdi, rubini prapar.* oculor. *℞* an. Scr. j. *lapid. bezoar.* Scrup. β. sem. citri, *Acetosa, rad. distamni,* an. Drach. i. *santalor. omnium,* an. Scr. i. sem. *ocymi* Drach. β. *madis in aceto macerati & exsiccati* Drach. i. F. Puluis.

Et cum calida omnia, nonnullis, quod spiritus inflammant, atque incendunt, atque hoc modo cum febre pestilenti consentiant, suspecta sint, radices omnes ferè calidas, ut angelicæ, valerianæ, zedoariæ, Imperatoricæ, leuistici, aceto prius præparant; vel in aceto radices angelicæ, leuistici, zedoariæ, rutam, saluiam, atque alia mecerant, & manè cochlear j. curius, quàm aquam theriacalem exhibent.

Vel *℞. Theriaca* lb. i. Extrahatur cum aceto destill. postea destillando acetum separetur. *extracti* Drach. i. Adde *oculorum* *℞*, *unicornu, lapidis bezoar.* an. Scr. β. Misce.

De hac mixturâ fumendum instar grani tritici manè & vesperi, cum cubitum itur, & superbibendum cochlear aceti bezoartici.

Eodem modo ex speciebus liberantis & aliis quibuscunque speciebus ac pulueribus, in quibus vis calefaciendi suspecta est, cum aceto extracta parari possunt, & cum de extracto, tum de aceto præseruationis gratiâ aliquid sumi.

Atque hac ipsâ de causâ commendatur Spir. vitriol. qui aliis quoque calidioribus medicamentis commodè admiscetur, ut:

*℞. Olei macis, nucis mosch. distill. spiritus terebinth. balsa. Orientalis,* an. Scr. sem. *spiritus vitriol.* Scr. ii. Misce, de quo gutt. i. vel gutt. ii. cum syrupo Granatorum vel aceto. *Citri exhibentur.* Et extracta reliqua vtiliter cum aceto præparantur, atque omnia calida acidis corriguntur.

Deinde ne in morbo tam periculoso nouis & inexpertis nimium fidamus, sed efficacissima & vsu longo probata vsurpemus, monent nonnulli & hoc, vni alexipharmacò perpetuò inhaerendum non esse, sed mutanda interdum alexipharmaca, ne natura vni assuescat, id immutet, atque ita parum ab eo auxilij percipere possit; & ut, (cum pestilentie grassantis definita natura lateat,) si plura vsurpentur ab iis, quod ab vno non potest, sperari possit.

Atque hæc de præseruatione sufficiant. Illud saltem addimus, cum ea felix habeatur ciuitas, quæ tempore pacis ea, quæ belli sunt, cogitat: quisque dum sanus est, ita & animæ & corpori prospiciat, ut si fortè grauissimo hoc morbo corripatur, animam, & si Deo placuerit, ipsum etiam corpus ab omni periculo seruare possit. Itaque primò à Deo peccatorum remissionem petet, vitam emendabit, & pretiosum illud, ut Ignatius, in Epistola

ad Ephesios, eleganter nominat, *et. µανυ ἀθανάσια, ἀντὶ τοῦ τῷ κυρίῳ ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῆν ἐν θεῷ διὰ ἰσχύος Χριστοῦ, κατὰ τὸν ἀλεξίφρακτον* sibi comparabit: deinde, ut necessaria ad pestilentis huius morbi curationem remedia semper in promptu habeat, operam dabit.

## CAPVT VI.

### De Curatione Pestilentie.

Curationem quod attinet, de eâ quoque sunt dissentientes Medicorum opiniones. Nam quidam Alexipharmacis vel solum vel maximè confidunt: Alij præterea, ut in aliis febribus, venæ sectione & purgatione opus esse censent. Cum verò, vtra opinio verior sit, scire summopere vrile sit, & leue aliquod erratum commissum in peste curandâ irreuocabile damnum pariat, diligenter de eâ re disquirendum.

Ut autem id rectè fiat, Indicationes in conspectu habere oportet. Pestis autem per se & quatenus occultus morbus, venenatæ ac malignæ qualitatis ac dispositionis per contrariam qualitatem alterationem ac destructionem: causâ verò internâ veneni per inspirationem aut contactum hausti, tum huius vi generatarum pestilentium ἀποκρίσιν eradicationem & seu per διαφύσιν seu per sudorem discussionem indicant. Atque hinc patet, pestem per se, neque venæ sectionem neque purgationem indicare: aliis tamen de causis, aliaque ob circumstantias quandoque admitti possunt.

Et primò quantum ad venæ sectionem, testantur plerique doctissimi Medici, qui & ipsi in hac re obseruandâ diligentiam adhibuerunt, & quid alij obseruauerint, fideliter inquisuerunt, plures, quibus vena non aperta est, quàm quibus secta fuit, euasisse; ideoque censent, minùs peccari in peste curandâ, si venæ sectio omittatur, quàm si incautâ adhibeatur: tutioremque esse in venæ sectione adhibendâ timiditatem, quàm audaciam.

Ambros. Paræus, de peste cap. 24. refert anno 1565. cum pestis per totam Galliam ferè grassaretur, se ex omnibus vrbium, per quas Regi Carolo nono Bayonem iter erat, Medicos & chirurgos diligenter & studiosè disciscitatum esse, quid ægris successisset in purgatione & phlebotomiâ: atque omnes vna voce respondisse, obseruasse se sedulo; omnes peste correptos, quibus liberaliter sanguis detractus fuerat, & corpus valdè purgatum, deterius inde habuisse, tandèque interiisse: reliquos, quibus solis alexiteriis prouisum esset, ferè cunctos euasisse. Idem testatur Cornelius Gemma, Fallopius, Conradus Gesnerus, Ioh. Bauhinus. Fatetur & ingenuè Roder. Fonseca de sanit. tuend. capite 27. ex multis, quos malignâ febre in hospitali curauerat, plures mortuos fuisse quibus sanguis sectâ venâ missus fuerat; pauciores, in quibus abstinerat. Et P. Forestus refert, in peste Delphensi, quæ anno 1557. grassata est, eos, quibus pest duodecim horas vel diem naturalem vena aperta fuisset, mortuos esse; vel admodum paucos ex iis euasisse. Neque aliter fieri potest. Nam si naturam pestilentie consideremus, & contrâ naturam venæ sectionis, & cuius gratiâ adhibeatur, perpendamus: liquidò constabit, pestilenti veneno non opponi venæ sectionem, neque per venæ sectionem illud educi posse: imò facile fieri potest, ut vires, quæ aliàs in hoc morbo valde periclitantur, intempestiuâ venæ sectione labefactentur, naturæque motus in expellendo veneno impediatur, illudque introsum rapiatur.

Et si enim Lud. Septalius in animaduers. medic. lib. 5. num. 36. scribit, in peste illâ insigni, quæ Mediolani anno 1575. & 1576. grassata est, se cum aliis medicis primò quidem venæ sectionem auersatum fuisse, verum cum ex sententiâ curationes non succederent, mutatâ sententiâ aliorum exemplis

& felicioribus successibus excitatum, venæ sectionem postea feliciter adhibuisse, tamen id ad omnem pestilentem constitutionem trahi non potest. Addit enim ipse, *ibid.* Septalius quod pestis ea non ex vniuersali aeris corruptione orta fuerit, sed Contagione communicata, salubri alioquin cælo & anni constitutione saluberrimâ, & rerum omnium, quæ ad victum faciunt, maximâ abundantia, & quod corpora Mediolanensium alioqui succi plena sint. Itaque ipse concedit venam non esse secandam, si pestis sit ab vniuersali aeris corruptione vel victu prauo.

Quapropter non in qualibet pestilenti constitutione, nec in quolibet corpore sanguis mittendus: sed si ea deprehendatur in corpore aliquo sanguinis copia, vt metuendum sit, ne putrida febris vehemens, à quâ æger non minus, quàm ob ipsam pestem periclitari possit, accedat; aut sanguinis ad loca inconuenientia impetus animaduertatur, vnde pestis curatio impediri aut retardari possit, aut, quod Fallopius addit, si bubo delituerit, viresque potius sint copiâ oppressæ, quàm dissipatæ: tum deum sanguinis missionem instituere licet; tantam tamen, quantam vires ferunt. Et quidem mox in principio instituenda est venæ sectio, intra 12. horarum aut non multo plurius spatium. Quibus elapsis, venæ sectio amplius non conuenit.

In venâ autem aperiendâ obseruandum, an dolor aliquis alicubi in corpore appareat, necne. Nam si nullus vllibi dolor animaduertatur, vena aliqua in brachio communis aperiatur. Si verò dolor alicubi deprehendatur (vbi bubo vel Carbunculus sit erupturus) in eo latere vena aperienda, & quidem ea, quæ naturæ motum adiuuet, non impediat. Ideoque si parotis post aures, vel bubo sub axillis, aut carbunculus in partibus superioribus erumpat, in brachio eiusdem lateris vena aperienda. Si autem circa inguina naturam aliquam expulsionem moliri animaduertamus, Saphenam vel aliam pedis venam eiusdem lateris aperire commodum est. Si tamen carbunculus in alterutro crure oriatur, cum is inflammationem & dolorem vehementissimum, quo vires deliciuntur, excitare soleat, commodum est, in opposito crure venam aperire. Neque enim hoc modo materiæ motus impeditur; sed ita etiam à partibus superioribus materia versùs inferiora trahitur, simul verò nimius ad locum affectum affluxus & inflammationis augmentum prohibetur. Monent etiam quidam, si carbunculus vel bubo appareat, antequam venæ sectio instituat, prius cucurbitulam tumori applicandam esse, ne venenum, quod natura ad exteriora expulit, venæ sectione ad interiora reuocetur.

Purgatio.

De purgatione in peste curandâ non minor est controuersia. Verùm ne prolixè hac de re disputemus. Hoc primò tenendum, Nullo purgante medicamento, vt Cratonis verbis & sententiâ vtar, seminarium pestis eiici; nisi fortasse magnâ naturæ commotione factâ, quod sit satis periculose, cum Antimonio & similibus, quorum vii natura irritata cum noxiis quoque vtilia eiicit. Nimirum licet fieri possit, vt natura fortioribus medicamentis, præcipue ex  $\zeta$  &  $\gamma$  paratis, irritata, humores vitiosos è corpore expellat, atque vnâ, quod eos occupauit, pestilens venenum eiiciat, indeque ægri sanentur: Hoc tamen ex accidente fit, in naturis quibusdam fortioribus: Ipsum verò purgans medicamentum primariò pestilenti veneno non opponitur: Imò sæpe talia purgantia plurimum nocent. Nam cum Natura plerumque venenum pestilens ad ambitum corporis expellat, purgatione hic motus materiæ impeditur, venenumque pestilens ad interiora retrahitur, humoribusque magis permiscetur. Ideò & humorum motu concitato periculosa, imò lethales, vomitiones & diarrhœæ

excitantur. Quapropter inprimis in Alexipharmacis, non in purgatione salutis spes, post Deum, in peste collocanda: quæ si rectè adhibeantur, purgantibus sæpe opus non est. Interdum tamen etiam post alexipharmaca, purgantia viurpanda.

Duo enim hic perpendenda. 1. diligenter corporis constitutio, quod peste corripitur, consideranda; & quomodo post Alexipharmacum sumptum sese æger habeat, qualique febris pesti accedit, attendendum. Nam si corpus purum sit, nec de febre aliquâ putridâ periculosâ metus, sola Alexipharmaca sufficiunt, atque vnice danda opera, vt per sudores pestilens venenum discutiatur, & per ambitum corporis, quæ via est commodissima, eiiciatur: sicut sæpe compertum est, homines à peste vnico sudore largiore liberatos fuisse. Si verò corpus Cacochymicum sit, & metuendum idem ferè periculum ex febre putridâ atque à peste: post sumptum Alexipharmacum, medicamentum purgans exhibere inutile non est, vt pars aliqua materiæ putredinem conceperit, febrémque aucturâ subtrahatur, vt natura reliquum facilius vincere possit.

Deinde & illud considerandum; An pestis, quæ grassatur, magis ab aeris vitio aut contagio ortum habeat, An verò potius ab interno humorum vitio dependeat; vt sit post annonæ caritatem. Nam si ab aeris, qui inspiratione attrahitur, aut contagij venenositate, Spiritus vitales inficiente, pestis ortum habeat, purgatione opus non est, sed alexipharmaca sufficiunt: nisi forsan pestis in corpus valde caco-chymicum incidat. Tum enim interdum Purgatio non inutilis est, licet non pestis, sed febris tantum putrida subsequatur ratione.

Si verò, quod interdum fit, ab internâ humorum corruptione Pestilentia maximam partem ortum habeat: purgationem instituere non solum vtile, sed & necessarium est. Nam si corpora prauis & corruptis humoribus scateant, purgatio instituenda est, ne illi aliorum medicamentorum vsu inflammantur, aut ab humoribus corruptis venenum fortius euadat, ac sese latius disseminet, aut humores illi copiosi agitati in nobilem aliquam partem irruant, & inflammationem lethalem, pleuritidem, phrenitidem, anginam vel aliud periculum creent; & omnino ne febris putrida periculosa accendatur. Vnde, si purgatio omittitur, licet pestilentis veneni vires per Alexipharmaca fractæ sint, malum non raro in alium, non minus periculosum morbum degenerat.

Qui verò solum purgantibus initio exhibitis venenum pestilens è corpore tollere conantur, frustra laborant, imò ægrum in vitæ discrimen coniiciunt. De quâ re pluribus, dictum in Institut. lib. 5. par. 2. sect. 1. cap. 6. Quia tamen Lud. Septalius, *animadu. medic. lib. 5. num. 46. & seqq.* acriter defendit, in pestis curatione à purgatione inchoandum, à sudoriferis verò omnino abstinendum esse; eius opinionem adhuc examinare libet. Vtitur autem mox in principio distinctione Septalius, & si pestis per contagium vagetur ac hominibus optimè sanis communicetur, à purgantibus abstinendum censet; cum si exhibeantur, carnes colliquant, bonos humores euacuent, spiritus exhauriant, & vires vitales destruant. Si verò corpus prauis humoribus repletum sit, omnino purgandum esse censet, præsertim cum nostrâ ætate tot medicamenta purgantia inuenta sint, quæ neque venena sunt, neque venenatam naturam participant, neque excessu caloris igneum febris æstum adaugere, neque etiam alui fluxum concitare solent.

Et quidem statim initio aut saltem secundo die purgandum putat, idque ideò primò, quod materia hæc cruda, cuius purgationem prohibet Hip-



pocrat. 1. aphor. 2. 2. non sit, utpote quæ coctionem nullam recipere potest; (cruda enim ea dicuntur, quæ coctionem recipere apta non sunt,) sed summopere corrupta, quæ ad statum meliorem nullum reduci potest. Deinde quoddam maxima ex parte turgat, & principes partes impetatur, ut ex variis, quas natura tenet, excretionibus, per aluum, vomitum, per sudores, per urinas, per cutis efflorescentias, per carbunculos & bubones videre est. Imò etsi non turgat, statim tamen euacuandum esse docet materiam pestilentem, ne reliquos humores inficiat & corrumpat. Et frustra expectari coctionem, quæ nulla futura sit. Neque etiam vlla mala & incommoda à purgantibus metuenda censet, quæ à crudâ euacuatione sequi docet Galenus, 1. aph. 22. & 2. aph. 9. Alexipharmaca verò frustra exhiberi putat corpore non purgato; cum vires suas, corpore non purgato, ad cor mittere non possint, si natura ipsa nullum sudorem mouere rēnter, sed expectandum potius esse, donec natura ipsa aliquid moliatur.

Verumenimvero acceptamus hoc primò, quod Septalius concedit in peste, quæ corpora sana & vitiosis humoribus non reſerta per contagium inuadit, à purgantibus abstinendum esse. At pestem istam frequentissimam esse putamus. Et proinde etiam rectissime tunc ab alexipharmacis, cum purgantia locum non habeant, est faciendum curationis initium.

Ergo quæstio saltem est de corporibus prauis humoribus reſertis, an si ea peste corripiantur, à sudoriferis vel purgantibus faciendum sit initium. Quæ nostra sit sententia, iam antea dictum. Lud. Septalij verò opinio parum firmis rationibus nititur. Nam sit sanè, ut prauis & corruptis humoribus adsint, tamen ab iis, quatenus solum corrupti & putridi sunt, natura pestilentia non constituitur, sed quatenus venenum coniunctum habent, à quo maius, quam à putredine, imminet periculum. Venenum autem non indicat purgans, sed alexipharmacum. Et quia à veneno pestilenti maximum periculum imminet, ei primum alexipharmaca opponenda, postea de purgantibus, quæ cacoehymia requirit, dispiciendum. Et sit sanè, ut humores tales nullam coctionem admittant, tamen non purgantia indicant, quatenus venenati. Sit etiam, ut putridi purgationem indicent, de tempore tamen adhuc quæstio est, & ante alexipharm. sumpta purgandi sint. Nihil etiam huc facit aphorismus 22. sect. 1. Ibi enim tractatur ab Hippocrate de humoribus qui purgatione indigent, docetque humores in febribus putridis acutis crudos non purgandos esse initio, nisi turgant. At pestilens humor, quatenus talis, purgationem non indicat, ideoque nec quæri potest, an in principio, ut turgens, purgandus sit; cum nullo modo purgationem indicet. Et quamuis sæpe vomitus, alui profluvia, maculæ, carbunculi & alia in peste accidunt, tamen illi motus non semper naturæ opera sunt, sed potius à prauitate materiæ, ut in aliis venenis, accidunt. Et ubi naturæ opera fiunt, ea quidem adiuvanda est; sed per alexipharmaca, non purgantia, quæ humores turbant magis, & venenum cum iis plus permiscunt, ab externis ad interiora reuocant, viresque deiciunt, & sæpe periculosas & lethales alui fluxiones concitant. Ab alexipharmacis verò tale periculum non imminet, sed quod venenatum est, & mortem acceleraturum erat, impugnant & expellunt, naturamque à summo periculo liberant, ut humores postea vitiosi facilius & commodius expurgari possint.

Tutissima ergò pestilentiam curandi ratio summam hæc erit. Si pestilentia aliquem inuaserit, Deo in auxilium primum inuocato, mox ad alexipharmaca & sudorifera confugiendum, neque villo modo curatio differenda. Atque existimo tot homines peste

sæpe interire, quod plerique tardiùs alexipharmaca usurpent, multoque posse seruari, si ea citius, & antequam venenum humores corrumpere incipit, assumerent. Aliquoties enim obseruavi hæc in pestilentibus constitutionibus, quosdam, cum se infectos sentissent, statim sumptis alexipharmacis ad sudorem se composuisse, & postea nihil mali amplius passos esse, sed postmodum ad consueta negotia rediisse. Contra si curatio protrahatur, & hora 8. vel 12. iam elapsa sint, antequam medicamentum aliquod propinetur, censemus vix euadit.

Post primum sudorem porro dispiciendum, an corpus sit plethoricum, & venæ sectio requiratur. Tum enim ea sine omni mora intra horas duodecim aut certe ante 24. instituenda. Verum quia plerumque Medici tardè consuluntur, & inuasionis principium non semper obseruatur, ac propterea virum sapius præceptum ut plurimum adest: plerumque consultius est, venæ sectionem intermittere, quam incautè & cum periculo ægri eam instituere.

Alexipharmacorum autem antea, ubi de præseruatione egimus, magna copia proposita est, à quibus efficacissima & vñ probata eligenda sunt: cum periculum hæc facere sine periculo non liceat, & in peste inefficacia atque inutilia remedia adhibita ægrum in vitæ discrimen coniciant, atque exitiales affectus ne leuissimum quidem errorem ferant, ut rectè Galenus, lib. 10. meth. med. cap. 11. scribit.

Ac proinde non immeritò quæritur; An in curandâ pestilentia lapidi Bezoar quoque locus sit? Dissentientes authorum opiniones collegit Gaspar Bauhinus, de lapide Bezoar. capite 34. & c. 36. historias plures recenset eorum, qui lapide hoc feliciter vsi sunt: Contra c. 37. eorum, qui hunc lapidem non magnificiunt, ac sine fructu usurparunt, historias recenset. Ut inde non facile videre sit, vtri parti fides sit adhibenda.

Ego cum illorum, qui eum profuisse testantur, fidem planè in dubium vocare nolum, tres causas esse existimo, cur idem effectus ab eodem non semper proveniat. Primò, quod genuinus semper non habeatur. Ut enim de aliis, quæ de adulteratione huius lapidis habentur, apud Bauh. c. 25. non dicam, in equis reperiuntur & ab iis excernuntur lapides, qui colore & substantiâ lapidem Bezoar planè referunt, ut videre est apud eundem Bauhin. c. 14. Mindererum, de pestil. cap. 15. Cum enim scriptores rerum Indicarum referant, hos lapides apud ipsos Indos raros & magni pretij esse: mirum certè, tantam hodie eorum copiam suppetere. 2. Bezoar, ob magnum eius pretium, sæpius exigua quantitate, & vix vnius atque alterius grani pondere exhibetur; cum ad vii x. & xli. exhiberi possit, imò in morbis periculosos debeat. 3. Quod rerum aliarum admixtione eius effectus impediri possit. Sæpe enim rerum occultis, hominibusque parum perspectis dissensus sunt, ob quos effectus quos singula seorsum habent, in mixtione impediuntur.

Ergo ut hæc concludam. Licet verum lapidem Bezoar non contemnendum censeam, ne contra experientiam pugnare videar, tamen nisi forsân lapis iam ante probatus in promptu sit, in peste, morbo acuto & periculoso non facile huic soli fidendum. Nam cum mani pretij hic lapis sit, impostorum diligentiam in eo adulterando vel falso substituendo, occupari probabile est, & si in promptu genuinus habeatur, tamen pauperiorum res angustæ eum non admittunt.

[Variè disputatur à Medicis de efficacia lapidis Bezoar, præcipue de vi eius in peste curanda, dum alij eum summis laudibus extollunt, alij non adeò magnificiunt. Sed verum esse, quod lib. 4. de Febr. cap. 6. scripsi, quod nimirum lapis hic non semper præstat, quæ multi pollicentur, causam esse, primò quod non semper genuinus habetur; deinde quod ob pretium magnum

Historia  
Zacut.  
Lusitan.

magnum plerunque nimis parua quantitate exhibetur, testatur historia, quam refert Zacutus Lusitanus; de Pr. med. Adm. lib. 3. obs. 86. vbi narrat, foeminam quandam incidisse in febrem malignissimam, deterrimis comitatam symptomatibus, inter quæ & hoc fuit, quòd tribus diebus sexaginta duos lumbricos per os excreuit; & ex contagio familiares omnes eodem morbo correptos fuisse, atque omnes periisse, quibus lapidis bezoar in parua quantitate fuit exhibitus: dominam autem, cum maximam eius assumeret quantitatem, interdum vno haustu 3. j. euasisse, licet periculosius, quàm reliqui, laboraret; atque eodem modo & alios curatos fuisse.

Vnicorn.

Eadem ferè de Vnicornu ratio est. Nam quid illud sit, quod passim in Thesauris quasi asseruatur, & in magno pretio, nomine Vnicornu habetur, vix aliquis certò affirmare potest. Ideoque vitam & sumptus hoc medicamento in periculum adducere, consultum non est, cum alia non minùs efficacia & vsu probata remedia suppetant; quæ suprà enumerata sunt.

Smaragd.

Mindererus magis Smaragdum laudat, dosi gr. vi. vel vij exhibitum, atque hunc puluerem momentaneà quasi vi mira præstitisse scribit:

℞. Smaragdi prepar. lapid. Bezoar. an. gr. vij. hyacinthi prepar. gr. iij. F. Puluis.

Non sine fructu & istum olim peste hîc grassante exhibui:

℞. Lap. Bezoar. opt. gr. xij. offis de corde C. Scr. j. Smaragdi prepar. hyacinthi prepar. an. gr. vij. F. Puluis.

Qui diuidatur in partes duas, atque exhibeatur cum aquâ aliquâ conueniente.

Camphora.

Plurimi & camphoram commendant, quòd valde putredini resistat, & venenosos halitus discutiat. Hinc celebratur hic puluis D. Hesso adscriptus:

℞. Sacchar. cand. Drach. iij. zinzib. albi, Drach. ii. camphora, Drac. i. F. Puluis. Dosis Drach. i.

Qui cum aquâ conueniente, commodissimè verò exhibetur cum decocto Tanaceti, cum aquâ acetosâ, & dimidiâ parte Aceti parata.

Verùm satis efficacia medicamenta, vt dictum, suprà sunt proposita, Vnum atque alterum tamen adhuc addere libet. Ex theriacâ & flor. Sulphur compositis elegans & vtile medicamentum concinnauit Nobilissimus & Celeberrimus ille Mathematicus, Tycho Brahe, cuius compositionem peculiari Epistolâ Rudolph. II. Imperatori Augustiss. communicauit, quam integram hîc inferere libet.

Augustissime & Potentissime Imperator,

RVDOLPHE,

Domine Clementissime.

Epistola Tycho-  
bræ  
ad Rudolph.  
II. Imp. con-  
tinens de-  
scriptionem  
Alexipharm.

**D**escriptio Medicamenti, quod contra morbos Epidemios passim nunc grassantes, Dei dono, efficax est, quale Sacra Casarea Maiestas tua clementissimè per suum Capitaneum Brandeisensem à me expetiit, in hunc modum, prout ipsemet adinueni, & comprobaui, se habet.

Accipiat primū pro corpore & fundamento Theriaca Veneta optima & veteris, aut potius Alexadr. lib. vna, cui in vitro oblongo satisque capaci superfundatur Spiritus vini, è generoso vino, ternâ distillatione & rectificatione moderato calore elicitur, vt extet supra theriacam ad quantitatem palmæ. Posteaque bene obturato vitro, ne spiritus exhalet, fiat digestio in tepido balneo per septimanam. Quâ peractâ materia omnis, quæ in vitro est, filtratur per bibulam chariam, vt separetur purum ab impuro, liquorque admodum rubicundus & pellucidus, qui in hac filtratione pronenit, indatur cucurbita vitrea, & suprà posito Alambico cum suo recipiente, atque vrobique bene clausis de more vitris fiat lenta destillatio in balneo medio-criter calido, nec aestuante, donec spiritus vini in receptacu-

Dan. Sennerti Tom. II.

lum guttatim euocatus materiam siue essentiam theriacalem in fundo cucurbita vitrea instar mellis liquidi, colorem tamen ad subrusam nigredinem tendentem obtinentis, reliquerit. Spiritus autem ille vini Theriacalis per se in vitro bene clauso conseruari poterit, & parum manè, vbi lubuerit, de eo sumi, instar alterius aqua vitæ. Habet enim in se aliquid de volatili essentia theriacæ, ideoque præseruatiui loco est, præsertim si ex oleo iuniperi sulphurato, de quo mox dicemus, bis vel ter ulterius in balneo exaltatus fuerit. Porro essentia illa Theriacæ, quæ in fundo remansit, sic efficacior reddenda. Sumatur sulphuris è cholcotare puro ter sublimati, & quartâ ex aloë, Myrrhâ & croco semel leniter sine adustione eleuati quarta pars libra; hanc superfundatur in cucurbita vitrea oblongâ de oleo Baccarum iuniperi, quod purum & in balneo rectificatum est, tantum, vt superemineat quatuor digitis. Potest etiam addi oleum succini in balneo ter rursus destillatum, & ab odore vehementia liberatum, vt sit eius quarta pars respectu olei iuniperini, estque sic melius: ponaturque bene clauso vitro in fornace cinerum, vbi stet in tepida digestionem per quatuordecim dies. Eliciet interim oleum iuniperi è floribus illis sulphuris rubicundissimam tincturam & optimam eorum essentiam in se attrahet. Fiat & hic separatio filtratione, prout antea. De puro autem & rubicundo liquore, qui papyrus bibulam transiit, addatur duodecima pars essentia Theriacæ prius confecta, ita vt hac duodecim vicibus oleum illud iuniperi sulphuratum excedat: Mox simul digerantur in tepenti balneo in phialâ, oblongâ bene obturatâ. Potest tamen iis prius aliquid addi de extracto Rad. Angelicæ, sale absinthij puro & essentia carabis albi, his tribus simul mixtis & pro decimâ sextâ parte priori liquori iunctis, posteaque vti dictum, simul in digestionem collocatis, idque per octiduum. Superaddere etiam conducit ante digestionem de prius reseruato spiritu vini Theriacali tantum, vt tribus digitis superstet. Digestione hac peractâ fiat denuò separatio impuritatū in trinfecarum per filtrationem supradictam, & spiritus vini additus separetur in balneo, lentissimo igne, donec materia in fundo remaneat, instar picis liquida, quæ, ex Dei benignitate, præsens est remedium contra luem Epidemiam, octo, decem, vel duodecim guttis, pro ratione patientis in aquâ aliquâ competenti, vtpote Prunella, Angelicæ, aut Cardobenedicti cochleari vno intrò assumpta, idque statim ac morbus sentitur, antequam per somnum virus cor occupauerit, posteaque sudore per aliquot horas, quò diutius, eò melius, elicit. Si manè quolibet ieiuno stomacho de hac medicinâ dua vel tres gutta in vino absinthiaco vel quouis alio appropriato liquore assumantur, præseruatiui eximij loco est.

Potest verò hac ipsa Medicina, per se omni auro præstantior, adhuc magis exaltari per additionem tinctura coralliorum, sapphyri & hyacinthi & margaritarum materia resoluta, tum quoque auri potabilis, si modò verum & genuinum ac corrosiuis rebus non inquinatum & corruptum, haberi possit, ita vt de singulis hisce scrupulis vnus prius confecto medicamento adiungatur misceaturque.

Quin & vniuersalius vt hoc reddatur medicamentum ad omnes morbos, qui per sudorem curari possunt, qualis ferme est tertia pars omnium eorum qui humanum corpus infestant, sic procedendum.

Antimonium selectum in regulum purum ter vel quater reiteratâ secum abiectione redigatur, posteaque contusa & puluerisato regulo per cucurbitam terream ignem fortem sustententem ad latus dispositam impellatur forti igne & successivè ad aucto alcohol antimoniale in aliam cucurbitam terream recipientis loco appositam, donec totius ferme regulus Antimonij instar pulueris subtilissimi vas anteposuum subierit. Hoc Antimonij Alcohol postea in vasculis quibusdam reuerberationi idoneis, & ignis vim perferentibus benèque argilla munitis, imponatur in reuerberatorium clausum, ita vt flamma infra ac suprà transeat, ipsa autem vascula conclusa non attingat; & fiat reuerberatio

successive adaucta per sex hebdomadas, donec Antimonium in puluerem album vel substatum redactum, quodammodo fixum euadat.

Hic puluis Antimonij etiam in aliquâ copiam assumptus non purgat, nec quidpiam corpus molestat; sed solummodo sudorem moderatum nec debilitantem ciuit.

De quo si prius preparata Medicina parum immisceatur, multo adhuc praestantior & efficacior ad omnes morbos Epidemicos redditur. Et insuper febres quasunque rite administrata curat, obstructionesque aperit.

Atque hac de Medicina Epidemica, quam Casarea tua Maiestati, prout clementissime voluit, humillime & fideliter consignavi; ut secretam habeat, sibi que soli reseruet, demisse peto. Mito verò nonnihil de eadem, quatenus hanc iuxta priorem descriptionis partem absolueri licuit, qua etiam valida est, atque Deo dante, in talibus morbis praesens remedium exhibet.

Estque hac purior & praestantior eâ, quam Cas. Maiestas tua à suo Capitulo per me etiam paratam habuit.

Hanc ut Cas. Maiestas tua clementi animo accipere, donec plura huiusmodi & maiora in eius gratiam parare oportunitas dederit, non dedignetur, subiectissime oro. Deus Opt. Max. Cas. tuam Maiestatem ab omni malo tueatur. Data ex arce Casarea tua Maiestatis Benachia, die 7. Septembris, Anni 99.

### Tycho Brahe.

Efficax est & hoc electuarium Cratonis.

℞. Scordij Drach. iiii. tormentill. dictamni atb. Zedoar. gentiana, angelica, caryophyllata, an Drach. i. croci, camphora, an Drach. sem.

Pulueriscentur, asperganturque aqua Cardui bened. in qua dissoluta fuerint Theriacæ Drach. ii. & cum sufficiente quantitate Sympi de succo Cardui bened. F. Electuarium.

Vulgus rob Sambuci cum aceto Theriacali non infelicitur usurpat.

Mindererus hanc aquam ad exhibenda medicamenta valde commendat:

℞. Succu nucum iugland. immatur. limonum, acetosa, pimpinell. an. lb. i. sem. cardui bened. scordij, ruta, an. lb. i. scabiosa, hedera terrestr. caëdula, melissa an. Vnc. viii. chelidon. galega, vel in eius defectu veronica, aceti de Rubo Ideo, sambucini, rosacei, an. Vnc. iiii. rutacei lb. i. radic. tormentill. gentiana, dictamni alb. an. Vnc. i. B. petasita, imperator. angelica, Zedoar. cortic. citri an. Drac. iiii. boletor. ceruinor. Vnc. ii. fol. dictamni cretici, scordij cretici, chamaedrys an. Vnc. i. santali citrini Drac. iiii. ligni Rhodij Drac. ii. Theriacæ Androm. Vnc. ii. mithridatij Vnc. i. baccar. in niperi recent. lb. i. cortic. medianor. sambuci recent. fraxini recent. an. M. iiii.

Cortices Sambuci & Fraxini contundantur, & cum aceti è floribus Tuniciis, aqua Pimpinellæ, Rosarum an. f. q. extrahatur inde succus. Succus omnes misceantur, addaturque Theriaca, Mithridatium, & cætera concisa & contusa, macerenturque per triduum, & per balneum aqua inde destilletur. In aqua destillata dimidia parte suspēdatur camphoræ Drach. i. in nodulo. Altera pars etiam seorsim vsu seruetur pro iis, qui Camphorā non ferūt.

Maximas quoque vires habet, & à plurimis valde praedicatur Elixir pestilentielle, quod Crollius, pag. 228. describit; si adulto ℞. ii. iuniori ℞. i. vel Drach. f. cum aceti rosacei scordij vel rutacei Drach. i. vel q. f. propinetur.

Ergo si quis peste infectus sit, ex iis, quæ ad manus sunt, efficacissimum sumat medicamentum. E.g. Adulto Theriacæ Drach. i. vel Electuarij de ouo aut diascordij Fracastorij Drach. ii. Salis absinth. Fraxini vel Cardui bened. gr. aliquot cum ℞. i. pulueris Saxonici, aut Casaris rubei, cum liquore conueniente propinetur: Vel aqua aut spiritus aliquis contra pestem, ut Elixir pestilentielle Crollij. Exg. r.

℞. Elect. de ouo Drach. i. Theriac. Drach. sem. pulueris

Saxonici, specier. liberant. an. Scrup. f. syrup. acet. citri Vnc. i. aqu. acetosa, cardui bened. an. Drach. x. aceti scordij Vnc. sem. Misce.

Vel ℞. Pulv. Saxonici, Casaris rubei, an. Drach. f. syr. acet. citri Vnc. i. scordij, aceti Theriac. an. Vnc. sem. aq. Stapediana vel alterius talis. Vnc. i. sem.

Plurimum etiam commendatur decoctum rad. chelidoniae maioris, ut ex Matthiolo, in comm. Germanico in Dioscor. lib. 2. cap. 10. videre est, quodque feliciter usurpauit, & modum eius praeparandi descripsit Gasp. Keglus, in tract. suo de peste. Grauidis, ut & infantibus detur Electua, diascordij Fracastorij, vel pulueris Montagnanæ infantibus ℞. i. adultis Drach. i.

Laudatur & Bezoardicum minerale & ♂, diaphoreticum. Quæ etsi satis efficacia sunt, tutius tamen est ea cum aliis, puluere Saxonico, Montagnanæ, & similibus miscere.

Atque talia in vsu quotidianum ex aliis compositis facile misceri possunt.

In horum tamen medicamentorum vsu cautiones quædam obseruandæ sunt. I. de Theriacâ & medicamentis calidioribus aliis, quod antè etiam monui, obseruandum, ut non temerè, sine vilo morbi naturæ, ætatis, sexûs, anni temporis, atque aliarum circumstantiarum respectu usurpetur. Vbi enim febris pesti coniuncta iam corpus occupauit, ea cautè, & non nisi frigefacientibus admixtis exhibenda. Itaque, ubi metus est, ne humores & spiritus nimis accendantur, spiritusque dissipentur, ægroque aliquod periculū inde creetur, rectius ij faciunt, qui talia non cū aquis Theriacalibus & calidis, sed potius cum frigidis aquis aut quod commodissimum est, cum aceto vel aqua aliquâ, quæ acetū aut acidus succos recipit, qualis est aqua Stapediana, Mindereri, & similes exhibent. Imò sunt, qui in magno calore, vehementi ventriculi dolore & Cardialgiâ, vomitu, similibusque symptomatis, Theriacam non planè veterem, sed recentiorum annorum scilicet duorum vel trium exhibet, in qua vires opij adhuc vegetæ symptomatū vim tandiu refrenare possunt, donec reliqua Alexipharmaca vires suas exerant, vimque veneni infingant. Sunt alii, qui opiata, ut Philonium (commodior vsus esset Laudani Opiati) Alexipharmacis miscent, ut nimirum motus atque actio veneni pestilentis sistatur & frenetur, symptomatumque vehementia mitigetur, donec Alexipharmaca vires suas exere, seque veneno opponere possint. Imò sunt quidam, qui Opio vim sudoriferam tribuunt. Alii ubi non viget calor, causa nulla est; cur Theriaca reicienda sit; cum plus commodi venenum expellendo, quàm damni, calorem excitando, afferat.

II. Obseruandum, Theriacam, Mithridatium, Electuar. de Ouò, & similia calida ac fortia medicamenta non facile infantibus & pueris, grauidis & puerperis esse exhibenda, sed alia mitiora substituenda. Conuenit his magis Diascordium Fracastorij, quod sine insigni humorum agitatione veneno resistit, sudores mouet, putredinemque inhibet, Exhibetur autem hoc modo commodissime.

℞. Succu acetosell. seu trifolij acetosi Vnc. ii. citri Vnc. i. diascordij Drach. i. spec. cordial. de gemmis an. Scrup. i. aceti Vnc. i. Misce.

III. In Camphorâ ac Camphorariis exhibendis naturarum constitutio consideranda. Qui enim infimo sunt ventriculo & capite, aut qui aliis camphoram auersantur, iis alia potius, quàm camphorata, medicamenta sunt exhibenda. In tanta enim medicamentorum copia non opus est, nec necessarium, ut vni medicamentum adstringamur. Imò medicamenta variare vtile est.

IV. Quò maiorem veneni vim esse animaduertimus, eò efficaciora, & quæ praesentissimas vires habeant, medicamenta eligenda sunt: quo in genere excellunt Aquæ & spiritus destillati, quorum mentio antè facta est, quæ mox in totum corpus penetrant, pestilentiæque veneno sese opponunt. Facit idem Camphora, quæ



quæ reliquorum medicamentorum quasi vehiculum est. Non magnâ tamen eius copiâ opus, sed duo vel iii. gr. sufficere possunt.

V. Si æger medicamentum vomitu reiiciat, mox illud repetendum. Imò cû illud retineat, semel exhibere Alexipharmacum non sufficit, sed intra 8. horarum spatium repetendum. Et si primùm medicamentum exhibito Cor non liberetur, fortius exhibendum secundum: imò intra 24. horarum spatium ter Alexipharmacum exhibendum. Neque sibi quis persuadeat, si semel vel bis sudauerit, & melius nonnihil habeat, se iam extra omne periculum constitutum esse: cû venenum iterum, si minimâ etiam eius reliquæ in corpore hæreant, vires postmodum sumat, nonnumquæ naturæ bellum inferat. Itaque necessarium est, alexipharmaca & sudorifera talia intra biduū quinque vel sexies repetere. Quod cû sæpe negligatur, plurimi, quæ seruari possent, intèreunt. Medicamento exhibito æger sese, in primis primâ & secundâ vice (si enim veneni vis fracta sit, non multum refert, si tertiâ vice non sudet) ad sudorem componat, nec frigidum aërem vlllo modo admittat; sed det operam, vt sudor copiosè fluat, atque si potest, ad duas horas sudorem continuet, vt venenum pestilens planè è corpore eiiciatur. Et si medicamento satis copiosè sudor non prolicitur, aliis etiam modis, vt lagenâ aqua calente plenâ, aut lapide calente, linteis aceto vel vino madidis inuolutis, pedibus appposito, excitetur.

In sudore proliciendo tamen cauendum, ne vires deiciantur. Cû enim aliàs morbi huius vehementia vires subito prosterнат & corpus exoluat: si, quòd nonnulli faciunt, stragulis non tantùm æger contegatur, sed ferè suffocetur, sudorquæ nimis diu, ad horas scilicet 4. vel 5. continuetur, facile fieri potest, vt vires planè deiciantur. Quare vt dixi, sufficit, sudorem horis duabus continuare.

Censent præterea docti Medici, vni remedio in peste non esse fidendum, sed, vt Crato, *epist.* 134. hac de re scribit, initio singulis propemodum horis, deinde successu temporis singulis diebus remedia mutanda; cû vix in vno aliquo antidoto tantum roboris sit; quantum ad hostem tam potentem debellandum requiratur.

V I. A somno abstinere æger, donec bis sudauerit. Iulius quidem Palmarius, assumpto Pharmaco, duas horas dormire permittit; cû per somnum sudor æquè profluat, ac per vigilias: verùm metuendum est, ne vis veneni per somnum ad interiora serpat, ægerque in vitæ periculum coniciatur.

V I I. Inter sudandum reficiatur æger. Conseruâ Rosar. Acetosæ, Rob Rubium, Succo & Syr. Citri. Granator. Aquis Cordialib. & similibus, qualia mox proponuntur. Odoramenta etiam ægros valde recreant, atque inspiratione cor potest roborari, vt per expirationem halitum venenatum à se fortius expellat. Itaque in conclauis Acetum Theriacale lateribus ignitis infundatur: Trochisci & Candelæ pro fumo accendantur: Odoramenta cû alia naribus admoquantur, tum in pyxide habeantur species liberantis, vel alia talis confectio; quæ subinde moueantur, vt de puluere illo aliquid naribus attrahatur. In primis yero hîc vtilis sunt Aq. odoratæ suprà propositæ.

V I I I. Præter hæc sunt & alia, quæ partim Cor roborant, partim venenum è corpore eiectè possunt. Nonnulli, dum æger sudat, panem è furno calentem accipiunt partemque aliquam excuant, cavitatemque Theriacæ 3. ii. replent, & vmbilico apponunt, vt venenum à pane attrahatur. Alij Raphanum, in partes orbiculares dissectum, axillis, & aliis emanatoriis ac plantis pedum applicant. Alij panis medullam aceto madidam cordi applicant. Cordi nonnulli apponunt pannum quadri-

plicatum, aceto vel simplici, vel theriacali aliquo imbutum; vel sacculum ex saluâ, acetosâ, rutâ contusis & aceto madefactis, calidè applicant. Alij alios Cordiales sacculos adhibent. Poteest & Electuarium aliquod, cum Oleo Citri & Myrrhæ, vel vnguentum conueniens, regioni cordis, temporibus & pulsibus adhiberi. In humidis tamen & frigidis adhibendis videndum est, ne sudorem impediunt, venenumque ad interiora repellunt. Quidam ante sudorem cum lacte calido Gargarismum instituere iubent; cû lac calidum halitum venenatum ac pestilentem ad se trahat.

I X. Finito sudore corpus linteis mundis modè calentibus exsicceetur Diligenter tamen videndum, ne, aëre frigido occurrente, venenum intrò recedat. Et si sudorem rectè sese habere animaduertatur, ac symptomata remittant, quod indicio est, veneni maximam partem expulsam esse: linteaminina quoque & tegumenta lectorum mutantur.

Post sudorem æger cibus *euxybutis & eumolus* reficiatur, vt ouis recentibus, iusculis carniū, prisanâ, & aliis, qui sunt molles, & qui in paruâ quantitate multum nutriunt. Atque his æger sæpius reficiendus est. Neque enim, vt in aliis morbis acutis, inedia & tenuis diæta conuenit; sed vires sæpius refectione opus habent. Cibo tamen multo corpus onerandum & grauandum non est. Vtilissimum quoque, cibos acidis condire.

Et licet sudorem ciere (si tamen die Critico erumpat, non impediendus est) postea opus non sit: continuanda tamen ea sunt medicamenta, & singulis diebus exhibenda, quæ putredinem inibent; febri malignæ resistunt, incendiumque in visceribus extinguunt. E. g.

℞. Conseru. rosar. 3. ii. vel. iii. Dissoluantur in aq. acetosæ lb. i. Colentur.

Vel: ℞. Morsulor. de succo & cortic. citri Vnc. i. Dissol. in aq. scabiosa Vnc. iii. Adde vini granator. Vnc. i. Misce.

Vel ℞. Decocti C. C. vsti & crudi in aquâ conueniente vase clauso cocti lb. ii. succi citri Vnc. iii. ribium vel. berber. Vnc. ij. iulebi rosar. Vnc. i. sem. Misce.

Vel ℞. Aq. acetosæ, scabiosa, rosar. an. Vnc. iii. aceti de rub. Ideo, flor. tunici, rosar. an. Vnc. ii. vini albi lb. sem. succi citri, iulebi rosar. an. Vnc. i. cortic. citri recent. Drach. vi.

Stent simul mixta in vitro, donec liquor odorem citri attrahat.

Vel ℞. Aq. cardui bened. acetosæ, scabiosa, an. Vnc. iii. rosar. Vnc. ii. cinamomi Vnc. i. succi citri, granator. an. Vnc. iii. extract. croci Scr. sem. solut. margar. corallor. C. C. an. Scr. i. confect. Alchermes Scr. ii. Misce.

Vel ℞. Conserua medulla citri Vnc. ii. rosar. acetosell. borrag. an. Vnc. i. ribium. condit. Vnc. sem. confect. Alchermes Drach. sem. spec. el. de gem. frig. cordial. temper. an. Scrup. i. Cum syr. tunici & spir. vitrioli, q. s. ad gratam aciditatem. F. Electuar.

Vel ℞. Solut. corallor. margarit. an. Scr. i. hyacinti, extr. croci, an. Scr. sem. confect. Alchermes Scr. i. ol. de cortic. citri. gutt. iij. sacch. albtissimi in aq. rosar. f. q. dissol. q. s. F. Rotulæ.

Possunt & alia ex Syr. Acetositar. Citri, de succo Acetosæ, Granator. Oxyfaccharâ, Rob Ribium, & similibus parari.

In primis yero commendatur spiritus vitrioli, qui insignem vim habet putredini resistendi, obstructions aperiendi, febresque extinguendi.

Vtilis est & confectio Alchermes, si cum succo Citri propinetur.

Vt ℞. Confect. Alchermes Drach. ii. syr. acetos. citri. Vnc. ii. granator. rub. Idæi, an. Vnc. i. Aq. acetosæ lb. sem. rosar. opt. Vnc. ii. scabiosa, an. Vnc. i. M. Detur sæpius haustus.

Post sudorē  
quâ ratione  
æger tractā-  
dus.

Somnus.

Inter sudandū  
quomodo  
æger tractā-  
dus.

Et de talibus alterantibus singulis ferè horis aliquid offerendum, nunc potius, nunc Syrupi, nunc Electuarij, nunc Rotularum, nunc alià formà, vt natura roboretur, venenòque resistere possit.

Postquam ita malignitas ac venenositas maximam partem victa est, si humores vitiosi in corpore abundant, aut pestis inprimis ab interno humorum vitio proueniat, Purgatio conueniens non omittenda est. Sint autem medicamenta purgantia leniora, ne vel vires debilitentur, vel humores ad aluum præcipitentur, & periculosum alui profluuium excitetur. Eligantur etiam talia, quæ præter purgandi vim, veneno resistere possunt, qualia sunt, Agaricus, Rhabarbarum, Symplicis solutius cum decocto Tamarind, vel Syrup. rosar. solut. præparatus cum Rhab. Pilulæ Pestilentia. E quibus ægro conuenientia medicamenta eligere non difficile est. Inter Composita conuenientissima est Tryphera Persica, Syr. Diaferos, &c.

Sunt quidam, qui Purgantia cum Alexipharmacis miscent, atque inter hos Heurnius, qui recipit Cæpam albam excauatam, eamque Theriacæ Drach. i. cum modico puluer. Radicum Dictamni & Tormentillæ replet, ac sub cineribus coquit, coctamque contundit, & affusâ aquâ Cardui bened. Aceto Calendulæ, succum exprimit, additque Trypheram Persicam, idque medicamentum & purgaturum, & mox sudorem excitaturum pollicetur: Contrariòsque eodem tempore, quod alij metuunt, motus non timet; Cum natura illicò ab hoste hoc liberanda sit, atque vsus, ista proba esse, docuerit.

Prosper Alpinus, lib. 4. de medicinâ Egypt. capite 13. refert, Egyptios peste infectorum cruribus, brachiis & inguinibus vesicatoria applicare, ex quibus vlcera multa iis in partibus, per quæ humores corrupti à naturâ expurgantur, excitentur: Alij tres longas scarificationes seu vulnera potius cruribus infligunt, quæ non sanant, priusquam ægri perfectè à peste sani euaserint.

Cum autem plerumque Natura magnam humorum venenatorum partem ad emunctoria Cordis, Hepatis, Cerebri expellere, ac Bubones & Carbunculos excitare soleat: Restat tandem, vt de Curatione Bubonum & Carbunculorum pestilentium dicamus.

Et I. Bubones quod attinet, alij aliter eos tractandos censent.

Sunt quidam, qui in hoc naturam planè imitandam esse existimant, & cum natura non nisi successiuè ac longiore tempore maturationem eorum instituat: etiam Medicum id vnicum hîc operam dare debere existimant, vt maturantibus medicamentis tumor iste ad suppurationem ducatur. Si enim mox in principio vel vesicatoria adhibeantur, vel scarificationes aut incisiones instituantur, non modò magnum inde dolorem, qui inflammationis maioris causa sit, viresque debilitet, excitari: sed id etiam periculi subesse putant, ne venenum, quod à natura ad exteriora protrusum, quietum & quasi sopitum iacebat, hoc modo moueatur atque agitetur, & spiritibus atque humoribus mixtum, iterum cordi, à quo expulsus erat, communicetur. Alij contrà sentiunt. Cum enim materia hæc pestilens contumax sit, & non faciliè in pus mutetur, non solum maturantia adhibenda & suppurationem expectandam esse censent; cum metuendum sit, ne humor venenatus, antequam in pus mutetur, iterum spiritibus & humoribus facili de causâ communicetur. Ideoque cum longè maius hîc, quàm in aliis non pestilentibus Bubonibus, periculum subsit, id vnicè agendum existimant, vt pestilenti veneno exitus, quem natura quærit, aperiatur, reliquumque postea conuenienti modo maturetur. Vnde non solum vesicantia mox adhibent, sed scalpello cutem incidunt.

Verùm distinctione hîc aliquâ opus videtur. Nam

si perfectè aut certè maxima pars veneni in Bubonem è corpore eiecta videatur; id quod cognoscitur ex eo, si postquam bubo erupit, & febris & symptomata remittant, atque æger melius habere incipiat: non peccatur, si concocto, licet non perfectè, vt in aliis tumoribus, expectetur, & ea omnibus modis adiuuetur. Si verò vel bubo non satis erumpat, venenumque à naturâ non satis, seu ob naturæ debilitatem, seu ob veneni copiam, expellatur; vel licet maxima veneni pars in Bubonem depulsa sit, tamen ob eius copiam moles tumoris nimis augeatur, vnde febris & symptomata non solum non minuantur, sed augentur, ægerque melius non habeat: nullo modo cunctandum, sed vnicè danda opera est, vt veneno exitus patefiat. Atque tunc frustra expectatur maturatio, quæ in materiâ tam venenatâ ante mortem ægri nulla futura est.

Esti itaque Cucurbitulæ siccæ etiam versùs ambitum corporis trahant: tamen his vttiliora sunt vesicantia. Et cum vnicè danda sit opera, vt venenum non solum à corde auertatur, sed etiam planè è corpore eliminetur, ne vllus ad illud ei regressus detur, commodissimum est, vt cutis scarificetur aut incidatur, vt manifestâ viâ patefactâ non solum liberius expiret, sed & humores pestilentes & corrupti effluere possint. Neque vllus metus est, quod nonnulli existimant, ne venenum per hoc remedium agitaturn ad cor regrediatur. Cum enim via ipsi patefiat, potius per illam à natura è corpore eiicitur. Et si simpliciter hoc metuendum esset, etiam in Carbunculo pestilenti maturatio expectanda esset: cum tamen extra dubium sit. Carbunculum mox scarificandum esse, vt exitus veneno pestilenti detur. Manifestum etiam est, naturam non à loco do. ente attrahere, sed ad dolentem locum humores mittere. Neque dolor extimescendus, qui ex vnâ atque alterâ sectione adeo magnus oriri non potest; & licet dolor aliquis inde oriatur: è duobus tamen malis minus eligendum, præstatque, cum aliquo dolore ægrum seruare, quàm sine dolore venenum in corpore relinqui, à quo mors expectanda sit. Immodò dolor leniri potest lacte calente, in quo flores chamæmeli cocti sint, atque aliis, vt mox dicetur.

Vt igitur venenum è corpore tollatur, aut vesicatorium aliquod adhibeatur; vt

℞. Camharid. demptis alis & capitibus part. j. fermenti partes iii, aceti parum. Misce.

Vel ℞. Sem. sinapi, corric. median. sambuci partes æquales.

Contundantur, & cum aceto misceantur in formam cataplasmatum, quod inducatur linteo albo.

Vel ℞. Fol. sambuci, sem. sinapi, nuclearum nucum rancidarum partes æquales.

Terantur & applicentur, Loco priùs theriacâ circumcircâ illito.

Aut Cauterio potentiâ, vel ferro cutis aperiatur, vt pestilenti humori egressus detur, ac via sit, per quam natura pestilens venenum è corpore expellere possit. Ac si dolor aliquis ex incisione oriatur, Ouum recens cum oleo rosaceo mixtum buboni imponatur.

Magno etiam cum commodo, licet incisio facta non sit, pulli gallinacei vel columbini, circa anum deplumati, buboni applicantur: idque sæpius cum nouis pullis repetitur: Hoc modo enim & dolor mitigatur, & venenum euocatur. Nonnulli bubonem exsiccatum vino macerant, dum mollescat, & buboni imponunt.

Postea detur opera, vt materia reliqua per idonea medicamenta maturetur. E. g.

℞. Rad. althææ Vnc. iii. farina lini, fenugraci, an. Vnc. i. rad. lilior. alb. sub cinerib. coctar. & contus. num. vi. ficuum contus. fermenti, an. Vnc. ii. sem. fini columbini. Vnc. i. sem. Coquantur in decocto radic. althææ & flor. chamæmeli in formam pulvis: Postea adde pinguedinis porci

Bubonum  
Curatio.

An in Bubonibus, maturatione expectanda.

Vesicantia.

Scarificantia.

Vesicantia.

porci. Vnc. iiii. olei lilior. alb. Vnc. ii. sem. scorpion. Vnc. i. sem. croci. Scr. i.

Iterum coque in formam cataplasmatum.

Alij capam cum theriaca sub cineribus coctam cum Emplastro maturante & oleo scorpionum miscent atque applicant.

Nonnulli quidem theriacæ usum hic reformidant, quod puris generationem impediatur: verum si maturantia admisceantur, facile hoc incommodum vitari potest, & nihilominus venenum Theriaca euocat.

Vel ℥. Rad. althaeae, lilior. alb. an. Vnc. i. Coqu. ad molliem, & per setaceum traiciantur. Adde pulueris dictamni albi, scordij, an. Vnc. i. caricas pingues num. iiii. Cum oleo lilior. & chamemel. F. Cataplasma.

Est quidam Guilielmus Magistrius, ut neque hoc præteream, qui scribit, ex attrahentium hic genere esse & balneum tepidum ex aqua fontana, aut potius lacte vaccino, in quo æger duabus horis a cibo stare debet, spatio trium aut quatuor horarum, ad medias usque coxas, eoque modo venenum non tantum ad exteriora allici, sed etiam ut plurimum integrè resolui.

In locum incisione apertum tale digestium adhibendum.

℥. Terebinth. Vnc. sem. vitellum oui unius, olei rosar. Vnc. sem. Misce.

Quod si ob incisionem minus profundam bubone maturato pus adhuc conclusum contineatur, scalpello aperiendus est: Vbi pus iam fluere incipit, hoc vnguentum adhibeatur.

℥. Terebinth. mellis rosati, an. Drach. vi. farina hordei q. s. F. linimentum.

Simulque hoc Emplastrum applicetur.

℥. Empl. diachyli simpl. Vnc. iiii. ammoniaci, galbani vino solut. an. Vnc. i. Misceatur in mortario pistillo calido, addendo: Rad. cynogloss. Vnc. β. pulu. bufon. exsiccati. rad. valerian. scabiosa, an. Drach. ii. ebuli. Drach. i. β. lenistici. Drach. i. olei lilior. & scorpion. q. s. F. Emplastrum. Postea hoc vnguento vtendum.

℥. Terebinth. Vnc. i. mellis rosati, farina hordei, sarcocollae, thuris, myrrhæ, an. q. s. F. vnguentum.

Hoc verò in primis attendendum ne vlcus citò claudatur, sed studiosè potius apertum seruandum, donec, quicquid veneni est in corpore, effluxerit.

Nonnunquam accidit, ut bubones non suppurentur, sed discusso veneno, & tenuiore parte materiæ per insensibilem transpirationem, crassior in glandulis relinquatur: ne igitur dolor sæpe recurrens, ac molestia inde ægro creetur, reliquæ emolliendæ & discutiendæ sunt, id quod fiet emplastro de Meliloto, oxycroceo, & similibus.

[Grauissima, & magni momenti est questio hæc; cum in talibus morbis malignis aliquid præter rationem tentare, cum ægri periculo coniunctum sit. Cum verò & de venæsectione, & de purgatione seorsim queratur, de vtraque seorsim agemus. Et primò quidem venæsectionem quod attinet, nonnulli eam instituendam esse, planè negant. Ita Fernel. 2. de abdit. rer. causis. cap. 12. scribit, in peste à venæsectione & valida purgatione abstinendum esse: additque causam, quod talia mala à venenata qualitate scaturiant, quæ antidotis propterea, pestilenti veneno contrariis, expugnanda, & per sudores eiicienda est. Petr. Sal. Diuersius etiam, de pestil. febr. cap. 21. prolixè hanc questionem agitat, & concludit, in pestilenti febre venam secandam non esse. Idem statuit Paræus, lib. 21. cap. 21. & alij Medici multi, qui in bubone pestilenti præcipuè metuunt, ne venæsectione natura ab opere suo, quo materiam pestilentem ad locum ignobiliorem deponere conatur, auertatur, & humor malignus ad interna reuocetur. Præterea vires valde languent in talibus morbis, & propterea non facile admittunt venæsectionem.

Alij contra, ut Trincauellius, Massarias, de peste,

Nicolaus Massa, Iohan. Baptista Gemma, de bubonis & carbunculi pestilentis curatione, venæsectionem admittunt; cum sæpe in peste infectis magna satis sanguinis naturam onerantis copia adsit, qui facile inflammationes parere, & febrem augere potest, neque alia remedia necessaria corpori ita repleto tuto administrari possint, & experientia testetur, sanguinis missionem in talibus morbis multis profuisse.

Verum quæ in genere de sanguinis missione in peste, supra, hoc cap. dicta sunt, etiam de peste cum bubone coniuncta locum habent: nimirum tum saltem venæsectionem locum habere, ubi & sanguinis copia adest, ut metuendum sit, nisi minuatur sanguis, febrem putridam periculosam accedere posse; & quidem id maturè & in principio statim faciendum esse. In bubone tamen pestilenti ita venæsectio instituenda, ut natura à conatu suo nullo modo auocetur, sed potius is eam adiunetur, & humor pestilens, qui ad bubonem à natura protruditur, ad interiora reuocetur. Itaque si in aliquo loco bubo erumpat, vel dolor aliquis bubonem erupturum prælagiat, non in loco à parte affecta longinquo vena aperienda, ne materia ad interiora retrahatur, sed potius ita instituatur venæsectio, ut motus naturæ adiunetur. Ac proinde si post aures parotis, vel sub axillis bubo eruperit, vel erupturus putetur, in brachio eiusdem lateris vena aperienda: si verò in inguinibus tale quid fiat, saphæna, vel alia pedis eiusdem lateris secanda, ut ita ad locum affectum materia potius attrahatur, quam aliò auocetur.

De purgatione maior difficultas est. Verum cum eadem de re prolixè, lib. 5. Instit. part. 2. sect. 1. cap. 6. & sup. hoc ipso cap. egerimus, quæ ibi dicta sunt, hoc loco repetere nolo. Hoc saltem addo, Zacutum Lusitanum, de prax. Med. Adm. lib. 3. obseru. 19. prolixè defendere, in bubone pestilenti purgandum esse. Verum nullis rationibus vtitur, sed saltem autoritatibus pugnat, quæ sine rationibus ad controuersiam tanti momenti decidendam non sufficiunt: Nos, ut locis alleg. diximus, equidem purgationem in peste non planè prohibemus, sed suo loco, ac tempore, & maturè eam admitemus: verum cum iam bubones & carbunculi eruperint, tuto exhiberi purgantia posse, persuaderi non queo, imprimis fortiora.]

Carbunculos tandem quod attinet, ij statim scarificandi sunt, & quidem satis profundè, ut humor pestilens & corruptus sanguis euocetur: postea imponendum est Emplastrum aliquod conueniens, cuiusmodi est hoc:

℥. Farina lenium, fol. plantagin. vna lupina, an. M. i. medulla panis secalini ℥. iiii. Coqu. in formam Cataplas. quod calidum applicetur, singulisque 4. horis renouetur.

℥. Theriac. mithridat. an. ℥. i. fermenti ac. ℥. β. ficuum. num. iiii. capam sub cinerib. assatam num. i. alij assati. ℥. i. β. fimi columbin. ℥. ii. sem sinap. ℥. i. β. croci. ℥. iiii. sapon. Venet. ℥. i. β. butyr. rec. ℥. β. Misce.

In primis commendatur Emplastrum de Fuligine, quod sic paratur.

℥. Fuliginis camini. ℥. x. fermenti, therebinth. butyri, an. ℥. i. saponis Keneti. ℥. i. β. mellis rosati ℥. vi. salis commun. ℥. β. vitellos ouorum. ii. theriac. mithridat. an. ℥. ii. Misce.

Vel ℥. Rad. consolidæ scabiosa, an. ℥. β. salis petra. ℥. ii. vitellum oui unius. Misce.

Vel quod sæpe probatum est: ℥. Succ. rad. consolidæ scabiosa, pedis columbini, an. Coch. vi. farina lenium hordei, an. Coch. iiii. Misce.

Commendatur & Emplastrum Angeli Salæ hoc:

℥. Gummi sagapeni, ammoniaci, galbani, an. ℥. iiii. therebinthina cocta, cera virgin. an. ℥. iiii. β. magnæ Arsenicalis subtil. pulu. ℥. xviii. rad. Aron. pulu. ℥. viii.

Gummata defecata prius oportet esse aceto scillitica, coctaque in formam Emplastri & pondere æstimata. Tum demum

Digerentia,  
& mundat.  
tis.

An in cura-  
tione Bubo-  
nis pestilentis  
vena secanda,  
& purgandus  
sit.  
De Venæse-  
ctione.  
Negatiua.

Afirmati-  
ua.

Deciso.

De purga-  
tione.

Afirmatiua  
Zacuti Lu-  
sitani.

Sententia  
Auroræ.



*demum Emplastrum inde cum aliis speciebus s. a. con-*  
*cinnetur. Ad foras alliciendum venenum virisque in*  
*pus conuertendum, excellenti specificaque virtute*  
*pollet.*

Præparatio Magnetis Arsenicalis supradicti.

*℞. Arsenici Crystallini, sulphuris vini, antimoni*  
*crudi, an. pari, equal.*

*Pilo simul subigantur in mortario ferreo, mittanturque*  
*in matrarium vitreum satis forte in furnum venti, postea*  
*in arenam posita ignem tamdiu subitus habeant, donec vi-*  
*tro bene calefacto dicta species simul instar picis colliquen-*  
*tur. Id quod cognosces, si, dum filo fundum contigeris, ma-*  
*teria adhaereat, irabaturque instar Terebinthina. Po-*  
*stea frange vitrum, refrigeratamque materiam subfuscā*  
*que representat lapidē subtilitertere, & ad usum custodi.*

Potest & Bufo siccatus vino maceratus imponi. Ad  
loca vicina verò, & ne venenum versùs interiora re-  
cedat defensiuum aliquod ex refrigerantibus, siccanti-  
bus & adstringentibus adhibetur, vt vnguentum de  
Cerasa cum Bolo.

Vel: *℞. Olei rosacei ℥. i. B. Aceri rosacei ℥. B. Boli*  
*armeni q. s. F. Cataplasma.*

Nonnulli corylam foetidam contundunt, & circa  
carbunculum applicant, sæpiusque renouant. Neque  
inutile fuerit, si multus sanguis corruptus circa car-  
bunculum deprehendatur, venam sub carbunculo ape-  
rire, vt sanguis ille corruptus euacuetur, nec iterum ad  
cor feratur.

Et, si calor Carbunculi sit nimius, vt non solum  
vicinas partes inflammer, sed summum dolorem ex-  
citer, applicari potest Emplastrum de Cynoglossa, vel  
de pomis granatis, quod sit ex pomis Granatis acidis,  
ad molliciem coctis, & per seraceum traiectis: idque  
singulis 4. horis renouandum est, Scribit quidem Pe-  
trus Droëteus, malè eos sentire, qui existimant ma-  
lum punicum ad inhibendum copiosum humorum  
fluxum adhiberi, cum potius attrahat, & inde in ma-  
gnum tumorem celeriter bubo (nam de Bubone lo-  
quitur: quod tamen etiam Carbunculo applicari po-  
test) accrescat. Sed parum in eo sibi constar. Nam mox  
addit: Debet autem Cataplasma vicinas Buboni par-  
tes contingere: vt ex iis velut humorem exprimat in  
glandulam tumentem.

Elchara vbi generata fuerit, vnguento adimenda.

*℞. Pingued. porci rec. sine sale ℥. i. Vitellum oui vnius*  
*farina tritici ℥. i. Milce.*

Vel: *℞. Pulueris radic. althea ℥. i. B. buglosse ℥. B. fa-*  
*rina fenugraci, lini an. ℥. i. B. Coqu. & cum Butyro sine sa-*  
*le. F. Cataplasma.*

Elchara, vbi sublata fuerit, mundandum vicus vn-  
guento de Apio: postea adhibetur vnguentum Ba-  
silicum vel aureum, & applicatur emplastrum de  
Minio.

Nonnulli referunt, si Sapphiro in cute circa carbun-  
culum circulus ducatur, non solum præcaueri, ne la-  
tius serpat, sed & venenum extingui. Interim, dum  
sanatur carbunculus, singulis septimanis bis hæc vel  
alia conueniens potio offeratur, vt quicquid veneni  
in corpore reliquum est, per eam expellatur.

*℞. Ag. Scabiose, flor. calendula an. ℥. ii. boli armeni,*  
*vel terra sigill. ℥. i. Milce.*

Atque hæc de præseruatione & curatione pestilen-  
tiæ sufficiant. Potuissent equidem plura medicamenta  
congerere: verum, vt supra etiam dictum, talia pas-  
sim plurima extant, præcipue apud auctores, cap. præ-  
ced. p. 407 allegatos, vt & Vnzerum, in *Antidotario*  
*Pestilentiali*, vt potius de delectu, quam copiâ sollici-  
tos esse deceat. Vt tamen etiam iis qui copiâ delectan-  
tur, satis fiat, fasciculum remediiorum talium in fine  
huius libri subiungemus.

Quæ verò ratione symptomatibus, quæ peste infe-  
ctis accidere solent succurrendum sit, ex iis, quæ  
infra, cap. vi. huius libri dicentur, patebit.

## CAPVT VII.

*De Pestilentis ac malignæ febris naturâ, & à*  
*peste differentiâ.*

PRÆter pestilentiam crebra mentio fit febrium pe-  
stilentium & malignarum. Quæ ergo inter hæc  
tria, pestilentiam scilicet, febrem pestilentem &  
malignam sit differentia, quæque pestilentis & ma-  
lignæ febris natura, iam explicandum; cum à paucis  
genuinam inter hæc tria differentiam monstrari vi-  
deamus.

Omnium autem hac de re opiniones recensere &  
examinare longioris operæ foret. Vt quisque de pe-  
ste sentit: ita eam ab aliis distinguit. Vnam atque al-  
teram opinionem recensere placet. Antonius Portus  
& nonnulli alij, qui pestem sine febre dari non pu-  
tant, pestem & pestilentem febrem non distinguunt.  
Pestem verò & pestilentes febres ab aliis febribus sal-  
tem modo & gradu putredinis differre statuunt. Pri-  
mò quidem à reliquis putridis, quæ nihil pestilens vel  
magnum habent, hoc modo distinguunt; quòd pestis  
& pestilens febris non à vulgari putredine, sed largâ,  
profundâ, sordidâ, conclusâ, ad minima elaboratâ &  
in lentore quodam constitutâ, à qua semina conta-  
gionis emanant, proueniat: reliquæ verò putridæ à  
vulgari saltem putredine oriantur. A malignis verò fe-  
bribus pestem & pestilentes febres ita distinguit, quòd  
illæ quidem à putredine etiam non vulgari proueniat,  
quæ tamen contagiosa non sit. Quibus addit Portus  
& differentiam à loco, quòd in peste & pestilentibus  
febribus putredo spiritus & humores in cordis sinibus  
existentes, vel ipsum corpus visceris occupet: in aliis  
verò febribus in partibus à corde remotioribus putref-  
cant humores: statuitque si putredo secundum omnes  
gradus & conditiones modò descriptas daretur, nisi  
tamen in contentis in corde existerit, contagiosam fe-  
brem & malignam esse posse; pestilentem tamen non  
esse.

Verum suprà sufficienter demonstratum, materiam  
pestis in sola putredine, quocunque etiam modo des-  
cribatur & limitetur, querendam non esse. Et proin-  
de pestis ab aliis febribus discrimen ex solis putredinis  
gradibus desumi non posse.

Ludouicus Mercatus, lib. 3. parte 1. class. 1. art. 4.  
quæst. 176. satis prolixè hac de re disserit. Primò qui-  
dem docet, pestilentialem naturam non esse morbi  
genus specie distinctum ab aliis tribus vulgo notis,  
puta morbis intemperiei, malæ conformationis &  
solutæ vnitatis: additâ ratione (sed quæ falsa) quòd  
nullum morbi genus reperi quæat, præter intempe-  
riem, malam compositionem, & solutam vnitatem:  
statuitque pestem saltem esse accidens ac modum &  
conditionem, aut quid extrinsecus accedens cuius  
horum: pestem nimirum pro materiali esse morbum,  
cui adhaeret venenosa conditio; pro formali verò tru-  
culentam & perniciosam naturam illi morbo additam;  
quæ adeò pestilens sit, vt propriam morbi conditionē  
obumbreret & proprium nomen mutet, vt pestis nun-  
cupetur. Reliqua verò, quæ deinde prolixè hac de re  
scribit, si expendamus, res eò redit. Tres esse in peste  
conditiones: 1. vt sit vulgaris. 2. vt sit perniciosa. 3.  
vt sit contagiosa: Et in quocunque morbi genere hæc  
conditiones reperiuntur, illum pestem appellari posse  
scribit; vbi vna vel plures deficiunt, ei pestis nomen  
non esse tribuendum. Itaque etsi aliquis morbus sit  
perniciosus & lethalis ac ipsa pestis: tamen si conta-  
giosus non sit, pestilentem non esse appellandum: cõ-  
trà licet aliquis morbus contagiosus sit: tamen si perni-  
ciosus non sit, pestem dici non posse.

Pestem itaque ab aliis febribus putridis primò hoc modo discernit, quòd aliæ febres putridæ non habeant tantam putredinem, sed solum superficiale, & ex communibus caulis, obstructione scilicet aut cutis densitate, oriuntur; neque de se semina contagij effundant: pestilentes verò etiam citra obstructionem solâ seminarij vi progigni possint; atque eadem contagiose sint.

Inter pestem verò & pestilentes morbos tale discrimen constituit. Pestilens, inquit, morbus vnus cum sit, vnumque solum ad naturæ suæ integritatem requirat, talis haberi debet, si perniciosus sit & contagiosus. Præterea plerumque ex interno corporis vitio prauisque humoribus principium sortitur, & tandem nulli morborum sorti adstrictus est, sed liberè adiungi potest omnibus morbi speciebus, ita vt vno tempore febres tertianæ, continuæ, catarrhi, pestilentes esse possint, pestem tamen non generent, quia scilicet non sint vnus conditionis & speciei, quod necessarium est ad veram pestis naturam. Pestis verò ratio etsi morbis pestilentibus affinis sit, & eodem modo in pernicio & contagio sita sit: tamen aliis modis eam à morbis pestilentibus differre docet. Primò quidem, ait, vt pestis fiat, vna tantum futura est morbi species omnibus peste correptis, siue ea sit febris, siue dysenteria, aut quiuis alius morbus, ita vt omnes vnâ morbi specie afficiantur; perniciosâ tamen & contagiosâ. Deinde quòd pestis varias fortitur causas externas, generantes & efficientes, ob quarum diuersitatem variæ oriuntur pestis differentia & species.

Et si verò in hac sententiâ aliquid veri contineatur: tamen multis quoque modis à vero aberrat. Primò enim falsum est, quòd statuit, pestilentiam non peculiare morbi genus esse ideò, quòd non detur aliquod morbi genus, præter intemperiem, malam conformationem & solutam vnitatem. Nam & propositio peccat & ratio, quæ ad eam conformandam adducitur, falsa est. Rationem enim quòd attinet, firmissimis, vt ex ultimo, argumentis monstratum est, libro 2. Inst. p. 1. capite 4. dari in similaribus alios morbos, præter intemperiem, cuius generis etiam pestis est. Neque enim pestilentia modus saltem morbi est, vt supra monstratum, sed peculiaris morbus, cui alij coniunguntur, modò plures, modò pauciores. Nam modus nullam peculiarem indicationem suppeditat, nec curatur; id quòd in peste fit, vbi ipsi pestilenti dispositioni remedia opponimus.

Neque eo quis effugiet, si dicat, pestilentiam saltem in causâ esse, nullum verò peculiarem in corpore humano morbum excitare. Refutatum enim hoc est, loco allegato, pag. 151. vbi monstratum, à causis occultæ agentibus similes naturæ causæ morbos induci. Et cum, vt ipse Mercatus docet, ibi necessariò pestilentia existat vbi formales eius effectus conspiciuntur: certè non saltem in causâ venenum pestilens esse statuendum; sed cum omnis forma per formales illos, quos appellat, effectus patienti suam naturam imprimere, illique nouam dispositionem inducere nitatur: etiam hoc in peste fieri, negandum non est. Et cum alij morbi omnes ob formalem rationem ad certas classes redigantur, & formalis ratio differentias morborum pariat: cum pestilentiam formalem quandam morborum rationem esse agnoscat, cur non etiam cōcedat, eam peculiare morbi genus constituere? Præterea pestem non esse simplicem modum, sed morbum principalem & peculiarem, ex eo patet, quòd qui eâ corripiuntur & contagium ab alio suscipiunt, non necessariò eundem illum morbum intemperiei, conformationis & solutæ vnitatis accipiunt, quo ille, qui eos infecit, laborabat; pestilentem tamen morbum eundem contrahunt.

Deinde falsa est differentia, quam inter pestem & pestilentem morbum constituit, quòd scilicet peste correptis omnibus eadem sit morbi species, siue ea sit

febris, siue alius morbus: vbi verò plures morbi vagentur, non esse pestem, sed solos pestilentes morbos. Nam licet in peste quilibet, vna veneni pestilentis sit ratio: tamen symptomata & morbi, qui ab eâ excitantur, sæpe sunt plures & diuersi, nunc febres, nunc dysenteria, nunc pleuritides, nunc alij morbi. Neque cum pestis contagiosa esse, eandemque morbi speciem aliis communicare dicitur, id ita accipiendum est, quasi morbi illi noti, & symptomata eadem, quæ peste laborantem infestant, necessariò etiam infecto communicentur, sed satis est si venenum idem illi communicetur, à quo occultus morbus similis, similisque venenata in corpore dispositio excitetur; licet symptomata pro variâ corporis laborantis constitutione non semper eadem sequantur. Id quòd cuilibet in qualibet pestilente constitutione obseruare facillimum est.

Hercules Saxonia pestem & febrem pestilentem non perniciæ aut veneno, sed ita distinguit, quòd pestis sit morbus perniciosus, vulgaris: febris pestifera verò propriè accepta sit morbus perniciosus sporadicus. Verum nec hoc planè satisfacit. Nam dantur febres plurimæ pestilentes, quæ sunt quidem perniciosæ, sed non sporadicæ, verum epidemica: veræ tamen pestilentia nomen non merentur.

Verum plures opiniones recensere super sedemus, & rem breuiter sic concludimus. Pestis naturam in occultâ quadâ & homini planè aduersâ qualitate sitam esse, eandemque contagiosam esse, ac habere potestatem in alios sese diffundendi, supra satis explicatum est, & nemo, vt opinor, facile negauerit. In quocumque ergo morbo hæ conditiones reperiuntur, vt scilicet plurimis perniciosus sit, & facile in obuios quosque per contagium diffundatur: is pestis appellari potest, siue febrem habeat coniunctam, siue non habeat. Si autem febrem habeat coniunctam, & pestem & pestilentem febrem sine discrimine appellari posse existimamus; modò hoc teneamus, febrem non esse de naturâ & essentiâ pestilentia, vt supra dictum. Et hac ratione febris pestilentialis & pestis nec essentiali causâ, nec proximâ, nec remotis nec subiecto differunt.

Quia autem ab Autoribus non paucis pestilentia à febribus pestilentibus nonnullis discernitur, & nonnulli etiam febres pestilentes sine peste constituunt cum Galeno, 3. epid. com. 3. 2. 57. & de prasag. ex puls. capite 4. explicandum est, quænam sint illæ febres pestilentes, quæ à peste differunt. Tales autem sunt illæ, quæ illam formalem Pestis rationem non habent, & ob similitudinem quandam perniciæ ac symptomatum ita dicuntur: in quibus scilicet vel perniciæ illa, vel contagium, quorum vtrumque in peste conspiciuntur, & maximum est, deest, vel si vtrumque habent, minus tamen perniciosæ & contagiosæ sunt, vel quæ licet valde quidem malignæ sint, citra tamen constitutionem & statum anni pestilentem, quem pestilentiam quandoque nominari supra diximus, vagantur. Et omnino pestilentes febres sine peste eæ dicuntur, vbi humorum corruptio nondum quidem summum illum gradum, qui pestilentis veneni naturam constituit, attingit: ipsæ tamen etiam veneni & malignitatis aliquid pestilenti similis obtinent. Hinc hæ febres plerique sporadicæ esse statuunt, & Crato, conf. 275. hac vtitur distinctione. Febris, inquit pestilens alia est priuata, alia publica. Priuata, quæ minus saua & contagiosa est, nec omnib. exitialis, interinas habet causas, à quibus in corpore putredine ob humorum prauitatem, orta, cordis calor non tam à calore putredinali, vt in aliis febribus putridis, quàm malignitate opprimitur. Hæ febres, si eò progressa fuerint, vt corpora iam morbidam expirationem habeant, quæ omnibus est contagiosa, non amplius pestilentes priuata, sed publicæ sunt. Priuatas autem dicimus, quia vitiosos humores continent, inuadunt, nec nisi conuersantes valde pradi-

Her. Saxonia.

Pestis ac pestilens febris interdum non differunt.

Febres pestilentes sine peste.

Non ita sepe morbi pestem omni tantum.

positos ledunt. Publica verò sunt, quæ propter morbidam expirationem contagiosa conuersantibus existunt, & in aëre atque vestibus seminaria cōtagij relinquū. Hæc Crato.

Hæc tamen dextera & commodâ explicatione indigent. Verum est, febrem pestilentialem in specie dictam & pestem causâ essentiali non conuenire. Quamuis enim uterque affectus à veneno fiat: non tamen sit uterque ab eodem veneni genere. Necessarium tamen non est, ut semper causis efficientibus, præcipuè remotionis differant, & pestis à causâ solum communi; aëre scilicet aut victu communi, proueniat; pestilens verò febris ex humorum priuata corruptione oriatur; Atque hinc pestis publica sit, pestilens verò febris priuata. Nam fieri potest, ut etiam febris pestilens sine peste, quam appellat, producat à causâ communi, aëris scilicet vel victus vitio; quæ tamen verâ peste & pestilente febre eo differat, quod illum venenositatis & contagij gradum non attigerit, & si plures ingulet, non tamen contagiosa sit; aut si utrumque possit, non tamen nisi conuersantes, & quidem prædispositos inficere, nec etiam contagij semina ad distans spargere, aut per fomitem in loca longè distita transferre possit.

*Pestis & pestilens febris differunt.*

Summa hæc est: pestis & pestilens febris in specie dicta principaliter pernicipi & contagionis vehementiâ differunt; quæ non solum in sporadicis, sed & epidemias febribus pestilentialibus minor quàm in ipsa peste animaduertitur. In sporadicis tamen febribus differentia illa longè manifestior est. Sporadicæ enim non solum essentia & veneni ratione, sed etiam causarum diuersitate differunt. Causæ enim febrium pestilentialium sporadicarum, & aliorum morborum priuatorum particulares sunt & priuata; pestilentia verò causa semper communis est.

*Pestilentium & malignum febrium discrimen.*

Si quis porro quærat; quænam inter pestilentes & malignas febres sit differentia: Authores quoque non parum discrepare animaduertet. Nam si quis solum eas velit appellare malignas, quæ à Cratone pestilentes priuata appellantur, & reliquas, ad harum differentiam, pestilentes: is nullam inter pestem & febrem pestilentem differentiam constituit; cum tamen à plerisque tria hæc distinguantur; pestis, febris pestilens, & febris maligna. Præterea certum est, etiam malignas strictè appellatas epidemias esse posse; non solum priuatas. Et cum in malignis etiam febribus, præter putredinem & calorem, occulta & venenata qualitas adsit: non quidem is peccare videtur, qui omnes febres, quæ à verè & propriè dictâ peste differunt, in quibus tamen maligna & venenata qualitas apparet, seu pestilentes, seu malignas appellat: Quia tamen non omne venenatum pestilens est; & apud Medicos non solum febres, sed & tumores, ulcera, alique morbi maligni appellantur qui ab omni pestilentia labe immunes sunt; non immerito malignus à pestilenti distinguitur, & pestilens opponitur non pestilenti; malignus, benigno.

*Malignus morbus quid.*

Et in genere benignus morbus est, ut libro. 2. Inst. part. 1. capite. 11. dictum, qui supra propriam naturam nullum graue symptoma habet. Malignus autem quem peiora, quàm pro sua essentia ratione, symptomata comitantur: seu, ut Galenus lib. 1. prorrhet. 1. 14. habet, maligni morbi ij appellantur, quicunque periculum imminantes, spem salutis non adimunt.

*Febris maligna duplex.*

Si tamen quærat, unde illa praua symptomata in malignis proueniant: distinctione opus est. Febris enim maligna duobus modis dici, & præter febris propriam naturam grauiora symptomata habere potest. Primum, cum omne quidem venenum à febre abest, ob causam tamen vehementiam & malam aliquam qualitatem, v. g. humoris cruditatem, acrimoniam, vel loci affecti rationem, curatio difficilis redditur, & grauiora apparent symptomata. Deinde cum ob occultam & venenatam qualitatem grauiora apparent sym-

ptomata, morbusque periculosior euadit. Prior febris malignæ species, quomodo à pestilentibus differat, manifestum est. Sed de illa hic nobis agere institutum non est; sed de istâ inprimis, quæ ob occultam & malignam qualitatem talis dicitur. Ideoque cum quæritur, unde in hiis febribus grauiora illa symptomata accendant, causa alia vix reddi poterit; nisi quod materia, à qua febris excitatur, occultam aliquam, & ad venenositatem accedentem qualitatem habeat, ob quam magis læditur æger, quàm ab aliâ eiusdem generis febre, quæ nihil tale obtinet. Itaque res eo redit, ut minor in his sit pernicipes quàm in pestilentibus; ut sicut pestilentes à peste differunt, ita malignæ à pestilentibus non nisi gradu pernicipi distinguantur. Pernicipi gradu dico, non gradu veneni. Nam hic facile concesserim sicut venena alia à pestilenti veneno specie differunt: ita & malignam illam in febribus malignis materiam & qualitatem specie à pestilenti veneno differre. Quia tamen utriusque ratio nobis ignota & occulta est, & non nisi effectibus nobis innoscit, ac utrumque homini infestum & noxium est: gradu pernicipi differre diximus; quod scilicet pernicipes & contagium in pestilentia sint maxima, & summum gradum obtineant; minoris vehementiæ sint in febribus pestilentialibus in specie dictis; minoris adhuc in febribus malignis propriè appellatis; licet procul dubio materia, à qua pestis prouenit, ab eâ, à quâ febris pestilens generatur, & à quâ maligna producitur, specie differat. Imò contagium in malignis sæpe planè abest.

Vnde plerique pestem & pestilentes febres à malignis ita discernunt. Primum quod pestis & pestilens febris ex aëre & contagio ortu trahat: malignæ potius ex morbo appatu proueniant; Quod quod vique verum sit, iam dictum. Deinde quod pestis & pestilentes febres non solum plurimos passim inuadant, sed etiam maximam partem eorum, quos inuaserant, interimant: Malignæ autem febres licet plurimos inficiant: tamen non plurimos, quos inuadunt, & medio tollant, sed plerique eorum conualecant, & qui moriuntur, non tam citò, ut in peste, plerumque pereant. Sicut etiam, ut dictum, febres malignæ non semper contagiosæ sunt. Præterea in peste & in pestilentibus febr. putredo & calor præter naturam non tam ex causis, à quibus aliæ febres putridæ producuntur, excitantur, sed à delecteriâ & venenatâ seminario contagiosi vi: at in malignis potius ex causis aliis, ut in febribus putridis communibus, putredo excitatur, indigentque febres malignæ magis morbo appatu, qui in pestilentibus febribus sæpe non necessarius est, cum etiam sine eo pestilens venenum humores corrumpere possit, tandem & symptomatum vehementia in malignis tanta non est, quanta in peste & pestilentibus febribus, neque bubones, carbunculi, & similia in iis conspiciuntur.

Nimirum malignæ febres & ipsæ prauæ sunt: minores tamen, quàm pestis & pestilentes febres: perniciosiores autem, quàm simpliciter putridæ: & propterea quasi inter pestem & reliquas putridas mediæ, & ad veram pestem via atque initium. In omni enim febre, quæ simpliciter putrida non est, præter vulgatam putredinem, occulta & nobis peculiari ratione aduersa ac venenosa adest materia, nunc tamen magis, nunc minus pernicipiosa. Nam ut rem paucis verbis comprehendam, si ea malignitas ac venenositas illum gradum attigerit, ut plurimi, qui ab eâ ægrotare incipiunt intereant, & obuij quique ab ægris inficiantur, & non solum in proximos, sed etiam in remotos, vel per aërem, vel per fomitem, contagium propagetur pestis appellatur, siue adsit febris, siue non adsit. Et si adsit febris, nihil obstat, quod minus ille morbus pestilens febris in genere appellari possit. In specie tamen appellatur febris pestilens, ubi minor venenositas, minusque

*Pestilentia & maligna febrium discrimen.*

*Febris maligna duplex.*



minúsque contagium adest ; & vel quidem plerique moriuntur , alij tamen non inficiuntur , aut saltem maximè dispositi & proximè cum ægris conuersantes ; vel licet & contagium & pernicies quædam in febre eadem animaduertatur , contagium tamen & pernicies non summum gradum attigerint , ac non pauci conualescant. Maligna febris mitior adhuc est , & licet grauius quædam habeat symptomata , pauciores tamen inde moriuntur ; siue tales febres sint epidemice , & ex communi causâ ortum habeant , siue sint sporadicæ , & ex priuatâ causâ proueniant. Non semper etiam ita contagiosæ sunt , vt pestilentes verè dictæ. Verum hac de re suprà in *fine cap. 1.* pluribus actum.

## CAPVT VIII.

*Ad quod febrium genus Pestilentes & maligna pertineant.*

Cum duo in febribus pestilentibus & malignis conjungantur, febris ac maligna & pestilens qualitas : jam porro querendum est ; cum quo febrium genere malignitas hæc conjungi possit , an cum omni , an verò certo febrium genere. Sunt autem , vt suprà dictum est , tria febrium genera ; Ephemera , Putrida & Hæctica. Nonnulli ergo cum qualibet harum febrium differentiâ pestilitatem & malignitatem conjungi posse statuunt , ac pestilentem nunc esse ephemeram , nunc putridam , nunc hæcticam. Alij , vt Platerus , ad duo febrium genera pestilentes & malignas redigunt. Nam Platerus duplex febrium malignarum & pestilentium genus constituit ; vnum breue , quod ex linocharum purarum non putridarum sit genere : Alterum longius , quod è putridarum continuarum sit numero. Alij tantum in putridarum classem malignas & pestilentes collocant.

*An dentur ephemeræ pestilentes.* Quam rem si quis accuratius perpendat , hoc primò animaduertet , febres pestilentes nullas ephemeræ & hæcticas propriè dictas dari. Ephemeræ enim quod attinet , definiuntur illæ incendio & effervescentiâ spirituum ; ac tales pestilentes illæ , quas appellant , ephemeræ non sunt. Nam licet ipsa malignitas & pestilentia aliunde pendeat : febris tamen illa , quatenus talis , plerorumque authorum sententiâ à putredine prouenit. Etenim siue concedamus , spiritus posse putrescere , siue id negemus , febris pestilens , quam illi appellant , ephemeræ propriè dicta non erit. Nam si spiritus putrescere non possunt ; & febris , de qua queritur , est ex putredine : nulla dabitur febris ephemeræ pestilens. Si autem concedamus spiritus posse putrescere , & ex his putrescentibus febris accendatur : tamen ea non erit de vulgari ephemerarum genere , in quibus nulla est putredo , sed tantum spirituum effervescentia & calor nimius , sine eorundem corruptione & totius substantiæ mutatione.

Neque etiam credibile est , spiritus , qui maximè ignei & mobiles , & propterea ad putredinem minús dispositi sunt , primùm , & quidem solos putredinem concipere ; humores verò , qui magis apti ad putredinem sunt , à putredine planè immunes manere. Et licet venenum , vt Platerus docet , aliquod inflammans dari possit , atque ab hoc pestilens sæpe non multum abesse concedamus : tamen illam inflammationem & calorem igneum in corpore sine corruptione seu putredine vel humorum vel spirituum excitare vix potest. Id quod maculæ , bubones & carbunculi in pestilentibus febribus erumpentes testantur. Bubones verò & carbunculos sine humorum corruptione non erumpere certum est : maculæ verò non à portione aliquâ veneni , quod tantillum sæpe est , proueniunt , sed ab humoribus corruptis oriuntur. Et sit sanè , quod non nego , dari venenum pestilens , quod spiritibus inprimis in-

*Dan. Sennertii Tom. II.*

festum sit : tamen cum tum non solum spiritus incalcescant , sed corrumpantur & destruantur : febres ephemeræ non erunt , nec ad febrium ephemerarum classem referri poterunt , magna que omnino hîc apparet differentia. Etenim in verâ ephemerâ spiritus solum incalcescunt ; in pestilenti verò hac febre corrumpuntur. Et quamuis vtrique febris non diu duret , sed breui temporis spatio suum cursum absoluat : tamen hoc planè inæquali exitu accidit ; cum ephemeræ simplex periculo vacet : pestilens verò , quæ sit spiritibus affectis periculosissima sit , aded vt pauci euadant , sed plerique citissimè intereant ; cuius rei exemplum præbet sudor Anglicus , de quo suo loco dicetur.

Hæcticas quod attinet , negandum non est , in pestilentibus febribus quandoque cor ipsum affici , & forsan putrescere & corrumpi. Quamuis etiam hoc in dubium à nonnullis vocetur , An scilicet cor possit putrescere ob rationem & auctoritatem Aristolis inprimis , qui *lib. 3. de part. an. cap. 4.* scribit : solum cor viscerum atque omnium partium corporis nullum graue vitium pati , vt pote à quo reliqua membra , vt principio , gubernentur , & quod in nullâ bestia cor , vt reliqua viscera , corruptum inuentum sit : tamen id simpliciter negandum non est ; cum ipsa experientia id testetur : sicut hac de re exempla à Fernelio , *lib. 5. parhol. cap. 12.* & Schenk. *obs. lib. 2. obs. 202.* Guiljelm. Fabric. *lib. 2. obs. Chirurg. 27.* annotata sunt. Neque id Aristotelem latuisse existimo ; qui id solum statuit , Cor nullum grauem morbum pati posse , vt scilicet animal viuat & ad sanitatem redeat. Cum enim hostiæ solum ex sanis , quantum ad sensum , animalibus peterentur : verum est , nullum animal corde affecto , ita sanum videri posse , sicut dum interdum renes , lien , aut aliæ partes corrumpuntur. Ipsum tamen etiam cor , sed non sine præsentis animalis damno , affici posse , confitetur ; dum paulò post scribit : *At verò , quæ morbo vitiis-que eiusmodi pereunt animalia , iis dissectis , affectus morbo in corde conspiciuntur.* Ergo licet concedamus , in pestilentibus febribus cor affici posse , & febres inde oriri , quæ hæcticam referant : hæcticas tamen propriè dictas eas febres esse negamus. In hæcticâ enim simpliciter dictâ etsi cordis substantia afficiatur : tamen ille affectus tantum in calidâ intemperie consistit ; in febribus verò pestilentibus cor non solum incalcescit , sed etiam corrumpitur. Vnde etiam lógè alia est ratio harum hæcticarum , si ita cui eas appellare placeat cum Galeo , *3. de prasag. ex puls. cap. 3.* & *2. meth. med. cap. vlt.* quàm hæcticarum vulgariarum , & longè alia in pestilentibus , quàm aliis hæcticis , conspiciuntur symptomata.

Deinde hæ pestilentes vix dari possunt sine putredine. Nam cum humores in corde contenti magis apti & parati sint ad putredinem , quàm cordis solida substantia , aut eius humores proprii : vix possibile est , ipsam cordis , à quo hi reguntur & fouentur , substantiam , aut ejus humiditates proprias putrescere posse , vt humores in ventriculis cordis contenti non sentiant putredinem. Nam quod à putrido tangitur , & ipsum putrescit ; præcipuè si magis dispositum est. Atque ita maxima est inter hanc febrem pestilentem & hæcticam differentia. In hæcticâ enim verâ temperies saltem cordis mutatur , & cor præter naturam calefactum est : in pestilenti verò hac ipsa substantia cordis corrumpitur. Hæctica sine putredine consistere potest : hæc vix , ac ne vix quidem. Hæctica diu durat , antequam hominem enecet : In pestilenti hæc homo breui temporis spatio moritur.

Ex quibus omnibus concludimus , in omni febre pestilenti & malignâ aliquam seu putredinem seu corruptionem esse , non saltem mutationem in qualitativis primis. Vnde febres malignas & pestilentes in earum numerum collocamus , quæ ex humorum putredine dependent. Interim tamen quia aliqua inter

cas differentia apparet, & nunc ipsum cor, nunc humores, nunc spiritus afficiuntur: magis propter similitudinem, quam cum aliis propriè dictis habent, cum aliis nominibus destituamur, ita eas appellare & earum alias ephemeræ, alias hæcticas, alias putridas nominare liceat.

An dentur  
febres mali-  
gnæ intermit-  
tentes.

Verum jam porro quæritur; E quo putridarum genere sine hæc febris. Et primum: An omnes sint continuæ, an verò aliqua intermittentes. Etsi autem verum sit, in pestilentibus febribus, præteritum si qualitas venenata præualeat, & cor labefaceret, naturam impeditam & oppressam morbum vel certo ordine aggredi, vel ab humoribus corruptis aliquandiu sese liberare non posse: & proinde febres pestilentes & malignas ferè omnes continuas esse statuamus: distinctione tamen aliquà vrendum videtur.

Pestilentes  
febres omnes  
sunt conti-  
nuæ.

Nam pestilentes febres propriè dictas, & à malignis distinctas, omnes continuas esse censemus; cum venenata putredinis ea sit causa, ut quocunque in loco exciteretur, in totum corpus se diffundere, & corruptis in venâ canâ atque arteriis humoribus, facile continuò cor lacessere possit, ac debilitatâ virtute certis intervallis humores pestilentes expelli non possint. Neque valet hic argumentum Herc. Saxoniæ quo etiam intermittentes pestilentes dari probare conatur. Datur, inquit, pestilentia sine febre. Ergo magis potest dari pestilens intermittens febris. Consequentiam enim hæc non video. Nam licet verum sit, pestilentis veneni tantam vim esse posse, ut hominem jugulet, antequam febris & putredo exciteretur: tamen si tractu temporis à pestilenti veneno putredo exciteretur; fieri non potest, ob causam jam dictam, ut natura certis periodis materiæ putridæ expulsionem instituat. Et quamvis putredo pestilens in humoribus in primis viis contentis primò accendi possit: tamen, propter maximam actiuitatem & vim veneni, humorumque continuitatem, facile labes illa superioribus quoque venis communicatur.

Malignæ fe-  
bres quædam  
intermitten-  
tes sunt.

Febres autem quæ in specie malignæ dicuntur, & in primis quæ ex privato humorum vitio generantur, Intermittentes interdum esse, ipsa Experientia testatur. Nec ratio id dissuadet. Nam impossibile non est, ut in primis viis putrescentes humores malignitatem concipiant; & cum in talibus febribus tanta veneni vis non sit, nihil obstat, quin natura statis periodis excretionem aliquam instituere possit. Verum tamen etiam si hæc febres interdum certos typos obseruent, & quidem plerumque tertianæ sint; tamen, quia natura oppressa ordinem in motibus suis certum seruare non valet, accidit tum, ut febris statò ordine non exacerbentur, sed erraticæ quasi sint.

Pestilentes  
& malignæ  
febres  
continuæ  
quales.

Porro quæ è continuarum genere sunt pestilentes & malignæ, nulli continuarum generi addictæ sunt, sed prout putredo & corruptio in sanguinem temperatum vel intemperatum, morbosum apparatus hunc vel illum, hoc vel illo in loco, incidit: ita nunc hæc, nunc illa febris species excitatur. Et febres tales nunc synocharum naturam referunt, nullasque insignes mutationes obtinent; nunc reliquarum continuarum modo cum horrore incipiunt, & quædam exacerbationes habent ac periodos absoluunt, prout humorum apparatus sese habet. Neque enim usus saltem aliquis ex humoribus, sed quilibet illorum, dum putrescit & venenatus redditur, pestilentes febres excitare potest; quod symptomatum diuersitas, quæ diuersorum humorum naturam insequuntur, satis testatur. Nam alios vigilæ, alios sopor & veternus, alios delirium, alios alia symptomata infestant, quæ non solum propter partium diuersarum imbecillitatem, & materiæ ad eas motum, sed etiam propter materiæ diuersitatem oriuntur.

Differentia  
februm po-  
stulentium.

Ex his, quæ hæcenus dicta sunt; facile colligi potest, quid de differentiis febrium pestilentium & ma-

lignarum sit statuendum. Itaque plura de differentiâ à causis, materiâ putrescente & loco desumptâ, addere opus non est. Hoc saltem notandum est, duo, ut aliquoties jam dictum, in qualibet malignâ & pestilenti febre reperiri: Primò Putredinem, à qua febris oritur: deinde perniciosam & malignam qualitatem, ob quam febris illa pestilens & maligna dicitur. In utroque reperiuntur quædam differentiæ.

Nam febrem quod attinet, non solum à causis, materiâ & loco putredinis, ut in aliis febribus, sumuntur differentiæ, sed etiam à vehementiâ putredinis; siquidem putredo nunc maior, nunc minor est. Deinde ipsa pestilens ac maligna qualitas insignem habet latitudinem; unde accidit, ut febres pestilentes & malignæ aliæ aliis perniciosiores ac sæuiores, aliæ mitiores ac debiliores sint. Nam si & malignitas & putredo summa sit, perniciosissima febris oritur, in quâ & à malignæ & pestilentis qualitatis vehementiâ cor valde debilitatur, & ab insigni putredine ac calore cum ipsum, tum reliquæ etiam vires valde læduntur. Si autem contingit, ut putredo sit magna, qualitas verò illa maligna non ita vehemens; tum febris magis ad naturam aliarum putridarum accedit, & à febre & à calore quidem, ut in aliis putridis, ægro magna molestia creatur, sed à prauâ qualitate cor non adeò affligitur. Si autem putredo non est magna: qualitas autem maligna vehemens; tum febris apparet mitis, & febrilia multa ac vehementia symptomata non animaduertuntur; nihilominus à qualitate malignâ cor valde læditur, talisque febres valde fraudulentæ sunt, & cum nec ægris, nec Medicis sæpe periculosæ videantur, ægrum, ubi extra periculum constitutus videtur, iugulant. Si denique nec putredo est magna nec qualitas maligna vehemens, febres oriuntur, quæ nec ratione putredinis, nec malignitatis periculosæ sunt.

Cæterum cum in hisce febribus non tam putredo, quam malignitas spectanda sit, differentiæ, quæ à putredine sumuntur, febrium malignarum & pestilentium, quatenus malignæ ac pestilentes sunt, propriæ non sunt, sed iis cum aliis febribus putridis communes. Idèò hoc loco non saltem differentia à putredine, sed in primis malignitatis differentia spectanda est, in quâ aliquam differentiam occurrere negandum non est. Obseruatum enim est, ea remedia, quæ in vnâ pestilente constitutione vtilia comperta sunt, in aliâ parum profuisse: quod procul dubio ex veneni diuersitate accidit: ac rectè recentiores annotarunt, pestilens venenum modò viperæ, modò cicutæ, modò napelli, modò dipladis, modò aliud venenum æmulari: quod ad curationem rectè instituendam obseruare vtile est.

Verum cum, ut aliorum venenorum, ita etiam qualitatis malignæ & pestilentis formalis ratio nobis ignota sit: essentielles etiam differentias constituere difficile est; sed potissimæ desumuntur ex symptomatibus: per quæ malignitas se prodit. Quæ cum sint varia, hinc variæ habentur febrium pestilentium & malignarum differentiæ. Interdum enim maculæ quædam varij coloris in cute efflorescunt, unde febres peticulares & petechiales appellantur: Alia est febris differentia cum quâ variolæ & morbilli conjunguntur: alia est febris, quæ sudatoria & sudor Anglicus appellatur: Alia, quam morbum Hungaricum nominant. Ita dantur nonnunquam febres malignæ pleuriticæ, catarrhales, anginosæ & aliæ cum dysenteria coniunctæ, quæ iam ex enumeratione symptomatum & signorum clariores fient, prout natura veneni cum hac vel illa parte antipathiam peculiarem habeat.

## CAPVT IX.

## De Causis febris pestilentis &amp; malignæ.

*Causa febris pestilentis.*  
**D**E causis verò pestilentis febris, & à peste & à maligna differentis, vix alia, quàm quæ de peste diximus, afferri possunt, sed easdem illas causas pestilenti febrì applicare possumus. Cum enim pestilentis veneni, vt & aliorum natura determinata nobis incognita sit, etiam causarum illud venenum producentium gradum determinatum vix definire possumus, & proinde causæ februm malignarum & pestilentium quærendæ in aëre, cælo, victu prauo: quibus tandem accedit contagium. Verùm cum videamus venenum veram pestem constituens ab aliis symptomatum copiâ, vehementiâ, magnitudine, modo operationis, contagij velocitate, & ad distans sese diffundendi potentiâ, summâque tandem pernicio differre: Eadem procul dubio ratio etiam in causis est, vt nimirum si causæ pestem aliàs excitantes nondum illum summum gradum attigerint, febris pestilens producat. Vnde videmus plerumque pestilentes febres præcedere, & tandem, causarum vehementiâ auctâ, aut diutius durante, in veram pestem abire.

*Causa febris malignarum.*  
 Febres verò malignas in specie dictas quod attinet, plerique earum causas saltem in morboſo corporis apparatu quærent. Quod etsi quandoque verum sit: tamen suprà dictum, non omnes febres malignas saltem priuatas & sporadicæ esse, sed sæpe epidemias. Exemplo sint febres illæ, quæ Anno 1551, & 1580. per vniuersam Europâ, imò omnes ferè mundi regiones, grassatæ sunt. Nam cum febres istæ eodem tēpore in diuersis regionibus diuersæ naturæ homines, & quidē maximā hominum partem, inuaserint, priuatas & sporadicæ non fuisse, cuilibet manifestū est. Cum verò pauciores ex iis perierint, neque pestilentia, neque pestilentium februm in specie dictarum naturam habuerunt, sed solum malignæ fuerunt. Et cum maximam hominum partem, & quidem in omnibus regionibus inuaserint: ex morboſo & priuato corporis apparatu causam non habuerunt, sed ex communi aliquâ causâ ortæ fuerunt. Tales etiam fuerunt febres, quæ anno 1616. post insignem illum & hisce regionibus insolitum æstus, vniuersæ ferè Germaniæ epidemiæ, hic cerre VVittebergæ tam frequentes fuerunt, vt nulla domus reperiretur, in quâ nō ægri decumberet, imò tot ægrotarent, vt in nonnullis ædibus vix vnus vel alter sanus esset, qui reliquis ægrotantibus ministrare posset. Quanquam verò & epidemiæ essent hæ febres & contagiosæ: tamen sexcentisimæ vix moriebatur, atque ita pestilentes hæ febres non erant. Neque tamen ex priuato corporis apparatu, sed causâ communi, vt dixi, æstu scilicet insigni, & procul dubio peculiari aliquo astrorum influxu ortum habebant. Itaque & in hisce febribus communes causas admittimus, & si epidemiæ sint, tam ex aëris vitio, quàm victu prauo communi prouenire posse statuimus. Vt verò in malignitate propriè & in specie dictâ minor est perniciositas: ita & minorem in causis istas febres producentibus venenositatem & prauitatem esse existimamus.

Quæ verò febres malignæ, vt & pestilentes in specie dictæ, priuatae sunt & sporadicæ, eas in primis à causis particularibus, à quibus vitiosi ac prauis humores seu morboſus quidam apparatus in corpore colligitur, prouenire statuimus. Arque huius apparatus ratione, qui in diuersis, pro ratione ætatis, sexus, vitæ generis, & aliarum circumſtantiarū, diuersus est, febres hæ & earum Symptomata valde variant, vt raro eadem accidentia & Symptomata in diuersis appareant.

Prauus autem hic apparatus, & humorum corru-

prio oritur primò à cibo prauo & putredini ac corruptioni obnoxio: quales cibi, vt hac de re Galenus, 1. de diff. febr. capite 3. scribit, quidam naturâ tales sunt, quorum scilicet ea est natura, vt ex iis prauis succi generentur, de quibus videatur Galenus, libro de cibis bonis & mali succi: quidam verò diuturnitate temporis & negligenti asseruatione talem labem contraxerunt.

Huc pertinet etiam aqua, quæ computruit, aut rerum putridarum & corruptarum mixtione inquinata est. Deinde etiam humores boni in corpore ita corrumpi possunt, vt malignitatem, imò venenositatem acquirant. De quo alij aliter sentiunt. Integra illa controuersia pluribus explicata est, libro 2. Instit. p. 2. capite 12. monstratumque humores in corpore nostro ita corrumpi, & à naturâ suâ degenerare posse, vt naturam venenorum induant, à quibus halitibus venenati & maligni atque cor delati periculosa symptomata & mortis periculum inducunt; porissimum ubi nouâ accedente putredine exagitantur, à quâ etiam febris oritur, quæ ob adiunctum venenum maligna est.

## CAPVT X.

## De pestilentis febris signis.

*Pestilens febris signa.*  
**D**E pestilentis febris in specie dictæ signis peculiariter aliquid addere opus non est. Eadem enim, sed mitiora & pauciora saltem in iis conspiciuntur, atque in primis illa, quæ essentiam veneni pestilentis consequuntur, in eâ non eadem, quæ in pestilentia, conspiciuntur. Neque enim tam periculosa sunt, vt vera pestilentia, neque etiam tam contagiosa.

Quantum autem ad signa differentiarum, quæ suprà propositæ sunt, si qualitas venenata sit summa, simulque etiam maxima putredo, vires maximè deiiciuntur, & grauiora, ob putredinem, insequuntur symptomata, vt capitis aliarumque partium dolores, vigilia, inappetentia, sitis magna & inexhausta, inquietudo, excrementa & vrina valde mutata ac sanorum maximè dissimiles. Si autem putredo sit summa, maligna verò qualitas remissior, illa, quæ ex putredine & febre oriri solent, symptomata, sunt quidem valde vehementia, non tamen adeò grauiora & molesta, vt in priori differentiâ. Virtus enim vitalis non adeò deiicitur, & propterea melius symptomata illa perferre potest. In hac febre calor etiam in exterioribus semper *admodum* est putredini, vsque ad statum: circa quem demum, si æger non euadet, exteriora primùm tepescere & tandem frigescere incipiunt. Si enim euasurus est, aliquid quidem remittit, sed non planè. Si putredo non magna est, qualitas autem maligna vehemens; mitia sunt, quæ febres comitantur, symptomata, sed vires valde deiiciuntur. Si denique nulla ferè adfit putredo, sed maxima malignitas, pestis naturam ea febris æmulatur, in quâ ægri sine morboſe mori conuerunt. Nam nulla putredinis adfunt signa, nulla sitis, nulla alia grauiora symptomata, sed tantum summa viriū deiectio & imbecillitas, ac tandē inopinata mors.

Alteram deinde differentiâ, quod attinet quâ febres pestilentes vulgò distinguuntur in Ephemeræ, putridas & hecticas: Ephemeræ, quæ ex spiritibus in primis affectis oritur, cognoscitur. Primò ex magnâ & subito inuadente imbecillitate, & quamvis interdum vires non nihil colligi videantur, collectis spiritibus: tamen mox iterum concidunt, & ægri in frequentem syncope & animi deliquia incidunt, ac tandem succumbunt. Secundò sentiunt hi quidem calorem, non adeò tamen mordacem, & qui non diu durat; sed vno, duobus, aut ad summum tribus diebus, vel ad salutem, vel ad mortem ægri morbus terminatur. Terriò pulsus sunt inæquales, imbecilles ac languidi. Spiritibus enim deficientibus facultas vitalis munus suum

*Ephemeræ pestilentis signa.*



suum exequi non potest: Vnde sæpe in mediâ actione deficit, variâque inæqualitatis causa existit. Quartò in hac febre non sunt alui fluxus colliquantes: Urinæ non sunt turbidæ, sed ferè similes naturalibus & sanis, non adfunt bubones, carbunculi, parotides, atque alia exanthemata.

In Humoralibus autem pestilentibus conspiciuntur bubones, carbunculi, parotides, pustulæ, maculæ, & alia exanthemata; atque alia adiunt signa, quæ in aliis putridis apparere solent, ut sunt vigilie, deliria, anhelitus & respiratio frequens, cardiogmi, vomitus, variæ alui excretiones, urinæ crassæ, turbatæ, sitis magna, linguæ ariditas, asperitas.

Hæcticæ denique pestilentis signa sunt: Primò magnus virium languor, pulsusque debiles ac verè deficientes. Si enim in simplici hæcticâ vires ita concidunt: certè mirum non est, in hæcticâ pestilente, ubi cor non solum aliquâ intemperie laborat, sed simul à qualitate malignâ opprimitur ac corrumpitur, vires maximè deficere. Secundo, ut & in aliis hæcticis calor ab ipsis ægris vix percipitur, adeò ut de nullo affectu, nisi de summâ virium imbecillitate conquerantur.

### De Signis febrium malignarum.

Restant signa febrium malignarum in specie dictarum, quæ diligenter cognoscere, summè necessarium est. Nam pestis & pestilentium febrium ea est vehementia, ut ferè in principio mox sese prodant. Malignæ verò febres in principio latent: ut tamen mox cognoscantur, nihil vtilius est. Nam si in principio non mox cognoscantur, malignitas altius radices agit, tempusque agendi commodum præterlabitur, ac æger in vitæ discrimen adducitur. Cum enim malignitatis, & pestilentis veneni non tanta sit vehementia, aliquandiu in obscuro quasi delitescit, aliâque febrem benigniorem simulat, nec se prodit, nisi ubi iam vires sumpsit, & victoriæ spem concepit. Quapropter omnia signa diligenter perpendenda sunt, ne vel febris, quæ maligna non est, pro tali habeatur; quod nonnulli interdum faciunt, qui vix continuæ aut acutæ febris nomine audito, malignam febrem esse pronunciant; vel si talis sit, negligatur. Et licet vix vnum pathognomonicum datur, quod solum febrem hanc certò detegere valeat, tamen si vllum signum appareat, quod nobis suspectum sit, & de malignitate nos admoneat, illud non negligendum est, sed eâ ipsâ de causâ reliqua omnia diligentius perpendenda; ne si de omni periculo securi sumus, fallax & latens huius morbi natura nobis imponat. Exempli gratiâ, si præter febris morem & præter solitum sopor, lipothymia, cardialgia, vel aliquid aliud accadat, omnia diligentissime perpendenda sunt. Omnino enim in febribus malignis locum habet, quod de peste prælagiendâ habet Poeta:

---Sæpe exiguis mihi  
Augurium tibi triste dabit.

Primum ergo signum, quod ab illâ malignâ qualitate dependet, est, quod omnia symptomata maiora, quàm pro febris naturâ, videntur esse vehementia, & in omnibus symptomatibus peculiaris aliqua apparet conditio, quâ à seipsis, dum in aliis morbis apparent, differunt, & peculiare omnino quid in hac febre præ se ferunt, quod dum in aliis morbis apparent, non obrinent. Vnde si quis periculum, quod ex febre est, conferat cum periculo, quod imminet ex symptomatibus, illud præ hoc negligendum videatur. Inprimis adest virium insignis imbecillitas, sine causâ manifestâ; mox à principio maior, quàm pro febris & caloris febrilis naturâ. Nam si quis laborat febre ardente, in quâ calor est maximus, eius vires à caloris vehementia debilitari non

est mirum: at si quis febre laborat, cuius calor est mitior, & vires nihilominus deiciuntur, hoc iam malignitatem a gignit. Adest inquietudo, anxietas, inordinati sudores, & similia.

Primum hoc signum sequitur alterum, pulsus frequens, parvus, inprimis debilis. Etsi autem in aliis differentiis & circumstantiis à naturali parum discrepare videatur, tamen si vigor ille naturalis sine manifestâ causâ desit, iam malignitatis suspicionem affert; quæ tamen morbo progrediente se magis prodit. Nam inter initia sæpe pulsus naturalibus similes sunt, aut non multum ab iis discrepantes apparere solent; quod diligenter observandum, & alia etiam signa consideranda sunt, ne hic decipiamur. Si enim inquietudo, anxietas, inordinati sudores, frigidi & intercepti, ac alia prava symptomata adfint: falsa illa pulsus imago & simulata bonitas ad febrem benignam indicandam non sufficit: neque pulsus naturalis cum malis accidentibus consistere potest. Est etiam interdum in huius febris initio pulsus formicanti similis, minimus & frequentissimus, qui ex materiæ malignæ copiâ procul dubio accidit. Varius quoque ut plurimum pulsus est in hac febre, & interdum intercensens, transactis primis diebus, quod fit, ob pugnam naturæ & materiæ, & illius sæpe impotentiam, ob quam ordinatè & integrè suum officium exequi non potest.

Tertium, urinæ primis diebus aliquando sanorum nimis similes sunt; quod dum fit, & alia signa ac symptomata grauia adfunt, certum est malignitatis, quæ clam & ex insidiis naturam oppugnat, indicium. Qualitas enim illa maligna & venenata cum non in putredine consistat, sensim primò & sine insigni aliquâ humorum agitatione & perturbatione cor oppugnat. Vnde eius indicia in urinis quidem non apparent, aliis tamen signis satis sese produnt. Aliquando etiam urinæ tenues & crudæ sunt, nullumque continent sedimentum: aut si quod habent, illud excremento potius simile est, quàm sedimento. Etsi enim urina cruda etiam in aliorum morborum initiis appareat, tamen si tenuis sit & aquosa ac omnino à naturâ aliena, mox incipiente morbo, & cum leui febre, quæ leuem etiam adesse putredinem significat, aliquid aliud præter putredinem adesse indicat, nimirum virium & facultatum magnam impotentiam, quæ non ex humorum putredine & calore febrili, sed potius ex malignâ qualitate ortum habet. Conspicitur quoque interdum urina crassa, colorata & turbida, crassum, rubrum & turbidum sedimentum habens, quod maximam humorum conturbationem, magnamque putrefactionem & facultatis naturalis impotentiam significat.

Quartum, calor harum febrium non habet eam acrimoniam, quam in aliis putridis; si scilicet eiusdem generis febres malignas & benignas inter se conferas. Nam etsi in ardente febre calor sit maximus, summum incendium, tamen si eundem & symptomata cum ardente simplici, quæ nullam habet coniunctam malignitatem, conferas, tum calor erit, quàm pro naturâ eius febris, minus mordax; symptomata verò, quàm pro ratione caloris, grauiora.

Quintum, facies plerumque solet esse retri, & à statu naturali multum mutata, viuidaque illâ vi & spiritu destituta videtur. Vnde plurimi existimant, febres hæc ab Hippocrate esse aspectu terribiles appellatas.

His signis satis quidem cognosci potest pestilens & maligna febris; semper tamen & alia symptomata coniunguntur. Nam primò actiones læsas quod attinet, vel sopore & veterne, vel vigiliis exercentur. Imaginatio multis modis corrumpitur, somnusque variis & absurdis imaginibus turbatur memoria debilitatur; vertigo, tumores, convulsionēs,

Hæticæ pestilentis signa.

Malignarum febrium signa.

Symptomata vehementia.

Pulsus.

Urina.

Calor.

Facies.

stiffidum sanguinis & moribus quid initio febrii significet.

siones, corporis totius inquietudo & anxietas adest. Dolores capitis infestant, oculi caligant, aures obscur-  
descunt, tinnitibus & sibilis molestantur, odoratus &  
gustus corrumpitur; crura, artus & omnia membra  
quasi contracta & conuassata iis putantur, cardialgia  
accidit, sitis molesta est, nausea infestat. Ita etiam in  
Excretis varia accidunt symptomata. Vermes enim  
modò per aluum, modò per os, modò per nares  
erumpunt. Adfunt fluxus alui biliosi, colliquantes,  
foetidi. Nares stillant sanguine; quod signum ut in  
morbis acutis aliis malum habet Hippocrates: ita hu-  
ius morbi naturam non obicure arguit, præsertim si ini-  
tio morbi accidat, etiam in maiori quantitate. Expe-  
rientiâ enim compertum habetur, non solum stilli-  
cidium narium; verum etiam maiorem sanguinis è  
naribus effusionem per initia prauam morbi naturam  
significare. Indicat enim hoc magnam humorum  
ebullitionem, prauamque qualitatem, ac virium de-  
bilitatem, ob quæ omnia natura ante tempus vacua-  
tionem instituit. Apparent etiam tumores, modò post  
aures, modò circa alas & inguina, qui sæpè retroce-  
dunt, & difficulter maturantur. Maculæ rubescences  
& liuescentes efflorescunt in dorso, brachiis, cruri-  
bus, & thorace, de quibus suprà plura. Variolæ etiam &  
morbilli interdum conspiciuntur. Denique in quali-  
tatibus mutatis accidunt symptomata: Facies est li-  
uida, plumbea: apparent hinc inde in cute, ut dixi-  
mus, maculæ; lingua est sicca, aspera & nigra, os ama-  
rum: extrema modò refrigerantur, modò incendio  
vrantur.

Et ut hæc concludamus, nihil ferè mali est, quod  
non interdum in hisce febribus appareat; ac quod ma-  
gis extrà omnia tuta apparent, eò magis intus omnia  
sunt turbata & mutata.

### Prognostica febrium pestilentium & malignarum

Pestilentium febrium in specie dictarum eadem in  
prognosticis, quæ in peste ferè est ratio. Quò enim  
symptomata sint deteriora, vomitus scilicet humo-  
rum corruptorum, alui deiectiones foetidæ, atræ, li-  
nidæ, vireiscentes: respiratio difficilis, anhelitus frigi-  
dus & foetidus; cardialgia, lipothymia; deliria, sopor  
grauis; facies horrida; pulsus paruus & debilis; ex-  
trema frigida & liuida; maculæ paucae, violaceæ, li-  
uidæ, nigrae, atque non debito tempore erumpant,  
cum grauib. accidentibus, & retrocedant, antequam  
discutiantur; & contrà vires sint debiles: omnia mor-  
bum grauem & periculosum significant.

Contrà si talia grauia accidentia pleraque absint, &  
omnia symptomata sint mitiora & moderata, si macu-  
læ sint multæ & magnæ, rubentes, atque erumpant  
criticè, & quidem cum ægri leuamine, neque retro-  
cedant, & vires sese bene habeant: salutis spes super-  
est.

Ex hisdem symptomatis de malignarum febrium  
exitu aliquid prælagire licet. Verum cum de iis satis  
prolixè, *Instit. lib. 1. part. 3. cap. 4. §. 6. 7. 8.* dictum  
sit, facile ex iis, quid de qualibet malignâ febre speran-  
dum sit, colligere licet.

## CAPVT XI.

### De curatione febrium pestilentium & mali- gnarum in genere.

Indicationes in febribus pestilentibus ac malignis.

IN omnibus pestilentibus & malignis febribus duo  
adfunt, Venenum & malignitas, ac febris ad quæ  
tota curandi ratio dirigenda est. Et quidem quid fe-  
bris indicet, & quâ ratione ei occurrendum sit, ex  
iis; quæ hætenus de febribus dicta sunt, patet;  
*Dan. Sennerti Tom. II.*

quomodo venenum pestilens & malignitas oppu-  
gnanda sit, ex iis, quæ de pestilentia dicta sunt,  
manifestum euadit. Verum in hoc maxima difficul-  
tas, cui prius, cui posterius prospiciendum sit, &  
quomodo venenum pestilens ac malignitas tollen-  
da sit, ne febris augeatur; & contrà febrî prospi-  
ciendum, ne malignitas negligatur. Et quidem præ-  
cipuè de tribus est controuersia, de alexipharma-  
cis ac diaphoreticis & sudoriferis, ac inprimis iis,  
quæ primum caliditatis gradum excedunt; deinde de  
venæ sectione; tertio de purgatione.

Et si verò plerique hîc eodem modo has quæstio-  
nes, ut de pestilentia dictum, tractare, neque etiam  
inter curationem pestilentis & malignæ febris in spe-  
cie dictæ discernere soleant, tamen hîc distinctio-  
ne opus est. Et quamuis in plerisque febrium ha-  
rum curatio conueniat, in aliquibus tamen discre-  
pat. Cum enim in utroque harum febrium genere  
venenum & putrefactio adfit, nunc Venenum, nunc  
putredo & febris plus vrget. Ideoque hæc duo, pe-  
stilens venenum & malignitas, ac putredo & febris  
inter se conferenda sunt, & vnde plus periculi im-  
mineat, perpendendum. Ideoque si plus periculi  
immineat à veneno, ea ferè curandi ratio est, quæ  
in peste proposita fuit, quæ tamen ita instituenda,  
ut febris non negligatur, multò minùs augeatur.  
Si verò febris plus vrgeat, ad eam inprimis cura-  
tio dirigenda, ita tamen, ne malignitas augea-  
tur.

Quapropter verè & in specie ita dictas febres pesti-  
lentes quod attinet, cum earum natura ad pestem  
propius accedat, earum etiam curatio pestis curatio-  
ni magis cognata est. Ideoque si tales febres grassen-  
tur, vel statim vel præmissio clystere, ad alexiphar-  
maca & sudorifera confugiendum. In alexipharma-  
cis verò exhibendis id obseruandum, ut, quantum  
fieri potest, temperatiora eligantur. Inprimis verò  
hîc efficaces sunt aquæ destillatæ; ut quæ valdè pe-  
netrant. Ideoque alia etiam cum iis exhibenda. Me-  
dicamenta autem talia in pestilentia præseruatione &  
curatione suprà multa sunt proposita.

Aquæ destillatæ.

℥. Succ. ex fol. recent. & virid. galeg. verben. bor-  
raginis, scordij, melis. Calend. acetos. cardui bened.  
plantagin. è rosæ incarn. an. ℥. i. limon. matur. siue ci-  
tri, ℥. ii. aceti rubi Idæi, rut. an. ℥. i. sem. citr. re-  
cent. Vnc. i. portulac. Vnc. β. flor. nymph. alb. recent.  
Vnc. iiii. cortic. fraxin. rec. manip. iiii. Puluerisanda  
pulueriscentur.

Infundantur per triduum in succis prædictis, po-  
stea destill. f. a. per organa vitrea.

Efficax est & hæc aqua. ℥. Radic. & herb. pentaphyll.  
fol. scordij, scabios. cardui bened. acetos. calendul. rad. an-  
gelic. morsus diaboli, contra hierua, tormentill. an. Vnc. i.  
zedoar. sem. citri, an. Vnc. sem. croci, Drach. i. Theriac. ve-  
teris, Vnc. i. camphor. Drach. β. aceti vini, ℥. i. sem. succi  
citri, ℥. ii. spiritus vini opt. (aut si morbus cum non  
fert) aq. alicuius conuenientis, ℥. i. Stent in infusione  
per dies duos, & destillentur, f. a.

Ægyptiis familiaris est hic puluis. ℥. scordij, cha-  
madryos, sem. citr. an. Drach. i. aristoloch. long. zedoar. di-  
etamni Cretici, C. C. vsti, boli Armeni, terr. sigillat. rosarū,  
calef. spic. margaritarum præp. an. ℥. i. camphor. Drach. β.  
corall. rubr. Scrup. i. sacchari candi, Drach. ii.

Huius ℥. i. cum theriaca Andromachi, ℥. ii. in Aq. ca-  
laf. vel citri exhibent calidè manente cibum, & à  
cibo spatio sex horarum, ægrumque in lecto pannis  
cooperiunt, ut sudet, atque sudorem omni conatu pro-  
uocant, repetuntque hoc ter in die.

Vel ℥. Spec. liberant. sine aloë, Vnc. i. diamargarit. fri-  
gid. ℥. v. diatrion. santal. ℥. iiii. unicornu. Drach. i. tormen-  
till. Scrup. iv. sem. citri excort. bol. Armen. præp.  
an. Drach. i. terr. sigill. dr. dimid. zedoar. Scrup. ii.  
Q 3 cinamom.

*cinamomi, Drach. j. croci, Scrup. i. camphor. Scrup. ij. Ma-*  
*nūs Christi ad pondus omnium.*

Dosis drachma vna cum aceto petasitz, & Ange-  
lica.

Commendatur etiam valdè diascordium Cornelij  
Gemmæ, cum aceto bezoardico eiusdem exhibi-  
tum :

*Diascordium  
Cornel. Gem-*  
*mæ.*

*℞. Scordij recens collecti, & in umbrâ siccati, Drach. x.*  
*ditamni Cret. summi, absinthij Pont. Epithymi Cret. an.*  
*Vnc. dimid. flor. rosar. Damascen. calendul. bugloss. Ital. an.*  
*Drach. ij. sem. plantaginis, Scrup. ij. melonum excort. &*  
*incis. cucumeris excort. cucub. excort. an. sesquidrach-*  
*mam. C. C. vsti prapar. Drach. iij. rad. gentian. angelic.*  
*℞edoar. diptamni albi an. Scr. v. nucis mosch. macis,*  
*croci orient. piperis albi, cinamomi, corallin. an.*  
*Drachm. j. rhabarbari, ligni aloës opt. Rhodij, asa dul-*  
*cis, boli Arm. mastich. an. Scrup. iij. camphor. Scrup.*  
*ij. B. cardamomi. spic. Ind. santal. albi, cortic. citri, ra-*  
*sus. eboris, an. Scrup. iij. B. off. de corde cerui, moschi,*  
*an. Scrup. i.*

Subtilissimè læuigata cum sacchari albissimi, aquâ  
rosarum, ac vino Cretico despumati quant. suff. co-  
quantur ad iustam Electuarij consistentiam, cui sub  
finem.

Adde Extract. rad. tormentill. veronic. Sars. parill,  
an. Drach. j. iuniperini; Drach. ij. ol. chalcantini  
rectificati, sesquidrachmam. citri. Scrup. j. Fiat  
Opilata.

*Acetum Be-*  
*zoarticum.*

Eiusdem Acetum Bezoarticum.

*℞. Aceti vini op. florib. caryophyllorum hortensium*  
*immacerati, Vini albi, an. part. iij. succi fol. Acetos.*  
*expressi ac depurati, scabios. ant. galeg. an. part. i.*

Destillentur simul multo circuitu.

Efficax etiam est valdè sal volatilis C.C.

Et extant talia medicamenta plurima passim, & pos-  
sunt etiam in rem præsentem varia parari.

Vt *℞. Aq. bezoard. alicuius, Vnc. ij. diascord. Fra-*  
*castor. Drach. i. terr. sigill. Scr. i. syr. acetosif. citri,*  
*Vnc. j. M.*

Vel *℞. Aq. cardui ben. Acetos. an. Vnc. j. confect. dias-*  
*cordij, Drach. B. Misbridat. Scr. i. terr. sigill. Scr. B. aceti*  
*scord. syr. acetos. citri, an. Vnc. B. M.*

Vel *℞. Aq. bezoardic. Vnc. ii. salis absinthij, cardui*  
*ben. an. Scr. B. diascord. Fracastor. Drach. B. spir. vitriol.*  
*Scr. B. syr. acetos. citri, iulebi ros. an. Vnc. sem. M.*

Vel *℞. spec. liberant. f. aloë, pulu. bezoardici, an. Scr. i.*  
*Casar. rubei, D. B. F. Puluis.*

Vel *℞. pulueris bezoardici Drach. B. spec. liberant. f.*  
*aloë, Scr. B. lapid. bezoardic. g. i v.*

Etsi verò de sudoriferis alij aliter sentiant, tamen qui  
rerum momenta diligenter pensauerint experientiam  
consultuerit, faciliè hæc quæ diximus vera esse animad-  
uerter. Sunt equidem nonnulli, inter quos Thom. Mi-  
nadoüs, in responsione ad quæstionem de diaphoreticorum  
secundo ordine calidorum, & theriacæ in febribus mali-  
gnis vsu, & de febribus malignis libro 2. capite 16.  
17. 18. quia diaphoretica illa calidiora & sudorifera in  
principio exhibita planè reiciunt, quòd facultas  
concoquens lædatur noui caloris accessione; quòd  
calorem natium & spiritus huiusmodi medicamen-  
ta dissipent, quòd respectu etiam humorum putres-  
centium plus noceant calore suo, quàm iuuent  
digerendo: Et omnino quòd nihil commodi, vt  
mox dicetur, ex iis sperari possit. Sudorifera verò  
reiciit Minadoüs, quòd malignæ febris putredo ne-  
que semper neque sæpe habeat mineram in totius  
corporis ambitu, sed vt plurimum in centro & vis-  
ceribus. Deinde quòd sudorifera ad sensibilem eua-  
cuationem pertineant, quæ nisi costâ materiâ cum  
commodo agri fieri non possit, vt passim ex Hip-  
pocrate & Galeno patet. Ideoque neque Indicans  
sudorifera dari in initio malignæ febris, nimirum  
materiæ in ambitu corporis contentam vel natu-

raliter ad eam partem impetum habentem: neque  
tempus sudores ciendi adesse, cum sudores, qui sine  
coctione accidunt, infidi sint. Et inprimis calida  
damnat; cum longè maius ex eorum caliditate dam-  
num, quàm commodum ex sudoris prouocatione,  
consequatur.

Verumenimverò cum experientia contrarium teste-  
tur, & plurimos febribus malignis laborantes sudori-  
feris felicissimè curatos fuisse infinitis exemplis pro-  
barum sit: rationibus istis ita simpliciter fidem non  
habendam, sed rem diligentius perpendendam cen-  
semus.

Principiò verò benè ex Galeno, lib. 11. meth. med.  
cap. 11. Minadoüs monet, difficile esse, eiusmodi ali-  
quod auxilium inuenire, quod citra vllam noxam  
magnificè proficit. Ideoque rationem decidendi hanc  
quæstionem rectè constituit: perpendendum esse, ma-  
iusne commodum, quàm incommodum, vel contrà  
maius incommodum, quàm commodum febris mali-  
gnæ laborantibus accedat ex vsu calidorum diapho-  
reticorum & sudoriferorum. Si enim maius emolu-  
mentum, quàm damnum importent, adhibenda; si  
verò contrarium præstent, omittenda esse.

Quod vt rectè perspiciatur, acceptamus & hoc: In  
quolibet morbo esse quinque consideranda; vrgens,  
causam principalem, impedimenta, affectum, vires; &  
ad vrgens, id est, quod vires maximè prosternt, siue sit  
è symptomatum, siue causarum, siue morborum ge-  
nere, in quolibet morbo curationem primò esse diri-  
gendam. In febre autem malignâ vrgere duo, febrilem  
calorem, & malignitatem, inprimis verò ma-  
lignitatem, quæ in omnibus febribus malignis vires  
evidenter deicit, quod febris malignæ calor non  
semper facit, & proinde huic malignitati inprimis  
& perpetuò in hac curatione propiciendum esse,  
magis vel minùs, pro illius magnitudine & exigui-  
tate.

Verùm ex his, quæ libenter admittimus, præsuppo-  
sitis ac principiis postea non rectè hanc quæstionem  
concludit, & suam sententiam deducit Minadoüs.  
Primò enim cum quæritur, an quid commodi affer-  
rant diaphoretica calida: neque ratione febris, ne-  
que ratione putredinis, neque ratione constipatio-  
num vel obstructionum, neque ratione redundan-  
tiæ, neque ratione virium vllum locum habere pro-  
lixè probat, atque hoc modo ex hac controuersia  
sele expediri putat. Verùm omittit malignita-  
tem, quam maximè in hac febre vrgere antea di-  
xerat. Etsi enim in omnibus febribus putridis vti-  
lissimum sit, transpirationem esse liberam, tamen  
in febribus malignis id maximè est necessarium. Et  
cum naturam ipsam à visceribus ad ambitum cor-  
poris malignam materiam felicissimè expellere vi-  
deamus: huius gratiâ & diaphoretica & sudorifera  
exhibentur.

Neque eo se expedit, quòd vrgens in duo genera  
diuidit; in vrgens, quod dat inducias, & vrgens  
quod non dat inducias: ac malignitatem aut nun-  
quam aut infrequentissimè in humoribus tantam  
vim, quæ omnes inducias adimat, habere scribit, sed  
ferè semper tantum temporis præbere, quòd possimus  
prius impedimenta remouere. Etenim non semper  
malignitas dat inducias, sed sæpe breuissimo & pauco-  
rum dierum spatio hominem iugulat. Et quamuis  
nonnunquam dat inducias: ita tamen humores in-  
terea corrumpit, viresque sensim deicit, vt postea  
nulla salutis spes supersit, & morbus, qui primò  
curabilis fuerat, malignitate neglectâ incurabilis  
reddatur.

Neque etiam obstat materiæ cruditas. Cum enim  
materia maligna, quatenus talis, vix vllam coctio-  
nem admittat; & præterea, nisi mox euacuetur,  
hominem in certum vitæ discrimen adducat; om-  
niò

*De diapho-*  
*reticorum &*  
*sudoriferorū*  
*vsu in febi-*  
*bus malignis.*



nind in principio morborum valde malignorum mox sudorifera exhibenda sunt; & in primis si febris maligna ex contagio ortum habeat, id faciendum, ut illud *uasua* conceptum discutiatur. Et longè alia ratio est sudoriferorum & aliorum purgantium; neque sudorifera omnes humores vitiosos, sicut purgantia tollunt: sed sufficit, si illud *uasua* & putredinale ac malignum fermentum, ut sic dicam, quod instat veneni humores corrumpit, discutiatur. Quod si discussum sit, etsi aliquid vitiosorum humorum adhuc remaneat, tamen ab iis tantum periculum, ut dum malignitas adesset, amplius non imminet. Neque etiam hoc concedendum, quod febrium malignarum putredo neque semper, neque sæpe habeat mineram in totius ambitu, sed ut plurimum in centro & visceribus. Hoc quidem concedimus, in ambitu & habitu corporis materiam non contineri, etsi à naturâ plerumque eò detrudi soleat: in vena cauâ & arteriis verò continetur; cum febres pestilentes, ut & malignæ pleræque continuæ sint. Si verò in primis viis vitiosi humores multi contineantur, eos omnino etiam euacuandos censemus, non, neglectâ tamen malignitate, ut postea dicitur.

Itaque ut ex iisdem principiis quæstionem hanc concludamus, perpendendum, an ex sudoriferorum vñ plus commodi, quam damni in malignis febribus sperandum sit: quod ex eo cognoscemus, si considerauerimus, an febris, an verò malignitas plus urgeat. Etenim si magnum à malignitate impendat periculum, quod plerumque accidit: mox post primarum viarum euacuationem ad alexipharmaca & sudorifera accedendum. Vbi quod libenter concedimus, temperata præcipue, & quæ febrem non augeant vsurpanda. Si tamen illa non sufficiant: plus commodi ex malignæ materiæ per sudorifera nonnihil calidiora discussione, quam ex aliquali calore accenso oritur, potestque calor ille aliis medicamentis adhibitis iterum facile temperari. Si verò febris plus urgeat, ut aliæ putridæ febres quidem curanda: interim semper alexipharmaca admiscenda: & præcipue talia, quæ simul ad *διαφύων* & sudores corpus disponunt, & expulsionem malignorum humorum promouent, ut antea dictum, ut postea cocta & victa materia facilius Naturæ seu artis beneficio per sudores expelli possit.

Vena sectio.

Postea, si opus sit, venæ sectio instituenda est mature, antequam scilicet omnia in corpore turbata fuerint. Vbi scilicet sanguis vel copiâ peccat, ut vasa distendat, vel viribus oneri est, vel motu aliquo concitatur, ut metuendum sit, ne in principem partem rapiatur. Et licet commodius sit, ut ante venæ sectionem primæ viæ euacuentur: si tamen morbus moram non pariat, etiam sine istâ euacuatione statim venam aperire licet. Ne tamen planè negligatur hæc viarum euacuatio, per clysteres fieri potest, qui nec vires dejiciunt, nec reliquos humores turbant, & citò operantur, nec aliorum medicamentorum vñ remouantur. Sint tamen clysteres ij lenes.

Vbi verò progressum malum fuerit, ac in totam massam sanguineam malignitas diffusa, sanguinis missione non solum nullum auxilium Naturæ ferimus; sed vires potius debilitamus. Itaque si principium jam præterlapsum sit, tutius intermittitur, quam in tempestiuè instituitur venæ sectio.

Si verò sanguinis euacuatio quædam requiratur: virtus tamen debiliorem non admittat, cucurbitulæ, quæ sanguinem citra insignem virium jacturam detrahunt, caloremque à partibus internis & spiritus malignitate ac veneno infectos cum sanguine tenuiore versùs exteriora auocant vsurpandæ. Applicentur autem commodissime partibus inferioribus, cruribus nimirum, ut vnâ etiam humores vitiosi quam longissime à corde & cerebro, nobilissimis corporis partibus

ad inferiora reuellantur. Adhuc verò commodior multique vsus est venarum in pedibus apertio.

Purgationem quod attinet, alia in initio harum febrium plerumque non conuenit, nisi quæ primas vias, in quibus non raro multi humores vitiosi, qui febrem vel fouent vel augent, continentur, euacuat, & reliquos humores non agitat: Purgantia ergo miria sint, qualia suprà in curatione pestis proposita. Certum enim & experientiâ confirmatum est, fortiorum purgantium vñ in febribus pestilentibus & malignis plurimos perisse, benignorum verò multos seruatos fuisse. Ipsi enim putridi & maligni humores maxime Naturam stimulant; qui si paulò vehementius agentur, validissimas deinde euacuationes efficiunt, & non raro periculosas diarrhœas excitant. Et comperitum est, quosdam cum purgationem, quâ corpus à morbo præseruarent, vsurpassent, ac fomitem febris malignæ jam circumferrent, humoribus agitat in febrem malignam incidisse, maculæque erupisse, & intra paucos dies mortuos esse. Ita memini studiosum cum de dolore capitis conquerebatur, nec de morbilis quicquam suspicaretur, purgatione sumptâ paulò post morbillos erupisse, sed imperfectè, licet medicamenta diligenter adhiberentur, & statim iterum euacuisse subsequente alui fluxu, & pertinaci tussi. Quapropter lenes clysteres hic valde vñiles sunt, & tutò applicantur, aut lenia planè medicamenta.

Si materia ad superiora vergat, & nausea urgeat, materia per vomitum euacuanda: quem in finem vomitoria suprà, lib. 2. cap. 6. proposita conuenientia exhibentur.

Verum in genere hæc satis determinari nequeunt; in speciali de febribus hisce tractatione res clarior fiet. Etenim febres tales pestilentes malignæ interdum per contagium propagantur, vbi tutissimum est, conceptum quocunque modo inquinamentum per sudorifera & alexipharmaca è corpore expellere, & postea, si opus sit, purgationem & venæ sectionem instituere. Interdum etiam natura ipsa ad ambitum corporis materiam expellit, ut in variolis & morbilis fieri solet. Ac tunc etiam Natura in opere suo turbanda non est, nec materia, quæ ad ambitum corporis protruditur, purgantibus ad interiora reuocanda, sed potius natura alexipharmacis & sudoriferis in opere adjuuanda.

Interdum verò febris à vitioso humorum apparatu ortum habet, aut certè fouetur, & materia vitiosa in ventriculo, circa præcordia, in intestinis hærens nauseâ, dolore, æstu, amarore, anxietate & aliis indicis sese manifestat, quæ necessariò quamprimum vel vomitu vel per aluum euacuanda. Et solet sæpe in primis viis magna saburra vitiosorum humorum contineri præcipue in febribus pestilentibus, quæ à victu prauo originem habent, qui febri vel primam originem dederunt, vel symptomatum vehementiam augent, quam cum natura ipsa sæpe per vomitum excludere cum *εὐopsis* soleat, Medicus eum adjuuare debet.

Hinc iterum ad alexipharmaca accedendum, quæ tamen talia sint, ne febris per ea augeatur. Ideoque postea ea adhibenda, quæ temperatiora sunt, simulque febri & putredini resistunt, qualia sunt; *Acetosa, poma citri, granata, pentaphyllum, tormentilla, cornu cerui, os de corde cerui, lapis bezoar, bolus Armenius, terra sigill. rosa, camphora & similia*, & ex his parata medicamenta, quorum suprà in præseruatione & curatione pestilentie facta est mentio, & postea etiam aliquot recensentur. Ad quæ pertinent & bezoartica mineralia & diaphoretica dicta, quæ Chymici ex ♂. ♀. ☉. parant, quarum descriptiones passim extant, plurimæ.

Cum tamen ex his quædam frigida & sicca sint, metuendumque, ne obstructions in corpore augeantur,

tur, fuliginēque malignæ retineantur, crisisque retardetur: alia his admiscenda sunt, quæ penetrant & expulsiōnem humorum corruptorum promouent, vt *Carduus benedictus, scordium, scabiosa, angelica, pimpinella*, & similia. Inprimis aquæ bezoardicæ sapius exhibendæ sunt, quæ ita temperari possunt, vt simul febri & putredini resistant. Ideoque iis admiscenda syr. acetosil. citri, granator. acetosæ, acetosell. ribes, rubi Idæi, oxylacch. i. &c.

*Illitiones ad sudores.*

Antiqui non solum internis, sed & externis medicamentis ad sudores mouendos utebantur: Et celebris est inter alia, inunctio Aëtij, quæ paratur ex aquæ & olei communis an. ℥. iii. nitri ℥. ii. quæ coquuntur vsque ad aquæ consumptionem. Quo vnguento totum corpus bis tæue leni frictione inungitur, vt pori cutis aperiantur. Loco ol. communis oleo amygdal. dulcium, amararum, chamæmelino, anethino, sambucino, pro morbi ratione, vt licet: vt & aquæ communis loco aliquâ destillatâ conueniente,

Vtuntur & hodie Ægyptij ad omnes corporis partes talibus linitionibus cum leuibus perfrictionibus administratis: quas præstant cum oleo rutæ, aut amygdalarum, aut chamæmelino, aut iuniperino & nitro rubeo. Quâ frictione cum linitione hæc in multis ad sudores aptis largum sudorem concitant, atque sic morbum finiunt. Hoc auxilium in pestilentibus febribus, in quibus exanthemata apparere incipiunt, vel exitura sperant, plurimâ cum utilitate exercent, semel ad minimum in die probè calidam molientes linitionem, à qua statim febricitantes multis pannis cooperientes sudorem promouere, venenosumque humorem à visceribus ad cutim trahere student. In pueris etiam atque infantibus variolis suspectis vel malignis exanthematibus nullum præstantius neque familiarius habent auxilium, vt hæc de re scribit Prosp. Alpinus, lib. 4. de Med. Ægypti. cap. 15.

*Vesicatoria.*

Imminutâ materiâ etiam vesicantia, è cantharidibus, synapi, nasturtio, fermento, ranunculo & similibus, nonnulli applicant. Verùm de hoc remedio apud quosdam altum est silentium: apud alios grauissimæ & prolixæ controuersiæ, atque de vesicantibus & phœnigmis integri tractatus scripti extant, vt tum apud alios, tum apud Herculem Saxon. tractatu de phœnigmis, videre est. Verùm vt breuissimis hanc rem attingamus, non inconueniens videtur, si erubus vel etiam brachiis, suprà cubiti flexuram extrâ, vel paulò supra carpum ea imponantur, prout locus, ad quem materia, quam reuellere & deriuare cupimus, ruit, aut circa quem præcipuè hæret, monstrat: cum citò, tutò, & sine multâ molestiâ, atque sine virium debilitatione materiam venenatam ab interioribus, vt & à capite ad ignobilissimas corporis partes euocent, atque ipsa experientia testetur, multos à grauib. malis hoc modo liberatos fuisse.

Cum verò cantharides in nonnullis naturis incommoda vesicæ afferant, ne quid tale accidat, videndum: & si quid tale metuendum sit, (sæpius tamen nihil incommodi ex vsu cantharidum oriri, experientia docet) rutiùs sinapismi, quàm vesicantia è cantharidibus, adhibentur. Et in vsu tam vesicantium, quàm sinapismorum hoc obseruandum, ne mox, vt dictum, in principio, sed imminutâ, aliquâ ex parte materia, applicantur. Deinde, si forsan critica aliqua per aluum euacuatio accidat, ne illa impediatur, & quos ad aluum natura mouet humores, ad ambitum corporis retrahantur. Et proinde nec diè critico applicanda, ne Natura fortè xpian institutura in opere suo impediatur.

*Malignarum febrium curatio.*

Si verò febris maligna sit in specie ita dicta, idem quod antea de pestilentibus dictum, perpendendum, & videndum, an malignitas, an verò febris plus urgeat, & præterea etiam an ab interno humorum ap-

paratu, an per contagium malignitas hausta sit, & quò natura ipsa vergat. Nam si per contagium contracta sit febris, vel etiam ipsa natura ad ambitum corporis tendat, tutissimum est, mox sudoriferum exhibere morbo & aliis circumstantiis conueniens, & quidem temperata possunt tunc vsurpari, & postea reliqua, vt morbus requirit, & de febre pestilenti dictum, peragenda. Comperique sæpè, febres, quæ primo continuæ erant, & malignitatis suspicionem præbebant, leuis sudoriferi & bezoardici vsu in benignas & intermittentes mutatas fuisse. Si verò ex prauo humorum apparatu febris sit, & non minùs urgeat putredo, quàm malignitas, non ita ad sudorifera properandum, sed primæ viæ primùm euacuandæ sunt, & non solum clysteres, sed & lenientia locum habent, syr. ros. solut. manna, cassia, tamarindi, rhabarbarum, agaricus, tryphera Persica. Et omninò, quod jam suprà etiam monui, hîc iterum repetendum est; In curatione febrium cum pestilentium tum malignarum, diligenter statim initio corporis constitutionem, & victus rationem, quæ præcessit, consideranda esse. Nam si ex iis aliisque signis pateat multos vitiosos humores in ventriculo & vicinis locis abundare, à quibus grauius circa ventriculum symptomata oriuntur; ipsæque febris fouetur & augetur, danda est opera, vt ij quamprimùm euacuentur. Cum verò clysteres eò non penetrent, vel vomitu rejiciendi vel per aluum euacuandi sunt, vt modò dictum. Vtile etiam hîc est serum lactis depuratum lb. ii. mensurâ præter propter acceptum, modico mannæ adiecto, quod & aluum mouet & febrilem calorem temperat. Et licet aliquid eius retineatur & per venas distribuatur: tamen sanguinis feruorem suppressit & mitigat ac calorem febrilem alterat. A fortioribus verò, scammonio, colocynthide, turbit, & similibus planè abstinendum. Tempus tamen hîc diligenter notandum, & perpendendum, quomodo febris sese habeat. Nam si putredo statim incrementumumat, humorumque effervescentia statim maior sit, illico, vt in aliis acutis, & præcipuè si humores turgeant, purgandum, nec nisi ad tertium diem ad summum purgatio differenda. Quod tempus si præterfluxerit, quiescere turis est, aut clysteribus saltem rem agere, quàm medicamenta intempestiuè exhibere, & maiorem humorum ebullitionem excitare. Et quidem si humores vitiosi multi in primis viis hæreant, ante venæ sectionem id faciendum: si verò vitiosi humores in primis viis multi non sunt, sed materia peccans præcipuè in venâ causâ hæreat, venæ sectio, præmissa tamen clystere, priùs instituenda. Si verò putredo non citò serpat, & febris sit mitior, purgationem etiam tardius, ante septimum tamen, instituere licet.

Quæ de vomitu dicta antea sunt, etiam hîc locum habent. Interim alexipharmacis cor semper roborare vtile est.

Primis viis vel etiam turgente materiâ euacuatâ statim venæ sectio, si ob causas antea enumeratas eâ opus sit, & quidem ante quartum diem instituenda, eo modo, vt ante dictum.

Post corporis euacuationem & venæ sectionem vtile est sudoriferum aliquod, sed quod febrem non augeat, exhibere.

Vt ℥. Boli armeni, terra sigillata, radic. tormentilla, scordij. C. C. an. Scr. s. F. Puluis.

Qui exhibeatur in aquâ scabiosæ vel cardui bened. Vel exhibeantur pulueris bezoardici nostri Scr. ij. vel Dra. i. Cuius descriptio hæc est.

℥. C. C. s. vstion. prepar. Drach. i. s. oculorum cancri preparat. terra sigillat. Sil. succini, margaritar. preparat. corall. rubr. prepar. an. Scr. i. off. de cord. cerni, smaragdi preparati, hyacinthi preparat. rubini preparat. an. Scrup. s. lap. bezoartici Orient. Scrup. i. fol. aur. num. iij. F. Puluis.

Cui

Cui in usu præterea lapidis bezoardici gr. iiii. vel grana aliquot salis C. C. volatilis vel bezoardici mineral. addi possunt.

Inprimis verò vitiles sunt aquæ destillatæ, ut antea etiam dictum, ob summam penetrandi vim.

Fortioribus verò sudoriferis vires debilitantur, & cum humores in hisce febribus non semper ita dispositi sint, ut per sudores discuti possint, discutitur tenuius, crassius relinquatur.

Quapropter præparatio & alteratio humorum conueniens instituenda. Solet enim in hisce etiam febribus Natura humores adhuc coquere. Quæ propterea adiuvanda iis remediis, quæ aperiunt, humores incidunt, ebullitionem & putredinem sistunt, febris feruorem extinguunt: è quibus semper eligenda & admiscenda, quæ malignitati resistunt. Excellunt in hoc genere, *Acetosa, scordium, cardum benedictus, semen citri, radices tormentilla, scorzonera, pentaphylli, succus & syr. citri, vinum granatorum, oxyssacchara.*

Magnus etiam hic usus est spiritus vitrioli, qui insignem vim putredinem sistendi, obstructions aperiendi, incidendi, attenuandi, abstergendi, corrupta separandi, reliquorum medicamentorum actiones intendendi obtinet. Idemque aliis etiam de causis commodissime aliis medicamentis admiscetur. Nam cum syrupus de cichorio, de endiuia, violarum, nymphae & plures alij syrupi, ob sacchari admixtionem soli febribus extinguendis vix sufficiant, & vel in bilem mutantur, vel bilem certe non satis doment, nec sitim extinguant: si his spiritus vitrioli addatur, ut aciditatem aliquam contrahant, sitim longè felicius sedant, calorem extinguunt, omnesque suas operationes rectius expediunt. In huius tamen usu id observandum, lætis pulmonibus, vel rupto aliquo vase, vel exulceratione internâ aliquâ in phthisi, sputo cruento, dysenteria, sanguinis mictu, renum ac vesicæ vlcibus, pleuritide, ventriculi inflammatione, & omnibus ferè pulmonis affectibus, nisi forsan à crassa pituitâ vasa pulmonis obstruente, ortum habeant; ut & senibus macilentis ac tabidis, ab eo abstinendum esse.

Vtilis est & hic syrupus ad alterandum, putredinem inhibendam, sitim sedandam, qui, si liber, aquis conuenientibus dilui potest.

*℞. Acetis tunic. rubi Idæi, sacch. albi, an. lb. β. Bulliant in vase vitreo clauso horâ j.*

Factâ residentiâ colentur, & in loco tepido stent diebus aliquot, & feces, si quæ subsederint, iterum separantur.

Addatur spiritus vini Vnc. iij. cortic. citri recet. Vnc. ij. Stent iterum in digestionem:

Postea colentur, & addatur syr. acetos. citri. Vnc. iij. spir. vitriol. Scr. ij. & si liber, ol. cinamom. gutt. vi.

Insignes etiam in hisce febribus vires habet compositus ille spiritus ex spir. tartari. vitri. & Aquâ theriacali suprà descriptus.

Habentque ista medicamenta pleraque etiam vim simul sudores mouendi. Et quanquam non semper statim sudor sequatur: tamen medicamenta talia continuanda & singulis diebus exhibenda sunt, ut corpus ad sudores sensim disponatur, & Natura tandem sponte suo tempore humores vitiosos per sudores expellat; quæ ita comparari possunt, ut simul febri & putredini resistant.

In hunc usum sæpe aquæ contra febres malignas alicuius Vnc. ii. cum syr. aliquo conueniente dentur.

Vtilis & hæc est. *℞. Succo citri, acetosa, endiuia, gallega, taraxaci, borragin. an. lb. j. β. cardui bened. cardui marie, scordij, scabiosa, rosar. Prouincial. an. lb. j. pomorum citri cum cortic. & seminibus concisorum num. vj. rasura C. C. crudi lb. β.*

Stent in infusione horis 24. Postea destillentur. F. Aqua contra febres malignas.

In frequenti etiam usu est in pestilentibus ac malignis febribus Aqua cordialis Herc. Saxoniz, quam describit de febribus libro 8. capite 37.

Vel detur subinde & singulis diebus aliquid istius pulueris, cum aliquâ aquâ conueniente.

*℞. Rad. Zedoaria, angelica, helenij, aceto scordij præparat. an. Drach. ii. tormentilla Drach. j. β. fol. acetosa, scordij, cardui bened. an. Drach. ij. sem. citri excortic. acetosa, aquilegia, an. Drach. j. santali citrini, succini albiss. an. Drach. j. β. terra sigillat. boli Armeni, margarit. præpar. corall. rubr. præp. an. Drach. j. C. C. vsti præpar. Vnc. β. Off. de C. C. Drach. j. croci Drach. j. Puluerisatis adde spec. liberant. f. aloë. diamarg. fr. de gemm. frig. an. Drach. i. F. puluis contra febres malignas.*

Vbi humores iam satis præparati sunt, nisi natura sponte eos expellat, per viam conuenientem euacuandi sunt. Sed & tum lenioribus medicamentis vtendum. Et purgatio vix ante diem decimumquartum instituenda; imò si humores abundant pituitosi, vix ante 17. diem tentanda.

Si ad urinam vergat materia, emulsione seminum melonum, citri, cardui bened. cum aquis acetosæ, capillorum ♀, & similibus natura adiuuanda.

Toto verò morbi tempore tam in malignis, quam pestilentibus febribus, pulsibus & cordi medicamentis cor roborantia & malignitati resistentia applicanda, quæ passim extant.

Monetur quidem hic à nonnullis quæstio de usu epithematum cordis in febribus malignis, petechialibus, variolis, morbillis & similibus, An nimium locum habeant, necne. Et quidem nonnulli ea ad cor roborandum admittunt, alij verò, vbi exanthemata pestifera efflorescunt, cordi imponenda non censent, ne *παλινδρομή* & recursus humorum ad cor, partem nobilissimam, fiat; & ne cutim densando fuligines & fumosa excrementa, quæ cor motu suo expellit, retineantur, & hinc putredo maior febrisque acrior excitetur, & crisis impediatur. Verumenimverò si epithemata non sunt valde adstringentia & repellentia, sed in qualitatibus actiuis temperata, (adstringentia enim & refrigerantia valde merito suspecta sunt) in reliquis moderatè siccant, & inprimis peculiari facultate cor roborant: non tantum sine vlllo periculo, sed & cum commodo vsurpari possunt. Neque enim Natura fuligines malignas solum per cutim cordi superpositam expellit, neque epithemata cordis regioni imposita totius corporis cutim adstringere & occludere valent: sed potius Natura epithematum auxilio fortior facta promptius reliquam materiam vitiosam ad ambitum corporis expellet.

Dietam quod attinet, Cibus sit boni succi & facilis coctionis; & cum vires langueant, cauendum, ne natura copiâ cibi oneretur. Cibi quoque iis rebus, quæ huic febri conueniunt, condiendi sunt. A vino, nisi forsan Syncope imminet, abstinendum: Commodior verò est potus tenuis Cereuizæ: commodè etiam præbetur decoctum Cornu cerui, cum spiritus vitrioli eâ quantitate, quæ ad gratam aciditatem sufficit: cui etiam iulebi rolarum vel violarum aliquid admisceri potest: Sitim enim sedat, obstructions aperit, putredinem arceat, malignitati resistit. Nec cum iis sentio, qui C. C. decoctum non plus virium habere putant, quàm aquam, in quâ lateres igniti extincti sint. Plurimorum enim doctissimorum Medicorum obseruatione deprehensum est, vim insignem in cornu cerui etiam vsto inesse, ut hanc negare summa sit pertinaciæ, Aegyptij, ut Prosper Alpinus, lib. 4. de medic. Aegypti. cap. 4. refert, pulpam tamarindorum & berberis fructum exsiccatum cum seminibus feniculi vel citri

Purgatio.

Urinam clemia.

Topica.

An epithemata cordis in febribus malignis conueniant.

Dietæ.



in plurimâ aquâ communi infundunt, porumque ita parant, quem agris in febribus malignis & pestilentibus toto morbi tempore concedunt, plurimumque in huius potus usu confidunt: cum tamarindorum & berberis fructus febrium putredini maximè resistere compertum habeant. Reliqua commodius iam in specie explicabuntur. Etsi enim in malignitate omnes hæ febres conueniant: tamen natura humoris maligni non semper est eadem, quæ etiam curationem in nonnullis variat, ut ex sequentibus patebit.

## CAPVT XII.

## De Variolis &amp; Morbillis.

**E**tsi autem cum veneni & malignitatis natura sit latens & abscondita, pauca de differentiis eius dici possint: quia tamen effectibus & symptomatibus sepe malignitas latens prodit, quædam symptomata & morbos, qui aliquam in hisce febribus differentiam videntur constituere, in specie perpendemus. Et primo loco agemus de variolis & morbillis.

Notissimum autem hodie morbi genus est, quod variolarum & morbillorum nomine appellatur: Verum cui variolarum, cui morbillorum nomen attribuendum sit; & an antiquis hoc malum cognitum, ac quo nomine appellatum fuerit, non satis clarum. Græcis visitata sunt *ἡ ἐξανθήσασιν καὶ ἐκθύσασιν* vocabula; quæ etsi non semper distinguantur, tamen cum duplex sit *ἡ ἐξανθήσασιν* genus, vnum, quod saltem colorem cutis mutat; alterum, in quo pustulæ quædam eminentiores in cute erumpunt: Posterius hoc genus *ἐκθύσασιν* nomine propriè appellari posse patet ex Galeno, 3. *Epid. comment.* 3. 1. 51.

Neque enim credendum est, antiquis Græcis morbi hoc genus planè incognitum fuisse. Nam quæcunque huius morbi causa sit, de qua inter Medicos, ut postea dicetur, non conuenit, nihilominus etiam apud Græcos illa locum habuit; & descriptiones à nostris non planè discrepant. Ac si Arabum ætate, quod nonnulli volunt, primum hic morbus cepisset, procul dubio ut noui morbi Arabes in suis scriptis mentionem fecissent. Et licet sint quædam, in quibus exanthemata Hippocratis, Galeni, Aëtij cum nostris variolis & morbillis forsan conuenire non videantur: tamen sciendum, nec nostras variolas & morbillos semper eiusdem generis apparere; & eiusdem generis morbos aliis atque aliis seculis ex diuersitate regionum & victus, ex peculiari vi siderum, ex vario hominum vitæ genere, & causis aliis cum externis tum internis, quasdam mutationes & differentias accipere posse. Interim tamen multa, quæ tum ad naturam horum, tum ad curationem spectant, communia habent. Et licet seorsim ac singulatim de iis non tractarint Græci: idè tamen illis ignotos hos morbos fuisse, dicendum non est. Cum enim saltem morborum epidemiorum comites sint, & per modum criseos in morbis contagiosis & malignis erumpant, peculiariter etiam de iis non tractarunt; sicut nec de contagio & aliis, quæ pestilentes morbi comitari solent.

Latini papulas & pustulas appellant. Hodie dicuntur variolæ & morbilli; variolæ quidem quasi parui vari, vel quoddam cutem variant, ut nonnulli opinantur. Morbilli verò quasi parua pestis; il *Morbo* enim Italici in specie pestis dicitur: habentque morbilli hoc nomen, quoddam pesti magis cognati sint. Sunt enim variolis deteriores.

Qui autem affectus variolarum, qui morbillorum nomine sit appellandus, Authores non conueniunt. Nonnulli pustulas illas eleuatas, quæ in pus mutan-

tur, morbillos dicunt; alias verò, quæ saltem colorem cutis variant, variolas nominant, & hinc etiam variolarum nomen deducit. Verum plerique doctiores Medici cōtrario modo has voces vsurpant, & variolas quasi paruos varos dictos putant, & hoc nomen tribuunt pustulis illis eminentibus, humore plenis, & quæ plerumque suppurantur, quas Germani *die Blattern* & *die Bothen* nominant. Morbillos verò vocari maculas in cute efflorescentes seu exigua rubra tubercula, quæ Germani *die Masern* appellant. Verum si de rebus constat, facile de verbis conueniri potest.

Notandum tamen hic, etsi apud Medicos plerosque saltem duorum vocabulorum metio fiat, Morbillorum scilicet & variolarum, tamen plures omnino sunt, aut certe specierum harum differentia; quas etiam Germani, ut & aliæ Nationes, vulgò peculiaribus nominibus exprimunt. Sub nomine *Blattern*, *Bothen* equidem variolas comprehendunt, quarum tamen est quædam differentia, & præter communes variolas & morbillos à vulgo nominantur *die Schaffsblattern* und *Vindbothen*, *die Steinbothen*, *Ritteln* oder *Rotteln*. Et rursum variolæ communiter dictæ, *die Blattern* und *Bothen*, non planè eiusdem modi sunt. Alię enim sunt maiores, alię minores, quædā albicant, quædā liuēt, vel alterius coloris sunt, quædā statim erumpunt & in altum attolluntur ac maturantur, ac circulo cinguntur rubro & sine grauib. symptomatibus erumpunt & periculosa non sunt; aliæ sunt liuidæ & tardè erumpunt, vel statim iterum subsident, & habent circulum liuidum, quæ plerumque lethales sunt. *Die Schaffsblattern* oder *Vindbothen* per Crystallinos expressisse videtur Ioh. Ph. Ingrassias de *Tumoris p. n. tomo 1.* quæ sunt pustulæ per vniuersum corpus dispersæ, lupini ferè magnitudine plus minusue, albæ, ac instar Crystalli resplendentes, à quibus aquositas, quædam deinde effluit: suntque hæ minùs periculosa & sæpe, citra notabilem febrem infantesprehendunt. *Die Steinbothen* verò sunt tubercula quædam parua, sine multâ sanie, sparsim nec copiosè erumpentia, omnium ferè minutissimæ variolæ, quæ penè citra febrem infantes inuadunt, ut rarò decumbant; citissimè etiam sanantur.

Ad morbillos procul dubio pertinent *Ritteln* vel *Rotteln*, à rubore procul dubio sic dicta exanthemata, quæ sunt tubercula pusilla rubea cum calore aut tussi inuadentia ac aliis morbillorum symptomatibus; minùs tamen, quàm vulgares morbilli, periculosa, enanescunt etiam instar morbillorum. Et quandoque sola inuadunt, quandoque morbillis interispermuntur, quandoque sanatis variolis superueniunt. Hoc malum Rubellam appellare videtur Haly Abbas *lib. 8. theoric. c. Rubella*. 14. *Est species, inquit, aliqua, quæ vocatur rubella, quæ ex sanguine fit calido & subtili: & non multum malo, & hæc species cum ad statum peruenerit, similis fit mili granis (unde etiam sub nomine miliarij descripta videtur) aut paulò maior, & eius color ruber, nec aperiuntur pustula, sed fluunt, id est, insensibiliter discutiuntur & enanescunt.*

Præter has differentias adhuc alia est, sed rarior quidem, quam aliquoties obseruavi, quo nomine tamen ab aliis discernere, hætenus dubius fui. Etsi enim instar erysipelatis totum ferè corpus prehendam; tamen non vidi quod adultos, quod in erysipelate fieri ferè solet, sed infantes solum corripit. Malo ergò ad morbillos referre. Et forsan malum est, quod Forestus, *lib. 6. obseru. 59.* purpuram & rubores, ac *ἐρυσίπελα* appellat; Iohan. Philippus Ingrassias, loco citato, Rossianam & Rossaliam à Neapolitanis nominari scribit: *Rossalia*. Maculæ rubræ & quasi ignitæ cum vix effatu digno tumore per vniuersum corpus quasi quædam parua erysipelata erumpunt in principio, seu morbi die quarto vel quinto. In statu verò vniuersum corpus rubrum & quasi ignitum apparet,

Variola &amp; morbilli.

Endoputia

An variola &amp; morbilli antiquis noti fuerint.

Variola vnde dicta.

Germani.

ac si vniuersali erysipelate laboraret. In declinatione rubor ille imminui, & maculae rubrae latae, vt in principio, iterum apparent, quae tandem septimo vel nono die euanescent, epidermide squamarum instar decedente. Malum verò hoc graue ac periculosum & saepe lethale est. Nam calor est feruentissimus, sitis inextinguibilis, & plerumque pulmonum (vnde tussis excitantur) faucium & aliorum viscerum inflammationes, deliria & alia mala vrgent. In declinatione tandem materia ad articulos extremorum transfertur, ac dolorem, & ruborem, vt in arthriticis, excitat. Cutis squamarum instar decedit, mox pedes ad talos & suras vsque intumescunt, hypochondria laeduntur, respiratio difficilior redditur, tandemque abdomen intumescit, aërique non sine magno labore & post longum tempus pristinae sanitati restituntur, saepe etiam moriuntur. Ita obseruauit Clariss. Dn. D. Michaël Doringius, affinis & Compater meus honorandus, vt literis ad me datis scripsit, puerum quendam Vratislaviae post hunc morbum pedibus, cruribus, scroto, ventre, ac facie intumuisse: cum genarum nonnullo ac perpetuo quod rubore, febriculâ irregulari, tussi quâ paucâ, eaque spumosa saltem & pituitosa reiciebat, difficultate respirandi summâ. Hic septimo die, antequam moreretur, post summam respirandi difficultatem, ponderis sensum circa pectus, ac stertorem, pulmonis abscessu rupto pus & sanguinem atrum tussi reiecit, & hinc 7. ab illo paroxysmo die, cum eadem symptomata redirent, mortuus est. Corpore aperto tota pectoris cauitas aquâ citrinâ repleta, pulmonesque ambo toti liuidi & gangrenosi conspiciebantur; & sinister magnum intrusum abscessum fouebat. Abdomine aperto innatabant intestina tota simili aquâ: omentum prope consumptum videbatur. Hepar, quod pro indiuidui ratione portentosa fuit magnitudinis, subpallidum. Et talia mala ac symptomata, arthriticos nimirum dolores & tumores, tumorem abdominis, & similia morbo huic succedere, nihil mirum est. Nam cum variolae non solum in externis partibus, sed etiam in omnium viscerum superficie erumpere soleant: idem etiam in Rossaliâ accidere potest; & sicut totum corpus extrâ inflammatur, ita etiam viscera interna procul dubio inflammantur; & de pulmonibus res extra dubium est. Idem tamen procul dubio in aliis etiam visceribus accidit; vnde materiae parte ad extrema protrusâ, primum fiunt dolores arthritici, hinc tumores hydropici, ac viscera ipsa corrumpuntur.

Cum verò talis sit horum *εξαρτημάτων* differentia, tamen de variolis & morbillis saltem dicemus, reliquae differentiae ad has facile referri poterunt. Et quidem variolarum & morbillorum differentiam quod attinet, morbilli à subtiliore, calidiore & sicciore, cuiusmodi sanguis potissimum biliosus esse solet; variolae, à crassiore materiâ proueniunt: magnitudo tanta morbillis non est, quanta variolis: variolae sunt pustulae quaedam & vesiculae, quales feruenti aquâ ambustis emergunt; in morbillis verò maculae potius quaedam apparent, instar morsus pulicum, cum cutis asperitate tamen, aut certè exigua tubercula, sed quae in pustulas sanie plenas non mutantur seu attolluntur, sed post septimum ferè diem sine exulceratione, nullo ferè vestigio ac nullâ foeditate in corpore relicta, abeunt: in variolis dolor dorsii maior, in morbillis minor: contra in morbillis maior pectoris angustia, & feruor totius corporis, & lacrymae etiam plures, tum quia materia est mordacior, tum quia celerius & cum maiore impetu mouetur: citius quoque egrediuntur morbilli & ad statum perueniunt, ob materiae tenuitatem & calorem.

Et si verò procul dubio diuersae, quas haecenus enumerauimus, *εξαρτημάτων* differentiae, à diuersis & peculiari modo corruptis humoribus proueniunt, tamen

cum quae specifica illa cuiusque humoris natura sit, quique determinatus corruptionis gradus, vix explicari in hac rerum Naturae obscuritate possit, & cum in plerisque aliis, quae ad signa & symptomata pertinent, conueniant, conjunctim de iis agemus. Si quid tamen occurrer, quod alicui differentiae peculiariter conuenire videbitur, nec illud omittemus.

Et vt primò morbos hos breuiter describamus, *variola quid,* variolae sunt pustulae in summâ cute, partibusque cuti proportionem respondentibus, cum febre continuâ propter peculiarem sanguinis effervescentiam & ebullitionem à facultate expultrice excitatae.

Morbilli verò sunt maculae aut tubercula parua, *Morbilli quid,* rubra, in cute erumpentia cum febre continua, itidem à facultate expultrice & sanguinis peculiari ebullitione excitata.

Subiectum est cutis, ac in primis externa eius superficies, quae *ἐκδερμὶς* dicitur: sed tamen & membranae ac partes aliae internae variolis vt & morbillis afficiuntur, ita vt in quibusdam post mortem dissectis deprehensum sit, eorum viscera haud secus atque cutem sordidis eiusmodi pustulis obsita atque sordida fuisse, vt etiam infra ex Fernel. 2. *de abd. rer. caus. cap. 12.* dicitur.

Verum vt natura tam variolarum quam morbillorum clarior reddatur duo mox à principio explicanda sunt. *Primò,* Quanam causa sit interna & proxima, à quâ cum pustulae tum maculae in cute efflorescentes proueniunt. *Secundò,* an sine febre, an verò semper cum febre, & quo febris genere erumpant.

De primo aliquid definire difficillimum est, ob discrepantes hac de re Medicorum opiniones. Arabes, qui primi hac de re diligenter scripserunt, causam proximam, & continentem variolarum & morbillorum re-  
*De Causa variolarum & morbillorum.* ferunt in immunditiem à primo ortu in sanguine relictam ex sanguine materno, quem menstruum vocant, quo foetus in vtero matris alitur. Quamquam enim foetus in vtero matris, quod optimum est, ex sanguine pro alimento attrahit, tamen fieri non potest, quin aliquid impuri, praesertim mensibus posterioribus, vbi copiosiore alimento opus habet, simul attrahat. Miscentur postea cum hoc in corpore mulieris cacoehymico vitiosi humores alij, quorum bona pars ad venas vteri, tanquam ad communem sentinam deriuatur: vbi diutius retentum totum illud maiorem *μυξοπύαν* acquirit. Relicta illa labes in corpore tandem delitescit, donec quacunque de causâ impulsivim suam, tanquam fermentum, in vniuersam sanguinis massam effundat. Tum enim sanguis effervescit & ebullit, vt quod ex illo inquinamento minutis etiam particulis corporis permixtum erat, seceratur, secretumque ad arbitrium corporis propellitur, & has pustulas ac maculas excitat, cum leuiori aliâ segregatione natura id praestare haud possit.

A quâ sententiâ non multum discrepat Rhasis opinio, qui, *de pestil. cap. 1.* sanguinem puerorum & infantum musto comparat, quem natura, cum adhuc depuratus non sit, elaborare & purgare intendens, in ebullitionem excitat, per quam partes heterogeneas ab homogeneis separantur. Atque idè omnes variollis & morbillis obnoxios esse statuit; quoniam sanguis necessariò ex statu primo in secundum, id est, ex impuriore in purum & defecatum transit: sicut mustum necessariò per ebullitionem in vinum purum mutatur. Quamquam enim expressè sanguinis menstrui mentionem non facit Rhases, tamen cum puerorum & infantum sanguinem musto comparat, & quasdam impuritates habere statuit, quae ebullitione separandae sint: procul dubio innuit, in ipso vtero illam impuritatem & labem infantes contrahere.

Atque vt haec crederent hi authores, eo praecipue persuasi sunt, quod viderunt, variolas & morbillos omnes homines, nisi mors ex aliâ causâ praevenerat, inuadere,

inuadere, potissimum verò infantes & pueros ad annum ætatis vsque septimum, rarius adulescentes: imò infantes in lucem editos fuisse, qui variolis & morbillis in vtero adhuc conclusi laborarunt. Deinde quòd animaduertunt, quòd qui semel vel bis iis laborarunt, postea plerumque ab hoc morbo immunes sunt. Et si enim accidat interdum vt nonnulli tertium hæc mala patiantur, tamen id rarius euenit.

Gentilis sententia.

Huic Arabum sententiæ sese opposuit Gentilis, has ob rationes: 1. Quòd infans in vtero sanguine optimo & purissimo nutriatur: 2. Quòd variolis & morbillis non solum infantes & pueri, sed & iuuenes, imò ætate confecti & senes laborent. In quibus certè videretur impossibile, materiam illam & labem in corpore tamdiu latere potuisse. Inprimis cum plerique ex iis antea febribus, scabie, & morbis similibus laborarint, per quos quicquid impuri in corpore est, expellitur & secernitur. 3. Quòd scemina, quibus menses supprimuntur, his morbis non laborent.

Fernelius.

Gentilem secutus est Fernelius, lib. de abd. rerum caus. cap. 12. & rationes modò allatas ipse etiam contra communem sententiam adducit. Ipse verò ex causâ quadam communi cælesti malum hoc originem habere has ob causas statuit. Primò, quòd non solum feruidiore cælo, sed etiam hyeme interdum grassentur hi morbi. 2. Deinde quòd annos complures iaceant, & certis annorum intervallis sæuiant in plebem, aliàs quidem seorsim exanthemata, aliàs exanthemata solum. Causam autem cur infantibus & pueris hæc magis familiaria sint, quàm adultis, hanc reddit, quòd firmior ætas adultior tantillis malis non lacessatur, nisi cum fortè constitutio grauior inualuerit.

Mercurialis.

Mercurialis & ipse Antiquorum sententiæ se opponit, & de morb. pueror. cap. 1. primò ex historiis noui orbis eam refutare conatur, cuius authores scribunt, quarundam regionum incolæ ferè extinctos fuisse à variolis vitio aeris infecti. Deinde ex eo probare vult variolas & morbillos ortum non habere à menstruo sanguine, quòd menstrui sanguinis vitium mox ab ortu mundi mulieribus affuerit: Morbus verò hic antiquis fuerit incognitus, & Arabum tempore primùm innotuerit. Ipse verò statuit causam communem internam esse proprietatem & inclinationem à parentibus, qui hoc vitio prius tentati fuerint, contractam. Statuit enim omnes à parentibus, qui his morbis correpti fuerunt, aptitudinem quandam ad similes morbos concepisse, ac proinde esse illos quasi hæreditarios.

Mercurialis opinio exanimatur.

Atque hæc sunt de causis variolarum & morbillorum discrepantes sententiæ, inter quas, vt ab eâ incipiamus, Hier. Mercurialis opinio minùs probabilis videtur. Nam non esse nouum morbi genus suprà dictum est.

Et si Arabum tempore incepisset, procul dubio in descriptione huius morbi mentionem eius fecissent, nec causam in sanguinis materni impuritatem retulissent. Esse verò morbum hæreditarium, rationi consentaneum non est. Nam cur semel aut bis tantum homines hoc morbo corripiuntur, si est hæreditarius, non sapius? Deinde cur qui peste semel laborant, eandem ad pestem inclinationem & aptitudinem soboli non communicant? At hoc non fit. Et quidem meritò. Nam natura vincens venenum pestilens, illud è corpore planè exterminat. Idque eodem modo in variolis & morbillis facit. Et nisi hoc fieret, nemo à variolis & morbillis perfectè sanaretur. Vnde non est accommodatum exemplum macrocephalorum, quod his verbis proponit Mercurialis: *Id perinde accidit, vt id quod scripsit Hippocrates, in libro de aq. aëre & locis, de macrocephalis India populis. Nam primum gens illa arte & studio cepit infantibus capita oblonga facere; unde cum parentes eiusmodi capitibus præditi essent, factum est, vt filij ab ipsis similes geniti sint, adeò vt proprietate paternâ tota illa gens facta sit macrocephala. Sic prope-*

*modum contingit in variolis & morbillis. Hic morbus celi vitio omnes tentantur aut ferè omnes, qui deinceps cum proprietatem paternam filiis communicarint, non est mirum, si longè latèque morbum propagarint, & hac proprietate facta sit non solum promiscua, sed & naturalis.*

Nam in macrocephalis duplex est causa. Primò imaginatio matrum è conspectu macrocephalorum concepta. Secunda ipsa in corpore cuiusque parentis dispositio. At neutra in variolis & morbillis locum habet. Non imaginatio, vt cuius manifestum est. Neque etiam omnes morbi, quibus parentes laborant, necessariò in corpore relinquunt dispositiones, per quas iidem in sobolem deriuntur. Præterea non causam reddit Mercurialis, cur omnes homines morbillos & variolas patiantur. Nam si hic morbus nouus est, & à parentibus in liberos propagatur, atque omnes ferè hodie hunc morbum patiuntur: necessarium est, cum primùm cœpit, omnes homines eo correptos fuisse, quod impossibile est. Cum enim actio non fiat nisi in patiens dispositum, fieri non potest, vt vna & æqualis in omnibus ad variolas & morbillos recipiendos fuerit dispositio.

Reliquas duas opiniones quod attinet, habet vtraque suos sectatores; etsi apud vtroque hoc in confesso sit, vtram etiam opinionem defendas, eam dubitatione non carere. Pro vtrâque scilicet sententiâ rationes tam probabiles sunt, vt vix videamus, quomodo alterutri saltem tuto fidem adhibere possimus. Ergo, saluo aliorum iudicio, potius vtramque opinionem coniungemus; licet ebullitionem putredinemque ac determinatam quandam humorum corruptionem variolarum & morbillorum causam proximam agnoscamus: à tribus tamen illam provenire statuiamus, ab aëre maligno, à sanguine materno, & à vitioso alimento. Nimirum variolæ & morbilli proximè proveniunt à quodam naturæ conatu, illud, quod sanguinem inquinat, expellentis. Omnes enim variolæ & morbilli proximè per modum quandam crisis proveniunt, quâ natura seu facultas expultrix excrementitios seu prauos aut malignos humores, quibus sanguis inquinabatur, paulatim, à partibus scilicet internis, per venas primùm maiores, post minores, ac demum minimas, quæ ob exilitatem capillarium nomen acceperunt, ad cutem, & quæ cum hac coherent, aut ei ἀνάλογα sunt, expellit, & bonos à malis separat. Verùm vitium illud sanguinis, ob quod natura sese ad expulsionem accingit, à triplici causâ provenit; nimirum ab aëre venenato & maligno, humores inficiente; à vitio quodam sanguinis materni, quo infans in vtero alitur; & quod addimus, etiam à victu prauo. Vnde variolæ & morbilli plerumque duplices constituuntur: aliquando epidemij, aliquando sporadici. Atque hoc modo si vtramque opinionem coniungamus, facilè quasdam difficultates, quibus vtrâque opinio, si seorsim defendatur, premitur, euadere poterimus.

Atque vt de antiquorum & Arabum sententiâ primò dicamus, etsi Fernelius & Mercurialis eam planè reiciunt: tamen simpliciter repudianda non est. Nam cum variolæ & morbilli omnibus hominibus communes sint, vt vix reperiatur, qui non aliquando iis inficiatur, ac ætati puerili hic morbus familiarior sit: causa etiam aliqua communis quærenda est, quæ omnibus hominibus, & inprimis puerili ætati, sit communis. Ad aërem hic solum cum Fernelio confugere non possumus. Nam dantur variolæ & morbilli, qui epidemij non sunt, sed sporadici ac sparsim hunc vel illum priuatim corripiunt; quod signum est, variolas & morbillos rum temporis non à communi, sed priuatâ causâ provenire. Præterea singulis ferè annis reperiuntur infantes variolis ac morbillis laborantes. Ergo si variolæ & morbilli solum ex aëris vitio provenirent, singulis annis daretur aër pestilens & malignus;

Contrariis decisio.

Arabum sententia explicatur.



malignus; quod concedendum non est. Itaque cum in aërem solum non possimus referre causam, in corpore quaerenda est causa communis, & quidem talis, quæ ab ipso ortu infantibus adfuit; cum habeatur compertum, infantes variolis aut morbillis laborantes in lucem editos, vel statim post ortum ipsis correptos fuisse. In vtero autem alia causa non datur, quam semen & sanguis maternus, quo alitur infans. Seminis quidem vitio qui morbi contingant, difficulter tolluntur & eradicantur, ac sæpe recurrunt. Ex sanguinis ergo, quo infans in vtero alitur, vitio, causa hic petenda est. Licet enim, ut rectè Galenus, 5. *Epid. com. 3. l. 73.* docet, meliorem sanguinem ad se trahat nutrimenti causâ infans, deteriorem autem relinquat, unde prægnans prauis humoribus impletur, quos in partu natura euacuat: tamen ubi fœtus grandior factus, copiosiore alimento opus habet, impossibile est, quin etiam aliquid de prauis humoribus attrahat; inprimis cum in gravidis menses supprimantur, cum quibus aliâs natura singulis mensibus id quod vitiosum in corpore cumulabatur, excernere solebat. Unde eo tempore, quo fœtus grandior factus est, matres & plenitudine, & vitiosis humoribus minùs laborare deprehenduntur, & symptomata, quibus ob sanguinis copiam & prauorum humorum retentionem antea vexabantur, euanescent.

Atque hæc est labes & communis causa, ob quam plerique infantes variolis & morbillis corripiuntur. Quæ labes si à causâ cælesti in actum deducatur, & ab aëris vitio natura ad expulsionem stimuletur, aut si per contagium, quod sæpe fit, malum hoc disseminetur: tum variolæ & morbilli infantibus epidemij sunt. Si verò natura solum à causâ internâ excitata & stimulata hanc expulsionem tentet, nihil obstat, quin etiam priuatim & sparsim, morborum sporadicorum modo, diuerso tempore, nunc hos, nunc illos infantes variolæ & morbilli inuadere possint.

Cur autem ista labes non mox in primâ infantia à natura excutitur, sed demum post plures annos, ut tertium, vel septimum, isto malo infantes corripiantur, quaerendum est. Utque id breuiter explicemus, sciendum, istam labem non primariò in sanguine hædere, sed in partibus solidis, neque illam materiam, quæ per crisin in variolis & morbillis excernitur, mox à primo ortu in venis contineri, & ita per plures annos asseruari: Verùm in solidis partibus totius corporis relinquatur quædam dispositio, ob quam tales humores cumulantur. Ut enim quâ semel est imbuta recens conseruat odorem testa diu, doliûmque saporem & odorem, quo est imbutum, vino, quod infunditur, communicare solet: ita cum ex impuritatibus illis sanguinis mœstri in vtero labes quædam & morbosa dispositio in omnibus partibus contracta sit, etsi alimentum, quo infans vitur, bonum sit: tamen ob illam dispositionem malam, labem aliquam contrahit, acciditque, ut sanguis non vndiquaque purus generetur: Quem ubi natura ampliùs ferre nequit, hanc excretionem instituit. Quod autem hoc apud quosdam citiùs, apud alios tardiùs accidere solet: causa est, quod pro variâ illâ dispositione & temperamenti diuersitate, quam plurimum hac in re posse certum est, non semper eadem copiâ impurius sanguis generatur, & quod fermentum illud sanguinis aut paucum ab ortu fuit, aut suam quasi maturitatem non acquisiuit, & præterea natura illi quasi assuera est, atque hinc obrutum & sopitum tam diu iacuit benigniori sanguine. Vbi autem tanta eius copia cumulata est, ut naturæ molestus esse incipiat, tum solet ea hanc excretionem instituere. Quibus accedit & externarum causarum stimulus, cum scilicet natura vel ab aëris vitio, vel à contagio aliorum variolis & morbillis laborantium ad excernendum stimuletur. Atque hanc ob causam omnes homines semel variolis & morbillis la-

borant, ac necessariò omnes hanc criticam quasi euacuationem patiuntur. Si quis verò bis, vel ter his laborat, iam ad alias causas recurrendum.

Interim secundò Fernelij opinio non planè reicienda est, qui ex peculiari quadam malignitatis specie aërem contaminante hos morbos prouenire statuit. Etenim rationes, quæ eum ad id statuendum adduxerunt, non sunt leues, quas etiam suprâ recensuimus. Nam non est credibile, si quis anno trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, aut sexagésimo ætatis, variolis aut morbillis laborat, atque interim varios morbos passus sit, labem illam in vtero contractam inter tot naturæ morûs & conatûs, atque ad id ætatis delitescere posse. Deinde morborum epidemiorum modo interdum grassantur variolæ & morbilli, certisque annis silent, & pestilentium morborum ritu per interualla quædam redeunt, & nunc quidem variolæ, nunc morbilli. Quod certè è sanguinis vitio non accidit. Ex eo enim si tantum malum proueniret, sparsim potiùs, & priuatim infantes corripere deberet, sicut priuatim quilibet hoc vitium in vtero contrahit. Atque hinc quoque accidit, quod variolæ & morbilli sæpiissime pestilentiam antecedunt, & pestis nunciij à Medicis appellantur.

Secundæ huic causæ adhuc tertiam addimus, nimirum post ortum victum prauum, è quo scilicet tale aliquod vitium in sanguine, quale ex sanguine menstruo in vtero, iam post ortum contrahatur. Atque hac etiam de causâ accidit, ut homo idem bis vel ter morbillis corripiatur.

Nam licet illa labes in vtero contracta primùm à naturâ discussa sit: fieri tamen potest, ut à causa superiore & aëris vitio eodem modo humores iterum corrumpantur; præcipuè si hoc, de quo modò diximus, ex alimento vitium accedat. Nonnullis tamen iterum ac tertium rediit hoc malum, quod in illis de primo fomite aliquid fuerit relictum, sicut vinum non planè defecatum denuò per feruorem turbidum redditur.

Cum autem vitium hoc in sanguine, vndeunque etiam contractum sit, natura per quandam criticam euacuationem & ebullitionem, ut vulgò vocant, soleat discutere: quæri solet, an semper hoc fiat cum febre, an verò aliquando etiam sine febre. Nonnulli etiam sine febre variolas & morbillos erumpere posse statuunt: citantque pro se auctoritatem Auicennæ, qui, *primâ quartæ, tract. 4. cap. 6.* scribit: melius esse, ut morbillos antecedit febris, quam ut subsequatur. Deinde, aiunt, si sanguis leuiter ebulliat circa cutem, & materia vitiosa per cutem expellatur, calorem cordi non communicari, sed per cutem & calorem expirare, & materiam vitiosam euacuari: atque ita fieri posse, ut toto morbi progressu febris non adsit. Imò ad experientiam prouocant. quâ obseruatum sit, variolas & morbillos absque febre interdum erupisse.

Alij verò contrà statuunt, & quidem rectiùs, nunquam variolas & morbillos sine febre fieri. Nam cum per crisin quandam variolæ & morbilli excitentur, crisis verò & ebullitio sine febre non fiat: faciliè hinc apparet variolas & morbillos sine febre non prouenire. Incipit enim illa ebullitio, ut illi volunt, non solum circa cutem, sed in venis maioribus, locis calidissimis, è quibus ut calor cordi non communicetur, impossibile est. Quod verò locum illum Auicennæ attinet, sciendum, duo genera febrium cum variolis & morbillis coniungi posse, vnum, quod propriè ex illâ ebullitione excitatur, cuiusque symptomata & crisis est variolarum & morbillorum efflorescentia; & bonum est, si, variolis & morbillis erumpentibus, febris hæc cesset: Nonnunquam verò post variolas febris apparet, & quando illæ suppurantur, excitatur: vel quia materia tota primo impetu non fuit expulsa, vel quia pars eius intro est recepta, quod peius indicium est. Experientiam quod attinet, cum pueris &

*Fernelij sententia explicatur.*

*An variolis & morbillis semper febris coniungatur.*

infantibus familiaris sit hic morbus, & febris sæpè non adeò magna, ex materiæ paucitate aut lenitate, ebullitionem magnam non producente, de morbo aliquo infantes non conqueruntur, vel etiam conqueri possunt, donec variolis & morbillis erumpentibus eos ægrotare cognoscatur: Atque hinc absque febre eos erumpere, sed falsò, creditur.

Qualis sit  
febris, qua  
varioli &  
morbilli co-  
iunguntur.

Sed iam quaeritur, è quonam febrium genere sit hæc febris. Cum variolæ & morbilli per quandam sanguinis ebullitionem fiant, & calor æqualis per totum morbi decursum sentiat: merito febris hæc inter febres ex sanguine ortas, quas Synochas, & vulgò cum Arabibus conclusas siue conclusæ caliditatis appellant, refertur. Cum verò Synocha febris duplex sit, cum putredine & sine putredine: iam porro videndum, qualis hæc Synocha sit. De quâ re Medici non consentiunt. Nonnulli enim & cum putredine, & sine putredine variolas & morbillos erumpere posse statuunt, & ebullire quandoque illam materiam posse, quæ causa est variolarum & morbillorum, sine omni putredine; sicut per ebullitionem quandam in musto, sine omni putredine, partes heterogeneæ ab homogeneis segregantur. Atque hinc etiam febrium, quæ apparent in variolis & morbillis, quandam esse differentiam dicunt, quod scilicet quædam grauiiores sint, aliæ vix ab ægris percipiuntur.

Verum etsi concedamus, febrium esse talem differentiam, tamen semper adesse putredinem seu humorum corruptionem statuimus. Neque enim saltem est sanguinis quædam accensio, sed humorum quædam corruptio, quam materia in variolis conclusa indicat, qualis nulla est in Synochâ sine putredine. Neque etiam sponte suâ fit talis ebullitio, qualem in musto, cereuisiâ, atque aliis extra corpus humanum rebus, fieri videmus; sed à naturâ seu facultate expultrice, per modum quandam *υπόστασις* fit ista vitiosorum humorum expulsio, ad quam natura à materiæ putridæ, corruptæ, aut quocunque modo appellare libeat, vitio, vel à causâ externâ incitatur. Quod illa ipsa materia, quæ variolarum & morbillorum proxima causa est, satis indicat. Hæc tamen ut modò diximus modò maior, modò minor est, à quâ etiam febris modò mitior, modò vehementior accenditur. Quæ mitior est, prorsus euanescit inter paucos dies, & propterea ab infantibus & pueris ferè negligitur, nec nisi ab iis, qui diligenter attendunt, cognoscitur. Nonnunquam verò, & quidem sæpius putredo maior est, unde & in principio, & in progressu febris maior est, quæ, si morbus salutaris futurus est, morbillis & variolis erumpentibus, fit minor. Nonnunquam & pestilentem naturam violæ & morbilli induunt, unde non pauci infantes extinguuntur.

Causa præ-  
variolæ.

Atque hæc causæ internæ, & hoc modo, ad generationem variolarum & morbillorum concurrunt. Externæ verò & procatactice causæ, à quibus internæ illæ moventur, quoque plures esse possunt. Primò est aer sanguinem exagrans, siue manifestâ, siue occultâ & malignâ, è sublimi & peculiari vi syderum, aut ex inferioribus suscitara qualitate: quod pertinent temporum anni mutationes insigniores, præsertim veris & Autumni constitutio calida & humida, austrina scilicet; regio item calida & humida. De aëre autem hoc sciendum, duplici nomine eum ad generationem variolarum & morbillorum concurrere posse. Aliquando concurrat ut causa principalis, ut antea dictum est, quando scilicet tanta est aëris malignitas, ut per se ad humorum generandis variolis & morbillis necessarium ortum sit sufficiens, atque determinatam hanc in iis corruptionem, præcipue in tenellis, qualia sunt infantum, corporibus possit inducere: unde tunc variolæ & morbilli pestis nuntij sunt. Aliquando verò vitium aëris tantum non est, ut per se humores ita corrumpere queat, tamen qualitatem

habet, ut vitiosos illos humores in corpore latentes agitare & mouere possit. Deinde & alia huc pertinent. Balnea nimirum crebra, agitatio corporis nimia, & quæcunque calorem in corpore accendere possunt. Inprimis verò ad hanc rem multum facit contagium. Nam ex corporibus variolis & morbillis laborantibus *νοστήν* quædam *ἀπόκρισις*, itémque *ἄφρονα νοστήν*, effluuium morbidum, Hippocrati dicta, l. de nat. human. com. 2. 1. 4. Aristoteli *πνεῦμα φθαρτικὸν καὶ βαρὺ*, f. 7. probl. 8. Alexandro Aphrodisæo *λοιμικὴ καὶ σπασμικὴ ἀπόρροια*, effluuium pestilens & putrefaciens, libro 2. probl. 42. Galeno, lib. 1. de diff. febr. *μίασμα λοιμῶδες καὶ σπασμωγῶδες*, effluit, & minutissimis sensumque effugientibus corpusculis diffunditur, quæ ut seminarium malignitatis alteri corpori *ἀναλόγῃ* quocunque modo communicata, similem in eo humorum agitationem & ebullitionem excitat.

Et si verò suprà etiam dictum sit, quomodo variolæ & morbilli differant, tamen & hic explicandum, cur nonnunquam variolæ, nonnunquam morbilli erumpant. Nam si vitium sanguinis materni & labes in vtero contracta horum morborum causa est, quæ sit, cur nunc pustulæ quædam elatæ quæ in pus mutantur, nunc verò saltem maculæ quædam apparent; Causa huius rei primò est varia humorum constitutio. Nam sanguinis in variis corporibus varia est constitutio: Vnde etiam vitium & labes, quam infantes in vtero contrahunt, non est eadem. Deinde sit, ut eadem sit sanguinis constitutio, tamen à causarum sanguinem corrumpentium actione diuersitas aliqua induci potest; & varij corruptionis humorum sunt termini.

Cur nunc  
morbilli, non  
variolæ  
erumpant.

Et ut ad differentias accedamus, secundum ipsam humorum varietatem etiam quædam variolarum obferuatur differentia, ut & morbillorum; in substantiâ, quantitate & qualitate. Secundum substantiam quidem aliæ ex hoc, aliæ ex illo humore constant. Secundum quantitatem, aliæ magnæ, multæ, profundæ sunt; aliæ parvæ, paucae, superficiales, pro materiæ copiâ maiore vel minore. Secundum qualitatem variæ animaduertuntur differentiæ; aliæ sunt albæ, aliæ rubicundæ, subflauæ, luidæ, violaceæ, subnigræ, coloris varij, pro diuersitate humoris, è quo constant, id est, prout humor benignior aut malignior est, ex quo ortum ducunt, *Tactu* aliæ duræ sunt, ob crassitatem & cruditatem materiæ; aliæ molles, humore aqueo vel flatu etiam turgentes. Est & in isto quædam differentia, quod quædam subitò & cum impetu erumpunt, aliæ lentè & tardè seu paulatim; aliæ rursus diu durant & tardius dissoluntur; aliæ citius euanescunt, ex quiete materiæ longiore aut breuiore. Reperitur & quædam in loco, in quo erumpunt, differentia. Aliæ enim cutem & extremas vel potius externas solum partes occupant: aliæ verò etiam in internis erumpunt, atque hæc vel euidentes sunt, quæ in oculorum palpebris inuersis, in naribus, & aperto ore in palato, linguâ & faucibus conspiciuntur: vel occultæ seu abdite & abstrusæ, quæ asperam arteriam seu guttur, pulmones, iecur, lienem intestina, vterum, aliasque internas partes obsident. Id quod Auicenna, etiam, lib. 4. fen. 1. tract. 4. c. 3. docet. Obseruatumque est, quibusdam à morte dissectis pulmones, iecur, lienem, omniæque interiora, haud secus atque cutem, sordidissimis papulis scatuisse.

Differentia  
variolarum  
& morbillorum.

#### Signa diagnostica.

Signa variolarum & morbillorum quod attinet, *Signa diagnostica* alia imminentes ac instantes iam variolas & morbillos indicant, alia præsentis; quando pustulæ iam foras eruperunt, alia humorem, è quo nascuntur; alia partem, quam occupant. Præsentis iam visu agnoscuntur: remanent tamen tum pleraque signa, quæ imminentes demonstrant. Itaque de signis imminentiū & præsentium

presentium coniunctim agemus. Et quidem ea ex actionibus læsis, excrementis, & qualitatibus mutatis petemus.

Primò actiones variè læduntur. Dolor capitis, oculorum, gutturis, cum temporum & frontis pulsatione percipitur, narium pruritus, sternutatio, terror in somno, paroxysmi epileptici similes, deliria nonnunquam; quæ omnia fiunt à vaporibus & fuliginibus seu fumis acris, ex sanguinis ebullitione in caput ascendentibus. Ad est dorsi dolor & pullatio in spinâ ob tensam ibidem à copiâ feruentis sanguinis venam cauam, partésque vicinas. Grauitas præterea totius corporis, ardor, & punctiois quidam sensus in cute sentitur, ob copiam & feruoré materiæ eò transmissæ. Difficultas spirandi animaduertitur; ob copiam vaporum, seu feruidarum fuliginum, qui aëri frigido attrahendo vix transitum concedunt; tussis sicca & inanis è vaporibus transeuntibus, vel etiam pustulis eo loci erumpentibus, quæ naturam stimulant. Accidit præterea tremor pedum, oscitatio, pandiculatio; cordis palpitatio; omnia quidem ex ebullientis sanguinis vaporibus excitata.

Deinde in exercitiis hæc signa animaduertuntur. Urina sanorum vrinis non est dissimilis; eam ob causam, quod natura, quicquid materiæ vitiosæ est in corpore, ad ambitum corporis propellere solet. Interdum tamen turbidæ sunt, quod magnam humorum ebullitionem & agirationem significat. Hæmorrhagia narium quoque non raro accidit, ex sanguinis feruore, & acrimoniâ venarum orificia aperiente; quæ si larga sit inter iniria, morbum leuiorem reddere solet plerumque. Vomitus quoque ventriculo, seu à materiâ, seu à vaporibus prauis ascendentibus stimulari. Lacrymæ sponte ex oculis solent effluere, aut oculi lachrymabundi apparent, ob acrimoniam vaporum, oculorum tunicas mordicantium & vellicantium, vel etiam ob serosum humorem ad oculos per se humidos transfusum.

Tandem adest & in qualitatibus corporis quædam mutatio. Facies vna cum oculis rubet, ob sanguinis ebullitionem, huiusque vel vaporum ad superiora motum: vox estrauca, siue ob vapores per asperam arteriam transeuntes, siue ob pustulas eo loci enatas: os est siccum; ob feruorem fuliginosi spiritus è pectore redditi. Aspera est cutis, ex pustulis toto corpore per eam diffusis: febris denique synocha accenditur, ex vehementi sanguinis in intimo corpore ebullitione.

Vbi ergo initio pleraque signa hæc conspiciuntur, & præsertim circa secundum aut tertium diem augentur, & sparsim quædam maculæ rubentes in cute apparent: imminet variolarum & morbillorum est indicium. Et tum illæ maculæ, præsertim circa diem quartam, in sublime attolluntur, ita vt quædam quasi tubercula rubentia parum eleuata in cute conspiciantur, vnde variolæ fiunt vel in latum extenduntur, vnde morbilli. Variolæ tamen cum maiore pruritu & dolore emergunt & apparent, primò veluti capita acuum aut grana milij, deinde in pustulas mutantur, sanie repletas, ipsâ febris cæterisque symptomatibus paulatim mitescentibus, quæ tandem suppurantur, exsiccantur sensim & decidunt. Morbilli verò citius erumpunt, & postea resoluuntur ac euanescent.

Arguitur autem de variolis & morbillis suspicio, si epidemij sint, & puer sit aut infans: his enim præcipue accidit hoc malum; minùs adultioribus; rarissime senibus; nisi ex aëre corrupto: aut æger cum aliquo variolis aut morbillis laborante sit conuersatus, aut in familia aliquâ vnus ex infantibus, variolis aut morbillis laboret, aliæque causæ externæ præcesserint. Omnibus enim modis contagiosi sunt hi morbi, & præcipue iis corporibus, inter quæ est analogia, qualia sunt consanguineorum.

Dan. Sennerti Tom. II.

Tempus autem, quo variolæ & morbilli frequentius grassantur, est ver & autumnus; inprimis si æstas pluuiosa præcesserit, & austri continuo spirauerint, vel hyems tepida & australis fuerit. Hæc enim tempestas maximas humorum agitationes efficit: quibus accedit fructuum vltus, quos copiosius pueri solent comedere; æstiuo & hyemali tempore rariores sunt, nisi à temperie suâ naturali deflexerint, vel semina prauitatis à præcedentibus anni temporibus in pueris conceperint.

Signa verò causarum quod attinet, à sanguine ipso nullæ omnino variolæ fiunt, estque humor, qui variolas & morbillos excitat, planè excrementitius. Qualis autem sit humor, faciliè indicat color. A bile enim cum flauedine rubescunt: & acredinis sensum maiore exhibent: à pituitâ colorem album habent, ac sanie liquidiorè abundant. Ab humore melancholico nigricantem, & cum siccitate magis sordescunt. Imò nonnunquam violaceæ, virides, liuidæ & nigrae sunt, si scilicet humores magis corrupti sunt, vehementi æstue xusti, & quidem proût hæc vel illa materia superauerit, cuiusque *quantitas* maior aut minor fuerit, Testantur varietatem causarum & alia signa. Si materia enim sit biliosa, minor quidem dorsi dolor & grauitas adest: maior tamen ardor, inquietudo & sitis. Ab humore crassiore minor quidem est pruritus & ardor, maior autem corporis grauitas.

Loca, quæ ab iis obsidentur, etiam ex actionibus læsis cognoscuntur. Nam, si non solum in cute, sed & in partibus internis, ventre, intestinis, pulmone erumpant; febris admodum grauis est & molesta, difficultas respirationis, & angustia pectoris magna, tussisque maior adest, dolor ventris & intestinorum vehementer affligit: quibus nonnunquam vrina cruenta & dysenteria accedit.

### Prognostica.

Pertinent autem variolæ & morbilli ad morbos acutos. Nam vt plurimum intra diem 14. terminantur. Diuidunt nonnulli tempus variolarum in tempus ebullitionis humorum, & in tempus exitus variolarum. Tempus ebullitionis plerumque quatuor diebus absoluitur, diesque primus est principium, secundus augmentum, tertius status; quartus, initium declinationis, quo tempore febris & symptomata remittere solent. Idem quartus dies, qui declinatio ebullitionis est, exitus variolarum principium esse solet. Augmentum ad septimum protrahitur: status vndecimo die viget: ab vndecimo ad decimum quartum est declinatio; quo tempore morbilli exsiccantur, etsi interdum ad diem 20. usque exsiccatio protrahatur.

Quemnam autem morbus hic sit habiturus exitum, ex iis, quæ variolas & morbillos comitantur ac sequuntur, cuiusmodi sunt ipsarum variolarum & morbillorum qualitas, magnitudo, numerus, figura, tempus & modus exitus, locus ac varia symptomata, ac viribus ægri colligere licet. Si etiam initio morbi sanguis è naribus largiter effluat, variolæ & morbilli pauciores erumpere, & æger facilius liberari solet. In genere, melius est, variolas & morbillos citò, quam tardè, erumpere. Nam & materiæ obedientiam, & naturæ robur id ostendit. Deinde bonum est, si post earum exitum febris ac omnia symptomata imminuantur. In specie variolæ meliores sunt albæ & rubrae, magnæ, plures, molles, eminentes, rotundæ, diffusæ, & sine contiguitate propinquæ, quæ citò & sine magnâ ægri molestiâ maturantur & decidunt, quæque loca externa, ignobiliora præsertim, occupant. Deteriores verò sunt violaceæ, virides, liuidæ, nigrae, siue plures, siue pauciores, siue parua, siue magnæ, duræ & verrucis similes, depressæ, propinquæ & contiguæ, aut duplices variolæ, inprimis si



in earum medio nigra macula apparet, quæque tardius erumpunt, tardiusque maturantur, aut iterum eueniunt subito; & quæ interna occupant, vel foris faciem tantum aut pectus. Hæ enim prauitatem & inobedientiam materiæ, calorisque incendium magnum & virum labefactionem portendunt. Et auger malum, si virium debilitas & praua accidentia adiungantur, ac symptomata post apparitionem earum non remittant; ut si post variolarum exitum æger nausæ, vomitu, stomachi dolore, siti inextinguibili molestat. Peius est, si lipothymia crebra, magna pectoris angustia, angina, fluxus alui viridis, aut cruentus, vrina cruenta vel nigra, extremorum perfrigeratio, vel conuulsio accedat. Malum item, raucedine affici, difficulter loqui, delirare, cibum auerſari, deglutire non posse, vigiliis infestari, vel somno nimio detineri. Ac qui moriuntur ex variolis vel anginâ plerumque pereunt, interclusâ à pustulis spiritus viâ; vel syncope, ex spiritu à materiâ malignâ corruptione; vel alui profluuium & dysenteria. Et sæpe licet non statim ægrum iugulent; tamen diuturna vel lethalia mala variolæ inducunt, in internis præsertim corporis partibus. In naribus vlcera diuturna sæpe, & imminutum odoratum; in faucibus, raucedinem, impeditam respirationem; in oesophago difficilem deglutionem; in pulmonibus, peripneumoniam, tabem & dyspnoeam in ventre, hepate, & intestinis periculosos fluxus ac cruentam deiectionem; in renibus cruentas mixtiones.

Maximè verò infestæ sunt oculis, in quibus opacitas, lippitudinem, caliginem, albuginem, sæpe & cæcitatem plane efficiunt. Solent & in cure fœdi coloris maculas & foveas ac cicatrices turpes relinquere, potissimum in facie, ubi partibus eius quibusdam cutis ferè *dermis* seu carnis expers est, & proinde vlcera ibi difficulter coalescunt.

Eadem ferè est ratio morbillorum. Periculosiores hi quidem suâ naturâ sunt, quàm variolæ; cum ex sanguine feruidiore, qui febrem & omnia symptomata grauiora excitat, constent: citius tamen iudicantur, nec oculis ita noxij sunt, seu non ita oculos petunt, ut Variolæ, quod subtilis illorum materia prius dissoluatur, quàm figi in iis queat. Inter eos autem rubri & disuncti salubriores sunt, & qui citò apparent, ac quibus apparentibus symptomata remittunt & mitigantur. Peiores autem virides, violacei, nigri, & qui tardè exeunt, aut mox ad interiora recurrunt, magnamque pectoris angustiam & frequentem syncopen adiunctam habent.

Verum licet variolæ & morbilli plerumque in salutem ægri finiantur: ægrum tamen in illorum *magis* seu declinatione quandoque mori contingit; vel quia visæ sunt declinare materiâ intrò raptâ: vel quia etiam verè declinantibus aut resolutis variolis externis pars materiæ siue ex naturæ imbecillitate, siue ex errore ægri, adstantium, incuriâ Medici, intus relicta, magisque deprauata occupauit viscera, & febrim aliæque symptomata grauiâ auxit.

#### Curatio.

Curationem Variolarum & Morbillorum quod attinet, & Indicationes, quæ eam dirigunt. Primus scopus fit. Naturæ, quæ commodè materiam vitiosam per ambitum corporis expellere in hoc febris genere nititur, opem ferre; quod fit, dum causâ, quæ naturam in opere suo impedit, tollitur, & motus naturæ adiunatur, vires confortantur, & malignitati resistit Medicus.

Virium materiæ naturam impediens consistit in humorum copiâ nimia, vel eorum malâ qualitate; vel natura ob viarum obstructions in opere suo impeditur. Itaque Medici est, humores prauos tollere, eorum

siue crassitiem, siue tenuitatem & feruorem corrigere, viasque claudas aperire, malignitati resistere, & naturæ humores ad cutim expellentis conatum adiuuare. Præter hoc Medicus symptomatum vehementiam auertere debet, & præcauere, ne pars aliqua, siue interna, siue externa, damnum inde contrahat.

Cum verò morbus hic plerumque in corpora teneriora incidat, venæ sectio, quod vires eam non ferant, raro admittitur. Amatus equidem Lusitanus, *Centur. 3. curat. 16.* puero quinque annorum, dum variolarum indicia adessent, venam internam brachij aperuit, & quatuor uncias sanguinis detraxit. Sicut idem aliàs etiam in sanguine in pueris mittende audacior fuit, (ut hæc iis quæ *libro 2. capite 5. diximus*, addamus) & Auenzoarem, quem Auenrois *7. Coll. capite. 3.* puerulo triu annorum sanguinem detraxisse testatur, imitatus, *Centur. 1. curat. 10.* puellæ cuidam *7. annorum* febricitanti venam interam brachij aperuit, sanguinisque uncias sex detraxit, & *Centur. 5. curat. 96.* puero *8. annorum* quatuor uncias emisit & *Centur. 5. curat. 52.* puero *5. annorum* venam aperuit. In valde tamen teneris, præcipuè in morbillis, malo Trincauellio assentiri, qui *de rat. curandi part. affect. libro 2. capite 10.* scribit, se in valde teneris venæ sectionem nunquam probasse, cum id præter rationem fieri videatur, & sæpè malus eius rei euentus sequatur, & licet aliquando res bene succederet, id potius fortunæ quàm rationi attribuendum sit. Si tamen in ætate, quæ venæ sectionem perferre possit, sanguinis abundantia venæ sectionem postulet, mox in principio, ante quartum diem, aut sanè priusquam variolæ erumpant, dum vires adhuc constant, & sanguinis tanta copia ad ambitum corporis confluit, venâ aperienda, ut natura oneris parte leuata, quod reliquum est facilius vincere possit. Post quartum autem diem, & ubi maculæ erumpere incipiunt, abstinendum à venæ sectione; inprimis si iam æger melius habere incipiat, ne materia ad ambitum corporis tendens ad interiora reuocetur.

Deinde si alius sit adstrictior, clystere leui aut blando aliquo medicamento eluenda, ut quod in primis viis hæret, expurgeretur, ut Syr. Rosar. solut. Tamarindis, Mannâ, Cassiâ: Talibus scilicet, quæ non solum aluum lenire, sed & sanguinis feruorem restinguere refrigerando, partisque internas roborare moderatè adstringendo, viresque tueri valent. Possuntque hæc pharmaca rum inter se, tum cum conuenientibus aliis, prout res postulat, commisceri. Ab omnibus verò fortioribus purgantibus, non solum in principio, sed & toto morbi decursu abstinendum, ne eorum vehementiâ vel naturæ conatus in expellendo à centro ad superficiem impediatur, vel profluuium alui periculosum excitetur: & proinde, si in declinatione quid humorum vitiosorum in corpore superesse animaduertatur, id ipsum blandè educendum. Alioquin abstinendum purgantibus, si tranquilla omnia in ægro appareant.

Lactentium curatio, quod ad interna remedia attinet, inprimis in lactantium seu nutricum diætâ & medicatione posita est. Nam in lacte facultates ciborum & medicamentorum, præsertim purgantium tot etiam mutationibus præcedentibus conseruantur, *6. Epid. sect. 5. c. 33.*

Postea, cum naturæ in hoc morbi genere præcipuæ partes sint, & ipsa sæpe sine vllis medicamentis hoc morbi genus sanat, pendendum; An natura suum officium faciat, & rectè materiam ad curem expellat; An verò in opere suo deficiat.

Si satis erumpere naturæ beneficio variolas & morbillos animaduertimus, non opus est eam multis medicamentis adiuuare, ne calefacientium vsu intèpestiuo materia nimis agitur, febrisque augeatur. Quod si tardè & parcius erumpant variolæ & morbilli, adiuuanda

adiuuanda natura iis quæ materiam paulò magis fundunt, meatûsque aperiunt. Istitis tamen aliquid de refrigerantibus, & modicè adstringentibus addendum vt partes internæ roborentur, atque ita non solum non afficiantur, sed fortius etiam materiam vitiosam expellant: & ne sanguis feruorem concipiat, semper ea eligenda vel admiscenda, quæ malignitati resistunt, in primis si de hac sit suspicio, ingrauescente, vt esse solet, pestilenti temporis constitutione, & malo communiter grassante.

Expellentia  
medicamen-  
ta.

Ex aperientibus & expellentibus sunt; Radices & semina faniculi, semen napi, cardui benedicti, aquilegia, Citri: Radices Diſtamni albi, Pimpinell. Capillus Veneris, Flores Calendulæ. Ius Cicerum rubrorum, Scordium, Scabiosa, Myrrha, & quæ imprimis ad expulsionem hinc faciunt, ficus, & secundum plurimos, Lentis. Imò Theriaca, Mithridaticum, & Diascordium, in robustioribus dari possunt. Et alia quæ malignitati resistunt, vt: Cornu cerui, lapis bezoar, species liberantis, Corallia Margaritæ: Quæ tamen potius ad sequentem classem pertinent, respectu qualitatum primarum.

Refrigeran-  
tia.

Refrigerant; Acetosa, & Acetofella, Lactuca, Nymphaea, Portulaca, Hordeum, Pruna acida, Endiuia, Cichorium, Plantago, succus Citri, vinum Granatorum, succus Limonum, Oxyſacchara. Rob ribium. Refrigerantia autem illa & adstringentia commodius initio, primo scilicet & secundo morbi die exhibentur, antequam natura sese ad expellendum accingat: Postea vero, vbi erumpere incipiunt variolæ & morbilli, conatus naturæ adiuuandus: pro morbi tamen naturâ, vario modo hæc miscenda & adhibenda. Si enim febris & feruor sit magnus, temperatoria adhibenda, aut frigida admiscenda. Atque in hoc casu maximè conueniunt, quæ citra calorem expellere possunt, vel quæ frigida simul vim aperiendi habent, vt Acetosa, Succus citri, vinum granatorum, cornu cerui, Margarita, Tormentilla. Ex his varia medicamenta componi possunt. Vſitatæ compositiones sunt ex Auicennâ delumptæ, quarum prior magis partes internas roborat, posterior magis expellit.

℥. Lacc. ablut. Drach. v. lentium excortic. Drach. vii. gummi tragacanth. Drach. iii. Coq. in Aq. lb. ss. ad remanentiam. Vnc. iii. vel iiiij.

Vel ℥. Ficum Drach. vii. lentium excortic. Drach. iii. tragacanth. sem. faniculi. an. Drach. ii. Coq. in Aqua lb. i. ss. Colatura potanda detur.

Vel ℥. Lentium munda. Vnc. iv. caricar. num. x. vuar. pass. munda. Vnc. ii. sem. faniculi, Drach. iii. croci, Scr. i. lacc. Drach. i. ss. Coq. in Aqua, lb. iij ad tertiæ partis consumptionem. De Colaturâ Vnc. iv. vel v. pro dosi propinentur. Aqua expulsua ad morbillos D. Sigism. Kolreuteri.

℥. Caricar. pingu. num. xxx. lentium M. iii. sem. rapar. Drach. vii. hordei mund. Vnc. x. fenic. Drahc. x. Concisa & conuassata Coq. in lb. v. (vel pluribus) aq. simpl. ad lb. j. consumptionem. Postea omnia simul destillantur. in B. Alia.

℥. Hordei mundi, Vnc. i. sem. fenic. Drach. v. rapor. Vnc. ss. rad. glycyrrh. Drach. ii. ss. herb. scord. M. sem. acetos. M. j. sem. lentium M. i. ss. Caricar. pingu. num. xii. Incis. & contus. inf. in aq. puriss. lb. iii. stent in infus. per diem, postea destillantur.

Potio ad morbillos.

℥. Sem. rapor. Drach. i. anisi, fenic. an. Drach. ii. hordei, lentium, Vnc. ss. M. ss. Caricar. num. iv. Coq. vase clauso in aq. Cardui ben. q. s. colentur. pro Vnc. iv.

Atque hæc sunt remedia composita, longo vsu ab antiquis probata, quæ propterea nullo modo reiicienda, & cum nouis incertis commutanda sunt. Infantibus autem, qui tales potus non admittunt, ficus comedendæ dentur, vinumque Granatorum propinetur. Ficus enim insignem vim habent pellendi humores ad cutem. Et si quod ab earum dulcedine incommo-

dum metuitur, id facile vino granatorum corrigitur. In compositis autem his nonnulli de Lentibus & Tragacanthâ dubitant. De lentibus dictum est, in *Institut. lib. 4. par. 1. cap. 3.* quibus saltem hoc addimus; Cardanum, Amat. Lusitanum & Ioh. Bapt. Syluaticum sequitur Lud. Sepralius, *animaduers. Medic. l. 5. num. 59.* qui pluribus etiam lentium vsum improbat. Verum cum Arabes in medicamentorum facultatibus inuestigandis diligentissimi, medicamenta illa ex lentibus, caricis, laccâ & tragacanthâ valde commendent, atque alij doctissimi Medici non sine fructu illis hætenus vsi sint, ea quæ contra lentium vsum afferuntur, de iis vt alimento intelligenda sunt. Et verum omnino est, lentes cibum omnino incommodum præbere, in quem vsus, vt satis elixentur, diu coquendæ sunt. Interim nihil prohibet, quin medicamenti loco decoctum, quo ex iis saltem quod subtilius est extrahitur, exhibitum ad promouendam variolarum eruptionem occultâ vi facere possit; vnde etiam nonnulli signaturâ suâ seu formâ variolis similes esse statuunt. Vt verò in peste & verè pestilentibus febribus exhibeantur non suaserim, sed tunc potius ad vera alexipharmaca confugiendum puro. Et omnino si adhibendæ sunt, tutius cum aliis, quàm solæ exhibentur. Gummi Tragacanthæ verò licet motum naturæ in expellendo impedire videatur, tamen sciendum, composita illa medicamenta Arabum diuersos scopos respicere, ideòque Gummi Tragacanthæ iis admisceri, ad ebullitionem nimiam humorum præcauendam, partesque internas roborandas. Efficacia tamen & hæc deprehensa sunt.

℥. Sem. Napi, Drach. i. citri, Scr. i. aquileg. melon. excortic. an. 3. ii. Cum Aq. Cardui bened. scabios. an. Vnc. ii. F. Emulsio, quæ dulcoretur. iulepirosar. Vnc. ss.

Vel ℥. sem. Napi, aquileg. an. Drach. i. ss. cardui ben. excort. Drach. i. melon. excort. Drach. iii. Aq. acetos. scabios. cardui bened. fumar. an. Vnc. ii. F. s. a. Emulsio, quæ dulcoretur. Rotul. manus Christi perl.

Possunt eiusmodi emulsionibus solutiones Perlarum & corallorum addi. Imò pulueres Bezoartici, in peste curandâ propositi, hinc conueniunt, vt:

℥. C. C. vſti prapar. Drach. ss. offis de C. C. Scr. i. sem. cardui bened. Scr. i. citri, Scr. ss. species. liberant. Drach. ss. margarit. prapar. corallor. prapar. vel solutionis eorundem, an. Scrup. ss. F. Puluis.

Cuius Scrupul. i. vel Drach. ss. vel Scrup. ii. pro ratione ætatis in Aquâ Acetos. Scabios. Cardui bened. florum Calendul. Fumar. Feniculi, exhibeantur. Vel dentur gr. ii. iii. vel iiij.

Lapis Bezoar, cum solutionis Perlarum Scr. ss.

Puluis expulsiuus.

℥. Boli Arm. Orient. Vnc. ii. sem. caulium. chin. sel. rad. tormentil. el. an. Vnc. ss. C. C. vſti prap. Vnc. ii. myrrh. el. diptamni alb. an. Drach. iii. sem. napi el. Vnc. i. ss. fol. auri, num. xx. F. Puluis subtiliss.

Vel ℥. sem. nasturt. aquileg. an. Drach. i. scobis C. C. Drac. ss. corall. rubr. prap. margarit. prap. an. Scr. i. F. Puluis.

Dum verò hæc exhibentur, vnice danda opera, ne æger frigidum aërem admittat, præsertim hyeme. Itaque æger in aëre calidiore detineatur, diligenter regatur, ne conatus naturæ impediatur poris cutis occlusis, humoresque ad interiora recedant, atque materia, quæ expelli debebat, intus coërceatur: vnde anxietas, febris, aliæque symptomata cum maximo vitæ discrimine in ægro augeantur. Quapropter etiam nulla Epithemata frigida corpori admouenda sunt.

Non verò solum in eo laborare debet Medicus, vt variolæ & morbilli erumpant, sed videndum quoque, ne partes seu internæ seu externæ ab iis lædantur. In partibus internis præcipua pulmonis & intestino-

Partes quo-  
modo à va-  
riolis defen-  
denda.

Pulmo.

Pulmoni conueniunt *Looch de Papauere, de Lentibus & Tussilagine, Syrupus iuinibinus, violarum, Tragacanthum frigidum, Diapenidium, conserua rosar. violarum.*

Intestina.

Intestina roborantur *Syrup. Cydoniorum, Myrtillor. Lentibus bis coctis in aqua Plantaginis, Tormetilla, semine Plantagin. Acetof. Rob ribium.* Ideoque prior, vt dixi, Auicennæ compositio, potius ad roboranda viscera, quam ad expellendum composita videtur. Lacca enim Hepar & Lienem, Gummi Tragacanthæ pectus, Lentesc Intestina respiciunt, & roborant.

In externis Oculi, Nares, os ac fauces roborandæ sunt. Oculos defendunt, humoresque ad eos ruentes depellunt, Aqua Rosar. & Plantag. in quibus Rhus obsoniorum vel Tutia præparata infusa fuerit, aut additum Sief album vel Camphora.

Vel *℞. Aq. rosar. plantaginis, euphrag. an. Vnc. ℞. camphor. croci, an. gr. ii. M.*

Vel *℞. Pulu. Smaragdi, Scr. ℞. margarit. præp. gr. iv. camphor. gr. ii. aq. rosar. Vnc. iii. Misce.*

Ad nares defendendas utilis est Aqua rosar. cum succ oagrestæ.

Vel *℞. Santal. Drach. i. camphor. gr. i.*

Affundatur acepum rosatum, & sæpius naribus admoveatur.

Si ab ichoribus oculi claudantur, lacte calente seu tepente, vel decocto seminis fenugræci aut lini, cum aqua rosarum parato, fomententur.

In aures instilletur oleum rosaceum & myrtinum.

Os &amp; fauces.

Vt Os & fauces præseruentur, collutiones & gargarismi instituantur, ex decocto & aquis Prunellæ, Plantaginis, Rosarum, Balaustris cum succo Granatorum, acidorum, Syr. myrtino, de ros. siccis, melle rosato, Diamoro, Rob nucum,

Pueris, qui gargarizare nequeunt, fauces & palatum sæpius cum linteo circa bacillum inuoluto liniantur rob nucum, mororum, vino granatorum, & similibus.

Aures, si fluant, curandum est, vt apertæ maneant, si dolore affligantur, spongiam in aq. tepente cum ol. rosato mixtâ immerfam iis identidem applicare conuenit.

Nonnunquam nares à pustulis ita obturantur, vt negato per has spiritu os & fauces impensè deficiantur: Quod vt caueatur, iubeatur ægri attrahere naribus oxycratum, poscam, aut vaporem excipere ex decocto rosar. rubr. plantagin. fol. myrtillor. summit. rubi, fol. salicis, pampinorum vitis, & similibus.

Quæ crudæ diu ac duræ manent variolæ, earum maturationem quidam ex Rhase adiuuant vapore aquæ, in quâ chamæmelum sit coctum, aut foru ex decocto fl. maluz, rosar. & ficuum.

Variolas, dum maturantur, & materiâ in saniem cōuertitur, pruritus comitatur. Materia enim ista paulatim acrior reddita dum in cute dissipari mox nequit, tristem eam sensus perceptionem efficit. Videndum ergo, ne scalpatur, atque inde turpes cicatrices, præsertim in facie relinquantur. Tutissimum plerumque est, præcipue vbi sanies alba, & proinde cocta apparet, rem totam naturæ committere; cum experientia docuerit, eos, quibus variolæ sponte apertæ & exsiccatæ sunt, minore cum deformitate, & minoribus relietis vestigiis, sanatos fuisse. Si tamen magnæ sint, aut plures coniungantur, postquam satis maturatas esse, ex mollitie, albedine, & doloris remissione apparet: id quod post se primum diem ab exitu earum, qui est morbi dies vndecimus, contingit, Arabes eas aperire iubent. nisi suâ sponte aperiantur, ne sanies diutius retenta seu coëscita, vel retrocedat, atque acrior reddita, cutem profundius exedat. Aperiantur ergo pustulæ, saniesque molliter abstergatur. Aperiant autem acu, inprimis aureolâ. Veteres æs magnopere commendant; non verò forcipe, ne cuticulâ abla-

tâ vlcus nudum aëri exponatur, & crustæ tenaces relinquantur, quæ *ἀνὰ δ' ὤσας* sine dolore anelli à cute non possunt, ac pluribus locis, duobus aut tribus aperiunt, ne iterum mox occludantur

Vt verò apertæ variolæ exsiccentur, Arabes Aquâ salis cum paucis croco abluere, vel decocto aut suffitu ex santalis, rolis rubris, foliis tamarisc. myrtillorum fouere: vel si res citius expedienda sit, super farinâ oryzæ, milij, fabarum, hordei recumbere iubent. Alij & commodius quidem variolas conspergunt farinis, cum puluere thuris, mastiches, myrtillæ mixtis. Verum plerumque, vt dictum, commodius est, naturæ rem totam committere. Sale enim facillè dolor excitari potest, vel pustulis intempestiue clausis vlcera deteriora gignuntur: dolor tamen cauebitur, si minores solum variolæ, non maiores, aut quæ recens ruptæ sunt saliantur.

Arabes quoque, vt crustæ facilius & citius exsiccatis probè variolis de cidant, oleo vel vnguento rosaceo, aut amygdal. dulc. eas inungere iubent, Verum, antequam probè arescant, id tentandum non est, ne sordida vlcera reddantur. Si tamen vlcera diutius relinquantur, Vnguento albo Camphorato, de Cerasâ, de Lithargyro, & similibus exsiccentur.

Sanatis variolis color fœdus cutis, & vestigia seu foveæ & cicatrices turpes deformes, in facie præsertim, nonnunquâ relinquantur. Delètur hæc vestigia iis, quæ detergunt & Græcis *ῥυτίλας* dicuntur: iis, quæ carnem replent, & *σφικτικὰ* dicuntur: & iis, quæ cutem emolliunt, ac complanant, & dicuntur Galeno *λενιτικὰ* læuigantia; adhibita simul probâ & conuenienti victûs ratione. Color fœdus tollitur frequenti ablutione, quæ fit decocto Lupinorum, fabarum hordei rad arund. vitar. ranaceti, gentaur. min. chelidon. maj. abrotan. succo limonum, Sapone cum nitro & tartaro, Aquâ item sigilli Salomonis, florum fabarum, Schrophulariæ. Pro foueis explendis commendatur pinguedo humana, & asciæ piscis.

## Diatæ.

Primum omni curâ & studio æger ab aëre frigido prohibeatur, vt iam antea monitum, hyeme præsertim. Non tamen nimio æstu torquendus est æger, ne calor naturalis fuliginum feruentissimarum copiâ stranguletur, vel deficientibus viribus materia morbi subsistat, egerque odore rerum frigidarum oblato reficiendus.

Victus rationem quod attinet, cum morbi hi ex acutorum numero sint, victus acutis morbis conueniens instituendus, tenuis scilicet, inprimis morbi primo tempore. Duo enim hic morbi tempora, quando naturæ cum noxiâ materiâ confictus ingrauescit, non sine ratione à Medicis constituuntur dierum numero distincta, vnum ebullitionis sanguinis, quod à primo die in quartum vsque extenditur: alterum exitus, maturationis & exsiccationis quod in morbillis plerumque die seprimo, in variolis decimo quarto finitur: Etsi exsiccatio nonnunquam ob cruditatem & crassitiem materiæ, ad vigesimum diem extendatur. Itaque primis diebus à pleniore victu abstinendum, ab ouis scilicet, iure carniū & carnibus ipsis, quippe cibis *ἐντροπίμοις*: ita tamen victus attenuandus, vt vires ad statum vsque perdurare possint; ne in statu postea plenius nutrire opus sit, quo ipso natura ab opere suo non sine periculo auocaretur. Inprimis cum sequenti tempore, quo variolæ & morbilli erumpunt, ægri suâ sponte, ob appetitum prostratum, cibos omnes auersentur, & ad sumendos, qui conueniunt, propemodum sint cogendi. Et pueris inprimis hac in parte plus concedendum est, vt pote quorum corpora per se *ἐνδονόρρα* sunt, maximè omnium diffabilia perspiratu insensili, & ob copiam innati caloris in ediam non facillè tolerant.

Sint



Sint autem cibi non acres, non falsi, non pingues, non dulces, qui ebullitionem & acrimoniam humorum augere possint: sed moderatè refrigerent & adstringant, ut feruorem sanguinis temperent, maximè inter initia, ac partes internas roborent, & ab iniuriâ exanthematum tucantur. Inprimis autem vitandi fructus *ἀπατοι* æstiu, quippe *ἐυνοητοί* qui faciliè in corpore putrescunt. Potus etiam plenus non sit.

Vinum non conuenit, præsertim dulce, præcipuè antequam erumpunt exanthemata. Eius loco danda cereuisia tenuis, vel aqua hordei, in quâ lamina aurea aliquoties sit extincta, aut chalybs ignita, cui nonnunquam succus citri, granatorum, ribes addi potest. Post exitum tamen, & ubi symptomata remiserant, parum vini oligophori cõceditur, iis maximè, qui sunt assueti. Quod denique ad res naturales reliquas attinet, toto morbi decursu & *σῶμν* sit moderatus, ne diutius recto per somnum intus calor æstus ingrauescat, caputque vaporibus magis repleatur, & moderatè sint *vigilia*, ne nimium resolutis spiritibus virtus deficiat. Ager corpore *quiescat*, ne calor nativus dissipetur, qui in expulsionem materiæ incumbit morbosicæ. Incipientibus tamen variolis lenes brachiorum & crurum frictiones non improbantur, quippe quibus humoris noxij attractio ad cutem iuuetur. *Aluum*, nisi quotidie officium suum faciat, lenissimo clystere, aut glande stimuletur. Fugienda denique vehementes *animi perturbationes omnes*, ira præsertim ac timor, quorum hic sanguinem prauum ad interiora retractum circa cor detinet; illa æstu maiore sanguinem turbat, & inflammat.

## CAPVT XIII.

## De Febris Petechialibus.

Est deinde aliud febris malignæ genus, in quo maculæ quædam apparent in cute, ab authoribus puncticulæ, peticulæ, petechiæ, purpuræ, forsân etiam nominatæ; quæ idcirco variis nominibus insigniuntur & febres peticulares, petechiales, lenticulares, purpuratæ nominantur, appellationibus desumptis à similitudine, quàm hæ maculæ habent, cum lenticulis, puncturis & moribus pulicum, & quod purpuræ colorem referunt. Sunt enim petechiæ nihil aliud, quàm maculæ diuersorum sæpe colorum, inprimis rubræ & purpuræ, pulicum moribus ferè similes, in cute, præcipuè circa dorsum, collum, pectus, & in brachiis, in malignis febribus apparentes.

Petechiæ.

An febris petechialis antiqui fuerint cognita.

Primò autem circa has febres à nonnullis in controuersiam vocatur; An febris hæ antiquis fuerint cognita. Fracastorius, lib. 2. de morbis contag. capite 6. Anno 1505. & 1528. in Italia primùm has febres apparuisse scribit, cum prius notæ non essent, etsi certis regionibus, ut Cypro & vicinis insulis, fuerint familiares, atque ibi diu cognitæ. Idem & alij statuunt, qui existimant, has maculas non esse easdem cum exanthematibus illis, quorum Galenus, libro 5. meth. med. capite 12. mentionem facit his verbis: *Ὅτι ἐν αὐτῇ ἐρᾷ, τῇσδε πύσθῃσι, quas exanthemata vocant, toto in corpore confertim multa apparebant, ulceroſα quidem plurimis, omnibus certè sicca. Eratque intuenti perspicuum, reliquias eas esse sanguinis, qui in febre putruerat, quas veluti cinerem quempiam natura in cutem rruisset.*

Verùm quamuis concedamus, maculas & febres has ab antiquis, ut alia nonnulla, fusiùs & diligenter non fuisse pertractata, neque etiam pustularum nomina & exanthematum cum loco allegato tum alibi explicata: tamen antiquis planè incognitas fuisse credibile non est. Hippocrates enim in epid. & Coacis *καὶ ὅτι τῶν ἀνδρῶν* & *ἐν ὅσῃσδε* nominat, ac Aërius, tetrab. 2. serm. 1. capite 29. in febribus à prauis humoribus ortis excitari vibices, similes culicum moribus scribit: & mani-

festè ibi docet, omnes non exulcerari. Ac certè ratio nulla apparet manifesta, cur non antiqui etiam ab his infestari potuerint, cum iisdem, quibus hoc tempore, causis apud antiquos locus fuerit. Itaque cum tempore Hippocratis & Galeni febres pestilentes nostris omnino similes grassatæ fuerint, atque cætera symptomata omnia cum nostris congruant: quid quæso, obitat, cur maculæ istæ etiam non erumpere potuerint?

Quoniam verò macularum cutis varia sunt genera, sciendum est, quâ ratione petechiæ ab aliis maculis discernendæ sint. Primò à tuberculis & vlceribus discernuntur, quòd in istis quædam cutis asperitas & extuberantia apparet: In petechiis verò solum maculæ. Ab aliis verò maculis, ut lentigine & similibus, figurâ, magnitudine & febre differunt. Petechiæ enim habent coniunctam febrem, quæ ab aliis plerique maculis abest. Nec elatæ, longæ vel maghæ sunt, sed rotundæ & pulicum moribus rectissimè comparantur. Ne tamen pulicum morsus pro petechiis habeantur, quâ ratione differant, videndum. In moribus pulicum in medio tanquam punctum quoddam morsus vestigium inest, quòdque compressione non delitescit, etiam reliquo rubore circumquaque euanescente. Petechiæ verò, si digito comprimantur, euanescent quidem, sed redeunt & nullum puncturæ vestigium in medio conspiciunt. Præterea petechiæ in brachiis, cruribus, pectore, & copiosius ac frequentius in dorso apparent, non autem in facie. Erumpunt nimirum in partibus, per quas insigniores arteriæ ac venæ transeunt. In facie verò rarè apparent; cum hæc pars semper externo aëri obuia sit, & ab aëris ambientis frigiditate materia faciliè repellatur: sicut videmus & in brachiis, in parte illâ, quæ lecto applicatur & eius calore fouetur, eas conspici, in parte verò reliquâ, aëri externo obuiâ, delitescere. Et si apparent in facie, cum non nisi ex maximâ copiâ materiæ provenire possint, sine periculo esse non solet.

Quomodo petechia ab aliis maculis discernenda sint.

De materiâ autem, à quâ maculæ istæ excitantur, Authores non consentiunt. Alij eas solum è vaporosâ materiâ provenire existimant, & quidem eâ de causâ, quòd hæ maculæ citò fiunt & citò euanescent, sine omni extuberantiâ, pruritu aut vlcere. Quæ sententia si rectè explicetur, locum habere quidem potest: commodius tamen ij loquuntur, qui à parte tenuiore humoris putrescentis & corrupti eas provenire statuunt. Nam etsi citò oriantur & euanescent: tamen id non arguit, quòd ex humore provenire non possint, cum humores tenues & ipsi subito erumpant & euanescent; sicut hoc in variolis & morbillis fieri videmus. Et licet sine exulceratione, pruritu ac sine extuberantiâ fiant: tamen eas ab humore provenire posse, vitiligo & aliæ maculæ testantur. Cum Galeno ergo, de diff. sympt. 65. in humorum vitium qualitates mutatas corporis, & inter illas & maculas istas referimus. Generanturque & maculæ illæ à pulicum moriunculis ex sanguine ad superficiem corporis tracto. Ac licet humor, qui febrium harum causa est, interdum crassior sit: tamen saltem à parte eius tenuiore & subtiliore in cutem expulsâ hæ maculæ excitantur.

De causâ etiam efficiente Medici non planè consentiunt. Alij enim criticè, alij symptomaticè eas erumpere docent. De quâ re istud observandum in corpore nostro quæcunque præcipuè in ambitum corporis, expelluntur, facultatis expultricis beneficio expelli, quæ à re molestâ stimulata, onere illo se liberare cupit. Excitatur autem ea humorum vel quantitate, vel qualitate vel utroque. Verùm natura in expellendo ordinem quendam observare solet. Nihil enim, dum omnia rectè in corpore fiunt, expellit, antequam coctrix facultas opus suum perfecerit. Itaque nulla critica & planè laudabilis euacuatio fit in morbi principio, sed, coctione demum absolutâ, ea perficitur. Si verò in principio eam tentat, coacta id facit.

De modo generationis petechiarum

Atque hinc triplex in corporibus nostris motus observatur

Triplex natura motus

*In expulſione humorum Critic.* ſeruatur, qui etiam in petechiis animaduerti poteſt. Interdum enim planè bonus & criticus eſt iſte motus, vbi natura, materiâ victâ, die critico expulſionem iſtam inſtituit, & vt partes corporis internas prauis humoribus liberet, humores noxios ad ſuperficiem corporis pellit, & hoc modo morbum ſoluit; id quod rariùs in petechiis euenire ſolet. Interdum motus eſt planè ſymptomaticus, vbi ſcilicet in principio, crudâ adhuc omnino materiâ, atque die non critico, aliqua euacuatio inſtituitur: id quod frequentius accidit in petechiis. Vt plurimum enim petechiæ ante coctionis ſigna & antequam materiâ à naturâ victa ſit, apparent: vnde etiam morbum non leniunt, ſed potiùs humoris maligni in venis ebullientis, & vel copiâ vel prauitate naturam ſtimulantis indicia ſunt. Interdum medius quidam motus obſeruatur; vbi ſcilicet in progreſſu morbi, poſt aliqua coctionis ſigna, & cum mediocri virium robore, talis excretio inſtituitur, vnde notabilis quædam morbi remiſſio, ſed liberatio non integra à morbo percipitur, cum natura adhuc ante tempus debitum ad excretionem ſtimuletur.

*Petechia non critico morbo erumpunt.* Ex quibus apparet, rariùs per modum criſis erumpere petechias. Præterea cum bonæ criſis & hæc conditio ſit, vt notabilis aliqua fiat euacuatio, iſta in petechiis non accidit; & per maculas iſtas materiæ copia, quæ in venis eſt, plerumque non ſatis tollitur. E quo manifeſtum euadit, eos non rectè ſentire, qui exiſtimant, bene cum egris agi, ſi magna macularum iſtarum copia erumpat. Tantum enim abeſt, vt materiâ in venis & viſceribus ebullientem maculæ iſtæ, niſi alia excretio manifeſta accedat, tollant, & propterea ægro aliquod commodum inſignius afferant, vt potiùs magnam materiæ copiam arguant. Nam licet eius, quod malum eſt, copioſior euacuatio ſit bona: tamen per maculas iſtas non multum euacuatur, ſed copioſiæ maculæ potiùs periculum portendunt, ideo quod magnam prauæ materiæ copiam adeſſe ſignificant, ex quâ ſcilicet halitûs attollantur. Neque tamen contrâ, quod nonnulli volunt, ex paucitate macularum ſemper bonam ſpem concipere licet. Neque enim paucitas macularum ſemper paucitatem materiæ arguit, ſed ſæpe etiam naturæ in expellendis humoribus vitioſis verſus exteriora imbecillitatem. Neque obſtat, quod ſæpe in periculum incidunt, in quibus hæ maculæ deliteſcunt. Nam hoc quidem verum eſt, melius eſſe materiâ erumpere, quàm in corpore deliteſcere, & moueri verſus exteriora, quàm verſus interiora: iſtæ tamen maculæ, vt dictum, parum de materiâ, quæ in venis deliteſcit, & febris malignæ cauſa eſt, tollunt. Et vbi deliteſcunt, ideo ſaltem periculum portendunt, quod indicio ſunt, materiâ aliâ viam affectare, & ad caput, cor, aut aliam partem internam cum ægri periculo moueri.

*Petechiarum differentia.* Macularum autem iſtarum differentia variæ ſunt. Primò colore differunt. Nam proiit hic vel ille humor peccat in corpore: ita etiam huius vel illius coloris maculæ in cute apparent. Etenim ſi ſanguis aliàs bonus ac temperatus putredinem concipiat, & à ſtatu naturali recedat: rubræ apparent maculæ, quæ omnium tutiſſimæ ſunt. Si autem bilis prædominetur, & malignam putredinem concipiat: maculæ flauæ vel virides erumpunt, quæ iam deterioris conditionis ſunt. Si denique melancholia vel humor ater & aduſtus putreſcit, puniceæ & nigræ maculæ apparent, quæ omnium deterri-mæ ſunt.

Deinde & quantitate differunt. Aliàs enim copioſius, aliàs parcius erumpunt; aliæ ſunt maiores, aliæ minores; quæ differentia ex materiæ quantitate, craſſitie & lentore, ac virtutis robore ac debilitate ortum habet: aliæ etiam alio tempore apparent. Nam aliæ mox in principio erumpunt, aliæ procedente morbo efflorefcunt. Vnde, vt ſuprà dictum, petechiæ aliæ ſymptomaticæ, aliæ criticæ erumpunt. Et licet, quæ citius erumpunt, magnam materiæ copiam & malignitatem ar-

guunt: tamen quæ ſeptimò die erumpunt, ægrum extra omne periculum conſtitutum eſſe non indicant: ſed etiam alia ſigna, conſideranda ſunt. Si verò tardiùs apparent hæ maculæ, non leue periculum ſignificant. Nam accidit, id aut ob humorum craſſitiem, in quam vbi incidit malignitas vel venenofitas, non facile poteſt ſeparari; aut ob cutis denſitatem, quæ in hiſce affectibus, in quibus liberâ tranſpiratione & ventilatione maximè opus eſt, non leue creat periculum.

Signa harum februm quod attinet, ſunt eadem illa, quæ ſuprà in genere recensuimus: quibus vbi ſefe maculæ coniungunt, certius malignitatis argumentum ſunt.

### Curatio.

Cum febres petechiales ad malignas pertineant: etiam earum modo curandæ. Et vix alius, præter P. Peredam, in *Scholiis in meth. medend. Mich. Joh. Paſchali lib. 2. cap. 2.* id negat, nihilque malignitatis aut veneni in hiſ febris adeſſe affirmat: ideoque curandas cenſet planè, ſicut alias febres continuas. Vltimò verò Alexipharmacorum hîc nullum eſſe ſcribit, imò quocunque tempore noxium, quia ſint craſſa & obſtruentia, neque habeant in hac febre qualitatem contrariam.

Verum cum ipſâ experienciâ pugnat, quæ ſatis docet, malignitatem hiſce febris ſubefſe, Symptomaticum enim in iis talis vehementia & ſauitia deprehenditur, vt à ſolâ febre, plerumque miti, illa prouenire non poſſit, ſed latente & occultâ malignitate. Deinde valde errat, dum Alexipharmacorum uſum ideò improbat, quod craſſa ſint & obſtruant. Non enim omnia talia ſunt, ſed dantur multa, quæ, quod ipſe facere iubet, aperiunt: qualia ſunt carduus benedictus, ſcordium, ſemen napi, ſcabioſa & plurima alia. Ideoque communem aliorum Medicorum opinionem ſequimur, qui in hiſce febris ob malignitatem peculiari curandi ratione opus eſſe exiſtimant.

Sicut verò febres malignæ diuerſis ſymptomatibus ſefe produnt, & peculiari malignitatis gradu differunt: ita eas curandi ratio non planè eſt eadem. Ac licet in omnibus ea, quæ malignitati reſiſtunt, ſint vtilia: tamen non pauca ſunt, in quibus cura ſecundum varios illos malignitatis & putredinis gradus, & membra, quæ læduntur præcipuè differt. In morbo enim Vngarico, vt dicitur, plerumque magna prauorum humorum colluies circa ventriculum & primas vias hæret, ex cibo prauo contracta, vnde & purgantia & vomitoria neceſſaria ſunt. In petechialibus verò non ita frequenter tanta humorum colluies eſt in primis viis.

Itaque has febres Petechiales quod attinet, commodiſſimum eſt; primò ventrem ſaltem lenire mannâ, *Alum lo- nientia.* Syr. roſar. ſol. cum Infuſo rhabarb. cremore tartari, extracto rhabarbari, quibus aliquid camphoræ addi poteſt, vel Pil. Peſtilen. Drach. j. & alia conuenientia exhibentur.

Vel ℥. Eleſt. diacathol. Drach. iiii. trypher. Perſit. Drach. ii. rhabarb. Scr. i. Cum ſacch. F. Bolus. Vel Fiat talis potio.

℥. Rad. ſcorzonera Vnc. β. ſol. acetofa. M. β. cardui bened. ſcordy. an. P. i. ſol. ſena el. Vnc. β. rhabarb. el. Drach. β. zedoaria. ſem. citri. an. Scr. β. cinamomi Scr. i. flor. cordial. an. P. i. Infundantur in aquâ ſ. In Col. Vnc. ii. β. vel Vnc. iiii. diſſolu. manna Vnc. β. iterum colentur, & add. ſyr. roſ. ſol. Vnc. ſem. ſpir. vitriol. gutt. ii.

In iis, qui ad vomitum proclines ſunt, & cum materia ad ventriculum vergit, vomitum medicamentis ſuprà, lib. 2. capite 6. propoſitis mouere licet.

Hinc ſi opus ſit, ſanguis que abundet, atque vrina turbida totam maſſam ſanguineam infectam eſſe arguat, venæ ſectio inſtituatur ante quartum diem, aut poſtea omittatur. Nam vbi omnia in corpore turbata ſunt,

sunt, malumque latè diffusum, venæ sectione & purgatione non solum naturæ opem non ferimus, sed vires quoque frustra debilitamus. An autem maculæ iam apparentes venæ sectionem impedire possint, de eo dictum est, lib. 3. institution.

Postea cum videamus naturam ad ambitum corporis tendere, an ille motus promouendus sit, dispiciendum: cum de eo Medici dissentiant. Alij tum solum iuuandum hunc Naturæ motum tenent, cum rectè agit, & criticè materiam vitiosam expellit, quod sit post coctionem, dic Critico. Si verò natura rectè non agat, id est, nondum coctà materiā expulsionem instituat, eam adiuuandam non esse. Alij sunt, qui medios quosdam motus inter Criticos & malos Symptomaticos constituunt, vbi scilicet natura non quidem criticè, nec tamen cum ægri damno expellit; atque illos etiam motus adiuuandos esse existimant: & propterea etiam in febrib. petechialibus, vbi materiam ad cutem tendere animaduerrimus, cutem laxare, aperire, & omnibus modis malignos humores ad ambitum corporis promouere iubent.

Atque hæc sententia vero magis consentanea est. Sciendum enim, non omnes euacuationes Symptomaticas vitiosas esse, sed inter eas esse quandam differentiam. Quædam enim non solum tempore, sed & qualitate humorum, qui euacuatur, Symptomaticæ sunt; quando scilicet non, quæ morbum parit, materia, sed alia euacuatur, quæ euacuatio propterea semper noxia est, & cohibenda; Nonnunquam euacuatio quantitate vitiosa est, quæ & ipsa propterea sistenda. Imò nonnunquam accidit, vt tempore, quantitate & qualitate vitiosa sit aliqua euacuatio. Si verò tempore solum Symptomatica sit euacuatio, in quâ scilicet nihil præter naturam est, nisi quod ante perfectam coctionem, circa morbi principia accidit: ea potest utilis esse, & propterea non supprimenda est. Id quod etiam in hisce febribus est faciendum, & quidem eâ maximè de causâ, quod maligni & pestilentes humores coctionem non ita admittant, sed quamprimum euacuandi sint.

Submisera.

Itaque æger in loco mediocriter calido, & ab omni aëris frigidi afflatu munito, detineatur; & medicamentum aliquod sudoriferum & expulsuum ac malignitati resistens, ei exhibeatur, qualia suprà de peste & curatione febrium malignarum in genere fuerunt proposita. Ea tamen eligenda, quæ calorem febrilem augendo, insigne aliquod damnum non afferunt. Commendantur valdè emulsionēs ex semin. napi, citri, cardui bened. acetos.

Vt ℞. Sem. Napi Drach. i. citri, cardui ben. an. Drach. β. Aq. cardui bened. Vnc. iiii. vel iiii. F. Emulsio. Cui addatur Syr. è succo scordij Vnc. β. vel eidem aliquid confect. liberant. aut puluer. C. C. admisceatur.

Vel ℞. Sem. Napi Drach. i. citri, cardui ben. cornu cerui vsti prepar. an. Drach. β. ossis de corde cerni. zedoaria an. Scri. i. F. Puluis.

De quo detur Drach. i. cum Aq. Scabiosa vel simili.

Vel ℞. Boli armeni, terra sigillat. rad. tormentill. petasit. pimpinell. scordij, C. C. vsti prepar. an. Drach. β. F. Puluis.

Cui etiam aliquid de speciebus Confect. liberant. addi potest. Vtilis est & puluis Cæsaris rubeus appellatus. Imò in robustioribus naturis, & vbi maior est malignitas, Theriacam exhibere licet. Etsi enim febrem calore suo augere videatur: tamen periculum maius imminet à malignitate, quàm à calore febrili; & calor Theriacæ aliorum admixtione temperari potest. Et tutissimum est, talia calida mox in principio, præmissâ tamen, si opus sit, sanguinis euacuatione, antequam putredo inualecat, exhibere, vt venenosa & maligna illa qualitas discutiatur. Semper tamen ad malignitatis naturam respiciendum, & si ea sit mitior, non temerè vires fortioribus sudoriferis debilitandæ sunt, humoresque accen-

dendi. Oestianus Roboretus, cui & alij adstipulantur, scribit, se in hac febre efficacissimum in seipso deprehendisse lapidem Bezoar. Monet tamen, vt non semel tantum, sed sæpius, & in conueniente quantitate, gr. sci. xij. vel plurimum vnâ vice exhibeatur.

Cæterum ferè omnia hîc locum habere possunt, quæ variolarum exitum promouent, & quæ suprà in curatione pestis & febrium malignarum in genere proposita, quæ hîc non repetimus.

Dubium autem hîc occurrit, cum quaeritur, quid agendum sit, vbi maculis istis iam apparentibus alui fluxus superuenit. Licet verò contrarij isti motus esse videantur: cum tamen natura sensibilem humorum euacuationem per aluum instituat, nequaquam ea supprimenda est; nisi fortè quantitate excedat. Et propterea ea naturæ negotium committendum, ac interim solum aliterantibus conuenientibus cau. & morbificæ occurrendum.

Postea pro viribus roborandis, margaritæ, cornu cerui, & similia exhibenda; pulueresque ex iis parati iusculis & cibis admiscendi, cibique succo citri condendi. Vtile est & hoc Electuarium.

℞. Conseru. rosar. scabios. scordij, veronica, cardui ben. an. Vnc. β. theriaca Drach. i. rob. ribium. Vnc. β. sem. napi, citri an. Drach. i. Syr. acetos. citri. q. s. F. Electuar. de quo sumantur Drach. ii. vel iiii. cum aq. cardui bened. scabios. vel scordij.

Vel ℞. Conseru. rosar. incarnat. acetosell. an. Vnc. i. tunicis Vnc. β. cortic. citri condit. Drach. ii. rob. ribium, Vnc. β. spec. liberant. cum bolo sine aloe, diamarg. frig. an. Scri. i. Syr. acetos. citri, oxysacch. simpl. an. q. s. F. Electuarium.

Vtilis est, vt pote cordi amicissima, confectio Alchermes, quæ hoc modo commodè offerri potest.

℞. Confect. alchermes, Vnc. β. terr. sigillat. Drach. ii. margarit. prepar. Drach. i. β. C. C. prepar. Drach. i. lapid. Bezoar. Scri. i. Syr. acetos. citri, granat. an. Vnc. ii. aq. acetos. fragor. an. β. β. M. detur subinde haustulus.

Possent & alia, quæ suprà in peste enumerata sunt, ad confortandum adhiberi.

Extra quoque non sine commodo adhibentur ea medicamenta, quæ venenum à corde auocant: Inter quæ in primis commendatur ol. de Scorpion. Marthioli, & oleum Magni Ducis Hetruriæ; si iis Vnguentum rosac. misceatur, & regio cordis, tempora & pulsus illinantur.

Potest in eum finem adhiberi Theriaca cum succo citri.

Nonnulli quoque, vt & in morbillis, corpus pannis rubeis regunt, existimantque, eos ratione similitudinis ad se alliciendi vim habere.

Alij adhibent inunctionem ex hydrelæo & nitro, quæ cutem relaxandi, poros aperiendi, humores euocandi, ac dissoluendi, simulque calorem febrilem contemperandi vim habent, de quo suprà dictum.

Nonnulli vesicatoria, vt etiam suprà dictum, in hisce febribus adhibent. Cum enim in febribus, in quibus materia maligna in venis putrescit, continuo vapores prauis cor petant, illudque offendant; utile est, vapores & humores illos à nobilioribus partibus ad exteriora reuellere: id quod commodissimè faciunt vesicantia. Habetque Medicus hac in re, quàm imitetur, Naturam, quæ ad ambitum corporis materiam malignam protrudit. Iis tamen magis conueniunt, in quibus exteriora frigent, atque interiora vruntur, grauius in capite aduunt Symptomata, vt dolores, deliria, conuulsiones, lethargus, & in quibus habitus corporis est carnosior, ac temperamētum frigidius. Quæ si obseruentur, facillè omnia incommoda quæ alij obiciunt, euitantur. Cætera roborantia & putredini ac malignitati resistentia medicamenta cum aliis febribus malignis communia habent.



## CAPVT XIV.

## De Morbo Vngarico.

Morbus Vngaricus.

**I**nter febres malignas, & quidem non raro petechiales, est febris illa, quæ vulgò morbus Vngaricus & lues Vngarica ac Pannonica dicitur. Quod quidem nomen inde accepit, quòd lues hæc Anno 1566. in Hungaria maximè innotuisse videtur. Nam cum Maximilianus II. Imperator contra Solimanum, Turcarum tyrannum, expeditionem suscepisset ad Camorram; tum primò innotuit hic morbus; ad Iaurinum incrementum sumpsit: postea disfluente exauctorato milite, ad Germanos, Gallos, Italos, Belgas, hoc malum propagatum & penè per totam Europam disseminatum est; Et non solum milites ex Hungariâ redeuntes, verùm etiam per contagium plurimos eorum, qui expeditioni illi non interfuerant, interemit. Diuersoria enim passim ægrotantibus repleta erant, viæ cadaueribus occupatæ; vnde labes illa in vicinas domûs & villas translata, nullâ aëris præcedente corruptione. Maximè tamen afflixit Viennam Austriæ, cum per illam ferè omnes milites transirent, & recolligendarum virium causâ ibi hærent. Appellabatur tum vulgò, *die Hauptkrankheit oder Kopffvveh*: Item *die Herizbrenne*, quasi causus cordis. Vsatissima appellatio fuit morbi Hungarici.

Nonnulli morbum Vngaricum & febrem petechialem planè pro eodem morbo habent. Sed, vt mihi quidem videtur, non satis rectè. Etsi enim petechiæ & maculæ illæ, quandoque etiam in morbo Vngarico conspiciantur, tamen non semper id accidit, & potest hic morbus esse sine maculis. Contrà verò maculæ in febris petechiali omni inueniuntur; vnde & nomen hæc febris habet. Et si petechiæ non appareant, maligna quidem dicitur febris, sed non petechialis. Ego, si nominis imponendi penès me esset potestas, eum Militarem vel Castrensem appellarem; cum in castris ex prauorum ciborum & aquarum vsu & omnino præià diætâ oriatur, & hinc in alios per contagium diffundatur. Febres verò petechiales vbique grassari possunt, & plerumque vbi sunt Epidemiæ, à cœli influxu & aëris constitutione communi ortum habent. Si quis tamen morbum Vngaricum pro peculiari febris petechialis differentiâ, quam à morbo appatu accipiat, habere velit: cum eo non pugnam. Aliæ enim febres petechiales ex humorum in venis vitio solum prouenire possunt. Morbus verò Vngaricus semper humorum vitiosum apparatus circa ventriculum & primas vias coniunctum habet, & inde ortam cardialgiâ, quæ non adest in omnibus petechialibus febribus, vnde etiam curatio non nihil variat, & vomitoria, quæ in hoc morbo cum commodo ægri exhibentur, non in omnibus febribus petechialibus locum habent.

Etsi verò tum temporis maximè hæc febris grassata sit, tamen non credendum, morbum nouum esse, & tum primò ortum, sed ante etiam notum fuisse; Etsi appellationem morbi Vngarici tum forsitan acceperit. Testatur enim Langius, *lib. 1. Epist. 4.* duce Friderico, Comite Palatino, contra Mahometicæ factionis Imperatorem in bellum profecto, in exercitu Romani Imperij, in quo ipse tum Medicum agebat, ita populariter hunc morbum grassatum fuisse, vt ferè tum plures eo morbo, quàm hostis gladio perierint. Atque ipse refert ad causum hunc morbum, duasque eius species describit, quæ cum Hungarico hodie appellato planè conueniunt: Vnam, quæ à sicca calidâque aëris constitutione *χολο-πυρ* oriatur, ab ortu Pleiadum vsque ad solstitium æstiuale, cuius interna causa sit cholera, sanguini permixta, in maioribusque circa cor, hepar, ac non raro circa pulmonem vasis putrescens, in quâ lingua admodum nigrescat, patientesque sæuissimis symptomatibus,

nempe cephalalgia, delirio, hæmorrhagiâ, phrenitide, ventris torminibus vexentur: Alteram, quæ ab æquinoctio autumnali vsque ad Pleiadum occalum, si Australis constitutio præcesserit, ingrauescat, & ex pituitâ ac cholera ortum habet. Et proculdubio idem morbus antiquis incognitus non fuit. Neque enim nouæ causæ in eo inueniuntur, quæ apud antiquos locum habere non potuerint.

Hoc tamen negandum non est, in Vngariâ peculiare quiddam ad hunc morbum producendum inueniri, præcipuè in exercitu, quod alibi eiusdem planè generis non facile reperitur. Nam primò aër ad hunc morbum multum facit. Aër enim Vngaricus, vt ij, qui eo loci medicinam fecerunt in Castris, referunt, duobus extremis non assuetis insensibilis est. Vel enim extremè crassus est, & nocte nebulis inspissatus; vel iis discussis extremè subtilis, ac æstate feruidissimus. Atque inprimis hic aër Germanis infestus est. Nam cum in Germaniâ Austrina aëris intemperies summis Alpium ingis maximam partem excludatur: vbi in Vngariam, quasi ad zonam torridam, veniunt, subitâ mutatione factâ non parum læduntur. Libero enim & patente tractu à Cyrenaicis & transmarinis Africæ oris Vngariam Auster & Libanotus perflant, & dispositiones in corporibus longè contrarias iis efficiunt, quas Germani ab Aquiloniis & salubrioribus ventis mutauerunt. Familiares verò Germanorum venti Carpathiis rupibus, quasi obicæ, excluduntur. Quibus accedunt crebræ paludes; Et quòd amnes ex declinibus montium iugis præcipitati, nimbis adaucti, aluèos suos facile deferunt, & magnas inundationes efficiunt, quæ limosis locis exceptæ fœtorem magnum excitant. Adiunguntur his castrorum sordes inuitabiles, quibus aër per se crassus magis inquinatur. Talémque reporem, mollitiem & crassitiem, aëris illius esse ferunt, vt si lintecolum aquâ stagnante præsertim, lotum ad Solem siccandum exponatur, pediculis paulò post scaturire quasi animaduertatur.

Secundò copiosè in victu vtuntur in exercitu carnis bubulis, crassis, iisque qui statim iuxta flumina latent, piscibus coctu contumacibus. Quibus accedit, quòd omnia illa parum coquunt, & tantum non cruda interdum deuorant, vitiumque coctionis primæ in secundâ vini meracioris potu corrigere conantur. Vescuntur item fructibus fugacibus, quibus regio illa fertilissima abundat, immoderatiùs.

Tertiò non postremas partes in hoc morbo inducendo aquæ insalubris potus sibi vindicat. Sæpe enim militibus aquæ stagnantes & limosæ potandæ sunt. Etsi enim si semper suæ salutis consuleret exercitus, & nunquam ferè à Danubio diuelleretur, facile aquæ insalubris potum vitare posset, tamen contrarium sæpe fieri, experientia docuit. Cum enim vbiuis ferè locorum terrâ vix ad paucos pedes effossâ aquæ venæ reperiantur, in his aperiendis milites quidem laborare solent, sed parum curant, an argilaceæ, limosæ vel alterius generis sint. Stagnantes verò aquæ adhuc deteriores sunt. Etsi verò Vngari aquarum cruditatem, fœtorem & omnino omnem noxam alio, tanquam ad omnia venena tutissimo remedio, corrigere soleant, & eo non minùs familiariter, quàm pane vtantur, tamen Germani & alij milites eius vsui non assueti non parum eo læduntur, & sæpe ignem igni addunt. Nonnulli verò vt crudum cibum, ita aquam crudam vini meracioris potu corrigere student. Verùm si iam cruditates ad secundæ coctionis organa sunt protrusæ, vino potentiore malum potius augetur, dum crudi illi humores, tanquam vehiculo, ad exiliores venas deuehuntur.

Imò quartò ex vini Hungarici potentis vsu immoderato plurimos sibi hunc morbum contrahere, extra dubium est. Ex vini enim huius, præsertim meracioris, vsu bilis copiosa cumulat. Et inprimis ij ab eo plurimum læduntur, qui priùs in regionibus Septentrionalibus

libus cereuisiis tantum assueti, vinum solum, idque fortissimum, non bibunt, sed potant, & auidissimi potus, ad hanc vini generosi delicias delati, in eius vlu nulum modum seruant.

Quibus & alia causa accedunt, de quibus omnibus frequentius quam alibi, hunc morbum excitari, & sauius grassari in Vngaria, atque inde morbi Vngarici nomen sortitum esse, mirum non est.

Et si vero in Vngaria notissimus sit, tamen cum & in aliis locis eadem causa, & praecipue aeris anomalia insignis, aut certe sub dio eius iniuria perferenda, cibus prauus, aqua corrupta, & omnino in tot. nationum colluue ad victum inadlucum transitus & in diata errores, alibi etiam in castris dari possint: non mirum, si & alibi idem morbus excitari possit. Id quod in Germaniam etiam nostra accidisse, facile animaduertet, qui morbos, qui anno 1626. in castris excitati, & in alias regiones etiam contagio diffusi sunt, perpendet.

Porro morbi huius naturam quod attinet, apud plerumque Medicos extra dubium est, esse febrem malignam, imo reliquis perniciosiorem, ut penes ad naturam pestis accedat. Apparet enim ea symptomatum vehementia, quae longe grauior & perniciosior est, quam ut a simplici putredine provenire possit. Contagium etiam in eo valde efficax est, unde longe lateque facile disseminatur, atque omnis aetatis ac sexus homines inuadit & non paucos ex iis, quos corripit, iugulat. Langius, ut dictum, ad causum refert. Summus enim in hac febre feruor apparet, a quo salivialis linguae humiditas exsiccatur, & lingua ab atra accensi sanguinis fuligine obfuscat, unde affectus hic *die Brenne*, a colore linguae, appellatur. Crato ad synochas putridas refert. Rulandus febres has ex earum numero esse statuit, quas Hippocrates *μυρωδεις* appellat. Experientia enim testatur, in hac febre magnam semper esse humorum & sanguinis ebullitionem & perturbationem, calorem esse acrem & tactum ferire. Malignitas tamen, ut dictum, non abest, quod vel ipsa Curatio indicat. Nisi forsitan quis febres alias ardentiores cum morbo Vngarico confundere velit.

### Causa.

Atque ita cum duo in hac febre coniungantur, malignitas, imo saepe pestilentialis constitutio & humorum corruptio: utrumque hoc vitium ortum habet ex iis causis, quas supra in genere febrium pestilentium & malignarum esse diximus. Hoc tamen mihi notandum videtur, cum morbus Vngaricus, ut ab aliis petechialibus febribus differt, castris proprius sit, ut ex iis, quae de natura eius dicta sunt, patet: non est hic opus ad causas coelestes vel aeris toti regioni communem constitutionem recurrere; sed sufficit ille aer, qui castris est proprius, qualem in Vngaria esse diximus: quae eius constitutio et si in aliis regionibus ubique non inueniatur: hoc tamen in exercitu & castris plurimis commune est, sub dio humi cubare, & vapores e terra exhalantes, ut & pluuias excipere, & vestimenta pluuiis madefacta cum saccis permutare non posse, tempore vero hyberno angustis saepe hypocaustis includi. Iisdem accedit communis victus prauus saepe, quo in melioris inopia vesci coguntur, & plerumque ij, qui meliori victui adueri sunt. Vnde pravi humores in primis viis primo cumulantur; e quibus cum sensim aliquid cum chylo ad hepar deriuetur, sanguinem prauum inde fieri necesse est, qui postea in dies redditur deterior, tandemque, accedente in primis aeris constitutione incommoda, non solum putrescit, sed & malignitatem concipit, unde febris ista tandem excitatur, quae inquinamentis in alios diffusis hinc inde late disseminatur, & saepe etiam eos corripit, in quibus iste prauus humorum apparatus, ut in militibus non inuenitur; unde etiam symptomata non parum variant. Nonnulli qui-

dem sunt in ea sententia, morbum hunc per contagium primum ab Italis in Hungariam esse delatum; atque esse febrem petechialem. Is enim morbus familiaris est Italis, & nunquam ferè ibi cessat. Et quamuis in Vngaria quaedam symptomata, ab Italis aliis non animaduerta, contracta sint: putant tamen, eundem morbum pro regionis, victus & aliarum circumstantiarum ratione, saepe diuersa habere accidentia. Verum si quis morbi huius exortum variis temporibus, & in diuersis regionibus consideret, facile inueniet, non semper ab Italis eo translaturum, sed ab iis, quae in castris & exercitiis communes sunt, causis contractum fuisse.

Vnde etiam apparet, quid de febris huius naturae & proximae eius causae sentiendum sit. Et si aliter ea de re sentiant. Rulandus enim, de *huc Vngarica cap. 2.* Th. Iordanum, de *pest. phenom. tract. 1. cap. 19.* secutus, pituitam non tam extra vasa, quam intra vasa sanguini permixtam & putrescentem morbi huius causam esse statuit, idque istis argumentis probare conatur.

1. Est, quod phlegmagoga in principio morbi exhibita, quae primam corporis regionem euacuant, profint. Sanguinis vero missio initio instituta parum vel nihil utilitatis afferat.
2. Quod circa noctem fit exacerbatio, quod pituitosi humoris proprium est.
3. Quod tempore pluuioso & flante Austro hac febris maxime grassatur, & eos corripit, qui phlegmat. alimentis vsi sunt, & inde ortis succis abundant.
4. Quod omnes de ventriculi dolore conqueruntur, ob lacunam pituitae ibi constitutam: unde & cerebrum afficiatur.
5. Quod sudoribus & vrinarum profusionibus maxime tollitur hic morbus.
6. Quod transit terminum peracutorum, qui est dies 14.
7. Quod abscessu plerumque finitur.
8. Quod calor primo tangenti miris apparet, insistenti vero fit mordacior.

Verum argumenta haec non satis firma sunt, nec cum iis, quae cum alijs Medici docti, tum ipse observauit, & experientia saepe suggerit, consentiunt. Ioh. Langius enim, loco allegato, ad causum hanc febrem refert; Crato ad Synochas putridas, & ipse Rulandus passim in historiis narrat, aegros in hac febre aestuare vehementer, & calore totum corpus aduri, linguam esse aridam, scabram, sitim adesse vehementem. Quae certe omnia febrem continuam, & eam non pituitosam arguunt, sed potius biliosam, aut interdum, si in corpus plethoricum incidat, synocham referentem, non tamen ex puri, sed pravi sanguinis putredine ortam. Hoc tamen simul facile concedo, saepe magnam pituitosorum humorum copiam in ventriculo & primis viis ex victu prauo colligi. Verum humores illi fomes & causae febris continuae, quae omnium confessione in venae causa accenditur, non sunt, sed a calore febrili agitantur, atque agitati cardialgiae, aestus quoque aliorum symptomatum, in principio febris praecipue, causa sunt, ipsamque febrem augere & fouere possunt.

Vnde facile est respondere ad argumenta Rulandi.

1. Quod phlegmagoga in principio exhibita profint, non causa est, quod proximam febris causam tollunt, sed quod pituitam e ventriculo, & proximis viis euacuant, quae plurimorum malorum ac symptomatum causa esse, febremque augere potest. Neque tamen illud, quod ventriculum affligit, & vomitu saepe reicitur, vel alias etiam euacuatur, semper vel saltem pituita est, sed, ut Thobias Coberus, cum alibi in suis observationibus Castrensibus Vngaricis, tum *dec. 2. observ. 5.* testatur, saepe etiam cum pituita aut post pituitam bilis pallida, citrina, vitellina & aëuginosa in maxima copia reicitur.

An pituita  
sit morbi Vn-  
garici causa.

Vngaricus  
morbi natu-  
ra.

Causa.

relicitur. Neque etiam venæ sectio semper noxia est, sed ad humores vitiosos in venis contentos euacuandos utilis & necessaria; id quod ipse *cap. 8. quest. 14.* concedit, & aliquoties in historiis curationum venam aperuit.

2. Et si pituita multo sanguini mixta sit, & exacerbatio circa noctem fieri possit, tamen non semper hoc accidit, ut ipsa experientia & observationes docent.

3. Quod tempore pluuioso & austro flante hæc febris grassatur, non causa est, quod ista aëris constitutio humores febris causam primum producit, sed quod occasionem præbet, ut humores vitiosi corrumpantur, & putredinem concipiant, vel poros cutis occludendo, vel aliàs putredinem inducendo; sicut alia humida & austrina aëris constitutio ad putredinem apta est.

4. Dolor verò ventriculi nullum certum pituitosi humoris indicium, sed potius bilis, quæ maiorem dolorem inferre solet, quàmque copiosè sæpe in morbo Vngarico vomitu reici experientia testatur, & æstus sæpe magnus, intensus & vix tolerabilis, ipso farente Rulando è regione ventriculi percipitur.

5. Neque enim sudor & urinæ copia pituitam arguit, sed potius vitiosos & tenues humores, quos natura à sanguine bono separat & sero dilutos per ambitum corporis expellit.

6. Et quia hæc febris terminum acutorum non transcendit, à calidis potius, quàm pituitosis humoribus eam generari indicio est.

7. Licet etiam aliquando per abscessus finiatur hic morbus, & id tamen calidorum humorum potius, à quibus eiusmodi inflammationes, parotides & bubones fiunt, quàm pituitosorum, indicium est. Raro verò accidit, ut humor ad pedes decumbat, & id potius in fine morbi ob errores in victu commissos accidit, neque morbus criticè hoc modo soluitur.

8. Tandem neque calor semper primò mitis, sed satis acris apparer.

#### Signa diagnostica.

Signa diagnostica.

Quantum ad signa symptomatum in hac febre magna est varietas, nihilque ferè est symptomatum, quæ in febribus malignis aliis apparent, quod in hoc Vngarico dicto morbo reperiri non possit. Quapropter signa ibi explicata hæc repetere opus non est. Verum inter reliqua magis molestus est continuò affligens capitis dolor, adeò ut præ doloris huius vehementiâ & continuatione reliqua symptomata ab ægris nonnunquam non sentiantur; vnde *das Hauptwehe oder Hauptkranckheit*, nonnullis appellari hunc morbum antea diximus.

An vermes in capite nascantur.

Itaque cum hoc malum primum innotesceret, in eâ fuere nonnulli sententiâ, dolorem hunc ortum habere à vermibus quibusdam in cerebro natis; vnde à quibusdam hæc febris, Vermis cerebri fuit appellata. Suntque in eâ sententiâ non pauci authores, & inter hos etiam Arabum quidam, dolorem capitis à vermibus in anteriore parte capitis supra nares (ubi oues sæpe habent vermes) natis oriri posse. Quibus quidem contradicit Volcherus Coiter, etsi prius eandem opinionem habuerit, & nullos reperiri vermes in capite scribit, sed saltem quædam filamenta esse lumbricis non absimilia, ex albâ pituita constata, quæ incauti pro vermibus habeant. Verum nolim ego omnes observationes Medicorum hæc de re, quæ videri possunt apud Schenckium. *observ. lib. 1. observat. 77. 78. 79. 80.* in dubium vocare, præsertim cum certum sit, in capitibus omnium, spongiosâ nimirum illâ parte anteriore Cranij, vermes reperiri interdum, quod ipse testari possum. Vide *lib. 1. Practic. Pari. 1. cap. 18.* Verum an in morbo Vngarico ex hac causâ dolor fiat, non facile dixerim.

Apparent sæpe etiam in hoc morbo maculæ illæ & petechiæ, quas nonnulli pro pathognomonico signo morbi Vngarici habent: verum neque in omnibus morbo hoc laborantibus conspiciuntur, neque omnes febres petechiales pro morbo Vngarico habendæ sunt.

De reliquis signis hoc notandum, variari, ut antea quoque dictum, ea sæpe pro regionis & victus ratione diuersâ; observatumque, cum hic morbus in Vngariâ ortus esset, eiusque semina primum per exauctoratos milites in varias regiones essent delata, eum non ubique planè eadem symptomata habuisse, sed in nonnullis regionibus quasi eneruatum miriorem euasisse.

Et ut hæc de signis huius morbi breuiter concludamus, placet eius historiam, cum primum innotuit, è Thomæ Iordani lib. *de pestis phenomenonis, tract. 1. cap. 19.* hic addere.

Circa tertiam, inquit, vel quartam à meridiem horam innadebat, eiusque è monachia cum leni rigore aut potius frigore & horrore observabatur. Post hora quadrantem æstus illum excepit, qui noctes & dies sequentes assidue eos detinebat. Conquerebantur inprimis de capitis dolore. Deinde manu quoque admovent ostendebant sub sternone regionem ad cartilagineam mucronatam, ubi orificij ventriculi sedes vulgò creditur: ibi omnibus quadam renitentia & durities observabatur, cuius etiam attactum non ferebant. Siis exhausta primis statim diebus aderat, postmodum, vel ad summum tertio die, deliria adveniebant, quæ sat diu perseuerabant. Exacerbationes erant circa vesperam, & per noctem recrudescere morbus; lingua erat arida, labia fissa: quibusdam sanguinis sputum supernebat, nonnullis materia per aluum euacuata salutaris spem accedebat. Plurimimò ferè omnibus, materia à capite in aures secessionem faciebat; unde surditates, eoque sequestrata materia salutis argumentum præbebat. Parotides frequentes erant. Pessima fuit Crisis, quibus tubercula in summo pedis oboriebantur, quæ scalpendo aperta, serpebant, donec negligentibus sphacelus crux occuparet. Salutem recuperabant alij decimo quarto die: licet aliquibus etiam in vicesimum diem sit producta curatio. Omnes, qui vini potum non abstinerant, perierunt.

Et in primis notabile hoc signum est, & quod in aliis petechialibus febribus non reperitur, dolor circa ventriculum vehemens, præsertim si summis digitis comprimatur. Nec enim facile quemquam reperies, ut Tob. Coberi verba habent; qui non manu quasi ductâ te ad hunc locum affectum sit deducturus. In iis tamen, qui per contagium solum inficiuntur, nec ex victu prauo eundem apparatus morbosum contraxerunt, & hæc & alia signa variare possunt.

#### Prognostica.

Quid de morbo hoc præfagiendum sit, facile ex his, quæ supra, *cap. 6.* & loco ibi allegato, de signis febrium pestilentialium & malignarum diximus, colligere licet. Nimirum quod vires fortiores; & symptomata mitiora sunt; eò melior morbi euentus sperandus: contra quod vires debiliores & symptomata grauiora sunt, eò morbus est periculosior. Nam si vires non sint deiectæ admodum, non infestet lipothymia, aut grauior capitis dolor; à vomitu aut alui fluxu æger non debiliior reddatur; maculis erumpentibus vomitus & alui fluxus sedetur, ægerque leuetur, & præcipuè die critico melius habere incipiat, & hæmorrhagia narium accidat, ægrum conualitutum sperare licet. Contra si vires subito collabuntur, alui fluxus & vomitus, quibus varij coloris humores foetidique reiciuntur, perseuerent, morbusque inde non imminuatur; urinæ nigra, crassa subito tenues euadant, aut urina retineatur, vel paucior reddatur; si æger vigilet continuò, vel soporosus euadat, somnum inquietum & terribulum plenum habeat, delirer, floccos legat, &



& festucas colligat, conuellatur, tremat, tinnitum aurium sentiat perpetuum, oculis apertis dormiat, toruam videat, dentibus stridat, manus pedesque continuo nudet, spiritum altum, frequentem ac cum stertore & clangore ducat, atque alia praua symptomata adsint: morbus lethalis & periculosus indicatur.

### Curatio.

In Morbo Vngarico curando, vt & in aliis febribus malignis, ad tria inprimis respiciendum: 1. vt fomes malignitatis tollatur: 2. vt putredini & malignæ qualitati resistatur: 3. vt symptomatum vires deicientium vehementia mitigetur.

Quâ ratione autem hæc commodè expediri possint, Medici non parum, discrepant. Nonnulli, vt Mindererus & alij planè purgationem in principio reiciunt, vtpote quæ humores plus turbet; & propterea statim ad alexipharmaca & sudorifera confugiunt: nonnulli alium quidem laxant, sed lenissimis taltem & ecoproticis medicamentis: alij verò paulo etiam fortiora vsurpant, & plerique etiam vomitoria probant.

Verum distinctione etiam hæc, vt sæpius dictum, opus est. Etenim si corpus aliàs purum sit, & per contagium saltem labem hauserit, primis viis leniter euacuat, alexipharmaca mox exhibenda esse, facile concedimus. Si verò ex prauâ diætâ & victu morbus hic contractus sit, & ex ventriculi dolore, anxietate, æstu circa præcordia, nausæa & similibus symptomatibus colligatur, magnam saburram vitiosorum humorum circa ventriculum hære, ea omnino primò per purgantia vel vomitoria tollenda est. Seorsim enim tales humores ab aliis secreti subsistunt, nullam coctionem & emendationem suscipiunt, quidquid cibi vel medicamenti assumitur, corrumpunt, ac si sudorifera, iis nondum euacuat, exhibeantur, in penitiora corporis rapiuntur, morbumque valde augent. Neque purgantia tunc exhibentur, vt humores à venâ cauâ euacuent, sed eos saltem, qui in viis obuij sunt magnâ copiâ, tollant.

Itaque in huius febris initio danda est opera, vt primæ viæ, quæ vitiosis humoribus plerumque sciant in hoc morbo euacuentur. Et cum magna plerumque hæc sit vitiosorum humorum colluies, qualis ea sit videndum, & hinc pro humorum peccantium varietate remedia varianda.

Clysteres inferiora quidem euacuant: verum vbi circa ventriculum, quod plerumque accidit, humores hærent, eò non penetrant.

Vbi pituitosi crassi & crudi humores peccant, præcipuorum Authorum consensu vtilissimus est Agaricus. Ex.gr.

℞. Agarici trochisc. Scr. iij. oxymelit. simpl. conseru. scordij vel rosar. ana parum sacchari q.s. F. Bolus.

Vel ℞. Decocti folior. sena, in quo agarici Drach. i. ebullierit. Vnc. iij. syrupi diaphanicon Vnc. i. Misce.

Vel ℞. Agarici trochisc. Drach. i. flor. cassia Vnc. i. vel Drach. vi. olei citri gutt. i. Cum sacch. F. Bolus.

Vel si bilis sit admixta, tale fiat medicamentum.

℞. Pulpa tamarind. Drach. ii. manna, cassia, ana. Drach. iij. agarici trochisc. rhabarb. ana. Scr. i. Cum syr. rosar. solut. & sacch. F. Bolus.

Solâ cassiâ non vtendum, cum humectet & putredini non resistat.

Vel ℞. Rad. scorzonera Vnc. sem. scordij, acetosa, flor. cordial. ana. P. i. fol. sena el. Vnc. sem. agaric. albi Drach. i. zedoaria Scr. i. Coqu. in Aq. s. In collat. Vnc. iij. dissolu. manna Vnc. sem. Coletur. Adde. syr. rosar. sol. Vnc. B. Misce.

In fortioribus naturis, & vbi humores vitiosi in primis viis tenaciùs hærent, vt leniora medicamenta eos vix moueant, paulò fortiora admiscere licet, vt Elect. diaphanicon. el. rosar. Mesue, de succo rosar. spec. diaturbith, & similia.

Dan. Sennerti Tom. II.

Non incommodè etiâ in hac febre, inprimis vbi vomitoria. molestia circa ventriculum percipitur, vomitus instituitur. Nam sæpe magna copia circa ventriculum hæret humorum pituitosorum, biliosorum omnis generis, qui ventriculum lancinant, tetrâ fumis & exhalationibus capiti & cordi molesti sunt, omne quod ingeritur corrumpunt, ac medicamentorum vim infringunt. Qui cum nullam coctionem à natura recipere nec in statum meliorem reduci possint, maturè euacuandi. Etenim si in corpore detineatur hæc Camarina, & calore febrili & medicamentis moueatur, ad penitiora penetrat, & aliis humoribus admiscetur, febrem auget, & pessimorum symptomatum causa est. Commodissimè autem vomitu materia hæc euacuatur. Vnde Thob. Coberus, obs. Castrensi. Vngaric. decade 2. obseruat. §. scribit. In morbo Vngarico ad vomitum tanquam sacram anchoram, mox confugiendum esse peminem: negaturum, qui curationi huius morbi interfuerit. Habetque ibi exemplum nobilis, qui cum primò phlegma viscidum, hinc omnes bilis species vomitu reiecisset, roborato paulum ventriculo sequenti die lustro sospes & sanus interfuerit, cum prius per trimestre tempus sensim quasi licet non decumbens, languens tamen, ad actiones obtorpuisset.

Quæ tamen hæc de fortioribus purgantibus & vomitoriis diximus, ea solum de morbo Vngarico in specie sic dicto aut potius Castrensi, & quidem è prauo victu contracto, dictum, nec aliis febribus malignis & petchialibus applicari volo, in quibus tanta humorum saburra circa præcordia non hæret, sed vitiosi humores maximam partem in maioribus vasis continentur: Ibi enim omnino lenioribus medicamentis agendum. Quibus autem medicamentis hoc fieri possit, ex iis quæ de peste & febribus malignis aliis dicta sunt, patet.

Postea, ne sanguinis massa tota inficiatur, in iis corporibus, quorum constitutio eam requirit, & vires ferunt, venæ sectio instituenda, Et quidem cum vires in hoc morbo citò deiciantur, morbusque acutus sit, & sanguis faciliè inficiatur, maturanda est, & statim initio instituenda venæ sectio: nihilque in hoc morbo periculosius, quàm curationem in principio differre. Obseruatumque est, plerosque, qui venæ sectionem in principio neglexerunt, obiisse. Itaque mox, & si cruditates ac vitiosi humores in primis viis non adsint, vel iam euacuata sint, primo vel secundo die vena aperienda. Plerumque enim vires tam citò collabuntur, vt venæ sectionem postea ferre nequeant. Et licet nonnunquam in principio huius morbi macula in cute appareant, quæ ebullitionem sanguinis, & motum eius ad ambitum corporis indicant: tamen tantum abest, vt venæ sectione motus naturæ impediatur, vt potius natura illo sanguinis, quocunque modo grauantis, onere liberata, supraque residuum potentior euadens, reliquos humores rectius gubernare, vincere & expellere possit. Si verò dies aliquot iam elapsi sint (cum principium ultra quartum vix extendatur) viresque iam prostratae, & malignitas totam massam inuaserit, tutius est venæ sectionem omittere. Quæ etiam non tutò instituitur, si vomitus, vel alui profluuium adsit.

Pertunditur autem vena Basilica, quæ confestim multitudinem sanguinis imminuit: aut, si hæc non appareat satis, Mediana. Si verò debiliores fuerint vires, istarumque venarum sectionem non ferant, commodissimè vena in pedibus aperitur: quam aliàs quoque in hoc morbo prodesse obseruatum est; vt quæ non solum corpus à copiâ sanguinis liberat, sed & illâ venam magnam, per dorsum extensam, in quâ præcipua in hoc morbo putredo est, satis commodè euacuat, & humores versùs superiora ruentes reuellit. Cum summa vero utilitate hæc vena in fœminis isto morbo laborantibus aperitur. Et vt hæc in summam, verbis

Iohan. Cratonis, contraham: Si quem hic morbus inuadit, & ventriculum malè affectum deprehendit, illicò vtatur bolo purgante ex agarico trochiscato, & si plethora sanguinis adest (siue ad vasa, siue ad vires) tertio die venam secet (nisi priùs id fieri possit) post tertium diem nemo, cui vita clara est & salus sua, vel purgatione vtatur, vel phlebotomiâ, quamuis minus periculi in purgatione, quàm in venâ sectione est; minùsque etiam in sectione venarum pedis, quàm venarum brachij periculum sit.

Si ergò biduo vel triduo elapso vires iam labantur, & nihilominus venâ sectio requiri videatur. Cucurbitulâ venâ sectionis vicariâ affigi possunt. Imò nonnunquam etiam post venâ sectionem ex applicentur, vt tenuis & ichorosus sanguis cum malignis vaporibus à partibus nobilioribus interioribus ad exteriores ignobiles reuocetur. Commodissimus autem locus cucurbitulis affigendis sunt partes inferiores. Ita enim à corde & partibus superioribus sanguis reuelli- tur. Dorso autem vix applicare licet, ne sanguis versùs cor attrahatur.

Vbi ita natura oneris parte leuata fuerit, neque ampliùs metuendum est, ne humorum prauorum collu- uies in primis viis cumulata sudoriferorum vsu, ad internas corporis partes ipsasque maiores venas & arterias rapiatur, vt maligni humores per sudores discutiantur, laborandum. Ea tamen medicamen- ta eligenda, quæ feruorem humorum, atque calo- rem febrilem non augent. Quod tamen iam aliquo- ties dictum, inter se comparanda febris & malignitas. Quò enim maior est malignitas, eò potentiora & effi- caciora alexipharmaca, posthabita, etsi non neglectâ quodammodo febre, exhibenda; Cùm à malignitate maximum periculum immineat. Conuenit hic cornu cerui vltum præpar. Pulvis Cæsaris rubens, lapis be- zoar, Species Liberantis, & similia antea proposita.

℥. *Spec. liberant.* Scr. ii. *diamargar. frig. japphiri præ- par.* an. Scr. β. F. Pulvis. Detur cum aqua cardui bened. vel acetos.

Vel ℥. *Rad. scorzonera, fœniculi*, an. Vnc. β. *fol. scor- dij* M sem. *sem. Cardui bened.* Drach. i. *citri* Drach. sem. *granor. chermes* Drach. ii.

Coqu. vase clauso in *aq. card. bened. & acetos.*

Colaturâ ℥. ʒ. iii. Adde *syr. scordij vel acetosif. ci- tri*. Vnc. β. vel Drach. vi.

Vel ℥. *Sem. napi* Drach. ii. *citri, acetosa*, an. Scr. i. *camphora* ʒ. iii. F. Pulvis.

Emulsiones etiam ex semine napi, capite præceden- te expositæ vtilis sunt: Decoctum item cornu cerni cum succo citri. Est & zedoaria & aqua inde destillata efficax. Alij hunc puluerem commendant.

℥. *Sacchari candi* Drach. iii. *zingiber* Drach. ii. *cam- phore*. Drach. i. F. pulvis.

Cuius dosi Drach. i. cum aq. acetosæ, scabiosæ, car- dui bened. perasit. & modico aceti. Commodius tamen esset, pro zingibere, zedoariam, radic. scorzonera, vel simile quid substituere.

Thomas Iordanus multis, quo tempore hic mor- bus in Vngariâ innotuit, peculiare quoddam medica- mentum, quod Electuarium de zedoariâ nominabat, in vsu fuisse scribit, quod componitur hoc modo.

℥. *Theriac. Alexandrin. Mithridatij el.* an. Vnc. iii. *zedoar. el.* Vnc. i. *zingiber. albi*. Vnc. β. *rad. tormentill. serpentar. pimpinell.* an. Drac. iii. *myrrh. croci, eff. de C. C. diptamni.* an. Scr. ii. β. M.

Dosis erat aurei vnus dissoluti in pari portione aquæ & aceti. Posset etiam misceri hoc Electuarium cum *syr. acetos. citri*.

Verùm cautione opus est in Theriacâ & Mithrida- tio, & aliis sudoriferis calidis exhibendis, cùm febrem augeant. Ergò si merus est, ne eorum vsu febris augea- tur, vel cum aceto & aquis frigidis exhibenda, vel pla- nè omittenda & tutiora vsurpanda.

Alij hunc puluerem laudant:

℥. *Flor. sulphur.* Scr. i. *succini albiss. cornu cerui*, an. Scr. β. *terr. sigill. Silesiac.* Scr. ii. F. Pulvis.

Et licet ista medicamenta ad sudorem ciendum se- mel atque iterum propinare sufficiat, tamen eadem, quatenus cordis vires roborant, malignitatem expu- gnant, sæpiùs exhibenda: singulis scilicet diebus bis vel ter: Minori tamen dosi, quàm antea. Atque tunc viles sunt species liberantis, Electuar. de gemmis, cordial. temperat. diamar. frigid. & alia, supra in curatione pestis & febrium malignarum proposita. Conuenit quoque, vt antè dictum, decoctum cor- nu cerui cum semine & corticibus citri paratum, cui succus citri vel spiritus vitrioli addatur.

Vel: ℥. *Conseru. acetosell.* Vnc. i. β. *rosar. incarnasar. scabios.* an. Drach. vi. *flor. citri condit. cortic. citri condit. rob ribium*, an. Vnc. β. *spec. liberant. sine aloë. cordial. tem- per.* an. Scr. ii. *terr. sigill.* Drach. β. Cum *syr. acetosif. citri*. F. Electuarium.

Nonnulli valde laudant radicem scorzonera, eam- que cum lapide bezoar efficacissima contra hunc mor- bum medicamenta esse, scribunt.

℥. *Rad. scorzonera*. Drach. i. *boli Arm. terr. sigill. Offis de corde cerui, scordij, smaragd. prepar.* an. Scr. i. F. Pulvis.

Cui pro libitu lapidem bezoar addere licet.

Vtiles sunt & aquæ bezoartica supra in peste com- memoratæ, præcipuè illæ, quæ cum succis plantarum & aceto parantur. Nam cum spiritu vini paratæ in hoc morbo, minùs conueniunt, vt

℥. *Theriac. opi. media atar.* Vnc. i. *succi citri, vini gra- nator.* an. ʒ. i. β. *aq. acetos. scabios.* an. ʒ. ii.

Destillantur f. a.

Vel ℥. *Rad. scorzonera*, Vnc. β. *diptamni alb. tormen- till. zedoar.* an. Drach. ii. *rosar. rubrar. M. β. sem. citri, cor- tic. citri*, an. Drach. ii. *rasur. cornu cerui crudi*, Vnc. β. *cam- phor.* Scr. i. *succi citri, aceti rosacei*, an. lib. β. *aq. scabios. acetos.* an. lib. i. Destillantur f. a.

Non solum autem assumenda sunt talia Alexiphar- maca, sed & extrâ regioni cordis & pulsibus idonea medicamenta applicanda, Formulæ iam supra propo- sitæ fuerunt, quas toties repetendas non censemus. Commendatur inprimis extractum Cordiale, seu Aqua pro Epithemate Cordis in Dispensatorio Norimber- gensi descripta.

Commendatur etiam in hoc morbo, vt & in aliis fe- bribus malignis, sequens candela, pro spiritibus con- seruandis & malignitate expugnandâ, si eius accensa fumus ore, naribus, & sub axillis, imo toto corpore ex- cipiatur. Paratur autem hoc modo.

℥. *Thuris albi* Drach. vi. *thuris nigri*, Vnc. i. *succini albi, flauis, myrrh.* an. Vnc. β. *camphor.* Drac. ii. *C. C. Augu- sto capiti*, Drach. vi. *angelic. pimpinell.* an. Drac. ii. *cer. ʒ. i. fila ex cannabe num. iii. ex serico, auro, argento*, an. num. ii. F. f. a. Candela.

Cùm autem iape accidat, vt primâ vice malignitas tota expugnari non possit, humores vitiosi relictî etiam per diuretica expellendi sunt. E quibus tamen ea eligenda aut admiscenda sunt, quæ simul maligni- tati resistere, humoresque alterare valent. Paranda sunt ergò ea ex semine Napi, Citri, cum seminib. Me- lonum, radicib. fœniculi, scorzonera, graminis, cardui bened. cum *Syr. acetosif. citri & limonibus*, spiritu vitrioli.

Dixta talis sit, qualis in febribus malignis exposita, *Dixta* nimirum, vt Galenus, 1. *aphor.* 17. scribit: Si vires labo- rantis sint debiles, & ea quæ in corpore est dispositio, sit ex corruptione humorum vel defectu, parum alimenti talibus sæpe offeramus. Et quidem ipsa ali- menta propter putredinem siccant, propter febrem refrigerent, inprimis verò sint cordi amica, & ma- lignitati resistent. Cibi ergo condiendi succo acetosæ, pomorum aurantior. citri, granatorum, aquâ scorzonera, acetosæ, rosarum, aceto tunicis, rosarum, Vinum

Vinum huic morbo valde noxium; vt & cereuisia potens. Potus conueniens decoctum cornu cerui vel hordei cum citri succo, granatorum, oxysaccharâ, spiritu vitrioli. Vel paretur tale Iulapium:

*℞. Aq. fontana coct. pura, vel decocti, C. C. lb. iii. Iulepi rosar. Vnc. iv. spirit. vitriol. rectific. vel succi citri recentis, q. s. ad gratiam aciditatem.*

Symptomata, quæ in hac febre occurrunt, & de quibus mitigandis nonnulli prolixè tractant, quod atinet, cum pluribus febribus, non solum malignis, sed & aliis sint communia, de iis hoc loco non agimus.

## CAPVT XV.

## De Sudore Anglico.

Sudor Anglico.

Sudor Anglico oritur & in Angliâ.

**E** Malignarum febrium numero etiam est sudor Anglicus, quem & hydropyreton, ac febrem sudatorium, à loco, in quo cœpit, & sudoribus copiosis, qui has febres comitabantur, appellabant. Nam in Angliâ cœpit Anno 1486. & 40. ferè annis Anglis fuit familiare & perpetuum hoc malum, vt quamuis brumali frigore nonnihil intermitteret, postea mox iterum reuenteretur: tantamque in Angliâ, antequam de certo remedio constaret, hominum multitudinem è medio sustulit, vt vix crederetur à tantâ hominum copiâ illam Insulam inhabitari. Ex Anglia per inferiorem Germaniam, Belgium, Hollandiam, Zelandiam, Brabantiam, Flandriam, Daniam, Norvvergiam, Galliam, ab anno 1525. vsque ad annum 1530. disseminatum est hoc malum, & præcipuè autumnò sæuiit. Tanta fuit febris huius malignæ initid trulentia, vt quamprimùm urbem aliquam inuaderet, singulis diebus quingentos aut sexcentos occuparet, & ex ægris primò vix centesimus quisque euaderet. Correpti enim statim, sine bubone, carbunculo, exanthematibus, languore dissoluebantur, & animo deficiebant, cum summo virium languore, inquietudine *καταδωμῆς*, capitis dolore, pulsu crebro, celeri, inæquali, cordisque palpitatione maximâ, quæ nonnullos, qui ex hoc morbo euaserant, per duos vel tres annos, nonnullos per omnem vitam comitata est. Sudore verò dissoluebant perpetuo & copioso, qui non finiebatur, antequam morbus solueretur; quod intra 24. horas contingebat. Nam qui sudorem non proliciebant, neque cardiacis utebantur, & qui impatientius calorem ferebant, auramque frigidam captabant, ii omnes subitò intra 24. horas moriebantur. Postea ubi huius morbi curatio innotuit, vt ægri sudores elicerent, ac cardiacis se munirent, pauciores moriebantur.

De naturâ sudoris Anglici.

De naturâ huius febbris variæ fuerunt apud authores dissensiones. Nonnulli hanc febrem antiquis planè incognitam fuisse statuebant; quorum sententia planè absurda non est. Etsi enim ad malignarum febrium à Medicis antiquis descriptarum speciem aliquam referri possit, tamen nulli apud antiquos determinatus hic malignitatis gradus fuit cognitus, aut certè non descriptus. Nonnulli ad febres ephemeræ referebant, quod 24. horarum spatio solueretur.

Verùm falsa planè hæc est opinio. Nam cum ephemeræ propriè dictæ saltem ex spirituum incedio fiant, nullo modo hæc febris ad eas referenda est. Cum enim eam sudores copiosissimi & multa pessima symptomata comitata sint: inde facillè colligere est, spiritus non solum incensos, verùm & ipsos humores tenues ac calidiores affectos & corruptos esse. Et licet 24. horarum spatio hæc febris solueretur: non tamen idè ad Ephemeræ referenda est; sed inde potius maxima inter naturam & inter morbum pessimum colligitur pugna.

Dan. Sennerti Tom. II.

Nonnulli ad Cardiacas febres: alij verò ad Colliquatias, de quibus mox dicetur, referebant: Quidam non incommode illis febribus accensebant, quas Galenus, *aduersus Lycum. c. 2. ἐλάσσει* nominat. Vt sit, certum est malignitatem in hac febre imprimis obfedis & corrupisse spiritus & subtiliorem sanguinis partem. Ideoque natura adhuc fortis mox expulsionem illius materiæ aggressa est, feliciterque eam perfecit: modò illam in opere ægri admissione frigidi aeris, non interrumbarent.

Causa huius febbris proculdubio fuit maligna & *Causa.* venenata aliqua aeris constitutio, spiritibus & subtiliori humorum parti ac cordi inimica. Leuinus Lemnius, *lib. 2. de Complex. c. 2. ex victu & lautis mensis cibi que affluentia, & continuo vini Cretici vsu originem habuisse scribit.* Sed parum probabiliter: cum & alibi causæ hæc reperiuntur, nec tamen hanc febrem inducant, neque istæ causæ toti plebi communes sint. Ergo, vt dictum, potius ex peculiari aeris corruptione malum hoc deducendum est, quod vel illud arguit, quod in plurimis Belgij locis cum aëre nebuloso morbus hic homines inuasit. Sicut ex observationibus Ioh. Tyengij, Medici Amstelod. refert Forestus. *lib. 6. Observation. obseruat. 7. in Scholio.* Amstelodamum, 20. Septembris Anno 1529. post prandium, per aërem quendam nebulosum hoc malum intrasse, & ibi tantum per quinque dies grassatum fuisse; post quintum verò diem euauisse, neque amplius in eâ vrbe visum fuisse. Confirmat idem & illud, quod Ioachim Schillerus, *de Peste Britannicâ*, scribit, Aues sub arboribus peste correptas & interemptas passim repertas fuisse, & abscessus sub alis, cicericis instar, habuisse.

Qualis autem illa corruptio aeris fuerit, aut vnde originem habuerit, non facile inuenire est. Hieron. Fracastorius, *lib. 2. de morb. contag. cap. 5. in solitione*, quod gypseum est, à quo certis constitutionibus subtilissimi & corrupti humores atrollantur, causam refert. Verùm probabilius est, ex præcedente cœli & regionis humiditate morbum hunc originem habuisse; accedente tamen imprimis peculiari aliquo siderum ad hanc corruptionem influxu.

## Febres Colliquatiae.

Sudori Anglico, vt diximus, cognatæ sunt febres *Febres Colliquatiae.* antiquis Colliquatiæ dictæ, quæ & ipsæ inter malignas habentur. Etsi enim colliquatio febribus pestilentibus propria non sit, sed etiam aliis ardentibus accidat, neque etiam in omnibus pestilentibus adsit, tamen valde familiaris est pestilentibus febribus.

Hic autem notandum, Colliquationis vocabulum *Colliquatio quid.* hoc loco non satis propriè accipi, quod Galenus ipse non diffitetur, quando 3. *de causis Symp. cap. 2.* scribit: *Fit quedam σπινθηρ sine ἀνάλωσι dissolutione, aut quomocunque libet appellare, aliquando totius corporis, aliquando humorum duntaxat, qui in venis continentur.* Ea enim propriè dicuntur liquari, quæ à frigore concreta sunt, & ex concretis humida & fluxibilia fiunt. Partium autem substantia, cum à frigore concreta non sit, propriè non dicitur colliquari, sed potius extenuari & dissolui. Calorque æstuosus, à quo corpus emaciatur, non ipsam substantiam liquat, sed quod partium proximum alimentum esse debebat, absunt. Potest & vocabulum colliquare accipi cum Galeno, *de fac. nat. libro 1. capite 13. & 2. aph. 37.* pro eo, quod est in humorem soluere, quâ ratione medicamenta purgantia, si humorem proprium non nascantur, corpus colliquare dicuntur.

Colliquatio autem hæc aliàs fit insensibiliter, & id, quod colliquatur per ἀδρῶν διασπολὴν discutitur; aliàs sensibiliter accidit, & id, quod dissoluitur, vel ad ventrem confluit, vt hac de re scribit Galenus, *lib. 3.*



*de caus. sympt. capite 2.* vel ad renes vel per sudores expellitur. Succis quidem, qui in venis sunt, in serofam saniem solutis, renes, qui ad excrementum id trahendum sunt nati, potissimum cum sani sunt, serofum quidem à venis expurgant, fluxionem autem ad vesicam assidue mittunt. Vbi autem renes trahere non valent, aut venæ huiusmodi serum in ventrem mittunt, aut toti corpori id partientes, subitaneos, hydro-pum statim inducunt. Si verò, quod liquatur, crassum sit, quales renes trahere non possunt, totum in ventrem necessariò confluit.

Calor, qui hanc colliquationem efficit, igneus est; cuius duos gradus rursus constituit Galenus. Vnum, quo pinguedo; alterum, quo caro colliquatur aut potius extenuatur. Et hic longè est vehementior, ille moderatione. Exercet autem calor iste vehemens vires suas facilius in corporibus molli carne & adipe præditis: qui verò habent corpus durum, vix sensibilem colliquationem pariuntur. Vnde & corpora iuuenum facilius colliquantur, quam senum.

#### *Curatio Sudoris Anglici,*

Etsi autem morbus iste ferè intra seculum conspectus non sit, tamen cum morbi tales epidemij interdum recurrere soleant, quâ ratione curatus fuerit, dicendum, Tota autem curationis ratio in veneno debellando, & sudore proliciendo, sita erat. Etsi enim hic morbus satis periculosus esset, ut plerique eo morentur, tamen minus erat lethalis, iis, qui rectè tractabantur. Etenim in omnibus venenum à naturâ ad ambitum corporis pellebatur, & per sudorem 24. horarum spatium eiiciebatur. Quâ in re Medici rectè naturam imitabantur, & proinde ea, quæ venenum retunderent, & sudorem elicerent, exhibebant. Itaque in primis dabant operam, ut ab omni aëris afflatu ægrum prohiberent, & propterea non permittebant, urinæ reddendæ causâ à lecto se mouere, nec manum pulsus explorandi gratiâ exercere. Nam quos frigidus aër afflabat, iis venenum ad interiora recedebat, iique summopere periclitabantur. Studebant quoque, ne ægri in lecto situm mutarent, aut se detegerent; aut si in lecto se mouerent, adstantes vnicè id agebant, ut vndique corpus ab externo aëre rectum esset: quam molestiam qui ferebant, Fracastorius refert, mercedem laboris reportabant, & euadebant: qui verò ferre non volebant, sed decubitus mutabant, nouum aërem aucupabantur, impedito sudore, suâ causâ peribant.

Monuerunt tamen docti Medici, ut in corpore tegendo, pro virium & naturarum diuersitate, modus obseruaretur, ne nimio lectorum onere & calore ægri suffocarentur. Nam si vires constabant, planissime & copiosissime sudor erat proliciendus: si verò summe essent languidæ, ita moderandus, ne vires planè deicerentur. Referunt enim authores fide digni, nimio sudandi studio magnam hominum partem tum suffocatam fuisse. Cum enim maximam in sudore salutis spem esse, atque eius beneficio 24. horis ægros conualecere viderent; ipsi adhuc sani, se mutuo adhortabantur, ne se negligerent vrgente morbi vehementia, nec, victi precibus, se ante tempus liberarent. Hinc factum, ut postea ægri violenter operati, etsi misere clamarent, obtestarenturque Deum atque hominum fidem, ut sese dimitterent, seseque suffocari iniectis molibus iurarent, assistentes nihilominus has querelas ex delirio proficisci persuasi, vrgerent, & lectis continerent ægros usque ad horam 24. & ita plurimos suffocarent.

Et cum ægri etiam ad somnum nimiam inclinationem haberent, ægris, donec sudor cessaret, & symptomata remitterent, tumorque manuum euanesceret, concedendus non fuit: sed colloquijs & alijs mo-

dis auertendus, ne venenum ad cor renocaretur.

Vtebantur autem ad sudorem ciendum & malignitatem rerundendam feliciter aquâ acetos. scabios. terrâ sigill. bolo Arm. dictamno, &c. Laudatur & sequens Electuar. de quo Drach. ij. vel iij. exhibeantur cum Aq. scabios. acetos. cardui ben. & aceti parte dimidiâ.

*℞. Spec. liberant. Drach. ij. Corallor. præpar. Margar. præp. an. Drach. j. s. cortic. citri. rad. tormentill. an. Scrup. ij. flor. sulphur. Scrup. s. theriaca Drach. j. s. syr. acetos. citri. q. s. F. Electuar.*

Tyengio, Medico Amstelodamensi, ut refert Forestus, hic potus ad sudorem ciendum familiaris tum erat,

*℞. Flor. nymph. violarum, an. M. s. cardui ben. pimpinell. borragin. bugloss. passular. enucl. an. P. j. ficum num. x. lentium excortic. lacca abluta, an. Drach. v. stragacanth. Drach. iij. Zedoar. distamni, radic. tormentill. an. Drach. i.*

Coq. in s. q. aq. Nymphae & Bugloss. F. Potus, qui alterat humores, membra inflammata humectat, venenum è corpore per sudores expellit, spiritus recreat. Ideoque frequenter, & quoties ægri calore nimis vrerentur, potumque appeterent, de eo aliquid propinabat.

Inter sudandum ægri reficiebantur succo & syr. citri, granator. acetos. & alijs, quæ supra in peste curandâ descripta fuerunt. Odoramenta quoque conuenientia adhibebantur, & naribus admouebantur, ut:

*℞. Aq. rosar. Vnc. iij. aceti Vnc. i. caryophyll. santal. citrin. an. z. s. Misceantur & lento igni in conclaui euaporent. Vbi sudauerit æger satis copiosè, sensim de tegumentorum onere aliquid tollendum, sudorque tandem diligenter abstergendus.*

### C A P V T XVI.

#### *De Febre maligna cum spasmo.*

**M**Alis hisce meritò accensemus & illum morbum, <sup>Febri cum spasmo.</sup> qui Anno 1596. & 1597. in Episcopatu Coloniensi, VVestphaliâ, Comitatu VValdeccensi & VVirtensteinensi, atque Hassa grassatus est; quem tum vulgò *die Kriebelkrankheit, Kriempffsicht, oder ziehende Seuche* appellârunt, conuulsionibus, veterno, delirio ac mentis alienatione, nunc cum febre, nunc sine febre, homines grauissimè affligens. Qui hoc morbo corripiebantur, vellicationem aliquam in membris extremis sentiebant, modò in manibus, modò in pedibus, modò in manibus & pedibus simul, nunc in vno latere, nunc in utroque, quasi membrum formicis plenum esset & stupore corriperebatur. Post hanc vellicationem digiti in manibus & in pedibus conuellebantur, & vel contrahebantur vel extendebantur: & hæc conuulsio, sumpto ita ab extremis partibus principio, serpebat quasi in cubitum, genua, humerum, coxendicem, totumque corpus, donec ægri instar globi alicuius, conuulsi aut rectà extensi procumberent; quæ conuulsio nunc vno modo continuò durabat, nunc permutabatur, & nunc breuius, nunc longius perseuerabat. Cum conuulsione & spasmo isto acerbissimi dolores erant coniuncti, qui ægros ita torquebant, ut per longa locorum intervalla clamores & eiulatus miserissimi audirentur. Tam subito sæpe hoc malum inuadebat, ut nonnullis mensis assidentibus cochlearia vel cultros è manibus excuteret, & ipsi mox conciderent, atque aratores post aratrum subito procumberent, cum antea nihil mali sensissent. Nonnulli quoque, cum eos primùm malum inuadebat, vomere solebant. Atque hi affectus per aliquot dies, nonnunquam & septimanas, in membris exterioribus perseuerabant, neque caput afficiebant, si remedia idonea tempestivè adhiberentur. Si verò remedia non adhiberentur,

rentur, ipsum caput etiam afficiebatur, & ægri Epilepsiâ corripiebantur, & omnem sensum amittebant. Post paroxysmum hunc nonnulli ad sextam vel octavam horam vique immoti quasi apoplexiâ correpti, iacebant, vt à nonnullis pro mortuis haberentur: Aliqui amentes reddebantur, alij verternosi, aliqui deliri; & quidem deliriorum varia erant genera pro humoris abundantis ratione. Durabat autem hæc mentis alienatio in nonnullis quatuor dies, in aliquibus longiori spatio: quæ tamen vbi cessabat, vel auditus difficultatem vel visus debilitatem relinquebat; alij verò planè paralytici euaserunt. Cessante paroxysmo fames præternaturalis omnes ferè corripiebat, cibosque auidè & eos varij generis appetebant, vt vix saturari possent. Postea omnibus ferè fluxus alui superueniebat, & quò parcius cibo utebantur, eò copiosius aluius fluebat. Plerisque tandem pedes & manus intumescabant: nonnullis tubercula seroso humore plena erumpebant. Sudores verò non promanabant. Neque contagio carebat hoc malum. Experientia enim docuit, ex iis, qui diu & cum multis ægris in domo aliquâ conuersati sunt, rarò aliquem impunè euasisse. Neque tamen malum hoc statim sese exeruit, sed sæpe post sex, duodecim, aut plures etiam menses: obseruatumque, nonnullos in domo aliquâ per annum aut duos etiam sine vllò damno cum ægris conuersatos, tandem tamen & ipsos isto morbo correptos fuisse. Et vt leuissimus, ita curatu difficillimus fuit hic affectus. Qui enim epilepsiâ corripiebantur, vix integrè eâ liberabantur, sed per intervalla subinde aliquid mali recrudescebat. Ita qui amentes aut deliri fiebant, stupidi vique ad mortem permanebant, neque pristinum mentis vigorem vnquam recuperabant. Et licet post morbum hunc nonnulli ad 15. annum superstites fuerint: singulis tamen annis, mense Decembri & Ianuario, aliquid mali sentiebant.

Causa.

Ortum autem habuit hoc malum procul dubio ex pestilentibus ichoribus, & malignis vaporibus nervos & cerebrum inprimis vellicantibus. Nam ista, quæ modò recensuimus, symptomata non rarò peste infectis superuenire solent, vt docet Cardanus, lib. 2. de subr. Valleriola; libro 3. Loco. com. capite 18. Petrus Salius Dinerlus, de Pest. cap. 5. Idem & curatio docet. Nam medicamenta, quæ tùm cum comodo adhibebantur, ex Cephalicis & Alexiteriis composita erant. Malignus autem ille vapor & humor ortum habuit ex victu prauo, dum, ob annonæ caritatem, panem non bonum, fructus corruptioni obnoxios, fungos & id genus alia, ad explendam famem, pauperes deuorabant. Ex quo victu prauo vitiosos humores in corpore colligi necesse est qui temporis diuturnitate peiores redditi, tandem malignam hanc & inprimis nervoso generi ac cerebro inimicam vim inducebant.

Historiam autem huius morbi & curandi eum rationem edidit tùm Facultas Medica in Academia Marpurgenfi. Ex eo ergò tractatu remedia, quæ cum ægrorum comodo tùm exhibita fuerint, breuiter recensibimus.

In mali autem huius grauissimi Curatione ad duo præcipuè respiciendum fuit Medicis, vt vitiosa & venenata materia tolleretur, & nervi debilitati confirmarentur. Quantum ad primum scopum, cum ex certis indiciis deprehensum fuerit, fontem vitiosæ materiæ circa primas vias, ventriculum scilicet, Hepar, & Lienem, & venas partibus hisce vicinas hære, purgatio necessaria fuit. Quem in finem tale Electuarium Medici Marpurgenes tùm ordinârunt.

℞. Diaphenici solidi, Vnc. iiii. elect. de succo rosar. Vnc. ii. pulu. hermodact. mund. turbit. albi, esula mund. & correct. an. Drach. i. diagryd. castor. an. Scrup. ii. costi zinzib. caryophyll. an. Scrup. i. sem. ruta, cumini, croci, an. Scrup. β. Cum Syr. rosar. solut. F. Electuar.

Dan. Sennerti Tom. I I.

Antidotum autem conuulsium hoc est.

℞. Rad. pœonia, visci querni, an. Vnc. ii. castor. salua an. Vnc. i. bacc. lauri, cranij hominis præp. an. 3. ii. theriaca. muhrdat. an. Vnc. xii. melis despumatis. lb. ii. F. Electuar.

De Electuario purgante exhibita fuit Vnc. β. idque ter repetitum. Quatuor à sumpto pharmaco horis sumpsit æger iusculum, in quo cocta vel macerata fuerunt rosmarinus, serpillum, iatureia, salua. Purgatione peractâ, totum mentem, alternis vicibus, sequentibus medicamentis vtendum fuit. Primò sex continuis diebus sumpsit æger de puluere conuulsio 3. i. Est autem hæc descriptio.

℞. Rad. vincetoxici, helenij, succisa, caryophyllar. pœonia. an. Vnc. i. sem. bacc. lauri. Vnc. i. summitat. salua, serpilli, flor. rorismar. an. Drach. ii. spec. diamoschi dulc. pliris archont. dianthos an. Drach. i. β. F. Puluis.

Postea die post quadraturam Lunæ, Plenilunio vel Nouilunio, iterum Electuarij purgantis 3. β. sumpsit. Hinc iterum vsus est puluere conuulsio, vique ad proximam lunæ phasin. Die verò intsequenti rursum Electuarium purgans vsurpauit; idque, vt dixi, per mensem continuauit, donec melius habuit. Postea verò singulis mensibus, præcipuè Decembri & Ianuario, quibus hoc malum semper exacerbatum maximè fuit, ante Nouilunium sumpsit 3. i. de puluere conuulsio. Potus fuit, medicatus è radicibus helenij, pœoniæ, saluiæ, rutæ, baccis iuniperi.

Ipsa verò membra vt roborarentur, tota spina dorsifillita fuit oleo Lumbricorum, Vulpino, Castorei. Eodem modo vncta omnia membra affecta. Linteo quoque calido fricabantur, & postea spiritu vini, in quo flores primulæ veris, Lauendulæ, Salua, Ruta, Beronica, Castorium, macerata fuerant; vel spiritu vini & aquâ Lauendulæ mixtis, illinebantur. Et si spasmus in pedibus esset vehemens, Lotiones pedum instituebantur, ex betonicâ, serpillo, floribus chamæmeli, Primulæ veris.

In ipso autem paroxysmo membrum affectum spiritu vini, modo iam dicto illinebatur, & linteo calido fricabatur: Ac si dolor non cessaret, vinculo arctè ligabatur, donec vapor malignus, spasmus causa, dissiparetur. Simul verò exhibebatur vel de puluere conuulsio Drac. i. vel de Antidoto Vnc. sem. Die verò sequenti dabatur Electuarij purgantis Vnc. sem. & postea cura dicto modo continuabatur.

## CAPVT XVII.

### De Catarrho & tussi epidemiâ malignâ.

**I**N Febrium Malignarum catalogum meritò & illa adscribitur, quæ cum catarrho & tussi epidemiâ, anno 1580. sub Sirij ortum, maximè autem circa nouilunium æquinoctij autumnalis, totam penè Europam, imò ferè omnes mundi regiones peruagata est; & hinc inde varia nomina accepit. Appellabatur enim catarrhus febrilis, febris catarrhosa, febris suffocativa, catarrhus epidemius, tussis epidemia, cephalalgia contagiosa. Germani nominabant denzief, den Schaffschusten, die Schaffkranckheit, das Hünervenne, quòd ægri instar gallinarum coryzâ vexarentur.

Inuadebat hoc malum cum dolore capitis & calore febrili, nonnullos infestauit perpetua in somnum propensio, vt in peste fieri solet: alios vigilæ tenebant: mox sequebatur tussis sicca, dolor pectoris, & præcipuè septi transversæ, faucium asperitas, ventriculi languor, tandem grauis anhelitus, qualis solet animaduerti in iis, qui morti sunt vicini. Et quamuis tussis non diu durabat: tamen illa anhelitus difficultas addiem 14. extendebatur, nonnullis sudor superueniebat, qui die 30. vel 40. conualecebat: atque hi

Catarrhi  
epidemij hi-  
storia.

non multum expectorabant, sed materia sudoribus consumebatur, aliis per aluum, aliis per urinam exercebatur. Et quamvis maxima hominum pars hoc malo corripiebatur: omnes tamen ferè euadebant, & vix millesimus quisque moriebatur: nimirum ij, qui vitia quædam diuturna & latentia in visceribus habebant, & qui sanguinem apertâ venâ mittebant. Experientia enim hoc comprobavit, omnes ferè mortuos esse, quibus vena aperiiebatur; ferturque, Romæ ultra 2000. hominum hoc malo extincta esse; fortassis & hac de causâ, quod Itali Medici, (ita enim hac de re scribit VVierus) nimis prompti sunt ad mittendum sanguinem, & saltem ad calorem febrilem, minus verò ad malignitatem & latens venenum attenti sunt.

Causa.

Causam huius mali referunt plerique in catarrhum epidemium, qui ortum habuerit ex constitutione humidâ annorum præcedentium, & diuturno Austri statu. Quantum enim incommodi afferat, & quantum humores corrumpat hæc aëris constitutio, satis ex lib. 3. Aph. & epid. Hipp. atque aliis locis patet.

Non tamen solum Anno 1580. febrem istam grassam crediderim: sed si observationes superiorum temporum in promptu essent, proculdubio sæpius, etiamsi non semper eodem modo, grassam esse deprehenderemus. Post illud tempus anno scilicet 1591. in plurimis Germaniæ locis, etsi non eadem planè facie, conspecta fuit febris catarrhalis.

Similem tussim epidemiam, quæ Anno 1557. populariter grassata est, descripsit accuratè Vallerio: in *App. loc. Comm. cap. 2.* refertque, eundem morbum ante etiam Anno 1510. viguisse. Descripsit eundem morbum Forestus *lib. 6. observ. 1.*

Quomodo autem febris ad catarrhum sese habeat, consideratione dignum. Plerique quidem statuunt, materiam catarrhalem in venas per totum corpus diffundi & hinc febrem ex humorum putredine accendi, vel quia humor in venas prolapsus ibi putredinem concipit, vel quia obstructionem in iis efficit. Fieri tamen etiam potest, ut febris sit morbus primarius, eaque sæpe maligna, in quâ sicut in aliis febribus comitatis, ita hic etiam natura partem humoris, à quo molestatur, per hanc viam è corpore eicere tentat. Idque in catarrhis epidemiis frequentissimè accidere puto.

An sint plures  
quàm tres  
februm differ-  
rentiæ.

De Catarrhis cum febre peculiarem habet opinionem Ioh. Zechius, *consult. 52.* quæ hic prætermittenda non videtur (etsi potius ad febres catarrhales in genere, quàm malignas pertineat) statuitque præter tres vulgares februm differentias, ephemeram, putridam, hæcticam, quartam se inuenisse à nemine hætenus observatam, quæ sit febris continua, uniformis sine ullâ exacerbatione, pulmonum, thoracisque immodicum calorem citra putredinem consequens: Calorem autem accendi statuit ob aëris inspirati inopiam culpâ angustiarum vasorum. A calore verò hanc febrem accendi; cum quia pulmones calefacti calorem cordi immediatè communicant, tum quia aërem quantumcunque frigidum inspiratum ita excalefaciunt, ut cordi quantum satis est refrigerando minimè sufficiat. Verum vix possibile est, ut hoc modo febris excitetur, cum etiam in aliquâ angustia calor in pulmone adhuc ventilari possit, ne febrem accendat; neque videmus in asthmaticis hac de causâ febrem accendi. Et sit sanè, ut hoc modo febris accendatur: tamen non video, cur non ad vulgatas differentias referenda sit. Nam calor ille corpori inhærebit, vel *καὶ ἐν τῷ* vel *ἐν τῷ στήθει*. Si prius, erit hæctica. Si posterius, vel fouebitur à calore spirituum, & erit ephemera, vel humorum, & erit putrida. Neque enim credibile videtur, ut ob angustiam vasorum pulmonis tantus calor in pulmonibus excitari possit, qui febrem in toto accendat, ut non simul humores putrescant. Etsi enim excrementa, quæ è pulmonibus eiciuntur,

sint alba, id tamen non sufficit ad demonstrandum nullam adesse putredinem, cum & in pleuriticis sæpe album sputum reiiciatur. Neque ipsam pulmonum substantiam statim putrescere opus est.

Malignæ quoque eæ febres sunt, quas Angina, pleuritis & peripneumonia comitatur popularis. Et notissima est ea, quæ Anno 1564. & 1565. plurima Germaniæ inferioris loca Rhénique accolæ inuaserat. Ita autem hoc malum ortum habuit. Præcesserat anni præcedentis constitutio humida, hyeme sæpe in cælo conspectæ fuerunt stellæ cadentes, sagittæ ardentes & similia, quæ & totâ æstate, durante hoc malo, visa sunt. Et primò quidem hyeme oriebantur tumores phlegmatici, in collo sine insigni dolore; Vere postea & æstate superueniebant Anginæ valde periculosæ & pestilentes, quarum malignitate alij primo, alij tertio, alij quarto die moriebantur: qui octauum diem attingebant, omnes euadebant. Adoriebatur autem hoc malum homines cum febre, lingua intumescens, aëri, cibo, potuique aditus præcludebatur. Vnde ægri miserimâ morte suffocabantur. Extrâ in collo nullus tumor apparebat, præter aliquam rubedinem, similem phlegmonæ illi erysipelatodi, quam Rosam vulgò appellant. Sæpe accidebat, ut tumores illi collo & faucibus desertis ad inferiora tenderent, & intersepimentum illud thoracis occuparent; unde ex Anginâ oriebatur pleuritis non minore cum periculo coniuncta, quàm ipsa Angina. Nonnunquam etiam in ipsos pulmones irruerat materia; unde peripneumonia. Interdum & deserto thorace dorsum occupabat, atque in eo intolerabiles dolores excitabat. Præcipuè hoc accidebat fœminis, quæ menstrua patiebantur. Et tales omnes ferè moriebantur. Quod ex eo factum esse videtur, quod per venam canam propinquam sanguis infectus fuit, & purgatio illa menstrua agitatæ humoribus in totum corpus concitata. Hi morbi epidemij etiamsi asperissimo hyemis frigore superueniente minuerentur: tamen malum hoc in pestilentem pleuritidem est mutatum æstate sequenti. Cum febre continuâ, dolor in vno loco primum hærebat, postea totum pectus occupabat, præcipuè si topica dolori leniendo applicarentur; & ad pulmones materia serpebat, iisque repletis tussis cum ipso cruento accidebat, & quod copiosius ac facilius materiam expectorabant, eò magis periclitabantur, & ferè omnes circa finem sexti diei moriebantur. Qui autem nihil sanguinis expuebant, nonumque diem attingebant, euadebant, nisi in morbum reciderent: tunc enim ante finem tertiæ septimanæ moriebantur.

Idem mali genus sæpius grassatum esse, ex observationum Medicarum lectione patet. Anno 1348. sæuissimam pestem cum sanguinis sputo viguisse varij referunt, quam his versibus describit Fracastorius:

*Bis centum fluxere anni, cum flammea Marte  
Lumina Saturno tristi miscente, per omnes  
Aurora populos, per que rigat aquora Ganges,  
Insolita exarsit febris, que pectore anhelò  
Sanguinem sputum exagitans, miserabile visu,  
Quarta luce frequens fauo perdebat acerbo:  
Illa eadem Assyria gentes, & Persidos, & qua  
Euphratem Tigrimque bibunt, post tempore paruo  
Corripuit, ditæque Arabes mollemque Canopum,  
Inde Phryges, inde & miserum trans aquora vecta  
Infecit Latium atque Europâ sanis omni.*

Peripneumoniam talem pestilentem etiam grassam esse Anno 1557. menle Octobri, refert Dodonæus, *lib. obs. Med. cap. 21.*

Sed ut hæc concludamus, nihil, ut supra dictum, ferè Symptomatum & malorum est, quod non cum peste & malignis ac Pestilentibus febribus interdum coniungatur. Vnde accidit, ut illi morbi varia à Symptomacibus



promatibus & affectibus maximè urgentibus accipiant nomina. Quæ omnia inde oriuntur, quòd materia maligna modo cum hac, modò cum illà parte maiorem *av-  
māyeyw* habet, aut eadem ad hanc vel illam partem devoluitur. Ita eadem ad intestina confluenta, dyſenteria nonnunquam excitatur. Qualem Anno 1583. cum febre longe latèque grassatam fuisse ferunt, atque etiam annò 1626. grassatam novimus.

De Febr.  
cum catarrho  
coniuncta.  
De genera-  
tione febris  
catarrhalis  
Triplex eius  
intra non-  
nullos modos.

1.

[Egimus equidem de hac febre, quatenus malignitatem coniunctam habet, *hoc cap.* Sæpe tamen tales febres cum ipsarum, tum popularum grassantur sine malignitate aliqua. De earum ergo generatione sine respectu malignitatis aliquid adhuc dicendum. Nonnulli statuunt triplicem febris cum catarrho generationis modum. Primum modum esse statuunt, cum catarrhus in ventriculum delapsus, coctionem primam vitiat; unde ex pravo chylo pravius sanguis generetur in hepate, qui facilè putredinem capiat, & febre exciter. Secundum modum ponunt, cum materia catarrhi descendens è capite, venas subit, & in iis putrescit. Tertio, cum eadem materia in venas lapsa, eas obstruit, & ita putredinis ac febris causa est.

Examinan-  
tibus.

Verùm nulla causarum harum vera esse videtur. Primam enim quod attinet, sit sane, ex catarrho in ventriculum delabente coctio eius turbari, & pravius chylus generari possit, qui postea in pravius sanguinem mutetur, ut inde febris facilè excitetur: tamen de hac febre hic non quæstio est, utpote quæ diu eandem præcedente & durante catarrho generari potest; sed de hac febre quæritur, quæ aut catarrhum statim coniunctum habet, aut interdum etiam catarrhum aliquo tempore præcedit. Reliqui verò duo modi planè falsi esse videntur. Neque enim credibile, materiam hanc excrementitiam seu in cerebro generari, seu per venas à reliquo corpore in cerebrum effusam, per angusta venarum orificia in venas iterum à natura recipi; cum parentes è cerebro viæ sint, per quas euacuari possit.

Sententia  
Anterior.  
Febris com-  
posita.

Mihi probabile videtur, tales febres ex earum numero esse, quas comitatas appellant. Natura enim humores vitiosos febrim excitantes non semper vsque ad coctionem & crisin in venis retinet: sed ut eorum onere se liberet, aliquam eorum partem vel sensibilibiter euacuat per aluum, vomitum, hæmorrhagiã; vel in loca aliqua deponit, unde fit erysipelas, angina, pleuritis, ophthalmia. Id quod fit, etiam in hisce febribus. Natura enim aliquam humorum partem ad cerebrum depellit, quæ cum sit naturæ molesta, à facultate expultrice cerebri expellitur, unde catarrhi fiunt.]

### Curatio.

Verùm febrim harum omnium curatio convenit in eo, quòd malignitati sit resistendum: in eo verò differt, quòd materia vitiosa nunc hoc, nunc illud membrum petit; unde diversa oriuntur Symptomata, Catarrhi, Tussis, & alia. Membris igitur illis singulariter prospiciendum. Et ut ex. gr. eam febre, quæ anno 1580. cum Catarrho & Tussi passim grassata est, asseram, cum materia febris & Catarrhi cauta in primis viis maximam partem hæserit, medicamenta primam corporis regionem euacuantia, cum summâ utilitate à Medicis præscripta sunt, ut flores cassiæ, Electuar. lenitiu. diacathol. manna, syr. rosar. solut. Fortioribus dabatur Elect. de succo rosar. Atque accidebat, ut corpore satis purgato, plerique intra triduum vel quatrimum conualescerent, nec vllum graue symptoma ampliùs perciperent, modò bonã dietam observarent. Si enim febrilis fomitis maxima pars sublata esset, natura adhuc fortis & parum debilitata reliquum concoquebat & expurgabat. In quibus tamen corporibus magna vitiosæ materiæ copia erat, ij non ita facile conualescebant. Opus ergo erat materiam reliquam alterare & præparare aq. acetos. taraxaci, violar. capill. q. scabios. syr. acetosiratis Ci-

tri & similibus. Postea materiã concoctã iterum instituebatur purgatio. Et tandem vsurpabantur, quæ materiam in capite consentam & ad pulmones ruentem coquerent, incrassarent, absumerent & educerent, Diatragacanth. frig. diamargarit. frig. confect. diatreos, syr. de liliub. de papauere errat. & hortensi, cum aq. Tussilag. violar. & similibus. Looch item sanum & expert. Diacodium Montani. Exhibebatur etiam decoctum filiquarum.

Ex quibus exemplum facilè peri potest, quæ & reliquas febres Epidemias & malignas curandi ratio sit. Primò enim, quis humor vitiosus in corpore, qui malignitatis quasi fomes est, abundet, & quo loco hæreat videndum, isque conuenienti modo educendus. Deinde verò malignitati resistendum, humorque reliquus alterandus. Tandemque si aliquod membrum peculiariter afficiatur, & symptomata in eo præcipuè excitentur grauia, appropriatis illis occurrendum: quod quomodo fieri debeat, ex sequente capite etiam aliquo modo patebit.

Atque hæc de Febribus dicta sint. Et si verò febris ipsa per se grauis morbus non est: vix tamen alius reperitur, cui grauiora accidant symptomata, ut ex iis, quæ hæcenus de febrim omnium naturã & signis dicta sunt, manifestum est. Ac proinde præ aliis morbis, quantum bonum sit Sanitas, monstrare; temperantiam, sanitatis nutricem, suadere; atque à crapulã, morborum matre, dehortari; imò ad pietatem nos instigare potest. Quid aliis febricitantibus animi sit, ego quidem nescio: mihi quas cogitationes febris suggesserit, ex versibus hisce, quos, ante annos non ita multos, per febrim filio meo dictavi, Lector Beneuole, cognosces, & procul dubio, quicumque pius es, eadem mecum sæpe cogitabis. Rectè enim Marcus Eremita scribit: *Σύμβας οδωρὰ μνήμην δὲ παρέχει τῶν σωτηρίων. Et Εἰ μὴ θέλεις ἀποποιῆσθαι, μὴδὲ ἀποποιῆσαι δύλῃ*

*Hospitium est Mundus, non Patria: Munde Valere,*

*Dicendum cunctis mortali lege creatis.*

*Omnibus est calcanda semel lethi via. Verum*

*Quam sorte hac via dissimili calcatur! ad orcum.*

*Quosdam precipitat Mors; quosdam ad gaudia Cæli.*

*Ducit, & aterna transcribit cinibus aula.*

*Hoc, mortalis homo, semper meditare, tuique*

*Conscia corda roga, quò te ductura sit huius*

*Aeternæque illius vite diribitor Mors.*

*Et si non ardes felicia gaudia cæli;*

*Fac tamen Infernum metuas. Non ludicra res est*

*Infernus. Dicam quid sit, per imaginis umbram*

*Vrentis si flamma Febris te forsitan unquam*

*Visit: iam statue hoc tecum, atque hoc rere futurum.*

*Ut toto affligat te anno febris ista, nec ullum*

*Solamen sitis implacabilis adsit, & omnis*

*Deficiat liquor, aut si forsitan vina, Zythumque*

*Vndaque circumstent, siccato nulla palato*

*Gutta tamen placeat. Sis solus, & undique amici*

*Diffugiant, alique, & te lux splendida nunquam*

*Irradiet, sed nox te terreat horrida, & ipsa*

*In nocte horrenda, per flammam perque tenebras*

*Horrendum mixtas, te spectra immania miris*

*Affligant crucientque modis. Non illic mentem*

*Subuertet dolor, & crudas excrescet in iras?*

*An non cuncta timebis, & anxius omnibus horis,*

*Et sortem duram teque ipsum exosus, acerbos*

*Opiabis tandem letho finire dolores?*

*Quòd si tantula ferre nequis, si incerta fugacis*

*Vis morbi in tantum te macerat, & tibi amara*

*Tempora tota siliunt: quid te, quid fiet, ubi omne*

*Æuum vsque infandum aternis cruciabitur pœnis?*

*Namque etenim non istud, Homo, non febris Auernus;  
Sed nec somnium Auerni: imò nec somnium Auerni.  
Vinbra. O quàm longum æternum hoc! quàm dirus  
Auernus!*

*Quare, homo, fac memori hac semper duo mente re-  
noluas,*

*Atque ita mortalis fugientia tempora vita  
Transige, ut æternum potiariis gaudia Celi.*

## CAPVT XVIII.

## De Febrium Symptomatum tollendis.

**S**ed ut ad institutum reuertamur, & tandem huic de febribus doctrinæ finem imponamus, Medici officium est nôsse, quâ ratione symptomata illa, quæ in febribus sæpenumerò occurrunt multa, & non minorem, quàm ipsa febris, ægro molestiam exhibent, tolli aut mitigari possint. Etsi enim & aliis morbis talia symptomata coniungantur, & ab aliis quoque causis oriantur, tamen quatenus a febrili causâ pendent, febriumque comites sunt, de iis hîc conclusionis loco aliquid secundum ordinem partium corporis dicemus.

## Dolor capitis.

Et quidem primò dolorem capitis quod attinet, oriatur, is ex humoribus & vaporibus, vel per venas & arterias, vel ex ventriculo, ipsique subiectis locis, ad caput ascendentes, & vel copiâ distendentibus, vel intemperie atque acrimoniâ meninges & pericranium vellitibus & molestantibus. Is nisi tollatur per vniuersalia, quæ febris aliâ requirit, venæ sectionem scilicet, alui per clysteres & purgantia euacuationem, cucurbitulas & similia: aliæ quoque reuulsiones instituendæ, ut frictiones, lotiones extremorum, ex decocto anethi, chamæmeli, verbenæ, betonicæ, lactucæ, saluæ, violar. &c. In malignis febribus plurimi laudant radices raphani in taleolas incisas, pedibusque sale & aceto prius mundatis appositas, quod vim habeant malignitatem ad se attrahendi: Imò nonnulli occipiti etiam applicant: si vehemens capitis dolor adsit. Videndum tamen, ne eius odore caput repleatur. Alij fermentum cum sapone & sale, foliis caulium inductum pedibus apponunt. Vtilia sunt & hîc vesicatoria, partibus infra caput apposita.

Vbi euacuantia & repellentia præmissa sunt, Topica ipsi Capiti adhibenda, quæ humores & vapores moderatè repellant, simulque alterent, mitiores reddant, & dolorem leniant.

Sunt tamen quædam ex his, quæ capitis dolorem & æstum leniunt, quæ potiùs halitûs illos & vapores calidos attrahendo, quàm repellendo & refrigerando profunt. Qualis procul dubio est camphora. Refertur & à nonnullis huc sedum maius, quod in rectis in maximo æstu & siccitate succo & humore ruget, aëre verò pluuioso flagrescit, quod procul dubio ex aëre halitûs sicciore & pinguiore, quibus nutriatur, attrahat; sicut & Aloë Americana multos annos in nostrorum hypocaustorum laquearibus suspensa durat & viret. Ideoque & succus attrahendi halitûs illos calidos & siccos vim habet, & linteis applicatus febricitantes refrigerat, & cum paucò lacte muliebri mixtus dolores capitis in febribus ledat.

Vsitatissima sunt Oxorrhodina dicta, ex aqua. rosar. oleo rosar. & aceto, quæ passim extant.

*℞. Aq. rosar. Vnc. i. v. fol. salicis, Vnc. i. aceti rosar. Drach. vi. albumen oui vnius, F. Epithema fronti applicandum.*

*Vel ℞. Aq. rosar. Vnc. iii. flor. sambuci, betonicæ, verben. an. Vnc. ii. sem. papau. albi, Vnc. β. nucleor. Perscor. num. vi F. Emulsio, quæ futuræ coronali aut fronti applicetur cum linteaminibus.*

*Vel ℞. Aq. rosar. Vnc. iii. flor. sambuci, fol. salic. an. Vnc. i. anethi, Vnc. β. aceti rosar. Drach. vi. camphor. gr. vi. Misce.*

*Vel ℞. Aq. Verben. flor. sambuci: acac. salicis, an. Vnc. i. β. rosar. Vnc. ii. maioran. anethi, an. Drach. ii. nucleor. Perscorum, num. x. F. Emulsio. Adde camphor. gr. v. Misce.*

*Vel ℞. Nuc. ingland. excort. num. x. Perscorum, amygdalar. amar. an. num. vi. sem. cannab. Vnc. β. papaueris albi, lactuc. an. Drach. ii. Cum Aq. verben. rosar. flor. sambuci. an. Vnc. ii. anethi, aceti rosar. an. Vnc. i. F. Emulsio.*

Si dolor sit vehemens, gr̃num vnum atque alterum Opii addi potest.

Plurimum commendatur etiam radix Rhodia contusa, & cum aq. rosar. capiti imposita; quæ non solum dolorem lenit, sed & caput roborat. Vt.

*℞. Radic. Rhod. Vnc. i. aq. rosar. lb. i. β.*

Coq. ad tertiæ partis consumptionem, atque decocto panni linei madefiant, capiti que imponentur.

*Vel ℞. Flor. violar. rosar. nymph. an. Drach. i. santalor. omn. an. Drach. i. sem. papau. alb. Drach. ii. flor. chamæmeli Drach. i. β.*

Contusa irrorentur aquâ rosar. & Nicotiane, paucò aceto. ac sindoni rubræ inuoluantur, fronti que applicentur.

Medicamentis his etiam commodè nitrum præparatum admiscetur.

*Vel ℞. Ol. rosar. violar. nymphæ, an. Vnc. β. rad. Rhodia Drach. β. succi lactucæ, solani, an. Vnc. sem. Cera q. s. F. Linimentum.*

Efficax est & vnguentum Alabastrinum, inprimis futuræ coronali inunctum, cui aliquid vnguenti populei admiscere licet.

In horum tamen topicorum vsu obseruandum; In principio atque vbi vapores in caput ascendere incipiunt, illud tamen nondum valde replent, & vbi magnus humorum feruor adest, ut periculosa phrenitis metuenda sit, repellentia, corpore tamen prius euacuat, & reuulsionibus præmissis; tutius adhiberi. Hoc enim modo viæ coarctantur, cerebrum refrigeratur; unde vapores non ita faciliè admittuntur. Sunt qui ista repellentia non capiti, sed collo applicant, ut vaporum per venas ascensus facilius prohibeatur.

Verùm vbi humores & vapores iam caput & cerebrum occupauerunt, vel humores ipsi adeò tenues & calidi non sunt: Repellentia & refrigerantia, præcipuè sola, adeò commoda non sunt. Metus enim est, ne humores incrassentur, cerebrumque impingantur: Vnde soporosi affectûs, catarrhi ad pulmones periculose descendentes, atque alia mala oriuntur. Anodyna igitur & moderatè calida, ad discutendos vapores admiscenda sunt, ut Anethum, flores chamæmeli, sambuci, meliloti, betonica, nuclei Perscorum, & similia.

## Vigilia.

Vigilia.

Vigiliæ plerumque doloris comites sunt: nonnunquam tamen etiam sine dolore in febre adsunt. Oriuntur enim vel ex dolore, vel siccitate, quæ ex humore aut vapore calido vel sicco, vel utrâque intemperie prædito dependet. Vnde pleraque medicamenta, quæ dolorem capitis curant, vigiliis tollendis simul idonea sunt. Generalibus ergo præmissis, Repellentia, frictionesque & lotiones pedum adhibeantur, ut:

*℞. fol. salicis, lactuc. nymph. malv. violar. an. M. ii. summit. anethi, M. i. capitem papaueris albi incisurum, lb. vii. Coq. pro lotionem pedum.*

Allumenda quoque, quæ ascensum illum vaporum ætrium & calidorum impediunt, eoque mitigant, cerebrique siccitatem emendant. Detur insculum gallinæ, in quo folia lactucæ ebullierint. Vtilis est & emulsio Amygd. dulc. & sem. quatuor frig. maj. & papaueris albi,

albi, cum Aq. hordei, violarum, borrag. vel aliâ conueniente præparata. Possunt eadem operâ alia quoque vel malignitati resistentia vel refrigerantia & confortantia admisceri, vt iuleb violarum, rosar. rotul. manûs Christi perl. diamargar. fr. &c.

Vt  $\mathcal{L}$ . Amygd. dulc. Vnc.  $\beta$ . sem. melon. excort. Drach. vi. papauer. alb. Drach. iii. decocti hordei lb. i.  $\beta$ . aq. violar. borrag. an. Vnc. iii. F. s. a. Emulsio. Cui addatur Iulebi vel Syrupi violar. Vnc. i. Aut si Electuarium placet:

$\mathcal{L}$ . Conferu. violar. nymph. rosar. an. Vnc. i. caulium lactuc. Ital. condit. Vnc. sem. sem. quat. frig. maj. contus. Drac. i. Cum Syr. Papan. albi. F. Electuar.

Vel  $\mathcal{L}$ . Syr. violar. Vnc.  $\beta$ . papauer. Vnc. i. aq. lactuc. violar. an.  $\mathcal{Z}$ . i. sem. M. Simul verò adhibeantur Topica,

Vt  $\mathcal{L}$ . Cortic. hyoscyami, solani, sedi maioris an. M. i. Coq. in vini, aceti rosacei an. lb. i.  $\beta$ . ad partis quartæ consumptionem.

In decocto calido panni lintei calefiant & capiti applicentur, in dolore & vigiliis.

$\mathcal{L}$ . Vng. populei Vnc. sem. ol. violar. nymph. an. Drach. ii. ol. nuc. mosch. express. Drach. sem. opij Scrup. sem. M. F. Linimentum, quo tempora & nares inungantur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Capit. papan. albi cum sem. num. iii. Contunduntur, & cum Aq. Anethi. Vnc. sem. rosar. an. q. s. Misce in formam pultis, & temporibus applicentur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Aq. rosar. opt. Vnc. i. lactuc. papaueris, an. Vnc.  $\beta$ . st. sambuci, anethi, an. Vnc. i.  $\beta$ . nucl. Persic. num. x. sem. papan. albi, Vnc. sem.

Contundantur & misceantur pro epithemate.

Emplastrum de Lactucâ Nicolai Massæ, futuræ coronali applicandum.

$\mathcal{L}$ . Succ. folior. lactuc. lb.  $\beta$ . semperuini, solani, fl. nymph. an. Vnc. iii. rosar. Vnc. i. sem. aceti vini albi, Vnc. i. farin. hordei, Vnc. i. sem. sem. papan. albi, Vnc. i. hyoscyam. Vnc. sem. F. ad ignem Cataplasma.

Vel  $\mathcal{L}$ . flor. violar. nymph. sambuci, an. P. i. cortic. papauer. mandragor. an. Drach. i. sem. anethi, lactuc. an. Drach. sem. croci, Scr. i. opij, Scr. sem. Contusa ligentur in nodulo.

Vel  $\mathcal{L}$ . Flor. violar. nymph. an. P. ii. cortic. mandrag. Drach. iii. opij, gr. vi. croci, gr. iv. Ligentur in sindone rubrâ. F. Nodulus; qui naribus crebrò admoueatur. Potest idem prius maderieri aq. rosar. lactuc. anethi.

Nonnulli & plantas pedum, & volas manuum vnguento populeo, oleo violar. & similibus vngunt.

Si ista non sufficiant, efficaciora medicamenta adhibenda, vt Theriaca recēs, Philonium, Requies Nicolai, & quod in primis laudatur, Laudanum opiatum. Instante tamen crisi, ab opiatis & aliis somniferis medicamentis abstinendum, ne motus naturæ impediatur. Immo vbi imbecillis est ventriculus, tutius est eiusmodi medicamenta solum ore continere, quàm deglutire. Commodè quoque & minore cum periculo laudanum opiatum clysteribus additur. Ne quoque cerebrum per ista medicamenta nimis refrigeretur, & lædatur, semper aliquid, quod cerebro familiare sit, modicòque calore reliquorum frigiditatem temperet, admiscendum.

### Somnus profundus.

Somnus profundus.

Somnus profundus in quibusdam febris, præcipuè quotidianis, semitercianis, & malignis, oritur à malignis narcoticisque vaporibus cerebrum replentibus, vel nimio narcoticorum in curandis vigiliis vsu. Tollitur is sensum irritatione & reuulsione ac discussione vaporum illorum. Agri ergo colloquiis, vellicatione, strepitu à somno excitentur, & arceantur, ac ligaturis, frictionibus, clysteribus, vapores à cerebro auocentur. Naribus autem admoueatur acetum, vel ruta aceto madida. Vtile quoque est ad primam vel secundam vertebra Cucurbitulas, vel Phœnigmos aut vesicantia applicare, & Theriacâ aut Mithridatio palatum ac labia inungere, quibus aliquid Castorei addi potest. Efficacissima in hoc genere est Confectio Anacardina cum

Aceto scillitico, si febris eam admittat. Fomentum autem discutiens tale esse potest.

$\mathcal{L}$ . Betonic. primul. ver. origani, salvia, ruta, flor. chamam. sambuci, lil. conuall. meliloti, an. M. i.

Insuantur duobus sacculis, qui coquantur in equalibus vini, aceti, & aqua partibus & alternatim calidè capiti apponantur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. angelic. imperator, zedoar. tormentill. diptamn. an. M. i. rosar. rubr. M. ii. maioran. lauecul. an. Dra. ii. aceti, Mens. ii.  $\beta$ . Coq. vase clauso, & decocto linteola maderiant, & capiti imponentur.

Hoc modo vbi caput per dimidiam aut integram horam fomentatum fuerit, diligenter linteis calidis abstergatur, & vngatur ol. chamam. maioran. & similibus.

Licet & sternutationem ciere, quod commodissimè fit radicibus lilij conuallij; vel capiti raso iste pulvis inspergatur.

$\mathcal{L}$ . Zingib. galang. an. Drach. ii. piper. albi, longi, nigri, cubeb. cardamon. nucis mosch. macis, an. Drach. i. sem. spica nardi, castorei, an. Drach. i. F. Pulvis.

Vel vertici sacculus ex floribus chamam. stœchad. Arab. cinam. caryophyll. organ. serpill. & similibus calefacientibus & exsiccantibus confectus apponatur.

Si malum sit pertinacius, phœnigmus ipsi capiti raso applicari potest. Et cum natura soporem grauem per parotides criticè soluere soleat, natura arte adiuvanda est per cucurbitulas & phœnigmos, vel vesicatoria post aures applicata.

### Deliria.

Deliria quoque non rarò in febris accidunt, ex calidis, acribus, & malignis vaporibus, aut tenui ac bilioso humore cerebrum occupantibus, quibus nisi occurratur, simplex delirium in phrenitidem conuerti potest. Itaque præmissis vniuersalibus, huic malo obuiam itur per reuellentia & repercutientia, eodem ferè modo, quo in dolore capitis & vigiliis. Reuellant clysteres, frictiones cucurbitulæ, quæ primò scapulis apponuntur; hinc semper versùs inferiores partes, tandemque ad crura descenditur. Et cum aliàs febres putridæ venæ sectionem requirant, si immineat, vel accidat delirium, ea multò magis necessaria est. Topica, quæ capiti apponuntur, principio sint repellentia; procedente verò malo ea admiscenda, quæ calore tepido feruorem cerebri mitigant, & vapores malignos discutunt, qualia sunt flores chamameli, meliloti, betonic. maioran. Aut si metuitur, ne odoratis hisce caput repleatur, vsurpari possunt, malua, semen fœnugraci, lini. Plerique hinc valdè commendant pullos gallinarum vel columbarum viuos per medium dissectos & capiti impositos. Alij eodem modo applicant pulmones calidos animalium recens mactatorum: qui si refrigerentur, iterum decocto chamameli cum lacte parato calefieri possunt.

### Conuulsiones Epileptica.

Conuulsiones Epileptica nonnunquam satis periculosa, præcipuè in febris malignis & pestilentibus, à venenatis vaporibus aut humoribus meninges cerebri vellicantibus oriuntur. Quod si fiat, acetum rutaceum crebrò naribus admoueatur. Clysteres conuenientes applicentur, deturque aliquid de pulvere hoc, in febris malignis cum Epilepsiâ coniunctis efficacissimo.

$\mathcal{L}$ . Rad. Pentaphyl. tormentill. an. Dra.  $\beta$ . ras. vngul. alci. Drach. i. crystalli præparat. Drach.  $\beta$ . corall. rubr. præparat. margar. præparat. ocul. cancr. præparat. an. Scr. i. smaragd. Oriental. præparat. Drach.  $\beta$ . rad. pœon. mascul. Drach.

Conuulsiones Epileptica.



Drach. i. Fiat Pulvis. Pro ditioribus addantur aliquot grana lapidis Bezoar.

### *Hæmorrhagia narium.*

Si hæmorrhagia narium accidat, equidem si sit critica non est facile sedanda; si tamen sit nimia & vires deiciat, ei succurrendum, ut in Practicâ dictum, & inprimis malignitas, quæ naturam ad hanc excretionem stimulat, impugnanda. Vtilis hîc est syrupus coralliorum sæpe sumptus,

Vel ꝥ. *Succi granator. Vnc. vi. ribes. Vnc. iiii. aq. plantaginis, tormentille an. lb. i. rosar. Vnc. iiii. manus Christi perlati q. s. ad gratam dulcedinem.*

Vel ꝥ. *Succi cydoniorum inspissati lucidi vel minia cydonior. lb. β. corall. rubr. præp. Drach. i. β. santali rubri, cistrini an. Scr. iiii. succini præp. Drach. ii. lapidis hamatis, boli Armeni, margarit. præp. an. Scr. i. cum syr. granator. F. Electuar.*

Vtile est & compositum Sperniolæ pondere gutt. iiii. vel v. cum aquâ plantag. vel tormentill. Laudani etiam opiatu gr. i. in pilulâ vel syr. granatorum exhiberi potest.

### *Tussis.*

*Tussis.*

Tussi, quæ febres quoque comitatur, quâ ratione subueniendum sit maximâ ex parte cap. præcedente dictum. Nimirum conueniunt Syr. papauer. è iuiubis; violar. cum aq. Tussilag. spec diatrag. frigid. ut in febre malignâ.

ꝥ. *Diacodij Montag. Vnc. sem. syr. viol. Drach. x. aq. papau. errat. Vnc. i. sem. spec. diatrag. frig. Drach. i. M.*

### *Lingua ariditas.*

*Lingua ariditas.*

Lingua etiam in febribus sæpe arida, nigra & aspera redditur; quandoque inflammatur, quam affectionem Germani *die Brenne* appellant; nonnunquam lento quodam humore obducitur; id quod accidit ex vaporibus & fuliginibus linguam faucisque adeo exurentibus, ut salialis humiditas absorbetur. Qui quidem vapores si minùs calidi minùsque copiosi sint, solum siccitas excitatur; si valde calidi, sicci & copiosi, lingua præterea aspera & nigra redditur. Imò nonnunquam quasi fiaditur. Si iidem vapores ex crudo, crasso, lentoque humore ortum habuerint, circa linguam, dentes ac fauces hærent, & lentore quodam linguam obducunt. Imò hæc mala non solum linguam occupant, sed interdum & œsophagum totum vsque ad os ventriculi.

Huius ergo malo ut resistatur, ea, quæ refrigerant, humectant & abstergunt, si opus sit, adhibenda. Ergo si malum mirius sit, sufficiunt Syr. violar. de Iuiub. granator. portulac. mel. rosar. cum decocto hordei, prunorum, iuiubarum, violar. sem. cydon. maluæ, psyllij, althææ,

Ut ꝥ. *Mucil. sem. psyll. Cydon. Malu. aq. violar. extr. an. Vnc. β. syr. violar. Vnc. i. sacch. cand. Drach. iiii. M.*

ꝥ. *Sem. cydonior. psyllij, an. Vnc. sem. iragacantha. Drach. i. Cum Aq. rosar. q. extrahatur mucilago, cui admisceatur Syr. de granatis dulcibus parum.*

Verum si maior ariditas & nigredo adsit, fortiora requiruntur medicamenta, Commendatur hîc aq. Lactucæ, Prunellæ.

ꝥ. *Aq. semperuiui. Vnc. vi. lactuc. prunell. nucum an. Vnc. sem. In his dissolu. nitri præparat. Drach. i. sem. M.*

Inprimis verò aq. semperuiui, h. m. composita,

ꝥ. *Semperuiui. lb. i. salis ammoniac. Vnc. sem. Reponantur in loco subterraneo, donec sal liquecat; postea destillentur; aquâ destillatâ os & fauces abluantur.*

Efficacissimum est & ꝥ. præpar. quod saltem pri-

nellæ vocant, quodque in aq. semperuiui dissoluitur, eoque non solum fauces colluuntur, sed eius particula aliqua absorbetur.

Est & hoc præstans remedium.

ꝥ. *Cancrorum fluuiatilium vinorum. num. vi. vel vii. semperuiui. M. ii.*

Contundantur & succus exprimatur, cui addi aliquid nitri præparati vel salis ammoniaci potest, quo fauces colluantur. Vtile quoque fuerit, extrâ collum inungere ol. violar. & aliis refrigerantibus.

Vbi lentore quodam lingua faucisque obducuntur, inprimis necessarium est, medicamentis conuenientibus sæpius linguam mundare, os verò vino diluto vel aq. hordei cum pauco aceto & melle rosato colluere, vel hoc gargarismo uti.

ꝥ. *Hordei integri. saluæ, hyssop. an. M. sem. caricarum num. vii. Coq. in l. q. aq. puræ & in decocti lib. ii. Dissolue Syr. acet. simp. Vnc. iiii. vel oxymel. Vnc. ii. M.*

Licet & talibus oris collutionibus aliquot guttas spiritus vitriol. addere, qui egregiè huiusmodi lentos humores incidit & abstergit.

### *Sitis.*

Sitis & ipsa plerumque febris indiuiduus comes est, *Sitis.* & oritur ex nimia oris & ventriculi caliditate, & siccitate ac humidi defectu. Siccitas autem oritur ex intemperie calidâ totius, & inprimis Hepatis & cordis, ac calidis fuliginibus inde ascendentibus; vel ex humore bilioso, salso qui ventriculum occupat. Itaque sitibundis aliis circa ventriculum magnus æstus est, aliis pulmones igneum quid quasi expirant. Quam distinctionem notare vtile est. Quæ enim ex pulmonis incendio calidas fuligines cordis excipientis & expirantis oritur sitis, per eam ventriculus non admodum afficitur; sed os maximè aridum est, & veluti torridum à fuliginibus continud exhalantibus; eamque qui patiuntur, iis difficilis sermo est, propter trachææ & laringis asperitatem & siccitatem. Neque hanc sitim potus facile sedat; cum minima eius portio, quæ bibitur, ad pulmones perueniat, sed quamdiu fauces irrigantur & potu colluuntur, tamdiu solum sitis lenitur; postea eadem statim redit. Itaque in siti, quæ ex pulmone æstuante oritur, præstat potius frigidissimum aërem inspirare, quàm bibere. Si verò sitis ex ventriculo proueniat, rectissime tollitur sublatis causis, à quibus dependet, humore videlicet bilioso vel salso ventriculum occupante. Cætera utriusque causæ communia sunt. Nam cum, siue ventriculo siue pulmone æstuante, os eandem affectionem contrahat, ob internæ tunicæ communionem, eadem quoque refrigerantia & humectantia sitim ab utraque causâ tollent. Ergo vtile est, frigidam aquam ore continere, atque illam sæpius mutare. Et si verò potus maximè humectat; tamen cum, si ægri, quantum sitiunt, bibant, alia incommoda incurrere possint, sitis aliis modis fallenda est.

Cerasa itaque acida seu condita seu siccata, vel taleolæ ex cucurbitâ, cucumere, caules item lactucæ conditi, ore detineantur. Quæ tamen sitis causâ exhibentur medicamenta saccharo condita magis sitim leniunt, si ab iis saccharum prius eluatur. Saccharum enim sitim non tollit, sed potius augeat. Prodest item Crystallum vel Tamarindos vel ribes fructus ore detinere, vel succum granatorum sumere: & quidem si tussis sit molesta, sumatur granatum pomum dulce; si tussis non adsit, acidum. Commendantur & folia crassulæ vel portulacæ detractâ cuticulâ in aquâ frigidâ macerata & lingua imposita, aut aquâ fontanâ, in qua momentum ꝥ. dissolutum sit, os colluere. Valde etiam commendatur semen psyllij, quod in aquâ frigidâ maceretur, ut mucilago extrahatur, & postea in ore detineatur.

Vel ꝥ. *Conseru. rosar. vel viol. Vnc. ii. flor. cassia Vnc. sem. mucilaginis seminis psyllij Drac. ii. M.*

vel

Vel  $\mathcal{L}$ . *Mucilag. sem. psyllij* Vnc.  $\beta$ . *cydonior.* Drac. ii. *spec. diarrag. frigid.* Drach.  $\beta$ . *sacch. candi* q. s. F. Linctus.  
Vel fiat talis porus, qui simul aluum laxat, bilémque sitis causam commodè subtrahit.

$\mathcal{L}$ . *Cassia extract.* Drach. vi. *mucilag. sem. psyllij* Drach. iii. *syr. viol. solut.* Vnc. i. *aq. hordei cum Tamarin. decoct.* Vnc. iii. M.

Vtile est etiam ad sedandam sitim saccharum candum, violaceum spiritu vitriol. admisto, atque aquâ rosar. madefactum, iterumque exsiccatum. Si his omnibus sitis non sedatur, frigidus potus concedendus est, & quidem assuetis aquæ frigidae potus. Verùm quæ conditiones in eo obseruari debeant, suprà dictum.

Aquæ simplicis loco varij potûs conficiuntur. Conueniens est aqua cocta, cui aliquot guttæ spiritûs vitrioli ad gratam aciditatem admixtæ sint, vel decoctum berber. de quo suprà: vel *Syr. limonum*, *granator. oxy-sacchara*, *Syr. & Iulep. violar.* Conuenit & aqua hordei. Nonnulli radices acetosæ in aqua coquunt, quæ inde colorem vini rubri contrahit. Vel coquitur hordeum cum tamarindis, & sub finem addito santalo citrin. & cinam. aromatizatur, qui porus non solum sitim sedat, sed & aluum laxat, hepar refrigerat, cor roborat.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Aq. fontanæ puræ* lb. ii. *saccha. candi* Vnc. i. *santal. rubr. pulv.* Drach. iii. *cinam.* Drach. ii. *fl. rosarum rubr.* Drach. i.

Infunde in vitro clauso in loco calido horis 6.

Deinde colentur. Adde *Spir. vitriol.* Scrup. i. *succi citri, iulebi violar. rosar.* an. Vnc. i. M. F. Claretum.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Aq. fontan. cocta* (Nonnulli ei panem à furno calentem iniiciunt) *mensur. unam, acet. quartam mensura partem, sacchari albissimi vel candi, vel rotul. manûs Chr.* Vnc. iii. vel iiiii. F. Potus clarus.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Radic. acetosæ cerasor. acidor. exsicc.* an. Vnc. i. *sem. pulpa tamarindor.* Drach. vi. *passul.* Vnc. sem. *fruct. berber. sicc.* vel *condit.* Drach. v. *sem. Melon.* Drach. iii. *Coq. in aq. hordei* f. Col.  $\mathcal{L}$ . lb. ii. *succi citri* Vnc. iiiii. *iulebi violar. vel rosar. q. s. M.*

In malignis vtilissimum est decoctum C. C. cum spiritu vitriol. vino granat. iulebo rosato.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Decocti C. C.* lb. iii. *syr. de succo viol.* Vnc. iiiii.

Transfundantur aliquoties de vase in vas, & spiritûs vitriol. guttæ aliquot, quæ ipsi gratam aciditatem concilient, adiciantur.

In potu tamen administrando id obseruandum, de quo etiam suprà dictum, ut potus non sumatur in principio paroxysmi, vel in augmento, sed in vigore, & potissimum febrili accessione iam declinante. De nitro suprà semel atque iterum dictum, quod aliis medicamentis in hoc genere non cedit, sed summam calorem præternaturalem coercendi, sitimque sedandi vim habet.

### Singultus.

Singultus accidit in febribus præcipuè, dum ventriculorum humores acres & mordaces, nonnunquam & maligni, vel quocunque modo naturæ molesti, vellicant. Vtilissimum autem est, primò humorem illum, qui ventriculo molestus est, vomitu reiicere. Si post vomitum singultus manet, reliquus conuenienti modo alterandus: in quo consideranda est natura humoris. Nam si frigidior est humor, tutius dantur calida, ut *Syr. de mentha*, *absinthio*, & si febris patitur, vinum *absinthites*, decoctum *flor. chamæmeli*, *absinthij*, *anethi*. In calido autem humore conueniunt *lactuca*, *portulaca*, *acetosa*, & similia: & bolus Armenus cum aq. *Nymph. buglossi*, *rosar. portulac.* Vel emulsionem *sem. 4. frigid. mai.* cum aq. *portulac. acetos.* Conuenit & vinum granat. & *conseru. rosar. viol.* Quod si his omnibus singultus sedari non potuerit, danda gr. iii. vel iiiii. Laudani opiat; in humo-

re quidem calido cum conseruâ rosar. acetosæ; In humore autem frigido cum conseruâ menthæ vel absinthij, cui gutta vna atque altera olei destillati chamæmeli vel anethi addi potest.

Si Laudanum opiatum desit, Philonium vel Theriaca eodem modo viurpari potest. Extrâ verò ventriculo adhibenda est cucurbita cum multâ flammâ. Alij verò dorso è regione ventriculi eandem applicant. Inungatur quoque oleo absinthij, menthæ, anethi, vel fomentum ex iisdem instituat.

Vt  $\mathcal{L}$ . *Mentha. absinthij* M. *sem. sem. anisi, carui, anethi, radic. cyper.* an. Drach. ii. *caryophyll. sesquidrachmam.*

Infuantur sacculo, coquant. vino rubro pro fomento.

### Cardialgia & Vomitus.

Cardialgia, nausea, vomitus ex eadem ferè causâ oriuntur, ex quâ singultus. Nam quodcumque materia aliqua vitiosa, corrupta, maligna, vel copiâ vel qualitate aliquâ vitiosâ ventriculum irritat & molestat, nunc inde dolor solum oritur, nunc singultus, nunc nausea, & inanis vomendi conatus, nunc natura id, quod molestum est, vomitu reiicit: Ideoque hi affectûs eadem ferè habent remedia.

Vomitum quod attinet, non semper statim sistendus, sed nonnunquam etiam promouendus, ut materia vel copiâ vel malignitate molesta euacuetur. Sublatâ enim materiâ ventriculum vellicante, vomitus sistitur: si verò materia diutius detineatur, magis corrumpitur, & maiora ac grauiora postea inducit symptomata. Potest eadem quoque per aluum educi. Et si ventriculus omnia medicamenta vomitu reiiciat, Clystere materia versùs inferiora ducenda. Si tamen vomitus sit nimius & ita diuturnus, ut cibi exhibendi nulla occasio sit, virésque debilitentur, & metuentum, ne isto motu & irritatione omnes totius corporis humores vitiosi ad ventriculum confluant, omnino sistendus est. Quod fit, si assumantur medicamenta ventriculum roborantia, humoresque secundum qualitatem; quâ ventriculo molesti sunt, alterantia. Itaque si humor calidus & biliosus, quod plerumque fit, vomitus causa sit, exhibeatur *Syrupus acetos.* *rob. ribium*, *succus berber.* *diacydon.* *conserua rosar.* præcipuè *vitriolata*, *sem. acetos.* *portulacæ*, *Corallium præpar.* *margaritæ*, *extract.* *tormentillæ*, *spir. vitriol.*

Si verò bilis sit acris valdè, qualis est prassina & æruginosa, ea inprimis medicamenta ex antea dictis eligenda, quæ summam vim acrimoniam illorum humorum obtundendi habent, qualia sunt decoctum hordei cum *semin. melonum*, *Syrup. acetosæ* & *nymphææ* cum aq. *buglossi*, *violar.* & simil. Hinc, vel etiam prius *rhæbarb.* Drach. i. sumere licet, ut materia illa subtrahatur. Si verò materia sit frigidior, nux moschata, *caryophylli*, *macis*, *sem. coriandri*, *mentha*, *cortic. citri*, *sem. anethi*, *diacydon.* composit. Theriaca non admodum verusta conuenit. Vtile est & vinum decoctionis mastiches. Et si humor sit crassior, tenacior, ut facilius vomitu reiici possit, *oxymelite s.* vel *scillitico* incidendus. Vbi materia mixta est, mixta medicamenta adhibenda, ut aqua menthæ, cum *Syr. ribes*: puluis etiam iste in omni vomitu conuenit.

$\mathcal{L}$ . *cortic. citri*, *ligni aloës*, *mastiches*, *sem. coriandri*, *portulac. santal. alb.* an. Drach. i. F. Puluis.

Extrâ quoque quæ applicantur ventriculo pro varietate causarum moderanda sunt. Vtilis est panis tostus vino madidus, & puluere coralliorum, nucis mosch. *macis*, *spec. diarthod.* *abba. aromatic.* *rosar. conspersus*.

fus: vel imponatur Emplastrum de crustâ panis, vel emplastrum ex fermento, menthâ & mastiche, quod ita paratur.

℞. Fermenti, lb. i. fol. menth. sic. M. ii. mastiches, Vnc. i. Terantur & cum ol. mastich. Fiat emplastrum vel linimentum.

℞. Crustarum panis parum tostatum & aceto rosacco irrigatarum lb. ß. pulpa cydoniorum vel diacydon. f. Vnc. ii.

Misceantur affuso vino rubro, adde pulv. mastiches, Vnc. sem. absinthij, rosar. rubr. an. Drach. ii. macis, fl. chamamel. an. Drach. i. ol. rosac. chamamel. q. s. F. Cataplasma.

Vel paretur emplastrum ex pulpâ cydoniorum cum pulv. coralliorum & rosarum. Vel imponantur sacculi aut cataplasmata ex foliis menthæ, absinthij, florum chamamel. meliloti, rosas anetho, radic. cyperi, caryophyll. acori, zedoar. bacc. iuniperi.

Vt ℞. Absinthij, rosar. rubr. an. M. sem. radic. cyperi, Vnc. sem. mastiches, Drach. iii. caryophyll. macis, an. Drach. sem. Cum sindone rubrâ F. Sacculus.

Vel vngatur ventriculus ol. absinthij, menthæ, cydoniorum, mastichino, nardino, nucis mosch. Destillata sunt efficacia.

Naribus quoque quædam non inutiliter contra vomitum adhibentur odoramenta: vt mentha, ruta, acetum, aqua rosarum, panis item tostus aceto madidus.

Si iis omnibus vomitus non tollitur, ad laudanum opiat. accedendum, cuius gr. iii. cum Syr. vel conferu. conueniente exhibenda.

Est & hoc obseruandum, si materia sit maligna, quæ ventriculum vellicat, ea eligenda, quæ simul malignitati resistunt, vt C. C. terra sigillata, bolus Armenus, corallia, margaritæ, cum conferuâ rosar. acetosæ, rob ribium, berber. quibus addi potest aliquid Theriac. vel Mithridatij.

### Alui fluxus.

Alui fluxus in febribus sæpe oriuntur ob humores ad intestina fluentes, & vel copiâ vel qualitate expultricem stimulant; vel quod virtus ita debilitata sit, vt excrementa retinere nequeat. Nonnunquam & fluxus colliquatiui accidunt, cum ob causæ malignitatem & magnum æstum quasi colliquati humores ad intestina fluunt. Ob posteriores duas causas si alui fluxus accidat, res cum summo periculo coniuncta est, raroque ægri conualescunt, & tum id vnice agendum, vt causæ vehementiæ & malignitati resistatur. Ob alias verò causas si fluxus accidat, modò qualia oportet euacuentur, si æger bene ferat, listi non debet. Si enim sistatur, & materia, quæ euacuari debebat, retineatur, retenta ea longè peior euadit, & postea rursus fluxum periculosiorem excitat, vel ad partes nobiles regurgitat, & symptomatum pessimorum author est. Si verò sponte non sistatur fluxus, & ob diuturnitatem, vel virium deiectio, vel dysenteria metuenda sit: initio illi humores acres & intestina vellicantes abstergantur, & per lenia soluentia mori humores educantur, & quidem per talia, quæ post se adstrictionem relinquunt: qualia sunt rhabarbar. præcipuè in substantiâ sumptum, syr. rosar. solut. myrobalani.

Postea ea exhibeantur, quæ seu acrimoniam seu malignitatem humorum corrigunt, & adstringunt. Vtilissimum est, talia cibus admiscere. Ergo semen acetosæ, berber. fumach, quod commodissimè cibus admiscetur, radic. tormentill. nodulo includantur, & in iusculis ebulliant. Cum cibus etiam fumantur vel misceantur

Syrupus vel miua Cydoniorum, Syr. ribium, berberis, spec. diamargar. frig. corallium, C. C. bolus Armenus, terra Sigill. Vtile etiam est lac ex amygdal. dulc. & sem. 4. frig. maior. ac papauere cum aquis conuenientibus paratum. Eadem quoque extra cibum exhiberi possunt. Et præter ista conferua ros. antiqua. conferu. tormentill. quæ valdè efficacia sunt, vt & ipsa tormentill. quocunque modo sumpta, rob ribes, diatragacant. frigid. camphora, vinum granator. cydoniorum, decoctum C. C. Trochisci de terrâ Sigill. de carabe, de spodio: Crystallus in bile æruginosâ, quem supra ex Ioh. Languio, lib. i. ep. c. 4. porraceæ & æruginosæ bilis ac dysentericæ alexipharmacum diximus, quod ex eodem etiam reperit Valleriola, lib. 4. enarrat. cap. 3. Vterque verò proculdubio, ex Petri Aponensis libro de venenis sumpsit. Atque hæc omnia ferè in fluxu bilioso locum habent.

Si fluxus verò sit lientericus & à causâ frigidâ, vtiliter sumitur Mastiche cum rosatâ nouellâ. Per alium iniiciantur Clysteres abstergentes tantum, ex decocto hordei, addito saccharo & melle rosato. Postea adstringentes vsurpari possunt, ex rosis rubris, plantagine, consolidâ, tormentill. cum ol. menthæ, myrtino, rosaceo. Extrâ quoque applicentur, quæ ventriculum atque intestina roborant, vt pulpa cydoniorum in aceto cocta, & alia, quæ in vomitu sunt proposita. Nisi his fluxus sedatur, ad laudanum opiatum, Philonium, Theriacam recentem veniendum. Videndum tamen, ne fluxus alui sit ex obstructione venarum mesaraicarum. Tunc enim adstringentia nocent: vsurpanda verò hordeum, Rhaponticum, diatrion santalon, spica nardi, & alia aperientia & simul roborantia.

### Lipothymia & Syncope.

Tandem Lipothymia & Syncope in febribus nonnullis, in primis malignis, ægros infestare solent, ad quam tollendam medicamenta roborantia Cor, suo loco proposita conueniunt. Exhibenda videlicet Conferuæ, Syrupi & aq. rosar. borrag. bugloss. melissæ, Syr. acetos. citri, de cortic. citri, de rubo Idæo, tunicis vinum granatorum, confectio Alkermes, spec. cordial. temperatæ, Elect. de gemmis, diamargarit. lignum aloës, corallia, margaritæ, emulsio margarit. cum aquâ rosar. borrag. & cinamomi parata, tinctura & solutio coralliorum, solutio perlarum.

Vt ℞. Conferua ros. tunicis, borrag. bugloss. acetosell. an. Vnc. i. margarit. preparat. Drach. i. off. de C. C. Scr. ii. C. C. f. vstion. preparat. Drach. sem. fol. auri, num. vi. confect. Alchem. Drach. i. ß. Cum Syr. acetos. citri, F. Electuar.

Vel ℞. Ambr. gryseâ, p. viii. mosch. p. i. sacch. albiss. parum, Tere affundendo aliquid spiritus rosar. F. instar pultis.

Hinc ponatur in vitrum clausum in cellam in arenâ per mensem. Postea iterum aliquid sacch. & spiritus ros. affunde, iterum reponere. Dosis pisi magnitudine in liquore conueniente.

Extrâ applicentur pulsibus & cordi sacculi ex rosis, ligno aloës, santalis, corticibus citri, radic. Ireos, melissæ, flor. borrag. bugloss. vel lintheamina aquis ex eisdem madida apponantur.

Vt ℞. Cortic. citri flauor. rosar. rubr. santali citrin. galang. macis, an. Drach. i. sem. spec. diamosch. dulc. zedoar. caryophyll. meliss. an. Drach. i. camphor. Scrup. sem. F. sacculus, qui irroretur aq. melissæ & aceto ros.

Vnguenta itidem cordialia ex vnguento rosaceo, ol. destill.

Lipothymia & Syncope.



destill. citri, caryophyll. cinamomi, rutæ, croco, camphorâ parata.

Odoramenta omnes spiritus recreant, qualia parantur ex aquâ rosar. cinam. carfunculi, vino, radicibus Ireos. Vtilis est ad hanc rem pulvis in dispensat. August. sub titulo; pulvis violatus odoratus.

Mulieribus tamen, ea, quæ odoratiora sunt, tunc non semper admouentur. Habenda quoque in hisce ventriculi ratio, cum illa animi deliquia non raro à ventriculi orificio ortum habeant: Quod si fiat, exhibendus panis vino odorato vel vino granatorum madidus, fomentandusque est ventriculus decocto absinthij, menthæ, flor. rosar. rubr. chamæmel. & aliis, quæ in singultu sunt explicata.

Hæc, quasi obiter & appendicis loco, de quibusdam & frequentioribus, quæ febricitantes infestare solent, symptomatibus dicta sint. Qui plura de horum & aliorum, quæ febribus accidunt, symptomatum causis & curatione cognoscere cupit: eos, qui ex professo hac de re scripserunt, consulat. Ut enim symptomata talia rectè tollantur, causarum, quæ vnius symptomatis non semper eadem, cognitione exactâ omnino opus est. Quam quia sæpe vulgus & empirici negligunt, non leuiter errant. Dum enim, quæ vni graui aliquo symptomate laboranti, profuisse animadverterant, aliis, qui simile quid patiuntur, causæ inuestigatione neglectâ, adhibent, sæpe accidit, ut ægris non solum non prosint, sed & noceant: cum eadem symptomata à diuersis causis proueniant.

### Conclusio.

Atque hæc, Lector Beneuole, sunt quæ de Febribus iam dicere potui, Voluisssem plura, & meliora, & forsitan potuisssem, si otium illud, quo nonnulli abundant mihi quoque concessum fuisset. Verum hæc pleraque inter morbosepidemios superiorum annorum, & crebras ægrotantium interpellationes, animo hinc inde distracto, conscripta fuerunt. Pro quibus ipsis tamen Deo ter Opt. Max omnium bonorum auctori, gratiæ immensæ debentur. Ideoque Hymnum, quem, sub initium anni 1614. Febris quartanæ, quæ laboraueram, & pestilentia grassantis periculis liberatus atque ereptus, Deo Seruatori cecini, hîc subiungere, & quasi votiuam tabulam suspendere volui imò debui.

**E**Rgo iterum desueta diu, iamque obsita longum  
Spisso pleetra situ in numeros animare canoros  
Inclita facta iubent, Bonitasque immensa Iehoua.

Eja age Mens, Cor, Lingua, & corpore quicquid  
in hoc est,

Exerere, & quascunque potes, nunc collige vires,  
Totumque in laudes te magni effunde Iehoua,  
Mens eja exerere, & meritas Patrique Deoque  
Clementi grates persolue, atque omnia in unum  
Sis conferre memor laudum ornamenta Iehouam.

Ille quidem iustus Deus est, abnormia plectens  
Facta hominum: at facilis venia & placabilis idem  
Non memores durus producit longius iras:  
Sed lenat oppressos ultro, gemitusque presantum  
Audit, nec blandi affectum Patris exuit unquam,  
Nam scit, quam nostra fragilis sit fabrica massa.

Ecco etenim! urentis me vis longinqua tenebat  
Morbi; languebam, cœu flos, cui feruidus Auster  
Abstulit afflatu succum gratumque decorem:  
Jam mihi mors atra ante oculos, tenebraque sepulchri  
Versari. Tum clamavi: ne, quaso, dierum  
Nunc abrupte mihi numerum; Pater optime, parce,  
Audisti orantem, & mea mi peccata remisit;

Dan. Sennerti Tom. I I.

Audisti orantem, & morti tenebrisque sepulchri  
Me bonus eripuit; cordi, membrisque vigorem  
Reddidit antiquum; & curas tristemque dolorem  
Leuitia, luctumque hilari mutauit oratu.

Post cum presentem intentarent omnia mortem,  
Ut tenebras mortis vitarem & mille pericla,  
Me baculo rexit Pastor bonus: ille sinistra,  
Et dextrâ strages inter morientium, & inter  
Pestiferi occulte volitantia tela veneni  
Liberum ab interitu seruauit, meque sub alis  
Cœu pullos gallina, manu omnipotente tueri,  
Et tutum in mediis voluit prestare periclis.

Summa; DEVS bonus est, & quam promittere larga  
Spes umquam potuit, largitur plura benigne.

Ergo tot toties liber, Deus alme, periclis,  
Ergo tot toties auctus, Pater optime, donis,  
Quid faciam? quo te iam gratius munere douem?  
Nil habeo, DEVS: omne tuum est, quod Pontus &  
Æther,  
Quod Tellus habet. Hoc unum mihi restat egeno,  
Ut grates tibi persolnam. Quare accipe grates:  
Verum quas valeo, non quas tibi debeo grates.

Magnus es, ô DEVS, atque tuum mirabile Nomen;  
Magnus es, & nullis prensandus sensibus, omne  
Immensum humani ingenij excedis acumen,  
Principium sine principio, te nulla coercet  
Meta, nec ullius te claudit terminus ani:  
Nil tibi cras, vel Heri; sunt cuncta Hodie, Omnia sunt  
Nunc:

Omnia scis, & cuncta potes: Tu Totus ubique  
Cuncta reple; presens sustentas omnia; presens  
Cuncta regis; cunctis tua dat presentia vitam:  
Omnia habes; nullius eges, mutabile nil est  
In te: cuncta agitas; nec te tamen omnia agentem  
Exercet labor; est requies, sunt otia semper  
Lætati tibi; in te uno requies tua; sufficis vnus  
Ipse tibi: melius nil te: nil omnia pra te:  
Omnia sunt à te, per te sunt omnia, & in te,

Magnus es, ô DEVS, & totus mirabilis idem es.  
Verum cuncta tua superat facta inclita dextera  
Erga mortales miseros Clementia Amorque,  
Atque super cunctos Bonitas tua maxima cœlos  
Eminet immensum. Lapsis peccata remittis,  
Ergis oppressos; mediâq; in morte iacentes  
Seruas, & morti ereptos in pristina reddis.

Sed quò plura cano, restant mihi plura canenda:  
Deficiunt vires; dextera benefacta benigna  
Non obtusa capit mens hac; mea lingua, meum cor  
Non laudes aquare tuas, non facta referre  
O verè miranda potest, lingua hesitat, & mens  
Tot doxis cumulata stupet, tanto aucta fauore.

Ergo cum desint vires, tibi prompta voluntas,  
Et grato placeant hæc fusa è pectore grates.

Sed, Pater, & porrò antiquo me amplectere amore  
Auxiliūque, à te sperantem rebus in arctis  
Non sperata ope destitue: spes credula ne me  
In te confundat fidentem. In corpore sano  
Da sanam mentem, ut lato te pectore semper  
Laudare, ac rectè, mihi quæ expedienda dedisti,  
Officiis fungi, & tua iussa capeßere possim.  
Pestiferi depelle procul contagia morbi,  
Et tandem depone graues, ut mitis es, iras;  
Vndique sit nobis salua hac Sarepta; nec ignem,  
Nec pestem, nec bella, famemue, aut quicquid alumnis  
Nempe tuis Satana ministratur visque dolusque,

T

Ploret:

*Ploret: in excubiis cœli felicitis alumni  
Scent vigilas: saluus sit defensoribus istis.  
Cum Patriâ Patria Pater, & Schola floreat annis  
Leucorea innumeris: serorum ad secla nepotum  
Vt commissa sibi Divina oracula, Linguae,  
Atque Artes, Dic fama monumenta, propaget.*

*Sic cor, sic linguam, sic corpore quicquid in hoc est,  
In laudes animabo tuas; Te luce canam, te  
Nocte canam, penita fibra te pectoris, & quod  
In me est cunque tuam Bonitatem alimūque favorem.  
Perpetuo celebrabunt, & tua facta sonabunt:  
Inclita facta, tuæque feram miranda potentis  
Gesta manus, vivens dum spiritus hos reget artus,  
Quis natus narrabo meis illa omnia, natiq;  
Vt natus porro narrent memoranda iubebo.*

*Verum quid promitto, Deus? promittere quicquam,  
Me quando intueor, mea cum promissa recorder,*

*Ausim ego? quin potius sic tendo ad sidera palmas.*

*Qui mentem expromptam, Deus, & qui Velle dedisti,  
Da quoque posse: etenim sine te mea nulla potestas,  
Idem fac rectis adsit Constantia factis.  
Dux operum semper tua sit Sapientia, ab alto  
Illam mitte throno cœli, scintillula lucis  
Divina ignigenis radiis emissa pigrantem  
Fomitum in ingenij mentem hanc accendat, amore  
Vsq; ut inextincto Verique caleseat & Aequi.  
Vt vita, quod restat, iter, perque auiæ, perque  
Obscuras mundi tenebras, & nubila cœca,  
Pralucente facem te, recto tramite pergam.*

*Sic erit, ut quondam felici sede receptus,  
Cum Cherubim, Seraphim, & Cœlestis ciuibus aula  
Omnibus, aeterno celebrem tua numina cantu,  
Et, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Ter Maxime, Terque  
Optime, non cessante canam per secula oratu.*



FASCICVLVS  
**MEDICAMENTORVM**  
PESTILENTIA GRASSANTE.  
DIVERSIS TEMPORIBVS.

P R O

Diuerfis Rebus publ. à Clariss. aliquot Medicis  
præscriptorum, iuxta ordinem annorum  
& Respub. dispositus.



THE FACULTY OF

# MEDICAMENTORVM

PRESTANTIA GRASSANTE

DIVERSIS TEMPORIBVS

PER

Directoris Republicae et Civitatis. aliquid Medicis

praeferendum habet et hunc modum

& Respon. d. d. d. d. d.



# MEDICAMENTA CONTRA PESTEM, CONSCRIPTA ET COLLECTA

A

## PETRO SIBYLLEN O, REIPVBL. EGRANÆ MEDICO.

Anno 1564.

*Trochisci fumales D. Pfeils, quibus Illustrissimus  
Saxon. Princeps Mauritius usus fuit.*

℞. **B**ENZOI mundi in aq. rosar. mace-  
rati & rursus exsiccati, Vnc. ii. Styrac.  
calam. Vnc. β. santal. citrin. Drach. ii.  
sem. lig. aloës, Drach. i. sem. rosar. Vnc.  
iii. sem.

Mixta tundantur in mortario ad horā vnam, post ad-  
datur sacch. finiss. Vnc. i. mosch. ℞. xv. dissoluti in aq. rosar.  
contundantur omnia ad horā dimidiū: addantur zibeth.  
℞. vii. mucilag. tragac. ex aq. ros. q. s. Fiant Trochisci.

*Candela vel Trochisci, qui apud Comites & nobi-  
les in Misnia & Saxonia in usu sunt.*

℞. Benz. ℞. β. pulueris. crassiusculè & infundatur  
in aq. ros. per diem naturalem.

Postea ℞. fol. ros. rub. recent. Vnc. iv. sacch. finiss.  
Vnc. j. pistentur longo tempore, tandem adde Benzoe  
suprascriptum & rursus simul tundantur per duas ho-  
ras, his admisce moschi, Drach. i. ambr. Drach. β. zibeth.  
Scr. i. M. ritè & formentur troch. parui & inuoluantur  
foliis ros. siccenturque in umbra, & recludantur in  
scatulam mundam.

*Trochisci alij pro Consulibus & magnis viris  
in urbibus.*

℞. lign. aloës, Vnc. sem. benz. Dra. iii. mosch. gr. v. sacch.  
cand. Vnc. iii. F. i. a. cum aq. ros. Trochisci.

*Alij pro iisdem personis.*

℞. benzoin. Vnc. sem. styrac. calam. Dra. ii. lign. aloës,  
Scr. sem. sacch. cand. Vnc. ij. mosch. gr. ii. cū mucilag. tra-  
gacanth. ex aq. rosar. formentur Trochisci.

Vel ℞. ladan. benzoi, sacch. puriss. an. Dra. vi. mosch.  
Dra. β. M. cum infus. tragacanth. F. Trochisci.

*Pulvis prestans carbonibus inspergendus.*

℞. alipt. mosch. Dra. ii. benzoin. Dra. iii. styrac. calam.  
santal. citrin. an. Scr. i. lign. aloës, Scr. β. caryoph. Dr. β. nucis  
mosch. Scr. i. cinam. acerrim. Dra. i. M. fiat Pul. pro fumo.

Dan. Sennerti Tom. I I.

*Candela pro ciuibus suauiter redolentes & vsi-  
tata in quibusdam Bohemia urbibus.*

℞. Ladan. Vnc. iii. alipt. mosch. oliban. an. Vnc. i. thy-  
miam. Vnc. i. β. ros. rub. ase dulc. an. gr. vi. santal. citr. ci-  
namomi opt. an. Dra. iii. myrrh. cortic. aurant an. Dra. ii.  
carbon. silia ℞. β. Vnc. ii. styrac. liquid. q. s. M. cum in-  
fus. tragacanth. & formentur candelæ pro fumo.

*Sacculus pro vestibus in scriniis.*

℞. fl. lauend. viol. spica, an. M. j. borrag. bugloss. ne-  
nuph. meliss. basilicon. an. p. j. ros. rub. non explicatarum,  
p. ii. been. alb. & rub. cortic. citri, sem. citr. an. Dra. β.  
lign. aloës. Scr. i. caryophyl. macis, cinamomi acerrim. an.  
Dra. i. rad. irid. llyr. Scr. i. ase dulc. Dra. β. mosch. ℞. v.  
M. contundantur grosso modo, F. Puluis.

*Pomum Ambra hybernium.*

℞. lign. aloës, Dra. i. calam. arom. Dra. β. caryophyl.  
Scr. ii. cinamomi acerrim. Scr. j. sem. ocym. caryophyl.  
citri, an. Scr. i. nucis mosch. Scr. i. β. ros. rub. maioran. an.  
Dra. i. β. rad. valerian. diptamn. tormentill. an. Scr. sem.  
myrrh. Scr. sem. cubeb. Scr. i. sp. diamosch. d. diamb. an.  
Scr. i. sem. nigell. ℞. vi. oliban. mastich. an. Dra. β. rad.  
angelic. Dra. ii. zedoar. Dra. i. doronic. Scr. i. β. caphur.  
℞. iii. ladan. puri, styrac. calam. an. Dra. i. sem. cum  
styrace liquid. & modico olei spicæ odorif. F. Pomum  
cui adde, ambr. gryseæ. ℞. vi. moschi. ℞. vii.

*Pomum stiuale.*

℞. terebinth. cum aq. rosar. semel atque iterum lotas  
Dra. i. ladan. puri, Dra. ii. rosar. rub. Dra. β. santal. om-  
nium, an. Dra. i. fl. violar. bugloss. nenuph. an. Scr. i. cort.  
granator. citri, an. Scr. i. caryophyl. croci, macis an. Scr. i.  
zedoar. Scr. ii. camphor. Scr. β. cum mucilag. gumm.  
Arabic. cum aq. rosar. extract. & styrace liquidâ F. Po-  
mum. Possunt addi gr. vi. Mosch. in aq. ros. dissoluti.

*Pro Pauperibus.*

℞. ruta recent. M. i. Contundatur in mortario  
adde aceti vini q. s. & agentur inter se in mortario  
deinde exprime succum per telam lineam raram, hunc  
serua, imbue in eo spongiolâ, includêque in orbiculum  
perforatû ex ligno iuniperino, & alternis diebus renoua.

*Pomum Ambra pro pauperibus hyemale.*

℥. fol. rut. Scr. ii. maioran. Scr. sem. ros. rub. Scr. i. ligh. aloës, gr. iv. rad. angelic. Drach. i. styrac. calam. ladan. puri, an. Drach. i. caphur. gr. iv. cera citrin. Vnc. i. cum aq. ros. F. Pomum.

Aliud ℥. fol. ruta, summit. absint. an. n°. xxiv. maioran. Scr. sem. zedoar. Drach. sem. angelic. Drach. i.

Contundantur & macerentur in aceto, ligentur in telam lineam rubr. & includantur ligneo pomo iuni-perino proforato.

*Sacculus cordialis.*

℥. sem. acetos. citri, cort. citri been. alb. & rub. croci Oriental. integr. santal. omn. spic. Indic. corall. rub. an. Drach. sem. flor. borrag. bugloss. ros. rub. an. p. i. Sp. diamosch. d. latiss. Galen. cordial. liberam. an. Scrup. i.

F. l. a. succulus quadratus interpassatus ex sindone rubeo duplici.

*Aqua vita præstantissima præservatiua Cl. Dn. D. August. Schurf.*

℥. Vini sublimati optimi ex optimo vino 3. vel quater distillati lb. i. in quo infundantur, caryoph. piper. nigr. granor. Paradis. an. Drach. i. B. Nucis mosch. Drach. i. Macis Drach. ii. cinamomi, Zingiber. alb. galang. an. Drach. ii. Zedoar. Drach. i. sem. Cubebar. lign. Aloës an. Scr. ii. & gr. ii. omnia crasse contusa stent in infusione per d. 8. postea distillantur f. a. in M. B. Deinde.

℥. illam aq. distillatam, & Misce cum Zedoar. diptam. alb. gentian. angelic. cardui ben. cardopati an. Drach. i. Santal. alb. citr. an. Drach. sem. Mosch. gr. iii. caphur. gr. iii. Theriac. Mithridat. an. Vnc. sem.

Stent sic commixta ad dies tres, postea iterum distillantur, ut prius. De istâ aq. exhiberi potest. Vnc. sem. cum Drah. Theria. & Vnc. iii. aq. acetos. vel plus vel minus, secundum naturam & conditionem infirmi & morbi.

*Electuarium præservatiuum eiusdem.*

℥. Spec. el. de gemm. liberantis, an. Drach. ii. de Hyacinth. Scr. ii. smarag. rubin. an. Scr. i. sem. margar. perfor. & non perforat. an. Scr. ii. corall. rubr. alb. spody, rasur. Ebor. an. Drach. sem. ligni aloës Drach. sem. off. de C. C. n°. ii. C. C. vst. in aq. rosar. extincti, sem. acetos. an. Scr. ii. santal. omnium an. Drach. sem. rad. diptam. alb. tormentill. an. Scr. v. terr. sigill. Drac. sem. boli Armen. sem. citri, ros. rub. an. Scr. ii. croci. Scr. i. fol. Auri puriss. num. xxx. moschi, ambr. an. gr. iii.

Terantur lapides pretiosi in vino odorifero f. a. Deinde add. Sacchar. cand. Vnc. xvii. cinamomi elect. Vnc. i. sem. M. F. Pulvis. Dos. 3. i. in curatione, verum in præservatione 3. i.

*Aliud præservatiuum & curatiuum eiusdem.*

℥. Myrrh. croci an. Drach. ii. off. de C. C. Drach. i. diptam. alb. Drach. ii. Zingib. alb. Vnc. sem. Caphur. Drach. i. tormentill. Drach. v. Zedoar. Drach. iii. sem. serpentar. pimpinell. an. Drach. i. theriac. opt. mithridat. an. Drach. ii. M. cum Aq. vita q. f. F. Electuarium. Dos. in curationem Drach. i. sem. cum aq. acetos. Vnc. iii. In præservatione Scr. i.

*Electuarium D. Iouochsu Colonienfis.*

℥. Cinamomi electiss. Vnc. sem. nuc. mosch. rad.

tormentill. boli Armen. an. Drach. ii. Zedoar. daron. Roman. macis. aristolochia rotund. an. Drach. ii. fol. menth. coriand. præp. anisi, carui, corallior. santal. rub. fl. borrag. bugloss. an. Drach. sem. rad. Endiu. cichor. taraxac. fol. pilosell. rad. pimpinell. præmorf. an. Scr. ii. off. de C. C. margar. perforat. fragment. sapphiri, granati, an. Scr. i. xyloaloes, Scr. ii. croci Scr. i. conseru. ros. antiq. Vnc. i. sacchar. albiss. & mellis despumati an. q. f. succi scabiose & acetos. an. Vnc. i. M. F. f. a. Electuarum.

*Pulvis D. Casparis Lindemanni.*

℥. fragment. Hyacinth. Drach. i. B. smaragd. sapphir. rubini, Scr. ii. margar. non perforat. Drach. ii. Scr. i. corall. rub. alb. spody de canna. rasur. eboris lign. aloës, an. Drach. sem. off. de C. C. n°. ix. serici crudi. C. C. vst. in aq. rosar. extincti. sem. portulac. acetos. coriandr. præp. an. Scr. i. santal. omnium an. Drach. i. been. al. & rub. rad. tormentill. terr. sigill. boli Armen. ros. rub. an. Drach. i. Scrup. ij. sem. citri Drach. i. caphur. gr. vj. fol. auri n°. xxx. mosch. ambra gryf. an. grvjj. M. F. Pulvis.

*Pulvis eiusdem, tempore hyberno.*

℥. Cinamomi electiss. Drach. ii. nuc. mosch. caryoph. an. Drach. i. sem. rad. valerian. pimpinell. tormentill. cort. citri, rad. vincetox. enul. camp. an. Drach. ii. santal. citr. Drach. i. sem. corall. viriusque Drach. i. carab. alb. Drach. i. sem. terr. sigill. boli Armen. an. Drach. iii. C. C. vst. Drach. i. caphur. Drach. sem. margar. orient. Scr. ii. spec. elect. de gem. Drach. sem. sem. basilic. acetos. coriandr. citri, an. Drach. sem. fl. scabios. anthos, ros. rub. borrag. an. Scrup. j. ligni aloës Drach. sem.

Pulveriscentur omnia subtiliss. F. Pulvis. Exhibeatur cum vino odorifero, vel cum aq. acetos. vel alterius aq. cordial. Drach. i. in curatione, in præservatione Drach. sem.

*Morselli D. Doct. Iohannis Bohemi.*

℥. rad. diptam. pimpinell. an. Drach. i. B. santal. omnium. an. Drach. i. cinamomi, lign. aloës. an. Drach. i. B. off. de C. C. Scr. i. rasur. ebor. margar. sapphir. rubin. hyacinth. an. Drach. sem. unicorn. Scr. sem. been viriusque. sem. acetos. citri excorticati, an. Drach. B. cort. citri Dra. j. ambra mosch. an. gr. v. auri præp. Scrup. sem. sacch. albiss. in aq. acetos. & scabios. diss. lb. j. B.

F. Confectio in Morfulis vel rotulis, Huius medius morfulus manè & vesperi sumitur in præservatione.

*Electuar. eiusdem ex Zedoaria.*

℥. Myrrh. aloës, croci, off. de C. C. diptam. alb. an. Scr. ii. Zingiber. alb. Vnc. sem. caphur. Drach. sem. rad. tormentill. Vnc. i. Scr. ii. serpent. pimpinell. an. Scr. i. zedoar. elect. Vnc. ii. Scr. ii. Theriac. vera Andr. Mithridat. an. Vnc. iii. cum aq. pestil. q. f. F. Electuar.

Huius ℥. manè quantir. auellanz, tempore præservationis: sed in affectione pestis Drach. i. vel Scrup. ii.

*Electuarium confortatiuum in præservatione pro pauperibus, eiusdem Bohemi.*

℥. Ficum rec. lb. sem. nucleor. ingland. lb. B. ruta. Vnc. sem. salis communis Drach. i. B. M. & contund. omnia in mortario, F. inde Electuar. add. succ. acetos. Vnc. ii. syr. acetos. citr. Vnc. i. De hoc manè sume portionem quantitate iuglandis.



*Electuarium, quod in usu habuit M. Vldaricus Leonorus Medicus Pragens.*

℞. Theriac. Alexand. opt. conseru. ros. an. Vnc. ℞. mithridat. Vnc. i. caphur. Scr. iii. zedoar. rad. diptam. angelic. gentian. aristol. rot. tormentill. valerian. pramors. pimpinell. leuistic. veronic. baccar. lauri an. Scr. ii. myrrh. rub. Dra. i. boli Armen. prep. in aq. acetos. abluti. terra sigill. an. Vnc. sem. croci Dra. sem. cinamomi electiff. Dra. ii. Sp. elect. de gem. f. & cat. diamosch. d. diamarg. f. diatrion sant. off. de. C. C. an. Scr. ii. electuar. regy. Vnc. sem. syr. acetos. citri Vnc. ii. aq. visa contra pestem descript. Arnoldi de Villa noua. Vnc. i. M. omnia f. a. additis & commixtis auri folias. folijs x. F. Electuarium probatissimum.

Ulus huius remedij est: tempore praeservationis magnitudine fabae particula mane horis 4. ante prandium sumitur. Tempore vero curationis in comparatione fortis naturae & adulto viro datur de eo pondere ducati. Mulieri in pondere aurei Rhenani: puero vel puellae pondere aurei Rhenani medij. Tempore hyemis, si pestis cum frigore aut tremore inuadit, exhibetur cum vino Rhenensi & prouocatur sudor: in aestate cum calore si inuadit pestis, dissoluitur Electuarium hoc cum aq. acetos. aut aceto vini, aut aceto ros.

*Electuarium aliud familiare, sed valde praestans D. Ion. Castneri.*

℞. nucleor. recent. excoct. ex ingland. n°. xx. ficum. recent. n°. xv. fol. rut. summit. absinth. scabios. an. M. i. aristoloch. viriusque an. Vnc. ℞. tormentill. pimpinell. diptam. alb. baccar. lauri excoct. an. Drach. iii. sem. rad. gentian. valerian. an. Drach. i. off. de C. C. Drach. i. boli Armen. prepar. terr. sigill. an. Drach. iiij. macis. cinamomi elect. caryoph. an. Drach. i. mastich. Drach. sem. lign. aloës, zedoar. an. Drach. i. baccar. iuniper. matur. Drach. iii. Omnibus contusis adde deinde, Theriac. Vnc. i. sem. aceri ros. Vnc. sem. vini opt. Vnc. iii. M. & F. Electuarium, cui adde salis communis Vnc. i.

De hoc Electuario manè particula quantitate auellanae sumatur, horis 4. desuper ieiunando.

*Alia eiusdem.*

℞. fol. ruta M. i. salvia. M. sem. omnium desiccatorum & puluerisator. rad. pimpin. sic. & contus. Vnc. i. sem. gentian. Drach. i. cardamom. Vnc. sem. baccar. iuniper. Vnc. i. nucleor. recent. ex inglandib. Vnc. i. baccar. lauri excoct. Vnc. sem. serpent. Drach. ii. rad. tormentill. Drach. ii. sem. bol. Armen. prep. Vnc. sem. His omnib. contusis & in puluerem redactis adice Theriac. Alexand. Vnc. i. Mixta cum Vnc. sem. aceri rosar. rursus mortario contundantur & commisceantur.

Manè de hoc Electuario 4. horis ante prandium auellanae quantitas sumitur.

*Puluis eiusdem praestantissimus & à multis approbatus.*

℞. Aloës hepatic. Vnc. ii. myrrh. el. Vnc. ii. croci oriental. Vnc. sem. cinamomi. coriandr. prep. anisi. an. Drach. iiij. rad. tormentill. boli Armen. prep. an. Vnc. i. ℞. terr. sigill. Vnc. sem. basilic. Drach. ii. been alb. & rub. an. Drach. i. cortic. cassia lign. marris perlar. an. Dra. sem. off. d. C. C. corall. rub. rasur. Ebor. rhabab. el. an. Dra. sem. sp. el. de gemm. D. i. aromat. ros. Gabriel. Dra. i. latit. Galen. Dra. sem. Sacchar. cand. Vnc. sem. M. F. Puluis. Dosis eius Dra. ii.

*Puluis Saracenorum satis praestans.*

℞. rad. tormentill. diptamn. alb. iunio. an. Vnc. sem. citri. boli Armen. prep. an. Drach. ii. off. de C. C. corall. viriusque, an. Drach. i. ℞. trium santal. an. Drac. sem. rhabarb. el. Dra. sem. spica gr. iiij. caphur. Dra. i. M. F. Puluis.

*Confectio in Morfellis.*

℞. sp. de gem. Mes. Drach. ii. liberant. Drach. i. rad. angelic. Scr. iiij. zedoar. Scr. i. sem. cardopat. Drach. sem. pimpinell. Drach. sem. caryophyll. cinamom. acerrim. an. Scr. iiij. croci. cardamom. an. Scr. sem. diptamn. Scr. j. been. alb. & rub. an. Scr. j. fol. rut. calament. an. Scr. sem. unicornu Scr. ii. smaragd. Dra. sem. margarit. granator. an. Scr. i. fol. auri, n°. xvi. amb. Drach. sem. sacchar. q. s. cum aq. ros. & aceto dissol. F. Confectio in Morfulis. Dosis pro viris Drach. j. adolescentibus, Drac. sem.

*Confectio alia in rotulis.*

℞. spec. diatrionsant. el. de gemm. an. Drac. ii. rad. tormentill. diptamni. zedoar. zingiber. cortic. citri. macis. cinamomi acerr. an. Drac. i. off. de C. C. croci. an. Scrup. ℞. sp. aromat. ros. Gabr. Drac. ii. saluificantis, Vnc. sem. fragment. lap. pretios. an. Drac. i. sacchar. q. s. in aq. scabios. & rosar. dissoluti, F. Confectio in rotulis.

*Puluis haud contemnendus D. Doct. Sturciadis pro diuitibus.*

℞. boli Armen. prep. rad. tormentill. diptam. an. Vnc. i. cinamomi acerrim. corall. alb. prep. an. Drach. iiij. rhabarb. elect. Drach. ℞. terre sigill. corticis citri, been. alb. & rub. santal. citrin. rasur. ebor. margarit. sem. sancti in aceto per diem infusi, an. Drach. ii. carabe. macis. an. Drach. i. sem. acetos. endiu. portulac. spody. lign. aloës. off. de C. C. an. Scr. ii. serici combust. smaragd. granat. hyacinth. rubin. sapph. an. Drach. i. auri & argenti folias. an. Scr. i. spica naydi gr. iii. unicornu Scr. i.

F. Puluis. Dos. Drach. i. sumpta in vino odorifero.

*Cerotum D. Sturciadis sub alis & in inguinis applicandum.*

℞. Aloës epat. myrrh. opt. gall. mosch. alumin. succi acac. an. Drach. ℞. caphur. Scr. sem. rosar. myrritil. corall. rubr. santal. omnium an. D. i. ladani Dra. i. F. puluis. M. cum oleo lilior. ex florib. parato & cum aq. ros. omnibus mixtis q. s. F. cerotum.

*Iulep praeseruatium pro deliciis.*

℞. Conseru. rosar. meliss. borrag. bugloss. an. Vnc. ii. syr. de acetos. citri, Vnc. i. aq. acetos. scabios. rosar. pimpin. an. Vnc. ii. M. F. Iulep.

*Puluis praeseruatius pro infantibus.*

℞. Rhabarb. el. Drach. i. C. C. vst. aloës lor. prep. an. Scr. i. sem. sancti, Scr. ii. sem. acetos. Scr. i. ℞. caulium Scr. ℞. citri, pulu. lumbric. an. Drach. ii.

M. F. puluis. Eius dosis est 3. i. dissoluta in aq. sacchari

*Conditum pro grauidis.*

℞. conseru. rosar. borrag. bugloss. an. Vnc. i. sem. rorismar. citri condit. an. Vnc. sem. bol. Armen. prep. 3. ii. zedoar. diptamni croci, tormentill. an. Dra. ℞. Syr. de succo Borrag.

*Borrag. cortic. citri an. q. f. fol. auri aliquot.*

M. f. a. F. Conditum. Dosis est prægnantibus quantitas mediæ auellanz; haustu de super exiguo ex vino sumpro.

*Alexiterium in formâ electuarij M. Iohan. Bohemi Vvittebergensis.*

℞. rad. tormentill. pimpinell. cort. citri, an. Vnc. i. sem. angelic. terr. sigill. vera. boli Armen. veri præp. an. 3. ℞. Trochisc. de caphur. Dra. i. myrrh. elect. aloës. los. cum aq. ros. Zedoar. macis, garyophyl. nuc. mosch. baccar. lauri, zingib. an. Dra. j. croci oriental. Drach. i. sem. off. de C. C. Drach. sem. C. C. vst. ac loti, Drach. ii. diptamn. Cretic. ireos, gentian. sem. cardui ben. citri an. Drach. j. sp. diapliris. c. mosch. diarmarg. an. Drach. j. diamb. diarmosch. dulc. el. de gemmis an. Drach. i. sem. theriaca optima, Mithridatij, vel diascordij Fracastor. an. Vnc. i. syr. acetos. citri Vnc. ij. puluerifanda puluerifentur diligenter, deinde cum Theriaca & Mithridatio incorporentur, donec omnia bene vniantur & cum syr acetos. citri F. Massa mediocriter solida. Detur Drach. i. sem. cum aq. acetos. post incisionem venæ, & sudet ac non dormiat. Puero Drach. sem. datur. Sed in præseruatione manè horis 4 ante prandium Scr. i. exhibetur.

*Alexiterium D. Stephani Vvilde Medici Zwickauensis.*

℞. rad. Angel. vera, aristoloch. vtriusque unicornu, gentiana, galanga, an. Vnc. sem. cortic. citri, croci, cinamomi, pimpinell. an. Drach. ij. ligni aloës, serici crudi, diptamn. Cretic. tormentill. limatur. auri, margaritar. an. Drach. i. sem. off. de C. C. sem. acetosell. boli Armen. præp. terra sigill. vera, rasur. eboris, doronici, santalor. omnium an. Scr. i. ij. baccarum lauri, absinth. beën alb. & rub. fragment. 5. lap. pretios. an. 3. ii. passular. mundat. Vnc. i. sacchar. cand. Vnc. ii. caphur. Drach. ii. M. F. a. Electuarium solidum. Idem est vsus seu vtilitas cum superiore.

*Electuarium siue haustus Iouis barbarè dictus.*

℞. Theriac. opt. Alexand. & el. Vnc. iii. rad. tormentill. subtiliter pulu. Vnc. i. M. in modum Electuarij. Deinde

℞. vini ter destillati Vnc. iii. camphor. Vnc. sem. in mortatio agitentur, & fiat seorsim aqua, quæ seruetur in vitro. Signetur aqua pro haustu Iouis.

Vsus huius electuarij est.

℞. elect. modo descripti Scr. i. ij. vini sublimati & camp. 3. i. aq. scabios. & acetos. an. Vnc. i. Detur hæc dosis infecto. Quisquis enim in peste hanc medicinam usurpauerit, eamque retinuerit & de super iudauerit, euadet.

*Antidotus monachorum.*

℞. diptamn. Cretic. tormentill. aristoloch. long. an. Drach. ii. zingib. alb. Zedoar. cinamomi el. an. Vnc. sem. off. de C. C. unicorn. ligni aloës an. Drach. i. camphor. Vnc. sem. sacchar. cand. Vnc. i. Mithridat. Theriac. Ver. an. Drach. ij. F. cum Syr. acetos. citri Electuarium.

*Pilula præseruatiua pestis & ventris lenitiua Spirenses.*

℞. Off. de C. C. croci, spody, sem. ocymi an. gr. xv. ligni aloës gr. xii. boli Armen. præp. cum aq. ros. Scr. 3. camphor. beën alb. & rub. an. gr. vij. fl. bugloss. Drachm. sem. garyophyl. cortic. & sem. citri, zingib. el. omnium mundatorum an. Scr. sem. ambr. gryf. gr. iij. Hyacinth.

granati an. gr. v. agarie. el. rhabarb. opt. an. Drach. i. spica. gr. v. aloës Drach. iij. sem. & g. iij. cum aq. bugloss. & salvia. F. Massa oblonga, quæ in umbrâ exsiccari permittatur.

*Pilula alia cuiusdam excellentis Medici, eiusdem virtutis.*

℞. fol. stordij Drach. j. sem. summit. centaur. min. agarie. trochisc. aloës opt. an. Drach. i. summit. agerati, sem. santonic. nigell. anis. garyophyl. an. Drach. i. sem. C. C. vst. præp. pulu. succin. albiss. sem. acetos. an. Drach. sem.

Puluerifentur omnia per se, postea aspergantur succo aurantiorum; mixto cum acerrimo aceto vini, & aq. rosarum aquis portionibus & permittantur exsiccari, maceretur septies, vltimo addendo croci gr. xii. Moschi. ambr. an. gr. x. cum syr. de sacco aurant. F. Magdalen vel massa.

*Electuarium præseruatiuum D. Georgij Curionis.*

℞. succ. Diptamn. succi folior. ruta sylu. in vere; in æstate verò ℞. eorum radices exsiccatas, an. Vnc. vi. Deinde

℞. Nucleor. ex iuglandib. excortic. Vnc. iii. fol. ruta domest. Vnc. iii. salis gemm. Vnc. i. ambr. Vnc. sem. vel ad minus Drach. iii. ficuum siccarum ad pondus omnium, Theriac. opt. sextam partem, myrr. opt. Vnc. i. baccar. lauri Vnc. sem. cum melle despumato q. f. F. Electuarium.

*Aliud eiusdem.*

℞. Nucum recent. iugland. n. xx. caricar. n. xvi. ruta, Vnc. iii. aristoloch. long. Vnc. i. tormentill. diptamn. lauri an. Vnc. sem. salis communis ad quantitatem nucis Gallicæ, mellis q. f. F. Electuarium.

Sumatur omni manè in quantitate nucis Gallicæ, addendo pro lubitu, theriac. Andromach. q. f.

*Puluis præstans D. D. Spirensium probatus & in præseruatione & curatione.*

℞. Imperat. carlin. phn. enul. aristol. rot. an. Dra. sem. pimpin. Drach. i. sem. citri, cordial. an. Scr. i. cardui ben. Scr. i. ligni aloës, croci, caryophyl. cardamom. macis, an. Scr. i. ambr. moschi, an. gr. viij. cinamomi, Drac. iii. aristoloch. long. Zedoar. an. 3. i. gentian. 3. sem. sem. meliss. maioran. agni casti, an. Dra. sem. rasur. ebor. C. C. vst. carabes, an. Dra. sem. unicornu, 3. ij. tormentill. Dra. ij. santal. citrin. Dra. i. sem. ros. rubr. Dra. sem. camphor. 3. sem. boli Armen. terr. sigill. ver. an. Dra. ij. corall. alb. rub. an. 3. i. limatur. auri, margarit. smaragd. an. Dra. sem. sapphir. Hyacinth. Granat. Rubin. an. Scrup. sem. Sacchar. q. videbitur.

*Conditum Pestilentiale.*

℞. Conseru. violar. rosar. borrag. bugloss. citri, an. Vnc. sem. spec. de gemm. fr. diamosch. dulc. sem. citri, acetos. verben. gentian. an. Scrup. sem. boli Armen. præp. terr. sigill. an. Scrup. iij. rad. diptamn. tormentill. Zedoar. doronic. off. de C. C. Hyacinth. sapphir. rubin. Granat. margarit. corallior. rub. santal. omnium, rasura eboris, spody Unicornu, an. gr. vi. diarrhod. Abbat. diarrag. frig. an. Drach. sem. fol. auri, n. iv. syrup. granat. q. f. F. conditum & deauretur.

*Confectio in Morsellis D. Sommerfeldts.*

℞. gran. iuniper. betonic. cinamomi el. nuc. mosch. macis, caryophyl. Zedoar. an. Scr. iij. salvia, menth. ruta, cichor.

*cichor. serpentar. angelic. aristol. long. & rot. enula campan. diptamni, gentian. tormentill. baccar. lauri, an. Drach. β. santal. amb. croci, daronic. sem. acetos. lenist. citri, cruce, oliban. mastich. terr. sigill. prep. myrrh. spodi, rasur. ebor. off. de C. C. unicorn. margarit. prep. sapphir. smaragd. corall. rub. ligni aloës an. Scr. i. boli armen. Dra. v. sacchar. q. f. dissoluti in aq. acetos. q. f. camphor. Scrup. sem. F. Confectio in mortulis.*

## Confectio in Rotulis eiusdem.

*℞. Santal. utriusque, rosar. rub. an. Scr. ij. sem. acetos. citri, an. Scr. j. margarit. Scr. ij. been alb. & rub. off. de C. C. serici combust. an. Scr. j. smaragd. Hyacinth. Sapphir. unicorn. an. Scr. sem. sem. basilicon. daronic. an. Scr. i. El. regis, diaborrag. an. Vnc. sem. Sacchar. tabarzet. q. f. F. dissoluto saccharo in aq. ros. confectio in Rotulis.*

## Sacculi redolentes contra aeris infectionem pro usu pharmacopolij.

*℞. maioran. basilic. lauend. rosar. an. Vnc. sem. cortic. aurant. Drach. iij. meliss. Drach. ij. styrac. calam. cinamomi, santal. citr. Zedoar. macis, caryoph. an. Drach. i. sem. acetos. coriand. endiu. an. Drach. sem. camphor. Ser. sem. spica Celtic. Drach. ij. croci gr. v. M. F. Sacculi quotquot volueris & in duplici sindone exhibeantur.*

## Pilula praeservativa pestis & pravorum humorum in corporeeductivae D. Sixti Kolbenschlag.

*℞. aloës succot. lot. Drach. iij. myrrh. Drach. j. sem. ambra Dra. j. xyloaloes, off. de C. C. serici crudi an. Scr. ij. been utriusque, tormentill. boli Armen. an. Dra. i. valerian. diptam. an. Dra. sem. croci Dra. sem. rhabarb. el. Drach. j. sem. agaric. Drach. j. spica Scr. j. sem. salis gemm. Zingib. an. Scr. j. cortic. citri Drach. j. schœnanth. asari an. Scr. j. Nuc. mosch. caryophyl. an. Scr. sem. myrobalan. chebul. Indor. citrinor, an. 3. β. diagryd. correct. Drach. ij. margaritar. camphor. an. gr. vi. eum Syr. de acetos. citri vel de limonib. F. Massa pilular. aut cum succo acetos. vel aq. absinthij. Dosis est, Drach. j.*

## Pilula pestilenciales D. Sommerfelts.

*℞. myrrh. croci, carab. boli Armen. corall. rubr. an. Dra. j. terra sigill. prep. Drac. ij. diptamn. Zedoar. sem. acetos. an. Dra. sem. camphor. gr. vi. aloës lot. ad pondus omnium. F. pilulae ad magnitudinem pestilentia- lium cum Syr. acetos. citri.*

## Electuarium liberantis pro pueris.

*℞. sem. santon. bol. Armen. an. Drach. ij. sem. cau- lium, citri, an. Dra. sem. rad. tormentill. enula, an. Scr. ii. corall. rubr. Scr. ij. smaragd. Hyacinth. Sapphir. an. Scr. sem. rasur. eboris, serici crudi, sem. Plantag. an. Scr. j. sacch. albiss. Vnc. viij. aq. acetos. scabios. cardui ben. an. q. f. F. confectio in rotulis.*

## Experimentum praestans in peste & omni veneno, saepe probatum.

*℞. rad. mēu, Olfenichij an. lb. j. angelic. Vnc. v. di- ptamn. Vnc. iij. tormentill. Vnc. ij. pimpinell. Vnc. i. β. Unicorn. opt. Dra. vi. Theriac. veier. opt. 3. ij. sem. Mi- thridat. Vnc. j. sem.*

Hæ radices omnes debent esse recentes & colligen- dae circa duo festa beatae virginis, quæ collectæ & an- tē mundatæ, postea subtiliter incidendæ sunt, tan-

dem desuper fundatur vini optim. quod emineat duo- bus vel trib. digitis super præscripta ingredientia. Stent per diem & noctem in infusione, tandem di- stillentur cautè & reponantur in vitro, & detur patien- ti bonus haustus, ieiunet desuper hor. vi. tandem à sudore detur ei citonium assum ad edendum, post hu- ius usum dentur ei cibi facili coctionis, & parum.

## Contra pestem mirabile.

*℞. rad. tormentill. chelidon. an. Vnc. iij. scabios. ru- ta, an. M. j. sem. acet. vini. lb. iij.*

Coquantur per quadrantem horæ & dimittantur infrigidari. Huius decoctionis

*℞. Vnc. j. in quâ dissolv. Theriac. Drach. ij. boli Armen. prep. 3. i. se. M.*

## Haustus sudativus optimus.

*℞. Theriac. electiss. elect. liberant. an. Drach. sem. Mithridat. Aure. Alexandr. pulv. diptamn. zedoar. terra sigill. croci hortens. an. Scr. j. boli Armen. Scr. ij. aq. scabios. sambuc. solatri an. Vnc. sem. vini ardentis, acet. an. Vnc. sem. M.*

## Alius haustus expertus.

*℞. Theriac. el. Drach. j. Mithridat. Scr. j. elect. de croco Scr. sem. gr. v. spec. liberant. Drach. sem. aq. ro- sar. scabios. acetos. an. Drach. j. M. Da infecto.*

## Aqua vite saluberrima & utilissima in pestis infectione.

*℞. Zedoar. diptam. alb. gentian. angelic. cardui ben. an. Vnc. sem. santal. alb. citrin. an. Drach. ij. mosch. opt. gr. v. camphor. Scr. sem. Theriac. Mithridat. an. Drach. vj.*

Infundatur in nostrâ aquâ vitæ: Stent in infusio- ne per iij. dies, postea F. distillatio in B. M. Deinde.

*℞. caryophyl. piper. nigri, gran. Paradis. an. Drach. ij. Nuc. mosch. Vnc. sem. macis, Vnc. j. cinamomi, Zin- gib. galang. an. Vnc. j. zedoar. Drach. sem. cubebar. Vnc. sem.*

Infundantur in aquâ vitæ nostrâ, stent in infusio- ne per dies viij. postea distillantur f. a.

## Haustus alius.

*℞. aq. bugloss. Vnc. vj. margarit. Scr. i. sem. rasur. auri Vngar. Scr. j. unicorn. veri; Scr. sem. M. F. Potus.*

## Electuarium pestis.

*℞. myrrh. croci, off. de C. C. an. Scr. ij. gr. viij. diptamn. Drach. ij. zingib. albiss. Vnc. sem. camphor. Drach. ij. zedoar. Scr. viij. tormentill. Drach. j. The- riac. Mithridat. an. Vnc. iij. M. cum aq. vitæ F. Ele- ctuarium.*

## Pulvis optimus & expertus à quodam rustico contra omnia venena.

*℞. rad. valerian. Vnc. iij. vincetox. Vnc. j. polypod. q. Vnc. i. angelic. ver. Vnc. j. urtic. min. Vnc. j. ange- lic. sylvestr. Drach. vj. alib. Vnc. ij. cort. rad. cooco- gnid. Vnc. i. Hæc singula in ollam novam vitream po- nantur, affundendo acet. vini acerrimi tantam, vt duobus vel tribus digitis superemineat, postea coope- riatur olla & perluretur optimè. Bulliant lentè, deinde per mediam horam satis bene refrigerentur. Coletur acetum per pannum & abiiciatur. Radicibus verò ma- ceratis*

ceratis & coctis addantur baccæ duodecim vuz lupinæ, & ad singulas baccas dena folia vuz lupinæ. Exsiccentur hæc omnia supra fornacem, puluerifentur, & per cribrum excutiantur. De hoc puluere tempore pestis propinetur Dra. i. cum vino albo, aut aceto pro diuersitate temporis.

### *Electuarium aliud salubre.*

℞. Fol. scordij Dra. vi. Zedoar. angelic. garyophyl. tormentill. diptamn. vulg. an. Dra. ii. gentian. Dra. i. sem. croci orient. Dra. i. theriac. vera Andr. Vnc. i. β. cum Syr. de succo scordij, F. Electuarium.

### *Theriaca cuiusdam D. Norimberg.*

℞. terra sigill. tormentill. an. Vnc. i. boli præp. diptamn. zedoar. an. Vnc. sem. smaragd. auri finiss. an. Dra. sem. sem. citri mund. Dra. i. ambra Scrup. i. croci Dra. i. F. omnium puluis, qui infundatur in syrup. limon. siue acetos. citri lb. i.

Stet tribus diebus in infusione, deinde.

℞. Theriac. opt. mithridat an. Dra. i. sem. deinde commisc. & F. Electuarium.

### *Haustus saepe probatus.*

℞. Vini distillati septies opt. Dra. vi. camphor. Dra. sem. croci in quantitate medix lentis. M, detur infecto post venæ sectionem in aq. acetos. aut Borrag.

### *Electuarium curatiuum nobilissimum contra pestem D. Hupertij.*

℞. tormentill. pimpin. angelic. diptam. alb. an. Vnc. sem. valerian. magistrant. morsus diab. gentian. serpentar. an. Dra. ii. aristoloc. vtriusque, chelidon. vngul. caball. plantag. mai. caryophyllat. cort. rad. capp. an. Dra. ii. Zedoar. Dra. iii. Herb. ruta, verben. veronic. an. Vnc. sem. scabios. gran. laur. iuniper. an. Dra. iii. cortic. citri, sem. citri, acetos. an. Dra. ii. sem. beën alb. & rub. doronic. lign. aloës, cinamomi an. 3. ii. galang. 3. ii. sem. myrrh. 3. iii. rasur. ebor. C. C. vst. Carabes, an. Drach. ii. sem. bol. Armen. terr. sigill. an. Vnc. sem. salis Drach. ii. nucum ingland. ab utroque cortice mundatar. n.º xl. sicuum pingu. n.º xxx.

Puluerifanda puluerifentur, ficus & nuces inciduntur. Coquantur demum cum lb. sem. mellis despumati, instar opiatæ. Vltimò add. Theriac. opt. Vnc. ii. Mithrid. Vnc. iii. M. simul.

### *Infusio contra pestem D. Aubusimi.*

℞. Bol. Armen. terr. sigill. amborum in aq. ros. & aceto præp. an. Vnc. vi. rad. diptam. alb. pimpinell. tormentill. valerian. zedoar. gentian. an. Vnc. ii. angelic. imperial. Vnc. iii. fl. vetonic. herb. scabios. cardui ben. an. M. ii.

Herbæ & radices lauentur cum vino alb. deinde inciduntur & infundantur in aceto & vini destillati an. lb. vi. Huic infusioni add. Theriac. veter. lib. i. Dos. pro senioribus Vnc. ii. pro iuniorib. Vnc. i. sem.

### *Electuarium cuiusdam Bauarici Medici.*

℞. pulu. saluificanti. Vnc. sem. spec. liberant. latificanti. Rasis an. Drach. i. β. zedoar. Dra. ii. rad. angelic. Dra. iii. sem. cardopat. Dra. ii. camphor. Scr. iii. doronic. Dra. sem. fol. ruta Scr. ii. sem. zerr. sigill. præp. 3. ii. unicorn. 3. i. off. de C. C. Scr. ii. sulphur. rub. præp. caryophyl. an. Dra. iii. spec. letifi. Galen. 3. i. diamarg. aromas. rosat. desr. Gab. an. 3. i. serici vsti Scr. ii. xyloaloes crudi Scr. ii. margarit. preparat. Scr. ii. sem. fol. auri n.º xxii. manus Christi perlat. Vnc. i. elect. de ouo Vnc. sem. theriac. veter. Vnc. vi. Mithrid. Vnc. ii. Cum Syrup. de succo acetos. F. Electuarium.

### *Trochisci præstantes & singulares tum in præseruatione, tum in ipsâ peste sublinguâ inter sudandum tenendi.*

℞. pimpin. scabios. tormentill. zedoar. an. 3. i. sem. angelic. 3. ii. sem. rasur. ebor. 3. i. spec. el. de gemm. diamargar. diamosch. d. an. 3. β. sem. ruta, acetos. citri an. Scr. ii. gr. viii. myrrh. elect. 3. ii. g. v. alipt. mosch. gallia mosch. an. Vnc. sem. Theriac. 3. v. Mithrid. Vnc. i. unicorn. 3. vi. Sacchar. tabarz. Vnc. xviii. cum mucilag. Tragacanth. F. Trochisci, demum inuoluantur in spec. liberantis.

### *Trochisci redolentes pro fumo in conclauis ipsius agri.*

℞. lign. aloës ladan. an. 3. i. Stry. calam. 3. sem. mosch. opt. gr. ii. Sacchar. Vnc. i. sem. Cum aq. ros. F. Trochisci.

### *Puluis præseruatiuus & curatiuus pestis à Doct. Viennensibus ordinatus.*

℞. Hyacinth. 3. i. smaragd. Rubin. an. 3. ii. margarit. 3. i. sem. corall. amb. an. 3. iii. boli Armen. Vnc. i. crystall. 3. i. lap. hemat. 3. i. diptamn. tormentill. zedoar. angelic. doronic. mors. diab. pimpinell. valerian. beën vtriusque, rhabarb. el. an. Vnc. sem. C. C. vst. præp. 3. iii. rasur. ebor. santal. rub. & citr. an. 3. i. croci, 3. sem. cinamomi elect. Vnc. sem. serici 3. sem. sem. acetos. portulac. coriand. an. Scr. i. fl. violar. borrag. bugloss. nenuph. an. 3. i. sem. rosar. 3. ii. camphor. Drach. i. fol. aur. argenti an. num. x. M. F. l. a. Puluis.

### *Electuarium D. Castneri.*

℞. Conser. fl. tunic. Vnc. ii. acetos. Vnc. i. Theriac. Venes. Vnc. v. Mithridat. Vnc. ii. sem. rad. Angel. Vnc. sem. tormentill. 3. i. sem. diptam. 3. ii. zedoar. 3. iii. boli Armen. præp. 3. ii. cardopat. 3. i. sem. fol. ruta 3. i. croci oriental. Scr. i. sem. camphor. Scr. iii. sem. sulphur. rub. præp. Scr. v. unicorn. Scr. ii. sem. smaragd. 3. i. sem. margar. Scr. ii. sem. fol. auri n.º xv. ambra Scr. i.

Cum Syrup. acetos. citri & succo acetos. F. Electuarium.

### *Aqua Bezoartica multum commendata.*

℞. Caryophyll. piper. long. granor. Parad. an. Drach. i. β. nuc. mosch. 3. i. macis, cinamomi, Zingiber. alb. galang. an. Drach. ii. zedoar. Drach. i. sem. cubebar. 3. i. lign. aloës. Scr. ii. sem. Conquassentur omnia & infundantur simul in iustâ quantitate spir. vini rectif. ad iustum tempus digestionis, postea distillantur s. a. igne primi gr. Deinde.

℞. Zedoar. diptamn. alb. gentian. angelic. montan. cardopat. cardui ben. petasi. an. Vnc. i. santal. alb. citri an. Vnc. sem. mosch. gr. iii. camphor. Scr. sem. Theriac. Alexand. Mithridat. opt. an. Vnc. i. sem.

Contundantur & iterum misceantur cum prædictâ aq. destillatâ, ac digerantur simul tempore conueniente. Postea iterum distillantur & vsui seruentur in vase idoneo.

Dos. est cochl. i. sem. dissol. in aq. acetosæ aut rosar.

### *Puluis Bezoarticus pro pauperibus D. Kegleri.*

℞. Castor. baccar. lauri, an. Vnc. sem. aristol. ros. Drach. ii. gentian. nucis mosch. an. Drach. i. camphor. Scr. i. omnia redigantur in puluerem.

Puluis



*Pulvis pretiosus tempore pestis haud contemnendus.*

℞. rad. tormentill. serpentar. leuistic. corall. alb. turpesh. spermatis ceti, an. Vnc. sem. rad. fœnic. cortic. citri, an. Drach. i. margarit. granator. an. Drach. sem. M.

Ex hoc puluere da Scr. i. mixtum Theriacæ præstantissimæ Dra. i. & acet. vini vel cum aq. scabiosæ.

*Emplastrum mollificatiuum & maturatiuum.*

℞. rad. lilior. alb. valerian. raphani, pirethri, sem. sinap. an. vnc. sem. gumm. ammoniac. sagapen. galban. opopan. an. Drach. vi. pulu. scabios. chamam. an. Drach. ii. caricar. ping. n.º. v. succi cape assata Drach. ii. ol. scorpion. lilior. visci quern. an. q. s. Gummi dissoluantur & F. s. 2. Emplastrum.

*Emplastrum aliud mollificatiuum, maturatiuum & aperitiuum, Doctoris Sturciadis.*

℞. Emplastri diachyl. simp. Vnc. iii. ammoniac. galban. dissolut. in aceto Vnc. ii. ferment. Vnc. iii. sem. sinap. Vnc. i. cappar. assatar. n.º. iii. ficum ping. n.º. viii. unar. pass. sine arillis Vnc. i. sem.

Contundantur, & dissoluantur singula. F. cum ol. ros. resinâ & cerâ, in modum Emplastri.

*Aliud.*

℞. lingu. passer. ruta, scabios. plantag. cortic. med. sambuci. ebuli an. M. i. exprimatur succus, cui adde butyr. marialis q. s. F. Linimentum.

*Topica Spirensia.*

℞. Theriac. Venet. Drach. i. sp. diamosch. d. ladan. an. Scr. sem. Fiat cum modico oleo de spicâ linimentum.

*Emplastrum.*

℞. cap. ass. n.º. iii. ficum n.º. x. Theriac el. Vnc. sem. pulu. castor. Drach. i. F. ad formam Emplastri.

*Linimentum mollificatiuum & aperitiuum.*

℞. Mell. Vnc. ii. salis communis, alb. Graci an. Vnc. i. pulu. gran. iuniper. Vnc. sem. F. Linimentum.

*Aliud cuiusdam periti Medici pro bubonibus curandis.*

℞. Capam, eam repleto ficibus, rutâ & optimâ Theriacâ. Hanc itaque lino crasso, vel canabe circumligatam assabis, ab assatione in mortario contundes, atque calidè buboni impones, idque singulis horis renouabis.

*Alia familiaria & usitata Topica medicamentata pro apostematibus curandis.*

℞. ruta viridis, raphani in taleolas dissecti, an. M. i. si nap. cochl. i. omnib. contulis seorsim, deinde M. omnia, ex illis impone apostemati.

*Aliud.*

℞. vimum gallin. M. cum albumine oui in formam emplastri, quod applicatum apostemati extrahit venenum.

Item ℞. medium corticem sambuci, tantundem fa-

rinæ auenaceæ, coque cum optimo crasso lacte, ad formam pulmenti, & calidè applicetur, quod citissime maturat apostema, ut aperiri possit.

*Pro Carbunculis & Anthracibus.*

℞. Vuam lupinam Germ. einbeern. ea habet 4. folia & in medio nigram baccam. Ex iis folium vnum pustulis applica quater in die, semper nouum apponendo.

## MEDICAMENTA CONTRA PESTEM, PRO REPV. DRESDENSI, Ordinata

A

D. IOHANNE NÆVIO  
Elect. Saxonie Medico.

Anno 1566.

*Pulvis Praservans.*

℞. Terra Armeniaca Orientalis vera, & ter ex aq. scabiosa abluta, Vnc. sem. rad. Scabios. tormentill. valerian. Petasit. gentiana, aristol. rotund. dictamni nostratis, Enul. cāpan. Angelic. Brisgoënsis, an. Dra. xv. Fol. Dictamni Cretici, scordij Cretici, an. Scr. iii. cardui bened. Dra. i. cinam. interioris opt. acuti saporis Dra. ii. b. corticū mali citri Dra. ii. seminis eiusd. ex cort. Dra. i. b. acetos. Dra. i. sancti, Dra. b. cornu Cervi vsti, Scr. iii. scobis Eboris, Dra. sem. ramentorum unicornu veri, si haberi poterit, Drach. sem. coral. ambor. præp. an. Scr. ii. Margaritar. oriental. præp. Dra. i. santali lutei, croci Oriental. seminis endiuia an. Drach. sem. camphor. Scr. i. succini albi Scr. ii. ligni aloës crudi Drach. sem. ossium ex corde Cervi Dra. i. pastillorum ex Caphurâ. Drach. i.

Pulueriscentur subtiliss. & misceantur, mixtis adde Spec. Elect. de gemmis, confectiois cordialis, an. Scr. ii. Folior. auri puri subtiliss. inciss. num. vii. sacchar. albiss. Vnc. ii. Singulis bene commixtis fiat pulvis. Dos. p. i.

*Rotula Praservatiua.*

℞. Spec. pulueris præscripti Drach. vi. Conseru. Borraginis, Buglossi, rosar. an. Scr. i. Sacchar. albiss. in aq. acetosâ & parum Vini Rhenani dissoluti Vnc. vii. Fiant Placentulæ.

*Electuarium Praservatiuum.*

℞. Conseru. Borraginis, Buglossi. Viot. Rosar. acetos. an. Vnc. i. Rosmar. Drach. vi. rad. tormentilla, Dictamni nostratis, Zedoar. elect. Angelicæ Brisgoënsis an. Dra. i. ossis de corde Cervi veri, Dra. sem. Cortic. citri Scr. ii. seminis mali citri ex cort. Dra. sem. Terra Armeniaca cum aq. acetosâ ter abluta Dra. ii. Sigill. Lemnij Turcici Dra. i. santal. omnium an. Scr. sem. Croci oriental. Scr. sem. Theriaca vete. Andromach. Vnc. i. Mithridatij boni Dra. vi. aceti rosati cochlearia vi. Theriaca cum Mithridat. in aceto dissolutur: deinde addantur pulueres & conseruæ: & omnia diligenter subigantur in mortario ad formam Electuarii: quod folio Auri tegatur.

Sumatur manè magnitudine nucis anellanæ vel per se, vel sex cochlear. aq. scabiosæ, aut vini Rhenani, sed cal. 12

calidè melius, si sumitur cum urinâ propriâ. Potest etiam parari sine Theriacâ & Mithridatio.

### *Sacculus Cordialis Prasern.*

℥. Flor. Borriginis, Buglossi, ros. rub. an. M. sem. fol. Meliss. Basilic. seu ocymi Gariophyll. an. Vnc. sem. Dictamni Cretici Vnc. sem. Cort. citri recent. Dra. iii. zedoar. electa Dra. ii. santali citrin. Dra. i. ligni aloës crudi Scr. ii. specier. cord. temperat. confectionis liberantis sine bolo & aloës, an. 3. i. β.

Incidentur flores cum foliis & parum conquassentur: redigantur & reliqua in puluerem crassiusculum, & additis speciebus cum cæteris diligenter mixtis impleatur sacculus Cordialis ex serico rubro factus, & interfluatur.

### *Linimentum Cordiale.*

℥. Unguenti de nymphæâ luteâ Dra. i. sem. Theriaca Andromach. Mithridatij boni an. Vnc. sem. succi borraginis defecati Dra. iii. olei. de mace. Dra. sem. de croco Dra. ii. spec. cordial. temperat. pro Epithemat. Dra. i.

Misceantur omnia diligenter, donec veniant ad formam linimenti.

### *Pilulæ.*

℥. Aloës rosat. 3. iii. Rhabarb. electi opt. agarici trochiscati boni ana 3. i. sem. Epithymi Cretici 3. sem. Mass. pilular. Russi verar. 3. i. Cornu cervi vsti, rad. Angelica an. Scr. i. Corallina, scordij Cretici, fol. dictamni Cretici, zedoar. electa, rad. tormentill. santal. lut. an. Scr. sem. schananos gr. iii.

Pulveriscentur singula & cum aq. acetosæ & modico vini Rhenani fiat massa. Ex qua formentur pro qualibet drachmâ, pilulæ 21. Dos. drach. i. vel sem.

### *Pro Infantibus.*

℥. Spec. Elect. de gemm. frig. Dra. i. sem. liberantis cum bolo 3. ii. β. diarrh. Abbat. Dra. i. β. Corall. rub. prap. Dra. sem. off. ex corde Cervi vel. Scr. i. seminis sancti Dra. i. rad. Pæonia, Granor. eiusdem excort. an. Scr. ii. cinamom. inter. opt. Vnc. β. vel Dra. iii.

Pulverisa pulverisanda subtilissimè, adde sacchari albiss. Vnc. ii. F. Pulvis.

### *Pro gravidis Rotula.*

℥. Margarit. orient. non perforat. Dra. sem. Lapid. pretiosior. ingredien. El. de gemmis an. Scr. sem. Cornu cervi vstian. Scr. ii. rad. Pæonia, gran. eiusdem excortic. an. Dra. sem. spec. diamargarit. Auscenna, confectionis cordialis an. Dr. i. sacch. rosati veteris Dra. β. sacchari albiss. in aq. acetosæ & rosarum dissoluti Vnc. vi. β. F. Confectio in placentalis.

### *Electuarium Curativum.*

℥. Theriac. veteris Androm. Vnc. i. Mithridat. boni. Elect. de oño an. Vnc. sem. Antidoti de sanguinib. Dra. vi. rad. tormentill. fol. dictamni Cretici, scordij Cretici an. Dra. β. rad. dictamni nostratis Scr. ii. terra Armeniaca Oriental. sigilli Lemny Turcici an. Scr. iii. cornu cervi vsti, ramentor. unicorn. si haberi poterint, an. 3. sem. seminis acetosa, mali citrij excort. sancti an. Scr. i. caphura Dra. sem. }

Pulverisanda pulveriscentur subtilissimè, & cum Sy. acetositis citri q. s. redigantur ad formam Elect. regantur folio auri.

N.B. Infantibus hoc Electuarium non detur.

### *Aqua.*

℥. rad. dictamni nostratis, gentiana, zedoar. electa, angelica Brisgoensis, Carlina, Imperatoria, cardui bened. an. Vnc. ii.

Incidentur omnia & bene conterantur. Deinde.

℥. Santalor. luteor. alb. an. Vnc. ii. moschi Alex. opt. Scr. i. caphura Scrup. ii. Theriac. veteris. Mithrid. bon. an. Vnc. iii.

Pulverisanda pulveriscentur, & simul omnia ponantur in organum vitreum, quibus superfunde spiritum vini, siue vini destillati boni lb. iii. stent in loco calido duobus diebus, deinde colentur per pannum lineum, colatura vsui seruetur. Siquis autem totam compositionem per Alembicum, vt vocant, destillaret, haberet aquam palato magis gratam.

Sumatur manè cochl. i. cum aq. cardui bened. vel acetosæ cochl. iii. pro prasernat.

Infecti fumant cochl. iii. vel. iii. & sudent aliquot horas.

### *Oleum pro cute & pulsibus & bubonibus.*

℥. ol. tormentill. lib. i. laurini, abietis an. Vnc. vi. gummi elemi Vnc. iii. hedera Vnc. ii. sem. euphorbij Vnc. sem. olivani, ligni aloës crudi an. Vnc. ii. mastiches, myrrha, aloës, ladan, castorei, serapini an. Vnc. ii. sem. galanga, cinamomi, garyophyllor. nuc. myristica, cubebæ, zedoar. elect. an. Vnc. i. opopanacis Vnc. β. resina pini, picis navalis an. Vnc. sem.

Terenda terantur, & in vas vitreum recondantur, & stent diebus octo in fimo. Postea lento igne destillantur, & oleum exiens diligenter colligatur, & vsui seruetur.

*Si ager sudore defatigatus fuerit, utatur sequenti Confortativo.*

℥. Conf. borrag. bugloss. an. Vnc. i. rosar. acetosell. an. Dra. vi. Rob. de ribes Vnc. i. de berberis, de cerasis an. Vnc. sem. sem. citri excort. Dra. sem. terra Armeniaca Oriental. sigilli Lemny, an. Dra. sem. margarit. Oriental. splend. & prap. Dra. sem. caphura gr. vi. corall. rub. Scr. i. ossis de corde cervi veri Dra. β. specier. elect. de gemm. Scr. ii. syrapi acetositis citri q. s.

Fiat mixtura ad formam Conditi. Sumatur sæpe magnitudine Castaneæ.

### *Emplastrum ad Apostemata.*

℥. Fermenti Vnc. sem. raphani Vnc. i. sem. farin. sem. sinap. Dra. i. cap. assa Dra. ii. sem. ally ass. Diac. i. sem. theriaca Dra. iii.

Misceantur omnia in mortario, & F. cataplasma apostemati imponendum ter de die.

### *Aliud ex Gummatibus.*

℥. Caricar. non rancidar. Dra. iii. passular. min. exemptis nucleis, gummi Ammoniacy an. Vnc. sem. Bdellij, Serapini an. Drach. ii. sem. succi Apij Vnc. ii. sem.

Gummata in aceto dissoluantur: Postea in mortario omnia diligenter misceantur, & fiat Emplastrum.

Applicetur calidè, post sex horas renouetur.

## MEDICAMENTA CONTRA PESTEM, CONSCRIPTA

A

D. IOH. SCHROTERO,  
Profess. Medicinæ in Aca-  
demia Ienens.

Anno 1566.

*Pulvis preseruans.*

℞. Zedoar. rad. diptam. alb. gentian. herb. scord. cardui  
ben. acetosa. an. Fiat pulvis. Dos. Dra. i. manē in aq. Car-  
dui bened. vel hyeme in vino albo.

*Electuarium de nucibus.*

℞. Nuc. iuglandium xx. ficuum pinguium, xxv. aristol.  
long. & rotund. Vnc. i. β. diptamn. alb. rad. tormentill. pim-  
pinelle. an. Drach. ii. β. fol. absinth. ruta, scabiosa, asari, an.  
Manip. i. bacc. lauri Dra. ii. sem. cortic. citri, galang. macis  
an. Dra. i. flor. borragin. z. ii. off. de corde cerui, Myrrh. an.  
z. i. mellis opt. despumati mensuram vnam cum dimidia  
F. L. a. Electuarium, de quo sumatur quouis manē bolus  
magnitudine Castaneæ.

*Morsuli pro ditioribus.*

℞. Cinamomi elect. bol. armen. prep. an. Vnc. i. corn.  
cerui vsti, sem. citri, limon. acetosa an. z. i. β. diptamui, tor-  
mentilla, angelica scabiosa, cort. rad. borrag. santal. omnium  
an. Drach. i. rosar. rub. garyophyl. coriandr. prep. sem. portu-  
laca, rasura eboris an. Ser. ii. sem. anisi, marathri, ligni  
aloës, nucus mosch. serici crudi, sem. iunip. in acet. infusi,  
sem. coti an. Drach. sem. off. de corde cerui, fragment. pre-  
tios. an. gr. xv.

Puluerifatis puluerifandis omnibus subtiliter, cum  
f. q. sacchari optimi dissoluti in aqua ros. & acetosa. Fiat  
confectio in morsulis pondere Dra. ii. Dosis n<sup>o</sup>. i. ante-  
quam aëri te exponas.

*Electuarium pro infantibus & grauidis.*

℞. Cortic. citri, sem. citri, coriandri prep. garyophyl. an.  
Vnc. sem. spodi, corall. rub. ligni aloës crud. sem. portulaca  
acymi, santal. rub. rasur. eboris, zedoaria, nucus mosc. an.  
Dra. i. sem. acetosa, terre Lemnia an. Dra. iii. serici minutim  
inci, corn. cern. prep. an. Scr. ii. cinamom. electi Vnc. i. off.  
de corde ceru. n<sup>o</sup>. viii. margarit. prep. fragment. pretios. an.  
Scr. iii. folior. auri fini num. xxx. conseru. borrag. bugloss.  
rosar. an. Vnc. ii. sy. acetos. citri Vnc. iii. sacch. albiss. q. s.  
dissol. in aquis Melissa & Bugloss. F. Elect. in formā  
opt.

*Electuarium pro grauidis pauperibus.*

℞. rad. tormentill. Helenij an. Drach. vi. sem. anisi,  
cerui Vnc. i. sem. Fiat cum melle despumato Electua-  
rium.

*Rotula.*

℞. Terra Lemnia vera, boli Armen. an. Dra. vi. rad.  
tormentill. diptamni, santal. rub. an. Drach. ii. sem. Zedoar.  
Drach. ij. cort. citri, margar. an. Drach. i. rasur. eboris, croci,  
scordij an. Scr. ii. fragment. prep. Smaragdi, Hyacinthi,  
Dag. Sennerti Tom. II.

Rubini, Sapphyri, corall. alb. carab. an. Scr. j. cornu cerui  
prep. Scr. iii. fol. aur. num. x. sacchari dissoluti in aq. ros. &  
scabios. Fiat confectio in rotulis.

*Electuarium.*

℞. Spec. Diatriosant. conseru. rosar. borrag. Nymphaea  
an. Vnc. sem. boli Armeni, terr. Lemn. prep. Carlin. Ze-  
doar. an. Drach. sem. fragment. s. lapid. pretios. an. Scr. i.  
Mithridat. opt. Drac. j. fol. auri num. iii.

Cum Syr. acetositaris citri. Fiat Electuarium.

*Electuarium pretiosum & probatum.*

℞. Tormentill. Vnc. iii. cardui bened. Vnc. iii. sem. Car-  
lin. Vnc. ii. terr. Lemn. prep. boli Armen. prep. an. Vnc. i.  
caphur. Drach. ii. Moschi, ambr. an. Scr. ij. Theriac. elect. 7.  
annor. Mithridat. opt. & recte dispens. an. Vnc. iii. sem.  
Specier. diamarg. secundum Nicolaum Dra. ii. sem. aq. vit.  
ex Maluatico destill. q. s.

Puluerifatis omuib. subtiliter ponantur in phialā  
vitrea, & ore ipsius bene obturato maneat in infusio-  
ne per 24. horas. Postea strauiter destillentur, vsquequod  
remaneant feces siccae: & aqua seruetur. Cui adde sacch.  
albiss. & opt. lb. i. sem. croci Drach. ii. Bulliant ad spissitu-  
dinem syrupi & tunc adde Zedoar. Dra. ii. boli Armen.  
prep. Dra. iii. terr. sigillat. Drach. iii. Carlin. corn. ceru. in-  
sto tempore collecti & prepar. an. Vnc. i. lap. serpentis an.  
Scr. i. Hyacinthi, Sapphyri, Granati an. Dra. i. Margarit.  
Matris perlar. an. Dra. ii. Corall. alb. rubr. santal. alb. rubr.  
an. Dra. i. cort. citri, offis de C. C. an. Scr. ii. beēn albi, rubr.  
an. Dra. i. fol. auri num. xxx. argenti num. xxxvi. Syr. ace-  
tos. citri, de limonib. acetosell. rob. ribium an. Vnc. ii. conf.  
ros. borrag. bugloss. an. Vnc. ii. sem. M. F. Electua-  
rium.

*Elixir vita.*

℞. Cinam. opt. Vnc. i. Rosismarin. acetosell. scordij an.  
M. sem. rad. Angelic. ros. rubr. ligni aloës an. Dra. i. santal.  
citrin. Drach. sem. maceris, cardamomi viriusque, garyo-  
phyl. medul. sem. cardui bened. oxalidis, citri an. Scr. i. mo-  
schi gr. viii. Aq. vit. ex vino ter destillar. Vnc. xxii.

Per xv. dies quotidie quinquies agitando in vitro  
obturato reposita mancant, postea colentur, adde  
Syr. de cortic. citri, Min. cotoneor. an. Vnc. ii. sem.  
Misce.

*Pilula.*

℞. Aloës elect. Dra. ii. myrrh. croci an. Dra. sem. rha-  
barb. elect. Agarici trochiscati. an. gr. xiiii. caphur. gr. xvi.  
ros. rubr. santal. omni. corall. rub. an. gr. iiii. zedoar. tormen-  
till. diptamni, gentian. an. Scr. sem. Cum Syrupo acetosi-  
tatis Citri Fiat massa pilularum.

*Pilula magis laxantes.*

℞. Aloës hepatic. Dra. vi. myrrh. Dra. iii. croci Dra. i.  
rhabarb. Dra. ii. agaric. Dra. i. sem. garyophyl. spic. an. Scr.  
sem. cortic. citri Dra. i. tormentill. Dra. sem. sem. citri Dra. i.  
sem. santal. rubr. Dra. i. terr. Lemn. prep. Scr. ii. caphur. gr.  
iii. Cum Syrupo acetositaris Citri Fiat massa.

*Pilula Hyemales.*

℞. Aloës succotrin. Agarici trochiscati, an. Dra. iii.  
sem. rhabarb. elect. Dra. ii. sem. myrrh. chebul. Scr. ii. zin-  
gib. cinamomi, garyophyl. an. Dra. sem. ros. rub. corall. viri-  
nsque an. Scr. i. sem. Citri, myrrha, croci an. Scr. sem. rad.  
Peonia, sem. eiusd. Zedoar. diptam. alb. pentaphyll. gentian.  
an. gr. vii. Cum Syr. de corticib. Citri Fiat massa.

V

*Pulvis.*

## Pulvis.

℞. Medull. corn. ceru. Monocerotis an. Dra. i. dorenicis, Zedoar. an. Dra. sem. Misce F. Pulvis.

## Trochisci sublinguales.

℞. Mithridatij opt. Elect. de ovo an. Dra. ii. rad. angelic. Dra. i. sem. ligni aloes, maceris an. Drach. i. corticis citri, Iréos, an. Dra. sem. Alipt. moschat. Gall. moschat. ros. rubr. an. Scr. ii. sacch. opt. Drach. vi. Cum mucilagine Tragacanthi infusi in aqua ros. & angelicæ, Fiant Trochisci. ætate addantur bolus Armenus, flores Nymphææ, Violar.

Vnguentum pro illis, qui infectos visitant, quo inungenda nares bis vel ter quotidie item cor.

℞. Vini Maluatici, ol. Hypericonis an. lib. sem. Scorpion. ros. an. Vnc. iii. spic. Aceti de vino an. Vnc. ii. succi. Meliss. Borrag. acetos. abrasan. rosar. an. Vnc. i. Pulv. chamedryos, salu. rosar. meliss. cardui bened. an. M. sem. rut. verben. menth. florum Hyperic. an. p. i. diptamn. albi. gentian. Aristoloch. rotund. aloës, myrrh. an. Dra. i. β. ladani, styrac. calamit. benzoï an. Dra. ii. spic. Dra. sem.

Bulliant ad consumptionem humiditatis completam, deinde adde ceræ novæ parum.

Fiat linimentum, cui, quando ab igne aufertur, adde specier. cordial. temperat. santal. rubr. an. Drach. ii. Gallie mosch. vere Drach. i. sem. myrrhæ, aloës, ladani, styracis calam. an. Scr. iii. croci caphura, zedoar. diptamni albi, cardui benedicti, chamedryos, iréos, gentiana an. Dra. i. Misce Fiat s.a. vnguentum.

Ab infectis ad alios regredientes utantur hoc pulvere suffumigatorio.

℞. Bacc. iunip. Vnc. iii. Myrrh. aloës an. Vnc. i. succini, sant. alb. an. Vnc. sem. thuris, styracis calamit. ladani, thymiamatis an. Drach. ii. Fiat ex omnibus pulvis crassiusculus.

## Curatio infectorum.

## Pulvis alexiterius pro robustis.

℞. Gentian. diptam. alb. torment. an. Scr. i. cardopat. terr. sigillata Turcica aqua acetos. lote. santali rubr. cornu cerui vsti, Zedoar. corall. rubr. prap. an. Scr. dimid. camphor. gr. i. sem. F. Pulvis. Detur in Vnciis tribus aquæ Scabiosæ addendo Scrup. vnum Mithridat. vel Theriacæ optima.

## Alius.

℞. Diptamn. alb. tormentill. gentian. Cardopat. zedoar. scordij, rad. Cardui bened. thapsi barbat. an. Scr. i.

Sumatur in aceto vini, tempore æstivo; in vino, hyberno tempore.

Si addere volueris Theriacam, minorem pulveris dosim assumes.

## Alius.

℞. spec. cordial. Drach. ii. carnu cerui rasi in isto tempore collecti Drach. i. myrrh. rubr. sem. santonic. an. Drach. sem. Fiat Pulvis subtil. Detur in aceto vini calido.

## Aqua Mithridatica.

℞. diptamn. alb. lb. i. rad. tormentill. pentaphyll. an. lib. sem. zedoar. scordij, rut. an. Vnc. iii. sem. cardui ben. carlina, valerian. an. Vnc. ii. rad. pæon. sem. eiusdem an. Vnc. ii. aq. nucum lib. viii. chamadr. rosar. scabios. chamapit. an. lib. i. succi scabios. angelic. chelidon. galeg. an. lib. i. sem.

Contusas radices cum aquis & succis macera super cineribus calidis per 24. hor. postea adde vini granator. lib. i. sem. Mithridat. opt. confer. acetosell. an. lib. i. rosar. borrag. bugloss. citrangul. an. Vnc. iii. Spec. diamargarit. fr. Vnc. i. El. de gemm. Vnc. sem. diamosch. d. Drach. ii. F. arte per vitrum distillatio summâ cum diligentia.

## Aqua theriacalis.

℞. Theriac. Androm. recto dispens. pentaphyll. cum toto an. lib. sem. confer. acetos. citri, acetosell. rosar. bugloss. borrag. an. Vnc. iii. rad. diptamn. alb. valerian. angelic. cardui ben. morsus diabol. an. Vnc. iii. galang. serpentar. pimpinell. tormentill. pæonia, an. Vnc. i. sem. Cort. citri, sem. citri ramentor. C. C. sem. pæon. an. Vnc. i. bol. Armen. terr. Lemnia. legit. an. Vnc. β. santal. omnium, Margarit. fragment. lap. pretios. prap. in succo limon. spec. diamb. an. Drach. iii. caphur. Dra. i. Mosch. Dra. sem. vini ter destillati ex vino optimo lib. vi. aq. nucum lib. iii. angelic. lib. iii. suc. scabios. rut. verben. pentaphyll. lib. i. β.

Hæc crasso modo contuso infundantur simul, excepta Theriacâ & conferuis per dies 2. naturales, & postea F. arte destillatio per vitrum.

## Aqua alia Destillata.

℞. Theriaca Andromach. Vnc. i. β. pentaphyll. cum toto, sem. Pæonia an. Vnc. i. rad. sigill. Salomonis, Helenij, tormentill. Pimpinell. Angelic. Ostru. coran. ceru. vngul. alci iusto tempore collect. terra Lemnia ver. sem. Eruca. Garyophyllor. an. Vnc. sem. sem. citri, cinamomi, ligni aloës an. Dra. i. Margarit. cum succo limon. prap. santali utriusque an. Scr. i. Moschi. Scr. sem.

Pulverifatis omnibus subtiliter infundantur per 24. horas in lib. vi. aut f. q. aquæ vitæ ter de vino opt. destillatæ & postmodum fiat arte destillatio.

## Alia.

## Infusio vel Destillatio.

℞. Succ. Galeg. lib. β. aut eius loco, succi Pentaphylli lib. sem. Theriaca Andromachi, Mithridatij opt. an. Vnc. iii. Imperatoria, Carlina, zedoar. diptamni albi, Angelica, Gentiana, Card. ben. an. Vnc. ii. Pentaphylli cum toto Vnc. i. sem. sem. Pæonia Vnc. i. specier. elect. latizia Galeno adscript. Diamargarit. frigid. ana. Vnc. sem. Caphur. Scr. ii. Moschi Scr. i. fol. auri num. xv.

Terenda conterantur, & fiat vel infusio vel destillatio in ix. libris Vini ter destillati.

## Pulvis.

℞. Sacch. candi 3. i. Zinzib. alb. Scr. ii. Caphur. Scr. i. Detur calide in vnciis tribus aq. scabiosæ, vel angelicæ.

## Electuarium Curativum.

℞. Theriac. Andromach. Vnc. i. Mithridat. elect. Vnc. sem. scordij, galeg. an. 3. vi. tormentill. zedoar. diptam. alb. Verben. an. 3. iii. Angelic. Carlin. Gentiana an. 3. ii. terr. Lemn. prap. an. 3. i. β. Caphura 3. ii. spec. Diamarg. Scr. ii. Diamoschi dulcis 3. β. Cum syr. de scordio fiat Electuar. Posia



## Potio pro Grauidis.

℞. Sem. *Pæonia maris* num. xv. pulueriscentur & coquantur in vnc. iii. aq. *Meliss.* vnicâ ebullitione, postea addatur. *Pulu. Card. bened. zedoar. Tormentill.* an. Scr. ii. *Aceti de vino* Scr. i. Misce Fiat potio. Hyeme pro aceto sumatur vinum.

## Ad Bubones & Apostemata Emplastrum attractivum.

℞. *Ammoniaci, Euphorbij, Castorei, Opponacis, Galbani* an. Vnc. β. Dissolutis in vino adde. sem. *Eruca, sinapis, Raphani* an. Vnc. β. *Squilla* Vnc. i. *Facum ol. lini.* Vnc. sem. *styr. calam* Drach. ii. *Cantharid.* num. xij. *Cera & ol. lini & vini sublimati* q. s. Fiat. Emplastrum.

## Emplastrum de Fuligine Camini Iacobi Riccy.

℞. *Theriac. opt. Mithridat.* an. Vnc. β. *Fermeti, Terebinthina* an. Vnc. ii. *Mellis ros.* Vnc. i. sem. *Butyri recentis* Vnc. i. *salis communis* Vnc. i. *Fuliginis camini* Vnc. ii. *β. saponis saracenicis* Vnc. iii. *Croci, Drach. iij. Vitell. ouorum* quatuor. Pistentur. omnia. & fiat Emplastrum.

## MEDICAMENTA IOH. GVINTERII ANDERNACI.

Anno. 1566.

## Antidotum ad Pestilentiam.

℞. *Fol. absinth. Cnici agrestis seu Cardui bened. chama-dryos, chamapytios* an. M. β. *gine* Vnc. i. *Flor. Betonica altis-sia, Buglossi, Scabiosa, Cysij seu Borriginis* an. P. i. *se-min. citri, Acetosa, Portulaca, Petroselin, Coriand. prap.* an. Drach. β. *semin. anisi, fenicul. ammeos* an. Scr. ii. *Bacc. iunip. Drach. i. Garyophyll.* Scr. iii. *Cortici citri, aurant.* an. Drach. i. sem. *ligni aloës s. agalochi. santali. omn.* an. Drach. i. *cinamom. electi.* Drach. iii. *gal-langa, Drach. i. sem. rad. Pimpinell. Diſtam. alb. zedoar. tormentill. Angelica, Imperatoria, Carlina, Iridis Illy-rica s. Florentina Rhubarb. Centaurei, Rhapontic. Gen-tian.* an. Drach. i. *Myrrh. elect. & odor, Thuris* an. Scr. ii. *Strybeos prap.* Scr. ii. sem. *Croci* Scr. ii. sem. *boli Ar-meni veri* Drach. i. *Terra sigillat.* Drach. i. *Succin. alb.* Scrup. iii. sem. *Vnicornus, Off. de corde Cerni* an. Dra. sem. *Spec. Elect. de gemmis, Diarhodon, Laxificantis Galeni. Liberantis* an. Scr. i. *Hyacinthi, sapphir. sma-ragdi, Corall. rubr.* an. Scr. sem. *Ambr. Mosch.* an. gr. viii. *succi Berberor. mali punici, citri acidi, absinthij* an. Vnc. i. *sacch. Penid. Vnc. i. candi* Drach. i. *albiss. q. s.* Fiat mixtura instar antidoti seu Opiatæ.

## Tessella.

℞. *Radic. Gentian. Angelica. zedoar. Helenij, Pim-pinell. Tormentill. Iridis Florentin.* an. Drach. ii. *Semin. citri. Oxalidis, Cichorij, anisi* an. Drach. sem. *Baccar. iunip. Dra. i. Glycyrrh. Drach. i. sem. Corticum mali aurant* Scr. ii. *Cinamomi elect.* Drach. iii. *santali rubr.* Drach. i. *Agallochi seu ligni aloës* Drac. β. *Ramenti eboris, Offis de corde Cerni* an. Scr. i. *Croci, ambr.* an. Scr. i. *Conserua acetosell. bugloss.* an. Drach. ii. *rosarum* Vnc. sem.

Cum Saccharo & aqua scabiosa fingantur tabellæ pendentes drach. semissem. Sumantur manè & yespè-ri duabus horis ante cibum.

Dan. Sennerti Tom. I I.

## Tragema.

℞. *Spec. Diamargar. Aromatici rosati Gabrileis* an. Drach. i. sem. *rad. Angelica, zedoar.* an. Dra. i. *seminis citri, Oxalidis* an. Scr. ii. *Cortic. citri, ramenti eboris* an. Scr. i. *Moschi, Ambr.* an. Scr. β. *sacchari ros. tabulati* Vnc. vij. Misceantur & fiat puluis.

## Aliud.

℞. *Rad. tormentill. Diptamni* an. Drach. i. *seminis ace-tosa, Citri* an. Drach. i. sem. *Zinzib. albi, cinamomi, Cro-ci, Santali albi, rubri* an. Scr. sem. *bol. Armeni, Terr. sigillas.* an. Scr. iii. Fiat. Puluis.

## Electuarium liquidum.

℞. *Conseru. rosar. Bugloss. borraginis, Violarum* an. Vnc. i. *specierum Diarhodon. liberantis* an. Drach. ii. *santali rubri, xyloaloe, Corall. rub.* an. Drach. sem. *sacch. candi, Manus Christi* an. Vnc. i.

Misceantur cum syrupo ex corticibus citri ad ele-ctuarij liquidi formam.

## Pilul.

℞. *Cinamomi electi, Garyoph. ligni aloës, Myrrha, Croci, Galang. Macis, Nucis mosch. Cardamomi, alipr. Moschat. Syracis calamis. Zinziberis, zedoar.* an. Scr. i. *aloës Hepatic. Drach. i. agaric. Scr. ii. Rhubarb. Drac. vj.*

Omnia probè trita redigantur ex vino Maluatico in massam, & fiant pilulæ.

## Aqua contra Pestem.

℞. *Rad. Angelic. Personat. maioris* an. lb. sem. *Corti-cis medi, fraxini* M. ii. *Cinamomi* Vnc. ii. Macerentur per dies & noctes deinde distillentur in balneo Mariæ celeriter: postea iterum paulatim de-stillentur.

## Alia.

℞. *Imperatoria, Angelic. Carlin. valerian. tormen-till. zedoar. Iridis, Pimpinell. Enul. campan. Diſtamni* an. Vnc. sem. *Cinamomi* Vnc. i. sem. *fol. salu. Ruta, agrimon. Cardui bened. Betonic. scabios. acidul.* an. M. sem.

Omnia minutim incisa macerentur in vino gene-roso per per biduum, deinde inferuecant ad ignem in fictili vase vitreato bene operto, lutoque obducto, ad horam vnam: postea per linteum pannum sensim co-lentur, & destillentur.

## Trochisci pro fumo,

℞. *Laserpitij seu asa dulcis, Syrac calamit.* an. Dra. ii. *ligni aloës* Drac. iii. *radic. ireos* Drac. i. sem. *Moschi* gr. v. *sacch.* Drach. iii. Ex aquâ rosaceâ fiant Trochisci.

## Aqua odorata ad vestes.

℞. *Iridis Florentin. zedoar. spic. nard.* an. Vnc. ii. *Mastichis, Cinamomi, Nucis Mosch. Garyophyl* an. Vnc. sem. *Baccar. iuniperi* Drach. iii. *Beën, Ambr Moschi* an. Scr. sem.

Omnia ex vino Maluatico ex Gallia Narbonensi, aut Alfatiâ macerentur dies decem aut viginti, postea in duplici vase destillentur.

## Puluis odoratus ad vestes.

℞. *Rosar. rubr. Violar.* an. Vnc. iii. *Corticis citri, Myrtorum, Xyloaloe, santali citrini* an. Vnc. i. *Camphor. Ambr.* an. Scr. sem. *Beën, Moschi* an. gr. v. *F. Puluis, Qui aquâ rosarum mixtus vestibus aspergatur*

V 2

Alia

*Alia Aqua odorifera.*

℞. aq. ros. lb. iiii. aceti generosi lb. i. rosar. rubr. M. i. sem. santal. omnium an. Drach. i. Camphor. Drach. sem. Moschi gr. vii. Specier. Diamb. Ireos an. Vnc. i.

Omnia in mortario terantur, exceptis speciebus Diambrae, moscho & camphora, ac dissolutis in aqua rosacea adduntur species & moschus: imposito alembico caeco digeruntur per dies nouem in stercore equino, postea destillantur.

*Curatio.**Aqua Sudatoria.*

℞. Pimpinell. Tormensill. Diptamni albi, serpentaria, gentian, zedoar, galang, an. Vnc. sem. Piperis longi, Garyophyllor. Macis an. Drach. j. Theriac. Venet. boli Armeni, terr. Sigill. an. Drach. ij. Macerentur per duos dies in vino generoso muscatellino & destillentur. Dosis Vnc. iij, calide.

*Alia.*

℞. Radicum Angelic. Pimpinell. Galang, an. Vnc. sem. Thuris, Myrrha, aloes, an. Drach. i. Macis Drach. sem. Theriac. Venet. Drach. ii. sem.

Ex aquae fumariae, Teucrij & Cardui benedicti, singulorum vnciis quatuor, vini selibra destillantur. Sumantur vnciae tres cum Theriacae vel electuarij de quo drachinae semisse.

*Pro Pauperibus.*

℞. rad. angelic. galang, ligni Guajaci, Cinamomi, Bacc. iunip. an. Drach. i. Coquantur in mensura dimidia vini albi optimi usque ad tertias. Dentur vnciae tres, & sudet.

*Vel.*

℞. Vincetoxici Vnc. i. sem. Fumar. Vnc. i. sem. Rut. Drach. vj. Bacc. iunip. Vnc. sem.

Coquantur omnia in duab. mensuris aceti generosi ad dimidia partis consumptionem, & sine refrigerere, postea cola. Dentur vnciae ii. vel iij. calidae.

*Ad Apostemata Cataplasmata.*

℞. Vitell. ouor. q. v. Salis, Mellis, farin. hord. an. q. pl. F. Cataplasma.

*Vel.*

℞. Lil. alb. el. cap. assat. q. v. malu. & bismatu. contusar. an. part. æq. Fermentum nucis ingland. magnitudine. Fiat Cataplasma, quod calide applicetur.

*Ruptorium mirabile.*

℞. Vir. ad rubedin. calcin. lib. ij. Salis Vrin. Vnc. i. sem. sulphuris. Vnc. i. sem.

Fiat pulvis subtil, qui trajiciatur per cribrum. Postea injiciatur retortae vitreae bene lutatae cum Recipiente appposito, & oleum destilla, quod per inclinationem a Phlegmate separa. Hoc oleo illine lignum mucronatum & circulum circa apostema eodem finge, tunc sponte excidet.

MEDICAMENTA  
PRO REPVB. TORGENSI,

ordinata à D. Ioh. Kentmanno,

Anno 1568.

*Electuarium pro familia.*

℞. Fol. acetos. contus. Vnc. i. rad. Tormentill. Vnc. sem. angelic. Valerian. Diptamn. Pimpinell. an. Drach. ii. Bacc. iunip. recent. M. ij.

Contusa omnia cum succo acetosae vel aceto rosae misceantur in formam Electuarij. De quo fumatur mane & vesperi instar castaneae boli forma.

*Aliud.*

℞. Nucleor. nucum ingland. Vnc. ij. ficum octanum lib. partem, fol. rut. Vnc. j. Bacc. iuniperi quarantam lib. partem, lauri Drach. x. zedoar. aristoloch. rotund. valerian. rad. Helenij an. Drach. ii. salis Drach. sem.

Contrita cum aceto misceantur ad consistentiam Electuarij, de quo sumito tantum, quantum de priori.

*Pulvis pro sanis & infectis.*

℞. Seminis citri excortic. plantag. acetos. an. Drach. sem. fol. scord. Drach. ii. scabios. Drach. sem. acetos. Drach. i. Cortic. citri Drach. sem. Cinamomi interioris opt. & acutiss. saporis Drach. iij. rad. Tormentill. Drach. ii. serpentar. Pimpinell. valerian. angelic. Zedoar. diptamni an. Drach. j. boli Armeni prep. Drach. i. cornu Cerui vsti, Corall. rubr. Margarit. puriss. an. Drach. sem. Croci Orientalis Scrup. i. Pulueriscentur singula subtilissime & misceantur. Dosis huius drach. sem.

Possunt etiam de hoc puluere Morsuli aut rotulae confici, accipiendo huius pulueris Drach. iiii. add. sacch. alb. Vnc. sex dissoluti in aq. ros.

*Electuarium.**Ex Praecedenti puluere, pro sanis itidem ab infectis.*

℞. Pulu. praescript. Vnc. iij. sem. Mitridat. opt. Vnc. i. Theriac. veteris Vnc. j. sem. Camph. Scr. sem.

Misceantur & cum syrupo de succo acetos. q. s. redigantur ad formam Electuarij. Dosis Scr. i.

*Trochisci.*

℞. Electuarij praescript. Vnc. j. sem. Alips. mosch. Drach. i. gall. mosch. gr. iij. sacchari albiss. Drach. iij. Camphor. gr. ij. Cum mucilagine tragacanthae fiant pastilli instar Bechicorum, inuoluantur speciebus liberantis.

*Electuarium aliud.*

℞. Conserv. rosar. Borraginis, violarum, acetos. an. Vnc. sem. Folior. Scordij, Rut. an. Drach. ii. Amygd. Vnc. sem. Ficum num. iij. Cortic. citri Drach. vj. Cinamomi interioris acutiss. sapor. Drach. i. sem. rad. zedoar. Scr. j. sem. diptamn. ireos, angelic. pimpinell. anul. camp. an. Drach. sem. tormentill. Drach. ii. iunio. Scr. ii. rasur. eboris, cornu cerni vsti, an. Drach. sem. conf. liberantis cum bolo. Vnc. j. spec. cordialium de gemmis Mesuae an. Vnc. sem. Incorporentur omnia cum Syrupo acetositis citri & aceto rosarum an. q. s. Fiat electuarium ad formam opiat. Dosis Drach. sem. ieiuno stomacho.

## Pomum ambræ hyberno tempore vsurpandum.

℞. spic. nardi, Scr. i. ros. rubr. sem. basiliconis, nucis mosch. an. Scr. sem. garyoph. Scr. i. cinamomi, ligni aloës, santali citrini, thuris alb. an. Scr. ii. styracis calamit. Drach. i. sem. succini albi, Scr. i. asa dulcis, Drach. i. sem. ladani purissimi, Drach. i. Cum aqua rosarum Fiat pomum ambræ, deinde addatur ambræ & moschi ana q. s.

## Aliud quouis tempore conueniens.

℞. flor. Lauendul. gr. xv. ros. maioran. an. Scrup. i. Rorismarini, gr. xv. nucis mosch. corticum citri an. Scr. i. cinamomi interioris, Drach. i. sem. ligni aloës, Drach. β. santal. citr. Drach. i. ladani puriss. Drach. j. sem. styrac. calamit. Vnc. sem. Gallia mosch. vulgaris, Alipt. moschat. an. Drach. sem. specierum diamoschi dulcis, diamb. an. Scr. i. Miscantur cum aqua rosarum, in qua dissolutum fuerit tragacanthum, deinde bene incorporentur, Fiat massa pomi ambræ, cui adde. Asa dulcis, Vnc. i. sem. styrac. liquid. Drach. ii. Misc.

## Pomum ambræ æstiuum.

℞. flor. nymph. violar. an. Scrup. sem. rosar. Scr. i. corticum citri, radic. iridis Illyric. santali citrini, an. Drach. i. Gallia moschat. Scr. i. sem. camphor. gr. ij. ambr. gran. iij. Misc. & cum Tragacanth. in aqua ros. Fiat pomum ambræ.

## Curatio.

### Electuarium probatum.

℞. Rasur. unicornu, ossis de corde cerui, an. Vnc. sem. camph. Vnc. i. dictamni Cretici, radicis tormentill. an. Drach. i. sem. Zedoar. Vnc. ij. sacchar. cand. Vnc. j. β. Theriac. ver. ac bon. Vnc. vj. Syrupi acetos. citri q. s. Miscendo fiat Electuarium.

### Potio confortans cor & reliqua viscera, simulque à veneno praeseruans.

℞. Flor. borrag. bugloss. an. pug. iij. fol. acetos. flor. ros. rubr. violarum, eichor. endiu. syluestr. an. M. j. sem. citri, acetos. an. Drach. ij. rad. Valerian. tormentill. an. Vnc. sem. beën albi, rub. an. Drach. i. santal. alb. rubr. serici crudi, ossis de corde cerui an. Scr. i. trochisc. de camphor. Drach. sem. Coquantur s. a. in f. q. aquæ fontis puræ ad casum tertie partis, stent in infusione per 12. horas. Fiat expressio fortiss. coletur. Colaturæ ℞. lib. i. sem. In quâ dissolue, Syrupi acetos. citri, succi limonum, Pomor. dulcium an. Vnc. i. sem. vini granatorum Vnc. iij. Misc. Fiat Potio. Dentur Vnc. ii. vel iij. manè.

### Aliud confortans.

℞. Conseru. borragin. bugloss. violar. rosar. acetos. an. Drach. iij. citri conditi Vnc. sem. rob. de berberis Drach. vj. specier. cordialium temperat. diamoschi, Electuar. de gemmis, diamarg. frig. diatriosantal. an. Scr. sem. Syrupi acetositis citri q. s. Fiat conditum.

### Puluis post sudorem alternis diebus exhibendus.

℞. Fol. scordij Vnc. sem. dictam. Cretici Drach. i. seminis citri Drach. sem. acetos. endiu. portulac. an. Scr. i. corian. prap. Drach. i. macis Scr. i. cinam. electi Drach. ii. spic. gr. iij. radic. angelic. rhapantis, an. Drach. sem. tormentill. diptamni an. Drach. j. rhabarb. electi Drach. sem. beën alb. rub. an. Drach. sem. sericicombusti, ossis Dan. Sennerti Tom. I l.

de corde cerui, spody an. Scr. i. limatur. eboris Drach. sem. ligni aloës Scr. i. santali citrini, margar. splend. an. Drach. sem. carabes Scr. i. boli Armen. Drach. iij. terr. sigillat. Drach. sem. fol. auri n. vii. ambr. gr. ij. moschi. gran. j. fragment. Sapphiri, smaragdi, Hyacinthi, Granari, ana. gran. v. Misc. F. puluis. Quo etiam sani vti possunt cum buccæ panis aceto madefacta.

### Ad bubones & apostemata Emplastrum.

℞. Cap. allium, althæam, ana par. æq. minutim incisa coque in aqua fontanâ purâ ad mollietiem pulmenti instar, adde. fenugraci puluerisati, adip. porcin. veteris parum. Omnia rursus calefiant, & pistillo ligneo subigantur, vt fiat s. a. Emplastrum.

### Aliud Emplastrum maturatiuum.

℞. Fol. sambuc. Manipul. j. simi columbini, sem. sinap. an. Manip. j. Theriac. vet. opr. Vnc. i. Fiat cum vrinâ humanâ vel vino albo Emplastrum.

### Aliud.

### Fortius & calidius prioribus.

℞. Ammoniacy, Euphorbij, castorei, opopanax. an. Drach. ii. sem. cum vino in mortario dissol. adde sem. eruce, sinapis, raphani an. Drach. ii. scille Drach. vj. fecis olei lini Drach. i. sem. styrac. calamit. Drach. iii. cantharid. n. x. fermenti veteris Drach. ii. cera & ol. lini q. s. Fiat Emplastrum.

### Vnguentum mundificans & exsiccans.

℞. Farin. tritic. parum, vitell. oui vnius. Miscæ & cum lincolis apostemati iniiciatur.

## MEDICAMENTA D. IACOBI THEODORI TABERNÆMONTANI.

Anno 1582.

### Electuarium exhilarans pro formidolosis nimium in peste.

℞. Conseru. ros. borraginis, bugloss. flor. garyophyl. hortens. an. Vnc. i. florum aurantiorum condit. citri condit. an. Vnc. sem. Pulu. latitia Galeni Drach. ij. cinam. electi, pul. corticum citri, an. Drach. j. Zedoaria, doronici Romani, an. Scr. i. sem. croci electissimi, Scrup. sem. syrup. corticum citri & pomor. dulcium redolentium, an. q. s. Fiat Electuarium.

Sumatur vespere & manè magnitudo Castaneæ dimidiæ.

### Rotula.

℞. Pulu. latitia Galeni Drach. ij. cortic. citri, cinamomi electi, an. Dra. i. sem. Fol. melisse, basilici an. Dra. i. doronici, Zedoar. an. Scrup. i. sem. ligni aloës, flor. borraginis, bugloss. echij veri, macis, an. Scr. i. croci orient. Scrup. sem. sacch. opt. Vnc. x. dissoluti cum stillacitiis liquoribus corticum Aurantiorum, Cinamomi & buglossi, an. q. s. Fiat Confectio in Rotulis vel Morsulis.

### Puppa pro dinitibus.

℞. Trium florum cordialium an. p. j. cort. citri Drach. ii. rad. buglossi Scr. i. sem. echij ligni aloës, doronici Romani,

Romani, zedoaria, cinamomi an. Scr. i. croci, granorum chermes, angelica, macis, meliss. an. Scrup. sem. Cum sindone rubra fiat puppa, quæ ponatur in potu.

### *Præseruatiua vniuersalia.*

#### *Antidotum de ovo expertissimum D. Theodori.*

℞. Ovor. recentium vnius diei n°. iiij. Quorum albumina abiicito, & testas eorum Croco optimo Orientali impleto, deinde in cinere calidissimo tamdiu, donec in tenuissimum puluerem redigi possint, affato postea.

℞. Seminis Thlaspi veri, ad pondus omnium. angelice, rad. Imperator. an. Vnc. i. sem. bacar. hedera, scor. dii veri an. Vnc. ij. rad. pimpinell. boli Armen. terra Lemnia, rad. pulsatill. sanguisorb. montan. pulu. cordialis descript. Brassanoli an. Vnc. i. Zedoar. rad. antithor. tormentill. dictamni Cretici, rad. fraxinel. s. dictamni albi, monophylli, fol. & summitatum rur. caprar. cardui saheti, rad. vincetoxici seu hirundinar. an. Dra. vj. pulu. latit. Galeni, corticum citrei mali, chamadryos, succini albi veri, an. Vnc. sem. pulu. cordialis temperat. diamb. sem. citri mundat. grani infectorii, pulu. diamoschi, an. Drach. iij. antidoti Theriacalis Matthioli, vel eius loco, antidoti Mithridatici, Theriac. Andromachi, an. Vnc. xii. Syrup. cortic. citri. Vnc. iv. Terantur omnia & commisceantur ad minimum per spatium vnius horæ, fiatque electuarium solidum more solito.

### *Pulus præseruatiuus.*

℞. summitat. absinth. Vnc. sem. rad. tormentill. Drac. ii. flor. cætaræ minor. rad. valerian. pimpinell. calaminth. Italic. angelic. Drach. β. caryophyllorum, n°. xv. Fiat Puluis. Detur Drac. β. in vino generoso manè ieiuno ventriculo.

### *Alius Puluis.*

℞. Petasitis. Drach. vi. rad. angelic. gentian. an. Vnc. i. β. glandium decorticat. cruciat. an. Drach. ii. Fiat Puluis.

### *Pulus pro diuitibus.*

℞. Doronici Romani s. Alpini, Vnc. i. Boli leuanticum cum optimo vin. & liquoribus, stillatis melissa & scabios. loti, Drach. iij. seminis Oxalidis, Drach. i. sem. rad. tormentill. fraxinel. cinamomi electi, caryophyll. maceris, spic. zedoar. croci, Agallochi, an. Drach. i. coriandri præparati, Drach. sem. sacchari rosacei tabulati, Vnc. ii. Misce & F. Puluis subtilissimus.

### *Pulus grossus.*

℞. Granorum iuniperi maturorum noctem in aceto fortissimo maceratorum, rursusque exsiccatorum, Confect. coriandri, feniculi, an. Vnc. iij. coriandri præparati, Vnc. iij. confect. carui, anisi, acori veri, id est, calami aromatici nucleorum nucum iugland. confect. liberantis in tabulis, an. Vnc. ii. seminis anisi, carui, feniculi omnium mundatorum & in aceto rosaceo per noctem maceratorum, rursusque exsiccatorum, an. Vnc. j. sem. seminis citrij mali excorticati, radicum Helenij. tormentill. an. Vnc. sem. pimpinell. alb. Vnc. i. angelic. Imperator. fraxinel. seu diptam. albi, ana Vnc. sem. zinziberis albi, cinamomi electi, cass. lign. ver. aut eius loco cinamomi crassioris, an. Vnc. i. Zedoar. doronici, an. Dra. iij. corticum citrij mali, caryophyllorum, an. Drach. ii. β. maceris, cyper. Babylonici, nucum moschat. an. Drach. i.

Incidenda omnia minutim ressellatimque incidantur, misceantur omnia instar pulueris grossi: De quo sumatur manè & vespere cochleare vnum singulis viciibus.

### *Alius eiusdem vsus.*

℞. Confessionis liberantis Guidonis in tab. Vnc. iij. confessionis coriandri, anisi, feniculi, carui, an. Vnc. iij. granorum iuniper. in aceto maceratorum, nucleorum nucum iuglandiū mundat. an. Vnc. ii. doronici Romani s. Alpini, Drac. v. cinamomi, cass. lign. ver. an. Vnc. sem. galang. dicti, rhabarbari, an. Drach. ii. pimpinell. hircin. Scrup. v. rad. Imperator. dictamni albi, angelic. gentian. zedoar. an. Scrup. iij. sem. acetos. pimpinell. feniculi, an. Scr. ii. sem. tubear. crassiusculæ fract. nucis moschat. acori veri, caryophyll. maceris, an. Drach. i. Incidenda incidantur. & cum reliquis misceantur. Fiatque puluis grossus secundum ætem.

### *Pulus pretiosus, pro diuitibus.*

℞. Boli Armeni veri, Vnc. i. rad. heptaphylli caryophylli hortensis, dictamni albi, santali citrini, an. Drach. i. margarit. præparat. Scr. ii. eboris, cornu monocerotis, spodij, cortic. citri, antithor. an. Scr. i. β. fragment. lap. prer. an. Scr. i. β.

Fiat omnium puluis subtilissimus. De quo manè ieiunus sumat magnitudinem auellanae dimidia, æstate cum aq. cichorij, hyeme cum aqua melissæ, vel corticum aurantij, citri, aut vino generoso.

### *Pilula præseruantes quotidie sumenda.*

#### *Pilula pestilenciales Theodori pro diuitibus.*

℞. Cornu monocerotis, rad. antithor. an. Drach. i. β. zedoar. pulu. cordialis, liberantis Guidonis, rhabarb. electissimi s. fragidis Lemnia, luti Armeniaci, scordij, croci Orientalis, an. Drach. i. coc. infectorii, Scr. ii. sem. fragmentorum smaragdi, myrrh. elect. benzoi, an. Drach. i. β. margarit. præp. Scr. ii. fragmentorum rubinorum, hyacinthorum, sapphirorum, granatorum veror. ossium de corde cerui, foliorum auri meri, argenti meri, an. Scr. i. aloës sincerissim. cum stillatis corticum citrij mali, & rosarum liquoribus tota, succi castracæ, seu giarg. ad spissand. cocti, an. Vnc. β. Cum syrupo corticum citri q. s. Fiat massa Pilularum.

#### *Pilula pestilenciales eiusdem pro pauperibus.*

℞. Aloës succotr. lot. Vnc. i. sem. myrrh. Drac. iv. croci electi, Drach. i. β. terr. sigillat. agarici trochisc. an. Drac. i. boli leuanticum, benzoi, an. Scr. i. sem. Cum succo Castracæ Fiat massa pilularum. Formantur pilula magnitudine pisi minoris. Dosis n°. viij. vel. ix.

### *Alia Pestilenciales Pilula.*

℞. Aloës lot. Drach. iij. boli Armeni Orientalis, terr. sigillat. croci, antithor. benzoi, an. Drach. i. Fiat massa pilularum cum syrupo corticum citri.

### *Pilula liberantes dicta.*

℞. Pulu. liberant. Scr. viii. cinamomi, zedoar. rad. angelic. antithor. tragoselini, tormentill. an. Scr. iij. boli leuanticum, Drach. i. Imperator. rad. morsus diaboli, granor. iuniperi, rad. vincetoxici, an. Scr. ii. chelidon. maior. echij, galang. caryophylli hortulani, an. Scr. j. sem. doronici, caryophyllorum, nucis mosch. an. Scr. j. aloës lota ad pondus omnium. Cum syrupo de succo Oxalidis confice massam. Detur manè Scr. i. vel Drach. dimidia.

### *Pilula de cornu Monocerotis.*

℞. Cornu Monocerotis, Drach. ij. seminis citri, Scr. ii. sem.



ii. sem. boli Armeni veri, terr. Lemn. ver. tormentill. radicum dictamni, pimpinell. an. Scr. ii. antithor. Scr. ii. sem. doronici, rad. bistort. an. Scr. i. sem. pastillorum de spodio, Scr. i. aloës cum stillaticio liquore lotæ ad pondus omnium.

## Pilula Theriacales.

℞. Salis Theriaci descr. Actij, theriac. Andromachi. mithridat. an. Drach. iij. caryophyllor. Scr. iij. sem. figilli Lemnij, gleb. Armen. Anshor. f. antithor. cinamomi, galang. an. Scr. iij. maceris, Dra. i. tormentill. agallochi, rosar. rubr. an. Scr. ii. cubebar. santali citrini rubri, an. Scr. i. aloës lotæ ad pondus omnium. Cum Syrupo acetositaris citri F. massa.

## Electuaria.

### Electuarium aureum D.D. Achillei, Illustrissimæ principum Saxoniæ Medici.

℞. Zedoar. boli Armeni, sphragidis Lemn. cinamomi acutissimi, an. Drach. i. sulphuris virginei, Scr. ii. B. caphur. Scr. ii. dictamni albi, gentian. angelic. aristoloch. rotund. vere, tormentill. rad. Valer. morsus diaboli, leuistici, pimpinell. Germanic. besonic. baccar. lauri mundatarum, ossis de corde cerui, an. Scr. i. myrrh. ver. & elect. feminis citri, an. Scr. i. sem. fol. rut. gr. xv. croci, gr. vii. Pulveris Electuarij de gemmis frigid. de gemmis calid. diamoschi. dulcis. diamargariti Nicolai, diatrion-santaloni. an. Scr. i. B. conferv. rosar. Drach. vj. theriac. prob. mithridatij antidoti, electuarij de ono, an. Vnc. B. auri meri foliati fol. n°. viii. Syrupi corticum citrij mali, aq. vit. rectificat. an. q. f. F. Electuarium solidum instar Electuarij de ono.

Præservatiui loco manè ieiunus sumat magnitudinem duorum pisorum, aliquot horas postea ieiunando. Sumitur vel per se, vel in vino albo, aut liquore conueniente.

Curationis vice dantur Drach. ii. in aceto vini, aq. rosar. aut acetosæ, calidè ad minimum tres vel quatuor horas sudando. Quod si eum horrore malum inuaserit, detur in aquâ Melissæ, vino Maluarico, aut aliàs generoso.

### Electuarium de Galega.

℞. Summis. & folior. rut. caprar. Dra. x. rad. & sem. Pimpinell. boli Armeni veri, terr. figill. ver. cortic. cass. lign. ver. an. Vnc. sem. petasitis, rad. angelic. tormentill. an. Drach. v. croci, rad. Anshor. an. Drach. iij. theriac. Andromach. opt. mithridat. probat an. Vnc. i. Pulverisanda pulueriscentur subtilissimè, & cum nouemdecim uncis mellis despumati, Fiat Electuarium. Vltimò addantur theriaca & mithridatium. Detur manè magnitudo ouellana.

## Confectiones.

℞. Boli Armeni veri cum stillatitiâ rosar. aq. loti Vnc. sem. luti figillati, seu luti Lemnij, Drach. iij. rad. antithor. zedoar. an. Drach. iij. agallochi, doronici Romani, diptamni albi, tormentill. pulu. diamargarit. Nicolai an. Drach. i. sem. feminis Oxalidis, citri mundati, corticum citri, cartilagin. & cordibus ceruorum, feminis ocyini, an. Drach. i. ramenti eboris, Scr. i. unicornu, fragmentorum quinque geminarum, an. Scr. i. Sacch. q. f. dissoluti in sufficienti quantitate liquorum stillatorum buglossæ & ros. F. confectio in rotulis vel mortulis.

### Alia Confectio.

℞. boli Armeniaci, zedoar. an. Vnc. i. sem. tormen-

till. Drach. v. rad. pentaphylli, vincetoxici, an. Vnc. sem. figilli Lemnij, Drach. iij. Phu Pontici, coralliorum rubri an. Scr. iij. margaritarum, Drach. i. gall. moschat. ver. Scr. ii. santali citrini, spodij, an. Scrup. i. sem. Sacchari q. f. dissoluti cum liquoribus stillatitiis cordialib. fiat confectio, vt dictum est. De hisce vel superioribus rotulis manè ieiunus sumat num. ii. vel iii.

### Electuarium Bezoarticum in tabulis D. Theodori.

℞. terr. lemn. ver. boli leuistici optimi & loti, tormen-till. an. Vnc. sem. rad. caryophylli hortensis, rad. solba-strell. an. Dra. iij. spodij, Scr. iij. corallij viriusque cinamo-mi electi, cass. lign. ver. rut. caprar. an. Dra. ii. cornu Monocerotis, santalorum omnium, an. Scr. v. margarita-rum præparatarum, dictamni cretici, spic. Indic. antithor. an. Scr. iv. ramentorum cornu cerui, zedoar. Phu Pontici, mactis, an. Scr. iij. B. doron. Europ. f. Alpini, succini albif-simi, croc. opt. diptam. alb. an. Drach. i. sem. citr. mali, angel. an. Scr. ii. B. coco. infector. seu cherm. Scr. ii. agallochi, fragmentorum pretiosorum omnium, an. Scr. i. B. gall. mosch. ver. ambr. cinerit. mosch. odoratiss. an. Scr. i. fol. auri fini, fol. argent. fini, fol. n°. xv. sacch. albissim. in stillatitiis liquoribus bugloss. & ros. dissoluti, an. q. f. Fiat confectio in mortulis, siue in Tabulis.

## Potiones.

℞. Nucum ingland. bacc. iunip. rut. an. Vnc. sem. Incidantur & contundantur in mortario: affunda-tur acer. de vino ad eminentiam duorum digitorum, referuentur in vitro benè obturato. Et si liber, bene agitentur, manèque cochleare vnum assumatur. Præ-seru. 24. hor.

## Alia.

℞. Theriac. diateff. Drach. i. pulu. angel. Drach. i. acet. rosar. an. Drach. sem. aq. cardui bened. Vnc. ii. Misce. Hac potione quolibet octiduo vttere semel aliquot ho-ras postea sudando.

## Aqua Destillata.

℞. Scabios. cum toto, crucias. rad. serpentar. an. M. i. absinth. figill. Salomonis, ruffilag. cum toto, an. M. sem. Incidantur & vino fermententur, postea destillentur.

## Alia.

℞. Centaur. minor. lb. i. rad. gentian. lb. sem. Incidan-tur & contundantur ad formam pulmenti & quinque vel octo diebus in vino generoso macerentur, postea-que destillentur.

## Alia.

℞. Rad. valerian. Vnc. xii. allij. capita, num. iij. cha-madryos. Vnc. iij. fol. ling. ceruin. num. xx. rad. pimpi-nell. Vnc. iij. sem. nuc. iugland. virid. immatur. num. xx. Incidantur & contundantur minutissimè. Affunde po-atea vini sublimati mensur. i. aq. chelidon. maior. lb. i. bugloss. centaur. minor. an. Vnc. xii. salu. Vnc. vi. rut. Vnc. vi. sem. absinth. Vnc. iv. sem. rosar. Vnc. iv.

Digerantur omnia triduo vel quadriduo in loco ca-lido, vel exponantur soli. Destillentur postea in M. B. lento calore. Referuetur aqua in vase vitreo in quâ dis-solue Theriac opt. Vnc. xii. & per mensem soli rursus exponatur. Trajice per Filtrum. De hac aquâ sumat ie-iunus manè Vnc. sem. Est præservatiuum excellens hyemali tempore.

## Alia.

℞. Rut. herb. chelidon. maior. cum toto, salu. ingland. nuc. immatur. num. xxx.

Incisis & contulis minutissimè infunde vini sublimati, aq. acetos. an. Mensur. i. sem.

In vase vitreato biduum soli exponantur: destilla postea in M. B. & quotidie manè cochleare vnum assume.

*Præservatiua Gravidarum, Electuarium D. Theodori.*

℞. Succ. granator. Vnc. iii. pomorum redolentium ac dulcium, Vnc. iv. sacch. opt. Vnc. xii. Decoquantur ad lentum ignem, donec ad syrupi consistentiam pervenerint, adde. conseru. borrag. bugloss. an. Vnc. ii. sem. rut. caprar. aut florum caryophyll. hortensis, cichor. an. Vnc. i.

Commisceantur omnia probè cum prædicto syrupo, & postea insperge sequentes pulveres. pulvis doronici Roman. fragmentor. pretiosor. omnium, corall. rubr. prepar. margarit. prepar. pulv. cordial. granor. tinctorior. pulv. liberantis an. Dra. i. cornu monocerotis, boli armen. veri, terr. sigillat. ver. rad. anchor. an. ʒ. i. gall. mosch. Mes. Scr. i. sem. moschi, ambr. an. Scr. i. Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui suprà dictis probè commisceatur, ut electuarium inde fiat: de quo manè detur magnitudo castaneæ dimidiæ, aliquot horas postea ieiunando.

## Aliud.

℞. Pulv. cordialis diamargariti, latit. Galeni, serici erudi torrefacti, ana. Dra. ii. ossium de cordibus cernuorum, Dra. i. sem. fragmentor. hyacinthi, granat. an. Scr. iii. margarit. prep. doronici Europ. agallochi, sem. oxalidis, an. Drach. ii. boli Armen. pulv. croci, an. Scr. i. sem. citr. condit. conseru. flor. bugloss. an. Dra. iii. rosar. Melissophylli, condit. cidonior. an. Dra. ii. sacchar. candefacti, Vnc. viii. Dissoluti cum stillatitia rosar. liquore odoratissimo, q. s. Syrupi de limonib. seu de acetositate citri, q. s. Fiat Electuarium iustæ spissitudinis. Detur quantum prioris.

## Aliud.

℞. Rad. tormemill. Vnc. i. Pulv. cordialis, cinamomi electi, an. Dra. ii. spec. diamargar. Auic. an. Dra. i. sem. cornu Monocerotis, sphragidis Lemn. boli Orientalis, an. Dra. i. Quinque fragmentor. pretiosor. an. Scr. i. sem. conseru. rosar. Vnc. iii. rut. caprar. Vnc. ii. bugloss. borrag. an. Vnc. i. sem. Syrupi corticum citri, q. s. Fiat Electuarium secundum artem. Sumatur manè magnitudine duarum. auellatarum.

*Manus Christi cum gemmis D. Theodori.*

℞. Margarit. preparat. corall. rubr. preparat. an. Drach. ii. eboris combusti, Drach. i. Quinque fragmentor. pretiosor. cornu Monocerotis, succini albi, an. Scr. ii. boli Armeni veri, terr. sigillat. an. Scrup. i. fol. auri, num. ii. Sacchari albiss. Vnc. xii. Dissoluti in liquoribus stillatitiis rosar. & buglossi an. q. s. F. confectio in tabulis.

Manè & vespèri, qualibet vice sumantur num. ii.

*Confectio præservans, pro Mulieribus Pauperibus.*

℞. Pimpinell. albi, Galeg. an. Drach. ii. Gram. juniperi, Cass. lign. ver. an. Scrup. iv. dictamni Cretici, Scrup. ii. sem. rad. Phu Drach. i. caryophylli hortulani, Scrup. ii. chamedrios Scrup. i. sem. rub. zin-

dor. cyperi rotundi, cinamomi, nucis moschat. rosar. rini coronarij, melissophylli an. Scrup. ii. Sacchari q. s. dissoluti in aq. stillatitiâ radicum mardij, caryophyll. q. s. Fiat confectio in morsulis vel rotulis.

Sumatur manè duabus horis ante pastum num. ii. vel iii. Vespèri v. cubitum eundo.

*Præservatiua pro Infantibus.*

*Rotula.*

℞. Tormentill. Drach. ii. rad. vincetoxici, antisor. boli Armeni, terr. sigillat. cornu cerui vsti an. Drach. i. corticum citri, diptamni albi, scordij veri, an. Scr. ii. corall. rub. margarit. preparat. succini albi, sem. citri mundat. an. Scr. i. sacchari optimi, Vnc. viii. Dissoluti cum stillatitiis liquorib. oxalidis & rosar. an. q. s. Fiat confectio in morsulis.

*Confectio liberans à Peste pro Infantibus, D. Hupertii Streitteri.*

℞. Seminis santonici, boli Armeni veri an. Dra. ii. rad. Heptaphylli, enul. campan. an. Scr. ii. sem. caulium, citri cortic. an. Scr. i. sem. Corall. rubr. preparat. serici crud. timat. eboris sem. Plantag. an. ʒ. i. sapphirorum, Hyacinthorum an. Scr. sem. Sacchari albissimi q. s. Dissolvatur saccharum cum stillatitiis scabiosæ, oxalidis & cardui benedicti liquoribus an. q. s. Fiatque confectio. Dentur quotidie manè num. ii. vel iii.

*Pulvis D. Theodori.*

℞. Scordij veri Dra. ii. seminis santonici, Corall. an. Dra. i. sem. Tormentill. Diptamni albi. Fol. sen. an. Dra. i. Agav. trochisci. Rhabarbari elect. Ramentorum corn. ceru. an. Dra. ii. seminis citri mundati Scr. i. B. corn. Monocerotis, trochiscorum Alhandar, Cinamomi an. Strup. i.

Misceantur secundum artem, & fiat omnium pulvis subtilissimus. De quo datur puero vel puellæ 12. annorum Drach. i. cum melle vel syrupo quodam. Octavo annorum infanti, Drach. dimidia. Quatuor vero annorum Scr. i.

*Curatiua.*

*Oleum citrangelorum aduersus pestem & ventena omnia D. Theodori, quo statim, quamprimum malum inuasit, nares & pulsus arteriarum, item Apostemata inungi debent.*

℞. Pomorum citrangelorum n.º. vi.

Terantur cum corticibus & nucleis ad modum pulmenti, quib. superinfunde olei recentis & loti lib. iii. Misce & pone ad solem per dies octo, deinde in balneo Mariæ, vel in diplomate per duodecim horas coque, postea fortiter exptime & cola, mox adde Flor. borrag. recentium, bugloss. recent. an. Vnc. iii. Caryophyll. hortulani, summat. Hyperici, an. Vnc. i. sem. rut. caprar. Cardui benedict. Scordij veri & recentis an. Vnc. i. rad. tormentill. Drach. i. Verben. Vnc. sem. Dictamni Cretici, Gentian. Dictamni albi. an. Drach. ii.

Contundantur omnia minutissimè & rursus ad solem per octiduum relinquito: deinde in Diplomate seu balneo Mariæ, ut suprà dictum est, coquito, fiatque fortis expressio, aspergendo super aliquantulum vini Cretici. His factis expressioni addatur, boli Armen. veri, Theriac. Andromac. Antid. Matthiol. an. Vnc. i. Angelic. gummos. santalor. omnium, Benzoi an. Vnc.

Vnc. sem. *Rhabarbari electi*, *cinamomi electi* an. Drach. iij. *Myrrha pura*, *corticum citri*, *feminis citri*, *Zedoar. Daronici*, *caryophyl.* an. Drach. i. sem. *Gran. chermes*, *ligni aloës*, *spic. nard. macis* an. Drach. i.

Contundenda contundantur minutissimè, omniaque cum reliquis probè misceantur: *Terra sigill. bolus Armenus*, *Theriac. Andromachi*, & *antidot. Matthioli* cum vnciis quatuor vini sublimati, & totidem vini Græci seu Maluatici dissoluantur, misceanturque denud, & ut suprà dictum est, in Sole relinquantur, deinde in diplomate bulliant, donec humiditas vinorum prædictorum absumatur, fiatque postea expressio, cui misceantur *Zibethi optim.* Scrup. i. *Moschi Alexandrini*, *Ambr. cinerit.* an. Scr. sem.

Dissoluantur probè in oleo, ipsūque oleum in phialā vitreā sedulò obturatā ad vsum tanquam thesaurus secretus reponatur. Oleo hoc inungantur pulsūs in manibus & temporibus; item regio cordis & ceruix.

## Potio sudorifera pro robustis.

℞. *Electuarij de ouo* Scrup. sem. *boli Armeni veri* Scrup. j. sem. *Theriac. Andromach. Antidot. Matthioli.* seu *Mithridat.* an. Scrup. i. *Aq. bezoartic.* Scrup. ii. *Aq. oxalid.* Vnc. i. M. Fiat potio.

## Alia pro imbecillioribus.

℞. *Electuarij de ouo* Scr. iij. *boli Armeni* Scrup. i. sem. *Theriac. Andromachi*, *Mithridat.* an. Scrup. sem. *Aq. bezoartic.* Vnc. ii. *Aq. stillatic. acetos.* Vnc. i. M. Fiat potio sudatoria.

## Aqua Bezoartica mea.

℞. *Rad. Angel. Valerian.* an. Vnc. iij. *Granorum inniperi*, *Dictamni albi*, *Tormentill. serpentar. Gentian. Pimpinell. alb. Aristoloch. long.* an. Vnc. ij. *rad. Helenij Asclepiad.* an. Vnc. i. sem. *Corticum citri*, *boli Armeni* an. Vnc. i. *Croci*, *Zedoar. Daronici*, *sphragidis Lemnia.* an. Vnc. sem. *Corall. albi & rubri*, *feminis Thlaspi, oxalidis*, an. Drach. i. *Myrrha elect.* Drach. ii. *cornu cervi vsti*, Scrup. ij. *herbarum Salu. Ruta, Pulegi, calaminth. Italic. scabios. Basilici, Veronic. Maioran.* an. M. ij. *Fumar. Scordij*, an. M. j. sem. *Florum borraginis*, *bugloss. Violarum* an. P. j. *Rosmarini.*

Terantur omnia in puluerem crassiusculum & ponantur in vase vitreo mundo addendo. *Theriac. Andr.* Vnc. iij. *Mithridat.* Vnc. iij. Misceantur probè & superfunde vini sublimati rectificati lib. viij. *Aquarum stillatitiar. oxalidis*, *Cardui benedict.* an. lb. iij. Misce & pone ad Solem per quatuordecim dies, deinde destillentur per vesicam magna diligentia, vel in balneo Mariæ. Postea.

℞. *Cinamomi electi* Vnc. sem. *Pul. Diamargarit. frig. Macis*, *nucis Moschat.* an. Drach. ij. *santal. rubei & citrini*, *Zedoar.* an. Drach. i. *caryophyl. ligni aloës*, *Pul. Latit. Galeni*, *Larificantis Almanforis*, *El. de gemm. frigid.* an. Scr. j. *Moschi, Ambr.* an. gr. ii.

Terenda crassiusculè terantur, ac probè cum reliquis misceantur, in syndone rubro colligantur, & à filo in aquam prædictam dimittantur.

## Aqua Bezoartica aurea Theodori.

℞. *Electuarium de ouo cum cornu monocerotis*, Vnc. j. *Theriac. Andromachi*, *Antidoti Matthioli*, *Mithridatis*, *boli Armeni veri* an. Drach. vj. *Pul. Scordij veri* Vnc. sem. *Angelic. verben. bacc. heder. antithor.* an. Drach. ii. sem. *Tormentill. cardui benedicti*, *Zedoar.* an. Drach. ij. *granor. chermes*, *dictamni albi*, *calaminth. Italic.* an. Drach. i. sem. *terr. Lemn. Capbur.* an. Scrup. iij. *Spec. cordial. temperat.*

*rad. Vincetoxici*, sem. *Thlaspi* an. Drach. i. *Spec. liberantis* Scrup. ii. sem. *Daronici Romani seu Alpini. Cinamomi* an. Scrup. ij. *cornu monocerotis*, *croci optim.* an. Scrup. i. sem. *nucis Moschat.* Scrup. i. *spec. lasit. Galeni* Scrup. sem. *Aq. bezoar. Theodori præcedentis* lib. ij. *Vini maluatici optimi*, lib. i. sem. *Aq. rosar.* Vnc. v. *oxalidis*, *angelic.* an. Vnc. iij. *cardui bened. Scordij*, *Helenij*, *Tormentil.* an. Vnc. iij.

Misce, & oone in cucurbitam vitream bene obturatam per biduum, deinde lento igne per Alembicum destilla.

Dosis huius aquæ maxima Vnc. ij.

## Potio sudorifera pro robustis.

℞. *Electuarij de ouo* Drach. β. *boli Armeni, Theriac. Andromachi*, an. Drach. sem. *Pul. scordij veri, Radicum Angelic.* an. Scrup. i. *spec. Cordial. temperat. liberantis* an. Scrup. sem. *cornu Monocerotis gr. v. Aq. Angelic. Cardui benedict.* an. Vnc. i. sem. M. Fiat Potio.

## Alia pro iisdem.

℞. *Electuarij de ouo* Drach. j. sem. *boli Armeni, Mithridat.* an. Scrup. sem. *Pulu. baccarum hederæ, Radicum Antithoræ* an. Scrup. j. *spec. larit. Galeni, pul. Daronici Romani* an. Scrup. sem. *Liquorum stillatitiorum scordij, Helenij* an. Vnc. i. sem. M. Fiat Potio sudorifera.

## Alia pro robustis, quos astu aggressum est malum.

℞. *Electuar. de ouo* Drach. i. sem. *Pulu. boli Armeni veri* Scrup. i. *Mithridat. electi, antidoti de sanguinibus*, *Pulu. radicum tormentill. terr. Lemn. vera* an. Scr. j. *Pulu. cordialis* Scr. sem. *aq. oxalidis*, *rosarum, aceti florum caryophyll. hortens.* an. Vnc. i. sem.

## Alia eiusdem vsus.

℞. *Electuarij de ouo* Scrup. v. *Pulu. boli Armeni* Scr. ii. sem. *sphragidis Lemn.* Scrup. i. sem. *Theriac. Andromachi, antidoti Matthioli, Pulu. cordialis, antithoræ*, an. Scrup. sem. *cornu monocerotis gr. v. aqu. stillatit. oxalidis, aceti rosarum, vel florum caryophyllorum, aq. tormentill.* an. Vnc. i. Misce. Fiat potio sudorifica.

## Potio sudorifica, hyeme, vel si aliàs horrore malum inuasit.

℞. *Electuarij de ouo* Scr. iij. *Theriac. probat.* Scr. ii. *Pulu. boli Armeni veri* an. Scrup. j. sem. *baccarum heder. scordij veri, angelic. spec. cordial.* an. Scrup. sem. *cornu monocerotis gr. iij. aq. angelic.* Vnc. i. sem. *vini Maluatici* Vnc. i. Misce. Fiat Potio.

## Potio AEstiua, si calore inuasit malum, sumenda.

℞. *Electuarij de ouo* Scrup. iij. *Theriacæ Andromachi* Scr. i. sem. *boli Armeni preparati* Scrup. ii. *Pulu. tormentille, terr. sigillat.* an. Scrup. i. *spec. cordial. temperat.* Scrup. sem. *cornu monocerotis gr. iij. aqua stillatitia tormentill.* Vnc. i. sem. *aceti florum Caryophylli hortulani* Vnc. i. Misce. Fiat potio sudorifera.

## Potio pro pueris duodecim & ultra annorum.

℞. *Electuarij de ouo* Scrup. iij. *Pulu. boli Armeni* Scrup. i. *Angelicæ, spec. liberantis* an. Scrup. sem. *cornu monocerotis*

*monocerotis* gr. iiii. *aqua stillatitia angelica* Vnc. ii. Misce, Fiat. Potio. Sumatur, si horrore aggressa sit pestis.

Quod si calore, vel æstiuo tempore, detur sequens.

℞. *Electuarij de ouo* Scrup. ii. sem. *Pulu. boli Armeni veri* Scrup. i. sem. *tormenilla. spec. liberantis* an. Scr. sem. *terr. Lemn. vera* Scrup. i. aq. *oxalidis* Vnc. i. *tormenill.* Vnc. i. sem. *aceri florum Caryophylli hortensis* Vnc. sem. Misce. Fiat potio sudorifica.

#### *Electuarium Theriacale pro pauperibus.*

℞. *Theriac. diatessar.* Vnc. iiii. *Angelic. puluerisat.* Vnc. i. sem. *baccar. heder.* Vnc. i. *scordij, boli Armeni preparati & loti.* an. Vnc. sem. *rad. ostrutij* Dra. ii. Puluerisanda subtilissime pulueriscentur, postea Theriaca addatur, & cum Syrupo de corticibus Citri, Fiat Electuarium.

#### *Electuarium Theriacale pro pregnantibus.*

℞. *Theriac. Alexandrin.* Vnc. ii. *rad. tormentill.* Vnc. i. *boli Armeni rubri* Vnc. sem. *serpentaria, rad. pimpinell. rubra* an. Drach. ii. Pulueriscentur, & cum Syrupo de corticibus Citri, fiat Electuarium.

#### *Pulvis pro pauperibus.*

℞. *Rad. tormentill.* Vnc. i. *boli Armeni. flor. Centauræ minoris* an. Vnc. sem. *rad. pimpinell. croci* an. Drach. ii. Misce, & fiat omnium pulvis.

#### *Alius.*

℞. *Rad. Pimpinell. fol. acetosæ* an. Vnc. i. *rad. tormentill. sigillata* an. Dra. ii. *diptramni albi* Drach. i. sem. *boli Armeni* Drac. i. Misce. Fiat Pulvis.

#### *Alius.*

℞. *Diptramni albi* Vnc. i. *meliss. Angelicæ, ana* Vnc. sem. Fiat omnium Pulvis.

#### *Pulvis Bezoarticus curatiuus D. Theodori.*

℞. *Angelicæ probè mundatæ & lot.* Drach. x. *calamimtha Italica* Drach. vi. *anthor. Myrrh. Melissæ* an. Drach. v. *granorum heder. cornu monocerotis* an. Dra. iiii. *scordij veri, boli Orientalis, sphragidis Lemnia, rad. ari, tormentill. sanguisorbæ, Aristolochia rotund. ver. doronici Alpini* an. Drach. ii. *croci, zedoaria,* an. Dra. i. Fiat omnium pulvis subtilissimus, & sedulo probeque misceantur.

#### *Pulvis alius pro dinitibus.*

℞. *Rad. Imperatorie* Drach. x. *fraxinella, tormentill.* an. Drach. vi. *florum centauræ parui, Cardui benedicti* an. Vnc. sem. *fragmentorum Hyacinth. cornu monocerotis, antithora* an. ad Drach. j. Fiat Pulvis secundum artem. Dos. Drach. i. ad Drach. i. sem.

#### *Alius.*

℞. *Scordij veri* Drach. vi. *chamedryos, Cardui benedicti, rad. fraxinel. Pulegij ceruini, Zedoaria, tormentill. granorum hedera* an. Vnc. sem. *summitatum rut. caprarie, Aristolochia rotunda ver. boli Armeni, sphragidis Lemnia, croci, Antithor. Angelic. Imperatoria* an. Dra. ii. Fiat pulvis secundum artem.

#### *Alius.*

℞. *Zedoaria, corticum citri, rad. Imperatoria, Angelicæ, an.* Vnc. sem. *scordij, chamedryos, boli Armeni, sigilli Lemnij* an. Drach. iiii. *granorum iuniperi, heder. Antithor. cornu monocerotis* an. Drach. ii. *betonica, ligni aloës* an. Drach. i. sem. *hyperici, doronici, croci* an. Drach. sem. *Ambr. cineritia, moschi odorati* an. Scr. sem. Fiat Pulvis subtilissimus secundum artem.

#### *Aqua destillata.*

#### *Aqua pro pauperibus.*

℞. *Sigilli Salomonis, rad. serpentaria, pimpinell. rubr. angelicæ, an.* Vnc. ii. *tormenill.* Vnc. i. sem. *herb. betonica* Drach. x. *petasitis* Vnc. i. *Scabios. Drach. vi. caryophyllat. verben.* an. Vnc. sem. *baccar. heder.* M. i. Contundantur omnia & affundatur. *aqua bugloss. borraginis* an. lib. i. *vinisublimari* lib. ii. sem.

In vitro bene obturato exponantur Soli, vel alij calori per octiduum. Postea destillentur cum summâ diligentia.

#### *Alia.*

℞. *Radic. gentian. recent.* lib. i. Incidatur & contundatur minutissime, eique affundatur in vase vitreo aquæ absinth. ad digiti vnus eminentiam. Stent in loco calido per triduum. Adde *Theriac. opr.* Vnc. i. sem. *Aq. Menth. crispæ, Flor. chamam.* an. lib. i. *succirut. absinthij.* an. lib. i. *nucis moschat.* Vnc. sem.

Destilla per cucurbitam in cineribus collocatam; exibat aqua pro dissolutione electuarij de ouo, vel aliorum. Vsurpatur etiam per se.

#### *Alia non destillanda.*

℞. *Rad. tormentill.* Vnc. j. *angelic. Drach. vi. pimpinell. sanguisorb. cinamom.* an. Vnc. vi. *rad. Valerian. zedoar. boli Armeni veri, terr. sigillat. ver. verben. Bacc. iuniperi, heder.* an. Drach. ii. *flor. bugloss. p. i. nuc. vomic. flor. sambuci, salvia Roman.* an. Drach. i. *Theriac. prob. Mithridat. opr.* an. Vnc. ii.

Puluerisanda grosso modo pulueriscentur, & in vitro affundatur spiritus vini quater rectificati, vini maluatici ana lib. i. sem. Syrupi de succo acetosæ, acetositatis Citri ana vnc. iiii. Theriaca postea & Mitridatium in aq. rosar. & borrag. ana vnc. vi. dissoluta addantur, benèque agitentur, & Solis vel hypocaufti calori quatuordecim dies exponantur. Quod clarum erit, effunde & in vitro benè obturato reserua. Dantur vna vice vnciæ tres, absque admixtione aliorum.

#### *Alia aqua pretiosa.*

℞. *Summitat. hyperici* M. iiii. *chamedryos, Ital. calamimth. cardui benedicti* an. M. i. *scordij* M. i. sem. *centauræ minoris, verben. dictamni Cretici* an. M. sem. *albi, gentiane, tormentill. Aristolochia rotund.* an. Vnc. sem. *baccar. iunip. heder.* an. Drach. v. *rhabarbari* Drach. iiii. *Trochiscor. de caphura* Drach. ii. sem. *caphur.* Drach. ii. *croci* Drach. i. Arida contundantur, herbæ minutissime incidantur, misceanturque. His factis superinfunde

*Vini sublimari* lib. vi. ponantur per octiduum continuuum ad Solem, deinde in balneo Mariæ probè destillentur. Postea feces sume & puluerisa, rursusque in Cucurbitam ponito ac superinfundito

*Aq. hyperici* lib. vi. *borraginis, buglossi, melissophylli* an. lib. i. *pimpinell. cardui benedicti, scabiosa caryophyllata*



*phyllata* an. lib. sem. Misceantur probè omnia, & in M. B. vtriusque destillantur, priorique destillationi addantur. adde Syrup. cortic. citri lib. i. sicum pinguium lib. sem. *uuarum zibebarum exarillatarum Passularum* an. Vnc. iii. *zedoaria* Vnc. sem. *cinamomi*, *castia odorat.* an. Drach. v. *Theriaca Andromachi*, *Mithridat.* an. Vnc. vi. *vinu Maluatico generosi* lib. ii.

Contundèda contundantur crassiusculè, reliqua dissoluantur cum vino Maluatico, seduloque commisceantur, & in vitrum mundum stricti orificij probè reponantur per mensem ad solem. His omnibus peractis per filtrum traiciantur.

Postea, *℥. Spec Diamargarit. diamoschi, diambr. Elect. de gemm. frigid. an. Drach. ii. sem. Margaritarum preparatarum, fragment. Smaragdi, Hyacinthi, Corallij rub. an. Drach. i. sem. Ambr. cineritæ, moschi an. Scr. i. Colligantur omnia in syndone rubro, & à filo in aquam prædictam dimittantur. Dantur robusto Vnc. ii. sem.*

## Electuaria.

### Antidotum Curatinum, Antidotum vitæ nuncupatum.

*℥. Boli leuantici optimi* Drach. xxii. *rad. tormentill. dictamni albi an. Drach. xi. Helenij, bistortæ an. Dra. x. limatur. cornu cerui Dra. vii. cinamomi, rad. pinipinella, granor. iuniperi, heder. an. Drach. vi. Antithor. seminis thlaspios, an. Drach. v. nucis moschata, rad. caryophyllata, agarici trochiscati, galanga, acori veri, cyperei, cornu monocerotis, rad. centauri magni an. 3. iiij. rhabbari electi. 3. viii. zedoar. angelic. an. Scr. viij. caryophyll. 3. ii. aurilaminati, Margaritarum, foliorum meliss. scordi, veri an. Scr. v. quinque lapidum pretiosorum, pastillorum de terrâ sigillatâ, de spodio, de capbura an. 3. i. 3. macis, granorum tinctoriorum, gall. moschat. ver. rad. peon. croci an. Drach. i. santal. omnium moschi electissimi, ambr. gryf. an. Scr. ij. sem. agallochi, doronici Europæi, rad. chelidoni, sem. ocymi, limatur. eboris, origani Cretici an. Scr. ii. Corall. vtriusque, cardui benedict. Calaminth. Italic. chamadryos an. Scr. i. mell. optimi lib. ii. sem. conseru. oxalidis, syrup. de corticibus Citri an. lib. sem. granatorum acidorum, acetositis citri, conseru. meliss. flor. caryophyll. an. Vnc. iiiij. Misce probè & secundum artem fiat antidotum instar Theriacæ.*

## Apostemata.

*Diarhabarbarum Theodori, intus sumendum, se vlcus iam sit mundificandum, expellens venenatas impuritates & curationem mouens.*

*℥. Rhabarb. electi. Drach. vi. agarici trochiscati Dra. v. pulu. baccar. hederæ Dra. ii. sem. diamarg. frig. Dra. ij. turpethi electi Drach. i. sem. zinziberis albi, doronici an. Scr. sem. zedoar. Scr. i. spic. Indic. gr. xy. conseru. rosar. bugloss. an. Dra. vi. Syrup. rosar. solutini cum Rhabarb. q. s. Fiat Electuarium.*

## Emplastrum attractiuum.

*℥. Mercurij sublimati Dra. sem. cantharid. n°. xii. Pulueriscentur & cum oleo rosar. atque farinâ hordei. Fiat Emplastrum.*

## Vel.

*℥. Vnguenti rosati Mesuës, diachyli simplicis an. Vnc. ii. Mercurij sublimati 3. i. cantharidum crassiusculè pulueris. n°. x. Incorporentur instar cerotij. s. Emplastri.*

## Vnguentum Causticum Theodori.

*℥. Arsenic. rubr. alb. an. Vnc. i. Macerentur per noctem in aceto generoso, postea defunde acetum, & maceratis adde mastich. ceruss. an. Vnc. i. vitrioli calcinati Vnc. sem.*

Fiat Puluis omnium, & macerentur per triduum in succo Plantaginis in loco calido, post in umbrâ exsiccantur, & subtilissimè pulueriscentur: postea

*℥. adip. porcini, aqua scabios. flor. q. s. vt fiat vnguentum. Ad quod requiritur sequens.*

## Emplastrum defensiuum.

*℥. Ceruss. pulueris lib. 3. lithargyr. argent. auri an. Vnc. sem. olei oliu. tres libr. quadrantes. Misce & lento calore coque ad aliquam spissitudinem, tunc adde ceræ vncias vi. vt Fiat Emplastrum.*

## De Carbunculis, Vnguentum defensiuum Theodori.

*℥. Olei rosarum omphacini, myrthini veri an. Vnc. iii. succ. plantaginis morell. an Vnc. ii. vini granatorum, aceti st. caryophyll. Vnc. i. Decoquantur simul ad lentum ignem, donec prædicti succi absumantur: deinde colo transfundantur, & adde ceræ lotæ q. s. Pulu. Terr. Lemn. vera, boli Armen. veri an. Vnc. 3. capbur. Scr. ii. f. Fiat s. a vnguentum.*

## Vnguentum incarnatiuum eiusdem.

*℥. Terebinth. Vnc. iij. mellis optimi 3. vi. pulu. sarco. coll. thuris Scr. ii. myrrh. Scr. ii. sem. aloës succotrin. sang. Dracon. an. Scr. i. 3. croci optimi, mastiches an. Scr. j. Cera virginea q. s. Fiat s. a vnguentum.*

# MEDICAMENTA CONTRA PESTEM,

## D. SIGISM V N D O K O L R E V T E R O, P R O Republ. Dresdensi ordinata.

Anno 1583.

## Alexiterium.

*℥. succ. fol. Calend. acetos. betonic. an. lib. ii. cichor. puleg. scabios. rut. an. lib. i. verben. lib. sem. agrest. Vnc. iii. sem. Mell. opt. destum. 3. iii. succ. ribium, berberor. an. Vnc. iii. sem. vini Rhem. opt. lib. i. Cret. aut Maluat. Vnc. x. Misc. decoq. postea lento igne in vase coperto ad consistentiam Syrupi, & adde permiscendo Syr. infusion. rosar. acetos. citri, limon. an. Vnc. ii. sem. Deinde in tenuiss. puluerem prius reductis simul mixtis insperge, semper agitando, vt formam Elect. solidioris acquirant, q. s. de subseq. spec. Aloës succorr. Vnc. ij. Myrrh. elect. Vnc. sem. croci Vnc. i. boli Armen. 3. iii. sem. terr. sigill. 3. ii. castor. 3. i. nuc. vomic. 3. iii. unicornu 3. iii. sem. cinamomi 3. sem. santal. alb. rub. citrin. an. 3. ii. fol. auri n°. xxi. ligni aloës 3. ii. sem. visci qu. Vnc. i. cort. citri, limon. aurant. an. 3. iii. margarit. splendid. Vnc. sem. Corall. alb. rubr. an. Scr. iii. rasur. dens. apri Drach. v. C. C. vsti Vnc. i. sem. sem. eruca Vnc. i. cardui ben. Drach. vij. basilic. Dra. ii. citri, limonum, aurant. napi an. Dra. i. acetos. napi an. Dra. iii. nucl. iugland. ex cort. aceto per noctem macer. lib. i. sem. cariear. pingu. n°. xv. bacc. lauri, iuniperi an. Vnc. i. rad. tormentill. Vac. sem. doronici Drach. iii. sem. diptamn.*

*dipamn. Dra. iii. angelic. domest. syluestr. pimpinell. sorba-  
frill. an. 3. i. b. zedoar. biflor. Kalerian. Ostruc. phu. veri,  
aristot. long. & rot. an. Drach. ii. sem. gentian. Drach. iii.  
sem. urtic. alth. an. Dra. i. sem. Men. Zingib. leuistic. sigill.  
Salom. an. Drach. i. petasit. Vnc. i. helenij Drach. vi.  
Asclepiad. Vnc. i. Aron. Vnc. i. sem. Asari Drae. ii. cru-  
ciat. Vnc. i. sem. succis. Vnc. iii. sem. Olsnitiij Vnc. i.  
fol. dipamn. salu. gratiol. Calend. Ononid. cardui bened.  
Veron. Carlin. an. Dra. ii. sem.*

Quod remanet de speciebus, referuetur in vasculo mundo, & seponatur.

### Aqua alexiteria.

*℞. Puleg. acetos. cichor. scabios. rut. salu. fumar. cardui  
be ned. an. M. viii. galeg. M. v. Calend. M. xiii.*

Sint plantæ virides & modò collectæ; concisæ pa-  
rumper humectentur. Vini Rhen. puri lb. iii. aq. scabios.  
fumar. meliss. cichor. verben. betonic. an. lib. sem. Aceti vini  
acerr. lib. i. Destill. f. in B.

### Electuarium sudoriferum.

*℞. C. C. prepar. Vnc. sem. succ. rut. millefol. an. Vnc. ii.  
Caricar. num. vii. Lentium Dra. i. feniculi Dra. i. sem bac-  
car. lauri Dra. ii. rasur. dentis apri. ligni visci q. an. Dra. iii.  
rad. apij Dra. ii. sem. rut. rapar. cardamomi vir. an. Dra. i.  
Cum oxymel. comp. & conseru. fumar. F. Electua-  
rium.*

### Puluis ad sattulos.

*℞. Rad. irëos Dra. i. sem. plantag. cichor. hierac. lap.  
mai. an. Dra. iii. valerian. petasit. angelic. helenij. leuist. an.  
Dra. vi. fol. basilic. rorismar. coron. Puleg. meliss. serpill. ma-  
ioran. origani. hyssopi. rut. an. M. i. st. millefol. rosar. rubr. an.  
M. iii. stochad. arab. rad. pæon. an. Vnc. i. spic. Cel. Dra. iii.  
Ind. Dra. ii.*

Concisa & contusa mediocriter referuentur in vase  
ligneo mundo.

### Electuarium præservativum.

*℞. nucl. ingland. per diem naturalem aceto macerati.  
post mundator. exquisitè. lib. i. Tritis adde fol. rut. virid.  
minutissimè concis. Vnc. iii. puleg. virit. concis. Vnc. ii. Con-  
seru. euphras. borrag. bugloss. rosarum violar. meliss. an.  
Vnc. i. betonic. Vnc. iii. rad. pimpinell. cond. cichor. cond.  
an. Vnc. ii. sem. Hac bene mixta referuentur seorsim.  
Rursus.*

*℞. Zedoar. Vnc. iii. myrrh. Vnc. ii. sem. rad. asclepiad.  
hierac. olsniti. rad. angel. tormentill. cichor. ana. Drach. sem.  
sem. citri. limon. aurant. an. Dra. i. basilic. acetos. an. Dra. i.  
sem. Corall. alb. rub. Margarit. præp. Carabes alb. an. Dra.  
i. santal. omnium an. Scr. iiii. boli Armeni Vnc. sem. Co-  
riandri præp. Dra. vi.*

Ex his omnibus f. puluis tenuiss. & huius medietas  
commisc. referuatæ iam mixturæ, & syr. acetos. sim-  
pl. q. f.

Efformetur Electuarium.

### Rotula è zedoaria.

*℞. Resid. mediei. pulueris, cui adde Myrrh. Vnc. i. sem.  
Zedoar. Vnc. i. sem. Sacch. in aq. rosar. betonic. acetos. an. q.  
f. dissol. F. s. a. Rotulæ trochiscorum instar.*

### Puluis pro fumo.

*℞. Syrac. calam. Vnc. ii. ladani Vnc. i. baccar. iuniperi  
M. v. putam. bacc. lauri M. i. fol. quer. Vnc. ii. Origan. ma-  
ioran. serpill. hyssop. puleg. an. Vnc. i. sem. cortic. citri Vnc. i.  
Thymiam. Vnc. ii. Thuris Drach. vi. Sabin. Vnc. ii. fol.*

*spic. vulg. M. iii. summit. hypericon. Vnc. i. rosar. alb.  
M. xii.*

Concisa & mediocriter contusa dentur in vasculo  
lig neo bene cooperto.

### Emplastrum ad Bubones.

*℞. fol. betonic. salu. Calend. ruta virid. an. M. ii. rad. ara-  
morac. raphani an. M. ii. sem. lil. alb. Vnc. iii. cepa Vnc. i.  
caricar. num. vi. farin. tritici Vnc. i.*

Concisa & contusa coq. in f. q. aq. ad mollitiem, op-  
timè deinde contusis adde sinap. Drac. sem. salu. Dra. iii.  
fermenti. Vnc. iii. Ammoniacy aceto dissol. Vnc. i. Mellis  
q. f. Coq. ad Empl. consistent.

### Vnguentum mundificans.

*℞. Vitell. ouor. num. vi. fungi musc. aceto macerati.  
postea triti Vnc. i. fol. betonic. calend. chelidon. an. M. sem.  
fermenti Dra. ii. Misce simul in vnam massam, contus.  
adde. Galbani in aceto dissol. Vnc. s. Asa foetida Dra. i. fa-  
rina silig. Dra. i. spec. alexit. Dra. i. terebinth. aq. scabiosæ. lo-  
za, Drach. vi. Mellis rosati q. f. Subiganrur in Vn-  
guentum.*

### Electuar. amarum.

*℞. Aloës succorr. Vnc. iii. spec. alexiterij Vnc. i. Myr-  
rha Vnc. i. sem. Mastich. Dra. vi. Diagryd. ritè præp.  
Dra. i. Cum syr. acetos. q. f.*

### Aliud lenius.

*℞. Elect. lenitiini, diasebesten sine diagryd. ana. Vnc.  
iii. tryph. Persic. Vnc. i. Misc.*

### Vnguenta.

*℞. Thur. mastich. myrrh. sarcocoll. an. Dra. i. farin. hord.  
fabar. an. gr. xv. sangu. dracon. boli Armeni an. Dra. sem.  
resin. colata, terebinth. pur. colophon. pic. naut. an. Dra. vi.  
seu ceruini Drach. iii. Ol. hyperici Vnc. i. sem. Cera q. f.  
Fiat Vnguentum.*

### Morsuli è zedoaria.

*℞. cort. citri cond. Dra. vi. aurant. Scrup. ii. rad. eryng.  
cichor. pimpinell. omn. condit. ana. Dra. ii. & absterio bene  
faccharo crassiusculè concisorum. Corall. rub. & alb. præ-  
par. an. Scr. i. ligni aloës Dra. sem. Myrrha Scr. i. Fol. auri  
num. iiii. zedoar. Drac. ii. boli Armeni loti aliquoties aqua  
rosar. & cinamomi q. f. F. s. a. Morsuli.*

### Puluis pro fumo.

*℞. Rosar. rubr. Dra. ii. sem. Syrac. cal. Dra. i. sem. ben-  
zoes Scrup. ii. ligni aloës, cort. citri Dra. sem. stochad.  
Arab. gr. v. Hisce mediocriter contusis add. scobis tenuiss.  
ligni ros. Scr. ii. Mosch. gr. iii. ambr. gr. ii. M. detur in py-  
xide lignea mundâ.*

### Rotula tempore pestis.

*℞. Zedoar. Drach. ii. Myrrh. Drach. sem. ligni aloës  
gran. xv. Rad. Cichor. angelic. helenij. pimpinell. omn. cond.  
an. Dra. i. gentian. gr. x. Margarit. præp. gr. vii. s. Conf.  
rosar. rubr. Dra. ii. sacch. dissol. in aq. beton. q. f. Fiant Ro-  
tulæ.*

### Puluis pro fumo communis.

*℞. Cort. bacc. lauri, bacc. iuniperi, an. M. ii. fol. querc. fa-  
gi an. M. iii. summit. hyperici. serpilli. pulegy. origani. sabin.  
rosar.*

rosar. alb. rub. an. M.ii. Concifa & mediocriter con-  
qualf. commisc. F. Puluis

## Aqua pro suffumigio

℞. Boli Rom. lib.ii. alum. boli vulg. an. Vnc.iii. ace-  
tos. rosar. rub. scabios. an. M. iiii. galega, absinth. Rom.  
an. M. i.

Hæc omnia concifa & conqualf. coq. optimè in  
canth. vi. aq. & aceti acerr. ad canth. consumpt. trans-  
colarum referuetur.

## Trochisci pro fumo.

℞. Styrac. cal. Drac. xi. ladan, benzoës, caryoph. an.  
Dra. i. sem. rosar. rubr. Dra.ii. ligni aloës Scr.ii. saccha-  
ri Dra. vi. lign. rosei, Dra.iii. trochisc. alipt. mosch. rec.  
prep. Drach. ii. mucilag. tragacanth. cum aq. ros. q.  
s. F. s. a. trochisci.

## Species pro sacculis.

℞. hyssop. puleg. basilic. meliss. maioran. rut. an. M.iii.  
rad. angelic. valerian. Cichor. iræos. lap. mai. pæon. asclep.  
petasit. lenistie. ostruc. an. Vnc. i. fl. mille fol. rosar. rubr.  
M.ii. stachad. Arab. Dra. ii. spica Celt. pug. i. Hæc om-  
nia mediocr. concifa & mixta referuentur.

## Electuarium amarum.

℞. Dictamni albi, gentian. asclep. pimpinell. zedoar.  
tormentill. pæon. bryon. eryng. an. Vnc. sem. boli. Armen.  
Dra.iii. Myrrh. Dra.ij. Cort. citri Drach. vi.

Hæc singula minutissimè puluer. commisc. melli de-  
cocto galegæ, rutæ & puleg. in aceto despum. ad for-  
mam & consistent. Electuarij. Referuetur. in fictili.

## Puluis odoratus.

℞. ligni aloës Drach. ii. ladan Drach. vi. santali  
citrin. Drach. iii. styrac. calam. Drach. v. benzoës Dra.  
i. sem. rasur. cort. citri exter. Vnc. sem. rosar. rubr. 3. x.  
caryophyll. 3. i. Moschi, Zibeth. an. Scr. sem. Mediocri-  
ter concifa & conqualf. referuentur

## Syrup. alexiterius.

℞. fol. Calend. galeg. uerben. myrrhid. cichor. beton.  
scabios. an. M. i. rad. angelic. olsnit. pimpinell. diptamni  
albi, petasit. bistort. tormentill. ostruc. asclep. an. Vnc. i.

Coq. concifa & conqualf. in vi. vel. viii. canth. aq.  
communis ad sufficientiam, transcol. cum lib.ii. mel-  
lis ad ipsius despumationem ebulliant in fictili  
mundo.

# MEDICAMENTA

## PRÆSCRIPTA COLLE- GIO MEDICO, IN

Academia VVittebergenfi,

Anno 1598. 1609. 1610. 1611.

### 1. Puluis ad suffiendum pro pauperibus.

℞. Baccar. inniperi M.ii. Cortic. baccar. lauri M. i.  
Thuris libr. sem. Fol. absinthij, ruta, quercus an. M. ii.  
Scobis ligni inniperi M. iiii. Succini Vnc. i. F. Puluis  
pro fumo.

Dan. Sennerti Tom. I I.

### 2. Candela pro fumo.

℞. Styrac. calamit. benzoës, thuris elect. an 3. ii.  
cinamomi, caryophyll. macis, nucis, mosch. radic. ange-  
lic. rosar. rubr. siccarum, santal. citrin. ligni aloës, cortic.  
citri sic. an. Scr. i. moschi gr. ii. carbonum tilia duplum  
ad speciem tragacanth. in aq. rosar. camphorata dissol. q.  
s. F. Candela pro fumo.

### 3. Alius puluis pro ditioribus.

℞. Baccar. inniperi lb. i. thuris Vnc. iv. styrac. ca-  
lamit. benzoës an. Drach. i. sem. santal. citrin. Vnc. sem.  
ligni aloës 3. ii. fol. lauri Vnc. i. flor. laueudal. 3. ii. rosar.  
rubr. Vnc. i. sem. scobis ligni inniperi M. iiii. F. Puluis gros-  
so modo pro fumo,

### 4. Puluis praeseruans.

℞. Boli armeni veri prep. terr. sigillat. ver. an. Dra.  
ii. rad. tormentill. pimpinell. angelic. petasit. an. 3. sem.  
valerian. ostrutij an. 3. i. sem. acetos. citri, enduia an.  
Scr. i. fol. seordij, dictamni cret. cardui ben. acetos. an.  
Dra. i. cinamom. interni, caryophyll. zedoar. ligni aloës,  
santal. citrin. corall. rubr. prep. C. C. vsti & prep. mar-  
garitar. orient. prep. an. Scr. ij. croci orient. trochisc.  
de camph. an. Scr. i. spec. electuar. de gemmis 3. i. M. F.  
Puluis,

### 5. Electuarium Praeseruatium.

℞. Conferu. acetos. acetosell. rosar. an. Scr. i. anthos.  
3. ij. sem. citri excort. cortic. eiusdem, an. Scr. j. boli arme-  
ni veri 3. i. terr. sigill. vera 3. sem. mithridatij elect.  
Vnc. sem. theriac. optim. 3. ii. croci orient. Scr. sem. aceti  
vini rosar. cochl. iiii

Theriaca cum Mithridatio in aceto dissoluatur, ad-  
danturque pulueres cum conferuis, & diligenter in  
mortario ad formam Electuarij ducantur. Dosis sit adul-  
tis 3. i. infantibus Scr. i. vel. ii.

### 6. Morfuli praeseruantes.

℞. Boli armeni veri cum aquâ acetos. prepar. Scr.  
iiii. rad. tormentill. dictamni albi, pimpinell. semin. ci-  
tri excort. an. 3. i. electuar. de ono 3. i. sem. spec. liber. s.  
aloe 3. i. conferu. flor. acetos. Vnc. sem. sacch. albif. dissol.  
in aquâ acetos. lib. i. F. s. a. Confectio in morsulis.

### 7. Electuarium pro familia.

℞. Fl. acetos. Vnc. i. radic. tormentill. angelic. va-  
lerian. dictamni albi, pimpinell. baccar. inniperi recent.  
an. M. ii. Contusa cum aceto rosarum, M. & adde rob  
sambuci Vnc. iii.

### 8. Puluis praeseruans pro pueris.

℞. Spec. elect. diamarg. frigid. diarrh. Abb. libe-  
rans. cum bolo an. 3. i. B. corall. rubr. prep. 3. sem. ossis de  
corde cerui veri Scr. i. sem. santon. 3. i. rad. pæonia, gra-  
nor. eiusdem excort. an. Scr. ii. sem. cinamom. interni opti-  
mi, cortic. citri an. 3. i. B. Puluerisatis puluerisandis add.  
sacch. albif. Vnc. ii. M. F. Puluis.

### 9. Rotula praeseruantes pro gravidis.

℞. Margar. orient. non perfor. Scr. B. frag. lapid. pro-  
tios. an. Scr. sem. sem. acetos. C. C. vsti & prep. an. Scr. ii.  
rad. pæonia, granor. eiusdem excort. an. 3. B. spec. diamarg.  
cal. confect. cordial. an. 3. i. sacch. rosar. veteris 3. B. sacch.  
albif. in aquâ acetosa & rosarum odoratiss. an. dissolut.  
Vnc. vi. sem. F. Confectio in rotulis.

X

10. Acetum

10. *Acetum pro spongiis.*

℞. Granor. iuniperi Vnc. i. fol. ruta recent. Vnc. sem. scordij Dra. ii. Incisis iis & contulis adde rad. angelic. 3. ii. Zedoar. Dra. i. aristoloch. longa, valerian. an. Dra. i. sem. Pulveriscentur grosso modo & affundantur aceti vini fortis lib. iiii.

11. *Lingualia.*

℞. Zedoar. Vnc. sem. rad. pimpinell. angelic. an. Dra. i. i. ligni aloes, cinamom. elect. cortic. curi an. Scr. ii. macis Scr. i. sacchari albiss. Vnc. iii. Cum s. q. tragacanth. in aq. rosarum dissoluit. formentur Hypoglottides.

12. *Pomambra pro viris.*

℞. Flor. rosarum rubrarum, violarum an. Drach. ii. an. rhos. summis. maiorana, laurandul. an. Dra. i. cortic. curi siccer. nucis mosch. cinamom. interior. an. Dra. iii. ligni aloes, santal. citrin. an. Dra. i. styrac. calamit. benzoe an. Dra. ii. Cum s. q. tragacanth. in aqua rosarum dissoluit. F. Massa pomamb. pro viris. Dosis sint Dra. iii. quæ aromatisentur cum moschi, ambr. an. gr. ii. & Syndoni rubræ includantur.

13. *Pro mulieribus.*

Aromatisentur cum castorei gr. iii. includantur Syndoni.

14. *Sacculi Cordiales pro viris.*

℞. Rosarum rubrar. 3. iii. flor. violar. purpur. nymph. alba, fol. maiorana, scordij, santal. citrini an. Dra. i. β. rad. iridis, cortic. citri Vnc. sem. zedoar. Scr. iii. cinamomi, caryophyll. macis an. Dra. sem. styrac. calam. an. Scr. iii.

Concisa & tuta crasso modo fermentur ad usum. Dosis Drach. iii. includantur Syndoni. Pro viris adde camphora gr. ii. moschi gr. i. F. Sacculus.

15. *Pro mulieribus.*

Adde castorei gr. iii.

16. *Linimentum ad naves.*

℞. Theriac. optim. mithridat. elect. an. 3. i. myrrh. elect. ben. qes, styrac. calam. an. Scr. i. santal. citrin. spec. cordial. temper. an. Scr. ii. ol. nuc. moschat. Dra. i. vini maluaticis aceti rosarum, scordij an. q. s. F. Linimentum.

17. *Electuarium Curatium.*

℞. Theriaca Andromachi veteris Vnc. i. Mithridat. elect. Electuar. de ovo. diascord. Fracastor. an. Vnc. β. rad. tormentill. Scr. iii. dictamn. alb. Scr. ii. fol. dictamn. Cret. scordij an. Dra. sem. boli armen. ver. terr. sigill. an. Scr. iii. C. C. vsti & prap. Dra. i. sem. acetos. citri excort. an. 3. sem. sancti Scrup. i. camphor. gr. xxiv. Pulveriscentur subtilis & cum s. q. Syrup. acetos. citri redigantur ad formam electuarij.

## 18.

℞. Electuarij huius Scr. iii. aq. scordij Vnc. iii. aceti vini Vnc. i. M. F. Haustus sudorifer, pro adulto.

## 19.

℞. Elect. præs. 3. β. vel Scr. ii. aq. scordij Vnc. ii. β. aceti vim Vnc. β. M. F. Haustus sudoriferus pro pueris ab anno 7. ad 14.

## 20.

℞. Electuar. præs. Scr. i. aq. scordij Vnc. i. aceti vini 3. ii. M. pro minoribus.

21. *Syrup. refrigerans & confortans.*

℞. Syr. de succo acetos. acetosell. acetositar. citri, oxy. sacch. s. an. Vnc. i. rob. ribes, cerasor. an. Vnc. β. vini granat. Vnc. i. vel. q. s. Misce.

22. *Electuarium refrigerans & confortans.*

℞. Carnium citri condit. Vnc. i. conseru. flor. citri, acetosell. borragin. rosar. an. Vnc. sem. manu Christi perlata 3. ii. β. cum Syrup. acetositaris citri q. s. F. Electuarium.

23. *Potus purgans pro adultis.*

℞. Decocti communis flor. & fruct. in quo sem. citri 3. sem. acetos. portulac. an. Scr. i. bullierint, Vnc. iii. Dissolue in his Elect. diacathol. lenitiu. s. an. 3. iii. rosati Mef. Dra. sem. trypher. Persic. 3. i. adde Syr. de cichor. s. oxy. sacchar. an. Vnc. sem. M. Fiat haustus pro adultis.

24. *Pro iunioribus ab anno 7. ad 14.*

Paretur dimidia pars.

25. *Pro infantibus.*

Paretur pars tertia.

26. *Clyster pro adultis.*

℞. Fol. malu. utrinque, mercurial. violar. an. M. i. flor. chamam. M. sem. sem. lini. fenugr. an. 3. ii. rad. alib. Vnc. sem. Coquantur in sufficienti quantitate aq. ad tertias, pro lb. i. colat. adde Elect. diacathol. Vnc. sem. diaprun. lenitiu. 3. ii. rosati Mef. Dra. i. β. viol. Vnc. ii. mellis rosat. colat. Vnc. i. vitell. oui n° i. Salis communis Dra. sem. M. Fiat clyst. pro adulto.

27. *Pro iunioribus.*

℞. Decocti supra scripti, Vnc. viii. Elect. diacathol. 3. ii. lenitiu. simpl. 3. i. ros. Mef. 3. sem. ol. violar. Vnc. i. mellis rosat. colat. Vnc. sem. vitell. ouor. n° i. salis Scr. i. M.

28. *Pro infantibus.*

℞. Decoct. supra scripti, Vnc. iv. Elect. diacathol. 3. i. lenit. simpl. 3. sem. rosati Mef. Scr. i. ol. viol. Vnc. i. mellis rosati colat. Vnc. sem. vitelli oui n° 1/2. salis Scr. β. M.

29. *Emplastrum ad bubones mitius.*

℞. Radic. malu. alib. fol. malu. viol. an. M. i. Coqu. ad mollitiem Post tuis iis adde. Buryri recent. non saliti Vnc. ii. adipis gallin. Vnc. i. fermenti Dra. i. β. ol. rosat. q. s. M. Fiat Vnguentum.

30. *Fortius.*

℞. Capar. magnar. rubr. ademptis tunicis exterioribus assatarum in puppâ cannabinâ sub cinerib. n° viii. Fermenti acerrimi ad magnitudinem 1v. caparum. sicum pinguium n° viii. passular. magnar. n° xx. theriac. veteris Vnc. ii. ammoniac. in acer. dissolu. Vnc. i. sem. camtharid. abietis alis & capitibus Scr. ii. Pulverisatis pulueris adis ad formam Emplastri redigantur.

31. *Emplastrum ad carbunculos.*

℞. Theriac. opt. mithridat. elect. an. 3. ii. fermenti, terobinth. an. Vnc. i. mell. rosat. Dra. vi. buryri recent. Vnc. i. salis communis Vnc. sem. fuligin. camini 3. x. saponis veneti Vnc. i. sem. croci 3. i. sem. vitell. ouor. n° ii. Contundantur omnia, & F. Emplastrum.



## 32. Pulvis ad infectas domos.

℥. Vitrioli, nitri an. lb. sem. bacchar. lauri recent. Vnc. ii. S. myrrh. rubr. Vnc. ii. alumin. Vnc. sem. sulphur. Dra. i. Pulverisata misceantur.

## 33. Alius.

℥. Vitrioli Vnc. v. nitri Vnc. i. myrrh. rubr. Vnc. v. Pulverisata infundantur in aceto vini q. s. de hoc infunde in lateres ignitos, ad faciendum fumum qui venenatam auram in locis infectis consumit, vestesque quibus adharet, à veneno liberas facit.

# MEDICAMENTA AB EODEM COLLEGIO PRÆSCRIPTA

Anno 1626.

## Præservantia.

### 1. Pulvis ad suffiendum pro pauperibus.

Idem, qui suprà ab eodem Collegio præscriptus, n<sup>o</sup>. 1.

### 2. Pulvis ad suffiendum pro divitibus.

Idem, qui suprà, n<sup>o</sup>. 2.

### 3. Candela pro fumo.

Eadem, quæ suprà, n<sup>o</sup>. 3.

### 4. Species pro vino.

℥. Absinth. vulgar. scordij, cardui bened. an. M. i. dictamni Cretici M. sem. rad. helenij, pimpinell. an. Drac. vi. cortic. citri, Vnc. sem. Dentur. in chartâ.

### 5. Pulvis præservans.

Idem qui suprà num. 4.

### 6. Pulvis Montagnana.

℥. Sem. citri, acetos. an. Drach. ii. rad. dictamni albi, gentiana, tormentill. an. Drach. ii. S. boli Armeni, cinamon. elect. an. Vnc. i. margarit. prepar. sapphir. prepar. off. de C. C. an. Drach. i. santal. omnium, semin. ocy-mi, an. Dra. i. sem. F. Pulvis præservans, de quo scribit Montagnana, quod nunquam viderit aliquem mori, qui illo vsus fuerit.

### 7. Rotula liberantis.

℥. Spec. liberant. f. aloë, Vnc. sem. extract. angelic. zedoar. an. Scrup. i. sacch. in aq. rosar. dissol. Vnc. v. F. Rotulæ.

### 8. Rotula cordiales.

℥. Spec. confect. de hyacint. Vnc. S. confect. alchermes 3. i. sem. extract. angelic. 3. sem. zedoaria Scr. i. scordij gr. vii. magisterij corallior. Scr. sem. Cum sacchar. in aqua galega & acetosa dissol. F. Rotulæ.

### 9. Rotula præservantes

℥. Balsam. sulphur. Scrup. sem. extract. helenij Scrup. i. ol. angel. Scrup. sem. sacchar in aq. Dan. Sennerti Tom. 11.

scabios. dissolut. Vnc. iv. vel v. F. Rotulæ.

### 10. Rotula pro infantibus.

℥. Pulu. bezoartic. D. Sennerti, spec. liberant. f. aloë an. Drach. i. extract. tormentill. boli Armeni an. Scrup. i. sacch. in aq. rosar. dissol. q. s. F. Rotulæ.

### 11. Rotula pro gravidis

℥. Marg. orient. non perfer. Dra. sem. fragm. 5. lap. pretios. an. Scr. S. semin. acetos. C. C. vsti & prepar. an. Scr. ii. rad. pæonia, gran. excort. eiusd. an. Dra. S. spec. diamargar. calid. confect. cordial. an. Dra. i. sacch. ros. veteris Dra. sem. Cum sacch. Vnc. vi. sem. in aq. acetos. & rosar. dissolut. F. Rotulæ.

### 12. Electuarium præservans.

℥. Confer. scordij, galega, rut. scabios. tormentill. acetos. acetosell. rosar. flor. calendul. an. Vnc. ii. rad. pimpinell. condit. helenij condit. scorzon. condit. an. Vnc. S. boli Armeni, terr. sigillat. an. 3. ii. rad. bistort. succis. angel. Zedoar. an. 3. ii. cortic. citri condit. Vnc. i. theriac. opt. mihridat. an. 3. vi. Cum syr. de succo citr. scordij, galeg. an. q. s. F. Electuarium.

### 13. Electuarium de zedoaria.

℥. Pulu. rad. zeddar torment. pimpinell. helenij, ol. snitij, angelic. an. 3. ii. myrrh. 3. i. Incorporentur aceto bezoartico ac addatur Rob. sambuci, Vnc. iiiii. junip. Vnc. ii. Misce.

### 14. Electuarium pro familia.

Idem quod suprà, num. 7.

### 15. Syrupus & Morfuli præservantes.

℥. Spec. confect. liberantis Austriac. Diuidantur in partes duas æquales, ex vnâ cum Sacch. in aq. acetos. scabios. cardui bened. dissolut. q. s. F. Morfuli.

16.

Alteri parti affundatur acerum vini optim. q. s. stent in infusione per dies aliquot in loco calido, donec omnis vis attracta fuerit: postea acerum colatum cum sacch. coqu. ad Syrupi consistentiam. Fiat Syrupus.

### 17. Acetum Bezoarticum.

℥. Fol. rut. scord. flor. tanacet. lutei, rosar. rubr. an. M. S. rad. Angelic. succis. ol. snitij, dictamni albi Zedoar. an. Vnc. sem. Affunde aceti q. s.

### 18. Pulvis pro infantibus.

Idem qui suprà num. 8.

### 19. Acetum ad odorandum.

Idem, quod suprà num. 10.

### 20. Pomum ambra.

Idem, quod suprà num. 12. 13.

### 21. Noduli ad odorandum.

℥. Flor. rosar. rub M. sem. melis. luendul. fol. rut. cortic. citri sic. an. 3. i. santal. citrin. macis, ligni aloës, caryophylli, rad. angelic. zedoaria, sem. nigell. Scr. ii. camphor. gr. iiiii. Pulveriscentur grosso modo, insuantur nodulo, pondere Vnc. sem. vel Dra. vi.

X 2

Qui

Qui volunt, possunt moschum vel ambram addere.

## 22. Trochisci sublinguales.

Idem, qui supra numero 11.

## 23. Balsamum.

℞. Ol. angelic. rut. an. Scr. i. citri destill. Scrup. sem. moschi, ambra an. gr. ii. Ol. macis express. q. s. Fiat Balsamum.

## 24. Amuleta.

℞. Arsenic. alb. Vnc. sem. auripigment. Dra. i. sem. pulu. bufon. sicc. Vnc. ii. santal. rubr. Drach. sem. Cum mucilag. tragacanth. F. Amuleta formâ consuetâ.

## 25. Pulvis ad infectas domos.

Idem, qui supra n° 32.

## 26. Electuarium Alexipharmacum curatiuum.

℞. Rob sambuc. Vnc. ii. Theriac. Vnc. i. sem. Sal. cardui benedict. absinth. fraxini an. Drach. i. Spir. vitrioli Scr. iiii. puluer. corall. rubr. Drach. ii. Cum Syrup. Scordij. F. Electuarium.

## 27. Electuarium Curatiuum aliud.

Idem, quod supra, num. 17.

## 28. Aqua Theriacalis.

℞. tormentill. lapp. maior. s. bardan. pimpinell. succisa, valerian. an. Vnc. iiii. Imperator. angelic. gentian. serpentar. an. Vnc. i. capar. mundatar. à cortice, Nucum recent. nondum planè maturarum an. Vnc. vi. fol. ruta cum floribus, acetos. cardui benedict. lauendul. verben. recent. an. M. ij. camph. in sp. vini dissoluti Drach. i. Theriac. Mithridat. an. Vnc. j. sem. aceti rosar. Vnc. vi. Vini albi prestant. q. s. Destillentur.

## 29. Syrupus refrigerans & confortans.

℞. Syrup. de succo acetos. acetosell. galeg. an. Vnc. i. succi citri Vnc. i. s. Vini granat. Vnc. ii. sem. succi ribium, rubi Idei, berber. an. Drach. vi. Aqu. Lauendul. fragor. s. vino, acetos. cerasor. an. Vnc. iiii. rosar. Vnc. i. sem. Spir. vitrioli Scr. i. Milce.

## 30. Electuarium refrigerans & confortans.

℞. Carnis citri condit. Vnc. i. Conseru. acetos. acetosell. galeg. borragin. rosar. an. Vnc. sem. spec. diamargar. frig. Drach. i. confect. Alcherm. Drach. sem. cortic. citri condit. Manus Christi perlat. Drach. i. sem. Cum Syrup. acetositat. citri q. s. F. Electuarium.

## 31. Linimentum ad nares.

Idem, quod supra, num. 16.

## 32. Unguentum ad bubones.

Idem, quod supra num. 29.

## 33. Fortius.

Idem, quod supra num. 34.

# MEDICAMENTA CONTRA PESTEM,

A

MEDICIS VRATISLAVIENSIBVS  
P R Æ S C R I P T A,

Anno 1607.

## Præseruantia.

### 1. Pilula Pestilentiales.

℞. Aloës succotr. Gummi Ammoniaci puriss. an. Vnc. i. Myrrh. elect. Vnc. sem. Salis absinthij Scr. ii. Ammoniacum soluat aceto scordij. Coletur & concoqu. ad spissitudinem aliquam. F. Massa. Dosis Scrup. i.

### 2. Electuarium Præseruatiuum, quod in Peste anno 1599. mirè profuit.

℞. Rad. bistort. tormentill. succis. thapsi barbati, valdè bon. scabios. absinthij, pimpinell. Helenij, angelica, an. Vnc. sem. Fol. rut. verben. scordij, an. Drach. ii. Sem. acetos. Drach. i. sem. card. bened. meliss. an. Scr. iv. myrrh. zedoaria, an. Scr. j. camphor. aceto destill. solut. Drach. vi. Syrupi de succo scordij & acetos. q. s. Fiat Electuarium.

Pro mulieribus, in quibus est caput debile imminuto camphoræ pondere, adde Ol. garyophyll. destill. gutt. aliquot.

### 3. Rotula liberantis composita.

℞. Spec. liberantis Drach. vj. Extract. tormentill. Drach. s. angelica Zedoaria an. gr. xv. Sacchar. aqu. tormentill. scabios. & angelic. soluti lib. sem. F. Rotulæ.

### 4. Species pro sacculis.

℞. Rad. Valerian. angelic. an. Vnc. i. baccar. iuniperi Vnc. ii. fol. scordij Vnc. ii. sem. ruta Drach. vi. Macis in aceto infus. Drach. ij. M. Fiat Pulvis crassiusculus.

### 5. Pulvis pro fumo purarum ædium.

℞. Bacc. iuniperi M. iv. rut. virent. absinth. rad. helenij, Cort. betul. infer. circa caudicem an. M. ii. fol. querc. Vnc. i. myrrh. rubr. Vnc. iiii. Exsiccata pulueriscentur. Dosis pro ratione ædium.

### 6. Amuletum.

℞. Arsenici Crystallini, rubri, lapid. Magnet. part. equal. santali rubri modicum pro colore. Cum mucilag. gummi tragacanth. aquâ rosar. extr. q. s. F. Amuletum formâ consuetâ.

# MEDICAMENTA CVRATIVA.

### 1. Electuarium Curatiuum.

℞. Theriac. Germ. lib. sem. Salis card. bened. absinthij, scabios. fraxini an. Drach. i. spir. vitrioli Dra. ii. M. Fiat Electuarium. Dosis à Drach. sem. ad Dra. ii.

### 2. Aquæ

## 2. Aqua sudorifera.

℞. Nucum ingland. immat. n°. 100. vel maturefcentium auram maturatarum cum toto nempe viridi lignoso cortice, incidantur & contundantur minutim. Contusis adde. scabios. verben. solani, semperuini ana. M. j. Misce & affuso aceto optimè bulliant. Stent per noctem in infusione. Postridie destill. lento igne. Dosis ab Vnc. sem. ad Vnc. ij.

## 3. Pulvis sudoriferus.

℞. Rad. pimpinell. Vnc. sem. distamni albi, valerian. an. Drach. ii. Tormetill. Drach. vi. Angelic. Drach. ii. C. C. Oculor. cancri prep. an. Drach. iii. Succini albi Drach. ii. sem. napi Scrup. iv. Card. benedict. Scrup. viii. terr. sigill. Serig. Vnc. ii. boli Armeni par. Flor. Sulph. myrrhat. an. Scr. iv. Salis fraxini, scabios. card. benedict. iuniperi, absinthij, valerian. artemis. an. Scrup. i. sem. Macis aceto macerat. Croci an. Scrup. i. Misce. F. Pulvis subtilis. Dosis a Scrup. i. ad Scrup. iv.

## 4. Syrupus roborans.

℞. Syrup. de succo Rubi Idæi, acetosi simpl. de succo Ribium, an. Vnc. ii. Aqu. tormentill. veronic. scabios. card. benedict. an. Vnc. i. sem. Spir. Vitriol. Scrup. i. M. pro dosibus iv.

## 5. Pulvis pro domibus infectis.

℞. Baccar. iuniperi M. i. v. rut. virentis, absinthij, rad. helenij. Cort. betul. infer. circa caudicem. Cornu hirci raspatum non castrati, Sabina, Capill. hirci castrati. an. M. ij. fol. quercus Vnc. i. myrrh. rub. Vnc. i. Exsiccata pulueriscentur. Dosis. cochl.

## 6. Flores Sulph. myrrhati.

℞. Sulph. purific. & pulueris. lib. i. Vitriol. calcinat. Sal. gemma calcin. an. lib. sem. aloës Vnc. i. myrrh. thuris an. Vnc. ii. Croci Drach. iii. M. F. s. a. Sublimatio.

# MEDICAMENTA CONTRA PESTEM, SELECTA PRO REPVB.

Francofurtensium ad Viadrum,

Anno 1611.

AD PRÆSERVATIONEM.

## 1. Pulvis pro fumo communis.

℞. Rad. inæos Florentin. Drach. iii. Caryophyll. Scr. v. Scobis ligni iuniperin. fraxini an. Drach. i. Cortic. samar. Limonum, aurantiorum, Civi, Flor. genist. rosarum rubrarum, anihos. an. P. l. Baccar. iuniperi cum summitatibus ramulorum, baccarum Lauri cum corticib. an. Drach. j. sem. Nuc. cupressi Scrup. ii. sem. Fol. querc. absinthij, salvia, maioran. an. P. l. Myrrh. elect. Olibani, gummi Arabici an. Scrup. iii. Resin. abietin. Drach. ii. Grosso modo incisa feruentur ad usum.

## 2. Alius pro pauperibus.

℞. Cortic. baccar. lauri, vel Fol. lauri M. i. vel viriusque M. sem. Gran. iuniperi select. M. ii. fol. querc. M. i. fl. rosar. M. j. Sabin. Vnc. sem. Olibani, Vnc. i. Dan. Sennerti Tom. II.

myrrh. rubr. Carab. an. Dra. ii. rad. irid. angelic. enul. an. Drach. ii.

## 3. Pulvis pro fumo pro diuitibus.

℞. Specier. puluer. communis pro fumo q. s. adde Ligni guaiaci Drach. j. santal. citrini odorati, ligni aloës, an. Scrup. i. Caryophyll. Cinamomi electi, an. Drach. i. sem. fl. Lavendul. P. sem. fol. Rorismarini, lauri an. Drach. sem. rament. succini Scrup. ii. sem. Thymiamatis Scr. ii. Terebinth. Cypr. Scrup. v. Syracis calamit. Scrup. iii. sem. ladani puriss. Drach. sem. alipt. mosch. gr. xvij. camphor. Drach. i. asa dulcis Drach. ij. F. Pulvis grosso modo.

## 4. Trochisci pro fumo communes.

℞. Thuris, Mastich. gran. iuniperi, myrrh. elect. carab. alb. an. Drach. j. nuc. moschat. garyophyll. an. Dra. sem. ligni cupressi, calami aromati. an. z. lib. ladani, Thymiamatis an. Drach. i. sem. Benzoin Drach. ii. Syracis liquid. Dra. sem. Terebinth. Cypr. Drach. ii. moschi gr. ii. Cum mucilagine tragacanthæ aquâ rosar. extractâ q. s. Fiant Trochisci parui.

## 5. Trochisci pro magnatibus cum moscho.

℞. Radic. angelic. Zedoar. an. Drach. i. sem. galang. diptamni albi an. Scrup. iiij. Syracis calamit. asa dulcis odorati. ladani puriss. an. Drach. ii. thuris Dra. i. sem. alipt. moschat. Gall. moschat. ver. an. Scr. i. Gran. iuniperi num. ix. Myrrh. elect. Succini albi, ligni aloës, an. gr. vii. Camphor. Scr. sem. flor. Lavendul. rorismarin. an. gr. iiij. Sacchar. candi albi Drach. ij. ambr. gryseæ gr. iii. moschi gr. viij. Zibethi gr. iii.

Dissoluantur ambra, moschus, camphora & ladanum cum aquâ rosarum & cum mucilagine tragacanthæ in aquâ rosar. extract.

Fiant s. a. Trochisci aspergendo oleum spicæ.

## 6. Electuarium ex Scordio præstantissimum.

℞. Pulueris scordij Vnc. i. sem. rad. Tormetill. diptamn. albi. angelic. valerian. Bistort. Pimpinell. an. Vnc. i. sem. Cass. lign. Vnc. i. Syrac. calamit. Vnc. sem. boli nostratis preparat. z. i. B. Conseru. rosarum, calendul. an. Vnc. viij. Piperis longi, Zingiberis an. Vnc. ii. Mellis despumati lib. ii. Vini Maluatici vel Hispanici aromatici lib. i. Misce. Fiat s. a. Electuarium.

## 7. Conditum pro familia Stapedij.

℞. Gran. iuniperi, Vnc. vi. Caricarum. num. xii. nucleorum nucum inglandium Vnc. viii. Conseru. flor. borrag. citri vel bugloss. an. Vnc. iiij. Theriac. veter. rad. tormentill. gentian. pimpinell. angelic. zedoar. an. Vnc. i. Cum Syrupo de Limonibus. Fiat s. a. conditum.

## 8. Electuarium nucum Mithridatis vulgare.

℞. Nuc. ingland. excortic. lib. i. Fol. rut. mundat. Vnc. ii. Caricar. pinguium lib. ii. Salis triti Drach. vi. Puluerisatis puluerisandis, cum Syrupo acetos. citri, rob ribium & berberorum, atque aceto vini scordiato vel rosato, Fiat s. a. Electuarium.

## 9. Idem aliter cum pulvere Scordij.

℞. Nucum inglandium, siccum an. num. iiij. fol. rut. num. xxx. Pul. scordij Drach. ii. sem. citri. excort. Drach. j.

Drach. i. cort. citri Drach. sem. salis nitri depurati. Scr. i. boli Armeni ver. Drach. i. condit. citri Drach. i. Theriac. Drach. i. sem. Mithridas. Drach. i. Cum succo citri q. s. Fiat. s. a. Electuarium.

### 10. Tabula Bezoartica.

℞. Spec. diamarg. cal. Drach. ij. Liberantis Scr. iij. Zedoar. elect. cortic. citri, cornu cerni prepar. an. Scr. i. santal. citrin. rub. an. Drach. sem. Fol. auri fini num. v. Magisterij perlarum, Smaragdi preparat. an. Scr. sem. Caryophyllorum Drach. i. rad. pimpinell. Drach. sem. Extratt. angelic. Scr. ii. Cinamomi electi Scr. iij. Sacch. albi Vnc. ix.

In aqua cardui benedicti & rosarum soluti. Fiant s. a. rotulae. In fine adde olei de cortic. citri destillati gutt. viii.

### 11. Rotula, ex extracto Zedonria.

℞. Sacch. alb. Vnc. iij. dissolue in aqua. pimpinell. inspissatoque Saccharo adde Extracti zedoar. Drach. i. vel Drach. sem. vel olei ex zedoar. arte chymic. rite extracti gutt. xv. Fiant Rotulae.

### 12. Rotula Zedoaria communes.

℞. Pulv. zedoar. Drach. ij. Sacchari optimi, in aqua pimpinell. dissoluti. Fiant s. a. Rotulae.

### 13. Confectio Saccharata pro pueris.

℞. Rad. gentian. angelic. zedoar. pimpinell. an. Dra. j. Emolliantur in aceto rosarum per horas iij. Postea diuidantur in taleolos quadratos minores, saccharoque obducantur & exsiccentur in cribro.

### 14. Electuarium praeservatiuum pro gravidis Andernaci.

℞. Cinamomi electi, ligni aloes, santal. omnium, Nuc. moschat. an. Dra. i. angelic. Zedoar. enul. an. Dra. sem. semin. citri, anisi, cichorii an. Scr. i. flor. borrag. bugloss. an. P. i. Margaritar. Rament. eboris, Sapphiri, Corall. rubror. an. Scr. sem. Conseru. rosarum, borragin. flor. citri an. Vnc. sem. Cum succo acetos. & saccharo q. s. Fiat Electuarium.

### 15. Aliud electuarium gravidarum.

℞. Cortic. citri tenuissime incisorum, aurantium inforum. Semina citri, coriandri prepar. Caryophyll. an. Drach. ii. Corall. rubror. ligni aloes, santal. rubror. rasur. eboris, Zedoar. Nuc. moschat. an. Drach. i. terr. sigill. 3. i. sem. C. C. prepar. Scr. i. Cinamomi elect. Vnc. sem. ossis de corde cerni num. ii. Margar. prepar. Scr. ii. Fragment. hyacinth. Sapphiri Smaragd. granat. prepar. an. Scr. sem. sem. pæon. excortic. acetos. an. Drach. sem. fol. auri num. viij. conseru. borrag. bugloss. rosar. incarn. meliss. an. Vnc. i. Cum syrupo acetos. citri & de corticibus citri. M. Fiat Electuarium.

### 16. Rotula pro gravidis

℞. Rad. Tormentill. zedoar. an. Scr. ii. sem. pæon. excortic. acetos. an. Drach. sem. spec. diamarg. frig. Dra. i. Fragment. pretios. omn. an. Scr. sem. C. C. prepar. 3. s. Corall. rubror. prepar. Scr. j. Ol. Nuc. mosch. gr. v. Caryophyll. gutt. ii. Cinamom. gutt. iij. Sacchari Crystall. in aqua acetosa dissoluti. Fiant s. a. Rotulae.

### 17. Pulvis Bezoarticus pretiosus.

℞. Boli Armeni veri, ossium de corde ceru. prepar. an. Drach. j. santal. omnium an. Scr. i. terr. sigillat. Scr. iij. lapid. Bezoar. gr. ix. camphor. Scr. sem. Cinamomi Scr. ii. sem. Croci orientalis gr. ix. semin. citri excortic. Scr. sem. Hyacinthi preparati Scr. sem. Moschi, Ambr. gry. ssa an. gr. v. rad. diptam. alb. tormentill. zedoar. bein utriusque an. Scr. ii. fol. auri num. iij. M. Fiat pulvis subtilissimus.

### 18. Pulvis Praeservatiuus pro familia.

℞. Pulv. fol. acetos. absinthij, scordij, rut. cardui benedicti, scabios. an. Drach. i. rad. valerian. enul. Olsni. cij, tormentill. bistort. serpentar. an. Scr. iij. vincetoxici, gentian. pimpinell. polypodij q. an. Scr. ii. Angelic. Diptam. albi, zedoar. an. Scr. i. sem. sem. acetos. citri. excortic. an. Scr. i. rut. cardui benedicti an. Scr. ii. s. Gran. iuniper. Scr. v. Baccar. lauri num. vii. Sacchar. albiss. Vnc. v. Misce Fiat Pulvis.

### 19. Pulvis pauperum de acetosa.

℞. Fol. acetos. Rad. valerian. eq. parti. Macerentur in aceto, rursusque in umbrâ exsiccentur, seruenturque ad usum. Possunt alii addi, ut Scordium, verbena, carlina, &c. Misce, Fiat pulvis.

### 20. Tragæa Bezoartica pretiosa.

℞. Cornu cerni preparati, Margarit. preparat. Eboris vsti, cinamomi, tormentill. boli Armeni, unicornu veri, an. Drach. i. Cortic. citri Scr. ii. irium santal. an. Scr. i. Rasur. ebor. Hyacinthi, Sapphiri, Corall. rubror. & albor. Succini albi orientalis, rad. valeriana, zedoaria, xyloaloes an. Scr. i. terra sigillata, Scr. i. & gr. xi. Serti crudi torrefacti g. xii. Spec. diamarg. frigid. diamosch. dulc. an. Drach. ii. Bein albi & rubri gr. xii. fol. auri num. iij. Sacch. albiss. lib. i. Misce, Fiat Tragæa.

### 21. Alia Tragæa praestantissima ex flor. Sulphuris myrrhat.

℞. Flor. Sulphuris myrrhat. Vnc. i. Sacchari cand. alb. Vnc. sem. Spec. liberantis cum vel sine aloë Dra. i. Misce.

### 22. Flores Sulphuris myrrhati sic parantur.

℞. Sulphur. flauiss. Goslariensis. i. Salis fusi, vitrioli Goslariensis purificati & calcinati lib. i. vel lib. sem.

Puluerisata coniiciantur in cucurbitam vitream, & sublimentur gradato igni, sublimarum Sulphur de novo cum sale & vitriolo sublimetur. Idque tertio cum sacch. cando. Horum florum partem vnam seruato ad affectus thoracis magnam auxilium.

℞. Horum florum alteram partem: adde myrrhe aequalem portionem, & aloës tantundem, cum quarta parte croci Austriaci, misce, & quarto sublimato. Flores sublimatos ferua: in peste & pulmonum affectibus nobile remedium.

℞. Hosce flores myrrhatos quantum libet, verbi gratia Vnc. i. adde illis Spiritus terebinthina rectifica in cucurbit. vitrea Vno. iij. Munio sigillo Hermetico & collocato in aqu. cal. vel Bal. M. vaporoso per dies ix. & Spiritus fit rubicundissimus. Huic rubicundo liquori affunde spiritum vini probe rectificatum & paruo alembico separato aquositate in B. M. manebit in fundo Balsamus sulphuris praestantissimus.

Spiritus terebinthinae destillatione euanesceat.



## 23. Aqua Theriacalis siue expulsiua temperata.

℞. Rad. gentian, cyperi, tormentill. enal. campan. an. Vnc. i. Fol. caps. barb. cardui benedicti, morsus diaboli, pimpinell. scabios. oxalid. agrest. min. an. M. sem. summit. rut. P. i. baccar. myrri Vnc. i. rosar. purpur. flor. bugloss. borraginis, hyperici an. Vnc. i. mundentur omnia, pistentur, & macerentur 24. hor. in vini maluatice, aq. rosar. & oxalid. an. lib. i. Deinde reponantur in vase vitreo, addantur theriac. & Mithridatij an. Vnc. iiii. Fiat Destillat. in B. M. Aqua destillata phiala vitrea excipiat, eique rursus addatur croci Drach. i. terr. sigillat. boli armeni, Santal. citrini, rasur. eboris, limatur. cornu cerui iunioris prope caput assumpti an. Vnc. sem. Obserata phiala soli exponatur octo vel decem dierum spatio. Seruetur pro com. muni vsu.

In summis ardoribus tato datur & sudores tamen copiose satis mouet. Optima paratur mense Iunio: innoxie propinatur etiam lactentib. puerulis in peste, variol. & morbill. Item grauidis, pro quibus & similibus delicatis personis, quod gratior sit, colari debet per manicam addito saccharo & cinamomo conquassato.

## 24. Limimentum pro naribus.

℞. Theriac. Mithridat. an. Drach. sem. Sem. acetos. Scr. ii. Santal. citrini odorat. Drach. i. sem. Ol. nucis moschat. destillat. Angelic. Succini albi an. Scr. sem. Camphor. myrrh. select. an. Scr. i. mosch. gr. iiii. aceti rosacei. q. s. F. Limimentum.

## 25. Aliud.

℞. Olei nuc. moschat. express. Drach. j. sem. destillat. maior. gutt. vi. Myrrh. Succini albi an. gutt. iiii. Theriac. optim. Scr. i. Extraet. ligni aloës Scr. sem. moschi, ambr. an. gr. iiii. Cum aqua vite pretiosa q. s. F. Limimentum.

## 26. Pomum odoriferum.

℞. Nucem moschatam dimidiam, Rad. angelic. leuistici, gentian. an. Scr. sem. ligni aloës, Santal. citrini odorat. rosar. rubrar. fol. myrtill. veror. cortic. citri fragrantiss. Aurantior. Caryophyllor. an. sem. i. Ladani puriss. Scr. ii. Succini albi Drach. sem. myrrh. gr. vii. Camphor. gr. ii. Croci orientalis gr. iiii. asa dulcis odorat. Drach. sem. moschi dissoluti cum ladano in aqua rosar. redolentiss. gr. ii. ambr. grisea gr. iiii. Dissoluta cum ladano & moscho in mortario calido. Postea adde reliqua, & fiat f. a. massa exterius Zibethi gr. ii. inungenda pro pom. odorifero includendo orbiculo aureo vel argenteo.

## 27. Noduli odoriferi, pro Orbiculis ex ligno iuniperi vel saccharo factis.

℞. absinthij, rut. meliss. Salu. maioran. lauridul. rosar. rubr. an. P. sem. caryophyll. num. v. nucis mosch. num. Cinamomi, macis, an. Scr. sem. graui. iuniperi Scr. i. croci gr. ix. rad. gentian. leuistici, angelic. ostrucij Drach. i.

Macerentur per noctem in aceto acri rosato in loco tepido. Mane in fornace tepida caute iterum exsiccentur: exsiccata pulueriscentur, asperganturque aqua vit. optim. aqua rosar. q. s. & adde Theriac. Mithridatij an. Drach. sem.

Misce omnia & syndone excepta formentur in nodulos ex qualibet Vncia, vel Vncia sem. nodulus vnus includendus orbiculo ex iunipero facto.

## 28. Pomum ambræ pro Peste.

℞. Ladani electi Vnc. sem. camphor. gr. iiii. mosch. elect. gran. vi. dissoluantur in mortario calido cum aqua rosarum q. s. Dissolutis adde alypt. moschat. styrac. calamit. an. 3. ii. succini albi Drach. i. sem. mastich. 3. sem. Sem. nigell. Roman. rosti Scr. i. cortic. citri, caryophyll. nucis moschat. macis. Myrrh. elect. an. Drach. sem. Rad. iréos Florentin. Xiloaloes, Santal. citrin. an. Scr. ii. flor. rosar. rubr. lauridul. an. P. sem. Olei angelic. Zedoar. rut. an. gutt. ix. & baccis iuniperi Scr. i. spic. fenicul. an. gutt. v. Olea arte chymica extracta cum cæteris incorporentur in massam: vnde fiant Poma ambræ inungenda zibetho nobilissimo, & obducenda syndone rubro, includantur nodulo.

## 29. Species pro sacculis odoriferis.

℞. Rad. valerian. iréos Illyric. ostrucij, angelice an. Dra. iiii. phu pontici olsnici, Zedoaria an. Drach. ii. B. cortic. citri, Santal. citrin. an. Drach. i. B. ligni aloës Drach. i. Baccar. iuniperi Drach. iv. Fol. meliss. rorismarin. thymi, ror. an. M. sem. absinthij, maioran. an. P. ii. Flor. rosar. rubrar. spica, lauridul. rorismarin. an. P. iiii. camphora Drach. i. sem. nuc. moschat. Scr. ii. sem. caryophyllor. Scr. iiii. sem. nigell. rosta Scr. iiii. sem. Myrrh. Scr. ii. Incisa omnia grosso modo & tusa reponet.

## 30. Acetum contra Pestem.

℞. Rad. tormentill. serpentar. gentian. pimpinell. angelic. an. Drach. vi. Fol. ruta, absinthij, scordij an. Vnc. sem. Bacc. iuniperi, lauri an. Drach. v. Zedoar. Drach. ii. nuc. moschat. nuc. Indica minutim incis. an. Drach. iiii. sem. Theriac. optim. Mithridatij elect. Drach. ii. sem. aceti scordij vel flor. ruti. q. s. Seruetur.

## 31. Amuletum ex Hydrargyro.

℞. Nucem quellanam excauatam, vt moris est, immitte in illam cauitatem hydrargyri tantum, quantum caput dimidia exeatari putaminis capacitas, obsignatoque foramen diligenter cum cerâ Hispanicâ. Postea istum nucleum include sacculo cordiali ex syndone rubra duplicatâ, & adde Rad. angelic. Zedoar. olsni in aceto maceratar. Zedoaria, an. Dra. sem. camph. opt. cortic. citri, asa dulcis an. Dra. sem. flor. rosar. rubr. spicanardi, lauridul. an. P. sem.

Omnia cum nucleo illo includantur sacculo cordiali minori, & bene interpassato, ne nucleus loco moueri, aut ad imum delabi possit.

## AD CURATIONEM.

### 1. Electuarium Diascordium Fracastorij.

Passim descriptum habetur.

### 2. Electuarium Bezoarticum Curatiuum & Preseruatiuum.

℞. Theriac. Andromachi Vnc. B. Mithridatij Drach. iiii. Rad. angelic. pimpinell. cinamomi elect. an. Scr. sem. Flor. sulph. myrrh. Scr. ii. Cum Syrup. acetos. citri q. s. F. Mixtura.

### 3. Aqua Stapediana prima pretiosa pro diuitibus.

℞. Theriac. Andromachi, Mithridatij Damocratis an. Vnc. vi. Puln. Elect. de bolo Iouber. bezoartici. Nicolai an. Vnc. ii. Aqua vita per balneum bis destillat. vini maluatice, Aceti. rutacei an. lib. i. succi rad. pimpinell. limo-

num. an. Vnc. vi. Destillentur in Balneo torido, lento igne. Huic destillato liquori conseruato in phialâ vitreâ adde Theriac. veter. Vnc. vi. maneatque sic simul omnia, vt in fundo theriaca quiescat. Hæc Aqua quod verustior, eò melior. Sed est valde calida; ideòque si peritis insignem calorem comitem habeat & febrim, vt & alias tempore æstiuo, eius loco commodè & tutò substituitur aqua Theriacalis temperata Paræi, quæ quouis tempore innoxie sumi potest.

#### 4. Aqua Stapediana secunda siue sudorifera communis.

℞. Condit. pro familiâ Stapedij lib. ii. Aquæ vit. semel in Balneo extrahit. Vini Maluatici, Aceti rutacei, succi radic. pimpinell. limonum an. lib. i. In Balneo, vt de priori dictum, liquor extrahatur, cui adde Theriac. veteris Vnc. iiii. refideatque per quietem in fundo theriaca.

#### 5. Aqua Bezoartica Langj.

℞. Herb. Chelidon. cum radicibus M. iiii. sem. ruta M. i. scordij M. ii. dictamni Cretici, card. benedict. an. M. i. sem. xedoaria, angelic. an. Dra. iiii. cortic. citri, limonum, an. Dra. ii. B. flor. tunica, borragin. an. Drach. iiii. cinamomi opt. Dra. ii. sem. caryophyllor. Dra. ii. Incisis incidendis & contutis contundendis fiat infusio in

℞. vini sublimati ter destillati lib. viij. vini Maluatici, aceti scordij an. lib. i. Aquæ rosar. scabios. an. lib. ii.

Macerentur per biduum. Postea lento igne in organis vitreis destillentur. Huic destillato liquori adde Theriac. Vnc. iiii. Mithridatij Vnc. i. sem. camphor. Scr. ii. macis Dra. i. sem. cinamomi Dra. iiii. ligni aloës Scr. ii. sansali citrini Dra. ii. sem. caryophyllor. Dra. i. sem. conseru. flor. tunica. Vnc. ii. card. benedict. Vnc. i. cornu cerui prepar. Dra. i. B. spec. liberantis Scr. v.

Macerentur in priori destillatione & ita seruentur ad vsum.

#### 6. Puluis Bezoarticus Curatiuus.

℞. Semin. acetos. Citri excortic. rad. tormentill. an. Dra. ii. Margarit. prepar. Cornu cerui prepar. an. Dra. i. sansal. omnium, ocyimi an. Dra. i. Antidoti Saxonici Dra. vi. Misc. Fiat Puluis.

#### 7. Puluis ex scordio viridis præstantissimus.

℞. Scord. Vnc. ii. Card. bened. cornu cerui vsti & cum succo Scordij prepar. an. Vnc. i. B. Sem. citri, veronic. pimp. an. Dra. iiii. Rad. petasidis, sars. parill. an. Vnc. i. corall. rubr. prepar. Drach. vi. flor. Sulph. myrrhat. Dra. ii. B. camphor. Scrup. i. sem. Misc. Fiat Puluis diligenter mixtus.

#### 8. Puluis Euphorbintus VVildj.

℞. Euphorbij electi Drach. i. mastich. Scrup. ii. croci Drach. sem. sacchar. ops. Drach. iiii. Misc. F. Puluis.

#### 9. Alexiterium VVildj.

Ex iisdem speciebus cum Theriacâ & mithridatio additis conseruis, &c. vt notum est, fit Electuarium præstantissimum pro robustis.

#### 10. Potio corroberans.

℞. Syrup. acetos. citri, de succo limonum, de pomis, Rob. ribum, berberorum an. Drach. ii. Solue in aquâ acetos. cardui bened. an. Vnc. i. scabios. Vnc. sem. add. manus Christi perlata Dra. vi.

#### 11. Aqua Perlata pro infectis.

℞. Tab. manus Christi perlat. Vnc. i. succini albi orient. pell. Scr. i. B. Magister. perlar. Scr. i. Aqu. borraginis, acetos. card. benedict. scabios. an. Vnc. i. Syrup. e succo ribum Vnc. i. B. Iulepi rosacei Drach. vi. spir. vitrioli q. s. vt iucundum acidulumque saporem percipias.

#### 12. Alia potio confortans.

℞. Conseru. flor. rosar. incarn. borraginis, bugloss. an. Vnc. sem. acetos. Drach. i. meliss. Dra. ii. cort. citri conditi. Rad. cichor. condit. an. Vnc. B. Flor. citri, myrobalan. chebul. condit. ana. Dra. iiii. Aq. borragin. Vnc. vi. scabios. rosarum, endiuia, card. bened. an. Vnc. iiii. Bulliant parum: Colentur & exprimantur, clarificenturque cum albumine oui: adde succi citri acidi Vnc. ii. tinctur corallior. Scr. sem. Misc. & reponere in loco frigido.

#### 13 Syrupus confortans.

℞. Syrup. de succo acetos. Limonum, acetos. citri, acetosell. rubi & dei an. Vnc. i. Sacci violar. purpur. Robribium, berberor. oxysacchar. Iulepi rosacei, violacei, mine cydonior. an. Dra. vi. manus Christi perlat. Dra. x. cortic. citri conditi. & minutim incis. Vnc. sem. aqu. Endiuia, cinamomi tenuioris an. q. s. pro aromatizando. Misc.

#### 14. Electuarium resumptiuum.

℞. Condit. cortic. citri Vnc. ii. aurant. Vnc. i. Conseru. rosar. acetos. acetosell. an. Vnc. ii. Flor. borraginis, violarum an. Vnc. i. sem. boli Armeni Dra. i. terr. sigillat. Strigensis, corallior. rubror. prepar. cornu cerui vsti & prep. an. Dra. i. sem. Margarit. preparat. Dra. ii. Sansali citrini Scr. ii. ligni aloës Scr. i. Fol. auri n° iiii. confect. Alckermes Dra. ii. Cum Syrup. acetositat. citri q. s. Fiat Electuarium.

#### 15. Morsuli confortantes pro infectis.

℞. Sacch. Crystallini Vnc. iiii. dissol. in aquâ rosatum, & ad iustam consistentiam cocti, agitur donec incipiat inspissari: & tum adde cortic. citri minutim incis. Vnc. i. sem. Olei cinamomi destill. gutt. v. macis gutt. iiii. & cortic. citri, caryophyllor. an. gutt. iiii. succi citri recenter express. q. s. pro aciditate euidenti. Fiant s. a. Morsuli.

#### 16. Tabula confortantes pro Infectis.

℞. Boli Armeni Drach. i. Magisterij perlar. corall. rubror. prepar. an. Drach. sem. terr. sigillat. Strigensis, cornu cerui vsti prepar. an. Scr. i. Pulv. cinamomi opt. Scr. sem. Nucis moschat. macis an. gr. v. Olei caryophyll. gutt. iiii. Sacchari Crystallini Vnc. ii. Dissolue Saccharum in aqua rosar. addendo in fine foli. auri. n° iiii.

#### 17. Episthema Cordiale.

℞. Spec. de gemmis Drach. j. Santal. rubror. cortic. citri, xyloaloes, macis an. Drach. sem. been albi & rubri, camphora, croci an. Scr. sem. moschi gr. iiii. Aq. ros. fragrantiss. Vnc. iiii. sem. Carfunculi Vnc. sem. Vini generosissimi Vnc. iiii. aceti rosacei Vnc. ii. Misc. pro Episthemate.

#### 19. Linimentum Cordiale.

℞. Theriac opt. Vnc. sem. Succu Limonum vel Citri Vnc. sem. aceti rosacei 3. ii. Confect. Alckermes 3. B. camphor. Scr. ii. croci Scr. sem. moschi gr. iiii. Misc. pro Linimento.

## Aqua hordei pro infectis.

℞. Hordei mundi M. i. Rad. Caryophyllat. mundat. vel acetos. scorzon. an. Drach. ii. sem. Coquantur in aqu. pluuiat. mens. ii. ad crepaturam hordei. Colaturæ adde Syrup. è succo rubi Idæi vel Syrup. Limonum, vel Rob berberor. Vnc. iiii. aceti scordiat. Vnc. sem. Colectur iterum per manicam Hippocratis.

## 20. Unguentum ad bubones primum apparentes.

℞. Unguenti dialtheæ simpl. Vnc. i. Flor. chamemeli. meliloti citrini, Fol. Scabios. an. Scrup. ij. Mithridatij Scrup. sem. pinguedinis gallin. Scrup. i. sem. caricar. pingui. n°. ii. Olei lilior. alborum Drach. ij. Scorpionum Scrup. iiii. Cum s. q. aqu. vit. F. linimentum.

## 21. Emplastrum valide attrahens ad bubones.

℞. Caparum assatarum sub cineribus, aliorum similiter coctorum sub cineribus an. Vnc. i. sem. Fermenti acris Vnc. i. sem. Theriac. veteris Drach. sem. Mithridatij Drach. ii. Axung. suilla vet. Vnc. sem. stercoris columbini Drach. i. corporum cantharidum ablatis alis & pedibus Scrup. sem. ammoniaci, Euphorbij, castorei, opopanax, galbani in aceto vini dissol. an. Drach. i. rad. diptamni albi, pimpinell. ari, vincetoxici an. Drach. i. sem. Pulu. fol. scabios. rut. centaurij minoris an. Scrup. i. Sem. eruc. sinapis, raphani an. Drach. i. squill. prepar. Drach. ii. Croci, camph. an. gr. vi. farin. hordei Drach. iii. Olei lini, resin. abietin. therebinthin. Cyprie, cer. citrin. an. q. s. Fiat s. a. Emplastrum.

## 22. Alij idem minore labore sic parant.

℞. Caparum sub cineribus coctarum Vnc. iiii. Fermenti acris Vnc. i. stercor. columbini Vnc. ii. Axung. suill. & gallin. an. Vnc. i. Contunde & Fac s. a. Emplastrum.

## 23. Emplastrum ad Carbunculos.

℞. Mithridatij opt. Theriac. an. Drach. i. Saponis Veneti Drach. ii. Butyri recentis, Fermenti acris, an. Dra. iii. Mell. rosati Drach. ij. Croci Oriental. Drach. j. Capam sub cineribus assatam. n°. i. Alij itidem pro cineribus testis Drach. i. ficuum pinguium n°. ii. simi columbini, Sem. sinapis an. Scrup. ii. sem. Cantharid. ablatis alis & pedibus Scr. i. Misce pro Emplastro s. a.

## 24. Emplastrum Defensiuum in ambitu Carbunculi.

℞. Boli Armeni Vnc. iiii. terr. sigillat. Vnc. ii. C. C. vsti & preparati, Eboris preparat. an. Drach. ii. camphor. Drach. iii. cer. Vnc. iiii. Olei rosacei Vnc. ii. album. onorum duorum. Misce pro Linimento.

## 25. Aliud.

℞. Boli Armen. terr. sigill. Strigens. santal. rubr. an. Drach. i. Unguent. Rosacei. Cum s. q. succi plantaginis. F. Linimentum.

\* \*

# MEDICAMENTA CONTRA PESTEM,

A

## MEDICIS BERLINENSIBVS & Coloniensibus præscripta,

Anno 1625.

### 1. Pulvis pro fumo.

℞. Benzoi puriss. Vnc. iii. rament. succini, Vnc. i. sem. styrac. calamit. Drach. vi. ladani mundi, ligni aloës, rosar. rubrar. Sacchar. albiss. an. Drach. ii. Caryophyll. Santal. citrini odorati, cinamomi, cortic. citri, granor. iuniperi, Thuris an. Drach. sem. Alipt. moschat. Scrup. sem. Crasso modo incisa & probe permixta afferentur in scatula.

### 2. Trochisci pro fumo.

℞. Benzoi, ladani mundi an. Vnc. sem. Thuris, styracis calamit. granor. iuniperi an. Drach. ii. Myrrh. elect. ligni aloës, garyophyll. mastiches, Rad. angelic. garyophyll. an. Drach. ii. santal. omnium, cortic. citri cinamomi an. Drach. sem. Ambr. Moschi an. gr. vi.

Cum mucil. Tragacanth. aqu. rosarum extract. & paucâ styracis liquidæ quantitat. F. s. a. Trochisci intra duo fol. rosar. purpurear. recentia reponenda.

### 3. Candela pro fumo.

℞. Ladani mundi, Thymiamatis an. Vnc. sem. Thuris Vnc. i. styrac. calamit. Vnc. sem. Myrrh. Drach. ii. benzoi Drach. i. garyophyll. Scrup. i. cinamomi, ligni aloës, santal. citrini, Fol. lauri, Rosar. rubrar. cortic. citri, sem. ocymi, baccar. iuniperi Drach. i. sem. Gall. moschat. Scrup. i. Moschi gr. iiii.

Ladanum & Moschus aqu. rosar. fragrantiss. dissoluantur, addatur Carbonum tilia s. q. post incorporantur cum mucilagine Tragacanth. aquâ. rosar. extracta & fiant s. a. Candelæ.

### 4. Pulvis pro fumo communis.

℞. Baccar. iuniperi Vnc. iii. lauri Vnc. iii. Fol. Rut. meliss. tormentill. absinthij, Rosar. rubrar. an. Vnc. ii. Thuris Vnc. i. F. grosso modo Pulvis s. a.

### 5. Pulvis pro suffitu in Templis, æstivalis.

℞. Sem. coriandr. prepar. lib. i. Flor. rosar. rubr. exsicc. ligni iuniperi an. lib. sem. thuris Vnc. vi. thymiamatis, ladani an. Vnc. ii. Mastichis, Styracis calamit. santali albi, citrini, Myrrh. an. Vnc. i. sem. Camphor. Benzoi an. Drach. vi. fol. quercus, Nymphaeæ alba, an. M. iiii. fol. acetos. flor. lilior. conuall. an. M. ii. Granor. iuniperi Vnc. iiii. Incidenda incidantur & contundenda contundantur. F. Pulvis pro suffitu.

### 6. Pulvis pro suffitu in templis. Hyemalis.

℞. Ligni iuniperi lib. ii. Granorum eiusdem contus. lib. i. Thymiamatis, Myrrh. thuris albi an. Vnc. vi. semin. coriandri, nigell. Iridis Florentin. ladani, sandarach. an. Vnc. iiii. cortic. aurantior. Styrac. calamit. an. Vnc. iii. Mastichis Vnc. ii. Garyophyllat. Absinthij an. M. v. Meliss. Salu. Spic. M. iii. Incidenda incidantur & contundenda contundantur. F. s. a. Pulvis.

### 7. Rotula

7. *Rotula Extractionis Cardui benedicti.*

℞. Extr. cardui benedicti. Drach. i. sem. Sacchar. albiss. Vnc. iiii. aqua pimpinell. dissoluti F. l. a. Rotul.

8. *Rotula Extractionis Angelica.*

℞. Extract. Angelic. Dra. sem. Sacch. albiss. Vnc. iiii. aqua scordij dissoluti F. l. a. Rotul.

9. *Rotula Extractionis Zedoaria.*

℞. Extr. zedoaria Drach. β. Sacchar. albiss. aqua rosarum dissoluti, F. Rotula Vnc. iiii.

10. *Pulvis Praeservativus suavisissimus pro delicatis.*

℞. Smaragdi, Cornu cervi, Alcis, Margarit. Corall. rubr. omnium aqua scordij prepar. an. Drach. β. Hyacinthi, Granati, Rubini omnium aqua scordij prepar. an. Scr. i. Rasur. eboris Drach. sem. ossis de corde cervi. Oculorum cancrorum. Lapidis Bezoar veri an. Drach. sem. Misce F. l. a Pulvis subtilissimus.

11. *Electuarium ex citro Prophylacticum.*

℞. Poma citria recentia optimi coloris, num. iiii. Discindantur in frusta & coquantur in l. q. aquae rosar. fragrantissimae ad pulvis consistentiam, & trahantur per cribrum, ut fiat massa fere impalpabilis, cui adde Conseru. Rosar. prouinc. Borragini, violar. purp. an. Vnc. sem. Spec. Liberant. sine aloë. Cordial. temper. de gemm. frigid. an. Scr. i. Corall. rubr. prepar. Margarit. prepar. succini albi prepar. an. Scr. ii. Cornu cervi prepar. Dra. i. Sacchar. albiss. vnc. vi. in aqua rosar. fragrantiss. & Cinamomi, an. q. s. dissoluti. F. l. a. Electuarium, cui admisce Confect. Alchermes Drach. i. β. Olei cinamomi gutt. vii.

12. *Electuarium ex Nucibus commune*

℞. Nucum inglandium recentium, vel harum defec-  
tu siccarum aceto rutaceo maceratarum, ut excorticari possint, lib. i. Fol. rut. Vnc. ii. ficuum pinguium lib. ii. Salis absinthij Drach. vi. Cum syrupi de scordio & aceti rutacei f. q. F. l. a. Electuarium.

13. *Pulvis Bezoarticus Aureus pro diuitibus.*

℞. Boli Armeni veri aq. scordij preparat. Rad. Carlin. in aceto flor. tunicis per iridium macerata, Diptamni albi, tormentill. an. Scr. iiii. Angelic. Zedoaria, Gentian. morsus Diaboli, Tunic. scabios. Serpentina, Cinamomi acutiss. an. Vnc. β. rad. pgonia, galang. calami aromatic. Doronici Romani, Ari, Petasidis, Ostrucij, valerian. zinziber. albiss. macis an. Drach. ii. Cort. citri, nucis Moschat. Cubebarum, Baccar. Lauri, Iuniperi, sem. Aurantior. Coriandr. prepar. Santonici, Acetos. Ocym. cardui benedict. an. Drach. i. Fol. Chamadryos, Scordij, verben. Menth. Meliss. ruta, Cardui benedict. Salvia minor. Diptamni Cretici, Flor. Rosar. rubr. an. Scrup. ii. gr. v. unicornu veri, Fragment. lapid. pretiosor. omnium, Ossis de corde cervi, Eboris vsti, Corallij utriusque, Margaritar. preparat. santalor. omnium, terr. sigill. ver. vel Strigenf. Succini albi, Cornu cervi vsti an. Drach. i. Myrr. elect. Croci oriental. an. Drach. i. β. fol. auri purissimi num. xv. Aceti vini acerrimi, Vnc. i. β. vel q. s. pro aspersione, Misceantur, & fiat pulvis subtilis.

Potest etiam aliquid Sacchari addi circiter partem quartam.

14. *Pulvis Bezoarticus communis.*

℞. Pulv. Bezoart. aurei. Vnc. i. β. sem. acetos. Santonici an. Vnc. sem. Myrrh. elect. fol. dictamni Cretici, Chamadryos, Beronic. Cardui benedicti, Ruta, Verberne, Scordij, an. Drach. vj. rad. Zedoaria, Liquiritia ras. Carlin. prepar. Petasidis, Tormentill. Diptamni albi, Rhapontici, Gentian. Ostrucij, Angelic. Helenij, Pimpinell. sem. Coriandr. preparat. Anisi, Terr. Sigill. Strig. Baccar. lauri excortic. iuniperi. an. Vnc. i. sem. Milce F. l. a. Pulvis subtilissimus.

15. *Confectio Rotularum liberantis.*

℞. Spec. Liberantis sine aloë, Drach. i. Sacchar. albiss. Vnc. iiii. Aqu. rosar. fragrantiss. dissolut. F. Rotula.

16. *Rotula ex oleo Citri.*

℞. Spec. Diamarg. frigid. Scr. ii. De gemmis Scr. i. Margarit. prepar. Cornu cervi prepar. Smaragdi prepar. an. Scr. sem. Ol. e cortic. citri gut. iiii. Sacch. albiss. Vnc. iiii. in aqua rosarum dissolut. F. Rotula.

17. *Morsuli de Citro.*

℞. Succ. citri. recent. express. & per residentiam depur. Vnc. i. sem. Cortic. citri recent. incis. Vnc. i. Margar. prepar. Drach. i. Smaragdi prepar. Cornu cervi vsti prep. an. Scr. ii. sem. Macis Scr. i. Ol. still. aurantior. gut. vi. Sacchar. albiss. in aqua rosar. dissolut. Vnc. vi. F. l. a. Morsulis.

18. *Aqua Praeservativa pro pueris & Infantibus.*

℞. Poma citria recentia integra, n<sup>o</sup>. ii. Discinde in frusta, & contundantur cum tota substantia & seminibus, adde Rad. Tormentill. recent. comus. Vnc. ij. Macis aceto rosar. per noctem macerat. Vnc. j. Conseru. flor. tunic. Vnc. iiii. Zedoaria Drach. ii. Cinamom. acutiss. Drach. vi. Aqu. rosar. fragrantiss. lib. ii. Scordij Cardui benedicti an. lb. i Stet in infusione super cineres calidos per horas 24. deinde destillentur in alembico vitreo.

Si vis dulcoretur Iulepo Rosaceo.

19. *Pulvis Praeservativus pro gravidis.*

℞. Spodij prepar. Drach. i. Corall. rubr. prepar. Margarit. prepar. Ossis de corde cervi an. Scr. ii. sem. faniculi, Drach. sem. Fragment. Lapid. pretiosor. omnium an. Scrup. sem. Ol. nucis mosch. destill. gutt. iiii. Misce. F. Pulvis subtilissimus.

20. *Electuarium Praeservativum pro gravidis.*

℞. Conseru. flor. Tunic. Meliss. an. Vnc. ii. Rosar. rubr. Vnc. i. Spec. Liber. sine aloë Drach. iiii. Corall. rubr. prepar. Dra. ii. β. boli Armeni prepar. Terr. Sigill. Strig. an. Drach. i. sem. santali citrini, Spodij de Ebone, an. Drach. β. Succini albi prepar. Drach. i. Margarit. prepar. Drach. β. Syrup. acetos. citri & de succo acetosell. q. s. F. l. a. Electuarium.

21. *Herba pro vino medicato.*

℞. Herb. absinthij M. ii. Card. benedict. M. iiii. Scordij. M. ii. Radic. Scorzoner. zedoar. an. Vnc. i. Cortic. citri Vnc. ii. Granor. iuniperi Vnc. sem. Incisa & contusa dentur in charta.



## 22. Radices sublinguales.

℞. Rad. Ostrucij. Angelic. zedoaria, Pimpinell. Helenij, Tormentill. valerian. an. q. v. Macerentur per horas 24. in aceti vini s. q. & rursus exsiccantur.

## 23. Rotula vel Trachisoi sublinguales.

℞. Extract. Lign. aloës Scrup. sem. Ol. è cort. citri, Angelica an. gutt. iii. zedoaria gutt. ii. Sacchar. albiss. Vnc. i. sem. Cum mucilagine Tragacanth. aqu. rosar. moschat. extractâ f. s. a. Rotule.

## 24. Aqua vita Citria.

℞. Spirit. vini optimi lib. xii.

In hoc per biduum infundantur.

Poma citria cum succo & semine in frusta discissa num. vi.

Post destillentur in alembico vitreo per B. M. dulcoretur destillatum Iulepi rosarum sufficienti quantitate.

## 25. Species pro Saccul. odoratis.

℞. Rad. Zedoaria, valeriana, Angelic. Ostrucij, Iridis Myr. an. Drach. ii. Cortic. citri, aurantior. Fol. Meliss. Rorismarin. Maionan. Ruta an. M. s. Flor. rosar. rubr. M. i. Lauendul. Spic. an. M. sem. Ligni aloës santal. citrini odor. Myrrh. elect. an. Drach. i. sem. nigell. torrefact. Basilici an. Drach. ii. Caryophyllor. Cinamomi acutiss. nuc. moschat. an. Drach. i. β. Camphor. Drach. sem. Alipt. Moschat. Gallia Moschat. an. Drach. i. Syrac. calamit. Benzoes an. Dra. i.

Incidenda incidantur & contundenda contundantur.

## 26. Pomum Ambra.

℞. Rad. Iridis Myric. Santali citrini odoratiss. ana Drach. i. Ligni aloës opt. Cinamomi opt. Caryophyllor. Cortic. citri. aurantior. Rad. Angelic. an. Scrup. sem. kadani puriss. Vnc. sem. Syracis calam. Benzoes, an. Drach. iii. Moschi. Ambr. an. gr. iii. Ol. Maiorana. Spic. Lauendul. an. gutt. ii. Cum mucilag. Tragacanth. aqu. rosar. & vitæ albæ pretiosæ s. q. extractâ, fiat f. a. pomum: vt tenaciùs cohæreat, potest aliquid cerebinthiæ addi, ac inuoluatur serico rubro duplicato.

## 27. Amuletum Cordiale Hydrargyricum.

℞. Nucem auellanam Longobardicam excavatam, quam imple Hydrargyri s. q. ad medietatem; foramen arctissime occludatur cerâ Hispanicâ. Nux postea includatur in sacculum cordialem ex serico rubro duplicato, cui adunge specierum pro sacculis odoratis Dra. iii. & interpassetur, ne nux sacculi fundum petat.

## 28. Amuletum Cordiale Arsenicale.

℞. Bufonis torrefacti & puluer. ℥. iii. Arseniei albi Vnc. sem. rubri, Diptamni albi, Tormentill. an. Dra. iii. Margarit. non perforat. Drach. i. Corall. rubr. Smaragdi, Hyacinth. an. Drach. sem. Croci Scr. ii. Cum mucilagine Tragacanthi aqu. rosar. extractâ, fiat massa, ex quâ formentur placentulæ ad formam cordis, quæ obducantur primò telâ lineâ. post serico duplicato.

## 29. Unguentum Cordiale.

℞. Unguenti è Nymph. Vnc. i. sem. Rosati Mes. recent. Vnc. sem. Specier. Liber. Drach. i. Theriac. Muhridari an. Drach. i. olei scorpion. Drach. i. sem. Confect. Alchermes, Drach. sem. Ol. Citri, angelic. an. gutt. iii. Cum aqua rosar. & aceti Bezoartici s. q. fiat f. a. Linimentum.

## 30. Unguentum Nasale.

℞. Ol. moschat. express. Drach. i. sem. Destill. maior. gutt. vi. Myrrh. Succ. albi an. gutt. iii. Theriac. optim. Scrup. i. Extract. ligni aloës Scrup. i. Moschi, Ambr. an. gran. iii. Cum aqua vitæ alb. pretiosæ s. q. fiat f. a. Linimentum.

## 31. Acetum Bezoarticum.

℞. Bacc. Lauri, iuniperi an. Vnc. sem. rad. Angelic. ostrucij. Zedoar. Pimpinell. distamni, Tormentill. valerian. an. Drach. vi. Fol. rut. Scordij. Flor. rosar. Lauendula an. Vnc. sem. Cortic. citri, aurantior. an. Drach. iii. Macis Caryophyll. Myrrh. an. Drach. ii. Aceti flor. tunica q. s. pro infusione.

## 32. Oleum scorpionum compositum.

℞. Flaued. cortic. citri Vnc. ii. Flor. rosar. rubr. recent. Tunic. Meliss. an. Vnc. i. sem. Succini albi Vnc. sem. rad. zedoar. angelic. Anthor. an. Drach. ii. Camphr. Drach. i. sem.

Incisus incidendis, & contrusis contundendis affundatur Olei Scorpionum lib. i. vini maluatici Vnc. iii. Aq. rosar. fragr. Vnc. ii.

Commisceantur diligentissime & stent in infusione super cineres calidos per horas 24. post coquantur in duplici vase & exprimantur. Expressioni adde Camphor. Scr. ii. Moschi opt. Scr. sem. Misce diligenter & afferuentur in vitreo bene clauso: potest etiam maioris efficaciz causâ theriaca addi.

## 33. Potio sudorifera pro infectis diuitibus cum lapide Bezoar & unicornu.

℞. Aqu. scordij. Calendul. an. Drach. vi. in his dissolue Antidoti Matthioli. Alexiterij an. Drach. i. sem. Theriac. opt. Scrup. i. Pulv. Bezoart. aurei, Unicornu veri, Lapid. Bezoar. an. Scr. sem. Syrup. de acetos. citri, De succo acetos. an. Drach. vi. Aceti cortic. citri Vnc. sem. Ol. sulphur. acidi gutt. iii. Misce.

## 34. Alia pro diuitibus sine lapide Bezoar & unicornu.

℞. Aqu. Acetosell. Nucum an. Vnc. i. In his dissolue Elecluar. de ono. Alexipharmaci an. Drach. β. Muhridari opt. Scrup. i. Pulv. Cordial. pretios. Spec. Cord. temper. De gemmis frigid. ana. Scrup. sem. Essentia Margaritar. gr. vi. Syrup. de Limonibus Vnc. i. De succo scordij, De succo acetos. an. Vnc. sem. Aq. Alexiter. Aceti flor. unic. an. Drach. i. spir. Vuriol. gutt. iii. Misce.

## 35. Alia pro pauperibus.

℞. Aqu. Cardui benedicti Scabios. an. Vnc. i. sem. In his dissolue Diascord. Theriac. opt. an. Scrup. ii. Pulv. Bezoar. comm. Drach. sem. Aceti rutac. Vnc. sem. M.

## 36. Alia

36. *Alia pro Gravidis.*

℞. Aq. è cort. citri, Cornu cerui an. Vnc. i. In his dissolue. Elect. diascord. Drach. j. Spec. Diamarg. frig. boli armeni prapar. Terr. sigill. Srig. an. Scrup. sem. Syrup. de rubo Ideo, Succ. citri recent. express. an. Vnc. sem. Aceti flor. Tunic. Drach. ii. Tinctur. corall. gutt. iii. Misce.

37. *Alia pro pueris.*

℞. Aqu. præservat. pro pueris Vnc. i. sem. In his dissolue. Elect. diascord. Drachm. sem. Spec. Liberant. Scrup. sem. Syrup. de Limonibus Vnc. sem. Magister. Corall. Margaritar. an. gr. iii.

38. *Emulsio Margaritarum pro Insectis.*

℞. Aqu. Rosar. fragr. Vnc. sem. Acetos. Bugloss. an. Vnc. i. Vini maluatici, vel huius defectu Khenani optimi, vel aqu. cinamomi Vnc. sem. Manus Christi perlat. Vnc. i. Succini albi prapar. Drach. sem. Margarit. Scrup. i. auri puriss. fol. n<sup>o</sup>. iii. Misce. Fiat s. a. Emulsio.

39. *Aqua cocta pro potu quotidiano.*

℞. Hordei mundi M. i. Rad. mund. tunic. Scorzon. an. Drach. ii. Coquantur in duabus mensuris aqu. fontis ad crepaturam hordei. Colatura adde Rob. de Ribes Vnc. iiii. Aceti rosar. Vnc. sem. Coletur iterum per manicam Hippocratis.

40. *Iulepus confortans pro Insectis.*

℞. Aq. acetos. Fragorum, Scordij, Borrag. an. Vnc. j. sem. Vini Granat. acidor. Drach. vj. Syrup. de succo acetosell. de Limonib. an. Drach. ij. Iulep. rosar. Drach. ii. Margarit. prapar. Scr. i. Spiritus viuriol. q. s. pro concilianda aciditate iucunda.

41. *Potio Refectiua pro Insectis.*

℞. Aq. Endiuia. Violar. Rosar. frag. Bugloss. an. Vnc. i. Syrup. de acetos. citri, Drach. vj. de rubo Ideo, Rob. de Ribes Drach. ij. Succini albi prap. Scr. i. Olei sulphuris acidi q. s. pro suaui acore. Misce.

42. *Emplastrum attrahens bubones.*

℞. Flor. Camomill. nostr. Sem. fœnugraci, Lini, Malua contusorum an. Drach. i. Rad. Lilior. albor. Caparum sub cineribus assatarum, Alliorum itidem sub cineribus coctorum an. Vnc. ii. Ficum pinguium num. vi. Fermenti acris Vnc. i. Rad. & herb. Tormentill. Valerian. dictamni an. Dra. iiii. Vincetoxici Drach. ii. Sem. sinapi, fimi columbin. an. Vnc. sem. Mithridatij opt. Theriac. opt. an. Drach. i. sem. Emplastr. Diachylon Vnc. i. sem. Ol. lilior. albor. Scorpionum, Terebinthin. Resin. cer. aqu. scabios. los. an. q. s. F. s. a. Emplastrum.

43. *Emplastrum Maturatiuum ad bubones.*

℞. Rad. lilior. albor. Althæa mundat. an. Drach. vi. Fol. malu. bisfalu. an. M. i. Sem. Fœnugraci, Lini, an. Drach. ij. Flor. camomill. Summitat. Anethi an. M. s. Coquatur in f. q. aqu. ad modum pultis, cui adde Butyri recentis non salis Vnc. i. sem. Pingued. gallin. Drach. ii. Olei Lini, Scorpionum ana. Vnc. iiii. sem. F. s. a. Cataplasma.

44. *Emplastrum ex Bufonibus Guiliel. Fabricij.*

℞. Pulu. bufonis exsiccati Vnc. i. Fermenti acris Vnc. iiii. Theriac. Vnc. i. Fol. Rut. viridis Vnc. i. Commisceantur omnia in mortario cum mellis s. q.

45. *Emplastrum ex fuligine.*

Habetur supra lib. 4. cap. 6.

46. *Linimentum Defensiuum pro Carbunculis.*

℞. Vng. Albi Camphorati, Rosacei, an. Vnc. sem. boli Armeni, Terr. sigill. Srig. an. Drach. i. Ol. Rosacei q. s. M. pro linimento.

## MEDICAMENTA CONTRA PESTEM

A

### COLLEGIO MEDICO TUBINGENSI ordinata, Anno 1626.

## P R Æ S E R V A N T I A.

1. *Electuarium præservatiuum acidum.*

℞. Rob ribium inspissat. lib. i. Antidor. Matthiol. Vnc. iiii. sem. boli armeni. Oriem. aqua Theriacali prapar. C. C. vsti prapar. succo scordij an. Drach. ii. Ol. sulphur. acidi q. s. Misce. Fiat. Electuarium.

2. *D. D. Horstij Electuarium præservatiuum.*

℞. Conserv. flor. bugloss. rosar. an. Vnc. i. Pulveris ligni Indici subtilissime pulverisati, & per noctem in f. q. aceti scordij macerati hac ratione, ut acetum totum à pulvere absorbeatur Drach. x. Extract. zedoar. angelic. an. Drach. i. camphor. Scrup. i. Cum Syrup. acetositis citri q. s. Fiat Electuarium, addendo pro fermentatione, spiritus vit. Scrup. i. vel q. s. M. Seruentur in fictili amplo.

3. *Aqua vita Paracelsi.*

℞. Spir. vini bis destillati mensuras duas, Theriac. Andromach. Vnc. vi. Myrrh. Vnc. ii. Rad. vngul. caball. Vnc. iiii. spermat. ceti, terr. sigillat. an. Vnc. sem. Radic. hirundinar. dictamni albi, pimpinell. valerian. an. Vnc. sem. camphor. Drach. i. sem.

Incisa & confusa indantur vitro, & stent clausa post fornacem per mensem.

4. *Pulvis Bezoarticus.*

℞. Lactis sulphuris Vnc. i. croci. Orientalis Drach. sem. zedoar. myrrh. rub. an. Drach. i. Sacch. rosar. tabul. Vnc. ii. Ol. stil. angelic. guttas iiii. Misce, Fiat Pulvis.

## 5. Vel huius loco.

℞. *Florum sulphuris ter sublimatorum* (melius cum aloe, myrrha & croco) Drach. ii. *β. cornu cerui preparat. terr. Lemnia ver. an.* Scrup. ii. *myrrh. elect.* Drach. i. *croci Orientalis* Scrup. i. *Sacchari fini ad labium. F. Pulvis.*

## 6. Rotula.

℞. *Extract. angelic.* Scrup. i. *zedoaria* Scrup. sem. *Confect. Alckermes* Scrup. i. *essentia croci gr. vi. Ol. still. citri gutt. iiii. succini gutt. ii. lapid. bezoar. Orient.* Scrup. sem. *Sacch. fini Vnc. iiii. β. Dissolut. in aqua Theriacalis Vnc. i. cinamom. rosarum an. q. s. F. Confectio in Rotulis.*

## 7. Rotula pro infantibus.

℞. *Myrrh. rub. elect.* Drach. i. *specier. liberantis* Drach. i. *sem. lapid. Bezoar. Orient.* Scrup. *β. Margarit. prep. corall. rubr. prepar. an. Scri. Sacchari albiss. in aqu. citri & rosarum dissoluti q. s. F. Confectio in Rotulis.*

## 8. Pulvis praeservativus pro infantibus.

℞. *Cornu cerui preparat. succo scordij, cortic. citri odoratiss. Rad. tormentill. an.* Drach. i. *β. lactis sulphuris, succini albi preparat. boli Armen. Orient. preparat. an.* Drach. *β. Sacchari candi* Drach. vi. *M. F. Pulvis: vel cum saccharo suffic. in aqua rosarum & cinamom. dissolut. F. Rotulae.*

## 9. Pulvis pro gravidis.

℞. *Boli Armeni Orient. cum aqua veronic & cum vino destillat. decies lot.* Scrup. iiii. *Rad. tormentill. Drach. i. sem. zedoaria, macis moschat. granor. alckermes recent. an.* Drach. i. *rasur. eboris Dra. i. sem. corall. rubr. preparat. margarit. preparat. an.* Scrup. ii. *F. Pulvis.*

## 10. Amuleta.

℞. *Theriac. Andromach. Drach. i. β. Radic. zedoaria, angelica, enula, dictamni an.* Drach. sem. *castorei Drach. i. camphor. Scrup. i. sem. croci Scrup. sem. Thuris Drach. sem. Ol. still. succini, angelica, iuniperi an. gutt. iiii. cum infusione gummi Tragacanth. in aceto rutaceo facta F. Massula, cuius vncia senis vel vncia vna sericea rubro inclusa pro periammate de collo suspensa gesseretur.*

## 11. Species pro globulis ex ligno iuniperi- no tornatis.

℞. *Folior. rut. salvia, scordij, rorismarini, Rad. angelic. zedoar. an.* Vnc. sem. *cortic. citri, aurantiorum an.* Drach. ii. *Flor. rosar. rubrar. semin. nigell. an.* Drach. i. *sem. baccar. iuniperi Vnc. sem. grosso modo incisa & contusa dentur drachmae duae in syndone ligatae pro vno globulo.*

## 12. Linimentum ad nares pro ditioribus.

℞. *Balsam. rosar. incarnat. scrup. ii. Ol. destillat. citri, cinamom. an. gutt. iiii. styrac. liquid. scrup. i. Extract. angelic. scrup. sem. Moschi, Zibeth. opt. an. gr. ii. M. pro Balsamo.*

## 13. Pro pauperibus.

℞. *Rat. Salvia, absinth. galeg. angelic. scordij an. M. sem. macerentur incisa in Olei olivar. Vnc. iiii. aceti rutacei Vnc. ii. per horas duodecim: postea lento igne coquantur ad aceti consumptionem: adde colaturae expressae. Olei iuniperi ex granis Vnc. ii. Misce & serua.*

## 14. Trochisci sublinguales.

℞. *Mithridat. optimi. Electuar. de ono an.* Drach. i. *β. zedoaria, xyloaloes. cortic. citri, Iréos odorat. an.* Scrup. i. *sem. rosar. rubrar. Scrup. ii. flor. sulphur. Drach. i. Sacchar. albiss. Vnc. viii. cum mucilagine gummi Tragacanth. aqua rosar. extracta. F. Trochisci sublinguales; possunt etiam preparari cum moscho & ambrâ.*

## 15. Trochisci pro fumo.

℞. *Myrrh. ladani puri, flor. sulphur. an.* Drach. i. *camphor. scrup. i. ligni aloës succulent. fragment. succini an.* Drach. i. *Sacchar. albiss. Vnc. iiii. cum mucilagine Tragacanth. aqua rosar. extracta. q. s. F. Trochisci.*

## 16. Pulvis pro fumo.

℞. *Ligni iuniperi tornati lib. sem. Radic ostrucij, baccar. lauri an. Vnc. ii. fragmentor. succini, mastiches, myrrh. thuris, styrac. calamit. benioin. an.* Vnc. i. *flor. sulphuris Vnc. i. sem. Grosso modo incisa Misce.*

## 17. Pilula Pestilenciales composita.

℞. *Myrrh. elect. Vnc. sem. Radic. angelic. succin. albiss. croci Oriental. an.* Drach. sem. *agaric. trochisc. Rhabarb. veri an.* Drach. i. *β. Aloës succotrin. aqua rosarum decies lota & exsiccat. Vnc. i. Ol. still. angelic. gutt. iiii. Syrup. mastichin. q. s. F. Massa Pilularum.*

## 18. Vel pro Ditioribus.

℞. *Extract. aloës Drach. ii. Rhabarbar. Drach. i. sem. ligni guaiaci Drach. ii. zedoar. angelic. an. Scr. i. Essent. croci Scrup. sem. Salis absinthij, ligni guaiaci an. Scrup. i. camphor. Scrup. i. Ol. stillat. citri, succini an. gutt. v. macis gutt. iiii. F. ex his massa. Dosis à Drach. β. ad scrup. ii.*

## 19. Medicamentum D. Heurnij, quod simul purgat, sudorem pronocat, veneno resistit, cor firmat.

Eius descriptio habetur supra lib. 4. cap. 6.

## CURATIVA.

### 20. Electuarium Curativum D. Blossij.

℞. *Theriac. Andromachi, Mithridatij optimi, Electuarij de ono, an. Vnc. ii. Diascordij Fracastorij Vnc. i. β. Extract. zedoaria, angelic. Card. benedict. an. Vnc. β. Spec. liberantis Drach. iiii. diamargar. frigid. de gemmis frigid. an. Drach. ii. cornu cerui viti Vnc. sem. citri condit. Vnc. i. pulv. radic. angelic. zedoaria, chamaleont. seu Carlin. chelid. maior. emul. scorzonera, Dictamni albi, Pimpinell. Lenistici. Petasit. Gentian. tormentill. bistort. an.* Vnc.

Vnc. sem. *Salis absinthij, arthemise*, ana Drach. ii. *prunell.* Drach. ii. *ß. Camphor. Lactis sulphur.* an. Vnc. sem. *Spiritus sulphuris, Virioli, Salis* an. Scrup. iiii. Cum Syrup. *aceiosu citri* q. s. Fiar Electuarium.

### 21. Emplastrum ad bubones

*℞. Caparum*, indito prius croco, tostatum, *Alliorum assa-*  
*zorum* an. Vnc. iiii. *caricarum pinguium* n°. xx. *fer-*  
*menti*, *Semin. sinapi* an. Vnc. sem. *malu. radic. alth.*  
an. Vnc. i. *Salis nitri*, Drach. ii. *galbani, ammoniaci* an.  
Drach. iiii. sem. *cera*, Vnc. i. *Theriac. optim.* q. s.

*pulu. bufonum* Drach. i. sem. M. Fiar Emplastrum.

### 22. Emplastrum de fuligine.

*℞. Theriac. optim. Mithridatij* an. Vnc. sem. *fermenti,*  
*Terebinth.* an. Vnc. ii. *mellis rosar.* Vnc. i. sem. *But-*  
*tyri recentis* Vnc. ii. *Salis communis* Vnc. i. sem. *fuli-*  
*ginis camini* Vnc. ii. sem. *Ol. ligni Indici* Drach. i. *Sa-*  
*ponis Veneti* Vnc. iiii. *Salis nitri* Drach. ii. *Croc.* Drach.  
iii. *visellor. ouor.* n°. iiii. *mucilag. sem. cydon. cum aqua*  
*scabiosa extract.* Drach. vi. Impastentur in usum Em-  
plastri.





DANIELIS  
SENNERTI  
D. ET MEDICINÆ  
PROFESSORIS.  
PRACTICÆ MEDICINÆ  
LIBER PRIMVS.

DANIELS

SENNERT

D. ET. MEDICINE

PROFESSOR

PRACTICE MEDICINE

LIBRARY



Illustrissimo & Celsissimo Principi ac Dn.

**D. FRIDERICO,**  
**HÆREDI NORVVEGIÆ,**  
**DVCI SLESVVICI, HOLSATIÆ,**  
 Stormariæ atque Ditmarsiæ, Comiti in Oldenburg,  
 & Delmenhorst, &c.

**DOMINO MEO CLEMENTISSIMO.**

*Salutem & Felicitatem perpetuam P.*



**I**T A M hominis breuem esse, artem verò Medicam longam, tam verum est, ut hanc sententiam aphorismorum suorum initium esse voluerit Hippocrates; totius v. Medicinæ procemium constitui posse; plurimi doctissimi Medici iudicârunt. Etenim si vitæ humanæ spatium & curriculum perpendamus, infantia & pueritia nugis, adolescentiâ voluptatibus maximam partem consumitur: tantulum, quod restat, ætatis, neque id torum, seriis negotiis impenditur, & ubi vix rectè discere incepimus, plerique è vita abripimur, & lampada aliis tradere cogimur. Ars medica contrà tam longa & ampla est, ut ferè infinita videatur. Nam, præter variarum linguarum & artium notitiam, primum illa admirabilis corporis humani fabrica omniumque in ea partium structura, vsus & officia exactè Medico cognoscenda veniunt. Morborum deindè hanc violantium & destruentium genera, eorumque causæ, cum suis signis, discenda sunt: quorum omnium tantus est numerus, ut iam ante multa secula trecenta fuisse scripserit Plinius, exceptis generum speciebus, quarum quanta sit multitudo, facile intelligit is, qui tantum, quas Febris nomen sub se differentias comprehendat, nouit. Præterea Medico vastissima illa remediorum sylua, in tres partes, fossilium & mineralium, plantarum, atque animalium distincta, perlustranda; quarum quælibet quàm latè pateat, vel plantarum innumerus numerus docere potest. Tandem cognitam & perspectam Medico esse oportet methodum, qua instructus suum cuique morbo remedium dextrè opponat, viresque corporis humani conseruet: abs quo si sit, quod remedium esse debebat, venenum erit. Neque ignorare deset, qua ratione simplicia medicamenta ad vsum medicum commodiorem præparanda, & ex iis composita miscenda sint. Quæ sola pars tam ampla est, ut hodie peculiarem quasi artem, quæ Pharmacopœia dicitur, constituerit; quæ ipsa iterum maximam Chymicæ partem, eamque satis difficilem & laboriosam, complectitur.

Quò autem vita breuior & ars medica longior est: eò magis annitendum iis, qui animum ad Medicinam appulerunt, ut breuissimo isto vitæ humanæ spatio artis longissimæ, quantum fieri potest, cognitionem sibi comparent. Qua in re cum meritò ij, qui in publicis scholis, quas Vniuersitates & Academias vocant, docent, artis medicæ tyronibus facem præluere debeant: ego etiam, postquam ante hos viginti sex annos, diuinâ providentiâ à Serenissimo Saxonæ Electore ad munus docendi publicè medicinam in Academia hac vocatus sum: mearum partium esse existimaui, eò labores meos dirigere, ut Studiosis artis huius monstrarem, qua ratione breuissimum vitæ spatium in arte longissima discenda benè collocare possint. Idque primò docere conatus sum in Institutionum Medicarum Opere, deinde in Introductione ad lectionem autorum Chymicorum, quam de consensu & dissensu Chymicorum cum Aristotelicis & Galenicis inscripsi; ut & in tractatu de febribus. E quibus si quid commodi & utilitatis ad artis Medicæ tyrones redundauit, est, quod gaudeam. Hoc certè meum propositum, hic scopus fuit. Cum autem inventi aliqui sint, quibus ea non displicuisse animaduerti, idem in Practico opere

paulò *μὴδὲν ἴσμεν* & plenius conscribendo tentare cœpi. Cuius librum primum cùm amici penes me esse intelligerent, atque ut eum publici iuris facerem hortarentur: ego equidem mihi in mentem reuocaui, multa adhuc in eo lima indigere: quia tamen ex eo aliquid vtilitatis ad artis Medicæ studiosos redundare posse existimarent, ipsorum voluntati obsecutus eum in publicum nunc prodire patior.

Cùm verò operi huic, pro more huius seculi, Patronus aliquis quaerendus esset, non præter rem me facturum existimabam, si illustrissimo nomini tuo, *Celsissime Princeps*, illud inscriberem & dedicarem. Nam præterquam quod omnibus interest, qui nati homines, aliquam Medicinæ cognitionem habere: tam falsum est, seruilem eam atque indignam insinuari Principibus, quàm verum ac certum, eorum antiquitus propriam fuisse. Quod (ut Poëtarum fabulas & illorum fictos heroas præteream) satis, opinor, testari possunt tot maximorum regum nominibus appellata medicamenta. Quid quod Princeps bonus quilibet tibi Medici refert imaginem. Nam quid ille aliud agit, quàm ut aut sarram testamque seruet publicam rem, aut, si quid ea detrimenti passa sit, maturâ ope succurrat: non aliter ac Medicus, cuius omne officium vel in tuenda hominis sanitate, vel recuperanda occupatur. Sed sunt & peculiare mihi huius mei instituti causæ. Quarum prima singularis ille, & ut sic dicam, meliore quodam astro Cels. T. velut impressus erga literas earumque cultores amor, & incredibilis beneuolentia; quam & pro mea virili commendandam mihi ad posteros hac qualicunque dedicatione existimabam. Deinde quia natum hoc opus in Electorali Saxonica Academia, iure quodam id Cels. T. cui cum eâ longè Illustrissima domo tam arcta intercedit cognatio atque affinitas, videbatur deberi. Accipe igitur, *Illustrissime Princeps*, hoc quicquid curæ ac laboris nostri est, serena, hoc est, tua fronte, & meis conatibus bonus ades ac felix. Sic T. Cels. Deus semper incolumem, semper florentem, & quantum ipsa velit felicem præstet. VVittebergæ Idib. Aprilis, anno Christi M. DC. XXVIII.

*Illustriss. Tua Cels.*

Subjectissimus

DANIEL SENNERTVS D. Facult. Medicæ  
Profess. & Senior, ac Sereniss. Elect. Sax. Medicus.

## LECTORI BENEVOLO. S.

**N** eandem, Lector beneuole, qui Medicinam scriptis explicandam susceperunt, methodum secuti sunt. Galenus equidem, cum plures Medicina partes sint, singulas seorsim explicauit, & de singulis plurimos libros edidit, de corporis humani nimirum constitutione, omnium partium natura, usu, & actione, de morborum & symptomatum differentiis ac causis, de urinis, pulsibus, morbis, & locis affectus cognoscendis, & de prognosticis, de alimentorum facultatibus, de simplicibus & compositis medicamentis, de sanitate tuenda, de methodo mœdendi, & huius generis alios. Cuius vestigiis insistentes plurimi superioribus sæculis & nostra ætate docti viri, ista, qua prolixè & diffusè Galenus descripsit, in compendium redigere, qua obscure tradidit, explicare, qua non satis perfectè docuit, supplere conati sunt. Alij verò, præcipue Arabes, & Latini hos secuti, prætermittis illis generalibus methodis, secundum partium corporis ordinem à capite ad calcem omnes humani corporis præter naturam affectus, cum suis causis, signis, & curatione tradiderunt: quod genus scriptorum vulgò Practicos nominant.

Et si verò virique suam laudem merentur: tamen non parum refert, virorum scripta prius legat, qui ad Medicinam discendam accedunt. Sunt quidem non pauci, qui se opera compendium facturos putant, si, neglectis generalibus Methodis, mox ad Practicorum lectionem sese conferant. Atque hic plurimos in describendis & congerendis medicamentorum formulis præcipue occupatos vides, qui

se satis instructos ad faciendam Medicinam accedere opinantur, si magnam ferraginem eiusmodi formularum, Receptas dicunt, congefferint. Verum summo opere falluntur, neque, si isti via insistere pergant, unquam ad solidam Medicinæ cognitionem peruenient, sed cum generalibus methodis destituantur, perpetuò fluctuabunt, & cum morbi non semper simplices facie, qua à Practicis describuntur, sed compositi, varietate complicati ac confusi sæpe occurrant, incerti hærebunt, & quid agendum sit, sæpe nescient. Neque tamen idè Practicorum libri reijciendi sunt. Nam cum secundum partium diuersitatem ea, qua in generalibus methodis traduntur, non parum variant, & secundum diuersas partes limitentur & determinentur; neque eadem planè sit ratio curandi inflammationem, exempli gratiâ, oculi & pedis: qua ratione generalis doctrina & curandi ratio cuiuslibet parti applicanda sit, docendum. Quod cum Galenus integrè & absolutè expeditum non dederit, neque curandi varietatem omnem, qua à natura partium, situ, & aliis circumstantiis oritur, ostenderit (etiâsi exempli loco multa attuleris) omnino id tradere & explicare necessarium est.

Quâ ratione tamen id fieri debeat, non omnes idem sentiunt. Quidam enim generalem methodum secuti, cum tria sint morborum genera, & uniuscuiusque differentia multa, singularum differentiarum curationem per se tradendam esse censent, à prima usque ad ultimam, indicando semper varietatem illam curandi, qua à natura partium, situ, & aliis oritur. Et hæc via curandi omnes morbos



morbos rationem traditurum fuisse, nisi morte praeventus fuisset, Franciscum Frisimelicam, sui seculi Medicum clarissimum, scribit Comes Montanus, in praefatione de morbis. Tentarunt idem cum alij nostro seculo, cum Job. Paul. Pernumia, & Godofredus Sieghius, Medici clarissimi, etsi non planè eodem modo. Alij verò, & plures, eam, qua hodie in Practicorum libris occurrit, Methodum usurparunt. Est tamen, quod in utrisque docti viri desiderent. Nam quamvis prior modus methodicus videatur, & in simplicibus quidem morbis satis bene succedat: tamen in compositis & complicatis affectibus, & ubi plures morbi ac symptomata ad unius affectus naturam constituendam quasi conspirant, nescio quid perplexitatis & obscuritatis habere videtur; cum unus affectus, qui uno nomine in scholis Medicorum notus est, in diversissima saepe genera distribuendus sit. Unum enim symptomata saepissime à plurimis & diversis causis oritur; & affectus praeter naturam non semper ita simplices, ut in doctrinà de differentiis morborum ac symptomatum proponuntur, occurrunt, sed compositi affectus sese frequenter obiciunt. Invenias nimirum morbos & symptomata ab autoribus, qui hanc methodum sequi volunt, in locis diversissimis posita, & quidem iis, ubi ea, nisi indicis operâ adiutus, nunquam quassueris: cum tamen in praxi Medica utile sit, causas symptomatum omnes in conspectu & numerato, ac quasi in tabula habere. Altera verò Methodus hoc praecipue habet incommodi, quod eadem toties repetit, & qua semel ac generatim praecipere poterant, saepius in species iterat, & quod exempli gratia assero, qua semel doceri poterat ratio caput alterandi, purgandi, humores ab eo revellendi, & qua sunt huius generis alia, in omnibus affectibus capitis ferè repetitur.

Qua cum ita sese habeant, commodissima Medicinam & docendi & discendit ratio videtur illa, si partes Medicinae omnes ordine primum ad Galeni exemplum tradantur & cognoscantur, partiumque corporis humani omnium natura, usus & officium, morborum & symptomatum differentia, causa & signa, alimentorumque ac medicamentorum facultates & preparationes, & per hac sanitatem praesentem conservandi: amissam verò restituendi, morbosque omnes, eorum causas & symptomata, à corpore depellendi ratio in genere cognoscatur: deinde verò hac per universalia theorematà Methodus per omnes corporis humani partes diducatur, & qui in qualibet morbi, & à quibus causis oriri possint, quaeque inde symptomata proueniant, investigetur, & qua in singulis partibus ab eorum natura, situ, & aliis circumstantiis curandi occurrat varietas, & quomodo uniuersalis methodus singulis partibus applicanda sit, doceatur & discatur.

Priorem illam Medicinam seu partem, seu Methodum cum in Institutionibus tradere studuerim, nunc, postquam ad Practicam Medicam scribendam animum adieci, usitatum equidem Practicorum ordinem obseruabo, & eò, quod à doctis à capite ad calcem omnes corporis humani praeter naturam affectus tradam: ita tamen, ut perpetuo uniuersalis Methodi vestigiis insisterem, omnia, quantum fieri potest, ad eam reuocem. Ideoque cum symptomata à morbis & eorum causis pleraque dependant, & remotis, à quibus pendent, causis sponte euanescent: ordine à capite inchoato, quas qualibet pars morbos cum in simili, tum organicà constitutione, & qua verique communis est, unitate pati possit, docebo, eorumque omnium causas, signa, curandique rationem tradam. Postea, quae ex his morbis & eorum causis symptomata in qualibet parte oriantur, monstrabo; & quomodo horum ablatio ab illorum remotione pendeat, docebo. Sicubi tamen symptoma aliquod ob vehementiam ad se curam trahere poterit, quamvis eius vel mitigandi, vel tollendi sit ratio, non prateribo. Etsi verò vulgo apud Practicos morbi soluta unitatis, & Chirurgia, quum appellant, planè omittatur: tamen cum eorum Curatio non minus, quam aliorum, à Medico requiratur, & ad eorum curationem non solum manus opera, sed & medicamenta ple-

rumque requirantur: eos omittendos non putauim.

Commodissime autem sex libris tota hac tractatio absolui posse videtur: Si nimirum agatur, In primo, de morbis cerebri & organorum sensuum externorum, & symptomatibus, quae sensibus cum internis, tum externis accidere possunt: In secundo, de Pectoris, pulmonis, ac cordis morbis ac symptomatibus: In tertio, de morbis ac symptomatibus, quae visceribus infimi ventris accidunt: In quarto, de morbis mulierum & infantum: In quinto, de partium externarum morbis & symptomatibus: In sexto, de venenatis ac malignis morbis.

Quam methodum & ego sequor, & isto ordine in Practico hoc opere scribendo progrediar, quousque Deus voluerit, utamque & vires mihi cōcesserit. Tantum autem abest, ut hoc meo labore artis Medicae Studiosos ab antiquorum & probatorum autorum lectione auocare velim, ut potius ad illam eos adducere cupiam. Ideoque non solum magis necessaria est probatoribus autoribus, antiquis & recentioribus selegi, sed etiam autores illos subinde citavi, ut uberiorem explicationem ab iis petere possint. Atque hic dissimulare non debeo, socerum meum p. m. Dn. D. Andr. Schattonem, olim in hac Academia Medicinae Professore clarissimum, & meum Antecessorem, non pauca utilia in lectionibus in 9. Rhasis, quae tamen morte praeventus non absoluit, collegisse. Quae operâ cum me labore nonnullos autores legendi subleuaret, ex iis quaedam, quae meo & aliorum usui commoda visa fuerunt, hinc inde inserui.

Ex hoc verò meo labore si, quod unice opto, aliquid commodi ad aliquos redundauerit, est, quod gaudeam. Omnibus placere impossibile est. Et licet forsitan in reliquis expositioni plerorumque satisfacerem: in materia tamen Medica me omnibus non satisfacturum, etiam non monitus, intelligo. Ita enim hodie res comparata est, ut non solum tot sint Dispensatoria, seu Antidotaria, ut appellant, quot Pharmacopoliâ, sed ferè quot Medici. Quamvis enim Medici de morbo eodem curando conueniant: tamen de materia medica plerumque dissentiunt; cum quisque sua medicamenta, quae aliis praefert, habeat. Quod an cum rei Medicae incrementis, agrorumque commodo vel damno coniunctum sit, aliis iudicandum relinquo. Deo equidem benignissimo debentur gratia, quod hac etiam in parte uberem suppellectilem materia medica suppeditat: interim ambigo, an neglectis medicamentis, quae multorum seculorum usu probata sunt, & multos à gravissimis morbis liberarunt, ad noua, & saepe nondum satis probata, tam procliuus esse deceat, & ita materiam medicam mutare, ut, si Hippocrates & Galenus, imò, qui ante hos quinquaginta annos vixerunt, Medici ad viuos redirent, vix unâ quannullam formulam intelligerent. Rectè & prudenter Forestus, lib. 9. obseru. 23. Temerarium, inquit, & insignis stultitiae argumentum est, in ancipiti medicamento periculum facere; cum nulla cogit necessitas, & meliorum copia superest. Ideoque adduci non possum, ut cum illis sentiam, qui, ubi res etiam folijs sena vel leni aliquo medicamento transigi potest, Mercurialia & Antimonialia medicamenta usurpant.

Non equidem sum nescius, à multis talia commendari, quasi puerperis & infantibus etiam innoxia sint: verum credat id, qui vult. Manus nostrae sunt oculatae, credunt quod vident. Me vestigia terrent; cum sciam, quam multis croci metallorum nominati, & inde aqua, quam appellant, Benedicta, Mercurij vitæ dicti, ut horum saltem mentionem faciam, etiam diligentissime preparatorum, usus infeliciter cesserit, eorumque usu aliquos non solum in vita discrimen coniectos, sed & plane vitam priuatos mecum multi norint. Ideoque etiam si interdum in quibusdam gravissimis morbis talia medicamenta locum habere concedam: tamen ut tam familiariter usurpanda esse credam, sicut folia sena, vel agaricum, imò manna, quod nonnulli faciunt, persuaderi non possum.

De formulis etiam medicamentorum aliquid monendum videtur. Et licet primò dubius essem, an vlla, vel certe tot formulae medicamentorum inferendae essent; cum

qui methodum medendi callet, & materiam medicam simplicem notam habet: facile cuius morbo accommodata remedia parare possit: tamen ut tyronibus inseruirem, non solum simplicem materiam medicamentorum, sed & certis formulis comprehensam addere volui, ut viderent artis Medicae Studiosi, quomodo illa, qua in Institutionibus de compositione medicamentorum tradidi, in usum trahi possint. Scio equidem, Practico illi experientissimo, Felici Platero, vitio à quibusdam versum fuisse, quod tot formulas, & in eodem saepe morbo varias, sua Practica inseruerit, qui idem procul dubio in me reprehendent. Sed habuit ille procul dubio sui instituti causas graues, de quibus hic non disputo. Habui & ego easdem, & exemplum etiam Galeni, qui, in libris de compositione medicamentorum sec. loca & genera, multa antiquorum medicamenta collegit: ut de aliis Gracis, Aërio, P. Aegy-neta, & reliquis non dicam. Neque enim tot formulae ideo praescribuntur, ut quilibet quamlibet arripiat, sed ut pro re natâ, & aegri conditione formulas variare sciat. Hoc enim praesuppositum volo in Medico, qui vel ipse formulam aliquam medicamenti praescribit, vel ab alio praescriptam mutuari volet, ut materia simplicis, & methodi medendi cognitionem habeat: qua qui instructus est, non facile magnis encomiis & titulis medicamentorum se falli patietur. Et omnino aegrorum etiam causâ formulas variare opus est. Si enim unum medicamentum, & quidem eodem modo, saepius exhibeatur, plerumque aegris nauseam conciliat. Deinde non ignoro, non paucos futuros, quibus minus rem gratam fecisse videbor, quod inter medicamenta cum alterantia, tum purgantia, pleraque ad Galenicorum & vulgatum modum preparata proposui; cum medicamenta expectassent, quae paucorum granorum pondere, aut guttarum quantitate, sine nausea aegris exhiberi possint. Verum suauitas, ubi haberi potest, ut non auersanda, ita ob suauitatem solam medicamenta non semper aliis preferenda, sed ad Indicationes semper respiciendum, & videndum, ut ipsa medicamenta exacte respondeant. Contra quod peccat, qui non ad humoris peccantis naturam respiciunt, & aphorismi illius Hippocratis, qui talia, qualia opus, purgare praecipit, obliui, siue bilis, siue pituita, siue melancholia abundet, sine discrimine gummi Guttæ, extractum scammonij, Antimonium Mercurium exhibent, saltem ut palato aegri blandiantur. Ut & illi, qui, ut iridem aegro blandiantur, inlebum aliquem colore rubicundo, sapore acidulo exhibent, etsi ad morbum pellendum nihil faciat, forsitan etiam obsit. Et omnino sum in eâ sententia, eos minus peccare, qui medicamenta Indicationibus quidem respon-

dentia, sed paulo ingratiore exhibent, quam eos, qui exhibent quidem medicamenta aegri palato non ingrata, sed suauia, verum si facultates eorum examines, & cum morbo conferas, parum, vel nihil Indicationibus respondentia: etsi interim non nego, ubi nausea in medicamentis euitari potest, id studiose faciendum esse. Imo res eò hodie rediit, & quidem Medicorum nonnullorum, qui sua medicamenta ultra modum laudant, culpâ, ut aegri, si iis consilium petentibus medicamenta, quae morbi natura postulat, nomines, ea tanquam vulgaria fastidiant, & in morbis etiam grauissimis, arthritide, affectione hypochondriaca, hydropse, specifica saltem expectant, & quidem talia, quae exigua dosi morbum radicitus statim tollant. Cum tamen, si modo iuxta & non empiricorum more morbos curare libeat, nulla alia dentur specifica medicamenta, quam quae specificum Indicant suggerit. Aut si per specifica quis occultâ qualitate agentia accipere velit, frustra in morbis notis, & à manifestis causis pendentibus, ad occultas qualitates confugimus.

Interim verum est, in materia medica magnam esse differentiam, & medicamenta alia aliis esse efficaciora: & propterea selectissima & efficacissima semper eligenda sunt. Nec hac etiam mea mens, quod medicamenta, quae è vulgatis Practicorum libris, vel etiam eorum observationibus propono, semper vulgari modo preparata usurpari velim. Materiam potius medicamentorum ab antiquis haecenus non infeliciter usurpatam, & certa proportionem mixtam, propono, quam quilibet, quomodo potest, artificiosissime praeparet. A Recentioribus multa medicamentorum forma, extracta spissiora & liquida, quae essentia & tinctura nominantur, aqua artificiosius preparata, Sympi sine longa coctione, & alia multa inuenta sunt.

Exhibeo autem nunc Librum Primum huius operis, qui equidem ad nonum annum, quod poemata scripturis Horatii praecipit, premendus forsitan, & quod ipse agnosco, multis in locis magis exornandus videbatur. Verum cum Vitæ summa brevis spes nos vetet inchoare longas, & soli Deo sit notum, quid post annum nonum vel de me, vel de aliis futurum sit; Amicorum, qui editionem viderunt, monitis obsequi volui. Habes, Lector Benevole, si nihil aliud, tamen Locos communes, in quos, quae lectio auctorum quotidie suppeditaueit, commodè & ordine referre poteris. Quod meum institutum si Tibi non ingratum fore intellexero, paulo post etiam librum Secundum publici iuris faciam, & nulli labori parcam, ut & reliquos libros, cum Deo, adiciam. Interim Bene Vale. VVitteberga Cal. Martij Anno Christi 1628.



ΣΤΝ ΘΕΩ.

# MEDICINÆ PRACTICÆ LIBER PRIMVS.

De Capitis, & Sensuum cum interiorum, tum exteriorum, motusque  
spontanei p. n. affectionibus.

## P R O O E M I V M.



V M omnium totius corporis humani præter naturam affectuum, morborum nimirum, causarum morbificarum & symptomatum, quæ ei præter naturam accidunt, curandi rationem tradere, si Deus voluerit, nobis propositum sit: vsitatum Practicorum ordinem secuti à Capite facimus initium. Caput autem supremum corporis loco positum, sensus & motus organa continet, atque in cerebro, parte eius præcipua, sensuum interiorum seu

facultatum principum actiones perficiuntur, spiritusque animales elaborantur, & hinc in sensuum exteriorum & motus organa, utpote sine quibus ij non perficiuntur, per nervos distribuuntur.

Ut ergo delineatam in Præfatione methodum sequamur, dicendum primò erit, quos morbos cerebrum patiatur, quotque modis spiritus animales, qui in eo generantur & continentur, viciuntur: quibus etiam morbis, quæ cerebro & tegumenti & munimenti loco sunt,

sunt, meninges & cranium affici possint; & à quibus causis morbi harum partium omnes proueniant; quæ ratione cognosci, & quomodo curari queant.

Postea explicandum, quæ ab harum partium & spirituum vitii actiones læsæ, & symptomata ortum habeant. Et cum in cerebro perficiantur, & ab eo originem habeant omnes sensus interni, sensus nimirum communis, ejusque affectiones, somnus & vigilia, Phantasia, ratiocinatio, item memoria ac motus animalis: dicendum primò, quæ circa somnum & vigiliam, quæ in phantasia ac ratiocinatione, quæ denique in motu animali symptomata & læsæ actiones occurrant, & singularum læsarum actionum causæ inuestigandæ.

Tandem de symptomatibus, in quibus cum sensibus internis ac ratiocinatione & motu animali etiam sensus externi, & ita omnes vel pleræque actiones animales læduntur, tractandum erit.

Post actiones læsas alterum symptomatum genus (nam tertium symptoma qualitarum mutatarum locum hic non habet) explicandum, excretorium scilicet & retentorium in cerebro vitium; vbi duo symptomata præcipue occurrunt, prius in excrementorum copiâ, quod vitium vulgò catarrhi nomine venit; & alterum in excrementorum cerebri retentione & suppressione.

Deinde similiter quot morbis sensuum externorum organa; nimirum tactus organum, oculi, aures, nares, lingua, corripit, & qua ratione illicurari possint, tradendum. Posteaque docendum, quæ actiones læsæ in his partibus accidunt, & quæ sint earum causæ. Vbi agendum erit de Dolo in genere, & qui insignis sæpe est, de Dolo in specie; de læsionibus actionum, quæ in visu, auditu, olfactu, gustu obtingunt, & si quæ alia sunt circa has partes symptomata. Ac si aliquod symptoma ob vehementiam curationem, non minus, ut alia Indicantia postulet & ad se trahat, quomodo illud tollendum vel mitigandum sit, monstrabimus.

Et si verò & cutis capitis & capilli in eâ sua vitia habent: tamen quia cutis commune totius corporis regumentum est, de ejus & capillorum vitiiis suo loco inter externos corporis affectus dicemus.

## LIBRI PRIMI PARS I.

### De morbis capitis.

#### CAPVT I.

##### De intemperiebus capitis sine materia, & primo de calida.

**C**EREBRUM primaria capitis pars est: id duplex membrana circumdat: Exterior quidem & Cranium propior illa, crassior & durior, quæ vulgò Dura mater; Interna verò, & proximè cerebri substantiam ambiens, tenuior, quæ vulgò Pia mater nominatur. Membranas cranium tegit: hoc pericranium: pericranium tegitur à membrana carnosâ: omnes tandem has partes cutis. De cutis morbis & vitiiis, ut antea dictum, cum suo loco acturi simus, de cerebri, membranarum ejus, cranij & pericranij morbis hic agendum, & quos quælibet harum partium morbos pati possit, inquirendum.

Sunt autem harum partium, ut & aliarum, morbi trium generum, intemperie seu partium similium, organici, & vtriusque communes. Et primò quidem quod morbos intemperiei, & qui his partibus, quate-

nus similes sunt, competunt, attinet, Cranium, ut osseum & durum, quodque externas alterationes non ita facile admittit, vix ipsum insignem intemperiei morbum patitur, quandiu pericranio, membrana carnosâ & cute rectum est: verum si propter vulnera sit denudatum, ab externo aëre alteratur & corrumpitur. Cerebrum verò & meninges intemperiei morbis sæpe corripuntur. Et si verò intemperies aliqua nonnunquam in alterutra harum partium primò excitari, & vna earum plus, alia minus affici possit, & actionum quoque læsiones aliæ atque aliæ accidunt, prout cerebrum & ejus membranæ plus afficiuntur: tamen quia tanta est harum partium connexio, tantusque consensus, ut si vna insigni aliquâ intemperie labores, fieri nequeat, quin & altera ejusdem fiat particeps; curandi etiam ratio ferè sit eadem: de intemperie harum partium conjunctim agemus. Si quid tamen, quod alterutri peculiare sit, occurreret, & illud attendemus.

Cum verò cum Galeno, de differ. morb. cap. 1. docuerimus, libro 2. Inst. par. 1. cap. 3. quod intemperies alia sit simplex; calida scilicet, frigida, humida, sicca; alia composita, calida humida, calida sicca, frigida humida, frigida sicca; & hæc omnes rursus vel sine vel cum materia: de his intemperiebus omnibus ordine hic etiam inter morbos capitis dicendum. Quanquam enim intemperies sine materia raro dantur; & cum dantur, ferè à causis evidentibus & externis, (nisi morbus hæreditarius sit) ortum habent; plerumque verò cum intemperie humor similis qualitatis conjunctus est: tamen vtile est, scire, quam curationem intemperies quælibet per se & quatenus talis requiratur; cum alio modo curetur intemperies sine materia, quam quæ cum materia conjuncta est. Quapropter ordine de iis in specie agemus, si pauca quædam de morbis capitis & intemperiei in eoin genere præmiserimus.

##### De affectibus capitis in genere notanda.

Primò omnes cerebri morbi multa signa communia habent, quæ Galenus, in art. Med. c. 76. descripsit: *Signa cerebri, p. n. affecti.* Quæ sunt, inquit, in cerebro dispositiones, ea cognoscuntur aut ex dementia speciebus, aut ex sensuum vel imaginationum læsionibus, aut ex actionum, quæ secundum electionem & voluntatem sunt, aut ex iis, quæ excernuntur per palatum, aures, nares, aut per differentias dolorum.

Deinde in curatione affectuum capitis hoc in genere est notandum, cum caput supremo corporis loco positum sit, & præterea venæ & arteriæ multæ, subtilem ac tenuem sanguinem & spiritus, quibus facile subtilia & vaporosa excrementa permiscuntur, cum pro nutritione ejus, tum pro spirituum animalium generatione deferentes cerebrum ingrediantur, atque in id desinant, cerebrumque, utpote frigidum & humidum, ac molle, vapores illos facile imbibat, retineat, ac difficulter discutiat, imò potius condenset: in omni affectu capitis esse operam dandam, ne id à vaporibus adscendentibus lædatur. Ideoque non solum ipsum caput roborandum; sed in primis cauendum, ne vapores in partibus inferioribus generentur, aut geniti ad caput eleuentur. Quapropter in capitis affectibus abstinere æger à cibis & potu, qui multum vaporum emittunt, quale est vinum potens, ut & cereuisia forti, imprimis multo lupulo condita; & maxime vitandus talis potus ab exercitio & motu corporis vehementiore. Calefacto enim corpore caput vaporibus repletur, & corpore ab exercitio exinanito, spiritibusque & animalibus & vitalibus deperditis, natura instaurationem eorundem appetit, & proinde fit potulenti adhuc semicrudi, in vapores reioluti, in venas & arterias raptus, & translatio: vnde & cerebrum vehementer turbatur, & excrementa multa cumulantur. Inter cibos, qui



qui caput replent, est præcipue lac, quod facile cor-  
rumpitur in ventriculo, unde etiam Hippocrates, 5.  
aph. 64. Lac nocere caput dolentibus, scribit. Caput  
etiam replent ipsique noxia sunt *Semen cannabis*, li-  
ni, cruce, sinapi, daucus, cæpe, bacca juniperi, dactyli. Et  
quæ Galenus. 2. de comp. med. secund. loca cap. 1. in  
fn. & ex eo Aëtius, teirab. 2. serm. 2. cap. 46. in om-  
nibus capitis affectionibus vitare jubet, quod capitis  
dolorem inducant; *Vitæ semen, absinthij succus, lactis  
porus, glandes quercina comesta, olina nigra, arbuti fructus,  
mamæcydon Græcis appellatus, eruum*, quod etiam articu-  
los exoluit, *myrrha, thui, hedera corymbi*, & quæ men-  
tem perturbant, *Lenisci fructus, crocus, pencedanum,  
cyclaminus sicca cum vino posita, styrax*, qui modicus qui-  
dem porus tristitiam discutit, multus autem turbulen-  
tos somnos efficit. Alij inter ea, quæ capite laboran-  
tibus minus commoda sunt, recentent etiam *auella-  
nas, nuces juglandes, castaneas, schœnanthum*, quod ca-  
piti multum nocere, scribit Savanorola, tract. 1. cap.  
32. rubric. 1. Damnat etiam *columbas* Vega, scribitque  
se obseruasse, eas peculiari ratione caput affligere, de  
quibus videatur Valleriola, Enarr. medic. lib. 5. Enar.  
10. Caput quoque replet alvus conclusa, inedia. Sicut  
& noxium capiti est calceatis pedibus dormire.

Ne autem genitus vapor ascendant, exercitatio ve-  
hementior post cibum vitanda, vocis intentio, & spi-  
ritus efflatio vehementior, somnus meridianus in non  
assueris, & statim à cibo initus, vel longior, vomitus,  
tussis.

### De intemperiebus capitis sine mate- ria in genere.

Intemperie  
capitis sine  
materia.

Postea de intemperiebus sine materiâ hæc in gene-  
re tenenda: Primò causa intemperiei sine materiâ  
omnia esse possunt, quæ vel extra vel intus quoquo  
modo cerebrum calefaciendo, refrigerando, humectan-  
do, siccando afficere possunt, quæ postea in specie pa-  
tebunt.

Signa quod attinet, primò opera danda, vt cognos-  
catur, an intemperies sit cum vel sine materia. Inue-  
stigandum nimirum, an causæ aliquæ euidentes præ-  
cellerint: quod si factum, intemperies plerumque est  
sine materiâ. Verum potest etiam esse cum materiâ.  
Potest, inquam. Nam si causæ procacitærica plenum  
corpus inuenerit, aut fundendo humores, aut expri-  
mendo, aut attrahendo intemperiem cum materia ex-  
citare potest. Si verò talis causæ absit, conjecturam fa-  
cere oportet, à causâ aliqua interna malum extitisse,  
& ita cum materia conjunctum esse. Intemperies quo-  
que sine materia est sine sensu grauitatis, tensionis,  
punctionis, morius.

Tertiò quoad curationem, intemperies sine mate-  
ria hæc communem rationem obtinet, quod sicut ci-  
tra materiam est, & in sola qualitatum ac intemperiei  
mutatione consistit: Ita etiam quatenus talis ad pri-  
stinum & naturalem statum reducitur, solâ alteratione  
sine ullâ euacuatione. Etsi verò in intemperiebus ca-  
pitis sine materiâ quandoque euacuandum sit: tamen  
id non postulat intemperies per se, & quatenus talis;  
neque intemperiei opponitur euacuatio: Sed ideo  
euacuamus, quia metuiamus, ne, si corpus sanguine aut  
vitiosis humoribus plenum sit, caput ex intemperie de-  
bilitatum, & imbecillius redditum, abundantes in cor-  
pore humores faciliè admittat, atque ita affluentibus  
ad caput humoribus, ex intemperie, quæ sine materia  
est, intemperies cum materiâ euadat.

### De Capitis intemperie calida sine materia.

Intemperie  
capitis cali-  
da.

Intemperies hæc etsi in nostris regionibus non ita  
frequens sit: tamen in regionibus calidioribus non  
infrequens est, ob æstum solis & ærem feruidiorem.

### Causa.

Quæ autem intemperiei calidæ causæ sint, lib. 2. Causa  
Instic. pars. 2. c. 10. è Galeno, de caus. morb. cap. 2. do-  
cuimus. E quibus patet, cerebrum partésque vicinas in  
capite præter naturam calefieri posse, si homo in aëre  
calidiore, sub radiis Solis, præsertim nudo capite, vel in  
aëre ab igne aut frequentia hominum calefacto com-  
moretur, si calidis tegumentis caput supra modum vel  
diutius inuoluerit; si medicamentis caput calefacien-  
tibus seu externis, vt fomentis, lotionibus, embrochis,  
oleis, linimentis, odoramentis & suffribus calidis, præ-  
cipue ambra & moicho, & hujus generis aliis, supra  
modum vsus fuerit; seu interna vturpauerit, aut cibos  
& potiones calefacientes, aromatibus multis condi-  
tas, vinum antiquum & generosum, Hippocraticum,  
mulsum & id genus alia immoderatus sumperit; si  
perturbationibus animi vehementioribus, vel diutur-  
nioribus, irâ præcipue, correptus fuerit: si diu vigila-  
uerit; si cogitationes, quæ spiritus ad caput reuocare,  
eosque variè mouere solent, diu intenderit. Quæ causæ  
omnes ed facilius capiti calidam intemperiem in-  
ducere possunt, si homo cerebrum sua naturâ calidius  
obtineat.

### Signa Diagnostica.

Percipitur calor tactu in cute capitis, præcipue in Signa Dia-  
fronte & temporibus, cutisque primâ manus injectio- gnostica,  
ne statim aridior, quam ante apparet; intra cranium  
agitatio quadam percipitur & pulsatio in temporibus;  
facies & oculi apparent rubicundiores, lucem & splen-  
dorem refugiant. Somnus est brevis & perturbatus,  
non profundus, à quo homo faciliè excitatur: vel etiam  
vigiliæ infestant. Eger faciliè irascitur. Inquietus est  
in motibus, in cogitationibus & imaginatione muta-  
bilis; quorum vtrumque ex spirituum leuitate & mo-  
bilitate à calore contracta prouenit. Præcesserunt causæ  
antea enumeratæ vel omnes, vel vna. Delectant &  
iuuant, quæ refrigerant: nocent, quæ calefaciunt & ex-  
cessum caloris augent. A qua verò causâ intemperies  
ista contracta sit, sermones ægri docebunt. De numero  
signorum intemperiei capitis calida controuersiam vide  
in fine Capitis, quest. 1.

### Prognostica.

1. Quò minor excessus caloris fuerit, ed malum tu- Prognostica  
tius: quò major, periculosius: & metuendum tunc, ne  
inflammatio, delirium, aut alia mala attrahantur.  
2. Curatio ipsa satis facilis est. In refrigerantibus  
tamen adhibendis cautè procedendum, ne cerebro ali-  
quid damni afferatur; præsertim in pueris, mulieri-  
bus, & iis, qui corpus mollius & tenerius habent, ac  
in otio viuunt; in senibus item; & iis, qui cathar-  
this obnoxij sunt. In talibus enim corporibus medi-  
camenta faciliè penetrant, & caloris natui vis non est  
tanta, vt maiori frigori resistere possit: ideoque infi-  
gniter refrigerantium vsu cerebrum faciliè offenditur,  
& in contrarium malum deducitur.

### Indicationes.

Intemperies capitis calida refrigerantia indicat; & Indicationes  
quidem major frigidiora, minor mitiora.

Et cum caloris tanta vis sit, vt etiam in corpore pu-  
ro aliquid ab inferioribus sursum trahat, multòque fa-  
cilis id præstet, si corpus plenum sit, atque ita caput  
repleatur, & intemperies, quæ à primo ortu sine ma-  
teria est, in eam, quæ cum materiâ est, faciliè transeat;  
ac præterea humiditates, quæ in capite sunt, à ca-  
lore fundantur, partésque capitis à calore laxiores  
& imbecilliores reddantur: necessarium est, vt  
medica



medicamenta, quæ ad refrigerandum caput in principio adhibentur, aliquam adstringendi vim habeant. Adstringendi tamen illa facultas sit moderata. Nam si insignem vim adstringendi haberent talia medicamenta, & topicis vim ad inferiora penetrandi occluderent, & poros ac meatus adstringerent, vaporesque, qui perspirare deberent, clausis meatibus retinerent, caput replerent, & malum augerent. Et si refrigerantium, quæ leuiter adstringunt, copia nobis desit, ea sumamus, quæ citra adstrictionem refrigerant, & aliquid adstringentium misceamus. Et cum iste humorum versus caput raptus ac motus facilius fiat in corpore plethorico vel biliolo: sæpe sola refrigerantia & adstringentia non sufficiunt, sed ut affluxus humorum ad caput præcaueatur, necessarium est, sicut antea etiam dictum, ut sanguis, si is in corpore abundet, imminuatur, & à capite auertatur venæ sectione vel cucurbitulis: Bilis verò, si adsit, idoneis medicamentis, de quibus postea dicitur in intemperie capitis cum bile, euacuetur.

Quia verò cerebrum membrum nobile est, facultatum principum sedes, sensus & motus fons atque origo, spirituumque animalium officina, & minimam noxam facile percipit: non licet tam audacter refrigerantia, ut in partibus ignobilibus adhibere, caloremque eius obtundere, neque in eorum usu diu persistere, aut ea frequenter applicare, sed per vices caput linteo sicco abstergere & siccare, aut leniter fricare oportet. Et cum ex refrigerantibus quædam stuporem inducant iis non utendum, nisi dolor aut vigilie instent. In declinatione quoque sola refrigerantia non usurpanda, præsertim in corporibus impuris, & quibus grauitatis aliquis sensus in capite percipitur. Cum enim per calorem p. n. ut dictum, caput facile aliquid superflui ad se, tanquam cucurbita, trahat, illud in fine resolendum & discutiendum.

Circa Topic.  
ea caput refrigerantia  
qua obseruanda.

Præterea circa externorum & topicorum usum hic notandum, quod, cum cerebrum cranio, ossis fati crasso, tegatur, ea sunt admiscenda, quæ tenuitate substantiæ facilius penetrant, & alia medicamenta secum rapiunt, quæ de causa acutum plerumque admiscetur. 2. Medicamenta eo loco applicanda, quo facilius penetrare ad cerebrum possunt. Ideoque cum cranium minus crassum sit circa frontem & tempora, & peruium etiam circa suturas: circa frontem, tempora, suturam coronalem & synciput medicamenta topica applicanda sunt. Posteriori verò capitis parti sine fructu adhibentur refrigerantia; imò si ibi applicentur, nervos lædere possunt. 3. Et ut topica medicamenta suo munere rectius fungantur, abradere pilos sæpe utile est. Sunt quoque topica, si capitis calor sit insignior, actu frigida applicanda; Et ubi paulum incaluerint, iterum muranda. Qua de causa etiam non crassa & multiplicata linteamina, è quibus caput incalescat, usurpanda. In corporibus verò mollibus, in quibus fortius refrigerantia suspecta esse diximus, aliquid olei chamæmelini, anethini, sambucini admisceri potest. Topica quoque ratione ætatis moderanda; cum insigniter refrigerantia non ferant pueri, senes, & corpora mollia, ac qui catarrhis sunt obnoxij.

Neque solum topica extra applicanda; sed cū per nates recta via ad cerebrum aer penetret, odoramenta quoque usurpare licet. Præterea cum magnus pedum & capitis consensus sit, pedum lotiones utiles sunt, sicut nec manuum inutiles.

#### Medicamenta simplicia interna.

Simplicia  
medicamenta  
caput refrigerantia  
interna.

Folia; Lactuca, portulaca, plantaginis, solani, quod fortius est & stuporem facile inducit.

Flores; Rosarum, violarum, nymphae, papau. albi, borraginis.

Semina; Lactuca, papaueris albi, melonum, cucumeris, cucurbita, citrulli, hordei.

Fructus; Cucurbita, poma dulcicida, bacca myrti & myrtilorum.

E lignis; Santalum.

Quibus & alia refrigerantia commodè admiscere licet, ut: acetosam, enasiam, succum citri, acetum.

#### Externa.

Eadem & extra adhiberi possunt: Quibus accedunt *Externa.*  
Folia; Semperniui, salicis, vitis, umbilici Veneris, myrti, cucurbita, nymphae, lenticula palustris.

Semen; Psylli, lactuce, papaueris.

Radix; Rhodia, radix & cortex mandragora.

Succi; Foliorum salicis, vitis, semperniui, nymphae, plantagin. solani.

Mucilagines; sem. psylli, præcipue cum aceto parata. De qua monet Matthæus de Grad. lib. 1. pract. c. 1. aduertendum esse, ne semen rumpatur; cum ea saltem pars, quæ in superficie est, & à qua per agitationem cum aceto parum calido pronenit, sit frigida & humida intima verò acuta & ignea. Lac.

E quibus parantur variæ medicamentorum formæ, quæ omnes capiti alterando utiles sunt, ut lib. 5. Instit. part. 3. cap. 1. dictum, è quibus nunc his, nunc illis, prout commodum fuerit, utemur.

De externis medicamentis etiam hoc monendum, etsi vulgò habeantur saltem pro frigidis simpliciter, tamen pauca eorum partes aliquas admixtas habere calidas, quibus minima illa corpuscula calida, quæ cum intemperie calida coniuncta sunt, euocant, qualia sunt flores rosarum, violarum, nymphae luteæ, sambuci, radix rhodia, semen psylli & similia, quæ propterea etiam maiore cum commodo & tutius adhibentur, quàm simplicia frigida; etiam ea de causa, quod anodyna sunt, & dolores capitis, qui intemperie calida capitis laborantibus familiares sunt, mitigant.

#### Medicamenta composita Interna.

Aquæ destillata; Rosarum, violarum, lactuce, portulacæ, nymphae, solani, cucurbita. *Composita interna.*

Conseruæ; Rosarum, violarum, nymphae, citri.

Syrupi; Violarum, rosarum, nymphae.

Condita; caules, lactucæ.

Iulepi & Potiones; Iulepi rosarum, violarum; & quæ sunt ex syr. & aquis modò enumeratis: ut:

℞. Syr. violar. Vnc. j. β. oxyssachar. simpl. Iulep. rosar. an. Vnc. β. aq. hordei simplicis Vnc. x. vel aq. lactucæ, endiniae, acetosæ an. Vnc. iij. Misce pro duabus vel tribus dosibus.

Vel ℞. Syrup. violar. Vnc. i. β. nymphae de endiniae an. Drach. vi. aq. lactucæ cichor. endin. an. Vnc. ij. F. Iulep pro duabus dosibus.

Monet hic rectè Matthæus de Gradib. pract. lib. 1. cap. 1. ut in dolore capitis, & febribus quoque, non simus nimis parci in exhibendis syrups & potionibus; sed in adultis ad 3 x. potiones illas ex syrups & aq. destillatis mixtas exhibeamus: cum in minore quantitate ad omnia membra & caput facile non penetrent. Cui libenter subscribo; modò ægros obsequetes habeamus.

Emulsiones: ex sem. quatuor frigid. maior. papau. lactucæ. ut:

℞. Sem. quatuor. frig. maior. excortic. Vnc. β. papau. alb. Drach. ij. Aq. hordei f. β. β. lactuca Vnc. iij. nymphae Vnc. ii. rosar. Vnc. i. F. Emulsio. Adde Iulep. vel syr. viol. Vnc. i. β. M. Species; elect. de gemm. frig. diamargar. frigid. diatrion santal. Electuaria.

℞. Conseru. violar. rosar. an. Vnc. i. nymphae Lactucæ condita an. Vnc. β. Specier. diamarg. frig. Dra. β. Cum syr. violar. F. Electuar.

Vel ℞. conseru. rosar. borrag. an. Vnc. ii. sem. quatuor frig. maior. excortic. an. Drach. i. Specier. diamarg. frig. Drach. β. Cum syr. violar. Fiat Electuar.

Rotule

Rotula & Morfili; *Diacodium album solidum Augustanorum*: Rotula ex speciebus ante enumeratis cum sextuplo sacchar. in aqua conuenienti dissoluto.

Monet hic etiam non sine causa Matth. de Gradib. pari. i. pract. cap. i. in morbis cerebri calidis, & omnino omnibus morbis, in quibus refrigeratione opus est, saccharo non nisi albiſſimo vtendum eſſe; cum ſaccharum minus purum & defecatum multum vinctuosi vaporabilis & calidi participet.

### Externa.

Composita  
Externa.

Epithemata  
& Embrocha  
quomodo ca-  
piti appli-  
canda.

*Epithemata, irrigationes, embrocha, lotiones capitis* sunt ex simplicibus supra enumeratis decoctis, vel fucis eorum aut aquis, vt & lacte. Et quidem liquida medicamenta, si frigida actu applicentur, plus refrigerant. Ac licet omnibus formis iam dictis applicari possint: tamen si à loco altiore decident, plus refrigerant. Vt autem (vt & oxyrrhodina) non facile diffuant, sed diutius morentur, corona ex panno lineo vel lanà conuoluta anteriori capitis parti imponatur, & ita applicetur, vt caput circundet parte anteriore, vbi capilli desinunt, ex lateribus supra aures, in parte autem posteriore versus occiput; quo modo simul partes inferiores, facies & oculi, non inquinantur, cum caput saltem in loco intra coronam mediam irrigetur: non verò, vt vult Altimarus, cap. 10. iuxta frontem, vbi pars pilosa desinit, & iuxta vtrumque eius latus, locum applicandæ coronæ laneæ, pro loco oxyrrhodinis perfundendo ex Galeno malè intellecto accipiens. Exempl. gr.

℞. Flor. rosar. nymph. an. M. ss. sambuci P. i. Fol. salicis, vitis, lactuca, hordei an. M. i. Coq. ad consumptionem tertiar partis. Adde aceti Vnc. i. ss. Colatura frigida vel tepida fronti & syncipiti panno lineo imponatur, aut eà caput perfundatur, aut ex alto irroretur.

Vel ℞. aq. rosar. Vnc. iiii. ol. rosar. Vnc. ii. aceti rosar. Vnc. ss. album onor. num. ii. Conquassata misceantur & linteo multiplicato syncipiti & temporib. imponantur.

Vel ℞. olei violar. rosar. nymph. an. Vnc. ss. aq. rosar. lactuca, semperuini an. Vnc. ii. aceti Vnc. ss. Misce pro epithemate frontis.

Vel ℞. succi lactuca, portulacæ, solani, umbilic. q. an. Vnc. ii. semperuini Vnc. i. Excipiantur spongia vel linteo & fronti applicentur.

Vel ℞. aq. rosar. Vnc. iiii. fol. salic. lactuc. an. Vnc. i. flor. sambuci Vnc. ss. olei violar. rosar. an. Drach. vi. aceti Vnc. i. Misce.

Vel ℞. mucilag. sem. psyll. Vnc. i. olei rosar. Vnc. i. ss. aceti Vnc. i. ss. M. Valeſcus de Taranta, lib. i. cap. i. hoc commendat:

℞. sum. vitis, fol. salicis recent. violar. rosar. nymph. sem. papau. lactuc. portulac. umbilic. q. an. Vnc. ii. ol. viol. rosar. lb. ss. vini austeri Vnc. iiii.

Coquantur & colentur ac liquor capiti Epithematis loco imponatur.

Oxyrrhodina.

Oxyrrhodina huc pertinent, quæ antiquis in magno vsu fuerunt, & omnibus aliis huius generis topicis præferuntur à Galeno, 2. meta. m. cap. i. qui scribit, se vbi eius copiam haberet, nullo alio vsu fuisse medicamento; sed hoc omnes curasse. Componuntur autem oxyrrhodina ex oleo rosarum & parte aliquâ aceti. Oleum autem illud sit eo anno factum, & omnis alterius mixturæ expers: & si ex omphacino componatur, est initio morbi, quo tempore non nihil repellendum, commodius; cum sit & frigidius, & adstringendi aliqua facultate præditum magis, quàm quod ex maturis conficitur, quod iam caloris aliquis est particeps, & in declinatione vtilius adhibetur. Additur autem aceti aliquid, vt partium tenuitate faciliorem rosæco transitum præster, quo imprimis indiget omphacinum, quod est crassioris substantiæ, magisque adstringit, & propterea ad penetrandum ineptius est. Mixturam autem aceti

Galenus, in lib. de med. facil. parab. cap. i. definit, vt quanta pars aceti addatur, quæ tamen mensura non est stricte obseruanda, sed aliquando plus, aliquando minus aceti addendum. Qui enim tenerum & minus solidum corpus habent, iis vehiculo multo oleum non indiget, maiore copia verò, quibus corpus densius est. In cerebro quoque humido plus aceti tutius admiscetur (quia valde siccatur) minus admiscendum in sicco. Siccatur enim acetur & vigilias inducit. Dictum etiam de oxyrrhodonis in Institut. lib. 5. part. 8. sect. ult. cap. 39. diciturque etiam de iis aliquid infra. cap. 5.

Olea; violarum, rosaceum, nymphæ, myrtinum, cydoniorum, cucurbitæ, ex floribus mali, sem. papau. quod tutius adhibetur, quàm succus papaueris, sem. lactucæ, de falicibus.

Linimenta; vt

℞. succi lactuca vel plantag. Vnc. ss. mucilag. sem. psyllij aq. lactuc. extr. Vnc. i. ol. rosar. violar. nymphæ an. Vnc. i. ss. Coquantur ad succorum consumptionem, Fiat linimentum.

Vnguentum; Rosaceum, refrigerans Galeni, populeum, album camphorat.

Vel ℞. olei violar. rosar. an. Vnc. i. ss. papaueris Vnc. ss. succi semperuini, solani an. Vnc. i. aceti Vnc. ss. Coquantur ad succorum consumptionem. Adde santali albi, rubri an. Drach. ss. mucilag. sem. psyllij Vnc. ss. camphora in aq. ros. dissol. gr. vi. cera. q. s. F. vnguentum.

Vel ℞. cerat. albi Galeni Vnc. ii. succi solani vel cucum. Vnc. i. Ducantur simul in mortario. F. vnguentum.

Vel ℞. ol. rosar. Vnc. i. mucilag. sem. psyll. cydoniorum cum aq. ros. ext. an. Vnc. ss. cera parum liquefacta ad ignem. M. F. vnguentum.

Vel ℞. mucilag. sem. psyllij malu. succ. portulac. semperuini an. Dra. i. ol. rosar. nymph. an. Vnc. ii. cera Dra. iiii. F. vnguentum.

Vel ℞. olei rosar. omphacin. an. Vnc. iiii. santali albi, myrtillor. rad. rhodia an. Dra. i. cera alba aq. rosar. lota q. s. F. vnguentum.

Cataplasmata: Emplastrum vel potius cataplasma Haly.

℞. Flor. rosar. rubr. viol. nymph. sem. malua. farina hordei an. Dra. iiii. santal. albi & rubri sem. papau. & cortic. papau. sem. lactuc. an. Dra. ii. melilori Dra. i.

(Ad temperandum frigus reliquorum) F. puluis. & incorporetur cum oleo rosaceo, succo lactuc. & aceto.

Vel ℞. olei violar. rosar. papaueris an. Vnc. ss. farina hordei, sem. papau. albi confusi q. s. camphora Scr. ss. Misceantur cum albumine oui, Fiat cataplasma.

Vel folia psyllij contundantur & cum oleo rosaceo & pauco aceto in formam cataplasmat. misceantur.

Vel fl. violar. purpurear. rec. confusi fronti & temporibus imponantur.

Vel ℞. Sem. papaueris albi Vnc. ss. flor. rosar. rubrar. P. ii. farina hordei Vnc. i. Cum lacte muliebri & oleo rosaceo, Fiat cataplasma, quod inter duo linteamina tenuia applicetur fronti.

Vel ℞. Fol. lactuca M. ii. flor. rosar. M. ss. sem. papau. albi Vnc. ss. Coquantur ad mollitiem. Confusi adde farina hordei Vnc. i. olei violar. q. s. Fiat cataplasma.

Vtile est & cataplasma ex foliis salicis & capreolis vitis cum pauco aceto.

Vulgus non incommode placentas illas post destillationem aq. rosar. in balneo relictas capiti applicat, quod medicamentum sit efficacius, si aq. rosar. vel alia conueniente irroretur. Nonnulli cataplasmatibus loco & conseruas refrigerantes vsurpant, vel eas cataplasmat. admiscunt; quod eo tempore tamen potest fieri, cum herbarum recentes & succi earum desunt.

Cerota & Emplastra, & quæ solidiorem formam habent; applicanda sunt abrasis capillis, & quotiescunque incaluerint, debent permurari. Tale est cerotum santalinum.

Vt  $\mathcal{L}$ . *ceroti santal. diu cum lactuca succo in mortar. subacti* Vnc. i.  $\beta$ . F. Emplastrum.

Vel  $\mathcal{L}$ . *pulu. rosar. rubrar. cap. papau. sem. lactuca an. Drach. ii. camphora gr. vi. olei violar. cera an. q. s.* Fiat cerorum.

Monet verò Trallianus, lib. i. cap. 10. vt cera semper lauetur aqua frigida adiecta.

Sacculi.

Sacculi; qui tamen, quia ex herbis & floribus exsiccatas parantur, vbi subita alteratione opus est, non ita efficaces sunt, nisi aquis refrigerantibus conspergantur; aliàs in diuturnis morbis & catarrho obnoxiiis satis commodi sunt.

Vt  $\mathcal{L}$ . *Flor. violar. nymph. rosar. fol. salic. ana M.  $\beta$ . sem. papau. alb. lactuca santali citrini ana Drach. i.*

Incisa & confusa crasso modo insuantur sacculo vel pileo linteo, qui capiti imponatur.

Pulueres.

Pulueres. Licet quoque à capitis lotionem puluere ex rosas, violis, santalo & similibus parato caput conspergere: sed & pulueres ob crassitiem tardius operantur.

Odoramenta.

Odoramenta.

$\mathcal{L}$ . *Flor. rosar. p. ii. violar. nymph. ana p. i. santali citrini* Scrup. i.

Ligentur in nodulo ex linteo albo vel sindone rubrà, qui aq. rosar. aut pauco aceto adspersi potest.

Vel  $\mathcal{L}$ . *santal. citrini flor. rosar. nymph. an. Drach. i. camphora* Scrup.  $\beta$ .

Affundatur in vase angusti orificij aq. rosar. & supra ignem ebulliant, vaporque naribus excipiat. Vel in aq. rosar. camphora dissoluatur, & aqua spongiola vel gossypium madesiat, & saepius naribus admoueat. Camphora tamen cum per se non frigida sit, sed per accidens refrigeret, eiusque odorem non omnes ferant, & vigilias quandoque excitet, & caput grauet, cautè vsurpanda. Quod & de aliis odoramentis accipiendum, quæ, quia talia sunt, ob vapores calidos, seu vt chymici loquuntur, partes sulphureas, caput facile replevere possunt; & in intemperie capitis calida, non tam frigiditatem inducendo; quàm spiritus animales suauiter demulcendo, dolorèque, qui calida capitis intemperie laborantibus familiaris est, leniendo profunt.

An Odoramenta cerebrum refrigerant. Rationes pro negativis.

¶ [Equidem Practici inter medicamenta, quæ ad intemperiem cerebri calidam temperandam adhibentur, etiam odoramenta vsurpant, flores rosarum, violar. nymphææ, & similia. Verùm res ista non parum dubia est, an nimirum odoramenta ista per se cerebrum refrigerent. Nam 1. omnes odores non à frigiditate, sed à caliditate proueniunt, vt res ipsa loquitur. 2. Vnde etiam odoramenta eiusmodi caput replent; ac sunt multi, quibus odor rosarum dolorem capitis excitat. 3. Opinio ista ex falso principio nata est, nimirum camphoram, rosas, & similia, esse simpliciter frigida; cum tamen vel calida sint, vel, licet quidem frigida ex parte sint, partes tamen calidissimas, è quibus spiritus ardens paratur, admixtas habeant: vt in rosas, floribus sambuci, & aliis manifestum. A quibus partibus calidis cum odores pendeant, certè refrigerare non possunt. Cum tamen experientià constet, eiusmodi medicamenta aliquid commodi in doloribus capitis, etiam à causa calida, præstare, id verò non faciant frigiditatem inducendo ad calidam intemperiem; alia huius rei causa querenda est, quæ est quòd huiusmodi medicamenta dolorem leniunt, qui calidà intemperie capitis laborantibus familiaris est. Habent enim eiusmodi sulphurea & spirituosà vim narcoticam quandam, vt in spiritu vini, sambuci, & similibus manifestum est; vel certè spiritus animales suauiter demulcendi, vel discutiendi, vel calidos vapores euocandi; vt in camphora id patet.]

Globuli & Poma odorata.

Globuli quoque & Poma odorata fieri possunt ex floribus rosarum, nymphææ, sem. papau. lactuca, hyoscyami, si cum tragacantha in aq. rosar. soluta excipiantur.

In nares quoque liquores refrigerantes actu tales attrahere vtile est: Inter quos præcipuè commendatur lac

Dan. Sennerti Tom. II.

muliebre cum oleo violar. nymph. vel emulsio sem. lactuc. papauer. facta cum aq. lactucæ.

Oris collusionem fieri iubet Forestus, lib. 9. obs. 3. ex lacte ebutyrato acido incoctis prius thyrilis vitis & acetosellæ.

Lotiones pedum & manuum.

Vt  $\mathcal{L}$ . *Fol. violar. malu. salic. vitis nymph. an. M. ii. Flor. nymph. rosar. an. M. i. cap. papauer. num. x.* Coq. pro lotionem pedum & manuum.

Lotiones extremorum.

In declinatione, ob causam supra in indicationibus dictam, addantur ea, quæ modicè resoluunt & discutiunt; vt oleum Chamæmelinum, vel solum, vel cum oleo rosar. mistum. Nam temperatum calorem obrinet, qui etiam calidis non multum obest, si actu frigidum adhibeatur; cum actuali frigiditate calidam intemperiem tollere statim possit: mox autem cum in actum deducitur à calore capitis moderato suo calore, si quid superflui est; discutere potest.

Olei Chamæmelini vires.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Mucilag. sem. alibæ cum aq. flor. chamamel. extracta, olei chamamel. an. Vnc. i. rosacei* Dra. vi. Misce pro linimento.

Vel Vnguentum alabastrinum fronti & temporibus illitum. Videatur quoque Galen. 2. de compos. med. nat. tot. cap. i.

Diaeta.

Æger in loco frigidiusculo vel temperato versetur, vel aer, si calidus sit, corrigatur stratis in pauimento foliis salicis, vitis, rubi, lactucæ, floribus rosarum, violar. nymphææ, & lectulus ramulis earundem circumdetur, vel aq. rosar. aut communi frigida pauimentum irroretur; vel linteamina aqua frigida vel rosacea madida in cubiculo suspendantur, vel aqua frigida de vase in vas transfundatur, vel flabellis aer ventiletur. Contra vitentur radij Solares, Balnea, hominum turba, quæ expiratione & transpiratione aerem calefacit, & omnino aer calidior, & quæ aerem calefacere possunt. Aer non sit lucidus valde, sed tenebrosus non nihil: Lumen enim spiritus, hi verò agitati humores commouent. Qua de causa vitetur quoque aspectus rerum rubrarum & aliarum coloribus lucidis præditarum; odor aromaticum & ipse noxius est. Cibi sint frigidi, vt hordeata, aut frigidis condiantur, vt lactuca, acetosa, cuius folia cum butyro cocta gratissimum præbent cibum capiti & cordi, portulacæ, endiuia, cichorio, sem. frigid. maioribus, succo vuarum immaturarum, citri, cerasorum, ribes, aceto, aq. rosarum. Abstineat ab omnibus iis, quæ supra caput replere, eique noxia esse diximus. Potus sit aqua simplex assuetis, cui aliquid iulepi rosarum & violarum admiscere licet: Aq. hordei, cui etiam sem. quatuor frig. maiora addi possunt, vel cum aq. hordei ex iis emulsio fiat. Adicere etiam licet sem. papaueris, si aq. hordei somnifera expetatur, vel cereuicia hordeacea tenuis. Auicennas quoque commendat acetum cum aqua multa mistum, si æger habeat sana viscera, sit sanguineus naturæ, & assuetus aquam frigidam bibere.

Aerem calidum corrigendi ratio.

Vt  $\mathcal{L}$ . *aceti vini* Vnc. i. *aq. frigid.* Vnc. v. Misc. pro vno haustu.

Commodè aliquid iulepi rosar. vel violar. addi potest.

A vino, præsertim generoso, planè abstinendum; cum præ cæteris caput tentet & calefaciat. Aluum sit laxa, ne vapores acres ad caput adscendant, & si sit ignauior, vel cibus aluum lenientibus in prima mensa exhibitis, vel clysteribus laxetur. In secunda verò mensa cibi sumpti adstringendi aliqua vi præditi sint, vt adscensum vaporum ad caput prohibeant. Quod præstant, cum superius ventriculi orificium claudendo, eiusque vim re-  
trahentem, ne vapores & partes chyli spirituosas nimis citò defluere sinat, roborando; tum, quando crassà suà substantià se cibus immiscet, prohibendo, ne chyli spirituosæ pars tenuior nimis citò & confertim in venas

Z

nas

nas & arterias mēfaraicas diffundatur, sed in ventriculo tamdiu moretur, donec cum crassiore chyli parte probè mixta sensim in reliquum corpus commigret. *Orium, quia, ac somnus* ægro utilis est. Vitentur omnia, quæ spiritus & cerebrum turbant, agitant & calefaciunt; vt animi perturbationes, ira præcipuè, strepitus & clamor, sonique omnes vehementiores, Venus ac corporis motus vehemens, inedia.

## QVÆSTIO I.

## De Signis.

Videtur quædam diuersitas in Autoribus in recensendis signis intemperiei calidæ. Paulus, *lib. 3. cap. 4.* tria tantum signa intemperiei calidæ ponit, cutem prima manus iniectione aridiorem, rubentes oculos, quod inuentur frigidis, lædantur calidis. *Auicē. lib. 3. Fen. 1. tract. 1. cap. 19.* & eum secuti Practici plura addunt, quæ nos etiam recensuimus. Neque omnia calori per se competere videntur. Verum etsi Medicus distinguere debeat inter communia & propria, & ea quæ per se & per accidens fiunt: tamen omnia Medico nota esse debent. De quo Costæus in annotat. in *Auicēanam, lib. 3. Fen. 1. tract. 1. cap. 23.*

## QVÆSTIO II.

## An in Calida Intemperie Capitis calida extra applicare liceat?

Calida intemperie Capitis Cal. conueniant.

Ab Antiquioribus equidem id tentatum non memini. Sunt verò ex recentioribus Medicis, Chymicis præsertim, qui in doloribus capitis, etiam à causâ calida spiritum vini subtilissimum extra adhibere iubent. Quod etsi plurimis absurdum videatur, quibusdam tamen non displicet; cum hoc modo pori aperiantur, spiritusque feruidi ratione similitudinis attrahantur. Neque res videtur esse de nihilo; in primis si à causâ calida externa intemperies illa inducta sit (Neque enim in omni intemperie capitis calida sine periculo id fieri potest.) Nā idem de Camphora queri potest, quæ etsi vulgo frigida esse statueretur: tamē doctissimi hodie Medici rei euidentia edocti, quique eius inflammationem, partium tenuitatem, odorem, saporem considerant, calidam esse rectè statuerunt. Maximè enim inflammabilis est Caphora partiumque summa tenuitate prædita, sapore acri, odore maximè penetrante, vigilias inducit: quæ omnia caliditatis argumenta sunt. Quibus omnibus persuasi ad intemperiem capitis refrigerandam nonnulli planè ineptam censent, veteresq; de alio succo vel gummi locutos putant; alij verò in capitis intemperie calida corrigenda ideo saltem adhiberi putarunt, vt partium tenuitate reliquis medicamentis viam muniat. Verum probabilius est, ratione similitudinis calidos vapores euocare; sicut combustis non frigida, sed calida, refrigeratis tempore hyberno membris non calida, sed nix & aqua frigida adhibentur, eadem de causâ. Imo illam ipsam ob causam etiam humida humiditates è corpore euocare valent, sicut cochlearum caro extra applicata ex intimis quoque corporis partibus humores euocat, vt Galenus, *1. de simp. med. faculi.* docet; & experientia id testatur.

## CAPVT II.

## De Intemperie Frigida Capitis sine Materia. Causæ.

Intemperies Capitis frigida.

Intemperiem frigidam capiti inducunt, in primis ær frigidus, siue ob anni tempus talis, siue ob peculiarem constitutionem, vt ventos frigidos, quales sunt borea-

les, siue ob regionem. Is enim cum & per nares admittatur, & extra caput ambiat, illud, præcipuè nudum, vel non satis coopertum alterare potest. Lotiones item & medicamenta refrigerantia extra immoderatus adhibita: Medicamenta quoque & alimenta refrigerantia, vt lactuca, portulaca, endiuia, papauer, &c. Nimia itē sanguinis euacuationes, gaudium nimium, Venus immoderata, quæ spiritus absumunt; quies nimia & somnus, tristitia ac timor, quæ calorem & spiritus quasi suffocant. Nonnulli etiam lacrymarum profusionem nimiam addunt. Et facilius istam intemperiem ii contrahunt, qui antea cerebrum frigidius habent. Reliquæ causæ refrigerantes vix solam intemperiem inducunt, sed ferè materia simul accersunt. Et facilius intemperie frigidæ capitis pars posterior afficitur, calidâ contra syncipiti: Vnde in affectibus capitis frigidis nonnulli maximè occipiti calefacientia medicamentâ adhibent.

## Signa Diagnostica.

Caput tangenti frigidius apparet; facies pallet; venæ in fronte & temporibus minus sunt conspicuæ; oculi subtrument, non rubent, sed pallore potius deformantur; grauitas tamen capitis manifesta non adest: Alioquin simplex intemperies non esset, sed cum materia coniuncta. Ager ad somnum est propensior, animi vigor minus acris est; quia spiritus etiam refrigerantur. Eademque de causâ torpor & pigritia quædam in membris morui dicatis percipitur. Præcesserunt causæ refrigerantes. Noncent frigefacientia, profunt calefacientia.

Signa Diagnostica.

## Prognostica.

I. Intemperies cerebri frigida sine materia equidem non ita difficulter curatur. Et tutius adhibentur cerebro calefacientia, quàm refrigerantia. Cauendum tamen & hîc, ne quid in excessu peccetur; cum nimium calefacientia vigilias, deliria, & similia mala inducant.

II. Recens tamen si sit intemperies frigida, facilius curatur, ideoque ei statim occurrendum. Nam si diutius durer, & in habitum quasi conuertatur, curatur difficilior.

Prognostica.

## Indicationes.

Intemperies cerebri frigida calefacientia indicat: Et si hæc recens, leuioribus primò tractanda; Inueterata verò calidorum continuatione opus habet. Tutius tamen applicantur calefacientia occipiti, ob nervos, qui eo loci habent originem, quibusque frigida inimica, calida amica, quàm syncipiti, vbi plures sunt arteriæ calidos vehentes spiritus, qui faciliè incalescunt.

Indicationes.

Si tamen corpus sit impurum, illud prius euacuandum, vt calefacientia medicamenta tutius vsurpentur, & ne à cacoehymia alicubi hærente affectus augeatur, & ex intemperie sine materia fiat intemperies cum materia. Quod quomodo fieri debeat, postea de intemperie capitis frigida cum pituita dicetur: Hic intemperiei frigidæ sine materia curationem subiungemus.

## Medicamenta simplicia caput Calefacientia interna.

Radices; *Pæonia* Lunâ decresciente collectæ, *Feniculi*, Caput calireos, *caryophyllata*, *helenij*, *aristolochia*, *angelica*, *dictamnij* succientia, *albi*, *valeriana*.

Folia; *Rorismarini*, *maiorana*, *ruta*, *betonica*, *salvia*, *hyssopi*, *melissa*, *calamintha*, *origani*, *pulegi*, *primula veris*, *euphrasia*, *satureia*, *scarba*, *feniculi lauedula*, *lauri*, *centaur. minoris*, quod nervis dicatum est, *mari*, *chamæpithyos*, *thymi*, *serpilli*, *ocymi*.

Flores; *stæchad. Arabica*, quæ, vt *Mesue*, capite de *stæchade*, habet, educit cholera nigram & phlegma, & mundificat cerebrum ac nervos & organa sensuum, ac confortat

Stæchad. Arabica.



fortare ea, & valde confert ægritudinibus factis in ipsis, secundū omnem modum vſus eius, siue in potu siue in fomentis & lauacris, *Rorismarini, lauendula, lily conuallium, salua, scarlea, betonica, pœonia, primula veris, tilia, tunicis*, qui contra vertiginem, Epilepsiam, paralyſin, conuulſiones & tremorem commendantur.

Semina; *Pœonia, anisi, fœniculi, sileris montani, carui, basilici, coriandri preparati, pastinaca syluestris, cumini, dauci, sinapis, eruca.*

Ligna; *Aloës, visci querni, coryli, iuniperi fraxini, guajaci.*

Fructus; *baccalauri, iuniperi, anacardia, carpobalsamum.*

Aromata; *Cubeba, cardamomum, grana paradisi, nuc moschata, macis, calamus aromaticus seu acorus, caryophyll. cinamomum.*

Succi & liquores; *Opobalsamum, vinum.*

Gummi; *Thui, mastiche.*

Marina; *Succinum, ambra.*

Ab animalibus petita; *Castoreum*, quo vix aliud inter simplicia in calefaciendo cerebro efficacius & potentius est, *moschus, zibethum.*

### Externa.

Eadem & extra adhibere licet, quibus addi possunt.

Folia; *Verbenaca recta*, quam omnium maxime discutere & perfecte caput roborare, maxime viridem, imò & acidam cum radicibus ac simul cum serpillio oleo incoctam, scribit Galenus, 2. de compos. med. sec. loc. c. 2. *Lauri, Nicotiana, asari, absinthij.*

Radices; *Asari.*

Flores; *Chamameli, meliloti.*

Semen; *Nigella.*

Gummi; *Iuniperi, tacamahaca, euphorbium.*

Succi; *Ladanum.*

Animalia; Afellos quoque sub aquario vase nascentes, qui millepedæ appellantur, maxime prodesse, si oleo incoquantur, testatur Galenus loco allegato. adeps vrsi.

Ex quibus parantur & componuntur Interna & Externa,

### Composita Medicamenta Interna.

#### Decocta.

*Decocta cephalica calida.* Cephalicum Langij in ep. p. 740.

℞. Fol. *betonica, salua, flor. stœchad. Arab. an. M. B. rad. pœonia, sem. fœniculi an. Drach. iij. nucis mosch. Drach. B.*

Coquantur in aq. simpl. ℞. ij. ad tertiæ partis consumptionem: colatura, si libet, dulcoretur saccharo.

Vel ℞. rad. *pœon. caryophyll. an. Drach. ij. maiorana, betonica, salua an. M. j. flor. stœchad. Arab. p. ij. rorismarin. lauend. an. p. j. sem. anisi, fœniculi an. Dra. j.*

Coquantur in aqu. puræ ℞. ii. ad tertiæ partis consumptionem. Post coctionem stent horis tribus in loco calido: deinde colentur.

Colaturæ adde Sacchar. Vnc. iij.

Clarificentur & ad Iulepi formam coquantur. Atque inter coquendum in nodulo suspendantur *caryophyll. macis, cinamomi, an. Drach. B. nucis moschata, Scrup. ij.*

Vel ℞. rad. *acori veri, galanga, an. Drach. ij. pœonia Vnc. B. primula veris, salua minor. maioran. an. M. j. hyssopi M. B. sem. anisi, fœnicul. seselios an. Dra. ij. Flor. stœch. Arab. rorismarin. salu. an. p. j. Coq. in aq. f. Colaturæ*

℞. libr. j. Sacchar. Vnc. iij. F. portio clarificata, quæ aromatizetur puluer, nuc, mosch. & specier. diamosch. dulcis, ana Vnc. B. Sumar æger mane Vnc. iv. vel v.

### Vina Medicata & Clareta.

*Vinum melissatum, saluiatum, rorismarini, stœchad. Vinum & Arabic. betonic. Claretum in Instit. lib. 5. part. 3. sect. 3. claretum cephalic.* cap. 4. descriptum.

Vel ℞. *Nucis moscha. macis, caryophyll. an. Vnc. j. cardamomi, cubebar. an. Vnc. B. sem. anisi, fœnicul. an. Drach. ij. conseru. rorismarin. bugloss. an. Vnc. j. spec. aromat. rosati dianthos an. Drach. j.*

Affunde vini albi vel Maluatici mensuras iij. Stent per tres dies in infusione: postea colentur aliquoties per manicam Hippocratis. Fiat Claretum.

Vel ℞. *Cinamom. Drach. vj. caryophyll. nucis mosch. galanga, cubebar. cardamom. granor. paradisi, sem. fœniculi an. Vnc. B. Vuarum passarum ℞. j. rosar. rubrar. Vnc. iij. rorismarini, serpilli an. Vnc. ij.*

Indantur sacco & suspendantur in vase capiente mensuras xx. & affundatur vinum vel mustum, si haberi potest, quod est commodius.

Cereuisia eodem modo coq̃diri potest *Salua, melissa, roremarino, betonica.*

Vt ℞. *Zingiberis, cinamom. an. Vnc. j. rad. caryophyllata Vnc. B. beteny, bac. ar. lauri an. Drach. ij. macis, nucis moschat an. Drach. B. cardamomi Drach. j. F. puluis, qui ligetur in nodulo raro.*

### Mulsū.

℞. *Cinamom. elect. Drach. j. caryophyll. nuc. mosch. Mulsū co. an. Drach. ij. calami aromatici, cardamomi, granorum phalicum. paradisi, coriandri preparat. an. Drach. j. Affunde vini mensuras iij. vel iiij. Mellis despumati ℞. j.*

Bulliant in vase clauso in balneo per dimidiam vel integram horam: postea colentur per manicam Hippocratis.

### Hydromel.

℞. *Mell. opt. ℞. x. aq. pura ℞. lx. Coquantur & despumentur s. a. Postea in sacculo conclusa imposito. Salua, origani, artemisia, hormini, hyssopi, betonica an. M. i. Item in alio sacculo, baccarum Lauri conuassatarum ℞. j. flor. lupuli. M. iij. hordei integr. P. ij.*

Omnia coquantur & despumentur ad tertiæ partis consumptionem, donec liquor ouum in superficie sustineat. Colentur, & in vasculis liquor concipiatur, in quib. fermentetur: Feruore aliquâ parte peracto in nodulo suspendantur hæc aromata.

℞. *Cinamomi caryophyll. galanga piperis granor. paradisi an. Vnc. B.*

Feruore plane absoluto vascula tora repleantur, tribus mensibus elapsis mulsæ ad capitis affectus frigidos efficax exhibetur.

Extat etiam hydromel in Instit. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 4.

### Aqua Destillata & Spiritus.

Simplices; *Rorismarini, salua, maiorana, betonica, Aqua destil. lauendula, melissa, primula veris, lily conuallium, flor. lata cephalica calida. stœchados Arab. flor. tilia, pœonia, origani, calamintha, iuniperi, serpilli, cinamomi, tunicis, angelica, caryophyllata, macis, cubebarum, pulegij, ruta.*

Compositæ; *Cephalica dua in Instit. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 5. Lauendula compos. ibid. & aqua infusionis Lauendula Augustini Schurffij, quæ paucis mutatis ita componitur.*

℞. *flor. lauendul. M. ij. nuc. mosch. zinzib. cubebar. an. Drach. iij. cinamomi opt. galanga macis calam. aromatici sem. eruca an. Drach. i. B. Infundantur in vini Rhenani lib. iiij. per dies aliquot, postea in arena destillantur. Aqua Cephalica Langij, quæ hæc est.*

℞. *Flor anthos, rosar. rubrar. maiorana an. M. ij. flor. bugloss.*

bugloss. M. j. spec. confect. anacardina Vnc. ij. aq. bugloss. betonica, flor. tilia an. lb. i. lauendula lb. s. spiritus vini lb. j. s. Infundantur per mensem, postea destillantur.

Aqua Cephalica Quercetani.

℞. Flor. primul. veris Rorismarin. Maioran. Betonica. an. M. i. spec. diamosch. dulc. diambra an. Drach. vi. confectio anacardina. Vnc. s. Cubebar. Ligni aloës nuc. mosch. caryophyllor. piperis longi, carpobalsami an. Drach. i. rad. acori, aristolochia rotunda, ireos an. Vnc. j. s. gran. iuniperi Drach. ij. sem. filer. montani, anisi, fœniculi an. Drach. j. aq. primul. veris, betonica, salvia an. q. s. (aut, quod commodius: vini generosi q. s.)

Infundantur diebus 8. postea destillantur in cineribus calidis. Fiat aqua, cuius cohlear exhibeatur.

Vel ℞. Flor. lilior. conuall. M. j. salvia M. ij. rosar. M. iii. lauendul. melissa an. M. ij. nucis moschat. Drach. ij. caryophyll. Vnc. j. s. macis Vnc. s. Affundantur vini q. s. stent in loco frigido tribus septimanis, postea destillantur.

Olea destillata; Rorismarini, maiorana, lauendula, melissa, salvia, caryophyll. macis, nuc. mosch. cinamom. fœniculi, angelica, pulegi, anisi, ruta, carui, iuniperi, succini. E quibus etiam fiunt balsama, de quibus infra.

Tincturæ, Extracta, Essentiæ Chymicis dictæ; Ruta calami aromatici, pœonia, rorismarini, succini, melissa, &c. Extractum Cephalicum Quercetani, Matthiol. in Instit. vel Hoc:

℞. Rad. acori, pœon. visc. querc. lign. aloës bacc. iunip. an. Vnc. i. sem. pœon. Drach. vi. cinamom. caryophyllor. macis cardamom. fruct. anacard. an. Drach. ii. s. flor. anthos, salu. primul. veris, pœon. calendul. betonica. lauendul. stœchad. Arab. lilij conuall. euphrag. tilia an. P. j.

Incidenda incidantur, cōrundenda cōrundantur, & affundatur Spiritus vini, vt digitis quatuor emineat, Digérantur in balneo diebus 8. Inde fiat colatura, liquorque per destillationem ad extracti liquidi consistentiam separetur, cuius dosis ʒ. i. Destillatum etiam pro aquâ cephalicâ vsurpari potest ad Vnc. s.

Syrupi; De stœchad. simpl. & compos. qui Epilepsia, spasmus, paralyti, tremori & omnibus cerebri & nervorum frigidis affectibus utilis est, nisi fluxus catarrhi obstat: tunc enim aliquid ex astringentibus addi debet; Betonica, ruta, pœonia, melissa, de calamintha, mel anthosatum, anacardinum.

Conferuæ; Betonica, salvia, lauendula, melissa, anthos, maiorana, flor. tilia, lilij conuall. primula veris, stœchados, pœonia, tunicis.

Condita; Nuc. moschat. calam. aromaticus, myrobalani, chebula, nuxiuglans, cum aromatibus radic. pyrethri, cortic. citri.

Confectiones. Confecta; Cubebarum sem. anisi, fœniculi, coriandr. carui, caryophyll. cinamomi.

Rob; Iuniperi.

Species & Pulueres; Diambra, diamoschi dulc. aromatici. rosar. caryophyllati, diaxyloaloes, dianisi, latissia Rhafis.

Vel ℞. Rad. acori Drach. iij. flor. stœchad. Arabic. coriandri preparati, cinamom. an. Drach. ij. sem. fœniculi, fileris montani, an. Drach. j. s. corall. rubr. preparat. Dra. i. flor. rorismarini, Drach. s. nucis moschat. sem. anisi, pœon. cardamomi an. Drach. i. sacchari antosati ad pondus omnium, F. puluis.

Vel qui Langio tribuitur puluis capitalis:

℞. Majorana, salvia, lauendul. stœchad. arabic. an. Scrup. i. cinamom. cubebarum, galanga, seminis callitrici, caryophyll. zedoaria, sem. fœniculi, xyloaloes, an. Drach. s. betonica, rorismarini, melissa, nucis mosch. coriandri preparati, an. Drach. iij. cardamomi, piperis longi, granorum pœon. an. Drach. i. macis, zingiberis, an. Drach. s. sacchari lb. j. F. puluis.

Puluis ad omnes frigidos capitis affectus habetur

apud Quercetatum, in pharmacop. dogmat. restit. c. 40.

Vel ℞. Nucis moschat. macis, zingib. caryophyll. galanga, sem. anisi, fœniculi, ruta, carui, thuris, salvia minoris, cinamom. an. Drach. ii. sacchar. lb. s. Fiat puluis.

Vel ℞. Sem. cumin. coriandr. preparat. an. Drach. s. fœniculi, macis, zingib. cubebar. radic. pœon. an. Drach. ii. cinamom. Drach. i. Fiat puluis.

Vel ℞. Radic. Ireos Florent. ʒ. s. zingiberis, galang. maioran. calam. aromat. an. ʒ. s. piper. longi Scr. i. sacchari albi ad pondus omnium.

Fiat puluis, non solum caput calefaciens, siccans ac confortans & catarrhos absumens, sed & reliqua membrorum roborans.

Vel ℞. Nucis moschat. cardamomi, cinamom. ligni aloës, an. Drach. i. sem. pœon. coriandri preparati, an. ʒ. ii. species diambra, diamosch. dulcis an. Drach. i. succini albi ʒ. s. Fiat puluis.

Boli.

℞. Confer. betonica, salvia, an. Vnc. i. Mithridat. Scr. Boli. ij. Cum sacchar. Fiat Bolus, qui diuisus sumendus in introitu lecti, duabus vicibus.

Vel ℞. Confer. rosar. Vnc. s. anthos Vnc. i. theriaca, mithridat. an. Scr. i. Cum sacch. Fiat Bolus, cubitum ituro sumendus.

Electuaria; confectio anacardina, theriaca, Mithridatium, aurea Alexandrina, diacorum, diacastoreum, &c. quale habetur in Instit. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 11. confectio alchermes.

Langij hoc.

℞. Diacori Vnc. i. s. confer. maiorana, lauendula, rorismarini an. Vnc. i. stœchad. arabic. Vnc. s. species diambra, Scr. v. caryophyllor. cardamomi, cinamomi, an. Scr. ii. cubebar. nucis moschat. galanga, an. Drach. s. visci querni Scr. ii. corall. rubr. Scr. i. Cum saccharo in aqua lauendulæ dissoluto. F. Electuarium.

Rorula & morsuli, Fiant ex speciebus modò enumeratis, quibus & olea destillata & extracta addi possunt; vt.

℞. Specier. aromat. rosar. diambra, an. Drach. i. olei caryophyll. gutt. iij. sacchar. in aqua lauendula dissoluti Vnc. ij. F. rotulæ.

Vel ℞. Sacchar. in aqua betonica dissolut. Vnc. iii. olei anisi gutt. vij. rorismarini gutt. iij. salvia gutt. ij. ambra grysea gr. v. F. rotulæ.

Throchisci; De Gallia moschata, dianisi, de succino.

De internorum medicamentorum omnium vsu & hoc notandum, si totum corpus simul calefacere animus est, ventriculo vacuo ea esse assumenda: Ita enim promptius in totum corpus distribuuntur. Si verò tantum caput calefaciendum, commodius sumuntur post cibum: sic enim diutius circa os ventriculi hærentia efficacius caput afficiunt. Modò non sint ex iis composita, quæ ad distributionem cibi vehementiorem faciunt. Talia enim post cibum exhibere prohibet Galen. 4. de sanit. tuend. cap. 7.

Externa.

Inter quæ liquidiora omnia actu calida admoueantur, & eligantur primò ea, quæ minus calida sunt: quæ verò calidiora sunt, admoueantur, dum ventriculus vacuus est; ne, si pleno eo admoueantur, vapores sursum ad caput alliciantur.

Validiora quoque non tutò, nisi post totius corporis euacuationem, applicantur.

Epithemata, fomenta, embrocha, lotiones.

Exemplum est in Institut. lib. 5. par. 3. sect. 3. cap. 41.

Vel ℞. Flor. lauendula chamamel. an. M. i. Folior. lauri, hyssopi, betonic. maioran. an. M. ii.

Coquantur in sufficiente q. lixiuij vel aq. pro lotionne capitis.

Vel ℞. Flor. betonic. serpilli, maiorana, origani, lauri,

Olea destillata Cephalica.

Tinctura Cephalica.

Syrupi Cephalici calidi.

Conferuæ.

Condita.

Confectiones.

Pul. cephalici calidi.

Langij puluis cephalici.

Electuaria cephalica calida.

Rorula & morsuli.

Externorum medicamentorum caput calefacientia.

Epithemata.

*lauri, flor. chamamel.* an. M. ij. Affundatur lixiuij q. f. Inter lauandum vsurpetur Smegma odoratum.

Vel *℥. folia saluia, majorana, rorismarini, lauri, calamintha* an. M. sem. *betonic.* M. j. sem. *flor. Chamam. melilot. stœchad. Arab. lauendul.* an. P. j. Coquantur in aq. f.

Colatura calida per clepsydram vel gutturium capiti instilletur vacuo ventriculo. Vel decoctum per pannum linteum vel spongiam capiti calidè applicetur.

Epithema ex cineribus & aceto ex Auicenn. lib. 3. fen. 1. tract. 2. cap. 12. commendat Iacobus de Partibus scribitque experientia constare, illud sæpè profuisse.

℥. cineris Vnc. ij. aceti Vnc. vj. Misc. in forma lixiuij; In quo calefacto intingantur panni lintei, expressique epithematis loco capiti applicentur.

Aquæ quoque destillatæ, & spiritus, si iis caput irroretur, potenter id alterant. Theriæ quoque sulphureæ caput calefaciunt. Quæ si desint, succedaneum tale parat Capiuaccius.

℥. Sulph. vini lb. j. salis lb. β. *majoran. serpill. stœchad. arabic. calaminth. montan. saluia, betonica, rorismarini, pulegi, melisse* an. M. j. aqua communis lb. 100.

Fiat decoctio ad partis tertiæ consumptionem pro stillicidio.

Olea; præter destillata antea inter Interna enumerata; *Rutaceum, nardinum, serpillinum, costinum, sampsuchinum, de castoreo, de euphorbio, de lateribus, oleum Magni Ducis Hetruria*, quod veluti miracula facere videtur, vt scribit Capiuaccius, *oleum irinum, laurinum*, cui ob odorem grauem alia admiscenda, *de pulegio, de spica.*

Balsama magistralia & artificialia, quæ temporibus & vertici illini possunt; *Arabicum seu Iudaicum*, si haberi potest, è *Pern & Tolu*; *rorismarini, majorana, ruta, lauendula, nucis moschatæ, caryophyll. succini*, Compositum est in Institut. lib. 3. part. 3. sect. 3. cap. 31.

Vel *℥. Stœchad. Arabica, lauendul. saluia, rorismarini, majoran. origani, fol. lauri, serpill. hyssopi* an. M. i. sem. *anisi fenicul.* an. Drach. ij. rad. *caryophyllat. angelica.* an. Drach. iij. Contusis adde spiritus *terebinthina, aqua anisi*, lb. j. *caryophyll.* an. q. f. Destillentur per vesicam. Destillatæ aquæ adde *styracis liquidi* Vnc. iij. Iterumque destillentur.

Postea *℥. Styrac. calamita* Drach. ij. *myrrha, gummi juniperi* an. Vnc. j. *succini albi, thuris, asa dulcis* an. Vnc. j. sem.

Quibus affunde aquam & oleum proximè destillatum, aut si non suffecerint, aliquid aq. *rorismarini, granor. juniperi, vel anisi* adde, iterumque destilla in cineribus.

Aquæ & oleo destillatis adde *Cubearum, calami aromatici* an. Drach. ij. *caryophyllor. nucis moschat. cinamomi* an. Vnc. sem. *croci* Drach. sem. Vltimòque destilla.

Tandem separa oleum ab aqua, & serua oleum instar balsami, cuius non solum in externis vsus est, sed etiam in vino vel alio liquore octo vel decem guttæ exhiberi possunt.

Vel *℥. Terebinth. lb. j. thuris* Vnc. j. sem. *styracis calamita* Vnc. j. *ligni aloës* Vnc. sem. *nucis mosch.* Vnc. j. *cubearum*, Vnc. sem. *cinamomi, caryophyll. sem. carui* an. Drach. vj. *flor. lauendula* Vnc. ij. *croci* Drach. j. sem. *moschi*, si liber. & *ambra* an. Scrup. j. vel trochisc. *gallie moschate*, Drach. sem.

Affunde spiritus vini optimi lb. iij. Stent in vase diligenter clauso octo diebus in digestionem; postea in cineribus destillentur. Primò destillat aqua cum oleo crocei coloris; Continuetur destillatio, donec color ad nigredinem mutari incipiat, & tùm statim mutetur recipiens: cauendum enim sedulo, ne oleum vllum è *caput* contrahat. Separetur oleum ab aqua & spiritu.

Vnguenta & Linimenta; *Marcidatum, Aregon.*

Dan. Sennerti Tom. I l.

℥. Olei *rutacei, nardini* an. Vnc. sem. *nuc. mosch. express.* Drach. sem. *pulu. caryophyll.* Scrup. j. olei destillati *majoran.* gutt. iij. Fiat linimentum, quo synciput & tempora inungantur.

Vbi majori calefactione opus est, olea calidiora eligimus, iisque *styracem, calamitam, benzoe, euphorbium, mithridatium, theriacam, spir. vini* admiscemus, vt:

℥. Vnguenti *mariati* Vnc. sem. *ol. nuc. mosch. express.* Dra. sem. *destill. lauendul.* Scrup. sem. *caryoph.* gutt. iij. M. Cataplasmata;

℥. Farina *lupinor. pulueris serpilli, flor. chamamel. stœchad. arabic. majoran.* an. Drach. i. Misc. c. a. cum vino ad ignem. Adde Olei *rutacei, sampsuchini* an. Vnc. sem. Fiat cataplasma.

Vel *℥. Farina sanuigraci, lupinor.* an. Vnc. i. fol. *lauri.* Vnc. sem. Coquantur in mulsa & addatur olei *irini, sarapsuchini* an. q. f. Fiat cataplasma.

Vel *℥. Baccarum laur. origani* an. Vnc. i. *thuris, mastich.* an. Dra. ii. Cum succo *betonica* vel *ol. conueniente* Fiat Cataplasma.

Commendatur & radix *panacis* contusa, & cum oleo mista applicata. Guainerius laudat cineres calidos modico vino albo conspersos cum panno lineo impositos. Plura Epithemata & Linimenta videantur apud Auicenn. lib. 3. fen. 1. tract. 2. c. 13.

Emplastra & Cerota; de *betonica*; de *euphorbio.*

Fortiora tamen medicamenta calefacientia, quale est *euphorbium*, satius est adhibere in intemperie cum materia, quàm in intemperie nuda & sine materia.

Vel *℥. gummi juniperi, styrac. calamita, thuris* an. Dra. i. *stercoris columbini* Dra. ii. *nigella parum torrefacta* Dra. i. *nucis moschat. caryophyll.* an. Scrup. i. olei *nardini, terebinthina & cera* q. f. Fiat emplastrum bregmati imponendum.

Aliud *℥. Farina lupinorum, pulu. serpilli, flor. stœch. Arab. majoran.* an. Dra. ii. *gumm. tacamahaca* Dra. sem. olei *nardini, cera* an. q. f. Fiat Emplastrum.

Pulueres; post lotionem capitis pulueres rectè & commodè capiti insperguntur; vt.

℥. *Nucis moschat. majoran. caryophyll.* an. Drach. i. *flor. stœchad. Arab. rorismarini, ligni aloës* an. Scr. i. *moschi, ambra* an. gr. iij. Fiat puluis.

Vel *℥. Nucis moschai. caryophyll. granorum tinctorum se. kermes* an. Drach. i. *cort. curi* Dra. sem. *ligni aloës* Scrup. j. Fiat puluis.

Si pulueres *Caluarie* affricentur & postea aliquid spiritus vini optimi, vel potius aquæ vel spiritus cephalici irroretur, facilius ad cerebrum eorum vis penetrabit & id roborabitur.

Sacculi & Pilei; pulueres, si linteo aut sindone aut serico includantur, Fiunt sacculi & pilei.

Guainerius hunc commendat:

℥. *Flor. chamamel. betonica, verbenæ, majoran. absinthij, rosar. rubr. flor. stœchad. Arab. rorismar.* an. P. j. *gummi juniperi* Vnc. sem. *folliculor. sene, granor. tinctorum* an. Drach. sem. *ligni aloës* Drach. iij. *ambra quantum liber.*

Cum sindone rubra Fiat sacculus vel pileus, qui diu gestetur.

Vid. etiam Fernel. l. 5. M. M. cap. 19.

Vel *℥. Thuris* Drach. i. *succini* Scrup. i. *majorana, rorismarini, betonic.* an. Drach. iij. *flor. stœchad. Arab. 3. i. lauendula* Drach. β. *caryophyll. nucis moschat.* an. Scrup. ij. Cum sindone rubra F. sacculus.

℥. *Ruta, serpilli, hyssopi* an. Dra. i. *majoran. betonic.* an. Dra. iij. *flor. stœchad. Arab. lauendula*, an. Dra. i. β. Fiat pileus.

℥. *Flor. stœch. Arab. M. β. beton. majoran. verbenæ, flor. chamamel* an. P. ij. *lauend. P. j. nucis moschat. caryophyll.* an. Drach. ij. *gumm. juniperi* Scr. ii. *thur.* Dra. iij. *gall. mosch.* Scr. β.

Côrulis omnibus crasso modo F. sacculus vel pileus.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Maiozan. serpilli, melissa, roris marini, stæchad. Arabic. laurandula an. M. B. cort. citri, granorum kermes an. 3. iii. cubebæ. caryophyll. nucis mosch. an. 3. B. F. pulvis crallus & ex eo pileus*

*Coronæ quoque ex herbis Cephalicis, ut maiorana, roremarino &c. paratas capite gestare vtile est.*

*Smegmata; Smegmatum exempla vide in Institutio-nibus, lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 31.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Saponis Veneti Vnc. ii. ladan, styracis calamit. ligni aloes. thuris an. 3. i. caryophyllor. ireos an. Dra. iß. moschi, ambr. an. q. s. Fiat Smegma.*

*Pulveres trochisci & candelæ ad suffitus; qui tamen in dolore capitis vel intermittendi vel parce vsurpandi. Pulveres & trochisci carbonib. accensis insperguntur; candelæ accenduntur. Fumus ex his & naribus attrahi & pileis nocturnis excipi potest. De quibus tamen omnibus observandum, ne accendantur. Sine flamma enim suaviorem & fortiozem odorem spirant: flamma verò eorum vires & odorem facile absumit & dissipat. Exempla sunt in Institut. loco modo allegato.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Styracis calamita, benzoes, ladan. an. 3. ii. gummi iuniperi. thuris an. Dra. B. gran. iuniper. 3. ii. caryophyll. Dra. i. B. pulv. carbonum tilia q. s. Cum mucilagine tragacanthæ aq. rosar. extracta F. candelæ.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Gummi hedera, thuris, gr. iuniperi an. 3. i. nucis moschat. caryophyll. styrac. calamit. an. Scr. ii. nigella parum torrefacta 3. B. gallia moschata Scr. i. Cum ladano & mastiche dissol. in in aq. salu. F. trochisci pro fumo.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Gummi hedera coriandri, nigella aceto macerata & siccata an. Dra. B. thuris, mastiches, granor. iuniperi an. 3. ii F. pulvis pro suffumig.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Salvia, maioran. rosmarin. caryophyll. cinamomi an. 3. i. fol. lauri 3. B. ligni aloes Scr. i. thuris 3. i. B. gallia moschat. 3. B. F. pulvis.*

*Pertinent huc & odoramenta, quibus vel vestes conspergi, vel manus & nares illiniri possunt, quæque supra ignem in vaporem resoluuntur, ex aquis & aliis cephalicis calidis præparata, de quibus etiam in Instit. l. allegato.*

*Balsama; Ex oleis destillatis supra enumeratis, etiam ad odorandum, ut & tempora inungenda, ut antea dictum, balsama parari possunt, Roris marini, maiorana, salvia melissa, ruta, laurandula, nucis moschata, caryophyll. succini Compositi exemplum est in Institut. l. modo allegato.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Olei maioran. Scr. B. salvia, macis, caryophyllorum an. gutt. vi. melissa, laurandula, succini an. gutt. iii. ol. nucis moschat. expressi q. s. F. balsamum. Pomambræ seu Poma odorata. Exemplum est in Institut. loco modo allegato.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Ladani 3. ii. styrac. calamit. Vnc. B. nucis moschat. mac. an. Scr. ii. rosar. 3. B. cinamomi, ligni aloes an. Scr. B. zibethi, moschi an. gr. iii. ambra gr. ii. olei destillat. caryophyll. gutt. v. mucil. tragacanth. aq. rosar. extract. q. s. F. Pomambr.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Semin. nigelle, caryophyll. nucis moschat. rosar. rubrar. an. 3. i. laurandul. 3. B. ladan. 3. iii. benzoes, styracis calamit. an. 3. B. mosch. gr. v. zibeth. gr. iii. ambra. gr. iii. mucilag. tragacanth. aq. rosar. laurand. extract. q. s. F. Pomambr.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Benzoes, styrac. calamit. an. Dra. ii. cinamon, ligni aloes an. 3. B. ol. destillat. caryophyll. gutt. iii. nuc. moschat. expressi Scr. ii. olei destillat. maior. gutt. vi. ambra, mosch. ana gr. iii.*

*Excipiantur ladano agitato in mortario cum oleo costino vel de spica.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Styrac. calamit. 3. ii. caryophyll. macis, ligni aloes an. 3. B. laurand. 3. ii. gall. moschat. 3. iß. mosch. ambra, an. gr. iii. Cum succo maioranæ & styrac. liquida. Fiat Pomum.*

*Noduli odorati Fernelius. lib. 3. method. medend. cap. 19.*

$\mathcal{L}$ . *Caryophyll. 3. B. macis 3. i. nigella præp. Vnc. B. flor.*

*stæchad. Arab. maioran. an. 3. B. Ligentur in nodulo serico ad odorandum.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Troch. Gallie mosch. Scr. i. fol. maioran. roris marini, flor. stæchad. Arabic. ana Dra. B. macis Scrup. B. nucis mosch. caryophyll. cinamomi, ligni aloes an. Scr. i. moschi, ambra an. gr. ii. F. pulvis, qui si donec rubra vel serico includatur.*

*Moschus tamen, quod semel monuisse sufficiat, in mulieribus, quæ hysterice affectionibus sunt obnoxia, omittatur.*

*Masticatoria. Caput quoque calefaciunt, quæ masticantur, ut: Cubeba, nux moschata, cardamomum, pyrethrum, sem. eruca & similia. Resoluuntur enim ex iis halitus, qui ad cerebrum penetrant, idque calefaciunt.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Cubebæ. Vnc. i. cinamomi, caryophyllor. macis, nucis moschat. an. Scr. i. semin. carui Vnc. i. maiorana Dra. i.*

*Concitantur & contundantur crasso modo & masticet æger tantum, quantum pugillo comprehendere potest.*

*Auribus immissa vel applicata. Cum in auribus in actum deducuntur hæc medicamenta, in vapores resoluuntur, qui cerebrum calefaciunt; qualia sunt: oleum rutaceum, costinum, de castoreo, moschus & similia.*

*Vel si sacculi ex calidis cephalicis parati, & vino generoso calido vel spiritu vini adspersi, auribus applicentur, vapores, qui inde eleuantur, per aures ad cerebrum penetrant.*

*Inunctiones etiam volarum pedum & manuum cum oleis calidis ad caput calefaciendum profunt, ut docet Galenus, 2. de comp. med. secundum loc. cap. 1.*

*Phanigmi tandem in malo contumaci viles sunt, de quibus Galenus, 1. de comp. med. secundum loc. c. 2. & nos in Institut. lib. 5. Qualis apud Trallian est, lib. 1. cæ. 16.*

Vel  $\mathcal{L}$ . *Fimi columbin. 3. iß. piper. albi 3. ii. castorei 3. B. croci 3. i. Cum aceto & oleo nardino Milceantur.*

*Præter hæc multa medicamenta ad caput calefaciendum vtilia descripsit Galenus, 2. nat. r. c. cap. 1. & 2.*

### Diata.

*Vitetur aer frigidus, subterraneus, caliginosus, ventus frigidus: eligatur contra aer calidus & purus: vel paratur talis arte, stratis per conclaue herbis calidis odoratis, salvia, maiorana, roremarino, laurandula, pulegio, serpyllo, vel iunipero, baccis iuniperi: Et modo dictæ plantæ carbonibus iniiciantur: aut suffitns modo antè dicto excitentur: modo his æger non offendatur, sicut hysterice mulieres non quousvis gratos odores ferre possunt: aut accendatur ignis ex ligno iuniperi, roris marini, laxari, laurandulæ stipitibus. In nostris regionibus aer sat comode in hypocaustis igne in fornace accenso alteratur. Diligenter quoque cavendum, ne manus, & inprimis pedes refrigerentur.*

*Cibi condiantur salvia, roremarino, maiorana, hyssopo, satireja, aromaribus. Auicennas, lib. 3. fen. 1. tr. 2. c. 12. etiam allij esum commendat. Videntur pisces. Vinum bibatur album, tenue, quod caput non replet. Et si enim antiquum & generosum ad frigidam intemperiem corrigendam esset potentius; tamen quia caput replet, & tentat, ab eo abstinendum: vel bibatur tenue vinum medicarum, vel mulsum ac hydromel supra descriptum. Vel paratur talis cereuisia:*

$\mathcal{L}$ . *cinamom. 3. j. galang. 3. B. baccar. lauri 3. B. caryophyll. nucis moschata, granorum paradisi, cubebæ an. 3. i.*

*Pulverisata includatur linteo raro, & in vas cereuisiæ amphoras ii. vel iii. capiens coniciantur. Vigiliæ somnum superent, quemadmodum & corporis motus & exercitium quierem, Fricentur manæ crura & pedes, ac vesperi cubitum iturus lauet pedes aquâ, in qua herbæ cephalicæ calidæ coctæ sint. Venus, ut & tristitia, timor, ac sollici*



sollicitudo nocent, gaudium moderatum utile est. Exemplum talis intemperiei curatae habetur apud Forestum. lib. 9. observ. 6. 7.

## CAP V T III.

## De Intemperie Cerebri Humida sine Materia.

## Causa.

Intemperie  
cerebri hu-  
mida.

**H**umidam cerebri intemperiem excitant mora in aëre humido, pluvia & nix, si iis caput minus probè tectum obijciatur: præsertim si caput post lotionem & madefactionem non exsiccat: Lunæ radij, balneum aquæ dulcis, vita otiosa & quies. Medicamenta humectantia tum externa, tum interna: ut & cibus ac potus plurimum humectans: Somnus longus. Atque inducitur hæc intemperies facilius iis, qui cerebrum natura humidius obtinent.

Verum humida intemperies capitis diu sola non persistit: sed humores superfluos colligit, catarrhisque caput obnoxium reddit.

## Signa Diagnostica.

Frons & facies est mollis, nares humidæ, & excrementa narium & oculorum plura. Actiones animales omnes hebetantur, præcipue si adsit vna frigoris excessus, memoria inprimis est labilis, adestque in somnum propensio, è quo non ita facile expergiscuntur: Humiditas per se nullum delirium patit: Præcesserunt etiam causæ modò enumeratæ: Delectant & juuant siccantia, nocent humectantia.

## Prognostica.

Deterior est excessus humiditatis, quàm siccitatis. Facilius verò curatur humiditas cerebri, quàm siccitas. Siccantia enim tutius adhibentur capiti.

## Indicatio.

Cerebrum humidum siccantia requirit.

## Curatio.

Cerebrum  
humidum.

Quia verò humiditas plerumque frigiditati conjungitur, aut cum materia copulatur, & calefacientia cerebrum supra proposita omnia quoque idem siccare valent: Calefacientia ea etiam hic in intemperie humida profunt; & quidem omnia; si frigiditas cum humiditate conjungatur. Si verò caliditas conjuncta sit, temperata eligenda, aut calida frigidis admistis, ut, rosis, myrobalanis, coralliis, cornu cervi, smaragdo, radicibus quinque fol. tormentillæ; santalo, myrrillis, nuce cupressi, & similibus temperanda: Pauca ex iis hic quoque jungemus. De quibus & hoc notandum: non nimis odorata usurpanda esse, quæ caput vaporibus replendo *caput vapores* inducunt.

## Medicamenta Interna.

Interna.

Plurimum hic valet decoctum ligni Guajaci & Sassafras & radicis China cum modico visci querni. (Alij in capite siccando non minorem efficaciam tribuunt decocto radic. quinque folij & tormentillæ, si ad modum decocti radic. Chinæ paretur & exhibeatur; ut & vino, in quo rad. pentaphylli & tormentillæ maceratæ fuerint) castoreum, species diambra, aromatici rosati, theriaca, Mithridas sales theriacales, confectio anacardina.

## Externa.

Præterea calefacientia supra proposita, herba & semen pastinacæ siluestr. radix Imperatoris; myrrus, myrtilli bacca, cineres calidi vino madidi commendantur. Lotiones & Embrochæ;

Lotiones.

℥. Betonica, majoran. rosar. rubrar. calaminth. an. M. ii. sem. pastinaca sylu. Vnc. sem. radic. cyperi Dra. ii. flor. stæchad. Arab. P. ij.

Concludantur in sacculo, qui coquatur in lixiuio pro lotionem capitis.

Inprimis siccant Embrochæ ex thermis sulphureis & bituminosis, quæ non solum cerebrum siccant, sed & ita roborant, ut superflui aliquid facili non admittat. Vbi calefacientia minus tuta sunt, caput lixiuio, in quo flores rosar. rubrarum & folia myrti cocta sunt, abluatur, & postea pannus fumigatus puluere rosar. rubrarum & styrace imponatur.

Embrochæ.

Cataplasmata; Vbi ob calorem siccantia calida adhibere non licet, commodissimum est cataplasma ex cochlearum carne, (licet & totas cum testis contundere) in mortario minutim contusa, addito momento thuris & myrrhæ. Cochlearum enim caro superfluitatem ab intimis ad externa euocat, & ita internas partes quocunque humore grauatas siccatur: vteriam docuit Galen. 1. 1. de simpl. med. facult.

Cataplasma.

Pulueres Cephalici; qui & capiti inspergi & sacculis conficiendis materiam præbere possunt.

Ut ℥. Pulegi, calaminth. majoran. flor. stæchad. Arab. betonic. cortic. citri, gummi juniperi, caryophyll. an. Drach. j. F. Puluis.

Vel ℥. stæchad. Arabic. betonic. rad. pæonia, majoran. ligni aloës, caryophyll. nucis moschat. an. Dra. i. sem. moschi, ambræ, an. gr. iii. F. Puluis.

Vel ℥. Gummi. juniper. tacamahac. an. Dra. i. rosar. rubrar. corticum thuris, citri, caryophyll. mastich. santalor. omnium, myrtill. an. Dra. sem. Fiat Puluis.

Antequam Pulueres insperguntur, commodum est caput prius styrace liquidâ inungere. Sacculi & Pilei;

℥. Betonica, majoran. rosar. origan. an. Dra. sem. gummi. juniperi, tacamahace, thuris, mastich. an. Dra. j. caryophyll. nucis moschat. cupressi, Drach. sem. F. Puluis crassus & cum sindone rubrâ cucupha. Vbi calefacientia locum non habent, fiat sacculus ex rosis rubris, myrto, santalo rubro & corallis rubris.

Vel ℥. Salis torrefacti, ℥. ii. milij torrefacti, ℥. iii. semin. melanthij, ℥. i. sem.

Insuantur duobus sacculis lineis, qui capiti imponantur.

Et reliqua supra de intemper. Cerebri frigidâ proposita olea, linimenta, vnguenta, emplastra, inprimis Emplastrum de betonica; ceratum cephalicum, de euphorbio: Et quæ infra in capite de Intemperie cum pituita proponuntur.

## Diata.

Aër eligatur naturâ siccus, qualis est montanus, vel talis arte efficiatur. Idem sit lucidus & serenus: vitetur verò humidus, crassus, nebulosus, qualis est in conuallibus, circa paludes, & in locis subterraneis: caput à ventis muniatur. Inprimis venti australes vitentur, qui caput replent, 3. aphorif. 17. Vitentur & Lunæ radij.

Cibus vim siccandi habeat: eliganturque assa potius, quàm elixa: condiantur aromatibus & herbis siccantibus cephalicis. Abstinentium à carne vitulinâ, agnina, & juniorum animalium, cerebro, fructibus fugacibus.

Potus sit paucissimus. Præstantissima est in tali capitis affectu ea victus ratio, quæ præscribitur iis, qui decocto Guajaci, sassaeparillæ aut sassafras vtuntur.

Imò & ipsum decoctum vtile est, cerebrumque valde siccatur. Vigiliæ, quæ insigniter siccant, & eâ de causâ edaces ab Hippocrate, 6. Epid. sect. 4. r. 18. aliis 20. nominantur, somnum, qui corpus & caput humectat, superent. Motus & exercitium corporis otio præferatur. Caput diu pectinandum. Exemplum talis intemperiei curatæ est apud Forest. lib. 9. obseru. 9.

## Q V Æ S T I O.

*An detur intemperies humida sine materia.*

De humida intemperie in genere & in specie cerebri nonnulli, vt Phylot. Alian. Montaldus, tract. 1. de dolore cap. 15. dubitant; an detur idque negant; eâ ratione, quia mixtum humescere non possit, nisi humidum corpus imbibat. Verum hi non satis capiunt, quid sit humida intemperies sine materiâ & cum materiâ. Quod explicandum. Humida enim intemperies sine materiâ non est qualitas sine subiecto, sed cum subiecto; ita tamen, vt qualitas illa sit in ipsa parte substantiæ, & à nullâ aliâ substantiâ humidâ à substantiâ partis diuersâ foueatur. Talis humida intemperies cerebri contrahitur, cum cerebrum nutritur alimento nimis humido, & humidum ipsum (vt sic dicam) substantificæ ei vnitur; vel etiam causâ externa, vt si aëre humido vel aquâ atomi humidæ cerebro communicantur: ita tamen, vt sub formâ insensibili ferè existant in ipso cerebro. nullus verò humor adsit, qui eam foueat. Et propterea nullam peculiarem curam præseruatoriam instituere opus est. Humida autem intemperies cum materiâ est, vbi humida substantia à parte substantiæ diuersâ adest, quæ intemperiem à parte excitat & fouet. Id quod faciunt humores præternaturales.

*An detur humida & sicca intemperies sine materia. Montaldus negat.*

*Pro intemperie humida.*

[ Philot. Alian. Montaldus, tract. 1. de morb. capitis, cap. 15. negat, dari intemperiem humidam & siccam sine materiâ; idque & ratione, & auctoritate Aristotelis ac Galeni probatè conatur. Ratio hæc est, quod mixtum aliquod humescere non potest, nisi humidum naturâ corpus in se imbibat; neque exsiccari, nisi per humidæ substantiæ depreditionem. Verum non videtur satis intelligere Montaldus, quid per nudam intemperiem humidam intelligendum sit. Quæ res propterea explicanda. Quando corpora prima simplicia mixti compositionem ingrediuntur, si principium humidum abundet; fit inde temperamentum humidum. Vnde etiam in morbois constitutionibus & intemperiebus, si pars aliqua, cerebrum putâ, alimento tali nutriatur, quod plurimum humectet; in reliquis autem sit temperatum, & naturâ partis conueniens, cerebrum ex tali nutrimento humido contrahit intemperiem, quia partium solidarum substantiam humida illa alimenti substantia ingreditur, illique intermiscetur, assimilatur, & substantificæ, vt ita dicam, vnitur. Hinc postea talis pars rectè intemperata & humida nominatur. Ergo humida intemperies partium sine materiâ non notat qualitatis humidæ præsentiam sine omni subiecto: hac tamen lege, vt vnâ cum aliis principiis ad partis totius constitutionem faciat, licet aliquam diuersitatem habeat, hæc tamen formam, vel, vt Aristoteles loquitur, totum non mutat. Humida autem intemperies cum materiâ denotat non saltem subiectum, sed tale subiectum, quod à substantia & forma partis multum sit diuersum: & intemperiem parti viuenti inducat & foueat; quale est humor aliquis præternaturalis, & substantia à partium corporis nostri naturâ notabiliter differens, suâque peculiari formâ subsistens, suâque temperiem partis substantiæ imprimens. Hoc modo si res explicetur, ad Aristotelis & Galeni loca faciliè respondere est. Hoc enim rectè docent, (de intemperie tamen sine materia loquendo) humidum corpus non dari, nisi aquam,

aut aliud humidum corpus. Interim non negant, corpus aliquod humidum, à partis substantia diuersum, extra eam consistere, namque temperiem corpori communicare posse.

Eadem est ratio siccæ intemperiei. Etenim humidæ substantificum partis à calore dissipari & exsiccari potest, & quidem à tali calore, qui in ipsa partis substantia, & non in humore aliquo præternaturali inhærens, consistat. Et licet nullus humor præternaturalis exsiccans parti accedat: tamen quod illa siccitas, quæ absorptionem partium humidarum lequitur, intemperies, & quidem sine materiâ dici non possit, causâ nulla est. Nam siccitas est accidens corporis sicci. Iam si siccæ partes, absumptis humidis, dominium obtineant in mixto, dicitur mixtum siccum, illaque siccitas abundans facit intemperiem siccam, & quidem sine materiâ. Imò nec hoc concedendum, siccitatem nihil aliud esse, quàm naturalis substantiæ humidæ depreditionem. Fieri enim potest, vt, quod antea de intemperie humida diximus, alimentum siccum assuatur, idque parti assimilatur. Tum equidem naturali humido nihil decedit; quia tamen partes siccæ humidas superant, temperamentum illud merito siccum appellari potest. ]

*Pro intemperie sicca.*

## CAPVT IV.

*De Intemperie Sicca sine Materia, & intemperiebus Compositis.**Causa intemperiei Sicca.*

Cerebrum siccant calor Solis, ignis, thermarum, cibi siccantes, omnes immoderatæ corporis euacuationes, per hæmorrhagias quasunque, alui fluxum, sudorem, Venerem: vigiliæ nimix, inedia, animi perturbationes vehementiores, inprimis mœstitia & tristitia, animi intentio & studia nimia, labor, medicamenta siccantia immoderatè adhibita.

*Intemperies sicca cerebri.*

*Signa diagnostica.*

Capitis cutis est aridior, sensus acres, motus celeres, excrementa è naribus vel palato pauca profluunt oculi caui sunt & aridi, tempora adstricta, frons intenta, facies tota squalidior; adiunt vigiliæ: præcellerunt causæ cerebrum siccantes, iuuant humectantia, nocent siccantia.

*Prognosticum.*

Siccitas cerebri, si non multum à mediocritate recedat, cæteris intemperiebus minus damni infert: si verò magnus sit siccitatis excessus, omnium deterrimus est, & difficulter curatur.

*Indicatio.*

Cerebri siccitas humectantia requirit. Attendendum tamen an caliditas vel frigiditas siccitati coniungatur, & pro qualitatibus harum ratione medicamenta varianda: simul etiam ad causam, à qua siccitas inducta est, respiciendum. Si enim à tristitia & vigiliis ortum habeat, optimè ei opitulabitur somnus & animus hilaris ac curis vacuus: si ab inedia, Venere, vel nimia euacuatione, succurrerit rectissimè plenior & boni succi victus.

*Curatio.**Medicamenta Interna.*

Folia; Borriginis, buglossæ, lactuca, malua.

*Medicamenta externa.*

Flores;

*Flores; Violarum, borraginis, buglosse, nymph.  
Semina; Papaveris, quatuor frigida maiora, lactuca,  
malu.  
Fructus; Poma dulcia & dulcicida, amygdala  
dulces.*

**Externa.**

Internā enumerata etiam extra adhibere licet: quibus accedunt Folia & semen *Malua, violaria, althæa, semen Cydonior, fenugraci, lac, pinguedo gallina, butyrum recens sine sale.*

Medullæ crurum vituli; spuma ex sero lactis, omentum agninum vel veruecinum in oleo chamamelino vel sambucino coctum & capiti impositum, pulmo arietis calens & catulus dissectus capiti impositus, omentum veruecis. E quibus liquida tepida applicentur, semel vel bis de die, manē & vespere, pluribus diebus, prout ex vigiliis & aliis symptomatib. id opus esse coniicimus.

E quibus fiunt.

**Interna.**

Decocta ē plantis modo enumeratis.

Aquæ destillatæ; *Violar. borragin. buglosse, lactuca, nymph.*

Syrupi; *Violar. borragin. buglosse, nymph. papaveris.*

Iulepi; *Violarum.*

Conferuz; *Violar. borragin. buglosse, nymph.*

Condita; *Caules lactuca, radic. satyrj.*

Emulsionēs; *Amygd. dulc. seminum quatuor frigid. maior. an. 3. i. papaveris 3. i. b. aq. hordei simplicis lb. b. borragin. bugloss. an. Vnc. iii. F. Emulsio. Cui adde Iulepi violar. Vnc. i. b.*

*Vt ℥. Amygdal. dulc. Vnc. b. sem. quatuor frigid. maior. an. 3. i. papaveris 3. i. b. aq. hordei simplicis lb. b. borragin. bugloss. an. Vnc. iii. F. Emulsio. Cui adde Iulepi violar. Vnc. i. b.*

Species; *Diamargarit. frigid. diatragacanth. frigid.*

Electuaria.

*℥. Conferu. violar. bugloss. an. Vnc. i. lactuca Italica condita, Vnc. b. specierum diamarg. frigid. Scri. i. Fiat Electuarium.*

**Externa.**

E quibus liquida tepida applicentur.

Epithema; *Ex succo vel decocto malu. althæa, borragin. ex emulsione sem. papau. lactuca, lacte, aquis humectantibus cephalicis.*

*Vt ℥. Olei viol. amygdal. dulc. lactis muliebris, an. 3. vi. succi lactuca Dra. iii. Misceantur pro Epithemate frontis.*

*Vel ℥. Semen. papau. albi 3. vi. lactuca, cucurb. ana Drach. iii. aq. violar. Vnc. vi. Fiat emulsio, cui adde Mucilag. semin. psyll. aq. viol. & lactuca extracta, Vnc. b. Misce.*

*Vel ℥. Olei viol. Vnc. ii. aneth. Vnc. b. album. ouorum bene conquassatorum, num. ii. Lactis mulieris vel alterius Vnc. iii. Misce.*

*Lotiones & Irrigationes; cum decoctis humectantium herbarum ante propositarum, vel etiam lacte dulci.*

Non utendum hic lixiuio in lotionibus capitis, quia siccatur, sed lacte potius, quod humectat.

*Vt ℥. Radic. althæa, Vnc. i. fol. althæa, malua, violarum, lactuca, ana M. i. flor. Violarum, nymph. borragin. chamamel. an. p. i. sem. lini Vnc. b. papauer. 3. vi. Coque in aqua f. pro lotionem vel irrigationem capitis.*

*Oleum; Oliuarum matur. violarum, amygdal. dulc. nymphæ, sesaminum.*

**Linimenta.**

*Vt ℥. Olei violar. Vnc. b. amygdal. dulc. Dra. ii. pingued. gallin. Vnc. b. F. Linimentum.*

*Vel ℥. Mucilag. sem. malu. lini, fœni grec. psyll. an. Vnc. i. butyri recentis sine sale Vnc. i. b. medulla crurum vituli Vnc. ij. cera quantum satis, Fiat Vnguentum molle.*

*Vel ℥. Radic. althæa Vnc. b. fol. violarum, branca vrsina, malua ana M. i. flor. rosar. albar. violar. nymphæ. alba an. p. i. sem. cydon. 3. ii. Coquantur in aqua ad molli-tiē, & probè contusa per seraceum traiciantur. Adde medulla crurum vituli, butyri sine sale, olei violar. ana Vnc. b. cera parum. Fiat Vnguentum molle.*

*Odoramenta; Ex florib. violar. rosarum, nymphæ,*

*Errhina; ex iisdem, lacte, ol. violar.*

*In aures instillantur; Oleum violar. rosar. nymphæ, amygd. dulcium, sesaminum.*

*Lotiones pedum; Ex simplicibus modò dictis decoctis.*

**Diaeta.**

Vniuersa Dietæ ratio ad humidum vergat. Aer eligatur humidus, qualis est in conuallibus iuxta flumina, aut si talis naturâ non detur, plantis humectantibus sparsis concilietur.

Cibi sint boni & facili concoctionis: oua forbilia, pinguiuscula: carnes pullorum gallinaceorum, vitulina, hædinæ, elixæ potius, quàm assæ, pisces, butyrum recens: cibique alterentur lactucâ, flor. violar. borragin. malua & similibus. Salis verò & aromatum condimenta, quantum fieri potest, vitentur. Conueniunt etiam amygdalæ dulces, passulæ, pruna, rapum. Vinum sit tenue & oligophorum, vel decoctum hordei cum glycyrrhiza & iulepo violar. aut cereuisia aliqua humectans.

Somnus sit longior. Vt n. vigiliæ caput & vniuersum corpus siccant: ita somnus illud madefacit & humectat. Hinc non inutile fuerit, in tali intemperie à cœna lenia somnifera exhibere, vt lactucam, amygdalas dulces, vel earum lac, sem. papaveris.

Nec vitile est balneum aquæ dulcis. Vitetur Venus, labores nimij, ira, tristitia, nimia animi intentio: animus potius laxetur æger.

Exemplum talis intemperiei habet Forest. lib. 9. obs. 8.

**De intemperiebus capitis compositis sine materia.**

Vt de Intemperiebus compositis multa in specie addamus, opus non est: cum ex iis, quæ de simplicibus dicta sunt, facili, quæ causæ, signa, curandique ratio compositarum sine materia sit, pateat.

Quæ enim causæ calefaciendi & siccandi vim simul habent, calidam & siccam intemperiem inducunt; quæ refrigerandi & humectandi, frigidam & humidam: quæ refrigerandi & siccandi, frigidam & siccam.

Cognoscuntur quoque hæ Intemperies eodē modo ex effectibus, causis, quæ præcesserunt, dispositione cerebri naturali, iuuantibus ac lædentibus. Nam si quis cerebrum sua natura frigidum & humidum habeat, ei que causæ amplius refrigerantes & humectantes occurrant, & effectus ac symptomata adsint, quæ seorsim in vtraque intemperie sæpè diximus, v. g. ad somnum, eumque profundiorē, propensio, mentis stupor & ingenij tarditas, sensuumque inertia, calefacientia & siccantia prosint, humectantia & refrigerantia noceant: ex his facili colligere est, adesse cerebri humidam & frigidam intemperiem. Contraria apparebunt, si calidum & siccum fuerit.

Curandique ratio quoq; ex superioribus patet. Prout enim hæ vel illæ qualitates coniunguntur: ita medicamenta contrariis qualitatibus prædita eligenda & miscenda

*De Intemperiebus capitis compositis sine materia.*

miscenda sunt. Et propterea utraque qualitas vel una magis excedit: ita contraria usurpanda, quæ vel æqualem vim obtinent, vel ita temperanda, ut medicamenta contra eam qualitatem, quæ magis excedit, magis pugnet, & reliquam non augeant. Ideoque in intemperie humidâ cum caliditate conjunctâ siccâ calidâ non semper tuta sunt. Sæpe tamen medicamentum unum duabus qualitatibus resistit simul, & quæ calefaciunt, ferè omnia etiam siccant. Exemplum intemperiei cerebri frigida & humidâ, cum pituitâ habetur apud Solenandri, *sect. 1. consil. 2.*

## CAPUT V.

*De Intemperiebus capitis cum materia in genere.*

*Intemperies capitis cum materia.*

*Causa.*

**P**lerumque verò cum Intemperie materia conjungitur, quæ eam vel excitat, vel fouet: eaque est vel humor vel vapor.

Materia autem hæc in capite vel generatur & cumulat, vel aliunde transmittitur. Cumulat in capite ex imbecilla vel vitiosa nutrimenti concoctione ob cerebri partium & capitis *ἀσθένειαν & διαρρηξιν*, quæ plura, quam par est, excrementa proueniunt. Nam etsi alimentum, quod ad caput alendum distribuitur, bonum sit: tamen si coctio in capite rectè non fiat, multa excrementa cumulantur; aut quod excrementa ob crassitiem, copiam, meatuum angustiam, expultricis debilitatem expelli non possint. Materia verò extra caput genita, seu ob cibos vitiosos, seu ob errorem coctionis primæ aut secundæ, ob quem multa excrementa generantur, ab inferioribus ad caput fertur, vel transmissa à partibus aliis robustioribus ad caput imbecillum, præcipuè frigidum & humidum; vel eò attracta à calore aut dolore, ut & vocis intentione & clamore, rubarum inflatione, vomitu, quæ omnes causæ humores & vapores ad caput alliciunt, idque replent. Nimirum omnes ferè capitis affectus proueniunt, vel à capitis imbecillitate, vel à partium inferiorum repletionem & cacochymia. Si enim caput vel à primo ortu imbecillum sit, vel ex aliquo incommodo, ut vulnere, casu, contusione, externisque aliis injuriis, vigiliis, animi affectibus debilitatum sit: facili ex affluente alimento etiam bono multa excrementa cumulat.

Deinde ob prauam victus rationem, ob vicerum, ventriculi, epatis, lienis, vteri, &c. intemperiem, & hinc dependentem vitiosam alimentorum concoctionem, prauum humores in corpore cumulari solent, qui facili de causâ ad caput, præcipuè verò si debile sit, feruntur.

Quò etiam faciunt suppressæ còuetae euacuationes mensuræ, hæmorrhoidum, vel quod vlcus, aut fistula aliqua, quæ diu vitiosos humores effuderit, suppressa est.

Non prætereundum & hoc de morbis intemperiei cum materia, cum ex Astrologorum sententiâ Luna cerebro maxime præsit, & ipsâ experientiâ teste, secundum luminis Lunæ augmentum & decrementum, humores decrescant vel augeantur, morbos cerebri secundum Lunæ *φάσιν* non parum mutari, & nunc augeri nunc minui.

*Signa Diagnostica.*

Qua ratione a intemperies cum materia ab intemperie sine materia discerni possit, supra, cap. 1. dictum. Forrestus equidem *lib. 9. obseru. 10.* etiam quædam signa communia intemperiei cum materia recenset: verum non capitis illa propria sunt, sed intemperiei cum materia in toto corpore.

Signa autem, quibus an per se, an verò per consensum afficiatur cerebrum, discernere licet, nonnulli ex Galen. 1. de loc. affect. cap. 9. & 1. prorrhet. comment. 1. text. 3. ad tria capita redigunt.

Primò considerare jubent, an omnia symptomata, quæ affectum illum comitari solent, quæque sunt veluti characteristicæ, exactè adsint. Si enim adfuerint, proprium esse capitis affectum indicio est: Si non omnia affuerint, per consensum esse argumento est.

Deinde considerare jubent, an ea symptomata, quæ affectum illum significant, sint perpetua & continuè molestant. Hoc enim si fiat, signum est primum esse capitis affectum: Si verò interdum intermiserint, per consensum caput affici significatur.

Tertiò perpendendum monent, an alia pars prius fuerit affecta, antequam caput laborare cœpit. Nam si nullus præcessit alterius partis affectus, primum caput affici putandum est.

His tamen alia quædam addi possunt, & signa, quibus discernitur, an caput primario, an per consensum afficiatur, omnia hæc sunt. Si per se caput afficiatur, nativum ad tale malum est propensio; nullum in aliis partibus, quæ cerebrum in consensum trahere possunt, adest vitium; Antecesserunt causæ, quæ potissimum caput afficere aptæ natæ sunt; ea, quæ capiti soli adhibentur & applicantur, prosunt vel nocent; & symptomata & affectus in cerebro primario conspiciuntur; affectusque ferè continuus est. Fieri enim potest, ut, licet materia semper, causâ præsentem; præsens sit: tamen interdum quiescit, atque ita affectus, qui inde dependet, non continuus sit; idque propterea Medicum, si ex aliis signis certus sit, intemperiem cerebri per se adesse, turbare non debet. Contra si genita extra caput in reliquo corpore materia continuè ad caput feratur, atque inde continuus affectus excitetur, perpendendum quandiu ille affluxus durauerit. Si enim non diu durauerit, fieri potest, ut, licet affectus continuus sit, verbi gratia, dolor capitis in febre continuâ: ipsum tamen cerebrum permanentem intemperiem nondum contraxerit; si verò diu jam durauerit, fieri non potest, quin ipsum cerebrum jam intemperie laboraret, atque ita affectus complicatus sit, scilicet per se, & per consensum. Si verò antecesserunt causæ, quæ vel totum, vel partem aliquam læserint, & in toto, vel ventriculo, hepate, corde, vtero, vel alia parte aliquis morbus appareat, ad cuius ortum, augmentum & decrementum etiam morbus in capite initium trahit, augeatur & decrescit, ac proinde non semper continuus est, sed si morbus vel remittit vel intermittit, & ipse remittit & minuitur, vel cessat, ac iisdem præfidiis & morbo capitis, & parti in reliquo corpore affectæ succurritur, & symptomata non solum in facultate animali læsa, sed & alia partis illius, à qua cerebrum in consensum trahitur, adsunt: cerebrum per consensum affici indicatur.

Notandum tamen hæc quoque, aliquando fieri posse, ut capitis affectus cum alterius partis affectu inualescat & cum eo leuetur, nec tamen ab illa parte per consensum afficiatur. Quod accidere potest, si ex eadem parte & fonte materia in partes plures simul influat; dolor tamen in parte, quæ materiam mittit, non percipitur. Ita, 6. *Epid. comm. 4. text. 4.* Agesi Filia cum doleret ipsi coxendix, correpta fuit Asthmate; dolore sedato suspirium sedabatur: nulla tamen hic inter thoracem & coxendicem fuit sympathia, sed ab eodem loco, eodem tempore, in utramque partem humor infuebat, & ibidem eodem tempore dissipabatur & retrò cedebat. Ideoque hic diligenter inquirendum, an pars illa, quæ simul cum capite affligitur, primario affecta sit, & materiam capiti communicet, an verò illa aliunde eam suscipiat.

Observandum & hoc, non semper statim affectu, cuius consensu caput afficitur, remittente, etiam materiam & dolorem in capite euanescere. In febribus enim intermittentibus quandoque, cessante paroxysmo, nihilominus per aliquot horas adhuc dolor in capite perseverat; quod accidit, quod propter cranij densitatem

*An cerebrum per se, an per consensum afficiatur.*

*Luna in cerebri morbis.*



tem in capite tardius materia, quàm in reliquo corpore, discutitur. Summa: per essentiam, ut loquuntur, caput afficitur, si nullum extra caput est vitium, & ad sunt signa capitis per se affecti; per consensum verò, si nullum vitium sit in capite, ob quod materia generetur, sed solum extra caput.

Transmittitur autem illa materia, quâ cerebrum per consensum afficitur, vel à toto corpore, ut in febribus vapores, in plethorâ sanguis, in cacochymia pravi humores: vel ab aliquâ parte; & frequentissimè à ventriculo, è quo per œsophagum vapores sursum ad caput ascendunt: ab hepate item, corde, liene, pulmone, vtero, renibus, vesicâ, intestinis; imò externis artubus per venas, arterias, nervos, & occulta quoque corporis spiracula. Caput enim veluti tectum fumosæ domui impositum, excipit quæcunque ab imò effumant, sursumque feruntur. Cum autem materia hæc, ut dictum, sit vel humor vel vapor, & humor rursus vel sanguis vel bilis, vel pituita, vel bilis atra, vel melancholia: de iis ordine dicemus, quatenus quidem intemperiei solum cum materia causæ sunt.

Nam humores cerebrum & membranas occupantes quadruplici ratione iis damnum inferre possunt, vel dum ipsa saltem quasi irrigant, ac hoc modo eorum temperamentum immutant, dum scilicet per venas delati, cerebro eas, quas habent, qualitates imprimunt; vel dum humores vitiosi sanguini permisti, quando ad alendum cerebrum confluunt, ejus temperiem simul mutant; vel quando succo alimentario laudabili existente, ob debilitatem cerebri is non rectè coquitur, atque inde humores excrementitij generantur, qui in cerebro subsistentes, illi suas qualitates imprimunt, & sæpe per os ad nares euacuatur; vel dum magnâ copiâ extra vasa elapsi, in spatia inania & poros acmeatus cerebri & membranas ejus effusi, ea in tumorem attollunt. De postremo suo loco: jam de intemperie solum, quam humores excitant, dicemus.

Prius tamen generatim quædam præmittenda, & primò quidem dicendum, quâ ratione, an cum flatu & vapore, an verò cum humore sit intemperies, cognosci possit, & quæ generalis intemperiem capitis cum materia curandi ratio sit.

Primum quod attinet, si cum flatu vel vaporibus sit intemperies capitis, adest tensio capitis sine gravitate, & punctio per intervalla, sonitus aurium, & sæpe vertigo, præcessit diæta flatûs generans, ægèrque ab iis, quæ flatu discutiunt, emolumentum percipit.

Cum humore si sit intemperies, percipitur sensus gravitatis, tensio est stabilis, nec ita de loco in locum movetur.

Si vapore aut flatu caput afficitur, cum is mobilis sit, ab inferioribus partibus eum capiti communicari, idque per consensum ferè affici, suspicio est: quanquam interdum etiam flatu in ipso capite, sine affectu partium inferiorum, generari possit.

Si caput ab humore crasso, pituita aut melancholia afficiatur, cum hi humores non ita mobiles sint, neque ab inferioribus ad superiora facillè ascendunt, in ipso capite genitos fuisse & cumulos, plerumque est indicio. Tenuis verò, ut sanguis & bilis, plerumque ab inferioribus transmittuntur.

#### Curatio.

Curatur intemperies cerebri cum materia, materiæ euacuatione, & intemperiei, seu simplex sit, seu composita, per contraria alteratione. A materiæ tamen euacuatione semper incipiendum: cum impossibile sit, intemperiem capitis tollere, materiâ, quæ eam fouet, adhuc in eo hærente.

Semper tamen totius corporis prius habenda est ratio, neque caput commodè euacuatur, nisi prius totum corpus euacuatum sit. Ideoque à corporis uni-

uersi euacuatione, si necessaria ea sit, curatio inchoanda, & vel sanguis, si abundet, imminuendus, vel cacochymia euacuanda, ne materia superflua ad caput affectum, quod facillè fieri potest, affluat. Et clysteres nunquam in morbis capitis sunt prætermittendi: quia non tantum fumos & vapores reuellunt, sed etiam à cerebro ipso consequutione quædam attrahunt.

De vniuersi tamen corporis purgatione ex iis, quæ in genere de purgatione rectè instituenda præcipi solent, hoc repetimus & monemus, semper attendendum esse, an affectus sit sine febre, an verò cum febre, atque ita cruditatem conjunctam habeat. Nam si sit sine febre, quouis tempore (præparantia tamen quædam præmittere nihil prohibet) purgantia exhibere licet, & quidem etiam paulò fortiora. Si verò febris conjuncta sit, attendendus aphor. Hippocr. 22. sect. 1. *Concocta medicari oportet, non cruda, nisi materia turgeat.*

Postea videndum, An materia in cerebro cumulata & genita sit, an. v. aliunde transmittatur. Quid agendum sit, si aliunde transmittatur materia, sequenti capite dicetur. Si materia in ipso capite cumulata sit, primò ea ipsa euacuanda, postea caput roborandum.

Euacuatur autem caput priuatim; aut per modum & vias sensibus manifestas, aut insensibiliter. Sensibilis euacuatio fit per duas præcipuè vias, per palatum & nares, per quas natura, quam sequi debet, & ipsa caput plerumque expurgare solet. Nam quamuis Natura quandoque etiam per aures caput purget: tamen id rarius est, & plerumque non nisi in grauissimis morbis accidit, ut in internis inflammationibus, sanguine & pure circa cerebrum collecto. De his viis omnibus Hippocr. 6. aph. 10. *Caput, inquit, dolenti & vehementer laboranti, prius vel aqua vel sanguis per nares, aut os, aut aures effluens morbum soluit.* Observatum tamen etiam est, naturam in quibusdam per aures caput expurgasse, & citra vllum grauem morbum, nullo sanguine & pure circa cerebrum collecto quotannis aliquoties aurium doloribus præcedentibus, notabilem ichorum copiam per eas effudisse, idque familiis quibusdam hæreditarium fuisse. Multò minus per oculos euacuare licet, quam viam natura vel errans, vel ut majus malum præcaueat, quandoque eligit, ne cecitatem, aut aliquod aliud visus vitium inducamus; cerebro verò parum profimus.

Inter istas tamen duas vias, nisi quid obstat, ea quæ per palatum fit, commodior est. Natura enim ipsa solâ hanc viam molita est, & in sano homine per infundibulum in palatum euacuatio cerebri ferè sufficere potest. Nasus verò naturæ consilio odoratus & respirationis gratia præcipuè factus est. Vbi tamè major est excrementorum cerebri copia, natura hac via sæpe abutitur. Præterea per palatum via securior est, neque ita istâ euacuatione cerebrum concutitur, ac eâ, quæ fit per nares, cerebrumque comotum majoris sæpe mali causâ esse potest, dum in cerebro euacuando aberrans natura ad partem aliquam principalem humorem transmittit.

Potentius tamè, vbi iis tutò uti licet, errhina humores commouet, cum non solum medicamenti qualitas, vel vapor, ut in apophlegmatismis, sed & ipsa ejus substantia cerebrum stimulet. Neque tamè hi duo modi caput priuatim euacuandi in quouis humore, & eadem ratione locum habent. Nam apophlegmatismi, ut ipsum nomen indicat, iis affectibus inprimis competunt, qui à pituita & frigido humore ortum habent. Ideoque de Apophlegmatismis suo loco, vbi de intemperie capitis cum pituitâ agemus, dicetur. Hoc saltem hic in genere de iis monemus, ut ad masticatoria, sic & ad apophlegmatismos ea eligantur, quæ nec odore, nec sapore sunt insuauia, nihilque maligni habent, ne vel cerebrum vel œsophagum offendant.

Errhina verò in pluribus humoribus locum habent: alia

Humores  
quor modum  
cerebrum p.  
a. afficiant.

Cerebri à  
flatu affecti  
signa.

Cerebri ab  
humore affi-  
cti signa.

Quot modis  
caput eua-  
cuari possit.

Curatio in-  
temperiei ce-  
rebri cum ma-  
teria.

# 276 De intemp. capit. cum mater. in genere.

alia tamen in alio, vt suo loco patebit. Quare de Errhinis hic in genere aliquid adhuc addemus.

## Errhina.

Errhina.

De Errhinis autem in genere in Institut. lib. 5. part. 3. sect. 3. c. 30. diximus: hic saltem de iis, quatenus caput euacuandi vim habent, agendum. Euacuant verò Errhina præcipue excrementa circa anteriorem cerebri partem hærentia, & quæ circa cerebrum eiusque meningis colliguntur: non verò ea, quæ in posterioribus ventriculis, nisi fortan sternutatoria cerebrū totum vehementius concutiant. Hinc Errhina in omnibus soporosis affectibus & sensuum stupore vtilia sunt, & internis doloribus profunt, & sternutatoria catarrhos, qui in fauces irruunt, potenter reuellunt.

Medicamenta autem Errhina duplicia sunt: alia peculiari vi humores trahunt; alia facultatem expultricem solum irritat, vt ipsa sponte cerebro concusso humores vitiosos eiciat, quæ in specie prarunica & sternutatoria dicuntur. Prioris generis rursus duplicia sunt: quædā enim calore aperiunt funduntque humores, ac detergent, vt *succus betæ*, *succus calamintha montana*, *succus hedera*, *semen nigella*, *maiorana*, *pulegium*, & alia odorata, quibus tamen vtendum non est in ea catarrhi specie, quæ Coryza appellatur, ne dilatazione maiore partibus, & tenuitate humoribus inducta, maior fiat fluxio, humorque tenuior & acrior reddatur. Alia non solum acrimoniā & calore, sed etiam totā substantiā excrementa à cerebro alliciunt, vt *agaricus*, *turbith*, *colocynth*, *cyclamen*, *elaterium*, *elleborus albus* & similia. Quæ verò cerebrum irritando euacuationis causa sunt, cum dictis quidem modò multum conueniunt, acriora tamen sunt & tenuiora, vt ad ipsum cerebrum penetrare possint, qualia sunt *saponaria*, *radix ari*, *piper album*, *zingiber*, *pyrethrum*, *castoreum*, *euphorbium*, *helleborus albus*, qui vtramque vim habet. Quomodo autem in specie parentur Errhina, in Institut. alleg. dictum.

Liquida in nares ex volā manus attrahuntur, vel supino corpore naribus infunduntur; ore tamen prius vino vel aqua impleto, ne liquor per palatum in os influat: quanquam, quod sic influit, etiam humores efficaciter per fauces educit. Formulæ verò postea suis locis proponuntur.

Ab errhinis quando abstinendum.

Cauendum tamen ab errhinorum vsu, dum oculi sunt affecti, vel nares vlcerebus obnoxie: (errhinis scilicet, quæ vim euacuandi habent; vlcerebus enim dicata tunc profunt.) dum orificia venarum in naribus laxa sunt, vt hæmorrhagia ex irritatione metuenda sit, aut dum vertigini homo est obnoxius: cum sternutatoriis cerebrum vehementius concutiat, & facile vertigo excitetur; & tunc potius Apophlegmatismis vtendum. Post errhinorum verò vsu lacte vel oleo violarum nares eluere non inutile est, vt tollatur, si quid acridinis & acrimoniæ est relictum.

Nisi tamen hæ viæ sufficiant, & malum pertinacius sit, ad materiam euacuandā adhiberi possunt sinapismi, & vesicatoria capiti applicata, quibus cutis exulceratur & sensibiliter humor effunditur. Et tandem, vbi reliqua non sufficiunt, cauteria, quæ vel in vertice ad futuram coronalem, vel inter primam & secundam cœuicis vertebra, vel medicamento caustico, vel ferro ignito excitantur. De quo mox, quæst. 3. dicitur. Sunt enim cauteria aut fonticuli potius per cauteria excitati materia auxiliij sensibiliter euacuantis, quod indicatur ab humore, qui sensum gignitur & morbum diuturnum excitat. Talem materiam fonticuli cōtinuò euacuant; modò vnus, modò plures, prout materia paucior vel copiosior fuerit. Et quidem prout materia est euacuanda, vel reuellenda, vel deriuanda ita etiam in hoc vel illo loco fonticulus excitandus. Nam si simpliciter reuellenda est materia, in partibus

Fonticuli in morbis capit.

infra caput, vt capite sequenti dicitur, fonticulus excitandus. Si euacuanda, reuellenda seu deriuanda, in occipite: si simpliciter euacuanda, in futura coronali; modò id sine periculo fieri possit, de quo quæst. 3. dicitur. Neque solum è capite materiam euacuat vlcus cauterio in occipite excitatum, sed etiam quæ ad pectus ruit, intercipere valet.

Cauterio non minorem vim euacuandi habet setaceum: imò verò maiorem, cum per foramina duo plus euacuet, quàm per vnum; neque ita commodè pileo loci in fonticulo gestari possit. De quo in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 7. satis dictum. Videatur Hieronym. Fabric. de operat. chirurg. ris de setaceo parando.

Auicennas, lib. 3. fen. 1. tract. 2. c. 33. etiam ad interceptionem vaporum, qui per arterias cum sanguine arterioso adscendunt, proponit incisionem arteriarum in temporibus vel aduersionem earum per cauteria, modumque & ea, quæ in tali operatione necessaria sunt, pluribus describit. Idem eodem in loco plura cauteria præscribit, & præcipit, vt tria cauteria supra medium capitis applicentur, vt à cerebro humores extrahantur; duo super tempora, quibus via humoribus & vaporibus ab inferioribus ad superiora adscendētibz interceptiatur; vnum in nucha seu posteriore capitis & colli parte. Verum non sine causa addit in comment. Iacob. de partibus, cum plerique ægri vix suasues medicinas admittant, quis toties se vltulari sinet; ideoque cōsulit, ne Medicus tot cauteriis vti attentet; nisi instanter ab ægro & amicis postulentur: cum incertum sit, an eorum vsu malum sit cessaturum, & metuendum sit ne sanatis vlcerebus malum recrudescat.

Insensibilis capitis euacuatio fit per inconspicuos tū cutis, tum partium subiectarum meatus præsertim verò per suturas: sitque adhibitis eo loci topicis remediis, digerendi, diutius & exsiccati vi præditis; quæ supra, c. 3. de Intemperie capitis humida proposita sūt. Eligenda tamen semper ea, quæ natura humoris, & intemperies coniuncta postulat: & in intemperie humidā & frigidā, siccantia, calida, in materiā verò calidā, quæ sine calore siccant, vsurpanda. Atque ita humor, qui in capite hæret, euacuandus apophlegmatismis, errhinis, sternutatoriis, sinapismis, vesicatoriis, cauteriis, reliquisque insensibiliter discutiendus, & exsiccandus.

Tandem dum caput euacuatum est vel etiam dum euacuatur, intemperies, quæ superest, vel quæ materiæ coniuncta est, corrigenda per contraria. Vbi semper cephalica supra proposita in intemperie sine materia eligenda; sicut eadem quoque purgantibus immiscenda sunt. Quomodo autē capitis per contraria alteratio fieri debeat, ex superioribus, quæ de intemperiebus sine materia dicta sunt, patet. Ideoque quæ intemperiei, quatenus talis, debeatur curatio, ex superioribus peratur: In sequentibus verò præcipue, quid materia intemperiei coniuncta requirat, docebimus.

Faciemus autem initium de Intemperie capitis cum materiā per consensum; vbi generales reuellendi, deriuandi, repellendi à capite leges trademus: reliqua, quæ materiæ in capite contentæ debetur curatio, communis est in capite genitæ vel cumulata, & aliunde communicatæ.

## QVÆSTIO I.

An pilula commodius, quàm alia forma medicamentorum, ad caput euacuandum vsurpentur.

Vulgata apud plurimos practicos est sententia, pilulas commodius, quàm electuaria, vel poriones, in capite purgando exhiberi, quòd fortius à capite & remotioribus attrahant, idque ideo, quòd diutius in ventriculo

An pilula commodius capite euacuent, quàm alia medicamenta.

triculo morentur. Verum hoc quidem concedimus, pilulas ad caput purgandum efficaciter exhiberi, sed non faciunt hoc propter formam, verum quia est fortioribus medicamentis constat. Quod autem propter formam ad caput purgandum, quam aliarum medicamentorum formae vtiliores sint, parum rationi consentaneum est, & ex falsa hypothese nata est hæc opinio, quod scilicet medicamenta in ventriculo hærentia, vitiosos humores à reliquo corpore ad se trahant. Neque enim medicamenta purgantia ad se in ventriculo humores trahunt, (aliis enim extra umbilico & ventri applicata, manibus tractata, aut naribus ad olfaciendum admota non purgant) sed quia sui aliquid in corpus transmittunt, quod humores peculiari vi, & ad singulos humores determinatam fermentat quasi & quietos commouet; unde facultas expultrix irritata & stimulata humores vitiosos cum medicamento purgante per aluum expurgat. De quo videantur *Institut. libr. 5. part. 1. sect. 1. cap. 11.*

## QVÆSTIO II.

*Quo tempore pilula ad caput purgandum sint usurpanda?*

*Quo tempore pilula ad caput purgandum exhibenda?*

Non omnium eandem de tempore exhibendi pilulas fortiores ad caput euacuandum esse sententiam, qui scripta Medicorum seculorum superiorum legit, facile animaduertit. Plerique in ea fuerunt sententia, quam etiam in praxi ipsa secuti sunt, pilulas, quæ ex capite fortius trahere debent, (nam de lenioribus, & quæ saltem primas vias euacuant, hæc quaestio non est, eaque citra controuersiam hora una ante cibum sumi debent) una atque altera hora post cenam exhibendas esse, ea procul dubio ratione persuasi, quod crediderunt, cum cibi vaporibus vim medicamenti facilius ad caput ascendere, atque ita fortius à capite attrahere. Verum posteriores Medici non sine causa huic opinioni contradixerunt, & rectè olim iam etiam Paulus Aegineta, *lib. 7. cap. 4.* scripsit; qui vesperi medicamentum purgans exhibent, aut à cibo, noxam inferunt; quippe alimentum corrumpunt, minusque euacuant. Et reuera, si coctio nondum sit absoluta, alimentumque distributum, concoctio turbatur, minusque, quam par est, operatur medicamentum, cibo à quo eius vis retunditur, permixtum. Cibus quoque nondum integrè coctus ad venas cum medicamento purgante rapitur humoresque vitiosi, qui purgante medicamento attrahuntur, chylo permiscuntur, eumque inquinant. Ideoque commodissimum tempus exhibendi tales pilulas, ut & alia purgantia medicamenta, est matutinum, ubi concoctio iam absoluta est. Neque ratio, quæ illos mouit, alicuius momenti est. Nam humores vitiosi à purgante medicamento moti ad vias euacuationis non per oesophagum, per quæ vapores ad caput præcipuè adscendunt, sed per venas perueniunt: ideoque commodissimum purgationis tempus est, si viæ illa omnes liberæ sint, & coctio in ventriculo absoluta,

## QVÆSTIO III.

*Cui loco ad caput euacuandum cauteria in capite applicanda sint?*

*An cauteria futura coronali adhibenda?*

Duo loca, in quibus cauteria ad materiam in capite euacuationem applicantur, à plerisque Medicis nominantur; occiput & synciput, seu futura coronalis; & de priore quidem loco nulla lis est, etsi, ut antea dictum, non ita commodus videatur, & setaceum ei præferendum sit. De loco verò in syncipite seu futura coronali Medici dissentiant. Plurimi quidem fonticulos, qui in capite ad futuram coronalem, qua sagittali committitur, excitantur multum facere ad eliciendos, reuellendos, euacuandosque humores, qui intus in capite sunt, ne

*Dan. Sennerti Tom. II.*

detenti, aut deorsum descendentes varias corporis partes afficiant, statuunt; & hinc in primis ad capitis morbos frigidos & humidos, ut dolorem capitis, vertiginem somnum profundum, paralytin, & ad mortuos, qui ex detentis in capite humoribus, & ex fluxu eorum ad oculos, nares, aures, columellam, fauces, dentes, pectus, articulos viles esse tradunt, & quidem quinq; de causis, ut Hieronym. Fabricius ab Aquapendente, *de operat. Chirurg. c. de fonticulo in futura coronali*, docet. Primum, quia hoc in loco facilius detinentur gestanturque fonticuli: Secundò, quia anterior capitis pars humidior est posteriore, & propterea maiore humorum euacuatione indiget: Tertiò, quia hic locus minus durus & ad exhalationem humorum aprior est: Quartò, quia laxior & rarior est quam ceteræ partes: Quintò, quia ibi adest vena interius per suturas penetrans, in nonnullis per caluariam, insculpto in ea foraminulo; & proinde caluariam eo loci combustam & apertam humores multi è penitioribus partibus profluunt: cuius rei exemplum *ibidem* adducit Fabricius, & propterea de loco illo exactè inueniendo *ibidem* pluribus agit. Alij, inter quos Montanus, *consil. 36. 143. 170.* Hieronym. Mercurialis *tom. 3. consil. Fabi. Pacius, in lib. 5. method. medendi, cap. 13. & in appendice ad libr. 7.* Ludou. Sepralius, *animaduers. medic. lib. 6. num. 107.* (qui testatur, se 40. annis, quibus medicinam Mediolani fecit, nullum vidisse, qui ex hac cauterij applicatione quid commodi perceperit, aliquos verò in periculum, inflammatione excitata, coniectos fuisse.) Zechius, *in consultationibus medicis, consultat. 75.* & alij cauteria huic loco applicata improbat, ideoque præcipuè, quod cum summo periculo coniunctum sit hoc auxilium. Cum enim os hoc loco sit tenuissimum, & durior membrana per fibras, neruos, arterias, venas, pericranio connectatur, ignito ferro facile inflammari, & cerebrum in consensum trahi potest. Refert idem Zechius, *consultat. prima*, pistorem quandam Bononiæ ab inustione hoc loco facta, in phrenitidem eadem die incidisse, ideoque idem in loco cauterij applicandi inueniendo manus radicem summis naribus, non autem ad superciliorum intermedium applicare iubet. Secundò, quod difficile sit, humores in capite latentes, suapte natura deorsum inclinantes sursum per futuras euocare. Et omnino hisce autoribus subscribo, & cum Zechio sentio, si ob euocandam ex alto materiam in cerebro hærentem, & cerebrum siccandum roborandumque, destillationem, quæ *ἀδρῶς* in fauces aut thoracem ruit, cohibendam, aut symptoma aliquod quod subito exficcare iubet, quemadmodum in apoplexia & lethargicis affectibus fieri solet, vltio necessaria sit, vnicam eamque superficiali & cutaneam sufficere; & tum tamen etiam cum summâ cautione, ne cerebrum vltione illâ lædatur, instituendam esse. Vbi verò fonticulum excitare, eumque diutius apertum seruare animus, quod humores vitiosi à cerebro auertantur, potius in capitis parte posteriore, inter secundam & tertiam vertebram cauterium applicari potest; cum eundem usum præstare possit, & sanè minore periculo applicari queat. Etenim cauterium anteriori parti capitis applicatum, non tam ex ipso cerebro, quam ex illa venâ, quæ eo loci ad cerebrum tendit, cuius mentionem fecit Hieronym. Fabricius ab Aquapendente, euacuare, atque ita humorum affluxum ad cerebrum potius impedire quam è cerebro euacuare videtur. Cum verò idem fonticulus in occipitio, vel setaceum excitatum, & quidè cum minore periculo præstare possit: meritò ad ista potius, ubi necessitas postulat, confugiendum videtur.

## CAPVT VI.

*De Intemperie Capitis cum Materia per Consensum.*

Statis autè frequens est hæc intemperies, & hoc nomine omnem illam intelligimus, ubi caput à materia

*Intemperies capitis per consensum.*

A a

in

in partibus inferioribus generata, & ad caput adscendente afficitur. Capiti nimirum supremo corporis loco posito idem accidit, ut supra quoque dictum, quod in tuguriis recto, ad quod fumi & vapores omnes feruntur & præterea per venas, arterias, ut & nervos, quos in omne corpus distribuit, cum omnibus ferè partibus consentit. Nā quidquid vaporis vel humoris in venis & arteriis est, vel ab aliis partibus, hepate, liene, corde, utero, in eas effunditur, id omne liberè ad caput moveri potest. E ventriculo verò non solum per latam & patentem viam vapores ad caput adscendunt, sed & per nervos sextæ coniugationis cerebrum cum ventriculo consensum habet maximum. Rondeletius, *method. curand. morb. cap. 5.* etiam per arterias & venas, quæ à vena porta originem trahunt, & exteriori ventriculi tunica inferuntur, materiam ad caput ferri posse docet. Et quidè cum è ventriculo materia cerebro comunicatur, fit hoc, vel quia cibus est copiosus, & crudus, vel corruptus in eo continetur, vel quia humores vitiosi in eo abundant, vel quia venenum sumptum est.

Capitis cum  
ventriculo  
consensum.

Cum Intestinis.

Cum Liene.  
Cum Renibus.

Cum Pulmone.  
Cum Utero.

Cum diaphragmate.  
Cum extremitatibus.

Ab intestinis etiam materia quandoque capiti communicatur, cum scilicet vel vermes in iis delitescunt, vel humores vitiosi in iis hærent, vel feces & excrementa præter modum & tempus retinentur, unde vapores multi ad caput eleuantur. A Liene per arteriam magnam imprimis materia ad caput transmittitur. A Renibus per arterias & venas. E pulmone per asperam arteriam halitus & vapores ad caput adscendunt. Uterus quoque præter vasa, per quæ cum cerebro consentit, vinculis spinæ dorsii robustissimis alligatur, & per ea cerebrum facile in consensum trahit. Consentit quoque cerebrum cum septo transverso. Ab extremis etiam partibus per nervorum ducta sæpe materia ad caput adscendit. Materiam tamen potius per vasa, venas & arterias communicari, eum verò, qui per nervos & spinalem medullam fit consensu, potius propter condolentiam fieri, nonnulli censeant: cum pars ab acrimonia vel multitudine humorum vellicata, eam, cum qua communicationem habet, in consensum trahit. Quod ut facilius & expeditius fieri possit, omnino concedendum. Ita planè negandum non putarim, aliquid materiam per nervos sextæ coniugationis & spinalem medullam cerebro quoque communicari: cum manifestè in epilepsia id fieri videamus in quâ aura venenata sæpe ab extremis partibus per nervos usque ad cerebrum adscendit.

### Signa Diagnostica.

Signa capitis  
per consensum  
affici.

Quomodo in genere, an cerebrum per consensum afficiatur, cognosci possit, præcedenti capite explicatum est. In specie, si afficiatur consensu totius corporis, totius corporis affecti signa aderunt, ut plenitudo, & suppressa aliqua evacuatio, febris, crisis, mēstrua purgatio. In hisce n. omnibus cum humores in corpore turbentur, caput aut vaporibus, aut sanguine & sæpe cum eo vitiosis humoribus repletur, & hisce malis sublati capitis affectus cessat.

Signa cerebri  
à ventriculo  
affici.

Si à ventriculo cerebrum in consensum trahatur, eius affecti signa adsunt; prava concoctio, ob ventriculi debilitatem, aut cibum ac potum vel copiosum, vel vaporosum assumptum, cibi fastidium, nausea, ructus, ventriculi morbus & conturbatio. Interdum diaphragmatis compressio & anhelitus difficultas, ex materia flatulenta in ventriculo contrita. Et quidem si cibus crudus & copiosus sit in ventriculo, ex antecedente diæta id cognoscitur. Si verò cibus corruptus sit in ventriculo, adest nauseabunda satietas, ructus foetidus, fumosus acidus, ventriculi morbus & circa præcordia dolor & anxietas, appetitus deiectio. Si materia biliola sit, & in ventriculo aliunde effundatur, ut in picrocholis, ascitus ille vaporum in caput sedatur humore pravo benigniore cibo depresso & mitigato. Augetur verò, cum ventriculus cibo est vacuus, & post somnum, ac præcipue inedia,

cum tum temporis bilis liberè ad ventriculum effundatur, & ad caput fumos mittat; à cibo verò vapores illi deprimantur, & acrimonia mitigetur; modò æger cibis boni succi, non acribus, qui acrimoniam bilis augere possunt, utatur. Ructus, si accidunt, sunt fumosi, & amari, bilis quandoque vomitu reicitur, oculis <sup>cap.</sup> <sup>ma. 1721</sup> interdum obuerfantur. Qui verò à pituita excitarum affectus, ventriculo vacuo & per famem sedatur, cum ventriculus vacuus & à cibo liber, frigidus & crudos humores concoquere tentet: post cibum verò magis inualescit, cruditate aucta, dum ventriculus simul à cibo & pituita grauatur, & dum cibum & pituitam concoquere perfectè non valet, & debilitè in eos agit, mulri vapores & flatus ad caput eleuantur, ut dū ignis debilis in viridia ligna agens multos fumos excitat. Quandoque ramen accidit, ut ventriculo vacuo & per inedia plurimi vapores ex pituita in ventriculo excitentur, & inde dolor capitis & ventriculi excitetur: quod fit, quando humor frigidus in ventriculo est copiosus, ut calor ipsum vincere & concoquere non possit, sed vapores & flatus multos ex eo excitet. Et cum cibus assumptus non integrè sedat dolorem ventriculi & capitis, ut in bile accidere solet, sed eum potius auget. Ea, quæ ventriculo profunt, etiam caput juvant, ut vomitus & alia & quæ ventriculi affectum augent, ea etiam capitis morbum augent. Et id, quo vomitu reicitur, qualis humor sit, qui per consensum caput afficit, docet.

Interdum tamen accidit, ut cerebrum & stomachus simul afficiantur, & reciproca quasi fiat materiam communicatio. Vbi diligenter attendendum, quæ pars primò afficiatur. Fieri enim potest, ut in cerebro leue aliquod, & nisi quis diligenter attendat, sensibus vix obuium vitium sit, & à cerebro debili materia in sanum ventriculum defluat, cuius continuo affluxu ipse ventriculus tandem deliteretur, eius coctio lædatur, unde vapores multi ad caput eleuantur, idque lædunt. In quo casu licet malo ventriculi remittente etiam caput melius habeat: tamen pars primò affecta non est ventriculus, sed cerebrum. Itaque diligenter perpendendum, an cerebri, an verò ventriculi affecti signa prius adfuerint. Si enim mali initium in capite est, principio nullum in actionibus ventriculi vitium apparuit, sed in capite potius ea præcesserunt, & capitis grauitas, somnus, vel aliarum capitis actionum debilitas vel vitium aliquod apparuit. Si venenum sit in ventriculo, eius signa aderunt, quæ suo loco proponuntur. De quibus omnibus, plura de morbis ventriculi dicentur. Si ex vermibus caput afficiatur, signa vermium adsunt. Si humores vitiosi in intestinis hæcant, vel feces retineantur, etiam suis signis id facile cognoscitur.

Si ex Utero caput afficiatur, vel menses suppressi sunt, vel viduis ac cœlibem vitam agentibus semen retinetur, & alia signa uteri affecti adsunt. Caput verò imprimis in vertice afficitur, & quæ utero profiunt vel obliunt, ea etiam capitis affectum minuunt vel augent.

Si ab hepate caput per consensum afficiatur, affectus is plerumque occupat dextram partem capitis excrementa capitis sunt falsa & calida: Hepatis affecti signa adsunt, & ad hepatis morbum curatum vel diminutum capitis affectus imminuitur vel tollitur.

Si à Liene, sinistra capitis pars magis afficitur & dolor, si adest, magis à cibo infestat, & eadem circa lienem occurrunt. De quo vide questionem in fine capitis.

Si à Corde & arteriis caput in consensum trahatur, sanguinis feruidioris in corde & arteriis signa adsunt, & feruor in capite, & rubor in facie atque oculis apparet, & arteriæ in capite vehementius pulsant, & quæ feruorem sanguinis temperant, præcipue profiunt.

Eodem modo si à Pulmone sit affectus capitis, affecti pulmonis signa adsunt, & quæ pulmone comoda vel incommoda sunt, eadem simul capiti profiunt vel obliunt. Simul etiam, si ex vesicâ vel renibus materia communicetur, earum partium affectuum signa aderunt.

Prognosis

Ab Utero.

Ab hepate.

A Liene.

A Corde.

A Pulmone.



*Prognosticum.*

Facilius curatur; ceteris paribus, Intemperies hæc per consensum, quam quæ per essentiam.

*Indicationes & Curatio.*

Capitis per  
omni affe-  
cti curandi  
ratio.

In omni capitis per consensum affectu hoc generale præceptum est, ut partis mandantis, materiæ, quæ transmittitur, & capitis, partis recipientis ratio habeatur: nisi à crisi is proveniat. Nam si à critico humorum motu aliquis affectus in capite excitetur, si natura rectè agat & humorem vitiosum è corpore euacuare conetur non verò errans ad caput transmittat, de consilio Hippocrat. 1. Aphor. 20. ad Galen. 1. ad Glaucon. c. 15. nullo modo crisis turbanda, neque repellentia, neque alia adhibenda; sed totum negotium naturæ rectè agenti committendum. Crisi n. absolutæ affectus ille facile evanesceat nisi forsitan ex vehemèti humoris ad caput motu præsentissimè periculum, inflammationis scilicet cerebri & delirii lethalis imminet; quod ex vehemèntissimo dolore, calore, & instante delirio cognoscitur. Tum n. ne ob sanguinis cum impetu ad caput ruentis copiâ crisis vel nulla fiat, vel imperfecta, mediocriter repellentia adhibere utile est, quæ affluxum humoris ad caput non tollant penitus, sed moderentur. Rarius tamen hoc accidit & cautè hic agendum. Quod si crisis nondum sit præsens; ex motu tamen materiæ, quem natura crisis moliens instituit, vapores vel humores ad caput mittantur, perpendendum, per quæ loca natura crisis sit institutura, de quo in Instit. lib. 3. par. 3. c. 16. dictum. Et si natura sit ignavio, ei subueniendum, ut per convenientia loca humores vitiosos facilius expellat.

Si verò extra Crisin sit, & partis mandantis & capitis recipientis habenda est ratio. Curandi verò ratio semper à parte inchoanda, quæ materiam ad caput transmittit, & pars mandans vulgò appellatur; nisi affectus ipse tantus sit, ut ad se curationem mox ab initio convertere iubeat. Nam si multa materia in toto corpore, vel in parte aliqua contineatur, à quâ ea, quæ in capite est, foueatur, nisi prius totum vel pars, quæ materiam capitis morbo subministrat, euacuetur, frustra in capite vel euacuando vel alterando laboratur.

Reuellentia  
à capite.

Deinde caput non negligendum, sed eius simul habenda ratio est, ne humores ad id affluant, vel ab eo facile recipiantur, vel in eo sedem figant. Quod sit reuulsione, deriuatione, interceptione. Reuulsio fit venæ sectione in brachiis vel cruribus instituta: cucurbitulis, dorso, scapulis, brachiis, coxis ac cruribus admotis, tam scarificatis, quæ fortius reuellunt, quam non scarificatis, vel hirudinibus partibus inferioribus apposis: clysteribus iniectis, purgantibus exhibitis, frictionibus crurum ante cibum, coxarum, dorsum, vinculis cruribus iniectis, lotionibus extremorum, vesicatoriis collo ac cubito applicatis; fonticulis item seu cauteriis. Cauteria autem ad excitandum fonticulum applicanda cruribus quatuor digitos infra genua, si à toto corpore materia capiti communicetur. Hoc n. modo & totum corpus euacuatur & à capite materia reuellitur. Quod etiâ faciendum, si à partibus infra renes ob menses vel hæmorrhoides suppressos, ad caput materia transmittatur. Nam ita & materia reuellitur, & menstrua ac hæmorrhoides prouocantur. Si verò partes supra renes, ut & hepar & lien capiti materiam suggerant, in brachiis fonticuli excitandi, dextro quidem, si ab hepate, in sinistro verò, si à liene.

Interceptio  
et Repel-  
lentia mate-  
riam ad ca-  
put tendentis.

Intercipitur materia adstringentibus collo adhibitis. Repellitur à capite materia, & caput, ne facile admittat, roboratur oxymelini & aliis repellentibus, refrigerantibus ac adstringentibus adhibitis. Deriuatur materia, quæ in cerebro & eius membranis est, apertis venis post aures, in fronte, sub lingua, in naribus. Si quæ

tandem materia in cerebro sedem fixerit, euacuatur ea cum sensibilibus, cum insensibilibus, iis modis, qui capite præcedente propositi sunt.

Quæ omnia qua ratione fieri debeant, postea in specie patebit: de repellentibus saltem, & quæ humorum ad caput affluxum prohibent, in genere adhuc quædam addemus.

Cum reuellere incipimus seu sanguinis missione, seu quocunque modo alio, statim subiungenda repellentia. Si enim & reuellentia materiam à capite auertat, & repellentia eandem repellant, facilius scopum nostrum assequimur, caputque roboratur, ne tam facile affluentem aliunde materiam admittat. Excipiunt tamen aliquos casus Medici, in quibus non liceat adhibere repellentia, nimirum in febribus, cum vaporibus exitum intercludant, & dolorem capitis ita augeant; quando euaporatio fit à toto in corpore plethorico; & quando catarrhus coniungitur, ne repercutientium usu is augeatur. Marthæus de Grad. tamen, in 9. Rhasis in fin. c. 1. Catarrhum nō semper sufficere putat ad prohibendum repellentia, sed monet, si materia biliosa ad caput redat, ut de phrenesi sit metus, ad prohibendam phrenesin & maius malum, non attendendum esse catarrhum, & minus malum, quod ex repellentium usu euenire posset, sed repellentia adhibenda esse. Imò & in reliquis casibus idem obseruandum puto, & si ex motu materiæ ad caput graue aliquod malum metuendum sit, nō omittenda sunt repellentia. Præstant autem hoc medicamenta refrigerantia & nonnihil adstringentia, qualia sunt succus porulaceus, semperuini, polygoni, aqua rosacea, cui oleum rosaceum & aceti aliquid admixtum sit, succus cucumeris, cucurbitæ, quibus etiam aliquid aceti, vel alterius adstringentis medicamenti mixtum sit. Vbi nihil aliud ad manus est, posca, id est, aqua frigida aceto mixta scopo huic satisfacere potest. In omnibus tamen capitis affectibus hic commendatur oxymelini appellatum, quod conficitur ex oleo rosaceo, cui aliquid aceti admiscetur, & quod ob adstrictionem commodius ex oleo recenti, & quod annum vnum non excesserit, de quo supra cap. 1. plura dicta sunt, quæ & huc referantur.

Hoc saltem hic addimus, in aceti electione hoc attendendum esse, ut in biliosa & calidâ materiâ, ac ubi virgilia vrgent, acetum minus acre (acre enim caloris particeps est) eligatur, aut si acre sit, minor eius portio admisceatur: si autem materia sit crassior, acris & copiosior uti licet.

De oxymelini nota.

Hoc quoque monendum ex Galeno, 2. lib. 7. c. 1. Sicranium vel cerebrum, vel eius membranæ vulnere aliquo detectæ sint, acetum planè omittendum esse; quia, cum acre & mordax sit, excitato dolore maiorem fluxum concitare potest. Conueniunt & alia refrigerantia & repellentia supra c. 1. proposita.

Tandem quod in genere alibi in Instit. de repellentium usu dictum, id in affectionibus capitis omnibus quoque obseruandum, ut inter prima initia sola repellentia adhibeantur; postea verò cum aliquid materiæ affluentis in capite receptum, quod amplius repelli nō potest, mixta oritur indicatio; & materia, quæ adhuc fluit, repellenda, quæ verò iam influxit, discutienda digerentibus; atque ita mixta remedia adhibenda; & quidem ubi à statu remotior est morbus, repellentia præualere debent; ubi statui propinquior, vel in statu est, æquales vires habere debent medicamenta, & in declinatione, ac ubi materia iam amplius non affluit, sola laxantia & discutienda adhibenda; atque ubi fluxus iam cessauit, materia, quæ in capite substitit, iis modis, qui capite præcedente propositi sunt, tollenda.

Postquam hæc in genere de affectibus capitis per consensum dicta sunt, quædam adhuc in specie addenda. Primum si caput per consensum totius afficiatur, quod sæpe accidit in febribus, unde dolor capitis & deliria excitantur, tum, quia in capite permanens causa non est, magis incumbendum euacuationi & reuulsioni

Materia à toto ad caput ruens quomodo reuellenda.

affluentis materiæ, caputque per repellentia defendendum. Ideoque materia ad caput ruens venæ sectione in brachiis, vel talo & pedibus, clysteribus, purgatione, cucurbitulis, frictionibus, ligaturis, cruribus, brachiis, & dorso adhibitis, reuellenda; quem in finem etiam cubito extra applicantur vesicatoria ex cantharidibus & fermento, plantis pedum imponitur raphanus cum sale, ruta item contula cum sale & fermento applicatur, ut extremitates venarum arteriarumque laxatæ ad se vapores proluciant, & à capite retrahant.

*Repellentia.*

Interim dum hoc modo reuulsiōni materiæ à capite studemus, simul repellentia & caput roborantia oxyrhodina & alia supra cap. 1. & modò proposita applicanda.

*Interceptio.*

Ad interceptiendam verò materiam collo circa arterias & venas carotidas linteolâ succo lactucæ, vel aqua rosarum cum aceto madida, vel oleo rosarum, nymphaeæ, myrtino imbuta apponere licet.

Reliqua curatio ad ipsum principalem morbum dirigenda. Intus tum ea exhibere vtile est, quæ vapores, qui sursum feruntur, deprimant, conseruam rosarum, rob. ribes, succum citri, granatorum, species diamargariti frigidi & similia. Quæ omnia locum habent, si, ut antea dictum, affectus capitis non à criticâ euacuatione proveniat. Tum enim nihil agendum, sed totum negotium naturæ committendum. Si tamen natura nondum crisin tentaret, sed aliquam eius significationem præmitteret, unde caput afficiatur, natura adiuvanda est, & leni aliquo medicamento ad convenientia loca, quod natura tendit materia ducenda.

*Capitis per consensum ventriculi affecti curandi ratio.*

Si ventriculo affecto caput in consensum trahatur, & quidem, si cibus vel potus plus nimio in ventriculo recluderetur, procuranda eius coctio, & inedia imperanda, vel si malum vigeat, cibus vel potus statim vomitorio leni exhibitio per os reiciendus; vel ut maturè per aluū descendat, clystere alius irritanda. Ita si cibus corruptus sit in ventriculo, similiter vel vomitorio eiiciatur, vel, si homo ad vomitum aprus non est, leni purgante exhibitio, vel clystere injecto per aluum educatur. Et quantum fieri potest absque cibo æger somno & quieti se dedat, aut si dormire non possit, leniter ambulet, donec cibus vel coquatur & à natura superetur, vel ad intestina descendat. Cibo vomitu eiecto vel per aluum euacuato, ventriculus internis & externis roboretur, & ut suo loco dicetur, curetur.

*Nidiosa cruditas remedia.*

In primis verò considerandum, an in ventriculo cacochymia & cruditas sit nidiosa vel acida. Si enim nidiosa cruditas & humores bilioli ac mordaces, in ventriculo abundant, & vapores congeneres ad caput inde adscendant, euacuandi illi syrupo rosarum solutiu. mānā, cassiā. Ad vapores verò reprimendos & extinguendos, ac præterea vias coarctandas aq. frigida potus in assuetis utilis est. Item syrupus de rosis siccis, granatorum, acetositate citri, myrtillorum cum aqua plantag. lactucæ, portulacæ.

*Acida cruditas remedia.*

In acida verò cruditate & pituitosis humoribus convenit mel rosarum solutivum, hiera simplex Galeni, diaphœnicum. Ad flatum verò ab hoc humore natos discutendos vtile est anisum, cuminum, chamæmelum, mentha, cortices citri, diagalanga, dianisum. Mercatus ad flatum in ventriculo discutendos commendat aquā calidissimam, quæ præterquam, quod malitiam humorum retundat, coctioni etiam plurimum prodest, ventriculum abluat, & ad euacuationem non parum iuvet, & actuali caliditate flatum, antequam in ventriculum irrumpat, mirum in modum discutiat. Idem in vtrâq. causa, & in quacumq; intemperie, quæ ex inferiorum viscerum consensu oritur, se feliciter vsū fuisse his pilulis scribit:

℞. Folior. senæ Vnc. vi. passular. mundatar. 3. iii. glycyrrhiz. 3. iβ. folior. fumariae, borrag. betonic. cichory, absinthij, an. 3. i. Coque in vase clauso in aqua borragin. fumar. aut absinthij.

Decocti ℞. Vnc. viij. In iis macerato rhabarbar.

3. iβ. schenanth. Scr. i. Colat. adde species. hiera Galeni Vnc. j. agentur donec pulveres humorem assumpserint, & additâ syrup. ros. solutiu. f. q. F. Massa.

A cibo exhibeantur, quæ adscendentes vapores reprimunt, & os ventriculi claudunt:

Ut ℞. Coriand. preparat. Vnc. iii. cinamom. sem. anisi an. Vnc. β. fœniculi, 3. iβ. cumin. aceto preparat. carui an. 3. β. rosarum rubrar. 3. i. mastich. Scr. i. sacchari albisissimi vel manus Christi perlat. Vnc. i. F. pulvis, in cruditate acidâ & humore frigido.

Vel ℞. Conseru. rosar. Vnc. ii. betonic. carni citri condita an. Vnc. i. myrobal. emblic. condit. Vnc. β. diacydon. sine speciebus. sem. coriand. prepar. an. 3. i. corall. rubr. preparat. Scrup. ii. mastich. Scrup. i. Cum syrup. cydoniorum. Fiat Electuarium, in cruditate nidiorosa.

℞. Coriand. preparat Vnc. ii. sem. anisi Vnc. β. cinamom. species. diarrhod. glycyrrhiz. an. 3. ii. sacchar. rosar. tabulat. ad pondus omnium. Fiat pulvis post pastum.

Reliqua, quæ huc faciunt, patebunt ex doctrinâ de ventriculi intemperie cum materiâ.

Vermes, si tetros vapores ad caput migrant, interficiantur, & à corpore exturbentur, ut suo loco dicetur.

Eadem ratione & aliæ partes, à quibus cerebrum per consensum afficitur, hepar, lien, renes, uterus, curentur, ut de singulis suo loco dicetur. Quod dum fit, id quod antea in genere præceptum est, semper observandum, ut caput, quod pars recipiens est, non negligatur. sed ab ipso materia reuellatur, repellatur, ipsumque, ne humores & vapores admittat facile, roboretur, & materia, quæ in id affluxit, modis antea dictis euacuetur, tandemque intemperies, si quæ reliqua est, contrariis alteretur.

In specie si ab Vtero materia cerebro comunicetur, cucurbitulæ spinæ propè anū & intra coxas versus pudenda admotæ reuellendo plurimum præstant. Si materia, præcipuè vaporosa & calida in venâ cauâ & arteriâ magnâ lateat, vel per eam adscendant, spina secundū longitudinem, sub quâ trunci venæ cauæ & arteriæ magnæ latent, refrigerantibus inungenda est.

## Q V Æ S T I O.

*An cerebro consensu Hepatis affecto, dolor & molestia in dextrâ capitis partē; Lienis in sinistra; Vteri in vertice & syncipite percipiatur?*

Communis ferè Practicorum sententia est, si caput hepatis consensu afficiatur, in dextra parte dolorem & molestiam magis percipit, si ob Lienem afficiatur, in sinistra; si ob utrum, magis in vertice. Dissentit verò ab hac sententia Rondeletius, method. curand. morbos. c. 5. statuitq; dolorem, qui ex consortio hepatis & Lienis in capite suboritur, non dextram potius, quàm sinistram partem occupare, nec aliâ partem præter anteriorem ei assignandâ in qua omnis materia, quæ ab inferioribus partibus sursum fertur, subsistit, ob causas, quæ postea ex Galeno, 1. Epid. comm. 1. text. 2. afferentur. (quo loco et si Galenus tantum de dolore per vteri consensum agat, causæ tamen, quæ ab eo afferuntur, communes sunt omni dolori; qui per materiæ ab inferioribus transmissionem fit) Et si enim ab hepate facilius per venâ cauam, à Liene per arterias materia sursum ad caput feratur: tamen cum vena cauâ arteriâq; magna tantum iuxta iugulū diuidantur, dextramq; & sinistram arteriam & venam in caput mittant, causam esse nullam putat, cur, quod à iecore & liene demandatur, per hanc potius, quàm per illâ viam ad caput perueniat, & in dextrâ potius, quàm in sinistra parte dolorem exciter; nisi forsità casu vel aliquâ aliâ læsione pars vna debilior sit quàm altera, ut facilius id, quod ab inferioribus transmittitur, suscipiat.

fulcipiat. In consensu verò per vterum distinctionem adhibet. Caput in vertice & syncipite ab vtero magis affici, tum tantum verum esse putat, cum materia per arterias & venas ad caput transmittitur. Nam, ut Galenus, 6. Epid. comm. 1. text. 2. docet, vapores calidi per arterias ad caput eleuantur, arteriæ verò per collum ab utraque infundibili parte rectè in synciput discunt. Præterea & sanitatis tempore tenuia ac calidiora cerebri excrementa maximè per synciput distillari solent: si quidem eo loci futura sunt laxissima & ipsa caluaria subtilissima, plurimique meatibus perula. Adhæc multa sèsu prædita corpora per suturas euadunt, quæ ad dolorem percipiendum sunt aptissima. Imò non per arterias solum ad caput vapores mittuntur, sed & per venas, ac in syncipite & vertice sedem figunt, & distensionem faciunt, eo quod venæ, quæ sinus duræ meningis constituent, ibi desinunt, potissimumque tertius & quartus. Si verò cerebrum ab vtero in consensum trahatur, non per fumos & vapores per vasa transmissos, sed per condolentiam, quæ fit ob connexionem spinæ cum vtero, tum dolor & molestia magis in occipite percipitur; & hoc vnum peculiare habent hi dolores, qui ab vtero per consensum spinæ fiunt, quod in occipite magis percipiuntur & initium faciunt, cum reliqui omnes, qui per fumos & vapores transmissos, imò & per humores in capite collectos fiunt, ob causas à Galeno modò allegatas in syncipite & vertice magis percipiuntur.

Et quidem vterum quod attinet, facile Rondeletio assentimur, & considerandum putamus, an consensus capitis & vteri fiat per venas & arterias, an per spinam. In priori enim magis verticem & synciput, materiâ ad caput per venas & arterias transmissâ, in posteriore occiput, capite per spinam in consensum tracto, affici putamus. Et quidem cum cerebrum per spinam consentit, quia vterus membranosa constat substantiâ & nervosa naturâ intextâ, seu per condolentiam nervosum genus in consensum trahere potest, seu per materiæ alicujus communicationem. Etsi enim corpus totum est *ὑπόπνοον* & *ὑπέρπνοον*: tamen nervosa nervosis & cerebro facilius aliquid communicant, quàm aliis partibus, ut in Epilepsia, quæ fit à partibus extremis, fieri videmus, ubi aura illa maligna per nervos cerebro, non cordi vel alteri parti communicatur.

Hepar verò & Lienem quod attinet, etsi verum esse concedimus, plerumque per vasa, arterias & venas materiâ ab hisce visceribus communicari, & non magis ad dextram quàm sinistram ferri, & inde dolorem in syncipite excitari: tamen experientia ipsa testatur, sæpius in dolore per consensum, nunc partem dextram, nunc sinistram affici; quod non solum fit, quod hæc vel illa pars debilior sit, sed ob Hepatis & Lienis cum dextrâ & sinistram consensum. Si autem porro queratur, quomodo ille consensus fiat, vix alia causa dari potest, quàm *ὑπόπνοον* & *ὑπέρπνοον* Hippocratis, quæ fit *ἡ δὲ* *ἰσχυρὰ*, quæ dextra dextris, sinistra sinistris respondent.

## CAPUT VII.

## De Intemperie cum vapore &amp; spiritu flatulento.

*Intemperie caput à vapore & spiritu.*  
**P**ostquam ista in genere de Intemperie capitis cum materiâ, seu in eo genitâ & cumulatâ, seu aliunde transmissâ diximus: Proximum est, ut pro diuersitate materiæ caput afficientis, ista in specie explicemus. Initium autem facere liber de Intemperie cum vapore & spiritu flatulento.

## Causa.

*Causa.*  
 Flatus autem & vapores vel in ipso corpore generantur, vel extra in caput admittuntur. Primò si in corpore

Dan. Senneri Tom. I I.

generatur flatus & vapor, Intemperiem hanc excitant quæcunque flatum vel vapores gignendi aut concitandi vim habent. Flatus autem generantes causas duæ sunt: Agens, scilicet calor imbecillis, qui materiâ quidem rarefacit, discutere verò nequit; & materia ad flatum generandum apta, ut cibi flatulenti & humor pituitosus ac melancholicus. Pro natura tamen humorum, è quibus eleuantur, est flatum & vaporum differentia. Flatus equidem ex humoribus frigidis, crassis & viscidis ac glutinosis eleuatur, & propterea difficilius resoluntur: vapores verò & à frigidis humoribus, & à calidis, sanguine & bile excitantur. Vapor verò is vel spiritus flatulentus aliquando in ipso cerebro generatur, ob aliquam ejus intemperiem, ob quam alimentum, ex quo alendum erat, ex parte in flatum conuertitur; quod etiam faciunt venti, qui per aures & nares admissi cerebrum afficiunt, ut & frigus externum: vel in reliquo corpore generatus ad caput mittitur, idque fit, vel ex toto corpore, vel aliqua parte. Humores quoque commouet, & ut inde vapores ad caput eleuentur, facit ira, exercitium corporis nimium, aer calidior, balneum à cibo.

Secundò etiam extrinsecus flatus & vapores in caput admitti possunt. Primò quidem venti cum australes tum boreales, per aures & nares in caput admissi, id replent. Deinde vapores aliarum rerum frigidi, calidi, humidi, interdum etiam maligni, ut vapores ex locis palustribus & limosis, vapores rerum, quæ suauem quidem habent odorem, sed fortem, ut camphoræ, molchi, croci, scarleæ, menthæ, & similia; vapores rerum foetidarum, ut allij, caulium, foliorum nucum, cannabis, lini & similia, carbonum item fumus, & candelarum exstinctarum; maligni, ex cadaveribus, interdum & fodinis metallicis.

## Signa Diagnostica.

Cognoscitur flatus vel vapor in cerebro, quod sensus tensionis sine grauitate percipitur; quod affectus, quem excitat, subito nascitur & remittit, quod facile de loco in locum mutatur. Vapores etiâ & flatus in capite præter dolorem, quæ distendendo membranas pariunt, sonitum & sibilum in auribus, vertiginem, incubum, soporem, epilepsiam, apoplexiam etiam excitare possunt. Sæpe quoque venæ in collo intumescunt, & inflatæ apparent, pulsatio arteriarum capitis est fortior, maximè si in arteriis sit materia peccans; quandoque etiam imaginatio, spiritibus turbatis, corrumpitur & deprauatur; excrementa è capite ferè nulla excernuntur, nisi vapores tandem in humorem degenerent. Præcesserunt causas flatus generantes modò dictæ, ut materia crassa & flatulenta, ac calor imbecillis; vini potentioris, aut cibi flatulenti aut vaporosi usus; adest febris; instat crisis vel menstrua purgatio. Quod autem flatus vel vapor in ipso capite sit genitus, & non aliunde transmissus, ex eo cognoscitur, quod nullus sonitus aut inflatio in ventriculo aut partibus vicinis percipitur; & neque propter ciborum repletionem, neque inanitionem, vel symptomatum, quæ flatus in capite excitant, remissio, vel augmentum percipitur. Præcessit capitis grauitas, & aliquis sensuum sensim læditur, leuique de causa malum inde excitatum recurrit. Si autem flatus & vapor ab aliis partibus ad caput feratur, partium affectarum notæ indicabunt locum, à quo flatus attollitur. Venæ in collo sæpe tenduntur, vrinae in superficie bullis repletæ sunt.

Et cum flatus non ex seipso originem habeat, videndum, quæ sit materia, à qua resoluitur, & an cum caliditate vel frigiditate sit conjunctus, id quod ex iis cognoscitur, quæ de ipsis humoribus postea tradetur. Ipsi tamen vapores etiâ, cujus humoris soboles sint, produunt. Pituitosi enim flatus & vapores tardius mouentur quàm biliosi, grauitas capitis major adest, cum quadam in somnum propensione, tenebræ si oculis oboriantur,



tur, diutius durant; biliosi mordaces sunt & acres, citò euanciscunt; melancholici tristitiam excitant, fixi sunt. Melancholia enim ad euaporandum minus apta. Qui à sanguine sunt, mites sunt, temperati caloris, & magis quantitate quam qualitate molesti, somnum excitant.

Sunt quoque signa, quæ docent, per quas vias vapor & flatus ad caput adscendant. Nam si per partem anteriorem adscendant, percipitur tensio thoracis, & quidē, si per arterias latentes in profundo, quasi chorda cum pulsatione tendens apparet, si per venas, sine pulsatione id fit. Si per partem posteriorem, tenduntur venæ & arteriæ in eadem parte. Si fiat ascensus per venas & arterias manifestas in collo vel facie, tensio vel pulsatio ibi deprehenditur.

### Prognosticum.

Non ægrè curatur à vaporibus & flatibus orta intemperies, modò materia & pars, vnde proueniunt, cognoscatur, & facile curari possit. Tamdiu enim durant, quàm diu humor, à quo atolluntur.

### Indicationes.

Materia, è qua flatus eleuatur, siue sit in capite, siue in reliquo corpore, euacuanda; flatus & vapor à capite auertendus, repellendus, interceptiendus, discutiendus; caputque alterandum & roborandum: Si tamen vaporum & flatum commotio valdè urgeat, vt ea sederet quamprimum opéra danda: si extra flatus in caput admissus sit, is discutiendus & caput alterandum.

### Curatio.

Ideoque primum videndum, qualis materia seu in toto seu in capite abidet, & flatibus ac vaporibus materiam suppeditet, eaque euacuanda, vt sequentibus capitibus dicitur, tum venas secando, tum purgando, tum etiam particulares capitis euacuationes instituendo.

Quibus expeditis, si in capite flatus sit genitus, ex materia frigida & humida, caput fouendum decocto florum chamæmeli, anethi, rutæ, folior. lauri, flor. meliloti, sem. cumini, feniculi, vel inungendum oleo anethino, chamæmelino, irino, rutaceo: vel imponatur sacculus ex milio, sale & dictis modò plantis.

Vt ʒ. Mili. torrefacti M. ss. flor. cham. melilot. ros. mar. rini, stæchad. Arabic. pulegij, an. P. j. sem. cumini, anethi, an. Drach. j. Fiat sacculus.

Olfacienda exhibeantur; Majorana, rosmarinus, radix ireos, caryophylli, castoreum, ol. saluia. Auribus instilletur oleum rutaceum, saluia, chamæmelinum, anethinum, amygdalar. amaran. vel moschus & castoreum lanæ bomicinæ inuoluta aurib. indantur. Et alia, quæ in Intemperie cum Picuita proponuntur, vsurpentur, vbi flatus est à materia frigida.

Si verò aliunde flatus vel vapor ad caput eleuetur, curatio ab iis inchoanda, quæ materiam, quæ flatus suppeditat, euacuant, & quæ flatus & horum materiam à capite deorsum trahunt, quæque humores & vapores ad caput tendentes repellunt. Ideoque commodissimè initio vsurpantur clysteres paulò fortiores, qui materiam, quæ in intestinis & circa mesenterium est, euacuant, & ne ad caput feratur, potenter reuellant. E.g. fiat talis Clyster:

ʒ. Mercurial. beton. an. M. ij. flor. chamæmel. M. j. meliloti, M. ss. sem. feniculi, cumini, carui, an. Drach. ij. Coquantur in aqua simplici. Colat. ʒ. ss. j. Benedicta lanar. Drach. sem. elect. diaphenic. biera simpl. an. Drach. ij. olei chamæmel. anethini ana Vnc. i. Fiat Clyster.

Si Intemperies capitis calida adsit, quæ morū ad caput vaporum adiuuat, eosque attrahit, oxorrhodina vel alia repellentia, supra cap. i. proposita, vsurpanda, quæ intemperiem capitis corrigant, idque robovent, ac

eos facile recipiat. Imò collo eadem ad inhibendum vaporum adscensum, applicare vtile est. Vt & ligaturas in partibus adhibere, à quibus vaporem adscendere cognitum est.

Neque inutile fuerit medicamentum, quæ vapores supprimunt, adhibere: inter quæ sunt conseruæ rosarū, robribes, myrobal. conditæ, corallia, spiritus vitrioli, salis, & similia. Reliqua etiam curatio eo modo, qui mox de humoribus traditur, perficienda, & humores, qui vel in ventriculo, vel venis mesaraicis, vel circa vterum, vel in habitu quoque corporis continentur, à quibus vapores hi attolluntur, expurgandi, & vnà cum vaporibus à capite auertendi sunt, per venæ sectionem, scarificationem, frictiones, purgationes, vomitus & alia, quæ deinceps proponuntur. Hoc saltem obseruato, vt medicamentis ea admisceantur, quæ flatus discutiunt, cuiusmodi sunt Semen anisi, feniculi, carui, cumini, dauci, seseleq. ammeos, anethi, rutæ, accorus conditum, cubeba, galanga, juniperi bacca, lenisticum, bacca lauri, species diacalaminthe, diacymini, dianisi, aromatici rosarū, diamasch. amari, diagalanga, & alia, quæ flatus crallos in intestinis & ventriculo discutiunt.

Videndum tamen, qualis sit materia. Si enim firacilior, & ab humoribus biliosis & mordacibus vapores eleuentur, à calidis abstinendum, & vtendum syrupo granatorum, limonum, citri, acetosellæ, quibus vaporum ad caput adscensus prohibeatur. Caput quoque oxorrhodino tunc fouendum. Tandem flatus discutiendi medicamentis modò enumeratis.

Et cum ex ventriculo sapius vapores ad caput adscendant, illudque repleant, ejus tum imprimis habenda ratio, ac medicamenta, quæ vapores è ventriculo adscendentes supprimunt, exhibenda: de quo cap. precedente dictum. De coriandro ad vapores è ventriculo adscendentes supprimendos vsurpando vide paulò post questionem. Auicennas prima terti, tract. 2. cap. 19. & Mesues distinct. 12. antidotarij, si causa mali sit flatus in ventriculo, valde commendat oleum de kerna, seu granis cataputiæ majoris, vtpote quòd crallos flatus discutit & phlegma crallum attenuat, ac propterea dolori stomachi, vt & capitis, ex hac causa orto prodest, seu ventri inunctum seu bibitum, seu clystere injectum. Auicennas loc. alleg. ad flatus discutiendos etiam adhibet balneum siccum, præcipuè jejuno stomacho vsurpatum.

Tandem si flatus & vapor extrinsecus in caput penetrauerit, & quidem si vêtus causa mali sit, considerandum, an fuerit austrinus & calidus, an verò frigidus & borealis; & an per nares, an verò per aures magis ad caput penetrauerit. Si calidus, in aures instilletur oleum chamæmel. anethin. cum rosac. mixtū repidè, vel ex iisdem medicamenta naribus admoueatur. Etsi enim causa sit ventus calidus: tamen cum animus sit flatum discutiendos, non aures stipare & concludere, moderatè calidis vtendum. Si verò ventus fuerit frigidus, calidiora adhibenda, ea scilicet, quæ supra in Intemperie capitis frigida, & antea in hoc ipso capite sūt proposita, & modis ibi explicatis. Si à bonis odoribus caput sit repletū, qualitates odorum perpendendas, & frigida calidis, humida siccis opponenda. Si verò odores mali & graueolentes fuerint, etsi ferè calidi sint, cum euaporabilia ad caliditatem inclinent; tamè simpliciter frigida olfacienda non sunt; cum vapores in capite retineant & eorum discussionem prohibeant: sed moderatam caliditatem habere debent; nisi forsan magnus caloris excessus sit: tum enim oleum cucurbitæ, violar. & similia narib. attrahenda, & aer ipse, qui inspiratur, refrigerandus, vt supra, c. i. dictum. Si vapores maligni sint, non solum contrariis qualitatibus prædita naribus sunt attrahenda, verum cum maligna qualitas plerumque altius in corpus sese insinuet, ea quoque, quæ peculiari vi malignitati illi resistunt, exhibeantur.

Cōtra vapores metallicos, mercuriales & arsenicales Caput à ut commendatur

Vapores in capite discutiendi.

Vapores à capite auertendi.

Intemperies capitis à ut.

Caput ab odoribus repletum.

Caput à ut.



*quod in Coriandro, quodque caput immoderate sumptum instar veneni lædit, ab aceto figitur & corrigitur, ut utile ad ventriculum roborandum, concoctionem adjuuandam, cor & cerebrum mundandum fiat remedium, quod ipsa experientia testatur. Quod cum non attendunt Chymici quidam, qui oleum coriandri destillatum quasi egregium confortans exhibent, illud ipsum, quod cerebro adeo noxium esse, non sine causa scripsit P. Salius Diuersus, propinant.*

*commendatur Zedoaria; item hoc Elestuarium, de quo mane portio auellana magnitudine sumenda, & naribus quoque aliquid illinendum.*

*℞. Ally, nucum juglandium an. M.℞.*

*Contundantur & super igne cum melle despumato misceantur; addanturque theriac. optima Dra. ii. Zedoaria, garyophyll. macis an. Drach. j. F. Elestuarium.*

*De his vide Auicennam, prima tertij, tract. 2. cap. 20. 22. 23.*

*Suffragati à fumo carbonum.*

*Tandem vapores illos quod attinet, qui ex carbonibus accensis periculum suffocationis inferunt, etsi & illi intemperiem cerebri & spirituum procul dubio etiā aliquando mutant, & procul dubio narcoticā vim cōiunctam habent: tamen quia etiam replendo, & angustiam pariendo nocent, dicemus de curatione à vapore carbonum penè suffocatorum infra, c. 17. de angustia cerebri.*

*Quantum ad curandi rationem attinet, danda opera, ut quāprimum illi vapores discutiantur. Itaque æger statim in aërem liberum deducendus vel deportandus est, & aliqua vitæ aqua præstans, quæ vapores illos discutiat, adhibenda, cui aliquid theriacæ addi potest. Hinc vomitorium cum oxymelite exhibendum, & tandem sternutatorium naribus inflandum & oleum destillatum, vel balsamum rutæ, saluæ, vel aliquid simile naribus inungendum; neque omittendæ reuulsiones per clysteres, frictiones & similia.*

#### *Diatæ.*

*Abstineat æger à cibis flatulentis, & iis omnibus, quæ caput replere possunt, & supra, c. 1. proposita sunt. Si causa aliqua euident, quæ humoribus & spiritibus in capite & corpore commotis, vapores & flatus excitauit, adsit, ut Solis radij & æstus, motus violentus, ira, vini potentioris vsus, odores vehementes, capitis agitatio, inspectio rerum, quæ velociter mouentur: causæ hæc omnes remouendæ sunt. Caput muniendum à frigore, ne vapores concludantur & retineantur; fugienda crepusculi aura, & venti australes, ærque nebulosus & crassus, lunæ ac Solis radij. Si à pituita sit flatus, cibi condiantur flatus discutientibus. Alius seruetur aperta, cœna sit frugalis, & post cibum non bibatur, nec à cœna statim dormiatur. Nihil enim æquè caput replet ac somnus & potus post cibum. A cibo studia grauiorque negotia ac æriæ cogitationes omittantur, ira & tristitia vitetur. Caput sit quietum, nihilque capite inclinato agendum vel adspiciendum.*

#### *Q V Æ S T I O.*

*An coriandrum ad suppressendos vapores è ventriculo adscendentes sit usurpandum?*

*Apud plerosque Practicos ad suppressendos vapores è ventriculo adscendentes & coctionem ventriculi adjuuandam coriandrum dari, notissimum est. Sunt tamen quidam, inter quos P. Salius Diuersus, in annotat. in Alim. cap. 18. qui ejus vsum improbant, ideo quod non tantum non prohibeat ascensum vaporum ad caput, sed & suā naturā maximè caput petat, vapores alios secum ad caput ducat, & si largius sumatur, delirium inducat, ut Dioscor. lib. 6. cap. 9. docet. Et de aliis quoque Coriandri facultatibus Medici discrepant, aliique calidum, alij frigidum esse putant: de quo Matthiolus, in Diosc. lib. 3. cap. 57. Verum enimvero si quis odorem, saporem, aliisque coriandi qualitates perpendat, facillè animaduertet non frigidum, sed calidum esse; de quo tamen hic controuersia præcipua non est. Verum ejus vim, quā caput petit, quod attinet, est ea, si immoderate sumatur, cum croco, nuce mosch. thure & similibus ei communis. Moderatè tamè sumptum propterea non rejiciendum, præcipuè præparatum. Vaporosum enim illud & volatile, ut loquuntur Chymici,*

*quod est in Coriandro, quodque caput immoderate sumptum instar veneni lædit, ab aceto figitur & corrigitur, ut utile ad ventriculum roborandum, concoctionem adjuuandam, cor & cerebrum mundandum fiat remedium, quod ipsa experientia testatur. Quod cum non attendunt Chymici quidam, qui oleum coriandri destillatum quasi egregium confortans exhibent, illud ipsum, quod cerebro adeo noxium esse, non sine causa scripsit P. Salius Diuersus, propinant.*

#### *CAPVT VIII.*

*De Intemperie Capitis cum Sanguine seu Plethora.*

##### *Causa.*

*Intemperies hæc calida & humida est, qualis sua natura est sanguis: Ad sanguinis autem in capite copiam cumulandam faciunt omnes plethora & sanguinis in corpore abundantie causæ, quas lib. 2. Institut. part. 2. c. 3. recensuimus. Ad caput verò copiosius fertur & attrahitur sanguis calore, dolore, ira, mentis nimia intentione, corporis exercitatione nimia, vini generosi potu, acerbis calidisque fumis & odoribus, & facilius affluentem sanguinem caput admittit, si laxius sit vel debilius.*

*De Intemperie capitis cum sanguine.*

##### *Signa Diagnostica.*

*Adest capitis grauitas & tensio, præcipuè flante austro; vasa in capite distenduntur, oculi & facies inflantur, rubent, venæque in iis conspicuæ sunt; calor capitis mitior est: quæ omnia certum signum exhibent, modo non ab alia causa externa proueniant. Nam ira & erubescencia, corporis item motus vehementior, potus vini potentioris, febris, calor externus, balnea, & quæcunque alia sanguinem calefaciunt & fundunt, eum ad exteriora monere possunt, licet sanguis in corpore non abundet. Contra timor, mœstitia, externum frigus, sanguinem, quamuis ille subsit multus, ad interiora reuocant. Ut igitur certum ex calore & colore corporis & capitis peti possit signum, expectandum, secundum Galeni consilium, donec animi & corporis motus sedentur, antequam feramus inde aliquod iudicium.*

*Signa sanguinis in capite abundantie.*

*Notandum & hoc, etsi interdum sanguis in capite non peccat, sed alius humor, bilis, pituita, melancholia: tamen si à tali humore dolor diuturnior excitetur, fieri potest, ut doloris occasione tenuior sanguinis pars ad caput attrahatur, ad cuius præsentiam rubeat & caleat. Verum symptomata isthæc tum non sunt diuturna, & quis humor adsit, ex aliis quoque signis discernere non difficile est.*

*Sanguinis etiam in cerebro copia interdum somnum longum, interdum deliria, eaque cum risu & hilaritate aliqua, insomnia cum spectris & visis rubris: si tamen sanguis est tenuis, in vigilias propensionem excitat, & proinde modo in somnum ruunt, modo mox expergiscuntur; pulsus artiarum in temporibus magnus est & plenus.*

*Dolor, qui adest, magis in parte anteriore percipitur, & præcipuè ab hora nona noctis vsque ad tertiam diei; nonnunquā & sanguis è naribus effunditur: vrina, si in toto simul sit plethora, sit saburra & crassa: excrementa, quæ à cerebro proueniunt, probè cocta sunt, moderatè crassa, non salsa, sed potius dulcia. Præcessit victus ratio sanguini copioso gignendo apta, cōsuetæ sanguinis euacuationis suppressio; ætas & temperamentum ad sanguinē copiosū gignendum apta sunt, & aliæ plethora causæ præcesserunt. Ab euacuatione sanguinis æger melius habet, ut & inedia & victus ratione frigidior. Nocet satietas, crapula, ebrietas, sanguinis euacuationis consuetæ suppressio, & capitis ac totius calefactio.*

# 284 De intemper.cap.cum sanguin.seu plethor.

## Prognosticum.

Non contemnendum hoc malum est, sed statim cunctandum; etsi sit sine febre: quia facile sanguis in ista plenitudine extra vasa lapsus inflammationem cum febre, vel graues capitis dolores, vel alias graues affectiones inducere potest. Et si pulsus inualecat, inflammationem instare indicio est.

## Indicationes.

Sanguinis copia est imminuenda, & si is ab inferioribus ad caput mittatur, est reuellendus, repellendus, interceptiendus; qui influxit, deriuandus, euacuandus & discutendus. Intemperies verò ipsa contrariis alteranda. Vnà saepe ramen operâ & sanguis repelli, & intemperies emendari potest.

## Curatio.

Plethora in capite curatio.

Premisso ergo clystere, vel aluum leniente medicamento, sanguis imminuendus & reuellendus. Cum verò quæ sanguinem euacuant & imminuunt, vt & reuellunt, alia tardè & insensibiliter, alia subito & sensibiliter id faciant, vt lib. 5. Institut. part. 2. sect. 1. cap. 16. dictum; qui verò à sanguinis copia in capite fiunt morbi, aut statim in principio sint magni, aut in magnos morbos transire facile possint; imminuentis periculi ratio subitam requirit sanguinis euacuationem, qualis sit venæ sectione, modò vires ferant.

Itaque aperiatur cephalica vel dextra, vel sinistra, prout secundum hanc vel illam capitis partem maior molestia percipitur, vel si caput totum dolor æquè occupet, in dextro brachio; aut etiam mediana, aut interna, prout in toto, vel aliqua parte sanguis abundare videtur. Extrahatur autè sanguis, pro ratione plenitudinis & viriū, semel, aut iteratò, vt loco alleg. dictum. Quod si ex mensium vel hæmorrhoidum suppressione sanguis ad caput feratur, maior tamen sit sanguinis copia; primum ad plethoram minuendam vena in brachio aperiatur: hinc reuulsionis gratia in malleolo secetur; si verò non ita magna sit sanguinis copia, vnà operâ sanguis imminui, & reuelli potest, venâ in talo apertâ: deturque opera, vt consuetæ euacuatio reuocetur.

Si tamen vires, ætas, & alia, quæ vires definiunt, venæ sectionem prohibeant, cucurbitulæ cum scarificatione primum lumbis, deinde scapulis & brachiis, tandè cervici imponantur: modò mensium suppressio non præcesserit; & si major sit sanguinis copia, à tibiis inchoare oportet. Sunt quidem nonnulli, qui ob solam animi mollietatem venæ sectionem renuunt, atque his quidè aliquando indulgere, & ea, quæ modò diximus, auxilia substituere possumus, modò morbus det inducias, nec ob longiorem curationem aliquod imminet periculum: si verò morbus sit acutus, & qui, si curatio protrahatur, præsens periculum minetur, nihil ægro indulgendum, sed quod Hippocrates, 4. aph. 10. de purgatione monet, etiam hic locum habet. In acutis morbis eadem die, quâ incipiunt, esse medendum: si enim differatur, morbus interim naturam superabit. Non omittantur quoque aliæ reuulsionēs per clysteres, ligaturas & frictiones extremorum, aut per lotiones crurum & brachiorum, ante cœnam institutas.

Neque inuile fuerit etiam post venæ sectionem lenies illas purgationes, præcipue bilem spectantes, ex syrupo rosarum solutiuo, manna, tamarindis &c. repetere. Etsi enim sanguinem non euacuant: tamen bilem, in quam sanguis calidior facile degenerat, tollunt, & intestina ac primas vias ab excrementis, à quibus vapores ad caput eleuantur, liberant. Inprimis viles sunt myrobalani, cum non solum bilem euacuent, sed & sanguinem alterent, vt pote quæ sunt frigida in secundo, & sicca in tercio. Quod etiam præstant, simulque euacuant & al-

terant, tamarindi, qui sunt frigidi & sicci in secundo.

Deinde ad sanguinis ad caput motum impediendum vsurpentur repellentia, potestate & actu frigida tempore æstatis, & si æger sit iuuenis: potestate verò tantum frigida tempore hyberno, & in senibus. De quibus cum cap. 1. & cap. 5. dictum sit, ea hic non repetimus.

Interceptientia etiam venis & arteriis temporum applicari possunt, vt:

℞. Mastich. Drach. iij. myrtill. corall. rubr. an. Dra. ʒ. olei myrtini Drach. ij. succi plantag. Drach. iij. cera q. s. Fiat Ceratum.

Vel ℞. boli armeni Dra. ij. mastich. Drach. i. sanguin. draconis Scrup. ij. balaustiorum Drach. ʒ.

Excipiantur albumine oui & aqua rosarum. Applicentur temporibus.

Si verò sanguis ad caput iam fluere desit, repellentibus opus non est; siquidem illum ibidem figerent & retinerent. Abstinentium quoque ab iis, si catarrhus adsit frigidus; quia ejusdem fluxum per compressionē ceteri magis commouent: atque tunc frictionibus potius à vertice ad humeros deorsum factis vtimur.

Materiam aurem, quæ influxit, quod attinet, ea euacuanda est ex capite, quod sit primò: Sensibiliter, aut venarum narium cum recentibus ramulis herbæ millefolij, flor. graminis, vel aliis folijs nonnihil asperis, vel setis porcinis referatis; (nam licet quidem etiam scalpello, vel hirudinibus apposis eas referare jubeant; tamen id tutum non est, vt postea in questione tertia, dicitur) aut venâ frontis apertâ, aut hirudinibus narium apicibus apposis, aut cucurbitulis cervici affixis: vt & erethinis ex succo betæ, majoranæ &c.

Interest tamè aliquid, quæ vena aperiatur. Nariū enim venæ apertæ euacuant ex ipso capite, quacunque parte dolor fuerit; ex capitis parte v. posteriore laboranti rectè in frontē excurrens vena incisa prodest, vt habet Hippocrates, 5. aph. 68. quæ, vt Galenus habet in commentario nō solum vacuat, sed etiā cū reuulsione vacuat, cum antè & ponè opponantur: sicut cum anterior pars capitis laborat, in occipitio vena aperta, vel cucurbitulæ adnotæ profunt. Laudantur & incisiones venarū, quæ sunt in temporibus; in dextro quidè latere, si sinistra pars sit affecta; in sinistro, si dextra. Nonnulli venas, quæ ex vtraque parte colli ascendunt, & Arabibus Guidez dicuntur, aperiunt, & in extremis à sanguine ortis in capite morbis præsentaneum remediū esse scribunt. Et procul dubio plurimū cōmodi afferret harū venarū sectio, si non periculū immineret, quod ob amplitudinem, & quia in valida spiritus retentione, & vocis intentione admodum tument, ægrè sanguis sisti possit. Itaque tutius est, minores ipsius ramos, cutè capitis in temporibus & fronte perreptantes, vt modò diximus, aperire. Licet & venas sub lingua aperire, quæ jugularis interioris os perreptatis sunt propagines. Galenus, Aërius, Paulus Aegineta, Auicennas & antiqui plerique, si sanguis calidus & vaporosus in capite morbi diuturnum, qui aliis remediis nō cedit, exciter, secare jubet arterias, quæ in temporibus, in fronte, & post aures sunt: eas scilicet, quæ raso capite si rāgatur, calidiores apparēt, & pulsus majore excitant, de quo postea, quæst. 3. plura dicentur.

Secundo: Insensibiliter euacuant discutientia & resoluentia. Itaque post principiū addenda resoluētia repellentibus vsque ad statum in declinatione sola resoluentia, sed moderata, cum intemperies sit calida, cōueniūt. Discutiunt autè medicamēta ex flor. chamæm. meliloti, sem. althææ, lini, fœnigræci. Nonnulli pulmones animalium recenter maceratorum in aq. calida, vel decocto chamæmeli, meliloti, anethi applicant: alij etiam carulos vel pullos columbarum per medium discissos. Verum hæc sæpius permutanda sunt; cum faciliè corrumpantur, & corrupta prauum odorem exspirent.

Dum hæc sunt, non negligenda caput alterantia, qualia supra, de Intemperie capitis calida sine materia, proposita sunt, iisque si intem

Repellentia sanguinem ad caput fluentem.

Interceptientia.

Sanguinem ex capite euacuanda.

Quæ vena in capite aperienda.

intemperies quædam reliqua sit, ea corrigenda. E quibus eligenda ea, quæ refrigerant & minus humectant, vitroia, plantago, santalum, margaritæ, corallia, & eorum solutiones.

Caterum si his præstitis capitis grauitas & dolor adhuc perseveret, indicio est, sanguinem amplius purum non esse: sed bilem vel melancholiam admistam; cum sanguis copiâ peccans facile inflammetur, & quod subtile est, in bilem, quod crassum, in melancholiam vertatur. Itaque reliqua curatio ad bilis & humoris melancholici præparationem, & purgationem dirigenda de qua postea.

#### *Dietæ.*

Victus ratio & intemperiei calidæ & humidæ, & plenitudini sit contraria. Aër sit moderatè frigidus, in passivis parùm declinans ad siccitatem, qui si talis non datur, parandus, ut supra, cap. I. dictum. Vitentur venti, præcipuè austrini. Cibus sit refrigerans, & tenuior, vergens ad siccitatem, & vitentur ea usque ad declinationem, quæ plenius nutriunt, ut ovo sorbilia, & carnes, quæ multum nutrimenti præbent, ut pulli gallinacei, gallinæ, capri, carnes vitulinæ, hædinæ, veruecinæ. Vitentur quoque lac, & omnia cum lacte parata, ac multò magis ea, quæ ad caput effumant, idque vaporibus replent; quales sunt fructus oleosi, cœpe & similia, supra, cap. I. proposita.

Conceduntur hordeata, pisces saxatiles, pruna, & huius generis alia: cibi condiantur refrigerantibus, supra, cap. I. propositis. Vino planè abstinendum, aut tenue aquosum oligophorum aut dilutum bibendum, aut aliquid aquæ superbibendum; ita enim vapores supprimuntur; aut bibatur cereuisia tenuis, vel ab assuetis aqua. In prima mensa quæ aluum lubricam reddunt, ut pruna Damascena, iuscula gallinarum aut pullorum, aut aliarum carniū, cum herbis emollientibus, spinachia, malua, borragine, lactucâ parata; in secunda verò mensa sumantur quæ ascensum vaporum prohibent, claudendo os ventriculi; ut caro cydoniorum condita saccharo, pyra cocta, vel tosta, semen coriandri præparat, saccharo obductum. Ager non valde exerceatur, vitetque iram, & animi affectiones vehementiores, & studium atque animi intentionem à cibo. Neque caput multis tegumentis inuoluatur, ne humores & vapores ab inferioribus ad superiora rapiantur. Membra inferiora fricentur post vniuersales euacuationes, somnus non sit prolixus. Aluus, ut dictum, sit lubrica, ne ab excrementis in intestinis morantibus vapores ad caput eleuentur. Exemplum talis morbi curati est apud Forestum, lib. 3. obs. 9. & seqq. usque ad 13.

#### QVÆSTIO I.

*Quanam vena in capitis affectibus aperienda sit?*

Non idem hac de re sentiunt Medici. Galenus equidem, quem reliqui Græci sequuntur, ut è lib. de curand. rat. per vena sectione, c. 7. & albi passim videre est, venam humeralem seu cephalicam dictam, modò in conspectum veniat, aperiendam censet: Auicennas verò & alij Arabes non sine distinctione hanc rem definiunt. Si enim abundantia sanguinis, quæ morbum in capite parit, solum in capite sit, & partibus capiti vicinis, aut etiam in reliquo corpore fuerit, iam tamen ad partem affectam omnino affluerit, neque metus ullus amplius sit, ex reliquo corpore sanguinem ad caput affluxurum, solas venas capiti proprias incidendas docent, ut venam frontis, vel in occipite, vel post aures cucurbitulas apponendas censent. Si verò etiam in reliquo corpore sanguis abundet, & fluxus adhuc duret, vel san-

guinis fluxus metuatur, tunc venam cephalicam aperiendam existimant, quâ apertâ & partes capiti vicinæ euacuentur, & sanguinis ad caput affluxus reuellatur: vel etiam si viscera & partes infimi ventris sint repleta, basilicam aperiendam putant, quæ, ut Galenus, 4: de rui. vict. in acut. docet, præcipua membra, quæ infra collum & claviculam sunt, facilius & expeditius euacuat. Quòd si & caput & inferiora repleta videantur, venam, quæ media seu mediana dicitur, secandam statuunt, quæ ex coalitu humeralis & axillaris fit, & caput, ac sub eo partes, euacuare potest. Auicennas hoc præterea addit, si plus euacuare voluerimus, venam prope talum vel saphenam secandam esse. Mesues etiam in omnibus capitis morbis hæmorrhoidum prouocationem plurimum posse scribit.

Et omnino distinctione hic quadam opus est, & quid leges euacuationis ex toto, quid reuulsionis, & ex parte affecta euacuationis requirant, attendendum. Etenim in principio morbi non solum ad caput, sed etiam ad totum corpus, & partem, à qua fit affluxus sanguinis, respiciendum, & ita venæ sectio instituenda, ut capiti proximis, non noceamus, id est, sanguinis ad caput affluxum prohibeamus. Ideoque in principio talis vena aperienda, quæ simul sanguinem abundantem possit euacuare, & à capite reuelleret: nullo verò modo vena in ipso capite in principio aperienda: sed si plenitudo proueniat ab hepate, & partibus ad illud attinentibus, & sit in toro corpore, vena interna vel mediana statim aperienda.

Si verò à mensium vel hæmorrhoidum suppressione sanguinis abundantia & capitis morbus proueniat, quæ vena primùm aperienda sit, autores dissentiant.

Alij enim statim in principio, dum fluit adhuc sanguis, venas in cruribus & pedibus secandas, aut loca illa scarificanda putant; cum, si in partibus superioribus vena aperiatur, sanguinis motus ad caput magis concitetur. Alij plenitudinem primò demere, venâ communi in brachio apertâ, postea sanguini motum ad inferiora reuocare, venâ in pedibus sectâ, iubent.

Verum hinc quantitas sanguinis abundantis, & morbi capitis hinc dependentis magnitudo attendenda. Etenim si sanguinis copia sit minor, & morbus det inducias, venas in pede primùm, & quidem sæpius, si opus sit, aperire licet; cum venæ hæc & sanguinem minuant, & reuellant; siquidem vena vbicunque aperta sanguinem imminuere potest. Cum verò hæc venæ in pedibus, ut minores, sanguinem tardius euacuent: si magna sit eius copia, & morbus vehemens, ac præsens propterea auxilium requiratur, in cubito vena primùm aperiri potest, seu externa, seu mediana. Hinc deinde danda opera, ut naturalis fluxus iterum concilietur. Si verò in toto corpore nulla, vel non magna sit sanguinis abundantia, affluxus tamen eius ad caput metuatur, statim cephalica aperiri potest. Tandem verò & corpore euacuato, & fluxu cessante, nisi malum celsit, venas in capite aperire licet. Videatur & Iachinus, in 9. Rhaf. cap. 3. Inualuit quidem apud vulgus, & apud tonsores nostros opinio, in affectibus capitis plurimùm prodesse venæ, quæ est inter pollicem & indicem, quam ideo cephalicam appellant, sectio. Verum nullis fundamentis ista opinio nititur. Nam nullus ramus ex cephalica ad manum tendit, sed omnes rami venarum in manu sunt vel rami basilicæ, vel communis.

## QVÆSTIO II.

*An arteria in affectibus capitis à sanguine  
secanda sint?*

*An arteria  
in affectibus  
capitis ap-  
prienda.*

Veteres, ut ex Galeno, 3. de loc. affect. cap. 8. 6. de tuenda san. cap. 9. 1. de curand. ratione per sang. missione, capp. duobus ultimis, Aëtio, Aegineta, Avicenna, Rhase videre est, ubi sanguis calidior & feruidior ad caput fertur, & in eo abundat, & sæpe diurnos capitis dolores, vertiginem & alia mala diurna, quæque aliis remediis non cedunt, excitat, ad arteriarum sectionem, tanquam præsentissimum remedium, accedere solebant. Et quidem in temporibus, infestantibus oculos fluxionibus calidis; post aures verò in vertiginosis maximè, & iis, qui diurnis doloribus capitis ac spirituosus affliguntur. Experimentique comprobatum est, post varia diu frustra tentata remedia hoc auxilij genus tandem profuisse. Verùm plerique hodie eam tentare metuunt: 1. cum nostris chirurgis ratio eas secandi non sit cognita, 2. (quæ duæ rationes etiam à Galeno, lib. 3. de curandi ratione per sanguinis missionem, cap. 2. attinguntur) quòd difficile sit, erumpentem ex arteriis sanguinem compescere & supprimere. 3. quòd, etiamsi sistatur, & vulnus ad cicatricem perducatur, nihilominus: *deu pro qua fiat.*

Verùm enim verò periculum & hæmorrhagiæ & aneurismatis vitari potest, si arteria tota præcidatur, ut ex Galeno, loc. allegat. cap. ultim. patet. Alias enim, ut Galenus, 5. meth. med. cap. 7. docet, difficulter sanguis sisti arteriâ secta potest. Platerus prius etiam arteriam denudare iubet, ut ligari postea possit. Sed nec planè impossibile est, etiamsi tota non disseccetur, sed sic ut vena aperiatur, sanguinem sistere, modò deligatio rectè fiat, neque ea citò soluiatur, ut Ambrosius Paræus, lib. 16. chirurg. c. 4. docet, qui in diurnis capitis affectibus, à sanguine feruido, tenui & vaporoso, istam sectionem non solum in seipso, sed & in aliis feliciter & cum commodo instituit. Verùm nisi aliis omnibus frustra tentatis, ad hanc sectionem non accedendum. Diligenter etiam perpendendum est, quibus in casibus ea necessaria sit. Plerique statuunt, id tentandum esse, cum certi sumus, causam in arteriarum sanguine spirituofo esse. Idque ex arteriarum pulsu vehementiore & calore ad tactum agnoscitur: id quod verum etiam esse credimus. quanquam enim multa hac de re argutetur Theodorus Collado, in obseru. in Holler. methodum, cap. 9. & probare conetur, primò, aliquem dolorem capitis ac oculorum pulsatilem, etiam materia fluente per arterias exteriores, non requirere hoc remedium, imò id, si adhibeatur, malum esse; secundo, in aliquo affectu seu dolore capitis aut oculorum, cuius materia fertur per venas & arterias internas, arteriotomiam vrilem esse: tamen quæ affert non magni momenti sunt. Ludit enim procul dubio æquiuocatione doloris pulsatis. Neque enim credo, Hollerium, cum dicit, in omni dolore capitis pulsatili singulare remedium esse arteriotomiam, dolorem pulsatilem propriè dictum intelligere, qui est proprius partium inflammarum, ubi ob partes inflammas tenas pulsatio arteriæ vehementior percipitur, sed eum, qui sit sine inflammatione, cum scilicet ob sanguinem arteriosum, spirituosum & flatulentum, qui dolorem capitis diurnum excitat, arteriæ in temporibus vehementius pulsant, & tactæ calidiores percipiuntur, qui dolor sæpe tam pertinax est, ut nisi secta arteriâ vix tolli possit. Neque, quod se demonstraturum promittit, demonstrat Collado, scilicet aliquem dolorem etiam materiâ fluente per arterias externas non requirere hoc remedium; sed hoc probat, aliquem dolorem esse pulsatilem, materiâ non existente intra arterias, sed etiam aliquando intra venas: & ita concedit, materiam tum non existere intra arterias, sed venas; cum tamen se demonstraturum promiserit, ma-

teria intra arterias existente aliquando arteriotomiam non solum inutilem, sed etiam noxiam esse. Alterum quod attinet, contrarium statuit Galenus, & non ob quoluis capitis affectus arteriotomiam instituendam, sed ob eos solum, cum sanguis feruidus per arterias externas fertur, clare docet, 3. de loc. affect. cap. 8. cum scribit; *Non omnes huius auxilij beneficio fuisse curatos, eos nimirum, ubi vapor ille spirituosus per arterias internas ad caput adscendit.* Addit enim: *Etenim alia arteria iis maiores ad cerebrum ex ipsius basi per retiformem plexum adscendunt,* per quas huiusmodi affectionem fieri consentaneum est, elato per ipsas vaporoso calidoque spiritu.

## QVÆSTIO III.

*An venas narium scalpello vel hirudinibus  
aperire liceat?*

Plurimi quidem Medici etiam venas narium scalpello & hirudinibus aperire iubent, sed neuter modus tutus est. Nam cum venæ illæ visui non pateant, quâ ratione etiam scalpello aperiendæ sint, Chirurgus non videre, & facillè hic aliquid peccare, neque etiam vulnus ita obligari potest, sicut in venis subcutaneis. Refertque Alexander Benedictus, in Proem. lib. 14. præf. tonsorem quendam in naribus pilos incautè tondentem venulam secuisse, nec còtinuato sanguinis profluvio sistendi modum fuisse, ita, ut sequenti die vulneratus expiraret. Neque est, ut quis arteriam vulneratam dicat. Id ipsum enim satis in naribus cauere non potest chirurgus, nec discernere, an venam vel arteriam fecerit. Imò, ut ibidem monet Alexander Benedictus, in toto corpore venæ & arteriæ orificiis conueniunt. Multò minus tutum est, hirudines naribus immittere; cum facillè penitus irrepere & pertinacius hære queant, ut non facillè extrahi, ac magnæ hæmorrhagiæ causæ esse queant: cuius rei exemplum annotauit Herc. Saxonia, lib. 1. præf. c. 2. de quodam Particio Veneto, cui hirudo naribus apposita adscendit in caput, ita, ut nullo modo vel extrahi vel necari posset, vnde æger nimia sanguinis effusione extinctus est. Et simile quid etiam Venetiis accidisse refert.

*An venas  
narium scal-  
pello vel hi-  
rudinibus  
aperire li-  
ceat.*

## QVÆSTIO IV.

*Cui loco cucurbitula reuulsionis gratia sint  
applicanda?*

Diximus cucurbitulas scarificatas, venæ sectionis vicarias, primò lumbis, deinde scapulis & brachiis, tandem cervici imponendas esse. Contrarium sentire videtur Platerus, dum, præf. tract. 2. p. 257. scribit: Cucurbitulas colli lateribus, summo humero, scapulis, brachiis, coxis, suris, natibus quoque applicandas esse: sensim à superioribus versus inferiora cucurbitularum applicatione procedendo, repetendòque eodem, vel etiam sequentibus diebus: adhibita postmodum scarificatione, si validius à parte trahere velimus.

Verùm nulla est hîc repugnantia. Nos enim tantum de cucurbitulis scarificatis locuti sumus, quas meritò primo partibus remotioribus applicamus. Platerus verò & de scarificatis & non scarificatis loquitur, & non scarificatas primo loco propinquo applicat, hinc sensim remotiori, ubi demum & ultimò scarificationem adhibet, atque ita non scarificatis saltem sanguinem versus locum scarificandum deducit,

*Cui loco cu-  
cubitula in  
affectibus  
capitis appli-  
canda.*



## CAPVT IX.

## De Intemperie capitis cum Bile.

## Causæ.

**I**ntemperies hæc calida & sicca est, bilēque coniunctam habet: quam quæ causæ generent, in Institut. lib. 2. part. 2. cap. 5. explicatum est. Eæ autem & hic locum habent: nimirum æt calidior, anni tempus calidum, vigiliæ nimia, exercitatio corporis nimia, & vitæ genus laboribus deditum; inedia, cibi, qui facili in bilem vertuntur, vinum potens, medicamenta calida & sicca, & id genus alia. Idque facilius ista præstant, si hominis temperatura sit calidior & siccior, habitus corporis gracilis, ætas iuuenilis.

## Signa diagnostica.

Sensum mordacitatis, & dolorem acutum mordacem & pungentem ob acrimoniam & feruorem totius capitis, excitat humor biliosus: vnde caput totum calidum tangenti deprehenditur, dolorque, etsi vehemens, est sine insigni grauitate, quia suâ tenuitate poros subit, nec inflat, dolorque magis in dextrâ parte percipitur, quod procul dubio intelligendum est, cum caput ab hepate *vel iñ* afficitur. Facies pallet, vel potius flauet, & ad citrinum colorem tendit, vt & oculi. Actiones cerebri potius deprauantur, quam abolentur, vel imminuuntur. Aliter enim sæpe imaginantur, & ratiocinantur quàm par est, bilisque in cerebro abundans delirium læpe, cum quadam seueritate & iracundia, excitat; vigiliæ infestant, quas interdum leuissimus & breuissimus somnus interrumpit, obuersantur ante oculos, præsertim dum æger obdormiscit, imagines flammarum & incendij, pugnarum & dimicationis, volatûs. Excrementa cerebri sunt pauca, aurium verò multa, & flauescunt, adestque linguæ, narium & oculorum siccitas, os amarescit. Non quiescunt ægri, sed inæqualiter variè & inordinatè corpus mouent: Pulsus, si in corpore reliquo bilis abundet, est magnus, velox, frequens: Vrina citrina, ignea, & tenuis: ac symptomata, quæ coniunguntur, per periodos affligunt, & plerumque circa meridiem ingrauescunt. Refertque Iachinus, in 9. *Rhas. c. 4.* Iuuenem quendam dolorem capitis ex bile adeo grauem quotidie circa meridiem passum esse, vt fureret. Solèturque tunc accidere, sicut & in febribus, vt vrinæ tenues & aqueæ quasi mingantur, bile ad caput tendente; circa vespèram verò iterum tinguntur, dum eadem in venis humoribus permisceantur, & cum vrina excernitur.

Præcesserunt causæ bilem generantes, vt hepar calidum & siccum, ætas iuuenilis, cibi & potus ad bilis generationem facientes, & reliquæ bilem cumulant causæ. Inuiant quæ refrigerant, bilem euacuant, à capite auertunt, alterant, eiusque generationem prohibent: contra nocent quæ calefaciunt, bilem generant, retinent, augent, eamque ad caput concitant. Lux etiam vehementior molesta est.

## Indicationes.

Humor biliosus est euacuandus, à capite auertendus; repellendus; si aliunde affluit. Intemperies verò tam cerebri, quàm humorum coniuncta, calida & sicca, contrariis alteranda, caputque roborandum. Et quidem si febris adsit, coctio prius expectanda; nisi materia rugeat: si verò febris absit, quocunque tempore purgationem exhibere licet, modò viæ apertæ sint. Hæ enim si apertæ nō sint, aperiendæ prius, de quo in Institut. lib. 5. part. 2. sect. 1. cap. 6. & de febribus, lib. 2. cap. 6. dictum. Ideoque frustra nonnulli ad bilem di-

gerendam multa medicamenta propinant. Etsi enim illa, quæ præscribunt, medicamenta vtilia sint tamen potius purgationem, ad intemperiem alterandam, quam ante purgationem, ad bilis coctionem, quæ hic, in morbo non febrili, nulla opus est, conducunt.

## Curatio.

Iniiciatur ergo primum clyster ex refrigerantibus & emollientibus.

Vt *℞. Fol. malua, violaria, parietaria, mercurialis, beta, an. Mi. prunor. damasc. num. x. hordei M. ℞.* Coquantur in aq. simplici. Colat. *℞. lb. i. cassia vel elect. lenitini, aut diacathol. Vnc. i. olei violar. Vnc. iii. sacchari rubri Vnc. ℞. salis 3. ℞.* Fiat clyster.

Vel *℞. Malua, violar. endiu. lactuc. an. Mi. flor. nymph. P. ii. sem. quatuor. frigid. maior. Vnc. ℞. prunor. num. x. i. Coque in aqua hord. i. Colat. ℞. lb. j. flor. cassia 3. vi. elect. diacathol. Vnc. ℞. olei violar. Vnc. ii. mell. rosati colat. Vnc. j.* Fiat clyster.

Vel exhibeantur syrup. violar. aut rosar. solutiu. Vnc. ii. vel iii. cum aqua vel decoctione endiuæ, vel decocto florum & fructuum.

Vel *℞. Cassia, elect. lenitini. an. Vnc. ℞. pulpa tamarindorum 3. ii.* Cum saccharo F. bolus.

Vel in decocto aut aqua calidos humores alterante dissoluatur cassia Vnc. i. & addatur syrup. solutiu. rosar. aut violar. solutiu. Vnc. ℞. F. haustus.

Postea si bilis mista sit cum sanguine, vtilis est sanguinis missio, sed parciore, ad sanguinis copiam imminuendam, eundemque refrigerandum: mittendus etiam reuulsionis gratia sanguis, vbi inflammatio metuitur. Si verò nulla copia sanguinis adsit, nihilque tale metuat, venæ sectione opus non est. Consent autem Medici, venam potius in dextro, quàm in sinistro brachio aperiendam esse; quia sedes bilis potissimum sit in dextro latere: & aperienda est vena vel mediana vel humeralis.

Postea bilem præparantia exhibenda, quæ scilicet eius feruorem & acrimoniam attemperant, vt sine molestia per conuenientia loca euacuari possit, refrigerantia scilicet, & humectantia, è quibus cephalica eligantur. Si tamen id conditio humoris postulat aliàs, & si bilis sine villo incommodo euacuari potest, statim ad purgationem accedendum, vt antea dictum. Conueniunt ergo hic, si opus est, caput humectantia, & refrigerantia supra proposita; quibus & alia bilem præparantia, vt endiuia, acetosa, cichorium & similia miscantur. Et si bilis sit tenuior & cum multis vigiliis, lactuca, nymphæa, papauer.

*℞. Syrup. papau. Vnc. i. de nymphæa Vnc. ℞. aq. lactucæ, violar. nymph. an. Vnc. i. Misce.*

Vel *℞. Syrup. granatorum, de agresta, nymph. an. 3. vi. aq. portulac. lactuc. rosar. an. Vnc. i. Misce.*

Si bilis sit crassior.

*℞. Aq. endiu. cichor. an. Vnc. i. ℞. syrup. acetos. f. Vnc. i. endiu. Dra. vi. Misce.*

Etenim natura bilis semper perpendenda. Quò enim bilis calidior, eò fortiora refrigerantia adhibenda. Vt si bilis sit pallida, fiant medicamenta ex hordeo, cichorio, endiuia, rosis, acetosa: si flaua, & præsertim vitellina, illa scilicet ex adustione bilis pallidæ orta, nymphæa, papauer addenda: si sit visciditatis particeps, vt vitellina illa Guainerij ita dicta, quæ pituitæ aliquid admistum habet, syrup. acetosus & acerrimus addendum: de qua re prolixius agit Sauanarola, *pract. tract. 4. cap. 30.*

Obseruandum etiam hic in vsu istorum medicamentorum, quod aliàs in genere percipitur; cum dulcia facili in bilem mutantur, syrupos & alia dulcia in parua quantitate esse vsurpanda, & aquis ac decoctis refrigerantibus bene diluenda. Acida potius, præcipue vbi incisione aliqua opus est, conueniunt, & si bilis sit crassior.

Deinde

*Purgantia  
bilem in affe-  
ctibus capi-  
tis.*

Deinde purgetur humor biliosus, verum non admodum validis & calefacientibus medicamentis, quibus sanguis magis calefit, & ad superiora fertur, sed lenioribus, & quæ simul feruorem sanguinis tollunt, blandèque euacuant; qualia sunt *syrup. rosar. & violar. solutiuus*, *aloe* cui, vt fortius purget, paucillum scammonij, ad Vnc. i. s. gr. v. i. i. vel x. prout natura corporis, & humoris copia id requirit, addi potest, & Gal. *hiera picra*, *myrobalani citrin.* *tamarindi*, *manna*, cui, quia facile bileicit, refrigerantia, & quæ eius in bilem mutationem prohibeant, addi possunt; vt *syrup. rosar. solutiu.* *cremor tartari*, *aqua endiu.* *violar.* &c. *Rhabarbarum*. De quo tamen notandum, quod quidem ad bilem euacuandam vtile, & admodum familiare est medicamentum; quia tamen siccac ac fumosum est, & facile exhalat, solum non dandum, sed cum aqua endiuæ, violar. & similibus frigidis, addendusque *syrup. rosar. vel violarum solutiuus*, *electuarium lenitiuum*, *diaprunis lenitiu.* *diacatholicum*. Et fortiora, *electuar. de psyll.* *diaprunis solutiuum*, *de succo rosarum*, *pilula aggregatiua*, *aurea*, quæ vsurpanda, si bilis sit crassior & ob lentorem pertinacius adhærescat, vel pituitæ aliquid admixtum habeat:

*Hauftus.*

℞. *Specier. decocti flor. & fructuum* Vnc. s. *sem. quatuor frigid. maior.* an. Dra. i. *tamarind.* Vnc. s. Coquantur in aqua simpl. In colat. s. q. Infund. *rhabarb.* Dra. s. *cinamomi* Scr. s. *spica* gr. vi.

Colat. ℞. Vnc. iiii. in iis dissolue *manna* Drach. vi. vel Vnc. i.

Iterum colentur. Adde *syr. rosar. solutiu.* Vnc. s. Fiat *Hauftus*.

Decoctum etiam vel syr. flor. & fructuum hic, quod bilis feruorem reprimat, sanguinem mundat, & bilem leniter educit, vtilis est.

*Syrupus.*

℞. *Prunor.* num. xl. *juubarum*, *sebesten.* an. num. xxx. Coque in aq. ℞. iiii. ad remanentiam ℞. i. In colatura dissolu. *pulpa tamarindor.* *cassia extract.* an. Vnc. iiii. *manna* Vnc. i. Si libet, adde saccharum. Fiat syrupus pro iiii. dosibus, quarum quælibet scammonij gran. iiii. acuat.

Vel ℞. *Rhabarbari* Scr. iiii. *cinamomi* Scr. i. *flor. cordial.* P. ii. Infundantur in aq. endiuæ.

Colat. ℞. Vnc. iiii. s. In iis dissolu. *pulpa tamarind.* *el. de succo rosar.* an. Dra. ij. *syrup. violar. solut.* Vnc. s. M. Delicatis talis Bolus exhiberi potest.

*Bolus.*

℞. *Conseru. violar. vel rosar. cum manna parata* Vnc. s. *extracti scammonij* gran. vi. vel *diagrydy* Scr. s. *cinamomi*, *macis*, *mastiches*, an. gr. iiii. Fiat Bolus.

Vel ℞. *Cassia* Vnc. s. *elect. rosar.* Mef. Dra. i. *rhabarbar. elect.* Scr. ii. *spic.* gran. vi. *trochisc. de viol. cum scamon.* Scr. i. Cum sacchar. Fiat Bolus.

*Puluis.*

℞. *Rhabarbari* Dra. s. *spec. diaturbith.* cum *rhabar.* Scr. i. *diagrydy* gr. iiii. *macis*, *santal. citrin.* an. gr. iiii. Fiat Puluis.

Et quidem hols & liquidis medicamentis bilis commodius purgatur; cum iis refrigerantia & humectantia commiscere liceat, pilulæ verò magis siccant. Si tamen alicui pilulæ arident, & præcipue si bilis sit crassior, tales exhiberi possunt.

*Pilula.*

℞. *Pilul. aggreg.* Scr. ii. *de rhabarbar.* Scr. i. *diagryd.* gr. iiii. cum aq. endiu. Fiant pil. xx. i.

Vel ℞. *Rhabarb.* Dra. s. *spica* gran. iiii. *specier. hiera f.* Scr. i. *agarici trochisc.* Scr. s. *diagrydy* gr. iiii. Cum syr. violar. Fiant Pil. xxv.

Notandumque hic illud, quod Galenus, lib. 1. nat. et. cap. 2. monet, in omni capitis morbo, à quocunque humore fiat, admiscenda esse phlegmogoga.

*Clyster.*

Clysteres etiam refrigerantes & humorem biliosum euacuantes sæpius iniicere vtile est.

Vt ℞. *Malua*, *althæa*, *violaria*, *parietaria*, an M. i. *hordei* M. s. *semin. quatuor. frigid. maior.* ana ʒ. iiii. *prunor.* num. x. Coquantur in aqua simplici.

Colat. ℞. ℞. j. *cassia pro clysteribus* Vnc. i. *elect. de psyll.* Vnc. s. *olei violacei* Vnc. ii. *mellis rosati colati* Vnc. i. *salis* Dra. i. Fiat Clyster.

Si bilis ad ventrem confluat, atque inde vapores ad caput eleuentur, ægerque ad vomendum facilis sit, vomitoria etiam lenia exhiberi possunt. Si verò æger ad vomendum difficilis sit, ne caput magis repleatur, omittenda vomitum cientia, & bilis per aluum educenda.

*Vrinam  
cientia.*

Neque solum ista electiue purgantia vsurpanda, sed & ea, quæ abstergendo potius eandem cum per aluum, tum vias vrinæ educunt qualia sunt decoctum lupuli in sero lactis, & fumaria cum sero lactis exhibita.

Postquam humor biliosus ita euacuatus, qui restat, alterandus, & intemperies inducta corrigenda contrariis, frigefacientibus scilicet & humectantibus, supra, cap. 1. & 4. propositis, quæ hic repetere opus non est. Quibus & alia ad bilem temperandam vtilia addere licet, vt *dentem leonis*, *sonchum*, *portulacam*, *syrup. de portulaca*, *de aggregata*, *oxysaccharum*, & si vigilie infestent, præcipue vsurpanda *lactuca*, *nymphaea*, *papauer*, & ex iis parata medicamenta. Simul etiam & postquam humor biliosus per aluum aliquo modo euacuatus fuerit, ab initio etiam hic repellentia conueniunt, quæ supra de intemperie capitis calida & à plethorâ proposita sunt. Et licet repellentibus opus non sit: refrigerantia tamen adhibeantur tum interna, tum externa, cap. 1. proposita. Inter quæ odoramenta reliquis præferuntur, quod satis refrigerant, exitum tamen vaporum è capite non prohibent. Topica, quæ adhibentur, non sint humida, & & sanguinem ad putrefactionem disponentia, sed eligenda astringentia, succ. granat. berber. Ideoque Forrester, lib. 9. obseru. 12. sacculis potius, quam lotionibus vtendum censet.

Camphora tamen hic, quia siccac, & vigilias inducit, vel omittatur, vel cautè adhibeatur; cum somnus in hac intemperie capitis commodissimus sit. Ideoque & quia bilis siccac, & plerumque vigilias inducit, somnum conciliantibus sæpe opus est, vt lotionibus pedum, medicamentis, quæ acrimoniam bilis retundunt, & cerebrum humectant, ex foliis lactucæ, flor. violar. capribus & seminibus papaueris, & similibus, de quibus suo loco dicetur.

*Camphora  
in affectibus  
capitis.*

Neque omittantur reuulsiones per cucurbitulas si ne scarificatione, per frictiones, ligaturas, lotiones extremorum. Vtile etiam hic est balneum aquæ dulcis.

Hinc particulares euacuationes instituantur. Apoplegmatisimi quidem pituitæ propriè conueniunt. Masticari tamen & hic possunt grana mastiches cum passulis, & salua crebro expui. Et si aliquid pituitæ admixtum sit, aliquot grana piperis vel cubebæ, vel parum cortic. radic. çappar. addi potest. Errhina parentur ex succo betæ; aqua tamen hordei admixta. Vel fiat Gargarismus ex decocto hyssop. hordei & oxymel. simpl.

*Euacuatio  
bilem à ca-  
pite.*

Vel ℞. *Succi rosarum* Vnc. ii. *diagryd.* ʒ. i. *extract. rhabarb.* Scr. i. *succi betæ* Vnc. iiii. *mellis* q. s. F. Errhinum.

Vel ℞. *Succi rosarum* Vnc. s. *diagryd.* Scr. i. *mellis* parum. Misce.

Vel *Scammoniam* aut *elaterium* cum lacte misceatur, quod naribus attrahatur.

Vel ℞. *aq. maioran.* Vnc. ii. *manna* Vnc. sem. Misce.

Rhabarbarum quoque vsurpare licet. Sternutatoria cum ex solis frigidis, vtpote quæ naturam sufficienter non stimulant, parari non possint, parantur, si iis opus, ex frigidis & calidis simul mistis, vt ex succo violarum vel rosarum, quibus aliquid piperis aut helleb. addi potest. Aut vapor aceti, in quo castoreum dissolutum sit, naribus attrahatur.

Et si bilis sanguine permixta sit, sanguisque biliosus, tenuis, feruidus ac vaporosus mali causa sit, ad arteriarum

seriatum sectionem, aliis remediis non iuuantibus, accedere quoque necessarium est, de qua *capite precedenti* dictum.

Tandem etiam digerentia ex chamæmelo, meliloto, sem. lini, scæni græci adhibenda; vt & vnguentum alabastrinum, eodem modo, vt in Intemperie cum sanguine, de quo postea etiam, *in questione*, dicitur. Et quia cochlearum caro citra calorem redundantem humorem euocat, etiam hic nonnulli cataplasma, quod paratur ex cochlearum carne confusa, cum modico thuris commendant.

### Diatæ.

Ær, in quo æger degit, sit frigidus & humidus, vel talis arte pareatur, vt supra, c. 1. dictum. Victu vtatur æger refrigerante & humectante, supra, eodem *capite*, proposito & descripto, quo generatio bilis prohibeatur, & genita temperetur. Abstineat vino, potusque assuetis aqua cocta & præparata, vel aqua hordei aut cereuisia tenuis. Assueti cubitum ituri haustum aquæ frigida bibant. Somnus sit longior: perturbationes animi & corporis motus vehementiores, vt & inedia, vitentur.

## QVÆSTIO

*An in Intemperie cum humore bilioso etiam locum habeant discutientia & resoluentia.*

Videntur quidem minus conuenire discutientia, 1. Cum sint calida, & intemperiem augeant, ac faciliè putredinè humori inducere possint. 2. Quia attrahere valent humores ad caput. 3. Quia bilis spontè & faciliè exhalat, & vix vllas sui reliquias in capite relinquit.

Verum enim verò in declinatione non sunt planè omittenda discutientia. Si enim locum habent in inflammatione, vt docet Galenus, 1. 3. m. m. c. 6. 8. & 9. & 1. ad Glaucon. c. 1. 5. & 2. nat. m. c. 2. omnino etiam in humore bilioso adhiberi possunt. Tantum verò abest, vt intemperiem augeant, vt potius refrigerent. Digerentia enim, vt vult Galenus, 1. de simpl. medicam. facult. c. 4. & 2. ad Glaucon. c. 2. refrigerant ex accidente, quatenus materiam calidam discutunt. Neque metus est attractionis; cum non nisi vniuersalibus præmissis, & post vsum repellentium adhibeantur; vbi verò metus adhuc est de affluxu, compositis ex repellentibus & discutientibus vtendum. Et quanquam humor biliosus sit tenuis & faciliè exhalet, tamen faciliè fieri potest, vt in capite hærens crassescat, & hinc non totus exhalet. Intetum non diffiteor, cautione opus esse in discutientibus in hac intemperie adhibendis, videndumque esse, ne istis intemperies calida augeatur.

## CAPVT X.

### De Intemperie Capitis cum Pituita.

#### Causa.

*De Intemperie capitis cum pituita.* QVæ cum pituita coniuncta est intemperies, frigida & humida est. Generatur autem & cumulat pituita in cerebro hyeme, & cōstitutione æris frigida, locisque palustribus & vlginosis, ætate senili, in primis vbi cerebrū frigidius & humidius est, vel à morbo aliquo, aut nimia Venere, aut immoderato sanguinis è naribus fluxu, debilitatū est, aut ob meatuū angustia, excrementorum crassitie, facultatisque expultricis debilitatē excrementa expellere non valet. Aliunde verò ad caput transmittitur, si in vniuerso corpore, aut determinata aliqua parte abundet, & causæ accedant, quæ ipsā ad caput allicere valēt, vt dolor capitis, calor, & similia.

Dan. Sennerti Tom. 11.

Non parum etiam sæpe ad hanc intemperiem geherandam facit hepar calidum & humidū, à quo sanguis vaporosus materiam multis vaporibus, qui in caput eleuantur, præbet, quæ ibi hærentes cerebrum debilitant & materiā pituitæ præbent. Et omnino huc faciunt causæ omnes pituitam generantes, lib. 1. *Instit.* enumeratæ.

#### Signa Diagnostica.

Adest capitis grauitas & tensio, sensuum cum internorum tum externorum inertia, mentisque stupor & tarditas, in somnum propensio, idem est longior & profundior; nisi moror & sollicitudines, vel aliæ causæ intertrumpant, ac vigilias excitent. Somnia sunt de rebus albis, aquis, pluuiis. Cælo sereno melius habent ægri; nubilo, & aëre frigido habent peius: circa Lunæ *quartæ* peius: Lunā ab aspectu Solis vacuā melius. Si tamen in parte capitis anteriore pituita abundet, soporosus magis affectus extat; si in medio vel posteriore, fatuitas & memoriæ læsio magis excitatur.

Os saluā multā humet, lingua est mollis, sitis adest nulla, & pituita copiosior è naribus & per palatum excernitur, quæ sapore est vel dulci, vel acido, vel salso, pro natura & differētia pituitæ. Facies pallet, nisi forsitan doloris vehementia aut diuturnitate tenuior sanguinis pars ad caput rapiatur, cuius præsentia id rubeat & caleat; oculi subtrahunt. Caput si tangatur, non est ita calidū, sed potius frigidum, & quod non nisi tegumentis multis adhibitis calefieri potest. Nonnullique conqueruntur, se frigiditatē instar niuis & glaciei in capite percipere. Molestia, quam parit, sæpe magis in occipite sentitur, præsertim iis horis, quibus pituita dominatur, & tertia scilicet hora noctis vique ad nonam. Vrina, si simul in reliquo corpore pituita abundet, est cruda, crassa, alba; pulsus paruus, mollis, tardus, rarus; affectus, quinde excitatur, est diuturnus. Quod si cum his tēperamentum ægri, ætas, anni tempus, æris constitutio, diætæ præcedens, & omnino causæ, quæ caput frigefacere & humectare, ac pituitam in eo cumulare solent, consentiant, certiora omnino erunt ista signa. Iuuant quæ pituitam alterant & euacuant, caputque calefaciunt & siccant; nocent quæ pituitam nimium augent, caputque frigefaciunt & humectant.

#### Prognostica.

Intemperies hæc curatu non ita facilis est, & sæpe in stuporem, paralyfin, apoplexiam, & soporosos affectus degenerat; & quod diuturnior est, eò difficilius curatur, vt & in corpore senili. Tempus hybernum quoque, quod morbum augeat, minus aptum est ad curationem; commodior est calida & sicca æris constitutio, qualis est æstiuæ.

#### Indicationes.

Cum intemperies tolli non possit, nisi causa prius tollatur, pituita primū euacuanda, & si ad caput moueatur, reuellenda, Intemperies verò frigida & humida per calefacientia & siccantia corrigenda.

#### Auxilia & Curatio.

Itaque sanguinis euacuatione ob pituitam equidem nullā opus est. Si tamen in reliquo corpore, quod fieri impossibile nō est, præcipuè si hepar sit calidius, sanguis abundet, cum in ætate florente vel consistente etiā detrahère inutile non est. Hoc enim modo & vaporū ad caput exhalatio impeditur, & superfluum alimentum demitur, vt natura postea quicquid crudum & pituitosū in sanguine est facilius & exactius cōcoquere possit, & medicamenta postea tutius vsurpantur. Sanguine euacuato, aut si sanguis euacuatione opus non sit, statim ad

ipſius humoris pituitofi euacuationem ſe accingat Medicus.

Primò ergo, præcipue ſi ab inferioribus humor ad caput feratur, iniiciatur clyſter.

Clyſteres enim non ſolum ex primis viis materiam ſuperfluam euacuant, ſed & à membris principalibus ſuperioribus, & maxime cerebro, humores ſuperfluos verſus inferiora trahunt. Primò talis ſufficit:

*Clyſteres.*

℞. *Malua, althæa, beta, parietar. betonic. hyſſopi, an. M. i. flor. ſtæchad. chamamel. melilòt. an. p. ii. Coq. in aqua l.*

Colat. ℞. lb. i. in qua diſſolue *hiera ſimpl. Galen. benediſt. laxatiu. an. Vnc. β. mellis anthoſati, roſat. colati, an. ℥. i. ſucci beta 3. x. olei lilior. alb. ℥. ii. ſalis 3. β. F. Clyſter.*

Vel ℞. *Rad. iroſopæonia, an. ℥. β. mercurial. beta, ſalvia, ruta, betonica, an. M. i. roriſmarin. flor. chamamel. an. p. i. ſem. aniſi, fœniculi, an. 3. ii. agaric. albi in petia ligati 3. β. Coquantur in aq. ſimplici.*

Colat. ℞. lb. i. adde *benediſt. laxat. Vnc. β. diaphanici 3. ii. mellis roſat. ſolut. Vnc. i. olei rutaceti Vnc. iβ. laurini 3. i. ſalis 3. i. F. Clyſter.*

Si in ventriculo ſit materia fluitans aut nauſeam excitans, ægèrque ad vomitum facilis ſit, vomitus conceſcetur: alias vomitus inutilis, cum caput repleat,

### Præparantia pituitam in capite.

*Præparantia  
pituitam in  
capite.*

Deinde humor pituitoſus, niſi ſit ſaluſ, cum magna ex parte ſit craſſus & viſcidus, præparandus & attenuandus inciditibus & abſtergentibus, hyſſopo, ſaluia, origano, maiorana betonica, verbenâ, quæ ſiue aſumpta, ſiue extra uſurpata in morbis capitis à materia frigida multum prodeſt, ruta, roriſmarino, ſtæchade, pæonia, matricaria, in mulieribus, & aliis cephalicis calidis, ſupra, c. 2. propoſitis, tum ſimplicibus tum compoſitis; quibus & alia medicamenta incidentia & abſtergentia addi poſſunt. Magna ex parte pituitam craſſam & viſcidam eſſe diximus. Quando enim pituita fluida eſt, & catarrhus coniunctus, ac materia euaporationi apta, quæ nimia attenuatione redderetur fluidior, & plures vapores ſuppeditaret, uſurpada caleſcientia & ſiſtentia non nihil, atq; incræſſantia, vt; *ſaluia, mentha, abſinthium, maſtiche, nuc. moſchata, nuc. cupreſſi, thui, mel roſatum, & ſimilia.* Vbi verò materia eſt frigida, craſſa, viſcida, ab attenuantibus mitioribus inchoandum; qualia ſunt oxymel ſimplex, aqua maioranæ, hyſſopi, betonicæ: poſtea ad fortiora aſcendendū, qualia ſunt oxymel compoſitum, ſcilliticum, ſyrup. ſtæchad. Arabic. aq. maioranæ, rutæ, roriſmarini, decoctū radicū pæoniæ, acori; & prout viſciditas maior, vel minor eſt, ita etiam incidentium & abſtergentium, vt oxymel ſimplicis & compoſiti plus vel minus admittendū. Omnino enim in præparatibus iſtis medicamentis hoc obſeruandū, vt à lenioribus incipiamus, ne, ſi nimis calida ſtatim initio uſurpantur, materia fundatur & morbus vehementior reddatur. Ideo Matthæus de Gradibus reprehendit eos, qui in dolore capitis à cauſa frigida à principio exhibent ſyrup. de ſtæchade, qui eſt valde calidus. Quapropter rectiſſimè fit, ſi, cum materia eſt multa, primò leniora uſurpentur, hinc pars materię euacuetur, & poſtea ad fortiora fiat progreſſus. Si pituita ſit ſaluſ, ſemper addenda cichorium, endiuia, ſcariola.

*Potiones.*

Vt ℞. *Radic. fœnicul. Vnc. β. fol. betonica. hyſſop. an. M. i. ſemin. fœnicul. 3. i. flor. roriſmarini. ſtæchad. Arabic. an. p. ii. Coquantur in aq. ſimplici.*

Colat. ℞. Vnc. vii. ſyrup. de betonica, de ſtæchad. ſimpl. an. 3. vi. oxymelitis ſimpl. Vnc. i. Miſce pro duabus doſibus.

Vel ℞. *Radic. calam. aromar. pæonia, galangæ, ana Vnc. β. betonic. ſaluia, roriſmarin. an. p. i. ſem. pæon. Vnc. β. aniſi, fœnicul. an. Drach. iii. flor. ſtæchad. Arabic. ſaluia, ſambuc. roſarum, an. p. i. Coquantur in aqua pura.*

Colat. ℞. lb. iβ. ſacchari Vnc. iii. Fiat potio clara, Quæ aromatizetur ſpecier. diamoſch. auleis Dra. i. Pro 3. vel 4 doſibus.

Vel ℞. *Hyſſopi, betonica, ſaluia, an. M. i. flor. ſtæchad. Arab. M. β. Coquantur in aq. ſimpl.*

Colat. ℞. Vnc. viii. ſyrup. de hyſſop. de ſtæchad. ſimpl. an. Vnc. i. Miſce pro duabus vel tribus doſibus.

Vel ℞. *Syrup. ſtæchad. Vnc. i. oxymel. ſimpl. Vnc. β. decocti cephalici Vnc. iii. vel iiiii. F. Hauſtus.*

Vel ℞. *Radic. fœnicul. Vnc. i. pæonia, angelic. iroſo Florentina, an. 3. β. ſaluia, maioran. betonic. calamith. hyſſopi, an. M. β. ſem. fœnicul. ſileris montani, an. 3. ii. carui 3. i. flor. ſtæchad. Arabic. anthoſ. lauridula, an. p. i. Coquantur in aq. ſimplici.*

Colat. ℞. lb. iβ. Dulcoretur ſaccharo & clarificetur, Adde aq. cinamomi Vnc. β. Fiat potus pro quatuor doſibus.

Vel ℞. *Rad. fœnicul. perroſel. an. Vnc. β. pæonia Dra. ii. betonic. hyſſopi, calamith. capill. Veneris, meliſſ. maioran. an. M. i. flor. ſtæchad. Arabic. p. i. Coq. in aqua l.*

Colat. ℞. lb. i. mellis anthoſati, ſyrup. de betonica, oxymel. ſ. an. Vnc. i. Fiat potio pro 4. doſibus, Quæ aromatizetur ſpecier. aromar. roſat. Dra. β.

℞. *Rad. fœnicul. pæon. an. Vnc. β. hyſſop. calamith. betonic. capill. Veneris, maioran. roriſmarin. ſtæchad. Arab. an. M. i. flor. ſambuc. M. β. ſem. pæon. Drach. β. Coq. in l. q. aq. puræ.*

Colat. adde mellis lb. ii. aceti ſcillitici lb. β. Fiat Syrupus, Qui aromatizetur pulueris nuc. moſchat. 3. i. Quæ conquaſſata in nodulo ſub finem decoctionis addatur, Syr. huius datur Vnc. iβ, cum aq. beton. fœnic. hyſſopi, an. Vnc. i.

Vel ℞. *Syrup. de ſtæchad. ſimpl. de betonica, de hyſſopo, an. 3. i. oxymel. ſcillit. 3. vi. aq. betonic. roriſmarin. hyſſopi, an. Vnc. iii. M. pro tribus doſibus.*

Et reliqua, quæ ſupra, c. 2. de intemperie capitis frigida ſunt propoſita.

### Purgantia pituitam è capite.

Poſtea purgatio inſtituatur agarico, turbiſh, trochiſc. *Purgantia  
pituitam è  
capite.* albandal. foliis ſena, aloë, pilulis aureis, cochiis, Arabicis, lucis, de agarico, aſſajerei, ſpeciebus diatrubiſh, electuario diaphanico. & ſimilibus.

℞. *Aloë loca cum aq. maioranæ, agaric. trochiſcat. an. Drach. j. maſtiche, cubebar. an. gr. vi. trochiſcorum albandal. Scrup. i. Cum ſyr. betonicæ. Fiant pilulæ. Doſis Drach. i.*

Vel ℞. *Pilul. cochiar. Scr. ii. aurearum Scr. i. trochiſcorum albandal. gr. iii. Cum aqua betonicæ. F. Pilul. xviii. vel plures.*

Vel ℞. *Pil. cochiar. 3. i. aurear. 3. β. trochiſcor. albandal. gr. ii. Cum oxymel. ſcillit. F. Pilul. xvii. vel plures.*

Vel ℞. *Pilul. cochiar. 3. ii. aurear. aloëphangin. an. 3. β. agarici trochiſcat. 3. ii. turbiſh. electi gr. xv. maſtich. cinamom. cubebar. an. gr. vi. trochiſcor. albandal. gr. vii. Cum aq. roriſmarini. F. Pilul. 3. Drach. j. xv. vel xvi. vel xvii. vel quot liber. Detur Drach. j.*

Vel ℞. *Pilul. cochiar. Scr. ii. de hiera cum agarico Scr. i. trochiſcorum albandal. gr. iii. Cum aqua maioranæ. Fiant Pilul. xx. i. Zechius haſ Pilulas laudat.*

℞. *Agar. elect. 3. ii. colocynth. 3. v. β. myrobal. chebulor. 3. i. ſemin. maioran. ruta, pæonia, aſari, piperis, zingiber. an. 3. i. nuc. moſchat. cubebar. caryophyll. xiloaloes, maſtich. cardamom. ſpica nardi, an. 3. β. hellebor. nigri 3. ii. ſalis gemma. nitri, an. gr. v. aloë hepatica pondus duplum. Fiant Pilulæ cum benediſt. laxatiu. Quarum 3. i. bis terue in menſe; vel 3. i. tertio quoque die ſumatur.*

℞. *Elect. diaphanic. 3. β. vel 3. v. vel vi. pul. ſtæchados Bol. Arab. rad. pæonia. an. 3. β. Cum ſaccharo. Fiant Bolus.*

Vel ℞. *Agarici trochiſcat. 3. iii. elect. diaphanic. 3. β. ſtæchad. Arab. ſem. aniſi, an. 3. β. Cū ſaccharo F. Bolus.*

℞. *Pulue*



Vtile etiam est saepe clysteres repetere & iniicere,  
*Dan. Sennerti Tom. I I.*

Quorum omnium cum alia sint mitiora, alia velle  
tiora, semper à benignioribus inchoandum; & subin  
paulatim vim medicamenti augendo tentandum; qu  
tum ferre possint ægri; nihilque incomodi habent le  
ora, quàm quod parum profunt, quod tamen augen

Caput eu-  
cuanzia mo-  
dicamenta.

Medicamenti vires corrigere possumus : contra verò valentiora incautè vsurpata plurimum nocere possunt. Sensibiliter quoque euacuant vesicatoria, & cauteria. Ad insensibiliter verò resoluendam & digerendam materiam capiti applicantur lotiones, embrochæ, vnguentra, cerota, emplastra, ac denique quæ ex profundo materiam attrahunt, dropaces, & sinapismi, vt supra etiam dictum.

De tempore autem errhinorum, vt & apophlegmatismorum vsurpandorum notandum hoc in genere : Vsurpanda ea esse tempore maturino, & ieiuno stomacho.

### Errhina.

Errhina.

De Errhinorum & Ptarmicorum varietate dictum est in Instit. lib. 5. p. 3. sect. 3. c. 39. vt & in genere supra, c. 3.

Materiam errhinis præbent folia maiorana, ruta, Nicotiana, flores lil. conuallium, sem. nigella, rad. beta, pyrethri, cyclamini, cucumeris sylvestris, hellebori : succus beta, bliti, brassica, maiorana, anagallidis, cyclaminis : mel, manna, saccharum rubrum, piper, euphorbium, castoreum : aqua maiorana, Nicotiana, nonnulli & fel anseris, & aliorum animalium admiscunt.

Vt ℥. Caulum beta vel radic. iridis, vel cyclamini, vel gentiane. Formentur inde styli pyramidalis figura, alligentur filo, & macerati in aqua maioranæ indantur in naves manè, ieiuno stomacho, vel etiam vesperi, ante cenam.

Vel ℥. Ladani Vnc. β. pulu. maioran. Dra. iβ. sem. nigella Dra. i. styracis liquida q. f. F. Nasalia iustæ magnitudinis, & inuoluantur puluere, qui sit ex maioran. Dra. β. rad. nigell. Scr. β.

Vel ℥. Succu beta, maioran. ruta, an. ℥. β. māna electa, vel mellis anthosati, ℥. iβ. M. Attrahatur liquor in naves.

Vel ℥. Succu beta, maiorana, ruta, an. Vnc. i. vini albi Vnc. iiii, sacchari rubri Vnc. β. M. Addi etiam potest semen nigellæ torrefactum.

Vel ℥. Succu beta rubra Vnc. ii, aq. mellis Vnc. iiii. vini alb. Vnc. β. pulu. sem. nigell. macis, cubebæ an. Dra. β. M. Sc. pro Errhino.

Vel ℥. Succu cyclamin. beta, brassic. maioran. an. Vnc. β. M.

Si herbæ vel radices virentes & succulentæ desint, è quibus succi exprimi possint, illorum decoctum vel aqua vsurpetur.

Vt ℥. Rad. ieros Vnc. β. maiorana, salvia, ruta, an. M. β. rad. cyclam. ℥. i. Coqu. in aq. simplici.

Colat. ℥. Vnc. viii. mellis rosati colati, spiritus vini, an. Vnc. i. M. Sc.

Vel ℥. Rad. pyrethri, ieros, an. Drach. ii. pulegi, origani, betonica, maiorana, an. M. β. agarici trochiscati Drach. i. flor. stachad. Arab. P. i. Coq. in sufficient. q. aq. simpl.

Colat. ℥. Vnc. vi. In iis dissolue mellis anthosati ℥. i. scillitici Dra. ii. M. Sc.

Vel ℥. Agarici trochiscati Vnc. β. betonica, anagallid. flore rubro. an. P. ii. Coqu. in hydromelite pro Errhino.

Efficacissima etiam sunt Errhina, si scammonij modicum admisceatur.

Linimenti formæ,

℥. Sem. nigella prepar. piperis albi : myrrha, an. Scr. ii. rad. cucumer. sylvestr. Scrup. i. Trita excipiantur oleo irino. F. Linimentum.

Vel ℥. Piperis albi, cubebæ, caryophyll. nuc. moschat. sem. nigella, pyrethri, an. Scrup. i. diagrydij, elaterij, an. Scr. β. moschi gr. ii.

Trita excipiantur f. q. olei irini, & ducantur in formam linimenti naribus inungendi, & post illitionem aer attrahatur.

Trallianus, lib. 1. c. 11. ad varios capitis affectus hoc commendat :

℥. Melanthij Drach. viii. salis ammoniac. Dra. i. elaterij Drach. iiii.

Trita excipiantur oleo scyonio vel irino, vt cerati habeant consistentiam, quo nares illinantur.

Loco Errhinorum etiam vsurpari possunt turundæ ex gossypio paratæ, & madefactæ succis, decoctis, vel aquis supradictis, pulueribuique idoneis confectæ, & naribus immittæ.

Videatur quoque Galenus, 2. κατὰ τὴν. cap. 2. Paulus, lib. 3. cap. 3.

### Ptarmica

Ptarmica ex iisdem fere medicamentis sunt, ex quibus errhina, acrioribus tamen, quæ suo calore & acrimonia cerebrum ita feriunt & percellunt, vt ad sensum illum molestiæ quasi refugiens sese contrahat, sui que concussionem supervacanea simul cum immisso medicamento à se repellat, & extrudat.

Præstat id herba ptarmica ab effectu sic dicta, sole etiam odore, si eius flores & folia terantur, & ellebori albi radix in spiritu vini macerata, si sola fibra radicis in naves immittatur, iterumque extrahatur. Nam puluerem solum insufflare, nisi veterino consopitis, aut apoplexia detentis, tutum non est, ob ingentem, quam efficit in cerebro, agitationem, Lily conuallium flores Puluerisati etiam sternutationem cient.

℥. Piper. albi, pyrethri, hellebori albi, castorei, caryoph. an. Scrup. i.

Trita macerentur in suff. q. hydromelitis, in quo inunctum linteam naribus indatur.

Vel ℥. Ellebor. albi Dra. i. piper. longi, sem. staphidis agrie, nuc. moschat. an. Scr. i. Cum tragacantha in aq. maioranæ dissoluta. F. Nasalia.

Vel ℥. Fgl. maiorana, sem. nigella, caryophyll. zingiber. rad. pyrethri, acori, cyclamini, an. Scr. β. F. Puluis.

Vel ℥. Sem. nigell. Scr. ii. piperis albi, ellebori albi, an. Scr. β. maioran. Scr. i. F. Puluis sternutatorius.

Pertinet hæc & puluis, qui hodie è Nicotiana, mace. re, maiorana, moschò, ambra paratur.

Si catarrhus coniunctus sit, errhina & ptarmica fortiora vitentur, cum caput vehementius agitent, & humores commoueant. Ac tunc potius odoramenta exsiccantia conueniunt.

Si post errhinorum & ptarmicorum vsum ardor aliquis intra nares percipitur, aqua tepida simplici, vel oleo violarum, vel lacte tepido attracto is lenitur.

### Apophlegmatismi.

De iis actum est in Instit. lib. 5. sect. 3. part. 3. c. 28. Detrahunt verò à capite pituitam, & è crebro per palatum in os alliciunt, gargarismi, collationes oris, masticatoria, inunctiones palati. Quocunque autem modo vsurpentur, duplici ratione vim suam exerunt.

Vel enim caliditate & acrimonia humores fundendo id præstant, vel simul tota substantia id perficiunt.

Prioris generis sunt semen anethi, hyssop. origan. rad. capparium, pyrethri, valeriana, sem. eruce, sinapis baccalauri, cubebæ, cardamomum, grana paradisi, galanga, mastiche, passula, ficus.

Posterioris generis sunt quæ purgant, vt radix iridis recens, sem. staphidis agria, & similia.

Ideoque pro humoris peccatis & affectus natura & differentia etiam medicamentorum quendam delectum habere oportet.

Prioris generis medicamenta, vt leniora, in affectu leuiori vsurpari poterunt : vbi verò humores alius in cerebro, delitescunt, & magnum instat periculum, valentiora eligere conuenit.

Cautè tamen vsurpentur apophlegmatismi in iis, qui fluxioni ad pectus, & tibi obnoxij. His enim magis conueniunt Errhina, quæ nonnulli Caput purgia in specie appellant : cum tamen hoc nomen iure optimo etiam apophlegmatismis comperere possit.

Masti

*Masticatoria.*

*Mastiche* mansa vel sola, vel cum passulis, blandè & leniter pituitam è cerebro elicit: *Passula* item cum pipere masticata.

Valentiora sunt *radix iridis*, *agaricus*, *semen sinapi*, *nasturtij*, *staphidis agria*, *radix pyrethri*, *cyclamini*.

Vt  $\mathcal{L}$ . *Mastiche* Drach. ii. *pyrethri*, *staphidis agria*, an. Drach.  $\beta$ .

Contusa grosso modo masticentur, crebro expuendo, aut cum l. q. mellis, vel pulpa caricarum pinguium & cera figurentur pastilli manfiles, instar lupinorum.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Pyrethri*, *cubebae*, *staphidis agria*, an.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . Excipiantur mastiche & cerâ an q. s. f. Pastilli manfiles.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Agaric*. Dra.  $\beta$ . *specier. diamb.* Scr.  $\beta$ . *pyrethri*, *cubebae*, *ligni aloes*, an. Scr. i. *mastiche* Scr. ii. Cum aqua iridis Fiant Trochisci manfiles, & in Sole siccentur, qui mansi manè caput purgant & roborant.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Piperis longi*, *nucis moschat.* an. Dra. ii. *staphidis agria*, *pyrethri*, an. Scr. ii. *sem. sinap.* Scr. i. Cum melle f. trochisci manfiles.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Uuarum passarum* Dra. iii. *hyssopi*, *pyrethri* an. Dra. ii. *mastiche*, Dra. iii. Cum melle & cera Fiant trochisci manfiles.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Cubebarum*, *piper. albi*, an. Dra.  $\beta$ . *pyrethri*  $\mathcal{Z}$ . i. *mastiche* Vnc.  $\beta$ .

Contusa & conclusa nodulo vel sacculo lineo raro masticentur. Vtilissimum etiam est *agarici* Scr. i. vel ii. diu masticare.

Masticatoria tamen non omnes admittunt, ut quibus dentes carioli aut exesi sunt, aut exciderunt, & masticare non possunt. Non quoque conueniunt, cum adsunt vlcera circa fauces, vel tussis adest, aut affectus pulmonum. Nam materiam versus eas partes trahunt. Videatur etiam Galenus, 2. *de nat. hom. c. 2.*

*Inunctiones palati.*

$\mathcal{L}$ . *Theriace*, vel *Mithridatij* q. s. dissoluanturq; in oxymelite scillitico, & addatur aliquid sinapis vel pulueris castorei, & misturâ illâ palatum inungatur.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Pulm. nuc. moschat.* *caryophyll.* *sinapis*, *piper. albi*, *pyrethri*, *zingiber.* an. Scr.  $\beta$ . *mellis anthosati* Vnc.  $\beta$ . M. & inungatur palatum.

Fortius erit medicamentum, si aliquid de *staphide agria*, vel *elaterio* addatur.

*Gargarismi & Collutiones oris.*

$\mathcal{L}$ . *Fol. beta*, *maioran.* *hyssopi*, *calaminthe* an. M $\beta$ . *cort. rad. cappar.* Dra. i. *sem. sinapis*, *rad. pyrethri*, *pip. alb.* an. Scr. ii. *caricarum pinguium* num. iii. Coquantur in suff. q. aq. vel *hydromelitis*, pro  $\mathcal{f}\mathcal{b}$ .

Colat adde *mellis anthosati*, *oxymelitis*, an. Vnc.  $\beta$ . vel *oxymel. scillit.* Vnc. ii.

Misceantur. Tepidum ore diu contineatur mane ante pastum cum, vel sine gargarisatione.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Origani*, *pulegij*, *maiorana*, *betonica*, *ruta*, *zingiber.* *piperis*, *stachad.* *Arab.* an. Vnc.  $\beta$ . *mastiche*, *staphidis agria*, *nuc. moschat.* an. Drach.  $\beta$ . *sem. sinap.* Drach. vi.

Contusa coquantur in suff. q. vini ad tertie partis consumptionem,

Colatura vsurpetur pro Gargarismo.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Agarici trochiscat.* Vnc.  $\beta$ . *hyssopi*, *origani*, *calaminthe*, an. M $\beta$ . Coquantur in aq. s.

Colatura  $\mathcal{L}$ .  $\mathcal{f}\mathcal{b}$ .  $\beta$ . *oxymel. simpl.*  $\mathcal{Z}$ . i. f. Gargarismus.

Dodonæus quoque lac ex amygdal. amaris, aut ex nucleis persicorum, cum aq. pulegij factum non inutiliter apophlegmatismi loco vsurpari posse scribit; cum & pituitam detrahat, & eam expediat, præsertim erucae & sinapis semine addito.

Apophlegmatismi etiam in *Errhina* mutari possunt,

*Dan. Sennerti Tom. I I.*

si capite supino naribus hauriantur, ut per summum palati relabantur in fauces. Hoc enim modo dum basin cerebri transeunt, viam, per quam excrementa cerebri decurrunt, abluunt, & ex ventriculis cerebri excrementa validius extrahunt.

Ad Apophlegmatismos merito etiam refertur fumus ille, qui ex *Nicotiana* accensa canalibus beneficio, à Belgis præcipue, per fauces & palatum attrahi solet, & pituitam è capite elicit; de qua re consulantur libelli à recentioribus de *Nicotiana* scripti. Commodior tamen est pulvis, cuius supra inter *prarmica* facta est mentio.

De apophlegmatismis quoque agit *Aëtius*, *teirab. 2. serm. 2. cap. 5*  $\mathcal{Z}$ . vbi & sequentem recenset, ac de eo scribit, quod, qui eo vitur, neque capitis dolore, neque ocalorum caligine, neque aurium & dentium affectibus corripitur:

$\mathcal{L}$ . *Sampsucci sicci*, *irid. Illyrica*, *pyrethri*, *hyssopi*, *nitri*, *piperis*, *semin. apij*, *rad. panacu*, *staphidis agria*, an.  $\mathcal{Z}$   $\beta$ .

Si verò vim eius in eundere voles, adde *myrrha*  $\mathcal{Z}$ . iii. Singula primò seorsim, deinde simul terito cum aqua, & formato pastillos, pauco melle admixto. Vnus autem tempore melle & aq. diluito, ac pro gargarismo vitur.

*Errhina* supra, c. 5. fuerunt enumerata. Recenset etiam quædam *Actius*, *teirab. 2. serm. 2. cap. 5*  $\mathcal{Z}$ .

*Topica.*

Topicorum, quæ vim habent reliquias discutiendi, & caput roborandi, calefaciendi & exsiccandi, formulæ supra, de *Intemperie capitis frigida & humida*, traditæ sunt, quæ huc transferantur. Inter quæ cum à Galeno, 2. *de comp. medicamentor. sec. loc. c. 2.* tum ab *Aetio*, *teirab. 2. serm. 2. c. 48.* valde commendatur *verbenaca recta*, ut

quæ omnium maximè discutiatur, & mirificè roboretur, omnique capitis dolori ex frigiditate aut crassis humoribus orto medeatur, præsertim viridis, imò & arida, cū radicibus, & cū serpillio oleo incocta, & inprimis si *crocodiliadis* maximè circa aquas nascentis radix addatur.

$\mathcal{L}$ . *Vini albi fortis* Vnc. v. *salis communis* Vnc. i. Liquefiat sal cum vino bulliendo. Postea addo spirit.

*vini vel aqua alicuius cephalica* Vnc. v.

Madefiat eo linteam, quod capiti imponatur.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Fol. lauri*, *maioran. flor. stachad.* *Arab.* an. M. i. *chamameli*, *meliloti*, *fol. sena*, an. M. i. *agarici albi*  $\mathcal{Z}$ . ii. Coquantur in lixiuio pro lotionem capitis.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Lixiuij ex sarmentis vitis* q. s. ad vnam lotionem. In eo coq. *maiorana*, *bacc. lauri*, *pulegij*, *calaminthe*, *ocymi*, an. M. i. *agaric. elect.*  $\mathcal{Z}$ . ii. Addaturque pars tertia vini, & Coquatur ad quartæ partis consumptionem.

Postea colentur, & lixiuio isto ac sapone odorato caput lauetur.

Vnguentum hoc, quod

$\mathcal{L}$ . *euphorbij*  $\mathcal{Z}$ . i. *cera quadrantem*, *olei dulcis*  $\mathcal{f}\mathcal{b}$ . i. commendat ad temporum & frontis inunctionem *Aëtius*, *teirab. 2. serm. 2. c. 49.* & sæpe vnico eius vsu ante balneum frigidum capitis affectiones cessare scribit.

Prodest & oleum ex *euphor.* Drach. iii. & olei  $\mathcal{f}\mathcal{b}$ . i. paratum, in aurem instillatum. Paul. *Ægineta*, *lib. 3. cap. 5.* valde laudat vnguentum ex *euphorb.* & *castoreo*. Vbi & alia externa medicamenta habet ad capitis affectiones frigidas.

$\mathcal{L}$ . *Radic. cucumer. syluestr. minutim concisa*, & crasso *Emplastro* modo contusa Vnc. i. Coq. in olei cheiri, Vnc. x. ad consumptionem quintæ partis.

Colentur cum forti expressione. Col. adde pulu. *castorei*, *absinth.* an. Dra.  $\beta$ . *euphorbij* Dra. i. *spica nardi* Scr. ii. Cera q. s. f. Emplastrum.

Quo solo inueteratos capitis dolores diuturnos internos & externos, etiam contumacissimos, se sanasse scribit *Zechius*, *conf. 3.*

$\mathcal{L}$ . *Syrac. calamita* Vnc. i. olei irini  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . de *euphorb.*  $\mathcal{Z}$ . ii. *theriaca veteris*  $\mathcal{Z}$ . i. Cera q. s. f. Ceratum.

Aliud ceratum, eiusdem *Zechij*, ad intemperie cerebri

B b 3 frigidam



frigida & humidam, & inde pendentes catarrhos diuturnos efficacissimum.

*℞. Caryophylli, thuris, macis, an. Scrup. ii. corallior. ambrosij, podij, ambrosij, an. 3. ℞. nucis cupressi 3. i. styracis calamitæ, vernicis an. 3. i. b. ladanij 3. vi. resina Vnc. i.*

Soluatur ladanum cum resina in vino veteri, & coquantur ad iustam consistentiam.

*Aqua cephalica ad extra.*

In primis vero ista aqua valde commendatur ad pituitam & flatus in capite absumendos, & catarrhos exsiccandos, ad cerebrum & memoriam roborandam, ad dolores capitis è causa frigida, si cochlear vnum capiti infundatur & tempora ac frons ea illinantur.

*℞. Salvia, rorismarin, betonica, serpilli, maioran. an. M. ii. flor. chamamel, meliloti, an. M. i. lilij, conuall. laurandula, summit. anethi, an. Vnc. i. sem. sileris montani, carni, cinnamomi, nucis moschat. caryophyll. granor. Paradisi, cubebæ, baccar. lauri, an. Vnc. ℞. Concisis & contusis affundantur in vitro vini Rhenan. optim. Mens. ii. Hinc adde succi rosar. alb. plenar. aq. fl. cheiri, an. ℞. i. b.*

Stent in digestionem octo diebus, hinc destillentur.

*Sacculus.*

Aut paratur talis sacculus: *℞. Milij, furfuris maris, salis communis, an. Vnc. ii. sem. faniuli Vnc. i. bacc. lauri contusarum Vnc. ℞.*

Torrefactis omnibus in sartagine fiant sacculi duo ex linteis, qui mane capiti calidi applicentur per dimidiam horam & per vices permittentur.

Aut *Pileolum* vel *cucupha* ita fiat: *℞. Flor. rorismarin, stachad. Arab. an. P. i. fol. salvia, maiorana, verberna, origani, an. M. ℞. macis, nuc. mosch. caryophyll. an. 3. i.*

Tria omnia *Pileolo* ex sindone rubra innantur, qui aliquot septimanis in capite gestentur.

Eadem medicamenta, vel his similia, sacculo lineo inclusa in lixiuio coquantur, pro capitis lotionem.

Aut *℞. Flor. chamamel. fol. betonicæ, salvia, asari, an. M. i.*

Subiciantur cineri fermentorum vitis in fundo vasibus, & aq. superflua fiat lixiuium. Postea, antequam caput lixiuio illo lauetur, madefcat eo sacculus lineus continens maioran. salvia, rorismarin, flor. laurandul. stachad. Arab. rosar. rubrar. ana M. ℞. agarici albi Vnc. ii. Caput mane ante prandium lauetur, adhibito, si placet, sapone odorato.

Commendatur & sequens medicamentum:

*℞. Cucumeris agrestis q. l. Coqu. in f. q. aq. addita parte textæ olei communis.*

Colaturâ caput vngatur, & radices contusæ instar cataplasmatibus capiti applicentur.

Guainerius hoc præcipue laudat:

*℞. Bacc. lauri, origani, an. Vnc. i. Fiat Puluis, & cum succo foliorum betonicæ F. Cataplasma. Si addatur cera & oleum irinum, Fit Emplastrum.*

*Puluis pro fumo ad cerebrum siccandum:*

*℞. Benzoes Vnc. ℞. styrac. calamitæ 3. iii. thuris Vnc. ii. flor. laurandula 3. ii. caryophyll. 3. iii. gran. iuniperi Vnc. ℞. trochiscorum gallia moschata, si libet, Scr. i. qui in feminis omittantur. Fiat puluis crassus carbonibus ignitis inspergendus.*

*Trochisci.*

*℞. Ligni aloei, costi, an. 3. i. gallia mosch. thuris, gummi iuniperi, an. Scr. ℞. Cum styracis liquid. Fiant pilul. vel trochisci carbonibus iniiciendi.*

Odoramentorum tamen vsus nec continuus sit, nec frequens, verum moderatus: aliâ enim capitis grauedinem inducunt. Non etiâ, nisi corpore purgato, vsurpentur.

Reliqua etiam topica, quæ supra, in intemperie capitis frigida & humida, proposita sunt, etiam hîc locum habent. Inter quæ magis commendatur sacculi, & pulueres, inunctiones, cerota, emplastra, quàm fomenta, embrochæ & lotiones, quæ actuali suâ humiditate caput offendere possunt. Idcirco, si vsurpetur, calefaciendi & siccandi vis humectandi vim actuslem superet, & proinde pro aqua simplici vsurpetur lixiuium. Aquarâ tamé & spirituum cephalicorum destillatorum vsus nihil incommodi habet, sed potius plurimû utilitatis præstant, si iis caput allinatur. Exempla supra proposita sunt.

Quod si hæc non sufficiant in affectibus grauioribus, vt lethargo, caro, ad sinapismos ex sinapi, pyrethro, castoreo, euphorbio, columbarum stercore & ficibus paratos adicendum.

Vt *℞. Pyrethri, sinapi, scille, an. Vnc. i. euphorbij, an. 3. ℞. Milce omnia cû succo asphodeli & maioranæ. Fiat Emplastrum in lethargo & caro veile, & à somno excitans.*

Vel *℞. Ol. nardini, castin. an. Vnc. ℞. castorei, euphorbij, pyrethri, an. 3. ℞. scilla Vnc. i. b. F. Linimentum.*

Topica talia etiam proponit Paulus Aegineta, lib. 3. c. 5.

### Interna caput roborantia.

Neque negligentur medicamenta interna caput calefaciendi, supra, 2. enumerata, quæ intemperiem corrigunt, caput roborant, ne aut aliunde transmissa superflua recipiat, aut intra se generet & cumulet, quibûque reliquæ pituitæ consumuntur & discutiuntur. Inter quæ multum laudatur decoctum rad. saris parillæ, Chinæ, & si maiore exsiccatione & calefactione opus sit, ligni Guaiaci. E.g. paratur tale decoctum:

*℞. Rad. China transversim in tenues talulas incisa Vnc. ii. fol. betonicæ, calamitæ, an. M. i. flor. stachad. Arab. M. ℞. rad. pæon. Vnc. ℞. Incisa omnia infundantur in aq. ℞. xii. vase clauso, horis xiiij. in loco calido.*

Postea lento igne secundum artem coquantur ad dimidiam partis consumptionem.

Sub finem adde *cinnamomi Vnc. ℞.*

Sumat æger quotidie manè Vnc. v. horis v. ante prandium, & Vnc. iij. horis ii. ante cœnam.

Bene purgato corpore etiam sudor ægro manè præcipi potest.

Quod si his omnibus tentatis & adhibitis malû persequeret, vt de cœcitate, vel aliis grauioribus malis periculum imminet, repetitis euacuationibus vniuersalibus & particularibus, intermixtisq; roborantibus, expedit adhibere embrochas, ex thermis naturalibus vel artificialibus actu calidis, quarum aquæ manè ex alto pluuia instar demittantur super futuram coronalem, ad horæ quadrantem vel semissem, continuando per septem aut plures dies, prout vires & vsus ægri postulat.

Vel Sinapismi ex sinapi, stercore columbino, caprillo, ruta sylvestri, radicibus pyrethri, bryoniæ, costi, euphorbio, incorporatis cum caricis pinguis, vel alio modo applicentur, inchoando semper à mitioribus: de quibus in Institut. lib. 5. p. 3. sect. 3. c. 28.

Vt *℞. Caricarum pinguium q. l. Macerentur per diem in aqua. Deinde addatur dimidium vel æquale pondus. vel duplum sinapis, prout lenior, vel acrior sinapismus expetitur.*

Monent hîc nonnulli, nec abs te, quod, licet antiqui quidam acetum adhibuerint, experientia tamen docuerit, sinapis vires aceto exolescere, quod non aliunde accidit, quàm quod sal volatiliss, à quo tota vis mordicandi in sinapi & similibus pendet, ab aceto figitur.

Aut applicetur cauterium, vel ad futuram coronalem, quâ parte extremitas mediij digiti verticem capitis attingit, posita radice manus circa carpum ad radicem nasi, idque exsiccationis causâ; vel, quod tutius, ad colli vertebra, quâ capiti committitur, deriuationis gratiâ. Eodem modo ad euacuationem & exsiccationem materiarum Dropax vsurpari potest: & ad sensibilem euacuationem Setaceum in ceruice, quo solo sæpe graues & diuturni capitis affectus curantur.

*Caput calefaciendi & roborantia interna.*

*Embrocha.*

*Sinapismi.*

*Acetum an sinapi miscendum.*

*Cauterium.*

*Dropax. Setaceum.*

### Dietæ.

Victus ratio ad calidum & siccum vergat. Itaq; aer talis sit, siue natura, siue paratus arte, iis modis, qui supra, c. 2. sunt propositi. Videndum tamen, ne odore æger offendatur. Valde etiam calidus aer cauendus; cum & caput repleat, & humores in eo cõtento sliquet & fundat, flatusq; exciter, & sæpe malum hoc, quod latebat, detegat,



detegat. Hinc etiam videmus, eos qui hac intemperie cerebri laborant, si sub Solis radiis morentur, vel caput ad ignem calefieri sinant, peius habere. Ideoque commodissimus est aer succus, qui in alterutra qualitate actiuatum non multum excedat, ad calidum tamen plus quam ad frigidum vergat. Vitandus aer crassus & nebulosus circa fluuia, stagna, lacus, paludes: in locis subterraneis non diu morandum.

Caput astate leniter regatur, & radiis Solis nudum non exponatur, vt nec Luna radiis; hyeme bene regatur, sed non oneretur. Si aerem morbi causam fuisse constet, is mutetur.

Victus sit patens, in primis cœna. Alimenta sint boni succi, facili coctionis, nec frigida, nec excrementitia, nec vaporosa, sed attenuandi vi prædita. Alimentorum diuersitas in primis vitanda. Abstineat æger à multo piscium esu, præsertim eorum, qui carnem molliorem habent; à lacte item & lacticiis, carne suilla, & similibus; leguminibus item, & oleribus & fructibus, præter vias. Panis sit bene fermentatus, coctus cum semine carui & amisi, & modico salis: vilis est & bis coctus. Reliqui cibi condiantur salui, maiorana, roremarino, pipere, caryophyllis, cinamomo, nucem moschara. Carnes assæ potius sint, quam elixæ. Potus sit parcius. Vinum post corporis purgationem conceditur, sed parca. Commodissimus potus est hydromel medicatum salui, hyssopo, roremarino &c. Corporis exercitatio sit paulo vehementior, ieiuno stomacho, & excrementis prius depositis. Somnus moderatior, parcius potius, quam nimius, qui horas 7. non excedat, nocturnus, non diurnus; nec incatur; nisi duabus à cœna horis exactis; ante quem leuis deambulatio vilis. Decubitus in somno sit in alterutrum latus, non supinus. Dormiatque æger capite elato & recto.

Post somnum, antequam æger à lecto surgat, pedes, crura, & brachia diligenter fricentur, qua frictione & calor naturalis excitatur, & sic à capite auersio. Venus vitetur, vel sit parciissima; quæ immoderata nimium in modum capiti noxia est. Animi affectus, qui spiritus agitare, & turbidiores reddere possunt, vitandi, & maxime mœror, & tristitia; quæ caput frigidius reddunt, & debilitant. In multam noctem non lucubrandum. Alius sit laxa, & nisi respondeat, sollicitetur subinde pilula vna atque altera ex aloë ante cibum assumpta, aut terebinthina Cypriæ auellanae magnitudine eodem tempore deglutita, vt primæ viæ mudentur, & vapores ad caput tendentes reuellantur. Commodæ sunt in hunc vsum hæc pilulæ:

℞. Terebinth. Cypri. vel Venera Vnc. ℞. aloë rosat. Drach. iij. agaric. trochisc. Drach. jss. Fiant Pilulæ mediocres.

### Q V Æ S T I O

*An odorata in hoc affectu conueniant?*

De aromatum & aliarum rerum bene olentium ad olfaciendum vti alij aliter sentiunt. Quidam ea admittunt, quod caput exsiccent; quidam improbat, quod vaporibus & exhalationibus caput repleant. Melius, vt hanc controuersiam dirimat, dixit, immoderatum vsum aromatum cerebro nocere, moderatum vero prodesse; quia siccet. Malim tamen dicere, odoratas res, quæ moderatum odorem spirant, prodesse; quod cerebrum siccant, & spiritus animales recreant; quæ vero vehementiorem odorem spirant, nocere; quia caput repleant, & humores sæpe fundant. Ita ambra odor frequens capiti non nocet, sed plurimum prodest; moschi non item, quia vehementior.

Exempla huius intemperiei sunt apud Montanum, Consil. 3. 1. Solenandrum, sect. 1. conf. 2. Forestum, lib. 9. obseru. 17. 19. Zechium, consil. 12. 72.

### C A P V T X I.

*De Intemperie Capitis cum Humore Seroso.*

Est non leuis pituitæ & humoris serosi sit cognatio: *Intemperies capitis cum humore seroso.* tamen non planè eiusdem naturæ esse, vel ex iis, quæ de naturâ serosi humoris in Institut. lib. 2. part. 2. cap. 7. dicta sunt, patet. Pituita enim plerumque crassior est; serum verò tenue & aquosum. Non tamen serum pura pura aqua est, quod vult Carolus Piso, qui puram putat aquam, seu aqueam humiditatem; siue cum cibo & potu ingestam, siue partem chyli aqueam serum esse dicit, idque ab ichore discernit; qui scilicet sit cuiusque humoris pars fluxa, eiusdem coloris & naturæ cum propriis humoribus.

Quamquam autem auctores quandoque has voces discernunt, vt Ichor vel sanguis crudus, vel imperfectus sit, vel tenuior pars massæ sanguineæ corruptæ & colliquatæ; & p̄p̄ verò, seu serum, *serum in populo*; tamen duo hæc vocabula sæpe sunt synonyma, vt ostendit Dn. Caspar Hofmannus, in collectaneis de Ichoribus, num. 12. & 13.

Duo autem seri seu ichorosi materiae sunt genera: Vnum mite, quod est sanguinis pars aquea eū diluens, vel aquea humiditas cibo & potui admixta; alterum acre & salum, quod suam acrimoniam ex colliquatis seu corruptis, seu quacunque de causa falsis & acerbis acquirit. Serum enim quod pura pura aqua sit, in corpore vix reperitur, sed quod ipse Piso, in præfatione, fatetur, dæ per vasa decurrit, ex iis ichoribus, qui in sanguine redundant, partem aliquam secum transportat, quocunque fertur. Neque etiam, vt pituita, in corporibus pituitosis tantum reperitur serum copiosius; sed in his præcipue, qui corpore sunt graciliore, & ad caliditatem & siccitatem vergunt, & sanguinem æstiosum atque atrescentem habent. Atque si quis ea, quæ in nonnullis morbis accidunt, diligenter perpendat, in nullam aliam causam, quam humorem serolum, referri posse animaduertet. Affectus enim illi sæpe fugaces & momentanei sunt; ac facili de causâ recurrunt; quod neque ex pituitoso, neque ex alio humore accidere potest, neque aliorum humorum signa tum adsunt. Vnicum verò serum eius est naturæ, vt ubicunque in corpore redundat, facile hinc illic moueatur, ab alieno calore effervescat & ebulliat, ac feruens atque agitatum in varias partes feratur, easque afficiat; facile tamen etiam discutiatur & euanescat.

Vt autem in aliis partibus variorum malorum sæpe est causa humor iste serosus: ita in capite quandoque plura mala excitat; de qua re inter recentiores diligentius monuit Carolus Piso, in lib. de morbis à colluvie serosa. Cum enim ad caput venæ & arteriæ plures tendant, & per id disseminentur, ac in primis cum spiritu vitali, qui vnâ cum sanguine arterioso ad caput, ad spiritum animale generandum, mittitur plurimus, etiam serum multum, quo sanguis arteriosus abundat, ad caput mittatur, & sanguis quidem in nutrimentum capitis assumatur, serum verò ad illud ineptum sit, neque etiam per vasa, per quæ adscendit, recurrere, neque per partis calorem debilem transpirare insensibiliter possit, neque ob cranij densitatem exsudare sensibilibiter; vel in capite cunctantur, vel pondere suo deorsum secundum ductum membranarum & nervorum descendit: vnde & in capite & partibus capiti subiectis, & cum eo consentientibus; variorum affectuum causa est; doloris capitis, dentium, aurium, & aliarum partium & præcipue vagorum illorum in externis partibus, scapulis, dorso, thorace, brachiis, cruribus; epilepsia, convulsiorum morum, paralytis, ruffis, thoracis doloris, & similitum.

*Seri in capite collectio-  
nis causa.*

# 296 De intemperie capit. cum humore seroso.

## Causæ.

Seri generatio.

Non generatur autem serum in capite, sed præcipue in secundæ concoctionis instrumentis, ac in primis vitio lienis in toto corpore cumulat; de quo alibi dictum, atque inde ad caput fertur, ibique cumulat. Et quod maior serosi huius humoris in toto est abundantia: eò facilius ad caput conuertitur. Colligitur autem in toto vel ob nutrimentum tali humiditate abundans, vel dentatis in toto habitu corporis, vt & in capite, poris cutis, ab aëre frigidiore, aut alia de causa, retentoque sudore; vel vitio lienis, vt iam dictum. Corripatur autem ad caput serum, vel sensim, dum cum ipso sanguine, qui nutrimenti gratia attrahitur, & præcipue cum arterioso, affluit, & copiose ad caput fertur, si accedat hepatis caliditas, venosumque genus sit amplum; vel confertim ad caput mouetur ob causas, quæ feruorem in sanguine excitare possunt, & faciunt, vt tenuior & serosior sanguinis pars sursum feratur; quod fit quando corpus motu, calore febrili: animi affectibus, aëris æstu, vel alia de causa incalescit; unde quoque accidere solet, vt plerumque cum catarrhis & morbis à motu serosi humoris ortum habentibus febricula coniungatur, ex agitatione & feruore feri in arteriis proveniēs. Facit huc multum etiā Luna, quæ secundum *oporis* suas humores in corpore mouere solet: præcipue verò mouent serum radij Lunares, si nudo capite excipiantur. Atque hinc accidit, vt perturbationes & commotiones serosi humoris, cum in toto corporis habitu, tum in capite præcipue euenientes, instantium Lunæ *oporis* & mutationum tempestatum mox futurarum sint prænunciæ.

## Signa Diagnostica.

Dolor qui inde oritur plerumque non est admodum acris aut pungens, sed grauis potius, cum tensione. Interdum tamen accidit, vt acerbissimi dolores in brachiis & cruribus ab humore seroso excitentur: vbi scilicet ille acris, ac prauæ qualitatē est particeps. Mala, quæ ab hoc humore oriuntur, non sunt continua, & sæpe locum mutant. Vapor enim & humor hic quoque verum variè moueri & impelli possunt. Vaporem tamen à sero discernere non ita difficile est. Vrina plerumque est paucior, nec sudores matutini fluunt. Ea etiam, quæ de causis modò tradita sunt, in notitiam huius humoris deducere possunt.

## Indicationes.

Humor serosus è toto corpore & capite euacuandus, à capite auertendus & repellendus, intemperies adiuncta corrigenda, & partis, quæ eum generat, intemperies emendanda.

## Curatio.

Euacuatio humoris serosi.

Primo autem euacuatio eius per aluum instituenda est: ad quam (modò viæ sint apertæ) nullâ præparatione opus est; cum serum per se satis fluidum sit. Ideoq; exhibenda medicamenta serosos & aquosos humores educantia; qualia sunt manna, syrupus & mel rosatum solutiuum, syrupus de spina ceruina, mechoacanæ, agaricus, semen carthami, ebuli, gummi gotte, extract. efule, cortic. ebuli, sambuci, flor. persicorum, prunor. sylvestrium, folia senæ; quibus quoque rhabarbarum & diagrydium addi possunt, quæ bilem, feri stimulum & vehiculum, expurgant.

Vt *℞. Polypod. quern.* Vnc. *℥. cuscute, betonica, summitat. lupuli, hyssopi.* an. P. ii. *fol. senæ elect.* Vnc. *℥. sem. carthami contus.* Drach. iii. *rhabarb. Scr. i. passularum.* Vnc. *℥.* Coquantur in aq. simpl. In Colat. Vnc. iii. dissolue manna Vnc. *℥.* Iterum coletur. Adde syrup. rosar.

solutiui, vel de spina, ceruina, Vnc. *℥.* F. Haustus. Vel fiat talis Syrupus:

*℞. Radic. pœonia, meos Florentina, an.* Vnc. *℥.* *merc. rialis, cuscute, capillor. Veneris, betonica, summitat. lupuli, flor. sambuci, an.* M. *℥.* *sem. ebuli, carthami contusi, an.* Drach. vj. *fol. senæ elect.* Vnc. iii. *sem. fœnicul.* Drach. ij. *flor. bugloss. anihou, an.* P. ij.

Coquantur in aq. vel hydromelite. Colaturæ *℥.* lb. j. Infundantur in ea *agarici* Vnc. *℥.* *mechoacanna* Drach. iij. *zingiber. galanga, an.* Drach. j.

Iterum coletur.

Adde sacchari q. s. *succi rosarum* Vnc. ii. F. secundum artem Syrupus, de quo cochlearia tria vel quatuor manè exhibeantur.

Vel *℞. Mechoacan.* Scrup. ij. *specier. diacarthami, vel diaturbith. cum rhabarb. Scr. j. diagrydy, gummi gotte, an.* gr. ii.

Fiat puluis, qui sumatur in iusculo carnis, & postea superbibatur serum lactis.

Si tamen feruor aliquis sanguinis percipiatur, qui occasionem præbuerit, vt serum ad caput moueretur; aut sanguis copiosior sit, vel consueta euacuatio suppressa, præmissio leniente medicamento venæ sectio primum instituenda, quæ feruorem sanguinis sistit, eiusque copiam imminuit; cum magna serosi humoris copia sæpe cum sanguine educi solet.

His præactis reliqua serosi humoris copia per. vrinas & sudores euacuanda. Eligenda autem hic ex diureticis ea, quæ lienem profunt, eiusque obstructions aperiunt, & intemperiem calidam non augent, sed potius corrigunt.

In primis verò vtilia sunt sudorifera, sudoresq; certissimum sunt & prophylacticum, & curatiuum remediū doloris capitis, & aliorum morborum, qui à seroso humore à capite defluente ortum habent. Ideoque danda opera, vt æger sæpe manè sponte in lecto sudet, & nisi sudores sponte proueniant, medicamentis prouocandi. In quibus eligendis capendum ab iis, quæ valde calefaciunt & siccant; cum etiam calidæ & siccæ constitutiones seroso humore abundare possint; sed temperatiora eligenda: aut si ligno Guaiaci, saris parilla, & similibus vti libeat, cichoracea & humectantia addenda. Vtile est & vinum chamædrytes, & diaphoreticum.

Deinde particulares euacuationes fiant per masticatoria è mastiche & passulis, apophlegmatissimos capite præcedente propolitos.

Vesicantia quoque & cauteria occipiti & brachiis, vel seraceum ceruici applicentur.

Ad absumendos quoque, & exsicandos, vt & per sudorem & insensibilem transpirationem discutendos serosos humores, non inutiles videntur ij pulueres, (qui tamen facile etiam in pilulas & electuaria redigi possunt) qui quidem ad arthritidem præcipue commendantur, sed tamen ad omnes generis affectiones ab humoribus serosis ortas vtilēs sunt, & quidem sub nomine Cratonis, Eraſti, Monauij, Donzellini, & aliorum circumferuntur, sed, vt ex consiliis Cratonis à Scholzio collectis, *Consil. 216.* patet, medicamenta sunt à veteribus excogitata, quibus arthriticos sanari posse affirmant, si per integrum annum eorum vsus continetur, vt per Ianuarium mensem Scr. ij. per quinque dies, in Februario totidem per totidem dies, in Martio & Aprili per duos dies, in Iunio vno die, in Iulio duobus, in Augusto vno, in Septembri, Octobri, Decembri duobus sumantur. Quanquam putarim neminem ad dies istos ita planè adstrictum esse, sed vel vno mense per dies viginti, aut plures, prout vsus postulat, vsurpari posse. Cratonis descriptio hæc est:

*℞. Aristoloch. rotund.* Vnc. j. *centaur.* Drach. iij. *gentiana* Drach. vj. *mei* Drach. v. *hyperici* Drach. vj. *perroselin.* *Macedon.* *℥.* *℥.* *agaric. albiss.* *℥.* ij. *rhapontic. veri* *℥.* j. F. Puluis. Alia antiqua descriptio hæc est:

*℞. Rhapon*

Sudores in morbo à seroso humore vtilissimi.

Pulueres Arthritici.

*℞. Rhapontic. veri* Drach. i. *agarici* Drach. ij. *valerian.* Drach. iij. *petroselin.* *Macedonic. mei.* an. Drach. v. *gentiana, aristolochia rotunda,* an. Drach. vij. *chamadryos* Drach. viij. F. Pulvis.

Alia: *℞. chamadryos, dictamni, Cretici, iua arthetica, censaur. minor. gentiana, aristolochia rotunda,* an. Vnc. ij. *cort. interior. inglandium* ℥b. j.

F. Pulvis; cuius dosis Drach. ℥. per dies triginta vel quadraginta. Eiusdem generis est diacorallium Alexandri, quod Capiuaccius, de Arthrit. omnibus in arthritide curanda anteponendum censet.

*℞. Corallij nostri seu Anagallidis* Drach. ij. (forſan Vnc. ℥.) *myrrhe* Vnc. iij. *caryophyll.* Vnc. ℥. *rhapontici* Vnc. j. *folij* Vnc. ℥. *aristoloch. virinsque,* an. Vnc. ij. *ſpica nardi* Vnc. iij.

F. pulvis. Exhibetur manè, hor. 6. ante cibum, Scr. j. per centum dies, postea triginta diebus intermittitur; rursus centum diebus exhibetur, iterum 30. dies intermittitur; hinc per dies centum sexaginta alternis diebus exhibetur; inde rursus tertio quoque die: de quo plura in doctrina de Arthritide dicentur.

Cuius generis & alia ad serofos humores absumendos, & insensibilem transpirationem promouendam, parari possunt; ex cineribus ossium humanorum, equorum ceruorum; ex cineribus & sale milui, ciconia, hirundinum; ex herbis; primula veris, pilosella, ruta, salvia, asarum, betonica, hyperico, acoro; floribus consolida regalis, succino, ungula alcis. De quibus plura suo loco de Arthritide: qualia etiam habet Platerus, tract. 2. pract. pag. 721. 722.

Neque omittantur caput siccantia & roborantia supra proposita. Quibus hoc addi potest:

*℞. Mastich. gumm. iuniperi, nuc. mosch. parum roſe,* an. Scr. j. *caryophyll. subtiliter pulverisatorum* Scr. ℥. *ladani puri* Drach. vj.

Ducatur ladanum in mortario calido, addanturque pulveres cum pauxillo oleo mastich. F. Massa, quæ extendatur supra alutam. tegatur sindone rubra. F. Emplastrum vertici imponendum.

Pila quoque è succino si manibus gestetur & versetur, ut incaleſcat, ac subinde naribus admoueat, sine offensione excrementitios humores in capite absumit, idque roborat.

### Dietæ.

Victus ratio sit siccans, aer siccus & calidus moderatè, & cibi tales, qui minimum aquosi & serofi humoris suppeditant. Cum autem, ut in Instit. loc. allegato, dictum, serofus humor partibus duabus constet; vna aquea, altera salia: quando dicitur cibum siccum esse debere, non tale alimentum intelligendum, quod siccæ & terræ naturæ sit; quales sunt carnes sale & fumo indurata, pisces sale conditi, & quæ terrestrem succum generant; (hæ enim potius augent salsedinem serofi humoris, quam minuunt) sed hic eum substantiæ modum intelligimus, & tale alimentum, quod non multum aquosi humoris, nec falsi, suppeditat, ideoque bonum & utilem succum præbet; quales sunt carnes, tum quadrupedum animalium, tum avium plerarumque; ut carnes gallinacæ, hædinæ, vitulinæ, perdicum, & similes, quæ & bonum alimentum præbent, & viscerum, præcipuè lienis, feruorem & siccitatem corrigere possunt: imò hac ipsa de causa iuscula, præcipuè carnum non reicienda, moderatè sumpta; cum substantiam alimentorum multam participant. De liquidis verò aliis non plus sumendum, quam distributio alimenti in totum corpus, & correctio caloris & siccitatis in visceribus, præsertim liene, seri plus, quam par est, ad se trahente, postulat. A fructibus horariis, prunis, pyris, pomis, & similibus abstinendum; cum serofam humiditatem augeant. Passulæ verò utiles sunt. Vino etiam parcè utendum, eiusque non plus, quam

cibi concoctio & distributio requirit, bibendum. Etsi enim spiritum ardentem in se contineat: tamen is paucus est, maxima verò pars aquea; & præterea vinum serofos humores secum ad caput rapit, atque illis, qui iam in capite hærent, feruorem inducit, eosque commouet. Alius aperta seruetur, & nisi spore officium faciat, arte laxetur. Animi motus vehementes, & meditationes atque animi intentiones nimis vitentur; cum vna cum spiritibus sanguinem arteriosum, & cum eo serum, ad caput rapiant, naturæque meditationibus & cogitationibus intera excrementa minus rectè expellat. Utilis verò est corporis exercitatio ieiuno corpore facta, quæ serofos humores discutit, vel sensibilibus, ludoris forma, vel insensibilibus, per ἀδιδον διαπνοήν. Vestibus ita corpus tegatur & muniatur, ut pori cutis aperti seruentur, illique patentibus vel sudor erumpat, vel vapores libere transpirent. Qua de causa etiam corpus noctu plumeis culcitris probe tegatur, ut sub somni finem manè sudor erumpat, quem ad præseruandum à morbis à serofis humoribus ortis, optimum prophylacticum esse supra diximus, ipsa astipulante experientia. Venus vitetur.

## CAPVT XII.

### De Intemperie capitis cum humore Melancholico.

#### Causa.

Intemperies, quæ cum hoc humore coniungitur, est frigida & sicca. Quæ autem humoris melancholici causæ sint, Institut. lib. 2. part. 2. c. 6. dictum, quæ omnes hic locum habent: præcipuè verò in capite ipsam cumulant, & ad id trahunt, mæror, tristitia, animi sollicitudo, curæ, meditationes nimis, vigiliæ immoderate, medicamenta desiccantia nimium capiti adhibita.

Intemperies capitis cum Melancholia.

#### Signa Diagnostica.

Grauitatis sensus est cum vigiliis & visis in somno tristibus, pauores sine causa; cogitationes sunt assidue, sæpe etiam deliria cum timore & mœsticia. Punctiones quasi circa oculos; facies est macilenta & horrida, maximè si humor melancholicus ad atram bilem vergat; color faciei est liuidus & plumbeus: nonnunquam accidit repentina motus amissio, in qua ægri oculis apertis fixo obtutu res aspiciunt, ac licet taceant, ferè omnia animaduertunt: quæ circa ipsos fiunt; excrementa ferè nulla eiiciuntur è capite. Molestia, quæ percipitur, magis est in parte sinistra, & sentitur illa magis horà, quâ melancholia moueri solet; scilicet ab horà nonâ diei vsque ad tertiam noctis. Cum quibus si ægri temperamentum, ætas, vitæ ratio præcedens, tempus anni autumnale, & causæ aliæ melancholiam generantes prægressæ consenserint, certius de hac intemperie iudicium habetur. Utilitatem adferunt quæ melancholiam euacuant, temperant, & à capite auertunt. Nocent quæ humorem hunc generant & augent.

#### Prognostica.

1. Longus & curatu difficilis hic morbus est, sicut omnis affectus melancholicus; præcipuè si diuturnitate temporis radices egerit: circa initia verò curatu facilius est. Ideoque circa initia curatio eius non negligenda, sed maturè medicamenta adhibenda.

2. Facilius quoque curatur hæc intemperies cerebro per consensum laborante, quam si per se afficiatur: modò affectus primarius, à quo dependet, sit curabilis.

3. Malum

# 298 Deintemp. capit cum humore melanch.

3. Malum à suppressâ aliqua euacuatione profectum reductâ illa non ita difficulter tollitur.

## Indicationes.

Melancholicus humor præparandus & euacuandus est: & si ad caput moueatur, reuellendus. Intemperies frigida & sicca corrigenda, & ne humor melancholicus iterum generetur, præcauendum.

## Curatio.

Itaque si cerebrum primariò afficiatur, nihil opus est, quantum ad ipsam rationem affectus attinet, anguinis detractio: quod si aliquando mittendus sanguis, aliqua aliâ ratione mittendus est, vt Galenus, 3. de loc. aff. 7. scribit. Quæ autem illa sit, docet Aëtius ex Posidonio; si scilicet sanguis multus sit in toto, aut aliqua euacuatio conuicta suppressa fuerit. Quapropter si plenitudinis cuiusdam ligna affuerint, & cætera contentiant; primæ viæ primùm euacuentur.

Paretur ergo & iniiciatur talis clyster.

℞. Rad. alibæ, polypod. quern. an. Vnc. ℞. malua, alibæ, mercurial. an. M. j. betonica, maioran. an. M. ℞. fol. sene elect. Vnc. ℞. Coqu. in aq. simpl. vel iure carnis Colat. ℞. ℞. j.

Cassia pro clysteribus ℞. j. elect. diacathol. ℞. ℞. mellis an- thosati Vnc. j. olei chamamel. Vnc. iij. salis Drach. ℞. F. Clyster.

Vel exhibeatur hic Bolus:

℞. Cassia recens extratt. Drach. vj. elect. diacathol. Drach. iij. confect. Hamech. Drach. ℞.

Cum saccharo fiat Bolus. Vel dissoluatur in feri lactis Vnc. iij. F. Haustus.

Vel purgentur primæ viæ cassiâ, syrup. rosar. vel violar. solutin. elect. lenitiuo, diacathol. foliæ, vel decocto fol. sene, secundum Augustanos.

Vel ℞. Meliss. fl. borrag. bugloss. an. P. ij. passul. Vnc. ℞. fol. sene elect. Drach. vj. galanga Drach. ℞.

Infundantur per noctem in l. q. aq. ℞. Colat. Vnc. iij. ℞. In quibus dissolue manna Vnc. ℞. Iterum coletur. Adde syrup. violar. vel ros. solutin. Vnc. i. Misce.

Imò etiam si venæ sectione opus non sit: tamen à primarum viarum ejusmodi euacuatione curam inchoare necessarium est.

Hinc, si opus, aperiatur cephalica sinistri brachij, & sanguis ad Vnc. iij. vel plures, educatur, præsertim si niger ille fluxerit; alioquin, si lucidus & purus, vena citò constringatur, vt Galenus iubet, 3. de loc. aff. cap. 1. Quia autem sanguis melancholicus crassior esse solet, frictio vel corporis exercitatio, vel brachij aquâ tepidâ fomentatio, vt attenuetur, præmittenda, & vulnus latius infligendum.

Si vero menses vel hæmorrhoides suppressæ sint, vena in talo aperiatur. Postea humor præparetur, & purgetur medicamentis conuenientibus, ita vt attenuantibus semper addantur humectantia; cum humor melancholicus per e sit siccus & terrestris.

Præparant humorem melancholicum medicamenta, quæ humectant & calefaciunt, eumque liquant, atque attenuant, sed non siccant admodum, aliquor diebus continuanda: & maximè victus talis.

Radic. Buglossi, borraginis, fœniculi, filic. polypod. gramin. appar. heleni, glycyrrhizæ, scorzonera.

Folia; Melissa, lupuli, scolopendr. cuscute, ro- rismar.

Flor. Borrag. bugloss. stœchad. Arabic. violar. ro- rismar.

Cortices citri.

Seum caprinum.

Vnde sunt; Syrupus de melissa, de borragine, de lupulis, de buglossa, tuniceis, de thymo, de corticib. ci- tri, de pomis.

Conseruæ; Bugloss. borragin. meliss. malua.

Condita; Cortic. citri, caro citri.

Confectio; Alcherme, de hyacyntho.

Vel ℞. Rad. fœnicul. polypod. querni, an. Vnc. i. gly- cyrrhiza Vnc. ℞. bugloss. cori. rad. cappar. an. Drach. ij. melissa, betonica, summitat. lupuli, an. M. j. flor. borrag. bugloss. stœchad. Arabic. an. P. j. sem fœniculi, citri, locymi, an. Drach. j. passul. exacinar. Vnc. j. Coquan- tur in aq. simpl. Colat. ℞. ℞. j. Vnc. ij. Dulcorentur sac- charo pro quatuor dosibus.

Vel addantur Syr. de pomis & de borragine, an. Vnc. ij. Vel ℞. Rad. fœnicul. asparag. polypod. quern. glycyrrh. an. Vnc. ℞. capill. ♀. thymi, an. M. i. rorismar. M. ℞. flor. borrag. bugloss. an. M. i. violar. stœchad. Arab. an. M. ℞. santalor. citrinor. cortic. citri. an. Drach. j. passul. minor. Vnc. j. Coqu. in aq. l. Colentur, & cum sac- charo F. Syrupus, cuius Vnc. ij. dentur cum sero lactis caprini. Vel Colaturæ clarificatæ dentur Vnc. iij. cum Syrupi de pomis Vnc. ℞. pro dosi.

Vel ℞. Rad. borrag. fœnicul. cichorei, cortic. rad. cappar. an. Drach. ij. radic. asari Drach. j. fol. meliss. ser- pill. maioran. betonica, chamadryos, pulegi, an. M. ℞. flor. stœchad. Arabic. schœnanth. an. P. j. fol. sene. epithy- mi, an. Drach. iij. sem. anisi, fœnicul. cortic. citri, an. Scr. j. flor. cordial. an. P. ij. passul. maior. exacinar. Vnc. j. Af- fundantur aq. ℞. iij. & coquantur in vase duplici clau- so in aqua. Colaturæ adde succ. fumar. pomor. borrag. rosar. an. Vnc. vj. sacch. albi ℞. ℞. F. l. a. potio, de qua sumat æger mane & ve. peri Vnc. iij.

Purgant. fol. sene, polypod. quern. epithym. myrobo- lani Ind. elleborus niger & albus; lapis Armenus & La- zuli, de quibus videatur in Institutionibus, lib. 5. part. 1. sect. 1. cap. 11. Et cum, vt ibi dictum, Alexand. Tral- lianus lapidem Armenum elleboro albo præferat, au- toritate Tralliani confusus Guainerius sapissime eo vius, & diuersimodè quidem, ac nunquam optato fi- ne frustratus est, vt dicitur radi. 15. cap. 6. puluerem- que, quem mox subiiciam, inde parat; electuarium diacathol. diaseña, confect. Hamech, p. de fumar. de quina que generib. myrobolan. Ind. de lapide Lazuli, extractum hellebori nigri, antimonium.

In quorum vsu obseruandum, ne in principio fortio- ra exhibeantur, ne humorem agitent, & per se perti- nacem contumaciorem reddant, fortioribusque sem- per blanda & leniora quædam, & humectantia ad- mi-cenda. Idcoque medicamenta in forma liquida cõ- modiora sunt. Et omittenda quoque sunt omnia sic- cantia, vt aloë, hiera, pilulæque rarò vsurpandæ.

Vt ℞. Rad. fœnicul. polypod. quern. an. Vnc. ℞. beto- nic. melissa, capill. Veneris, an. M. i. cererach. flor. borrag. bugloss. an. M. ℞. sem. anisi, fœnicul. an. Drach. i. fol. sene elect. Drach. x. hellebori nigri præp. Drach. ℞. epithymi Drach. ij. passul. maior. enucleat. Vnc. i. glycyrrhiz. ℞. ℞. Coq. in. l. q. feri lactis Colaturæ ℞. ℞. j. Syrupi de stœcha- de simpl. violarum solutini, de pomis, an. Vnc. j. Misce pro tribus dosibus.

Vel ℞. Fol. sene elect. ℞. ℞. polyopod. querni, epithymi, rad. gra. apa, an. Drach. i. cremor. tartari Drach. ij. dia- grydi Scr. j. sem. anisi fœnicul. spica, caryophill. macis, an. Scrup. ℞. Dos. Drach. j. Silibet, potest addi sac- charum.

Vel ℞. Fol. sene mundat. ℞. j. cremor tartari ℞. ℞. ci- namomi Drach. ij. caryophyll. diagryd. an. Drach. ℞. F. Puluis. Dos. Drach. i.

Puluis Guainerij:

℞. Lapid. Armeni Scrup. ij. croci Scrup. ℞. macis Scrup. j. F. Puluis. Alij de lapide Lazuli talem parant.

℞. Lap. Lazuli sapius loti Scrup. ij. epithymi Scrup. j. croci Scrup. ℞. sacchar. Drach. i. F. Puluis.

Vel ℞. Elect. diacathol. Vnc. ℞. diaseña Drach. ii. cõ- fect. Hamech. Drach. j. Cum saccharo F. Bolus. In mor- bi progressu hæ Pilulæ exhiberi possunt:

℞. Pil.

Humorem  
melancholi-  
cum in capi-  
te præpara-  
ndum.

Euacuatio  
melancholia  
de capite affe-  
cto.



*℞. Pil. Indarum* Scrup. ij. *cochiar.* Scrup. j. extra-  
sti *hellebori nigri* gr. vj. Cum aq. meliss. F. Pilulæ  
xxiiij.

Et quia humor hic pertinax est, & semel nunquam  
plene euacuatur, præparantia & purgantia repetere &  
continuarè opus est.

Intet omnes syropos hic primas tenere syrupum de  
de pomis compositum, descriptum à Mesue, cap. de  
soda frigida à melancholia, scribit Rondeletius, method.  
curandor. morbor. cap. 9. ut qui non solum con-  
coquit, sed & educit humorem melancholicum  
ac pituitosum; idque sine noxa ventriculi & alia-  
rum partium.

Paratur autem hoc modo:

*℞. Capillor. Veneris, radicum buglossa domestica &*  
*stylvest. florum bugloss. polypodij, epithymi, an.* Vnc. j. fo-  
lior. *sena; chamamel. stachad. an.* Drach. vij. *chamadryos,*  
*schananthi, hellebori nigri, an.* Drach. iij. *fumi terra*  
*Drach. vij. eupatorij* Drach. iij. *succi pomorum dulc.*  
*Drach. viij.*

Omnia præter epithymum & succum pomorum,  
bulliant in lb. iij. aquæ usque ad lb. ij.

Deinde bulliat in iis ebullitione vna epithymum,  
& coletur, & cum succi pomorum lb. ij. sacch. q. s. Fiat  
Syrupus.

Non tamen usurpari debet in principio, sed in pro-  
gressu morbi, & præcedente totius capitis vniuersali  
purgatione.

Iacchias decocto hellebori nigri vitur, hoc modo  
parato:

*℞. Cortic. helleb. nigri* Vnc. s. Contusi leniter in-  
fundantur in lb. ij. aq. horis vj. Postea adde addè *cina-*  
*moni, sem. dauci, epithymi, an.* Drach. j. *passular. Vnc.*  
*s. flor. bugloss. M. i.*

Coqu. ad dimidiæ partis consumptionem, dulco-  
rentur saccharo, propinentur pro duabus dosibus.

Post vniuersales istas corporis euacuationes parti-  
culares euacuationes per erihina & gargarismos supra  
propositos instituendæ; quibus hic polypodium, thy-  
mum, epithymum, elleborum addere commodum est.

Si morbus sit pertinax, & æger sanguine simul abun-  
det, etiam frontis vel narium venas aperire vtile est.

Per insensibilem etiam transpirationem discutienda  
materia: medicamentis verò, quæ hoc præstant, sem-  
per admiscenda humectantia. Utendum nimirum oleo  
irino, anethino, lilior. albor. amygdal. dulc. chamamelino,  
unguento alabastrino; vel lotiono ex decocto florum cha-  
mameli, borraginis, rosarum, flor. stachad. Arab. fol. beto-  
nica, melissa, sem. anethi, fol. sena adiectis.

Decoctum hoc Embrochæ modo per plures dies ca-  
piti instillare commodum est:

*℞. Folior. malua, alibea, bugloss. summ. aneth. an.* M. ij.  
*f. chamam. viol. an.* M. j. *sambuci P. j. capit. papau. num. vj.*  
Coquantur in aquæ lb. xxj.

Si humor melancholicus ab inferioribus, præcipue  
liene & hypochondriis, comunicetur, frictions &  
alia reuulsionis media non omittenda; de quo plura di-  
centur suo loco de melancholia hypochondriaca.

Peracta purgatione, imò dum adhuc peragitur, ea ex-  
hibenda, quæ caput & cor alterant, roborant, & simul  
exhilarant: ex consenuis; borraginis, buglossi, violarum,  
melissa, anthonis, cort. citri conditi, radic. condit. helenij,  
quod Rondeletius, in meth. curand. morbor. cap. 9. mi-  
ram vim & proprietatem ad hilaritatem & gaudium  
excitandum habere, & à nonnullis pro secreto haberi  
scribit; confect. alchermes. de hyacintho, elect. de gemmis,  
larificante Rhafis & Galeni, dianthonis, diamoschi dulcis,  
item lapid. Bezoar, aduersus omnes melancholicos mor-  
bos valde vtili, corallii, margaritis.

Ut *℞. Conseru. bugloss. borraginis, an.* Vnc. j. *rosarum*  
*Vnc. s. margarit. præp. Drach. s. hyacinthi, sapphiri, sma-*  
*ragdi, coralliij utriusque, an.* Scrup. s. *cinamomi, macis*  
*galange, nuc. moschat. an.* Scrup. j. *caryophyll. cubebæ.*

*ligni aloës, styrac. calamita, sem. Basilici, an.* Scrup. s.  
*croci* Scrup. j. *moschi, ambræ, an. gr. iij. carnis. vuar. pas-*  
*sar. Vnc. ij. aq. rosarum moschata Vnc. j. sacchari. q. s. F.*  
*Electuarium. De quo mane sumat. Drach. iij. cum aquæ*  
*bugloss. Vnc. iij.*

Vel *℞. Conseru. bugloss. borragin. melissa. an.* Vnc. j.  
*anthonis, violarum, an.* Vnc. s. *cort. citri condit. Drach.*  
*ij. specier. diamoschi dulcis, latitia Galen. an. Scr. i. con-*  
*fect. alchermes Drach. s. Cum Syropo tunicis. F. Ele-*  
*ctuarium.*

*℞. Conseru. bugloss. violar. rosar. an.* Vnc. j. s. *tuni-*  
*cis Vnc. j. specier. dianthonis, diamb. diamarg. frig.*  
*an. Drach. s. Cum Syropo de pomis & corticib. citri*  
*F. Electuarium.*

Vtile est & semel in septimana sumere Drach. s.  
vel Scrup. ij. Mithridatij, cum Vnc. s. conseru. flor.  
borragin. vel buglossæ.

Vel *℞. Conseru. bugloss. violar. an.* Vnc. j. s. *meliss. cor-*  
*tic. citri conditorum, an.* Vnc. s. *specier. diamb. diamosch.*  
*dulc. diamargarit. frigid. an.* Drach. s. *lapid. Bezoar.*  
*Scrup. s. Cum Syropo de pomis. F. Electuarium.*

Vel *℞. Conseru. bugloss. meliss. violar. an.* s. ij. *cort. citri*  
*conditor. Vnc. j. specier. diamb. diamosch. dulc. diamarg.*  
*rit. calid. an. Drach. s. confect. alchermes Drach. j. lapid.*  
*Bezoar. Scrup. j. Cum Syropo de pomis. F. Electuarium.*

### Dieta.

Aër ad calidum & humidum vergat, sit lucidus, non  
tenebricosus, non fœtidus, sed suauolens. Viæ ratio  
instituatur ita, ut præter caliditatem magis incli-  
net ad humidum: cibi que talis sit, ut bonum san-  
guinem suppeditet. Sæpe enim, præcipue si malum  
recens sit, solâ viæ ratione bonâ, qua probus, tenuis  
& clarus sanguis, qui omnem humorum malitiam cor-  
rigit, gignitur, & corporis humectatione malum hoc  
curatur. Ad bonum sanguinem gignendum faciunt pa-  
nis ex bono frumento, bene coctus, oua recentia, car-  
nes animalium iuuenum, præsertim pullorum galli-  
naceorum, hædorum, vinum bonum, & similia. Con-  
uenit & prisa hordeacea. Ex oleribus conueniunt  
malua, buglossa, borrago. Ex fructibus, vna & mala  
dulcia, vna passæ. Vitet æger omnem cibum, qui suc-  
co melancholico materiam præbet, qualia sunt le-  
gumina, porrum, cape, caules & similia, quæ Galenus  
3. de loc. affect. cap. 9. recensuit. Cibi quantitas etiam  
moderata sit, nec abstinencia se maceret æger. Vinum  
tenue bibat, conditum melissa, flor. bugloss. borrag.  
cort. citri. Modus & exercitia corporis sint moderata, &  
quæ ad excrementa discutienda sufficiant, non verò  
corpus resoluant & exsiccant: animus à mœrore abdu-  
catur, & omnibus, quantum fieri potest, modis ad læ-  
ticiam componatur. Somnus sit longior, omnique  
modo prouocandus; cum in eo maxima curationis  
spes sit, utpote qui cerebrum maximè humectat: vigi-  
liæ verò nimix sunt interdiciendæ. Balneum aquæ dul-  
cis in hac intemperie vtile est. Omnia, quæ metum &  
tristitiam conciliare possunt, vitentur. Animus contra,  
quibus potest modis, ad hilaritatem componatur.

### Q V Æ S T I O

An acetum melancholicis vtile sit?

Donatus Antonius ab Alto Mari, de medend. corp.  
human. morb. cap. 7. ex Aëtio & Paulo Aegineta, qui  
hoc ipsum è Posidonio mutuari sunt, extollit aceti  
acerrimi sorbitionem post omnem cibum, ubi iam dor-  
mire velit æger; vel quod attenuet, succumque melan-  
cholicum discutiat, vel quod sumptorum ciborum  
vapores humidos confectum ad caput deferat, somnū-  
que propterea conciliet: tantorumque virorum, siue  
his, siue aliis rationibus moti fuerint, consilium sequen-  
dum

Caput &  
Cor roboran-  
tia in melan-  
cholia.

dum censet. Verum maioris ponderis nobis sit Hippocratis & Galeni autoritas, ratione & experientia munita, qui in affectibus melancholicis aceti usum improbant. Hippocrates, 3. de ratione vietus in acut. cap. 38. scribit: Nigra ab aceto fermentantur, attolluntur & multiplicantur, & exaltat nigra acetum; & Galenus ibidem, acetum melancholiz aduersissimum esse dicit. Qua de re etiam diximus de Febris. lib. 2. cap. 19. vid. etiam infra, part. 2. cap. 8.

An acetum  
& acida, in  
melancholi-  
cis morbis  
conueniant?

Negativa.

[ Equidem non infrequens est apud multos, acidos liquores in melancholicis morbis exhibere; unde nonnulli in frequenti usu habent spiritum Vitrioli, tinctur, rosar. & violar. Vitriolat. syrup. rosar. Vitriolat. conferu. rosar. Vitriolat. quæ omnia hypochondriacis etiam frequentissime exhibentur. Verum an recte, dubium. Hippocrates certe 3. de rat. vict. in acut. text. 38. scribit: *ἡ οὖρ ὅτι τὰ μέλανα ζυμύται καὶ μακρὴν γίνονται, καὶ πλεονάζουσι. ἀναγνῶν δὲ μέλανον ὅτι*, id est, Nigra ab aceto fermentantur & in sublime attolluntur, & multis partibus augentur. Acetum namque nigra exaltat. Vbi notandum vulgo male verti hunc locum: *Educit nigra acetum*. Et ibid. Galenus acetum melancholiz aduersissimum esse statuit. Et licet humor melancholicus, non sit ita acidus, vt bilis atra: tamen aliquam aciditatem etiam melancholiz tribuit Galenus, lib. 14. meth. med. cap. 9. libr. 3. de loc. aff. cap. 7. lib. de placit. cap. ult. Ergo si humor melancholicus aliquo modo est acidus, acidis corrigi non potest, cum contraria contrariis curentur.

Affirmativa.

Contra alij ad experientiam prouocant, & in morbis melancholicis spirit. Vitrioli Martis & Veneris se magnum vltum comperisse iactitant, & eos penè pro Panaceis habent.

Deciso.

Qua de re vt meam sententiam aperiam, omnino certum esse puto, acida per se humorem melancholicum non corrigere, sed potius eum augere, & deteriorem reddere, & vt in atram bilem degeneret, facere, & propterea ab eorum usu in alteratione humoris melancholici merito abstinendum esse. Quod verò interdum prodesse videntur, causa hæc est: Humor melancholicus, quandiu in hypochondriis quietus hæret, molestus non percipitur, ægròque nihil mali inferre videtur. Tum autem, quando mouetur, & in alias partes principes transfertur, vel vapores, & sui generis noxios ichores à se mittit, molestus esse incipit, variaque grauissima symptomata producit. Tunc ergo omne illud, quod commotionem illam sentinæ melancholicæ, humorisque huius motum ad partes principes inhibere, exhalantes inde halitus compescere, & ita disponere ac figere potest, ne quid amplius ichorū prauorum è se fundat, symptomata quoque ab humore melancholico profecta tollere potest. Et proinde pro salutari remedio habendum, & ægri & medici (ab ægris rectius post horum usum iam habentibus persuasi) censent. Et non negandum, acetum, & inprimis acidus succos minerales assumptos, qui fixo Sale constant, humores quoque salfos figere, & vt in hypochondriis quiete coerceantur, nullamque homini molestiam creent; nec sui generis vapores & ichores de se fundant, præstare. Et hoc ipsum est, quod Paracelsus scribit, nihil esse salutaris & melius, quàm morbum in centro suo retinere (quod ipsum tamen etiam de narcoticis accipiendum videtur, quæ ad paroxysmos febrium tollendos exhibentur) id est, fumos illos noxios ita figere, vt molesti amplius esse desināt. Verum nec hæc regia & tuta via curandi morbos est. Nam salutare illud præceptum; ad causam morbi, & morbum ipsum, magis quàm ad symptomata, nisi valde vigeant, respiciendum esse, hic negligitur, ægræque palliativæ haccurâ deceptus, in maius periculum coniicitur. Et hæc ipsa conuetudo, acidus eiusmodi spiritus in omnibus ferè morbis exhibendi, inter alias plures etiam forsitan vna est, cur hypochondriaca affe-

ctio ita frequens & diuturna sit. Et obseruatum est, ex nimio spirituum acidorum vii quoidam planè melancholicos factos.]

## CAPVT XIII.

### De Intemperie Capitis cum Bile Atra.

#### Causa.

Bilem atram è sanguine, bile flaua, vel humore melancholico adustus provenire, Institut. lib. 2. part. 2. cap. 6. dictum. Eadem causæ & hic locum habent. Causæque, quæ sanguinem, vel bilem, vel melancholiam, seu in capite, seu in hypochondriis, seu in toto adurunt, vbi ille humor adustus capiti communicatur, intemperiei calidæ & siccæ cum materia, quæ est atrabilis, causa esse possunt. Vnde malum hoc (quæ remotiores causæ sunt) sæpe incalescenti melancholiz succedit, & ira, mæsticia, nimia animi intentio, ac stultitia, sollicitudo, vigilia; præcedentes capitis dispositiones calidæ, inflammatioque, vini potentis nimius usus, medicamenta immoderatè calefacientia, intemperiem hanc producere possunt. Præcipuè verò in biliolis, extenuatis, & iis, qui hepate ac corde calido & sicco præditi sunt: obesi verò & pituitosi ad hunc morbum minus sunt dispositi.

Intemperie  
capitis cum  
atra bile.

#### Signa Diagnostica.

Adest dormiendi impotentia, & vigiliz pertinacissimæ; sæpe etiam accedit delirium. Pro humorum tamen, è quibus atra bilis gignitur, diuersitate hic etiam est quædam differentia. Nam si ex sanguine adusto bilis atra sit generata, hilariiores nonnihil sunt, & ad risum proclives, ac præcesserunt signa sanguinis abundantis. Si ex bile flaua profecta sit, ferinum est delirium, cum iracundia & temeritate, ac quod Hippocrates. 6. aphor. 13. *μετὰ σπένδης* appellat, audaces sunt & violenti. Si ab humore melancholico sit atra bilis, mæsti sunt & taciturni, & cum per intervalla loqui incipiunt, garuli sunt, neque loquendi finem faciunt. Omnibus tamen ferè hoc commune est, vt aspectus sit horridior & truculentior; de quo suo loco de Mania plura.

#### Prognostica.

1. Curatu difficile hoc malum est, & tempus ad curationem satis longum requiritur. Cum enim cerebrum naturæ sit frigidum & humidum, longè à naturali sua constitutione recessit, & valentiora medicamenta; ac longius tempus, vt ad pristinum statum reducat, postulat.
2. Facilius curatu est in iuuenibus, ac mediæ ætatis hominibus: difficilis verò in senibus.
3. Melancholicis & nephriticis hæmorrhoides superuenientes bono sunt.

#### Indicationes.

Intemperies hæc calida & sicca refrigeranda & humectanda est. Materia ipsa eodem modo alteranda, temperanda, attenuanda & euacuanda est, eiusque generatio inhibenda. Et quidè si humor atter proveniat à bile flaua exusta, calidior est, & magis refrigerantibus indiget: si verò ab humore melancholico, minus calidus est, minusq; refrigerantia requirit, vterque tamen humida postulat. Qui autè à sanguine exusto est, mediocrè conditionem obtinet. Et si in toto, vel partibus inferioribus generetur, & ad caput trāsmittatur, à capite reuellatur, repellatur, & quod reliquū, euacuetur. Et quò eius generatio prohibeatur, intemperies viscèris, à qua produ-

ducitur,

ducitur, corrigenda, & cum plerunque à caliditate & sic-  
citare hepatis, vt & lienis, ortu habeat, ea viscerum in-  
tèperies refrigerantibus & humectantibus alteranda. Et  
quia vigiliz in hoc morbo vigent, eumque augèt, danda  
diligenter opera, vt somnus omnimodo concilietur.

## Curatio.

Itaque primò clyster aliquis humectans, ex althæa,  
malua, parietaria, borrag. bugloss. violis, cum cassia &  
electuario diacathol. paratus, iniiciendus,

Vt *℞. Rad. althæe, polypod. querni, an. Vnc. β. parietaria, branca vrsin. fumaria, lactuca, borrag. an. M. i. fol. sena 3. vi. prunor. num. xij.* Coquantur in aq. simpl.

Colat. *℞. lb. i. cassia pro clysteribus 3. i. elect. diacathol. 3. vi. olei olinar. chamamel. an. 3. is. F. Clyster.*

Hinc si ex sanguine adusto bilis atra prouenerit, vel  
in capite, aut toto sanguis adustus & feruidus redundet,  
communis, basilica, vel cephalica vena, prout opus, aperi-  
atur: sanguinisque missio præsentissimum in hoc morbo  
est remedium. Et quidem si in capite redundat san-  
guis, statim cephalica aperiatur; si in toto simul, primò  
còmunis vel basilica, deinde cephalica secetur, & præci-  
pue in sinistro latere. Reuulsionis quoque gratia laphena  
aperiri potest; præsertim in mulieribus, cum menses  
suppressi huic malo originem dederunt, vt & si hæmor-  
rhoides suppressæ morbi causa sunt. Quandoque etiã  
in viris natura *grata metascan* humorem, huius morbi  
causam, à capite & nobilioribus partibus ad cruales  
venas detrudere, & varices in cruribus excitare, morbu-  
que hoc modo dissolvere solet.

Neque inutile fuerit hirudines circa tempora & post  
aures, vel etiam ani venis applicare, si hæmorrhoides  
suppressæ sint.

*Atram bilem  
in capite  
reparantia.*

Hinc materia præparanda refrigerantibus & hume-  
ctantibus, vt:

Radicibus; *Borrag. bugloss. gramin. asparagi, polypod. glycyrrhizæ.*

Floribus; *Borrag. bugloss. violar. nymphae. rosarum.*

Foliis; *Lactuca, borrag. endiuia.*

Seminibus; *Quatuor frigidior. maior. papau. lactuc.*

Fructibus; *Passul. iunubar. sebesten. pomor. prunor.*

Et, quæ hinc fiunt,

Aquis; *Borrag. bugloss. violar. rosar. endiu. fumaria.*

Syrupis; *Viol. de borrag. bugloss. nymphae. byzantin. simpl.*

Conseruis; *Borrag. bugloss. rosar. violar. nymphae,* qui-  
bus cordialia ob affinitatem adicere licet: Conseru.  
*Anthon. meliss. cortic. citri.*

Et quidem medicamenta ex his, pro natura humoris,  
è quo humor hic ater generatus, eligenda sunt. Nam si  
ex sanguine feruido atra bilis sit genita, ea eligenda,  
quæ de intemperie capitis cum bile. proposuimus; si ex  
humore melancholico, ea ferè conueniunt, quæ capite  
præcedente de intemperie cum humore melancholico  
tradita sunt,

Vt *℞. Aq. borrag. bugloss. fumar. an. 3. ii. syrup. borrag. bugloss. violar. an. 3. is. M. F. Potio pro ii. dosibus.*

Vel *℞. Rad. bugloss. glycyrrh. polyp. querni, an. 3. vi. fumar. ceterach. an. M. β. fl. cordial. M. i. epithym. 3. ii. Coqu. in aq. pura.*

Colat. *℞. 3. vi. Adde succi pomor. 3. vi. sacchari 3. is. Ebulliant & depurentur, vel addatur syrup. de pomis, violis, an. Vnc. i.*

Vel *℞. Conseru. bugloss. borrag. violar. an. 3. i. nymph. rosar. an. 3. β. specier. diamarg. frig. 3. β. Cum syrupo de pomis. F. Electuarium.*

*Atram bilem  
in capite pur-  
gantia.*

Purganda postea est materia *syr. viol. solut. diapruno solutiu. decocto sena, epithymo, polypod. diacathol.* quibus  
deinde *hellebor. niger* adiici potest, *confect. Hamech & diasena, lapide Armeno, Lazuli, pilulis de fumaria, de la-  
pide Lazuli.* Vbi notandum, vt purgantibus istis semper  
ex humectantibus & præparantibus antea enumeratis  
aliquid admisceatur, & purgantia non vsurpanda,  
nisi corpus prius humectatum fuerit.

*Dan. Sennerti Tom. II.*

Vt *℞. Flor. cass. elect. diacath. an. 3. β. confect. Hamech. 3. i. Cum saccharo. F. bolus, vel dissoluantur in aq. fumariz & bugloss. an. 3. ii. & addita syrup. violar. Vnc. β. F. Haustus.*

*℞. Fol. sena Vnc. β. epithym. Dra. ii. flor. violar. borrag. fumaria, an. P. ii. passular. ex acinatar. glycyrrhizæ, an. 3. β. Coqu. in aq. hordei simplici.*

Colat. *℞. 3. iij. In iis dissolue manna elect. Vnc. i. Co-  
lentur, adde syr. violar. solutiu. 3. β.*

Vel *℞. Rad. bugloss. graminis, an. 3. β. polypod. querni 3. ii. glycyrrhizæ 3. β. cortic. fraxin. amariso. an. 3. iij. meliss. lingua ceruina, ceterach. capillor. 3. an. M. i. fol. sen. ele-  
tor. 3. ii. epithym. 3. β. hellebor. nigr. præp. 3. ii. sem. a. frig-  
id. maior. an. 3. i. sem. portul. 3. ii. ocym. fenicul. zedoar. an. 3. i. iunubar. sebesten, an. num. x. passul. ex acinatar. sa-  
marind. an. Vnc. β.*

Infundantur per noctem in aq. pura, postea ebul-  
liant & colentur.

In colaturæ lb. ij. infundatur *rhabarb. 3. β. cinamom. Scr. iij. flor. cordial. an. P. ii.*

Colat. adde succi pomor. *Borstorfianor. vel aliorum odo-  
ratorum lb. i.*

Iterum parum coquantur, sacchariq; q. f. ad dulcora-  
dum addatur, & clarificentur. F. Potus ad dies 5. vel 6.

Vel addatur sacchari q. f. Coquantur ad syrupi con-  
sistentiam, de quo 2. vel 3. cochlearia propinentur.

Licet & in grauioribus malis antimonio & medica-  
mentis ex eo præparatis vti.

Post purgationem alterantia supra proposita repe-  
tenda, quibus addi possunt margaritzæ, fragmenta lapidū  
pretiosorum, lapis Bezoar, corallium, bolus Armenus,  
quæ non solum, vt nonnulli putant, vim habent exsiccā-  
di ichores, qui in arterias penetrarunt, sed & falsis illis ac  
adustis humoribus (quo modo etiam acerū acrimoniã  
amittit) acrimoniã adimunt, & ita ad illa, quæ solēt, sym-  
ptomata excitanda ineptos reddunt, vel etiam peculiari  
vi spiritus defecandi & illustrandi prædita sunt.

*Atram bilem  
in capite al-  
terantia to-  
pica.*

Post sanguinis missionem & purgationem fronti &  
futuræ coronali frigida humectantia applicanda sunt.

Vt oleum rosar. violaceum, nymph. amygd. dulc. qui-  
bus oleum anethinum & chamamel. admisceri potest.

Aqua rosar. lactuc. viol. & aliar. plantar. refrigerantium,  
Epithemata è refrigerant. & humectantium aquis &  
decoctis.

Vt *℞. Ol. viol. nymph. rosar. an. 3. i. aq. lactuca, solani, rosar. aceti, an. 3. β. Milce.*

Vel *℞. Fol. lactuca, borrag. endiu. an. M. i. flor. rosar. borrag. bugloss. nymph. an. P. ii. capit. papau. cum semine num. x. Coquantur in aq.*

Colaturæ *℞. lb. i. Adde ol. violar. rosar. an. Vnc. ii. M. pro Epithemate.*

Vel *℞. Fol. malu. flor. violar. nymph. an. M. ii. capis. papauer. albi cum seminibus num. vi. flor. chamamel. melilot. summitat. anethi, an. M. i. fol. sena 3. ii.*

Coqu. & decocto caput abluatur, & hinc ol. viol. &  
de nympha cum lacte muliebri irrigeretur: vel si ascen-  
sus vaporum metuat, cum oleo rolaceo.

Linimentum:

*℞. Ol. violar. seu cucurbitæ, an. Vnc. i. papauer. aneth. an. Vnc. β. mucilag. sem. psylli aq. violar. extracta Dra. v. sem. lactuca, hyoscyam. an. Drach. β. croci Scrup. β. Misc. F. Linimentum.*

Emulsiones; *sem papau. lactuc. amygd. dulc.*

Sacculi fiunt ex rosis, flor. violarum nymph. sem. papau.  
Lotiones pedum & manuum ex refrigerantibus & hu-  
meclantibus supra propositis.

Balneum aq. dulcis vtile est, cum decocto earundem  
plantarum paratum.

Tandem post euacuationes vniuersales institutas &  
absolutas ad particulares cerebri euacuationes perue-  
niendū, quæ sunt apertione venarum frontis, natiū, aut  
sub lingua, aut applicatione hirudinum ad venas post  
aures, enrhinis item, vt capite præcedente dictum.

Si malum non cedat, Zechius, *Consult. 80.* ad tria tantum generosa remedia confugiendum censet, si humor adustus in toto corpore simul redundet. Sunt autem ea, lactis serum, cum succo cichorii & fumarie largâ copiam quindecim diebus hor. 5. ante prandium haustum; aquæ theriacales, quarum minera sit ferrum, epotæ; & aquæ dulcis tepidæ balneum, pluribus diebus vespere, duabus horis ante cenam, viurpatum: cuius vsu & vniuersum corpus humectatur, & obstructi & adstricti meatus aperiantur.

*Cauterium  
in mania.*

Si reliqua non profint, etiam ad cauteria bregmati, modo supra explicato, nonnulli deueniendum, & cauterium per mentes aliquot apertum tenendum censent. Scribitque Guainerius, *tract. 11. c. 9.* se nobili cuidam fœminæ mania laboranti cauterium potentiale syncipiti applicasse, quo curis ad cranium vsque absumpta sit: hinc in coniunctione Lunæ & Solis cranium trepano aperuisse, & foramen per mentem apertum seruasse, atque ita fœminam illam, quæ plus quam duobus annis mania laborauerat, sanitati restitutam fuisse. Vtilissimum etiam est ægrum in balneum aq. dulcis calidæ sapius inducere.

#### *Diatæ.*

Aer in caliditate sit temperatus, ad humiditatem vergens. Cibus sit in quantitate mediocris refrigerans & humectans, vt: præsana, iuscula carniū, carnes pullo- rum gallinaceorum, gallinar. agnina, hædina, vipulina, perdicum, oua fortilia. Abstinentum verò ab iis, quæ bilem gignunt, iisque, quæ crassum succum suppeditant; quales sunt, caro bubula, ceruina, hircina, & fumo, indurata. Ex piscibus conueniunt laxatiles & friabiles. Grandes verò pisces, duri & viscosi, salsi, & fumo vel aere indurati nocent. Cibi condiantur borrag. malua, lactuc. asparago Panis sit similagineus. Vino æger planè abstineat, nisi à metu aut melancholia adusta hoc malum originem habeat. Tum enim vinum album tenue concedendum, aut si fortius sit, diluendum aq. borrag. violar. endiuie & cichorii. Huiusmodi enim vinum ad excrementa biliola temperanda & expellenda, partiumque solidarum siccitatem corrigendam est aptissimum. Vel bibat æger aquam hordei cum succo granatorum dulcium, aut serum lactis, in quo epithymum maceratum sit, vel etiam lac calidè emulsum cum saccharo potet. Exercitium sit mediocre. Somnus sit consuetudo longior, qui propterea medicamentis cum externis, tum internis conciliandus. Alius laxa sit, & nisi sponte officium faciat, clysteribus vel lenientibus medicamentis aperta seruetur. Animus ad hilaritatem componatur, & omnes, quæ iram & tristitiam commouere possunt, occasiones vitentur.

#### CAPVT XIV.

*De Venenatis & malignis, & tota Substantia cerebro contrariis morbis.*

*Venena cerebro aduersa.*

PRÆTER intemperies hæcenas enumeratas cerebrum quoque morbos quosdā malignos, venenatos, quos totius substantiæ vocant, quandoque patitur. Talis est illa *distortio* quam imprimis aura vel vapor, vel materia venenata, quæ epilepsiam excitat seu ea in cerebro generetur, seu ab inferioribus transmittatur. Tales sunt dispositiones, quas imprimunt venena cerebro peculiariter infensa; olanum furiosum, hyoscyamus, herba Sardonias, seu apium risus, virus canium, torpedo, mæstruus sanguis malignus, vinum fulmine tactū, cicuta, napellus, vmbra arboris iuglandis, taxi, cocculi de Leuante, & pisces iis capti, aconitum; thus cum vino, sanguis humanus potus, lolij semen, flores colchici, quorum alia

somnū p.n. inducunt; alia imaginationem & raliocinationem lædunt, ac deliria excitant; nonnulla conuulsiones aut paralytin inducunt. Refertur inter ea etiam cerebrū & sanguis felis; de quo memorabilis historia est apud VVeinrichium, *de monstr. c. 15.* quæ ita sese habet: Puella quadam VVarislauia mollior, non multorū annorum, cum publicè spectaret à carnifice latronem capite truncari, territa spectaculi fœditate in epilepsia incidit. Multa, vt sit, pro remedio tentata, sed frustra omnia. Ex vulgo quispiam suaserit, felium sanguinem porrigi vtile esse, quo ebibito malum non difficulter cessaturum. Offertur, accipit misera infelici euentu admodum. Paulò post enim felis naturam induit ex intervallo, & quod id animal in ædibus solet, id illa imitatur, voce, saltu, gestu, vestigiis, cum mures in silentio venatur in angustissimis etiam quibuscunque potest foraminulis, idque ita diu, dum paroxysmi vehementia remiserit. Hactenus VVeinrichius. De quibus omnibus vide etiam *lib. 6. pract. part. 6. 7. 8.* Ita in mania peculiarem malignitatem statuit Platerus.

Verūenimverò cum, vt modo dictum, alia alias actiones lædant, ac de epilepsia, sopore graui, & deliriis, quæ ab huiusmodi venenis proueniunt, suo loco dicendum sit, & vix aliquod venenum sit, quod, etiam si cerebrum primò afficiendi vim habeat, non tamen reliqua membra in consensum trahat: in enumeratis symptomatibus de iis aliquid dicitur; reliqua suo loco, vbi de venenis in specie agitur, explicabuntur.

#### CAPVT XV.

*De Vitio Spirituum Animalium.*

AN spiritus animales partes sint corporis, nec ne, hic non disquirimus: satis est, si sciatur, eos ad actiones animales omnino necessarios esse, neque sine iis eas perfici; & si actiones hæ rectè perfici debent, requiri, vt ipsi non minus, quam cerebrum suam naturalem temperiem & constitutionem habeant.

Generatur spiritus animalis in cerebro, quod eius fons & origo est; & ea de causa præter facultatem altricem, quæ ipsi cum omnibus partibus viuentibus communis est, peculiarem substantiam, ab omnibus aliis corporis partibus diuersam, habet, & potentias, quibus & retinet materiâ, è qua spiritus animalis generatur eamque alterat & coquit, & in spiritum animale mutatur.

Generatur autem spiritus animalis ex subtilissima spiritus vitalis parte, & aere attracto, ab ipsa cerebri substantia, quæ animæ, vt agentis principalis, proximū instrumentum est, cui in toto corpore similè reperire non est. Ea enim animæ sedes est, non verò ventriculi, & ab ea spiritus animales elaborantur, atque in ea, nõ verò in ventriculis, quorū alius vsus est, vt alibi dictum, continentur. Cerebri verò substantia ad actionē hanc concurrir præcipuè per suum calidum innatum & peculiarem temperiem, ac pro huius variatione etiam spiritus animales variant. Est tamen etiam necessaria peculiaris cerebri conformatio, quæ in magnitudine, figura, & cavitatibus consistit, quæ non solum in spirituum generationem & conseruationem, sed ad motum, necessaria est; & præterea cerebrum suam temperiem & calidum natium debito modo dispositum habere debet. Hoc enim modo cerebrum constitutum spiritus animalis origo, fons & domicilium est.

Plura autem ad naturalem constitutionem spirituum requiruntur. Primò vt habeant suam temperiem, quæ est quidem calida, sed longè temperatior, quam spirituum vitalium. Secundò vt sint tenuissimi & subtilissimi: quæ de causa rerum Creator sapientissimus innumeros arteriarum plexus in cerebro collocauit, vt per minutissimarum arteriarum insensibilia orificia spiritus vitalis in cerebrum exactè tenuissimus quasi percolaretur,



& à sanguine arterioso separaretur. Tertio ut sit purissimus, lucidissimus & splendidissimus: quâ de causâ spiritus animalis è spiritu vitali, à sanguine arterioso separato, & in cerebro, omnis ferè coloris experire, recepto gignitur, & ibi ulteriorè elaborationem adsequitur. Idem nimirum hic fieri credendū est, quod in igne, qui quò magis in flamma à fumo separatur, eò fit clarior & lucidior. Quarto ut sit copiosissimus: quam ob causam cerebrum amplissimum, mollissimum, innumerisque poris & cavitatibus præditum est, & ad illud innumeræ ferè arteriæ decurrunt. Quinto ut naturalem suum motum in cerebro habeant.

Quæ naturalis spirituum animalium constitutio si lædatur quocunque modo, etiâ actiones animales, quæ per ipsos, ut instrumentum proprium, obeuntur, vitari necesse est. Etenim si spiritus animales nimium incalēscant & feruidiores reddantur: id quod fit in febribus acutis, & parvum internarum inflammationibus, vaporibus calidis caput perentibus, spiritibusque sese permiscētib; item in cerebri & membranarum inflammationibus, & intemperie calida p.n. in phrenitide, in mania; aut dum à causis externis, ut æstu Solis, aliisque, supra, e. i. enumeratis, cerebrum incalēscit, vigilie immodicæ & deliria accedere solent. Frigidus contra spiritus animales actiones omnes hebetat, & stoliditatis ac amenitiæ causa est.

Si spiritus animales suam naturalem tenuitatem non obtineant, sed crassiores iusto sint, animales actiones quoque rectè sese non habent, sed torpidiores quasi sunt. Negat quidem Platerus planè, ubi de læsâ visione tractat, spiritus animales crassescere; cum sint ætherei penè, & tales mutationes non patiatur: verum id ita simpliciter admitti non potest. Etenim spiritus animales duobus modis crassiores esse possunt; vel dum tales generantur, vel dum vapores aliqui ipsis admiscuntur. Primum enim si spiritus vitalis, & aer, è quibus spiritus animales generantur, crassiores sint, spiritus etiam animales inde crassiores fiunt. Atque inde accidit, ut ob aeris & spirituum vitalium subtilitatem nonnullarum regionum incolæ ingeniosiores sint, quàm in aliis; aliarum verò stupidiore, ob aerem, in quo viuunt, crassiorem. Sic Bæoti apud antiquos stoliditatis & stupiditatis nomine male audierunt; de quo Horatius, in *Epistolis*:

*Bæotum in crasso iurares aere natum.*

Impuriores. Si spiritus animalis tenuitas & puritas propter vaporis alieni admistionem perturbetur, actiones animales etiâ variè læduntur. Si enim vapor frigidus & humidus ipsi admisceatur, spiritus animalis quasi torpidus & iners redditur; unde sæpe post cibū propter vaporū in cerebrū adscensum, hominē ad actiones illas cerebro proprias minus aptū esse animaduertimus. Si vapor obscurus & nebulosus quasi, qualis cum ab internis humoribus, tū ab aere externo cerebro comunicatur, & spiritui animali permiscetur, homines non ita alacres, sed quodamodò tristes esse animaduertimus. Si vapores sint calidi, quales in ebriis à vino, vel potus alterius largiore usu eleuari solent, variæ animi mutationes, & quasi deliria, pro cerebri & humorū in corpore variâ dispositione excitantur; de quo Horatius, lib. 3. *Carm. Od. 21*.

*O nata mecum Consule Manlio,*

*Seu tu querelas, sine geris iocos,*

*Seu rixam, & insanos amores,*

*Seu facilem, pia testa, somnum.*

Si enim vini vel alterius potus vim inebriandi habetis vapor cum sanguinis abundantis vapore permiscetur, iocos & hilaritatem excitat; si caput humidū sit, propensionem in somnū inducit; si vasa seminaria semine sint referta, insanum amorem producit; si pituita caput refertum, somnum: si bilis vapor permiscetur, rixas & iram excitat; si melancholicæ vapor, tristitiam & querelas.

Tenebrosi. Si spiritus animalis naturalem illam luciditatem & splendorem amittat, & opacus, tenebrosus, ac niger

*Dan. Sennerti Tom. II.*

quasi euadat: quod præcipuè fit à vaporis melancholici admistione; metus & tristitia sine causâ, & affectus melancholici excitantur. Nam ut Galen. 2. *de sympt. caus. c. ult.* scribit, cum nihil eorum, quæ extra corpus sunt, nos æquè perterreat, ac tenebræ, si eæ ipsi rationalis animæ parti sint circumfusæ, necesse est hominem timere, ut qui semper unâ cum corpore timoris causam circumferat.

Si spiritus animales sint pauciores, quàm par est, & deficient, omnes animales actiones languent, & ex defectu spirituum, & causis spiritus dissipantibus actiones principis facultatis non solum imminuuntur & abolentur, sed & deprauantur quandoque, & delirium excitatur, ut docet Galen. 7. *aph. 9.* eodem modo, quo tremores artuum. Ut enim dum pondus nimium facultati mouenti imbecilli offertur, tremor excitatur, ita dum obiectum sensibile principi facultati debili offertur, imaginatio & ratiocinatio obiecto non satis proportionatæ & debiles vacillant quasi.

Deficiunt autem in cerebro spiritus animales, vel quia absumuntur, & non generantur in cerebro, vel quia in reliquum corpus diffunduntur. Absumunt spiritus in cerebro sanguinis nimia profusio, nimia euacuatio, Venus nimia, morbi diuturni, præsertim maligni, nimia animi intentio & studia, vigilie, curæ. Non verò generantur, si spiritus vitales non suppedientur. Effunduntur etiâ nonnunquam spiritus in sensuum externorum organa, ut in cerebro deficient. Ut enim in magnis animi affectibus spiritus vitales è corde in reliquū corpus interdum effunduntur, ut animi deliquium inde accidat: ita quoque spiritus animales in externorum sensuum organa effundi possunt, ut veluti attoniti homines fiant.

Præter has causas & aliæ sæpe dantur, occultæ nimirum, spiritus maligna vi afficiētes; quales sunt venena, quæ cerebro tota substantia infesta esse antea diximus, & inter ea, quæcunque narcotin quandam, & temulentiam quasi inducunt, ut lolium, semen hyosciami, cortex mandragoræ, solanum, venenum canis rabidi, & quod ab aliarum quoque bestiarum venenatarum ictu communicatur.

Imò etiam vapores maligni spiritus animales afficientes intra corpus generantur: hinc in epilepsiæ ægri in fine paroxysmi sopore corripiuntur, & stupidi aliquandiu iacent; quod, ut Platerus docet, non accidit, quia cerebrum nimia agitatione defatigatum est; sed quia vapores maligni, qui prius nervosum genus afficiendo convulsivos motus excitabant, cerebrum & spiritus iam labefactant, soporēque & stupiditatem, donec discussi sint, excitant.

Si tandem spiritus nimium agitentur, per iram, gaudium, terrorem, & alios animi affectus; vel à vaporibus ab inferioribus partibus ascendētib; aut etiam in ipso capite, è putridis humoribus, ut in membranarum corruptione, & vermibus in capite, eleuatis perturbentur; vel à nimia corporis circumgyratione & agitatione, aut rerum motarum aspectu, casu & ictu vehemente, cranij depressione, calore & Lunæ radiis, doloribus vehementioribus, cerebri intemperie calida, & ipsi agitentur, & motu quodam inordinato cieantur, vertigo & alia symptomata oriuntur.

Facit huc & simulata ac diu continuata stultitia, quæ spiritus continuò & deprauatè agitans prauam dispositionem ad continuum talem motum per consuetudinem inducit, ut suo loco diceretur. Contra si non moueantur, & ut debent, in organa sensuum non influant, etiam animales actiones læduntur; quod fit in affectibus soporosis, & catalepsi.

#### Curatio.

Cum ergo tot sint spirituum vitia, quæ ex effectibus & symptomatibus modò enumeratis, & signis etiâ humorum

morum cognoscuntur: non vna erit spirituum vitia emendandi ratio; sed quodlibet vitium peculiari modo ad naturalem constitutionem reduci postulat. Si enim sint nimis calidi spiritus, sunt refrigerandi; si frigidi, calefaciendi; si crassi, impuri, attenuandi & purificandi, illique naturalis tenuitas & claritas restituenda, & vapores, qui eos inquinant, discutiendi & ab iis separandi. Si malignis qualitatibus inficiantur, iis resistendum. Si deficiunt, efficiendi.

Verum cum ista vitia spiritibus cum cerebro sint communia, & ab humorum vitiiis pendant: plura de curatione non addimus; cum materia medica, quibus hisce indicationibus satisfieri potest, praecedentibus capitibus proposita sit. Si quæ tamen restant peculiaria, ea postea explicabuntur, ubi de actionibus lætis, quæ à spirituum horum vitio proueniunt, agetur.

*Spiritus animales roborantia & augentia.*

Hoc saltem addimus, ad cerebrum roborandum, spiritus reficiendos & augendos, plurimum posse vinum, ut & oua forbilica cum saccharo & cinamomo, si bonum vinum superbibatur; plurimum etiam ambram griseam orientalem, cum saccharo in iusculo vel ouo forbili sumptam, si scilicet ad Dra. ii. ambræ addatur lb. ss. sacchari, vel rotularum manus Christi perlat. ut & moschū, hyacinthum, margaritas, & aromata pleraque. Inde ad spiritus animales roborandos & recreandos utiles sunt trochisci Moscardini dicti:

℞. Ambra, moschi, an. Dra. ii. Zibethi ʒ. ss. iragacantha in aq. flor. naphae odoratiss. soluta q. i. sacchari lb. iii. vel iiii.

Contundantur omnia in mortario, & f. a. misceantur.

F. Pasta, e qua formentur pastilli parui, figura rhomboide, vel alia, qui exsiccentur, quorum vnus si in mensuram vini iniiciatur, ei suauissimum odorem & saporem conciliat. Commendantur & lapis Armenus ac Lazuli, ut fuligines, quibus spiritus inquinantur, discutiant; item myrobolani emblicæ & chebulæ, quod spirituum dissipationem prohibeant.

Spiritus quoque instaurat confectio Alchermes. Ad eosdem confortandos commendatur succinum. Magna quoque vis est, ad spiritus instaurandos & reficiendos, spiritus ex vino maluatico vel alio optimo destillati: & maior adhuc Aquæ vitæ dictæ, quæ si recte pareretur, sæpe cum admiratione vires languentes, & iam ferè collabentes reficit; quarum passim multæ extant descriptiones. Nobilis est illa, quæ vulgò aqua Carfunkuli dicitur, cuius descriptio in Institutionibus, lib. 5. part. 3. sect. 3. c. 5. habetur: ut & illa aqua, quam Matthiolus, lib. 5. in Dioscorid. c. 7. describit. Alia minus sumptuosa:

*Aqua Carfunkuli.*

*Aqua vitæ Matthioli.*

℞. Granorum Paradisi, cinamom. cubebæ, styrac. calamitæ, an. Vnc. i. macis, nucis moschata, cardamomi, caryoph. an. ʒ. ss. flor. lilior. conuall. M. ii. rosar. rubrar. M. vi. laurula M. j. borrag. bugloss. an. M. ii. melisse, saluæ, an. M. i. mentha crispe M. ss. Contulis adde vini maluatici, aq. ros. an. Canth. ii. Digerantur & destillentur suspendendo in nodulo, in collo alembici, ambræ & moschi, an. Scr. i. vel quantum libet.

Extat passim etiam multa electuaria, ad spiritus multiplicandos & confortandos utilia, ut illud Mesue, quod ad lactificandum, gaudium generandum, iuuentutem conseruandam, coloris pulchritudinem, & odoris bonitatem conciliandam prædicatur, & ita paratur:

℞. Rosar. ʒ. iii. cyperi ʒ. ii. caryophyll. mastiches, ligni aloes, spica Indica, asari, an. ʒ. ss. cinamomi, croci, melisso-phylli, ocymi minoris, margaritar. fol. Indi, macis, cardamomi minoris, nucis moschata, corticum citri, gallia moschata, doronici, ocymi maioris, an. ʒ. i. moschi ʒ. ss. Cum mellis myrobalan. emblicar. vel belliricarum quantitate ad species quadrupla. F. Electuarius, hyeme præsertim vtile.

Vel ℞. Hyacinth. sapphir. smaragd. doronici, corall. alb. rubri, an. ʒ. i. cinamom. macis, galagæ, nucis mosch. an. ʒ. ss. caryoph. cubebæ, ligni aloes, styrac. calamitæ, sem. ocymi, an. ʒ. ss. croci ʒ. ss. moschi, ambræ, an. gr. vi. cort. citri conditorum ʒ. ss. glycyrrhiz. ʒ. ii. passul. pinguium, sacchar. candi, an. ʒ. i. conseru. bugloss. borrag. an. ʒ. ss. succi pomor. dulc. depu-

rati ʒ. ii. aqua rosar. moschata ʒ. i. sacchari optimi lb. i. F. secundum artem Electuarium.

Videantur etiam Actuarij de spiritu animali libri duo.

## CAPVT XVI.

De Morbis Compositionis, & primò de morbis figurae.

Cum haecenus morbos, qui cerebro, quatenus simile est, competunt, explicauerimus: proximum iam est, ut de morbis organicis eiudem dicamus. Cum verò, ut ex Galeno, lib. de morbor. differentiis. & Institut. lib. 2. part. 1. c. 5. patet, morbi organici in morbos numeri, magnitudinis, conformationis, compositionis, & finitui diuidantur: quinam ex his in cerebro & capite inueniantur, videndum.

Et primò figuram quod attinet, naturalis capitis figura, quæ optima est, ut Galenus, lib. de ossibus, 9. de vitiis capitis optima qua, par. c. 17. & art. med. c. 11. describit, sphaera assimilatur, ad latera vtrinque leniter compressæ, quæq; in temporibus rectior, & quodammodo plana; in parte verò antica & postica plus, quàm in sphaera, prominet: hac tamen plus protuberat, quàm illa; in vertice verò sphaera curuitatem seruat. Quibus ergo hæc capitis figura cum decente magnitudine obtigit, ij vigorem & alacritatem habent sensuum, pollent ingenio, iudicio & memoriâ, & robore corporis præstant.

Quæ verò capita à naturali figura recedunt, ea quæ generaliter à Galeno vocantur, dicunturq; ita non solum ea, quæ fastigiata sunt, sed etiâ in quibus vel antica, vel postica, vel vtrique extremitas, seu eminentia, deest, vel plus, quàm par est, eminet, ut vel retrò solum vel ante, vel tursu fastigiata capita appareant. Etenim vel synciput, seu anterior cranij pars plus iusto eminet, occipite contra quasi euanescente & nõ extuberante; vel occiput p. n. prominet; vel neque antica, neque postica eminentia protuberat: & si in lateribus depresso non sit, quasi perfectâ sphaeram exhibet, quod si in temporibus depresso sit, in vertice caput eminere potest, & acuminatum esse. Cuiusmodi Therisitæ caput fuit, quod, ut Homer. Iliad. 8. scribit, ὑπερδεν φούρος ἐν κεφαλῇ, quod interpretes per ὀξυκέφαλον rectè explicant. Galenus eam capitis figuram, quâ longitudo in latitudinem, & latitudo in longitudinem mureretur, dari negat, & propter deprauatam cerebri constitutionem talem hominẽ viuere posse inficiatur, quod in ea tota cerebri constitutio perueratur, eaque à paucis, cum rarissima sit, animaduersa. Vesalius tamen illam se vidisse, lib. 1. anatom. c. 5. restatur, & ante eum Conciliator, diff. 79. & Hugo Senens. in com. in art. med. Galien.

*Figura capitis vitiosa.*

### Causæ.

Ortum habent figuræ hæc vitia plerumque in utero ante natiuitatẽ, vel ob materiæ vitium, vel ob facultatis formatricis errorẽ; nonnunquam & post ortum inducuntur, dum tenella infantium capita ab obstetricibus & nutricibus vario modo formantur, quando fasciis inuoluuntur, & manibus tractantur; aut dum, quæ in utero vel partu contracta sunt vitia, ab iis non rectè emendantur. Nonnunquam tamen tum pueris, tum adultis figura capitis vitatur, dũ ex casu vel percussione caput deprimitur; quod & cū, & sine fractura fieri potest. De quo vitio emendando cum in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. c. 5. sit dictum, & suo etiam loco de fracturis cranij eius mentio sit facienda, de eo hĩc nihil addimus.

### Signa Diagnostica.

Figura vitiosa visu cognoscitur, quæ etsi cranij conformationem præcipuè indicet: tamen & cerebrũ quod cranio concluditur, eandem figuram participare, verò consentaneũ est. Effectibus tamen sese etiam prodit, & stultitiam

titiam quibusdam innatam facili ex capitis figura vitiosa cognoscere est.

### Prognostica.

Figuræ vitium, quod vel à conformatione praua, vel ex partu difficili, vel obstetricum imperitia inductum est, si recens sit, & non procul ab ortu, aliquantisper corrigi potest, dum adhuc ossa mollia & flexibilia sunt. In adultis verò, ubi ossa iam induruerunt, incurabile est.

### Indicatio & Curatio.

Si quâ parte caput præter naturam eminet, ibi depressendum, quod nullo alio modo fieri potest, nisi manuum operâ; ut scilicet obstetrix vel nutrix manibus caput sapius leniter tractando, & fasciis inuoluendo, eam figuram, quæ præternaturalis est, aboleat, & eam, quæ expectatur, ipsi inducat.

### De Sutura Capitis.

Suturas capitis, quarum tres esse; coronalem, lambdoidem & sagittalem, ex anatomicis patet, pro varietate figurarum capitis variare, docet Hippocrates, in *instituto libri de vulneribus capitis*. Idq; aliquando quidem verum esse observationes docent, qualè & Volcherus Coiter, in *obseruationibus anatom.* habet. Non tamen semper suturas variare propter eminentiarum cranij defectum vel excessum, doctissimi Anatomici testantur. Reperta quoque capita esse, quæ omnibus futuris destituta fuerunt, obseruatum est. Verum quia ista ipsam conformationem sequuntur, neque à Medico corrigi possunt, plura hæc addere ea de re non libet. Videantur Vesalius, de *human. corp. fabr. lib. 1. c. 6.* Syluius, in *comment. ad lib. Galen. de off. Colubus, lib. 1. anatom. c. 6. & 1. 15.* Eustachius, de *off. Ambrosius Paræus, lib. 4. Chirurg. c. 3.* Riolanus, *anatom. c. 19. & in commentar. de offib. c. 8.* Bauhinus.

## CAPVT XVII.

### De Morbis meatuum & Cavitatum Cerebri.

**I**N superficie cerebri nulli morbi occurrunt, & si qui in cranio interdum reperiuntur, cum in fracturis interdum exasperatur, & festuca quasi prominentes membranas comprimunt, de eo suo loco, cum de vulneribus capitis, & fracturis cranij ageretur, mentio fiet. Sequuntur ergo morbi in meatibus cerebri.

Sunt autem cavitates & meatus hi triplices: alij in cerebro, alij ad cerebrum, alij à cerebro.

Primò enim cerebrum ipsum porosum est, & in porosa & fungosa quasi eius substantia spiritus animales generantur, continentur & mouentur; quod vel spatium illud docet, quod in mortuis inter tenuem & crassam meningem interiectum est satis magnum.

Deinde sunt in cerebro ventriculi, excrementis eius euacuandis parati; quæ de causa in iis etiam glandulæ quadam locatæ sunt, quæ veluti spongiæ per vasa à cerebro vel cerebello ed trāmissa excrementa cerebri exsugunt; ideòq; omnes etiam in infundibulū, cui glandula pituitaria substrata est, desinūt. Ad corporis enim callosi latera duo superiores ventriculi cerebri tenui quodam corpore, quod speculum lucidum dicitur, inferius distincti positi sunt. Ab horū tergo apparet corpus concamerau seu fornix, sub quo tertius est ventriculus, ex priorū concursu proueniens, in quo duplex est meatus: anterior desinit in palatum, seu infundibulum dictum, quod finit in sellam ossis sphenoidis, ubi glandula pituitaria est, & plexus retiformis, seu rete mirabile, ut Galenus vocat; posterior verò in quartum ventriculum de-

labitur. Cerebello etiam suum ventriculum recentiores quidam attribuunt. De quo infra, *part. 2. c. 33. quæst. 3.* dicitur.

Ad cerebrum tendunt, quæ à sinibus cerebri egrediuntur venæ & arteriæ, quas *χρυσ.* ductus, vulgò vocant, quæ à tenui meninge susceptræ, in ipsam cerebri substantiam disperguntur, quæque rubra illa puncta, quæ dissecto cerebro conspiciuntur, constituunt, & sanguinem arteriosum ac venosum, spiritusque vitales, cum ad cerebri nutritionem, tum ad spirituum animalium generationem, aduehant.

A cerebro & spinali medulla, quæ & ipsa à cerebro ortum habet, nervi omnes suam originem habent; quorum *οὐχὺς* seu paria triginta septem, secundum vulgatam opinionem, recensentur: septem scil. à cerebro orta, triginta à spinali medulla. Recentiores verò quadraginta numerant: decem à medulla oblongata intra cranium, triginta à spinali medulla; vulgò ita dicta, extra cranium ortum ducunt; de quibus consulantur Anatomici.

Pertinent & ad vias à cerebro futura cranij, per quas vapores & fuligines à cerebro exhalant.

### Causa.

Hi ergo meatus & cavitates ut ad cerebri nutritionem, spirituum animalium generationem, conseruationem, motum, & in totum corpus distributionem necessariæ sunt: ita iis angustioribus redditis istas actiones lædi necesse est. Et si verò angustia plures causas sint: tamen angustia meatuum horum omnium prouenit vel ab obstructione, vel à compressione.

Obstructio fit à vaporibus, vel humoribus. Compressio vel à cranio depresso, vel à sanguine, aut humore, aut tumore, aut ipsa cerebri substantia, anfractus eius & nervorum principia comprimente.

Obstructionem quod attinet, fit illa primò à vaporibus crassis. Si enim hi confertim & copiose ad caput ferantur, meatus cerebri opplere & obstruere possunt. Tales vapores eleuantur à cibo vel potu pleniore vel

vaporoso, vel humidore, ab humoribus item & excrementis vaporosis in ventriculo, intestinis; à vermibus in utero, in venis cum melaëicis, tum venarum cauarum ramis; quod non raro in principiis & inuasionem febrium cum intermittentiū, cum continuarum fieri solet, ubi à materia calore attenuata & agitata vapores ad caput copiosi feruntur, meatusque obstruunt, & somnum inducunt. Possunt quoque meatus cerebri obstruere fumi & vapores crassi extrā admissi: id quod ii, qui ex carbonibus accensis in conclauibus conclusi exhalant; præstare possunt; quibus non dissimiles sunt, qui à musto & cereuisia feruente attolluntur. Cuius rei exempla habet Marcell. Donatus, de *hist. medic. mirab. lib. 1. c. 6.* & Platerus, *obseru. lib. 1. pag. 16. 17.*

Deinde idem præstare humores crassi, qui in ipsa substantia cerebri cumulari eius meatus obstruunt, & præcipue si exortum nervorum, & vias illas, per quas spiritus animales in totum corpus influunt; occupant, & varia, pro modo obstructionis, & natura humorum, actionum læsarum genera inducunt. Si enim obstructio illa sit leuior, affectus soporosi excitantur; si verò grauior & integra, apoplexia generatur.

Tertiò idem fieri potest à sanguine extra vasa sua effuso, si non inflammationem parit, sed anfractus eius obstruit: id quod non solum in percussionibus & lapsu fieri potest, ubi interdum, cerebri substantia etiam non vulnerata, vasa aperiuntur & rumpuntur; sed etiam interdum ob plethoram quoad vasa: unde & viuientibus & mortuis quandoque magna sanguinis copia per os & nares erumpit.

Angustiores etiam redduntur illi meatus ad cerebrum tendentes in *φλεγμονώδη* illa diathesi; de qua postea.



*Compressio  
meatum co-  
rebri, cuiusque  
causa.*

Compressio fit à causis vel internis, vel externis. Inter internas sunt primò humores crassi & pituitosi, qui basin cerebri, vbi nervorum principium est, occludere, & spirituum animalium in corpus reliquum distributionem impedire possunt.

Deinde sanguis ex vulnere, vel contusione, vel etiam sine cerebri vulnere, ex eius vehementi concussione, vel ex venæ alicuius, ob plethoram ad vasa, & ob sanguinis, per menses, hæmorrhoides, nares, evacuationem suppressam, ruptione, aut in cerebri substantiam, eiusque poros, anfractus & meatus, aut ad basin cerebri effusus, comprimendo sensum & motum omnem abolere potest.

Tertiò idem accidere potest, vbi vasa ad cerebrum tendentia *φλεγματώδη διαδίδωσι* laborant, & ita replentur ac distenduntur, ut sanguis ab iis vix capi queat, & propterea substantiam cerebri, eiusque meatus grauet, comprimat, ac angustiores reddat, ut nec spiritus vitales liberè à corde ascendere, & in cerebrum distribui, nec animales liberè in cerebro moveri, & in nervos influere possint.

Quartò Platerus nervorum principium, seu basin cerebri, ab ipso etiam cerebro comprimi posse, statuit, dum scilicet vel eius substantia ab humore pituitoso in eo immoderatus cumulat, vel etià ab aëre humido & crasso, ut vult Marthæ de Gradibus, ita irrigatur, ut mollior laxiorque facta subitò subsidat, nervorumque principia comprimat, vel ventriculi seu cavitates cerebri ita subitò replentur, ut non ob obstructione spiritibus animalibus transire denegent, (neque enim spiritus animales in ventriculis cerebri, sed in cerebri substantia & nervis sedem suam habere statuit) sed basin cerebri grauent, & principium nervorum compriment.

Quintò idem addit tumorem durum, qui pondere suo meatus cerebri comprimat, & angustiores reddat.

Inter externas verò causas est cranij cerebrique à causis externis compressio. Si enim ictu vel casu vehementiore fracta vel depressa calvarià cerebrum simul comprimat, poros & meatus in eo angustiores fieri, & hominem subitò sensu & motu priuatum conidere necesse est.

*Suturarum  
capitis diffi-  
cultas.*

Suturarum angustiam quod attinet, potest illa fieri à vaporibus multis & lentis eò loci hærentibus. Interdum etiam planè deficiunt suturæ, & inuenta sunt capita omnibus futuris carentia. Quod cum antiquis, Aristoteli, de *histor. animal. lib. 3. c. 7.* Herodoto & Arato notum fuit, tum recentiores plures idem obseruauerunt. Fallopius, in *comm. in lib. Gal. de ossib. & in obseruat. anatom.* Volcher. Coiter, in *obseruat. anatom. & Chirurg.* Reald. Columbus, *lib. 1. anatom. cap. 5.* Iohan. Andreas à Cruce, *lib. 1. Chirurg. sect. 1. cap. 2.*

*An natura  
dini commo-  
dus sit.*

Capita talia sanè firmissima & à dolore tutissima esse, & quò futuræ sunt pauciores, eò capitis valetudinem commodiorem esse scribit Celsus, *lib. 8. de medic. cap. 1.* Verum etsi hæc Celsi sententia vera sit de externis iniuriis, quæ capiti occurrere possunt, tamen vaporibus & fuliginibus retentis multa incommoda cerebro accidere possunt; ac si de iis etiam accipiat, falsissima est. Observationes enim (qualem etiam habet Reald. Columbus, *loc. alleg.*) docent, nonnullos diurno & incurabili capitis dolore fuisse vexatos, non alià de causa, quam ob suturarum defectum, ob quem vaporibus & exhalationibus nullus datur exitus.

#### Signa Diagnostica.

*Angustia  
meatum  
cerebri signa.*

Cognoscuntur hæc meatum cerebri vitia ex operationibus cerebri læsis, præcipuè imminutis & abolitis. Cum enim ad actiones animales obundas spiritus animales liberè per cerebri substantiam moveri, & in nervos influere debeant, si angustioribus illis meatus redditis, & occlusis liberè moveri & in nervos influere non possint, fit inde somnus nimius, stupor, apoplexia,

paralytis, pro vitij magnitudine. Nam si vitium sit leuius, ob id sensus saltem aggrauantur, quod fit in sopore, vel in stupore leuiore, motusque tunc motus, etiam si in sopore quiescat. Si verò vitium hoc magnum sit, sensus omnes & motus abolètur ut in sopore & stupore grauiore, caro; aphonia & apoplexia accideresoleat.

A quibus verò causis meatum hæc angustia proueniat, porro inquirendum. Causæ externæ, ictus, percussio, lapsus, ex aliorum relatione cognoscuntur: quæ eadem etiam, an sanguis extra vasa sua effusus mali huius causa sit, docere potest.

Internas causas quod attinet, patent ex eis, quæ antea de signis intemperierum capitis cum materia diximus. Si à vapore, eius signa aderunt, & cibis ac potus vel copiosus, vel vaporosus adsumptus est; vel alius morbus vel in toto, vel parte aliqua deprehenditur, ex cuius causâ agitata sursum multi vapores ferri possunt. Vapores soli nisi narcoticam vim habeant, stuporè vix excitant, soporem verò frequenter pariunt, imò & apoplexiâ excitare possunt, sed quæ leuior est, & quæ sola corporis agitatione & concussione sanatur. Si à pituitâ proueniat angustia cerebri, cognoscitur ex præserte corporis constitutione, ætate ienili, ex anni tēpore, cœlique constitutione, & aliæ causæ pituitâ generantes præcesserunt: pituita per nares faucisque euacuationes conueta suppressa sunt, ægerque prius de capitis gravitate ac pondere, pigritia in motu, oculorum obtenebratione est conquestus, & cum multo stertore dormiuit.

A sanguine si ortum habeat, dolor capitis plerumque præcessit, & rubor in facie, atque alia plethoræ, tum in toto, tum in capite præcipuè, signa adfunt. sanguisque per os & nares interdum erumpit. Cum à tumore est angustia, vix viuente homine is latus cognoscitur, diuturnus tamen stupor adest.

#### Prognostica.

1. Quò minor causæ seu obstruendo, seu comprimendo angustiam parientis vis est, eò malum leuius est; quò potentior, eò grauius.

2. Hinc quæ à vapore fit obstructio, leuior est, & facilius vapore discusso curatur, quàm quæ ab humore.

3. Et quò maior humoris copia, eò malum periculosius est. Hinc nisi pituita per emunctoria sua euacuetur, & à meatibus, quos obstruit, aut comprimit, excutatur; vel in spinalis medullæ principium delapsa paralyfin excitat; vel circa principium nervorum hærens, motumque auferens cessante tandem etiam thoracis motu, & respiratione penitus sublata, ægum suffocat.

4. Quæ à sanguine prouenit angustia, si sanguis adhuc in vasis suis hæreat, faciliè curatur: si verò è vasis effusus sit, nisi per aures, nares, & os effundatur, aut tanta eius saltem copia sit, quæ insensibiliter discuti possit, putrescit, & inflammationem, febrem, conuulsionem, & tandem mortem accersit.

5. Quæ à tumore est angustia, incurabilis est; cum tumor in cerebro abditus emolliari & discuti non possit, & si quid curationis admittit, ea non alia erit, quàm quæ intemperiei cum pituitâ debetur.

6. Quæ à compressione cranij fit angustia, prout ea vel maior, vel minor, & cum minore, vel maiore cerebri & vasorum eius læsione coniuncta est, & prout facilius cranium eleuari potest, vel non potest, eò periculosior, & difficilior, vel minus periculosa, & faciliore curatio est.

7. Defectus suturarum incurabilis.

#### Curatio Angustia cerebri à vapore.

Vapor, qui continens obstructionis meatum cerebri causa est, discutiendus, & ne extra cerebrum generetur, & ad id mittatur, præcauendum. Itaque materia, à qua suppeditatur, euacuanda, & partis mittentis ratio habenda, *vapores capiunt infestationem os animi.*



habenda, ut supra, cap. 7. dictum. Proinde si à venoso genere, quod in febribus accidit, & quidem mox cum febre incipiat, ad febrim præcipue curatio dirigenda: capitis tamen & cerebri, quod vapores recipit, ratio habenda, & ea, quæ vaporum ascentum impedire possunt, eosque deprimere, repellere, discutere valent, usurpanda, ut supra, de intemper. capit. per consens. c. 6. & 7. dictum. Si à ventriculo, vel vtero, vel alia parte vapor ille eleuatur, pars illa euacuanda, roboranda, & vapores à capite reuellendi, atque in eo discutendi.

*Curatio eorum, qui à Carbonum fumis, & similibus vaporibus suffocantur,*

*Carbonum fumis suffocatio ut curanda.* Pertinent huc vapores illi, qui ex carbonibus accensis, ut & illi, qui è musto ac cereuisia feruescente attolluntur, & quibusdam periculum suffocationis intenterunt, quodam planè suffocarunt. Qui quæ ratione noceant, alij aliter sentiunt, ut apud Marcellum Donatum, de histor. medic. mirab. lib. 2. cap. 6. Forestum, lib. 15. obseru. 26. Paræum, tractat. de renunciationibus, & Institut. lib. 2. part. 1. sect. 2. cap. 6. videre est: quin tamen etiam crassitie suæ cerebri meatus oppleant, negari non potest.

Quantum ad curandi rationem, danda opera, ut quamprimum vapores illi discutiantur. Itaque ægri statim in aërem liberum deducendi vel deportandi sunt, & Aqua vitæ aliqua præstans, quod vapores illos discutere potest, instillanda, cui aliquid rheriacæ addi potest. Hinc vomitorium cum oxymelite exhibendum, & sternutatorium naribus instandum, atque oleum destillatum vel balsamum rutæ, saluæ, vel simile quid naribus inungendum. Neque omittendæ reuulsionones per clysteres, frictiones, & similia.

*Curatio Angustia cerebri à pituita.*

*Angustia cerebri à pituita curatio.*

Si à pituita cerebri meatus obstruente siue comprimente angustia in eo fiat, & inde seu somnus grauis, seu stupor, seu apoplexia, seu paralytis fiat, eo modo curanda, qui supra, cap. 9. de intemper. capit. cum pituita, propositus est: nimirum ex vniuerso corpore pituita euacuanda, eadem à capite reuellenda, per os & nares euacuanda, & medicamentis tum internis sumptis, tum extra adhibitis discutienda, caputque calefaciendum & roborandum, ut ibid. dictum.

*Curatio Angustia cerebri à sanguine.*

*Angustia cerebri à sanguine curatio.*

Ita si à sanguine, siue obstruente siue comprimente, angustia est, sanguis venæsectione, cucurbitulis, & aliis modis euacuandus & reuellendus, ac repellendus ut supra, cap. 8. de intemper. cum sanguine, dictum. Et quidem si sanguis extra venas illapsus sit, & vena aliqua seu causâ violentâ, seu quocunque modo aperta; præter ea, quæ ibi tradita sunt, & venæ frontis, & nasi, & sub lingua, deriuationis gratia, aperiri possunt sanguisque, ne confertim affluat, repellendus, & qui iam extra vasa existit, euacuandus & discutendus, ut postea, cap. 20. dicitur.

*Curatio Angustia à cranij compressione.*

Si à cranij depressione sit angustia; cranium eleuandum, ut Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 6. dictum, & postea etiam suo loco de fracturis & compressione cranij dicitur. Quamuis verò in infantibus etiam sine fractura deprimi possit: curandi tamen ratio est eadem.

*Curatio Angustia Suturaarum.*

Si Sutura à vaporibus vel humoribus obstructa sint, discutendi illi fomentis ex chamamel, meliloto, betonica, stœchade, serpillio, & similibus, quæ ex superioriibus nota sunt. Cauendum verò hîc à repellentibus & adstringentibus, quæ malum augent.

Ut meatus & cauitates in cerebro & capite plures sint, vel maiores, id non facile accidit, nisi fortian à prima conformatione; quæ mala incurabilia sunt; quale exemplum anno 1622. Mense Augusto, in oppido vicino, Kemberga, sese obtulit; vbi infans natus est, qui in capite foramen habebat; quod ab ore sursum ad occiput patebat, ita ut ore aperto per totum caput, quasi tubum vel canalem, transpicere liceret.

CAPVT XVIII.

*De Morbis in Numero, & de Vermibus ac Calculis in Capite.*

**M**ORBUS Numeri quod attinet; etsi nullos in cerebro statui vel dari nonnulli statuunt; suo tamè modo dari & concedi possunt. Nam ut de iis, qui Bicipites nati sunt; quorum historias recenset Schenckius, lib. 1. obseru. 15. & 16. Platernus, obseru. lib. 3. p. 550. nihil iam dicam: Cornutos etiam natos fuisse, atque ita hac parte in capite quosdam abundasse, idem Schenckius, lib. 1. obseru. 24. & Guilelmus Fabricius cent. 2. obseru. 25. testantur. Verum cum hæ monstrosæ sint à primo ortu capitis constitutiones, nec curatione admittant, eas prætermittimus. Hoc tamen prætereundum non censemus, Bartholomæum Cabrolium, obseru. 11. referre, se cuidam cornu in fronte natum, cuius longitudo erat dimidiati pedis, crassities pollicis, serra relectuisse.

Quoniam verò Galenus, lib. de diff. morb. inter morbos numeri refert non solum id vitium, quod à rerum naturalium, verum etiam illud, quod à præternaturalium abundantia accidit, atque inter ea etiam vermes recenset; eum secuti, inter morbos in numero, seu rerum p. n. in cerebro abundantium hîc vermes recensimus. Etsi enim alij aliter hac de re sentiant, ut Institut. lib. 2. part. 1. cap. 7. dictum, & in re obscura quiuis per me quidlibet sentire possit: tamen quia de vermibus capitis commodiore loco, quàm isto, tractari vix potest, hoc capite de vermibus agemus.

Vermes in capitis parte anteriore, ad nasi radicem, vbi oues & capræ frequenter, eos habent, nasci, Aui-cennas, lib. 3. fen. 1. tr. 2. cap. 3. ex Medicorum Indorum relatione narrat. Idem tamen & in aliis regionibus ac seculis accidere annotatum, & cuidam Italo ex frequentiori odoratu basilicæ herbæ natum scorpionem in cerebro dolores vehementes & longos, & mortem denique attulisse, Hollerius, lib. 1. de morb. intern. cap. 1. refert. Et è capicibus eorum, qui febre Vngarica Theriode mortui sunt, vermes confertim prorupisse; testatur Conradinus, cap. 11. de febr. malign. Quod confirmat Volcherus Coiter, in append. obseru. anatom. & Chirurg. Et Cornel. Gemma, in append. oper. Cosmocrutici, in matronæ cuiusdam, pestilenti hemitritæo extinctæ, capite aperto magnam putredinem circa cerebri substantiam, & inter meninges cum vermiculos, tum cimum copiam incredibilem repertam fuisse. Valescus de Taranta quoque, lib. 4. cap. 30. refert, se vidisse in iuvene febrim habente acutam duos tresque vermes, ad formam granorum pini expulso, & iuvenem sanatum fuisse. Narrat quoque Forestus, lib. 9. obseru. 1. in schol. Beniuientis cum multi morbo quodâ ignoto è vita decederent, tandem Medicos hoc morbo interemptum incidisse, & in eius cerebro inuenisse vermem rubrum, breuem; quem cum multis medicamentis

# 308 De morb. in num. & de verm. ac calc. in cap.

mentis vermes occidendi vim habentibus occidere non possent, tandem frustra raphani incisa in vino Maluatico coxisse, quo medicamento vermis occidebatur, atque hoc remedio postea simili morbo, quasi epidemia, affectos omnes curasse. Refert *ibidem*, Forestus, se quendam nouisse lue Gallicâ infectum, qui cum longo & diuturno capitis dolore affligeretur, nec ullis remediis curari posset, tandem Bononiæ cranium eius in frontis parte superiore, quâ dolor hærebat, perruptum, & vermem sub eo, supra duram matrem, nigriusculum, instar gurgulionis, inuentum esse, quo ablato dolor cessauerit. Ita narrat Ambr. Paræus, *lib. 9. cap. 20.* cui-dam ex cranij putredine & carie supra ipsam crassam meningem vermes plures natos fuisse. Notabilis quoque est historia, quam Franciscus Hildesheimius, *specileg. lib. 1. pag. 41.* recitat, de quodam, qui vermes tredecim oblongos, lanuginosos, viuos, instar erucarum seu omiscorum, quos auriculares vocant, in capite continuit, quique per fauces, nares & aures prodierunt.

*Historia ex Alfar. Cruzio, de vermibus in naribus excreto.*

[ Vermes e capite excretos fuisse, variæ testantur historiæ, quarum aliquas, modò recensuimus: quibus addenda est historia, quam habet Vincentius Alfarius Cruzius *de quasit. per Epist. Centur. 3.* & disputatio de loco, in quo generatus fuerit, quæ *ibid.* habetur. Quidam Fuluius Angelinus, ad Vincent. Alfar. Cruzium scribit, quendam febrem malignâ epidemiâ laborasse, & octo noctes insomnes duxisse. Tandem cum conualesceret, sensisse quendam pruritus in dextra nare, & statim elapsum esse vermem, qui medij digiti longitudinem æquaret, crassiusculo corpore, rubrum nigro capite & duro, duobus acutis brachiis, instar scorpionis mordentem, nonnullis pilis rubeis præditum, sex pedes versus caput, nonnullos verò paruos versus caudam habentem, quibus placidè gradiabatur, Vixit quatuor dies sine cibo.

*De loco in quo generatus sententia Fulv. Angelini.*

De huius vermis generatione statuit Fuluius Angelinus, eum in ventre inferiore generatum fuisse, atque inde in ventriculi capacitatem regurgitasse, è quo dum æger somnum per noctem caperet, per œsophagi viam leniter gradiens, in amplitudinem buccæ peruenit, & ore clauso, ut per noctem fieri solet, in narium cavitatem se absconderit, inuento narium satis capaci foramine, ibique quiescit, donec vel grauians, vel vellicans ægrum ad emungendas nares stimulauerit; idque ut statuat, istis rationibus vtitur. Prima est, quod nullum graue symptoma circa cerebrum apparuit; quod fieri solet dum vermes in cerebro, vel loco vicino generantur. Deinde quod aliàs compertum sit, vermes intestinorum per nares exiisse. Verum non credibile est, vermem tam magnum, & taliter figuratum, è ventriculo in palatum, & hinc in nares irepere potuisse, ut æger id nullo modo perciperet, neque rationes allatæ satis firmæ sunt. Neque enim æger planè fuit sine omnibus grauib. symptomatibus, sed octo ferè noctes duxit insomnes, & mente aberrauit. Possunt etiam tales vermes, si quieti degant, id quod accidit, cum alimentum habent, diu latere, ut nullum graue symptoma afferant. Deinde vermes, qui interdum ex ore, & quandoque etiam è naribus, ex ventre inferiori è progressu, erumpunt, veri lumbrici sunt, nec ascendunt tales vermes, ut id ab ægro non percipiatur.

*Alfar. Cruz.*

Rectius sentit Vincent. Alfarius Cruzius, *d. l.* vermem hunc, si non in ipso cerebro, tamen prope cerebrum, circa colaturam nasi, genitum fuisse; & docent hoc aliæ etiam historiæ vermium in capite generatorum, quæ videantur apud Auicennam *sen. 1. tr. 2. cap. 3. de Soda*, Arculanum, *in 9. Rhaf.* Forestum, *lib. 9. obseru. 4. in schol.* Guilhelm. Fabricium, *Hildan. centur. 1. obseru. 8. & 16.* Et omnino isto in loco nec materia, nec causa efficiens deest, de quo suo loco dictum.]

## Causæ.

Possunt quandoque in caput irrepere eiusmodi vermes; id quod seruus ille apud Hildesheimium suspicatus est, qui cum sæpius bene potus in gramine dormiisset, vermem eiusmodi vnum atque alterum in aurem irrepsisse, à quo reliqui deinceps generati fuerint, credidit. In capite tamen etiam generari, ex corruptione humorum, præcipuè malignorum, certum est: id quod in malignis & pestilentibus febribus, & nonnunquam in putredine ac corruptione cranij accidit.

## Signa Diagnostica.

Cognoscuntur vermes ex dolore diuturno, qui nullis remediis cedit, vehementi, maximo; præsertim cum caput mouetur, & ferè lancinante fœtore, qui per nares & os exhalat, sternutatione, & frequenti vertigine, quæ ægrum corripit.

*Vermis in capite generatus.*

## Prognosticum.

Malum hoc satis periculosum est, & curatu difficile, ac quod sæpissime ægris exitium affert.

## Indicationes.

Vermes seu viui, seu mortui, exturbandi sunt ex capite. Ideoque præmissis vniuersalibus, vermibus aduersantia, eosque necantia, & errhina, & sternutatoria ad eorum expulsionem vsurpanda.

## Curatio.

Errhina & sternutatoria ex superioribus nota sunt: iis tamen talia admiscenda, quæ vermes hos necare vi peculiali comperta sunt, ut *juccus raphani*, *hiera*, *aloes*, *succus fol. persicorum*, *abrotani*, *absinthij*, *ol. amygdal. amarar. ol. persicorum*.

Vel excipiat naribus & ore hiant talis fumus:

*℞. Centaur. minor. marrub. beionica, an. Drach. ij. 2. doaria Drach. 3. angelic. succini, an. Drach. ij. anisimon. trudi Vnc. i. minij Drach. 3. boli Armeni Drach. i. aristolochia rotunda Drach. ij. absinthij Drach. iii. Fiat puluis carbonibus inspergendus.*

Loco verò dolenti applicetur hoc Emplastrum:

*℞. Aloës, puluer. lumbricor. cuiuscunque descripti an. Drach. ij. fellis taurini Drach. j. olei absinth. cere, an. q. l. F. Cerorum.*

Quod emplastrum cum applicauisset, & fumum naribus ter quateruè excepisset seruus ille apud Hildesheimium; vermes lanuginosi viui tredecim per fauces, nares, & aures prodierunt, atque dolores remiserunt: post menses tamen aliquot adhuc duo prodierunt.

Marquardo tamen, *pract. lib. 1. cap. 1. corollar. 64.* suspecta est vermium interfectio. Ideoque hoc Emplastrum imponit capiti raso:

*℞. Amygdal. amarar. contusar. succi folior. persicor. abrotani, absinthij, an. Vnc. j. Misce, & capiti imponatur.*

Per nares verò excipiat vapor è lacte, ut ita vermes exeant. Commendatur & Tabaci succus, & fumus naribus attractus, ad vermes in capite occidendos.

Calculos etiam quandoque in cerebro nasci, obseruatum est à Medicis; cuius rei historias collegit Schenckius, *lib. 1. obseru. 81.* Exemplum etiam extat apud Guilhelm. Fabricium, *cent. 1. obseru. 11.*

*Calculi in capite generati.*

Cognoscunturque ex dolore, qui est fixus, & nullis cedit remediis, adest grauitas, sine excrementis tamen. Sed malum id incurabile est.

Annotauit etiam Guilhelmus Fabricius, *cent. 2. obseru. 2.* globulum plumbeum sclopeto emissum in caput

put iuuenis adactum fuisse, ibique, vulnere etiam sanato, sex mensibus inter cranium & duram matrem ad latus futuræ rectæ, nullo superueniente symptomate, remansisse.

Possent & huc referri fungi cerebri, verum cum ij saltem in vulneribus cerebri nascantur, suo loco, vbi de vulneribus cerebri agemus, de iis dicemus.

## CAPVT XIX.

## De Morbis Magnitudinis in Capite.

Capitū magnitudo vitiosa.

**A**D morbos Magnitudinis vitiatæ in capite pertinet hydrocephalus, & tumores cerebri, ac membranarum eius. Verum cum ij morbi compositi sint, & cum magnitudine aucta concurrat intemperies cum materia, de iis seorsim in fine huius libri dicemus.

Pertinet hūc & illa prodigiosa capitis magnitudo, quam ex Fincelio de miracul. refert Schenckius, lib. 1. obseru. 3. 2. de infante quodam, cui ad quintum mensem capitis magnitudo ita aucta est, vt in circumferentia vnam æquaret. Et occurrunt similia interdum etiā capita prodigiosæ magnitudinis: sed cum ista vitia à prima conformatione sint, incurabilia sunt. Eodem modo sese res habet de nimia capitis paruitate.

## CAPVT XX.

## De Commotione cerebri.

Commotio cerebri.

**S**itus totius cerebri in homine viuente mutari non potest: in partibus verò cerebri eiusmodi affectio fieri potest, vbi ob depressionem ossis, ab ictu aliquo validiore, vel etiam sine ossis depressione, ab ictu vel collisione capitis quacunque vehementiore, partes cerebri, præcipue superiores, quæ alioquin ab inferioribus disiunctæ seruari debent, p. n. cum ipsis coniunguntur, cerebrique partes quasi loco naturali dimouentur. Agendum ergo hūc de illa affectione, quæ vulgo Cerebri commotio nominatur. Et si verò & angustia ferè cum ea coniungatur, & nonnunquam etiam vasa quædam rumpantur, & proinde in diuersis locis de ea agi posset: tamen non incommodè inter morbos in situ, & ante vulnera capitis, hoc loco, de ea agi posse videtur.

Facit huius affectionis mentionem Hippocrates, 7. aph. 5. 8. & Galenus, in comm. Paræus, lib. 9. Chirurg. c. 9. & 22. Guilhelm. Fabricius, cent. 1. obseru. 11. 12. cent. 3. obseru. 9. & alij. Hippocrates de ea ita scribit: *Quibus occasione aliqua cerebrum vehementius fuerit concussus, multos protinus fieri necessum est.* Recentiores appellant cerebri commotionem: quo nomine malum id præcipue intelligunt, vbi sine externo aliquo vulnere, sine cranij fractura, vel depressione, ex percussione vel lapsu vehementiore, vel cranij modiolio perforatione, vel manus illusione, vel bombardarum & tonitruum fragore talis consternatio accidit, vt ægri neque loquantur, neque agant aliquid, sed ferè apertis oculis immoti maneant, similes iis, qui motu & consternatione perculsi sunt, atque attoniti. Accidere ista symptomata statuit Galenus, loc. alleg. quia virtus animalis retracta in cerebrum cogatur, per tales affectiones commotione vehementiore offensa; & propterea quietem agat, & ferietur, atque inde organa sensuum & motus suo officio non fungantur. Et quidem hoc ita sese habere, in leuiore modo facile concedi potest; in grauiore tamen credibile est, non solum spiritus in cerebrum reuocari, sed & conturbari, & ob cerebri situm mutatum, & angustiam, motu eorum impedito, symptoma eiusmodi excitari. Vbi enim cerebrum vehementius concutitur, non solum spiritus commouentur, & con-

turbantur, sed & cerebri partes à naturali situ dimouentur, & meatus cerebri concutiuntur, imò vasa ad cerebrum tendentia, & per eius substantiam sparsa, vt & nerui, non solum comprimuntur & contorquentur, sed & rumpi possunt, si vis maior sit, & inde sanguis in cerebrum effundi potest: quod sanguis per os & nares sæpe effusus testatur, à quo meatus cerebri tum obstrui, tum comprimuntur. Et quidem, vbi cranium frangitur vel deprimitur, fit hoc facilius: integro tamen etiam eodem manente, imò capite galea ferrea recto, vehementiore ictu cerebrum grauissimè concuti; & venæ ac arteriæ in eo rumpi possunt. Ideoque quæ hūc de isto malo dicuntur, tam in commotione cerebri cum fractura cranij, quam sine fractura eiusdem locum habent. Facilius autem ista commotio fit syncipite percusso, quam alia capitis parte, vt historia de Nerei filia, quæ mox recitabitur, docet.

## Signa Diagnostica.

Ex adstantium relatione, an æger grauius percussus vel lapsus, vel simile quid passus fuerit cognoscitur. Symptomata autem, quæ cerebri commotionem sequuntur, hæc sunt: Si concussio minus violenta est, non statim muti redduntur, sed sopore quasi corripuntur, non aded tamen profundo, quin excitari possint; vel vertigo corripit: si concussio sit vehementior, *ἀπώλεια* & *ἐνπληξίς*, vt Hippocrates 7. aph. 14. nominat, accidit, & auditus, visus, motusque aboletur; delirium etiam quandoque accedit, sanguis per os & nares effunditur, oculi inflammantur, & sæpe inflantur; plerique hoc modo affecti vomunt, cōsentiente cum cerebro ventriculi orificio per neruos sextæ coniugationis. Et primò quidem quicquid in eius capacitate reperitur, euomitur: hinc quicquid à vicinis paribus affluit, in primis bilis flaua, quæ ad motum aprior, vesiculæ fellis lacescit, in ventriculum infunditur. Vbi sanguis corruptus putrescere circa cerebrum & membranas eius incipit, cerebri & membranarum eius inflammatio excitatur, calorque cordi communicatur; vnde febris continua oritur, delirium, conuulsiones, & tandem, nisi materia euacuetur, cerebri corruptio & sphacelus.

Rei huius historiam narrat Hippocrates, 5. Epidem. Pulchra, inquit, erat virgo, Nerei filia, & ferè annos nata viginti, cui à femina ludente latè manu syncipiti percussus est. At tum quidem oculorum caligo corripuit, & sine respiratione erat, cumque domum peruenisset, illico febris vehementi correpta, & capitis dolore tentata est, cum faciei rubore. Septimo autem die ad aurem dextram pus graueolens aliquantum, rubrum, cyatho uno amplius, prodiit, meliusque habere, & allenari visa est. Rursus inualecente febre in somnum propensa erat, neque loqui poterat; faciei pars dextra contrahabatur, difficultas spirandi, & conuulsio cum tremore aderat, & lingua impediebatur, oculusque stupidus factus est; nono mortua est.

## Prognostica.

1. Duplicem hic affectus euentum habet. Aut *Prognostica* enim redeunt ad se ægri; aut non redeunt, sed moriuntur.

2. Et quidem dum ad se redeunt, atque iterum loqui & moueri incipiunt; id fit quandoque sine grauib. symptomatibus, postquam facultas animalis ad se redit, spiritusque explicando partibus communicat, meatus aperiuntur, spiritibusque naturalis motus restituitur, præcedente interdum quodam leui delirio; quod accidit, vbi nulla vasorum, neruorum aut membranarum cerebri facta est disruptio.

3. Quandoque verò ad se quidem redeunt, & loqui incipiunt ægri, sed grauissima tamen patiuntur symptomata.

symptomata. Vasis enim ruptis, & sanguine circa cerebrum, vel in cerebri substantiam effuso, febris acuta, delirium, vel, cerebro repleto, sopor grauis, stupor & paralysis sequitur. De quo Hippocrates, 7. aphor. 14. *Ex istu capitis ἐπὶ τοῦ κεφαλῆς ἢ ἀπὸ τοῦ κεφαλῆς, stupor aut desipientia, malum.* Si materia è capite eiiciatur, & ad nervos detrudatur, sequuntur & alia interdum symptomata, vt collirelaxatio, tumores periculosi in capite, cæcitas, ab obstructione nervorum opticoꝝ, convulsiones. Cuius rei historiam habet Guilhelm. Fabricius, cent. 1. observ. 11. & cent. 3. observ. 9. 36.

4. Interdum verò ægri ad se non redeunt, sed moriuntur; & si symptomata enumerata permaneant, vel alia accedant, quo tempore omnia remittere oportebat, periculum portenditur, & ob inflammationem, putredinem & gangrænam, ac sphacelum cerebri, convulsio & apoplexia, & tandem mors sequitur. Quod si cerebri portione abrupta, vel nervi, vel membranz avulsæ, vel vasa disrumpunt insignia sint; quod in corporibus senilibus facilius accidit, in quorum capite minor est cerebri motus, spatiumque inter cerebrum & cranium maius, quâ de causâ cerebrum magis concuti potest; sic affecti breui, & plerumque intra triduum moriuntur. Eius rei historia fuit modò ex Hippocrate, 5. epid. relata. Habet etiam similes Valleriola, lib. 3. observ. 1. & 8. Dodonæus, observ. med. cap. 12. Guilhelm. Fabricius, loc. alleg.

5. Si cerebrum vehementius loco suo motum sit; nihil tamen in eo ruptum, fatuos reddit, qui nullo modo restitui possunt.

### Indicationes.

Principiò curandū, ne sanguis ad caput affluat; quod expeditur reuellentibus & repellentibus. Sanguis è vasis effusus, saniesque ex eo genita, circa membranas cerebri hærens, euacuanda; quod fit vel sensibilibus, cranio aperto, vel insensibilibus, dum medicamentis attractivis foras elicitur, & discutitur. Si quid verò læsum est, sanandum.

### Curatio.

Curatio commotionis cerebri.

Ideoque statim vena in brachio aperienda; simulque caput, crinibus abrasis, oleo rosaceo, vel myrtino inungendum, aut tale Cataplasma capiti imponendum;

℞. Farin. hordei, fabarum, an. Vnc. vi. olei rosar. Vnc. iij. aceti. q. s.

Fiat Cataplasma; quod capiti applicetur, & sæpius renouetur. Sicca verò, & vehementius adstringentia vitanda sunt; cum poros obstruant, & transpirationem prohibeant, ac proinde inflammationem non arceant, sed potius accerant.

Clysteres quoque iniiciendi, & repetendi; & vapores à capite auertendi, atque aliæ reuulsiones per frictiones partium extremarum, cucurbitulas (scapulis appositæ, instituendæ.

Die altero Paræus venam puppis, quæ supra lambdoidem est, aperit, obturatis, vt id commodius fiat, ore & naribus, & spiritu magno conatu eliso, vt membrana cerebri hoc modo intumescant, & sanguis extrudatur; & paucis diebus post etiam venam frontis, & sub lingua, vt sanguis omnibus viis è capite eliciatur.

Post quartum diem repellentibus discutientia admiscenda sunt; quale est hoc Cataplasma;

℞. Absinthij M. j. flor. rosar. rubr. chamamel, an. P. j. farina fabarum Vnc. j. sanguinis draconis Drach. ij. myrtia Drach. iij. Cum oleo rosaceo F. s. a. Cataplasma.

Vel hoc. Fomentum;

℞. Rad. althæe Vnc. iij. ireos, cyperi, calami aromatici, an. Vnc. j. fol. saluæ, maioran. betonic. flor. rosar. rubr. stæchad. Arab. an. M. s. salis communis Vnc. j.

Coquantur in vino rubro, & aqua fabrorum.

Decocto spongia excepto foueatur caput, vt tamen non nimis incalecat.

Inferuit etiam huic scopo Ceratum Vigonis, vsu comprobatum, quod ita paratur.

℞. Furfuris Vnc. iij. farina lentium Vnc. ij. rosarum, fol. & granor. myrti, an. Vnc. j. calami aromatici. Dra. x. chamamel, meliloti, an. M. s. nuc. cupress. num. vi. olei rosacei, chamamel, an. Vnc. iij. cera alba Vnc. iij. sturis, mastiche, an. Drach. iij. myrrha Drach. ij.

Pulverisandis pulverisatis, & liquefactis oleis cum cera, F. Emplastrum.

Tandem sola discutienda vsurpantia, ex radicibus althææ, cyperi, calami aromatici, fol. saluæ, maioran. betonic. flor. stæchad. chamamel. quibus ad caput roborandum flores rosarum rubrarum addantur.

Alexander Benedictus, lib. 1. meth. med. morb. cap. 5. Emplastrum ex gummi hedera valde commendat, eoque senem decrepitem octogenarium, qui ex capitis percussione obmutuerat, præter omnem opinionem, se sanasse refert; idque etiam fracta caluariæ ossa, plurquam credibile sit, ferruminare scribit. Paratur autem hoc modo;

℞. Gummi hedera Vnc. iij. resina pura Vnc. s. cera 3. iij. olei rosacei 3. ij. B. ammoniaci 3. ij. terebinth. 3. iij. succi corymb. hedera Vnc. iij. farina fabarum q. s. Miscantur.

Pulli quoque columbini, vel gallinacei, vel catuli per medium dissecti, vel pulmones animalium calidi, capiti admoti insignem discutiendi vim habent.

### Dieta.

Dieta sit tenuis, & æger vino ad diem 14. abstineat; vt & carne ferè, & pane ac prisanâ, vel alio tenuiore cibo sit contentus. Acida, salia, & acria vitanda; ægerque in quiete & tranquillitate continendus.

Exempla videantur apud Hippocratem, 5. Epid. num. 55, & 7. Epid. num. 85. Forestum, lib. 9. observat. 30. 32. Exempla commotionis cerebri etiam habet Schenckius, lib. 1. observ. 47.

### De Cranij depressione sine fractura.

Cum hætenus depressionis cranij aliquoties mentio facta sit, & si cranium deprimatur, cerebri, quod vnâ comprimitur, meatus angustiores reddantur, capitis figura vitietur, & in situ etiam vitium accadat; de ea etiam aliquid hoc loco dicendum.

### Causa.

Fit autem compressio illa à causa violenta, percussione, casu, & quidem nunc cum fractura cranij, de quâ suo loco, vbi de fracturis cranij agemus dicitur; nunc sine fractura, de qua hoc loco. In infantibus enim, & qui ossa cranij molliora habent, caluariæ ossa absque vlla fractura comprimi possunt, idemque patiuntur, quod plumbea, stannea, & cupreavasa.

### Signa.

Digitis fouea & depressura deprehenditur; & si depressio paulò sit maior, muti fiunt, vomitus bilis adest.

Modum curandi tradidimus in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 6. quibus hoc addimus, in infantibus nulla violentia opus esse, nec aliam curam requiri, quam vt densus capillis ceratunali quod cephalicum, ad depressa ossa eleuanda idoneum, adhibeatur. Molli enim infantium ossa, natura cooperante, facile iis in pristinam sedem restituantur.

Vt ℞. Resina pini, cera flaua, an. Vnc. iij. terebinth. clara, gummi elemi, an. Vnc. iij. olei rosacei Vnc. ij. ammoniaci

Ceratum Vigonis.

Emplastrum gummi hedera.

Quomodo sit curandum.



*ammoniacy Vnc. j. farina volatilis Vuc. j. vini nigri q. s.*  
F. Emplastrum.

Vel applicetur *Emplastrum de gummi elemi* Conci-  
liatoris, aut *Guidonis de centaureo*.

Vel hoc: *℥. Mastiches, terebinth. an. Vnc. j. gummi elemi Drach. x. colophonie, resina pini rec. an. Vnc. ℥. am- mon. Drach. j. succi betonice, consolida maioris, minoris, an. Vnc. i. apij Drach. vj. vini odorati ℥. ℥.*

Bulliant ad consumptionem succorum & vini. Po-  
stea fortiter colentur:

Colaturæ adde *cera alba, olei mastich. an. q. s.*

F. Ceratum super ignem, quod cranium depressum  
suum in locum reducit.

*Siriasi.*

Præter hanc, quæ à causa violenta fit cranij  
depressionem, alterius adhuc mentionem faciunt Au-  
tores; quæ à causa interna ortum habet in infantibus.  
Aëtius, *reirab. 1. ferm. 4. cap. 13.* Siriasin appellat, quod  
in syncipite cavitatis quædam apparet. *Σίριος* enim, &  
ut nonnulli legunt, *σείριος*, apud Græcos dicitur fossa  
ac fouea, in qua semina feruntur. Etsi verò Aëtius,  
*loco allegato*, saltem ab inflammatione cerebri ac mem-  
brarum id accidere dicit: tamen & in aliis morbis  
os bregmatis in infantibus nonnunquam subsidet. In  
Germania mulieres appellant *das Blat fallen oder schi-  
essen*. Ossa enim syncipitis parte superiore, vbi coro-  
nalis & sagitalis sutura coeunt, in infantibus non  
dura sunt, sed cavitatem quandam efformant, quam  
membrana quædam, quæ omnium postrema siccescit,  
& ossa euadit, quamque Arabes Zeudech, nonnulli  
Fontanellam, Germani *das Blat* appellant, tegit. Id os  
seu membrana potius, ut diximus, interdum in infan-  
tibus subsidet, & à mulieribus pro lethali plerumque  
signo habetur: quod procul dubio accidit, cum ipsum  
cerebrum in morbo aliquo graui in motu deficere inci-  
pit, nec satis dilaturatur.

## CAP V T XXI.

*De Morbis soluta Vnitatis in capite & Cere-  
bro; & primò de Contusione capitis.*

*Suturarum  
cranij so-  
lusio.*

**R**estat tertium morbi genus, soluta Vnitas, quæ ut  
plurimum à causis externis & violentis accidit:  
aliquando tamen à causis internis suturæ capitis, quæ  
aliàs contiguæ sunt, disjunguntur, ut euident inter  
eas sit distantia; (nisi quis hanc suturarum distantiam  
ad morbos compositionis referre malit) quod euenit  
ab humorum vel vaporum copia, qui distendendo fa-  
ciunt, ut suturæ magno spatio distent; ut docet Pau-  
lus Aegineta; Et tale exemplum recitat Iacob. Fonta-  
nus, *pract. l. 1. cap. 3.* de quodam Iuvene Aquensi, in  
cuius capite dissecto suturæ ferè quatuor digitis inui-  
cem distabant, & è quo ingens copia serosi humoris,  
qui in ventriculis & tota substantia cerebri contine-  
batur, effluebat. Scripsit etiam nuper ad me Medicus  
quidam è Silesia, pestis, quæ anno 1622. in Polonia  
grassata est, tantam fuisse sauitiem, ut eà extinctis cra-  
nium rumperetur. Verùm rariora hæc sunt, & incurabi-  
lia. Itaque de ea vnitatis solutione, quæ à causis  
externis & violentis accidit, dicamus.

Sunt autem solutæ vnitatis plures differentiæ, de  
quibus in Institut. *lib. 2. part. 1. cap. 10.* dictum: hic in-  
primis dicendum erit de contusione, vulnere, fractu-  
ra, & carie. Et quidem soluta vnitatis in capite, est vel  
in cute tantum & carne, vel simul in pericranio, vel  
etiam cranio. Et quæ in cranio est, vel cranium totum  
penetrat, vel non; & quæ penetrat, est vel sine duræ  
matri læsione, vel cum eà; & quæ cum duræ matri  
læsione est: aliquando ad piam matrem & cerebrum pe-  
netrat, aliquando non.

Non autem hic dicemus de vulnere in genere, sed

quæ de eo dicenda sunt, suo loco, vbi de partium ex-  
ternarum, & habitus corporis morbis agetur, expli-  
cabuntur. Hic saltem ea, quæ capiti propria sunt, per-  
sequemur; sicut & Hippocrates, in *lib. de vulneribus  
capit.* de iis agit. Dicemus autem primò

### De Contusione.

Contusio autem est interna membri continui solu-  
tio & collisio, extrinseco plerumque integro apparen-  
te, quæ fit à re graui, dura & obrusa, quam sequitur  
*ἐκχύωσις*, seu *ἐκχύωσις*, sanguinis scilicet subter cu-  
tem effusio.

*Contusio ca-  
pitis.*

### Causa.

Hæc fit, cum caput vel fuste, vel aliâ re obtusâ per-  
cutitur: vel ex lapsu caput rei duræ, non acutæ allidi-  
ditur, & cute plerumque integrâ venæ exiguæ sub cute  
te aperiuntur, sanguisque ex iis effunditur, & inde tu-  
mor mollis, liuidus, absque magno dolore, excitatur.

Fit autem duplici modo; vel cum cutis vulnere, vel  
sine eo. De eâ, quæ fit cute integrâ, primò dicemus; de  
altera *capit. sequent.*

### Prognostica.

1. Malum hoc, si nimirum & cutis & cranium salua  
sint, si rectè tractetur, periculo vacat.

2. Si tamen musculi temporales contendantur, deli-  
rium, paralysis, conuulsio, & mors inde sequi potest.  
Cuius rei exempla sunt apud Glandorpum. in *speculo  
Chirurg. cap. 10. 11. 12.*

### Indicationes.

Danda autem opera, ut humorum affluxus prohibea-  
tur dolorque, si adsit, mitigetur, & sanguis, qui sub cu-  
tem effusus est, euacuetur, & vasorum orificia iterum  
claudantur.

### Curatio.

Ideoque statim initio repellentia & adstringentia *Curatio.*  
adhibenda, eaque sæpius, ne incallescant, remouenda,  
Ac proinde statim capillis, si in loco capillato contusio  
sit, prius abradis, adstringentia, supra, *cap. 1. & cap. 8.*  
proposita applicanda, & oleo rosaceo locus inungē-  
dus; deinde oui albumen bene conuassatum, vel io-  
lum, vel aquâ rosacâ & aceto mistum, & stuppâ exce-  
ptum imponendum.

Vel tale Repellens applicetur:

*℥. Olei rosacei Vnc. iij. album. ouor. Vnc. ij. pulu. nnc. cupressi, balauftiorum, alum. rocha, rosarum rubrarum, an. Drach. j. Misce, & imponatur.*

Vel *℥. Farina hordei, fabarum, an. Vnc. vj. olei rosa-  
cei Vnc. iij. aceti q. s.* F. Cataplasma.

Locus ipse paulo arctius ligetur, sitque ligaturæ ini-  
tium in loco affecto, & desinat eo loco, è quo fluxum  
imminere metus est. Ligatura enim arcta fluxiones ar-  
cet. Medicamenta autem talia sæpius renouentur.

Secundo die vinum austerrum, in quo rosæ, myrtus  
betonica, & aliquid florum chamæmel. cocta sint, te-  
pidum imponatur, & si dolor aliquis appareat, medi-  
camentum bis de die mutetur, & locus oleo rosaceo re-  
pido foueatur.

Si contusio maior sit, & ob dolorem affluxus maior  
metuatur, vena statim aperienda, & si corpus impurum  
sit, medicamentum bilem purgans exhibendum, vel  
etiam clyster iniiciendus, & tenuis victus imperandus.  
Et si dolor vehementior sit, lanâ oleo rosaceo & cha-  
mæmelino madidâ locus fouendus, vel decocto, rosa-  
rum, radicis althææ, lini, fœnugræci: betonice,  
vel vnguento Alabastrino inungendus.

Vbi

# 312 De morb. solut. vnitatis in capit. & cerebr.

Vbi iam dolor sedatus, & de affluxu amplius non metus est, danda opera, vt sanguis extra vasa effusus euacuetur: quod fit vel insensibiliter, per ἀδύλον διαπύλον, vel sensibiliter, materiā in pus conuersā, & tumore aperto.

Tutius verò longè est materiam insensibiliter discutere, quàm permittere, vt in pus verratur.

Quapropter paretur tale Cataplasma.

℞. Gum. absinthij. M. j. β. rosar. rubrar. flor. chamamel. betonica, ferula campana, an. M. β.

Coquantur in vino ad mollitiem. Postea contundantur, & addatur farina hordei, fabarum, an. Vnc. j. β. pulu. sem. cumini. Drach. ij. olei rosar. q. s. f. Cataplasma.

Vel imponatur emplastrum, quod capite præcedente ex Alexandro Benedicto recensuimus; aut emplastrum de betonica, aut de gummi elemi, aut ceratum Issidis, descriptum à Galeno, 5. κατὰ γέν, cap. 2. ceratum de mairsylua, emplastrum de Ianua Fernelij, emplastrum de gratia Dei Fernel. lib. 7. method.

Vel ℞. Emplast. diachyl. Vnc. ij. oxycrocei, de meliloto, an. Vnc. j. olei chamamel. anethini, an. Vnc. β. Malaxentur. f. Emplastrum.

Vel vsurpetur, Cerotum Vigonis de minio, quod emollit & discutit, & ita paratur:

℞. Olei chamamel. lilior. albor. an. Vnc. x. mastichini Vnc. ij. pingued. veruecis lb. j. β. lithargyri auri ℥. viij. minij. ℥. ij. vini boni cyathum j.

Bulliant omnia simul agitando, primùm lento, hinc fortiore igne, donec massa colorem tubnigrum contraxerit, tum adde terebinthina lb. ij. pulu. mastiches ℥. ij. gummi elemi ℥. j. cera q. s. Iterum coquantur. Fiat Emplastrum.

Vel Fomentum tale paretur.

℞. Nuc. cupressi contusar. num. x. myrsill. ℥. j. rosar. rubr. absinthij, fol. salu. maiorana, stœchad. flor. chamamel. an. M. β. aluminis rocha, rad. cyperi, calam. aromat. an. Vnc. β. Coquantur in vini rubri lb. iij. lixiniij communis lb. ij.

Decocto caput foveatur, & post fomentationem exsicceretur, & emplastrum aliquod imponatur. Forestus lib. 9. obseru. 32. hoc emplastrum Helidæi, quod mirum in modum humiditatem in contusionibus discutiat, commendat:

℞. Flor. rosar. rubrar. chamameli, absinthij, betonica, an. M. j. Coquantur ad mollitiem, & contundantur, adde farin. fabar. Vnc. iij. ol. rosar. vini nigr. styptici. an. q. s. Fiat Emplastrum, seu potius Cataplasma.

Si verò ob humoris effusi copiam is totus discutinequeat, & suppuratio impediri non possit, medicamentis maturantibus suppuratio promouenda, vt oleo dulci tepido, vel decocto maluæ, althææ, caricarum; vel parando ex his cataplasma, cum farina hordei, adipe gallinæ, oleo communi; vel imponendo emplastrum triapharmacum, quod fit olei dulcis parte vna, aquæ communis partibus duabus; & triticæ farinæ f. q. quibus vitellum oui addere licet.

Vbi ex dolore & loci mollitie materiam in pus conuersam esse cognitum fuerit, extrahenda ea; idque ocyus faciendum, ne pericranium, & quæ ei connectitur, duram matrem corrumpat. Quod fit sectione factâ in loco decliniori, & ad materiæ euacuationem commodiore. Si temporalis musculus est contusus, sectio non in ipso musculo, sed in loco propinquo instituenda; aut si in ipso musculo sectionem instituere libeat, secundum longitudinem fibrarum fiat; ferum tamen non nimis altè alligetur: vitandique musculi caput mouentes.

Abscessu aperto, & materiā euacuatâ, vlcus detergendum tali, vel simili medicamento:

℞. Syr. de absinth. simpl. rosarum, an. ℥. j. terebinth. ℥. j. β. pulu. ireos, aloes mastiches, myrrha, farina hordei, an. Drach. sem.

Vlcere mundato cauitas implenda, & cicatrix inducenda. Carnis tamen excrescentia seu ὑπερπλασία, quæ in hisce contusionibus frequenter suppullulat, depalceda pulueribus χαλαρπηκτοῖς, aut liquore illo viridi, qui in ὑπερπλασίᾳ quacunque vtiliter, & sine omni dolore, adhibetur; qui Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 13. describitur.

## De Contusione Capitis Puerorum.

Quia verò in primis pueri & infantes, propter capitis molem, tibiarumque imbecillitatem sæpius labuntur, caputque grauiter offendunt, & contundunt, sanguisque ex contusione collectus sub cute tumorem excitat; de hac in puerorum capitibus contusione in specie aliquid addemus ex Iulio Cæsare Arantio, qui, in fine comment. l. Hippocr. de vulnerib. cap. scribit, se iuniorem, minuscque exercitatum, metuisse, ne sanguis sub cutem effusus ibi putresceret. & ad membranam descenderet; & idcirco sectionem cuti adhibuisse vt sanguis educeretur: sed hoc modo in maximum discrimen infantes adduxisse; cum & ob sanguinem affluentem vires resolverentur, & dolore, ac clamore & eiulatu infantum, fluxio, & tandem inflammatio excitaretur: ideoque longo rerum vsu se oculatiorem factum, tandem à sectione planè abstinuisse, ac sequenti curandi modo graues etiam contusiones feliciter curasse.

Ab acceptâ contusione protinus, vbi opus, abrafo, aut, si ratio ob dolorem fieri non possit, fornice deronso capillo, linteam, vel stappa, oui albumine, & aceto rosaceo madida, imponenda, & deligatione factâ, integro die naturali linteam extrinsecus iisdem madefaciendum, ne exsicceretur. Ita enim humorum confluentium impetus prohibetur, & aliqua pars resoluatur.

Sequenti die sequens Cataplasma imponendum:

℞. Pulu. rosar. rubrar. fol. & baccar. myrsi, an. Vnc. ij. farina fabarum, hordei, an Vnc. j. absinthij, betonica, an. Vnc. β. sem. cumini Drach. j. mellis albi Vnc. ij. Cum vino nigro austero f. Cataplasma. cui adde olei rosar. chamamel. an. Vnc. j.

Hoc medicamentum, quod appellat Benedictum, bis singulis diebus tepidè imponendum est, vt non solum contusam partem, sed & circumscriptas complectatur; sitque eius quantitas, quæ vnâ vice adhibetur, mediocris. Si enim sit exigua, parum habet virium, & à partis calore facillè exsiccat: si nimia, locus affectus comprimitur. Atque in istius medicamenti vsu ad diem vsque nonum vel decimum perseuerandum est. Indies enim partem detumescere, & collectum sanguinem resolui, ac per poros cutis euaporare animaduertetur; ac si caluaria etiam contusa sit, ad pristinum statum reducetur.

Cum verò dies vndecimus præterierit, Emplastrum diapalma Galeni, corio tenuissimo illitum, imponendum, & tertio quoque die immurandum.

Post vigesimum diem ad reliquias humorum absorbendas, & collisam caluariam in suum naturalem statum reducendam, emplastrum Barbarum corio illitum applicandum. Et quamuis curatio protrahatur, & collecti, & effusi sub cutem humores tardius dissipentur, tamen curatio hoc modo feliciter expeditur.

Forestus ad tumores, qui pueris ex lapsu in capite oboriuntur, oleum anisi commendat, si eo tumor illinatur. Victus interim arari sit sufficiens, non nimis tenuis.

Eadem curatio adhiberi potest, si infanti recens nato in partu difficili, caput contusum & tumidum, ob sanguinem effusum, sit: sed simplicior. Solum enim diaphanicum ex rosaceo confectum tumores hos discutit.

CAPVT XXII.

De Vulneribus Capitis sine cranij. membrana-  
rum & cerebri læsione.

Et primò

De Vulnere sine Contusione.

*Vulnus cutis  
capitis sim-  
plex.* **P**rimò vulneratur caput sæpe, cranio integro ma-  
nente; vbi scilicet solum cutis, pāniculus carnosus,  
musculi, & nonnunquam etiam pericranij vulneratur.

Signa Diagnostica.

*Signa dia-  
gnostica.* Signa diagnostica quod attinet, vulnera capitis, quæ  
partibus cranio superpositis accidunt, & cutis carnisue  
vulnera dicuntur, vel ipso obtutu, vel saltem specilli in-  
dagine patefiunt. Cæterarum verò partium læsiones  
non ita facile innotescunt.

Prognostica.

Quæ vulnera etsi per se periculosa non sunt; præci-  
puè cuti & panniculo carnosio inflicta, nemoque ex iis, si  
rectè tractentur, moriatur: tamen nec illud malè dicitur:  
nullū capitis vulnus contemnendum esse; quod Hip-  
pocrates, in *proæmio libr. de vulner. capit.* monuit. Ideo-  
que in iis curandis, quàm in aliarum partium cutaneis  
& non profundis vulneribus, plus diligentia adhiben-  
dū: cum, si quid negligatur, sæpe magnū periculū accer-  
satur. Etenim etsi cutis solum vulnerata sit: tamen nisi  
diligentia debita adhibeatur, vlcus inrudescentes non  
parum molestia exhibet, & à pure partes subiectæ cor-  
rumpuntur: aliquando febris inducitur; vnde Medico qui-  
dè negotium, ægro verò periculū affertur: Exemplū nota-  
bile est apud Schenckium, *lib. 1. obseruat. 35.* de Carolo  
Regis Hispania filio, qui ob vulnus capitis non peri-  
culosum negligenter tractatum in vitæ periculū addu-  
ctus est & alterū, *ibid. obseru. 36.* de quodā, cui ob vul-  
nus capitis etiā non graue, sed non rectè curatū, cranij  
os viciatum fuit, & hinc diuturnus & longus capitis do-  
lor exortus, vt & apud Valeriolam, *lib. 3. obseru. 1.* Gui-  
lelmum Fabricium, *cent. 1. obser. 21.*

Curatio.

*Curatio.* Primò ergo videndum, quousque vulnus penetret.  
Nā si cutis sola læsa sit, nulla alia curadi ratio est, quàm  
quæ aliis cutaneis vulneribus debetur. Nimirum sanguis.  
si copiosius fluat, sistendus, capilli circa vulnus abradē-  
di, & labia vulneris coniungenda. ac coniuncta seruan-  
da, & ne quid labiis vulneris intercidat, neque accides  
aliquod superueniat, cauendum. Quod potissimum fit,  
si interna causā, quæ est *δυσκράσις* partis calida & do-  
lorifica, quæ grauiā concitat symptomata, cum caloris,  
tum doloris vi, & humores tenues ac mobiles, à quibus  
*φλεγμώδης* merus imminet præsentissimus, attrahit, sub-  
mouetur. Submouetur autem, si dolori & calori, attra-  
ctionis causis, resistamus. Dolori succurrimus eo, qui  
infra exponetur, modo; calida verò & flāmea partis affe-  
ctæ interperies corrigitur refrigerantibus, nepe rolis ru-  
bris, plantagine, albumine oui: cōpositis autē, vngue-  
to de cerussa, vnguento de alabastro, vnguento rosaceo  
Mes. vnguento infrigidante Galeni, vel linimento sim-  
plici, quod confit ex æquali portione vnguenti rosacei  
Mes. & ceroti de succo solatri. Labia vulneris solā deli-  
gatione hic facile coniunguntur. Si enim capitis cutis  
sola incisa sit, propter capitis rotunditatem vulnus non  
est adeò longū, (nā si longum fuerit; procul dubio cra-  
nium simul læsum erit) neque labia eius ita distant, vt  
non facile vniri possint. Si tamen solā deligatione hiā-  
tia vulneris labia satis coniungi non possint, futura in-  
cruentā vel siccā ad mutuū cōtractum adducenda. Vul-

Dan. Sennerti Tom. 11.

neri verò vsitatum aliquod medicamentum digestium,  
quod vocant, imponendum; quale sit ex *terebinth.*  
Drach. vj. *olei hyperic.* Drach. iij. *thuris pulu.* 3. j. oui  
*vitello* j. Mistis.

Vel *℞. Resina abietina* 3. vj. *vitellum oui* j. Misc.  
Vel hoc, quod valde efficax:

*℞. Terebinth. clara, gummi elemi, an.* 3. j. β. *pingued. ca-*  
*strati* 3. ij. *porci antiqua* 3. j. Liquefiant ad ignem, Fiat  
Vnguentum.

Pure bono apparente; quod tridui vel quadridui spa-  
tio accidit, digestiuo addi potest aliquid mellis rolati  
colati, ad vulnus detergendum, etiam mel crudum; aut  
despumatum; vel resinarum & thuris dosis augeri

Vel tale Vnguentum vsurpetur:

*℞. Terebinth. Veneta* 3. ij. *styr. rosa. vel mellis rosarum*  
*3. j. pulu. aloës, myrrh. mastich. an* Drach. β. Misc. F. Vn-  
guentum.

Hinc Sarcoticis & Epuloticis vulnus claudendum.

Interdum tamen accidit, vt capitis cuti vulnus non  
pūctum, vel cœsum infligatur, sed lapsū, vel simili violē-  
tiā cutis pars maxima à cranio, sine eius læsione, auella-  
tur, vt in frontem vel latera dependeat; atq; tū, nisi alio  
modo suo in loco contineri possit, cutē suere nihil pro-  
hibet, vt cranium ab aëre defendatur, Toti verò capiti  
repellens cataplasma, quale *capit. præced.* propositum;  
imponere necessum.

Si verò vulnus vsque ad pericranij penetrauerit, il-  
ludq; læserit, danda & tunc quidē opera, vt labia vulne-  
ris coniungantur; quoniam quacunque cute dete-  
gantur & denudentur, ægrè ad curationem perducun-  
tur; & sæpe accidit, vt si vel pericranij, vel cranij de-  
nudetur, etsi primò simplex fuerit vulnus; partibus ta-  
mē subiectis alteratis à sua natura degeneret, & facul-  
tate alteratrice læsā humiditates crudæ in vulnere ge-  
neretur, & postea maiore labore ad pus generandū opus  
sit. Potest tamen & hic labiorū vulneris cōiunctio solā  
deligatione fieri, nec facile tutura instituenda. Cū enim  
pericranium arctissime cranio cohæreat, fieri vix potest  
quin læso pericranio & cranium lædatur, & vulnerato  
pericranio os ab aëre alteretur. Ideoq; cū cranij dera-  
dendum sit, tum ob has causas, tum vt cranio ad exlu-  
dationē sanguinis vsque derafo sāguis ad carnis gene-  
rationem facile suppedietur; utura, ob quā derafo cra-  
nij impeditur, vix hic locū habet. Si tamen vulnus tā  
amplū sit, & labia latius distent, ac magna cutis pars,  
siue sola, siue cū subiectis partibus, vt teporali musculo  
relecta & auulsa sit: si cui vulnus tale suere libeat, vi-  
deat tamē, vt solā cutē suat; nō verò simul subiectū peri-  
cranij. Nā cū pericranij sit mēbranosum, & sensus ma-  
ximè particeps, magnis dolor ex sutura ista excitaretur  
& facile inflammatio suboriri, ac dura mater in consensū  
trahi posset. Cauendū quoque, ne labia vulneris cum  
violentia attrahantur: quod si faciendum esset, & cum  
labia vulneris sint tumida, potius sutura omittenda.

Attendendū & hoc in sutura, vt ita institatur, vt sa-  
niei derur liber exitus, ne supra cranium colligatur, &  
cranium corumpat. De sutura in vulneribus capitis  
vide *cap. 24. quæst. 1.*

Verum siue vulnus suatur, siue non suatur, pericra-  
nij diligēs habēda est ratio. Cū enim sit substantiæ mē-  
braneæ, & per suturā duræ meningi adnexum, dolorē,  
inflammationē, febrem, conuulsionem, si malè habeat,  
accensere potest. Ideoq; vniuersalibus corporis euacua-  
tionibus, si opus, præmissis, & circa vulnus capillis, vt  
antea dictū, derafis, si dolor adsit; vulnus oleo rosaceo  
circūcirca inungendū. Vel cataplasma ex vitello oui, &  
oleo rosaceo imponendū. Et cum dolor ex pericranij  
læsione excitari, & sanies sub eo colligi, ac cranij cor-  
rumpere possit, pericranium, nisi satis pateat, incidendū,  
& os radendum, vt sanguine quasi exstillante idonea  
carni generanda suppedietur materia. Temerè tamen,  
& sine necessitate pericranium non secandum, neque  
sine causa doloribus æger infestāsus; sed tū solū, cū  
suspicio

*Vulnus cutis  
capitis cum  
pericranij  
læsione.*

*Cuti capitis  
vulnera non  
facile sūdā.*

*Pericranium  
suendum.*

fuspicio est læsi cranij, aut insignis est contusio, sanguinem cruentum continens. In primis in pueris non facile ad hanc sectionem veniendum, ne vires in ea ætate imbecilliores dolore & sanguinis profusione deiciantur, & vasa capitis clamore & eiulatu distendantur; unde inflammatio & alia symptomata oriri possunt: sed potius Topicis materiam resolvere conandum.

Cranio denudato qua medicamenta imponenda.

Cranio verò ipsi denudato & raso non vnguenta, sed medicamenta actu & potentia sicca cū linamentis siccis imponenda, vt temperamento ossis similima, ex doctrina Galeni, 6. meth. med. c. 6. pulueres nimirū cephalici dicti, qui parantur ex aloë, thure, cortic. thuris, mastiche, myrrha, sarcocolla, bolo Armeno, sangu. dracon. farina hordei, orobi, rad. irid. Florent. vel Illyrica, aristolochia Et quidem in mollioribus corporibus minus sicca eligenda sunt, potestque solum thus sufficere: in siccoribus magis siccantia vsurpentur:

Vt ʒ. Aloës, sarcocolla, myrrha, an. ʒ. iij, thuris ʒ. ij. sangu. dracon. ʒ. ʒ. Puluis.

Vel ʒ. Myrrha, aloës, cortic. thuris, aristoloch. ireos, sarcocolla, an. Drach. j. F. Puluis.

Vel ʒ. Aloës hepatica ʒ. iij, myrrha ʒ. j, thuris ʒ. ʒ. F. Puluis.

Vel ʒ. Aloës hepatica, rad. irid. aristoloch. rotunda an. ʒ. ij, myrrha, thuris an. Drach. j. sangu. dracon. Drach. ʒ. F. Puluis.

Ipsis verò vulneris labijs vnguentum aliquod digestiuū & sarcoticum adhibedū, qualia paulò ante proposuimus. Omnino enim primis diebus, vt pericranij dolor sedetur, illico pus mouendū vnguentis, quæ Chirurgi digestiua vocant: Eorum tamen vsus cum in omnibus, tum vel maxime capitis vulneribus, ita moderandus est, ne vulnus recens & *ἀπὸ πύου* in vlcus diutinum & sordidum facessat, Postea vulnere satis purgato protinus ad *σάρκωσιν* deueniendum; qualia sunt è thure & cortice thuris, myrrha, radic. aristolochiæ, ireos Illyricæ, aloë, sanguine draconis, & vulnus, vt dictum, consolidandum, & cicatrice claudendum. Insuper huic vsui & hoc Emplastrum:

ʒ. Olei rosacei omphacini completi ʒ. iij. mastichini, myrtini, an. ʒ. j. succi betonice ʒ. ij. pingued. hircin. ʒ. ʒ. ʒ.

Coquantur ad succi conumptionem, & postea colectur. Colat. add. mastiches ʒ. x. gummi elemi ʒ. vj. terebinth. ʒ. iij. cera alba q. s.

Iterum ebulliant, & fiat Cerotum.

Historia curati vulneris, in quo tota musculosa capitis cutis vsque ad pericranium diuisa erat, vt tota ab occipitis initio in frontem & faciem dependeret, exstat apud Ambr. Paræum, lib. 9. cap. 15.

In omnibus autem capitis vulneribus & hoc attendendum, an vulnus telo venenato infictū sit. Si enim venenum, telo vulnere illatum sit, illud extrahendum, & alexipharmacis oppugnandum & infringendum, vt suo loco de vulneribus in genere diceretur.

#### De Vulnere cum partium externarum contusione.

Vulnus capit. cū cutis contusione.

Sæpe etiam accidit, vt relū, vel aliud quid, quo æger vulneratur, simul obrutum & inæquale sit; & tum vulnus quidem infligitur, sed cum partium subiectarum, cranio tamen integro inahente contusione; quæ cum in pus abeant paulò post vlcus latum & profundum efficitur: quod genus vulneris ita curandum:

Primo diligenter dispiciendum, ne in vulnere lapillus, festuca, capilli, vel simile quid insit, & relinquatur, & an cranium saluum sit. Et si cranium sit saluum, abradis per vulneris ambitū capillis, sanguis, si immoderatus fluat, sistendus, atque opera dāda, ne pars vel dolore, vel inflammatione corripitur; cū hoc generale axioma sit: Nullū vulnus sanari posse, nisi partis, quæ vulnerata est, tēperies sese rectē habeat. Itaque, si opus est, sanguis euacuandus, humores vitiosi expurgandi, & fluxio

à capite auertenda, victusque tenuis imperandus, neque ægro oua, carnes, vinum concedenda, vulnuique in ambitu, vt dolor arceatur, oleo rosaceo inungendum.

In ipsum verò vulnus, quæ pus mouent, digestiua appellata, imponenda, (cum carnes cōtulas in pus mutari sit necessarium) vt suppuratio quāprimū promoueatur, & cruditas illa in labijs vulneris, quæ ab aëre alterante inducta est, quæq; Medico molestia sæpe exhibet, ægro verò periculū affert, auertatur. Omne enim vlcus exiccationē requirit, præter id, quod contusum quod humectari & emolliiri postulat. Videdū tamē, ne medicamēta illa sint nimis humectantia & putrescentia; sed ita constituta, vt partis calorem naturalem à contusione, externo aëre, medicamentis debilitatum, foueāt, & humores in labijs vulneris, cōgestos attenuēt: quod præstāt tēperatæ caliditatis, & paucae humiditatis medicamenta, & quæ alicuius absterisionis participia sunt ac dolorem leniendi vim habent. In quem finē in principio vtendum oleo rosaceo maturo, vel solo, vel cū vitello oui, in corporibus mollioribus, quod præstantissimū est medicamentum, & requisitas cōditiones omnes obtinet. In durioribus verò corporibus resina laricina, vel aliud digestiuum vsurpandum.

Et omnino hīc vssimū medicamentum est Terebinthina, omnibus vulneribus commoda, præsertim partium neruolarum, qualis pericranium est. Præferuat enim contusa à corruptione & putredine, ea corroborat, dolores sedat, vlcera mundat, & si acrimoniam aliquam præ se ferat, ea facile tollitur ablutione cum aqua betonicæ vel consolidæ. Et cū in passivis sicca sit, siccitas temperatur humidis, vt oui vitello, & olei rosacei modico adiecto.

Efficax est & hoc:

ʒ. Olei rosacei, terebinthina, an. ʒ. j. ʒ. cera ʒ. ʒ. croci Scrup. ʒ.

Si inflammationis metus adsit, addatur farina hordei Vnc. ʒ.

Et vt fiat sarcoticum, addatur corticum thuris ʒ. j. aloës Drach. ʒ.

Si dolor vrgeat, reliquis medicamentis cataplasma ex radicibus althææ, hordei farina, floribus meliloti, oleo rosaceo, vitello oui, & croci momento paratum imponatur.

Cōctione sese ostendente, & pure optimo apparente, quod sit circa diem septimum, vulnus abstergatur melle rosato, terebintha, succo apij, & similibus, vel per se, vel cum digestiuis mistis. Vlcare purgato sarcotica adhibenda, & humida omnia dimittenda. Cui vsui inferuiunt pulueres cephalici. Vel vsurpentur hoc vnguentum, in vulneribus capitis vtile:

ʒ. Artemisia, betonica, scabiosa, canda equina, pimpinella, an. M. j.

Contundantur, & succus exprimatur;

Cuius ʒ. ʒ. vj. olei rosacei, mastichini, myrtini, an. Vnc. ij. Coquantur ad succorum conumptionem.

Postea add. aloës, thuris, mastiches, sanguinis draconis, gummi elemi, myrrha, an. ʒ. ij. cera q. s. F. Vnguentum.

Cicatrix tandem emplastro diapalma, vel de betonica inducatur. Si os caluarie detectum sit, diligenter inquirendum, an & ipsum aliquid damni acceperit. Etsi enim fractū non sit: tamen contundi potest; vnde paulò post, cū sanies in eo colligitur, maculæ & puncta subrubea in eo apparent, quæ postea in colorem liuidum & plūbeū mutantur, ipsumq; cranium deinde nigrescit, non nutritur, & emoritur, vt cum eo pericranium vniri, & caro super eo generari non possit. Tū ergo abradendum os est eo vsque, donec rubeus color appareat, & sanguis instar lacrymarū rubeatū exstillet.

Tandem vnū adhuc circa ista cutis capitis vulnera monet Paræus, lib. 9. c. 15. nimirū, si à ferarū, vel hominis etiam morsibus tale vulnus infligatur, aliter tractandū esse, quā si à gladio, vel alio telo inferatur; & quatione tractandum sit exemplis ibidem docet. Statuit scilicet



scilicet, orntia ferarum, imò & hominis, morfu inflicta vulnera maligni aliquid coniunctum habere: quod nisi aliquis in contusionem, quæ à dentibus fit, referre velit, procul dubio à salua coniuncta eueniet; & proinde eius etiam rationem habendam. Quapropter etiam labia vulneris scarificat, & saniem sanguisugis extrahit, vlcusque abluit medicamento:

*℞. Muhridatij Vnc. j. Iberiaca Vnc. ij. unguenti Egyptiaci ℥. β. aq. vite, cardui benedicti an. q. s. M.*  
De quâ re infra etiam, lib. 5. par. 4. cap. 19. dicitur.

## CAPVT XXIII.

*De Soluta unitate cranij, sine meningum & cerebri vulnere.*

*Cranij vulnere sine meningum & cerebri læsione.*

**H**Actenus de ea continui solutione in capite egimus, in qua tantum cutis & pericranij, cranio integro & saluo, læsa sunt: iam de ea agendū, in qua cranium læsum est; & primò quidem de Unitate soluta, in quâ cranio læso meninges & cerebrum salua manent.

*Differentia.*

*Fractura cranij quæ.*

Autores autē alij aliter solutæ unitatis in cranio differentias recensent, & alij aliis nominibus vtuntur: nos Hippocratem, in libro de vulnerib. capit. secuti, qui ante omnia hac de re diligenter cognoscendus: siquidē neq; superfluas, & minus viles recensuit, nec necessarias, & quæ frequēter accidunt omisit; quinque, & quidē Hippocratis nominibus, recensēbimus, aliis tamen aliorū autorum appellationibus nō omisis: nimirum, *ρωγμή*, *φλάσις*, *ἐσθλασις*, *ἐσθρασις*, *ἐσθρασις*. *Ægineta*, lib. 6. c. 90. plures habet differentias.

*Fissura.*

*Fissura cranij.*

Fissura & fissio, *ρωγμή* & *ρωγμή* & *ρῆξις*, Latinis etiā rima dicitur. Accidit autem fissura vel fissio, cum à graui & contundente telo, vt lapide, ligno, casu ab alto, & in re durā impulsu, cranium ita læditur, vt vasis testacei in modum findatur, seu rimā agat, ita tamen, vt craniū situm suum naturalem seruet, & partes eius loco non moueantur: Et semper quidē à re graui & contundente rima prouenit; nonnunquā tamen simul ab incidēte & acutā, vt gladio acuto, sed graui simul. Quantò verò ossa sunt duriora, tantò sunt aptiora ad rimam contrahendam; quantò molliora, ad contusionem sunt aptiora. Sunt tamen qui rimam à fissura distinguunt, & sub rima fracturam, sub fissura sedem comprehendunt.

*Fissura cranij quæ.*

Fissurarum autem, seu rimarum rursus sunt differentia, scilicet modi: & quatuor præcipuè à latitudine seu angustia: à longitudine vel breuitate: à rectitudine & curuitate: à profunditate desumpti. Alię enim fissurę cōspicue sunt, quæ offe denudato oculis cōspici, & specillo tangi possunt; alię verò inconspicue & cœcæ, quæ visui obuiæ nō sunt; præcipuè circa initium, antequā sanie contraxerunt. Non verò cœcæ, eæ dicuntur, vt nonnulli putant, quando non is, in quem ictus incidit, locus, sed alius in cranio finditur. Hęc enim alia fracturæ differentia est, vt mox dicitur: alia media, quæ capillaris, *περιχρῆσις* *ρωγμή*, & *περιχρῆσις* appellatur, angustissima & arcuissima fissura, & instar capillorum sese habens, solum q; ferè latens; quæ tamen, si ad interiora penetret, grauissimorum symptomatum, & mortis sepe causa est. Cum enim & oculorum obtutum effugiat, nec specillo inuestigari queat, læsi ossis abrasio, aut perforatio negliguntur, sanguis contra, ruptis effusus vasis, intus coercitus putrescit.

Alię rursus fissurę non per totum cranium, seu vtrāque laminā, penetrant; alię totum penetrant: vbi scilicet vtrāque laminā ad meningem durā vsque finditur;

*Dan. Sennertii Tom. I I.*

cui fissurę interdum & hoc accedit, quod meningē ab interna caluaria separatur, ex qua separatione vasa diuulsa sanguinē effundunt, qui sub cranio collectus, nisi ipsi via ad exitum pateant, agro exitum affert. Aliquādo solum externa laminā finditur, internā integrā manente: aliquādo contrā accidit, vt externa lamina integra maneat, interna verò rimam seu fissuram contrahat. Cuius rei exemplum recitat Fallopius, in lib. Hipp. de vuln. capit. cap. 13.

Alię rursus fissurę breues sunt, alię longę, alię rectę, alię curuę. Quibus addere possumus differentia à Numero, quod nunc vna rima est, nunc duæ, vel plures.

*Contusio.*

*Contusio cranij.*

Secunda differentia est *φλάσις*, Galeno, & Paulo *Ægineta*, *φλάσις*, contusio & collisio, cum sine rima & fissura, ab irruente & illiso extrinsecus violenter, aut obstinate duro aliquo & obtuso corpore, os ita contunditur, vt etsi externa eius facies ad sensum permaneat integra; in profundo tamen sit continui solutio, dū os intus deprimitur, & in se cogitur, vt idē ferè ossi contingat, quod canibus, dū à re dura non acuta læduntur, accidere solet. *φλάσις* enim contundere, & cōtundēdo emollire significat: & vsurpatur hoc vocabulum de piscibus & carnibus duris, quæ plagis emolliuntur. Et necessariū omnino est, vt sub ipso ictu os in seipsum impellatur, & cauum fiat id, quod colliditur; alioquin nō collideretur: vt verò cessante ictu cauum & cōpressum maneat non est necessarium. Maxima enim ex parte mollia ad naturalem situm regrediuntur, vbi percussio & vis externa cessauerit. Itaque eorum sententia mihi non videtur probabilis, qui *φλάσις* per depressionē cranij explicant, ita vt tangētib; & intuētibus fouea appareat, rēque explicant similitudine vasorum eupreorū, stāneo-rū, plumbeorum, quæ rebus duris allisa introrsum pelluntur, absque solutione cōtinui, & foueā contrahunt. Hęc enim fracturę cranij species non est, neque ad fracturas pertinet, sed figurę saltem sit vitium, cū nihil neque fissum, neque fractum, neque collisum sit, sed os solummodò depressum: etsi quandoque fractura cōiungi possit. Clarum verò est, & ex Hippocrate apparet, eum de contusione loqui, quando os nunc plus, nunc minus collidi, & nunc altius, ac totum os, nunc saltem in summo statuit; quod depressioni non competit, sed contusioni. Nisi quis fortē Hippocratem vtrāque cranij læsionem, depressionēque & contusionem sub nomine *φλάσις* comprehendisse dicere velit. Vtrumque enim fieri potest, vt scilicet cranium contundatur, simulque deprimatur.

Atque ita duæ contusionis seu collisionis cranij species constitui possunt: vna, cum cranium solummodò in seipsum cedit, ac subsidet, sicut spongia, vel caro cōpressa, & locum, ac figuram naturalem non mutat; altera, cum cranium simul deprimitur, & figuram mutat, ac foueam acquirit. Verum cōtusio hęc simplex non est, sicut & reliquę, cum quibus alię læsiones concurrunt: & cum fractura hęc species sæpe coincidit. Interdum enim cranium contunditur sine rima & fissura, quod in puerorum capitibus, quorum ossa sunt molliora, ferè accidit; aliquando rimam contrahit. Quorum enim ossa sunt duriora, in iis vix contundi potest cranium, quin simul frangatur.

Cōtusio rursus aliquando est sine eorum, quæ sunt intra cranium, læsione; aliquando verò cū eorum læsione. Etenim nonnunquam ex graui capitis contusione non solum venę, sed & arteriæ, ac nerui, qui sunt intra cranium, rumpuntur; quæ contusio periculosissima est. Et quidem venulę & arteriæ, quæ sub cranio rumpuntur, non semper sub loco cranij, in quo sita cōtusio, rumpuntur, sed etiā in parte cōtusio oppositā vel vicinā. Fieri quoq; potest, vt cranio in vna parte cōtuso vel percusso, in aliā parte aliqua sutura dissolatur, & ossa,

quæ per suturam vnita erant, disjungantur & hient; imò etiam cranium integrum in alia parte rumpatur & rimam contrahat.

### Depressio.

Depressio  
cranij.

Tertius modus, seu differentia est *εσφαλαν*, Latinis depressio, defessio, introcessio, contrusio, effractura Parro; cum scilicet os finditur, sed nò, vt in fissura simplici, in suo loco manet, verùm intro cedit: id quod fit ex validis relorum obtusorum, lapidum, fustium ictibus, vel capitis ex lapsu ad rem duram obtusam vehementiore allisione. Quamquam enim depressio cranij etiam dicatur, cū cranium integrum manens intro saltem deprimitur, sicut dum cuprea, vel stanea vasa comprimuntur: tamen inter vulnera, & vnitatem solutam illa latio non est referenda, ac osse in suum locum reducto, nihil mali amplius superest. Hic verò de ea saltem compressione loquimur, quæ cum fractura & ossis comminutione est coniuncta, atque ita nō simplex fractura est, sed coniuncta cum rima vel sede.

Differentiā hanc fracturæ aliqui non rectè explicat, & plurimi ita solum fieri docent, cum os prædictus vehementia non solum finditur, ac intro truditur, verùm insuper frangitur, fragmentumq; cranij secedens sub oram siue limbum ossis vicini integri truditur. Quod vt aliquando fieri posse concedimus, & vnum *εσφαλαν* modū hunc esse admittimus: ita non semper necessariū esse putamus, vt particula ossis effracti sub os quod integrū manet, detrudatur, & sub eo lateat. Sufficit enim ad *εσφαλαν* constituendam, vt aliquod ossis fragmentum à toto separatum interiora, & cerebri membranas versum detrudatur, & vel aliquibus angulis & extremitatibus acutis, quasi spiculis, meningem, lædat vel planā superficiē seruatā cerebrum comprimat, eiusq; motū impediat. Ego hanc læsi cranij differentiam commodissimè fracturam in specie appellari posse existimo.

*Εσφαλαν* etiam peculiaris differentia est, quæ Galeno, 6. *method. medend.* c. 6. Paul. Aeginetæ, *libr. 6. c. 9. κεκρωσσι & κεκρωσσει* dicitur: cum scilicet fragmenta cranij deorsum compulsa simul cum telo feriente, dum illud educitur, sursum trahuntur, ac reliquis sublimiora fiunt, ita tamen, vt Galenus, *loco allegato* scribit, vt, quæprimū ab integris fracturæ partibus deduci cœpit ægra, intro magis recedat, & membranæ innitatur.

### Sedes.

Sedes fractu-  
ra cranij  
speci vni-

Quarta solutæ in cranio vnitatis species est *εδρη*, Latinis sedes, iessio, vestigium. Erosianus per *δρακοντι* explicat, & alij *εγκοιλω*, *δρακοντι*; & *εδρη* pro eodem habent. Incisio etiam Latinis commodè dici potest. Interpretes Hippocratis etiam hīc varij sunt. Planissimè re explicari posse puto, si dicatur, *εδρη* seu sedē, & vestigium esse, cum à telo acuto craniū læditur, ita vt aciei reli impressi vestigium, & sedes, quā scilicet parte telum inedit, manifestè appareat. Aduenit autem *εδρη* perpetuò cum cutis & pericranij vulnere.

Verùm varij huius læsionis rursus modi sunt. Primò enām huic pertinet simplex illud vulnus, cum pugione, cultro, stylo, vel alterius rei acutæ cuspide cranium læditur, quæ Punctura rectè appellatur, quæpue nunc externam solum, nunc vtramque tabulam cranij penetrat. Deinde illud simplex vulnus, cum à telo leui, acuto, & bene scindente secundum longitudinē scinditur, ita vt suum naturalem situm adhuc retineat, & vestigium in osse inciso appareat, quæ Incisio appellari potest: fitq; ea nunc ita, vt extrema saltem lamina, nunc v. vt vtraq; discindatur. Tertius simplex modus est, si cum incisione aliquid ossis deperdatur, quam *δρακοντι* & *εγκοιλω* in specie, & dedolationem siue excisionem nominant; dum scilicet sicut, quando asseres ascia vel dolabellā complantantur, aliquid ligni abscinditur: ita hīc etiam

aliquid de superficie cranij abscinditur. Huc referunt nonnulli etiam id vulnus, quando bombardarum & sclopetorum glandibus aliquid cranij interdū aufertur.

Compositi modi sunt, cum quidem ipsū telū acutum est, sed non satis acutum, nec leue, sed aliquo modo obrutum, vel graue; vnde accidit, vt cranium non solum scindatur, sed etiam rimam contrahat, aut contrudatur, imò deprimatur, & cranium effringatur. Et quidem si cranium sit durius, cum incisione facilius fractura coniungitur; si verò sit mollius, contrusio.

Fieri quoque potest, vt in exteriori cranij superficie solum incisionis vestigium sese ostendat; intus tamen rima sit.

### Contrassura.

Vltima differentia est, quam Hippocrates *εσπασσεν* seu infortunium, Paul. Aeginetæ *εσπασσεν*, Latini contrassuram, seu resonitum appellant. Neque sine causa hoc nomen indidit huic malo Hippocrates. Reuerà enim infelices & infortunati sunt, qui nec ipsi sciunt, quo loco læsi sint, neque Medicus satis certus hac de re fieri potest, nisi cū res ferè iā desperata est. Accidit autē contrassura ex resulu ictus in partē à plaga distantē, & ad resistendum minus aptā. Dum enim aer in diploë vocata, hoc est, in mediotullio cranij, seu inter vtramque laminam, conclusus vehementer ex ictu alterius loci agitur & impellitur vndique, fit, vt loco alter caluæ solidæ allisus ipsam perfringat.

Et si verò de hac fracturæ specie alij aliter sentiunt, & nonnulli eam ad oppositam plagæ partē simpliciter restringunt; alij verò, vt Paulus Aeginetæ, *lib. 6. c. 90.* hoc negant, & si quid tale accidat, etiam in contraria parte cranium collisum esse dicunt, similitudinemq; vitri, vt pote quod vacuū est, rejiciunt: tamen controuersia hæc facile decidi potest, si verbis Hippocratis adhæreamus, qui non in parte opposita semper cranium frangi dicit, sed alio, quam quo vulnus est, osq; nudatum fuit, loco; & addit, non scire posse Medicum, vbinā malum hæreat, & quam partē vulneratus sit æger: cum tamen facile id sciri posset, si in contrariā semper parte læsio esset; siquidē æger facile significare potest, quo loco percussus & læsus sit. Itaque satis est ad hanc differentiā constituendam, si rima non in loco sit, cui ictus inflicus est, sed alio, seu vicino, seu opposito. Sunt quidē nonnulli in ea sententia, rimam nunquā egredi extra os, in quo plaga facta est: sed contrarium docet experientia. Testatur enim Nicolaus Florentinus, *serm. 7. sum. 1. v. 4. c. 1.* se hoc obseruasse in quodam artifice, qui funes faciebat, qui cum in capite fuisset percussus, facta in loco cōtusionis incisione, nihil læsū repertū fuit; tertia post eadē die cum febris fuisset subsecuta, aperta parte opposita copiosa sanies fuit inuenta. Refert quoq; Petrus Pavv, in *anatomico succenturiato*, se vidisse ictū bregmaticis os sinistrū, quo loco *κεκρωσσει* iungitur, fisso syncipitis osse, dextro idque propè bregma, loco ita vicino coronariæ suturæ, vt in ipsā rimæ pars sese extenderet.

Præterea interdum accidit, vt in externam laminam cranij ictus incidat, eaque integra maneat, altera verò non solum rimam contrahat, sed & fragmenta, quæ meningem & cerebrum pungunt, de se emittat; quod malum longè periculosissimum est: imò præter cranium & venulæ cerebrum ambientes ex aduersā ictus parte rūpi, & aperiri possunt. Inde sanguis effluit, & breui in pus mutatus cerebri substantiam putrefacit & corrumpit: id quod se deprehendisse testatur Amatus Lusitanus, *centur. 6. curat. 110.*

Ex his, quæ dicta sunt, patet, tres posse constitui contrassuræ modos. Primus est, cum locus fissus & locus percussus sunt in vno eodemque osse. Secundus, cū eiusdem ossis percussa tabula externa, eaque integrā manente, interior dehiscit. Tertius modus est, vbi os percussum ab osse fisso suturā determinatum est.

Potest

Potest huc & alius casus refecti, vt ictus scilicet in aliqua parte capitis infligatur, vas autē aliquod in meningum alterutrā, (scilicet in pia matre, ob vasorum eius tenuitatem) non eā regione, quā ictus illatus est, sed aliā etiā, ad quā ictus non pertingerit, dirūpatur ob concussionis vehementiā. Sic vbi occipitio grauius percussio sanguis manasset ē naribus, conualuisse percussio obseruauit Fallopius. Et contra fronte percussio sanguis sub occiput, ruptis vasis, effundi, ægrōq; malum lethale afferre potest. Exempla cōtra fissuræ recensent Nicol. Florētinus, *serm. 7. sum. 7. 11. 4. c. 1.* Fallopius in *com. in lib. Hippocr. de vuln. cap. 14.* Paræus, l. 9. c. 8. De loco contrasissuræ vide c. sequent. quest. 2.

Fracturæ  
cranij  
differe-  
ntia unde.

Atque hæc sunt differentiæ fracturarum crani; quas licet alij aliter recenscant & explicent, tamen si Hippocratem & ipsam rei euidentiā consulimus, res plana est. Pendent enim, vt breuiter ista contrahamus, omnes vulnerati & fracti crani; differentiæ tum à telorum, quibus cranium læditur, varietate; tum ab offis, quod læditur, ratione.

Etenim si telum acutum sit & leue, eoque, seu punctum, seu casum cranium vulneretur, fit simplex Incisio, quæ *ἐκτομή*, & vestigium dicitur, quā nunc cranium perforatur, quæ in specie Punctura dici potest, nunc cōsim læditur, quæ Incisio dicitur; nunc etiam particula, si ad angulum obliquum vulnus infligatur, abscinditur. quam Dedolationem appellant: cui læsioni vicina est ea, quæ sclopetorū & bombardarū fit glandibus; quibus interdū aliquid de externa lamina tollitur. Si obtusum sit telum & graue, idque incidat in cranium mollius, vel ictus non sit admodum vehemens, crani; Confusio accidit: si verò cranium sit solidius & durius, & ictus grauior; vel rimam contrahit cranium, vel frangitur, & pars aliqua de eo abruptitur: si autem telum non admodum acutum sit, simulque graue, potest fieri aliqua incisio, simulque cranium contundi, deprimi, frangi.

### Causæ.

Fracturæ  
crani; causæ.

Crani; istæ fracturæ, & læsiones omnes à causis euidētib; & violentis ortum habent; quæ etsi Indicationibus non considerentur: nonnihil tamen in fracturis determinandis, & ad earum quantitatem, & qualitatem definiendam faciunt.

Cum enim istæ, de quibus hactenus diximus, læsiones omnes sectione, confusione, tensione fiant, in telo considerandū pōdus, prout graue vel leue; figura, prout latum vel angustum, acutum vel obtusum est. Ab acuto enim fit incisio vel punctura; à lato & obtuso contusio vel fractura: quæ omnia curiosè planè persequitur Paulus Ægineta, *lib. 6. cap. 88.*

Considerandus etiam est modus ictus & læsionis, & quod de telo dictum, idem etiam fit, si lapsu ab alto caput rebus duris illidatur. Si enim id acutum est, incisio fit: si obtusum, fractura, rima, vel contusio. Et plerumque à lapsu fit cōtusio, rima vel fractura, eaq; maior vel minor, prout casus ex loco alto, vel humiliore est, resq; cui caput alliditur, dura vel minus dura. Modus, vt dictū, ictus læsionem variat. Si enim æger rectè telo occurrat, siue manu iaciatur, siue feriat, siue quid in ipsum illabatur, siue lapsus in rē durā impingat, grauius læditur; minus verò grauius, si ictus obliquus sit.

Neque hīc solūm teli & ictus conditio, sed & offis habilitas cōsideranda. Nā licet nullū os tā firmū sit, quin à causa violenta possit frangi: plurimū tamen interest, an sit validū vel infirmū, durum vel molle. Quod enim validum est, non nisi ab ictu vehementiore. & telo grauiore frangitur; quod infirmum, etiā ab ictu & telo nō admodum graui læditur: quod molle, facilius cōprimi-  
tur; difficilius, quod durum. Consistit autem offis robur in crassitie, duritie, soliditate, tegumento: quæ omnia cū clarissimè Hippocrates explicet, ea ex libro de vulner. capitis hīc recitare libet. Caluaria, inquit, media du-

plex est, ossaq; eius & in summa parte, quā carne tegitur, & ab ima, quā cerebrum membrana contegit, durissima sunt; maximè densa & leuia. sed cum à summo ad ima discedis, ex durissimis & maximè densis minus densa, mollia magis, & caua inueniuntur, vsque ad interiorē partem, quā inter se connectuntur. Hæc autem maximè caua est, mollissima, & spōgia similis. Quin & vniuersa caluaria a summo & ab imo, parte exigua excepta, spōgia representat, pleraque est caruncula similis, madētisq; quauē, si digitis teratur, in sanguinē vertitur. Discuntur etiā in osse venulae tenues sanguinis plena. Quod igitur ad duritiē, mollitudinē, & cavitatē, caluaria sic se habet. Quod verò ad crassitudinē & tenuitatē, ex vniuerso caluaria osse id tenuissimū est & infirmissimū, quod inter frontē & verticem est, idēque paucissima & tenuissima carne tegitur. Hæc etiam parte plurimū cerebri subest. Quamobrem vbi vulnus & telum aequale sit, vel etiam minus, ab hac parte magis colliditur, finditur ac desidet: in quo casu res magis ad interitum precipitat, maiori negotio curatur, & vitatur mors, quā cum id incidit qualibet aliā capitis parte. Ex pari itē vulnere, pari ictu, vbi alioquin plaga lethalis sit, homo celerius moritur, cum hac parte caluaria percussus est; quā cum aliā quauis; quoniam cerebrum inter frontem & verticem celerrimè ac maximè sentit id malum, quod accepit os & caro: ex cæteris os temporis infirmissimum est, quod maxilla in tempore cum caluaria committatur, & sursum ac deorsum moueatur articuli modo; quod iuxta sit item, per quod facultas audiendi est, quod vena caua & valida per tempus transit. Ex vniuersa caluaria id, quod post aures & verticem est, robustius est, & carne continetur copiosiore & altiore, quā omne id, quod à parte priorē est. Quocirca, vbi vulnera ac tela parua similiaq; omnino sunt, atque homo aequaliter, vel etiā grauius percutitur hac parte caluaria minus finditur & colliditur. Ac si alioquin ex vulnere homini intereundum sit, noxa in posteriore parte existente diutius trahitur; cū os ob crassitudinem diuturniore tempore pus contrahat, & inferius ad cerebrū transfundat. Præterea hac parte minus cerebri subest, & plerique ex iis, qui posteriore caluaria parte vulnerantur, plures moriemur euadunt, quā ex iis, qui priori. Hactenus Hippocrates.

Neq; solūm ossa pro diuerso situ, verūm ætatis etiam & temperamentatione differunt; & in aliā ætate & temperamento molliora, in alio duriora & solidiora sunt, atque hinc facilius contrunduntur & franguntur.

### Signa Diagnostica.

Signa hīc petuntur primò ab affectibus seu symptomatibus, quæ plagæ superuenire statim solēt: secundò à causis: tertio ipse sensus consulendus. Primū frontem quod attinet, caluaria ipsa, cum ossea planè sit, sensusq; per se expers; neque dolorē, neque aliud graue symptomata excitare potest, sed tantū ē membranarum & cerebri compressionē, puncturā, lancinationē, grauias symptomata oboriri solent: de quibus Celsus, *lib. 8. cap. 4.* Pertusā, inquit, caluariā protinus requirendum est, num bilem vomuerit, num oculi eius oboccati sint, num obtuerit, num per nares auresq; sanguis ei effluerit, nūc conciderit, num sine sensu quasi dormiens iacuerit. Hæc enim non nisi osse fracto eueniunt. Quibus addi potest oculorū rubedo, vertigo tenebricosa. Augerū suspicio, si æger in percussione actū stridoram quasi fracti offis perceperit. De his sunt aphorismi Hippocratis: Quibus diuisum est cerebrum, his febrem & biliosum vomitum superuenire necesse est, 6. aphor. 50. Quibus occasione aliqua cerebrū vehementer fuerit cōcussū, multos protinus fieri necesse est, 8. aph. 58. Propter plagam in capite acceptā stupor & desipientia, malum, 7. aph. 14. Ab offis vulnere desipientia, si in vacuum vsque penetraverit, 7. aphor. 14. Quæ symptomata omnia eueniunt cerebro & eius membranis affectis. Etenim cum cerebrum facultatis animalis sedes sit, & ab eo spiritus animales omnia sensus &

Fracti crani  
signa & ex-  
ploratio à  
symptomati-  
bus.



motus organa accipiant, si cerebrum comprimatur & concutiat; & spiritus animalis motu turbari, eiusque in organa sensus & motus influxum inhiberi necesse est. Hinc ex spiritu animali uturbatione vertiginē, ex influxu ac motu denegato lapsū, & spontanei motus abolitionem, obcecationem; obmutescētiā, stuporem, somnūque quasi profundum fieri necesse est. Atque ubi membranæ cerebri lancinantur, trahitur ventriculus in consensum, ob nervos sextæ coniugationis, atque facultas eius expultrix irritatur, ut primū ea, quæ in ipso continentur, deinde bilis (quæ ad motum aptissima, vesiculā fellis membranaceā eadem de causā in consensum tractā, facile reicitur.) euomantur. Et cum venæ & arteriæ ad cerebrum tendentes violenter rumpuntur, sanguis ex iis effunditur, qui interdū per os, aures, nares effluit. Signa tamen hæc etsi propria sint; non tamen semper sunt inseparabilia, atque accidere potest, ut etsi cranium fractum sit; nihil tamen istorum appareat: si scilicet fractura sit parua, caput robustum. Quædam etiam horum symptomatū statim inuadunt, ut subitus in terram lapsus, vertigo, caligo oculorum, biliosus vomitus, sanguis ē naribus, auribus, palato fluens *apoplyxia*; alia postea superueniunt, ut conuulsiones & epilepsia, febris, delirium, corporis, paralysis.

Ab ista conditione.

Ideoque etiam secundus fons signorum consulendus, & ictus conditio perpendenda. In quo consideranda: Percutiens, capitis ictū recipientis dispositio, & instrumenti conditio. Inquirendum nimirum, an is, a quo percussus fuit æger, robustus vel imbecillis fuerit; num de industria, vel de improviso, cū vehementia, vel oblique ictum intulerit; num ex alto vel minus alto loco; nū ex propinquo, vel minus propinquo percussit. Nam si qui vulnerat, est fortior, & de industria ac præmeditatus, aut ex loco altiore & rectā percutit, is grauius ferit, & os facile rumpit, contundit, & intro deprimit. Et qui ex loco altiore in rem duram cadentes impingunt, iis & facile os rumpitur, & contunditur, & intro cedit. Qui verò in loco plano cadit, & in rem minus duram impingit, cranium minus affligit.

A subjecto.

In eius verò, qui percussus est, capite perpendendū, an debile & robustum sit, durum vel molle, sanum, an tequā percuteretur, vel morbosum fuerit; an æger sit senex, vel iuuenis; item: quā parte vulnus inflictum sit, & inde de læsionis vehementia coniectandum, ut modò in causis dictum fuit.

Instrumentum tandem considerandum, an nimirum lapide, ligno, ferro, telo percussus sit, & an telum leue vel graue, acutum vel obtusum, durum vel minus durum, æquale vel asperum fuerit. Tela enim rotunda, orbiculara, & plana, obtusa, dura, graua cranium maximè rumpunt, contundunt, & intro deprimunt. Tela verò oblonga, tenuia, acuta, & leuia magis secant, quàm contundunt.

Per usum.

Tertiò sensus ipse, fidelissimus testis, fracturas detegit, & hic Hippocrates iubet, ut Medicus, antequā quid tentetur, quò ægrū & astantes sibi confidentiores reddat, primò capillos cōsideret. Si enim hi telo sunt dissecti, & in vulnere ipso continentur, ossis denudati & legi signū id esse docet. Etenim à lapide, vel alio telo cadente proiecto, si extremitas eius in angulū acutū abiecit, pili sæpe & conscinduntur, & in ipsam ossis substantiā impinguntur, ut citra rimæ abrasionē euelli non possint. Deinde vulneris conditio attendenda. Nam si vulnus longū sit in syncipite, quia ibi cutis est tenuis, & os rotundum, de cranij fractura meritò suspicio suboritur. In temporibus verò etsi vulnus sit longius, tamen quia os ibi depressum & planum est, & caro multa, os ibi fractum esse, non ita facile suspiciandum.

Per specillum.

Verum certior explorandi modus est per specillum. Itaque quā plaga est, specillum immittere oportet, neque nimis tenue & acutum, ne, cū in naturalem quandā foveam inciderit, opinionem fracti ossis frustra exhibeat; neque nimis crassum, ne exiguæ rimulæ fallat. Vbi

specillum os attingit, si nihil asperum, sed omnia leuia apparent, integrum os habetur. Si verò eo loci extra futuras asperi quid occurrat, fractū os esse indicio est. Sutura vero, quæ & ipsa aspera est, fallere potest, & pro rima haberi. Et quamuis suturæ plerumque naturalē suū locum habeant: tamen cū is non sēper sit ita planē certus, ne fallamur, & futurā pro rimā, vel cōtra habeamus, tutissimum est, os nudare, & plagā diligenter explorare. Verū si in ipsis futuris sit vulnus, longè difficilimum est fissuram cognoscere, ut pluribus Hippocr. *lib. de vulnerib. capit. &* suo exemplo, qui, *l. 5. epidem.* se hoc modo deceptum, idque cum vulnerari pernicie, ingenue fatetur. Sutarum enim loco cranium naturā suā fissum est: Itaque si his locis leuior inciderit fissura, facile pro naturali suturæ fissurā plaga habetur, seu visu, seu specillo id explores. Ideoque diligenter omnia animaduertere oportet, & teli conditionem attendere; cum à simili telo, eiusdemque magnitudinis, aut etiam minori ictu, atque graui, vel etiam leuiori, multo magis homo lædatur, si telum futuras attingerit, quàm si alias partes.

Celsus specillo contentus non est, & licet nec minima rima appareat: tamen si ex tali, vel ictus conditio- *Per atramentum scriptorium.* ne, & symptomatibus superuenientibus de fractura cranij suspicio sit, ossi atramentum scriptorium (quod ex sola galla fieri potest, si vitrioli acrimonia metruatur) medicamento mistum inducere iubet; & postea os radere. Quod enim fissum est, quia nigrum colorem in se recipit, nigrum manet, reliquum album naturalem colorem rasurā acquirit.

Hanc autem fissuram hoc modo deprehensam porro secundum profunditatem radere oportet. Si enim ratione nigredo omnis eximitur, indicio est, fissurā minorem esse; si verò deleri non potest, ad profundiora peruenit. Quæ ex Hippocrate mutuatus est Celsus. *lib. 8. cap. 4.* qui vult, ut primò ossi nigrum aliquod medicamentum imponatur; secundo linteam oleo imbutum supra extēdatur; tertio cataplasma ex maza superponatur, & postridie, resolutio vulnere, caluaria radatur. Nonnulli hoc modo fracturam explorant:

*℞. Thuris, ladani, cera, an. Vnc. iij. terebinthina, farina fabarum, an. Vnc. ij.*

Omnia simul imponantur. Si postridie aliquo in loco medicamentum fuit exsiccatum, ibi fracturam esse censent. Alij hoc imponunt:

*℞. Cera noua flaua, thuris, santali, an. ʒ. ij. terebinthina, aceri, farina fabarum, an. Vnc. j. Misc. ad ignem. Fiat Emplastrum.*

Fallopins scribit, eò loci, ubi cranium contusum est, quasdam maculas, seu puncta alba, instar eorum, quæ in vnguibus apparent, conspici. Os enim contusum post duos vel tres dies adhuc viuit & nutritur: post tertium autem diem sanguis, qui in partibus contusis est, exhalat, ideoque cessat rubedo.

His addiderunt alij & alia. Iubent nimirū, ut æger filum vel funiculū dētribus apprehensum alterā extremitate teneat, alterā verò Chirurgus eū fortiter intēdat, & intentum manu percutiat; aut ut aliquid, quod durum est, frangi tamē facile non potest, dentibus frangere conetur. (Hippocrates, in *Coacis*, caulem asphodeli, vel ferulam masticare iubet. Videatur Duretus in *Coacis*, *l. 3. tract. 2. aph. 6.*) Dum enim hoc modo vel funiculus percutitur, vel in frangenda dentibus re dura laborat æger, ipsum facile locū affectum & cranij partem fractam deprehensurum, atque ibi stridorem, vel strepitū percepturum existimant. Scribit tamē Ambros. Paræus, *lib. 9. cap. 2.* etsi utrumque sæpius tentauerit, signorum tamen horum veritatem experientia comprobare non potuisse.

Signa verò Infortunij ab Hippocrate appellati, seu cōtra fissurā quod attinet, si quis grauius percussus, vel lapsus sit, & symptomata suprā enumerata adsint, rima tamen nulla in parte læsa appareat; in parte vicina vel opposita

signa contra fissurā.



opposita diligenter inquirendum. Etenim in alijs partibus vulnus cicatrice obducitur, in ea verò, in qua est larens fractura, nullo modo: caro quoque ibi mollior, tumidior, & flaccidior apparet; sanies, quæ è vulnere effluit, copiosior est, quàm pro vulneris magnitudine. Per intervalla febricula quædam percipitur; & si stylus immittatur, cutis à cranio separata reperitur. Imò, etsi cutis sub loco fracto integra sit: tamen si raso diligenter capiti emplastrum ex pice, cum liquida, tum nigra, cera, terebinthina, pulvere ireos & mastiches imponatur; locus cutis, in quo fractura est, humidior & mollior apparet: æger etiã nihil tale cogitans cogitur subinde manus ei cranij parti admoveere.

An autem vtraque lamina cranij fissa sit, vel externa solum, hoc modo præter rasuram deprehenditur: Primò æger ore ac naribus obturatis spiritum comprimat; si vtraque lamina est fissa & fracta, humor, vel spiritus cum ipso mixtus per rimam egreditur; quod tamen in osse nudo saltem locum habet. In testò verò ex auditu id cognoscitur, cum mandendo fortiter strepitus exauditur, vtraque ossis parte diuisa.

Deinde iubent, vt pulvis mastiches albumine oui excipiat, & in linteo extensus rimæ applicetur. Si enim postmodum medicamentum ea parte, quæ rima est, sit magis, quàm alibi, siccum, indicio est, rimam ad membranas cerebri penetrare; cum calor expirans medicamentum siccet. Si non penetrat, etiã tale nihil adest. Tandem si, vt dictum, atramentum scriptorium rimæ illinatur, & cranium abradatur, quamdiu nigredo apparet, facillè, quousque rima penetrat, deprehenditur.

Si dura mater sit vulnerata, aut ab aliquo officuli fragmento pungatur, præter bilis vomitum, casum, occæcationem, vertiginem, torpor accidit, mens non constat, nervorum resolutio, vel convulsio sequitur, febris adest continua. Videatur etiã Celsus, *lib. 5. cap. 26.*

### Prognostica.

Fracturæ  
cranij  
prognostica.

1. Si cranium quocunque modo læsum sit, periculo non vacat, nec contemni vulnus debet; etiã ubi omnia bene sese habere videntur. Scribitque Ambrosius Paræus, *lib. 9. cap. 13.* & à veteribus proditum, & experientiâ confirmatum esse, in cranij fractura neminem extra periculum positum censi debere, nisi post exactum diem centesimum: quod & Hippocrates, in *proæmiol. lib. de vulnerib. capitis*, monuit. Minus tamen periculi est, si externa saltem tabula læsa sit; & minus adhuc, si incisa solum: contusio verò maius periculum coniunctum habet.

2. Si verò vtraque lamina diuisa sit, & tota calvaria aperta, maius periculum adest. Minus tamen periculi est, si sedes sit, aut fissura lata & ampla: maius, si sit angusta; adhuc maius, si sit contusio & rima; & præcipuè si sit rima angusta; maximum, si rima sit in alia parte ab ea, quæ ictum excepit. Etenim etsi rima sæpe sit tam angusta, vt sensum exiguitate fallat: tamen pluribus mortis causa fuit, teste Ægineta; cuius rei historiam recitat Valleriola, in *appendic. loc. comm. cap. 15.* Quanquam non tam ob rimam ipsam, quàm ob sanguinem supra cerebrum effusum ægri periclitentur. Periculumque auget, si non constet, qua in parte fractura sit, & quod sæpe osse extra integro, nihilominus ossis aliquod fragmentum ab interna tabula separatum sit; quod dum membranas pungit, gravissimorum symptomatum, & sæpe mortis causa est.

3. Maius adhuc periculum est, si præter cranium & dura mater; maximum si simul tenuis membrana & cerebrum læsa sint: & quò vulnus profundius penetrat, eò periculosius est.

4. Vt autem hæc clarius pateant, & quantum periculi quodque vulnus habeat, appareat, aeris ambientis

conditio & regio, locus vulneris, vulneris conditio, capitis dispositio, & ea, quæ superveniunt, symptomata consideranda. Et aerem quidem quod attinet, astate capitis vulnera sunt periculosiora, propter inflammationis imminentiæ metum: hyeme quidem etiã, ob frigus; quod tamen aere igne temperato facillè evitari potest. Et si homini ex vulnere moriendum est, hyeme, quàm astate viuet diutius. Calor enim tempore hyberno vegetior est, ac astate humores citius incallescunt, & putredinem concipiunt.

5. In humida regione plus periclitantur ægri, quàm in sicca, cum cerebrum ab humidis facillè offendatur. Hinc in nonnullis regionibus vulnera capitis etiã à Chirurgis non satis peritis feliciter curantur; id quod sæpe in Germania accidit. In alijs verò etiã à peritisimjs Chirurgis tractata ferè omnia sunt lethalia: id quod Neapoli, Florentiæ, & Bononiæ accidere solet. Fracturæ etiã, & vulnera capitis in plenilunio inflicta periculosiora sunt; cum tum corpus & caput magis humoribus abundet.

6. Vulnus quò cerebro vicinius, eò periculosius: & ex cerebro vulnerato maius, quàm ex ullâ capitis parte, periculum imminet.

7. In occultis rimis & contusionibus etiã non parum periculi affert, quod, quæ inter duas tabulas est medulla compressa, aliquid sanguis effundit, qui eò loci putrescens, ossis inflammationem & corruptionem affert, vt interdum non solum aliquot post acceptum ictum septimanis, sed & mensibus, nihil malè suspicans æger moriatur: cuius rei notabile exemplum habet Petrus Pavv, in *comm. in lib. Hippocrat. de vulner. capitis*. de quodam, poculo stanneo in capite percusso, in quo nihil fissi deprehensum est; consolidatòque vulnere æger bene se habere persuasum habens, post decimum mensem inter deambulandum vertigine correptus concidit, neque diu post obiit. Aperto cranio deprehensum est, os loco ictus planè computruisse, & meningem in consensum traxisse.

8. Vulnera in syncipite & bregmate valde periculosa sunt. Nam os illud debilius & tenuissimum est, carne tegitur paucissima, & cerebrum eò loci copiosius; vt Hippocrates, *lib. de vulnerib. cap.* habet. Reuerà tamen cerebrum hoc loco, quàm alio, magis abundare non videtur: sed hîc magis arcuatur & attollitur, vt convexam cranij partem repleat, (quod forsàn etiã intellexit Hippocrates) vicinius etiã est cranium, ac proinde hoc loco facilius, quàm alijs, ab externa violentia lædi potest. Præterea quocunque modo æger decumbat, saniei non datur commodus effluxus. In posteriore capitis parte vulnera se contrario modo habent; quia ibi os est firmitus. Quæ in anteriore sunt parte, medio modo sese habent, cæteris paribus. Licet enim & ibi cerebrum sit copiosum, os tamen satis crassum est, & præterea viæ adfunt expurgandæ materiæ per nares & aures. Ideoque etsi tela æqualia sunt, & vis æqualis: tamen semper gravius afficitur os capitis anterius, quàm occiput. Et vulnerato occipite plures enadunt, quàm in alijs capitis partibus. Et si ex occipitis vulnere homini moriendum est, vitam diutius trahit. Nam propter ossis crassitiem noxa tardius cerebro communicatur, & longiore intervallo pus generatur & colligitur.

9. Sicut ipsius ossis læsione nulla periculosiora sunt vulnera, quàm quæ bregmati infliguntur: ita in temporibus vulnera valde periculosa sunt, ob musculos temporales, in quibus venæ, arteriæ, & nervi disseminantur, quibus rectè cerebro tempora connectuntur; & propterea iis læsis hæmorrhagia, convulsiones, deliria, carus, & alia symptomata accidunt. Neque propter musculos os ibi commodè nudari & secari potest. Quibus accedit, quod maxillæ inferiori detrimentum affertur, eiusque motus impeditur, ob læsum temporalem musculum, qui maxillæ motui addictus est; & auditus organo vicino damnum facillè afferre potest. Vi-

deatur historia huius rei apud Guilelm. Fabricium, *cent. 2. obseru. 8.*

10. Sunt quoque vulnera periculosa in futuris, cum propter cranij eo loci imbecillitatem, tum propter duram meningem, quæ fibris ibi annectitur. Et sanies per futuras è vulnere facile in duram matrem destillat.

11. Minus periculosum vulnus est, quod cæsum factum; magis, quod punctum; maxime, quod cum contusione. Contundentia enim præterquam, quod ossis depressio canitares cerebri comprimunt, etiam complura alia mala inferunt, quæ ob cutis integritatem oculis non sunt obuia; qualia sunt, totius medullaris cerebri substantiæ concussio, squammulæ alicuius ex cranij interna parte, membranas cerebri pungentis abscessus, rupio denique nervi alicuius molliuiculi, vel venæ, vel arteriæ.

12. Rima quò latior est, & statim primis diebus apparet, eò minus periculosa: angustæ verò rimæ, & quæ non apparent, magis periculosa sunt. Et si externa saltem lamina findatur, rima periculo vacat: periculosum verò est, ubi vtraque lamina fissa est, cum sanies tum in duram matrem decidere possit: periculosissimum est, si solum interna lamina findatur; cum rima illa lateat, & in conspectum non veniat; præcipue si festuca aliqua membranas pungat. Valde etiam periculosa est fissura, si cum depressione coniuncta sit, & ossis pars auulsa subiectum cerebrum premat. Periculosissimum vulnus est, si rima in aliâ parte sit, quàm quâ percussa est, & vas aliquod intus in parte aliqua, quam ignoramus, rumperatur.

13. Periculosa etiam sunt cranij depressiones, & sæpe neglectæ mortem afferunt; cuius rei exempla annotauit Guilhelm. Fabricius, *cent. 2. obs. 3.* ubi etiam rectè Felicem VVirtz refutat, qui in sua Chirurgia, *cap. 7.* statuit, non multum laborandum in cranio depresso eleuando, sed negotium totum naturæ committendum esse, & parum referre, etiam si fouea remaneat. Et si enim in infantium & mollioribus capitibus hoc locum habere possit, & idoneis emplastris adhibitis, vt supra dictum, cranium naturâ coopitulante restituatur: tamen in siccioribus & durioribus ossibus omnino eleuatione cranij opus est. Spatium enim inter cranium & membranam est satis exiguum, vt eo depressio & cerebrum lædi, & motus eius impediri possit. Imò et si ab initio grauiora symptomata non superueniant: tamen curatione neglectâ, & cranio depresso incuruato manente, stupiditas ingenij incurabilis sequi potest: vt id obseruatione peculiari docuit Guilelm. Fabricius, *cent. 3. obseru. 21.*

14. Maius adhuc periculum est, si præter cranium etiam dura membrana, quacunque sui parte, præcipue autem mediâ capitis parte, ubi sinum illum sanguine refertissimum (torcular vocant) constituit, lædatur; quo loco lauciata omnem illam intercapedinem, quæ inter cerebrum & duram matrem interiacet, adimplet, cum præsentaneo mortis periculo.

15. An autem ex vulnere cerebri conualiturus sit æger, ex virtutis robore, & morbi vehementia diiudicandum. Si enim naturæ robur sit magnum, & calor innatus sese rectè habeat, sæpe etiam periculosa capitis vulnera præter spem sanantur: contra ubi vires deficiunt, & calor est imbecillis, malum est indicium, præsertim si praua symptomata statim accedant. Et quò pars, quæ læditur, est nobilior, & quò læsio maior, eò vulnus periculosius est.

16. Quò caput, vel naturâ, vel ex morbo, vel ex ætate, est debilius, eò vulnus est periculosius. Hinc in senibus vulnera capitis sunt periculosiora; minus iuuenes & mediæ ætatis periclitantur. Nam & calor in senibus est debilior; sanguisque minus laudabilis, & serosus minus aptam vniõni & adglutinationi materiam præbet. Infantes verò, & pueri, etsi ossa habent molliora, &

sanguine bono humentia; ac propterea ex sese facilius sanantur: superuenientium tamen symptomatum ratione, & quod putredo in corpore calido ac humido facile exciratur, satis suspecta sunt.

17. Si caput destillationibus obnoxium, aut æger erysipelata in capite pari soleat, aut corpus lue Venereâ infectum, aut omnino cacochymicum sit, aut hæctica febris, vel tæbe, vel alio morbo consumptum; vulnus periculo non vacat. Cum enim ad vulnus vniendum naturæ robur, & bonus sanguis requiratur; vtrumque deest in hæcticis, & morbo vel tæbe consumptis; bonus verò sanguis in cacochymicis. Periculosum etiam est, si quis in capite post Veneris actum vulneretur.

18. Symptomata quod attinet, duo eorum genera sequi solent: vnum eorum, quæ affectus cerebri substantiæ, & partium vicinarum sequuntur, qualia sunt, conuulsio, paralytis, delirium, sopor, stupor, febris, & similia, quæ in toto apparent; alterum eorum, quæ ob repentinam spirituum animalium agitationem, turbationem, & dissipationem proueniunt, qualia sunt voce priuari, non videre, non audire. A quibus symptomatibus aliquando ad se redeunt ægri, sine vllis grauibz symptomatibus superuenientibus; quando scilicet nec cranium fractum, nec neruus, venæ, aut membrana aliqua cerebri rupta est: aliquando verò ad se non redeunt, vel si ad se redierint, in grauiissima symptomata incidunt; ubi nimirum partium harum aliqua læsa est.

19. Itaque quæ initio vulneratis accidunt symptomata, minus terrere debent, quàm quæ perseverant, vel postea superueniunt. Cum enim fiant saltem ob dolorem, hæmorrhagiam, aut spirituum animalium turbationem, lethale vulnus non significant. Quæ verò vel permanent, vel quarto, septimo die, aut deinceps, quo tempore omnia in melius mutari oportebat, accidunt, periculum portendunt, & saniei collectionem, putredinem, vel simile quid adesse significant.

20. Si nullum prauum symptoma adsit, vulnus quidem periculosum dicendum est, non tamen lethale, modo Medicus & ægro adstantes singuli suum officium faciant. Et quod de aliis morbis acutis dicitur, id & hic locum habet. Si æger quiescat, mente constet, somnum capiat, facile ipiret, siti non vigeatur, cibum non fastidiat, non doleat; si febris absit, vel desierit, pus album sit, leue, æquale, non fætidum odoris, conuenientis quantitatis; si ægri facies sit similis bene valentis, & sui potissimum; si membrana sit mollis, sui coloris, liberè moveatur, caro increfcescens rubicunda, ac ceruicis & maxillæ quietus & facilis motus: bene prælagire licet, etsi vulnus magnum sit.

21. Si per vulnerum capitis initia febris oborietur quarto, aut septimo die, id à puris generatione fieri putandum est, nec adeò periculosum est. Dum enim pus sit, dolores, ac febres accidunt, 2. *aphor. 47.* Si verò post septimum, & eo tempore, quo iam terminari debet, incidat, periculosum; cum putredinis in cerebro, meningibus, aut cranio sit indicium: præcipue si alia etiam adsint signa, quæ putredinem adesse simul attestentur, vt pallidus & subflauus vulneris color. Perpendendum tamen hic, an febris sit ab erysipelate: rum enim minus periculum coniunctum. Cognoscitur autem ab erysipelate, & biliosa materiæ confluxu febrem ortam esse, si cum rigore inuadat, tertianæ typum obseruet, atque sudore terminetur paroxysmus; si vulneris labia subtumida sint, vnâque tota facies; si ceruix & maxilla adeò rigeant, vt vix caput moueri, & os deduci possit; si mordicans & pungens dolor, & calor maior, quàm ab inflammatione.

22. Si vulnus aridum & siccum, salitarum carniū instar, appareat, & vulneris labia depressa, & non tumida sint, nihilque saniei vulnus emittat, & liuidum ac citrinum appareat, periculosum est. In vulneribus enim magnis,

magnis, si tumores non superveniant, malum: Hippocrates, 5. aphor. 66.

23. Si capitis vulnere tumor superveniens statim evanescat, malum: nisi fiat id ob evacuationem aliquam per purgationem, phlebotomiam, aut resolutionem: Hippocr. 5. aphor. 56.

24. Si os initio nigrum euadat, mors prædicenda & timenda.

25. Propter plagam in capite acceptam stupor aut delipientia, malum, 7. aphor. 14.

26. Si os purulentum euadit, & pustulae per linguam exoriuntur, linguaque præ siccitate finditur & denigratur, ex acris saniei per palati foramina in linguam delapsu, raro euadunt ægri.

27. Si æger delirat, si memoria aboletur, si lingua est incontinens, si caligant & obscurantur oculi, si aures obsurdescunt, si æger in lecto iacet immobilis, vel ex eo se præcipitem vult dare, si urina & alui excrementa supprimuntur, si paralytis aut convulsio accedit: omnia ista vulnus lethale indicant.

28. In omnibus capitis partibus facile caro regeneratur & inducitur, excepta frontis ea parte, quæ paulum est super interstitium superciliarium; ut interdum per omnem ætatem vlcus ibi maneat. Est enim eo loci cavitatis, quæ ad nasi cribrosa ossa pertingit, & excrementa, quæ alioquin per nares & oculos efferuntur, eo confluunt: Ambros. Paræus lib. 9. cap. 12.

29. Urinæ quoque perturbatae, quales iumentorum, cum maximam humorum corruptionem ostendant; nec non albæ & perspicuæ, utpote bilis flauæ ad caput motum significantes, periculosa sunt. Obseruavit etiam Ioh. Andr. à Cruce, ut, tract. 1. de vuln. lib. 1. c. 5. refert, eos, quibus diarrhæa, dysenteria sponte supervenerit, ferè omnes periclitatos fuisse; ac quàm plures etiam, qui pollutione vexantur.

### Curatio.

Cranij fracti curatio.

Si cranium læsum sit, quocunque etiam modo, corpus euacuandum, in corporibus plethoricis & cacochymicis. In eiusmodi enim corporibus etiam quæ levia sunt vulnera, ob humorum copiam prava attrahunt symptomata; multò magis verò id accidit in magnis. Imò in omnibus vulneribus capitis euacuatio necessaria est, in quibus sectione, dilatatione, ossis abrasione opus est, & causa adest, ob quam affluxus humorum meruatur.

Ideoque primum, & protinus primâ die vena aperienda, cephalica vel communis, modò vires id permittant, ut affluxus tenuioris sanguinis ad caput impediatur, & sanguinis tantum euacuandum, quantum eius copia requirit, & vires ferunt, & prout ex vulnere parçè vel copiosè effluxit; aut si venam aperire non liceat, cucurbitæ scarificatæ dorso applicentur, & scapulis, vel etiam lumbis.

Deinde corpus euacuandum medicamentis idoneis, & inprimis bilem ac serum, quæ, ut mobilia, facile ad caput feruntur, purgantibus; plurimumque omnino utilitatis in vulneribus capitis purgatio rectè instituta habet. Conveniunt hinc syrup. rosar. & violar. solutivus, pulpa tamarindor. myrobolan; præsertim citrina, infusæ vel decoctæ; cum humorum ad caput motum impediatur, & caput roborent. Neque inutile est rhabarb. (alioquin quidem vaporosum, & capitis affectibus minus commodum) infusum in decocto myrobolan. citrinar. & admisto syrupo rosarum solutivum, vel pulpa tamarindorum.

Vel iniiciatur hic Clyster:

℞. Rad. pæon. Vnc. i. parietar. malvæ, althææ, betonicæ. Att. M. i. sem. pæonia, Drach. ii. flor. borragin. P. ii. Coquantur in aq. simpl.

Colat. ℞. lb. i. elos. diacathol. Indi maioris, ana 3. vi.

olei lilior. alborum Vnc. ii. rutacei, mellis anthosati, ana 3. i. falsæ Drach. 8. F. Clyster.

Non tamen medicamenta purgantia sint nimis lenia; cum ob humorum ad caput motum in vulneribus capitis aliis plerumque adstricta sit. Ideoque syrupo rosarum vel violarum solutivum, & lenibus istis medicamentis in robustioribus 3. i. vel 3. ii. electuarij rosari Mesuæ, vel de succo rosarum addere utile est, cum aqua vel decocto cichorei.



Clysteres quoque sæpius repetere convenit, ut vapores à capite reuellantur.

Exhibenda præterea biliosos humores alterantia, & quæ calidorum vaporum ad caput motum impediunt, caputque roborant, ut syr. rosar. myrtinus, de endivia, granatorum, de betonica, quæ simul serum sanguinis subducit, urinamque movet, cum aqua vel decocto hordæi, betonicæ, cichori, plantaginis, conserva item rosarum.

Ipsam verò vulnus quod attinet, potest, ut ex superioribus patet, id variis modis fieri. Si enim vulnus fiat ab instrumento incidente, vel pungente, non potest cranium lædi, nisi cum vulnere cutis: si verò à contusione, potest id fieri etiam sine cutis capitis vulnere, & cum eo: potest quoque vulnus utramque laminam penetrare, vel alteram tantum. De his ergo ordine dicendum.

Et primò quidem si cutis vulnerata sit, & satis pateat, labiaque, quantum opus, diduci possint, sectione nulla opus est; sed aut digito, aut vnguibus, aut instrumento obrusam aciem ex altera parte habente membrana ab ossè diuellenda, sic, ut labia æqualiter, & quantum satis, distent.

Si verò cutis non satis pateat, latius aperienda, donec fissura tota in conspectum veniat: & inprimis hinc cauendum, ne quid de pericranio integrum relinquatur. Terebrâ enim vel scalpello postea laceratum dolores & inflammationem excitat, & malum facile cerebro communicat. In pericranij autem sectione id monendum, tunc eam solum tentandam, cum suspicio est læsi crani; aut insignis est contusio, sanguinem concretum continens. Aliàs verò non sine causâ doloribus affligi æger debet. In pueris etiam non facile hæc sectio tentanda, & sanguis profusione ac dolore vires ea ætate debiles deliciendæ; sed potius opera danda, ut convenientibus topicis materia discutiat.

Sectio verò cutis ea plerumque commodissima est, si Chirurgi operâ fieri debet, (Nam quæ ex vulnere est, necessariò talem habemus, qualem accipimus) quæ duabus transversis lineis crucis, siue litteræ X. figuram exprimit; præsertim cum fractura aut depressio magna est. Aliàs hæc sectio non semper necessaria est, sed etiam rectam à latere vulneris, versus ipsum vulnus, ita ut anguli recti constituentur, ex linea recta ducta supra rectam, inprimis si vulnus sit rectum vel oblongum, institui licet, hoc modo:  vel trigonam  Sanguinis postea fluxui & dolori succurrendum linamentis vel albumine oui, vel vino austero madidis.

In sectione autem musculi temporales vitandi, quantum fieri potest; cum & nervosissimi sint, & cerebro vicini, & inflammationes, deliria, & convulsiones asferre soleant. Vitandæ quoque sunt futuræ; cum eo loci fibræ duræ matris pettanseant: & ad latera futurarum sectio facienda. Scribit tamen Iohannes Andr. à Cruce, tract. 2. de vuln. lib. 1. c. 1. si se necessitate cogente, & in temporibus, & in futuris felici eventu sæpè sectiones molitum esse; statuitque consultius esse, aliquid nonnullum cum fiducia, vel cum periculo facere: securusque est hac in re Celsum, qui scribit, urgente necessitate, & si accidentium magnitudo impellat, etiam temporum incisionem faciendam, sed iuxta villorum progressum.

In vulnere etiam frontis cauendum, ne sectio fiat per transversum. Etenim si musculus, qui palpebram attollit, per transversum secetur, palpebra decidit, nec oculus

Pericranij sectio.

Sectio cutis capitis quo modo instituenda.



oculus aperiri potest; atque hoc modo visio laeditur sed sectio à parte inferiore sursum versus facienda. Neque etiam sectio nimis ampla facienda; non solum quia turpitudine ex cicatrice maiore oritur, sed pars denudata etiam imbecilla redditur. Ideoque tanta solum, quanta ad plagam detergendam opus est, sectio facienda.

Hinc ad os laesum accedendum. Cum verò cranium variis modis laedi possit, ut supra dictum, de iis ordine dicemus;

*Et primò de fissura, in qua externa solum lamina laesa, internâ integrâ manente.*

*Fissura cranij in externa solum lamina.*

Fracturâ detectâ & denudatâ, scalpro, seu plano, seu incuruo, seu cauo os deradendum, quamdiu vestigium aliquod fracturæ apparet: de quo In Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 8. dictum. Quia enim in rima necessario aliqua sanies colligitur, quæ è superpositis partibus defluit, & os atque subiectam membranam facile corrumpere potest; deratione ossis eiusmodi saniei collectio impeditur. Deinde quia labia in osse plerumque inæqualia & aspera sunt, ac dolorem pariunt, neque caro cum iis facile vnitur; asperitas omnis deradendo tollitur. Tertio etiam in cognitionem fracturæ peruenimus, & quàm profunda sit, radendo cognoscimus.

Ut autem de profunditate fissuræ certius constet, primò super os aliquod nigri coloris medicamentum liquidum, vel atramentum scriptorium imponendum, ac vulnus siccis linamentis implendum; & cataplasma dolorem leniens imponendum; post die soluto & purgato vulnere os deradendum. Tum enim fissura, quæ nigrum medicamentum in se suscepit, nigra apparet, os verò reliquum album. Os ergo tamdiu, vel vnâ vice, vel pluribus vicibus deradendum, donec tota rima aboleatur, & os totum album appareat, & sanguis instar lacrymarum extillare incipiat.

Non tamen sine causâ quis hic dubitare posset, an opus sit (præcipuè in nostris regionibus, in quibus capitis vulnera non ita periculosa sunt, ut in multis locis in Italia) ita curiosè semper fracturas rimari; præcipuè non penetrâtes; & tam accuratè radere. Si enim, ut postea dicitur, Galenus, 6. meth. med. cap. 6. rectè monet, & ipsa experientia confirmat, fragmenta ossium longius excurrentia usque ad finem prosequenda non esse; cum nulla inde noxa sequatur, & tales ossium rimas natura sponte, ut in aliis ossium fracturis, consolidare soleat: cur non etiam in his fracturis, ubi non totum cranium, sed superior saltem lamina fracta est, idem fieri possit? Vid. quæst. 3. cap. frequent.

Figure scalprorum videantur apud Iohan. Andr. à Cruce, & Ambros. Paræum, lib. 9. cap. 4.

Antequam autem os radere incipimus, vulnerati aures aut lanâ, aut gossypio, aut carptis linamentis obturandæ sunt, ne ex naturâ molestiam aut strepitum æger percipiat: ægri quoque caput ab assistantibus immobile tenendum. Dum verò raditur, vulneris labia puris linamentis munienda, ne à scalpro vel aere ledantur.

Scalprum verò, ne attritu longo incalescat, & os inflammetur; vel in oleum rosaceum, vel aquam rosaceam sapius immittetur, vel, quod commodius, immutate oportet; cum aliâ etiam scalprâ permittenda sint. Ideoque scalpella & numero multa, & magnitudine differentia in promptu habere oportet.

Post raduram & ossis & cutis vulnerata ratio habenda. Et si verò & regeneratio partis deficientis, & rima, & cutis coactis naturæ opus sit: adiuvanda tamen ea medicamentis. Et primò quidem pulueres cephalici supra propositi imponendi, nec pingue quid cranium imponendum. Delectus tamen hic medicamentorum habendus. In vulnere enim exiguo, & corpore humidio-

re & molliore, sufficit thus in maiore & sicciore, manna thuris vsurpanda: si vulnus sit sordidum, & corpus valde siccum, myrrha, & alia valentius siccantia vsurpanda. Et tempore quidem frigido calida vsurpanda; iris, aristolochia: tempore verò æstivo sanguis Draconis, cornu cerui. Supra os pulueres, linamenta sicca imponenda: (quæ etiam in principio, si pulcres illi non in promptu sint, semper cranium imponenda) supra linamenta verò tandem digestiva vnguentâ dicta, cutis & labiorum vulneris gratiâ, applicanda; inprimis verò in capitis vulneribus laudatur resina abietina cum modico oleo rosaceo: & sunt supra etiam talia proposita.

Ut verò post rationem inflammatio aliqua non exciteretur, interdum anodynus vti oportet, & proinde partes circa vulnus oleo rosaceo calido fouere: deinde linteam vino calido, in quo rosæ & betonica cocta sint, madidum imponendum, quod totam partem oleo inunctam complectatur. Aut, si inflammatio iam imminet, cataplasma ex farina hordei & rosæ cum posca imponendum. Apparente iam pure ad detergendum vnâ & alterâ vice melle rosaceo, vel solo, vel cum dicto vnguento misto, vtendum, prout puris maior vel minor copia est. Nam si copiosum sit pus, solo melle rosaceo vtendum. Vulnere deterio sarcoticum medicamentum supra pulueres imponendum, ut vnguentum Basilic. de betonica, de matrisylvia.

Tandem vulnere carne repleto, vel siccis linamentis, vel emplastro diapalma, vel alio conuenienti cicatrix inducenda.

*Curatio fracturæ Cranij, quæ utramque laminam penetrat, sine tamen membranarum lésione.*

Si verò maior sit cranij læsio, quàm ut extrema solum lamina fissa sit, videndum, qualis sit fractura. Potest enim tantum esse fissura, vel simul ossis depressio & fractura; vel etiam contusio. Si sit simplex vtriusque laminæ fissura, sed sine membranarum & cerebri lésione, curanda est ut mox dicitur. Si v. cranium simul depressum sit, eleuandum, ut in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. c. 5. dictum, & Ambr. Paræus, lib. 9. c. 5. tradit. Si ossis aliquid effractum, & in multas testas defractum sit, & ira auulsum, ut facile eximi possit, forcipe vel voliellâ extrahendum: si pertinacius autem adhæreat, & præcipuè si membranas pungat, vel premat, vectibus, forcipibus excisoriis, scalpris eximendum: de quibus Paræus, lib. 9. cap. 6.

In ossibus tamen extrahendis nulla violentia adhibenda; sed si extractioni resistent, opus totum naturæ committendum; (modò ab iis membranis non ledantur) quæ id, quod instrumentis nullis consequi licet, facile suo tempore expedit. Multò minus cranij pars, quæ curi vel pericranio adhuc coheret, (etsi à reliquo cranio auulsa sit) extrahenda, & cerebrum ac membrana eius, suo tegumento spoliata, nuda relinquenda, sed suo loco restituenda, & naturæ negotium committendum; quæ ipsa vel separabit, vel reliquis ea agglutinabit. Ut Paræus, lib. 9. cap. 7. monet, & historia curationis comprobatur.

Si verò simplex rima sit, sed sine cerebri & membranarum lésione, ita curatio instituenda. Duo pericula hic præcipuè imminet. Primum est, quod sanies ad duram matrem destillat. Cum enim ex fractura os debile effectum sit, alimentum affluens debito modo concoquere non potest; unde excrementitia quædam humiditas in loco fissuræ nascitur, & etiam in partibus incumbentibus, quæ per rimam in membranam duram destillat: unde metuendum, ne humor hic putrescens membranam contumpat, & inflamet; unde febres, conuulsiones, deliria, & sæpe mors ipsa sequitur: atque hæc vulgarissima interitus eorum, qui ex vulneribus capitis moriuntur, causa est. Secundo, interdum acci-

*Fractura cranij laminam utramque penetrans.*

*Fractura cranij quæ pericula imminet.*

*Cranium in fractura quomodo radendum.*



cidit, vt festuca quasi, & frustulum ossis intus separetur, ac duram membranam pungat, vnde dolores, acutissimi, & conuulsiones oriri possunt. Itaque præcipuus hic curationis scopus est, vt saniei huius exitus pateat, vel pareatur, & si festuca aliqua cerebrum pungat, illa dematur. Ac proinde si foramen inflicto vulnere expurgando & curando non sufficiat, vel quia ex depressione ossis nimium comprimitur membrana dura, vel quia nigrescit; alterum foramen adhuc, priori vicinum, molliendum est prominentibus interstitiis cuspidibus resectis.

Quapropter curandum, vt cutis loco affecto, vel ex vulnere pareat, vel dicto antea modo aperiatur. Si verò fractura tam ampla non sit, vt per eam sanguis vel sanies, quæ ab osse & cute continuo separantur, inque duram matrem destillant, euacuari possint; cranium maturè, & quam potest fieri citissime aperiendum, vt saniem expurgare, & duram membranam ab ea mundare liceat.

Cranium  
quomodo  
aperiendum.

Quomodo verò cranium aperiendum sit, Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. c. 8. dictum; & tractat hac de re diligenter Iohan. Andr. de cruce, de vulner. lib. 1. tr. 2. c. 13. Aperitur autem cranium vel scalpris, vel terebra, vel modiolis. Neque enim, vt verbis Petri Pavv, in comm. in Hippocr. de vuln. capitis, vt ait, semper per pristinam exsectionem, quæ trepano fit intelligenda. Tentandum delere fissuram; planandæ ossis fracti oræ; si angustæ sint valde rimæ, dilatandæ, vt superfluis exitus detur; idque accommodatorum scalprorum vsu. Abradentes scalpri si non suffecerint, etiam ad cycliscum accedendum. Breuiter: omnia tentanda, priusquam modiolus in usum trahatur. Periculo enim non vacat. Vnde nisi summâ urgente necessitate eo non vtendum. Nimirum scalpri locum habent, vbi magna fractura est, & ossa fracta vacillant, vt & in ossibus mollioribus: si verò os firmitus sit, terebrâ vel modio opus est. Si enim os non solum fractum, sed & effractum & depressum sit, nec terebram, nec modiolum adhibere conuenit, ne osse magis compresso subiectæ membranæ lædantur; sed sano ossi tunc; proximè tamen, quantum fieri potest, versus fracturam, imponenda, & cranium, quantum ad saniei exitum necessarium est, aperiendum, ossisque quam minimum eximendum, ne membranæ valde denudatæ aliquid incommodi patiantur; sed satis est, si, quod membranas pungebat, eximatur.

Monet & hoc hîc Galenus, 6. meth. med. cap. 6. Si ossium fragmenta quædam longius excurrant, ne ea usque ad finem prosequamur; cum nulla ex eo, modò reliqua rectè peragantur, noxa sequatur, ipsâ experientiâ teste; ad quam etiam prouocat Amatus Lusitanus, cent. 6. curat. 100. qui tales ossium rimas longius procurrentes consolidari & ferruminari vidit. Vt enim in aliis ossibus; ita etiam in cranio natura callum obducere solet.

In scalpris verò eligendis hîc alio modo res sese habet, ac in rima, quæ externam tantum cranij laminam penetrat. Ibi enim latiora scalpri primò vsurpanda, deinde strictiora & angustiora: hîc verò ab angustioribus incipiendum, & ad latiora progrediendum.

Dura mater  
quandoque  
aperienda

Notandum etiam hîc, quod obseruauit Guilhelm. Fabricius, lib. 1. obseru. 7. duram matrem, inter quam, & cranium plerumque spatium est, quandoque arctè totam cranio adherere: quo in casu perforatio ferè inutilis est; cum sanguis non inter ipsum & membranam duram, sed infra duram membranam, seu matrem, quam vulnerare ita non licet, contineatur. Si tamen necessitas id postulet, ea ipsa potius aperienda, quam permittendum, vt æger sine auxilio moriatur. Cuius rei historia extat apud Glandorpium, in speculo Chirurgia, obseru. 4. de quodam pugili, cui cum grauiter in capite vulnerato tertia die graui symptomata superuenirent, vt suspicio esset, materiam intra cranium collectam esse, cranium apertum est; verum nihil efflu-

xit, sed dura mater in tumorem elata in conspectum venit; quæ cum scalpello incuruato, ne pia mater læderetur, aperiretur, maxima copia saniei effluxit, quæ non intra cranium & piam matrem, sed intra duram & piam matrem latuerat; quæ euacuata, & idoneis medicamentis adhibitis, æger sanitatem recuperauit.

In apertione cranij & hoc obseruandum, vt in decliniori, quantum licet, parte apertio fiat, (modò per futuras aut per ossis renuitatem aut crassitiem liceat, & cerebrum vulneratum non sit, quod tunc per declinioria loca aperta exire solet) vt saniei facilius exitus detur. Neque etiam perforatio in futuris facienda est: nam quia eò loci venæ & membranæ transeunt, ferro facile lædi possunt. Et quia cranium ibi imbecillius est, facile fieri posset, vt in terebrando ferrum præter opinionem descenderet, & membranam, ac cerebrum læderet. Præterea futuræ factæ sunt, vt per eas vapores capitis exhalarent: si ergo callus ibi post apertionem generaretur, exspiratio impediretur. Si tamen aliter euacuatio saniei fieri non potest, minus periculi è suturarum apertione, quam ex retentione saniei est. Nec etiam in osse temporum, etsi id lauium sit, perforatio instituenda; cum miculos temporales secare non liceat, ob pericula prognost. 9. proposita. Nec tamen æger sine auxilio relinquendus, sed, si necessitas id postulet, loco vicino, in osse syncipitis, sectio instituenda; vt docet Galenus, 6. meth. med. cap. vlt. & Ambros. Paræus, lib. 9. cap. 15. Imò si necessitas summa expostulet, etiam tempora diuidere, & ægrum omni ope non destituere iubet Petr. Pavv. in comm. in Hippocr. de vuln. capis. refertque, se vidisse alâ molæ puero ita contusum tempus dextrum, vt aliquot ossis pertusi fragmenta per vulnus eximerentur; nihil tamen incommodi toto curationis tempore patiente puero; imò tempora aperi manu Chirurghi non semel vidisse, absque vllò symptomate. Duo tamen monent: primum, vt non, nisi summa expolcente necessitate, tempora diuidantur, deinde vt nouacula semper secundum ductum fibrarum, temporalis musculi ducatur.

Tempus aperiendi quod attinet, dierum numero id definiri non potest; sed quò citius, eò melius, & si fieri potest, ante quartum aperiatur. Neque expectandum, donec graui symptomata superueniant; sed si malum tantum sit, vt graui superuentura symptomata metuendum sit, quamprimum apertio cranij instituenda. Si tamen Medicus in principio non vocatus, vel alia de causa apertio dilata sit, quandocunque opus & necessitas id postulat, apertio instituenda; cum experientia docuerit, sæpe satis longo, ab accepto vulnere, tempore, cranium feliciter fuisse apertum, & ægros à grauissimis symptomatibus liberatos. Et satius est, tardius occurrere remediis malo, quam iis omisissis sine auxilio ægrum mori sinere. Itaque quantum fieri potest citissime, vel ante quartum diem, apertio instituat; præcipue tempore æstiuo, quo humores facilius putredinem concipiunt. Imò Celsus nec tertium diem expectari voluit; cum humores interea temporis ad membranam descendentes, & exitum non habentes, grauissima symptomata excirent.

Tempus aperiendi cranij.

Si tamen fractura ita pateat, vt saniem per eam euacuari posse spes sit: vel si materia exigua & benigna fuerit, quæque à calore nativo facile regi & discuti possit, regioque sit temperata, aer non æstiuans, ægri constitutio robusta, nec is prauis humoribus scateat, neque accidens vllum appareat; potest apertio nonnihil differri, an forsitan naturæ operâ, sine sectione, æger conualescere possit.

Post perforationem si sanguis copiosius fluat, medicamento aliquo sanguini sistendo apto cohibendus: quale est, quod à Galeno, 5. meth. med. cap. 4. describitur, quod paratur ex thuris parte vna, aloës parte vna & dimidia; & cum vtendi tempus instat, oui albumine ad mollis crassitiem subigitur, & molliissimis leporis pilis excipitur,

excipitur, ac vulnere imponitur. Et oræ foraminis radenda ac læuiganda sunt instrumento lenticulari, ne asperitas in carne succrescente aliquem dolorem exciter; & si quid scobis in dura membrana collectum est, id omne detergendum.

Capitis vulnera, petente membrana, quo modo curanda.

Osse patente vel aperto, vt iam saniei exitus dari possit, de medicamentis idoneis dispiciendum, quæ patienti iam duræ membranæ imponenda sunt. De quibus Medici, cum antiqui, tum recentiores, valde dissentiant; vt postea, in *questione 4. post caput sequens*, diceretur, Vt igitur rem in pauca contrahamus, feliciter vulnera talia curantur, ipsâ experientiâ teste; vt ex Valleriola, *lib. 4. obseruat. 19. lib. 5. obseru. 9. lib. 6. obseru. 4.* Guilel. Fabricio, *cent. 4. obseru. 4.* & aliis videre est, si mel, vel syrupum rosaceum (pauillo olei rosacei addito, si dolor vigeat) panno sericeo vel syndoni illitum membranæ imponamus, vulnus verò cephalico aliquo vnguento repleamus, cranioque puluerem cephalicum inpergamus, tandemque emplastro de betonica, vel simili cephalico id muniamus, caput verò totum oleo rosaceo inungamus. Sedato dolore & inflammatione, melli rosaceo, quod membranæ imponendum, guttula vna atque altera aquæ vitæ admisceri potest.

Cephalicum Conciliatoris celebre, quod, *different. 181.* describit, vnguentum ita paratur:

*Vnguenta & Emplastrum ad vulnera capitis.*  
℞. Gummi elemi Vnc. iij. resina puriss. Vnc. iiii. cera Vnc. vi. ol. rosac. Vnc. iij. β. ammoniac. Vnc. ii. terebinth. 3. iij. F. Vnguentum.

Aliud eiusdem:

℞. Gummi elemi Vnc. iij. opopanax Vnc. ii. bdelli 3. β. resina pini 3. i. cera q. s. F. Vnguentum.

Gummi elemi vtilissimum

Inprimis enim in capitis vulneribus vtile est gummi elemi, quod, vt, *ibidem*, Conciliator scribit, attrahit, dolorem mitigat, malam intemperiem propter familiaritatem, quam cum corpore habet, corrigit.

Guilelmus Fabricius hoc primo vtitur.

℞. Terebinth. aq. beton. & salu. lota Vnc. i. olei rosac. 3. β. & vitell. ouorum Drach. i. gummi elemi cum oleo super igne lento dissoluti & colati Vnc. β. croci Scr. i. vitellos ouorum num. ii. Misce.

Vtile est & hoc:

℞. Resina pini 3. β. terebinth. Vnc. iij. cera, thuris, gummi elemi an. 3. β. Misce. F. Vnguentum.

Dolore sedato ad mundificationem hoc vtitur:

℞. Pulv. caryophyllat. angelic. aristolochia rotunda, ireos Florentin. an. 3. i. extract. saluie, betonica an. 3. ii. gummi elemi, oleo rosaceo dissolut. 3. ii. mellis rosati q. s. aqua vita parum, Misce in mortario, F. Vnguentum.

Emplastrum de betonica ita paratur:

℞. Betonica M. ii. matrisylvie, saluie, hyperici, millefol. 3. piloselle, consolid. minor. an. M. i. centaur. minor. maior. pimpinell. verberna, an. M. β. terebinth. clara Vnc. xx. olei rosac. Vnc. x. resina pini, gummi elemi an. Vnc. iβ.

Herbæ contundantur & terantur, ac affundantur vini albi 3. ii. Digerantur per dies viii. vel plures, ac quotidie agitentur. Hinc coq. ad tertiæ partis consumptionem, colentur, exprimantur. Post reliqua, & cera q. s. addantur, & s. a. Fiar Emplastrum.

Alij hac descriptione Emplastri de betonica vtuntur.

℞. Betonica viridis, pimpinella, agrimon. saluie, pulegy, millefol. consolid. maioris, matrisylvie, an. Vnc. vi. thuris, mastich. an. Drach. iij. ireos, aristoloch. rotund. an. Drach. vi. cera alba, terebinth. an. Vnc. viii. gummi elemi Vnc. ii. resina pini Vnc. vi. ol. abietini, vini albi, an. q. s.

Herbæ in mortario contusæ octo diebus in vino albo macerentur, & sæpius agitentur, tandemque ebulliant. Expressum & colatum vinum coquatur ad tertiæ partis consumptionem, & addatur ol. abietinum, postea cera liquata, & hæc fusâ, resina & gummi, deinde terebinthina; quibus paulum refrigeratis reliqua trita, & creta: & manibus assidue subigantur, dum totus ha-

mor exeat. Tandem ad formandam massam additur lac caprillum, iterumque manibus continenter medicamentum subigitur.

Emplastrum cephalicum Basilicum ita paratur:

℞. Herbar. viridum; betonica, plantag. matrisylvie, pimpinell. roris. marin. an. M. β.

Emplastrum cephalicum Basilicum.

Contusa macerentur per diem in olei rosac. Vnc. iij. mastich. Vnc. i. pinguedinis recentis vitulina, porcina, an. Vnc. ii.

Deinde adde vini Vnc. vi. Coquantur ad vini consumptionem.

Colentur. Postea adde mastich. gummi elemi, resina pini, li. b. argyri, an. Vnc. β.

Rursum coquantur, donec subnigrum acquirant colorem, semper agitando, tandemque addantur terebinth. clara Vnc. ii. cera q. s. Fiar Emplastrum.

Guilelm. Fabricius tale parat:

℞. Emplastri de betonica Vnc. iiii. gummi elemi oleo rosaceo dissol. Vnc. i. pulv. rosar. rubr. myrtillor. an. Drach. i. mastiches, calami aromatici, angelica, caryophyllor. an. 3. i. olei & cera q. s. F. Emplastrum.

Emplastrum Fr. Arcæi:

℞. Ol. rosac. omphacini & completi Vnc. ii. mastich. myrtin. an. Vnc. i. pingued. hirci Vnc. iβ. succi betonic. 3. j.

Coqu. ad consumptionem succi. Adde mastiches 3. x. gummi elemi 3. vi. terebinth. 3. iij. β. cera alb. q. s. Iterum ebulliant, F. Emplastrum.

Est & hoc vtile:

℞. Gummi elemi, resina pura, an. Drach. ii. cera Vnc. iβ. ol. rosac. Drach. vii. ammoniac. Vnc. β. terebinth. 3. vi. succi betonic. 3. x. F. s. a. Emplastrum.

Habet & hic locum Emplastrum Alexandri Benedicti, quod *lib. 1. cap. 5.* describit, quod supra, *cap. 20.* proposuimus.

Felix VVirtz hoc suum laudat Vnguentum:

℞. Seni cernini, mellis despumati, an. Vnc. β. aloes bepatica puluerisat. 3. i. Misce. Ioh. Andr. à Cruce hoc feliciter vsus est.

℞. Vini Vnc. xx. succi betonic. Vnc. iiii. calamintha 3. ii. myrrhe, thuris, aloes, sanguinis draconis, centaur. minor. granor. hyperic. an. Drach. i.

Puluerisanda pulueriscentur, ac omnia misceantur, & per biduum macerentur.

Postea lento igne ad tertiæ partis consumptionem coquantur.

Addantur mellis rosac. Vnc. iiii. Iterum parum bulliant: vase ab igne remoto adde aqua vita, vel spiritum vini Vnc. vi. Colentur.

Tandem adde olei terebinth. Vnc. iiii. & in vase vitreo clausa serpenter.

De betonica Vnguentum Hieron. Fabricij ab Aqua pendente,

℞. betonic. viridis M. viii. Contundantur: contusis addantur ol. communis 3. iiii. cera, terebinth. 3. i.

Coquantur & exprimantur.

Expresso succo iterum adde betonic. viridis contusa M. viii.

Iterum coquantur & exprimantur.

Plura talia vnguenta & emplastra videantur apud Andream à Cruce, *lib. 1. de vulner. tract. 2. c. 16.*

Sunt nonnullis; præcipue vbi dolor & inflammatio non adest, (Nam dum pars præter naturam calet, & sanguis ac spiritus ad locum affectum confluit, non ita tunc adhibentur) aquæ vitæ in vsu; & quod Galenus de Eudemi medicamento testatur, idem etiam multi de aquis & spiritibus istis prædicant, quæ propterea apud plures nationes in vsu sunt, videnturque membranarum cerebri naturæ siccæ optime conuenire: idèoque vnam & alteram formam adscribemus,

Iohannis de Vigo hæc est:

℞. Aq. ardentis seu spiritus vini 3. x. myrrhe 3. i. aloes 3. i. sarcocolla, thuris, an. 3. ii. croci Scr. i. Misce.

Imum

Aqua & spiritus ad vulnera capitis.

Imum vulneris linamento isto liquore imbuto repleatur, & hinc emplastrum de betonica, vel aliud applicetur.

Iacob. Carpenſis hæc eſt:

℞. Aq. vitæ lb. v. vini Maluatici lb. ij. ſ. aloës, myrrha, thuris, an. Vnc. j. ſ. pulu. rad. conſolid. maior. Vnc. ij. centaury. minor. Vnc. j. ſ. hyperici Vnc. ſ. terebinthin. clara lb. j.

Omnia miſceantur, & per menſem ſtent in vaſe vitro optime obturato. Poſtea colentur & exprimantur. Expreſſum vſui ſeruetur, in quo lintea pura madefiant, & vulnere imponantur.

Alia: ℞. Spiritus vini ℥. j. ſ. aloës hepatic. ℥. j. myrrha Drach. iij.

Super lento igne miſceantur.

Alia: ℞. Spiritus vini rectificati lb. ij. maſtiche, myrrha, thuris, gummi elem. hedera, ammoniac. opopanax. bdellij, matrifylu. betonic. an. Drach. j. theriaca, ℥. ij.

Contundenda contundantur, & omnia miſceantur ſimulque ſtent in infuſione vitæ clauſo per triduum: inde deſtillantur in B. M. Deſtillatum vſui ſeruetur: vel potiùs, vbi in ſpiritu vini ſoluta fuerint ſoluenda, colentur. In deſtillato, ſeu liquore, linteamina pura madefiant, iſſque vulnus repleatur, & deinde emplastrum de betonica, aut de matrifylu. imponatur.

Monet hic etiam Ambroſ. Paræus, lib. 9. c. 18. quod os, quod terebra attingit, vel ær affluit, ſquammas ſemper emittit; ad quam deſquamationem celerius promouendam aſpergit puluerem ex eruca, pœonia, cucumere ſylueſtri, & ariſtolochia. Prohibet verò, ne ſquamam detrahat Chirurgus, ſed totum negotium naturæ committat. Deſquammato oſſi cephalicum puluerem adſpergit.

Deſenſus in  
vulneribus  
capitis.

Neque ſolum vulneris, ſed & partium vicinarum habenda ratio eſt. Ideòq; in principio opus eſt repellentibus & exſiccantibus, vt materiæ influxus prohibeatur, & quod influxit, exſiccetur: partēſque vicinæ roborentur.

In hunc uſum Hippocrates, lib. de vulner. cap. cataplaſma cōponit ex farina hordei, & oleo roſaceo; quod omnibus medicamentis reliquis vltimò, vt & vulnus, & partes vicinas complectatur, ſuperponendum.

Vel fiat tale, tempore æſtatis:

℞. Farin. hordei ℥. viij. olei roſacei ℥. iij. poſca, ſeu oxycrati q. ſ. Cataplaſma.

Hyeme verò farinæ hordei & oleo roſar. addantur pulu. roſar. Vnc. ij. & cum vino formetur cataplaſma.

Si conuſio aliqua adſit, ea, quæ ſupra propoſita, uſurpanda vel tale Cataplaſma:

℞. Farin. hord. Vnc. vi. myrtill. Vnc. ij. olei roſac. Vnc. iij. pulu. betonic. Drach. vj. oxymal. ſimpl. Vnc. iij. vini, albi generoſi q. ſ. Cataplaſma.

Simul vtile fuerit caput magnâ ex parte, vt & ceruicem, & collum, & inprimis venas iugulares, oleo roſaceo calido inungere, ad dolorem, ſi adſit, leniendum, & ad ſanguinem, qui ad caput affluit, moderatè refrigerandum & repellendum.

Notandum & hoc, quod monet Iohan. Andreas à Cruce, quod poſt caluariæ perforationem membrana intacta colorem & motum naturâlẽ ſeruare ſolet; poſtmodum eo amiſſo, amplius non mouetur, nec ob id aliud nouum ſymptoma ſuperuenit: paucis poſt diebus ſuperficies eius alba & tenuis ad modum in ſquamas reſolui incipit, & pellicula quædam prætenuis aranæ telæ modo eleuatur, inde noua caro oriri incipit. Vt enim ob æris externi, & medicamentorum topicorum contactum externa cranij ſuperficies emoritur, & ab humido ſuo natiuo derelictum, ab oſſe reliquo ſeparatur, & quaſi piſcium ſquamas de ſe emittit: ita dura matri idem iſdem de cauſis euenit; & Chirurgoſ non exercitatos ſæpe timidos reddit, vt membranam illam corruptum iri metuunt; cum tamen nihil periculi

ſubſit, ſed ſuperficialis illa corruptio ſolo melle roſaceo amoueat. Cui ſi non cedit, hoc Vnguentum imponendum.

℞. Terebinth. clara, vin. alb. lota ℥. ij. mellis roſati, aq. viſc. farin. hordei cribrata, an. ℥. j. myrrha, aloës, ſacchari albi, an. Drach. ij. Miſce.

F. Vnguentum; quo vttere donec membrana iterum pura & ſui coloris appareat.

Solent interdum & ſætor quidam in ſeparatione iſtius membranæ apparere, qui tamen nihil periculi coniunctum habet; cum ſaltem in externâ ſuperficie ſit vitium; niſi alia praua ſymptomata adſint.

Neque ſine fructu eſt; ſi cephalica interna etiam exhibeantur, nunc calidiora, nunc frigidiora, & réperatoria; prout febris, & alia, quæ coniuncta ſunt, id requirunt. Valleriola etiam aureæ Alexandrinæ, vel Mithridatij Drach. j. cum diamoſcho dulci, & pœoniæ ſemine exhibet. Ipſum verò cranium quod attingit, etſi rimæ coalitus, & cranij per callum ferruminatio, vt capite præcedente dictum, naturæ opus eſt; adiuvanda tamen ea medicamentis, & cranio pulueres cephalici, ita veteribus dicti, quod cranij fracturis ſint idonei, ſupra enumerati, inſpergantur & imponantur. Callus autem, quo cranij oſſa ferruminantur, ſerè 40. aut 50. dierum ſpatio perfectionem ſuam acquirit: quantum propter corporum diuerſam conſtitutionem ita certus dierum numerus deſignari non poſſit; cum in iuuenibus citius, in ſenioribus tardiùs abſoluatur.

Exemplum talis vulneris curati eſt apud Guilelm. Fabricium, cent. 4. obſeru. 4. Glandorpium. ſpec. chirurg. cap. 20. obſeru. 3.

Calli in cranio  
nigeneratione.

### De Cranij fractura, cute integra manente.

Interdum accidit, vt cranium frangatur, cute ad ſenſum integrâ manente. Etſi enim conuſio etiam tû in cute ſit: eius tamen externa ſuperficies eſt integra, nulumque vulnus in ea apparet. Nâ cû ſit mollior, cedere poteſt, vt nõ vulneretur: os verò ſubiectû, quia durum, iſtui reſiſtit, & ab impetu eius frangitur; id quod ex iſtus ratione, ſuperuenientibus ſymptomatibus, tactu, dignoſcitur. Tum ergo inquirendum, an fracturæ cranij aliquid annexum ſit, quod neque à natura, neque à medicamentis curari poſſit; quorum tria præcipuè ſunt: nimirum magna ſanguinis copia intra cranium & membranam cerebri effuſa, oſſis particula vel feſtuca membranam pungens, & oſſis depreſſio, cerebrum comprimens. Sanguinis effuſi copia eognoſcitur ex ſanguine per nares & aures etiam effuſo ex capitis grauitate, ex ſopore, ſtupore. Os depreſſum tactu cognoſcitur, & fouea digito deprehenditur. Cerebrum comprimi & pungi ex eo colligitur, quod, dum æger naſum emungit, puncturam percipit: aut poſt puncturæ ſignum ſuccedit delirium.

Cranij fra-  
ctura cute  
integra ma-  
nente.

Si itaque horum aliquod adſit, omnino cranium aperiendum, & ſi depreſſum ſit, eleuandum, & ſanguis è venis effuſus euacuandus, ac fragmentum cranij eximendum. Si verò horum nihil adſit, & ſymptomata mala abſint, præmiſſa venæ ſectiõne, & medicamento purgante bilem exhibito, ea ſerè curatio inſtituenda, quæ cap. 21. de conuſione caput. propoſita eſt, Nimirum capiti raſo tale Repellens imponendum:

℞. Farina hordei lb. ſ. ladani, pulu. roſar. myrtill. maſtiche, an. Drach. j. olei roſac. oxycrati, an. q. ſ.

F. Cataplaſma, quod manè & velperi renouetur.

Particulares quoque capitis euacuationes inſtituantur: quarto die gargarifmus paretur ex decocto hordei, in quo paſſulæ & hyſſopus cocta ſint, & mel roſatum diſſolutum. Nares quoque intus oleo amygdal. dulcium inungantur. Poſt quartum diem vſque ad ſeptimum caput hoc vnguento illinatur:

E c

℞. Pulu.

Duram me-  
ningem mi-  
ſcitantia.

*℥. Pulu. rosar. rubrar. myrsil. nuc. cupressi, san-  
tal. rubr. albi, absinth. ladani, schœnanthi, asari, an.  
Drach. j. olei rosar. completi, myrtini, an. Vnc. iij. cere  
Vnc. ij. β. F. Vnguentum.*

Post septimum vel nonum dissoluentia siue discuti-  
entia applicentur, vt emplastrum de betonica, cerot.  
de gummi elemi, emplastrum sacrum, cum æquali por-  
tione diapalınæ. Vtile est & hoc Emplastrum:

*℥. Opopanac. Vnc. β. gummi hedera 3. vj. bdellij 3.  
β. resina Vnc. ij. ol. rosar. Vnc. iij. terebinth. Vnc. vj.  
ammoniacy Vnc. ij. cere q. s. F. a. Emplastrum.*

Linimentum extrahens sanem & materiam conten-  
tam sub cranio.

Vel *℥. Ol. lentisci, laurini, gummi elemi, resina pi-  
ni, an. Vnc. iij. succi saluia Vnc. ij. ammoniaci, opopanac.  
galbani an. Vnc. β.*

Dissoluantur gummi in aceto, postea bulliant  
in succo saluiz ad succi consumptionem, & refrige-  
rentur.

Si verò post septimum mala accidentia superueniāt,  
quæ sanem collectam indicent, tunc cranium ape-  
riendum, & producendum vt supra dictum. Videatur  
etiam infra post *caput seq. cap. 5.*

Facta etiam inter solutæ vnitatis in cranio differen-  
tias contusionis mentio. Verùm ad eam curandam ea-  
dem ferè medicamenta vsurpanda, quæ supra, *cap. 2. de*  
contusione capitis, proposuimus: quibus saltem hoc  
multiplici vsu probatum, è *59. Epist. à Scholtz. collect.*  
addimus.

*℥. Farina hordei, fabarum, an. Vnc. ij: pulu. betonica,  
chamameli, melilori, rosar. an. Drach. j. calami aromat. 3.  
β. oxymel 3. j. olei rosar. hyperici, an. 3. β. vini boni q. s.  
Misce. F. Cataplasma.*

*¶ [Guilh. Fabricius Centur. 2. obseru. 2. quendam  
Geneuensem ictu sclopeti in fronte cum insigni fractu-  
ra cranij vulnus accepisse refert, & Geneuæ curatum,  
globum tamen inuentum non fuisse, & semestree  
post sanationem incolumen vixisse. Cum verò mor-  
bo acuto tandem obiisset, cranium eius apertum, &  
globulum è regione verticis inter cranium & du-  
ram matrem ad suturæ rectæ latus inuentum fuisse,  
membranâ tamen planè à globulo illasâ.]*

Et Zacutus Lusitanus, *de Pr. Med. Adm. lib. 1.  
obseru. 5.* refert, Meretrici cuidam vulnus profundum  
per verticem capitis acuto cultello inflictum fuisse,  
somnia lentâ pluribus diebus sine sensu & motu reman-  
sisse, magno tamen labore euasisse, & domestica nego-  
tia iterum obiisse, neque vnquâ de animali actione læsa  
conquestam fuisse. Cum verò annis octo post febre ma-  
lignâ mortua esset, & cranium apertum fuisset, inter du-  
ram matrem & cranium, dimidium cultelli, quo fuerat  
vulnerata: ferrugine oblitum inuentum fuisse.]

## CAPVT XXIV.

*De Cranij Fractura cum meningum & cere-  
bri læsione.*

*Et primò*

*De Vulnere meningis dura saltē.*

*Vulnus dura  
meningis.*

**S**I vulnus tam altum sit, vt etiam simul dura meninx  
sit læsa, vulnus hoc id peculiare habet, vt sanguis  
copiosè effluat; cum plurima vasa per eam disseminē-  
tur, & dolor in parte membranosa valde vrgeat; ac pro-  
inde sanguis sistendus, & dolor leniendus. Et quia  
cum membranâ & cranium & cutis læsa sunt, quæ &  
cutis & cranij vulnus requirunt, peragenda, & vi-  
dendum, ne membrana ex sanie ab hisce partibus  
destillante lædatur; tandēque vulnus duræ matris  
sanandum.

Ideoque si sanguis copiosè fluat, os, nisi antea ex  
vulnere pateat, statim aperiendum, & membrana dete-

genda. Offe aperto statim imponendum aliquod medi-  
camentum sanguinem sistens; in primis illud celebre  
Galenī quo *5. m. cap. 4.* se ad sistendum sanguinem,  
etiam in vulnere capitis, & sanguine à durâ matre flue-  
te, feliciter vsu scribit: quod ex aloë, thure, & oui al-  
bumine: mollissimisque pilis leporis componitur.

Nonnulli tamen ante hoc medicamentum impo-  
nunt prius puluerem ex aloë, & manna thuris compo-  
siturum.

Ad dolorem leniendū, ne inflammatio & conuulsio  
excitetur, nihil commodius est oleo rosarum tepido,  
quod & leniendi & repellendi vim habet. Alij instil-  
lant sanguinem ex alâ turturis & columbæ recens ef-  
fusum: in quibus sanguinibus præter doloris miti-  
gationem etiam vis deterforia inesse deprehendi-  
tur; & illam curationem ad septimum diem con-  
tinuant.

Iohan. Andr. à Cruce ita in curando progreditur, Præ-  
missis vniuersalibus in secunda visitatione hoc medi-  
camentum imponit:

*℥. Olei terebinth. Vnc. j. spiritus vini, syr. de rosif  
sic. an. Vnc. j. Misce.*

Postea totum vulnus tali puluere replet:

*℥. Myrrh. aloës, mastich. sangu. dracon. rhabarb.  
corall. rubr. an. Drach. ij.*

F. Puluis subtilis, qui per pannum lineum rarum  
traiciatur; & imponatur emplastrum de betonica. Et  
quia hic autor oleo terebinthinæ spiritum vini miscet,  
possent etiam hic aquæ cephalicæ, *cap. præcedentis* de-  
scriptæ, locum habere, vt & vnguenta cephalica ibi-  
dem proposita.

Si autem corrumpi & purulenta euadere incipiat  
membrana, detergenda, ne putrescat, melle rosato, vel  
melle cum farina hordei, & succo apij. Ioh. Andr. à  
Cruce etiam lisdīs medicamento vtitur ad in-  
cipientem membranæ corruptionem; vt & Ægy-  
ptiaco vnguento initium sphaceli feliciter curasse se  
scribit.

Matthiolus oleum è vitellis ouorum ad membranas  
cerebri putrescentes cōmendat, & eas putrilagine con-  
fectas à sanis mirum in modum separare, idque se in  
quâ plurimis magno cum honore expertum esse, testa-  
tur. Ambros. Paræus, *lib. 9. cap. 2.* hoc Iohan. de Vigo  
proponit.

*℥. Aqua vita 3. iij. mell. rosar. 3. β.*

Quod si leniore isto remedio contumacius malum  
corrigi nequeat, hoc vtitur:

*℥. Aq. vita Vnc. ij. mell. rosar. 3. j. puluer. mer-  
cur. Drach. ij.*

Misce super ignem.

*℥. Aq. vita 3. j. β. syrup. absinth. mell. rosar. an. 3. ij.  
vnguent. Ægyptiac. 3. ij. β. sarcocolla, myrrha, aloës, an.  
3. j. vini albi boni Vnc. j.*

Bulliant leniter, & colentur.

Quod si putredinis tanta vis sit, vt istis remediis  
non cedat, Ægyptiaco cum aqua plantaginis, aceti lo-  
co, composito solo ad id profligandum vtitur, vel solo  
Mercurij puluere, vel cum alumine misto.

Quod si dolor non valde vrgeat, aut iam mitigatus  
sit, vt materia, quæ è vulnere segregatur, rectè conco-  
quatur, oleum hyperici, mastichinum, vel abietinum  
imponendum, vel cephalicum aliquod vnguentum.

Pure laudabili apparente olea omittenda, & ad de-  
tergendum syrupo vel melle rosato vtendum.

Tandē ipsam duram matrē quod attinet, vulnus qui-  
dē eius vnionem postulat, sed quia & dura est, & labia  
eius adduci nequeunt, vnio eius per carnis, vel substan-  
tiæ ei analogæ generationē procuranda, Archigenes in  
hunc vsu succum calaminthæ supra durâ matrem ef-  
fundit, & farinam milij inspergit, vt vulnus siccat, de-  
tergatur, & caro generetur. Habent & hic locum medi-  
camenta cephalica. Reliquis partibus vulneratis pul-  
ueres, vnguenta, & emplastra cephalica imponenda.

Pertinet



Dura me-  
ningis cru-  
ssa.

Pertinet huc & dura matris confusio. Nonnunquā enim membrana dura, vt crassior, contusa, & concreto sanguine reipera est. Et tum sanguis concretus abster- gendus est oxymelire s. *syrup. rosato, melle rosato, syrup. de absinthio, syrup. de marrubio*, quibus resina terebin- thina, aut abietina, vel sanguis colubinus immisceri queunt.

### De vulnere tenuis meningis, & cerebri.

Cerebri &  
tenuis me-  
ningis vul-  
nus.

Tandem si pia mater, seu tenuis membrana, cum ce- rebro cui arctissime annexa est, vulneretur; & san- guinis profusio, & inflammatio metuenda est, pro- pter innumera vasa, quæ per tenuem meningem disseminantur, & propter vtriusque membranae sen- sum exquisitum.

Quæ de causa etiam vulnera capitis valde pericu- losa sunt, si non solum cranium, & dura membrana, sed simul & tenuis, & cerebrum læsa sint: & quod vul- nus profundius penetrat, eo periculosius est. Cerebrum enim aëri expositum facile corrumpitur, & à sanie de- fluente læditur, ac putrescit. De quo Hippocrates, 6. aph. 18. *Vesica discissa, aut cerebro, aut corde, aut sepro transverso, aut aliquo ex tenuibus intestinis, aut ventriculo aut secore, lethale est.* Vbi, vt Galenus, in comment. mo- net lethale non mortem necessariò inferens significat, sed etiam periculosum.

An cerebri  
vulnera me-  
nia sint le-  
thalia.

Neque enim omnia vulnera cerebri necessariò mor- tem afferunt; sed ea solum, quæ profundiora sunt. Ac vt in aliis, ita etiam in capitis vulneribus sæpe quasi mi- racula fiunt, & qui planè desperati videbantur, præter spem conualescunt. Ideòque vulnerati sine auxilio nunquam relinquendi, nec deserendi. Vidit ipse Ga- lenus vulnera talia curari. 8. de usu part. 10. 6. aph. 18. Exempla quoque habentur apud Valleriolam, lib. 4. ob- seru. 10. lib. 5. obseru. 9. lib. 6. obseru. 4. Guil. Fabriciū, cent. 4. obseru. 1. 2. 3. Et longum catalogum Medico- rum, qui vulnera cerebri sanata viderunt, recen. et Ioh. Andr. à Cruce, de vulnerib. lib. 1. tract. 2. cap. 14. de cere- bro scissato. Imò obseruatum est, particulā cerebri amissa ægrum nihilominus conualuisse: cuius rei hi- storix variæ annotatæ à Medicis Anton. Musa Brassa- uola, comment. in Hipp. aph. 18. libr. 6. Nicolao Massa, lib. 1. epist. 11. Fallopio, de curand. vuln. c. 45. Francisco Arceo, de curand. vuln. lib. 1. c. 6. Iohan. Andr. à Cru- ce lib. 1. de vuln. et. tract. 2. cap. 14. Ambrosio Paræo, lib. 9. cap. 22. & aliis, quæ pleraque collegit Schen- ckius, lib. 1. obseru. 40. 42. Notatu etiam di- gnæ sunt hi- storix de periculosissimis cerebri vulneribus, quæ extāt apud Cabrolium, obseru. 16. 21. & 34. Henric. Petrum tom. 2. Dissputat. harmoniac. dissput. 16. quest. 10. Dum hæc scribo, offertur mihi & Chirurgus faber lignarius curandus, qui in ossē sinistro, ad futuram coronalem, se- curis ex alto proiectæ acie vulnus pollicis ferē longi- tudine in cerebrum penetrans acceperat, ita vt particu- la cranij effracta statim eximi posset, & cerebri portio nucis iuglandis ferē magnitudine propenderet. Con- ualuit tamen, cerebri illa portione extra propenden- te sensim abscedente. Et, quod mirum est, toto morbi decursu nec de dolore capitis, nec de vllō symptoma- te conquestus est, & ambulare sine vllō impedimento potuit. Ad vulnus curandum vsurpatum vnguentum Guilielmi Fabricij, quod infra describetur, cui & chirur- gus aliquid interdum pulueris cephalici admiscuit; & emplastrum de betonica.

An sine Co-  
rebro homo  
vivere possit.  
Historia  
Zacuti  
Lusitan.

[Zacutus Lusitanus, de prax. Med. Ad lib. obs. 4. scribit, quod decennis puer ense percussus fuerit in postica parte capitis, & vulnus satis magnum acceperit, cum læsione ossis, membranarum, & de- perditione substantiæ cerebri. Nam ex illo cerebrum quantitate nucis iuglandis exiuit. Additque quod hic puer post tres annos, confluentibus humoribus ad partem debilem, hydrocephalo correptus, &

Dan. Sennertus Tom. II.

mortuus fuerit, apertumque cranium sine cerebro in- uentum sit, & dura membrana duplicata fuerit.

Quæ historia mira modò vera sit. Ego de veritate eius non parum dubito. Neque video, quomodo ho- mo sine cerebro, membro tam nobili, & tam necessa- riis actionibus destinato, vel momento temporis vivere possit. Equidem aliquid de cerebri substantia exemptum fuisse, homine saluo, & alij obserua- runt, & ipse vidi, vt supra annotavi: Et Volcherus Coiter, in obseru. anat. & Chirurg. refert, cum qui- dam ab equo calce in capite iuxta coronalem fu- turam percussus, & grauissima symptomata pas- sus, & tandem mortuus esset, inuentum fuisse, postquam cranium apertum fuit, putredinem dimidiam cerebri partem in eo occupasse. Verum quod aliquis eò v. que vivere potuerit, donec tota cerebri substantia abumeretur, hætenus à nemine annotatum. Ego vel hæc historia falsa est, vel si vera est, non cerebrum erit officina spirituum animalium sed alijs eorum generationis locus inquirendus erit. Optatim, tempus, locum, & testes huius obseruationis, quæ magni momenti, adscripti fuis- sent.]

An etiam  
vera,

Curatione quod attinet, vt sanguis sistatur, medica- mentum ex Galeni 5. meth. c. 4. antea propositum, cui bolus Armenus addi potest vel aliud cōueniens, vsur- pandum. Et si quid cranij fractum, quod euelli queat, maturè extrahendum: si verò sine violentiā euelli ne- queat, naturæ totum negotium committendum, ne, si violentiā adhit eatur, æger in manibus Chirur- gicis moriatur atque ita ægro Medicus nihil proficiat, sibi verò infamiam pariat.

Curatio.

Hinc cauendum, ne sanies ex partibus cerebro incū- bentibus vulneratis in cerebrum descendens, illud, vt- pote frigidum & humidum, labefacteret, aliteret, & cor- rumperet, ideoque sanies illa quamprimum absumenda; & exsiccanda; ad quam rem calore & siccitate opus est, & proinde digestiua humida hic locum non habent, & omnia oleagina, vinctuosa, pingua, etsi potentia sicca sint, fugienda; cum cerebri corpus molle ab iis fa- cile corrumpatur; sed siccantia vsurpanda. Nonnulli quidem oleum alijetis, ol. terebinthinæ destillatum, balsamum Orientalem adhibere solent: sed ista propriè pingua non sunt.

Quapropter dum vulnus soluitur, aër cubiculi cali- dus sit, vel candelis circa ægrum accensis, aut simili mo- do alteretur, & linteola vino Cretico, vel alio poten- ti, in quo rosæ & betonica cocta sint, imponenda, aut sanguis columbæ calidus instillandus. In siccioribus etiam corporibus, & tempore hyemali, aquis vitæ su- pra descriptis vti licet. Alij succum nepethæ laudant: alij thuris purissimi puluere vtuntur, vique ad septi- mum, donec caro incipiat succrescere.

Hieron. Fabricius ab Aquapendente se in magno ce- rebri vulnere felicissimo successu hoc vsum scribit. lib. 2. Chirurg. c. 20.

℞. Farin. milij 3. B. olei Hispani 3. j. Mithridatij 3. vj. balsam. nigri, quod è Portugalia afferitur, Drach. iij. aq. vita 3. v. olei de calchamo 3. j. b. (quod ego tamen non fa- cile adderem) Misce.

Supra verò imponit hoc Emplastrum:

℞. Farina hordei 3. viij. pul. flor. chamemel. 3. iij. spi- ca, si bonam hab. an. 3. iij. betonic. stœchad. an. 3. B. olei ma- stich. lb. B. rosac. compler. 3. iij. oxymeli. simpl. 3. v. vini al- bi q. s. ad emplastrum formandum.

Oleum autem Hispanum, quod ad vulnera breuissi- mo tempore sananda valde commendatur, ita paratur: ℞. Olei vetustissimi 3. iij. terebinth. pure 3. ii. frumē- ti, id est, tritici integri Vncj. sem. hyperic. Vnc. ij. rad. cardui benedict. valerian. an. Vnc. j. thuris pulue- risat. Vnc. ij.

Rad. & herbæ crasso modo contundantur, & in vino immergantur, & per biduum macerentur. Hinc oleū &

E c 2

frumentum

frumentum adiciatur, & coquantur ad vini consumptionem, & colentur: Colaturæ addatur terebinth. & thus, & iterum parum ebulliant.

Iohan. Andr. à Cruce cum sindone rubra imponit oleum terebinth. cum melle rosato mistum. Reliquum vulneris replet tali medicamento:

℞. Myrrh. aloës mastich. sanguin. dracon. an. ʒ. ij. terebinth. ʒ. ij. spiritus vini ʒ. j. Misce.

Vel ℞. Terebinth. ag. consolida lota Vnc. ij. spiritus vini. syrupi rosacei, an Vnc. j. pulv. thuris, mastich. myrrhæ, an. Drach. ij. mumia ex cranio, sem. hyperic. sanguin. dracon. an. Drach. j. Misce.

His emplastrum de betonica, vel gummi elemi imposuit, totumque caput oleo rosaceo omphac. inunxit, superpositis splenis vino, in quo rosæ & betonic. cocta fuere, madidis Puellam quoque, quæ cuspide falcis vulnus in capite cū cerebri læsione acceperat, atque à cuius capite cranio aperto notabilis portio cerebri exierat, curauit ad diem vsque 14. solo oleo terebinth. & aq. vitæ, vel spiritu vini misti inde in vulnus guttatim instillauit istum liquorem:

℞. Vini ʒ. xx. succi betonic. ʒ. liij. calaminth. ʒ. ij. myrrhæ, thuris, aloës, sanguin. dracon. centaur. minor. granorum hyperici, an. ʒ. j.

Contusis contundendis infundantur per triduum vase clauso. Postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem, & addantur mellis rosacei Vnc. liij. iterumque parum ebulliant. Ab igne remotis addatur spiritus vini Vnc. j. Colentur: Colaturæ addantur ol. terebinth. Drach. liij.

Et in vase vitreo diligenter clauso vsui seruentur. Reliquum vulnus repleuit puluere cephalico, & emplastrum cephalicum imposuit.

Feliciter etiam ad vulnera cerebri sananda vsurpatur balsamum Orientale; cui & artificiale hoc substitui potest:

℞. Terebinth. clara lb. ij. resina pini ʒ. liij. thuris, myrrhæ, mastichæ, an. ʒ. j. gummi elemi ʒ. j. Destillantur s. a.

Quod si dolor & hic urgeat, oleum rosaceum cum vino miscendum, & imponendum. Extra verò, dum dolor molestus est, conuenientia fomenta imponenda; in primis emplastrum vel cataplasma de farina hordei.

#### Potiones Vulneraria in Capitis Vulneribus.

Potiones  
vulneraria  
in vulneri-  
bus capitis.

Potionum vulnerarum nonnullum vsus esse, in Insticut. lib. 5. par. 1. sect. 1. cap. 9. dictum, & docet id experientia. Non tamen eadem in omnibus partibus æquè conueniunt; sed secundum partium diueriam materiam variandæ sunt. In vulneribus capitis ergo, si cranium, vel cerebrum, aut eius membranæ vulneratæ sint eligendæ plantæ, quæ aliàs capiti conueniunt, vt betonica, primula veris, artemisia, lilium conuallium, caryophyllata, salvia, carduus benedictus, hypericum, nuxmoschata quibus plantago, veronica, & alia loco allegato enumerata addi possunt: quæ coquenda sunt in vino, vel, si vinum locum non habet, in vino & aqua, aut cereuisiâ: & sumitur plerumque pulueris ex plantis ʒ. β. vel paulò plus, & coquitur in vini vel cereuisiæ mens. i. ad tertiæ vel quartæ partis consumptionem. Et colatura, si libet, melle vel saccharo edulcoratur, & exhibetur manè & vespri Vnc. ij. vel paulò plus.

Vt ℞. Betonica, primul. veris, cardui benedicti, pyrolæ, consol. Sarracenica, artemisia rubra, sanicula an. ʒ. β.

Puluerisatis omnibus, ℞. tantum, quantum cochleari capi potest. Coquantur in vini vel cereuisiæ mens. i. ad partis tertiæ consumptionem; dulcorentur mellè vel saccharo, & vespri & manè ʒ. ij. propinentur.

Vel ℞. Plantag. rosar. rubrar. caryophyllat. hyperic. veronica, an. Vnc. β.

Coquantur in vino: Colaturæ addantur magisterij oculorum cancri Scr. ij.

Vel ℞. Artemisia rubra, betonica, primula veris, verberna, rad. caryophyllat. an Vnc. β. Coq. in mensura vini vna.

Vel ℞. Sanicula, artemis. betonic. veronica, an. ʒ. j. conseru. rosar. rubrar. Vnc. ij. caryophyllat. ʒ. β. tormen- till. ʒ. ij.

Coq. in aq. puræ, & vini Rhenani, an. lb. ij. vase clauso, in B. M. Colentur per manicam Hippocratis.

Vel ℞. Fol. aquilegia M. vj. consolida Sarracenica M. liij. beta M. liij. betonica. M. ij.

Omnia vitridia concindantur & contundantur, & in vase duplici clauso, nullo liquore addito, in balneo bulliente coquantur horis 4. Postea sponse sinantur refrigerari, & liquor percoletur: de quo manè & vespri ægro duo cochlearia exhibeantur.

Potionum loco quoque conseruæ exhiberi possunt, vel pulueres.

Vt ℞. Conseru. betonic. primul. veris, rosar. rubrar. an. ʒ. j. margarit. prapar. oculor. cancri. prapar. macis. an. ʒ. j.

Cum syrupo betonica Fiat Electuarium, de quo manè & vespri ʒ. β. detur.

Vel ℞. Nuc. mosch. ʒ. β. oculor. cancri prapar. ʒ. liij. F. Puluis. Detur Drach. j.

Vel Corall. rubr. prapar. margar. prapar. an. ʒ. j. spody ʒ. ij. oculor. cancri ʒ. j.

F. Puluis; cuius dosis Drach. j.

#### Dietæ.

Aër sit temperatus, ad calidum vergens, & nisi talis sit, arte pareatur; ita tamen, vt ignis longius ab ægro accendatur. Calidum enim vt est 5. aphor. f. 2. in vlcere pus mouet, & maximum securitatis præbet indicium, cutè emollit, extenuat, dolorem lenit, rigores, conuulsiones mitigat, capitis grauitatem soluit, ossibus fractis plurimum prodest, maxime si nudata, multoque magis, si in capite. Aër verò frigidus in vulneribus capitis, præsertim cum cranij fracturâ, & meningum læsione, vitandus. Frigus enim conuulsiones, tetanos, rigores ac horrores febriles affert: Hippocrates, 5. aph. 17. Proinde vulnus diligenter tegendum, aër cubiculi temperandus, & dum vulnus detegitur, calefaciendus. Imò, vt Ambros. Paræus, lib. 9. c. 13. testatur, multi ex vulneribus capitis sauciati frigore imprudenter admisso in discrimen vitæ adducti sunt.

Aër tamen nimis calidus, æquè ac frigidus, vulneribus capitis inimicus. Ideoq; etiâ plumis, lineamentibus, fasciis, pellibus, medicamentis calidis, aliisq; calorè augentibus caput non est onerandum, sed, vt Hippocrates, de offic. Medici, ait, fasciæ munda sint, lenes, molles, tenues, ne locus vulneratus oneretur, ne uè vaporum transpiratio prohibeatur, & calor augeatur. Imò si magnus æstus sit, qualis sub Cane, & tempore æstiuo, aër etiam refrigerandus, vt suprâ, c. 1. dictum. Aër quoque sit obscurior, non valde lucidus, qui spiritus commouet, & dolorem augeat.

Victus sit tenuior, ne vapores multi ad caput adscendant, & humores ad caput moueantur. Et si sanguinem humorèq; tenues ad partem vulneratam assiluros metus sit, cibus refrigerans, & sanguinem nonnihil incrassans, ac vasa constringens esse debet. Ideoque ægri primum panatellâ, vel prisanâ hordeacea sunt alendi. Non improbantur tamen etiam cichoracea, malua, lactuca, quæ & somnum conciliant, & vapores calidos caput petentes temperant ac incrassant.

In mensa vltima cydonia vtilia sunt. Nonnulli hæc cerebrum gallinarum commendant, vt quod ob substantiæ similitudinem cerebro vulnerato multum prodest. Scribit quidem Iohan. Andr. à Cruce, de vulner. lib. 1. tract. 2. cap. 6. se nunquam ob cerebri gallinarum exhibitionem cerebrum vulneratum sanitati restitutum videre potuisse; licet interdum ob tenuem victum, & medicamenta idonea id acciderit. Ad negandum tamè hoc

Dietæ  
vulneribus  
capitis.

Cerebri gal-  
linarum in  
vulneribus  
capitis vsu.

hoc non sufficit. Scribit contra Cardanus, gallinæ cerebrum & memoriam iuuare, adeoque, vt aliquos, qui delirare inceperint, resipiscere fecerit. Amygdalas dulces quidam etiam non exhibendas censent; quod caput grauent.

Vini potus ad diem 14. vsque planè intermittendus; cum caput petat, & vaporibus repleat, neruisque noceat: sed cereuisia tenui, & aq. hordei bibenda. Si sitis molesta est, iucus malorum granatorum utilis est. Feruorem enim bilis reprimat. Somnus sit moderatus. Interdum aeger non dormiat; quoniam caput somnus diuturnus replet; nisi noctu nō dormiuerit. Si tamē phlegmone cerebrum aut meninges inuaserit, etiam interdum, præsertim ab aurora ad meridiem, somnum inire suadet Ambros. Paræus, lib. 9. cap. 14. cum eā diei parte sanguis in corpore dominetur; qui cum per vigilias in habitum & superficiem corporis effundatur, somno contra intro ad partes corporis nobiles, cor & hepar reuocetur: si cum ortu Solis in habitum corporis effunditur, etiam vigiliarum motu magis magisque effunderetur, inflammatioque augetur. Si vigilie sint immoderate, somnus concilietur lenioribus medicamentis, vt *part. 2. c. 1.* dicetur. Decubitus sit in ea parte quæ minus dolet, donec pus sit genitum; postea in affecta parte aeger iaceat, vt pus effluat, nisi dolor prohibeat. Quies animi & corporis imperanda. Exercitij tamen loco lenes frictions in partibus inferioribus ante citū instituuntur. Oculorum acies non intendenda; & proinde, vt dictum, lumen intensum vitandum, & potius mediocres tenebræ eligendæ.

Vitandus quoque sonus & strepitus vehemens, vt tympanorum, tubarum, ferrarum, & similes. Comperit enim est & hunc quibusdam mortem attulisse, vt refert Guil. Fabricius, *cent. 1. obseru. 20.* Ager pauca loquatur, abstineat risu, clamore, & inprimis, sternutationem caueat: nihil duri etiam masticandum.

Animi symptomata, vehementiora præsertim, ira & metus, valde capite vulneratis noxia sunt, vt mortem quandoque afferant; sicut id obseruauit Guil. Fabricius, *cent. 1. obseru. 17.*

Nocentissima quoque est Venus, aded, vt quidam penè sanitati restituti ex vsu Veneris mortui sint. Exemplum annotauit idem Fabricius, *cent. 1. obseru. 84.*

Aluis singulis diebus reddatur, & nisi spontè officium faciat, arte mouenda, ne feces retentæ vapores ad caput mittant.

### Q V Æ S T I O I.

*An vulnera capitis per agglutinationem seu suturam, an verò per carnis generationem sananda sint?*

*An vulnera capitis sananda sint per suturam, an per carnis generationem.* Inter chirurgos agitur controuersia de curatione vulnerum capitis sine cranij fractura, an capitis cutis vulnerata per suturam & agglutinationem, vt loquuntur, an verò per carnis generationem curanda sit. Alij enim per agglutinationem curari volunt, eā de causā, ne caput ab externo aëre offendatur: alij verò vulnera capitis consui nolunt: 1. quia cutis capitis durior, & vt aliarum partium, non agglutinatur, 2. quod periculum imminet, ne fanies sub futura retineatur, & retenta pericranium & cranium corrumpat & dolorem, inflammationem, & alia mala excitet 3. quod metuendum sit, ne suendo pericranium lædatur. Ab externis verò aëris iniuriis, etiam sine futura, tegumentis caput defendi posse aiunt.

Verum enimuero quod ipsam suturam attrinet, dictū iam ante est, omittendā omnino esse, nisi necessitas summa id postulet, & ubi necessaria est, cauendum, ne pericranium simul lædatur. Et præstatissimi chirurgi ferè eam omittunt: potestq; alteratio capitis ab aëre frigido tegumentis caueri. Et si tota cutis incisa est, omnino me-

tuendum, pericranium simul læsum esse; quo vulnerato tutius est futuram omittere, quàm adhibere. Malè verò puto opponi futuram carnis generationi, atque curationem per agglutinationem & futuram pro eodem haberi. Etsi enim negandum non sit; cum experientia id testetur, etiam cutem capitis (quamuis tardius, cum crassior sit & siccior) conglutinari: tamen vix fieri posse puto, vt illa agglutinatio fiat sine omnis carnis generatione; præsertim cum longiore tempore ad cutis agglutinationem opus sit. Et licet tardè generetur: omnino tamen & conglutinationem cutis fieri necessarium est; cum non ex carne cutis, neque ex cute caro crescat, aut cutis per carnem conglutinetur; sed ex cute solum cutis generetur, & cutis per cutem seu cicatricem coalescat. Ideoque satis esse puto, si chirurgus de hoc primum sollicitus sit, vt necessaria medicamenta adhibeat, & vulneris labia per deligationem coniungat, reliquum naturæ committat. Nam vt simul aliquid carnis succrescat, ipse vix prohibere poterit; cum non sit possibile, vt sine omnis puris generatione & prouentu tale vulnus sanetur. Alteratur enim tum à telo, tum ab aëre externo, cruditateque quandā contrahit, quæ non nisi coctione, & puris aliquā generatione emendatur. Vnde in eius, quæ in pus vertitur, locum alia noua succrescat necesse est.

Vulnera frontis nonnulli etiam per suturam coniungi debere docēt, vt deformitas vitetur; idq; idē, quod primò statim futura sicca, vel per glutinum adhiberi nō possit; quapropter suendum censent vulnus, & secundo & tertio die suturam remouendam, & glutinum adhibendum putant. Verum hoc modo deformitas nō euiratur. Puncta enim semel facta cōspiciuntur; neque futura vsque ad vulneris consolidationem durat. Neque refert, etiamsi in prima deligatione futura sicca non adhibeatur. Sufficit, si in secunda id fiat.

*Vulnera frontis an sananda.*

### Q V Æ S T I O II.

*Quo in loco contrassura fiat.*

De contrassuræ loco non omnes idem scribere, supra dictum est. Nonnulli in eā sunt sententia, fieri hanc fracturam in aliā quidem ossis parte ab ea, quæ ictū excepit, in eodem tamen osse, nullo modo in opposita parte. Sententiæ huius est Paulus Aegineta, lib. 6. cap. 90. ubi aduersus Soranum disputat: cui assentiuntur Guido de Gauliaco, Vidus Vidijs, Gabriël Fallopius. Idq; ex vii futurarum probare conantur, quas inter alias causas ideo etiam datas volunt, vt, si parte aliqua cranium frangeretur, reliqua indemnis seruaretur, terminusq; lisionis esset futura ipsa. Ideoque etsi vitra & cucurbita exsiccata in parte opposita frangantur: in cranio tamen aliter rem habere statuunt. Vitrea enim vasa & cucurbitæ exsiccata vacuæ sunt; & agitato ex percussione in iis aëre, nec exitum inueniente; in aliā, vel opposita parte fit fractura: cranium verò vacuū non est. Vitra etiam & cucurbitæ continua corpora sunt; cranij verò partes inter se saltem contigunt, & futuris distinctæ.

*Contrassura quo in loco fiat.*

Alij verò, & quidem ipsa experientia edocti, in aliā cranij, quam quæ percussa est, parte; immò in opposita fracturam fieri posse statuunt. Dux horum proculdubio Hippocrates, qui, in *lib. de vulnerib. capitis*, scribit: Frangitur caluaria sub vulnere aliā parte, quàm ubi plaga est. Idem post Hippocratem Soranus, lib. 8. de affect. cap. 4. & Cornelius Celsus, lib. 8. cap. 4. Galenus, lib. 6. meth. med. cap. ultimo. Auicennas, quinta quarti tract. 3. Nicol. Florentinus, Iohan. de Vigo, Io. Andr. à Cruce, statuunt, qui omnes in aliā, quàm ubi plaga est, cranij parte fracturam fieri posse asserunt, & obseruauit. Ideoque ob rationes qualdā sensum dimittere nō licet, vt Aristoteles, 1. de generat. & corrupt. sect. 58. habet; & in morbis externis sensus omnibus rationi-



bus præferendus. Neque experientia hæc elidi potest, quod Amatus Lusitanus, *cent. 3. curat. 42.* & alij quidam asserunt, fieri posse, ut vnâ parte caluariæ læsâ, alia longè distans afficiatur, nõ quod os fissum sit, sed quod sub eo cerebri meningum, venula aliqua rupta sit, ex qua sanguis effluit, & sanies fit, ac putredo oritur. Experientia enim contrarium docet, obseruatumque, ut ex locis allegatis patet, non solum venas, sed ipsum craniũ in parte opposita, vel distanti ruptum fuisse. Et quamuis cranij ossa non continua sint, sed contigua saltem: tamen quod alijs corporibus accidit, & cranium accidere potest. Dum enim aer in cranium ex ictu commouetur, & per totam cranij substantiam ferrur, vbi in concursu cranij parti oppositæ alliditur, renitens frangit. Et sic sanè, quod etiam Galenus, *9. de usu partium cap. 17.* vult, ut hanc quoque futuræ utilitatē habeat, ne, si fractura accidat, ea nimis longè protrahatur, sed ad futuram terminetur: tamen nihil obstat, quin in oppositâ etiã aliâ parte fractura fieri possit, ob causam modò dictam. Fracturæ quidem ad proximum os continuationem prohibent futuræ: ut verò in alio osse fractura peculiaris fiat, prohibere non possunt. Nõ tamen necessarium est, ut quoque supra diximus, ut cõtrafractura semper fiat in parte oppositâ, sed satis est, si fiat in aliâ, quàm quæ percussa est.

## QVÆSTIO III.

*An cranium fissum statim & semper radendum sit?*

*Cranij fissi  
an semper  
radendi sit*

Celsus, *lib. 8. cap. 4.* quo de vulneribus capitis diligenter tractati antiquiores quidẽ Medicos in omni fissio fracturæ osse protinus ad ferramenta, quibus id exciderent, venisse scribit. Ipse verò melius esse putat antè emplastra experiri, quæ caluariæ causâ cõponuntur, eorũque aliquod ex aceto mollium per se supra fissum fracturũ; os imponere, deinde super id aliquando latius, quàm vulnus est, eodem medicamento illitum lintecolum, & præterea succidam lanam aceto tinctam imponere iubet, & hoc modo vsque ad diẽ quintum curare. Quod si caruncula increfcere cõeperit, & febricula aut soluta erit, aut leuior, & cupiditas cibi reuerterit, satisq; somni accedat, in eodem medicamento perseuerandũ esse censet. Hac enim ratione sæpe rimas callo quodam, qui veluti ossis cicatrix est, impleri scribit; qui callus aliquando melius sit velamentum cerebro, quàm caro, quæ ex scisso osse increfcit. Si verò sub prima curatione febris intenditur, breuèsq; somni, & iidem per insomnia tumultuosi sunt, vlcus inadet, neque alitur, & in cernicibus glandulæ oboriuntur, magni dolores sunt, tibi que semper fastidium increfcit: tum demum ad manum scalprũque veniendum censet.

Hieronym Fabricius ab Aquapendente verò, *lib. 2. chirurg. c. 17.* Celsi sententiam, quam etiã Petrus Pavus, in comment. in hunc locum, paradoxam appellat, improbat, ob sequentes rationes: 1. quia in vulneribus capitis quæ suâ naturâ admodum periculosa sunt, pessimum est, expectare praua symptomata, ac tum demum prouidere, cum forsitan occasio præterierit. 2. quia, si rima non deradatur, ut plurimum nigritiem contrahit, ob quã deinde ad os radendum cogimur. 3. quia cranium, etiam non læsum, si denudatum sit, deradendum est; ut rasurâ saniei collectio, quæ ad subiectam membranam destillare potest, & eam corrumpere, præcaueatur. Labia, quæ in osse incisa sunt, inæqualia & aspera læuiganda sunt, & rasurâ in exactam cognitionem profunditatis rimæ perueniendum.

Verum enim uerò Celsi, utpote viri in Chirurgia peritissimi, sententiam, præsertim vbi externa saltè lamina fissâ est, non planè reiiciendam puto. Etsi enim in iis regionibus, vbi periculosa sunt capitis vulnera, nemini

suaserim, ut rationem differat: tamen in nostris, & alijs regionibus, vbi minus periculosa sunt capitis vulnera, ex Celsi sententia curatione institui posse puto; cum certum sit, & experientia id testetur, natura, ut in alijs partibus, ita & in capite, sæpe ossa consolidare, sine omni rasura; quod vel fissuræ illæ, quæ longius procedunt, testantur, quas ad extremum vsque inuestigare, Galenus, *6. m. m. cap. 6.* & omnes Medici prohibent, quasque natura sine rasura sanat. Itaque hic vulneris conditio diligenter perpendenda. Si enim eius labra non sint aspera & inæqualia, & vulnus tale sit, ut non sit metuendum, graua symptomata superuentura: naturæ negotium committere, & pulueres cephalicos atque alia necessaria medicamenta adhibere licet, Et quamuis negari non possit, multos satis commodè viuere, quibus magna pars cranij dempta est: tamen quod Celsus habet negari non potest, melius & fortius velamen cerebro esse callũ, quin rimâ cõcrefcit, quàm carnem, quæ concrefcit, vbi os derasum est. Potest etiam sine ratione vulnus mundari. Si verò vulnus sit inæquale & asperum, aut ob graua symptomata imminetia malum metumimus, ad rasuram statim accedendum. Neque hic semper ad septimum vel octauum vsque diem naturæ negotium committendum, & grauiissima symptomata, expectanda sunt; sed quid sub primâ curatione, ut Celsus loquitur, & primis statim diebus fiat, attendendum. Facile enim ex signis à Celsi traditis cognosci potest, an morbus in peius vel melius vergat.

## QVÆSTIO IV.

*An dura meningi denudata siccantia, an verò humectantia medicamenta imponenda sint?*

Non eadem medicamenta membranæ duræ denudatæ chirurgos, vel olim, imposuisse, ex Galeno, *6. m. m. c. 6.* patet: sed aliquos blandissima, quæ hodiè digestiua vocantur; alios vehementer siccantia. Meges Sidorius, ut, *ibidem*, refert Galenus, vehementissimis siccantibus utebatur, ut & ciuis quidam ipsius, Eudemius vir satis exercitatus in hac artis parte, sic, ut emplastrum, quod Isin vocant, nudatæ membranæ imponerent, & super hanc foris oxymel. Emplastrum autem Isis cephalicum *lib. 5. de comp. medicamentorum sec. gener. c. 2.* describitur, paraturque ex cera 3. 100. terebinth. Drach. 200. squamma aris rubri, aruginis rasa, aristoloch. rotund. churis, salis Ammoniac. aris vsti, rad. dracuncul. ana, Drach. viij. aluminis vsti Drach. xij. olei veter. Vnc. x. Terenda terantur, adiecto aceto acerrimo, & ut conuenit, coquantur, quouique nõ inquinetur manus, & fiant pastilli, manibus aceto acerrimo intinctis, qui per decem dies in aceto acerrimo macerentur. Nullũ verò aliũ his vsum se vidisse scribit Galenus: hoc tamẽ testatur, magis sanatos fuisse eos, qui ab Eudemo illo curabantur, quàm ab alijs, qui blandis utebantur. Neque ea curandi ratio Galeno displicet, hanc ob causam, quod auditorius meatus, qui non solum vsque ad durâ cerebri membranam pertingit, sed etiã neruum attingit, qui in ipsum à cerebro descendit, etiam vehementissima medicamenta tolerat: qualia propterea etiã duræ membranæ, ut naturâ siccissimæ, conuenire possunt: atque ita Eudemi curationem approbare videtur Galenus. Eandem curandi rationem & Celsus obseruauit, qui perforatione peractâ duram matrem aceto acerrimo vult inspergi, ut, si cruor aliquis super ipsam sit concretus, discutiarur. Deinde vsurpat emplastrum viride, vel Iudæum, quæ valde siccant, & ab eo *lib. 5. cap. 19.* describuntur. Atque hæc curandi ratio petita videtur ab Hippocrate, qui, *lib. de vulnerib. capit.* iubet, ut exciso osse, & membranâ patefactâ, valde siccantibus & detergētib; ea purgetur, ne diutius

*An dura me-  
ningi siccan-  
tia an hu-  
mectantia  
imponenda.*

madens



madens sub aliis medicamentis hebes fiat, & putrescat.

Ex posterioribus verò Medicis sunt, qui membranam duram denudatam spiritum vini, seu aquam vitæ aliquam, præcipuè cum cephalicis, vel solam, vel cum melle rosaceo, aut terebintina, aut vnguentis cephalicis siccis mistam imponunt. Neque hic curandi modus per siccantiam rationibus destitui videtur. Primò enim vlcerum omnia exsiccatione indigent; anodyna verò & humida facile putredinem excitant. 2. Oleum est nervis inimicum. Meninx autem dura est nervosa substantia. 3. Frigida sunt nervis inimica; quale est oleum rosaceum, quod plerique adhibent.

Qui verò Romæ vivebant Medici tempore Galeni, contrariam rationem sequebantur, ac humectantibus, & præcipuè oleo rosaceo utebantur: alij columbæ sanguinem calidum supra membranam instillabant. Et de oleo rosaceo quidem scribit Galenus, 1. 1. de simpl. medic. facult. cap. 2. de sanguine columbæ se sexcentos novisse eorum, quibus Romæ perfuncti fuerint, capitis ossa, nec quidquam ab usu rosacei citra columbæ sanguinem offensos: statuitque, nihil melius inveniri posse, quam ut osse perforato optimo rosaceo utaris. Galeno adstipulatur Aetius, lib. 2. cap. 85. & Paulus Aegineta, lib. 6. c. 90. Sequuntur hanc curandi rationem & hodie plurimi, qui cum oleo rosaceo, tum digestiis medicamentis utuntur, scribuntque non dari aliquod medicamentum, quod ira nobis similis temperaturæ naturalem & innatum calorem foueat & corroboret, fluxiones inhibeat, intemperiem remoueat, causis dolorem patientibus resistat: & proinde cum præcipua cura Medici esse debeat, inflammationem prohibere; nihil verò magis ad inflammationem excitandam faciat, quam dolor, medicamenta dolorem sedantia, & præcipuè oleum rosaceum, semper esse necessaria. Præterea quia vulnus incrudescens non parum molestiæ exhibet; incrudescit autem siccis medicamentis: potiora putant humectantia & lenientia.

Sunt tandem, qui utramque curandi rationem probant, ac parum referre putant, utram sequamur.

Verum enim verò cum siccantia & humectantia medicamenta valde differant, & contrarios planè effectus edant, non parum refert, an his, an verò illis utaris. Itaque hac in re & vulneris, & corporis, & regionis conditio consideranda. Etenim si membrana sine inflammatione sit alba, illæsa, ac pura appareat, dolorque absit, medicamenta sicca cephalica uturpanda. Accidit verò sæpe hoc, ubi à telo membrana detecta est: quæ si mollis, illæsa, alba, & pura appareat, mel rosatum, vel solum, vel cum siccare aliquo mistum adhiberi potest. Scribitque Iohannes Andreas à Cruce, se longo experimento compertum habere, in athletis & exercitatis corporibus mel rosatum cum guttis iiii. aquæ vitæ immo vulneri, seu membrana detectæ feliciter cum sindone imponi, & residuum vulnus pulvere vel vnguento cephalico repleri. Neque omnino aquæ vitæ illæ in tali vulnere planè reiiciendæ videntur; cum nervosis partibus amica sint, à putredine præservent, & in omnibus vulneribus vlceribusque detergendis, siccandis, & ad bonum exitum perducendis; mirabilem vim habeant: id quod quadraginta annorum experienciâ se observasse scribit Valleriola, lib. 5. observ. 8. Si verò dolor & inflammatio metuantur, & membrana non planè illæsa sit; id quod plerumque accidit, cum artificis manu ac instrumentis cranium aperitur, & vel agitatione nimia, vel ossis eminentiâ, vel quocunque modo membrana læditur, & non rectè sese habet: commodissimum est oleum rosaceum omphacinum, quod ex immaturis oliis expressum est, & cum rosis non planè apertis paratur, quod & adstringendi vi aliquâ roborat, & temperatâ frigiditate inflammationes prohibet, & suppurationem, quæ in principio vulneris statim procuranda, citat. Cum enim inflammationem penitus euitare non possimus, initio-

rem eam fore docet Hippocrates, lib. de vlcerib. si quàm celerrimè vulnus suppurare fecerimus. Non tamen nimis diu, & ultra septimam, præter propter, quod sit tertio die, deligationem, (neque etiam certo dierum numero hoc definiri potest) in huius usu persistendum, ne putredo aliqua excitetur, & membrana tum à frequenti oleorum impositione, tum è puris longiore morâ hebes fiat; præsertim æstate, quo tempore citius pus generatur: hyeme autem ad septimum vlque diem nunquam medicamentis suppuratoriis utendum. Ideoque quamprimum pus bonum apparere incipit, oleo rosaceo mel rosaceum addendum, aut syrupus rosaceus, vel etiam oleum de vitellis ouorum. Hinc ad magis siccantia accedendum, & cranio pulveres cephalici inspergendi. Ad quam rem Mege Sidonius Iside solò utebatur in capicibus Periarum durissimis & robustissimis, & his, qui in Asia degebant. Itali non nisi duplo rosaceo adiecto uti audent. Neque verò siccantia eiusdem planè modi in omnibus corporibus usurparunt antiqui; sed in mollioribus corporibus utebantur emplastro, seu vnguento Iside, à Galeno descripto; quod fit ex vna parte emplastri Iside, & duabus partibus cerati rosacei: in mediocri tempe amecto; vnguento composito ex æquali horum portione. In robustissimis corporibus, qualia sunt nautarum, agricolarum, emplastrum Iside solum locum habere potest.

Eodem modo temperaturæ & corporis constitutionis ratio habenda est in lenioribus, & anodynis illis adhibendis. Etenim in corpore molliore & humidore, qualia puerorum, sufficit solum oleum rosaceum. Sin caput sit siccus, ut in adultis, & præcipuè crispis capillos habentibus, resina abietina admiscenda, vel oleum hyperici. Sin adhuc siccus, plus resinæ, quam olei rosarum sumendum. Ita & æstate utilius est oleum rosaceum, hyeme resina abietina.

Hodiè ferè utuntur vnguentis cephalicis, de gummi elemi, de betonic, de marti ylu. quæ ita pleraque sunt composita, aut aliorum admixtione ita facile temperari possunt, ut dolorem leniant, inflammationem prohibeant, putredinem arceant. Vbi maiore siccatione opus est, adhibent, vel admiscunt aquas vitæ supra propositas. Exempla talium curationum videantur in locis supra allegatis.

## QVÆSTIO V.

An Cranio fracto, cute verò integrâ manente, cutis secanda sit?

Est Pauli Aeginetæ, Celsi, & plerorumque Chirurgicorum opinio, si cranium fractum, cutis verò integra sit, cutem capitis secandam esse, ut fractura pateat & reliqua, quæ debent, commodè peragi possint. Refer tamē Vidus Vidius, in comment. in lib. Hippocr. de vulneribus caput, Iacobum Perusinum, Romæ Medicum & Chirurgum suo tempore celebrem, longo usu observasse eos magis servari, qui sine cutis incisione, partim lenientibus, partim siccantibus medicamentis curantur, quàm quibus cutis inciditur, & os aperitur; atque is longè aliam esse rationem cranij fracti denudati, quàm cute intacti docet. Etenim si cranium detectum sit, si absque sectione relinquatur, humor, qui supra membranam cerebri delapsus est, à calore, qui expirat, discuti non potest; quocirca putrescens hominem iugulat. Vbi verò cutis integra est, calor non expirat; ideoque saniem digerere, & ossa solidare potest; id quod in aliis etiam fracturis, quæ carne & cute teguntur, quotidie fieri videmus.

Verum sententia hæc absolutè vera non est. Facile quidem eam recipimus, si neque magna sanguinis copia sub cranium effusa sit, neque os fractum membranas pungat, neque cranium depressum cerebrum comprimat, ut supra dictum. Ut enim alia ossa fracta à natu-

An Cranio fracto cutis integra secanda sit.

Spiritus vini in vulneribus, seu videri, ubi quæ à putredine præservandis utilitas.

# 332 De fract.cran.cum mening.& cerebr. læsion.

ra consolidantur ita in cranio idem accidit; sicut manifestè in fracturis longius progredientibus euenit, quas ad extremum vsque inuestigare Galenus prohibet. Et si nec vasa nec cutis valde læsa sit, sanies illa exigua à natura facilè discutitur.

Verùm si sanguinis magna copia sub cranium effusa sit, & partium subditarum corruptio à pure metuatur, membrana ab osse fracto, vel depresso pungatur, aut comprimatur; id quod ex signis supra traditis, & symptomatibus grauibz superuenientibus apparet: cum natura ista vitia corrigere non possit, omnino cutis sectio, & cranij apertio necessaria est. Præterea cum cutis sectione neglecta nec fractura ossis, neque modus eius, neque terminus satis cognosci possit, cautus hinc sit Medicus, ne in aliquod periculum ægrum coniciat. Et sit, vt saniem per cutem exhaurire possit: ossicula tamen & squammæ in profundo hærentes non ita facilè extrahuntur.

## QVÆSTIO VI.

*An in cranij fractura, etiam internam laminam penetrante, semper cranium aperiendum sit?*

*An in cranij fractura cranium semper aperiendum sit.*

Communis est opinio, quam supra proposuimus, si cranij vtraque lamina fissa sit, cranij aperiendum esse, vt sanies, quæ colligitur, & deligatione non exprimitur, nec alio modo euacuari potest, exitus pateat. Sunt tamen nonnulli, qui contrarium sentiunt, & breuius ac tutius emplastris, ceratis, & aliis medicamentis extra apposis, quàm manuum & ferri operâ cranium hoc modo fractum curari posse putant; idè, quod 1. per medicamenta nihil ampliùs destruitur; quod sit manuum opera, sed quod fractum est statim reficitur, 2. quod cranij apertione sæpe inflammationes & alia symptomata accersuntur, 3. quod membranarum cerebri inflammationes solis medicamentis, non verò manuum operâ sanantur, 4. quod dantur medicamenta, quæ sagittas, pinas, & alia è corpore extrahunt, quorum sylua est apud Galenum, 6. de compos. med. sec. gen. Scribonium Largum, de compos. med. cap. 201. Celsum, lib. 5. cap. 2. quibus etiam sanies sub cranio contenta extrahi posse videtur. Et 5. tandem, quod ipsa experientia testatur, plurimos sola medicamentorum applicatione, sine manuum operâ, sanatos fuisse.

Verum enim verò eadem ferè huius quæstionis solutio est, quæ tertiæ. Etenim si certò constat, neque cranium de pressum esse, neque quicquam effractum, à quo cerebrum lædatur, & sanies tam paruum copiam esse, ac naturæ robur tantum, vt medicamentis adiuta saniem absorbere & dissipare possit; id quod ex symptomatibus apparet; apertione cranij opus non est. Verùm si sanies sit paulò copiosior, aut à cranio cerebrum, aut membrana eius lædantur, nullo modo omittenda sectio. Et cum semper satis certi esse non possimus, quanta sanies copia collecta sit sub cranio, & quantum naturæ robur sit; tutius ferè semper videtur, maturè cranium aperire, antequam symptomata graua superueniant, quæ postea apertionem difficiliorem & periculosiorem reddunt. Neque enim, si vtraque lamina rupta sit, per medicamenta semper sanies omnis discuti, neque membrana abstergi, & à corruptione seruari potest. Et quamuis in partibus carnis ad extrahendum aliena talia medicamenta adhibeantur; tamen quia id tardius præstant, & interea temporis inflammatio, & alia mala excitari possunt; his solis non fidendum. Inflammationum etiam membranarum cerebri sine vulnere & fractura cranij alia ratio est, quàm eius, quam hinc metuimus. Ibi enim humor adhuc in venis, & partium poris est: non verò extra partem incumbit; & propterea faciliùs à naturâ regi potest; hinc verò, extra partem incumbens, si putrescat, eam necessariò corrumpit. Neque etiam omnes à membra-

narum cerebri inflammationibus conualescunt. Et quamuis interdum in robustioribus naturis, in quibus sæpe in vulneribus quasi miracula fiunt, fracturæ tales sine cranij apertione curentur; tamen idem de aliis omnibus polliceri non licet.

## CAPVT XXV.

### De Fungis Cerebri.

**E** Membranis cerebri vulneratis interdum caro quæ, *Fungi cerebri.* dam mollis, & radice subnixa, instar fungi, pullulat; quæ idcirco etiam fungus appellatur. Vt enim per arborum cortices interdum humor quidam vitiosus exstillat, qui in fungum concrecit: ita si membrana cerebri lædatur, humor quidam exstillans in carnem mollem, quæ fungi instar est, mutatur, & breui tempore sæpe magnum incrementum sumit. Natura enim nunquam otiosa est, ac si humores affluentes, ob eorum ineptitudinem, vel etiam partis debilitatem, in eius alimentum vertere non possit, in eam, quam potest, naturam conuertit; quo modo etiam alibi in corpore verrucæ & similia generantur.

Subiectum, vt in *Epist. ad Guilelm. Fabric. cent. 1. obseru. 35.* scripsi, membranam esse puto, eamque non integram, sed vulneratam, seu contusam, ita vt humores affluentes ex eâ læsa exstillent, & in talem fungosam ac mollem substantiam conuertantur. Ideoque non solum in cerebro, sed etiam in aliis partibus membranosis contulis, tales fungi oriuntur.

Discernendos autem esse puto istos fungos, propriè ita dictos, à carne illâ vtili, quam natura prouida interdum ad cerebrum & membranas nudatas regendas ex vtili alimento, ex humoribus secundariis, quos vocant, generat, quamque nonnulli etiam fungum appellant. De quo procul dubio intelligendum est, quod Volcherus Coiter, in *obser. anat.* scribit, se in omnibus capitis vulneribus, quæ tum ipse curauit, tum à Fallopio, & Iulio Cesare Arantio curata vidit, animaduertisse, substantiam quandam fungosam, duram, & ita tenaciter partibus subiectis annexâ, vt spatula auferri nequiebat, suppullulasse. Fungos enim propriè dictos, qui plerumque lethales sunt, in capitis vulneribus ita frequenter nasci, credibile non est. Ista quoque caro non ita subito generatur, nec valde extuberat. Fungi verò propriè dicti ex humoribus vitiosis affluentibus, instar fungorum, citissimè generantur, vt sæpe vno die magnitudine oui gallinacei excrescant; & licet aliqua pars dematur, paulò post maior repullulat.

### Symptomata & Signa.

Visu facilè huiusmodi vitium cognoscitur. Ex contusâ enim, seu vulneratâ membranâ cerebri breui temporis spatio fungosa pallida caro subito excrescit & pullulat, vt sæpe etiam supra cranium & cutem emineat.

### Prognosticum.

Fungi hi periculosi sunt, & plerumque lethales; cum ab humorum vitiosorum ad cerebrum affluxu proueniant, & tandem putrescentes gangrænam attrahant.

### Indicationes.

Cum ab humorum vitiosorum ad cerebrum affluxu gignentur fungi; humores illi è corpore euacuandi, & à capite reuellendi sunt. Ipse verò fungus siccantibus & exedentibus medicamentis absorbendus: acriora tamen hinc vitanda. Excisio verò, quæ ferro fit, vt & quæ ligaturâ

ligaturâ, & filo serico, adeo tuta non est; cum graua symptomata superuenire soleant. Si tamen fungus nimium incrementum sumat, filo serico ad radicem ligandus arctius, vt decidat; reliquum medicamenti siccantibus absumendum. Si etiam durities aliqua, & malignitas adsit, quæ canceri naturam referat, tum lenioribus medicamenti non cedit fungus; acrioribus vero magis irritatur; & proinde nisi radicibus excindatur, vix tuto, citò, & sine dolore curari potest, vt sentit Guilhelm. Fabricius.

*Curatio.*

Qua ratione corpus vniuersum à vitiosis humoribus euacuari debeat, ex superioribus patet. Ad fungum vero exciccandum & absumendum inferuiunt sabina, hermodactyli combusti, rad. caryophyllat. angelicæ, aristoloch. rotundæ, irid. Florent. rosmarinus.

Ambrosius Paræus hoc puluere utitur:

*℞. Sabinæ ʒ. ii. ochra ʒ. i. f. Puluis.*

Guilelm. Fabricius isto:

*℞. Rad. caryophyll. angelic. calami arom. an. Drach. ʒ. aristoloch. rotunda, iridis Florentin. ligni Guaiaci, an. Drach. ii. flor. salu. summ. maioran. flor. ros. marin. an. P. i. f. Puluis subtilissimus.*

Deinde hoc Emplastrum imponit:

*℞. Emplastri de beronic. Vnc. iiii. gum. elemi dissol. in ol. ros. Vnc. i. pulu. rosar. myrrill. mastiches, calami arom. an. Drach. i. ʒ. Cum s. q. olei rosarum. M.*

Videatur Paræus, lib. 9. c. 19. Guilhelm. Fabricius, cent. 1. obs. 14. 15. cent. 2. obseru. 35. 36.

## CAPVT XXVI.

*De Carie Cranij.*

*Cranij caries.*

Continui solutio in ossibus, quam erosio ab humoribus acerbis gignit, caries appellatur. Ea quandoque etiam cranio accidit; cum scilicet per vulnera aut vlcera sanies defluens ossis substantiam corrumpit. In quo humore interdum est peculiaris proprietas, quæ ossi aduersatur, vt obseruatum sit, cranium corruptum & cariosum euasisse, cute capitis integrâ manente.

*Signa Diagnostica.*

Cognoscitur visu, & os nudatum à naturali colore in liuidum & nigrum mutatum est; actu quoque, specillo immisso, deprehenditur: cum scilicet inæquale & asperum quid occurrat, & specillum leuiter adactum, in ossis substantiam, tanquam lignum cariosum penetrat. Cariem ossis indicat etiam sanies liquidior, tenuior, & foetidior, quàm quæ à simplice carnis vlcere provenire possit. Caro insuper est laxa & mollis, vlcusque, sicne accidit, est rebelles, nec facile cicatricem contrahit.

*Prognosticum.*

Si caries non admodum magna sit, & medicamenta, vel ferrum cummodò adhiberi possit, malum incurabile non est.

*Curatio.*

Quicquid ossis corruptum est, à sano separandum. Fit hoc dupliciter: medicamenti, vel manus operâ. Si enim caries minus profunda sit, sufficiunt medicamenta, quæ insigniter exciccant; quo fit, vt glutine, quo cum osse sano cohærebat, absumpto abscedat, & separetur: vel natura roborata, & vitioso humore absumpto, spon-

te, quod corruptum est, separat. Inferuiunt huic vsui pulueres cephalici dicti, supra enumerati, quibus & alia exciccantia addi possunt. Ex iis sunt alia mitiora, alia fortiora.

Mitiora, in corporibus mollioribus, & si corruptio ossis non sit magna, vsurpanda, sunt, Radix ireos, aristolochia rotunda, pencedani, myrrha.

Fortiora, quæ in corporibus durioribus, & si corruptio maior sit, locum habent, sunt, rad. draconij, cortice pini, scoria aris; inter fortissima est, euphorbium, & virriolum.

Extmpli gratia:

*℞. Pulv. aloes, pumia, vsti, pompholyg. an. Drach. ii. rad. ireos Florentin. aristoloch. rotund. myrrha, an. Drach. i. ostrea combusta Drach. ʒ. f. Puluis subtilissimus, qui vel solus, vel melle rosato, & spiritu vini mistus applicetur, & hoc emplastrum apponatur:*

*℞. Cera noua, resina pini, gummi ammoniac. elemi, an. Drach. vi. terebinth. Vnc. iiii. pulu. mastiches, myrrha, aristolochia rotunda, ireos Florentin. aloes, opopanax. euphorb. an. Drach. i. olei rosacei q. s. f. Emplastrum.*

Vel imponatur emplastrum de betonica.

Quod si maior sit ossis corruptio, quàm vt medicamenti emendari possit, os radendum, donec integrum & album appareat, ac aliquid sanguinis exstillet; vel scalpro, aut alio instrumento cariolium excindendum: aut si corruptio maior sit, & maligna, vt nec ferro tolli possit, cauterio os adurendum. De quibus plura dicentur, vbi in genere de ossium carie curandâ tractabitur. Videatur interim Celsus, lib. 8. cap. 2. Ambros. Paræus, lib. 9. cap. 20. & lib. 18. cap. 26. 27. Hieron. Fabricius ab Aquapendente, lib. 3. c. 10. Chalmeteus, ench. Chirurg. cap. 8.

## CAPVT XXVII.

*De Tumoribus Cerebri:**Et primò**De cerebri & meningum eius inflammatione.*

Aboluimus hætenus tria morborum simplicium, quæ capiti accidere possunt, genera: supersunt quidam morbi compositi; tumores nimirum, in quibus intemperies cum materia coniungitur, cum magnitudine auctâ, & quandoque etiam cum vnitæ solutâ: quorum duo explicanda sunt, inflammatio scilicet, & hydrocephalon.

Et primò quidem inflammationem quod attinet, cum ad cerebrum & eius membranas plurima vasa sanguinem vehentia tendant, & per has partes disseminantur, si sanguis ex iis excidat, & in poros, & spatia partis effundatur, atque ibi corrumpi, & putrescere incipiat, inflammatio excitatur, quæ Græcis *apoplexia* nominatur, ἀπὸ τοῦ ἀπνῶν, quod ratio lædatur, & delirium ab hac inflammatione excitetur, vt infra, part. 2. cap. 7. dicitur: vbi etiam, quæst. 1. an cerebrum inflammari possit, explicabitur.

*Cerebri & meningum eius inflammatio.*

*Caussa.*

Caussa nimirum inflammationis cerebri est sanguis isque vel purus, vel pituitosus, vel biliosus. Vt autem sanguis ille p. n. ad cerebrum & membranas eius effundatur, faciunt quæcunque sanguinem nimis calefacere, & ad caput conuertere possunt, vt aëris feruor, quo cerebrum incalescit, humoresque feruidi è toto corpore sursum trahuntur, ictus & capitis vulnera, ac dolor inde sequens, vigilie diurnæ, ira, victus ratio calidior, ac imprimis vini meracioris potus, à quo sanguis accenditur, & ad caput mouetur, tandèque motus humorum symptomaticus in febribus.

*Caussa inflammationis in cerebro.*

Inprimis

In primis verò duobus modis cerebri & membranarum eius inflammatio generatur; vel febre præcedente, vel sine febre, ex cerebri & membranarum eius læsione, aut nimia calefactione.

Primò enim ut in febribus quibusdam continuis, sæpe malignis, materiæ febrem patientis pars aliqua à natura mox sub initium ad partem aliquam, ut pleuram, pulmones, fauces detrudi solet, unde pleuritis, peripneumonia, angina oritur: ita si eadem ad cerebrum, aut membranas eius detrudatur, inde inflammatio cerebri & membranarum eius excitatur; quæ febris propterea vulgò quidem symptomatrica appelletur, sed rectius à Platero comitata dicitur; cum febris ista non inflammationem cerebri, sed inflammatio cerebri febrem sequatur, & à febrili materia ortum habeat.

Deinde aliquando ex causis evidentibus, ut vulnere, percussione, contusione capitis, morà sub radiis solaribus, & similibus causis sanguis ad cerebrum, eiusque membranas concitatur, & confluit, ibique inflammationem excitat.

Pars affecta nunc est cerebrum secundum membranas eius: aliquando cerebrum ipsum. Etenim cum vasa, quæ sanguinem ad cerebrum deferunt, membranis cerebri inuestientibus inserantur, si sanguis eò effundatur, ipsæ inflammationem concipiunt, & sanguinis parte in cerebrum effusa ob vicinitatem ipsum quoque calorem concipit, & inflammatur. Et cum cerebrum ipsum etiam alatur, & ad spirituum animalium generationem arteriæ sanguinem aduehant, si sanguis conferim in eius substantiam & poros effundatur, ibi calorem p. n. concipit, putrescit, & inflammationem parit.

Vocatur quidem à nonnullis in dubium, an cerebri substantia inflammari possit: sed nihil obstat, quin id accidat; cum & illud sanguine nutriatur: de quo plura in Institut. lib. 2. part. 2. sect. 2. cap. 4. de phrenitide dicta sunt. Videatur etiam Petrus Salius Diuersus, de affectibus partium, cap. 1.

Sive autem cerebrum, siue membranæ eius inflammantur; & generationis ratio, & curandi modus idem est. Quamuis, si cerebrum inflammetur, cum maiori periculo coniunctus morbus sit; cum phlegmones magnitudinem gangrænae sequi soleat, de quâ interpretatur Galenus aphorismum 50. sect. 7. *Quibus cerebrum syderatum est, intra tres dies pereunt; si verò hos supervixerint, sani fiunt.* Et cum inflammatio cerebri plerumque in gangrænam abire soleat, inflammatio ista cerebri sub nomine sphaceli cerebri plerumque à Medicis proponitur; de quo etiam Hippocrates, 3. de morb. in initio, & 2. de morb.

Et si verò curandi ratio parum aut nihil variet, siue cerebrum, siue membranæ eius inflammantur: tamen symptomatibus non parum differunt; de quo mox in signis dicetur.

### Differentia.

Differt hæc inflammatio: I. ut dictum, ratione subiecti, quod nunc sunt membranæ solùm, nunc verò ipsum etiam cerebrum. II. ratione causæ, quæ nunc est sanguis purus, nunc sanguis cum multa bile mistus, vel etiam sanguis serosæ humiditatis, aut pituitæ aliquid participans. Et si verò sanguis & bilis aduri possint, ut in atriam bilem vergere incipiant, & tum etiam grauiora deliria excitentur: tamen cum bilis in atriam bilem iam abiit, potius mania, quàm phrenitis oritur, & vix atra bilis putrescere, ac febrem excitare potest, sicut id in cancro videmus.

Verum differentia hæc cum curationem non multum diuersam habeant, inflammationes cerebri & membranarum eius simul proponere volumus. Quia tamen signis & symptomatibus non parum discrepat inflammatio cerebri ab inflammatione mem-

branarum eius, signa utriusque seorsim proponemus.

### Signa Inflammationis Membranarum Cerebri.

Inflammatis cerebri membranæ adest febris continua, & delirium perpetuum, ac vigiliæ; quæ propterea signa inflammationis membranarum cerebri sunt pathognomonica. Primò febris acuta & continua semper coniuncta est: siquidem aliquando febris inflammationem procedit, aliquando, ob magnum cordis & cerebri consensum, statim inflammationem cerebri sequitur, quæ de tertio in tertium exacerbatur; ut etiam in pleuritide accidere solet, quod bilis ferè semper coniuncta sit. Et licet prior differentia inflammationis cerebri à febre ortum habeat: tamen rursus inflammatio capitis & cordis consensum augere potest. Deinde adest delirium perpetuum; sed id sensim, & paulatim inchoat, & inflammationis huius præludium esse solet: quoniam in incendio illo, spiritibus animalibus continuo agitati & impulsis, mentisque officinæ turbata, imaginatio & ratio suo munere, ut par est, fungi non possunt. Tertiò vigiliæ plerumque vrgent & molestæ sunt.

His accedunt & alia: sæpe ægri floccos & festucas legunt, ob turbatam spectris inanibus phantasiam. Dolor capitis & cervicis percipitur, quem successu temporis ægri non percipiunt; quoniam mens ægrotat: ægri ad iram proni sunt, strident dentibus, oculi rigent, accidunt tremores, & totum corpus inordinatis motibus concutitur: obliuiscuntur ægri meiore petita matula, vel linguam intra os retrahere, ubi exseruerint, memoriæ varietate spectrorum & imaginum à munere suo auocata. Pulsus est tardus & durus; respiratio magna & rara; quia spiritum etiam ægri ducere obliuiscuntur, & raritas magnitudine in illo febrili incendio suppletur. Æger sit *σπαρτητός*, id est, sitim etiam præsentem non sentit; quia mens læsa est. Facies & oculi rubent; attracto per calorem sanguine ad caput; oculi squalent, ob siccitatem cerebri; & viuidi amplius non sunt, quod spirituum animalium vigore destituuntur; & lumen refugiunt, quo spiritus agitati magis dissipantur. Apectus est cornus, ob conceptam animi ferocitatem; lacrymæ excernuntur acres, pauca oculorum angulis adherentes. Lingua aspera est, citrina vel nigra, vaporibus feruidis humiditatem linguæ absorbentibus, eiusque tunica corrumpentibus: sanguinis stilla sit è naribus, naturâ conante quod molestum est expellere, sed præ virium imbecillitate succumbente: quod si stilla nigra sit, lethale est; ob exustum in venis cerebri sanguinem. Interdum lacryma acris ex altero oculorum fluit ob dissolutionem humorum ab immodico calore, unde & lacrymæ siue sordes in oculis existunt. Urina supprimitur, quia sensus interiores laborant, & ægri neque pondus, neque actionem urinae percipiunt. Dum autem emittitur, alba plerumque est, & perspicua, quod bilis, quæ urinam tingere solet, ad caput rapitur. Imminentis quoque inflammationis cerebri signum ex urina haberi potest. Si enim circularis spuma in urina appareat, in morbo, qui in inflammationem cerebri abire potest, statum copiam significat, qui humores secum ad caput rapere, & inflammationem ibi parere possunt. Vbi verò iam urina, quæ antea erat valde tincta, vel etiam turbida, clarior & remissa colorata apparet, sine signis coctionis, & morbi diminutione; moueri humores ad caput, & iamiam instantis cerebri inflammationis indicium est; præcipue si vigiliæ infestare, & æger delirare incipiat. Ausus est adstrictior.

An autem inflammatio sit à sanguine puro vel bilioso, ex signis intemperierum capitis supra traditis cognoscendum. Hoc, saltem hinc addimus, si ex sanguine puro sit inflammatio, vel cum humore seroso aut pituitoso

An cerebri  
inflammati  
possit.

Membrana  
tum cerebri  
inflammatio  
tum signa.



tofo misto; deliria sunt mitiora, & cum risu: si vero à flaua bile; delirium est grauius, & cum iracundiâ & truculentiâ: quæ si aduratur, grauiissimum fit delirium.

### Signa Inflammationis Cerebri.

Cerebri in  
inflammatione  
signa.

Si verò sanguis confertim & subito in ipsum cerebrum effundatur, symptomata non parum variant. Febris quidem continua vtrique inflammationi communis est: reliqua tamen non parum differunt. Nam in inflammatione cerebri, primò quidem, cum sanguis per membranas affluit, ægrum apprehendit ingens capitis dolor, qui per occiput collo & vniuersæ spinæ communicatur. Hinc sensus omnes amittuntur, tum externi, tum interni. Et ægri nec dolorem, nec quicquam molestiæ percipiunt, nec delirant, & interrogari non respondent, & parum aut prorsus non loquuntur: quod non accidit in inflammatione membranarum cerebri, in qua adest delirium, dolor perseverat, & sensus non amittuntur, sed solum deprauantur, solusque motus in inflammatione cerebri remanet, qui adeo interdum validus est, ut vix loco contineri queant ægri, qui nonnunquam etiam in proprium corpus sæuiunt, & capillos sibi euellunt, vel vnguibus faciem dilaniant; quod procul dubio prouenit irritatâ naturâ, ab æstuante intra corpus maximo incendio. Facies in principio rubet, ut & oculi. Morbo verò procedente corpus languescit, & ad motum impotens redditur, ut decubitus raro mutent ægri, ac dormire quasi videantur; manus tamen sæpius mouent, quasi aliquid quærere vel apprehendere velint; manus etiam sunt tremulæ.

### Prognostica.

Inflammatio  
cerebri quot  
diebus ter-  
minatur.

1. Inflammatio cerebri & membranarum eius morbus est acutus & periculosissimus; quæ si sit acutissima, quale exemplum est 3. *Epidem. comm. 3. agrot. 4.* tertio die hominem iugulare potest. Plerique ita affecti intra septimum diem moriuntur; perpauci; hique rari, hunc superant. Galenus, ut, *loc. allegat.* testatur, acutâ à prima die statim phrenitide correptos, quarto & quinto die vidit exanimatos fuisse, tertio non vidit. Auicennas, *lib. 3. fen. 1. tract. 3.* vnicâ die phrenitide extinctos narrat. Prosper Alpinus, *lib. 1. de med. Egypt. cap. 13.* refert, in Ægypto se vidisse phreniticos mortuos tribus vel quatuor diebus. Nonnunquam tamen ad diem 23. & 24. & plures extenditur: mutatâ morbi naturâ ex acuto simpliciter in acutum ex decidentia; ut ex Hippocrate, *loc. allegat. 1. 84. & seqq.* videre est.

2. Longè tamen periculosius malum est, si ipsum cerebrum, quàm si membranæ tantum inflammentur. Cerebri enim inflammatio plerumque in gangrænam & sphacelum desinere solet; de quo Hippocrates, 7. *aphor. 50.* Quibus cerebrum sphacelo correptum est, intra dies tres moriuntur: si verò hos superant, sani fiunt: qui vero conualescunt, nec morbi, nec alterius rei ad morbum pertinentis recordantur.

3. Inflammatio cerebri & membranarum eius, quæ à puro sanguine est, minus periculosa est, quàm cum bilis simul mista est.

4. Quod functiones plures sunt læsæ, & grauiora sunt symptomata, eò malum periculosius est.

5. Lingua contremiscens hic malum. Significatur enim magna animalis facultatis imbecillitas, ex immoderata cerebri caliditate & siccitate.

6. In inflammatione membranarum cerebri alba deiectione mala; quia significat motum bilis ad caput. Galenus, 1. *prorrhet. com. 1. f. 12.*

7. Urina pellucida & alba, veluti aqua, in inflammatione cerebri, & membranarum eius, malum; quia morbum maxime crudum esse, bilemque omnem sursum

rapi ostendit. De quo Hippocrates, 4. *aphor. 72.* Quibus pellucida & alba sunt urina malum: maxime vero si in phreniticis appareant. Scribitque Galenus, in *commentar.* nullum se phreniticum seruatum vidisse, in quo talis apparuisset urina.

8. In inflammatione adhuc cruda rigor signum pessimum est; id est, si accidar rigor ille, materiâ biliosâ adhuc in corpore existente: quod ex eo cognoscitur, quod alba per alium deiciuntur. Est enim rigor ille symptomaticus, 1. *prorrhet. tom. 1. aphor. 13.*

9. Ut in aliis febribus acutis: ita in inflammatione cerebri, & membranarum eius, sanguinis è naribus stilla, mera, id est, nigra sincera, pessima est, exustionem scilicet sanguinis in cerebri venis significans, quem natura morbo succumbens frustra expellere nititur. Nam, ut Galenus addit, rubri sanguinis stilla in morbo exitiali haud vnquam visa est, sed nigri semper, 1. *Epid. comm. 3. agrot. 1.* Si verò copiosius sanguis fluat, indicio est, ægrum ex morbo conualiturum.

10. Si quis in tali morbo dentibus stridat, non confectus id facere à pueritia, futuri delirii indicium est: quod si verò iam deliret æger, & simul stridat dentibus, mors in propinquo est. Nam conuulsio significatur musculorum in temporibus & maxillis, 2. *prognost. 1. & 1. Epidem. com. 2. f. 53.*

11. In inflammationibus cerebri, in quibus tremulæ, Deliria in  
obscuræ, & contrestabiles desipientiæ sunt, ut Hippo- inflammatione  
crates, 1. *prorrhet. 33.* nominat, longè periculosiores sunt, quàm quæ sunt *de profundis*, & tumultuosæ, ob membranarum inflammationem, & ob simulatam mansuetudinem minimè contemnendæ; quod tam cerebrum ipsum, quàm membranæ ipsæ inflammatae sint. Non raro enim accidit, ut Galenus, in *comment.* ait, ut ægri tales quiescere iaceant, neque solum non tumultuose exclament, exsiliantque, ut antea, vel aliàs fieri videmus, sed neque prorsus loquantur, neque figuram decubitus permulent, ita ut familiaribus præbeat opinionem, quod mox sint dormituri; imò dormire putentur. quod neque loquantur, neque moueantur, & clausas etiam palpebras quidam habeant, & si quis accedens cum iis colloquatur, alij palpebras non aperiant, alij, postquam aperiant, statim claudant. Vnde Hippocrates obscuras desipientias appellat, quod non solum Idiotis, sed etiam Medicis cognitu sint difficiles. Galenus tales *opprimendos* & hæcticas appellat; quod ipsum cerebrum humorem acceperit, & quasi imbiberit.

12. Pessimum etiam signum est, si phrenitidi superueniat conuulsio; ut Galenus, 1. *meth. med. cap. 8.* testetur, se nullum vidisse, aut audiuisse vnquam, qui hoc modo affectus euaserit.

13. Qui in febre acuta, aut phrenitide (quæ omnis est vel inflammatio cerebri, vel membranarum eius) aut peripneumonia, aut capitis dolore manus ad faciem subinde ferunt, aut frustra venantur muscas, aut colligunt festucas, aut de veste pilos euellunt, aut de pariete festucas carpunt; id omne malum exitiale est. Affectus enim tanta vis significatur, ut mentis etiam sedem inuaserit, & perturbauerit, 1. *prognost. 1. text. 23.*

14. A peripneumonia inflammatio cerebri, malum. Nam materiæ à loco ignobiliore ad nobiliorem translatio significatur, ob morbi magnitudinem; & virium imbecillitatem, 7. *aphor. 12.*

15. Inflammationem cerebri & membranarum eius, & inde prouenientem phrenitidem iudicat sudor bonus; & præcipue si à capite multus & calidus fluxerit, sudante simul reliquo corpore. Contingit autem nonnunquam etiam per sanguinis è naribus fluxum eandem iudicari. Galenus, 3. *de crisib. cap. 3.* Nonnunquam & per alium ingens copia bilis post summum morbi vigorem à natura euacuatur.

16. Quæ verò ad suppurationem tendunt, omnes ferè sunt lethales; cum pus intra membranam & cranium euacuari non possit. Refert tamen Herculus Saxonia

ma, capite proprio, se vidisse seruatum, cui sanies erumpebat per os & aures: sed ipse hoc pro raro & tantum non pro miraculo habet. Ducit autem morbus ad interitum per virium resolutionem, tremorem, conuulsionem, vererum.

### Indicationes.

Cerebri inflammatio  
quomodo curanda.

Quæ in aliis inflammationibus dantur indicationes, et hæc locum habent: nimirum sanguis & humor, qui ad caput affluit, euacuandus, reuellendus, deriuandus, repellendus, intercipiendus: qui verò iam affluxit, & in capite hæret, vel sensibilibiter euacuandus, vel insensibilibiter discutiendus. Et si per attractionem ipsius capitis eò confluat, ob intemperiem capitis calidam, refrigeranda illa est; si ob dolorem, is mitigandus. Si verò per transmissionem eò feratur materia, siue à toto, siue à parte aliqua; ratio habenda cum mittentis, siue sit pars aliqua, siue totum corpus, & ea euacuanda, & alteranda; tum recipientis, hoc est, capitis, quod propterea roborandum, ne materiam affluentem admittat. Et cum febris semper coniungatur, totius corporis simul ratio habenda, & imprimis si à febre ortum habeat hæc inflammatio, curatio febris, ut decet, instituenda. Ipsa tandem intemperies capitis alteranda. Vires quoque corporis custodiendæ, alimento iusto modo & quantitate adhibito, & somno ac quiete conciliatæ.

### Curatio.

Quâ ratione autem istis indicationibus satisfieri possit, maximam partem ex iis, quæ suprà, cap. 8. de Intemp. cap. cum sanguine curandâ, dicta sunt, patet. Nimirum cum inflammatio cerebri sit morbus valde acutus, & breui tempore ita inualeſcat, ut curationem postea non admittat, subitum auxilium requirit; quale est venæ sectio, quæ sanguinem, inflammationis causam, euacuat, alio reuellit, deriuat, atque ita quod in inflammatione adhuc sit, prohibet; quod verò factum est, tollit.

Venæ sectio.

Quæ venæ  
aperienda.

Itaque si vires id ferant, præmissio leni clystere, sanguis mox detrahatur ex cephalica, aut si magna adsit sanguinis copia, ex hepatica vel mediana primum, & post aliquot horas è cephalica, quæ non solum reuellit, sed etiam deriuat, & è venis, per quas sanguis ad caput proximè fluit, euacuat. Si tamen ex mensium vel purgationis post partum, vel hæmorrhoidum suppressione malum originem habeat, saphena in pede aperienda. Quia tamen verò consentaneum est, iam aliquid in capite receptum esse, vel proximè in id moueri; nec cephalicæ sectio postea omittenda. Nisi enim sanguinis ad caput fluentis impetus sistatur, & ille, qui in venis, per quas ad caput defertur, fluctuat, deriuetur, sine fructu repellentia adhibentur; cum humores, dum vasa plena sunt, repellentibus non cedant. Et si verò nonnulli dubitant, an in inflammatione cerebri & membranarum eius præsertim à sanguine bilioso, sanguis mittendus sit: tamen causas dubitandi sufficientes non habent; cum certum sit, bilem sine sanguine inflammationem non parere, & non nisi sanguine commixtam ad cerebrum ascendere; idque imprimis verum est, si inflammatio cerebri per se, sine febre, incipiat. Et si verò quandoque accidat, ut natura errans, vel in augmento, vel in statu febrium biliosos & vitiosos humores à sanguine separare conetur, eoque ad caput mittat: tamen nec tunc id sine sanguine sit, & tunc vena, ut mox dicetur, aperienda.

Quando vena  
aperienda.

Aperiatur autem statim ab initio, quacumque etiam diei horâ; cum tutum non sit in inflammatione cerebri phlebotomiam ad tertium diem differre, donec tota materia influat, & in capite figatur. Si verò febris inflammationem aliquandiu præcesserit, nec ab inflammatione febris illa ortum habeat, & iam ratione febris sanguis missus sit, nihilominus repetenda venæ se-

ctio, & pro virium, quæ procul dubio febre iam debilitatæ sunt, ratione parcius sanguis mittendus. Si verò sanguis antea non sit multus, & vires constiterint, audacius sanguis emittendus. Itaque tunc cephalica mox aperiatur, vel, si vires id non ferant, vena in manu, aut, quod commodissimum est, saphena in pede vno, vel utroque; cuius venæ in talibus morbis apertio plurimum utilitatis affert. Cum verò delirium aut imminet, aut iam adsit, foramen non amplum fiat, ut vulnus citò coalescat: accurate quoque vulnus obligetur, ne ab ægro reuellatur. Quam ad rem linimentum vtile est ex aloë, albumine oui & pilis leporinis paratum.

Quantum  
sanguinis euacuandum.

Quantum sanguinis euacuandum sit, tum ex viribus ægri, tum ex humoris inflammationem parientis copia & conditione æstimatur. Minus enim educitur, si humor ad bilis naturam propius accedat, plus si ad sanguinis, & si sanguis sit copiosior, & inflammatio incipiens, nec ex alio morbo orta. Non tamen, ut Arabes quidam volunt, vsque ad deliquium animi sanguis emitti debet, ne vires collabantur, quæ per se ob vigilias, & iactationes perpetuas, mentemque turbatam imbecilliores sunt, & à victu paulò pleniore auxilium in hoc morbo expectare non possunt. Et tutius est, bis potius eodem die, vel bidui ipatio venam aperire, quàm semel copiosâ nimis euacuatione vires deicere.

Cucurbitula.

Si verò venam aperire non liceat, cucurbitulæ cum scarificatione iteratâ & profundâ applicentur primò partibus inferioribus, postea superioribus; nec omittatur alia reuulsionum genera, per frictiones crurum, cucurbitulas, etiam non scarificatas, cruribus applicatas, ubi sanguinis euacuatione ita non opus est. Nam si plenitudo adhuc adsit, scarificatio, ut dictum, simul adhibenda: quod imprimis faciendum, ubi ex suppressis mensibus, vel hæmorrhoidibus malum originem ducit. Vtile quoque fuerit, vesicatoria ex cantharidibus scapulis & brachiis apponere.

Clysterum vñs etiam post phlebotomiam conuenit; ac imprimis, si phlebotomia omissa sit, frequentius iniiciantur ex humectantibus & refrigerantibus parati; quibus præterquam, quod alius emollitur (ventris enim adstrictio hinc summo periculi cauenda est, ut quæ malum & causam eius auget & confirmat) humorum etiam acrimonia temperatur.

Vt ℞. Rad. althææ Vnc. i. fol. malu. violar. lactuc. parietar. beta. an. M. i. centaur. min. flor. nymphae an. p. i. prunor. Damascen. num. x. Coquantur in aqu. hordei simplic.

Colat. ℞. lb. i. adde elect. lenitiu. simpl. vel diacathol. cassia pro clysterib. an. Drach. vi. olei violar. Vnc. ii. syr. rosar. solut. Vnc. i. salu. Drach. β. F. Clyster.

Et quod clysteres præstant, idem commodè mitiora lenientia efficere possunt, quæ propterea commodè intro exhibentur; cum non solum primas vias euacuent, sed & feruorem humorum temperent ac refrigerent, qualia sunt syr. rosar. & violar. solut. cassia, tamarindi, diaprun. simplex, lenitiu.

An autem electiuè purgantia inter initia exhibere liceat, de eo inter Medicos non conuenit, ut postea, in questione prima, dicetur, quorum summa hæc est. Si inflammatio hæc febrem sequatur, & materia errabunda sit, ut pro turgente haberi possit, & magna sit cacochymia, ut sanguinem copiosius mittere non liceat; lenientibus antè enumeratis rhabarbarum vel etiam aliquid Trypheræ Persicæ elect. rosar. Mesue, de succo rosarum, aut aliquot grana diagrydij addere licet.

An electiuè  
purgantia  
inflammationi cerebri  
conueniant.

Vt ℞. Rhabarb. opt. ʒ. i. flor. cordial. an. P. j. cinamomi. spica, an. Scr. β. Infundantur in aq. endiuia.

Colaturæ ℞. Vnc. iij. In quibus dissolue elect. rosar. Mess. Drach. ii.

Iterum colentur. Adde pulpa tamarind. syr. rosar. solut. an. Vnc. β. Misce.

Si verò inflammatio sine febre ex vulnere, vel simili causâ

causâ inceperit, quamdiu febris abest, purgare licet: vbi vero febris accedit, à purgantibus abstinendum.

Videndum tamen hic, an maior sit sanguinis copia, an vero cacochymia. Cum enim in tali casu utroque auxilio sit opus, si sanguinis maior copia adsit, liberalius is euacuandus. Et tunc leniora purgantia exhibenda, sufficitque in tali inflammatione rhabarbarum. Si vero maior adsit cacochymia, & ideo sanguinem copiosius emittere non liceat, copiosius purgandum, & cum rhabarbaro, ut dictum, aliquid Trypherae Persicæ, vel elect. rosati Mesue, vel de succo rosarum addendum.

Repellentia  
in inflamma-  
tione cerebri.

Quamprimum autem vena aperta est, ad sanguinis motum in caput impediendum, & caput, ne nimis incallescatur, temperandum, vsurpanda repellentia; de quibus supra, cap. 1. §. 8. dictum est.

An tepida  
vel frigida  
sit adhiben-  
da.

An vero vel tepida, vel frigida sint adhibenda, morbi natura & tempus, ætas, & anni constitutio definient. Nam in inflammatione legitima incipiente, si æger sit iuuenis, & anni tempus calidum, refrigerantia actu frigida adhibeantur; imò Auicennas niue ea refrigerare iubet: si vero inflammatio sit notha, æger senex, tempus anni frigidum, tepida admoveantur. Ita Galenus, 2. de compos. med. 1. hyeme actu calida vel tepida; æstate frigida applicare iubet.

Si etiam æstus sit vehemens, & ipsum cerebrum inflammatum, actu frigida adhibeantur, & quoties incaluerunt, renouentur, & raso eâ parte capiti hæc topica imponantur; cum ut vis medicamenti melius penetret, tum ut capite onere capillorum leuato sumi facilius discutiantur. Non enim, quod Archigenes meruit, tam breui tempore detonsa capillorum leges ita largè fructificare potest, ut plus materiæ hæc ratione ad caput trahatur. Vbi autem capilli per se breues aut rariores sunt, etiam in tonso capiti rectè applicari ista medicamenta possunt.

Non quoque nimis diu horum vsus continuetur, sed circiter dies tres saltem. Aceti etiam portio minor sit, propter vigilias, quæ virgent.

Si vero, quod nonnunquam accidere solet, inflammatio ad cutem, & versus capitis partes exteriores vergere videatur, ne materia intrò, & ad cerebrum repulsa grauius malum inducat, à repellentibus, in primis fortioribus abstinendum.

Odoramenta quoque vtilia sunt, quæ cerebrum refrigerant; quæ supra, cap. 1. proposita ex flor. rosar. violar. nymph. aq. rosar. Nec omittantur lotiones crurum ex decoctis herbarum refrigerantium cephalicarum: sed quæ actu calidæ vsurpentur. Ita enim actuali caliditate reuellunt: potentiali autem frigidityte refrigerant, humores temperant; quibus aliquid florum chamæmeli & meliloti addi potest, ad aliquam discutionem.

Ut quoque impetus humoris ad caput fluentis intercipiatur, inter iactia fasciæ aquâ rosarum & aceto madidæ collo circumiiciendæ. Imò nec abs re fuerit, dosum vnguento rosaceo aut aceto, ad feruorem humorum in vasis temperandum, inungere.

Dum hæc peraguntur, & capiti extra applicantur, non omittenda interna medicamenta, quæ humores alterant, eorumque calorem remittunt, supra, cap. 1. proposita.

Et quia æstus non solum est in cerebro, sed in toto simul corpore, nonnulli epithemata ex refrigerantibus aquis, & aliis medicamentis cordi imponunt.

Quia etiam in hoc morbo vigilie pertinaces sunt, quæ morbum miris modis augent, vires deficiunt, coctionemque humorum, quæ in somno fit, impediunt, mox ab initio medicamenta somnum conciliantia, vel repellentibus miscenda, vel seorsim adhibenda, formâ epithematum, inunctionum, lotionum, odoramentorum. Pleraque tamen ex iis, quæ somnum conciliant, etiam repellendi, & calorem cerebri temperandi vim habent.

Dan. Sennerti Tom. I I.

Ut ℞. Fol. lactuca, salic. vitæ, an. M. ii. flor. nymph. violar. rosar. albar. an. M. j. chamæmel. M. ss. capir. papauer. albi cum sem. num. xv. Coq. in aq. f. q.

Decocto tepido spongia imbuatur, quæ capiti applicetur, atque eodem extrema abluantur; cum lotiones extremorum magnam ad somnum conciliandum vim habeant.

Vel ℞. Capir. papauer. alb. cum sem. n. vi. flor. nymph. lactucæ P. ii. sem. lactuca Drach. ii.

Contundantur minutim, & affundendo aqua anethi: Vnc. ss. rosar. lactuca, an. q. f.

Misceantur in formam pulvis, seu cataplasmatidis, & fronti imponantur.

Post lotiones inungatur frons & tempora tali Lini-mento:

℞. Olei violar. nymph. vnguenti populei, an. 3. iii. opij, ol. nuc. mosch. express. an. gr. iii. Misce.

Vel ℞. Fol. lactucæ M. ss. flor. rosar. M. ss. sem. papauer. alb. Vnc. ss. Coq. in aq. ad mollitiem. Contulis adde farina hordei, lactis mulieb. an. Vnc. ss. olei violacæ q. f.

Fiat Cataplasma ad frontem.

Si delirium & vigilie valde vrgeant, quomodo iis occurrendum sit, dicitur par. 2. cap. 1. Exhibeantur laudani opiat gr. ij. vel iij. In opiatorum tamen vsu Medicus cautus sit, & circumspectus, ne exhibeantur, si vires valde debiles sint, ne spiritus ac calor ab iis extinguantur.

Ut autem materia, quæ influxit, euacuetur, cum sensibiles, tum insensibiles euacuationes instituendæ. Sensibiliter euacuatur sanguis, qui influxit, venis in capite apertis; de quibus supra, cap. 8. dictum. Inter eas vero maxima cum utilitate aperiuntur venæ narium, & si villo modo morbus est sanabilis, hoc modo curari poterit, sanguisque satis copiose per eas emittendus. Idque satis mature, & statim post vniuersales euacuationes faciendum. Snadent quidem nonnulli etiam, ut venæ sub lingua aperiuntur; neque sine fructu id foret: verum in iis, qui mente non constant, id præstare non ita facile est. Possunt & hirudines post aures applicari, ut & cucurbitulæ cum scarificatione occipiti apponi.

Sanguinem & capite euacuanda. Vena narium aperienda.

Vena sub lingua an hic aperienda.

Quo tempore, & dum hæc fiunt, remittantur illa repellentia & refrigerantia, & quoad actualem, & quoad potentialem frigiditatem. Itaque in morbi progressu repellentibus aliquid discutientium addendum, secundum notissimam communem illam curandi inflammationes legem. Et primò quidem parum addatur de resoluventibus: quò vero morbus ad declinationem propius accedit, eò plus addatur. Et tandem in declinatione resoluentia sola vsurpentur, ut reliquæ humorum in cerebro discutiantur. Ideoque oleo rosaceo addatur ol. chamæmel vel anethin.

Discutientia.

Vel ℞. Flor. rosar. rubr. M. i. sum. anethi, flor. chamæmel. an. M. ss.

Coquantur, & loco fomenti adhibeantur.

Est & vtile tum vnguentum Alabastrinum.

Applicantur quoque futuræ coronali pulli columbarum, vel catuli per medium dissecti, vel pulmones agnorum calentes, quæ omnia efficaciter resoluunt, sine nouæ materiæ attractione, ut etiam supra, c. 8. dictum. Et quidem à lenioribus ad efficaciora sensim adscendum; nec fortiora primò adhibenda, ne tenuior pars humoris discutiatur, & crassa relinquatur, & graue aliquod delirium exciteretur.

Si vero ex hisce medicamentis parum commodi sequatur, consultissimum censet Ludouicus Mercatus, summo capiti cucurbitulas affigere, quibus per futuras aliquid extrahatur & euocetur; & si rabor ac tumor appareat, cutem scarificare: scribitque, hoc auxilio Medicum consequi posse, quod reliquis omnibus non valuerit; maximè si mox adhibeatur lauacrum

Cucurbitula an vertici affigenda.

Somnum  
conciliantia  
in inflamma-  
tione cerebri.

aq. dulcis; in quo aliquid ex discutientibus coctum sit. Monet tamen, hoc saltem in eâ inflammatione esse faciendum, quæ sine febre per se incipit: in febribus verò malignis & acutis id non tentandum esse, nisi multæ euacuationes præcesserint, ut nulla plenitudo, vel vitiosi humoris in corpore sit redundantia, sed materia solum in capite hæreat.

Interea verò, & toto morbi tempore, alterantia, quæ calorem in cerebro & toto corpore temperant, simulque vires conseruant, vsurpanda & continuanda; qualia supra; cap. i. proposita sunt; præcipue in ea inflammatione, quæ à febre continuâ, ut morbo primario, ortum habet.

Ut 2c. Conseru. rosar. violar. borragin. nymph. acetos. an. Vnc. i. spec. diamargar. frigid. Scrup. ii. fragmen-  
torum 5. lapid. pretiosor. an. gr. iii. sem. acetosa, por-  
tulac. an. Scrup. i. Cum Syrup. acetosif. citri, vel granat.  
F. Electuarium.

### Diatæ.

Diatæ.

Aër, in quo continetur æger, sit temperatè frigidus. Calidior enim morbum auget: nimis verò frigidus cun-tem densando, & insensibilem transpirationem prohibendo nocet. Æstate ergo, ubi calidus est nimis, refrigeretur iis modis, qui supra, c. i. sunt propositi.

Victus sit tenuis & refrigerans, ac quod morbus est acutior, eò sit victus tenuior. Conuenit autem, ut in aliis calidis & acutis morbis, præstant cremor. Olerar. ite, quæ refrigerandi vim habent, ut lactuca, endivia, & alia, supra, c. i. proposita. Non diu ieiunet æger. Cibus enim acrimoniam humorum demulcet. Cibusque paucus, sed sæpius offeratur. Potus sit aqua hordei, vel iulepus ex aqua fragorum sine vino, endivia, acetosa, violarum, iulepo. rosar. violar. vino granatorum, aut decoctum radic. acetosæ cum syrupo violarum. Nec inutilis est emulsio sem. quatuor frigid. maior. & papaueris albi. Vel coquantur sem. quatuor frigid. maior. nodulo inclusa in aqua, & colatura, vel sola, vel cum iulepo rosarum, vel violarum exhibeatur. In nostris regionibus commodus potus est cereuisia tenuis, quæ non multum lupuli habet. Vino omnino abstinendum in principio, ne malum exasperet, ut postea, quæst. 2. dicitur. Æger, quibus fieri potest modis, in quiete conuincatur; cum motus ille varius, & vires deiciat, & somnum impediatur. Somnus verò omnibus modis concilietur.

Cerebri spha-  
celum.

De spha-celo cerebri existat historia apud Amat. Lusitanum, cent. i. curat. 9.

### QVÆSTIO I.

An electiue purgantia in principio inflammationis cerebri, aut membranarum eius exhibenda sint?

An electiue  
purgantia in  
inflammatio-  
ne cerebri  
conueniant.

De hac re inter Medicos non conuenit, aliisque ea vsurpanda; alij verò ab iis abstinendum censent. Qui ab iis abstinendum putant, eâ ratione ducuntur; quod materia cruda sit, humorque vitiosus à bono nondum separatus; ideoque si agitur purgantibus, futurum existimant, ut citius, & maiore cum impetu ad caput affectum ruat.

Alij contra plus commodi sperant ex humorum euacuatione, quam damni ex agitatione. Quanquam enim negare non possint, humorem plerumque adhuc esse crudum; tamen eandem conditionem turgentis materiæ habere existimant, & errabundum caput petere; ideoque quamprimum purgandum esse, ne ad caput ruat, & malum tam periculosum generet: imprimis cum venæ sectione totus euacuari non possit.

Verum distinctione hic opus est, & perpendendum,

ut supra dictum, an inflammatio ortum habeat à febre, an febris ab inflammatione, ut morbo primario, proueniat. Si enim morbus primarius febris sit, atque ex humorum vitiosorum, qui per eam in venis agitantur, motu excitetur inflammatio, non immerito talis materia ad turgentem refertur; ideoque de consilio Hippocratis, 1. aph. 2. 2. per initia statim euacuanda est. Etenim errabunda est materia, & natura eâ liberari cupit, eamque propterea è venis expellere conatur; quod non facit in materia quieta, & non turgente. Et quanquam natura ad certam partem eam pellat: tamen tam immobilis non est materia, quin ductum medicamenti purgantis facile sequatur. Atque errabundam esse, & turgentem, vel ex eo patet, quod materia talis primò in hanc partem moueri videtur, mox ad aliam fertur. Vnde ex pleuritide fit nonnunquam angina, vel peripneumonia, ex peripneumonia phrenitis. Si verò materia iam fuerit in cerebrum recepta, & principium morbi præterierit, frustra adhibentur purgantia. Ad declinationem etiam, quod vult Massariæ, cum periculo differtur purgatio; cum hic morbus occidat vel in principio, vel in augmento, vel statu: si verò conualescat æger, ad periculum auertendum post statum purgatione amplius opus non sit. Alia verò longè est ratio inflammationis, quæ sine febre præcedente à cerebri vel membranarum eius læsione, aut ab effluencia sanguinis in capitis venis prouenit. Ibi enim omnino Hippocratis consilium, 2. de fract. 1. 20. & 22. sequendum, qui in talibus inflammationibus purgat quidem in principio, dum febris abest; si verò febris accedat, amplius non purgat. Non enim tum turgens est materia, qualis est, quæ per febrium initia ad partem aliquam ruit; neque morbi initium est ex venis totius, sed ex peculiari parte incipit.

### QVÆSTIO II.

An vini potus in inflammatione cerebri, & membranarum eius conueniat.

De hoc etiam Medici non consentiunt. Nonnulli à vino in hoc morbo omnino abstinendum esse, atque id tanquam venenum fugiendum censent; cum humorum ad caput motum adiunget, & delirium, quod coniunctum est, augeat. Alij verò vinum concedunt, si vigilie pertinaces sint, viresque concidant, utpote quod vires instaurat, vigilias temperat, & insaniam demulcet.

An vini po-  
tus in cerebri  
inflammatione conueniat.

Verum prior sententia vero magis consentanea est, ob rationes allegatas. Nam quod vigilias moderari, & animum demulcere dicitur vinum, hoc de melancholicis deliriis & vigiliis potius verum est, quam isto, quod ex humore calido, & inflammatione oritur, quæ vini vsu potius exasperantur. Ideoque in principio à vini vsu planè abstinendum. Postea verò, ubi morbus id admittit, viresque requirunt, in assuetis *δρις οφείον* saltem concedendum; præcipue iis, qui aliàs meraciore uti consueuerunt.

### CAPVT XXVIII.

#### De Hydrocephalo.

Aliquando serosus humor in capite tantâ copiâ colligitur, ut illud in tumorem attollat, qui affectus Græcis *ὕδρον κεφαλή* & Hippocrati, 2. de morb. *ὕδρον ἐν τῇ ἐγκεφάλῳ*, Latinis Hydrops capitis appellatur: magnitudo scilicet capitis aucta ab humore seroso. Auctor *Defin. Medic.* definit hydrocephalum, quod sit collectio humoris aquosi, vel cruenti, vel feculentis.

Hydrocephalon.



in parte aliqua corporum eorum, quæ caput constituunt. Ita enim legendum videtur, *ἡ δὲ ὕδρῳ ὑδατὶς*, ἢ *αἰματὸς ὕδρῳ*, ἢ *τροπυῶδες*. Nam sic etiam Aërius habet, qui procul dubio hunc locum in sua scripta transtulit.

### Causæ.

Hydrocephali  
causæ.

Causa huius morbi continens est humor serosus, quo nomine omnes humores, quos Medici inter causas hydrocephali ponunt, complectimur. Celsus solum ab aqua fieri; Auctor *definit. Med. vt & Aërius, retrab. 2. serm. cap. 1.* ab humore aquoso, vel cruento, vel feculento fieri scribit; vbi male Cornarius vertit, fieri ab humore lento; cum hoc saltem velit Aërius, tardè & lentè, non subitò hunc tumorem generari; non verò ab humore crasso, vel lento. Auicennas non solum ab aqua, sed & aliis humoribus fieri scribit. Nimirum ut serum, à quo hydrops in abdomine generatur, non semper est eiusdem modì, sed nunc simplici aquæ planè responderet, nunc feculentum est, & plus de hoc vel illo humore participat ita quoque se res habet in hydrocephalo, in quo aqua illa nunc pura & limpida est, nunc feculenta, nunc etiam cruenta, sanguine tenuiore, ex venarum orificiis apertis effluente, permisto.

Quo loco  
aqua in ca-  
pite colligitur.

Locum affectum quod attinet, non semper vno in capitis loco serosus ille humor colligitur, sed coaceruatur nunc inter cutem & pericranium, nunc inter pericranium & cranium, nunc inter cranium & cerebri membranas, nunc inter membranas & cerebrum: & tum, vbi scilicet aqua est intra cranium, futura cranij saepe dilatantur, ipsūque cranium, quod in infantibus adhuc molle est, distenditur. Verius, *de corp. hum. fabricio. l. br. 1. cap. 5.* aliam adhuc differentiam obseruauit in puella biennij Augustana, cuius caput in mensibus plus minus septem ita increuit, ut viri caput quoduis mole excederet, ob aquæ nouem libras in ipsius cerebri cavitare, & quidem dextro, sinistroque ventriculo collectas, quorum amplitudo & cavitates valde extentæ erant; cerebrum verò in capitis vertice, membrana quasi modo, tenue, & quodammodo continuum cum sua tenui membrana corpus caluaria quoque prorsus membranea erat; in reliquo capite nihil aquæ erat. Et, quod mirum, ad mortem vsque sensibus integris vsa est. Qualis historia etiam est apud Guilhelm. Fabricium, *Cent. 1. obseru. 12.*

Colligitur ista etiam aqua nunc in toto capite, nunc in parte aliqua præcipua; sicut in anteriore id obseruauit Epiphan. Ferdinandus, *hist. medic. 2. 1.* Quocumque autem in loco aqua contineatur, effunditur in eum, cum è venis, vel anastomosis, vel diapedesi patefactis effluit, idque, quod vel à reliquo corpore ad caput mittitur, vel, quod frequentius accidit, quia ibi sensim coaceruatur. Cuius rei causa est calor cerebri debilis, & cerebrum nimis refrigeratum & humectatum, quod alimentum rectè elaborare, vel ab inferioribus transmissos humores discutere nequit. Facit huc in primis sanguis, quo infans in vtero alitur; aquosus & serosus, quem mater vel ex nimio aquæ potu, vel ex vi fructuum, aliorumque ciborum, qui copiosum serum gignunt, cumulauit.

Hydrocephalus  
infantis  
frequentius  
obtingit.

Accidit autem malum hoc frequentius infantibus, quàm adultis; & quidè, vel in vtero, ut obseruauit Epiph. Ferdinandus, *hist. medic. 2. 1.* vel extra vterum, dum circa partum caput ab obstetricibus incautè comprimitur, vel, etiam sine errore obstetricis, natura serosum humorem multum in capite collectum ex venis pellit. Nonnunquam tamen & adultiores hoc morbo corripiuntur; sicut rei huius historiam habet Carolus Piso. *de morbis à collu. serosi humor. obseru. 1.* de quadam puella temperamenti calidi & sicci, (in quo serosi humores facilius colliguntur) quæ ex menstrua purgatione suppressa, & aquæ liberaliore potu hoc malum contraxerat; ut & alterum viri cuiusdam, *obseru. 2.* Guilhelm. Fabricius, etiam

Dan. Sennertii Tom. 1. 1.

iuuenis 18. annorum, hydrocephalo laborantis historiam annotauit, *cent. 3. obseru. 19.*

### Signa Diagnostica.

Signa dia-  
gnostica.

Facile visui hoc malum cognoscitur. Quo autem capitis loco serosus humor contineatur, ex signis discendum. Si extra cranium, & quidem inter cutem & pericranium, contineatur humor, tumor est euident, mollis, eiusdem vbique coloris, pellucidus plerumque, ut posita ex aduerso candelâ, vel ad radios Solis capite collocato, aqua conspici possit: tumor est doloris expers, in altum incuruatus, qui tactui cedit, & rursus assurgit, compressusque aquæ fluctuantis motum exhibet. Atque ista signa apparent, vbi per se incepit hic tumor: si ex contusione vel percussione prouenit, initio quidem rubet, & dolet tumor, postea verò concolor, & sine dolore euadit. Cum autem inter cranium & pericranium aqua contineatur, cætera quidem eodem modo sese habent, & figura ferè sunt eadem; nisi quod doloris aliquis sensus adest, propter pericranij distensionem, tumorque est durior.

Si verò inter cranium & cerebri membranas aqua contineatur, tumoris ad tactum mollis non est, nisi valida fiat compressio. Tum enim impulsus cedit; cum cranium infantum adhuc sit mollius, & maximè futuris dilataris. Dolor etiam in iis maior est, & totum caput tumidius, & frons ipsis extra proiecta est, ac intentis oculis vident, & frequentius lachrymantur, sensus ferè hebetantur, ac sopore afficiuntur.

### Prognostica.

1. Si aqua extra cranium contineatur, affectus curationem recipit. Neque tamen etiam tum periculo vacat; cum adsit magna intemperies, & ætas plerumque tenera sit, quæ neque morbum, neque remedium sustinere potest; præcipue si aqua sit copiosa. Tum enim lenia medicamenta parum iuuant, fortis ætas non fert. Si verò aqua intra cranium collecta sit, plerumque incurabile malum est. Nec tamen tum planè æger despondendus, sed exsiccantia medicamenta vsurpanda, & cauteria applicanda.

2. Si lethargus vel apoplexia accedat, mors in propinquo est.

### Indicationes.

Aqua, quæ in capite quocumque loco continetur, euacuanda, & ut in eo amplius non colligatur, præcauendum; quod sit, totum corpus, si opus est, euacuando, cerebrumque frigidum & humidum calefaciendo & siccando, & vitium, cuius ratione generatur & colligitur aqua, corrigendo.

### Curatio.

Euacuatur autè aqua è toto corpore hydragogis, sudores & vrinam mouentibus. E capite verò, vel insensibiliter, per medicamenta discutientia & exsiccantia; vel sensibiliter, vesicatoriis, cauteriis, cutis capitis sectione. Humor, qui paucus est, insensibiliter discuti potest; qui verò multus, sensibiliter educendus. Nihil tamen tum prohibet, quin cum euacuatione sensibili etiam discutienda & exsiccantia adhibeantur.

Aquam d  
capite ena-  
cuanis.

Vniuersalem corporis euacuationem quod attinet, infantibus vix turò hydragoga dantur; & alia remedia, quàm externa, vix iis commodè adhibentur. Si verò nutrix prauis humoribus scatet, corpus eius purgandum. Si tamen puer tam adultus est, ut sustinere medicamenta possit, exhibendum mel rosar. solutiu. vel succus irid. & iambuc. sed paucà quantitate, & cum syrupo rosar. solutiuo.

Vel ℥. Rad. ireos Drach. vi. sem. fenicul. anisi, coriand.  
an. Drach. β. passular. Vnc. β. Coqu. in aq. pura. In cola-  
turâ infunde mechoacan. agarici, an. Dra. ii.

Colaturæ adde mellis rosar. solutin. ꝑnc. ii. Detur cochlear.

Adultioribus pil. cochiae exhiberi possunt, vel succus  
iridis, vel gr. ii. elaterij cum pil. conuenientibus.

Per sudorem ferolum humorem euacuant decoctum  
ligni Guaiaci, sarsæ parill, sassafras, vel balneum Laconi-  
cum & sudatorium.

Per urinam euacuant decoctum betonicae, rad. feniculi, asparagi, sem. anisi, & alia.

Vniuersalibus euacuationibus præmissis, si opus est, prius tentanda insensibilis euacuatio, quæ tutior est, quàm sensibilis. Quia autem cutis densitas ad aquæ retentionem & collectionem non parum facit, primò cutis rarefacienda & mollienda decoctio maluæ, chamæmeli, meliloti, parietariæ. Hinc exsiccantia & discutientia vsurpanda; in quem finem vsurpari possunt, *oleum chamemel. anethin. rutaceum, laurinum, irinum.*

Cataplasma item ex farina fabarum, lupinorum, orobi,  
rad. iris, absinthio, ac melle.

Ceratum de betonica, Emplastrum ex stercore colum-  
bino, caprino, thapsiâ.

*Cochlearium*  
*in hydroce-*  
*phalo rufus.*

Auicennas vsurpat. cochleas, quas coquit in decocto  
artemisiae, stoechadis, calaminth. montan. vel cucum. asi-  
nini, vel ebuli, eaque ita coctas contundit, & calidè ca-  
piti raso applicat.

Amatus Lusitanus, *senz. i. cur.* 69. infantem hydrocephalo laborantem intra tres dies hoc medicamento se curasse scribit:

℞. Pulv. absinthij, chamamel. melilori, an. Vnc. ii. buty-  
ri recentis, olei chamamel. an. Vnc. iiij. cera parum, Fiar ad  
ignem vnguentum.

Idem & hoc, vt yfu comprobatur, laudat;

*℥. Mell. lb. β. salis Vnc. β. pulv. origani Vnc. iiii. Misce, & calidè caput inungatur. Exsiccat & thermæ sulphureæ, ubi earum est copia, si spongia in iis madescat, & capiti imponatur. In defectu verò coquantur in aqua sal, sulphur, & alumen, & eodem modo applicentur.*

Vel ℥. Sem. coriandr. anisi, an. Drach. ii. artemisia  
origani, pulegy, an. M. ss. sulphur. Vnc. ss.

Coquantur in lixivio. In colatura spongia madefiat,  
& calida capiti applicetur.

*Aqua calcis  
vina in hy-  
drocephalo.*

Hieron. Fabricius ab Aquapendente in pueris, qui infantiam exceſſerunt, in hydrocephalo maximo, ut remedium efficaciſſimum, laudat aquam calcis viuæ (abieſtâ calce) ſi eâ calidâ ſpongia imbuatur, & capiti imponatur; ac hoc ſolo remedio ſe hydrocephalum curafſe ſcribit.

Idem commendat spiritum vini primæ destillationis, cum parte quarta aquæ scabiosæ cum spongia impositum. Monet autem hîc spongiam nouam esse recipiendam, & arctè fasciâ capiti alligandam, ac, ne refrigeretur, calido linteo superposito moderate calefaciendam esse.

Vel ꝯl. *irini, rutae, chamemel. an. Vnc. iß. pulu. rad. iros, sulphur. an. Drach. ij. cera parum* Fiat Lini-  
mentum.

Vel ℥.Ol.Chamamel.vel rutac.Vnc.iiii.sulphuris ℥.i.  
M.F.Vnguentum,quod diu continuetur.

Potest & hic locum habere Balsamus sulphuris cum aliis mixtus.

Vel  $\mathcal{X}$ . *Emplastri cephal.* Vnc.ii. pulu. cumini  $\mathfrak{z}$ .i. ab-  
sintb. anesib. specier. aromat. rosar. ana  $\mathfrak{z}$ . $\beta$ . olei chamamel.  
parum. Misce. F. Emplastrum.

Vel 4- Farina fabar. lupinor. an. M.ii, sulphur, flani  
Vnn.iß.cumini Vnc ß.

Coquantur in suff. q. lixiuij non fortis, addantur olei  
aneth. vel rutac. Vnc. ii F. Cataplasma.

Carolus Pilo agrum illam puellam hoc modo

curavit: primo syrup. rosat. solutiū. cum diacatholico exhibuit; hinc sanguinem è talo detraxit, pilulas aggregatinas septimo quoque die exhibuit, caput verò fuit lixiuio cum herbis cephalicis, semine carthami, & agarico parato, atque imposuit cataplasma ex absinthio in vino cocto, & emplastro è cochleis supra proposito.

Quod si ex vasorum contusione non solum aquo-  
sus humor, sed & feculentus sanguis collectus sit, san-  
guinem primò incidere & attenuare, inde discutere &  
evacuare oportet.

Quod præstat spongia aut stappa poſcâ madida, in æſtate, vino verò cum aceto miſto in hyeme. Vtilis eſt & farina hordei cum oxymelite.

Si his remediis non cedat malum, ad sensibilem euacuationem accedendum. Celsus antequam ad sectionem accedit, prius sinapisimo rem tentandam suadet, dum, *lib. 4. c. 2.* scribit: In hydrocephalo tonderi ad curam necessarium est: deinde imponere sinapi, sive exulceret. Si id parum proficit, scalpello utendum est. Euacuant & cauteria aquam sensibilibiter. Ita Carolus Pifo virum illum curavit, cauterio occipiti imposto, quo aqua subuiridis quædam per multos dies euacuata est, ægerque inde conualuit.

Sectionem tandem quod artinet, si reliqua non pro-  
sint, in eâ, modò morbus sit curabilis, maxima salutis  
spes est. Paulus Aegineta, *lib. 6. c. 3.* si inter cutem & pe-  
ricranium aqua sit, vnam dissectionem per medium  
transuersam facere iubet: si verò inter pericranium  
& cranium, & tumor sit maior, duabus dissectionibus  
per medium sese mutuo secantibus vtitur. Si maxi-  
mus sit tumor, tribus vtitur, literam H. referentibus.  
Facienda autem est sectio in loco vbi maior est aquæ  
copia, & in loco decliui. Vitandi tamen sunt mu-  
sculi temporales. Aëtius, *tetrab. 2. serm. 2. cap. 1.* si  
paruus est tumor, apicem ipsius vnicâ sectione diui-  
dit; si verò magnus, duas aut tres, aut plures sectiones  
facit iuxta magnitudinis proportionem, in locis ad  
effluxum commodis. Vbi autem sub cranio hæserit hu-  
mor, tamdiu expectandum est, donec è capite per cra-  
nium redundet humor, futuræque distendantur, & tu-  
mor appareat.

Sectione peractâ aqua non semel, sed paulatim eua- *Aqua ex hy-*  
cuanda. Si enim confertim educatur, non minus pe- *drocephalo*  
riculo id vacat, quàm si hydropicorum aqua  $\alpha\theta,\omega\omega$ , eua- *educatio.*  
cuetur; cuius rei historia est apud Guilelm. Fabricium,  
*cent. 3. observ. 17.*

Hinc Hieron. Fabricius, cū sensibilem euacuatiō-  
nem propter infelicem, qui sæpe accidit, euentum perti-  
mescat, vtramque euacuationem instituit, & sensibilem,  
& insensibilem. Facit primò exiguum vulnus, cui im-  
mittit cannulam argenteam nonnihil incuruam, ex-  
actè vulneri respondentem, ita vt nihil humoris effluere  
possit, nisi cannula sit aperta. Hinc parum humoris  
emittit, & cannulam ligno stuppâ inuoluto obstruit,  
ac capiti medicamentum aliquod siccans & discuti-  
ens imponit, & ita sensum humorem tum sensibilibiter  
emittit, tum discutit. Euacuata aquâ vulnus debito mo-  
do, & vt aliàs fieri solet, ac de cutis capitis vulnere di-  
ctum est, conglutinandum & sanandum.

Tandem cerebrum refrigeratum & humectatum calefaciendum & siccandum. Verùm eàdem operâ id per medicamenta aquam exsiccantia & discutiientia expediti potest: possunt t̃que medicamenta calefacientia & siccantia etiam post aquæ assumptionem & euacuationem aliquandiu continuari, vt cerebro sua temperies restitatur. Hoc saltem attendendum, facilius in calefaciendo errorem, quàm in siccando committi posse.

Historia Hydrocephali etiam exstat in *Spicileg. Fr. Hildesheimij*, pag. 780.

*Inflatio Capitis.**Inflatio ca-  
pitis.*

Non tamen semper ab humore seroso caput intumescit, sed quandoque etiam flatûs admiscetur, sicut in hydropse tympanite, qui tumor ad *εμφορήματα*, de qui bus *lib. 5. part. 1. cap. 41.* dicitur, pertinent.

Curatu autem tumor hic est facilior; nisi illum causa antecedens foueat. Talisque forsân fuit tumor, qui ab Amato Lusitano intra triduum medicamentis flatûs discutientibus curatus fuit.



## LIBRI PRIMI

## P A R S II.

DE ACTIONIBVS CEREBRI LÆSIS,  
Sensuum Internorum scilicet, & Ratiocinationis; Motus item animalis symptomatibus, ac Excretorum & Retentorum in cerebro vitiis.

## Præfatio &amp; summa huius partis.



**A**BSOLVIMVS hætenus omnes cerebri, ut & partium, quæ cerebrum muniunt & regunt, morbos: proximum iam est, ut de symptomatibus, quæ homini cerebri ratione accidunt, dicamus. Etenim ex morbis his, & eorum causis, symptomata omnia, de quibus dicemus, originem habent, isque sublati evanescent. Nam cum ad actiones, quæ à cerebro, & in cerebro fiunt, cerebrum bene & naturaliter constitutum, ac dispositum, id est, suam temperiem, calorem innatum, & spiritus, & præterea structuram, ac naturalem conformationem, ac unitatem obtinens requiratur: si quid horum à naturali constitutione degenerat, actiones, quæ à cerebro, & in cerebro eduntur, lædi necesse est, & varia symptomata excitari.

Sunt autem illa symptomata duorum generum: Actiones læsæ, & Retentorum ac Excretorum à cerebro vitia. Symptomata enim qualitatum mutatarum hic vix ulla Medico occurrentia dantur. Et si enim à cerebro usu sumi Tabaci, ut & causis internis, macula aliqua contrahi possint, eaque in Anatome conspiciantur: tamen in vivis sensibus obvia non sunt.

Actiones cerebri, præter nutritionem privatam, quæ ipsi cum omnibus partibus est communis, duæ sunt: Una, quæ ab ipso fit, cerebroque propria est; Spiritus nimirum animalis generatio: altera, quæ in ipso perficitur; Sensus nimirum interni, & Ratiocinatio, Spiritus animalis generationem quod attinet, cum ille à cerebro, quatenus calido innato & propria temperie præditum, perficiatur, & vix alia, quam quæ supra de Intemperiebus Cerebri dicta sunt, hic dici possint: vitiis, quæ circa spiritus animalis generationem accidunt, de quibus etiam part. 1. cap. 5. dictum est, missis, saltem hic de Symptomatibus Sensuum internorum ac Ratiocinationis agemus: quibus coniungemus Motus animalis, qui quoque à cerebro provenit, vitia.

Et proinde hæc agendum erit,

1. De Symptomatibus, quæ in sensu communi accidunt, nimirum de vigiliis nimis, de Somno p. n. Cataphorâ, & Comate, de Insomniis p. n. immoderatis & grauibis,

2. De Imaginationis symptomatibus; ubi dicendum erit de Vertigine.

3. De Symptomatibus, in quibus Imago & Ratiocinatio læditur; siue imminuatur, siue depravatur.

Dan. Sennertii Tom. II.

uetur: cuiusmodi affectus sunt, Mentis imbecillitas & hebetudo, Tarditas ingenij, Stupiditas & Torpor mentis, Fatuitas, Stultitia & Amentia, (ubi simul de Memoria imminutâ & abolitâ, seu oblivione agatur) Temulentia, Delirium, *Παραφρεσίη*, Phrenitis, & Sabare Arabibus dicta affectio, Melancholia, Amor insanus, Melancholia errabunda, Arabibus Curubuth, Mania, Lycanthropia, Rabies; quod pertinet Insania canina, lupinâ, felina, Tarantari, Chorea S. Viti.

4. De Symptomatibus, in quibus plures sensus interni læduntur: qualia sunt Coma vigil. Typhomania, Sopor grauis, dæmoniacus, Sopor ecstasticus, Somnambulatio, Lethargus.

5. De motus animalis symptomatibus, & læsionibus, quales sunt, Lassitudo, Pandiculario, Inquietudo, Horror, Rigor, Tremor, & Motus impotentia, ac Paralysis, Convulsio, & Motus convulsiui.

6. Tandem de symptomatibus, in quibus sensus interni, & Ratiocinatio, & Motus, ac sensus externi simul læduntur, vel certè plures animalis facultatis actiones; qualia symptomata sunt, Incubus, Catoche, & Catalepsis, Stupor manente auditu, vel motu ecstasticus, Epilepsia, Carus, Apoplexia.

Quæ verò sensibus externis seorsim & privarim, sine superiorum facultatum læsione, accidunt symptomata, de iis parte sequenti tractabimus.

Tandem explicandum erit & alterum symptomatum genus in Excretis & retentis, ubi dicitur de Catarrho, & Excrementis cerebri p. n. retentis, & Sternutatione.

## CAPVT I.

## De Vigiliis nimis.

## Et primò

## In Genere.

**V**T ergo de symptomatibus, quæ sensui communi accidunt, primò agamus; affectiones sensus communis sunt Somnus & Vigiliæ: atque ita animalia, & inter ea homo, comparata sunt, ut per vices vigilent & dormiant. Et si enim ad actiones, quæ per vigiliæ fiunt, condita sunt: tamen quia spiritus animales, & consequenter etiam vitales, ac calor innatus per eas absumuntur, eorum instauratio, quæ in somno fit, necessaria est. Itaque homo sanus actiones suas per vigiliæ quidem obire; ubi verò spiritus aliquo modo absumpti sunt, se quieti dare, somnumque capere debet: id quod commodissimè fit horis duabus vel tribus post cœnam exactis. Quod ubi fit, corpus ad actiones per vigiliæ rursum obeundas redditur vegetius, alacrius, mens acuitur, & ad omnia peragenda habilior redditur homo; cum per somnum spiritus absumpti instaurentur, calor augeatur, cibi crudi, & humores concoquantur, corpus humectetur, & ita in sanitate conseruetur, atque ad senectutem traducatur.

Si verò modum somnus & vigiliæ excedant, malum, ut est 2. aphor. 3. Et ut Galenus, 2. de Sympt. diff. cap. 3. scribit: Duo egregia circa primum sensorium, quod omnium sensuum est commune adlunt symptomata; Sopor & Peruigilium.

Et primò quidem vigiliæ quod attinet, si de modum excedant, quando nimirum omnino homo non dormit per aliquot dies, vel non satis diu, scilicet non 7. vel 8. horarum, vel plurium spatio, pro naturæ constitutione, (Infantes enim diutius dormiunt, quàm senes) noxa corpori infertur. Cum enim in iis calor ad exteriora moueatur, sensusque sint in continuo exercitio, spiritus ac tenuior sanguinis pars absumitur,

*Vigiliarum  
nimiarum  
incommo-  
dum.*

carnes colliquantur, corpus, & præsertim cerebrum, siccat, unde plurima incommoda oriuntur. Spiritus enim animalibus abruptis, & cerebro exsiccat, spiritus obtunduntur, mens perturbatur: & cum consequenter etiam spiritus vitales, qui animalibus præbent materiam, absumuntur, imò ipsi etiam per se in vigiliis cum labore coniunctis imminuantur & dissipantur; languor totius corporis sequitur, naturalisque actiones, quæ, ut rectè perficiantur, spiritu & calore plurimo indigent, simul offendentur. Et si homo utatur alimento solido, aut copioso, corpus cruditatibus, & superfluis humoribus repletur, & ad cachexiam deducitur; si verò minore, & tenuiore victu utatur, ad tabem disponitur, senectutique acceleratur. Et quia spiritus ac humores, præcipue sanguis & bilis, per vigiliis incallescunt, & accenduntur, dolor capitis, oculorum rubedo, ventriculi roisiones, vertigo, febres, & deliria excitantur, variisque malis corpus obnoxium redditur. Ideoque etsi vigilie nimie in symptomatum numero sint, ac subtilis causis, à quibus pendent, tollantur: tamen si nimie sint, ita interdum vires deiciunt, & tot incommoda secum afferunt, ut Medici in iis temperandis, & inducendo somno, qui auxilium est in multis morbis, supra gemmas & lapides pretiosos æstimandum, ut quidam ait, opera necessaria sit.

Cum autem somnus & vigilie contrariis modo sese habeant, & somnus naturalis sit cessatio naturalis sensus communis & primi, ac sensuum externorum, salutis animalis gratia facta; Vigiliæ contra *ἐρέπνια* seu *ἄνοος* sensus communis, & externorum: vigilie immodicæ, & p. n. Græcis *ἀγρυπνία*, sunt sensus communis, & externorum, præter modum, ac tempus constitutum, solutio ac exercitium, & durans *ἐρέπνια*. Nihil enim in vigiliis, quæ in symptomatum numerum veniunt, p. n. est, quàm quod ultra debitum tempus extenduntur, & dum dormiendi tempus est, in officio & *ἐρέπνια* sensus persistunt. Quod tamen non de iis vigiliis intelligendum est, quando homines ex proposito, & de industria, negotij alicuius expediendi gratiâ, vigilias protrahunt, & somnum quasi arcent; sed iis, cum homo, qui dormire debet ac cupit, dormire non potest, sensuumque externorum actiones præter voluntatem persistunt, atque ita vigilie homini molestæ sunt.

#### Causæ.

Cum verò hæ vigilie somno naturali contrariæ sint, somnique naturalis defectus; contrarias somno naturali causas habebunt. Cum autem, ut in Institut. lib. 1. c. 14. dictum est, somni proxima causa sit spirituum animalium à cerebro in organa sensuum influentium in cerebro detentio & quies, ac quasi feratio: vigiliarum nimiarum causa proxima erit quies eorundem denegata, & continuus in organa sensuum externorum influxus.

Causæ verò mediatae variæ esse possunt. Auicennas, *fen. 1. 3. tract. 4. cap. 4.* ponit octo. 1. Intemperiem simplicem calidam vel siccam, vel intemperiem compositam, calidam & siccam, & quidem cum, vel sine materiâ. 2. Salsedinem seu nitrositatem humoris serosi, misti cum sanguine & salsa pituita, vellicantem cerebri membranas. 3. Dolorem. 4. Intentam cogitationem & curas. 5. Lucem nimiam & splendorem. 6. Apostema aliquod in partibus cerebri, aut cerebro propinquis, à quo eleuantur vapores sicci & mali. 7. Malam digestionem & repletionem, ex acerbis vel corruptis cibis, aut multo potu. 8. Febrem putridam, è qua vapores multi eleuantur: quas tamen ita ad methodum commodissime redigi posse putamus.

Vigilia p. n. accidunt, vel quia vapores illi, qui spiritus animales in statu s. n. sopiunt, aut, uti aliis placet, qui principia nervorum obstruunt, defunt; vel quia

spiritus in cerebro turbantur, agitantur, commouentur. Ob vaporum illorum, qui spiritus sopiunt, vel principia nervorum obstruere dicuntur, defectum, vigilie p. n. accidunt inedia nimia, aut cum cibi, qui assumuntur, nullam ferè talem exhalationem suauem præbent; aut quod vapores à causa calida vel sicca absumuntur. In senibus & decrepitis vigilie accidunt ob cerebri siccitatem, & imprimis ob defectum suauum exhalationum, prouenientem à debili & difficilli coctione, & contra vellicationem cerebri ab acerbis & salis humoribus ac vaporibus, & ut Præfici quidam loquuntur, humoris nitrositatem. Hinc vini potus senibus somnum conciliat, non tantum vi narcoticâ, sed & quod coctionem & distributionem ciborum adiuvat, & facit, ut vapores suaves ad cerebrum eleuentur. Contra refrigerantia & humectantia ad somnum conciliandum senibus non sunt utilia. Vide Langium, lib. 1. *epist. 26.*

Spiritus turbantur ac commouentur, & inquietiores redduntur variis modis: 1. ab intemperie cerebri calida vel sicca, vel calida & sicca, cum, vel sine materia. 2. ab externis sensuum obiectis vehementioribus, ut strepitu, somno, punctationibus. 3. in specie ab obiectis tactus vehementioribus dolorem patientibus, seu doloribus magnis, quacunque in parte. Quod pertinet eorum affectus, qui dispnciam in morbis pectoris, vel hydrope patiuntur. Hi enim vel dormire nequeunt, vel, si obdormiant, suffocationis periculum incidunt. 4. in animi affectibus nimis, ira, molestia, sollicitudine & curis, timore, gaudio, amore, insomniis grauioribus. 5. à vaporibus acerbis, in primis biliosis, & melancholicis.

#### Differentia.

Ut ita causæ omnes, quæ vigilias p. n. excitare, quæque curationem variare possunt, & hæc vigiliarum p. n. aliquot differentias constituunt, hæc sunt.

1. Vaporum spiritus animales sopientium, vel, ut alij loquuntur, principia nervorum obstruentium, defectus.
2. Cerebri intemperies calida, vel sicca: vel calida & sicca cum, vel sine materia, ut bile, pituita salia, humore melancholico, atrâ bile.
3. Dolor vehemens in quacunque corporis parte dispncæ, & omnino omnium sensuum externorum obiecta vehementia.
4. Vapores acres turbantes spiritus.
5. Animi affectus nimij: de quibus iam ordine dicemus; si prius, quæ in genere de vigiliis p. n. dicenda sunt, expediuerimus.

#### Signa Diagnostica.

Quâ ratione vigilie cognoscendæ sint, signis opus non est; cum ipsæ se se satis manifestent, & ægri de iis conquerantur. Et quamuis ægri id non referant: tamen, ut Galenus, 1. *prognost. 1. 8.* docet, vigilias longiores præcessisse cognoscitur ex eo, quod oculi apparent squalidi, licet nulla immodica euacuatio præcesserit, ægri palpebras difficulter attollunt, eæque instabiles sunt. Quâ ratione autem causæ cognoscendæ sint, postea in specie de singulis dicetur.

#### Prognostica.

1. Vigilia nimie non contemnendum malum sunt, quæ præter id, quod homini eam, quæ ipsi naturaliter ex somno debetur, refectionem subtrahunt, etiam, ut Galenus, 1. *prognost. 8.* & 12. *meth. med. c. 1.* & 5. docet, non minus vires exsoluunt, ac deiciunt, quàm sensibiles euacuationes. Vnde ab Hippocrate, 6. *Epid. comm. 4. 20.* vigilie edaces appellantur. Et quot incom

Vigilia nimia quid.

Vigiliarum nimiarum causa.

Differentia vigiliarum.

Vigiliarum nimiarum incommoda.



incommoda immodicæ vigiliæ homini afferant, antea, in initio huius capitis dictum.

2. Vigiliis, qui sunt ætate consistente, plus offenduntur, quam iuvenes. Galenus, 3. aph. 30.

3. Corpora vigiliis assueta minus læduntur. 2. aph. 50.

4. Quod maior caussarum, à quibus vigiliæ p.n. excitantur, vis est, eò periculosiores sunt vigiliæ: & quod facilius causæ tolli possunt, eò etiam minus periculi coniunctum habent vigiliæ. Atque ideo à causa interna periculosiores sunt vigiliæ, quam ab externa, & euidente.

5. A vigiliis conuulsio aut delirium malum, 7. aph. 18. Videatur Galenus, & alij commentatores in hunc aphorismum.

6. Si à vigiliis nimis proueniat tussis, malum. Siccitatem enim organis respirationis communicari significat.

7. Breue autem plerumque tempus est, quo siue ad salutem, siue ad mortem vigiliæ terminantur; cum vires diu sine somno consistere non possint. Et quidem via ad mortem est per virium dissolutionem; via verò ad salutem & sanitatem, per somni restitutionem.

Observatum tamen est, nonnullos satis diu sine vitæ dispendio vigilasse. Seneca, in libr. de provident. refert, Meccenatem tribus annis integris sine somno permanisse, & tandem ab hac ægitudine liberatum fuisse solâ placidâ & leni harmoniâ. Sicut & de eodem Plinius, lib. 7. natur. hist. cap. 51. narrat, quod ei triennio supremo nullo horæ momento contigerit somnus Fernelius. Patholog. lib. 9. c. 2. mente quendam captum menses 14. insomnes duxisse refert. Montuus, de morbis, lib. 1. cap. 27. scribit, se novisse mulierem, quæ per 35. annos insomnis permanfit sana, & citra noxam. Heurnius, de morb. capit. cap. 16. refert sibi in Italia narratum esse, Nizolium, illum Ciceronianum, decennium somnum non vidisse.

### Indicationes.

Vigiliis nimis quidem commodissime succurritur, si causæ, à quibus ex pendent, tollantur: quod quomodo fieri debeat, postea in specie dicetur. Verum cum causæ illæ sæpe statim, & breui tempore tolli non possint, ac interim vigiliæ vrgeant, & vires deiiciant, atque ob vigilias tum periclitetur æger: vigiliæ tunc curam ad se trahunt, & remedia postulant. Vigiliæ autem nimis somnum indicant, ut sibi contrarium, seu remedium somnum concilians.

Interim si etiâ causæ succurri possit, facilius somnus conciliabitur. Et quia plerumque vigiliæ nimis fiunt à vaporibus biliosis; bilis euacuanda, si morbi natura id admittat, & reperienda. Venæ sectioni verò hic nullus per se locus est; cum sanguis per se non inducat vigilias. Et si interdum, ubi vigiliæ vrgeant, venæ sectio requiritur, id non fit ob vigilias, sed ob adiunctum alium affectum. Vide Benedict. Victor. Fauentinum, tom. 1. cap. de vigiliis. Forestum, libr. 10. obseru. 36. in schol.

### Curatio.

Quia verò somnus conciliatur, cum spiritus animales ad sensus necessarij sopiuntur, ut quiescant, & in organa sensuum non influant; seu, ut alij volunt, cum meatus, per quos in organa sensuum spiritus animales influunt, clauduntur, & nullum obiectum vehementius in sensuum organa agit; (cum vnus saltem sensus excitatus vigilias excitare possit) quatuor modis somnus conciliari potest: Si primò remoueantur omnia, quæcunque sensum aliquem ad operandum excitare possunt, 2. Si ab externorum sensuum actione animus auocetur, & spiritus animales à motu ad quietē placidē inuitentur. 3. Si ea exhibeantur, quæ cali-

dos, siccos, & acres vapores temperant, & suaves vapores, ac *ararupudore*, in cerebrum mittunt, quibus id humectatur, & spiritus animales quasi sopiuntur; quæque vapores acres à cerebro auocant: ut frictions extremorum. 4. Si ea exhibeantur, quæ peculiari vi spiritus animales sopiunt, ac torpidos reddunt; quæ in specie *ararupudore*, & *vaporum* dicuntur. De quibus ordine dicendum.

Primò ergo danda opera, ut omnia obiecta, quæ sensum quemcunque excitare possunt, remoueantur: lux nimia, strepitus, & sonus vehementior omnis, odores item fortes, & imprimis quæ tactum afficiunt. Ideoque æger in molli lecto cubet, à quo absint culices & pulices, claudantur fenestæ, æger ipse oculos claudat, omnis strepitus & sonus vehementior absit, ac silentium adstantibus imperetur.

Secundò facultas ad vnum aliquem sensum blandè diuertatur, & ab aliis auocetur blando aliquo, non vehemēti obiecto, (cum vehemens obiectum potius excitet sensus, quam sopiat) ut spiritus à reliquis sensibus auocari blandè sopiantur, & quieti tradantur; id quod fit cantu suauis, & Musicâ vniformem sonum edente, autum cantillatione, susurratione submissè loquentium, strepitu aquæ ad modum riuus blandè fluentis, vel aquæ in peluim per gutturnium, vel filtrum, quod Chymicis dicitur, stillantis sonitu, motu in lecto pensili, scalpturâ cutis capitis leni, plantarumque pedum blandâ titillatione.

Tertiò somnum conciliant quæ suaves *ararupudore* ad caput mittunt, & calidos, siccos, atque acres vapores temperant, aut propter cognationem euocant; & tum maximè conueniunt, ubi à vaporibus calidis, siccis, & acris vigiliæ proueniunt. Quæ tamen ipsa pleraque peculiarem aliquam, sed leuem omnino spiritus animales sopiendi quasi vim habere credibile est. Cuiusmodi sunt: *sent. & fol. lactuc.* cuius frequens tempore vespertino comestio familiare antiquis erat ad somnum conciliandum remedium; *flores violar. nymph. rosar. sem. frigid. maiora, anethum, amygdal. dulc. nuclei Persicor. quibus & sem. papau. alb. addere licet.*

E quibus fiunt,

### Interna.

A Q V A, violar. nymph. lactuc. portulacæ, solani, rosar. hypnotica Dorncreitij.

#### EMULSIONES:

Vt ʒ. Amygdal. dulc. Vnc. β. sem. papau. alb. Dra. iiii. aq. rosar. Vnc. i. lactuc. Vnc. vi. Fiat s.a. Emulsio. Cui adde iulepi, vel syrup. violar. Vnc. i. Misce.

Vel ʒ. Sem. papau. alb. Vnc. β. lactuc. Drach. i. amygd. dulc. excori. num vii aq. lactuc. Vnc. iiii. nymph. violar. an. Vnc. ii. F.s.a. Emulsio, cui adde iulepi violar. rosar. an. Vnc. β.

Possunt etiam addi species diamarg. frigid. vel alia, pro morbi naturâ.

SYRUP, violarum nymph. papau. qui ad Vnc. i. & plus, post cœnam exhibetur.

CONSERVÆ; violar. nymph.

CONDITA; caules lactucæ Indica conditi.

POTIONES VEL IVLEPI.

Vt ʒ. Syrup. violar. Vnc. i. nymph. papau. an. Vnc. β. aq. lactuc. nymph. an. Vnc. iiii. rosar. Vnc. i. Misce pro 2. vel 3. dosibus.

Vel ʒ. Syrup. de papau. de nymph. an. Drach. vi. aq. lactuc. portulac. an. Vnc. iβ. specier. diamarg. frig. Scr. β. Misce.

Vel ʒ. Syr. papau. ʒ. j. β. aq. lactuc. ʒ. ij. vini albi ʒ. j. Misce.

Vel ʒ. Aq. violar. lactuc. an. Vnc. jβ. confect. alherm. D. β. spec. diamarg. frig. D. j. syr. de papau. de violis, an. ʒ. β. Misce pro haustu.

DECOSTA:

Vt ℥. Fol. lactuc. M. j. flor. violar. borrag. bugloss. nymph. an. M. B. passular. 3. B. Coq. in aq. f. Colaturæ ℥. lb. B. add. syrup. violar. Vnc. j. B. nymph. 3. j. Misce pro duabus dosibus.

Vel coq. in iure pulli, vel gallinæ, iij. vel iiij. capita papau. aut folia aliquot lactucæ. Iusculum hoc detur sub horam somni. Cum quo etiam hordeatum fieri potest.

ELECTVARIA; diacodium simpl. Vnc. j. exhibitum.

Vel ℥. Conseru. violar. rosar. nymph. caulium lactuc. cond. an. Vnc. B. Cum syrup. de papauer. F. Electuarium, de quo datur Vnc. B. vel Drach. vj.

Vel ℥. Conseru. nymph. Vnc. j. violar. syrup. papau. an. Vnc. B. Misce.

PVLVIS; ex semine papauer. & saccharo.

ROTULÆ, diacodium album, in forma solida, de quo 3. B. exhibetur.

Sunt autem ista omnia medicamenta exhibenda sub tempus somni.

#### Externa.

#### Externa.

Quæ fronti, temporibus, naribus, suturæ coronali, vel toti capiti, pedibus item, ac manibus applicantur.

LOTIO CAPITIS; fiat cum decocto fol. lactuc. & imponantur fol. lactucæ, quibus sæpe renouatis in febribus, ubi ne opiata quidem contulerunt, somnum se conciliasse scribit Nicol. Massa. Possunt & addi fol. nymph. solani, vitis, violar. & alia, quæ supra, part. 1. c. 1. sunt proposita.

EPITHEMATA; fiant ex earundem plantarum decoctis, iuncto lactuca, nymphæ, solani, lacte muliebri, emulsione sem. papau. alb. & lactuc.

Vt ℥. Sem. lactuc. 3. ij. papau. alb. 3. v. nucleor. Persicor. 3. ij. aq. lactuca, papau. an. Vnc. ij. B. anethi Vnc. j. F. Emulsio pro epithemate.

Vel ℥. Nucleor. Persicor. 3. B. sem. papau. albi 3. ij. aq. solani 3. iij. rosar. Vnc. j. F. Emulsio pro epithemate.

Nonnulli aq. anethi cum zedoaria puluerisata vtuntur, eamque temporibus apponunt.

Vel ℥. Mucilag. sem. psyllij aq. violar. extract. emuls. sem. papau. alb. an. Vnc. B. nucum ingland. nucl. Persic. an. 3. j. B. lap. alabastr. prepar. Drach. B. Misce.

Parari etiam possunt SACCULI ad tempora. E.g.

℥. Flor. violar. rosar. nymph. an. 3. ij.

Fiat Sacculi duo ex lindone rubra, qui conueniente liquore aliquo humectentur, & temporibus applicentur.

Vel ℥. Fol. lactuca P. iij. solani P. ij. sem. papau. albi 3. j. nucl. Persicor. num. x. flor. rosar. M. j. nymph. M. B.

Concidantur & indantur sacco, qui ebulliat in aqua, & expressus capiti imponatur.

#### CATAPLASMATA:

℥. Amygd. dulc. num. vj. nucleor. Persicor. num. v. sem. papau. albi 3. i. lactuc. Drach. ij. thuris 3. j. nuc. moschat. num. j.

Omnia contusa cum medulla panis albi, aq. rosar. & lacte muliebri subigantur, & misceantur. Vide Institut. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 39. in fine.

OLEA; ad inungendum frontem, tempora, & plantas pedum: Ol. violar. nymph. papau. alb. amygdal. dulc. anethinum, salicis, mandragora.

MEDULLA; crurum viruli, cerui.

VNGVENTA; populeum recens, somniferum Vnde variae illitiones & inunctiones fiunt.

℥. Ol. amygdal. dulc. 3. j. violar. nymph. papau. an. 3. vj. vnguent. populei 3. B. Misce.

ERRHINA. & quæ naribus admouentur, vel naribus attrahuntur, itque illinuntur; vt aqua destillat. rosar. lactuc. solani, nymph. lac muliebri, ol. papau. violar. nymph. Vel odoranda exhibentur ex flor. rosar. violar. nymphæ, papau.

Vt ℥. Papau. alb. cap. ij. flor. rosar. alb. violar. nymph. sem. coriandr. non preparat. 3. j. B. oculor. populi, santali citrin. an. Drach. j.

Conquassentur, & ligentur in nodulo, qui intoretur aq. rosar. & lactuc. & sapius naribus admoueat. Flores quoque ligustri odore somnum conciliant.

LOTIONES extremorum; cum decocto fol. lactuc. malua, violar. althæa, salicis, vitis, flor. nymph. sumit. aneth. flor. chamamel. quæ actu calida adhibeantur, vt facilius penetrent.

Vt ℥. fol. lactuc. salicis, violaria, malua, vitis, an. M. iij. flor. nymph. sumit. anethi, an. M. ij. capit. papau. albi cum sem. incisor. num. xij. vel xv.

Coq. pro lotionem pedum.

Vel ℥. Fol. malua, violar. lactuc. an. M. ij. flor. chamamel. M. j. sumit. anethi M. ij.

Incisa coquantur pro lotionem pedum.

Vel ℥. Flor. nymph. M. iij. rosar. alb. fol. vitis, violar. lactuca, sumit. anethi. an. M. j.

Coq. in aqua pro lotionem pedum.

PVLVINARIA quoque plantis viridibus, vt fol. lactuca, salicis, vitis, flor. nymph. violar. parare licet: quibus ob odorem suauem, & penetrationis gratiā, aliquid melissæ addere commodum est.

Quarto somnum conciliant, quæ spiritus animales torpidos reddunt, & sopiunt quasi. Quod (etiamsi calida sint) peculiari vi præstant, & idcirco *hypnotica*, aut potius *vapores* dicuntur: quem effectum hætenus malè nimia frigiditati attribuerunt. De quo *quest. 1.* dicitur.

*Narcotica & Hypnotica.*

#### Talia sunt.

Rad. Mandragor. hyoscyami.

Fol. Solani, hyoscyami, mandragora, tabaci.

Flor. Hyoscyami, papaueris, croci.

Sem. Papau. albi, nigri, hyoscyami, lolij.

Fruct. Mandragora.

Cortic. Papau. & mandragora.

Succ. Mandragora, hyoscyami, opium.

Gumm. Stryax. Neque refert, quod stryax aliàs inter calida medicamenta refertur. Est enim ipsi hoc cum opio commune. Interim experientia edocti stryacem ad somnifera medicamenta referunt, Dioscorides, lib. 1. cap. 69. & Galenus, 2. de compos. med. f. loca cap. 1. in fine.

E quibus leniora sunt sem. & cortic. papau. solanum, quod etiam referri possunt, (nisi quis in tertiam classem ea referre velit,) absinthium, sem. coriandr. crocum; fortiora, hyoscyamus, mandragora; fortissimum Opium, quod hætenus 4. gradu frigidum habitum est. Vnde autem reuera ea efficacia proueniat, dicitur *quest. 1.*

Ex his parantur varia medicamenta somnifera,

#### Interna.

#### AQVÆ DESTILLATÆ:

℥. Ally, opij. an. Vnc. ii. aq. solani, lb. j.

Destillantur, & aliquot guttæ aquæ exhibeantur.

Alia: ℥. Opij Vnc. j. ally, capit. ij.

Simul contundantur, & in B. M. per alembicum destillantur. Aquæ vna vel altera gutta in vino data somnum mirabiliter prouocat. Langius, lib. 3. Epist. 1. cap. 1.

Alia: ℥. Sem. papau. alb. nigr. an. Vnc. B. vini albi, fellis leporin. an. 3. ij. aq. lactuc. 3. iij.

Macerentur per 3. dies: Postea destillantur in B. M.

Huius aquæ gutta vna somnum ad horam 1. conciliare dicitur.

Alia, quæ Helidæo Paduano attribuitur:

℥. Lolij lb. j. opij, 3. j. Infund. in vini Maluat. lb. vj. adde salu. commun. 3. ij. papau. 3. B. hyoscyam. alb. lactuc.

*Luc. an. M. B.* Destillentur, & aqua à Drach. *B.* ad Drac. *j.* exhibeatur.

*PILVLÆ* de cynoglossa, quæ dantur à *℥. B.* ad *℥. j.* pilule narcoſice Plateri, quæ parantur hoc modo :

*℥. Opj* Drach. *j.* Dissoluantur sensim, & rursus exsiccentur. Deinde nouo spiritu vini affuso opium dissoluatur, & add. *ol. cinamom.* gutt. *ij.*

Postea *℥. cinamom.* *z. ij.* sacchari candi Vnc. *j.* piper. Drach. *j.* sem. coriandr. Scrup. *ii.* croci Drach. *B.*

Subtilissimè puluerisatis addatur opium dissolutum, & sensim miſceantur, ac cum syrupo papau. redigantur in massam, addendo moschi Scrup. *B.* Massa diligenter in mortario agitur. Ne verò massa exsiccentur, oleo de been subigatur. Dosis pilulæ duæ paruæ.

Possunt inde etiam fieri tabulæ, si sacchari dosis augetur: sed tum dosis etiam est augenda.

Aliæ eiusdem: *℥. Opj* Scrup. *j.* sem. hyoscyam alb. Scrup. *ij.* piper. Drach. *ij.* castor. Drach. sem. croci Scrup. *j.*

Dissoluatur opium in vino Maluatico, vt fiat massa, quæ exsiccentur, rursusque puluerisata cum syrupo papau. redigatur in massam, de qua in forma pilular. datur Scrup. *B.* vel, si parum operetur, plus.

Sequentes Dorncreilio attribuantur:

*℥. Opj* purificati Drach. *j.* magist. perlar. corall. an. Scrup. *j.* sal. salu. maioran. an. Scrup. *B.* Cum confect. alkerm.

*F.* Pilulæ num. xvij. inaurandæ.

Dosis pilula *j.* vel sola, vel cum aq. lactuc. Vnc. *ij.* & syrup. de papau. Vnc. *B.*

Sal. Albertus sequentib. frequentissimè vsus esse dicitur:

*℥. Philon. Rom. confect. alkerm.* an. Drach. *B.* pulu. croci Scrup. *j.*

Fiat Pilulæ xvij. quæ diuidantur in duas partes, & vna pars circa medium noctis sumatur.

TROCHISCI ex Meluè laudati, ad vigilias & delirium in febre:

*℥. Sem. lactuc. portulac. papau. cucurbit. melon. cucumer.* an. Drach. *v.* succi glycyrrhiz. amyli, tragacanth. opj, an. Drach. *js.*

Terantur omnia subtiliter, & cum mucilag. sem. psyllij *F.* Trochisci. Dantur ad Drach. *ij.*

Plateri: *℥. Species pro electuario opiato*, (eius descriptio paulè post proponitur.) add. gum. tragacanth. in vino Maluat. dissolut. & cum saccharo *F.* Trochisci, ad Drach. *B.* exhibendi.

Alij, qui etiam Tabularum narcoticarum Plateri nomine circumferuntur:

*℥. Opj* Drach. *ij.* Infund. in vini Maluatic. Vnc. *ij.* & postquam dissolutum, ac bene agitarum fuerit, rursusque subsederit, liquor clarus à fecibus effundatur, & filtreretur: cui adde sacchari Vnc. *ij.* cinamom. Drach. *ij.* moschi Scrup. *B.* mucilag. tragacanth. cum aq. rosar. factæ q. *f.*

Misce instar pastæ, sicceturque, donec in tabulas formari queant, quæ exhibentur ad Scrup. *B.*

Habuit & sequentes alias in vsu, quas etiam ad sedandam tussim vehementem exhibuit:

*Specier. diatrag. frig.* Drach. *js.* pulu. sem. hyoscyami albi Scr. *j.* opj, vino dissoluti gr. *v.* sacchar. penidi Vnc. *j.* gum. tragacanth. aq. rosar. dissolut, q. *f.* Fiant Trochisci parui.

#### PVLVIS:

*℥. Cinamom. myrrh.* an. gr. *v.* opj, croci, an. gr. *iiij.* *F.* Puluis, qui diuidatur in partes, *z.*

LAUDANA, quæ ferè reliquorum omnium instar esse possunt; de quorum compositione, & variis variorum autorum descriptionibus prolixè agit Libavius syntagm. arcanorum Chymic. lib. *8.* cap. *44.*

Nostrium, quo hætenus vsi sumus, hoc est:

*℥. Opj* s. a. purificati *z. j.* Affunde spir. vin. optimè rectif. vt digitis tribus superemineat, stent diebus *14.*

sæpius agitando: Postea quod clarum est sensim effundatur, & ipir. vin. lento calore separetur, ad iyr. liquidioris consistentiam.

Seorsim infundantur in ipir. vin. etiam dieb. *14.* *specier. diamb.* Vnc. *ij.*

Et tinctura clara separetur.

Hinc extracto Opj affundatur tinctura diambra pars dimidia, & succi citri recentis purificati Vnc. *j.* Stentque in digestionem, seu calore tepido, dies *20.* sapientque agitentur.

Vbi ipir. vin. maxima pars exhalauerit, adde extract. castor. solut. corallior. margarit. an. Drach. *B.* essent. croci Scrup. *j.*

Affunde tincturæ spec. diambra reliquum in lento igne spiritus vini exhalet. Sub finem adde ol. citri, cinamomi, caryophyll. an. gutt. *v.* *F.* Massa instar extracti: Dimidia parti adde moschi, ambra. an. gr. *v.*

Reliquum reseruetur pro fœminis.

Laudanum Opiatum D. Andr. Donneri.

*℥. Essent. opj debito modo purgati, atque aceto opt. extr. z. j.* croci aq. limonum stillat. extract. *z. B.* styrac. liquid. puriss. Scrup. *j.* spec. diamb. diamosch. dul. an. *z. iiij.* terr. sigill. Turc. Scrup. *ij.* pulu. off. de C. C. magist. succini, an. Drach. *B.* corallior. perlar. an. Scrup. *B.* ol. anisi Drach. *B.* nucis mosch. expr. Scrup. *j.* citri, aurantior, an. gutt. *v.*

Essentiæ cum styrace primò uniantur ad lentum ignem.

Postea addantur species cum reliquis speciebus atque oleis:

Diuidantur in partes duas æquales: Vni part. adde essent. castorei Scrup. *j.* atque cum syrup. papau. simpl. q. *f.* redigatur in iustam Electuarij consistentiam. S. Laudanum Opiatum pro mulieribus. Parti alteri adde ambra. mosch. an. gr. *v.* Cum syrup. papau. simpl. q. *f.* F. Electuarium. S. Laudanum opiatum pro viris.

Possunt tamen ista Laudana etiam forma liquida, seu extracti liquidi exhiberi; quale est illud, quod in Epist. à Scholtzio collect. epist. *61.* commendatur, & in maniâ, in vigiliis extremis, colicâ in febribus ardentibus, phrenesi, peripneumoniâ desperatâ; cum comodo exhibitum fuisse prædicatur.

*℥. Spec. diambra* Vnc. *ij.*

Infundantur in vino destillato quatuordecim diebus, vt latum digitum superemineat.

Adde opj Drach. *v.* mumia Drach. *B.* succi hyoscyami Vnc. *j.* corall. rubr. caraba, an. Drach. *ij.* croci Scrup. *j.* moschi gr. *xvj.* ambra. gr. *xij.*

Affuso rursus spiritu vini, vt superemineat latum digitum, digerantur per mensem, quotidie agitando. Dosis Scr. *B.* pro ægri constitutione.

Et quia Laudanum Opiatum instar omnium, vt diximus, esse potest, & frequentissimè vsurpatur, varium eius vsus monstrare libet.

#### POTIONES.

*℥. Aq. rosar. borragin.* an. Vnc. *j.* cinamom. *z. ij.* syr. violar. *z. iiij.* margarit. preparat. *℥. B.* laudani opiati gr. *ij.* vel *iiij.* Misce.

Vel *℥. Aq. papau. solani.* an. Vnc. *j.* succini preparat. *℥. B.* essent. papau. Drach. *ij.* laudan. opiati gr. *ij.* syr. violar. Drach. *iiij.* Misce.

#### SIRVVS.

*℥. Syr. de papau. z. B.* de nymph. *z. ij.* pulu. croci gr. *iiij.* laudan. opiati gr. *ij.* Misce.

#### EMVLSIONES.

*℥. Amygdal. dulc. z. ij.* sem. papau. albi Drach. *j.* aq. violar. nymph. an. Vnc. *j.* *B. F. a.* Emulsio; in qua dissolue laudan opiat. gr. *iiij.* inlebi violar. *z. B.* margarit. preparat. gr. *v.* Misce.

#### PILVLÆ.

*℥. Laudan. opiat.* gr. *ij.* vel *iiij.* magist. perlar gr. *ij.* Cum aq. violar.

Fiant Pilulæ *ij.* inaurandæ.

Vel

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Laudan. opiat* gr. iij. vel iij. *magist. corall. rubr.* gr. iij. *F. Pilulæ* num iij.

*Electuaria, vel MISTVRÆ:*

$\mathcal{Z}$ . *Conseru. violar.* Drach. ij. *laudan. opiat* gr. iij. *Misce.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Conseru. flor. nymph.* Drach. ij. vel iij. *laudan. opiat* gr. ij. *spec. diamarg. fr. d. b.* Cum *syrup. de papau.* *Misce.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Conseru. rosar. albar.* Drach. ij. *laudan. opiat*, *magist. perlurum, an. gr. ij.* *Misce.*

**ELECTVARIA:** Philonium, à Philone medico Tarsensi, ita dictum; cuius descriptionem habet Galenus, 3. de comp. medic. floc. cap. 4. Aëtius, i. i. serab. 3. serm. 1. cap. 37. Aegineta, lib. 7. cap. 11. & alterum, quod maius, seu Romanum (Arabes enim res Græcas Romanas appellare solent) appellatur, descriptum à Nicolao: quæ à Scrup. j. ad Drach. j. ad summum exhibentur: Requies Nicolai, iheriaca recens, & aliæ antiquis vñratæ compositiones.

*Plateri Electuarium Opiatum:*

$\mathcal{Z}$ . *Specier. diamb. vel diamosch. vel aromat. rosar.* 3. ij. *cinamom.* 3. j. *santal. rubr.* 3. b. *sacchar.* 3. b. *opij in vino Maluatic. dissol.* 3. b. *ol. caryophyllor. vel cinamom. gurt.* aliquot: additæque *syrupi cydonior. vel conseruat. ci- tri i. q.*

*F. Electuarium, quod exhibetur ad Drach. b.*

*Commendatur & hoc:*

$\mathcal{Z}$ . *Conseru. nymph. violar. an. Vnc. j. diacody d. ij. requiei Nicolai,* 3. iij. *specier. diarrhod. abbat. d. ij. sem. frigid. maior. papau. alb. an. d. j. lactuc. scariola, coriandr. an. d. b. croci gr. v.* Cum *syrupo de papau.* *Fiat. Ele- ctuarium.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Spec. pil. de cinoglossa d. j. philon. Mes. 3. j. re- quiei Nicol. 3. j. b. conseru. rosar. 3. ij. violar. 3. ij. borra- gin. bugloss. an. 3. j. Mithridat. opt. recent. 3. b. Cum syr. de papau. q. l. F. Electuarium; cuius dosi 3. b.*

### Externa.

Quæ, vt antea etiam dictum, vel temporibus, syn- cipiti & fronti imponuntur, aut inunguntur, aut in lo- tionibus capitis adhibentur, vel naribus odoranda ad- mouentur; vel etiam volis manum & pedum inungun- tur. Mitiora equidem futuræ coronali applicari possunt Opiata verò non item.

**EPITHEMATA, & CATAPLASMATA** ad tempora, & frontem:

$\mathcal{Z}$ . *Rad. mandragor. aut hyoscyam. capit. papau. alb. an. part. æq.*

Torreantur, & deinde terantur cum vino; & ol. rosa- cei q. l. apponanturque fronti, & temporibus.

Vel hoc Dominici Leoni:

$\mathcal{Z}$ . *Farin. hordei* 3. j. *b. cort. rad. mandrag. sem. hyos- ciam. alb. cort. papau. an. Vnc. i. sem. lactuc. portulac. flor. violar. nymph. an. Drach. b.*

Coqu. omnia in succo solani, hyoscyam. & mucilag. sem. psyllij.

Deinde addatur ol. de mandragor. de nymph. de papau. amygdal. dulc. an. Vnc. sem.

Iterum coquantur ad formam pulvis, & tandem addatur lac. muliebre, in quo opij Drach. i. fuerit dissolu- ta. *F. Cataplasma.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Sem. papau. alb. Vnc. j. opij gr. iij. croci gr. vj. nucleor. Persicor. num. x.*

Contusa cum aqua anethi misceantur in formam pulvis, vel cataplasmatas; ac extendantur super pan- num lineum, qui fronti & temporibus applicetur.

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Sem. papau. albi Vnc. b. lactuc. Drach. iij. nu- cleor. Persicor. Drach. j. aq. papau. alb. 3. b. lactuc. anethi, an. Drach. j. b. F. Emulsio, cui adde requiei Nicolai Drach. j.*

*Epithematis loco capici applicetur.*

Fieri quoque possunt **SACCVLÆ** ad tempora;

Vt  $\mathcal{Z}$ . *Flor. nymph. violar. enula, an. Drach. j. sem. hyos- cyami, croci. an. Scr. j.*

*F. Sacculi duo interpassati, temporibus admo- uendi.*

**INVNCTIONES**, quibus non solum tempora, sed & plantæ pedum, volæ manuum, pulsus, nares inungi possunt:

Vt  $\mathcal{Z}$ . *Ol. violar. nymph. vnguenti popul. an. Drach. j. opij, croci, an. gr. vj. Misce.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Ol. violar. vnguenti popul. an. Drach. j. ol. hyos- ciam. mandragor. an. Drach. b. opij, croci, an. gr. vj. cera parum.*

*Fiat Vnguentum.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Nucleor. Persicor. sem. aneth. an. 3. j. Contusis affunde aq. lactuc. Drach. iij.*

Exprimatur succus, in quo dissolue opij gr. vj. adde ol. papau. vnguent. popul. an. Drach. ij. cera parum.

*F. Vnguentum.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Vngu. populei Drach. ij. sem. hyoscyam. cort. mā- dragor. an. Scr. j. ol. nuc. moschat. express. Drach. b. opij d. b. Misce cum ol. papau.*

*F. Vnguentum.*

Aliud:  $\mathcal{Z}$ . *Vngu. rosar. alabastr. an. Drach. iij. croci gr. v. opij gr. iij. Cum oleo rosar.*

*F. Linimentum.*

Aliud:  $\mathcal{Z}$ . *Vnguenti popul. Drach. iij. ol. nuc. moschat. expr. Scrup. j. laudani opiat gr. vj. extr. croci gr. iij. spec. diambra gr. iij. Misce.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Vnguenti popul. rec. Drach. ij. ol. papau. Drach. iij. sem. hyoscyami gr. v. cori. mandragor. gr. x. opij gr. iij. croci gr. vij. cera Drach. b. styracis Scr. j. Misce & F. Vn- guentum molle.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Ol. violar. nymph. vnguenti popul. an. Vnc. iij. b. cort. mandrag. Drach. ij. roci Scrup. ij. opij Scrup. j. cera Drach. vj. Misce & F. a. Vnguentum.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Ol. hyoscyami, papau. nymph. mandrag. violar. an. Vnc. j. vnguenti popul. Vnc. iij. pulu. cort. mandragora, opij, an. Drach. ii. croci Drach. b. cera q. l. M. & F. Vn- guentum.*

Hiscæ addenda sunt **Balsama**, quæ pro delicatioribus, vt qui grauem & ingratum vnguentorum istorum odorem fere non possunt, vel nolunt, adhiberi so- lent.

$\mathcal{Z}$ . *Ol. nuc. mosch. expr. Drach. j. extr. croci gr. iij. lan- dan. opiat gr. iij. styracis calamita Scr. b. Misce.*

Aliud:  $\mathcal{Z}$ . *Balsam. anethi 3. j. b. ol. nucis mosch. expr. 3. b. rinct. croci guttul. v. extract. opij gr. vi. moschi gr. ii. cam- phor. gr. i. Misce.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Barf. chamemeli Drach. j. anethi Drach. sem. ol. thuris destill. gr. v. opij, croci, an. gr. vi. Misce.*

**EMPLASTRA:**

$\mathcal{Z}$ . *Capit. papau. alb. cum semin. 3. ii. cort. mandragor. hyoscyam. an. Drach. vj. fol. lactuc. salicis, flor. nymph. ro- sar. an. M. i. ol. tb. i. vini tb. b.*

Coqu. ad vini consumptionem. Colar.  $\mathcal{Z}$ . *tb. b. sem. lactuc. 3. ii. opij 3. i. b. croci d. ii. cera q. l. F. Emplastrum pro fronte, & temporibus.*

Aliud:  $\mathcal{Z}$ . *Vnguenti popul. 3. i. sem. hyoscyam. d. iij. opij, croci, ol. nuc. mosch. expr. d. b. rad. mandrag. d. ii. ol. de papau. 3. b. cera q. l. F. Emplastrum.*

**PEDVM LOTIONES:**

Vt  $\mathcal{Z}$ . *Herb. violar. lactuc. an. M. iij. solani, nymph. an. M. ii. capit. papau. alb. cum semin. n. iij. flor. verbasci, melilot. rosar. hyoscyam. cum sem. an. M. i. rad. hyoscyam. Vnc. i. Coq. in aq. pro pedum lotionem.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Fol. lactuc. alkekengi, solani, malu. violar. an. M. ij. flor. rosar. nymph. an. M. i. melilot. M. b. capit. papau. alb. num. xii. summit. anethi M. i. cort. mandragora Vnc. i. Coq. in aq. pro lotionem pedum.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Fol. salic. lactuc. cucurbit. vitis. an. M. ii. flor. nymph. summit. anethi, an. M. i. capit. papau. alb. viridum cum sem. concisor. num. vii. cort. mandragor. Vnc. ii. Coq. pro lotionem pedum.*

Vel



Vel  $\mathcal{L}$ . Fol. salic. solani, lactuc. an. M. j. flor. anethi, chamam. an. M. j.  $\beta$ . cort. mandragor. Vnc. j. capis. papau. num. vj. Coq. pro lotionem pedum.

ERRHINA, quæ sunt ex opio, & croco, dissolutis in ol. violar. mandragor.

ODORAMENTA & SUFFRITVS ex styrace, & opio.

NODULI ad odorandum:

$\mathcal{L}$ . Fl. violar. nymph. rosar. an. P. i. sem. lactuc. papau. alb. an. Drach. j. hyoscyami Drach.  $\beta$ . cort. papau. alb. mandragor. an. Drach.  $\beta$ . opij gr. iij. croci. Scrup.  $\beta$ . Cum sindone rubra, vel linteo albo. F. Nodulus naribus sapius admouendus; qui etiam intingi potest in aq. rosar. lactuc. solani.

Vel  $\mathcal{L}$ . Flor. nymph. violar. an. P. j. cort. papau. mandragor. an. Drach. j. opij Scr. j. croci Scr.  $\beta$ .

Cum linteo, vel sindone rubra F. Nodulus.

Alius:  $\mathcal{L}$ . Flor. nymph. violar. an. P. ii. sem. lactuc.  $\beta$ .  $\beta$ . cort. mandrag. Scr. j.  $\beta$ . sem. anethi, Scr. j. croci gr. viij.

Ex concilis. F. Nodulus.

Alius:  $\mathcal{L}$ . Capis. papau. flor. violar. nymph. an. P. j. sem. lactuc. portul. an. Drach. j. cort. mandragor. sem. hyoscyami an. Scr.  $\beta$ . anethi, croci, an. gr. iij. vel iij. M. & F. Nodulus. Parari etiam possunt.

POMA SOMNIFERA:

$\mathcal{L}$ . Flor. violar. sem. cicuta, hyoscyam. an. Drach. j. opij  $\beta$ . j. camphor.  $\beta$ .  $\beta$ . cinamomi, caryophyll. an.  $\beta$ .  $\beta$ . asa dulcis  $\beta$ . ij. ladani, styrac. liquid. an. Drach. ij. Cum aq. hyoscyami F. l. a. Pomum.

Commodum quoque est, ut plantis hætenus enumeratis, & odorem spirantibus pauimentum conspergatur.

GLANDES ex Opio, & ol. violac. ac melle. Verum cum facile ex his damnum aliquod ægro afferri queat, filum alligandum, si iis uti placet, ut, quando liber extrahi possint. Tutius est, grandem parare ex cort. mandrag. & melle.

### De Vsu Opij & Opiatorum Medicamentorum.

De usu opij  
& opiatorum  
medicamentorum.

De usu tamen Opij, & Opiatorum quædam monenda sunt. Magnam omnino Opiatorum medicamentorum esse vim, certum est. Cum enim vix aliud vires corporis humani magis deiciat, quam dolor, & vigilia nimia; somnus contra vires reficiat, & calorem ac spiritus instauret. Opiata certe, quæ vnâ operâ & somnum conciliant, & dolorem tollunt, vtilissima sunt: & propterea valde à Medicis commendantur.

Actius, *tetrab. 4. ferm. 1. cap. 102.* Antidotum Pœonianam opiata valde commendat, & multos ex ægris ab eius usu à somno surrexisse scribit, adeo concoquendi facultate præstantes, ut obliiti sint, an vnquam aliquid à principio doluerint. Nostro vero seculo in opiatorum usu & laudibus multus fuit Felix Platerus, Medicus Experientissimus. Interim cum plurimum etiam Opiata nocere possint, non equidem, ut antiqui crediderunt, refrigerandi supra modum vi, sed quia spiritus torpidos reddunt, soporemque sæpe grauem, stuporem, spiritus difficultatem inducunt, & interdum ipsam mortem afferunt, ut videre est apud Schenckium, *lib. 7. obseru. 186.* Forestum, *lib. 10. obseru. 6. in Schol. & obseru. 35. in fine Scholij.* Platerum, *lib. 1. obseru. 15.* Guil. Fabricium, *in responsoriâ ad D. Doringium Epistolâ, de Hernia uterina*, cautus omnino in opii, & opiatorum usu sit Medicus. Tutiusque est, extra primò ea capiti adhibere, & videre, an extra applicatorum usus sufficiat, antequam intra corpus exhibeantur. Sunt tamen & ipsa topica cautè adhibenda, ita ut & morbi, & naturarum ratio habeatur, ne scilicet ea ante vsum vniuersalium applicemus, vel fortiora pueris, & mollioribus corporibus adhibeamus. In hiis enim stuporem inferunt, memoriamque lædunt in reliquam vitam, vel alios affectus procreant. Sic refert Forestus, *lib. 7.*

*obseru. 22. de ferote suâ Gertrude*, quod ex morbo conualecens ab vnctione opij ad vigilias vrgentes adhibita, circa tempora perperno vrgens frigus senserit, tanquam gelu fuisset. Multos quoque ob intempestiuam stupescientium tam applicationem, quam exhibitionem lethargum incurrisse, idem Forestus obseruauit, ita, ut illi, qui prius vigiliis vexati fuerant, postea somnolenti & lethargici euaserint, ut videre est ex *scholio obseruationis sequentis 23. citati lib. 7.*

Quæ autem cautio hic necessaria sit, docet Galenus, *12. meth. med. cap. 1. Committunt*, inquit, *Medici eiusmodi excessus, in aliis quoque remedium generibus non paucis, tum vel maxime in iis vocatis Anodynis, quæ ex papau. succo, vel alterci semine, vel mandragora rad. vel styrace, vel tali quopiam sunt. Nam & qui agris gratificantur, in eorum medicamentorum usu modum excedunt, & qui intempestiue immodicèque sunt animosi, dum prorsus horum usum refugiunt, doloribus agros ingulant. Ergo veluti in omni totius vitæ tum habitudine, tum actione: ita hic quoque consilium illud sapientis, qui, Ne quid nimis dixit, amplectimur, habentes pro fine, quò tendamus, agri vilitatem. Quippe si fas est, iis remediis, quæ morbum sanant, vitendo, quod optamus, efficere, abstinendum a sapientibus medicamentis. Sin ex vigiliis & viribus resoluendis ad mortis discrimen ager tendat, tum profecto tempestiue eiusmodi medicamentis vitare, scilicet non ignarus, corporis habitum nonnihil ex iis lædendum, læsionem tamen, quam mortem, potius eligendam. Hæc Galenus. Omnino enim hoc præcipue attendendum, an vires tam diu morbum sustinere possint, donec causa vigiliarum, vel doloris, ordinariis medicamentis tolli possit, neque prius ad opiata accedendum, antequam periculum aliquod ægro ex vigiliis, vel dolore imminere videatur. Perpendendum & hoc, an vires à morbo nondum valde deiectæ sint, sed saltem ob dolorem, vel vigilias periclitari incipiant. Tum enim tuto, reliquis nihil iuuantibus, opiata exhibere licet, quæ cum somnum inducunt, sit, ut dolor etiam non percipiatur, & in somno spiritus ac calor reficiantur, ac materia morbifica rectius concoquatur, & vincatur. Verum, reliquis nihil iuuantibus dixi. Primò enim semper leniora vsurpanda; & primò quidem cibi medicinales somnum inducentes, hinc medicamenta leniora, & tandem ad opiata adscendendum. Si verò non solum ob vigilias & dolorem æger periclitetur, sed ab ipso quoque morbo vires iam deiectæ sint, ut ferè de ægri vita dubitetur, tum non facile opiata exhibenda, quæ eo in casu nihil aliud efficiunt, quam dum spiritus sopiunt, torpidosque reddunt & ignauos, ut mortem accelerent, & soporem perpetuum inducant. Quod innuere videtur Auicennas, dum, *lib. 5. summ. 1. rr. 1.* quasi sub persona Philonii loquens scribit: Et meum iuuamentum ad eum, cui dimissa mors est, est iuuamentum maximum. Frequens etiam nimis opiatorum usus fugiendus, ne cerebrum lædant, & ipsi dispositionem prauam inducant, vel etiam ventriculo noceant.*

Infantibus quoque & pueris parè admodum somnifera, præsertim opiata, exhibenda. Solent enim ingenium & memoriam labefactare. Imò nec concedendum nutricibus, ut sæpe syrupum papaueris infantibus nimis vigilantibus exhibeant, ut & infantibus, & sibi inprimis quietem concilient. Hebetat enim & is sæpius sumptus ingenium ac memoriam.

Tempus exhibendi somnifera medicamenta quod attinet, si leniora sint, ex violis, nymph. lactuc. sem. papau. alb. amygdal. cum cibis exhiberi possunt. Ita enim suavis illa exhalatio cum cibi euaporatione permixta in caput fertur, & exhalationes calidas & siccas in eo, ac siccum cerebri intemperiem temperat, ac demulcet. Quæ verò fortiora sunt, ut opiata, cum planè medicamentosa sint, cibo permisceri non debent, sed

Tempus exhibendi opiata.

vel

vel cibo concocto, vel vnâ atque alterâ horâ post cibum sumprum exhiberi.

Non etiam in principio paroxysmorum, aut crisi instante exhibenda. Cum enim tum calor expandi ad exteriora debeat, & expulsio spirituum beneficio fiat; in somno verò calor ad interiora reuocetur, & spiritus sopiantur: naturæ ille conatus, ac motus impederetur.

Si quis etiam torpor capiti, & læsio aliqua inducta videatur, corrigatur lorione cū decocto fol. beton. man. flor. chamæmeli: & si præter opinionem æger profundius, ac diutius dormiat, naribus admoueatur spongia, vel linteolum aceto acerrimo madidum, vel pulvis nigellæ & rutæ aceto maceratus naribus indatur.

### Dieta.

Cibus sit talis, qui suaues vapores generet, & qui vim habeat vapores ex alimento adscendentes densandi, vt spiritus sopiantur. Talis est prisana hordeacea; inprimis si alteretur lactucâ coctâ, oua sorbilia, carnes gallinar, virulina, hædina, panis cum amygdalis & sem. papau. alb. paratus, iuscula, & alij cibi ex amygdalis parari. Ex oleribus vtilia sunt lactuca, maïua. Vinû, si morbus id ferat, dilutum liberalius bibatur. Antiquum verò, & generosum potius vigilias excitat. Neque inutile fuerit, antequam quis cubitum eat, haustum aq. destillatæ lactuc. aut violar. bibere. Si morbus id ferat, ad somnum conciliandum etiam valet aq. dulcis tepida bibita. Nā & corpus vniuersū refrigerat, & succos acres temperat. Antiqui ad somnum conciliandum post cœnam lactucâ frequenter utebantur: cum hodie, imò & apud Romanos, iam appetitus potius excitandi gratiâ ante cibum, vel cum cibo exhibeatur; de quo Martialis, lib. 3. Epigram.

*Claudere qua cœnas lactuca solebat auorum,*

*Dic mihi cur nostras inchoet illa dapes?*

Abstineat æger à cibis salis, acris, acidis, exsiccantibus. Reliqua quod attinet, vt supra de somnum conciliantibus dictum, cubile non sit lucidum, absit omnis strepitus & sonus vehementior, æger ipse quietus sit, & taciturnus, oculos clausos habeat. Hoc etiam non prætereundum, quod Galenus ad somnum conciliandum habet, 6. Epidem. comm. 4. text. 17. *Quos arte dormire volumus, eos eatenus vigilare seruare debemus quatenus stare iam nisi conuientes non possint. Ego enim multis, qui se celerius quieti dederant, cum vigilare diutius eos coegissem suauem somnum conciliari.*

### De vigiliis præter naturam in specie.

#### Et primò

#### De vigiliis nimis ob vaporum spiritus sopientium defectum.

Postquam hæc ita in genere de vigiliis p. n. dicta sunt, iam in specie de iisdem, secundum causarum supra enumeratarum differentias, dicemus. Et primò quidem vigilias, quæ ob vapores ad somnum necessarios deficientes sunt, quod attinet, suaues illi vapores somno conciliando necessarij deficiunt, vel quia ad cerebrum non feruntur, vel quia ad cerebrum eleuati ibi non conseruantur, sed dissipantur. Non feruntur ad caput, non solum cum non generantur; vt in inedia, & dum cibus, qui tales vapores nō suppeditat, est assumptus, aut ob nimiam copiam non coquitur, aut quia coctio debilis est; quod in senibus, & frigidum ventriculum habentibus fieri solet; verum etiam quia à calore p. n. absumuntur, & dissipantur vapores, in intemperie totius corporis, calidâ præcipuè, vt & sicca; quod fit in febribus acutis & biliosis, aliisque ægritudinibus biliosis; aut tales vapores generantur, qui ad spiritus sopiendos

idonei non sunt, sed potius eos turbant; de quo mox dicetur. Ad cerebrum verò eleuati vapores non conseruantur, sed dissipantur ab intemperie cerebri calida & sicca; quod in inflammatione cerebri præcipuè accidere solet.

Ideoque febres pluribus modis vigilias inducere possunt; nimirum, quia nec vapores idonei ad somnum inducendum in iis ad caput eleuantur, sed tales; qui spiritus potius turbant, & agitant: & si qui blandi vapores à cibis eleuantur, à calore febrili absumuntur.

*Febres quomodo vigilias inducunt.*

### Signa Diagnostica.

Vapores somno conciliando necessarios deficere ob inedia, cibum iis suppeditandis ineptum, copiam cibi & cruditatem; ex diætâ ægri, quæ præcessit, & ætate senili cognoscitur.

Absumptos ac dissipatos esse, & adhuc dissipari, cognoscitur ex intemperie calida & sicca totius corporis, ex febre acuta & biliosa, ex immoderato vini generosi potu, aut medicamentorum calefacientium & siccantium usu.

### Prognostica.

1. Si ex inedia, vel diætæ vitio vigilias proueniant, cibo exhibito, & diætæ errore correcto vigilias facile tolluntur.

2. Prout febris est vehementior, vel minus vehemens, ita etiam vigilias magis vel minus pertinaces sunt.

### Indicationes.

Si ob inedia sit hic vaporum defectus, vel in diætâ aliquem errorem, vt multum nocet perseverantia in iisdem causis: ita plurimum prodest transitus ad contrarias. Et proinde cibus boni succi suppeditandus, vt & potus; qui multos suaues, & benignos, somno conciliando aptos vapores suppeditat. Si cibus minus commodus sit, melior substituendus; si copiosius sumptus; paucior præbendus; si cruditas adsit, corrigenda: vt de morbis ventriculi dicetur. Si calor febrilis vapores illos absumat, curatio ex doctrina de febribus petenda.

### Curatio.

Materia remediorum ex iisdem locis depromenda. Hoc saltem hîc monendum, vt ex medicamentis, quæ ad calorem febrilem alterandum vsurpantur, ea eligantur, quæ simul suaues & somniferos vapores ad caput mittunt, & calidos vapores temperant, qualia sunt, lactuca, nymphaea, viola, sem. papau. alb. lactuc. quatuor frigid. maiora, amygdal. dulces, & quæ ex his fiunt.

Ex cibis similiter eligendi, qui probè coquantur in ventriculo, suaues illos vapores plurimos suppeditant; quales antea in diætâ in genere enumerauimus.

### Secundò.

#### De vigiliis ex caliditate, & siccitate cerebri.

Et si verò idonei vapores ad caput eleuantur: tamen ibi dissipantur ab intemperie cerebri calida, vel sicca, vt Galenus. 1. prorrh. comm. 2. text. 29. & 2. aphor. 3. docet. In vigiliis verò producendis primas tenet caliditas, secundas siccitas. Caliditas enim maioris actiuitatis est, & vapores ab inferioribus adscendentes facile dissipat, ipsosque spiritus agitat, ita vt caliditas duobus modis ad vigilias producendas concurret. Siccitas tamen eisdem etiam absumit, & maximè hoc fit, si caliditas & siccitas coniungantur.

*Vigilia ex caliditate & siccitate cerebri.*

Intemperies autem hæc vel est cum materia, vel sine materia:

materia: quorum prius sæpe accidit in febribus putridis ardentibus, inflammatione cerebri & membranarum eius, melancholia, mania, intemperies cum pituita falsa, & humore seroso. Nonnunquam & à potu vel medicamentis calidis, & siccis contrahitur. Ita Galenus, 2. de loc. affect. c. 9. refert, puerum apud Grammaticum agentem ex meraci vini potu vigilem permanisse, ac postea febre correptum periisse.

Vnde autem intemperies istæ cerebri originem habeant; quomodo cognoscatur; quid periculi portendat; quid indicent; & quomodo curandæ sint, dictum est pariter huius libri, quæ omnia inde petenda. Hoc saltē hinc iterum repetimus, quod antea etiam monuimus, ut ex medicamentis, quæ ad intemperiem cerebri corrigendā vsurpantur, ea eligantur, quæ simul suaves vapores ad caput mittunt, & vim aliquam soporiferam obtinent

### Interna.

E. g. ℞. Conseru. nymph. violar. an. Vnc. jß. lactuc. Ital. condit. Vnc. ß. Cum Syrup. de nymph. vel papau. F. Electuarium in vigiliis ab intemperie calida & sicca.

Vel ℞. Aqua lactuc. violar. an. Vnc. iij. Syrup. violar. papau. an. Vnc. jß. F. Potus pro 2. dosibus.

### Externa.

Si intemperies sit calida, vsurpentur ol. violar. rosar. nymph. papau. mucilago sem. psylli, semperniuum, lactuca, papauer. è quibus vel epithemata, vel lotiones capitis fiant. Si intemperies sit sicca, cōuenit ol. amygd. dulc. lac. Si siccitati iungatur frigiditas, quod in melancholia accidit, profunt chamam. aneth. fœnugracū, malua, althæa, melilotus, & ea, quæ supra, c. 1. 2. sūt proposita.

Si peccet bilis, humectantia & refrigerantia conueniūt, quæ supra, c. 1. & cap. 9. de intemperie capit. cum bile, sunt proposita, in primis lactuca, viola, papauer, nymphaea, cucurbita.

Si causa vigiliarum sit pituita falsa, calida simul admiscenda, & attenuantia, ut aneth. chamamel. melilot. & vsurpanda ol. amygdal. dulc. commune, in quo cum aq. hordei, & vino albo subdulci sit parum chamæmeli, melilori, erpilli, coctum.

Exempl. grat.

℞. rosar. violar. nymph. fol. salicis, an. Vnc. j. Santali Vnc. ß. corr. papau. Drach. vij.

Iniiciantur in vas vitreum, & affundatur aq. rosar. q. s. Bulliano in cineribus calidis, vaporeque exhalantes ore & natus excipiantur in vigiliis ex intemperie cerebri calida & sicca.

Exemplum vigiliarum ex intemperie cerebri calida & sicca sine materia est apud Forestum, lib. 10. observ. 35.

### Tertio

#### De vigiliis à vaporibus calidis, siccis, & acerbis.

Si vapores calidi, sicci, acres, ab humoribus biliosis, falsis, melancholicis, prauis, ad cerebrum attolluntur, spiritus etiam turbantur, & vigilæ excitantur.

Attolluntur autem illi vel à toto, ut in febribus ardentibus, vel ab hepate, liene, vtero, ut supra, c. 6. part. 1. dictum. Accidit etiam hoc sæpissime à generosi vini potu, à calidis & siccis medicamentis; aut cum in ventriculo sit prava coctio, & à cibo vel potu copioso, aut corrupto, aut cibus flatulentis, & prauis; quales sunt lentes, fabæ, fungi, & rubera.

Neque solum à reliquo corpore vapores illi in caput mittuntur, sed sæpe etiam in ipso capite ex apostematē aliquo, vel vlcere, in partibus cerebro propinquis ad

cerebrum eleuantur; sicut & in inflammatione cerebri & membranarum eius vapores tales calidi attolluntur, & spiritus animales agitant.

### Signa Diagnostica.

Signa humorum & vaporum caput molestantium supra, part. 1. tradita sunt. Pituita falsa, & ventriculi debilitas plerumque in senibus vigiliarum causa est.

### Prognostica.

1. Quantum periculi hoc genus vigiliarum habeat, ex morbificis humoribus, à quibus pendent, coniectandum.

2. Vigiliæ, quæ senibus ab humoribus falsis eueniūt, difficulter curantur; cum materia istius generatio ob ætatis constitutionem præcaueri non possit, necatas fortiora, vel crebriora purgantia iustineat.

### Indicationes & Curatio.

Parti, quæ vapores ad cerebrum mittit, conuenientibus medicamentis succurrendum, humorque peccans euacuandus, & post cœnam exhibenda ea, quæ vapores illos demulceant; qualia supra de curatione vigiliarum in genere, numero 3. recensuimus. Febrē quod attinet, & totius corporis intemperiem calidam, temperanda ea refrigerantibus, aq. hordei, lactuc. sero lactis caprini, cum emulsione sem. papau. & melon. O. piata verò cum cautione supra proposita exhibenda.

Ad intemperiem frigidam & siccam hoc cōmendatur: ℞. Spec. diambra Scrup. ij. diamosch. dulc. Drach. ß. succini alb. Scrup. j. ambra gryseæ gr. iij. Cum Sympo de cort. citri.

F. Pilulæ num. xxiiij. Capiantur tres hora somni.

### Quarto

#### De vigiliis à frigida & sicca intemperie, & de vigiliis senum.

Nonnunquam & à frigida & sicca intemperie excitantur, & non solum vapores calidi & sicci, sed & frigidi atque acidi vigilias pariunt; quale quid melancholicis & senibus accidit. Fit hoc quandoque è serosis humoribus, & pituita falsa, quæ humores, & ipsi membranas cerebri vellicant, & sui generis vapores emittunt, quibus spiritus turbantur: quæ non minima causa est vigiliarum in senibus; etsi & aliæ concurrant: quod scilicet cerebrum ipsum euadat siccus, coctio debiliior, & pauci suaves vapores in cerebrum eleuentur; de quo vide Langium, lib. 1. epist. 26. vbi de senum vigilia agit. Neque solum in senibus, sed & aliis, vigilæ ab humoribus, seu falsis, seu acidis, generantur. Dum n. vel ob cibi copiam vel calorem debilem, sit cruditas acida in ventriculo, vapores & fumi similes in cerebrum eleuantur, & vigiliarum causæ sunt.

Et omnino senum vigilæ aliquid peculiare habent. Etenim in senibus vigiliarum causa est inuauū illarum exhalationum, ad somnum inducendum necessariarū, & in iuuenibus abundantium defectus, à debili coctione in ventre inferiore proueniens; & contra copia serosorum, salis, & nitrosorum humorum, qui alimentum spiritumascere, ut sic dicam, non sinunt, & suaves ac volatiles vapores figunt ac supprimunt, atque ira impediunt, ne suaves in cerebrum eleuentur, aut si quæ ascendunt, iis permiscuntur, & cerebro ac membranis eius molestæ sunt, atque ita vigilas & inquietudinē nocturnā potius, quàm somnum pariunt & proinde vigilas hoc modo excitatas nullo modo frigida curant, ut potè quæ coctionē ampliùs debilitat, & cruditatē illam acidam augent, sed potius moderate

calida, vinum nempe dulce, aqua vitæ, & aromata ac medicamenta coctionem iuuantia, quæ quod melius sese habet, eò plures vapores suaues somnum concilians ad cerebrum eleuantur.

Curatio autem harum vigiliarum difficilis, & vt Crato, *consil.* 1. 18. monet, vigiliis senum, ac præcipue eorum, qui in summis curis versantur, & quos iamdiu hoc malum vexat, vigiliis mederi, difficile est.

Curandi etiam ratio ab aliarum vigiliarum curatione diuersa est. Etenim quibus calor est debilis, vt in senibus, ab his, vt pore frigidis, abstinendum, & contra calida ac spirituosiora exhibenda, quæ non tantum coctionem adiuuare, sed & spiritus ac vapores suaues emitte-re valent; quale est vinum dulce. Et proinde, vt idem Crato monet, lotiones, inunctiones, præsertim frigida, nihil profunt, imò frigida plurimum lædunt. Itaque calidis & odoratis vapores potius contemperandi, & propterea horâ decubitûs vna atque altera pilula ex sequentibus sumenda:

*℞. Spec. diambre ℥. ij. diamofchi dulcis ʒ. ss. succin. albi Drach. j. ambra grysea gr. iij. Cum syrup. de cortic. citri F. Pilulæ xxiiij.*

### Quinto

#### De vigiliis à dolore, pectoris angustia, ac sensuum externorum obiectis.

*Vigilia à dolore.*

Cum cuiusque sensus externi obiectum vehemens sensum commotionem in consensum trahat, vniq; sensus excitatus reliquos commouere, ac vigilias excitare possit: frequentissime vigilias excitant tactus obiecta, quæ dolorem gignunt, dolorque in quacunque parte corporis, si sit magnus, vigilias excitat.

*Quomodo à dolore vigiliae fiant.*

Cum enim sensus communis simul afficiatur eo commoto omnes reliqui sensus commouentur, atque ita vigilie suboriuntur. Capiuaccius quidem existimat, dolorem excitare vigilias, quia nō permittat alimentivaporē in caput ferri; cum propter dolorem fluat materia in partem, quæ primò afficitur. Verum ratio prior probabilior est. Neque enim omnes vapores à cibo ad partem dolentem confluunt. Et licet vaporum satis sit in capite, ægæque dormire incipiat, tamen ab obiecti vehementia iterum excitatur, non secus ac si æger vellicetur, aut pungatur, aut clamore excitesur.

Quomodo autem dolori succurrendum sit, dicitur in *part. 3. sect. 1.* huius libri, c. 2. vbi de symptomatibus tactus agitur. Hoc saltem hîc addimus, si dolor grauis somnum turbet, neque aliâ ratione leniri possit, narcotica vlturpanda esse, quæ vnâ operâ & somnum conciliant, & dolorem leniunt: de quibus antea de vigiliis in genere diximus.

Pertinent hîc & illæ vigilie, quæ sitientibus accidunt, vt & quæ fluxu alui, & dysenteria laborantes infestant; nec non quæ dispnea in morbis pectoris, & hydropse laborantibus molesta sunt, quibus accidit, vt dormire nequeant, vel, si dormire incipiant, suffocationis periculum imminet. Ideoque sitis lenienda, & morbi, à quibus vigilie pendunt, tollendi.

Et quod obiecta tactus præstant, idem & aliorum sensuum symptomata præstare valent, vt lux nimia, strepitus, & sonus, quæ omnia dormientes inquietos reddunt & excitant; ideoque amouenda sunt.

### Sexto

#### De vigiliis ab animi affectibus.

*Vigilia ab animi affectibus.*

Tandem etiam animi affectus vehemētes, ira, timor, mæror, curæ, & sollicitudines, amor, gaudium, spiritus concitare, & vigiliarum causæ esse possunt. Quod referenda & consuetudo. Vt enim in excrementis reddendis natura sua tempora obseruat: ita consuetudo facit,

vt homines certis horis noctu excitentur & vigilent; inprimis si curæ & cogitationes variæ accedant; quod senibus familiare est.

Causæ hæc ex ægris, vel adstantibus facili cognoscuntur.

### Prognostica.

1. Ab animi affectibus, & causis evidentibus, vigilie non sunt ita periculosa, quàm quæ ab internis proueniunt.

2. Consuetudo, tanquam altera natura, non facile mutatur.

### Curatio.

Animi affectus corrigantur, & ad læticiam moderatâ æger disponatur, quæque eam excitant, & somnum conciliant, exhibeantur; vt vinum, sed moderatum. Ac si de re aliquâ intentâ cogitatio vigiliarum causâ sit, mēs aliò auocanda. Et cum affectus, si diu durent, tandem intemperiem aliquam capiti concilient, ei occurrendū, & biliosorum, ac melancholicorum humorum prouentus præcauendus, &, si quid eorum genitum iam est, euacuandum, vt *part. 1.* diximus. Consuetudo contrariâ consuetudine sensim mutanda, & cogitationes omnes à cubitum ituris seponendæ.

## Q V Æ S T I O I.

### Qua vi virentia & vapores somnum concilient?

Qua vi medicamenta, quæ somnum conciliant, id præstent, Autores non parum dissentiunt. Nonnulli in ea sunt sententia, causam vigiliarum proximum esse immoderatam canalium, per quos spiritus animalis ad singula organa sensum influit, apertione, ob defectu vaporum, qui eisdem canales certis quibusdam horis obstruere debebant. Ideoque eorum occlusionem per tales vapores esse proximam somni causam: & propterea ad somnum conciliandum, si vigilie vrgeant, requiri medicamenta frigida, crassa, ac frigidos vapores, eorūque plurimos, ad caput exhalantia. Capiuaccius verò statuit, quod talia medicamenta narium calorem sensorij iudicantis dissipent. Atque ita existimat, talia soporifera & anodyna non reuera talia esse, sed saltem secundum dici, quod partem quasi sensu priuent. Cum enim quod pars calidior est, eò sensum habeat exquisitiorem, si medicamentum calorem narium sensorij dissipet, & remoueat; & stuporem induci, & somnum conciliari.

*De vi narcoticorum.*

Alij frigoris excessu spiritui animali ad partem aditū intercludi dicunt. Atque ita secundum has opiniones *νάρκη* & *ναρκωτικά* valde frigida statuuntur. Vnde etiam secundum hanc communem opinionem ad narcoticorum correctionem adhibentur calida, piper, cinamomum, pyrethrum, costus, euphorbium, castoreum, crocus, nux moschata, sem. petroselini, danci, feniculi.

Verum, vt liberè dicam quod sentio, nulla vnquam in Physicis introducta fuit perniciosior opinio, quàm eorum, qui omnia ad qualitates primas reducere conantur; qui error hæcenus & in ista controuersia commissus est, dum omnes ferè Medici facultatem somnum inducendi frigiditati principaliter attribuerunt; cum tamen, si rem diligenter perpendamus, longè aliter sese res habeat. Nam tantum abest, vt *νάρκη* illa & *ναρκωτικά* medicamenta propriè dicta valde frigida sint, vt contrarium potius verum sit, & calida deprehendantur. Vinum vim narcoticam habere rectè statuit Platerus, *prax. tract. 1. lib. 1. cap. 2. pag. 31. & 107.* & testatur id experientia. Eadē vis inest lolio, quosdāq; à panis & lolio confecti esu primò in leuem quandā amētiā, hinc in

*Narcotica sunt calida.*



in somnum profundū, longumq; incidisse, refert VVierus, de prestig. *Damon. lib. 7. cap. 13.* Styracem calefacere, extra controuersiam est; & tamen soporē afferre docet Dioscorides, *lib. 1. de mat. med. c. 68.* & Galenus. 20. de compos. med. sec. loc. cap. 1. in fine, & 6. Epidem. comm. 5. 1. 1. Anethum calidum est, & nihilominus somnum conciliat, teste Galeno, 6. de simpl. med. faculr. Eodem modo sese res habet de sem. cannabis, nuce moschat. nucleis Persicor. amygdalis amaris, absinthio, lupulo, allio; quæ omnia calida sūt omniū confessione, & tamē somnum conciliant. Reliqua etiā, quæ frigiditate somnum inducere creduntur, omnia frigida non sunt. Nā vt de papanere vulgari, cuius semen frigidum esse creditur; cum tamen oleum ex eodem exprimitur, quod flammam alit, & ad lucernas eodem modo, vt ol. oliuar. lini, cannabis, adhiberi potest, nihil dicam: opium vulgō frigidum, & quidem vltra tertium gradum, statuitur. Verū si eius qualitates & vires diligēter perpendamus, calidū esse animaduertemus, vt prolixē & accuratē id demonstrauit Cl. Dn. D. Doringius, *tract. de opio sect. 2.* Est enim amarum, acre, vt linguam vellicet, fauces incendit, sitim excitat, odorem grauem habet, faciliē inflammatur, animum efferat, Venerem concitat, pruritū excitat, sudorem ciēt, dura emollit & discutit; de quibus omnibus D. Doringius, *loc. allegat.* videatur, ne actum, agere hīc opus sit.

Ex quibus omnibus patet, frigida non esse, quæ *vaporibus* & *vaporibus* dicuntur. Quibus accedit & hoc, quod tantulā quantitate, gran. scilicet ij. vel iij. pondere, quæ Opium, & Laudanum opiatum (quod tamen purū putum opium non est) exhibentur, corpus tam insigniter refrigerare, & tot crassos ac frigidos vapores, qui ad meatus cerebri omnes obstruendos sufficiant, emitte-re non potest. Quis enim, nisi qui opinionibus præcōceptis obcecatus est, credat, ab opij gr. ij. vel iij. assumptis corpus etiam febre æstuans ita refrigerari posse, vt illa refrigeratio vsque ad cerebrum penetraret? Quod ne à satis magnā aquæ quantitate fieri potest. Cum ergo in tam parua quantitate exhibitum non solum somnū profundū, & stuporem inducat, sed & paulō liberalius exhibitū enecet: rectius qualitatī alicui occurrat, & peculiari proprietati quæ in spiritu quodam sulphureo consistit, vt ex odore & inflammabilitate, ac resolutione patet, vim hanc tribuimus. Hic enim spiritus, seu odore in cerebrū admissus, seu per poros cutis penetrās, seu intra corpus sumptus, in cerebro spiritus vi peculiari sopit, & torpidos, ac quasi immobiles, atque ita ad actiones animales edēdas ineptos reddit. Quod id etiā confirmat, quod Platerus, *tract. i. lib. i. cap. 5. pag. 185.* scribit, se nunquam deprehendere potuisse, quod à narcotico extrā cuti applicato, ea stupida, & indolens reddatur; licet, vt certi aliquid cognosceret, massam opij emollitam podagrā laboranti extra explicarit.

## Q V Æ S T I O I I.

Quomodo opium præparandum & corrigendū sit?

Antiquos, qui Opium frigiditate excedere, & nocere putabant, calidis planē medicamentis, pipere, pyrethro, croco, castoreo, euphorbio, & similibus ad eius correctionem vsos fuisse, antea dictum. Verū falsā hypothesi ad istam opium corrigendi rationem adducti sūt. & medicamenta non satis commoda præpararunt. Vt saltem de Philonio Romano dicam, olim satis vsitato medicamento, experientia docuit, ob tot medicamentorum calidorum admisionem vix posse deglutiri, quin fauces accendat, & in iis ardorem excitet; clysteribus etiam, vel pondere sesquidrachmæ admistum, nonnullis ingentem ardorem in imo ventre, & intestino recto excitasse.

Hodie satis vsitatum est, vt Opium cum spiritu vini spec. diamb. aromat. rosat. vel similibus imprægnato ex-

trahatur, vel spiritus vini eiusmodi extracto opij addatur, vt & olea destillata, atque alia cordialia, vt ex variis Laudani Opiati (ita enim medicamentum hoc appellare libuit Paracelso) descriptionibus, quas collegit Libanius, *Synagm. arcan. Chymicor. lib. 8. cap. 84.* videre est.

Reprehendunt tamen hanc Opij præparationem Recentiores quidam, quod, vt Petrus, in *Nojolog. harmon. tom. 1. dissip. 5. quest. 9.* habet, fœtidum, & venenosum suum sulphur, quod etiam post ignis examen adhuc super sit in opio, in spiritum vini aquæ deponat, imò à spiritu vini magis attenuatum malignitatem suam citius exferat, & in partes penitus insinuet. Quibus addunt & hoc, quod vino vis quædam narcotica inest, quæ de causa Platerus, *tract. tr. 1. lib. 1. cap. 2. p. 66.* in sopore & stupore vini vsū improbat. Præterea Turcos & Egyptios vino, quasi opij succedaneo, in eius defectu vti, patet ex Christoph. à Costa, *de arom. lib. 1. cap. de Opio.* & Prosper. Alpino, *de Medic. Egypt. lib. 4. cap. 1.*

Isti igitur aliam Opium præparandi, & corrigendi rationem ineunt. Opium in exigua fustula concidunt, & in patellis aliquot super leni cinerum, vel alio calore tam diu siccant, donec sulphur fœtidum exhalet, ac opium suauiores, & gratiores odorem spirat, ac digitis in puluerem teri possit; quod ferè 6. vel 7. dierum spatio accidit. Inde tincturam aceto destillato extrahunt. Acida autem, vt acetum, succus citri, & limon. ea de causa eligunt, quod, sicut acrimoniam humorum, ita, & narcoticam vim acida heberant, & spiritus narcoticos figunt, ac supprimunt: vnde in soporiferis affectibus, venenisque soporiferis commodus est aceri vsus, ipsiusque ebrietatis acetum & acida sunt remedium.

Verum enimverò, vt, quid mihi hāc de re videatur, liberè aperiā: primò illam Opij siccationem, & leuē quasi tostionem quod attinet, si, de quo tamen certò constare prius debet, quædam heterogeneæ partes sunt in Opio, quarum aliæ aliis magis sunt noxiæ, torreatur sanè, me non obstante, Opium, sed ita, ne illud sulphur narcoticum, cuius vis experitur, dissipetur, & corpus inefficax relinquatur. Ipse tamen Petrus, vt antea dictum, etiam post ignis examen sulphur illud fœtidum, & malignum superesse scribit.

Quantum ad reliquam præparationem, rectissime opium extrahitur, seu utilis eius substantia à reliquis inutilibus partibus separatur, spiritu vini. Hic enim sulphurea corpora & substantias faciliē recipit & imbibit. Correctionem verò quod attinet, illa antiquorum per calida, & quidem vehementer calefacientia, falsā nritur hypothesi, vt antea dictum, neque opium summè frigidum calefacientibus corrigendum: nisi forsan talia sint, quæ occultā proprietate vi narcotica opij resistūt, qualia sunt inprimis alā, & castoreum, quod oppositam opio facultatem habere, Galenus, *de compos. med. sec. loc. cap. 3.* scribit, & quæ opij theriacam ac Bezoar esse dicunt Auicennas & Guainerius, *locis propriis.* Acida verò quod attinet, quæ hic à plurimis ad vim narcoticam refrænandam admiscuntur, imò quibus à nonnullis opium extrahi diximus; equidem libenter concedo, acida narcoticorum vim infringere, & soporosis affectibus prodesse: verū id non experitur, sed vis soporifera quæritur. Si tamen quis metuat, ne illa nimis vehemens sit, & aliquid periculi homini afferat, illi acida, inprimis succum citri & limonum, addere fas esto. Et tūc etiam, additis scilicet acidis, laudanum opiatum in maiori dosi exhibere licet, & cum laudanum opiatum, sine succis acidis paratum, vltra grana iij. vel iij. vix exhibeatur, illud, quod cum acidis paratum est, ad vj. vij. viij. vel plura etiam grana propinare licet. Tandem, quia cū vi narcotica qualitas corpori nostro, & spiritibus inprimis, aduersa coniuncta est, vt illa corrigatur, & ne quid dāni spiritus patiantur, aromata, & eorum olea, moschus, ambra, margaritæ, corallia, & similia adduntur.

Opium quo  
modo corri-  
gendum.

## CAPVT II.

## De Somno p. n. ac Comate &amp; Cataphora.

Somnus  
quosimplex.

**V**igiliis opponitur Somnus, qui & ipse nimius esse potest, si nimirum homo diutius, quam par est, & profundius dormiat, quam s. n. solet. Vt autē somni nimij natura & causæ rectius cognoscantur, afferenda ex Auicenna, 3. *Can. sen. 1. 11. 4. c. de Suboeth & Caro*, somni distinctio, quā alium naturalem facit, eumque vel absolute talem, vel non absolute; alium p. n. Absolute naturalis est, qui post moderatas & vltimas vigilias quotidie hominem apprehendit noctu, à cibo, vt calore & spiritibus intro reuocatis, alimentum rectius concoquatur, spiritusque per vigilias dissipati instaurantur. Non absolute naturalis est, qui & naturalis grauior dicitur, qui nimia corporis exercitationem & laborem, sanguinis vel alui profluuium, dolorē, simileq; causas sequitur, calore naturali, & spiritibus supra modum absumptis; vel vbi halituoso quodā vapore caput repletur, id quod ebriis euenit. Diuturnior enim, & profundior somnus ex his causis absolute quidem naturalis non est: non tamen etiam p. n. Pertinet huc & ille somnus profundus, cuius Galenus, 2. *Prorrh. 1. 29.* mentionem facit, qui ægrotantes interdumprehendit post tridui, vel quadridui vigilias, magno cum ipsorum commodo; sicut & pueris interdum idem accidit, eosque à morbis tum præseruat, tum liberat. Hic enim somnus à spiritu & caloris ad interiora reuocatione saltem ortum habet. Nam natura defectum spirituum sentiens, tam diu calorem & spiritus animales in cerebro retinet, donec reparati sufficienter fuerint: & calore ad interiora retracto coctio fit felicior. Vnde multi suaves & halituosi vapores ad cerebrum adscendunt, somnumque longiorem & profundiorē excitant.

Præternaturalis tandem, & morbosus, vt appellant, somnus, de quo hoc loco nobis agendum, est, qui à causa p. n. & morbificā prouenit, spiritusque ita vincit & detinet, vt difficilis ab eo fiat expergefactio; neque ad spirituum, & virium instaurationem, sanitatisque commodum aliquod emolumentum affert. Is autem, etsi varius sit, & sub se complectatur Cataphoram & Coma, Lethargum, ac Carum, & nonnulli coniunctim de his agant: tamen, quia, quia in Comate vigili, Lethargo, Caro non solum sensus communis, sed & aliæ actiones animales læduntur; de his suo loco agemus: hic verò vbi de symptomatibus sensus communis tractamus, saltem de Cataphora, & Comate somnolento, in quibus sensus communis primario afficitur, dicemus.

## Nomen.

Coma, Cata-  
phora.

Quod malum Mauritanii suā linguā Subeth nomināt, id Græcis est καμα, vel καταφορά. Etsi enim Galenus 4. *de sanit. tuend. cap. 4.* etiam sanis Comata accidere scribit: tamen non proprie Comatis voce tum vitur, sed abusiue, pro somno naturali profundiore. Et quidem καμα dicitur quasi κίωμα, à κίω, quod est profundius, & prolixè dormire. Alij δὲ τὴν καμάζην, id est, commensationibus indulgere, deducunt hanc vocem, siue quod tales communiter symptomate somni profundi teneantur, siue quod καμάζοντες omnium facillimè in hunc morbum incidunt. Καταφορά verò dicitur, quod vehemens sit in somnum propensio. Vocabulum enim καταφορά, & καμάθη, vt mox dicetur, non solum de somno profundo accipitur, sed etiam de propensione in somnum, qualis est in Comate vigili. Etsi autem nonnullis καταφορά minus malum est, quàm καμα; sicut καμα minus rursus, quàm Carus; tamen exquisitā hanc vocabulorum distinctio-

ne opus non esse, ex Galeno intelligimus, qui, in *libell. de Comate*, & in 1. *prorrh. comm. 1.* affirmat, ab Hippocrate quamlibet καταφορά Coma nuncupari, vt promiscuè his vocabulis ille vsus fuerit. De quo etiā videatur Anur. Foësius, *Oeconom. Hippocrat. ad vocem καμα*. Interdū & Carus nominatur; sed nō proprie: quoniam hoc vocabulo malum multò grauius significatur quod à leui apoplexiā non multum distat.

Est autem Coma duplex, καμάθη, seu somnolentia, & ἀγρυπνία, seu vigil. Coma καμάθη, quod & sæpe absolute Coma appellatur, est, cum ægri oculos aperire nequeunt, & non solum in somnum propensionem continuam habent, sed & profundius dormiunt. Coma verò οὐκ καμάθη, seu, non somnolentum, & ἀγρυπνία, seu vigil est, cum ægri quidem in somnum propensionem habent, nihilominus dormire non possunt, sed saltem oculis clausis & coniucentibus inani dormiendi cupidine tenentur, ipsique variaz imagines obuersantur, quæ & somnum impediunt, & vt nonnihil delirant ægri, in causā sunt. In Comate vigili cum plures actiones animales lædantur, dicitur de eo suo loco; hoc capite saltem de Comate somnolento nobis agere propositum est.

## Definitio.

Est autem Cataphora seu Coma somnolentum somni grauis, seu sensus communis quies, à causa, quæ facit, vt spiritus animales ad sensuum organa non sine difficultate influant, ortum habens: seu symptoma in imminutā actione sensus communis, dum is veluti torperet, & neque spiritus animales ad externos sensus diffunduntur, neque is ab iis accepta obiecta agnoscit, & diiudicat.

## Causa.

Causam huius mali esse ea, quæ spirituum animalium ad sensuum organa influxum prohibent, eosque ad actiones animales ineptiores reddunt, iam antè dictum. Etsi verò à frigiditate & humiditate, vel à repletionē, & obstructione canalium, per quos spiritus animales influunt, id fieri plerique doceant; vt ex Galeno, 3. *Epid. comm. 1. aphor. 7. 2. prorrh. 1. 29. 3. prorrh. 1. 1.* videre est: tamen, vt postea dicetur, in *questione*, probabilius est, à peculiari vi narcotica spiritus animales torpidos & ad actiones animales ineptos reddente, ac in vapore quodam residente, id fieri, qui à venis & toto, in febribus, malignis præcipuè, & quæ καματόδες appellantur, vel à parte aliqua, vt à ventriculo, ab humoribus vitiosis, vini nimio potu, (cuius rei exemplum est apud Forestum *lib. 10. obseru. 34. & tria in Scholio*) intestinis, & vermibus in his, vterero, vt in hystericiis sæpe euenit, ad caput eleuantur. Pertinent & huc medicamenta, ac venena narcotica vi prædita, vt lactuca, papau. solanum, lolium, fungi quidam, opium. Si tamen vapores sunt crassiores, & copiosiores, vel vapores; qui ad caput exhalāt. in crassum & lentū humorē conuertantur, meatus cerebri ab iis obstrui posse, non negauerim: quæ si sit leuior, Coma esse potest; si verò grauior, Carum vel Lethargum excitat. Vapores tamen illi vix qualitatē narcoticæ expertes sunt. Ita etiam compressio cranij à percussione, & percussio in temporibus Coma inducere potest.

## Signa Diagnostica.

Æger diu & profundè dormit, demissā ferè inferiore maxillā, & hiantē ore, cum difficultate excitatur, oculos, si excitetur, aperit, sed mox iterum profundè dormit, & palpebras non sine difficultate attollit. Quis autem humor peccet, ex febre præsentē, vel aliis indiis, quæ supra *part. 1.* tradita sunt, patebit.

Signa  
diagnostica.

Differt

*Differt à Comate vigili*, quod in Comate vigili somnium est in somnum propensio, non verò dormiunt ægri: à Caro, quod in Comate interrogati respondent, in Caro verò non respondent, ab Apoplexiâ, quod in hac non sentiunt, immoti iacent, & stertunt: à Syncope, quod in hac facies est mortuis similis, & pulsus parvus & languidus: ab Vteri suffocatione, quod ad interrogata ferè non respondent, & oculos non aperiant, licet interdum audiant: in graui verò somno omnibus his contraria accidunt.

### Prognostica.

1. Somnus & vigilæ vtræque, si modum exceſſerint, malum, 2. aph. 3. Ac somnus immoderatus malus est, non solum vt signum; quod scilicet cerebrum p. n. affectum significat, sed etiam vt causa, eò quod spiritus & calorem naturalem obtundit, actiones animales torpidas reddit, cruda excrementa in capite, & toto corpore cumulat, & denique destillationum ac frigidorum morborum auctor est.

2. In quo morbo somnus laborem facit, malum est, 2. aph. 1. Cum enim somnus naturaliter vires instaurare debeat, si id non fiat, malum indicium est, tantæque humorum vitiosorum ac prauorum copiam adesse significat, quam calor in somno retractus & collectus cōcoque, & superare non potuerit: aut somnum illum non à naturali, sed maligna causâ inductum esse, indicio est. Contra si delirium adsit, illudque somnus sedet, bonum.

3. Exitiosum est Coma, cuius morbi calidi & sicciores auctores sūt, teste Galeno, 3. Ep. de comm. 1. text. 7. cuius causam esse putant vulgò, quod insignem in cerebro refrigerationem in morbo calido esse oporteat. Sed cum in morbo calido & sicco simul insignis intemperies frigida adesse non possit: probabilius est, potius à maligno & narcotico vapore in eiusmodi febribus talem somnum nimium excitari.

Periculosum quoque est, quod virium magnam imbecillitatem sequitur, ex acutissimo aliquo morbo, vel graui cerebri affectione. Galenus, *ibid.*

5. Minus periculosum est, quod ob consensum fit, siue ventriculi, siue intestinorum, siue vteri; modo causa tolli possit. Sublatis enim illis causis, Coma etiam tollitur: si tamen causa illa maligna sit, etiam suo periculo non vacat. Magis verò periculosum est, quod ipsius cerebri affectus sequitur.

6. Periculosius coma est, quod in continuis febribus accidit, quam quod in intermittentibus. In intermittentibus enim ad remissionem, aut intermissionem cum ipso paroxysmo desinit; in continuis verò etiam si primo accessu leue, & non magni momenti videatur, tamen indies crescit, & sæpe in Carum ac Lethargum permutatur.

7. Tempus, quo, siue ad salutem, siue ad mortem terminatur, semper breue est. Neque enim cerebrum membrum nobile, tam diu grauem affectum tolerare potest.

8. Ad salutem terminatur per discussionem causarum à quibus prouenit, quando natura per hæmorrhagiam, narium, alui fluxum, sudorem, sæpe etiam insensilem transpirationem, nonnunquam & per abcessus, & tumores, præcipue post aures, materiam euacuat; artis vero beneficio, cum medicamentis euacuetur. Ad mortem verò terminatur per virium dissolutionem, reliquis visceribus in consensum tractis, vel suffocationem, ubi malum ita ingrauescit, vt sensus & motus, atque ipsa adeo respiratio tollatur.

### Indicationes.

Intemperies cerebri, humoris & vaporis alteranda, aut potius vis *capitis*, & *vaporum* per contraria expugnanda. Materia, quæ in capite proxima Comatis causâ

Dan. Sennert. Tom. II.

sa est, euacuanda, & discutienda; si aliunde capiti cōmuniceretur, reuellenda; è toto, vel parte, è qua comunicatur, tollenda, ac, ne amplius generetur, præcauendum. Sensibus verò omnibus obiecta vehemētiora, quæ ipsos excitent, offerenda; virēque simul alimentis instauranda.

### Curatio.

Quæ ratione totius ratio habenda, & quomodo vapore ad caput adicendentes reuellendi & pellendi sint, patet ex iis, quæ suprà, *part. I.* diximus. Et cum pleuique Coma in febribus accidat, ad duo tum omnino respiciendum; ad ipsam febrem, quæ causâ ratione habet, & ad somnum; atque ita curatio instituenda, ne ea, quæ somno depellendo exhibetur, febrem augeant. Hoc tamen cum febris, tum Coma requirit, vt humor vitiosus, & febris, & somni p. n. causâ euacuetur. Ideoque et si febris causâ iam sanguis euacuatus sit: nihilominus venæ sectionem, si opus sit, repetere licet: vt fluxio inhibeatur, & materia à capite auertatur; quod commodissime fiet vena in curibus aperta. Sicut & clysteres sæpius iniicere, aut materiam leniter euacuare vtile est.

Et licet coctionis perfectæ signa non adsint: tamen si magis magisque materia in caput repere videatur, vt malum maius præcaueatur, materia vitiosa euacuanda est. Et aliis quoque modis, frictionibus, cucurbitulis, vineulis reuellenda. Quod etiam faciendum, si à vetriculo, vtero, vel alia parte inferiore materia ad caput adscendat; & partium, à quibus vapores eleuantur, curatio debito modo instituenda.

Si à nimio vini potu, eoque adhuc in ventriculo hærente, sit coma, oxymelite in os infuso, & penna oxymelite ac oleo intinctâ in fauces demissa vomitus excitandus.

Oxyrrhodina, quæ repellendi gratiâ, & ne vapores in caput admittantur, si materia per partes extrinsecas fluat, vsurpantur, actu calida vsurpentur, & iuræ coronali applicentur, ac liberalius acerrimis admisceatur, ita, vt ad vnam partem olei rosacei aceti partes duæ sumantur. Quia tamen vapores, vt pore tenuiores, repellentium medicamentorum vim sæpius subterfugiunt, discutientia potius vsurpanda; post capitis vniuersalem euacuationem.

Causam somni proximam quod attinet, cum eam frigidam esse hæcenus creditum sit, ad eam expugnandam etiam calida exhibenda esse traditum. Verum et si quædam calida ad somnum p. n. expugnandum vtilia esse certum sit; tamen cum non omnia id præstent, & vis illa narcotica à peculiari proprietate, quæ etiam in minimâ portione maxima est, consistat; ea medicamenta eligenda, quæ peculiari proprietate hypnoticorum vim expugnare obseruatum est: qualia sunt ruta, nigella, castoreum, acerrum & acida. Quod verò Platerus scribit, narcoticorum vires debilitare ea, quæ leniendo temperie quædam ipsorum caliditatem potius, quam frigiditatem emendant; id commodâ interpretatione indiget. Equidem frigida specificæ facultati narcoticorum non opponuntur: quia tamen occulta illa qualitas in subiecto tali, quod manifestis quoque qualitatibus præditum est, plerumque hæret, non infrequens est, vt mutato subiecto occulta qualitas suam naturam ex accidenti quasi mutet, & amittat; id quod acerrum & acida commodissime præstant.

Ideoque acerrum, & acida, vt succus citri, limonũ, ruta, castoreum, & ex his parata exhibenda; atq; aliis medicamentis morbo conuenientibus admiscenda; & narium admouenda ruta cum aceto, vel balsamum ruta, castoreum cum aceto, nigella cum aceto. Efficax etiâ remedium est in Comate ac cataphora, si acerrum acerrimũ supra laminam ferream ignitam fundatur, & vapor

Curatio  
Comatis.

Narcoticorum  
vim qua in-  
fringant.



aceti ab ægro naribus excipiantur. Adhuc efficacius erit, si aceto addatur sem. nigel. rutæ, & castoreum. Excitat etiam à somno suffusus ♀. Nonnulli theriacam exhibent: sed cum theriaca ob opium vim narcoticam potius augeat, ab ea abstinendum, præcipue si non planè vetus sit.

Apophlegmatismis, & Errhinis, quæ ad particulas capitis euacuationes adhibentur, & Topicis, quæ ad vapores in capite discutiendos vsurpantur, addantur etiam ruta, castoreum, acetum. Sternutatoria quoque adhibere licet. Sicut & alia medicamenta, quæ ad vapores illos discutiendos ab antiquis vsurpata sunt, eaq; pleraque calida, quod somnum nimium, & p.n. ab humore frigido semper provenire crediderunt. Verum cum & calidi humores ac vapores somnum talem inducere possint, videndum, an natura morbi ista medicamenta admittat. Si ergo humor pituitosus peccet, exhibeantur diâbra, diamofch, conferva betonicæ, & vngatur caput ol. rutæ, lannino, costino, de castoreo, vel foueatur decocto serpilli, rutæ, pulegij, calaminthæ, betonicæ, & aliis, quæ supra, *par. 1. c. 2. & 10.* sunt proposita.

#### Dietæ

Dietæ causâ respondeat: Aër sit lucidus. Potus diluatur aceto, & acidis. Cogitationis, & ratiocinationis exercitium in soporosis affectibus, quæ *mod. sunt vapores* *in to xoyivis, æt to pnyvovulivis*, utile esse docet Galenus, *G. Epid. comm. 3. aphor. 11.* Vt enim Hippocrates, *ibid.* habet, *ἡ ψυχὴ ἐν τῷ σπινθὴρ ὁρῶντι ἀνθρώπῳ*: Anima quasi deambulatio est cogitatio, & meditatio hominibus. Ideoque ægris subito iucunda, vel molesta nuncianda sunt. De quo Horatius, *serm. libr. 2. satyr. 3.* de quodam avaro Opimio scribit, qui

*Quondam lethargo grandi est oppressus, ut hæres  
Jam circumloculos, & clauas laius ouansque  
Curreret hinc: Medicus multum ceter, atque fidelis  
Excitat hoc pacto: Mensam poni iubet, atque,  
Effundi saccos nummorum, accedere plures  
Ad numerandum, Mominem sic erigit, addit & illud:  
Ni tua custodis, anidus iam hoc auferet heres,  
Men' vino? & vinas igitur, vigilat*

Et omnino sensibus omnibus obiecta vehementiora, & quæ iis molestiam aliquam exhibent, offerenda. Excitandus eger clamore, sonitu & strepitu, inprimis proprio nomine magnâ voce sepe appelleretur naribus acacia, v. ruta, castoreum, acetum, vt modo diximus, oblicienda. Ori & palato, iridem acacia iniicienda. Oculi radiis solariis, & luci splendide obliciendi. *ol. castorei, & ol. lannini*. Tactus frictionibus, vellicationibus, pilorum euulsionibus, & aliis huiusmodi irritandus.

Historia huius mali curati habetur apud Forestum, *lib. 10. obseru. 33. & 34.*

#### Q. V. A. S. T. I. O.

*Quanam Comatis, & Cataphoræ causâ sit?*

Causâ comatis & cataphoræ.

Causam Comatis & cataphoræ esse ea, quæ spirituum animalium ad sensuum organa influxum prohibent, iam dictum: quanam autem causâ id præstent, non ita planum, nec omnes eodem modo hîc sentiunt, vt in Institut. *l. 2. par. 3. sect. 2. c. 4.* dictum, vbi de causâ Comatis & cataphoræ egimus. Vt rem breuiter hîc complectamur, causâ Comatis somnolenti non sunt quæ calorem & spiritum ad interiora reuocant, ibique detinent, donec instaurati sint: sed quæ prohibent, ne iterum iusto tempore, imò etiam extrinâ vi stimulati organa sensuum influere possint.

Causas huius rei antiqui duas posuerunt, vel intemperiem frigidam & humidam, spiritus animales quasi stupidos reddentem, vel materiam canales, per quos spiritus animales ad organa sensuum influunt, obstruere,

causamq; comatis somnolenti & cataphoræ posuerunt intemperiem frigidam, aut humidam, vel frigidam & humidam, cum, vel sine materiâ refrigerationemque & humectationem nunc à causâ externa, vt aëre ambiente, pluuio, medicamentis, & alimentis tali qualitate præditis, præsertim vaporosis provenire, nunc ab interna, vt humoribus, & vaporibus in corpore. Plerique tamen statuunt, intemperiem esse cum materia coniunctam, quæ vapor sit (nam si sit humor, iam grauiorem affectum, carum scilicet, sequi ab humore sui generis ad caput eleuatus. Vtramque enim enumeratam qualitatem vim habere calorem, & spiritus densandi, cohibendi, & ad motum, actionesq; minus idoneos reddendi, (quamquam frigiditas id magis præstet) non tamen solum à refrigeratione & humectatione cerebri coma produci, sed & à repletionem, quæ etiam fiat à copia calidorum & putridorum vaporum, exhalantiū, vel à toto vt in febrium, præsertim pituitosarum, accessionibus, & inprimis iis, quæ propterea *καταρῶδες* nominantur, vel à parte aliqua, vt ventriculo, intestinis, & vermibus in iis. Sunt tamen quidam, qui negant, coma produci à materia meatus cerebri angustiores reddente, & obstruente, (hanc enim non coma, sed carum producere) sed solum cerebrum irorando, & refrigerando. Ideoque soporem illum profundum, qui vel solum capitis grauiorem, vel cerebri compressionem in cranij perforatione minus dextrè instituta, vel musculi temporalis inflammationem sequitur, potius ad Carum, quam Coma referendum censent.

Recentiores verò & Galenici, & Chymici rem clarius *Hypnotici* *explicare videntur.* Nam in hoc quidem cum antiquis *qualia*, consentiunt, quod ea, quæ vim habent spiritus cohibendi, torpidos, & ad motus, actionesque animales minus idoneos reddendi, Coma producant, verum quænam vis id præstet, in eo ab antiquis dissentiunt, neque solum in frigiditate & humiditate acquiescendum esse censent, cum multa sint frigida, quæ somnum non inducunt, contra verò etiam calida, quæ sunt hypnotica. Ideoque etsi non planè negent, frigiditatem cum humiditate ad somnum facere posse: non tamen hanc solam, & unicam huius mali causam esse, & qualitates has somnum aliquem naturalem profundiorē paulo quam illum p. n. de quo hîc sermo est, inducere; sed malum hoc à peculiari qualitate *ὑπνωτικῇ* & *καταρῶδῃ* provenire putant. Et videtur eorum sententia rationi consentanea. Etenim videmus eos, qui vinum fortius, aut spiritum vini immoderatus biberunt, quasi soporiferum medicamentum sumpsissent, profundius dormire. Et vt, *c. præced. quæst. 1.* demonstrauimus, medicamenta, quæ somnum grauem conciliant, non frigiditate, sed peculiari vi hypnoticâ & narcoticâ id præstant; quæ & venena quædam prædita sunt, eaque procul dubio non carent humores, qui in febribus malignis, & iis, quæ *καταρῶδες* nominantur, somnum profundum inducunt. Cum enim humores sæpe satis calidi in iis sint, frigiditate id præstare credibile non est. Et sunt multæ febres, in quibus longè maior vaporū, & quidem crassiorum, copia in cerebro est, quæ tamen *καταρῶδες* non sunt. Non tamen planè negauerim, vapores interdum posse tam crassos & copiosos esse, aut in humorem crassum degenerare, vt angustiam aliquam, & obstruentionem in meatibus, per quos spiritus animales in organa sensuum influunt, excitare possint, verum tum plerumque Carus, vel Lethargus sequitur.

### CAPVT III.

#### De Insomniis immoderatis.

Etsi in somno profundiore, qui ex copiosiore alimentis *insomnia immoderata*, Et vapore excitatur, sēsus & externi & interni quiescunt;



scunt; unde statim à cibo, & sensus externi fortius ligantur; ita etiam somnia rarius obueniunt; tamen in somno ex moderatis vaporibus obrepente, et si sensus externi quiescant; interni tamen saepe sese exerunt; & phantasia quidem ex parte libera manet; ut ex rebus, quas vigilans gesserit, senserit, cogitaueritque spectra plurima compareant; quæ cœu vera intueretur, illique fidem adhibet, nesciens se dormire, quæ operatio in somno Somnium appellari solet. Ista tamen operatio minus perfecta est, sed, ut in delirantibus phantasia male coherencia coniungitur: ita & in somno minimè coherencia coniunguntur. Vnde rectè dicitur, quod somnia sint dormientium deliria, deliria verò vigilantium somnia, & ad istam inconcinnam & ineptam imaginum coaptationem non parùm faciunt vapores mobiles, spiritusque turbantes; quales cum in febribus saepe sint satis copiosi, etiam febricitantes in somniis huiusmodi maximè molestantur, unde etiam prouerbum natum: *Per febrem somniare.*

Compertum tamen est, ut Aristoteles, *de historia animal. lib. 4. cap. 101* & Plinius, *lib. 10. histor. nat. in fine*, refert, & mulieres, & viros fuisse, qui nunquam quicquam somniauerint, quorum nonnullis in processu ætatis accidit, ut viso somnio mutarentur habitu sui corporis, vel in morbum, vel in morrem. Atlantes etiam non somniare fertur. Et si verò plerumque in somnia sine hominis incommodo sint, & propterea naturalia habeantur: tamen si immoderata, graui, & cum terrore sint; cum spiritus exagitant, hominèque delassent, ut excitati plus defatigationis, quàm refectionis, & refoctionis à somno percipiant, & ita plus incommodi, quàm commodi à somno habeant: de hisce in somniis inter actiones sensus communis læsas agendum. Et si enim phantasie, ac memoriæ proptia sint: tamen quia non vigilantibus, ut alia deliria, sed dormientibus accidunt, & cum vigiliis p. n. ferè communes causas habent; de iis hoc loco dicemus.

Somnia naturalia quid sint.

Cum autem somnia naturalia nihil aliud sint, quam visa homini in somno apparentia, seu operatio imaginationis circa phantasmata per somnum oblata: in somnia illa, de quibus hic agendum, sunt ea, quæ vel præter consuetudinem longius, & totam ferè noctem durant, vel animum ita exercent, spiritusque exagitant, ut, quamuis omnia falsa & ficta sint, tamen non minus hominem moueant, & turbent, ac si verè acciderint. Vnde vel subito terrore percussi homines excitentur, & si euigilare non possunt, in somno anxietatem summam percipiunt, corpus variè iactant, præ angore sudant, ut excitati ita lassi sint, ac si maximos labores sustinuisent.

### Causa.

Et si verò & à Deo, & à Dæmone, qui, permittente Deo, falsis spectris, etiam per somnum, homines terret, talia somnia immitti extra dubium sit; atque illud etiam sit certum, ab actionibus diurnis, quas memoria per somnum suggerit, somnia multa excitari, de quibus Claudianus:

*Omnia, quæ sensu voluntur, vicia diurno.*

*Tempore nocturno reddit amica quies:*

Tamen illa non sunt ea, quæ Medico considerata veniunt; sed illa, cum à causa interna homo grauioribus, & immoderatis somniis vexatur. Vnde nec huc pertinent in somnia illa graui, quæ à morore, timore, sollicitudine, & similibus causis ortum habent, illisque sublaris cessant.

Causæ autem illæ sunt vapores impuri, tæti, melancholici, à cibis vel humoribus eiusdem naturæ copiosius exhalantes, spiritusque animales inquinantes, & exagitantes; vel intemperies cerebri, vapores ab inferioribus adscendentes, & spiritus in cerebro agitant.

In somnia graui quæ excitent.

Primo enim cibi, & assumpta quædam terribilia somnia faciunt, ut fabæ, lentæ, lolium, phascoli, brassica, pastinaca, scruca, allium, simlacis semina. Pertinet huc & vitium, quod saepe copiosius sumptum somnū inquietat, & somnia graui facit; ut & narcotica pleraque. Vide Prosper. Alpinum, *de med. Egypt. lib. 4. cap. 2.* ubi refert, Egyptios certò affirmare, si assium, vel asis, vel bosa, vel bernaui, vel bers (descriptio horum medicamentorum narcoticorum allegato loco habetur) assumant, se in somno multa & varia, quibus delectantur, obiecta, ut viridaria, & hortos, puellas, & milites, bella videre: quod procul dubio accidit, vapore medicamentorum illorum narcoticorum ad cerebrum delato, spiritusque turbante, ac phantasmata varia obiciente, accedente in primis forti desiderio cum imaginatione huiusmodi res in somno videndi.

Secundò humores prauis, corruptis, melancholicis. Hinc ii, quibus cibo ventriculus nimium repletur, vel quibus cibus in ventriculo corrumpitur, ut inde multi vapores ad caput adscendant, inquietè dormiunt. Accidit hoc sæpius infantibus, qui, cum lac copiosius, quàm par est, sugunt, id ipsis in ventriculo corrumpitur; unde vapores prauis & acres ad caput eleuantur, spiritibusque permixti eos turbant, unde vel excitantur, & nimis vigilant, vel grauib. in somniis terrentur. Quamdoque etiam ex toto corpore & venis vapores tales ad caput copiosius attolluntur, id quod saepe accidit in febribus, unde prouerbum ortum: *Per febrem somniare*, quod scilicet plura absurda febricitantibus in somno, quàm sanis occurrant. Idque hominibus magis in supino decubitu accidit, cum in eo vasa magna in dorso caleant, & vapores copiosos ad caput mittant. Nonnunquam ex parte aliqua priuata tales vapores eleuantur, quod ex liene & hypochondriis fit frequenter in melancholicis, nonnunquam ex utero.

Tertiò si cerebrum sit calidum, vapores adscendentes, & ipsos spiritus animales turbat. Vnde homo vel vigiliis p. n. vel in somniis grauib. vexatur.

### Signa Diagnostica.

Ipsi homines hac de re, & de somniorum grauitate conqueruntur, & somno lassitudinem percipiunt. In infantibus ex eo id cognoscitur, quod inter dormiendum gemunt & concuriuntur, excitati clamant & plorant, nec placari possunt, fetidus odor saepe ex ore exhalat, calor percipitur in iis.

Signa diagnostica.

Causæ etiam iis signis facillè cognoscuntur. Si è ciborum, vel copia, vel qualitate malum proueniat, id ex diætâ, & cibis, quibus æger usus est, cognoscitur. Humores seu in toto, seu in parte aliqua abundantes etiam iis signis deprehenduntur. Cerebrum nimis calidum ex signis supra, *part. 1. c. 1.* propositis innotescit.

### Prognostica.

1. Ut iucunda & læta somnia hominis sanum, & bonum statum indicant: ita tristia & horrenda plerumque morbi imminenti sunt indicia, & melancholicam constitutionem significant.

Prognostica.

2. Somnia graui & terribilia corpus debilitant.

### Indicationes & Curatio.

Si æger cibus, vel flatulentis, vel prauis usus est, pro iis melioris succi substituendi. Si nimia copia sint ingestæ, cœna parca & sobria vitium hoc emendat; in primis si æger non statim à cœnâ se cubitum conferat.

Curatio in somniorum grauium.

Humores, vel in toto, vel in parte aliqua abundantes, & vapores, qui spiritus turbant, suppeditantes, euacuari, vel venæ sectione, vel purgatione; & dispositio vitiosa corporis, quæ humores illos generat, emendanda, de quo supra, *part. 1. cap. 5. & seqq.* dictum.

Post cœnam etiam exhibenda ea, quæ vaporum ad caput adscensum prohibent, quæ etiam supra, *part. 1. c. 6.* sunt proposita.

Calida euaporatio à cibo vel potu, vino præsertim, adscendens, in somniorum causa, frigida in fine cœnæ, vel aceti potu suppressenda. Vnde nonnulli, si dormitum ituri haustum aquæ frigidæ sumant, præsertim post vini usum, suavius dormiunt. Vitandus quoque decubitus supinus.

Si ab intemperie cerebri calida sit malum, alteranda ea, & curanda, vt supra, *part. 1. c. 1.* dictum.

Simul ea vsurpanda, quæ retros illos vapores, spiritus turbantes, discutiant. Melissa in cœna comesta contra molesta insomnia commendatur; vt & rad. buglossi puluerisata cum aq. fl. tiliz. Landatur etiam oleum anisi, si eius gutta vna atque altera linguæ, vel narium illinatur; modo malum non sit ab intemperie cerebri calida.

Pulvis, qui somnia horribilia arceat, & somnum inducit:

*℞. Smaragd. hyacinth. margarit. corall. an. q. s. F. Pulvis.* Sub noctem detur *Scrup. i.*

Si in infante malum proueniat à lactis in ventriculo corruptione, videndum an lac à nutrice non bonum suppedietur; idèoque vel nutrix mutanda, vel danda opera, vt lac corrigatur. Si copiosius tumpserit infans lac, parcius præbendum. Si ob ventriculi debilitatem corruptatur, extra oleo absinth. menthæ, mastichinæ ventriculus inungendus, vel emplastrum aliquod stomachale imponendum. Lac verò corruptum è ventriculo abstergendum melle, vel simplici, vel rosarum solutio.

## CAPVT IV.

### De Vertigine, & primò in genere.

#### Nomen.

*Vertigo.*

**V**ertigo affectus est à symptomate sic denominatus. Qui enim hoc malo corripiuntur, iis omnia in gyrum circumagi videntur. Diciturque Latine vertigo, Græcis *δινος*, *παρα δινος*, *ελλειγος* item, & *ελλειγος σκοτωμα*, *σκοποδινος*, *σκοποδινος*, *σκοπομαλινος* *αδινος*: quibus nominibus non species distinctæ, sed mali eiusdem diuersi gradus significantur, ac discernuntur.

Nam cum solum circumagi corpus, vel exteriora videntur, *δινος* & *ελλειγος* vocatur: quando verò simul oculi veluti offusæ caligine, obscurantur, *σκοτωμα* & *σκοποδινος*, seu vertigo tenebrosa appellatur, quæ sæpe ita ingrauescit, vt æger protinus concidat, nisi prehensilis proximis adminiculis seie fulciat, ac sustentet. Barbari verò Scotomiam appellant, & hoc nomine etiam in genere Vertiginem intelligunt; sed minus rectè. Neque enim omnibus, qui Vertigine laborant, tenebræ, quod *σκοτωμα* vox propriè inquit, offunduntur; etsi omnes, qui *σκοτωμα* patiuntur, etiam vertigine laborent. Nonnulli tamen inter *σκοτωμα* & *σκοποδινος* distinguunt, & *σκοτωμα* adhuc lenius malum, quàm sit *σκοποδινος*, esse volunt, ita vt *σκοτωμα* sit, cum sine circumactione, aut illa sanè leui, tenebræ offundi videntur, aut solum fumi, nubes, muscæ, volitare ob oculos purantur; vt ita *σκοτωμα* sit *σκοποδινος* incipiens.

Aliud verò à Scotomate malum est *υποχυμα* improprie sic dictum, quando è ventriculo fumis ad caput adscendentibus, aut per ardentium febrium vigorem, aut phrenitidem, fumis è calido humore elatis, & spiritui optico permixtis, pupilla nonnihil occluditur, visusque obtenebratur, quod etiam instante crisi per hæmorrhagiam narium fieri conuenit. Illud enim omne absque circumgyrationis phantasiâ accidit.

#### Definitio.

Etsi verò certum sit, animalis functionis læsionem in vertigine accidere: tamen quæ actio lædatur, non ita planum est. Alij enim visum, alij sensum communem, alij imaginationem, alij motum, & sensum deprauari existimant. Verum cum ista controuersia in Institut. *libr. 2. part. 3. sect. 1. cap. 9.* explicata sit, breuiter hic omnia complectimur, statuimurque principaliter, & semper imaginationem, & sensum communem in vertigine lædi. A visu quidem plerumque huic malo occasio primùm præbetur, & tum sensus communis, & hinc phantasia etiam afficitur: attamen & oculis clausis à motu vertigo excitatur; imò ebris idem accidit. Et vertigine nonnunquam homo corripitur, etsi nulla vel à visu, vel à motu, aut certè leuis occasio præbeatur. Et præcipua læsio est phantasiæ, ac Vertiginosi ea, quæ quiescunt, in orbem circumgyrari existimant, idque in omni vertigine accidit, siue occasio per visum præbeatur, siue abique tali occasione ab interna causâ exciteatur. Neque tamen hinc sequitur, quod vertigo sit delirium, de quo cum Altimaro disputat Massarias, *cap. de vertigine*; cum non qualibet functionum principum deprauatio delirium sit, sed solum, quæ in compositione aberrat, non verò, quæ in apprehensione simplici; id quod hic accidit, cum obiectum quietum pro moto apprehenditur.

Et quidem si à visu occasio Vertigini præbeatur: & sensus communis ac phantasia afficitur, & vterque rem, quæ quiescit, quasi motu agitatam apprehendit. Cum enim spiritus animalis obiecta sensuum recipiat, & ad sensum communem ac phantasiam deferat, si ille p. n. moueatur, obiecta quoque moueri videntur. Habetque se res, vt in aliis rebus visibilibus. Etenim vt, si rei albæ species per vitrum flauum, aut rubeum in oculum admittatur, res rubra, vel flaua appareat: ita etiam res quiescentes moueri videntur, si spiritus animales non rectè in oculos, sed circulariter agitati, influant. Si verò ab internâ tantum causâ exciteatur Vertigo, & oculi sint clausi, solum imaginatio afficitur, non verò simul sensus communis utpote qui non agit, nisi ab externo sensu motus, & externorum sensuum obiecta medijs sensibus exterioribus percipit. Secundario postea motus, & visus sæpe læditur. Cum enim à phantasia gressus animalis regatur, accidit, vt læsâ imaginatione consequenter lædatur motus, & ægri concidant: aut quia spiritus animales in anteriore cerebri parte p. n. moti etiâ eos, qui ad organa motus influunt, turbant, ac, vt inordinate moueantur, efficiunt, vnde fit, vt, spiritibus animalibus non, vt par est, in organa motus influentibus, ægri collabantur; aut, vt aliis placet, cum omnia circumagi videantur, non habent, vbi gressum figant ægri.

Et quia spirituum hoc vitium oculis quoque communicatur, tenebræ simul oculis oboriuntur. Vtrumque tamè etiam euenire potest, vt & aliorum sensuum læsio, quod spiritus animales in organa sensus ac motus non influant. Etenim cum spiritus animales rectâ lineâ in nervos influant, si hi circulariter moueantur, nervos præterlabuntur; sicut aqua, quæ in vase aliquo circulariter mouetur, è vase non effluit; etsi illud perforatum sit.

Sed & auditus nonnihil deprauatur interdum, vt levis fluctuatio obaudiatur, spiritu illo fatalento, spiritibus animales turbante, etiam ad neruum *ακουστικον* pertingente.

In nonnullis etiam olfactus, in aliis gustus læditur, teste *Ægineta, libr. 3. cap. 12.*

Ratiocinatio autem, & memoria salua est: cum Vertiginosi in ipso paroxismo agnoscant, se errare, & post paroxysmum omnium recordentur.

Quandoque tamen etiam sine Vertigine oculi obtenebrantur, & varia corpuscula, ac colores, iis falsò offeruntur, & in auribus sibilus, & motus quidam percipitur,

pitur, si agitatio, & circumgyratio ea spirituum in cerebro non fiat, sed sola vaporum cum illis permistio. Quæ symptomata cum veram vertiginem præcedere soleant, ut docet Aëtius, *teirab. 2. serm. 1. in princip. cap. 7.* Rhases, *cap. 3.* sub nomine Vertiginis hunc affectum comprehendit, eundemque describit Auicennas, *prima seri. 17. 5.*

Locus affectus in vertigine.

Locus affectus est cerebrum, & quidem quatenus pars organica, & spiritus animales continet; ac quibusdam meatibus, in quibus illi mouentur, est præditum; & quidem secundum partem potissimum anteriorem, quæ organis sensuum externorum propior est: quamquam & reliquis postea communicetur, quod ex motu deprauato colligitur.

Causa proxima vertiginis.

Causam huius mali proximam quod attinet, etsi de ea alij aliter sentiunt: tamen si non solum perpendamus, quod vertiginosi omnia in gyrum circumagi imaginantur, sed & quod ex corporis circumgyratione Vertigo sanis quoque oboritur, facile colligere est, immediatam, & proximam causam esse inordinatum, & quidem circularem spirituum animalium motum, quem alij vndosum appellant, quod tale quid in spiritibus in cerebro fiat, quale in vorticibus aquarum. Cum enim visio fiat speciebus non solum colorum, sed & reliquorum sensibilibus, ut quietis, motus, & huiusmodi aliis per oculos receptis, atque à spiritu animali ad sensum communem, & phantasiam deductis: si spiritus illi, qui species oculo receptas ad sensum communem, & imaginationem deferunt, p.n. & circulariter moueantur, motus ille speciei imprimitur, non aliter, ut antea etià dictum, ac dum res alba per vitrum coloratum adspicitur, atque ita res quiescens moueri putatur. Omne enim, quod recipitur, per modum recipientis recipitur.

Vertigo quid.

Atque ita Vertigo est imaginationis, ac sensus communis læsio, ac deprauatio talis, ut omnia in gyrum circumagi videantur, à circulari spirituum animalium motu in cerebro ortum habens. Nonnunquam tamen, ut dictum, etiam sensus externi simul afficiuntur.

### Causæ.

Causa vntigini.

Inordinatus autem ille, & circularis spirituum animalium motus, quem modo Vertiginis causam proximam & continentem esse diximus, non ab vna causa proficiscitur; vnde accidit, ut alij aliter de causis vertiginis sentiant. Commodissime à causâ hæc ita diuidi possunt: Causâ circularis, & inordinati spirituum animalium motus, sunt vel internæ, vel externæ. Internæ, vel in capite hærent, & vertiginem per essentiam pariunt, vel aliunde adueniunt, & vertiginem per consensum pariunt; qui fit vel ratione totius, vel partis alicuius, ut ventriculi, intestinorum, hepatis, lienis, vteri.

Primo nimirum, & plerunque illam circumgyrationem parit *ἀνωστὸν ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ κεφαλῇ πνεύματος*, inordinata motio spiritus statuosus per venas, & potissimum per arterias, in cerebrum effusi. *Πνεῦμα* enim hoc *ἐστὶν αὐτὸ τὸ πνεῦμα* cum *ἀπὸ τοῦ κεφαλῇ* in cerebro mouetur, spiritus animales quoque agit, & impedit, ut in illis angustiis occlusi in sese motu circulari conuertantur, & phantasiâ falsâ hanc rerum externarum, vel proprij etiam corporis, speciem exhibeant. Atque hinc, qui imbecillo sunt capite, & qui flatibus abundant, facile vertigine tentantur, etiam ob externam aliquam leuem causam; & propterea Vertigo malum est senibus familiare, ob spiritum vaporosum, ex imbecillitate caloris naturalis & pituitæ copiam redundantem, motumque inordinato impulsu: *3. aphor. ult.* Chymici quidam vapores hos resinosos, ac sulphureos esse statuunt, non salinos, qui dolores capitis, vigilias, epilepsiam, & deliria excitant, ac proinde citra acrimoniam esse, & nullos dolores inferre, sed saltem spiritus turbare, inque tenebras offundere. Verum vapores omnis generis causâ vertiginis esse

possunt, modo ita sint dispositi, ut spiritus animales in gyrum agere valeant.

Initium autem motionis sumit *πνεῦμα φανταστικόν*, vel extrinsecus à leui aliqua occasione, vel intus à seipso, ut est vaporis, & spiritus omnis natura fluxa, ac mobilis, præsertim calidi ac tenuis. Hinc accidit, ut, qui in arteriis cerebri spiritus feruidiores habent, facile per se, vel etiam leui accedente occasione, vertigine corripiantur, quæ diu multumque, & facili de causa, sæpe etiam cum dolore capitis hominem infestat, ut & aurium tinnitu, & arteriarum in capite, & auribus præcipuè, pulsus, ac vix, nisi arteriarum apertione, curatur.

Hinc causæ antecedentes sunt omnes humores, & quibus vapor suscitari potest, sanguis nimirum, bilis, pituita, melancholia, & humor serosus; cum tam calidus, quam frigidus vapor vertiginem excitare possit, ut docet Galenus, *3. de loc. affect. cap. 8. & 3. aph. 23.*

Causæ istæ, & humores, vel in cerebro hærent, & calefacti, vel agitati vertiginem per essentiam generant, vel extra cerebrum geniti aliunde ei communicantur, ac vertiginem per *συμπάθειαν* excitant: quod pertinet & Ebrietas, quæ corpus vaporibus replet; vnde ebrij non raro vertigine corripuntur, & ebriosi vertigini sunt obnoxij.

Causæ verò *ἀεκαταρκτηαὶ* sunt omnes aeris in qualitatibus excessus; præcipuè austrina constitutio, teste Hippocrate, *3. aphor. 17.* æstus & mora sub Sole, & quæcunque alia foris incidentia subito humores fundere, agitare, & in vaporem dissoluere possunt; ut immoderata corporis exercitatio, præsertim à repletionem, balneum, ira, & aliæ animi perturbationes, Venus nimia, inædia in iis, qui eam ferre non possunt, ob bilem in ventriculo, qui ab Hippocrate *πυροχολοῖ* & *ἰσ* dicuntur; corporis item in gyrum conuersio, vel rerum externarum circumrotatarum adspectus, aut velox motus, vel aquarum vorticolarum adspectus, prospectus ab alto, adspectus rerum lucidarum, & Solis inprimis, sonus vehemens, ut tonitru, & bombardarum, percussio capitis & dorsii. Quorum quædam cum tam potentia sint, ut in sanis etiam vertiginem excitare possint, multo magis in ægris, & iis, quibus caput ab internis causis malè dispositum est, præstare valent. Inducit & vertiginem nonnunquam purgatio. Nam à medicamento purgante humores vitiosi, si adsint, agitantur; & qui sani purgantur, vertigine corripi solent, teste Galeno, *2. aph. 22. & libell. quos purgare oporteat.* Vapores enim ex colliuatione humorum etiam bonorum excitati, spiritus animales in cerebro motu inordinato turbare possunt.

II. Eandem spirituum circumgyrationem producit valorum, & meatuum cerebri angustia. Nam si spiritus animales per loca impedita moueantur, retrocedunt, ex quâ retrocessione fit motus circularis.

III. Spirituum illam circumgyrationem excitant omnia illa, quæ spiritus, etiam sine vaporis admistione, agitare, mouere, ac perturbare possunt. A causis tamen his facilius excitatur vertigo, si cerebrum sit debile, quod spiritus animales continere, & ut par est, ac si fieri assolet, distribuere non potest, sed causarum violentiæ facile cedit.

### Differentia.

Est quidem aliqua Vertiginis secundum gradus differentia, ut ex iis, quæ antea dicta sunt, patet, quod nunc *ἀεκαταρκτηαὶ* seu circumgyrationis species offertur sine visus obtenebratione; nunc visus simul quasi caligine offusâ heberatur; nunc malum adeo inualefcit, ut spiritus animalis in organa sensus ac motus voluntarij distributio impediatur atque ita homo concidat. Maximi verò momenti est illa differentia, quæ à causarum modo enumeratarum varietate sumitur, quod scilicet verti-

Vertiginis differentia.



go generatur 1. à vapore spiritus animales turbante, qui quidem, si in ipso cerebro generetur, Vertiginem per primum cerebri affectum constituit; si verò aliunde in cerebrum eleuetur, per *vaporum* atque quæ rursus varia est, pro locorum, quæ vaporem illum subministrant, varietate. 2. à vasorum & meatuum cerebri angustia, quæ fit ab eorum compressione, obstructione, coalitu. 3. à spirituum, sine vaporum permissione, à causis evidentibus, & externis agitatione. Quæ differentia cum ob curationem attendendæ sint, de singulis in specie agemus: prius tamen de vertiginis signis diagnosticis, prognosticis, & curatione in genere dicemus.

### Signa Diagnostica.

Vertiginis  
signa.

Sicui omnia in gyrum circumagi videntur, quæ reuerà quiescunt, aut homo ipse circumportari videtur, is vertigine laborat: quod tamen plurimis modis accidit. Aliis enim hoc solum contingit; aliis præterea & visus obscuratur; nonnullis sibilus quidam, vel tinnitus in auribus percipitur; quidam, nisi proxima adminicula præhendant, planè concidunt. Non tamen vlli, qui vertigine saltem laborant, voce & sensibus priuantur, neque conuulsione tentantur: quâ ratione ab apoplexia & epilepsia vertigo differt.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Vertigo, quæ citra externam & evidentem causam non accidit, leuior est, quam quæ etiam sine euidente causâ inuadit.
2. Vertigo, præcipue grauior & diuturnior, est affectio epilepsia & apoplexia proxima, & ad has quasi via, teste Galeno, 2. *aphor.* 17. & 23. Si enim causâ illa augetur, tandem grauissima ipsa symptomata accersit.
3. Vertigo in senibus magis periculosa; quia ipsorum cerebrum debile est, & calor in eo paucus, pituita verò abundans. Et si frequentius senibus malum accidat, præsertim cum magna sensuum perturbatione, apoplexiam tandem affert.
4. Periculosior est Vertigo, in qua caput, vel corpus circumagi videtur, quàm in quâ saltem externa, & in qua fit vehemens vius læsio, ob causâ vehementiam. Et si Vertigo adeò inualeat, vt homo concidat, apoplexia & epilepsia prænuincia est.
5. Vertigo à calidis humoribus citius soluitur, quàm à frigidis.
6. Quibus in vertigine viridis aut purpureus color obuerfatur, ad epilepsiam; quibus ater, ad apoplexiam; quibus rubens, ad maniam magis proni censentur.

### Indicationes.

Indicationes.

Cum vertigo fiat ab inordinato, & circulari spirituum animalium motu, danda opera in paroxysmo, vt spirituum animalium motus ille sedetur, & causæ, quæ spiritus agitant, si adhuc præsentés sint, tollantur. Extra verò paroxysmum ad præcauendum, ne malum recurrat, singulæ causæ, prout natura earum id requirit, & postulat, tollendæ. Diæta quoque pro varietate causarum idonea instituenda, ac vitanda omnia, quæ caput replent.

### Cura in Paroxysmo.

Cura vertiginis in paroxysmo.

Itaque vt in Paroxysmo inordinatus spirituum animalium motus sedetur, æger ad quietem componatur: & si ab inferioribus humores & vapores ad caput tendant, reuulsiones, ac diuersiones, instituendæ, & proinde inferiores partes ligandæ, & fricandæ, quod in plantis pedum sale & aceto fieri potest, donec, si fieri possit, somnus superueniat; facies vino adspargenda. Si insignis sit Vertigo, non solum frictiones in-

stituendæ, sed & glandes, ac clysteres indendi. Hinc odoramentis vtendum, causâ tamen adhibita distinctione. In calidâ ex aceto cum aq. rosar. in frigidâ fiant odoramenta ex aceto cum molicho, ambra, spec. diamb. sem. nigellæ. Narium foramina inungantur oleo destillato nucis molchata, aut maioranæ, aut galbani. Tépota & manuum carpi fortiter fricentur aquâ, & aceto rosaceo, additâ pauculâ aquâ cinamom. ori indatur momentum salis, aut cinamomum, & macis masticanda dentur. Si ex fame sit Vertigo, quod in picrocholis fieri solet, mica panis in succo cydonior. granator. vel vino aultero intincta exhibenda. Marcellus, *de medic. cap.* 3. scribit, Vertiginem citò tolli, si betæ nigra succo tepora illinantur: item si abrotonum tritum in vino tepido bibatur, vel cum oxymelite non acri exhibeatur: vel applicetur fronti serpillum, aut aqua eius; temporibus ac ceruici affricetur aqua rosar. & vini.

Interdum tam vehemens est vertigo, & tam diu durat, vt apoplexia & epilepsia metuenda sit. Idcoque tum, ægro reclinato, & clytere præmisso, venam aperire, aut cucurbitulas cum scarificatione applicare, & palatum theriacâ vel Mithridatio inungere opus est.

Et si verò de venæ sectione in tempore paroxysmi instituendâ in vertigine controuersia sit, atque eandem nonnulli dissuadeant, metuantque, ne vires, quæ tum debiliores sunt, magis debilitentur: tamen si diuturna, & vehemens sit vertigo, & ea sit ægri constitutio, vt omnino, si apoplexia illum inuadat, venæ sectio instituenda sit; hinc verò apoplexiæ periculum imminet: causâ nulla est, cur non admitti debeat venæ sectio, si adsint Indicantia, quæ eam postulent.

Nonnulli, si vertigo per consensum à partibus inferioribus fiat, intercipientia quoque vsurpant, & medicamenta siccantia, atque adstringentia venis, atque arteriis iugularibus apponunt.

Quæ verò extra paroxysmum instituitur curatio, tota ad præseruationem, ne malum recurrat, dirigenda: quæ cum varia sit pro causarum varietate, de ea postea in specie dicetur.

Hoc saltem hic addo, ad præseruationem commendari semen carui maceratum in vino, & postea siccum, si quotidie sub horam decubitus cochlear dimidium diu masticetur, tandemque deglutiatur, idque per dies aliquot continuetur.

### Diæta.

In diæta ea conferunt, quæ humorum & spirituum inordinatum motum sistunt, & nullo modo motui isti causam præbent. Aer sit temperatus, non admodum lucidus, tempore paroxysmi: fugiendus crassus, humidus, nebulosus, qui vertiginem excitat, vt est apud Hippocratem, 3. *aphor.* 17. Caueat æger ventos, vitet quoque radios Solis & Lunæ: cibus sit causâ vertiginis aduersus: nocent omnia alimenta difficilis coctionis, & prauisucci, ac quæ vapores, & fumos multos ad caput mittunt, vt fabæ, pisæ, & alia legumina, lac, pisces viscosi, conchyliæ omnia, castanæ, auellana, nuces tancidæ, alium, porrum, cepæ, raphanus, & omnia huiusmodi supra; *part. 1. cap. 1.* proposita. Vitet æger etiam ciborum varietatem, & nimiam repletionem. Potus non sit vaporosus; ideoque vinum non bibendum, nisi ventriculus sit imbecillis ex frigiditate, aut vires in toto corpore deficient: vel parçè bibatur, & tenuius, non vinosum.

Cereuisia non multo lupulo sit condita, quæ caput replet. Post cibum sumenda, quæ os ventriculi claudunt, & adscensum vaporum ad caput impediunt, vt coriandr. præpar. cum nuce molchata, cydonia condita, vel diacydonium. Nonnulli crystallum appensum vertiginosis prodesse censent, atque ex poculo inde parato bibere, vel potui crystallum imponere iubent.

Motus, qui sit ventriculo vacuo, moderatus non est incom



incommodus, modò non fiat capite, vel dorso inclinato: vice exercitij sunt frictiones, quæ à supernis partibus ceptæ desinunt in inferiores.

A cibo non statim dormiendum. Vitandus ad spectus rerum, quæ circumrotantur, & in gyrum aguntur, vel celeriter mouentur, vt rotæ, & impetuosa flumina. Eger ex alto non despiciat, turbam etiam hominum, qui hinc inde ambulant, & mouentur, viter. A Venere abstinendum, nisi à mensibus suppressis, vel semine retento fiat vertigo. Cauendæ animi perturbationes nimis ira, mœsticia, alius sit apertæ, &, nisi singulis diebus officium faciat, arte irriteretur.

Secundò.

De Vertigine in specie,

Et primò

De Vertigine per essentiam.

Causa.

Vertigo à  
san.

Si in capite status ille, vel vapor generetur, sit vertigo *id est* idiomatice, eaque ab omnibus causis, quæ status, & statuum materiam in capite generare possunt, quales sunt sanguis spirituosus & feruidus, ac alij humores, è quibus status, & spiritus eiusmodi eleuantur in capite cumulat: plerumque verò iis accidit, quibus consuetæ cerebri euacuationes supprimuntur, idque Galenus exemplo ostendit eorum, qui, cum soliti essent purgari per aures ab excrementis cerebri, euacuatione illâ suppressâ facti sunt vertiginosi, & auribus reclusis, exituque iterum patefacto à vertigine liberati sunt, *comm. 2. in 6. epid. text. 29.*

Carolus Piso, in libr. de morb. ex collun. serosa in Vertigine animalem spiritum tumultuari, ac moueri scribit à feruente sero in capite; & ad suam sententiam probandam affert locum Hippocratis, 2. de morb. vbi hæc habentur: *Aqua si in cerebro oborta fuerit, dolor acutus syn-  
cipui, & tempora, interdumque alia capitis parte desinet,  
subindeque rigor, ac febris, oculorum regiones dolor occu-  
pat, sique caligant, pupilla scinditur, ac, si surrexit, ipsum  
Vertigo tenebrosa prehendit, &c.* Neque hinc de hydrophobia, quæ Mercati sententia est, sed de hemicrania Vertiginosâ agere Hippocratem statuit. Quod vt sæpissime verum esse existimo: ita nihil ob stare puro, quin & ex aliis humoribus eiusmodi vapores eleuari possint: sicut & vapores ex inferioribus adscendentes, ac vertiginem excitantes non omnes à serosis, sed & ab aliis humoribus proueniunt.

Signa Diagnostica.

Signa verti-  
ginis statu-  
luna.

Per affectum primarium, & à spiritu flatulento in ipso cerebro genito Vertiginem produci, cognoscitur ex præcedente capitis dolore, & grauitate, ex aurium tinnitu diurno, ac sensuum externorum quadam læsione; in nulla verò alia corporis parte aliquid mali, quod vertigini causam præbere possit, deprehenditur. Malum ipsum frequens est, vel continuum; nec citò discutitur: & ex leui causâ atque à populo homo vertigine corripitur, & præcipue cum imaginationem in aliquid inrendit. Vide Galenum, 3. de loc. affect. cap. 8. Et quidem si vapor ille (quod plerumque fit, unò à nonnullis semper fieri creditur) sit calidus, & à sanguine feruidiore ortum habeat, cognoscitur id ex temperamento corporis calido, ex tumore & pulsatione arteriarum in capite, ex rubore, & colore faciei, & signis aliis, *part. 1. cap. 8. supra* propositis. Alij etiam humores, qui flatibus & vaporibus præsent materiam in capite abundantes, signis, *ibid. cap. sequ. propositis* cognoscuntur.

Prognosticum.

1. Periculosior est Vertigo, quæ sit per *id est* idiomatice, *Prognostica.* quàm quæ per *id est* idiomatice.
2. Si vertigo hæc adeò inualescat, vt homo concidar, apoplexiæ prænuucia esse solet, vt antea dictum.

Indicationes.

Quid in paroxysmo, agendum sit, antea in genere *Curatione* dictum. Extra paroxysmum verò primò materia illa, *id est* idiomatice, è qua vapores illi generantur, conuenienti modo tollenda, & euacuanda: deinde vapores discutendi: tandem ille cerebri morbus, ob quem materia, & vapores illi generantur, tollendus, & cerebrum roborandum.

Auxilia.

Itaque si sanguis siue in toto, siue in capite abundet, vena aperiatur, & sanguis per intervalla educatur, capite reclinato, cum vertiginosi faciliè ex qualibet occasione vertigine corripiantur, & concidant. Aperiatur autem, si sanguis in toto simul abundat, primò basilica, vel communis, hinc cephalica: si verò in capite præcipue, statim cephalica. Et omnino in venæ sectione, si causâ mali sit sanguis nimis spirituosus, aut flatuosus curationis maxima spes est sita; cum sanguis arteriarum & venarum in cerebri sinibus confundatur, atque ita venâ apertâ sanguis spirituosus euacuari possit.

Post cephalicam Rhales, & Auicennas venas post aures incidunt. Non incommodè quoque vena in fronte aperiiri potest. Galenus, 3. de loc. affect. c. 8. & 2. de tuend. sanis. cap. 9. arterias quoque aperit, si scilicet vasa illa multo sanguine calido turgeant, & malum vehemens sit. Verùm quid de arteriarum sectione statuendum sit, *suprà, part. 1. cap. 6. quæst. 2. dictum*: hoc saltem hic repetimus, experientiam non raro docuisse, post varia remedia frustra adhibita arteriarum apertionem tandem profuisse, vbi scilicet in spirituosos sanguine in arteriis causâ mali hæret. Res igitur diligenter exploranda, & si certi sumus, sanguinem in arteriis causam mali esse, sectio arteriarum nonnunquam necessariò instituenda. Præcauetur autem omne periculum, si tota arteria transversim incidatur. Reuulsis enim vtrinque partibus dissectis, ad sibi continuas vulnus facilius coalescit. Quod tamen *suprà* etiam monuimus, diligenter hic perpendendum, quænam arteriæ vapores, & humores ad caput deferant. Dextra nimirum capite, vbi opus est, arteriarum quæ retrò, tum quæ secundum vtramque aurem sunt, propterea in fronte, & temporibus curiosè tangendæ sunt, quarum quæ calidiores aliis apparent, & maiorem pulsum exhibent, incidendæ sunt.

Si enim in arteriis internis spiritus ille flatulentus contineatur, (id quod ex eo cognoscitur, quod abest rensis & pulsatio vasorum externorum; adest verò colli dolor fortis, non tamen ex nervis affectis: nec vertigo remittitur per compressionem vasorum externorum, siue per fascias, siue per laminam plumbeam, siue digitis factam, neque per compressionem adstringentium) frustra externa secatur. Atque in eo casu Rhales inbet cucurbitulas scapulis apponere, quæ sint quasi vicariæ sectionis vasorum internorum latentium. Vide Galenum, 13. meth. med. cap. ult. Scarificationes etiam loco venæ sectionis, vel post illam, ad deriuationem faciendam, in scapulis, & collo cucurbitulis applicatis profunt.

Si verò alij humores abundant, purgatio conueniens secundum singulas humorum species instituenda: quod quomodo fieri debeat, *suprà, part. 1. propositum*. Et in primis in humore pituitoso vtile est electuarium *suprà, part. 1. cap. 10. propositum*, quod nonnulli Thariacam Hippocratis nominant: de quo hoc notandum: nonnullos pro absinthio,

maxime.

marrubio, stœchade, siccis, eorum succum sumere.

Medicamentis suprâ enumeratis pilulas istas addere liber.

℞. *Agaric. el. Vnc. β. myrobal. chebul. cubeb. an. ʒ. ii. rad. asari, sem. pœon. ligni aloës, Zingiber. an. Scr. β. mastich. cardamom. spica nard. an. gr. xv. trochiscor. albandal. Drach. β. gr. xv. extract. hellebor. nigr. pœon. an. gr. v. ol. maioran. ruta, caryophyllor. an. gut. j. aloës rosar. Vnc. iβ. Cum benedict. laxativ. F. Pilulæ, quarum Scrup. ii. vel Drach. j. bis in mense, vel singulis septimanis sumatur.*

Alia: ℞. *Pil. cochiar. Scr. ii. extr. solutor. Scr. β. pulu. cubeb. gr. iii. Cum aq. salu F. Pil. num. xxi.*

Vel hoc Decoctum propinetur:

℞. *Rhabarb. elect. Scrup. ii. agaric. alb. Drach. i. fol. fenae elect. Drach. iii. sem. fœnicul. Scr. i. carui Drach. β. zingiberis Scr. β. schœnanth. gr. vii. herbar. beton. meliss. an. P. ij.*

Infunde per noctem in aq. betonice. Mane decoq. pro Vnc. iβ.

In quibus dissolue *syrup. rosar. sol. Vnc. β. extract. panchymag. gr. v. aq. cubeb. Drach. i. Misce.*

Vel hæc portio:

℞. *Aq. rorismarini, meliss. an. Vnc. i. flor. lauendul. Dra. ii. extract. helleb. nigr. Scrup. β. panchymag. gr. xii. syrup. cichorii cum rhabarb. Drach. iii. spir. ʒ. gutt. ii. aq. pœon. Drach. i. Misce.*

Postea ad particulares capitis euacuationes per sternutatoria, erthina, masticatoria, apophlegmatismos deueniendum, quæ etiam suprâ sunt propositæ. Erthina quidem nonnullis suspecta sunt, quod metunt, ne eo motu humores & spiritus in cerebro magis agitentur, & vertigo exciteretur. Verum si capitis euacuationes conuenientes præcesserint, nihil tale metuendum.

Fiant & deriuationes omnis generis, per vesicatoria, setacea, cauteria, si opus sit, de quibus etiam supra dictum.

Vaporum quoque imperus reuellendus est frictionibus, à collo per spinam ad inferiora sensim ad extremitates perueniendo, eaque fricando. Post has frictiones, quod in capite collectum est, discutiatur, caput panno fricetur, non tamen calefacto.

Tandemque adhibenda, quæ vapores illos discutiunt, & caput roborant, tam interna, quam externa medicamenta.

Inter interna sunt cephalica calida, suprâ proposita, *part. i. cap. i.* & ex iis præcipue *rosmarinus, betonica, salvia, melissa, maioran. euphrasia, flor. stœchad. Arabic. lauendul. sem. pastinac. sylvestr.* Inprimis vero commendantur *radices Doronici*, quas comedere solent contra Vertiginem, qui in alpihus damas persequuntur, vt & *auricula ursi*; quam similiter venatores contra vertiginem usurpant, & inde *Schwindel-oder Rastvurkel* nominat, teste Bauhino, in *Tabernamont. rom. 2. pag. 40.* Commendant etiam nonnulli stercus pavonis, idque (& quidem masculi masculis, fœminis fœmellæ) pulueris mixtum exhibent: alij Drach. j. per noctem vino alao macerant, & per linteam colant, & propinant; huiusque vsu etiam inueteratam vertiginem curatam fuisse testantur. Exhibentur etiam *margarita, succinum, corallium.*

Commendatur & oleum succini, anisi, fœniculi, cumini, caryophyllor. lauendul. nucis mosch, maioran. rosmarin. balsamæ ex iisdem.

Composita: *diamb. diamosch. theriaca, Mitbridatiū.*

Vtilis est & hic Puluis:

℞. *Macis Drach. ii. cinamom. Drach. i. fol. euphragie Vnc. i. stœchad. Arab. flor. lauendul. an. Drach. ii. sacchar. ad pondus omnium. F. Puluis, cuius dosis ad ʒii.*

Vel ℞. *Sem. cumini, carui, anisi, fœnicul. an. Drach. ij. flor. lauend. Drach. iβ. F. Puluis.*

Vel ℞. *Euphragia cum floribus Vnc. β. macis aceto prepar. Drach. i. coriand. prepar. Scrup. iii. cubeb. Dra. β. sacchari candi Drach. vi. F. Puluis, de quo sumatur Drach. j.*

Efficaces sunt & sequentes Pulueres:

℞. *ardamomi vtriusque Drach. iβ. cubeb. Scrup. ij. carui Scrup. iii. cumini Drach. iβ. cinamom. Drach. iij. cort. myrobal. chebul. Drach. iβ. rad. bryon. Drach. iii. sem. papav. albi Drach. ii. fol. veronic. euphrag. lauendul. an. P. i. cap. stœchad. Arab. num. iii. sacchari olbi Vnc. iβ. F. ex omnibus Puluis tenuissimus, qui Dresdæ in vsu est.*

vel ℞. *Cubeb. Drach. ii. cardamom. sem. sinapi, cinamom. macis, ligni aloës, an. Drach. iii. spec. dianthos Scr. i. diamosch. dulc. Scr. ii. ambr. grysea. ver. zingiber. albi, maioran. an. Drach. β. sacchar. albiss. Vnc. v. M. F. Puluis.*

Vel ℞. *Sem. pœonia, nuc. moschat. coriandri prepar. visci q. an. Drach. iβ. cubeb. galange, piperis, tormentill. zingiber. an. ʒ. β. flor. rorismarin. Drach. i. adde sacchari. Vnc. iii. F. Puluis subtilissimus.*

Vel ℞. *Spec. arom. Drach. β. pulu. nuc. moschat. succin. albi prepar. margarit. prepar. an. Drach. i. macis Drach. β. ligni aloës Scrup. β. ol. carui fœnicul. an. gut. iii. nuc. mosch. gutt. ii. sacchar. Vnc. iii. β. M. pro Tragea.*

Commendatur à nonnullis etiam contra vertiginem, vt & contra epilepsiam, (etenim epilepsiæ ac vertiginis ferè eandem curandi rationem statuit Rondelerius) Puluis ex cinnabari natua:

℞. *Cinnabaris mineral. ver. Vnc. β. margaritarum, coralliorum. an. Scrup. ii. croci Scrup. i. fol. auri x. F. Puluis subtilissimus, cuius Scr. β. vel Scr. i. detur cum aq. lilior. conuall.*

Vel ℞. *Nucis mosch. Vnc. β. euphragie Vnc. ii. F. Puluis magnæ in vertigine efficaciz, qui detur manè à ʒ. j. ad Drach. iij.*

Efficax est etiam Confectio capitalis contra vertiginem D. Casp. Kegeleri:

℞. *Sem. pœon. excort. Vnc. iβ. nucl. auellana. Lamperti. excort. & parum incisar. prius in aquâ maceratur, & lotar. postea exsiccat. Vnc. iiii. granor. Paradisi, cardamomi, an. Vnc. ii. cubeb. Vnc. iiii. sem. anisi, fœniculi, an. Vnc. iii. carui, cumini aceto macerat. eruca, acori, filer. montan. nucis moschat. macis, an. Vnc. iβ. caryophyll. cinamom. optim. an. Drach. iβ. Zingiber. Vnc. β. flor. tilia. rorismarin. lauendul. an. Drach. iii. stœchad. Arab. Vnc. β. Cum saccharo albissimo F. a. Confectio.*

Vel ℞. *Granor. pœon. excort. coriandr. prepar. nucis mosch. galang. visci quern. cubeb. piper. long. cardamom. an. Drach. ii. zingiber. rorismarin. an. Drach. i. sacchar. alb. Vnc. iβ. F. Tragea.*

Possunt etiam ex pulueribus Rotulæ fieri:

Vel ℞. *Zingiber. alb. caryophyll. an. Drach. iβ. cubeb. cardamom. macis, an. Drach. i. sem. pœon. excort. nucis moschat. an. Drach. β. sem. ocymi caryophyllar. maioran. spica Indica, galang. an. Drach. i. sacchar. albi Vnc. viii. Dissoluatur saccharum cum syrup. stœchad. & add. conseru. lauendul. Vnc. i. Misce. F. Electuarium.*

Vel ℞. *Conseru. stœchad. betonice. an. Vnc. i. tunice, anthos, an. Vnc. β. spec. diamb. diapliris, theriaca, an. Drac. i. cum syrupo de stœchade. F. Electuarium.*

Vel ℞. *Conseru. anthos, lauendul. an. Vnc. β. maioran. Vnc. ii. euphrag. rosar. an. Vnc. i. calam. aromati. condit. myrobelanor. chebul. condit. an. Vnc. β. spec. diamb. Drach. i. ol. destill. fœnicul. carui, an. gutt. vi. caryophyll. nuc. mosch. an. gutt. ii. Cum syrup. de stœchad. F. Electuarium.*

Vel ℞. *Conseru. flor. rorismar. lauendul. betonice. an. Vnc. β. Mitbridat. Drach. β. elect. diacor. Vnc. β. pulu. nuc. moschar. macis, caryophyll. cubeb. cardamomi, an. Dra. β. sem. carui, fœniculi, fœnelios, eruc. an. Scrup. i. extr. pœon. visci querni gr. v. erula gr. viii. spec. diaplir. Scr. ii. diamosch. dulc. Drach. i. diagalange Drach. β. aq. theriac. apoplect. an. Vnc. β. spirit. ʒ. Drach. β. Cum syrupo de cortice citri*

*citri & mīuā cydonior. arom. an. q. l. F. Electuarium, seu Conditum, de quo manē & serō dosis nucis moschatæ magnitudine capiatur.*

Aut sumantur manē sem. fœnic. carui, grana juniperi, cubebæ, vel horum condita, & confectiones. Præcipue commendatur sem. pastinac. syluest. & aquilegiæ saccharo obductum.

Vel *℥. Pulu. rad. pœonia, ireos, margarit. preparat. an. Scrup. i. ol. destill. succin. cinamom. caryophyllor. carui, nucis moschat. an. gutt. iij. sacchar. in aq. lauendul. dissolut. Vnc. iij. F. Rotulæ.*

Vel *℥. Spec. diamb. diamosch. dulc. an. Scr. j. aromat. rosat. Scr. ij. corall. rubr. succin. alb. an. gr. xvj. cardamom. nucis moschat. santali citrini, an. Drach. sem. cubebæ. Scr. j. cinamom. macis an. Dra. sem. sacchar. Vnc. vj. Dissolu. in aq. rosar. & F. Rotulæ, quæ inungantur ol. anisi, vel fœniculi.*

Vel *℥. Margarit. preparat. corall. rubr. preparat. an. Scr. j. ol. caryophyllor. nuc. moschat. anisi, an. gutt. iiii. sacchari in aq. rosar. diss. Vnc. ij. F. Rotulæ.*

Vel *℥. Spec. dianthos, diamosch. dulc. arom. ros. an. Drach. β. extr. pœon. Scrup. j. ol. nuc. mosch. destill. gutt. x. fœnicul. gutt. vj. sacch. in aq. lauend. diss. Vnc. iiii. F. Rotulæ.*

Vel *℥. Sem. pœon. pastinac. syluest. carui, an. Scrup. j. rad. pœonia, visci querni, cubebæ. cranij human. prepar. granor. Paradis. an. Drach. β. spec. diamosch. dulc. Scru. ij. sacchar. albiss. in aq. rosar. & rorismar. dissol. q. l. F. Morfuli.*

Alij: *℥. Conserv. flor. beton. Drach. ij. myrobal. chebul. condit. Drach. i. cortic. citri condit. Drach. ii. spec. diamb. Scrup. j. dianthos. Scrup. β. pulu. puleg. Scrup. ii. cubebæ. caryophyll. cardamom. an. Dr. β. calami aromat. Scrup. i. extr. pœon. Scrup. β. galange gr. vii. smaragdi preparat. Scrup. β. solut. margarit. Scrup. ij. corall. rubr. Scrup. i. ol. carui, macis, an. gutt. v. nuc. mosch. gutt. viii. sacchar. opr. in aq. lilior. conuall. dissol. q. l. F. Morfuli Drach. ii. pondere, de quibus manē & serō vnus atque alter capiatur.*

Vel *℥. spec. diamosch. dulc. Scrup. ii. diamb. dianthos, diagalang. diaplir. an. Drach. β. pulu. cubebæ. cinamomi, cardamomi, an. Scrup. i. conf. anthos Vnc. sem. sacchar. albiss. in aq. beton. dissol. Vnc. iiii. sem. In fine adde ol. caryophyllor. gutt. iij. F. Confectio in morfulis.*

Vel *℥. sacch. ros. tabul. in aq. scorzonæ. dissolut. Vnc. iiii. rad. pœonia, ireos, scorzonæ. an. Scrup. sem. Doronici Drach. i. spec. dianthos, arom. rosat. diatrion. santal. an. Scr. i. extr. pœon. gr. x. ol. nuc. mosch. macis, an. gutt. iiii. cortic. citri, fœnicul. an. gutt. ii. F. Morfuli.*

Alij: *℥. Sacchar. albi lb. j. cinamomi, zingiberis, ireos, macis, nuc. mosch. cardamomi, cubebæ. caryophyll. an. Dr. i. fol. euphrag. ℥. sem. amygd. dulc. mundat. ℥. i. Cum aq. euphras. q. l. F. i. a. Morfuli.*

Vel *℥. Cubebæ. cardamom. fl. lauendul. an. Drach. β. macis, piper. longi, pyrethr. an. Scr. sem. mosch. ambra, an. gr. ii. Cum mucilag. tragacanth. aqu. cinamom. facta.*

Fiant Trochisci, qui in ore detineantur, & sensim deglutiantur.

Efficax est ad vertiginem depellendam Aqua vitæ rubra, Electoris Saxonie vulgo dicta, quæ hoc modo paratur:

*℥. Cinamom. opt. Vnc. i. sem. zingiber, alb. caryophyll. santal. rubr. an. Vnc. sem. macis, nucis moschat. piperis, galange, cardamom. cubebæ, Specier. aromat. rosat. diamb. dianthos, an. Dra. ii. sem. anisi, coriandr. prap. maioran. basilici, flor. lauend. anthos. spica nardi, an. Drach. ii. rosar. rubr. M. j. Incisa crasso modo infund. in spiritus vini opt. lb. v. aq. rosar. moschat. Vnc. ix. caryophyllor. cinamom. an. Vnc. i. (Caryophylli aq. borrag. macerantur, & postea destillantur; hæc est aq. caryophyll.) vini maluatic. lb. i. sem.*

Macerentur omnia per dies iiii. Postea exprimantur, & colentur per manicam Hippocratis.

Colaturæ add. sacchar. cand. lb. ii. Sinantur per bidan, Sennerti Tom. I I.

dum ita stare, deinde bis vel ter colentur, donec liquor clarescat.

Commendatur etiam valde aqua, vel spiritus rorismarini in Vertigine continua, præcipue à causa frigida, & hyeme, ac aëre frigido, cuius Vnc. β. exhibeatur; vt & aq. cinamomi, vel aq. & extract. scorzonæ, quæ peculiari proprietate contra Vertiginem opitulatur.

Est & hæc Aqua efficax:

*℥. Salvia, mentha crispa, an. M. i. flor. lauendul. M. ii. maioran. ruta, rorismarin. an. M. β. nucis mosch. caryophyll. macis, an. Vnc. β. granor. Paradis. cinamom. granorum, juniper. sem. pœon. an. Vnc. β.*

Infundantur in ℥. q. vini Rhenani vel Maluatici per dies aliquot, postea destillentur. Aqua hæc ad vsus tam internos, quàm externos commoda est.

Aliæ aquæ compositæ ad vertiginem descriptæ habentur in Institut. Efficaces sunt & sequentes, quarum prior Dresdæ in vsu est:

*℥. Veronic. M. iiii. euphrag. M. iiii. flor. malua M. ij. lauendul. rorismarin. cardui benedicti, an. M. β. stæchad. Arabic. M. j. rad. bryon. Vnc. iiii. castorei Drac. β. cinamom. Dra. i. sem. vini veteris optim. lb. iiii. aq. lauendul. veronic. tilia, lilior. conuall. betonic. an. lb. sem.*

Stent infusa in loco calido per biduum, postea f. a. destillentur. Dos is cochleare manē & vesperi, vel per se, vel cum pulueris contra vertiginem Dresdensis, supra descripti, Drach. j.

Vel *℥. Radic. bryonia, scorzonæ, an. Vnc. ii. β. pœon. Imperat. an. Drach. vj. herb. veronic. betonic. salvia, cardui benedicti, an. M. ii. sem. maioran. M. i. β. flor. anthos, lauendul. euphragie, an. M. sem. confect. anacardin. Drach. vi. cinamomi elect. Vnc. i. cubebæ. Drach. ii. ligni aloës Drach. i. sem. castor. elect. Drach. β. aq. veronic. lauendul. flor. tilia, an. Vnc. x. scorzonæ. vel salvia lb. β. vini Hispan. lb. ii.*

M. & infunde per dies 14. in loco calido. Postea destillentur.

Vel *℥. flor. lilior. conuall. lb. i. sem. lauendul. tilia, an. lb. sem. pœon. fol. beton. an. Vnc. ii. visci querni Drach. i. β. rad. pœon. Drach. ii. cubebæ. castorei, an. Dra. sem. macis, cardamomi, cinamomi, an. Drach. iiii. vini generosi Rhenani lb. v. Macerentur per dies 7. vel 8. Deinde destillentur per B.*

Et ne post pastum vapores multi ad caput adscendant, idque debilitent, talis Tragæa parari potest:

*℥. Confect. sem. coriandr. anisi, fœnicul. carui, cubebæ. an. Vnc. β. cinamomi Drach. ii. macis Drach. j. sacchar. rosat. tabulat. Drach. i. F. Tragæa.*

Vel *℥. Pulu. cydonior. exsic. Drach. j. sem. coriandr. Drach. sem. nuc. moschat. macis, an. Drach. i. mastich. sem. anisi, fœniculi, an. Drach. sem. cinamom. cortic. citri, ana Drach. j. sacchar. rosat. tabul. Vnc. v. Misce.*

Inter externa sunt odoramenta; ex nigellâ, maioran. castor. menth. & puleg. cum aceto.

Vel fiat tale Pomum:

*℥. Ladani puri Drach. ii. styracis calamit. Drach. β. benzoes Scrup. j. ol. destillat. caryophyllor. macis, an. gutt. iiii. gallia moschat. Scrup. j. F. Pomum.*

Vel paretur sequens Nodulus, & odorandus in manibus teneatur:

*℥. Summit. maioran. stæchad. Arab. an. P. i. flor. lauendul. rorismarini, an. P. sem. nucis moschat. Drach. sem. caryophyllor. cubebæ. an. Scrup. sem. sem. nigell. in aceto quinquies macerati Drach. ii. eruca Scrup. ii. castor. gr. iij.*

Ex concisis fiat Nodulus rotundus, ex serico rubeo cum stylo, qui manibus, vti dictum, teneatur.

Vel in aqua sequenti intingatur, naribusque sæpius admoueatur:

*℥. Aq. multipl. infus. flor. lauendul. Vnc. ii. apoplect. Vnc. sem. maioran. ruta, salvia, an. Vnc. i. cinamom. Dra. ii. Misce. Ballamum.*

*℥. Nuc. mosch. express. Dr. i. styrac. calamit. gr. v. Jada. ni gr. iiii. ligni aloës gr. ii. mosch. gr. iiii. ambra gr. j. ol. lauend. H h maioran.*

majoran. an. gutt. ij. croci, caryophyll. an. gutt. j. Cum aq. rosar. q. s. F. Balsamum. Inunctiones sint ol. rutac. laurin. nucis moschat. succin. balsam. apoplect.

Vel ℥. Ol. nuc. mosch. express. Drach. i. ol. destill. caryophyll. majoran. rosar. an. gutt. iij. succini gutt. ii.

Misce, & eo tempora, nares, occiput inungantur, vel exceptum gossypio auribus indatur.

Vel ℥. Ol. nuc. mosch. express. Drac. i. spec. diamb. diamb. mosch. dulc. an. Scr. s. ol. succini gutt. vi. moschi gr. ii. M.

Vel ℥. Balsami salvia, rosar. an. Scrup. s. caryophyll. gr. vii. ol. nucis mosch. express. Drac. i. lauendul. gutt. iij. succini gutt. ii. ambr. gr. iij. moschi gr. iij. zibeth. gr. v.

Misce pro Balsamo, quo nares & tempora sapius inungantur.

Nonnulli commendant pinguedinem damarum temporibus illiram.

Lotiones fiant ex decocto pulegij, hyssop. serpilli, rosar. betonic. stachad. majoran. salvia, rad. ireos, bacc. lauri.

Valde commendatur bombyx exsiccatus, & pulueris vertigi inspersus, quo Carolus V. frequentissime usum ferunt.

Pulvis etiam sequens capiti inspergi, vel cucupha inde parata capiti imponi potest:

℥. Herb. rosar. majorana, salvia, an. P. iij. flor. chamamel. P. ii. serici crudi Drach. s. rad. Imperator, Drach. i. Misce. F. Pulvis grossus.

Possunt & sacculi capiti imponi, ex plantis modo enumeratis parati.

Auribus immittatur ol. caryophyll. cinamom.

Ex periaptis commendantur, præter crystallum, corallia rubra, vt & succinum, siue de collo gestetur, siue pocula inde parentur, siue in potu suspendatur. Montanus, in anat. morb. lib. i. cap. 12. ex Nicolo virgam yulpi capiti alligatam vertiginem tollere scribit. Ruellius corollam ex foliis vlmī paratam capiti imponi jubet.

Et cum Vertigo ista per essentiam sæpe in apoplexiam degeneret, ad præseruandum ab apoplexia apud multos in usu est hic Pulvis; cuius Drach. i. singulis mensibus ante nouilunium cum aqua lauendul. aut ceraforum datur.

℥. Succin. præpar. Drach. ij. spec. diarrhod. abbat. Dra. s. rad. pæon. Scrup. ii. F. Pulvis.

Exemplum eiusmodi Vertiginis exstat apud Solepandrum, sect. 1. consil. 2. Forestum, lib. 10. obseru.

### Secundò.

#### De Vertigine per Consensum orta.

#### Causse.

Vertiginis  
per consensum  
caussa.

Vapor verò, qui Vertiginem per consensum excitat, ex variis locis eleuari potest. Frequenter excitatur Vertigo per consensum à ventriculo, vaporibus ab humore biliolo, vel pituitoso, vel cibis corruptis ad caput adscendentibus.

Primo enim cum bilis per inediam in eo effervescit, & hepar excrementa sua ad ventriculum mittit, vapores copiosi ad caput eleuantur, & vertiginem excitant: quod picrocholis imprimis accidere solet. Deinde idem ex pituita interdum euenit; vt & ob ventriculi imbecillitatem, propter quam ex cibo & potu vaporosus & flatulentus spiritus gignitur, & cibus in eo corrumpitur. Feruntur autem hi vapores ad caput facilius, cum agitantur: id quod fit ab inedia, motu nimio, vt vectione, aut navigatione; cuius rei exemplum habet Forestus, lib. 10. obseruat. 49. in Schol. de quodam Iuvene, qui, si curru veheretur, vertigine, nonnunquam & syncope, corripiebatur; cum pedes sine incommodo magnum iter conficere posset.

Idem vapores ab aliis quoque partibus, hepate, lie-

in iis communicari possunt: sicut & à parte aliqua interna. Vt enim vapor malignus, à pede, vel alio membro externo auræ alicujus instar eleuatus, epilepsiam quandoque excitat: ira & ab eodem Vertigo generari potest. Vnde & Vertigo interdum epilepsiam præcedit, ejusque mox secutura præsagium est.

Aliquando & per totius corporis & venosi generis consensum accidit vertigo, vt in febribus, quæ iam ab Hippocrate, in Coac. dicuntur. Vbiunque enim in corpore tales vapores generantur, si per venas, & arterias, vel etiam per vias apertas, vt œsophagum, & asperam arteriam, sursum adscendunt, & ad cerebrum penetrant, spiritusque agitant, vertiginem excitare solent. Id quod & ebriis interdum euenire solet, quibus à potu, vel multo, vel potenti, & spirituosio caput vaporibus repletur.

#### Signa Diagnostica.

Si per consensum oriarur Vertigo, malum per vices affligit, nulla capitis p. n. affectio, aut sensuum læsio præcessit, aliarumque partium affectarum signa ad-<sup>Vertiginis per consensum f.</sup> sunt; & Vertigo crescit, aut imminuitur, prout ipse affectus partis, quem sequitur, minuitur vel augetur.

Et quidem si sit à ventriculo, aderit cruditas, nausea, oris amaritudo; quia linguæ tunica ventriculi tunica continua est: <sup>cap. 103. uic.</sup> teste Hippocrate, 4. aphor. 17. & quidem jejunos maximè, infestat; quia bilis in eo tum effervescit, & ad eum vndique alimenta attrahentem hepar excrementa sua transmittere solet. Sumpto cibo minuitur, vel cessat; cessat quoque post vomitionem: & alia affecti ventriculi signa adsunt.

Si ab aliis partibus malum originem habeat, earundem affectarum signa aderunt; vt si ab vtero Vertigo proueniat, mensium suppressio, vteri strangulatio, vel alia ejusmodi aderunt.

Si per consensum totius Vertigo accidat, affecti quoque totius corporis signa aderunt; vt in febribus fieri solet.

Et quidem si signa coctionis præcesserint, hæmorrhagia critica sequitur; si nulla, à febris potius malignitate prouenit.

Si verò absque febre sit, & à sanguine calido & flatuoso in venis proueniat, imprimis post motum corporis vehementem Vertigo excitari solet. De quibus omnibus etiam supra, part. 1. cap. 6. dictum.

#### Prognostica.

1. Vertigo, quæ accidit per consensum alicujus membri stupore affecti, epilepsiæ, vel apoplexiæ indicium est.

2. Si vertigo accidat in febre ob crisin instantem, salutem indicat; modò vires constant. Si ante signa coctionis accidat, periculum portendit. Si medio modo seceres habeat, crisin imperfecta, & malam denunciat.

#### Indicationes.

Vt Vertigo per consensum rectè tollatur, necessarium est humorem, qui vaporem illum subministrat, præparare, si opus sit, & euacuare, vaporem ipsum, qui ad caput adscendit, reuellere, interciperi, (quam ad rem clysteres vtilissimi sunt) & repellere, si per vasa externa feratur; cum verò, qui jam caput occupauit, discutere, & partem ipsam mittentem roborare, eique naturalem dispositionem restituere, ne in eâ materia vitiosa vapores transmittens generetur; simul & ipsum caput roborare, vt vapores non suscipiat, aut faciliè discentiat, & ii, qui adscendunt, non ita faciliè spiritus commouere possint. Et quidem si affectus non vrget, à causa, à qua is pendet, remotione curatio inchoanda; si verò malum vrgeat, ipsi primò prouidendum, vt supra, de curatione paroxysmi, dictum.



*Auxilia.*

In sanguinis missione, si ille euacuandus sit, attendendum, ut præseruationis gratia venę in cruribus potius aperiuntur, quàm in brachio, ut Galenus, *de missione sangu. cap. 19.* docet; utpote quæ non solum sanguinem euacuare, sed & renellere, & ad partem contrariam trahere potest. Atque id præcipuè faciendum, si menses vel hæmorrhoides suppressæ vertiginis causam præbeant.

*Si à Ventriculo sit Vertigo.*

Vertiginis à  
ventriculo  
causatio.

Humor in ventriculo contentus vomitu, nisi quid prohibeat, aut purgatione per aluum euacuandus, præmissa, si opus est, præparatione. Quamquam enim Hippocrates, in *libr. de loc. in homin.* vomitum, ubi oculi affecti sunt, damnat; tamen de eo solum oculorum affectu id intelligendum est, qui ex primaria in cerebro causâ est, non verò per consensum ventriculi ortus. Et ne in vomitu æger vertigine corripiatur, caputque lædatur, vitale fuerit, fasciâ caput, dum æger vomit, constringere, aut oculos obuoluere, & ad futuram coronalem aliqua medicamenta adstringentia adhibere, quæ cerebrum à vaporibus adscendentibus tueantur; qualia sunt flor. rosar. rubrar. myrtilli, balaustia; nux moschata, acetum; vel vaporum ad caput adscensus clystere injecto prohibendus. A vomitu verò statim aliquid aromatici rosati, vel myrrhæ, vel syrupi de mentha, vel de cortic. citri propinandum, ad ventriculum roborandum, & vaporum adscensum prohibendum. Si verò euacuatis cruditatibus affectio non cesset, alius leniter purganda, & quidem in purgatione inchoandum à lenioribus, ut mannâ, syrup. rosar. solut. pilul. ex aloë paratis, & similibus; quæ si non suffecerint, humore præparato ad fortiora deueniendum.

Si æger sit picrocholus, non diu jejuset, sed cibum sumat maturius, ut vertiginem præcaueat; aut si jejunum paroxysmus inuadat, statim cibus exhibeatur.

Tandem quæ ventriculum roborant, & confortant, & halitus adscendentes compescunt, aut in ventriculo discutunt, usurpanda, cum interna, tum externa. Et quidem considerandum, an cruditas sit nidorosa, & humores calidi & acres in ventriculo abundant; an verò acida: & prout opus, cura instituenda; sicut hac de re suprâ, *pari. 1. cap. 6.* dictum. Ne post cibum etiam sumptum multi vapores ad caput adscendant, vertiginemque renouent, trageæ antea propositæ usurpandæ, quæ hic utilissimæ sunt, vel hoc Eleætuarium:

*℞. Conseru. rosar. Vnc. ij. maioran. Vnc. j. β. cydonior. condit. Vnc. j. cort. citri condit. Vnc. β. myrobalan. chebul. condit. n. ij. sem. coriandr. præpar. corallor. rubr. præpar. an. Drach. j. mastich. Drach. β. Cum syrup. cydonior. F. Eleætuarium.*

*Si ab hepate, Liene, Vtero, vel toto Corpore*

Vertiginis ab  
hepate, liene,  
vtero, toto,  
causatio.

Vertigo ortum habeat, curatio & ad partem mittentem, & recipientem dirigatur. Pars nimirum, cujus *superius* vertigo oritur, euacuetur, seu venæ sectione, seu purgatione, prout natura humoris peccantis requirit. Per venæ sectionem, cucurbitulas, scarificationes, frictiones, reuulsio instituitur: si consueua aliqua euacuatio suppressa sit, reuocanda ea, & pars cum mittens, tum recipiens roboranda. Si reliqua auxilia non prosint, nonnulli arterias post aures scindere iubent, ut ita via, per quam à toto, vel ab aliqua parte ad caput feruntur vapores, intercludatur.

Verum de arteriarum sectione antea, ubi de Vertigine per primarium capitis affectum, cui præcipuè competit, egimus, dictum. Tutius hinc venæ frontis, vel temporum, si eæ turgeant, vel venæ sub linguâ aperiuntur, vel in brachio fonticulus excitatur. Si tamen ex hepate, vtero, suppressis hæmorrhoidibus, vlcere, aut fistulâ

aliquâ in locis inferioribus, malum originem habeat, fluxio antiqua reuocanda, vel loco ejus fonticulus in cruribus aperiendus.

Vteri etiam regioni applicari potest *emplastrum de galbano, seu matricale, & emplastr. de mastich.* modò resectio mensium id non prohibeat.

In critica in febribus Vertigine nihil agendum, capiti que nihil applicandum, neque natura in opere suo turbanda. Si tamen crisis non rectè procedat, promoueri potest; ut alibi dictum.

*Tertiò.**De Vertigine à Meatuum Cerebri angustia.**Causa.*

Non solum verò à vaporibus spiritus animales in cerebro agitantur, sed & cerebri meatuum angustia ejusdem motus causa esse potest; cum scilicet spiritus animalis per loca impedita mouetur, & retrocedit. Angustia tamen hæc non est integra. Alias enim apoplexia sequeretur.

Vertigo à  
meatuum  
cerebri  
angustia.

Fit autem hæc angustia

1. Ab obstructione, quam pariunt vapores crassi; quæ non diu durat. Ut enim subito oritur: ita etiam subito resoluitur vapor. Quandoque & aqueus, serosus, atque pituitosus humor, qui cerebri anfractus, spatiaque adimplens, & flatum copiam simul generans, in eo fluctuat, & Vertiginem illam, quæ apoplexiam & carum præcedere, ac minari solet, & frequens, ac diuturnior est, excitat; ut hac de re Platerus docet.

2. Ex cranij fractura, ac cerebri compressione eadem angustia, & hinc sequens Vertigo excitari potest.

3. Angustiam hanc productam fuisse à vase venoso cerebri, omnibusque illius arteriis ab exortu, & ingressu in caluariam vniuerso per cerebrum ductu coalitis, induratisque, glandulisque paruis toto processu distinctis, obseruauit Platerus sectione in quodam mercatore, qui multis annis Vertigine laborans, nec ambulare, nec è lecto amplius surgere, quin corrueret, poterat. Ab angustia enim vasorum cerebri spiritus impediti retentique in cerebro ex leui corporis motu circumducti incurabilem Vertiginem pepererant.

Potuit ad vertiginem hanc etiam facere humor aliquis corruptus in glandulis illis hærens, qui moto corpore, & sanguine spirituoso arteriarum & venarum, simul excitatus, tetros emisit halitus, qui spiritus animales peculiari vi turbare valuerunt. Cui rei fidem, facit Fernelius, qui refert, occasione alicuius particulæ in occipitio dolentis, & post leuem contrectationem, noxium vaporem in cerebrum efflantis, vertiginem concitatam fuisse.

Nonnulli & subsidientiam addunt, eamque fieri statuunt à veneno, aut humore acri, vellicante, ventriculos cerebri, aut ex nimio dolore in quacunque corporis parte; ut in morfu oris ventriculi, in fame item sine vapore aliquo sursum misso. Verum non probabile est, ex istis causis cerebrum ita moueri posse, ut subsideat. Vero magis consentaneum est, à spirituum perturbatione & agitatione ex istis causis, quæ & materiâ aliquâ communicatâ, & sine materiâ communicatione fieri potest, Vertiginem produci.

*Signa Diagnostica.*

Si vertigo sit ab obstructione, signa adsunt vaporum & humorum illam inducentium, & pituitæ præcipuè in cerebro redundantis. Et quidem quæ ex vapore obstruente fit Vertigo, citò soluitur: quæ verò ab humore, pertinacior est.

Si humoraliquis extra vasa hæret quandoque etiam ægri de fluctuationis quodam sensu in capite conqueruntur; estque hæc etiam vertigo frequens, & diuturna.

Si à compressione, ictus, aut compressio, aut fractura cranij præcessit.

Si à coalitu vasorum sit Vertigo, grauissima illa est, & diuturna, vt historia antea à Platero adducta docet. Vix tamen in viuente homine de causa hac aliquid certi statui potest, sed sectio demum post mortem Medici conjecturam confirmat.

### Prognostica.

Difficilis curatu est Vertigo, quæ à compressione, ac obstructione prouenit, & apoplexiam, aut carum præcedere, ac minari, & nisi præcaueatur, tandem in hæc mala terminari solet. Coalescentia verò vasorum cerebri incurabilem vertiginem gignit.

### Curatio.

Cum autem quâ ratione angustia cerebri à quacunque causa curanda sit, suprâ, part. 1. cap. 17. dictum sit; nihil ampliùs hic de ea addere opus est; sed quæ ibi dicta sunt, in vertigine ex angustia meatuum cerebri curandâ omnia locum habent.

### Quartò.

### De Vertigine à Spirituum ex Causis evidentibus agitatione.

### Causa.

De vertigine  
à spirituum  
à causis eui-  
dentibus agi-  
tatione.

Spiritus, præter dictas hætenus causas, etiam euidentes causas agitare possunt. Faciliùs tamen id præstant, si interna dispositio, & debilitas cerebri adsit.

Et primò quidem spirituum circumrotationem excitant causæ externæ, vt corporis in gyrum conuersio, rerum externarum circumrotatarum, & variè motarum, vel aquarum vorticolarum adspectus, ab alto prospectus, item ambulatio per pontem angustum, & tremulum, adspectus rerum insigniter splendorum, vt Solis, exercitium intempestiuum, & motus corporis: vnde conualescentibus surgentibus, vel se mouentibus Vertigo obrepere solet; vehemens fragor tonitru, bombardarum, capitis percussio, & casus in caput, percussio in dorso; quæ & ipsa quandoque ob consensum spinalis medullæ vertiginem excitat.

Deinde internæ, vt Imaginatio. Si quis enim fortiter imaginetur objectum in gyrum motum, spiritibus animalibus, vt etiam in gyrum moueantur, occasio potest præberi. Ita animi perseverantes vel inhærentes commotiones spiritibus sæpe, & validè in cogitationibus illis profundis, & assiduis, vt & vigiliis, exagitaris vertiginem pariunt.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur hæc Vertigo faciliè ex ægri & adstantium relatione, qui causas, quæ præcesserunt, & vertiginem inducere valent, patefaciunt.

### Prognostica.

Non adeo periculosa hæc est Vertigo, nec diuturna, vt reliquæ differentię.

### Curatio.

Causis enim illis cessantibus, cessat Vertigo; accedente inprimis quiete, & somno: ac proinde aliâ curatione opus non est. Si tamen non planè cesset, frictions extremorum vtilis sunt.

## Q V Æ S T I O I.

An Vertiginis, qua dantur, differentia sint saltem secundum gradus, an verò etiam secundum speciem?

Vertiginis non eandem esse rationem, sed aliquando solam imaginationem, interdum & visum lædi, ac tenebras oculis offundi, interdum præterea etiam ægros concidere, notum est. Sed an hæc vertigines gradu tantum, an verò specie differant, controuertitur. Gradibus saltem differre, plerique statunt. Ludouicus Mercatus verò; tom. 3. lib. 1. cap. 9. non gradu tantum, & secundum magis & minus; sed specie distinctas esse has tres differentias, statuit; hac in primis ratione ductus, quòd differre eas videmus non solum ratione partis affectæ, sed & facultatis læsæ, & morbi, à quo oriuntur. In vertigine enim simplici anteriorem cerebri partem affici, lædique facultatem imaginariam, ob deprauatum spirituum motum: in tenebrosa etiam oculos pati, læsa facultate visiva, ab obstructione facta à vapore in neruis opticis commorante: in caduca denique posticam cerebri partem, & locomotiuam facultatem lædi per consensum, à deprauato motu spirituum in parte cerebri posteriore. Verùm controuersia hæc non difficulter solui posse, & vtrumque rectè dici mihi videretur; modò res rectè explicetur. Gradibus differre has vertiginis differentias existimo ratione causæ, cuius minor est vehementia in vertigine simplici, maior in tenebrosa, maxima in caduca. Si enim causa sit leuior, vt saltem prauus spirituum motus, isque leuior inde excitetur, imaginatio saltem deprauatur: si verò sit grauior, & seu à vapore copiosiore nerui obstruantur optici, seu motus ille spirituum sit tantus, vt liberè in neruos opticos influere non possint; tenebræ etiam oculis offunduntur: si verò causæ ejusdem vis sit tanta, vt etiam influxus spirituum in neruos motui inferuientes prohibeatur, ægri concidunt. Si autem vertigo vt actio animalis læsa consideretur, omnino species hæc tres vertiginis differre videntur. Nam in simplici vertigine vnica saltem actio, imaginatio, læditur: in tenebrosa duæ, imaginatio & visus: in tertia tres, imaginatio, visus, & motus animalis. Et si autem ad vertiginis essentiam constituendam sufficiat sola imaginatio læsa, & neque visus, neque motus læsio ad essentiam vertiginis pertineat, & posteriores duæ differentię affectus compositi sint, in quibus plures actiones animales læduntur; quia tamen ferè eadem curandi ratio est, & à communi causa, gradibus saltem differente, pendent, eaque sublata cessant, Medici, quos & ego secutus sum, has differentias non ad eos affectus, in quibus actiones animales plures læduntur, sed ad eos, in quibus vna animalis actio læditur, referunt.

## Q V Æ S T I O II.

An intemperies, vel humor sine vapore Vertiginem producere possit.

Dubitant equidem nonnulli, an solus vapor, an verò etiam humor possit inordinatum hunc motum spirituum inducere; imò nonnulli affirmant, solam intemperiem calidam sine humore & statu Vertiginem inducere posse, atque exemplo aquæ feruentis id probare conantur, quæ mouetur in gyrum à calore ignis. Rem tamen planam esse puto. Humor certè, nisi ex eo flatus excitetur, spiritus ita agitare non potest. Neque caliditas id per se præstat; cum in multis affectibus capitis spiritus incalescant sine Vertigine. Neque exemplum aquæ feruentis id probat. Quod enim aqua feruens agitur, & mouetur, causa sunt partes illæ aquæ, quæ vi caloris aërescunt; aut, vt aliis placet, partes ignis

ignis permittat, quæ cum, utpote leuiore, sursum tendant, & exitum quærant, aquam simul mouent.

QVÆSTIO III.

*An repellentia locum habeant in Vertigine per consensum partium inferiorum?*

*An repellentia in vertigine locum habeant.*  
Respondet quidem Massarius, quamlibet materiam repellendam esse; & quanquam huiusmodi repellentia præsidia aliquo incommodo non careant: tamen longè maiorem utilitatem asserre. Verùm in omnibus affectibus capitis per consensum tutius semper repellentia & interceptientia, quàm repellentia adhibentur.

QVÆSTIO IV.

*Quæ ratione prospectus ab alto, & in profundum Vertiginem excitet?*

*Quomodo prospectus ab alto vertiginem excitet.*  
Cur ab obiectis externis circumrotatis, & variè motis Vertigo excitetur, res non ita difficilis est. Ad obiecti enim talem motum per species visibiles spiritus optici speciei visibilis in oculo receptæ celeritatem veluti sequentes simili modo concitantur, & agitantur. Hinc ij, qui Vertigini sunt obnoxij, ad rerum talium adspectum oculos claudunt, vel obuclant, & iumentis, quæ molas in gyrum circumducunt, oculi obuclari solent, aut cæca in hanc operam eligi. Quomodo verò rerum profundarum & ab alto prospectus Vertiginem generet, non ita planum est. Theophrastus causam refert in titubationem, & dissipationem spirituum externorum, qui interiores agitent. Cum enim spiritus visorij, ubi res profundæ spectantur, in immensum quasi protendantur, in tantâ spatij longitudine firmos manere non posse, sed titubare quasi, & tremere, eumque tremorem radiorum communicarum spiritibus cerebri eos similiter mouere existimat. Verùm malè præsupponit visionem fieri radiorum, & spirituum emissionem, & spiritus continuè ab oculo ad rem visam extendi, & quasi baculum, vel funem tremere posse. Et si saltem longitudo spatij esset in causâ, cur non etiam prospectus in altum, & stellarum adspectus vertiginem moueret.

Hercul. Saxonia ex adspectu rei profundæ spiritum animale ita consumi putat, ut propter eius defectum, ne vacuum detur, postea attrahantur vapores, qui vertiginem excitent. Verùm enim verò non plus spirituum in rei profundæ, quàm propioris adspectu consumitur. Et si hæc huius rei causâ esset, etiam res longinquæ è directo in plano, vel alto positzæ, æquè ac res profundæ, vertiginem excitare deberent.

Probabilius est, ex rei quasi horrendæ, & metuendæ, ac periculosæ adspectione terrorem & metum excitari; & spiritus primùm vitales, & ab his naturales, utpote qui ex illis generantur, agitari, & ab illorum cursu & recurso & hos inordinato motu moueri. Vnde qui assueti sunt in alto versari, neque metuntur sibi, si ex alto prospiciant, Vertigine facillè corripunt non solent. Ita capite deorsum inclinato, spiritibusque tunc ab eo ad principium neruorum vergentibus, cum illud rursum erigitur, iisdem spiritibus impetu ad propriam sedem remeantibus, Vertigo excitari solet. Quanquam & à sanguine venoso atque arterioso spiritus vitales continente deorsum fluente, & spiritus animales turbante ac mouente idem, & forsan facilius, accidere possit.

CAPVT V.

*De Phantasia, Ratiocinatione, & Memoria imminuta, atque abolita.*

Post sensus communis symptomata, de quibus haecenus egimus, explicanda veniunt symptomata, quæ Phantasiæ, Ratiocinationi, & Memoriae accidunt; de quibus in Institut. lib. 1. p. 1. s. 1. c. 7. & s. 2. cap. 4. tractauimus.

Læduntur autem functiones istæ triplici modo: vel dum imminuuntur, vel dum abolentur, vel dum deprauantur. Imminutæ Phantasiæ & Ratiocinationis symptomata sunt, Mentis imbecillitas, & hebetudo, Tarditas ingenij, Stupiditas, & Torpor mentis abolitæ, Amentia. Ad deprauatas has actiones pertinent omnia deliriorum genera. Memoria verò, cuius officium est non iudicare, sed saltem imagines recipere, & retinere, debilitari & aboleri, deprauari non potest, ut plerique sentiunt.

*Phantasia, Ratiocinatio, Memoria læsa.*

De his itaque actionum principum læsionibus, quæ sine aliis, ut soporosis, & aliis, in quibus omnes animales functiones læduntur, affectibus contingunt, iam dicendum. Et primò quidem de imminutis & abolitis. Agemus autem de his coniunctim; quia communes causas, & communem curandi rationem habent. Præterea læsa memoria plerumque stoliditatis causâ est. Cum enim memoria species rerum non retinet, neque eas, ut debet, phantasiæ, & intellectui suggerit, facultates hæc obiecta, quibus exerceantur, non habent. Atque ita solum occupantur circa species ab externis obiectis oblatas; ac in operatione non persistunt; & homines dicuntur stolidi, infantibus similes, qui non discunt circa species reseruatæ, sed propt hoc vel illud ipsis offertur, ita iudicant, statimque & rei, & iudicij facti obliuiscuntur, & modò vnum, modò alterum appetunt & statuunt.

Primò ergo quod imminutas & ablatas has functiones attinet, pertinent huc omnes, qui adultiores facti, istas actiones, quæ homini maximè propriæ sunt, vel nullo ferè modo, vel debilitè certè exercent. Quod malum longè maximum est. Cum enim solis hisce functionibus homo à brutis differat, si iis destituatur, & priuetur, ferè ad brutorum classem detruditur. Sunt tamen talium quidam gradus.

*Phantasia & Ratiocinatio imminuta & abolita.*

Quidam enim omni ferè ingenio destituuntur, & facultas imaginatrix, præcipuè verò ratiocinatrix, ita à causis p. n. impedita est, ut nullos conceptus gignere possit, qui ad sapientiam spectent, nec illa ipsa principia, quæ ad disciplinas omnes in vniuersum discendas præsupponuntur, & præcognoscenda sunt, assequi queant. Quæ de causâ omnis via, & ad sapientiam aditus ipsis præcluditur, atque in istis instituendis oleum & opera perditur. Qui Amentes & Stolidi dicuntur; vitium ipsum *ἄνοια*, Amentia, & *μωρία*, Stultitia nominatur. Alij sunt, qui primorum quidem principiorum cognitionem assequuntur, atque hinc aliquas conclusiones deducunt, sed magno cum labore: qui ingenio Tardi, Hebetes, Stupidi appellantur; vitium ipsum Mentis hebetudo, Stupiditas, Torpor ingenij. Et si enim symptomata ista, præcipuè apud Latinos, nominibus non semper accuratè distinguantur; vsus tamen ferè obinuit, ut in Institut. loc. alleg. dictum, ut *ἄνοια* dicatur, cum Imaginatio, Ratiocinatio, & Memoria ferè abolentur: *μωρία*, ut ex Galeno, 1. *proorrhæ. comm. 2. t. ultim.* patet, cum sine delirio homo parum ratiocinatur; à quo vitio gradibus saltem differunt, Stupiditas, Tarditas, & Torpor ingenij. Cum verò actio imminuta, & deprauata concurrunt, & homo parum ac malè iudicat, Stultitia appellari potest. Memoria, ut diximus, non deprauatur, sed vel imminuitur, vel aboletur.

# 366 De phantaf. ratioc. & memor. debil.

aboleatur. Læduntur autem actiones hæc vel feorsim, vt sola interdum ratiocinatio, interdum sola phantasia, interdum sola memoria; vel plures simul.

Dicemus verò inprimis de Memoria læsione. Hæc enim læsâ, vti diximus, læditur consequenter phantasia & ratiocinatio; & læsæ memoriæ exempla sapius offeruntur. Phantasia verò & ratiocinatio cum plerumque vel à primo ortu lædantur, & homo stupidus, aut fatuus nascatur; vel ætate aboleantur, aut debilitentur, vt fit in senibus; vitia ea ferè incurabilia sunt.

Memoria læsa exempla.

Passim autem Memoria læsæ notabilia exempla occurrunt, quæ collegit Schenckius, lib. 1. obseru. 128. & seqq. Inter reliqua notatu digna sunt, quod Plinius, natur. histor. lib. 7. cap. 34. narrat, quendam ex præalto recto lapsum, matris, & affinium propinquorumque cœpisse obliuionem: alium ægrotum seruorum etiam; sui verò nominis Messalam Coruinum, Oratorem. Et Christoph. à Vega, libr. 3. art. Med. cap. 10. refert, Franciscum quendam ex acuta febre ita memoriam amisisse, vt, etsi prius peritus esset Theologus, postea nec litteras agnosceret, neque nomina rerum, quæ sibi assidue in vfu erant, memoria teneret. Et quod Bassianus Landus, de human. historia, recitat; Franciscum Barbarum, Hermolai amicum, Græcarum litterarum, quarum erat doctissimus, in extrema senectute oblitum esse; quanquam diiudicandi, & commentandi facultate polleret. Et quod de Studiofo quodam Mompeliensi ex Rondelerij narratione Thom. Iordanus, de pest. Phenom. tract. 2. cap. 2. habet, qui ex vulnere ita rerum omnium oblitus est, vt instar infantium Lutetias retrogredi, & prima pueris tradi solita elementa discere denuo necesse habuerit.

## Causa.

Causa læsa Phantasia, Ratiocinatio, & Memoria.

Ad causas horum symptomatum rectè inuestigandas necessarium est, quærere, quomodo, & quibus instrumentis hæc actiones in sanis perficiantur. Videmus enim homines etiam sanos secundum ætatis differentias diuersimodè has actiones edere. Primò enim infantes parum valent hisce functionibus, & à brutis non multum differunt: postea ætatis progressu magis magisque & memoria, & ratiocinatio, & phantasia sese exerunt, donec in adolescentia, & virili ætate ad ætatem perueniant, & quidem mirabiles & stupendos effectus homo edat. Hinc rursus declinante ætate vigor ingenij & memoriæ imminuitur, & tandem in decrepita ætate quasi repuerascunt plerique senes. Hæc in hisce ætatibus actionum istarum varietas animæ adscribi non potest, quæ ipsa semper eadem manet, nullamque alterationem, & mutationem recipit, sed diuersitas ista omnis ex organorum, cerebri puta, & spirituum animalium diuersa dispositione prouenit. Cerebrum certum caliditatis & humiditatis gradum requirere ad has actiones, extra controuersiam est; idque vel ex eo patet, quod infantes ob nimiam humiditatem in hisce actionibus minus valent, quâ absumptâ, & corpore indies sicciore euadente, facultates hæc magis sese exserere incipiunt.

Quis autem ille gradus sit, in hac humanæ mentis caligine determinare difficile est, imò impossibile. Ne dicam de occultis illis qualitatibus, quæ cerebro non denegandæ, ac modo substantiæ; vt nec de eo, quænam dispositio ad memoriam, quæ ad phantasiam, necessaria, & aptior sit. Videmus enim homines secundum has facultates variare, & rarissimè vnum aliquem hisce omnibus eminere. Id quod procul dubio à cerebri, & spirituum constitutione peculiari prouenit. Neque enim eadem omnibus actionibus æquè apta est. Primæ ætatis constitutio vegetatiuæ, ac sensitiuæ actionibus apta est, non verò actionibus mentis: contra senum constitutio ad has apta, ad illas ve-

ro inepta. Atque inde etiam accidit, vt in affectibus p. n. qui dispositionem cerebri, & spirituum mutant, quales sunt phrenitis, melancholia, mania, in momento quasi omni sapientia, & scientia, quâ antea præditus fuit homo, priuetur. Contrà etiam obseruatum, stolidos & stupidos plus ingenij ex morbo acquisuisse. Aristoteles, sect. 30. problem. 2. refert de Marco quodam Syracusano, quod, dum mente alienaretur, præstantior Poëta erat. Notabilia verò huius rei exempla duo recitat Ianus Huartus, Serutinij ingenior. cap. 7. Primum: Cordubæ, anno 1570. in aula Regia fatuus quidam erat, Ludouicus Lopezius, qui ob iocos & sales in gratia aulicorum erat. Is cum febre maligna corripere, in medio morbo ad tantum iudicij & discretionis acumen peruenit, vt vniuersam aulam in admirationem raperet; & toto vitæ, quod reliquum habuit, tempore prudentissimus perstitit. Alterum est hoc: Puer nobilis, satrapæ cuiusdam in Hispania pedisequus, sanus ingenij stupidi, & pauci intellectus, postquam in maniam (melancholiam fuisse existimo) incidisset, tam aptè, tam prudenter ad interrogata respondit, tamque acutas & ingeniosas edidit regulas de administrando regno, cuius ipse se Dominum esse imaginabatur, vt prodigij instar videndi, audiendique eius causâ complures confluerent. Ille ipse, cui inferuebat, herus rarè à lecto discedebat, De v m rogans, ne mentis ipsi restitueret Medicus sanitatem. Et cum ipsum pristinæ sanitati restituisset, malè id habuit herum, doluitque, ex sapienti & ingenioso rursus stolidum reddidisse. Imò ipse puer ægrè tulit, se pristinam sanitatem recuperasse. Cum enim in delirio viueret, eius animus subtilissimis mundi cogitationibus pascebatur, cuius Monarcham se esse imaginabatur, omnesque Reges, quasi Vasallos, se Dominum agnoscere credebatur. Quod licet falsum esset, nihilominus tantam inde delectationem habebat, ac si reuerà talis esset.

Galenus hac de re peculiarem libellum scripsit, quo monstrat, quod animi mores temperamentum corporis sequantur. Cui ipsa experientia adstipulatur, quæ ingens discrimen ingeniorum secundum regiones, & in singulis regionibus secundum temperamentorum varietatem nobis ostendit.

Naturalis autem hæc constitutio requirit tria: 1. bonam temperiem; quod & occultas qualitates, & modum substantiæ referimus. Cerebrum enim non solum bonam temperiem habere debet, sed & constare substantia suo modo tenui, ac subtili, non crassâ. 2. debet habere iustam quantitatem, figuram, & cōformationem. 3. vnitatem. In his si quid mutetur, actiones, quæ in eo, & ab eo fiunt, mutari necesse est.

Neque solum ipsum cerebrum bene dispositum sit oportet, sed & spiritus animales, qui proximum animæ in hisce actionibus obeundis sunt instrumentum. Et cum spiritus animales ex vitalibus fiant, & hos bene dispositos, subtiles, rectè temperatos esse oportet. Vnde etiam in sacris litteris prudentia & sapientia cordi adscribitur. Deusque Salomoni cor prudens & sapiens largitus esse dicitur.

Cum autem diuersæ sint facultates, phantasia, ratiocinatio, & memoria, & videamus etiam homines sanos alios memoriâ, alios phantasiâ, alios intellectu pollere; si, quæ constitutio memoriæ, quæ phantasiæ, in specie magis inferuiret, notum haberemus; & in causis harum læsarum functionum inuestigandis facilius progredi possemus. Nam intellectum quod attinet, eius operationes quidem sine corporeo organo perficiuntur; quia tamen in corpore perficiuntur, & anima, dum est in corpore, non sine phantasmate intelligit, & ante operationem propriam subordinatis actionibus vtitur, quæ cerebri & spirituum beneficio perficiuntur: his læsis & ipsa etiam Ratiocinatio læditur.

Tentarunt quidem in hac re aliquid cum alijs, tum Ianus

Ex morbo acquisitum ingenium.

Ad memoriâ



qua cerebri  
afflictio sit  
commoda.

Ianus Huartus, *in scrutinio ingeniorum*. Et memoriam quod attinet, vulgata equidem sententia est, ad apprehensionem utilem esse humiditatem; cuius rei signum sit in pueris, qui feliciter res memoriâ apprehendant, quàm senes, cum cerebrum habeant humidius. Idque ideo, quod cum memoria per viam quandam impressionis fiat, in cerebro molli facilius figuræ imprimantur, in duro difficilior. Ad species verò firmiter retinendas, necessariam esse cerebri duritiem, & siccitatem statuunt, & exemplo rerum externarum, ceræ præcipuè, id declarant, quibus, si molles sint facilius figuræ imprimuntur, facile tamen obliterantur: si verò duriores, difficilior quidem signa imprimenda recipiunt, impressa verò fortiter retinent. Verum si ea, quæ I. C. Scaliger, *exerc. 307. sect. 28.* hac de re habet, diligenter consideremus, vix admitti potest hic memoriæ modus. Cum enim memoria sit penè infinita, quibus spatiis continentur illa, quibus sedibus ita disposita, atque etiam ordinata, ut & vnumquodque separatim, & cuncta confertim, & singula ordinatim promere, statuere, digerere possimus? Et si, qua ratione actiones sensuum externorum perficiantur, diligenter consideremus, atque attendamus, species illas sensibiles non recipi in materia, sed à spiritibus ad animam deferri: tota huius rei causa in spiritibus proximè quærenda videtur; secundariò verò in cerebro.

Laesa memoria causa.

Ac si porro causas omnes, quæ memoriam, & intellectum tardant & iuvant, perpendamus, inueniemus, siccitatem cum moderato calore coniunctam memoriæ & intellectui esse aptissimam; id est, cerebrum, quod nec calore destituitur, nec humiditate abundat, esse ad has actiones aptissimum. Vnde Heracliti illud, quod Galenus, *in lib. quod anim. mores, cap. 5.* recenset: *Splendor siccus, animus sapientissimus*, id est, spiritus calidi & sicci, sed moderatè, tam ad memorandum, quàm ad ratiocinandum sunt aptissimi. Ideoque contrà & frigidum, & humidum, & siccum cerebrum, ad has actiones ineptum redditur. Aboler memoriam frigiditas, imminuit frigiditas aut siccitas. Et quidem frigiditas, vel sola, vel cum humiditate aut siccitate coniuncta. Hinc cum infantes, tum decrepiti senes parùm hisce actionibus valent. In infantibus quidem calor est copiosissimus; verum multa humiditate obruitur. In senibus & calor deest, & multa ad sunt excrementa, seu, ut Scaliger, *loc. allegat.* loquitur: in puero sunt multa excrementa; in sene etiam aliena. Et in humido cerebro multi spiritus commeantes sese tanquam circuli in aqua secant, & in humido cerebro multa inter intellectum, & species seruatas interponuntur, quæ si fuerint crassa, sit obliuio; si mobilia, dilatio recordationis; atque ibi reminiscencia, cum remouentur intercedentia impedimenta. Ideoque cum à frigiditate & humiditate cerebri spiritus animales ad has actiones inepti reddantur: frigiditas, & quæ hanc, ferè ut indiuidua comes, sequi solet, humiditas, & excrementorum copia, imminutæ & aboler phantasias, memoriæ, ac ratiocinationis causa merito statuitur. Sufficit tamen etiam sola frigiditas, & calidi natiui defectus, ut Galenus, *2. de loc. aff. cap. 7. & 3. de loc. aff. cap. 5.* docet.

Calida tamen & sicca etiam intemperies, ut dicitur, memoriæ obesse potest. Sicut & conformatio cerebri vitiosa hisce actionibus impedimento esse potest.

Et quod frigiditatem, quam plerumque humiditas sequitur, attinet; ad eam producendam faciunt omnes causæ, quæ suprà, *part. 1. cap. 2. 3. 10.* sunt propositæ. Quas vbi hic coniungamus, & huic loco applicemus, sciendum, quod frigiditas cerebri est vel simplex, vel composita, cum, vel sine materia, à causis, *loc. alleg.* propositis inducta. Non tamen hic saltem ad mitti temperiem & qualitates elementorum respiciendum, sed etiam ad ipsum calidum natium, cuius copia actiones omnes vegetiores reddit, defectus debi-

liores. Deficit autem calidum natium vel à primo ortu, vel post ortum. Calor natiuus à primo ortu deficit, dum cerebrum est nimis paruum, & ita in paruo cerebro paucus calor, aut dum cerebrum est nimis magnum, cui caloris innati quantitas non respondet, sed, propter magnam cerebri molem exiguus calor quasi dispergitur. Vnde plerumque Capitoes parùm ingenio valent. De quo vide Institut. *lib. 3. part. 1. sect. 2. cap. 3.* Infantes verò etsi quoad molem & quantitatem satis caloris habent: tamen ad ratiocinandum non apta est eorum cerebri dispositio: quia calor iste à nimia humiditate obrunditur, quæ postea absumptæ calor acrior & efficacior redditur, & indies homo ad has actiones aptior euadit. Siccitas enim ad prudentiam, humiditas ad dementia animam deducit, ut Galenus, *in libr. quod animi mores, cap. 7.* scribit. Transfertur autem hoc vitium sæpe à parentibus in liberos, & vtriusque partium imbecillitas sæpe hæreditaria est; ita & cerebri vitium istud in sobolem transir. Et quod in infantibus accidit, idem etiam in adultis potest fieri, ut in iis nimia humiditate calor obruatur, vel etiam à primo ortu nimis paucus sit; vnde homines, cum adolecunt, stupidi, vel amentes manent.

Si autem post ortum calor natiuus deficiat, vel ab humido obruatur, causæ eius rei variæ esse possunt. Primò est ætas, ob quam in senectute calidum deficit, senesque, etsi siccissimi sint; tamen quia humidum radicale, & calidum innatum in iis ferè absumptum fuit, ideo & ad ratiocinandum, & memorandum minùs apti sunt, & ut Galenus, *in lib. quod anim. mores, cap. 5.* habet, multi decrepiti senes amentes sunt, seu, ut in proverbio dici solet: *Bis pueri senes.*

Deinde Aër. Ut enim aër tenuis & porus subtilia reddit ingenia: ita crassus & impurus contrà tarda ac obtusa. Hinc, ut Galenus, *6. Epid. comment. 6. t. 8.* scribit, Athenienses acuto sunt ingenio, propter aërem tenuem, in quo degunt: Thebani verò stupidi, quia Thebis, & in tota Bæotia crassum est cælum; vnde Horatius, *in epist.*

*Bæotum in crasso iurares aëre natum.*

Tertiò ciborum, & potus frigidi ac humidi frequēs vsus, & præcipuè eorum, quæ vim quandam stupefacientem habent, ut papau. vsus frequēs, crapula & ebrietas; quæ maximæ ingenij & memoriæ pestes sunt. Et in primis si duæ hæ causæ, aëris nimirum, & cibi ac potus vitium concurrant, ingenium ac memoriam valde debilitate solent. Ita refert Eustach. Rudius, *lib. 1. Pract. cap. 6.* se in Tirolehsi quodam Comitatu amentium, stultorum, fatuorumque frequentissimum numerum vidisse, causamque mali agnouisse aëris frigiditatem & humiditatem, aquarum cruditatem; id quod ex gutturis bociis deprehendit; vini penuriam, & vsus frequentem panis cum semine papau. confecti. Quod etiam obseruauit Platerus, ut refert *tract. 1. Pract. c. 3.* in Carinthiæ valle, *Bink gerthale* dicta, in qua multi reperiuntur stulti & stupidi, capite informi, linguâ magnâ, & tumidâ, muti, strumoso gutture, aspectu deformi.

Quartò morbi, & causæ morbificæ eorundem symptomatum causæ esse possunt, si calidum innatum cerebri destruant, idque humidius reddant. Ita post morbos diuturnos, malignos, cerebri abscessus, vulnera, contusiones capitis, stupiditas & stoliditas interdum sequi, ac memoria amitti potest. Sic in peste illa famosa Attica, quam Thucydides, *lib. 2.* & Lucretius, *in fine lib. 6.* describunt, homines tanta omnium rerum cæpit obliuio, ut & familiares, & seipsos non agnoscerent; & memoriæ ex febre, & vulnere, ac capitis percussione amissæ exempla suprà recensuimus.

Venena quoque, & philtrea ex ingeniosis stolidos, & amentes reddidisse, notum est. Et inter ea cerebrum felis comestum memoriam abolere dicitur. Quòd pertinet: ut & narcotica capiti & ceruici incautè applicata. Idem præstare possunt medicamenta calidū natium

absummentia, vel extinguentia. Humores etiam vitiosi, intemperiem frigidam, vel frigidam & humidam cerebro inducentes, calorem natium suffocant, spiritusque ineptos ad hasce functiones reddunt. Pertinent huc & nimia sanguinis profusio, labores nimij, vigiliæ immodicæ, studia nimia, & omnia huiusmodi, quæ calidum natium cerebri possunt absumere.

Calida tamen & sicca intemperies etiam memoriam labefactare potest, dum inordinatum spirituum animalium motum facit; ut testatur Galenus, 3. de loc. affect. cap. 5. ubi scribit; novisse se quendam, qui ob labores in studiis, atque vigilias memoriam penè amiserat, læsâ etiam ratiocinatione: item agricolam, qui ob labores, quos vires colendo subierat, ac tenuem victum, eodem malo affectus sit. Et Scaliger, loc. alleg. scribit, quod etiam in siccis cerebris, si sint biliola, propter spirituum mobilitatem memoria lædatur. Quæ intemperies etiam à medicamentis induci potest; nonnulli quoque aliquos, qui, dum medicamentis calefacientibus, & siccantibus memoriam roborare vellent, cerebro nimium exsiccato, & calido nativo absumpto, fatui ferè evaserunt.

Nocer quoque memoriæ & ingenio, si mens diuersis studiis distrahatur, &

Pluribus intentus minor est ad singula sensus. dum plurimæ imagines sese inuicem turbant, obfuscant, ac confundunt.

Præter intemperiem etiam Conformatio, quæ ad spiritus capiendos, eorumque motum necessaria est, ingenio, ac memoriæ obesse potest. Quod referri potest & substantiæ cerebri modus; de quo in Institut. lib. 3. part. 1. sect. 2. cap. 3. Qui enim tenuitate cerebri destituuntur, & cerebrum crassius habent, ij procul dubio ad has actiones omnes non ita apti sunt. Etenim in tenui substantia cerebri spiritus animales mouentur expeditius, in crassa verò impediuntur. Et quod cerebri substantia, ac calidum, & spiritus innatus sunt tenuiora, & puriora, eò etiam puriores & tenuiores spiritus in eo generantur. Figura cerebri imitatur cranij figuram, & plerique, qui minus decentem capitij figuram habent, stupidi sunt, aut malitiosi, quale caput Therites, ob id famosus, habuit. Quod pertinet & casus ex alto, & percussio, quibus procul dubio cerebri conformatio læditur; unde quosdam memoriam amisisse, supra ex Plinio diximus. Et Guilhelm. Rondeletius, in fin. lib. 1. meth. cur. morb. refert, quendam valde eruditum, cui gladius in oculum altius adactus fuerat, ob vulnus illud memoriam ita amisisse, & rerum omnium ita oblitum fuisse, ut Luterias repetere, & prima literarum elementa iterum discere coactus fuerit.

### Signa Diagnostica.

Læsa memoria signa.

Ipsam malum ex actionibus ægri læsis facile cognoscitur. Cum enim memoriæ officia sint, facile arripere, fideliter retinere, expeditè expromere, & reddere; si horum aliquid desit, & in primis, si imagines sensibilium rerum, quæ prius animum mouerunt, in mentem, ubi opus est, non veniant, imaginatione & ratiocinatione saluâ: potissimum memoriæ vitiatæ signum est.

Causas quod attinet, si conformatio cerebri & capitis vitiosa horum malorum causa sit, ea in oculos incurrit, & vel ab ortu homini contigit, vel homo percussus & lapsus est.

Hæc si absit, defectus calidi natui, & frigiditas ac humiditas abundans ex causis calidum innatum cerebri absummentibus, & cerebrum refrigerantibus, ac humectantibus, vel etiam siccantibus, (quæ & ipsæ consequenter calidum natium absumunt) aut ex actionibus læsis, vel excretis, iuuantibus item, & nocentibus cognoscitur; ut supra, part. 1. cap. 2. 3. & 10. dictum. Nimirum si intemperies cerebri sit frigida & humida, somnus est longus & profundus: si humida tantum est

somnus longus, sed non profundus: si frigida tantum, moderatè somnolenti sunt: si frigida & sicca, non sunt somnolenti. Ita & copiâ, vel paucitate excretorum frigiditas, vel sola, vel cum humiditate, aut siccitate coniuncta cognoscitur. Qui enim frigidum & humidum habent cerebrum, multa excrementa per palatum & nares emittunt; qui frigidum & siccum, pauca; si frigidum tantum, moderata; si cerebrum sit calidum & siccum, cum memoriâ læsâ adest delirium ac rationis læsio.

### Prognostica.

1. Euentus mali talis expectandus, qualem causæ promittunt. Ipsa enim symptomata ex se eum non indicant: sed ut à causis suis pendent, ita non tolluntur, nisi iis ablatis.

2. Si absque causa externa memoria subito lædatur, imminens apoplexiæ, epilepsiæ, paralytis est indicium, si homini saluo aliàs id accidar. Si verò ægroto viribus destituto memoria deficiat, certissimum est propinquæ mortis indicium.

3. Mentis imbecillitas & stupiditas ab ortu contracta, & quæ à conformatione primæ capitis vitiosa provenit, incurabilis est.

4. Incurabilis est & illa, quæ ætatis ratione accidit.

5. Nec curatur, quæ ab inueterata epilepsia pendet. Ut enim illa vix curatur: ita & symptoma inde excitatum.

6. Difficulter & illa curatur mentis imbecillitas, & memoriæ læsio, imò plerumque incurabilis est, quæ à malignis morbis, venenis, ac philtis ortum habet.

7. Quæ à frigiditate & humiditate, ac humore pituitoso ortum habet, & cum lethargo, caro, apoplexia accidit, etsi & ipsa curatu sit difficilis: tamen interdum curatur, præcipue dum ætas viget, & vires constant.

8. Oblivio à caliditate & siccitate contracta curatu difficilior, quàm à frigiditate & humiditate; quia talis constitutio à cerebri constitutione remotior est, & facilius & tutius est caput calefacere, quàm frigefacere & humectare.

9. Oblivio sub accessiones periculosa. Hippocrates, 3. epid. comm. 3. sect. 37.

### Indicationes.

Intemperies cerebri & spirituum, quæ adest, & causa horum malorum est, corrigenda per contraria; & materia, quæ cum ea coniuncta est, euacuanda; ut part. 1. dictum; calidum natium instaurandum, & spiritus torpidi excitandi. Quæ tamen immodicas corporis euacuationes, & inanitiones sequitur memoriæ læsio, requirit tantum commodam refectionem per cibum, & calidum natium ac spiritus instaurantia ac roborantia; sicut & illa, quæ senibus accidit.

Memoria læsa, & ingenij debilitatio curatio.

### Auxilia.

Quâ ratione autem hisce Indicationibus possit satisfieri, dictum etiam supra, part. 1. cap. 2. 3. & 10. ubi monstratum, quâ ratione intemperies frigida & humida calefacienda, & siccanda sit, & pituita caput obsidens præparanda & euacuanda. Pauca saltem hic illis adiungimus.

Alterantia quod attinet, quæ eadem humorem pituitosum præparant, proponuntur etiam postea inter roborantia. V. g. materia pituitosa sic præparanda:

℞. Rad. ireos Floren. acori veri, valerian. pyrethr. an. 3. ℞. galang. 3. ii. beronic. majoran. meliss. thymi, flor. lily conuall. an. M. ℞. lauendul. saluie, stachad. Arab. an. M. ii. sem fenicul. 3. ℞. Coqu. in suf. aq. q.

Colat. ℞. ℞. j. ℞. adde mellis q. s. Despumetur, & aromatizentur nuc. moschat. & cinamom. pro 4. vel 5. dosibus.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. pæon. acori veri, an. Vnc.  $\beta$ . betonic. maior. serpill. hyssop. salvia, stæchad. Arabic. rorismarin. an. M.  $\beta$ . sem. carni, fœnicul. sileris montan. an. Vnc.  $\beta$ . cinamomi, nuc. mosch. macis, an. Dra. ij.

Concilia & confusa indantur in vas vitreum, & affund. hydromeli. lb. iii. vel q. l. & vase clauso in B. horis 2. coqu. postea colentur.

Colaturæ, si libet, addantur oxymeli. scillit.  $\mathcal{Z}$ . iij.

Dentur singulis diebus manè, & vespere  $\mathcal{Z}$ . iij.

Vel  $\mathcal{L}$ . Aq. beton. salu. an.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . essent. salu. meliss. an. Scr.  $\beta$ . syrup. de stæchad.  $\mathcal{Z}$ . i. aq. cinamomi  $\mathcal{Z}$ . ii. Misce pro haustu, qui cubitum ituro exhibeatur.

### Purgantia.

Purgantia ex prima parte nota sunt. Exempl. gr.

$\mathcal{L}$ . Pilular. aurear. Arabic. an.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . trochiscor. albandal. gr. iii. extract. castor. gr. ii. F. Pilulæ xxv.

Vel  $\mathcal{L}$ . Extract. solut. Andern. Scr. i. hellebor. nigri Scr.  $\beta$ . gummi gotte gr. i. vel. ii. extract. castor. gr. ii. Cum aq. lauend. F. Pilulæ xxi.

Commendantur & hæ, quæ tamen porius caput roborant, quam purgant:

$\mathcal{L}$ . Aloës, agarie. an. Dra. ii. sal. gemma  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . caryophyllor. cinamomi, macis, nuc. cardit. ligni aloës, thuris, mastich. myrrh. el. cubebar. absinth. croci, bacc. lauri, inniperi, stæchad. Arab. calam. arom. an. Dra.  $\beta$ .

Puluerisata cum vino odorifero Misc. & F. Massa pilul. Dosis Drach. i.

Vel  $\mathcal{L}$ . Agaric. albiss.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . sol. sene el.  $\mathcal{Z}$ . ii. zingiber. alb. sem. carni, an. Scr. i.

Macerentur per noctem in aq. beton. & hydromeli. an. Vnc. iij.

In Colatura dissolu. super igne diaphenic.  $\mathcal{Z}$ . iii. vel Vnc.  $\beta$ . iterum coletur. F. Haustus.

Antiqui fortioribus, ut hierâ compos. hierâ Logadij, hierâ Ruffi vtebantur.

Si ex intemperie frigida & sicca sit vitium, præparatio & purgatio sit ut supra, part. i. de melancholia dictu.

Particulares quoque euacuationes per errhina, masticatoria, gargarismos, apophlegmatismos fiant; de quibus etiam supra dictum.

Vtiles quoque sunt reuulsiones per cauteria & fonticulos, qui in cruribus, vel brachiis excitari possunt.

### Roborantia.

Roborantia, quæ scilicet intemperiem cerebri emendant, & reliquias materiæ absumunt, cerebrumque confortant, etiam ex superioribus patent.

Sint autem fortiora; cum temperamentum cerebri hisce affectibus valde mutatum sit, & difficulter in pristinum statum reducat.

### Interna.

Inter simplicia cephalica hæc magis utilia sunt, liliu. conuall. melissa, quæ memoriæ confortat, ingenium acuit, & animi tranquillitatem, ac hilaritatem præstat, & ad curas pellendas utilis est, beton.  $\beta$ . stæchad. Arabic. lauend. primula veris, maiorana, salvia, rorismarin. rad. acori veri, pirethr. semen. hormini, zingib. nuc. moschata, quæ non tantum ob manifestas, sed & occultas qualitates ad caput roborandum, & memoriæ confortandam commendatur, si sæpe ieiuno stomacho masticetur, vel alio modo usurpetur, cubebar. thuris item, Scrup.  $\beta$ . pondere cum vino, aut liquore conueniente sumptum, sem. sinapi myrobalan. castoreum, ebur. & alia supra, part. i. c. 2. proposita.

Ex quibus parantur:

Aqua; lili conuall. meliss. primula veris, maiorana, salvia, rorismarin.

Conseruæ; lili conuall. meliss. lauendul. betonic. stæchad. Arab. anthos.

Syrupi; stæchad. simpl. & compos. de betonica, mel anacardinum.

Benedictus Victor. Fauentinus syrupum suum de aromatibus commendat, quem ita describit:

$\mathcal{L}$ . Herb. & flor. sampsuchi, thymi, pulegi, serpilli, mentha, calaminth. hortens. silymbri. rorismarini, salvia, betonic. an. M. ii. Coquantur in suffic. quant. aquæ ad consumptionem tertiæ partis.

Colat. in sindone ligatæ infunde cinamom. nuc. mosch. macis, spica nardi, Celica, folij, zingiberis, an. Scr. i. anbr. moschi, an. gr. ij.

Bulliant ad 4. partis consumptionem, & cum s. q. sacchari F. l. a. Syrupus; cuius  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . cum aquæ flor. citri  $\mathcal{Z}$ . iii. misceantur pro doli vna, & sic pro alijs 5. vel 6.

Extracta & Essentiæ; melissa, salvia, rorismarini, ligni aloës, cinamomi.

Condita; zingiber, præferim si cum modico thure fumatur, rad. pyrethr. acori, myrobalan.

Confectio; sem. sinapi.

Olea destillata; nuc. moschar. meliss. maiorana. salvia, rorismarin.

Species aromaticæ; diamb. aromatic. rosar. diamb. sch. aulc.

Vina medicata:

$\mathcal{L}$ . Ligni aloës, zingiberis, piper. long. galang. an.  $\mathcal{Z}$ . i. caryophyllor. cubebar. an. Vnc.  $\beta$ . nuc. mosch. Vnc. ij.

In sacculum includantur, & affund. musti lb. xij. vel etiam plures.

F. Vinum medicatum.

Electuaria; Confectio anacardina, quæ ad frigidam & humidam intemperiem cerebri corrigendam est efficacissima, unde etiam confectio sapientum appellatur, quæ, ut gravior sit, sine castoreo parari potest. Scribit tamen de ea Ianus Huartus, in scrutinio ingeniorum, cap. 22. compositione istâ, quia valde calida & sicca, intellectum & memoriæ perire, etsi imaginationem exacuat, ut quis loquendo & respondendo per dictoria & comparationes excellat, & malitias ad dolos fingere calleat. Verum præsupponit ille vulgarem doctrinam, nimirum ad memoriæ opus esse cerebro molli. Cum autem certum sit, siccitatem cum moderato calore ingenium ac memoriæ acuere, non est de nihilo, quod de compositionis huius efficacia dicitur; & obseruati, quosdam eâ mirabilem sibi memoriæ comparasse, & proinde etiam in imminuta à caussis p. n. memoriæ usurpari potest.

Caute tamen ea exhibenda, præcipue in sanis, ad memoriæ roborandam. Vnde nonnulli eius Drach.  $\beta$ . vel minus, cum aq. calida exhibent, ut nimia eius exsiccatio remittatur. Iis verò, qui membra principalia calida habent, nullo modo exhibenda. Docuit enim & hoc experientia, nullos quidem memoriæ admirabilem sibi hac confectioe comparasse, sed parum vitales fuisse, & in ipso ætatis flore, corpore nimis exsiccato, extinctos.

Et rectè de hac confectioe hoc etiam monet Mercatus, prodesse quidem eam sæpe iis, qui memoriæ, quam à natura felicem obtinuerunt, vi caussarum præternaturalium læsam habent: iis verò, qui à natua constitutione debilem memoriæ habent, maximopere obesse, & ex eius usu nonnullos iudicium, alios memoriæ planè amisisse, & capitis dolores ingentes contraxisse. Natua enim partium temperies, si in meliorem statum mutari debet, sensim, & paulatim mutanda est, non vehementibus medicamentis, quale est Confect. anacardina, calidum & humidum natiuum absumendum & exiccandum est. Ideoque iis qui debilem habent à natura memoriæ, victu idoneo, & inprimis frequentioribus studiis, & memoriæ exercitatione subueniendum. Abs quo si sit, medicamenta parum proderunt.

Forestus hoc Electuario in muliere, quæ post apoplexiam memoriæ ferè amiserat, feliciter usus est:

$\mathcal{L}$ . Rad.

℥. Rad. acori veri, seu galang. minor. cordit. conseru. f. betonic. rorismar. an. Vnc. j. fl. herba paralyfis Vnc. β. cubebar. nucis mosch. cinamom. puluerisat. ana Drac. j. Cum syrupo de stœchad. F. Electuarium de quo singulis diebus manè sumebat instar castaneæ, & nucham, occiput, & frontem aq. hederæ arboreæ, ter, vel quater in alembico destillatæ inungebat.

Laudatur & hoc Mesue tanquam expertum, & satis vtile.

℥. Mellis anacardin. huri, rad. cyperi, acori, an. Vnc. j. piperis, macropiper. an. Vnc. β. myrobalan. chebular. Indar. an. Vnc. i. mellis q. l. F. Electuarium, cujus dosi à Drach. j. ad Drach. ij.

Vel ℥. Conseru. lily conuall. betonic. salua, rorismar. an. Vnc. j. lauendul. Vnc. β. spec. diamb. diamosch. dulc. an. Drach. i. sem. carni. caryophyllor. cubebar. nuc. moschat. an. Drach. β. ol. cinamom. gutt. vj. Cum syrupo de stœchad, vel i. q. sacchari in aq. rosar. dissolut. F. Electuarium.

Vel ℥. Conseru. betonic. meliss. lily conuall. anthos, an. Vnc. i. mellis anacardin. Vnc. β. spec. diamb. diamosch. dulc. an. Dra. j. Cum syrupo de stœchad. vel conseruation. myrobalan. chebular. F. Electuarium.

Vel ℥. Cinamomi, spica nardi, caryophyllor. an. Vnc. β. macis, zedoar. an. Dra. ij. Scrup. ij. moschi gr. v. ambra gr. vj. confect. anacard. Dra. ij. ol. nuc. moschat. Dra. ij. Cum syrupo de beton. q. l. F. Electuariū. Platerus hoc præscribit:

℥. Confect. anacardin. Dra. ij. conseru. maioran. rorismarini, an. Vnc. β. Misce, & fiat Electuarium, de quo quantitas nucis moschat. manè & vesperi sumi potest.

#### AQUA COMPOSITÆ:

℥. Rad. ireos, valerian. an. Vnc. j. meliss. betonic. origan. rorismarin. an. M. j. β. flor. primula veris, lily conuall. lauendul. rosar. rubr. an. M. j. stœchad. Arabic. Vnc. β. cinamom. opt. ℥. ij. galange, macis, caryophyllor. nuc. moschat. an. ℥. β. cubebar. cardamom. an. ℥. vi. ligni aloës ℥. β. spec. diambra ℥. i. asa dulcis ℥. β. Incisis & crasso modo contusis affunde vini Maluatic. vel Rhenani, lb. vj. vel viij.

Stent in digestionem per octiduum, postea destillantur. Aquæ in vitu spir. rosar. & julebus rosar. addi possunt.

Alia: ℥. Aq. betonic. bugloss. flor. silia, an. lb. i. spir. vini opt. lb. β. flor. rorismarin. rosar. rubr. maioræ. flor. bugloss. an. M. i. spec. confect. anacardin. Vnc. ij. Stent in digestionem per mensem, hinc destillantur.

Vel ℥. Flor. lily conuall. M. ii. spirit. seu aq. destillat. de bacis iuniper. lb. iiii.

Stent in digestionem per dies 14. Hinc colentur, & exprimantur. Suo tempore adde flor. salua, rorismarini, lauendul. an. M. i. spec. diamosch. dulc. diamb. an. Drac. ii. Macerentur per mensem, & hinc in vitro in Balneo destillantur. Huius aq. cochl. j. ter in septimana sumptum memoriam roborat, spiritus animales illustrat, & ab apoplexia & epilepsia præseruat.

Vel ℥. Flor. recentium & succulentor. rorismarin. bugloss. meliss. an. q. v.

Minutim incidentur, & add. sacchar. albi q. s. & in Sole aqua succulenta destilletur, de qua singulis diebus mane cochlear. j. hauriatur.

Præstat tamen hanc aquam in M. B. parare.

Vtilis est & Aqua sulphorum Dorncreilij, vt & Aqua sequens Vidi Vidij, quam libr. 7. de Medic. cap. 5. describit, & mirificè memoriam confortare, & ingenium acutere scribit, si manè Drach. ij. sumantur:

℥. Spir. vini opt. lb. v. aq. bugloss. meliss. betonica, stœchad. flor. lily conuall. an. lb. β. flor. anthos, rosar. rubr. bugloss. maioran. an. M. i. spec. diaplir. diacastor. an. Drac. iiii. confect. anacard. Vnc. i.

Infundantur prius flores, post species. Stent in digestionem per mensem 1. Postea destillantur.

Sequens Aqua sapientiæ nonnullis dicta etiam commendatur, quæ tamen inuria quædam recipit. Neque enim radices buglossæ, pœonia, myrobalani, anacardi vires aliquas aquæ communicant; cum nihil de iis in alembicum eleuetur.

℥. Rad. bugloss. ℥. ij. costi amari & cand. ℥. j. cyperivrandi ℥. ij. pœon. maris ℥. iij. summitat. maioran. verberna, euphras. flor. anthos, betonica, primula veris, an. M. iij. meliss. M. ij. lauendul. M. j. β. stœchad. Arabic. ℥. vi. santal. albi, rubri, citrini, an. ℥. v. myrobalan. chebular. bellyric. Indar. citrinar. piperis longi & nigri, castorei cardamomi, nuc. anacard. an. ℥. j. cubebar. ℥. ij. bacc. lauri excori. an. ℥. iij. nucis mosch. ℥. ij. Pulueriscentur subtilissimè, flores autem incidentur. Affunde aq. lily conuall. vel bugloss. Italic. flor. silia, rorismarini, aurea Langij, an. Vnc. ix. vini maluatici lb. xj. Adde spec. latif. Rhasis, latif. Galeni, ana. ℥. i. trochisc. Gallia mosch. Scrup. ii.

Stent in infusione in loco calido per 8. dies. Deinde destillantur igne lentissimo in M. B. addèdo postea magister. perlar. ℥. ii. cinetur. corall. ℥. i. essent. croci ℥. β. solut. sapphiri ℥. i. cinetur. ℥. Scrup. i. Misce.

Vltus Hæc aqua ingenium ob nimiam humiditatem & frigiditatem stupidum acuit, memoriam eandem ob causam labilem, debilemque mirificè confortat, sensus omnes spiritusque viuificat, atque exhilarat, melancholiam reprimat. Dosis est Vnc. i. alternis diebus.

Aquæ vitæ duæ pretiosissimæ, quas Casparus Peuceus describit, in suo tractatu de memoria, & ex aulig principum accepit:

#### Prima.

℥. Vuarum Creticar. vel Damascen. grand. (officina Cybeas vocant Vnc. ii. Concid. minutim, & infund. vini sublimati lb. i. β. aut dimid. canthar. (vel etiam lb. ij.) Infolentur autem calido loco, reponanturque octiduum vase vitreo bene obturato, adde flor. salu. minoris, rorismarini, borraginis, bugloss. an. ℥. ii. rosar. rubr. exarsa. l. litor. conuall. an. ℥. β. meliss. cortic. citri. recent. betonica, flor. tunicis, an. ℥. β. santal. citrin. rubr. an. Drach. ij.

Deducantur omnia in tenuissimum puluerem, & sic infusa tepido loco asseruentur, macerenturque tandem, donec liquor iniestorum vires omni ex parte exorbuerit ac combiberit, quod sapore deprehenditur, fitque ferè spatio 2. mens. Nihil obfuerit, si integræ ætatem Solis radiis exposueris. Tandem per manicâ Hippocrat. traiciantur. Si libet, adici possunt, moschus, ambra, vt aqua tanto fiat fortior. Dosis cochlear. i. aut β. ieiuno stomacho.

#### Alteræ Aqua:

℥. Cinamomi ℥. β. zingiberis ℥. ii. santal. omnium, an. ℥. iiii. caryophyll. galange, nucis moschat. ana. ℥. iv. macis, cubebarum, an. ℥. β. cardamomi ℥. i. β. Zedoaria. sem. nigella, ana. ℥. i. β. anisi, fœniculi, pastinac. sylvestr. ocymid. rad. angelic. caryophyllat. glycyrrhiz. calami arom. valeriana minor. fol. scarlea, thymi, calaminth. puleg. mentha, serpill. maioran. an. ℥. i. flor. rosar. rubr. salua, betonica, rorismarini, stœchados, bugloss. borraginis, ana. ℥. ii. cortic. citri ℥. i. β. spec. diambra ℥. iiii. arom. rosar. diamosch. dulc. diarrhod. Abbat. an. Drach. ii.

Terenda terantur, & infund. libris aquæ vitæ præstat. vi. hoc est, duobus canthar. Sinantur in vitreo vase 15. dies cōtinuos stare, occluso subinde vasis osculo. Deinde destillantur per alembic. in B. M. arctè occlusis commissuris. In aq. exstillatam ponantur santal. i. esserant incisi Drach. i. mosch. ambra in pet. lig. an. gr. iiii. vel v. julepi rosari clariss. lb. β.

Stentque ita per dies 15. postea aqua separetur. Præsentanea auxilia sunt aquæ hæc ad reparandâ memoriâ.

#### PVLVERES:

℥. Rad. cyperi, croci, myrrh. thuris, piper. alb. an. Drac. i. F. Puluis: Decur à Scr. i. ad Drach. i.

Vel ℥. Rasur. eboris, G. C. castorei, an. Drach. i. mosch. ambr. an. gr. iiii. F. Puluis.

Antiquitus valde celebratus est Puluis sequens:

℥. Thuris masculi Drach. i. piper longi vel albi Scr. β. Deducat in puluerem propinentur ieiuno stomacho, aliquot diebus sub aurorâ, cū vino, vel aqua mellis.

℥. Nuc.



℞. Nuc. moschat. thuris, ligni aloës, rasur. ebor. an. Dra. ℞. sem. anisi, sinapi, coriandr. preparat. cubeb. an. Scrup. i. cinamom. Drach. ii. margarit. preparat. Dra. ℞. mosch. ambr. an. gr. vi. manus Christi perlat. Drach. vi. F. Pulvis, de quo cum pane albo, vino subdulci madido, cubitum iurus bis in septimana Drach. i. vel Drach. i. ℞. sumat.

Multum etiam prodest, præsertim apud senes, in memoria deperdita instauranda pulvis Thritemij, qui ita paratur:

℞. Macis, cubeb. caryophyll. an. Drach. vi. fol. sena elect. chamap. zingiber. albi, crystallor. tartari, an. Dra. v. rad. calami aromati. gentiana, sem. cumini, sileris montani, anisi, petroselini, spica Indic. spica nardi, an. Vnc. sem. magister. corallior. perlarum, an. Drach. ii.

Redigantur secundum artem in puluerem. Dosis est Drach. i. Hunc accipiat per primum mensem manè & vesperi ante cibum horis tribus, in vino, vel etiam brodio; secundo mense tantum manè; tertio mense manè ter in septimana; quarto mense bis in septimana; & sic deinceps per aliquot menses.

Valde commendatur sequens Tragea, de qua manè & vesperi tantum, quantum duo vel tres cuspides cultri capere possunt, sumatur:

℞. Sem. leuistici, petroselini, ammi, anisi, api, an. Dra. sem. thymi, epithymi, hyssopi, origani, an. Dra. i. spic. Celt. cinamomi, sem. ruta, an. Drach. ii. piperis albi & nigri, chelidon. an. Drach. i. sem. myrobal. omnium, an. Scrup. ii. sal. gemma, chamedrys, centa. aur. virisq. marathri, an. Dra. ii. Cum paucis saccharo F. Tragea.

## PILULÆ:

℞. Pulv. cubeb. calament. nuc. moschat. caryophyll. thuris, ana. 3. ℞. ambra Scr. i. moschi gr. v. Cum succo, & aq. majoran. vel salvia, aut syrup. de stœchad. F. Pilulæ è Dr. xii. & conspergantur spec. diamb. & sumantur hora decubitus 4. vel 6. quotidie, per integrum mensem.

Marsilius Ficinus, lib. 2. de studios. sanit. cap. 9. è tribus illis muneribus, quæ Magi Christo obtulerunt, confectionem auream parat memoriæ conseruandæ, ingenio acuendo, sensibus vegetandis, spiritibusque fouendis & roborandis vtilem:

℞. Thuris Vnc. ii. myrrha Vnc. i. auri foliat. Drach. ℞. Cum vino fiant Pilulæ, quarum aliquot sub auro-ram sumantur.

Vel ℞. Succini odorati Drach. i. (posset ambra sumi) cubeb. thuris, myrrha, an. Drach. ℞. ligni aloës Scr. i.

Cum vino F. Pilulæ mediocres, quorum duæ vel tres alternis diebus antè cubitum dentur.

## ROTULÆ &amp; MORSVLI:

℞. Nuc. moschi num. ij. caryophyll. num. vi. ligni aloës Drach. j. sacchar. in aq. majoran. dissol. q. s. F. Rotulæ.

Vel ℞. Spec. diamosch. dulc. diamb. flor. lauendul. rosmarin. an. Dra. ℞. cubeb. sileris montani, flor. stœchad. Arab. ligni aloës, an. Scr. j. spec. confect. anacard. Drach. i. moschi, ambr. an. Scr. ℞. ol. destill. cinamom. nucis moschat. caryophyll. an. gutt. iiii. sacch. in aq. rosar. dissol. q. s. Fiant Rotulæ.

Claudinus sequentes Tabulas commendat:

℞. Ligni aloës Scr. ij. cardamomi, galanga. an. Dra. j. cinamomi Drach. ℞. gallie moschat. Scr. j. sacchari in aq. flor. citri dissol. Vnc. vj. F. Rotulæ, de quibus 3. vel 4. manè sumantur. Vel parentur hi Morsuli:

℞. Sacchar. clarificat. ℞. B. aq. lauendul. borragin. ana. Vnc. ℞. Coq. ad consumpt. aquæ. Postea adde margarit. preparat. Scrup. j. eboris vsti, C. C. vsti, smaragdi preparati, an. Scrup. ℞. ol. nuc. mosch. express. Drach. j. F. a. Confectio in morsulis, de quibus vnus vnâ vice præberi potest.

In intemperie frigida & sicca, quæ calefaciunt & humectant, requiruntur. Paretur ergo tale Electuarium:

℞. Conferu. flor. borrag. bugloss. beronic. lily conuall. ana. Vnc. sem. spec. diamarg. frigid. Drach. ℞. Cum syrupo tunici, vel stœchad. F. Electuarium.

## Externa.

Externa eodem modo se habere debent, & in intemperie frigida ac humida & sicca supra, cap. 2. 3. part. 1. proposita vsurpanda. Commendatur hic aq. hederæ arboreæ, diligenter destillata, & occipiti applicata.

Vtiles & hic sunt, extraque capiti applicari possunt, aq. destillata modo propolita.

Vel ℞. Spirit. vini op. ℞. B. caryophyll. nucis moschat. acori veri, maioran. flor. stœchad. Arab. an. Drach. ij.

Stent in vase clauso, & ubi opus, caput isto liquore illinatur. Sunt qui sequentem Aq. viræ miris laudat us extollunt:

℞. Cubeb. cardamomi, croci, confect. anacardina, an. Vnc. sem.

Affunde spiritum vini Maluatici ad supereminentiam 3. vel 4. digitorum. Stent in infusione per dies 10. Hinc effundatur liquor, & per chartam filtratur, quo tempore & occiput illinatur.

Vel abluatur caput lixiuio, in quo radices alari, lauri folia, thus, fol. senæ, acorus, flor. chamæmel. maioran. melissa, rosmarin. &c. ebullierint.

Aliàs quidem nimium, & præter modum caput lotionibus non fatigandum. Redditur n. inde caput debile, arque ad leuissimam auræ iniuriâ distillationibus obnoxium. Quoties tamen vîus exigit, vt octauo, vel decimo quoque die, lixiuio abluatur, in quo dicta modò ebullierint; vel eisdem indatur sacculor. arteruter, qui

℞. Macis Drach. j. caryophyll. nuc. mosch. maioran. ana Drach. sem. flor. labrusc. rosar. an. Drach. j. spic. Celtic. Drach. sem.

Concisa indantur in sacculo.

Vel ℞. Spica Celtica Drach. ii. flor. lauendula, rosarum, an. P. j. maioran. rosmarin. an. M. sem. rad. irid. Drach. j.

Concitantur, & panno lanco insuantur, fingaturque sacculus, qui feruenti lixiuio impositus probè exprimat, vt vim trahat & sorbeat. Apprimè confortant cerebrum & memorandi facultatem.

Adhibeatur & Sapo odoratus: qui

℞. Saponis Veneti ℞. B. rad. irid. odorat. 3. ij. calami aromati. 3. ii. ℞. fol. hederæ, caryophyll. cardamom. maioran. thym. stœchad. Arab. nigell. meliss. an. Scr. i. ℞.

Tritis terendis, & sapone derafo F. cum aqua card. benedict. Magdaleon, è quo formentur pastilli didrachmales.

Ol. thuris destillatum illitum valde etiam prodest. Oleum etiam myrrhæ temporibus, & occipiti inunctum in confortanda memoria valde efficax est. Paratur autem vel per distillationem, vel per deliquium; si scilicet oua ad duritiem coquantur, per medium dissecantur, vitellòque exempto spatium pulvere subtili myrrhæ impleatur, & in cellam ponatur, vt myrrha in oleum resoluatur. Vtile est & oleum maioran. saluæ, rosmarin. nucis moschat. caryophyllor. Laudatur & fel perdicis arteriis temporum semel in mense illitum.

## LINIMENTA &amp; VNGVENTA:

℞. Ol. de lateribus, nardin. an. Vnc. sem. nuc. mosch. express. Drach. ii. ol. destill. saluæ, maioran. nucis moschat. an. gutt. vj. mosch. gr. ii. cera parum. Misce.

Vel ℞. Ol. de lateribus, de castor. an. Vnc. sem. nuc. mosch. express. Drach. j. ol. destill. caryophyll. Drach. sem. thuris Scrup. sem. benzoës Scrup. j. cera parum. F. Linimentum.

Vel ℞. Ol. de lateribus, castor. an. Vnc. sem. destill. nucis moschat. caryophyll. cinamomi, an. Scrup. j. rad. pyrethri Scrup. ij. Cum pauca cera F. Vnguentum.

Vel ℞. Pulv. rad. pæon. valerian. maioran. an. Vnc. sem. ruta Drach. j. succi verben. Vnc. sem. castor. Drach. j. medull. nucum anacard. Drach. ii. Cum pinguedine vrsi. F. Vnguentum Commendatur & hoc:

℞. Ol.

# 372 De Phantas.ratiocin.& memor.debil.

℥. Ol. costini, juniperin. an. Vnc. j. nardin. Vnc. ij. de castor. Vnc. sem. spica Drach. iiii. pulu. cinamom. nuc. mosch. an. Drach. j. caryophyll. macis, flor. anthos, lauendul. stæchad. Arab. spic. Indic. Celt. an. Drach. sem. rosar. purpurear. cubebar. sileris montan. piper. long. cardamom. an. Scr. ii. vini Maluatic. Vnc. iiii. aq. rosar. Vnc. iiii. Coq. ad consumption. humiditatis, & colentur. Postea adde spec. diamb. diamosch. dulc. dianth. an. Drach. ij. mosch. in aq. ros. dissolut. Drach. β. cera q. s. Misce pro Vnguento, quo post lotionem occiput illinatur.

Nonnulli hoc commendant :

℥. Pingued. vrsi, eamque pone in vesicam vrsi cum ejus vrina, stent simul per octiduum: postea extrahe, & adde succ. homini, euphrasie, verbenæ, bugloss. valerian. aloës part. æq. Fiat Vnguentum.

Non prætereundum est hic Vnguentum, quod miris laudibus efferunt, & Carolus, Ducem Burgundiæ, à Doctore quodam Anglo decem millibus florenorum emisse, & tantæ efficacis esse scribunt, vt perpetuam rerum memoriam pariat. Etsi verò hic meritò illius recordemur, quod Galenus, *4. de compos. med. floc. cap. 4.* scribit de medicamentis ad suffusiones: Promissiones horum omnium esse magnificas, effectus verò aliquando nullos, aliquando valde exiguos; & facile crediderim, laudes istas hoc vnguentum non sustinere: tamen etiam non negauerim ad memoriam vtile esse. Paratur autem hoc modo;

℥. Succ. fol. meliss. basilic. flor. myrica, lilior. primula veris, rorismarin. lauendul. borragin. genist. an. Vnc. ii. nymph. rosar. violar. an. Vnc. i. cubebar. cardamom. gran. paradissantal. citrin. carpobalsam. ireos, croci orient. saurcia, pæonia, thymi. an. Vnc. β. styracis liquid. calamit. opopanax bdellij. galbani. gummi hedera. ladan. an. Drach. vi. rad. aristoloch. long. pæonia. ol. terebinth. nardin. costini, juniperin. laurin. mastichin. de been, de spica, an. Drach. v.

Puluerisanda pulueriscentur, & misceantur omnia, destillentur per alembicum secundum gradus ignis; & aqua, ac oleum separetur. Vltimum ejus hunc esse ferunt, vt primis duobus mensibus nares, & aurium mæatus quotidie magnitudine pili illinantur; sequentibus duobus mensibus, tertio quoque die; aliis duobus mensibus bis in septimana, deinceps singulis septimanis semel; hinc 14. diebus semel, vt ita annus compleatur; tandem sequentibus annis singulis bimcstribus semel.

Christophorus à Vega, *art. med. lib. 3. cap. 10.* adhibita diætâ frugaliore ex carnibus perdicum, gallinarum, turturum in prandio, passularum, & amygdalarum dulcium in cœna, & vino oligophoro rubro propinato per 20. dies, solum pulu. seq. dosin Drach. i. sem. exhibuit:

℥. Calamint. origani, puleg. an. Drach. iiii. macer. cinamomi. an. Drach. ii. piperis, galanga, zinziber. caryophyllor. cubebar. an. Drach. sem. castor. Scr. ii.

Triâ M. Vtatur sex diebus continuis Drach. j. jejunio stomacho, cum Vnc. j. vin. alb. aut Vnc. ii. aquæ inullæ, vel puluer. Scr. ii. M. cum syrup. de stæchade 3. β. ac deinceps propinetur mixtura diluta Vnc. i. sem. aq. fœnicul. siue cardui benedicti. Horâ somni pessulum j. ex sequenti antidoto sinistra nari indidit, ac deinde ægrum legere jussit per horam j. vel ij. quæ veller, tandem extracto pessulo dormire. Manè experefactum affirmat lectorum exactè meminisse, & sine hæsitacione ea recitasse.

℥. Menth. sicc. puleg. euphrag. verbenæ, sem. coriandri præpar. callitrich. an. Drach. j. flor. anthos Drach. i sem. calam. aramat. cinamomi. an. Drach. ij. caryophyll. Dr. i. sem. moschi, gallia moschat. an. gr. vi. mellis anacardin. styrac. calamit. an. Drach. β.

Formetur cum aqua fœniculi in Pessulos.

Vel tale fiat B A L S A M V M :

℥. Bals. majoran. ruta, an. Drach. j. succini Scr. i. extr. rad. valerian. ol. destill. acori, an. Scrup. j. confect. anacard.

Drach. j. gallia mosch. gr. v. Misce pro Balsamo.

S A C C V L V S :

℥. Flor. lauendul. rorismarin. salvia, fol. maioran. melissa, flor. stæchad. Arab. serpill. an. M. sem. nucis moschat. macis, caryophyll. an. Drach. j. styrac. calamit. benzoes, an. Drach. sem. sem. carni Drach. ii. F. Sacculus.

Cum etiam odores hic aliquid emolumentis conferant, in hunc vsum ejusmodi pomum odoriferum præscribi potest :

℥. Rad. ireos Drach. i. sem. fœseli stæchad. an. Drach. ii. nucis moschat. mentha, an. Drach. i. thuris, calamenth. styracis calamit. ligni aloës, an. Drach. sem. ambra Scr. i. ladan. q. s. ad formandum Pomum.

In intemperie frigida & sicca conueniunt malua, althæa, flor. borrag. bugloss. ol. chamæmel. anethin. amygdal. dulc.

E, g. Paretur talis Lotio :

℥. Rad. alibæa Vnc. iiii. caryophyllat. Drach. j. betonic. maioran. an. M. j. flor. violar. borragin. bugloss. rosar. chamæmel. lauendul. Coq. in lacte pro capitis lotionem.

A M Y L E T A etiam quædam, quæ appensa gestantur, ab Autoribus hic commendantur. Amethystus lapis gestatus sensus omnes acueret, Beryllus quoque intellectum, memoriâque roborare scribitur. Rhases linguam vpupæ appensam obliuionem tollere refert. Paratur etiam annulus ex auro puro, in quo inclusus est Adamas, sub coniunctione η & ζ in ν. quem ad memoriam & ingenij præstantiam valere, ex Hermete refert Mizaldus, *centur. i. memorab. aph. 19.* de quo cuique liberum iudicium esto.

## Diætâ.

In læsa memoria, & ratiocinatione à causa frigida & humida, quæ frequentissima est, diætæ sit hæc ratio, quæ etiam sanis, quibus ex eadem causa memoria est debilior, si medicamenta cerebrum roborantia modò proposita coniungantur, ad memoriam augendam prodest. Poterat equidem ea ex iis, quæ supra, *part. i. cap. 2. 3. & 10.* de diætâ dicta sunt, parere; eam tamen præsentibus affectibus accommodare libet.

Aër sit naturâ moderatè calefaciens & siccans, purus & tenuis, vel talis arte paretur, vt supra dictum, Caput ab aëris externis iniurijs, & frigore ac humiditate muniatur.

Cibus item sit moderatè calefaciens, & siccans, ac tenuis substantiæ; condiantur caryophyllis, nucis mosch. cinamom. galang. piper. zingiber. croco, maioran. saluiâ, Gallinarum cerebrum hic valdè commendatur, & id aded iuuare scribit Cardanus, vt aliquos, qui delirare cœperint, resipiscere fecerit. Abstinentium à carne porcina anatina, anserina, & piscibus, præsertim mollioribus, lacte, caseo, leguminibus, brassicâ, lactucâ, papau. fructibus horarijs, & omnibus, quæ vaporosa sunt, crassæ substantiæ; & coctu difficilia. Vinum moderatè sumptum spiritus exhilarat, & coctionem adiuvat: copiosius autem sumptum multos vapores ad cerebrum mittit, qui caput replent, spiritus turbant, & calorem extinguunt. Inprimis vitentur crapula & ebrietas, maxime ingenii & memoriæ pestes. Ac si incommodum aliquod ex vfu vini percipiat, eius loco substituatur aq. mulsa, in qua acorus, nux moschat. cinamom. cocta sunt. Cereuisia sit pura, non vaporosa multum.

Corpus exerceatur moderatis laboribus, extrema sæpe fricentur, caput manè diligenter pectinetur, vt pori cutis aperiantur. Et vt aliæ functiones otio torpent, exercitio verò expeditiores sunt: ita & hæ functiones crebro exercitio acuantur. Vt enim Hippocrates, *6. Epid. comm. 5. aphor. 11.* scribit, *τοῦτον τὸ πρῶτον ἐστὶν ἀπὸ τοῦ πρῶτου*. Ideoque memoria acuenda multum memoriæ mandando; iudicium, res subtiles meditando. Tempestiuè tamen id fiat, non statim à cœna, vel prandio

prandio, sed præcipue tempore matutino, quo tempore spiritus instaurati & refectioni sunt, & organa coctionis in suis functionibus non ita occupantur. Vnde aurora Musis amica rectè dicitur. Contra nocturnæ lucubrationes ingenio non parum obliunt, vt Marfil. Ficinus, lib. 1. de tuenda sanis. cap. 7. prolixè docet Somnus, & vigilie sint moderata. Somnus non mox à cibo ineatur; diuturnus vitetur: fugiat æger mœstiriam, & animi sollicitudinem, & ad lætitiā disponatur.

In obliuione verò à frigiditate & siccitate diæta ad calidum & humidum vergat: cibi omnes sint calidi & humidi: vinum dilutum moderatè bibatur: exercitia sint moderata: somnus longior: caput abluatur decocto flor. chamamel. & meliloti. A Venere planè abstinentendum.

Quæ de artificiali, seu locali memoria apud Ciceronem, Quintilianum, & nostro seculo in multis hæc de re editis libellis habentur, huius loci non sunt. Etsi enim arte ea non parum adminiculi memoriæ in sanis suppeditatur, & mira per eam præstari possunt: tamen præinponit illa memoriā, & phantasiam saluam, ac bene se habentem: ac quò quis hitce magis valet, eò ad hanc artem tractandam aptior est, quò minus, ineptior. Itaque vt claudus ad saltandum ineptus: ita qui phantasie & memoriæ imminutæ, aut abolitæ vitio laborat, de quo hic agimus, is nihil, vel parum auxilij ab hac arte speret.

Exempla curationis læsæ memoriæ, & multa ad eam velia medicamenta, videantur apud F. Hildesheimium, spicileg. 3.

## CAPUT VI.

De Delirio in Genere, & de Delirio simplici, Paraphrenitide, ac Temulentia.

Delirium

Non solum autem imminuuntur & abolentur phantasia ac ratiocinatio; sed etiam quandoque deprauantur: quæ functionum harum deprauatio, siue sit Phrenitis, siue Melancholia, siue Mania, siue quæcunque Phantasie & Ratiocinationis deprauatio, Græcis in genere παραφροσύνη, Latinis Delirium, & Desipientia appellatur. Occurrunt tamen & aliæ horum symptomatum appellationes. Hippocrates & Galenus ad leuem desipientiam significandam ferè vocabulis ληρότης, siue παραληΐσθαι, παραφροσύνη, & παραχθίναι vtuntur: item παταίσθαι, & παρακλῆσθαι: ad grauem ἐκπύρσις, & ἐκπύρσις. Παραλόφας promiscuè de vtraque usurpatur: Παραφρέσις verò maiorem, quàm leuem mentis errorem, & ad insaniam ac furorem quandam gradum significat.

Etsi verò magna sit deliriorum varietas: tamen in genere in deprauatione functionum principum phantasie, ac ratiocinationis conueniunt, quando scilicet phantasmata, seu imagines, nec quæ debent, nec vt debent, offeruntur, nec, vt par est, coniunguntur, seu phantasmata à consuetudine, & ratione aliena obiciuntur, ac inordinate & confuse mouentur, ac diuersorum obiectorum simulacra simul offeruntur, & ineptè coniunguntur: vnde absurda & loquuntur, & agunt delirantes.

Acciditque Delirantibus tale quid, quale dormientibus in ipsomniis, vnde, vt supra dictum, non ineptè somnia deliria dormientium, & deliria vigilantium somnia appellantur.

Ideoque etiam in genere, quæ deliriorum causa sit, quærendum. Cum verò nec ad conformationem solam, nec ad solam vnitatem hæc symptomata referri possint; cum videamus multos delirio corripi, in quibus neutrum horum læditur: vel cerebro, vt parte similari, læso, vel ob errorem externum hæc symptomata excitari necesse est.

Capiuaccius Melancholici delirij causam primam Phantasma tenebrososum, Maniaci verò igneus phantasma, statuit. Cum enim Ratiocinantem oporteat, phantasmata speculari, & ipsa etiam phantasia circa suas imagines, & obiecta versetur: si illa non rectè sese habeant, functio illa deprauatur, & perinde sese res habet, vt, dum species visibilis rei albæ per vitrum nigrum conspiciat, rubra, aut res quæcens inota videtur, ob obiecti, seu speciei visibilis, quod à medio concepit vitium.

Verum enim verò hic sciendum quod, cum in delirio duæ facultates diuersissimæ quarum vna organo corporeo vitur, alia nullo indiget, afficiantur, phantasia scilicet, & ratiocinatio, vna causa delirij statui non possit; sed duplex: Phantasia scilicet læsæ spiritus animalis vitiosus; Ratiocinationis verò deprauatæ phantasma vitiosum.

Itaque in genere Delirium definiri potest actio deprauata phantasie, ac ratiocinationis, à spiritui animali impuro, phantasmata absurdo, & inconuenienti occasione præbente. Phantasmatis enim huius p. n. se habetis causam idè rectè in spiritibus querit. Sicut enim, vt de vertigine diximus, spiritus animales si circumrotentur, hanc qualitatē speciei per vitium oblatae communicant: ita si alio etiam modo p. n. sint affecti, species & obiecta facultatum principum deprauare solent.

Atque ita causa præcipua horum symptomatum in spiritibus animalibus querenda: quàm si quis ad motum cerebri, vt partis similari considerati referre velit, non repugnauimus. Hoc tantum notandum; cerebrum, vt partem similem, posse considerari, primò vt mistum; deinde vt viuens, & calore vitali præditum, per quem animæ vegetantis actiones perficit; & terriò vt includit spiritum, qui solus proximum harum actionum instrumentum est. Hinc accidit, vt, etsi temperies cerebri lædatur, quod sæpe fit in febribus, & aliis morbis; tamen delirium nullum accidat, vbi malum spiritibus non communicatur. Vbi verò spiritus ille cerebri insitus, & consequenter etiam reliqui, qui in eo continentur, afficiantur, tum deliria contingunt. Cum enim spiritus illi, quibus anima in obeundis actionibus illis principibus vitur, debeant esse temperari, tenues, puri, lucidi, & ordinatè, ac certo quodam, ac regulati modo moueri: si quid horum desit, & mutetur, vitiumque illud speciebus & phantasmatis communicetur, varia deliriorum genera excitantur.

Cum autem duo spiritus, quem vtrumque animalem dicimus, sint in cerebro: Vnus insitus, qui proximum, & maxime intimum animæ in actionibus istis obeundis instrumentum est, quique ad temperiem cerebri pertinet, eamque perficit; alter, qui in cerebro generatur, quo anima etiam in actionibus sensuum, tum internorum, tum externorum, vt & motu animali vitur: si ille spiritus mobilis, quem in specie animalem nuncupare solemus, à causis p. n. quod facillè fieri potest, nimium calidus, vel impurus reddatur, & inordinatè ac irregulariter moneatur, leuiora deliria excitantur; si verò ille insitus à statu naturali deflectat, grauiora illa & pertinaciora deliria contingunt.

Atque ita delirij seu desipientiæ in genere causa querenda est in p. n. constitutione spiritus animalis in cerebro, siue illius insiti & fixi, siue mobilis. Etenim si hic impurus fiat, vel inordinatè ac irregulariter moneatur, vitium id communicatur phantasmatis, circa quæ occupatur ratio: vnde non ea, quæ debebant, menti præsentantur, sed aliena & absurda; nec eo modo, quo debebant, sed aliena qualitate infecta, nec ordinatè intellectui offeruntur, sed vel omnia ferè simul, & confuse; vel inordinatè, & quæ diuersissima sunt, & non coherentia, dum simul occurrunt connectuntur.

Quodnam autem illud spirituum vitium sit, explicare non facile. Vulgò quidem in manifesta intemperie ferè

ferè substituitur & inprimis in febribus delirij causam intemperiem calidam refertur. Verùm vix febris dari potest, in qua non etiam cerebri intemperies lædatur; cum febris totius corporis sit intemperies, & consequenter etiam spiritus animales incalescunt, & in febribus omnibus spiritus vitales accendantur, calorémque p. n. toti corpori communicent, & procul dubio inde etiam spiritus animales calefiant. Datur tamen multæ febres, in quibus nullum adest delirium. Præterea in melancholicis, & inprimis iis, quibus magna humoris melancholici copia in hypochondriis cumularur, vapores melancholici ad cerebrum ascendunt; nec tamen ægri inde melancholici fiunt. Ideoque procul dubio quædam, & occulta dispositio est in spiritibus animalibus, quæ delirij causa proxima est; quæ etsi vulgo calida, ignea, tenebrosa, impura dicitur; tamen satis his vocabulis declarari & innotescere non potest.

*Deliriorum  
differentia.*

Deliria autem hæc differunt primò Loco affecto; quod nimirum nunc cerebrum per se afficitur, & ipsum causam delirij suppeditat; nunc per *συμπύκνωσιν* afficitur; causa delirij à venoso & arterioso genere, hypochondriis, diaphragmate, ventriculo, vel aliis partibus communicata. Et quidem nunc causa illa, uti modo diximus, saltem spiritus animales in cerebro mobiles, nunc etiam spiritum insitum vitiat. Deinde Causa efficiens. Interdum enim solus vapor, sine humore, deliria excitat, iis, quæ ebriis eadem de causa accidunt, non absimilia; interdum sanguis, bilis flava, vel humor melancholicus, aut ater delirij causa est. Atque ex hac humorum varietate, & inprimis morum ac ingeniorum diversitate varij sunt delipientium ordines. Quidam enim solâ cogitatione delirant, imaginando absurda phantasmata, qui sæpe longam telam absurdarum cogitationum texunt, etsi pauca loquantur; unde *νῦν* nuncupantur; alij sermone delirant, qui ridicula, aliena, magnifica, vel maledica proferunt; alij opere, & factis cogitationes suas absurdas & aberrantes explent. Efficiuntque hæc omnia vel *μῦθος* & *ῥῆσις*, vel *ῥῆσις* & *πῶς*, sicut *παραφροσύνη* differentias hæc statuit Hippocrates, 6. *aphor.* 53. Et rursus quædam *ἁπλοῦς* est quædam *σύνθετος* ἀπὸ διπλῆς. Ut autem de deliriorum generibus distinctè agamus, ita commodè dividi possunt: Primò est delirium simplex, quod nomine generis exprimitur, & *ἁπλῆς*, ac *ἁπλοῦς* nominatur; eum reliqua delipientiæ genera sua peculiaria nomina habeant. Est enim secundo Phrenitis; tertio Melancholia; quarto Mania, & quæ sub his comprehenduntur.

*Delirium  
simplex.*

### De Delirio Simplici.

Et primò quidem simplex delirium quod attinet, etsi vox delirij, & *παραφροσύνη* omni delipientiæ generi tribuatur; tamen in specie interdum, & ubi absolute ponitur, certum delirij genus significat, quod nonnulli etiam Paraphrenitidem, alij Paraphrenisin, sed sine antiquorum exemplo, nominant.

Est autem hoc delirium non unius generis. Aliquando enim est cum febre, aliquando sine febre.

Et primò quidem à nonnullis etiam delirium levius, quod à calida intemperie cerebri, ab æstu Solis, vigiliis, meditationibus, & similibus causis contracta, oritur, nomine delirij simplicis comprehendunt; plerumque tamen apud Autores hoc nomine venit delirium; quod non proprio cerebri, sed partium inferiorum vitio, à vaporibus scilicet calidis, à reliquo corpore cerebro communicatis, excitatur.

Qui enim sine cerebri primario affectu, ob reliquum corporis consensum delirant, quod in febribus ardentibus accidit, eos, ut Galenus, 3. *de loc. affect. cap.* 7. habet, nemo Phreneticos, sed vel *ἁπλοῦς*, vel *παραφροσύνη* nominat. Quandoeunque enim vapores ca-

lidi, præcipue maligni, copiose in caput irruunt, spiritusque ac cerebrum nimis calefiunt, ac turbant, delirium excitatur; id quod accidit in augmento, & statu febrium ardentium, ac malignarum continuarum, & internis partium inflammationibus, in vermibus, cum putrescunt, & febrem excitant; interdum etiam paroxysmis intermittentium. Ut enim frigus spiritus torpidos reddendo ingenij tarditatem, stupiditatem, ac mentis torporem, & soporem excitat: ita nimia caliditas spiritus turbando, & nimis mobiles reddendo, errorem, & deliria generat. Et quia vapor ille, qui in caput irruit, tenuis substantiæ est, & facile discutitur, neque malum spiritum cerebri insitum occupat; propterea delirium non est continuum, sed remittente accessione, aut exacerbatione, & parte mittente calidos vapores non amplius communicante, delirium cessat, aut certe non est eiusdem generis vel vehementiæ.

Platerus causis his addit sanguinem calidiorem, & tenuiorem in sinibus & vasis cerebri contentum, non vapore solum, sed & propriâ substantiâ cerebrum accedentem; uti & eum, qui ab ictu, vel casu ed affluit. Quæ tamen sententia commoda interpretatione indiget. Nam si sanguis ab ictu vel lapsu, & capitis vehementi contusione elapsus intra cranium & duram matrem contentus putrescat & incalescat, delirium simplex excitare potest; cum non necessario statim simul cerebri membranz inflammentur. Deinde etiam sanguis in vasis contentus incalescere citra vasorum & cerebri inflammationem, & simplex delirium excitare potest. Verùm si sanguis non solum vapore, sed & suâ substantiâ cerebrum ipsum accendat, Phrenitidem potius, quàm delirium simplex, seu Paraphrenitidem, ut appellant, excitare videtur, tunc scilicet, cum extra vasa in ipsam cerebri substantiam effundatur. Et licet adhuc in vasis contineatur; tamen phrenitidis, & inflammationis membranarum cerebri metus tum iam adest.

Deinde nonnunquam ex inflammatione partis alicuius, quæ calidos vapores ad caput mittit, febremque continuam coniunctam habet, accidit delirium. Et præcipue hoc fit ex inflammatione septi transversæ, quod antiqui etiam *σπέρμα* appellant. Unde nonnulli recentiores hoc delirij genus in specie Paraphrenitidè nominant: sed sine antiquorum exemplo. Nonnulli tamen omne delirium per consensum paraphrenitidis nomine appellant; sed & hoc sine antiquorum exemplo. Nonnulli hoc delirium *παραφρένησις* appellant; quod etsi Hericulus Saxonia, lib. 1. *cap.* 4. ex Galeno, *de sympt. differ. c.* 3. citat; tamen ibi non extrat, sed vocabulum *παραφροσύνη*.

Prius delirium, quod in febribus accidit, quod attinet, sæpe delirij simplicis meminit Hippocrates, & Galenus. Hippocrates, 6. *aphor.* 53. Delipientiæ, quæ in calidis febribus fiunt, ferocitatem non habent; Phreniticis verò appellatis id inest. Galenus, *prorrhet. t.* 3. 1. Delipientiam consuetam, familiaremque gignit biliosus sanguis cerebrum petens. Et in 6. *Epid. comm.* 3. text. 36. In febrium vigore deliria contingunt ex repletione capitis.

Sunt autem huius delirij varij gradus, quos Hippocrates quoque peculiaribus nominibus expressit. Primum enim, & leuissimum gradum *πρὸς τὸ λῆρος* exprimit, 3. *Epid. agrot.* 1. & *ληρῶσαι*, vel *παρὰληρῶσαι*, nugatum esse dicit, 1. *Epid. agrot.* 14. *σμάρα παρέρουσι*, parum deliravit. In secundo gradu *παραφρονῶσαι*, delirasse dicit, & *παρέρουσι*, deliravit, 6. *Epid. agrot.* 5. & 8. De tertio gradu dicit, *παρὰληρῶσαι πάντα*, planè nugatus est, 1. *Epid. agrot.* 13. & *παρέρουσι πολλά*, multum deliravit, *ibid. agrot.* 4. & 10. De quarto gradu, *πάντα παρέρουσι*, planè deliravit, 1. *Epid. agrot.* 1. Qui ultimus etiam huius delirij simplicis gradus est. Nam si illud amplius intendatur, in phrenitidem degenerat.

*Signa*



*Signa Diagnostica.**Signa delirij  
simplicia.*

Delirium hoc ex febre comite cognoscitur, & quidem delirium præcedente. Imminere autem ex garrulitate quadam, aut nimia loquendi promptitudine, morumque mutationeprehenditur. Si nimirum, qui naturâ mitis, & facilis est in respondendo, fit ferox, & temerarius, & in iram præter solitum proclivior; qui taciturnus est, incipiat fieri loquax, corpus indecore mudet, vel obscœna dicat, aut faciat, aut in lectum mingat, eorum, quæ egit, & locutus est, statim obliuiscatur, eundemque sermonem sæpius repetat, & omnino si ægri actiones, & vultus à naturali modo, & consuetudine mutantur; delirium imminere indicio est; ut etiam Hippocrates 2. *Coac. s. 1. aphor. 10.* docet, in primis si vigilie pertinaces, aut somnus turbulentus præcessit. Si quis etiam in febribus acutis dentibus stridat, non consuetus id facere à pueritia; futuri delirij indicium est. Pulvis quoque in hypochondriis cum perturbatione delirium portendit; magis etiam si oculi crebrius moveantur. Hippocrates; in *Coac. lib. 3. s. 2. comm. 1 aphor. 13. sec. distinct. Hollerij.* Et oculorum motus in omnibus morbis, in quibus delirium metuendum, diligenter considerandi. Etenim instabiles illi ipsum prælagiunt. Nam cum cerebro vicini sint, & cum ipso, venis, arteriis, & nervis sociati; omnium ferè primi ipsius iniuriam perferunt, atque inde imminente delirio crebro hûc atque illuc moventur.

Ipsium verò delirium iam præsens ex sermonibus & actionibus ægri deprehenditur. Delirantis enim actiones, & sermones à consuetudo modo multum defleunt, dum loquuntur & proferunt absurda, quæ cum rebus non consentiunt, nec coherent, obscœna, & turpia loquuntur; dum manus temerè iactant & agitant, flores carpunt, festucas legunt, muscas venantur, quæ nullæ adsunt, partes regendas, & pudendas nudant, subito è lecto surgunt; latantur, aut moerent præter solitum, urinam & feces in lectum excernunt, tardius, quàm necessitas postulat, respirant, dolores non sentiunt. De quo Hippocrates, 2. *aphor. 23.* Quicumque dolentes aliquâ parte corporis omnino dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat. In ventrem etiam cubare, qui non est assuetus ita dormire, quo tempore sanus fuit, malum est. Delirium enim, aut dolor circa ventrem significatur. Eius generis aphorismi multi ex Hippocratis protherticis, prognosticis & coac. prædict. colligi, & hûc referri possunt.

*Prognostica.**Prognostica.*

1. Ipsum quidem delirium per se magni momenti non est, sed ex causa omne periculum pendet; ob quam nullum delirium tutum putat Galenus, 6. *aphor. 53.*
2. Euentus tamen is prædicendus, quem febris & vires prælagiunt. Quòd n. vires sunt debiliores, & febris vehementior, vel malignior, eò plus periculi metuendum. Si vires contra consent, & febris non sit periculosa, nec delirium aliquid periculi portendit.
3. Et delirium, quod cum bonis signis coniungitur, minus metuendum est, quàm quod cum malis. Et delirium intermittens, non vehemens, sed leue, præsertim quod sit per accessiones, non lethale est.
4. Somnus in delirantibus bonum signum est, præcipue si delirium sedet, ut Hippocrates, 2. *aphor. 2.* docet. Contra deliria, quæ iam valde debilitatis accidunt, exitiosa sunt, ut nullus ferè ex iis conualecat.
5. In principio quoque febris, quæ apparent deliria, & quæ sine signis coctionis accidunt, pessima sunt, & ad phrenitidem deducunt.
6. Mala signa cum deliriis apparentia mortem; lethalia verò iam imminens exitium minantur. Exitium nimirum portendunt deliria, si delirans non videat, non

audiat; si oculi lucem subterfugiant, inuoluntariè lacrimantur, aut peruerantur, aut alter altero maior fiat, aut album oculi rubicundum euadat, si ægri obrumescant, vox fiat clangosa.

7. Tempus solutionis breue est, cum febres illæ non sint diuturnæ, sed breui, vel ad salutem, vel ad mortem terminentur. Et quidem ad salutem terminatur delirium, si febris, quæ eius causa est, cesser, & critica euacuatio bona sequatur: ad interitum verò, si febris vel vires deiciat, vel ex delirio per consensum fiat delirium per se, & homo Phreniticus euadat. Si nimirum signis coctionis præcedentibus largior sequatur sanguinis euacuatio per nares, vel menstrua purgationes, vel hæmorrhoides, prorumpant, nihil periculi habet delirium, sed è signis decretoriis vnum est. Si verò nulla euacuatio sequatur, vel parua; ut sanguinis è naribus stillicidium, sudores capitis frigidi, & huiusmodi alia, lethale signum est delirium. De quibus passim exstant multi aphorismi apud Hippocratem in *Coacis*, protherticis, & prognosticis, quorum aliquos etiam in *Institut. lib. 3. part. 3. cap. 5.* proposuimus.

*Indicationes.*

Quamprimum delirij aliqua suspicio adest, videndum, ne illud incrementum sumat, & in phrenitidem degeneret. Itaque feruor humorum, qui vapores suppeditant, temperandus, vapores ad caput adscendentes reuellendi, repellendi, intercipiendi, quique ad caput iam penetraverunt discutiendi.

*Delirij simplicis curatio**Auxilia.*

Sanguinis feruorem temperant medicamenta, quæ aliàs febribus eiusmodi debentur.

Reuulsionis gratiâ instituendæ frictiones, ligaturæ, aut cucurbitulæ, etiam cum scarificatione, si opus sit, cruribus affigendæ. Et si hæc non sufficiant, & sectione venæ febris vehementiæ primò non sit satisfactum, ea, si vires ferant, reperenda, & vena cephalica, aut, quod commodius est, & si nondum vehementer materia caput obedit, venæ in pedibus aperiendæ. Clysteres quoque, qui materiam à capite reuellant, infundendi. Imò si febris aliquam remissionem, vel intermissionem habeat, die quietis lene purgans ex cassia, manna, tamarind. syrup. rosar. & violar. solut. vel rhabarbaro exhibendum. Vesicatoria quoque cruribus, vel brachiis applicata ad reuellendum à capite vtilia sunt. Proiungunt etiam pedum lotiones, & epithemata ac cataplasmata iis admodum.

Ut 24. *Fermenti acerrimi Vnc. iiii. sapon. Veneti Vnc. i. sal. communis Vnc. iss. aceri rosar. q. l. pro impastatione.* F. Cataplasma, quod linteis imponatur, plantisque pedum admoueat.

Dum hæc fiunt, simul refrigerantia, & adstringentia nonnihil capiti adhibenda, quæ feruorem humorum temperant, eosque ad caput non admittunt: de quibus supra, *cap. 1. 7. 8. 9 part. 1. dictum.*

Et quia vigilie plerumque cum delirio coniunguntur, hypnotica medicamenta, de quibus, *cap. 1. supra dictum*, tum internis refrigerantibus, tum repellentibus, quæ extrâ exhibentur, admiscenda.

Tandem ut etiam materia, quæ iam caput occupauit, euacuetur, vena in fronte aperiri potest, vel sub lingua, vel post aures. Repellentibus verò in morbi progressu admiscenda leniter discutientia, malua, chamæmel. melilot. betonic. aneth. sem. & mucilagó lini, fœnigræc. & ex his parata, ol. chamæmel. anethinum. In declinatione solum chamæmelum usurpari potest, vel vnguentum alabastrinum. Prodest etiam tum columbas per medium dissectas calentes capiti apponere, vel pulmones arietis, aut agnorum calentes, aut in lacte, vel ol. chamæmel. calefactos capiti applicare, & post

post remotionem horum caput aq. calente ablueret. Ac quò malum magis ad declinationem tendit, eò magis horum vsui insistere decet. Id tamen attendendum, ne nimium calidis medicamentis caput iterum incalescat, ac vapores rursum à partibus inferioribus ad caput attrahantur.

### De Paraphrenitide.

Deinde delirium tale, idque etiam cum febre coniunctum, oritur quandoque ex diaphragmatis inflammatione: quod recentiores nonnulli in specie Paraphrenitidem appellant; cum alij hoc vocabulo omne delirium, quod accidit capite non primario affecto, comprehendant: utriusque tamen, ut dictum, sine Antiquorum exemplo, & autoritate. Cum enim diaphragma neruosum sit in medio, habet magnam cum cerebro per neruos *communione*, & ut Galenus hac de re scribit, *lib. 5. de loc. affect. cap. 4.* (quo in loco cum expresse de hoc malo agat Galenus, merito vox Paraphrenitidis occurrere deberet, si antiquis in vsu fuisset) ab aliarum partium nullà perpetuum delirium procedit, excepto solo septo transuerso, à cuius inflammatione excitatum delirium non multum differt à phrenitide, & continuo delirio, ut veteres putauerint hanc parte inflammatione affectà homines phreniticos euadere, arque ob id *epé-vas* appellarint, quasi *ἐπεὶ ὅτι*, id est, sapienti parti aliquid conferat.

Causa huius delirii proxima cum sit inflammatio diaphragmatis, nihil de ea amplius hic addi potest: reliqua patebunt ex iis, quæ *lib. 2. de pleuritide, & diaphragmatis inflammatione* dicentur.

### Signa Diagnostica.

Delirium hoc eadem ferè signa habet, quæ in phrenitide apparent. Verum distinguitur ab eo, ut Galenus, *alleg. loc. docet*, & ex oculorum accidentibus, & sanguinis è naribus stillis; ut & spirationis specie. Quippe phreneticorum respiratio magna est, & ex longis semper intervallis. Contrà ubi à septo transuerso delirium oritur, inæqualis, ut modò exigua sit, arque frequens; modò magna, & cum angustia coniuncta. Nam incipiente septi transuersi inflammatione, priusquam desinant laborantes, exiguum, ac frequentem reddunt spiritum; contrà ab iis, qui ab affecto cerebro delirant, magna prodit, raræque spiratio. Sed frequenter ita confunduntur hæc signa, ut vix quicquam certitudinis habeant. Præterea ut eorum accidentium, quæ phrenitidem antecedere solent, quæque Galenus eodem loco proponit, aut nullum apparet, aut exiguum; ita sursum & intro reuelli hypochondrium, septi transuersi illico ab initio affecti proprium indicium est: id quod affecto cerebro posterius accidit, non incipiente affectu; sed cum is iam factus est. In primis verò Paraphrenitis ex eo cognoscitur, quod delirium iunctum est cum tussi & dolore lateris. Calor quoque circa caput, & faciei & oculorum rubedo maior est in iis, qui ob cerebri, quam qui ob septi transuersi inflammationem delirant.

### Prognosticum.

Delirii huius periculum æstimandum est ex vehementia morbi, & vitium robore, & ex horum collatione salus, vel mors prædicenda. De quibus etiam *cap. sequenti* dicitur.

### Curatio.

Curatio ad partem affectam in primis dirigenda, de qua *lib. 2.* dicitur; cum curatà inflammatione diaphragmatis etiam hoc delirium cesset. Interim ta-

men materia à capite auertenda & repellenda, ut modo de Delirio simplici, & *part. 1. cap. allegat.* diximus.

### De Temulentia, vel Ebrietate.

Sine febre verò deliriorum genera etiam aliquot *Temulentia* sunt. Pertinet primò hæc Temulentia, vel Ebrietas, à vi- & *Ebrietas* no aliisque potibus, & rebus inebriandi vim habentibus orta. Vt enim in febribus vapores calidi ex humore putrescente ad caput eleuantur, spiritusque turbant: ita etiam à ventriculo, vino, vel alio potu inebriante repleto, imò toto venoso genere, in quo spiritus eiusmodi penetrant, vapores calidi eleuantur, & phantasiam ac ratiocinationem turbant. Vnde Ebrietas rectè Volūtaria insania appellatur; cum ebrij delirantibus similia agant, & loquantur: & ut deliria pro corporis dispositione, in quod incidunt, variare solent: ita & Ebriorum non eadem actiones, & mores sunt. Alij enim in hilaritatem nimiam, risum, cachinnos, cantilenas, & iocos se effundunt: alij tristes euadunt, & de rebus sacris, de morte faciunt verba; vel etiam lacrumantur: alij ad iram, rixas, contentiones, clamores, pugnasque concitantur: alij somno statim corripiuntur. De quo Horatius, *3. Carm. Ode. 21.*

*O nata mecum Consule Manlio,*

*Seu in querelas sue geris iocos,*

*Seu rixam & insanos amores,*

*Seu facilem, pia testa, somnum.*

Hebent autem vim ebrietatem inducendi pleraque narcotica dicta, quorum vis antequam eò progressa est, ut soporem, vel stuporem exciter, prius temulentiā, & delirii quoddam genus producit. Inter ea primum est Vinum, & præcipue eius spiritus, in quo vis illa unita est. Idem tamen præstant & aliarum plantarum succi & spiritus. Cereuisia enim omnis, seu triticea, seu hordeacea, seu auenacea vim inebriandi habet, partim à lupulo, partim à frumento, è quo spiritus ardens æquè ac ex vino elici potest. Et spiritus omnes ex plantis parati, ut baccis & flor. sambuci, cerasis, rosis inebriant, si copiosius fumantur. Inebriant quoque cannabis, holij, pseudomelanthij, & hyoscyami semen, fructus fagi, cocculi de Leuante, cortic. mandragor. opium, si cum vino fortissimo bibatur. Refert etiam Lobelius, *in obseru. stirp. pag. 570.* fœminam Anglam grauidam esu 10. & 12. nucum myristicarum ebriam delirasse. Et Matthiolum scribit, ambarum vino infusum temulentos efficere: quod & lignum aloës Indum in vino infusum sine nocumento præstat.

Turcas, cum in aciem prodire volunt, ut audaciores fiant, & furibundi, quasi pericula minus metuant, opij Drach. β. cum vino sumere scribit non solum Bellonius: sed & Prosp. Alpinus, *de Medic. Egypt. lib. 4. cap. 2.* refert, Turcas post opium sumptum hilares admodum euadere, multaque ac varia loqui, fortioresque ad quæque omnia obeunda sibi videri, præterea subdormientes hortos, ac viridaria arboribus, herbis, ac floribus variis perbellè ornata in somniis videre. Ita ex cannabe, quæ Turcis Assis est, puluerem Turcas parare, idem, *eodem in loco*, scribit, quo sumpto ebrij fiant. Refert & hoc, *Egyptios* in vsu habere quoddam electuarium, quod in India paratur, & Bernau nominatur: cuius si Vnc. j. sumatur, homines primò hilares fiunt, multumque loquuntur, & canunt amatoria, multumque rident, aliæque deliramenta lata produnt, atque ea amentia ferè per horæ spatium durat; postea statim iracundi fiunt, & in iram præcipitantur, in eoque statu parum persistunt; demum tristes fiunt, tantèque timore, ac moerore anguntur, ut continuò plorent, & lamententur, denique somno corripiuntur.

Quædam etiam capiti admota idem præstant; sicut Rondelerius refert, quendam, cum hyoscyami folia capiti applicuisset, ad insaniam redactum esse.

*Signa*

*Signa Diagnostica.*

Actionibus & moribus facile se produnt Ebrij: ac si narcotica medicamenta tale delirium excitauerunt; ex ægro, vel adstantibus id cognoscitur.

*Prognostica.*

1. Ebrietas quidem ex potu vini vel cerevisiæ contracta post aliquot horas discutitur; præcipue somno accedente, & vomitu.

*Historia  
quatrduana  
ebrietas  
Observatio  
Henr. ab  
Heer.*

[ Ebrietatem interdum diutius & ad quartum vsque durare diem, patet etiam ex hac historia, quam habet Henr. ab Heer, *observ.* 19. Vir quidam ætatis consistentis, cum vino cerevisiæque plurimâ inebriatus fuisset, supinus concidit, domumque relatus, à Medico quodam triduo pro apoplectico curatus fuit, qui etiam decreuerat, quarto die cranium trepano aperire. Verum cum accederet Henr. ab Heer, & nullam in corpore, quod resupinatum erat, læsionem perciperet, pulsuum æqualem deprehenderet, respirationem nullo modo impeditam, cum omnimoda sternutationis absentia, summaque anhelitus libertate, de ebrietate suspicari cepit. Et cum ab vxore intelligeret, virum aliàs sobrium, malum hoc ex ebrietate contraxisse, cranij apertionem prohibuit, & ægrum, cum nec conuulsionibus, nec febre correptus hæcenus fuerit, extra vitæ periculum esse pronunciauit, iuxta *aph. 5. sect. 5. Siquis ebrius obmutescat, conuulsus moritur, nisi febris incidens hunc corripiat, aut quo tempore crapula solui solet, vocem edat.* Vt verò eum excitaret, mystaceos pilos (cum in capite omnes abradi essent) vellit, vnde ille & brachia mouere, & loqui cepit.

Etsi verò rara est ebrietas quatrduana: tamen accidit interdum, nec Galeno ignota fuit, qui, in *commun. alleg. aphorism.* scribit: Quidam post tridie crapulâ liberantur, alij sequenti nocte, aliis in tertiam vique diem durat, pro vini epoti viribus & copia, & potoris natura. Sicut enim cibi concoquendi vnum non est omnibus certum & statutum tempus, sic neque vini exhalandi. Crassa enim vina tardius exhalant, citius tenuiora, & assueti minus læduntur. Crediderim tamen hanc ebrietatem in aphoniam degenerasse. Addit & hoc *ibidem*, quendam, cum vino Hispanico se inebriasset, è scamno delapsus, & pro mortuo ferè in vicinum cubiculum delatum fuisse. Cum verò quidam temperuini succo, aceto acri, nitro permixto, scrosum inuoluisset, ebrietatem breuissimo temporis spatio discussam fuisse.]

1. Si verò à veneno, vel medicamento narcotico sit delirium, magis periculosum est. Imò etiam ex vino vel cerevisiâ ebrietas, si sæpius continuetur, memoriam & ingenium debilitat; vt non sine causa pestis, & mors memoriæ appelletur: ætuoſum genus lædit; vnde tremor, paralyſis, apoplexia, podagra excitatur: & quia etiam hepatis nocet, læpe hydropem inducit.

*Præseruatio ab Ebrietate.*

*Præseruatio  
ab ebrietate.*

Si tamen istam bibendi necessitatem, quæ magno mortalium malo, & Christianismi damno, in Germaniam præcipue inuecta est, quis effugere non possit, commendatur amygd. amar. 5. vel 6. aut 10. ante cibum sumpta, vt & nuclei persicorum; quod quidem nonnulli putant fieri, quod amaritudine humiditates absumant, ne ad caput adicendant: verum probabilius est vrinam ciendo id præstare. Commendatur & absinthium in ventriculo frigido. Scribitque Arculanus ex propria experientia, si quis absinthij comas, aut etiam folia rutæ manè, ieiuno stomacho, edat, ab ebrietate defendi.

Vtilis etiam est contra Ebrietatem brassica, vt & sem. ipsius in cibo sumpta, vt & folia eius capiti imposita;

*Dan. Sennertis Tom. 11.*

vertenaca recta, lac ieiuno stomacho bibitum. Commendatur & rad. betonic. Nonnulli hunc puluerem laudant:

*℞. Sem. caulium Drach. i. coriandr. Drach. 5. camphor. gr. ii. F. Puluis.*

Vel paratur tale Electuarium:

*℞. Conferu. rosar. rubr. rob. ribes, berberis, an. Vnc. 8. amygdal. amar. contusar. num. xii. sem. caulium Drach. ii. coriandr. prepar. Drach. i. Cum syrupo granator. F. Electuarium.*

Syrupus:

*℞. Succ. caulium albor. vini granator. succi ribes, an. 3. fi. aceri 3. i. sacchari q. l. Coqu. ad lulepi consistentiam.*

Vel *℞. Syrup. acetositar. citri & aq. q. l. F. lulepus.*

Extra commendantur fol. hederæ capiti imposita; vnde antiqui in conuiujs coronis ex hederæ caput cingebant; vel succus illius capiti inunctus: vt & lapis Amethystus gestatus.

Qui Ebrietatem etiam præcaue cupit, non ieiunus, vel statim in prima mentis ætate bibat, sed tardè, & vbi satis comedit.

*Curatio.*

Iam verò Ebrios, vt ab Ebrietate citò liberentur, iuuat vomitus, si vinum adhuc crudum ex parte in ventriculo consistat; qui etiam, si opus, medicamentis prouocandus: & si acida in fine mentis exhibeantur, acetumque aquâ dilutum, vel solum etiam haustum, quod Ebrietatis & venenorum narcoticorum ac furiosorum est antidotus; poma acida, pruna, cydonia comesta, eorumque succus haustus, lac acidum, lactuca item & brassica.

Vel *℞. Aq. fontis 1b. 5. aceti vini Vnc. iii. Syrup. acetositar. citri, vel oxyſacchar. simpl. 3. i. b. Syrup. violar. 3. 5.*

Misce pro lulepo. Vel etiam haustus aquæ frigida propinetur ad vapores suppressendos, & vini feruorem restinguendum.

Extra Oxyrrhodina capiti applicentur; & camphora, ac tantali odoranda exhibeantur. Postea etiam pedes fricentur, vel aquæ calida immergantur. Vtilis est & sudor, si erumpat.

Maximè verò ad abigendâ Ebrietatem somnus facit.

Pertinet huc & illud delirium, quod Græci etiam *ἄγανος*, & *ἀνρον* nominant, quod ab imbecillitate facultatis principis oritur, ob immoderatum sanguinis fluxum, vel diurnas vigilias; nonnunquam ob ætun capitis quo spiritus animales perturbantur. Atque istud delirium ex suis causis cognoscitur, & iis amoris tollitur.

Referenda & huc stultitia, in qua facultates principes non solum imminutæ, sed & deprauatæ sunt. Quæ nonnullis à primo ortu impressa est, aliis post ortum etiam contrahitur. Et quidem pender istud malum proximè à spiritus cerebri insiti vitio; vt & interdum à cerebri, & capitis conformatione prauâ; quam cum nec satis explicare, nec emendare possibile sit, de eâ amplius nihil addimus.

## Q V Æ S T I O.

*Quid sit Maſlach Turcarum?*

Vt hoc loco obiter quasi de Maſlach Turcarum, cuius supra facta est mentio, aliquid inferamus; communis hæcenus fuit opinio. Maſlach, vt ex Scaligero, exercit.

175. *sect. 1. V. Viero, lib. 3. de præſtigijs demonum, c. 18.* & aliis videre est, ex opio parari. Etsi enim nomen Maſlach non apud omnes occurrat; rem tamen ipsam satis Autores omnes describunt. Sunt tamen hodie, qui id negant, adducti autoritate Leonard. Thurnheuleri, qui sui *herbarij, lib. 1. cap. 29.* ex ceruatiæ succo Maſlach parari scribit, idque ex secreta Turcarum relatione sibi cognitum fuisse refert. Etsi verò apud nos non

*Maſlach  
Turcarum  
quid.*

fit in usu Maslach: tamen, ut etiam hac in re veritatem rescirem, scripsi eo nomine Patavium, ad virum Clariss. Dn. D. Daniele Bucrerium, Ciuem, & amicum meum, eumque rogaui, ut Veneriis apud Turcas, vel alios, quos huius rei notitiam habere putaret, hac de re inquireret, Percontatus ergo ille est primo hac de re Dn. Iohan. Baptistam Syluagium, Genuensem, Reipublicæ Veneræ apud Turcarum Imperatorem Interpretem, peritissimum linguarum & morum gentium orientalium. Is hoc primò negavit, Turcas prælium inituros tale quid, quo animosiores se morti opponant, deuorare: imò grauissimè prohibitum esse, ne quis prælium accessurus, quicquam earum rerum vel degustet, quæ mentem quocunque modo turbare queant. Id autem, quod animum præliaturis addit, prædestinationem esse, quam de vita & morte hominis ab æterno factam esse à Deo credunt. Vbi enim dimicandum est, Imperatores, vel Duces belli suos quisque adhortatur, se præstent strenuos, memores, se pro Deo sanctæque fide maiorum pugnare, & si quod periculum impendeat, se immunes nihilominus à morte futuros esse, si ira æterno Numini visum fuerit: sin aliquid secius fortè contingat, iamnam martyres se sciant esse, quibus cælum apertum sit. Deinde Maslach quod attinet, idem retulit, habere Turcas medicamenta quædam, quibus frequenter vtuntur, quæ primùm hilares reddunt, at mox, præsertim si copiâ peccatum sit, insanos; inde in somnum coniiciunt, quo variæ rerum iucundissimarum imagines omnino repræsentantur. Et quidem talia præcipuè duo habere, quorum primum patrio sermone Añón dicitur; alterum Bôngelic. Et Añón nihil aliud esse, quam opium nostrum, quod iter facientes assument, vt hilarius tempus perdant, seisque redeuntes suauius dormiant. Aiunt enim, post eius usum sibi somnia iucunda obici, & choreas pulcherrimarum virginum sibi videri. At si sæpius id sumant, insensati quali redduntur, minúsque, vt antea, animo semper valent. Quia etiam si assuecant huius vsui, fieri quàm sæpiissime solet, vt, quâ horâ sumere consueuerant, nisi eadem sollicitè repetant, iam malè se habeant, ac, si consuetudo fuerit vetustior, in animi deliquium cadant. Tristes sunt toto vitæ tempore, & ad omnia animi officia inhabiles redduntur, nec redire ad vllam hilaritatem queunt, nisi fuscata sit, & arte, vsuque opi parata. Quæ causa est, cur ii, qui animo ferè nobiliori præditi, & ad res gerendas nati, tanquam rem infamem & impiam exerceantur, sicque inter plebeios tantum, vilisque animos locum inueniant. Bôngelic autem electuarium est ex melle paratum, foliis & semine cannabis puluerisati, quod in maximo usu, & frequentiore adeo, quam opium habent; cum languentem ventriculi vim ipsis colligere videatur. Coniicit tamen & hoc in eadem homines pericula; cum delirantes reddat, & somnum capiant, (quem conciliat similiter) gigantes pugnare sibi videantur, ignesque & ciuitates ardentes. Cæterum idem Dn. D. Bucrerius, vt ab aliis etiam in veritatem inquireret, cum Veneriis manè in coronam Turcarum circa mensam cuiusdam fœminæ stantem incideret, videretque, ipsos aquam quandam potitare (quam vendebat hæc) feruentissimam, vt non nisi guttulam semper deglutirent, atque ex ipsis, quid esset, quæreretur, responderunt, decoctum esse seminis cuiusdam, quod Caphe vocant, allati ex Arabia Felice, quod bibunt matutinis horis, vt nostri aquam vitæ. Tandè cum etiam incideret in Dn. Poterium, ex scriptis Chymicis notum, atque ipsum de Maslach percontaretur, retulit hic, se multa iuuenem de eodem indagasse, ac tandem à pluribus Turcis edoctum esse, nihil quam opium hoc nomine vocari. Cui cum Dn. D. Bucrerius autoritatem Thurnheuseri, cui fidem facit, tot circumstantiis, quas afferre, obiceret, ille se parumpendere hominis istius fidem respondit, à quo nunquam non credulus fuerit delusus. Ex quibus omnibus patet, et si

vox Maslach non omnibus nota, nec vbique obuia sit; tamen medicamentum, quod eo nomine circumfertur, ex opio esse. Et cum de hac re sit vnanimis consensus, non tantum Turcarum, sed & Christianorum, qui nihil aliud pro Maslach, quod in Turcia emerunt, quam opiū monstrant; non video, cur eum deserere, & Thurnheusero assentiri potius debeamus, qui tamen in aliis rebus multis fidem suam suspectam reddidit. Si quis tamen hac de re certiora (nam fides hic penes experientiam est) cognita & perspecta habet, vt veritas pateat, ea in publicum conferat.

## CAPUT VII.

## De Phrenitide.

Phrenitis Græcis ἀνοΐα φρενῶν dicitur; quo vocabulo, vt Galenus, 1. *protrhet.* 1. 4. docet, *vis* seu *diarosa* propriè significatur, significatque (vt pleuritis, nephritis) inflammationem, ob quam ratiocinatio læditur, & delirium excitatur. Et cum diaphragmate inflammato mens etiam turbetur, factum est, vt à Platone, & veteribus aliis ἀνοΐα φρενῶν appellatio (Latini tum præcordia vertunt) diaphragmati tributa sit; quod huius etiam constitutio ad mentem aliquid facere videatur. Verum cum diaphragma ad mentem non pertineat, sed per accidens delirium illud contingat, verè ac propriè dicta Phrenitis fit tantum cerebri membranis primariò affectis; & propriè membranarum cerebri affectio est Phrenitis. Aliquando tamen etiam deliria symptomatica febrium ardentium deliria dicuntur.

Affectio autem hæc dupliciter considerari, vt & desiniri potest; vel vt morbus, in inflammatio scilicet membranarum cerebri, quâ ratione supra, *pari.* 1. *cap.* 27. considerata fuit; vel vt symptoma, seu deprauata actio facultatum principum; quâ ratione hîc consideranda venit.

Arque hoc modo considerata Phrenitis, est delirium perperuum & continuum. seu principum functionum cerebri, imaginationis (scilicet, & ratiocinationis) deprauatio, ab inflammatione membranarum cerebri orta, cum febre continua; aut potius delirium dependens ab in temperie calida cerebri cum materia, eaque ab inflammatione membranarum cerebri proueniente; vt postea de causis dicetur.

Vt enim in aliis deliriis, ita hîc phantasia, & ratiocinatio suum officium non faciunt, sed in iudicandis rebus aberrant, nec verum à falso, bonum à malo, turpe ab honesto, congruum ab absurdo, & quod nec loco, nec tempori conuenit, distinguere valent, & ob causæ rationem omnia cum contentione, rixâ & furore agunt.

Interdum tamen sola imaginatio, ratiocinatione saluâ; interdum vtræque functio deprauatur. Dum imaginatio sola afficitur, res absurdæ & non coherentes offeruntur, ac ea, quæ nullo modo adsunt, præsentia putantur: cætera rectè iudicant. Id quod Theophilo, Medico, contigit, vt Galenus, *de differ. sympt.* *cap.* 3. refert, qui cum tubicines angulum domus, vbi decumbebat, occupasse, assidueque sonare, tum pulsare putabat, in eo imaginationem deprauatam habebat: quod vero eos, vt sibi molestos, & quietem turbantes, domo eiicere iubeat, & in cæteris omnia prudenter agebat, & loquebatur, atque, vbi conualuit, quæ quisque adstantium dixisset, fecisse vè, narrare poterat, & imaginationis illius deprauatæ de tubicinibus recordabatur, in eo ratiocinatio & memoria salua erant. Alius, vt ibidem, Galenus refert, qui oclusis foribus singula vasa promens, & per fenestrâ transeuntibus monstrâs, ac nominans, & an ea proicere iuberent, interrogans, eaque ab alto proiciens, phantasiam & memoriam catenus

Phrenitis dupliciter consideratur.

Phrenitis, quid.

Quanam facultates lædantur in Phrenitide.



salua habebat, dum vasa omnia agnosceret, & nomina eorum recitaret: verum dum ea ex alto proiecit, ratione saluam non fuisse, ipso facto demonstrauit. Plerumque tamen & phantasia, & imaginatio simul deprauantur.

*Philosophi  
sola ratio  
salua per-  
manere pos-  
sit.*

Eustach. Rudius quidem hanc doctrinam impugnatur, statuitque, fieri non posse, vt ratione salua & illa permanente, sola imaginatio possit ladi; idque ea de causa, quia speculantem & intelligentem oporteat circa phantasmata versari: ideoque si à phantasia deprauata ratiocinatrici potentiae absurda phantasmata offeruntur, necesse esse, vt intellectus ea praua phantasmata speculando prauè quoque & absurde speculetur.

Verum enimvero etsi hoc verum sit, intellectum circa phantasmata versari: tamen ad intellectum non transmittuntur species materiales, vt à sensibus exterioribus transferuntur ad sensum communem, & hinc ad phantasia; cum intellectus specierum sensibilium non sit capax, neque organum corporeum habeat, sed intellectus agens phantasmata illustret, eaque à conditionibus materialibus liberet, & speciem intelligibilem efformet; vt de his pluribus Philosophi docent. Præterea intellectus de vno ad aliud discurret, & circa species memoriâ retentas etiam occupatur. Ideoque etsi phantasia aliquid absurdi menti offerat: tamen si species antea perceptæ in memoria adhuc retineantur, & rationi offerantur, inde errorem illum & deprauationem phantasiæ cognoscere, & corrigere potest: si nimirum animaduertit, neque loco, neque tempori, neque aliis circumstantiis, quas adhuc rectè memoria habet, & veras esse scit, absurda illa phantasmata, quæ ab imaginatione deprauata afferuntur, conuenire. Vnde rectè Aretæus, lib. 1. de causis & signis morbi diuturni. cap. 5. scribit, in melancholia in re vna aliqua esse lapsum, constante in reliquis iudicio.

Memoria etiam in Phreniticis sæpe læditur, seu aboletur, cum ægri, etsi sistant, bibere, & lotium vrgeat, mingere obliuiscuntur. Id tamen ferè ex accidenti. Innumera enim in tumultuosa illa spirituum commotione imagines offeruntur, quæ phantasia ita occupata reddunt, vt ad id, quod natura iubet, non attendat. Aliquando tamen etiam per se lædi potest memoria.

### Causa.

*Causa Phrenitidis cerebri membranarum inflatio.*

Causa huius mali primaria est membranarum cerebri inflammatio, cum sanguis biliosus è vasculis suis effusus membranas cerebri occupat, ibique putrescit, & accenditur; aut potius intemperies cerebri & spirituum calida, à membranarum cerebri inflammatione, proueniens, qua spirituum animalium turbulētus & inordinatus motus seu agitatio oritur, quæ proxima delirij huius causa est, vt pote phantasmata deprauans. Neque enim, vt postea in quaestione, dicitur, inflammatio cerebri, quatenus talis, delirium hoc excitat; sed tum demum, vbi calida illa intemperies cerebri, & spiritibus eius communicatur, qui inde turbantur. Imò obseruatum, cerebrum inflammatum fuisse sine delirio. In hoc enim delirio membranarum cerebri ambientes, vt per quas vasa sanguinem continentia transeunt, præcipue inflammantur. Vix tamen fieri potest, quin cerebrum ita vicinum etiam non incalcescat; imò aliquando, præcipue eius externa pars, simul inflammetur. Vnde & spiritus insitus, & qui in cerebro generatur, ac cōtinetur, incalcescit, & nimis mobilis redditur, varièque agitur, atque inde delirium continuum excitatur. Erit enim etiam in aliis febribus deliria accidant, de quibus capite præcedente dictum: tamen quia ista saltem per consensum fiunt, vaporibus biliosis ad caput: siue ex aliqua parte, siue toto elatis; deliria illa non sunt continua, nec tam vehementia & ferocia; vt in Phrenitide; vbi materia ipsum cerebrum occupauit.

Qua ratione autem cerebri & eius membranarum inflammatio generetur, & quas causas habeat, dictum est supra, part. 1. cap. 27. vt de eo hic addere nihil opus sit. Imò cum Phrenitis nihil aliud sit, quam cerebri membranarum inflammatio, nihil ferè amplius hic addere opus esset; sed omnia, quæ de Phrenitide dicenda sunt, ex loco alleg. peti possent: pauca tamen adhuc addere libet, præcipue ea quæ hinc affectioni ratione delirij sunt propria, & dicentur etiam quadam postea, in quaestione.

*Cerebri, imò inflammatio quo modo generetur.*

### Differentia.

Primo pro causarum varietate etiam delirium hoc variat. Equidem omnis phrenitis, vt pote inflammatio, est à sanguine: quia tamen sanguis is varius est, & non semper purus; etiam delirium variat. Mirius est, & cum risu, ac leui in somnum propensione, quod fit à sanguine puro; quod tamen rarius accidit: & diu non durat, cum ex sanguine inflammato facile bilis, aut atrabilis fiat: sæuius, si pallida bilis admisceatur; adhuc sæuius, & cum pertinacissimis vigiliis, si flaua bilis admisceatur, quæ si aduri incipiat, sæuissimum delirium excitat. Variatur etiam Phrenitidis magnitudo pro causarum vehementia, ita vt nunc sola imaginatio, nunc quoque ratiocinatio, imò quandoque memoria lædatur.

*Differentia Phrenitidis, 1. ratione causarum.*

Deinde ratione loci affecti. Etsi enim solum cerebri membranarum inflammatio, quod malum Arabes Charabium, & Sirsin calidam nominant; ad Phrenitidem cōstituendam sufficit: tamen interdum inflammatio ipsū cerebrum simul corripit; quod malum Sabare ab Arabibus appellatur. Et quidem cum sanguis, ac humor biliosus nondum per totam cerebri substantiam diffusus est, sed in membranarum meatibus adhuc hæret, Phrenitis dicitur, seu tumultuosa appellatur: si verò in ipsam cerebri substantiam humor imbibatur, hectica Phrenitis est, quam Hippocrates dicitur, & mitem nominat, quod ægri quiescunt, neque loquuntur; neque se mouent, & dormire videntur, vt ex 1. prorrhetic. 1. 33. videre est.

*2. Ratione loci affecti.*

*Sabare.*

### Signa Diagnostica.

Vtile est autem etiam signa imminentis Phrenitidis cognita habere, vt ei maturè occurratur. Proponuntur verò à Galeno, 3. de loc. affect. cap. 4. & 1. prorrhetic. 5. & sunt hæc: Vrgent vigiliæ, aut somnus est interruptus, & molestis somniis horrendis perturbatus, somniaque sunt conspicua; quidam dormientes vociferantur; alij è lecto exsiliunt; incipiunt delirare, etsi delirium non sit continuum, sed præcipue circa accessiones, & acerbationes vrgeant; in facie, & oculis præcipue, apparet rubedo, in auribus percipitur sibilus, sonitus, strepitus, tinnitus; res oblata visui geminæ videntur, lacrymæ ex oculis erumpunt, oculi inordinate mouentur, ægri se variè iactant & mouent, frequenter excreant sine necessitate; vrina ex tinctis albæ, & crudæ fiunt, humor bilioso caput perente; præterea ægri eorum, quæ dicuntur, obliuiscuntur, respondent cum iracundia, ac, vbi iamiam Phrenitis præstò est, ægri fixis & toruis oculis homines, qui ad eos accedunt, intuentur.

*Signa Phrenitidis imminenti.*

Signa verò præsentis iam phrenitidis ex iis, quæ de inflammatione cerebri, ac membranarum eius, loco alleg. dicta sunt, satis patent; vbi signa pathognomica inflammationis cerebri, seu Phrenitidis esse diximus, febrem continuam, delirium perpetuum, & vigiliæ pertinaces. Duo hic saltem addimus: primò, Galenum de signis illius Phrenitidis, quæ à cerebri inflammatione prouenit, & Arabibus Sabare nominatur, ipsi verò Phrenitis hectica est, prolixè agere in 1. prorrhetic. comment. 1. 1. 33. vbi docet, non solum illos

*Signa Phrenitidis præsentis.*

Phreniticos dicendos, qui exclamant, vel exsiliunt, sed & eos, qui quieti iacent, & prorsus non loquuntur, neque frequenter decubitus mutant, sæpiusque famulantibus præbent opinionem, quod mox si quod fiat silentium, dormituri sint; & cætera, quæ ibi videantur.

*Phrenitidis  
à cognatis  
affectionibus  
distinguitur  
ratiō,*

Deinde ex signis pathognomonicis supra propositis, febris continuâ, delirio perpetuo, & vigiliis facile Phrenitis; ab omnibus cognatis affectibus discerni potest. Febris enim differt à melancholicorum delirio; vigiliis à lethargo; delirio perpetuo & æquali ab aliis deliriis, in quibus caput non primariò, sed per consensum afficitur; præterquam cum consensu diaphragmatis laborat. Verum hoc delirij genus aliis signis à phrenitide differt. Respiratio enim in delirio ex sepi transuersi inflammatione est parua, & frequens; in Phrenitide magna & rara: & in Phrenitide caput, ac frons magis calent, oculi rubent, neque statim hypochondria sursum reuolluntur, vt in diaphragmatis inflammatione; sicut *cap. præced.* dictum. Addimus & hoc, fluxum bilis sæpe in atram degenerare; cuius conuersionis signa sunt, animi ferocia, cum scilicet æger clamat, alios verberibus & moribus imperit, & familiares pro hostibus habet.

### Prognostica.

Prognostica de inflammatione cerebri, & membranaturn eius, supra, *part. 1. cap. 27.* proposita, omnia etiâ hic locum habent; cum Phrenitidis causa proxima sit inflammatio cerebri, & proinde eipsa non differant. Vt breuiter illa contrahamus, euentus ex morbi magnitudine, & virium robore æstimandus est. Si enim vires sint languidæ, vt neque solæ, neque præsidiiis artis adiutæ morbo sustinendo, & vincendo pares sint morbus verò sit vehemens; id quod hic non solum ob præstantiam partis accidit, sed etiam à symptomatum vehementia colligitur; morbus lethalis est. Ideoque cū hic pars nobilis afficiatur, & ob id omnis Phrenitis periculosa sit, si accedant conuulsiones linguæ, & nervosarum partium, *arritia*, singultus, dentium stridor, vox clangosa, & tremula, tremor membrorum, vrina & fecum inuoluntaria, & inscia deiectio, & similia supra enumerata, Phrenitidem lethalem significant. Si verò hæc symptomata, vel pleraque ipsorum absint, & vires sint validæ, de salute adhuc spes est. Videatur etiam Forestus, *lib. 10. obseru. 3. in scholio.*

*Phrenitis  
lethargum  
vel coma  
mutatur,*

Vnum saltem iis addimus: Phrenitis si vertatur in lethargum, aut coma, non bonum; non tam quia materia biliosa, consumptâ pituitosâ putredine, accenditur; vt nonnullis videtur, quàm quia ipsa cerebri substantia corrumpi & labefactari incipit. Vnde & Phrenitis hectica præca est, 1. *prorrhet. comment. 1. 1. 3. 2.* Et quamuis hectica Phrenitis videatur esse mitior, nec dolor capitis sit in eâ ita magnus, nec delirium tam vehemens, sed ita blandum, vt æger delirare vix videatur; tamen fucata istâ mansuetudine Medicus non decipiatur, sed potius mortem proximam esse colligat. Etenim quibus cerebrum sphacelo correptum est, substantiâ cerebri ob inflammationis magnitudinem ita corruptâ, vt iam emori incipiant, ij intra 3. dies moriuntur, 7. *aphor. 50.*

### Curatio.

Cum Phrenitis ab inflammatione cerebri & membranarum eius, vt proximâ causâ, dependeat, & eâ posita exciteretur, sublata cesset; nihil aliud de curatione Phrenitidis dici potest: quàm quod supra, *loc. alleg. de curat. inflammat. cerebri, ac membranarum eius.* dictum. Et præcipue venæ sectio hic necessaria est. Notat quidem Arculanus, vnum saltem casum occurrere, in quo non competat venæ sectio: quando scilicet phrenitis

pendet à sola bile, nullo sanguini permixtâ. Verum cum phrenitis sit inflammatio, impossibile est, vt sine sanguine fiat.

Duo saltem hic addimus: Primò, quia in Phrenitide vigilie vigent, & maximum negotium facessunt; vt pote quæ attrahendo humores ad caput, & id calefaciendo, Phrenitidem augent, imò excitare valent; deliriumque præterea est perpetuum: ad somnum conciliandum, & delirium sedandum hypnoticis hic plurimum indigemus, imò ad narcotica quandoque deueniendum; de quibus supra, *cap. 1. de vigiliis nimis, dictum.* Ideoque è medicamentis internis, quæ ad temperandum humorum feruorem exhibentur, ea eligenda, quæ simul somnum conciliant; vt lactuca, violæ, nymphæa, papauer. Multum hic prodest electuariū illud, quod ex sem. papau. & saccharo conficitur, & Græcis Diacodium appellatur, quod non solum calidos, & acres vapores, & humores temperat, sed & somnum egregiè conciliat.

Extra mox ab initio repellentibus misceantur hypnotica, vel seorsim adhibeantur, Exempl. gr.

*℞. Fol. lactuc. salicis, visis, an. M. j. flor. nymph. rosar. rubr. violar. an. M. j. summit. anethi M. ss. capit. papau. alb. cum sem. num. xv. Coq. in l. q. aq. ad tertias.*

Colatura tepida capiti cum spongia applicetur, & eadem extrema abluantur. Si Vnc. ss. vel Vnc. j. rad. mandragor. addatur, efficacius erit. Neque solum caput, sed & pedes ac manus lauandæ ad refrigerationem, reuulsionem, & somni conciliationem.

Harum lotionum capitis vsum Hippocrates & Galenus probant in delirio cum vigiliis, etiam vbi sanguis è naribus profluit, minus tamen profluit, quàm oportebat; de quo in 1. *Epid. comm. 3. aph. 24. seu rot. 7.* A lotionem inungatur frons tempora & pulsus hoc, vel simili Linimento:

*℞. Unguent. rosac. populei, ol. violar. denymph. an. Drach. ij, opij, ol. nuc. mosch. express. an. gr. iij. Misce.*

Oxyrrhodinis etiam, & illitionibus addantur aq. lactuc. papau. nymph. ol. papau. nymph. mandragor. Plurimum prodest in vigiliis ex hac causa, si caput inungatur ol. violar. frigidum, & oxyrrhodinum superponatur. Et reliqua supra proposita, c. 1. vsurpentur.

Potest & hic Clyster iniici:

*℞. Maluæ violar. lactuc. parietar. an. M. j. summit. anethi M. ss. capit. papau. num. vj. bordei M. ss. Coq. in aq. f.*

Colat. *℞. ss. j. ol. violar. Vnc. iij. sacchar. alb. Vnc. j. F. Clyster.*

Vel *℞. Malu. mercur. lactuc. scariol. an. M. j. nenuph. viol. an. M. j. ss. prun. Vngar. N. x. syr. fur. macri M. j. Coq. in aq. hord. Colat. Vnc. xij. Dissolu. cass. rec. extr. Vnc. ss. diaprun. f. aut pulpa. tamar. Drach. ij.*

Vel *Elect. de succ. rosar. Drach. ss. tripher. Persicor. Scr. iv. olei violac. Vnc. iij. vitell. oui. N. j. sacch. rubr. 3. ss. salis Drach. j. M. F. Enema.*

Bilis etiam feruorem restinguentia exhibenda.

Vt: *℞. Pulp. tamarind. Drach. ij. rad. cicbor. sativ. condit. Vnc. ss. lactuc. ital. condit. pulp. citri condit. an. Drach. iij. conferv. flor. nymph. rosar. incarnat. bugloss. an. Drach. v. acetosell. Vnc. ss. spec. diamarg. frig. Drach. sem. fragment. lapid. pretios. an. Scr. j. corall. rub. præpar. Dra. i. Cum syr. conseruat. citri q. s. F. Condit.*

Superbibatur aq. hord. aut vin. Cydon. aut aq. flor. nymph. endiu.

Si calor cordi communicetur,

*℞. Aq. rosar. Vnc. iv. viol. Vnc. ij. bugloss. borrag. an. Vnc. ss. acetos. Vnc. ij. acet. vin. alb. Vnc. ss. pulu. spod. Drach. ss. seric. cocco tint. crud. Scr. j. offis de cord. C. Scr. ss. lign. aloës Scrup. j. santal. omnium, an. Scr. ij. croci gr. viij. camph. gr. vj.*

M. F. Epithema. Ad sinistram mamillam applicetur cum

*Vigiliis in  
Phrenitide  
quomodo  
dandum.*

cum panno chermefino, quod lixiuio semel atque iterum elotum est.

Hepatis regioni sequens apponatur Epithema :

*℞. Aq. Lactuc. ij. rosar. Vnc. iij. endiu. acetos. an. Vnc. iij. absinth. acet. vini alb. odorif. an. Vnc. β. santal. alb. rubr. spody an. Scr. j. camphor. gr. v. spic. gr. iv. spec. diarrhod. abbat. Drach. i. M. Applicetur tepidum cum linteo.*

Sunt qui generales etiam partes refrigerent.

*Vt : ℞. Vini alb. Vnc. j. aq. rosar. ℔. β. santal. rubr. Vnc. β. M. His foue testiculos.*

*Opiata cau-  
te usurpan-  
da.*

Opiata cautè omnino, & circumspectè usurpentur, vt, *ibid.* dictum, ne Phrenitis in veterem mutetur, & ab iis abstinendum, si vires sint imbecilliores. Etsi enim, si mitioribus remediis febris ac delirium non sedetur, res plena periculi sit: tamen salus ab opiatas sperari non potest, sed spes in angusto est, quia aut vires iam succumbunt, aut abscessus metuendus est, cuius maturationi cerebrum sufficere non poterit. Vbi tamen necessitas id postulat, laudandum opiatum exhiberi potest, vt *suprà, cap. i.* dictum. Aut, quod tutius est, clysteribus permisceatur.

Deinde quia contingit, vrinam quandoque suppressi in hoc morbo, siue quod sponte illa subsistat, siue, quod credibilius, quod ægri eam reddere negligant; unde partes illæ distenduntur, & tandem inflammatione corripuntur, quæ vel sola ægro interitum afferre potest: itaque tum ægri ad vrinam reddendam sapius incitandi sunt, ac pubes, & perinæum fouendum emollientibus, ac laxantibus, & vrinam prouocantibus; (acalidis tamen abstinendum, ) decocto fol. parietar. maluat. petroselin. & similibus, aut inungenda illa loca ol. amygdal. dulc. scorpiõ. vnguento dialthææ, vel pinguedine cuniculi, aut cataplasma fiat ex parietaria cocta cum ol. scorpiõ. & amygdal. dulcium.

Reliqua, vt dictum, ex *part. i. c. 27.* petantur. Hoc saltem adhuc addimus: si febrilis feruor, & sitis vrgeat syrupi modicè adstringentes, veluti sunt, syr. de succo granat. de succo ribes, de succo berber. limonum, citri, exhibeantur. Vel præparetur sequens Iulepus:

*℞. Aq. nymph. Vnc. iij. rosar. bugloss. an. Vnc. vj. syrup. de succ. ribes Vnc. ij. spir. ☉. Drach. i. vel q. s. β. M.*

Vel *℞. Aq. fontan. puriss. ℔. ij. trifolij acetosi, papau. erras. an. ℔. β. spir. ☉. Drach. j. vel q. s. ad gratum saporem:*

Adde *flor. violar. borragin. nymph. an. Drach. j. santali rub. limati Scr. ii.*

Stent in infusione per aliquot horas; postea filtrètur per chartam emporeticam: tinctura, quæ rubicundissima erit, edulcoretur saccharo albo q. s. vel syrup. acetos. citri.

Cordi quoque, & pulsibus epithemata applicentur refrigerantia, & confortantia; de quibus in doctrina de febribus dictum. Testibus etiam nonnulli epithemata adhibent refrigerantia, vt pote spongiam marinâ in aq. rosar. madefactam, cui penetrationis gratia acetum admiscant.

Chymici magisterium margaritarum, tincturam coralliorum commendant.

#### Diata.

Dietæ etiam ratio ea obseruetur, quæ *suprà, de inflammatione cerebri & membranarum eius,* proposita est.

Ob delirium hoc saltem addimus, quæri à Medicis vtrum æger in luce, vel tenebris habendus sit. De eo Celsi sententiam adferimus, qui, *libr. 3. cap. 19.* sic scribit: Antiqui tales ægros in tenebris habebant, quas ad quietem etiam conferre iudicabant: at Asclepiades, tanquàm tenebris ipsos terrentibus in luce habendos esse dixit. Neutrum tamen perpetuum est. Optimum itaque est, vtrumque experiri, & habere eum, qui te-

*An in luce  
vel tenebris  
detinendi  
sint phrene-  
tici.*

nebras horret, in luce; eum, qui lucem, in tenebris. At vbi nullum tale discrimen est, æger, si vires habet, loco lucido; si non habet, obscuro continendus. Hæc Celsus. Aliqua n. naturarum diuersitas hic occurrit, atque alios plus tenebræ, alios lux turbat. Et nonnulli dum in aëre sublucido veriantur, multa, quæ non sunt, se videre imaginantur, alia pro aliis agnoscunt, & varias imagines ab obiectis concipiunt. Ideoque tum non solum omnes picturæ è cubiculo amouendæ, cum eiusmodi colorum varietas occasionem præbeat, vt multa falsæ imaginentur ægri, sed & æger in loco obscuro continendus. Contra si æger tenebras horreat, & pertimescat, in luce continendus. Vt æger in quiete detineatur, etiam turba ab eo arceatur, adstantesque sint pauci, prudentes, & ægro familiares, ac grati: absint verò quos ægri odio habent.

Musica quoque suauis interdum demulcendus æger: custodiendus etiam diligenter; ne damni aliquid, vel sibi, vel aliis inferat, & nisi admonitionibus, ac obiurgationibus quietus contineri possit, vinculis coercendus. Somnus omnibus modis concilietur; cum nihil Phreniticis tam vtile sit, quàm somnus & somno deliria mitescant, ægrique conualecant.

#### QVÆSTIO

*An Cerebrum, an verò membrana eius in phrenitide inflammantur?*

Vt in iis, quæ *suprà, part. i. cap. 27.* & hoc ipso capite dicta sunt, nihil dubij, quantum possibile, relinquamus, explicandæ omno videntur sequentes duæ controuersiæ, quæ à nonnullis mouentur: Primò, an omnis inflammatio membranarum cerebri delirium afferat; deinde, an phrenitis fiat solum ab inflammatione membranarum cerebri, an verò etiam ab ipsius cerebri, substantiæ inflammatione. De priore vt dubitarent nonnulli, ipsi occasionem præbuit Hippocrates, qui, *5. Epidem. t. 47.* recensens historiam Nerei filiae, quæ membranarum cerebri inflammatione ex percussione laborasse putabatur, nullam delirij mentionem facit; quod tamen in similibus casibus non omittere solet. Et *libr. 3. sect. 1. agrotat. 3.* referens historiam ægri, qui in Dealcis horto decumbebat, qui Phrenitide laborauit, nec tamen continuò delirauit. Et, in *Commentar. in locum 5. Epidem.* refert Franciscus Vallesius, se vidisse in capitis fracturis membranas, præcipuè duram, inflammari conspicuè, atque adeò suppurari, postea & frustra extrahi, homine non delirante.

*An in infla-  
matione mē-  
branarū ce-  
rebri semper  
ad sit delirium?*

Secundò, etsi negandum non sit, cerebrum inflammari posse, tamen id non fieri in phrenitide, sed aliam eam esse affectionem nonnulli putant, cum cerebrum inflammatur, quàm quæ inflammatio membranarum ipsius parit; vt pote quæ diuersa habet symptomata.

Ex his dubiis vt nos expediamus, hoc ex iis: quæ *suprà* de delirio dicta sunt, pater; delirium non fieri posse nisi ipsum cerebrum, spirituique in eo, qui functionum principum sunt instrumenta, afficiantur. Non tamen necessarium est, vt ipsum cerebrum semper inflammetur; sed satis est, si à vicinis membranis inflammatis incalescat, vel aliunde vapores calidi illi communicentur.

Ideoque non impossibile est, etsi cerebri membrana afficiantur, vt tamen delirium nullum accedat: si nimirum malum cerebro non communicetur, neque spiritus in eo turbentur.

Si verò cerebrum ab inflammatione membranarum p. n. incalescit, tunc delirium, de quo nunc agimus, excitatur. Atque ita Phrenitis non potest esse sine inflammatione membranarum cerebri; inflammatio autem membranarum cerebri potest esse sine delirio.

Alteram verò quæstionem quod attinet, concedendum putamus, phrenitidem, vt pote quæ sæpe curabilis affectus est, solum ab inflammatione membrana-

rum

rum cerebri provenire: ipsum verò cerebrum, etsi quoque inflammari posse concedimus, ipsius tamen inflammatio aliis à Phrenitide affectus est, & Phrenitide lōgè periculiosior, utpote in quo ægri non delirant, sed sensu omni priuantur. Inflammationis equidem cerebri nomine tres affectus comprehenduntur: Primò enim ab humore bilioso, aut eius vaporibus, ad cerebri membranas cum sanguine affluente, etiam cerebri substantia irrigatur & incallescit. Deinde humor, qui est in membranis cerebri, etiam in venulas cerebri effunditur; nondum tamen in ipsam cerebri substantiam effusus est. Tertio sanguis in ipsam substantiam, & spatia cerebri effunditur, & tum non solum membranae sed ipsa cerebri substantia simul inflammatur. Etsi enim non nihil. Etsi enim nonnulli Medicorum cerebrum inflammari negarint: tamen non solum doctissimorum Medicorum autoritas, sed & experientia, & symptomata, quæ ex inflammatione cerebri proveniunt, contrarium persuadent. Ad phrenitidem autem constituendam priores duo affectus sufficiunt; etsi inflammationes cerebri propriè dictæ non sint, sed cerebrum saltem ob vicinas membranas affectas afficiatur. Si verò ipsa cerebri substantia afficiatur, longè, ut dictum modò, periculiosior affectus est, cuius Hippocrates, 2. & 3. de morbis, sub sphaceli cerebri nomine mentionem facit; ut & 7. aph. 30. dum scribit: Quibus cerebrum sphacelatum est, in tribus diebus pereunt: si verò hos evaserint, sani fiunt. Paulus Aegineta etiam, Aëtius, & Avicennas eius meminerunt, & diversis capitibus de ea, & phrenitide tractant: & proinde nos etiam signa eius supra, part. 1. cap. 27. seorsim proposuimus, & ab inflammationis cerebri signis & symptomatibus separavimus; cuius historiam descripsit Hippocrates, 2. de morbis in initio; & Petrus Sal. Diviersus, de affect. paric. c. 1. Hoc tamen ita accipiendum putamus, in Phrenitide quidem non totam substantiam cerebri inflammari, sed solum externam eius partem, quæ membranas contingit; & qui hoc modo afficiuntur etiam Phrenitici ab Hippocrate, 1. prorrh. text. 33. sed ànagōdus nominantur, ut Galenus, in comm. explicat. In eo verò affectu, quem Hippocrates, 2. & 3. de morbis ac P. Sal. Diviersus, de affect. paric. cap. 1. describunt, interina partes cerebri, eiusque propria substantia inflammatur, & malum plerumque in sphacelum degenerat.

## CAPVT VIII.

## De Melancholia in Genere.

## Nomen.

Melancholia unde nomen obtineat

**M**elancholia, ut ex Hippocrate, 3. aphor. 14. & lib. de aere, aq. & loc. videre est, morbi nomen est, non humoris: proculdubio tamen ex illorum affectu p. n. genere, qui, teste Galeno, 2. meth. med. cap. 2. & 3. de loc. affect. c. 7. nomen acceperunt à causa; id est, à materia, quæ illos produxit. Cum verò humoris melancholici duo præcipue genera sint: vnum, quod excrementitius humor naturalis est, & veluti fex sanguinis, quæ circa lienem præcipue cumulatur, & μέλαι χυμοί, ac Melancholia in specie appellatur aliud, quod est excrementu p. n. ex aduersione melancholiæ, sanguinis, & bilis genitum, & μέλαινα χολή, atra bilis nominatur: malum, de quo iam agendum, ex priore genere, hoc est, succo atro, vel melancholico ortum habet; quando is peccans, siue in cerebro, siue in toto, siue in hypochondriis, principes animæ functiones depravat. Quæ verò ab atra bile provenit, harum functionum depravatio Mania appellatur, ut postea dicetur. Interdum tamen Hippocrates melancholicum delirium nomine μέλαινα

indigitat; ut 6. aphor. 21. & 36. sed minus propriè.

## Definitio.

Definitur itaque vulgo Melancholia, quod sit delirium, seu imaginationis, & ratiocinationis depravatio, sine febre, cum timore & mœstitia, à spiritu animali tenebricoso & melancholico, simili phantasmati occasionem præbente, orta. Ut enim in aliis deliriis, ita etiam hinc phantasia, & ratiocinatio læditur; sed In primis phantasia: ratiocinatio verò non semper multum, neque in omnibus, & ut Aræteus, lib. 1. de caus. & sign. morb. disturn. cap. 7. loquitur, in melancholia in vna re aliqua est lapsus, constante in reliquis iudicio. Melancholicorum enim ratiocinatio circa vnam rem falsam plerumque, quam veram esse credunt, & phantasia depravata circa eam assentiuntur, aberrat, de reliquis prudenter, & sapienter ratiocinantur. Ita puer ille, cuius supra, cap. 5. ex Huarti scrutiny ingenior. c. 5. mentionem fecimus, in eo solum delirabat, quod se totius mundi monarcham credebat; de republ. verò administrandâ prudenter differebat. Sic mercator ille apud Forestum, lib. 10. obseru. 15. optimè ratiocinabatur, nisi quod ad extremam inopiam se redactum esse conqueretur. Sic qui melancholiâ hypochondriacâ laborant, & sine causâ timent, ac mœrent, ipsi sæpe intelligunt, timorem illum, ac mœstitiam esse vanam, & sine causâ.

Memoria verò nec per se, nec per accidens læditur: quod non fit in phreniticis, ubi imaginatrix ob immoderatum calorem spirituum, & veluti efferata innumeram obiectorum multitudinem memoratrici offert, sed sine ordine; quæ propterea citò, & facile in illâ obliterantur. Atque hinc accidit, ut propter memoriæ integritatem cum probè sæpe ratiocinentur melancholici tum plerique versuti admodum sint. Imò obseruatum est, nonnullos in delirio hoc carmina etiam elegantia composuisse.

Differt autem hoc delirium ab aliis deliriis, quod metuunt plerumque, & mœsti sunt ægri præter solitum; neque tamen metus aut tristitiæ causam ullam afferre possunt, quæ alicuius momenti sit, nisi forsitan eam, quam animo falsò concēperunt, & pertinaciter fouet: dum scilicet alij carceres, alij supplicia, alij condemnationem æternam, alij alia timent, & quidem ex leuissima sæpe occasione, ut apud Forestum, lib. 10. obseru. 1. 2. videre est. Quandoque tamen à manifesta causa incipit timor, qui si perseverans, melancholiam parit. Rarò verò rident: & risus potius maniacis ex feruore sanguinis, quàm melancholicis competit. Si enim sanguis sit calidior, & feruidior, maniam miretur efficit si verò sit crassior, & frigidior, melancholiam producit, à quâ mœstitia vix abest, etiamsi ea minor sit; talesque melancholici per intervalla lætitiæ alicuius signum exhibent, & interdum in risum prorumpunt. Si autem plus iusto latentur tales melancholici, iam instantis mania est indicium, ac præludium.

Quod tamen ex communi Medicorum sententia de timore & mœstitia, quæ huius delirij propria sint; quibusque à reliquis deliriis discernatur, dictum est, rectè accipiendum. Neque enim semper mœstitia aliqua, & timor insignis in omnibus melancholicis apparet; imò nonnulli lætitiâ quasi affici videntur, cum falsis suis imaginationibus indulgent, & se Reges, vel Principes, aut diuites esse imaginantur. Ita, ut Horatius, epist. lib. 2. epist. vlt. scribit:

----- fuit haud ignobilis Argis,  
Qui se credebat miros audire iragēdos,  
In vacuo lætus sessor plausorque theatro.  
Hic ubi cognatorum opibus curisque refectus  
Expulsi helleboro morbum bilemque meraco,  
Eo redit ad sese: pol me occidisti, amici,

Non

In Melancholia phantasia imprimis læditur, ratiocinatio verò nec in omnibus, nec sæpe multum.

Memoria hic plandè non læditur.

Melancholia ab aliis deliriis differat.



*Non seruastis, ait, cui sic extorta voluptas.*

*Et dempsit per vim mentis gratissimus error.*

Cui similem historiam supra, cap. 9. ex Huerti scrupulis ingenior. cap. 7. recensimus, de famulo Hispano, qui se totius mundi Monarcha esse imaginabatur, & hinc maximam dilectionem ac voluptatem afficiebatur. Itarefert Marcell. Donatus, de histor. medic. mirab. lib. 2. cap. 1. mulierculam quandam se Regi desponsatam esse persuasum habuisse, quæ si forte in fragmenta victorum, aut alia lucida corpuscula incidebat, gemmas sibi à coniuge Rege transmissas dicebat, eaque tanquam rem carissimam, in arca, quam totam ferè oppleuerat, asservabat. Eiusdem generis deliramenta cuiusdam senioris diuitis, qui, referente Seneca, quæcunque, quibus, ut opus erat, quam maxima expetebat, mulieres paruas, & homines paruos abominabatur, prægrandes equos peroperabat, amplissimis poculis utebatur, & calceamenta pedibus maiora gestabat, larissimis vestibus vestiebatur. Et huius generis deliramenta sæpe occurrunt, ubi ægri quidem absurda imaginantur, & in cogitatione illa, ut verissimam, pertinacissimè hærent; timoris tamen, aut mororis parum, vel nihil adest: qui omnes cum sine febre delirant, neque etiam vlla in iis truculentia, aut ferocia appareat, ut maniaci appellari non possint; nomine Melancholicorum merito etiam comprehenduntur. Et cogitandum Lectori relinquere, quod referenda sit illa falsa imaginatio, quæ iis, quibus crura amputata sunt, accidit, cum sæpe post multos post amputationem menses crura amputatæ grauitè sibi dolere conquerantur; ut testantur Ambr. Pareus, lib. 1. cap. 17. eiusque rei historias recenset Guilel. Fabricius, centur. 3. obseru. 14. & 15.

*Vna Melancholia definitio.*

Itaque ut Melancholiæ nomen pro delirio acceptum omnibus eius speciebus competat, malo cum Aretæo, de caus. & signis morbor. dicitur lib. 1. c. 5. Melancholiam definire, quod sit animi angor in vna cogitatione definitus, atque inhærens, absque febre, & furore, à phantasmate melancholico ortus. Vbi tamen notandum, per angorem animi non cordi passionem intelligendam esse; cum melancholia phantasia & facultatum principum læsio sit: sed cogitationem in vna re ita defixam, falsam tamen, ut inde quasi animi quædam anxietas oriatur. Vnde etiam ita commodè Melancholia definiri potest, quod sit delirium sine febre & furore, in quo animus à falso phantasmate, à spirituum animalium dispositione occulta seu tenebrosa orto, delusus in vna cogitatione cum angore quodam hæret, & defigitur.

*Melancholia, ut magna, variata.*

Est autem Melancholicorum magna varietas, ut omnes melancholicorum imaginationes absurda faciliè comprehendere non possint, nihilque tam absurdum, & ineptum sanis occurrere potest, quod non melancholici sibi imaginantur, & verissimum esse pertinacissimè credunt. Atque occurrunt huius rei exempla passim, quorum aliqua in Institut. lib. 2. par. 3. sect. 2. cap. 4. recensimus: plura existant apud Scheenckium, libr. 1. obseru. 254. & seq. Marcell. Donatum, de histor. medic. mirabil. lib. 2. cap. 1. Forestum, lib. 10. obseru. 12. & in schol. Plate. rum, lib. 1. obseru. Pro dispositione enim humorum varia, vitæ, conditionis, ac cogitationis varietate innumera hæc varietas occurrit. Nam quidam risum interdum admittunt; quidam cum ira aliqua, & contentione phreniticis adsimulantur; quidam nescio quæ scelera se commisisse imaginantur, atque hinc supplicij metu, & mortis terrore vexantur; alij se ad inferos damnatos, imò gehennæ flammis cremari conqueruntur; nonnulli se mori, vel etiam mortuos putant; nonnulli cæsum ruiturum metuunt; quidam serpentes, vel ranas in ventre se gestare peruersum habent; nonnulli se in bruta animalia conuersos credunt; alij in testam, aut vitrum mutatos; nonnulli lacrymaptur quidam desperabundi mortem sibi inferunt; quidam diuina affectant, & colloquia cum Deo & Angelis so-

niant; alij anari nihil nisi de diuitiis cogitant; quidam quasi diuites, etsi tales non sint, de magnis opibus gloriantur; quidam elati, & superbi, vel de pretiosis vestibus, auro & gemmis cogitant, ac loquuntur, vel se Principes, aut Reges esse opinantur; alij contra animo abiecti, licet diuitiis abundant, de paupertate conqueruntur; alij de studio, quo sunt delectati, perpetuo cogitant, ac loquuntur. Mæstitia tamen, & timor plerumque cum hoc delirio coniungitur, aut certe peritax, & intentia, quasi cum animi angore de re vna, sed falsa, cogitatio. Abest etiam febris, etsi post febrem, aut in declinatione febris, humoribus adustis relictis melancholia generari aliquando possit.

Affici autem cerebrum, & quidem ut pars similis est, extra controuersiam est; de quo mox in causis dicetur. Verum cum, ut Fernelij verbis utar, negandum non sit, dum iracundiâ, doloribus, gaudio, metu, cæterisque eiusmodi animi perturbationibus concutimur, conspicue, atque insigniter cor in nobis opprimi, & gestire, animique perturbationes in corde fieri; Melancholia verò sit delirium cum tristitiâ, aut metu, aut certe alio animi affectu: concedendum est, eâ ratione in melancholicis simul cor affici: imò plerumque principium melancholiæ est ex corde. Cordis enim temperies corrupta corrumpit temperiem cerebri. Et licet delirium hoc nunquam accadat, nisi cerebro primario affecto: tamen, ut iam in causis dicetur, si spiritus vitalis impurus sit, & tenebrosus, vitium hoc spiritibus animalibus, & cerebro communicatur, & ita cor sæpe huic delirio primam occasionem præbet, malumque hoc fouet, & proinde tum non solum ad cerebrum, sed etiam ad cor in curando respiciendum. Imò etsi cerebrum primario afficiatur: tamen quia hoc delirium semper cum aliquo animi affectu coniunctum est, animi verò affectus cor valde alterent, ac afficiant: vix fieri potest, ut in melancholico delirio cor etiam non afficiatur.

### Causa.

Causa huius delirii proxima statuitur phantasma, ut Capiuaccius appellat, tenebrosissimum. Vbi tamè quod supra de delirio in genere diximus, monendum; quia in melancholico duæ diuersæ facultates afficiuntur, phantasia & ratiocinatio; quarum illa organo corporeo, spiritibus utitur, hæc non utitur, sed saltem phantasmata specularur: duæ etiam proximæ causæ ponendæ sunt, phantasia scilicet læsæ spiritus animalis tenebrosus & melancholicus; rationis verò deprauatæ phantasma, ut Capiuaccius appellat, tenebrosissimum. Causa enim, à qua prima huius mali origo, est certa, & occulta, quam vulgo melancholicam & tenebrosam nominant, spirituum animalium dispositio, quam immediatè & proximè sequitur phantasia deprauatio, seu phantasmatis tenebrosi & melancholici efformatio: quod intellectui postea obiectum & obuersans, illud delirium melancholicum, & animi angorem excitat. Ego, ut omnibus eiusmodi deliriis competat, malim appellare melancholicum. Phantasma autem tenebrosissimum, aut melancholicum redditur à simili animalium spirituum dispositione. Cum enim spiritus animales, qui sunt proximum animæ in hisce actionibus obeundis instrumentum, speciesque deferunt, lucidi, tenues, subtiles, & mobiles esse debeant; quæ de causâ ipsum etiam cerebrum est nitidissimum, ac nullo colore infectum: si illa ipsorum naturalis constitutio lædatur, actiones animales, quæ eorum beneficio perficiuntur, læduntur; & quidem variis modis, prout spiritus vitiantur. In Melancholiâ spiritus Melancholicos, id est, opacos, obscuros, tenebrosos, & fixos quasi reddi dicimus; quæ eadem dispositio plerumque etiam est in spiritibus vitalibus. Qui enim tristes, & meticulosi sunt in hoc delirio, procul dubio spiritus vitales

*In Melancholia præter cerebrum, quod primario laborat, etiam Cor afficitur.*

*Causa Melancholia proxima.*

vitales crassiores, impurioreque habent. Nam ut spirituum puritas & subtilitas animum hilarem ac alacrem reddit: ita crassities, frigiditas, & impuritas moerorem ac tristem.

*Melancholia  
quomodo ri-  
morē & ma-  
litiā indu-  
cat.*

Quā ratione autem spiritus ac vapores Melancholici tristitiam ac moerorem efficiant, inter Galenum, ac Auerroem controversia est; de qua quæ in *Institut. lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 4. dicta sunt*, hic repetere superuacaneum est. Hoc saltem declarationis gratiā addimus: in spiritibus non solum qualitates primas, sed & secundas, ac occultas esse attendendas; cum ad actiones illas perficiendas æquæ sint necessariæ, ac qualitarum primarum temperies. Videre est huius rei exemplum in humore vitreo, crystallino, & tunica corneâ in oculo, in quibus non solum qualitates primæ, sed ad visionem recte perficiendam æquæ, imò multo magis, pelluciditas, & ægrotia, seu coloris carentia est necessaria; quæ si desit, visio non recte perficitur. Eodem modo in spiritibus, & vitalibus, & animalibus, præter qualitarum primarum temperiem etiam tenuitas & subtilitas, puritas, ac luciditas requiritur; quæ si desit, spiritus non satis aptum animæ instrumentum sunt. Atque hunc puritatis, luciditatis, & subtilitatis defectum in spiritibus, atque coloris, & tenebrarum nomine Galenus exprimit. Et quanquam à sensibus externis non percipiatur illa tenebricositas: tamen causa est, ut omnia objecta ad modum vitiosæ dispositionis spirituum represententur, & vitiosa illa dispositio spirituum speciebibus imprimatur. Id etiam fieri in somniis animaduertimus, in quibus sæpe horrenda & metuenda offeruntur, propter abundantiam vitiosorum humorum in corpore, qui faciunt, ut objecta hoc modo sensibus internis represententur.

Platerus equidem malignitatem materię, quæ melancholiam, ut & quæ maniam producit, tribuit. Verum ut facile concedimus, & hæcenus defendimus, non solum à qualitarum primarum mutatione melancholiā provenire; ita malignitatem peculiarem, & propriè dictam ei tribuere opus esse non putamus, sed sufficit ad melancholiā generandam, si spiritus animales naturalem luciditatem & puritatem amittant, & in statum contrarium deducantur: quæ tamen dispositio p. n. qualis sit, facile explicari non potest. Ideoque et si malignitatem negamus; occultam tamen, qualitatem facile admittimus: quam si intellexit Platerus, ei assensimus. Et dispositionem illam Melancholicorum p. n. non esse simpliciter opacam, sed occultam; ex eo patet, quod, si imaginationi ipsorum satisfactum, sanitati restituantur; sicut illi accidit, qui, cum nasum magnum se habere putabat, farsimine apposito, & vomito conualuit: cuius rei etiam alia exempla in Institutionibus habentur, & infra etiam recēlebuntur.

Piant autem spiritus Melancholici, seu opaci, impuri, & tenebricosi, seu quocunque nomine appellare libeat, tribus modis: vel quia tales vitio cerebri generantur, vel quia, etsi naturā suā sunt puri, à materia aliqua impura, & melancholica, quæ ipsis permiscetur, inquinantur, & Melancholici redduntur: vel quia ob sanguinis, & spirituum, à quibus generantur, vitium tales sunt.

Prius fit cum cerebri constitutio vitiosa est, & Melancholica, quæ ex sanguine, & spiritu vitali, etiā puro, impuro, & melancholicum spiritum animale generat, quæ cerebri constitutio potissimum à spiritu infuso melancholico dependet. Capiuaccius equidem hoc negat, & à nullā qualitarum primarum intemperie in cerebro melancholiā excitari posse statuit, dicitque, à cerebro calido fieri spiritus animales calidiores, & hinc delirium maniacum, à frigiditate spiritus animales paucos, ac frigidos, indeque fatuitatem. Verum non solum ad qualitates primas in cerebri constitutione est respiciendum, sed etiam ad alias, uti antea dictum; sicut oculi constitutio id manifestè demonstrat.

Secundò sunt spiritus melancholici, cum spiritus vitalis in corde vitiosus, & impurus gignitur; qui cum sit spiritus animalis materia, spiritum animale eiusdem generis & modi generari necesse est, impurum scilicet, & melancholicum. Si tamen hoc diu dureret, tandem ipsum etiam cerebrum affici necesse est. Nam cum cor caloris nativi, & spiritus vitalis, qui in totum corpus diffunditur, fons sit, si illud frigidius & siccius, quam par est, seu melancholicum euadat, tandem totus corporis habitus talis redditur, imò & ipsum cerebrum, quod tali sanguine etiam nutritur, & à spiritibus melancholicis affluentibus continuè inquinatur, & tandem Melancholicum euadit.

Tertium fit cum cerebrum per consensum afficitur, & quidem tribus modis. Primò cum ab universo corporis habitu, & præcipue venis maioribus, materia hæc in cerebrum fertur; quod fit in primis corde affecto, & spiritus, ac sanguinem melancholicum generante: secundò cum ab hypochondriis materia melancholica transmittitur; quæ Melancholia Hypochondriaca nominatur: tertio cum ab utero.

Notandum tamen hic, etiam si causa Melancholiæ sit humor melancholicus, à quo etiam affectio hæc, nomen habet: tamen in melancholicis, utpote frigidis & siccis, multum pituitæ cumulari, propter debilitatem caloris naturalis; ad quod propterea in curatione Melancholiæ sæpe etiam simul respiciendum.

### Differentia.

Melancholicorum hæc differentia sumuntur primò à forma ipsa delirii, quæ multiplex & varia est, pro phantasmatum varietate, quæ ab imaginatione deprauata exhibentur. Causa diuersitatis illorum phantasmatum est primò natura humoris melancholici, qui in aliis sincerior est, in aliis impurius, in aliis non nihil adustus: deinde natura & constitutio corporis ac cerebri. Nam ut vinum moribus potantium, ita humor melancholicus laborantis constitutioni se accommodat. Postea consuetudo vitæ, & actionum. Qualis enim olim cuiusque intentio cogitatio fuit, aut qualis vitæ conditio, talis sese representat melancholica deliratio. Propter has ergo causas alij alia cogitant, & loquuntur. Quidam prorsus conticescunt, quod melancholicorum, inter initia præsertim, proprium est, teste Galeno, ut multum loqui Phreneticorum, & semper cooperiri, utrorumque, in 3. *Epidem. comm. 3. aph. penult.*

Sed præcipua Melancholicorum differentia, quæ ad curationem mali plurimum momenti affert, sumitur ex situ materię, vel ex sedibus, in quibus humor gignitur, & redundat, ut ex causarum enumeratione patet. Atque ita quatuor præcipuæ sunt Melancholiæ differentię. Prima est per primarium cerebri affectum; secunda per consensum cordis, & totius; tertia Hypochondriaca; quarta per consensum Vteri. Arabes quidem plures partes, quibus in Melancholia cerebrum per consensum affici potest, recensuerunt, ut ex Avicenna, & interpretibus eius videre est. Ventriculum, Hepar, Lienem, Vterum, Hamorrhoides, & alias partes: nullas tamen reuera inter eos & Græcos, qui omnem Melancholiā ad tria capita redegerunt, in proprium cerebri affectum, consensum à toto, & eum, qui fit à venis mesaraicis, & hypochondriis, est dissenus, si res rectè explicetur: Galenus enim, 5. *de loc. affect. cap. 1.* expressè fatetur, quod si Lien officium suum non faciat, & humores melancholicum vel non attrahat, vel per conuenientia loca non excernat, tū alios affectus, tū Melancholiā inde excitari posse. Idem de Hepate, hamorrhoidibus dici potest. Verum hæc partes omnes aliter melancholiā non producant, nisi quatenus humor retentus vel in totum corpus diffunditur, vel in hypochondriis stabulatur; ideoque Melancholia inde orta

*Prima Melancholicorum differentia à varia delirii forma.*

*Secunda & præcipua Melancholicorum differentia à situ materię in quadrupla est.*

orta ad Melancholiam per consensum totius, vel ad hypochondriacam referri potest. Vteri tamen quin peculiaris mentio fiat, at se non videtur; cum in specie & priuatim ad eum curatio interdum dirigenda sit. De his ergo quatuor Melancholiarum differentiis iam ordine dicendum, si prius ea, quæ in genere de signis Diagnosticiis, Prognosticis, Curatione, & Dieta, quæ omni Melancholiarum competunt, propoluerimus.

### *Signa diagnostica Melancholia in genere.*

Dum imminet Melancholia, æger in somniis terretur, somnumque habet turbulentum, & horrendis lominis interruptum: postea vigiliis infestatur, præter solitum fit moestior, & tristior, aut tristitia cogitat, & mentit sine euidenti causa, aut certe in vna cogitatione pertinacissime hæret; quæ si perseverant, præsentis iam Melancholiarum indicia sunt. Ita enim Hippocrates, 6. aph. 23. Si metus atque tristitia longo tempore perseverant, Melancholiarum est signum. Hinc æger fit taciturnus, & morosus, hominum consortia fugit, & solitudinem sectatur, fit suspicax; præter solitum inedia tolerat, & in nonnullis inedia tolerantia tam pernix est, ut fame mori malint, quam comedere, & vivere; crebro suspirant, respiratio est tarda & rara, pulsus tardus, parvus, rarus; tandemque, ubi malum augetur, illa, quæ cogitant absurda, sermone, & gestibus proferunt, ut manifestè delirare deprehendantur: absurda tamen illa loquuntur & agunt sine omni scuitia & furore; febre præterea carent.

### *Prognostica in genere.*

1. Sicut nulla desipientia cura est; quia functio princeps læditur: ita nec Melancholia. Per se tamen lethalis morbus non est, nisi aliud accedat.
2. Malum hoc recens facile, & non multo negotio curatur. Sæpius enim solâ victus ratione conueniente, quâ probus, tenuis, & clarus sanguis gignitur; & præterea humectatione corporis, accapitis, præsertim verò balneis aquæ dulcis, se Melancholicos sanitati restituisse, absque villo alio remedio validiore, testatur Galenus, 3. de locis affect. cap. 7. Et tunc bonum signum est, melancholicorum corpus augmentum sumere. Indicium enim est, sanguinem iam meliorem reddi, & attemperari. Inueteratū verò malum difficulter curatur. Itaque inter initia ipsi occurrendum; cum inueteratum plerumque ægrum ad mortem comitetur.
3. Facilius tollitur, & minus periculi habet Melancholia per consensum, quam quæ per essentiam.
4. Facilius curatur Melancholia, quæ cum risu aliquo est; difficilius, quæ cum studio, ob humoris prauitatem maiorem.
5. Leuius est malum, si imaginatio saltem læditur grauius, si simul ratiocinatio.
6. Melancholia hæreditaria ferè nunquam curatur.
7. In morbis Melancholicis periculosa sunt tempora verno humorum depositiones, & decubitus; quoniam permittantur frequenter vel in apoplexiam, vel in conuulsionem, vel maniam, vel cæcitatem; teste Hippocrate, 6. aph. 50. Mala enim hæc nonnunquam ab humore Melancholico proueniunt. Sæpius verò melancholia in epilepsiam transit, teste Hippocrate, 6. Epid. in fine.
8. Si melancholicus præter solitum in risum, vel fletum, vel lacrimas soluatur, ne in maniam transeat, metuendum.
9. Via ad interitum in melancholia est, vel per viri resolutionem, quæ paulatim succedit, cum ægri cibum ac potum pertinaciter auersantur, parum aut nihil dormiunt; vel caloris natui suppressione, & suffocatione, quod fit, dum ægri animi mœrore, vel aliis cogitationibus se miserè conficiunt; vel per conuulsionem, aut

epilepsiam, materiâ ad neruorum principium, & membranas cerebri conuersâ

10. Via ad salutem est, si materia melancholica vel dissipetur, si pauca fuerit, vel ad inferiores & ignotiores partes à naturâ detradatur, & per varices, hæmorrhoides, aut vteri venas expellatur, aut in scabiem, similesque cutaneos affectus mittitur, vel denique præsidiiis artibus eadem superetur, & profligetur.

11. Insanis si varices, vel hæmorrhoides superuerint, insaniæ solutio, 6. aphor. 21. Quod de Melancholia intelligendum esse explicat Galenus.

### *Curatio in genere.*

De curatione in genere vix multum dici potest, præter id, quod supra, part. 1. cap. 12. dictum fuit. Hac talitè diligenter attendenda: Primò procurandum esse omni studio, ut bonus, clarus, tenuis, ac subtilis sanguis generetur, qui omne causarum vitium corrigere potest, quo solo auxilio, & aquæ dulcis balneo, sine villo fortiore remedio; se recentem Melancholiam sanasse testatur Galenus, 3. de loc. aff. cap. 7. Quâ ratione autem hoc fieri possit, dicetur mox in diata. Deinde ut ab animi perturbationibus, mœrore, tristitia, timore, & curis æger liber sit; cuiusque animus ad hilaritatem auocetur. Tertio ut æger ad contrariam imaginationem deducatur. Compertum enim est sæpe, si agro persuadeatur, illud, quod ipsi molestum videtur, & in quod omnem cogitationem defigit, remotum esse, Delirium cessare, & post ægrum, si quid causæ super sit, ad eam extirpandam medicamenta facilius admittere. Commodum quidem est, ut æger ad contrariam imaginationem deducatur; verum raro hoc ab ipsis obtinetur. Ideoque ipsorum imaginationibus quidem indulgendum; sed interim fallendi sunt. Ita refert Trallianus, lib. 1. cap. 17. Medicum quendam, qui caput sibi amputatum putabat, curasse imposito repente capiti ipsius pileo plumbeo, ut gravitatem sentiens caput se recepisse putaret. Alius nauium se ingentis magnitudinis habere putabat; Chirurgus naribus prehensis nouacula eas se imminuere fingit, carnisque fustia abicissa ostendit, quomodo æger conualuit. Gattinaria refert, Medicum quendam melancholico, qui tanas in ventre se habere putabat, purgans exhibuisse, & excretis ranas viuas iniecis se, quas cum ille è ventre suo exturbatas crederet, conualuit. Quidam se mortuum putabat, refert Holliero, lib. 1. de morb. inter. c. 15. & propterea cibum capere noluit: socij comitate, qui enim eo se in sepulcro mortuū esse asserbat & cibum nihilominus capiebat, ad cibum capiendum persuasus fuit. Et exstant huius rei exempla passim plura. Nullo verò modo concedendum, ut Medici, vel adstantes cum ægro de imaginationibus eius falsis pertinacius contendant. Quare hoc etiam notandum, ex præcepto Aëtij, interdum ab omni medicamento abstinendum esse aliquandiu; & naturæ aliquam quietem concedendam, quæ aliquando continuis remediis afflicta quiescens recreatur, & validius morbum aggreditur & superat. Quia etiam humor melancholicus circa vesperam moueri solet, commodum videtur, circa vesperam, horâ quartâ, exhibere purgantia, eaque mitiora, (fortia enim raro fert) & illa aliquot diebus continuare. Præparantia verò horis matutinis exhiberi possunt.

Reliqua patebunt ex his, quæ postea de singulis Melancholiarum speciebus dicentur. Cordialia tamen hic etiam non omittenda; cum cor in Melancholia non planè immune sit; & cum dantur medicamenta, quæ simul & cordi, & capiti amica sunt, & alterando humori melancholico apta; illa eligenda sunt: qualia sūt, borrago, bugloss. melissa, ocyum, cort. citri, grana kermes, fl. tunicis, lignum aloës, crocus, moschus, ambra, & similia. Conserua satyrii, & radices eiusdem conditæ etiam in melancholia viles sunt; exceptâ eâ, quæ ex amore est.



## Diata.

Cum probus sanguis omne hoc vitium ferè emendare possit, ut talis, id est, purus & tenuis generetur, prouidendum. Fit autem hoc dupliciter; primo si cibus ad talem sanguinem generandum aptus eligatur; deinde si is probe coquatur. Itaque cibi sint calefacientes, moderate humectantes puri, tenuis substantiæ, concocti faciles, non flatulenti. Exhibeantur, ergo carnes pullorum, gallinarum, caponum, perdicum, hædorum, agnorum, veruecina, vitulina, & similes; pisces saxatiles, oua sorbilia; ex olerib. borrago, bugloss. lactuca, endiuia; ex fructibus ficus, amygdal. pincæ, pistacia, vna passæ, mala Punica medijs saporis; & quibus ob iecoris calorem maior copia atri humoris colligitur, ij refrigerantibus, & humectantibus cibis vtantur, ut iusculis ex hordeo. Breuiter: melancholicis omnibus conuenit cibus, qui est tenuis substantiæ, copiosioris nutrimenti, humidus in passiuo, in actiuo temperatus vel ad caliditatem declinans. Frigiditas tamen excedat, aut ad frigidum vergat, si ex adustione melancholiæ proueniat.

Côtià verò vitæ cibus frigidus, crassus, siccus, feculentus, & omnia, quæ sanguinem melancholicum gignunt, ut caro bubula, hircina, caprina, aprugna, leporina, & animalium omnium, quæ annosa sunt, & ex auiibus, quæ magis ambulant, quam volant, ut anserina, anatina, & similes. Inter pisces, qui habent crassam carnem; ex oleribus brassica, legumina omnia & maximè lentæ. Abstinentium & à salis, duris, aceto conditis, & sale ac fumo induratis tam piscibus, quam carnibus. De aceti vlu diximus supra, *part. 1. cap. 12. in question.* Et nullo alio modo concedi potest, nisi ut vapores illos siccis ad cerebrum adscendentes reprimat & figat, ne somnum turbent; idque saltè in melancholia ab hepatis affectu fieri potest; in alijs locum non habet. Potus sit vinum bene maturum, & dulce, aut cereuisia pura, in primis triticea.

Aër sit in calore & frigore temperatus, paulisper humidus, ac, nisi talis sit, arte paretur. Somnus vigilias superet, qui melancholicis est remedium supra gemmas & lapides pretiosos æstimandum: in primis quæ danda opera, ne æger multum vigilet; cum ex hac vnica causa malum in habitum transire, & quod peius; in maniam mutari possit. Curæ & sollicitudines animi omnes studiosè cauendæ sunt, ægrique animus suauibus colloquijs, vel etiam musicâ ab intentis & mœstis cogitationibus, ac imaginationibus auocandus, & ad hilaritatem adducendus. Et cum ægri de vna re falsò animo conceptâ plerumque solliciti sint, & de ea perpetuò cogitent; danda opera, ut, quibuscunque fieri potest, persuasionibus, ac medijs à falsa illa cogitatione abducantur.

## CAPVT IX.

## De prima Melancholia specie, qua fit Cerebro primario affecto.

**P**hantasma tenebricosum ac Melancholicum, quod proxima melancholici delirij causa est, fieri à spiritibus animalibus eodem modo dispositis, antea dictum. Dispositionem autem istam, ut itidem antea dictum. Spiritus animales obtinent, vel quia tales in cerebro, & quidem eius vitio, generantur; vel quia, licet puri & lucidi generentur, antè cerebro bene constituto generari possent, à materia aliunde in caput missa inquinantur, aut ad eorum generationem materia melancholica suppeditatur. Ut autem de prima melancholiæ differentiâ, quæ fit per primum Cerebri affectum, prius dicamus, ut aliarum partium vitia cõctiones, quæ in iis obcuntur, corrumpunt, & ventriculus malè constitutus chylum vitiosum, hepar malè

sele habens sanguinem vitiosum generat: eodem quoque modo si Cerebrum non bene sele habeat, spiritum animale vitiosum, & dispositioni p. n. respondentem gignit.

## Causa.

Dispositio autem illa Cerebri vitiosa non solum quærenda est in qualitatibus primis, frigiditate ac siccitate; cum multi senes has obtrineant, neque tamen sint Melancholici: sed in eo præcipuè sita est, quod cerebrum in modo substantiæ à naturali puritate luciditate, seu albedine deflectit, & impurum, crassum, tenebricosum, & melancholicum euadit. Tum enim spiritus animales, eiusdem constitutionis vitiosæ generantur. Si tamen frigida & sicca intemperies cerebri eo progressa sit, ut tennes, lucidas, & puras partes ex cerebro, & spiritu insiro quasi exprimat, & cerebri constitutione ita mutet, ut tenebricosum euadat, inter Melancholiæ causas numerari potest. Causæ enim, quæ Melancholicam dispositionem cerebro inducunt, sunt omnia illa, quæ humorem melancholicum in cerebro cumulant, eiusque, & calidi innari substantiam tenebricosam reddunt.

Primo ergo causa huius mali sunt terror grauis, subito & ex improviso accedens, fortisque rei horrendæ imaginatio, quæ fortes impressiones in spiritibus, humoribus præterit si iam antè ad melancholiâ dispositi sint, & cerebro ipso faciunt, ut rectè scribit Platerus, totumque corpus ita mutant, ut melancholiâ grauissimam, deterioremq; ferè eâ, quæ ab interna causa fit (humores & vapores intelligit) producat, & quæ, ut idem Platerus scribit, ægrè, nisi tota sanguinis massa exhauriatur, possit curari. Posset quidem hæc melancholiæ species etiam ad eam, quæ per consensum totius est, referri, cum sanguis in toto corpore ferè mutetur: quia tamen cerebrum maximè, & primariò afficitur, ad hanc speciem eam referre malumus. Fit autem hoc, si homo visò aliquo horrendo, ut cadauere, aut simili re, abominanda, vel spectro terreatur, aut imaginatione, & metu periculi in tenebris nocturnis, in sylua, vel loco solitario percellatur; cuius rei historias habet Platerus, *tom. 1. Pract. pag. 111. & in obs. lib. 1.* Et si verò quomodo imaginatio, & animi perturbationes tales istam in humoribus & spiritibus alterationem efficere possint, integrè explicari non facile sit: tamen experientia testatur, species rei, vel iucundæ, vel horrendæ & formidabilis, visui, aut auditui oblatas, & memoriâ conceptas, ac conseruatas, atque imaginationi & mēti repræsentatas adeo seruire vestigia & naturam rerū, vnde prodierunt, ut ferè non minus, quàm ipsæ res, externæ alterare, & corpus mutare, & morbos tum inducere, tum depellere possint. Et facilius præstant hoc hæc causæ, si corpus ad melancholiâ sit dispositum. Tum enim humor melancholicus in corpore abundans ad caput rapitur, ibiq; herens cerebri constitutionem mutat.

Secundò Melancholicam hanc dispositionem Cerebro inducit humor melancholicus in capite cumulat, quod fit in primis ob intemperiem Cerebri frigidam & siccam, aut potius ob natiuam, aut quocunq; modo contractam, melancholicam, id est, minus puram, & lucidam cerebri constitutionem; quæ cum sæpe à parentibus in liberos deriuetur, accidit etiam, ut melancholia tunc in liberos traducatur, imò quandoque totis familiis hæreditaria sit.

Cerebri autem hanc constitutionem melancholicam sanguinem in materiam sibi similem mutantem, post ortum frequentissimè inducunt tristitia, mœror, curæ, luctus, atq; animi sollicitudo diu perseverans, vel ob rei charæ amissionem, ut parentum, liberorum, amicorū, pecuniæ, & bonorum, honorum; vel in generosis animis ex pudicitia, & verecundia ob errorem aliquem, sæpe etiā leuem, & nullius momenti, commissum, vel ex inuidia,

C. 1. &amp; p. 111.

Melancholia  
ca cerebri di-  
sp. sita nō in  
qua. ita sit in  
primis solum  
conf. sit.Causa me-  
lancholia ce-  
rebri disposi-  
tionis prima  
fortis imagi-  
natio, & gra-  
ues animi  
perturbatio-  
nes.Aër, somnus,  
& vigilia,  
animi pa-  
thematia.Secundò hu-  
mor melan-  
cholicus in  
capite collo-  
catur.



uidia, odio, & vindictæ cupiditate, ex zelotypia, vel ex desiderio; & amore alicuius rei, de quo c. seqq. in specie agitur.

Deinde humoriste melancholicus in cerebro colligitur, cerebroque etiam talis constitutio, inducitur, & in eo relinquitur interdum à morbis calidis, post phrenitidem, cum calore remittente, & resolutis partibus tenuioribus, materia sicca & crassa, ac feculenta in cerebro relinquitur, & in cerebro similis intemperies excitatur, à qua humor melancholicus, & fouetur, & augetur. Idem post epilepsiam interdum accidit, & epileptici Melancholici, & contra Melancholici epileptici fiunt. De quod Hippocrates, 6. Epid. in fine, Melancholici quoque magnâ ex parte epilepsiâ corripi consuevere, & epileptici Melancholici fieri. At horum utrūque magis accidit, prout ad alterutram partem morbus inclinatur. Etenim si in corpus, epileptici, si verò in mentem, Melancholici fiunt. Quem locum prolixè explicat Galenus, 3. de loc. affect. cap. 6. Nimirum si humor melancholicus cerebri corpus, seu conformationē lædit, id est, obstructionis in ventriculis auctor est, secundum vulgatam doctrinam, seu potius, si membranas ventriculos inuestientes vellicat, epilepsiam producit: si verò ipsam Cerebri constitutionem, & spiritus, qui facultatum principum proximum instrumentum sunt, lædit, Melancholia excitatur.

### Signa Diagnostica.

Delirium melancholicum ex primario cerebri affectu est perpetuum, & ut plurimum vehemens, oculorum obrutus fixus, & signa abundantis melancholiæ in capite suprâ, part. 1. cap. 12. proposita adsunt. Symptomata contra, & præternaturale aliquid circa hypochondria, hepar, venosum genus, & cor non animaduertitur: præcesserunt vigiliæ, cogitationes assiduæ, curæ, aut subitus terror & consternatio, atque alia causæ, quæ caput exsiccare, humoremque melancholicum tandem in eo relinquere potuerunt, ut phrenitis, epilepsia. Sanguis etiam emissus hic signum præbet. Si enim is non est crassius, & ater, non in toto, vel corde causa mali est, sed in Cerebro: nisi forsan membri alterius affecti signa adsunt.

### Prognostica.

1. Quod materia in capite est copiosior, frigidior, & siccior; eo difficilius hoc malum curatur.
2. In morbis Melancholicis vere & æstate suspecti sunt humorum decubitus, & vel apoplexiam, vel maniam, vel conuulsionem, vel cæcitatem, denunciant, 6. aphor. 56.
3. A terrore Melancholia profecta primariò cæteris omnibus est curatu difficilior. Platerus.

### Indicationes.

Materia melancholica, quæ in capite spiritus inquinat, similemque dispositionem iis imprimit, & cerebrū ad spiritus melancholicos generandos disponit, est alteranda, & euacuanda; nimirum cum sit sicca, frigida, crassa; humectanda, calefacienda, attenuanda. Hinc medicamentis humorem melancholicum educentibus expurganda. Postea reliquæ discutiendæ: caput roborandum, & intemperies, ac constitutio eius vitiosa corrigenda, ipsumque ad naturalem statum deducendum. Totius tamen semper simul habenda est ratio.

### Auxilia.

Quâ ratione autem hisce Indicationibus satisfieri possit, explicatum suprâ, part. 1. cap. 12. vbi de intemper. Dan. Sennerti Tom. 11.

perie capitis cum humore melancholico curandâ dictum. Ideoque hic pauca saltem addimus.

Et præparantia quod attinet, iis etiam *Prum* *Qrum*, ut & crystallos *Qri* admiscant nonnulli. Verum et si in melancholia hypochondriaca locum habere possint, cum aperiant, & abstergant: tamen non video, quomodo in melancholia per essentiam locū habere queat; cum sint frigida & sicca, nec qualitates humoris melancholici corrigant. Exempl. gr.

*℞. Aq. pomor. redolent. borrag. an. Vnc. j. spir. ros. Scr. s. syr. de pom. f. Vnc. j.*

M. pro haustu, qui per aliquot dies horis matutinis continuandus.

Purgantia sæpius repetenda sunt. Ad humorem verò melancholicum euacuandum valde efficax est extractum hellebori nigri Scr. j. vel etiam Drach. s. pondere exhibitum.

Vel *℞. Aq. borrag. bugloss. fumar. an. Vnc. j. extr. solutin. Andernac. Scr. j. helleb. nigr. Scr. s. syr. de epithymo, borragin. an. Drach. iij. M. pro Haustu.*

Commendatur & puluis Valesci de Taranta, qui infra, cap. 11. proponetur.

Vel *℞. Fol. sena Vnc. ij. pithym. rhabarb. zingiber an. Scr. iij. spec. diarrhod. abbat. Drach. j. cinamom. macis anisi, margarit. an. Scr. s. confectio. electuar. de succo rosar. in tabulis Drach. iij. sacchar. candi in syrup. violar. concretū ad pondus omnium.*

F. Puluis. Dosis Scr. iij. vel Drach. j. s. in iusculo.

Vel *℞. Mass. pil. de fumar. de lapid. Lazuli, an. Dra. s. extr. helleb. nigr. gr. iij. ol. maioran. gut. j. Cum syrup. rosar. sol. F. Pilulæ.*

Vel *℞. Extr. panchymagogi, vel extract. melanagogi Querc. Scr. j. helleb. nigr. Scr. s. rochisc. alband. gr. iij. ol. anisi gutt. ij. F. l. a. Pilulæ.*

Quod si melancholici neque has, neque alias medicamentorum formas admittere velint, quod sæpe fieri solet, propinetur sequens Decoctum galli decrepiti:

*℞. Rad. polypod. Vnc. sem. scorzonera. Drach. ij. cortic. rad. helleb. nigri preparati Drach. j. glycyrrh. Drach. j. s. flor. borrag. bugloss. violarum, an. P. j. sem. anisi, fenicul. an. Drach. s. passul. minor. lotar. Vnc. s. fol. sena Alex. f. s. Drach. v.*

Ebulliant in iusculo galli decrepiti, & detur iusculum edendum & bibendum.

Verum purgantibus multis ægri non fatigandi: sed plus commodi ab alterantibus expectandum.

In alterando & roborando capite commendantur præcipuè margaritæ, hyacinthus, borrago, bugloss. crocus, rosæ, melissa, doricum, aromata subilia, & odorem ac saporem suauem habentia. vinum album subtile aromaticum.

Commendatur etiam hoc Electuarium.

*℞. amygdal. dulc. excort. Vnc. ij. nuc. iugland. excort. Vnc. j. s. nucl. perscor. Drach. j. sem. papau. alb. Vnc. s. ocymi 3. j. Contundantur, & add. nucis condita Drach. ij. margarit. prepar. Drach. j. conseru. meliss. betonic. bugloss. borragin. an. Vnc. j. Cum syrup. de cort. citri & violar.*

F. Electuarium, de quo vesperi exhibeatur Vnc. s.

Vel *℞. Condit. flor. citri, aurant. an. Drach. ij. nuc. Indic. Drach. iij. cort. citri Vnc. s. Conseru. st. nymph. rosar. violar. an. Vnc. j. borraginis, bugloss. an. Vnc. s. flor. lauend. anthos, an. Drach. j. spec. elect. de gemm. 3. s. diamosch. dulc. Scr. j. conf. alkerm. 3. s. tintur. corallior. rubr. Scr. j. essentia cinamom. 3. j. Cum syr. de cort. citri. cum moscho q. s.*

F. Conditum, (quod duplici folio auri tegi potest) cuius dosis quantitas nucis moschatæ, vel castanæ.

*℞. Conseru. rosar. Vnc. j. flor. tunie. pæon. an. Vnc. s. violar. nymph. an. 3. ij. aq. pomor. redolent. 3. v. borragin. bugloss. an. Vnc. j. s. succi granator. dulc. Vnc. j. cydonior. rec. depurati Vnc. s.*

Misce, & contund. in mortario marmoreo. Hinc K k 2 fortiter

fortiter exprimantur, & colentur, Colaturæ add. *vinell.*  
*corallior.* Scr. j. *finaragd.* Scr. β. *styr. de cinamom.* borrag.  
 an. Drach. vj.

M. pro portione, cuius dosi cochlear. ij. manè & vespere.

Cardanus se solis somniferis potionibus, & lotionibus, ac vfu chryolithi intra octiduum Melancholicos curasse scribit.

Chymici hic præcipue tincturam, & magisterium laudant; de quo infra, cap. 20. pag. 478. Commendant etiam tinct. corallior. magist. lap. Lazuli, chryolithi, perlarum, coralliorum, sal. chrystalli, finaragdi, sapphiri, essentiam macis essentiam & tincturam croci, sapphiri, finaragdi, essentiam anagallidis. E Chymicis nonnulli etiam spir. ☿, & præcipue spir. ☿. Quis commendant Sed non video quàm commodè; cum aliàs acida melancholicis sint noxia, & humorem melancholicum, qui per se aridus est, augeant, & exalcent. Nonnulli tamen quàm specificum commendant sanguinem asini ex venis post aures tempore verno emissum, si in colinteola munda, nullo vfu antea infecta, madefiant, & exsiccantur, & postea particula duos digiros lata, & vnum pollicem longa in aqua fontana maceretur, eaque res postea manè exhibeatur, & sudor, si fieri potest, prouocetur.

Externa.

Si materia adhuc generetur à perseuerante ibi calida dispositione, tum refrigerantibus, & humectantibus, vt violis, rosis, nymphaea, & similibus, quæ odoramenti loco vsurpentur, vtendum; vel caput abluatur decocto rosarum, violarum, maluarum, hordei.

Particulares capitis euacuationes.

Particulares quoque capitis euacuationes instituuntur, cum sensibiles, tum insensibiles. Aperiantur venæ narium, temporum, frontis, post aures, idque aliquoties fiat; imò & in pedibus vena aperiri potest. Sanguini enim permiscetur humor melancholicus, & cum eo commodè euacuatur.

Apophlegmatismus talis instituitur:

℞. *Pyrethri, zingiber.* an. Drach. j. *sem. Raphid. agria, cruce,* an. Drach. β. *cubebæ.* Scrup. j. *ambra gr.* vj. Cum *oxymel. simpl.* F. Linimentum palato inungendum.

In nares immittantur sternutatoria ex hellebor, alb. maiorana, nigella, & similibus; & quidem fortiora eligantur.

Commendatur & serum caprinum cum extracto hellebor. nigri pro errhino.

Efficax est & sequens Pulvis sternutatorius:

℞. *Fol. Tabac. veri,* oleo sem. anisi preparat. Drach. j. *sem. maioran.* Drach. j. *agarici albiss.* Drach. sem. *pulu. fl. lilior. conuall.* Scrup. j. *ambra gr.* v, *moschi gr.* iij.

M. pro Pulvere subtilissimo, cuius parum manè & vespere narium attrahatur.

Fomenta & inunctiones fiant ex stœchad. Arab hyssopo, melissa, thymo, pulegio, flor. chamæmel. boragine, bugloss. quibus addantur malua, althæa, sem. fenigræc. quæ coqu. in vino subdulci, vel in lacte, vel in iure capitis veruecis, aut pulli gallinæ. & spongiâ decocto imbutâ caput foueatur. Ac si papau. capita, aut fol. nymphaeæ addantur in mediocri quantitate, somno conciliando, cuius semper in melancholia curanda Medicus rationem habere debet, vna operâ succurritur.

Vel imbuarur spongia ol. calidis, & humectantibus, vt oliu. chamæmel. anethin. lilior. albor. amygdal. dulc. & capiti applicetur.

Inprimis vtile est stillicidium ex lacte caprino recepti super futuram coronalem factum.

Vtile est & Linimentum ex *oui vitello,* & *ol. amygd. dulc.* Vnc. j.

Vel ℞. *Sem. papau. alb. cannabis, granor iuniper.* an. M. j. *thuris* Vnc. sem. *nucleor. Persicor.*

*malor. Armeniac.* an. Vnc. iij.

Contund. & misc. cum aq. rosar. & flor. sambuci, ac supra totum caput in panno lino ponantur, idque toties reperatur, quoties exsiccata fuerint. Nonnulli etiam fonticulos supra futuram coronalem factos commendant. Alij cranij per trepanum apertionem, vt vapores melancholici, & si quid aliud est p. n. in cerebro, euacuetur. Refertur Rondeletius, *meth. curandi morb. cap. 41.* quosdam, quibus ex casu, & lapsu cranium apertum fuit, sanatos fuisse; & Sanctorola scribit, quendam ex vulnere sanatum fuisse.

Somni, vt diximus; vtpote qui valde vtilis est in hoc morbo curando, etiam Medicus rationem habeat. Ideoque si ea, quæ antea diximus, non sufficiant, opij grana aliquot cum vnguento populeo misceantur, eoque tempora & nares illinantur. Si contumaces sint vigilæ, laudan. opiat gr. iij. exhibere licet.

Monet ramen Crato, *consil. 186.* remedia somnifera foris adhibita, etsi plurimum prodesse videantur, tamen melancholicis non satis tuta esse quod de fortioribus intelligendum puto.

Amuleri loco de collo nonnulli suspendi iubent Smaragdum, alij corallia rubra, alij lap. Chelidonium,

### Dieta.

Dieta ex antea dictis patet. Inprimis cibis sit boni succi, quosolo, & aquæ dulcis balneo recentem hanc melancholiâ Galenus se curasse scribit, 3. de loc. affect. c. 7. Si enim cerebri constitutio nondum valde mutata sit, nutrimentum bonum continuè affluens vitiū præfens, & nondum inueteratum corrigere, & balneum aquæ dulcis frequens materiam discutere & euacuare potest. Reliqua diæta eadem est, quæ antea, & supra, part. 1. c. 12. est proposita.

## CAPVT X.

### De Amore infano.

ET si ad causas, quæ cerebri constitutionem immutando melancholiam inducunt, & quidem ad animi sollicitudinem, & curas Amor quoque pertineat, & proinde melancholia ex amore immoderato orta ad eam, de qua modò diximus, melancholiâ speciem referri possit: quia tamen hic animi affectus præ reliquis vehementior est, & peculiare quid obtrinet, Medicis plurimis peculiari capite de Melancholia ex amore orta, seu de Amore Infano agere placuit; quos & hic sequemur, & seorsim de hoc delirio hoc capite agemus: de quo etiam in Institut. lib. 2. part. 3. sect. 1. c. 7. & ibid. sect. 2. cap. 4. quædam diximus.

Amor Græcis ἐρως est, vnde affectum hunc Barbari Heroos, & hoc malo laborantes Heroticos nominant, Arabes Ilisei. Est autem Delirium melancholicum, ex amore nimio ortum. Non equidem omnes amantes delirant. Etsi enim verum sit Poëtæ illud.

*Crede mihi, stulto nemo in amore sapit.*

& plerique amantes cæco amoris imperii in diuersum à recta ratione abripiantur, & videant meliora, probèque, deteriora sequantur: tamen non semper rectæ rationis vsum amittunt, sed amicorum, imò mentis, & conscientiæ ad meliora hortantis monita sequi possunt, si validius paulò affectui huic reudentur, & resistant, & causas, ac occasiones huius mali vitent. Interdum tamen affectus hic tam vehemens est, vt præcipue si diu duret, hominem ratione quasi spoliaret, & fere delirium efficiat,

Causa.

## Causa.

Causa am-  
ri infani  
primaria.

Causa enim huius delirii primaria est impressio for-  
tis rei amabilis; seu Amor, non ille blandus Dei, virtu-  
tis, boni, ac honesti, parentum, liberorum, imò & con-  
iugii, sed Veneris, quo homines cū ratione insaniunt.  
Eti enim & hic amor, qui est inter masculum & fœ-  
minam, si intra suos limites contineatur, blandus, &  
suavis affectus sit: tamen si nimius sit, ut Seneca ait, est  
rationis obliuio, & insaniz proximus, scđum, ac mini-  
mè conueniens animæ sospiti vitium, turbat consilia,  
altos & generosos spiritus frangit, à magnis cogitatio-  
nibus ad humilimas detrahit. Etenim si hominis, seu  
viri, seu fœminæ, vel reuerā pulchri, vel qui talis ap-  
paret, (Est enim, quod vulgo dicitur, Amor cæcus)  
species ex visu, vel colloquiis concepta fortiter memo-  
riæ imprimatur, & imaginationi, ac menti sapius offer-  
ratur, tatum rei amatz desiderium, & appetitus oritur,  
ut magna in homine inde fiat mutatio, & præ amore  
ægræ nec somnum, nec cibū capere possint, & animi va-  
riis perturbationibus percellantur. Dū enim, ut in Insti-  
tut, loc. alleg. diximus, ipem & opinionem consequendi  
rem amatam concipiunt, in profundissimum sæpe gau-  
dium erumpunt, & præ gaudio multa inepta, & stulta  
agunt, & loquuntur, & periculis se non rarò maximis  
exponunt. Vbi verò de consequenda re amata desperat,  
nec mutuum amorem respondere animaduertunt, lu-  
gent, dolent, aut etiam irascuntur, interdum etiam vio-  
lentas manus sibi inferunt. De quibus multa passim  
apud Poetas, quæ, etsi de amore, qui nondū in delirium  
degenerauit, dicta videantur: tamen eadem etiam om-  
nino delirantibus ex amore conueniunt. Terentius, in  
Eunuch.

In amore hac omnia vitia: Iniuria,  
Suspiciones, Inimicitia, Inducia,  
Bellum, Pax rursus.

Et Plautus, in Mercat.

Amori accidunt etiam ultro hac, quæ diximus,  
Insomnia, ærumna, error, terror & fuga,  
Ineptia, stultitiaque adeo, & temeritas,  
Incogitantia, cupiditas, & malivolentia.  
Inheret etiam auaritia, desidia, iniuria,  
Inopia, contumelia, & dispendium.

In primis verò graphicè incommoda amoris describit  
Plautus, in Cistell. act. 2. Sc. 1.

Credo ego amorem primum apud homines carnificinam  
commentum:

Hanc ego de me coniecturā domi facio, ne foris quarā,  
Qui omnes homines supero atque antideo cruciabilita-  
tibus animi.

Factor, crucior, agitor, stimulator, versor in amoris rotā  
miser:

Exanimor, feror, differor, distrahor, diripior: ita nullam  
mentem

Animi habeo. Vbi sum, ibi non sum: ubi non sum, ibi est  
animus.

Ita mihi omnia ingenia sunt: quod lubet, non lubet iam  
id continuo.

Ita me amor lapsus animi ludificat, fugat, agit, ap-  
petit;

Raptat, retinet, jactat, largitur: quod dat, non dat,  
deludit:

Modò quod suadet, dissuadet: quod dissuadet, id ostendat,  
Maritimis moribus mecum experitur: ira mentem fran-  
git amantem

Animum: neque, nisi quia miser non eo pessum, mihi  
ulla abest

Perdito pervicis.

Imò, ut Virgilius. Eclog. 8. ait:

Sæuus amor docuit natorum sanguine matrem

Commaculare manus; quod à Medea factitatum.

Egregiè quoque insanum hunc amorem descripsit Se-  
neca, in Hippolyt.

Dan. Sennerti Tom. I I.

Torretur estu tacito, & inclusus quoque,  
Quamuis tegatur, proditur vultu furor:  
Erumpit oculus ignis, & lasse gena  
Lucem recusant, nil idem dubia placet,  
Artusque variè iactat incertus dolor:  
Nunc ut soluto labitur moriens gradu,  
Et vix labante sustinet collo caput:  
Nunc se quieti reddit, & somni immemor.  
Noctem querelis ducit; assolli iubet,  
Iterumque poni corpus, & solui comas,  
Rursusque fingi: semper impatiens sui  
Mutatur habitus: nulla iam Cereris subit  
Cura, aut salutis; vadit incerta pede  
Iam viribus defata, non idem vigor,  
Non ora tingens nitida purpureus rubor.  
Populatur artus cura; iam gressus tremunt:  
Tenerque nitidi corporis cecidit decor,  
Et qui tenebant, signa Phœbea facis  
Oculi, nihil gentile, nil patrium micant:  
Lacrime cadunt per ora, & assiduo gena  
Rore rigantur.

Et sunt huiusmodi ærumnarum, quibus amantes affli-  
guntur, pleni Poëtarum libri:

Tot verò curis, ærumnis & sollicitudinibus cū  
amantes conficiantur, non mirum est si tandem in me-  
lancholiam incidant. Etsi enim Amor, ut diximus in  
principio species delirii, & Melancholiz non sit: tamē  
nimia animi sollicitudo, inedia, & vigiliz, ira, & vehe-  
mentissimi animi affectus, quibus continuo cruciantur  
amantes, cerebrum refrigerant, & exsiccant, humores  
melancholicos cumulant, & cerebro Melancholicam  
dispositionem inducunt. Et quidem in principio nihil  
tale incauti metuunt; dum verò obiectum gratum, &  
delectabile memoriæ nimis imprimunt, & continuo de  
eo cogitant.

Labitur totus furor in medullas,

Ignem furtivo populante venas.

Non habet latam data plaga frontem,

Sed vorat rectas penitus medullas,

ut Seneca, in Hippolyt. habet. Ideoq; ut idē, ibid. scribit,

Qui blandiendo dulce nutrit malum,

Serò recusat ferre, quod subiit, iugum.

Causæ verò huius delirii remotæ sunt omnia, quæ Causa re-  
ad amorem conciliandum faciunt. Cum verò amor sit moia.

appetitus. appetitum verò præcedat notitia, & ignoti  
nulla cupido sit: primus ad amorem gradus est rei no-  
titia; ad quem peruenitur visu, & auditu. Et in primis  
amoris causa est obiectum pulchrum, seu reuerā tale  
apparens, visui oblatum. Vnde Amor Græcis ἐρα, &  
ἐρῶν, ab influendo, quod ex adpectu per oculos,  
quasi per fenestras, in mentem hominis influat, dictus  
putatur; & hinc illud est vulgatum, ἐν τῷ ὁρᾷ ζῆλος τοῦ  
ἐρα, & illud: Oculi sunt in amore duces. Vnde ille apud  
Virgilium:

Vi vidi, ut per, ut me malus abstulit error.

Ita David Bersabæ, Dido Æneæ conspectu amore ac-  
censa est.

Ut verò Amor ex visu, seu auditu perceptus, penitus  
se se menti insinuet, & obiectū fortius animo inprima-  
tur, multum facit otium, solitudo, lectiōnes librorum  
amatorum, colloquia amatoria, & frequens cū ami-  
co, vel amicā conuersatio: de quo Seneca, in Octau.

Vis magna mentis, blandus atque animi calor.

Amor est: inuenta gignitur luxu, otio:

Nutritur inter lata fortuna bona.

Et de otio Ovidius ait:

Hæc sunt iucundi causæ cibisq; mali.

## De Philtris.

Cum verò inter causas Amoris insani etiam Philtra. Philtra un-  
à multis numerari soleant; de iis hîc aliquid dicendum. de dicantur.  
ἑλγος, Græcis ἐρα τὸ φιλῶν, hoc est, ab amando  
deriuatur,

deriuatur, nomenque ab effectu inditum, quod scilicet res ea amorem conciliare creditur. Interdū etiā in genere *φάρμακον* appellatur; de quo postea locus adducetur: vnde etiam Pharmaceutria apud Theocritum, & Virgiliū nominata est. Latini Poculum amatorii, Germani *Liebranck*, itidem ab effectu, & formā exhibendi nominant; cū talia in liquidis, & potulentis facilius propinari possint. Describique solet Philtrum, quod sit pharmacum ad amorem conciliandum exhiberi solitum. Quamquam enim à malè feriatis quibusdam etiam quædam actiones, & ceremoniæ Magicæ in eundem finem institui soleant, vt ex Pharmaceutria Theocriti, & Virgilij apparet; tamen de iis hīc non agimus. In primis verò, de quo in *Institut. lib. 2. part. 3. sect. 2. c. 4.* dictum, hīc querendum: an philtra illa, quod ipsis tribuitur, præstare, id est, amorem conciliare possint; Cum verò amor, vt Plato definit, sit desiderium, rei placitæ; seu, vt Scaliger, *exerc. 301.* definit, Affectus vnionis; hoc queritur: an philtra talem appetitum, & affectum conciliare possint? Et quidem cum Philtra eā ratione exhibeantur, vt amorem mutuum concilient, hoc in questione est; an ea mutuum erga eum, qui iam amat, amorem in alio excitare possint: seu an is, qui amantem non redamat, pharmacis & philtris cogi possit, vt repugnans; & inuitus etiam amantem redamet. Neque enim Amor semper mutuus est, sed amatus sæpe se amari nescit; & nonnulli licet amari se sciant, amantem tamen non redamant: cuius rei exemplum est in Didone & Aenea.

Fieri autem hoc non posse, in *Institut. loc. alleg. diximus.* Cum enim amorem rei notitia præcedere debeat, & quidem sub specie pulchræ rei; & ignoti nulla cupiditas sit: at verò ij, quibus philtra propinantur, sæpe nullo modo cognitum habeant, se amari, neque eius, à quo amantur, notitiam habeant; multò minus vt pulchrum agnoscant; nullo modo in amorem philtris pertrahi possunt, quæ notitiam illam conciliare non valent. Imò licet is, à quo amoris conciliandi gratiā philtra propinantur, notus sit; tamen si idem exosus sit, nec placeat, philtra pro odio amorem inducere nō possunt; cum talia pharmaca in corpus quidem agant, in animam verò hominis agendi nullam potestatem habeant.

Hoc quidem non negamus, Veneris stimulos, & Venereos affectus interdum à talibus medicamentis induci posse: non tamen is appetitus ad certam, & peculiarem, quod hīc præsupponitur, personam determinatur, sed promiscue in obuiam quamque.

Hoc verò experientia sæpe docet, pro amore furorē, & insaniam philtris inductam fuisse; de quo Poëta:

*Philtra nocent animis, vimque furoris habent.*

Vnde & leges Romanorum graues, & capitales poenas in eos constituit, qui pocula amatoria aliis exhibent. Plutarchus de L. Lucullo, Imperatore, refert, quod hausto poculo amatorio in furorē inciderit, quo tandē miserē perijt. Lucerius, Poëta, philtro ab vxore Lucilla, accepto in furorē coniectus sibi ipsi manus violentas intulit. Et talia exempla passim occurrunt, atque aliquot etiā annotauit Schenckius, *lib. 7. obseru. 30. & 31.* Noruicq; hīc VVitebergæ fuit ante paucos annos quidā calceolarius, qui philthro accepto multos annos insanus vixit, & tandē in claustrō insanus mortuus est.

Etsi, vt occurrant exēpla eorum, qui philtris in amorem alicuius inducti creduntur; tamen id vel Demonis fraudibus factum, qui etsi in hominis animam nullum habet imperium; tamen Dei permissu, vt alios prauos affectus in hominum animis, ita & istum excitare potest, hominūq; mentē dementat, & impuris cogitationibus amantium sese associat, atque interim iis, qui philtra exhibuerunt, persuadet, à philtris eiusmodi effectum dependere; atque ita superstitiosam de philtris opinionem in hominū mentibus confirmat, eoque ad malè agendū, & secū colludendū porro incitat; vel quod

philtris adscribitur, conuersationi potius, colloquiis amatoris, & aliis causis amorē conciliantibus adscribi debet. Ita narratur historia de Rege Macedonum, Philippo, qui cum amore puellæ arderet, & Olympiæ, Reginæ, vxori, persuasum esset ab aliis, philtro à puella propinato Regem maritum in hunc amorem pertractū esse, illa puellam ad se adduci iussit; adductam verò cum & formæ elegantia, & morum suauitate excellere videret suspicione de philtro abiectā exclamauit: *χαίρειταις διαβολαὶ οὐ γὰρ ἐστὶν οὐδὲν φάρμακον ἔχει: Valeant,* inquit, *calumnia: Tu in te philtra habes.* Vbi vox *φάρμακον*, vt supra diximus, pro philtro sumitur,

### Signa Diagnostica.

Qui melancholici sunt ex amore, vultum sæpe mutant, & nunc hilaritatem, nunc tristitiam præ se ferunt; & in primis si amici, vel amicæ mentio fiat, vel is, aut ea visui obiciatur, non solum in vultu, sed & in pulsu mutatio deprehenditur; quo modo Galenus, *de præcogn. ad Posthum. c. 6.* mulierem quandam ex amore ægram esse deprehendit, & ab Erasistrato, Medico, Antiochum, Seleuci Regis filium, Stratonicæ noueræ amore ægrotare deprehensum esse, refert Valer. Maximus, *lib. 5. c. 7.* Ideoque si Medicus tale quid de ægro suspiceretur, neq; is ob verecundiam animi affectum prodere velit, Medicus tangat pulsum, & curet, vt amicæ, vel amici metio fiat, vel de eo nuncium, aut epistola afferatur: aut is, vel ea ex improviso ægrotanti offeratur. Tum enim ad mentionem, vel ad speciem eius non solum faciei color, sed & pulsus mutabitur. Pulsus equidem amanti nullus proprius est, & peculiaris; sed turbatus saltem, vt neque naturalem æqualitatem, neque ordinē seruet. Sic etiam si carmina amatoria, vel sermones, aut cantilenas amatorias audiant ægri, vel in hilaritatem & risum, vel in tristitiam, & fletum soluntur, in risum quidem, si se in gratia amicæ esse existimant; in fletum, si repudiatos se opinantur. Facies amantium pallet, vigilie vrgent, corpus contabescit, oculi intra orbitas conduntur, & graues sunt, ob spirituum defectum. In sermonibus, gestibus & actionibus decorum non obseruant amantes, & multa præter τὸ δέον loquuntur, & agunt, & in iis grauitas nulla, quæ debebat, apparet; de quo illud:

*Non bene conueniunt, nec in vna sede morantur, Maieſtas & Amor.*

Erit homines immutantur ex amore, vt Terent. in *Eunuch.* ait, vt non cognoscas eosdem esse. Et effectus amoris, & quantū ex iis corpus immutetur, antea etiā in causis diximus; vt exēplis etiā in *Institut. loc. alleg. ex Galeno, lib. de præcognit. ad Posthum. c. 6.* Valerio Maximo, *l. 5. c. 7.* Amato Lusitano, *curat. medicor. cent. 3. curat. 36.* Fracisco Valleriola, *lib. 2. obseruat. 7.* docuimus: qualia etiam passim in historiis, & Poëtis occurrunt. Medea filios disceperit impotentia amoris, vel zelotypia in amatum Iasonem. Dido sibi ipsi manus violentas infert vehementiā amoris in Aeneam victa. Hercules amore effeminatus turpiter seruiuit Omphalæ. Sæson amore superatus arcana sua cum suo maximo damno amicæ reuelauit. Salomon, omnium hominum sapientissimus, amore mulierum victus Idololatriam committit. Noratu etiam dignum est quod Cornax, *lib. 2. consult. Medic. c. 3.* refert, se vidisse, Nobili cuidam iuueni, qui puellæ, cuius nuptias ambiebat, in mensa affidebat, subitò venam in temporibus prope autem sponte apertam fuisse, & copiosum sanguinem ex ea profluxisse. Quosdam obrepulsum, vel amicæ discessum subitò mortuos esse, refert Marcell. Donatus, *de histor. Mod. mirab. lib. 3. c. 13.* vbi plures infani amoris historias recenset.

*Prognostica*



*Prognostica.*

In principio quidem malum hoc curatu difficile non est: si verò radices agit, vel in maniam degenerat, vel ægri marasmo, & tabe consumuntur, vel sibi ipsis violentas manus inferunt.

*Curatio.*

Initio ergo, vbi constitutio cerebri nondum adeo immutata est, saltémque vanis illis cogitationibus torquentur amantes, malo statim resistendum, & vt Ouidius habet,

*Dum licet, & modici tangunt præcordia motus,  
Si piget, in primo lumine siste pedem.  
Opprime, dum noua sunt, subiti mala semina morbi.*

Et:

*Dum nouus est, cepto potius pugnemus amori:  
Flamma recens parua sparsa resedis aqua.*

Ideoque fugienda solitudo, & amicorum colloquiis & conuersatione animus amore æger à mœstitiâ, & vanis illis cogitationibus ad hilaritatém auocandus, & quibus fieri potest modis oblectandus, & de re amata cogitationes excutiendæ, & virorum grauiû admonitionibus æger ad mentem meliorem adducendus, monstrandumque quàm absurda, inepta, & genere ac conditione indigna agat, atque ea, quæ amatur, omnibus modis exosa reddenda, eiusque vitia, seu corporis, seu animi exaggeranda. De quibus tamen multa præcipere potius Ethici est, quàm Medici. Et extant hac de re non pauca apud Ouidium, in lib. de remedio amoris, Ideoque plura hic non addimus. Inprimis fugiendum otium. Nam, vt idem Ouidius habet,

*Otia si tollas, periëre cupidinis archus,  
Contemptaque jacent, & sine luce, faces.  
Desidiam puer ille sequi solet, odit agentes:  
Da vacua menti, quo teneatur, opus.  
Quam plantanus riuo gaudet, quam populus unda,  
Et quam limosa canna palustris humo:  
Tam Venus otia amat: finem qui quaris amori,  
Cedis amor rebus. Res age, tutus eris.*

Hinc tres Deas Amori inuictas esse Poëtæ tradunt; Minervam, Dianam, Vestam.

Si verò malum ita radices egerit, vt admonitionibus vix amplius locus sit; modo capite præcedente proposito æger curandus.

Et si ex Veneris appetitu, & seminis abundantia tale malum ortum habeat, vxorem, vbi res fert, ducere commodissimum est; cum, etiam ex Apostoli consilio, melius sit, nubere, quàm vtriusque, si res id non ferat, medicamenta Venerem sopientia, & semen exstinguentia exhibenda. Inter quæ commendatur sem. agni casti, rutæ, portulacæ, menthæ, camphoræ; quod tamen Scaliger, exerc. 104. §. 8. negat, sem. coriandr. lactucæ. Folia etiam falicis trita, & pota Venerem imminuunt, & si sæpe vsurpentur, planè auferunt. Idem verbera præstare dicitur, atque etiam gestata Venerem extinguere. Idem præstare lapidem topazium in annulo gestatum scribunt. Inprimis saccharum Hni, quod Venerem imminuit, & si sæpius vsurpetur, virilitatem tollere potest.

De Menthâ procul dubio hinc ortum prouerbum: *Mentham tempore belli neque serito, neque edito.* Quod quamuis inde natum putat Aristoteles, sect. 20. problem. 2. quod, quia corpus refrigerat, animositate & fortitudini sit aduersa: tamen quia mentha frigida non est, hæc potius huius adagij causa videretur, quod Mentha Venerem extinguit; quod ipse, loc. alleg. concedit Aristoteles. Cum enim belli tempore multi pereant, & proinde nouo milite & ciue, qui mortuis succedant, opus sit, ad eam rem liberorum propagatione opus est, quam Mentha, vt pote semen extinguens, impedit, & proinde eo tempore inutilis est.

Hinc commendantur hæc medicamenta:

*℥. Trochiscor. de camphora, menth. sicca, an. Drach. i. sem. agni casti Drach. s. Cum syrup. nymphæ. F. Pilulæ.*  
Vel *℥. Menth. sicca, sem. agni casti, nymph. an. Drach. i. rasur. eboris, cerall. rubr. an. 3. s. sacchari alb. in aq. nymph. dissolut. Vnc. iii. F. Rotulæ.*

Vel *℥. Sem. lactuc. portulac. coriandr. menth. sicca an. Drach. i. F. Puluis.*

Cui si addantur sacchari Vnc. iii. vel iiii. in aq. nymph. vel menthæ dissolut. F. Rotulæ

Aqua Castitatis, vt appellant:

*℥. Aq. menth. chelidon. aneth. lilior. cornuall. lilior. albor. nymph. an. Vnc. i. Misce. Dosis Vnc. ii. vel iij.*

*Diata.*

Victus sit tenuis; cum sine Cerere & Baccho frigeat Diata. Venus, & hic etiam locum habeat oraculum Saluatoris: Hoc genus Dæmoniorum non eiicitur, nisi precatione & ieiuniis.

Videantur de hoc affectu etiam Langius, lib. 1. Epist. 24. Valefc. de Taranta, lib. 1. c. 11. Forestus, lib. 10. obseru. 29. & 30. Inprimis verò eruditè & prolixè de infania ex amore tractat Fr. Valleriola, obseru. lib. 2. obseru. 7. qui ibi videatur.

*Cura furoris ex philtro.*

Quamprimum cognitum habetur, vel suspicio est, philtum datum esse, statim ipsi occurrendum, ne venenum, in quod philtum degenerant, cor petat, & hominem iugulet. Primò itaque necessaria sunt vomitoria, vt sunt aq. benedicta, elect. vitri Gnij Crollij, Aurum vitæ, & similia; quibus semper addendum aliquid alexipharmacorum, seu sunt lap. Bezoar, terra sigillata, aqua theriacalis, mithridatica, &c. Agto quidam radicem asari contusam exhibuit, quâ sumptâ multum euomuit, & ita pristina sanitati restitutus est, vnde radix hæc mirè commendatur.

*Cura furoris ex philtro.*

A sumpto vomitorio statim prouocandus sudor cum aqu. acetosæ, cardui benedict. angelicæ, betonic. præseruatina aliquâ, aqu. Mithridatica, theriacali, spir. theriacali, spir. Tartari compos. Andernaci, terra sigillata; quibus admisceri possunt elixir propriet. mater perlarum præparata, vel eius magisterium, succinum album præparatum.

*℥. Aq. acetos. card. ben. an. Vnc. i. terra sigill. Siles. Scr. i. matr. perlar. præpar. succini albi præpar. an. Scr. s. lap. bezoar. gr. ii. mixtur. simpl. Scr. s. aq. theriacalis Drach. i. syr. acetos. citri Vnc. s. M. pro Haustu.*

Vel *℥. Aq. plantag. cardui bened. an. Vnc. is. theriacal. Drach. ii. terra sigill. Scr. j. C. præparati gr. xv. sal. absinth. Scr. s. extr. gentianæ gr. iiii. spir. s. gr. vii. syr. de succo acetosæ Drach. iii. Misce pro Haustu, quæ dosis per aliquot dies manè vacuo ventriculo repetenda, donec sudor largus consequatur, & alienationem aliquam percipiat æger.*

Postea per aliquot dies exhibeatur tale Decoctum:

*℥. Succ. meliss. recent. hyperic. an. vnc. ii. extr. rad. vinetox. Drach. s. lap. magnetis boni, & ferrum trahentis, 3. ii. mellis despumati q. s. F. Electuarium, cuius Drach. i. vel Drac. is. ieiuno ventriculo exhibenda, donec remittat malum. A meridie quotidie exhiberi potest aliquid de tincturâ coralliorum, à gutt. vi. ad x. vel Haustus de emulsione cannabinâ sequens:*

*℥. Sem. cannabis Vnc. i. vini albi generosi Vnc. ix. F. contundendo Emulsio, cui adde margarit. præparat. 3. s. pulu. sem. hyperic. Scr. i. lap. chrysolith. Scr. s. bezoar. gr. iiii. M. pro 3. dosibus.*

## CAPVT XI.

De Melancholiâ per Consensum Cordis  
& Totius.Melancholia  
per consen-  
sum causâ.

**V**alde cognata, & proxima Melancholiâ ex primario cerebri affectu est Melancholia, quæ fit consensu cordis, & totius, adeo, ut nonnulli eam, quæ fit cordis vitio, spiritus vitales melancholicos ad spirituum animalium generationem suppeditantis, ad melancholiam per primum cerebri affectum referant. Nos ad melancholiam per consensum referre malumus; cum cerebrum saluum esse possit, & spiritus animalis melancholicus saltem ob errorem externum, seu materiæ vitio generetur. Hoc tamen verum est, si spiritus & sanguis vitalis impurus diu ad cerebrum affluat, tandem ipsum cerebrum dispositionem melancholicam inde contrahere.

## Causâ.

Melancholiâ huius causâ est humor melancholicus, & spiritus vitalis similis in toto abundans; & quidem nunc purus, nunc cum alio humore mixtus.

Continetur autem iste humor melancholicus in venâ causâ, ut & arteriâ magnâ ramis; sicut ille, qui melancholiam hypochondriacam excitat, in ramis venâ portæ confinetur; unde & delirium hoc continuum est, non verò per vires infestans, ut in melancholiâ hypochondriacâ accidere solet; licet quasdam exacerbationes habere possit, quales etiam in febribus continuis fieri solent.

Colligitur verò iste humor præcipue ob intemperiem cordis frigidam & siccam. Cum enim cor, si sit frigidum & siccum, etiam intra sanitatis limites spiritus tales gignat, ob quos homo est tristior, & timidior: probabile est multo magis si intemperies illa iam morbofa fiat, quod spiritus tales generabuntur, quorum ratione ægri etiam sine causâ externa timidi, & tristes redantur. Cor enim frigidum & siccum tam subtile, ut par est, & tam calidos spiritus non generat. Hi ergo ipsi ad melancholiam apti sunt, & cum spiritibus animalibus præbeant materiâ, eiusdem generis spiritus animales inde generantur, id est, minus calidi, crassi, impuri, & vno verbo Melancholici.

Et cum cor officinâ sanguinis, & spiritus vitalis sit, & ad temperiem totius corporis mutandam maximam vim habeat, temperiemque cordis temperies totius sequatur: intemperies hæc & constitutio p. n. cordis toti corpori communicatur. Facit tamen etiam sæpe ad melancholicam totius corporis constitutionem inducendam hepar, & lien, si eorum vitio sanguis melancholicus generetur. Et quidem non solum hepar frigidum & siccum, verum etiam calidum & siccum ad humoris melancholici generationem facit. Cum enim hepar tale sanguinem adustum, & crassum generet, ubi calor exspirat, & crassiores partes in liene hærent, sanguini melancholico præbetur materiâ. Neque tamen ob id melancholia, & mania easdem planè causas habent, & confunduntur. Nam in melancholia quidem humor esse potest adustus, sed causâ exurens iam cessavit, calor delit, & humorem frigidum & siccum post se reliquit; in mania verò causâ adurens adhuc durat. Interdum tamen accidit, ut mistus quasi affectus ex mania & melancholia exciteretur, & æger aliquo temporis spatio maniacus sit, alio melancholicus; dum scilicet humores sunt adusti, sed amplius caliditatem notatu dignam non obtinent.

Et quidem ista cordis, & viscerum, imò totius corporis intemperies, & melancholica constitutio nonnunquam à parentibus in liberos deriuatur, & tum inter morbos hæreditarios melancholia numeratur. Si etiam

quis corporis constitutione melancholicâ est, facilius hoc morbo corripitur. Hinc graciles, nigri, hirsuti, præsertim cum pilis crassis, & nigris, & qui venas latas habent, facilius melancholiâ corripiuntur. Nec tamen alij, qui eam corporis constitutionem non habent, sed corpore sunt molli, albo, aut rubro, à morbo hoc planè immunes sunt; sed si causâ, quæ iam enumerabuntur, adsint, aut præcesserint, in omnibus omnino corporibus, cuiuscunque constitutionis, melancholicum delirium hoc excitari potest: quod ipsa experientia testatur.

Secundò etiam in quacunque corporis constitutione melancholiam generant curæ, tristitia, subitus terror & consternatio, metus, quæ sanguinem in toto corpore mutare possunt; nimia animi intentio, & rerum difficultum, vel impossibilium inuestigatio, nimia exercitatio & labores, vigiliæ, ieiunia: quæ omnia humidam radicalem, & corpus absumunt & exsiccant. Faciunt quoque huc febres acutæ, & diuturnæ, humores in corpore adurentes, & siccantes, cibi item crassi, & sanguini melancholico generando apti; quales sunt caro bubula, ceruina, hircina, aprugna, pisces marini, & grandes, & alij cibi sale & fumo conditi, ac indurati, brassica, lentes, legumina, panis furfuraceus, vel ex panico, milio, fabis coctus, caseus vernus, vina crassa, nigra, cereuisia crassa. Facit quoque ad melancholiâ generationem aer crassus, & turbulentus, frigidus, siccus, vel etiam siccus adurens, ut æstas calida & sicca, quæ humores adurit. Quamvis enim ea potius bilem, quàm melancholiam gignat: tamen superueniens frigiditas autumnii id impedit, & materia adusta, & crassa in melancholiam degenerat; unde quartanæ autumnino sunt familiares; & inter anni tempora ad hunc morbum autumnus commodissimus est. Cumulant quoque humorem melancholicum in toto corpore causâ, quæ eum in corpore detinent, ut vitium aliquod lienis, ob quod sanguis à feculento humore non expurgatur, atque hinc in vniuersum corpus redundat: hæmorrhoidum etiam, & mensium suppressio, ob quam sanguis talis retentus in toto corpore redundat, illudque inquinat.

Cum verò multi humore melancholico abundant, nec tamen delirent: delirium non generatur, nisi humor iste cerebro communicetur, & spiritus tenebricosi, & melancholici inde reddantur: quod fit in primis ob animi affectus, studium, curas, sollicitudinem, quibus is ad cerebrum rapitur. Interdum tamen & Dæmones hanc occasionem arripientes, Deo permittente, sese huic corporis constitutioni associant, & omnis generis tristes, absurdas, & prauas cogitationes homini suggerunt; unde Melancholia balneum Diaboli vulgo nominari solet.

## Signa Diagnostica.

Si à totius corporis venis ad caput humor melancholicus transmittatur, erit delirium continuum, quod tamen aliquas interdum exacerbationes, vel remissiones habet: nihil verò insigne p. n. circa hypochondria apparet, aderuntque melancholiâ in toto corpore abundantis indicia, & æger vel ab ipso ortu corporis constitutionem melancholicam obtinet, est fulcus, macilentus, niger, hirsutus, vel, si natura talis non sit, præcesserunt causâ melancholiam multiplicantes, siue eam generent, siue detineant, febres acutæ, diuturnæ vigiliæ, curæ, & similes antea enumeratæ. Hinc nonnunquam corpore molli, albo, vel rubro, vel etiam bilioli melancholici fiunt, si præcesserint curæ, vigiliæ, cibis prauus, melancholicum succum generans, hepar, & cor ex morbo aliquo ad melancholiam generandam disposita sint, præcesserint febres diuturnæ, mensium vel hæmorrhoidum suppressio. Quæ omnia confirmantur sanguinis phlebotomiâ emissi inspectione, qui melancholicus apparet, si talis in toto redundet.

Melancholia  
per consen-  
sum signa.

*Humori melancholici & simplicis & mixti signa.*

An autē humor melancholicus purus & simplex sit, an cum alio mixtus, deprehenditur, ex iis, quæ antecesserunt, & effectibus. Nam si ea præcesserunt, quæ simplicem humorem melancholicum tantum generare valent, vel quacunque ratione eum in corpore colligere, si ægri constitutio & temperatura sit melancholica, color plumbeus, nulla præcesserit febris diuturna, vel ardens, aut cordis, vel hepatis caliditas, vel siccitas nimia, quibus humores aduri solent, cum delirio metus & tristitia sit insignior: à puro humore melancholico delirium est.

Si autem humor alijs admixtus sit, præcesserunt causæ cum humore melancholico etiam sanguinem, bilem, pituitam, vel atram bilem generantes, & symptomata quoque nonnihil variant. Nam si sanguis admixtus sit, delirium interdum fit cum risu; si pituita, delirium est mire, cum obliuione & pigritia, metus ac mœror valde excedunt; si bilis admixta sit, delirium est cum ira, & exandescencia aliqua; si bilis atra, delirium est mania proximum.

*Diaboli melancholia se immiscens signa.*

Diabolum verò se immiscere melancholiz, patet ex eo, quod ægria, quæ antea ignorabant, proferunt, futura prædicunt, arcana patefaciunt, linguis, quarum ignari antea fuerunt, loquuntur, & alia supra caprum & ingenium proferunt. Quamuis enim ex morbo, ut supra diximus, dispositio aliqua cerebro induci possit, quæ ingenium augeat, & hominem quàm antea prudentiorem vel sapientiorem reddat: tamen si ea proferat æger, quæ planè supra eius caprum sunt, ad causam naturalem id referri non potest.

### Prognostica.

1. Prognostica, quæ supra de melancholia in genere enumerata sunt; etiam hîc locum habent. In specie huc pertinere videntur, *aphor. 11. sect. 6. Melancholicis & nephriticis hemorrhoides supervenientes bona sunt. Et aphorismo 12. sect. eiusdem: Insanis si varices, vel hemorrhoides supervenerint, insania solutio.*

2. Melancholia per consensum, seu totius, seu partis alicuius, tandem in melancholiam per essentiam sæpe degenerat.

### Indicationes.

Humor melancholicus cum in toto, tum in capite consistens primò præparandus, & deinde euacuandus. Omnium verò primò si sanguis abundet, & humori melancholico mixtus sit, is euacuandus, & si cordis, vel alterius membri, hepatis purâ, vel lienis vitio, aut generetur, aut cumuletur, & detineatur in corpore humor melancholicus; morbus illius membri curandus. In primis autem melancholia à capite reuellenda. Multi enim sunt, qui humore melancholico abundant, nec tamen delirant, & melancholici fiunt; cum humor iis caput non occupet. Tandem caput, & cor alterandum, & roborandum.

### Curatio.

*Vena sectio.*

Si ergo sanguis redundet, præmisso clystere, vel in leni pharmaco purgante, vena aperiatur in brachio, in primis sinistro, & pro eius redundantia, & viribus ægri sanguis euacuatur: præstatque ob spirituum necessitatem paulatim, & partitis vicibus sanguinem detrahare. Atque præcipuum ad curationem melancholiz, & mania remedium venæ sectionem esse censet Platerus, scribitque, se longâ observatione didicisse, innumeros hac ratione sanatos fuisse à chirurgis quibusdam, vel alijs, qui hisce morbis sanandis operam dabant, qui vigesies, & lxxagesies quoque venas tundendo, insanos penitus, & melancholicos ita restituerunt, ut postea sani adhuc longam vitam vixerint, qui in vena certa eli-

genda nihil laborarunt, sed nunc brachij, nunc pedis, hanc, illamve, nunc alibi, sine discrimine, aperuerant: quod remedij genus & ipse, sed maiore curâ & providentiâ, ac methodicè, præmissis semper alui purgationibus, ut paucit. Is enim non solum venam aliquam patentem in brachio eligit, sed & saluarellam sinistræ manus, & in pedibus quoque malleoli venam, & Saphenam dictam, præcipue si menses non rectè fluant, vel quæ ad pollicem pedis excurrit, secat; varices quoque si in cruribus, aut alibi appareant, cum magnam eiusmodi materiæ melancholicæ copiam contineant, aperiendas censet; tandemque fontis & narium venas. Quæ omnia de repetitâ venæ sectione, etsi in primis de mania verâ esse non dubitem, hæc tamen suo etiam modo locum in melancholia, præcipue in melancholia, quæ ex terrore, vel metu subito, & ex improviso accidere oritur, quæque tam fortem in spiritibus, & humoribus, ac cerebro ipso impressionem facit, ut æger timeat, nisi tota sanguinis massa exhaustiatur, curari possit: Habetque, ut Crato ex sententia Montani loquitur, humor melancholicus seminarium ignis in se, quod aliàs magis, aliàs minus intenditur & cum effluuio, in maniam degenerat. Aliquâ tamen cautione opus est, ob timorem & mœsticiam, quibus plerique melancholici perpetuò afficiuntur, ob spirituum, quibus maxime opus habent melancholici, dissipationem, suffocationem, & imminutionem, ne nimia sanguinis euacuatione spiritus exhausti, & vires deiciantur. Cognoscit autem facile Medicus, quid in hoc melancholiz genere agendum sit, si causas, ob quas humor melancholicus genitus, aut collectus est, consideret. Si enim hepar ob intemperiem calidam & siccam talem humorem generet, aut sanguinem in corpore abundantem exurat aut eadem totius corporis intemperies ab internâ, vel externâ causâ contracta præster, aut à subitâ consternatione malum ortum habeat, hæmorrhoides, vel menses suppressi sint: sanguinem audacius pro copia, & viribus ægri, & quidem ex pluribus venis, per intervalla tamen, euacuare licet. Si verò vigilia, curæ, inedia, amor, & similes causæ sanguinem spiritusque absumentes præcesserint; vel nulla, vel parior sanguinis euacuatio instituenda.

Aperiatur autem primò interna, aut Mediana, vel dextri, vel, quod commodius videtur, sinistri brachij vena; & quidem latiore foramine, ut sanguis crassior etiam effluat. Diligenter enim hîc attendendum, ne crassior sanguinis melancholici pars intus relinquatur, subtilis verò, & utilis euacuatur. Monet quidem Galenus, si sanguis affluens non sit melancholicus, statim suppressendum esse. Verum monent hîc alij, sæpe accidere, ut, licet sanguis primò subtilis exeat; crassus tamen postea sequatur. Hinc vena in talo aperiatur. Aut si venam sæpius aperire non licet, vena in talo statim aperiatur; cuius apertionem in hoc morbo maxime utilem esse, experientia docet. Reuellit enim à capite promptius, & sanguinem crassiorem ad inferiora tendentem facile euacuat. Et si ex mœstium, & hæmorrhoidum suppressione malum hoc proveniat, consueta euacuatio reuocanda; non tamen statim id in principio morbi tentandum, sed prius plenitudo in toto demenda, ne medicamenta, quæ euacuationes illas prouocant, cum sint calida & sicca, malum augeant. Per venam tamen in talo, sectionem statim sanguinem ad consuetum euacuationis locum reuocare nihil prohibet; nisi forsan tanta copia sanguinis ex suppressione eius sit cumulata, ut consultius sit, primò in brachio venam aperire. Si æger etiam crurum venas amplas habeat, quæ varicibus similes sint, hirudines iis affigere utile est.

Sanguinis euacuatione peractâ, ad præparationem materiæ melancholicæ accedendum, quæ per dies nunquam pauciores, quàm quatuor, interdum etiam octo continuanda est. Dictum verò antea, ad humorem melancholicum requiri calefacientia, humectantia, & attenuantia,

*Præparatio.*

cennantia, qualia suprà, *part. 1. cap. 12.* sunt proposita, quæ vnâ operâ humorem melancholicum in cerebro, corde, & toto præparare, & alterare possunt.

Exempl. gr.

*℞. Syrup. de succ. borrag. bugloss. de epithym. an. Vnc. β. aq. scolopendr. borrag. an. Vnc. iβ. Misce pro vna dosi, & sic pro reliquis.*

Vel *℞. Rad. fœnicul. scorzonera, bugloss. an. Vnc. β. polypod. q. cori. amarisc. rad. cappar. an. Drach. iij. sem. anisi, fœnicul. an. Drach. iβ. citri Drach. ii. fol. capill. ♀. scolopendr. meliss. lupuli, thymi, an. M. i. flor. borrag. bugloss. violar. an. P. j. passular. exacinat. Vnc. i. glycyrrhiz. Vnc. β. Coqu. in aq. f.*

Colat. *℞. Vnc. xvi. add. syrup. de epithymo, de pomis, de succ. borragin. byzant. simpl. an. Vnc. iβ. Milc. pro 4. vel 5. dosibus.*

Vel *℞. Rad. polypod. q. asparag. fœnicul. an. Vnc. i. belenij, bugloss. cori. amarisc. rad. cappar. fraxini, an. Vnc. β. herb. borrag. lupuli, melissa, thymi, epithym. capill. ♀. an. M. i. sem. fœnicul. cymy caryophyllor. ana Drach. ii. flor. borrag. bugloss. violar. genist. an. P. iij. Coqu. in sero lactis, & sub finem adde succ. pomor. dulc. melissa, fumaria, an. Vnc. iij.*

Postea colentur, & saccharo colatura dulcoretur: vel addatur syrup. de pomis, bugloss. de cortic. citri, an. q. f. & cinamom. condiatur.

*Electuaria.*

Non solum autem syruporum, vel potionum formâ præparantia exhiberi possunt, sed & formâ conseruatum, & electuariorum, qualia postea inter alterantia & roborantia proponuntur. Et vt facilius talia in corpus distribuuntur, aliquid syrupi, vel aq. conuenientis, aut iusculi gallinæ post sumptum tale medicamentum haurire utile est.

Exempl. gr.

*℞. Conseru. bugloss. borragin. fumar. rosar. an. Vnc. i. spec. diamarg. frigida. diamb. dianthos, pliris archontici an. Drach. i. cori. citri condit. Drach. vi. Cum syrup. de pomis F. Electuarium, cuius manè, & ante cœnam Vnc. β. exhibeatur aliquot diebus, cum syrupo, vel aq. conueniente, aut iusculo.*

Atque hæc humoris melancholici præparatio omnino necessaria est, & sæpe satis diu continuanda. Etsi enim humor hic putridus non sit, & propterea propriè non crudus, nec ob cruditatem coctionem hic moliri necessarium sit, vt in Institut. *lib. 5. part. 2. sect. 1. cap. 7.* dictum: tamen alia de causâ præparatio necessaria est. Etenim cum hic humor sit crassius, siccus, terrestris, & omnino contumax, ac, vt Platero placet, malignitatis quid obtrineat, non temerè ipsum purgantibus agitare decet. Aliàs enim, & nisi præparatus sit, purgantium, præsertim validiorum, vñu exacerbabitur, vt cancer medicamentis, quæ digerendi & abstergendi vim habent. Itaque prius mitior reddendus humectantibus & attenuantibus medicamentis.

*Nectar Vari. gnana.*

Varignana inter præparantia laudat. sequēs vinum, non solum in melancholiâ, sed & in aliis morbis melancholicis, atque eo solo quartanas se curasse scribit:

*℞. Epithym. follicul. sem. flor. borrag. an. Vnc. β. cinamom. Vnc. iij. cassia, spica, macis, cardamom. an. Vnc. β. zingiber. caryophyll. sem. anisi, an. Vnc. iij. F. Nectar. cum vino subtili, cuius dosi manè cyathus vnus. Quia tamen potus hic parum humectat, conuenire videtur in eâ tantum melancholiâ, quæ sine causâ calefaciente orta est.*

Imò non solum hisce præparantibus humorem melancholicum præparare necessarium est; sed vñle quoque dum præparantia ista vsurpantur, tertio, vel quarto quoque die clysterem emollientem, & humectantem, quique humores ad aluum blandè alliciat, iniicere. Humor enim melancholicus terrestris, piger, & pertinax est, vt, nisi egregiè humectetur, & attenuetur, medicamentis purgantibus non cedat.

Parentur autem tales clysteres ex parietar. malua, althæa, mercuriali, violaria, branca vrsina, chamamelo, melilot sem. anisi, lini, polypod. passulis, glycyrrhiz. cum melle rosar. & violar. cassia, electuar. diacatholic. & modico hieræ picræ, ol. violar.

Vt *℞. Rad. althæa, polypod. q. an. Vnc. β. parietar. mercurial. malua, violar. an. M. i. flor. chamamel. M. β. sem. lini Vnc. β. passul. maioran. exacinat. Vnc. ii. Coqu. in aq. f.*

Colat. *℞. lb. i. cassia, electuar. diacathol. an. Vnc. β. ol. violar. Vnc. ii. chamamel. Vnc. i. vitell. ouor. num. i. F. Clyster.*

Præparantibus talibus præmissis ad purgationem accedendum; quæ melanagogis instituitur, qualia sunt; *sena, epithym. polypod. radix gualapa.* quibus *syrup. violar. solut. & manna* addi possunt, *helleborus niger, lap. Lazuli, & Armenus, electuar. diacathol. diasena, confectio Hamech, pilula de fumar. &c.*

De confectioe Hamech tamen hoc loco notandum, eam à Medicis nonnullis improbari. De ea enim Solenander, *sect. 5. consil. 22.* scribit: *Hamech, inquit, in sua confectioe mirificam sarraginem contulit, & non decoquenda decoxit, longèque dissimilia simul confudit, tandemque confecit horrendam confectioem sine vlla Medicorum arie, quæ nulli grata esse potest. Nihil dico de acribus, scammonio, & colocynthide, medicamentis admistis.* Idem ferè sentit Rondelerius, in *Pharmacop. officina*, vbi eandem saltem ad ichores prauos humorum vñlem esse docet. Eandem confectioem improbat Fernellius, vt & Steeghius, *Medicina pract. lib. 1. cap. 14.* Et reuerà non videtur satis commoda confectio, præcipuè ob myrobalanorum, quæ constringunt, copiam. Etsi enim Arabes iis frequenter vñ fuerint, recentes tamen habuerunt, quibus nos destituimur. Et commodius omnino, si cui eâ vñ libeat, ad ichores prauos, & hinc orram scabiem, & similes cutaneos affectus, quàm melancholiam vsurpatur.

Verum de purgatione hñc rectè instituenda Autores non contentire videntur. Aliqui enim fortiora purgantia planè reformidant: scribitque Crato, *Consil. 174.* se multos melancholicos curasse, licet verè affirmare possit, se nunquam lapide Lazuli, vel scammonio vñ fuisse. Ideoque ex Meisue sententia censeat, istum gradum esse sapientia, ne ad medicinas fortes deueniamus, nisi vbi debiles non contulerint. Et cum eo faciunt alij quidam, qui experientiâ rectè adfirmant, fortioribus medicamentis humorem melancholicum deteriore, & ferociorem reddi. Contra Antiquos in curanda melancholia helleboro, & fortissimis medicamentis purgantibus vñs esse constat; quos & Recentiores quidam imitantur: neque id sine causâ facere videntur, cum humor pertinax sæpe mitioribus remediis non cedat, sed fortiora requirat. Ne ergo in curando hoc mortuo Medicus vel timiditatis, vel temerariæ audaciæ crimen incurat, rem hanc diligentius perpendat. Distinctione verò hoc negotium expediri potest. Primò inter initia non fortiora, sed leniora medicamenta vsurpentur: postea verò, vbi humor iam satis præparatus est, ad fortiora progrediendum. Deinde origo humoris melancholici consideranda. Nam si ex abundantia sanguinis, hepatis, vel alterius membri calore, aut externa causâ calefaciente humor melancholicus ortum habeat, à fortioribus, & vehementioribus purgantibus abstinendum; cum medicamenta talia loca se causæ melancholiam generanti præbeant, humoremque melancholicum, qui in se seminarium ignis continet, vt antea ex Cratone dictum, ferociorem reddant. Tunc ergo mitiora medicamenta, quibus Crato se melancholicos curasse refert, vsurpanda: modò sint electiuè purgantia, & eâ quantitate exhibeantur, vt humorem melancholicum non solum agitent, sed etiam educant. Aliàs enim damnum, quod ex humorum agitatione accidit, maius est, quàm commodum ex leni, & insufficienti purgatione. Atque

infer



inter ista medicamenta purgantia præcipua sunt, fol. senæ, myrobalani Indæ, polypod. q. epithym. quibus tamen aliquid hellebori nigri rite correcti addi potest. Neque is tam vehemens medicamentum est, ut albus, præsertim is, qui ex albis, & vicinis regionibus in nostras deferatur, qui tam vehemens non est, ut qui in talidis regionibus crescit; in primis si mitioribus misceatur, & aliis medicamentis temperetur: ut in syrupo de pomis solutiuo videre est.

Si autem terrestris, & crassus sit humor, sine sanguinis, vel aliorum humorum effervescentiâ, fortiora purgantia adhibenda, ut hellebor. niger, imò etiam albus, quem in melancholicis sine ullo incommodo, imò cum ægri utilitate se exhibuisse scribit Marthiolus, in *Dioscorid. lib. 4. cap. 146.* Et mitior redditur, si aliquoties radices mundatæ cum aceto forti coquantur, rursumque exiccantur; & quò crebrior earum cum recenti aceto affuso fuerit decoctio, eò mitior futura est per superiora euacuatio; ita, ut dosis tandem earum esse possit Dra. i. in cereuisia calente cum tantillo butyri. Minore tamen quantitate exhibeantur talia fortiora, & sæpius repetantur; cum quantitas minor vehementiam medicamenti minuere, & nihilominus sæpius repetitum humorem etiam pertinacem frangere possit. Si tamen iam corpus valde exsiccatum sit, & contabuerit, ac humor potius siccitate, quàm copiâ peccet, virēsque iam symptomatum vehementiâ debilitatæ, & collapsæ sint, tum fortiora medicamenta locum non habent, sed mitioribus, & quæ corpus humectant, utendum, in maiore tamen copia.

Regula circa  
purgationem  
obseruanda.

Mesues de purgatione hîc instituenda quatuor Regulas tradit:

Prima est, ut non semel, & confertim, adeoque cum labore, & molestia corpus euacuetur: sed moderatè, & per intervalla, ut natura purgans medicamentum regere possit, non verò à medicamento violento prosternatur.

Secunda, ut medicamenta purgantia non multum recedant à gradu medicamentorum lenium, quæ Benedicta appellari solent, cum in qualitatibus manifestis, tum in occultis.

Tertia, ut purgantia semper misceantur cum aliquibus humectantibus. Quæ de causâ in hoc affectu medicamenta purgantia commodius in forma liquida, quàm sicca exhibentur; cum liquida plus humectent, & iis plus humectantium misceri possit.

Quarta, ut purgantibus semper admisceantur medicamenta, quæ spiritus, ac partes principes roborant.

Quibus consideratis non erit difficile, conuenientia cuique ægro medicamenta in hoc morbo præscribere. Vbi ergo mitioribus purgantibus opus est, talis potio præparari potest:

℞. Fol. sen. el. Drach. vi. epithym. Vnc. β. zingiber. sem. fenicul. an. Scr. ii. glycyrrh. 3. i. flor. borrag. bugloss. violar. an. P. i. passul. Vnc. β.

Coqu. vel infundantur in iure pulli, vel prunorum Damalc pro Vnc. iv.

Colaturæ adde syr. rosar. vel violar. solut. Vnc. i. vel mann. Drac. vi. F. Haustus.

Vel ℞. Succ. borrag. bugloss. depurator. an. lb. i. pomor. odorator. lb. iii. fol. sen. Vnc. iii. sem. anis. fenicul. corr. citri. an. Drach. ii. Simul infundantur per diem vnum, & post lenem ebullitionem addatur sacchar. lb. i. Fiat secundum artem Syrupus.

Vbi fortioribus medicamentis opus, admiscetur confectio Hamech, aut vsurpantur pilulæ de lapide Lazuli, vel ipse lapis Lazuli, aut helleborus niger, præsertim in robustioribus.

Ut ℞. Electuar. diacatholic. Vnc. i. confect. Hamech 3. lb. vel Drach. ii.

Dissolu. in aq. borrag. meliss. scolopendr. an. suff. q. vel Vnc. iii. ut Vnc. v.

Colenturque & F. Haustus.

Vel vsurpetur syrup. de succ. pomor. cum fol. sen. & helleboro nigro.

℞. Succ. pomor. dulc. lb. i. borrag. meliss. an. lb. β. flor. cordial. an. P. ii. fol. senæ, epithym. cortic. hellebor. nigr. præparat. an. Vnc. β.

Coquantur secundum artem cum suffic. quantitate sacchar. F. Syrupus, in quo in nodulo suspendatur cinamom. caryophyll. croci, spec. aromati. rosar. diamosch. dulc. an. Scrup. β.

In cuius Vnc. iii. dissolu. mann. Vnc. i. & cum iuscu. capon. vel gallin. tribus horis ante prandium exhibeatur.

Vel ℞. Rad. bugloss. polypod. q. an. Vnc. β. fol. sen. Vnc. i. follicul. sen. hellebor. nigr. præparat. ana. Drach. vi. flor. bugloss. borragin. an. hos, fumar. an. P. ii. sem. anis. cortic. citri. zedoar. galang. cinamom. an. Drach. i. Coqu. in suffic. q. aquæ ad remanent. lb. i. β.

Colaturæ adde succ. pomor. dulcium lb. i. β. sacchari q. s. F. secundum artem Syrupus: Cuius dosis Vnc. ii. vel iii.

Utilia etiam sunt sequentia:

℞. Rad. polypod. q. Vnc. ii. gramin. scorzon. helenij. bugloss. glycyrr. an. Vnc. β. cortic. tamarisc. fraxin. an. Dra. iii. summitat. lupuli. meliss. thymi. an. M. i. sem. melon. ex-corticat. Vnc. β. anis. feniculi. an. Drach. ii. iniubar. sebest. an. num. x. passular. Vnc. i. β. hellebor. nigr. præparat. Dra. ii. sem. carthami. contus. Vnc. i. turbit. el. Dra. ii. Coqu. in aq. pura.

In colat. infundantur fol. sen. el. Vnc. ii. epithym. Vnc. β. rhabarb. el. Dra. iii. flor. cordial. M. β. cinamom. Dra. i. spica Scrup. i. cortic. citri Dra. ii.

Colat. ℞. lb. ii. succ. pomor. dulc. lb. β. sacchar. q. s. Coqu. ad syrup. liquidior. consistentiam, qui per dies 5. & plures exhibeatur. Huc pertinet, & ab huius syrupi descriptione non multum differt, (nisi quod rhabarbarum additur) syrup. rosatus laxatiuus compositus, seu helleboratus Montani, in dispens. Augustano descriptus.

Vel ℞. Myrobal. omnium, an. Vnc. β.

Contundantur crasso modo, & manibus cum oleo amygdal. dulc. madidis fricentur.

Hinc infundantur in suffic. quant. aq. borrag. & fumar.

Postea ℞. Polypod. q. Drach. i. epithym. thymi. glycyrr. an. Vnc. β. fol. sen. Vnc. i. β. cortic. radic. hellebor. nigr. 3. iii. sem. citri. fenicul. anis. an. Dra. ii. Bulliant omnia ad consumptionem medietatis. Postea colentur, & additæ sacchar. s. q. F. Syrupus; cuius dosis Vnc. iii. vel iiii. cum syr. rosar. solut. vel violar. sol. Vnc. β.

Utilis etiam est Helleborismus Matthiol. ab eo lib. 3. *Epistolar. in Epistola ad Georgium Hantschium* descriptus.

℞. Cortic. hellebor. nigr. Vnc. ii. sem. anis. feniculi, an. Dra. β. citri. cinamom. an. Dra. i. spica. Scr. i.

Infundantur in succi rosar. lb. iiii. Omnia bulliant ad consumptionem tertiæ partis, & cum sacchari lb. i. β. vel lb. ii. F. secundum artem Syrupus; cuius Vnc. iii. vel solius, vel cum aliis medicamentis exhibendæ.

Utile quoque est Oxytel helleboratum. Iuliani à Gesnero commendatum.

Habetur quoque in Euonymi Thesauro succus hellebor. nigr. qui paratur ex radicibus hellebori nigri, si coquantur in aqua simplici, & inter coquendum despumantur diligenter, & effusâ aquâ primâ noua aqua affundatur, atque ita coctio aliquoties repetatur, donec nihil amaritudinis in radicibus amplius percipiatur; tandem omnis illa aqua per filterum coletur, & lentissimo igne ad spissitudinem mellis coquatur, & sub finem aliquid mastiches, exempl. gr. ad rad. lb. i. mastich. Drach. ii. vel iii. addantur. Cuius exhibeatur Scrup. i. vel Drach. β.

Verum conuenientius esset, si aquæ simplicis loco ad coctio

Hellebori-  
smus Mat-  
thioli.

Succus helle-  
bori nigri  
Euonymi.

coctionem vsurparetur decoctum fœnicul. anisi, puleg. Commodius adhuc, si succo isti primo per coctionem extracto spiritus vini raturum, vt quatuor digitis emineat, superinfunderetur, & extractum pararetur.

Si adhuc artificiosius parare velis extractum, primo mensura separato digeri poterit primum extractum per aliquot dies cum nouo spiritu vini, qui macis vim prius imberit. Vel extracto guttæ aliquot ol. anisi, citr. meliss. addi poterunt. De quo exhibetur Scrup. i. estque Extractum hellebor. nigri in morbis melancholicis summè efficax, quod vel solum, vel cum aliis purgantibus, vt extract. panchymagogo, vel catholico aliquo, vel pilulis, pro constitutione humoris, & corporis ægri, misceri poterit.

Habet & Penotus, de medicamentor. chymicor. preparat. Extracti hellebor. nigri. descriptionem, quam ex verustissimo codice se transcripsisse dicit, estque talis.

℞. Hellebor. nigri rad. cum fol. M. iiii. Conquassatis adde vinum moschatellin. & in balneo bulliant per diem & noctem. Colatura fortiter expressa filtratur, & fundatur supra recentium itidem conquassat. radic. hellebor. nigri M. i. rosar. rubrar. M. v. (forlan M. B.) caryophyllor. prius contus. Drach. vi. addendo spiritus vini partes octo. Digerantur per dies tres, postea colentur, & filtrantur, ac destillantur ad crassitiem mellis, hinc feces comburantur, & phlegmate seu aqua ab extracto separata sal extrahatur. Huius salis

℞. Vnc. B. croc. Drach. i. ambr. gryf. Drac. ii. vel q. l. M. omnia.

Dosis est Scrup. i. cum aqua asseruat, Drach. iiii. Extracto huic miras vires in sanguine mundificando, & senectutem retardando tribuit Penotus. Qui de eo videatur, pag. 186. de preparat. medicament. Chymicorum.

Valescus de Taranta, lib. i. cap. 13. & alij valde laudant hic puluerem Haly, quem ipse his verbis commendat: Posito, inquit, quod alia medicina non valeant, ista valet nutu Dei Misericordis, & est medicina coronata quæ secretissime teneatur, vt humanus intellectus q. deperditus hoc medicamento instauretur. Paratur autem hoc modo:

℞. Epithym. Vnc. B. lapid. Lazul. agaric. an. Drach. ii. scammon. Drach. i. caryophyll. num. xxx. F. Puluis, qui semel in septimana datur à Scrup. ii. ad Scrup. iiii. in aqua vel syrupo aliquo conueniente. Vix tamen & iste puluis, nisi corpus antea bene humectatum sit, satis commodus est; cum valde siccandi vim habeat.

Pilulæ sequentes etiam viles sunt in humore melancholico euacuando:

℞. Fol. sen. elect. Vnc. B. polypod. q. epithym. Ceric. an. Drach. ii. aloes extract. Drach. vi. extract. scammon. Drach. ii. hellebor. nigri. Drach. B. succ. glycyrrh. extract. helen. zedair. an. Scrup. i. massich. macis sem. aquileg. an. Drac. B. Cum syrup. borrag. & pomor. f. q. redigantur in massam pro Pilulis formandis.

Verum cum humor melancholicus pertinax, & fixus sit, sæpius iteranda est huius preparatio, & euacuatio, ac continuâ medicatione plurimos melancholicos curatos fuisse, experientia docet. Imprimis verò perpetuâ humectatione indigent melancholici, ideoque humida alterantium loco vsurpanda, & purgantibus admiscenda; vnde etiam medicamenta in liquida forma vtiliora sunt, quàm sicca; & frequentius euacuandum per leniora, quàm per fortiora. Inter leniora valde vtilis est syrupus multiplicis infusionis violarum cum fol. sen. ita paratus, vt nouem vicibus in aqua communi, vel borraginis, vel scorzonæ violæ infundantur, & postea vltimæ infusionis lb. viii. addantur fol. sen. Vnc. vi.

Commendatur ad melancholiam, vt & maniam curandam in robustis etiam J. & multis hoc medicamentum profuisse, è Galeni quoque schola Medici testan-

tur. Excipit tamen melancholiam hypochondriacam Mercatus, neque etiam iis exhiberi vult, qui us sanguis superassatur, vel caliditas in toto, aut viscere aliquo viget. Contrà tamen Matthiolus, in Dioscorid. lib. 5. cap. 59. in vniuersum aduersus morbos omnes prouenientes ab humore melancholico, ac præterim iis vtile esse scribit, qui hypochondria habent inflata & ventosa. Verum humor, & viæ prius benè præparandæ essent, ne humor frustra ageretur. Et cum J. humorem melancholicum à proprietate non trahat, helleborus verò niger in humore melancholico peculiari vi euacuando multiplici experientia comprobatus sit, malum hunc præferre.

Dum hæc ita fiunt, vel maxima ex parte peracta sunt, danda etiam opera est, vt corpus externis medicamentis humectetur, & si vna pars, verbi gratia, hepar, intemperata sit, humorique melancholico generando causam præbeat, eius intemperies corrigatur, partes principes roborentur, & spiritus foueantur. Atque hæc iis in primis diebus, quibus purgantia non exhibentur, vsurpentur, & post purgationem continentur.

Et si malum aliis remediis non cedat, tria esse remedia vtilissima, serum lactis cum succo cichorii & fumariae, potum thermarum, quæ mineram ferri habent, & balneum aq. dulcis, supra part. i. cap. 14. dictum. Et omnino ad corpus humectandum vtilissimum est aquæ dulcis balneum, quod corpus humectat, & suavi humore & calore temperat, ipsumque humorem melancholicum benigniorem reddit, & sudorem leniter & moderatè mouendo (Nam liberalior sudor exsiccando nocet) eius aliquid discutit. Vtile etiam fuerit in aq. balnei humectantia & moderatè calefacientia coquere, vt maluam, althæam, violar. borrag. bugloss. sem. hordilini, flor. chamamel. melilot. parietar. branc. vrsin. capitæ veruecis. Affundere quoque licet libras aliquot lactis recentis. Aqua autem balnei à tepore ad caliditatem declinet, nostròque calori respondeat. Lauet verò æger horis tribus vel quatuor ante cibum. Quidam totum corpus leniter fricando inungunt ol. chamamel. anethin. Aërius ol. communi vtitur, addito nitro.

Dum lauat æger, caput irrigetur decocto plantarum Embrochæ, modò dictarum, siue ex alto per stillicidium demisso, siue spongiis capiti applicatis.

Vt ℞. Fol. malu. althæa. flor. chamamel. an. M. i. borrag. bugloss. violar. an. M. B. stechad. Arabic. P. i. Coquantur pro Embrochæ.

A lotion caput inungatur ol. violar. anethino, amygdal. dulc. quibus parum ol. nuc. mosch. aut macis admisceatur. Spinam dorsum in balneo, aut post exitum in è balneo inungere vtile est ol. lilior. albor. violar. amygdal. dulc. pinguedine gallinæ.

Ad reliquias humoris melancholici insensibiliter discutitendas Antiqui magnis antidotis vtebantur. Sic Galenus theriacam in quarrana exhibet, humore satis præparato, & corpore euacuato: & Aërius theriacam dare iubet quibusdam interuallis, præsertim hyeme, & incipiente vere.

Ad viscera roboranda Absinthij decocto quidam vtuntur, quod Aërius ita prædicat, vt eius solius vlu quosdam ab hoc morbo curatos fuisse asserit. Ventriculum enim, & hepar roborat.

Inprimis verò cerebri & cordis, vt in omni, ita & in hac melancholia, habenda est ratio. & ea roboranda aquis, syr. conferu. borrag. bugloss. meliss. violar. nymph. rosar. & similibus.

Magna vis & efficacia cor roborandi, & exhilarandi, ac resistendi timori & mœrori sine causa est in confectio Alkermes, modò rectè præparata sit, qualis hodie in monte Pessulano præparata ad nos affertur: & lapis Lazuli, quem nonnulli in hac confectioe omittendum censent, non solum vim purgandi, teste Auicenna, in libro de viribus cordis, sed

Extractum  
hellebori nigri.

Aliud Penotus.

Balnea, & lotiones.

Embrochæ.

Inunctiones.

Antidotes.

Absinthij decoctum.

Cerebrum & cor roboranda.

Confectio Alkermes.

Antimonium  
an locum hic  
habeat.

sed & segregandi à sanguine vapores melancholicos habet.

### Electuaria:

℞. Conseru. flor. borrag. violar. meliss. nymph. rosar. an. Vnc. i. cortic. citr. conditor. Vnc. β. spec. latificantis Rhasis diamb. diamargar. frigid. an. Scrup. ii. corall. rubr. prepar. margarit. prepar. an. Scrup. i. confect. Alkermes Drach. i. Cum syrup. tunic. & de pomis, an. q. l. F. Electuarium.

Vel ℞. Succ. pomor. Borsdorffianor. vel alior. odorat. lb. ii. borrag. bugloss. flor. tunic. an. lb. iβ. sacchar. albiss. lb. ii. Coqu. secundum artem. Sub finem adde vini odorati ℥. v. spec. latificant. Rhasis ℥. i. gallia moschat. Scr. β. confect. alkermes ℥. i. F. Conditum, de quo manè singulis diebus sumatur Vnc. β.

Vel ℞. Conseru. fl. borrag. tunic. violar. meliss. rosar. incarnatar. an. Vnc. β. spec. latitia Gal. Scrup. iiii. diamb. dianthos, diamargarit. frigid. ana. Scrup. ii. corall. rubr. prepar. margarit. preparat. an. Scr. i. Cum syrup. de pomis F. Electuarium.

Vel ℞. Conseru. fl. borrag. bugloss. rosar. violar. tunic. rosismar. maioran. an. Vnc. i. lap. bezoar. orient. Scrup. i. spec. conf. diamb. diamarg. frig. diamb. diamosch. dulc. an. ℥. i. Cum syr. de succo borrag. q. l. F. Mixtura, addendo ol. cinamom. gutt. iiii.

Vel ex speciebus cum saccharo in aq. rosarum & cinamom. dissoluto F. Confectio in Tabulis.

Commendantur & hæ aquæ contra Melancholiam:

℞. Pomor. citri num. vi. vini maluat. mens. ii. aq. rosar. mens. iβ. spec. diamarg. fr. de gemm. fr. cordial. temper. latif. Gal. diaphir. arch. diamosch. dulc. an. ℥. vi.

Destillantur lento igne. Ligentur in petia mosch. ambræ, an. Scr. β.

Verum de talibus notandum, frustra margaritas, corallia, & lapides pretiosos in destillando admisceri; cum in alembicum non ascendant.

℞. Conseru. borraginis, bugloss. an. Vnc. iβ. margarit. preparat. Drach. β. hyacinthi, sapphiri, sinaragdi, corallior. lapidis bezoar, an. Scrup. β. radic. condit. scorzonera Vnc. β. cinamom. macis, galanga, ana. Scrup. i. caryophyll. ligni aloes, an. Scrup. β. ol. citri gutt. iiii. spir. rosar. Dra. i. sacchar. opt. in aq. rosar. dissolu. q. l. F. Electuarium.

### Morsuli:

℞. Spec. electuar. de gemm. diamb. diamosch. dulc. latific. Rhasis, an. Dra. i. sacchar. in aq. cinam. Vnc. β. rosar. suff. q. dissolut. Vnc. iiii. F. Rotulæ, vel Morsuli.

Externa  
dialia.

Et quia, ut dictum, in omni melancholia cordis maxima habenda est ratio, non solum interna ad id roborandum vsurpentur; sed & externa medicamenta cordi applicentur.

### Epithema:

℞. Succ. borrag. bugloss. an. Vnc. iβ. aq. rosar. Vnc. iiii. meliss. Vnc. ii. spec. cordial. temperat. latificant. Rhasis, cortic. citri, an. Dra. β. vini odorati Vnc. i. spir. rosar. Scrup. β. F. Epithema cordis.

### Sacculus:

℞. Meliss. flor. rosar. rubr. an. M. β. bugloss. violar. an. P. i. cortic. citr. caryophyll. macis, santal. citrin. ligni aloes, cinamom. an. Drach. β. gallia moschat. Scrup. β. zedaira sem. ocymi, an. Dra. β. granor. Kermes Dra. i. ambr. gr. iiii. Cum sindon. rubr. F. Sacculus pro corde.

### Vnguentum:

Vel inungatur cordis regio oleo destillato citri, aut solo, aut cum vnguento roiaceo odorato, vel alio cordiali misto.

Inprimis danda opera, ut somnus concilletur statim ab initio; quod sit frictionibus extremorum sub somni tempus, epithematis, linimentis, odoramentis, & aliis supra, cap. i. propositis.

### Dieta.

Dieta sit talis, qualis supra de melancholia in genere proposita est, in omnibus ad calidum & humidum vergens. Aer igitur in hisce qualitatibus sit temperatus, & propterea purus, odoribus suauibus refertus, non foetidus, non tenebrosus, nisi quantum somni ratio exigit.

Cibi sint εὐχρηστοί & εὐπύματοι, ac mediocriter humidi, flatulique expertes; ut caro pullorum, gallinarum, hædina, vitulina, veruecina, oua recentia, pisces saxatiles, passulæ, amygdalæ: condiantur flor. borrag. bugloss. roremarino. Conueniunt quoque poma & pyra dulcia, & odorata cocta. Abstineat æger à leguminibus, casco antiquo, & omnibus omnino cibis, qui succum crassum, atque excrementitium generant. Vinum conceditur album, tenue, oligophorum. Et cum morbus sit diuturnus, talis victus ratio instituat, quæ corporis vires, si non augeantur, tamen conseruentur, non verò debilitentur, vel imminuantur, in melancholicis præsertim, qui cibo pertinacius abstinent, aut parcè admodum hunc sumunt. Somnus omni studio concilietur, & prorogetur. Delectatio quærenda est ex Musicâ, aliisque, quibus maximè delectari sanus consuevit, leniterq; obiurganda inanis tristitia, aut, si nihil proficiatur, æger acriter increpetur & obiurgetur, ac diligenter ab assistantibus obseruetur & custodiat.

Aer.

Cibus & po-

Somnus.  
Animi pa-  
themat.

## CAPVT XII.

### De Melancholiâ Hypochondriacâ.

Secunda Melancholiæ per consensum differentia, eâque satis frequens, est, quæ Hypochondriaca appellatur, quod ex hypochondriis ortum habeat, & ex causâ in hypochondriis genitâ exciteretur. Hypochondriorum autem nomine veniunt non solum sita in his vtrinque Hepar & Lien, sed & Ventriculus, potissimum eius fundum, & Mesenterium cum suis venis, itemque Pancreas, & Omentum, ut postea dicitur.

Melancholia  
hypochon-  
driaca unde  
dicitur.

Notandum tamen hîc, affectionem, aut passionem hypochondriacam latius patere, quam melancholiam hypochondriacam. Non solum enim melancholia, sed & alia mala plurima ex materia vitiosa in hisce locis cumulatâ oriri possunt: neque semper cum affectu hypochondriaco melancholia coniungitur, sed tum demum, cum cerebro vapores peculiari modo dispositi ex materia illa exhalantes communicantur, spiritibusque animalibus miscentur. Ideoque hîc non omnia, quæ de affectu hypochondriaco dici possunt, proponemus, sed ea tantum, quæ ad Melancholiam hypochondriacam explicandam, & curandam necessaria videntur, reliqua infra, lib. 3. part. 5. sect. 1. ubi in genere de affectione hypochondriaca dicitur, explicabuntur.

Affectio hy-  
pochondriaca  
latius patet,  
quàm Me-  
lancholia  
hypochon-  
driaca.

Arabibus Melancholia Mirachia, vel Mirachialis eadem de causâ appellatur, quod scilicet causâ eius in Mirach, id est, ventre inferiore, seu abdomine contineatur; Græcis πυρδνε, & vulgè etiam Flatulenta melancholia nuncupatur, quod qui eâ laborant, in ventriculo & intestinis flatibus abundant, qui & rugitibus sese produnt. Chymici affectionem hypochondriacam Tartarum hypochondriorum appellant.







carus, præcipuè generationis & cumulationis humoris melancholici in hypochondriis causæ sunt errores in victu diu continuati, & ventriculi, ac hepatis, & lienis *ἀνισορρογία*.

Primò enim, cum coctionis primæ errata in secunda corrigi non possint, à pluribus verò in diætâ plurimum delinquatur, & hinc in prima coctione multi errores committantur; plurimos etiam errores & vitia in secundâ coctione consequi necesse est. Ad humoris verò melancholici generationem faciunt ea, quæ crassum & feculentum succum generant. Si enim plus huius sit in chylo, quàm debebat, omne hoc excrementum à liene attrahi, elaborari, segregari, atque euacuari nequit, sed eius maxima pars à natura valida & robusta plerumque in pancreas, mesenterium, & omentum, atque ferè per eos venæ portæ ramos, qui non in ipsa intestina, sed in mesenterium, & pancreas defluunt, & obliterantur, deponitur, vt hac de re rectè Fernelius, *de part. morb. & sympt. lib. 3. cap. 7.* differit.

Ventriculi debilitas. Facilius verò id accidit, si ventriculus sit debilis. Cum enim cibi eiusmodi crassi & feculenti etiam in eo, qui ventriculum satis fortem habet, nihilominus similem chylum suppeditent; multò magis hoc accidit, si ventriculus sit debilis. Ideòque inter remotiores causas omnia locum habent, quæ ventriculum debilitare valent; de quibus *lib. 3. de imbecillitate ventriculi*, dicitur.

Ventriculi ac Hepatis & Lienis ἀνισορρογία. Et adhuc promptius id fiet, si aliqua adsit lienis, ventriculi, & hepatis *ἀνισορρογία*. Tum enim ventriculus debilis cibos non rectè coquit, & cruditaris causa est. Lien verò & Hepar, si calidiora sint, avidius illum ad se, & sæpe adhuc crudum, trahunt, & quidem tenuem, & aquosam chyli partem maturius, crassam tardius; illamque in vapores tenues: nunquam & subtiliores, ac acres resoluunt, atque vel in caput, vel in totum corpus distribuunt; vnde catarrhi, dolores vagi, vel sudores excitantur; hæc vehiculo destituta in venis mesaraicis subsistit, obstructions in iis parit, ampliùsque exiccatur, & incrassatur, vel etiam adurit, & obstructions in venis mesaraicis parit, ac humori melancholico materiam præbet, atque ita humorum crassorum, & feculentorum copia in hypochondriis cumulat, atque hinc cum melancholia, tum plurima alia hypochondriaca mala oriuntur, quæ ibidem Fernelius recenset, & prolixius infra, *lib. 3. part. 5. sect. 1.* enumerabuntur.

Cibi & potus acutosi. Imò hæc, si affectum hunc producere debet, necessario circa lienem hæret, & si id tantum fiat, mitior est melancholia. Accidere tamen potest, vt in vtroque hypochondrio illa cumuletur, & tum grauior affectio est, & non solum melancholia, sed & alia symptomata adsunt, ob materiam mistam, quæ partim calida, sicca, acris & amara est, ob igneam, quæ in hepate & venis circa hepar est, dispositionem, & sensum æstus in dextro hypochondrio exhibet; partim frigida, sicca, acida, quæ in liene, & circa eum hæret, & colligitur; de quibus *loc. allegat.* dicitur. Suppeditant autem tali humori materiam cibi crassi, difficilis coctionis, visceri, flatulenti, caro bubula, suilla, aprugna, ceruina, pisces maritimi, & in aquis stagnantibus degentes, carnes & pisces sale ac fumo indurati, aues in aquis degentes, legumina, brassica, oua indurata; vina non defecata, austera in primis, quæ in lapide calcario, vel alio solo, quod materiam mineralem, vel tartaream continet, crescunt; cereuisia ex aquis impuris cocta, præcipuè si sit turbida, & non defecata.

Aeris vitiosa constitutio. Facit ad hoc malum generandum etiam aer crassus, foetidus, nebulosus, qui inspiratione attractus (spiritus animales, & vitales inquinat; item autumnalis, modò calidus, modò frigidus.

Quies & nimium otium. Quies & otium nimium huius mali generationem quoque promouent, dum ob ea multa excrementa in

Dan. Sennerti Tom. II.

corpore retinentur, calorque non excitatur, & ventilatur; vnde obstructions in corpore fiunt. Atque hæc, cum lucubrationibus & meditationibus, causa est, cur literari, & qui vitam sedentariam agunt, malo hypochondriaco frequentius sint obnoxij, minus verò ij, qui quotidianis laboribus exercentur.

Euacuatio- nes suppressæ. Alius suppressa etiam ad malum hoc generandum facit. Etenim si excrementa diutius in intestinis detineantur, venæ mesaraicæ ex iis pro bono, & recenti chylo crassam & feculentam materiam attrahunt, & qua multi feculenti humores generantur, atque obstructions in venis mesaraicis & liene excitant; vnde iis, qui ad affectionem hypochondriacam sunt dispositi, summè vtile est, aluum semper habere laxam. Multum quoque ad malum hoc inducendum faciunt suppressæ euacuationes, per quas natura vitiosos eiusmodi humores in primis viis collectos euacuare solebat, vtalui deiectiones, & vomitus quibusdam certis temporibus consueti: ac quæ maxima huius mali causa est, hæmorrhoides, quæ aliquando fluxerunt, suppressæ.

Immoderata animi affectio. Inprimis verò mali huius causa est metus & tristitia, & animi nimia intentio; idque maximè in iis, qui à naturâ corporis constitut onem melancholicam adepti, taciturni, cogitabundi & tristes sunt. Atque hinc etiam accidit, vt infantes, & iuuenes, qui à curis & mœstitia alieni sunt, in hoc malum non incidunt, sed adulti, post annum trigésimum plerumque. Tum enim temperamentum corporis non solum fit siccus, & errores in victu commissi in adolescentia sese produnt, sed & curis, meditationibus, atque animi intentione homines tum magis occupari incipiunt.

### Signa Diagnostica.

Signa Melancholiae hypochondriacæ diagnostica. Melancholiæ Hypochondriacæ signa sunt, delirium absque febre, cum mœrore & timore; idque non continuum, sed notatu digna interualla habens. Sunt enim melancholiæ hypochondriacæ laborantes nonnunquam satis hilares; mox tamen sine causa in mœstitiam recidunt. Cum enim vapor Melancholicus ater & tenebrosus, huius mali causa proxima, in cerebrum eleuatur, spiritibusque animalibus permiscetur, eosque inquinat, delirium inde excitatur, ægèrque multa falsa imaginatur, metuit non metuenda, sine causa mœret, & variis modis animum macerat: duratque hoc delirium tam diu, quàm diu vapores illi spiritibus permiscantur: postquam verò vapores illi melancholici discussi sunt, delirium cessat, donec noui vapores ad caput eleuati spiritibus animalibus permiscantur, eosque turbant.

Et hæc quidem propria Melancholiæ signa sunt; quibus tamen interdum & alia coniunguntur. Nam quia vapor ille flatulentus melancholicus in cerebro permiscetur spiritibus animalibus, qui non solum imaginationi, sed & aliis sensibus inferuiunt, accidit, vt etiam circa alios sensus varia symptomata oboriantur; in auribus tintillus, strepitus; sonique varij, nunc campanarum sonitum, nunc aquarum strepitum referentes; oculi obscurè vident, vel etiam omnia circumagi videntur. In nervos etiam sese insinuans vapor varios dolores, & alia nervosi generis symptomata accersit. Idem vapor, dum seu per venas, seu per arterias sursum tendit, & cor transit, illud in eas angustias redigit, vt motu violento palpitare, & arteriarum celere, & velocem motum ad expellendum, & discutendum vaporem sibi molestum, instituere cogatur: quod dum fit, æger de summa cordis angustia conqueritur, de vita desperat, maximisque suspiriis opem & auxilium exposcit; plerumque etiam vrgent vigilæ, quæ à vaporibus illis siccis ortum habent, qui non solû spiritus perturbant, sed & cerebrum exiccant, ac somni proximam causam absumunt; aut, si dormiunt, somnus

Somnus ea de causa est perturbatus cum somniis metus & terroris plenis. Adhuc etiam alia affectionis hypochondriacæ signa, quæ Galenus, 3. de loc. aff. cap. 7. ex Diocle ita recenset: Sumpto cibo, maxime coctu difficili, sputum multum & humidum concitatur: item ructus acidissimus, flatus, æstus, in hypochondriis fluctuatio non ilico, sed cum retinuerint, interdum quoque ventriculi vehementes dolores, qui nonnullis ad dorium usque procedunt: concoctis deinde cibis quiescunt, mox aliis cibis ingestis eadem reuertuntur symptomata, quæ inter ieiunos, interdum etiam à cibo molestant, atque euomunt crudos cibos, & phlegmata in amara, & calida, & acida, adeo ut dentes stupore afficiantur. Et alia coniunguntur, quæ suo loco de affectione hypochondriacæ explicabuntur.

Hoc saltem hic addimus, non omnia symptomata in omnibus apparere, sed modò hæc, modò illa, pro partium lætarum, vel seorsim, vel simul ratione. Si enim venæ melaicæ saltem obstructæ sint, & in iis humor contineatur, mitior est affectio: grauior, si ipsa viscera simul afficiantur. Et quidem si utrumque viscus afficiatur, atque vtriusque venæ sint obstructæ, grauiora, & plurima apparent symptomata: si verò vnum saltem viscus obstruatur, mitiora & pauciora sunt.

Quia verò hoc malum non continuum est, sed per intervalla quædam inuadit, & paroxysmos suos habet; qua ratione illi oriantur; & quo modo inuadant agros, etiam explicare non inutile fuerit: præsertim cum ægri ipsi raro omnia recipere possint, quod improuiso hoc malo corripiuntur, & ratione ac mente perturbata omnia memoriâ comprehendere non valent. Primò quidem corripiuntur paroxysmo ægri sæpe etiam citra vllam euidentem, vel externam causam, vbi materia copiosius accumulata à natura mouetur, & vapores, ac flatus ab ea excitantur. Solèturque & hic morbus, ut alij, suas habere periodos. Facilius tamen hoc fit, si causa externa aliqua accedat, ut improuiso terror, mæror, ira, vltus ciborum flatulentorum, vini potentis crapula. Vbi verò malum agros apprehendit, in nonnullis quidem subito, & ex improuiso hoc accidit; interdum ex flatibus, & vaporibus ascendentibus ructus antecedunt; ventriculus distenditur, & orificium eius lacinatur, ac per gulam transiens vapor acidus linguæ nervos perueniens eam quasi constringit, ac rigidam, & ad sermonem immobilem reddit; interdum per cor transiens vapor anxietatem lipothymia non absurdilem, vel cordis palpitationem excitat, atque alius ascendens difficilem respirationem parit. Hinc cerebrum occupans delirium parit, atque, ut antea etiam dictum, caligo oculis offunditur; in auribus tinnitus excitatur, ac membranae cerebri tenduntur, & dolor in iis excitatur, ut ægri totam cerebri substantiam à cranio sibi euulsam iri metuant. Et dum porro vapor per spinam dorsii deorsum tendit, interdum in vtroque brachio frigus quoddam, aut stuporem potius, & motum formicantem inducit. Quæ cum, anxietatis & terroris omnia plena sunt, ægrique metuant, ne labantur & concidant, ideòque locum quieti quærant, interea mente quasi priuantur, vel delira loquuntur, & sudore frigido perfunduntur. Hinc calore illos vapores discutiente, rubore iterum suffundi incipiunt, anxietas minuitur, & mentis actiones sese iterum exerunt, ac tandem, paroxysmo superato, nihil ægri amplius sentiunt, præter metum alicuius grauioris morbi, epilepsia vel apoplexia, vel subitanea mortis; atque hinc tristitiam, & animi mærorem concipiunt.

#### Prognostica.

1. Malum hoc, ut omnes morbi melancholici, diuturnum, & difficile curatu est. Humor enim melancholicus natura sua pertinax est, nec facile medicamentis cedit, imò si minus cautè tractetur, ferocior reddi-

ditur. Præterea Indicationes inter se plerumque pugnant: ventriculus est debilis, frigidus, & calefacientia postulat; contra hepar in hoc affectu plerumque est calidius. Humor ipse quoque crassus, & siccus, & propterea humectantia postulat: cum eo tamen plerumque serosus humor coniungitur; unde ipso abundant hypochondriaci. Faciunt quoque non parum ad morbi huius diuturnitatem errores ægrorum dum & in victu sæpe delinquant, & diuturni morbi petrafi, vel vsum medicamentorum intermittunt, vel Medicos temerè mutant.

2. Facilius tamen curatur in principio, quàm si iam sit inueterata; & si durer hæc melancholia, tandem similis vaporis dispositio cerebro imprimatur, & ex affectu per consensum proprius excitatur.

3. Tantò malum est grauius, quantò humor magis adurit, & atræ bilis naturam accedit. Si enim humor ille, qui vaporem suppeditat, adurit, vel adustus illi admiscetur, melancholia in maniam tandem transit. Cuius rei signum est, cum, qui antea erant meticulosi & tristes, iam hilares quasi, animosi, audaces & iracundi fieri incipiunt; quod facilius accidit, si æger multo, & potenti vino pro potu utatur.

4. Si materia illa, & vapores inde excitati prauam & peculiarem corruptionem subeant, aut copiosius ad cerebrum ferantur, malum interdum in epilepsiam degenerat; interdum cerebro morbi diuturnitate valde debilitato, & cruditate aucta, in apoplexiam transit.

#### Indicationes.

Vapor ille, qui proxima, & continens huius delirii causa est, etsi spontè à natura discuti solet: tamen danda opera, ut id quàm citissime fiat. Ne verò malum recurret, vaporum ascensus prohibendus, sique, ne cerebro, & cordi molestiam afferant, aliò diuertendi. Et quod curationis caput, humor melancholicus, è quo vapor ille eleuatur, ex hypochondriis euacuandus. Quod rectè & ordine fiet, si viæ obstructæ aperiantur, & venæ melaicæ, quæ simul siccitate plerumque laborant, humectentur, humor ipse crassus attenuetur, & incidatur, & tandem per aluum & vrinas euacuetur, atque eius generatio prohibeatur; quod eueniet, si omnes causæ, à quibus is originem traxit, vel à quibus moueri, & augeri potest amoveantur, & vitentur. Tandem cerebrum & ventriculus roborandus, ut & aliæ partes principes.

#### Curatio.

##### Alui Lenitio.

Cum aluum in hoc morbo laxam habere semper vitale sit, & reliqua remedia, nisi primæ viæ euacuatae sint, parum prosint; ab alui lenitione, & primarum viarum euacuatione curatio inchoanda. Vbi maxime cauendum, ne purgantibus validioribus, & à partibus remotioribus trahentibus humores non solum in hypochondriis, sed & in aliis venis commoueantur; qui cum exitum non inueniant, nec ad euacuationem tum apti sint, hepatis & venarum obstructionem augent, aliæque incommoda secum trahunt, atque ita plus nocent, quàm prosunt. Inijciatur ergo talis Clyster:

℞. Rad. althææ, polypond. q. an. Drach. vi. malu, pariet. althææ, viol. mercurial. an. M. i. flor. chamamel. M. ℞. furfur. in petia ligat. M. i. prunor. num x. Coqu. in aqua pura.

Colatur. ℞. ℞. i. Eleæthar. lenit. vel diacatbol. Vnc. i. hiera simpl. Dra. ii. mell. rosat. colat. ol. violar. an. Vnc. i. chamamel. Vnc. i. vitell. oui num j. F. Clyster.

Sanguis.

Paroxysmi  
& sympto-  
matum.  
quoniam sit  
ratio.

Signa Me-  
lancholia hy-  
pochondriacæ  
prognostica.

*Sanguinis Euacuatio.*

Postea si sanguis abundet, & hepar sit calidius, vt sanguis euacuetur, corpusque ventiletur, & ad vsum medicamentorum aptius reddatur, vena aperienda.

*Sanguinis  
mij.*

Commodissimum autem foret, si ex venæ portæ ramis sanguis euacuari posset. Cum autem ii nullibi pateant, nisi in ano, vtilissimum esset, sanguinem per hæmorrhoides euacuare; hæmorrhoidumque fluxus ad melancholiam curandam multum potest, arque interdum hypochondriaca melancholia, quæ aliis remediis tolli non potuit, hoc vno sanata fuit. Verum nisi natura ipsa hunc tentet, ab arte sola earum fluxus vix sperari potest. Si tamen fluere consueverint hæmorrhoides, aut tumeant, hirudinum applicatione, vel aliis modis, vt aperiuntur, tentandum.

Cum etiam menstruorum fluxus naturalis sit, & natura per eum vitiosos humores, qui in corpore colliguntur, simul euacuare soleat, cauendum, ne suppressatur, & si suppressus sit, reuocetur.

Venæ verò in brachio tum demum aperiendæ, vbi, vt diximus, sanguis abundat, aut ille iam à succo melancholico infectus est. Hinc sanguis ex venis crurum, poplitis, aut malleoli emittatur; cum sanguis prauus infra hepar maxima ex parte consistat, & humor melancholicus, tanquam fex sanguinis, aliquando inferiora petere soleat. Et fieri potest, vt hoc modo sanguis ad hæmorrhoides fluat, & illæ cum maximo ægri commodo aperiuntur.

*Vomitoria.*

Quia verò non raro ob ventriculi debilitatem crudi & pituitosi humores in ventriculo cumulantur; sæpe necessarium est, à vomitu initium curationis facere, ne à præparantibus, vel purgantibus excrementitij illi humores ad penitiores partes rapiantur, atque obstructions augeant.

Vt *℞. Succ. radic. raphani express. Vnc. iiii. hydro-mel. Vnc. iij.*

In quibus mistis macerentur per noctem *radic. asari comus.* Drach. ij. Manè colentur & exprimantur, liquorque tepide propinetur.

*Præparantia humorem melancholicum in hypochondriis.*

*Materia  
morifica  
præparatio.*

Hicce peractis jam ad materiæ præparationem accedendum, quæ attenuantibus, & aperientibus perficitur, sine insigni tamen calefactione, & exiccatione, propterea, quod plerumque ardor quidam, & siccitas melancolicarum addit, & inflammationi quid simile partes illæ, & inferiori orificio ventriculi vicinæ obtineant. Quæ in re non raro peccatur ab iis, qui ad flatum tantum, quibus hypochondriaci etiam abundant, habito respectu, valde calidis & siccis medicamentis in hac melancholiz specie vtuntur, quibus morbus potius exasperatur.

Contra nec nimis refrigerantia, & humectantia sine aliqua apertione conueniunt; tum in partibus illis sint obstructions, quas tollere semper conuenit. Vbi tamen plus aquosi admixtum est, calida non mittantur. Atque ita, prout varia est conditio humoris in hoc morbo, & aliud atque aliud membrum magis læsum est, ita curatio aliàs magis calida, aliàs minus calida postulat, aut etiam moderatè refrigerantia & humectantia, quæ omnia tamen sint aperientia & attenuantia. Si caliditas & æstus major percipitur in hypochondriis, horâ vnâ ante cibum feri lactis caprini ℥. ℥. vel ℥. j. commodè exhibetur, quod & calorem istum temperat, ac venas mesenterij refrigerat, & materiam, obstructionis causam eluit. Simplicia;

Radices; *Feniculi, asparag. eryngij, graminis, borragin.*  
Dan. Sennerti Tom. II.

*bugloss. cichorij, scorzonera, helenij, polypod. glycyrrhiz. centaurij major.* Crato enim inter aperientia, & obstructions tollentia in hoc morbo multum tribuitur. *rad. centaur. major.* quod vulgò Rhaponticum appellatur, si succus è recenti radice, exprimatur, & cum saccharo in formam syrupi redigatur, ac de eo singulis diebus manè sumantur cochlearia duo, vel tria: vel si radix centaurij maioris in vino horis 24. maceretur, & ante cœnam æger vini haustumumat, idque aliquot diebus continuet.

Cortices; *cappar. tamarisci, fraxini, citri.*

Folia & herbæ; *ceterach. scolopendr. chamadr. chamapit. capill. ♀. meliss. betonic. hyssopi, endiuia, cichorij, fumaria, cuscuta, cardui ben. absinthij, præcipue Pontici, cochlearia, veronica.*

Flores; *borrag. bugloss. violæ centaur. minor. sambuci. genist.*

Semina; *anisi, feniculi, endiu. ocym. aquileg. genist. quatuor frigid. major.*

Fructus; *prun. amygdal.*

*E quibus fiant Medicamenta vsualia:*

Aquæ; *borrag. bugloss. meliss. chamadr. capill. ♀. hyssop. fumar. cuscut. scolopendr. puli.*

Syrupi; *byzantin. de duab. radicib. de fumar. de scolopendr. de borrag. bugloss. endiu. de epithym. de lupul. de polypod. de pomis.*

Conseruæ; *borrag. bugloss. meliss. fumar. cichor. betonica, cochlear. runc.*

Conditæ; *cortic. citri. radic. helen. eryngij.*

Extracta; *veronic. meliss. card. benedict. absinthij, ceterach.*

Species; *electuar. latitia Galen. Rhas. de hyacinth. diarrhod. Abbas.*

Trochisci; *de capparib. de absinthio.*

Ex his varia pro vsu & constitutione ægri fieri possunt. De quibus hoc monendum, vt initio non ea vsurpentur, quæ fortius vrinam mouent, ne materiam vitiosam è primis viis ad hepar, & venam cauam deducant, malum augeant, aut morbum aliquem in renibus excitent.

Rejicit quidem alia de causa diuretica Hollerius, quod scilicet splen nullum habeat consensum cum renibus per viam communem: verum diuretica nec planè rejicienda sunt, sed corpore, & primis viis per purgantia euacuatis etiam locum habent, & sæpe nigra planè per vrinam euacuantur, cum ægri commodo: nec ratio Hollerij vera est. Sunt enim viæ è liene ad renes, quas monstrarunt Recentiores Anatomici, & eas recenset Laurentius, *quæst. 27.* & per arterias emulgentes satis commodè è liene ad renes materia euacuari potest.

*An diuretica  
in melancholia  
hypochondriaca  
conueniant.*

Valde etiam calida vitanda, aut, si vsurpentur, aliis temperanda, ne humorem adurant, peiorémque reddant, tetròsque vapores excitent, & grauius symptoma inducant.

*Potio:*

*℞. Rad. cichorij, borraginis, scorzonera, polypod. q. cortic. rad. cappar. an. Drach. ii. rad. asari Drach. i. fol. meliss. betonica, ceterach, fumaria, capill. ♀. chamadryos, an. M. B. centaurij minoris, absinthij Pontici, an. P. j. flor. cordial. P. ii. cortic. citri Drach. ii. sem. anisi, feniculi, ana Drach. i. fol. sena el. epithymi, an. Drach. iii. passul. minor. Vnc. i.*

*Potio.*

Infundantur omnia in aq. puræ ℥. iiii. Stent vase clauso, loco calido, & postea in B. ebulliant;

Colat. add. *succi borragin. rosar. fumaria, an. Vnc. iiii. sacch. ℥. j.*

F. Potio clara, Dosis Vnc. iiii. vel Vnc. v.

## Syrupi.

*℞. Succ. buglossi, borragin. pomor. suaucolentium, ana ℥i. melisse ℥b. ℞. Infunde in eo granor. kermes Vnc. i. troci Drach. i. Colentur, & cum sacch. s. q. F. Syrupus.*

*Vel ℞. Rad. asparag. fœnicul. polypod. q. helenij, scorzon. cichor. an. Vnc. sem. cortic. rad. cappar. tamarisc. fraxin. an. Dra. iii. citri, aurantior. an. Drach. ii. fol. ceterach. ling. ceruin. endiu. hortens. hepatic. nobil. chamedr. card. benedict. capillorum q. is, an. M. sem. epithymi Vnc. sem. sem. aquileg. Drach. i. sem. anisi, fœnicul. an. Drach. i. quatuor frigid. majoran. ana Drach. ii. glycyrrh. rasa Vnc. sem. passular. exacinat. Vnc. i. sem. Coqu. in aqua pura. Colaturæ ℞. ℥b. iii. succ. pomor. dulcacidor. odorator. ℥b. i. borrag. fumar. an. ℥b. sem. sacchar. q. s. F. Syrupus.*

*Cujus Vnc. ii. vel iii. sumat æger manè, & superbibat haustum aquæ borraginis.*

*Vel ex iisdem simplicibus fiat Decoctum, & clarificatio idonei syrupi addantur.*

Decocta.

## Claretum.

Claretis.

*Si æger decocta & syrupos respuat, aut ex syrupis aliquid incommodi metuat, cum dulcia leni non satis utilia sunt, fiat tale Claretum:*

*℞. Rad. fœnicul. eryng. helen. scorzon. an. Vnc. sem. cortic. tamarisc. rad. cappar. polypod. q. an. Drach. vi. cortic. citri Vnc. sem. zedoar. Drach. ii. chamedr. ling. ceruin. meliss. capill. Veneris, absinth. an. M. sem. flor. borrag. bugloss. an. M. j. cinamom. Drach. ii. spic. Indic. ligni aloes, an. Drach. i. Affunde vini Rhenani calefacti ℥b. vj.*

*Stent aliquandiu in infusione, & postea aliquoties trajiciantur per manic. Hippocrat.*

*Ultimò add. sacchar. albiss. Vnc. iii.*

*Manè post iusculum, vel in prandio & cœna loco primi haustus vsurpetur,*

## Aqua.

Aque.

*Vel paretur talis Aqua:*

*℞. Rad. aperient. ℥i. helen. Dr. vi. cortic. tamarisc. fraxin. an. ℥b. meliss. betonic. chamedr. chamapit. ana. M. ii. card. benedict. M. i. sem. anisi, fœnicul. an. ℥b. flor. bugloss. genist. centaur. minor. an. M. i. Macerentur omnia in aq. borrag. lib. iiii. vini ℥b. iii. postea colentur. Colat. add. succ. fumar. ℥b. i. cochlear. ℥b. ℞. trochisc. de cappar. Vnc. j.*

*Destillentur. Destillatum exhiberi potest vel solum, vel cum syrupo borrag. aut alio, aut etiam addi oxymel. scillitic. vel cum Glatum.*

## Electuarium.

Electuarium.

*℞. Conseru. cichor. meliss. borrag. bugloss. card. bened. an. Vnc. i. cortic. citri. condur. rad. condit. helen. an. Vnc. ℞. spec. diarrhod. abbat. Drach. j. confect. Alkerm. Drach. ℞. Cum syrup. byzantin. simpl. F. Electuarium.*

*De quo sumat æger Vnc. ℞. vel Drach. vi. & superbibat aquam borraginis.*

## Purgantia.

Purgatis.

*Postquam aperientia & præparantia hæc aliquot diebus sunt exhibita, quarto vel quinto die purgatio instituat. Et quidem purgantia sunt mitiora. Crato sæpe non fortiora, quam syrup. rosar. solut. cum aq. rosis Majalis ( utpote quæ longè subtilior est reliquâ aquâ, ita ut testæ qui inclusa Solique meridiano exposita, & calefacta statim euaporet ) confectum addita mannâ diluta infuso flor. persicor. exhibet. Et talia mitiora sæpe, & diu continuanda sunt Licet tamen interdum & fortiora exhibere.*

*Maximè verò viles sunt clysteres sæpius repetiti*

*sed non admodum acres; verum mediocres, & simul flatus discutientes.*

## Potiones.

*℞. Polypod. q. Drach. vi. cortic. citri Drach. ii. fol. sen. Drach. v. rhabarb. Drach. sem. epithym. Drach. iii. flor. borrag. bugloss. an. P. ii. caryophyll. num. iiii. sem. fœnicul. anisi, an. Scrup. i. cinamom. Scrup. sem. passular. Vnc. sem. el. diaphan. Drach. ii. Infund. in suffic. quant. seri lactis.*

*Colat. ℞. Vnc. iiii. syrup. de pomis Regis Sabor. Vnc. j. M. F. Haustus.*

*Vel ℞. Radic. aperient. vino preparat. Vnc. j. scorzon. Vnc. sem. cortic. tamarisc. fraxin. citri, an. Vnc. sem. meliss. ceterach. chamedr. an. M. sem. flor. borrag. bugloss. sambuc. genist. an. P. i. sem. endiu. portulac. agni casti. anisi. an. Drach. j. rad. helleb. nigri preparat. glycyrrh. an. Vnc. sem. passular. maior. Vnc. i. Coqu. in aq. simpl. In Colat. infund. fol. sen. Vnc. ii. zedoar. galang. an. Drach. i. sem.*

*Colat. ℞. Vnc. xiiii. adde syrup. de epithym. de pom. Reg. Sabor, an. ℥. ii. F. Potio pro 4. dosibus, quæ aromatizetur spec. lætitæ Galeni, aut diambri.*

*Alia; ℞. Infusio. rosarum fact. in aq. endiu. & fumar. aq. part. Vnc. ii. aq. anisi, cusc. flor. borrag. an. Vnc. j. fol. sena el. & vino albo irrorat. Drach. v. passular. minor. Drach. ii. rad. glycyrrh. rasa, sem. anisi, coriandr. prepar. an. Scrup. ii. caryophyllor. num. iiii.*

*Bulliant omnia tribus ebullitionibus vase recto, tunc adde rhabarb. opt. Drach. i. el. de succo rosar. Drach. ii. diaphœnic. Drach. i. pulu. santali citr. Scrup. i.*

*Relinquantur per noctem in infusione loco tepido; postea fortiter exprimantur per linteam, fiatque Potio, quæ detur manè tribus horis ante pastum in humoribus mistis.*

## Syrupi.

*Donatus Antonius ab Alto Mari hunc Syrupum valdè commendat, quem & alij laudant:*

*℞. Hyssop. sampsuchi, serpilli, melissophyll. betonic. an. M. sem. borrag. lupul. scolopendr. fumar. capill. Veneris, an. P. sem. rad. cichor. borragin. fœnicul. cappar. an. Vnc. iiii. absinth. cortic. citr. an. M. j. fol. sen. elect. polypod. q. an. Vnc. ii. puleg. flor. chamamel. centaurij minor. an. Drach. ii. chamedr. chamapit. an. Vnc. ii. junc. odorat. ( id est, schœnanth. ) spic. anisi. fœnicul. asar. an. Drach. j. passular. enucleat. Vnc. i. Coquantur s. a; Colat. ℞. ℥b. iiii. add. succ. pomor. dulcacidor. rosar. & maioran. punicor. acidor. an. ℥b. sem. borrag. & fumar. depurat. an. ℥b. i. sacchar. q. s. F. Syrupus, de quo æger sumat. Vnc. iii. vnâ vice, & superbibat parum aq. lupul. & borrag.*

*℞. Rad. scorzon. polypod. q. ana Drach. vi. bugloss. cichor. cortic. tamarisc. citri. an. Vnc. sem. ceterach. chamedryos, meliss. an. M. i. thymi, epithym. an. Vnc. sem. flor. sambuc. genist. an. M. sem. sem. fœnicul. Drach. ii. hellebor. nigr. Syriac. prepar. Drach. iii. glycyrrhiz. Vnc. sem. passul. exacinat. Vnc. i. Coqu. in aqua pura. In Colat. infundantur fol. sen. elect. Vnc. ii. follicul. sena Vnc. i. radic. gialapa, rhabarb. an. Drach. j. turbit. el. Drach. ii. flor. borrag. bugloss. an. M. sem. stœchad. Arab. P. j. cinamom. Scrup. j. spic. Indic. Scrup. sem. caryophyll. zedoar. an. Drach. i. sem.*

*Colat. ℞. ℥b. j. acer. scillit. ℥. ii. succ. borrag. vel pomor. Vnc. iii. sacchar. ℥b. sem.*

*Coqu. ad julep. vel syrup. fluidior. consistentiam, de quo singulis diebus æger manè Vnc. iii. vel iiii. vel q. s. sumat, addaturque singulis dosibus ol. anisi. vel cinamom. vel citri gutt. i. idque continuetur 4. diebus, quinto æger quiescat, hinc ad vsum syrup. redeat, donec planè absumptus sit.*

Est



Est & hic Syrupus, vt in omni, ita etiam in Melancholia hypochondriaca vtilis:

℞. Polypod. q. ℥b. sem. bugloss. borragin. melissophyl. an. M. i. cypri, cappar. acori, asari, an. Vnc. i. sena, epithym. an. Vnc. ii. sem. lactuc. endiu. an. Vnc. iii.

Puluerifata omnia præter senam & epithym. quæ referuentur, ebull. in l. q. aquæ ad consummat. medij. In fine decocto adde senam & epithym. & innox remoueat ab igne. Postea colentur. Colaturæ adde sacchari q. l. F. Syrup. s. a.

Sumatur 6. diebus continuis.

Et quia aliis aliæ formæ medicamentorum magis arident, potest etiam talis Nodulus parari:

℞. Rad. polypod. q. scorzon. an. Drach. ii. fol. sen. Vnc. i. rad. gialapa Drach. ii. hellebor. nigr. præpar. Dra. i. sem. zingiber. cortic. citr. galang. zedoar. ana Drach. j. sem. anis. fœnicul. an. Drach. ℥. flor. anthos. bugloss. an. P. i.

Ligentur in nodulo, qui in cereuisia suspendatur. Ne reliquorum medicamentorum sapor ingratus percipiatur, aliquid absinthij addere licet.

### Vinum.

Commendatur & vinum purgans, quod Zvvingero adscribitur:

℞. Rad. aperient. an. Vnc. sem. bugloss. cardui benedict. absinth. an. M. sem. fœnicul. Vnc. sem. fol. sen. elect. Vnc. i. sem. agaric. Pri alb. an. Vnc. sem. zingiberis, cinamom. an. Drach. i.

Infundantur in vino, de quo chyathus vnus vel duo, prout opus fuerit, manè & vesperi, ante cibum, vel manè saltem, per dies plures sumatur.

Vel ℞. Fol. sena el. Vnc. ij. rhabarb. opr. Drach. ii. rad. mechoacanna vel gialapa Dra. j. corr. rad. hellebor. nigri præpar. Vnc. sem. fol. fumar. cusc. scolopendr. ceterach. meliss. flor. 3. cordial. flor. rorismarini, an. P. ii. sem. anis. fœniculi, an. Drach. ii. cinamomi, Drach. j. limatur. chalybis præpar. Vnc. sem.

Incisa & confusa ligentur omnia in sindone pro nodulo, qui in ℥b. iiii. vini Rhenani injiciatur, de quo vino medicato quatuor horis matutinis ante prandium quotidie Vnc. iii. præter propter exhibeantur.

### Pulueres.

Tenuioris fortunæ homines vtantur pulu. sen. præpar. iuxta descriptionem Montagnanæ, qui acui potest gr. iiii. vel iiii. diagryd. pro natura ægri.

Vel sumatur pulueris sen. præparat. Drach. i. vel Scr. iiii.

℞. Crystallor. q. i Vnc. sem. fol. sena Alex. Drach. v. rhabarb. el. agaric. crochisc. an. Drach. ii. scammon. præpar. Drach. i. turbit. alb. hermodactyl. an. Drach. ij. cinamom. galang. macis, an. Drach. ℥.

Misce pro puluere, de quo Drach. i. in liquore, vel iusculo propinetur.

### Pilula.

Aut vsurpentur Pilul. Grez à Quercetano descriptæ, vel de Ammoniac. Platerus has commendat.

℞. Alois Drach. ii. myrrh. Drach. sem. epithym. Drach. i. rad. gentian. asari, an. Drach. sem. gum. ammoniac. aceto dissolut. Scrup. j. sem. petroselin. Drac. sem. rhabarb. el. Drach. i. sem. spic. Scrup. i. Cum succ. absinth.

F. Massa, de qua æger alternis, vel tertio quoque die sumat Scrup. ii. vel etiam plus, si copiosius purgare libeat & liceat.

Idem & has commendat:

℞. Aloës Succirina Vnc. i. sem. rhabarb. agaric. an.

Drach. i. zingiber. mastich. gentiana, an. Scrup. i. ammoniac. aceto diss. l. Drach. sem. succi absinthij r. p. i. i. (extractum efficacius est) cennaur. min. an. Scrup. j. limatura chalybis vel croci ♂ Drach. ℥. terebinthina Cypria q. l. F. Pil. Dos. Drach. ℥.

Quibus Electuaria vel Boli arident, fumant el. <sup>Electuaria & Boli.</sup> diacathol. dialenæ vel in bolo, vel in sero lact. dissoluta. Multum in hoc morbo valet extract. helleb. ori nigri, quod in pilul. formari, vel alio modo exhi. erri potest. Venticuli tamen in purgantibus imprimis habenda est ratio, præcipue iis, qui cruditate acidâ laborant, & cauendum, ne nimio purgantium medicamentorum vsu is amplius debilitetur.

Vomitoria in alijs etiam repeti possunt, & pro <sup>Vomitua prænotatio.</sup> ægri tolerantia nunc leniora, nunc fortiora vsurpanda. Vomitu enim excitementi humores circa ventriculum & loca vicina hærentes non raro excutuntur, qui purgantibus per aluum euacuari non possunt.

Vt ℞. Rad. asar. Drach. iii. sem. atriplicis Drach. i. agaric. Scrup. ii. flor. genistæ, sambuc. an. P. i. Coq. in hydromel. ad Vnc. vi. adde oxymel. j. Vnc. i. sem. F. Vomitorium.

Purgatione hoc modo peractâ, iterum aperientia, incidentia, attenuantia vsurpanda. Et cum purgantia viscera nonnihil calefacere soleant, & aliâs in hoc affectu hepar & venæ mesaraicæ plerumque sint calidiores, addantur medicamenta, quæ p. n. illam venarum mesaraicarum caliditatem, & siccitatem emendent: quos scopos omnes explere poterit seri lactis caprini vsus aliquot diebus, octo scilicet aut 14. continuatus. Et ne vllum damnum afferat, & magis sit efficax, pulueres vel pilulæ conuenientes ante serum vsurpentur.

℞. Rad. filicis maris, quinquæfol. absinth. cardui bened. chamædryos, ceterach, agrimon. an. Drach. i. Cum syrup. acetos. citri.

F. Pilulæ majores, quarum 6. vel 10. singulis vicibus ante serum haustum sumantur.

Vel ex pulu. horum omnium fiat extractum, de quo ante vsu seri lactis ℥. ii. forma pilul. vel aliâ æger sumat.

Vel vsurpetur cum sero lactis extract. carduibened. veronic. meliss. ceterach, & similia. Ita enim maior vis aperiendi & penetrandi conciliabitur sero, & minus refrigerando nocebit.

Necessarium verò est vt sumatur maiore copia, præsertim ventriculo non admodum debili, nimirum ad ℥b. iiii. vel etiam plures, & ebibatur calix vnus post alium pitissando, & post vsu seri deambulandum, vt in profundiora corporis sese insinuet, & materiam, quæ obstructions facit, per aluum & vrinas deducat. Neque magna seri copia pertimescenda. Si enim per venas penetrare, & iterum per aluum, & vrinas statim deici debet, magna copia requiritur; in minore verò nihil præstat eodem modo vt thermæ & acidulæ in maiore quantitate ebibuntur.

Ne tamen ventriculo damni aliquid inferatur, sacculis, vnguentis, & emplastris conuenientibus roboretur. Et post vsu seri singulis diebus manè & vesperi sumatur de elect. seq. portio, quæ quantitate nucem juglandem æquet:

℞. Conferu. bugloss. borragin. an. Vnc. i. rosar. anthos, an. Vnc. sem. sp. diarrhod. abbat. diatrion. santal. an. Drach. sem. margarit. præpar. Scrup. ii. ligni aloës Scrup. i. cortic. citri condit. Vnc. sem. confect. alkeri. Drach. sem. Cum syrup. de pomis F. Electuarium.

Vtile est & absinthium per dies 30. vel 40. exhibitum post purgationes in vino generoso non austero; cum absinthium ipsum per se satis adstringat. Nimirum in vini ℥b. iiii. macerentur absinth. M. ii. & singulis <sup>Absinthij vtilitas & vsus.</sup> diebus

diebus vnum atque alterum cochlear exhibeatur.

Vel cereuisia aut vinum absinthites paratur simpl. vel compos.

*℞. Cortic. tamarisc. frangula, sarsaparill. an. Vnc. ii. absinth. M. v. epithym. meliss. an. M. j. gr. junip. Vnc. j. flor. genist. Vnc. sem.*

Concisa, & contusa sacculo includantur, & in musto, vel recenti cereuisia deferueant.

Vtiles etiam sunt trochisci de cappar. de absinth. aditit iis, quæ virtutem cordis, & cerebri roborant; vt sp. diamb. cordial. temperat. de gemm. de hyacintho, lætitiæ Galen. Rhab. hyeme, & vere incipiente, corpore euacuato, theriacæ vel Mithridatij aliquid cum refrigerantibus mistum exhibeatur.

Vt *℞. Theriac. Scr. j. conferv. rosar. Drach. ii. Misc.*

Agérque omnibus aliis medicamentis eo die abstinere.

Vel *℞. Conferv. rosar. borrag. an. Drach. ii. Mithridat. Drach. sem. sp. laetificant. Rhab. Scr. j. M.*

Chymici ad intentionem istam complendam cremore & crystall. tartari, tartaro vitriolato, spir. tartari compos. quam vulgo misturâ simplicem vocant, vtuntur,

Primùm quoque ad obstructions hypochondriorum aperiendas commendatur non solum à Chymicis, verum etiam à Galenicis. chalybs præparatus, adeo vt Iul. Cæs. Claudinus, *respons. 29.* proprium melancholici hypochondriaci alexipharmacum chalybem nominet, quoniam continuus illius vsus semper felicem in ægris finem sit assecutus; siquidem in referendis obstructionibus, in quibus omnis melancholici curanda cardo vertitur, nulli medicamento cedat.

Cum verò chalybs non solum vim aperiendi, sed & adstringendi, & fluxus sistendi habeat, prout diuerso modo præparatur, chalybs præparatus aperiens vsurpetur. Inprimis hic utilis est tinctura chalybis; de qua re plura dicentur suo loco de affectibus hypochondriacis in genere.

Commendatur & seq. Electuarium de chalybe D. Kolreuteri.

*℞. Limas, chalyb. tenuiss. lb. β. Superfund. acetum vini acerrimum, quantum imbibit Stent. 24. hor. postea, vbi exiccata reperitur, aliud affundatur simili modo, sin minus, ad prunas in lebeate vitreato incrustato agitata teratur, donec perfectè exiccetur, & tum acetum, vt primò factum est, affundatur, & hoc fiat tertio, id est, tribus diebus continuo, postea perfectè exiccata aceto scillitico in marmore, vel alio duriore lapide teratur, & in liuorem redacta, exiccataque sumatur; & add. pulu subscript. totum.*

*℞. Rad. iereos Drach. ii. Zingib. lapath. acuti, cyclamin. eryngy, bryon. an. Vnc. i. fol. ceterach. scolopend. betonic. ruta, chamedrys, thamepit, agrimon. calaminth. galanga, caryophyll. macis, ligni aloes, zedoar. Daronici, an. Drach. sem. spic. Ind. croci, an. Scr. β. cori. rad. cappar. fraxini, fagi, salic. ramarisc. cass. lign. ver. costi dulc. an. Scr. ii. visci q Drach. β. cinamomi Drach. iii. ammeos, cardamomi, cymini aceto macep. coriandr. præparat. sem. agni casti, petrosel. melanth. portul. an. Drach. i. siler. mont. Drach. ii. sem. anisi Scrup. iiiii.*

F. Puluis tenuiss. Huic chalybs totus præparatus commisceatur, & cum melle purissimo despumato, ac tertia parte oxymel. scillit. & syr. è cich. c. rhab. F. Electuarium.

Vtiles etiam, & magnæ efficaciz sunt in melancholia hypochondriaca Acidulæ: vt pote quæ lienem & venas melaraicas aperiunt, ac sine omni molestia omnis generis vitiosos humores per aluum copiosè educunt: quales sunt Egranæ & Schvvalbacenses.

Eadem, quæ acidularum, & Thermarum ratio est. Et si enim externus thermarum vsus in melancholicis, qui plerumque macilenti atque exsucci sunt, raro commodus sit, & metuendum, ne corpus amplius iis exsicceretur, si bibatur, eadè ratione, quæ acidulæ, pro-

sunt: cum ob mineralia, à quibus suas vires habent, & primas vias eluant, & vitiosos humores, qui in iis hærent, per aluum & vrinas educant, ventriculum calefaciant, hepar & lienem roborant. Therma, quæ in hoc affectu conueniunt, sunt Aponenses, in agro Parauino, & Aquarianæ, Regio Longobardo 25. miliaribus distantes: therma S. Casiani in Italia, Badenses Marchionis, & Ferinæ in Germania.

Vbi nec acidularum, nec thermarum copia habetur, serum lactis caprini eorum loco vsurpetur, cum succo cichorii & fumariz: ac si flatulèria ejus metuatur, dum igne depuratur, aliquid seminis coriandri & ligni sassafras addi potest. Vel medicamenta ex chalybe aliquot diebus continuantur.

Neque interim externa & Topica omittenda sunt, sed extra etiam vsurpanda, quæ obstructions aperiunt, ac flatus discutiunt, vt fomentationes lienis, præcipue ex flor. chamæmeli, genistæ, melilot. sambuc. fol. & rad. malu. althææ, rutæ, calaminth. pulegij, ceterach, rad. filic. cortic. rad. cappar. tamarisc. & similibus.

Vnguenta etiam ac linimenta, vel emplastra lienii applicentur; de quibus de lienis affectibus atque affectione hypochondriaca in genere diceretur.

Hoc saltem hic non prætereundum censemus: post corporis purgationem utile esse aq. dulcis tepidæ balneum, in qua fol. viol. malu. althææ, mercurial. brancæ vsin. fl. chamæm. meliloti & similia cocta sint.

Tandè quæ viscera roborant, vsurpada, nō solum in fine curationis, sed & medicamentis præparatis, & purgatis per interualla subijgi debet, vt ita caput & viscera ad nativā cōstitutionē & temperiem reducantur.

Pro corde & cerebro roborando jam antea medicamenta proposita sunt. Iis addi possunt & hæc:

Commendatur inprimis Smaragdus, & porus, & collo gestatus, vt in omni melancholia, ita & hic, ejusdemque tinctura, vt & sapphiri, & corallior.

*℞. Aq. flor. borrag. in B. destill. ℥. iv. cinamom. ℥. sem. margarit. præparat. ℥. ii. smaragdi præpar. Drach. i. β.*

Misceantur in mortario marmoreo. F. Liquor potabilis instar emulsionis. Vel sumantur margaritarum & smaragdi præparat. loco horum magisteria. Detur vnū atque alterum cochlear ingruente paroxysmo calidè.

*℞. Sp. aromat. ros. ii. d. ambr. an. ℥. i. margarit. præpar. Scr. j. ambr. gr. iv. ol. destill. macis, caryophyll. citri, an. gutt. ii. sacchar. in aqu. cinam. ℥. β. borrag. f. q. dissol. Vnc. iii. F. Rotulæ*

Efficax est & hoc in paroxysmo Hypochondriaco: *Mixtura & Electuaria.*

*℞. Essent. melissa ℥. ii. zedoaria ℥. iii. spir. rosar. Scr. i. julebi rosar. ℥. ii. syrup. tunicis ℥. i. succ. recent. citri, granator. dulc. ana. Vnc. sem.*

Vt & hæ Rotulæ:

*℞. Ol. nuc. mosch. destill. ℔. β. confect. alkermes, extract. pæonia, an. ℔. i. calam. arom. ℔. β. margarit. præparat. ℔. i. corall. rubr. præpar. ℔. β. ol. carni gutt. iii. sacch. in aq. pæonia & melissa dissol. Vnc. vi. F. Rotulæ.*

Est & hæc aqua efficacissima:

*℞. Rad. bugloss. borraginis, an. ℥. i. β. pæonia, cortic. citri, an. ℥. ii. rorismar. meliss. an. M. i. flor. borrag. bugloss. stachad. Arab. an. ℥. β. sem. basilic. croci, cinam. caryophyll. an. ℥. i. confect. alkerm. ℥. ii. aq. bugloss. borrag. an. Vnc. iii. vini Rhenani lb. ii.*

Stent infusa, destillentur.

Felici etiam cum successu exhibere licet sequentem puluerem, dosi, quantum apice cultelli bis capi potest, sub lecti ingressum.

*℞. Pulv. smaragd. hyacinth. margarit. corall. præpar. scobis eboris, boli Armen. an. part. æq. Misc. F. Pulvis.*

Vel cū tryphera Mesuæ in formā Electuarij redigatur.

Hoc quoque in obstructione venarum melaraicarum profuisse deprehensum est.

*℞. Spec. diarrhod. abbat. diarrion santalon, rosar. nouell. an. ℥. β. diapnid. ℥. ii. fl. cusc. beton. hyperic. ana Scr. β. sem. sanic. Drach. β. cinam. spic. an. ℔. β. spody. santal. ru. br. alb.*

Chalybis  
vsus.

Acidula.

Therma.

*alb. an. Scr. j. Cum syr. de epithym. & endiu. an. q. s. F. Electuarium.*

*Vel ℥. Conseru. roris marini. maior an. meliss. borrag. an. Vnc. j. margar. prapar. hyacinth. prapar. confect. alkerm. an. Drach. s. cortic. citr. condit. Vnc. s. cinamom. caryophyllor. macis, an. Scrup. j. Cum syrup. tunic. Fiat Electuarium.*

*Vel ℥. Conseru. anthos, meliss. bugloss. an. Vnc. j. calam. arom. condit. cortic. aurant. condit. rad. cichor. eryng. conditarum, an. Vnc. s. trochisc. de cappar. Drac. j. s. nuc. in India condit. Drach. ij. cinamom. macis, crasso modo concisum, an. Scr. j. ol. citr. gutt. iij. Cum syrupo borrag. F. Electuarium.*

*Vel confect. de hyacintho Scr. ij. vel Drach. j. saepe exhibeatur.*

Pretiosa quidem, sed utilis est hæc mistura, multumque facit ad vapores melancholicos discutendos.

*℥. Conseru. tunic. Vnc. j. rosar. confect. alkermes, an. Vnc. s. lapid. Bezoar, Scr. j. succin. alb. pulueris. Scr. ij. Cum syrup. de cortic. citr. F. Electuarium.*

Si vigilæ sint molestæ, lotiones pedum & manuum, item vnguenta, & alia supra proposita usurpanda.

*Aqua destillata.* Commendatur & hæc Aqua in melancholiâ hypochondriaca:

*℥. Corcerni num. j. fol. meliss. M. j. basilic. menth, ceterach, fl. borrag. bugloss. violar. tunic. an. M. s. anthos, lauend. an. P. j. sem. basilic. coriandr. prapar. anis. citri, an. Drach. j. macis, santal. citr. cinamom. an. Drac. ij. caryophyll. Drach. j. Concisa & contusa macerentur in vini maluat. lb. j. aq. borrag. bugloss. an. lb. ij. meliss. lb. j. F. Destillatio in Balneo.*

Exhibeantur Vnc. iij. cum syrup. violar. tunic. vel borrag. Vnc. j.

Reliqua, & inter ea etiam quæ Chymici exhibere solent, proponuntur libro tertio.

### Dietæ.

*Cibus & Potus.*

Quod in omni curatione verum est; in huius affectus curatione verissimum: Omnia medicamenta frustra usurpari, nisi diligens diætæ ineatur ratio. Et omnium Medicorum testimonio, atque ipsâ experientiâ teste, nihil ad hoc malum curandum est magis necessarium aut plus confert, quam bona diætæ. Ergo causæ omnes, è quibus malum hoc provenire supra diximus, sedulo vitandæ sunt: cibi nimirum omnes crassi, & vitiosi succi; ac usurpandæ potius carnes gallinarum, vitulina, agnina, hædina, vervecina: inter pisces, lucius, perca, & saxatiles. Panis sit albus, bene, non tamen nimis, fermentatus; vinum album, tenue, cerevisia clara, & defecata. Commodum est, si primus haustus semper sumatur de vino, vel cerevisiâ melissâ, absinthio, carduobened. borrag. & simil medicatâ. Aromatû vsus nimis noxius; quod caliditate, siccitate, & acredine iecur & sanguinem plus, quam par est, calefaciunt, & venas melaraicas exsiccant. A cibo tamen medicamento aliquo peptico uti interdum veile est.

*Ve ℥. Sp. arom. rosar. Drach. i. succin. alb. puluer. Drach. sem. ambr. gr. viii. mosch. gr. iii. ol. nuc. mosch. destill. Scrup. sem. conseru. rosar. rubr. Drach. ii. sacchar. in succo cydonior. dissol. Vnc. jv. F. Mortuili.*

Et sunt tales formulæ passim notæ. Cibi quoque assumantur eâ quantitate, quæ ventriculo nullam in coctione molestiam pariat; nec noui assumantur, priusquam priores è ventriculo in ventrem descenderint. Varij quoque & multi cibi simul assumpti hoc malum non parum augent. Alius ut laxa semper sit, opera detur. Mœstitia & curæ nimix vitentur. Plura de diætæ ratione in hoc malo videantur in consilio Petr. Andr. Matthioli, quod est 182. *Consil. à Scholizio sol-*

*Excreta, & animi pathemata.*

*lect.* Diligenter etiam, & prolixè de Melancholia Hypochondriaca tractat D. Balth. Brunnerus, *Consil. 6. 7. 8. 9. 10. 11.* qui videatur Et dicuntur plura huc conferentia infra, lib. 3. de aff. hypochondriaca.

## CAPVT XIII.

### De Melancholia ex Vtero.

**T**ertia Melancholiæ per consensum species est Melancholia ex vtero; quæ quidem duplici modo generatur. Vel enim sanguis melancholicus per menses euacuari solitus exitum non habens regurgitat, & aut in hypochondriis, aut vasis totius corporis cumulat, unde melancholia per consensum totius, aut hypochondriaca oritur, de quibus antea dictum; vel in ipso vtero à sanguine retento vitiosa dispositio inducitur, & ab humoribus prauis in vtero cumularis vapores melancholici ad cerebrum eleuantur, qui varia symptomata inducere solent.

Causa proxima huius mali, ut in hypochondriaca, etiam est vapor, qui & cor anxium reddit, & spiritus animales obfuscat, obcurat, atque inquinat, atque ita mœstitiâ, timorem, & delirium parit. Quod eò facilius in fœminis accidit, quod naturâ sint deiectioni animi, & præcipuè in viduis, quas animi mœror, & curæ cruciant. Verum symptomata hæc non sunt continua, sed tamdiu durant, quamdiu vapor, qui proxima est causa, adest: quo discusso symptomata remittunt, & evanescent, donec noui ad caput eleuentur: quod ex eo patet, quod, dum vapor ille quiescit, satis hilares sunt eiusmodi fœminæ, nec vlla melancholiæ signa exhibent, mox commoto, & agitato humore, & vaporibus ad cor & cerebrum eleuatis, subito mœrore corripiuntur. Docuit ista omnia eleganter Hippocrates, in lib. de morb. virgin. dum ita scribit: *Est muliebris natura animi magis deiectioni & imminui. Caterum virgines nobiles & matura viro hoc magis patiuntur unâ cum mensium descensu, antea non valde his affectæ. Postea enim sanguis in uterum confluit, veluti effluxurus. Cum igitur osculum exitus non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit, propter cibos & corporis augmentum, tum sanguis non habens exitum reslit ad cor, & seipsum transfusus. Cum igitur hac repleta fuerint, cor fatuum fit, deinde ex fatuitate torpedo, postea ex torpedine delirium apprehendit.*

Malum nimirum hoc virginibus iam nubilibus familiare est, cum sanguis ad uterum confluens, ibique exitum quærens, exitum non inuenit. Deinde viduis, in primis ob curas & mœrorem animi, in quem ob mariti obitum pleræque coniiciuntur: ut & aliis fœminis quibus menses, aut post partum purgationes, ex aliqua causa euidente supprimuntur, aut non rectè fluunt.

[Vteri culpâ melancholiam contingere posse, nullum dubium. Obseruatum tamen, in iis, quæ propter retentionem mensium melancholicæ sunt, malum non semper ab vtero proficisci, quasi uterus ipse proximè humorem melancholicum cumulet, & ad caput mitteret; sed potius, quod sanguis melancholicus retentus, & consuetum exitum ex vtero non habens, in venis totius corporis regurgitat, & sic melancholiam per consensum totius producit. Exemplum huius rei præbuit fœmina, Anno 1636. quæ nunquâ mensium profluuium passâ erat, licet aliâs sana esset. Tandem autem propter euacuationes sanguinis consuetas per venæ sectionem & scarificationem omiffas, in melancholiam incidit satis grauem. In huius curatione ad uterum respicere opus non erat; cum impossibile esset, vala quæ naturâ clausa erant, aperire, & melancholicus sanguis in toto redundaret. Ideoque venæ sectione repetitâ, clysteribus alterantibus, hypnoticis adhibitis, breui perfectæ sanitati restituta fuit.

Quod

*Melancholia ex Vtero causa proxima. Causa antecedens, & remota.*

*Melancholia per consensum in fœminis non semper ab vtero.*

*Exemplum.*

Quod non factum fuisset, si vterus aliquam notabilem noxam contraxisset, cum illi nulla fuerint adhibita medicamenta. Ideoque etsi non negandum, in quibusdam feminis melancholiam in specie ab vteri mala dispositione ortum habere, quæ quando adest, peculiarem habet typum, signa diuersa, & per vices vehementer recurrentem melancholiam, non continuè affligentem; curationemque priuatim ad vterum directam requirit: tamen etsi vterus interdum primus mali fons est, causa proxima non in vtero, sed venis communibus consistit. Quapropter si femina, & quidem ex mensium suppressione, in melancholiam incidat, considerandum, annon occasione retentorum mensium in illis, quæ temperamento sunt melancholico, propter retentionem sanguinis melancholici, qui aliàs tempore consueto cum mensibus euacuatur, melancholia sit contracta, quæ per consensum totius & cordis dici meretur; an verò vapor ille melancholicus ab ipso vtero proximè, propter prauam vteri dispositionem, (quod ad curationem scitu summopere necessarium) communicetur. Nam illius melancholici curationis ad totum corpus dirigenda: simul tamen etiam laborandum, ut fluxus menstruus in illis, quæ iam ante illum passæ sunt, reuocetur: in hac verò cura præcipuè ad vterum dirigenda.]

### Signa Diagnostica.

*Melancholia ex vtero signa diagnostica.*

Femina hæc malo laborantes sunt mœstæ, cogitanda, timidæ & anxie citra causam manifestam, nullaque re delectantur, vel gaudent, sed tædio habent omnia, amantque solitudinem, sed cum suo incommodo. Et quidem hæc patiuntur per intervalla quædam, in quibus cum aliis melancholicis conueniunt. Sunt autem alia non pauca, quæ à melancholia per essentiam, cum reliquis melancholiciæ per consensum differentis, eam discernunt. Nimirum præter hæc omnia symptomata accidunt fletus & risus, non satis possunt verbis exprimere, quid mali sentiant, sed conqueruntur, & multa proferunt, ex quibus, quid mali patiantur, Medicus vix certò colligere potest. Conqueruntur de doloribus variis, tum præcipuè sinistri lateris, & regione cordis, qui vniuersam mammam aliquando prehendit, inprimis verò de manifesto pulsu in dorso circa diaphragma, qui accidit ob arteriæ magnæ eod loci p. n. vehementem pulsationem. Nam cum sanguis circa vterum hærens incendatur, communicatur id malum non solum venæ cavæ; sed & arteria, quæ iuxta dorsum est, venæ cavæ malorum fit particeps. Habent præterea somnia tumultuosa: alius in quibusdam supprimitur, in quibusdam pauca reddit: menses supprimuntur, vel parcius fiunt.

### Prognostica.

*Prognostica.*

1. Quod diutius hoc malum durat, eò curatu est difficilius.
2. Nisi maturè huic malo occurratur idoneis remediis, in maniam periculosam plerumque transit.

### Indicationes.

*Indicationes.*

Cum à suppressa sanguinis euacuatione malum hoc ortum habeat, 1. Sanguis superfluus imminuendus & euacuandus. 2. Hinc humor melancholicus, qui ex sanguine suppresso generatus est, præparandus & euacuandus. 3. Sanguinis superflui in vtero & vicinis locis congestio præcauenda. 4. Animus à tristitia ad hilaritatem auocandus, cerebrum & cor roborandum.

### Curatio.

#### Vena Sectio.

Sanguis imminuitur venæ sectione, & cibi detractione. Venæ sectionem quod attinet, si tempus, quo menses fluere solent, adhuc longius absit, venæ basilica, vel mediana in brachio aperiatur. Si verò mensium fluxus iam instet, aut nuper præterierit, vena in pede secetur. Et commodissimum quidem est ad melancholiam hanc tum curandam, tum præcauendam, quibus, tribus, vel 4. diebus ante consuetum mensium fluxum venam in talo aperire. Ad sanguinem imminuendum vtile est cibi aliquid detrahare, & cibum tenuis substantiæ præbere, ut crassi humores vasa obstruentes attenuentur.

#### Purgatio.

Sanguine euacuato, si constet ex signis, scilicet si affectio diutius durauerit, quod mores aliquo modo immutati sint, ægerque cogitationibus absurdis, & melancholicis resistere nequeat, iam humoris melancholici aliquid accumulatum esse, id quod ferè semper accidit; is præparandus & euacuandus. Quod quâ ratione fieri debeat, ex capitibus præcedentibus satis patet: ideoque pauca hac de re addemus. Cum femininarum natura fortiora purgantia non ferat; humor verò contumax sit, mitiora medicamenta; sed frequentius, usurpanda. Exhibenda scilicet pilulæ ex aloë, agarico, mastich. & fol. senæ paratæ. Vel exhibeatur confect. Hamech. f. scammon & colocynthide facta; vel serum lactis, in quo fol. senæ & flor. cordiales macerati sint.

Vel fiat Syrupus.

℞. Rad. polypod. q. scorzonæ. an. Vnc. j. fol. sen. elect. Vnc. iij. flor. cordial. an. M. B. cortic. citr. Vnc. B. zedoar. Drach. ij. Infund. in aq. borrag. lupul. meliss. an. Vnc. x. succ. borrag. depur. Vnc. viij. pomor. Vnc. vj.

Postea leniter ebulliant.

Colaturæ adde rhabarb. agaric. trochisc. ana Vnc. sem.

Iterum parum bulliant, & colentur.

Colaturæ adde sacchar. q. f. f. a Syrupus.

Cui adde aq. cinamomi Vnc. j. Datur ad Vnc. ij. vel Vnc. iij.

Si tamen morbus iam augmentum sumpserit, ita ut mediocria non sufficiant, cum ne mouere quidem humorem tam crassum, fixum, ac stabilem possint; ad fortiora, elleborum nigrum, & lap. Lazuli ascendendum. Ideoque helleborismus Matthioli, & alia medicamenta purgantia capite præcedente proposita usurpanda.

Commendatur quoque hic Pulvis;

℞. Epithymi Vnc. B. lap. Lazuli prepar. agaric. trochisc. an. Drach. iij. diagryd. vel extr. scammon. gr. xv. caryophyll. num. xx. fol. sen. Drach. vj. sacchar. albiss. Vnc. iij. F. Pulvis, Dosibus Drach. B. vel q. f.

Vbi semel atque iterum purgatum est, antequam iterum ad purgationem accedatur, medio tempore medicamenta humorem melancholicum alterantia usurpanda, quæ hactenus proposita sunt.

Vel ℞. Conseru. borrag. anthos, meliss. an. Vnc. j. cortic. citr. condit. rad. bugloss. condit. an. Vnc. B. myrobal. chebular. emblic. condit. an. num. ij. confect. alkerme Drach. B. lap. Lazul. prepar. Drach. B. spec. el. de gemmis, vel hyacinth. Drach. j. B.

Cum syrup. bugloss. F. Electuarium.

Simul & vtero prospiciendum, & danda opera, ut menses, si subsistant, prouocentur. Ideo hæc potio parari potest:

℞. Vini alb. lb. vj. aq. matricar. lb. B. dictam. Cret. puleg.

*Sanguis per venam secta missa.*

*Purgatio.*

*Pilula. Electuarium. Infusa.*

*Pulvis.*

*Alterantia & Preparata.*

*Vinum medicatum.*



*puleg. calaminth. an. P. j. sabin. rad. rubia, an. Vnc. j. galang. cinamom. macis, sem. dauc. an. Drach. iij.*

Stent in infusione per diem integrum : postea co-  
lentur, & addatur limaturæ chalybis præpar. lb. ss. at-  
que in loco calido in vase vitreo bene clauso asservien-  
tur per dies 10. Dosis ab Vnc. iij ad lb. ss.

Commendatur etiam valde hæc Aqua in vteri affe-  
ctionibus & mensium & seminis retentione, & melan-  
cholia inde nata:

*℞. Succ. borragin. depurati, meliss. an. lb. ij. croc. opr. Vnc. ss.*

Infundantur, & postea destillentur in balneo. Do-  
sis cochlear vnum manè cum iusculo.

*Cor & cere-  
bri confusio  
na.*

Et cum cor arque cerebrum simul in hoc morbo af-  
ficientur, ea etiam roboranda, & à vaporum melanco-  
licorum iniuria defendenda, vt, *capit. preced.* dictum.  
Hoc saltem addimus, diligenter laborandum esse, ne  
habitualis frigiditas & siccitas cordi, cerebro, vel etiam  
tori corpori inducatur. Quapropter medicamenta hu-  
midiora semper vsurpanda: sicciora verò quibus humor  
melancholicus exasperatur, vitanda. Ideoque nec ex-  
terna, quæ caput & corpus humectant, negligenda.  
Atque inter purgandum, & post purgationem aquæ  
dulcis tepidæ balneum cum herbis humectantibus, &  
moderate calefacientibus vsurpandum: & si malum  
his medicamentis non cedat, vt à capite & corde ma-  
teria auertatur, fonticuli in cruribus excitentur.

## CAPVT XIV.

*De Melancholia Errabunda, Arabibus Kutubuth  
dicta, & Attonita.*

*Melancholia  
Errabunda.*

**M**elancholia Errabunda Medicis dicta, ea melan-  
choliæ species est, quæ plerumque Februario  
mense ægros infestare solet; nomenque hoc accipit,  
quod, qui eâ laborant, ne horam in vno loco quies-  
cere possunt, sed hinc inde continuo vagantur, nes-  
cientes tamen quò vadant. Ab Arabibus vocatur Ku-  
tubuth, ab animali, vt scribunt, quod in superficie  
aquarum stagnantium hinc inde perpetuo cursitat.

*Kutubuth.*

### Causa.

Causam proximam huius melancholiæ esse statuunt  
melancholiam naturalem aliquo modo adustam, &  
certum corruptionis modum adeptam. Nam si valde  
esset adusta, accederet furor. Alij censent provenire à  
bile adusta, melancholiæ non adustæ permixta, quæ in  
permissione ralem, & peculiarem, corruptionis gradu  
adepta est. Et quidem generatur per primum cere-  
bri affectum, non per consensum. Infestat autem ma-  
gis mense Februario, quod ista peculiaris sit materiæ  
malitia, quæ autumnis cumulata, & hyeme reservata,  
in fine hyemis sese exercit. Nonnulli etiam eo tempore  
astrorum positum concurrere putant: sicut certum est,  
pro vario siderum situ, nunchos, nunc illos hu-  
mores moueri, & varios morbos inde excitari.

### Signa Diagnostica.

Ægri, vt dictum, sunt in continuo motu, fugiunt  
hominum consortia, loca solitaria amant, nec tamen  
sciunt quò vadant. Color corporis est citrinus, lingua  
sicca, vt valde sitientis, oculi sicci, concaui, nunquam  
lactymantes, totum corpus est siccum & aridum, fa-  
cies præ se ferens tristitiam. Tales melancholici timi-  
diores sunt, quàm vlli alij Melancholici, vnde, vt di-  
ctum solitudinem amant, noctu magis vagantur, la-  
tebras circa inortuorum sepulchra, & alia loca solita-  
ria quærunt. Homines obuios fugiunt, & si iis inspe-  
rato offerantur, eos non aspiciunt, aut vident. Cu-

ius rei procul dubio causa est, vel summus timor, ob  
quem omnia suspecta habent & fugiunt, vel quia ob-  
iectis ab extra oblatis non attendunt; cum phantasma  
eorum, & ratio circa phantasmata & specibus mente  
conceptas perpetuò sit occupata. Solitaria autem  
loca quærunt, ne turbentur in suis, speculatio-  
nibus, quas error phantasie offert, sicuti sani spe-  
culationibus dediti consortia hominum, ac obiecta  
sensus irritantia fugere solent. Crura eorum ple-  
rumque vlceribus sciant, quæ non consolidan-  
tur; cum ob continuum morum melancholia ad crura  
descendat.

### Curatio.

Curandi ratio ferè eadem est, quæ melanco-  
liæ, cum vnam cum ea causam, gradu saltem, &  
permissionis modo differentem, obtineat. Ideoque hu-  
mor melancholicus, qui in capite spiritus inquinat, &  
cerebrum ad spiritus similes generandos disponit, est  
alterandus & euacuandus. Deinde caput roborandum,  
& intemperies eius ad naturalem constitutionem ce-  
phalicis humectantibus moderate calefacientibus, vel  
potius temperatis deducenda; quæ de resuprà, *cap.*  
*9.* dictum. Et inprimis hic utilis est sanguinis euacua-  
tio, quæ copiosius, vel vnâ vice, vel pluribus insti-  
tuenda. Danda quoque inprimis opera, vt somnus  
concilietur; cum vix aliud ad malum hoc expugnand-  
um plus faciat, quàm somnus. Medicamenta pur-  
gantia sæpe repetenda. Præcipiunt etiam hinc nonnul-  
li Medici, vt ægri, si alia non profint, flagellentur, vt  
à prauis cogitationibus abducantur, & ratio ad se con-  
uertatur; deinde vt obedientes fiant. Verùm an id satis  
tutum sit, dubito; cum hic metus, qui in hac melan-  
choliæ specie maximè viger, augeri, iisque aliquid pe-  
riculi attrahi possit.

### De Melancholia Attonita.

Affectui melancholiæ errabundæ contrarius est Me-  
lancholia Attonita. Nam sicut in illa ægri vagabundi  
& inquieti hinc inde discurrentes locum, quo subsi-  
stant, non inveniunt: ita in hac omnia contrario mo-  
do sese habent. Nepe ægri quasi stupidi, & locomotiua,  
sed apparenter solum destituti, certo loco affixi &  
immobiles quasi hærent, iacentes se non erigunt, se-  
dentes non assurgunt, stantes subsistunt, nec spontè  
pedes promouent, nisi vel ab amicis & adstantibus  
impellantur, & ad locum mutandum manuum operâ  
solicitantur. Homines quidem non fugiunt: loquen-  
tibus tamen, licet attendere videantur, nihil respon-  
dent, surdis veluti auribus, quicquid monitum fuerit,  
prætermittunt, & quasi cogitabundi, & contemplatione  
aliarum rerum occupati, obiectis visui, & tactui oblatis nō  
attendunt. Interim & dormiunt & vigilat per inter-  
ualla: cibum ori admotum comedunt, potum hauriunt,  
inque his & similibus satis tractabiles, vel non multum  
reluctantes existunt.

*Melancholia  
Attonita.*

Est quidem hic affectus rarus: obseruatus tamen à  
Clarissimo Dn. D. Iacobo Iano, Sereniss. Elect. Saxon.  
Vidua Lichtenburgi Medico, Amico meo singulari,  
anno 1630. in viro triginta, & quod excurrerat, an-  
norum, Ecclesiæ cuiusdam pastore. Hic enim tempera-  
mento melancholicus verno tempore melancholia la-  
borare cepit, tristiorque subinde factus nihil quidem  
absurdi protulit: attamen quasi tentationibus vexatus,  
sed propter peccata (quæ in iuuentute commiserat, nō  
atrocia, sed leuia planè) se cum Deo in gratiam redire  
non posse, sibi persuasum habebat, indignumque se re-  
putabat, qui gereret munus Ecclesiasticum. Itaque des-  
perabundi instar non tantum totum tempus vernum,  
sed & integram æstatem, qua aliquoties sibi ipsi, vt &  
uxori, violentas manus inferre tentauit, suæque inter-  
dum,

dum, & quasi per paroxysmum *μτὰ σπασμὸν* agere visus est, miserè transegit. Tempore autumnali feruore illo in actionibus remittente, tristior præter modum factus est, semperque tacens crebra solùm suspiria ingeminauit. Amicis præsentibus, & variis consolationibus ægri miseriam lenientibus, interdum à melancholia & tristitia serió dehortantibus, lubens quidem auscultare visus est: ad responsum tamen dandum, licet variis propositis interrogationibus continuò instigatus, permoneri non potuit. Hanc tamen vocem aliquando edidit: Ah Deus! Qua exceptâ aliquot seprimanis non verbum vllum ex eo, licet sæpius interrogato, & vt loqueretur, monito, extorqueri potuit. Interim nocturno tempore dormiebat, bene manè euigilans cogitabundi instar in lecto immobilis iacebat, è lecto operâ vxoris eleuatus, ab eadem vestibus induebatur, indutus stabat instar statuæ, manu capiti & temporibus sponte admotâ, quod præter modum tristes facere solêt, suspirabat, impulsus, & manu deductus, incedebat, ad scamnum vel sellam adductus sedebat: instigatus inde assidebat, cibum à coniuge in os insertum edebat, & cantharo ori applicaro, quem monitus arripiebat & tenebat, bibebat. Hic affectus durauit toto autumno: media hyeme minui cœpit, ita, vt tandem restitutus munus Ecclesiasticum iterum obiret, cui adhuc præest: tristior tamen, quia naturâ melancholicus longo tempore est deprehensus.

#### Causse.

Causse huius mali à melancholia per consensum totius & cordis non multum differre videntur. Etenim hic humor melancholicus in toto cumulatus, illâque dispositionem, quæ melancholicum delirium inferre potest, acquirens, sibi similes vapores cerebro communicans, spiritus animales ita reddit fixos, & quodammodo immobiles, vt præter illa firmiter cœcepta & impressa phantasmata nulli fermè speciei phantasticæ efformandæ, & rationi representandæ apti & idonei sint. Vnde phantasia & ratio speciebus illis firmiter inhaerentibus occupata, nec obiectis aliis attendere, vel illa satis cognoscere potest. Hinc per consequens nullus rerum obiectarum appetitus, & voluntarius ad illa motus sed mera apparens stupiditas. Hoc enim sæpissime habet hæc melancholiæ species, quod causa sit vehementior, vt pore quæ non tantum tristitiam & delirium melancholicum inferre, sed & spiritus torpidiores, & quasi fixos ac immobiles reddere valet; idque propter naturam humoris melancholici, & vaporum inde ascendentium. In casu verò antea proposito melancholicus humor æstatis tempore nonnihil caloris præternaturalis acquirens, & sic quodammodo adustus existens, delirium vehemens excitauit, & quasi maniacum. Absumptis autem tractatu temporis partibus calidioribus, vel fixioribus redditus, segnius animum irritare, tandemque spiritus planè torpidos reddere cœpit.

#### Signa Diagnostica.

Signa huius melancholiæ non est opus prolixè recensere; cum ex eius descriptione sint manifesta. Parent etiam ex historia supra recensita. Hoc tantum mpendum, nonnullos Medicos historias duas à Ferrello, lib. 5. de part. morb. ac symptomat. cap. 2. descriptas, non esse Catoche, sed melancholia attonita laborantium, existimare. Verum falluntur, & non parum interest inter Catochen & Melancholiam attonitam. Etenim in historia prima primus illorum repère hoc vitio correptus est; melancholia a. hæc plerumque lentè inuadit. Deinde omni sensu & motu caruit; melancholici attoniti verò sensu & motu præditi sunt; etsi sensibus illis tam promptè non vtantur, vt sani: quia illorum phantasia in certum phantasma defixum reliquis obiectis nõ

attendit. Alter in historia secunda non vidit, neque audiuit, neque sensum tactus habuit; melancholici attoniti verò vident, audiunt, & sentiunt, licet hoc se facere verbis non proferant. Deinde ille membra habuit, in loco & situ persistentia, fixa & stabilia, quod fuerunt ab astantibus locata; melancholicus verò attonitus ex historia superiore brachium spontè eleuauit, & capiti admouit, bibens cantharum manu tenuit. Catoche etiam correpti oculos apertos habent, loqui non possunt; quod non animaduertitur in melancholia attonita laborantibus.

#### Curatio.

Decura in specie aliquid addere opus non est. Est enim eadem, quæ aliorum melancholicorum; nisi quod ob causam vehementiorem fortiora medicamenta requiruntur.

### CAPVT XV.

#### De Mania.

Mania Græcis *μανία*, id est, insaniendo dicitur, (ineptè verò à nonnullis à manibus, id est, diis infernalibus, vel *μανία*, vel *μαντιόμα*, vel *μανία*, id est, Lunâ deducitur) iisdem etiam *ἐκστασις* est, vehemens mentis motus & delirium. Vocabulum Maniæ & Latini retinent; iisdem quoque Insania nominatur; quamquam Celsus nomine Insaniæ omnia deliriorum genera complectatur; iisdem & Furor dicitur. Neque Medici Ciceronem sequuntur, qui, lib. 3. Tuscul. quæst. scribit, Latinos eam affectionem furorem appellare: quam Græci Melancholiam. Non enim Melancholicorum furor est, sed Maniacorum.

Solet equidem Mania melancholiæ sæpe succedere & causæ saltē, ac symptomatum vehementia ab ista differre nonnullis videtur: qua de causâ Tralliano nihil aliud est, quàm intensio melancholiæ ad maiorem feritatem. Verum causæ, melancholiæ & maniæ nõ solum vehemētiā, verum & naturā ac speciem differunt, & interdum per se, ac non præcedente melancholiā oritur Mania, quæ quidem cogitatione, verbo, & opere melancholicorum deliramenta imitatur, sed citra timorem, vel metum, imò cum audacia, iracundia, iurgiis, & mentis perturbatione tanta, vt ægri tanquam immanes bestię obuios quosque inuadant, imò nec sibi ipsi sæpe parcant.

Est nimirum Mania, seu Furor, delirium, seu imaginationis & ratiocinationis deprauatio, sine timore, sed potius cum audacia, temeritate, ira, iurgiis, & ferocia, sine febre, à dispositione spirituum feruida & ignea ortum habens. Vide Institut. lib. 2. part. 3. sect. 3. cap. 7. pag. 398. Imaginantur enim ea, quæ non sunt, & nullum discrimen inter honestum & turpe, bonum & malum, amicum & inimicum agnoscunt. Memoria verò in Mania sæpe maxima ex parte seruat; quod ex cantilenis ipsis familiaribus colligit Aëtius, quarum in furore illi non obliuiscuntur.

Verum vt natura huius mali manifestior reddatur, de loco affecto, & causâ antè dispiciendum. Et quidem locum affectum quod atinet, etsi plerique Medici cerebri solum in Mania affici dicant, & verum sit, delirij huius causam proximè in cerebro contineri: tamen vero valde consentaneum est, cor simul affici, quod affectus illi, & perturbationes animi vehementes, audacia temeritas, ira, & alia animi *μανία* monstrant, quæ etiam ad essentiam Maniæ pertinent, & tamen à corde proueniunt. Præterea & hoc idem persuadere videtur, quod Maniaci, qui in claustris, & domunculis publicis custodiuntur, hybernū frigus, & quidem sæpe nudi, multos annos, sine vlla corporis læsione & iactura

Mania vnde dicitur.

Mania quomodo à melancholia differat.

Mania diffinitio.

In Mania præter cerebrum & cor affici.

iactura ferunt, ac, quod mirandum, si tangantur, non frigere, sed calere in medio frigore hyberno deprehenduntur, ut videre est apud Forestum, *lib. 11. obseru. 20.* Quanquam enim consuetudo etiam hic aliquid facere possit: ramen eam solam non sufficere, aliorum exempla docent. Qui calor in vniuersum corpus, nisi corde affecto, vix diffundi potest: & credibile est, non solum spiritus animales, sed & vitales, feruidos, & quasi igneos euasisse; sicut idem iis, qui vino inebriantur accidit.

### Causa.

Mania Causa  
sa coniuncta.

Causam primam & coniunctam Maniæ feruidam, & igneam quasi, spirituum dispositionem esse diximus. In quo si quis acquiescere nolit, sed occultam aliquam qualitatem addere velit, ei facile assentiamur. Facit id Platerus, qui quidem non negat, in hoc affectu humorem atrum adesse; verum manifestam qualitatem contentus non est, sed malignam, occultam, & venenatam qualitatem addit, necessariumque putat, ut humor arer hanc dispositionem suscipiat, si maniam inducere debet, atque impossibile esse existimat, ut tam enormia accidentia, quæ in ægris, ac si veneno perciti essent, sese proferunt, & non breui tempore, sed sæpe multos annos durant, à manifesta causa, & solo calore provenire possint. Etsi enim negari non possit, insignem esse feruorem in sanguine & spiritibus, quod ipsum testatur, ut modò diximus, quod qui in claustris publicis custodiuntur, & nudi misere in stramine volutantur, frigus hybernum multos sæpe annos citra vitæ iacturam ferunt: tamè longè alia in mania est huius humoris conditio, quam aliàs atræ bilis esse solet. Aliàs enim viscera omnia labefactat & corrodit, ac humores fermentat: maniaci verò cætera sani sunt, & viscera salua habent, ac sæpe satis viuaces sunt. Cum isto etiam spirituum feruore nulla febris coniungitur. Ideoque credibile est, aliam adhuc, occultam, & potentioris qualitatem subesse, venenis cognatam, & talem, qualis etiam à venenis quibusdam inducitur. Dantur enim venena, quæ insaniam inducunt, & compertum est, nonnullos à phileris propinatis in maniam incidisse.

Causa antecedens.

Dispositionem hanc spirituum igneam, vel quocunque nomine alio appellare liceat, plerique vel ab intemperie cerebri sine materia, vel à materia simul provenire statuunt. Verum impossibile est, affectum tam grauem & diuturnum, atque in quo non solum cerebrum, sed & cor afficitur, à nuda saltem intemperie provenire; neque credibile est, seu cor, seu cerebrum ita à naturali statu deiici posse, ut non simul humores afficiantur. Causa ergo antecedens semper coniungitur, materia nimirum simili qualitate prædita, bilis scilicet atra, hanc igneam & occultam qualitatem adepta, quæ in venæ causæ ramis detinetur, maioribus præsertim; (procul dubio & arteriis) id quod utilitas venæsectionis in hoc malo indicat. Refert enim Platerus, innumeros sanatos fuisse à Chirurgis quibusdam, & aliis, qui ex professio hisce morbis sanandis operam dabant, qui vigesies & sexagesies etiam venas tundendo, nunc brachij, nunc pedis, hinc illam, alibi aliam, sine discrimine, insanos plurimos restituerunt, ut postea incolumes longam adhuc vitam vixerint.

Causa antecedens fœder.

Verum continetur hæc materia nunc in vniuersi corporis venis, nunc in venis cerebro propioribus: imò interdum in ipsis cerebri valis; unde etiam mitiora, vel grauiora, & hæc, vel illa symptomata excitantur. Nunquam & circa vterum, ex sanguine illic abundante, & semine retento ac corrupto, talis materia colligitur; unde melancholiam ex vtero quandoque in maniam degenerare, capite præcedente dictum, quæ Furor vterinus appellatur, in quo, tum aliis modis insaniunt fœminæ, tum quandoque etiam concubitus & Venerem vehementissimè appetunt. Cuius rei historiam

Dan. Sennert. Tom. I I.

annotauit Dominicus Leonus, *cap. de mania*, in quadam virgine, quæ ob seminis retentionem, & Veneris desiderium maniaca facta erat, ita ut per agros & sylvas erraret, & obuium quemque ad coitum prouocaret, ac renuentes conuictis, & lapidibus insectaret; quem eius furorem coitus sedauit. Quocunque autem loco prima illa causa contineatur, reliquam sanguinis massam ab ea, quasi fermento & veneno, infici, credibile est.

Et quamquam atra bilis, huius mali causa, ex bile flaua, vel melancholia adusta plerumque generetur: sanguis tamen etiam hoc modo corrumpi potest, docetque experientia, non solum macilentos, fulcos, ristes, & qui naturam ad melancholiam proclines sunt, hoc malo corripitur; sed omnibus naturis hoc malum accidere posse.

Feror autem ille sanguinis & humorum etsi vehemens & acris sit: tamen putredine & inflammatione caret, ac propterea mania sine febre est.

Causas remotiores & euidentiores quod attinet, gignitur ille feruidus humor vel in hepate, ob calorem illius nimium, vel cum chylus calidior in ventriculo genitus ob calidiorem victum hepatis suppeditatur.

Causa remota & euidentior.

Quod faciunt & hæmorrhoidum ac mensium purgationes, & post partum in fœminis euacuationes retentæ; item fistularum & vlcera antiquorum occlusio, vel varicum curatio; sicut de Mario referunt, eum euasisse maniacum, postquam varices in cruribus ei Medici exemissent.

Externæ causæ sunt aeris constitutio calida; unde tempore æstiuo, & circa caniculares; ut & in autumno, 3. aph. 22. magis, quam alio tempore, infestat hoc malum; atque aliæ causæ, ob quas humores aduruntur, & maniacam *seditionem* acquirunt. Quod pertinent & morbi præcedentes, qui humores adurunt, sicut interdum phrenitidi Mania succedere solet.

Inter euidentes autem causas præcipuæ sunt duæ: diurna mœstitia, curæ & sollicitudines, præcipue excandescentiæ, & iræ concurrente, quo modo Ajax in Maniam incidit, & sibi ipsi manus violentas intulit; & sæpe melancholiæ diuturnæ mania succedere solet.

Et huc etiam pertinet insania ex amore. Etsi enim supra, c. 9. inter melancholiæ differentias de melancholia ex amore egerimus, tamen ut aliæ melancholiæ; ita & hæc, si diutius durer, tandem in ipsam maniam degenerat, atque ad hoc caput pertinet.

Deinde venena assumpta, quorum quædam insaniam inducere posse, iam antea dictum. Ita solanum, quod maniacum inde dicitur, insaniam inducit: idem facit cerebrum felis comestum, mustela, morsus canum, luporum, & aliorum animalium rabiosorum. De quibus Dioscorides, *lib. 6.* Pertinent huc & philtrea, de quibus Poëta:

*Philtrea nocent animis, vimque furoris habent.*

Ita Lucretium amatorio poculo accepto in delirium hoc incidisse scribunt. Vinum quoque fulmine congelatum, cum redit ad pristinam constitutionem, potum, aut enecare, aut insaniam inducere referunt. Quibus omnibus non sine causa addi potest vis illa superior dæmonum, quæ Dei permisso humoribus vitiosis sese associat, talemque insaniam inducit; unde Maniaci sæpe talia loquuntur, agunt & perpetrant, quæ vix ad causas naturales reduci possunt.

### Differentia.

Differentiæ Maniæ respectu varietatis delirii sunt, *Mania differentia*, quod delirium aliud est breuius & mitius, aliud vehementius & diuturnius.

Deinde quod Mania nunc à causa interna, nunc externa ortum habet, quodque maniaci interdum certarum bestiarum feritatem imitantur; præcipue in duo genera Mania diuiditur. Prius est, quod speciale aliquid, præter delirium illud cum audacia, iracundia, & reliquis

M m mania

manix symptomatibus, non obtinet, neque ab animalis alicuius veneno inductum est, sed à causa interna ortum habet, neque alicuius bestix mores in specie refert, quod etiam *ἐκαστος κατὰ γένος* à nonnullis nominatur. Alterum verò genus est, quòd aegri vnius bestix mores in specie referunt, quòd etiam plerumque à veneno, & morfu talium bestiarum rabidarum communicatur & inducitur; qualis est Lycanthropia, rabies canina, lupina, ac felina. De posteriore hoc genere dicitur *c. seq.* Prius quod attinet, quòdque hoc capite tractamus, etià ex humoribus aliqua eius delirij possit constitui differentia, & humores in iis, qui in insaniam incidunt, varij reperiri possint, atque in aliis sanguis, in aliis bilis flava, in aliis melancholia, & humor ater abundet, & propterea etiam ij, in quibus sanguis abundat, mitius insanire, ridere, & frequenter cantare soleant; qui bile abundant, temerarij sint, & iracundi; ex atio verò humore triste & ferinum delirium oriatur: tamen, in omnibus maniacis humores in atram bilem degenerasse oportuit, quæ tandem igneam, vel potius malignam, & occultam illam dispositionem suscipit.

Et siue homo, antequam eum mania corripit, sit sanguineus, siue biliosus, siue melancholicus, quod è suis signis dignosci potest: tamen maniacus non euadit, antequàm humor, quicunque etià, specificam illà, igneà & occultam dispositionem acquirit; atque ideo curandi ratio parum discrepat. Hoc tamen non prætereundum, cum materia illa vel æqualiter per omnes venas diffundi possit, vel vno in loco præcipue contineatur, & hinc in alia diffundatur, si materia est in venis, vel omnibus, vel membris principalibus propioribus, insania est perpetua & continua: quod si vno in loco præcipue concludatur, circa vterum, vel alium, habet delirium hoc interdum quasdam remissiones & interualla.

#### Signa Diagnostica.

Signa diagnostica ipsius affectus.

Mania leui negotio cognoscitur ex imaginatione & ratiocinatione deprauata, cum aegri, & falsa imaginantur, & absurda & inepta multa agunt & quidem sine timore, sed potius cum audacia, temeritate, loquacitate, iurgiis, iracundia, sanitate in se & alios, & omnino animi perturbatione tanta, ut aegri bestiarum instar obuios quosque inuadant; & morfu, vnguibus, aliisque, quibus possunt, modis, noceant, nec sibi ipsis parcant, sed vestes dilanient suas, ac manus violentas sibi inferant, & propterea custodia & vinculis continendi sint, è quibus tamen omni conatu erumpere conantur. Vigilant præterea Maniaci pertinacissime, ut referat Fernellius, quædam menses 14. insomnes duxisse; ac inusitato atq; admirando corporis robore valent, quod ratione deprauatà solus appetitus dominatur spiritibus animalibus, iisque igneis quasi, & feruidis à mentis functionibus ad nervos & musculos totis conuersis. Oculi multis sunt sanguinolenti, aspectus toruus & truculentus.

Signa distinctiva.

Atque his moris maniam ab aliis cognatis affectibus discernere non erit difficile. A phrenitide differt, quod non febricitant maniaci, neque alia cerebri inflammati signa adsunt: à melancholia, quod non est cum timore & tristitia, sed potius cum audacia & iracundia: à dæmoniis distinguuntur Maniaci eo, quod dæmoniaci quæ supra humanam potestatem sunt agunt, ut quod linguis peregrinis, & quas nunquam didicerunt, loquuntur; futura prædicunt, sæpe per vomitum particulas ferri, globos plumbeos, puluerem tormentarium, animalia viua, & alia, quæ naturaliter in homine generari non possunt, eiiciunt; cuius rei exemplum habetur apud Hildesheimium, *spec. leg. 2. p. 186.*

Signa causarum.

Causarum signa quod attinet, humorum in capite abundantium signa suprà, *part. 1.* sunt proposita. Euidentes causæ ex relatione aegri, vel astantium, & iis, quæ præcesserunt, cognoscuntur. Si ex amore sit insania, cognoscitur, ut suprà, *cap. 9.* dictum. Si ex vtero, præcessit

menstruum obstructio, & alia, quæ cap. *præced. de melancholia ex vtero*, sunt proposita.

Nonnulli etiam signa instantis manix recensent, enumeranturque ab ipsis, capitis grauitas, aurium tinnitus & sonitus, splendores oculis obuersantes, vigiliæ immodicæ, curæ & sollicitudines, ira ex leui occasione, oculi caui & fixi, consueti hæmorrhoidum & mensium in feminis fluxus suppressio. Verum etsi hæc, & alia, quæ nonnulli recensere solent, Maniã præcedere consueuerint: tamen non omnes, quibus ista conspiciuntur, mania corripuntur, sed, exempli gr. ex hæmorrhoidibus, & mensibus suppressis alia quoque mala excitari possunt; & symptomata modò enumerata multos affligunt, qui nunquam maniaci euadunt. Hoc manix instantis certius signum est, si aeger quacunque etiam de causa delirare, & melancholiã corripere incipiat, & simul in obscenitatem, & ineptum risum pronus sit, siq; qui antea blandus erat, leui de causa valide exadescat, & animo vehementer perturbetur, oculorum obtutus sit intentus, fixus, & toruus.

#### Prognostica.

1. Malum hoc diuturnum, & curatu difficile est, ac non solum per menses, sed sæpe multos annos durat, & ægros vsque ad mortem comitatur. Est enim atra bilis humorum omnium pessimus & pertinacissimus, præcipue si malignitatem induat, ac habet se instar fermenti; nec malum cessat, quamdiu istius materiae aliquid in corpore superest. Præterea in usurpandis medicamentis Medico aegri non non obtemperant & obediunt, nec in isto furore persuaderi possunt, ut idonea medicamenta admittant.

2. Minus tamen periculosa est insania, quæ sit cum risu, & mitioribus symptomatibus, quam quæ cum studio, & insigni feritate accidit.

3. Si menses & hæmorrhoides fluant, bonum.

4. Bonum est, si aluium laxam habeant aegri: quod si non fiat, malum.

5. Quanquam verò curatu difficilis est hic morbus: tamè per se lethalis nõ, & nisi aegri vel sibi ipsis manus violenter inferant, vel alij morbi accedant, raro ex hoc malo moriuntur, sed sæpe vsque ad mortem malum id eos comitatur. Qui autem fiat, quod maniaci sæpe tamdiu cū tot in diæta erroribus viuunt, postea, *quæst. 7.* dicitur.

6. Via ad interitum, nisi aegri sibi ipsis violentas manus inferant, aut sponte in vitæ periculum sese coniciant, est vitium dissolutio, quam afferunt vigiliæ continuæ & longæ, abstinencia à cibo, & fames, quam interdum aegri pertinacissime perferunt, & motus violenti, quibus continuo ferè exercentur.

7. Ad salutem verò terminatur Mania, si insignis aliqua fiat persudorem, vel alui fluxum euacuatio, aut copiosa hæmorrhagia è naribus, hæmorrhoidibus, vtero, varicibus; vel artis præsidis spiritu ille feruor, & praua qualitas remittatur & corrigatur, & humor, qui proximam causam fouebat, euacuetur. De quo Hippocrates, *6. Aphorif. 2.1. Si insanis varices aut hæmorrhoides superueniant, fit mania solutio.* Potest & huc referri *aph. 5. sect. 7. Post Maniam dysenteria, aut hydrops, aut exsiccatio, bonum.* Soluitur enim Mania, & in alium morbum mutatur humore vitioso ad inferiores corporis partes robore naturæ per crisin, licet imperfectam, depulso, & ad intestina misso, & per ea euacuato; aut eodem intra abdominis cavitatem cumulo; aut quando furiosa insania in taciturnam & silentem desipientiam mutatur, acrimoniã humoris à natura deuicta & castigata. Alij tamen hic per *ἐκσάνν* vehementem furorem intelligunt. Dum enim natura humores coctos per crisin esse euacuatura, vehementissima antecedere solent symptomata, ob materiæ motum & impetum.

Etsi verò morbus in alium morbum hic mutetur: tamen qui succedit, non ita periculosus est, ut pote adhuc fies. Et morbi per crisin facti sæpe citius curantur, si remedia



remedia adhibeantur; cum humores illi magna ex parte à natura victi & cocti sint.

*Indicationes.*

*Indicationes.*

Cum Maniæ proxima & continens causa sit feruida illa, ignea ac maligna, si ita appellare libet, spirituum dispositio; ista verò à simili humore dependeat, & foueantur: primò omnium humor ille vitiosus præparandus & euacuandus est.

Deinde danda opera, vt idem à partibus principalibus, cerebro & corde, auertatur & repellatur.

Tertiò intemperies illa, & dispositio, cum spirituum humorum, alteranda & mutanda. Et si materia magis in vna parte, quàm alia contineatur, cum in euacuando, cum in alterando eius partis præcipuè ratio habenda est. Ac cum cerebrum & cor in primis afficiantur, ad eas partes maximè respiciendum. Sic & hepar & lien refrigerandus, si sanguinem calidiorem ac feruidiorem suppedient; ac omnino præcauendum, ne materia vitiosa amplius, atque iterum generetur. Denique symptomata, quæ grauiter infestant, vt vigilæ, mitiganda.

*Curatio.*

*Sanguinis Euacuatio.*

*Vena sectio.*

Inchoanda autem est curatio à venæ sectione, cui, si æger persuaderi queat, clyster præmittatur, vel aliud medicamentum primas vias euacuans. Et omnino venæ sectionis magna est in hoc morbo utilitas, vt pote, quæ non solum sanguinem & humores in venis contentos euacuat, & à cerebro reuellere ac deriuare potest, sed & ex accidente refrigerat. Potestq; sanguis hic pluribus modis peccare, vel vt causa principalis, in iis scilicet, in quibus sanguis abundat, vel vt causa adiuuans vbi materia maligna miscetur sanguini, vel etiam vt causa sine qua non, vt aliis auxiliis locus detur. Testaturq; Platerus, Practicus Experientissimus, vt antea etià dictum, se longâ obseruatione comperisse, innumeros ab aliis Medicis derelictos sanguinis missione sanatos fuisse à quibusdam chirurgis, vel aliis, qui ex professio huius malis sanandis operam dabant, qui vigesies, & sexages quoque, venas tundendo insanos penitus ita restituerunt, vt postea incolumes adhuc longam vitam vixerint; qui in vena certa eligenda nihil laborarunt, sed nunc brachij, nunc pedis, hanc, illamve, nunc alibi sine discrimine aperuerunt. Quod remedij genus & ipse, sed maiori curâ & prouidentia quàm illi, methodicè præmissis semper alui purgationibus, usurpauit.

*Quandâ vena aperienda.*

Primò ergo vena aliqua visui & tactui magis obuia in brachio, & præcipuè in sinistro, aperienda. Deinde in manibus, saluatella; in pedibus, maximè in fœminis, saphena; vel quæ ad pollicem pedis excurrit. Varices quoq; si in cruribus, vel alibi apparent, cum magnâ copiam melancholici humoris, ad eū locū detrusi, contineant, aperiuntur, & non statim sanentur, hæmorrhoides, si fieri potest, prouocentur. Cum enim à maniâ præseruare soleant, & sponte aperta à maniâ liberent, Medicus naturam imitari, ac materiæ inclinationem, sequi debet. Menses quoque in fœminis, si debito modo non fluant, prouocentur, Venæ etiam frontis in pertinaciori malo aperiendæ, vt & venæ narium, setis, vel millefolio immixtis. Verum venæ istæ nō omnes simul, aut continuò aperiendæ, sed per intervalla, interiectis humorum præparationibus & euacuationibus, de quibus mox dicetur. Maxima enim curationis spes in his magnis euacuationibus, sanguinis scilicet, & humoris melancholici, per vices factis, sita est. Perpendendus autem sanguis, qui effluit. Si enim sit nigrior, copiosius euacuandus; si rubicundior, parcius.

Post venæ sectionem æger cibo & potu reficiendus,

*Dan. Sennerti Tom. I l.*

& studendum, vt nocte sequenti dormiat; quod iis medicamentis, quæ postea proponuntur, perfici poterit.

Multis quoque profuit, hirudines ad tempora, & post aures, & ad anum, si hæmorrhoides supressæ sint, apponere.

*Humoris Præparatio.*

Venæ sectione, & sanguinis euacuatione peractâ, ad materiæ præparationem accedendum, eaque sæpius repetenda, ac diu continuanda, atque à leuioribus ad fortiora progrediendum. Præparantia sunt refrigerantia, & humectantia, quæ atræ bili conueniunt, ex borrag bugloss, viol. nymph. lactucâ, & aliis supra, part. i. cap. 13. propositis simplicibus. Et licet medicamenta quædam simplicia non semper vtrique qualitate huic morbo conueniant; tamen aliis admixtis, quod deest, potest suppleri. E quibus taliavel similia parari possunt:

℞. Aq. borrag. nymph. an. Vnc. vj. syr. borrag. viol. nymphae, an. ℥. ij. M. Propinentur tribus vicibus.

Vel ℞. Rad. bugloss. Vnc. ij. glycyrrh. Vnc. i. ceterach, fumar. endiu. an. M. j. sem. 4. frig. maior. an. Drach. j. tamarindor. Vnc. ℥. flor. cordial. an. P. ij. Coqu. in aq. pura.

Colaturæ ℞. Vnc. x. syr. viol. de pomis, nymph. an. Vnc. j. ℥. F. Potio pro tribus dosibus.

Vel Colat. adde sacch. suc. de pomis, an. ℥. ij.

Parum ebulliant. F. Iulebus, qui aromatizetur pulu. fantal. citr.

Vtile est & serum lactis, quod non solum ad humorem atrum est præstantissimum medicamentum, sed & tale, ad quod usurpandum facilius persuaderi possunt ægri; cui addi potest syrup. violar. vel rosar. solut. de fumaria.

*Purgatio.*

Postea purgantia usurpanda, & quidem leuiora singulis septimanis exhiberi possunt, fortiora singulis mētib; exhibenda, atque inter ea per vices, vt iam dictū, venæ sectio, si opus sit, repetenda. Et prout bilis, vel ater humor plus abundat, ita ad hunc vel illum magis respiciendum; & usurpanda, rhabarb. sene, epythym. polypodj el. diacathol. diasen. &c. cocta vel dissoluta in sero lactis, addito syr. rosar. solut. vel viol. solut.

*Purgatio.*

Inter fortiora sunt ellebor. nigr. alb. lap. Lazuli, confect. Hamech., Gum, & ex eo parata medicamenta, quæ & ob humoris contumaciam necessaria sunt, & quod minori dosi exhiberi possint, ægris etiam ignorantibus. Ægri enim in hoc morbo non faciliè obtemperant, ideoque fallendi sunt, & medicati vini, vel aliâ formâ, quæ commoda videbitur, ipsis exhibenda medicamenta.

℞. Rad. glycyrrh. Vnc. j. polypod. q. Vnc. ij. helen. ℥. ℥. sem. 4. frig. maior. an. Drach. j. ling. ceruin. capill. ♀. ceterach, meliss. fumar. an. M. j. epythym. Vnc. ℥. tamarind. passular. an. Vnc. j.

Coqu. in aqu. simpl.

In Colat. infundantur, fol. sene Vnc. ij. rhabarb. ℥. ℥. ellebor. nigr. Drach. ij. flor. cordial. an. P. ij. sem. ocym. fœnicul. an. ℥. j. cortic. citri ℥. ij. galang. Zedoar. an. ℥. j. cinamom. ℥. ij. spic. Indic. Scr. j.

Postea ebulliant, & colentur.

Colat. add. suc. pom. dulc. borrag. vel viol. an. ℥. ℥. sacch. q. s.

Coqu. ad syrup. dilutioris consistentiam. Vel, quod commodius, rhabarb. non simul infundatur, sed cum cinamomo nodulo inclusum in syrupo suspendatur.

Vel paratur tale Diacydonium:

℞. Polypod. Vnc. j. epythym. Vnc. j.

Coq. in aqua purâ ℥. j. vel ℥. q. Colentur. Colat. add. carn. cydon. iam coctam, & exprimatur. Expressioni addat sacch. ℥. j.

M m 2

Iterum

Iterum coq. ad formam diacydoniati, cui insperge sub finem pulv. mechoacan. vel potius rad. gualapa Vnc. j. sanatal. citr. zingib. an. Drach. j. M. Dosis est ad Vnc. j.

Vel exhibeatur hic Pulvis aliquoties:

℞. Fol. sen. el. Vnc. j. sem. anisi, fœnicul. an. Drach. j. glycyrrhiz. flor. viol. an. Drach. ℞. cremor. tartari Drach. vj. F. Pulvis.

Cuius dosis Drach. j. vel 3. j. ℞. Si minor dosis, vel fortior operatio expeditur, addere licet lap. Lazuli, vel diagryd. Scrup. j.

Vel paretur talis Pulvis:

℞. Lap. Lazuli Drach. j. ℞. diagryd. vel extract. scammon. Scrup. j. turbit. Drach. j. sena Vnc. ℞. epitym. cremor. tartari, an. Drach. ij. sem. anisi, cinamom. cortic. citri, an. Drach. j. croci Scr. ℞.

F. Pulvis, cuius dosis 3j. vel ʒ. jv. primâ vice exhibeantur.

Vel paretur talis Potio:

℞. Cortic. helleb. nigr. prepar. (quod fit, si f. q. acc. ti, vel vini, cum sem. anisi, aut in aq. vel decocto dilutiore fœnicul. vel anisi 24. horis in balneo macerentur, & postea liquore effuso rad. asseruentur) Vnc. ij. fol. sen. foelic. sen. Vnc. j. ℞. sem. fœnicul. anisi, an. Drach. vj. flor. cordial. an. M. ℞. cortic. citri Vnc. ℞.

Macerentur in mensur. vini albi tenuis duabus, Colentur sine expressione, & per manicam Hippocr. traiciantur, ac dulcorentur iulepo rosar. & violar. atque aromatizentur santal. citrino.

Et imprimis hellebor niger utilis est: ideoque eius extract. vel in formâ pilular. vel syrup. exhiberi potest.

Vt ℞. Extr. hellebor. nigr. Scr. ij. syr. viol. Vnc. j. borrag. Vnc. ℞. M.

Si hæc non suffecerint, potest exhiberi ʒium, & ex eo parata medicamenta,

Tandem helleborus albus, quo antiqui frequentissime in talibus morbis vsi sunt, adeo, ut in pro- uerbio eos, quos insanire dicere volumus, *Helleboro purgandos* esse dicamus, sed cautè, adhibendus, & corpus ad eius usum rectè præparandum; de qua re videantur tum alij, tum Heurnius, lib. 2. meth. ad praxin. c. 21. & Iohan. Baptista Codronchius, in Commentario de Helleboro.

Cor. & Cerebrum roborantia.

Purgatione vnâ atque alterâ peractâ, ea simul vsurpanda, & intericienda, quæ cor & cerebrum corroborant, sanguinem & spiritum mundant, ac fuliginosas exhalationes discutiunt; qualia parantur ex rosis, violis, nymphæa, bugloss. borrag. fl. tunic. melissa, scorzonera, cortic. citri, pomis odorat. sp. diamargar. frig. confect. de hyacintho, alkermes: quæ ipsa vnâ operâ humorem atrum alterare & præparare possunt.

Vt ℞. Conserv. rosar. incarnat. borrag. bugloss. an. Vnc. j. cortic. citr. condit. Vnc. ℞. Affunde aq. borrag. bugloss. viol. an. Vnc. iij. nymph. rosar. an. Vnc. i. M. diligenter in mortario marmoreo, & colentur. Colaturæ adde succi citri, granat. syr. tunic. an. Vnc. j.

Traiciantur per manicam Hippocratis, addendo cinamom. santal. citr. an. Drach. j. F. Potio clara.

Vel ℞. Conserv. rosar. violar. bugloss. borrag. tunic. an. ʒ. ℞. meliss. cortic. citr. condit. lactuc. Ital. condit. an. ʒ. ℞. pulv. sem. ocym. sp. diamagr. frig. diarrhod. abbat. an. Scr. ij. conf. Et. alkermes. Drach. j. Cum syrup. nymph. & succ. citri. F. Electuarium.

Vel paretur talis Pulvis:

℞. Sem. ocym. santal. citr. cortic. citr. an. Drach. j. fl. cordial. an. ʒ. j. meliss. Drach. ℞. margarit. preparat. sp. el. de gemm. frigid. de hyacintho, an. Scrup. j. F. Pulvis.

Somni conciliatio.

Et cum vigilæ in hoc malo sint pertinacissimæ, ut ægros nonnunquam per aliquot menses non dormiuisse observatum sit; somnus tam externis, quam

internis medicamentis prouocandus: de quibus supra, capite primo, dictum.

Monendum tamen hîc, somniferorum non eandem esse naturam. Quædam enim licet somnum inducant; spiritus tamen magis turbant, & ubi ægri euigilant, longè inquietiores, quàm antea, euadunt, ac malum curatu difficilius reddunt: qualia sunt, hyoscymus, solanum furiosum; imò nec opium ipsum, nisi corrigatur, ab hac noxa immune. Et sicut nemo vino, vel ebrietate, quæ etiam somnum inducunt, maniacos ad somnum deducere audent: ita quoque, cum hîc non solum somnus queratur, sed somnus quietus, & hinc spirituum quietatio: ea eligenda, quæ simul spiritus quietos reddunt.

Inter externa commendatur succus sedi maioris recens expressus, capiti impositus, & aqua eiusdem. Utilis est & aqua solani, & papaueris.

Inter interna à nonnullis laudatur Mâdragora, quod nō solum somnum inducat, sed & spiritus quietos reddat, ac, ut Dioscorides habet, etiam bilem atram vomitu educat, sanguinemque & spiritus puriores reddat. Coquantur autem radices in vino bono, & decoctum exhibetur.

Occurrunt etiam quædam Empeirica apud Auctores, quorum proba est penes experientiam, Commendatur cerebrum arietis nondum Venerem expecti, si nimirum caput vno ictu ipsi amputeretur, & totum cum pelle, cornibus saltem abiectis, coquatur, cerebrumque postea cum farina, additis cinamomi, zingiberis, nucis moschat. macis, caryophil. an. Vnc. ℞. (foras, Drach. ℞.) super prunis misceatur, & in partes tres diuisum manè exhibeatur, ita, ut post sumptum medicamentum duabus horis nihil comedat æger, ac in ceteris quoque rectam dietam obseruet.

Retulit mihi nuper quidam vicinæ Ecclesiæ Pastor, in suo pago intra triduum sanatum fuisse maniacū exhibitō canis cerebro cocto, (addebat, vnius coloris canem esse debere) affirmabatque, sibi præterea alios tres notos esse, qui eodem medicamento sunt sanati. Alij commendant emulsionem ex sem. papau. albi, nuc. iugland. semin. nigell. cannab. granis iuniperi, thur. factam cum cereuisia calida. Specifica etiam proprietate huic malo resistere creditur radix nymph. luteæ, quæ mense Maio effossa, & decrescente in tessellâs dissecanda, & cum aceto vini leniter decoquenda, hinc rursus exsiccanda in umbra, & in pollinem redigenda inque usum reponenda, de qua Maniacis manè & vesperi Drach. j. vel Drach. ʒ. ℞. cum tribus cochl. prædicti aceti ex decoctione reservati propinetur.

Commendantur & folia buxi;

℞. Fol. buxi num ix.

Scindantur in minimas particulas, & exhibeantur in vno atque altero cochlear. aq. lauend. ieiuno ventriculo, (præmissis tamen præmittendis) & si fieri potest, sudor eliciatur: repetaturque hæc dosis semel atque iterum.

Nonnulli imprimis laudant sanguinem asini ex venis post aures emissum. Venas post aures aperiunt, sanguinemque linteolis mundis, nulli vsui antea expostis, excipiunt, eaque siccant, atque ex his vnum digitos duos latum, pollicem verò longum, accipiunt, & in haustu aquæ fontanæ macerant, aquamque illam manè tribus diebus exhibent, dantque operam, quantum possibile, ut æger sudet. Nonnulli valde laudant decoctum anagallid. flor. purpureo.

Quo pertinent & Amuleta, quæ à nonnullis commendantur, de quibus etiam penes experientiam esto iudicium: radix eryngij, bryoniæ, hyperici, de collo gestata. Adamas sinistro lacerto alligatus, lapis chrysolithus, lapis Lazuli gestatus, lapis Chelidonium rufus panno illigatus, & iuxta sinistra ala detentus.

Chymici commendant saccharum Ani, & liquorem seu tincturam coralliorum, lap. Armeni, lap. Lazuli, sapphiri,

*sapphiri, spir. margaritarum, sal angelica, pimpinella, & alia.*

Laudatur & Nitrum, neque sine causa. Cum enim malum hoc ab impuris, feruidis, & inquietis spiritibus ortum habeat; nitrum non solum omnem fumum crasum, & flammam fumosam clarescit, sed & volatilia figit, ideoque cereuisia, dū feruet, aliquid  $\textcircled{D}$  nonnulli adjiciunt. Ita enim non solum cereuisia purior & clarior redditur, sed & obstructions aperiuntur, crassities & fuliginosa sanguinis ac spirituum dispositio emendatur.

Vtilis est & spir. vitrioli, præcipue si sit mania ex iracundia, aut cum iracundia multa conjuncta. Iracundiā enim affectis maximè resistit spir. vitrioli.

Topica.

Quantum ad Topica, si æstus & furor vehemens sit, repellentia mox inter initia applicentur, vt oxyrrhodinum, addito oleo anethin. aut chamamel. & aliis, de quibus supra, *part. i. cap. 13.*

Circa quorum vsum hoc obseruandum, vt humectantia potius præpolleant, quam refrigerantia: ideoque merè frigidis vix vtendum, sed flor. chamamel. aliquid addendum, vel pōst adhibenda resoluentia & discutientia. Deinde topica non actu frigida, sed tepida applicanda. Commodè ergo caput fouetur ol. violar. nymph. cui aliquid ol. chamamel. addatur, vel omentumagni tepidum capiti admoueatur, vel foueatur caput decocto maluæ, viol. lactuc. nymph. chamamel. sem. lini, aneth. papau. lactuc. fl. stæchadis, rosarum, vt & succo polygoni, plantag. vel aquis destillatis eorumdem, vel similibus.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Herb. verben. fragar. an. M. j. beton. M. ii. sem. cannab. Vnc. j. sem. coriandr. Vnc. β. mily. Vnc. j.*

Incisa & contusa includ. sacculo ex tela linea parato, qui in vino coquatur, & vertici calidè admoueatur.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Verben. M. j. β. sabina, lupuli, an. M. j. placentam rosarum num. j. granor. juniperi Drach. vj.*

Concisa grosso modo indantur sacculo in aqua communi coquendo, & vertici imponendo.

Vel imponatur capiti sequens Placenta seu Cataplasma:

$\mathcal{L}$ . *Placentam rosarum num. j. granor. juniperi M. β. sem. lactuc. Drach. j. papau. nigri Drach. ii. spir. vini Vnc. sem. albumen oui j.*

Contundantur cum s. q. aq. rosarum, in fine addendo seminis carui vel cumini parum.

F. Placenta, quæ vertici imponatur.

Singularia repellentia in hoc affectu esse perhibentur succus ex cancribus viuis contusis linteo exceptus, qui fronti applicetur, & quoties siccescit, mutetur, & renouetur. A Chymicis mirè laudatur Balsam. N. quod fronti & temporibus inungendum. Nitr. præparatum, quod cum modico camphora in aq. nymph. dissolutum, cum petiis capiti applicatur. Tinctura santali rubri cum aq. rosarum præparat. in cuius Vnc. v. dissoluantur camphor. gr. ix. moschi gr. v. & calidè capiti raso imponantur.

Commodissimæ sunt lotiones capitis, quas, vt consuetas, facilius, quàm alia medicamenta, ferunt ægri; quæ, si symptomata vrgeant, singulis diebus semel, vel etiam bis vsurpentur. Intermittendum autem est in lotionibus hîc lixiuium, cum nimium siccescit, sed aqua dulcis sufficit, cum speciebus modò dictis.

Vtilis est & hic Sacculus:

$\mathcal{L}$ . *Sem. cannab. Vnc. iiii. coriandr. mily, an. Vnc. β. herb. fragar. beton. an. Vnc. ii.*

Sacculo insura coquantur in cerenisia, & capiti applicentur.

Corpore euacuato nonnulli etiam calidiora discutientia adhibent; & recipiunt herbas cephalicas, easque in aqua fontana coquunt, postea parant sacculum ex baccis lauri, & rad. hellebori nigri contus. an. q. s. sacculumque istum in decocto modò dicto parum coquunt; hinc diebus 9. continuis caput isto decocto fo-

Dan. Sennerti Tom. II.

mentant, & postea sacculum futuræ coronali imponunt: vnde humores vitiosi per omnia capitis emuntoria euacuatur. Docet enim experientia, helleborum nigrum in morbis melancholicis non solum intus, sed & extra vtiliter adhiberi.

Cauteria futuræ coronali applicata maximè vtilia sunt, vt scribit Gordonius, *cap. de Mania*, probatque id experientia cuiusdam Maniaci, cui cum esset vulnus inflictum capiti cum fractura cranij, quamdiu fuit vulnus apertum, tam diu bene habuit; vulnere sanato, reuersa est Mania.

Cordi quoque prospiciatur. Etenim cum vehementer irascantur maniaci, & feroces sint, magnum æstum circa cor esse credibile est, qui omnino mitigandus.

Ergo imponatur cordi tale Epithema:

$\mathcal{L}$ . *Aq. rosar. nymph. an. Vnc. iiii. borrag. acetos. an. 3. ij. flor. rosar. rubr. sem. ocym. santal. ciurin. rubr. an. Drac. β. camphor. gr. vj.*

Tepidè regioni cordis applicetur.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Vng. rosar. ol. violar. nymph. an. 3. ii. pulu. rosar. rubr. santal. ciur. rubr. an. 3. β. camph. gr. vj. M. F. Vnguentum.*

Vel Sacculus talis paretur:

$\mathcal{L}$ . *Flor. rosar. rubr. violar. bugloss. an. M. j. meliss. M. β. sem. ocym. rad. rhod. santal. ciur. an. 3. β. camph. gr. v.*

F. Sacculus, qui vel siccus, vel aq. rosar. aut vino madidus cordi applicetur.

Ad totum corpus temperandum, acresque vapores discutiendos, balneum tepidum aquæ dulcis vsurpetur, cum herbis refrigerantibus & humectantibus, aut temperatis.

Lotionibus quoque, & frictionibus externorum vapores feruidi à capite reuellantur & dissipentur.

### De Furore Vterino.

Pertinet ad Maniam, & peculiaris ejus species est, *Furor uterinus Mania species.* illa infania, quæ vulgo Furor vterinus dicitur, cum fœminæ in infantiā illā Venere potissimum appetunt, vel eā non satiari possunt.

Cuius causa est, vel semen copiosum, ob plethoram, aut vasorum seminariarum feruorem genitum; vel, si semen præternaturalem caliditatem, & acrimoniam acquirat, & virosū quasi euadat, ex humoribus salis, serosis, biliosis, & acribus, qui semini permiscantur.

Eius causa.

Hinc enim si sanguis feruidus in caput feratur, maniam inducit. Cuius imminentis signum est sanguinis in mammis collectio. De quo Hippocrates, *5. aphor. 40. Quibus in mammis sanguis colligitur, furorē significat.*

Signa.

### Curatio.

Curatur hoc malum, si nimius seminis prouentus prohibeatur, aut legitimā Venere euacuetur, vel medicamentis absumatur, ardorque illius emendetur: & si humores vitiosi & acres semini permisti illud vitiosum & acre reddant; si illi humores euacuentur, seminisque caliditas & feruor remittatur.

Curatio.

Refrigerant semen, & ejus feruorem extinguunt, vel etiam siccando, (in qua classe etiam sunt quædam calida) aut occultâ qualitate absumunt, lactuca, portulaca, mentha, quæ peculiari vi Venere extinguit, semen viticis, inde agni casti dictæ; vnde ad maniam ex femine, & retentis menstruis tale fiat Electuarium:

$\mathcal{L}$ . *Sem. agni casti, gr. juniperi, an. 3. iti. myrsill. 3. β. sem. portulac. lactuca, pæonia, an. 3. i. F. Puluis, & cum melle crudo Electuarium, de quo Drach. i. exhibeatur ante prandium, & vesperi cubitum ituro.*

Reliqua, quæ Venere reprimunt, ex *cap. 10. de amore insano* perantur.

### Diaeta.

Quæ in diaeta sint obseruanda, supra, *part. prim. c. 13. dictum.*

dictum. Quibus saltem hæc addimus : cauendum esse studiosè , ne æger solus relinquatur, vel inter ignotos, vel quos contemnit, aut odio habet. Si opus, vinciantur, & vinculis cohibeantur ægri, & omnia circa ægrum ita comparentur, vt deleatur potius, quàm offendantur : qua in re astantium prudentiâ opus est, vt interdum ipsis assentiantur; non tamen ipsorum delirium confirment. Suavis Musica maniacos sapissime demulcet, vt exemplum Saulis, Israëlitarum Regis, testatur.

Caueat & sibi Medicus, ne aliquid damni patiatur; cum sæpe odium erga Medicum blandis verbis occultent ægri. Somnus, quibus fieri potest modis, prouocetur. In cibo dulcibus & acribus, quæ calidos humores generant, abstinendum. Vino quoque æger abstinere. Neque enim ignem igni addere conuenit. Ac si omnino concedendum videatur, detur tenue, & diluatur, ac temperetur aq. violar. bugloss. rosar. nymph. santalis, julepo rosar. violar. Quæ in re consuetudini aliquid dandum. Qui enim vino assueuerunt, minus eo offendentur; cum exhilaret, modò moderatè sumatur, vel, vt dictum, diluatur. Alius seruetur aperta.

### Q V Æ S T I O I.

*Qui fiat, quòd Maniaci & Melancholici interdum peregrinis linguis loquuntur, & futura prædicunt.*

Sunt quidem nonnulli, qui hypothesin quæstionis in dubium vocant, negantque, vel Melancholicos, vel Maniacos peregrinis linguis loqui, vel futura prædicere posse : sed cum nimis agitationibus moueantur, linguamque etiam variè agitent, & sæpe sonos inconcinnos edant, accidere existimant, vt, cum vulgus illos intelligere non possit, putet, eos Latine, Græcè, aut Hebraicè loqui.

Verum enimuero non est, vt de historiarum veritate dubitemus; cum fide digni authores testentur, rem ita se habere. Refert enim Antonius Guainerius, *tract. 1. §. cap. 4.* se rusticum quendam melancholicum vidisse, qui semper Lunâ existente combustâ carmina componebat Latina, & transactâ combustione, circa duos dies ad aliam Lunæ combustionem, ne verba latina proferre poterat. Idem & alij Medici testantur. Rhases refert, quosdam melancholicos ex illiteratis literatos euasisse, & ea prædixisse, quæ euentus comprobauit. Erasimus Roterodamus, in *Encom. medic.* narrat, quendam Spoletanum idiomatica locutum esse, quæ nunquam didicerat, recuperatâ verò valetudine, & vermibus ope medicamentorum pluribus ejectis, ea loqui amplius non potuisse. Refert quoque Forestus, *lib. 10. obseru. 19.* mulierem melancholicam cantiunculas latinas, & hymnos cantasse, quos nunquam didicerat. Et, *ibidem, in Schol.* se vidisse puerum, nauæ filium, qui, cum in capite esset vulneratus, & deliraret, semper linguâ Germanicâ optimos Syllogismos fecerit, quos postea, cum curatus esset, facere nesciebat.

Causas huius rei alias afferunt. Quidam enim ex astris easdem deducere conantur; inter quos est Guainerius, qui, *loco modò allegato*, vbi pluribus de hac quæstione agit, ex hypothesibus Platonicis & Astrologicis quibusdam ita hac de re philosophatur: Animam, inquit, ante infusionem in corpus omnium rerum notitiâ possidere, sed eam aboleri quodammodo, & obfuscarî, corporis, cui infunditur, vnione, & ergastulo. Recuperari verò per doctrinam, vel per influxum, vel per impressionem Planetarum, qui natiuitati tempore infusionis animæ præsidebat. Et huius impressionis tantam vim esse, vt animam donet potestate talia efficiendi, qualia ipsæ stellæ efficere possunt; faciendi scilicet ex sano ægrum, ex ægro sanum, & alia multa: verum huic potestati resistere corpus, & sensus corporeos;

quibus ligatis, quod fiat in melancholiâ, posse stellæ suas influentias perfectius animæ communicare, atque ita melancholicum illiteratum posse fieri literatissimum, & futura quoque prædicere.

Verum magna petita sunt, quæ præsupponit, & sibi concedi postulat Guainerius: animam scilicet in corpus infundi ex se omnium rerum notitia præditam, per infusionem in corpus obliuione rerum antea cognitarum capi, eamque stellarum influxu rursus excitari; quæ ipsi non conceduntur.

Deinde etsi concedamus ipsi, astra ad temperamentum immutandum multa posse, vel etiam inclinationem ad linguas, aut alias disciplinas imprimere; hoc tamen concedi non potest, astra ipsam linguarum, vel aliarum disciplinarum notitiam inducere posse. Hoc enim si possent, quandoque etiam sanæ mentis homines sine doctrina ad talem notitiam peruenire possent. Neque deprauati sensus plus possunt conferre ad recipiendum astrarum fluxum, quàm bona eorum constitutio. Neque melancholici & Maniaci planè à sensibus abstracti sunt.

Alij humori melancholico id tribuunt. Nam plurimos, qui ingenio, & artibus excelluerunt, vel in administrandis Rebus publ. aut aliis rebus perficiendis plurimum præstiterunt, melancholicos fuisse, deprehensum est. Etiam facultatem linguis peregrinis loquendi, ac futura prædicendi melancholiæ tribuunt, melancholiamque humanam animam ad res miras disponere dicunt; & sicut vinum immoderatus haustum mores hominum immutat: ita etiam humorem melancholicum, si plus iusto abundat, vel à naturali temperie deliscit, mentem hominis immutare, & eam ad res mirabiles perpetrandas disponere putant. Quibus & addunt illud, quod Aristoteles, *7. Eudem. cap. 14.* Melancholicos esse *ἐνθυνοῦντες*, id est, recta habere somnia, scribit.

Verum enimuero nec opinio ista assensum meretur. Etsi enim hoc suo modo concedatur, melancholicos esse ingeniosos, de quo in *Institut. lib. 3. part. 1. sect. 1. cap. 2.* dictum: tamen ea, quæ supra hominis vires sunt, melancholia efficere non potest; qualia sunt peregrinis linguis loqui, & futura prædicere. Etenim etsi in homine ad omnes linguas discendas sit aptitudo: tamen omnes linguæ vsu discuntur; & futura prædicere, solius Dei est, aut eorum, quibus id communicat. Et quod Aristoteles dixit, melancholicos esse *ἐνθυνοῦντες*, eò nihil aliud voluit, quàm eos clara habere somnia, qualia etiam solent esse matutina, non ita obscura, qualia pituitosi & biliosi habent. Neque etiam ebrietas præstare id potest, vt homo aliquid ultra vires naturales agat. Etsi enim ebrii multa confidentius agant, atque audaciores facti voculas aliquas, quas aliquando didicerant, vel Græcas, vel Latinas proferant, & sæpe magis disertî, quàm sobrij videantur: tamen plura non possunt in hac re præstare, quàm didicerunt.

Atque ita quamquam concedi possit, & ab ebriis ac melancholicis nonnulla rectius perfici, quam dum sunt sobrij, & sani: tamen id verum saltem est de iis, quæ antea didicerunt. Nam & vinum, & melancholia, vt Aristoteles, *sect. 30. problem. 1.* habet, *ἀνεπατάδα* sunt, & ad ciendos spiritus, à quorum alacritate omnis ingenij vis pender, plurimum possunt.

Non multum ab hac sententia differt opinio Iani Huarti, Medici Hispani, qui, *cap. 7. ingen. scrutin.* scribit, Latinæ linguæ magnam esse cum anima rationali consonantiâ, & esse quasdam naturas, quæ peculiari ter linguis inueniendis accommodatæ sunt. Ideoque si per morbum illud temperamentum in cerebro excitetur, quod elegantissimæ alicui linguæ necessarium est, illico linguam Latinam hominem obuiam habiturum, & vocabula Latina, etiam citra deliberationem, ei occurrere scribit.

Verum nec hæc opinio probabilis. Etenim præsupponit nondum



*Qui fiat, quod Maniaci cum tot diata erroribus  
tam diu uiuant.*

non dum concessa. Primò homines habere ad linguas inueniendas peculiarem dispositionem. Secundò delirantes saltem linguâ Latinâ loqui, ac linguam Latinam maximam habere cum anima rationali consonantiam. Quorum & hoc nullo fundamento nititur: & obseruatum, melancholicos non solum Latinè, sed & Græcè, & Hebraicè locutos esse. Et quamuis, vt supra, cap. 5. dictum, concedamus, ex morbosa constitutione dispositionem in cerebro aliquam concitari posse, ob quam homo ingeniosior euadat, quàm sanus fuit, vt ejus rei exempla loc. cit. attulimus: tamen ad id quod supra hominis vires, perficiendum nec melancholia, nec alia morbosa constitutio disponere potest. Neque enim linguarum peritia ab ingenio est; sed à memoria. Et quamuis à morbosa constitutione cerebri actiones phantasie & ratiocinationis exaltari possint: tamen memoria, quæ rerum cognitionem præsupponit, ita perfici non potest, vt linguas, quas nunquam cognouit, suppeditare possit.

Alij ergo, cum harum rationum nullam vero consentaneam videant, statuunt, Dæmones, qui morbis sese immisceant, permittente Deo, horum effectuum autores esse. Morbis enim naturalibus similia multa sæpe pari eos; qui à dæmone vexantur, testatur historia, quam habet Fernelius, 2. de abd. rer. causis cap. 16. de iuvene quodam, qui pro epileptico habitus, & in tertium mensem curatus fuit, donec tandem tertio mense dæmon, totius mali autor, se tum Latinè, tum Græcè loquendo prodidit.

Quorum opinioni & nos assentimur; modò rectè explicetur. Non enim omnia, quæ patiuntur melancholici & Maniaci, dæmonibus attribuenda. Etsi enim sæpissime sine vlla corporis morbosa dispositione, Deo permittente, hominem obsidere & occupare Dæmon possit, qui verè obsessi dicuntur & sunt: tamen quandoque morbis, & præcipuè melancholicis, sese immiscet dæmon, & forsitan frequentius hoc accidit, quàm sæpe creditur. Ita in historia Euangelicâ, apud Lucam, cap. 13. v. 12. mentio fit mulieris, quæ habebat *spiritum infirmitatis*, annos octodecim, quæque erat contracta, nec omnino poterat caput erigere. Et præcipuè, vt dixi, humori melancholico sese immiscet dæmon; vnde etiam melancholia Balneum diaboli dicitur. Melancholici enim, & attri humoris ea natura est, vt varia phantasmata & deliria pariat, metum, mœstitiâ, ferocitatem, & alia multa excitet. Dæmon ergo tali occasione abutens, & se humori melancholico immiscens, multa edit, quæ vulgus sæpe morbo ascribit; cum tamen ascribenda sint dæmoni. Alia nimirum humori vitioso, alia dæmoni ascribenda sunt. A melancholiâ est mœstitia, timor; ab atra bile ferocitas, iracundia; ab vtraque delirium, vigiliâ. Si verò in delirio multa miranda accidunt, si ægri ad desperationem adigantur, sibi ipsis & aliis noceant, si ad impia stimulentur, aut ad maledicendum Deo incitentur, vt ejus rei exempla aliquot habet Platerus, lib. 1. obseru. pag. 44. & seq. ea jam à Dæmone prouenire credendum est; etsi aliis indiciis sese is non prodât. Si verò æger jam linguis, quas nunquam didicit, loquatur, futura prædicat, eo ipso Dæmon se manifestè prodit.

Atque ita rem se habere, patet ex eo, quòd ii, qui à dæmone hoc modo vexati fuerunt, medicamentis idoneis adhibitis curati sunt. Postquam enim subiectum aptum & dispositum amplius non est, deserit dæmon suam sedem, & aliò migrat. Ita Erasmus, in Encomio Medicinæ, refert, dæmonem, qui ab exorcistis curari non poterat, medicamentis exhibitis, plurimisque vermis eiectionis, curatum fuisse, vt amplius peregrinis linguis loqui non potuerit. De quo etiam Langius, lib. 2. Epistola 35. Ita Martinus Rulandus, Pater, dæmoniacum & Maniacum curauit; de quo videatur Cent. 3. curat. 100.

Omnino admiratione & cogitatione dignum est, quòd cum Maniaci tam graui symptomata pariantur, & cum cerebrum, tum cor afficiatur, nihilominus tam diu, & sæpe multos annos, & quidem cum tot in diata erroribus, viuere possint. Hieronym. Mercurialis tres hujus rei causas affert. Prima est, quod viscera nobiliora vitiosos humores à se quam maximè depellere soleant, ac propterea & hic cerebri facultas humorem vitiosum ab eo maximè depellat. Secunda, quia in aliis visceribus similis humor non colligatur; cum ad humorem melancholicum expellendum natura machinata sit amplissimas venas, quæ educant sanguinem melancholicum ab hepate (aut potius à vena portæ) ad lienem, ac lienem ipsum maximum, & ad excipiendum hunc humorem amplissimum. Tertiam causam hanc ponit, quòd, licet portio aliqua colligatur in cerebro, tot tamen sint motus maniacorum, vt satis esse possint ad consumendum illum humorem atrum, ne noceat cerebro.

Verum relinquamus has rationes suo loco. Quamquam enim natura expellat humorem melancholicum, vbi omnia rectè sese habent: tamen in hoc ipso morbo cumulatam esse, & eâ ipsa de causa in maniam ægros incidere, neque etiam motibus illis maniacorum violentis discuti posse, manifestum est.

Causa ergo potius in dispositione humoris hujus quærenda est, quæ omnino talis est, (ab est enim putredo & inflammatio) vt facultatem naturalem, ob cuius læsionem plerique morbi lethales sunt, non afficiat; imò calor ita auctus, aut fixus esse videtur, vt facultatis naturalis robur potius adiuuet, quàm debilitet. Hinc & frigus hibernum, atque alios in diata errores enormes tolerare possunt maniaci. Ad quam rem tamen, vt supra quoque dictum, etiam facere potest assuerudo: sicut sæpe videmus pueros penè nudos facilius, frigus hibernum tolerare, quàm viros quoidam optimè vestibus munitos. Præterea qualitates occultæ sæpe sine vitæ iactura longo tempore in corpore asseruantur: cuius exēpla suppeditat epilepsia, philtrea, & alia venena.

## CAPVT XVI.

### De Rabie, & Hydrophobia.

Reliqua deliriorum genera, quæ partim Melancholiâ, partim Maniæ affinia sunt, hoc, & sequenti capite comprehendemus. Et quidem quæ de iis in Institut. lib. 2. part. 3. s. 1. cap. 7. & sect. 2. cap. 4. diximus, hic non repetemus, sed pauca quædam addemus, & præcipuè de curatione hic tractabimus.

Et primò quidem Lycanthropiam quod attinet, duæ ejus sunt differentiæ: vna Dæmoniaca; altera Naturalis, quæ medicinæ considerationis est, de quâ nihil, præter ea, quæ in Institut. diximus, addemus, reliqua ex sequentibus de Rabie parebunt.

Quantum verò ad hydrophobiam & rabiem; etsi non semper hoc morbo affecti delirant: tamen quia frequenter hoc accidit, & præterea omnes præter voluntatem agunt; etiam inter deliria de ea agendum.

Appellatur hoc malum à plerisque hydrophobia, quod eo affecti aquam, imò omnia liquida, exhorrescunt. Alij sub nomine Rabie caninæ de morbo canis rabidi, de veneno rabidi canis, & aliis, hoc malum proponunt. Verum in genere Rabiem appellare malo; cum non canes tantum rabie corripiantur, & ab eorum morbo homo in rabiem incidat sed, vt in Institut. dictum, etiam lupi, cameli, equi, sues, boues, vulpes, feles, & vt Cælius Aurelianus, libr. 3. acutor. cap. 9. & Aui-

*Quomodo  
Maniaci tam  
diu viuere  
possint.*

*An & alia,  
præter canes,  
animalia in  
rabiem agan-  
tur?*

cennas, 6. quarti, tract. 4. cap. 5. & 6. habet, vrsi, leopardi, asini, muli, mustelæ, simiæ. Baccius, in tract. de venen. etiam gallum in rabiem actum fuisse, & ab eo hominem interemptum, vidit.

Plerique tamen à cane Rabiei hoc nomen indiderunt, quod frequentius, quam alia animalia, canes in rabiem agantur. Imò sunt, qui existimant, solum canem primariò & principaliter, & ex principiis internis rabie corripì, reliqua animalia omnia saltem secundariò, & malo à cane rabido communicato, eà laborare.

Verum non impossibile videtur, etiam in aliis animalibus hoc venenum generari posse, præsertim iis, quæ cognationem habent cum canibus; quales sunt lupi, qui frequentissimè quoque rabie corripiuntur, ut ex libello Germanico; de lupis rabidis, Ioh. Bauhini patet. An verò in homine etiam generari possit, de eo in Institut. dictum.

Definitio.

Est nimirum Rabies affectus præter naturam, & sæpe quidem delirium, à veneno quodam peculiari in animali genito, & homini communicato genitum, cum vehementi liquidorum omnium, & aquæ potissimum, abominatione.

### Causa.

Rabiei causa.

Mali hujus causa est venenum peculiari modo dispositum, quod ab animali rabido homini communicatur. Et ut veneni hujus natura non in qualitatibus primis consistit, sed à tota substantia, ut loquuntur agiti: ita quoque non ex manifesta humorum corruptione, sed ex proprietate peculiari naturæ animalium infensâ provenit, nò ex qualitatibus primis; quod ex eo patet, quod indies multæ mutationes in qualitatibus primis accidunt, quæ tamen rabiem non excitant; & quod, ut plurimi Medici, & ipsa experientia testatur, non solum maximo æstu, sed etiam per maxima frigora canes & lupi in rabiem agi solent; quod fieri non posset, si à caliditate & siccitate malum hoc originem haberet; cum à causa frigidissima effectus calidissimus fieri nò possit: sed ab utroque excessu hoc accidit, quod uterque humores corrumpere, vel corruptos mouere potest.

Cur autem canis præ reliquis animalibus in rabiem agatur, nonnulli causam ex qualitatibus primis, alij ex temperamento melancholico, quo canis præditus sit, deducere conantur; sed frustra. Nam cum qualitates primæ in aliis animalibus tale nihil efficiant, & nullis indiciis probari possit, canem esse animal melancholicum: omnino etiam hic ad peculiarem proprietatem & inclinationem ad hoc malum contrahendum, quod canis præ reliquis animalibus habet, recurrendum.

Quomodo venenum ab animalibus rabidis homini communicatur.

Communicatur autem hoc venenum ab animali quocunque rabido, seu cane, seu lupo, seu homine, seu alio: & quidem frequenter per morsum & salivam: imò & per osculationem animalis rabidi, quæ seu saliva, seu halitus animalis rabidi excipitur: nonnunquam tamen & per solum salivæ animalis rabidi contactum, aut esum carnis rabidi animalis, ut in Institut. dictum.

Hoc saltem addimus, venenum rabidorum animalium nunc esse fortius, nunc debilius. Si venenum sit fortius, & majoris efficaciz, etiam contactu carnis, præcipuè mollioris, & rarioris, qualis est in lingua & labiis, rabiem inferre potest. Quandoque tamen etiam per cutem densiorem hoc præstat, sicut Matth. de Gradibus, conf. 82. quendam, Iohan. Coqueranum, ex sola manus impositione in os rabidi canis post multos dies rabie affectum fuisse refert; quod idem testatur Petrus Andr. Matthiolus. Si verò venenum sit debilius, non solo contactu, imò nec semper morsu, rabiem infert. Est enim, ut aliorum animalium venenatorum, ita & rabidorum animalium in hoc genere differentia, secundum locorum, temporis anni, ac aliarum circumstantiarum differentiam.

Scribit etiam Aræteus, lib. 1. de sign. & caus. morb.

acutorum, cap. 7. quod à rabido cane, qui in faciem, dum spiritus adducitur, tantummodò inspiraverit, & nullo modo momorderit, in rabiem homo agitur. Et Cælius Aurelianus, acutor, morb. lib. 3. cap. 9. scribit, quod quidam in hydrophobicam passionem devenierint solius aspirationis ardore ex rabido cane adducto.

Post acceptum autem, & communicatum hoc venenum, alij citius, alij tardius in rabiem aguntur; alij quidem statim, & post paucos dies, & infra septimanæ ipsatium; alij post longius tempus. Anton. Muia Brallauolus; lib. 2. Aphor. comment. 23. scribit, repertos aliquos, qui 17. anno post morsum rabiem contraxerunt. Guainerius, in tract. de venen. cap. 12. scribit, se à fide digno accepisse, cuidam post 18. annum malum accessisse. Alzaharavius testatur, expertum se esse, rabidi canis venenum per 40. annos in corporibus delituisse.

Quæ autem causa sit, quod nunc tardius, nunc citius sese exerit, in Institut. dictum. Quibus hoc saltem addimus, ob partis etiam, quæ demorsa est, varietatem nunc citius, nunc tardius in rabiem incidere demorsos posse. Si enim nervus, vena, aut arteria læsa sit, citius, & breviori tempore, per has partes nobilioribus membris venenum communicari potest; quam si pars ignobilior, & cum partibus nobilioribus consensum non habens, demorsa fuerit. Quò etiam facit ipsius veneni natura, quod nunc debilius, nunc validius est.

Quamvis verò diu in corpore possit latere hoc venenum: tamen potius morbus ab eo inductus inter morbos acutos, quam diuturnos referendus. Illud enim tempus, quo actiones in homine adhuc saluæ sunt, & quo venenum nondum lædit, in morbum non computandum est.

Excitatur autem hoc venenum latens in corpore etiam occultis quarundam rerum actionibus; si nimirum quis sub ymbra forbi dormiat, vel commoretur. Narratque Guainerius, tract. de venen. cap. 12. venenum à morsu canis rabidi communicatum, quod per decem & octo annos latuerat, excitatum fuisse, cum morsus sub ymbra forbi maneret, ægrumque intra tertium diem rabidum mortuum fuisse; quod & Fernelius affirmat. Et Matthiolus scribit, si commorsus à rabido animali ante annum exactum tangat vel cornus, vel sanguinariæ plantam, eum in rabiem incidere.

Atque hæc quidem mali huius frequentissima generatio est, & venenum hoc ab animalibus rabidis homini communicatur. Observatum tamen est, venenum hoc, aut certe quod id æmuletur, & si non rabiem, tamen hydrophobiam inducit, brevique tempore hominem jugulat, in corpore humano generari posse, præcipuè ex terrore; cuiusque rei historias quinque recenset Marcell. Donatus, de histor. medic. mirabil. lib. 6. cap. 1. vnam etiam Petr. Salius Diverius, de affect. paric. cap. 19. Præter quæ exempla notabilis etiam exstat historia apud Fel. Platerum, lib. 1. observat. de femina quadam, quæ noctu extra urbem relicta, & deserta, ac solitudine territa, domum reuersâ nec aquam, nec vinum, nec iusculum, nec aliud quicquam deglutire poruit, sed hinc oblatris suffocationis periculum incurrit, imò ex contactu, & conspectu rerum liquidarum; & quod mirum, acré nonnihil agitarè, vel aurâ leuè sentiens idè patiebatur: quæ octavo à prima inuasionè die extincta est.

### Signa Diagnostica.

Cum verò multum referat, malum hoc statim in principio agnoscere, ut medicamentis idoneis ei obuiam iri possit, antequam ad rabiem, & summum, ac incurabilem gradum perueniat; ac verò sæpe incertum sit, an canis, vel alia bestia, quæ hominem momordit, rabida fuerit, nec ne: diligenter danda opera, ut in eius rei notitiam perueniamus; præsertim cū vulnus, quod animal rabidum inflixit à vulnere, quod canis nò rabidus intulit, nihil differat. Ad explorandū ergo, an canis, qui aliquè momordit, rabidus fuerit, nuces iuglandes contritas vulneri

Venenum rabidorum animalium dicitur latere potest in corpore.

An venenum hydrophobiam inducens in corpore humano generari possit.

Signa diagnostica.

vulnere imponere, & aliquot horis, vel per noctem, aut diem (prout vulnus magnum vel paruum fuerit; cum à magno vulnere facilius venenum nucibus communicetur) super vulnere relinquere, & postea gallo vel gallinæ deuorandas obicere. Si enim canis rabidus fuerit, postero die peribit. Alij triticum vulnere imponunt: alij sanguinem ex vulnere detrahunt, & cum farina ofsam inde formant, ac gallinæ obiciunt, quæ si inde moriatur, canis fuit rabidus. Rhases & Auicenna medullam panis vulnere affricare iubent, vt sanguine, vel sanie emanante inficiatur, eamque cani deuorandam obicere, qui si illum non comedere, vel etiam non olfacere velit, vel, si comederit, inde rabidus fiat, aut moriatur; signum est, canem rabidum fuisse.

Verum vt nullum dubium relinquatur, ipsum animal, quod aliquem momordit, considerandum. Secundum Dioscoridem verò canis rabidus potum & cibum auersatur, multam pituitam, sputumque ex ore & naribus emittit, vel potius saliuam siccissimam, & rubiginosam; præter solitum toruus videtur, oculos rubentes & igneos habet, in omnes, notos pariter, & ignotos, sine latratu irruit, eosque morder, domesticos non agnoscit, non latrat, vel parum, vox est rauca. Canes rabidi etiam sunt macilenti, caudam demissam, & sub ventrem inflexam gestant, linguam exserunt, eamque tanquam bile infectam, croceam, rubram, vel nigram; sæpe velociter currunt, mox subsistunt, sæpe in cursu in arbores, vel alia obstacula impingunt, canes alij ipsos fugiunt.

Signa autem incipientis rabiei sunt, anxietas & iracundia sine ratione, ventriculi vellicatio, & grauitas, & querela de aëre inclementiore, & quasi austrino, etsi feruens & mitis sit, corporis grauitas, & impotentia ad omnes actiones, vigiliæ & somnus perturbatus, timor sine causa, paruum bibendi desiderium contra morem. Aegri secum loquuntur, & murmurant, lucem ac lumen accensionem etiam de die optant. In parte olim vulnerata & commota, etsi vlcus, iam diu fuerit consolidatum, dolor quidam percipitur, ac versus caput tendit; quod cum apprehenderit, quædam verrigo excitatur, vt æger rectè progredi non possit. Quæ signa propterea diligenter attendenda sunt; cum sint iam instantis rabiei signa.

Vbi verò iam facta & confirmata est rabies, accidit membrorum quædam veluti distensio, pandiculationi similis, sed non continua; corporis & faciei rubor; ægri sunt anxij, spumant, oculos toruos & aspectu horribiles habent, in proximos exspuunt; quidam more canum, si à canibus morfi fuerint, latrant, & obuios quosque dentibus impetunt, & quidem præter voluntatem. Narrat enim Gentilis, in *Comment. in Auicenn.* adolescentem quendam rabiosum matrem hortatum fuisse, ne sibi propinquaret; siquidem se continere non poterat, quin appropinquantem morfu inuaderet. Aliqui ex iis delirant, alii verò mente constant vsque ad extremum spiritum.

Hoc omnibus commune est, vt aquam, & liquida omnia abhorreant, & cum vident pauxillum aquæ, timeant; ac peius habeant: imò non solum visum, sed nec sonitum & nomen aquæ, & liquidorum ferre possunt.

Etsi vero, vt in *Institut. lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 2.* dictum, alij huius rei causas afferant: tamen maximè probabilis ratio ibi proposita, quod nimirum venenum hoc, quod omnia membra hominis ægri occupauit; peculiarem dissensum & aduersitatem ad omnia liquida habet, & à liquidis exasperatur ac concitatur, vt ferocius in partes infirmas sæuiat. Vt enim qui à phalangij specie, quam Apuli Tarantulam vocant, icti, audito musicorum instrumentorum sono statim exiliunt, & saltare incipiunt: ita veneni à rabidis animalibus illati hæc vis est, vt à liquidis exasperetur; vnde rabidi liquida omnia auersantur.

Pulsus in rabidis sunt parui & inordinati, grauitas membrorum augetur, alius supprimitur, vrina guttatim redditur, vox est rauca, spiratio difficilis, ægri linguam exserunt, & cum malum valde intenditur, bilem euomunt, vel flauam, vel atram; singultu corripiuntur: quæ tamen non in omnibus, & non, nisi vno atque altero die ante mortem, apparent; alii etiam paulò ante mortem conuulsionibus, & maximo stridore dentium corripiuntur.

### Prognostica.

1. Cum rabies, vt alij morbi, vel ad salutem, vel ad mortem terminetur; secundum Rhases & Auicennam salutis spes est, si sanguis copiosè ex vulnere effluxit, aut postea, dum vulnus curatur, vel sponte sudor multus, vel vrina, præcipue nigra, euacuatur. Verum tamen hisce non firmiter fidendum est, sed tutissimum, statim idoneis prædiis malo huic occurrere. Vnde Aëtius: Qui à rabioso cane morfi sunt, si neglecti fuerint, vel malè curati, in affectionem aquæ timoris incidunt. Et Celsus: Vbi parum citò initio occursum est, solet aquæ pauor nasci.

2. Si vulnus ab animali rabioso inflictum non sit profundum, nec neruus, vena, vel arteria vulnerata, de salute maior spes est, modò idonea remedia adhibeantur.

3. Si malum iam eò processit, vt rabies & timor aquæ adsit, tum in angusto spes est: & Dioscorides, Paul. Aegineta, Aëtius, Celsus, Auicenna, & plerique alij Medici scribunt, nullum ferè, quem aquæ timor iam corripuit, euasisse, etiam si idonea medicamenta adhibeantur, & alios quidem 4. dierum spatio, alios intra septimanam mortuos esse. Cum enim membra principalia iam venenum occupauit, frustra omnia medicamenta adhibentur. Quia tamen Dioscorides ex aliorum relatione narrat, Eudemum, & Themisonem, Medicum rabie affectum, pristinæ sanitati restitutum fuisse, idemque de aliis etiam alij referunt: distinguunt hic nonnulli, & eos, qui per contagium ab homine acceptum in hunc morbum inciderunt, posse seruari; eos verò, qui à cane, lupo, vel alio animali rabido morfi fuerunt, omnes interire putant.

### Indicationes.

Duo ergo hic Medico agenda. Primo cum, si homo iam in rabiem inciderit, & hydrophobiâ correptus sit, spes sit in angusto; danda opera, vt, quamprimum homo à cane, vel alio animali rabido morfi sit, aut linguâ, ore, aut alio modo sputum animalis rabidi tetigit, ne in rabiem aut hydrophobiam incidat, præseruetur. Et quamuis ab initio graua symptomata non percipiantur: tamen quia sæpe longo post tempore, vt dictum, morfi in hoc malum incidunt; nullo modo curatio differenda.

Deinde si homo iam morbo hoc laboret, curandum, vt ab eo, quantum possibile, liberetur.

In præseruatione tres scopi Medico sunt propositi.

Primus est, vt veneno morfu immisso via in corpus progrediendi intercipiatur, idemque mox reuocetur & extrahatur.

Secundus, vt, seu morfu, seu alio modo communicatum sit venenum, prohibeatur, ne ad interiora progrediatur, & per vniuersum corpus diffundatur, ac membra principalia, ne id admittant, sed potius à se propellant, roborentur.

Tertius, vt venenum, & ab eo impressa mala aduersè, seu malignitas extingatur.

## Curatio.

*Præservatio  
& Curatio  
Ligatura.*

Primum expeditur, si vincula partibus affectâ parte superioribus, si partis conditio admittat, iniiciantur, & per tres vel quatuor digitos supra partem læsam arcta deligatio instituat. De quo tamen monet Celsus, *lib. 5. cap. 27.* ne partes nimium fortiter ligentur, ne torpeant. At si partis conditio ligaturam non ferat, medicamenta adstringentia, puta sanguis dracon. bolus Armen. balauſtia, & ſimil. cum oui albumine vicinis locis imponenda.

*Cucurbitula-  
rum applica-  
tio, & ſcari-  
ficatio.*

Simul ſtatim vulnere, quod ab animali rabido infligitur, cucurbitulæ cum ſcarificatione, ſi partis conditio id ferat, & quidem cum magna flamma, imponantur, vt venenum immiſſum extrahatur; quæ in re tamen vulneris qualitas perpendenda. Si enim vulnus antea ſatis ſit magnum, non opus eſt ſcarificationes adhibere, ne inflammatio exciteretur, quæ poſtea impediat, quod minus alia remedia, quæ venenum euocant, adhiberi poſſint. Si autem vulnus ſit exiguum, locus morſus tunc ſcarificari poteſt, & quidem ſi aliquod temporis ſpatium à morſu præterlapſum ſit, ſæpius adhibendæ ſunt, & partibus vicinis altiora vulnera infligenda. Si verò pars talis ſit, vt cucurbitulæ commodè affigi non poſſint, ſcarificatio ſola adhibenda, vt ſanguis effluat, qui ſiccâ ſpongiâ è vulneribus exſugendus, non verò vulnus aquâ abluendum; aut hirudines applicandæ, quæ ſanguinem veneno infectum extirgant. Si quoque vulnera ab animali rabido inflicta ſint anguſta, ampliſcanda, & carnis nonnihil orbicularim auferendum, ſi pars ferat, vt vulnus diutius apertum ſeruetur, ac venenum effluere poſſit. Licet etiam animalia viua, vt columbas, gallinas, plumis prius euulſis, podice vulnere admouere, & ſi vna moriatur, ſtatim aliam adhibere, vel pullos gallinarum, aut columbarum per medium diſſectos adhuc calentes læsæ parti imponere.

*Attrahentia  
medicamen-  
ta.*

Poſtea applicentur medicamenta valde attrahentia, quæ Inſtitut. *lib. 3. part. 1. c. 9. & part. 3. ſect. 3. c. 36.* ſunt propoſita; ex alio ſcilicet, ſtercore columbino, ſinapi, nuce iuglande, trita cum fermento, ſale & melle, quibus commodè admixcetur Theriaca. Vtile eſt & emplaſtrum vel cataplaſma de angelica. Commendatur plurimum ex Dioſcoride deſumptum, & ſæpe cum felici ſucceſſu uſurpatum, ex alio, cepis, & ſemine tritici maſticato paratum. Galenus, *lib. 1. de ſimplic. med. fac. cap. de cancr. uſtis*, & *lib. 3. de compoſit. medicament. ſecundum gen. cap. 5.* Item, *lib. 2. de antidot. cap. 11.* commendat valde Emplaſtrum paratum ex picæ, opoponace, & aceto.

Recipe autem Picis lb. i. aceti acerrimi lb. j. 3. viii. opopanax. Vnc. iij.

Oppopanax prius in cyathis 4. aceti diſſolvitur, acetum, quod ſuper eſt, cum picæ coquitur, quod ubi conſumptum eſt, opopanax additur, & coquuntur, cauendo ne efferueant; ſcribitque Galenus, neminem ſe vidiffe, qui illo viſus mortuus ſit. In tenerioribus corporibus liquari poteſt vino, vel oleo veteri; in robuſtioribus per ſe applicatur.

Galenus, *de theriaca ad Piſonem*, etiam cum felici ſucceſſu theriacam cum ol. roſar. liquatam imponi reſtat.

Aëtius laudat hoc: *tetr. 3. ſerm. c. 10.*

℞. Spum. argent. ceruſſ. reſin. pini, an. lb. i. ol. veter. lb. iij. Vnc. vii. ammoniac. thymiam. galban. an. Vnc. iv.

Ceruſſæ & argenti ſpumam ol. coquito, donec mampus non inquinent; deinde liquefacta adiiçito, & vnito.

Laudatur & emplaſtrum diadiſtamnum, quod Galenus, *5. de compoſ. medicam. ſecund. genera, cap. 4.* deſcripſit.

Hieronymus Capiuaccius, *lib. 7. præſt. cap. 12.* ſequens commendat;

℞. Ciner. cancr. ſumiat. ally, menth. gentian. ariſtol. rotund. an. Dra. ii. baccar. lauri, boli Armen. an. Dra. i. M. cum ſucco mentha. F. Emplaſtrum, vel potiùs Cataplaſma.

Expeditiſſima verò via eſt, adhibere cauteria actualia, quæ & venenum abſumunt, & diuturnum vlcus, per quod virus effluat, relinquunt. Viſione peractâ danda opera, vt cruſta quàm celerimè amoueatur, vt venenum quàm citiſſimè per vlcus euacuari poſſit. Nam cruſta vlcerei pharens facit, vt venenum retineatur, & ad corporis interiora penetret. Amouetur autem aliàs, ſi illinatur vitello oui, & recenti butyro. Verum cum periculum ſit in mora, ſi locus ſit carnoſus, etiam manuali opera cruſta demi poteſt. Si autem locus viſionem non ferat, aut æger ignem actualem admittere nolit, adhibenda medicamenta cauſtica, & eſcharotica dicta, inter quæ etiam Zius ſublimatus, & præcipitatus vtiliter uſurpat. Vlcus ſeruetur diu apertum, ad minimum 40. dies, ne aliquid veneni in corpore relinquatur.

Sunt nonnulli, qui, ſi partis conditio id ferat, partem demorſam ſtatim amputandam cenſent, exemplo illoſe an ſtatim amputanda, ſum, qui ab aſpide, aut viperis demorſi digitos ampuauerunt, & ſalvi euaserunt, vt reſert Galenus, *3. de loc. aff. ſect. cap. 7.*

Verum non ita neceſſarium hoc factu videtur: cum venenum canis rabidi non ſit tam celeris actiuitatis, ac venenum alpidis, vel viperæ; & alijs modis ſatis euacuari & extrahi poſſit.

Quidam & hoc remedium proponunt, vt ſeruus aliquis adhibeatur, qui ore è vulnere venenum exſugat. Verum cum id non ſine periculo ſugentis fiat, id tentare, quod gentiles in mancipiis ſuis ſibi licere putabant, in ſtatribus Chriſtiana charitas non permittit, præſertim cum alia remedia, quæ idem præſtare poſſunt, ſint in promptu.

Circa auxilia autem iſta externa & chirurgica, quæ venenum euocant, Dioſcorides, *lib. 6. cap. 39.* & Paulus Aegineta, *lib. 5. cap. 3.* admonent, quod ſi à principio prætermiſſa fuerint, (principium autem alij tribus diebus definiunt, alij ad ſeptimanam extendunt) poſtea fruſtra adhiberi, & ægrum doloribus cruciari; cum iam venenum in totum corpus diſfuſum ſit. Non tamen inutile fuerit, ſi, quocunque etiam tempore, fonticulus in loco affecto exciteretur, vt continuâ illâ euacuatione venenum reuellatur.

Vt autem cognoscat, an hiſce remedijs venenum omne extractum & diſſipatum ſit, nihilque periculi amplius ſubſit, Paul. Aegineta ex Oribasio eadem probatione vti iubet, quæ uſurpari ſolet ad cognoscendum, an canis, qui morſum intulit, rabidus fuerit, nec ne: nimirum nuceſ iuglandes tritaſ vlcerei apponere, deinde gallo, vel gallinæ deuorandas obicere. Si enim non moriatur, ſignum eſt, venenum planè eſſe extractum, vulnuſque ab eo mundatum, ideòque tunc cicatricem induci poſſe. Si verò moriatur, ſignum eſt, nondum omne venenum extractum eſſe, & propterea vulnus adhuc apertum ſeruandum, operamque dandam eſſe, vt reliquum etiam extrahatur.

Venaſectioni hiç nullus locus eſt, vrpote quæ venenum non euacuat, ſed vires debilitat, venenumque exagitat,

Purgationem quod attinet, vt ab initio ea inſtituatur, nihil eſt, quod eam indicet. Imò ſi exhibeantur purgantia, metus eſt, ne venenum ad interiora trahatur, & humores, ac corporis partes inquinentur. Si verò malum iam progreſſum ſit, & venenum ad interiora penetrauerit, tum purgatio non inutilis eſt, eamque tantum auxilij afferre ſcribit Dioſcorides, vt quidam, qui iam hydrophobiæ propinqui eſſent, ſumpto helleboro ſanati fuerint; ideòque non ſemel atque iterum, ſed frequentius ante diem 40. eâ ita vti præcipit. Imò nonnulli referunt, ſi canis rabidus helleborum album



cum polenta sumpserit, ac euomuerit, à rabie liberatum fuisse.

Humores tamen prius præparare non inutile fuerit calefacientibus, incidentibus, abstergentibus, atque veneno simul resistentibus; vt syr. scord. de cortic. citri, betonic. de pomis, de succ. bugloss. epithymo, decoctionibus paratis è semin. citri, radic. gentian. angelic. dictamn. alb. scord. vincetoxico, bugloss. melissa, hippolapacho, &c.

Purgantia, quæ in Rabie caninâ conueniunt, sint omnium consensu validiora, vt elleborifinus, hiera diacolocynthid. Ruffi, Archigenis, Logadij, Pacchij. pilul. ex helleboro, Jnio, de lapid. Lazul. cochlear. de nitro, fœtidæ. Si ætas, temperamentum, vires, vel ær dissuadeant talia, eligantur mitiora, ac mediocria, vt est sena, epithym. polypod. hellebor. niger, myrobal. nigri, & agarie. præcipuè, qui simul veneno resistit.

Composita sunt elect. de dactyl. confect. Hamech, elect. Indum maius, ac benedicta laxatiua.

Reliquis scopis, nimirum vt veneni ad interna progressus prohibeatur, partes principes roborentur, quò facilius venenum à se propellere possint, ac maligna humoribus & corpori à veneno impressa aboleatur, iisdem ferè medicamentis satisfieri potest, scilicet antidotis, & iis, quæ peculiari vi huic veneno resistunt.

Simulque pulsus omnes, temporum, manuum, pedum, & cordis regio per biduum singulis sex horis, & aliis quinque diebus bis tantum in die, & circa locum demorsum etiam eodem modo, vel, vt alij volunt, tertiâ quoque horâ illiniri debent oleis illis famosis Magni Ducis Hetruriz, vel scorpionis Matthiol. aut aliis, vt venenum à partibus nobilioribus propulsetur.

Etsi autem plurima à plurimis recenseantur: tamen cum non pauca ex iis fabulosa videantur, certa saltem enumerabimus. Ab omnibus verò commendatur *Alyssum*, vt Dioscorides, lib. 3. cap. 89. habet. De eodem scribit Galenus, lib. 6. *simpl. medic. fac.* Nuncupata est herba alyssum, quòd mirificè iuuat commotos à cane rabido; sed & rabienti data sæpe in totum sanauit, & hoc ex totius substantiæ similitudine. De eodem etiam Plinius, lib. 24. cap. 11. *Alyssum* nomen accepit, quod à cane commotos rabiem sentire non patitur ex aceto potum, alligatumque. Et Galenus, 2. de antidot. cap. 11. modum exhibendi tradit: *Alyssum*, inquit, herbam contusam & cribratam, accipe, cuius, cum opus fuerit, cochlear exhibe ex aquæ mulsæ cyathis tribus, à primo die vsque ad 20. sin minus, saltem primis septem diebus. Verum vt authores in commendanda hac planta contra morsum canis rabidi consentiunt: ita in eâ describendâ discrepant, aliamque Dioscorides, aliam Galenus, aliam Plinius describere videntur. Sed quia suam valde commendat contra morsum canis rabidi Galenus, præstat ei adhærere, & videtur *Alyssum* Galeni satis clarè descripsisse & depinxisse Tabernæmontanus, lib. 2. *herbar. sect. 5. cap. 5.* & quidem ex C. Clusij lib. 4. *histor. rar. plant. cap. 21.*

Commendantur deinde valde *canceris fluuiatiles*, cum eorum cinis, tum decoctum, multo anetho admixto, *scordium*, *chamedrys*, *gentiana radix*, *ruta agrestis semen*, *chamamelum*, *centaurium minus*, *artemisia*, *aristoloch. rad.* *sylvestris*, *vincetox. radic.* Drach. iß. exhibetæ, *pulegium*, *oxylapath. cardus benedictus*. Radicem cynorrhodi Plinius, lib. 25. cap. 2. vt oraculo patefactam, commendat, eamque aliis omnibus ferè remediis præfert. Laudatur & vinum generosum statim potum, & allium comestum.

Inter composita antidotus è canceris pluribus commendatur & à Græcis, & Arabibus, vt ex Dioscoride, lib. 6. cap. 37. Galeno, 2. de antid. cap. 11. item, 11. de *simpl. medic. fac.* videre est. Scribitque Galenus, neminem vnquam mortuum esse, qui cancerum puluere rectè vsus sit, &

quidem, 11. de *simpl. medic. fac.* ex *Æschione*, Præceptore suo, sumit cancos fluuiatiles post otrum Canis captos, quando Sol Leonem transit, Lunâ decimâ octauâ, & eos viuos in sartagine æris rubri comburit. *Cinereum* sumit duo cochlearia, vel Drach. ii. *pulu. gentian. cochlear. j.* seu Drach. i. *vin. meraci* iv. cyath. quæ in modum polentæ dilutæ miscet, & quotidie bibenda exhibet.

Deinde ex *Asclepiade* recipit *ciner. cancer. part. x. i. hur. part. j. gentian. p. v.* & exhibet huius pulu. cochlear. bibendum x. diebus, aut, si iam à mortu aliquot dies processerint duo cochlearia propinat. De hoc tamen medicamento obseruandum, cancos veros vsurpandos esse, qui sunt corpore rotundo, non nostros gammaros, aut astacos. Nonnulli tamen etiam nostros vsurpant.

Commendatur à plerisque Medicis aduersus morsum canis rabidi Theriaca, vt efficacissimum remedium, cui turò in hoc malo præcauendo fidi possit. Galenus, in lib. de Theriac. ad Pison. cap. 14 & in libell. de Theriac. ad Pamphil. Scribon. Largus, lib. de comp. medic. c. 171. & 173. proponit quoddam antidorum Apuleij Celli, & cap. 176. aliud, cuiusdam Cassij, & cap. 177. antidorum Martiani, Medici, cui quia nihil deest, *Thiæna* appellata sit, quæ felici cum successu in hoc morbo curando exhibita sit.

Laudatur à nonnullis & hoc Antidorum:

*℞. Mithridat. elect. pulp. rad. aristol. rot. an. Vnc. ii. terra sigill. Vnc. ß. muscarum, quæ de Napelli fructibus vitum querunt. num. xx. Cum succi citri recent. q. s. f. Mistura, cuius dosis Dra. i. ad Dra. iß.*

Inter Recentiores alexipharmacum præsentissimum proponit Palmarius, in lib. de morbis contagios. quod solum, neglectis purgantibus, & omisâ etiam vulneris curâ, quocunque à mortu tempore vsurpatum, certissimum ac tutissimum remedium existat, & quo nullum vnquam animal vsus fuerit, quod non mali huius periculum euitauerit, cum quacunque victus ratione, illæsis tamen capitis partibus, & modò vulnus inflictum capitis partes ore superiores non attigerit, aut aquâ elorum fuerit. His enim partibus vulneratis, aut parte vulnerata statim à mortu frigidâ elotâ, parum spei superest.

Est autem tale:

*℞. Fol. rut. verben. salu. plantag. polypod. absinth. vulg. menth. artemis. melissophyll. beton. hyperic. centaur. minor. singulor. æquale pondus.*

Colligantur singula, quo tempore magis viribus pollent: deinde papyraceis chartis inclusa siccantur, seorsim in loco, ad quem neque Sol, neque pluuia pertingat, ne vel nimium exarescant, vel situm contrahant. Post redigantur in puluerem, de quo Drach. iß. ve Drach. ii. singulis diebus demorso exhibeantur, vel cum saccharo, vel cum vino, vel iusculo, vel alio modo, ieiuno stomacho, horis tribus ante cibum. Si tamen tempus aliquod à mortu inflicto præterierit Drach. iij. exhibeantur.

Extra verò vulnus prius spongia, vel linteolis siccis exsiccatum vino aut hydromelite, in quo pulueris huius Drach. ß. soluta sit, bis vel ter quotidie foueatur, deinde emplastrum, vel vnguentum, quale in aliis vulneribus, admoneatur.

Post alexipharmaca, & purgationem etiam exhiberi possunt sudorifera, vt venenum dissipetur. Efficacissimum autem est visc. querc. lignum sumptum, viscus autem ipsum extrinsecus applicatum.

Sudorifera simul alexiteria sunt, dictamnus Cretic. & alb. vulgar. card. benedict. scord. tabac. angelica.

Vt *℞. Ligni visci q. dictamni, an. 3. ii. vel iii. aq. chamamel. lb. ii. Coq. ad medietat. Dosis 3. viii. vel x.*

*℞. Dictamn. alb. 3. ß. lign. visci q. 3. ii. sem. & flor. cardui bened. ana Drach. iß. f. Puluis;*

Cuius *℞. a Dra. j. vsque ad 3. ii. vini albi generosissimi Vnc. iß. aq. cardui ben. 3. ii. vel iii. Mixta exhibe.*

Præter

Præter sudorifera conueniunt etiam diuretica antidotis mixta, vel exhibita, quæ vtraque vi polleant, inter quæ præstant (pica Celtica, valeriana, asarum, scordium, & alia, quæ eodem tempore, quo sudorifera, conueniunt.

Nonnulli etiam, & quidem Auicennæ autoritate, vrinas validissimè prouocandas esse, vel ad sanguinis mixtum cenent; cum hac ratione venenum simul excernatur; atque in eum finem cantharides etiam exhibent. Hinc rustici vulgato experimento vermes, seu scarabæos Maiales melle asseruatos in hunc vsum exhibent. Alij capita iis abscindunt, & reiciunt, postea in oleum oliuarum recens eos iniiciunt, & quidem in lib. j. num. vi. atque de hoc oleo ægro sæpius Vnc. i. vel Vnc. ii. propinant.

*Rabiei imminuentis curatio, & portum præseruatio.*

Imminente Rabie quamprimùm validiora adhibenda remedia, vt sinapismi, velicantia ex validissimis simplicibus parata, quale est tale:

*℞. Cantharid. abiectis pedibus & alis Dra. vi. sinap. hellebor. alb. an. Dra. ii. semin. ammeos Drach. i. fermenti Dra. iv. aceti scillis. q. s. Misce. F. Massa, de qua portiones brachiis, femoribus, & tibiis apponantur, & diutius detineantur, vt cutis simul absumatur; vlceræque diu aperta seruentur emplastro diachylo simplici.*

Antidota propinentur in dupla quantitate, quàm in præseruatione, singulis diebus manè theriac. vel Michridat. Dra. ii. in vino potenti, vesperi, ante cœnam, antidot. de cancris, gentian. hellebor. albus protinus exhibendus, (qui tamen in rabie iam præsentem non exhibendus, vt nec alia purgantia, nec sanguinis missio tum concedenda) qui magis, quàm quid aliud, prodest, interpositisque diebus reperendus. Hæcque antidota ad 40. diem tum exhiberi debent. Quidam suadent, vt æger in anno quater purgetur, & singulis 15. diebus sumat theriacam. Nic. Florentinus, vt per integrum annum antidota vsurpentur, Aëtius, vt singulis annis appropinquante morsus tempore per hieram æger purgetur, & instante die per triduum theriacam sumat.

Pro amuletis commendantur, dens canis rabidi humero suspensus & substratus, corium vrsæ & phocæ.

Tandem si æger iam hydrophobia correptus sit, et si, vt dictum, ipse sit in angusto; tamen nec tum deferendus, sed medicamenta modò dicta exhibenda, verum maiore dosi, Palmarius ægrum etiam vinciri; & ore aperto illi suum puluerem infundi iubet.

*Balneum & aqua potum in hydrophobia conueniant.*

Antiqui etiam balneum & aquæ potum commendant, scribitque Celsus, vnicum hydrophobiâ oppressis remedium esse, non opinantem ægrum in piscinam non ante ei præuisam proicere, ac si natandi peritiam non habeat, modò merum bibere pati, modò attollere; si habet, interdum deprimere, vt inuitus etiam aqua sarietur. Verum obseruauerunt plurimi, ad præcautionem quidem non raro hoc profuisse, quanquam alios nec ad præseruationem huic remedio fidendum esse, experientia docuerit; hydrophobiâ verò correptis nihil profuisse, sed etiam nocuisse: id quod Cælius Aurelianus, Auicennas, & Celsus docent, quod ipsa quoque ratio suadere videtur. Etenim cum inter venenum hoc & aquam tanta sit antipathia, vt ægri etiam ad visum, sonum, imò motionem aquæ exhorrescant, credibile omnino est, ex merione in aquam, & potu eiusdem morbum magis exasperari.

In præseruationis diætâ vitentur pulli columbini, quia tota substantia nocent; contra à proprietate commendantur caro arietis, cancri fluminales, castaneæ, brassica. Vescantur ægri nucibus iugland. cariçis, amygdal. allio, capâ, porro, raphano, smirnio, asparago, cichorio, rumicæ sylu. & hortensii, &c.

*Quâ vi venenum animalium rabidorum agat?*

Quæ huius veneni causa sit, & in quo mali huius essentia consistat, alij aliter statuunt, & nonnulli quidem quandam putrefactionem esse dicunt; quod facit Fracastorius lib. 1. de morb. contag. cap. 9. Alij, vt ex Dioscoride, Aëtio, Paulo Aegineta, & Actuário colligi potest, intemperiem calidam & siccam, in partibus præcipuè solidis contractam, vel, vt Pelops, Galeni præceptor, statuit, vt ex lib. 1. de simpl. med. fac. c. de cancris vstu, videre est, immodicam siccitatem, quasi in contrarium habitum mutatâ penitus solidarum partium substantiâ, veneni huius essentiam constituere statuunt. Verum enim verò neque in putredine causa huius mali constitui potest; cum nulla putredinis signa adsint, ac putredo sine manifestis signis tam diu in corpore latere non possit: neque etiam intemperies calida & sicca ad constituendam huius mali essentiam sufficit; cum intemperies tam diu in corpore esse non possint, sine læsione actionum corporis, neque effectus insignis caliditatis & siccitatis appareat, neque si in intemperie causa consisteret, malum ferè incurabile esset: de quo Galenus, 1. prorrhet. com. 2. s. 19. Idem docet communicationis modus; cum tantillum sæpe sit, per quod malum hoc homini communicatur, & nihilominus tam insignem in corpore mutationem efficiat, quod qualitates primæ in tam parua mole non faciunt. Insuper durabilitas huius veneni, tam longo tempore in tot corporis mutationibus permanens idem docet, in quibus nihilominus venenum hoc naturam suam retinet, imò in dies se multiplicat; quod etiam patet ex historia à Fernelio allegata de lupo, qui in cibum variè præparatus plurimos rabie infecit: quod fieri nō potuisset, si essentia veneni huius in qualitatibus primis consisteret, cum ignis vi qualitates illæ variè mutentur. Tandem & curatio idem persuadet, quæ non qualitatibus primis, sed totâ substantiâ agentibus perficitur: de quâ re in Institut. loco allegat. dictum.

## QVÆSTIO. II.

*An Venæ sectio in hoc morbo conueniat?*

Cum morbus à capis, vel aliorum animalium morsu contractus sit longè periculosissimus; & Antiqui & Recentiores Medici omnis generis auxilia ad depellendum hoc malum excogitarunt, & inter ea quidem purgationis, & venæ sectionis mentionem faciunt: de quo quid sit sentiendum, paucis dicendum.

Et quidem venæ sectionem quod attinet, primò quidem nonnulli venæ sectionem in morsu canis rabidi præcipiunt, persuasi, vt putant, autoritatibus Pauli Aeginetæ, lib. 2. cap. 2. Celsi, lib. 3. c. 27. Rhasis, lib. 20. continentis, tractat. 2. cap. 2. Deinde etiam ratione; cum vero consentaneum videatur, si in aliis vulneribus magnis venæ sectio adhibetur, vt æger à dolore, febre, inflammatione, conuulsione, & similibus accidentibus præseruetur, etiam eodem fine in morsu canis rabidi venam aperiri posse. Verum, vt antea dictum, contraria opinio vera est, ac venæ sectio in morbis à cane rabido potius obest, quàm prodest; cum sanguinis missio venenum potius in venas trahat, quam extinguat, simulque vires deiciat. Atque eâ procul dubio de causa Dioscorides, Galenus, Oribasius, Aegineta, Actuarius, aliique Medici Præstantissimi, vbi ex professo de hoc morbo agunt, venæ sectionis nullam mentionem faciunt, vel etiam planè eam reiciunt. Et longè alia est vulnere magnorum simplicium, quam morsus canis rabidi ratio, in quo potius à veneno, quam à vulnere periculum. Et si fortè aliqui sanguinis missionis mentionem faciunt, potius de eâ quæ

quæ ex parte commorfa fit, quam quæ ex venis in brachio, loquuntur.

## QVÆSTIO III.

*An Purgantia medicamenta in hoc malo  
conueniant?*

Qui purgationem in morfu rabidorum animalium instituendam negant, eo potissimum argumento nituntur, quod veneni huius natura non in qualitatibus primis, & manifestis, sed in occultis consistit, & nec qualitarum primarum alteratione, nec purgantibus, sed alexipharmacis, ac tota substantiâ agentibus curatur; quod purgantia calori nostro sunt aduersa, ideoque vires potius frangere, quam conseruare videntur. Alij contra purgantia admittunt, qui quidem fatentur, purgantia non rectâ veneno huic aduersari, illudque expugnare, sed hoc solum à peculiaribus alexipharmacis fieri: interim tamen hoc mediâtè præstare posse statuunt, dum nimirum vitiosos humores, in quibus venenum residet, educunt, atque ita venenum simul euacuant.

Cui sententiæ ea ipsa de causa & nos subscribimus; præsertim cum venenum hoc sit lentum, & diu in corpore hæreat.

Quo autem post morsum tempore purgatio instituenda sit, dispiciendum. Rhases, in tractat. 8. ad Almanf. statuit, statim in principio purgandum esse medicamentis humorem melancholicum euacuantibus. Verum alij Græci & Arabes omnes verant in principio, id est, quando adhuc venenum in partibus externis residet, purgatione vti. Verum hic considerandus modus, quo venenum hoc in corpus immisum est. Si enim labris & linguâ venenum in corpus attractum sit, statim in principio purgare licet; cum alijs auxilijs venenum alijs euocantibus locus tum non detur. Si verò morfu venenum partibus externis immisum sit, in principio purgare non licet. Ideoque cum Rhases, in tractat. 8. ad Almanf. statuit, statim in principio purgandum esse, id de priori casu intelligendum est: de posteriori verò, quando alij Græci & Arabes omnes verant in principio purgantibus vti, ne venenum ex vulnere ad interiora corporis rapiatur; sed tum tandem purgantia exhibenda sunt, cum omnia ritè circa vulnus peracta sunt. Et licet ritè omnibus peractis spes sit, venenum extinctum esse: tamen cum facile fieri possit, ut aliqua eius portio ad interiora penetrauerit, ea, quam minima etiam fuerit, humores corrumpit, & in sibi similem materiam immutat. Ideoque corrupti illi humores euacuandi sunt, ut venenum simul euacuetur, & alij humores à veneno & corruptis humoribus, non inficiantur, simulque medicamenta, quæ reliquos humores à corruptione præseruant, & contra venenum pugnant, exhibenda. Si tamen crassi humores, adsint, ut ij facilius ductum medicamentorum sequantur, attenuantia prius vsurpari, & quæ primas vias euacuant, vel abstergunt, possunt. Præcipue verò adhibenda alexipharmaca, quæ vim veneni mitigant. Ad purgationem autem in hoc morbo Antiqui omnes, Dioscorides, Oribasius, Paul. Ægineta, Aëtius, Actuarius, helleborum album commendant, eumque præ reliquis in hoc morbo efficacissimum esse dicunt. Antiqui etiam hieram diacolocynthidos, hieram Logadij, Pachij, lapid. Lazuli & medicamenta, quæ alijs ad melancholicum humorem & atrum vsurpari solent, commendant. Qui helleborum album reformidant, helleborum nigrum vsurpare possunt, & in primis agaricum, qui in morbis venenosis commendatur, & vim alexiteriam habere prædicatur.

## CAPVT XVII.

*De Tarantatis & Choreâ S. Viti.*

AD hunc locum non incommode refertur *Tarantula* <sup>mor. m.</sup> *lum*, quod ab istâ Taratula infertur; quo qui laborant, vulgò Tarantatos nominant. Et si enim de morfu Tarantulae etiam inter venena agendum sit: tamen quia à veneno hoc peculiare delirij & insanie genus inducitur, etiam hoc loco de eo non incommode tractatur. Huic cognatum est alterum, quod Choream S. Viti appellant.

Est autem Tarantula, seu Tarentula, Phalangij, seu aranei genus, quod procul dubio à Tarento, antiqua Apulie ciuitate, nomen accepit, vbi frequens est hoc animalculum, & valde sæuit. Et si verò ejus operationes planè admirandæ sunt, ut videre est apud Aristotelem, lib. 9. *histor. animal. cap. 39* & Plinium, lib. 11. *naturalis historia, c. 24.* adeò, ut Aristoteles genus quoddam araneæ *oppo. ratur* nominet; & tela ejus, ut ex Dioscotide patet, sanguinem sistit, & vulneribus commode adhibetur, & in tertianis diuturnis, ac quartanis pulsibus apposita febrem tollit: tamen venenosum & noxium etiam est animal, & non solum cum ceruo, lacertis, viperis, bufone antipathiam habet, ut ex loco allegato Aristotelis, Æliano, lib. 1. cap. 8. Plinio, lib. 10. c. 74. patet, sed & homini damnosum. Et dubium ferè est, utrum magis admiranda sit ejus in tela texenda industria, quam planè ad Geometriæ leges conformat, & tam tereti filo, & tam æqualia deducit stamina, ac à centro & medio texere incipit, circinnato orbe subtegmina annectens, ut Plinius loquitur: an verò veneni illius natura. Tam enim admiranda à veneno hoc hominibus inducuntur symptomata, ut reperti fuerint, qui penè pro fabula habuerunt, quæ de malo hoc scribuntur: cum tamen omnia sint certissima, & oculos huius rei testes habeant plurimos, & hodie Apulie & Salentinis sint notissima. Antiqui equidem, Nicander, Ægineta, Aëtius, Celsus, Auicennas, Rhases, & alij, referunt plurima, eaque satis magna, quæ à Tarantula commotis accidere solent, symptomata; nimirum quod dolor in parte ista exoritur, tumor & pruritus, superuenit corporis frigiditas, ventris ac totius corporis inflatio, virgæ in quibusdam erectio & priapismus, corporis stupor, tremor, membrorum conuulsio & resolutio, adeò ut iuuenes etiam robustissimi omnes vires statim amittant, artuum dolor, corporis varia iactatio, vertigo, vigilie, somnus, deliria, vocis priuatio, oculorum rubor, sudores frigidi, & similia, quorum alia alijs, & quidem alijs plura, alijs pauciora accidunt. Verum id maximè admiratione dignum est, quod, ut Matthiolus, in lib. 2. *Dioscorid. cap. 75.* scribit, *isti à Tarantulis non solum alij perpetuo canunt, alij rident, alij plorant, alij clamitant, sed & quod præcipue mirum veneni huius vis Musicâ mulcet. Quandoquidem auditis lyricis instrumentis, per tibiarum sonum primo statim occursum isti à tarantula à plangoribus cessant, & in medium tripudiare & saltare incipiunt, tamque diu rem persequuntur, ac si sani essent, & nullo vnquam tenentur dolore. Quod si eueniat, ut tibicines tantillum quiescant, non multo post tempore in terram concidunt, & ad pristinos redeunt languores, nisi tamdiu indeficiente sonitu saliant atque tripudiant, donec venenum partim insensibiliter, per cutis meatus, partim per sudorem exeat & discutatur. Ob id igitur tibicines stipendio conducuntur, alternatimque mutantur, ut absque vlla sonitus intermissione tamdiu tripudiant demorfi, quousque penitus curati conquiescant.* Refertque Epiphanius Ferdinandus, *histor. 81. senem 94. annorum adeò debilem, ut non, nisi scipione innixus, ambulare posset, commorsum à Tarantula, auditâ musicâ veluti capreolum statim* Nn saltasse

saltaſſe & tripudiaſſe. Vnde etiam pauperes in Apulia omnem penę ſuam ſubſtantiam in muſicos & tibicines erogant. Cum enim ſciant, menſe Iunio, Iulio, Auguſto, niſi tripudiant, ſe peſſimę habere, ſibi de nummis proſpiciunt, quibus tibicines & muſicos, qui per totam illam prouinciam vagantur, & Tarantatis inferuendo multum lucri faciunt, conducant. Et quidem tripudiant & ſaltant intra oppida, in publicis plateis, in agris, alij vno die, alij duobus, tribus, quatuor, quinque; alij vnā hebdomade, alij pluribus. Neque ſemel iſti vno anno ſaltem ſaltant, & alij quidem bis, alij ſemel, ſed ſape per multos annos. Refertque idem Epiphanius Ferdinandus, ſe nouiſſe mulieres, quę vique, ad decimum, decimum quintum, decimum ſeptimum, trigefimum annum ſaltarent. Scribit etiam Petrus Põponatius, *de fai. lib. arb. & prædeſt. lib. 2. cap. 7.* ſibi ab incolis Apulię relatum eſſe, quod illa ſaltandi libido per periodos annuos recurrat, & ſi quis morſus fuerit à Tarantula Calend. Iuniis, iterum ſequenti anno iſdem Calendis tripudiare eum incipere, & quidem (de quo tamen dubitat Pomponatius; & proinde experientia conſulenda) ſi Tarantula moriatur vel ſuo fato, vel violentiã non amplius venenum operari; quandiu verò viuat Tarantula, tandiu ſingulis annis morbum redire.

Præterea à Tarantulis morſi quidam circa ſepulchra verſantur, & in feretris mortuorum cubant, virgines obſcenas partes oſtendunt, euellunt ſibi crines; alij penſiles in cunis moueri, alij terrã obrui cupiunt; nonnulli etiam alios morſu impetunt. Magnã quoque appetentiã laborant, præcipue dum ſaltant, variis coloribus delectantur, & ſi quem colorem auerſantur, eum, qui veſte eo colore infecta indutus eſt, infectantur; aquam abhorrent, vinum bibunt, & merum etiam potum eos non inebriat, & alia admiranda patiuntur.

### Cauſſa.

Verum qua ratione à veneno Tarantulę tot & tanta, ac tam admiranda ſymptomata inducantur, obſcuriſſimum. Qui à manifeſtis qualitatibus, & à veneni frigiditye talia ſymptomata deducere conantur, eos operam & oleum perdere tam manifeſtum eſt, vt cum iis diſputandum eſſe non cenſeam. Et optarim, vt ii, qui omnium rationes è qualitatibus primis reddi poſſe audacter, & glorioſe promittunt, & vt præ aliis ſapere, ac nihil ignorare videantur, ad neceſſarium ignorantie illud aſylum, occultas qualitates, confugere turpe putant, hic exerceant ingenium, & quantum poſſunt, periculum faciant, & eorum, quę hætenus de veneni Tarantulę, & muſicę in eo curando vi diximus, & dicemus, cauſas è qualitatibus primis reddant. Nos hic, vt in omnibus aliis venenis, in occulta qualitate neceſſario acquieſcimus. Et quidem actiones naturales pleręque læſæ à ſpirituum & caloris natui, quę à veneno hoc ſit, corruptione proueniunt; nec mirandum, quod tot diuerſa in diuerſis accidunt ſymptomata; cum idem etiam ab aliis venenis pro corporum diuerſitate accidar. Verum quod muſicã adeo delectantur demorſi, id in primis in occultam, & æþi-veneni huius vim referendum, quę à muſica excitatur. Nam Tarantulę ipſæ etiam ad ſonum citharę, tympani parui, tibiaſum, cymbalorum, fidium, ſolent ſaltare & tripudiare. Scribitque hac de re Epiphanius Ferdinandus: Qui nobis non credit, veniat, ac videat, ac periculum faciat. Nam veriſſimum eſſe, quod ſcribimus, inueniet. Imò etiam alia animalia à Tarantula demorſa ſaltant; refertque item Epiphanius Ferdinandus, ſe viſiſſe veſpam à Tarantula morſam fuiſſe, & cum forte fortuna ibi eſſet citharęduſ, citharãque pulſaret, & Tarantulam, & veſpam tripudiare cõpiſſe: gallum quoque commorſum ſaltaſſe ac tripudiaſſe.

Ira etiam, quod in Apulia præcipue hæc ſymptomata accidunt, non in caliditatem (cum alia loca ſint calidiora) id referri poteſt, ſed in occultam procul dubio regionis vim, ſeu cœlitũ, ſeu diuinitũ immiſſam.

### Signa Diagnostica.

Malum ex cauſſa, quę præceſſit, iſtu ſcilicet tarantulę, vt & ſequentibus ſymptomatibus cognoſcitur, vt opus non ſit hæc plura recenſere.

### Prognostica.

1. Malum hoc periculo non vacat, & niſi medicamenti idoneis curatur, poteſt eſſe lethale.
2. Erſi verò Tarantulę morſus periculofus eſt, non eſt tamen morbus acutus, vt iſtus aſpidum, viperarum, ſed tardi motus eſt hoc venenum.
3. Rarò etiam morbus lethalis eſt, vt ex mille à tarantulis demorſis, ſi conuenientiã remedia adhibeantur, vix duo moriantur.
4. Secundum locorum varietatem vt aliorum venenorum, ita etiam huius veneni vis nunc maior, nunc minor eſt.
5. Pro ratione etiam loci, qui pungitur, malum nunc periculofius, nunc mitius eſt. Qui enim in loco, cui vena, arteria, vel neruus ſubjectus ſit, morſus fuerit, periculofius laborat, quam qui in carne ſolũ; cum hoc modo partibus principibus venenum faciliũs communicetur.
6. Periculofum quoque, ſi Tarantula jejuna jejunum mordeat,

### Indicationes.

Cum hoc venenum, vt alia, occultã vi in corpus humanum agat, ipſi peculiaria & propria antidota ſtatim opponenda. Et primò quidem ſi homo in loco, qui à Tarantulis infeſtatur, degat, idoneis antidotis ſeminare debet, ne, ſi forſan pungatur, periclitetur. Si verò quis punctus ſit, danda opera, ne venenum in corpus penetrret, ſed ſtatim è corpore extrahatur; deinde vt per interna medicamenta è corpore expellatur.

### Curatio.

Ad præſeruandum (vt & ad curandum) commendatur anchuſa comeſta, & decoctum ejus potum, artemiſia, allium, bolus Armenus, theriaca, & antiphalangium, quod poſtea proponetur in curatione.

Deinde ſi quis à phalangio morſus ſit, curandum, ne venenum ad interiora penetrret, ſed ſtatim ad exteriora reuocetur, & è corpore extrahatur. Apponantur igitur loco commorſo cucurbitulę, vel etiam pars ſcarificetur, aut ei veſicatoria, vel ſtercus caprę, aut panis maſticatus, aut muſcæ cum fermento imponantur; idque ſtatim fiat, antequam venenum ad interiora penetrret.

Vt verò venenum à partibus interiorioribus repellatur, mox alexipharmaca exhibenda: inter quę ſunt & antè in præſeruatione enumerata, quę tamen hic in majori doſi ſumenda. In primis verò commendatur ex Dioſcoride ſemen paſtinacę ſylu. ad Drach. j. cum vino bibiturũ; item meliſſa, vel agrimonia Drach. vnius pondere cum vino hauſta. Laudatur & radix ariftoſochię rotund. ad Drach. j. ſumpta, vt & ſemen nigellę, & ſuccus plantaginis. Albucaliſ hoc Eleſtuarium commendat:

℞. Flor. ruta ſicc. coſti, mentaſtri, pyrethri, an. part. æquales, aſa ferida partem quartam ad pondus omnium, mellis q. ſ.

Fiat Eleſtuarium. Doſis Drach. i. Epiphanius Ferdinandus,



Ferdinandus, qui diligens fuit in obseruandis iis, quæ circa demortuos à Tarantulis euenerunt, quinque remedia experientiâ comprobata commendat. Primum est aqua vitæ seu spir. vini. Cum enim omnes authores ad curandos Tarantatos vinum commendent: multò magis spir. vini utilis erit, qui felicissimè ab Vnc. j. ad Vnc. iii. pro ratione ætatis exhibetur.

Secundum est quinta essentia rorismarini, quæ ipsa etiam contra ictus Tarantulæ prodest.

Tertium aqua vitalis ejusdem, quæ ita paratur:

*℞. Flor. citranguili bonam quantitat. fol. tenerorum quercus, cardui bened. scabiosa, acetosell. sonchi, saluie, majorana, flor. lauendulæ, absinthij, rorismarini, tussilaginis, rosar. rubr. scorzonera, melissa, pimpinella, borraginis, fol. arbuti, lenticularis, ruta, an. M. iii. cyperi nostrat. radic. angelica, baccar. lauri, juniperi, cortic. citri, tormentilla, zedoaria, an. Vnc. j. cinamom. caryoph. an. Vnc. β.*

Destillantur in Balneo.

Quartum est Electuarium Antiphalangium, quod omnia ferè simplicia contra Tarantulæ morsum commendata complectitur.

*℞. Fruct. myrti, tamariisci, an. Vnc. j. sem. pastinacæ nigell. agni casti, dauci, anisi, cumini, origani, an. Drach. j. terra sigill. boli Arm. orient. prepar. an. ʒ. ii. centaur. minor. aristoloch. rotund. an. Drach. β. fol. meliss. trifolij bituminosis, chamepitios, abrot. an. P. β. theriac. opt. Mithridat. ana. Drach. ii. β. succ. cæpar. ally, plantaginis, atriplicis, hedera depurator. an. q. s.*

Cum melle fiat è succis Syrupus, cum quo fiat Electuarium, addendo spir. vini q. s. Dosis ʒ. j. β. ad ʒ. iij. cum vino.

In præseruatione Drach. j.

*Musica vis.* Verum nullum certius remedij genus est, quàm Musica. Vt enim fide digni authores, & oculati testes referunt, si à Tarantula morsus jam moribundus, & ferè omnibus sensibus priuatus sit, quàmprimùm cytharæ, lyra, fidium, tympani parui, cymbali, tibiæ sonum audit, statim quasi reuiuiscit, oculos aperit, aures arripit, in pedes sese attollit, primum digitos pedum & manuum secundum musicam melodiam mouere incipit, hinc manibus, pedibus, capite gestare, saltare & tripudiate. Vnde in tota Apulia tempore æstatis tibicines vagantur, vt Tarantatis præstò sint.

Quæ autem vi hoc præstet Musica, obscurissimum est, vt, quod supra etiam dictum, habeant hic, qui omnia ad qualitates primas deducere conantur, in quo vires ingenij experiantur. Equidem quæ de Musicæ viribus dicuntur, nemini ignota sunt, esse nimirum in ea quid diuini, Musicam esse animi exercitium, sicut motus est exercitium corporis, à dolore animum abstrahere, ad lætitiā inuitare. Verum hoc in quæstione est, quæ fiat, quod Tarantulæ veneno infecti ita musica delectantur, & ad saltandum ac tripudiandum inuitantur, & saltando à morbo liberantur.

Primo cur adeo Tarantati musica delectentur, aliud, quod dicam, non habeo, nisi quod animalculum hoc ipsum est harmonicum, & musica delectatur. Non enim omnia animalia musicâ delectantur, non fues, non boues, non alia plurima. Tarantulam verò esse animal harmonicum, & vt Aristoteles appellat, *σφόνταρον*, vel ex ejus tela apparet, quam plane ad Architecturæ & Geometriæ leges textit, vt id pulchrè Plinius, lib. 11. cap. 24. describit. Exemplum simile habetur in apibus, quæ & ipsæ in fauis cellulas suas affabre, quasi ad Geometriæ regulas, delineatas formant. Eadem æris sono quoque delectantur & conuocantur. Quia ergò Tarantulæ musica delectantur, ipsasque ad cytharæ sonitum tripudiare vidit Epiphanius. Ferdinandus; venenum quoque animalis hujus similem dispositionem sanguini & spiritibus in corpore humano (habent enim venena vim totius corporis humores & spiritus mutandi) imprimit, quæ postea auditâ musicâ ab imaginatione mouetur. Sed quæ fiat, quod animalculum

hoc musicâ delectetur, & huic veneno vis adhuc impressa maneat, vt homo eo infectus auditâ musicâ ad saltandum moueatur, hoc nemo facillè explicabit. Ita admiranda sunt Iehouæ opera etiam in rebus minutissimis; & in abjectissimis animalculis tanti diuinæ sapientiæ thesauri absconditi latent, quos nullus hominum facillè eruet. Deinde postquàm à Musica occulta quadam, & inexplicabili via ad saltationem excitantur, saltationem sequitur veneni oppugnatio; cum motis cum corpore spiritibus venenum sensibilibiter per sudores, & insensibiliter discutatur, & vi naturæ, præcipuè si remediis adiuuetur, venenum præiens & agiturum expugnetur.

Malo huic cognatum est aliud, quod Chorea & saltus S. Viti appellatur. Hoc enim delirij & insaniz genere qui laborant, dies noctesque saltare gestiunt. Nonnulli equidem choream S. Viti ad *ἐκδυσμασµὸν* Veterum referendum censent. Neque negandum est, quandoque etiam quiddam diuini subelle, & malum hoc pœnæ loco interdum diuinitus immitti, sicut sedecim vitris, & tribus scæminis in cœmeterio choreas ducentibus ex imprecatione sacerdotis anno Domini 1012. id accidisse refertur ex Vincent. Beluacensi, lib. 26. cap. 10. Verum sapissimè hoc malum à causis naturalibus, & humore maligno prouenit; cum *ἐκδυσμασµὸς* Græcorum sine dubio à Dæmone immissus fuerit, & præcipuè in sacrificiis, quibus cessantibus etiam *ἐκδυσμασµὸς* cessauit. Qui verò hoc modo laborant, continuò, diésque noctesque saltant. Ita refert Felix Platerus, lib. 1. obseruat, vt & in Practic. se vidisse scæminam Basileæ, cui magistratus viros aliquot robustos constituerat, qui alternatim vno fesso, altero succedente cum ea dies noctesque tripudiarent. Quod ferè mensis spatio spectantibus multis durauit, sine ferè intermissione, etsi solearum pedum ejus cutis attrita esset, Et licet aliquando, vt cibum caperet, & somno correpta, sedere cogeretur: tamen gestu motuque corporis inquieto interim nihilominus corpus veluti saltans agitabat.

Orum autem habet procul dubio hoc malum ab humore maligno Tarantulæ veneno simili. Sicut enim hydrophobia quidem à rabidorum animalium veneno extracommunicato plerumque oritur: interdum tamen, vt suprâ dictum, etiam in ipso corpore tale venenum generatur, à quo hydrophobia excitatur: ita etiam non impossibile est, humorem malignum Tarantulæ veneno cognatum in ipso corpore generari.

## CAPVT XVIII.

*De Comate Vigili, & Sopore graui atque Ecstatico.*

Postquam symptomata, in quibus sensus Interni singuli sedrsum læduntur, explicauimus; proximum est, vt de iis, in quibus sensus interni simul læduntur, agamus. Qualia sunt Coma vigil, Sopor grauis & Ecstaticus, Somnambulatio, & Lethargus.

Et primò quidem Coma vigil quod attinet, in eo sensus communis, Imaginatio & Ratiocinatio, læditur. Nam, vt Institut. lib. 2. part. 3. sect. 1. cap. 7. dictum, qui Comate vigili detinentur, in somnum quidem propensionem habent, quem etiam clausis oculis plerumque exprimunt, dormire tamen non possunt, simulque plerique delirant, clamant, aut somno correpti statim, quasi territi, aut spasmo correpti, brachia vel crura inordinate mouent, & jactitant, atque excitari toruū vident, absurda loquuntur, & à delirantibus non differunt. Est enim Coma vigil, cum ægri clausos habent oculos, vt dormire videantur,

*quæ hyphomania dicitur, affertur frigidit. & Leptargo, & phrenitis mixta. vid. Morb. hy. Comati.*

*Comati vigilis natura quam.*

cum tamen vigilent, seu, cum clausis, & in somnum propensis, ac conuiuentibus oculis frustra somnum capere tentant ægri, & facile oculos aperiunt, ac delira loquuntur, & manus ac crura, imò totum corpus inordinatè mouent ac concutiunt.

#### Differentia.

Estque Coma hoc duplex, vt habet Galenus, *lib. de Comate*, vnū Phreneticū, alterum nō Phreneticū. Phreneticum est cum delirio; non phreneticum sine delirio. Phreneticum rursum duplex est, vel ignauum, cum ægri vix mouentur; vel expeditum, cum ægri valde delirant, ac promptè mouentur, & vbi euigilant, è lecto prosiliunt, ac nonnunquam adstantes inuadunt. Qualis ille æger apud Heurnium fuit, qui, cum ad somnum se composuisset, & cum monacho, custode clinico, solus relictus fuisset, rursus expergefactus monacho, qui defatigatus vigilis & ipse obdormiuerat, caput cultro abscidit, iterumque ad somnum se composuit.

#### Causa.

#### Causa proxima.

Causam huius symptomatis quod attinet, vt ea, quæ in *Institut. lib. 2. loco allegat. sect. 2. cap. 4.* diximus, non repetamus, sed breuiter saltem contrahamus; Comatis vigilis causam esse compositam, & quæ simul somnum & vigilias producit, extra controuersiam est. Verum quænam sit illa causa, controuersum. Vulgo quidem assignatur bilis cum pituita, aut sanguine mista. Verum probabilius est, causam huius symptomatis esse vaporem narcoticum, simulque mentem turbantem, sicut hoc in spiritu vini, solano maniaco, & aliis multis narcoticis videre est, quæ & somnum inducunt, & deliria excitant. Ideoque præcipue in febribus malignis hoc symptoma accidit, & teste Paulo Ægineta etiam à venenis idem malum introducit: qualia proculdubio sunt illa narcotica, quorum supra, *cap. 6.* ex Prosperi Alpini *lib. 4. de Medicina Aegypti. cap. 2.* mentio facta est: in quibus tamen venenis nulla pituita & bilis mistio est, sed peculiaris malignitas, & occulta qualitas, quæ simul & delirium & in somnum inclinationem parit. Quanquam enim vis narcotica ad somnum disponat, & adsit ad somnum inclinatio, atque ideo oculis conuiuant ægri: quia tamen ille vapor in causa est, vt multæ absurdæ imagines phantasie obijciantur, accidit, vt ægri delirent, & dormire nō valeant.

Si quis tamen duos vapores hic statuere velit, vnum narcoticum, & somnum inducentem, alterum somnum turbantem; nec cum illo morosè litigabo.

Inprimis verò maximam vigilandi necessitatem habet inflammatio phrenetica, si adsit. Etsi enim vapor ille narcoticus faciat, vt æger ad somnum propensius sit: tamen inflammatio somnum impedit. Atque hinc accidit, vt, prout huius vel illius oculi vis est, maior, etiam somnus vel vigilæ, ac deliria præualeant, atque æger nunc plus, nunc minus moueatur.

Nonnunquam tamen etiam (etsi ratione causæ tum alterius generis videatur) hoc malum oriri potest à summa virium debilitate, quæ ex vehemēti morbo, immanissimis doloribus, aut immodicā euacuatione accidit; vnde homines oculos apertos seruare nequeunt, & inclinationem in somnum habere videntur, non tamen dormiunt, ob dispositionis ad somnum necessariæ defectum, & in summa dormiendi necessitate causæ somniferæ inopiam. Accidit hoc in iis, qui diuturno morbo exhausti, jam in limine mortis versantur; vt in phthisicis: quibus tamen non tantum virium defectus, sed & continuæ euaporationes calidæ in cerebrum, propter vlcus, & vomitum pulmonum, vigilias faciunt. Et hoc comatis genus est illud, quod Galenus Phreneticum appellat.

Huc pertinet etiam sopor ille grauis, qui *ex animæ* dicitur, qui quidem à naturali causâ dependet (nam qui à causâ supernaturali accidit, de eo Medici non est agere, & dictum fuit de eo, *loco modo allegato*, in *Instit.*

oriturque à vapore simul somnum inducente, & in somnia simul excitante. Solum in eo videtur esse differentia, quod hic, quàm in comate vigili, somnus arctior est. Et habere narcotica quædam vim simul somnum inducendi, & multa in somnis spectra injiciendi, patet ex eo, quod Prosper Alpinus, *de Medic. Aegypti. lib. 4. cap. 2.* scribit, Ægyptios affirmare, si opium, vel Asis, vel bosa, vel bernaui, vel bersacciant, se plurima pulcherrima viridaria, atque formosissimas, lasciuientisque puellas in somnis videre, vel alia, quibus delectantur: additque, hanc opinionem sic apud Ægyptios inualuisse, vt non tantum de plebe, sed etiam ex primatibus, Nobilibusque Ægyptiis multi eum in finem huius medicamenti vtantur; ibique antiquam consuetudinem esse, vt aliquis ad aliquam rem vocatus, volens ejus laborem subterfugere, neget se id posse, quia eo die atque hora herbam comedere consueuerit. Nam quum somnia nihil aliud sint, quàm dormientium deliria, & certum sit, illa narcotica, vt ex eodem loco Prosperi Alpini patet, varia deliria in hominibus, antequam in somnum delabuntur, excitare: non mirum est, etiam dormientibus imaginationem variis modis turbare, & varia spectra obijcere, quæ illi pro veris habent.

#### Signa Diagnostica.

Qui Comate vigili laborant, ii, vt ex modò dictis apparet, oculis conuiuentibus somnum caprant, dormire tamen non possunt, aut, si dormiant, mox iterum excitantur, delirant, inepta loquuntur & agunt, corpus variè mouent & jactitant, temerè è lecto surgunt, moxque iterum decumbunt.

#### Prognostica.

1. Coma vigil. periculosum & curatu difficile esse, *Prognostica* ideo vulgo docetur, quod ex materia contraria, & bile cum pituita & sanguine mista ortum habeat. Verum id falsum esse, & modò, & in *Institut. loco allegat.* monstratum. Interim periculosum esse negandum non est, sed aliâ de causâ: quia scilicet à vapore maligno & venenato ortum habet.

2. Si sermo sit impeditus, spirantibus in gutture murmur audiatur, potulenta ægri difficulter deglutiunt, humor tenuis è naribus destillet, ægri supini cubent; morbum periculosum indicant.

3. Coma vigil in phrenitidem, vel lethargum mutari solet.

4. Lethale coma vigil est, quod ex virium infirmitate accidit.

5. Deliria vehementiora in Comate vigili plerumque conuulsionem præagiunt. Non quidem, vt vulgo docetur, quod calorem hic superiorem esse, & succellu temporis totam humiditatem absumendo, ac siccitatem inducendo conuulsionem pariturum indicio sit; sed potius quia vapor ille malignus spiritus turbans etiam nervos vellicando conuulsionem inducere potest.

#### Indicationes & Curatio.

Eodem fundamento, vt modò diximus, nixi *Indicationes & curatio.* plerique, quod scilicet ex contrariis causis constet, contrariis etiam medicamentis curandum esse Coma vigil censent, partim scilicet iis, quæ lethargum, partim quæ phrenitidem curant. Et quidem considerare jubent, vtra causâ, bilis, an pituita, superet. Nam si pituita bilem superet, ad lethargum curam magis esse dirigendam; si verò bilis excedat, magis ad curam phrenitidis esse declinandum.

Verum puto, tutissimum esse, ad ipsam naturam vaporis

vaporis hoc malum excitantis respicere. Et cum malum hoc raro solum inuadat, sed plerumque febrium malignarum comes sit, tota ferè curatio ad febrem illam dirigenda est, ac malignitas expugnanda; cum sublata febris causâ, & malignitate expugnata, cum febre hoc etiam malum tollatur. Cum tamen materia tum caput præcipue perat & occupet; ut à capite amoueatur, omnis danda opera.

Primo ergo venæ sectio instituatur, & si iam in principio morbi, cui coma vigil coniugitur, ea instituta sit, repeti potest, & vena in pede reuulsionis gratia aperiri.

Hinc oxysrhodinum capiti admoueatur, & propter somnum, vel delirium magis urget, ista mixtura temperanda, ut malo præsentì conueniat. Ultra tamè triduum oxysrhodina non continuanda. Glandibus quoque, clysteribus acribus, frictionibus fiat reuulsio. Hinc materia præparanda & euacuanda conuenienter. Tandem, ut reliqua materia in capite discutiatur, & caput roboretur, inunctionibus & fomentis ex ol. chamæmel. irino, costino, pulegio, aceto maceratis, & similibus utendum; de quibus in caro & Lethargo dicitur.

Soporis grauis curatio itidem ex cura lethargi & cari patebit.

Sopor verò dæmoniacus, ut à causâ supernaturali pendet, ita etiam Medicæ curationi non subicitur.

#### Q V Æ S T I O I V.

*An Coma ἀγρυπνον, & Catochus sint iidem affectus?*

Coma ἀγρυπνον nonnulli etiam κατόχον, vel κατόχου appellant, & Coma ἀγρυπνον ac Catochum pro eodem affectu habent. Reprehenditque Amat. Lusitanus, Centur. 2. curat. 15. in Schol. Leonhardum Fuchsum, quod lib. 1. de med. morb. eodem capite, 24. nimirum, de Catocho & Catalepsi egerit; putatque, catochum & catalepsi diuersos affectus esse, eandem verò κατόχον & Coma ἀγρυπνον, seu vigil. Verum, ut existimo, sine ratione, & sufficiente causâ. Cum enim κατόχου & κατόχου deprehensionem, & firmam detentionem significant, à Medicis utraque vox iis tribuitur, qui diductis palpebris, & apertis oculis obriescunt quasi, & immoti ac fixi manent. Κατόχου verò, siue κατόχου vox propriè Comati vigili non competit; cum in Comate vigili ægri apertos oculos non habeant, ut faciunt, qui Catoche laborant, sed perpetuò conuiuant, ut Galenus, l. de Comate, c. 3. & 4. & Comment. 3. in tert. Epidem. docet. Κατόχου tamè vox non semper in vna significatione vsurpatur, ut infra, cap. 29. dicitur.

#### C A P V T XIX.

##### *De Somnambulis.*

**S**omnambuli. Pertinet ad hunc locum & eorum affectio, qui vulgo Noctambuli, seu νυκτάται (rectius forsan, cum etiam sani noctu ambulant, νυκτάται, somnambuli) nominantur, qui dormientes è lecto surgunt, ambulant, & vigilantium munera exercent: quorum passim fit mentio apud Medicos. Ex professio verò de hac affectione scripserunt, Petrus Sal. Diuersus, de affect. particularibus, cap. 18. Iacob. Horstius, in Comm. de Noctambul. Andr. Libanius, part. 2. singular. tract. 8. dictumque etiam fuit hac de re Inst. lib. 2. part. 3. sect. 1. cap. 7. & sect. 2. cap. 4. Quibus ut quædam addamus, & signa ac curationem subiungamus, sunt Somnambuli propriè ij, qui dormientes noctu è lecto insciji surgunt, & dormientes ambulant, ac vigilantium, & mira quidem, opera perpetrant; quorum tamen manè è somno excitati non recordantur, motu animali vi imaginationis fortioris concitato.

Dan. Sennerti Tom. I I.

Mira verò planè, & vix credibilia, ac vigilantibus inimitabilia sæpe perpetrant isti somnambuli, quorum exempla quædam collegit Schenckius, lib. 1. obs. 127. Mirum & ridiculum est illud, quod ex Iacobo Horstio recitatur, de quodam Nobili, qui nudus in somno surrexit, indusium manibus secum gestans, & ad fenestram perrexit, ac correpto fune è trochlea pendente in domus fastigium ascendit, & in picarum nidum incidens, pullos indusio inuolutos secum abstulit, ad lectum rediit, & actorum immemor probè dormiuit. Manè verò expergefactus, fratribus duobus in eodem cubiculo dormientibus quasi somnum id, quod reuera perpetraverat, recitauit. Postea verò è lecto surrecturus, & indusium quærens, illud, sed pullis picarum circumdatum, inuenit, & postea etiam cum fratribus picarum nidum expugnatum deprehendit.

[Quod in Somnambulis motus expeditus sit, extra controuersiam est. In sensuum autem internorum & externorum læsione maximam diuersitatem occurrere, variz historiæ docent. Ut iam alias omittamus, ex Henr. ab Heer.

Henricus ab Heer, obseru. Medic. oppido rarar. 2. refert, Sacerdotem quendam, annorum 45. iam à quindecim annis in somniis mortem sibi intentari autumasse, & ut plurimum ab amicissimis. Atque talia somnia terribilia singulis noctibus ter, quater, & sæpius recurrisse, & quidem circa primas noctis vigilias, recessisse mediâ nocte transactâ. Somnia hæc tam terribilia fuerunt, ut, licet funibus vel linteis multiplici plexu connexis scienti & volenti vesperi vincti fuerint pedes: tamen furibundus & quasi alter Samson, vincula omnia rumperet, vel certè compedibus pedes expediret; sæpe extra lectum, imò extra cubile se corripere, tanto cum horrore, ut toto corpore concuteretur, & cordis palmo teneretur. Hæc omnia, addit Heer, dixit, sibi apertis obseruari oculis, campanæ pulsum se audire, horasque distinctè numerare, solâ se libertate iudicij circa ea, quæ spectant obiectum somnij, priuari.

Idem, eod. in loco refert iuuenem quendam, cum in celebri Academia Poësin profiteretur, interdum mentem in omnia versasse, ut versus melius elaboraret: sed quod vigil nequiuertat, noctu præstitisse, surrexisse, pluteum aperuisse, scripsisse, sæpe altâ voce, quod scripserat, relegisse, demum cum risu & cachinno sibi ipsi applausisse, atque contubernalem, ut secum plauderet, hortatum esse, positisque sandaliis & veste; clauso pluteo, chartisque, ut vesperi fecerat, repositis, lectum repetiisse, somnumque, dum excitaretur, protraxisse, omnium quæ noctu egisset, ignarissimum: manè pridianâ sollicitudine adhuc laborasse, quomodo hiatibus versuum replet. Cum verò chartas ad suum libitum impletas, idque suâ manu, videret, attonitum quasi, & sollicitum fuisse, bonine an mali genij opus esset. Idem, ut, ibid. addit Heer, cum vxorem duxisset, eam tamen, ut refert coniugij condicio, quædam celârat, quoties noctu, infantem cunis ereptum ut plurimum gestans, domum perambulabat, comitanti per omnia vxori, quæcunque rogatus patefaciebat, & ad omnia vxoris quærita verissimè respondebat, ita ut ab ambulante & quasi dormiente, quæ à vigili nullis extorsisset illecebris aut artibus, & quæ rogare erubuisset, simplici interrogatiunculâ sincerè & sine fuce intelligeret: mirante postea sæpius noctambulo, quomodo, quæ secretissima habebat, in vxoris cor linguamque venissent. Qui ambulantiem & loquentem viderunt, vxor, socij, & familia, oculis apertissimis fuisse assueuerunt. Idem tamen nihil se vidisse, sanctè affirmabat. Sub annum ætatis 45. somnambulare desist, nec vnquam sopitus lecto se mouit, nisi prius vino se nimis repleuisset. Idem cessante somnambulatione somniis multis, sed plerumque veracibus, detentus fuit; in iis soceri, vxoris, filij primogeniti, affinium plurimum secutura funera tam clarè vidit, ac si ipsorum exequiis interfuisset. Etiam nunc plerumque, ut scribit Heer, postridiè sibi

euentura læta, tristia, rixas, damnum, lucrum, in somnio ita præuidet, vt ferè horam venturorum prædicere possit.]

### Causa.

de quo ad  
motum inci-  
piuntur Som-  
nambuli?

Perficitur autem iste motus beneficio pedum & manuum, & aliorum animali motui inferuentium organorum. Imperatur à locomotiuâ stimulara ab appetitu, concitato à phantasia, quæ obiectum aliquod in somno oblatum cognoscens illud appetitui vel fugiendum, vel appetendum offert. Et si enim in homine vigilante ratio & voluntas in locomotiuam imperium habeat tamen in somnambulis voluntatis, & recte rationis imperium non concurrunt; aut certè si concurrunt, obscurum, obtenebratum, & exiguum illud esse ex eo patet, quod somnambuli sæpe in præcipitia, & loca periculosa adscendunt & feruntur, in quæ vigilantes conscendere nec possunt, nec audent, vt ipsi postea somno excusso, & periculi, in quod dormientes se coniecerunt, magnitudinem attendentes, toti cohorrescant.

Qui autem fiat, quod non omnes homines affectum hunc patiuntur, sed quidam solum, & illi quidem non singulis noctibus, sed per certa intervalla, & alij quidem frequentius, alij rarius, consideratione dignum est. Causa verò proxima huius rei esse videtur, quod appetitus in iis est fortior, & vehemens, ac locomotiuâ agilior, & summa ad res expediendas alacritas; imaginatio verò debilior: ac causa adest, quæ sensus externos ligat, somnumque profundum excitat. Vnde fit, vt ratiocinatio phantasie segnitè operantis ope destituta, in somno nullas consideret circumstantias; & memoria quiescente errores phantasie non corriguntur. Inde etiam euenit, vt nec pueri, nec senes, sed adolēcentes ferè, qui appetitum habent fortem, & affectibus facillè ducuntur, hoc malo solum laborent.

Somnambu-  
lorum natura  
& constitutio  
qualis.

Appetitus verò illa vehementia à spirituum dispositione pendet, quam quidem illi ab admistis vaporibus accipiunt. Vt enim sanis ratione dispositionis spirituum actiones illæ principes variantur: ita etiam somniantes rerum imagines in memoria asseruatas alij clarius, alij obscurius perspiciunt, & non solum imaginatio, sed & appetitus hinc variatur, & quidem pluribus modis. Quidam enim planè quietè dormiunt, nonnulli in somno loquuntur, rident, flent, pedes & manus variè mouent, in lecto sese erigunt, secum cubantes percutiunt; & si hic appetitus valde intendatur, tandem accidit, vt planè à lecto surgant, & ad rem appetitam persequendam moueantur. Neque enim hæ dormientium & somniantium actiones differre videntur, nisi quod hi surgunt, illi in lecto iacētes eadem ferè agunt.

Quæ autem vaporis illius, qui spiritibus hanc dispositionem imprimit, & somniorum illorum causa est, natura sit, alij aliter docent. Et plerique ex qualitatibus primis & secundis causas petunt, & alij melancholicæ, alij cholericæ corporis complexionis causam hanc ascribunt, cerebrumque humidum addunt, quod vapores illos ex inferioribus ascendentes condenser. Verum, vt mihi quidem videtur, frustra; cum sufficientem huius affectionis causam non afferant. Etenim in quocunque corporis temperamento & constitutione, seu sanguinea, seu pituitosa, seu biliosa, seu melancholica affectionem hanc accidere posse, ipsa experientia docet. Ideoque mihi vero magis consentaneum videtur, vaporem, huius affectionis causam, talem penè vim obtinere, qualem illa narcotica, quæ sensus ligant, & simul somnia plurima, eaque clara excitant; qualia quædam dari, & Aegyptiis in usu esse, ex Prosperi Alpini lib. 4. cap. 2. de medic. Aegypt. cap. præced. diximus, & quale quid, atque huic analogum etiam in comate vigili accidit, vt ibidem dictum: etsi in his quædam occurrat varietas. Etenim in quibusdam sensus & motus ita ligatur, vt in lecto iacentes gestibus solum, vel voce, ad quæ in somnio stimulantur, peragant; in comate vi-

gili oculi subinde conuient, somnus verò ab imaginationis vehementia turbatur; in somnambulis sensus externi solum ligantur, appetitus verò tam fortis est, vt etiam ad motum animale hominem incitet. Et hoc ita sese habere, vel ex eo patet, quod inter euidentēs & externas causas à Medicis lactuca, semen papaueris, vinum, & similia narcoticam vim habentia recensentur.

Disputatur hoc loco, an cholerici, an melancholici ad hanc affectionem magis dispositi sint. Nonnulli cholicos, ob illam audaciam & temeritatem, quæ suaperagunt somnambuli, magis, quam melancholicos ad hanc affectionem dispositos esse putant. Alij probabilius esse putant, statuere, melancholicam spirituum dispositionem ad eam aptiorem esse. Melancholicorum enim imaginatio, vt ad deliria promptior, ita fortis planè est, & ita quidem, vt, quæ semel animo conceperunt, pertinacissimè persequantur, & nullis persuasionibus à proposito dimoueri queant. Et narcotica ipsa, quæ somnia talia turbulenta inducunt, melancholicæ magis cognata, quàm aliis humoribus videntur.

Verum negandum non videtur, melancholicam quandam dispositionem hinc concurrere, & plerumque eos hoc malo laborare, qui ad affectionem hypochondriacam sunt dispositi; & in somnambulis, quod melancholicorum est, circa vnam saltem rem imaginationem occupari, etsi in cæteris sopita quasi, & ligata sit. Quia tamen melancholici, etsi pertinaciter imagines impressas conseruant, & circa eas fortiter occupantur, plerique tamen ad rem persequendam tardiores, meticulosi, & cunctatores sunt; contrarium verò in somnambulis accidit, qui expediti & audaces sunt: talis dispositio spirituum accedat, necesse est, quæ appetitum valde moueat, & omnino tale quid, quale est in vino, à quo etiam melancholici sæpe, dum eo incalescunt, in risum & iocum soluantur, atque audaces fiunt.

Atque ita proxima causa huius affectionis est fortior appetitus, locomotiuam ad aliquid agendum stimulans, sensibus reliquis à vaporibus ligatis, nec phantasiam, & consequenter ratiocinationem mouentibus. Vt enim phantasia modò est fortior, modò debilior: ita etiam appetitus modò est fortior, modò debilior; vt ex amore & odio apparet. Appetitus verò ille à spirituum dispositione pendet; quam inducunt vapores, qui spiritibus permiscuntur, qui, vt diximus, vim sensus ligandi, & simul somnia multa, eaque clara, obiciendi vim obtinent, in quibus appetitus facillè mouetur. Hinc adeo fit, vt somnambuli non singulis noctibus surgant, sed tum demum, cum vapores illi ad cerebrum eleuantur. Quod faciunt tum causæ antecedentes, tum procatacticæ, & euidentēs.

Proxima id-  
nabulati-  
onis  
causa.

Inter causas antecedentes sunt humores, qui vapores suppeditant, qui eiusmodi dispositionem spiritibus inducere valent; qualis in ebriis & delirantibus sæpe apparet. Neque est, vt causam antecedentem ad vnum humorem astringamus; cum omnes humores tale quid contrahere possint, quale ebriis & narcotica sumentibus accidit.

Causa ante-  
cedens.

Hinc causæ externæ, euidentēs, & procatacticæ sunt, quæ vel eiusmodi humores & vapores subministrant, vel eos commouent; quales sunt fabæ, & alia legumina, lactuca, sem. papaueris, vinum recens dulce, vel aliud generosum caput replens. Faciunt huc etiam diurnæ actiones & cogitationes, quarum imagines memoria per somnum phantasie obicit. In primis huc facit Luna, cuius motu vt epilepsia, ita etiam hoc malum commoueri experientia docet. Et præcipuè radij Lunares, si dormientis capiti incidant, hoc malum excitare solent. Facilius quoque ad hoc malum dispositi in aere pluuioso, & turbido eo, corripuntur, quam in sereno: vt & post crapulam, & cibum, vel potum copiosius sumptum.

Causa ex-  
terna, eu-  
dentes, &  
procatacti-  
ca.



*Signa Diagnostica.**Signa diagnostica.*

Omnibus somnambulantibus hoc commune est, quod noctu surgunt, & dormientes ambulant, & eorum, quæ egerunt; non reminiscuntur, aut, si reminiscantur, ea pro somniis habent. Reliqua, quæ agunt, & dormientes perpetrant, planè varia sunt, & ut vigilantes alij aliis occupantur, ita etiam variæ sunt somnambulantium actiones, ut historię, quæ de hac re passim extant, docent. Quæ quidem nonnulli clausis oculis, alij verò apertis peragunt. Neque enim qui seras aperiant, pullos avium ex nidis extrahunt, obuiam factis de via cedunt, vel alia, ad quæ visus requiritur, peragunt, oculis clausis efficere possunt.

*Cur somnambuli ea agant, quæ vigilantes non possunt.*

Quod autem tam mira peragunt, & quæ vigilantes perficere non possunt, aggrediuntur & perficiunt, ad id fastigia sine scalis superant, in puteos descendunt, ex iisdem adscendunt, præcipitiis sine damno se committunt; non est, ut causam corporis leuitati spiritibus turgentis adscribamus, sed vera causa est, quod somno sensus ligati sunt, ac solo appetitus ductu cum summa incogitantia, sine omni metu, actiones suas aggrediuntur. Videmus idem in ebriis & delirantibus fieri, qui eadem temeritate ea sæpe perficiunt, atque ea pericula aggrediuntur, quæ sobrii & sani facere non possent.

*Prognostica.**Prognostica.*

1. Noctisurgium etsi plerumque nihil damni inferat; tamen quia somnambuli tales in vitæ discrimen sæpissime adducuntur, affectusque hic in peius malum, ut epilepsiam, vel simile quid mutari potest; danda opera, ut æger ab eo liberetur.

2. Solet autem hic affectus sæpe ætatis decursu mutari. Ut enim infantes & pueri non facile eo corripiuntur, sed iuvenes, & consistentis ætatis: ita etiam senes plerumque sponte deserit, humorum dispositione ad hoc malum inducendum apta mutata.

*Indicationes & Curatio.**Indicationes & Curatio.*

In Curatione ad duo attendendum. Primò quid in paroxysmo agendum sit. Deinde quomodo is præcauendus sit. Prius quod attinet, si somnambuli sunt in loco tuto, excitandi sunt, vel clamore, vel aliis modis, aut, si ex loco periculoso eripi possint, & illud faciendum. Si verò in præcipitio sint, vel alio loco periculoso, è quo vigilantes sine periculo redire non possint, nullo modo inclamandi, vel excitandi sunt. Obseruatum enim est, quosdam excitatos in vitæ discrimen peruenisse. Ita refert Bodinus, quendam dormientem noctu in profluentem iuisse, vltius tamen non processisse: cum verò socius metueret, ne vltius procederet, eumque proprio nomine inclamaret, eum tum repente corruisse, & submersum esse.

Increpandi etiam & castigandi sunt expergefacti, ut metu objurgationis; vel castigationis à surgendo potestea abstergeantur.

Ne verò iterum in somno surgant & ambulent, humores illi vitiosi, qui vapores illos, spiritus animales ligantes, phantasiæque turbantes, emittunt, expurgandi. Sanguis nimirum, si abundet, euacuandus, humores vitiosi, inprimis melancholici, euacuandi, & alia, quæ supra, cap. 8. suprà proposita, sunt agenda. Inprimis cerebrum est roborandum, ut supra, part. I. dictum; & quæ postea de Incubi curatione dicentur, facile huic affectui etiam applicari poterunt.

*Dieta.*

Dieta sit talis, quæ materiam, huius mali causam, non suppeditat. Aer sit purus. Noctu radij Lunæ vitentur, & ne ii ad caput dormientis pertingant, cauea-

tur. Cibi sint boni succi, non flatulenti, & qui somnia turbulenta pariunt, ut fabæ, lentēs, & similia. Somnus non statim à cibo ineatur. Cæna sit parciore, animi affectus sint moderati, ne imagines diurnarum actionum, vel cogitationum vehementiorum in somno recurrant, phantasiæque turbent.

*Cibus. Somnus. Animi affectus.*

## CAPVT XX.

*De Lethargo.*

**L**ethargus nomen *ἡ δὲ λέθηρος ἀργία*, siue *ἡ δὲ λέθηρος ἀργία*, vel *ἀργία* accepit, id est, ab obliuione & inertia, seu obliuione inerti, aut cum ignauia coniuncta, quasi dicas obliuionem inertem; quoniam iis, qui hoc malo laborant, memoria ita læditur, ut nihil eorum, quæ fecerunt, viderunt, audierunt, recordentur; & oculis clausis, ac in somnum perpetuò propensis quasi, ignauia sepulti iacent. Celsus & ipse vocabulum Græcum retinuit; cum alij Latini Veternum nomen. Plinius tamen, lib. 28. cap. 17. Veternum à Lethargo discernere, & pro sopore graui, seu caro accipere videtur. Generaliter enim nonnunquam Lethargi vox, ut & vocabulum comatis & cari, pro omni somno profundo, & difficilis expergefactionis vsurpatur.

In specie autem, & propriè Lethargus & Veternus is affectus est, in quo perpetua adest in somnum propensio, cum omnium rerum obliuione, imaginatione & ratiocinatione læsa, cum lenta febre continua. Seu Lethargus est inexpugnabilis dormiendi necessitas, somnūque grauis, cum delirio & memoria læsa, ac lenta febre continua. Hæc enim in hoc affectu concurrunt; perpetua in somnum propensio, omnium rerum obliuio, delirium seu phantasia, & ratiocinatio læsa, ac lenta febris continua. Estque Lethargus affectus inter coma vigil & carum mediæ naturæ. Nam qui Lethargo laborant, profundius dormiunt, quam qui coma vigil patiuntur: lenius verò, quam qui caro laborant.

*Causa & Locus affectus.*

Verum ut natura huius affectus clarior euadat, de causa & loco affecto, & causa eius disquirendum; cum nec antiquiores, nec recentiores eâ de re inter se consentiant. Antiqui omnes causam ponunt pituitam lentam & viscidam, in cerebro redundantem, & putrescentem; et si de loco & modo, quo id fiat, non omnes idem planè sentiant.

Plerique statuunt, frequentissimè cerebrum secundum anfractus suos, nonnunquam & secundum substantiam temperiemque affici, & à pituita imbibita nunc quidem solùm irrigari, nunc etiam instar spongiæ intumescere, & à pituita putredine incensa inflammationem, vel inflammationi simile quid exhiberi. Vnde nonnulli Lethargum inter tumores cerebri ponunt, atque ipse Auicenna Lethargum apostema phlegmaticum nominat, genitum in meatibus substantiæ cerebri, hoc est, in sinuosis illis ductibus, & plicaturis, non in membranis, quæ, ut ipse censet, humorem phlegmaticum, & duritiem non recipiunt; nec in ipsa cerebri substantia, quæ tam viscidam & lentam pituitam non admittit; nec etiam in ventriculis cerebri. Nam si in ventriculis cerebri gigneretur, apoplectici fierent; cum tamen Lethargici contra, quàm apoplectici, excitati oculos aperiant, audiant, respondeant, quanquam ægrè: quod indicio est, ductus spirituum à cerebro ad organa sensuum, non planè, ut in apoplexiâ, obstructos esse. Hinc Capiuaccius, & alij Recentiores distinguunt inter Lethargum verum, & nothum: & verum ab inflammatione, alij ab apostemate frigido fieri statuunt; nothum verò absque apostemate in capite, sed per cōsensum aliarum partium, ut in febre quotidianâ, hemitritæo,

vel à membro aliquo: qui propterea sit continuus, sed modò intendatur, modò remittatur, secundum morbi modum. Et huiusmodi Lethargo sæpe laborare putant senes decrepitos, & quidem ob calorem debilem, quo neque excrementa, neque vapores disentiuntur. Aliis tamen Galeni & Auicennæ interpretibus hæc non placent, qui in cerebri substantia, & anfractibus, sine villo tumore & inflammatione pituitam colligi & putrescere censent. Et licet Auicenna apostema phlegmaticum Lethargum nominet: id tamen non de tumore cerebri accipiendum esse putant Interpretes, sed de materiæ pituitosæ in cerebri anfractibus collectione, quam putredo & phlogosis quædam sequatur. Neque enim inflammationis cerebri adesse indicia, neque in Galeni scriptis occurrere putant, Lethargum tumorem, multò minus inflammationem appellari, vt ex 1. *prorrhet. comm.* 1. 13. *meth. med. cap.* 21. 3. *aphor.* 30. 3. *de caus. puls.* cap. 16. 4. *de præag. expuls. cap.* 8. & plurimis aliis locis patet, in quibus quidem pituitam in cerebro putrescentem causam Lethargi ponit; tumoris tamen, vel inflammationis non meminit. Quod verò, 13. *de meth. med. cap.* 21. Lethargum phrenitidi contrarium malum esse dicit: id de loco affecto inprimis, & causa, quæ in Lethargo est pituita, in phrenitide bilis, accipiendum existimant: vnde 4. *de causis puls.* cap. 14. scribit: Lethargus in cerebro fit, Phrenitis in membranis.

Porro cum febris, quæ in Lethargo adest, lenta & obscura sit, eam à cerebri inflammatione, vel affectione inflammationi cognatâ deducunt, quæ ortum habeat à materia per se frigida, calida tamen per accidens, ob putredinem.

Pituitam enim putrescentem in cerebro vapores ad eor mittere paucos, & non impensè calidos, atque hinc oriri febrem illam lentam censent; reliquum, quod non putruerit, refrigerando, & humectando soporem inducere. Et carum & Lethargum vtrumque quidè à pituita oriri statuunt; eo tamen discrimine, quòd in caro pituita non putrescat, in Lethargo verò putredinem concipiat.

Atque ita plerique Medici causam proximam & coniunctam Lethargi statuunt esse humorem pituitosum, frigiditate quidem & humiditate calorem cerebri naturalem obtundente, & spiritus animales torpidos reddente, sed calore etiam p. n. per putredinem contracto cerebrum nonnihil accendente, & φλόγην, atque affectum inflammationi similem, & hinc febrem lentam continuam excitante.

Hinc antecedentes causas ponunt, quæcunque pituitam in capite gignunt & cumulant; quales sunt aëris immoderata frigiditas, humiditasque, cibi visceri & lenti; quòd inprimis facit diætâ & ventriculus, quæ succum pituitosum generant, siue suo, siue alimentorum assumptorum vitio. Non tamen Lethargus generabitur, nisi materia prius capiti communicetur, illudque occupet, quod sit vel quòd hepar succi huius copiâ aggrauatum eum ad cerebrum mittit, vel quòd cerebrum ob calorem & dolorem eum attrahit, quòd facit somnus multus à repletionem & supinus, præsertim diurnus. Hinc etiam Lethargum familiarem esse ætati ingruescenti, & consistenti, & iis, qui naturâ sunt pituitosi, statuunt; ita tamen, vt calor aliquis supersit, qui febrem accendere possit.

Primitiuas faciunt aërem crassum, turbidum, austrium, moram in radiis Lunæ, cibos crassos & viscidos, vt & cæpas, quæ vnâ partem habent crassam, à qua generatur pituita; alteram vaporosam, quæ caput vaporibus replet; otium, intermissa exercitia, & alia, quæ supra, p. 1. cap. 10. proposuimus; & pituitam in capite cumulare diximus. Et vt Lethargus actu inducatur, præstant, quæ faciunt, vt materia transpiratione prohibita in capite putredinem concipiat: qualia sunt cibi multos vapores ad caput exhalantes, vini potentis

usus nimius, & similia. Atque hæc communis & vulgata de natura & generatione Lethargi est doctrina.

Inter recentiores verò Platerus aliter hac de re sentit, negatque, ex putredine pituitæ, præsertim in capite, febrem accedi, aut fieri posse, vt idem pituitosus humor putridus suâ frigiditate carum, & calore febrem accendere, atque vnum idemque & frigidum, & calidum esse queat; cum contraria in eodem subiecto consistere non possint. Ipse verò ita hac de re statuit, vt in febribus intermittentibus, ex materia in venis melaëraicis putrescente calore attenuatâ, & copiosè sursum ad caput in paroxysmi initio delatâ, sopor grauis in tertianis, & quartanis nonnullis accidit, & vt in febribus continuis cerebrum dolore præcedente diuturno, & graui incalescitur, in vigore, vel post ipsum caro subsequente, percussum ægrum in somnum sæpe discrimen adducit: ita in principiis continuarum febrium, si propter nimiam euaporationem cerebrum ita labefacteretur, vt sopor grauis sequatur, Lethargum hunc esse dicit, qui cum febre continua copulatus sit, & mox cum illa inuadat, quæmque ab alio caro, qui in declinatione accidit, non adeò differre, censet, nisi quod statim cum febre incipit. Et omnino hac in re Platerum rectius, quàm Antiquos (nisi forsitan eorum sententia commodius explicetur) sensisse existimo, atque impossibile esse credo, vt eadem pituita putrescente in cerebro, & febris, & sopor exciteretur. Etenim nec humor hic per se ad putredinem, præcipuè in capite, concipiendam aptus est, neque, si eam concipiat, tantam concipere potest, quæ in totum corpus calorem diffundere, & cor ita labefactare potest, vt inde febris continua exciteretur; præcipuè si extra cerebrum subsistat, & extra vasa eiusdem in sinuosis anfractibus putrescere debeat.

Hoc verò magis consentaneum videtur, soporem illum grauem non esse primum affectum, sed à vapore narcotico fieri, & esse symptoma febris talis, quas Platerus comitatus appellat, continuæ nimirum lentæ, qualis est quotidiana continua, tertiana notha, & semitertiana. Quod ipsum præter Platerum alij etiam Medici, qui pituitam scilicet præcipuam huius mali causam statuunt, consentiunt. Vnde Vidus Vidius scribit, Lethargum frequenter consequi febres pituitosas, ac mali moris, cuiusmodi sunt semitertianæ, vel tertianæ nothæ, & pestilentes. Etenim sopor ille grauis, qui Lethargus non est, in variis febribus accidere potest; cum Lethargus saltem lentam febrem coniunctam habeat; quod indicio est, eum saltem cum febre pituitosâ coniungi. Ideoque etsi vapor narcotico in excitando Lethargo primas partes tribuimus, & à pituitâ in capite putrescente febrem non deducimus, sed febrem primum affectum esse statuimus, quem Lethargus comitatur: tamen pituitam non planè excludimus, eamque, si in toto, siue in capite collecta sit, ad malum hoc etiam facere, concedimus. Etenim si pituita in copia in capite collecta sit, & cerebrum aliàs sit humidius, atque homo in febrem incidat, & pituita illa in cerebro calore febrili liquetur & fundatur, cerebrumque eâ irrigetur; aut si pituita in venis calore fusa per febrem in caput pellatur: eo facilius somnus, & quidem grauior, induci potest, vaporque narcoticus cū bile pituitâ concurrens somnum grauem facit, sicut cum coma vigil. Et adsunt in hoc malo indicia, quæ pituitæ copiam non solum in cerebro, sed & venis cumulatæ arguunt. Urinam enim reddunt ægri instar iumentorum turbidam, cuius causa est crudorum humorum in venis à calore facta agitatio; alui excrementa sunt liquida, oculi plerumque & facies tument, vbi à somno excitari ad se reuertuntur ægri, conqueruntur de colli doloribus, ex humoris decubitu ad spinæ vertebra. Si quis tamen Lethargum etiam dari putat, qui à febre primaria non dependeat, sed quem potius febris sequatur, cum eo etiam non pugnabo, modò commodè

ea sententia explicetur. A pituitæ equidem solius putredine affectum talem, qui febrem habeat comitem, produci facile non posse, satis probabile est; verum si è sanguine pituitoso id fieri dicatur, absurdum non videtur. Galenus, 13. meth. c. 12. Lethargum malum phrenitidi contrarium secundum speciem esse affirmat; at phrenitis, cum sit inflammatio membranarum cerebri, non à sola bile, sed à sanguine bilioso ortum habet. Ita vero consentaneum videtur, Lethargum non à sola pituita, sed à sanguine pituitoso, seu ab inflammatione pituitosa fieri, quæ febrem lentam etiam excitare potest. Quæ sententia, ut antea dictum, Capiuaccij fuit: quam sine causâ sufficiente nonnulli rejiciunt. Neque enim, quod Platerus virget, sola pituita sine sanguine in cerebro putrescere, & tantum calorem concipere potest, ut febrem exciter. Et res ipsa loquitur, atque experientia testatur, inflammationem in Lethargo adesse, & sæpe tantam, ut etiam sphacelus cerebri inde producat; cuius rei exemplum est apud Forestum, lib. 10. obseru. 11. in nobili puero, cujus caput cum post mortem apertum fuisset, cerebrum & cerebellum, in parte dextra vergens ad posteriorem, omnino saniosum, putridum, corruptum, & sanguinolentum inuentum est; quod indicio fuit, sine sanguine hanc putredinem excitatam non fuisse. E quibus Antiquorum & Plateri sententia forsitan aliquo modo conciliari potest; si cum Capiuaccio dicatur, Lethargum alium verum esse, alium nothum; aut potius esse duos Lethargi modos: Vnum provenire ab inflammatione cerebri pituitosâ; alterum vel à vaporibus prodeuntibus in febre pituitosa primaria, vel à pituita copiosa in cerebro collectâ; ibique à calore fusa & liquata.

#### Signa Diagnostica.

Qui Lethargo laborant, omnium obliuiscuntur, delirant cum perpetua in somnum propensione, & excitati rursus feruntur in somnum, interrogatique vix respondent, oculosque, quos excitati aperiunt, statim iterum claudunt: in affectu tamen grauiore non ita arcte committuntur palpebræ, ut non aliqua albi oculi pars videatur. Vbi reuersi ad se fuerunt, conqueruntur de capitis dolore grauante, & de colli doloribus, ex humorum decubitu ad spinæ vertebra, oscitant, osque hians aliquandiu ob ignauiam & obliuionem apertum seruant, matulâ porrectâ eam se in manibus habere obliuiscuntur. Febris lenta statim adest, cuius calor non acris, nec mordax est, eaque continua, habens tamen accessiones quotidie sub noctem. Pulsus magni sunt, aucti necessitate ob febrem; non tamen absolute magni, nec respectu sanitatis; sed respectu respirationis, quæ cum sit parua, necessitatiq; sufficere non possit, ejus vice pulsum magnum fieri necesse est. In Lethargo enim instrumenta respirationis, nerui scilicet thoracis, magis afficiuntur, quam pulsus, arteriæ scilicet. Idem tamen sunt intermittentes, ob fractam facultatem, rari & rardi; quia locus affectus, nempe cerebrum, viscus molle est. Respiratio rara est, & imbecilla, ob morticem facultatem languentem. Nonnihil tussunt, ob pituitæ defluxum ad laryngem & pulmones. Alii excrementa plerumque liquida sunt, vrinam reddunt, ut iumenta, turbida; cuius causa est crudorum humorum in venis à calore facta agitatio, sine tamen separatione. Tument oculi & facies, ut somnolentorum; sudor multus, & præsertim in extremitatibus adest, isque sæpe frigidus: lingua est alba & mollis, oculi prominentes, faciesque vniuersa est tumida & pallida: manibus & capite tremunt, ob neruorum principium affectum; supini jacent, ad pedes delabuntur, in multis singultus accidit.

Quibus signis Lethargum à cognatis affectibus discernere non ita difficile est. A caro enim differt, quod in caro non adest febris, vel, si adest, præcessit, eaque

vehementior. A catalepsi differt, quod in Lethargo oculi manent clausi, in catalepsi aperti, ægerque in eo, quo correptus fuit, statu permanet, quali obriguisset. Ab apoplexia differt, quod in hac sensus & motus, ac ratio, principelque cæteræ facultates non solum immiuntur & hebetantur, sed & abolentur, respiratione solum seruata: & apoplexia non sensim gignitur, ut Lethargus, sed subito hominem inuadit, & quidem sine febre. Ab vteri strangulatu differt, quod Lethargici excitati respondent; hysterica verò mulieres non, & præter hæc sæpe conuelluntur, febrisque adest. A comate, quod coma in accessione præcipue febrium inuadit, iisdemque declinantibus remittit, vel euanesceit: somnus verò, quo Lethargici opprimuntur, æque profundus semper est, à quo ubi violenter excitantur, statim in eum relabuntur. A Typhomaniâ, aut comate vigili differt, quod in hac propensio, quidem in somnum adest; æger tamen non dormit, sed facile expergilcitur: id quod in Lethargo vero non accidit.

#### Prognostica.

1. Lethargus acutum genus mali est, & nisi succurratur, celeriter jugulat, Celsus, lib. 3. cap. 21. omnisque Lethargus legitimus ferè lethalis; unde malum periculosius esse, quam peripneumoniam, etsi & ea plerumque sit lethalis, testatur Galenus, 4. de Caus. puls. cap. 13. ob partis affectæ præstantiam. Occupat enim Lethargus partem præstantissimam, & grauissima habet symptomata, nihilque, quod ad morbum periculosum constituendum facit, Lethargo deest.

2. Lethargici in septem diebus moriuntur; si verò hos effugiunt, sani euadunt, teste Hippocrate, 2. de morbis.

3. Lethargus accidens iuuenibus, æstiuo tempore, regionibus calidis & siccis, deterior esse statuitur, quam qui accidit senibus, hyemali tempore, & regionibus frigidis, ex 2. aphor. 34. Platerus tamen senes plerumque interficere scribit; quod & ipsa experientia, & ratio persuadet. Siue enim febrem illam, ex sententia Plateri, spectes, siue inflammationem pituitosam, ex Capiuaccio. utrobique senes, ob caloris narium debilitatē, qui neutrum malū vincere potest, periclitantur.

4. Sanantur autem ægri, si facultas naturalis & vitalis constat, & actiones animales non valde læduntur. Si nimirum Lethargicus jam melius intelligit, facilius mouetur, memorari incipit, ad interrogata respondet, spiratio fit faciliior & liberior; parotides erumpunt die critico, multa expuit, per nares purgatur, & symptomata omnia minuuntur, ipse est ægrum conualliturum.

5. Quando materia Lethargi causa, euacuatur per aluum, vel deriuatur ad emunctoria post aures, cum febris & symptomatum remissione, bonum.

6. Contra verò, si symptomata statim ab initio sint grauiora, ac vires prosternantur, nulla salutis spes est.

7. Qui ex Lethargo seruantur, Empyici fiunt, teste Hippocrate, in Coac. prædict. & in tertio de morbis. Pituita, enim à capite ad fauces decumbens, si non expuatur, confluit ad pulmones, à quibus compressis in cauum thoracis spatium ejicitur, ibique putrescens suppuratur, ut à plerisque hoc Prognosticum explicatur. Monet tamen, non sine causa, Mercurialis, alienum esse à ratione, hoc Prognosticum de Empyicis in specie dictis interpretari velle; cum non sit possibile, ut materia, quæ in cerebro lethargum facit, in pectus transmittatur, ac ibi in pus vertatur. Ipse verò per suppurations hoc loco eos intelligit, quibus materia putrefacta per aures, vel nares euacuatur. Et verum est, Hippocratem ἐμπύκτους sæpe nominare consueuisse non eas tantum, quæ sunt circum thoracem, sed etiam in aliâ quauis corporis parte in pus mutationes, ut Galenus, 5. aphor. 8. & 7. aphor. 44. docet.

8. Si Lethargici vrinas claras & tenues reddant, malum.

9. Si Lethargicus multa & liquida egerat per aluum, valde exigua vitæ spes est, teste Hippocrate, 3. de morb. Nam indicium est prostrata, & ferè extinctæ virtutis retentricis.

10. Quando symptomata, quæ Lethargo conjunguntur, inualescunt, & sudor frigidus, præsertim in capite, augetur, lethale est, virtute jam magis & magis debilitatâ, teste Auicenna.

11. Tremor in Lethargo malum statuitur, vel quia materia flatulenta resoluta cerebri neruos concutit, vel quia tanta materiæ copia significatur, vt & dorsalis medulla ab ea occupetur. Si tamen materia è cerebro expellatur ad neruos, & inde æger melius habeat, bonum; habetque se res, vt in paralyfi post apoplexiam.

12. Fit nonnunquam, vt Lethargus in sphacelum parte aliquâ cerebri desinat, quando sanguis pituitosus putrescens abcessum gignit. Adest tum dolor capitis vehemens, febris intenditur, tremores vniuersi corporis accidunt, & alterius lateris paralyfis, si totum cerebrum non sit occupatum. Cujus rei exempla sunt apud Amat. Lusitanum, Dodonæum, Forestum.

13. Lethargum phrenitis sanat, concocta morbi materiâ: & contra non vtiliter phrenitis in Lethargum vertitur cerebri naturali calore extincto. Galenus, 6. Epid. comm. 6. aphor. ultim.

#### Indicationes.

Indicationes.

Ex iis, quæ de natura & causis Lethargi dicta sunt, patet, curam partim ad febrem, siue ea sit continua quotidiana, siue semiterriana, siue terriana notha, & malignitatem, si quæ adsit, partim ad caput dirigendam esse. Quæ ratione febres illæ sint curandæ, suo loco dictum.

Habitâ igitur febris, & totius ratione, eoque, quantum opus, euacuato, materia ad caput affluens & reuellatur, & repellatur, æger à somno excitetur, materia, quæ ad caput affluxit, euacuetur, & discutatur, caputque tandem roboretur.

#### Curatio.

Curatio.

Primò ergo danda opera, ne materia in toto corpore redundans ad caput feratur, verum potius ad partes cæteras reuellatur, & quod commodissimum est, è corpore euacuetur. Et in reuulsoriis auxiliis diutius, & ferè semper persistendum.

Vena sectio.

Ergo clystere præmissò sanguis euacuetur è venâ cephalicâ, nisi id vires prohibeant. Et quidem maturè instituatür venæ sectio; cum morbus sit acutus: præcipuè si malignitas adsit, venæ sectio non diu differatur.

Vbi pituitosus humor, quod plerumque fieri solet, simul abundat, & frigidior tempore morbus inuadit, parcius sanguis ad 3. iiii. vel iii. euacuandus. Nonnulli quidem planè dissuadent venæ sectionem; sed cum febris conjuncta sit, & procul dubio humor vitiosus per venas diffusus ad caput affluat; non solum à capite reuellitur venæ sectione sanguis, sed & natura parte oneris leuata reliquum facilius concoquet. Post cephalicam nonnulli venam frontis aperiunt. Potest & hîc vena in pedibus aperiiri.

Cucurbitulæ cum sine scarificatione applicatio.

Si verò venam secare non liceat, cucurbitulæ scarificatæ vtilis sunt, quæ dorso & humeris primùm, hinc versus occiput admoueantur. Vtilis tamen etiam sunt cucurbitulæ non scarificatæ, quæ tractu suo non solum materiam à capite reuellunt, sed & facultatem animalem sopiram excitant.

Hirudinum applicatio.

Si vniuersi corporis euacuatio præcesserit, cucurbitulæ inter primam & secundam vertebra ceruicis applicari possunt.

Ligatura &

Cum commodo etiam hirudines hæmorrhoidi-

bus affiguntur; quod remedij genus ab imminente Lethargo præseruare, & jam Lethargo correptos ab eo liberare, obseruatum est; præsertim si malum ab hæmorrhoidi suppressione ortu habeat.

Eadem fine instituantur ligaturæ fortes, frictions pedum cum sale & aceto, manibus inunctis ol. ruta-  
ceo, & de castoreo.

Repetantur quoque glandes & clysteres:

℞. Parietar. mercurial. saluia, majoran. betonic. cen-  
taur. minor. an. M. j. agaric. in petiâ ligat. Drach. iij. Suppositorum  
& enematum  
usus.

Coquantur in hydromel. l. q. Colaturæ ℞. lb. j. elect.   
hier. simpl. Ind. an. Vnc. ss. ol. lilior. albor. rutac. an. Vnc. j.   
mell. rosar. vel anthos. 3. vi. sal. Drach. i. F. Clyster.

Post venæ sectionem sæpe statim ad medicamenta purgantia transeundum; & præcipuè si humor ad caput ruens turgentis naturam præ se ferat, atque graue periculum immineat, si coctio, & præparatio humorum expectetur.

Ideoque attenuatis crassis humoribus, quantum temporis angustia concedit, purgantia exhibeantur. Cathartica autem medicamenta in principio mitiora sint, ob febrem continuam coniunctam. Commodam est hîc infus. agar. cum hydromelite, cui aliquid rhabbari addi potest; cum bilis plerumque humorum ad ad caput vehiculum sit, aut pilul. de hierâ cum agarico.

De purgantibus autem hoc monendum, quandoque solis pituitam purgantibus vtendum esse, quandoque bilem purgantia admiscenda, prout pituita, vel bilis admiscetur. Si Lethargus est in principio, cum materia adhuc ad caput confluat, & ejus vehiculum sit humor biliosus, non solum pituitam purgantibus tunc vtendum est, verum etiam de bilem purgantibus aliquid admiscendum, rhabarb. scilicet, & scammonium. In morbi progressu verò, & cum materia jam ad caput fluxit, & in eo hæret, solis pituitam purgantibus vtendum; nisi forsan febris etiam notha sit, & ex misto humore ortum habeat.

Si tamen febris sit remissior, & materia in capite valde vrgeat, etiam fortiora exhibeantur. Possunt & clysteres aciores sæpius repeti.

Non incommodum fuerit & vomitoriis vti, si materia in ventriculo contineatur. Vomitus pro-  
uocatio.  
Repellentium  
usus.

Interim dum hæc peraguntur, & quidem mox post venæ sectionem, repellentia medicamenta capiti ad futuram coronalem applicentur, quæ supra, part. 1. c. 5. & seqq. proposita sunt.

Mitiora tamen illa vsurpentur, vbi frigidus humor & pituitosus admistus est.

Neque à reuellentibus interea desistendum, sed clysteres acres, ligaturæ & frictions continuandæ. Post secundum, vel tertium diem repellentibus discutientium aliquid addendum, vt ol. chamæmel. rosac. flor. stœchad. Arabic. origani, pulegij, calaminthæ, castorei.

Vel ℞. Ol. rosac. Vnc. iij. aceti fl. tunic. Vnc. ss. castorei Drach. ij. M.

Alij cinerem capillorum humanorum admiscant, quem Lethargi antipharicum vocant.

Vel applicetur hoc Epithema:

℞. Fol. majoran. fl. lauendul. an. p. iij. rosarum rubr. M. j. rad. angelic. tormentill. an. Drach. j. ss. ostrurij, zedoar. aceti vini opt. Vnc. ij. aq. q. si

Coq. ad tertias. Colentur. In colatura stuppa maderiat, capiti que imponatur.

Danda quoque opera, vt æger è somno excitetur. Excitatur autem iisdem ligaturis & frictionibus, quæ ad reuellendum adhibentur; cum dolorifica sint, vt & pilorum vellicatione, vociferatione & strepitu, ac aliis, quibus fieri potest, modis. Inprimis verò tactus objecta vehementia & dolorifica hic plurimum possunt. Ideoque frequenter cucurbitulæ magnæ sine scarificatione variis corporis partibus applicandæ, plantæ pedum fricandæ, & alia objecta, & quæ ægrum ad vigilandum excitare possunt, ipsi obicienda.

Semini inhibito.

Exemplum



Exemplum elegans Lethargici excitati ex Horatio, supra, c. 2. recentissimus. Facit ad eam rem etiam inunctio palati cum oxymelite s. & scillit. sinapi, pyrethr. Mithridario, & similibus.

Suffitus, quibus nonnulli ad excitandum vtuntur, satis commodi hic non sunt; cum cerebrum valde repleant. Rectius ex pulegio, ruta, serpillio, hyssopo, origano, in aceto coctis, addita particulâ castorei, vapores calidi naribus ægri excipiuntur; de quibus supra, cap. 2. dictum.

Vel ℥. Sem. nigell. Drach. j. rad. angelic. Zedoar. an. Scrup. ij. castor. Scrup. j. baccar. lauri ℥. s. camphor. gr. vii. Contund. & Misc. F. Nodus ex sind. rubr.

Potest & sequens Balsamum naribus inungi: ℥. Bals. angelic. majoran. ruta, an. 3. j. extr. theriac. ℥. j. ol. laur. destillat. galban. an. gutt. v. M.

Vel acetum destillarum acre infundatur laminæ ferreæ candenti, & fumus naribus accipitur.

Si morbus det inducias, materia præparetur medicamentis ex betonicâ, saluiâ, capill. qris, majoran. rosmar. feniculis, pulegio. Medicamentis que hic semper particula castorei admiscenda, utpote cuius usus in Lethargi curatione ferè omnibus aliis medicamentis præfertur, & quo vnico, vt Trallianus, lib. 1. cap. 14. docet, plurimi veterino correpti pristinae sanitati restituti sunt.

Exempli gratiâ,

℥. Rad. fenic. Vnc. i. pæon. Vnc. s. beton. rorismar. an. M. i. salvia M. sem. Coq. in aq. s.

Colat. ℥. Vnc. ix. oxymel. s. Vnc. ij. mell. rosat. col. Vnc. i. M. pro 3. dosibus.

Vel ℥. Oxymel. s. Vnc. ij. castor. Drach. s. Misc.

Est & efficax hic oxymel. scillitic. quo æger singulis diebus cum syrup. de betonic. & simil. vtatur. Si febris sit valida, à syrup. de stæchad. abstinendum. Vtilis est & spit. s. ac. s. is, cum aquis & syrupis cephalicis exhibitus; cum humores crassos attenuet, & incidat, & euaporationem ad caput prohibeat.

Vel ℥. Lign. sassafras, rad. pæon. an. Vnc. j. acori veri Vnc. s. salvia, beton. majoran. satyria, an. M. i. flor. stæchad. Arab. rorismar. an. M. s. sem. scil. Drach. ij.

Coqu. in hydromel. lb. ij. in vale clauso.

Colaturæ clarificatæ adde oxymel. scillit. mell. rosati colat. an. Vnc. i. s. & aromatizetur nuc. mosch. Drach. s. pro tribus vel 4. dosibus.

Postea purgantia fortiora vsurpentur. Vtendum ergo ad pituitam purgandam agarico, semine carthami, mechoacannâ, turbith, electuar. Indo major. Episcopi. diaphenico, benedictâ laxatiuâ, trochicis alhandal. Alexander Trallianus scammon. Scrup. j. cum castor. Scrup. ij. in oxymelit. exhibet, quo deploratos multos se restituisse testatur. Verum etsi, vt Oribasius ex Ruffo Ephesio refert, nullum aliud sit Lethargo correptis æque vtile ac efficax medicamentum ad purgandam pituitam, quam bilis admista in caput derulit, quam scamnoneum cum castoreo exhibitum: tamen cautè hic in dosi agendum, præsertim in febre continua, quæ hoc malum comitatur. Neque tamen & in purgando cunctabundus nimis, aut timidus sit Medicus; cum materia ad caput ruens valde vrgeat, & consultius sit, eam euacuare, dum in motu est, quam dum in capite firmata est, & sedem ibi fixit. Et omnino periculum in hoc morbo aliquid periclitari permittit, & vt Serenus habet: Medici hac potiora putant, quam dulci morte perire. Et si accidat, vt Lethargus per crisin eueniat, humoribus, qui morbum produxerunt ad caput ruentibus, & febris, quæ adfuit, jam facta sit remissior, tum totius, & febris non magnam habere rationem oportet, sed necessarium est caput respicere, & materiam, quæ ad id fluxit, & in eo hæret, præparare & euacuare, sicut supra, part. 1. cap. 10. dictum.

℥. Turbith. elect. ℥. iiii. agaric. alb. 3. ii. zingib. ℥. ii. sem. fenicul. ℥. i. fol. beton. salu. an. P. ii. castor. gr. vi.

Infundantur in s. q. hydromel.

Colat. ℥. Vnc. iii. mell. rosat. solutiu. Vnc. sem. Misc.

Si vires ferant, adde electuar. Ind. Drach. i.

Vel ℥. Pilul. de agaric. cochiar. an. Drach. s. castor. gr. iii. extr. panchymagog. vel mechoacan. gr. vi.

F. Pilulæ xx.

Clysteres aciores repetendos esse, antea etiam diximus.

Vt ℥. Hyssop. calaminth. origan. flor. stæchad. Arabic. hyssop. centaury. minor. an. M. i. pulp. colocynth. in peria ligata Drach. i. s. agar. in peria ligati Drach. ii. sem. cartham. Vnc. i. feniculi, cumini, an. Drach. ii.

Colaturæ ℥. lb. i. adde hier. simpl. elect. Ind. an. 3. s. olei rutæ. Vnc. ii. F. Clyster.

Quod si clysteres vel non retineantur, vel nimis retineantur, atque ita parum profint, glandes aciores immittendæ, & toties repetendæ, donec alius egeratur.

Vt ℥. Sp. hier. picra Galen. Drach. ii. pulp. colocynth. agar. alb. an. Drach. s. diagryd. Scrup. i. sal. gemm. Drach. ii. mellis q. s.

Coquatur mel ad iustam consistentiam, & species inspergantur, ac fiant Glances.

Neque omittenda, vbi vniuersales corporis euacuationes præcesserint, humorum per vrinas euacuatio, ex decocto rad. petrosel. fenicul. alparag. gramin. asari, quæ vnâ operâ & humores crassos attenuare, & ad vias vrinæ deducere possunt.

Atque hoc modo Antiqui tam præparantia, quam purgantia satis fortia & calida vsurpabant, vt febris cum Lethargo conjunctæ nullam ferè rationem habuisse videantur: idque ex eo fundamento, quod putarunt, febrem esse saltem symptomatice, & sequi putredinem pituitæ in cerebro, quâ sublatâ febris cesset. Verum cum, vt antea dictum, si rem diligenter perpendamus, febris non solum sit symptomatice, sed ex materia febrili vapores narcotici in caput ascendant, & calor pituitam in capite fundat, vel ex vniuerso corpore pituita in caput ruat: febris planè non negligenda est, & prout est intensior, vel remissior, medicamenta moderanda, ac calida illa medicamenta, quæ aliàs caro competunt, in Lethargo ob febrem ita temperanda, ne periculum, quod aliàs à Lethargo imminet, auctâ febre per calidiora medicamenta duplicetur. Et potest caliditas medicamentorum temperari oxymelite, quod aliàs commodissimè admiscetur. Et si omnino ob reuulsionem materiæ purgantia, eaque fortiora, requirantur, nec tamen febris ea admittat, clysterum usus repetitus, vt dictum, commodissimus est.

Nonnunquam sudore Lethargus, seu potius febris, Lethargi causâ, finitur, eaque sublatâ etiam Lethargus cessat; quod ipsum indicio est, febrem esse morbum primarium, quod si naturam vergere animaduertamus, sudor arte & medicamentis promouendus.

Vniuersali curatione peractâ caput euacuandum tam sensibiliter, quam insensibiliter per nares, palatum, errhinis, prarmicis, inunctionibus palati. Insensibiliter embrochis & fomentis, inunctionibus, & aliis supra, part. 1. cap. 10. propositis.

Sternutatoria etiam ex helleboro albo & nigellâ parari possunt. Inprimis puluis rad. lilii conuall. naribus insufflatus tanquam appropriatum hic remedium commendatur. Apophlegmatismis, vt & Masticatoriis, ob illam in somnum propensionem ægri nou facile vtuntur. Vbi tamen selescolligere incipit æger, non negligenda.

Formulæ horû remediorum petantur ex allegato c. 10. part. 1. Inprimis verò, vt antea etiam dictum, castoreum in hoc malo magnæ efficaciz est, & reliquis omnibus præfertur, quod nō solum vim habeat pituitam incidendi, sed & quia caput non valde repleat ac turbet. Ideoque errhinis & apophlegmatismis admiscendum.

Suppositorum applicatio.

Materia morbifica per urinam euacuatio.

Sudoris promouatio.

De Sternutatoriis hoc monendum, si affectus perseveret, & æger difficulter excitetur, eorum usum commodissimum esse; non tamen continuo in eo persistendum, ne caput repleant, ac humores nimis fundant ac moveant. Multò magis ab initio morbi ab intempestivo sternutamentorum usu abstinendum; cum magis ab iis tum materia fundatur; partibus impingatur, unde morbus fit contumax, vel interdum in apoplexiam degenerat.

Diaphoreticorum usum.

Tandem insensibiliter resoluentia applicanda, & à mitioribus ad fortiora progrediendum, quæ etiam ex cap. 10. part. 1. petantur.

Vel coquatur castoreum in succo rutæ, & aceto ac oleo, atque eo occiput fricetur: nonnulli capillos hominis vstos addunt.

Vi ℥. Castorei Vnc. β. capill. homin. vstor. Vnc. i. aceti, succi rutæ, an. q. s.

Misc. eoque caput irroretur & fricetur.

Aur hoc Decocto caput illinatur:

℥. Beton, salvia, rorismar. flor. stæchad. Arab. spica nostræ, an. Drach. ii. castor. Drach. iii. baccar. lauri, juniperi, an. Vnc. β. sem. pæon. rutæ, fœnicul. an. Drach. j. pyrethri Drach. iii.

Coqu. in vase duplici, vel loco calido digerantur, colaturaque expressa caput illinatur.

Vel ℥. Baccar. lauri, juniperi, an. Vnc. i. β. rad. angelic. zedoar. Imperator. an. Vnc. i. herb. rorismar. salvia, betonic. an. M. i. ruta, satureia, majoran. flor. lauridul. an. M. sem.

Incisa bulliant in f. q. aceti; in quo decocto spongia, aut linteum in eo madefactum, calidè capiti imponatur. A fomentatione hæc capiti absterio sequens adhibeatur Linimentum:

℥. Ol. ruta, majoran. an. Drach. ii. satureia Scrup. i. succini Scrup. sem. rorismar. zedoar. an. gutt. vii. Misc.

Rondeletius hoc vititur Linimento, quod capiti raso applicat:

℥. Castor. rec. Drach. ij. ciner. capill. propr. 3. ii.

Dissolu. cum oxyrrhodino, & redigantur ad formam vnguenti.

Vesicatoriorum & sinapismorum applicatio.

Quod si mitiora non sufficiant, ad vesicatoria ac sinapismos, ex sinapi, pyrethro, columbarum stercore, nigella, euphorbio, castoreo, &c. adicendum, ut & alia medicamenta, quibus materia ex alto attrahitur, quæ scapulis, humeris, post aures, aut derafo capite vertici & suturæ coronali imponantur.

Vi ℥. Pulu. cantharid. Scrup. i. euphorb. Scrup. sem. piper. gr. vi. fermenti Vnc. β. F. Vesicatorium.

In mollioribus vesicatoria ex pulvere & semine flammulæ Iouis parantur, quibus octava pars pulveris cantharidum addi potest. Quod tamen dictum est, vesicatoria locis capiti vicinis, vel ipsi capiti applicanda esse, id de morbi progressu, & cum materia jam capiti impacta est, ac in eo quiescit, & cum derivationis atque euacuationis gratiâ applicantur, accipiendum est. Aliàs verò, ut hoc superioribus addamus, etiam reuulsionis gratiâ in principio morbi vesicatoria usurpari possunt; sed loco remotiori tum applicanda, cruribus scilicet, vel brachiis.

Nonnulli, cum morbi vis maxima est, etiam cauteriæ actualia occipiti inter primam & secundam vertebra applicant.

Capiti roboratio.

Tandem caput roborandum medicamentis supra, part. 1. cap. 14. propositis, ut:

℥. Conseru. beton. anthos, salvia, an. Vnc. i. lauridul. Vnc. β. calam. aromat. condit. Drach. ii. nucis mosch. cond. Drach. i. spec. aromat. rosat. diamb. an. Drach. β. Mithridat. Scrup. ii.

Cum syrupo stæchad. simpl. F. Electuarium.

Vel ℥. Conseru. flor. anthos, primul. veris, an. Vnc. β. rosar. incarn. Drach. iii. spec. arom. rosat. Drach. j. latif. Gal. Drach. β. Cum syrupo de stæchad. & modico acetos. q. s. F. Electuarium.

Vel ℥. Aq. salvia, lauridul. an. Vnc. i. β. extr. angelic. zedoar. an. gr. v. essent. castor. gutt. iii. manus Christi c. ol. succini Drach. iii. aq. theriacal. Drach. j. Mitce.

Inprimis castorei usus continuetur, si malum protrahatur, & manè per aliquot dies eius gr. iii. & iiii. cum oxymel. simpl. vel scillit. aut syrup. de stæchad. exhibeantur. Testaturque Trallianus, ut etiam antea dictum, multos isto morbo victos hoc solo remedio mortem evasisse.

Chymici plurima quidem commendant, veluti sunt ol. majoran. rorismar. terpilli, rutæ, salviæ, ol. vitrioli castorei, quod gran. aliquot pondere in aq. lilior. conuall. majoran. & rorismar. exhibent: sed istis omnibus hæc, & in similibus cerebri affectibus præferunt sulphur Lunæ hoc modo paratum.

℥. purissimi tantum, quantum videbitur; solue in aq. forti communi. Deinde calcina tartar. cui affunde aq. calentem, & vulgari via sal tartar. elice: filtra lixivium hoc sale tartar. imprægnatum, & intice dissolutum; & præcipitabitur in formâ subtiliss. calcis: calcem hanc frequenti aquæ calentis affusione edulcora, & à faldine libera; tum intra prunas in trigillo triquetro colloca, ut colorem assequatur puniceum. Calci affunde acetum ter destillatum, & extraheatur sulphur. coloris cærulei. Acetum tinctum separa, & aliud substitue, dum nihil aliud amplius extrahatur. Abstrahere in cineribus per alembicum acetum, & sulphur. hæc remanebit in fundo.

Iam ℥. spir. vini. subtilissimi part. j. sal. urine part. β.

Misc. probè, & in baln. vaporosum collocata inuicem vniantur. Hinc sulphuri hæc id superfunde, & deinde hoc solvatur. Solutum vasi circulatorio inditum per dies 30. circuletur, postea in cucurbitam non nimis amplam circulatam liquorem transfer, & ex arena destilla forti igne. Sic sulphur. hæc cum spiritu vnâ ascendit per alembicum coloris cærulei. Hoc postea cum extr. castor. dosi gr. vi. vel viii. miscendum, & in aq. salviæ, majoran. rorismarin. quotidie exhibendum.

#### Dietæ.

Aër sit moderatè calidus, alteratus odoribus ex castoreo, pulegio, hyssopo, origano, & similibus, purus ac lucidus, ut spiritus excitentur.

In principio sit victus tenuis & paucus, vimque attenuandi humorem pituitosum habeat, altereturque propterea hyssopo, roremarino, majoranâ, & similibus, oxymelite ob febrem addito. Ratione febris quidem commodus est prisana usus, sed conspergatur ea cinamomo. Reliqui etiam cibi aceto, & herbis cephalicis condiantur. In progressu tamen morbi & præcipue in declinatione, aliquid carnis boni succi, & facili coctionis concedi potest. Nonnulli vtuntur lacte amygdalar. dulcium cum melle. Sed quia amygdalæ vim quandam somnum conciliandi habent, usus earum hæc tutus non est. Vitentur omnia alimenta pituitosa, & vaporosa, pisces, lac, fabæ, legumina, fructus frigidi & humidus, ut Persica, pyra, poma, pruna, ficus.

Potus sit aqua bordei cum cinamomo, vel hydromeli, quod sit plenius vel dilutius, prout febris minus vel magis vrget. Vitale quoque est oxymel dilutum.

Vel ℥. Mell. lb. j. aq. lb. iii. salvia, betonic. an. M. j.

Coquantur ac digerantur. Colaturæ adde aceti 3. iiii. F. Oxymel.

A vino abstineat æger vsque ad declinationem, aut si ob ventriculi imbecillitatem aliquid vini agro sit indulgendum, sit aquosum & subastinguens.

De somno non plus concedatur, quam quod viribus saltem conservandis sufficiat. Ab assiduo vero somno, æger omnibus modis arceatur, inprimis mox à cibo. Et cum æger obliuiscatur, & quasi stupidus sit, ac cum mictionis, tum egestionis alui obliuiscatur, admonendus & sollicitandus, ne vrinam, vel feces alui diutius detineat; curandumque, ut alui quotidie egeratur.

## CAPVT XXI.

## De Lassitudine.

**H**Actenus de symptomatibus, in quibus sensus interni solummodo læduntur, actum est. Proximum iam est, ut de motus animalis symptomatibus, ac læsionibus dicamus, quales sunt, Lassitudo, Pandiculatio, Inquietudo, Horror, & Rigor, Tremor, Convulsio & Motus Convulsiui, Paralysis, & Motus impotentia.

Et ut de Lassitudine primò dicamus, quæ Græcis est *ἀσθένεια*, dolor, labore imprimis, qui Græcis *πόνος*, contractus, est ea in genere sensus quidam molestiæ in partibus motui animali dicatis, seu pigritia quædam, & debilitas, & ad motum animale inepitudo cum dolore, cum scilicet homo ob exercitium & laborem ad motum, quem prius facile obire poterat, suscipiendum non ita aptus est, ut antea, sed cum molestiâ quâdam & dolore aliquid agit.

Recentiuntur autem Lassitudinis quatuor genera: Vlcerosâ, Græcis *ἐλκώδης*, Tensiuâ, *τεννώδης*, Inflammationis speciem referens, *φλεγμονώδης*, & Exsiccatiua.

Commodè tamen in duo primùm genera omnis Lassitudo diuidi potest. Alia videlicet Lassitudo est Spontanea, quæ etiam sine insigni motu & exercitio ab humorum vitio prouenit, & corporibus cacochymicis vel plethoricis accidit: alia non spontanea, quam Exsiccatiuam nominant, quæ nimios labores, & corporis motum, etiam absque humorum vitio, sequitur.

Lassitudo spontanea tria Lassitudinis genera sub se complectitur: Vlcerosâ, Tensiuâ, & *φλεγμονώδης*. Vlcerosâ est imbecillitas corpus mouendi, cum sensu punctionis in ambitu & musculis totius corporis, à materiâ acri & mordaci. Quâ qui patiuntur, per vniuersam cutem, & corporis ambitum quasi puncturas, ac si acubus pungeretur, percipere conqueruntur, ac si infixas carni & cuti spinas haberent; & omnino quendâ quasi exulcerationis sensum percipiunt, Vnde & vlcerosâ Lassitudo nomen accepit. Ortum verò habet ab acrimia, & mordaciū excrementorū copia, quales sunt humores biliosi, atra bilis, vel alij, qui ex putredine & corruptione acrimoniâ acquisierunt. Nonnulli & adipem, colliquatam ex nimio calore inter huius lassitudinis causas referunt. Imò non solū humores, sed & vapores acres hanc lassitudinē excitare valent. Quæ omnia vel à natura & calore fusâ ad ambitū corporis pelluntur, seu motu & exercitio nimio liquata & attenuata ed attrahuntur, seu à mora in Sole, ira, aliaque aliqua commotione vehemēti ed concitantur.

Tensiuâ est impotentia motus cum sensu tensionis fibrarum restarū in musculis in toto corpore. Nam qui hanc lassitudinem laborant, tensionē quandam se percipere aiunt, præcipuè in partibus, quæ inter exercitandū laborare maximè consueuerunt, musculorū scilicet tendinibus & fibris, ac neruis, ita ut amplius non motu corpore, & cessante exercitatione, impressa quasi remaneat antegressi laboris vestigia, atque in musculis, & eorū partibus relinquatur dispositio, qualis inter exercitandū affuit. Sequitur verò maximè plethorâ ob quâ solidæ partes in musculis tenduntur. Non tamē impossibile videtur, quin & ab alia materia fieri possit, modò nō sit mordax, siue sit vapor & flatus, siue pituita, siue melancholia. Huic nonnulli addunt lassitudinē contudentē, quæ Græcis *ὀστέονος* est. Verum hæc doloris potius species est.

Phlegmonodes lassitudo est ad motum impotentia cum sensu contusionis quasi, vel cōtractionis musculorū, & partium voluntario motui inseruientium. Quam qui patiuntur, contusas quasi, & contractas atque inflamas partes sibi esse conqueruntur. Et hæc ab vtraque causâ ortū habet, nēpe cacochymia & plethora, & in ea simul musculorū tensio & calor percipitur: cum scilicet & humores vitiosi, & sanguinis copia, seu potius vapo-

res à sanguine attenuato excitati ad musculos effunduntur, vel musculi inter exercendum calefacti nimium humorem ad se attraxerunt. Sensusque hic lassitudinis in musculis ferè, qui sub cute locum habent, percipitur. Vbi verò nerui interiores, tendines ossibus adhærescentes, & membranae ossa obuoluētes tenduntur, ita ut ossa dolere putentur, Lassitudo, & dolor *ὀστέονος* Medicis nominatur. Atque hæc lassitudo potissimum ex materia melancholica, membranas, quæ ossa obuoluūt, occupante ortum habet; & propterea febribus quartanis, ac scorbuto valde familiaris est, ut & sæpe morbo Gallico.

Lassitudo verò non spontanea, seu exsiccatiua, nullum talem doloris sensum habet, sed fit solum, cum corpus nimio exercitio exsiccatur ac resolutum est, atque post defatigationem quierem cupit.

Alij adhuc plures differentias addunt, & nunc vlcerosâ tensiuâ, nunc vlcerosâ phlegmonodē, nunc tensiuâ Phlegmonodē, nunc omnes misceri statuunt.

Præter has tamen adhuc alia addenda videntur, quam Gracilitatis appellant, quæ est imbecillitas ad mouendum, ob facultatis mouentis, seu potius musculorum læsionem. In hac nullus est tristis ac molestus sensus, sicut in vlcerosâ, tensiuâ, ac phlegmonodē, sed tantum difficulter mouentur ægri. Hæc autem ad mouendum impotentia sequitur carnis & adipis musculorum consumptionem, quæ Gracilitatis propterea dicitur, quia in hac lassitudine corpus emaciatum est. Acciditque & sequitur vel morbos longos & chronicos, ut febrem hecticam, tabem, & omnino *ἀστροφία* in quocunque morbo longo; vel febres ardentes, malignas, & pestilentes; atque tunc vlcerosâ, tensiuâ, phlegmonodes coniungi potest.

## Signa Diagnostica.

Atque hæc sunt causæ Lassitudinis, cuiusque differentia, & quarum descriptione etiam signa earum patet. De signis hoc saltem addimus: Lassitudinem spontaneam cognosci, quod nullus labor, vel exercitium nimium præcessit, sed, quamprimū ægri mouentur, ea percipitur. Et in vlcerosâ quidem lassitudine, præter signa antea enumerata, cacochymia, præsertim biliosa, signa adsunt, & huic ferè succedit rigor. In tensiuâ signa plethoræ adsunt. In phlegmonodē signa vtriusque. In non spontaneâ verò necessariò præcessit exercitium & motus: quod in non spontanea non semper est necessarium. Plerumque enim sine omni præcedente labore & exercitio hominem occupat: quadoque tamen exercitium & labor in corpore cacochymico, vel plethorico humores ad ambitum corporis mouere potest: vnde spontanea lassitudo oritur.

## Prognostica.

1. Lassitudo non spontanea, & quæ solum laborem atque exercitia sequitur, plerumque nihil periculi coniunctum habet, sed, si quiete, & cibo ac potu corpus reficiatur, sponte cessat. Aliquando tamen lassitudo etiam ex laboribus periculosa est, si in corpore cacochymicum incidat, cuius exemplum est apud Hippocratem, lib. 3. Epidem. sect. 2. ag. 8.

2. De Lassitudine verò spontanea in genere scribit Hippocrates, 2. aph. 5. *ὅτι ποτὶ αὐτὸ μακροὶ χρόνοι ἐκείνους*. Lassitudo spontanea morbos præfigit. Ostendit enim, redundare in corpore humores, vel qualitate, vel quantitate, vel vtroque modo peccantes. Et propterea tum alij morbi, tum febres, plerumque sequi solent. Ideoque quando spontaneam Lassitudinem sentit homo, cacochymia vel plethoræ tollendæ idonea remedia querere debet.

3. In quibus per febres Lassitudinis sensus est, illis ad articulos, & iuxta maxillas potissimum abscessus fiunt 4.

*Aphor. 31.* Dum enim natura victrix humores crassiores, & ad euacuationem minus aptos à partibus nobilioribus ad imbecillos articulos, & glandulas post aures, ac sub mento propellit, in partibus iis & vicinis sparsi lassitudinem in iis pariunt. Et quidem si dolor, & molestia sensus in toto corpore percipitur, ad articulos magis humor decumbit: si contra in superioribus partibus, magis ad maxillas, & post aures.

4. Post febrem Lassitudo totius perseverans recidivam significat. Hippocrates, *lib. de indicat. p. 4. p. 5. c. 1. p. 6. c. 1.* id est, corporis robore deficiente.

### Indicationes & Curatio Lassitudinis spontanea.

Lassitudinis  
spontanea  
curatio.

Cum Lassitudo omnis spontanea ex humoribus in musculis, & circa musculos, & in ambitu corporis hærentibus fiat, & foueatur, vel à cacochymia, vel à plethora, vel ab utraque: ut humores circa musculos hærentes tollantur, danda opera, deinde, ut causa, quæ humores istos subministrat, tollatur, laborandum. Itaque humores in ambitu corporis discutiendi, cacochymia vero, vel plethora, vel utraque tollenda. Quæ verò post laborem sequitur lassitudo, si quiete & cibo corpus reficiatur, cessat eodem modo quæ in extenuatis à morbo accidit, bonâ victus ratione, quæ convalescentibus debetur, tollitur.

Ideoque humores seu à natura ad ambitum corporis protrusi, seu motu, & exercitatione eò attracti, leni exercitio, frictionibus, vel balneo discutiendi. Si verò vel cacochymia, vel plethora subsit, eaque levis sit, quiete, somno, & cibo parco, sed boni succi, tollenda, iuxta aphorismum: *Quiete & abstinentia multi magni morbi curantur*; & vini moderato usu, ut videlicet humores crudi, & semicocti coquantur, & persudores aut urinas euacuentur. Neque enim crudi illi humores ideo coquendi esse dicuntur, ut in sanguinem, corporis alimentum, convertantur, (cum, nisi in venis consistant, & ad sanguinis formam suscipiendam apti sint, id fieri non possit) sed ut attenuati dissidentur melius. Quod si maius humorum vitium sit, quam quod istis modis tolli possit, ad maiora illa remedia, sanguinis missionem & purgationem, accedendum, prout hoc, vel illud remedij genus requiritur. In vlcerosa lassitudine purgatione opus est; in tensiva sanguinis missione; phlegmonodes utroque auxilio opus habet. Ut ergo in vlcerosa Lassitudine humores vitiosi facilius discutiantur, frictio adhibeatur; præsertim cum oleo dulci. Si verò paulò altius hæreat materia, ut frictionibus discuti non valeat, motu & exercitio insuper opus est, ut excutatur, & cum calore spiritus corporis omnes partes peruadentes excrementa discutiant. Cibi iis conveniunt humidiores, & tenuior victus ratio.

Tensiva Lassitudo similiter frictionibus mollioribus cum dulci oleo opus habet, ut tensa laxentur. Ab hac quiete imperanda. Balneo etiam aquæ dulcis modicè calidæ uti commodum fuerit. Cibus, quam in vlcerosa lassitudine, sit parcior, sed boni succi. In phlegmonode Lassitudine corpus quoque oleo dulci fricandum, & balneum tepidum paulò calidius usurpandum, ciboque paucissimo boni succi, & vi attenuandi præditi utendum.

### Lassitudinis ex labore Curatio.

Lassitudinis  
exsecutiva  
curatio.

Lassitudines post labores quiete sanat. De quo Hippocrates, 2. *Aphorism. 48.* In omni corporis motu simul ac quis fatigari coeperit, quiete statim lassitudinem leuat. Ideoque si quis lassitudinem percipiat à labore, non est in labore persistendum.

Maximè verò quiete per somnum lassitudinem hanc tollit. Nam in somno membra omnia in homine quiescunt, dum eo in situ collocantur, eaque formâ, quæ

media dicitur, musculis omnibus relaxatis, & nihil laborantibus; & in somno humores nimium fusi in musculis hærentes discutiuntur, ipsique spiritus labore absumpti reficiuntur. Si quis tamen à Lassitudine quiescat, nec mitigetur lassitudo, purgatione, vel sanguinis missione opus est.

Verum non solum quiete, sed & exercitium à labore contractas lassitudines corrigit, si sit priore leuius; quia discutiit humores, seu sponte, aut alia de causâ in ambitum corporis motos, seu à calore attractos. Et quidem contrarius priori motui lassitudinem & defatigationem tollit, ut si quis montem scandendo defatigatus sit, descendendo rursum citius lassitudo tolletur. Inprimis verò exercitij loco utebantur veteres frictionibus, quas & sanitatis causâ instituebant. Et quidem frictionem, quæ ante labores ad partes laxandas, & excrementa discutienda instituebatur, Præparatoriam nominabant; quæ verò post labores eadem de causâ fiebat, à modo præparatoria. Frictiones autem instituebantur manibus oleo dulci inunctis. Apud nos ut balnearum, ita & frictionum antiquis usuratarum usus ferè exolevit, & eorum loco balnea humida & calida usurpantur, quibus seu maior corporis pars, seu pedes tantum immerguntur; quod mirè lassos reficit: cui etiam frictio coniungi potest. Parantur verò Balnea vel ex aqua simplici, vel additis, malua, althæa, chamæmel, hyssopo, & similibus.

Quod si maius humorum vitium sit, quam ut istis remediis tolli possit, ad magna illa remedia, sanguinis missionem, & purgationem accedendum. Verum de Lassitudinum differentiis & curatione videatur Galenus. *lib. 3. & 4. de iuenda sanitate*, ubi prolixè hac de re agit; ut & Aëtius, *recrab. 1. serm. 4. cap. 35. 36. & seqq.*

## CAPVT XXII.

### De Pandiculatione & Oscitatione.

Pandiculatio est præter solitum extensio quædam musculorum totius corporis, ad vaporum non acrium in iis partibus dissipationem instituta. Coniungitur plerumque & oris apertio ac diductio, quæ Oscitatio nominatur; quæ tamen & sine pandiculatione potest accidere. Cælius Rhodiginus, *lection. antiquar. lib. 11. p. 4.* affectionem hanc ab Hippocrate ἀλύνν vocatam, plerisque etiam ἀλύνν nominari, scribit. Neque planè præter rem, ut mihi videtur; cum Hippocrates, 7. *aphor. 56.* coniungat ἀλύνν, oscitationem, & horrorem; eique potius, quam inquietudini, potius vini comperat, atque ita totus Aphorismus potius pandiculationi, quam alij affectioni congruat. Si tamen Galeni explicatio sequenda sit, malo potius de quo *cap. seqq.* dicemus, tribuenda hæc vox videretur. Ita enim ille in hunc Aphorismum: ἀλύνν secundâ valetudine eos dicunt, qui præ sensuum offensione, & læsione errabundâ sunt sæpe mente & incertâ, atque ad alias subinde, aliâque transeunt rum res, tum actiones; aduersâ verò valetudine similiter etiam ἀλύνν eos dicunt, qui non ferentes decubitu lecto non quiescunt, sed formas mutant, quia præsens semper grauis sit & molesta. Et est procul dubio hæc primitiua potius significatio; sed sæpe ad vicina transferuntur vocabula.

Pandiculatio  
& oscitatio

### Causa.

Nimirum si vapores halituosi in musculorum spatiis colliguntur, & non acrimoniâ, sed copiâ potius molesti sunt, muscoli in toto corpore, ut eos expellant, constringuntur. Quod si vapor in musculis temporalibus, & masticatoriis præcipuè contineatur, Oscitatio fit.

Vapores



## CAPVT XXIII.

## De Inquietudine.

Vapores autem illi halituoſi, pandiculationis cauſa, ſæpe ex latente cacochymia aut plethorâ in muſculo- rum ſpatiis colliguntur, & cum Laſſitudine ſpontanea coniunguntur. Vnde ſicut laſſitudo ſpontanea, ita & pandiculatio, & oſcitatîo frequens futurorum morbo- rum, & iſtantium paroxyſmorum ſunt præſagium. Sæpe poſt ſomnum Pandiculatio accidit, vbi in ſomno ex alimentî coctiõne, & ceſſatione à motu halituoſa ac va- poroſa excrementa in ſpatiis muſculorum colliguntur. Solet & ante ſomnum pandiculatio & oſcitatîo accide- re, vaporibus illis halituoſis per diurna exercitia & vi- giliis collectis, & laſſitudine inde oborta, quæ poſtea in ſomno in quiete tollitur. Inſuper & poſt exercitia ni- mia Pandiculatio ſequitur, laſſitudinisque ex labore contractæ Pandiculatio quaſi remedium eſt. Etenim cum ex labore halituoſi vapores ad muſculos attrahan- tur, ibique cumulentur, motu iſto pandiculationis vapores iſti diſcuntur. Præterea muſculi à motu ni- mio deſatigati in quiete laſſitudinem illam ſentiunt. Verum conſtricti laſſitudinem illam minus percipiunt, & propterea ad eam edendam inuitantur. Nonnun- quam & externum frigus pandiculationem conciliat, cum poros cutis claudat, fumidoſque ac halituoſos vapores ſub cute detineat, quas natura per pandicu- lationem diſcutere ſatagit. Tandem etiam imaginatio ſæpe Oſcitatîonis cauſa eſt, vt ſi quis alium oſcitan- tem videat, vel de oſcitatîone cogitet, & ipſe oſciter: præcipue tamen hoc pigris, laſſis, & ſomnolentis ac- cidit.

Nictatio oculorum.

Ex eadem cauſa, è qua, Pandiculatio & Oſcitatîo prouenit, etiam pender Nictatio oculorum, quæ cum homo ad ſomnum propenſus eſt, accidit, ortumque habet, cum ex continuo motu oculorum palpebræ laſ- ſatæ ſunt, & ad claudendum, quod dormientibus ne- ceſſarium eſt, inuitantur. Facit tamen huc etiam ſpiri- tum animalium diſpoſitio, qui cum iam ſopiri inci- piunt, eius rei indicium in palpebris cerebro valde vici- nis primò ſtatim apparet.

Poteſt tamen dari adhuc alia cauſa Nictationis, aſ- peritas nimirum oculi, quæ ab aëre, contentiſque in eo, inducitur, oculoque moleſta eſt. Hæc enim vt tol- latur, palpebræ grata quadam humiditate imbutæ ocu- lis exalperatis crebrò inducuntur, vt eorum ſuperficiem irrigent, abſtergant, & leuitatem quandam iis in- ducant.

Prognostica.

Porrò Pandiculatio in ſanis ſaltem vaporum in mu- ſculis quacunque de cauſa collectorum, & laſſitudinis indicium eſt: in febris verò iſtantis paroxyſmi ſig- num; ſicut & ſi extra febres ſæpius accidat Pandicu- latio, vel oſcitatîo: impendentium morborum ſignum eſt, & materiæ vitioſæ exſuperantiam ſignificat, cor- pûſque febrili propinquam diſpoſitionem habens indi- cat, & proinde iſtantibus morbis occurrendum eſſe monet. Plinius, lib. 7. c. 6. & Gellius, lib. 3. c. 16. Oſcita- tionem in enixu lethalem eſſe ſcribunt, ſicut ſternuiſſe à coitu abortiuum.

Cæterum cum à pandiculatione & oſcitatîone in ſanis periculi nihil imminet, ſed potius proſint, curatione nullâ opus eſt. Ideoque in Pandiculatione ciuilitatis potius quam vtilitatis gratiâ, membra minus exten- dere iubemus, quod & in oſcitatîone locum habet. Eſt enim oſcitatîo pigritiæ, & fluxæ atque apertæ ſe- curitatis, & vagi animi indicium. Vnde oſcitanter pro negligentibus ſumuntur, & oſcitatîo pro ignauia. De oſcitatîone tamen hoc monendum, os non nimis di- latandum, ſed comprimendum eſſe; cum ex nimia in oſcitatîone oris dilatatione, ſeu diductione maxilla in- ferior facilè luxari, & os hians manere poſſit. Si tamen latentis humorum vitij pandiculatio & oſcitatîo fre- quens ſignum ſit, ei occurrendum, vt modò de Laſſitu- dine dictum.

Inquietudo, quam Barbari Teſtigationem appellant *Inquietudo* (etſi alij Teſtigationem pro Palpitatione ſumant) Hippocrati & Galeno variis nominibus appellatur, *ἀλυσμός* nimirum, & *ἀλυσμός* & *ἀλυσμός*, *ἐπ' αὐτοῖς*, *ἐπ' αὐτοῖς*, *ἐπ' αὐτοῖς*; *δυσφορία*: quanquam Hippocrates in hiftoria adoleſcentuli, 3. *Epidem.* hæc diſtinguere videatur. Tertio, inquit, die *δυσφορία*, *ἀσώδης*, *περὶ*, *ἀλυσμός*, *ἀπὸ*, *πῆς*. Eſt verò ſymptoma cum alijs morbis; tum præci- pue febris nonnullis familiare, cum ægri corpus & membra variè iactant, & nunquam in eodem ſitu manent, ſed nunc pedes; nunc manus de loco in locum transferunt, nunc de latere in latus, modò in dorſum, modò in ventrem ſe conuoluunt, mox ſe erigunt, iterum- que quieſcunt, ad pedes prouoluuntur, nec vllam loci vel decubitus formam ſeruant.

## Cauſæ.

Etſi verò delirantes & phrenetici idem facere ſo- lent: tamen tum ex imaginationis deprauatione, & variis phantaſmatis, nunc ad hoc, nunc ad illud agen- dum inuitantibus, id accidit. Iſta verò inquietudo, quæ ſine delirio, in febris præcipue, accidit, or- tum habet à re moleſta, muſculos, & partes motui dicatas, aut ſentientes moleſtante. Etſi verò calor totum corpus in febris occupans etiam homini moleſtus eſſe poſſit: tamen quia non omnium fe- brium, nec ſemper, ſed præcipue quarundam con- tinuarum, & quandoque etiam intermittentium in paroxyſmo eſt ſymptoma, potius ab acri & maligna materia, quàm calore ſolo prouenire vi- detur.

Eſt autem duplex iſta Inquietudo, vel Critica, quæ *Inquietudo* in perturbatione fit, criticum humorum motum an- *duplex* tecedente; ſolentque tum ægri ſe erigere, iactare, & va- riè mouere, quandoque etiam delirare. Altera, quæ ci- tra criſin eſt, & Symptomatica nominatur, quæ accidit in genere, cum quicunque dolor, & quæcunque mo- leſtia hominem angit. Eſtque rurfum duplex: Vna, cum os ventriculi à prauis humoribus vellicatur; de qua Galenus, 7. *aphor.* 56. ſcribit, *ἀλυσμός*, ſeu anxie- tatem, & inquietudinem iſtam iis maximè euenire, quibus in ore ventriculi propria quadam humoris mo- leſti qualitas continetur, neque multi, neque innatan- tis in ventriculi capacitate, ſed altius in iſtis tunicis inhibiti. Nonnunquam cauſa iſtius inquietudinis eſt eibus intempeſtiue exhibitus. Altera eſt, quæ oritur à materia maligna & acri, febrim excitante, quæque circa viſcera moleſtar, vel ab inflammatione alicuius viſceris prouenit; vnde eæ febres *ἀσώδης* nomi- nantur.

## Signa Diagnostica.

Affectio hæc per ſe ſatis patet. Inquietudinis verò, quæ ab orificio ventriculi fit proprium ſignum eſt Nau- ſea *ἀνέμετος*, Nauſea ſine vomitu: quæ ſi abſit; vel ab humore prauo & maligno circa viſcera, vel ab inflam- matione alicuius viſceris prouenit, quod ex ſuis ſignis patet.

## Prognostica.

Ex Inquietudine, quæ præcedit criſin, nihil incom- modi metuendum, ſi inde euacuatio, vel abſceſſus ſe- quatur. De quo, 2. *Prorrh.* hæc habentur: Ex inquietu- dine rigor iudicatorius ſi fiat, morbum ſoluit, ſuperue- nientibus ſudoribus, vel vomitionibus commodis, vel aluo ſubductâ.

Prognostica.

2. Nec illa aliquid periculi habet, quæ sit à cibo intempestiue exhibitio, sed eo vel concocto, vel reiecto quiescit.

3. Periculosa verò est inquietudo, quæ ortum habet à malignitate & acrimonia materiæ febrem excitantis, vel ab inflammatione interna, vel virium debilitate, quæ morbum ferre nequit. De quibus Hippocrates, 1. *Coac. aphor. 2. Quæ cum refrigeratione anxietates fiunt, pessime.* Et quidem dupliciter ratione mala est hæc inquietudo, partim ut signum, quia prædicta mala & morbos indicat; partim ut causa, quia vires deicit, & coctionem humorum impedit.

#### Curatio.

Curatio.

Inquietudo, quæ febres sequitur, curationem peculiarem nullam requirit, sed si crisis antecedit, videndum, ut crisis rectè peragatur. Si citra crisis fiat, danda opera, ut morbo, à quo pendet, succurratur, ideoque in restringendo humorum incendio, & prauitate materiæ corrigendâ laborandum. Si tamen æger ab humoribus ventriculi orificium vellicantibus valde angatur, exhibenda, quæ acrimoniam illam humorum mitigant, & ventriculi orificium roborant; qualia sunt, syrupus granat. acetos. citri, ribes, acetosel. papau. cum aqua lactuc. portulac. nymph. Extra verò inungendus ventriculus oleo mastich. cydoniorum, absinthij. Vel foveendus similibus medicamentis, de quibus in doctrina de Cardialgia & de Febribus.

### CAPVT XXIV.

#### De Horrore & Rigore.

Horror & Rigor.

DE Horroris & Rigoris generatione ac causis satis multa in instituit. *lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 5. diximus, & extant passim prolixæ apud Medicos, hac de re disputationes, neque Galenum semper idem de eo docuisse, sed varium fuisse, ex locis ibi allegatis patet. Ut pauca addamus, Horror & rigor affectus sunt saltem vehementiâ & magnitudine differentes. Rigor enim est musculorum totius corporis vibratio, & concussio cum refrigeratione, & dolore quodam; Horror verò quasi parvus rigor est, cum in eo saltem cutis concutitur, habetque causam, quàm rigor, minus vehementem.*

Horror & Rigor quomodo ad facultatis animalis, & motus depravati symptomata referantur.

Et quidem primo hoc præsupponendum, quod nemo facile negauerit, Rigorem fieri à facultate expultrice stimulata; & eatenus quidem ad facultatis naturalis symptomata referri posse; quia tamen facultas animalis ad id, quod molestum est, expellendum, & propulsandum simul insurgit, satis commodè etiam ad facultatis animalis, & quidem motus depravati, symptomata refertur. Generatur enim eodem modo horror, & rigor, quò sternutatio, tussis, singultus, qui motus & ipsi sunt facultate expultrice à re molesta stimulata. In eo tamen differunt, quod cætarum & determinatarum partium hi sunt motus; in horrore & rigore verò totum corpus concutitur.

Horroris & Rigoris causa proxima.

Rigoris subiectum sunt musculi totius corporis, seu potius musculi in ambitu corporis. Causam verò proximam quod attinet, Galenus equidem alicubi, quem alij etiam Medici sequuntur, refrigerationem, & motum calidi innati causam proximam Rigoris constituit, docetque, dum calidi innati, seu spiritus influentis ob refrigerationem externam, quæ in musculis accidit, influxus & motus ad exteriora prohibetur, eundem cum impetu & violentia quasi ad exteriora viam querere, atque iterum repulsum maiore cum impetu ad exteriora tendere, atque ita ex lucta ista, & motu calidi ad interiora, & hinc rursus ad exte-

riora, corporis totius concussionem sequi, quæ Rigor nominatur.

Verum enim verò non semper à refrigeratione Rigor incipit, sed concussio illa corporis in Rigore à bile excitata refrigerationem antecedit; ut & ubi medicamentum acre vlceri imponitur, aut scintilla ignis corpori incidit, quod etiam Galenus, 2. *de Symp. caus. 5.* docet. Et Refrigeratio non causa est retractionis caloris ad interiora, sed effectus potius proueniens à retractione caloris innati ad interiora, ob causam dolorem excitantem. Deinde si eo, quem Galenus ponit, modo Rigor induceretur, motus similis palpitationi esset, neque fieret à facultate expultrice stimulata.

Itaque causam proximam Rigoris constituimus re molesta subito partes sentientes vellicantem, atque expulsionem irritantem. Ad quam causam omnes aliæ causæ reducendæ. Primò quidem extra dubium est, materiam aliquam Rigoris proximam causam plerumque esse, imò à nonnullis pro sola Rigoris causa poni, quæ materia primo acris esse debet, mordax, & omnino molesta, ut partes sentientes vellicare possit; deinde multa, & velociter moueri. Nam si pauca sit, & immota, potius lassitudinem vlcerosam excitat.

Si quis tamen etiam solum caloris ad interiora recursum causam Rigoris quandoque statuere velit, illi hoc notandum, à caloris solius recursum Rigorem non fieri, cum in lipothymia & syncope nihil tale animaduertatur, sed omnino adesse aliquid præter materiam vel excrementitiam, vel onerosam naturæ, quod eam stimulet. Refrigeratio autem, seu caloris recursus non causa est rigoris, sed quiddam consequens. Cum enim partes sentientes à re molesta subito ingruente percellantur, cohorrescunt, & illo ipso horrore ac rigore calor versus interiora, & fontem suum recurrit, & sic accedit refrigeratio. Fit autem hic caloris ad interiora recursum nunc ob causas externas, dum nimirum parti exvlceratæ acre medicamentum imponitur, vel scintilla ignis cuti incidit, aut aqua frigida cuti inspergitur; nunc à causa interna. Cum enim partes omnes circa viscera membranarum vestiantur, quæ nervos à sexta coniugatione accipiunt, & propterea sensu exquisito præditæ sunt, accidit, ut vellicatæ omnes partes corporis sentientes, etiam externas, in consensum trahant. Natura verò de partium internarum, utpote nobilium, salute sollicita sanguinem & calorem ad suppetias ferendum, ad interiora subito reuocat, unde partes externæ molestiam percipiunt, quàm facultas expultrix à se amota totius corporis musculos concutit.

E quibus controuersia illa, quæ de subiecto Rigoris, aut potius materiæ, rigoris causæ, inter Fernelium & alios agitur, facile componi potest.

Galenus & Interpretes eius Rigoris subiectum constituant partes corporis sentientes, seu musculos, & carnem in ambitu corporis, ut ex Galeno, *de Symp. 4. de iuenda sanit. c. 2. 2. de Crisibus, c. 2. 10. meth. med. c. 4.* videre est. Ab hac tamen sententia discessisse putatur Fernelius, dum, *lib. 4. Patholog. c. 11.* febrium intermittentium materiam non in ambitu corporis, verum in primis viis, & circa viscera contineri docet, scribitque, præcordia & partes omnes, quæ circa hæc sunt, quia membranis separantur, nervosque sentientes suscipiunt à sexta cerebri coniugatione, eximio tangendi sensu esse præditas, magna quoque societate cum principibus, corde & cerebro, tum externis partibus esse connexas, & cum iis ita consentire, ut affectæ mox principes partes, vniuersumque corpus in consensum trahant. Ita bilem vomituri rigescunt, & cum calida, mordacia, ac acris medicamenta, vel cibus vtriculum & præcordia feriunt, & cum pus interiore abscessu collectum erumpit in membranas, rigor accidit.

Verum enim verò non multum Fernelius à vulgata sententia de causa Rigoris dissidet. Sit sanè, ut statuat, aliquando

Horroris & Rigoris subiectum.

aliquando ex solo consensu partium externarum cum internis rigorem fieri, cum scilicet partibus membranosis & nervosis circa viscera affectis, & in consensum trahuntur, & natura quasi auxilio & subsidio internis ventura, calorem ad interiora reuocat, vnde exteriora refrigerantur, totumque corpus concutitur: tamen cum negaturum non puto, etiam dum partes externae à re molesta vellicantur, rigorem accedere posse. Atque ita primum & adaequatum rigoris subiectum sunt membranae partes non solum circa viscera, sed etiam in ambitu corporis. Hae enim à re molesta vellicatae, vel quibusdam ex his vellicatis, reliquae in consensum trahuntur, musculos quoque, quibus arcte coherent, in consensum trahunt.

Rigoris generationis modus.

Itaque ut Rigoris generationem, quam nonnulli variis disputationibus inuoluunt, & obscurant potius, quam explicant, breuiter & perspicue comprehendamus, Rigoris causa proxima est res molesta facultatem expultricem in partibus membranosis stimulans, ac musculos in ambitu corporis in consensum trahens, & ad concussionem talem concitans. Quod ipsum manifestum esse puto. Cum enim sensus doceat, totius corporis musculos externos in Rigore concuti, necesse est, ut causa aliqua in iis adsit, quae ad motum istum stimulet. Siquidem natura non laessita nihil tale tentat.

Causa autem naturam ad motum hunc & concussionem stimulans vel in ipsis musculis in ambitu corporis continetur & colligitur, cum scilicet humores & vapores biliosi, aut quicunque acres in ambitu corporis collecti sunt; vel aliunde communicatur. Consensum partium externarum cum internis quod attinet, si quis cum Fernelio per simplicem consensum, & qualitatem spiritalem transmissam, seu affectum saltem, ut loquitur, non materiam & causam affectus communicatam ab internis partibus & visceribus, Rigorem quandoque generari statuere velit, nec cum eo, ut antea etiam dictum, pugnaverim. Non enim absurdum videtur, partibus nervosis & membranosis intus affectis consentire nervosas & membranosas in ambitu corporis, & propterea quasi subsidio, & in auxilium calorem & spiritum ad interiora recurrere, quo subito partes externae quasi spoliatae, molestiam quandam ex subita alteratione percipiunt, ideoque ad eam amoliendam concutiantur.

Fieri tamen etiam potest, & id magis simile vero, videtur ut calore & spiritibus ad interiora recurrentibus humores & vapores vitiosi in ambitu corporis haerentes vna moueantur, atque ita proxima fiant rigoris causa. Frequenter verò, quod etiam Fernelius admittit, fit Rigor per consensum internarum partium, cum vapor quidam teret & acris ex humore ibi quocunque modo moto in ambitum corporis mittitur, & partes illas vellicat.

Refrigeratio in Rigore quomodo se habent.

Quia verò cum rigore coniungitur refrigeratio, ita quidem, ut nonnulli rigorem etiam per refrigerationem definiant; quomodo refrigeratio in rigore sese habeat, videndum, ut & vnde dolor ille, & molestia illa oriatur, an à refrigeratione semper, an aliunde proueniat. Rectissime autem ij sentiunt, qui statuunt, cum rigore, & quidem omni, adesse sensum doloris, verum cum aliquando quidem à causa refrigerante, plerumque tamen ab ipso motu, & concussionem corporis prouenire; ut cum dolor praecedat refrigerationem, refrigeratio verò sequitur, & fit ex spiritibus & caloris ad interiora ob dolorem retractione.

Refrigeratio enim duplici modo in rigore accidit. Aliquando est saltem cutanea, & in superficie corporis fit, ob dolorem, quem acrimonia humoris excitat. Aliquando verò fit in ipsis musculis refrigeratio, eaque vel ob humorem pituitosum, aut melancholicum attenuatum, & in omnes partes diffusum, partes vellicantem, vel ob viscerum inflammationem, in qua interna vruntur, exteriora verò calore retracta ad interiora frigent.

Dan. Sennert. Torn. II.

Atque hic cum sit generationis Rigoris modus, & haec proxima causa, facile omnes remoras & medietates ad eam reducere licet. Sunt verò Rigoris causae vel Internae, vel Externae. Inter Internas cum sit materia acris & mordax colligitur ea sub cute, ob partium in ambitu corporis caliditatem & siccitatem; ut docet Galenus, 5. de loc. affect. cap. ult. & in libr. de Rigore, & Palpitat. c. 7. Idque facilius accidit accedente cutis densitate, & ex quacunque causa, adstrictione, & prohibita transpiratione, in corporibus praecipue biliosis, ut docet Galenus, 10. meth. med. cap. 4.

Rigoris causa remora & medietas interna.

Deinde generantur humores biliosi & ichores prauis in ambitu corporis, cum venae & aliae partes in ambitu corporis exsiccantur; ut est apud Hippocratem, 1. de vit. etur ratione in acut. comm. 4. t. 1. & Galenium, in Comment. Transmittitur verò materia à partibus vel communibus, vel priuatis. A communibus venis mittitur materia in ambitum corporis vel cuticem, instante crisi, vel periodice, & secundum typos in principio paroxysmorum in febribus intermittentibus; vel sine typo & symptomatice, quando sine crisi subsequente materia in ambitum corporis è venis protruditur. A partibus verò determinatis variis materia transmissa rigoris causa est; ut ex Cerebro: cuius exemplum 1. in Prorrh. t. 20. 23. & 25. ex Vtero, 5. aph. 61. 69. ex Ventriculo, 6. Epidem. t. 31. & 3. Prognost. t. 31. ex Hepate, Renibus, Vesica. Et omnino, siue aliquid materiae & vaporis ad ambitum corporis trahatur, aut mittatur, siue saltem in consensum trahantur partes externae, dum interiora vellicantur, Rigor accidit. Potestque materia vellicans esse bilis, salia pituita, melancholia, atra bilis, humorque quicunque putridus, sicut pus, acria medicamenta, cibis & potus acris.

Inter externas verò & euidentes Rigoris causas sunt aer & ventus frigidus, siue penitus in corpus penetret, siue cuti exulceratae occurrat, aspersio aquae frigidae, scintilla ignis in cutem illapsa, aqua feruens infusa, medicamentum acre parti exulceratae impositum. Haec enim quia molesta sunt partibus sentientibus in ambitu corporis, natura ea excutere conatur. Potest tamen etiam fieri, ut calor & spiritus talia molesta percipiens ad interiora refugiat, humoresque in ambitu corporis commoueat, vnde accidit, ut partes subito alteratae & vellicatae sese concutiant. Saepè enim calor externus rigoris causa est; quod nonnunquam balneum ingressis accidit. Idem facit mora sub Sole, vnctio calida, animi affectus, praecipue timor. Tales enim causae omnes excrementa, quae prius quiescebant, calefaciendo, attenuando, & in spiritum vertendo, ad motum concitant, vel spiritus commouendo ea simul agitant, ut Galenus, 2. Symp. caus. cap. 5. docet.

Externa & euidentes.

E quibus causis haecenus rigorem fieri diximus, ex iisdem etiam Horror prouenit, minus tamen vehementibus acrimonia, copia, & motu, ut docet Galenus, 2. de Causis Symp. cap. 6. Etenim in horrore est causa, vel minus acris, ut bilis cum pituita mista, vel si sit pura bilis, ea non est ita acris, neque copiosa, neque vehementer mouetur. Praeterea in horrore membrana saltem, & panniculus carnosus afficiuntur; in rigore autem simul musculi in consensum trahuntur.

Horroris causa.

### Signa Diagnostica.

Ipse Rigor ut signis inuestigetur, opus non est, cum sensibus satis pateat. Ut verò à qua causa proueniat, cognoscatur, per signa inuestigandum. Causae externae & euidentes ex aegri, vel astantium relatione cognoscuntur. Vbi verò Rigor sine causa euidente & manifesta inuadit, vnde proueniat, inquirendum. Quia verò Rigor plerumque cum febribus coniungitur; quam febrem indicet, & à qua causa per consequens proueniat, è doctrina de febribus petendum: neque omnia ea recensere huius loci est. Ut pauca saltem attingamus;

Signa diagnostica.

Rigor est vel vehemens; vel paruus. Vehemens in continuo semel fit saltem vel in principio, vel in fine. In principio qui accidit, est signum inflammationis internæ in parte membranosa, vt meningum cerebri, pleuræ, mediastini, ventriculi, membranarum hepatis, vesicæ, renum, peritonæi. Fitque vbi pars membranosa primum vellicatur, & inæqualis intemperies adest. Vbi verò in progressu morbi partes membranosa repletæ sunt, atque intemperies æqualis inducta est, rigor amplius nõ accidit. In fine verò febris continuæ si rigor vehemens accidat, fit vel sine inflammatione, vel cum inflammatione. Si sine inflammatione contingat, indicat, quod materia febrilis vel criticè, vel symptomaticè è venis extra venas pellatur. Si cum inflammatione, eam ad suppurationem tendere indicio est. Sicut etiam quandoque rupto abscessu rigor accidit. In intermittentibus verò fit Rigor vehemens in principio paroxysmi, materiâ per partes sentientes motâ, facultatem expultricem fortem adhuc stimulante, scilicet in tertiana, vel quotidiana ex pituita vitrea, vel quartana.

Si verò Rigor sit paruus, & is longus, ac quotidie inuadat, vel etiam eadem die sæpius recurat, cum magna refrigeratione, capitis grauitate, catarrho, & faucium ardore, indicat febrem quotidianam catarrhalem. Si verò paruus Rigor sit, & longus, & quarto quoque die inuadat, quartanæ signum est. Longus Rigor, sed paruus, ad tertium diem inuadens, ita tamen, vt etiam die intermedio accessio fiat, semitertianæ signum est. Rigor paruus non admodum longus, nec cum magna refrigeratione, singulis, vel alternis diebus corripiens, tertianam notham significat.

#### Prognostica.

*Prognostica.* Prognostica pleraque ad doctrinam de febribus pertinent; & propoluimus etiam quædam in Institut. lib. 3. part. 3. cap. 5. quibus adhuc quædam addemus.

1. Rigores periodici, qui febrium intermittentium propria sunt symptomata, & vel quotidie, vel alternis, vel ternis diebus inuadunt, omni periculo vacant.

2. Optimi verò sunt Rigores critici in febribus continuis, die critico cum signis coctionis accidentes, & post quos corpus maximè incalescit, (quod enim calor corporis est robustior, eò post rigorem fortius in ambitum corporis sese exserit) quosque sudores copiosi, aut vomitus, alui deiectio, aut hæmorrhagia narium sequitur, & post quos febris vel tollitur, vel imminuitur; de quibus Hippocrates, 4. Aphor. 58. Eorumque exempla sunt passim apud Hippocratem, 1. Epidem. comm. 3. t. 2. 2. 3. Epidem. comm. 1. t. 2. 4. Epid. text. 83.

3. Mali verò sunt Rigores, quos mala signa antecesserunt, vel comitantur, vel statim sequuntur, à quibus corpus non incalescit, quod naturam & calorem languidum significat; aut quos nulla, vel mala sequitur euacuatio, & qui morbum nec tollunt, nec minuunt. De quibus, 1. Prorrh. A rigore refrigeratus non incalescens, malum. & 1. Epidem. comm. 3. text. 28. & 3. Epidem. comm. 3. text. 29. & 4. Aphor. 56. Febricitanti rigor superueniens, febre non deficiente, malum.

4. Inprimis verò Rigor malus est; si euacuatio aliqua morbum subsequatur, quæ tamen morbum non imminuit, vel tollit, vt docet Galenus, 4. Aphor. 64. Nam & virtus debilis rigorem ferre non potest, & vires ab euacuatione dissoluantur: de quo Hippocrates, loco modo allegato, 4. aphor. 46. Si Rigor accidat febre non deficiente, agro iam debili, lethale est. De quibus etiam 1. Prorrh. t. 57. 3. Prorrh. text. 27. 3. Epidem. comm. 2. t. 9.

5. Rigere sæpius in febribus acutis, inæqualis,

& perturbata motionis febrilis materiæ, ac proinde periculosi morbi indicium est, vt ex Hippocrate, lib. 2. Coac. sect. 2. Aphor. 3 2. comm. 2. ex distinctione Hollerij, pater.

6. Ex his, qui tæbe diuturnâ consumpti sunt, aliqui ante mortem rigere deprehenduntur. Hippocrates, lib. 6. Coac. sect. 2. comm. 1. aphor. 18.

7. Quæ de Rigore dicta sunt, eadem & de Horrore plerumque locum habent. Etenim horrores illi boni sunt, quos signa coctionis præcesserunt, quosque euacuationes morbum tollentes, vel minuentes sequuntur. Mali verò sunt, qui sine signis coctionis, propter maximam humorum prauitatem, aut naturæ imbecillitatem, fiunt, quæ vitiosos humores expellere tentat, verum expellere nequit; vel quas prauæ euacuationes sequuntur.

Verum multi Aphorismi de Rigore & Horrore agentes videantur apud Hippocratem, lib. 1. Coac. comm. 2. & passim alibi in Coacis, quos omnes huc afferre prolixioris operæ foret. Et potius ad prognostica febrium pertinent.

#### Curatio.

Rigor & Horror cum aliorum morborum comites & symptomata sint, per se curatione nullâ indigēt, sed sublata causa cessant. Quia tamen in febribus interdum, præcipue quartanâ, Rigor aded magnus est, vt ægro valde molestus sit, viresque deiciat, tum calidis dorsum, à quo rigor incipit plerumque, inungendum, oleo scilicet rutaceo, chamæmelino, anethino, costino, laurino, de castoreo, de piperibus cum theriacâ, Mithridatio, castoreo, & similibus.

*Curatio.*

## CAPVT XXV.

### De Tremore.

**T**remor, Græcis Τρόμος, etiâ inter symptomata motus animalis lasi, eiusque deprauati pertinet, quo qui laborant, membra liberè mouere, & protensa vel suspensa seruare non possunt; sed membrum à facultate animali in altum sublatum pondere suo deprimitur, iterumque à facultate motrice erigitur, eaque motus vicissitudo breuibus, & quæ vix discerni possunt, intervallis accidit.

*Tremor quale symptoma.*

Est videlicet Tremor motus voluntarius deprauatus membrorum huic motui inferuentium, quo perpetuâ vicissitudine seu eleuantur & deprimuntur, seu in anteriorem & posteriorem, seu in læuam & dextram partem mouentur, pendens à facultatis motricis, membrum in eodem situ seruare non valentis, imbecillitate, seu à facultate motrice p.n. onerata.

Nonnulli quidem ad actionem imminutam referunt tremorem: verum, seu deprauatam, seu imminutam actionem dixeris, non multum peccabis. Siquidem si totius membri motum, & motum secundum se spectes, omnino deprauatur est, aliterque fit, quam fieri debet. Si verò facultatem mouentem respicias, eius, vt pote debilis, & membrum, vt debet, mouere non valentis respectu, etiam imminuta actio appellari potest. Et quidem motus is, qui à facultate motrice prouenit, membro simpliciter p.n. non est, sed is, qui à membri grauitate prouenit. Concurrit enim in hoc motu facultas animalis, neque planè contra voluntatem est omnis motus in tremore, vt in conuulsione, sed facultas mouens quidem voluntariè membrum in altum eleuat, vel dextrorsum, aut sinistrorsum, vel antè aut retrò mouet, (hoc enim nisi faceret, membrum in eam loci differentiam, quò pondus vergit, laberetur; & prolapsum, quod in paralyti accidit, in eo maneret) sed ob debilitatem membrum in eo statu seruare nequit. Duobus videlicet motibus



motibus contrariis partes tremore laborantes afficiuntur, vno, qui voluntarius est, & à facultate animali mouente instituitur; altero, qui contra voluntatis imperium accidit, quo membrum ob grauitatem & pondus deorium, aut in aliam loci differentiam labitur, in qua prolapsum cum facultas mouens iterum conetur erigere, pondus contra perpetuò renitatur; breuibus, & quæ vix discerni possunt, interuallis hæc motus vicissitudo accidit: quæ tremoris essentiam constituit. Ideoque membra tremorem non sentiunt, dum rei alicui firmiter innituntur, sed tum demum, cum facultas mouens membrum liberè mouere conatur.

*Tremor à  
paralyfi &  
convulsione  
differentia.*

Ex quibus patet, rem se longè aliter habere in Tremore, quàm in paralyfi & convulsione. Etenim in paralyfi membrum, postquam in aliquam situm differentiam delapsum est, eam solum seruat, vel per interualla continentur vno, eoque tardo & languido motu attollitur & mouetur. In convulsione verò pars solum contrahitur, & contracta seruat. In Tremore autem vt dictum, duobus motibus, pars continuò mouetur, vno, qui fit à facultate animali, membrum attollente & mouente; altero, qui contra voluntatis imperium sequitur membri naturalem grauitatem. Inter quos duos motus perpetua quasi pugna est, dum facultas animalis membrum eleuare, & liberè mouere conatur, ob grauitatem verò membri ipsa debilis, illud mouere liberè non potest. Habetque se res vt in iis, qui pondus aliquod gestant. Si enim id leue sit, facultasque ei ferendo par, nullus tremor fit, & facultas motrix ponderis inclinationi satis obstitit. Si verò pondus sit grauius, quam vires ferre queant, partes sub pondere tremunt. Qui verò planè oneri ferendo pares non sunt, sub eo succumbunt, & immoti manent. Ita etiam nec in iis, qui bene valent, nec cum membrum planè resolutum est, & nihil mouetur, tremor accidit; sed cum facultas debiliter mouet.

*Tremor à  
palpitatione  
differentia.*

Differt etiam Tremor à palpitatione. Tremor enim ex dimidia parte motus voluntarius est; palpitatione verò planè p. n. fit, siquidem qui membrum mouere non instituunt, non tremunt. Palpitatione verò accidit, etsi pars voluntario motu non moueatur. In palpitatione etiam non totum membrum, scilicet cutis, musculi, ossa, nerui, & omnia, è quibus constat, quod in tremore fit, mouetur, sed caro, & imprimis cutis mouetur, palpitansque membrum non, vt tremens, continuò sursum & deorsum, aut dextrorsum vel sinistrorsum mouetur, sed in eodem situ manens, & immotum, nunc distenditur, nunc subsidet.

*Tremor à  
vigore differ-  
entia.*

Differt tandem à rigore, qui non fit facultate motricis secundum voluntatis imperium membrum attollente conantis, sed ab expultrice naturali stimulatâ, quæ animalem in consensum trahit: & plerumque Tremor est in vnâ parte; rigor verò in omnibus totius corporis, rigorque fit cum dolore & molestia; Tremor verò sine dolore accidit.

### Causa.

*Tremor  
causa proxi-  
ma.*

Facultatis motricis imbecillitatem & debilitatem, seu facultatem motricem pr. nat. oneratam tremoris proximam causam esse, in definitione diximus. Idque verum esse, facile corpora, quibus tremor accidit, consideranti patebit. Tremunt enim senes, ebriosi, valde refrigerati, qui ad paralyfin inclinationem habent, & omnino qui ex causa quacunque neruorum genus debile habent. Verum hîc monendum, dum facultatis motricis debilitatem causam esse diximus, nos Medicis vsitatum morem loquendi sequi. Aliàs enim, vt in Institutionibus, lib. 2. part. 1. cap. 2. dictum, facultates propriè non debilitantur, sed animæ inseparabiles proprietates sunt, & senex, si haberet oculum iuuenis, videret vt iuuenis, cum eadem potentia sit instructus, ergo dum facultatum debilitatem dicimus, pro-

ximè de instrumentis intelligimus, & proinde tremoris causa in instrumentis voluntario motui dicatis quærenda est.

Proximum autem, & proprium voluntarij motus organum est musculus, & præcipuum in eo neruus, qui per ipsius musculi substantiam tenuissimis fibris dissimatur; seu fibræ illæ, in quas nerui musculi resoluuntur; & quidem neruosa illæ fibræ bene constitutæ, calido scilicet suo innato, quod Auicennas spiritum motorium nominat, præditæ, & spiritu animali influente, qui insitum fouet, & excitat, persusæ. Facultatisque ad mouendum robur totum pender à neruorum musculis insitorum, seu fibrarum neruolarum in musculis, rectâ constitutione: & contra facultatis motricis imbecillitas ab ipsarum malâ dispositione, quæ prouenit vel à domestico & peculiari neruorum, vel spirituum animalium influentium vitio.

*Proxima  
Tremoris  
causa vbi  
hæreat.*

Atque ita Tremoris p. n. causa quærenda est vel in spirituum animalium influentium vitio; vel in neruorum & fibrarum neruolarum in musculis mala dispositione; & quidem aut in intemperie, & similari constitutione, ac caloris illius insiti vitio, aut in morbo organico eorundem. De quibus, vt causis tremoris proximis, iam dicemus, & vna operâ cuique alias remotiores, cum internas, tum externas causas subiiciemus.

Spirituum animalium influentium vitio fit tremor, cum illi deficiunt, non quidem absolutè, vt in paralyfi, sed cum non iustâ copiâ influunt. Quod accidit, quia vel non generantur, vel geniti absumuntur, & dissipantur. Non generantur ob cerebri intemperiem frigidam, cum in morbis cerebri frigidis quacunque de causa contractis, de quo supra, part. 1. cap. 2. & 10. dictum, tum in senibus; vnde Tremor senibus familiarissimus est, vt pote quorum cerebrum vnâ cum vniuerso corpore refrigeratur, vt & iis, quorum parentes hoc symptomate laborarunt.

*Tremor à spi-  
rituum ab-  
sorptione, &  
resolutione.*

Ob spirituum vitalium defectum spiritus animales non generantur, vel quia ipsi vitales spiritus non sufficienti copiâ generantur: id quod in morbis, in quibus calor & vis concoctrix languet, accidit; vel quia ob inordinatum motum à cerebro non fluunt; id quod fit in vehementibus animi pathematis, vt in ira, gaudio nimio, timore & terrore ex aspectu rei, quæ vel veneratione, vel metu & horrore terret; qualis est hostis, periculi instantis, principis, loci præcipitis, serpentis, facinoris, vel alterius rei horrendæ intuitus; quibus modis omnibus spiritus subito percelluntur, & magno imperu, siue ad interiora, siue ad exteriora, feruntur; atque ideo ad cerebrum non perueniunt; vnde spiritibus animalibus generandis materia denegetur.

Generati verò spiritus animales resoluuntur, & dissipantur (quod tamen ipsum etiam spiritibus vitalibus commune esse potest) in morbis diuturnis nimia sanguinis euacuatione, & purgationibus immodicis, & exercitio nimio, Venere immoderatâ, longâ inedia, vigiliis, animi deliquiis, & similibus.

In ipsis verò membris & neruis causa tremoris est, primò, cum intemperie aliquâ, vel frigidâ, vel humidâ laborant; id quod plerumque accidit; vel etiam siccâ: vt in phreneticis & maniacis quandoque euenit, vt Hippocrates, 1. *Prorrhet. aphor.* 9. & 14. docet, vbi aut calidum innatum neruorum à calore p. n. absumitur, aut malignâ qualitate dissipatur. Potest enim illa intemperies frigida & humida, quæ plerumque Tremoris causa est, neruosis partibus induci à causis tum Externis, tum Internis. Causæ externæ sunt aer frigidus aqua frigida, nix, glacies, nimius aquæ frigidæ in febribus, post balnea, exercitiâ & motus corporis, aut inedia, potus, imprimis si aqua è niue, vel glacie soluta sit. Internæ verò sunt, humores frigidi & crassi, imprimis pituitosi, quacunque de causâ cumulari: quæ

*Tremor ab  
intemperie  
neruos lada-  
te.*

causla & in iis locum habet, quibus sanguis, vel alia coniueta euacuatio suppressa est. Vnde, vt postea, *questione tertia*, dicitur, causla morbi apud Hippocratem 2. *Epidem. sec. 4.* Stymargi ancillæ puerperæ, quæ ob retentionem sanguinis tremore correpta, sanguinisque è venis tali emissionem curata est; potius ad humorum nervosi generis calorem opprimentium copiam referendum puto, quàm ad errorem externum, pondus scilicet membrum deprimens, quod Capiuaccius existimat: nisi quis fortan ad vapores prauos, è sanguine post partum suppresso elatos ad nervos, causlam referre velit.

*Tremor à  
maligna &  
narcotica  
causla.*

Deinde in nervosis partibus vitium est, cum prava dispositio à causlis tota substantiâ, & occulto modo nervosis partibus infectis ipsis inducta est. Quod à venenis plurimùm accidit; vt & *Pro*: vnde Aurifabri, & alij, qui argentum vinum tractant, eiusque halitus & vapores excipiunt, vt & ij, qui lue Venereâ laborantes, cinnabaris & *Pro* suffitu vsi sunt, plerumque tremulas manus habent. Idem præstare possunt humores maligni & pravi, in febribus magnis, aut aliis morbis; quibus tamen febres plerumque coniunctæ sunt, vt & retentiones secundinæ, sanguinis etiam post partum suppressiones, vt modò diximus. Pertinent huc & medicamenta narcotica, vt opium, hyoscyamus, quorum incautior vsus tremorem inducere potest; vt & vinum meracius ac potentius, præsertim ieiuno stomacho potum, quod ipsum nervos ferit, & vim quandam Narcoticam obrinet: vnde vini potatoribus & helluonibus tremor familiaris esse solet.

*Tremor à  
nervorum ob-  
structione,  
vel compressio-  
ne.*

Tandem in nervis vitium est, cum obstruuntur, & densiores redduntur, vt spiritus animales sufficiente quantitate in eos influere non possint: idque ab humoribus frigidis & humidis, vel etiam melancholicis fieri potest, aut, vt aliis placet, cum à quocunque humore comprimuntur & irrigantur; quod etiam ab humoribus serosis, & pituitosis fieri potest; quâ ratione in febribus ardentibus tremores fiunt, teste Galeno, 6. *Aphor.* 26, nisi qui ab occultâ humorum illorum malignitate, vt dictum, nervos lædi, humidum radicale consumi, spiritusque dissipari statueret velit. Ab ortu quoque nervis vitium, inesse potest; cuius rei historia refert Platerus de quodam, qui à primo ortu ad senium vsque continuo tremuit brachiis, manibus, pedibus, quibus inter ambulandum veluti saltabat, capite item, quod agitabat, & maxillâ, quâ veluti marticabat.

### Differentia.

*Differentia.*

Et si alij plures Tremoris differentias constituent; vt quod alius maior, alius minor; alius totum corpus, alius partem quandam, hancce, vel illam occupat; tamen ea præcipua est, quæ à causis petitur; cum secundum eam curatio etiam variet. Aliam enim curationem requirit tremor, qui ab intemperie cerebri frigida provenit, aliam, qui à spirituum vitalium, qui animalium materia sunt, defectu, aut inordinato motu; aliam, qui à spirituum, seu animalium, seu vitalium dissipatione & resolutione provenit; aliam iterum, cum nervi intemperie frigida & humida laborant; aliam cum ab occulta, venenata, ac maligna, aut narcotica qualitate afficiuntur; aliam cum obstruuntur, densantur, seu comprimuntur, & humectantur.

Est etiam notatu digna tremoris differentia, quod alius simplex, alius cum convulsione mixtus, qui *convulsio* dicitur; cuius etiam postea, *prognost.* 10. fiet mentio, qui non solum in febribus interdum accidit, sed nonnunquam etiam in epilepsia, remittente paroxysmo, cum agri tremore tali, cum convulsivis moribus mixto, aliquot horis affliguntur, donec vapor epilepticus totus discussus est.

### Signa Diagnostica.

Tremor seipsum oculis prodit, siue sit in parte aliqua, siue in toto, sicuti &, an parvus vel magnus sit. Quomodo etiam ab aliis affectibus, paralyti, convulsione, palpitatione, rigore differat, antea dictum. A qua verò causla dependeat, suis indicis colligendum, quæ ex constitutione corporis, præsertim cerebri & nervorum, ac humorum in his, & symptomatum, vt & causarum, quæ præcesserunt, vel accidunt, consideratione sumuntur. Primò nimirum quærendum, an causla externa, vel evidens aliqua, ex earum numero, quas antea recensuimus, præcesserit. Hæ si non præcesserint, de causis internis inuestigandis sollicitus sit Medicus.

*Signa dia-  
gnostica.*

Cerebro affecto, & spirituum animalium influentium (absque causis externis & evidentibus) vitio tremore fieri, colligitur ex signis, quæ intemperiem frigidam & humidam cerebri indicant, & supra *part. 1. cap. 2. 3. & 10.* sunt proposita. Profunt quæ cerebro hoc modo per se affecto sunt utilia; cerebroque curato pars ob consensum læsa & ipsa curatur. Absunt signa membrorum, quæ tremorem patiuntur, per se affectorum, & prius partes cerebro propiores, hinc remotiores afficiuntur. Ipsas verò partes nervosas absque spirituum animalium influentium vitio malè affici colligitur, si cerebri malè affecti signa non adsint; contra cum causla tum affectus monstrent, in ipso membro dispositionem vitiosam hære. A parentibus propagatum fuisse malum, ex relatione agri cognosci potest.

### Prognostica.

1. Tremor, qui à causis evidentibus, vt terrore, & alijs animi pathematis, vigiliis, inedia, exercitiis nimis provenit, nihil periculi habet, sed causis iis sublati ipse cessat.

*Prognostica.*

2. Tremor paralyti succedens etiam malus non habetur; quoniam indicium est naturæ vel vincen- tis morbum, vel certè imminuentis. Et præstat actionem aliquam esse imminutam, quam abolitam.

3. Tremor verò à causis internis pendens, & vt morbus affligens, etsi & ipse per se lethale malum non sit, nec per se aliquid periculi afferat; quia tamen facile in paralytin, apoplexiam, lethargum, ipsimum degenerare potest, non contemnendus. Sicut & ob causlam, à quâ pendet, mortem non longè abesse, sapius significat.

4. Tremor quò vehementior est, aut in parte nobiliore consistit, eò deterior. Avicennæ in parte sinistra est periculosior; quia calidum innatum eius partis facilius cedit & succumbit.

5. Tremor in senibus non curatur ob cerebri, & spirituum magnam imbecillitatem; sed eos plerumque ad mortem comitatur.

6. Tremor hereditarius, vel qui paulatim ob errores in victus ratione contrahitur, & præcipuè in iis, qui à natura facultatis animalis organa debiliora habent, raro curatur; sed vel in eo statu permanet, vel ætatis progressu etiam augetur.

7. Quibus in febribus tremores sub initio incidentes conquiescunt, iis tandem in articulis abscessus dolens suppurat, aut vesica laborat; materia scilicet à venis in nervos, aut articulos effusa, aut in vesicam, ubi urina difficultatem efficit. Hippocrates, in *Coac.*

8. Si tremor in convulsione permutetur, malum; quia, vt vulgus existimat, nervosarum partium exsiccationem magnam sequitur, à qua, tanquam à priuatione ad habitum, non fiat regressus; vel potius quia materia, quæ antea nervis intemperiem inducendo tremorem efficiebat, iam deteriore qualitate inducit, vt nervos vellicet.

9. In febre ardente tremoribus delirium succedit, *philosophi.*

*passionem facta materia è venis in nervos ; sed cum ægri detrimento. Cum enim priori morbo succedit alius æquè grauis , aut etiam grauior , viribus hac ratione consumptis , exiguum tum vitæ spem superesse necesse est. 6. Aph. 36. & in Coacis.*

10. Qui Tremores ad manum resiliunt, in malo sunt, Hippocrates, in Coac. Aliquando enim si ægri manus diligenter spectetur, aut attingatur, intremescentem illam reuelli subito animaduertimus; qui motus ex tremore & conuulsione mixtus est, ac *αποσπασμαδίνης* appellari potest, & 3. *Prorrhet. Aphor. 13.* Estque periculosa affectio; non tamen simpliciter. In longis enim febribus, vbi multa cruditas est materia, minore illa periculo accidit, neruis humore madentibus, vnde & multi euadunt. In acutis verò, & ardentibus, vt vulgata est sententia, incendio febrili nerui exsiccati sunt seu potius, vbi à materia praua vellicantur, lethale signum est, ac ferè delirium & conuulsio sequitur, vnde ægri moriuntur.

11. In vehementi phrenitide & melancholia ex flaua bile in atram mutata, tremores sunt mortiferi, teste Hippocrate, in Coacis, ob neruorum, vt vulgò existimatur, ex incendio febris & vigiliis exsiccationem, aut potius ob prauam qualitatem humoris nervoso generi inimici. Videre tamen licet & in phrenitide, & ante hanc, tremulum quendam motum ab acrium vaporum morfu, aut humorum per partes nervosas transitu; qui sæpe criticus est & salutaris.

12. Mulieri post partum ex retentione secundinæ tremor proueniens, malum; quia signum est putridorum, & malignorum humorum spiritibus inimicorum.

13. Tremor in apoplexiâ vel lethargo accidens, malum signum est. Indicat enim, quod virtus extremè oppressa exurgere nitatur ad expulsionem materia; in quo tamen conatu deficiens, extincto calore naturali tandem succumbit.

14. Inedia, aut quauis alia euacuatione extenuatum si tremor apprehendat, malum; quoniam spiritus dissolui, & vires ex inanitione collabi est indicium.

15. Tremor in labio inferiore vomitum instare indicio est.

#### Indicationes.

*Indicationes.* Etsi Causa tremoris proxima sit, facultatis motricis debilitas: tamen quia illa à multis causis, vt supra dictum, oriri potest, singulis suis contrariis occurrendum. Neque enim in omni tremore, vt Galenus, lib. de Tremore, c. 5. monet, calefaciendum, sed si à bile proueniat, vt in febribus ardentibus, infrigidantia nonnulla requiruntur.

Si videlicet non generantur spiritus animales ob cerebri intemperiem frigidam, cerebrum calefaciendum & roborandum. Si spiritus virales, animalium materia, deficient, causa, ob quam hoc accidit, tollenda, ac corpus inanitum reficiendum, & spiritus instaurandi.

Si in neruis sit intemperies frigida & humida, calefacientibus & siccantibus tollenda, humores, à quibus fouetur, euacuandi & discutiendi, ac nerui roborandi.

Si autem praua aliqua *διέσθιον* à causa maligna, vel venenata, aut narcotica iis impressa sit, si causa adhuc præiens sit, tollenda, & *διέσθιον* illa nervos roborantibus expurganda.

Tandem si seu obstructio ac densitas, seu compressio & irrigatio neruorum adsit, humor, à quo id fit, tollendus, ac nerui roborandi.

#### Curatio.

*Curatio.* Cum autem quâ ratione cerebri intemperiem cum,

& sine materia emendare, vt & spirituum animalium vitia corrigere conueniat, supra, *part. 1.* dictum sit, de spirituum verò vitalium vitiis de affectibus cordis, lib. 2. dicendum sit, & præterea Tremor ille, qui ex conspectu rei quocunque modo tremendæ, vel ex ira, aut aliis animi pathematis prouenit, sublatâ causâ, quæ spiritus perturbat, facile cesset: tantum hic dicemus de Tremore à spirituum, tum vitalium, tum animalium dissipatione & resolutione: deinde de Tremore, qui à neruorum vitio ortum habet, videlicet de intemperie frigida & humida, simulque, cum eandem curationem habeat, de neruorum obstructione, densitate & compressione: tandem de praua dispositione, à venenis, ac malignis & venenatis humoribus, & narcoticis impressa, curanda; & quidem breuiter, cum curatio tremoris multa cum paralysis curatione, de qua, c. seq. dicetur, communia habeat.

#### De Curatione Tremoris à spirituum absorptione & dissolutione.

Si spiritus vel ob morbum aliquem grauem, aut longum, vel euacuationem nimiam, vel Venerem, vel similem causam, absorpti sint, dissipatas quidem aliquo modo vires restituere non ita difficile est, amissæ verò planè difficulter reparantur. Ad reficiendum autem spiritus etsi & medicamenta supra proposita, *part. 1. cap. 15.* & quæ postea lib. 2. de Affect. cordis, proponuntur, vtilia sunt: tamen inprimis bona diætæ ratio, quæ resectoria nominatur, vtilis est. Versetur ergo æger in aëre puro, temperato, & rerum suauolentium odore alterato. Cibus sit boni succi, facilis coctionis, & qui plurimum spirituum suppeditat. Talis sit & potus, plurimumque hic valet vinum bonum moderatè sumptum. Æger quiescat, vel etiam moderatè exerceatur. Somnus sit moderatus, vel etiam paulò prolixior. Æger sit animo læto, & ab affectibus animi immoderatis alieno.

#### Curatio Tremoris à causa frigida & humida nervos ladente.

Si verò Tremor à materia frigida & humida, temperiem, seu innatum calidum neruorum ladente, seu eos obstruente, aut comprimente, & irrigante ortum habeat, eadem ferè curandi ratio competit, quæ postea de paralysis proponetur. Videndum primò, an plethora aut cacoehymia in toto, vel parte adsit; eaque tollenda. Itaque si sanguis peccet, siue ex se, siue suppressa aliqua euacuatione consueta, vena aperiatur. Ita Hippocrates, 2. *Epidem. sect. 4.* Styrgæi ancillæ, quæ post partum tremores toto corpore occupant, quod à partu purgatâ non fuisset, venam secuit in talo, vt sanguinis multitudinem demeret. Et vix in alio casu sanguinis euacuatio in tremore conuenit, quam vbi tremor ex suppressis hæmorrhoidibus, menstruis, vel purgatione sanguinis post partum, ortum habet. Atque tum commodissime vena in talo aperitur, vel etiam hæmorrhoides prouocantur. Aliàs verò in frigido affectu, ne corpus magis perfrigeretur, non conuenisset venæ sectio, vt refert Galenus, in libr. de Tremore, cap. 5. & de venæ sectione aduersus Erasist. cap. 5. Vbi verò plethora tanta non est, venæ sectionis scopus cucurbitulis cum scarificatione, & cibi paucitate suppletur.

Si verò humor frigidus mali causa sit, præparetur & purgetur, vt supra, *part. 1. cap. 10.* dictum, cerebrumque, ac partes nervosæ roborentur. Iis verò, quæ supra, loc. alleg. dicta sunt, pauca saltem addimus. Ad alterandum & roborandum inprimis saluia & castoreû commendantur, vt & galega & stachas Arab. Drach. j. pondere cum hydromel. exhibita; item conseru. primul. veris, anthos, meliss. & acorus conditus, & huius generis alia.

Auicennas commendat cerebrum leporis assatum; & castoreum omnibus modis, cum assumptum, tum extra adhibitum, prodest.

Ad confortationem neruorum, præcipue post diuturnos morbos, vtile est hoc Electuarium:

℞. Pulpa pullorum columbarum syluest, vel ciconiarum in vino elixarum Vnc. iij. cerebri leporis assati Vnc. j. amygdal. dulc. mundatar. num. xxx. pinearum recentium lotarum cum hydromelise num. xx. passul. minor. Vnc. j. sp. elect. resumptiui Drach. ij. pulu. cinamomi Drach. iij. zingiberis, caryophyll. galang. macis, an. Scrup. j. cardamom. Scrup. sem. mosch. gr. ij. mellis despumati q. s. F. Electuarium.

Vel ℞. Conseru. fl. lauend. rorismar. salu. an. Vnc. β. plect. diacori Drach. vj. cerebri leporis assi Vnc. j. castorei Drach. β. cranij hum. preparati Drach. ij. pulu. rad. & sem. pæon. an. Drach. j. visci quern. Drach. β. spir. primul. veris Drach. j. essen. salu. Drach. β. Cum syr. de starch. q. s. F. Electuarium.

Vel ℞. Conser. beton. rorismar. an. Vnc. j. β. zingib. cond. Drach. vj. spec. diamosch. d. diamb. an. Drach. β. theriaca Drach. ij. aurea Alexand. Drach. β. spir. vitr. volat. Scrup. j. Cum syr. de betanica q. s. F. Electuarium.

Vt & hoc;

℞. Conser. flor. saluie, anthos, acori, an. Vnc. ij. cranij hominis preparati Vnc. β. rad. ac sem. pæon. rad. plantag. aquatic. an. Drach. j. β. cerebri leporis assati Vnc. ij. M. F. Electuarium.

Vel paretur hic Syrupus ad neruos roborandos vtilis:

℞. Herbar. primul. veris, saluie, ruta, chamapythios, maioran, chamadryos, saureia, calaminth, origani, betonic. an. M. β. calami arom. Vnc. sem. Coqu. & cum f. q. mellis F. Syrupus, in quo adhuc calido Nodus suspensatur & relinquatur;

℞. Cinamomi, caryophyll. macis, nuc. moschat. sem. pæon. piper. nigri, longi, zingiberis, spica, sem. anisi, an. Drach. j.

Nicol. Florentinus refert, serm. 3. tr. 3. cap. 9. quod mulier quædam sexagenaria à tremore capitis liberata fuerit solâ comestione nycticoracum, quos depilatos cum visceribus decoquebat, & comedebat.

Chymici essentiam melissæ laudant, in aqua basilic. exhibitam. Alij in quinta essentia vini folia saluie macerant.

Nonnulli alijs remediis nihil proficientibus decoctum ligni sancti, & sarsæ parillæ per aliquor dies propinant, ad excrementitium humorem exsiccandum; & per sudores exhaustiendum & euocandum.

Tremor à potu aquæ è niue resolutæ curatur balneo calidissimo, in quo æger moretur, donec bene sudauerit. Postea vtatur cibis & inunctionibus calidis.

Ex Topicis ad alterandam intemperiem neruorum partium, humorem pituitosum discutiendum, & neruos roborandos conueniunt ol. costin. vulpin. de castor. lumbric. terebinth. Philosophor. de piper, nardinum, iuniperi, & lilior. alborum, in quo flor. lauendulæ, liliorum conuall. macerati fuerint, vel oleum ex floribus trifolij, qui inprimis commendantur, & alia, quæ de paralyti postea proponuntur, quibus ceruix, & origo neruorum, & membrum tremulum inungatur, iisdemque aqua aliqua apoplectica aut cephalica admisceatur.

Vel ℞. Ol. iunip. de castor. de piperib. vulpin. an. Vnc. β. vnguenti Mariati Vnc. j. β. sapon. Veneti Vnc. j. pulu. sem. eruc. vrtic. ruta, cepar. an. Drach. j. axung. anatis Vnc. j. β. Misc. pro Vnguento.

Vtilis est balsamus rorismarin. lauendul. saluie, petroleum, ol. destillat. iuniperi, maioranæ, melissæ.

Lauetur quoque membrum tremulum aquâ vel decocto saluie, rorismarini, lauendulæ, maioranæ, baccar. iuniperi, addito castoreo.

Nonnulli sequentem Aquam stillatitiam pro secte- to habent.

℞. Fol. salu. recent. lb. j. camphora Vnc. j. vini alb. q. s.

Digerantur per 8. Dies, deinde destilla in B. & modo dicto vtete.

Vtile est & hoc Destillatum:

℞. Mastiches, iurris, myrrha, opopanax, sagageni, an. Drach. iij. styracis calamita, liquida, an. Vnc. β. terebinthin. Vnc. ij. herba iñe arthetica, fl. lilij conual. la- uendula, an. M. β. Concisis & conculis affunde vini Rhenani lb. ij.

Stent in infusione loco calido 4. diebus. Postea destillentur.

In destillato dissolue mosch. Drach. j. Hoc liquore & nucha, & spina dorsi, & membrum affectum illinuntur.

Possunt & sacculi, & cucuphæ ex cephalicis, & aromaticis pulueribus concinnata vertici capitis raso ad- moueri.

Nec inutile fuerit, cucurbitulas sine scarificatione ad vertebra, vnde nerui membri affecti prodeunt, apponere.

Sunt & efficaces thermæ, & præcipue sulfureæ, quæ si desint, Laconicum parari, aut balneum cum herbis conuenientibus potest.

### Curatio Tremoris à maligna, venenata, ac narcotica caussa.

Si ab vsu narcoticorum medicamentorum, aut vapore, vel contactu argenti viui, aut venenis, aut humoribus malignis, qui neruis infesti sunt, tremor originem habeat, exhibenda medicamenta venenis & malignitati aduersantia, neruosque roborantia. Nonnulli, neque sine ratione, si Tremor sit ab hydrargyro, aurum limatum, vel foliatum medicamentis internis (vt & externis, vt dicitur) permiscunt. Cum enim aurum cum hydrargyro tantam habeat cognationem, vt hydrargyrum ab auro imbibatur, fieri potest, vt, si id in corpore reperiat, cum eo vnietur, & tandem per alium excernatur.

Nonnulli docent, hydrargyrum sudoribus à corpore elicere, vt instar arenæ cuti adhæreat, & postea aqua ablui possit, hoc modo: Ægrum alternis diebus in balneo sicco lauare iubent, vno die ignitis lateribus affuso vino, in quo saluia & absinth, cocta sint, altero, rhure carbonibus iniecto, ægrumque dum balneo egreditur, aquâ vitæ cum melissa destillata, idque diebus 14. continuant.

Extra etiam adhibenda, quæ neruis familiaria sunt, ac membra tremula illinenda theriacâ dissolutâ in ol. irino aut laurino, vel decocto & aquâ saluie lauanda.

Vel ℞. schananth. cyperi, acori seu calami arom. spica, caryophyll. nucis moschat. piperis, an. Drach. ij. hermodactyl. satyri, an. Drach. j. spir. vini vel aq. Apoplect. Vnc. j. cera q. s. F. Linimentum.

Efficacius redditur, si auri limati, vel foliati Drach. sem. addatur, si malum sit ab hydrargyro. Commendatur & ol. sulphuris, vel Balsamum sulphuris, si tota spina & membrum tremulum eo inungatur.

### Diata.

Diata pro ratione causarum conueniens ordinanda. Si à spirituum absumptione, & inedia pendeat tremor, cibo boni succi corpus quamprimum reficiatur. Si à cerebri & partium neruorum intemperie frigida & humida ortum habeat Tremor, diata conuenit, quæ supra, part. 1. cap. 10. proposita est. In senibus tremulis pullorum, & columbarum iuuenum caro, præsertim tempore hyberno, commendatur.



Bibatur æger cereuissiam, vel hydromel saluia, betonica, roremar. conditum. Abstinentum ab immoderato vini usu, à nimia venere, lotionem in aqua frigida; neque etiam manus frigidâ aqua abluendæ, sed potius decocto, vel aqua saluiæ, aut flor. lauendæ.

Nonnulli urinam ad manuum lotionem commendant. Vtile est & balneum ex aqua theriac. vel marina. aut, si hæc desint, ex decocto plantarum, quæ cerebro & nervis amica sunt.

## QVÆSTIO I.

*An Tremoris vox quandoque etiam pro Rigore accipiatur?*

Tremoris vocem duobus modis à Galeno accipi, propriè, & impropriè, scribit Hercul. Saxonia, *libr. 1. cap. 14.* Propriè pro depravatione motus ex facultatis motricis imbecillitate, de qua iam actum. Impropriè etiam pro Rigore. Atque hanc impropriam significationem vocis Tremoris usurpata docet à Galeno, *libr. de Theriac. ad Pamphilian.* vbi scribit; theriacam curare tremores; qui contingunt in febrium accessionebus, & 2. *de Antidot. cap. 9.* vbi docet, Mithridatium curare tremores accessionum febrium. Verum enim verò, etsi vulgus istas appellationes, & symptomata interdum confundit; tamen Medici eas semper discernere solent. Neque loca allegata contrarium probant; sed versione Latinâ utrobique deceptus est Hercul. Saxonia. Neutro enim in loco aliquid de tremore in textu Græco habetur: etsi versio Latina pro rigore vocem tremoris substituerit; quod etiam Latina attentè legentem facillè latere non potest. Etenim, in *libr. de Theriac. ad Pamphilian.* ita habetur; ἀπαρτὸν τὸν τρέμουτον, hoc est, *utilis est Theriaca cuiuscunque typi rigorem tollere*, vbi τρέμουτον, non τρέμουτον habetur. *Lib. 2. de Antidot. cap. 9.* ita legitur: τρέμουτον τὸν τρέμουτον, id est, *febris secundum periodum affligentibus auxiliatur, & qui paresi ac Tremore laborant.*

## QVÆSTIO II.

*An proxima Tremoris Causa sit una, facultatis motricis imbecillitas.*

Proximam Tremoris causam esse facultatis motricis imbecillitatem, quæ membrum, quod à naturali pōdere deprimitur, liberè mouere non potest, supra dictum est. Hercul. Saxonia tamen, *loc. alleg.* aliam causam habet, dicitque, dari adhuc alium tremorem, qui fiat musculis nullâ ratione exercitatis, & motis, ac differre à legitimo tremore, non quidem in forma motus, sed potius in causis. Esse enim eandem motus formam compositam ex eleuatione, & depressione, sed causis differre; cum legitimus tremor habeat eleuationem factam à facultate animali, motum depressionis à grauitate membri. Spurius verò habeat motum eleuationis à causa, vel non naturali, vel præter naturam, vapore scilicet, vel flatu, qui repleat nervosum, & musculosum membrum, & replendo membrum eleuet, motum verò depressionis similiter à grauitate membri.

Verum fallitur & hic Saxonia. Et primò confundit palpitationem ac Tremorem. Palpitatio enim est Tremor ille spurius, quem ponit, & motu isto reciproco non totum membrum volūtario motui dicatum, quod tremoris subiectum proprium est, sed solum musculosa pars cum cute à vapore, vel flatu eleuatur, membro toto situm non mutante, nec moto.

Deinde quod putat, fieri posse tremorem, musculo non moto, vel exercitato, atque hoc in Doctore Bottonno, & virgine quadam moniali se vidisse scribit; etiā in eo deceptus fuit Saxonia. Musculorum enim actio

duplex est, una, quæ pars attollitur, seu transfertur; altera, quæ eleuata seu suspensa, vel in quacunque loci differentia mora, in eodem statu seruatur, quod sit in motu tonico. Ideoque fieri potest, vt, licet vnâ parte manus vel brachium rei alicui quietæ innitatur, nihilominus tamen ob motum tonicum, quem facultas animalis debilis in toto membro præstare non potest, Tremor in membro, quod quiete videtur, accidat, qui nullius alterius generis est, nec aliam causam habet, quam tremor antea descriptus.

Cardanus quoque, *in 6. Aphor. 26.* seu, vt ipse numerat, 25. Galenum reprehendit, quod vnicam proximam tremoris causam posuerit, facultatis motricis scilicet imbecillitatem, quæ membrum, vt par est, mouere, vel extensum seruare nequit. Etsi enim Tremor iste senibus familiaris sit; alium tamen, præter illum ponit, qui & validis corporibus accidat. Talem se vidisse scribit in vxore Mercatoris, Iohannis Angli de Monte, quæ tremore adeo cruciabatur, vt tres viri illam non possent continere, quæ simul & cordis palpitationem patiebatur. Idem in Duce quodam militum se vidisse scribit. Atque omnino maximam inter has duas tremoris species differentiam esse docet. Illum, qui à Galeno & aliis vulgò describitur, accidere senibus imbecillis, aut alio modo debilitatis; hunc verò iuuenibus & validis. Illum esse continuum; hunc habere accessiones, vt comitalem morbum, & conuulsiones: illum tremorem esse lentum, exiguum, ac vix conspicuum; hunc velocem, vt vix contineri possit: illum superposito tabulæ membro cessare; hunc, etiamsi membrum quiescat, nihilominus membrum agitare: illum fieri sursum ac deorsum; hunc etiam ad latera. Causis etiam differre hoc tremores statuit, vt iam dicitur. Ipse ergo duo genera tremoris constituit, vnum, quod fiat ab imbecillitate facultatis motricis, quod sit rardum, & cum parua concussionem, ac cesset, si membrum quiescat: alterum verò velox, & cum magno impetu, ac per accessiones, quod fiat ex corruptione facultatis, non debilitate. Causam autem corruptionis facultatis, dicit esse vaporem quandam stimulantem & pungentem nervos, sicut id & in conuulsionibus videre est. Ascendere autem illos vapores ad cerebrum, & nonnunquam etiam à cerebro ad nervos, aut ad cor transmitti, vnde simul palpitatio cordis accidat; sicut id vxori illius mercatoris accidit. Atque tales etiam tremores esse docet, qui per febres ardentes contingunt, qui accidunt vaporibus talibus ad principium nervorum missis: vnde etiam Aphorismus ille habet; solui Tremorem delirio, vbi scilicet vapor, qui antea principium nervorum vellit, iam ad ipsam substantiam cerebri, eiusque ventriculos penetrat. Neque etiam hunc motum ad palpitationem referri posse docet, cum tremor hic sit motus magnus, velox, creber, totius membri sine dilatatione & contractione cum mutatione situs, quorum contrarium accidit in palpitatione, vt ex Galeno, *lib. de Palpit. & Tremore, cap. 5.* videre est.

Non dissentire videtur à Cardano Platerus, qui de causis Tremoris scribit: Nervorum quosdam affectus non spiritus intercludere, sed nervos alia ratione labefactando, lædendoque tremorem inducere; vt si ab humoribus excrementitiis, sicut dictum, non tantum spiritus intercipiendi imbecillitas hæc in musculo tremoris causa sit, sed & irritando nervum ad motum, qui in tremore fit, non nihil impellat; vnde & aucta causa, vel perseverante, tremor in conuulsionem sæpe desinat.

Verum enim verò libenter quidem concedimus, motum hunc, quem describit Cardanus, à Tremore, qui vulgo explicatur, omnino distinguendum esse, ne forsan in curatione nobis accidat, quod ipsi Cardano euenit. cui, vt, *loco allegato*, ipse scribit, cum Dux quidam militum hoc malo correptus curandus oblarus fuisset, atque ipse tantum ea cogitaret, quæ Galenus passim de

de Tremore scribit, nullamque aliam causam esse existimaret, quam facultatis debilitatem, ægrum curare non potuit, quem tamen forsitan curare potuisset, si ea, quæ de hoc tremore addidit, perpenderit. Sed non Galenus Cardanum, verum Cardanus seipsum decepit, dum putauit, hunc affectum, quem in vxore illius mercatoris ac Duce militum obseruauit, tremorem esse à Galeno descriptum, & pendere à facultatis motricis imbecillitate; in quo valde errauit. Etenim tremor nunquam fit sine motu voluntario, & tremor, respectu facultatis motricis, est motus voluntarij debilitas; respectu verò totius membri, motus voluntarij deprauatio: id quod non accidit in hoc motu à Cardano descripto, qui omnino contra voluntatem accidit, & ita quidem, vt etiam vi externâ motus ille p. n. semper impediri non potuerit. Præterea Tremor non fit cum tanta corporis concussione & agitatione; sed saltem in duas situs differentias, vnam, in quam, à facultate motrice trahitur, alteram, in quam pondere suo membrum vergit. Vnde ad tremorem hic motus à Cardano descriptus referri non debet.

Vt verò, quid mihi videatur, aperiâ, conuulsiones, epilepticas non dissimiles fuerunt hi motus, quos Cardanus pro tremore habet. Etsi enim in perfecta epilepsia ægri concidant: tamen si causa sit leuior, id non semper accidit, & talis epilepsie exempla in Institutionibus recentissimis, ac tale etiam habet Smerius, in *Miscell. pag. 526*. Ac hoc ipso anno 1624, femina quædam Halæ Saxonum tale quid perpessa fuit, quæ cum cancrum exulceratum in mamma haberet, atque indies ille profundius serperet, tandem cum corruptio vsque ad membranam thoracis peruenisset, aliquoties tales conuulsiones passa est, vt etiam ab aliquot hominibus quiesca contineri non potuerit. Quomodo autem & resolutiones & conuulsiones ex consensu thoracis fiant, docet Adrianus Spiegelius, de *human. corp. fabr. lib. 6. c. 4*, nimirum ob consensum, qui est inter arterias intercostales, & spinalem medullam, prouenitque à propaginibus illis, quæ in spinam se penetrant per foramina thoracis. Atque facile hoc cognoscere potuisset Cardanus; cum ipse scribat. Tremorem hunc accessiones habuisse, & membrum concussisse, & à vapore nervos vellicare ortum habuisse. Ideoque vel ad epilepsiam, vel ad conuulsuos motus potius hic tremor, quem ita appellat Cardanus, referri debet, quam ad tremorem propriè dictum. Si enim cerebrum & principium nervorum simul afficiatur, est epilepsia; si verò nervorum propagines infra caput afficiantur, fiunt motus conuulsui.

Quod verò tremores illos in febribus ardentibus attinget, hic concedendum puto, conuulsionem quandam interdum cum tremore concurrere, & tunc spasmodum *τρεμὸν δὴ αὐτὸ τρέμων πασμοδὸν* appellari posse. Facile enim accidere potest, vt facultas ex morbo ad mouendum sit debilis, & inde fiat Tremor: quod si humor sit magnus & simul nervos vellicare incipiat, tremori conuulsio accedit, & motus quidam ex conuulsione & tremore mixtus accidit.

Atque ita vna proxima tremoris est causa debilitas facultatis motricis, quæ membrum eleuatum in eo statu seruare nequit. Notus verò illi, qui à vellicatione nervorum oriuntur, conuulsui sunt.

### QVÆSTIO III.

*An Tremor ab errore externo quoque  
provenire possit?*

Capiuaccius, cap. de Tremore. motum in Tremore duobus modis deprauari statuit, vel læsâ facultate, vel ab errore externo; & ad errorem externum refert primò vitium spirituum animalium, quod hi nequeunt facultatem influxam seruare robustam. Deinde mobile,

seu pondus mobilis, partiumque motui destinatarum, cuius exemplum ponit sanguinis abundantiam, & potum copiosum. Tertiò ad vitium spirituum & pondus simul refert venena, frigiditatem nimiam, calorem, & humores calidos, ac similia, quæ cum spiritibus animalibus aduersantur, tum calidum partibus insitum lædunt.

Verum non video, quomodo aliquid ad errorem externum referri possit, quod obiecti rationem, respectu motricis facultatis, non habet. Itaque spirituum vitium non ad errorem externum, sed partium, quæ proximum motus organum sunt, nervorum scilicet, morbos & dispositionem p. n. rectius referri puto. Spiritus enim animales influentes insitum nervis calidum perficiunt, temperiemque eorum quasi complent, & vt facultas motrix motum actum præstare possit, efficiunt. Potus verò copiosus; & sanguinis euacuandi retentio, tremoris causa sunt, non quod membrum nimis graue reddunt, sed potius, quia vel insitum nervis calorem debilitant, vel ad vitiosorum humorum, qui idem efficiunt, generationem faciunt.

Atque idem præstant venena, frigus nimirum, & humores in febribus ardentibus; qui ipsi tamen maligna sæpe, & occulta potius vi, quam manifesta qualitate, nervis inimici sunt; vt supra de causis dictum.

### QVÆSTIO IV.

*Quomodo Hydrargyrum Tremoris  
Causa sit?*

Hydrargyrum Tremoris causam esse, extra dubium est, testaturque id experientia. Nec ignotum est id aurifabris, qui ad noxam, quam argentum viuum inferre potest, vitandam, dum argentea vasa inaurant, in aere libero, vento secundo, sedere solent, vt fumus argenti viui ab eis arceatur. De modo autem controuersum est. Nonnulli & vaporem argenti viui noxium esse, & in inunctionibus extra etiam adhibitum nervis nocere statuunt. Alij saltem vaporem ore exceptum noxium esse docent, Platerus, in *tratt. 1. de Causis Tremoris*, vtrumque negat, & argentum viuum in substantia, nec per suffitum nec per inunctiones corpus subire, sed viribus tantum eo vsque deductis, nervis nocere statuit.

Verum enimverò nemo, qui argentum viuum tractauit, eiusque naturam cognitam habet, Platero facile assentietur. Etenim Hydrargyri ea natura est, vt in alia corpora sese intime insinuet, eiusque mistio tam exacta, vt naturam suam, quocunque etiam modo mutata videatur, non amittat, sed ad pristinam naturam facile redeat; vaporque Mercurij nihil aliud est, quam ipsum argentum viuum in tenuissima corpuscula redactum. Ideoque vtrumque fieri putamus, vt & vapore ac suffitu, & inunctionibus noceat, & quidem non solum qualitates communicando, sed etiam substantiam. Etenim vapor ille, vt dictum, nihil aliud est, nisi Mercurius in subtilissimas & minimas partes resolutus, qui facili negotio in Mercurium viuum & currentem etiam redit, quod Chymicis tam notum est, quam quod notissimum. Quin verò & inunctionibus in corpus penetrare possit, nemo dubitabit, cui vires argenti viui notæ sunt; atque ipsa experientia id confirmat. Quantum enim è suffitu & inunctionibus corpori nocere possit, historiis & exemplis demonstrat, Fernelius, de *Lue Venerea*, cap. 7. Iulius Palmarius, de *morb. contag. l. de hydrarg. c. 5*. Forestus, lib. 8. obseru. 5. & quidem non solum qualitate, sed & substantiâ, facile patebit ei, qui exempla ista & historias diligenter perpenderit. Præterea refert Laurentius Scholtzius, in *obseru. Schenck. lib. 7. de Hydrarg. obseru. 20*. cuidam frequenter videnti Mercurio accidisse, vt Mercurius brachio eleuato & demisso in eo fluctuaret, & motu manifestè perciperetur.

## CAPVT XXVI.

## De Motus Impotentia in Genere.

Cum Tremor sæpe fit paralyfis sequentis præludium, itque, ut à facultatis motricis imbecillitate dependet, ita in motus impotentiam, & abolitionem sæpe definat; commodè atque ordine post tremorem iam de motus impotentia, & abolitione agimus. Et primò quidem in genere de motus impotentia; postea in specie de Paralyfi dicemus.

Notandum enim hîc, motus impotentiam latius patere, quàm paralyfin. Nam ob luxationem articulorû, & ossium dislocationem, eorundemque fracturam, ob vulnera, ob tumores, ob exsiccationem, & duritiem tendinum ac ligamentorum, & similes causas, membra, ut debent, & secundum voluntatis imperium moveri non possunt; ac mouendi impotentia excitatur, quæ tamen paralyfis non dicitur. Neque cui crus fractum, ac vulneratum est, paralyticus appellatur, etsi ambulare non possit: sed tum solum paralyfis nominatur cum facultas motrix læditur, aut frustratur, ob spirituum animalium in musculis defectum, ut, *capite sequenti*, dicitur.

Cum ergo plures causæ esse possint, ob quas facultas motrix in officio suo impeditur, eas omnes in conspectu habere oportet, ut, quæ in quolibet ægro locum habeant, inuestigari queat. Cum autem motus voluntarij organum sit musculus, nervi spiritum animale, sine quo nullus fit motus voluntarius, deferant, cerebrum verò eum communicet & transmittat; ac insuper membrum, quod moveri debet, naturaliter dispositum esse debeat; in hisce quatuor impedimenti ac læsionis, quæ in motu voluntario accidunt, causæ quæranda est. De ea verò motus impotentia, quæ fit ob spirituum animalium defectum, ac nervorum, spinalis medullæ, ac cerebri vitium, postea de paralyfi ac apoplexiâ dicemus. Hoc verò capite eas causas saltè explicabimus, ob quas citra paralyfin & apoplexiam motus animalis læditur; & præcipuè de musculorum ac partium musculis connexarum, & quæ moventur, vitiis & morbis.

Et musculos quod attinet, primò nimia eorum refrigeratio causâ motus impotentia esse potest: id quod iis accidit, quibus manus vel pedes ab externo frigore aëris, vel aquæ, nimis refrigerati sunt, in quibus neque manus, neque pes officium faciunt, & neque rectè apprehendere, neque rectè ambulare possunt.

Deinde exsiccatio musculorum interdum motus impotentia causâ est, ubi videlicet muscoli, tendinesque iis inferri ita exsiccantur & indurantur, ut amplius flecti aut contrahi, & extendi nequeant. Tunc enim membrum fixum & immobile manet. Accidit hoc sæpius post nimios labores, præcipuè in senibus, quibus membra ita exsiccantur, ut digiti & manus incurvæ maneat neque rectè amplius officium facere possint. Accidere etiam potest interdum exsiccatio ex pinguedinis, quæ musculis adnata est, defectu, ut & à glutinis illius, quo tendines oblinuntur, absumptione; quæ ab atrophia dependet. Cuius rei notabile exemplum est apud Forestum, lib. 10. observ. 97. de puero quodam, qui crurum atrophia laborans, ut ambulare non posset pro paralytico à multis Medicis, quorum consilia, loco allegato, videre est, frustra curatus, tandem verò à Foresto restitutus est.

Nonnunquam tumor durus, veluti scirthus, aut nodus ab excrementis in musculis genitus, in primis circa tendines, ubi plures in articulorum regione concurrunt, mouendi impotentiam excitat; id quod in carpo, & circa genu frequentius accidere solet, Germani ab hac, & priori causâ mouendi impotentia laborantes Contractos vocant, quod manus, vel genua incurva & rigida contrahuntur, ut extendi planè non possint. Idem à cicatrice post vulnus in musculo, vel tendine, qui

vulnerati, non verò planè dissecti erant, accidere potest, à quo vulneris labiis contractis, musculoque breviori reddito, pars, cui inferitur, contrahitur, nec rectè moveri potest; quod non solum in articulis manuum ac pedum accidit, sed etiam musculo temporali læso accidisse, indeque os adeo contractum fuisse, ut vix liquidissimos cibos admitteret, observavit Platerus.

Si quoque extendantur per motum violentum nimium tendines adeo, ut fiant inde distracti longiores, quam par erat, aut à vinculis, quibus continentur, liberentur, ac laxentur, accidit, ut membrum postea sufficienter elevari nequeat. Ita refert Platerus, lib. 1. observ. 140. cuidam lapicidæ, dum saxum immensè molis volueret, adeo tendines in sinistra manus vola ad digitos, annularem & minimū definētes, attractos fuisse, ut à vinculis, quibus derinentur, laxari, elevari que duas chordas sub cute tenas in altum referrent, contractique hi duo digiti & attracti postea semper manerent. Contractionum talium aliquot historiæ videantur apud Platerum, observ. lib. 1. a pag. 137. ad pag. 140.

Tumor etiam in musculo dolorem coniunctum habens motus impotentia causâ est, membrumque dolens, ut par est, ægri movere nec possunt, nec volunt.

Tandem soluta continuitas in musculis vel illorum tendinibus facit, ut membrum, quod trahere debebat, movere non possint, partim ob dolorem, ob quem pars vulnerata moveri non potest, partim quod musculus, vel tendo vulneratus contrahi, aut extendi nequit. Idè efficiunt vlcera, & præcipuè post ischiadicos dolores orta, quæ membranas, nervos, ligamenta, & tendines circa coxæ articulum corrumpunt, unde claudicatio, aut ad motum impotentia excitatur. Idem tamen & in aliis articulis fieri potest. Sicut etiam à magnis combustionibus ad articulos nervi & tendines quandoque ita retrahuntur, ut membrum inde incurvetur; præcipuè si circa initia Chirurgus ferulis & aliis idoneis medicamentis incommodum non præcaueat.

Secundò in partibus musculis annexis, & præcipuè ossibus, nonnunquam tamen & ligamentis ac cartilaginibus, causâ motus impotentia hæret.

Primò si conformatio ossium sit vitiosa, qualis nonnullis à primo ortu obtingere, vel etiam ex fracturis accidere solet, motus impeditur, ut vel æger claudicaret, vel manu rectè apprehendere non valeat.

Secundo dislocatio ossium, & luxatio, & ea qualiscunque motui obest. Præterea si ossa frangantur, membrum moveri non potest, partim quia, cum pars ossis fracti, cui musculus & tendines inferuntur, moventur, reliqua pars abrupta non sequitur: partim propter dolorem, qui etiam levi motu in osse fracto excitatur.

Insuper causâ motus impotentia in ligamentis articulos obvoluentibus & firmantibus esse potest. Eorum enim continuitas si solvatur, vel si laxentur, ossium luxatio, vel membri elongatio, quam appellant, accidit. Nam quandoque ligamenta rumpuntur, quandoque etiam ex vulnere solvuntur; sed verumque rarius accidit. Nonnunquam etiam ex vlcere ibi latente exeduntur; quod in coxendicis articulo ob sinuosa ibi excitata vlcera accidere solet: unde nonnulli toto reliquo vitæ cursu luxato & abbreviato crure claudicant, vel pede elongato claudicant. Nonnunquam distractis ex tensione nimia, & motu violento quocunque ligamentis articulos firmantibus, & ex parte ab ossibus, quibus cohærent, veluti anulis motus articuli impeditur, cum dolore ab initio sæpe diu molesto. Denique laxata ligamenta neque membrum satis firmant & constringunt; unde fit, ut articuli elongentur, & facili de causâ luxentur. Idque nonnullis ab ortu accidit, ut crura quasi pendula, & vnum altero longius obrineant, ac facili de causâ ossium dislocationem patiantur. Si quoque exiccentur nimium, & indurentur ligamenta; id quod in callosa & nodosa podagra fieri

Motus impotentia à nimia tendinum extensione.

Motus impotentia à soluta continuitate.

Motus impotentia à conformatione ossium vitiosa. Motus impotentia ab ossium luxatione, & fractura.

Motus impotentia à ligamentorum vitio.

solet, articulus & membrum immobile manet, vel ægrè mouetur, & cum mouetur, stridor aliquis ac fragor, ac si rumpereetur, percipitur.

*Motus impotentia à cartilagineo vicio.*

Tandem si cartilago, quæ capita ossium mobilium munire solet, suam naturalem lubricitatem amittat, & hinc cartilago vel exsiccat, vel exasperetur, motui impedimento est. Atque hæc causæ sunt, ob quas citra paralyfin spontaneus motus impediti, vel tolli potest.

### Signa Diagnostica.

*Signa diagnostica.*

Ipsium motus impedimentum perse obuium est, nec signis opus habet. Cum verò pro diuersitate causarum cura varianda sit, causæ diligenter inquirendæ.

Primò refrigeratio manuum vel pedum latere non potest, sed ipse æger, quid passus sit, referet.

Exsiccatio & Induratio musculorum ac tendinum, & atrophia membri, visu ac tactu comprehenditur, potestque hac in re Medicus, ne fallatur, & atrophiam membri pro paralyfi habeat, satis instrui à Foresto. loco antea allegato, lib. 10. obseru. 97.

Contractos etiam, & qui scirrhus ac nodos circa articulos habent, facile à paralyticis visu & tactu discernere licet. Paralyticorum enim membra aliorum ope flecti & extendi possunt; membra verò contracta & rigida etiam aliorum ope extendi non possunt, sed incuruata manent, tumoresque duri tactu deprehenduntur.

Si ab extensione violenta tendinum & ligamentorum motus impotentia proueniat, æger ipse, quid violenti passus sit, vel quid egerit, referet; atque ipsa extensio tendinum tactu deprehendi potest. Ita tumores, vulnèra, vlcera, combustiones in musculis, & circa articulos visui obuia sunt.

Ossium quoque viciū, seu organicum seu luxatio, seu fractura, sensibus deprehenditur, diciturque de signis fracturarum & luxationum suo loco. Ita si ligamenta vel rumpantur, vel vulnerentur, ex causis evidentibus, quæ præcesserunt, id patebit. Et tunc articuli luxantur, & membrum plerumque iusto longius redditur; quod si accadat, & nihil tale præcesserit, indicio est, ligamentum laxius redditum fuisse.

Exsiccatio ligamentorum tactu deprehenditur, & tum inter mouendum stridor plerumque percipitur.

### Prognostica.

*Prognostica.*

1. Quæ à refrigeratione extremorum mouendi impotentia, facile refrigeratione cessante, & plerumque sponte, cessat. Nonnunquam tamen medicamentis opus habet.

2. Immobilitas membrorum, quæ ab exsiccatione & induratione musculorum, item duris tumoribus, nodis, callis, vel cicatricibus in tendinibus & ligamentis accidit, curatu difficilis est, & si malū diuturnum sit, ac ratione gratis, & ob labores diuturnos obtigerit, ferè incurabilis est. Recens verò curationem sæpe admittit.

3. Si impotentia membrum mouendi fiat, quòd à violentia tendo aut ligamentum distracta sint incurabile malum est, si, vt & musculus penitus amputatus sit. A combustionem viciū facilius, vel difficilius curatur, prout illa minor vel maior est.

4. Si ab organico ossium vicio motus impedimentum eueniat, idque sit natium, & à primo ortu contractum, malum incurabile est.

5. Si luxatio, vel fractura rectè curetur, etiam impedimentum motus tollitur: si verò incurabilis est, vel inegre curari non potest; & motus impedimentum aliquod remanet. De prognosticis autem luxationum & fracturarum dicitur suo loco.

6. Quæ ab vlceribus diuturnis circa articulos, præcipue coxæ, est immobilitas, plerumque incurabilis est.

7. Eadem ratio est ligamentorum vicij. Si enim illud curabile est, mouendi impotentia corrigi & tolli potest: sin minus, perpetuum morus impedimentum remanet.

### Curatio.

Primò, si ob refrigerationem nimiam manus, vel pedes officium facere non possunt, plerumque, si æger de loco frigido in calidum se conferat, sponte cessat malum. Hoc tamen hic notandum, statim ad ignem & locum valde calidum non accedendum, neque medicamenta calida mox applicanda esse. Hoc enim si fiat, magnus dolor percipitur, & nonnunquam, si magna sit refrigeratio, etiam gangræna inducitur. Imò si magna sit refrigeratio, aqua frigidissima pars primò lauanda, aut niue fricanda est: id quod Norvvegis, Finlandis, & aliis Septentrionalibus populis familiarissimum est. Documentum huius rei præbent, rapa, poma, & oua congelata. Si enim ea in aquam frigidissimam iniiciantur, gelu extrahitur & extra adhæret, & ea incorrupta manent. Si verò in aquam calidam, vel tepidam iniiciantur, corrumpuntur. Postea verò si aliquid intemperiei adhuc remaneat, fouenda calidis medicamentis, vt decocto baccar. lauri, rorismar. saluæ, lauen. dul. & simil. aut lacte dulci, in quo ea cocta sint, aut oleis calidis, de cera, terebinth. de lateribus, & similibus inungenda.

*Curatio motus impotentia à refrigeratione.*

Secundò, si ab exsiccatione musculorum & tendinum sit membrum mouendi impotentia, humectantia & calefacientia, neruosque roborantia adhibenda. Musculus vel tendo ad eum tendens inungendus ol. amygdalar. dulc. violar. chamæmel. lilior. albor. lumbri. cor. hyperici, pinguedine anserinâ, humanâ, præcipue medullâ crurum vituli, terebinth. & similibus. Alij commendant pinguedinem iuniorum catulorum per decoctionem paratam hoc modo: Catulorum, qui 9. dies non excedunt, sumantur numero iij. exenterentur, & decoquantur in aqua communi ad totalem carnis dissolutionem: vbi pinguedo supernabit, refrigeretur; hinc pinguedo colligatur, & visui seruetur. Balnea etiam, & fomenta vsurpentur, ex radic. althææ, liliorum alb. bryoniæ, ieros. mandragoræ, quæ etiam valde emollit, foliis maluæ, violar. althææ, saluæ, chamæpyt. thymi, florib. chamæmel. melilot. semin. lini feni græc. pŷllij. Et si enim quædam ex his discutere, & ita magis exsiccare videntur, tamen humectantibus admistis illud præcaueri potest. Interim vim neruos roborandi habent. Vbi tamen attendendum, an impotentia motus sit ex simplici exsiccatione, an verò etiam ichores in partibus contenti motum naturalem impediant; & cuilibet indicationi conuenientia medicamenta eligenda. Ex his enim quæ proponuntur, non omnia impotentia ab exsiccatione, sed illi, vbi tendines & ligamenta sunt laxa, & humida, conueniunt, quod facile prudens Medicus agnosceret, & discernet.

*Curatio motus impotentia ab exsiccatione.*

Possunt & inſectis ex decocto ebulli, & radic. althææ parari, & singulis quinque diebus renouari.

Vel parentur seq. species pro Balneo:

℞. Rad. ebulli lb. iij. baccar. lauri, iuniperi, ruta sylu. an. M. ij. fl. chamæmeli, hyperici, agrimon. fol. salicis, querc. an. Mj. M. Cataplasmata ex iisdem fiant.

Emplastra parantur ex gummi ammoniac. elemi, bdellio, galbano, opoponace, styrace calamitâ, medull. crurum vituli, radicibus ieros, lilior. albor. & similibus.

Vt ℞. Rad. althææ, bryon. lilior. albor. an. Vnc. j. maluæ, althææ, chamæpyt. fl. chamæmel. melilot. an. Mj. sem. feni græc. lini, an. Vnc. j.

Coq. in decocto pedum & capitis, veruecis pro fomento.

Postea inungatur locus affectus tali Vnguento: ℞. Vnguenti dialth. Vnc. j. axung. human. gallin. anseris,



anseris, medull. crur. vituli. an. Drach. ij. succi lumbric. Drach. s.

M. pro Vnguento. Postea Emplastrum diachylon imponatur.

Post balneum & hoc Vnguento membra affecta mox illini possunt:

℞. Gummi. Ammoniac. opopan. an. Vnc. j. s. bdellij. Drach. vj. Dissoluantur in sp. vini Rhen. add. ol. lumbricor. terrest. Drach. jx. M.

Platerus, lib. i. obseru. p. 138. 139. 140. non sine fructu huius usus est: primo hoc Vnguento:

℞. Ol. lumbric. lilior. albor. an. Vnc. ij. s. cheirin. irin. an. Vnc. s. lithargyr. Vnc. j. Coque parum, & addatur gummi Ammoniac. dissolui in aq. vitæ 3. j. styracis 3. ij. lariceæ Vnc. s. cera q. s. F. Vnguentum.

Euplastrum postea tale apponitur.

℞. Gummi Ammoniac. Vnc. ij. galban. opopanac. bdellij. an. 3. j. Dissoluantur in aq. vitæ, adde styrac. calamit. 3. s. pinguedin. anserin. medull. crurum vituli, an. 3. j. thuris 3. ij. rad. ireos. 3. j. hermodactyl. 3. j. s. lariceæ & resine communis q. s. F. Emplastrum.

Manè remoto emplastro hunc Fotum instituit:

℞. Rad. althææ, bryon. ireos, lilior. recen. incisar. quantum poculum vulgare capit, absinthij, thymi, saluæ, an. M. j. stor. chamam. meliloti, sambuci, an. p. j. sem. lini, fenigrac. an. cochlij. iij. vel iij.

Cocq. in decocto intestin. capitis & pedum vituli, addito pauco vino.

Plura eiusmodi medicamenta videantur lib. 3. de Scorbuto, de Curatione membrorum contractorum & rigidorum.

Manualis quoque opera, ac instrumenta, & machina ad tendines, musculos, & ligamenta adstricta sensim relaxanda, & extendenda non incommode adhibentur. Sed id pro membrorum affectuum ratione variâ variis modis perficitur. Si digitus vnus, vel plures in manu sint extensi, annulus illi indendus, qui alij annulo vicino digito sano adhibito affixus & cõnexus sit. Ita enim cum sanus digitus mouetur & contrahitur, alter simul inflectitur. Si verò membrum, vt genu, brachiũ, digitus, contractum, sit sensim indies, & sæpe membrũ vel manibus, vel pondere appenio, quod in pede fieri potest, vel idoneis instrumentis & machinis extendendum. Instrumenta ad hanc rem idonea videantur apud Guilielmum Fabricium. Centur. i. obseru. 83. & libr. de Combust. cap. 15.

Ad atrophiam illam in cruribus in adolescente, vnde motus impotentia orta erat, adhibuit Forestus singulis diebus manè, interdum & bis de die, frictiones medicetæ manu factas, dum adhuc in lecto decumberet manè æger, per integram horam, incipiendo à coxa vsque ad talos & pedes, & sursum, atque deorsum membrum fricando, vt eo modo apertis poris, & meatibus sanguis ad crura tabida conflueret. Has friciones cũ per dies 12. & plures continuasset, peruenit ad vñctiones, quæ humectarent & moderatè calefacerent. Prius nimirum per dimidiam horam instituit friciones illas siccas cum panno aspero, deinde talem inunctionem adhibuit.

℞. Ol. amygdal. dulc. 3. ij. chamamel. Vnc. j. Misce, quo modo adolescentem pristinæ sanitati restituit.

Terrio. Eodem modo, quo ob exsiccationem tendinum & musculorum motus impotentia curatur, etiam tollitur motus impotentia ex scirrhis, durisque circa articulos tumoribus; modò sint curabiles; vt & à combustione, aut ligamentorum exsiccatione ac duritie ortum habens, videlicet per emollietia antea proposita, & membrorum rigidorum, manuum, vel instrumentorum idoneorum opera in contrariam figuram sensim factâ extensione. Guilielmus Fabricius, loco allegato, in contractionibus à combustione callum nouacula excindit, & partes, quæ præter naturam coaluerunt, separat, ac vulnus debito modo curat.

Dan. Sennerti Tom. II.

Quarto. Mouendi impotentia ex fractura vel luxatione tollitur, curatâ fracturâ, vel luxatione; quod quo modo fieri debeat, dictum in Institutionibus, lib. 5. part. 1. sect. 2. c. 3. & 4. & dicentur de iis suo loco plura.

## CAPVT XXVII.

### De Paralyfi.

Paralyfis, à παραλύειν, id est, resolui, dicitur: quoniam niam nervus & musculus, in quem nervus inferitur ita resolutus, & eneruatur, vt ad motũ προσιρρηκὸν exercendum fiat planè ineptus. Est enim, vt Galenus, 3. de loc. affect. cap. vlt. habet; Paralyfis maxime τῆς κινήσεως ἀπώλεια, Vbi verò sensus solum perit: ea, si propriè loqui libeat, partis est ἀνασθησις. Et si & ea affectio, vbi sensus & motus simul perit, nomine paralyseos comprehendatur. Cognata Paralyfi est νάρκη, νάρκη, hoc est, torpor, vel stupor, quæ affectio et si potissimum sensus hebetudo sit: tamen etiam à Medicis pro affectu ex sentiendi, mouendique difficultate composito accipitur, seu pro diminutâ & imperfectâ Paralyfi. Stuporem seu Torpor sæpe ad veram Paralyfin via est, eiusque futuræ prodromus; & saltem causarum magnitudine hi duo affectus differunt. Particula autem παρὰ hoc locò vim minuendi habet, vt παραλύομενοι media corporis parte, aut vno in membro resoluti dicantur, cum λυόμενοι & κατὰ λυόμενοι qui toto corpore hoc modo affecti sunt, quales apoplectici & morri vicini, de quibus Hippocrates, 2. Aphor. 47. Nominatur & ὁρεπληγία, vel ὁρεπληξία, tanquam vnus medietatis corporis resolutio, inde & ἡμιπληγία, appellatur, ad differentiam apoplexiæ, quæ πᾶσι τοῖς ὁρεπληγία. est & affectus totius. Sic enim Galenus, in 3. Proorrh. Aphor. 26. & 68. scribit, παραπληγία tale πᾶσι τοῖς ὁρεπληγία quoque pro Paralyfi vsurparur. quæ remissior laxatio, aut resolutio est membrorum, mouendi facultate potissimum deficiente. Ab Auicenna & interpretibus vulgò Mollificatio nominatur; non quod reuerà nervi emolliantur & laxentur, sed quod molliores videantur, Propria enim musculi actio est contractio ad originem, quo fibræ nervorum & tendo sit rigidior & durior quasi, vt in fidibus etiam fieri videmus. Cum autem fibræ illæ ab illâ actione cessant, & tendines non contrahuntur, aut non contrahi possunt, videntur esse molliores, et si reuerà molliores non sint, ac nulla essentialis mollities ipsis accadat; sicut & fides, cum remittuntur, reuera non molliores, sed laxiores saltem fiunt.

Cur autem accadat, vt nunc sensus & motus simul, nunc motus saltem, saluo sensu, aut contra, saluo motu, sensus saltem aboleatur, de eo dictum est in Institut. quæ hic repetere opus non est.

### Definitio.

Est videlicet Paralyfis motus in parte vna, vel pluribus abolitio, (nonnunquam & sensus simul aboletur) ob spirituum animalium ad motum spontaneum necessariorum defectum. Cùm enim plures & diuersæ sint causæ, ob quas hæc motus abolitio fieri potest, omnes ad causam vnâ aliquam redigi oportet, quæ est spirituum animalium defectus. Spiritus enim animales ad motum voluntarium, vt & sensum, omnino necessarij sunt, ac sine illis nullus sensus ac motus perfici potest. Vulgò quidem docetur, causam proximam esse denegatum influxum facultatis motricis. Verum, vt alibi sæpius dictum est, propriè loquendo facultates non influunt, sed anima vbicunque est, ibi omnibus suis facultatibus prædita, & instructa est. Exercet autem illas organis idoneis. Ad quorum perfectionem

Curetio motus impotentia ex scirrhis, durisque tumoribus, ac ligamentorum vñctio.

Paralyfis.

Paralyfi cognatus est stupor.

ὁρεπληγία, ὁρεπληξία, ἡμιπληγία.

πάρσις.

Mollificatio.

perfectiorem & spiritus animales influentes requiruntur, qui faciunt, ut facultas insita in actum prorumperere possit.

### Differentia.

Aboleretur autem motus nunc in toto corpore, (quod tamen rarius accidit) seu in omnibus infracaput partibus, citra lésionem actionum principum, (Hæc enim si coniungatur, est apoplexia) cum spinalis medulla tota affecta est nunc alterum latus tantum, seu sinistrum afficitur; dextrâ scilicet, aut sinistrâ saltem parte spinalis medullæ læsa: nunc determinatæ saltem partis motus tollitur, ut manus, pedis, palpebrarum, à quibus etiâ nomen accipit, & Paralysis pedum, manuum, linguæ, palpebrarum, aut alterius partis nominatur.

### Causa.

Causa.

Etsi verò de causâ proximâ nulla sit controuersia: in causarum tamen reliquarum enumeratione non parum discrepant Autores. Quamquam enim è Galeno & Auicenna suas opiniones omnes ferè depromant: alij tamen aliter eas explicant. Galenus quidem, *libr. 1. de Symptom. Caus. cap. 5.* de Paralysis causis hæc habet: *Continens siue proxima, siue quomodocumque alio vocabulo libeat appellare, huius symptomatis causa est talis quispiam in nervo affectus, cuius occasione à principio ad ipsum virtus transmitti prohibetur. Porro prohibetur, siquidem meatum aliquem nervus habet, qualem qui ad oculos descendunt, manifestè habere cernuntur, vel ex obstructione, vel compressione: si autem non habet, ex constipatione, vel frigore, vel compressione.*

Auicenus verò, *cap. proprio*, ita de causis Paralysis docet: *Destructio sensus & motus fit, quoniam spiritus sensibilis, vel motuus, aut retinetur à penetratione ad membra, aut penetrat, sed non suscipitur eius impressio propter complexionis corruptionem.*

Hinc plerique doctiores Medici de causis Paralysis ita sentiunt, quod facultas influens (rectius spiritus influens) vel non transmittitur, ob morbum nervorum eum deferentium, vel non suscipitur, licet influat, meribri recipientis vitio Alij tamen aliter id explicant.

Nos, ut hæc hoc loco breuiter contrahamus, (plura enim postea infra, *quæstione 1.* dicentur) statuimus, cum à nervo musculus omnem vim mouendi accipiat, hincque & suam peculiarem temperiem, & similem constitutionem necessariò habeat, & ut spiritum animale à cerebro in musculos ferat, etiam organicam constitutionem obtineat: à nervorum, siue in partem ipsam, quæ moueri debet, insiti sint, siue longius ab eâ remoti, & ad eam tendant, vitio & morbis omnem Paralysis provenire. Et quidem nervos (sub quibus & spinalem medullam comprehendimus) malè affectos Paralysis causam esse, vel ut sunt partes similes, atque intemperie laborant, aut *ἀρμονία* patiuntur; vel ut instrumenta & canales spiritum animale ferentes, dum angustia præter naturam laborant; vel quum ipsorum unitas soluta est. Etsi enim partis ipsius, quæ moueri debet, vitio spiritus animales non suscipi etiam vulgò dicatur: tamen id omne partibus obvenit, quatenus sunt nervosæ & nervos obtinent; & ob nervos ipsi insitos hoc accidit. Quamvis, ut postea dicetur, ob curationem & medicamentorum applicationem necessarium sit inquirere, an in ipso musculo, seu nervo musculo inserto, an verò in via, seu nervo ad ipsum tendente causa mali sit.

Quod verò nonnulli addunt tertium, nimirum causam posse esse etiam in origine, id supernacaneum videtur. Nam si intelligunt originem spinalis medullæ, aut cuiuscunque nervi, & tum in via à cerebro ad membrum causa hæret. Si autem per originem ipsum cerebrum intelligunt, (sicut nonnulli statuunt, quod in ce-

rebro causa Paralysis esse possit, si illud spiritibus destitueretur) verum equidem est, cerebro affecto motum in toto corpore aboleri posse; verum is affectus non est Paralysis, sed apoplexia, vel aliquis soporosis affectus.

Cum ergo tria ista tantum morborum genera, intemperies & *ἀρμονία*, angustia, & soluta unitas in nervis, siue à cerebro, aut spinali medulla ad membrum aliquod tendentibus, siue alicui musculo insertis, sint causa Paralysis, quæ faciunt, ut musculus spiritibus animalibus destituatur; (quorum defectum proximam & coniunctam Paralysis causam esse diximus) de his ordine dicemus.

Et primò quidem Intemperiem quod atinet, in eo omnes consentiunt, frigidam & humidam intemperiem in nervis causam Paralysis esse; quâ totus nervus resolvitur, & ad spiritum animale suscipiendum, (frigus enim spiritibus inimicum) & motum ineptus redditur. Vnde rectè vulgò frigus nervis inimicum esse statuitur. Et potest hæc intemperies vel sine, vel cum materia esse, siue à causa externa vel interna provenire.

Paralysis à  
intemperie  
frigida &  
humida in  
nerviis.

A causa externa & evidente Paralysis fit ob contrarium diuturnum rei frigida, nimirum aërem ambientem frigidum, ventum borealem, contrectationem nivis vel glaciei, moram in aqua frigida, vel sessionem super lapide frigido; sicut hoc quibusdam accidisse, Galenus, *1. de loc. affect. cap. 6.* docet. Idem etiam, *4. de loc. affect. cap. 4.* refert, quendam hyeme tempore frigido & pluvioso, cum madidum pallium collo diutius obvoluisset, in manus paralytin incidisse, nervis, qui à spinali medulla ad manum deducuntur, nimium humectatis & refrigeratis.

Ab interna verò causa excitatur Paralysis, cum humores pituitosi, frigidi & humidi nervos alicubi irrogant, refrigerant, & humectant, eorumque tonum laxant, & temperiem naturalem destruunt, ut spiritum animale commodè suscipere, eoque frui & uti non possint. Humores autem illi, qui spinalem medullam, seu nervos alterando Paralyticos causa sunt, plerumque à capite descendunt. Cum enim spinalis medulla, & omnium nervorum origo sit à cerebro, si quid vitiosi humoris in capite collectum sit, & à natura à cerebro expellatur, vel sponte defluat, viâ declivi & pronâ in nervos descendit, eosque afficit; & hoc etiam modo (nam an compressione, vel obstructione idem etiam fiat; postea dicetur) post apoplexiam Paralysis sequi solet: cum humor, qui apoplexiam produxerat, è cerebro excussus, & per cavitatem vertebrarum dorsî descendens, & spinalis medullæ ac nervorum ductus sequens nervos irrigat, alterat & humectat, atque ad officium suum, & usum ineptos reddit. Quod tamen & sine apoplexiâ aliis de causis fieri potest.

Quâ autem fiat, ut post apoplexiam alterum tantum latus resolvatur, alterò manente incolumi, inquisitione dignum. Auicennas statuit, spinalem medullam divisi-  
sam esse in duas partes, perinde ac cerebrum, & hinc fieri, ut, licet humor alteram occupet, altera salva manere possit. Leonhardus Iacchinus verò, qui neque in cocta vitulorum arterum medulla, neque in crudâ hoc discrimen inuenire potuit, in *9. Rhasis, cap. de Paralysis* Auicennam reprehendit, quasi, rationibus quibusdam deceptus, falsa statuerit; cum contra mirari naturam potius debuerit, quæ in continuis quoque corporibus alteram partem sine altera possit afficere. Ipse enim miræ naturæ sagacitati hoc tribuit, quæ *πῶς ἂν* se, seu ut non solum per capitis & spinæ nervos, verum & per nervos, musculos, & cutem totius corporis. Verum etsi Iacchinus istam spinalis medullæ in duas partes divisionem inuenire non potuerit: Recentiores tamen Anatomici, Varolius, & alij satis clarè monstrârunt, ut ipsâ cerebrum est duplex, ita & spinalem medullam esse duplicem.

duplicem. Vnde facile est rationem reddere, cur vnum latus lædatur, altero saluo. In quam enim partem natura humorem, apoplexiæ causam, deponit, ea Paralyti afficitur: Hoc tamen non negandum, naturæ hoc esse sagacitatis & prouidentia, vt humorem vitiosum non ad vtrumque latus simul deponat, sed alterum saltem, & ita vno læto alterum integrum conseruet.

Intemperies autem hæc non solum in ipsis musculis, sed & in nervis ad musculos tendentibus esse potest. Capiuaccius equidem, & alij Auicennæ Interpretes statuunt, ab intemperie non in ductibus, sed solum in musculis Paralytin fieri posse. Verum nec experientia, nec ratio id satis confirmat. Galenus, 4. de loc. affect. cap. 4. refert, quendam, cum madidum pallium tempore frigido & pluuioso diu collo obuoluisse, in manus paralytin incidisse, nervis non in manu, sed qui à spinali medulla & collo ad manum deriuantur, refrigeratis. Ac si nervi altera portio ubicunque refrigeretur, & ad officium inepta reddatur, partes omnes, quibus nervi illius ductus reliqui communicantur, seu quæ à ramo isto nervos suos accipiunt, resoluuntur.

Præter intemperiem nervi, quatenus sunt partes similes, etiam à causis occultis, iisque peculiari modo infectis, lædi possunt. Quod facit vis narcotica, cum in medicamentis & venenis narcoticis, tū in humoribus, qui similem naturam induunt. Ab hac causâ procul dubio est Paralytis, quæ à contactu marinæ torpedinis, seu retis, in quo fuerit capta, ortum habet, aut à contractione argenti viui provenit, & aurifabris, atque iis, qui specula parant, vt de Venetianis refert Hercul. Saxonia, familiaris est.

Vinum etiam huc pertinere credibile est, quod quantum nervis incommodi immoderatus sumptum pariat, tremor manuum in potatoribus non raro docet; vnde etiam vulgò nervos ferire dicitur. Quanquam verò Paralytin à vino induci putent alij à siccitate, vt Rondeletius, & quod suo calore, ac tenuitate excrementa ad nervos deducat; alij, vt Eustach. Rudius, quod in nervis acerosum euadat: tamen probabilior putamus Plateri sententiam, qui statuit, vinum peculiari vi narcoticâ sensus ac spiritus torpidos reddere; quam confirmat Fernellius, qui, lib. 5. de part. morb. & symptom. cap. 8. refert, se vidisse aliquando vniuersam corporis cutem ex crapula & vinolentia stupore affectam fuisse. Et narcoticam talem vim habere non raro humorem illum, qui apoplexiæ & Paralytis causa est, credibile est. Quanquam enim frigiditas concurrere potest: tamen si saltem frigiditas Paralytin excitaret, non tam pertinax esset hoc malum, nec tam diu tam efficacia medicamenta calefacientia & siccantia sæpe sine omni, vel cum paruo fructu adhiberentur; quod satis arguit, causam aliam longè potentiorē & efficaciorē: quàm sit sola intemperies frigida & humida, subesse.

Huc pertinet procul dubio Paralytis Scorbutica, atque ab his duabus causis, irrigatione videlicet, & humectatione nervosarum in musculis partium, ac vi narcotica provenit, quæ seu ab ichore & seroso humore, seu à vaporibus malignis, qui à colluie humorum Scorbutica eleuantur, ortum habet; de quâ cum in Institut. & lib. 3. de Scorbuto, cap. 2. plura dixerimus, hinc nihil addimus: vbi etiam, quomodo ex colica fiat Paralytis, monstratum.

Secundò si nervi quatenus partes organicæ considerantur, seu quatenus sunt canales spiritus animales ad musculos ferentes, angustia p.n. in iis spiritibus animalibus transiitum intercludens Paralytis causa esse potest, & in eo omnes Medici consentiunt. Verum quot modis angustia ista in nervo excitari possit, dissentiant.

Vulgò autem tres angustia causa ponuntur: Obstructio, Compressio, & Denlatio.

Dan. Sennert. Tom. II.

Obstructio fit, cum ab humore crasso nervi substantia, seu cavitates ita repletur, vt spiritus animales transire non possint.

Verum obstructionem hanc fieri posse negat Platerus ideo, quod humor crassus in nervorum tam solidorum substantiam, tam subito, vt sæpe apoplexia in Paralytin mutetur, se insinuare non possit. Ipse verò humores istos secundum cavitates spinæ descendentes, & pondere suo incumbentes nervis, ipsos comprimere, & spiritibus animalibus viam interciperi, ac præterea nervorum naturalem temperiem ac tonum labefactare statuit. Veruntamen non impossibile planè videtur, vt humor aliquis in substantia cerebri collectus in ipsam nervorum substantiam sese insinuet: neque opus est, vt humor ille planè crassus sit. Nam quo minus porosi sunt nervi, eo facilius obstrui possunt.

Compressio fit secundum Platerum ab humoribus nervis extra incumbenribus. Deinde accidit à tumore quocunque nervos comprimente, à contusione, à luxatione vel inflexione vitiosa vertebrarum dorsi subito factâ, (nam si sensim fiat, quod fit in gibbosis, sensim quoque cedit medulla, nec contorquetur; vnde nihil mali nervi patiuntur, nec motus aboletur) vel aliorum ossium, à fracturâ ossium, à vinculo injecto, & causâ quacunque comprimente, vt à diuturno in cubitum innixu, capitisque supra cubitum inclinatione, vt & femoris super femur positu. Quod & frigus referri potest nervos adstringens.

Denique Denlatio seu coarctatio, seu stipatio, quæ Galeno est *μύωσις*, accidit, vt Galenus, lib. 1. de caus. sympt. cap. 9. docet, cum nervus crassiorē, quàm propria natura, habitum seu conditionem suscepit. Id verò contingit duplici ratione; vel quia nutritus sit viscidis & crassis succis, vel quia sit coactus à violento frigore.

Terriò causa Paralytis est soluta vnitas, cum nervo dissecto, eroso & rupto, membro, in quod spiritum animalē deferebat, ille denegatur, & hinc sensus, ac motus perit; nisi ab aliis nervis illæsis adhuc spiritum hauriat.

Atque ex his, quæ de triplici morborum genere, quibus dum nervi afficiuntur, Paralytis inducitur, diximus, manifestum euadit, qui humores Paralyticos causa esse possint; de quo Autores dissentiant, vt postea, quæst. 2. dicitur. Nimirum humores omnes, qui nervos, vel secundum vulgarem sententiam obstruunt, vel extra comprimunt, vel alterant, refrigerant, humectant, ac irrigant, ac stupefaciunt, paralytis causa esse possunt; imò & vapores, qui idem præstare queunt: quod in Paralyti Scorbutica fieri videtur, nisi quis ad humorem serosum potius tum recurrere velit. Ideoque etsi humores pituitosi & frigidi ad Paralytin induendam sint valde apti, & hinc destillationes talium humorum à capite, & omnia, quæ crudos ac pituitosos humores in capite generant, ad Paralytin induendam sint apta: tamen humores biliosi & melancholici ac serosi hinc non planè excludendi sunt, vt postea, q. 2. dicitur. Quanquā enim humores biliosi & melancholici siccati vim habeant, & aliis humoribus collati sicci sint: tamen quia humores sunt, humidi sūt, & nervis humidiores, ipsosque proinde humectare & irrigare, ac præterea extra iis incumbentes eos comprimere possunt. Non raro quoque in febribus malignis malignitatem & vim narcoticam inducere solent, atque eo etiam modo Paralytis causa esse possunt. Via autem, per quam influunt humores ad musculos, cerebrum plerumque esse, facile concedimus; vnde affectus cerebri sæpe futuræ Paralytis indicium sunt, & in Paralytin degenerant. Quandoque tamen etiam è venis eo effundi posse, vel crises in morbis monstrant. Narrat enim Galenus, 4. de loc. affect. cap. 4. cuidā, qui à vehementi peripneumoniā cōualecebat, brachij, tã quoad posteriores, quam quoad superiores partes, & cubiti maximā partē, ac summos digitos sensus difficultate la-

borasse, atque motum quoque aliquot digitorum læsum fuisse. P. Ægineta, lib. 3. cap. 18. facit mentionem Paralyseos ex colicâ per iudicatoriam quandam translationem, quæ etiam Scorbuticis familiaris est. Et Fernelius, lib. 5. de part. morb. & sympt. cap. 3. refert, bilem flauam sub finem intermittentium febrium in spinam dorsi, ac in neruorum originem effusam aliquando Paralyfin generasse. In quibus casibus omnibus per venas potius ad spinalem medullam & neruos effundi humores biliosos, quàm à cerebro communicari, probabilius. Aliam tamen adhuc viam monstrat Adrianus Spiegelius, de human. corp. fabric. lib. 6. cap. 4. nimirum per arterias mesentericas; de quibus in Institut. & lib. 3. de Scorbut. cap. 2.

Paret ex iisdem etiam, quæ sint causæ procatacticæ & euidentes, videlicet frigus aëris & aquæ, medicamenta & vinâ narcotica, somnus in loco humido, vel ædibus calce recens obductis, mora sub radiis Lunæ, sibi pituitam suppeditantes, præcipuè crapula & ebrietas, præsertim ex vino, inprimis si jejuno stomacho poterit, & quæcunque caput replent, ac neruis nocent, vt & Venus nimia, calus ab alto, percussio capitis vel ceruicis, contusio & luxatio vertebrarum, vt & aliorum ossium, eorundemque fractura, & similia, quorum hæcenus facta est mentio.

Causa dispositiva.

Ex his etiam, quæ hæcenus de causis Paralyfis tradita sunt, eam senibus & hyeme frequentius accidere posse, & quos morbos sequi soleat, manifestum est. Secundum Auicennam quinque ægritudines sequi solet: apoplexiam, epilepsiam, dolorem colicum, strangulationem vteri, & febres chronicas. Rarius tamen epilepsiam sequitur; tunc scilicet, quando à paroxysmo epilepsiæ materia ad neruorum principium vno impetu detruditur, spirituūque animalium transitum impedit. Quandoque tamen etiam, alios morbos sequi solet, vt de peripneumoniâ dictum. Scorbutus quoque familiaris est.

#### Signa Diagnostica.

Signa diagnostica.

Paralyfis ipsa, & symptomata ex iis, quæ sensibus apparent, facile à vulgo etiam agnoscitur. Etenim pars affecta motu, vel simul etiam sensu destituitur; sæpe numero & atrophia tandem contabescit. Addunt quidam & alia signa, quod nimirum pulsus in parte affecta sit debilis & frequens, quandoque etiam latus sanum ita calidum, ac si esset in igne, & latus resolutum ita frigidum, ac si esset in niue: quod vt quandoque accidere potest, ita proculdubio à peculiari causâ accedit; cum videlicet humores frigidi & crassi sunt in latere affecto, qui faciunt, vt non solum spiritus animales, sed & vitales sese liberè in partem affectam diffundere non possint: vnde latus ægrum frigidum apparet, sanum verò, in quod calor influens totus conuertitur, & liberè effunditur, calidius.

Duo verò signis diligenter inquirenda veniunt: Locus primariò affectus, & causâ, secundum quas curatio maximè variat; neque ipsi parti affectæ semper medicamenta applicanda. Stultè (vt Iacchinus loquitur) faciunt, qui ad resoluta membra operam ponunt, origine naturali ignoratâ; nihilque perficies, nisi affectam prius partem noueris. Notabile est huius rei exemplum apud Galenum, 1. de loc. affect. cap. 5. de quodam Paulania Syro, qui in tribus digitis, seruato motu, sensum amiserat, & triginta jam diebus è medicamentis satis idoneis digitis impositis nihil auxiliij senserat. Hunc enim cum Galenus à vehiculo in dorsum lapsus cognosceret, conjecturam fecit, in primo exortu nerui post septimam vertebram prodeuntis partem, quampiam ab ictu fuisse inflammata, & nunc habere scirrhosam dispositionem; ideoque illud ipsum medicamentum à digitis amotum illi spinæ parti apposuit, vnde digitus læsus cum adstantiū admiratione est restitutus.

Causarum eadem est ratio. Longè enim aliter Pa-

ralyfis, quæ ab intemperie est, curanda venit, ac ea, quæ à compressione, vel luxatione, vel fracturâ, vel simili causâ euidenti.

Locus ergo primariò affectus vt rectè cognoscatur, primò inquirendum, an ægro aliquid ab externis, & euidentibus causis acciderit, an scilicet percussus, contusus, lapsus, vulneratus, aut in parte aliquâ corporis compressus sit; aut an ab aëre, pluuiâ, aquâ, niue refrigeratus. Ex his enim & locus affectus, & causâ innoscitur. Ita Galenus in Paulania illo, de quo modò dictum, qui in itinere ex curru delapsus dorsum ita læserat, vt sensum trium digitorum sinistræ manus amitteret, ex causâ illa euidente locum primariò affectum non manum, sed spinam dorsi esse collegit, 1. de loc. affect. cap. 6. & 3. de loc. cap. ultimo. Vbi plura huius generis exempla reperiuntur.

Si verò nulla externa, vel euidentis causâ præcesserit, obseruandum, in quibus partibus functiones animales laborant, vel amissæ sunt. Multitudinem enim neruorum affectorum ostendit partium affectarum numerus. Ad quam rem inprimis Anatomica cognitio requiritur, vt Galenus, 1. de loc. affect. cap. 6. docet, & notitia, vnde in quamlibet partem nerui deriuntur & implantentur. Si enim simul cum dextra vel sinistra corporis parte eadem quoque faciei pars resoluitur, & impedimentum accadat in sermone; cerebrum secundum illam partem, simulque initium spinalis medullæ secundum illam partem affecta sunt.

Si autem pars faciei dextra, vel sinistra solum resoluitur, reliquo toto corpore saluo manente, spinalis medulla salua est, cerebro saltem secundum illam partem, à qua nerui ad partes eas deriuantur, affecto. Quod si verò omnes partes capitis saluæ sint, sub capite vero partes resolutæ, cerebrum saluum est, vitiumque est in spinali medulla, aut neruo aliquo. Et quidem si omnes totius corporis, vel vnus lateris sub capite partes resoluuntur, initium spinalis medullæ affectum est. Et quidem totum, ac secundum transuersum, si omnes sub capite partes, tam dextræ, quàm sinistræ resolutæ sint. Sin verò in vno saltem latere, vel medietate corporis sub capite, motus ablatus sit, in altera duntaxat spinalis medullæ parte, dextra vel sinistra, causâ mali hæret. Sin autem non omnes vnus lateris partes resolutæ sint, sed multæ saltem, non initium spinalis medullæ affectum est, sed in loco aliquo inferiore causâ mali hæret. Quo loco autem consistat causâ mali, docebit partium resolutarum numerus, & cognitio neruorum è spina in quamcunque partem prodeuntium. Exempl. gr. Si motus brachiorum saluus sit, crura autem resoluta, vtrumque, vel alterum; mali causâ hæret infra lumbos, in vertebris ossis sacri, neruisque inde prodeuntibus. Et quidem si vtrumque femur, crus, & vterque pes resoluitur, spinalis medulla eò loci tota afficitur; sin verò vnum crus saltem resoluitur, vna saltem pars spinalis medullæ, dextra vel sinistra, læsa est.

Si verò non totum corpus, non multæ partes, sed aliquæ, vel vna saltem resoluta sit: neque in cerebro, neque in spinali medulla, sed extra eam, in nerui alicuius, vel neruorum propagine causâ hæret. Ideoque ex Anatomicis tum inquirendum, vel in mentem reuocandum, vnde musculus, cuius motus cessat, neruos suos accipiat. Exemplis aliquot rem illustrabimus: Si (circa musculorum affectum) caput circumagi nequeat, vel buccæ non moueantur, vel si ceruicem in latera mouere nequeat æger, aut potius si hæ omnes partes laborent; tunc nerui posteriores ex propagine primæ, secundæ tertiz, quartæ, quintæ, aut sextæ vertebræ ceruicis affecti sunt. Vbi ceruicem quis flectere nequit, anteriores nerui distarum propaginum sunt læsi.

Si brachiū stupeat & resoluitur, reliquo corpore sano, & illæso, si solum brachium attollere nequeat æger, aut



aut cutis externa summi brachij stupeat, primus brachij nervus afficitur. Si cubiti motus impeditus sit, consideranda est ejus flexio. Si enim sola cubiti flexio extrorsum sit impedita, cum stupore cutis internæ, cubiti alio motu omni saluo, secundus brachij nervus laborat. Quando autem æger cubitum introrsum flectere, non potest, & anterior cutis brachij itupet, aut musculi in cubito siti stupent, aut flectere digitum aut carpum non potest cum stupore cutis, tertius nervus lætus est totus: vel si flectat adhuc cubitum, circa articulum cubiti affectus est. Sin verò stupeat, aut non moveatur digitus annularis aut parvus, quintus nervus patitur. Si extendere cubitum, carpum, vel digitos nequeat, vel si musculi stupeant, quartus nervus affectus est. Partem ejus affectam ita cognoscet. Si enim extensio cubiti sit integra, paulò supra articulum cubiti patitur. Sed si externa cutis, cubitusque ad brachiale sensum amiserit, intra articulum illum afficitur. Ita & in aliis partibus affectis exortus & propaggines nervorum, qui spiritum animale iis deferunt, inquirantur.

Præterea à juvantibus & nocentibus sedes mali, & locus primariò affectus cognoscitur. Nam si noxa supra partem Paralyticam consistat, & medicamenta ipsi affectæ adhibeantur, nihil juvabunt. Conferent autem, si fonti mali applicentur; id quod in Pausania Syro, de quo antea, accidit, 1. de loc. affect. cap. 6.

Cæterum de partibus in facie observandum, quod resoluta in aduersam sanam contorqueri soleat; quia musculus sanæ partis ab actione suâ, id est, tensione siue tractione non cessat, atque ita pars resoluta tractum aduersæ siue oppositæ sanæ partis sequitur, quæ & brevior propterea redditur.

Diligenter tamen tunc discernendum est, utrum pars affecta & contorta labore paralyti, an conuulsione. Nam si, exempli gr. distortio oris existat à paralyti, pars resoluta longior facta in sanam trahitur, ut diximus. Contrarium accidit, si fiat à conuulsione, ubi ægra decurrata sanam attrahit. Deinde in Paralyti pars affecta facile extendi potest; quod in conuulsâ fieri nequit, quæ rigida manet. Præterea conuulsio cum dolore aliquo est conjuncta, non paralyti, in qua plerumque sensus simul perit. Postremo in Paralyti faciei palpebra oculorum inferior demissa est, ægerque deorulum aspicit, cujus contrarium observatur in conuulsione.

Signa causarum.

Cognitâ jam sede locoque affecto *id est, de causâ* malique causa inquirenda. Et primò quærendum de causis externis & euidentibus, ut de refrigeratione ab aëre, aqua, niue, medicamentis foris impositis frigidis, de contrectatione marinæ torpedinis, de opiætorum & narcoticorum usu, de compressione à corpore duro, tumore, casu, ictu, vinculis, luxatione ossium, fracturâ eorundem, & similibus.

Si horum nihil præcesserit, sed apoplexiâ æger laborauerit, facile & hoc ex ægri & adstantium relatione cognoscetur. Si nec hæc præcesserit, à corporis constitutione ex humorum abundantia insigni, ac morbis, quæ præcesserunt, vel adsunt, ex ætate, regione, anni tempore, victus ratione, humor peccans & morbi causa cognoscetur. Consuli etiam possunt iuvantia & lædencia.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Omnis Paralyti foris à causa interna difficulter curatur; cum humores, qui nervos occupant, non sine maximo labore & negotio amoveri possint: inprimis cum in medicamentorum necessariorum usu, ac recta diæta rarò persistant. Et primò quidem solent, qui per omnia membra resoluti sunt, celeriter rapi; ac, si correcti non sint, diutius quidem viuunt, sed rarò tamen ad sanitatem perueniunt, & plerique spiritum miserum trahunt, memoriâ quoque amisâ. In partibus verò nunquam acutus, sæpe longus, ferè sanabilis mor-

bus est. Celsus, lib. 3. cap. 28. Verùm hic norandum, primò, procul dubio prioribus verbis de apoplexia Celium loqui. Sua enim tempora secutus, utrumque affectum, & apoplexiam, & Paralytin propriè dictam, paralytin nominat. Deinde non simpliciter verum esse, paralytin semper esse longum morbum, etiam eam, quæ in partibus saltem est; id quod Paralyti Scorbutica testatur, quæ sæpe breui temporis spatio finitur, ut lib. 3. de Scorbuto, parti. 5. cap. 4. sect. 2. dicemus. Experientia idem docuit Petrum Salium Dixerunt, qui propterea, in notis in Alimmarum, cap. 14. statuit, Paralytin non semper ab humore frigido & viscido provenire, verùm & à vaporosa materia, quæ ad principium nervorum transmissa, obstructionem in iis inducens, ac spiritus animalis viam intercipientem, sensum & motum inferiorum partium inhibeat. Exemplumque affert cuiusdam consoris, qui post crapulam nocte mediâ cum timore suffocationis expergefactus incidit subito in paralytin omnium corporis partium infra faciem existentium, sensuque & motu adeo priuatus est, ut nec acu profundè perforatus, nec gladiolo scarificatus, quicquam sentiret, nullamque partem, nisi caput, mouere posset; qui solutâ crapulâ, ac frictionibus tantummodò, ac inunctionibus quibusdam resoluventibus ad spinam intra tertium diem omnino sanatus est. Ideoque ea paralyti sola longa est, quæ ab humore crasso provenit.

2. Et præcipuè paralyti, quæ ex soluta apoplexia provenit, difficilis curationis est, & periculosa, ob causæ vehementiam, ob confirmatam partium imbecillitatem, & ob metum recidivæ. Nam Paralyti apoplexiam excipiens, sæpe in eandem recidit, vel materiâ, quæ ad cerebrum & spinalem medullam defluxit, ad cerebrum iterum recurrente, ut nonnullis placet; vel, quod verosimilius est, facto vndique majori concursu similis materiæ ad cerebrum, vel ejusdem in cerebro cumulatione, ubi retenta hominem denuo apoplecticum reddit.

3. Minus periculosa est Paralyti, si solum motus aut sensus lædatur; magis, si uterque: pejor rursus, in quâ plures nervi & musculi sunt affecti. Hinc majus periculum minatur Paralyti, si medulla spinalis sit affecta, quàm si partis alicuius saltem nervus sit affectus. Et eò periculosiores etiam spinæ affectus, quod cerebro sunt propiores.

4. Paralyti ex nervi grandioris aut spinalis medullæ incisione transuersim factâ non curatur; quia incisio hæc non coalescit. Hippocrates, 6. aphor. 39.

5. Paralyti ex luxatione valida & subita vertebrarum, præsertim cervicis, (cum à vertebra cervicis nervi è medio inter vertebram superiorem & inferiorem exeant; in lumborum non item, sed è vertebra superiore exeant) plerumque lethalis est, teste Avicenna; propterea, quod nervi insigniter contunduntur & atteruntur, & ipsa spinalis medulla contunditur & læditur, ac propter sequentem inflammationem vertebræ facile ad pristinam sedem reduci nequeunt. Si in Paralyti ex ictu, contusione, casu nervi vehementer contunduntur; non curatur. Signum verò est nervos vehementer contusos esse, si illico post ictum Paralyti oriatur. Aliàs si non illico, non tam ob attritionem nervi Paralyti existit; quàm ob inflammationem, quæ ictui succedit.

6. Tremor Paralyti superveniens, bonum; quoniam meatus nervorum aliquo modo aperiri significat, per quos aliquid spiritus animalis ad aliqualem motum sufficiens transire potest.

7. Si membrum resolutum fuerit actu calidum, de sanitatis recuperatione spes est.

8. Si membrum Paralyticum extenuetur, ejusque color vegetus mutetur; aut non curatur morbus, aut difficulter: quia non solum spiritus animalis defectum, sed & calorem naturalem propemodum extinctum ar-

guir; præsertim si resoluti lateris oculus imminuatur: id quod spirituum defectum indicat.

9. Cruribus & pedibus resolutis facilius est curatio, ob sicciorum & robustiorum eorum nervorum naturam.

10. In senibus difficulter curatur Paralyfis, ob caloris nativi imbecillitatem; ut & hyeme. Plus autem sperare licet tempore æstivo & verno, si æger rectè regatur.

11. In omnibus nervosi generis affectibus, qui à pituitosis & frigidis humoribus fiunt, ut sunt apoplexia, & paraplegia, febris valida superueniens non parum adjumenti affert, teste Galeno, 2. *Prorrhæ. aphor.* 50. Morbi enim causam febris illa absumit, nervosque calefacit, & exsiccatur.

12. Rhases, 1. *contin.* se multos resolutos ex diarrhœa superueniente curatos vidisse scribit: quod Marcell. Donatus, in *histor. medic. mir. lib.* 2. *cap.* 5. non de valida & antiqua, sed de debili & recenti Paralyfi accipiendum censet. Potest idem & de Paralyfi scorbutica verum esse, quæ ex humore seroso & mobili provenit.

13. Paralyfis raro degenerat in alios morbos, ipsa verò alios morbos sequitur, apoplexiam, epilepsiam, colicam, febres chronicas, suffocationem vteri, ut supra dictum.

### Indicationes.

#### Indicationes.

Cum proxima Paralyfis causa sit spiritus animalis in parte resoluta defectus; ut is parti restituatur, requiritur. Verum ista indicatio inutilis est; cum non detur materia remedij, quæ huic proximè & immediatè possit satisfacere. Ergo à causis, à quibus continens ista dependet, indicatio utilis petenda. Sunt autem illæ, ut dictum, intemperies frigida & humida, vis narcotica, angustia, quæ rursus à plurimis causis, ut dictum, proveniunt; & soluta unitas. Etsi verò de modo, quo causæ nonnullæ paralyfin efficiunt, autores non conveniant, ut supra, de causis, dictum, & postea, in *questionibus*, dicitur; tamen in curatione vix aliqua est discrepantia. Humor enim pituitosus, siue alterando & refrigerando, ac humectando, siue obstruendo, siue comprimendo Paralyfin efficiat, curationem eandem requirit, humorque pituitosus, quocunque etiam modo Paralyfin efficiat, è nervis tollendus est.

Curatio ergo tribus capitibus comprehendere potest, agendumque primò de curatione Paralyfis ex humore pituitoso & frigido; secundò de curatione Paralyfis ex humore tenui & seroso; tertio de curatione Paralyfis à causis evidentibus. Quamquam verò etiam vim narcoticam inter causas Paralyfis supra recensuimus; tamen eadem medicamenta, quæ ad humorem pituitosum adhibentur, videlicet medicamenta nervis amica, narcoticam quoque vim infringere possunt.

In curatione tamen semper ad locum affectum, in quo causa mali hæret, respiciendum, & ei medicamenta applicanda. Si enim omnes infra caput partes resolutæ sint, ad spinæ initium in cavitatem cervicis topica applicanda; simul tamen cerebrum non negligendum. Si verò seu plures, seu pauciores partes læsæ sint, semper ad eam partem medicamenta applicanda, in qua causa mali hæret. Et si origo nervi affecta sit, eò loci medicamenta applicanda. Si verò non in principio, sed in parte quadam solum progressus nervus affectus sit, eò loci medicamenta adhibenda.

### Curatio Paralyfis è pituitâ ortum habentis.

#### Curatio Paralyfis pituitosa.

Paralyfis, quæ ab humore pituitoso, vel spinale medullam, vel nervum occupante, & quocunque etiâ modo spiritus animalis influxum prohibente, partisque temperiem corrumpente, ortum habet, curatur, si hu-

mor pituitosus è loco illo tollatur. Quod fit, si vel in alium locum trahatur, vel è corpore evacuetur, vel discutatur & absumatur; ac præcaueatur, ne novi humores, qui paralyfis causam augere & movere possunt, cumulentur, & ad partem affectam affluant, tandemque intemperies introducta corrigatur, nervique roborentur.

Ut autem ista ordine fiant, ab universi corporis evacuatione incipiendum. Deinde cum à capite ad nervos materia effluere soleat, illud evacuandum & roborandum. Et tertio parti affectæ succurrendum. Etsi verò, quanam ratione hæc fieri, & in actum deduci possint, & præcipue quomodo capiti succurrendum sit, supra, *part.* 1. *cap.* 2. 3. & 10. satis dictum: tamen quædam hic adhuc addere libet. Ea verò, quæ ad nervos propriè spectant, iubiicere necessarium est.

Universalem ergo corporis evacuationem quod attinet, in hac Paralyfi specie vix venæ sectione opus est; cum sanguis non peccet, sed pituita, & plerumque in senibus pituitosis, ac naturâ frigidis hoc malum accidat. Si tamen crudi sanguinis copia humorem pituitosum producat & foueat, venam in brachio partis sanæ aperire licet. Parcè tamen sanguis evacuandus, ne languidus calor extinguatur.

Universi potius corporis purgatio ad humorem pituitosum dirigenda. Itaque secundum commune præceptum aliis & primæ viæ primò expurgandæ, ne attenuantium & præparantium, quæ necessaria sunt vitiis humorum crudi in ventriculo & primis viis hærentes maiori copiâ ad penitiora corporis & nervos deducantur.

Clyster ergo talis iniiciatur:

℞. *Mercurialis, betæ, salvia, hyssopi, origani, betonica, an. M. j. fl. chamamelis, summit. centaur. minor. an. M. ss. sem. ruta, feniculi. an. Dra. j. ss. agaric. alb. ʒ. ii. Coqu. in aqua.*

Colaturæ ℞. ℥. i. In qua dissolvantur *electuar. hier. cum agaric. benedict. laxat. an. Dra. vi. ol. chamamel. li. lior. alb. ruta, mell. ros. col. an. Vnc. j. salis Dra. ss. F. Clyster.*

Vel ℞. *Rad. bryon. Dra. vi. fol. salvia, ina arithet. centaur. min. mercurial. an. M. j. fl. primul. ver. origani Crei. ruta, an. p. sem. stæchad. Arab. p. j. sem. siler. mont. Dra. j. sem. caribami in per. lig. Vnc. sem. colocynth. in p. l. Dra. i. F. Decoctio in f. q. aquæ.*

Colaturæ ℞. ℥. j. In qua dissolue *elect. diaphanic. Vnc. sem. hiera diacolocynth. ʒ. iii. ol. castorei, ruta, an. ʒ. i. sal. gemm. Scrup. i. M. pro Enemate.*

Vel alia purgantia mitiora in eundem finem vsurpanda, ut pilulæ assaireth & alexphangin.

Ut ℞. *Pilul. assaireth. Dra. j. ss. alexphangin. agar. troch. an. Dra. j. mastich. Scrup. i. Cum Syrup. stæchad. simpl. vel oxymel. scillit.*

F. Pilulæ mediocres, quarum æger Dra. j. capiat per vices.

Inter mitiora ista & lenientia in hac Paralyfi specie cassia locum non habet; cum nimium humectet: species hieræ magis conveniunt. Utile est hic in Paralyfi & terebinthina, quæ cum aliis electuariis & pulveribus purgantibus convenientibus in formam Boli formari, & Dra. i. vel Dra. ii. pondere exhiberi potest.

In forma liquida exhibendi terebinthinam modum ex Lemnio, *Institut. lib. 5. part. 1. sect. i. c. 11. proposuimus.*

Si ventriculus pituita repletus sit, commo- vomitoria dum etiam est, vomitum ciere in iis, qui ad eum apti sunt.

Vomitum ergo tale parari potest:

℞. *Raphani in taleolas incisi Vnc. j. ss. sem. raphani atriplicis, rad. asari, an. Dra. ii. agar. Dra. i. flor. genist. p. i. Coqu. in hydromel.*

Colat. ℞. Vnc. iii. v. vel vi. oxymel. simpl. Vnc. ss.

In fortioribus succi nicotian. depurati ʒ. ss. addi potest.

Chymicis sua sunt vomitoria è floribus ʒ. niii. croco metall.

metall. vitriol. albo ☉le vitrioli, Mercurio, de quibus alibi.

Postea ad præparationem & euacuationem humoris pituitosi accedendum, & vtraque aliquoties repetenda. Si ramen statim in principio vocetur Medicus, non incommodum est, imò necessarium videtur; vt Medicus statim ad fortiora purgantia, qualia postea propinentur, accedat, dum materia adhuc in motu est, antequam nervis sese penitus insinuet, iisque impingatur. Vbi verò malum iam confirmatum est, & materia nervis impacta, prius attenuanda & præparanda, postea euacuanda est.

Pituitam hinc præparantia omnia sint calida, sicca, attenuantia, simulque cerebro & nervis amica, qualia supra, parte 1. cap. 2. & 10. recensuimus, quæ hinc omnia repetere opus non est. Pauca saltem composita addemus.

Vt ℞. Syr. stachad. de betonica, de hyssopo, mellis anthesat. an. Vnc. i. aq. lavendul. salvia, rosmarini, hyssopi, an. Vnc. ii. cinamomi Drach. ii. F. Potio pro tribus dosibus, cui aliquid oxymel. simpl. vel scillit. addi potest.

Est enim acetum sit nervis inimicum; tamen, vt Hercul. Saxonia hac de re loquitur, nervis inimicum non est cum melle, & inimicum est nervis exiccatis, non pituita repletis. Veruntamen, quia etiam ipsum oxymel. nervos, si sitacrius, vel eius vis nimis vellat, acidorum vsus omnino parcius sit.

Vel ℞. Aq. betonic. primula veris, an. Vnc. iii. salvia, Vnc. ii. hyssop. Vnc. i. syr. de hyssop. Vnc. i. B. de beton. Vnc. i. essentia castorei Scrup. B. aq. cinamomi Drach. ii. M. pro 4. dosibus, quarum vna mane & vesperi propinetur.

Vel Fiat hoc Decoctum:

℞. Rad. ireos, helenij, acori veri, ab. Vnc. B. salvia, beton. hyssop. rosmar. an. M. i. flor. stachad. Arab. M. B. sem. anisi, feniculi. an. Drach. ii. Coqu. in aqua pura lb. iii. ad remanentiam lb. ij.

Colatura dulcoretur sacchari vel mell. rosat. aut anthesat. lb. B. & aromatizetur pulv. cinamomi Dra. i. Zinzib. alb. nucis moschatae, an. Dra. B. cubebæ. Scr. i. atque per manicam Hippocr. traiciantur.

Valde etiam commendatur Syrupus de iua arthetica, qui hoc modo conficitur:

℞. Iua M. ii. salvia, maioran. rosmar. poly. origani, calaminth. mentastri, pulegij, hyssopi, thymi, ruia sylvestr. & domestic. betonic. serpill. an. M. i. rad. acori veri, aristoloch. pencedani, valerian. bryon. gentian. dictamni, an. Vnc. B. fenic. petroselin. apij, asparag. rusci, an. Vnc. i. stachad. Arab. sem. anisi, feniculi. ligustic. ameos, carui, siler. montan. an. Z. iii. rad. pyrethri Vnc. B. passul. Vnc. ij.

Bulliant omnia in iusta quantitate aquæ ad consumptionem quartæ partis.

Inde colentur, & cum mell. f. q. s. a. ℞ Syrupus, qui aromatizetur pulvere nucis moschatae, cinamomi, & cubebæ. cuius Zi. vel Zi. B. cum aqua idonea sæpe exhibeatur.

℞. Mell. rosat. col. Z. viii. extr. calami arom. Zi. B. M. pro Syrup. de quo manè & vesperi per aliquot dies cochlearia ij. propinentur.

Inprimis hic utilis est primula veris, quæ ob magnam in Paralyfi curanda vim herba Paralyfis vulgò appellatur.

Utilis est & mulsæ, in qua castorei aliquid dissolutum sit.

Paulus Aegineta, lib. 3. cap. 18. & Aëtius, serap. 2. serm. 2. cap. 28. Sagapeni, opoponac. asæ foetidae exiguam portionem cum mulsâ manè singulis diebus exhibent.

Et quia morbus est diuturnus, ac medicamenta sæpius iterata facile nauseam ac fastidium pariunt, commodum est, potui talia miscere. In hunc ergo vsus fieri potest hydromel. seu melicratum; cuius generis

est, quod Quercetanus à Friderico, Electore Palatino, communicatum, Pharmacop. dogm. restit. lib. 1. cap. 1. B. describit:

Vel ℞. Mell. opt. lb. B. aqu. fontan. lb. vi. Despumetur.

Postea adde salvia, puleg. betonic. hyssopi, an. M. i. vel M. B.

Coquantur tam diu, donec herbarum vires melicratum attraxerit.

Colatura calida aromatizetur cinamomi, cortic. citri an. Drach. i. B. triump. piperum. an. Scrup. B. granor. paradisi, cardamomi, galang. an. Scrup. i. nuc. moschat. Scrup. B. F. Potus clarus.

Vel ℞. Aq. lb. xx. mell. lb. i. B. rad. acori veri, salvia, rosmarini, an. M. i. rad. ireos Vnc. B.

Coquantur ad consumptionem tertie partis, addendo sub finem cinamomi, nucis moschatae, an. Dra. ii. piperis Dra. B. F. Melicratum.

Loco mellis & saccharum vsurpari potest.

Vel paretur seq. Hydromel digerens:

℞. Aq. communis lb. ii. mellis opt. Vnc. iij.

Decoq. lento igne, donec non amplius spument. Decocto adde. fol. salvia, organ. an. p. i. puleg. serpill. an. p. B. rad. ireos concisa Zi. sem. anisi, oriand. an. Z. B. mact. cinamomi, an. Scr. j.

Bulliant ad consumptionem quartæ partis. Colentur, & in 4. doses diuidantur.

Hydromelitis aromatici descriptio etiam existat apud Langium, lib. 3. epistolar. medic. Epist. 1. cap. 5. De quibus omnibus & cum cibo, & extra cibum sæpe aliquid bibi potest.

Est autem vinum, imprimis potens, non convenit Paralyticis: tamen in assuetis id loco vehiculi ad medicamenta ad nervos interius deferenda utile est. Ideo in vino salvia, rosmarinus, hyssopus, betonica, herba Paralyf. chamæpit. & huius generis alia macerari possunt. Commodius verò est, si cum musto hæ plantæ deferueant.

### Purgantia.

Præparatâ iam per aliquot dies materiâ aliquid purgantium admiscere licet, agaricum, mechoacan. fol. lenæ. Vt:

℞. Rad. fenic. pæon. an. Vnc. B. ireos, calami arom. an. Drach. ii. sem. fenicul. Dra. i. B. baccar. iuniperi, cubebæ. an. Z. ii. fol. heipnic. herb. paralyf. salvia, chamæpit. rosmar. flor. stachad. Arabic. an. p. i. fol. sen. elect. Z. i. B. agar. alb. Z. B. mechoacan. Dra. ii. Zingib. Z. i. B. cinamomi, mastich. nuc. mosch. an. Drach. i. Infundantur in f. q. hydromel.

Colat ℞. Vnc. x. syrup. stachad. simpl. Vnc. ii. de hyssopo Vnc. i.

Dentur manè tribus diebus.

Ve ℞. Flor. calend. exicc. Z. iii. aq. fl. primul. ver. vini albi generos. an. lb. ij.

Indantur vasi vitreo bene munito, ac macerentur. hor. xxiv. in B. tepido, postea exprimantur prælo: hinc.

℞. flor. primul. ver. sic. Vnc. ii. ac macerentur denuo hor. xxiv. in supradicta prima colatura in B. tepido; exprimantur secundâ vice fortiter. Ac in hac express. infundantur tertîâ vice flor. anthos Vnc. i. per horas xxi. in B. tepido, ac exprimantur prælo.

Tandem ℞. fol. sen. Vnc. iii. turbit. alb. & gumm. hermodactyl. mund. an. Vnc. i. B. cort. lign. sanct. Vnc. i. cinamomi Vnc. B. caryophyl. arom. sem. anisi, an. Dra. ij.

Præparatis rite omnibus affundatur spir. vitriol. rectif. Drach. ii. ac affundatur præscripta colatura, indatur phialæ vitreæ capaci; ac maceretur iterum in B. tepido hor. xxiv. Tandem ignis subministratur, vt omnia ebullire incipiant; postea exempta exprimantur prælo, add. sacch. alb. f. lb. i. Despumetur album. qui, ac coqu. ad Syr. consistentiam, seruetur vsui.

His

His peractis quiescendum per aliquot dies, ægërque interea conuenienti diæta regendus. Hinc fortiora purgantia vsurpentur, turbit, colocynthis, pilulæ de agarico, cochiaz, sceridæ, de hermodactyl, de sagapeno, de opoponace, elect. Indum. benedicta laxat. hiera cum agaric. hiera Logadij hiera Pacchij, atque inter ea mitiora primùm vsurpanda.

*Pilula de Iua  
antispasmodica.*

Mirum in modum commendantur pilulæ de Iua, quarum singulis diebus hora vna post cœnam (ego mallem manè eas exhibere) Scr. i. sumat æger.

Parantur tamen hoc modo:

℞. Iua, herb. paralyf. betonica. flor. stachad. Arab. (al. addunt fl. anthos) an. Dra. i. ficcata in vmbra in puluerem redigantur, quibus adde turbit. elect. ʒ. i. B. agaric. alb. Dra. ii. colocynth ʒ. B. zingib. sal. gemm. an. gr. x. rhubarb. optim. Dra. i. B. spica. Indic. gr. viii. spec. hiera simpl. Gal. ʒ. B. diagryd. Dra. i.

Omnia puluerifata cum succo Iuæ recenti in massam pilularum redigantur.

Vel ℞. Pilul. scerid. Mesue, aut, quæ fortiores sunt, Rhasis, Scrup. ii. de opoponace Scrup. i. castor. gr. v. Cum syrup. de betonic. vel hyssop. F. Pilul. xxi. quæ repetantur quoties opus est.

Vel ℞. Agar. trochisc. Dra. ii. turbit. Drach. i. sal. gemma, zingib. an. Scrup. i. castor. Scr. B. hier. diacolocynth. ʒ. i. F. Mistura, cuius dosis Dra. i.

Vel ℞. Pilular. scerid. Scrup. ii. B. agar. troch. Scrup. i. troch. Albantal. gr. ii. castor. gr. iiii. Cum mell. scillit. F. Pilulæ.

Nonnulli pilulas, & quidem maiori formâ, ne vis medicamenti cito dissoluatur, sub tempus somni exhibent. Verùm si forte tale medicamentum sit, cibum corrumpet; si lenè, nihil præstabit. Ideoque commodissimum fuerit, tales pilulas post mediam noctem exhibere.

Quibus pilulæ non arident, Potiones exhibeantur.

Vt ℞. Betonica, rorisinar. chamapit. an. p. i. sem. carthami contusi, fol. sena elect. an. Dra. iiii. hermodact. Dra. i. sem. anisi Scrup. iiii. F. Decoctio in hydromelite. In colatura infundantur Agarici trochisc. Dra. i. B. turbit. Drac. B. Zingib. Scrup. ii. cinamomi Scrup. i. Colaturæ Vnc. iiii. adde mell. rosat. solut. Vnc. B. M.

Vel fiat Syrupus talis:

℞. Rad. acori veri Vnc. i. pæon. helenij, imperator. an. Vnc. B. chamapit. M. ii. salua, beton. hyssop. primula veris, an. M. i. flor. lauendula Dra. B. sem. anisi, feniculi. an. ʒ. ii. bacchar. lauri, iuniperi, an. Drach. iiii. Coqu. in l. q. aq. puræ.

In colatura infundantur fol. sen. elect. Vnc. iiii. agaric. albi Vnc. i. turbit. Vnc. B. mechoacan. Dra. iiii.

Iterum ebulliant & colentur.

Colatura cum l. q. sacchari coquatur ad Syrupi consistentiam, & aromatizetur cinamomi, zingib. galang. an. Dra. ii. De quo dentur ʒ. ii. vel iij.

Hoc modo si diebus aliquot purgantia & præparantia exhibita fuerint, quies à medicamentis per dies aliquot concedenda, & postea eadem medicamenta secundâ, tertiâ, aut pluribus vicibus repetenda, ac semper à mitioribus ad fortiora progrediendum. Tempore quietis tamen reuulsiones per clysteres, frictions, & cucurbitulas institui possunt.

Roborantia quoque nonnulla capiti & nervis vtilia vsurpanda, ægërque bonâ diætâ regendus.

Vt ℞. Conser. primula veris Dra. iiii. Mithridat. Dra. i. Misc.

Vel cum saccharo F. Bolus, qui post purgationem seqq. diè manè, horis 4. vel 5. ante prandium, sumatur.

Vel ℞. Theriac. Scrup. ii. aur. Alex. Scrup. i. conf. fl. lauend. Drach. ii. essentia castor. gr. v. sal. chamapit. gr. vii. essentia salua Scrup. B. Cum sacch. q. i. F. Bolus post cœnam deglutiendus.

Vel ℞. Mithridat. Dra. B. conf. anacard. Scrup. B. conf.

fl. salu. Drac. ii. spir. primul. ver. gutt. v. ol. destill. salu. gut. ii. exir. castor. gr. iiii. Cum saccharo F. Bolus.

Purgatione vniuersali peractâ, si caput & cerebrum sint primariò affecta, materiamque suppedient, vel pars materiæ ibi hæreat, particulares eius euacuationes instituantur, per errhina, apophlegmatilinos, gargarismos, de quibus supra, parti. i. cap. 10. dictum.

Habent & suum hîc locum pratrica, vt & masticatoria. Præparari etiam possunt tales hypoglottides, quæ manè ieiuno ventriculo, vt & horis pomeridianis, in ore detineantur.

℞. Pulv. nuc. mosch. ʒ. i. B. sem. nasturt. pæon. an. Scr. ii. rad. pyrethri Scr. i. castorei Dra. B. moschi. gr. ii. Cum succo salua F. Trochisci lupinis similes.

Vel ℞. Rad. acori veri Drach. i. pyrethri. Scr. ii. zingiber. pæonia, caryophyll. nuc. moschat. an. Dra. B. cubebæ. Scr. i. Cum infus. gum. tragac. in aq. lauend. & salu. facta addita sacchari q. i. F. Trochisci quantitate lupinorum, quorum vnus, præsertim tempore decubitus, in ore teneatur.

Apophlegmatismus talis parari potest:

℞. Rad. pyrethri. Drach. ʒ. calami arom. Drac. i. ireos Dra. B. granor. iuniperi Drach. i. fol. salu. maioran. an. P. i. rorisinar. meliss. an. P. B. cubebæ. Dra. B. F. Decoctio in l. q. aquæ puræ ad tertias.

Colat. ℞. Vnc. vii. in quibus dissolu. essentia salu. ʒ. ii. syr. de stachad. Vnc. i. B.

Misce pro Apophlegmatismo, de quo calefacto cochlear vnum atque alterum per horæ quadrantem in ore detineatur.

Si caput ab affectu liberum sit, euacuationibus hisce præmissis, corroborantia nervos vsurpentur, de quibus postea.

Si iteratâ aliquoties materiæ præparatione & euacuatione, morbus tamen contumaciter persistat, sudores prouocandi decocto ligni Guaiaci, tartæ parill. Chinæ, vel ligni lassâfræ, scortum singulorum vno sumpto, vel pluribus admistis. Et sub finem decoctionis addantur, si libet, fol. primul. veteris, salua, rorisinarini, cinamomum, nux. moschata. De quo decocto manè bibat æger Vnc. vi. vel vii. & in lecto horâ vnâ atque alterâ fudet. Decocto dilutiore secundo potus loco in mensâ uti poterit. Atque istiusmodi medicamenti genus aliquot septimanis continuandum.

℞. Ligni Guaiaci Vnc. viii. cortic. eiusdem, rad. helen. pæon. iridis, cortic. citri siccorum, an. Vnc. i. aq. puræ lb. x.

Infunde hor. xxiii. in loco calido, postea coquantur.

Colatura dulcoretur saccharo, & condiatur spec. diagalang. vel diacynamomi Dra. i. Capiat æger manè, & post meridiem Vnc. vi. ac manè fudet.

Loco decocti interdum destillatum parari potest. Exempli loco sit sequens liquor antiparalyticus:

℞. Limat. ligni Guaiaci Vnc. iiii. cori. ligni eiusd. ʒ. i. rad. farseparrill. Vnc. i. B. China Vnc. i. lign. sassafr. Dra. vi. aloei, galanga, an. Dra. i. B. rad. scorzonæ, polypod. hermodactyl. pæon. fenic. an. ʒ. i. B. sem. pæon. ʒ. ii. F. Infusio 24. hor. in loco calido in aq. communis, vini Rhen. ap. l. q. Post in vesica destillentur.

Destillarum funde super fol. betonic. iua arthet. salu. an. M. i. flor. iilia, primula ver. stachad. Arab. rorisinar. lauendula an. M. B. chamem. Rom. ʒ. cordial. an. P. ii. theriac. Dra. i. B. Mithridat. Dra. i. B. sem. & cori. citri, an. Dra. i. B. cinamomi Dra. vi. F. l. a. Destillatio in MB. pro lb. i. B.

Liquori destillato adde manus Christi c. ol. cinamomi, c. ol. succini, an. ʒ. i. conf. diacymini c. ol. cynini ʒ. vi.

Misc. De hoc destillato manè & vespèri Vnc. iiii. vel iiii. propinentur.

Pro Poru ordinario hoc uti poterit:

℞. Rad. China Vnc. iiii. aq. fontan. lb. x. Coq. ad partem quartam consumptionem.

Colatu



Colatura dulcoretur saccharo, & condatur cina-  
mo.

Multum quoque tribuitur aq. vel decocto rorisma-  
rini, si illius Vnc.iii. quotidie sumantur cum gr.iii. extr.  
radic. pyrethr. vel castorei.

Vbi decoctum hoc, vel destillatum semel absumptum  
est, iniiciatur clyster; vel purgantia supra proposita re-  
petantur. Atque ita per vices decoctum sudoriferum &  
purgantia diebus xl. continuantur, si tempus, ætas, &  
vires id permittant.

*Nervus robo-  
rantia.* Tandem quæ frigidus humores in nervis absumunt,  
eisque calefaciunt, spiritum & calorem ad eos attra-  
hant, eosdemque roborant, cum internè, tum externè  
vsurpanda. Qualia sunt pleraque, quæ supra, *part. 1. c. 2.*  
*3. & 10.* sunt proposita.

Ideoque vsurpanda melicrara antea descripta.

*Aqua destil-  
lata.* Aqua destillata; Rorismar. salu. laeundul. primul. ve-  
ris, chamapit. betonic. & compositæ Apoplectica & Pa-  
ralytica.

*Conferua.* Conferuæ; primul. veris, chamapit. beton. salu. anthos,  
laeundul. stæchad.

*Conditio &  
species aro-  
matica.* Radic. condit. acori, belenij, ireos, galang. pyrethr. nux.  
moschat. condita, diacorum Mesue.

*Antidoti.* Spec. Aromat. caryophyll. diamb. diagalang. diamosch.  
dulc.

Valde commendatur etiam magisterium perlarum.  
Prodest & theriaca antiqua, vel Mithridat. quæ Drac.i.  
pondere exhibeantur cum conferu. vel aqua appropria-  
ta, vel mulla. Efficacior est aurea Alexandrina & con-  
fect. anacardina.

Vel ʒ. Aq. betonic. cubebæ. salu. primul. veris, an. Vnc.  
ii. antiepilept. Langij Vnc. ʒ. cinamomi Drach. ii. syrup. de  
stæchad. Vnc. i. Misc. F. Potio pro 3. dosibus. Alia:

ʒ. Conferu. chamadr. chamapit. an. ʒ. ʒ. salu. primul.  
ver. an. Dra. iii. aq. betonic. chamadr. an. Vnc. iii. flor. tilia,  
pæon. an. Vnc. iʒ. M. & agitentur fortiter in mortario  
marmoreo, post leuiter bulliant, exprimantur, & co-  
lentur.

In colatura dissolu. extr. granor. juniperi Scrup. i. ga-  
lang. calam. arom. an. Scrup. ʒ. aq. cinamomi Dra. ii. brody  
rad. enula cond. Drach. vi. syrup. de cinamomo Dra. iii. M.  
F. Potio pro 3. dosibus.

*Electuaria.* Vel ʒ. Conferu. salu. anthos, primul. veris, chamapit.  
laeundul. an. Vnc. i. calami aromatici condit. Dra. vi. spec.  
diamb. diamosch. dulcis, ana Dra. ʒ. Mithridat. Drach. i.  
pulu. nucis moschat. Scrup. ii. cubebæ. Scrup. i. Cum syrupo  
stæchados simpl.

F. Electuarium, de quo quantitate nucis inglandis  
quotidie, vel alternis diebus, 4. horis ante prandium, &  
tantundem quibus horis ante cœnam, & vesperi æger  
sumat.

ʒ. Conferu. fl. primul. ver. Vnc. iʒ. salu. rorismar. an.  
Vnc. ʒ. nuc. moschat. cond. rad. enula cond. an. Dra. iii. spec.  
diamb. diamosch. d. an. Dra. ʒ. extr. visci q. Scrup. i. galan-  
ge Scr. ʒ. margar. præp. Scr. i. corall. rubr. præp. ʒ. ʒ. Mi-  
thridat. Dra. i. essentia castor. ʒ. ʒ. Cum syrup. brody nuc.  
mosch. F. Electuarium.

Vel ʒ. Flor. laeundul. Vnc. iʒ.

Incidentur minutim, & addantur sacchar. Vnc. vi.  
pulu. caryophyll. cinamomi, macis, an. Vnc. ʒ.

Stent in vase clauso in Sole aliquot diebus, & non-  
nunquam agitentur.

Vel ʒ. Conferu. fl. lily conuall. primul. veris, salu. an.  
Vnc. ii. Mithrid. optimi antiqui Vnc. i. cerebri leporis assi-  
ci & exsiccati Dra. ii. spec. diamb. Dra. i. sem. pæon. baccar.  
juniperi, an. Scr. ii. Cum syrup. stæchad. F. Electuarium, de  
quo sumat æger singulis diebus Vnc. ʒ.

*Cerebrum le-  
poris.* Cerebrum quoque leporis laudatur, quod peculiari  
proprietate in hoc morbo prodest. Vnde commendatur  
hoc Electuarium:

ʒ. Cerebri leporis recentis assi, vel in fictili fixi, con-  
feru. salu. an. ʒ. ʒ. thamapithyas, betonic. an. Vnc. iii. ci-  
namomi, caryophyll. piper. nigri, an. Dra. i. cerebintb. Cy-

pria aq. chamapit. tota Vnc. ʒ. sacchar. dissolut. in aq. iue.  
vel mellis q. f. F. Electuarium, de quo manè, horis iii. ante  
cibum, sumantur Vnc. ʒ. vel Dra. vi.

Pulueres quoque varii parari possunt, qui in aqua Pulueres.  
appropriata, vel cum pane vino aut mulsâ madido su-  
muntur, vel cum saccharo in Rotulas aut Morulos  
formantur.

Vt ʒ. Nuc. moschat. Vnc. ʒ. radic. pyrethri Drach. i.  
flor. laeund. Drach. ii. anthos, salu. an. Dra. ʒ. cinamomi,  
caryophyll. an. Dra. i. galang. cubebæ. cardamom. an. ʒ. ʒ.  
F. Puluis.

Vel ʒ. Fol. meliss. primul. veris, iua arihet. an. Dra. iʒ.  
cubebæ. nuc. moschat. sem. anisi, an. Dra. i. coriandr. præpa-  
rati, cinamomi, caryophyll. cardamomi, an. Drach. i. visci q.  
sem. pæon. an. Drach. ʒ. sacch. ad pondus omnium F.  
Puluis.

Efficacissima sunt olea destillata, vt & extracta; quæ Moruli &  
vel cum conferuis, misceantur, vel saccharo excepta in Rotule.  
Tabulas vel Morulos concinnentur.

Vt ʒ. Extract. calam. arom. Scr. i. ol. destillat. nucis  
moschat. salu. rorismar. cinamomi, an. gutt. vi. caryophyll.  
gutt. ii. spec. diamb. Dra. ʒ. sacchar. in aqua laeundula dis-  
soluti Vnc. iii. vel iii. F. Moruli.

Vel ʒ. Spec. diamosch. d. Dra. iʒ. diamb. Scrup. ii. dia-  
marg. cal. Dra. ʒ. rasur. visci q. ungula alcis, an. Scrup. i.  
fragm. lap. v. pretiosor. an. Scrup. ʒ. extr. galanga, ireos,  
pæon. an. gr. vii. cardamom. gr. xv. ol. destill. nuc. mosch. gutt.  
vii. sacch. in aq. lil. conuall. dissol. q. f. F. Moruli.

Vel ʒ. Spec. diamb. Drach. i. ol. d. stillati salu. nucis  
moschat. caryophyll. an. gutt. iii. sacch. aq. rorismar. dis-  
soluti Vnc. ii. F. Rotulæ.

Vel ʒ. Ol. destillati salu. nucis moschat. cinamomi.  
caryophyll. an. gutt. vi. sacchar. in aqua iua dissoluti Vnc.  
ii. vel iʒ. F. Rotulæ.

Ve ʒ. Sacchari ʒ. ʒ. Decoqu. in aq. fl. laeund. & lilior.  
conuall. Vnc. iii. ad perfectam coctionem; adde ol. succin-  
ti rectif. gutt. xv. cinamomi gutt. ix. essent. salu. Drach. i.  
F. Rotulæ.

Aquæ Apoplectica & Paralytica passim extant apud Aq. Paraly-  
Langium, lib. 3. epist. 1. cap. 1. Vidum Vidium, Heur-  
nium, Hercule, Saxoniam, & alios, quos consulere  
licet.

Potest & talis sine destillatione (Tincturam vel Ef-  
ficientiam hodie appellant.) parari:

ʒ. Primul. veris, salu. an. M. i. flor. lily conuall. stæ-  
chad. Arabic. laeundul. anthos, an. M. ʒ. caryophyll. nuc.  
moschat. galang. cinamomi, cubebæ. granor. Paradisi, ligni  
aloes, an. Dra. i. rad. acori veri, ireos, pæon. an. Vnc. ʒ. sem.  
fenicul. anisi, siler. montani, pæon. an. Dra. i. spec. diamb.  
diamosch. d. an. Dra. ii.

Affundatur spiritus vini optimè rectificati tantum, vt  
ad manus latitudinem, vel plus etiam emineat. Stent  
in infusione diebus aliquot in vitro clauso, & singu-  
lis diebus agitentur. Postea spiritus vini, qui vim  
specierum imbibit, per inclinationem effundatur.  
Dosis est Vnc. ʒ. vel solius, vel cum aqua aliqua con-  
uenienti.

Alia aqua contra Paralyfin:

ʒ. Rorismar. laeundul. an. Vnc. iii. salu. sem. sinapi  
an. Vnc. i. cardamomi, galanga, cubebæ. cinamomi, an. ʒ. ʒ.  
macis, croci Orient. visci q. an. ʒ. i. castor. opt. aurea Ale-  
xand. Mithridat. an. ʒ. ʒ.

Macerentur in loco cal. diebus 8. in vini sublim.  
opt. ʒ. ij.

Postea ʒ. aq. salu. rorismar. laeundul. flor. relia, lil. con-  
uall. an. ʒ. ii. Misc. & f. a. destillentur. Alia:

ʒ. Spec. diamb. ʒ. iʒ. diamb. d. abb. diamosch. an. ʒ. ii.  
spir. vini opt. q. f. F. a. Extractum liquidum, quod saccha-  
ro in aquâ conuenienti soluto dulcorari potest.

Aqua Saluæ composita:

ʒ. Fol. salu. hortens. virid. ʒ. vii. nucis mosch. caryophyll.  
zingiber. albi, cubebæ. gran. Paradisi. cinamomi, an. ʒ. ʒ.  
baccar. lauri Drach. i. galanga Drach. ii. spic. nard. cort.  
citri,

*citri*, an. ʒ. i. *camphor*. Scrup. i. *flor. laeundul.* ʒ. ʒ. *rorismar.* ʒ. i. Infund. omnia, vt decet, præparata in *vini opt. veter.* lb. viii. per dies 3. Postea f.a. in B. destillantur.

Alia aliqua:

ʒ. *Rad. acori veri, galange, angelic. enula, cyperi.* an. ʒ. vi. *fol. salu. minor. maior. rorismar. meliss. ruta.* an. M. i. *flor. laeund. spica, lily. conuall. primula veris,* an. M. ʒ. *nuc. moschat. zedoar. cinamomi, caryophyll.* an. Dra. iiii. *castor.* ʒ. i. *ʒ. cori. citri* Vnc. ʒ. *spec. diamosch.* ʒ. ij.

Conquassata infund. in vino forti, & permisceantur donec pulvis instar fiant, postea destillantur.

Aqua articularis:

ʒ. *Iua arthet.* lb. i. *rad. pentaphyll.* Vnc. iiii. *fol. pilosell.* lb. ʒ.

Incisis & contusis affund. *vini Rhen. veteris opt.* lb. vi. F. f. a. Destillatio per organa vitrea in B. Collectus liquor seruetur.

Alia D. Kolreuteri:

ʒ. *Vermium terrestr. ablutor. vino veteri* ʒ. ii. ʒ. iiii. *castor.* ʒ. ʒ. *ʒ. ʒ. vel Vnc. j.*

His superfund. *vini veteris* lb. i. Stent infusa 24. horis; postea seorsim

ʒ. *melissophyll. odor. puleg.* an. M. i. *chamapit. agrimon. herb. paralyf. chamaneli Romani,* an. M. i. ʒ. *betonic. euphrag.* an. M. ii. *salvia M. iiii. hyperici M. iiii. flor. sambuc. verbasc.* an. M. i. *baccar. lauri* ʒ. i. ʒ. *stachad. Arab. cap. N. vii. rasura Guaiaci* ʒ. ii. *sassafr.* Vnc. ʒ. *caryophyll. nuc. moschat.* an. Dra. ii. *sebananth. Scrup. i. rosar. rubr.* M. ii. *flor. laeundul. spica nard. betonic. maioran. rorismarin,* an. M. i.

His quoque concisis & conquassatis superfund. *spir. vini puriss.* lb. v.

Stent per triduum ad cineres calidos sæpius mouendo. His adde *vini Rhen. veter.* lb. iiii. *aq. meliss. laeund. betonic. hyperic. sambuc. salvia, rorismar.* an. ʒ. vi.

Postea simul omnia mixta destillantur f.a. in B. Destillato liquori, si placet; addi potest moschi Scr. ʒ.

Aqua Arthetica D. Brambachij:

ʒ. *Baccar. iuniperi* lb. ii. *lauri* lb. i. *flor. laeund. fol. puleg. cum summit.* an. Vnc. xvii. *menth. crisp. calamenth.* an. lb. j.

Postea ʒ. *rad. ostrui. zedoar. macis, cinamomi,* an. Vnc. i. *caryophyll. cardamomi,* an. Vnc. ʒ. *flor. anthos M. i. vrtic. min. c. sem. M. i. salu. minoris M. ii.*

Omnibus contusis ac minutim incisis affunde *vini opt. ardent. q. s.* atque bene cooper.

Deinde sepeliatur vas bene conclusum & obstrutum in cella, in loco & terra frigida. Stent in infus. per mensem, deinde destillantur.

Tandem ad Topica accedendum, quæ cum parti resolutæ ad calorem & spiritus reuocandos, tum in primis loco, vbi causa mali hæret, applicanda, ad humorum exsiccationem & discussionem.

Pars ergo affecta pannis calentibus quotidie fricetur; sed leniter, ne quod de naturali calore & spiritibus attractum est, iterum dissipetur.

Cucurbitulæ etiã applicentur, quas valde commendat Auicennas post corporis expurgationem, si absque scarificatione capitibus musculorum partis affectæ applicentur, præcipue eo fine, vt spiritus ad partem torpentem attrahatur. Qua de causa cucurbitulæ angustiores esse debent, & cum multa flamma applicari, sed non diu affixæ manere, ne, quod attractum est, dissipetur. Et vt id, quod attractum est, ibi conseruetur, & non statim dissipetur, emplastrum ex pice & resinâ pini statim imponi potest. Quin tamen aliquid materiæ morbificæ nervis inhaerens hoc modo extrahi, & loco moueri possit, impossibile non videtur.

Vel membrum stupidum & resolutum vrticis viridibus leniter percutiatur, aut ipsi sinapismi & Rubificantia imponantur, donec pars rubescere incipiat. Et si materia à cerebro descendat, & in spinali medulla hæreat, etiam scapulis & brachiis interdum adhiberi

debent, vt materia à cerebro & principio spinalis medullæ ad exteriora trahatur, & euocetur.

Postea, & progressu temporis (Auicennas post trigesimum diem iis vititur) spinæ dorsi quoque ea applicare vtile est, vt reliquæ materiæ extrahantur, & spiritus ac sanguis ad partem affectam reuocetur. Rubificantia tamen tam diu non sunt in loco affecto relinquenda, vt vesicæ in cute excident (tum enim spiritus & sanguis ad partem affectam, nõ reuocaretur, sed dissiparetur) sed tam diu solum, sinapismi & dropaces relinquendi, donec pars rubicunda digito pressa non albescat, sed rubicunda permaneat.

Postea inunctiones fiant Oleis & Vnguentis conuenientibus, cuiusmodi sunt, *ol. chamamel. lilior. albor. irin. hyperici, sambuci, rutaceum, laurinum, costinum, de spica, lumbricor. terrestr. de piperibus, vulpinum, de castoreo, euphorb. de stillatim iuniperi, cera.* Peculiari ratione præparata olea, *viperinum, de ciconia, anserinum,* habentur in Practica Leonell. Faurentini, cap. de Paralyfi, & *Cati seu Felis,* apud Forestum, lib. 10. obseru. 82.

Ex Vnguentis commendatur, Agrippa, Aregon, Martiatum virumque, de bdellio. Efficax est & sequens Vnguentum Anserinum:

ʒ. *Anserem veterem pinguem,* suffocetur, deplumetur, & exenteretur. Exenteratus inde *cera flaua, butyri ouilli, salis communis,* an. Vnc. ii. *pingued. vulpin.* Vnc. iiii. *cati syluest.* Vnc. i. ʒ. *porcina* Vnc. ii. *humana* Vnc. i. *medull. crurum asini, bouis, cerui,* an. Vnc. i. ʒ. *pulu. thuris, farina fabar. filiginis,* an. Vnc. ii. repleatur, & consuetur, veruque transfigatur, & assetur; vel ollæ vitreatæ inditus lento igne assetur: vbi cauendum, ne aduratur. Liquor exstillans viui seruetur.

Aliud:

ʒ. *Anserem deplumatum, enisceratam,* vino albo ablutum, configatur vndique *caryophyllis,* & infarciaur *foliis salvia, rorismarin, spica,* iisdem addendo *pingued. felis sylu.* Vnc. i. ʒ. *pulu. myrrh. thuris,* an. Vnc. ʒ. *castor. euphorb.* an. Dra. i. ʒ. *lumbric. in aceto suffocatur.* n. xxx.

Insuantur omnia, & torreatur anser more vsitato in veru, aceto albo rutaceo supposito in sartagine in quod pinguedo destillet, posteaque refrigerato liquore innatans axungia colligatur, & seruetur in vitro ad hosc vsus præstantissima.

Crato commendat Vnguentum de Sapone, quod ipse ita parat:

ʒ. *Sapon. Veneti* lb. ʒ. *ol. baccar. iuniperi* ʒ. i. *pulu. sem. eruc.* Dra. vi. M. pro Vnguento.

Vel ʒ. *Ol. laurin. de laterib. nardini, sinapi expr.* an. ʒ. i. ʒ. *gummi seqq. in aquâ vitæ dissolutor. opopanax, galban. ammoniac. sagapen.* an. Vnc. ʒ. *euphorb.* Dra. ii. Misc. quibus adde *ol. iuniper. de piperib. succini, spica destill.* an. Dra. i. *rad. helleb. alb. pyrethr. sinap.* an. Dra. i. *piperis alb.* Dra. ʒ. *sal. ammoniac.* Scrup. ii. *castor.* Scrup. i. *Cera q. f. l. a.* Vnguentum, quo partes læsæ spir. vini ante ignem prius fricandæ illinantur.

Valent & pinguedines humana, anserina, vulpina, cati, cati, syluest. vrsi, leonis, viperarum.

In calidis tamen & siccis oleis, præcipue destillatis, & in primis in principio adhibendis, hoc obseruandum, vt aliquid pinguium addatur, ne materia nervis inacta, vel adhærens exsiccetur, indurescat, & quasi lapidescat.

Ex his varia pro re nata misceri possunt.

Vt ʒ. *Ol. chamamel. lilior. albor.* an. Dra. i. *lumbric. terrestr. vulpini,* an. ʒ. ʒ. *spec. diamosch. dulc. pulu. chamapit. rorismarin.* an. Dra. ʒ. *castor.* Scr. i. *cera, pinguedin. vulpi,* ana q. f. Vnguentum.

Vel ʒ. *Gummi Ammon. bdellij in spir. vini dissolut.* an. Vnc. ʒ. *axung. taxi, anseris, vulpi,* an. Vnc. iiii. *rad. ireos* Dra. i. *fol. ruta, betonic. herb. paralyf.* an. Dra. i. *stachad. Arab. rorismar. chamamel. melilot.* an. p. i. *styrac. calamit. benzou,*

*benzoes, an. 3. ii. caryoph. thuris, nuc. mosch. an. 3. i. ol. vulpin. castor. lumbric. terrestr. cera, an. q. s. F. Linimentum.*

*Vel 2℥. Ol. vulpini, laurini, terebinth. de castor. an. 3. B. vnguenti Aregon. Martiati magni, an. 3. ii. galbani, Ammoniac. bdellij, an. 3. i. cera q. s. F. Linimentum.*

*Vel 2℥. Rad. ireos, calam. aromat. an. 3. i. B. galang. 3. i. fol. salvia, rorismar. iua, fl. laeund. stachad. Arabic. an. p. i. ol. vulpin. de castor. lumbric. an. 3. ii. terebinth. 3. i. vini albi fori 3. iiii. Coq. ad vini consumptionem.*

*Colaturæ adde spiritus vini 3. i. sagapen. bdellij, castor. styrac. calamit. benzoes, an. 3. i. nuc. mosch. caryoph. piper. longi, pyrethri, an. 3. B. pingued. taxi 3. B. cera q. s. F. Linimentum.*

Efficax etiam ad Paralyfin Vnguentum describit Valeriolus, lib. 4. obs. 4. quod huc transferri potest.

Efficax est & hoc:

*2℥. Lumbric. terrestr. spiritu vini lotorum, & in furno exsiccat. lb. B. pulu. zingiberis, galang. an. 3. B. ol. lilior. albor. vel costini q. s. F. Vnguentum.*

Ante nouam inunctionem sordes, quæ de priori relictae sunt, abluantur pāno imbuto decocto fl. chamamel. melilot. beton. maioran. ruta, salu. fol. lauri, chamapit. hyssop. rad. ebuli, cyclamini, ireos, calam. aromat. pyrethri.

Ex quibus & Sacculi ac foris parari possunt, additis caryoph. nuce mosch. castoreo.

*Vt 2℥. Beton. M. i. B. maioran. chamadr. chamapit. an. M. i. calaminth. origani, serpilli, marrub. urtic. an. M. B. fol. lauri num. v. fl. spica, stach. Arab. an. p. ii. galanga, piper. l. 3. i. B. mastich. succini, an. 3. i.*

Concisa & contusa crasso modo decoq. pro Fomentatione.

Alij sequenti Mixturā membra affecta fricant:

*2℥. Spir. vini, spir. granor. iuniperi, an. 3. iiii. pingued. castorei 3. i. pulu. sem. sinapi 3. i. B. rad. aristoloch. salis communis, an. 3. B. Misce.*

Efficacissima verò sunt Balsama cum naturalia, tum Artificialia, seu olea destillata, quæ Balsami nomine veniunt, & apud Euonymum, Heurnium, c. de Paralyfi, & alios descripta extant.

Inter quæ valde commendatur sequens Balsamum, quod Guidoni de Cauliaco attribuitur, quodque Matthiolus loco veri balsami substituit:

*2℥. Fol. salvia, maioran. menth. herb. paralyfi, an. p. i. spic. nard. croci, carpobalsami, sang. dracon. thuris, mumie, opopanax. bdellij, mastich. gum. Arab. styrac. liq. benzoes, an. Dra. ii. B. moschi 3. B. terebinth. Vnc. v.*

Omnia puluerisata Misc. cum terebinth. ponantur in alembic. & destillentur: primò, exit aqua; hinc oleum, postea substantia quædam crassior, quam Mel appellant, cuius vsus est in hoc, & omnibus frigidis affectibus.

Est & magna vis ol. destillatorum, salvia, nucis moschata, laeundul. spica, rorismar. succini, de lateribus, vt & petrolei, præcipue albi.

Vtilis est hæc Aqua, quâ membra affecta illinantur & fricentur. Liber eiusdem etiam 3℔. cum aqu. salvia, vel alterius conuenientis 3 iiii. manè exhibere:

*2℥. Flor. laeundul. spic. nostræ, stachad. Arab. salvia, rorismar. an. M. B. maioran. iua, primul. veris, an. M. i. rad. aristoloch. rotund. ireos, calam. aromat. an. 3. i. B. nuc. mosch. 3. ii. caryophyll. piper. cubebæ. cardamom. an. 3. i. spec. diamosch. dulc. diamb. an. 3. ii. sagapen. opopanax. myrrh. castor. an. 3. B. baccar. iuniperi M. i.*

Incisa & contusa infundantur in vini albi lb. vi.

Stent in infusione diebus 8. postea, si odoratiores petatur, aliquot grana ambrae, vel moschi tenui linteolo obuoluta rostro alembici appendantur.

Possunt & sequenti Aquâ arthetica membra affecta humectari & fricari:

*2℥. Granor. iuniperi, herb. urtic. Rom. an. M. ii. spic. nostr. M. B. schenanth. Dra. i. gran. paradisi. coccognia. piperis l. an. 3. i. B. caryoph. castor. myrrh. an. 3. ii. B. Concisa & cōtusa infund. in spir. vini Rhen. mens. ii.*

Dan, Sennerti Tom. II.

Stent. in infus. per 3. dies, postea destillentur in M. B.

Alia Aqua arthetica, D. Eulenbeck, Medici quondam Dresdensis:

*2℥. Fl. laeundul. spica, beton. maioran. rorismar. an. M. i. fol. sambuo. fl. verbasc. an. M. ii. hermodactil. 3. B. nuc. moschata. Dra. ii. caryophyll. 3. i. baccar. iuniperi M. i. Incis. & contus. infundantur in vini Rhen. lb. v.*

Stent in infus. per 4. d. hinc destillentur.

Vtiles sunt & Suffumigationes, quibus inferuit se-  
quens Puluis.

*2℥. Succini mastich. myrrhæ, an. 3. i. thuris 3. ii. caryoph. cinamomi, nuc. mosch. macis, an. 3. B. ligni aloes Scrup. lb.*

Puluerisata irrorentur spir. vini, exsiccentur postea, & iterum irrorentur quinquies, ac exsiccentur, & F. Puluis, qui iniciatur prunis, vt fumus exciteretur, quo calefiat linteum, eoque subinde membra paralytica fricentur & foueantur.

Si his malum non cedat. Emplastra & Cerota supra spinam dorsi imponenda.

*Vt 2℥. Castor. euphorb. piper. longi & nigri, an. Dra. i. ammoniac. opopanax. an. Dra. vi. medull. cerui, cruris bubul. an. 3. ii. terebinth. 3. vi. styrac. liquid. 3. ii. adipis gallin. anseris, porci, an. 3. i. B. ol. nardini, irini, de lateribus, de terebinth. an. 3. B. vini albi veteris q. s. ad gummi dissoluenda.*

Bulliant omnia ad ignem. F. Emplastrum.

Alij ab inunctione imponunt emplastrum ex solo gummi Tacamahacæ paratum.

*Vel 2℥. Empl. de bacc. lauri, de beton. melilot. an. 3. i. thuris 3. B. castor. euphorb. an. 3. i. sem. nigell. nasturt. sinap. rad. pyrath. fol. nitri, an. 3. B. Cnm ol. de laterib. redigantur in formam Emplastri, quod super alutam extensum applicetur.*

Sudores quoque in parte affecta prouocare vtile

fuerit; quod fiet per euaporationes à decocto herbarum prædictarum & radicum facto in aqua, aut potius vino ita parato, vt halitus calentes partem affectam attingant: aut decoctum ex herbis dictis calens in vas aliquod infundatur, in quo æger ieiunus ita sedeat connectus, ne aquam attingat, sed vapores saltem excipiat; vel lateres calentes linteis decocto herbarum dictarum madidis inuoluti parti affectæ imponantur, vt sudor eliciatur, vel in balneo sicco, quod itusam vulgò appellant, vapor ex decocto herbarum dictarum lapidibus vel scoriis calentibus insperso excipiat. Ad sudores mouendos valde hîc commendatur decoctum radicum bardanæ vel lappæ maioris. Vbi æger satis sudauit, in lectum componatur exhibita theriaca, Mithridat. vel aurea Alexandr. 3℔. vel 3 ii. camaq. conueniente. Non verò semel tantum eiusmodi balneis vtendum, sed sæpius, & bis vel ter singulis septimanis.

Autumnali quoque tempore vinaceis ex vuis maturis effervescentibus membra manè per horam vnâ, vel longius spatium immergere, & postea oleo, vel vnguento aliquo conueniente inungere, idque per dies 15. vel plures continuare summè vtile fuerit; de quo videatur Donatus ab Alto Mari, Tractat. de vinaceorum facultate & usu. Idem faciunt feces vini, si in illis calefactis partes resolutæ quotidie bis foueantur. Membra resoluta regantur pellibus vulpinis, leporinis, canis, cæti sylvestris, plumis anserum, columbarum, anicula- rum sylvestrium.

Si his omnibus nihil, vel parum efficiatur, ad Ther-  
mas deueniendum erit, præsertim verno tempore, præmissis vniuersalibus & particularibus corporis euacuationibus. Est autem hîc opus delectu thermarum; suntque viles sulphuræ, bituminosæ & nitrosæ, non multi aluminis participes. Sûntque singulis ferè regionibus etiam suæ; de quibus descriptiones thermarum in singulis regionibus & historiæ ab iis curatorum consulendæ.

Si thermæ naturales desint, Artificiale balneum tale parari potest, si aquæ exsiccationis causa, sal, alumē, tartarum vini, sulphur, permisceatur, & in eis ferrum

vel chalybs sæpe igneus extinguitur; &, vt appropriatum magis balneum fiat, & calefaciat, plantæ etiam conuenientes admiscendæ.

Vel tale paretur:

*℞. Fol. betonic. saluie, maioran. pulegi, rorismar. hyssopi, origani, thymi, ruta, chamæpiti. an. M. iiii. fl. chamamel. melilot. an. M. ii. rad. pyrethri, bryonia, an. ℥. ii. baccar. iuniperi M. iiii. lauri M. ii. sulphuris lb. iiii. nitri lb. i. Coqu. in aqu. ad Balneum.*

*Cauteria.*

Nonnulli & Cauterium apponunt inter primam & secundam vertebra, vel alio loco, pro ratione membri affecti, vt humor neruos occupans euacuetur.

*An febrem accendere li-  
seat.*

Nonnulli & febrem accendendam putant ad absumendum & exsiccandum humorem pituitosum, exhibitâ crebrius theriacâ & confect. anacardinâ, aut oleorum calidiorum, vt formicarum, euphorbij, circa pulsus temporum & brachiorum, ac sub axillis inunctione. Verum cum accedere febrem facilius sit, quam accensam extinguere, relicto præsidio minus tuto, alia tutiora eligenda.

Chymici, præter magisterium perlarû, (quod in *aq. primula veris* vel *rorismar.* Scr. ℞. pondere exhibent) cõmendant ol. saluie, succini; magister. smaragdi, coralliorum; tincturam amethysti; essentiam flor. cheiri.

Extra inungunt ( præter olea antea commemorata) ol. sanguinis humani, vt & balsamum de galbano, cuius descriptio in Institutionibus habetur.

### *Dieta.*

Interim dum hæc fiunt, & toto morbi decursu Dieta conueniens instituenda, qualis, *part. i. cap. 2.* proposita. Aer sit calidus, siccus & purus. Qui si talis naturâ loci non detur, arte paratur, vt, *ibid.* dictum. Nonnulli censent intra ægri cubiculum columbos alendos, vt pote quorum halitus Paralyticis proffit.

Cibus calefaciendi & attenuandi vim habeat, pituitæ generationem prohibeat, condiaturque cinamomo, cariophyll. nuce moschat. macere, hyssopo, thymo, saluia, roremarino, maioranâ, satûreia, & similibus. Et primis quidem 14. diebus victus sit tenuior & parcius, cum materia morbi plus, quam vires virget. Ideoque famem interdum tolerare, & cœnam intermittere proderit. Toto verò morbi decursu cibo sese æger non oneret; cum nihil in hoc affectu sit perniciosius, quàm nimia cibi & potus repletio. Cibus quoque sit boni succi; carnes assæ, quàm elixæ magis conueniunt. Eligantur & ij cibi, qui peculiari vi huic morbo resistunt, aut certe pituitam non generant, vel eam etiam absumunt; quales sunt columbæ syluestres, turtures, hirundines, cuculi, cerebrum leporis. Commendant nonnulli viperarum carnem; ideoque harum carne, vel farinâ harum iure subacta capones & gallinas saginant. Vtiles sunt & pineæ nuces, pistaciæ, amygdalæ, auellana Lombardicæ. Panis condiatur semine carui, fœnicul. anisi, melanthij. Condimenti loco in mensa vsurpetur sinapi; cappares; item sales theriacales, de viperis, betonicæ, cinamomi, hyssopi, iuniperi, saluie, nucis moschatæ, cariophyllor. Contra ab omnibus cibis frigidis & humidis, flatulentis, auiibus aquatilibus, carnibus agninis, suillis abstinendum. Pisces, si fieri potest, in cibum planè non admittantur; aut ægro eos appetente saxatiles aromatibus conditi concedantur. A lacte etiam, & omnibus lacticiis abstineat æger, vti & à fructibus horariis.

*Potus.*

Potus sit hydromel aliquod ex supra scriptis, cum foliis saluie, maioranæ, rorismarini, hyssopi, chamæpityos, cinamomo, nuce moschat. zingibere, cardamomo, granis paradisi, pipere paratum, aut cereuisia hyssopo vel saluia condita, vel potus, qui Hippocras vulgò pharmacopæis appellatur, & hoc modo paratur:

*℞. Cinamomi ℥. ii. zingiberis ℥. ℞. piper. longi, granor. paradisi, galang. an. ℥. i. cardamom. ℥. i. ℞. nucis moschatæ, cariophyll. macis, an. ℥. i.*

Coquantur vase clauso in aq. fontan. lb. vi. Colatura dulcoretur sacchar. alb. lb. ℞. & per manicam Hippocratis traiciatur.

Morbo tamen declinante ad ventriculi robur conseruandum vinum concedi potest, sed antiquum, quod non facile acescit, idque paucum.

Pars corporis affecta, quæ restitui nonnihil cœpit, frequenter exerceatur, aut potius fricetur; moderatè tamen, vt calor, sanguis & spiritus ad illam reuocentur. Et quidem frictiones in partibus ægris viles sunt ad calorem & spiritus reuocandos; in sanis ad auersionem. Somnus non excedat horas septem, sitque nocturnus, non diurnus. Aluus aperta seruanda, &, quia Paralyticis aluus adstrictior esse solet, per interualla clysteres iniiciendi.

### *De Curatione Paralysis ex humore tenui, & ex Colica ac Scorbuto.*

Cum Paralysis ex Colica ex tenui potius & bilioso vel seroso humore, quam crassa pituita proueniat, vt & ea, quæ mortuòs biliosos interdum sequi solet: curatio quoque non parum à curatione Paralysis ex pituitâ variat. Neque enim tam calida medicamenta, vt in Paralyti pituitosa, hic locum habent. Et cum materia illa tenuis, biliosa ac serosa, ex intestinis non tam ad principium neruorum, quàm ad neruolas musculi partes ac tendines transmittatur, principio neruorum illæso, tota curationis ratio in eo consistit, vt intemperies intestinorum corrigatur, & humores vitiosi ex iis euacuentur. Deinde vt materia quæ est in membris exterioribus, discutatur, ac membra roborentur. Et cum in ista Colica & Paralyti pertinaces alui obstructions adsint, clysteribus opus est, sed iis non calidis & siccantibus quales in Colica ex pituita & flatibus requiruntur, sed potius humectantibus, moderatè refrigerantibus, emollientibus, & abstergentibus. Et quia motus ad inferiora segnior est, vnde etiam accidit, vt materia cum ad alia membra, tum ad musculos moueatur, irritantibus opus est, quæ intestina ad excitationem stimulent. Conueniunt ergo hic clysteres ex matuâ, parietaria, mercuriali, branca vrsina, violaria, ex lacte caprino; quibus cassia extracta addatur, ex ol. violaceo & rosaceo cum adipe asferino, & vitellis ouorum, item ex cremore ptisanæ cum ol. chamæmel. Ad absterfionem verò & expultricem stimulantem commodissime additur aliquid hieræ simplicis, vel mellis violar. aut rosac. vel nitri parum. Et quidem clysteres tales semel atque iterum iniicere non sufficit, sed ter vel sæpius etiam infundatur, vt peruersus naturæ motus inuertatur, & humores prauis per aluum excernantur.

Postquam aluus per clysteres aperta & emollita fuerit, si plethoræ in venis indicia appareant, vena aperienda. Hinc purgantia exhibenda, & per mitiora medicamenta, ac per *ἐνύδριον* materia expurganda; quibus, si indicia obstructionis in venis appareant, medicamenta aperientia temperata admiscenda sunt. Conuenit hic syrup. rosar. solut. violar. solut. manna, rhabarb. Si morbus id requirat, etiam extract. esulæ, hellebori nigri, turbiti exhibentur. Et si ventriculus est humidus ac laxus, conueniens est vsus hieræ, quæ humores in intestinis abstergit. Ne tamen caliditate vel siccitate sua hiera noceat, ex refrigerantibus & humectantibus aliquid misceri potest.

Materiâ subductâ sæpius ieiuno ventriculo ea, quæ in affectione hypochondriaca & scorbuto vsurpari solent, dentur. Nonnulli tart. correcti ℥j. in aq. saluie, aut mixtur. simpl. Di. in aq. Paralyf. ℥. iis. exhibent. Hinc sudor prouocari potest tali Potiuncula:



℞. *Aq. primula veris, betonic. an. Vnc. iß. succin. preparati, matris perlar. preparata, an. Scrup. ß. extr. galanga gr. vii. spir. tartar. correcti Scrup. ß. manus christi c. ol. succini Drach. iiii. aq. theriacal. Dra. ii. Misce:*

Vel sequenti Bolo:

℞. *Conseru. betonic. salvia, an. Drach. iß. theriaca Scr. ii. extr. ligni sancti Scr. ß. sal. chamam. gr. vii. Cum sacch. q. f. f. Bolus.*

Quo sumpto liquor aliquis conueniens bibatur. Dentur etiam quotidie de Rotulis confortantibus mane & vesperi aliquot.

℞. *Extr. galanga Scrup. i. ligni aloes Scrup. ß. essent. salvia Drach. ii. succini preparati an. Drach. ß. ol. succini Scrup. ß. cinamomi gut. vii. sacch. in aq. flor. laur. & st. ilia dissol. Vnc. vi. F. Conf. in Rotulis.*

Membra verò resoluta fricentur panno asperiore, postea inungantur oleis non vehementer calidis; qualia sunt, lilior. albor. anethin. chamamel. & similia. Et si illa supra proposita adhibentur, aliquid moderate refrigerantium admisceri potest; vt ol. rosac. & similia. Quæ præterea ad huius Paralysis curationem facere possunt, videantur apud Schenckinm, lib. 1. obser. 189.

Paralysin autem Scorbuticam quod attinet, in ea curanda imprimis ad materiam, Scorbuti causam, respiciendum est, postea membris resolutis medicamenta adhibenda. Qua de re, de Scorbuto. lib. 3. part. 5. sect. 2. cap. 7. dictum.

#### Curatio Paralysis à causis evidentibus.

Curatio Paralysis à causis evidentibus.

In Paralyti à contusione, casu vel ictu, si ob plethoram affluxus ad partem læsam metuatur, vena aperiatur, alio per clysterem prius euacuata. Postea corpori applicentur non simpliciter adstringentia & refrigerantia, vt in contusione sine Paralyti, sed partim discutientia, partim adstringentia cum quadam calefactione, nisi inflammatio adsit. Vtile ergo est tale Emplastrum:

℞. *Mastich. thuris, gummi hedera, an. Vnc. ß. pulu. lumbric. Drach. i. maioran. Drach. ii. flor. chamamel. rosar. an. Drach. ß. ol. rosar. chamamel. cheirini, an. Vnc. i. terebinth. & cera q. f. Fiat Emplastrum.*

In declinatione diminutis adstringentibus, digerentia augeantur, vt reliquæ dissipentur, ac medicamenta, quæ in Paralyti pituitosa proposita sunt, vsurpentur, vt:

℞. *Farin. fenigrac. pulu. rad. alibea, an. Vnc. ß. lumbric. terrestr. Drach. iiii. ammoniaci, bdellii, adipis anserin. an. Drach. ii. ol. lilior. alb. cera, an. q. f. F. Emplastrum.*

De particularibus resolutionibus Linguae, Palpebrarum, Vesicæ, Ani, & similibus dicetur suo loco.

#### Q V Æ S T I O I.

*An Galenus & Auicennas de causis Paralysis consentiant, & Frigus saltem densando nervos Paralysin inducat?*

Defectus equidem spirituum animalium in nervis proxima & continens Paralysis causa est. Cum verò is à pluribus causis provenire possit, in iis recensendis inter Autores discrepantia quædam esse videtur. Primò quidem aliter eas causas recenset Galenus, aliter Auicennas. Galenus, 1. de Sympt. causis, cap. 5. ita de iis scribit. Continens quidem, siue proxima, siue quocunque alio vocabulo libeat appellare, huius symptomaticis causa est talis

Dan. Sennerti Tom. I f.

quispiam in nervis affectus, cuius occasione à principio ad ipsum virtus transmitti prohibetur. Porro prohibetur, ( siquidem meatum aliquem nervus habet, qualem ille, qui ad oculos descendit, manifestè habere cernitur) vel ex obstructione vel compressione: si autem non habeat, ex constipatione, vel frigore, vel compressione. Vbi quatuor causæ ponuntur Paralysis: nervi scilicet Obstructio, Compressio, Constipatio, & Frigus.

Auicennas verò aliter causas Paralysis digessit, & Paralysin fieri docet, vel quia facultas, seu spiritus non fertur ad membra, vel, licet feratur, membrorum vitio non suscipitur. his verbis: Destructio sensus & motus fit, quoniam spiritus sensibilis aut motius vel retinetur à penetratione ad membra, vel penetrat, sed membra non suscipiunt eius impressionem propter complexionis corruptionem. Quibus eadem quidem causas prohiberi spiritus animalis in nervos influxus affert, obstructionem scilicet, densationem, & compressionem: addit verò alterum membrum, cum videlicet influit quidem spiritus, sed ob depravationem temperamentis partis spiritus influens à membro non suscipitur.

Hic tamen Galenum & Auicennam facile conciliari posse putat Iulius Guastaninus, lib. locorum è medic. select. cap. 24. & quidem hoc modo. Nam primò quidem eos in eo convenire statuit, quod uterque tres causas ponit, cur spirituum influxus prohibetur, videlicet, obstructionem, compressionem, & densationem. Nec de hoc dubium est. Deinde etsi aliud vitium addere videatur Auicennas, cum scilicet membrum spiritus impressionem non suscipit, propter complexionis corruptionem, nervorum scilicet illius membri, qui spiritum suscipere debent: tamen eam ipsam temperamenti corruptionem ab Auicenna propositam non esse aliud putat, quam affectus à Galeno propositos, obstructionem, compressionem, & densationem. Cum enim Auicennas temperiem corrumpi in nervis assermet non ab intemperie calida aut sicca, sed frigida & humida; obstructionem à Galeno propositam ab humore frigido, & densationem à frigore illam ipsam temperiei corruptionem esse putat. Affectus enim, qui causa Paralysis, modò pertinet ad nervos iuxta eorum initium, cerebrum aut spinam, aut locum à membro læso remotiorem; modò ad eorum propagines seu portiones exiliores, quæ musculis interuntur. Cum ergò exiles hi nervi in ipsis partibus propter obstructionem, compressionem, aut densationem spiritus suscipere non possunt, id Auicennam propter complexionis corruptionem fieri statuere putat. Et licet Galenus refrigerationem in specie addat: tamen has duas læsiones, refrigerationem & densationem, ad vnam redigendam censeat; cum à frigore fiat densatio, & densationem ac frigus putat esse synonyma, ac prius posterioris explanationem.

Verum enim verò hoc modo Galenus & Auicennas non satis conciliantur, & omnino Auicennas peculiarem causam adhuc addere voluit. Licet enim hoc non sit negandum, frigus aliquando nervos condensare posse: tamen frigus tum proxima prohiberi influxus spirituum animalium causa non est, sed densatio seu angustia; voluitque Galenus tum proximas prohiberi influxus spiritus animalis causas recensere: idemque expressè distinguit constipationem, frigus, & compressionem, & disunctivè eam proponit. Auicennæ verò locus multò minus istam interpretationem patitur, & præter mentem eius dicitur, quod temperamenti corruptio, quam ponit Auicennas, non sit alius affectus, quam à Galeno proposita obstructio, compressio & densatio. Frigus enim quidem temperamentum mutare potest, sed compressio id non mutat, vt nervus fiat

inhabilis ad spiritus suscipiendos : potestque fieri compressio sine omni intemperie.

Mens ergo Auicennæ hæc est ; spiritum animale aliquando influere non posse propter angustiam nerui à quacunque etiam causa prouenientem , & quocunque loco ea hæreat ; aliquando verò , licet nulla sit in neruo angustia , & licet influant spiritus animales ; tamen à membro eos non suscipi , seu , ut loquitur Auicennas , eius impressionem non suscipi propter complexionis corruptionem , id est , quia à frigore innatum partis , & in ea neruolarum fibrarum temperamentum & calor corruptus est , cum eo spiritum animale influentem vniri , ei se associare , & suam *évépyeuv* in membro , cuius temperies naturalis destructa est , exercere non posse . Quod nec ipsum Galenum negare puto ; cum , 4. *de loc. affect. cap. 4.* Paralyfin à refrigeratione deducat , & medicamentis calidis sanatam fuisse scribat.

## Q V Æ S T I O . I I .

*Qui humores Paralyfis causa esse possint.*

Agitur quoque inter Medicos controuersia , qui humores Paralyfis causa esse possint . De pituitosis equidem res plana est , eosque omnes inter Paralyfis causas admittunt ; verum an biliosi etiam & melancholici , ac quo modo Paralyfin inducant , controuertitur . Galenus , 4. *de loc. affect. c. 4.* narrat , cuidam , qui à vehemēti perineumonia conualecebat , brachij tam posteriores , quam inferiores partes , & cubiti maximam partem eodem modo ad summos digitos sensus difficultate laborasse , atque motum quoque aliquorum digitorum nonnihil læsum fuisse . Alexander Trallianus , lib. 1. *cap. 6.* refert , quendam in Paralyfin ex mœrore incidisse , deinde sumpta hierâ adeo læsum , ut totus immobilis fieret , & propemodum interiret , nisi in contrarium mutatus fuisset , & humectantibus omnibus , cum potibus , cum cibus , & aliis , quæ temperatum ipsum redderent ; vsus fuisset . Paulus Aegineta , lib. 3. *cap. 28. & 43.* facit mentionem Paralyfis ex Colica per iudicatoriam quandam translationem , ab humore bilioso ( refrigerantia enim proderant ) ortæ . Fernelius , lib. 5. *de part. morb. & sympt. cap. 3.* scriptum reliquit ; bilem flauam sub finem intermittētiū febrium in spinam dorsii , ac in neruorum originem effusam aliquando Paralyfin generasse . Hercul. Saxonia , lib. 1. *c. 40.* refert , quædam inflammatione oris ventriculi laborasse , & rupto abscessu factum fuisse Paralyticum . Rondeletius verò , 1. *Method. curand. morbor. cap. 32.* Fernelio sese opponit , & bilem , ut & melancholiam , Paralyfin efficere posse negat ; cum hi humores potius siccent , quam emolliant neruos , & bilis ad conuulsionem magis , quam ad Paralyfin excitandam sit idonea . Deinde quod bilis , quæ concocta & pauca sit , ad loca tam diffita & remota facile penetrare non possit . Neque enim per cerebrum , neque per vertebrarum foramina & spinam eò peruenire posse putat . Etenim si per cerebrum & spinalem medullam delaberetur , phrenitidem excitaret ; atque id potius in ardentibus febribus accideret ; si verò per vertebrarum foramina eò ferretur , cum sanguine simul eò deduci , & in venis contineri potius debuisset , atque hac ratione continuam potius , quam intermittentem excitasset . Ipse verò sub finem febrium intermittētiū biliosarum Paralyfin fieri putat , quod bilis & febrilis calor pituitam in cerebro contentam , aut in ipsa spinali medulla latitantem eliquare potuerit , quæ in neruos effusa Paralyfin induxerit ; statuitque , sanguinem solum tenuiorem bilemque aquosiores Paralyfin committere posse , dum aut obstructionem faciunt , viamque spiritibus intercipiunt , aut humiditate spiritus extinguunt vel consopiant , aut neruos emolliunt & elongant .

Verum enim verò negandum non est , bilem & me-

lancholiam causam Paralyfis esse posse ; cum tot modi sint , quibus Paralyfis excitari potest . Possunt videlicet humores Paralyfis causa esse neruos refrigerando , humectando , & irrigando , sensus ac spiritus vi occultâ sopiendo , extrâ pondere & grauitate eos premendo , eodēque obstruendo . Quod ipse Rondeletius negare non videtur .

Duplici autem viâ humores ad neruos feruntur . Vel enim ex ipsis meatibus cerebri in neruorum sui stantiam infunduntur , vel saltem , ductum spinalis medullæ neruorumque inde ortorum sequentes , extrâ neruis incumbunt . Platerus quidem posteriorem modum solum admittit , obstructionē verò reiicit , negatque , humores crassos in ipsam neruorum , qui ita manifestas vias non habent , substantiam penetrare posse . Verum si vapor , præcipue qui vi narcotica præditus est , in ipsa substantia cerebri contineatur , atque in humorem ibidem condensetur , vel etiam tenuior humor ibi contineatur , eum in neruos infundi & penetrare posse impossibile non est . Quanquam enim manifestas cavitates non habent nerui ; tamen , cum neruorum substantia sit rara , humores tenues in eos sese insinuare possunt . Obseruandum tamen & hoc , bilis nomine non raro etiam serofos & salios humores apud autores accipi .

Atque hinc ad argumenta Rondeletij respondere facile est . Nam cum ipse concedat , sanguinem tenuiorem bilemque aquosiores Paralyfin committere posse , frustra pugnat contra Fernelium ; cum Fernelius non definiat bilem , quæ Paralyfin facit . Neque enim omnis bilis acris est , ut necesse sit , eam neruis effusam conuulsionem excitare , ut in ictero videre est , in quo in cute nullus pruritus aut dolor percipitur . Neque in intermittētibz febribz via , quâ humores ad neruos transeant , denegatur . Quamuis enim fomes febrilis in febribz intermittētibz sit extra venam cauam : tamen in eam effunditur , & in paroxysmo tandem per eius ramos expellitur , ut , lib. 2. *de Febribz , cap. 16.* monstratum fuit . Atque hoc modo partim ad spinalem medullam , partim musculos transmitti potest . Videantur quoque quæ de generatione & curatione Paralyfis Scorbüticæ , lib. 3. *part. 5. sect. 2. de Scorbuto , cap. 4. & 7.* dicemus .

Si verò ex capite delapsus biliosus humor Paralyfin generet , modus generationis est facilis ; cum & comprimendo , spiritibusque viam intercipiendo , & , si aquosa sit bilis , neruos irrigando , Paralyfin excitare possit . Et si saltem à liquatione pituitæ fieret hæc Paralyfis , potius in augmento vel statu febris , vbi calor maior est , quam in declinatione , ea accidere deberet .

Melancholiam quod attinet , statuunt quidam è Recentioribus melancholicum humorem , etsi siccus & terrestris inter humores dicatur , tamen , quia humor est , humidum , & neruo humidiores esse , ipsūque humectare posse , melancholiamque aliis humoribus collatam esse siccam , partibus verò corporis humidam & humectantem . Verum rectè explicanda est hæc opinio . Etenim etsi humor melancholicus ad tactum , & quâ humor , & quiddam liquidum est , humidus est : potentiam tamen non humectandi , vel siccandi habet , sicut thermæ , lixiuium , vina potentia , spiritus , & alij liquores multi siccandi potentia præditi , corpora , quæ contingunt , non emolliunt , sed siccant potius . Ergo si à melancholia generatur Paralyfis , credibile est , eam extrâ pondere suo neruos comprimere , & spiritui fluxum prohibere , ut Platerus sentit . Aut si omnino humectando id efficiat , sit potius hoc ab humore seroso , quo melancholicus humor plerumque diluitur , quam à crassa eius substantia ; id quod in Scorbüticis accidit .

## QVÆSTIO III.

*An Sudorifera in Paralyfi sint exhibenda.*

Ludovicus Septalius equidem, lib. 6. animaduvers. medic. n. 74. Sudorifera in Paralyfi reiecit, & vrinam cientia præfert, magnūque errorem passim à Medicis committi putat, quod, omisiss vrinam cientibus, ea usurpent, quæ sudores mouent, decoctum Guajaci, sarsaparill. & similia, eā de causa, quod per vrinam crassiora quoque educantur, per sudores autem tenuibus euacuatis crassiora magis incalescant & crassiora reddantur, magis obstruant, atque difficiliora reddantur ad motum & euacuationem.

Verū et si hæc omnia vera esse concedimus de morbis, quorum causa circa viscera & in hypochondriis, vel etiam in venis hæret, tamen in Paralyfi hæc ratio locum non habet. Cum enim circa nervos causa mali hæreat, non video, quomodo inde ad vias vrinæ facile peruenire possit: per ambitum verò corporis facilis euacuatio est. Neque metuendum, ut sudoriferorum vsu materia incalescat nimium, utpote quæ frigida est, & ita calefactionem requirit, ut etiam nonnulli febrem, quæ eam calefaciat & fundat, accendendam putent; aut crassescat: cum illa ipsa sudorifera vim habeant eam attempuandi.

## CAPVT XXVIII.

*De Spasmo, seu Conuulsione, & Conuulsivis motibus.*

*Spasmus.* Σπασμὸς Græcis, Celso Distensio nervorum, vulgò Conuulsio, est motus membrorum ita deprauatus, ut præter voluntatis imperium, & contra id membra versus musculorum suorum principia retrahantur. Aut, si verbum verbo reddere velimus, Spasmus dicitur contractio. Σπᾶν liquidem Græcis est trahere. Membrum enim conuulsū, ut & motum secundum voluntatem, musculi sui medio, quod ventrem vocant, contrahitur versus suum initium, quod caput musculi nominatur. Tendo etiam, in quem musculus desinit, contrahitur, & ab hoc os, vel membrum, cui inferitur, contrahitur. Quia tamen in contractione illa partes ita distenduntur, ut rumpi quasi videantur, Latinis conuulsionem & distensionem nominare placuit. Et quidem quod musculus tenditur, & ad principium suum trahitur, vnaque cum hac pars, cui inferitur, id commune est sanis ac conuulsis, teste Galeno, 2. de sympt. caus. cap. 2. Sed quod inuitis, & præter voluntatis imperium accidit, id p. n. affecto corpori inest, non sano, ut Galenus docet, 3. de loc. affect. cap. 6. Aliud verò vocabulum est σπᾶσμος, quod propriè vnitatem solutam in parte nervosa citra vulnerationem significat, seu partium nervosarum, vel fibrarum in musculis ex distensioneruptionem. Nam quod in carne πῆγμα dicitur, id in nervis appellatur σπᾶσμος, ut ex Galeno, 3. meth. med. cap. 6. & m. m. cap. 1. & de constitutione art. cap. 6. videre est. Et quidem manus vel pedes, ut & caput, frequentius conuelluntur, quandoque etiam maxillæ ita constringuntur, ut vix vllâ vi diduci possint. Rariores aliquot conuulsionum historias annotavit Marcellus Donatus, de histor. medic. mirabil. lib. 2. cap. 3. Refert enim, penem quibusdam morientibus, imò etiam jam mortuis rigidum & conuulsū fuisse; (modò conuulsio fuerit illa penis rigiditas) aliquando anum ita à conuulsione constrictam, ut clysteris canalem non admitteret; deprehensum etiam, manus mortuorum tam constrictas fuisse, & quandoque tractantium manus ita firmiter constringisse, ut difficulter diuelli potuerint; cuiusdam etiam capite truncati cadaver, dum in pheretra ad sepulchrum portaretur, repente adeo concussū fuisse, ut loculi tabulæ inuicem disungerentur, ac penè ex ge-

Dan. Sennerti Tom. 11.

stantium humeris decideret, quod ad iactum sagittæ, dum funus progredieretur, duravit.

Est videlicet Spasmus seu Conuulsio symptoma *Spasmus quid?* deprauatæ facultatis animalis, libere mouentis; inuoluntaria scilicet, & *involuntaria* facta membri versus musculi sui principium contractio, quæ plerumque non sine dolore fit. Quod tamen de ipso actu motus & contractionis intelligendum. Posteaquam verò contractio jam facta est, membrumque rigidum est, ablatum potius motus est. Siquidem neque ipsi ægri membrum contractum libere mouere possunt, & sæpe ita rigidum à Conuulsione fit, ut neque ab astantibus extendi possit. Et ubi motus tonicus est, membrum rigidum manet, ut flecti nullo modo possit.

Affectus est in musculo, qui proprium voluntarij motus instrumentum est, & quidem secundum se totus contrahitur; præcipue verò secundum fibrosam partem: vnde Galenus conuulsionem, nunc musculorum, nunc nervorum *πᾶσι* esse scribit. Contrahitur verò pars fibrosa versus originem suam. Origo autem nervorum est cerebrum & spinalis medulla; musculi, vel fibrarum hujus, ipsius caput; tendinis, finis musculi; sicut ligamenti origo vel principium est os, cartilago, aut durior membrana.

Sunt quidem nonnulli, qui inter Conuulsionem & distensionem distinguunt, ac Galenum reprehendunt, quod ista confuderit. Verum illa ipsa *Conuulsio & distensio non differunt.* Distensio, quæ in terano apparet, etiam est contractio. Quanquam enim membrum terano laborans rigidum, rectum, & extensum manet: tamen id fit, quia ex vtraque parte fit æqualis contractio, & musculi anteriore & posteriore parte æqualiter contrahuntur, ut neutra pars vincat; vnde membrum rigidum manet.

Monendum tamen hîc, distinguendum esse inter spasmum seu conuulsionem, & motum conuulsivum, seu *σπασμωδὴν κίνησιν*. Spasmus enim, seu Conuulsio propriè dicta est musculi versus suum principium contractio, ex qua membrum rigidum manet, sicut in terano, *ὁ πρὸς τὸν*, risu Sardonio, & aliis veris conuulsionibus apparet. Motus verò *σπασμωδὴς* seu conuulsivus est etiam musculi versus suum principium retractio; verum non in vna sitis differentia continuat, sed cum quadam concussione, ut in epilepsiâ, febribus malignis, vulneribus capitis sæpe videre est. In hoc enim differt spasmus seu conuulsio à motu conuulsivo, quod, ut dictum, in conuulsione membrum ex contractione rigidum manet; in conuulsivo verò motu membrum agitur, vibratur, & variè concutitur.

Deinde in vera conuulsione sensus omnes, cum interni, tum externi integri sunt; in motibus verò conuulsivis sæpe læduntur.

Ad motus hosce conuulsivos referendus, vel iis cognatus est ille, qui nonnullis sub primum somnum accidit, quo totum corpus ita concutitur, ut lectum totum concutiat, & homo inde excitetur. Qui procul dubio accidit à vaporibus quibusdam acerbis à ventre inferiore adscendentibus; & principium nervorum vellicantibus, sed qui statim evanescunt.

Cardanus verò, in Comment. aphor. 37. seu, secundum ejus distinctionem, 39. sect. 6. etiam hanc differentiam agnoscit & admittit, verum nominibus aliis exprimit, & quem nos Conuulsivum motum appellari diximus, quique cum manifesta agitatione & concussione fit, Conuulsionem solum appellandum censet; Distensionem autem, quæ fit motu occulto, cuius species *ἐμμεγροδόνος*, *ἐπιδόνης*, & *πῆγος*. Verum præter communem loquendi usum hæc statuit, & præter necessitatem vulgatas appellationes mutat: cum synonyma sint spasmus, conuulsio, & distensio, ut dictum. Concussiones verò illæ & agitationes manifestæ, quas solum

Qq 3 conuul

conuulsiones appellandas censet, *πασμὸς πᾶσι*, seu conuulsui motus, non conuulsiones propriè à Medicis dicuntur.

*Spasmus & Paralysis interdum iunguntur.*

Notandum & hoc, Spasmus equidem opponi paralyti, quod in paralyti est mouendi impotentia, etsi membrum flexile sit, in spasmō verò & motibus conuulsuius motus deprauatus: interdum tamen iunguntur ita, vt per vices & alternatim affligant, ita vt pars modò conuellatur, modò resoluitur. Cujus rei exemplum est apud Hippocratem & Galenum, 3. *Prorrhēt. s. 26.* quale etiam vidit Petrus Salius Diuersus *vt in notis in Alimmarum, c. 13.* refert, quod tamen raro accidit.

### Definitio.

*Conuulsionis causa proxima.*

Sed, vt definitio perfecta constitui possit, de proxima causa conuulsionis inquirendum, ad quam omnes aliæ, quæ satis multæ sunt, redigi possint. Etsi autem ea sit tendinum & fibrarum in musculis contractio seu longitudo imminuta, ob quam eandem situs differentiam musculum & totum membrum, cui inseritur, secum trahit: tamen cum idem etiam in motu voluntario accidat; Conuulsio verò contractio præter voluntatem sit: quænam causa sit, vt præter voluntatem tendines & fibrosæ musculorum partes ita ad originem suam contrahantur, grauissima & intricatissima controuersia est.

Vulgata equidem doctrina est ex Hippocrate, 6. *Aphor. 39.* Spasmus ex inanitione vel repletionem fieri. Et vtuntur plerique cum Galeno similitudine perita à chordis ex intestinis animalium exsiccatis paratis, vt & coriis ac pellibus. Vt enim hæc, vbi Soli vel igni exponuntur, humore absumpto corrugantur & breuiora fiunt; pariter etiam vbi humorem aliquem imbiberunt, latitudine & crassitie auctâ, longitudo imminuitur, & breuiora redduntur: ita etiam putant, in neruis, ac nervosis musculorum tendinibus ac fibris idem accidere, eosque à causis nimium siccantibus & humectantibus breuiores reddi.

Recentiores plerique tertium genus causæ addunt; quod tamen etiam Galenus, 5. *Aphor. 1.* obseruauit, vellicationem videlicet nervosi geueris ex re molesta.

Verum etsi calumniis facile obnoxium sit, si quis à sententia in omnium libris ferè vulgata secessionem faciat: tamen vbi de veritate agitur, non quis, vel quot aliquid dixerint, videndum, sed quam bene quid dicatur, perpendendum. Idque & hic faciendum puto. Quibus autem & quantis difficultatibus priora duo causarum genera inuoluta sint, in Institutionibus, lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 5. dictum, & infra, *quest. 1.* dicitur. Et quamuis nonnulli anxie laborarint, vt causas omnes remotiores ad hæc duo genera referrent: tamen id, quod conati sunt, non præstiterunt; adeo vt doctissimi atque ingeniosissimi Medici de vera causa inuenienda ferè desperasse videantur. Inter quos est acutissimus Auenrois, qui, 3. *collectan.* scribit: *Vtinam scirem, cur distendantur in latum nerui, & non in longum.* Et mox: *Scias, Medicorum verba in hoc symptomate vniuersè propiora esse verbis Muscorum, seu fabellarum canentium, quam demonstratorum.*

Verum ne actum agamus, ea, quæ in Institutionibus, loca allegat, prolixè hac de re diximus, hic non repetemus, nec ea, quæ postea, *quest. 1.* dicuntur, sed saltem sententiam nostram, quam vero magis consentaneam, quantum quidem in hac rei obscuritate licet, esse putamus, summatim proponemus. Et propterea breuiter hic statuimus, causam proximam Spasmi esse facultatis expultricis partium nervosarum à re molestante irritationem, quæ animalem facultatem sibi in eodem subjecto iunctam in consensum trahit, atque ad motum incitat; seu materiam fibrosas & nervosas partes in musculis irritantem. Reliqua, quæ ad hanc rem pertinent, infra, *quest. 1.* proponuntur.

Vnde definimus spasmum, quod sit musculotum deprauatus motus, seu versus principium contractio præter voluntatem, à facultatis expultricis partium nervosarum à re molestâ irritatione, quæ animalem sibi iunctam in consensum trahit, & ad hunc motum incitat, orta.

### Causa & Subjectum.

Sed vt hæc clariora fiant, de subjecto & causis quædam addenda. Subjectum quidem proprium & proximum conuulsionis musculum esse statuimus. Cum enim musculus proprium & adequatum motus voluntarij, qui secundum naturam sit, instrumentum sit: etiam motus illius deprauati seu conuulsionis causa erit; & musculo contracto ossa, & quicquid in parte mobile est, simul contrahuntur. Veruntamen neruis solùm, & fibrosis nervorum partibus mediantibus, vt etiam supra dictum, musculi conuellantur. Etsi enim musculi ipsi per se sæpe vulnerentur, contundantur, & tumorem aut alium morbum patiantur: non tamen conuellantur, nisi nervos malum peculiariter attingat.

Variarum autem corporis partium musculos conuulsio occupat. Interdum enim totum corpus, caput scilicet, & omnia sub capite membra conuulsione corripiuntur: interdum caput saluum est, & omnes sub capite partes conuulsionem patiuntur: interdum vnius lateris membra omnia: interdum vna saltem pars, oculus, lingua, ceruix, brachia, manus, crus, pes, digitus.

Causam proximam diximus esse facultatis partium nervosarum irritationem, quæ animalem in musculis in consensum trahit, & ad motum incitat, seu si alicui *ἐκπαροχὴ* libeat, materiam nervosas & membranosas in musculis partes irritantem. Nam, vt in Institut. etiam dictum, aliter sese res habet in expulsiōe in parte, quæ potentiam habet ad voluntatis imperium sese mouendi, aliter in ea, quæ eâ destituitur. Conuulsio ad prius genus pertinet, sicut & sternutatio ac tusis: in quibus nimirum, quia facultas expultrix naturalis, facultatem animalem in consensum trahit, motus quidam sensibilis excitatur, atque ita vtrique facultas ad conuulsionem concurrat. Neque sola facultas animalis huius motus causa est, vt potest quæ sibi relicta nullum motum, nisi ad voluntatis imperium, aggreditur. Sed hic ad motum hunc primò facultas naturalis concurrat. Cum enim causa, quæ conuulsionem parit, in musculo resideat, seu humor seu vapor, primò inde afficitur & irritatur facultas naturalis, quæ sibi coniunctam facultatem mouendi in consensum trahit. Quæ etsi aliàs salua sit, atque imaginatio non deprauata, ob irritationis tamen vehementiam, & totius animalis salutem, ac illam, quæ est in toto corpore, sympathiam partium & actionum obsequi cogitur, & hunc motum coacta seu permittit seu imperat, quem non irritata nõ imperasset, seu permisisset; aut certe facultas animalis à naturali in consensum tracta & irritata spiritus animales coacta ad membrum affectum mittit, forsan non ita concurrente imaginatione. Neque enim adeo credibile esse videtur, cum tam vehemens contractio in conuulsione fiat, vt etiam membrum extendi non possit, eam contractionem ab imaginatione, ac locomotiuam dirigente facultate imperari; sed potest fortasse per spiritus animales ad membrum affectum affluentes etiam inuitâ imaginatione motus ille, cuius modum ignoramus, fieri. Neque tamen sine concursu facultatis animalis motum istum fieri posse, manifestum est. Estque irrefutabilis demonstratio hæc, quod conuulsio est contractio: contractio musculorum actio propria: musculi instrumentum non facultatis naturalis, sed metricis: motus musculorum nunquam fit citra facultatis animalis operam, quæ appetitum & rationalem,

*A qua causa (a musculo in conuulsione) contrahitur.*



lem, & sensitiuum complectitur, aut certè non sine spirituum animalium ope.

Neque refert, quod hi motus contra voluntatem fiunt, & quod partem conuulsam etiam volentes extendere non possunt ægri. Etenim vel ab appetitu irrationali fiunt, vel animà quasi perturbatâ, vt ex Aristotele, lib. 3. de anima, cap. 2. & Galeno, 2. de motu musculorum, cap. 6. in Institut. diximus; vbi monstratum fuit, motus voluntarios non esse planè ejusdem generis.

Si porro quærat, quâ fiat, quodd nunc saltem versus vnâ partem contractio fiat, parsque ita contracta immobilis maneat; quæ propriè est Spasmus, Conuulsio seu Distensio: nunc verò in hanc vel illam partem varia fiat agitatio, quæ motus Conuulsus propriè nominatur: etsi Cardano contrâ conuulsionem appellare placuerit; differentiarum causa in hisce consistere videtur, quod in vera conuulsione seu vapor seu humor nervos vellicans penitus se in nervorum substantiam insinuat, iisque adhæret, & quasi infixus est: in Conuulsio verò motu materia non adhæret nervis pertinacius, sed facillè iterum à natura excutitur; quæ tamen cum iterum nervos petit, conuulsus motus continuatur, & tam diu durat, donec materia vellicans tota discussa est. Vnde procul dubio materia, quæ conuulsium motum excitat, vaporosa, serosa vel biliosa, ac omnino tenuis est; quia facillè discutitur, & sæpe hinc inde vagatur. In Spasmo autem & conuulsione vera materia est crassior & tenacior, ac propterea pertinacius nervis adhæret. Præterea in conuulsivis motibus materia nervos extra musculos positos potius afficit, & sic muscoli mediare, & per consensum patiuntur, dum id, quod molestum est, nervis motu suo excutere tentant. In conuulsione autem ipsæ nervosæ fibræ in musculis insertæ afficiuntur immediatè. Quibus accedit & hoc, quod in vera conuulsione vnus musculus saltem, vel plures ejusdem generis, seu extendentes seu contrahentes afficiuntur: in motu verò conuulsio etiam contrarij, aut certè nervi extra musculos eò loci, vbi versus oppositos, & contrariorum motuum musculos æqualiter ramos mittunt. Ita enim cum musculis in corpore humano comparatum est, quod omnes, si paucos excipias, sphincteres vesicæ & ani, vt & cremasteres, contrarios musculos habent, quorum si hic contrahit, ille extendit; si hic eleuat, ille deprimit, & ita de cæteris motus differentiis: etsi numero contrarij semper non sunt pares, sicut caput flectentes duo sunt, extendentes duodecim. Itaque in conuulsione seu spasmo in vno saltem musculorum contrariorum genere causa mali hæret; vnde etiam membrum versus musculi illius principum contrahitur, & ita rigidum manet. In conuulsivis verò motibus materia vellicans nervos, qui ad vtrumque contrariorum musculorum genus tendunt, infestat; vnde pars nunc contrahitur, nunc extenditur, & omnino vario motu agitur, prout materia nunc hunc, nunc illum musculum vellicat. Hinc etiam in spasmo, vtpote in quo causa saltem circa partem affectam, & in loco priuato hæret, cerebrum & sensus integri sunt: in conuulsivis verò motibus cerebrum sæpe simul afficitur; vnde etiam sensus ferè simul læduntur. Et conuulsivi motus ferè accidunt per partium aliarum consensum, materiâ ab vtero, ventriculo, vel alia parte cerebro per nervos communicatâ: quæ cum à cerebro rursus excutitur, & in nervos expellitur, nunc hanc, nunc illam partem vellicat, atque inde variorum membrorum conuulsio & agitatio excitatur. Et quidem si materia hæc ad principium medullæ spinalis mittitur, & æqualiter totam occupat, tunc æqualiter vniuersum corpus conuellitur, & tam dextrâ, quam sinistra corporis partis membra concutuntur. Malumque hoc omnium grauissimum est, præcipue si aliquid materiæ adhuc in cerebro hæreat, vnde & partes capituli concutuntur, & sensus afficiuntur. Si autem dex-

tram saltem, vel sinistram corporis partem perat, motus conuulsus tantum in dextra vel sinistra parte accidit. Si verò non ad principium spinalis medullæ, sed ad neruum priuato alicui membro inseruentem materia mittitur, motus etiam conuulsus fit saltem in priuato illo membro, & nunc brachium, nunc crus, nunc manus concutitur. Et si magna materiæ efficacia vel copia sit, membro è directo posito per communes nervos communicatur. Aliquando etiam, vbi causa mali in priuato aliquo membro generatur, cum ea agitari incipit, primum illa pars motu conuulsio corripitur, postea tamen materia per nervos cerebro communicatur, & hinc ad principium spinalis medullæ protruditur; vnde vniuersum corpus motu conuulsio prehenditur, aut certè latus è directo loci affecti situm.

Non etiam hic prætereundum, quomodo Spasmus *Spasmus flatulentus* generetur, qui Græcis *αἰσχυρὸς κρῆσμος*, der *tulentes*, *Krampf* appellatur, Italis etiam Crampa vel Cramfus nominatur, qui cum maximo dolore, in cruribus præcipue, & imprimis in suris, accidit, si inter dormiendum pedibus non contextis quis decumbat. Quod malum cacochymicos, flatulentos, & poculis ac crapulæ deditos infestat, partemque cum dolore summo affligit, sed plerumque breui temporis spatio durat. Durat tamen interdum, vt Iohan. Baptista Montanus, in 9. *Rhasis*, refert, per horas quatuor, vt Medicos aduocare opus sit, & plerumque ad verum spasmus via est.

Quomodo autem generetur, pluribus, in Institution. dictum est, quæ hic repetere non licet. Vero consentaneum est, spasmus hunc flatulentum à flatu vel humore aliquo tenui ac seroso in musculo aliquo collecto, ejusque fibras vellicante, fieri.

Causas antecedentes, præcatarticas & evidentes Spasmi quod attinet, primò à sanguine ac plethorâ spasmus fieri vulgo docent, & quidem ex plenitudine, ejusque rei exemplum inflammationes afferunt. Verum enim verò multi dantur plethorici, qui spasmus non patiuntur; sicut nec inflammationibus omnibus Spasmus conjungitur. Et si Spasmus tum accidat, fit hoc vbi sanguis corrumpitur & putrescit, acrimoniam acquirit, nervosque vellicat; vt etiam ex Galeno, 6. *method. meden. cap. 2.* & alibi videre est.

Pituita deinde conuulsionis causa statuitur, & plerique eam replendo nervos conuulsionem excitare statuunt. Verum de modo planè inter se dissentiant, neque adhuc sufficienter causam reddiderunt, cur ob pituitam paralyticis membra potius resoluantur, quam conuellantur, vt postea, in *quæstione*, dicetur. Probabile ergo & hic est, pituitam corruptam acrimoniam suam potius nervos vellicare, quam replere. Et dantur multi morbi pituitosi, quibus conuulsio non conjungitur. Atque exempla, quæ Forestus & alij afferunt, quibus monstrare volunt, à pituita nervos replente Spasmus excitatum fuisse, id non satis demonstrant, nec plus probant, quam cacochymiam pituitosam in talibus corporibus fuisse. Quomodo verò conuulsio à pituita illa producta fuerit, non satis probant.

De bile Medici, qui vulgarem sententiam sequuntur, in hoc quidem consentiunt, quod conuulsionem inducere possit: sed de modo dissentiant. Etsi enim quidam statuunt, bilem esse tenuem, & in nervi substantiam facillè penetrare, ac in eam sese insinuare posse: tamen plerique agnoscunt, bilem vellicando potius id præstare, quam replendo.

Humorem melancholicum, non, nisi rarissimè, aut fortè nunquam, spasmus producere posse quidam statuunt, ea de causa, quia crassior sit, quam quod possit in neruum, qui durus est sese insinuare. Verum ex præsupposita opinione hæc dicuntur. Si ergo melancholia spasmus parit, vellicando id præstat.

Quæcunque ergo causæ humores, qui nervos & fibras musculorum vellicare possunt, generant, conuulsionis

*Causa præcatartica.*

sionis causa esse possunt; vt ebrietas, crapula & repletio, consuetæ euacuationes suppressæ, balnea & exercitia in corpore plethorico vel cacochymico, ær frigidus ac humidus, & similes.

Quia tamen tales humores in multis abundant, & causæ tales multis obtingunt, qui tamen conuulsionem non patiuntur: procul dubio occultam aliquam dispositionem nervis inimicam humor acquiritur necesse est, antequam conuulsionem pariat, similem illi, quæ epilepsiam generare solet.

*Causa conuulsio-  
nis.*

Causas reliquas evidentes ferè omnes nervos exsiccando conuulsionem inducere statuunt; sed parùm rectè, vt postea etiam, *questione 1.* dicitur.

Primò enim inter causas illas referunt febrem ardentem & phrenitidem, quæ cerebri membranas ac nervos omnes exsiccant. Verùm enim verò non omnibus febribus ardentibus, nec omni phrenitidi hoc accidit, & sæpe conuulsiones in febribus malignis, satis, quantum ad calorem, mitibus, accidunt; contra in aliis febribus, vbi calor ardentissimus est, non contingunt conuulsiones. Quod indicio est, non à calore siccante, sed à vapore aut humore maligno nervos vellicante conuulsiones provenire. Quod & hoc arguit, quod conuulsiones illæ non sunt perpetuæ, sed per intervalla sæpe recurrunt, quod fieri non posset, si à nimia exsiccatione provenirent.

Coleram quoque inter causas conuulsionis referunt; nec malè, ipsâ experientiâ teste: eam tamen tum ab humore aliquo acri & maligno provenire, cum alios nervos, tum officium ventriculi vellicante, & ita alios nervos in consensum trahente, probabile est. Sicut etiam Galenus vomitum ex bile æruginosa inter causas conuulsionis ad causas nervos vellicantes refert, testaturque, adolescentem quendam interdum vomitu bilem æruginosam rejecisse, & inter vomendum toto corpore conuulsum fuisse, & simul vt euacuata est ærugo, protinus conuulsionem cessasse, *5. aphor. 1. 12. method. medend. & 5. de loc. aff.*

Eadem ratio est hellebori & aliorum fortium purgantium medicamentorum. Etsi enim quidam statuunt, siccando, & nimia inanitione hæc spasmus producere: tamen ipse Galenus, *5. aphor. 1.* & plerique interpretes eius agnoscunt, non tam ab inanitione & exsiccatione, quam à vellicatione nervorum conuulsionem provenire. Et omnino rationi consentaneum est, potius à re molesta nervos vellicante, siue sit ipsum medicamentum, siue humores vitiosi à medicamento agitati, quam inanitione, conuulsionem tum fieri: cum sæpe tam breui temporis spatio post sumptum tale medicamentum accidat, quo non probabile est, tantam interea inanitionem factam fuisse, è qua nervi exsiccari & corrugari quasi potuerint. Et contra sæpe in dysenteria & alui profluvio longo tempore fluxus durat, corpusque satis inaniant, neque tamen vlla inde sequitur conuulsio.

A frigore quoque interdum accidunt conuulsiones; refertque Forestus, *lib. 10. observ. 13. in Schol. & lib. 10. observ. 104. in Schol.* Fridericum, Comitem de Alta flamma, ex largiore aquæ frigidæ potu in Conuulsionem incidisse. Verùm frigus nec siccando nec replendo id præstare potest, sed potius quia vel nervis inimicum est, vel crudos ac vitiosos humores in corpore retinet, febrémque auget.

Eodem modo in vulneribus capitis interdum neque ex repletionem, neque ex inanitionem Conuulsiones accidunt, sed quia à sanie collectâ membranæ cerebri & nervi vellicantur.

Ita in punctura nervorum conuulsio fit, quam alij ad plenitudinem, alij ad inanitionem referunt, sed neutri, vt manifestum est, rectè: sed fit ea potius propter dolorem ac condolentiam ac consensum, & propterea etiam nervo discisso sanatur.

Et omnino tales causæ, vt frigoris & caloris im-

moderatus appulsus, nervorum & nervosarum partium vulnera & puncturæ, compressiones, inflammationes, luxationes, ciborum corruptiones, animalium venenatorum ictus & mortus, subitus terror, ira, & similia, in quibus frustra se torquent nonnulli, vt ea ad repletionem & inanitionem referant, rectissimè ad vellicationem nervorum referuntur, quam res tales vel ipsæ præstant, vel humores in corpore commouent, qui id efficiant.

### *Differentia.*

Præcipuæ differentia sumuntur à loco affecto, qui est nunc totum corpus, nunc pars vna vel plures. Et in primis notabilis, & ab omnibus Medicis proposita est cervicis ac spinæ dorsæ, & hinc totius corporis, conuulsio. Cuius tres sunt species: Prima est *ἐμπροσθεν*, quando non solum cervix, sed & reliquum corpus in anteriora conuellitur, & mentum pectori penè admoventur, vt æger corpus erigere non valeat: fitque musculis, qui corpus in anteriora flectunt, affectis, & ad principium suum reductis.

Altera est *ὀπισθεν*, quando cervix & spina versus posteriora flectitur, quod fit affectis musculis, qui corpus posteriora versus flectunt. Tertia *πλάγιον*, in qua cervix & reliquum corpus rigidum ac in neutram partem flexile apparet. Etenim in isto affectu partes manifestè conuulsæ non apparent, sed æqualiter & antè & retrò tensæ in æquilibrio permanent, quemadmodum in illo motu voluntario secundum naturam, qui *τονικός* dicitur. Et corpus hoc modo affectum propriè rigidum dicitur. Celsus tamen, *lib. 4. cap. 3.* quamlibet istarum differentiarum rigorem appellat.

Deinde huc referenda & illa differentia, cuius supra mentionem fecimus, quod conuulsio in genere accepta alia est perpetua, nullis motibus ac concussionibus interrupta, qua membrum contractum manet, quæ propriè conuulsio & Spasmus est, in qua cerebrum saluum est; alia, quæ membrum variis motibus hinc inde agitur; quod fit, cum causa per corpus variè mouetur, & plerumque accidit cerebro affecto, & conuulsivus motus propriè dicitur. Istam tamen nominum distinctionem Medici accuratè non observant, sed passim etiam conuulsivos illos motus conuulsiones appellant. Spasmus autem propriè appellatum vulgò ex Arabibus proportionatum ad materiam; conuulsivos verò motus Spasmus non proportionatum ad materiam, seu per alicuius partis consensum nominant. Et quidem hunc non proportionatum ad materiam ideo dicunt, quod non propter materiæ nervos implentis copiam, nec ob eius inopiam, quam siccitas nervorum sequitur, ortum habeat, sed quod proveniat ex appulsu rei paræ, aut nihil proportionatæ ad materiam, nervoso generi inimicæ, quæ ex parte aliqua, cuius causatum hic morbus oritur, ad principium nervorum per partes nervosas transmissa, nervos vellicat, & ad expellendum id, quod molestum est, per hunc motum incitat. Seu, vt Capiuaccius explicat, appellatur non proportionatus ad materiam in quâ, quæ est musculus; cum musculus à facultate animali liberè mouente non moueatur, sed ab expultrice, quæ est facultas naturalis.

### *Signa Diagnostica.*

Spasmus seu conuulsio propriè dicta facilè cognoscitur, quod videlicet pars præter voluntatem versus nervorum musculique originem contrahitur, ac rigida manet, vt flecti ad voluntatis arbitrium non possit. In conuulsivo verò motu eadem fit contractio, sed non semel, verùm sæpius, ac pars variè concutitur atque agitur. Præterea, vt dictum, sensus reliqui in conuulsione verà integri sunt; in conuulsivis verò motibus plerumque simul læduntur.

Acque

Signum pa-  
thognomoni-  
cum.

Atque ista præter voluntatem contractio sola ad Spasmodum & motum conuulsium indicandum sufficit; atque vnicum signum pathognomonicum est. Nam et si & alia conuulsis symptomata accedant: tamen non semper hoc euenit. Dolor quidem satis frequenter adest: non tamen semper, vel quia sensim fit contractio, vel quia membrum ultra modum & naturalem terminum non contrahitur.

Ita interdum etiam febres coniunguntur, ægri modò calent, modò refrigerantur, modò palleſcunt, modò facies rubet & turgēt, ob inordinatum sanguinis & humorum motum: nonnunquam vrina est bona; nonnunquam magna vrinae crudæ copia emittitur; aliquando vrina retinetur, & alius supprimitur. Verùm hæc pathognomonica signa non sunt.

Motus con-  
uulsui à re  
motu differe-  
tia.

Conuulsus equidem motus tremorem non nihil quandoque refert; verum facile ab eo discernitur, quod in tremore semper concurrat voluntarius motus; Conuulsio verò planè præter voluntatem accidit; tremorque solum fit in vnam situs differentiam cum conuulsus motus varius esse possit.

Spasmi à  
Paralyſi dif-  
ferentia.

A paralyſi quoque Spasmus facile discernitur; quia membrum conuulsium non sine difficultate, vel etiam dolore extendi potest: at membrum resolutum sine omni difficultate partis sanæ, vel astantium operâ extendi potest. Præterea in Spasmo nerui & tendines rigidi ad tactum percipiuntur; in paralyſi non item. Spasmus denique breui temporis spatio vel ad salutem vel ad mortem terminatur; cum paralyſis sine vitæ periculo in multos annos durare possit.

Vbi autem causa mali hæreat, è partium conuulsarum numero cognoscitur. Etenim si cum toto corpore faciei quoque muscoli conuellantur, & vnà sensus interni ac externi afficiantur, cerebrum ipsum affectum est: si verò sensus omnes constant, neque faciei musculi conuellantur, verum totum corpus afficiatur; spinalis medullæ principium laborat. Vbi verò pars aliqua saltem conuellitur, nerui ac musculi eius membri motui interuenientes afficiuntur, sicut antea de Paralyſi dictum est. Quam ad rem musculorum & neruorum ex Anatome cognitio necessaria est. Cuius verò partis consensu cerebrum afficiatur, ex eius affectû signis patet.

Recensent hic Authores plerique etiam signa, quibus cognoscatur, an ex plenitudine vel inanitione conuulsio fiat. Verum cum ex hypothesi ista omnia dicantur, vt ea hic afferamus, opus esse non puto. Qui verò humor peccet, id ex suis signis hic & alibi propositis cognoscitur. Causæ euidenter etiam ex ægri vel astantium relatione cognoscuntur.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Quò motus in conuulsione est vehementior & diuturnior, aut plures, vel cerebro vicinas partes occupat, aut nobiles, & quarum actiones valde necessariae sunt, lædit, respirationem difficilem & interruptam, thoracis vel septi musculis conuulsis, efficit, eò periculosior est. Tales enim conuulsiones grauissima inferunt symptomata, maximos ac continuos dolores, vitium prostrationem, lipothymiam & syncopen; vigilias, difficilem respirationem ac suffocationem, quæ omnia hominem iugulare possunt. Contrà verò, vbi partes à cerebro remotæ aut ignobiles conuellantur, minus periculi est.

2. Facilius curatur conuulsio, si cerebri consensu fiat, quam si primario affectu nerui laborent: nisi tamen affectus, quo cerebrum laborat, ipse pertinax sit; quod in inflammatione cerebri accidit. Neque enim ob vehementia symptomata, dolorem, vigilias, æger diu durare potest, affectus verò breui tempore curari non potest.

3. Si toto corpore ab affectione immuni, aut labrum

conuellatur, aut palpebra, aut lingua, prauum symptoma putandum est, & quod magnos timores afferat, et si affectæ partes parua esse videantur. Paul Aegineta, de re Med. lib. 3. c. 19. Cerebrum enim ipsum tum affectum est.

4. A copioso sanguinis fluxu singultus aut conuulsio, mala, 5. Aphor. 3. Et. A sanguinis profluvio desipientia, & conuulsio, malum, 7. Aphor. 9. non tam ob inanitionem, quam ex motu & insultu bilis ac humorum prauorum sanguine enacuato.

5. Ab ægræ præparatæ conuulsio aut singultus, malum, 5. Aphor. 4. Et. Conuulsio ab helleboro lethalis, 5. Aphor. 1. Et. A medicamento purgantis potione conuulsio mortifera, 7. Aphor. 25. quod accidit, vt antea etiam, non quòd helleborus & similia medicamenta neruos ira exsiccant & contrahant, sed quòd qualitate maligna eosdem stimulant, & laceſcant, aut humores, qui id præstant, agitent. Non tamen semper conuulsionem à medicamento purgante fortiore lethalem esse, sæpe experientia docuit, atque ipse aliquot, qui post sumptam colocynthidem & mercurialia medicamenta conuulsionem passi sunt, atque euaserunt, curauit.

6. Ab ileo vomitus, singultus, conuulsio aut delirium, malum, 7. Aphor. 10. Nonnunquam enim singultus à materia, quæ præclusa per inferiora exitu sursum vomitione expellitur, concitatur, officio ventriculi ab ascendente praua materia vel vaporibus irritato. Si verò ad cerebrum vapores terri efferantur, aut cerebrum officio ventriculi consensuat, conuulsio aut delirium oritur, prout vel mentis officina, vel nerui offenduntur.

7. Si muliebri profluvio conuulsio aut animi defectus superueniat, malum, 5. Aph. 56.

8. In acutis febribus conuulsio & circa viscera dolores vehementes, malum, 4. Aphor. 76. Et. Propter ardores vehementes conuulsio aut tetanus, malum, 7. Aph. 67. quia indicium, materiam sursum ad cerebrum ferri. Et. In febribus spiritus offendens malum est: conuulsionem enim indicat, 4. Aphor. 68. ob musculos scilicet thoracis initium conuulsionis iam sentientes. De Conuulsionibus in febribus passim etiam alij aphorismi extant apud Hippocratem: In febre non intermitte, si labrum, palpebra, vel oculus, vel nasus, vel supercilium peruertatur, vel non videat, vel non audiat, iam debili existente corpore, quicquid horum eueniat, mors in propinquo est, 4. Aph. 49.

9. Conuulsiones, quæ perniciosas phrenitidas sequuntur, lethales sunt. Scribitque Aetius: tetrah. 2. ferm. 1. cap. 131. se neminem ex iis, qui sic conuulsi sunt, seruatum vidisse, neque, qui vidisset, audiuisse.

10. A vigiliis conuulsio aut desipientia, malum, 7. Aphor. 18. non quòd nerui calore vel vigiliis nimium exsiccati sint, sed quòd humores vaporesque prauis per vigilias geniti & agitati, cerebrum & neruosum genus laceſcant.

11. Conuulsio à vulnere pernicioſa, 5. Aphor. 2. ob saniem neruos vellicantem, & inflammationem neruos corripientem: præcipue si vulnus cerebri sit.

12. Febrem conuulsioni superuenire melius est, quam febri conuulsionem, 2. Aphor. 37. Et. Spasmo aut tetano si febris accesserit, morbum soluit, 4. Aph. 57. Febris enim ad conuulsionem accedens humores, conuulsionis causam, absumit: cum contrà si febris conuulsio accidat, à materia maligna eam prouenire, eamque cerebrum petere, & partes neruosas occupare indicio sit.

13. Quartana correpti non admodum conuulsionem patiuntur: si verò prius tentati sint, superueniente quartana liberantur, 5. Aphor. 70. Rigor enim in quartana humorem neruoso generi partim excutit;

& calor rigorem subsequens eundem concoquit & absumit.

14. Quicunque tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt; si hos effugiunt, sani fiunt, 5. *Aphor. 6.* Natura enim tam grauem tensionis, quæ utrimque fit, laborem, ac hinc ortum dolorem diu ferre nequit, & propterea primo statim dierum criticorum circuitu morbus iste iudicatur.

15. Quibus tandem hoc addimus, quod plerique, qui ex spasmu moriuntur, diu calidi manent; quia suffocati moriuntur, musculis respirationi dicatis conuulsis.

### Curatio.

#### Curatio.

Vt quisque de causis conuulsionis sentit, ita ad eas curationem dirigit. Quæ enim ab humore frigido nervos replente creditur fieri conuulsio, eam humorem crassum attenuantibus, viscidum detergentibus & euacuantibus, curandam censent, atque eodem medicamentorum genere, quæ in paralyti sunt proposita. Quam verò ab inanitione fieri putant conuulsionem, eam humectantibus, ut in hæticâ, interdum refrigerantibus, dum scilicet malum est à febre ardente; interdum moderate calefacientibus, cum scilicet immoderate euacuatio præcesserit, curandam putant.

Et quidem in Conuulsione, quam ex repletionem vocat, curanda nihil peccatur. Humor enim ille, quocunque etiam modo nervos afficiat, tollendus. Verum an humectantibus solis (quod lex methodi requirit, si malum est à siccitate) conuulsio aliqua curata fuerit, historiarum & observationes Medicorum consulantur: Forestus equidem, *lib. 10. observ. 108.* exempla conuulsionis ab inanitione humectantibus curatæ proponit. Verum si rem diligenter perpendamus, Contractura potius fuit, cuius capite præcedente mentionem fecimus quam vera conuulsio. Idem, *observ. 110.* vbi conuulsionis ex cholera exemplum habet, quam plerique ad inanitionem referunt, non humectantibus, sed calefaciente & siccante inunctione vritur. Et quamvis interdum humectantia & calefacientia adhibeantur: tamen potius ad nervos ex conuulsione rigidos nonnihil laxandos, & hoc modo ad dolorem leniendum, quam ipsam causam tollendam adhibentur. Idem Forestus, *lib. 7. observ. 17.* in conuulsione post febrem continuam, quæ vulgo inanitioni & siccitati ascribitur, inunctionem ex oleo irino & terebinth. adhibet: extra verò radicem pæoniæ de collo suspendit, & stæchadem medicamentis internis admiscet.

Itaque cum generalem causam conuulsionis vnam posuerimus, atque ab eadem causa Spasmos illos particulares provenire docuerimus, à quibus vniuersalis conuulsio & epilepsia generantur: ea quoque medicamenta Spasmo conuenient; quæ in epilepsia postea proponuntur. Ac propterea materia illa praua expultricem in nervis stimulans euacuanda & tollenda, & qualitas eius vitiosa corrigenda, causæque omnes, à quibus hoc malum exitit, aut fouetur tollenda, & omnino præcauendum, ne ex particulari conuulsione vniuersalis, & epilepsia generetur. Pleraque tamen medicamenta, quæ adhibentur ad paralytin curandam, rectè quoque adhibentur in conuulsione; cum nervoso generi amica sint, & causam Spasmi discutienti vim habeant.

Ideoque vniuersales, si opus sit, euacuationes, ut & reuulsiones, maxime per clysteres fortiores, instituuntur, postea topica, quæ in paralyti proposita, etiam hic adhibeantur. Ad curationem tamen rectè instituendam imprimis perpendendum an conuulsio fiat per se, an verò per consensum, Etenim si per se, & primum partis affectum fiat, simul quidem ad totum corpus, quod plerumque vel cacochymia laborans causam in

parte affecta fouere vel augere potest, principaliter tamen ad partem affectam curatio dirigenda. Si verò per consensum fiat, partis illius, cuius consensu malum excitatur, habenda ratio, ut postea dicetur.

Primo ergo in conuulsione per primum membri affectum videndum, an sanguis abundet; itaque pro abundantia & virium ratione copiosius vel parcius educendus. Hippocrates etiam, & Galenus, 4. de *vi- eturati. in act. 1. 28.* cum ob spirituum interceptionem & venarum *eturati. in act. 1. 28.* conuulsio excitatur, venam aperit, sed adhibitis prius fomentis & frictionibus, ut Huxus sanguinis adiuvetur.

Si verò ætas & vires venæ sectionem non admittant, cucurbitulis vtendum est cum scarificatione, primo quidem longius à parte affectâ, deinde, corpore bene expurgato, etiam in parte conuulsâ, in qua materia fixa est.

Applicentur dorso & cruribus, si sanguis in toto abundet: si in parte, pro vario eius situ etiam locus cucurbitulis querendus est. Paulus *Ægineta, lib. 3. cap. 19. & 20.* si crura sint conuulsâ, applicat coxis & postremis spinæ vertebris; si manus, primæ dorsi vel thoracis; si latrum tantum, aut palpebra, aut lingua, occipiti & primis ceruicis vertebris: in tetano ceruici apponit &, utrinque ad spinam, & pectori, quo musculis magis munitum est, & præcordiis, & ad vesicæ ac renum locum. Diligenter tamen cauendum, ne tendinibus musculorum cucurbitulæ affigantur.

Hinc ante topicorum usum ad totius corporis euacuationem accedendum, & pro materiæ ratione præparatio ac purgatio instituenda, ut, *capite præcedente*, dictum, & postea etiam de epilepsia dicetur. Si tamen fortis sit conuulsio, & partis nobilioris, siue totius corporis, ad purgationem festinandum est, materiâ etiam nondum præparatâ: semperque *castoreum* purgantibus admisceatur.

Simul fiant Reuulsiones omnis generis, maxime per clysteres, fortiores etiam, quam in paralyti: adhibeantur quoque frictiones ceruicis, spinæ, spatularum, manibus oleo lilior. albor. lumbricor. terrestr. vel castor. intrinsecis, idque sæpius in die; præsertim vbi dolor vrget: & dum frictiones intermittuntur, spina & conuulsæ partes à frigore custodiantur, vel, ex Celsi consilio, malagma aliquod ex calefacientibus imponatur. Membrum quoque conuulsam ad naturalem figuram sensum reducat.

His peractis veniendum est ad Topica materiâ resoluentia & discutientia; ut sunt olea, linimenta, vnguenta, fortis, sacculi, infusus, balnea naturalia & artificialia.

Et quidem cum materia crassior esse videretur, aut cum calor adest, vel corpus valde siccum est, ne siccantium & calefacientium usu nimio materia induretur, &, ut dolores illi, qui ex violenta membrorum contractione oriuntur, leniantur, medicamenta simul anodyna sint. Hinc Auicennas laudat renes pingues arietis, hœdi aut vituli, quos in parte affecta detinere iubet, donec exsiccentur. Postea membrum conuulsam inuoluit lanâ, quæ perfusione olei semper madida seruat. Idem quoque balneum ex oleo communi & lacte parat. Ac inseruit huic scopo etiam malua, borrago, althæa, fœnum græc. ol. amygdal. dulc. adeps gallinæ & vituli; quæ aliis, quæ spasmu propriè conueniunt; admiscuntur.

Sunt autem illa, *ol. vulpin. de castoreo*, & quod ex *castellis pinguibus* paratur, ut & *pinguedo anserum sylvestrium*, cuius præparationem, sicut & pinguedinis vulpinæ, peculiarem docet Hollerius, *cap. de Conuulsione*. Vtile est & *oleum Philosophorum*, iuniperi, laurini, rutæ, terebinth. petroleum, Balsamum sulphuris, gummi hederæ, Ammoniac. galbanum, & oleum seu balsamum galbani. in Institutionibus, *lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 33.* descriptum.



Vel ℥. Ol. terebinth. lumbric. terr. an. Vnc. j. s. pingued. human. Vnc. j. canis Vnc. s. Misce.

Vel ℥. Unguenti dialthée ℥. vj. ol. terebinth. chama-  
mel. an. Vnc. j. laurindul. ℥. iij. caryophyll. cinamomi, ligni  
aloes, an. Drach. j. s. styrac. liquid. calam. an. Drach. ij. F.  
Vnguentum.

Vel ℥. Ol. aneth. chamamel. an. ℥. j. vnguent. Martiat.  
Vnc. s. ol. perla, spica, an. Drach. j. spirit. vini Drach. iij.  
Misce.

Vel ℥. Ol. laurin. ℥. iij. spica, vulpin. lumbricor. an. ℥. j. s.  
destill. succini, galban. an. gutt. vj. ruta, anethin. an. gutt.  
iij. nuc. mosch. expr. Drach. j. s. Misce.

Vel paretur hoc Oleum, quod in Spasmo in vulne-  
ribus utile est:

℥. Ol. rosac. chamamel. lilior. alb. an. lb. s. matrifylu.  
betonic. rosar. an. ℥. j. asyrii humidi ℥. iij. vini nigrit. j.

Coquantur in vase duplici ad vini consumptionem  
atque exprimantur.

Commenendatur & hoc: ℥. Mustelam in frustra dis-  
sectam, imponatur in anserem pingue, additis herbis &  
aromatibus conuenientibus: pyrethro, saluia, lauen-  
dula, sinapi, castoreo, & similibus, anserque ad ignem  
lentum affertur, & pinguedo vsui seruetur.

Inunctæ partes pellibus inuoluantur, vulpium, ca-  
torum syluestrium, aut vesica apponatur oleo calefa-  
cto semiplena.

Ægineta in tetano diuturno in solium olei calentis  
ægrum descendere iubet bis quotidie; non diu tamen in  
ipso moram trahere, ne vires exsoluantur.

Posiunt etiam balnea fieri ex herbis conuenientibus  
additâ olei parte tertiâ, vel inunctis mox à balneo par-  
tibus conuulsis.

Nonnulli vruntur sequenti decocto carnis vulpinæ  
pro Balneo, quod singul anodynum est:

℥. Carnis vulpin. ab ossibus separata lb. ij. sal. commun.  
M. ij. Coqu. ad perfectionem. In decocto colato ebulliat  
summit. anethi M. j.

In quo decocto calefacto ponantur manus vel pe-  
des per 2. vel 3. horas, tribus vel pluribus diebus.

Potest & tale Fomentum parari:

℥. Agrimon. betonic. an. M. j. s. saluia, chamamel. cha-  
mepit. an. M. j. origani, calaminth. pulegi, serpilli, hype-  
perici, stœchad. vtriusque, an. M. s. anethi, meliloti cha-  
mamel. an. M. s. Misce & in aqua communi decoq. &  
decocto pars affecta fricetur.

Alij hoc Emplastrum commendant:

℥. Colophon. Vnc. ij. picis naut. resina, an. Vnc. j. thuris  
mastich. ceruss. an. ℥. s. sangu. dracon. nitri, sal. Ammoniac.  
terebinth. an. Dra. ij. cera noua ℥. ij. vitriol. albi ℥. ij. mar-  
perlar. Vnc. ij. lap. magnet. ℥. s. succini flau. ℥. j. s. ol. ouor.  
rosar. an. Drach. ij. F. a. Emplastrum, quod alutæ indu-  
ctum imponatur.

Vtilis est & aqua Antispasmodica, quâ locus affe-  
ctus fricandus:

℥. Fol. lauri, rorismar. an. M. j. s. flor. rosar. rubr. M. ij.  
serpill. M. s. flor. laurindul. ℥. iij. rad. ireos ℥. iij. cinamomi ℥.  
j. macis. Drach. j. Concul. & concis. macerentur in aq. fl.  
tilie Menf. j. s. saluia Menf. s. hinc destill. in MB. Liqueor  
destillatus seruetur.

*Balnea sicca.* Efficacissima verò sunt balnea sulphurea, Conue-  
niunt & Balnea sicca seu vaporosa è decocto saluiæ, ro-  
rismarin. stœchad. chamæpit. origan. iuniperi, & simi-  
lium, lapidibus ignitis, aut scoriis ferri ignitis infuso.

In vsu tamen horum medicamentorum omnium,  
quod antea etiam monui, obseruandum, ne subito sic-  
centur partes, ne tendinibus induratis malum grauissi-  
mum ægro concilieretur, & membra contracta maneant.  
Ideoque à mitioribus inchoandum, vt ol. chamæmeli,  
pinguedine anseris, medulla crurum bouis, oleo  
vulpino, lumbricorum; hinc ad fortiora ascen-  
dendum.

*Medicam.* Intra corpus sumptum castoreum cum mulsâ, aut  
alia aqua conueniente valde efficax est.

Inprimis verò essentia castorei cum spiritu vini extra-  
cta, gutt. v. vel vij. dosi in aqua saluiæ propinata, simul-  
que extra loco affecto illita, valde utilis est.

Vel ℥. Elect. dacori. Vnc. j. s. conferv. fl. saluia, betonic.  
an. ℥. j. rad. pyreth. cond. ℥. iij. theriac. el. ℥. j. Mithridat.  
spec. diacastor. an. Drach. s. extr. radic. cardopat. Scrup. j.  
Cum syrup. de stœchade Fiat Electuarium, de quo ma-  
ne & vesperi capiat quantitas nucis moschatæ.

Aliud:

℥. Conferv. pæon. rorismar. an. Vnc. j. maioran. betonica  
an. Vnc. s. primul. veris Drach. iij. bngloss. Drach. ij. pulu.  
sem. cardui ben. fenicul. an. ℥. j. rad. pæon. ℥. iij. nuc. mosc.  
cond. ℥. iij. s. cort. citri condit. zingib. cond. an. ℥. vj. ga-  
langa cond. calam. arom. an. ℥. j. s. cinamom. acut. ℥. sem.  
Incisis incidend. misc. Cum. syrup. pæonia. F. Electua-  
rium.

Vtilis est Aqua hirundinum composita, sicut & in  
epilepsiâ, quæ hoc modo paratur:

℥. Pullos hirundinum domesticorum è nidis extra-  
ctos, num. lx. purgentur, (quod fit demendo tantum ex-  
tremities pennarum grandiorum, capitibus pennarû, *Aqua hi.*  
vel radicibus in corpore relictis non euulsis) & lotis *rundinum*  
vino (alij integras comburunt in olla noua) affunde *composita.*  
vini Maluatici lb. iij. vel. q. s. adde semin. fœsel. cardui  
bened. an. Vnc. s. calami arom. cyperi longi, an. Drach.  
ij. fol. maioran. ruta. an. M. s. rasura C. C. visci querni, un-  
gula alcis an. Vnc. s. radic. pæon. ℥. a decrescenae collecta-  
rum Vnc. ij. castorei Vnc. j.

Stent in infusione per vnam atque alteram septima-  
nam, postea destillantur in B. M. vel arena. Atque hæc  
Aqua hirundinum dulcis appellatur.

Alij loco vini Maluatici sumunt acetum, & Aqua  
hirundinum acida appellatur. Dosis aquæ est à Drach.  
s. ad Vnc. s. pro ratione ætatis. Datur vel sola, vel  
mixta cum saccharo, aut cum duplo aquæ flor. tilia, vel  
lilij conuallium. Ad tetanum etiam laudatur lotium  
caprinum cum aqua mixtum, & ieiuno ægrotanti ex-  
hibitum.

Paulus Ægineta, de re Med. lib. 3. c. 10. scribit, con-  
uulsis acanthi radicem & spinæ albæ semen potum,  
itemque spinæ Egyptiæ opitulari, quosdam etiam  
centaurij tenuis succum exhibere refert. Ibidem, c. 30.  
in robustis exhibet aquam mulsam ad. dimidias deco-  
ctam, & panacis Drach. j. Dar & Ammoniacum, & suc-  
cum Cyrenaicum erui magnitudine.

Laudatur valde hoc Electuarium.

℥. Castor. sagapeni, opopanax. an. Drach. j. succi  
Cyrenaici Drach. j. s. acori, scordij, an. Drach. ij. s. trium pi-  
per. schœnanth. carni, an. Drach. ij. asari, scilla assata,  
an. Drach. j. s. radic. ireos, sem. apij, mastich. an. ℥. j. suc-  
ci stœchad. Arab. Vnc. j. mellis. q. s.

Terenda terantur, & melle anthosato excipiantur.  
F. Electuarium, cuius exhibetur quotidie Drach. s. cum  
aquamulsâ.

Cardanus, de curationibus admirandis. cap. 15. quæ-  
dam opisthotono laborantem curauit abstinentiâ à car-  
nibus, vino & ouis, linteis in ol. chamæmel. & lilias.  
madefactis perpetuò impositis ceruici, partibusque,  
quæ contrahebantur, & medicamento; quod con-  
stabat ex Mithridatio, & electuario de moscho  
cum margarit. hyacintho, smaragdisque Orienta-  
libus.

Hippocrates, 5. Aph. 21. & 3. de morbis largam perfu-  
sionē aquæ frigida probat in mediâ ætate in tetano si-  
ne vlcere; (nâ vlceratis frigus nō cōuenit, quia est mor-  
dax, suppurationemque impedit) quod Galenus etiam  
ad alias conuulsionum differentias accommodat, vbi  
scilicet æger iuuenis est, non infans, & tem-  
pus æstiuum. Ita enim calor natiuus clausis poris cu-  
tis intro cogitur, & per accides absimitur morbi mate-  
ria, seu à subita aquæ frigida perfusione corpus frigore  
concuritur, & materia nervis adhærens excutitur. Et si  
vero Paulus Ægineta, loco allegato, hoc remedium im-  
probatum

An conuuls  
aqua frigida  
perfundendj.

probatū esse scribit à posteris, quod & ipse rejicit: tamē reperti sunt, qui post eum id vsurpauerunt, inter quos est Valescus de Taranta, lib. 1. cap. 21. qui duos tetano laborantes hoc modo curauit: Aegrum à quatuor viris erectum tenere iussit, & 24. vrceos aquæ supra collum & omnia inferiora membra eius perfudit, & statim eum collocauit ante ignem, & post seiqui horam inunxit eū à collo vsque ad vltimam vertebra & lumbos ac brachia vnguento dialthææ, Marriato, & Agrippæ, ac oleo castorei, ipsique iusculum pulli propinauit: vterque æger hoc modo conualuit.

Nonnulli ad spasmus curandum etiam febrem inducendam putant: de quo quid sentiendum sit, *questio- ne 2. dicemus.*

### *Diaeta.*

*Diaeta.*

In hac conuulsione victus ratio sit eadem, qualis in paralyti proposita est. In cibo vitetur coturnix: cum ex eius vsu, vt Auicennas scribit, periculum Spasmi & Tetani imminet, non solum quia helleboro vescitur, verum etiam quia à tota substantia eam vim habet. Decoctum ligni Guajaci, sarsaparillæ vel lassafas cum victu attenuante & incidente egregiè tam generationem humoris pituitosi prohibet, quàm generatum ac nervis adhaerentem abluunt, at nervos roborat. Acerum etsi insignem vim attenuandi crassos humores habet, tamen quia nervis inimicum, seu solum, seu cum aliis mistum, est vitandum. Danda etiam opera, vt membra conuulsa extendantur, sed lentè, ac sensim. Sic enim conuulsione minus affliguntur, nec materiam nervos impetentem admittunt. In primis verò si maxillæ conuellantur, præcauendum tunc, vel alia re interiecta, ne dentibus linguæ damnum inferatur.

### *Conuulsionis per consensum Curatio.*

*Conuulsionis per consensum Curatio.*

Conuulsionis autem per consensum eadem ferè curandi ratio est, quæ epilepsiæ per consensum, vt suo loco diceretur. Nimirum, vt pauca addamus, si ab ore ventriculi succis acerbis vellicato conuulsio fiat, Galenus vomitū præcipit, 1. 2. *meth. med. c. vltim.* aut, ne os ventriculi transitu maligni humoris magis offendatur, pilulis ille per aluum subducatur, aut clystere acri.

Si ex cholera acutissima fiat, simili ferè ratione curatur, addendo quæ os ventriculi roborant. Ita cum bilis eruginosa in ventriculo hærens conuulsionem excitat vomitu rejicienda.

De curatione Conuulsionis ex vteri vitio videatur Galenus, 6. *de loc. affect. cap. 5.*

A venenati animalis ictu orta conuulsio curatur vinctulis supra partem læsam iniectis, teste Galeno, 3. *de loc. affect. c. 7.* & cucurbitulæ cum magna flamma, vel cautèrium actuale supra partem læsam apponatur; ac præterea veneni illius, quod iniectum est, antipharmacon exhibeatur, aut si hoc ignoretur, ad communia alexipharmaca confugiatur, & exhibeatur theriaca vel gentiana, saluia, vtraque aristolochia, dictamnus Creticus. Extra quoque vulnere theriaca cum oleo rosaceo mista imponenda. Vulnus diu apertum seruetur: de quo plura de venenis.

Quæ à vulnere conuulsio existit, cum non omnis lethalis existat, curatur prouidèdo, ne phlegmone nervosa pars apprehendatur, misso etiam sanguine si non satis effluerit; postea dolorem sedando per frictionem continuam cum oleo lumbricor. terrestrium. In punctura nervi si foramen sit angustius, ferro id dilatetur, vt medicamenta penetrare, & sanies exstillare queat: cauendo tamen, ne aucto dolore conuulsio ingrauescat. Dolori medetur terebinth. cum ol. rosac. mista. Spina dorsali oleo liliorum albor. & terebinth. inungatur; vel vulnere instilletur sulphur, (aut loco eius Balsamum sulphuris) aut parum euphorbij dissolutum

in oleo rosaceo & terebinth.

Vel *℞. Cere Vnc. j. picis, terebinth. an. Vnc. ss. euphorbij Drach. j. f. Emplastrum.*

In corporibus mollibus euphorbij dosi minui potest. Ista tamen vehementer calida & acris non applicanda nervo detecto, sed in profundo condito. In punctura enim nervi medicamenta exsiccare, sed sine mordacitate, debent. Talia medicamenta parantur ex calce læpe lora cum oleo rosaceo mista.

Quod si conuulsio his remediis non sanetur, ne cerebri, ac toto nervoso genere in consensum tracto æger de vita periclitetur, nervus per tranversum, paulo supra locum vulneratum, præscindendus. Præstat enim motum vel sensum partis amittere, quàm de vita periclitari. De quibus plura Galenus, 6. *meth. med. cap. 2. & 3.*

A meningum punctura cranium trepano aperiendum, vt materia transpiret; aut epispasticis extrahenda nisi plenitudo subsit.

Reliqua ex curatione epilepsiæ & paralytis petantur. Et quidem medicamenta interna præcipuè è cura epilepsiæ; topica è cura paralytis. In primis castorei intra & extra assumpti magna efficacia est, quia non solum maximam attenuandi & dissoluendi vim habet, verum etiam nervosis partibus proprietate quadam singulari conuenit.

### *Spasmi flatulenti curatio.*

Si à flatu Spasmus ortum habeat, qui vulgò *der Krampff.* appellatur, musculorum inuoluntariæ extensioni voluntaria contrarietum musculorum, qui conuulsis musculis opponuntur, extensio opponenda. Ita enim flatus, qui musculos contrahebant, ab iis repelluntur & quasi excluduntur. Atque hoc modo paroxysmus sæpe facillè tollitur; præcipuè in musculis, qui suram constituunt, & pedes digitosque mouent. Quod si non tantum in pedibus, sed & alibi, & in maxilla inferiore accidit, periculum epilepsiæ imminet. Si verò extensione in contrarium non tollatur iste Spasmus, clyster, ~~si~~ si opus sit, flatus discutiens iniciatur. Extra verò membrum decocto flor. chamæmeli, meliloti, rutæ, saluiæ, fol. lauri foueatur, fricetur; & inungatur ol. costino, de castoreo, de spica, & similibus. Vtilis est & spir. vini, præcipuè in quo si chamæmel. & lauend. macerati fuerint, seu aqua aliqua Apoplectica & Epileptica, si ea membrum illinatur. Theriaca quoque in spiritu vini dissoluta valde prodest. Poteest & hoc Cataplasma apponi:

*℞. Absinth. pulegi, rutæ, an. M. j. baccar. lauri p. j. cumini Vnc. j.*

Coquantur in vino, & cum melle f. Cataplasma. Vel sacculus ex milio, fursure & sale imponatur; cui addi possunt fl. chamæm. meliloti, baccæ iuniperi, lauri, semen cumini. Ager verò caueat sibi ab aère frigido, nec membra aqua frigida humectet. Cibos flatulentos, crapulam, cruditatem & nimiam Venerem fugiat.

Chymici in hoc affectu commendant tincturam & liquorem *℞.* corallior. medicamenta ex sulph. Balsamum gummi hederæ & elemi, essentiam & ol. destillatum radic. Imperatoriæ, magisterium hyacinthi.

Inter amuleta ab autoribus recensentur, vngula alcis annulo inclusa, vel aliàs gestata, tendines eiusdem, radix eryngij, tormentillæ, & bistortæ de collo appensa, magnes item, corallia rubra, lignum vilci querni.

\* \* \*

## QVÆSTIO. I.

*Qua sit proxima Conuulsionis causa?*

Causa proxima Conuulsionis etsi sit musculi versus suum principium contractio: tamen quia hoc ipsi cum motibus voluntariis commune est, de alia causa Medicus sollicitus sit, necesse est, ob quam præter naturam & voluntatem sit hæc contractio, quæ conuulsionem parit. Verum res hæc plurimis controuersis inuoluta est, & siue veteres, siue recentiores consulas, difficultatē non caret, ut raro inuenias, quæ animum veritatis audire faciant. Quia autem plura de hac quaestione instituit, diximus, istis repetendis tempus & operam perdendam non puto. Pauca ergo saltem addam. Galenus equidem, ut Iacchinus aperte confitetur hac in re varius est, & parum sibi similis. Interdum enim duas illas causas ab Hippocrate, 6. Aphor. 39. positas, inanitionem & repletionem scilicet, solum ponit; alibi verò, ut 5. Aphor. 1. tertiam causam addit, vellicationem partium nervosarum à re molesta. Et quidem ad hanc causam multæ causæ euidentes facile referri possunt, in quibus ad plenitudinem vel inanitionem referendis vulgò Medici frustra laborant, & ipsi inter se dissentiant.

Sunt equidem, qui putant, temerè ab Hippocratis doctrina recedi, idque ideo fieri à quibusdam, quod fundamenta, quibus ea innititur, non assequi queant. Fundamentum autem esse, quod Galenus, 2. de Symptom. causis, cap. 7. 2. de loc. affect. cap. 7. libr. 3. cap. 6. proponit, nimirum similitudinem inter motum voluntarium & conuulsionem. Ut enim in motu voluntario musculi versus sua principia contrahuntur, contractique simul attrahunt partes, in quas inseruntur: ita conuulsione eodem planè modo *ἀνωτὸς* musculos ad sua principia contrahi. Quod fundamentum equidem libenter concedimus, & hactenus aliquoties proposuimus. Dum verò subsumunt, hoc tantum fieri ob nervosorum corporum repletionem & inanitionem, principium petunt, & plurimum falluntur. Neque enim in sanis, & dum secundum voluntatem fit motus, repletio & inanitio est contractionis causa. Neque etiam ipse Galenus, & qui Hippocratem sequuntur, Medici duas has solum causas constituunt, sed vellicationem à re molesta addunt. 5. Aphor. 1. Neque à repletionem vel inanitionem conuulsiones oriri id satis probat, quod causæ cum internæ tum externæ, quæ ad plethoram & cacochymiam faciunt, conuulsionis causa sunt. Id enim tantum docet, conuulsionem fieri in corporibus vel plethoricis, vel cacochymicis. Quo verò modo non paralytis, non alius affectus à plethora & cacochymia proveniat, sed conuulsio, id non docet. Ita etiam quamvis euacuationes instituantur, id tantum inde colligi potest, plethoram vel cacochymiam tollendam esse, quod conuulsioni cum multis aliis affectibus commune; non verò probat, quomodo inde conuulsio proveniat.

Et causa illæ duæ tot difficultatibus sunt inuolutæ, ut nemo ex iis se hactenus expedire potuerit. Ad inanitionem quomodo puncturas, ictus animalium venenatorum, vsum medicamentorum purgantium & malignorum, & similes causæ referri possint, nonnulli quidem se variis modis torquent, sed frustra, ut etiam in Institutione dictum. Et quidem hoc concedimus, chordas, lora & coria exiccata absumpto humido breviora fieri, corrugari & contrahi: sed quomodo hoc in nervis ab istis causis fiat, nondum docere potuerunt. Ideoque plerique doctiores Medici, qui alias vulgarem doctrinam sequuntur, causas istas plerasque non exiccando nervos, sed vellicando eisdem, causam spasmi esse, vltro concedunt.

Nec magis feliciter in altera causa, scilicet repletionem, se expediant: neque dum causam reddere

*Dan. Sennerti Tom. II.*

potuerunt, cur humor pituitosus nervos replendo potius conuulsionem, quam paralytin efficiat. Scribitque Iacchinus, Avicennam difficultatem hanc vidisse, sed sic respondisse, ut à nemine intelligatur. Neque simile, quod de chordis & coriis hic adducunt, quadrat, quod scilicet quod accedit latitudini, à repletionem decedat longitudini. Hoc quidem verum est, quod corpora, quæ manifestam habent cavitatem, & rendi possunt, si in latum distendantur, breviora fiunt, & quod latitudini accedit, longitudini decedit. Quæ verò cavitatem manifestam destituuntur, ut lora, coria, & ipsæ nervosæ illæ fibræ, si humectentur, & secundum longitudinem, & secundum latitudinem laxiora fiunt: ut manifestè hoc in coriis, ut & in lignis, si aquam vel aërem humidum imbibant, fieri videmus, quæ & secundum latitudinem, & secundum longitudinem plus spatij occupant, & iterum exsiccata & secundum latitudinem, & secundum longitudinem immi- nuuntur.

## QVÆSTIO. II.

*An febris pro Spasmo curando excitanda sit?*

Cum febris superueniens spasmuum curare possit, ut ante diximus, de febre excitanda Autores dissentiant. Alij id planè improbant. Arabes Ephemeram concedunt. Galenus, 6. Epidem. comment. 6. aphor. penult. cum alias febres, tum ex diuturnis quartanas potissimum: Hippocrates & Galenus 1. Prorrh. comm. 2. aphor. 50. ita moderatam, ut nec nimium debilis nihil vel parum efficiat, nec nimium vehemens aut maligna vires exol- nat. Ideo Numenij filium obortâ apoplexiâ febri debili ac diuturna subsecuta haudquaquam sanatum fuisse. Verum febrem semel accensam deinceps ita temperare ac moderari, ut morbum solum expugnet, & naturæ non noceat, difficile est; ut supra etiam de Paralyti dictum. Ideoque tam anceps & periculosum remedium non tentandum.

## CAPVT XXIX.

*De Incubo.*

Postquam symptomata, in quibus facultates prin- *Incubus.*  
cipes seorsim, ut & motus animalis, læditur absol- uimus: restant adhuc ea symptomata, in quibus anima- les actiones seu plures, seu omnes læduntur. Inter quæ primò est Incubus, Græcis *ἐνθάλας*, ab *ἐνθάλας*, hoc est, insaliendo nomen habens; quod hoc malo correpti se ab aliquo inuadi, atque ab onere incumbente premi somniant: cuius affectionis ramen recordantur exper- gefacti, falsamque illam imaginationem fuisse agnos- cunt. Cæterum nonnulli malum Dæmoniacum esse putant, & Plinius, lib. 25. cap. 4. Faunorum in quiete ludibria appellat; quæ ramen fabulosa Aëtius, *teirab.* 2. *serm.* 2. cap. 12. & Orbasius, *συνοψ.* cap. 12. meritò repudiant. Quidam & *ἐπιβολή*, teste Aureliano, hoc est, aggressionem & inuasionem nocturnam nominant. Themison, teste Aegineta, *πνιγνίσιον* & *πνιγνίσιον*, Dioscorides *πνιγνίσιον ἐνύπνιον*, à specie suffocationis, quæ hoc malo laborantibus in somno offertur, Avicen- nas suâ linguâ Strangulatorem nominat: Nimirum qui hoc malo laborant, sub primum somnum onere se aliquo opprimi & quasi suffocari somniant, & quamvis clamare, & alios in auxilium vocare vel- lint, non possunt, neque etiam manus ad opus hoc, quo se opprimi somniant, amolendum & amouen- dum liberè mouere valent,

Alij verò Incubi sunt, quorum Augustinus, *de ciuit. Dei, lib. 1 §. c. 23.* aliique Autores mentionem faciunt, Dæmones scilicet, qui mulieribus se commiscunt, & ab incubando Incubi dicuntur, sicuti qui viris, & patiuntur muliebria, Succubi; quod an fiat, vel qua ratione fiat, diquirere huius loci non est: cum tantum de symptomate facultatis animalis læsæ & affectæ p.n. à causis naturalibus proueniente agere nobis sit propositum. Sunt tamen nonnulli, qui hoc malum Incubi nomen accepisse putant ex eo, quod ephialte laborantes opinantur, hominem, qui illos opprimit, turpis libidinis usum ab iis exigere, seu vnà cum illis concumbere; vnde etiam quidam in Cacodæmonem ejusmodi ludibria, quæ per somnum contingunt, referunt. Et fieri potest, vt hoc morbo, tanquam instrumento, ad affligendos & vexandos homines Cacodæmon vtatur.

### Definitio.

#### Definitio.

Est ergo Incubus respirationis offensio, & vocis interceptio, corporisque oppressio, seu motus impedimentum, cum falso in somnio ponderis thoraci incumbentis, à vapore crasso, posteriora potissimum cerebri obstruente, vt spiritus animales ad liberam respirationem, & motum edendum prodire nequeant.

Nimirum omnes ferè actiones animales in Incubo læduntur. Nam imaginatio deprauatur; sensus est torpidus; facultas motrix, quæ respirationi, voci & motui membrorum inseruit, laborat. Vnde ægri somnum quidem excutere conantur, sed cum maxima difficultate id accidit; assurgere, vel manus mouere, vel loqui aut clamare conantur; id tamen præstare nequeunt.

Quam læsionem cum homo percipit in somno, varias dormiens causas, vnde ea quasi oppressio veniat, comminiscitur & somniat. Quale quid etiam aliis iis, qui causam aliquam morificam in parte aliqua in somno sentiunt, accidit, dum se vulnerari, morderi, vel alio modo lædi, aut crus lapideum habere somniant. Etsi verò ad vocem edendam, & ad membra mouenda, qui Incubo laborant, adeo apti non sint, sed & in iis motibus aliquid impedimenti percipiant: tamen quia illi motus in somno ita necessarij non sunt, sed cessant, thoracis verò motus etiam in somno ob respirationem necessarius est, fit, vt hoc, tanquam summè necessario, etiam in somno, læso, tristis sensus oriatur grauitatis pectoris, qui sensus oblatu phantasie facit, vt æger suffocari ab externa aliqua violentia sibi videatur.

### Causæ.

#### Causa proxima.

Causa proxima est obstructio meatuum cerebri, qui ad initium spinalis medullæ tendunt, & spiritus animales organis sensus ac motus deferunt, à vapore crasso. Fernellius equidem, *de part. morb. & sympt. l. 5. cap. 3.* quem Platerus sequitur, causam esse crassam pituitam & melancholiam statuit, verum non in cerebro, sed circa præcordia inhærescentem, quæ per crapulam & cruditatem turgescit, diaphragma pulmonisque premantur, crasso autem vapore in fauces & cerebrum exhalante vox supprimatur, sensus atque mens obturbetur, visisque tristibus offendatur. Etsi verò quâdoque istâ thoracis suppressione hoc modo fieri posse non negamus; tamen ea non est præcipua causa, nec semper à cruditate & crapula, verum etiam sine his, & aliis causis fieri potest. Et cerebrum præcipue affici, id indicio est, quod non solum motrix respirationi seruiens, sed & quæ voci & aliorum membrorum motui præest, non ita libera est, & Incubo laborantes difficulter expurgantur: atque Incubus sæpius imminens grauioris cerebri affectus prælagium est.

Et quidem posteriores cerebri meatus, qui ad spinalem medullam tendunt, inprimis obstruuntur; vnde & supino corpore cubantes maximè hoc malo corripiuntur. Obstructio autem ista non fit ab humore, sed à vapore crasso saltem. Nam malum hoc citò fit, & citò desinit. Vapor autem crassior est, quia æger non sine difficultate expurgiscitur, aut forsan etiam narcoticam quandam vim habet. Obstructio etiam ea non integra est, sed leuior, quam quæ carum aut apoplexiam generat.

Antecedens causa, à qua vapor ille eleuatur, est crassa pituita, aut humor melancholicus in hypochondriis & circa præcordia hærens, quæ materiâ per crapulam & cruditatem, vel aliis de causis turgescit & motu nunquam diaphragma & pulmones premuntur; præcipue verò crasso vapore illinc in cerebrum exhalante, & neruorum principia obstruente, vnà cum motu thoracis, respirationi inseruiens, vox impeditur, & phantasia visis tristibus turbatur. Etsi verò à respiratione impedita, & grauitatis sensu præcipue triste illud somnium de opprimente aliquo oriri verisimile est: tamen aliquid etiâ hinc facere vaporem prauum in imaginationis sedem irrepentem, & spiritibus sese miscentem, credibile; sicut contra benignis & suauibus vaporibus mixtis cum spiritibus animalibus insomnia læta & concinna existunt.

Rhases & Auicennas etiam vaporis sanguinei meminunt, siue à sanguine ipso crasso è venis prodeat, siue à sanguine in semen crassum mutato: vnde Veneris per hunc morbum in somniis ludibria existunt.

Itaque vapor ille ad caput plerumque ascendit à materia extra hoc alibi consistente; in pueris etiam à vermibus: interdum verò & in ipso capite gignitur, ex alimenti cerebri excremento tenui, quando illud frigore externo repentino incrassatur & repellitur, necitò discuti queat.

Generatur autem ille vapor vel ob errorem externum, ob victum scilicet crassum & vaporosum, vel læsa facultate, præcipue ob intemperiem frigidam capitis vel ventriculi. Atque hinc causæ remotiores, procatartica & euidentes sunt nimia cibi repletio, crapula, & hinc sequens cruditas, somnus statim à repletionem, decubitus supinus; aer denique frigidus, cuius vi materia incrassata in cerebro in meatus eiusdem exprimitur; atque hinc remulenti inprimis ac cruditate laborantibus Incubus familiaris est, & quidem somni initio, quando vapores crassiores maiori copia ad caput eleuari incipiunt, nec, sicut vigilantibus accidit, satis discuti possunt. Et præcipue hoc accidit, dum homo supinus decumbit; cum per illum decubitum prompta fiat in caput euaporatio, ac materia facilius ad nucham & ad posteriores cerebri partes, ac initium spinalis medullæ moueatur, meatusque in illo decubitu nonnihil comprimantur. Non negarim tamen, ob decubitum supinum incubum facilius excitari etiâ ob motus musculorum motum thoracis promouentiu læsionem. Motus enim is in decubitu supino non ita liber est. Vnde etiâ qui supini dormiunt, facilius stertunt, quam ij, qui in alterutrum latum decumbunt. Inde causa huius morbi definitur, quod sit *ἀναδυσίασις ἐπὶ κεφαλῇ ἀναδρέχουσα ἐξ ἀδυσίας τοῦ ἀνθρώπου*. Hinc etiam pueri huic morbo inprimis sunt obnoxij ob *ἀδυσίαν*, quæ vitiosi humores collecti vapores multos in caput remittunt; sæpe & ob vermes in intestinis genitos. Atque hinc pauores quoque per somnum in pueris existunt, de quibus Hippocrates, 3. aph. 24. Narrat quoque quidam apud Cælium Aurelium, Romæ aliquando hunc morbum epidemium & publicè grassantem fuisse, & multos instar pestis iugulasse.

¶ Egi equidem de Incubo hoc ipso c. & vulgare sententiam explicavi: quia tamen de Incubi natura & causis aliquid dubij adhuc occurrit, illud explicandum. Vt autem ex definitione Incubi ibi tradita constet, duz

Causa anteceden.

Dubia de Incubi natura & causa.



De Natura.

duæ actionum læsiones in Incubo sunt, nimirum somnium grave & falsum, ac respirationis difficultas, quo unico Incubus ab aliis omnibus somniis grauibz differt, quodd scilicet in Incubo maior est respirationis difficultas, quam aliàs in somnio naturali esse solet: ut ita Incubus sit respirationis offensio cum prauis insomniis. Læsiones corporis enim sæpius in somno offeruntur, & somnia pariunt. Ita Galenus refert, quendam somniasse, sibi crus lapideum factum, & postea eiusdem cruris paralytin passum esse. Nam cum aliqua molestia, vel læsionis sensus, in parte aliqua per somnium occurrit, nec imaginatio liquidò cognoscere potest, qualis illa sit, aliquid aliud fingit. Ita ille, cum causam paralyseos iam influere sentiret, crus lapideum sibi factum esse somniauit. Incubum patientes cum difficili respiratione laborent, nec tamen vnde illa pendeat, liquidò cognoscere possint, onus vel hominem aliquem pectori suo incumbere imaginantur.

De causa. Antiqui.

Fernelius &amp; Platerus.

De causa verò maior difficultas est. Antiqui statuunt, in Incubo ventriculos cerebri à vaporibus crassis oppleri, & influxum spirituum animalium per nervos ad organa respirationis prohiberi: atque ita in nervis à cerebro ad thoracem tendentibus causam mali hæere existimant. Fernelius verò & Platerus equidem in eo consentiunt cum Antiquis, quodd vapor crassus huius mali causa sit; de modo verò quo difficilem respirationem inducat, dissentiunt, dum non ob cerebri & nervorum obstructionem influxum spirituum animalium in musculos thoracis prohiberi, sed à vaporibus circa præcordia hærentibus diaphragma & pulmones comprimi statuunt. Et sanè, quæ de obstructione ventriculorum cerebri dicuntur, falsa esse, iam plerique Medici agnoscunt, cum non in ventriculis, sed in substantia cerebri generentur & hæreant spiritus animales. De hoc tamen iam quæstio est, an læsæ respirationis causa à nervorum vaporibus crassis obstructione, an verò, ut vult Fernelius & Platerus, diaphragmatis compressione ortum habeat. Si, quod res, dicendum est, equidem sensus & motus ligatio quædam est in Incubo, sed talis saltem, qualis in profundè dormientibus accidere solet. Videmus hoc in canibus dormientibus, qui pedes aliquando movere solent, quin & vocem latratui similem, non claram tamen, sed veluti suppressam edunt, dum somniant se feras insectari, seu aliud quid agere. Et licet à vaporibus etiam caput repleatur: tamen illa repletio non est causa Incubi, sed potius etiam est sine Incubo. Vnde causa Incubi vera & proxima à Fernelio & Platero rectè in thorace consistere dicitur. Dum enim à vaporibus ascendentibus respiratio aliquo modo læditur, in somno inde phantasma oneris incumbentis formatur, ut homo se ab aliquo pectori incumbente opprimi somniet.

Proxima Incubi causa in thorace.

Quomodo respiratio à vaporibus lædatur?

Quomodo verò à vaporibus illis respiratio tunc lædatur, rectè explicandum. Fernelius de part. morb. lib. 5. cap. 3. scribit, crassam pituitam, aut melancholiam circa præcordia inhærescere, quâ per crapulam & cruditatem turgente, diaphragma, pulmonesque premantur; crasso autem vapore illinc in fauces & cerebrum expirato, vox supprimatur, sensus atque mens obturbetur, visusque tristibus offendatur. Eodem modo Platerus statuit, à venis melsaricis, maioribus præfertim, vndique circa præcordia dispersis, & in quibus propter primæ coctionis multa excrementa sanguis impurus facilius colligitur, vapores eiusmodi aliquando exsurgentes, & circa septum transversum subsistentes suffocationem hanc procreare.

Quomodo fit compressio.

Verum quomodo compressio ista diaphragmatis & pulmonum accidat, explicandum. Cum enim humores illi, à quibus vapores isti attolluntur, in vasis consistent, non poterunt in ventre abundantes, extra diaphragma comprimere, sed potius per vasa in pulmones, musculos abdominis, & diaphragma penetrare, at-

que ibi suffocationis quendam sensum excitare. Et quamvis in melsaricis venis inprimis hæreant illi vitiosi humores: tamen facile venæ causæ communicari, & inde in totum corpus eos distribui posse existimo: & præcipuè in lienem, in quem ramus splenicus maximâ parte absumitur, & in eo disperditur. A liene verò per arterias, quæ quintuplo plures sunt in eo, quam venæ, tales humores facile per totum corpus dispergi possunt. Interim negandum non est, tales vapores etiam per venas & arterias ad caput ascendere, & somni illius grauioris causam esse. Vnde ipse Platerus concedit, malum hoc sæpius recurrens tandem cerebro grauiora minari atque asferre accidentia.]

## Differentia.

Differentiæ Incubi à causa efficiente potissimum sumuntur. Provt enim vapor vel à pituita, vel ab humore melancholico, vel à semine eleuatur: ita diuersa, & pro natura humoris, phantasmata vel imagines per insomnia in hoc affectu exhibet; sicut à semine rerento Venereorum illecebris hominem ludificat. Alius quoque incubus fit per essentiam in capite, quem tinnitus aurium & vertigo, & dolores capitis antecedunt & sequuntur: alius per consensum ventriculi, hypochondriorum, testium, quas partes affectas esse, suis indiciis manifestum redditur.

## Signa Diagnostica.

Affectus hic ex relatione ægri facile cognoscitur. Signa Diagnostica. Conqueruntur enim, sibi inter dormiendum quid quasi incidere atque incumbere, grauique onere incumbente se premi, vel ab hoste aliquo inuadi & strangulari; ita ut neque clamare, (quamquam, quod à præsentibus, qui vigilat, auditur, vocem edant obscuram, inarticulatam & nihil certi significantem) neque se mouere, neque fugere queant, donec multo tandem labore & conatu de somno expergiscuntur. Nonnulli etiam se audire illum, qui super ipsos incidat, imaginantur. Virgilius 1. 2. *Aneid. circa finem*, Incubum eleganter hoc modo describit:

*Ac veluti in somnis, oculos ubi languida pressit  
Nocte quies, nequicquam anidos excendere cursus  
Velle videmur, & in mediis conatibus ægri  
Succidimus, non lingua valet, non corpore nota  
Sufficiunt vires, nec vox aut verba sequuntur.*

Quibus signis facile ab aliis affectibus p.n. discernitur. Scribit equidem Posidonius apud Aëtium, *tetrab. 2. epilepsia differ. 2. cap. 10.* Quæcumque patiuntur comitiali morbo correpti in exacerbationibus, eadem perpeti incubum passos, dum dormiunt. Verum maxima est inter hos duos affectus differentia. In epilepsia enim motus convulsui accidunt; in Incubo est motus impotentia: ortumque habet epilepsia à materia acri cerebri meningibus stimulante; Incubus à vapore crasso, meatus cerebri obstruente. Causarum & locorum, vnde vapor eleuatur, differentia è suis signis cognoscitur, tum ex specierum, quæ per somnum imaginationi offeruntur, qualitate, provt nigri vel alterius coloris sunt, aut hominem ad Venereum incitant.

## Prognostica.

1. Incubus quidem, si rarior sit, leuior affectus est; grauior tamen, cæteris paribus, quam vertigo: quoniam à vapore crasso producit, & dormientem hominem comprimit.

2. Incubus à causa interna perseverans, præsertim in ætate prouectioribus, aut epilepsiam nunciat, vapore tandem prauitatem & epilepticam diutius acquirere; aut apoplexiam, si meatus cerebri fortius occupet; aut melancholiam, si vapor ater commisceatur.

Spiritibus animalibus. Imo pueri, & obeso corpore aliquando hoc malo suffocantur, quando materia crassior & copiosior est, exitumque non reperit. Ideoque inter initia huic malo occurrendum est, monente Aëtio, Paulo, & Rhase.

3. Periculosior Incubus est, qui diuturnus est, ac frequens, & à quo æger stupidus permanet.

4. Incubus à causa externa refrigerante, aut à crapula continuata, minus perniciosus est.

5. Si Incubus accidit partim dormienti, partim vigili, deterior est; qui epilepsie propinquior: & rursum deterior, si post excitationem sudor frigidus, tremor cordis, spasmus, aut syncope sequatur.

#### Indicationes.

*Indicationes.* Cum Incubus ortum habeat à vapore cerebri meatus quadantenus obstruente, ille, ut paroxysmus tollatur, discutendus. Postea, ne redeat malum, humor, è quo gignitur, euacuandus. Amouenda quoque causa, à qua humor producitur, siue ventriculi imbecillitas sit, siue hepatis, siue alterius cuiusdam membri, siue error externus; atque ita etiam vaporum generatio prohibenda.

#### Auxilia.

*Cura.* Ager ergo in ipso paroxysmo seu insultu huius morbi statim leuiter excitetur, compellatione per nomen, vellicatione corporis, ac deinde, ut vapores reuellantur, discutiantur ac dissipentur, etiam extremorum frictione. Quam ob causam utile est, ut ij, qui huic malo obnoxij sunt, noctu fidum semper hominem adiunctum habeant, qui gementem ac quiritantem ægrum mox expergeficiat, ne suffocationis periculum longius augeatur.

Ne verò malum reuertatur, vena aperienda, si plethora adsit. Aperiat autem vel cephalica vel hepatica: in mulieribus ex mensium suppressione laborantibus, saphena; quæ etiam in viris, post euacuationem per venæ in cubito sectionem factam ad reuulsionem aperiri potest. Si phlebotomia vti non liceat, cucurbitulæ cruribus & scapulis applicentur, ac clysteribus reuulsio fiat, & frictiones continuentur.

Si humor pituitosus aut melancholicus altius insederit, præparetur incidentibus & abstergentibus, quibus misceantur quæ flatus discutiant. Postea debita ratione ac modo humor euacuetur. Et purgatio sæpius repetatur per interualla, maxime cum metus est, ne in alium affectum hoc malum transeat. Utrobique verò ad ipsum cerebrum respectus habeatur, & tota curatio partim ad ventriculum & hypochondria, partim ad affectionem cerebri dirigenda. De quo supra, *part. i. cap. 7. 10. 12.* & antea, de Vertigine, dictum, ac postea de epilepsia & apoplexia dicitur. Cordis tamen simul ratio habenda, ut in melancholia.

Post vniuersales euacuationes caput priuatim purgetur errhinis, apophlegmatismis, & similibus, ut locis allegatis dictum & dicitur. Quidam puluerem è corticibus citri siccis, cypero, caryophyllis, coriandro præpar. fol. maioranæ & betonica, flor. rosar. rubr. stœchad. Arabic. lauendulæ & rorismarini capiti inspergunt, vel cucuphæ includunt. Anisum etiam puluinis inspersum pauores in somniis prohibet. Vel caput lauatur lixiuio, in quo flor. stœchados Arabic. betonic. an. M. j. cyperi agaric. macis, an. Vnc. β. cocta sint. Commendatur & lupina pellis pro tegumento capitis inter dormiendum.

Ad flatus & vapores in capite, seu pituitosos, seu melancholicos propulsandos, caputque roborandum, iis medicamentis, quæ locis allegatis proposita sunt, utendum. Auicennas, Aëtius, & alij commendant semen nigrum pœoniæ maris, si eius grana x v. trita per

plures dies cum liquore conueniente exhibeantur. Plurimum quoque hic valet electuarium. Pleres autem conticum appellatum, si cum confectione alkermes seu diambæ permisceatur, & manè, ac hora decubitus, exhibeatur. Vtilis est & creber vsus diacori quotidie tribus horis ante cibum, ut & diamosch. dianthos, elect. de gemmis. Commendatur & theriaca bis singulis seprimaniæ cam aqua pœoniæ exhibita. Naribus quoque subinde odoramenta caput confortantia & flatus discutientia adhibeantur.

Cordi verò & pulsum regioni sacculi cordiales & arteriales passim noti, aqua rosar. melissæ, & similibus irrigati imponantur. Vel Balsama inungenda:

Ut ℞. Bals. citri Drach. i. chamamel. Rom. Dra. sem. ol. destill. ruta gutt. iii.

Vel ℞. Bals. rorismarini, succini, an. Scrup. i. ruta Drach. i. theriaca Drach. sem. Misce.

Vtiles sunt & frequentes pedum lotiones; cum vapores à capite reuellant.

Post cibum assumptum vapores prohibent diacydonium, aut puluis ex coriandro præparato, semine anisi, galanga, nuce mosch. cum sacchar. rosar. tabulato paratus. Et alia supra, *part. i. cap. 7.* proposita.

Vel ℞. Spec. aromat. rosar. Drach. i. diarrhod. abbat. Drach. sem. diamarg. frig. Scrup. i. cinamomi, macis, caryophyll. an. Scrup. i. sem. pœonia Drach. i. coriandri præpar. Vnc. β. anisi Drach. ii. visci querni Drach. sem. magister. corallior. z. i. sacchar. rosar. tabulati ad pondus omnium. F. Puluis. Dosis cochlear. i.

Vel ℞. Sem. coriandri præpar. Vnc. sem. anisi, fœnicul. an. Drach. β. Spec. aromat. rosar. Drach. i. sem. pœonia excortic. corallior. rubr. præpar. an. Scr. ii. sacchar. rosar. tabul. ad pondus omnium. F. Puluis.

Vel paretur tale Electuarium:

℞. Cydonior. cum arom. cond. z. i. β. nuc. iugland. condit. num. i. cortic. citri condit. z. β. conferu. rosar. Drach. vi. anthos. lauendula, maiorana, rad. condit. scorzon. an. z. β. pulu. radic. pœonia, sem. pœonia excortic. an. Drach. sem. corallior. rubr. præpar. Drach. i.

Cum syrup. cydonior. & de cort. citri F. Electuarium.

Dum cubitum itur, sumatur bolus ex conferua flor. rorismarini, lauendulæ, menthæ, melissophylli, pœoniæ; aut conditæ radices pœoniæ, aut excorticata eiusdem grana aqua lauendulæ inebriata, aut nux Indica condita.

Chymici in hoc affectu commendant tincturam & magisterium corallior. perlar. lapid. Armeni, Lazuli, chrysolithi, malachitæ, ol. rorismarini, saluæ, rutæ, succini, chamæmeli, cinamomi, extractum pœoniæ, visci qu. iuniperi.

Amuleta commendantur, radix pœoniæ de collo suspensa, corallia rubra, lapis chrysolithus auro inclusus, ut & malachites, & in sinistro brachio gestatus.

Infantes, qui pauoribus in somnis obnoxij sunt, non statim à cibo sumpto: dormiant, sed hinc inde gestentur, donec cibus descendat: mel etiam vel crudum vel rosatum lingendum exhibeatur, quod extergit; aut exhibeatur puluis ex radic. pœoniæ, margarit. coralliis.

#### Diata.

Degat æger in aëre ad calidum & siccum vergente, An. puro, neque tetris vaporibus inquinato: vitet aërem nebulosum, humidum, & ventis turbatum. Non moretur sub radiis Solis, Lunæ, vel ad ignem. Diata sit tenuis, attenuans, flatusque expers, & proinde vitentur legumina, & fructus ac radices flatulentæ. Ideo cibi calidi sint & sicci, qui facile concoquuntur & distribuuntur, nec in viis hærent, nec flatus ad caput mittunt. Vita sit sobria, cœna frugalis; ægerque crapulam, repletionem & ebrietatem fugiat. Cibi condiantur iis, quæ extenuandi vim habent; ut, pituita peccante, hyssopo, serpillio, satureiâ; in melancholia, quæ eam temperat, flor. bugloss. borrag. & similibus, de quibus supra, *part. i. dictum.* Vinum,

Vinum, cum caput repleat, parcius fumendum, vel eo tenuiori vtendum, aut cereuisia tenui, vel aqua, in qua semen coriandi, anisi, & cinamomum ebullierint. A cœna ad somnum tres horæ interponantur. Viterur decubitus supinus, quo caput repletur. Ad lectum ægri suspendantur vel humi sternantur radices pœoniæ, majorana, thymus, ruta, lauendula, rosmarinus, pulegium, mentha. Corpus moderatè & tempestiuè fricetur & exerceatur.

Symptoma quoddam partim Incubum, partim epilepsiam referens (et si potius mitior epilepsia esse videatur) describit Forestus, *libr. 10. obseruat. 5. 2.* quod seminis pœoniæ vsu sublatum fuit, vtpote quod epilepsia, Incubo, pauoribus & ludibriis nocturnis, vterique strangulationibus egregie medetur.

## CAPVT XXX.

## De Catoche seu Catalepsi.

## Nomen.

Quæ Latinis vulgò Congelatio dicitur, Platero Stupor cum rigiditate, Græcis est *κατάληψις* & *κατάχρησις*, siue *κατάχρησις*: quanquam posterius vocabulum non in vna significatione vsurpatum fuerit veteribus; vnde & hodie ambiguitas reliqua manet. Nam Paulus Aegineta distinctè agit de Catocho, qui coma vigil est, & de Catocho, qui vera Catalepsis. Et autor *definit. Medic.* Catochi (quæ fieri docet, cū sensu priuatur omni, corpusque omne velut gelu obrigescit) genera tria facit: primum Somnolentum, lethargo proximum; secundum Vigilans, affine tetano & præfocationi vteri; & tertium Phreneticum, ex catoche & phrenitide mixtum, quod & Typhomania nominatur. Quæ genera aliqui commodius sic discernunt, vt primum sit Lethargo proximum, secundum Coma vigil, tertium Catochus seu Catalepsis vera. Nos hic Catochi & Catalepsi vocabulis pro synonymis vtimus.

Dicitur autem Catoche, siue *κατάχρησις*, à *κατάχρησις*, id est, detineri, vel occupari, & *κατάληψις*, à *καταλαμβάνειν*, id est, prehendi, quod æger hoc malo repente corripitur correptusque eo situ permanet. Appellatur & Stupor in genere, qui si vehementior sit, & validius incumbat, ac diuturnius insideat, *ἐκστασις* à Græcis dicitur, à Latinis Excessus, vt habet Scaliger, *exercit. 3. 12.* Priuatio scilicet officiorum animæ sentientis, mouentis & intelligentis.

De vocabulo autem *ἐκστασις* hoc hic monendum est, quod Hippocrati quidem semper Ecstasis vehemens est mentis amotio ac delirium, & *ἐκστήναι* de mentis potestate exire, aut vehementer mente emoueri ac delirare significat, & vehementer insanientibus, phreniticis ac maniacis, passim apud Hippocratem tribuitur, & Galenus *ἐκστασις* per *μανίαν σφοδράν* exponit: vsus tamen vulgò obtinuit, vt ii, qui omnibus animæ sentientis, mouentis ac intelligentis functionibus priuati, & quasi mortui jacent, & sæpe, postquam euigilant, mira, quæ audiuerint, & viderint, narrant, *ἐκστατικοί* nominantur.

Ab *ἐκστάσι* aliam faciunt adhuc, *ἀραισιάν*, in qua non facultatibus animæ modò, sed & ipsa anima corpus priuatur. Quod an fieri possit, Philosophis & Theologis discutiendum relinquimus. Hoc saltem addimus, si hic affectus à causâ diuina profiscatur, siue intra corpus manente, siue extra egrediente animâ, *νυμφολήπτις* ab Aristotele, *1. Eudemior. & δεολήπτις*, ac *ἐκστασιζομένης* appellari, vt, loco allegato, Scaliger docet.

## Definitio.

Est videlicet Catalepsis sensuum internorum & externorum, ac in his præcipuè tactus, & voluntarij motus cessatio, seu, vt nomen innuit, subita prehensio & occupatio tum mentis & sensuum internorum, tum externorum, & motus voluntarij, quæ qui corripuntur, rigidi in eo statu, in quo prehensi fuerunt, apertis ac immotis oculis, statua alicujus instar, manent, & nec sentiunt, nec vident, nec audiunt, respiratione saltem & pulsû sâcio manente, à congelatione & immobilitate spirituum animalium, quàm vapor quidam figens caussauit, orra.

Interdum tamen, & vbi malum minus vehemens est, ægri non nihil audiunt, vident, imaginantur, recitantur, & quæ astantes loquuntur, percipiunt, & postea referunt, immoti tamen manent sine voce & sensu tactus; quemadmodum Galenus de suo condiscipulo narrat, *2. Prorrhet. aphor. 16.* Atque hos in specie *ἐκστατικὸν* appellat Platerus.

Affectus sanè vt rarus, ita admiratione dignus, vnde etiam vulgò eo detentos in ecstasin à Deo raptos existimant; atque hinc etiam procul dubio *νυμφολήπτις*, *δεολήπτις*, *ἐκστασιζομένης* vocabula, vt modò dictum. Eius historias duas Fernelius, *lib. 5. de partium morbis & symptom. cap. 2.* & aliquot Marcellus Donatus, *de histor. mirab. Medic. libr. 2. cap. 7.* & Shenkius, *lib. 1. obseru. 115.* recitant.

[ Catalepsis tam rarus affectus est, vt credant inter centum, imò sexcentos, vix vnum Medicum reperti, qui Catalepticum aliquem viderit. Ideoque historiarum Catalepticorum, si occurrant, diligenter annotandæ. Talem refert Hentric. ab Heer. *obs. 3.* hoc modo: Frater Christianus Insulensis, Capucinus, Leodij Catalepticus factus, vno genu terræ innitebatur, alterum ceu flexurus, incuruabat, brachium sinistrum pendeat ad genu, dextrum in aërem eleuatum habebat, diductis digitis, vt viam prætereuntibus, sicut olim statua Mercurij, ostentare videretur, vtrumque omni marmore rigidius erat. Patebant oculi, sed ita retorti, vt, licet sudario perstringerentur, non conuincerent. Os hiabat, cum respiratione satis libera. Pulsus in vtroque brachio & temporibus sat magni. Postquam post 20. horas ad se rediit, surrexit, & ambulauit, omnium præteritorum ignarissimus.

Et si verò Dodonæus & Henrnius in ea sunt sententia, neminem secundo sine vitæ periculo Catalepsi corripit: tamen hic Monachus sæpe paroxysmis catalepticis, etiam in secundum & tertium diem durantibus correptus est, & tandem ita conualuit, vt duodecim annis mali nihil senserit. Quoties verò, rigente parum collo, malum secuturum prælagiit, statim oleo calido nucham, toramque spinam inungi curauit, & ita malum auertit. ]

## Causæ.

Vt autem malum hoc admirandum est, ita eius causam reddere difficillimum. Et afferunt quidem alij alias, vt in Institut. *lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 6.* dictum: verum quæ rem satis non explicant, vt ibi pluribus monstraui. Iulius Cæsar Scaliger, loco allegato, animæ hunc excessum, vel à functionibus abscessum, aut abfistentiam, prouenire scribit percussis spiritibus, ac receptis in intimos cordis sinus. Verum si Catalepsis & hic stupor hoc modo fieret, animi affectus & syncope potius, quàm Catalepsis aut Ecstasis excitaretur.

Si verò in hac naturæ obscuritate probabile quid afferendum, omnino talis causâ danda, quæ differat à causis paralysis, comatis, cari, apoplexiæ, epilepsiæ, syncopes, & similibus affectuum: (quales causæ non sunt, quæ vulgò afferri solent, sed hisce affectibus communes) atque talem causam esse puto peculiarem spirituum animalium *διατέσιν*, vt scilicet illi in organis sensus & motus non deficient, sed figantur quasi & immobiles reddantur, ac immoti mancant, seu, vt vno verbo cū Scaligero, loco allegato, dicâ, causâ Catalepsis est spirituum animalium congelatio seu immobilitas.

Hæc autem ortum habet à vapore congelante, seu vim talem figendi habente, qui quidem ab humore melancholico ferè attollitur. Vnde rectè Stuporis nomine hic affectus appellatur, mentis puta. Vt enim in stupore, qui symptoma tactus est, obiecta tactui oblata ab organo non percipiuntur: ita hic etiam sensuum exteriorum obiecta, etsi à suis organis apprehendantur, à mente non percipiuntur.

Quæ autem spiritus illius congelantis natura sit, explicare non ita facile est. Quidam equidem in frigiditatem & siccitatem causam referunt, & ab humore melancholico, alij etiam à pituita vitrea eam perunt. Verum in corpore viuento vix talis frigiditas esse potest, quæ instar frigoris hiberni in cerebro spiritus congelet. Commodissimè vapor is figens, seu fixatius & congelatius appellari potest, qualis spirituum natura Chymicis satis nota est, qualisque natura fulminis interdum est, & spirituum illorum, qui in terræ moribus, & alijs etiam è terræ cavernis erumpentes homines & bruta repente rigida reddunt.

Causæ enim huius probabilitatem natura fulminis satis declarat, ut dictum, quæ res sæpe subitò congelat; narratque Cardanus, octo menses sub quercu cernantes fulmine percussos fuisse, sub ea specie, quam decumbebant, ut vnus comedere videretur, alter manum poculo adiuuere, alius bibere, qui procul dubio hoc morbo detenti exanimati fuere. Vnde etiam rectè Medici morbum hunc Congelationem nominant.

Verum ut rectius causa mali huius cognoscatur, porro inquirendum, an spiritus illi, qui sensui & motui inserviunt, an verò qui sensibus internis, an verò omnes spiritus animales congelentur. Communis equidem opinio est, spiritus animales omnes, & potissimum eos, qui sensui & motui inserviunt, immobiles reddi. Verum si quid in re obscura proferendum est, potius statuendum videtur, non illos spiritus, qui in membra corporis influxerunt, congelari & immobiles fieri, sed potius spiritus, qui imaginationi & menti inserviunt. Cum enim motus à phantasia dirigatur, neque sensuum exteriorum obiecta etiam ab organis suis recepta percipiuntur, si sensus interni & mens non attendant; sicut compertum est, viros quosdam deuotos meditationibus sacris quasi ex se raptos, aut literarum Studiosos meditationibus suis ita intentos fuisse, ut etiam oculis & auribus apertis non viderent, non audirent, imò nec sentirent: si spiritus ille phantasiæ & menti inserviens quasi figatur & immobilis reddatur, ut sensuum exteriorum obiecta affluentia non apprehendat, sit, ut, etsi in organis sensuum exteriorum spiritus animales adsint, qui sensuum exteriorum obiecta percipiant, & ad phantasiam deferant; ab ea tamen illa non percipiuntur, neque etiam à phantasia tum quasi torpida & quiescente motus ullus impetretur; & si quis ab externo impulsu fiat, ille non attendente nec gubernante phantasia accidat. Hinc procul dubio nata est Medusæ fabula, quæ huius morbi causam aliquo modo declarare potest, quæ cum esset mulier formosissima, ita, ut qui eius pulchritudinem attentè contemplerentur, extra se quasi raperentur, & ab omnium sensuum functionibus abstraherentur, fixique & immobiles, ac quasi lapides redderentur, finxerunt Poetæ, ex capitis eius intuitu spectatores in lapides conuersos fuisse.

Hæc autem ita se habere, ac in organis sensus ac motus spiritus animales non deesse, vel illud arguit, quod quidam ex Catalepticis ipsi quidem nullum membrum mouent, verum si ab alio id moueatur, mouendi potentia se exserit, & erecti consistunt, impulsu incedunt, & quocunque vel manus vel brachium vel crus insectitur, illic quasi fixum & stabile permanet; quod non fit sine spirituum animalium ope. Sicut & hoc spiritus animales non deesse indicat, quod ægri oculos diductis palpebris apertos seruant, quod non

fieret, sed potius conciderent palpebræ, si spiritus animales deessent, sicuti in paralyti accidit.

Ahinc patet, quomodo id accipiendum sit, quod in definitione diximus, in Catalepsi sensuum exteriorum & motus actiones cessare. Nimirum non quantum obiectorum per organa sensuum susceptionem attinet, sensus quiescunt, sed quantum superioris facultatis apprehensionem. Oculis enim apertis imago visibilis excipitur, sed à facultate superiore non apprehenditur. Eodem modo se res habet in sensibus reliquis.

Neque est, ut, quod hodie non infrequens, hæc doctrina alicui suspecta sit, quia Chymicorum terminos sapere videtur. Agnouerunt eandem, & iisdem terminis vsi sunt, docti Galeni Interpretes & Arabum; etsi rem non satis commodè explicauerunt. Ut de Scaligero jam non dicam, cuius antea mentionem fecimus, Matth. de Gradibus, part. 1. Pract. cap. 6. ita scribit: Causa coniuncta congelationis est mala complexio frigida & sicca in capitis posteriore parte immobilitans spiritus & nervos & nervosa membra ad operationem sensus & motus, maximè ad motum. Ita Dominicus Leonus; *artis Medic. lib. 2. sect. 1. c. 6.* Causa coniuncta, inquit, sunt vapores & humores, ipsaque intemperies frigida & sicca, actu frigida, figens & incrassans spiritus animales, eorundemque transitum obstruens. Qua quidem in re rectè sentiunt, immobilitatem, fixationem, vel, ut Scaliger loquitur, congelationem spirituum animalium proximam huius mali causam esse, eamque à figente quodam vapore fieri. Et hoc etiam verum est, quod ille spiritus in cerebro, sede mentis, figitur, & immobilis redditur, atque in organa sensus & motus non influat. Interim non negandum est, spiritus animales alios in ea organa influere. Neque fixio illa & congelatio fit à frigore & siccitate, quæ tanta in corpore viuento non datur, ut tam subitæ congelationis causa esse possit, sed à vapore peculiarem vim spiritus figendi & immobiles reddendi habente, qualis est in fulmine & alijs spiritibus.

Causam antecedentem ponunt humorem frigidum siccum. Et concedimus sanè, humorem melancholicum præ ceteris aptum esse ad vapores, qui talem dispositionem suscipiunt, emittendos. Non tamen solà frigiditate & siccitate id præstare potest.

Potest autem eiusmodi vapor nunc in ipso cerebro generari, & ita primum affectum excitare; nunc per consensum à toto, ut in febribus malignis; aut à membro aliquo, ut splene, intestinis, vel alijs.

Ad causas procatacricas multi referunt aërem frigidum, pluuiam, glaciem, niuem, & iter facere per loca niuosa & nimis frigida, ut per Alpes. Verum etsi verum sit, multos, qui per alpes, & similia loca tempore hiberno iter faciunt, ita congelari, ut partes extremæ emoriantur, & tandem sphacelo corripiantur: tamen planè alterius generis est hæc congelatio, quæ fit à frigore hiberno, quàm de quâ hic sermo est. Ita cibi quidem, qui humorem melancholicum generant, ad hoc malum producendum aliquid facere possunt: sed nisi humor is, vel vapor inde emissus peculiarem vim congelandi & figendi spiritus induat, causa huius mali proxima non fit. Referunt huc nonnulli etiam contactum torpedinis piscis, fumum vel inunctionem argenti viui. Verum & ista omnia potius stuporem in sensu tactus, quam Catalepsin inducunt.

#### Signa Diagnostica.

Malum hoc subitò hominem inuadit, & in quo statu ægrum offendit, vigilantem, stantem, bibentem, edentem, scribentem, legentem, in eo immotum seruat, ac si congelatus esset. Ager apertos oculos habet, eosque fixos & immobiles, palpebris veluti rigentibus, quas ne ad minas quidem claudit. In sensibus tamen in quibusdam aliqua est differentia. Qui enim exquisitâ Cata

Causa procatacrica.

Signa diagnostica.

Cata



Catalepsi laborant, nihil audiunt, nihil vident, etsi oculos apertos habeant, quod mens non attendit. Alij audiunt & vident, sed nihil loqui possunt. Quidam etiam mouere manus visi sunt. Quidam si impellantur, ambulant, sed instar statuarum in eodem statu manent. Quidam etiam somnia se vidisse ferunt. Respiratio seruatur, sed ita, vt per interualla sæpe magnum spiritum ducant. Pulsus similis est lethargicorum; non tamen ita languidus & mollis, magis verò æqualis. Præterea in lethargicis laxatur vniuersum corpus: contra stipatur & cogitur in Catalepticis, teste Galeno, 4. de caus. puls. cap. 16. Aluus & vrina supprimitur expultrice sopita, nec stimulationem excrementorum percipiente.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Catalepsis morbus periculosus est, &, nisi tempestiuè ægris succurratur, stupidi moriuntur non aliter, ac si gelu hiberno rigentes emoriantur.
2. Eò periculosior est Catochus, quod plura grauiora symptomata conjunguntur, vt spirandi difficultas & interceptio, oculorum distorsio, excrementorum suppressio, & tandem virium summa imbecillitas ac exsolutio. Ita Hippocrates, 3. Prorrh. text. 4. scribit: *Qua cum exsolutione fiunt Catoche & aphonía, periculosa sunt.*
3. Tempus, intra quod siue ad salutem, siue ad mortem morbus terminatur, breue est.
4. Intereunt Cataleptici, siue per virium dissolutionem, siue per suffocationem, vbi adeo motus cohibetur, vt respiratio supprimitur.

### Indicationes.

Vapores spiritus congelantes & immobiles reddentes è capite retrahendi, & in eo discutiendi, & materia, è qua generantur, euacuanda, totiusque simul ratio habenda. Quod rectissime fieri posset, si occulta illa vaporis qualitas & natura nota esset. Interim cephalica calefacientia & humectantia vsurpanda, & curatio, qualis intemperiei capitis cum melancholiâ, & vapore melancholico supra, part. 1. cap. 7. & 12. fuit proposita, instituenda. Et si omnino ad qualitatem occultam respicere libet, medicamenta, quæ Epilepsiâ, & soporosis affectibus conueniunt, adhibenda.

### Curatio.

Indicationes & Curatio.

Itaque, si æger sanguine abundet, vena cephalica secetur. In aliis clystere acriore prius aluus eluatur, & reliqua diuersionum genera vsurpentur. Postea humor melancholicus præparetur & euacuetur, vt supra, locis allegatis, dictum. Minimè autem hic à paruis incipiendum est auxiliis, quod in morbis, in quibus periculum non impendit, turò facere licet: at vbi vitæ periculum imminet, alienum est à ratione, à mitioribus inchoare velle. Topica quoque ibidem proposita vsurpentur, fiântque fomentationes, inunctionesque ex chamæmelo, meliloto, floribus stœchad. Arabicæ, buglossi, majorana, roremarino, primula veris. Et hoc obseruandum, ne in principio nimis calida & sicca adhibeantur, sed potius temperata & humectantia, vt materia ad euacuationem aptior reddatur. Monendum quoque hoc, ne in topicis acetum adhibeatur, ne vis congelandi & figendi spiritus in vapore vel humore aceti vsu augeatur.

### Dietæ.

Dietæ etiam ea sit ratio, quæ supra, in temperie cum humore melancholico, fuit proposita.

## CAPVT XXXI.

### De Epilepsia.

#### Nomen.

**E**pilepsia Græcis dicitur ab ἐπιλαμβάνειν, quod subito mentem sensusque omnes quasi prehendar. *Epilepsia vn. de dicta, & qua habens synonyma.*

Ἐπὶ quoque νόσῳ, seu quod crederetur diuinitus immitti, & à damone aliquo, qui hominem tam repente ac subito corripere, prouenire, quémque ideo incantationibus curare conari sunt, vt ex libro de Sacro morbo videre est, seu quod nobilissimam & sanctissimam corporis partem, cerebrum, occuparet & perturbaret, vt Platoni, in *Timæo*, placet; seu quod magnus morbus sit. Ἐπὶ δὲ τὸ μῆζα, quod magnum est, sacrum appellatur, Aretæus, de causis & signis morbor. diuturnor. lib. 1. cap. 4. seu quod sit morbus detestabilis & abominandus, sicut apud Poëtâ *Auri sacra fames* dicitur.

Πεδὺ παρὰ τὸν & νόσῳ παρὰ τὸν Hippocrati, de *Aere, aqua, & locis*, quod pueris familiaris sit. Aristoreli, 30. *Problem.* 1. fortasse ἢ τῶν ποτῶν ἐν σαρκί. Hinc Auicennæ mater puerorum dicitur.

Herculeus morbus, non tam, vt sentire videtur Aristoteles, loc. allegat. quod Hercules eo laborauerit, quam, vt Galenus, 6. *Epidem. in fine*, statuit, ob sæuitiam & magnitudinem, & τὸ δύσκαταμάχτην, id est, quod facile vinci non possit.

Caducus, à casu & lapsu subito ægri.

Comitialis, quod in comitiis & hominum frequentia facile detegatur, & quod, si hoc malo correptus quis fuisset, comitia peragi fas non esset.

Sonticus, quod valde noceat.

Lunaticus, Tralliano, lib. 1. cap. 15. vel quod in nouilunio nati solent hoc morbo corripri; vel quod secundum Lunæ conuersiones hic morbus inuadit.

Qui inspuratur, Plauto, in *Capit. Act.* 3. sc. 4. Contagiosum enim antiquitas credidit. Hinc Plinius, lib. 28. cap. 4. despuimus comitiales morbos, hoc est, contagia regerimus. Nā exspuere inter amuleta habitum est prisca, & ne familiam inficerent, rus ablegabant epilepticos. Apuleius, 1. *Apolog.*

Maior morbus, Celso lib. 3. cap. 27. Germanis, *die fallende Sucht, schwere Noth, schwere Gebrechen, schwere oder böse Kranckheit, &c.*

### Definitio.

Est autem Epilepsia actionum principum, sensusque & motus voluntarij ablatio & cessatio, cum rotius corporis præternaturali concussionem & motu conuulsio, à materia acri & peculiari ac occultâ vi, cerebro infesta, & membranas cerebri, neruosumque genus vellicante ortum habens. *Definitio.*

### Causse.

Proxima & continens caussa est vapor vel humor specifica & occulta vi membranas cerebri & neruosum genus vellicans, vt infra, q. 2. & 3. pluribus probabitur. *Proxima Epilepsia caussa.*

Antecedentes sunt, quæcunque specificam illam corruptionem pati, atque ita materiam acrem, malignam, cerebroque aduersam suppeditare possunt. Alias enim, & nisi διαδιδόν Epilepticam induant, Epilepsiam parere non possunt. Humores videlicet quicunque, sanguis, melancholia, bilis, pituita, semen, sanies; imò corporis partes, sicut ex cranii carie Epilepsia excitari solet, secundina, item corrupta, vermes. Quâ verò ratione hæ causse hanc corruptionem inducant, explicari facile non potest; cum διαδιδόν illa Epileptica occulta & ἀπύρῳ sit, & non nisi ex effectu pateat.

Quandoque etiam hoc malum hæreditarium est, & à parentibus cū semine & sanguine eorundem in liberos *Caussa hæreditaria.*

diffunditur, atque Epileptici Epilepticos generant. Facit ad Epilepticam dispositionem inducendam etiam astrorum positus, & plerumque qui in eclipsi lunari nascuntur, hinc malo obnoxij sunt; de quo consulantur Astrologi. Corripiuntur autem hoc malo frequentius pueri; unde & παιδῶν νόσος Græcis, & puerilis passio dicitur Cælio Aureliano: hinc adolescentes & iuvenes; rarius ætate maiores.

Causæ rari-  
tatis.

Remotiores etiam quasdam causas ad Epilepsiam generandam facere, experientia docuit; quales sunt, cibi excrementitij, graueolentes, & facili corruptibiles. Quamquam enim non in omnibus Epilepsiam inducant: tamen frequentius, quam aliàs ad Epilepsiae generationem faciunt. Ita ex esu fructuum horariorum crudorum, & lactis nimia ingurgitatione puellam Epilepsia correptam fuisse, refert Franciscus Hildesheim, *specul. p. 559*. Cibi itidem illi, qui peculiari vi Epilepsiam excitare creduntur, ut carnes hædorum, hepar hircinum & caprinum, coturnices, passeris, anguilla; de quibus exemplum habet Forestus, *lib. 10. in Schol. obseru. 57*. apium, de quo infra, *quest. 12. lentes*, de quibus exemplum habet Iulius Alexandrinus, *lib. 8. salubr. cap. 7. tubera & fungi*.

Causa pro-  
catartica &  
evidentes.

Procatartica verò atque evidentes causas, quæ materiam Epilepsiae causam, mouere, aut, ut antecedentes dicitur illam Epilepticam suscipiant, facere possunt, sunt, calor Solis, radij Lunæ, quos Anathyllus, Medicus, apud Stobæum, *serm. 100. καὶ παρὰ τὴν καὶ ἐπὶ τὴν ἡμέραν ἀνακρίν* scribit; inedia, cuius exemplum recitat Galenus, de Grammatico, *5. de loc. aff. cap. 6*. potus vini generosi & vaporosi, mora longa in balneo; cuius historiam affert Gabelkoffer, *Centaur. 4. curat. 59*. Olfactus rerum foetidarum, bituminis, picis, gagatis, cuius suffitu antiqui seruos emendos, an essent Epileptici, explorabant, Mercurialis, *de morb. capit. cornuum*, sulphuris, hepatis caprini assati, Mercurij sublimati, aquarum fottium, allij, apij, petroselinij; animi affectus, ut ira, Iohan. Baptist. Montanus, *Consil. 41. terror ex tonitru*, clangore tubarum: cuius exemplum apud Iohan. Matth. à Gradibus, *in 9. Rhafis*, Forestus, *lib. 11. in Schol. obs. 54. bombardarum fragore*, aut occurrente re aliqua improuisa & terribili. Ita excitatam fuisse Epilepsiam ob fratrem subito mortuum, refert Amarus Lusitanus, *Centaur. 12. curat. 90. ob decollationem spectatam*. Martinus VVeinrich, *de Monstris, cap. 15. Epilepticum cadetem*, Platerus, *lib. 1. obseru. Christoph. à Vega, lib. 3. de arte Medic. cap. 12. narrat*. Imò per jocum incussus metus & terror pueros fecit Epilepticos, referente eodem Christoph. à Vega, *loc. alleg. mæror*; cuius exemplum habet Amatus Lusitanus, *Centaur. 2. curat. 90. ira*, referente Galeno de Grammatico *5. de loc. affect. c. 6. exercitatio vehementior*, Vntzerus, *de Epileps. p. 102. titillatio, capitis inclinatio diuturna*, medicamenta purgantia fortia, Venus. Tandemque Dæmon malus se non raro dispositioni Epilepticæ immiscet.

### Differentia.

Differentia.

Sunt quidem plures Epilepsiae differentiae, ut quod alia est fortis alia mitis; alia recens, alia inueterata; quod alia seruat periodum, & vel singulis annis semel vel bis, vel singulis mensibus, in nouilunio & plenilunio, vel breuioribus interuallis, sed iis statis & certis, inuadit; alia verò non seruat periodos, sed nunc sæpius, nunc rarius, nunc per breuia, nunc per longiora interualla infestat. Est etiam epilepsia alia perfecta, alia imperfecta, ut mox de signis dicitur. Differentia tamen, quæ ad curationem maximè facit, est, quæ sumitur à causa, aut potius à loco in quo Epilepsiae causa generatur, quæ est, quod alia est primaria, seu per ἰδίαν, & prouenit à materia in capite generata; alia per consensum, à materia ad caput eleuata, siue à toto, siue à certa aliqua parte.

Itaque dicemus primò in genere de Epilepsia & signis diagnosticis ac prognosticis, & curatione, quæ in quacunque Epilepsia locum habet; secundò de Epilepsia per primarium cerebri effectum; tertio de Epilepsia per consensum.

### I.

### De Cognoscenda & Curanda Epilepsia in genere.

#### Signa Diagnostica.

Qui comitali vitio solent corripi, jam aduentate inueterudinem intelligunt, si calor summa defuerit, & incertum lumen, nervorumque trepidatio est, si memoria sublæditur, caputque versatur. Seneca, *lib. 3. de ira, c. 10*. Splendores instar iridis oculis obuersantur, odorem foetum sentiunt, aures sonant, bilis præter rationem accenditur. Aretæus, *lib. 1. cap. 5*. Capitis dolor & grauitas, pallor faciei; inordinatus linguæ motus, tristitia quædam percipitur.

Signa Epilepsiae imminu.

Vbi autem jam inuadit paroxysmus, homo subito corruit, toto corpore conuellitur, & motu non voluntario concutitur, omnes animales functiones tolluntur, atque inde post paroxysmum æger nihil eorum, quæ circa se gesta sunt, recordatur.

Signa Epilepsiae praesentis.

Nonnunquam tamen in mitiore Epilepsia æger non toto corpore conuellitur, neque concidit, sed aliqua saltem partes conuelluntur, & vel caput saltem concutitur, vel oculi contorquentur, vel manus ac pedes hinc inde iactantur, vel manus clausæ tenentur, vel æger in gyrum agitur, aut hinc inde discurret; nihil interim loquitur, audit, sentit, & paroxysmo finito ad se reuertitur omnium, quæ egit, vel acciderunt, ignarus est. Obseruauit non cadentem Marcell. Donatus, *lib. 2. hist. Med. mirab. cap. 4*. stantem Antonius Beniuenuus, *de abditis morbor. causis, cap. 97*, qualem ipse etiam vidi; sedentem Dodonæus, *in Schol. ad cap. Beniuenui allegat. cursitantem Erastus, in Anatom. librorum Comitis Montan. part. 2. p. 195*. Nonnunquam etiam euenit, ut Epilepsia laborans ea, quæ aguntur, audiat, & post paroxysmum eorum recorderetur: cuius exemplum est apud Brunnerum, *Consil. 14*.

Accedit his nonnunquam ut æger, præcipue in morbi insultu, vociferetur, & vocem inconcinnam edat, aut cum stertore spiritum sonorum emitat, dentibus stridat, spuma ante os appareat, quam sanguineam vidit Crato; vrina, feces alui, aut semen præter naturam excernantur.

Differt Epilepsia à vero spasmo, quod spasmus, cuius species sunt, ἐμπεσοδόν & ὁμοδόν, & tetanus, est conuulsio, seu musculorum ad principia contractio pertinax & continua; in Epilepsia verò corporis fit concussio per interualla. In conuulsione nulla in facultatibus principibus fit læsio: in Epilepsia verò principes functiones & sensus simul plerumque læduntur.

Epilepsia à spasmo differt.

#### Prognostica.

1. Epilepsia omnis periculosum & longum malum est. Alia tamen alià periculosior est; alia minus periculi coniunctum habet, ac facilius curatur.

2. Epilepsia hæreditaria vel omnino nunquam, vel rarissime curatur; eamque neque ætas neque Medicus discutere potest.

3. Recens curatu facilius est, quam inueterata; & si in initio neglecta fuerit, frequenter is, qui ea detinetur, commoritur. Alexander Trallianus, *lib. 1. cap. 15*.

4. Periculosior est, in qua functiones animales omnes abolentur, & conuulsio vehementior est, ac diuturnior, atque excrementa sponte effluunt.

5. Curatu facilius est, quæ, licet sit crebrior, breuior habet

Prognostica.

habet paroxysmos, & conuulsionem non vehementem, in qua æger liberius spirat.

6. Epilepsia ante pubertatem eueniens, curabilis: post annum verò 25. fere vsque ad mortem durat. 5. Aphor. 7. quod tamen vtplurimum verum est. Nonnulli enim, qui post annum ætatis 25. Epilepsia correpti fuerunt, Medicorum ope liberati sunt. Testaturque Trincavellius, lib. 1. consil. 29. se vidisse senem quinquagenarium, qui laborauerat 25. annis Epilepsia, curatum fuisse: qui tamen incidit in febrem & scabiem similem lepræ, quæ plus illi negotii faciebat, quam Epilepsia, donec eandem superaret. Et Nicol. Florentinus feminam quadragenariam ab infantia Epilepsia vexatam liberauit.

7. Epilepsia laborantes iuniores cum ætatis mutatio, tum loci, & victus liberat. 2. Aphor. 45. Sed & Epilepsia, quæ cum ætatis flore eualescit, abiens quasi pulchritudinis inuidia quosdam deformat, aut manum inutilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquem auferens. Aretæus.

8. Infantes admodum parui, & mox post natiuitatem Epilepsia correpti, raro euadunt.

9. Infantes tempore nouilunii nati plerunque epileptici fiunt, & raro mortis periculum euadunt.

10. Epilepsia in senibus ac decrepitis difficulter curatur.

11. Si mulierem vtero gerentem fortis Epilepsia inuadat, magnum periculum minatur.

12. Si ad vsum sternutatoriorum æger non sternutet, malum indicium est, atque argumentum, naturam iam ferè succumbere & prostratam esse: nisi in ægro quædam ad sternutationem sit ineptitudo ac impotentia naturalis. Obseruatum autem, quosdam nullo remedio ad sternutationem commoueri.

13. Epilepsia nonnunquam in paralyfin terminatur. Quod etsi nonnulli negant, experientia tamen ita rem se habere testatur; atque existant exempla apud Schenckium, in obseruat.

### Indicationes.

In curatione Epilepsie duo à Medico requiruntur. Primum est, vt à paroxysmo, quàm fieri potest citissimè, & sine omni damno, æger liberetur. Alterum, vt præcaueatur, ne in posterum æger Epilepsia iterum corripiatur.

Rectissimè tamen etiam ad paroxysmum instantem seu impendètem respicitur, operaque danda, vt is auertatur, aut saltem minus vehemens euadat, ligaturis conuenientibus partibus adhibitis, si per consensum malum fiat. Statim verò, vbi paroxysmi instantis signa præsentit æger, pilulam vnā laudani opiat, cuius partibus quatuor vna olei camphoræ admista fuerit, vel rotulam vnā antepilepticā capiat & assumat. In quem vsum hæ Rotulæ antepilepticæ parari possunt.

℞. Pulv. rad. pæon. iusto tempore collecta Drach. i. magist. perlar. corall. rub. an. Drac. i. sem. cranij hum. 3. ss. sacch. opt. in aq. tilia dissoluendi q. s.

F. s. a. Confectio in tabulis.

Potest etiam essentia castorei, gutt. iii. vel v. dosi, in aqu. flor. tilia propinari. In horū defectu exhiberi possunt ol. succini albi gutt. i. vel ii. in aq. Epilept. Langii.

Vel præbeatur seq. Haustus.

℞. Aq. Epilept. Langii Drac. vi. syr. de pæon. Drac. ii. spir. vitriol. gutt. vii. Misce.

Vel Portionis sequentis cochl. vnum atque alterum:

℞. Aq. st. tilia, pæon. an. Vnc. ii. cheiri, herba Trinit. an. 3. i. essentia pæonia 3. sem. syr. de pæon. Vnc. sem.

Nares & præcordia inungantur balsamo aliquo antapoplectico, vel balsamo rutæ aut succini.

Prius perficitur, si vapor malignus, & materia illa cerebri nerosumque genus suā acrimoniam & malignitatem molestant ac turbant à cerebro omnibus, quibus fieri potest, modis reuellatur, discutitur, dissipetur &

collatur; per medicamenta inprimis antepileptica, seu materia illi peculiari modo opposita, facultas excutitur; & ne æger in paroxysmo damni aliquid patiarur, præcaueatur.

Posterius vt præstetur, primò radix mali venæ sectio, ne, purgatione, quàm præcedat præparatio, & sudoris prouocatione tollenda.

Secundò, ipsa maligna qualitas, & Epileptica si deditur antepilepticis expugnanda.

Tertiò, cerebrum priuatim per errhina, apophlegmatismos, & gargarismos expurgandum.

Quartò, materia, quæ iterum cumulari posset, per setaceum, cauterium, & fontanellas absumenda & euacuanda.

Quintò, caput appropriatis medicamentis roborandum.

Sextò, diætæ reliquæ curationi cōueniens instituenda.

In genere autem hæc noranda: 1. In præparantibus purgantibus, sudoriferis, roborantibus semper ea esse eligenda vel admiscenda, quæ cerebro & nervoso generi sunt familiaria & appropriata, & quæ vi specificā Epilepsie resistunt. 2. Sæpius & per intervalla medicamenta esse repetenda. 3. Ad nauseam euitandam, & ventriculi debilitatem præcauendam vtilissimum esse, medicamenta cibo ac potui admiscere, ac potum ac cibum medicatum præbere.

### Cura in Paroxysmo.

1. Æger in loco lucido potius, quàm tenebricoso contineatur, & capite sublimi collocetur.

2. Dentès diducantur, patulumque os seruetur, interiecto ligno aliquo, commodissimè visci querni, si ad manus sit, vel cochleari, vel alio instrumento. (quæ succo vel extracto rutæ inungi possunt) vt æger facilius spiret, spuma effluat, & inprimis ne linguam morfu lædat vel amputet. Obseruauit enim Galenus, de differ. morb. cap. 8. & Forestus lib. 10. obseruat. 66. quosdam in paroxysmo particulam linguæ sibi morfu amputasse.

3. Clamore forti in aures facto facultas excutitur.

4. Membra cōuulsa, cum pollices & digiti manuum, qui vehementissimè conuellantur, tum aliæ partes, in rectum extendantur leniter; commodumque fuerit, si oleo vel pinguedine aliqua dolorem leniendi & resoluenendi vim habente prius inungantur, vt pinguedine humanâ, anserinâ, oleo chamæmelino, lilior. albor. amygdal. dulc. vulpino, rutaceo, è castoreo, laurino, lumbricor. terrest. hyperici, iuniperi, petroleo.

Vt ℞. Pingued. anserin. ol. amygdal. dulc. vulpin. lumbric. an. Vnc. sem. petrolei 3. i. ol. cerebinth. 3. sem. Misce.

Vel ℞. Ol. lilior. albor. chamæmel. an. 3. sem. dest. iuniperi 3. i. pingued. human. Drach. ii. Misce.

5. Membra directæ ita detineantur, caueaturque, ne ex violenta illa corporis concussionē æger aliquid damni percipiat. Omnem tamen motum cohibere non expedit; ne materia in capite retineatur; & paroxysmus protrahatur.

6. Enumeratis modò oleis & pinguedinibus tota quoque spina dorsa à cervice ad os sacrum illinatur, vel aqua aliqua antepileptica.

7. Reuulsio instituatur per frictions & ligaturas, quæ validæ sint ac dolorificæ, ac ligaturæ sæpe laxentur, iterumque constringantur. Conuenit in hunc vsum & plantas pedum sale ac aceto fricare.

8. Si paroxysmus sit diuturnior, alius stimuletur glande vel clystere acriore, vt non solum excrementa in intestinis ac locis vicinis euacuentur, sed & ea, quæ ad caput eleuantur & euaporarent, reuellantur, & ad alium deducantur. Exempli gratia:

℞. Rad. pæon. ireos, an. Vnc. sem. fol. ruta, betonic. maioran. summit. centaur. minor. an. M. i. flor. tilia, laur. dul. an. M. ii. sem. fenic. anisi, pæon. an. Drach. i. agarici in peria ligati Drach. ii.

Coqu.

Quomodo Epileptici extra paroxysmum curandi. Curatio in paroxysmo.

Quid in paroxysmo Epileptico agendum.

Coqu. in suff. quant. aquæ fontan. Colaturæ ℥. lb. j. In qua dissolue elect. diaphanic. benedict. laxat. an. ℥. sem. hiera simpl. Drach. ii. olei rutæ. Vnc. ii. mell. anthosar. ℥. i. salis Drach. i.

F. Clyster, cuius vis augeri potest, si pilular. aurear. vel trochisc. alhandal. grana aliquot addantur.

Chymici croci metall. vel vitri ℥. ii. gr. iii. vel iiiii. in aqua conueniente ebullire sinunt, & colaturam clysteri admiscunt. Vel etiam reliquis purgantibus omiffis croci metall. ℥. sem. in liquore conueniente coquunt, & colaturam cum decocto clysteris miscunt.

In paroxysmo epileptico ex vtero & ventriculo nonnulli etiam vomitum commendant, pennâ oleo, cui gr. iiiii. fl. ℥. nij admista sint, intinctâ excitatum, Nam per vomitum solet tum solui accessio.

9. Naribus ea adhibeantur, quæ non solum vim attenuandi & discutiendi habent, sed & specificâ vi Epilepsiæ resistendi prædita sunt. Inter quæ primas faciliè obtinet ruta quocunque modo adhibita. Ea ergo vel viridis cum aceto, vel lacinia succo rutæ cum castoreo misto imbuta naribus admoueat. vel oleum & balsamum rutæ naribus illinantur. Vtile est & oleum vel balsamum succini, quibus addere licet oleum destillatum majoran. pulegij, nucis moschat. caryophyll. cinamomi. Efficaces etiam sunt aquæ antepileptiæ, si iis nares irrigentur. Rutam syluestrem tanquam arcanum cuiusdam rustici experientiâ probatum, quo & ipse feliciter sæpe vñus est, commendat Trallianus.

Exempli gratia:

℥. Succ. ruta Vnc. ii. aq. antepilept. ℥. sem. castor. ℥. ii. pulu. rad. pæon. ℥. i. M. & naribus immittantur.

Vel ℥. Ol. destillat. ruta Scrup. i. succini Scrup. sem. major. gutt. iiiii. ol. nuc. mosch. expressi q. s. F. Linimentum vel Balsamum.

Vel ℥. Ol. nuc. mosch. express. extract. ruta, castor. an. Scrup. i. ol. destill. ruta, succini, an. Scrup. sem. theriac. antiq. Drach. sem. F. Linimentum.

Vel ℥. Extract. ruta Scrup. ii. castor. Scrup. i. ol. destill. ruta, succini, an. Scrup. sem. granor. juniperi, major. an. gutt. iii. camphor. gr. v. theriac. antiq. Drach. sem. F. Linimentum ad nares.

10. Lingua & palatum illinantur theriaca, Mithridat. confect. anacardin. aut diacastor. in succo vel aqua rutæ, lauendulæ, aut alia conueniente, vel aceto rutaceo dissolutis, aut castoreo in aceto macerato; aut sal ori indatur, & dentibus affricetur, & quidem non tantum sal esculentus, sed & ex ruta, aut aliis plantis antepileptici paratus.

Vel ℥. Castorei opt. ℥. ii. benzoes Scrup. i. Trita miscantur cum oxymel. scillitic. ℥. i. sem. & diductis dentibus cochleari in os infundantur.

11. Auribus, vertici, & futuræ coronali ea, quæ naribus admouentur, inungere licet: vel sacculus capitalis è speciebus diamosch. dulc. aromat. rosar. ruta, flor. lauendulæ, succino paratus vertici imponatur, vel ceratum ex iis compositum. Inprimis futuræ coronali oleum cranij humani commodè inungitur. Iisdem & tempora inungi possunt.

Commendantur & suffumigia ex granis juniperi, semine rutæ, asa foetida, galbano, & inprimis ex succino albo. Licet enim succini fumus extra paroxysmum lædat: tamen in accessione, seu in paroxysmo Epilepticos non patum iuuat; quod multiplici experientiâ confirmatum.

12. Si hisce æger non concitetur, aut hisce ad motis sternutatio non cieatur, fortiora sternutatoria adhibenda; præsertim adultis, de quibus jam loquimur. De Infantibus enim postea in specie dicemus.

Exempli gratia:

℥. Rad. pyrethr. ireos, an. Scrup. i. castor. bellebor. albi, an. gr. ii. sem. ruta, nigella, fol. majoran. sicca, an. Scrup. i. cubebar. piper. alb. an. Scrup. sem. F. Puluis,

Vel ℥. Piper. alb. fol. majoran. siccor. an. Scrup. ii. castorei Scrup. sem. euphorb. gr. ii. F. Puluis.

Vel ℥. Rad. ireos, majorana sicca, sem. nigella, an. Drac. sem. piper. albi ℥. i. pyrethri, caryophyll. an. ℥. s. F. Puluis.

Horum puluerum granum vnum atque alterum in nares ægri immittatur, vel puluerisata, & nodulis inclusa aceto madefiant, & naribus ægri admoueat.

13. Aëtius, tetrab. 2. ferm. 2. cap. 15. refert, collapsos statim excitari, si sanguis ex magno ægri pedis digito vulnerato labiis illinatur; de quo experientiâ consulenda.

Ferunt, D. Brunnérum, Archiatrum Halensem, turturæm foeminam deplumasse, & umbilico Epilepticiæ in paroxysmo imposuisse, atque sic paroxysmum abegisse. Extrahi enim fumum quendam venenatum scribunt, quo extracto ipsa conuellatur, & moriatur. Id quod in foeminis, & si Epilepsia sit ex consensu vteri, vero consentaneum esse puto.

14. Neque amulera negligenda, sed ægri collo appendenda; radix pæon. vngula alcis, corall. jaspis, smaragdus, lapis chelidonium.

15. Et cum in Epilepticis paroxysmis sæpe cor non parum afficiatur, non abs re fuerit, cordis regioni epithema aut sacculum cordialem applicare.

16. Monenda præterea & hæc, dum turpitudinem faciei, oris distorsionem & spumam occultare volumus, capite & facie tecta, videndum, ut id ita fiat, ne respiratio impediatur. Et dum ori aliquid indimus, ne dentibus lingua lædatur, & ut spuma emanare possit, & palato medicamentum adhiberi. Si conuulsio mandibularum sit fortior, lignum, vel alias res duras dentibus interponere non semper licet; cum interdum dentes hoc modo elidantur: sed commodius est, sacculum ex corio vel classiore linteo paratum, & rutâ, sinapi, pyrethro, castoreo, & similibus refertum dentibus interponere, quo modo & os apertum seruabitur, & morbo succurretur.

Non solum autem hæc circa ægrum agenda, & extra adhibenda sunt, sed & statim, & dum hæc fiunt, medicamenta quædam, quæ peculiari vi Epilepsiæ aduersantur, eiusque causam dissipat ac discutiunt, exhibenda.

Theriaca videlicet, vel Mithridat. in aqua conuenienti dissoluta.

Vel castorei ℥. i. in oxymel. scillit. Vnc. i. dissolut. aq. cerasor. nigror. dulcium, aq. hirundin. tilia, dentaria, & Epilepticiæ aliæ; ol. succini gutt. iii. vel iiiii. in aqua conueniente, mixtur. simpl. ℥. i. Drach. sem. vel ℥. ii. in aqua idonea; liquoris cranij humani gutt. viii. in aqua conuenienti.

Cinnabarim natiuam à Cratonè commendatam, ac magnetem Epilepsiæ appellatam fuisse, & hunc puluerem ad Epilepsiam, ut & vertiginem, usurpatum fuisse referunt:

℥. Cinnabaris natiua Vnc. sem. corallior. rubr. preparat. margarit. prepar. an. Scrup. ii. croci Scrup. i. fol. aur. duodecim.

F. Puluis, cuius gr. xii. vel xvi. dentur cum aqua conueniente.

Vel pulueris alicuius antepileptici Drach. sem. vel Drach. i. in liquore conueniente exhibeatur.

Vel ℥. Aqua flor. tilia Vnc. i. sem. cerasor. nigror. vel spiritus eorum. hirundin. vel picarum, an. Vnc. i. intur. seu extract. liquid. castor. Drach. sem. Misce.

Vel exhibeatur hæc Aqua:

℥. Cranium humanum non sepultum, destilletur per retortam in arena s.a. igne valido, ac destillatio ret repetatur.

Postea ℥. pæoniam marem cum toto, comburatur, & cum aqua fiat Lixiuum. Tandem

℥. Lixiuij huius, aq. cranij humani, an. ℥. iii. castorei ℥. i. sem. spec. diamoschi ℥. sem. Destillantur per B.M. Destillato adde margarit. prepar. gr. xx. ol. ℥. i. gutt. v. anisi gutt. x. Misce.

Exhibeatur in paroxysmo cochlear. j.



*Cura post Paroxysmum.*

*Cura ex-  
tra Paroxys-*  
Postquam paroxysmus cessauit, danda opera, ne reuertatur. Et quamuis Epilepsia morbus non sit ejusdem generis, sed alia per primarium cerebri affectum, alia per consensum: tamen cum multa sint, quæ in omnibus Epilepsiarum speciebus locum habent, illa primò proponemus.

*Vena sectio.*

Et primò quidem si plenitudinis notæ appareant, aut sanguis multus melancholicus adsit, viresque permittant, mox ab initio vena aperiatur; primis tamen viis, vt moris est, clystere vel medicamento propinato expurgatis. In malo verò inueterato venæ sectio tutò omittitur. Quantitas autem conueniens emittatur, & potius parcior, quàm copiosior.

*Præparantia.*

*Præparantia.* Postea ad vitiosorum humorum purgationem accedendum, qui prius tamè præparandi sunt. Etsi verò plethoricæ in præparatione & euacuatione humorum ad pituitam, quòd ab ea Epilepsiam fieri credunt, respiciunt: tamen tutissimum erit, considerare, quis humor, vel plures etiam misti abundant, & ad eos curationem dirigere: cum humores tales vitiosi causas eiusmodi malignas foueant, & earum naturam facilius induant. Ea tamen, vt supra de Indicationibus in genere dictum, medicamenta hic eligantur, vel admisceantur, quæ peculiari proprietate Epilepsiarum aduersantur.

*Humor Pituitosus ergo ita præparetur:*

*Potio.*

℞. Rad. pæonia decrescense Lunâ collect. ʒ. vi. iros II. lyric. Vnc. sem. acori veri, angelica, an. Drach. ii. sem. sem. pæon. cardui bened. an. Drach. ii. ruta, fenicul. an. Drach. j. sem. fol. ruta, betonic. hyssopi, salvia, majoran. an. M. j. flor. pæon. stæchad. Arabic. anthos, an. P. j. visci querni Vnc. ʒ. Coqu. in diplomate vase clauso in f. q. aqu. vel hydromelit. Vnc. xv.

Colatura expressa, vbi subsederit, effundatur, atque addantur syrup. de hyssopo Vnc. ii. stæchad. simpl. ʒ. i. ʒ. de pæon. oxymel. scillit. an. Vnc. i. F. Potus, qui in partes quinque diuidatur, & diebus quinque mane propinetur.

Vel ℞. Rad. pæonia Vnc. i. feniculi, eryngij, an. Vnc. sem. angelica, fraxinella, an. Drach. ii. visci querni. Vnc. i. betonica, ruta, majorana, hyssopi, an. M. j. flor. anthos, stæchad. Arabic. salvia, an. P. j. caryophyll. Drach. j.

Infundantur in f. q. aqua pæonia & flor. tilia vase clauso per triduum, in B. Colat. clara effundatur & f. q. sacchari dulcoretur. Dosis Vnc. iii.

*Vinum.*

℞. Visci querni Vnc. i. salvia, hyssop. an. M. j. flor. stæchad. Arab. tilia, an. P. ii. sem. pæon. fenicul. an. Drach. ii. cinamomi Drach. vi. calami aromat. nuc. moschat. an. Drach. iii.

Infundantur in vase vitreo, in sufficiente quantitate vini boni, & macerentur per dies iiij. Postea trajiciantur per manicam Hippocratis, ac colatura saccharo, si libet, dulcoretur. F. Claretum.

*Hydromel.*

℞. Mellis opt. lb. vi. aqu. pura lb. xxxvi.

Coqu. in vase conueniente, & desumpuntur, spumâ detractâ addantur, & in sacculo coquantur, salvia, betonica, hyssopi, rorismarin. an. M. iii. flor. stæchad. Arab. M. ʒ. visci querni Drach. vi.

Coqu. ad tertiæ partis consumptionem.

Postea liquor recondatur in vasculo ligneo, vt deferueat. Post dies aliquot suspendantur in eo in nodulo cinamomi, calami aromat. nuc. moschat. an. Vnc. ʒ. caryophyll. Drach. ii.

Asseruetur hebdomadibus aliquot, vt hydromel clarum fiat, de quo Vnc. iii. propinentur.

*Syrupus vel Iulepus.*

℞. Syrup. de hyssop. ʒ. i. ʒ. stæchad. simplic. pæonia, oxymel. scillit. an. ʒ. i. aq. hyssopi. l. lior. conuall. pæon. an. ʒ. ii. cinamomi Drach. i. Misc. pro duabus dosibus. Loco oxymel. addere licet spiritus vitrioli Scrup. ʒ.

Ad humorem pituitosum vtile etiam est decoctum hyssopi, de quo infra in Curatione Infantium.

*Humor Melancholicus si abundet, ita præparetur:*

*Potio.*

℞. Rad. pæon. helen. polypod. querni, an. ʒ. iii. betonica, meliss. rorismar. an. M. j. flor. pæon. stæchad. Arabic. tilia, an. P. i. vuar. passar. Vnc. i. glycyrrhiz. ʒ. ʒ. Coqu. f. a.

Colat. ℞. ʒ. ix. syrup. bigloss. Vnc. i. ʒ. tunic. beton. an. Vnc. i. M. F. Potio pro tribus dosibus.

*Iulepus.*

℞. Aq. pæon. cerasor. nigror. dulc. borrag. an. Vnc. iii. syrup. pæon. stæchad. simpl. tunic. an. Vnc. i. ʒ. aq. cinamomi Drach. iii. M. pro tribus dosibus.

*Humor Biliosus si abundet.*

℞. Rad. pæon. taraxac. graminis, asparagi, visci querni, an. ʒ. ʒ. endiu. capill. ʒ. an. M. ʒ. sem. pæon. endiu. an. Drach. i. Coqu. in f. q. aquæ puræ.

Colat. ℞. Vnc. x. syrup. endiu. simpl. violar. betonica. acetos. simpl. an. Vnc. i. ʒ. Misc. pro 4. dosibus.

*Purgantia.*

Præparati humores euacuandi sunt. Et quidem in Purgatio. cipiendum à lenioribus, & ad fortiora progrediendum, continuandusque eorum vsus diutius. Censetque non sine causa Thom. Erastus, in disputat. contra Paracelsum, in Epilepticis plurimis frustra omnia fieri, si purgationes non continuentur: ideòque non solum bis, ter aut quater, sed etiam plures menses continuandas esse. Principiò tamen crebrius purgat, & alternis vel ternis vel quaternis diebus leniora purgantia exhibet. Postea verò, cum actiones animales rectè sese habere incipiunt, ac symptomata remittunt, rarius purgat, singulis scilicet septimanis semel vel ter in mense; idque per totum annum. Post hoc tempus semel in mense, aut etiam per longiora intervalla. Monet & hoc Massarias, non semper in lenioribus subsistendum, sed quandoque etiam ad fortiora purgantia progrediendum esse; & hinc fieri putat, quod Epilepsia rarò curatur; quòd scilicet Medici semper in lenioribus hæreant.

Inter purgantia commodiora sunt agaricus, pituitâ præcipue abundante, sicut & helleborus in melancholia; in biliosis rhabarbarum addi potest.

Pituitoso ergo humore abundante in decocti ad pituitosi humoris præparationem parati sufficiente quantitate. Coqu. vel infundantur agarici trochiscati Drach. vi. fol. sena elect. Vnc. i. zingiber. galanga, an. Drach. i.

Colat. ℞. Vnc. vi. mell. anthosar. Vnc. ii. M. pro duabus dosibus.

Vel ℞. Pilular. coch. Scrup. ii. Arabicar. Scrup. i. trochisc. albandal. gr. iii. q. salu. gutt. i. F. Pilulæ num. xxv.

Verum

Verum quia plerumque humores plures simul peccant, purgantia quoque ad plures humores dirigenda, atque iis, cum continuatione opus, commodè præparantia adduntur.

### Syrupus.

℞. Rad. pæon. iusto tempore collect. Vnc. i. acori veri, visci querni, an. Vnc. sem. fol. hyssopi, betonic. salvia, ruta, primul. veris, sardui bened. an. M. j. sem. pæon. fœnicul. an. Drach. ii. flor. tilia, lilior. conuall. primula veris, an. M. ii. polypod. querni Vnc. sem. fol. sena elect. Vnc. ii. sem. cartham. excorticat. Vnc. i. agaric. trochisch. Drach. vj. hellebor. nigri Syriac. preparat. Vnc. sem. zingiber. galang. an. Drach. ij. cortic. citri. nuc. moschat. an. Drach. j.

Infundantur in suffic. quant. aqu. simplic. Postea ebulliant, colentur, & clarificentur, additaque sacchari suff. quant. coqu. lento igne ad syrupi consistentiam, cui sub finem addantur oxymelit. scillit. Vnc. iii. De quo dentur Vnc. ii. vel plures, pro corporis ratione.

Oxymel helleboratum Iuliani ad Epilepsiam vtile descripsit Gesnerus, quod in Augustano Dispensatorio quoque extat.

Habetur etiam syrupus helleboratus ad Epilepsiam utilis apud Quercetanus, in *teirad. in fine cap. 17.*

### Vinum.

℞. Mechoacan. Vnc. b. fol. sena elect. Vnc. i. turbit. elect. Drach. vj. zingiberis, galang. cinamom. nucis mosch. an. Drach. j. caryophyll. granor. Paradisi, an. Drach. sem. flor. stœchad. Arab. lil. conuall. an. P. j.

Conquassata macerentur in vini Rhenani lb. i. sem. in vitro clauso, loco calido.

Colatura filtretur per chartam, & si liber. dulcoretur. Dosis Vnc. iii.

Vel tale, quod Erasius in usu habuit;

℞. Rad. pæon. sem. pæon. excortic. an. Drach. i. sem. cinamomi, macis, galang. zingiber. caryophyll. an. Drach. j. fol. sena elect. Vnc. i. turbit. vel agaric. Drach. vi. vini ℥. xii. aqua simpl. vel alim. conuenientis Vnc. viij.

Macerentur horis 24. & postea additis sacchari ℥. iii. per manicam Hippocratis trajiciantur.

F. Claretum purgans, quod ad tres vel quatuor haustus suffecerit.

### Electuarium.

Electuarium laxatiuum Norinbergenfisbus vsitatum esse fertur. *die purgierende Kriebel-Latverge*; dictum.

℞. Elect. diaphenic. Vnc. iiii. de succo rosar. Vnc. ii. sem. antidoti conuulsu. Vnc. ii. turperb. alb. esula preparata, an. Drach. i. castorei, diagryd. an. Scrup. ii. costi, zingiber. caryophyll. an. Scrup. i. sem. cumini, ruta, croci, an. ℥. sem. Cum syrup. rosar. sol. F. Electuarium, cujus dosis ab Vnc. sem. ad Vnc. i.

Antidoti conuulsuæ descriptio hæc est;

℞. Visci querni, rad. pæon. an. Vnc. i. castorei, salvia, an. Vnc. sem. baccar. lauri, cranij hum. vsti, an. Drach. i. rheriac. elect. Mithridat. opt. an. Drach. vi. mellis despum. lb. ii. Misc. pro Electuario.

### Extracta.

Extractum hellebor. nigri descripsit Quercetanus, in *Teirad. cap. 14.* Potest & tale fieri:

℞. Cortic. hellebor. nigri Syriac. autumnio collecti lb. i.

Macerentur in vase vitreo clauso in B. in ℥. q. aqu. rutæ & anisi per octiduum. Postea succus exprimatur, & aqua per alembicum separetur, donec succus mellis consistentiam acquirat. Succo huic affundatur spir. vini optimus, & omnis tinctura extrahatur. Spiritus vini separetur, ut remaneat extractum, cui adde diagryd.

Drach. j. vel extract. scammon. Drach. sem. solutionis perlarum Scrup. sem. corall. Scrup. i. salis volatilis succini Scrup. sem. ol. succini, ruta, an. gutt. vii. croci opt. Drach. sem. ol. cinamomi, caryophyll. an. gutt. v. M. Dosis à Scrup. sem. ad Scrup. i.

### Morsuli.

℞. Turbit. elect. & gumm. Drach. iiii. diagryd. Drach. i. sem. vel extract. scammon. Scrup. ii. cinamomi, zingiber. nucis moschat. galanga, an. Drach. sem. corall. rubr. prepar. Scrup. sem. conferu. pæon. Vnc. sem. ol. salvia gutt. vi. sacchar. in aqu. lilior. conuall. & tilia dissol. q. i. F. Morsuli. Dosis Vnc. sem.

### Pilula.

℞. Extr. pilul. cochiar. Drach. sem. vel Scrup. ii. hellebori nigri gr. v. ol. ruta gutt. i. F. Pilulæ xv.

Alexander Trallianus, lib. i. cap. 15. commendat Antidorum, quod Theodoretum dicitur, & describitur à Paulo Aegineta, lib. 7. c. 11. Trallianus autem, vt quoque reliquum corpus purgare possit hoc antidotum, addit colocynthidem & scammon. pro ægri viribus, ac multos se nouisse scribit, quos sola eiusmodi purgatio sanauerit. Idem refert, se quidem etiam hiera picra purgasse, ac lap. Armeno, eius tribus scrupulis datis, & profecisse. verum in comitialibus inueteratis nullum adeo efficax medicamentum inuenisse, vt hoc medicamentum purgans, multosque se nouisse desperatos ab aliis Medicis vel hoc solo persanatos fuisse.

Inter Chymica & metallica commendatur ☿. & quæ ex eo fiunt, vitrum, flores. crocus, & hinc facta aqua benedicta Rulandi, spir. vitriol. viridis, qui ex vitriol. cum vrina puerorum destillando elicitur, ☿ vitæ. Quia tamen pleraque ex iis sunt vomitoria, in Epilepsia potius per consensum conueniunt; in Epilepsia v. per primarium cerebri affectum parum profunt. Eadem etiam cautè, & non, nisi rectè præparata, vsurpanda. Et de medicamentis eiusmodi prolixè tractat Quercetanus, in *teirade*. Quæ an omnia titulos illos & encomia, quæ præscripsit, iustinare possint, experientia docebit; quæ tamen sæpius periculosa: in primis cum non satis certum, an quædam ex illis ipse Quercetanus, & quo cum fructu, vsurpauerit.

Quod autem supra monuimus, post purgantia sæpe ad præparantia redeundū, & ea vsurpanda esse, quæ radices mali absumere possunt, hic reperendum. In quæ vsus Galenus, in consilio de puero Epileptico, medicamentum de scilla commendat, quo per dies x. vii. iubeat. Laudatur & oxymel. scilliticum, quod cum aceto paratur. Si tamen neruofum genus sit imbecillum, simplex potius succus scillæ cum melle aut saccharo miscendus, ejusque vsus similiter x. diebus continuandus à Drach. ii. ad Vnc. ii. ante prandium, & in robustis etiam ante cenam, purgante singulis septimanis interposito. Potestque hoc medicamentum vel solum dari, vel etiam antepilepticis misceri.

Trallianus inter simplicia, quæ, si quid corporis meatibus insideat, extenuare & absumere possunt, valentissimum pyrethri radices contusas & melle excoctas esse scribit, si detur cochleare vnum per internalia, donec vndecies exhibueris. Experientiâ, inquit, probatum est auxilium, ne ipsius vilitatem contemnas.

Verum de scilla, pyrethro, & similibus medicamentis calidis, atque attenuandi & incidendi vim habentibus notandum, ea ab antiquis vsurpata fuisse eo præcipuè fine, vt pituitam crassam, à quâ cerebrum obstruente Epilepsiam fieri credebant, attenuarent & inciderent. Verum cum Epilepsia potius à materia neruofum genus irritante & vellicante fiat, talia non nisi in frigida & humida corporis constitutione locum habent.

habent, aut si in ventre inferiore epilepsie causa per-  
tinacius hæreat; in reliquis cautius viurpanda. Imò  
magis efficacia sunt, si medicamenta, quæ peculiari  
vi Epilepsiam curant, adiungantur; cuius generis  
medicamenta inter antepileptica postea propo-  
nemus.

Post repetita præparata & alterantia subinde ad pur-  
gantia recurrendum, & diutius ea, ut antea dictum,  
continuanda. Ideoque etiam ea eligenda, quæ corpo-  
ri minus nocent, & minus maligna sunt. Ac licet in  
principio, cum, viurpari incipiunt medicamenta, ap-  
petitus delicti soleat; tamen hoc accidens statim cessat,  
ut scribit Erasius, paulatim assuefacta natura ad medi-  
camentorum usum, & corpore puriore iam reddi-  
to, ac per intervalla medicamentis idoneis robo-  
rato.

### Sudorifera.

Ut radices huius mali, quæ sæpe altius infixæ sunt  
quæ ut purgantibus tolli possint, plane euellantur, post  
vniuersales euacuationes sudorifera vtilia sunt. Nimi-  
rum decoctum ligni Guaiaci, cuius usu cum victu sic-  
cante & extenuante se multos Epilepticos curasse te-  
stat Leonhard. Iacchinus, in 9. Rhasis, cap. de Epilep-  
sia. Continuandus autem eius usus non solum per dies  
aliquot, sed & septimanas, si vires ferant.

Efficacior autem redditur, si medicamenta Antepi-  
leptica addantur.

#### Exempli gratia:

℞. Ligni Guaiaci lb. j. visci querni ℥. ij. radic. pæon.  
Vnc. j. Infundantur horis xxiiij. in aqu. lb. xij.

Postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem.

Colat. dantur Vnc. vj. ad sudorem ciendum. Reman-  
entia iterum coquantur, & decoctum illud loco porus in  
mensa viurpetur, vel vinum eo diluatur.

Eodem modo decoctum sarsæ parillæ, radic. Chinæ,  
ligni sassafras, parari potest. Commendatur & deco-  
ctum visci querni; radicum item pentaphylli.

Quercetanus, in Pharmacop. dogmat. rest. cap. 8. tale  
parat.

℞. Rasur. ligni buxi ℥. ij. ligni iuniperi, rad. pæon. vis-  
ci querni, an. ℥. j. ligni Rhod. C. C. an. ℥. vj. eboris, radic.  
China, an. ℥. j. sem. cardui benedicti, cortic. citri, an. ℥. j.

Macerentur horis 24. in aq. repidæ lb. viij. Deinde  
coquantur ad tertiæ partis consumptionem. Sub finem  
addantur flor. tilia, lilij conuall. an. p. ij.

Colentur per manicam Hippocratis. Dosis Vnc. v.  
vel vj.

Dantur & lapis Bezoar. eundem in usum.

Chymici ad sudorem ciendum spir. cardui ben. vel  
sambuci propinant Vnc. j. spirit. Guaiaci Scrup. ij. cum  
conueniente liquore, spirit. tartar. comp. Drach. ss. vel  
Scr. ij. in liquore conueniente, sal volatile C. C. Bezoar-  
tic. miner. gr. iiij. v. vel vj. ℥. ij. fixi Scr. ss. cum pauxi-  
lo theriacæ.

### Antepileptica medicamenta.

Corpore euacuato ea medicamenta, quæ occultâ &  
specificâ vi Epilepsie resistunt, viurpanda; siquidem in  
his maxima curationis spes sita est: eaque singulis die-  
bus, quibus non viurpantur alia medicamenta, exhi-  
benda. Eadem tamen vtiliter quoque præparantibus,  
purgantibus, & sudoriferis admiscantur.

### Simplicia.

Pæonia radix, semen, & flos. Colligendam autem ra-  
dicem censent alij mense Iulio, Sole existente in Leo-  
ne, in meridie, die Solari, decrescente Lunâ, aut porius  
nouâ, ut Hercul. Saxonia. Alij mense Aprili, Sole in ♊  
te existente, & ♋a in opposito; quod commodius vi-  
dan. Sennert. Tom. I. l.

detur. Alij ☉ in ♋ existente, ♋a in ♌ ♋issem quernum  
corylinum, & tilia, quod nonnulli aliis præferunt, ℥. ij.  
vel Drach. j. pondere datum. Ruta cum horiensis cum  
sylvestris. De Ruta sylvestri, eiusque in Epilepsia effica-  
cia videatur Alexandr. Trallianus, lib. 1. cap. 15. Potium  
montanum, castoreum, à ℥. j. ad ℥. ij. in liquore conueni-  
te datum. Vngula alcis, cranium hominis violenta morte,  
non morbo, interempti, atque in primis ossiculum illud  
triangulare, quod ad suturam λαψιδος in quibusdam  
corporibus reperitur. Commendatur etiam radice py-  
rethri, eryngij. Multos sanatos fuisse bibendo pulueris  
bryoniæ Drach. j. cum vino manè, vnius anni spatio,  
scribit Fontanus, lib. 1. Præst. Mizaldus verbenam col-  
lectam Sole per arietem currente, & mixtam cum ali-  
quot granis pæoniæ tritam, & cum vino exhibitam  
epileptico miracula facere scribit. Valeriana sylvestris  
Radix, antequam caulem edat, effossa valde commen-  
datur à Fabio Columna, in histor. Plantarum, qui re-  
fert; pulueris radicis huius cochlearis dimidij quan-  
titate semel vel bis cum vino vel alio conuenien-  
te liquore sumpti usu pro ægri & ætatis ratione  
plurimos sanatos fuisse. Succinum; corallium; sma-  
ragdus, lilium conuallium, flores tilia, radix dentaria, ve-  
sica apri cum urina in furno exiccata, C. C. coagulum  
leporis erui magnitudine ex aceto potum. Lignum co-  
ryli, quod Heracleum Rulandi esse censetur, siccus pa-  
nonis. Hieron. Donzelinus, in consil. à Scholtzio colle-  
ctis, consil. 38. scribit, cum primum pullus equinus in lucē  
prodit, vomitu quandam materiam reiecit, quam nisi quis  
præcipiat, mater statim deuorat. Hæc siccata & pulueri-  
fata à morbo comitiali liberat certo experimento, ut mira-  
res videatur.

Præter ista selectiora recensentur passim & alia. Po-  
tium (plerique interpretantur plantaginem illam se-  
ptinerueam) oportet ieiunum quam plurimum viridē  
comesse à primâ Luna ad tricesimam, tradit Scribonius  
Largus, c. 2. qui & alia remedia eodem loco habet.

Ab aliis laudatur hepar asini assatū, hepar capri, turdi,  
vrsi, in primis verò hepar ranarum, utpote quo etiâ per-  
tinax & diuturna Epilepsia sublata sit. Colligantur  
mense Maio, Iulio, Iunio ranæ palustres virides num.  
xl. viuis dissectis hepar eximatur, siccantur hepara  
extensa super foliis brassicæ in olla vitreata lento calo-  
re. Hinc pulueriscentur, & puluis in partes quinq; æqua-  
les diuidatur, cuius pars prima ieiuno cum vino sub  
ipso nouilunio in ☉ existente, exhibeatur, & pulue-  
re sumpto duabus horis à cibo æger abstineat: secunda  
pars cubitum ituro exhibeatur, & ita reliquæ. Sanguis  
mustelæ, caro mustelæ, cor lupi, testiculi apri, cor lepor-  
is, hirundinis, ciconiæ, vulturis, lac equinum, simus ci-  
coniæ, vermiculi inuenti in tuberositatibus cynosbari;  
& alia multa, quæ cum alij recensent, tum ex aliis colle-  
git Nicolaus Florentinus, serm. 4. tr. 2. c. 15.

Chymici spir. vitrioli comendant, & ol. ♋a, & ex mo-  
do enumeratis præparant oleum & sal volatile ac ma-  
gisterium succini, de quibus videatur Cl. D. Michaël  
Doringius, in Diatribe de Opobalsam. sect. 3. oleum ligni  
buxi, Quercetanus in tetrad. c. 16. ol. ligni Heraclei seu  
corylini, de quo Rulandus, in observationibus, oleum  
spiritum, & sal volatile & solution. cranij humani: tin-  
cturam & magisterium coralliorum, vngulæ alcis so-  
lutionem seu magisterium; item sal, aqua & spiritus ce-  
rasorum nigrorum dulcium, florum tilia, pæoniæ, lilij  
conuall. radic. dentariæ.

Etsi verò ista medicamenta ob peculiarem illam vim,  
quâ Epilepsie aduersantur, in omnibus causis locum  
habent; quia tamen alia temperata, alia calida, alia fri-  
gida sunt, non inutile fuerit, pro diuersa corporis con-  
stitutione in his aliquem delectum habere.

### Composita.

Ex his simplicibus multa cōposita sunt medicamēta.

## Pulveres.

Habentur ferè in omnibus pharmacopoliis pulveres contra Epilepsiam : inter quos est & pulvis Marchionis dictus, in dispensatorio Augustano.

℞. Visci querni, granor. pæon. fl. pæon. radic. pæon. omnium iusto tempore collector. an. Drach. ii. solut. corall. Scrup. ii. pèrlar. Scrup. i. cranij humani Drach. j. β. ungula alcis Drach. j. succini albi Drach. β. F. Pulvis.

Dosis à ʒ. i. ad ʒ. j. Pro ditioribus addi potest lapid. bezoar. ambra, an. Scrup. i. moschi Scrup. sem.

Pulvis Epilepticus D. Sigismundi Kolreuteri:

℞. Fol. beton. hyssop. quinquefol. herb. paralyt. an. ʒ. β. rad. bryon. pæon. eryng. gemian. an. ʒ. β. lign. visc. quern. corylini, coriand. preparati, sem. pæon. excort. an. Scrup. viii. C. C. vsti preparati Drach. vi. ungula alcis Drach. ii. unicornu Drach. iii. fl. pæon. lil. conuall. viol. purp. tilia, an. ʒ. iii. (al. Drach. i. sem.) fol. auri puri num. vi. corall. alb. rubr. margarit. preparat. an. Drach. ii. chamadr. ʒ. iii. unguinum anterior. pedum mediorum leporis Drach. i. coaguli leporis vel hœdi Drach. iii. off. de G. C. num. iiii. rasura parvis anterior. cranij Drach. iii. ungula asini Scrup. iiii.

Ex his omnibus F. Pulvis.

Alius :

℞. Ungul. alcis, cranij humani, rad. pæon. sem. pæon. an. Drach. i. corall. rubr. prepar. Scrup. ii. diamosch. dulc. Drach. sem. F. Pulvis.

Alius :

℞. Rad. pæon. iridis Florentin. visci querni ungula alcis, granor. pæon. an. Drach. j. corall. rubr. prepar. succini albi, an. Scrup. i. smaragd. prepar. ligni aloës, an. Scrup. β. flor. lauendul. smaragd. prepar. an. gr. vi. F. Pulvis.

Alius :

℞. Cranij humani Drach. ii. succini prepar. magist. pèrlar. corall. an. Drach. i. unguil. alcis, visci qu. rad. pæon. an. Scrup. ii. flor. tilia, lauendul. an. Drach. β. lap. bezoar. unicornu veri, an. Scrup. β. F. Pulvis. Dosis ad ʒ. β.

Alius :

℞. Sem. pæon. visci querni, cranij hominis è parte anteriore, stercor. pæonis, an. Drach. j. β. spec. diaxyloaloes, diamosch. dulc. an. Drach. β. ℞. F. Pulvis.

Possunt addi sacchar. ʒ. iiii.

Alius :

℞. Rad. & gran. pæon. cubebæ. visci q. cinamomi, an. Scrup. i. succini albi preparat. castorei, an. gr. iii. cranij hum. C. C. vsti preparati, an. Scrup. i. lap. smaragd. Scr. β. spec. diamosch. d. diaphir. an. Scrup. i. fol. auri num. ii. F. Pulvis.

Alius :

℞. Visci q. ungula alcis, C. C. vsti, corall. rubr. ocul. margarit. prepar. an. ʒ. β. rad. pæon. Vnc. β. rasur. cranij hum. ʒ. i. fol. auri num. vi. croci Orient. ʒ. i. sacchar. candi albi Vnc. sem. F. Pulvis.

Alius :

℞. Rad. pæon. Drach. j. visci q. unguil. alcis, an. ʒ. β. f. mi ciconiar. ʒ. j. β. cal. arom. galange, an. ʒ. β. F. Pulvis.

Alius :

℞. Rad. pæon. & sem. ejusd. tormentill. lapid. s. pretiosor. preparator. an. ʒ. sem. spec. diamosch. d. pulv. visci q. an. ʒ. i. cranij human. ʒ. iii. unguil. alc. ʒ. ii. sem. macis, cardamomi, cubebæ, coriandri, an. Drach. i. fol. auri & argent. num. vi. F. Pulvis saccharo edulcorandus.

Alius :

℞. Corn. unicornu, vel, in defectu hujus, lapid. bezoar. Drach. j. unguila alcis, margaritar. non perforat. corall. rubr. alb. preparat. C. C. vsti, radic. pæon. sem. pæon. excort. visci querni, auri Vngar. purissimi, an. Drach. sem. stercor. pæon. Scrup. i.

Pulveriscentur singula seorsim, & F. Pulvis subtilissimus.

Detur senioribus Drach. sem. cum aq. fl. tilia, vel lilij conuall. primulae ver. fl. pæon. vel aq. hirund. cum aceto destill. Junioribus verò, & præsertim pueris trium

vel quatuor annorum, aut circiter, ʒ. j. vna vice detur.

℞. Crato Epist. 121. mentionem facit pulveris cuiusdam contra Epilepsiam, quem Cæsar pro maximo secreto habuerit, & quo homines etiam proiectæ ætatis, & qui diu huic morbo fuerunt obnoxij, post purgationem curati fuerint. Eius descriptio hæc est. ℞. crystalli præp. ʒ. i. corallior. rubr. præp. ʒ. ii. Margar. præp. ʒ. i. smaragdi Oriental. præp. ʒ. β. Fiat pulvis, cuius dimidia pars est vna dosis, in aq. taraxaci. Additque Crato, se his fecisse periculum, ægroisque liberatos fuisse ab Epilepsia, sed postea tamen obiisse, existimaturque crystalli vsum non esse tutum. Verum contra probatur ab aliis Medicis, vt Anton. Guaignerio. rr. 3. c. 2. de fluxib. Joh. Langio, lib. 3. Epist. 1. cap. 4. Anshelm. Boërio a de gemm. & lapidib. lib. 2. cap. 74. qui scribit, Crystallum fluxum cholicum citissime, & à proprietate, tanquam bezoar aliquod compescere. Ex experientia aliquoties docuit, eius vsum non solum tutum, sed & vtilem esse. Nec refert, quod ægri, qui ex vso pulveris antea descripti ab epilepsia liberati sunt, tandem obierint. Alia enim obitus causâ, non crystallus, esse potuit.]

Pulvis è cinnabari nativa Cratonis supra propositus est, de quo videatur. Quercetanus, in tetrade, c. 33.

Alij ita præparant :

℞. Cinnab. nativa & mineral. vera Vnc. i.

Leuiter supra ignem lentum in tabula torrefiat. Postea subtilissime teratur super marmore in pulverem impalpabilem.

Deinde adde margarit. preparat. corall. rubr. preparat. an. ʒ. i. β. cranij hum. preparati, C. C. vsti preparat. an. ʒ. i. croci Drach. ii. fol. auri num. xxv.

Exactissime misc. & iterum terantur super marmore.

Plures pulveres videantur in Spicileg. Hildesheimi, cap. 7. Antidotario speciali VVeckeri, sect. 20.

## Aqua.

Aquarum Antepilepticarum passim descriptiones multæ extant. Aliquot saltem exempli loco afferre libet.

Aqua Hirundinum talis parari potest:

℞. Hirundin. n. xl. ruta M. ii. castor. ʒ. i. vini albi q. l. Destillantur in B. M.

Aqua Hirundinum D. Sigismundi Kolreuteri.

℞. Pullor. hirundinum vinorum quot haberi possunt, (e. g. numero 200.) quibus adde tertiam partem (ʒ. xiii.) castorei. Contundantur simul in mortario, & pro qualibet hirundine affunde aceti vini cochl. i. β. (vel etiam ij.) & stent sic simul in vase vitreo per triduum; postea destillantur, & rostro alembici imponatur cinamomum, vt per id transeat.

Alia :

℞. Hirundinum num. xx. Macerentur in vino per dies xiv. His adde visci quern. ʒ. iii. rad. pæon. ʒ. ii. castor. ʒ. i. herb. ruta rec. M. ii. fl. sambuc. tilia, rorismar. primula ver. an. M. j. cinamomi acutiss. ʒ. iii. cubebæ. macis, an. ʒ. ii. Incis. & contus. misc. & destill. cū f. q. vini. Rhen. opt.

Alia :

℞. Hirundin. num. lxxxiii. castorei, galbani, an. ʒ. v. ʒ. ii. β. sem. coriandr. ʒ. ii. ʒ. iii. seselcos ʒ. x. ʒ. i. aceti vini lb. x. ʒ. viii. F. Destillatio s. a.

Quæ aqua fœminis præcipuè exhibetur.

Alia :

℞. Hirundin. domest. num. xlv. amputatis pennis alarum & caudarum grandioribus; non euulsis, discerpantur in medium, & incidantur, affund. aceti lb. iiii. vini Rhen. lb. i. sem. Stent ʒ. d. & noct. Postea add. castor. ʒ. sem. visci qu. ʒ. i. unguila alcis ʒ. iii. C. C. crudi ʒ. ii. rad. & sem. pæon. an. ʒ. i. sem. ireos Drach. ii.

Stent iterum hor. 24 Postea F. Destillatio in M. B. bene obturatis vasis, ne quid expiret.

Alia :

℞. Hirundin. preparat. ʒ. iiii. castor. ʒ. iii. rad. pæon. ʒ. ii. β. succini ʒ. β. fl. lil. conuall. chamam. Rom. major. an. M. j. Macerentur

De Crato  
vsa contra  
Epilepsiam  
Pulvis contra  
Epilepsiam

An crystalli  
vsum tutum  
fuit.

Aqua H.  
irundinum.



Macerentur in aceto forti hor. 24. Deinde superinfund. vini Rhen. opt. lb. vj. & destillentur in B. f. 2.

Aqua Picarum composita talis paratur:

℞. Sem. pæon. radic. eiusdem, an. 3. B. aristoloch. long. 3. iij. visci querni Vnc. B. castorei Drach. ij. pyrethri Vnc. B. flor. stæchad. Arabic. 3. v. liliol. conuall. 3. j. B. primula veris, pæon. an. Drach. vj. lauendul. rorismarini, an. Drach. v. fol. saluie, maioran. beton. hyssopi, an. Vnc. B. cinamomi, caryoph. nuc. mosch. cardamom. an. Vnc. sem.

Singulis crasso modo contusis adde aq. liliol. conuall. lb. iij. flor. tilia lb. j. B. primula veris, lb. i.

Deinde ℞. Pullorum picar. num. xx. Bulliant in vase clauso in aqua liliol. conuall. Hinc. mista simul destillentur in B.

Alia: ℞. Pullor. picar. num. xv. Bulliant in aq. herb. & f. pæon. q. l.

Coqu. ad. mediet. Exprimantur forciter. Expressio- ni add. cardamomi, gran. pæon. cubebæ, an. Drach. ii. sem. coriandr. preparati, visci q. an. Drach. ii. galang. cinamomi, caryophyll. nuc. mosch. macis, an. Drach. i. sem. castor. 3. i. B. fol. lauri, bacc. lauri, an. Drach. ii. zedoar. ligni aloës, an. 3. i. B. fl. rorismar. lauend. rosar. maioran. saluie, meliss. betonic. stach. Arab. cort. citri, an. 3. vi. Zingib. Vnc. B. pyreth. Drach. ii.

Pulueris omnia grosso modo, & in aqu. prædicta & aq. herbæ paralyf. stent per d. 14. in loco cal. vase bene obturato. Postea destill. per B. Tandem in fine add.

Croci Vnc. sem.

Alia: ℞. Picar. mundatar. num. x. visci q. Vnc. sem. rad. pæon. Vnc. i. sem. fl. hyperici, betonic. primula ver. silia, an. M. sem. maioran. pæon. fl. cordial. an. M. i. lauendula, saluie, ruta, an. p. i. nuc. mosch. cinamomi, spec. diamo- sch. d. diaphir. an. Scr. f.

Picæ prædictæ & species commisc. quibus add. aq. f. tilia, pæon. card. ben. an. q. l.

Infund. per hebdom. i. postea destill. per B.

Alia Aqua Antepileptica.

℞. Flor. liliol. conuall. recent. lb. ij. primula veris lb. j.

Macerentur in vino Maluatico aliquot diebus, postea destillentur.

Destillato suo tempore adantur flor. beton. M. i. stæchad. Arabic. p. ii. saluie, betonicæ, ruta, hyssopi, an. M. B. sem. pæon. visci quern. an. Drach. ii. rad. pæon. Vnc. sem. aristoloch. pyrethri an. 3. ii. castorei Vnc. B. galang. maior. zingiber. sem. sesel. cardamomi, an. Drach. ii. cubebæ. ligni aloës, nuc. moschat. caryophyll. cinamomi, an. Vnc. sem. spec. diamo- sch. dulc. Drach. i. diamb. dianthos, an. Drach. sem.

Si destillatum superius non sufficiat, affundatur adhuc vini Maluatici tantum, vt emineat supra species iiii. digitorum altitudine: macerentur aliquandiu, hinc destillentur in B.

Aqua Antepileptica D. Caspari Dornauij. Archiatri Burgenfis, à Cl. Dn. D. Iohan. Georgio Pelshofero, Collega & Amico, charissimo, mihi communicata.

℞. Flor. liliol. conuall. lb. j.

Affunde aceri vini aceri Vnc. iij. Misc. Postea.

℞. flor. violar. 3. iij. Contud. cum mellis anthos.

Vnc. B. 3. iij. fol. primul. ver. betonic. an. Vnc. vj.

℞. flor. & fol. primul. ver. betonic. an. Vnc. vj.

Misc. cum suprædictis, adde flor. rosar. rubrar. 3. iij.

calendul. 3. iij. bugloss. lauendul. an. Vnc. ij. summit. ro-

rismar. maioran. an. Vnc. vj. saluie lb. ij.

Concisa & contusa miscantur cum aq. f. tilia Vnc. x.

succ. depur. rute lb. j. Misc. Postea.

℞. rad. pæon. Vnc. vij. rhapont. 3. j. B. aceri fl. ronic.

Vnc. vj.

Misce, quibus factis omnes istæ infusiones commisc-

ceantur: superfunde vini Vngar. lb. xij.

Stent in loco calido vase bene clauso, diebus vj. Ab-

strahe aquam per vesicam.

Dan. Sennerti Tom. II.

Huic destillato add. asa dulc. styrac. cal. ladani, an. 3. j. B. sem. feniculi, anisi, an. Vnc. j. pæon. eruce, synapi raphani, an. Drach. iij. visci querni Vnc. sem. ungula alcis Drach. ij. C. C. preparati Drach. iij. cranij hum. preparati, succini albi prepar. an. Vnc. sem. croci Orient. cinamomi, an. Drach. ij. cardamomi, cubebæ, an. Vnc. sem.

Stent per 2. dies, loco calido. F. rursus destillatio in cucurb. ex arena, donec lb. vj. exstillarint

Dubitari tamen non immerito potest, an ex visco querno, ungula alcis, C. C. prepar. cranio humano. vites aliquæ huic aquæ accedant.

Huc referri etiam potest

Aqua Pæoniæ composita, aliàs Flusivasser dicta:

℞. Rad. pæon. in Martio. ) decrecent, collect. sem. pæon. conquass. diptamn. alb. an. Vnc. j. visci querni, cort. citri rec. an. Vnc. sem. flor. lil. conuall. rec. primul. ver. rec. maioran. sicc. an. M. j. vini Maluatic. opt. lb. vj. spir. vini lb. ij.

M. Incis. & contul. infund. in vase vitreo bene recto in loco tepido, per mensem sæpius agitando; destillentur in cucurb. lento igne: destillat. adde flor. lauend. rec. M. ii. sem. fenicul. Drach. vi. piperis l. 3. j. cinamomi acerr. macis, an. Drach. i. sem.

Contundenda contund. Mixta simul stent 14. diebus denuo in infus. in loco cal. diligenter obstructo orificio vasculi & vitri. Vltimò destillentur lento igne.

Alia Aqua Epileptica:

℞. Flor. lil. conuall. lb. i. herb. paralyf. Vnc. viii. pæon. lauend. tilia, betonic. verbasco. an. Vnc. ij. pullor. inuenum pica. hirund. purgat. & vino diligenter lotor. num. xxiv. sem. filer. mont. cardui bened. an. Drach. ii. pæon. Vnc. ii. B. summit. ruta P. ii. sem. rad. pæon. 3. ii. sem. aristol. l. 3. i. B. diptamn. 3. B. visci qu. 3. i. & 3. vi. cubebæ. Vnc. j. piperis. castor. an. 3. B. flor. anthos 3. i. sem.

Affund. vini Maluatic. q. l. & per vesicam destill.

Alia:

℞. Flor. lil. conuall. Vnc. i. B. pæon. lauend. beton. an. 3. i. sem. tilia 3. i. anthos, stæchad. Arab. an. 3. B. rad. & sem. pæon. an. Scr. v. aristoloch. rot. 3. iij. visci. qu. Drach. ii. cubebæ. cinamomi, an. Scr. iiii. piperis l. Drach. sem. castorei. Scrup. i.

Contund. & incid. Infund. in spir. vini q. l. per aliquot dies, deinde destill. in B.

Alia Aqua Epileptica:

℞. Flor. lil. conuall. rec. lb. i.

Infunde in f. q. vini generosi tamdiu, donec. haberi possint flor. tilia recentes, tunc sume eorum lb. sem. flor. pæon. Vnc. iiii.

Stent in infus. aliquot septimanis, deinde destil. in B. ad siccitatē. In Destillato iterum infund. rad. pæon. 3. i. sem. diptamni alb. visci qu. an. Vnc. sem. rad. pyrethri. 3. B. sem. pæonia 3. sem. castorei Scr. ii. fol. ruta M. i. flor. stæchad. Arabic. lauend. an. P. iiii. betonic. P. vi. cubebæ. macis, an. Drach. ii. cinamomi Vnc. sem. scilla preparata Drach. iij.

Digerantur dieb. 15. hinc per alembicum destillentur.

Dosis ab Vnc. sem. ad Vnc. i.

Commendatur & Antidorus Phædronis.

℞. Rad. angelic. tormentill. an. Vnc. sem. rhapont. 3. iij. rad. & sem. pæon. an. Drach. vi. herb. potentill. cum. fl. 3. iij. ruta, coriandr. prepar. an. 3. ii. macis Drach. i. sem. galanga Drach. iij. cubebæ. Vnc. sem. piperis l. 3. iiii. castorei 3. ii. stercor. anserum. syluestr. pauonum. an. 3. B. ciner. hirundin. 3. i. B. ungula asini Vnc. sem.

Puluerisatis superfund. aq. picarum & hirund. an. lb. ii. vel q. l. Macerentur per mensem integrum in B. postea destillentur. Tum

℞. ligni aloës Drach. ii. succini alb. 3. i. B. spina serpent. purg. cranij hum. utriusque sex. an. Scr. v. corallij veriusque margarit. preparat. an. Scr. iiii. lap. Chalcedon. cand. 3. i. smaragd. Drach. B. stibij ad modum croci reuerberati. 3. i. ambr. gryf. Scrup. i.

In pollinem redacta circulentur in B. in pelicano per mensem integrum, ac tandem recondantur vitro bene obrurato, ac seruentur vsui.

Si vsus postulat, omnia bene simul agrentur, & adulto inde praebeatur cochli. j. in aq. lauendulæ; puero cochlear. s.

Vel ℥. Flor. lil. conuall. Menf. j. Affunde vini opt. Menf. iij.

Macerentur vase clauso diebus aliquot, postea destillantur. Hinc

℥. flor. lauendul. quart. j. cubebæ. cinamomi. galange. nuc. moschat. macis, an. Vnc. s. visci querni, radic. pæon. an. Drach. vj.

Affundatur destillatum superius, digerantur diebus 14. postea destillantur.

Aqua etiam nobilis Antepileptica habetur in Institut. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 5. Et videantur plures apud Langium, lib. 3. Epistolar. cap. 1. Conrad. Gesnerum, in Enonymo, Arnold. de villa noua, Breniary lib. 1. cap. 2. Andernacum, de vet. & noua medicina, VVeckerum, Antidot. spec. lib. 2. f. 1. Quercetaneum, in Pharmacop. Dogmatic. restituta, cap. 7. Dornkreilium, in Dispensatorio, Vntzerum, pag. 222. Brunnerum, consil. 17. 18. Francisc. Hildesheimium, in spicileg. pag. 605.

### Syrupi.

℥. Mellis scillitis. Vnc. j. s. aceti scillis. Drach. vj. succi pæon. Vnc. vj. sacchar. Vnc. iij.

Coq. ad Syrupi consistentiam.

Vel ℥. Rad. pæon. Vnc. j. s. eryngij, filipendul. dictamni albi, an. Vnc. j. visci querni Drach. vj. fol. ruta, saluie, millefol. hyssopi, maioran. cardui benedicti, an. M. j. flor. stæchad. Arab. tilia lauendul. an. P. j. (al. P. ij.) sem. pæon. Drach. ij. ruta, trifolij, an. Drach. j.

Coqu. in aq. puræ q. s. Colat. adde succi radic. pæon. ℥. ij. mellis scillitis. Vnc. iij. sacchar. Vnc. v.

F. Syrupus, qui aromatizetur spec. diamosch. dulc. ℥. ij. De quo frequenter sumatur, Vnc. s. vel Vnc. j.

[Testatur & refert Zacutus Lusitanus, de prax. Med. adm. lib. 1. obs. 20. se plures etiam natu iam grandes vidisse Epilepsia laborantes, quibus plurima auxilia, tam occultâ, quam manifestâ qualitate agentia, adhibita nihil profuerint, vno syrupo è succo folior. viridium Nicotianæ, & melle parato sanatos fuisse, assumpto ℥. iij. quantitate, tribus horis post cœnam, quadraginta diebus. Si viridis Nicotiana deest, sicca bonæ notæ usurpari potest.

### Electuaria.

Nicol. Florentinus, cap. propr. refert, se quandam fœminam, annorū 40. quæ ab infantia passa fuerit Epilepsia, curasse solo huius Electuarij vsu: ℥. Herba, quæ vocatur S. Pauli, quæ à quibusdam vocatur herba Paralyrica, quantitatē, quam libet; ea incidatur minucini, ac misceatur cum melle, atque addatur puluis caryophyll. pyrethri, radic. pæoniæ.

Crato hoc commendat.

℥. Succ. millefol. ruta, melissa, maioran. hyssop. ad spissitudinem cum saccharo cocti, an. Vnc. s. rad. eryng. minuium incis. visci querni, an. Vnc. j. radic. pyrethri tornatill. an. Vnc. s. C. C. prepar. Drach. v. Mithridat. iheriac. an. Drach. j. conseru. fl. rorismarini Vnc. j. sem.

M. lento igne. Dosis mane Drach. j. & ante somnum post cœnam moderatam Drach. s.

Vel ℥. Rad. pæoniæ, sem. eiusdem, an. Drach. j. smaragdi prepar. Vnc. s. corall. rubr. prepar. Drach. j. pulu. pul. lor. hirundin. vstor. Drach. s. ungula alci Drach. j. succi ruta Vnc. s.

Cum syrup. hyssopi,

F. Electuarius. Dosis ad quantitatem nucis moschatæ. Vel ℥. Spec. diamosch. dulc. Drach. ij. visci querni ℥. ij. rad. pæon. & sem. eiusdem an. Drach. ij. maioran. Vnc. s. smaragdi prepar. Drach. j. s. fol. aur. num. v. Cum syrup. pæoniæ F. Electuarius.

Montagnana, Consil. 44 scribit, se milles expertum sequens Remedium:

℥. Pyrethri, stæchad. costi, an. Drach. x. agaric. Drach. v. sem. carui, anethi, asa fœtida, aristoloch. rotunda, an. Drach. j. s. succi scilla, mellis electi, an. lb. j. Vnc. ij.

Coquat. scilla & mel lento igne, ad iustā consistentiā. Deinde speciebus additis F. Electuarius. Dosis mane, horis iij. ante prandium, Drach. iij. singulis diebus.

Aliud:

℥. Conseru. fl. pæon. herb. paralysis, tilia, an. Vnc. j. ruta Drach. vj. anthos, lauend. an. Vnc. s. spec. diamb. diamosch. dulc. an. ℥. ij. extracti rad. pæon. ireos, magisterij corallior. succin. prepar. an. ℥. j. Cum syrup. de stæchad. simp. & pæon. F. Electuarius.

### Rotula & Morsuli.

℥. Cinamomi opt. Drach. j. rad. pæon. sem. eiusdem an. Scr. ij. cubebæ. caryophyll. macis, an. Scr. j. spec. aromatici rosati, caryophyll. diamb. diamosch. dulc. an. ℥. s. sacchari in aq. pæon. & tilia dissolut. Vnc. iij.

F. Rotulæ, quæ conspergantur oleo anisi & macis, an. gutt. iij.

℥. Extract. aromat. rosat. pæon. an. Scr. j. conseru. primæ veris, fl. tilia, an. Drach. ij. sacch. in aq. pæon. dissol. Vnc. ij. F. Morsuli.

Circa istorum autem medicamentorum vsus inprimis notandum, vt & in aliis difficilibus morbis, ne ab vsu horum remediorū statim desistamus. Licet enim in principio parum sæpe videantur prodesse: eorum tamen vsus continuatus insignem affert vtilitatem, secundum illud Hippocratis, 2. Aphor. 52. Secundum rectam rationem omnia facienti si secundum rectam rationem minus res succedat, proinus non est ad aliud transfundendum; dum modo constet id, quod ab initio propositum fuerat.

### Externa Medicamenta.

Neque solum intra corpus talia medicamenta vsurpanda, sed & extra applicanda.

℥. Ol. nuc. mosch. express. Drach. i. ambra grysea, mosch. an. gr. vj. zibeth. gr. x. ol. succini, maior. an. q. s.

F. Balsamum, cuius granum vnum vel alterum natis inungatur.

Vel ℥. Bals. ruta Drach. j. succini alb. Scr. ij. rorismar. Scr. j. ol. destill. cubeb. gutt. v. cal. arom. gutt. iij. M. pro Balsamo.

Vel ℥. Ladani puri ℥. j. styrac. calam. ℥. s. lign. aloes opt. gallie mosch. caryophyll. an. Drach. j. myrrh. thuris, an. ℥. s. moschi gr. vj. ol. nuc. moschat. express. Drach. s. aq. maioran. q. s.

F. Pomum, obducatur sindone rubra.

Possunt & præcordia, nucha, & tempora (sicut & spina dors) sæpius ieiuno ventriculo Vnguento sequenti inungi.

℥. Ol. de castor. de piperib. costi, de euphorb. an. ℥. s. caryophyll. nucis moschat. an. Scr. ij. flor. lauend. Scr. iij. mastich. Drach. s. vini rubri fortiss. Vnc. ij.

Bulliant ad consumpt. vini. In fine adde Mithridat. opt. Drach. j. s. F. fortis expressio; add. xing. urfi, vulpis, an. Dra. vj. Misce.

Applicentur quoque vertici capitis ex cephalicis & antepilepticis medicamentis, sacculi & cucuphæ ac emplastra; de quibus postea inter caput confortantia medicamenta dicetur.

*Amuleta.**Amuleta in Epilepsia.*

Nec abs re fuerit Amuleta quædam collo & brachiis appendere, quæ occultâ vi hunc morbum depellât: qualia sunt, radix pœon. semen eiusdem; de quo videantur, Galenus, 6. de simpl. medicamentor. facult. Fernelius, 2. de abditis rerum causis. cap. 17. Lemnius, de occultis naturæ miracul. Hercul. Saxonia, cap. de Epilepsia, viscum quernum, sambucus supra salicem crescens, è quibus orbiculi & cruces fiunt, ungula alcis, corallium, smaragdus, iaspis, lapis chelidonium.

*Particulares cerebri euacuationes.**Particularis capitis euacuatio.*

Interim dum ista fiunt, non omitti debent particulares capitis euacuationes per errhina, apophlegmatismos, gargarismos, quæ collectam ex debilitate in cerebro materiam tollunt, quibus semper ea, quæ specificâ vi contra Epilepsiam pugnant, addenda.

*Errhina.*

℞. Succ. ruta, beta, an. Vnc. ℞. aq. sambuci, maioran. sem. pœon. nigell. an. Scr. j. M. & in nares trahantur. Aliud:

℞. Succ. pœonia, cyclamin. an. Vnc. ℞. maioran. ruta, an. Drach. ij. mellis Drach. j. ℞. spir. vini Vnc. ℞. Misce.

*Sternutatorium.*

℞. Nuc. moschat. rad. pœon. an. Drach. j. piper. albi, pyrethri, an. Scrup. j. elebor. albi Scrup. ℞. F. Pulvis.

*Apophlegmatismi.*

℞. Nuc. moschat. rad. pyrethri, pœon. acori veri, an. Drach. j. sem. eruc. Drach. ij. Cum suff. quant. mastiches. F. Pastilli Scrup. ij. pondere in ore tenendi & masticandi. Eadem materia in puluerem redacta, ac in nodulo inclusa masticari potest; vel pulueri addantur. mastich. & passular. an. Drach. vj.

Commendantur & sequentes Trochisci masticandi, quorum vnum atque alterum teneat per semihoram manè ieiuno ventriculo in ore æger:

℞. Galanga Drach. ij. nuc. moschat. Drach. ℞. rad. pœon. cubebæ. an. Scr. j. rad. pyrethri Drach. ℞. sacchari Drach. j. ol. nuc. mosch. destill. gutt. ij. Cum syrup. de stœchad. & albug. oui. F. Trochisci.

*Gargarismi.*

Alexander Trallianus pastillos ex hyssopo, pulegio, & pipere commendat. Item gargarismum ex hyssopo, pulegio, origano, & ficibus siccis septem.

Vel ℞. Rad. pyrethri Vnc. j. ℞. rorismar. salvia, hyssopi, ruta, an. P. ij. Coqu. in aqu. f.

Colat. ℞. ℞. ij. aceti rosacei, mellis anthosati. an. Vnc. ij.

Misce. Et misturâ istâ fauces colluantur.

Vel ℞. Ruta, betonic. salvia, hyssopi, an. M. ℞. rad. pœon. ireos, an. ℞. ℞. acori, pyrethri, granor. pœon. an. ℞. ℞. nuc. moschat. ℞. ℞. Coqu. in f. q. aq. simpl.

Colat. ℞. ℞. j. oxymel. scillis. ℞. ℞. mell. anthos. Vnc. j. F. Gargarismus.

Plura talia videantur apud Vntzerum, de Epilepsia, pag. 194.

*Cauteria.**Setaceum, Fonticuli.*

Ad eundem usum, & vbi materiæ sedes est in capite.

Dan. Sennert. Tom. 11.

vsurpari possunt cauteria actualia, quæ insignem excidendi, & humorem parti firmius impactum attenuandi & discutiendi vim habent. Ideoque vt humiditas cerebri nimia exicetur, & materia, Epilepsia causa, attrahatur ac dissipetur, futuræ coronali applicetur cauterium actuale. In applicatione autem huius cautæ agendum, & cauendum, ne alius, quam par est, adagatur ne vicinæ cerebri membranæ lædantur, & graue aliud quod malum attrahatur; de quo supra par. 1. cap. 5. dictum.

Fontanellæ verò cauterio, seu actuali, seu potentiali excitatæ, materiam, quæ iterum cumulari posset, euacuant, & à cerebro auertunt, quæ tamdiu aperta seruandæ, donec animaduertatur, nihil amplius talis humoris vitiosi in corpore colligi.

Idem ferè præstat Seraceum.

*Cerebrum roborantia.*

Tandem vt cerebrum à morbifica causa debilitatum pristinum robur acquirat, & ne ob eius debilitatem vitiosi humores in eo cumulentur, roborantibus opus est, internis & externis, quæ parantur ex medicamentis cephalicis & antepilepticis. Itaque exhiberi possunt medicamenta ex cephalicis & antepilepticis, quæ passim nota, & cuius generis antea titulo, Antepileptica, proposita fuerunt. Vide etiam Vntzerum, de Epilepsia, pag. 204. & seqq.

Vnum atque alterum adhuc apponere liber:

℞. Rad. vincetox. enula, succisa, pœon. caryophyll. an. Drach. vj. bacchar. lauri, Drach. ij. salvia, serpilli, flor. anthos, an. Drach. j. spec. diamosch. dulc. diaplir. dianthos, an. Drach. ℞. F. Pulvis.

Alius D. Nauij:

℞. Sem. pœon. off. de C. Crasur. eboris, an. Drach. ℞. rad. pœon. visci querni, nucis moschat. an. Drach. j. cranij human. ungula alcis, margarit. an. Drach. ij. Fiat Pulvis.

Vel ℞. Aq. epileptica Langij ℞. j. picar. hirundin. an. ℞. ij. spir. cerasor. nigr. sylu. ℞. j. essent. flor. pœon. ℞. ℞. tintura corall. rubr. ℞. ℞. extr. dictamni gr. ℞. ℞. ruta gr. ℞. ℞. destil. salvia gutt. ℞. ℞. manus Christi perlat. cum ol. succini Drach. v. M.

Vel parentur seqq. Rotulæ:

℞. Spec. diamosch. d. diaplir. diapœon. an. Scr. j. sem. pœon. citri, rad. pyrethri, an. ℞. ℞. visci querni, carduibenedicti, an. Scr. j. succin. alb. caryophyll. nuc. mosch. limatur. C. C. crudi, cranij hum. crudi, an. Scrup. ℞. Cum sacch. in aqu. lil. conuall. dissol. q. f.

F. Rotulæ.

Valde efficax est & seq. Electuarium:

℞. Castor. Drach. ℞. ℞. sem. pœon. sem. nigella, ruta sylu. rad. pyrethri, hyssop. an. Drach. j. succi rec. ruta, maioran. an. Vnc. ℞. cranij hum. ungula alcis, an. Drach. ij. Mithridat. el. rad. cond. eryng. an. ℞. ℞. pulu. ligni sassafr. ℞. vj. conferv. betonic. rorismar. an. ℞. ℞. Cum mellis scillic. q. f.

F. Electuarium Soli per mensem exponendum. Dos. Drach. ij. vel ℞. ℞.

Vel ℞. Ol. nuc. mosch. express. ℞. j. zibeth. ℞. j. mosch. ambra, an. gr. v. ol. succini, lauendul. maioran. ruta. an. gutt. vi. M. F. Balsamum.

Emplastrum:

℞. Ol. de castoreo, rutacei, irini, an. ℞. ℞. destillati succini ℞. ℞. rad. pœon. sem. pœon. visci querni, an. Drach. i. sem. nigella, ruta, castorei, flor. lauendul. tilia, lilior. conuall. stœchad. Arab. an. Scrup. i. Cum resina & cere an. q. f.

F. Emplastrum futuræ coronali applicandum.

Sacculus:

℞. Fl. lauendula, betonic. stœchad. Arab. anthos, an. ℞. ℞. summitat. serpill. maioran. an. Drach. i. rad. pœon. Drach. ii. sem. pœon. nigell. an. Drach. i. ligni aloës, sassafras, an. ℞. ℞. cinamomi, nucis moschat. macis, caryophyll.

*caryophyllor. an. Drac. ʒ. granor. iuniperi, gummi iuniperi, sacamahac. mastich. thuris, succini, an. Drach. j.*

Crasso modo contusa includantur sacculo ex serico rubro.

Præclarum etiam auxilium præstant thermæ, si lotiones & embrochæ ex iis instituantur.

### Dieta.

Dieta.  
Aër.

Dieta medicamentis respondeat. Aër sit purus & temperatus, aut potius à temperato ad calidum & siccum declinans: crassus verò & nebulosus, fœtidus, frigidus ac humidus, ventique australes & aquilonares. & fumus ac fuligines à carbonibus accensis, & rebus fœtidis vitentur. Radij Lunæ, qui hunc morbum excitandi peculiarem vim habent, fugiantur; atque inprimis aperto capite sub radiis Lunaribus cubare vel dormire summè noxium.

A cibis absteineat æger, qui crassos succos gignunt, flatuosi sunt, caput peculiari vi feriunt, etsi cetera sint *ἁπλῶς καὶ ὑγιεινά*. Inter carnes absteineat æger à caprina, & hircina inprimis, ut & coturnicibus, quæ peculiari quadam vi Epilepticis nocere creduntur: item à porcina, anseribus, anatibus, passeribus. Inter pisces ab anguillis, carpionibus, & omnibus piscibus, qui in cœnosis ac fœtidis stagnis ac paludibus degunt. Videntur & legumina, præter ciceres, lacticia in idem, nuces iuglandes, fructus horarij, brassica, lactuca, portulaca cape, allium, synapi, raphanus, apium, quod occultâ proprietate Epilepticis nocere dicitur; de quo infra, *quest. 1. 2.* dicitur. Vtatur contra cibis boni succi & facili coctionis. Atque Epilepsiam tollere dicuntur, caro turturis ac columbarum sylvestrium, hirundinum item, ac vulturis. Condiuntur cibi hyssopo, saluiâ, maioranâ, fœniculo, roremarino, rurâ, nuce moschatâ, macere, cinamomo, caryophyllis.

In potu vitandum vinum, aut, si vel ventriculi, vel virium ratione concedendum, sit paucum ac tenue. medicarum roremarino, saluiâ, hyssopo. Cerenisia in nostris regionibus satis commodus potus est, quæ sit clara ac bene defecata, nec multo lupulo cõdita, ne caput grauet. Vitale est & hydromel cum pœonia, saluia, roremarino, & visco querno coctum, ac nuce moschata aromatizatum. Item hic Potus:

*ʒ. Passular. cinamomi, rad. pœon. sem. pœon. an. q. l.*

Radices inciduntur, semina parùm contundantur, & omnia in vatculum cum segmentis coryli S.S.S. faciendo imponantur; atque affundatur aqua cum saccharo cocta, vel hydromel. Vel bibatur decoctum ligni Guajaci, ita ut libræ vni ligni aquæ. s. lb. xxiiij. affundantur, & ad tertiæ partis consumptionem coquantur.

Somnus qui  
& quies:

Somnus sit moderatus, capite nonnihil eleuato, nocturnus non diurnus, nec mox à cibo. Exercitationes sint moderatæ, ac iusto tempore, scilicet ante prandium & cœnam, instituantur, vel earum loco extrema fricentur. Animi affectus vitentur, inprimis terror & ira. Venus in hoc morbo ut pestis fugienda. Alius semper sit aperta; quod si naturâ non fiat, clystere vel leniente aliquo medicamento primæ viæ euacuentur. Cauendum quoque, ne æger ingruente paroxysmo versetur iuxta puteos, aquas, ignem, & omnia loca, in quibus damni aliquid pati potest. Ac si æger paroxysmum ingruere animaduertat, astantibus id statim aperiat.

### Signa perfecta curationis.

Cum ab usu medicamentorum non prius sit desistendum, antequam morbus sit planè expugnatus, nonnulli signa tradunt, quibus cognoscatur, an quis perfectè sit curatus. Si nimirum ægri naribus suffitus admoueat ex hyssopo hortensi, myrrha, bitumine, cornu capræ vel hirci, & quis ex tali suffitu non concidat, indicio

esse ægrum perfectè sanatum; sin secus, nondum perfectè existimant. Adhibetur & in eundem usum suffitus succini. Si quis item comedat hepar hirci, & non concidat, is sanatus putatur. *Aique hæc de Epilepsia in genere.*

## DE EPILEPSIA IN SPECIE.

Suprà iam dictum est, esse quasdam Epilepsie differentias, quæ curationem variant; atque ex præcipue sumuntur à loco, in quo materia, Epilepsie causa, generatur. Nam cum materia nunc in cerebro, nunc extra cerebrum generetur; dicitur Epilepsia alia per idiothiam, alia per sympathiam, seu consensum.

### De Epilepsia per primarium cerebri affectum.

Per *ἰδιοπάθειαν*, seu per essentiam, & primarium cerebri affectum, Epilepsia propriè est, cum in ipso cerebro est *ἀνάσσει*; Epileptica, & materia, mali huius, causa, in eo generatur.

Atque hæc praua qualitas ac *ἀνάσσει*, nonnunquam cum semine & sanguine à parentibus propagatur: unde morbus hic fit hæreditarius. Nonnunquam gravidarum perterrefactio, & ex hac fortis imaginatio hoc malum producit. Exemplum habetur apud Guiljelmum Fabricium, *Cent. 3. obseru. 3.*

Abcessum quoque in cerebro huius mali causam fuisse, annotauit Fernelius l. 5. *Patholog. cap. 3.* Ad quam Epilepsie differentiam & ea referri potest, cum in parte aliqua in capite cerebro vicina fons mali est. Ita corruptam meningem Epilepsie causam fuisse, obseruauit Fernelius, *loc. alleg. & 2. de abdit. rer. causis. c. 15.* Ex cranio quoque cariole Epilepsiam ortam docet Vidus Vidius, *lib. 2. de morb. particul. c. propr.* Forestus *lib. 10. obseru. 67. in Schol.* Faciunt huc capitis læsio ex ictu & percussione. Ioh. Langius, *lib. 1. Epistol. 10.* vulnera item, Valescus de Taranta, *cap. propr.*

### Signa Diagnostica.

Præter signa supra in genere enumerata hæc in hac Epilepsie specie sunt peculiaria: Homo subito quasi attonitus, sine vlla paroxysmi instantis præfensione, concidit, nihil vitij in partibus inferioribus, neque vllus dolor in parte vlla infra caput instante paroxysmo percipitur, neque vllus vapor ex vllâ parte inferiore ad superiora ferri animaduertitur. Signa cerebri & capitis affecti ad sunt, capitis grauitas & dolor, faciei pallor, oculorum caligo, somnia turbulenta, & insignis facultatis animalis debilitas, sensuum ac motus stupor & tarditas, auditus scilicet difficultas, sonitus ac tinnitus aurium, vocis tarditas, vertigo tenebrosa, manuum torpor. Paroxysmus ac motus cõuulsiuus est vehementior, ac longius durat, spuma copiosior circa os apparet. Frequenter inuadit circa Nouilunia & Plenilunia.

Signa Epilepsie per primarium cerebri affectum.

### Prognostica.

Epilepsia, quæ per primarium cerebri affectum est, *Prognostica.* deterior ac periculosior est eâ, quæ fit per *συμπάθειαν* aliarum partium: nisi tamen pars, cuius consensu inducitur, habitum quasi prauum contraxerit.

### Curatio.

Decuratione Epilepsie, quæ fit per primariū cerebri affectum non opus est ut multa dicamus; cum omnia illa, quæ antea de curatione Epilepsie in genere dicta sunt, huic speciei, utpote primariæ, competant.

Notandum saltem hoc, in hac Epilepsie specie, ubi opus est venæ sectione, cephalicam in cubito esse eligendam.

Animi affectus.  
Excreta & retentia.



eligendam: & nisi malum remittat, ac præsertim si caput simul sanguine calido repletum sit, venam in fronte etiam esse aperiendam.

De Setaceo verò hoc monendum est, id magnum hic usum habere; refertque Guiliel. Fabricius, *Cent. 1. observ. 41.* se iuuenem quotidie Epilepsiâ laborantem, & cui frustra alia remedia adhibita fuerant, & *Cent. 4. observ. 81.* puellam 18. annorum ab ipsâ infantia Epilepticam solo setaceo restituisse.

De Cauterio verò actuali futuræ coronali applicando hoc observandum, id in hac præcipue, imò terè sola Epilepsiâ differentia, locum habere; de quo supra *part. 1. cap. 5.*

Fonticuli, si malum nondum sit inueteratum, commodissime in brachio ad musculum deltoïdem excitantur, ut ad eum scaturiens in cerebro materia deriuetur. Si autem malum inueteratum sit, in loco viciniore, nucha scilicet, seu occipitio aperiendi sunt, ut ex loco vicino materia facilius deriuetur & euacuetur.

Exercitia sint moderata; & in specie à frictionibus in brachiis incipiendum, deinde ad pectus & ventrem descendendum, postea ad crura, & hæc valentius perficienda, ut etiam recrementa, quæ sursum vergunt, ad infera reuellantur. Ac aliis partibus perfrictis, caput demum fricari debet. Prius enim non conuenit, ne humores & vapores attrahantur.

Reliqua omnia, ut modo dictum, petantur ex curatione Epilepsiâ in genere.

### De Epilepsiâ per consensum;

#### Et primò quidem in genere.

#### Causa.

*Epilepsiâ per consensum causa.*

Hæc in parte aliqua infra caput generatur, & ex ea in caput sublata Epilepsiam excitat. Partes autem, è quibus materia, Epilepsiâ causa, ad caput tollitur, variae sunt: *Ventriculus*, cuius exempla refert Galenus, *5. de loc. affect. cap. 5.* Valeriola, *lib. 3. observ. 7.* Fernelius, in *Consil. Medic. 7.* Forestus, *lib. 10. observ. 64.* Lien, cuius exemplum refert Hollerius, *ad caput 14. lib. 1. in Schol. Vterus*, vel ex mensium obstructione, ut refert exemplum de puella Beniuenius, *de abdit. morb. causis. & curat. c. 97.* vel fluxione, vaporibus è materia commota cerebrum petentibus, vel in prægnantibus, de quo Aegineta, *lib. 3. cap. 13.* Fernelius, *lib. 1. Patholog. c. 3.* Leonhardus Iacchinus, in *9. lib. Rhafis, cap. propr.* Forestus, *lib. 10. observ. 65.* Iohan. Schenckius, *lib. 1. observ. 83.* Franciscus Hildesheim, in *specileg. pag. 598.* vel ex secundinis retentis, vel ex utero imperforato, Guilielmus Fabricius, *Cent. 3. observ. 60.* Vesica, Heurnius, *de morb. cap. 22. pag. 163.* Testes & vasa spermatica, Leonhardus Iacchinus, in *9. Rhafis*, Marcellus Donatus, *lib. 4. de histor. Medic. mirab. cap. 11. ex Alsabarano. Intestina & vermes in iis*, Forestus, *lib. 10. observ. 65.* Iulius Cæsar Claud. in *consult. 64.* Martinus Rulandus, *Cent. 8. curat. 13.* Colica, Aegineta, *lib. 3. cap. 13.* Aërius, *tetrab. 3. ferm. 1. cap. 29.* Massa sanguinis, ut in variolis, aliisque malignis febribus, inter quarum initia Epilepsiâ excitari solet. Pars aliqua externa, ut pes: videatur exemplum apud Galenum, *3. de loc. affect. cap. 7.* Iaschinum, in *9. Rhafis*, Vale- tium, in *Schol. ad cap. 16. lib. 1. Hollerij*, Trincavellium, *lib. 3. de ratione curandi affectus particulares, cap. 6.* Mercurialem, in *consil. 6.* Forestum, *lib. 10. observ. 67. & 68.* Pollex pedis. Gentilis, *super Auicenn. lib. 3. Fen. 1. sr. 5. cap. 8.* Donzelinus, in *Consil. Schol. 2. Conf. 38.* digitus, Leonell. Fauentinus, *cap. 11. de morb. med.* Brassavola, in *Comment. ad aph. 45. sect. 2. aphor. Hippocr. manus*, Pinellus, *tom. 1. Consil. 13.* Platerus, *lib. 1. observ. coxa*, Syluius, in *lib. de morbis internis, cap. proprio*, mammae, papilla, Marcell. Donatus, *lib. 2. de histor. Medic. mirab. c. 4.* labium superius, Douanetus, *lib. 3. Apolog. referente Schenckio.*

### Signa Diagnostica.

Paroxysmus ingruens aliquo modo præsciri potest, va- *Signa dia-*  
pòrque aliquis, ac veluti aura à parte quapiam inferio- *gnostica.*  
re versus superiora eleuari animaduertitur, aut dolor in parte aliqua percipitur, quem mox Epilepsiâ insequitur. Signa cerebri affecti non ad sunt, sed pars aliqua inferior præ cæteris vitio laborat. Omnia ferè sunt leuiora, paroxysmus scilicet non tam longus, nec concussio tam vehemens, nec tanta facultatis animalis læsio, ac in Epilepsiâ per primarium cerebri affectum.

### Curatio.

Curatio eadem ferè est cum superiore, nisi quòd sem- *Curatio.*  
per partis mandantis habenda ratio: totaque curatio idcirco quinque capitibus continetur: 1. Ut totius corporis euacuatio seu per venæ sectionem, seu purgationem, prout opus est, instituat. 2. Ut antepileptica medicamenta antea proposita vsurpentur. 3. Ut partis, quæ materiam cerebro communicat, ratio habeatur, eaque euacuetur, atque in eâ, si locus ferat, cauterium actuale applicetur, aut quocunque modo in eâ vlcus exciteretur, ut materia effluat ac dissipetur. 4. Ut materia ad caput tendens reuellatur, viæque, per quas aura maligna ad cerebrum fertur, intercludantur. Ideoque in paroxysmo frictiones & ligaturæ non in brachiis, sed in cruribus tantum & pedibus instituendæ, ut materia versus inferiora, non superiora trahatur. Vincula quoque supra partem, quæ causam suppeditat, iniicienda, si eius natura & situs id ferat. Venæ sectio etiam commodissime in cruribus & pedibus instituitur, præsertim si à menstruorum aut hæmorrhoidum suppressione malum originem habeat. 5. Cerebrum roborandum.

### De Epilepsiâ per consensum Ventriculi.

#### Signa Diagnostica.

Si è ventriculo vapor ille, Epilepsiâ causa, ad ca- *Signa Epile-*  
put eleuetur, dolor quidam, turbatio & rossio in ventri- *psiâ à ventri-*  
culo, grauitas & tensio circa præcordia, deiectionis appetitus, concoctionis debilitas, ructus, & alia ventriculi affecti signa ad sunt. Agri quoque morbi accessionem sentiunt, atque in Epilepsiam incidunt, si tardius cibum sumant, & diu ieiuent. Et in primis infantes sæpe hac de causâ Epilepsiâ corripiuntur, cum lac ipsis in ventriculo corrumpitur, aut cum vitioso nutricis lacte nutriuntur. Et tum animaduertuntur ventris tormina, fecesque alui croceæ, aut ærugini non absimiles apparent.

### Curatio.

Purgationis loco vomitus rectissime concitatur in *Curatio.*  
iis, qui ad vomitum proni sunt. Et quidem biliosus humor protinus vomitu excludi potest. Crassius verò & pituitosus prius præparetur melle rosaceo, oxymelitis generibus, syrupo de betonica, de stæchade, & similibus, cum decoctis & aquis conuenientibus. Si autem æger ad vomitum promptus & procliuis non sit, per alui deiectionem causa mali tollenda; biliosa, hiera & pilulis ex aloë; pituitosa, agarico, & cæteris, de quibus de morbis ventriculi dicitur. Fortiora autem purgantia in hac Epilepsiâ specie non vsurpanda, ne excrementa aliunde attrahantur, ventriculusque magis debilitetur.

Deinde operam dare oportet, ne imposterum in ventriculo humor vitiosus generetur, sed ventriculus roboretur. Et quidem ne alimenta in bilem corrumpantur, prohibet Trallianus potu absinth. & picra, Antidoto, quæ bilem euacuant, vel tunicis inhaerentem abster-  
gunt.

gunt; iubetque victum tepidum & temperatum adhibere, qui nihil habeat acre, aut pingue, aut oleosum, aut salum.

Ventriculus roboretur cum extra admotis, in causa calida ol. cydonior. rosar. & similibus; in frigida, mastiche, mentha, absinth. caryophyll. nuce moschara, & similibus: tum intra exhibitis, ut coriandro preparat. sacchar. rosar. betonic. myrobal. chebul. condit. zingiber. in India condito, extracto iuniperi, spiritu vitrioli, rotulis aromat. rosar. caryophyllat. syrupo de mastiche, de cinamomo. E quibus varia medicamenta composita, prout humores & acri natura requirunt, concinnari possunt.

Semper tamen iis aliquid medicamentorum contra Epilepsiam pugnantium admiscendum.

Vt ℥. Conseru. rosar. betonic. pœon. Vnc. ii. extract. gran. iuniper. Vnc. ℥. spec. aromat. rosar. Scrup. iiii. zingiberis in China cond. Vnc. ℥. spec. vitriol. Scrup. ℥. Cum syrupo conseru. cortic. citri F. Electuarium.

Vel ℥. Spec. aromat. rosar. Dra. i. extract. pœon. Scrup. j. calam. aromat. Scrup. ℥. zingiberis in China conditi ℥. ij. Cum sacchari q. s. F. Morsuli.

Post pastum etiam sequens Tragæa comoda est:

℥. Rad. pœon. scorzonæ. auc. mosch. an. ℥. i. macis acetomacer. ℥. i. ℥. sem. anisi, fenicul. an. Drach. i. succini albi, visci querni, sem. pœon. cardamomi, an. Drach. ℥. cubebæ. galangæ, rad. tormentill. doronici Rom. flor. anthos, an. Scrup. i. sacchar. albi Vnc. ii. F. Pulvis. Dosis coch. ℥. vel j.

### De Epilepsia à Vermibus.

#### Signa Diagnostica.

Signa Epilepsia à vermibus.

Si à vermibus sit Epilepsia, animadvertitur stridor dentium, membrorum tremor, terror item ac clamor subitus in somno, narium pruritus & frictio, salivæ, nocturno præsertim tempore, ex ore effluxus, facies pallida, eademque subito rursus incallescens & rubens, morsus ac dolor stomachi & intestinorum, & hinc frequens abdominis contrectatio, rugitus ac tormina ventris, abdominis insolita durities, membrorum verò ἀσπasia, tussis sicca, singultus, vermium cum alui excrementis egestio.

#### Curatio.

Curatio.

Ea, quæ vermes enecant atque expellunt, admixtis medicamentis antepilepticis exhibenda,

ut ℥. Aloes lota vel extracta Dra. i. ℥. extract. scammon. trochisc. albandal. an. Scrup. ℥. ol. destill. absinth. gutt. ii. myrrh. zedoar. an. gutt. i. F. Pilulæ, quæ dantur à Sc. i. ad Drach. ℥.

Vel detur ☿ dulcis à gr. xvi. in eduliis.

Pulveribus contra vermes, & aliis medicamentis, de quibus suo loco de Vermibus dicitur, addatur pœonia, & alia medicamenta Epileptica.

Postea exhibeatur hic vel similis Pulvis:

℥. Ungula alci Dra. vi. spec. diamosch. dulc. Vnc. ℥. corall. rubr. & alb. preparat. margarit. smaragd. preparat. terra sigill. bol. Armen. an. Drach. ii. sem. nigell. sancti, ruta. pœon. exc. blattæ byz. ant. dictamn. alb. nuc. mosch. an. Dra. i. rad. pœon. C. C. preparati, scordij, maior. corallina, an. Dra. iij. moschi, ambr. an. Sc. ℥. fol. auri num. xii. sem. caulium, porulac. an. Drach. i. tormentill. Drach. i. ℥. rhabarb. elect. Drach. j.

Pulveriscentur omnia subtilissimè.

### De Epilepsia ab Vtero.

#### Signa Diagnostica.

Epilepsia ab Vtero signa diagnostica.

Si ab Vtero sit Epilepsia, adest menstruorum suppressio, seminis vel secundinæ post partum retentio, fœ-

tus in vtero mortuus: dolor circa vteri regionem in pectine, in utroque inguine, in dorso: abdominis crebra & flatibus distensio, respiratio difficilis, cordis palpitatio, vlcus aliquod in vtero; si malum hoc primum, quando menstrua inceperunt fluere, inualerit. Symptomatum in hac differentia magna est varietas, quæ neminem turbare debet. Neque enim solum, ut in aliis Epilepsiæ differentiis, membra conuellantur & sensus turbantur; sed & aliis totum corpus contremiscit, aliis vna aut plures partes; aliis oculi saltem, aut lingua, aut caput, aut manus, aut crus, aut septum transversum: quibusdam mentis quædam, aut sensuum externorum actiones laeduntur; quædam oculis apertis non vident, aliæ multa se audire & videre dicunt, quæ à ratione aliena sunt; aliæ vociferantur & querulantur, quid vero mali sentiant, proferre non valent; aliæ rident, aliæ flent; pleræque omni tactus sensu priuantur; nonnullis horum plura accidunt.

#### Curatio.

In curatione semper ad vterum respiciendum, & propterea ea Epilepticis admiscenda remedia, quæ vtero profunt, & vteri suffocationi conueniunt. Itaque in Paroxysmo admoenda naribus fœtida, ut galbanum, castoreum, lagapenum, ol. succini, rutæ. Vterò verò sua uolentia adhibenda, nisi fœmina sit granida; tum enim satis fuerit graueolentia naribus admoerere. Sternutationem quoque ciere in hac Epilepsiæ specie plurimum prodest. Cucurbitulas verò ventri è regione vteri affigere, & medicamenta applicare, quæ flatu discutiant, utile est, ut ol. rutæ. è bacis lauri, & similia.

Extra paroxysmum primò vniuersales euacuationes instituantur. Sanguis nimirum, venis in cruribus circa malleolos apertis, euacuetur, & totum corpus conuenienter purgetur. Deinde vterus euacuetur, & materia vitiosa in eo contenta tollatur: quod fit non solum purgantibus; sed imprimis iis, quæ menses prouocant, cum internis, tum externis; de quibus suo loco. Eligenda tamen ex iis talia, quæ simul vi specificâ & occultâ Epilepsiæ aduersantur, aut iis talia admiscenda.

Et cum in fœminis natura vitiosos humores, qui in corpore cumulantur, ad vterum detrudere soleat, tanquique; qui ad vterum affluit, si non rectè sese habeat, corrumpatur: danda opera, ut humores vitiosi subinde è corpore euacuentur, & si quid corrumpatur, sensim ac paulatim per loca, quibus natura affluenit, euacuetur. Ideoque sanguinem bis teruè in anno è venis tali emittere, & corpus sæpius euacuare utile fuerit, habito respectu ad eum humorem, qui maximè peccare videtur.

Exempli gratia:

℥. Rad. pœonia, aristoloch. rot. an. Vnc. i. angelica Vnc. ℥. polypod. quern. Drach. vi. betonic. ruta. pulgij, mercurialis, an. M. ℥. sem. pœon. Vnc. ℥. cartham. comus. Vnc. i. fol. senæ elect. Vnc. i. ℥. follicul. senæ Dra. vi. sem. anisi, fenicul. sesel. an. Drach. ii. fl. bugloss. anthos, an. M. i. ℥. Coquantur in aqu. simpl.

Colaturæ ℥. ℥. i. in qua infundatur agarie. albiss. ℥. i. zingib. galang. an. ℥. i. ℥. Cum saccharo F. Syrupus, qui aromatizetur pulvere cinamomi.

Causâ sublarâ vterus & cerebrum roboretur theriacâ, Mithridatio, diamosch. dulc. amaro, lapide Bezoar; cum aqua scorzonæ. Efficax est & oleum succini, tum in paroxysmo, tum in mensibus ciendis.

Vtilis & valde efficax est hic Aqua hirundinum, cum castoreo & galbano ac aceto destillata, supra, inter medicamenta antepileptica, proposita.

Laudatur & hic Spiritus:

℥. Antidor. Marthioli Vnc. v. sp. vini opt. ℥. i. camph. Drach. ij.

In vitro clausa digerantur in B. vel fimo equino per dies

*die sex. Postea tepido Balnei calore destillentur, ne vni-  
quam alembicus calefiat, donec tertia pars exstillet,  
idque tertia vice repetatur. Sumatur de hoc spiritu  
manè & vesperi cochleari. cui sacchari pauxillum, sp.  
vitrioli gutt. iv. vel tincturæ corallior. gutt. vi. addi  
possunt.*

*Vel ℥. Syrup. de succo pæonia Vnc. i. ruta, meliss. an.  
Vnc. B. extract. liquidi castor. Dra. ii. gran. iuniper. Drac. i.  
B. angelic. zedoar. an. Scrup. i. sp. theriacal. modò descripti  
Drach. ii. aq. lanendul. Vnc. i. Milce.*

De qua mistura tempore paroxysmi cochlear. i. in-  
fundi potest.

*Vel ℥. Conferu. pæon. Vnc. i. margarit. prepar. corall.  
rubr. prepar. smaragdi, sapphir. hyacinth. preparat. an. 3.  
B. rad. pæon. sem. eiusdem, agni casti, visci querni, cranij hu-  
mani, an. 3. i. theriac. 3. i. B. caryophyll. 3. B. Cum syrupo  
Rachad. simplic. F. Electuarium.*

Circa hæc medicamenta hoc observandum, in hac  
Epilepsiæ specie medicamenta suaueolentia exhiben-  
da non esse; cum & caput grauent, & paroxysmum Epi-  
lepticum concitent.

Extra quoque adhibeantur quæ & menses cient, &  
vterum roborant. Inter quæ nonnulli commendant  
hanc pedum Lotionem:

*℥. Strobil. abiet. viridum M. ii. artemis. M. B. fermentor.  
iuniperi, cortic. fagi, an. M. i. chelidon. fol. alni, an. M. B. rad.  
vincetoxic. aristoloch. rotund. an. Vnc. v.*

Coqu. in aqua ad Balneum, quò manè per semiho-  
ram lauentur pedes.

Vel inungatur venter ol. rutaceo, lautino, lilior. al-  
bor. quibus ol. destillatum anisi, caryophyll. cinamomi  
addi possunt.

Vel fomenta adhibeantur ex roremarino, artemisia,  
chamæmelo, betonica, ruta, semine agni casti, baccis  
lauri, & aliis, quæ in suffocatione vteri propo-  
nentur.

Tandem cum in hac Epilepsiæ specie alia, præter ca-  
put, viscera sæpe in consensum trahantur, & humoris  
Epilepsiam generantis malignitas plerumque membra  
nutritioni dicata labefactare soleat, & hinc varia ex-  
crementa generentur: illorum quoque viscerum ha-  
benda est ratio, & ea ab excrementis subinde expur-  
ganda & roboranda, ne noua mala gignant, aut vetus  
augeant.

Et cum, ut antea diximus, in hac Epilepsiæ specie  
magna symptomatum varietas esse soleat, quia materia  
morbifica non solum cerebro, sed & aliis partibus com-  
municatur, sæpe ea de loco affecto Medicum dubium  
reddunt. Quæ de re egregia disquisito, an scilicet vte-  
rus vel crura fuerint affecta, exstat in Consiliis Brunne-  
ri, *Consil. 14. & 15.* cuius etiam infra *lib. 4. par. 2. sect. 3.*  
*cap. 3.* fiet mentio.

### De Epilepsia à partibus externis.

#### Causæ.

Præter supra enumeratas causas externas referen-  
da huc contusio, vulneratio, vlcus, aut alia aliqua  
in parte externa læsio; morsus item & ictus bestiarum  
venenosarum.

#### Signa Diagnostica.

In parte aliqua externa causam Epilepsiæ contineri,  
argumento est, si æger aliquando in ea vulneratus, vel  
contusus sit, aut vlcus in ea habuerit, aut ab aliquo ani-  
mali morsus sit; atque inde vaporem vel auram quan-  
dam, paroxysmo Epileptico ingruente, versus superiora  
ascendere sentiat, aut in ea dolorem vel tensionem ante  
paroxysmum percipiat. Ægrum in eâ parte læsum esse,  
vel ex eius relatione, vel cum multa infantibus & pue-  
tis accidant, quorum adultiores facti non meminerunt,

ex vestigio aliquo in ea, vvicatrice, duritie, vel quacun-  
que alia læsionis notâ cognoscitur. Si item vincula su-  
pra partem, quæ suspecta est, iniecta, & frictiones infra  
eam institutæ paroxysmum vel intercipient, vel mi-  
nuant: eò loci causam Epilepsiæ contineri argumento  
est. Inprimis verò in fœminis de loco, qui causam sug-  
gerit, hæc diligenter inquirendum. Accidit enim sæpe, ut  
instante paroxysmo Epileptico dolor vel tensio in cru-  
ribus, aut aliâ parte externâ percipiat; imò inde etiam  
quasi aura quadam ad caput ascendere sentiantur: eam  
tamen eò loci causam mali generata non sit, sed in vtero;  
cuius facultas expultrix à causâ morbifica stimulara per  
venas & arterias malignam & venenatam materiam ex-  
cludere conatur, cui calor innatus & vis partium prin-  
cipalium occurrens, eam per venas & arterias in pedes,  
vel alia loca remotiora detrudit, ubi cumalata vires  
randem acquirit, & vel nervis communicata, vel per  
alias vias ad cerebrum tendens Epilepsiam excitat. Id-  
eoque in tali causâ diligenter inquirendum, an vteri  
affecti signa præcesserint.

#### Curatio in paroxysmo.

Quamprimum æger quasi auram è parte illa eleuari  
sentit, intercipienda ea est vinculis supra locum inie-  
ctis. Et si à manu ascendit aura illa, vincula ad alam in-  
iiciantur. Hæc enim pars strictius ligari potest, quàm  
carpus, in quo ob carpi ossa vasa inter illa constringi  
satis nequeunt. Affigantur eidem, si moram res patitur,  
cucurbitulæ scarificatæ, locûsque fricetur.

#### Extra paroxysmum.

Si à venenatæ alicuius bestię morfu malum ortum  
habeat, venæ sectio & purgatio locum non habent; sed  
locus demorsus scarificetur, vel cucurbitulæ scarificatæ  
affigantur ad venenum eliciendum. Applicentur & to-  
pica valde attrahentia, adiectis iis, quæ peculiari vi illi  
veneno debellando accommodata sunt.

Si verò ex causâ alia quacunque materia Epilepsiam  
excitans alicubi contineatur, primum corpus semel at-  
que iterum purgandum est. Postea danda opera, ut ma-  
teria, è qua vapores ascendunt, renouatur ac discutia-  
tur. Ergo cucurbitulæ scarificatæ parti affigantur; aut  
pars lauetur acri lixivio, cui sulphur admixtum sit. Si  
his nihil proficitur, cauteria vlturpentur, aut valde at-  
trahentia medicamenta ex capsa, euphorbio, lepidio,  
quod Trallianus, *lib. 1. c. 35.* inprimis commendat, sina-  
pi, stercore columbino, cantharidibus, admixta simul  
theriacâ; aut emplastrum oxycroceum applicetur, cui  
tantum euphorbij admixtum sit, ut vesicas pustulæque  
in cute excitent. Efficacissimum verò est cauterium actua-  
le, cum nihil potius venena, ac prauos eiusmodi humo-  
res & dispositiones è partibus extirpet, quàm ignis.  
videatur etiam Alex. Trallianus, *loc. allegato.*

[In Epilepsia, quæ per consensum alicuius partis  
fit, diligens danda opera, ut pars illa, quæ auram mali-  
gnam ad cerebrum mittit, innotescat: cui vesicatoria vel  
cauteria, quæ materiam malignam extrahant, im-  
ponenda sunt, ut *lib. 1. Pr. par. 2. cap. 31.* dictum. Exem-  
plum eius rei habet Henricus ab Heer, *obs. 24.* de qua-  
dam puella, quæ cum ex terrore toto quadrimestri ferè  
continuo epilepsia laboraret, & in paroxysmo duos  
vtriusque pedis pollices continuo conficaret, ipse vtri-  
que pollicis butyrum Antimonij imposuit, vesicæque  
magnas excitauit, usque incisæ & carne ad ossa ablata  
à paroxysmo triduum liberam fecit. Quarto die, cum  
leuissimè conuelleretur, exhibuit antepilepticum ex  
cranio hominis, stercore pauonis, vesicâ apri cum lotio  
in furno exsiccatâ, visco corylino, oleo succini cum  
aquis antepilepticis, atque eam ita planè sanauit, & ab  
omni paroxysmo liberauit.

In qua historia hoc tamen mirabile, cum epilepsia Dubium  
hæc

*Epilepsia per  
consensum  
curatio sin-  
gularis.  
Observatio  
Heer. ab  
Heer.*

*Epilepsia à  
partibus ex-  
ternis causâ.*

*Signa dia-  
gnostica.*



hæc ex terrore orta fuerit, & talis epilepsia cerebro primario affecto fieri soleat, quæ factum fuerit, quod puella illa pollices confricauit, & cauterio ibi appposito sanata fuit. Causam eius rei esse puto, quod materia maligna ex terrore genita statim à natura foris ad extrema pedis depulsa fuit, à quibus postea vapor prauus & malignus ad cerebrum exhalans, epilepsiam excitauit; aut quod in paroxysmis à natura odo detrusa, & postea per cauterium euacuata fuerit.]

Cranium carie affectum, malignamque saniem supra membranas cerebri destillans, excisione & vitione sanatur; de quo supra, *part. 1. c. 26.* dictum. Simul etiam medicamenta Antepileptica adhibeantur, & cerebrum roboretur.

#### *De Epilepsia per Consensum, ubi de fonte mali non constat.*

Nonnunquam tamen accidit, ut, quamuis causa Epilepsie in capite non generetur, ita tamen occulte illa se in cerebrum insinuet, ut, quo in loco generetur, vel per quas vias ad cerebrum tendat, satis assequi non liceat, nec prius vilo vel sensuum, vel intellectus iudicio percipi possit, antequam paroxysmum producat.

#### *Prognosticum.*

Quam Epilepsie speciem nonnulli insanabilem putant. Verum etsi curatu difficilior sit, incurabilis tamen planè non est.

#### *Curatio.*

Vnde autem curetur, danda opera, ut radix mali, in quacunque etiam parte lateat, è corpore tollatur, & à cerebro auertatur.

Perficitur hoc frequenti corporis purgatione, quæ & materia iam genita euacuatur, & materia, è qua generari possit, subtrahitur. Facilius enim ex humore vitioso, quam ex succo probo partis alicuius mala constitutio malignam talem materiam generat. Et natura pharmaco purgante incitata, quicquid vitiosum in corpore est, facilius ad intestina, consuetamque euacuationis viam, quam ad partes nobiles, mittit.

Simul verò exhibenda medicamenta antepileptica, & ex iis efficacissima, ut diathesis illa Epileptica, & vitium humorum occultum, vbicunque etiam latentium, expugnetur.

Si purgationes non sufficiant, per medicamenta valida ex alto ad circumferentiam humores trahere, & imprimis per cauteria & fonticulos in locis conuenientibus excitatos humorum euacuationem tentare conuenit.

Tandem cerebrum roborandum, ut causa maligna resistere possit.

### INFANTIVM CVRATIO.

Etsi ex his, quæ dicta sunt, quæ ratione infantes curandi sint, facile patere possit: tamen cum morbus hic infantibus sit familiarior, nec omnia medicamenta, quæ adultis adhibentur, infantibus adhiberi possint; in specie quædam de Infantium cura addenda videntur.

#### *In paroxysmo.*

Distenta & rigida membra flectenda, vel in rectum dirigenda sunt, & tractanda ut antea dictum; ceruix & occiput linteolo aquâ lauendula calidâ madido fricandum; vertex oleo succini aut ruta illinendus; ruta trita naribus admoneatur, vel oleum aut balsamum succini & ruta; piruita ore eximatur; infundatur ori succus ru-

ta cum lacte, vel cum aqua tilia, aut cochleare paruum liquoris alicuius Antepileptici detur; vel puluis aliquis antepilepticus cum aqua conueniente, vel lacte Scr. 8. vel Scr. i. pondere pro ratione ætatis.

Puluis puerorum contra Epilepsiam D. Iohann. Nauij:

℞. Visci quer. corrice abraso Dra. ii. sem. pæon. 3. i. rad. pæon. 3. i. i. b. ungula alci, corall. vtriusque an. 3. 8. C. C. vsti 3. i. b. margarit. preparat. 3. i. cranij hum. Scr. ii. sacch. albi 3. i. b. F. Puluis.

Alius:

℞. Rad. pæon. 3. v. irid. Illyr. Vnc. 8. eryng. Drach. ii. sem. visci querni, gran. pæon. an. Scr. v. sacchar. albiss. 3. ii. F. Puluis.

Alius:

℞. Rad. pæon. Vnc. i. serpentar. Vnc. sem. visci querni Drach. 8. croci Orient. Scr. i. corall. rubr. Drach. 8. rad. & sem. fraxinellian. Scr. i. fol. anri puriss. N. iiii, C. C. Scrup. i. margar. Oriental. non perforat. 3. 8.

Puluerisanda pulueriscentur subtilissimè. Misc. Fiat Puluis. Dosis infanti quantitas pisi vnius vel duorum, cum lacte nutricis. Maioribus natu tripla quantitas cum aqua betonic. flor. tilia, ruta exhiberi potest.

Alius:

℞. Fragm. lap. pretios. an. Scr. 8. rad. pæon. Drac. i. i. reos Scr. ii. bistort. Scr. 8. glycyrrh. Dra. 8. sem. anisi, pæon. visci querni, an. Scr. ii. croci Scr. 8. margarit. Scr. ii. sacchar. candi alb. Vnc. 8. F. Puluis.

Alius:

℞. C. C. vsti prepar. Vnc. i. sem. pæon. rad. eiusd. sem. aquileg. an. Vnc. 8. smaragd. prepar. Dra. i. off. de C. C. N. j. F. Puluis.

Alius:

℞. Smaragd. prepar. corall. rubr. margarit. prepar. an. Drach. i. rad. pæon. sem. eiusd. an. Drach. 8. succini alb. unguil. alci, cornu alci, an. Drach. i. F. Puluis. Dosis Scr. i. cum aqua tilia:

Conuenit & hoc:

℞. Aq. pæon. flor. tilia, dentaria, an. Vnc. i. hirudinum, syrup. de succa pæon. an. Vnc. 8. sp. cerafor. nigror. Drach. ii. magister. corall. Scrup. ii. perlar. Scrup. i. extract. pæon. Drach. 8. M. diligenter. Dosis cochleare paruum in paroxysmo.

Cordis regioni emplastrum ex theriaca & radice pæon. admoveatur, vel tale epithema paretur:

℞. Fol. ruta P. i. fl. pæon. tilia, rosar. rubr. an. P. 8. spec. diapæon. Scr. iiii.

Incisa aspergantur aq. apoplectica & hirudinum F. l. a. Scurum cordiale, sindone rubra regendum.

Fiat etiam sacculus ex rad. pæon. & granis eiusd. contusis, & apponatur cordis regioni.

Nucha & spina dorsi inungatur seq. oleo:

℞. Olei de castor. Vnc. 8. succi ruse Vnc. i. Coqq. ad consumptionem succi.

#### *Extra paroxysmum.*

Censet quidem Trallianus, *lib. 1. cap. 15.* in infantibus nihil moliendum esse, neque agendum, quantum ad curationem attinet. Subsequentem enim ætatem, & calorem augescentem superfluum in capite humiditatem discutere posse. Verum cum, antequam illam ætatem attingat homo, hoc morbo vel iugulari, vel insigniter debilitari possit, sine auxilio non est relinquendus æger, neque in morbo tam periculoso negotium naturæ committendum, sed naturæ arte succurrendum.

Lactentes ergo infantes commodius curari non possunt, quam si medicamenta nutrici exhibeantur. Nutrix itaque primò talem vitæ rationem obseruet ut & ipsa sana degat, & salubri lacte infantem alar. Cibus propterea sit εὐχρηστος καὶ εὐπιπλῆτος, isque in isto tempore & quantitate exhibeatur. A vino vel abstineat, vel illud sic tenuet



tenue & paucum, ne nervosum genus infantium ad-  
huc tenerum & imbecillum lædatur. Exercitia sint  
moderata. A Venere, quæ pueris lactentibus est no-  
centissima, planè abstineat. Si verò lac probum nutritrix  
non præbeat, vel alia quærenda, vel opera danda, ut lac  
mutetur: & si lac sit nimis tenue, ut crassius reddatur,  
utatur carnibus assis, aliisque cibis minus humidis; sin  
crassius, extenuetur fœniculo, aniso, anetho, ruta, re-  
centibus & virentibus sumptis. Nam sicca magis  
acria sunt. Et si accidat, ut nutritrix concipiat, cauend-  
um, ne illa porro infantem lactet, sed alia quærenda,  
quæ lac habeat bonum. Lactis autem boni notas tra-  
dit Alex. Trallianus, l. 1. c. 15.

Propinentur quoque nutritrici medicamenta, quæ  
contra Epilepsiam pugnant, & supra sunt proposita.  
Infans non lauetur crebro, ne fiat humorum agitatio.  
Inprimis cauendum, ne terreatur, aut ad iram com-  
moueat.

Infantis quoque corpus à vitiosis humoribus pur-  
getur: quod commodè fit medicamentis purgantibus  
nutrici propinatis. Et quidem cum nutritrici duabus de  
causis purgantia exhiberi soleant, primò ut ipsa pur-  
getur, secundò ut infans: si, ut nutritrix à cocachymia  
liberetur, exhibeatur purgans, à lactatione abstinere  
nutrix debet, donec purgatio absoluta sit; si verò in-  
fantis gratia purgans exhibeatur, eo ipso tempore, quo  
purgatur nutritrix, infantem lactare debet. Infanti ta-  
men ipsi etiam ad aluum subducendam dari potest  
mel passulatum Hollerij:

℞. *Agaric. trochisc.* Vnc. sem. Infundatur in aquæ  
℥. sem.

Postea exempto agarico passulæ in eadem aqua ma-  
cerentur, donec turgere incipiant, turgidæ coquantur  
ad mellis crassitiem.

Vel ℞. *Fol. senæ* Vnc. i. *agaric. albiss. rad. pæon. an.*  
Vnc. sem. Infund. in aqua. *anisi & fœniculi* æqual. part.  
deinde imponantur passulæ. *Corinthiac.* ℥. i.

Coqu. & exprimantur, & ad mellis consistentiam  
iterum coquantur. Aut exsiccentur passulæ absque ex-  
pressionem facta. Vtilis est hic etiam syrupus de cicho-  
rio cum rhabarb.

Roboretur postea cerebrum melle anthosato, spe-  
ciebus electuarij pleres Archontici, diamosch. dulc.  
cum lacte nutritricis, vel detur hic Pulvis:

℞. *Rad. pæon.* Drach. ii. *ireos, vngul. alcis, visci quer-*  
*ni, sem. pæon. an.* Drach. sem. *corallior. rubror. prapar.* ℥. ii.  
*smaragd. prapar.* Scrup. sem. *succin. albi, croci, an.* Scrup.  
i. *sacchar. alb.* Vnc. sem. F. Pulvis.

Vel ℞. *Rad. pæon. iusto tempore collectæ.* Vnc. sem.  
*ungula alcis* Drach. sem. *succini alb.* Drach. i. *croci opti-*  
*mi* Drach. sem. *sacchar. alb.* Vnc. sem. F. Pulvis.

Suturæ coronali inspergatur hic Pulvis:

℞. *Granor. pæon.* Drach. i. sem. *flor. lily conuall. pæon.*  
*lauend. an.* P. j. *succini albi* Scrup. ii. *nucis mosch.* Dra.  
sem. F. Pulvis.

Itali, ac Florentini inprimis, quibus hoc malum fa-  
miliarius est, pueros recens natos ferro candente, aut  
particula ligni ignitâ adurunt, vbi summa vertebra  
cum capite coniungitur. Alij ex candela cerea accensa  
guttam vnam atque alteram feruentem in eundem lo-  
cum, eundem ob finem, destillare sinunt.

Ad præseruandum verò, ne infans vnquam Epilepti-  
cus fiat, nonnulli hoc commendant:

℞. *Spir. vini* ℞. iiii. *castor.* Vnc. sem. *radic. pæon.* ℞. iiii.  
Macerentur & colentur. Colat. infantis totum cor-  
pus abluatur.

Et cum non rarò accidat, ut infantibus circa aures,  
maxillas, & in aliis corporis partibus vlceræ & pustulæ  
erumpant, nullo modo hic naturæ conatus impediendus.  
Sienim talia vlceræ, materia intrò recedente,  
euanescent, cum in alios morbos, tum in Epilep-  
siam interdum infantes incidunt. Imò si intempesti-  
uè euanescere incipiant talia vlceræ, atque infans inde

malè habeat, conatus naturæ potius adiuuandus syru-  
po fumar. C. C. & similibus materiæ ad ambitum  
corporis motum promouentibus.

### *Cura lactentium per consensum ven- triculi.*

Præseruationis gratiâ recens natis, antequam lac vel  
alius cibus ipsis porrigatur, hoc detur:

℞. *Sacchar. alb.* Vnc. ii. *ol. amygdal. dulc. recens*  
*expr.* q. l.

F. Mixture instar pultis, cuius vsu materia vitiosa  
in vtero collecta in primis viis eiicitur. Alij exhi-  
bent saltem mel crudum, vel mel rosatum colatum,  
vel syrup. de cichorio cum rhabarb. vel mel deipuma-  
tum cum modico sem. fœnicul. & radic. pæoniæ & ol.  
amygdal.

Nonnulli putant, naturam ipsam huic rei prouidisse  
lacte materno, quod in principio serosius est,  
& propterea maiorem abstergendi vim habet, censent-  
que eos malè facere, qui lac hoc maternum, quasi  
vile præsidium, reiciunt, & aliarum nutritricum, quod  
jam crassius est, exhibent.

Cateatur etiam, ne ventriculus lactis copiâ onere-  
tur, ideòque infans rarius lactetur. Si lac coaguletur,  
atque in grumos concrescar in ventriculo infantis, dis-  
soluatur exhibitio melle cum sale, oxymel. simpl. sem.  
fœnicul. radicibus eryngij, aut, si hæc nihil iuuent,  
propinentur gr. v. plus minusue coaguli hædini vel  
leporini: vitia quoque lactis emendentur ut supra  
dictum.

Vel, in Epilepsia orta è lactis concretionem in ven-  
triculo.

℞. *Fol. vlm. P. iiii.* Coqu. in vrina pueri. Adde *bu-*  
*tyri recentis* Vnc. ii.

F. Cataplasma, quod applicetur ventriculi re-  
gioni.

Vel ℞. *Fol. malua, absinthij, vlm. an.* pug. j.

Coqu. in vrina pueri, & cum *butyri* ℥. ii. addito  
paucò fermento & ol. nardino, F. Cataplasma appli-  
candum ventriculi regioni.

Infanti frequentius & copiosius lac non dandum,  
ut dictum, quàm ut ventriculus conficere possit. Aliàs  
enim si copiosè & ferè assidue infans lac sugat, fieri  
non potest, quin magna cruditas generetur, ex  
qua non solum Epilepsia, sed & alij morbi pro-  
ueniunt.

### *Cura Infantum ab lactatorum.*

Infantes ab lactati quomodo curentur, docet Ga-  
lenus, in consil. de puero Epileptico: quod tamen cum  
sale legendum censet Hercul. Saxonia; cum infantibus  
concedat lactucam, apium, porrum, brassicam &  
lentes. Petatur etiam curatio ex præcedentibus Alex.  
Trallianus decoctum hyssopi, inprimis hyeme & au-  
tumno, commendat; cum ejus solius vsu plerique con-  
ualuerint, ut non amplius secundum aut tertium eun-  
dem in morbum inciderent. Quippe vitiosa & crassa  
recrementa incidit, & non permittit, vel in stomacho,  
vel in thorace recrementum in crassitiem coire & spif-  
sari; aliudque per vrinas, aliud per aluum expellit.

Et cum morbus hic aliquandiu latere, & inducias  
dare soleat, cura non citò abruptenda, sed continuanda,  
ut radix mali extirpetur. Habentque & hic locum  
cauteria in occipite inter tertiam & quartam colli ver-  
tebram, aut vbi summa vertebra cum capite coniun-  
gitur.

Videatur etiam Alex. Trallianus, lib. 1. cap. 15. Ron-  
delerius, de medend. morb. cap. 36. Hieron. Mercurialis,  
de morb. pueror. cap. 3. Iacobus Trunconius, tractat. 4. de  
custodienda puerorum sanitate, cap. 13. tom. 2. consilior. lib. 8. Horat. Augenius.

## Dietæ.

A carnibus omnino infantes abstinere bonum est, præcipuè suillis & bubulis, voluptatis autem causâ, aut alio etiam urgente vsu modicas accipiant, & raro; sed quæ non sunt pingues. Alex. Trallianus, *loc. allegato*. Idem non concedit sinapi, cæpas, daucum, ut quæ caput replent, nec apium; de quo infra, *quest. 6.* Plura de diætâ infantium videantur apud Trallianum, *loc. allegato*.

## QVÆSTIO I.

## An solus homo Epilepsia laboret?

Qua anima-  
lia Epilepsia  
laborant.

Affirmare quidem hoc videtur Aristoteles, *sect. 50<sup>o</sup> probl. 49.* Verum id alij iure negant, utpote quos experientia aliud docuit. Referunt enim Epilepsiâ laborare & coturnicem. Plinius, *lib. 11. cap. 22.* Julius Solinus, in *Poly-histor.* Aloysius Mundella, Vlysses Aldrouandus, *lib. 2. Ornithologia.* Alaudam, Aloys. Mundella, *lib. 3. cap. 23.* Aldrouandus, *lib. 18. cap. 10.* Accipitres & graculos, Dalechampius, in *comm. in Plin. lib. 3. c. 22.* Picas & perdicæ, Aldrouandus, *tom. 1. Ornithol. lib. 12. c. 11.* Mundella *loco citato*; Capos, Iacobus Oliuarius, *lib. 12. c. 22.* Passeres; idem, Barthol. Anglicus, Aldrouandus, *tom. 2. lib. 13. cap. 30.* Capras & oves, Hippocrates, in *lib. de Sacro morbo*; Canes, Iulius Cæsar Scaliger, in *comm. in lib. 2. Aristot. de plantis*, Cælius Rhodiginus, *lib. 6. Anriq. lect. c. 5.* Alij etiam animalia addunt.

## QVÆSTIO. II.

## Quodnam sit subiectum Epilepsia?

Epilepsia  
subiectum  
quod.

Subiectum Epilepsia omnes Medici cerebrum esse docent, utpote, quod omnium, quæ in Epilepsia læduntur, actionum fons & causâ est, & quo non affecto Epilepsia non excitatur. Solus Querceranus aliter sentit, in *Tetrad. c. 8.* Verum nullius momenti sunt rationes, quibus contra Galenum & vulgatam sententiam probare conatur, quod Epilepsia sedes non semper sit in cerebro, sed quod & in quibusdam Epilepticis cor primò & per se afficiatur, quia scilicet cordis actiones, non minus quam cerebri lædantur, ut ex cordis palpitatione, pulsus conuersione, animi deliquiis videre sit: quodque Epilepsia quædam sit, in quâ phantasia & memoria integra manent. Equidem si de loco generationis materia, quæ Epilepsiam excitat, quærat, nec Galenus, nec Galenicorum ullus vnquam asseruit, eam semper in cerebro generari. Verum hoc quæritur, quâ parte proximè & præcipuè affectâ Epilepsia excitetur. Eam cerebrum esse rectè affirmatur, utpote quod omnium actionum, quæ in Epilepsiâ læduntur, fons & causâ est, & hoc saluo, & non affecto nunquam Epilepsia excitatur. Et licet cordis palpitatio, & pulsus peruersiones in Epilepsia quandoque animaduertantur: non tamen hinc sequitur, quod cor Epilepsia sedes sit. Fit enim hoc vel antequam Epilepsia ingruit, dum vapores maligni versus caput tendunt: & in transitu illud lædunt; vel in ipso paroxysmo Epileptico, corde ab eadem causâ læso, aut per consensum affecto. Nam cum motu animali impedito respiratio quoque deprauetur, impossibile est, ut cordis actiones non deprauentur. Et licet cum Epilepsia aliarum partium actiones læsæ concurrere possint: tamen inter se non sunt confundendæ, quod Paracelsus plerumque facit, qui suffocationem vteri, syncopen, tremorem, & palpitationem cordis vertiginem, ecstasin, morbi caduci species facit. Licet quoque in quibusdam Epilepsia speciebus quædam sensuum internorum actiones non aboleantur, illud tamen non euenit, quod cerebrum tum non sit pars affecta, sed cor. Nam & tum aliæ ac pleræque actiones læduntur, etsi aliquæ super-

stites maneant. Id quod accidit, quod causâ Epilepsia alia est potentior, alia debilior, & cerebrum nunc magis, nunc minus læditur, Et dari quasdam imperfectas Epilepsias, supra diximus. Ac si omnium affectionum, in quibus cor per consensum afficitur, cor sedes esset, in plurimis morbis illud subiectum statendum esset, ut in suffocatione vteri, malo hypochondriaco, & aliis pluribus. Et si cor primarium Epilepsia subiectum est, cur Querceranus omnem curationem dirigit ad cerebrum, non verò ad cor?

## QVÆSTIO III.

## Quenam sit Epilepsia Causa proxima?

Proximam Epilepsia causam statuimus esse expultricis facultatis in membranis cerebri à materia tenui & acri, & qualitate occulta, nervosæ generi inimica, irritationem; & quidem, ut existimo, rectè, ut pluribus in *Institut. lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 6.* demonstrauimus. Etenim materia ex subito sæpe sumpto ab aliqua parte initio cerebrum nervosumque genus peruadit, & paulò post discutitur, sæpe nullo relicto sui vestigio. Et cum Galenus, *3. de loc. affect. cap. 7.* & cum eo alij Medici omnes, Epilepsiam quandam admittant, quæ excitatur, cum à parte aliqua interna quasi aura quædam ad caput ascendit: cur in Epilepsia per primarium cerebri affectum ad obstructionem ab humore crasso confugere opus est, & cur non tum eadem causâ admittitur, præcipuè cum sternutatio & singultus, Epilepsia cognati affectus, eodem modo generentur? Quæ de re Galenus, *loco allegato*, scribit: *Existimari*, inquit, *similem aliquem in Epilepsia cerebri motum fieri, qualis stomacho interdum à re quapsam molesta accidere solet.* Et Auicennas, *Fen. 1. lib. 3. tract. 5. cap. 8.* sternutationem paruam quandam Epilepsiam nominat, quando videlicet quod in anteriore parte cerebri molestum continetur, cerebrum excutit. Sicuti enim quod in anteriore parte cerebri acce & mordax inest, imperu quodam in sternutatione excutere natura tentat: ita in Epilepsia, quod in membranis cerebrum inuestientibus & principio nervorum molestum est, natura excutere conatur. Et sicut sternutatio oritur non à crassis & viscidis humoribus, sed iis, qui acrem vaporem emittunt: ita à simili vapore & humore Epilepsiam concitari vero consensaneum est, & experientia id confirmat. Compertum enim est, quosdam à vaporibus & odoribus prauis Epilepsiâ correptos esse: contra aliarum rerum vapores & odores eandem discutere. Ita suffitus galbani, cornu capræ, hepatis hirci manifestant Epilepsiam. Eandem contra tollunt odor rutæ, castorei. E quibus causis externis de internis in corpore latentibus coniecturam facere non difficile est: siquidem cum plura idem efficiunt, ut in communi efficiendi ratione conueniant, necesse est. Quæ omnia satis indicant, causam Epilepsia proximam esse humorem vel vaporem acrem, aut potius malignum, peculiari vi cerebrum stimulantem, & molestantem.

Galenus equidem aliud statuit, & *lib. 3. de loc. affect. cap. 5. & 7. 2. Aphor. 45. 2. de Symptom. caus. cap. 7. lib. de atra bile, cap. 5.* & alij Medici, qui eum sequuntur, plerumque docent, Epilepsiam fieri ab humore crasso, qui ventriculos cerebri obstruat, non integrè quidem, ut in apoplexia, sed ex parte, quem dum conetur eiicere cerebrum, sese contrahat, quo contracto nervi etiam contrahantur, & in consensum trahantur. Ita enim in *Comm. 2. Aph. 45.* scribit: *Apoplexia & Epilepsia inter se quodammodo affines & cognata sunt affectiones. Eundem enim locum affectum, & eundem humorem habent malignam causam. Hoc differant, quod Apoplexia fiat propter virtutis ad nervos affluentis plenam consummatamque priuationem: epilepsia ad motum vitiosum & peruersum; quin etiam utrobique humor est frigidus & crassus.* In quo quidem rectè docet, quod in Epilepsia laborantibus cerebrum

cerebrum concutitur, & quidem, ut humorem vitiosum excuriat: quod in infantibus Epilepsia laborantibus manu capiti applicata saepe manifesteprehenditur. Verum in eo non parum fallitur, quod humorem illum eiusdem naturae cum eo, qui apoplexiam excitat, esse statuit, & obstruendo etiam cerebrum ad concussionem stimulare docet. Etenim non credibile est, paucillum illud, quod ex partibus inferioribus, ipsius Galeni testimonio, instar auræ, per vias saepe occultas ad superiora ascendit, crassum esse, & obstruendo Epilepsiam excitare, sed potius membranas cerebri vellicando id præstare. Si quoque obstruendo Epilepsiam excitaret materia, Epilepsiae causa, motus potius tolli aut imminui, non verò convulsio excitari deberet. Et cum apoplexia & Epilepsia hoc modo, & ratione causae saltem secundum magis & minus differrent, ob eam tamen differentiam non ita variarent symptomata, sed potius paralytis & stupor, ac animalium actionum ablatio aut imminutio inde fieret, non convulsio. Præterea si ab humore crasso cerebrum ex parte obstruente fieret Epilepsia, apoplexiam antecederet, & sequeretur Epilepsia. Neque enim credibile est, ut videtur Massariæ, tam repente, & tam inexplicabili temporis momento integram cerebri obstructionem fieri, ut nullo modo ob inchoatam & semiplenam obstructionem præcederent Epileptica symptomata, si hoc modo generaretur Epilepsia: cum saepe dolores capitis, vertigines, & similia symptomata apoplexiam præcedere soleant. Multo minus in momento illa obstructio integra, solui potest. Ideoque cum obstructio non est integra, siue ingruente, siue desinente apoplexiâ, Epilepsia sequeretur.

De specifica autem huius humoris ac vaporis natura si quaeratur, omnino admittendum est, simplicem acrimoniam ac malignitatem & venenositatem ad Epilepsiam generandam non sufficere. Nam dantur multi morbi, in quibus tales humores, & inde exhalantes vapores ad caput ascendunt, ut lues Pœrea, febres malignæ multæ, venenatorum animalium morsus, quibus tamen, & aliis pluribus Epilepsia non coniungitur. Ideoque ad Epilepsiam generandam non sufficit, ut vapor sit acris, mordax, malignus, sed peculiaris in eo qualitas, & specifica proprietas, quæ membranæ cerebri & nervoso generi peculiari modo infestus est, & omnino *diadema* Epileptica in eo requiritur.

Quæ autem illa specifica sit malignitas & *diadema* Epilepsiam excitans, explicare in hac naturæ obscuritate impossibile; estque ea, sicut aliorum venenorum, occulta, & non nisi ex effectu colligitur. Nonnulli quidem à Chymicis hic se rem clarius explicare posse, quàm Galenicis, promittunt, sed an re ipsâ præstiterint, dubito. Paracelsus & Paracelsi sectatores plerique Epilepsiam mortuum Mercurialem esse docent. Quomodo verò id clarè explicent, non video. Neque enim, ut, in tractatu de Chymic. cum Galen. consens. ac dissens. dictum, satis explicant, quid sit Mercurius, & quomodo à reliquis principiis differat. Deinde cum multi morbi Mercuriales ex eorum sententia ponantur, non monstrant, quæ in re determinata & specifica huius mali natura sita sit, & quomodo hic morbus Mercurialis ab aliis morbis Mercurialibus differat. Alij, ut rem clarius explicent, à Petri Seuerini Idearadicem huius mali statuunt Vitriolum Mercuriale, & Quercetanus, in Terrad. cap. 11. scribit, nullum ex vaporibus Epilepsiam producere posse, nisi sit naturæ vitriolatæ. Et quidem plerique à Chymicis istis Mercurialem hunc morbum esse dicunt, deinde etiam ex parte aliqua salarium.

Verum enim verò asseruntur quidem ita hæc, sed firmis rationibus non probantur. Nam primò quòd dicunt, morbum Mercurialem esse, ob subiectum eius, quod sit cerebrum, frigida & humida cum Mercurio naturæ, id hoc non satis probat. Etenim etsi Epi-

lepsia fiat cerebro proximè læso: tamen hic quæstio est non de subiecto, sed de natura specifica illius humoris aut vaporis, qui cerebrum vellicando Epilepsiam parit. Is autem non semper in cerebro generatur, sed interdum in cranio, in ventriculo, vtero, & aliis corporis partibus. Neque etiam ideo Mercurialis dicendus, quod causa materialis, hunc affectum generans, in liquida seu vaporosa substantia consistit; cum vapores etiam sulphurei esse possint. Præterea nec medicamenta omnia, quæ curant hunc morbum, Mercurialia sunt: sicut ol. succini sulphureæ naturæ est; sal succini, sal C.C. magisterium coralliorum, salaria.

Tandem cum ex illorum sententia omnis vis mordendi & dolorem excitandi à salibus sit, atque Epilepsia fiat à vapore cerebrum vellicante; potius Epilepsiae causa, quæ talis, ad salem; quàm Mercurium pertinere videtur. Ideoque ipsi Paracelsici necessarium hinc censent, salem coniungendum esse; id quod nec nos negamus. Cuius autem naturæ is sit, & an satis demonstrant, salem istum vitriolatum esse, & nullum vaporem Epilepsiam concitare posse, nisi proprietatis & naturæ vitriolatæ sit, dubito. Cum enim ipsi paroxysmum Epilepticum excitari statuunt, cum exhalationes malignæ, acres, acidæ, adstringentes & corrosivæ spiritibus animalibus miscentur: id non solum ex vitriolo, sed & aliis pluribus fieri potest, alumine scilicet, & sole Armoniaco, ut & antimonio & arsenico. Vnde Petrus de Epilepsia scribit, humorem, qui Epileptici vaporis fomes est, ob copiam salis vitriolati, aluminosi & Armoniaci, quandoque & Mercurialis & arsenicalis, phlegmate Mercuriali, & sulphure glutinoso exuto instar aquæ fortis summam acrimoniam, fermentationis, corrosionis, & penetrationis vehementiam acquirere. Et certè si vapor iste, quod Quercetanus non negat, malignus est, potius malignitas in antimonio & arsenico quaerenda est, quàm in vitriolo. Adstrictio in alumine quoque est; vis corrodendi in omnibus salibus, unde tot aquarum fortium differentia. Et multi in febribus, & aliis morbis æruginosos humores vomitu reiciunt, à quibus procul dubio etiam vapores congenere in caput attolluntur, qui tamen Epilepsiam non excitant. Ergo æquè hic Chymicis ac Galenicis ad occultam & specificam qualitatem & proprietatem, necessarium illud humanæ ignorantiaæ asylum, confugiendum. Ut non immeritò magnus ille Medicus, Iohannes Crato, ad Zuingerum, in Epistolis à Scholtzio collectis, Epistola 137. scripsisse videatur: Utinam ante vitæ meæ exitum veram dignotionem huius mali, & verum remedium aliquis ostenderet!

¶ [De proxima epilepsiae causa dictum supra. Quia tamen ibi non facta est mentio quæstionis, an epilepsia etiam à sanguine fiat, eam hoc loco proponere libet. Dari epilepsiam à sanguine, probare conatur Petrus Salius Diuersus, de morb. partic. cap. 3. & historias duas epilepsiae, à sanguine, (ut putat) ortæ proponit Zacutus Lusitanus, de Pr. Med. adm. lib. 1. observ. 81. & 26. Et quidem epilepsiam à sanguine generari docet P. Sal. Diuersus, quando sanguis copiosus ab aliqua causa extrinseca, ut ex potu vini nimio, vel ex valida exercitatione, concitatus, ruit ad partes superiores, cerebrique vasa affatim replet. Tum enim naturam insurgere ad eiusdem propulsionem & discussionem. Et signa huius epilepsiae ponit, quòd æger sanguine abundat, facies rubet, manus porriguntur, dentes strident, & motus convulsivi accidunt. Zacutus Lusitanus verò ad hanc epilepsiam credendam adductus est eò, quòd fœminam quandam illustrem curauit, quæ cum sanguine plena esset, & horribili epilepsiâ laboraret, ei post septimum paroxysmum cephalicam aperuit, unde octauus paroxysmus mitior fuit; quod cum animaduerneret, iterum copiosius ex altero brachio sanguinem euacuauit, atque ita his euacuationibus factis, & enematum acri vi, & largè exoneratâ aluo,

An detur  
Epilepsia à  
sanguine.  
Dari, probare  
conatur.  
P. Salius Di-  
uersus.  
Zacutus Lu-  
sitanus.

conualuit. Idem probat historiâ Viri cuiusdam quadragenarii, robusti & rubicundi, qui ex intervallo epilepsiâ fuit correptus. Huic cum varia remedia interna & externa essent imperata, tandem etiam præseruationis causâ extra paroxysmum singulis mensibus vena in talo aperta fuit; & ita, euacuato & distracto sanguine ad longinquas partes, æger impostero bene valuit.

Responsio  
Auctoris,

Verum rationes istæ non satis concludunt, sanguinem proximam epilepsiæ causam esse. Nam *supra* tatis monstratum, ab obstructione meatuum cerebri non provenire epilepsiâ; & proinde nec à sanguine copioso, meatus cerebri obstruente, ea provenire potest. Et quot sunt plethorici, qui vino sæpe inebriantur, exercentur vehementius, irâ concitantur, nec tamen epilepsiâ patiuntur? Nimirum solum ab occulta & maligna qualitate, cerebrum vellicante epilepsia provenit, *ut ibid.* probauimus. Ad quam qualitatem confugere necesse habuit etiam P. Salius Diuersus, cum scribit, sanguinem ad cerebrum ruentem Epilepsiâ excitare, cum naturæ granis, & qualitate forsân etiam molestus est. Dispositionem epilepticam in corpus plethoricum incidere, & forsân copiam sanguinis etiam dispositionem epilepticam fouere posse, concedimus: at quod proxima & primaria Epilepsiæ causa sit copia sanguinis, id negamus. Vnde etiam argumentum à curatione & euacuatione sanguinis petitur, id quod debet, non satis probat. Sit enim, ut post repetitam sanguinis euacuationem æger melius habuerit: tamen non sequitur, quod sola sanguinis copia proximâ Epilepsiæ causa fuerit. Nam & alia remedia fuerunt adhibita. Et si in sanguine dispositio epileptica hæsit, non profuit venæsectio copiam sanguinis imminuendo, sed partim à capite eum reuellendo; partim cum eo vitiosum illud, cui maligna qualitas inhæsit, euacuando. Eodem enim modo, quo in melancholia, ut suo loco dictum, prodest repetita venæsectio, non copiam sanguinis imminuendo, à qua non provenit melancholia proximè, sed melancholicum sanguinem tollendo, in cuius locum postea purior & laudabilior succedit, ita etiam, si dispositio epileptica ipsi massæ sanguinis inhæret, ac sanguis ille sæpe euacuatur, & postea purior succedit, cessat Epilepsia. Ideoque si plethora adsit, & causa Epilepsiæ in sanguine hæreat, cum commodò venam, & quidem aliquoties aperiri concedo; plethoram verò proximam Epilepsiæ causam esse nego.]

Sola maligna  
qualitas pro-  
xima Epi-  
lepsiæ causa.

Epilepsia à  
sanguine, ut  
sanguis non  
datur.

#### QVÆSTIO IV.

*Quomodo Cerebrum in Epilepsia afficiatur, & qua de causa omnium sensuum actiones aboleantur?*

Qua ratione  
cerebrum in  
Epilepsia af-  
ficiatur.

Quomodo Cerebrum in Epilepsia afficiatur, id totum ex cognitione causæ proximæ pendet. Nam qui ab humore crasso Epilepsiâ fieri statuunt, necessariò etiam cerebrum ut partem organicam affici, eiusque ventriculos ab humore isto obstrui sentiunt. Verum cum istam opinionem supra reiecerimus, eorumque sententiam probauerimus, qui à vapore mordace, acri, & peculiari vi cerebro infesto, Epilepsiâ provenire docent, rectè etiam hîc statuimus, cerebrum in Epilepsia affici quidem & secundum substantiam, & secundum spiritus, quibus peculiari modo causa Epilepsiæ aduersa est; postquam tamen cerebrum rem sibi aduersam percipit, & facultate expultrice naturali id, quod molestum est, expellere conatur, nervosum & membranofum genus in consensum trahere. Et hîc fit, ut malignitate & acrimoniâ materiæ Epilepticæ vellicatum cerebrum sese cum nervoso genere concutiat, atque id, quod molestum est, excutere conetur.

Qua verò de causa omnium sensuum actiones aboleantur in Epilepsia, si ea non sit ab obstructione ab humore crasso, alij aliter sentiunt. Platerus in Epilepsiâ nervosum genus molestè ab humore pravo affici statuit, quem dum excutere conatur, cerebrum simul exagitat, & in consensum trahi dicit; & dum suppetias ad expellendum id, quod molestum est, afferre nititur, spiritus animales à se in nervorum initia propellere, atque ita effusis à cerebro spiritibus sensus internos cessare, & suis functionibus destitui; non aliter, quàm in lipothymia & syncope nonnunquam spiritibus vitalibus effusis cor à sua functione cessat.

Alij ab angustia meatuum cerebri hoc provenire statuunt: verum non ab obstructione, sed dum cerebrum à vapore molesto irritatur, contrahi & constringi illud dicunt, vnde meatuum oriatur angustia. Verum magis probabile est, in Epilepsia magnam fieri spirituum animalium perturbationem, atque idè omnes actiones turbari. Nam cum actiones animales sine spirituum animalium, & quidem sese rectè habentium, ministerio perfici non possint; in Epilepsiâ vero spiritus animales sese rectè non habeant, sed variè turbentur: actionibus animalibus obeundis debito modo inferuire non posse, manifestum est.

[Equidem de hac quæstione fusè hætenus dictum. Ut tamen, quæ illata sunt, clariora fiant, quædam adhuc addenda putamus. Existimamus autem, & docuimus, cerebrum affici non solum secundum membranas, sed & ipsam substantiam cerebri, ac spiritus animales; & his vapores epilepticos præcipuè occulto modo esse infestos. Etenim spirituum animalium maxima fieri solet perturbatio in epilepsia & omnium sensuum abolitio, quod non accidit membranis tantum affectis; cum in convulsionibus & motibus convulsivis, ab irritatione membranarum cerebri solum profectis, ut in vulneribus accidit, nulla fiat facultatum principum abolitio; sicut nec sternutatione, etsi itidem cerebri membranæ vellicantur. Deinde quia vapor, qui epilepsiæ causa est, non saltem acrimoniâ, sed occultâ qualitate agit; ad quam percipiendâ non in primis sensu tactus, qui in membranis est, opus est, sed ipsa cerebri substantiâ, quæ facultatem expultricem habet, ad eam percipiendam sufficiens est. Præterea nullus dolor percipitur, qui excitatur, cum membranæ affici solent. Tandem si cerebrum saltem, ut sensu tactus secundum membranas præditum afficeretur, tantum acrimonia præstaret id, & ad occultas qualitates confugere opus non esset. Etsi verò cerebrum afficitur, quatenus cognitionem naturalem habet rem ipsam percipiendi, & facultatem expultricem, id quod molestum est, expellendi: quia tamen cerebrum membranas & nervosum genus coniunctum habet, id in consensum trahitur, atque, hoc in consensum tracto, porò muscoli, in quibus nervi disseminantur: vnde illi convulsivi motus, qui ab aliis convulsionibus, cum aliis modis, de quibus *lib. 1. part. 2. cap. 28.* dictum, cum eo in primis differunt, quod in epilepsia sensus interni etiam læduntur, qui in convulsionibus veris sunt integri; utpote nervis saltem affectis, non cerebri substantiâ & spiritibus, quod fit in epilepsia.]

#### QVÆSTIO V.

*An Motus convulsivus in Epilepsia fiat à facultate animali, an verò naturali?*

De motus etiam illius convulsivi, qui in Epilepsia accidit, quoque membra variè agitantur, natura & causa inter autores, præcipuè Thomam Erastum, & Comitem Montanum, est controuersia. Thomas enim Erastus,

Quomodo  
Cerebrum in  
Epilepsia af-  
ficiatur  
De causa  
proxima Epi-  
lepsiæ.

Motus  
convulsivus in  
Epilepsia  
qui auctor  
Erastus,



Eraſtus, in *Anatomia librorum Comitum Montani*, & in *diſputatione de conuulſione*, pluribus defendere conatur, morbum hunc eſſe facultate animali prouenire. Inter cætera autem vtritur hoc argumẽto: Omnis motus, quem appetitus cum rationalis, tum irrationalis muſculis imperat, ſive bene ſive male id faciat, animalis eſt, ſive arbitrius. Is autem motus, qui per contractionem muſculorum ad ſua capita fit, mandatur ab anima ſeu appetitu muſculis. Omnis igitur motus talis dicitur, & eſt voluntarius ſeu animalis. Minorem ita probat, quod nulla animati corporis actio, quæ ab eo, quatenus animatum eſt, editur, ſive laudabilis ea ſit, ſive vituperabilis, ab illa eiſmodi corporis affectione, nihil ad hanc rem concurrente anima, produci poſſit. Muſculorum verò illa contractio, quæ, citra alicuius rei extraneæ operam, ad ſua capita contrahuntur, ac membra, in quæ inſerta ſunt, mouent, operatio eſt animati corporis, quæ animatum. Et proinde eiſmodi muſculorum motus à re nulla alia fieri poſſe, anima non coagente. Cum vero naturalis non ſit, utpote per muſculos voluntarij motus instrumenta exercetur, eſſe animale & arbitrium ſtatuit.

Contrà Comes Montanus hoc negat, lib. 3. de morb. c. 30. & deſenſione quintâ aduerſus Eraſtum, idque hac ratione, Si facultas animalis motum imperat partibus, imperium hoc ex appetitu oriri nec eſſe. Appetitus autem oritur ex cognitione; cognitio à ſenſu; ſed ſenſus in Epilepſia non viget, & illud, quod corpori moleſtum, neque percipere, neque facultatibus ſuperioribus communicare poſſunt. Deinde etſi in aliis conuulſionibus & ſpſmo ſenſus ſunt integri: tamen motus omnis, qui fit à facultate animali, eſt voluntarius. ſeu ſpontaneus: at conuulſium motum præter voluntatem, & contra eam fieri nemo ignorat; ac propterea facultati animali aſcribi non poſſe.

Verum etſi opiniones hæ extremè diſcrepare videantur: tamen neutra per ſe veritati planè conſentanea eſt, ſed ſi coniungantur, veram ſententiam conſtituunt; cum vtræque vis, & expulſrix naturalis, & motrix animalis facultas in Epilepſia concurrant. Etenim motus hi conuulſi ſimpliciter animales non ſunt; cum contra voluntatem fiant. Neque etiam ſimpliciter naturales; cum fiant beneficio muſculi, animalis facultatis instrumenti, neque credibile ſit, facultatem naturalem expulſtricem poſſe tam vehementes ac validos motus ſolum edere.

Itaque hac de re ſic ſtatuendum puto. Cerebri membrana, ubi à materia mordaci & maligna vellicantur ac moleſtantur, illud, quod moleſtum eſt, excutere conantur. Atque hoc modo vis expulſrix cerebri primò quidem mouetur: eadem tamen animale facultatem, quæ ſubiecto illi ſimul ineſt, in conſenſum trahit, eamque ad expulſionem laceſcit. Hinc fit, ut potentia illa cerebrum vehementius dilaret & comprimat, ac iſta compreſſione, quod ſibi moleſtum eſt, excutere conetur; quod in ſternutatione fieri videmus. Imò ſimul facultatem mouentem in neruoſo & muſculoſo genere in conſenſum trahit. Atque hoc modo à facultate expulſtrice quidem initium motus eſt, motus tamen vehementiam iuuat vis animalis. Aliter n. ſeſe habet expulſio in parte, quæ motu deſtituitur; aliter in ea parte, quæ ad motum apta eſt: variantque ſymptomata ſecundum partes ſubiectas; id quod & in ſternutatione, quæ magnam cum Epilepſia conuenientiam habet, videre eſt, ut & in ſingultu. Quanquam enim princeps & prima cauſa ſternutationis ſit vis expulſrix cerebri: irritatur tamen eadem & in conſenſum trahit vim motricem capitis & thoracis, cerebrumque irritatum in expulſione iſta à motrice functione corporis adiuvatur, muſculique capitis & pectoris contrahuntur, ut felicius ac potenter id, quod moleſtum eſt, à cerebro expellere poſſit. Videantur etiam quæ ſupra de Conuulſione dicta ſunt.

Dan. Sennerti Tom. II.

## QVÆSTIO VI.

*An ſanguis in paroxyſmo Epilepſia ſit mittendus?*

Fuerunt quidem inter Antiquos nonnulli, qui in Epilepſia paroxyſmo venam aperiendam cenſuerunt. Verum hodie nemo Medicorum eſt, qui id ſuadeat aut tentet. Etenim in iſta vehementi & inordinata conuulſione corporis nec commodè ſatis inſtitui poſſe venæ ſectio, nec, ſi poſſet, ſatis tutè ac cum vtilitate aliqua adhibetur. Nam cum in paroxyſmo Epileptico maxima naturæ & cauſæ morbificæ lucta ſit, ac natura id vnicè agat, ut materiam illam ſibi moleſtam excutiat, eadèque valde labore tum ob denegatum animalium ſpirituum influxum, ac reſpiratio, & hinc aliæ actiones, non rectè ſeſe habeant: facilè fieri poſſet, ut ſanguine, & cum eo ſpiritibus ſubtractis natura ſuccumberet, & ita æger in ipſo paroxyſmo cum medicinæ ignominia expiraret. Nec vlla cauſa eſt, quæ venæ ſectionem ſuadeat; nec per eam æger à paroxyſmo citius liberari poſſe.

*Sanguis an in Epilepſia paroxyſmo mittendus.*

## QVÆSTIO VII.

*An extra paroxyſmum ſanguis mittendus ſit in Epilepſia?*

Sunt quidem nonnulli, qui nec extra paroxyſmum in Epilepſia ſanguinem mittendum cenſent, eà imprimis de cauſa, quod morbus hic ab humore frigido & craſſo oriatur. Sed, ut ſæpe dictum, ex falſa hypotheſi id aſſerunt. Neque enim ab humore craſſo, ſed potius à tenui ortum habet Epilepſia. Ideoque etſi nunquam fieri queat, ut corporis conſtitutio pituitoſa adſit, aut è ventriculo, vel alia parte determinata, nullo ſanguinis vitio concurrente, Epilepſia excitari poſſit, & ita venæ ſectione opus non ſit: (in quibus etiam caſibus nulla venæ ſectionis ſupra facta eſt mentio) tamen in Epilepſia per eſſentiam, & ſi plenitudinis cuiuſdam notæ appareant, aut ſanguis multus melancholicus adſit, vena omnino aperienda eſt; cum indicans venæ ſectionis adſit: modò vires id permittant. Idem faciendum, ſi à conſuetudine aliqua ſanguinis euacuatione, ut menſium in feminis vel hæmorrhoidum ſuppreſſione, Epilepſia originem habeat.

## QVÆSTIO VIII.

*Quanam vena in Epilepſia ſit aperienda?*

Quæ verò vena aliàs aperienda ſit in Epilepſia, Auctores non planè conſentiunt. Etſi vero ſuprà in ſingulis Epilepſiæ differentiis, quæ vena, ubi opus eſt, aperienda ſit, definitum eſt: tamè, ut res clarior fiat, & quo fundamento ſupra propoſita nitantur, pateſcat; ſciendum, ſi Epilepſia fiat per primarium cerebri affectum, & aliqua plenitudo ſanguinis in capite appareat, vel in toto corpore ſanguinis plenitudo adſit, quæ vel ad producendâ, vel ſouendam Epilepſiam faciat, viresque permittant; commodiſſimè in cubito vena aperitur, quæ ſanguis euacuatur, & à capite derivatur. Si vero Epilepſia ſit per conſenſum ab utero, ac menſtruorum ſuppreſſionem, vel à ſuppreſſis hæmorrhoidibus, venæ in cruribus aperiendæ ſunt, ut & ſanguini motus ſuppreſſus conciliatur, & materia à capite reuellatur.

*Qua vena in Epilepſia aperienda.*

## QVÆSTIO IX.

*An Vomitus in Epilepſia conueniat?*

Etſi nonnulli vomitum in Epilepſia planè improbant, eà imprimis de cauſa, quod vomitus caput, quod

*Vomitus an in Epilepſia conueniat.*

aliàs in Epilepsia afficitur, concutiat: tamen hæc ratio sufficiens non est, nec vomitus planè improbandus, sed distinctione opus est. Etenim ubi cerebrum primariò afficitur, aut ubi à parte aliqua externa Epilepsie causa cerebro communicatur, nullus usus est vomitus; & experientia docuit, eos, qui violentioribus per alium & vomitum simul purgantibus in Epilepsia cerebro primariò affecto vtuntur, non solum nihil commodi inde percipere, sed peius inde habere. Sed tum vomitus prodest, & locum habet, ubi Epilepsia per consensum ventriculi, partiumque vicinarum oritur, seu cum causa Epilepsie iis in locis hæret, è quibus per vomitum excludi potest. Et naturæ quædam ad vomitum satis pronæ sunt, nec faciliè incommodi aliquid ex eo tum metuendum. Et sit, vt caput aliquo modo afficiatur vomitu: tamen longè maius commodum est, quod tum ex eo prouenit.

## QVÆSTIO. X.

*An Frictiones in paroxysmo Epileptico vsum habeant?*

*Frictiones in Epilepsia.*

Non malè, in *spicilegio*, c. 1. de Epilepsia, scribit Franciscus Hildesheim; in ipso paroxysmo Epileptico nullum vnquam auxilium præstantius se expertum esse, quàm frictiones validas ac violentas scapularum, brachiorum, crurum, & ipsius dorsi cum pannis asperioribus & pilosis. Erastus tamen, *disp. 4. contra Paracels.* frictiones non multi usus esse putat, quòd nihil euacuare ex loco affecto possint, propter obrusum membrorum sensum. Verum enim verò sententia prior verior est. Et si enim verum sit, sensum tum esse obrusum; tamen si frictiones fortiores sint, quales esse debent, sensus sopiti excitantur quasi. Præterea etsi sensus frictiones non percipiat: tamen frictiones fortes partes calefaciunt, humores & spiritus ad partem, quæ fricatur, concitant, ac mouent. Vnde sit, vt vapores ad caput tendentes versus inferiora & partes illas, quæ frictione incaluerunt, attrahantur & discutiantur.

## QVÆSTIO XI.

*An in paroxysmo Epileptico sternutationem cedere liceat?*

*Sternutatoria in Epilepsia an conueniant.*

Sunt nonnulli, qui in paroxysmo Epileptico sternutationes ciendas non putant, eà de causa, quod humores crassos sternutatoria è cerebro excutere non possint, verum eos mouendo & agitando maiores obstructiones pariant; imò, capite non euacuato, visui insigne damnum adferre possint; cum experientià constet, ex intempestiuo sternutamentorum vsu, materia in cerebro copiosâ agitâtâ, neruorum opticorum obstructio- nem, & hinc cœcitatem secutam fuisse. Verum supponunt hi ex antiqua opinione, à crassis humoribus, ventriculos cerebri obstructibus, excitari Epilepsiam. Cum verò supra satis sit demonstratum, non ab humore crasso, sed potius tenui, imò vapore & aura, Epilepsiam excitari; frustra hoc incommodum metuitur, materiàmque talem prarmica satis discutere valent. Atque usus & experientia docet, nihil damni à prarmicis in Epilepsia exhibitis prouenire, sed cum summa vilitate ea adhiberi. Interim non negamus, in aliis morbis, in quibus materia crassa & copiosa in capite abundat, prarmica cautè & cum circumspectione esse adhibenda.

## QVÆSTIO XII.

*An Apium Epilepticu sit noxium.*

*An apium*

Avicennas, *lib. 3. Fen. 1. tr. 5. cap. 11. de cibis præcipue*

apium reicit, vt pote quod peculiarem proprietatem Epilepsiam commouendi habeat; quem Arnoldus de Villâ nouâ, *lib. 1. cap. 2.* & alij inter quos e recentibus est Tabernæ montanus, sequuntur. Auicennam verò reprehendit Leonhard. Iacchinus de acutor. morb. curat. & merum delirium esse id putat, cum Galenus, in *consil. de puero Epileptico*, Apium Epilepticis concedat.

Verum non solum Auicennas, sed & Alex. Trallianus, *lib. 1. c. 15.* Apium Epilepticis, ceu naturaliter eos offendens, prohibet. Et Plinius, *lib. 20. nat. hist. c. 11.* ex Chrysippo & Dionysio refert, in puerperio ab eo cibo comitiales fieri, qui vbera hauriunt. Cum ergo tot docti viri id affirmant, non puto planè istam sententiam esse reiiciendam, sed potius experientiam, quæ non planè refragabitur, consulendam: Et quamuis multi hodie sine noxa vtantur eoi; tamen ad Epilepsiam dispositi non sunt. Et licet Galenus Apium Epilepticis concedat, id tamen degustare saltem permittit, licet & Smyrnum, quod tamen postea caput replere scribit; & similia, quæ ei ætati, & in Epilepsia parum commoda, concedit: quâ ipsâ de causâ Hercul. Saxonia hoc consilium cum sale legendum putat.

Hoc tamen hic monendum, cum de Apio quæstio est, petroselinum nobis ita dictum intelligendum esse. Id enim est verum apium hortense, & domesticum antiquorum; quod verò apium hodie dicitur vulgò, id est apium palustre antiquorum.

## QVÆSTIO XIII.

*An Cranij humani aliquis in Epilepsia vsus sit?*

Cranium humanum contra Epilepsiam hodie vsu- *Cranij hu- mani in Epilepsia vsus.* pari notissimum est. Reprehendit tamen hoc Erastus, *in disputat. contra Paracelsum part. 4.* scribitque, Diabolum persuasisse latenter hominibus, vt pro Epilepsia depulsionem vterentur puluere ex cranio humano preparato, & iussisse, vt deuorent fœminas fœminæ, mares muscoli. Paracelsum verò, cum inaniter offerri cranij puluerem animaduertisset, vt superstitionem confirmaret & auerteret, officulum quoddam paruum, angulare, magnitudine vnguis in capitis vertice inueniri, mentitum esse, quod epotum liberaret ab Epilepsia, & ne in mendacio deprehenderetur, addidisse non in omnium capitibus, sed in quorundam saltem reperiri. Ipse verò Erastus, in nullis reperiri statuit.

Verum enim verò etsi verum sit inter medicamenta passim circumferri multa, quæ reipsa quod de ijs prædicatur non præstant; nolim tamen hoc faciliè de cranio humano assueuerare; cum tot docti eruditique Medici testentur, verum esse, quod de efficacia cranij humani in Epilepsia scribitur, præcipuè cum Erastus nullam rationem, quæ contrarium suadeat, afferat. Id eoque etsi superstitosorum medicamentorum usus rectè reiiciatur, atque inde etiam Galenus, *de simpl. med. fac.* scribat, absurdum & indignum hominibus esse, talia vsurpare: idem tamen Galenus, *lib. 11. de simpl. Med. fac. titul. de Ossibus*, refert, se nouisse, quendam ossa combusta potui exhibuisse haud scientibus quid biberent, ne scilicet ea auerfarentur, ac multorum tum Epilepsiam tum Arthritidem curasse. Id quod de cranio etiam obseruare cuique promptum est. Et imprimis ad Epilepsiam curandam efficacissimus est spiritus, qui ex eo elicitur, si infantibus gutt. vi. vel vii. adultioribus plures exhibeantur; vt & sal ille volatilis, qui in destillatione liquoris huius è cranio colligitur.

Paracelsum quoque officulum illud in cranio humano reperiri affirmantem mendacij immeritò arguit Thomas Erastus. Etsi enim ipse ea non viderit: in multis tamen ad commissuram futuræ coronalis & sagittalis *Officulum triangulare in cranio humano.*

talibus talia officula triangularia reperiuntur. Et sunt penes aliquam, quæ nuper etiam meis Auditoribus monstravi, quæque habeo ex dono Dn. Michaelis Dö- ringij, iam Medicinæ Doctoris, & Physici Vratilla- uienlis, qui cum iter in Sabaudiam cum Dn. Guilielmo Fabricio, Hildano, Chirurgo celeberrimo, faceret, in offuariâ obuiâ multa ex craniis ibi asseruatis cum Dn. Fabricio collegit.

## QVÆSTIO XIV.

*Vtrum Amuleta prosint in Epilepsia?*

Amuletorum  
in Epilepsia  
usus.

Cum de Amuletis quædam in genere dicta sint, in *Tractat. de Consens. & Chymic. cum Aristotel. & Galen. ea*, quæ ibi prolata sunt, hic repetenda non censeo, sed arguenda solum, quæ, *loc. allegato*, affert Erasius contra Amuleta, examinabo. Primum quidem scribit, naturalia esse, siue propter formam substantiæ effectricem, siue propter certam temperaturam rebus subiectis insint, non aliter mutari, quam per sensibilibus qualitatibus alterationem. Quippe formæ substantiales neque cor- rumpuntur, neque mutantur, non mutato temperamen- to: at ab Amuletis eiusmodi temperamentum sensibi- lium qualitatibus mutari nequit. Verum enim verò male præsupponit Erasius, nullas in rebus dari quali- tates, & per eas mutationes, præter eas, quæ sunt à tem- peramento primarum qualitatibus; aut, si dantur, non mutari posse, nisi temperamento sensibilibus qualita- tum mutato. Experientia, enim multiplici constat, dari multas occultas qualitates, quæ ab ipsa forma substan- tiali, non mediante temperamento primarum qualita- tum, fluunt. Hæ ergo qualitates cum sui generis quali- tates contrarias habeant, unde rerum antipathia pro- ueniunt, possunt mutari, non mutato temperamento à sui generis qualitatibus.

Deinde nec illud admitti potest, occultas qualitates non, nisi proxima, & quæ contingunt, corpora afficere, in remota vero, & inter quæ aliquod interiectum sit, non agere. Reperiuntur enim inter quos & feles ea est antipathia, ut ad præsentiam felis etiam cistæ inclusæ: & quam non vident, animo deficiant. Et magnetis vi- res trahendi ferrum nullo obice aut obstaculo impediri posse, ac per tabulam interpositam ferrum à magneto trahi, res ipsa docet. Et quod Erasius negat, ferrum à magnete per medias carnes & cutim trahi, id affirmat Ambrosius Paræus, *lib. 8. Chirurg. c. 15*, ubi refert, quen- dam Chirurgum hernias puerorum curasse magnete in tenuissimum puluerem reducto, & cum polenta exhibi- to, inguine verò, quæ præcipitabantur intestina, melle inuncto, & subtili ferri limatura aspersa: de quo tamen Lectori iudicium relinquam.

Quod etiam impossibile putat Erasius, frustum lapi- dis aut radicis appensum cuti tantam vim morbifici hu- moris educere, ut morbum tam terribilem iugulare possit, id impossibile non est. Etsi enim sensibilibus hu- mores vitiosos non educant talia: in ipsam tamen caus- sam morbificam aliquo modo agere possunt. Etenim non ipsi humores, quatenus tales, causa Epilepsiæ sunt, sed malignum illud in humoribus, & praua hu- morum *dispositio*, ac quod peculiari vi cerebro infestum est, quod in minima etiâ quantitate magnas vires ha- bet, ut in venenis videre est. Illud ergo si extinguitur, & qualitas illa si tollatur, Epilepsia cessat, humore ma- nente, modo is non totus corruptus sit. Nec impossi- bile est, humorem aliquem qualitate praua depositâ manere, aut certè aliorum admixtione ita obrundi pos- se, ut amplius non deprehendatur: sicut non solum id in coctione humorum, & febribus, extincto paroxysmo, videre est, sed & aliis in rebus apparet. Spiritus vitrioli, exempli gratia, insignem aciditatem & acrimoniam ha- bet; at si aliquid salis vel ol. tartari addatur, omnem il- lam amittit. Vina pendula corrigi possunt manente sub-

Dan. Sennert Tom. II.

stantia. Ita & cereuisiæ acedentes sæpe qualitatem il- lam deponunt!

## QVÆSTIO XV.

*An usus sanguinis humani conueniat in Epilepsia?*

Ex Tertulliani *Apologetico aduersus gentes* patet, Ro- mæ usitatum fuisse, ut in theatro & arena iugulatorum gladiatorum sanguinem recentem de iugulo decurren- tem & repentem adhuc contra morbum comitalem biberent. Idem Plinius, *lib. 28. natur. histor. cap. 1*, testa- tur, & Cornel. Celsus, *lib. 1. cap. 34*.

Verum ut illa ipsa theatrica spectacula, & gladiatorum cædes diaboli inuentum sunt: ita, ut Plinij, *loc. allegato*, verbis utar, ille euerfor iuris humani, monstrorumque artifex cæde humanâ, & sanguinis humani effusione delectatus, ex hominum sanguine & sacrificia & phar- maca per suos sacerdotes fraudulenter instituit, homi- nibusque superstitionis persuasit, ut contra Epilepsiam sanguinem humanum haurirent. Verum nullius ani- malis sanguis adhuc calens sine incommodo bibitur. Docetque experientia, sanguinem animalium potis- simum adhuc calentem & spirituosum, haustum ma- gnâ in corpore mutationem efficere; possuntque inde Lycantrophia & Galianthropia excitari, ita ut homines eorum animalium mores referre incipiant, de quo supra, *cap. 16*, dictum. Sanguinem quoque huma- num Epilepticis nihil profuisse, sed animum ferocem induxisse, eadem experientia docuit. Nota est ex Iulio Capitolino historia de Marci Antonij Philosophi Im- peratoris vxore Faustina. Ea enim cum amore gladiato- ris derineretur & contrabesceret, Marcus Imperator id ad Chaldaeos & Mathematicos reulit, qui suaserunt, ut occiso gladiatore Faustina tepidum cruorem illius bi- beret, viroque suo mox concumberet, quo quidem san- guine gladiatoris hausto amorem deposuit, (foran de- siderio potius perremotionem obiecti, quam sanguinis haustu, sublato) vis autem illius gladiatoris sanguinis sese prodidit in partu illius Faustinae. Antonius enim, quem peperit, homo crudelis & gladiatorio animo ac temeritate fuit, ut pugnis gladiatoris & cruentis cædi- bus Rempubl. Romanam ferè attriuerit. Vid. etiam Li- bavius, *2. part. singul. p. 164*.

Refert quoque Iohan. Longius, *epist. lib. 1. cap. 71*, quendam Pastorem sicarium & homicidam duos ha- buisse filios, quos sibi in sui facinoris & latrocinij sub- sidium assciuit. Cum verò iuniorem ad tam sæua obe- unda facinora pusillanimum animaduertisset, occiso in sylua Ortonis tabellario, panem sanguine occisi madi- dum filio esurienti edendum præbuit, quo degu- stato tanquam dæmonis cæstro percitus sese ad quæ- vis perpetranda flagitia longè audaciorem factum, dum de eo lumeretur supplicium, sponte confessus est. Plura de sanguinis humani, instinctu diaboli, usu videantur in allegata modo epistola. Summa, ut Lucanus scribit:

*Nullus semel ore receptus*

*Pollus patitur sanguis mansuescere fauces.*

[Vltim sanguinis humani tutum non esse, supra diximus. Id confirmat etiam historia, quam refert Za- curus Lusitanus, *de Prax. Med. Adm. lib. 3. obs. 79*. ubi narrat, iuuenem quendam inimico suo, amicitia simu- latâ, ad conuiuium inuitato, inter potandum obrulisse poculum vini cum vnc. duabus sanguinis humani, ex homine russo venæ sectione emissi, adiecto etiam sac- charo. Quod cum ille incautus exhausisset, post tri- duum delira loqui cœpit, & in perpetuum fatuus re- mansit, nec vllò remediorum genere curari potuit.]

Potus san-  
guinis huma-  
ni minus tu-  
tus.

## CAPVT XXXII.

De Caro.

Nomen.

Carum unde dictum.

**C**arus ὁ τῆς κάρης, à capite sic dictus est, quod sit capitis grauitas, & inexpugnabilis dormiendi necessitas. Latini nonnulli torporem, Arabes Subeth appellant. Idem cum Caro etiam affectus videtur esse malum, quod Hippocrates, 7. Aphor. 14. & 58. ἐκπληξιν & ἀποπληξιν nominat. Quanquam ἀποπληξιν pro magnitudine affectus interdum apoplexiæ tribui videatur; de quo infra, de Apoplex. quest. 1. Et si verò Carus nonnunquam pro comate sumitur; tamen cum de Caro propriè dicto loquimur, est is proximus apoplexiæ affectus, in quo non solum somnus longior est & profundior, quàm in lethargo, sed præterea æger vocatus non audit, & nisi punctus, vix sentit, & quamuis sentit, non tamen loquitur, aut oculos aperit. Respiratio tamen illæta est, quo ipso ab apoplexia differt, in qua respiratio est difficilis cum stertore. Quando verò Galenus, 4. de loc. affect. cap. 2. & 2. acutor. aphor. 10. scribit; in Caro hominem neque sentire neque moueri, neque intelligere, neque meminisse, id ita accipi debet, quod Carotici non sentiunt nec mouentur, nisi obscure, & confuso quasi iudicio, dum videlicet obiecto fortius feriente ac pungente partem contrahunt, quod non fit in apoplexia.

Definitio.

Definitio.

Est videlicet Carus, vt Galenus definit, de sympt. differens. cap. 3. Paralysis quædam τῆς φαντασίης, seu, vt res clarius explicetur, resolutio & priuatio quædam sensuum internorum & externorum, motusque voluntarij, spirandi solum facultate illæta: seu somnus profundus cum sensus & motus, respiratione excepta, imaginationisque seu imminutione, seu ablatione, ob impedimentum motus, ac liberum exercitium spirituum animalium.

Causa.

Causa proxima.

Causam huius mali proximam esse in spiritibus animalibus, qui in organa sensus & motus influere, ac liberè in cerebro moueri non possunt, planum esse puto. Hoc autem impedimentum plerique ab angustia ventriculorum cerebri prouenire statuunt: quod commodè explicandum. Neque enim, vt alibi dictum, in ventriculis cerebri spiritus animales continentur & mouentur, sed potius in substantia & meatibus cerebri. Ideoque à meatuum cerebri, siue compressione, siue obstructione seu angustia, Carus ortum habet.

Et quidem primò à compressione cranij & cerebri fieri Carum, docet Fernellius, lib. 5. Pathol. c. 2. dum scribit, se vidisse quandam ictu vehementi ac valido concidisse, vt sanguis ex oculis, naribus, & ore emanaret, hinc totius mentis sensusque stupor inuaserit, vt caluaria pertusa ac denuo obducta fuerit, omnèque remediij genus sine sensu inductum fuerit, atque is tertio mente restitutus immemor omnium, quæ acciderant. Refertque Mercurialis, se vidisse quandam ab importuna cranij perforatione factum caroticum, vbi scilicet in vulneribus inter perforandum vel eximendum os, membrana cerebri violatur, negligentius impresso instrumento Chirurgico, quod μωρὴ γούλα appellat. Pertinet & huc musculorum temporalium ac arteriarum contusio: nisi causæ istæ commodius ad tertium causæ genus referri possint, de quo postea. Pertinent & huc allegari aphorismi 14. & 58. sect. 7.

Secundò ab obstructione meatuum cerebri, imò ce-

rebri refrigeratione & humectatione ab humore quodam frigido & crasso, Carum fieri posse, negandum non videtur: cum omninè inter soporis præternaturalis species hæc sit grauissima. Ad hanc causam faciunt iter per loca frigida, vt pluuiis & niuibus, habitatio in conclauis nuper ædificato & humido.

Tertiò. Sed præter angustiam causæ illæ externæ, ictus & percussiones capitis, casusque alio etiam modo actiones animales turbare posse videntur, videl. vel agitaris, commotis & perturbatis saltem spiritibus, vel etiam neruis, quibus spiritus feruntur, ruptis. De qua causâ utrâque Fernellius, loc. allegato, ita scribit: Fiunt præterea & soporosi affectus cerebro ictu vel casu vehementius concusso. Agitaris quippe & commotis spiritibus nulla rectè actio edi potest, tuncque subsistit homo quasi attonitus, vt qui aut timore aut verecundia obstupuit. At si concussionis vi & impetu fracta & depressa caluaria meninges cerebrumque premit, sensus atque sermonis expers obstupescit homo. At certè cum extractum cerebrum est, atque eius, aut neruorum inde prodeuntium diuulsio quædam obtrigit, omnibus quidem fractis ac debilitatis deterrimus sopor oritur, exiguum nobis salutis spem relinquens.

Pertinere huc videtur & ea Cari species, quæ fit arteriis, carotidibus, & musculis temporalibus affectis. Cum enim hæ arteriæ spiritum vitalem ad animalium spirituum generationem ad cerebrum vehant, si lædantur hæ arteriæ, & spiritui vitali transitus denegetur, spirituum animalium generatio non fit, & ita spiritibus vel deficientibus, vel perturbatis Carus oritur. Idem fit musculis temporalibus contusis, compressis, vel alio modo læsis, quos idcirco Hippocrates, lib. de articulis, μωρὴ γούλα nominat. Habent enim non solum maximum cum cerebro consensum propter insignes neruos, qui si lædantur, faciliè cerebro malum communicatur, sed & arteriæ carotides his musculis læsis lædi possunt.

Ad hanc differentiam Cari, quæ à perturbatione spirituum fit, pertinet & ille, qui fit à vehementissimis doloribus à causâ siue internâ, siue externâ, dissipatis videlicet spiritibus, & concidente in cerebro spirituum animalium robore; vnde nonnulli etiam subidentiam cerebri deducunt, quæ peculiaris in hoc affectu angustia causâ sit.

Pertinet huc & ille somnus grauis, qui in Epileptici paroxysmi sine accidit.

Quarò. Quibus tandem meritò addimus vim narcoticam, de qua supra, cap. 2. dictum, & cap. seq. de Apoplexia dicitur, dum spiritus animales torpidi, & ad actiones suas inepti redduntur. Accidit hoc ex medicamentorum narcoticorum, cum assumptorum, tunc extra applicatorum vsu. Deinde quædam venena Carum inducunt, sicut ex morsu aspidis soporem & torporem lethalem accidere, Plutarchus, de morte Cleopatræ, scribit; vt & fungorum quorundam esus, & alia venena. Sæpe etiam ex intrus genitis malignis humoribus in malignis febribus Carus accidit. Imò interdum in intermittentibus etiam febribus in principio paroxysmi calore attenuatâ & fusâ materiâ vapores ad caput eleuantur, & Carum excitant, qui non prius cessat, quam vapores illi discussi sint. Et quod in febribus à toto corpore accidit quandoque, idem etiam à priuatis partibus, intestinis, & vermibus in iis, ac vterò accidere potest. Refert quoque Mercurialis, Sabæos populos incidere in hunc morbum ex odore & fragrantia fructuum & florum apud eos nascentium, & curari suffitu bituminis & barbæ hirci. Pertinet huc & fumus carbonum accensorum in conclauis conclusorum, qui & aërem crassum & ventilando calori ineptum reddit, & vi narcotica spiritus torpidos efficit. Quod præstant & vapores illi è musto & cereuisia feruente exhalantes.

Differen



*Differentia.*

*Differentia.*

Differentiæ viles & ad curationem cognitu necessariæ à causarum diuersitate, & locorum, in quibus illæ in corpore generantur, varietate petuntur. Carus videlicet alius est per essentiam, vbi materia, eius causa, in capite generatur; alius per consensum: & quidem nunc ex hac, nunc ex illa parte prouenit. Causæ quæ sunt variz, vt modò dictum.

*Signa Diagnostica.*

*Signa diagnostica ipsius affectus.*

Eger graui & continuo somno opprimitur, atque oculos habet clausos, quod non fit in catalepsi; & si eos dum magno clamore vocatur, aperit, statim iterum claudit, interrogatus non responder; quod fit in lethargo, in quo ipsa febris semper coniungitur: cum carus, si cum febre sit, accessiones saltem febrium sequatur. Si pungatur, sentit, & membrum contrahit; quod non fit in apoplexia: libera tamen respiratio adest; nisi causæ vehementia sit maxima: ac tum parum ab apoplexia differt hic affectus.

*Signa Causarum.*

*Signa causarum.*

Causæ quoque huius affectus sua habent indicia. Nam si à compressione est; præcessit contusio vel ictus; quod ab ab astantibus cognosci potest: sicut & si à fumo carbonum aut veneno hoc malum originem trahat. Si ab obstructione, vel cerebri humectatione, pituitæ signa aderunt ex antecessis causis humectantibus & refrigerantibus, vt ære, cibis, medicamentis, ex temperamento itidem ac habitu corporis humidior ac frigidior; & signis aliis, de quibus supra, *part. 1.* Si febris adsit, facile suis cognoscitur signis, & naturam causæ patefacit. Si ex vermibus originem habeat, item si vaporibus inferioribus ascendens malum producat; diligenter inquirendum, in qua parte fons mali & materia, quæ vaporem illum narcoticum suppeditat, hæreat. Si à veneno ortum habeat, id ex adstantium relatione cognoscitur.

*Prognostica.*

*Prognostica.*

1. Το καὶ πάντως, vbiq̃ue malum, teste Hippocrate; in *Coac. prædict.* & Galeno, 1. *Prorrh. Aphor. 29.* Nā actiones animales, exceptā solā respiratione, sunt affectæ, & cerebrum, quod nobile membrum est, patitur. Magis verò periculosus est Carus, in quo respiratio quoque laeditur. Tum enim apoplexiam in propinquo esse, indicio est.

2. Cephalalgia καὶ πάντως cum capitis gravitate conuulsionem indicat. Hippocrates, in *Coac.* Cuius rei causam hanc reddunt, quod humor frigidus non nimis crassus in neruorum substantiam penetret, eos repleat, extendat, aut frigore vellicet, vt conuulsio sequatur. Verum probabilius est, materiam, quæ seu cerebrum humectando & replendo, seu vi narcoticæ, carum inducit, simul peculiari modo neruoso generi infestam esse, illudque vellicare, & prout in hunc vel illum locum prius incidit, hoc vel illud symptoma prius producere posse. Etenim si in fine paroxysmi sopor accidit, non tam ob defatigatum à nimia agitatione cerebrum, quam quod, vt rectè Platerus hac de re statuit, vapores maligni, qui prius neruosum genus afficiendo motus epilepticos excitabant, postea cerebrum labefactando soporem inducunt: cur non etiā vapor aut humor, qui prius in cerebro soporem inducebat, postea ad neruosum genus conuersus idem vellicare, & conuulsionem parere possit? Cuius rei documentum præbet vinum & spiritus vini. Etenim compertum est, ebriis nonnunquam post soporem conuulsionem superuenisse.

3. Carus in declinatione febrium continuarum proueniens, si vires sint debiles, lethalis est.

4. Si cranio contuso meninges & cerebrum contendantur, malum est; quoniam æger apboniā corripitur, & sensu motuque priuatur. Si verò cerebrum ipsum effringatur, aut neruorum fiat auulsio, deteriora symptomata succedunt, cum exigua salutis spe, vt ex 7. *Aph. 14.* & 58. colligitur.

5. Carus & somnus nimius ac grauis post quamlibet magnam inanitionem aut spirituum dissipationem & absumptionem, pessimus est. Aegrum enim morti vicinum nunciat.

*Indicationes.*

Si malum hoc proueniat à copiosa pituita cerebrum refrigerante, humectante, & irrigante, vel etiam meatus eius obstruente, calefacienda, attenuanda, & euacuanda ea erit, habitā prius ratione totius corporis. Si autem ab humore vel vapore narcotico fiat, ea exhibenda, quæ peculiarem facultatem habent narcoticam vim infringendi: simulque partis, quæ illam materiam suppeditat, habenda ratio est. Si à veneno proueniat, curatio ad illud dirigenda. Si accidat à compressione cerebri, cranium eleuandum, affluxus prohibendus, & quod affluxit, discutiendum.

*Curatio.*

Ergo si vel à pituita, vel à vapore narcotico originē habeat Carus, habitā prius totius corporis ratione, eoque euacuato, reuulsionibus institutis per frictiones, glandes, clysteres acres, vt supra, *part. 1.* dictum, caput per errhina, apophlegmarismos & similia euacuetur, vt, *ibidem*, dictum. Eger frequenter rutam & pulegium olfaciat, aceto intincta; pars capitis anterior friceretur ol. rutæ, cui castoreum admistum sit, vel etiam addatur sinapi ac nigella, vel sinapisimi instituantur. Acetum quoque acerrimum laminæ ferreæ candenti infundatur, ac vapor naribus excipiat, quod efficax est in affectibus soporosis remedium. Reliqua curatio ferè instituitur, vt, *capite seq. de Apoplexia* dicitur.

Si autem cum febre vel vermibus coniungatur Carus, vel aliunde per consensum accidat, respiciendum ad totum corpus, vel ad partem mittentem. Materia scilicet à capite auertenda, cerebrumque, quod est membrum recipiens, roborandum. Inprimis materia, quæ causam suppeditat, tollenda. Sublato enim morbo principali vel fomite, & illud, quod eum sequitur, cessat. Ea tamen non sunt negligenda, quæ vim narcoticam infringunt; ideoque acetum, ruta, pulegium olfacienda.

Si autem à veneno hoc malum inductum sit, & quidem hausto, mox vomitus instituat. Deinde dentur conuenientia alexipharmaca. Si opium sumptum sit, castoreum mixtum cum oxymelite detur. Si hyoscymus; cassia lignea aut castoreum exhibeatur. Si morsu animalis venenati inductum sit venenum & hinc pendens Carus, conuenientia alexipharmaca danda, ac venenum, per vulnus extrahendum. Si ignoretur venenum, propinetur theriaca antiqua cum castoreo. Sin extra admodum sit narcoticum, ol. castor. rutæ & de piperibus conuenit.

Simul in his omnibus danda opera, vt æger à somno excitetur, de quo supra, *cap. 2.* dictum. Nimirum extra adhibenda ruta, & ex ea parata medicamenta, castoreum, acetum, moschus, vel applicetur capiti emplastrum ex vna parte scillæ, vna rutæ, & duabus castorei.

Nonnulli plura medicamenta à proprietate iuuantia contra hunc affectum proponunt. Dominic. Leonus, *cap. proprio*, scribit, quendam Empiricum retulisse, succum consolidæ, præcipue minoris, quantitate ʒij. haustum, lethargicos & caro laborantes excitare, &

omnem somnum profundum remouere. Idem scribit; fel gruis tepesfactum in vase plumbeo; & illitum occipiti, à somno excitare, myrrham item & thus deglutitum somnum discutere. Recenset ibidem & alia quædam sub cervicali posita, vel corpori alligata, quæ vigiliæ præstant, vt oculos, cor & fel philomelæ, pennam dextræ alæ merulæ, caput & cor vespertilionis, oculos vpupæ; quæ tamen videntur esse supersticiosa.

Si denique à compressionem cranij & cerebri originem habeat Carus, curatio instituenda vt supra, *part. 1. c. 10.* dictum.

### Dieta.

#### Dieta.

Ager contineatur in aëre temperato, vel ad siccum & calidum vergente, lucido, non tenebricoso, & clamore forti ac vociferatione excitetur. Instituatur & frictiones & ligaturæ extremorum. Reliqua ex iis, quæ de Lethargo dicta sunt, & iam de Apoplexiâ dicentur, petantur.

### Cura fumo carbonum, vel musti vapore suffocatorum.

Propter cognationem non prætereunda cura eorum, qui fumo carbonum vel vapore musti aut cereuiis suffocantur. Cum enim interdum accidat, vt Medicus ad eos, qui fumo carbonum, vel vapore musti aut cereuiis feruentis penè suffocati sunt, subito vocetur, quid tum agendum sit; vt in promptu habeat, necesse est. Forestus, *lib. 1. §. obseru. 36. in scholio*; curationem ex Haly, *Practica lib. 6. cap. 4.* desumptam proponit. Verum Haly eoloci non de fumo suffocatis, sed de strangulatis, & fume suffocatis agit. Ager autem talis statim in aërem liberum exportandus, & os diducendum, ac apertum seruandum, & sp. vini optimè rectificatus, in quo aliquid theriacæ dissolutum sit, vel aqua theriacalis aut apoplectica vel epileptica vel hirundinum cum castoreo, vel acetum tutaceum instillandum. Hinc vbi æger iterum moueri incipit, vomitorium ex multo oxymelite exhibendum, dorsoque ægri concussio vomitus excitandus. Hinc aliquod sternutatorium naribus instillandum, & palato theriaca, Mithridatium cum castoreo, aliæque, de quibus de apoplexia dicetur, illinenda, Nec intermittendæ frictiones, clysteres. Tandem ea exhibenda, quæ spiritus animales & vitales reficere valent.

## CAPVT XXXIII.

### De Apoplexia.

#### Nomen.

Apoplexia unde dicta.

Apoplexia, Græcis ἀπὸ τοῦ ἀποπλῆτθαι dicitur, quod homo ceu fulmine ictus, aut victima ad aram caesa, subito concidat. Aponia & Apoplecticos ἀπὸν appellat Hippocrates, *4. de rat. viſt. in acut. 6. Aph. § 1. 7. Aphor. § 8.* quod hoc malo correpti statim obmutescant.

Aponia quid sit.

De voce verò ἀπὸν notandum, etsi vox etiam lædi possit solum instrumentis voci destinatis læsis: tamen Hippocrates, vt Galenus, in *Comm. ad allegatos Aphorismos*, docet, ἀπὸν καὶ ἐξοχλῶν eos saltem, quibus sensus & motus ablatus, quique non aliter atque attoniti sine villo sensu & motu prostrati iacent, sub nomine ἀπὸν intelligit, sub vno maximè manifesto symptomate τὸ ἀπὸν omnes voluntarias actiones læsas comprehendens. Fit autem hoc & in Apoplexiâ & in caro. Ideoque ἀπὸν nomine vtroque affectu laborantes comprehendit Hippocrates. Aphoniam quidem pro earo sumit, *§. Aphor. §.* pro Apoplexiâ verò locis modò allegatis.

De voce tamen ἀπὸν, & qualis is affectus sit, dicitur infra, *quæst. 1.* Latinis morbus sideratus & attonitus appellatur, quod quasi fulmine tacti ægri concidant. Nonnullis quoque vniuersalis paralysis nominatur, quod omnium partium sensus & motus aufertur. Germani *den Schlag, und die Hand Gottes* nominant.

[Aphonia equidem, vt supra diximus, etsi sit læpe propriæ vocis læsio, quæ pluribus à causis accidere, & etiam sine sensus & motus læsione contingere potest, solum instrumentis voci destinatis læsis tamen Galenus, in *comment. ad aph. §. sect. 5. ad aphorism. § 1. §. 6. ad aph. § 8. sect. 7.* docet, Hippocratem in allegatis aphorismis, & alibi etiâ, ἀπὸν; eos dicere, qui solum & motu voluntario priuantur, καὶ ἐξοχλῶν, quod vox voluntarium actionum sit præcipua, atque ἀπὸν tum idem esse quod apoplexiam. Et *4. de rat. viſt. in acut. text. 23.* scribit, vno ἀπὸν nomine Hippocratem & epilepsiam, & apoplexiam, & syncopen cardiacam intelligere.

Verum enimvero obseruari aliquoties in praxi affectum quendam, qui merito ad ἀπὸν refertur; an tamen sit apoplexia, merito dubitatur: cum porius inter epilepsiam & apoplexiam quasi medius esse videatur. Etsi enim veluti apoplectici concidunt ægri: tamen motu planè non priuantur, neque conuellantur, neque etiam vox iis initio planè perit, sed interdum quædam, pauca tamen, proferunt. Descriptum tamen hunc affectum apud nullum Authorem inuenire potui, nisi nuper apud Adrianum Spigelium, *lib. 2. de Semnari. cap. 16.* vbi eum his verbis describit: *Est, inquit, morbus in Germania & Pannonia frequens, quem Austriaci; Moravi & Styri Timorem appellant, inter apoplexiam & epilepsiam quodammodo ambigens. Cadunt enim veluti apoplectici sine sensu, non tamen motu priuantur, neque conuellantur, vt epileptici. Aliquando stertunt, nec tamen discusso morbo paralysin alicuius membri incurrunt.* Hæc Spigelius.

Talis Aponia est, quam ebrii quandoque patiuntur. Talis fuit ille affectus, quem hic Vir quidam doctus debilitate ventriculi laborans, passus est. Ille cum mensæ affideret, & parum comedisset, subito color faciei mutari cœpit, vocemque amisit, interdum tamen quædam pauca locutus est; (neque enim tales vocem semper planè amittunt, sed pauca quædam loquuntur) motus tamen non fuit ablati, cum & manu medicamenta propinanda à se propelleret, & ab adstantibus ductus, ambularet. Oculos habebat apertos, nemini tamen cognoscebat. Accidit verò, vt cum vltra diu horam ita habuisset, surgeret, & stans, sed ab adstantibus sustentatus, euomeret cruda mæla, ac plura, quàm tum absumpsisset. Post vomitum statim ad se rediit, & adstantes agnouit, se tamen vomuisse non meminit, atque ita horæ spatio ab hoc affectu liberatus est.

Simile malum alium quendam Virum mediâ nocte post crapulam inuasit, qui itidem vomuit, sed vix post horas duodecim à malo isto liberatus est. Idem post quinque septimanas, horâ tertriâ pomeridianâ, eodem malo correptus est, cum solus esset, pronus in faciem concidit; frontemque parte sinistrâ læsit, & pronus in faciem iacens repertus est. In lectum deportatus, mox vomuit aliquoties, neminem agnouit, motu tamen non planè priuabatur. Nam omnia medicamenta, manu sinistrâ tamen solum à se repulit, & stans à ministris sustentatus in matulam minxit, pauca locutus est. Post horas duas planè ἀπὸν factus, stertere etiam cœpit, & aliqua conuulsionis indicia in brachiis apparent, & ante sextam vespertinam mortuus est.

Alius quidam Vir, hepate calidiore præditus, cum crapulæ nimis indulgisset, subito mensæ affidens omnium sensuum perturbationem passus, atque ἀπὸν factus est: sermonem post horam recuperavit, sed sensum illa perturbatio diebus aliquot durauit. Eundem morbum

De Aponia, & an Aponia & Apoplexia sine sensu & motu sit, quid.

Observatio cuiusdam affectus, Aponia cognati, & inter Epilepsiam & Apoplexiam quasi medij.

Aliquis enim exempla.

morbum in pluribus aliis obseruauit, qui omnes post vomitum melius habuerunt, paralyti tamen, quod post apoplexiam fieri solet, non fuerunt correpti: Et memini, quendam ducem militum plusquam vigesies hoc malo, isto, quo dixi, modo correptum fuisse, semper tamen conualuisse: quod non fit in apoplexia.

Cum ergo non planè sensus externi, & motus voluntarius auferantur, sed potiùs interni sensus perturbentur, omnino *apoplexia* talis apoplexia dici non potest, neque etiam *epilepsia*, etsi nonnunquam in alterutrum affectum desinat, & plerunque apoplexiæ, prodromus sit.

*Causa huius  
apoplexiæ.*

Oritur hic affectus plerunque consensu partium inferiorum, à vapore narcotico, spiritus animales in cerebro seu sopiente, seu perturbante; id quod ebriis accidit, *s. aph. 5.* interdum etiam à capitis percussione, & spirituum perturbatione, sine principij neruorum concussione. Quia tamen, ut dictum, si causæ vehementia maior sit, ægri tandem, ut apoplectici, subitò moriuntur, ad apoplexiam tunc hic affectus referri potest, etsi ab apoplexia, quæ fit ab angustia principij neruorum, non parum differat. Nam in hac apoplexia simul statim ferè motus voluntarius auferitur, sensusque externus perit in aphoniam verò sæpe satis diu sensus externi, & motus voluntarius reliquus est; cum spiritus animales in ipso cerebro in primis afficiantur. Et quamuis aliquis in eam sententiam venire possit, *de vitiis* omnem pertinere ad eas affectiones, de quibus Hippocrates, *3. de rat. viñt. in acut. text. 23. & seqq.* agit, ut vult Salius *de affectibus particular. cap. 2. & 3.* & eam prouenire à sanguine: ut non negàrim, tale quid à sanguine aliquando accidere posse; tamen quia ea, quæ in ægris accidunt, diligenter perpenderit, facile animaduertet, id non semper accidere, & sæpe hoc affectu eos corripi, in quibus nulla est sanguinis abundantia, & nulla causa, quæ sanguini ad caput motum conciliare potuerit, præcessit. Et ipsa solutio mali testatur, non semper à sanguine malum hoc prouenire; cum, ut suprà dixi, plerunque post vomitum cesset. Et sit sanè, ut in facie aliquis rubor appareat, is tamen potiùs affectum sequitur, cum natura cerebro laboranti suppetias ferre vult, sanguine & spiritibus ad caput missis.

*Cura.*

Cum autem plerunque post crapulam, & ex repletionem hypochondrij, hoc malum accadat, necessarium est, ventriculum potu crudo, quo repletur, & cuius vaporibus cerebrum atque spiritus offenduntur, liberari, propterea que vomitorium exhibere commodissimum est, & quidem tale, quod statim vomitum prouocet. Ad quod præ ceteris tutissimum est, Vitriolum album, & sal Vitrioli, cum cereuisia calida buryro condita, vel iusculo aliquo pingui sumptum, quod statim vomitum prouocat, cum cætera vomitoria plerunque tardius id præstent.]

### Definitio.

*Definitio.*

Est autem Apoplexia animalium actionum omnium, motus scilicet ac sensuum cum principium facultatum læsione, ablatio, ab influxu spirituum animalium in organa harum actionum denegato, orta. Cum enim omnes actiones animales per spiritus animales expendantur, ubi spiritus in neruos & musculos non influunt, sensus ac motus perfici non possunt. Sola respiratio, imminuta tamen, aliquandiu reseruatur, ob maximam eius necessitatem; quia natura de salute hominis sollicita, quicquid spirituum potest, ad musculos thoracis mittit, & omnibus aliis motibus, quibus homo sine mortis periculo carere potest, ablati, respiratio, quæ homo sine vitæ periculo carere non potest, quandiu possibile, seruat. Præterea quia respiratio actio animalis simpliciter non est, sed præcipuè pulmonis motu perficitur, concurrente tamen motu

*Respiratio  
cur in Apo-  
plexia ser-  
uatur.*

thoracis. Seruatur plerunque & pulsus integer, quia is non ab animali, sed vitali facultate proficitur. In vehementissima tamen Apoplexia fit languidus, parvus & celer.

### Causa.

Cum actiones animales à spirituum animalium opera proximè proficiantur, merito quoque actionum harum læsarum causa in denegato spirituum animalium influxu & motu quaeritur, & rectè proxima causa Apoplexiæ & læsarum actionum animalium omnium statuitur esse denegatus influxus & motus spirituum animalium. Etsi verò antiqui hæc de re conentiant, & ab obstructione ventriculorum cerebri hoc fieri putent; tamen hodie non eadem est omnium Medicorum eadem de re sententia, ut in Institut. dictum, & postea, in *questione prima*, dicitur. Hic verò, ut rem paucis complectamur, statuimus, influxum & motum spirituum animalium prohiberi vel à meatuum, per quos spiritus animales in sensuum & motus organa influunt, seu principij spinalis medullæ angustia, vel à spirituum animalium torpore & narcosi, vel ab eorundem spirituum effusione aut perturbatione.

*Proxima  
Apoplexia  
causa.*

Angustia autem meatuum, per quos spiritus animales ad organa sensus & motus tendunt, cum rursus quatuor modis fieri possit, scilicet ab eorundem meatuum vel obstructione, vel compressione, & quidem cum humores pituitosi & excrementitij, ut & sanguis è vasis suis ad basin cerebri effusus meatus illos comprimunt, aut phlegmonodes *diademes*, aut cranium ictu, vel alia causa externa compressum meatus illos comprimit & angustiores reddit: causæ hæc, quæ ad curationem rectè instituendam omnino discernendæ sunt, sex erunt. 1. Humores pituitosi, seu quicunque alij excrementitij, spirituum animalium influxum prohibentes. 2. Sanguis è vasis suis ad cerebri basin effusus. 3. *φλεγματώδης* cerebri *diάδεσις*. 4. Cerebri à causa externa violenta compressio. 5. Vapor seu spiritus narcoticus, spiritus animales torpidos reddens. 6. Spirituum animalium à vulnere vel capitis percussione perturbatio aut effusio; de quibus ordine dicemus.

*Meatuum  
angustia.*

I. Si pituita, vel etiam simul humor melancholicus subitò commoueat, & spiritibus animalibus ad organa sensus & motus influxum prohibeat, non quidem, ut antiqui credebant, ventriculos cerebri obstruendo, sed basin cerebri, & principium neruorum, atque omnino cerebri oblongati, & in spinalem medullam iam desinentis, partem, è quâ omnes nerui originem suam habent, & per quam spiritus animales in omnes neruos influunt, seu premat, seu obstruat, spiritibus animalibus influxus & transitus denegatur. Vtroque enim modo, & compressione, & obstructione id fieri posse putamus. Nam si excrementa cerebri extra cerebrum subitò fundantur, principium neruorum comprimere possunt. Si verò intus cumulentur, & ad basin cerebri & principium neruorum subitò moneantur; illud obstruunt. Non tamen à veritate alienum videtur, etiam pituitam tenuem & acidam, seu potiùs serum acidum, utpote in loco per se angusto, obstructionem facere posse. Et humoris huiusmodi in apoplecticis abundantis sæpe multa adfunt indicia. Atque est humor hic per se neruis inimicus, & sæpe pertinacem paralytin, in quam apoplexia degenerat, excitat, & apoplexia in paralytin subitò desinens sæpe arguit, materiam non semper adeo fuisse crassam.

*Pituita Apo-  
plexia causa.*

II. Si sanguis è vasis suis seu ictu, seu contusione, seu quocunque validiore impetu ad basin cerebri & dictum locum effundatur, & non statim per os, aures, nares, quod quandoque fieri solèr, effundatur, sed neruorum principio extra affusus, eique incumbens id comprimat & coarctet, Apoplexiam inducit. Huius rei

rei duas historias describit Fernelius, lib. 2. de abdit. rer. causis. cap. 15. Primò enim refert, se vidisse, aliquando virum viribus integrum sinistri oculi ictu vehementiori repente attonitum corruisse, cum omnibus fortis Apoplexiæ indiciis, atque intra 12. horas mortuum fuisse: in cuius mortui aperto capite neque ossis, neque meningum neque substantiæ cerebri quicquam contractum diuulsumque, sed duntaxat internas oculi venas contusionis vi disruptas animadterit, è quibus sanguis cochlearium duorum mensura ad cerebri basin procubuerit. Deinde alium, qui citra causam externam Apoplexiâ extinctus esset, se dissecuisse refert, in quo humor crassus ac viscosus similiter ad contextum retiformem inuentus est, cerebri ventriculis nec oppletis, nec obstructis.

III. Non solum sanguis è venis affusus dicto modo Apoplexiâ generat, sed & phlegmonodes diathesis; quando scilicet cerebri vasa sanguinis copia ita replentur, vt substantiâ cerebri, meatibusque angustioribus redditis, spiritibus transitus denegetur; de quo in Institutionibus. Et pluribus etiam de his agit Petrus Salius Diuersus, de affect. partic. cap. 2. Hoc saltem addo, etsi verum sit, ipsis vasis iugularibus, seu venis, seu arteriis constrictis vel obstructis, nec soporem grauem, nec apoplexiâ fieri; tamen cum non solum Arabes vasa hæc apoplectica & suberica nominarint, sed & ipsi Græci carotidas appellarint, causam certè aliquam fuisse oportet, cur hoc nomen iis imposuerint, quam ego eam existimo fuisse, vel quod per hæc vasa sanguis, qui Apoplexiæ sanguinæ, & soporis grauis causa est, ad cerebrum fertur, vel quod vapores narcotici per ea ad cerebrum adscedunt.

IV. Si ictu vel casu vehementiore caluaria deprimatur, cerebrumque, & inde neruorum principium comprimatur, idem accidere potest. Vbi tamen impossibile non est, & ruptis vasis sanguinis effusionem, & spirituum perturbationem, vt etiam sit in cerebri commotione, concurrere posse.

V. Si vapor seu spiritus narcoticus spiritus animales quasi sopiat, & ad motum ineptos reddat; neque in cerebro rectè mouentur, neque in organa sensus & motus influunt, & omnino ad actiones animales inepti redduntur. Id quod accidere potest & ab opio, ac opiatis medicamentis, & à venenis ac humoribus narcoticâ vim habentibus. Cum enim carus & similes affectiones somnolentæ ex humoribus in corpore genitis, & venenis quandoque producantur: Apoplexiâ etiam hoc modo generari posse, impossibile non est. Frustra verò laborant, qui horum affectuum causam ex sola frigiditate deducere conantur. Atque hinc fit, vt, etsi Apoplexia in paralyin interdum desinat, tamen in eiusmodi hominibus ratiocinatio & memoria vix pristinum vigorem recuperet, sed hebetes ac torpidæ illæ actiones, præcipuè in senio confectis, deinceps relinquuntur. Quod accidit non tam quod frigida & humida intemperies cerebro inducitur, quam quod à vapore narcotico mala & torpida diathesis cerebro & spiritibus imprimitur. Pertinet huc & illa à & vino & spiritu vini narcosis, qua nonnulli omni sensu & motu ablato moriuntur. Et multis nota sunt exempla illorum, qui ebrii se currui domum reuersuri commiserunt, & ab affidentibus pro dormientibus habiti domum reuersi mortui inuenti sunt. Et meminiante paucos annos hæc infantem quendam, cum in conclauis à parentibus domo egressis, ne extra domum vagaretur, conclusus esset, inuento vitro spiritu vini pleno, cum magnam partem eius exhausisset, à parentibus domum reuersis humi prostratum vitrum in brachiis tenentem semimortuum inuentum esse, & paulò post expirasse.

VI. Tandem si cerebrum vulneretur insigniter, vt spiritus animales effundantur, vel etiam ictu aut casu

ita concutiat, vt spiritus animales omnes perturbentur; id quod fit in commotione cerebri, de qua supra, parte 1. cap. 20. dictum, aut cerebrum subleuetur & comprimatur, vel sanguis è vasis suis excidat; actiones illas, quæ spirituum animalium operâ perficiuntur, aboleri, & Apoplexiâ induci necesse est: de quo Hippocrates, 7. Aphor. 58. Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehementer concussum, minus protinus fieri necesse est.

### Differentia.

Primò Apoplexiâ secundum gradus quosdam distinguitur. Galenus, 3. de loc. aff. cap. 7. & cap. 10. 2. Aphor. 42. & alibi Apoplexiâ magnitudinem æstimat ex respirationis noxa maiore vel minore. Fortissima enim Apoplexia est, in qua protinus cum sensu & motu in toto corpore cessat quoque respiratio; vnde nec stertor nec spuma in hac apparet. Tales ante triduum siue ante horas 72. elapsas sepultura dandi non sunt, cum respiratio sensum nostrum latere possit, & dubium sit, vtum Apoplexiâ extincti sint, an vero ecstasi melancholica, vel præfocatione vteri laborent. Ita de Iohanne Scoto, celebri illo Scholastico, narrant, quod bis sit mortuus, & semel sepultus. Cum enim incidisset in ecstasin melancholicè, & exanimi similis iaceret, fratres illum pro mortuo sepeliuerunt in sepulchro concamerato. Tertiâ nocte ad se rediisse dicitur, cūque exclamasset in sepulchro capite ad fornix illi, idque pro spectri tumultu aliquandiu habitū esset, postea aperto sepulchro mortuus tandem inuentus est. In his enim affectibus calor cordis tam insigni ventilatione per pulmones non indiget; sed sufficienter diaphragmæ corporis per motū arteriarum facta aliquantisper temperatur & sustinetur; de quo Galenus, 6. de loc. aff. c. 5. Et proinde diligens exploratio motus etiam obscuri arteriarum certius exhibet signum de reliqua in corpore aliqua vita, quam quæ aliàs capi solent ab admotis ori vel naribus lanâ au gossypio carptis, aut pennâ molli, aut candelâ accensâ, si moueantur, aut à tersissimo speculo ori admoto, si ad halitum maculas contrahat, aut à cyatho aquæ pleno pectori imposito, si agitatio aliqua percipiatur. Præterea hæc intra triduum expectatione color faciei in cadauerosum mutatus, & stertor toto corpore exurgens mortuum ostendit.

Proxima fortissimæ, atque ita fortis ac vehemens Apoplexia est, in qua æger difficulter, & cum magna violentia respirat, stertorque auditur, & spuma circa os apparet. Tertia vehemens & ipsa est, sed minus, vbi respiratio quidem violenta est, inæqualis tamen, inordinata, & intermittens. Postremò debilis est Apoplexia, vbi respiratio aliquem ordinem seruat, quæ in paralyin ferè alterius lateris desinit, materiâ in spinalem medullam protrusâ.

Altera Apoplexiæ differentia est, quam causarum consideratio suppeditat; quæque sensibus facile colligitur: nimirum quod Apoplexia alia est ab humore pituitoso; alia à sanguine è vasis violenter ruptis effusio; alia à phlegmonode diathesi; alia à cerebri à causa externa compressione; alia à spirituum animalium perturbatione & effusione ob cerebrum vulneratum & læsum.

### Signa diagnostica in genere.

Si homo subito concidat, omnisque sensus ac motus, ac simul vox repente auferatur, solâ respiratione, sed ea difficili, remanente, nisi quod æger quasi dormiens, aut quasi mortuus (nisi adhuc aliqua respiratio, color faciei, & pulsus animaduertatur) iaceat, membrumque nullum moueat, sed omnia membra laxa sint, & si brachium vel pes eleuetur, pondere suo, vt in cadauere concidat, æger nec audiat, nec videat, nec, si tangatur

Spiritus  
animalium  
torpor &  
narcosis.

Spiritus  
animalium  
effusio aut  
perturbatio.

Differentia.

Signa diagnostica.



gatur vel pungatur, sentiat, nec loquatur, ore hiant, & cum stertore, respiret, oculoque clausos, vel palpebras suspensas aut contractas habeat, pulsus tamen, nisi fortissima sit Apoplexia, plenus sit & validus: is Apoplexia laborare dicitur. Resolvitur interdum in Apoplecticis & ani sphincter, sicut id ante paucos annos in Ciue quodam huius Academiæ observavi, cui cum Apoplexia corripere, anus sphinctere resolutio hiabat, ut clysterem injectum retinere non posset.

Apoplexia à cognatis affectibus differt.

Atque his signis Apoplexiam ab omnibus cognatis affectibus discernere non est difficile.

Primo quidem à lethargo differt Apoplexia, quod lethargo laborantes somnolenti sunt, & excitari possunt: Apoplectici vero excitari non possunt, sed quasi mortui iacent, nisi quod stertunt. Præterea febris cum lethargo coniuncta est, quæ in principio Apoplexiæ non adest: progressu tamen morbi calor quidam interdum in Apoplexia percipitur.

A caro differt, quod hic non subito, ut Apoplexia, sed sensim inuadit, & libera ac facilis, sine stertore, est respiratio, aut, si stertor adest, adest cum somno, & quidem profundo, sensusque & motus in caro non est plane ablati, ac, si pungatur æger, sentit, & quamvis non loquatur, ad punctiorem tamen movetur, & membrum contrahit.

Ab vteri vero suffocatione differt, quod in Apoplexia æger faciei colorem retinet; in vteri suffocatione autem color faciei mutatur, ac cadaueri similis est. In vteri quoque suffocatione vis sentiendi nonnunquam manet, neque respiratio impeditur, aut, si causa sit vehemens, ut etiam respiratio lædatur, tunc pulsus simul obscuratur, qui in Apoplexia plenus est ac validus: cum cor in Apoplexia ita affectum non sit, ut instanti suffocationis periculo valde repugnet.

A syncope discernitur, quod in ea quoque color faciei à naturali in pallidum, & cadaueri similem mutatur: deinde quod in syncope subito, spiritibus & sanguine ad cor raptis, muscoli per consensum afficiuntur, unde ægri dentes atque os, item manus arcte claudunt, ut vix aperiri possint; cum in Apoplexia membra omnia laxa sint. Neque veluti in Apoplexia, in syncope sensus profusus est ablati. Pulsus vero nullus est, ut & manifesta respiratio nulla, aut, si quæ est, maiorem æqualitatem servat, quam in Apoplexia.

Ab *ἐκστάσι* vero melancholicâ differt, quod in hac pulsus & respiratio obscuratur, & signa malum melancholicum indicantia præcesserunt.

Ab epilepsiâ differt, quod in hac corpus conuellitur, & motu inordinato concutitur, qui in Apoplexia nullus est.

A catarrho suffocatio differt, quod in hoc subito humor à capite ad pectus & pulmones decumbens respirationem & sermonem sæpius interrumpit, hominemque sensu & motu integro suffocat, aut certe suffocationis periculum minatur.

### Signa Causarum.

1. Apoplexiam ab humore pituitoso fieri, cognoscitur ex corporis constitutione, ætate, præcedente victus & vitæ generis, & aeris ratione. Si scilicet temperatura corporis fuerit frigida & humida, corpus pallidum & molle, ætas senilis, ægerque antea in aëre frigido, humido, nebuloso versatus sit, in otio vitam duxerit, & somno multo indulserit, cibisque frigidis & humidis usus fuerit, ac consuevit per nares & fauces pituitæ vacuatio suppressa sit. Quæ de pituitâ coniectura confirmatur, si æger, antequam in morbum incidit, capitis grauitatem, pigritiam in motu atque omnibus operationibus senserit, si palpebras tumidas habuerit, cum stertore dormierit, in aqua se suffocari aut glacie aut nix se operiri somniauerit, de quo etiam supra p. 1. dictum.

2. Si sanguis è vasis ad basin cerebri affusus Apoplexiæ causa sit, aliqua externa violentia, quæ vasa vicina vulnerauit, vel rupit, præcessit, quod adstantes indicabunt.

3. Si à phlegmonode diathesi cum sanguinis copia ortum habeat Apoplexia, signa eius sunt, si æger ante morbum toto corpore, & imprimis facie, rubeat, calidæ & humidæ constitutionis sit, lautè vixerit, cibisque boni & multi nutrimenti usus fuerit, vinum generosum biberit, in aëre calido & humido versatus sit, in otio vixerit, aut minus se exercuerit, somno nimio indulserit, absque sollicitudine vixerit, consuevit aliqua sanguinis euacuatio suppressa sit, tensionem & grauitatem in corpore senserit, urinam crassam & rubram emisit. Quæ signa confirmantur, si venæ colli turgant, in somno rubra spectra appareant, ut supra, *part. 1. de Intemperie capitis cum plethora*, dictum.

4. Si narcoticum quid extra sumptum Apoplexiam induxerit, ex aliorum relatione id Medicus cognoscet. Sicut nec ille affectus later Medicum, si quis vino vel spiritu eius sese ingurgitauerit. Si autem intrus in corpore genitus sit ille vapor, id ex eo colligitur, quod reliquarum causarum indicia absunt, & nulla pituitæ vel sanguinis abundantia in corpore animaduertitur, & nihilominus cum signis Apoplexiæ æger quasi ætonitus subito concidit.

5. Si à vulnere, vel ictu, aut casu cerebrum læsum sit, nec illud Medicum latere potest.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Quicumque sani repente doloribus capitis tentantur, & statim obmutescunt ac stertunt, in septem diebus pereunt; nisi febris eosprehendat, *6. aphor. § 1. & 5. aphor. § 5.* Febris autem intelligitur non quælibet, sed acuta, quæ materiam illam pituitosam, ac spiritum flatulentum tum attenuet, tum dissoluat. Si tamen Apoplexia ortum habeat ab affectione cerebri phlegmonode, febris, quæ adest, morbum non leuat, propterea quod phrenetica quædam symptomata acceruntur, quæ omnes facultates corporis vehementius prosternunt.

2. Apoplexiam fortem soluere impossibile est, debilem non facile, *2. aph. 42.* Ideoque Medicus mox inter initia curationis sese prognostico muniat, & in adhibendis necessariis remediis non cunctetur: in generosis tamen ac vehementibus remediis administrandis cautus & non temerarius sit. Accipiendus autem hic aphorismus de Apoplexia quam materia pituitosa & crassa efficit, quæ facile discuti nequit, aut quam materia narcotica fortis excitat, & ubi virtus omnis, ac imprimis expultrix, obruta & consopita est, suffocationisque periculum imminet. Quæ autem à compressione sit, & externa violentia, facilius curationem admittit, materiâ è venis per venæsectionem tempestiue exhaustâ.

3. Apoplexiæ vero vehementia ex noxæ, quam respirationi affert, vehementia dignoscitur, teste Galeno, *3. de loc. affect. cap. 7.* Maxime enim vitæ necessaria est respiratio, tandemque ægri spiritus præcluso suffocantur. Quatuor vero gradus seu differentias huius morbi ex respiratione magis minusve læsa idem Galenus, *2. aphor. 42.* constituit, ut antea etiam dictum. Si enim respiratio ordinem aliquem servat, debilis est Apoplexia, quæ in paralyfin alterius lateris ferè definit. Si vero respiratio est quidem contenta ac violenta, inæqualis tamen, inordinata ac intermittens; vehemens iam est Apoplexia. Vbi respiratio cum magna violentia est, stertorque auditur, & spuma circa os apparet, fortis iam ac vehementior est Apoplexia. Vnde Hippocrates, *2. aphor. 43. Strangulati & suffocati, nondum tamen mortui, ad se non redeunt, quorum circa os collecta spuma apparet.* Sciendum tamen hæc, cum spuma illa fiat

ex materia humida, & spiritu siue flatu, à motu vel calore, vel utroque; materiam illam humidam duplicem esse posse in Apoplecticis, humorem scilicet pituitosum, vel propriam pulmonis humiditatem. Si materia spumæ sit propria pulmonum humiditas, quæ ob vehementissimam cordis compressionem, angustiam & calorem excitatur, spuma ea paucior est, & hinc illa Apoplexia lethalis. Si verò spuma fiat ex humore pituitoso, qui ex difficili respiratione flatu repletur, spuma est copiosior, & tales apoplectici interdum seruantur. Refertque Galenus, in comm. alleg. aphor. nonnullos, quibus strangulatis spuma circa os apparuit, sibi esse restitutos, quamuis id raro accideret. Eadem stertoris ratio est; qui quod vehementior, eò malum periculosius est. Si tamen stertor antea magnus fuit, & is iam minuatur, symptomatibus reliquis non remittentibus; mortis iam instantis indicium est. Vbi verò mox cum sensu & motu ipsa quoque respiratio ad sensum aboletur, atque inde nec stertor nec spuma apparet, cum spiritus vel aëris inspirati reciprocatio nulla sit; fortissima Apoplexia est.

4. Et quidem ita interdum in Apoplexia ad sensum aboletur respiratio, vt, an æger viuatur, an mortuus sit, ambigatur, & signis quibusdam ad id explorandum opus sit, de quibus antea dictum. Ac tutissimum tunc est, tales ante tertium diem finitum non sepelire; cum respiratio sensum latere possit; de quo etiam supra, de differentiis, dictum.

5. Apoplecticis si à difficili respiratione sudor superueniat, lethale est. Ea enim ex ipsa seu sudatiuncula ab oppressione caloris innati accidit.

6. Si Apoplexia iuuenem, atque ætate inuaserit, maximam causæ vehementiam ostendit: ideoque talis Apoplexia admodum periculosa est. 2. aphor. 34.

7. Si subitaneis Apoplexiis febris mediocris ac diuturnior superueniat, periculosum; 1. proorrh. comment. 2. aphor. 50.

8. Apoplexia, si soluitur, plerumque in paralyin definit, materiâ naturæ robore in alterutrum latus depulsâ. Neque tamen semper, etsi in paralyin definit Apoplexia, æger seruetur: quia sæpe aut morbus ipse redit, aut sopor grauis prehendit, à quo æger non euadit, ob summam cerebri debilitatem, præsertim si sit senex. Nonnunquam apoplexia finitur fluxu phlegmatico oris, qualis lue Venerea laborantibus post inunctiones Mercuriales accidit.

#### Curatio in genere.

Curatio in genere.

Medicus ad ægrum vocatus, si eum Apoplexiâ correptum videat, eamque fortissimam esse animaduertat, non temerè aut facile eius curationem suscipiat. Ne tamen planè eum deseruisse, aut neglexisse videatur, frictiones, clysteres, & alia, quæ spiritus animales excitare possunt, adhibeat; generosiora verò medicamenta non prostituat. Si verò aliqua vitæ spes supersit, ad curationem, cum prognostico tamen, accedat, & quidem maturè; quod faciendum est faciat, idque, seu de die, seu de nocte exequatur; cum morbus exiguo tempore incrementum capiat.

Cum itaque in Apoplexia actiones animales ablatæ sint, & facultates quasi sopitæ, danda opera est, vt facultas animalis excitetur. Et cum actiones animales cessent ob spirituum animalium denegatum influxum, curandum, vt iis in principium neruorum transitus patefiat, & ne plus humorum vel vaporum, qui malum augere possent, ad caput feratur, cauendum. Reliqua curandi ratio, quæ causam auferat, pro diuersitate causarum instituenda.

Primum itaque æger in loco temperato collocetur, nec omnino supinus & extensus decumbat, sed aliqua ex parte sedens, erectaque ceruice, vt facilius aërem attrahat, tegumenta sint leuia, & cuneo interpo-

sito os apertum seruetur, nares prehendantur, pili, præsertim in cruribus, vellicentur, digiti complicantur, totum corpus concutiat, vt spiritibus via aperiat, moderatè tamen, ne agitatione vehementiore fusa in corpore pleno materia morbum augeat & foueat.

Partes extremæ, ac potissimum volæ pedum, fricentur sale & aceto, extrema fortiter ligentur: rura, cuius loco balsamum ruta, vel Apoplecticum, vt & succini, saluæ, castoreum vsupare licet, naribus admo-ueatur, vt & vertici & nuchæ.

Cucurbitulæ cruribus affigantur. Imò in Apoplexia summum & vnicum remedium habentur cucurbitulæ capiti impositæ: quod remedij genus D. Fracastorius Apoplexiâ correptus nutibus suis indicasse fertur; sed non intellectus periit. Ano glandes indantur, clysteres iniiciantur. Et quidem clysteres tam ante, quam post venæ sectionem, si ea opus sit, adhibere licet; qui etsi ex primis viis solùm, ac intestinis euacuare videantur: tamen consecutionis ratione à toto corpore trahunt, & vapores exhalantes à capite auertunt. Itaque eadem die duos vel tres clysteres iniicere licet, seu diu seu noctu id fiat, prout res postulat. Sint autem glandes aut clysteres paulò acriores.

Exempl. gratia.

℞. Spec. hier. Logad. vel hier. colocynth. Drach. ij. sem. carui, ruta, an. Scr. ij. castor. sal. gemm. an. Scrup. j. Cum s. q. mellis cocti F. Suppositorium.

Clyster fiat talis:

℞. Parietar. betonic. beta, salua, ruta, origan. primul. veris, an. M. j. sem. carui, foenicul. an. Dra. ij. Coq. in aqua fontana,

Colat. ℞. ℥. j. In ea dissolue el. diaphœnic. 3. vj. Indi maior. bened. laxat. an. 3. ij. ol. chamamel. rutac. an. 3. j. ℥. mellis rosat. colat. 3. j. salis comm. 3. j. ℥.

F. Clyster.

Vel ℞. Herb. chamapyt. paralyf. salua, hyssop. calamint. ruta, parietar. beton. centaur. minor. an. M. sem. sem. seseleos, urtic. ruta, foenicul. anisi, an. Drach. ij. flor. rorismar. P. j. stœchad. Arabic. P. ij.

Coq. in aq. communi.

Colat. ℞. Vnc. x. In quibus dissolue elect. bened. laxat. Vnc. 3. diaphœnic. Drach. vj. ol. de castor. ruta, an. 3. j. M. pro Enemate.

Sunt etiam qui croci metallorum aliquid clysteribus hic addunt, vel 3j. eius in spiritu vini ebullire sinunt, & postea cum reliquo decocto miscent. Verum an satis tuto, dubito. Compertum enim est, etiam à gr. iij. vitri antimonij glandi inditi, non solùm aluum copiosè motum, sed & duos vomitus excitatos fuisse. Idem ergo ne & hic accidat, metuendum. Quod si accideret, sanè incommodum foret, timendumque, ne ex conatu vomendi suffocatio acceleraretur.

Alius fortior:

℞. Rad. angelic. ireos, an. Drach. iij. fol. ruta, calaminta, pulegi, hyssop. centaurij minor. lauri, an. M. j. flor. stœchad. Arabic. lauendul. an. M. 3. fol. sena, semin. cartham. an. Vnc. 3. baccar. iuniperi Drach. iij. agar. albi Drach. ij. pulp. colocynt. in petia ligata, vel huius loco in melancholico humore, hellebor, nigri Drach. j.

Coq. in s. q. hydromel.

Colat. ℞. ℥. j. elect. hier. simpl. Drach. vj. hier. Logad. benedict. laxat. an. Drach. ij. pilul. coch. Scrup. j. ol. rutacei Vnc. ij. mell. rosat. colat. vel antihof. Vnc. j. sal. gemm. Scr. iij. F. Clyster.

Si clyster debito tempore non reddatur, glande aluus prouocetur. Sæpe tamen accidit, vt antea etiam dictum, vt sphincter ani resoluatur, vnde anus planè pateat, ac clysteres sine fructu iniiciantur, cum retineri non possint; qui casus plerumque desperatus est.

In primis verò sollicitus sit Medicus, an venam aperire liceat, & necessarium sit. De hac enim verum quod

quod Celsus, lib. 3. c. 28. scribit: Si omnia membra vehementer resoluta sint, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat. Aliud curationis genus vix unquam sanitatem restituit, saepe mortem tantum differt, vitam interim infestat. Post sanguinis missionem si non redit & motus & mens, nihil spei superest; si redit, sanitas quoque conspicitur.

Ergo considerandum, an sanguis causæ principalis, vel adiuuantis, vel sine qua non, rationem habeat, viresque venæ sectionem ferant, tumque sanguis mittendus. Vires autem non actionum animalium ablatione æstimandæ sunt, sed, quales ante Apoplexiæ inuasionem fuerant, considerandum. Si enim tum satis fortes fuerunt, etiam nunc permittunt venæ sectionem; nisi planè fortis sit Apoplexia. Nec vires sunt in Apoplexia debiles per resolutionem, (quæ debilitas venæ sectionem prohibet) sed per suffocationem & oppressionem. Ac proinde non solum non prohibent, sed & coindicant venæ sectionem. Si verò nullo modo sanguis peccet, aut vires sint dejectæ, aut æger admodum senex, venæ sectio intermittenda.

Quando venæ sectio instituenda. Statim vero, & sine omni mora siue noctu, siue die Apoplexiâ quis corripiatur, venæ sectio instituat, & quidem ante clysterem, præsertim si sit fortior Apoplexia. Si non adeo fortis, clyster præmitti potest. Frictur tamen prius corpus, & aperiatur vena in brachio. Quamquam enim nonnulli à saphenâ incipiunt, tamen ejus sectio parum prodest in tam præcipiti morbo; cum vena sit exigua, & tam longè à capite ac sanguis officina distet, nec satis citò, nec satis copiosè sanguinem à capite reuelleret possit. Licet quoque sanguinis euacuatio aliqua suppressa Apoplexiam antecesserit: tamen in paroxysmo Apoplexiæ non agitur de sanguinis euacuatione suppressa reuocanda, sed laboratur, ut emittatur sanguis, qui ita vrget, ut nisi subito euacuetur, mortem minetur.

Quam venæ aperienda. Aperiatur verò cephalica vel communis, & plus vel minus sanguinis emittatur, pro copiæ ratione, & virium tolerantia.

Est & hoc hinc notandum, vtilius ac tutius esse, non vnâ vice, mittere, quantum opus est, sanguinis, sed per vices, intra tamen paucarum horarum spatium. Nam per iteratam illam sanguinis missionem & materia facilius mouetur, & vires non deiciuntur. Atque inspicitur post primam venæ sectionem ægri facies, & pulsus exploretur, & si color faciei viuidior reddatur, & respiratio facilior, ac pulsus se bene habeat, bene sperandum, & confidentius sanguinis missio repeti potest.

Cucurbitula cum scarificatione quibus partibus applicanda. Si venæ sectione vti non liceat, reuulsio fiat per cucurbitulas cum scarificatione applicatas cruribus, brachiis, lumbis, scapulis; non verò posteriori thoracis parti, aut hypochondriis, ne contractis thoracis & abdominis musculis respiratio magis impediatur. Quamquam Aëtius post purgationem corporis etiam hypochondriis eas adhibere non dubitet: sicut & capiti nonnulli vnam magnam cum multa flamma adhibent.

Venarum in gularum sectio. Ad euacuationem materiæ proximæ à capite expedit, si fieri potest, venas narium aperire, aut mediam frontis. Nonnulli venæ jugularis sectionem commendant, secundum longitudinem factam, ut facilius coalescat; estque illa in Apoplecticis satis conspicua, ut collum stringere vel ligare opus non sit. Periculum tamen & prudentem chirurgum hæc sectio requirit; & ne post venæ sectionem arctiore ligaturâ opus sit, emplastrum de bolo Armeno, aloë, pilis leporinis, & albumine oui vulnere imponatur.

Aquarum apoplecticarum usus. Commodè quoque in paroxysmo Apoplectico aliquid aquæ Apoplecticæ ægro infunditur, siue sit à vapore narcotico, siue à pituita, Apoplexia. Aquæ enim hæc ob summam penetrandi vim præsentissimum saepe afferunt auxilium, & multos ab imminente Apoplexia, vel etiam jam præsenie, liberarunt: modò san-

guis non valde abundet, qui aquarum istarum vsu fundi posset; aut à causâ externa, aut violenta quadam malum ortum habeat, ut postea, quæst. 5. dicitur.

Vel de hac Potiuncula:

℞. Aq. langy, cardamom. an. Vnc. sem. cubebar. Vnc. j. apoplectic. Vnc. i. β. essentia anthos, salu. an. Drach. i. flor. pæon. gran. Kerm. an. Drach. sem. extract. pæon. Sru. sem. succini alb. preparat. Scrup. i. Milce.

Si à causâ interna ortum habeat Apoplexia, sternutationem quoque citè vtile est; de quo mox dicetur in curatione Apoplexiæ pituitosæ.

### Curatio Apoplexiæ pituitosæ.

Reliqua curatio secundum causarum diuersitatem, quæ supra fuit proposita, instituenda. Primò ergo Apoplexiam, quæ à pituita ortum habet, quod attinet, præter ea, quæ antea in genere sunt proposita, & ad excitandum spiritum animalem necessaria sunt, in specie quædam adhuc monenda sunt.

Inprimis & hic Medicus attendat, an venam aperire liceat. Quod faciendum, si sanguis pituitæ permisceatur, ac causæ adiuuantis, vel sine qua non, rationem habeat, viresque ferant. Minus tamen in hac specie Apoplexiæ, quàm in sanguinea, sanguinis euacuandum. Vulnus in venæ sectione fiat amplius. Alias enim sanguis, qui crassior est, statim subsistit.

Si venæ sectione vti non liceat, cucurbitulis cum scarificatione vtendum, ut antea in genere dictum.

Nec post venæ sectionem à reliquis reuulsionum generibus supra propositis desistendum.

Inprimis clysteres repetendi ex radic. angelic. fenicul. pæon. cortic. sambuci, fol. ruta, salvia, hyssop. origan. betonic. rorismar. maioran. calaminth. pulegy. florib. stachad. Arab. lauridula, granis juniperi, ebuli. sem. pæon. fenicul. anisi, agarico, fena, colocynthide, sem. carthami, el. hiera simpl. diacolocynth. Logadij, Pacchy, diaphenic. benedict. laxat. pilul. coch. melle anthosat. ol. rutac. laurin. chamamel.

Et omnino laborandum, ut materia ad diuersas corporis partes distrahatur, cerebrumque ab angustia & oppressione liberetur.

Post purgatio instituat cum pilul. foetid. cochiis, aureis, Arabicis, Indis, quæ acuantur trochisc. alhandal, diagryd. vel extr. scammon. addito gr. vno atque altero castorei. Aut loco pilularum extracta illarum, vel alia conuenientia extracta vsurpentur. Et, ut facilius deglutiantur, pilulæ dissoluantur conueniente liquore. Neque ingratus sapor illarum metuendus; cum sensus gustus in ægris his etiam torpeat. Vel extracta purgantia in liquore dissoluta exhibeantur.

℞. Pilul. coch. Scrup. ii. de agarico Srup. i. trochisc. albandal. gr. iii. diagryd. gr. ii. castor. gr. iii.

F. Massa cum melle anthosato, quæ dissoluatur in aq. saluiz Vnc. iii.

Vel ℞. Extracti catholici Scrup. ii. in aqua saluia Vnc. iii. exhibeantur, additis extract. liquid. castorei gutt. iii.

Vel fiat talis Potio:

℞. Fol. fena Drach. iii. follicul. fena Drach. ii. agar. albi Drach. i. β. turbit. elect. Drach. β. zingiber. galang. an. β. ii. Coqu. in aq. saluiz & rorismar. Colat. Vnc. ii. β. add. diaphenic. Drach. i. β. castor. Scrup. β. oxymel. simpl. Vnc. β. F. Potio.

Vomitoria verò fugienda, ne suffocationis periculum augeatur, & caput repleatur.

Ideoque etsi purgatiâ vehemèntiora cōueniunt, ut exigua quantitate exhiberi possint: antimonium tamè hic non cōuenit; cum vomitum simul moueat.

Auicennas post euacuationem etiam ferrum candens adhouet coronali futuræ & occipiti; quod ratione doloris & caloris sensum ablatum reuocat, & in hæc pituitosa saltem Apoplexia locum habet.

Rhases sartagine candente blandius vtitur; quam ita capiti admouet, ut capilli saltem adurantur, non cutis. Possunt & vesicatoria brachiis, pedibus, & syncipiti admoueri.

Particulares  
capitis euacuaciones.

Corpore vniuerso purgato particulares euacuaciones instituendæ sunt, tam quæ sensibilibus per os & nares fiunt, quam quæ insensibilibus per poros cutis in capite, de quo, *pari. 1. cap. 10.* dictum.

Lingua &  
palati inun-  
diones.  
Sinapi usus.

Lingua ergo & palatum inungantur Mithridatio vel theriaca veteri, vel Aurea Alexandrina, vel diacoro, vel confect. anacardina. Sinapi etiam semen pituitam potenter prouocat. Coquitur autem in vino forti, & eo palatum fricatur, vel in puluerem redactum, & melle exceptum palato inungitur. Pyrethri radices in oxymelite costæ idem præstant. Omnibus verò hisce vtiliter admiscetur castoreum.

Er rhina.

Parantur & er rhina cum vel sine sternutatione, quibus materia è capite elicitur; quæ fiunt ex majoran. semine nigellæ, pipere, castoreo, & similibus.

Vt *℞. Pulv. majoran. piperis, nucis mosch. sem. nigell. an. Scrup. i. castor. gr. vi.*

Cum oleo irino M. in formam Linimenti.

Vel cum cera & terebinth. fiant Nasalia figura pyramidalis, quæ alligata filo naribus induntur.

Sternutatio magis mouetur, si formâ pulueris indantur, vel naribus inflentur. Fortiora sunt pyrethrum, helleborus albus.

Vtendum denique iis, quæ caput per insensibiles meatus euacuant; cuiusmodi sunt olea calida spinali medullæ, ejusque potissimum initio, & capiti, abrasis prius pilis, applicata & inuncta: qualia sunt; *Oleum rutæ, irinum, laurinum, castor de lateribus, de piperibus, ol. destill. spica. rorismar. juniperi, cera, terebinth.* quibus spir. vini, vel aquæ Apoplecticæ addi possunt. Item Bdellium aquâ vitæ dissolutum.

Contri-  
buto-  
ratio.

His ita peractis ad cerebrum roborandum, & reliquam materiam discutiendam medicamenta exhiberi possunt. Inter quæ facillè primas obtinent, aqua destillata & spiritus, ut aqua lauendula, cinamomi, saluæ, rorismarini, rutæ, lily conuallium, flor. lilia; & composita Apoplectica dicta, quarum passim multæ descriptiones existant apud Langium, Vid. Vidium, Euonymum, VVekerum, Quercetanus, & alios.

Vnam atque alteram saltem hîc afferre liber.

Aqua Apoplectica meæ descriptionis, quæ in nostro pharmacopolio parata habetur, hæc est:

*℞. Flor. primul. veris Vnc. vi. Affunde Spirit. vin. lb. i. Stent in infusione. Suo tempore adde flor. lily conuall. lb. iij. rorismar. lb. i. vini Rhenan. canth. iv. Iterum destillentur.*

Stent in digestionem diebus 4. postea destillantur.

Hinc suo tempore

*℞. flor. lilia Vnc. vi. lauendul. lb. i. B. fol. & flor. betonic. saluæ, rutæ, an. M. j. flor. stæchad. Arabic. M. ii. sem. rad. pæon. visci querni, an. Vnc. vi. sem. pæon. cruce, an. Vnc. iij.*

Affunde destillatum liquorem.

Stent in infusione dieb. viii. postea destillantur.

Similiter.

*℞. Cubebar. ℥. ii. nucis moschata. granor. Paradisi, cardamom. an. Vnc. i. sem. calam. arom. cinam. an. Vnc. i. caryophyll. Vnc. sem. spec. diamb. cum. moscho & ambræ, diamosch. an. Drach. ii.*

Affunde vini Maluatici q. l.

Stent in infusione dieb. 8. Hinc destillantur. Tandem destillarum verumque conjungatur, aromatibus iterum affundatur, atque iterum destillantur. In vltima hac destillatione liquor diuidi, & tertiæ parti in destillando castorei Vnc. i. addi potest. Solent quidem nonnulli istis aquis totis in destillando admiscere ca-

storeum: verum cum eæ & præseruationis loco parentur, castoreum verò ingratum illis saporem conciliet, præstat eas sine castoreo parare, & parti saltem alicui castoreum addere.

Aqua Apoplectica D. Sigismundi Kolreuteri:

*℞. Nuc. mosch. caryoph. macis, zingib. zedoaria, galang. maj. & min. piperis albi, nigri, longi, cinamomi, calami arom. cyperi rot. doronic. gran. parad. cardamomi, cubeb. castorei, sem. carui, fenic. anisi, cori. citri, limon. aurantior. an. Drach. iij. thuris, myrrh. mastich. aloës hepatis. an. Drach. ii. spic. Ind. Celric. vulgar. rad. gentian. eryng. ireos, pæon. pyreth. ligni visci q. corylini, an. Vnc. sem. fol. chamædr. nepeta, chamæpyt. melissophyll. saluæ, rorismar. majoran. an. M. sem. euphras. M. ii. puleg. menth. hyssop. artemisia, organ. serpill. chelidon. an. M. sem. beton. M. i. aneth. M. sem. dactylor. amygd. d. an. Vnc. sem. baccar. juniperi M. j. flor. sambuc. violar. lauendul. tilia, rosar. rubr. pæon. primula ver. an. p. ii. borrag. bugloss. lil. conuall. an. p. ii. croci Drach. i. sem.*

Concis. & conuass. superinfund. vini albi Rhen. spir. vini opt. & puriss. an. canth. ii. B.

Bene obturato vase ponantur per mensem integrum ad Solem æstiuum, vel prope fornacem tempore hyemali, singulis diebus bis vel ter agitando, ac postmodum fiat Destillatio.

Vel *℞. Flor. lauendul. tilia, pæonia, saluæ, anthos, lily conuall. an. Vnc. i. visci quern. Luna decrescens collecti Vnc. sem. fol. beton. primula veris, hyssopi, an. M. j. cubebar. macis, nucis mosch. an. Vnc. sem. sem. eruce Drach. ii.*

Affunde vini q. l. Destillentur.

Alia:

*℞. Cardamomi min. cubebar. nucis mosch. an. Vnc. sem. ligni de visco q. Vnc. i. fol. ruta, saluæ min. an. Vnc. i. sem. flor. lauendul. Vnc. iij. castorei opt. Vnc. i. sem.*

Incis. & contusis affund. vini Rhenan. opt. vel aq. lil. conuall. cum vino destill. q. l.

Digerantur per d. 14. in vitro probè sigillato, Destillentur deinde f. a. in B.

Alia:

*℞. Fl. lauend. M. ii. anthos, spica, sambuc. ruta, rorismar. puleg. calaminth. menth. crisp. organ. serpill. beton. saluæ, major. fol. lauri, an. Vnc. sem. sem. anisi, fenic. pæon. an. Drach. iij. eruc. rad. enul. ireos Flor. angelic. doron. ostruuij, pyreth. pimpinell. pæon. asari, an. Vnc. sem. cinamom. Vnc. sem. zinzib. cubeb. nuc. mosch. caryophyll. macis, an. Drach. ii. gran. Parad. cardamomi, galang. zedoar. croci, piper. irinum gen. an. Scrup. iij. cal. arom. Vnc. sem. spic. Ind. schænanth. stæchad. Arab. an. Scrup. iij. visci quern. Vnc. i. castor. Vnc. sem. flor. lil. conuall. M. iij.*

Incis. & contus. grosso modo admisc. spec. diamosch. d. Drach. ij. diapræs. ℥. i. diapræon. Vnc. sem. M. F. Nodulus.

Superfund. vini opt. Rhen. lb. ix. sp. vini opt. lb. viii. aq. salu. lb. i. lauend. spica, hyssop. tilia, lil. alb. an. lb. sem. rorismar. majoran. an. Vnc. viii.

Infunde omnia simul in vitro per 14. d. loco calido. Deinde destill. f. a. & prima aq. cuius sint lb. iv. separatim seruetur, & deinde altera seorsim.

Aquarum istarum loco etiam tale Electuarium usurpari potest:

*℞. Conserv. flor. lauendul. Vnc. i. anthos, saluæ, majoran. betonic. an. Vnc. i. calam. arom. condit. Vnc. sem. spec. diamb. diamosch. dul. an. Drach. sem. sem. eruce Drach. i. Cum melle anacardino & syrupo stæchad. simpl.*

F. Electuarium.

Aliud:

*℞. Conf. saluæ, rorismar. majoran. stæchad. lauend. an.*



an. Vnc. sem. cal. arom. cond. conf. anacard. an. Drach. ii. pulu. diamb. diamosch. an. Drach. sem. sem. eruc. ruta, an. Drach. i.

Cum oxymell. scillis. vel melle anacard.

F. Electuarium.

Dosis instar castan. alternis diebus.

Addi quoque possunt castor. gr. aliquot.

Vel propinetur huius Potiunculae cochlear j.

℥. Aq. fl. silia, cubebar. lilior. conuall. an. Vnc. j. spir. cerasor. nigr. Vnc. sem. syrup. de pæon. de cort. citri. an. Drach. ii. succini alb. preparat. Scrup. i. brody nuc. mosch. condit. Drach. ii. aq. apoplect. Drach. i. M.

Confectio anacardina, ut in omnibus cerebri frigidis morbis, sic & hic summopere probatur, per se eam exhibendo, (modò ager ad se redierit, & medicamenta solidiora admittat) vel cum aqua vitæ dissoluendo. Conuenit & sinapis semen contusum, & z. sem. pondere cum oxymelite exhibitur; sicut & castoreum gr. vi.

Vel parentur hi Morfuli:

℥. Spec. arom. ros. Drach. i. diamb. Scrup. ii. diaplir. c. mosch. diamb. an. Scrup. i. pulu. macis, nuc. mosch. caryophyll. cubeb. cardamom. an. Scrup. i. conf. flor. laurandul. anthos, an. Drach. i. sem. extract. pæon. gr. v. galanga gr. iii. solut. corall. rub. ð. i. ol. nuc. mosch. express. gr. iv. caryophyll. succini, an. gutt. ii. sacchar. in aq. rorismar. & lil. conuall. dissol. q. s. f. l. a. Morfuli.

Alij:

℥. Succini alb. prep. Drach. ii. sem. spec. arom. ros. diamb. diambos, diaplir. an. Scrup. ii. sacch. in aq. beton. dissol. Vnc. viii. F. Morfuli.

Valde efficaces etiam sunt Rotulæ ex oleo cubeb. paratæ.

Vel præparentur hæ Rotulæ:

℥. Extract. rad. pæon. Scrup. i. cal. arom. gr. xi. margarit. prep. Scrup. ii. corall. rubr. prepar. Drach. sem. ol. nuc. mosch. expr. Scrup. i. ol. nuc. mosch. destill. gutt. xii. fœnicul. gutt. vii. sacchari in aq. pæon. dissol. Vnc. iii. F. l. a. Rotulæ.

Simul etiam externa cerebrum roborantia usurpanda.

Multum hic commendatur oleum nuc. mosch. destillatum, si naribus & auribus instilletur, palatoque illinatur.

Magni etiam usus sunt Balsama Apoplectica.

Ut ℥. Ol. nucis mosch. express. Vnc. sem. destill. laurandul. majoran. rorismar. ruta, an. Scrup. sem. cinamomi, caryophyll. an. gutt. v. succini Scrup. sem. ambr. zibeth. mosch. an. Scrup. i. Misceantur.

Vel ℥. Ol. nuc. mosch. Drach. iii. zibeth. ambr. mosch. an. Scrup. i. balsam. Orient. ol. succini albi, majoran. laurandul. an. Scrup. i. sem. caryophyll. ð. sem. M.

Aliud:

℥. Ol. nuc. mosch. destill. macis, an. Scrup. ii. laurandul. succini, caryophyll. an. Scrup. i. majoran. spir. ruta, anthos, an. Scrup. sem. nuc. mosch. express. q. s. f. Misce.

Aliud:

℥. Ol. nuc. mosch. expr. Drach. sem. zibeth. gr. vii. ambr. gryf. mosch. opt. an. gr. xi. ol. ruta destill. Scrup. sem. Misce.

Aliud:

℥. Ol. nuc. mosch. expr. Vnc. sem. ambr. gryf. gr. viii. mosch. opt. benzoes, styrac. calam. ladani opt. an. Scrup. sem. ol. destill. laurandul. cinamomi, ruta, rorismar. an. Scrup. i. caryophyll. gutt. vii. succini gutt. iii. M. optime in scutella argentea.

Sequentia etiam simul caput roborare, & materiae reliquias euacuare ac discutere possunt.

℥. Extract. ruta Dra. i. pæon. Scrup. i. ol. nuc. mosch. expr. Drach. sem. destill. gutt. vii. ruta, fœnic: an. Scrup. sem. succini gutt. v.

M. pro Linimento.

Dan. Scdmerti Tom. 11.

Vel ℥. Spec. diagalanga Drach. i. sem. pulu. pyreth. piper. an. Scrup. i. cubebar. Scrup. sem. sinap. gr. v. conf. anacard. Scrup. i. theriac. Drach. i. aq. salvia, laurand. an. Vnc. sem. Cum syr. de siæch. F. Linimentum.

Vel Fiat talis Compositio:

℥. Sem. sinap. piper. rad. pyreth. castor. part. æq. Excipiantur melle & succo ruta. Fiatque illinitio linguæ & oris.

Conuenit & Gargarismus, cuius usus fit manè:

℥. Rorismar. ruta, origani, salvia, vinca peruinc. an. p. i. Zingib. pyreth. an. Drach. i. sem. rad. lappa. majoran. Scrup. iii.

Decoqu. in lb. ii. ad tertiæ part. consumpt. & Colatura add. aceti rosac. acerr. q. s. F. Gargarismus.

Fomenta quoque capiti ex plantis cephalicis applicentur. Ut:

℥. Fol. salvia, majoran. puleg. ruta, an. M. i. flor. chamam. stœchad. arab. melilot. an. M. sem. rad. calami arom. sem. anisi, bacc. juniperi, an. Vnc. sem. nucis mosch. cubebar. an. Drach. ii.

Coqu. in vase clauso in f. q. vini. Colatura pro fomento capitis usurpetur. Si prædictis ad mollitiem coctis & contusis ol. irinum vel rutac. addatur, F. Cataplasma capiti applicandum.

Vel ℥. Ol. rutac. nardin. an. Vnc. i. sem. destill. è baccis juniperi Drach. iii. pulu. castor. Drach. i. euphorb. Drach. sem. cera q. s. Cataplasma & linimenta.

F. Linimentum pro capite & principio spinalis medullæ.

Vel ℥. Ol. mastich. Drach. iii. castor. Drach. i. ruta Drach. i. sem. pulu. laurand. baccar. lauri, an. Drach. sem. caryophyll. Scrup. i. pingued. vulp. Drach. iii. ol. ruta destill. gutt. v. salvia gutt. vii. succini gutt. iii. medull. crur. vituli Drach. ii.

F. Linimentum, quod nuchæ & vertebriis dorsi in ungatur.

Vel ℥. Ol. petra, laurini, an. Drach. ii. nuc. mosch. expr. Drach. i. destill. salvia, fl. laurand. caryophyll. galbani an. Scrup. sem. M.

Potest & capiti post fomentationem talis Sacculus Sacculi. imponi:

℥. Caryoph. nuc. moschata, cubebar. an. Vnc. sem. maioran. ruta, an. Vnc. i.

Concisa & crasso modo contusa insuantur sacculo è rela tenui, quo calefacto caput foueatur, hinc oleis antea nominatis illinatur.

Multum quoque prodest Epithema ex succino puluerisato in sacculum oblongiorem, interpassarum incluso, si sacculus iste in aqua vitæ vel spiritu vini cum pipere longo imbuto madescat, & ol. succini aliquot guttis aspergatur, futuræque coronali imponatur.

Circa oleorum tamen calidorum, præcipuè destillatorum, usum hoc obseruandum, ut non sola usurpentur, sed cum cera & pinguibus misceantur, ut cuti tenaciùs adhæreant. Sola enim adhibita faciliè dissipantur, & in auras euaporant.

Quidam & Phœnigmos capiti raso applicant formâ emplastri, è f. q. ficuum leniter coctarum, & duplo sem. sinapi contusarum, adjecto, si videbitur, pauco castoreo & euphorbio. Valenter quoque ad externa trahit emplastrum oxycroceum cum ol. laurino subactum; quod potentius præstat, si aliquid sinapis, pyrethri, staphidis agriæ addatur. Phænigmi.

Vel applicetur hoc Emplastrum:

℥. Galbani, opopanax, pyrethri, sem. sinap. castorei, piper. an. Drach. ii. sulphuris Drach. i. terebinth. Vnc. s. ol. destillati ruta & salvia, an. Scrup. s.

Puluerisatis puluerisandis misceantur, ac super aluta extendantur, & capiti calidè applicentur.

De Cauterio actuali, & sarragine candente, antea dictum, quam ignitam, aliis non proficientibus, nonnulli supra caput per horæ quadrantem detinent, ut Cauterium usus.

caput non tangat, nec vrat, sed calefaciat solum, & capillos ferè comburat.

Oleis illis calidis & eaz inungendæ sunt partes, quæ magis paralyti tentari videntur, vt ita paralytis excite-  
tur, & materia à capite ad partes ignobiliores transfe-  
ratur. Præstat enim vsum alicuius partis amittere,  
quam hominem mori. Et paralytis dat Medico ad  
agendum inducias, quas non concedit Apoplexia.

Nonnulli cæteris non iuuantibus febrem excitan-  
dam esse, quæ præsentaneum sit, ad materiam pituito-  
sam exsiccandam & resoluendam, remedium: & pro-  
pterea confectionem anacardinam cum hydromelite,  
vel alio conueniente liquore Drach. j. pondere exhi-  
bendam censent.

Si jam in Paralyfin morbus desinat, reliqua curatio  
ad eam dirigenda.

*Chymica.*

Quæ à Chymicis hîc commendantur, pleraque vul-  
gata etiam sunt, & simplicibus, quæ in vulgari contra  
Apoplexiam vñ sunt, parantur, nec Galenicis ignota  
sunt, spiritus scil. liliorum conuall. ceraforum, granorum  
juniperi, saluie, flor. lauendula, visci querni, cranij huma-  
ni: essentia, rosmarini, lauendula, salua, pæonia: tinctu-  
ra, corallior succini, smaragdi: olea destill. lauendula, sal-  
uia, majorana, rosmarini, musis moschara, ruta, angelica,  
sambuci, carui, succini, caryophyll. extract. pæonia, salua,  
cardamomi: sal salua, pæonia, succini, cranij humani: fecu-  
la, pæonia magisterium, cranij humani, succini, margari-  
tarum, coralliorum: balsamum, ruta, majorana, succini, an-  
gelica. Quibus addunt medicamenta ex argento præ-  
parata.

### *Dietæ.*

*Dietæ.*

*Aër.  
Cibus & po-  
tus.*

Dietam quod attinet, in hac Apoplexiæ specie aër  
ad calidum vergat. Cibi in paroxysmo nihil exhibea-  
tur, nec facile exhiberi potest vsque ad declinationem.  
Sit autem tum cibus attenuans. A vino abstinendum.  
Potus sit hydromel saluiæ, hyssopo, roremarino, cala-  
minthæ, origano, pulegio, melissæ conditum. Cibi  
etiam condianrur hyssopo, roremarino, thymo, satu-  
reia, ruta, saluiæ, nuce moschara, vt de paralyti dictum.

### *Curatio Apoplexiæ à sanguine orta.*

*Curatio apo-  
plexia san-  
guinea.*

*Vena sectio.*

Si Apoplexia sit à sanguine orta, is, quæ in genere  
proposita sunt, non neglectis, mox, si vires id ferant, at-  
que Apoplexia non sit fortissima, & desperata, etiam  
ante clysterem vena aperienda, & venæ sectio admini-  
stranda, vt ante de Apoplexiæ curatione in genere di-  
ctum. Plus verò in hac Apoplexiæ specie, quam in pi-  
tuitosa, sanguinis emittendum, sanguisque satis libera-  
liter, & quantum vires ferunt, euacuandus. Rhases in  
vtroque brachio venam aperit, quod interjectis 6. vel  
7. hor. fieri potest, vt expeditius sanguis à toto corpore  
& capite educatur, & iterata ista venæ sectio, vt antea  
quoque dictum, materiam facilius moueat, nec vires  
deiciat. Prudentiâ tamen hîc opus est, & si ex pulsu  
ac facie coniciat Medicus, ægrum non satis bene tole-  
rare phlebotomiam, repetenda non est, ne æger in peri-  
culum coniciatur.

*Cucurbitula  
cum cum sca-  
rificatione  
applicatio.*

*Purgatio.*

Si autem æger venæ sectionem non toleret, cucur-  
bitulis scarificatis vtendum. Post sanguinem euacua-  
tum clysteres & omnia reuulsionum genera, vt antea  
dictum, vsurpanda & repetenda.

Cæterum cum sanguis purus rarò peccet, purgan-  
ria post venæ sectionem quoque exhibere non abs re  
fuerit. Istud autem de purgatione, & quidem in omni  
Apoplexia, monendum, vt ea maturè, horis non mul-  
tis post venæ sectionem, instituatur, neglectâ tempo-  
rum electione. Neque enim vehementia morbi tem-  
pus maturinum, venæ sectioni & purgationi aliàs com-  
modissimum, semper expectare finit.

*Particulares*

Post purgationem exhibitam abstinendum aliquan-

diu à frictionibus, ligaturis, cucurbitulis; quoniam hæc *enactio.*  
contra, quàm pharmacum, ab interioribus ad exteriora *nos.*  
trahunt.

Corpore vniuerso purgato & particulares euacua-  
tiones instituere licet, quæ tamen hîc moderatiores  
sint, & medicamenta, quæ adhibentur, minus calida.

### *Curatio Apoplexiæ à vapore narcotico.*

Si à vapore narcotico Apoplexia oriatur, mox etiam *Curatio A.  
poplexia à  
narcotico.*  
omnia reuulsionum genera, quæ in genere supra dicta  
sunt, adhibenda; & si vaporem illum materia aliqua fo-  
ueat, euacuanda ea est. Deinde vsurpanda & propinan-  
da, tum extrâ applicanda ea, quæ vim sopitam excitant,  
& peculiari facultate vaporum narcoticorum vim in-  
fringunt. Inprimis vtile est castoreum, ruta, pulegium,  
quæ cum aceto mista naribus admouenda. Acetum  
enim & acida maximè narcoticorum vim retundunt &  
infringunt. Commoda quoque sunt balsama Apople-  
ctica, ruta, majorana, quibus aliquid castorei addi  
potest.

Exhibeantur etiam pleraque quæ supra in Apople-  
xia pituitosa sunt proposita; qualia sunt, salua, ruta,  
betonica, rosmarinus, lauendula, majorana, pulegium,  
stæchas Arabica, &c. Nec omittantur sternutatoria,  
quæ & ipsa vaporem illum discutere valent.

Huic Apoplexiæ cognatus affectus est, vt dictum,  
qui ex spiritus vini nimio vñ excitatur. Ideoque hu-  
jus curatio non prætereunda.

Cum verò spiritus vini non solum periculo sum stu-  
porem, sed & maximum calorem excitet, ea exhibenda, *A spiritum  
vini super  
cucurbitula.*  
quæ & calori, & facultati narcoticæ resistunt. Primò  
ergo vomitum excitare vtile est, quod fieri potest aquâ  
calidâ cum oleo communi ac butyro exhibita. Deinde  
exhibeatur lac caprinum, vel aliud item emulsio ex  
amygdalis dulc. ac semine cucurbitæ ac melonum cum  
aqua hordei parata, acida item ac acerum ipsum, & sy-  
rupi acidi.

Dietæ in Apoplexia à vapore narcotico sit qualis in  
Apoplexia à pituita. A vino & omni potu inebriante  
toto curationis tempore abstinendum.

### *Curatio Apoplexiæ à causis externis & violentis.*

Cum reliquæ tres Apoplexiæ species, quæ vel à san- *Curatio A.  
poplexia à  
causis ex-  
ternis.*  
guine è vulnere ad basin cerebri effusio, vel à cerebro  
compressio, vel ab eisdem vulnere, & læsione insigni  
ortum habent, curatione maximâ ex parte conue-  
niant, eas quoque coniungemus.

Si ergo quis in oculo vel aliâ parte capitis vulnera-  
tus sit, atque in Apoplexiam incidat, aut ex alto ali-  
quid in caput decidat, aut lapide, vel alia re graui ca-  
put percussum, cerebrumque compressum aut com-  
motum sit, vt æger sine sensu & motu iaceat; primò  
omnium, si vires ferant, statim, seu die, seu noctu, ce-  
phalica vena aperienda, & postea clyster iniiciendus,  
vt materia à capite reuellatur; aut, si venæ sectionem  
ægrî vires non ferant, cucurbitulæ scarificatæ partibus  
inferioribus affigendæ. Reliqua curæ ratio ad ipsum ca-  
put læsum dirigenda; & primò ad sanguinis affluxum  
inhibendum repellentia adhibenda, postea etiam di-  
gerentia. Et, si cranium depressum sit, illud retrahen-  
dum ac eleuandum: ossicula, si cerebrum pungant aut  
premant, eximenda.

Apoplexia, quæ sit ab insigni cerebri vulnere, etsi ple-  
rumque desperata ac lethalis sit, quamdiu tamen viuit  
homo, vulnus inflatum ex arte tractandum. Cætera  
verò naturæ permittenda sunt, quæ interdum per au-  
res, nares, & os sanguinem expellit, quas vias Medicus  
facile querere non potest. De quibus videantur, *part.  
1. cap. 20. 21. & seqq.*

Victus ratio in his Apoplexiæ generibus sit tenuior, &

& in principio carnibus, & omni pleniori victu, vt & vino abstinendum, & prisanâ hordaceâ, aut aquâ cum semine coriandri, aut cinamomo decoctâ, aut decocto hordei vtendum: reliqua etiam victus ratio ad frigidum declinet; cum plerumque è sanguine è vasis effuso putredo & febris exciteretur.

## PRÆSERVATIO AB APOPLEXIA.

Cum autem longè vtilius & tutius sit ab imminente Apoplexiâ ægrum præseruare, quàm à iam præsentem liberare; præterea danda sit opera, vt, qui semel à paroxysmo apoplectico liberatus est, impofterum ab eo non corripiatur, quod sæpissimè accidere solet: de præseruatione ab Apoplexia etiam dicendum.

Signa autem imminētis Apoplexiæ sunt, diuturna grauitas & dolor capitis, ac in somnum propensio, segnior totius corporis motus, frequens vertigo, tenebræ oculis offusæ, vel incerti ac discurrentes ante oculos lucis splendores, frequens incubus, somnia terribilia, aurium tinnitus, inflatio venarum iugularium, tremor totius corporis, vox tremula & interrupta, mentis abalienationes, rerum obliuio, mæstitia, refrigeratio extremorum sine causa.

Vt autem curatio Apoplexiæ in eo præcipue consistit, vt causa illa proxima, quæ influxum spirituum animalium impedit, tollatur: ita præseruatio in eo occupatur, vt causæ antecedentes, quæ, nisi amoueantur, Apoplexiam excitare possent, tollantur. Quæ autem causæ antecedentes sint, iam antea dictum. De causis verò illis violentis dicere nihil opus est; cum Medici arbitrio dirigi non possint.

In præcauenda ergo Apoplexia hæc prospicienda; primò, vt humor, qui angustiam cerebri parere potest, vaporisque, qui spiritus torpidos reddunt, non generentur, aut, si adsint, tollantur: deinde vt cerebrum, quod humores seu vapores vel gignit, vel admittit, & discutere non potest, roboretur.

Primò itaque si à sanguinis copia metuenda sit Apoplexia, sanguis, quantum opus, imminuendus: & cum nihil commodius hîc esse possit, quàm hæmorrhoides fluere, danda est opera, vt prouocentur; cum, quamdiu fluunt, facillè ab Apoplexia immunitatem polliceantur. Cæterum si id fieri nequeat, per venæ sectionem & cucurbitulas sanguis detrahatur, &, ne copiosior generetur, præcaueatur. Ideoque etiam à crapula, & inprimis vino multo ac generoso abstinendum.

Cum autem sanguis non solum quatenus copiosus, (cum multi sanguinei ab Apoplexia immunes sint) sed etiam quatenus spirituosus nimium, aut potius vaporosus est, seu vaporibus multis spiritus animales turbat, causa Apoplexiæ sit, & talis sanguis adustus in atram bilem degenerare soleat; omnino necessarium est, per interualla corpus iis, quæ humoribus biliosis conueniunt euacuare.

Alterantia quoque exhibeantur, quæ talibus adustis humoribus & sanguini vaporoso conueniunt. Inter purgantia inprimis conueniunt fol. senæ & rhabarb. cui addi possunt polypod. quern. epithymum.

Vt ʒ. Rad. polypod. quern. pæonia, cichor. an. Drac. iii. passul. minor. Drach. vi.

- Coq. in aqua pura.

In Colat. infundantur fol. senæ Drach. vi. rhabarb. Scrup. ii. flor. borrag. bngloss. violar. an. P j. Zingiberis, galang. an. Scrup. j. calam. aromat. Scr. ß.

In colat. Vnc. iiii. dissolue manna Vnc. ß. vel ʒ. vj. adde syrup. cichor. cum rhabarb. ʒ. ß. Misce.

Exercitia sint moderata. Caueant à somno meridiano, imò nec post cœnam mox cubitum eant, sed duabus demum horis à cœna peractis; quo temporis spatio etiam potandum non est.

Abstinendum quoque ab aquis vitæ dictis, etiam iis, quæ ad Apoplexiam aliàs commodæ sunt, & aquæ

Dan. Senneri Tom. I I.

Apoplecticæ dicuntur, in hac Apoplexiæ specie: etsi à nonnullis non satis cautè vsurpentur; cum in corporibus eiusmodi plenis, & sanguine spirituosus ac vaporosus abundantibus caput nimium repleant. Eadem de causa vitanda sunt vina crassa, turbida, dulcia, & potentia, quæ copiosorem ac crassorem sanguinem suppeditant. Non verò omittenda cerebrum confortantia: de quibus postea dicetur. Ea tamen eligenda, quæ sanguinem non nimis calefaciunt.

Secundò si à pituita metuenda sit Apoplexia, ac in senibus præcipue, ob calorem natium iam debilem, & spiritus pauciores, cerebrum nec bene coquat, nec humores excrementitios satis rectè excernat, atque inde pituitosi & crudi humores in capite cumulentur, ob quos in hyeme præcipue ad hoc malum procliuēs sunt: inprimis danda est opera, vt cerebrum roboretur, & ita generatio pituitæ præcaueatur, &, quæ generata est, euacuetur.

Et cum indies magis magisque temperamentum debilitetur, singulis diebus quod lapsum illum in cerebro corrigat, cerebri calorem conseruet, spiritus animales recreet, assumendum.

Vt: ʒ. Conserv. lauendul. Vnc. iiii. primul. veris, lior. conuall. saluia, beton. anthos, an. Vnc. i. calam. aromat. Vnc. ß. spec. diamb. cubeb. nusc. moschat. an. Drach. ß. Cum syrup. pæon. & stæchad.

F. Electuarium.

Inprimis ambra ad cerebrum roborandum & spiritus instaurandos maximè valet.

Vel ʒ. Ol. destillat. anisi gutt. iiii. nuc. moschat. carni, an. gutt. iii. caryophyll. gutt. i. ambr. ʒ. vi. sacchar. in aqu. rosar. dissolut. Vnc. iiii.

F. Rotulæ, quibus & ol. succini addere licet.

Vel ʒ. Spec. diamb. Drach. i. ß. diamosch. dulc. diaxyloal. an. Scrup. i. ol. anisi destillat. nuc. moschat. an. gutt. ii. sacchar. in aqua rosar. & lauendul. dissolut. ʒ. iiii.

F. Rotulæ.

Vel ʒ. Ol. destillat. nuc. moschat. cinamomi, caryoph. an. gutt. iiii. succini gutt. v. saluia gutt. iiii. sacchar. in aqu. rosar. dissolut. Vnc. iiii. F. Rotulæ.

Vtilissimæ etiam ad præcauendam Apoplexiam sunt hæc Pilulæ:

ʒ. Cubeb. calamintha, mastiches, nucis moschat. caryophyll. an. Drach. i. ambr. Drach. ß. mosch. ʒ. vi.

Cum succo vel extract. maioranæ formentur Pilulæ, de quibus Scrup. i. nocte nouilunium & plenilunium præcedente exhibeatur.

Ad cerebrum quoque roborandum vsurpandæ aquæ Apoplecticæ, quarum supra mentio facta. Quibus hæc addi potest.

ʒ. Flor. lauendul. M. ii. anthos, betonica, salu. an. M. i. cubeb. gran. Paradisi, an. ʒ. ß. nuc. moschat. ʒ. ii.

Stent in infusione spirit. vini opt. lb. ii. in vase diligenter clauso per dies aliquot postea colentur. De hoc spiritu, tempore hyberno inprimis, ante nouilunium præcipue, vt & alio tempore, Drach. i. vel altera, pro temporis ratione, cum pane albo sumatur.

Commendatur etiam, & multis in vsu est hic Puluis: Pulvis.

ʒ. Succini albi Drach. i. spec. diarrhod. abb. Drach. ß. rad. pæon. Scrup. i.

Datur Drach. i. cum aqua conueniente ante nouilunium.

Alij tamen.

ʒ. Succini ʒ. i. spec. diarrhod. rad. pæon. an. ʒ. ii.

Alij aliam proportionem obseruant.

Nucem quoque moschatam, cubebas, semen crucæ, sæpe ore detineant & mastigent, qui ab Apoplexia sibi metuunt. Aut semen carui & crucæ in puluerem redactum, & cum saccharo mistum masticetur. Efficax est & hic Puluis, de quo sumatur manè ad fabam magnitudinem:

ʒ. Sem. cruc. cubeb. cardamom. fefeli Cretici, piperis albi, an. Drach. i. F. Puluis.

*Balsama Apoplectica.*

Odoramentum quoque naribus admoveatur, & inprimis balsama Apoplectica.

Vel ℥. Ol. nuc. mosch. express. ℥. i. ambra mosch. Zibeth. balsami Oriental. an. Drach. sem.

M. & ol. caryophyll. & cinamomi quantum libet addatur.

Vtile est & hoc Emplastrum ad caput roborandum, & Apoplexiam præcauendam:

℥. Myrrha elect. styrac. calam. benzoeladani. an. ℥. B. gummi iuniperi ℥. iii. cranij hum. puluer. ℥. iib. lap. lazul. D. B. Cum styrace liquid. & terebinth.

F. Emplastrum, cuius portio panno serico magnitudinem taleri æquanti illinatur, & vertici imponatur.

Manè lingua & os munderetur aqua, cui aliquid aquæ origani, rorismarini, saluæ, & lauendul. admistum sit.

*Dietæ ratio.*

Vitandus aer frigidus & austrinus, & contra eum caput muniendum. Cibi condiantur aromatibus, ita tamen, ne caput repleant; vel condiantur sem. carui, saluæ, & similibus. Post cibum sumptum sumantur pulueres peptici de semine coriandri, cumini, galang. sem. fœniculi & mastich; vel diacydon. cum speciebus paratum, & similia supra, part. i. proposita.

Inprimis verò rectâ victus ratione hîc opus est, quâ præcaueatur, ne humor iste, quantum fieri potest, generetur, abstinendumque à cibis pituitosis, ac multorum piscium, olerum & lacticiniorum esu; ac magna ventriculi ratio habenda est, cum ad humoris pituitosi generationem multum faciat.

*Purgatio.*

Quia verò vix præcaueri potest in corporibus dispositis pituitæ generatio, per intervalla convenientibus medicamentis euacuanda est, atque euacuationes secundum individui cuiusque rationem instituendæ.

Vtilissimum & efficacissimum est & hoc Decoctum, quod non solum materiam detergit, incidit, & obstructions viscerum soluit, sed & membra interna, ac cerebrum inprimis, roborat:

℥. Sarsæ parilla ℥. ii. ligni sassafras ℥. i. sem. fœnic. ℥. vi. Infundantur hor. xxiv. in aq. fontanæ lb. iiii. vel v.

Coqu. ad dimidiæ part. consumptionem: sub finē adde flor. primula veris, anthos, an. M. i. ligni aloës ℥. ii.

Colat. seruetur ad vsum in vase vitreo. Dentur mane Vnc. iiii. vel v. cum aq. cinamomi cochleari dimidio, vt sudor leniter prouocetur.

Multum etiam ad præseruandum ab Apoplexia faciunt fonticuli in brachiis excitati.

*Erborum & gargarismorum vsus.*

Præterea in nares aqu. maioran. in qua semen nigell. erucæ, & parū zingiberis infusa sint, attrahere vtile est. Vel vtendum hoc Gargarismate:

℥. Rorismar. saluæ, rutæ, origani, an. P. i. zingiber. pyrethr. an. ℥. iib. rad. lappa mai. ℥. B.

Coqu. in lb. i. aquæ ad tertie partis consumptionem. Colat. adde aceri quantum sufficit.

Vel ℥. Aq. lauendule, saluæ, rorismarini, rutæ, an. ℥. iv. pyrethr. zingiber, an. ℥. iib. oxymel. scillit. ℥. iib.

*Præseruatio ab apoplexia vaporosa.*

Seruetur ad vsum pro Gargarismo.

Tertid. Cum Apoplexiæ, quæ a vaporibus ortum habet, præcipue obnoxij sint, qui cruditatibus & crapulæ dediti sunt; quiete & abstinencia, talibus inprimis, opus est, & proinde vitanda maximè crapula, & quæ hinc oritur, cruditas, ciborum varietas, exercitia post cibum, ira & vehemens animi motus. Et cum ex ista causa Apoplexia maximè metuenda sit melancholicis, melancholicusque humor præcipue literatis, & aliis ingeniis excellentibus ab anno 40. ad 60. molestus esse soleat, à curis molestis, & aliis causis humorem melancholicum cumulantibus, cauendum, & hæmorrhoidum fluxus, si fieri potest, prouocandus, humorque melancholicus convenientibus medicamentis præparandus & euacuandus, vt supra, part. i. cap. de Intemperie cum humore melancholico, dictum. Deinde medicamenta modò proposita ad cerebrum roborandum, & vapores discutiendos adhibeantur. Præcipue & hîc utilis est puluis è succino, spec. diarrhod.

abbat. & radic. pæon. vt & sem. carui, quod comestum & olfactum hîc valde vtile est, & odores & vapores, qui cerebrum infestant, vertiginem excitant, appoplexiamque minantur, corrigit ac dicitur. Efficacissimum verò est eius oleum destillatum. Castoreum quoque aceto madidum naribus admoveere conuenit. Viro cuidam litterato iam sexagenario, ob cruditatem ventriculi, & vapores inde in caput eleuatos, semel atque iterum Apoplexiæ initia sentienti, valde profuerunt hæ Rotulæ:

℥. Ol. carui D. B. nuc. mosch. gutt. vii. sacchar. albi ℥. ii. F. Rotulæ.

Auertantur etiam vapores à capite lotionibus pedum matutinis è decoctis herbarum cephalicarum, & frictionibus.

## Q V Æ S T I O I.

*An à sola intemperie cerebri possit Apoplexia generari?*

Causas Apoplexiæ supra suo loco recensuimus. Inter eas numerata non est intemperies cerebri. Cum verò experientia testetur, Apoplexiam esse morbum hæreditarium, & quorum parentes Apoplexiâ mortui sunt, iisdem malum hoc metuendum esse; non verò angustia cerebri & principij neruorum ab ortu contrahi & communicari possit: ipsa etiam cerebri substantia in talibus malè affici & disposita esse videtur. Nam cum compressio illa aut obstructio sit extra cerebri substantiam, eaque tantum in paroxysmo accidat, nemo autem actu Apoplecticus, seu in ipso paroxysmo generet: omnino statuendum videtur, dispositionem aliquam prauam, intemperiem, ac debilitatem in cerebro eius, qui Apoplexia demum corripitur, antequam ea corripere, adfuisse, quæ, sicut alij morbi hæreditarii, cum semine deriuari & communicari soboli potest. Quibus accedit & illud, quod Platerus præter causas supra enumeratas aliam adhuc ponit, scilicet spirituum animalium contumtionem tantam, ob quam non solum functionum animalium debilitas, sed & omnimoda illarum subsequatur abolitio, & grauis omnino, hominemque subito ingulans exciteretur Apoplexia, quâ senes aliquando intereant. Quæ ipsa causa ad intemperiem cerebri, seu eius debilitatem, ob quam spiritus animales amplius non generantur, redigenda videtur. Præterea cerebri imbecillitas sæpe diu antè percipitur, & facultatis animalis, intellectus, memoriæque debilitas, torpor in omnibus actionibus, aurium tinnitus ac sibilus, ac vertigo animaduertitur.

Sunt tamen, qui Apoplexiam morbum hæreditarium esse negant. Cum enim non generent podagricos, nisi ij, qui ipsi podagra laborarunt, nec leprosis aut lue Venereæ affectos, nisi qui ipsi leprâ vel lue Venereæ affecti fuerunt, & plerique in ipso paroxysmo Apoplectico pereant, nec post paroxysmum generent: fieri non posse videtur, vt morbum, quo non laborarunt, in sobolem transfundant. Præterea cum multi Apoplexiâ subito corripiantur, qui operationes cerebri integras habuerunt; probabile non videtur, vt, qui omnes operationes integras habuerunt, morbum aliquem in sobolem deriuent. Insuper cum intemperies non subito, sed per diuturnas alterationes inducatur, Apoplexia verò hominem subito & in instanti corripit: non videtur ab intemperie ortum habere posse.

Verum enim verò utraque opinio aliquid veri & aliquid falsi continet. Primo enim omnino concedendum, intemperiem quandam in Apoplexia concurrere posse; cum negari non queat, atque id experientia testetur, Apoplexiam sæpe morbum esse hæreditarium, qui omnino ab intemperie ac dispositione aliqua, & cerebri imbecillitate à parentibus communicatâ ortum habeat. Neque necessariū est, vt, qui Apoplexiæ obnoxios generant,

*An Intemperies sola Apoplexiam excitare possit.*

*An Apoplexia sit morbus hæreditarius.*



generant, ipsi iam ante Apoplexiâ laborauerint. Sufficit, ut dispositionem, à qua causâ Apoplexiâ prouenire poterit, habuerint, eamque soboli communicauerint, ob quam in liberis olim, ac suo tempore causâ Apoplexiâ gigni possit, etsi, cum generauerint, Apoplexiâ nondum laborauerint.

Interim tamen nec illud negandum, ab intemperie, quâ talis, Apoplexiam proximè produci non posse; cum intemperies actiones saltem deprauet vel imminuat, raro planè aboleat: & licet hoc præstet, sensum tamen & paulatim hoc faciat. Sed ab intemperie ac dispositione illa, & intemperie cerebri causâ proxima producit, quæ vel angustiam parit, vel spiritus perturbat, pituita scilicet copiosa, & vapores ac flatus.

An autem à consumptione spirituum animalium omnimoda fieri possit Apoplexia, quod vult Platerus, dubito. Cum enim illam consumptionem à cerebri debilitate in senibus fieri statuatur Platerus; subito accidere non posset, sed, quod fieri solet, sensum ac indies spiritus imminuerentur, & propterea satis manifestæ functionum animalium immutationes in aliis partibus omnimodam illam, ob quam lethalis accideret Apoplexia, consumptionem præcederent: cum tamen senes sæpe sensus omnes atque integros habentes subito Apoplexiâ corripi videamus.

## Q V Æ S T I O II.

### *Quæ sit Causâ Apoplexiâ proxima?*

*Causa Apoplexiâ.*

De causis Apoplexiâ pluribus in Institutionibus egimus, quæ hic repetere superuacaneum puto. Ut tamen quædam addamus, primò hoc præsupponendum est, spiritum animale dari, atque differre à vitali, & proximum instrumentum animalium actionum esse; ut id satis, lib. I. Instit. cap. 6. probavi. Neque dum satis evidentes & graues rationes vidimus, ob quas ab illa sententia nobis recedendum sit. Sunt quidem è Recentioribus, qui statuunt, argumenta, quæ pro spiritu animali probando adducuntur, nihil aliud ostendere, quam ad sensum & motum requiri partis sentientis & mobilis cum cerebro communicationem; quæ tamen fieri possit per solum spiritum vitalem, ut spiritus animales fingere opus non sit. Et ut principes actiones eduntur ministerio spiritus vitalis in cerebro existentis; (scil. implantati & influentis) ita eundem spiritum in nervis habitantē species sensibiles ab organo sensuum ad cerebrum, & contra imperium facultatis superioris, à cerebro ad musculos, deferre purant. Deinde nullam dari officinam generationis spirituum animalium in cerebro existimant, cum nulla cavitates in cerebro detur, in quam spiritus vitalis ex arteriis & cerebri sinibus, vel aëre per nares attractus (quæ sunt spiritus animalis materia) attrahatur. Tertio infantes in utero sine spiritus animalis opera moueri statuunt, utpote qui neque à matre suppeditetur, nec ab infante generetur. Non suppeditari à matre putant, quia nullus nervus à matre infanti implantetur: non generari verò infantes, quia aër desit, & per inspirationem in cerebrum non attrahatur.

Spiritum autem vitalem immediatè inseruire sensui & motui, probare conantur his rationibus: 1. Quia Venus nimia etiam actiones animales debilitat; cum tamen solus vitalis spiritus semini permisceatur. 2. Quia spiritus vitalis interceptio in carotidum angustia actiones animales abolet. 3. Quia in syncope actiones animales etiam abolentur. 4. Et in timore ac metu, in quibus spiritus vitalis perturbatur, tremor, qui facultatis animalis est symptoma, accidit. 5. Quia motus nimis lipothymiam, quæ facultatis vitalis symptoma est, inducit; & meditationes nimis coctionem ventriculi turbant, spiritum vitalem à ventriculo auocando.

Verum nullo modo concedendum, quod commu-

nificatio, quæ est inter cerebrum & organa sensus ac motus, fiat per spiritus vitales. Ratio enim illa, quæ ad id probandum adducitur, falsa est, quòd videlicet actiones animales principes operâ spirituum vitalium administrentur. Etenim spiritus insitus, seu calidum innatum cerebri non est spiritus vitalis, sed animalis insitus. Nam calidum innatum, seu spiritus insitus, non omnium partium idem est, sed pro diuersitate partium & actionum varius: in aure est naturæ aëreæ; seu aër insitus & implantatus; in oculo luminis insiti nomine venit spiritus innatus. Ita & cerebrum calidum innatum peculiare habet, cuius beneficio, quod sibi proprium est, agit, quòdque à calido insito cordis & hepatis differt. Neque etiâ spiritus mobiles in cerebro, quorum ministerio principes actiones obeuntur, vitales sunt; & dum id affirmatur, principium petitur. Quorsum enim cerebri substantia, cui similis in toto corpore non est, & tanta eius moles & structura tam artificiosè facta essent? Certè nisi spiritus animalis ratione facta sunt, frustra facta sunt. Itaque petitio principij est, ut diximus, quòd spiritus, à quibus species sensibiles ab organo sensuum ad cerebrum deferuntur, vitales sunt.

Cavitate verò sensibili nulla ad spirituum animalium generationem opus est; sufficit substantia cerebri illa mollis & spongiosa. Si hac tanta copia in mammis generari potest, si semen in testibus, ubi tamen nulla sensibilis cavitates apparet: quidni spiritus animales longè subtiliores in substantia illa cerebri spongiosa, quòd spiritus vitalis & aër facillè penetrare potest, generari possint? Sunt quidem nonnulli in ea sententia, ut in Institut. lib. I. cap. 6. & supra etiam, part. I. cap. 17. dictum, spiritus animales in quarto ventriculo cerebri, qui cerebro oblongato insculptus sit, seu generari, seu colligi. Verum Anatomici diligentiores demonstrant, ventriculi nomine hanc cavitatem vix dignam esse, neque in ipsa cerebri cerebellive substantia sitam esse, neque primaria intentione à naturâ efformatam, sed ex corporum dispositione ita emergere, nihilque aliud esse, quàm cavitatem quandam teretem, è duobus sinibus semicircularibus efformatam; & superiorem eius portionem cerebellum, inferiorem spinalem medullam conferre.

Infantes mouentur spirituum animalium beneficio, quorum sufficiens copia (magnâ enim opus non est; cum sensus & motus ferè orientur in infantibus in utero) ex spiritu vitali in cerebro generari potest.

Quæ verò afferuntur ad probandum, spiritum vitalem ad sensum & motum sufficere; id non satis probant. Quod enim Venus nimia facultatem animalem lædit, accidit, quia spiritus vitales, qui animalibus materiam præbent, subtrahuntur: Sunt tamen, qui & spiritus animales ad seminis generationem concurrere statuunt. Eadem de causâ in carotidum angustia & syncope, in terrore & metu, in exercitiis nimis, actiones animales cessant, vel alio modo læduntur, quia materia spiritibus animalibus generandis necessaria subtrahitur. Spiritus equidem vitales ad actiones animales necessarii sunt, verum non ut causâ proxima, sed ut remota, ut materia scilicet, è qua animales, qui proximum facultatis animalis instrumentum sunt, generentur.

Et si à spirituum vitalium defectu fieret Apoplexia, quæ differentia esset inter syncopem & Apoplexiam? Quam tamen omnes Medici admittunt, & rectè; cum maxima inter hos affectus sit differentia, atque in syncope, spiritibus scilicet vitalibus affectis, pulsus lædatur, qui in Apoplecticis non mutatur. Et quòd causâ Apoplexiâ in meatibus spiritus animales ferentibus, non in arteriis, aut vlla parte spiritus vitales continente, consistat; vel ex eo euidenter patet, quòd Apoplexia mutatur in paralyfin, quam nervis affectis fieri, extra controuersiam est.

Cum ergo spiritus animales proximum actionum

animalium instrumentum sint, etiam læsarum harum actionum causa in illis quaerenda. Etenim quicquid secundum naturam sese habens animalium actionum integritatem causa est proxima, id etiam præter naturam sese habens causa est læsarum earundem. At non spiritus vitalis, sed animalis, proximum actionum animalium instrumentum est. Ergo etiam ab hoc, non ab illo, actionum animalium causa pendet. Et proinde sicut sensus & motus priuati ab eorum defectu læduntur; ita etiam illius vniuersalis sensus ac motus læsionis in Apoplexia causa in spiritibus animalibus quaerenda est. Nimirum sicut in tremore, paralyti, cæcitate, stultitate, stupore, causa rectè in spiritibus animalis in parte illa, cuius actio imminuta vel abolita est, imminutionem vel defectum refertur; ita etiam omnes ferè antiqui & Recentiores causam Apoplexiæ, in qua omnes animales actiones abolentur, in spiritibus animalis influxum omnimodè prohibitum rectissime retulerunt.

Sed quæ causa sit, ob quam spiritus animalis influxus in organa sensus & motus in toto corpore prohibeatur, de eo Autores non consentiunt. De causis reliquis iam non dicam, quarum supra in enumeratione causarum facta est mentio: solum de angustia, ob quam spirituum animalium influxus prohibetur, aliquid afferam; cum de eâ Autores valde dissentiant. Antiqui, qui in ventriculis cerebri spiritus animales & generari, & contineri, & moueri, ac per eos in nervos influere crediderunt, omnes Apoplexiam ab omnimoda ventriculorum cerebri obstructione provenire statuerunt. Verùm Recentiores, Varolius, Platerus, Bauhinus, & alii diligenti cerebri anatomia edocti, falsum hoc esse demonstrarunt, & in ipsa substantia cerebri membranis suis conclusâ spiritus animales contineri, & hinc in nervos influere rectè docuerunt. Præterea observatum est à Fernelio, *lib. 2. de abdit. rer. caus. cap. 15.* & Casparo Bauhino, in *Anatom. lib. 3.* non semper in ventriculis cerebri Apoplexiâ extinctorum aliquid reperiri, quod obstructionis causa esse potuerit.

Itaque alia causa quaerenda est, ob quam influxus spirituum animalium ad organa sensus & motus planè inhiheretur. Eam verò esse putamus talem viarum, per quas spiritus animales influunt, angustiam, ut spiritibus animalibus via omnis intercludatur. Non verò opus esse putamus, ut tota cerebri medulla obstruatur vel comprimatur; sed ad Apoplexiam excitandam sufficit medullæ cerebri oblongatæ, seu principij nervorum in basi cerebri posteriora versus talis angustia, ob quam in omnia sensus & motus organa in toto corpore spirituum animalium influxus prohibetur. Etsi enim Antiqui aliter senserint: tamen Recentiores Anatomici summâ diligentia adhibita observarunt, nervos ad vnum omnes à medulla cerebri oblongata prodire; etsi alij, dum medulla hæc calvaria adhuc inclusa est; alij postquam cranium reliquit, & per dorsum vertebrarum foramina procedit, iamque spinalis medulla propriè dicitur, nascuntur. Hoc ergo nervorum omnium principium si ita afficiatur, ut spirituum animalium in nervos, qui in organa omnium sensuum externorum referuntur, & è locis vicinis, vñ scilicet cerebri medullâ oblongatâ, oriuntur, influxus denegetur, Apoplexia excitatur.

Fit autem hoc ubi medulla cerebri oblongata obstruitur vel comprimitur. Et quidem in forti Apoplexia anterior & posterior pars medullæ cerebri oblongatæ comprimitur vel obstruitur; in debili & mitiori nihil prohibet angustiam in alterutro saltem esse. Et est ea nervorum sensibus externis inferuentium in origine vicinia, ut, si causa gravis sit, quod in Apoplexia accidit, omnes simul afficiantur.

Id quod ipsa experientia confirmat, vtrationes conquirere opus non sit. Refert enim Fernelius, *loco modo allegato*, virum quendam viribus integrum sinistri

oculi ictu vehementiore repente attonitum corruisse, moxque sensu ac motu priuatum fuisse, cum spiritu difficili ac stertore, & cum aliis fortis Apoplexiæ indicijis, eumque nec venæ sectione, nec alia potuisse ratione seruari, quin horis duodecim interiret. Discisso apertoque capite neque ossis, neque meningum, neque substantiæ cerebri quicquam contractum diuulsivè, cerebri etiam ventriculos prorsus illæsos & inanes, sed duntaxat interiores oculi venas contusionis vi diruptas animaduertit, è quibus sanguis cochlearium duorum mensura in cerebri basin procubuerat, qui non, ut Fernelius vult, retiformem contextum obstringebat, sed principium nervorum comprimebat.

Et si Apoplexiæ terminationem, & in alios morbos mutationem diligenter consideremus, facile patebit, nullo alio in loco, quàm quo diximus, causam apoplexiæ consistere posse. Mutatur verò Apoplexia vel in paralytin lateris alterutrius, vel in memoriæ & ratiocinationis læsionem. Prius accidit, cum humor è cerebro oblongato, & principio nervorum in spinalis medullæ alterutram partem à natura excutitur, vnde cerebro & nervorum principio ab humore vitioso liberato sensibus quidem suis vigor redit, brachij verò & cruris alterutrius motus tollitur. Si verò è principio nervorum in ipsam substantiam cerebri hinc inde humor dispergatur, ac cerebrum eo quasi irrigetur, tunc morbus in via quidem cessat, sed cerebrum, ut similis pars, malè afficitur, vnde memoria & ratiocinatio læditur, sensibus externis & motu corporis salvis; ægrique cum tali memoria & mentis imbecillitate sæpe diu viuunt, ut exempla passim nota sunt. Quæ omnia, si alio, quàm quo dixi, loco causa apoplexiæ consisteret, fieri nullo modo possent.

Causa tamen, quæ istam angustiam inducit, non semper in eodem loco hæret. Nonnunquam enim causa est in ipso cerebro. Aliquando verò eandem angustiam etiam humores extra cerebrum ad basin eiusdem effusos, & principium nervorum comprimentes, atque ita ventriculis non obstructis, efficere posse, supra, ut & in Institut. dictum. Licet verò nervi optici non ex medio basis cerebri, parte anteriore, oriantur, ut antiqui crediderunt, sed reuera, si capite inuerso, Varoliano modo, sectio administreretur, ex principio truncorum priorum spinalis medullæ: tamen eo in loco est eorum exortus, ut à causa apoplexiam excitante simul seu comprimi, seu obstrui possint. Et sit sanè in nervos opticos influxus liber: tamen cum actio sensuum externorum non absoluitur in suis organis, sed sensus internos concurrere necessum sit; si illi laborant, neque visus, neque alius sensus perfici potest, & quamvis oculi speciem visibilem percipiunt: tamen nisi facultas princeps concurrat, nulla fit visio, ut alibi monstravi.

Tandem id aliquem dubium reddere posset, quod in Apoplexia sensus communis, phantasia, & cæteræ actiones principes etiam rectè sese non habent. Etsi enim influxus spirituum animalium in organa sensuum externorum & motus prohibetur: quia tamen cerebrum saluum est, & spiritus animales in eo; causa nulla esse videtur, cur non & actiones hæ, & facultate & organis rectè sese habentibus, fieri debeant. Verum nec istud nos de nostra sententia dimouet. Causas enim, cur principio nervorum affecto in Apoplexia sensus etiam interni lædantur, in Institut. *lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 6.* easque tres, proposuimus. Prima est, quod spiritibus animalibus motu, qui ipsis est perpetuus, denegato, eos quasi suffocari necesse sit. Cum enim spiritus animales non tardè, sicut humores, generentur, sed in perpetua generatione sint, & hinc etiam in perpetuo motu: si canales, per quos in totum corpus distribui debent, occludantur, eos in cerebro detineri, quasi concentrari, atque ita ad actiones sensuum internorum edendas

edendas ineptos fieri, necesse est; præcipue cum spiritus virales assidue copiâ largiori ipsis permisceantur, ideoque non tantum illorum generatio interturbetur, sed & generatorum actiones confundant. Apparet huius rei exemplum in corde, in quo si spiritus concentrentur, nec liberè in corpus diffundantur, actiones corporis læduntur. Secundò, membro vna ex parte saltem læso totam eius œconomiam turbari necesse est, vt epilepsiæ exemplo id manifestum est, & cerebri commotio ac percussiones docent. Tertiò, cum cerebrum ita grauiter affectum spirituum animalium generationi non sufficiat, mirum non est, actiones etiam internas turbari: Si enim in iis, quibus cerebrum pituita repletum est, & discursus & memoria laborat: quid ni in Apoplexiâ, cerebro tam grauiter affecto, omnes actiones aboleri queant? Vt enim causæ, sic effectus magnitudine differunt.

## QVÆSTIO. III.

*An à vapore narcotico fiat Apoplexia?*

Cum suprâ inter causâs Apoplexiæ etiam vim narcoticam recensuerimus, de ea verò non omnium eadem sit sententia; aliquid de eo dicendum est. Et quidem à recentioribus quibusdam hæc pro solâ causâ ponitur, vt ex Quercetano, in *Terrade*, videre est; vapor scilicet, seu nebulosa exhalatio in cerebrum eleuata. Quam causâam equidem libenter, sed non solam, admittimus, vt suprâ, & in *Institut.* dictum. Hoc saltem hic addimus, etsi Quercetanus & alij in natura huius vaporis definienda laborant: vix tamen commodius illam explicari posse, quam si dicatur, eam vim narcoticam spiritus animales seu stupefaciendi, seu congelandi, & in aliam quasi naturam verendi potentiam habere. Narcotica enim spiritus quasi ligant, stupefaciunt & sopiunt, ac sensui ac motui maximè obstant. Atque tales humores & vapores in corpore nostro generari, impossibile non est; cum constet, soporem, carum, & similes somnolentos affectus, ex humoribus in corpore genitis prouenire, quorum causâ frustra ex solâ frigidityte deducuntur. Atque hinc fit, vt, etiamsi Apoplexia in paralyfin desinat: tamen rarò in ejusmodi hominibus ratiocinatio & memoria ad pristinum planè vigorem redeant, sed hebetes ac torpidæ illæ actiones, præcipue in senio confectis, deinceps relinquuntur; quod accidit non tam quod frigida & humida intemperies, quàm quod à narcotico vapore mala & torpida talis *si ad hunc* cerebro imprimitur. Idque multò minus accidere posset, si ab aliâ causâ extracerebrum, & citra spirituum animalium vitium, Apoplexia generaretur. Et quamuis narcotica plerumque soporosos saltem affectus inducant: tamen impossibile non est, si eorum vis sit maior, quin ipsam Apoplexiam inducere possint. Imò lethargus & carus sæpe in Apoplexiam degenerant, vt experientia testatur; vnde causas eas habere communes necessum est; vt magni etiam Medici dubitauerint, quomodo hi affectus differant. Et ex vini & spiritus ejus potu nimio Apoplexiam excitari, suprâ dictum, atque ebrios *apoplexici* interdum fieri, testatur Hippocrates, 5. *Aphor.* 5.

Qui vero aliter naturam huius vaporis explicare conantur, iis id quidem per me licet; an verò commodius id faciant, dubitò. Quercetanus, in *Terrade*, ad spiritum vitriolatum, congelandi, coagulandi, constringendi & coarctandi vim habentem, qui nebulosas exhalationes in cerebrum euectas subito in glaciem & gelu quasi conuertat, generationem Apoplexiæ refert. Verum enim verò dicit ista, sed non probat; & quomodo in corpore viuento & actu calente talis vaporum in glaciem quasi & gelu conuersio fieri possit, non video, neque id in Anatomia eorum, qui Apoplexiâ extincti sunt, deprehenditur. Et qui effectus opij & alio-

rum narcoticorum cum vitrioli aciditate contulerit, simulque cum his Apoplexiæ symptomata comparauerit, faciliè animaduertet, stuporem, & reliqua symptomata, quæ in Apoplexia & cognatis soporosis affectibus contingunt, rectius ad vaporem narcoticum, quàm ad vitriolatum, acidum, & constringentem referri posse; in primis cum acida vim narcoticorum infringant.

Si quis tamen Quercetani sententiam mitius interpretari, & statuere velit, vel à cerebri dispositione peculiari, vel à vaporibus quibusdam seu narcoticis, seu coagulantibus spiritus animales à natura sua deijci & mutari, & quasi acquiescere, & à spirituosâ natura in crassam & aqueam quasi mutari, & ad actiones animales ineptos reddi, ille non multum diuersi dixerit, & contra me non pugnaverit. Refert Fauentinus, lib. 6. *annal. ex historia Bauarica*, An. 1548. ex terræ motu plures quàm 50. rusticos ita mulgentes cum vaccis extinctos riguisse, & corpora in salinas quasi statuas redacta. Et quomodo à fulmine vinum interdum vasis quasi coaguletur, non ignotum. Quidni ergo talis spiritus in corpore generari possit, qui cum ante quietus laruisset, vel irâ, vel terrore, vel aliâ causâ agitur & motus, instar venenorum subito in actum erumpat, & spiritus animales à natura sua mutet & quasi coagulet? Quid carbonum fumus possit, & quomodo homines attonitos subito reddat, non ignotum est, & collegit eius rei exempla Marcell. Donatus, de *histor. medic. mirab.* lib. 2. cap. 12. Idem calcis vapores præstant: refertque Valerius Maximus, lib. 9. cap. 2. Quintum Catullum à Mario propter publicas dissensiones mori iussu, recenti calce illito, multòque igne percalefacto cubiculo se inclusum peremisse. Ita etiam musti & cereuisiæ recentis feruentis vapore homines subito, quasi attonitos, concidere, & quandoque mortuos fuisse, omnibus notissimum est.

Cuius rei etsi alij alias causas reddant: maximè tamen veritati consentaneum est, vapores illos, seu fumos è carbonibus accensis, musto & cereuisiâ exhalantes aëri permisceri, & sic cum spiritu, quem ducimus, attrahi, atque ad cerebrum penetrare, ibique spiritibus animalibus misceri, & eos à natura sua immutare, & ad officium suum ineptos reddere. Nam quod nonnulli putant, ideo ex hac causâ attonitos concidere, quod in iis, quibus cerebrum excrementitiis humiditatibus scatet, eæ ab hac causâ fundantur, quæ fusæ obstruendo postea Apoplexiæ causæ sint, verò consentaneum non est. Nam vapores hi in omnibus, non tantum in iis, quorum cerebrum viciosis humoribus repletum est, idè præstant. Nec humorum fusorum indicia in iis satis apparent. Si quis tamen à solâ vi narcoticâ Apoplexiam excitari credere nolit, cum eo quidem non litigabo. Interim hoc verò consentaneum est, quod ille ipse humor, qui angustia in cerebro causâ est, simul talem vim narcoticam obtineat; vt ex pertinaci illa paralyfi, & mentis ac memoriæ læsione, quæ apoplexiam sequitur, patet, vt antea dictum. Et forsitan hoc etiam in causâ est, quod pueri rarius Apoplexiâ corripiuntur. Etsi enim non nego, id etiam ideo fieri, quia facultas expultrix in iis fortior non faciliè permittit pituitam copiosam coaceruari: tamen & hoc probabile, in pueris humores tales narcoticâ vi præditos non generari, sed in ætate senili præcipue accidere; vnde etiam senibus Apoplexia familiarior est.

Henningus Scheunemannus, *Med. refor.* cap. 3. è cremoso seu destillato Apoplexiam deducit, & exemplo fulminis rem explicat. Sicut videlicet fulmen sacculis illæsis nummos conflat, aut vaginâ illæsa ens emliquat, integrâ cute ossa comminuit: ita & destillatum in vnam massam cogere & colliquare cerebrum & pulmones, haud aliter, ac si cera essent. Verum portentosa illa opinio refutata est de *Consens. ac dissens. Chymic. cum Galen.* cap. 16.

*Cur pueri  
rarò apople-  
xia corri-  
piantur.*

## QVÆSTIO IV.

*An Aqua Apoplectica statim in principio conueniant?*

*Aquarum  
apoplecticarum  
usus.*

Et si apud Antiquos, vt & Practicos posteriores plurimos, nulla istarum aquarum fiat mentio: tamen hodie in Germania notissimæ & frequentissimæ sunt, nihilque iis cum in præcauendâ, tum in curandâ apoplexiâ est vñtati. Et res ipsa loquitur, ob summam, quam habent, vim penetrandi præsentissimum sæpe afferre auxilium. Quæritur tamen, an in omni Apoplexiâ, & mox in principio, nec venæ sectione; nec corporis purgatione aliquâ præmissâ, tutò, & sine alicuius incommodi metu, vsurpari possint. Ex hoc dubio vt nos expdiamus, sciendum, istas aquas insignem vim habere, vapores illos apoplexiam excitantes, humoresque frigidos discutiendi & dissoluendi, calorem naturæ & facultatem sopitam excitandi, cerebrum roborandi, & spiritus animales à natura sua quasi degenerantes conseruandi, & in pristinum statum reducendi. Præterea in minima quantitate maximam vim obtinent, & totum corpus facile ac subito penetrant. Ac proinde apoplecticis, qui ferè nihil deglutire valent, comoda sunt, & commodissimè exhibentur iis, qui à vaporibus illis narcoticis, & spirituum animalium vitio, aut pituitâ sine sanguinis permistione apoplexiâ laborant, corporis constitutione frigidâ præditi, aut in senectute constituti sunt, in quibus nullus metus est, vt humorum aliquis impetus & fluxus ad caput concitetur. Sin autem à sanguine Apoplexia ortum habeat, vel alij etiam humores sanguini, iam permixti abundant, non satis tutus vsus harum aquarum mox in principio; cum humores fundant, caput repleant, & hoc modo morbum augeant.

## QVÆSTIO V.

*An Purgantia sint exhibenda in Apoplexia?*

*Purgantia  
an in Apo-  
plexia exhi-  
benda.*

De Purgatione in Apoplexiâ instituenda duas difficultates obiicit Petrus Salius Diuersus, in annotat. in Altimar. cap. 19. Vnam; an stante cruditate pharmacum exhibere liceat, contra præceptum Hippocratis & Galeni; alteram; quomodo medicamentum, licet intra fauces ponatur, possit in ventrem descendere; cum Apoplectici sint toto corpore resoluti, atque ideo facultate deglutendi careant. Ac proinde incassum credit exhiberi purgantia, nisi in declinatione morbi id fiat.

Verum priorem difficultatem quod attinet, nullam hîc propriè dictam cruditatem & quæ prohibere possit purgationem, ac de qua Hippocrates & Galenus, cum cruda purgare prohibent, loquuntur, adesse facile patet, si ea quæ, Institut. libr. 5. part. 2. sect. 1. cap. 6. & 7. dicta sunt, perpendantur. Ideoque humor hic statim purgantibus tolli potest. Si tamen crassus sit nonnihil, vt præparatione aliquâ indigere videatur, attenuantiâ purgantibus admisceri possunt. Vt verò soli præparationi operaretur morbi magnitudo, & præsens, quod summopere viget, periculum prohibet. Facile enim fieri posset, si tempus in humore præparando consumatur, vt interim ob materiam ipsam caput affligentem homo de vita periclitetur.

Et omnino in paroxysmo huius morbi magis periculi metuendum à copia materiæ peccantis, quam eius aliqua crassitie. Si tamen morbum inducias dare animaduertatur, & is aliquo modo minuatur, aut saltem in præceptis periculum non labatur; humores præparare & attenuare conuenientibus medicamentis licet: quæ tamen præparatio propriè cœctio non est.

Altera difficultas non est de nihilo, & verum est, communia illa medicamenta purgantia in principio statim vix exhiberi posse, & vt Hercules Saxonia ait; si in his casibus præbeatis aliquod medicamentum commune, suffocabitis ægros. Ergo tum demum, cum post venæ sectionem & alia adhibita medicamenta æger iterum aliquid deglutire potest, exhibenda ista vulgaria medicamenta. Si verò in principio statim aliquid exhibere libet, validum sit illud, & in exigua, quantum fieri potest, quantitate: qualia fieri possunt è trochiscis alhandal. dyagrid. extract. scammon. Antimonium equidem, vt & ob exiguam molem hîc satis comoda essent, sed an exhibenda sint, è sequenti questione patebit.

## QVÆSTIO VI.

*An Vomitoria in paroxysmo apoplectico sint exhibenda?*

Auicennas, Paulus Ægineta, Aëcius, & alij vomitum prouocare iubent, pennâ oleo imbutâ, & in fauces immittâ. Sed cum Apoplecticus motu sit destitutus, ac conatum illum, qui ad vehementem istam excretionem est necessarius, adiungere non queat; metus est, ne diaphragmate & thorace vehementius compresso, spiritusque viis arctius restrictis, suffocatio acceleretur. Ac proinde verisimile est, Autores illos vomitum præcepisse in progressu morbi, quando euacuationes vniuersales jam præmissæ sunt, & æger paulatim restitutus conatum illum adiuuare potest, atque ad vomitum promptus est. Nam mox ante euacuationem, repleto corpore & capite, vomitum non profuisse, compertum est; quale exemplum etiam habet Forestus, lib. 10. in schol. obseru. 76.

## QVÆSTIO VII.

*An Repellentia in Apoplexia conueniant?*

Repellentia in Apoplexia Rhafes proponit. Medicorum nullus iis vñtur, inquit Leonhart. Iacchinus & Paulus, Auicennas, & Medici alij hoc auxilium prætermittunt. Purat tamen Massarias, si Galeni doctrinam sequamur, qui docet, materiam, qualicunque ea fuerit, fluentem à capite repellendam esse, vtique negandum non esse omnino, quod repellentia quoque possint conuenire. Verum enim verò etsi inter auxilia, quibus materia ad caput præter naturam fluens ab eo auertitur, etiam repellentia à Galenò proponantur: tamen non ibi docet, quod simpliciter in omnibus affectibus capitis, vt & aliarum partium, illa omnia semper sint adhibenda; sed satis est, si nunc hæc, nunc illa vsurpentur: & repellentia tum locum suum habent, vbi cum fructu, & sine omni incommodo, materia ad caput fluens per ea à capite auerti potest; quod in omni apoplexiâ fieri non potest. In pituitosa enim Apoplexia nullum locum habent repellentia, vt & in eâ, quæ fit à vapore narcotico: cum causæ in ea apoplexia repellentium vsu à cerebro auerti non possint, sed magis cerebro impingantur, & ad dissoluendum ineptæ reddantur. In apoplexiâ tamen sanguineâ, si caput admodum æstare videatur, repellentia planè reicienda non videntur. Etsi enim morbus mox ad statum perueniat: tamen vt difficilior angustia cerebri tollatur, sanguis magis magisque affluens facere potest. Ideoque eius affluxus principaliter quidem repellentibus, atque imprimis venæ sectione, inhibendus. Post venæ sectionem verò repellentia planè reicienda non sunt. Caute tamen iis vtendum, ne materiam, quæ in superficie



superficie est, intro pellant. Ideo adstringentia non sint, sed sufficiunt oxymorpha ex ol. rosarum & aceto, vel ol. & aceto. Vbi tamen suspicio humoris pituitosi admixti adest, satius est, omissis repellentibus in resolutionis subsidiis consistere.

# CAPVT XXXIV.

## De Catarrho & Cerebri Excrementis retentis.

**H**Actenus symptomata recensuimus, quæ cerebro accidunt, quatenus functionum animalium principium, & loco mouentis facultatis organum est. Nunc, priusquam ad externorum sensuum accedamus vitia, illud adhuc symptomatum genus, quod cerebro accidit, non quatenus animalis, sed & facultatis naturalis instrumentum est, Excretorum scilicet & Retentorum vitium, quod multorum aliorum in vniuerso corpore malorum fons & principium existit, explicandum. Est illud, dum excrementa cerebri vel in eo, vel circa illud detinentur, & non debito modo euacuantur, vel in cerebro copiosius cumulata in alias subiectas partes defluunt. Ideoque hic in genere quædam de excrementis cerebri dicenda, inprimis qualis sit illorum materia, à quibus causis procreentur, per quæ loca euacuantur, & quas denique præter naturam affectiones suo in varias partes decubitu efficiant.

**I.** Cerebrum cum peculiarem substantiam & materiam habeat, quod non solum ipsum nutritur, sed & in quo spiritus animalis generatur: in eo etiam quædam excrementa generantur; sed illa pauca, quæ in sanis per nares & palatum euacuantur. Excrementa autem illa pituitosa sunt, frigida & humida, sicuti ipsius cerebri intemperies ad frigidum & humidum declinat. Et pituitosa quidem in sanis pura, vt & in ægris nonnunquam, interdum verò cum aliis humoribus mixta, frequentius cum bile, rarius cum humore melancholico. Sic Plato scribit, in *Timæo*, quod Galenus, 8. de plac. Hippocrat. & Platon. cap. 5. repetit, pituitam acidam & saliam esse fontem omnium morborum, qui κατὰ φύσιν sunt, aut à destillatione ortum habent. Præterea sunt excrementa illa σκάρη suâ plerumque tenuia & acria, nonnunquam crassa, accedente vtrouque lentore. Quod ad cæteras qualitates, maximâ ex parte sunt frigida, interdum de caliditate aliquid participant; quædam item dulcia, vel insipida sunt, quædam salia, acria, aut amara, siue per adustionem talia sint facta siue per putredinem, siue per admistionem seri aut bilis, quædam acida, summè cruda, aliisque qualitates habent, prout ex corruptis humoribus genita sunt, aut ex cibo potuue resoluta, iterumque in liquorem densata. Sed ferè principio pituita est tenuior, vbi diutius in corpore hæret, sensim calore crassescit, vt ex tenui & aquæ primùm lenta & mucosa fiat, postea vitrea, tandem gypsea.

**II.** De causis excrementa in cerebro gignentibus & cumulantibus sciendum est, cerebrum, veluti tectum fumosæ domui impositum, assidue excipere halitus & vapores ex imis in variis coctionibus sursum eleuatos, tum per parentes vias venarum, arteriarum, ventriculi, gulæ, tracheæ; tum per occulta spiracula, quæ in viuentibus semper hiant, à spiritu & calore reserata. Ea enim est halituum & vaporum natura, vt continuò suâ leuitate sursum ferantur, donec vel dissipentur in itinere, vel in cerebrum ingredientibus, ibique condensati, & in liquorem coacti inde delabantur, propemodum vt nubes & pluuiæ ex terræ halitibus reciproco motu generari solent. Neque solum excipit vapores cerebrum, vt limes corporis superioris extremus, sed si immoderatiore calore præditum sit, huius vi plurimum quoque ex vniuerso corpore attrahit. Quod etiam faciunt meditationes intensiores & frequentiores, qui-

bus cum spiritus animales absumantur, vitales multos iis reficiendis suppeditari necesse est, cum quibus humores & vapores, qui in corpore abundant, facili in caput rapiuntur. Quod si præterea ex inferioribus membris aliquod, hepar inprimis, discrasia calidâ laboret, non tantum sanguinem adustum ad caput mittit, per totum venarum ambitum, præcipue verò per venas jugulares externas & internas, sed simul etiam caput calidorum halituum copiâ replet, quos cerebrum discutere nequit.

Accedit & hæc causa, quod cerebri & medullæ substantia ampla in homine perse multo indiget alimento, à quo multum etiam excrementorum gigni, facili est intelligere.

Si denique cerebrum suâ naturâ frigidius humidiusque sit, ac debiliter & imperfectè nutrimentum suum concoquat, aut si à quacunque alia causa copiâ crudorum halituum obruatur, accedente otiosa vitâ & victus intemperantiâ, magnum ex his causis excrementorum in cerebro prouentum existere, necesse est.

**III.** Quoad locum excrementorum cerebri, ille plerumque extra vasa continetur. Nam de sanguine, qui in vasis intra cranium ultra mensuram abundat, vt phrenitidis, apoplexiæ, anginæ, parotidum, aut tumorum aliorum calidorum in capite autor est, in præsentia nihil dicemus. Extra vasa autem excrementa illa (crassiora scilicet. Nam tenuia per suturas cranij exeunt) vel intra cranium, vel extra hoc continentur. Quæ intra cranium in cerebri ventriculis, anfractibus, poris substantiæ eiusdem, & circa meninges consistunt ea, si copia modum excedunt, maxima sui parte in palatum decumbunt, per vias ad hunc vltimum destinatas: reliqua per foramina secundi paris neruorum cerebri, vt Vesalius docet, ad oculorum radicem feruntur, vnde per amplum quoddam foramen, & minora alia in narium capacitatem corruunt. Si immoderatiore abundant, per sinus organorum olfactus, & per os narium, aliquid etiam in nares expurgatur, via non naturali nec legitima, vt in coryza siue grauedine contingere solet. Docetque Galenus, 8. de usu part. cap. 6. in sanis non necessariò pituitam per nares excerni, sed sufficere expurgando cerebro illos canales, qui è glandula pituitaria in os desinunt, vsuque proprium narium esse, odores excipere, & respirationi inferuire, pituitam verò effundi per narium meatus ex vsu abundante. Quæ extra cranium, sub cute præferrim verticis, cumulantur, ea vel ex ramulis jugularium externarum per faciem & tempora sursum imparis, & in cutem desinentibus resudant, vel ex halitibus per illas venas effumantibus concresecunt. Nam hæ venæ omne superuacaneum in cutem effundunt, quod ibi retentum accessione nouorum halituum assidue augetur, & in liquorem cogitur, qui sæpe cutem à cranio diuulsam in tumorem satis manifestum, instar cere mollem, attollit, interdum putredine accedente achores, aliosque tumores & pustulas in capite parit.

**IV.** Quod ad affectiones præter naturam, quæ ab excrementis cerebri gignantur; excrementa illa, quæ intra cranium coacervantur, in corporis partes internas magna ex parte præcipitantur. Atque si materia ad ventriculos cerebri expressa membranas cerebrum inuestientes vellicet, epilepsiam; si ad basin cerebri & principium neruorum delabatur, apoplexiam; si ad spinalem medullam & neruos detrudatur, stuporem, paralytin, tremorem, & conuulsionem gignit. Quæ verò ad anteriores capitis partes fertur, si ad nares confluat, grauedinem, aut odoratus læsionem; si ad oculos, cæcitatem; si ad aures, tinnitum aut surditatem affert. Quod denique per os delabatur, si in fauces procumbat, Catarrhum propriè dictum si in columellam, ραρόλη, hoc est, vix specie apparentem,

Excrementa cerebri per qua loca euacuantur?

Quæ pr. n. affectiones ab excrementis cerebri gignantur?

apparentem, in dependente illa tumorem; si in musculos laryngis, anginam; si in trachæam arteriam, bronchum; si in pulmones, tussim, asthma, dyspnœam omnem, sputum sanguinis, phthisin; si in thoracis cavitatem, empyema; si in ventriculum *ἀσθία*, lenteriam, vomitum; si ex ventriculo porro in intestina effundatur, diarrhœam; si ex intestinis in hepatis sese insinuet, obstructions hujus, aliorumque viscerum efficit. Neque solum per patentès hæc vias materia à cerebro defluit, sed nonnunquam tantum per larentes, cuiusmodi potissimum sunt venæ & arteriæ. Quæ enim tenuis & acris materia est, primò latas siue amplas, mox angustas quoque venas ingreditur, atque ita per vniuersum corpus distribuitur. Quæ verò crassa est, in amplioribus venis derenta, eas obstruit; vnde putredo & febres, vel diariæ, vel putridæ excitantur.

Descendit aliquando etiam materia à capite per arterias ad oculos; vnde diuturnâ & acri fluxione illi infestantur, à qua vix sanari possunt, nisi arteriæ dissecantur, vt Galenus, 13. *meth. med. cap. ult.* scribit.

Cæterum quæ excrementa cerebri extra cranium, sub cute potissimum verticis, congeruntur, in externas ferè corporis partes diffunduntur: quæ scilicet aut ob situs opportunitatem, aut ob imbecillitatem, excipiendæ fluxioni magis aptæ sūt, vt in oculorum partes externas; vnde lachrymarum fluxus & tumores præter naturam existunt, in maxillas, in dentes, in ceruicem, in scapulas, in brachia, in latera, in dorsum, in coxendicem, in crura, in omnes denique articulos. Atque ita externa hæc destillatio omnis arthritidis, (ah rectè, suo loco dicitur) omnisque ferè doloris externi, qui sine tumore manifesto est, causâ à Fernelio statuitur. Etsi autem cranij interuentu hi fluxionum, internæ scilicet & externæ, fontes distinguuntur: tamen inter se communicantur per venas & arterias, & per poros membranarum, vt ab internis semper aliquid penetret ad externa, & ab his vicissim intra cranium quædam subeant. Vt ita verum sit, quod Hippocrates, *lib. de princip.* scripsit; *ὁ ἐν κεφαλῇ ἐστὶν μετὰ πόλιν τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ κολλώδες*: Cerebrum est metropolis frigidi glutinosi seu pituitosi humoris. Caputque multum ad feri in totum corpus distributionem facit. Cum enim extra & intra caput venæ & arteriæ multæ, in quibus etiam serum multum continetur, perrepent, sanguis quidem in nutrimentum capitis absumitur, serum autem cum ad nutriendum ineptum sit, neque tamen pervias, per quas ad caput pervenit, recurrere, neque ob cranij densitatem sensibilibiter exsudare, neque etiam insensibilibiter ob calorem illarum partium debiliorem discuti possit, eò loci cumulat; & cum pondere suo natura deorsum tendat, & in loco declivi hæreat, faciliè à capite secundum ductum membranarum & nervorum in inferiores corporis partes descendit. Quæ autem in genere de fluxionibus istis à capite curandis dici possunt, faciliè ex iis, quæ supra, *part. 1. de Interperiebus capitis cum materia*, diximus, patent, & ex iis etiam, quæ jam de Catarrho dicemus, patebunt.

Postquam hæc in genere de excrementis cerebri diximus, jam de Catarrho in specie dicemus. Sunt enim symptomata in excretis hic duo: cum scilicet excrementa illa copiosius, quàm debent, excernuntur; quod symptoma in genere Catarrhus appellatur: vel cum detinentur; de quibus jam in specie agemus, & primò de Catarrho.

### De Catarrho.

Duo præcipuè vocabula occurrunt, quibus motus humorum præter naturam in corpore nostro exprimentur. Generalissimum est *ῥεύμα* & *ῥευματισμός*, fluxus seu fluxio, quæ vox omnem motum cuiuscunque humoris è quacunque in quacunque partem nostri corporis significat. *κατάρρεω* verò, *κατάρρεω*, & *κατάρρεω*,

Celfo destillatio, (malè enim Argenterium, in *comm. ad aphor.* 4. *lib. 2.* scripsisse, Latinos non habere proprium vocabulum, quo Catarrhi nomen expriment, ex Plinio, *lib. 19. cap. 6. & lib. 23. cap. 8.* patet) Græcis etiam aliàs *κατάρρεω*; tantum humoris superuacanei è capite, & præcipuè cerebro, in alias partes prolapsus & defluxus significat.

Auicennas tamen, ejusque interpretes, & superioribus seculis alij Arabes secuti, hæc vocabula confundunt. Vnde, *lib. 3. Fen. 2. tr. 1. c. 11.* anginam, pleuritidem, & peripneumoniâ à Catarrho fieri, Auicennas scripsit.

Catarrhi nomen rursum tripliciter sumitur, vel generalissimè, pro quacunque humoris in partem corporis quacunque fluxione. Ita, 3. *aphor. 1. 2.* Catarrhi vox tribuitur fluxionibus per venas & arterias ad pectus & cor, vt ex Hippocrate, *lib. de aere, aquis & locis* patet. Ita *κατάρρεω* defluxio in spinalem medullam nominatur, in *Coac. prænotion.* Sic Catarrhi ad dentes, ad oculos, ad aures, ad nervos & ad musculos acinania membrorum spatia, vnde dolores varij oriuntur, fieri dicuntur.

Deinde Catarrhi nomen strictius quidem, sed generaliter adhuc sumitur de fluxione humoris è cerebro in palatum, ac os & nares. Specialissimè verò Catarrhus est defluxio humoris è cerebro in palatum, os, ac pulmones. Atque ita Catarrhi vox generaliter accepta tribus fluxionibus tribuitur, Catarrho in specie dicto, Brancho, & Coryzæ. Hoc autem loco Medici non de Catarrho generalissimè accepto, seu de omnibus, quæ à cerebro & capitis vasis ad alias tum remotas, tum vicinas partes fieri possunt, fluxionibus, de quibus antea in genere diximus, sed de Catarrho in posterioribus duabus significationibus accepto agere solent. Quos & nos imitabimur. Interdum tamen & quædam immiscebimus, è quibus & aliarum è capite fluxionum generatio innotescere possit.

In specie enim Catarrhus est defluxio humoris à capite in palatum, os ac pulmones, teste Galeno, 3. *de Sympt. caus. cap. 4. & 2. Prognost. text. 64. & in comment. 12. Aphor. lib. 3.* vbi scribit: (ita enim legendum; cum locum hunc Leoniceus & Altimarus malè verterint) *Per hæc verba videtur Hippocrates significare, non qui maximè consueto more catarrhi dicuntur, qui ex capite per asperam arteriam in pulmonem, sed omnes, quæ à capite per venas deferuntur, fluxiones ad partes inferiores.* Branchus verò est excrementorum è capite in fauces destillatio, cum vocis obscuritate & raucedine. Coryza verò, sicut posteriores Græci hoc vocabulo vsi sunt, est ejusdem humoris in nares defluxus. Latinis Grauedo dicitur, quod in parte corporis anteriore circa frontem sensus quidam grauitatis percipitur, vt oculi vix attolli queant. Hippocrates tamen Coryzæ vocabulum olim generalius vsurpauit.

Verum etsi vsus ita obtinuerit, vt Catarrhus in specie dictus à brancho ita distinguatur, quod in brancho præcipuè catarrhus ad vocis instrumenta decumbit: tamen vtrique ex eodem cerebri loco, & in os humor defluit, ac præterea nonnunquam etiam in ventriculum catarrhus delabitur, qui tamen peculiarem appellationem non accepit.

Est igitur Catarrhus, vt quidem hoc loco de eo agimus, in genere symptoma præter naturam excretorum è cerebro, vt ex Galeno, 3. *de Sympt. caus. cap. 4.* patet, seu humoris excrementitij fluxus præter naturam è cerebro in partes inferiores.

In specie verò, ejusdem humoris è cerebro ad palatum, os, & pulmones defluxus, factus expultrice cerebri ad ea, quæ sibi molesta sunt, expellenda stimulat. Neque enim secundum naturam iis, qui optima valetudine fruuntur, eiusmodi materia destillat, sed exigua saltem salinæ aut mucis pars interdum per os aut nares detruditur. Afficitur autem hîc primò cerebrum, sicut ex eodem Galeni loco constat. Quale enim

Catarrhus.

Catarrhus specialiter acceptus quid sit

Catarrhus generaliter & specialiter sumptus quid sit

in ventriculo diarrhoea est, orta ex *normis*, siue mala & imperfecta eius coctione, tale in cerebro est catarrhus & Coryza.

*Causse.*

Proxima nimirum Catarrhi causa est humor, seu quantitate seu qualitate facultatem cerebri expultricem ad expellendum stimulant. Vt autem generatio & natura Catarrhi recte explicetur, cum materia, tum efficientes causas consideranda sunt: seu, quod in omni fluxione necessarium est, considerata materia seu mobile, mouens, terminus à quo, seu locus, vnde supeditatur materia, locus per quem, & terminus ad quem. Ideoque dicendum de Catarrhi materia, vbi ea generetur, quibus de causis, vnde moueatur, ad quas partes & per quas vias fluat.

Proxima  
Catarrhi  
causa.

Materia  
Catarrhi  
quae  
in fit?

Materia Catarrhi est humor excrementitius, cui pituitae nomen vulgò tribuitur. Licet enim excrementitij huius humoris pro alimenti & humorum ac vaporum, qui à partibus inferioribus ad caput mittuntur, diuersitate magna sit diuersitas, dum interdum nulla insigni qualitate praeditus est, & saltem copia peccare videretur nonnunquam etiam alienam qualitatem habet, & frigidus est, vel calidus, acidus, salus, acris, male coloratus, nonnunquam etiam corruptus & substantia peccans; vnde Catarrhi epidemij & contagiosi ortum habent, vt infra de differentiis dicitur: tamen omnis ille humor excrementitius de capite destillans pituita nominatur; cum peculiarem alterationem in capite à cerebro accipiat. Vt enim aliae partes, sic & cerebrum, habent innatam & propriam vim, non solum assumptum alimentum coquendi & assimilandi sed & excrementa peculiari modo alterandi & elaborandi.

Vbi, & quibus  
de causis  
Catarrhi  
materia generetur.

Colligitur autem humor iste in capite & cerebro, quod ob id, vt dictum ab Hippocrate, *lib. de princip.* (aliis de carnibus inscribitur) pituita metropolis appellatur. Ceterum Catarrhi materiam alia gignunt, & suppeditant, alia mouent & ad fluxum impellunt. Gignitur & colligitur materia in capite, vel ipsius cerebri, vel partium inferiorum vitio; seu generatur materia in capite vel lesa facultate cerebri coctrice, ob morbum, vel frustratam ob errorem externum, dum scilicet aut nimia copia alimenti cerebro offertur, aut id alienis qualitatibus infectum actioni eius resistit.

Cerebrum materiam Catarrhi suppeditat, & gignit, cum ob debilitatem nutrimentum non bene concoquit, & ita multa excrementa gignit; & cum vapores in caput ascendentes non resoluit ac discutit. Idque accidit ob frigidam in primis cerebri intemperiem, praecipue si humiditas concurrat. Et pro materia dispositione nunc excrementum pituitosum, insipidum, & subdulce parit; nunc acidum. Atque huc facit aetas senilis, aer frigidus & humidus, pluuiosus, & hyems, quo tempore cum pituita abundet, etiam Catarrhi sunt frequentiores, somnus nimis ac longus, & in loco humido ac subterraneo, diurnus item, pedum refrigeratio. Calidum vero & siccum cerebrum, etiam si, *in arte medica, cap. 18.* excrementis carere dicatur, tamen id de cerebro intra sanitatis limites constituto accipiendum est. Si vero intemperatum sit, alio modo ad Catarrhos generandos facit, dum scilicet copiosius ab inferioribus attrahit Catarrho materiam.

Non vero semper cerebri & capitis vitio materia catarrhi principaliter colligitur, sed saepe etiam partium inferiorum culpa, puta ventriculi, hepatis, lienis, venarum mesaraicarum, vteri, imò & nonnunquam torius venosi generis: quae partes cum vitiosos humores cumulant, non solum multi vapores ab iis ad caput ascendunt, sed & ipsi vitiosi humores ad caput feruntur & protruduntur, atque ab illo rursum ad subiectas partes descendunt & defluunt. Vnde frustra saepe in ca-

tarrhis auertendis ad caput solum respicitur: cum fons mali, vnde catarrhus gignitur, in partibus longè remotis hæreat, ventriculo puta, hepate, liene, vtero. Magis tamen catarrhis obnoxij sunt, qui cerebrum debile habent. Illud enim humores & vapores ex partibus inferioribus facile admittit. Cerebrum vero robustius vel non admittit, vel facile discutit. Atque ad hoc causae genus pertinent omnia, quae ad vitiosorum humorum in ventriculo & partibus aliis inferioribus generationem & collectionem faciunt, vt crapula, ebrietas, victus ratio humida, cibi, à quibus multi vapores ad caput attolluntur & difficulter coquantur, & ob quos ventriculus non clauditur, vt & alia omnia, quae in aliis partibus inferioribus humores vitiosos generant.

Ea enim ipsa materia, quae à partibus inferioribus supeditatur, atque in cerebro & capite colligitur, non solum ex eo per internas vias & intra cranium in partes subiectas delabitur; sed & excrementitij humores in externis partibus colliguntur, maxime sub cute verticis, quò venarum per faciem & tempora caput irrepentium extrema desinunt. Nam quoties hæ vel sero, vel alio humore excrementitio turgent, supernacanea sub cutem effunduntur, & in externas corporis partes feruntur, non tantum intra cutem & carnem, sed etiam per continuitatem musculorum, membranarum, neruorum, per venas, arterias, atque in oculos, in dentes, in maxillas, in ceruicem, in scapulas, in brachia, in latera, in dorsum & lumbos, in coxendicem, in crura, & alias partes externas influunt, vt supra etiam dictum: vnde dolores in variis partibus excitantur; quandoque & tumores. Atque hinc Fernellius, *l. 5. de part. morb. & sympe. c. 4.* destillationem seu catarrhum in genere dictum diuidit in Internum & Externum.

Materiam vero in cerebro seu eius vitio ibi genitam seu aliunde transmissam, commouent & ad motum, ac vt in partes subiectas defluat, impellunt, primò expultrix cerebri irritata à materia vel copia, vel qualitate vel vtraque. Dum enim plus humoris excrementitij in cerebro collectum est, quam vt à natura sensim & quotidie per consuetas vias euacuari possit, id eius copia grauat, & se exonerare cupiens, confertim ad partes inferiores eum protrudit. Idem facit, dum eius salsedine, acredine, vel corruptione stimulat.

Vnde mouetur  
materiam  
Catarrhi.

Deinde commouent materiam in capite congestam causae frigefacientes, vt aer frigidus, venti boreales, medicamenta frigida capiti applicata; id quod & experientia testatur, quaecunque etiam vi id praestent. Vulgata equidem opinio est, frigus comprimendo & constringendo cerebrum id praestare. In dubium tamen id vocat Mercatus, *lib. 2. Prax. cap. 1.* qui impossibile existimat, vt cerebrum in animali viuentem tantam possit sustinere frigiditatem, vt partes praë congelatione densatae intra cranium humores expellant. Ipse vero putat frigiditatem aeris ambientis cutem & partes externas densare, partes vero internas calidiores inde fieri, quò calore commotis & liquatis humoribus, ac viis apertis, fluxiones excitantur. Verum probabilius est, non à calore aucto tum Catarrhi materiam moueri; sed à frigore partim poros occludi, per quos alias vapores discuti solent, & hinc materiam Catarrhi cumulari, partim vapores in capite collectos condensari, & in humores mutari, & forsan etiam cerebrum non nihil costringi; cum viæ satis parentes sint, per quas frigus intrò ad cerebrum penetrare possit.

Humores quoque fundunt causae calefacientes, vt æstus, radij Solares, & omnino aer calidus, ob què tempore verno Catarrhi frequentiores sunt, quod hyeme in capite collecti aëre calidiore resoluantur, ac diffuant; calor item balnei, hypocausta calida, frictiones intemperstiae capitis cum pannis calidis, motus animi & corporis vehementes, medicamenta calida, mox à cibo usurpata, coopertura capitis nimia.

Ad quas  
partes fluat  
materia Ca-  
tarrhi.

Materia verè siue è cerebro expulsa, siue quacunque causâ comora vt fluat, in Catarrho in specie dicto fluit vel ad nares, vel in fauces & palatum, & his subiectas partes. In Catarrho generaliter sumpto ad loca multò plurà defluit, nimirum vel in totum corpus cum sanguine per venas, atque hinc gignitur interdum febris catarrhalis nominata, interdum atrophia vel cachexia, quæ non ab hepate, sed capite ortū habet, vel ad partē aliquam extra cranium, oculos, aures, nares, os, fauces, thoracem, ventriculum, artus, vt modò dictum.

Febris ca-  
tarrhalis.

Illud tamen, quod modò de febris catarrhali dictū, diligenti consideratione dignū est. Etsi enim negandum non censcam, febrem quandoque hoc modo generari posse: tamen nec illud contra absurdum est, naturam, vt per febrium initia interdum excretionem qualdam per aluum, vomitū, hæmorrhagias narium instituit, ita & materiam ad caput protrudere posse, vnde Catarrhus generetur. Arque ita febrem talem esse ex earum genere quæ comitatæ dicuntur, febrique catarrhum accidere.

Fertur autem materia nunc ad hanc, nunc ad illam partem, prout attrahitur vel calore, vel dolore, aut trāsmiſsa recipitur ob partis debilitatem, vel ad recipiendā fluxionem aptitudinem, sicut hæc causæ, *Inst. lib. 2. part. 2. c. 11*. explicatæ sunt. Ab Hippocrate, *lib. de glandulis*, septem loca enumerantur, ad quæ fluit materia; aures, oculi, nares, palatum, venæ & arteriæ, vertebrae, spinæ dorsæ & nervi: de quo videatur Crato, *Consil. 3*.

Per quas  
vias fluat  
materia Ca-  
tarrhi.

Tandem etiam via per quam consideranda est. Nunc enim per partes internas è ventriculis cerebri, per vias intra caluariam, in os, fauces, pectus, vel nares materia fluit; nunc verò per externas partes, seu extrā caluariam potissimum sub pericranio, in partes corporis externas fertur.

Chymicorū  
de Catarrhi  
natura &  
caussis sen-  
tentia quo  
sit.

Atque hæc Galenicorum de Catarrhi natura & causis doctrina est, cui an aliquid lucis & perfectionis è Chymicorum dogmatibus accedere possit, dubito. Nā qui Mercuriū causam Catarrhi esse dicunt, nihil, quod animus veritatis auidū satiet, afferunt, nisi prius, quid Mercurius sit, explicauerint, de quo, in *tractat. de consens. & dissensu Chymic. cap. 12*. dictum. Qui Catarrhum Sal esse dicunt, etiam rem penitus non attingunt. Quanquam enim verum sit, Catarrhos multos salios & acres esse: tamen etiam nonnulli planè insipidi sunt. Qui verò morbum Tartareum esse dicunt, nihil aliud ferè, quam Galenici docent, nisi quod verbis saltem discrepant, & præterea dum dicunt, Tartarum esse impuritates & superfluitates, vtili alimento permittas, non ira propriè voce Tartari vtuntur, vt ex *tractat. alleg. cap. 16*. patet. Neque tamen hoc ipsum concedi potest, quod omnis Catarrhus ex impuritatibus & superfluitatibus alimento mixtis ortum habeat, sed sæpe nullo alimenti, vitio materia catarrho a gignitur, si scilicet cerebrum debile sit, atque alimentum satis elaborare non possit, atque multum excrementi ita generet.

### Differentia.

Catarrhi  
differentia.

Atque hinc variæ Catarrhorum sunt differentiæ. A materiæ varietate alius est puitosus, insipidus, subdulcis, acidus, salus; alius crassus, tenuis; alius contagiosus. A causâ efficiente, quod alius primario cerebri vitio, alius per consensum oritur. A loco, à quo fluit, quæ vel totum, vel aliquam partem esse diximus. A modo fluxus quod alius repentè & confertim fluit, qui Catarrhus *ὀνυχόεις* *ὀνυχόεις*, vulgo Suffocatiuus appellatur: alius sensum fluit.

Inprimis verò hinc notanda est differentia Catarrhi, cuius supra etiam facta est mentio, à termino à quo, & via per quam, & termino ad quem, in catarrhum internum & externum. Internus est, cum materia è ventriculis cerebri & locis intra caluariam in vicinas partes defluit, varios morbos excitans; de quibus supra

dictum. Externus verò est, cum in externas partes varias ruit, vnde tumores & dolores in oculis, dentibus, maxillis, ceruice, scapulis, brachiis, dorso, cruribus & articulis oriuntur.

Notatu præcipuè digna est differentia, quod Catarrhus alius est contagiosus & malignus, alius malignitatis expers. Vnde etiam alius est sporadicus; alius epidemius, qualis fuit, qui anno 1558. & 1577. grassatus est, de quo Mercatus, *lib. 2. pract. cap. 1. & lib. 4. de febribus cap. 15.* & Forestus, *lib. 6. de febr. observ. 1. & 2.* Valleriola, in *appendice Loc. Commun. cap. 2.* qui eundem morbum antea etiam anno 1510. viginisse refert. Inprimis verò ille, qui patrū memoria cum febre & tussi sub Syrii ortum, maximè autem circa nouilunium æquinoctij autumnalis, totam Europam, imò ferè vniuersum orbem peruagatus est. Nec ab similibus fuit febris illa catarrhalis, quæ anno 1591. in plurimis Germaniæ locis homines inuasit.

### Signa Diagnostica.

Catarrhus ipse facillè sensibus obuius est, quando scilicet humor è cerebro per os, nares, oculos præter naturam excernitur; vel si ad partem aliquam corporis dilabatur, atque in ea continetur, ex effectis, functionibus eius partis læsis, qualitatibus atque excrementis à naturali statu mutatis, percipitur. Qualis autem materia catarrhi sit, agnoscitur à substantia eius, qualitate, atque alijs circumstantiis. Si enim Catarrhus sit tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi appareant, partes, per quas defluit, exasperentur & exulcerentur, si amaritudo, salcedo percipiatur, si febris adsit, quæ tamen non iuuat, si calida adhibita noceant; à materia calida, & quæ salios humores admistos habet, erit Catarrhus; præsertim si ætas, temperamentum, habitus corporis, ærisque constitutio, & victus ratio præcedens consentiat.

Si verò humor, qui destillat, sit insipidus, minimèque mordax, ac grauitas & tensio, citra oculorum & faciei rubedinem & calorem, adsit, ac præcesserit victus ratio frigidior, cruditas ventris, & cum his consentiat ætas, temperatura, æris constitutio; materia Catarrhi erit frigida.

Verum hinc notandum, materiam Catarrhi posse esse frigidā, cum tamen causâ impellens & mouens sit calida; vt si ex humore puitoso soluto & liquato à radiis Solaribus, à balneo calore externo, & similibus Catarrhus fiat. Contra materia Catarrhi calida à frigore moueri potest. Itaque diligenter inter se conferenda sunt signa materiæ & causarum mouentium ac impellentium. Etsi enim quis ex mora sub Sole, & balneo, vel exercitio corporis nimium incaluerit, atque ita catarrhum contraxerit: si tamen materia non sit acris ac mordax, falsa vel amara; frigida potius, quàm calida dicenda est. Contra etsi diutius quis sit versatus in aëre frigido: tamen si materia sit tenuis, acris, mordax, falsa, vel amara; iudicandum, materiam Catarrhi esse calidā, etsi causā eam mouens sit frigida.

Inter materiæ condiciones perpendenda quoque signa sunt cruditatis & coctionis, quæ Galenus proponit *lib. de totius morbi temporib. cap. 8.* *Humorum*, inquit, qui è cerebro per palatum & nares defluunt, indicium quidem est, cum aquei tennesque item copiosi & acres apparent. Extremam enim hoc cruditatem indicat. Coctionis verò nota sunt, crassior & minus acris, modiceque humor descendens. Quod si mucus etiam simul egrediat, certius iam hoc coctionis signum est.

Verum quanquam Catarrhum è materiæ qualitate cognoscere non ita difficile est; sicut quoque ex ægri relatione facillè innotescit, si quæ causâ catarrhum mouens præcesserit: longè tamè difficilior: sed quod ad curationē rectè instituendam magni momenti est, partem inuestigare, in qua materia Catarrhi primò generatur. Neque



Neque enim; vt dictum, semper in capite gignitur, sed sæpe à partibus longè remotis suppeditatur; ideoque tunc frustra medicamenta capiti adhibentur, nisi materia prima scaturigo sublata sit.

Materiam in capite generari indicio est, si Catarrhus diu perseverauerit, & æger facillè ac sæpe eo affligatur, nec aliarum partium affectarum signa adsint. Cum autè caput laborat, distinguendum est an intemperies sit frigida vel calida; de quo supra, *parte 1. de intemperie capitis*, dictum.

Si verò intermissiones vel dierum vel mensium adsint, magna ex parte ab inferioribus partibus materia Catarrhi suppeditatur. Vnde verò transmittatur, cognoscitur ex partis debilitate, & excrementis consuetis retentis. A toto corpore materiam Catarrhi suppeditari, indicio est, si febris adsit, & cum huius paroxysmis catarrhus augeatur vel minuat. A parte verò aliqua materiam Catarrhi suppeditari, argumento est, si alicuius partis morbus adsit vel præcesserit. Pars enim debilis semper plura excrementa cumulat. Sic quoque si partis alicuius excrementa retinentur, à parte illa humorem excrementitium suppeditari, indicio est. Ita quidam ex alui obstructione Catarrho laborant; alij ex suppressione sudoris consueri, vel hæmorrhoidum, vt & fœminæ ex suppressis mensibus. Si verò totum corpus, omnesque partes bene constitutæ sint, Catarrhi materiam ex victus ratione atque errore collectam esse indicatur; id quod ex ægri relatione facillè cognoscitur.

Patefit quoque facillè pars, in quam Catarrhus decumbit. Si enim per arteriam transit, & in pulmonem dilabitur, oritur tussis; si in ventriculum, *de opothymia*; si per partes sub cute externas fertur, ex dolore vel vago, vel cæcæ partium id. deprehenditur.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Catarrhus non contemnendum semper malum est, & qui frequentius catarrhis, præsertim grauioribus, infestantur, ij variis morbis pectoris, & in primis phthisi, sunt obnoxij.

2. Destillationes & raucedines senibus familiares sunt, teste Hippocrate, 3. *aphor.* 12. & in valde senibus coctionem non admittunt, 2. *aph.* 40. quia à frigidis causis oriuntur, quas calor senum imbecillis superare facillè non potest. Destillatione etiam cum impetu ad pectus ruente ex valde senibus nonnulli repente intereunt; aliis pars dextra vel sinistra resoluta stupet, teste Hippocrate, *lib. de aer. aqu. & loc.* Id quod, vt Galenus 3. *aphor.* 12. monet, non tam de consuetis catarrhis, qui ex capite in pulmones decumbunt, & diuturni esse solent, quàm de fluxionibus, quæ ex parte affecta per venas in subiectas partes feruntur, & subito nonnunquàm mouentur, intelligendum est. Cuius generis etiam Catarrhus fuit, quo ante aliquot annos Professorè hic celebrem p.m. laborare memini. Corripiebatur illo subito ante vesperam, cuius quidem pars magna per nares euacuabatur, reliqua verò ad linguæ principium decumbebat adedò, vt loquendi potentia ipsi adimeretur, reliquis sensibus internis & externis nihil læsis. Vnde in tabula, quo loco sibi malè esset, scribere necesse habebat. A quo symptomate clystere injecto, frictionibusque crurum adhibitis, intra paucas horas liberatus est.

3. Imò destillationes ex humore frigido ortæ neque in iuuenibus facillè coquuntur, propter magnam cerebridyscrasiam frigidam. Galenus, 2. *aphor.* 40. Destillationibus etiam pueri obnoxij sunt; quoniam cerebrum habent humidius, & excrementis plenum. Galenus, 3. *aphor.* 26. Quibus etiam sæpe suffocantur, si ad pectus ruant.

4. Catarrhi naturâ suâ frigidi diuturni sunt, difficulterque coquuntur, sicut omnes morbi frigidi; Catarrhi

Dan. Sennerti Tom. II.

verò calidi, & à causa calida orti citius finiuntur. Si verò vim erodendi habeant, periculosiores sunt, quia partes exulcerent. Cumque propter tenuitatem expelli nequeant, vehementem tussim excitant, qua caput magis repletur, & periculum est, ne pulmones exulcerentur. Et cum propter tenuitatem expulsionem resistant, metus est, ne vas aliquod rumpatur.

5. Ratione termini à quo etiam periculum aestimari potest. Si enim magna plenitudo sit corporis vel capitis, & omnino magna destillantis materia copia, periculum non contemnendum est; cum, si subito & confertim ruat, strangulationem asferre possit.

6. Ratione viæ & spatij, per quod fluit, minus periculosus est catarrhus, qui fluit per nares; magis, qui per tracheam & oesophagum; minus etiam periculosus est catarrhus, qui per inania membrorum spatia discutrit; magis periculosus, qui per nervos & venas; pessimus, qui per arterias; quia lyncopen minatur.

7. Ratione termini ad quem Cellius, *lib. 4.* ita distinguit. Si in nares destillatio fiat, lenè est; peius, si in fauces; pessimus, si in pulmones, vbi periculum est ab exulceratione; & addit: Si destillationes breues neglectæ fuerint, longæ esse consueuerunt.

8. Dolor capitis coniunctus cum catarrho augeat fluxionem; quia ob dolorem fit attractio.

#### Indicationes & Methodus curandi Catarrhos.

Tria potissimum in curatione Catarrhi attendenda: *Indicationes.*  
1. Pars, à qua catarrhus provenit. 2. Humor, qui est Catarrhi materia. 3. Pars, per quam, & ad quam fluit Catarrhus.

Primum quod attinet: cum in omni catarrho materia à capite fluat; capitis in omni catarrho habenda est ratio. Verum cum materia in capite quandoque generetur, quandoque aliunde transmittatur, non solum ad caput curam dirigere satis est, verum etiam ad partem, quæ materiam suppeditat, respiciendum; vt hæcenus aliquoties, & supra etiam, *part. 1.* dictum est.

Simul tamen respiciendum ad causam, ob quam fluere incipit materia, perpendendumque, an causa aliqua externa humorem ad motum impulerit. Et si moueatur materia attracta, causa attractionis, dolor aut calor, anodynus aut frigidus tollenda; si moueatur materia propter refrigerationem, caput calefaciendum; si propter caliditatem, refrigerandum. Qua in re tamen, vt antea dictum, attendendum, an causa excitans fluxionem fluenti materia sit contraria, ne, dum causæ fluxionis remedia opponimus, ipsam causam malique principium augeamus.

Secundo. Si materia catarrhi in capite tota generetur, nec sit copiosa, tantum sua temperies cerebro restituenda: à quo facillè discutietur. Si verò materia sit copiosa, euacuanda est, postea reliquum eius exsiccandum & absumendum. Ac si cum impetu & periculo in partem aliquam ruat, reuellenda, fluxusque eius omnibus modis sistendus. Si calida, acris, & mordax sit, refrigeranda, eiusque acrimonia mitiganda. Tandem pars, in quam catarrhus decumbit, si nobilis sit, confirmanda ne illabenti materia locum præbeat.

Summa: in omni Catarrho primum materia eius euacuanda, & ne amplius generetur, præcauendum, partisque, quæ eam suppeditat, vitiosa dispositio corrigenda: secundo caput roborandum: tertio humor, si ad partem nobilem, & in qua periculum aliquod euenire possit, fluat, auertendus & intercipiendus, ac materia vitiosæ qualitates corrigendæ & alterandæ: quarto pars, ad quæ fluit, si nobilis, roboranda. Seu in omni catarrhi curatione ratio habenda materiae fluentis, & causæ, propter quam fluit, & loci, per quem fluit.

Quibus autem auxiliis istis indicationibus satis fieri possit etsi maxima ex parte ex iis, quæ supra, *part. 1.*

X x 2

dicta

dicta sunt, patere possit: tamen quædam addere, & in specie de Catarrhi curatione aliquid dicere libet.

*De Catarrhi à Cerebro frigido, vel frigido & humido, seu pituitosi curatione.*

Catarrhi frigidi curatione.

Et primò quidem, si sine reliqui corporis, vel aliarum partium vitio, à solo capite vel præcipuè cerebro, ortū habeat Catarrhus; materia conuenienti modo præparanda & euacuanda, & si ἀδρῶς ac cum impetu, ad pectus ruat, auertenda, eiusque motus inhibendus, tandemque intemperies cerebri corrigenda.

Venefectio.

Itaque principiò, etsi materia solum à capite fluat, tamen si copiosa sit, aut maiore cum impetu ruat, atque metuendum sit, ne à reliquo etià corpore affluat, & catarrhum augeat, (sicut plerumque accidere solet, vt, qui catarrhis obnoxij sunt, cerebrum habeant frigidum, iecoris verò & reliqui corporis cōstitutionem calidam) etià in catarrho frigido, tum vena aperienda, & ab externa cubiti vena, & quidem parcè, sanguis mittendus. Si verò materia frigida sit pauca, nec cum impetu ruat, ac propter temperaturam ac cōstitutionem corporis reliqui, ætatemque senilem, nullus affluxus materiæ ad caput metuendus sit, venæ sectione opus non est.

*Præparantia.*

Præparantia.

Inter præparantia autem conueniunt ea, quæ supra, part. 1. de Intemper. capis. cum pituita, proposita sunt. Si autem materia ad pectus ruat, ad pectus quoque respiciendum: ideòque ex pituitam præparantibus eligenda cephalica & thoracica.

In præparatione verò & euacuatione catarrhi frigidi distinguendum, an materia sit tenuis & acris, an verò crassa. Nam si est tenuis, & aquosa quasi, incrassantia nonnihil adhibenda. Ac conuenit hic decoctum thuris, mastiches, fol. betonic. saluix, spec. diatragacanth. calid. nux moschata Si autem materia sit crassa, calefacientibus & attenuantibus opus est; qualia sunt, hyssop. marrubium, fœnicul. origan. oxymel. simpl. & scillitic.

℞. Aq. hyssop. betonic. an. Vnc. j. β. Syrup. de betonica 3. j. essent. salu. Scr. j. oxymel. simpl. Vnc. β. Misce.

*Purgantia.*

Purgantia.

Si materia tenuis sit & aquosa, inter euacuantia imprimis utilis est manna, quæ tenues humores educit; item mechoacanna, pilul. aloëphanginx, de hiera. Atque hoc etiam obseruandum, ne materia tenuis fortioribus purgantibus nimis agitetur, ne mora confertim & ἀδρῶς ad pectus præcipitetur; sed præstat lenioribus medicamentis eam sensim euacuare.

Materia verò crassa agarico, pilul. cochiis, de agarico, de hiera cum agarico, vel horum extractis, vel extracto aliquo phlegmagogo euacuanda. Ac si portio aliqui attulerit, infundatur agaricus in decocto cephalico & pectorali.

*Capitis euacuatio Particularis.*

Particulares capitis euacuationes.

Vniuersalibus euacuationibus præmissis, capitis euacuationes particulares, per errhina, apophlegmatismos, & gargarismos instituantur. Non tamen quælibet harum euacuationum in quolibet catarrho tutò institui potest, & videndum, ne per illas materia amplius agitata ad locum, in quem aliàs cum periculo tendit, affluat, sed potius ab eo auertatur. Ideòque si materia per palatum ad pectus, & præcipuè confertim, fluat, non per masticatoria, gargarismos, & apophlegmatif-

mos euacuanda materia, sed potius per errhina. Eadem ratio est, si materia ad ventriculum fluat. Si verò ad oculos, aut ad nares iam antea morbo affectas fluat, potius per masticatoria & apophlegmatismos, quàm per errhina, euacuanda.

Errhina autè & apophlegmatismi supra, part. 1. sunt proposita. Inter errhina autem facile hic semen nigellæ primas obtinet, quod sæpius odoratum in quouis etiam catarrho vtile est. Ideòque torrefactum & aceto conspersum crebrò naribus admoueat, vel puluerisatum, & cum aqua maioran. mistum, naribus attrahatur; vel ol. nigell. naribus interioribus illinatur.

Vel 2℞. Aq. maioran. 3. iij. β. succi betonic. 3. j. sem. nigell. pulueris. 3. β. nux moschat. Scr. j. Misce.

Ditioribus aliquot grana ambræ vel moschi addatur.

Exempl. gr.

℞. Aq. maioran. Vnc. ij. moschi gr. ij. ambr. gr. j. Misce.

Laudatur & hoc:

℞. Ligni Guaiaci comminuti Vnc. j. aq. pure lb. j. affundatur aqua prius calefacta, & per noctem macerentur. Deinde coqu. ad medietat. consumptionem. Sub finem adde. maioran. rosar. rubr. an. P. ij. Colentur.

In vsu tamen horum remediorum notandum: 1. ne mox initio, & dum adhuc caput plenum est, ac materia nondum concocta, iis vratur. 2. ne fortius resoluentia in catarrho frigido, cuius materia tenuis est, sola vsurpentur, ne materiæ tenuis spontè aliàs ad fauces fluentis impetus ad pectus & pulmones augeatur, sed incrassantia quædam, aut quæ impetum humoris ruentis figunt, iis admiscenda; qualia sunt, rosæ rubræ, mastiche, spica Indica, semen coriandri, gummi iuniperi, atque alia, quæ in catarrhi calidi curatione proponuntur.

Hinc in catarrho tenui vel sola mastiche mastice-tur, vel hi Trochisci:

℞. Nuc. moschat. Drach. j. mastich. gummi Arabic. an. Drach. β.

Redigantur in puluerem, & cum aqua rosarum fiant Trochisci.

*Catarrhum exsiccantia & caput roborantia.*

Corpore & capite conuenienter euacuato ea adhibeantur, quæ exsiccando reliquam Catarrhi materiam absumunt, simulque caput roborant, partim interna partim externa, medicamenta, quorum multa supra, part. 1. de Intemper. capis. frigid. & humid. & de Intemper. capis. cum pituita, proposita fuerunt, quæ hic repetere non libet.

Interna quod attinet, sumatur de iis modò lenioribus, modò validioribus, prout vsus postulauerit, portio exigua vesperi ante somnum, & post prandium, vt eorum vis vnà cum vaporibus ingesti cibi ad caput feratur; manè verò stomacho ieiuno plus exhibere licet.

Vtilis est & hæc Mixtura.

℞. Spec. laris. Gal. 3. j. dianth. diamosch. dulc. an. 3. j. aq. anthos. meliss. an. 3. j. betonic. 3. ij.

Incalescant lento igne, vt ebullire incipiant, & permittantur in infusione horis 4. Postea colentur. In Colaturâ dissolu. confect. Alkerm Drach. sem. magister. corall. smaragdi, an. Scrup. sem. essent. rorismarin. Drach. β. aq. cardamomi apoplectica an. Drach. vi.

Misce.

De hac mixturâ cubitum ieiuro, & è lecto surgenti, cochl. i. propinetur.

Monendum & hoc: calidis cephalicis medicamentis exsiccandi, & vaporum ad caput ascensum prohibendi gratiâ conseruam rosarum commodè admisceri, etiam in Catarrho frigido.

℞. Con

℥. Conseru. rosar. rubr. Vnc. ij. spec. aromat. rosar. ℥. ij. nuc. moschat. ℥. j. thuris albiss. ℥. ij. Cum syrupo de rosas siccis, aut de betonica, F. Electuarium, de quo sub tempus somni portio magnitudine nucis iuglandis sumatur.

Vel ℥. Conseru. rosar. rubr. Vnc. ij. lauendul. anthos, salvia, an. Vnc. j. spec. dianthos, diamb. aromat. rosar. an. 3. B. corall. rubr. prepar. pulueris nuc. moschat, an. Scr. j. Cum syrupo stœchad. simpl.

F. Electuarium.

Vel ℥. Conseru. salvia; pœon. an. Drach. vj. rorismar, rosar. an. Vnc. B. nuc. moschat. condit myrobolan. chebular. cond. an. Drach. iij. acori cond. Drach. j. spec. diamosch. dulc. Drach. B. arom. rosar. Scr. j. sem. pœon. Drach. B. cubeb. Scr. j. coriandr. prepar. margarit. prepar. an. Scr. sem.

Cum syrupo de rosas & beton. q. l.

F. Electuarium, de quo mane & vesperi portio nucis moschatæ magnitudine capiatur.

Aliud:

℥. Conseru. rorismarin. salu. lauendul. an. Vnc. ij. pœon. Vnc. j. rosar. Vnc. B. confect. Alkerm. Scrup. j. specier. diaplir. Dra. B. solut. perlar. corallior. rubr. an. ℥. j. essent. salu. Drach. j. Mithridat. Drach. ij. aq. apoplect. Drach. iij. Cum syrupo de stœchad.

F. Electuarium.

Si forma Morfulorum placet, sequens Confectio de thure præstantissima est:

℥. Sem. coriandri prep. 3. B. nucis moschat. thuris, an. 3. iij. glycyrrh. mastich. an. 3. j. cubeb. 3. j. conseru. rosar. rubr. 3. j. sacchar. albi 3. x. in aq. rosar. dissol.

F. Confect. in Morfulis, quorum singuli 3. iij. pendant, de quibus mane & vesperi vnus sumatur.

Vel parentur seq. Rotulæ:

℥. Ol. nuc. mosch. expr. 3. j. margarit. prep. ℥. j. smaragdi prep. ℥. j. sacchar. in aq. lauendul. dissol. 3. vj.

F. l. a. Rotulæ, de quibus capiantur mane & vesperi 4. vel 5.

Alia:

℥. Specier. diamosch. diamb. an. 3. j. sucini albiss. ℥. j. ol. anisi gutt. iij. sacchar. in aq. lauend. dissol. Vnc. iij.

F. Orbiculi.

Vinum etiam hoc contra Catarrhos vtile est:

℥. Corric. myrobal. omnium, an. 3. j. B. cinamomi 3. i. caryophyll. galang. cubeb. cardamom. granor. paradisi, nucis moschat. an. Scr. j. rosar. rubr. siccarum Drach. ij. flor. anthos. lauendul.

Affundatur vini quantum libet.

In Catarrho diuturniore decoctum ligni Guaiaci, fassafra, radic. Chinæ, farsaparill. cum diætâ conueniente exhibitum cerebrum ab humore frigido sanat & liberat. Et omnino in talibus morbis cõtinuatione opus est, nec à medicamenti alicuius semel atque iterum saltem exhibiti vsu salus speranda. Quam ad rem vtilissima sunt vina medicata, vt & cereuisiæ.

Exempl. gr.

℥. Rad. caryophyll. M. ij. granor. iuniperi M. j. farsaparilla lb. j. B. salvia, rorismar. chamæpit. an. M. iij. caryophyll. galang. an. Drach. B.

Affundatur sufficiens quantitas musti vel cereuisiæ recentis in dolio conuenienti, vt fiat vinum vel cereuisia medicata.

Externa.

Externa.

Externa medicamenta caput roborantia, & catarrhū simul exsiccantia etiam supra, part. 1. sunt proposita, quibus pauca addemus. Adhibeantur in primis lotiones capitis & pedum, suffitus, pileoli, cerota seu emplastrâ, pulueres.

Lotio capitis & pedum.

℥. Fol. betonic. maioran. salvia, origani, an. M. j. Capitis & pedum lotiones. flor. anthos. chamamel. stœchad. viriusque, an. M. j. B. nigella Drach. ij.

Coqu. in lixiuio pro capitis lotionem ante prandium, à qua caput linteis calidis probè abstergetur. Efficacius remedium erit, si de sublimi embrochæ modo in caput demittitur.

Etiâ thermarum aquæ vim sulphuris habentes per embrocham capiti immissa plurimum valent ad lican- dum Catarrhum frigidum, si post diligentem capitis purgationem adhibeantur, ac victus ratio idonea seruetur.

Suffitus.

Ad suffitum linteorum, quibus caput exsiccat, vel suffitus tegumentorum capitis hic Puluis vtilis est:

℥. Trochisc. alipta moschat. fol. salvia, maioran. rorismar. an. Drach. B. lauri. caryophyll. cinamom. ligni aloës, an. Scrup. j. thuris, stiracis calamit. an. Drach. j.

F. Puluis carbonibus iniiciendus.

Si cum mucilagine tragacanth. excipiantur, Pastilli formari possunt, super carbones iniiciendi.

Vel ℥. Benzoes Drach. ij. styracis calamit. Drach. j. ligni aloës, cinamom. an. Drach. B. caryophyll. Drach. j. B. moschi gran. vj.

F. Puluis, vel Trochisci carbonibus iniiciendi pro suffitu.

Pileolus.

℥. Fol. maioran. salvia, origani, an. Drach. j. flor. stœchad. Arabic. Drach. B. lauendul. rorismarini, caryophyll. macis, nuc. moschat. ligni aloës, an. Scrup. j. thuris Drach. B. rosar. rubr. siccar. Drach. ij.

Trita & sacculo ex sindone rubra parato infusa futuræ coronali imponantur.

Vel ℥. Flor. rosar. rubr. M. j. meliss. organ. betonic. rorismarin. an. M. B. thuris, mastich. ligni aloës, gran. iuniperi, an. Drach. iij. nucis moschat. macis, an. Dra. j. caryophyll. 3. B. nucis cupress. 3. j. B. gran. Kerm. 3. j. B.

Præparata l. a. sindoni rubræ, ad formam pileoli concinnata, includantur, & cum gossyp. intersuantur.

Alius:

℥. Fol. meliss. maioran. betonic. summit. origani, an. M. B. rosar. rubr. P. ij. nucis moschat. caryophyll. an. Drach. ij. granor. Kermes, macis, an. Drach. j. B. thuris, mastich. an. Drach. iij.

In puluerem grossum redacta serico rubro includantur, & interpassentur. F. Pileolus.

Puluis capiti inspergendus.

Sub ingressum lecti anterior pars capitis hoc Pulvere conspergatur.

℥. Nigella torrefact. Drach. ij. rad. cyperi Drach. j. flor. rosar. rubr. stœchad. Arabic. an. P. ij. nuc. moschat. caryophyll. an. Scr. ij. succini Scr. j.

F. Puluis.

Vel ℥. Origani. stœchad. Arabic. maioran. an. 3. j. rosar. rubr. gummi iuniperi, an. 3. j. B. ligni aloës Drach. j. macis Drach. ij. F. Puluis.

Alius:

℥. Benzoes. 3. vj. styrac. calam. ligni aloës, an. 3. j. B. F. Puluis grossus.

Odoramenta.

Ad Odoramenta pertinent suffitus supra enumerati. Nigella quoque aceto rosaceo quatuor dies macerata

& puluerisata, ac cum aqua maioranæ mista, & in nates attracta non tantum caput purgat, sed & roborat.

Vel ℞. Rosar. rubr. caryophyll. sem. nigella, cinamomi, nuc. moschat. an. Scr. ij. styracis calamit. Scr. ℞. moschi gr. iij.

Includantur serico, fiatque Nodulus odoratu caput siccans & roborans. Pomorum ambræ & balsamorum descriptiones ad caput exsiccandum supra, *part. i.* propositæ sunt.

### Cerota & Emplastra.

Cerota & Emplastra.

Bregmati etiam imponi possunt cerotum de Beronica in dispensatorio Augustano descriptum, vel Montagnanæ hoc:

℞. Ladani, gummi elemi, inniperi, thuris, styracis liquid. calamit. myrrha, an. Drach. j.

Commista diligenter in formam Ceroti redigantur.

Vel ℞. Mastich. gummi inniperi, nucis moschat. caryophyll. an. Scr. j. ladani Drach. vj.

Ducantur pistillo calido in mortario, & addita olei mastichini ℞. q. F. Emplastrum.

Vel ℞. Macis, nuc. moschat. gummi inniperi, mastich. thuris, styracis. calam. an. Drach. j. ℞. rosar. rubr. ℞. ℞. ladani, ℞. iij. terebinth. cera, an. q. ℞.

F. Massa, de qua portio q. ℞. corio rubro ad conuenientem formam inducatur, sericumque rubrum superducatur, & interpassetur.

Vel ℞. Flor. rosar. rubr. ℞. ij. gummi inniperi ℞. j. macis, nucis moschat. an. ℞. ℞. caryophyll. Scr. j.

F. Puluis subtilis, & cum ladani, cere, ol. chamamel. vel irini ℞. q.

F. Ceratum.

Qua ratione autem Catarrhi fluxioni, si impetuosior sit, & cum periculo ad aliquam partem conferri ruat, occurrendum sit, paulo post in Curatione Catarrhi calidi dicitur.

### DE CATARRHI CALIDI CURATIONE.

Catarrhi calidi curatio.

Si verò materia Catarrhi sit calida, primo imminuatur leni pharmaco, ex decocto iuiubat. tebesten, prunor flor. violar. capillor. ♀, glycyrrh. hordei in quo manna Vnc. j. ℞. dissoluta sit, aut syrup. rosar. solut. Vnc. iij. vel iij. exhibeantur.

Vena sectio.

Si sit corpus calidius sanguine repletum, ut metuendum sit, materiam ad caput affluxuram, atque ipsa materia tenuis in partem aliquam cum vitæ periculo ruat, venæ sectione opus est, quæ corpus refrigeret, materiam euacuet, & ne ad caput, atque hinc ad partem aliquam, cum periculo ruat, impediatur. Si autem propter vires aut ætatem venæ sectione uti non liceat, cucurbitula illius vicem suppleant.

Preparantia.

Postea adhibeantur quæ humoris feruorem ac acrimoniam mitigant, ut sunt syrup. de ros. siccis, de succo acetos. violar. de nymph. de papau. cum aquis & decoctis refrigerantibus ac modice adstringentibus.

Propinetur igitur exempl. gr. talis Haustus:

℞. Aq. papauer. borrag. an. ℞. j. ℞. syrup. violar. ℞. j. essent. papau. ℞. ℞. spir. sulph. accidi gutt. iij. Misce.

Purgantia.

Euacuetur deinde materia rhabarbaro, tamarind. electuar. diacathol. diaprunis, dialebesten, rosato Mesue, de succo rosar. pil. Arab. aureis, & aliis, quæ humori huic conueniunt.

Corpore euacuato caput etiam priuatim euacuandum, ut antea dictum. Cauendum tamen, ne materia tenuis nimium agitur, unde periculum sit, ne ad pulmones cum impetu fluat.

Exsiccantia & caput roborantia interna, & externa.

Capite quoque euacuato reliquæ exsiccandæ, & caput roborandum. Interna sunt conserua rosar. spec. aromat. rosar. thus, nuc. moschat. Extra verò puluis capiti inspergatur, aut sacculus imponatur, ex floribus

rosar. rubrar. sem. coriandr. prepar. santalis, cortic. papau. albi, gummi iuniperi, thure, mastiche, quorum formulæ, vbi de sistendo catarrho dicitur, proponuntur.

Exempli gratia.

℞. Gummi iuniperi ℞. ij. flor. rosar. rubr. P. ij. myrtill. ℞. j. macis, nucis moschat. an. ℞. ℞. thuris sem. pæonia, cortic. papau. an. ℞. ij. nucis cupress. ℞. ℞.

Pulueriscentur, & cum floccis panni coccinei Fiat Sacculus ex sindone rubra.

Vel Cerotum tale fiat:

℞. Mastich. cortic. thuris. an. Drach. ℞. sandarac. corall. rubror. rosar. rubr. myrtillor. balaustior. cortic. granator. an. Drach. j. ladani q. ℞. Cum olei rosar. & cere ℞. q.

F. Cerotum ad futuram coronalem, obducendum sindone rubra.

In declinatione etiam ieiuno stomacho caput lauetur decocto rosar. maioran. beronicæ.

### DE CATARRHO CVM IMPETU RENTE SISTENDO.

Atque hæc quidem sæpe ad Catarrhum tam frigidum quam calidum curandum sufficiunt, si nimirum materię copia non magna sit, nec cum periculo ad partem aliquam, præcipue pulmones, ruat. Si autem Catarrhus cum impetu ad pectus & pulmones ruat, fluxus omnibus modis inhibendus.

Catarrhus cum impetu fluente sistendi ratio.

### Auertentia & Reuellentia.

Vniuersali corporis evacuatione præmissa materiam Reuellentia, diuertere, ne ad vtrum locum confluat, conuenit. Securius quidem omnino est, ut Meise monet, distillationem non subito sistere, & materiam in corpore retinere. Si tamen præsens suffocationis, vel pulmonum exulcerationis periculum imminet, omnino catarrhus sistendus est, & præsidii conuenientibus auocanda materia à parte nobiliore ad ignobiliorem, ac dissipanda.

Fiunt autem diuersiones per clysteres, per lotiones extremorum ante cibum, per frictiones & ligaturas eorundem, per cucurbitulas, ut supra, *part. i.* dictum.

Galenus etiam, *5. meth. med. c. 13.* in Catarrho calido emplastrum ex fimo syluestrium columbarum, & quod ex thapsia paratur, vlturpari de quo quid sentiendum postea, *qu. i.* dicitur.

Seraceum quoque occipiti applicari potest. Nonnulli reuulsionis gratia futuræ coronali cauteriū applicat. Verum quid de eâ re sentiendum, supra, *part. i. c. i.* dictum.

### Catarrhum intercipientia & incrassantia.

Si verò acris, & calidus fluxus sit, cum tussi vehementi, vigiliisque continuis, de sistendo Catarrho cogitandum est.

Intercipientia & incrassantia.

In sistendo tamen catarrho obseruandum, sistendibus catarrhum tantum vrendum esse, dum materia ad pectus destillat, non postquam ad pectus influxit. Tum enim potius quæ materiam collectam per rursus euacuant, conueniant. Et cum materia per forum ad pectus maxima ex parte fluat, post cœnam, sub ingressum lecti, exhibenda sunt Catarrhum sistentia, sicut per vigilias illud, quod in pectus iam influxit, euacuandum. Non tamen statim in principio rursus usurpantur sistentia, sed præstat potius diuertentia adhibere nisi forsitan materia cum periculo ad pectus ruat, & suffocationis periculum adsit.

Inseruiunt quoque huic scopo ea, quæ vim adstringendi & incrassandi habent, adhibita formâ syruporum eclegmatum, gargarismorum, pilularum, trochiscorum rotularum in ore detinendarum, odoramentorum, puluerum capiti inspergendorum, ac ceratorum. Et quidem



quidem si externa non sufficiant, interna, ut pilulæ de cynoglossa, quæ exhibentur à gr.vi. ad ði. sub tempus somni.

Vel ꝥ. *Thuris albiss. sandarac. Arab. myrrh. an. Dra. ð. ligni aloes, nucis moschatae, macis, croci, an. Scrup. i. ladani parissimi, styrac. calam. an. Dra. ii. moschi gr. v. Cum syr. de stœchade*

F. Pilulæ, è Drach. i. numero vj.

Vtile est & laudanum Opiatum gr. ii. vel iii. pondere sumptum.

Exempli gratia:

ꝥ. *Ladani opiat. gr. ii. pulu. mastich. gr. v. olibani gr. iii. extract. croci gr. i. Cum aq. violar.*

F. Pilulæ numero v.

Item theriaca recens, vel bolus Armenus, qui in catarrhis sistendis valde utilis est. De quo vide lib. 2. part. 3. cap. de asthma, in quæst.

Videntur deglutienda grana mastiches & thuris horâ decubitus, vel per se, vel ita præparata:

ꝥ. *Granor. thuris, mastich. sandarac. Arab. tragacanth. an. Drach. ð.*

Macerentur in vino rubro. Deinde exsiccentur & deglutiantur num. v. vel vi.

Vel ꝥ. *Syrup. de rosis siccis, de iuinb. de papau. an. Vnc. i. bol. Armen. aq. rosar. lot. Scrup. iij.*

Misceantur, & fumantur duo cochl. sub tempus somni.

Vel ꝥ. *Cap. papau. num. ix. siliquar. glycyrrh. an. Vnc. iii. sem. althææ, bombac. an. Dra. iii. iuinbar. sebest. an. num. viii. Coq. in f. q. aquæ.*

Colaturæ adde sacchar. candi Vnc. iii. Coqu. iterum ad piffitudinem mellis.

Vtile est & diacodium sub ingressum lecti sumptum.

Vel ꝥ. *Lot. de papau. Vnc. i. spec. diatragean. fr. Dra. i. diacody Mesua Drach. ii. Cum syrupo iuinbino vel de papau.*

Fiat Eclegma.

Vel paratur sequens Electuarium, & portio nucis moschatae quantitate horâ somni præbeatur.

ꝥ. *Conseru. violar. recent. Drach. iii. betonic. Drach. i. ros. rubr. antiq. Vnc. ð. spec. diatrage. frig. Drach. ð. diacody Drach. ii. corall. rubr. prepar. Scrup. ð. boli Arm. prep. Ser. j. Cum syr. de rosis sicc.*

F. Electuarium.

Vel ꝥ. *Diacody Vnc. i. diacydon. simpl. Vnc. ð. spec. diapaup. Dra. i. ð. diatrage. fr. Dra. ð. conseru. rosar. alb. 3. j. nymph. alb. 3. ð. rob. ribes Dra. iii. succini albi prep. Dra. ð. Cum syr. de papau. F. Electuarium.*

### Gargarismi.

Gargarismi. ꝥ. *Rosar. rubr. M. ð. plantag. balaustior. an. Drach. ð. cortic. capium papauer. Dra. i. nigell. Dra. i. ð. Coq. in aq. simplici.*

Colaturæ adde syrupo. de papau. myrrhini, an. Vnc. i. boli Armeni Scrup. i. M. pro Gargarismo, vel potius sine multa agitatione liquor in ore detineatur.

Vel ꝥ. *Flor. rosar. rubr. balaustior. an. p. i. caput. papau. c. sem. num. ii. myrryll. Drach. i. rasura santali rub. Dra. ð. Coqu. in aqua communi ad tertias.*

Colaturæ ꝥ. Vnc. v. In quibus dissolu. Boli arm. prep. Scrup. i. syr. myrr. Vnc. i. M.

Alius:

ꝥ. *Aq. lactuc. rosar. an. Vnc. iii. vini granator. Vnc. j. syr. de papau. Vnc. i. ð. M.*

Vel ꝥ. *Aq. plantag. folani, rosar. an. Vnc. ii. myna cydonior. Vnc. i. ð. essent. papau. Dra. ii. phlegm. aluminis rectificat. 3. ð. M.*

### Rotula, Trochisci, Pilula in ore tenenda.

ꝥ. *Boli Armeni Drach. i. rosar. siccæ. terra sigillat. an. Scrup. i. spec. diatrageanth. frigid. Drach. i. amyli, gummi*

*Arab. an. Drach. ð. Dissoluantur cum albumine oui, & addito syrupo violarum aut de papauere F. Trochisci sub linguâ tenendi.*

Vel ꝥ. *Boli Armeni Drach. ii. gummi Arab. tragacanth. an. Scrup. ii. sem. papap. albi Drach. i. nuc. mosch. Drach. ð. sacchar. penidy, candi, an. Vnc. ð. Cum mucilagine seminis cydoniorum facta cum aqua rosar. F. Orbiculi.*

Vel ꝥ. *Cap. papau. num. vi. siliquar. Vnc. i. rad. glycyrrh. Drach. v. ireos Drach. i. ð. passular. Drach. iii. Coq. l. a. in f. q. ad tertias.*

In decocto colato dissolu. sacch. Vnc. iv. extr. glycyrrh. Scrup. i. croci Scrup. ð. F. l. a. Orbiculi.

Vel parentur seq. Trochisci:

ꝥ. *Spec. diatrage. frig. diapaup. an. Drach. i. boli Armen. prep. Scrup. ii. tragacanth. Drach. ð. amyli, succi glycyrrh. an. Scrup. i. sacch. candi alb. Drach. ii. Cum syrupo de papau. q. f. F. Trochisci sublinguales, de quibus vnus atque alter sæpius die noctûque in ore detineatur.*

Alij:

ꝥ. *Boli Arm. prep. Drach. i. gummi. tragac. sem. papau. alb. an. Drach. ð. gum. Arab. Scrup. ii. glycyrrh. Drach. ð. sacch. Vnc. i. ð.*

Puluerisata excipiantur mucilag. sem. psyllij, & F. l. a. Trochisci sublinguales.

Vel ꝥ. *Amyli Drach. ii. sem. lactuc. papau. albi, an. 3. i. gummi. Arab. tragacanth. an. Drach. ð. boli Armen. Ser. ii. Cum mucilagine sem. psyllij. F. Pilulæ sub linguâ tenendæ.*

Si humor falsus sit, spica addatur, aut spica noctu in ore teneatur; quod tanquam expertum Mesues commendat.

### Suffitus, & Odoramenta.

ꝥ. *Sem. coriandri Scrup. ii. gummi hedera, iuniperi, mastich. thuris, an Scrup. ð. trochiscor. de camphora, sem. papau. an. gr. iv. F. Puluis, cuius accensi fumus naribus excipiantur, vel eo capitis tegumenta suffiantur.*

Vel ꝥ. *Sandarac. Arab. Drach. i. mastich. succini alb. an. Drach. ð. F. Puluis.*

Alius:

ꝥ. *Succini alb. Drach. ii. mastich. Drach. i. ð. thuris, sandarac. Arab. an. Dra. ð. gummi. anima. acamahac. an. Drach. ð. ð. rosar. rubr. p. i. F. Pulu. grossus.*

ꝥ. *Syrac. calamit. caryophyll. nucis moschat. mastich. thuris, ladani, an. Scrup. i. ambra gr. iii. Cum aqua rosar. F. Trochisci carbonibus iniciendi in Catarrho frigido.*

In Asthmaticis tamen suffitus vix conueniunt; ut necij, quibus caput debile est, suffitus vehemens ferunt, sed sufficit cum styrace & momento thuris ac succini albi carbonibus inspersi suffitum excitare.

### Noduli & Pulueres capiti inspergendi.

ꝥ. *Santal. albi, rubri, an. Scrup. ii. citrini Drach. i. ð. rosar. rubr. cortic. papau. albi, an. Drach. ii.*

Redigantur in puluerem, & nodulo inferantur, qui piri inspergendi.

Vtile est & sequens Nodulus:

ꝥ. *Flor. rosar. violar. an. p. ii. santalor. omnium, an. Ser. j. camphor. gr. v.*

Concisa includantur nodulo ex sindone rubra parato.

Vel ꝥ. *Rosar. rubrar. Drach. ii. gummi iuniperi Scrup. ii. nuc. mosch. macis, an. Scrup. ð. rosar. rubrar. balaust. an. Drach. i. sem. pæon. thuris, mastich. an. Scrup. i. nuc. cupressi Scrup. ð.*

Cum serico F. Sacculus pro capite in Catarrho calido.

Vel  $\mathcal{L}$ . Gummi iuniperi, tragacanth. caryophyll. mace-  
rator. in aqua rosar. & exsiccat. an. Drach. ii. nucis mosch.  
macis, flor. stœchad. Arab. an. ðii. rosar. rubr. myrtillor. an.  
Scrup. i. Cum serico F. Sacculus.

Non incommodè etiam capiti inspergi potest se-  
quens Puluis:

$\mathcal{L}$ . Succini alb. sandarac. Arab. mastich. benzoe, nucis  
mosch. an. Vnc. i. cubebar. Vnc. ð. thuris Drach. v. Scr. i. cor-  
tic. thuris Dra. ii. F. Puluis.

### Ceratum.

Ceratum ex mastiche, gummi iuniperi, nuc. mosch.  
caryophyll. ladano, supra fuit propositum, quod & hic  
locum habet.

### DE CATARRHO SUFFOCATIVO.

De Catarrho  
per Venas  
vultus, vide  
Hippocr. aph.

Catarrhi suf-  
focativi cu-  
ratio.

Et si ex iis, quæ hætenus de catarrho sistendo & in-  
hibendo diximus, facile etiam, quæ ratione catarrhus  
Suffocatiuus curandus sit, pateat: tamen in specie ali-  
quid ea de re addere non inutile fuerit.

Si quando Catarrhus tanto imperu ad pulmones  
fluit, ut suffocationis periculum impendat, danda ope-  
ra, ut materia in plures partes statim distrahatur, reuel-  
lendo, deriuando; catarrhûsque sistatur internis & ex-  
ternis medicamentis exhibitis.

### Auxilia.

Acribus nimirum clysteribus aluius prouocent, ex-  
trema fricentur vinctanturque, cruribus & brachiis cu-  
cubitulæ affigantur, venæ iectio etiam, si opus sit, sine  
vlla mora administretur, purgantibus materia à pulmo-  
nibus acria trahatur in ventriculum & intestina; gar-  
garismis adstringentibus & aliis, quorum formulæ an-  
te propositæ, fluxus intercipiatur & sistatur. Postea fi-  
mus excitetur è mastiche, thure, & succino. Per vices  
etiam acetum rosaceum super lapidem ignitum affun-  
datur. Alij gummi tacamahacæ solum cum pistillo ca-  
lido dissolunt, & alutæ inductum bregmati & tempo-  
ribus applicant. Nonnulli puluerem succini, thuris, &  
mastich. cum album. oui, & aqu. rosar. impastant, quod  
lineo illinunt, & fronti temporibusque admovent.  
Quod tamen post horam aliquandiu remouendum, ne  
catarrhum plus iusto sistat: hinc renouandum. Nucha  
inungatur ol. succini, vel seq. Vnguentum adhibeatur  
capiti, quod efficacissimum est:

$\mathcal{L}$ . Pulv. nuc. cupress. alumin. vsti, sulph. vini, pyrethri,  
olibani, mastich. camphor. gallar. cortic. granator. rosar.  
rubr. an. Drach. ð. Cum aqu. fol. quercus q. i. misc. addendo  
succ. acacia, cydonior. an. Vnc. ð. M.

Si maximum periculum instet, phœnigmi quan-  
doque & vesicatoriis opus est. Phœnigmi hæc formu-  
la erit:

$\mathcal{L}$ . Rad. asphodeli, baccar. lauri, gummi iuniperi. rad.  
pyrethri, piper. longi, sinapis, an. Dra. i.

Terantur in Puluerem; & inuncto prius vertici oleo  
costino aliquid eius inspergatur circa futuram corona-  
lem; vel cum oleo euphorbij & cera F. Cerotum futuræ  
coronali imponendum.

$\mathcal{L}$ . Nigell. torrefact. Vnc. ð. sinapi Drach. iii. thuris, ma-  
stich. an. Drach. i. ð. fimi columbini, farina hordei, an. Vnc.  
ð. oximelit. simpl. q. s. F. Emplastrum pro futura cor-  
onali.

$\mathcal{L}$ . Fermenti parum, caricæ pinguem. N. i. cantharid.  
alis & capitis abscissis N. vi.

Cum aceto scillitico fiat Massa, quæ capite raso futuræ  
coronali imponatur, & post sex circiter horas vesica  
excitata rumpatur.

Vel applicetur tale Vesicatorium:

$\mathcal{L}$ . Ol. castor. costini, an. Vnc. ð. pulv. cantharid. præp.  
Ser. ii. fermenti acerrimi q. s. F. Cataplasma, ducatur su-

per aluta, longitud. 4. & latitud. 3. digitorum; & parti  
capitis anteriori ratæ applicetur, vel ad primam colli  
vertebram, & per noctem relinquantur.

Locum etiam hic habet Ceratum Galeni de stercore  
columbarum & rapia, cuius supra fuit facta mentio.  
Proliciat quoque pituita è naribus, palatiquè inun-  
ctionibus inciterur ad expulsionem.

Et si materia crassa est, ac magna eiusdem copia in  
pectore continetur, loch de scilla cum oxymelite &  
ammoniaco est dandum, & alia, quæ in asthma sunt  
utilia.

### Partium, ad quas Catarrhus ruit, roboratio.

Et si diuerrentibus & catarrhum intercipientibus ip-  
si quoque parti recipienti consularur: tamen etiam uti-  
le est, ipsam partem recipientem confirmare per adstrin-  
gentia, quibus expultrix ita roboratur, ut non solum  
non admittat materiam à capite ruentem, sed & eam  
expellat. Talia sunt, rosæ, balauſtia, plantag. myrtill. bo-  
lus Armenus, nuc. cupressi, & similia, quæ pro partium  
varietate aliò, atque aliò modo exhibenda. Pectori ta-  
men & pulmone adstringentia non conueniunt, præ-  
sertim postquam materia influxit, quæ nullo modo in  
pectore retineri, sed reici debet.

Vbi verò destillatio in parte recipiente peculiarem  
morbum generat, in oculo ophthalmiam, in alia parte  
aliâ; peculiares illorum morborum curationes requi-  
runtur: de quibus suo loco dicitur.

### Qua ratione partium, qua Catarrho mate- riam suppeditant, sit habenda ratio.

Vnum adhuc in Catarrhi curatione restat, quæ ra-  
tione scilicet partes tractandæ sint, quæ Catarrho sup-  
peditant materiam. Vbi in genere tenendum, quæcun-  
que etiam pars materiam Catarrho suppeditet, vtile es-  
se, ut ij, qui Catarrhis frequenter obnoxij sunt, singulis  
mensibus, paulo ante nouilunium, corpus leniter pur-  
gent; idque iis præcipue necessarium est, quibus aluius  
est sicciior. Nisi enim aluius quotidie suum officium  
spontè faciat; & caput & alia membra vaporibus re-  
plentur. Ideoque danda opera, ut aluius quotidie re-  
spondeat. Quod nisi fiat, lenioribus medicamentis id  
procurandum.

Et cum sæpe accadat, ut membrum aliquod vitiosum  
habitum contraxerit, unde quotidie aliquid materiæ  
ad caput transmittitur, atque inde Catarrhi & alij mor-  
bi excitantur: in tali casu sæpe requirit necessitas, ut fon-  
ticulus excitetur; quod commodissime fit in brachio, ut  
materia illa propiore viâ euacuetur.

In specie, ut supra etiam, part. i. dictum, si ventriculi  
frigidiore vitio materia catarrhi subministratur, ventri-  
culus cibo & potu non est grauiandus, neque ea aslu-  
menda, quæ vapores & fumos multos in caput emit-  
tunt. Ideoque nec generosa vina bibenda, nec rapha-  
nus, cape, porrum, sinapi, & id genus alia usurpanda:  
item viscida, lenta, pituitosa vitanda. Condiendus vero  
cibus aromatibus, macere, caryophyllis, nuce moschatâ,  
saluiâ, roremarino, maioranâ; & post cibum semen co-  
riandri, anisi, fœniculi, saccharo incrustata, & alia supra  
proposita sumenda. In usu tamen aromatum obseruan-  
dum, medicamenta ea moderatè usurpanda, ut cibum  
saltem condiant, non verò caliditate hepatis & renibus  
noceant, sanguinemque acrem generent, aut caput im-  
becillum petant. Roborandus quoque ventriculus me-  
dicamentis cum internis, tum externis, quæ suo loco  
proponuntur.

Ventriculo suum officium rectè faciente etiam hepar  
melius habet. Ipsi tamen quoque, si opus sit, succurren-  
dum. Sit ergo in intemperie calida hepatis usus fre-  
quens

Partium re-  
cipientium  
roboratio.

Partes mate-  
riam Catarr-  
ho suppedit-  
antes tra-  
ctandi ratio.

Ventriculi in  
Catarrho et  
habenda ra-  
tio.

quens hordei; eichorium sæpe vsurpetur, vt & species diarrhod.abbatis,& similia. Ita si pars aliqua alia, vt lien vel vterus, materiam catarrho suppeditet, ad eam primum, præcipuè in præseruatione à catarrho, curatio dirigenda est.

*Dietæ.*

Medicamentis hætenus propositis dieta respondeat, necesse est. Aër sit temperatus, & in Catarrho frigidus nonnihil calidior. Ventri austrini & aquilonares vitentur, & subita omnis modò ad frigidum, modò ad calidum mutatio. Nocet etiam cibus copiosior; vnde Celsus dimidium de consueto demit. Vitentur, vt antea etiam dictum, cibi concocti difficiles, vaporosi, acres, excrementitij: Cœna parca sit, Quamquam enim nonnulli contrarium statuunt: tamen non solum experientia constat, cœnam lautiorẽ catarrho obnoxiiis parum commodam esse, sed idem quoque ratio suadet. Si enim parum cibi assumatur, natura facilius & rectius in humoribus vitiosis noctu, & in quiete coquendis occupari potest; neque tot vapores & halitus in cerebrum attolluntur, qui per somnum, vt in vigiliis, ita discuti non possunt, sed in capite retenti Catarrhum augent. In secundis mensis ad vapores reprimendos vtile est sumere aliquid de carne cydoniorum, vel pyris coctis, item coriandrum, & tragemata supra, *part. i. proposita*. Ab omni potu caput vehementer replente abstinendum. In nostris tamen regionibus frigidioribus, & crapula nostrorum hominum, moderatus vsus vini concedi potest, vt auctus calor naturæ Catarrhi maturacionem promoueat. Cereuisia non contineatur in vasis valde picatis. Post cibum neque legere neque scribere iubet Celsus, *lib. i. cap. 5.*

Somnus sit moderatus; nec eorum consilium audiendum, qui Catarrho laborantibus vigilias præcipiunt. Vigiliæ enim cruditatem pariunt. Dormiendum itaque moderatè, sed non de die; nisi quis forsan diu somno meridiano assuerus sit, aut noctu vigilauerit. Diurnus enim somnus, & qui à cibi repletionem initur, caput replet. Quæ autem forma decubitus, & situs capitis esse debeat, mox, *quest. 2.* dicitur.

QVÆSTIO I.

*An Cerota & Emplastra è fimo columbino & thapsia in Catarrho calido conueniant?*

Galenus, *5. method. med. cap. 13.* de Catarrho calido cum imperu ruente, & sanguinis sputum excitante, cum metu exulcerationis pulmonum agens, historiamque curationis, quam in nobili fœmina Romæ peregerat narrans, inter medicamenta ab initio adhibita etiam mentionem facit Ceroti ex fimo syluestrium columbarum, quod vertici imposuit; nec non eius, quod ex Thapsia parauit. Idem ex Thapsia cerotum etiam *cap. 14.* proponit. Idem cerotum in catarrho, vbi de pulmonum exulceratione metus est, proponit Aëtius, *retrabibl. 2. serm. 4. cap. 60.* Paulus Aegineta, *lib. 3. cap. 31.* qui tamen illud non statim initio proponit, sed vbi aliis remediis malum non cessit. Habet idem remedium Auicennas, *lib. 3. Fen. 10. tract. 3. cap. 6.* qui & ipse non statim initio, sed vbi alia remedia non profunt, illud adhibet. Alexander Trallianus tamen, *ex allegat. cap. 13. l. 5. method. med. Galeni*, catarrhum illum calidum, salsum, & acrem fuisse, ac caput illius fœminæ intemperie calidâ laborasse colligens, reprehendit curationem propositam, eo nomine, quod nullo refrigerante & humectante medicamento vsus Galenus statim ab initio siccantia & calefacientia adhibuerit, quibus caput calidius redderetur, & catarrhi acrimonia adaugeretur. Ideoque ipse potius

primum refrigerantibus & humectantibus, quæ acrimoniam catarrhi temperent, vtendum censet. Imò ipse Galenus, *6. de tuenda sanitate. cap. 9.* medicamentum ex thapsia & sinapi nocere scribit, vbi caput intemperie calidâ laborat.

Hieronymus Capiuaccius, vt Galenum contra Trallianum tueatur, docet: calefacientia tribus nominibus vsurpari posse, vel tanquam euacuancia, vel tanquam retrahentia, vel tanquam calefacientia. Galenum autem iis vsum potissimum esse, vt retraherent materiam, deinde etiam vt insensibiliter eam discuterent. Quæ responsio si rectè explicetur, locum habere potest. Etenim cum Galenus ipse agnouerit, catarrhum illum calidum & salsum fuisse, nullo modo ad calefaciendum, sed ad catarrhum illum retrahendum eo medicamento vsum fuisse, planum est. Quod verò statim initio ceroto tali vsus est, metus vrgentis periculi fecit. Etenim etsi adfuerit in proposito catarrho intemperies calida, quæ refrigerationem postulabat: tamen plus vrgebat fluxus præceps materiæ ad pulmones, quam caliditas, vt pote quæ iam sputum sanguinis excitabat, & metum exulcerationis pulmonum incuriebat. Et licet nonnihil augetur intemperies capitis & causæ morbi ficæ: tamen per hoc remedium maximum periculum declinabatur, quo euitato postea intemperiem capitis & materiæ corrigere licet. Refrigerantibus & exsiccantibus idem præstari non potest. Cum enim sint partium crassarum, tardè operantur, & exprimunt potius humorem, atque affectum, qui statim expetitur, non præstant. Si autem destillatio non vrgeat, nec fluxus sit præceps in intemperie calida à calefacientibus abstinere tutius est: de quo casu intelligendus est locus Galeni, *6. de tuenda sanitate. cap. 9.* Loquitur enim ibi de destillatione non vrgente, & quæ in latitudine sanitatis accidit.

QVÆSTIO II.

*Quanam forma decubitus & situs capitis in Catarrho esse debeat?*

De forma decubitus, & capitis situ somni tempore, in *lib. 3. Auicenna*, non idem sentire videntur Interpretes. Etsi enim de curatione Catarrhi & destillationis tractans Auicennas, *3. fen. 5. tract. 1. cap. ult.* inter alia, quæ de somno monet, & hoc præcipit, vt, qui Catarrho sunt obnoxij, capite dormiant minimè eleuato, sed potius demisso, declinèque puluinari: olim tamen aliter hunc locum legerunt, ita nimirum. *Et oportet secundum omnem dispositionem, vt regatur cum eleuatione capitis, & eleuetur puluinari.*

Verum enim verò non ita simpliciter nec hoc, nec illud affirmari potest. Etenim situs capitis conueniens eligendus, vel ob materiæ ad caput ascensum, vel ob eiusdem à capite delapsum. Ascensum vaporum quod attinet, scribit Aristoteles, *10. problem.* ideo bruta non laborare destillationibus, sicut homines, quoniam brutis calor & humores, qui calorem sequuntur, in artus sese efferant, vnde per refractionem dissecti partim quidem in cervicem & caput, partim in spinam & lumbos, & ita non in vnam partem ferantur; cum in homine, qui figuram erectam habet, calor non dispersitus non partim ad anteriora, partim ad posteriora, sed totus ad caput eleuetur, quem humores sequuntur. Hanc Aristotelis rationem etiam in Catarrhis locum habere putat Hieronymus Mercurialis, *cap. 15. lib. 2. variar. lect.* & in figura ac situ capitis recto & eleuato plus vaporis & humoris ad caput ferri putat, quàm in situ declinui. Verum non satis firma est hæc ratio, & tum solum locum haberet, si vapores & humores liberè, instar vaporum in aëre, aut fumorum in furno vel fornace, & non vasis maximam partem conclusi, ad caput ferrentur: sed cum per vasa præcipuè adscendant, ratio hæc locum hic non habet; & cum in brutis, tum in homine ex hepate ac corde

*Forma decubitus in Catarrho.*

corde humores & vapores per venas & arterias ad caput feruntur. Imò si humores attendendi sint, cum illi suâ naturâ sint graues, difficilius in erectâ figurâ, quàm declinâ, caput petunt. Vnde rectè scribit Oribasius, (quod & experientia docet) *lib. 6. collect. in fine, c. 1.* decubitus à pedibus altior caput replere & instrumenta sensuum. Descensum verò Cataracti quod attinet, distinctione opus est. Si materia iam sit in capite seu ibi genita, seu aliunde transmissa, erectâ capitis figurâ facilius materia delabitur, quæ grauis est. Ideoque considerandum, vtrum plus vrgeat incommodum, quod partibus inferioribus delapsu Cataracti inferatur, an verò commodum, quod accidit capite sese in inferiora & partes ignobiles exonerante. Si illud plus vrgeat, capite declinâ cubandum, aut certè non valde erecto; si hoc, capite erecto. Si tamen adsit difficultas spirandi, quod sæpe in destillatione accidit, caput in lecto sublime habendum est, vt monet Celsus, *lib. 4. cap. 4.*

### DE EXCREMENTIS CEREBRI RETENTIS.

Vt excrementa cerebri quandoque copiosius, quàm par est, euacuari solent: ita eadem quandoque præter naturam retinentur. E quibus in cerebro retentis varia mala, epilepsia, apoplexia, carus, & similia oriuntur. Retinentur autem vel obstructis viis, vel dum facultas expultrix officium non facit. Aperiunt verò vias, & facultatem ad expellendum irritant, errhina & apoplegmatisimi; de quibus supra, *part. 1.* & hæcenus sæpius dictum. Topica quoque resoluentia, quæ materiam insensibiliter discutiunt, aliis præmissis vtiliter vsurpantur, de quibus etiam supradictum.

Si nares sint obstructæ, vnguento aliquo humectante & attenuante superior pars nasi illinatur:

Vt *℞. Ol. amygdal. dulc. amaran. adipis gallinæ, an. Vnc. ʒ. Misce.*

Naribus attrahatur aqua maioranæ, in qua semen nigellæ maceratum sit.

Vel *℞. Betonic. maior. viridum, an. M. ij.*

Exprimatur succus & naribus attrahatur. Infantibus commodè particula butyri sine sale, magnitudine pisi, naribus inditur. Pertinet huc etiam suo modo Sternutatio. Verum de eâ agetur infra, *part. 3. sect. 4. c. 9.*



## LIBRI PRIMI PARS III.


De Morbis ac Symptomatibus, quæ  
accidunt organis ac functionibus sensuum Ex-  
ternorum.

### SECTIO PRIMA,

De Symptomatibus sensus Tactus, & Do-  
lore Capitis.

#### CAPVT I.

De Stupore & Torpore.

 Vm hæcenus morbos, qui cerebro & capiti accidere solent, & symptomata, quæ in actionibus sensuum internorum, & motu voluntario, vt & in excrementis cerebri, contingunt, explicauerimus: proxi-

mum iam est, vt morbos, qui organa sensuum externorum infestare, & symptomata, quæ in actionibus sensuum externorum obeundis accidere solent, explicemus. Cum autem sensus tactus communissimus sit, & omnibus reliquorum sensuum organis insit, ab eo initium facere liber. Cum verò in tactus organo, vt in aliorum sensuum organis, multi morbi non occurrant, saltem de symptomatibus dicemus. Quæ verò de morbis dici possunt, inter causas eorum proponuntur.

Tactus autem instrumentum esse membranam, in Institut. *lib. 1. cap. 12.* monstrauimus. Læditur autem Tactus, cum imminuitur, vel aboletur, vel deprauatur. Imminuitur & aboletur in stupore & torpore; deprauatur in dolore, de quibus iam dicendum.

*Νάρκη & νάρκωσις*, Latinis stupor seu Torpor, etsi in genere actionum imbecillitatem significat, quo sensu Hippocrates, 6. *Epid. comm. 2. νάρκωσιν γνῶμης*, mentis stuporem & heberudinem dixit, & 6. *Epid. comm. 3. ʒ. 1. νάρκωσιν κοιλίας*, ventris stuporem & segnitiam: tamen in specie sensus tactus & sæpe etiam motus imbecillitatem significat, quæ nihil aliud est, quàm inchoata paralyticæ, causarum saltem magnitudine à vera paralyti differens. Quò pertinet affectus, quem Germani Obdormitionem vocant, qui tamen mixtus videtur affectus ex torpore & dolore.

#### Causæ.

Causa continens huius mali est spirituum animalium sensui & motui in parte aliquâ destinatorum defectus. Cum enim partes sensui tactus destinatæ membranosæ sint; patet hinc, subiectum stuporis esse partes, quatenus membranosæ & neruosæ sunt. Et cum eadem partes suas actiones expediant spirituum animalium beneficio, & spiritibus animalibus denegatis nulla actio animalis perfici possit: manifestum hinc euadit, proximam stuporis causam esse spirituum animalium defectum. Atque ita Stupor & Torpor erit sensus tactus, nonnunquam & motus, imminutio, vel etiam abolitio, à spirituum animalium defectu orta. Hinc torpor præludium atque initium quoddam paralyticæ est. Sensus enim tactus non planè extinctus, sed admodum labefactatus est.

Et quamquam interdum in toto corpore stupor accidat, sicut Brassauolus, vt, *ad aphor. 9. lib. 7.* refert, vidit quendam ab hæmorrhagiâ narium corporis totius stuporem incurrisse, quem mors excepit, nil proficientibus remediis, & Fernelius scribit, *lib. 5. path. c. 3.* vniuersi corporis cutem ex crapula & vinolentia stupore affectam, illaeso motu, Marthiolus etiam refert, rusticum quendam, cum hasta serpentem prægrandem occidisset, duobus annis postea vniuersi ferè corporis stupore laborasse: tamen rarissimum hoc est, & plerumque saltem vna pars, vel plures stupore afficiuntur.

Causæ ergo omnes, quas nuper in paralyti recensuimus, & hic locum habent, quæ saltem hic sunt minores & leuiiores. Deficiunt nimirum spiritus, quia non transmittuntur, vel quia transmissi non admittuntur, vel, licet influant, cum ipsa parte male disposita non vniuntur. Non transmittuntur, vbi vitium est in cerebro, quod rarissimè accidit. Nonnunquam tamen id euenit neruorum principio affecto. Frequentius verò accidit vel ipsius partis, quæ stupore laborat, vitio, vel neruorum, per quos spiritus animalis transmittitur. Neque enim in parte affecta causa semper querenda est, quod Empirici faciunt, habeturque huiusmodi exemplum apud Galenum, 1. *de loc. affect. cap. 6.* Occurrit Galeno quidam medicamentum digitis adhibitum ostendens, dixitque, triginta iam diebus sensum se amisisse, illaeso seruato motu, sed nihil auxilij ab impositis medicamentis percipere potuisse. Galenus, cum interrogasset, cuiusmodi remedium adhibuisset, atque intel-

Stupor vniuersalis.

ligeret,



ligeret, ad rem id esse idoneum, causam inuestigare cepit, cur nullum ab eo auxilium consequeretur. Inquirens ergo, quæ præcesserint accidentia, inuenit, atque ex ægri relatione cognouit, eum à vehiculo decidisse, & non multò post digitorum hunc affectum incurrisse. Et cum animaduerneret, in primo exortu nervi post septimam vertebra oriundi causam mali hæere, idem illud medicamentum à digitis amouit, & dorso applicauit, atque ita sensum in digitis cum multorum admiratione recuperauit. Partis verò ipsius vitio stupor excitatur, cum, licet spiritus animalis influat, constitutio partis siue à frigiditate; siue ab occultâ qualitate mutata est, à spiritu animali non, ut debet, afficitur, neque vis sentiendi in actum deduci potest. Et si verò etiâ ab externo frigore temperies partis mutari, & hoc modo stupor induci possit, sicut ex 1. de loc. affect. cap. 4. & 6. videre est: tamen quæ narcotica dicuntur, non frigiditate, sed occulta vi & malignitate id præstant, ut de torpedine pisce, naturalis historiæ scriptores referunt, & de rustico, qui, cum serpentem hastâ transfodisset, in stuporem totius corporis incidit, historiam ex Matthiolo supra recensuimus. Obdormitio autem à causa externa plerumque excitatur, compressione scilicet membri & neruorum in eo; vnde influxus spirituum animalium inhihetur, qui postea laxatis neruis copiosè & subito ad externas membranas partes excurrunt, & subitam in iis alterationem faciunt, quam dolor ille & molestia sequitur.

Plura, quæ supra de causis paralysis dicta sunt, hic de causa stuporis afferre opus non est. Hoc saltem monendum aut repetendum, neminem stuporis, ut & paralysis alicuius partis, causas omnes rectè inuestigare posse, qui Anatomie gnarus non est, & cognitum non habet, vnde quælibet pars neruos suos accipiat; cum sæpe accidat, ut non in ipsa parte affecta, sed loco remotiore, in nervi principio, vel eius ductu, causa mali hæreat.

### Differentia.

Stupor 1. vel simplex est; sensus tactus videlicet solius læsio, vel cum læsione aliqua motus coniunctus. 2. Stupor alius est totius corporis, ac artuum in primis extremorum; alius certæ cuiusdam particulæ.

### Signa Diagnostica.

Affectus ipse ex relatione ægrotantis cognoscitur, qui se vel nullo modo, vel difficulter & obscure ea, quæ tactui offeruntur; percipere conqueritur, plerumque cum debili etiam motu, siue in vna aliqua, siue pluribus corporis partibus. Quæ autem signa causarum sint, ex iis, quæ supra de paralyti dicta sunt, patet.

### Prognostica.

1. Stupor si in aliquâ parte diu perseveret, in paralytin definit, nonnunquam & in spasmus.
2. Stupor, qui totum corpus occupat, nec euacuationi cedit, & caro quid simile habet, & cui vertigo succedit, malum; quoniam imminente Apoplexiam nunciat, teste Auicenna. Imò per stuporem ex vehementi spirituum resolutione homo vnâ die moritur.
3. Stupor in facie torturam oris portendit.
4. Periculosus stupor est, in quo cum sensu simul læsus est motus; & qui diutius perseverat, & qui plures corporis partes, cerebroque vicinas obsidet.

### Curatio.

Cum stupor ex iisdem causis oriatur, à quibus paralytis, quanquam illis leuioribus: curandi rationem si-

milem requirit; nisi quod minus valida hic præsidia adhibentur.

Præmissis ergo vniuersalibus euacuationibus, ac, ubi opus est, particularibus, partem affectam Medici iubent immergere vinaceis calentibus recens expressis, vel lauare decocto saluæ, rorismarini, aut lauendulæ, facto cum vino vel aqua eorum: vel fricare spiritu vini, in quo pyrethr. vel castoreum sit infusum, vel aqua apoplectica aliqua vel paralytica, & alia adhibere, quæ de paralysis curatione supra propolita sunt.

## CAPVT II.

### De Dolorē in genere.

**D**eprauati verò tactus sensus symptoma egrum est Dolor; de cuius natura & causis variæ & proluxæ disputationes apud Medicos extant; & dicta sunt quædam hac de re in Instit. lib. 2. part. 3. sect. 1. c. 6. & sect. 2. cap. 3. quæ hic repetenda non censemus. Necessaria tamen quædam addemus. Monstratum autem eò loci, Dolorem esse molestiam, quæ ex sensu & perceptione obiecti ingrati tangibilis oritur; seu, ut Galenus definit, Dolorem esse tristem sensationem, in tactu putata. Causam verò proximam esse solutionem continui in parte sentiente seu membranosâ; aut, si cui *ακρίβολον* cum Philosophis libet, repentinam & violentam alterationem à qualitatibus tactilibus, continuum soluentem. Ut ita Dolor sit molestia seu sensus tristis à continui solutione partis sentientis; seu, molestia ab obiecto confertim & violenter in partem sentientem agente, atque ita continuum solvente, ortum habens.

Subiectum nimirum doloris sunt partes sensu tactus præditæ, id est, membranosæ; vnde quæ pars membranam nullam habet, sensuque tactus prædita non est, dolore etiam non infestatur. Cum verò sensibus aliis omnibus etiam tactus substractus sit, vtpote quorum organa membranas participant, etiam aliorum sensuum organa dolore afficiuntur; de quo Galenus, lib. de differ. symptom. cap. 3. *Maximi dolores, inquit, sensui tactus contingunt; quippe qui ex aurium phlegmone, aliòve affectu eos afficiunt, & proprii auditus dolores non sunt, sed tactus. Est enim sensus omnium sensoriorum communis, reliqui quatuor sui quisque solius. Ad eundem modum in oculis non raro dolores immodici videntur, tangendi scilicet in his sensu contristato.*

Potest sicut ad sensum quemlibet, ita ad dolorem, non sufficit obiecti molesti in organo apprehensio, sed etiam facultas cognoscens & superior concurrat, necesse est. Quo enim momento pars sentiens seu membranosâ ab obiecto sensibili afficitur, eodem simul facultati superiori & cognoscenti species communicatur, & inde ab eodem seu gratum seu ingratum iudicatur. Si verò facultas cognoscens superior non concurrat; nec obiecti apprehensio, nec dolor fit. Vnde Hippocrates, 2. aphor. 6. *Quicumque dolentes aliqua parte corporis dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat.* Et qui delirant; cum facultas superior in iis laboret, dolores non sentiunt, nec sapores discernunt. Et sæpe grauiter vulnerati ardore pugnæ & vindictæ mente aliò conuersâ dolorem non percipiunt.

Refertur autem dolor ad deprauatas actiones, non quod, ut in aliis sensibus deprauatis accidere solet, deceptatur tactus, & erret circa proprium obiectum, & aliquid, quod non est, esse putet; cum quod est calidum, pro calido, quod frigidum, pro frigido, quod est asperum, pro aspero accipiat: sed eo modo deprauata actio dicitur, quia non fit secundum naturæ leges, & obiectum organo non est proportionatum. Hinc Galenus, de differ. Symptom. cap. 3. tactum in suâ functione præter reliquos sensus symptoma *εξαιρετικόν* obtinere, dolorem

dolorem nempe, scribit, id est, eximium, & ab aliis actionibus deprauatis suo modo diuersum.

An verò dolor sit ipsa sensio, an molestia inde orta, etiam in Instit. loco allegato, dictum, nimirum proprie loquendo dolorem non esse ipsam sensationem simpliciter, sed molestiam ex sensatione ortam; seu, vt Galenus scribit, tristem sensationem, hoc est, tristitiam aut molestiam in sensatione aut ex sensatione. Neque enim hic de verbis tantum contendendum, neque, vt Galenus, de caus. sympt. cap. 6. scribit, refert, an molestum, an triste, an dolorificum, an dolorosum, an laboriosum appelles: sicut nec, si passionem ipsam molestiam dicas, an tristitiam, an dolorem, an laborem.

### Quæ sit proxima Doloris causa.

Doloris causa  
proxima.

De proxima verò doloris causa prolixa disputationes extant apud Medicos, vt etiam Instit. lib. 2. part. 3. sect. 2. c. 3. docuimus. Præ cæteris autem duæ magis probabiles sententiæ sunt, vna eorum, qui statuunt, solutionem continui esse proximam doloris causam; alteram illorum, qui subitam & violentam mutationem qualitarum actiuarum, seu qualitates tangibiles subito & violentè in tactum agentes, proximam doloris causam statuunt; neque inter se duæ istæ opiniones multum discrepare videntur.

Galenus equidem, 1. de sympt. caus. cap. 6. ex Platonis Timæo illud, quod præter naturam est, & violentè ac repente nos afficit, dolorem parere scribit. Verum cum illius violentæ & repentinae mutationis, si dolorem inducere debet, terminus sit solutio continui; etsi violentam & subitam mutationem in organo tactus factam in qualitatibus actiuis pro proxima causa doloris admittamus: tamen determinanda videtur per solutionem continui. Tum enim subita & violenta facta à qualitatibus tangibilibus mutatio dolorem inducit, cum continuum soluit. Vtrumque complexus videtur Hippocrates, in libr. de locis in homine, cum ab iis, quibus natura alteratur & corrumpitur, dolores fieri scribit; & post eum Aristoteles, cum, lib. 2. de Anima, cap. 12. ἡ δὲ αἰσθητικὴ τὰς ἐν τοῖς ὅλκῳ; οὐσίαις παθητικὰς docet: neque sine causa. Cum enim vnum & ens simul sint, 10. Physic. & vnum sine altero non existat, vnitatisque perfectionis, multitudo verò imperfectionis comes sit: ceterè etiam homo vnum erit, & ad sanitatem vnitatis necessaria, quæ amissa morbi & interitus sequuntur. Cum verò tactus ad vitæ conseruationem datus sit, & ab iis, quæ corpori nostro profunt, suauiter; ab iis, quæ obfunt, malè afficiatur: ceterè illud, quod corporis nostri perfectionem euertere natum est, ingratißimum occurrit. At nihil naturæ, quàm vnitatis solutio, infestius, nihil perfectioni nocentius. Ab ea ergo dolor etiam, symptoma omnium ingratißimum tristissimūque, oritur. Hinc omnia, quæ dolorem inferre dicuntur, ideo id præstant, quod suauissimam illam, gratissimamque, non solum animalibus, sed etiam entibus omnibus, vnitatem solunt.

Etsi verò vna proxima & immediata est doloris causa, nimirum continui solutio: tamen sunt aliæ principales, quæ proximè hanc antecedunt, qualitates nimirum primæ, qualitates secundæ, & humorum copia. Qualitates primæ continui solutionem non ita manifestam efficiunt, sed ratione contemplabilem. Copia verò humorum, & qualitates secundæ manifestè continuum solunt. Vnde facillè Galeni loca in speciem pugnantia conciliari possunt: Aliquando enim proximam doloris causam, quæ vna est, proponit, vt, 4. de simpl. med. fac. cap. 2. Comment. 3. in libr. Hippocrat. de fract. text. 5 4. libr. de inaequali intemperie, cap. 6. 12. method. medend. c. 7. Aliquando verò non proximam doloris causam proponit, sed principales; vt, 2. de loc. affect.

Causa doloris  
mediata.

c. 5. 2. victus ration. in acutis, textu 1. artis medica c. 80. Et ipse, qua ratione hæc loca conciliari possint, docet, 12. meth. med. c. 7. Cum enim dixisset, Naturalis ratio nos docet, vitium id corporis, ex quo sit doliturum, aut continui tatis diuisionem oportere esse, aut alterationem aliquam, paulò post addit, illud vero inquirere, an ipsum, quod vehementer excalefacit aut refrigerat, diuisionem aliquam continui efficiat, longiore forsitan disputatione eget, & vtrumque ostensum est à nobis in Commentariis de simplic. medicament. facultat. Verum, quid agendo, quæ vehementer vel calefaciunt vel refrigerant, dolorem inferant, querere, ad propositam rem minime est necessarium.

Causæ nimirum doloris tot sunt, quot tactus obiecta, hoc est, quicquid supra modum calidum, frigidum, durum, acutum, graue, repente in tactum intruit, organumque tactus offendit. Hoc tamen & hic monendum est, solutionem continui, non solutam vnitatem, esse proximam doloris causam. Fit autem solutio continui dum pars secatur, pungitur, distenditur, vitur; soluta autem vnitatis est, dum punctio, sectio, diuio abfoluta est, & membrum, quod antea vnum erat, diuisum. Fit verò dolor, vt dictum, à continui solutione, non à soluta vnitatis. De quo Hippocrates, de loc. in homine, li. 1. quorum natura corrumpitur, dolore afficiuntur, non quorum mutata & corrupta est. Et licet inflicto iam vulnere dolor adhuc perseueret: tamen is non est à soluta vnitatis, quæ solutione inducta est, sed ex humorum ad partem vulneratam affluxu, qui eam distendunt & irritant, & ita solutionem continui efficiunt; qui dolor etiam tam diu durat, quamdiu is humorum affluxus durat.

Reliqua verò, quæ dolorem inducunt, mediante solutione continui dolorem excitant. Ita intemperies mediante solutione continui dolorem inducunt. Sed apud omnes intemperies, & quidem sine materia, dolorem inducat, Galenus non idem docuisse videtur. Nam, 12. method. med. cap. 7. saltem quæ excalefaciunt, & quæ refrigerant, dolorem excitare tradit. Idem, 1. de Sympt. caus. cap. 6. docet. Verum, in comm. 2. libr. Hippocrat. de ratione victus in acutis, 1. corpora nostra dolore affici statuit, cum calefiunt, refrigerantur, siccantur, & humectantur. Idem docet artis medica cap. 80. Et, lib. de inaequali intemperie, c. 4. ab omni quidem intemperie dolorem proficisci & induci statuit, poriores tamen à calida & frigida, vt pote quæ qualitates efficacissimæ sunt, & lib. 2. de compos. medic. sec. loca, c. 7. calorem & frigus vehementissimos facere dolores, siccitatem mediocres, humiditatem nullum statuit.

Verum enim verò intemperies considerantur vel sine, vel cum materia. Si sine materia, tum & calida & frigida intemperies dolorem magnum & euidentem inducunt; siccitas verò moderatum. Humida verò sine materia nullum dolorem inducit: cum repente & confertim naturam mutare non possit, & vnitatem potius conseruet, quàm soluat. Si verò intemperies consideretur cum materia, tum à qualibet dolor induci potest, etiam humidà, sed partem distendendo.

### Differentia.

Sunt autem variæ dolorum differentia, partim ex partis affectæ natura, partim à causis desumptæ. Præcipuæ hæc sunt:

Βαρύς, grauis, Barbaris grauarius, sic dictus, quod æger veluti ponderis loco affecto incumbens sensum percipit. Prouenit hic dolor à causa in membro per se sensu destituto, membranâ inuoluta; qualia membra sunt, hepar, lien, renes, pulmo. Nam si tale membrorum parenchyma vel inflammatio, vel apostema, vel calculus, vel humor occupet; etsi ipsa caro visceris non sentiat, tamen, dum ambiens membrana tenditur, aut deorsum trahitur, fit inde dolor talis grauis.

An omnis  
intemperies  
dolorum inducat.

Doloris  
differentia.

Doloris  
differentia.

*Νογυατῶς*, Punctorius, qui mēbranis, præcipuē illis maioribus, accidit, eō loci quidem fixus, vbi membrana pungitur, ad magnum tamen spatium circumcirca se se diffundens. Talis dolor accidit in pleuritide, membrana costas succingente inflammata, item in renibus & hepate, eorum tunicis inflammatis, vel membranis, quibus vicinæ partes connectuntur, in consensum tractis.

*Οξύς*, acutus, pungens, Barbaris pungitiuus, puncto-  
*Dolor acutus.* rio cognatus cum membrum quasi acu, cerebra, aut palo impacto, perforari videtur, vt interdum in colo intestino accidit, & in cephalæa quandoque, præcipuē verò calculo aspero in vteribus hærente.

*Οὐρανός*, mordax, à mordaci humore partes sensibiles vellicante. Quò pertinet & pruriens, seu pruritiuus, qui ab humore acri & salso per cutem diffuso accenditur.

*Σφυγμῶδης*, *ἡ σφυγμῶδης*, pulsatorius, in quo æger manifestam sentit pulsationem. Equidem in homine sano solùm arteriæ pulsant earumque pulsatio sine dolore percipitur. Vbi verò inflammatio oborta est, vel affectus phlegmonodes, vt erysipelas & abscessus, earum pulsatio cum dolore percipitur, ob angustiam partium, quas arteria, dum attollitur, comprimit. Itaque dolor pulsatorius inflammationis proprius est, sed non omnis, verum maioris tantum, neque in omnibus partibus. Tria enim ad dolorem pulsatorium efficiendum requiruntur: primò, vt pars affecta sit sensu prædita. Secundò, vt arterias habeat. Tertio, vt membrum distendatur, & maiori ventilatione opus habeat. Vnde neque fit in scirrhis, neque in œdematis propriè dictis neque in peripneumonia, neque in pleuritide, neque in aliis partibus, quibus vel arteria, vel sensus deest.

*Ὄστέος*, id est, Ossium dolor, Barbaris frangitiuus, membranis, quæ ossa tegunt, proprius, qui propterea profundus est, & in intimo corporis sentitur, in quo æger ossa quasi frangi sibi & contundi queritur. Oriturque à flatu aut humore seroso inter os & membranam sese insinuante.

*Τένσιος*, Tensiuus, est membranarum, in quibus nulla sunt arteriæ, & cutis, ac glandularum, cum inflammatione laborant: capiti etiam sæpe accidit, & quidem à spiritus tenuis & flatuosi copiâ, si citra gravitatem & pulsus fiat. Si verò cum pulsû, membranæ inflammationem; si cum gravitate, humorum multitudinem intra membranas contentam significat. Accidit frequentissimè ob repletionem humoris siue vaporis, & flatus. Estque symptoma commune inflammationum & tumorum, inprimis calidorum. Nam venæ, arteriæ, & nerui tenduntur, vt per tota membra ab inflammato loco vique ad alas & inguina tensio percipiat. Excitatur quoque dolor ab immodicis exercitationibus, vnde & lassitudines tensiæ appellantur, quæ musculorum sunt. Plura de his vide apud Galenum, 2. de locis affect. cap. 3.

### Signa Diagnostica.

Dolor ipse, vt molestissimum symptoma, faciliè ex ægri relatione & querela cognoscitur. Causæ etiam externæ calefacientes, frigefacientes, secantes, vrentes, distendentes, similesque corpus violenter afficientes, itidem ex ægri relatione patefunt. Internæ verò causæ signis inuestigandæ sunt, de quibus in cuiuslibet partis morbis in specie agetur.

### Indicationes & Curatio.

Dolor indicat remedium anodynum, siue dolorem tollens. Cum autem, vt ex iis, quæ antea de natura & causis doloris diximus, patet, dolor quidem non sit ipse sensus, sed molestia seu tristitia, non tamen sit sine iensione, ad iensionem autem duo requirantur, ipse partis sensus & animaduertentia, seu superioris facultatis concursus: si vnum horum desit, non fiet dolor. Itaque quæ vni horum sunt contraria, etiam dolori sunt contraria.

Molestæ sensationi contraria est iucunda sensio: talem autem efficiunt, quæ substantiâ sunt molli, ac blando tepidoque, & temperato calore prædita. Vnde Galenus, 7. method. med. cap. 6. balneum aquæ tepidæ sensui tactus iucundissimum & dulcissimum esse scripsit. Et Hippocrates, 6. Epidem. sect. 4. s. 8. cum Medicum suauiter erga ægrum sese gerere iubet, præcipit, vt mollia tactui offerantur, tanquam gratissima. Et Galenus, in Commentario, addit, mollia ita tactui esse iucunda, vt suaves voces audiri. Hinc vola manus cuiusque parti apposita dolorem mitigat, & vinctuola ac pinguis & contactu suo, & calore tepido suauem pariunt sensationem; vt oleum commune dulce, pinguedines animalium temperat. Atque hæc sunt propriè Anodyna.

Sensio autem contraria est sensus priuatio. Sensio autem non fit vel ipso sensu ablato, vel animâ non animaduertente. Quæ ipsum sensum tollunt, naturalem temperiem partis tollunt, aut potius spiritus, sensationis instrumentum, quasi sopiunt ac stupefaciunt, & talia propriè Narcotica dicuntur, quæ non, nisi summa necessitate urgente, & cautè adhibenda sunt. Narcoticis substitui possunt Hypnotica; cum in somno omnes sensus cessent: modo hypnotica non sint simul narcotica. Alias enim nulla inter ea esset differentia.

*Narcotica.*

*Hypnotica.*

Animaduertentia tollitur, dum æger ad alia obiecta auocatur, quæ attentionem requirunt. Sic suauia colloquia, cantus suavis, inspectio rerum iucundarum, animus aliò auocando dolorem leniunt. Hinc etiam doloribus duobus corpus infestantibus maior minorem obfuscat, & ob iram & animi perturbationem dolor ex inflicto vulnere sæpe non percipitur. Atque hæc genuinæ, quas dolor per se suppeditat, Indicationes sunt, & hæc vera dolorem quatenus talis, curandi ratio est.

Dum verò alij medicamenta anodyna resoluentia & calida in primo, ac tenuium partium esse statuunt, quæ scilicet euacuent, digerant, rarefaciant, extenuent, concoquant, & æquabile reddant, quicquid in partibus dolore affectis aut humorum acrim, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum, tenuibus spiraculis infarctorum, aut etiam vaporosi, aut crassi, aut admodum frigidi spiritus exitum commodum non inuenientis inhærescit, aut conclusum est, vt Galenus, 5. de s. m. fac. cap. 19. hac de re loquitur, non propriè anodyna, & quæ omni dolori, à quacunque etiam causa proueniat, communia sunt, proponunt, sed medicamenta, quæ certis causis dolorem patientibus occurrunt. Anodynorum autem, vt & Narcoticorum materia in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 1. cap. 7. proposita est. Et si inter Anodyna & dolorem lenientia etiam calida in primo recensentur, ab autoribus fit hoc, quia calida in primo non multum differunt à temperatis, neque illos limites semper exactè distinguere faciliè est. Et licet aliquid materiæ digerant, atque ita remedia causæ dici posse videantur: tamen materiam totam digerere non possunt.

## CAPVT III.

De

*Doltre Capitis.*

**Dolor capitis.**

**C**Um autem dolor omnibus partibus sensu tactus præditis accidere possit, sapius inter symptomata in variis corporis partibus doloris fit mentio, Hoc loco saltem de dolore Capitis agemus; de reliquarum partiũ etiam suo loco acturi.

Dolor capitis, Græcis ὀδὸν μέν, ἀλγῖμα, καὶ πόθ- κεφαλῆς  
 atque vna dictione κεφαλᾶλγία & κεφαλαία dicitur, ap-  
 pellatione à symptomate & parte affectâ simul sumpta:  
 Arabibus Soda,

Caustic.

**Causae doloris  
capitis.**

**Causa continens**, vt aliorum dolorum omnium, est solutio continui in partibus sentientibus, seu membranosis in capite, Remotiores sunt, quæcunque continuum solvunt; quæ partim sunt externæ, partim internæ.

Externæ seu evidentes sunt ær calidus ambiens, siue à Sole talis, siue ab igne; frigiditas nimia, flatus & ventus aquilonaris & austrinus, odor grauior, percussio, ictus, & casus.

Interna sunt primò nuda intemperies calida & frigida. Calida quidem vel intemperiem conciliando, vel humores ad caput euacuando, vel iam in eo contentos flatu diffoluendo, liquando & extenuando, agitando. Huc faciunt vigilie, inedia, exercitatio & motus corporis atque animi nimij, qui humores exagitant, extenuant, calefaciunt, & in feruorem agunt. Frigida verò condensando, adstringendo; dum fuliginosa excrementa retinet, calorem naturalem intro agit, spiritus incendit, aut in repletis per austrum capitibus excrementa retinet, in corpore verò puro digerit & dissipat per accidens. Quæ enim singulæ intemperies capitis causas habeant, supra, *part. 1. cap. 2. 3. 4.* dictum.

Deinde materia peccans seu qualitate, seu quantitate. Qualitatis vitia in materia sunt excessus caloris & frigoris, acrimonia, malignitas, vt in lue venerea, & febribus malignis. Quantitas *πλεονεξία*, seu *περισύα* materiae parit, qua aut humores boni aequabili analogia redundant, vt in plethorâ; aut vitiosi & prauis, vt in cacochymia, quarum vtraque obstructionis meatum in capite caulla existit, & vasa distendere ac membranas comprimere solet.

Est autē materia illa aut humor, aut vapor seu flatus. Ac interdum vapor seu flatus ex piruita viticida copulis membranarum, pericranij scilicet, & duræ matris, inter suturas inharēte genitus, ita crassus & validus est, ut præter insignem dolorem, quo affligit, etiam copulas illas membranasque distendendo compagem futurarum, cranij relaxet. Cui malo mulieres non ineptæ ratione fasciis caput vinciendo consulunt; etsi superstitiosa nescio quæ mensuratio sæpe accedat. Nam & Hippocrates, in libro de iis, quæ in medicatr. fiunt, sub finem, ἀποπικνυμένα nominat, quibus ossium capitulis in suturis distenduntur, atque hinc natum dolorem, sanare docet. Et Galenus, 2. de loc. affect. cap. 7. *κεφαλῆς* *παθόντος* meminit ex Archigenis sententia in Cephalalgia circa phlegmonem, cuius visus erat, ut compressione suâ affluxum humorum & vaporum ad caput impediret, & efficeret, ne arteriarum in temporibus pulsus vehementiore caput concussus magis doleret, sicut dolere solent partes affectæ, dum moventur.

Cæterum & hoc observatum est, acerbos quoque <sup>Vermes</sup> capitis dolores exiitisse à vermibus in ipso genitis, <sup>calculi in-</sup> cuius exemplum ab Hollerio memoratur, ut & <sup>piso.</sup> Francisco Hildesheimio in *specilegio*. Videatur & Schenckius *libr. 1. observat.* 82. 83. 84. 85. Tandem calculos in cerebro genitos intolerabiles capitis dolores excitasse compertum est, ut apud Kentmannum in libello de lapidibus videre est.

Affligitur autem caput dolore à materia, hoc est. ab humore vel vapore, vel per *ἰσχυράματα* vel per *συμπύκνωσιν*.

Per idionādas & per essentiā, quando materia con-  
tinuum solvens dolorēque creans in ipso capite con-  
sistit, genita ibidem & cumulata ex imbecilla aut vi-  
tiosa nutrimenti concoctione, ob cerebri & partium  
capitis, *ἀδύναμις & δυσχρησία* Et omnino si caput  
debile fuerit, ad dolorem cum ab externis, tum in-  
ternis causis contrahendum paratius est. Scribit quo-  
que Galenus, 6. *Epidem. comm. 2. aphor. 3.* acuta ca-  
pita, in quibus dentium positus immutatus videtur,  
ve inferiores è regione superiorum non sint, sed veluti  
renulsum ac distortum os videatur, doloribus assiduīs  
conflictari.

Per *συνεχόμενον*, quando materia ad caput fertur, *per συνέχον*,  
sive eâ attractâ à dolore aut calore, sive ad caput im-  
becillum transmissâ à partibus aliis robustioribus, id-  
que motu vel critico, vel symptomatico. Transfertur  
autem à toto corpore, vt in febribus vapores, in ple-  
thora boni humores, in cacochymia prauī, vel ab ali-  
quâ parte; vt imprimis à ventriculo, è quo per œso-  
phagum vapores sursum ad caput ascendant, ab hepa-  
te item vapores & humores; vt & à liene, vtero, re-  
nibus, intestinis, & genitis in his vermibus, per venas  
& arterias, & per cœca quoque corporis spiracula.  
Caput enim, veluti tectum fumosæ domui im-  
positum, excipit quæcunque ab imo effumant, sur-  
sumque feruntur; vnde illud affici necesse est à par-  
tibus inferioribus, vel à toto etiam corpore, per  
connexionem valorum, quæ in vniuersum corpus  
sunt dispersa, vt supra etiam lib. 1. par. 1. cap. 6.  
dictum.

Fit hæc lymphathia κατὰ κορυφίαν partium inferiorum, quæ vapores aut humores capiti ab illis communicantur: cum alia κατὰ θυλάκιαν fiat, ratione vicinitatis partium dolentium, vt thoracis, faucium, scapularum; alia denique κατὰ σύμμετρον, vt à spinalis medullæ affectione aliqua, & partium cæterarum, quæ vel tunicas à membranis cerebri, vel nervos sensus causâ ab ipso cerebro accipiunt.

Atque ita caput consensum habet cum omnibus fe-  
re corporis partibus, etiam remotissimis, pedibus nem-  
pe, adeo ut vel minimâ dolente, facillè illud simul com-  
patiatur. Fitque frequentissimè iste consensus cerebri,  
spinalisque medullæ, & nervorum beneficio. Consen-  
tit verò maximè cum ventriculo, ob nervos insignes à  
sextâ coniugatione prodeuntes. Hinc affecto itoma-  
cho illicò simul etiam ipsum cerebrum in consensum  
trahitur, & afficitur. Sicut contra cerebrum affectum  
ventricululum in consensum trahit, unde delirantes,  
stupidi, vel alio cerebri morbo graviore affecti  
nihil appetunt, & si illud ob contusionem & per-  
cussionem graviores commotum sit, mox ægri vo-  
mitus incurrunt molestos, sæpè etiam periculosos,  
qui non, nisi sanato cerebro, listi possunt. Quem-  
admodum & cum utero, cuius latio vertiginem, &  
alios cerebri affectus inducit, in primis autem gra-  
uissimos capitis dolores, vaporibus illuc transmissis,  
excitat, quos è regione capitis dolente, tanquam si-  
gno certo, à doloribus, ex ventriculo obortis distingui  
posse, Laurent. Ioubertus, *cap. de Cephalalg.* do-  
cet, ubi scribit, se experienciâ frequenti cognovisse,  
dolores



Dolores capitis à ventriculo obortos magis anteriorem capitis partem offendere; dolores verò ab vtero verticem & occiput. Et doctissimus Langius, *lib. 1. epist. 49.* idem ferè testatur, quando refert; se illud plusquam centies expertum fuisse in hysteriarum, & quavis vteri affectione, solum verticem capitis, prope futuram coronalem, vbi mulieres glaciæ frigus & pondus se sentire farentur, vtero affecto lege quadam consortij condolere. Quod (inquit) si observaueris, ad discernendum, quando caput per matricis consensum doleat, tibi plurimum proderit. Quod quomodo accipiendum sit, & quæ eius sit ratio, supra, *lib. 1. part. 1. cap. 6. in quaestione*, diximus.

### Differentia.

Differentia  
doloris capi-  
tis.

Differentiæ dolorum capitis sumuntur ab obiecto & causâ efficiente; quâ ratione dolor alius est acer & perforans, excitatus ab humore aut, vapore bilioso vel adusto, membranas mordicante; alius grauius, qui *capitis* dicitur, à pituitosorum humorum copia, vel à plethora, vel ab ebrietate; alius distendens, à flatuum, vel mitiorum humorum abundantia, inter caluariam & pericranium, vel inter caluariam & duram cerebri membranam; alius pulsans, à tenui biliosoque sanguine, vel à spiritu redundante, quo fit, ut arteriæ impletæ ac distensæ vehementius pulsent, membranæque concutiant, quibus continentur ac fulciuntur.

Deinde à parte affecta, vbi dolor aliàs totum caput occupat, aliàs partem eius duntaxat, dextram vel sinistram, anteriorem vel posteriorem, Qui totum caput, aut maximam eius partem obsidet, ac recens est, nec ægro consuetus vel diuturnus, nec ita vehemens, ex quacunque causâ oriatur, *κεφαλαλγία* dicitur. *Κεφαλαλγία* verò, qui inueteratus ac vehemens est, leuiculâ occasione exacerbatur aded, ut nec strepitum aut vocem, nec splendorem lucis, nec vehementiorem paulò motum, nec vini potum porum ferè æger valeat, sed quietem ac tenebras amet. Arabes Onum, ac passionem Galeatem appellant. Atque hic dolor vel continuus est, & curatu difficilis, vel per intervalla, tanquam paroxysmos, recurrit & inualecit, ut in epilepsia, & morbis periodicis nonnullis aliis, qui vel sunt ordinati, certis diebus septimanisvè, vel manè, vel sub noctem redeunt; vel inordinati, qui omni tempore redeunt, præsertim autem tum, quando à causâ externa, exacerbantur. Qui verò dimidiam capitis partem affligit, *ἡμικρανία* & *ἡμικρανία* dicitur, atque hic etiâ vel recens est, vel inueteratus, siue causam fixam in cerebro habeat, siue aliunde communicatam. Frequenter tamen per sympathiam fit hypochondriorum, & ex intervallis reuerti solet.

Postremò à loco aut situ doloris quâ ratione dolor alius est externus, alius internus. Externus pericranium obsidet, & in superficie percipitur, ad radices capillorum, manûque pressu exacerbatur. Internus ad radicem mitescit, præsertim si sit sine distensione. Vterque eo vsque aliquando intenditur, ut ad oculorum radices pertingat. Quanquam enim Galenus, 3. *de loc. affect. cap. 9.* interiores solum dolores capitis ad radices vsque oculorum pertingere scribat: tamen & à pericranio oculorum cauum succingi, Fernelius monet.

### Signa Diagnostica.

Signa doloris  
capitis.

Causas evidentes Medicus vel sensus, visus nempe, tactusque iudicio cognosceret, vel ab ægro & adstantibus de iis certior fieret; nisi fortè mens quoque ægri laboret. Evidentes causæ si nullæ præcesserint, coniecturam facere oportet, dolorem ab interna aliquâ extitisse. Ac ab intemperie nuda caput dolebit sine sensu grauitatis,

D an. Sennerti Tom. II.

tensionis, punctiōis, morsus. Si à materia dolor capitis excitabitur, & quidem à vapore, vel spiritu flatulento, tensio aderit sine grauitate, & punctio per intervalla, atque alia signa, supra, *part. 1. cap. 7.* enumerata. Si verò ab humore dolor erit, sensus percipietur grauitatis, & dolor erit stabilior. Quæ verò intemperies causa doloris sit, quæ item materia, ex iis, quæ supra, *part. 1. de signis Intemperier. capitis cum & sine materia*, dicta sunt, patebit. Peccant verò hæ causæ magis qualitate, si nec tensio, nec grauitas adsit, sed sensus tantum præter naturam caliditatis, frigiditatis, siccitatis. Magis verò quantitate seu copiam, si dolor cum tensione & grauitate sit coniunctus.

Cæterum exactè definire, vtrum in dolore capitis afficiantur membrana cerebri, an cerebrum ipsum, vel partes huic vicinæ, id adeo necessarium ac utile ad curationem Galenus, *in fin. 2. de loc. affect.* esse non putat; cum semper remedia capiti applicentur. Dolor tamen punctuarius membranas cerebri affligi indicat qui si cum magnâ pulsatione sit, inflammationis argumentum est, arteriis, quæ membranas cerebri intexunt, renui feruidoque sanguine impletis ac distentis. A cæteris circa cerebrum partibus dolor potius cum grauitatis sensu existit.

Signum doloris capitis à vermibus est dolor cum rosione quâdam, & cum pruritu in naribus.

Signa doloris  
à vermibus.  
Capitis pri-  
mario dolen-  
tis signa.

An autem caput per se, an per consensum afficiatur, sic discernitur. Proprius & primarius capitis dolor est, vbi læsio in aliqua cerebri functione, siue principe, siue sensus & motus ministrâ, deprehenditur, cæteris extra caput membris præter naturam haud affectis. Dolor verò per consensum fit, quando caput per se sanum & bene valens aliunde malè afficitur. Præterea dolor primarius plerumque continenter, & sine intermissione fatigat; per consensum verò ingrauescit & mitescit, prout intenditur vel minuitur affectus in parte, à qua malum capiti communicatur, teste Galeno, *in fine 2. de loc. affect.* Quod si tamen in primario capitis affectu materia per intervalla in capite gignatur, dolor primarius intervalla quoque sua habebit: sicut contra dolor per consensum continuus esse potest, si genita extra caput in parte aliqua materia continenter ad caput feratur. Sed de his, & à qua parte materia, doloris causa, capiti committitur, dictum est supra, *part. 1. cap. 5. & 6.* Hoc saltem adhuc monemus, præter alia signa etiam consideranda esse, quæ ab ægri temperie, ætate, idiosyncrasia, sexu, habitu corporis, consuetudine, vitæ genere, anni tempore, cæli statu sumuntur, ut in quacunque doloris capitis specie de eius causis coniectura certior capi possit.

Morbi quoque, qui dolorem capitis comitantur, ut & vrinæ signa hic præbere possunt. Nam quibuscunque vrinæ in febribus turbatæ sunt, qualis iumentorum, iis dolor capitis adest vel aderit. 4. *aphor. 70.* Ex agitatione enim & feruore humorum per febrem spiritus flatulentis vnâ cum calore promptè ad caput attollitur, qui dolorem ibi concitat. Si etiam vrinæ, quæ in morbis claræ minguntur, non facillè turbantur, signum est doloris capitis; quoniam calor naturalis debilis non separat crassa à subtilibus; & qui præter naturam calor adest, vapores calidos de materia crassa resolutos sursum ad caput secum effert. 4. *aphor. 17.* Bullæ parvæ per coronam vrinæ sparsæ capitis dolorem adesse significant. Eritque dolor acrior, si bullæ illæ aureæ aut citrinæ fuerint; mitior, si albæ; diuturnus, si diu permancant. Fernelius, *de urin. cap. 16.*

Signa doloris  
capitis ex  
vrina.

### Prognostica.

1. Dolor capitis in cute vel pericranio capitis ab externa causa excitatus, aut si ab interna à flatibus, vel à materia non admodum copiosa & crassa, vel ab intemperie, quæ in habitum nondum abiit, oriatur, facillè

Dolores cor-  
poris qui pe-  
culiosiores.

Y y 2 curatur,

curatur, quam qui meningis obfidet, vel à contrariis causis ortum habet.

2. In doloribus capitis minus periclitantur ægri, quam in doloribus aliarum partium; ut aurium, oculorum, dentium, coli, peristitij ab ossis avulsione; eo, quod cerebrum per se sensus expers est, teste Galeno, 1. de causis, symp. cap. 8. Propterea Galenus, in 2. de compositione medic. secund. loca cap. 1. inquit, ob capitis dolorem vehementem neminem unquam aut syncope correptum fuisse, aut se ipsum occidisse, quemadmodum quidem coli dolore vexati fecerint: quod tamen ita intelligendum est, quatenus dolor non alios grauiore affectus accerlit.

3. In vehementi capitis dolore cum febre acuta, si urina alba & clara conspiciatur, malum est. Significat enim bilem sursum ad caput ferri, unde inflammatio metuenda est, ad quam delirium sequi solet, teste Galeno, in lib. de urin. cap. 5.

4. Dolor capitis fortis subito delitescens, non sequente alleviatione per crisin, est lethalis: quia cerebri lationem, virtutisque animalis destructionem significat.

5. In vehementi capitis dolore extrema frigescente, malum est. Ob vehementiam enim doloris calor naturalis intus retrahitur ad locum affectum, unde phlegmone facile excitari potest, ex 4. aphor. 48. & 7. aphor. 1. & 26.

6. Si dolor capitis, præsertim circa frontem & tempora, vehemens & continuus fuerit, cum febre acuta, & quarto die signum aliquod perniciosum apparuerit, septimo die mortem portendit, vel paulo post: si contra signa salutaria sese quarto die ostenderint, septimo crisis futura est. Quod si verò ante vigesimum perniciosa signa adfuerint, dolor tamen capitis cum febre ultra id tempus perseverauerit, tum sanguinis è naribus eruptionem, aut ad diuersas partes abscessum expectare oportet, teste Hippocrate, 3. Prorrh. aphor. 11.

7. Caput vehementer dolenti pus, vel aqua, vel sanguis per nares, os, & aures effluens, febrem soluit, teste Hippocrate, 6. aphor. 11.

8. Quibus ex morbo partium inferiorum conualescentibus dolor capitis vehemens superuenierit, si non præcedat excretio manifesta, iis in cerebro futurus est abscessus, morbi materiâ ab inferioribus ad superiora conuersâ, 4. aphor. 32.

9. Qui in doloribus capitis æruginosa vomunt, & cum surditate vigilant, ij citò vehementer insaniunt, ob collectam in cerebro bilem adustam, & consentum orificij ventriculi cum cerebro, 1. Prorrh. comm. 1. aphor. 10.

10. Capite dolentes, & catocæ detecti, ac delirantes, cum intercepta aluo, & ferociente intuitu, facieque impensè rubentes, opisthotono corripuntur, 1. Prorrh. comm. 2. aph. 56.

11. In capitis dolore coma & surditas, & hypochondriorum tensio, & corporis incontinens iactatio, parotides vel abscessus ad aures significat, ex raptu materiæ ad superiora, 1. Prorrh. comm. 3. aph. 26. & 77.

12. Dolores capitis ex parotidibus, aut alia quacunque causa, cum febre acuta, si in die non critico soluantur, aut repente euanescent, inutiliter solvantur. Significat enim *αὐτὸς ὁ πόνος* seu translationem materiæ ad alias partes, teste Galeno, 1. Prorrh. comm. 3. aphor. ult.

13. Quibus capitis dolores fiunt, & sonitus aurium sine febre, & vertigo, & vocis surditas, & manuum torpor, ij aut apoplectici, aut epileptici, aut obliuiosi fiunt, ex pituita crassa & viscida in cerebro & nervis cumulatâ. Hippocrates, in Coac. prædict. tota parte, quæ de dolore capitis agit.

14. Quicunque sani capitis dolore repente corripiuntur, & statim obmutescunt, ac sterrunt, ij intra septem dies

pereunt, nisi febris valida corripiantur, teste Hippocrate, 6. aphor. 51. Apoplexia enim significatur ex spiritus flatulenti, aut humoris crassi copia, nervorum principium obstruentis; quam materiam febris concoquere & dissolvere solet.

15. Quicunque in febre non lethali dixerit, sibi caput dolere, aut præ oculis obscurum quid apparere, si cardiogmus accesserit, ei biliosus vomitus expectandus erit; præsertim si rigor partium infra hypochondria superuenerit. Quibus verò in eiusmodi febre caput dolentibus visus hebetudo contingit, aut splendores ob oculos obuersiones, & pro cardiogmo aliquid tenditur in hypochondrio dextro aut sinistro, neque cum dolore, neque cum inflammatione, iis sanguis è naribus fluxurus est, 3. prognost. aphor. 30.

16. Si dolor capitis non ab initio ægritudinis affuerit, sed circa tempus criseos affligere cœperit, & spiratio repente facta sit difficilior, retractis hypochondriis, & pulsus tument, & arteriæ in temporibus pulsent, & genæ vel nates rubicundior sit, ac spontaneæ lacrymæ adfint, aut splendores ante oculos versari videantur, & æger manibus nares scalpat, nonnunquam etiam delirium accedat, ex humoris ad superna motu; tum sanguinis per nares fluxum expectare oportet, teste Galeno, in fin. lib. 1. ad Glaucon.

17. Vterum gerentibus capitis dolores soporosi cum gravitate obuinentes, mali sunt. Fortassis autem his etiam conuulsium quid pari contingit, 1. Prorrh. comm. 3. aphor. 11.

18. Dolor capitis vehemens & assiduus, qui nullis præidiis cedit, merum affert securitæ cœcitatæ, ob fluxum humoris ad oculos. Rhales, in 9. ad Mansorem.

### Indicationes.

Indicationes sumuntur vel à dolore ipso, vel à doloris causis.

A dolore, qui per se anodynum indicat, sumpta indicatio non attenditur, nisi is adeo vehemens sit, ut curationem ad se trahat; quod fit, quando vigiliis continuis, & intensis vires prosternt. Ac tum, ut dictum, postulat remedium anodynum, idque, quod aut verè tale est, si dolor ipse sit remissior; aut sic tantum appellatum, si dolor sit intensior. Vtrumque quale sit, capite præcedente dictum.

A causis doloris indicationes sumptæ dolorem unâ cum causâ auferre, partique integram sanitatem restituere docent. Si nimirum causa doloris sit extrema & euident, remoueat, ne malum foueat vel augeat. Si interna sit, eaque intemperies, per oppositionem contrarij mutetur; si materia sit, seu intemperies cum materia, materia illa euacuanda, reuellenda à capite, vel si fixa ibi hæreat, dilutienda; intemperiesque temperanda, & caput roborandum; sicut hæ indicationes supra, part. 1. propositæ sunt.

### Curatio.

Dolorem itaque tanquam anodynum mitigat succus aut mucilago maluæ vel althææ cum oleo rosæ, vel cum lacte muliebri capiti applicata; emulsio anygdalar. dulcium, decoctum flor. chamæmeli, melilori, sem. fœnigræci, panis è tritico lacte tepido madidus, ol. chamæmeli, anethini, commune cum vino albo tenui.

Si hæc non sufficiant, & dolor ac vigiliæ inualescant, veniendum est ad hypnotica & narcotica, ut sunt lactuca, nympha, solanum, mandragora, capita papau. opium. Progrediendum verò est à mitioribus ad valentiora & opiatâ. Atque talia narcotica non applicentur sutura coronali, quo loco facilè non cerebrum penetrare possunt, nec occipiti, ubi principium est nervorum & spinalis medullæ, sed fronti. Cerebrum enim

Remota  
causa  
signa

Curatio do-  
loris capitis.

Opium con-  
tra & nervi  
nocet.

enim & nervi opium & narcotica sine damno non ferunt. Si intrinsicus quoque ob doloris vehementiam iis uti requirit necessitas, cautè propinentur, & bene correctæ, ut *Philonium Romanum*, *Tryphera magna*, *Requies Nicolai*, *pilula de cynoglossa* à *Scrup. i. ad Scrup. ii.* & præcipue *Laudanum opiatum* ad *gr. ii. vel iij.* Tempus utendi hisce est, si dolor vehementer urgeat, ut spes non sit, illum euacuatione prius, vel per venæ sectionem, vel per pharmacum purgans mitigatum iri.

Doloris capitis ab intemperie curatio.

Quomodo autem causæ doloris tollendæ sint, & qua ratione intemperies nuda, ut & cum materia, scilicet cum sanguine, pituita, bile, melancholia, flatu, per primarium cerebri affectum & per consensum, tollendæ sint, supra, *part. i.* dictum, quæ hinc repetere opus non est. Hoc saltem monemus, ut in topicis eligantur ea, quæ simul sunt anodyna. In temperie frigida hoc Epithema commendatur:

*℞. Pulv. zedoaria Dra. i. aq. betonica, verbenæ, sambuci, an. Vnc. i. Misce.*

Totius vi.

Amuleta.

In omni etiam dolore capitis tanquam singulare medicamentum commendatur aqua verbenæ destillata, quæ & capiti extra applicatur, & pondere *Vnc. iiii.* vel *v.* assumitur. Imò amuleti loco eadem viridis collo appendendi potest; quo remedio miraculi instar ægrum quendam, qui nullis aliis remediis, quantumvis optimis, siue internis, siue externis curari potuerit, restitutum fuisse, refert *Forestus, lib. 9. observ. 52.* Potest etiam eadem herba in coronæ modum circumponi, vel cum rosaceo & aceto applicari. Alia amuleta ad capitis dolores enumerantur *ibid. in scholio.*

A calore solis.

Si verò dolor capitis ortum habeat à calore externo, qualis est solis, balnei, ventorum australium, quam cephalagiam *ἡ κεφαλαλγία* veteres nominarunt, *Galenus, 2. de compos. medic. secund. loc. rit. 3.* caput in frigidantia adhibet, quæ si actuali suâ frigiditate minus præstant, quam præstare debebant, ulterius illa refrigeranda vel demergendo in aquam gelidam, vel circumponendo glaciem. Ita enim fieri affirmat, ut non solum calor in capite excitatus tollatur, sed humores etiam & vapores, qui ad caput fortè impetum faciunt, deorsum in corpus truantur, ubi discuti postea faciliè siue à natura, siue ab arte possunt. Qualia autem ista sint, & quomodo applicari debeant, supra, *part. i. cap. 1.* dictum.

A casu vel percussione.

Quod si dolor capitis existat à casu vel ictu, sitque sola contusio absque vulnere & cranij fractura, præmissa reuulsionis gratiâ phlebotomiâ, aut clystere, aut utroque, caput rasum inungatur oleo rosaceo & myrrino mixtis, & aspergatur pulvis rosarum siccarum & myrtillorum ad prohibendam inflammationem, quam febris & delirium comitari solent.

Vel *℞. Pulv. myrryll. Vnc. i. nucis cupress. sumach, balaust. rosar. rubr. an. Drach. ii. ol. rosar. vel chamamel. q. s. F. Cataplasma.*

In fine ad discutiendum & resoluendum addatur absinthium, schœnanthum, farina lentium, fabarum. Laudatur & vnguentum è matrisylviâ, quod materiam foras è capite attrahit.

Si verò cranium vel fractum, vel contusum esse suspicio adsit, curatio instituat ut supra, *part. i. c. 21.* & seqq. dictum.

Doloris capitis ab ebrietate.

Dolor capitis ab ebrietate, etsi præsidia medica mereri non videatur: tamen quia ebriis gravissima symptomata accidunt, qualia sunt delirium, vertigo, tremor, convulsio, apoplexia, & denique mors ipsa, ut ex *3. sect. problem. Aristot. & ex 5. aph. sect. 5.* constat, planè negligi non debet. Perficitur autem materiæ euacuatione, & à capite repulsione, & intemperiei, si quæ inducta est, alteratione. Itaque si crudum vinum in ventriculo fluctuat, æger mox euomat. Post repellentibus utendum est, ut ol. rosar. cum aceto, aut cum hederæ & brasica succo. Vel imponatur hoc Oxyrrhodinum:

*Dan. Sen nerti Tom. II.*

*℞. Aq. rosar. optim. Vnc. iiii. chamamel. flor. sambuc. persicor. anethi, an. Vnc. β. succ. rosar. Drach. vi. acer. rosar. 3. ij. M. pro Oxyrrhodino.*

Utatur etiam medicamentis calorem à vino temperantibus.

Exempl. gratia tale detur Electuarium:

*℞. Conseru. rosar. Vnc. iiii. aceros. Vnc. i. rob. ribes. rad. condit. cichor. an. Vnc. β. spec. diamarg. frigid. corall. rubr. preparat. an. Scrup. i. Cum syrup. aceto su. citri, F. Electuarium.*

In primis, *syrup. de succo citri*, ut & *granator. vel iulep.* ex iis cumaq. convenientibus paratus extinguit calorem à potu vini contractum, & vapores depimit.

Quod si dormire nequeat, fricentur pedes & manus sale & aceto. Tandem alatur cibus boni succi, moderate refrigerantibus, & vaporum ad caput ascensum prohibentibus, ut prisanâ hordeacea, pullis gallinaceis cum agresta vel lactuca, pyris coctis, cydoniis conditis, & in fine mentæ de pulvere coriand. sumat cum saccharo.

Quod autem vulgo persuasum est, vini noxam vini potu deleri, id in iis locum habet, qui ob ventriculi imbecillitatem ex frigiditate vinum hesternum & immoderatè assumptum integrè non concoxerunt, unde crudi halitus ad caput mittuntur. Talibus enim Hippocrates vini meraci corylam seu heminam, qui dimidiis sextarius est, propinat, in fine *2. Epidem.* ut coctio nutrimenti iunetur, cruditates corrigantur, & vapores crudi in capite discutiantur. Iisdem etiam ieiunium nocet; cum vaporum sursum ascendentium copiam & acrimoniam augeat, quos cibus assumptus reprimit & mitigat. Et omnino, si quis ob copiam aut vitium alimenti cruditatem patiatur, parum iterum alimenti sumere, quod melioris sit substantiæ, cruditatem auferat. Natura enim novi alimenti, eiusque grati, aduentu coctionem aggreditur, & quam antea non valuit perficere, novi alimenti accessu coctionem perficit; aut certè natura novum alimentum, ut gratum, arripit & coquit, crudum autem, in quo coquendo frustra laborabat, dimittit; hinc facultas expultrix exurgit, & id expellit, unde accidit, ut amplius naturæ molestum non sit. Nam crudum, quod superingestum in cruditate nocet, id tantum est, quod iterum quantitate ventriculi vires superat: at quod in pauca quantitate sumitur, naturam ad coctionem reuocat, & cruditatem corrigit, non nocet.

Ultimò, si à vermibus in capite contentis sit dolor, quomodo is curandus sit, ex iis, quæ, *part. i. cap. 18* dicta sunt, patet: & omnino quomodo causæ omnes doloris capitis tolli debeant, ex iis, quæ, *part. i.* dicta sunt, manifestum euadit.

An vini potu vini noxam tollat.

Doloris capitis à vermibus curatio.

*De Κεφαλαία & ημικρανία.*

In specie saltem aliquid de Cephalæa & Hemicrania dicere liber. Vterque hic affectus diuturnus & δούλοῦ est, nisi quod alter caput totum, alter partem eius duntaxat alteram occupat; quanquam Hemicranie vocabulum etiam de recenti dolore dimidij capitis vulgò usurpetur. A Cephalalgia verò differt, non causis & signis, sed causarum magnitudinè & pertinacia. Nam in Cephalæa & Hemicrania dolor non solum diuturnus, sed adeo quoque vehemens & grauis est, ut æger in tenebris & quiescere contineri cupiat; lenique occasione dolor ita exacerbatur, ut tanquam malleo percuti caput, & frangi ac diuelli æger existimet. Quemadmodum *Galenus* scribit, in *2. de Compos. medic. secundum loca, cap. de Cephalæa*; & in *3. de locis affect. cap. 9.* Malum hoc feminas frequentius affligit, teste *Aureliano*, ob diligentiam in alendis & ornandis capillis.

Cephalæa & Hemicrania.

Quoniam igitur Cephalæa ex confirmata aliqua capitis intemperie, aut ex copia crudorum & crassorum humo-



humorum caput replente & obstruente, vel vapores quoque continenter eò mittente, aut ex acrim humorum in alto capitis residentium morfu, aut denique ex pericranij & meningum cerebri diuturna quadam affectione oritur: facile est intelligere, iisdem præsidij ac remediis hic vtendum esse secundum causarum diuersitatem, quibus in Cephalalgia differentiis & intemperiebus capitis cum materia; fortioribus tamen, diutiusque & frequentius, ob causarum vehementiam & contumaciam maiorem. Neque differenda est huius malis curatio. Nam ex vigiliis delirium & insaniam sæpenu-mero affert. Sequi etiam solent cæcitares, apoplexiæ, epilepsiæ, paralytes, lethargi, & similes affectiones capi- tis grauissimæ.

Itaque euacuationes omnis generis vniuersales & particulares hic conueniunt, & reuulsiones ac topica; prout conditio materiæ, & affectio vel totius, vel capi- tis solum, & loci in capite requirit.

Si plethora adsit, phlebotomia quoque fiat, & cepha-lica aperiatur. Tandem & vena frontis secetur, vel na-rium venæ aperiatur, & cauteria applicentur. Imò nonnulli etiam arterias aperiri suadent, de quibus omnibus supra, *part. I.* dictum,

Vtile etiam est in inueterato hoc malo decoctum li-gni Guaiaci vel Chinæ, vel sassa-parillæ, vel ligni sassa-tras; quorum formulæ supra etiam propositæ, & pas-sim extant.

#### Dietæ.

Dietæ medicamentis respondeat, quæ qualis esse de-beat, supra, de *Intemperiebus capitis*, dictum. Sicut au-tem in omni dolore capitis vitanda sunt, quæ ipsum replent, aut sua acrimoniâ cerebro molesta sunt, qua-lia supra, *part. I. cap. I.* enumerata sunt: ita alimen-tis semper admisceantur, quæ cerebrum naturâ suâ roborant; quo in genere sunt rosmarinus, maiorana, salvia, fœnicul. nux moschata, caryophylli, & ex fri-gidis rosæ & violæ. Somnus denique immoderatus in omni capitis dolore improbat, præsertim meridia-nus, & qui à cibo statim capitur. Hic enim caput in-signiter replet.



## LIBRI PRIMI PARTIS III.

### SECTIO SECVNDA.

#### De Oculorum & Visus Morbis ac Sym- ptomatibus.

#### CAPVT I.

##### Continens nomenclaturam Affectionum quæ Oculis accidunt.

Vitiis Symptomata, quæ tactui, vt sensui com-munissimo, accidunt, proximè explicaueri-mus: iam etiam qui reliquis sensibus, & eorum or-ganis, accidunt morbi & symptomata, dicendum. Cum autem inter sensus externos facile primas obti-neat visus, ab eo faciemus initium, & primò morbos, qui oculo accidere solent, proponemus; deinde de variis visionis læsionibus, & aliis symptomatibus, quæ oculis accidunt, dicemus. Et si verò oculus parua cor-poris pars est: tamen vix vlla alia est, quæ tot morbis sit obnoxia, & ingentibus ac variis casibus oculi na-tura patet, vt Celsus, *lib. 6. cap. 6.* loquitur. Cum au-

tem, vt idem Celsus subiicit, magnam partem ad vti-lum & dulcedinem conferant oculi, summâ curâ tuen-di sunt, ideoque etiam de eorum affectionibus præter naturam diligentius agemus.

Et primò quidem mortos oculi quod attinet, de iis acturus Medicus omnino oculorum naturalem consti-tutionem cognitam habeat, necesse est: quæ qualis sit, ab Anatomicis cognoscendum, & præcipue Iul. Caserio Placentino, *de sensuum organ. lib. 5.* & Hiero-nymo Fabricio ab Aquapendente, *lib. de oculo, visus organo.*

Oculus autem dupliciter consideratur; primò & pro-priè, vt ex iis partibus, tunicis, humoribus & nervis, opticis scilicet, quæ ad visum proximè conferunt, con-stat; deinde vt etiam eas partes connexas habet, quæ siue propter eius custodiam, siue propter commodio-rein eius vsum, adiecta sunt, quo modo etiam ad ocu-lum pertinent cilia, palpebræ, musculi. Arque postero-re hoc modo de oculo agit Galenus, *4. de compos. medic. sec. loca*, quem & nos sequemur.

Atque ita diuidemus morbos oculi in tres classes. *1. Morbi oculi sunt morbi partium, quæ oculis quasi tegumento & munimento sunt, palpebrarum puta; 2. sunt morbi, qui singulis partibus, quæ oculos constituunt, & ad eos pertinent, accidunt; 3. sunt morbi totius oculi.*

Primò palpebrarum vitia quod attinet, sunt ea: *Palpebrarum Tumor, εμψύσμα; asperitas, callositas, scabies pal-pebrarum, Græcis τράχυμα, τραχύτης, δασύτης, τύλωση, φωροδαλμία: Tumores & tubercula palpebra-rum, ὕδαρς, verrucæ, κρίς, hordeolum, χαλάζιον, grando, λιδία, nodi & excrementiæ, ἐκτρόπον, palpebrarum inuersio, & λαγροδαλμία, vel λαγροδαλμων: palpebrarum inter se & cum aliis oculi partibus coalescentia & coherencia, ἀγκύλωσις & ἀγκυλοβλέφαρον, cancer palpebrarum, liuor palpe-brarum ex percussione, ἐδρίασις, vbi in palpebra-rum pilis pediculi nascuntur, quæ tamen & aliis partibus pilosis communis est. φαλάγγωσις, τριχίασις, vbi pili inutiles, & oculos pungentes in palpebris na-scuntur, διστρίασις, vbi duplex vel multiplex pilorum ordo nascitur, μαδάρωσις vel μιλθωσις, pilorum palpebra-rum defluuium, πύλωσις, palpebrarum crassities cum pilorum defluuiio.*

Symptomata, quæ motui palpebrarum accidunt, sunt, oculos aperiendi impotentia, & ἱπποθ, tale vi-tium, quo palpebræ instabiles perpetuò nistant. Alij tamen totius oculi vitium esse malunt.

Interdum quoque res externæ oculis incidunt, quæ sub palpebris hærentes oculos infestant.

Deinde singulæ oculi partes suos morbos habent, & primò quidem tunicas quod attinet, annatæ seu con-iunctiæ morbi sunt, *τάραις, ὀφθαλμία, χύμωσις, pannus, πτερύγον, vnguis seu vngula.*

Annatæ cum palpebris communes morbi sunt, *οκλι-ροδαλμία & ξηροδαλμία.*

Cornæ tunica morbi sunt, color vitiosus, albugo, *Cornæ pustulæ, & vlcerata varia, quæ secundum varias circum-stantias varia nomina accipiunt, ὑπίπνον, quando pus sub cornæ continetur, ruptura cornæ.*

Annatæ & cornæ communia vitia sunt, *ὕπωση, seu suffusio, aut suggillatio, pannus, vulnere, pustulæ, vlcerata.*

Vitæ tunica morbi sunt *πρόωσις, seu procidentia, vitiæ vitæ, quæ varia nomina pro varia ratione accepit.*

Pupillæ morbi sunt, *μυδρίασις, pupillæ dilatio, Pupilla ὀδίασις, pupillæ angustia, ὑπόχυνα, pupillæ obstructio, & τία, humoris præter naturam inter corneam & crystallinam collectio.*

Habent & anguli oculi sua vitia, quæ sunt pruritus, *Angulorum δάκρυ, ἔγκανθις, cum caro angetur, ῥυάς, tumores scirrhi.*

Humoris Crystallini vitia sunt, glaucoma, exsicca-  
tio, diminutio, situs mutatio.

Humo

Oculus va-  
riis morbis  
obnoxius.

Oculi partem  
duplicem.

Morbi oculi  
quod triplicem.

Palpebrarum  
vitia.

Annatæ tu-  
nicæ vitia.

Pupilla vi-  
tia.

Angulorum  
vitia.

Crystallini  
vitia.



**Humoris quoque aquei dantur vitia & morbi;** quando scilicet is minus est pellucidus, inæqualiter crassus, opacus.

**Vitreus etiam humor sua habet via, vt si sit impurius,** obscurior, debitam figuram non habet.

**Neruis opticis accidunt, obstructio, coarctatio, ruptio, conuulsio.**

**Spirituum opticorum vitia sunt, dum fiunt obscuri, crassi, imminuuntur, aut deficiunt.** Pertinent huc splendores nocturni, dum lumen oculis noctu obueriatur.

**Musculorum vitia sunt, cum vel conuelluntur, vel laxantur, vel secantur.**

**Toti verò oculo accidunt; *ἀγορία*, seu imminutio, *ἐκτροπή*, seu procidentia, strabismus, vulnera, cancer, tumores.**

**Atque hi sunt morbi oculorum.** Symptomata quod attinet, & primò actiones læsas, cum oculus sit videnti organum, huc pertinent omnes visus læsiones, *ἀμύωσις*, *ἀμβλυωπία*, visus hebetudo, lusciositas, cæcitas visus deprauatus, vt nyctalopia, *παρόρασις*, strabismus, cum vna res duplex apparet, cum res omnes inuersæ apparent. Et cum, vt commodior visio fiat, oculi etiam sint motu præditi, in motu quoque accidunt symptomata, paralytis & conuulsio. Et cum oculus etiã tactu sit præditus, læpe etiam dolori obnoxius est. Cum etiam vt aliæ partes nutrantur oculi, in nutritione obtingens vitium est atrophia. Deinde in qualitatibus mutatis est color præter naturam. Tandem excrementorum vitia sunt epiphora & lachrymæ, *λήμει*, lachrymæ creuentæ. De quibus iam ordine dicemus.

## De Morbis & Vitiis palpebrarum.

### C A P V T I I.

#### De Tumore Palpebrarum, Emphysemate & Inflammatione earundem.

**P**alpebrarum officium est, oculos clausos ab externis iniuriis tueri, & tempore somni lumen arcere: vbi verò aperti sunt, præstare, vt oculus species visibiles admittere possit. Vnde palpebræ facultatem habent, quâ motu voluntario moueri possint, præsertim superior, vt scilicet oculi aperiiri & claudi possunt, quotiescunque libuerit. Hinc palpebræ proprios musculos habent, neruos, qui spiritum animale aduehant. Quapropter symptomata, quæ palpebris accidunt, præcipuè in motu læso erunt. Morbi verò, qui iis accidere possunt, varij sunt, quos alij aliter recensent. Commodissimè tamen sequenti modo enumerari, & appellationibus distingui posse videntur.

Inter eos primò est Tumor. Tumor autem palpebrarum aliquando à causis externis ortum habet, vt contusione, ictu vespæ, apis, araneæ, vel similis insecti, à contactu vrticæ; aliquando ab internis, ab humore aut vapore, vel calido, inflammationem aut exulcerationem pariente, vel frigido, palpebras inflante, qui tumor *ἐμφύσις*, & palpebrarum inflatio appellatur.

Et quidem hoc malum aliàs à causis externis excitatur, nonnunquam affectus alios sequitur, vt apostema in locis circa oculos & genas, lethargum, carum, item cachexiam & hydropem, quæ singula suam curationem peculiarem requirunt. Plerumque ophthalmiæ grauiori succedit, quando tumor ita increfcit, vt palpebræ vix claudi possint.

Si à causâ calida sit tumor, locum habent medicamenta, quæ in ophthalmia vsurpari solent; de quibus postea dicitur: quale etiam est ophthalmicum, quod in curatione ophthalmiæ Rhafes præscripsit, atque

primum est inter ocularia illa remedia, & infra, cap. 21. proponetur.

*Εμφύσις* verò, quod est tumor laxus sine dolore *οἰ- ἐμφύσις*, similis, ab humore aquoso ac teroso ortum habens, accidit in febribus diuturnis, vigiliis, in cachexia, hydrope, lethargo, caro, & propterea curatur morbis iis quibus coniungitur, sublatis. Fouere tamen licet palpebras decocto florum chamæmeli, rutæ, cumini; vel inungantur palpebræ oleo chamæmeli, anethi, rutæ, vel melle.

Si à vespæ vel apis ictu tumor sit, remoto aculeo lamina ferrea imponatur, donec dolor è punctione euascet; postea resoluentia adhibeantur, vel apis ipæ contrita imponatur. Si ab araneæ punctura tumor sit, theriaca vel Mithridarium imponatur. Si à contactu vrticæ vel aliarum rerum calidarum, inungantur palpebra oleo rosarum, vel succo phantaginis aut semperuini cum oui albumine.

### C A P V T I I I.

#### De Trachomate, Densitate, Asperitate, Callositate & Scabie Palpebrarum.

**T***Τράχωμα, παχύτης, δυσότης, σκωσις, πλῶσις, ψω- τράχωμα* *παλπεβια*, Densitas, Asperitas, Callositas, Scabies *παλπεβια* Palpebrarum, etsi vt distincti affectus ab autoribus proponi soleant: tamen cum communes causas, & communem generationis modum habeant, & solum gradibus differre videantur, omnes hos affectus hoc capite coniungemus: sicut etiam nonnulli alij Medici subcommuni *τραχώματι* nomine eos comprehendunt. Cum enim palpebræ continuò, dum aperiuntur & clauduntur, supra tunicis oculi externis moueantur, membranæ verò illæ leues & exquisito sensu præditæ sint; etiam palpebræ intus molles & leues esse debent, vt faciliè, & absque molestia supra oculorum tunicis moueri possint. Quæ earum constitutio naturalis cum in omnibus affectibus nominatis mutetur, etiam communi *τραχώματι* seu asperitatis nomine omnes comprehendi solent.

*Τράχωμα* autem est internæ palpebrarum partis asperitudo cum rubedine & pruritu, nonnunquam & cum pustulis seu tuberculis semina ficus vel milij referentibus, ab acri & falso humore ortum habens.

Et primò quidem dum materia hæc pauca est, saltem asperitatem quandam & pruritus excitare solet, cum molestia quadam in parte interiore palpebræ, præsertim cum mouetur, ad quam frictio sequitur, & ad hanc copiosioris materiæ attractio, vnde scabies succedit. Affectio nimirum hæc est morbus in superficie & in continui solutione, cui symptomata accedunt, pruritus & rubor.

#### Causa.

Causa proxima est humor adustus, mordax & falsus, siue sit sanguis adustus, siue bilis, siue pituita falsa, siue humor serofus, falsus, siue bilis atra. Plerumque tamen à mixto in massa sanguinea humore hoc malum excitatur. Possunt etiam hoc malum inducere collyria nimis acria, nimis diu adhibita.

Hinc ad malum hoc faciunt humores acres, falsi in capite collecti, aut hinc inde fluentes, & quæcunque ad talium humorum generationem faciunt, vt cibi falsi, &c.

Causa.

Differentia.

## Differentia.

Trachomati  
differentia.

Recesentur autem huius affectus tres species seu gradus. Primò enim cum palpebræ, si inuertantur, quasi densiores & inæquales apparent, affectio ea, vt Actius ex Senero, *terrab. 2. ferm. 3. cap. 43.* tradit, *Δα-σύτης*, Densitas palpebrarum nominatur, in qua palpebræ intus rubent, inæquales & asperæ sunt, ac pruriunt.

Densitas pal-  
pebrarum.

δύσκολος.

Secundus gradus est, cum iam maior est affectio, & non solum densitas & inæqualitas in palpebris inuer- sis apparet, sed manifesta iam asperitas & rubor, adq̃ vt intra eam emineant quasi grana ficus immaturæ; vnde Græcis affectio *δύσκολος*, Latinis ficosâ palpebra nominatur.

τύλασις.

Tertius gradus est, quando iam inueterauit vitium, & pars interna palpebræ exulcerata est, ac scissuram & callositatem contraxit, Græcis dicitur *τύλασις*, Latinis callositas palpebræ; Germani vocant, *den Ascherschnit*, quia mulierculæ credunt, malum hoc ex cineribus, ex quibus lixiuium paratum fuit, generari, si nimirum quis ad locum illum, in quo tales cineres iacent inopinato deuenit.

Adiungenda est his *ψωροδαλμία*, Scabies palpebræ. Quamquam enim à trachomate, eiusque speciebus in eo differat, quod non solum pars palpebræ interna afficitur, sed tota palpebra, præsertim verius oculorum angulos, cum pruritu rubet, aspera ac scabiola est, & exulceratur: tamen cum eundem generationis modum habeat, eam hic coniungere libet.

## Signa Diagnostica.

Pſorophthal-  
mia.

Si palpebra inuertatur, rubea apparet & aspera, ac veluti ficus semen, vel milij grana eminere videntur. Si à sanguine est, maior est rubedo sine magno pruritu: si à bile, minor rubedo, & maior pruritus, ac pustulæ paruæ apparent: si à pituita falsa, maior est pruritus, & maior serosi humoris copia exit: si à bile atra, rubedo est obſcura. asperitas maior, & quod effluit, liuidum est.

## Prognosticum.

*Τράχυμα* in primo gradu curationem suscipit; *δύσκολος* raro; *τύλασις* raro aut nunquam, & maxima cum difficultate.

## Curatio.

Curatio.

Totum corpus & caput, prout hic vel ille humor peccat, conuenienti modo primò euacuandum est; materia à capite auertenda, & si materia per venas & arterias externas fluat ad oculos, repercutientia interini- tia in fronte & temporibus adhibenda, vt supra, *parte 1.* dictum.

Deinde adhibeantur topica, primo quidem emollientia & intemperiem partis alterantia, atque acrimoniam humorum temperantia; postea verò abstergentia & exsiccantia vsurpentur.

Ad emolliendum instituatür fomentum ex decocto hordei, violarum, radic. althææ, semin. fænigræci, & simil. faciem super vaporem conuertendo, aut pannum linteum duplicem hoc decocto madidum supra oculos aliquoties ponendo.

Vel *℥. Maluæ, betæ, portulacæ.* an. M. j. acetosa M. B. flor. rosar. rubr. meliloti, an. p. j.

Coquantur in aqua, cuius vapore mane & vespere oculi foveantur.

Vel *℥. Endiuia, portulaca, dentis leonis,* an. q. s.

Contundantur, & cum albumine oui & modico oleo rosar. misceantur & oculis imponantur; vel succus horum expressus imponatur. Hoc enim modò pars restri-

geratur, mala intemperies tollitur, & acrimonia humorum temperatur. Vel linteo aquâ roiarum taraxaci, acetosæ, & oxylapathi madido oculus sæpe foveatur.

Ad abstergendum, quæ primo loco leniora, postea fortiora esse debent, vtilia sunt, *sacchar. candum, crocus, aloë, ruta, vitriolum, alumen, camphora,* & similia.

Vt *℥. Vnguenti pomatæ ℥. B. tutia aquâ rosar. lota, sief. albi,* an. ℥. B. vitrioli Romani ℥. B.

F. Vnguentum pro palpebris.

Vel *℥. Fol. ruta, chelidon. maior. flor. cyani,* an. M. j. vitrioli, aluminis, an. ℥. B. camphor. ℥. j.

Affundatur aquæ agrimonie & vini albi, an. q. s. Stent in infusione per biduum. Postea destillentur in Balneo.

Fortius est hoc.

*℥. Aqu. flor. cyani, chelidon. an. ℥. iij. sem. ruta ℥. B. vitrioli albi ℥. ij. viridis aris ℥. B.*

Coqu. in vale clauso, postea colentur.

Vel *℥. Aris vsti, cadmie lotæ, cerussa lotæ,* an. ℥. j. aloës, myrrh. an. Drach. B. sal. ammoniac. flor. aris. an. Scr. B. M.

F. Pulvis subtiliss. & conficiatur inde cum melle Linimentum pro palpebris.

Fortius est sief rubrum Rhasis; mitius rubrum Mesuræ, in quo vitriolum omittitur.

Sarcocolla quoque in lacte nutrita, & cum succo chelidon. mixta, ac palpebris illita, pruritus tollit.

Diligenter verò in horum vsurpatione attendendum, *Cautio in* ne fortius, quàm ex vsu est, vim suam oculis imprimat, *palpebris cau-* Et proinde si dolor ac rubor intensior sequitur, dies ali- *randis obser-* quot ab hisce remediis abstinendum. Sæpe, cum re- *uanda.* cens malum est, sufficit parum aloës, cum aqua rosarum mixtum & palpebris illitum, vel myrrha cum lacte mulieris dissoluta, vel vnguentum rosatum Mesuræ cum cum pauxillo tutiæ præparatæ mixtum adhibitur.

Vbi malum medicamentis hætenus expositis non cedit, frictionem palpebræ præcipiunt, & agro supino iacente palpebram inuertere iubent, eamque foliis ficus aut parietariæ, aut cum saccharo cando, aut cū spuma maris, vel osse sepiæ fricare leniter, & quidem eo vsque, donec sanguis prorumpat, & granulosa substantia absumatur; postea oculum aquâ rosarum tepida abluere. Rhases instrumenti meminit, quod, *diuison. l. 1. cap. 22.* Rosam nominat, Græcis *ἐλεφάρου* dici- tur, à cuius vsu palpebram abluat aquâ cum paucis aceti mixta, & alia administrat, quæ citato loco videantur.

Ad scabiosas, rubras, & exulceratas palpebras post vniuersalia remedia utilis est in principio fomen- ratio cum decocto rad. oxylapathi, acetosæ, & maluæ.

Postea

*℥. Aq. pimpinell. chelidonij, oxylapathi,* an. Vnc. ix. alumin. vsti, camphorij, oculor. cancri præd. an. Drach. sem.

Coq. & aquâ istâ de die bis vel ter palpebra scabiola abluatur.

Forestus feliciter vsus est linimento ex vnguento rosato, adiecto pauxillo tutiæ præparatæ.

Vel *℥. Butyri sine sale ℥. j. aqu. rosar. ℥. ij. terebinth. ℥. j. albumen oui vnius,* Conquassentur diligenter, donec commisceantur.

Vel *℥. Vnguent. rosar. Vnc. j. saporis Veneri Drach. B. sulphur. vini Drach. j. sarcocoll. aloës hepaticæ,* an. Scr. j. M. in mortario.

Vel *℥. Mellis Vnc. ij. succini, aloës hepaticæ,* an. ℥. ij. cortic. granator. aluminis, an. Scr. j.

M pro Vnguento.

*℥. Cadmie aq. rosar. lotæ ℥. B. sanguin. dracon. ℥. ij. viridis aris* Scr. j. aloës hepaticæ. Drach. ij.

F. Pulvis subtiliss. cui adde olei commun. Vnc. iij.

*pinguedinis*

*pinguedinis porci sine sale Vnc. ij. M. omnia diligenter, & addatur camphora. Drach. j.*

F. Linimentum.

Plura eiusmodi medicamenta videantur apud Aëtiū, retrabibl. 2. ferm. 3. c. 43. & Cornelium Celsum, lib. 6. c. 6, 5. Ad oculos scabros, collyria.

#### Dietā.

Aër, in quo æger degit, sit temperatus, & ad obscurum potius, quam lucem vergens; ventus, pulvis ac fumus, & eiusmodi externa alia oculos lædencia vitentur. In diætā etiam vitentur omnia, quæ humores acres & salsos gignunt, & quæ vaporosa sunt, tam ex cibis, quam potu: vestimenta circa collum non nimis angusta sint, monente Auicenna, ne sanguis & vapores sursum exprimantur. Facies non continenter prona seruetur. Decubitus non sit depressus.

### CAPUT IV.

#### De Tuberculis, Nodis, & aliis Palpebrarum tumoribus.

*Tulic, Aquila.*

*Tuberculo  
alp. cbrat.  
Hydatid.*

Solent etiam varij tumores & tubercula in palpebris oriri, inter quæ primò est *idam*, aquila, seu palpebrarum aquositas, Germanis, *Massergall, oder Massergewechs*, substantiæ illius vinctuosa in palpebra superiore tale incrementum, & pondere suo palpebram ita grauans, vt vix attolli queat, humorē perpetuò fundēs, & aquam intercutē in palpebris representans. Etenim cum palpebra superior duabus membranis constet, earum medium vinctuosa atque viscosa occupat substantia; quā palpebræ alioquin siccæ nonnihil emolliuntur. Hæc substantia in quibusdam, præcipuè pueris, vt natuta humidioribus, ex seroso humore incrementum sumens *idam* generat, & palpebra aquam intercutem representat, ac si digitis comprimatur, iique subito remoneantur, vestigium compressionis remanet, & quod inter digitos fuit, attollitur, humoremque palpebra, præsertim horis antelucanis, fundit, neque Solis radios oculi sustinent, sed lachrymas fundunt.

Si malum sit recens & paruum, sæpe sponte euanescit, vel medicamentis faciliè curatur. Si verò tumor sit maior & diuturnus, ac peculiari membranâ iam includatur, non nisi manus operâ tollitur.

Nonnulli incipientem hunc tumorem manè saltem ieiuna salina illinunt. Aut foueatur decocto absinthij, flor. chamæmeli, & semin. fœnigræci. Hinc imponatur emplastrum ex diachylo simpl. & ammoniaco aceto dissoluto, cui add. paxillum salis ammoniaci & radic. ieros.

Commendatur & hoc Vnguentum:

*℞. Pinguedin. salpæ Drach. iij. ol. sambuc. Drach. iij. cineris ungula asini Drach. j. thuris, mastich. mercurij mortificati, cerussa, an. Drach. s.*

M. F. Vnguentum.

Vel *℞. Mellis despumat. Drach. vij. olei nucibus pinus 3. ol. ouorum 3. ij. farina fabarum, pulu. rad. cappar. an. Drach. sem.*

F. Vnguentum.

Si verò hic tumor sit durior, nec medicamentis cedat, curatur manus operâ, vt nodi & aliæ in palpebris excrescentiæ, vt dicitur.

#### Verruca.

*Verruca pal.  
petrarum.*

Verrucarum genera omnia, quæ in aliis partibus generari solent, in palpebris etiam interdum oriuntur. De

quarum generatione, differentiis, & signis suo loco dicitur. Hic saltem pauca de curatione dicemus.

Ad Actochoordonas, seu verrucas asperas & peniles vtile est hoc Linimentum:

*℞. Pingued. ardæ Drach. v. olei olinar. Drach. j. s. apum vistarum Drach. j. cineris murium Drach. s.*

F. Linimentum.

Vel *℞. olei hyperic. Vnc. s. tartar. per deliquium 3. j. Misce.*

Vel *℞. Agrimon. fol. & radic. viridum Drach. v. capæ Vnc. s.*

Contundantur simul, postea adde *ol. lini 3. vij. tartar. per deliquium Drach. iij.*

Contundantur simul, tandem adde *cerussa citrina 3. ij. Misce.*

Ad Myrmecias, verrucas glabras ac sessiles:

*℞. Herba cancri, radic. capparum, ianunculi vrentis, an. M. ij. aluminis Vnc. j.*

Conburantur in olla noua in fornace figulina.

F. Pulvis qui in vulneratas & apertas nonnihil verrucas prius inspergatur:

Vel *℞. Scilla Vnc. iij. esula Vnc. ij. herbi cancri, rad. chelidon. an Vnc. j.*

Contundantur & destillantur.

F. Aqua, quā verrucæ illinantur.

Ad Thymos:

*℞. Mellis. vj. stercoris ouilli Drach. v. caprini, aceti, an Drach. iij.*

Misce imponatur.

Hieron. Fabricius ab Aquapendente, de operat. chirurg. portulacam rusam vel tabinam puluerisatam ad verrucas cum ex palpebris, tum aliis corporis partibus exterminandas commendat.

#### Kpîð, HORDEOLUM.

*Kpîð*, Hordeolum, Germanis *Gerstentorn, oder Augenhäber*, (Græci etiam *mod'ar*, id est, præputiolum vocant) est tuberculum in summa palpebra succrescens propè cilia, aliquantisper longum, quod suppurascens simile est grano hordei, vnde & nomen accepit.

*Hordeolum  
palpebrarum.*

Ortum habet ab humore pituitoso & crasso cum sanguine mixto, atque in eo, vt Celsus ait, tunica quiddam, quod difficulter maturescit, comprehendit.

Curatur vniuersalibus præmissis, si fomentetur cerâ candidâ aut adipe gallinæ, vel salinâ manè inungatur, aut corpore muscæ, capite abiecto, fricetur, quod à plerisque pro efficacissimo remedio habetur: vel foueatur locus panno calido, aut imponatur galbanum cum modico nitri subactum, vel sagapenum aceto dissolutum; vel foueatur oculus decocto hordei & flor. chamæmeli & postea sanguine columbino aut turturis aut perdicis illinatur.

Vel *℞. Sem. lini, fœnigræci, radic. althæa an. 3. v. Infundantur per noctem in aqua flor. sambuc. vt extrahatur mucilago huius Vnc. j. adde pinguedin. gallina 3. vj. ol. lilior. albor. cera alba, an. Drach. j. s.*

Coquantur ad humiditatis consumptionem, & F. Linimentum, quo palpebræ inungantur.

Vel *℞. Pingued. gallina 3. i. ol. lilior. albor. chamæmel. an. Vnc. i. sem. opopanax. galban. aceto dissoluti ana Drach. ii.*

Misce superigne pro Linimento.

*℞. Seni ceruini Drach. v. ol. lini 3. iii. cera alba Drach. ij. galbani, ammoniac. an. Drach. sem. sal. gemma Scr. sem.*

F. Emplastrum.

*℞. Thuris, myrrhæ, an. Drach. ii. ladani 3. s. nitri, cera, alumin. an. Drach. i. fecum ol. lilior, albor. q. l.*

F. Linimentum.

Si suppuratur, nec sponte aperitur, capello aperiat, & tumor ac pus exprimatur, & postea medicamentis conuenientibus curetur.

Si verò his medicamentis hordeolum nec discuti, nec ad suppurationem deduci potest, sectione tollendum. Animaduertendum autem, an tuberculum magis versus exteriorem partem palpebræ, an versus interiorem vergat. Si enim vergat magis versus exteriorem partem, secunda palpebra secundum longitudinem versus inferiora. Si verò magis vergat versus interiorem, palpebra inuertenda, & tumor secundum latitudinem palpebræ, seu transversim incidendus, cute aperta tuberculum extrahendum; quod commodius fit, si tuberculum acu incuruatâ cum filo serico per foretur, postea acu abscissa, utraque fili extremitate apprehensâ tuberculum, quantum fieri potest, extrahatur, & nouacula vel scalpello à palpebra separetur; cautè tamen, ne tota palpebra dissecetur. Tuberculo exempto, hapsus lini albumine oui in aqua rosarum dissoluto madidus oculo imponatur: posteriori die vulnus, si sit in parte exteriori, oleo ouorum inungendum, & emplastrum conueniens imponendum: in interiori verò parte lac virginis, vel vnguentum ex saccharo imponendum.

Χαλάριον, Grando.

Grando palpebrarum.

Cognatum hordeolo vitium est Grando, tuberculum rotundum, translucidum, arque huc & illuc mobile. Materia enim grandinis est magis dura & quasi lapidescens.

Curatur emollientibus & discutientibus; quibus si non cedit, ad sectionem accedendum.

Imponendum itaque ammoniacum aceto dissolutum, cum adipe gallinæ, vel terebinthina cum cera mixta. Si per medicamenta resoluentia discuti non potest, ad manus operam accedendum, & incisio facienda ut de hordeolo dictum.

Λιθίασι.

Lithiasis palpebrarum.

Similis ferè affectus est λιθίασι, cum in palpebra generantur nodi & excrecentiæ, & aspera quædam corpora lapidis instar dura, & oculos prementia. Generationis & curationis modus idem est, qui hordeoli & grandinis. Vide Aërium, iurabibl. 2. form. 3. cap. 79. 80. 81.

### Nodi & Excrecentiæ.

Nodi palpebrarum.

Præter hæc tubercula & alij tumores maiores interdum in palpebris oriuntur, quos iuniores Medici vno Nodorii nomine cōplectuntur, Germani *Berberlein* vocant. Græci verò cōmune nomen non habent, sed, ut in aliis partibus, ita etiâ in palpebris, pro diuersitate materiæ, e qua generantur, & quæ, vbi tumor aperitur, oculis sese exhibet, variis nominibus indignant. *Μελιμαρίς* nominant, quando vesiculam continent, plenam humore, qui colore & consistentia similis melli est: *παράματα*, quando id, quod in iis continetur, est veluti adeps: *εὐρώματα* quando quasi pulvem continet tumor. Pertinent huc & illi tumores, qui Ganglia dicuntur.

Quæ autem causa horum tumorum sit, dicitur, vbi in genere de tumoribus agitur. Hic solum de curatione dicemus.

Et quidem vbi tumores recentes & parui sunt, medicamentis emollientibus & resoluentibus discuti & tolli possunt, ut:

℞. *Medulle crurum vituli, cere*, an. 3. vj. *ammoniacy Drach.* ij. Misce.

Si verò malum diu durauerit, & incrementum sumperit, non, nisi sectione & manus opera, curatur, & si

stra tunc emplastra vel vnguenta adhibentur. Sectio autem hoc modo instituenda. Ager in loco lucido in sedili firmiter, ne manus vel caput mouere possit, contineatur. Hinc cutis super tumore ex vnâ parte chirurgi, ex alterâ parte ministri digitis extendatur (nisi antea à mole tumoris cutis satis sit extensa) Hinc nouacula acutâ cutem palpebræ è parte superiore versus interiorem ad tumorem usque incidunt nonnulli. Sed tutius est, cum Cello linea transversa secare, sequendo fibras transversas, ne illæ incidantur. Postea acu incuruatâ filum sericum non contortum continente tumor traiciatur, acuque abscissa, & filo utraque extremitate apprehenso, tumor, quantum fieri potest, extrahatur, & hinc à palpebra separetur. In separatione attendendum, ut nec palpebra perforetur, nec aliquid de tumore relinquatur. Tumore extracto albumen oui aquâ rosarum dissolutum cum hapsu lini imponatur. Tandem hoc medicamentum ad vulnus conglutinandum adhibeatur.

℞. *Ol. balsamina vel momordica* ʒ. j. *hyperic.* Vnc. i. *maylich.* Vnc. sem. Misce.

Vide Celsum, lib. 7. cap. 7. Paulum, lib. 6. cap. 14. Hieron. Fabric, ab Aquapendente, de operat. Chirurg.

## CAPVT V.

### De Cancro Palpebrarum.

Interdum & palpebras Cancer corripit, quod malum grauissimum & horrendum est. Causam & generationem habet eandem, quam in aliis partibus; de qua de cancro in genere dicitur.

Etsi verò malum longè grauissimum, & curatu planè difficile sit: tamen, ne æger sine auxilio relinquatur, quædam tentari possunt. Si cancer nondum exulceratus sit, corpore conuenienter prius euacuato hæc Aqua usurpari potest:

℞. *Granor.* seu *baccar. rubrar. solani* M. iij. *rosar. rubrar. dactylor.* an. M. ij. sem. *absinthij* M. j. *radic. iridis celestis* M. ʒ.

Herbæ omnes virides ac recentes contundantur, & affundantur *aq. solani* lb. iij. Digerantur ij. diebus & postea in B. destillentur.

Aqua bis de die linteolis oculo imponatur.

Si verò cancer iam exulceratus sit, inspergatur hic Puluis.

℞. *Erinaceum viuum, rad. sambuc. arundin. maior. testudinum nigrar. nemoralium*, an. M. iij.

Comburantur simul in fornace figulina in olla clausa: materia combusta pulueriferetur, & puluis cancro inspergatur.

Vel ℞. *Rad. cardopatia, dracunculi, scrophular.* an. Vnc. ii. sem.

Comburantur in olla clausa in fornace figulina; materia combusta puluerisata similiter cancro inspergatur.

Nonnulli & hanc Potionem commendant:

℞. *Rad. vincetox.* Vnc. ij. *tormentiil. serpentar. sanicul.* an. ʒ. iʒ. *valde bona, saluia*, an. Vnc. i.

Insundantur horis 14. in cereuisia, postea coqu. coquentur, & ægro manè & vesperi cochlearia quatuor exhibeantur.

Quod si medicamentis malum tolli non possit, ad Chirurgiam accedendum, & cancer sectione tollendus. Quia in in re danda opera, ut potius aliquid de parte sana tollatur, quàm de corrupta & cancrosa aliquid relinquatur. Postquam cancer exsectus est, sanguis non statim suppressendus, sed, ut aliquantisper fluat relinquendus Hinc albumen oui cum hapsu lini imponendum, & reliqua curatio conuenienti modo peragenda.



CAPVT VI.

De palpebrarum Inuersione, & Contractione.

palpebrarum  
inuersio.

IN situ quoque & connexione palpebræ morbis obnoxiz sunt; cum scilicet vel apertæ manent, vel cum non aperiuntur, & inter se, vel cum aliis partibus vicinis coalecunt. Prior morbus appellatur *ἐκτρόπος*, Palpebræ Inuersione, Germani vocat, *Ein plar Auge, oder vberstulpre Augentlieder*. Estq; affectus inferioris palpebræ, quæ inuertitur, & deorsum trahitur, vt internæ palpebræ pars cum deformitate videatur, & instar rubræ carnis appareat; neque cum superiore committitur, sed pender ac hiat.

Causæ huius mali variæ sunt. 1. Incrementum carnis in parte interna palpebræ, ob quod palpebra inuertitur. 2. Si vulnus vel vlcus in palpebra inferiori malè curatum sit, & palpebra in agglutinando nimis versus inferiora retracta sit. 3. Paralytis vel conuulsio inferioris palpebræ, ob quam attolli nequit.

Curationem quod attinet, si à causa interna & nimio incremento carnis palpebræ malum superueniat, primò corpus conueniente modo purgandum: hinc calumen rochæ in vino coquendum, & palpebra decocto lauanda.

Vel *℞. Aceti vini Drach. vi. acacia Drach. i. alum. vsti Drach. β.*

Coqu. & decocto palpebræ pars interna illinantur.

Vel *℞. viriol. albi, aluminis, tartar. albi, an. Drach. j.* Pulueriscentur subtiliter, hinc add. *lapid. hamatis. Drach. j. ℥ ii. turia, an. Drach. β.*

F. Puluis subtilis, quo caro luxurians conspergatur.

Vel *℞. Arii vsti ℥ β. virioli vsti, chalcitidis, myseos rost. an. Drach. i. F. Puluis subtilis.*

Hinc oculo imponatur Emplastrum Guilhermi Placentini.

*℞. Farin. sem. fenigraci ℥. iii. pulu. flor. chamamel. rosar. rubr. an. ℥ β. vini rubri q. l. ad incorporandum.*

F. Cataplasma, de quo sume q. l. & adde vitellum oui vnius, atque oculo imponatur. Hinc puluis aliquis enumeratus palpebræ inspergendus.

*℞. ℥ ii. turia, viridis arii, lapid. hamatis. lithargyr. an. Drach. i.*

F. Puluis subtilis, qui per sindonem trahatur, & palpebræ inspergatur. Simul emplastrum aliquod, quod fortiter adhæret, palpebræ extra imponatur, & palpebra versus partem superiorem adducatur.

Si medicamentis caro superflua non cedit, & tantum incrementum lumpsit, vt medicamentis facile absumi non possit, manus opera adhibenda. Aëtius, *tetrabibl. 2. serm. 3. c. 72.* modum sectionis hoc modo docet:

Ex interna palpebræ parte duæ sectiones fiant literæ Græcæ Λ figuram habentes, ita vt angustia literæ pars sit infernè versus maxillam, lata verò ad palpebræ marginem. Deinde particula illa cutis Λ figuram referens excindatur, resectâ simul etiam subiectâ carne. Postea labia incisionis iuxta partes marginis contrahenda. Sic enim incuruata & eleuata palpebra ad interiora remittitur. Tandem reliqua curatio peragenda, vt, loco allegato, Aëtius docet,

Alij carnem superflua duobus vel tribus locis acutiusculum sericum ducente perforant. Hinc carnem attrahunt, & scalpello vel nouacula à palpebra separant. Carne superflua separata Aquam istam imponunt:

*℞. Aq. prunor. syluest. ℥. iii. alumin. crudi ℥. vj. camphor. Drach. sem.*

Coqu. in aqua, quæ palpebra intus abluatur. Hinc palpebra versus superiora, & in naturalem situm reducatur, & albumen oui conuassatum cum hapso lini imponatur. Horis viginti quatuor elapsis ligatura sol-

uatur, & vulnus postea lacte virginis, vel alio conueniente medicamento curetur. In curatione ista hæc semper obseruandum, vt palpebra versus superiora semper attrahatur, conueniente emplastro conglutinante imposito; qualia passim obuia sunt. Vtile est & hoc:

*℞. Amyli ℥. vi. farina fabarum, pulu. radic. consolidæ, semin. lini, è quo oleum iam est expressum, an. Vnc. sem. gummi tragacanth. bol. Armeni, an. Drach. ij.*

F. Puluis, qui in vsu cum albumine oui misceatur.

Si ex vlcere vel vulneris mala curatione sit *ἐκτρόπος*, cutis palpebræ lunata figura incidenda, vt cornua ad maxillas, non ad oculum, conuertantur. Altitudo plagæ sit ad cartilaginem, ipsâ non læsâ. Nam si calædatur, palpebra concidit, neque attolli potest. Hinc cutis diducatur, vt paulum in ima oculi ora descendat, & super plaga hiet. In hiantem plagam linamentum coniciendum est, quod & coniungi diductam cutem prohibeat, & vt in medio caruncula generetur, quæ vbi locum impleuit, postea rectè oculus aperitur.

Si vero à conuulsione vel resolutione inferioris palpebræ sit malum, conueniente modo ea symptomata, vt dicetur, curanda. Vide etiam Aëtium, *tetrabibl. 2. serm. 3. cap. 71. & 72.*

*Λαγόφθαλμος.*

Quod in palpebra inferiori est *ἐκτρόπος*, id in superiori est *Λαγόφθαλμος*, id est *λαγόφθαλμος*, oculus leporinus, Germanis *Hasen-*

*chlaß*, quando scilicet superior palpebra ita sursum adducta est, vt oculum totum tegere non possit, sed

per somnum etiam aliquantum apertus maneat. Cum *Corybantias*, *mon.* *Lagophthalmia* idem ferè affectus est *Corybantias*, cuius mentionem facit Plinius, dum *lib. 11. cap. 37.* scribit, oculis patentibus dormiunt lepores, multique hominum, quod Græci *Corybantias* dicunt; ideo procul dubio, quod Corybantes, Iouis Sacerdotes excubias agere, & quasi apertis oculis dormire cogentur.

Causæ huius affectus plures sunt. 1. Interdum in vterò palpebra ita, ob materiæ defectum & conformationis vitium, formata est. 2. Interdum à consuetudine hoc malum ortum habet, cum infantes in cunis sursum vel retrò continuo spectant. 3. Idem à conuulsione fieri potest. 4. Cum palpebra à vulnere vel vlcere & cicatrice malè curatâ imminuta, vel sursum retracta est vnde vitium hoc aliis naturale à conformatione prima, aliis consuetudine contractum, aliis denique morbosum.

Prognostica.

1. Si à primo ortu, & conformatione in vtero hoc malum contractum sit, incurabile est.

2. Si multum palpebræ deest, malum incurabile est: si parum, curari potest.

3. In febribus apertis oculis dormire, malum portendit; cum conuulsionis sit indicium.

Curatio.

Si à consuetudine malum contractum sit, dum infantes in cunis iacentes semper retrò conspiciunt, contraria consuetudine curandum; seu potius, ne contrahatur, præcauendum, quod fit, si pannis nigris cunæ circa caput obuoluantur, & si caput versus tenebras & pedes luci obuertantur, vt ita versus lucem continuo adspiciant.

Si à conuulsione aut contractione palpebræ malum hoc ortum habeat, vt laxetur palpebra, danda opera. Talis igitur fiat Forus;

*℞. Rad.*

℞. Rad. althææ, sem. fenigrac. flor. chamamel. an. ʒ. ij. croci Drach. β.

F. Sacculus, qui aquâ conueniente calefactus oculo imponatur.

℞. Pinguedin. gallin. medulla cerui an Vnc. β. ol. chamamel. lilior. albor. unguent. dialthææ, an Drach. ij. Miice.

Eadem quoque medicamenta adhiberi possunt, si à cicatrice aut vulnere & vlcere malè curato ortum habeat *λερόφαλλον*, & danda opera, vt cicatrix emolliri queat. Quod si non possit, manus opera adhibenda. Paulò nimirum infra supercilium cutis incidenda lunatâ figurâ, cornibus sectionis deorsum spectantibus vsque ad cartilaginem, id est, vsque ad substantiam palpebræ membranæ; & cutis postea diducenda, vt paulum in ima oculi ora descendat, & plaga hiet, in quam linamentum coniiciendum est, quod & coniungi diductam cutē prohibeat, quod ubi locum impleuit, postea oculus aperietur. Vide Aëtium, *tetrabibl. 2. ferm. 3. cap. 27.* Celsum, *lib. 7.* Hieron. Fabricius ab Aquapendente, *de operat. Chirurg. tit. de Lagophthalm.* ob pericula & incommoda, quæ Chirurgia coniuncta habet, alio modo vtitur. Glutinum nimirum, quod duas aut tres habenulas appensas habeat, ad superiorem palpebram applicat, & aliud ex aduerso, habenulaque subinde arctius adstringit, & ita inferiorem palpebram ad superiorem perducit.

## CAPVT VII.

### De Palpebrarum inter se, & cum aliis oculorum partibus Coalitu & Cohærentia.

Palpebrarum Coalitus.

SI palpebræ vel inter se, vel cum alba, aut cornea aut utrâque oculi tunica coalescant, & præter naturam cohæreant, vt oculus aperiri non possit, malum hoc Græcis *αγκυλοβλέφαρον*, Aëtio etiam *αγκύλωσις τῆ βλέφαρου*, & *σφόδρασις τῆ βλέφαρου* est, *tetrabibl. 2. ferm. 3. c. 66.* Vulgo concretionem palpebrarum nominant.

Causa huius mali est vlcus negligenter & imperitè curatum, cum scilicet vel post *πύρρον* aut vngulam oculi, vel aliud malum vlcus in parte interiore palpebræ relinquitur; quod & in variolis, atque interdum post combustiones accidit. Dum enim oculus crebrò non aperitur, sed clausus manet, palpebra exulcerata vicinis partibus adhærescit, & sanescendo, quod diduci potuit ac debuit, agglutinatur, & palpebræ vel inter se, vel cum vicinis partibus coalescunt.

Huc etiam referri potest, etiam si sit alterius generis, illa palpebrarum cohærentia quæ fit, cum per somnum multa pituitosa & viscida materia, quæ Græcis *λίμν*, ad palpebras affluens, earum extremitates ita conglutinat vt vix aperiri possit.

### Prognostica.

1. Palpebrarum cum oculo coalitus vel non, vel difficulter curatur.
2. Si extremitate suâ solùm palpebra oculo adhærescat, facilius curatur; si verò tota palpebra cum oculo coalescit, curatur difficilior.
3. Curatur etiam facilius hoc malum, si annatæ saltem palpebra adhæreat; si verò corneæ simul concreta sit, ferè nunquam, & nisi cum difficultate, curatur.
4. Si verò palpebræ inter se solùm coalescant, non difficulter quidem diducuntur, sed sæpe rursus coalescunt.

### Curatio.

Et si, vt modò dictum, plerumque vix aliqua specurationis superstitiamen, si aliquid tentare libet, Chirurgia adhibenda. Nimirum quæ oculo adhærescit palpebra, scalpello, nouacula, vel forcipe cautè literanda est, vt neque ex oculo, neque ex palpebris quicquam abscindatur, aut, si omnino quid abscindendum sit, id potius ex palpebra fiat, quam ex oculo.

Et, vt tutius ista sectio fieri possit, nonnulli acincuria super loco, in quo oculo cohæret, palpebram perforant, hinc acu abscissa filo vtrinq; apprehenso palpebram attollunt, & postea eam ab oculo liberant. Palpebra ab oculo liberata inungatur medicamentis, quibus asperitudo curari solet, & palpebra sæpe moueatur, vt non solum medicamentum oculo indatur, sed etiam in palpebra rursus coalescat.

Si palpebræ inter se coaluerint, scalpello liberandæ. Atque, vt etiam hic sectio tutò peragi possit, nonnulli acincuriatâ, sericum filum molle ducente, vtramque palpebram transversim perforant, cauendo tamen, ne cornea vel pupilla lædatur. Hinc acu abscissa, filo prehensò, palpebras diducunt, easque primò nouacula, hinc forcipe liberant. Palpebris seu filo, seu specillo diductis, linamenta seu penicilli interponendi aquâ rosarum madidi, donec vlcus palpebræ curatum sit. Alij laminam plumbeam oleo rosaceo illitam interponunt. Vide Hier. Fabric. ab Aquapendente *de oper. chirurg. tit. de Ancyloblepharo.*

Si verò ex pituita solùm coalescant palpebræ, corpus conuenienti modo purgandum, & per vesicatoria, atque aliis modis materia ab oculis auertenda. Postea cubitum iturus æger palpebras aquâ rosarum, in qua balaustia vel rosæ coctæ sint, abluit, vel succo semperuiui; aut ol. rosar. cum pinguedine gallinæ mixto palpebras inungantur.

## CAPVT VIII.

### De Pediculis, & Ciliorum vitio.

pediculi.

VT in aliis corporis partibus, præcipuè pilosis, pediculi nasci solent: ita etiam quandoque in ciliis seu pilis palpebrarum nascuntur, quod malum Græcis *pediculosis* nominatur, ortumque habet, vt alij pediculi de quo suo loco diceretur, ex sordibus in iis, qui lotionibus & balneis non vrantur, ac corporis curam non agunt, & prauo victu in hominibus non puris & obsecanis; vnde lue Venereâ laborantibus hoc malum familiare est. Etiam per contagium contrahitur interdum, si quis in lecto, in quo *pediculosis* laborans dormiuit, cubet, aut pectine vtatur, vel linteo caput abstergat, quo alius hoc malo infectus vsus est.

Malum non contemnendum est. Acres enim fluxiones concitat, & oculi tandem ab iis valde læduntur.

Vt verò hi pediculi tollantur, abluantur palpebræ aqua marinâ, vel decocto betæ, & staphisagriæ, vel vnguento conuenienti illinantur, vt:

℞. Aloës, myrrhæ, an. Drach. ii.

Cum lardo misceantur.

F. Linimentum.

Vel fiat Linimentum ex staphide agria, aloë, & melle.

Vel ℞. Pinguedin. porci Vnc. i. puluer. pyri Drach. ii. Quini Drac. i. Misce.

℞. Pingu. porci antiqu. an. Vnc. i. hellebor. albi Drach. sulph. citrini Vnc. sem. Misce.

Aut albumen oui coctione induratum imponatur in acetum vini horis 6. postea sub somnū oculis imponatur. Vbi manè remouetur, pediculi inhærentes simul extrahuntur.

Pediculi ciliis.

extrahuntur. Tolluntur etiam pediculi, si palpebra fricetur corio, vel panno xylino, quo auri fabri vasa recens inaurata ex tergere solent. Vel fumus argenti viui, ore tamen ac naso diligenter clausis, & panno obvolutis palpebris excipiat. *De Ciliis.*

*De Ciliis.*

Affectiones *ἁβλαρίδων*, qui palpebrarum pili sunt, hæ præcipue enumerantur: 1. Inuersio eorum, quia vel pili ipsi à siccitate intorquentur, vel pori, per quos enascuntur, tortuosi redditi sunt, vel palpebra versus oculos ad interiora est incuruata; quod vitium *φαλάγγας* & *αἰσῆς*, seu laxatio & lapsus palpebræ, nominatur; vel radix pili vnius ab alterius radice impedita pilum intro reflectit. 2. Illorum abundantia, quod vitium in genere *τριχίας* appellatur. 3. Eorundem defectus, qui *μυδάρωσις* & *μυλωσις* nominatur. 4. Color alienus, ut cum pili albescunt, vel ob defectum humidi nutrientis, (& tum in extremitate albescere incipiunt) ex diuturna ægritudine, vel ob præsentiam materiæ phlegmaticæ in radice pilorum situm quasi contrahentis, ut in canitie, vel denique ob cutem vitiligine alba laborantem; de quibus jam dicendum.

*Φαλάγγας.*

*Φαλάγγας*, ἡ τῆς *ἁβλαρίδος* *ἁβλαρίδος*, id est, à pilorum acie ita dicta, non vno modo apud Autores accipitur. Aliàs enim sumitur pro eo palpebrarum affectu, cum cilium intro spectat, pilorum acie simul cum eo conuersa, sic, ut pili oculos pungant, seu, ut Aëtius, *τετραβίβλ.* 2. *sem.* 2. *cap.* 66. habet, est palpebræ *χάλασις*, cum palpebræ ita laxantur, ut eorum extremitates intro vergant, ut pili non faciliè appareant, nisi quis eas attollat; ut ita in *φαλάγγας* hoc modo sumpta nulli pili noui, ut in *τριχίας*, nascantur, sed naturales saltem intro vergant & pungant. Galenus tamen, in *Isagoge*, *φαλάγγας* esse dicit, cum pilorum duplex, triplexque acies in superiore vel inferiore palpebra præternaturam subnascitur; ut tum *τῆς τριχίας* species sit *φαλάγγας*.

Sed de priore modo sumpta *φαλάγγας* primò agemus, quæ & *αἰσῆς*, seu palpebræ laxatio & casus appellatur. Ortum autem habet hoc malum vel ab humoribus pituitosis palpebram occupantibus, eamque deprimentibus, vel ab exsiccatione cartilaginis in palpebris, & hanc sequente cutis corrugatione, & versus cilia depreffione.

Quod malum, quia non solum turpitudinem in facie parit, sed & quia cilia inuersa oculos pungunt; non negligendum est.

Vniuersali autem corporis euacuatione præmissâ oculus fomentetur hoc Sacculo:

*℞. Nuculearum nucis inglandis* Vnc. i. *sem. fenigræ.* *lini.* rad. *altheæ*, an. Vnc. *sem. verbena* Drach. ii.

Includantur Sacculo, qui calefiat in aceto, & palpebris imponatur.

Vel *℞. Fermentum* magnitudine oui, *pulueris magneti* Drach. i. *alumin.* *succini.* *nucum cupressi*, an. Drach. β.

Mixta omnia noctu palpebræ imponantur.

Si malum medicamentis non cedat, operachirurgica adhibenda; de qua videatur Celsus, *lib.* 7. *cap.* 7. Paulus, *lib.* 6. *cap.* 13. Arculanus palpebram exteriori parte scindit, eamque contrahendo versus exteriora & superiora ita fuit neccitque, ut tarsus prominens pilos inuersos secum ad exteriora ab oculi contactu auertat. Nonnulli alium modum vsurpant. Fiat retinaculum ferreum conuenientis figuræ, & postea digitis duobus palpebra relaxata, quantum opus, & potius plus, quam minus, attollatur, & retinaculum ferreum applicetur, trochleâ versus aures conuersa, retinaculum hoc singulis diebus acutius constringitur, ut palpebræ pars illa retinaculo inclusa tandem abscindatur, & à reli-

qua palpebrâ separatur, quod tamen vix trium septimanarum vel mensis spatio accidit; idque ut eo facilius fiat, bis singulis diebus locus oleo hyperici illinatur. Vbi pars illa palpebræ separata fuerit, eodem oleo, addito pauxillo pinguedinis lucij, curatur.

*Τριχίας.*

Si vero pili præternaturales in palpebris nascuntur, *Trichiasis palpebrarum*, & sub pilis naturalibus exorti, ac intro nuentes tunicas oculorum pungunt, vitium id Græcis in genere *τριχίας* nominatur, cuius species sunt *διςτριχίας*, seu duplex ordo pilorum, & *φαλάγγας*, cum multiplex ordo, & quasi acies pilorum subnascitur.

Generantur autem hi pili superflui ex humoribus pilos nutrientibus ad palpebrarum extremitates fluentibus. Ut enim terra pluuiis nimis irrigata luxurians quasi plurimas plantas profert: ita etiam si ad palpebras copiosi humores, minime tamen mordaces, confluant, plures pili proueniunt. Occasionem etiam huic malo præbent interdum tumores diuturni, vel deligatio diuturnior, à quâ cilia intus comprimuntur; vnde major ad radices pilorum humorum affluxus concitatur.

Malum hoc non est contemnendum; cum pili isti luxuriantes oculos pungant, & acutos dolores pariant, & affluxum humorum ad oculos concitent, tandemque cæcitatem inducant. Vnde *τριχίας* in palpebris cæcitatæ imminentis plerumque indicium est.

*Curatio.*

Triplex verò pilos superfluos in palpebris curandi ratio est. Primò, si euellantur, & ea medicamenta, quæ pilorum generationem prohibent, postea adhibeantur. Deinde, si pili per medicamenta corrodamur. Tertio, si sectione tollantur.

Primum modum quod attinet, vbi pili superflui & oculos pungentes seu plures, seu pauciores adsunt, vossella euellendi sunt. Danda verò opera, ut pili toties vellantur. Nam si abrumpantur, plus pungunt, quam si integri essent. Postea verò loco, è quo pili euulsi sunt, adhibenda ea, quæ pilos renasci prohibeant; qualia sunt, sanguis muscæ caninæ, quam Collum nominant, item ranarum viridium sanguis: vel adhibeatur rubigo ferri cum salina hominis jejuni, vel spuma maris cum aqua psyllij, vel erinacei terrestris fel & sanguis cum modico castoreo.

Vel *℞. Rad. mandragoræ* Drach. vi. *sem. persicariæ* Vnc. *sem. camphor.* *Scrup.* *sem. aceti cochlear.* i.

Misce in mortario, & succus exprimatur, quo pori, è quo pili euulsi sunt illinantur.

Vel *℞. Succus chondrillæ* Vnc. *sem. mastich.* Drach. i. *aceti.* *alumin.* *usti.* an. Drach. *sem.* M.

*℞. Cineris erinacei terrestris.* Vnc. *sem. rubigin. ferri* Drach. ii. *cineris onorum formicarum* Vnc. i.

F. Puluis, quo pori, è quibus pili euulsi, conspergantur. Plura vide apud Aëtium.

Si medicamentis pilorum generatio prohiberi non possit, nonnulli corrosiuis medicamentis eos extirpare conantur. Aegrum supinum in scamnum ponunt, & linteam, crucis vel brachii crassitie contortum, ceruici supponunt, ut caput versus dorsum propendeat. Hinc palpebras aperiunt, & gossypio oculi globum tegunt, ne à corrosiuo medicamento lædatur. Postea luxuriantibus pilis corrosiuum medicamentum illinunt, ægrumque ita supinum horæ quadrantis dimidij spatio jace sinunt. Postea linteo vel spongiâ munda medicamentum corrosiuum diligenter abstergunt, & aquâ, quæ postea proponetur, ad palpebras sanandas vtutur.

Corrosiua medicamenta talia sunt sequentia:

*℞. Calcis viua.* *vitrioli albi.* *cupri seu aris squamma.* *cineris montani.* an. Vnc. i. *viridis aris.* *sal. gemma.* *aluminis.* an. Drach. *sem.*

**F.** Pulvis, cui in olla vitreata affunde acetum acerrimum, vt fiat mixtura pulvis instar: hinc coquantur ad siccitatem; iterum pulueriscentur, iterumque nouum acetum affundatur, & ad siccitatem coquantur, idque sexies repetatur. Tandem pulueriscentur, & in vitro pulvis assuetur. Quo vti vbi volueris, affunde aceti rosati q. l. vt fiat mistura instar pulvis. Calefiat super igne, & pilis superfluis illinatur.

Vel *℞. Calcu. vine, cineris montani, vitriol. albi, an. Vnc. iij. sal. ammoniac. Vnc. iij.*

In olla vitreata affundatur acetum, & coquatur ad dimidias. Hinc ponatur in cella octo diebus, vt subsideat. Clarum effundatur, & in vitro seruetur: cui vsus tempore admisce puluerem calcis viue, vt fiat instar pulvis liquidioris, & mixtura calefacta palpebra, seu locus pilorum inungatur.

Aqua, quæ post corrosiuium adhibetur, hæc est:

*℞. Aqua cantharum dimidium. aceti cereuisia ℥. ix. Simul coqu. ac dum calent adde li. hargyri argenti, cerniss. an. Vnc. sem. thuris, mastich. oculor. cancri, an. 3. ii. camph. salis, an. Drach. i.*

Colentur, & liquore locus post corrosiuium amotum bis de die illinatur.

Tertia curandi ratio fit per sectionem. Modum pœlix docet Aëtius, *tetrabibl. 2. serm. 3. cap. 69.* Recentiores chirurgi duobus modis vtuntur. Nonnulli acu incurua filum sericum ducente palpebram perforant tribus locis. Hinc filis simul apprehensis palpebram attollunt & ducunt, & post fila palpebræ partem radices pilorum continentem nouacula abscindunt.

Verumcum ob perforationem hanc triplicem hic curandi modus tardior & molestior sit, commodius est, si forcipe lato palpebræ pars ea, quæ pilorum radices continet, prehendatur, & forcipe pars palpebræ, quovisque radices pilorum se extendunt, abscindatur. Facta sectione albumen oui conuassatum cum hapso lini imponatur: postea ablato albumine oui medicamenta ad vulnus conglutinandum idonea, ac, si opus sit, etiam aquæ pilorum regenerationem prohibentes imponantur. Vide Hier. Fabricium, *de operat. Chirurg.*

### De Pilorum defluuio.

*Pilorum & palpebris defluuium.*

Contra nonnunquam pili è palpebris decidunt, quod vitium *μαδρωσις & μίλωσις*, pilorum palpebræ defluuium, casus pilorum, & glabrities palpebrarum appellatur. Ortum habet hoc malum ex vitiosis & acerbis humoribus ad ciliorum radices confluentibus; vnde alimento destituuntur, & pilorum radices eroduntur. Sæpe id accidit post febres malignas, post quas interdum non solum pilicapitis; sed & palpebrarum decidunt.

Corporis totius prius ratione habita adhibeatur hoc Vnguentum.

*℞. Plumbi vsti Vnc. β. nucleorum dactylorum combustor. Drach. v. spic. Indic. Drach. i. β. ℥ij calcinat. piper. nigri, an. Drach. i. pingued. vrsi q. l. F. Vnguentum.*

Vel *℞. Muscarum combustarum Drach. ii. stercoris hirundinis, lapid. lazuli, spic. Indic. an. Drach. i. mellis depurati q. l. F. Linimentum.*

Vel *℞. Olei lini Vnc. i. serui hircini, pinguedinis vrsi, an. Vnc. sem. stercoris murium, dactylorum combustor. an. 3. i. Misce. Vide Aëtium, tetrabibl. 2. serm. 3. cap. 78.*

### Mollities Ciliorum.

*Mollities ciliorum.*

Nonnunquam & cilia nimis tenera aut flexibilia sunt, nec recta succrescunt, sed in oculos delabuntur, & dolores ac lachrymas concitant.

Ortum habet hoc vitium ab humore pituitoso, cartilaginem palpebrarum, & ciliorum radices occupante.

Corpus conuenienter euacuetur, & affluxus humorum velicatoris ac alijis modis prohibeatur, arque oculi internis medicamentis confortentur. Hinc Aquâ istâ palpebræ abluantur:

*℞. Fol. quercus, verbenæ, an. M. i. visci è pyro, fol. buxi, germinum juniperi, aluminis, an. M. ii. β.*

Affundatur aceti & aquæ pluuiialis, ana q. l. destillentur in vesicâ; aquâ palpebræ illinantur bis de die. Vel potius quantitate aluminis immutata fiat Decoctum, quod efficacius est. Hinc cilia gummi Arabico lentè illinantur. Vide etiam Aëtium, *tetrab. 2. serm. 3. cap. 68.*

*Πάλλασσι*

Compositum *ἐκ τῆς μαδρωσιως, καὶ τῆς σκληροφθαλμίας*, hoc est, ex pilorum defluuio, & palpebrarum duritie, malum est *πάλλασσις*. In *μαδρωσι* enim simplex saltem pilorum in papebris defluuium est: in *πάλλασσι* vero simul adest crassities, callositas, & rubor, palpebræque turgent, rubent, & lucida fiunt.

Causa est vel sanguis adustus, vel pituita salsa, vel bilis, vel melancholia adusta, aut humores hi mixti, qui palpebras occupant, in tumorem attollunt, & pilorum radices corrodunt. Malum familiare iis, qui luem veneream patiuntur, aut passi sunt.

Curatur hoc malum, si corpore vniuerso euacuato prius palpebris humectantia & emollientia, & naturalem temperiem ipsis restituentia, applicentur, ex portulaca cum lacte cocta, mucilag. femin. lini & cydonior. Postea imponantur ea, quæ ad pilorum defluuium antea sunt proposita.

## CAPVT IX.

### De Palpebrarum Liuore, Contusione & Percussione, Vulneribus & alijs à causis externis lasionibus.

**A**ccidit tandem, vt palpebræ à variis causis externis lædantur, percutiantur, contundantur, vulnerentur. Si vulnus sit in palpebris solum, curatur vt alia vulnera. Quia tamen palpebræ faciliè intumescunt, ad id prohibendum imponendum albumen oui cum momento boli Armeni in aqu. rosarum dissolutum, & linteolo vel hapso lini exceptum. Si liber, potest & momentum croci ac aluminis addi.

Postea oleo hyperici, vel alio vnguento conuenienti, aut emplastro diapalmæ vulnus conglutinandum. Vtile est etiam lac virginis, vel vnguentum ex saccharo n. Efficax est etiam hoc Emplastrum.

*℞. Cera ol. malilot. an. Vnc. i. cumini Vnc. sem. camphora Drach. j.*

Cera & oleum super igne liquefiant, deinde reliquæ addantur.

Sæpe verò, à contusione & percussione palpebræ quidem non vulnerantur, sed liuorem saltem contrahunt. Imò sæpe accidit, vt, etiamsi oculus læsus non sit, sed pars saltem vicina concutitur, nihilominus sanguine palpebræ suffundantur. Si ergo oculus sit percussus, & liuor metuatur.

*℞. Albumin. ouor. num. iij. aqu. absinth. cochlear. iij. terra sigill. vel bol. Armen. Drach. i.*

Imponantur palpebræ. Vel palpebra vnguento albo camphorato inungatur.

Tollitur autem liuor succo absinth. cum melle mixto, aut succo cyclaminis, aut aloë cum melle mixta, aut cumino cum melle mixto, aut cumino & aniso in aquâ cocto & imposito, aut farina fabarum, & scenigræci cum melle mixta. Succus etiam radices sigilli Salomonis recentis, vel siccæ vino macerata, liuorem ex ictu,



istū, seu fuggillationem in omnibus partibus feliciter tollit.

*De Palpebrarum combustione.*

*Palpebrarum combustio.* Si palpebræ combustæ sint, ℞. Aquæ verbena ℞. s. syr. cydonior. Drach.ii. feni-græc. Drach.j.

Extrahatur mucilago, quæ oculo imponatur. Vel vsuperetur aliud ambultis conueniens-medicamentum.

CAPVT X.

*De Symptomatibus, quæ in Motu Palpebrarum accidunt*

*Motus palpebrarum laesus.* Atque hæcenus plerisque morbos, qui palpebris accidunt, vt & symptomata in qualitatibus mutatis proposuimus: restat, vt de symptomatibus, quæ in motu accidunt, dicamus. Cum autem, vt supra dictum, officium palpebrarum sit, oculos tegere, & nunc aperiri, nunc claudi, prout opus: in motu læso symptomata fiunt, cum palpebræ aperiri vel claudi, vt debent, non possunt, vel viciose mouentur.

*Palpebræ mouendi difficultas.* Aperiri aut claudi non possunt palpebræ variis de causis. Aperiri non possunt, primò ob tumorem aut inflammationem: secundò ob coalitum & conglutinationem vel interse, vel cum aliis partibus, vel ob vulnera. Claudi non possunt in ectropio & λυζοπάλη. Præterea etiam aperiri vel claudi facillè non possunt ob siccitatem, vel humorem crassum & viscosum ad siccitatem tendentem. Cum verò de aliis vitiis hæcenus dictum sit, de eâ saltem difficultate aperiendi & claudendi oculos quæ à siccitate provenit, dicemus.

De hac autem difficultate claudendi & aperiendi palpebras peculiari capite agit Valescus de Taranta, vitiumque hoc Gesse appellat. Accidit hoc malum ab humore viscoso, crasso, ad siccitatem tendente. Et propterea non adest magna lippitudo, nec multus humorum affluxus, sed quasi grana quædam, seu lema in grana concreta non multum palpebris vel oculis adhærens reperitur.

Vniuersalibus præmissis fomentetur oculus aquâ tepidâ; vel ex semin. fœnigræc. & lini cum lacte muliebri, aut alio mucilago extrahatur, & oculo imponatur: vel mucilago sem. lini cum cera & oleo rosato misceatur & oculo applicetur.

*Palpebrarum instabilitas.* Deprauati verò motus palpebrarum symptoma est, quod Græci τρεπὸν appellant (quamuis nonnulli totius oculi affectum esse malint, de quo infra, cap. 39. dicitur) instabilitatem palpebrarum, Germanicè, das vlinckern, z vvitern oder fipfern der Augen Lieder, cum palpebræ inordinato motu continuò clauduntur & aperiuntur.

Malum hoc aliquando hæreditarium est, aliquando à flatibus accidit; & quidem nunc in vno, nunc in utroque oculo: quod malum in specie palpitatio, Germanicè, das Jerch, nominatur. Aliquando fit à conuulsione, cum palpebræ versus exteriorem oculi angulum continuò trahuntur.

Posteriore hæc duæ causæ proveniunt, cum palpebrarum musculi refrigerati sunt, ob sanguinis nimiam vel in vulnere capitis, vel per hæmorrhagiam narium detractionem, vel cum à frigore externo musculi refrigerati sunt, vel cum pituitosus humor ad eas affluit. Accidit etiam malum à retore, ira, timore.

Si malum ab ortu contractum, & hæreditarium sit, incurabile est. Si ab aliis causis oriatur, vniuersalibus præmissis, & capite euacuato, & per medicamentâ cum interna, tum externa roborato, topica quædam applicari possunt.

℞. Origan. M. v. stachad. Arabic. calaminta, an. M. iiii. spic. Indic. Vnc. β. flor. hyperici M. ii.

Dan. Sennerti Tom. II.

Affundatur vini Rhenani cantharus dimid. Stent in infusione per aliquot dies; postea destillantur in B. Aquâ postea manè & vespere palpebræ illinantur.

Vel ℞. Medulla iauri Vnc. i. β. unguenti mariali, olei ex auellanis express. an. Drach. vi. pinguedin. anatis ol. piceæ, an. Vnc. sem. Milce.

CAPVT XI.

*De iis, quæ in oculos inciderunt, eximendis.*

*Illapsa in oculos.* Postquam morbos & symptomata, quæ palpebris accidunt, explicauimus; antequam ad reliquarum partium oculi morbos accedamus, dicendum ali quid de iis, quæ in oculos illapsa sunt, & inter palpebras, & corneam atque annatam tunicam hærent. Solent enim & ea, nisi maturè tollantur, multorum malorum, inflammationis, dolorisque, & quæ hæc sequuntur, causa esse.

Traduntur autem varij modi educendi ea, quæ in oculos inciderunt. Vulgus vtramque palpebram trahere iubet, superiorem altera manu deorsum, inferiorem altera manu sursum, atque interea oculum ad superiora intus voluere, aut ex ore alterius, vel siphone paruo inflare aquam simpl. vel saccharatam, vel hydromel, vel lac recens multum inspergere, quo id, quod incidit, eluatur, præsertim, si acre & mordax fuerit. Aërius, tetrab. 2. ferm. 3. cap. 10. & 17. altero oculo clauso, & qui affectus est, aperto, culicem vel aliud animalculum illapsum, sua sponte exiturum scribit. Alij spiritum, ore & naribus clauso, tamdiu retinere iubent, donec oculi lachrymentur: ita fore, vt cum lachrymis eiciatur id, quod molestum est. Aut sternutationem cient, ac nare alterâ appposito digito obstructâ per alteram sub affecto oculo vehementius insuflant. Rhases cottonem stylo alligat, quem in resina pini intinctum molli ter ducit per oculum, palpebrâ alterâ eleuatâ, vt resinæ visciditate res apprehensâ simul extrahatur. Vel sumatur resina alba vel cera, & extremitate vnâ nonnihil emollitur, ac sub palpebram immittatur & per oculum molli ter ducatur, vt quod in oculo est, ei adhæreat. Succinum quoque ad pannum affricatur, donec incaliscat, quo supra oculum posito, palea, pilus, vel puluisculus attrahatur, vt ferrum à magnete. Vel sub palpebras subiciatur sapphirus politus, aut margarita rotunda, aut lapis chelidonium, aut oculus canceri læuis. Possunt etiam varia instrumenta parari, quibus palpebris eleuatis res aliena educitur. Quæ autem, vt acuta, oculo altius sunt infixâ, volsella vel forcipe subtili blandè extrahantur, ita, ne in obliquum contorta frangantur. Postea, si opus, hic Liquor instilletur:

℞. Aq. cichor. 3. i. β. plantag. Drach. vi. succini, albi, thuris, an. Drach. β. camphor. Scrup. β.

Misce, & per linteam colentur. Si calx viua in oculum inciderit, albumen oui infusum vim eius vstoriam obtundet; postea aqua vel lacte calx eluatur. Vide de his Aërium, loc. allegat. & Institut. libr. 5. pars. i. sect. 2. cap. 10.

*De Morbis Tunica Annatæ seu conjunctiue.*

CAPVT XII.

*De Ophthalmia.*

*Ophthalmia.* Inter oculi partes occurrit primò tunica alba, annata seu conjunctiua dicta, quæ & ipsa variis morbis est obnoxia. Inter quos primus est Ophthalmia, Celso Lippitudo dicta, quod in eo lachrymæ feruidæ ex oculis stillare solent. Nonnulli tamen inter ophthalmiam,

& lippitudinem distinguendum censent. Et sanè non nego, esse aliquam inter lippitudinem & ophthalmiam, quæ hodiè ita dicitur, differentiam: interim & hoc verum est, Cellum ophthalmiam veram nomine lippitudinis expressisse. Neque in lippitudine, quæ còtinuus viciosorum humorum ad oculum fluxus est, & sæpe pluribus annis durat quod non accidit in vera ophthalmia, omnis inflammatio abesse videtur; id quod rubedo & oculorum dolor indicat. Ideoque lippitudo ophthalmiæ notæ species quædam est. Adscribitur autem ab autoribus ophthalmia annatæ tunicæ, quod in ea maximè sit conspicua. Interdum tamen totus oculus etiam inflammatur. Malum frequens, magnique momenti, ob dolores sæuos, cum quibus est conjunctum, & mala alia, in quæ degenerare potest. Accepit autem nomen à loco affecto, vt nonnulli alij morbi etiam, teste Galeno, 2. meth. med. cap. 2.

*Annata oculi tunica inflammatio.*

Estque inflammatio annatæ seu albæ tunicæ cum rubore, ardore, dolore & lachrymis, orta à sanguine acri, venulas tunicæ illius occupante & distendente. Cum enim annata oculi tunica, quæ est quasi ligamentum quoddam cum musculis, oculos in sua sede continens; pericranij partibus vicinis connexa sit, facillè fieri potest, vt è venis capitis & temporum sanguis præter naturam ad eam confluat, & ibi inflammationem excitet. Vnde accidit, quod in graui ophthalmiâ dolor capiti, & partibus oculo vicinis communicatur. Quamuis verò in oculo sano venæ illæ tam exiles sunt, vt nullæ ferè appareant: sanguine tamen præter modum & naturam refertæ in conspectum sese dant, & qb' annatæ albedinem sese facillè produnt, & ob membranæ tensionem, humorisque acrimoniam, membrisque illius exquisitum sensum, grauissimi dolores oriuntur. Itaque morbus est inflammatio: pars affecta oculi tunica annata seu conjunctiva, quæ per se afficitur; per accidens verò etiam oculus. Quod si verò inflammatio ita magna sit, vt alias etiam oculi partes occupet, totius instrumenti morbus est. Nonnunquam enim humores in alias simul oculorum tunicas, vt duram & corneam, fluunt, qui, nisi per medicamenta idonea resoluantur, vel alio modo expurgentur, sæpius suppurati abcessum & vlcus faciunt, periculumque de oculi amissione inducunt, vel non suppurati diuturnum malum excitare, tandemque pupillam obcurantes, vel visus hebetudinem, vel omnimodam cæcitatem parere possunt. Imò interdum tanta est inflammatio, vt vicinæ etiam oculo partes in consensum trahantur.

#### *Causse.*

Causa hujus mali proxima & continens est sanguis, humorisque calidi, acres & vitiosi, sanguini permixti, & per venas tunicæ annatæ dispersi, easque distendentes. Humores autem hi vel per *συνεχισμὸν*, quod plerumque fit, è vasis capitis vicinis in tunicam annatam deriuantur, vel per *συνεχισμὸν* ex crudo aut corrupto oculi aut tunicæ ipsius nutrimento ibidem colliguntur. Monent tamen nonnulli, vix fieri posse, vt per *συνεχισμὸν* excrementorum oculi Ophthalmia generetur; cum ob exercitationem & motum ferè continuum eorum resolutio & discussio fiat. Sunt autem illi humores frequentissimi, sanguis cum admixta bile vel sero, rarius pituita & humor melancholicus.

Antecedens causa est non solum plethora, sed & cacoehymia; humorisque vitiosi in corpore geniti, qui ad caput seu transmissi, seu attracti per venas, quæ in pericranium & vicinos musculos disperguntur, & hinc in annatam oculi tunicam propagantur, in hæc loca effunduntur. Idque nonnunquam accidit nulla causâ externâ & procatarctica accedente, sed solum quia natura, copiâ vel quantitate sanguinis ac humorum irritata, sanguinem cum vitiosis humoribus ad has partes mittit; id quod sæpe in declinatione febrium qua-

rundam, aliquando etiam extra eas, accidere solet.

Nonnunquam causâ externa accedit, quæ fluxionem irritat, vt sunt, aeris constitutio frigidam aquiloniam sequens, pluuialis & australis, fumi acres, puluis, relique aliæ in oculos illapsæ, oleum item, acetum, vel alius liquor acris infusus, apum, erucarum, formicarum, & similium insectorum ictus vel contractus, vt & ab vtricâ, esulâ, & similibus plantis acribus contractus dolor, Solis ardor, aut ignis calor, vini potentioris immodicus vsus, ictus, casus, & quæcunque oculum debilitare, aut calore vel dolore humores acres ad oculos attrahere valent. Imò etsi nulla insignis in corpore plethora vel cacoehymia adsit: tamen æstus Solis, calor balnei, aer, ventus, fumi, puluis, ictus, & similes causæ, vt sanguis præter naturam ad oculum confluat, facere possunt. De causis etiam loquitur aphor. 11. sect. 3. *Si hyems sicca & aquilonia, ver pluuiosum & australe fuerit, æstare ophthalmias fieri necesse est; mulieribus præsertim & viris natura humidioribus. Contra si hyems austriua & pluuiosa fuerit, & ver siccum & aquilonium, ophthalmia sicca sunt.* 3. aphor. 12.

Videtur quidem de causis Ophthalmiæ apud Autores quædam opinionum discrepantia esse, dum alij à solo sanguine ophthalmiam fieri dicunt, vtpote quæ est Inflammatio, quæ est tumor sanguineus: alij verò ab aliis etiam humoribus eam generari statuunt. Verum facilis est conciliatio. Cum enim Ophthalmia sit inflammatio, omnino concedendum, nullam ophthalmiam fieri sine sanguine, atque ipse oculi color rubicundus sanguinem satis arguit; neque humores crassiores soli ad angustas hæc venas sese penetrare possunt. Interim sanguis non semper causa principalis est, sed nonnunquam vehiculum potius reliquorum humorum ad oculum confluentium. Etenim quando Ophthalmia à causis eidentibus, vt vento, fumo, puluere, ictu, & similibus originem habet, sanguis quidem affluens præcipua causa est. Vbi verò à causâ internâ & humorum vitio, natura humores ad hanc partem mittente. Ophthalmia oritur, ibi etiam alij humores ophthalmiæ causa esse possunt; quod vel doloris diuersitas docet: qui tamen cum sanguini misceantur in venis, eum in consensum trahunt, sanguisque ipse dolore ad partem affectam attrahitur. Sunt tamen hi humores præcipuè serosi & biliosi, quod ipsæ lachrymæ satis restantur. Vnde ad ophthalmiam magis dispositi sunt, qui humoribus biliosis ac serosis abundant. Oculi etiam magni & extra prominentes cum sint calidæ & humidæ naturæ, venæque ampliores habeant, & affluentem materiam facillè suscipiant, frequentius lippitudine corripiuntur.

#### *Differentia.*

Differt verò Ophthalmia secundum gradus præcipuè, quos etiam nominibus Autores distinguunt. Si enim phlegmones solum initium quasi adsit, cum scilicet oculus humidior reddi, rubere, calere, & nonnihil dolere incipit, idque ferè à causâ eidente, Sole, igne, fumo, puluere, vini potu: *Τάραξις* seu perturbatio & *Τάραξις oculi*. Ophthalmia notha, vel potius levis nominatur. Si verò inflammatio, calor, & dolor major sit, & lachrymæ copiosæ, ac ab internis præcipuè causis oriatur, Ophthalmia vera dicitur. Si autem tanta sit inflammatio, vt & palpebræ simul afficiantur, & quasi inuertantur, nec claudi possint, albumque supra oculi nigrum intumescat, vel etiam illi obducatur ita, vt nigro subsidente alboque rubescente eminente veluti hiatus in oculo appareat, *Χημωσις* dicitur, *από της χημωσις* hiatu.

Est & differentia quædam ratione humoris, quod alia à sanguine præcipuè, alia à bile, alia à melancholiâ esse dicitur.

Est etiam Ophthalmia quædam periodica, interual-  
lis quibusdam temporum rediens, teste Galeno. 2. *de  
differ. febr. cap. 11.* familiaris iis, quibus caput cali-  
dum & humidum est, facileque impletur, & oculi  
debiles sunt, fluxionibusque obnoxij. In iis propter  
reversus mali crebros, dolorumque & ardorum vehe-  
mentiam, oculi tandem contrahuntur, acie videndi  
prorsus deficiente, quam tabidam Ophthalmiam no-  
minant.

Est quoque contagiosa Ophthalmia quædam, Ga-  
leno teste, 1. *de differ. febr. cap. 2.* Sparsa enim obtutu  
oculorum semina contagionis putridæ, ob naturæ co-  
gnationem spiritus humorisque oculorum sanorum  
simili labe inficiunt ac contaminant.

Tandem etiam differt Ophthalmia secundum tem-  
pora. Principium enim est, quando humor tenuis ac  
plurimus defuit: augmentum, quando dolor auge-  
tur & humor fit crassior: status, cum signa coctio-  
nis magis apparent, & excrementa ita fiunt crassa, ut  
etiam dormientium palpebræ ab eis conglutinentur.  
Declinatio denique est, cum symptomata fiunt re-  
missiora.

### Signa Diagnostica.

Ophthalmia ipsa cognitu facilis est. Venæ enim  
exiles tunice annatæ tenduntur, & tument, atque inde  
oculus rubet, ardor & dolor in eo percipitur, lachrymæ  
& sordes adsunt.

Sed & differentiæ signis discernuntur. Si enim oculi  
calidiores saltem appareant, idque à causa externa  
τράπεζα erit. Si præterea dolor grauis adsit, & tumor  
ac ardor, & lachrymæ copiosæ, Ophthalmia censebitur.  
Quod si denique hæc omnia ingrauescant, ut palpe-  
bræ etiam simul afficiantur, & quasi inuertantur, χη-  
μωσι nominabitur.

Quod ad signa causarum, humorem, mali causam,  
non solum monstrat temperatura corporis, ætas, regio-  
nis aerisque constitutio, victus ratio; sed & alia signa  
proximam causam demonstrant. Si enim à plethora  
sit Ophthalmia, facies rubet, tumor evidens est, venæ  
apparent amplæ, nec lachrymæ sunt adeo mordaces,  
nec dolor adeo vehemens. Si à bile est Ophthalmia,  
rubedo non est adeo magna, sed lachrymæ acres ac  
dolor vehemens, ita ut oculi quasi vri videantur. Si ab  
humore pituitoso est Ophthalmia, rubedo, calor, & do-  
lor est remissior, ac potius sensus grauitatis, & lachry-  
mæ non sunt adeo mordaces; nisi à pituita falsa sit ma-  
lum, ac palpebræ noctu quasi visco conglutinantur, ut  
non possint aperiri. Si ab humore melancholico, pal-  
pebræ nocte non adeo conglutinantur, lachrymæ sunt  
paucæ, tumor parvus, morbus diuturnus est & con-  
tumax.

Nec inutile est, discernere, an ophthalmia à causis  
internis, an verò evidentibus originem habeat. Si  
causa externa præcessit, ea facile ex ægri relatione co-  
gnoscutur. Si verò illa absit, pars affecta & mandans  
diligenter inuestiganda est, ut humor vitiosus subtra-  
hatur, eiusque generatio impediatur. Nisi enim hoc  
fiat, sæpius recurrere solet ophthalmia. Quod autem  
membrum hinc humorem suppeditet, partium affecta-  
rum signa in specie demonstrabunt. Necessarium quo-  
que est, inquirere, an per vasa externa vel interna hu-  
mor ad oculos affluat. Si enim per vasa externa & à pe-  
tritorio humor affluat, tumor, dolor, & pulsatio in  
fronte ac temporibus percipitur. Si verò à vasis &  
membranis internis, dolor profundior erit, & multò  
vehementior. Pruritus quoque in palato & naribus  
sentietur, ac sternutatio frequens erit.

Tandem quoque tempora morbi ob curationem dis-  
cernenda. Principium ophthalmiæ est, ut antea etiam  
dictum; ubi venæ distendi, oculisque rubere incipit,  
& lachrymæ ac humor exstillans tenuis est. In au-

gmento rubor & dolor augetur: quæ in statu omnia  
sunt maxima, humorque incrassari incipit, & ex sordi-  
bus palpebræ conglutinantur. In declinatione omnia  
manifestè minuuntur.

### Prognostica.

1. Ophthalmia facilius curatur, quæ propius ad  
τράπεζα accedit, difficilius, quæ ad χημωσι.

2. In regionibus & temporibus frigidis et si ophthal-  
miæ rariores sunt: difficilius tamen tolluntur, ob mem-  
bri adstrictionem. Contrarium fit in regionibus &  
temporibus calidis, teste Auicenna.

3. Ophthalmia in pueris, si cætera paria sint, diffi-  
cilis curatur; quoniam tractari commodè nequit: &  
pueri caput imbecillum excrementisque plenum ha-  
bent, sicut & senes.

4. Ophthalmia per consensum à dura & pia matre,  
& à partibus intra carniem contentis sæuiores habet  
symptomata, & difficilius curatur, quàm ea, quæ fit per  
consensum ab externis.

5. Hinc si ad Ophthalmiam ab affluxu per venas  
frontis & temporum accedat fluxio noua ex venis in-  
ternis & meningibus cerebri, grauior fit affectus, quo  
oculi sæpe sua sede extruduntur.

6. Dolor diu perseverans in ophthalmia pessimum  
signum est. Materiam enim aut corrodentem, aut  
vehementer distendentem, aut suppurantem arguit.  
Periculum igitur est, ne vel exesis vel ruptis oculi tu-  
nicis, atque corneâ inprimis exulceratâ, cæcitas sequa-  
tur; aut, quod mitius malum est, suffusio expectanda  
erit, crasso humore circa pupillam concrecente. Ga-  
lenus 3. *meth. med. cap. 3.* etiam pupillæ dilatationem  
ac tabem, & χημωσι, hoc est, corrugationem, addit,  
præsertim ex refrigerantium nimio & intempestiuo ad  
oculum usu.

7. Ophthalmia, in qua lachrymæ copiosiores, & quæ  
mordaces, citius ad finem peruenit, teste Auicenna: at  
grana sordium in oculo parua deteriora sunt; quia ma-  
turationis tarditatem significant; teste eodem.

8. Ophthalmia laborantem alui profluuium super-  
ueniens liberat, 6. *Aphor. 17.* Retrahitur enim deorsum,  
& euacuatur causa mali antecedens; ideoque Medi-  
cus naturæ exemplo curabit ophthalmias per clysteres  
& medicamenta purgantia. Plura Prognostica videan-  
tur apud Celsum, lib. 6. *init. cap. 6.*

### Indicationes.

Cum Ophthalmia sit inflammatio, omnes, quæ ab  
inflammatione sumuntur, indicationes hinc locum ha-  
bent. Nimirum primò ne humores ophthalmiam ge-  
nerantes ad oculum affluant, cauendum. Itaque si  
causæ quædam externæ præcesserint vel adsint, eæ  
omnes primò amouendæ. Frustra enim hinc omnia  
alia auxilia adhibentur, nisi causæ illæ omnes amo-  
tæ fuerint. Si verò à causis internis solum ophthal-  
mia proueniat, inflammationis incrementum, remo-  
tâ causâ antecedente, prohibendum. Id quod fit,  
totum corpus & caput, si opus sit, euacuando, hu-  
mores ad oculum affluentes reuellendo & repellendo.  
Deinde quod influxit, tollendum, & causa conti-  
nente sublatâ, morbus ipse sanandus; id quod repel-  
lentibus & resoluentibus peragitur. Et quidem cum,  
ut antea diximus, non idem semper humor ophthal-  
miam exciter, ad humoris naturam & vitium medica-  
menta accommodanda.

Secundam indicationem suppeditat locus affectus,  
qui est oculus. Cum enim oculus sensu exquisitissimo  
sit præditus, minutissimis medicamentis, & quæ minimè  
dolorem inferant, tractandus. Et præterea ab oleis in  
omnibus oculorum affectionibus abstinendum; cum  
dolores & inflammationes pariant.

Terrid, etsi dolor sit inter symptomata, quæ ablata causa cessant: tamen cum ob vehementiam interdum ita virgeat, ut causæ ablatio expectari non possit, anodyna tum postulat.

*Regula quadam generales in medicamentorum Ophthalmicorum usu observanda.*

*Regula in oculis curandis observanda.*

Quæ omnia ut planiora fiant, & ut medicamenta, quæ his indicationibus respondent, rectè usurpentur, generales quædam Regulæ in Ophthalmiæ curatione observandæ sunt.

I. Topica oculis statim ab initio non adhibeantur, quia sæpe solis euacuationibus universalibus leuior ophthalmia sanatur. Quod si dolor urget, ita ut affluxus maior metuendus sit, & virium per vigilias deiectio, ille externis anodynis mitigetur. Et omnino usus medicamentorum topicorum sit parcius, monentque Mer catus, lib. 1. de capit. morb. cap. 2. quamvis plurima passim præscripta sint remedia, non omnibus ac plurimis aut semper utendum esse; cum plus sæpe promittant boni, quam præstent, ut Galenus ait, additque; Scio profectò, plurimos in omnimodam cæcitatem deductos esse, copiâ medicamentorum potius, quam defectu. Neque enim oculi semper utilia medicamenta sine incommodo ferunt, ne dum quæ inordinate & sine ratione adhibentur.

II. Lac muliebre recens, vel aliud, instillatum, vel impositum oculo, equidem faciliè primas inter medicamenta dolorem lenientiâ obtinet: in eius usu tamen hæc cautio, monente Aëtio & Auicenna, adhibenda, ne lac oculo diutius inhæreat. Faciliè enim à calore oculi corrumpitur, & ac imoniâ contrahit. Ideoque singulis ferè horis mutandum est. Id quod de albumine oui metuendum non est.

III. Repellentia, quibus in principio utimur, eiusmodi sint, ne nimia frigiditate & adstrictione suâ tunicas oculorum condensent, porosque claudant, siccitate verò oculos exasperent, doloremque ex utraque causâ augeant. Cum enim à phlegmone, quæ tumor est calidus, semper aliquid resoluitur, præsertim in membro raro, cute densa non tecto, quale est oculus, si materia illa retineatur, pauca etiam, si acrior sit, morsu; si multa, qualiscunque etiam, tensione dolorem vehementiorem excitabit. Ideoque lenientia quædam frigidis & abstergentibus admisceantur, ut lac, crocus, sarcocolla.

IV. Opium & Opiata non, nisi necessitate urgente, usurpentur; sitque eorum usus neque frequens, neque multus. Etsi enim, quod vulgo putatur, frigiditate non noceant: tamen non saltem acrimoniâ suâ & mordacitate dolorem augent, sed etiam spiritus opticos incrassant & hebetant; quod & Galenus observavit, 3. meth. med. cap. 2. & de comp. medic. sec. loc.

V. Diligenter quoque in omni oculorum affectione curandum est, ne suppuratio intrus fiat. Metuendum enim tum foret, ne à detenta sanie cornea, aut cæteræ oculorum tunice corrodantur.

VI. Ophthalmicis remediis semper admiscenda sunt, quæ à proprietate oculis conducunt.

VII. Sint etiam remedia, quæ oculis induntur, à sordibus diligentissimè mundata; & leuissimè trita atque cribrata, ut asperitatem deponant. Mordacitatis quoque sint expertia. Et proinde si mordacitas à calore dependeat, infundantur illa sæpius in aqua rosarum, endiviæ, hordei, lacte muliebri; si à frigiditate, in decocto passularum, caricarum, fœnigræci, meliloti, cum vino subdulci. Denique non nimium lenta sint, ne crassa nimis visciditate pertinaciùs oculis adhærendo indurentur. Ideoque etsi albumen oui cum aqua rosarum vel simili conquassatum sit conuenientissimum remedium ad repellendum in oculorum affectionibus; tamen videndum, ne talia medicamenta

admisceantur, unde indurescat, & oculis pertinaciùs adhæreat. Quod incommodum ut præcaueatur, Ludovicus Septalius, in *Animaduers. Medicis*, liquore ex albumine oui ad duritiem cocto expresso uti mauult. Verum cum liquori huic desit illa vis emplastica, quæ albumini conquassato inest, quâ, teste Galeno. 3. method. med. cap. 11. in lippitudine utilis est, ut diutius hæreat, & longiore tempore refrigerando repellat: consultius est, albumen oui usurpare, nihil tamen ei admiscere, ob quod indurari, & oculo pertinaciùs adhærere possit.

VIII. Mesue, de curat. agnitudinum aurium, hanc regulam tradit: Medicamenta, quæ oculis instillantur, semper actu frigida esse debent; quæ auribus, tepida aut calida, siue affectus ipse sit calidus siue frigidus. Sed actu frigida oculis sanis potius conueniunt ad præseruationem à morbis. In oculo autem phlegmone affecto actu tepida magis ex usu sunt, vergentia ad frigiditatem, si repellendum; ad caliditatem, si discutendum sit, quo utroque etiam dolor mitigatur.

*Curatio Ophthalmiæ leuioris, siue*  
*ῥιζαξίω.*

Si à causis externis leuior ophthalmia ortum habeat, eæ primum, quæcunque sint, omnes tollendæ. Frustra enim omnia alia auxilia adhibentur, nisi causæ illæ omnes remotæ fuerint.

Causis remotis si à calore Solis vel ignis malum originem habeat, oculus fouendus aqua rosarum, plantaginis cum camphora, vel sine camphorâ, lacte muliebri recenti, vel albumine oui conquassato cum aquâ rosar. Galenus, in 1. de remediis faciliè parabilib. c. 10, ad calidas ῥιζαξίω commendat focum oculorum ex sola posca, ad frigidos ex vino albo. Et si metus sit, ne malum augeatur, & à causâ interna foueatur, etiam sanguinis & humorum vitiosorum euacuatio institui potest. Postea cum repellentibus & refrigerantibus decoctum seminis fœnigræci, flor, meliloti, vel chamæmeli, admiscendum.

Si à dolore capitis ex Solis æstu contracto ophthalmiæ initia se produnt, aqua rosarum cum camphora, & sine camphora, & lac muliebre non solum oculis instillandum, sed & fronti applicandum. Rabbi Moyses, 2. Aphor. emplastrum ex teneris foliis rosarum laudat. Aëtius & Oribasius hoc in casu suadent, ut æger multum poret, ad conciliandum somnum, & coquendam inflammationem. Id quod aliqui de potu vini interpretati sunt. Sed quia caput antea æstuat, vini potus largior concedi non potest, sed aquæ, vel alius potus minus calidus. Contrâ si à frigore sit ophthalmia, balneum aquæ tepidæ conuenit; modò caput repletum non sit. Deinde cibo cocto vinum subtile & tenue propinandum.

Si à vento, fumo, vel puluere incipiat ophthalmia, a fumo & puluere, aqua dulci, vel lacte tepido oculi abluantur, ægerque in loco obscuro quiescat, & det operam, ut dormiat. Somnus enim imminentem lippitudinem sæpius præcauit. Foueatur etiam oculus aqua rosarum cum pauxillo croci.

Si verò ab ictu vel casu sit malum, & inflammatio metuatur, sanguis statim mittendus. Hinc dolorem sedantia & repellentia modò proposita, lac muliebre, aqua rosarum, albumen oui, & similia oculo instillantur, & cum linteo mundo oculo imponantur, vel albumen oui cum pauxillo albuminis & boli armeni applicetur. Postea ut sanguis ille è venis in tunicas effusus discutatur, & macula cruenta in oculo deleatur, sanguis columbæ, turturis, vel hirundinis oculo instilletur, ut postea de suggillatione dicetur.

Si ab apis, vespa, crabronum ictu sit ῥιζαξίω, ῥιζαξίω mortua seu galeopsos, rad, alibée, fol. ruta an, M. S.

Ab apum & vesparum ictu.



Contundantur in mortario, exprimatur succus, & addatur boli Armeni Drach. ii. & oculo imponatur. Vel saltem repellentia ex albumine oui, lacte muliebri, vel aqua rosar. imponantur. Vulgus statim ab ictu ferro comprimit oculum, vt non solum ferri frigiditate, sed & compressione affluens humor retrudatur.

Si à cantharidum, erucarum, formicarum contactu incipiat ophthalmia,

℞. Cremoris lactis, aqua endiuia, an. cochlear. ii. aceti cochlear. i. camphor. Drach. ℥. M. & imponantur.

Si hisce remediis ophthalmia à causa externa incipiens non tollatur, reliqua etiam, quæ in verâ ophthalmia adhiberi solent vsurpanda.

### Curatio ophthalmia vera.

Si à causa interna, vel etiam externa sit ophthalmia, quam tamen affluxus humorum foueat & augeat, & sanguis abundet, aluo euacuata mox vena aperienda est, & euacuationis & reuulsione gratia. Imò cum sine sanguine nulla ophthalmia fiat, etsi alii humores ad generandam ophthalmiam concurrant, non facile omittenda venæ sectio; aut eius loco cucurbitulæ cum scarificatione occipiti, ceruici, ac scapulis imponendæ. Plurimumque in omni ophthalmia prodest venæ sectio, & sæpe grauissimi oculorum dolores intra horæ spatium venæ sectione sublati sunt, teste Galeno, lib. de curandi ratione per sanguinis missionem, cap. 16. qui etiam, cap. seq. 17. narrat historiam cuiusdam, qui ab oculorum inflammatione, & cæcitatatis periculo sanguinis missione liberatus fuit.

Iubet autem Galenus Cephalicam, & ℞. id est, è directo affecti oculi, seu eiusdem lateris aperire. Quod & Rhases, si minus graue malum sit, suadet. Si autem malum grauius sit, in brachio lateris oppositi maioris reuulsione gratia, & hinc in latere affecto venam aperire iubet. Nonnulli primò ex mediana seu communi eiusdem lateris, postea ex cephalica sanguinem detrahunt. Verùm videndum, quid ægri vires ferant, & an venæ sectio commodè repeti possit. Si enim hoc fieri non possit, statim cephalica eiusdem lateris aperienda.

Quantum autem sanguinis mittendum sit, abundantia sanguinis, mali vehementia, & virium robur determinat. Galenus, loco allegat. cap. 17. cuidam primò libras sanguinis tres detrahit, & hora sexta post adhuc libram vnam. Auicennas quoque ad metum lipothyriæ sanguinem interdum in vera ophthalmia mittendum censet. Sed tutius est, siue eodem die, siue postea venæ sectionem iterare, seu eadem cephalica bis aperta, seu primum mediana, hinc cephalica, quàm largiore vnâ venæ sectione vires deicere. Viribus infirmis iuxta pollicem in manu sectio fiat. Si verò sanguinis copia non sit magna, aliique humores admisti sint, sanguis parcius detrahatur, eiusque loco cucurbitulæ cum scarificatione adhibeantur. Si etiam consuetæ sanguinis euacuatio suppressa sit, danda opera, vt ea reuocetur. Vnde in fœminis venas tali aperire, aut furas scarificare conuenit.

Si verò alij humores sanguini admisceantur, conuenientibus medicamentis euacuandi, & si opus fuerit, præparandi, eorumque vitia emendanda sunt. Et cum experientia doceat, vt Galenus, in libro contra Iulian. cap. 1. annotauit, aluum copiosius fluentem oculis inflammatis prodesse, vt Hippocrates, 6. Aphor. 17. rectè scripserit: Ophthalmia laboranti alui profluuium, bonum esse: Medicus naturam imitetur, & aluum clysteribus ac medicamentis fluidam reddat. Et inprimis biliosos humores in ophthalmia euacuare vtile est; cum ij maximè in ophthalmia sanguini permisti sunt. Obseruandum tamen est, ne medicamenta acria adhibeantur, ne humores agitati & exacerbati vehemen-

tius ad oculos fluant, sed mitiora medicamenta vsurpentur.

Præparationis ergo loco, & vt humores calidi & acres temperentur, in humore bilioso vsurpentur radic. cichor. fragariæ, santal. flor. rosar. violar. nymphetæ.

Vt ℞. Syr. violar. nymph. ribium, an. Vnc. i. aq. violarum, fragorum sine vino, an. Vnc. iii. euphrag. verberna, an. Vnc. i. Misce.

Postea instituat purgatio cum syrupo rosar. vel violar. solut. cassia, tamarind. rhabarb. myrobolanis.

℞. Myrobal. citrin. Drach. i. ℥. rhabarb. Drach. ii. spica g. vi. cinamomi Drach. ℥. Infundantur in aq. cichor. ℥. q.

Colaturæ adde syrup. ros. solut. Vnc. i. ℥.

Misce:

Vel etiam pilulæ lucis exhibeantur.

Hisce peractis particulares euacuationes, diuersiones & deriuationes instituendæ sunt, vt supra, parte 1. dictum. Si videlicet caput adhuc sit plenum sanguine, eum quoque è venis capiti propriis euacuare conuenit. Auicennas venam secare iubet, quæ est in angulo, aut rectam, quæ est in fronte. Compertumque est, ophthalmicos, qui casu in fronte vulnerati fuerunt, ab hoc malo hac occasione liberatos fuisse. Nonnulli etiam venas nasi aperiunt. Antiqui, vbi sanguis feruidior esset, & vaporibus plenus, ac per arterias externas in oculos fluere, arterias in temporibus aperiunt; cuius sectionis modum docet Galenus, in fine lib. 13. meth. med. & Paulus Ægineta, lib. 6. cap. 4.

Nec omittendæ reuulsiones per frictions lotionesque crurum ac pedum. Inprimis verò vilia sunt vesicatoria post aures applicata. Nonnulli farinam sem. erucæ sacculo includunt, & sacculum in vino coquunt, ac calidè è regione oculi affecti nuchæ imponunt, idque sæpius repetunt, vt humor ab oculo versus nucham trahatur. Si malum sit diuturnius, aut frequentius infestare soleat, setaceum adhibendum, idque vel 30. diebus apertum seruandum, vel cauterium actuale aut potentiale in ceruice vel brachio applicandum, & fonticulus excitandus. In diuturnis enim ophthalmiis, aliisque oculorum, qui ex affluxu humorum oriuntur, pertinacibus morbis, vesicatoria sæpe adhibita, setaceum ac cauterium, efficacissima sunt remedia.

Particulares euacuationes fiant per apophlegmatismos & gargarismos, vt supra, parte 1. dictum. De Errhinis est controuersia. Alij enim ea planè improbant, vtpote quæ ad anteriora & oculos trahant; alij ea admittunt; cum ijs Hippocrates, Galenus, Auicennas, & alij Practici sint, ac humores per vicinum locum ex oculis euacuare possint.

Vt autem rem breuiter expediamus, omnino in errhinis maior cautio adhibenda, vtpote quæ ad vicinas oculo partes trahant, quod non fit in apophlegmatismis & gargarismis, quæ per posteriora auertunt. Ideoque non, nisi totius euacuatione & capitis purgatione præmissa, & cum æger consuevit per nares excrementa capitis euacuare, ea, & quidem non fortiora, conueniunt, neque etiam facile, dum materia est in fluxu ad oculos, adhibenda. In diuturna etiam, & sæpe recurrente ophthalmia, præseruationis gratia errhina adhibere licet.

Dum corpus & caput ita euacuatum est, & omnis generis diuersiones institutæ, topica quoque oculis applicanda. Initio verò mali statim non adhibenda, vt supra, in regulis generalibus, dictum, Sæpe enim compertum est, venæ sectione & purgatione ophthalmiam sanaram fuisse, vt topicis opus non fuerit. Atque hoc præceptum oraculi loco habendum censet Mercurialis, & millicies se expertum scribit, quod inflammatio oculi à principio nolit tangi.

Præparantia humores in Ophthalmia.

Reuulsiones.

Particulares euacuationes in ophthalmia.

Errhina an in ophthalmia conueniant.

Topica in ophthalmia.

à Cantharid. di. erucarum, formicarum contactu.

Ophthalmia Curatio. Vera sectio.

Temporibus  
applicanda.

Nihil tamen obstat, quin vicinis oculo partibus, per quas fit defluxio, fronti scilicet & temporibus, ea in parte, ubi oculus dolet, vel toti fronti usque ad tempora, si uterque oculus laboret, repellentia & adstringentia medicamenta, præcipue si fluxus fiat per venas & arterias extra cranium, ut magnâ ex parte accidit, adhibeantur, ex succo vel aqua rosarum, plantaginis, solani, salic. lactuce, balaustris, capitibus papaueris, santalis, bolo Armeno, sanguine draconis, flor. rosar. rubr. addito thure & mastiche, gummi tacamahaca, quæ frigiditatem reliquorum corrigunt, & leniter adstringunt, mixtis cum albumine oui vel aquâ rosarum. Galenus, de medic. fac. parabil. viridia vitis folia in modum cataplasmatibus fronti imposita commendat; sicut & rubi portulacæ succum.

℞. Boli Armeni sangu. draconis, an. Dra. ij.

Incorpor. cum albumine oui, & dissolvantur in aceto, in quo rosæ, santal. rubrum, & thus cocta fuerint, & fronti applicentur.

Vel ℞. Boli Armeni Drach. ij. flor. rosarum, sangu. dracon. an. Drach. i. mastich, balaustris, an. Drach. sem.

Fiat Pulvis, qui excipiat albumine oui & aquâ rosarum, vel aceto rosarum, & applicetur temporibus ac fronti.

Vel imponatur succus plantaginis cum albumine oui, aut emplastrum aliquod adstringens.

Nonnulli talia etiam supra iugulares venas, & iuxta occiput apponunt. His enim modis omnibus influxus humorum ad oculos inhibetur.

Cauendum tamen, ne simul oculis repellentia, & temporum vasis cataplasmata & alia medicamenta adstringentia adhibeantur; cum, qui ab oculis repelluntur, humores recurrere angustatis vasis non possint: inprimis si corpus euacuatum non fuerit.

Hæc tamen præcipue de adstringentibus intelligenda sunt. Ea enim partes contrahunt, humores partim impingunt, & ad resolutionem ineptos reddunt, idcirco dolorem augent, & in principio non adhibenda sunt.

Alia verò, quæ sine adstrictione acrimoniam humorum temperare, cõque modicè repellere valent, non videntur planè inutilia, ut:

℞. Aqu. rosar. Vnc. i. euphrag. Vnc. s. tutia præpar. sief, alb. s. opio, an. Scr. s. camphor. gr. j.

Vel ℞. Sief. alb. s. opio Dra. s. Dissolu. in lacte muliebri, & aqua rosarum, & oculo imponatur.

Vel ℞. Album. oui Vnc. ii. lactis muliebr. Vnc. iii. succi plantag. Vnc. i. Misc.

Vel ℞. Mucilag. sem. psyllij extract. cum aquâ plantag. aut rosarum ℞. ii. album. oui bene conquassati ℞. j.

Mixta oculo imponantur, & nonnihil de eo oculo instilletur. Si feruor adsit, camphor. gr. v. addantur.

Vel ℞. Aqu. rosar. Vnc. ii. succi plantag. ℞. i. album. oui conquass. ℞. s. Misc.

℞. Fol. plantag. flor. rosar. rubrar. an. Drach. ii. balaustr. Drach. j.

Coqu. in aqua rosar. & plantaginis.

Vel ℞. Pulp. pomorum acidorum vel cydonior. coctor. in aquâ rosar. & plantag. ℞. ii. farina hordei ℞. i. sumach, balaustr. flor. rosar. rubr. an. Dra. s. succi sedi maior. plantag. an. q. s.

F. Cataplasma, quod repellit, & simul dolorem lenit.

Possunt etiam siccantia leniter & citra morsum repellentibus ac dolorem lenientibus addi ad humiditates absumendas, cerussa, tutia præpar. pompholyx, oculi s. sapphirus, granatus, smaragdus, margaritæ præparatæ.

℞. Cerussa lota aqua rosar. Dra. ii. aq. plantag. Vnc. ii. albumin. oui conquassati ℞. i.

Misc.

Vel ℞. Tutia præpar. Dra. s. aqu. rosar. ℞. ii. album. oui conquass. ℞. s. Misc.

Inprimis tres sequentes aquæ commendantur: I. est aq. fragorum:

℞. Fragar. recent. ℞. i. x. sacchar. alb. ℞. iiii. Misc. & per 8. dies in B. aquæ tepentis macera. Deinde in B. eodem destillantur.

2. Est aqua flor. cichorij:

℞. Flor. cichorij q. v. Colligantur ante ortum Solis, Sole signum ☊ modò ingresso, contundantur bene in mortario, admisceatur pulueris sacchari candi albi quarta pars, indantur vitro, ponantur ad Solem, & resoluantur in oleum, quod palpebris inunctum fluxionem tollit, & simul visum clarificat.

3. Oleum fl. cyani, quod h. m. paratur:

℞. Flor. cyani caruleor. ante ortum Solis collect. q. v. Contundantur in mortario marmoreo, indantur vitro, quod bene obturetur, & ad Solem per integrum mensem ponatur; hinc sumatur vitrum, & obuolnatur fermento, ponatur in furnum pistorium, & cum panibus coquatur. Ita proueniet oleum seu liquor quidam, summum oculis à calidis fluxionibus, & salis humoribus auxilium.

Si etiam dolor oculorum ab initio statim sit vehementior, quam primum aliqua euacuatio & repulsio facta est, medicamenta dolorem lenientia adhibenda; quæ ipsa tamen ita parari possunt, ut simul incrementum inflammationis prohibere valeant. Utile est inprimis albumen oui bene conquassatum, vel solum, vel cum aqua rosarum ac lacte muliebri aut alio mixtum, oculo instillatum, vel, quod commodius est, extra impositum. Quod tamen diu non relinquendum, sed singulis horis mutandum est, ne morâ acescat, corrumpatur, & acre euadat, doloremque augeat. Nonnulli lactis loco caseum planè recentem imponunt; sed & is sæpius mutandus, ne, si oleosus & pinguis fiat, malum augeat. Utile est & pomum dulce cum saccharo coctum & appositum, cui quoque aliquot grana opij & camphoræ admisceri possunt. Prodest & medulla panis albi in lacte infusa, cui aliquid decoctionis papaueris vel seminis scæniigræci addere licet, Galenus, lib. i. de remediis facili parabil. cap. i. o. commendat decoctum scæniigræci hoc modo paratum.

Principiò lotum diligenter in aqua dulci scænum-græcum leuiter in eadem coquitur, donec, quicquid in se habet acris, abiiciat; deinde effusa priori aquâ aliâ rursus aquâ coquitur. Idem decoctum Galenus etiam, 13. meth. med. c. 22. & 4. de composit. medicam. s. l. 2. usurpat. Monet iamen Ludouicus Septalius, li. 6. animadu. n. 97. decoctum hoc scæniigræci malè vulgò parari ex semine, cum sit calidius, quàm ut conueniat in oculorum inflammatione, cum calidum in secundo, & siccum in primo ponatur à Galeno, 8. de simpl. medic. facul. Ipse verò hoc decoctum potius ex foliis parandum censet. Verum incommodum, quod meruit Septalius, euitari potest, si paretur ad modum à Galeno, allegato cap. 10. lib. 1. de medic. facili parabil. propositum, si videlicet decoctum prius, quod, quicquid acre est in scæno græco, imbibit, abiiciatur. Prodest & decoctum violarum, sem. psyllij & cydonior, oculorum populi, meliloti; item Cataplasma ex luteo oui, medulla panis albi, & aqua rosar. vel lacte.

Vel ℞. Mucilag. sem. psyllij & cydonior. cum aqua rosar. & papauer. extract. an. Vnc. i. albumin. oui conquass. ℞. s. camphora, croci, an. gr. vi. Misc.

Vel ℞. Medull. panis albi in lacte & aquâ rosar. macerata, pulpa pomor. dulc. an. ℞. i. mucilag. sem. psyllij scæniigr. aqu. rosar. extract. an. Vnc. s. vitell. oui vnus, camphor. Scr. i. croci gr. vi. Misc.

Si dolor sit vehementior, gr. ii. opij addi possunt, & cum lacte muliebri, vel aqua rosar. misceri in formam cataplasmatibus.

Efficax est & emulsio seminis papauer. facta cum lacte muliebri,

Topica oculis  
applicanda.

Anodyna in  
Ophthalmia.

De effusa  
nigra in  
Ophthalmia.

muliebri, vel aqua lactucæ, aut decocto fœnigræci.

Fortiora sũt succus vel decoctũ lactucæ, solani, radic. mandragoræ, capir papau, si es album cum opio. Opiata tamen, vt etiam supra, in regulis generalibus, dictum, nõ nisi extrema necessitate vrgente, & vbi ex dolore acutissimo summa virium dejectio metuitur, vsurpanda, & vbi iis vtendum, Auicennas aquam saccharatam vel aquam mellis post illorum vsum instillare iubet. Commodè verò decocto meliloti post vsum opiatorum oculi fouentur. Plura videantur apud Platerum, lib. 2. Prætic. pag. 307. & seqq.

Topica in principio ophthalmiæ applicanda.

Reliqua topica quod attinet, morbi temporibus accommodanda sunt. In principio conueniunt repellentia, vt dictum, quibus in incremento resolutentia addenda, ita tamen, vt repellentia præpolleant. Hinc morbo præcedente vsurpanda resolutentia; quibus tamen adhuc aliquid repellentium admiscendum. Tandem sola resolutentia adhibeantur.

Habenda quoque ratio humorum, & medicamenta iis accommodanda. In Ophthalmia biliosa repellentia in principio, & dum materia adhuc fluit, adhibeantur, quæ citra vehementem astrictionem officium suum præstare possunt, quæque ita comparatæ sunt, vt acrimoniam humoris corrigant, & simul anodyna sint.

Exempl. gratia;

℞. Mucilag. semin. psyllij & cydon. aqu. rosar. & plantag. facta an. Vnc. i. albumin. oui bene conuassati Vnc. i. camphor. gr. vi.

Mista oculis instillantur, & linteis mundis imponantur.

Vel ℞. Balsam. Drach. β. acacia Scrup. i.

Infundantur in aqu. rosar. Vnc. iii.

In Colat. dissolue terendo subtiliss. tutia præpar. lapid. calaminaris, an. Scr. i. thuris, mastich. an. Scrup. β. mucilag. semin. cydonior. cum aqua rosarum facta Dra. i.

F. Collyrium. Aut species ligentur in nodulo, & in aqua rosarum suspendantur.

Vel ℞. Sief. alb. f. opio Drach. sem. lact. muliebr. aqu. rosar. an. Drach. vi. M.

Vel ℞. Aq. fragor. f. vino, tormentill. rosar. an. Vnc. i. sief. alb. f. opio Drach. β. Misc.

Chymici hic commendant sacchar. vel magisterium h. ni.

Humida autem illa medicamenta non planè actu frigida adhibenda, ne materiam nimis incrassent, & poros claudant, sed non nihil tepida.

Quo tempore topica in ophthalmia applicanda.

De tempore adhibendorum topicorum non idem sentiunt Autores. Auicennas, lib. 3. fen. 3. ar. 1. c. 9. scribit: Et oportet, quantum possibile est, vt retardetur in Ophthalmia collyriorum administratio vsque ad tres dies. Et paulo post; Oportet, vt in principio non adhibeantur inspissantia fortia, & quæ sunt vehementer stipitica; quoniam inspissant tunicas, & prohibent resolutionem, & augment. dolorem. Quem plerique sequuntur, & non, nisi tribus diebus peractis, talia collyria adhibenda censent. Quos reprehendit Ludouicus Mercatus, & talia adhibenda existimat primis tribus diebus, postea verò ad discussionem veniendum esse. Verum & rationes supra allatæ persuadent, & experientia docet, non ita tutò mox in principio adhiberi talia collyria. Imò experientia docuit, sæpe euacuationem & diuersiones materiæ, cum legitima victus ratione, ad curationem sufficere, vbi materia pauca est & benigna.

Deinde sciendum, morborum tempora non semper dietum numero ita exactè describi posse, sed nunc esse breuiora, nunc longiora, nunc plures, nunc pauciores dies completi. Itaque si fluxio sit diuturnior, non peccabit, qui etiam post tertium diem repellentia applicabit. Vtile tamen fuerit, vt ad dissoluendum tum aliquid admisceatur. Et omnino ad indicationes semper respiciendum; ac peccant ii, qui vno collyrio aut aqua Ophthalmica quocunque morbi tempore adhibita omnes ophthalmias curari posse persuasum habent;

cum medicamenta ista, vt dictum, secundum tempora inflammationis varianda sint.

In augmento videlicet repellentibus aliquid de resolutentibus admiscendum, qualia sunt, semen fœnigræci, lini, althææ, chamæmel, melilot, sarcocolla, tutia, & quæ, prout morbus versus statum aut declinationem propius accessit, semper augenda.

In augmento.

Vt: ℞. Sarcocoll. lacte nutrita Drach. i. tragacanth. Drach. iem. mucilag. semin. cydonior. q. s. F. Collyrium.

Sarcocolla autem nutritur, id est, infunditur vel maceratur in lacte per dies aliquot, semper nouo lacte affuso, idque ideo, vt, quicquid acrimoniæ habet, deponat. Et si siccitas ejus etiam metuatur, aliquid, quod lentore præditum est, admisceatur, vt mucilago sem. psyllij, cydonior. album. oui, tragacanth. amyllum, & hoc modo sarcocolla præparata sine morfu & attractione digerit. Non autem multum vnâ vice nutriatur & præparetur, ne, priusquam absumatur, acescat, oculisque lædat.

Sarcocolla nutritio.

Vel ℞. Flor. chamamel. melilot. an. M. sem. rosar. rubrar. P. i.

Coqu. in aqua plantaginis.

Colat. ℞. Vnc. iii. adde. sarcocoll. nutrita Drach. i. sem. tutia præpar. Drach. i.

Verum monendum, talia non locum habere, nisi vbi simul abstersione humorum crassiorum opus sit in declinatione, vel si oculus roborandus sit. Imò potius lipitudinè quàm ophthalmiæ veræ conueniunt.

A Chymicis commendatur crocus metallorum, è quo cum aqua euphragiæ & fœniculi parat aquam suam Ophthalmicam Martinus Rulandus, senior, quam & Quercetanus, in Pharmacop. restituta, lib. 1. c. 7. proponit. Habet & aliam ibi Quercetanus ex vrinæ pueri lb. ii. & vitrioli ac tutiæ, an. Vnc. iii. destillatam. Sunt qui aquam pluuialem majalem commendant in cantharo stanneo aliquandiu asservatam, cujus mensuræ vni addunt vitrioli albi Vnc. i. camphor. Drach. ii. & pro vsu seruant. Potest eidem aqua rosar. addi.

Vel ℞. Flor. sambuci.

Coquantur in lacte, & pro Epithemate adhibeantur. Insigniter enim dolores leniunt.

In statu.

In statu Sarcocollæ & aliorum resolutentium quantitas augeatur. Et viles tum sunt fomentationes, quæ fiunt vapore aquæ calidæ, in qua medicamenta resolutentia modò dicta cocta fuerint, teruè quateruè de die repetitæ, quæ dolorem leniunt, tensionem remittunt, humoresque resoluunt.

In declinatione solâ sarcocollâ vtendum, vt & aliis resolutentibus in aqua fœniculi, rutæ, euphragiæ, & chelidoniæ.

In declinatione.

℞. Sarcocoll. lacte nutrita Drach. iii. aloes aqua fœniculi lota Drach. i. sem. croci Scrup. sem.

F. Pulvis, è quo cum aqua euphragiæ formeretur collyrium siccum, quod in aqua fœniculi, euphragiæ, vel alia conueniente vsurperetur.

Inter ista medicamenta etiam valde efficax est tutia vera Arabum, seu pompholyx, quæ sine morfu siccatur.

Vt ℞. Tutia præpar. Drach. ii. aloes lota Drach. i. sacchar. Scrup. ii.

Tritâ infundantur in aqu. fœniculi, euphragiæ, verbenæ, rutæ, an. Vnc. i. Postea colentur & ad vsum seruantur.

Vel ℞. Vitrioli albi, tutia præpar. an. Drach. i. camphor. Scrup. i.

Puluerisata subtilissimè infundantur in aqua rosarum pro collyrio.

Vel ℞. Caryophyll. num. xii. tutia præpar. Drach. sem. virid. eris gr. xv.

Contundantur omnia crasso modo, & indantur linteis, ac fiat nodulus, qui in vini cyatho imponatur. Vfus tempore nodulus exprimendus, & gutta vna oculo instillanda.

Rhases quatuor medicamenta, lib. 9. ad Almanforem, cap. propr. proponit. Eorum primum in principio Ophthalmie valet, & in materia calida, præsertim si affluxus ejus fiat per venas frontis & temporum externas. Secundum in augmento magis prodest, & etiam in statu; quia non solum repercutit, & dolorem mitigat, sed nonnihil etiam abstergit & discutit. Tertium magis valet in declinatione, quando intentio est resolvendi & exsiccandi. Quartum dolorem etiam mitigat, & aliquo modo etiam exsiccat; ideo in principio quoque adhiberi potest.

In omni autem topicorum applicatione observandum, ut semper ante applicationem novorum topicorum sordes lippitudinis prius removeantur linteolo molli, vel aquâ saccharata, vel aliâ conueniente intincto.

Ophthalmia à frig. & crass. humoribus curatio.

Si Ophthalmia à frigidis & crassis humoribus proveniat, à pituita scilicet & humore melancholico, evacuationes vniuersales & particulares, & diuersiones omnes ad humores eosdem dirigantur, non neglectâ eorum præparatione, ut supra, part. 1. de Intemperie capitis cum his humoribus, dictum. Et quia sanguis est admixtus, secetur vena humeralis vel cephalica ante purgationem; postea frictionibus, ligaturis, cucurbitulis impetus humorum auertatur.

Quantum ad topica, repellentia hîc vix locum habent; iatis fuerit, si fronti aliquid, quod affluxum humorum nonnihil sistat, applicetur.

Vt ℞. Thuris, acacia, aloës, an. Drach. i. myrrha, sanguinis draconis, an. Drach. ss.

Fiat Pulvis, qui cum albumine oui misceatur, & fronti imponatur.

Ipsi verò oculo resoluentia moderatè, & dolorem lenientia applicanda.

Vt ℞. Decocti sem. fenigræci Vnc. iiii. thuris, sarcocolle, an. Drach. j. croci Scrup. sem.

Ebulliant semel atque iterum, & oculo applicentur.

Tandem in curatione Ophthalmie, & præcipuè in iis, qui eâ sæpius laborant, ad partem recipientem respiciendum, oculique per medicamenta appropriata confortandi, de quibus infra, de visus debilitate, dicetur.

#### Curatio ὀφθαλμίας.

ὀφθαλμίας Curatio.

ὀφθαλμίας tandem, cum sit malum vehemens & magni momenti, eadem remedia, quæ Ophthalmia, postulat, sed vehementiora. Venæ sectione igitur præmissâ purgatio instituenda, & quidem aliquoties repetenda. Adhibendæ & cucurbitulæ scarificatæ. Interdum necessarium est venas temporum, frontis, & quæ sunt post aures, incidere. Inprimis verò necessarium setaceum vel cauterium in occipite applicare. Reliqua medicamenta sunt eadem, quæ modò de curatione Ophthalmie verè sunt propofita.

#### Dietæ.

Aër sit temperatus ac purus, expers fumi, pulueris & ventorum; obscurior etiam & tenebrosior, ne oculi splendore offendantur, spiritibusque agitat. Fluxio concitetur. Linteolum atrum, vel viride vel cæruleum proinde oculo obducatur, habeatque ager non solum oculum laborantem, sed & sanum clausum vel tectum; cum vnius motus alterum etiam inquietum reddat. Aspectus verò rerum lucidarum vitetur. Victus ratio sit tenuis, præsertim primis diebus, donec fluxio constet. Ideo Celsus, lib. 6. cap. 6. scribit: In hoc casu primum omnium esse quietem & abstinentiam. Ita enim exinanitæ partes auidius, quos habent, humores retinent, ne ad oculos confluant.

A cibis absint omnia vaporosa, acria, & quæ caput replent ac feriant, aut in bilem faciliè mutantur, salia,

aromata calidiora, cepe, lac, mel, & quæ cum aceto parantur. Initio à vino hac de causâ abstinendum, ejusque loco in materia biliosa decoctum hordei & cinnamomi vsupandum. In crassis humoribus, & tempore hyberno conceditur hydromel. Acida quidem & acetosa conueniunt, præsertim post cibum, quia vaporum ad caput ascensum prohibent. Aceri verò vsus non conuenit; quia vehiculi loco est humoribus, & aliis aceturum partibus neruosis est inimicum. Peculiari verò vi in hoc morbo nocere solent, & propterea vitanda sunt semen cannabis, caulis, lactuca, fabæ, lentes, carnes porcinae & salia, oliuæ.

Somnus utilis est; quia in somno oculi non mouentur, nec lumen admittunt, atque ita humores ad se non attrahunt. Ac præterea per somnum materia, quæ in oculos confluit, concoquitur. Dolorem etiam, qui valde attrahit, somnus sopit. Ager non dormiat in latere, cujus oculus afficitur, dormiatque; eleuato capite. Quies ita ægro necessaria est, ut Celsus primo die à sermone quoque abstinere jubeat, ne motu materia ad caput attrahatur. Repletio omnis vitetur, maximè ventriculi; ut alius semper sit aperta & fluidior, curandum. Capilli, si multi sint, & caput grauent, tondendi. Animi affectus omnis immoderatio, & inprimis ira, vitetur.

In declinatione, ad reliquias & excrementa terriæ coctionis discutienda, balneum conuenit. Vnde Hippocrates quinque Ophthalmie sanandæ remedia proponit, dum, 6. Aphor. 31. scribit dolorem oculorum meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut medicamentum purgans epotum soluit. Quanquam de oculorum doloribus loquitur ille aphorismus: tamè omnino quoque de ipsâ Ophthalmia, cui cõjunctus est dolor, accipi potest; & præcipua sanandæ Ophthalmie remedia complectitur. Et quidem de venæ sectione & purgatione antea dictum, iisque, ubi requiruntur, solis, sine topicis, non raro ophthalmia curatur. De reliquis, inprimis verum est, quod Celsus scripsit: Hæc sicut in recentibus malis aliena sunt; quia illa concitare possunt & accendere: sic in veteribus, quæ nullis aliis auxiliis cessant, adeo efficacia esse consueuerunt. Et quidem fomentationes suo tempore adhibitas prodesse, antea, suo loco, dictum.

De vino & balneo, quæ huius loci sunt, res non ita expedita videtur, cum humores concitare, & ad oculum mouere possint, ideoque in specie aliquid de iis dicendum. Et præcipuè hic difficultatem habere videtur, quod alexipharmacis præcipit Hippocrates, allegato aphorismo. Verum cum, ut rectè Galenus & Auicennas docent, alia ratione vinum prodesse vix possit, nisi quia sanguinem crassiorem attenuat ac dissipat: non, nisi in declinatione, vino vtendum, & ubi materia est crassior. Aliàs metuendum, ne major humorum fluxus ad oculos fiat. Ita de Petro Ramo scribit Zvingerus, in Theatro volum. 17. lib. 3. eum, cum Lutetii literis operam daret, ex immodicis vigiliis in Ophthalmiam incidisse. Quem cum Iacobus Syluius, summus alioquin Medicus, ex allegato aphorismo, vino generoso vri iussisset, ita creuit malum, ut vix eadem multis remediis extingui potuerit. Celsus adhuc alium vsum meri potus addit, scilicet ut somnum conciliet. Modum autem bibendi vinum idem Celsus definit, dum scribit: Vinum bibendum esse lenè, subausterum, modicè vetus, neque effusè, neque timidè, ut neque ex eo cruditas, & tamen somnus fiat, lenianturque intus latentia acria.

De Balneo autem idem Autores etiam non sentiunt. Alij enim in humoribus calidis & acris eo vtendum censent; alij in crassis & pituitosis; alij quidem in declinatione; alij fluente adhuc materiâ ad sistendum fluxionem. Verum in vtroque casu locum habere potest. Nam ubi à biliosa materia orta est Ophthalmia, si tamen in toto capite ea non redundet, sed corpus jam purgatum sit, nullaque adsit corporis plenitudo, & materia non ampliùs sit in fluxu, balneum euocatur.

An vinum in ophthalmia conueniat.

An balneum in ophthalmia vitale sit.



enocet & contemperat acres humores, & maximam partem inter lauandum excreta sistitur fluxio, reliquumque contemperatum à naturâ facilius vinci potest. Ita etiam balneum conuenit iis, quos phlegmone *ιδιματίζουσιν* ab humoribus minus calidis infestat. Corpore enim prius euacuato humores crassi per balneum attenuantur. Si verò corpus adhuc plenum sit, & materia ad oculos ruat, inueniendum, ne calore balnei fusa materia ad oculos magis fluat.

De curatione Ophthalmiæ videatur etiam Galenus, de compos. med. sec. loc. & in libris de medicamentis facili parabil. Celsus, lib. 6. cap. 6. Paulus Aegineta, lib. 3.

Hoc etiam adhuc addimus, Hieronymum Fabricium ab Aquapendente, de Chirurgicis operationibus, titul. de suffusione, cum animaduerteret, medicamenta, quæ oculis imponuntur, non tam diu oculis inhaerere, donec vires suas latius exserant, sed facile effluere, vascula vitrea instar cucurbitularum, orbitæ oculi respondentia, inuenisse, quæ liquore repleta oculo applicat, quorum descriptio loco allegato videatur. Verum an talia ita commodè & sine periculo applicari possint, penes Lectorem sit iudicium.

### CAPVT XIII.

#### De Ophthalmiâ sicca.

Ophthalmia  
seca.

Peculiaris adhuc lippitudinis species est, quam Ophthalmiam siccam appellant, in quâ non tantus est lachrymarum fluxus, vt in ophthalmiâ humidâ modò propositâ, & præterea etiam palpebræ afficiuntur. Ejus tres recensentur differentiæ. Est enim vel cum pruritu, vel sine pruritu. Quæ cum pruritu est, & exigua fluxionem salis & nitrosam conjunctam habet, à Paulo, lib. 3. cap. 22. *ἰσχυρὸν δαλμύα* nominatur, quæ diuersus est affectus ab illo, qui suprà, cap. 3. descriptus est, atque ipse etiam *ἰσχυρὸν δαλμύα* nominatur. Si verò sine vllâ sit fluxione, & oculi tantum sunt rubri, neque tument, sed cum dolore quodam leui in iis. quidam sentitur pruritus & grauitas, ab eodem *ἰσχυρὸν δαλμύα* dicitur. Quæ autem sine pruritu est, & cum duritie palpebræ, *τὴν ἰσχυρὸν δαλμύα*, dura lippitudo appellatur.

Proueniunt affectus hi omnes ab humore pauco, sed sicco & salso, nitroso. Et cognoscitur, atque ab ophthalmiâ humidâ discernitur hæc ophthalmia, quod lachrymæ ferè nullæ exstillant. Noctu palpebræ ita coagulantur & indurantur, vt humectantibus & mollientibus sint aperiendæ.

Affectus hi quidem non sunt tam periculosi & acuti, vt ophthalmia humida: diuturniores tamen, & qui toto vitæ tempore ægrotum quandoque infestant.

Curatio ferè eadem cum ophthalmiæ curatione modò proposita; nisi quod in specie ad humorem salsum dirigenda. Is igitur temperandus & alterandus, euacuandus, reuellendus, deriuandus, vt suprà, part. 1. dictum. Postea ad topica accedendum. Et quia durities & scabrities conjungitur, indurata emollienda, vt de duritie palpebrarum dictum.

℞. Endiua, nymph. lactuc. solan. flor. vior. rosar. rubr. an. M. i. rad. althæe Vnc. i. sem. fenigræc. Vnc. ii.

Destilletur inde aqua, quâ vespri & manè oculi abluantur. Vel decoctum ex hisce paratur, quod efficacius videtur. Neque enim, vt multi sibi persuadent, destillata omnes vires, quas decoctum, habent; cum multæ partes in destillatione in alembicum non cleuuntur.

Vel ℞. Butyri majalis sine sale, ol. rosar. an. Vnc. i. s. aloes Drach. ii. camphor. Drach. sem. lithargyr. auri & argenti, an. Drach. i.

Butyrum & oleum liquefiant, hinc addantur reliqua, & in mortario plumbeo misc. F. Vnguentum, quo vespri palpebræ illinantur. Manè sequente liquore abluantur.

℞. Aq. agrimon. rosar. lactis muliebris, an. Miscantur.

Vel ℞. Parietar. scabiose, viridium, an. M. iv.

Destilletur aqua, cui aliquid sanguinis columbini vel hirundinum addatur, quâ mane & vespri oculi abluantur.

Vel ℞. Farina tritici Vnc. ii. lentium, fabarum, an. Vnc. i. sem. terre sigillata Drach. ii. rad. sigill. Salomonis Drach. ii. camphor. Drach. i.

Puluerisata misceantur cum aq. cichorij. Fiat Cataplasma, quod noctu oculis imponatur.

### CAPVT XIV.

#### De Vngue Oculi.

Vnguis oculi, vulgo vngula, Græcis *πρόγιον*, tanquam ala parua, nomen accepit à similitudine siue vnguis humani, siue alæ volucris, quam excrescentia illa ab angulo oculi plerumque majore verius pupillam protensa refert; quam & sagittam nonnulli vocant, à specie quadam triangularis cuspidis sagittæ præfixæ. Germanis dicitur, *der Nagel oder Nagelfell der Augen, oder Blatterfell der Augen*.

Definitur hoc malum à Paulo & Celso, lib. 7. cap. 7. quod sit membranula nervosa & fibrosa, orta ab angulo oculi, frequentissimè majore, juxta nasum, rarius à minore juxta tempora, & adhuc rarius à superiore vel inferiore palpebra, teste Aëtio, annatæ tunicæ valide adhærescens, & vsque ad corneam producta, nonnunquam etiam ad pupillam vsque protensa. Rhasi simile quid est membranæ nervosæ; Aëtio annatæ tunicæ incrementum est, vel caro super hanc excrescens ex scabrâ quâdam lippitudine, aut ex assidujs ad oculum fluxionibus. Atque hoc differt ab eo, quod Arabes Sebel, vulgo pannum vocant, quod morbi genus substantia non est membranosa, sed venosa, hoc est, ex venis turgentibus quiddam complicatum, & quasi contextum pannum referens.

Affectus ipse est morbus in numero præter naturam aucto; quia additum est aliquid tunicis externis oculi, quod addi non debebat. Subiectum plerumque est oculi annata. Interdum tamen ita inualefcit, vt corneam & pupillam integat,

#### Causæ.

Causa efficiens est facultas *ὀφθαλμική* in oculorum angulis, quæ annatam ultra naturalem terminum auget & extendit, vel supra eam aliquid efformat. Occasio ita luxuriandi illi facultati datur, quoniam caro in angulo vel ophthalmiâ diuturniore, vel ob pustulas, quæ post variolas & morbillos, aut alias etiam in oculo ortæ fuerunt, vel post combustiones ac scintillas ignis oculo illapsas, vel alias externas læsiones, vel ob assiduam fluxionem crassi & lenti humoris, scabritiem seu inæqualitatem quandam assecuta est, quam dum vis nutrienda extere & æqualem reddere nititur, incrementum ejusdem præter naturam producit, aut aliquid supra eam generat.

Materia ex qua est sanguis cum excrementis humoribus plus aut minus mixtus. Atque hinc differentiæ existunt, quod vnguis alius durus est, alius molli; quidam coloris citrini, quidam fusci, quidam rubei. Alius facili separabilis ab annatâ & corneâ, alius difficulter. Quidam annatam tantum occupat, alius etiam ad corneam extenditur. Est & quidam putridus ac cancrifus.

#### Signa Diagnostica.

Signis malum non eget; cum oculis sit, expositum, vt

ex descriptione antea proposita facile agnosci possit. Malignus & cancrusus vnguis cognoscitur à carne, quæ excreuit, crassa, dura, eminente, nigricante, & tempora per consensum afficiente, vt docet Aëtius. Discernitur à carne lachrymali, quod radix vnguis semper ad albedinem magis declinat.

### Prognostica.

1. Malum hoc non contemnendum est; cum ingrauescens pupillæ obductum videndi aciem tollat.
2. Recens malum, & magnitudine mediocri, non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis exteruntur. Si verò inueterauerit, atque ei crassitudo quoque accesserit, excidi debet, teste Celso, lib. 7. cap. 7. Imò sæpe tam arctè & pertinaciter annata tunica adhæret, vt neque per chirurgiam absque oculi iactura auferri possit; & proinde magnum & inueteratum incurabile fit.
3. Facilius hoc malum curatur in iuuenibus, quam senibus.
4. Facilius curantur *πτερυγία* albicantia, & angustum fundum habentia; his verò contraria ægrè curantur.
5. Putrida quoque & cancrusa curationem non admittunt; quia cancer radices habet, quæ euelli nequeunt: teste Aëtio, *tetrab. 2. serm. 3. cap. 58.*
6. Ea *πτερυγία* manu curare oportet, quæ adaucta ad nigrum oculi se extendunt. Quæ verò parua, & in albo sunt, ea commodum est, vt pharmacis comprimamus. Aëtius, *ibid.*
7. Docet & hoc Aëtius; *πτερυγία*, in quo principium fit suffusionis, curandum non esse; quoniam eo sublato citius suffusio conflat.
8. *Πτερυγία*, quæ ad pupillam vsque pertingunt, & propterea visionem impediunt, si tollantur, oculum quidem à fluxionibus liberant, cicatrix autem, quæ sectione circa pupillam relinquitur, nihilominus visum impedit.

### Indicationes.

Membranosa hæc tunica, quæ præter naturam accreuit, remouenda est, siue medicamentis extergentibus, si parua & mollis sit, nec pertinaciter adhæreat; siue manus opera, si contrario modo sese habeat. Aut si ex mente Aëtij sit annata tunica incrementum, id inhibendum, & quod excreuit, imminuendum adstringentibus, exsiccantibus, & extergentibus.

### Curatio.

Primò ergo vniuersales corporis euacuationes instituuntur; idque non semel, sed bis vel ter, prout opus est. Et crassi & viscosi humores expurgationi præparentur, & reuulsiones per vesicantia & aliis modis instituuntur, vt hætenus aliquoties dictum. Vniuersalibus hisce præmissis primò foueatur vnguis vapore aquæ temperatè calidæ; aut decocto hordei, maluæ, althææ, flor. chamæmel. meliloci, semin. lini, fœnigræc. anethi, flor. cyani, quoad oculus calefiat.

Postea extergentia adhibenda. Inter quæ mitiora sunt, *saccharum candum*, *aqua euphrasia cum saccharo*, *aqua chelidon. cum melle*, *acetum album cum vino albo misctum*, *aqua feniculi cum nitro ac sale*, *thui puluerisatum cum aqua calida in formam collyrii redactum*, *sepia ossa vsta ac tenuissimè irita cum momento salis ammoniaci*, *cornu cerui vstum*, *vel caprinum cum iburo & vino lanigatum*, *vel caprinum cum succo artemisia ac melle*, *vel cinis limacum cum melle mixtus.*

Efficax quoque medicamentum, & ferè citra morsum ac dolorem extergens, ex ouorum testis paratur, dum ouorum testæ in aceto acerrimo macerantur, postea siccantur, & in subtilissimum puluerem redigun-

tur, qui oculis inspergitur. Validiora sunt *arustum*, *viridoli*, *aris squama*, *flos aris*, *chalcitis vsta*.

Incipiendum verò est à lenioribus, quæ sine morfu, ac dolore suum officium præstant, quæ si non sufficiant, ad validiora accedendum.

Vt *℞. Lactis muliebris, mellis part. æqual.* adde aliquid *croci*.

Coquantur, & frequenter oculo instillantur.

Vel instilletur hæc Aqua:

*℞. Aq. chelidon. Vnc. v. aluminis, ceruss. an. Drach. i. camphor. gr. vii.*

Coquantur in vitro clauso in Balneo, & coquantur.

Vel *℞. Aceti rosar. Vnc. iiii. aq. rosar. Vnc. v. viridoli albi an. Drach. ii. mandibul. lucij combustarum, tutia prepar. an. Drach. sem. i. ariari Scrup. i.*

In vitro clauso coqu. in Balneo, & colentur, & bis de die liquor oculis instilletur.

Vel *℞. Aq. rosar. euphrag. an. Vnc. i. sem. acetii albi Vnc. i. tutia prepar. Drach. i. sem. squamma aris Drach. β.*

Ebulliant simul vase clauso, colentur, & filtrentur.

Ver *℞. Aq. plantagin. centumnodia, an. Vnc. ii. viridoli calcinati Drach. i. salis ammoniaci Drach. sem. myrrha Drach. i.*

Ebulliant, colentur, & filtrentur.

Vel *℞. Fellis luciorum piscium q. v.*

Destilla in vitro ad crassitiem. In liquore destillato solue parum camphoræ, & vsui serua. Fel verò incrassatum extrahe cum spirit. vini, spiritumque vini iterum per destillationem separa. Extracti huius & sacchari *℞. ana gr. j.* dissolue in prunis liquoris gut. iiii. ac cum pluma manè & vesperi oculis immitte.

In contumaciore malo, antequam ad manus operam accedatur, aliquod sieff validum conuenit, quale est sieff viride Rhasis, aut quod de chalcanto ex ejusdem descriptione paratur.

In vsu tamen acrium collyriorum obseruandum, ne cornea tangatur; cum ejusmodi collyria vim exulcerandi habeant. Itaque expedit, vehementibus extergentibus admiscere aliquid de tragacantha, gummi Arabico, decocto fœnigræc. lacte muliebri, albumine oui. Non inutile quoque fuerit, temporibus repellens aliquod applicare, ad affluxum humorum inhibendum. Oculis quoque clausis anodynum aliquod adhibere conuenit. Post dies aliquot dolore sedato ad collyriorum vsu redire licet.

Si medicamentis malum non cedit, ad manus operam accedendum, & membranæ illius detractio tentanda, quam eleganter docet Celsus, lib. 7. cap. 7. Paulus Aegineta, lib. 6. cap. 18. Aëtius, *tetrabibl. 2. serm. 3. cap. 60.* Hieronymus Fabritius ab Aquapend. *de operat. Chirurg. tit. de vngue oculorum.* Modi administrationis illius tres præcipuè sunt. Primò separando vnguem cum penna, & post abscindendo cum forcipe. Secundò vnguem eleuando, & acum subtrus cum pilo equino aut filo serico ducendo, vnguemque sic protractum, excidendo. Tertiò abradendo scalpello, si vnguis planè tenuis sit.

Postquam Chirurgica hæc tentata sunt, opera danda est primò, ne annata tunica palpebræ concrescar: quam ad rem Aëtius probat muriam acrem vel aquam fassam, quam in oculum infundit. Auicennas cuminum masticatum cum sale applicat, jubetque ægrum frequenter oculos mouere, nisi dolor prohibear. Potest & aqua aliqua leniter extergens modò proposita instillari. Secundò, vt caueatur inflammatio, quod præstari potest albumine oui cum haplo lini imposito. Tertiò, vt portio vnguis à ferro relicta extirpetur, ne malum denuò succrescat. Cui scopo inseruiunt collyria acria, modò proposita, post tres dies applicata, ne, si citius vsurpentur, inflammationem pariant.

*Dieta.*

*Curatio.*

*Ouorum testa ad oculorum vnguem.*

*Diaeta.*

Victus sit attenuans & incidens. Ager à vino abstinere vsque ad morbi declinationem, à cibis itidem vaporosis.

CAPVT XV.

*De Tunica annata, quam vulgo Pannum, Arabes Sebel nominant.*

Sebel oculi.

**A**ffectio hæc, Auicenna definiente, Panniculus est vel, vt Rhazes definit, quiddam instar panniculi ex repletionē venarum ortum, apparentium in superficie tunice annatæ vel corneæ oculi; quæ venæ cum tãquam exilia capillamenta variè & propinquè inter se contextæ sint, turgentes sanguine, speciem eiusmodi panniculi exhibent; vnde etiam à nonnullis Tela, vel Telaris excreſcentia nōminatur. Verisimile quoque est, aliquid sanguinis subtilis ex venulis illis exſudare, quod concretum speciem illam panniculi rarioris, seu telæ intextæ supra oculum euidentiorē reddat. Imò carnis ipsius tunicarum oculi tumor accedere potest. Ex quo, vt capite præcedenti dictum est, patet differentia ab vngue oculi, quæ excreſcentia quædam est neruea seu membranosa citra venarum repletionem, ab angulo oculi enata, non totum oculum, sed partem eius, forma vnguis vel sagittæ cooperiens; cum Sebel, seu Pannus totam annatam cooperiat.

*Differentia.*

Differentiæ eius sunt, quod pannus vel mollior est, vel durior; recens vel inueteratus; simplex vel cum ophthalmia, scabie, vlcere oculorum coniunctus,

*Causa.*

Gignitur Tunica alia secundum viam defluxus, materiâ ad oculos deriuatâ per venas & arterias siue externas frontis ac temporum, siue internas capitis: alia secundum viam congestionis materiæ paulatim factæ in ipsis oculi venis, ex nutrimento non bene conuerso, & retentis superfluitatibus.

Sæpe tunica hæc ad ophthalmiâ, & variolas ac morbillos, oculorum ictus, contusiones, combustiones sequitur. Malum hoc interdum hæreditarium est, & facilius eo corripuntur, qui oculos habent debiles, calidos, eminentes, atque aliàs ad ophthalmiam proni sūt.

Materia est sanguis vel solus, vel cū aliis humoribus mixtus. Ceteri humores sine sanguine causâ huius mali esse nequeunt; cum rubrum colorem non producant.

*Signa Diagnostica.*

Affectus hic per se manifestus est. Apparet enim panniculus ex repletionē vasorum rubeus, tanquam tela carnosâ, in superficie annatæ præcipuè; adest pruritus & dolor ex acrimonia & distensione; calor ex retentione euaporationis ac fuliginis: oculi offendentur à lumine & à contactu rei externæ siue frigidæ, siue calidæ: visio obscura est, vel ablata. Quod ad signa causarum, an à sanguine solo sit, vel cum aliis humoribus mixto, è colore discernitur. Si materia fluxit per vasa externa, supercilia & frons nonnihil tument, & dolor ac pulsatio extra magis sentiuntur. Si per interna, dolor magis ad radices oculorum tendit.

*Prognostica.*

1. Recens hæc affectio medicamentis, inueterata tantum manus opera curatur.

*Dan. Sennerii Tom. I I.*

2. Malum indicium est, si oculus imminuitur. Debitatem enim oculi significat.

*Curatio.*

Curatio, quæ per vniuersalia fit, comunis huic affectioni est cum ophthalmia & pterygio. Quod ad topica, si Sebel vel Tunica recens sit & tenuis, Auicenas testam oui recentis infundit in aceto calido decem diebus, & postea exsiccatam in vmbra, atque in tenuissimum puluerem redactam oculo immittit, ad abstergendum & exsiccandum. Addit & Marcasitam lapidem qui Dioscoridi est Pyrites. Si Sebel & scabrities simul coniungantur, laudat collyrium ex sumach puluerisato, cui quandoque admiscet parum gummi Arabici & sarcocollæ, vt dolor mitigetur, medicamentumque parti affectæ affigatur. Fortius est æs vstum in vrina aliquot diebus maceratum & siccaturum.

Vtilis est & hæc Aqua:

℥. Sacch. cand. 3. iij. lapid. hemalit. præp. 3. j. alum. vsti, vitrioli albi, camphor. an. 3. B. tartari Drach. ij. Af-funde aq. rosar. fanicul. aceti vini an. Vnc. ix.

Destillantur, vel potius coquantur & colentur.

Vel Aq. chelidon. Vnc. jv. aluminis vsti 3. ij. pumice Drach. j.

In vase vitreo clauso coquantur & colentur.

Vel ℥. Mastich. Vnc. sem. ceruss. alum. vsti, Drach. ij. spuma maris gr. xv. salis gemma gr. vij.

F. Puluis.

Vel ℥. Turia preparata Drach. iij. margarit. præp. corallior. rubr. præp. pompholyg. an. 3. ij. sacchari candi 3. j. B. camphor. zingib. an. Scr. j.

F. Puluis subtilissimus.

In malo inueterato, & vbi hæc non sufficiunt, euacuo corpore & capite, ad chirurgica præsidia accedendū est; quod rectissime fit tēpore verno & autūnali. Emol-litio verò quædam præcedat, eo modo, vt de Pterygio dictum. Postea vncino paruo argenteo venulæ eleuentur: & subiecta acu, cui filum sericeum innexum sit, ligentur, vt forcipe tenellâ præcidi possint. Quo facto oculus à sanguine profuso mundenr aqua decoctionis cumini, & obligetur. Dolorem vitellus oui cum aqua rosarum impositus mitigabit. Vrile quoque est defensiuâ siue apocrustica applicare fronti & temporibus, ne materia propter dolorem ad oculum attrahatur.

Ad absumendas reliquias puluerem citrinum Rhasis, cap. 15. de Ophthalmia, propositum, vel si eff viride Rhasis, c. 21. de vngue, applicare licet. Sed tutius est thus puluerisatum in aqua faniculi infusum apponere, vel sarcocollam nutritam.

Vel ℥. Aq. flor. cyani 3. vj. thuris, sarcocoll. an. 3. ij. castor. aloës, an. 3. j. camphor. 3. B.

Indantur vitro, eoque bene clauso in aqua calida ebulliant. Liquor singulis diebus bis vel ter oculis instilletur.

Fortior est hic Liquor:

℥. Aq. chelidon. 3. viij. testarū 3. vel ouor. vstar. sarcocollæ, aloës, an. 3. j. turia, vitrioli albi, sacchar. candi, an. 3. B.

In vitro clauso coquantur in balneo & colentur.

Commendatur tanquam expertum & hoc Collyrium:

℥. Lapid. hemarit. 3. ij. vitrioli albi, viridis aris, an. 3. iij. myrrh. croci, an. 3. j. piper. long. 3. B. sacch. candi Vnc. sem.

Tenuissime pulueriscentur & cribrentur, ac in pixide ad vsum seruentur.

Huius pulueris. ℥. Drach. j. dissoluatur in Vnc. ij. aqu. raphani, & applicetur quotidie bis aut ter, prout æger tolerare potest.

Forestus, l. 1. obseru. 6. hoc feliciter vsus est in iuvene quodam, qui fere integro anno ex panno cæcus fuerat:

A A a

℥. Succis

*℞. Succini fœnic. Vnc. iij. chelidon. ℥. iij. ruta ℥. ii. malua ℥. iij. aloës ℥. j. vitrioli ℥. ii. eruginis eris ℥. i. zingiber. cinamomi, an. ℥. ℞. fell. anguilla ℥. ℞. bubuli ℥. ii. sacchar. candi ℥. ij. mellis opt. ℥. ℞.*

Ebulliant succi addendo reliqua, & depurentur, ac fiat Collyrium.

### Diata.

Diata sit, qualis in ophthalmia & affectione præcedente proposita est. Aërem lucidum æger vitet, atque omnia, quæ materiam augere & exagitare possunt.

## CAPVT XVI.

### De Albugine & aliis vitiosis Cornea Coloribus.

*Cornea enim  
est visus.*

**C**ornea oculi tunica nō saltem, vt humores & spiritus oculi cōtineat, & ab externis iniuriis defendat, facta est, sed etiam peculiarem constitutionem obtrinet, videlicet perspicua, coloris expers lævisque facta, vt speciebus visibilibus liberum in oculum transitum concedat.

Quæ eius naturalis constitutio vitatur, si eius substantia crassecat, exsicceat, & corrugetur; si perspicuitatem amittat; si colore aliquo inficiatur. Si enim corrugetur & crassecat, ac naturalem perspicuitatem amittat, species visibiles vel planè non admittit, vel obscure. Si verò colore alieno inficiatur, is species transeuntes inficit, atque ita eo colore res visui offeruntur, quali cornea infecta est, eodem modo, sicuti vbi quis per vitrum coloratum videret. Vulgò quidem ista vitia inter symptomata qualitatum mutatarum referuntur: quæ tamen omnino ad morbos referenda sunt, ob causas, quas in Institution. lib. 2. part. 1. cap. 6. de colore Corneæ attulimus. Si quoque color alienus profundè hanc tunicam tingat, speciebus visibilibus transitus denegatur, quia corneæ pelluciditas amittitur. Quandoque etiam cornea rumpitur.

### CORNEÆ CRASSITIES.

Primò ergo substantia corneæ fit crassior ob humores crassos, qui sese in eam insinuant, & ob medicamentorum frigidorum usum; quod fit post Ophthalmiam, in qua humores subtiliores & tenuiores discutiuntur, crassi remanent; vel cum medicamenta frigida nimis incautè imponuntur. Corrugatur verò & exsicceat præcipuè in senibus. Et in utroque hoc malo visus vel imminuitur, vel planè aboletur, prout causæ magnitudo est.

### Signa Diagnostica.

Cognoscuntur autem hæc vitia primò ipso ferè aspectu; quia si crassior reddita sit oculi hæc tunica, inspicienti quasi quædam in superficie nebula apparet, nec oculi hæc tunica tam lævis & polita apparet, vt solet, ægri de visus imminutione conqueruntur, & quasi per fumum se videre dicunt, præcessit Ophthalmia, adest ætas senilis.

### Prognostica.

Si malum sit ex humoribus crassis impactis, idque recens adhuc, curari potest; si verò diuturnum sit, & ex vehementi frigidorum usu, vix curatur. Corrugatio etiam & obscuritas ob ætatem senilem non curatur.

### Curatio.

Curationem quod attinet, vniuersalibus præmissis, & corpore & capite euacuato, radix chelidonie spiritu vini abluatur, postea contundatur, & succus exprimat, qui guttatim oculis instilletur. Oculum etiam extergit tartarum vini Maluatici, aut potius cremor eiusdem oculis inspersus.

### COLORES CORNEÆ VITIOSI.

Colores corneæ præter naturam non omnes eiusdem sunt generis. Primò sunt λευκώματα in genere ita dicta, color scilicet in albo mutatus, qui vel ab humore corneæ impactato oritur, & Nubecula appellari solet, ægrique omnia per nebulam seu vaporem vel fumum se videre putant; vel à cicatrice in cornea, quod malum in specie λευκωμα nominatur.

Est enim Leucoma seu Albugo macula alba in cornea, ob quam visio læditur.

Gignitur autem Albugo, dum post vulnus vel vlcus corneæ cicatrix manet, quæ in nigro oculi alba apparet, à qua cornea ita densa redditur, vt speciebus visibilibus transitus denegetur, atque ita videndi actio impediatur: vel cum pituita inter corneam collecta eius perspicuitatem tollit, visumque impedit. Quibus tamè adhuc alia causa addi posse videtur. Cum enim diaphana, vt vitrum, glacies, gemma, si findantur, pelluciditatem sine humoris affusione amittant: tale quid etiam corneæ accidere potest, si scilicet eius lamina ictu, percussione, punctura findantur, & ita cornea inæqualis fiat. Arque ita proxima Albuginis causa est cicatrix in oculi cornea tunica vel pituita inter eius lamina collecta, & corneæ inæqualitas à quacunque causa inducta.

Differentiæ albuginis sunt, quod alia magis, alia minus crassa est. Paulus Aegineta ratione subiecti distinguit, vt alia cicatrices in superficie oculi consistent, quæ simpliciter λευκα nominantur, & νεφέλια, aut Albugo tenuis; alia in profundo, quæ λευκώματα, seu albugo crassa dicuntur.

### Signa Diagnostica.

Malum hoc patet oculis, & præcessit vulnus vel vlcus, è quo albugo hæc seu cicatrix enata est. Si vlcus non præcessit, à pituita in cornea collecta est. Si ictus vel violentia aliqua accedit, in illam causam referenda. Quæ autem cicatrices corneæ crassiores sunt, & magis albicant, visumque magis offendunt; contra, quæ minus crassæ. Præterea magis albicant, quæ in superficie sunt; quæ autem profundæ, ad nigredinem declinant; quoniam vterque tunica sunt propiores.

### Prognostica.

1. Vitium hoc vix prorsus tolli potest. Nam arduum est, in tam nobili membro, tam exquisito sensu prædito, cicatricem exterere; præsertim quæ diutior crassior, diuturnior, & magis profunda est. Itaque sæpe polliceri aliud non licet, quàm coloris pertineturam mutationem.

2. Diuturnas ac crassas albugines curare non oportet; cum acris & mordacia medicamenta requirant, quæ oculi non ferunt. Si verò etiam suffusio aut glaucedo affuerit, vanum est, cicatrices exterere; teste Aëtio.

3. Facilius curatur hoc malum in pueris, quorum corpora molliora sunt, & vim medicamentorum promptius admittunt; difficilius in siccis adultorum corporibus.

4. Vnde Albugo & cicatrices in oculo, quæ interdum post variolas in pueris remanent, successu temporis delentur, ne visioni obsint,

5. Facilius curatur Albugo, quæ à pituita in corneæ laminis collecta est, quàm quæ à cicatrice provenit.

*Indicationes.*



*Indicationes.*

Cum in albugine, quæ à cicatrice est, adsit corneæ durities & crassities; tunicam illam eâ parte emolliendi & attenuandi indicatio existit, vriterum perspicua reddatur. Pituita, si quæ adsit, discutienda est.

*Curatio.*

Premiis euacuationibus & diuersionibus topica hic potissimum locum habent, quibus cicatricem extergendi vis inest. Sint illa leuiora, non aciora, nec corrodentia, ne fluxione concitata vlcus denuo excitetur, à quo sanata cicatrix alia crassior remaneret.

*Emolliens  
cicatricem.*

Ad humectationem igitur & emolliationem cicatricis Rhales probat vaporem aquæ dulcis calidæ, aut decoctionis fœnigræci, maluæ, althææ, flor. chamæmeli, paleæ hordei vel auenæ repentis oculis exceptum, vsque ad faciei rubedinem, vt antea de vngue oculi dictum.

Vel ℥. Rad. althææ ʒ. j. b. maluæ, chelidon. maioris, euphrag. an. M. j. flor. melilot. cyani, an. M. b. sem. lini, fœnigræci. an. ʒ. b.

*Abstergia.*

Coqu. in aqua pura, & vapor calide oculis excipiat. Post vaporem conueniunt medicamenta, quæ leniter abstergunt, vt sacch. candi album in aqua euphragiæ dissolutum. Vel extingatur thus in aqua fœniculi aliquoties, & aqua oculis instilletur. Aërius lac equinum commendat cum modico melle assidue illitum. Nonnulli suadent, vt oculus lingua pueri vel puellæ, quæ prius fœniculum aut rutam masticauerit, lambatur. Vtilis est & anagallidis cætul. flore succus, cum melle rosaceo inprimis mixtus.

Deinde vt cicatrix amplius exteratur & abstergatur, adhibeatur succus centaurij minoris, chelidonis, agrimon. anemon. fœniculi, rutæ, calendulæ. Inprimis vero coumedatur aqua flor. rorismarini, si prius in balneo vel fimo equino aliquot diebus digerantur, & postea destillentur vel si 40. diebus digerantur, & aqua seu liquor, in quem flores resoluuntur, vsurpetur, & oculis instilletur.

Vel ℥. Buryri aqua euphrag. loti Vnc. j. tutia preparat. Drach. j. M.

Vel ℥. Aqu. flor. cyani Vnc. iij. thuris, sarcocolla, an. ʒ. iij. tragacanth. castor. aloës corall. prepar. camphor. an. ʒ. b.

Coquantur in vitro clauso, colentur, & vsui seruentur. Vel ℥. Succ. anagallidis cætul. ʒ. b. chelidon. ʒ. iij. fœnicul. ʒ. iij. mell. ros. ʒ. j. M.

Vel ℥. Succini centaurij minor. fœniculi, an. ʒ. iij. mell. rosar. ʒ. b. matris perlarum prepar. CC. preparat. an. Scr. j. alumin. calcinati Scr. b. Misce.

Validiora fiant ex felle animalium, videl. galli antiqui, perdicis, anseris, bouis, leporis, accipitris, miluij, anguillæ, lucij piscis, cum aqua fœnicul. vel modico melle mixto, vel stercore hirundinis.

Vt ℥. Succiruta ʒ. iij. fœnicul. ʒ. iij. fell. lucij piscis ʒ. iij. off. sepia vsti ʒ. b. sacch. candi ʒ. j. Misce.

Vel ℥. Stercor. hirundin. in puluerem redacti q. l. mellis & aq. euphrag. an. q. s. F. Collyrium.

Ad validiora abstergentia pertinet & alumen calcinatum, aloë, myrrha, æs vstum.

Nonnulli forma puluer. hæc medicamenta adhibet quæ Auicennas parat ex sarcocolla, spuma maris, aristoloch. rotund. & saccharo albo. Pulueres tamen diu in oculo non sunt detinendi, cum ferè semper dolorem excitent.

Vt: ℥. Tutia prepar. corallor. rubror. prepar. sapphir. prepar. an. ʒ. b. margarit. prepar. ʒ. b. camph. virrioli albi, an. gr. v. F. Puluis subtilissimus.

Vel ℥. C. C. vsti ʒ. j. off. sepia, sarcocoll. lot. an. ʒ. b. aristoloch. ʒ. j. sacchar. candi. ʒ. iij. F. Puluis.

Vel ℥. Tutia prepar. Drach. j. matris perlar. prepar. Dan. Sennerti Tom. II.

Drach. sem. sarcocolla Scrup. sem. Misce.

Vel ℥. Rad. irid. Floren. ʒ. j. punice. off. sepia. an. ʒ. b. sarcocoll. corallor. rubr. prepar. an. Scr. j. sacchar. candi ʒ. j. mesch. gr. ij. F. Puluis.

Vel ℥. Off. sepia, sarcocoll. aristoloch. rot. myrrha, spum. maris, sacchar. an. Drach. ij.

F. Puluis subtiliss. qui super albugine oculo clauso derineatur, & postea oculus aqua rosarum abluatur.

Efficacissimum quoque est collyrium à Rhase, cap. proprio descriptum.

Vel ℥. Succ. depurati fœniculi, ruta, anagall. flore cætul. chelidon. maj. an. ʒ. iij. tutia prepar. squamm. aris. lot. aloës, ʒ. b. mell. rosar. colat. Vnc. j. Parum coqu. colentur, & vsui seruentur.

Commendantur à nonnullis & lapides, qui in renibus & vesicis animalium inueniuntur, combusti & lori. Aqua quoque mellis destillata efficax est, cuius vsus per integrum mensem continuandum censet Gentilis, & hinc vtendum isto Collyrio:

℥. Aq. rosar. fœnicul. an. ʒ. iij. ʒ. pulueris ar. ʒ. j.

M. & per filtrum colentur, Quidam sem. ocymi tritum oculo immisum valde laudant.

Efficacissimus etiam hic est liquor ex hepate mustelæ piscis collectus; de quo in Institutionibus, l. 5. part. 1. sect. 1. c. 4. vt & medicamentum è felle lucij paratum, de quo supra, c. 14. dictum. Dum verò extra applicatur, simul exhiberi potest puluis cardui minoris pratensis.

Si autem, quod sæpe fieri solet, Albugo planè aboleri nequeat, & tamen à Medico petatur, vt color ille p. n. ac deformitas tollatur, ac color albus in nigrum mutetur, adhibendus in eam rem succus mali punici dulcis; succus item hyoscyami, qui 15. diebus illitus albuginem tollit, teste Aëtio, terrabibl. 2. serm. 3. c. 40.

*Albuginem  
oculi colorat.*

Vel ℥. Balust. acacia, gummi Arabici, an. Drach. j. antimon. gallar. an. Drach. iij.

Coqu. & decoctum sapiens in oculum instilletur.

Reliquos verò colores quod attinet, in iis (nisi perspicuitatem corneæ tollant, eamque opacam reddant) potius vsus deprauari, quàm imminui vel aboleri solet, speciesque visibiles eo colore infectæ visioni offeruntur, quali humor est præditus. Si sanguis effundatur in corneam, omnia rubea apparent; si flaua bilis, flaua id quod in ictericis fieri ex Galeno vulgò traditur.

*An ictericis  
visus deprauatur.*

Verum rectè Mercurialis monet, hoc non esse perpetuum, & se plurimos curasse, sed paucos vidisse, qui huiusmodi aliquid passi sint. Curauit ipse etiam plurimos ictericos, sed nunquam id obseruare potui. Etenim cum in corneam tunicam, vtpote quæ perspicua & coloris expers esse debuit, vasa non ita dispergantur, bilis quoque, quæ sanguini permixta est, in eam vix effundi potest. Si tamen color flauus in eâ, vel etiam annatâ oculi tunicâ appareat, vapor aceti in regulam ignitam infusi oculis excipiat. Rubor tollitur sanguine columbino, turturis, vel hirundinum instillaro.

CAPVT XVII.

*De Pustulis Annata & Cornea.*

**A**Nnatæ & Corneæ tunice communia vitia sunt, Pustula annata & cornea, vlcera, cancer, vulnera. Primò pustulas quod attinet, in cornea & annata tunica oriuntur pustulæ, quæ Græcis φλύκταινες & φλυκταινές, à φλύξ, id est, feruendo & bulliendo dicuntur. φλύκταινες enim propriè sunt vesicæ parvæ, aquâ plenæ, in quacunque corporis parte, similes, bullis aquæ feruentis, vel vesicis, quæ à combustione aquæ feruentis excitantur. Arabibus Bothor nominantur. Suntque tumores quidam parui, grani milij circiter magnitudine, siue in annata, siue in cornea tunica existentes, orti ab acri quodam aut seroso humore, tunicas distendente, & in tumorem eiusmodi attollente.

Morbus est in magnitudine aucta; simulque in interie. & soluta unitate, offendens visionem, si è regione pupillæ consistit. Subiectum est annata oculi tunica vel cornea, & hæc quidem parte sua vel superficiali, vel profunda. Nam Aëtius & Auicennas Corneæ laminas siue membranas quatuor constituunt, & ita nunc inter primam & secundam, nunc inter secundam & tertiam, nunc inter tertiam & quartam laminam materia continetur.

### Causa.

Causa, ut dictum est humor tenuis, acris, & serosus in annata vel cornea tunica collectus, eamque distendens. Aëtius quoque sanguinem admittit. Et omnino pustulæ corneæ & annatæ eisdem ferè causas habent, à quibus ophthalmia prouenit. Cum enim utraque tunica sit densa, materia aquosa & serosa sub ea facile colligi & detineri potest.

### Signa Diagnostica.

Pustulæ illæ visu facile dignoscuntur. Apparent enim in annata vel cornea oculi tunica tubercula quadam parua, grani milij magnitudine. Et quæ pustulæ in annata seu alba oculi tunica oriuntur, rubrum ferè colorem præferunt. Quæ autem in cornea, varium, prout in superficie vel profundiore loco corneæ consistunt. Quando pustulæ in superficie corneæ sub prima eius lamina consistunt, nigriores sunt; quæ sub secunda aut tertia, albæ magis apparent; cum color corneæ albus magis in conspectum se prodatur, si pustulæ in loco profundiore hæreant, quam si in superficie. Auicennas à conspectu vucæ in superficiali pustula colorem nigrum; à prohibito eiusdem in profundo intuitu, album vult produci, qui albus color est pustulæ in cornea exquisitæ ab aquoso vel seroso solum humore, sine sanguine admisto, productæ.

*Pustularum in cornea color.*

Cum autem pustulæ corneæ superficiales non parua sit similitudo cum vucæ procidentia; Aëtius, *terræ 2. ferm. 3. cap. 29.* ita eas discernere docet: Pustula in superficie corneæ vndiquaque nigra est, etsi nigredo non sit adeò intenſa; vucæ autem pars, quæ procidit, aut nigra, aut cærulea est, & in fundo circulum album exhibet, qui à labiis corneæ erosus est. In pustulis corneæ cornea exactè rotunda manet, & suam naturam figuram retinet: in vucæ autem procidentia pupilla minor redditur, nec figuram naturalem planè retinet, sed parte quadam sui veluti diuisa apparet, aut figuram & situm planè immutatum ostendit.

Materia etiam discernitur à doloris qualitate & magnitudine; pustularum colore, ægri temperatura, habitu & similibus.

### Prognostica.

1. Pustulæ in innata seu alba oculi tunica minus periculosa sunt, quam in cornea.
2. Superficialiæ pustulæ curatio faciliior est, vel minus periculosa; cum eâ rupta & exesa humor aqueus non profluat, aut vucæ tunica procidat. Quæ verò profundior, periculosior est; cum totam corneam facile erodere possit, ut ea exesa humor albugineus profluat & vucæ procidat.
3. Et præcipuè si iuxta pupillam sunt pustulæ, periculosa sunt; quia obducta cicatrice visus aboletur.
4. Si cornea in partem internam rumpatur, malum est immedicabile.
5. Si dolor & pulsatio & cætera accidentia in pustula paulò post remittant, spes est, fore, ut pustula per viam resolutionis terminetur. Si verò symptomata illa interdantur, suspicandum est, illam tendere ad suppurationem. Nam solent pustulæ istæ, si rumpantur, sæpe in vlcus mutari.

### Indicationes.

Materia in pustula collecta tota euacuanda est, & suppuratio, atque exulceratio, quâ fieri potest, prohibenda; præsertim si pustula sit cum inflammatione, ideoque danda opera, ut materia discutatur & resoluitur.

### Curatio.

Quod vniuersales euacuationes & renuſiones attinet, eodem modo illæ perficiuntur, ut in ophthalmia. Topica ab iisdem etiam non multum variant. Itaque in pustula cum inflammatione, qualis annatam potissimum occupat, conueniunt leniter discutientia, quibus & adstringentia nonnulla miscet Aëtius, ut in initio inflammationum fieri solet.

Commendat ergo albumen oui & luteum oui cum sacchar, & pauxillo croci.

Ex adstringentibus probat mala cydonia cocta, aut malicorium in aqua decoctum. Vel mucilag sem. psyllij aut cydoniorum extracta cum aqua rosar. oculis instil- letur.

Vel 2℥ *Lycij, croci, an. Drach. β. acacia* Scrup. j. *aqua rosar. Vnc. i. vel album, oui & aqu. rosar. an. Vnc. β. Misce.*

Vel poma cydonia cocta cum pauxillo vnguenti rosacei M.

Possuntque ista medicamenta in linteolis mollibus extendi, & toti oculo imponi.

Progressu temporis reoluentia augeantur, ut mucilag. sem. fœnigræc. aut decoctum flor. chamæmel. meliloti, sem. lini, fœnigræc.

Post hæc medicamentum ex thure, myrrha, croco, cū succo fœnigræci prodest, quo vtendum est. donec pustula discutatur, vel, si per reoluentia eam discuti posse spes non sit, donec pustula rumpatur, saniesque in linteis oculo imposito appareat.

Vel 2℥ *Meliloti verben. ruta, chelidon. an. M. j. flor. rosar. rubr. M. sem.*

Destilletur inde aqua, quæ oculis imponatur & instilletur.

In pustulis corneæ ex humore aquoso Auicennas exsiccantibus vtitur, ut terræ Samia torrefacta, turia, clymia, quæ cadmia natiua est, siue lapis calaminar. 3. i. atque aliis, è quibus tale Collyrium paratur:

℥. *Turia præpar. lapid. calaminar. scorie aris lot. an. 3. β. gummi Arab. 3. β.*

Terantur in aq. calida, & F. Collyrium. Huius 3. β. cum aq. fœnigræc. Drach. vi. excipiat, quando opus fuerit.

Chymici commendant saccharum n. & oleum n. quod in aq. euphragiæ dissolunt;

Vt ℥. *Aq. rosar. 3. i. β. euphragiæ 3. i. sacchari n. gr. xv. turia præpar. Scr. sem. Misce.*

Nonnulli commendant pinguedinem aſciæ piscis.

Quod si pustula ita incrementum sumpserit, ut medicamentis discuti non possit, acu argentea perforanda est, ut humor effluat; quod in pustula superficiali sine periculo fieri potest, in profundiore verò cautione opus est.

Dizta eadem est, quæ in ophthalmia.

Peculiaris pustula in annata tunica nuper in docto quodam viro à me animaduersa est, quæ in eo quidem conueniebat cum aliis pustulis, quod similis erat velicis, quæ à combustione aquæ feruentis excitantur, sed magnitudine discrepat. Primum quidè cū ea vesperi conspicienda mihi exhiberetur, in sinistri oculi externo angulo magnitudine semè cæna- bis æquabat, sed vnica nocte ita incrementū sumebat, ut dimidiâ auellanam æquaret, & ad corneam ferè excederet. Cum autem, vir ille sanguine bilioso abundaret, mox venam aperui, & purgans exhibui, & primum hūc Liquorem linteis mollibus toti oculo imposui.

℥. *Muci*

*℞. Mucilag. sem. psylli, cydonior. fœnigraci, aqu. ros. extr. an. 3. ij. aqu. rosar. 3. j. ss. flor. sambuci 3. B. croci Scr. B. Misce.*

Quo applicato subsidere cœpit pustula, Postea hunc Liquorem oculo instillaui,

*℞. Aq. rosar. 3. j. B. euphrag. 3. B. tutia prapar. sicc. albi s. opio, an. Scrup. j. vitrioli albi gr. ii. Misce.*

Atque ita infra paucos dies pustula euauit.

## CAPUT XVIII.

### De Vlcerebus Annata & Cornea.

**V**Lcera, quæ in annata vel cornea tunica excitantur, ortum habent vel à causâ externa, vt ictu, percussione, medicamentis acerbis, iis, quæ in oculos illapsa sunt; vel ab internis, vt humoribus mordacibus siue naturâ tales sint, vt bilis vtraque, siue putredine tales euaserint, vt humores quicunque. Materia illa vel aliunde confuit ad oculum; in annatam potissimum à vasis externis; in corneam ab internis; vel relicta in oculo est, siue ab ophthalmia præcedente, siue à pustula. Nam ad Ophthalmiam sæpe vlcera sequi solent, humore mordace per emplasticorum vsum intempestiuum cohibito; vt & post variolas & combustiones.

### Differentia.

Vlcera autem illa variis nominibus pro variis circumstantiis appellatur, vt Paulus Aegineta, lib. 3. c. 32. docet. Quod enim cauum, angustum, durum est, *βόρριον*, hoc est, fossula, dicitur; quod latius, sed minus profundum, *κείωμα*: quod in iridis circulo externo exortum ambientia etiam comprehendit, variique coloris est, circa externam iridis partem rubicundum apparet, circa internam candidum, Græcis *ἀργύρον*, ab albedine, vt videtur, dicitur; nonnulli vlcus coronale appellant. Quod denique profundum, solidius, asperum, & quasi crustosum est, *ἐπίφυμα* & *ἐργύμα* vocant. Auicennas lib. 3. sen. 3. tract. 2. cap. 3. septem differentias enumerat: quatuor superficiarias, & tres profundas, quæ saltem ratione magnitudinis, & quod vlcus aliud latius, aliud angustius, aliud superficiarium, aliud profundum est, discernuntur.

### Signa Diagnostica.

Subiectum, figura, & magnitudo vlcis in oculo visui ferè patet. Si vlcus in cornea consistat, præcessit pustula alba, & in præsentia vlcusculum album apparet in nigro oculi; cum ob proprium corneæ colorem album, quod *σαφές* eius terminatum album apparet, tû ob saniam albam sub cornea collectam. Si exulcerata sit tunica annata, punctum veluti rubicundum in albo oculi conspicitur, ob venas eius tunicæ sanguine repletas.

### Prognostica.

1. Vlcus corneæ tunicæ periculosius est, quàm annatæ, quod tamen ipsû etiâ in adultis ægerimè sanatur; & corneæ vlcus, quod è regione pupillæ consistit, adhuc periculosius est: quia post vlcus sanatum relinquatur cicatrix opaca, quæ visionem lædit; aut si rumpatur tota tunica, sit effluxus humoris aquei, aut viciæ procidentia. Imò Platerus refert, se vidisse aliquando quatrduo post inflammationem oculi in vlcus conuersam ex utroque oculo humorem crystallinum effluxisse & in barba hæsisse. Sed credibile est, non solum externas illas oculi tunicas, sed totum ferè oculum tum inflammatum fuisse.

Dan. Sennertii Tom. I I.

2. Vlcus, quod foras rumpitur non ita periculosum est, quàm quod intro rumpitur; quoniam externa omnia tractari commodius possunt.

### Indicationes.

Vt aliarum partium vlcera, ita etiam vlcus in oculo indicat, solutam vnitatem vniendam; si quid imminutum, id regenerandum, & locum cicatrice claudendum esse. Hæc vt præstari à natura queant, (naturæ enim opus est, non artis, partem aliquam regenerare, conglutinare, & consolidare) Medici officium est, impedimenta actionis illius naturæ remouere. Materia igitur fluens ad oculum est diuertenda & euacuanda; lordes detergenda; dolor, si adsit, mitigandus; natia oculi temperies restituenda & conseruanda. Atque ita, vt aliarum partium, ita & oculorum vlcera, in primis requirunt detergentia & exsiccantia. Quantû tamen ad materiam medicamentorum, non parum ab aliorum vlcum medicamentis medicamenta in oculorum vlcerebus differunt, ob differentiam naturæ ipsius partis. Cum enim oculus sit exquisito sensu præditus, ob *εὐαισθησία* illam medicamenta sint lenia & temperata, sine asperitate & mordacitate, cuiusmodi sunt, quæ primum in hac qualitate gradum non excedunt. Quæ si simul adstrictione careant, detergendo quoque procederunt. Sordidis tamen vlcerebus paulò valentiora adhibeantur, teste Galeno, 4. de compos. medic. secund. loc. cap. 3.

### Curatio.

Vniuersalia igitur, de quibus in ophthalmia diximus, præmittenda, simulque medicamenta fronti & temporibus applicanda, quæ influxum humorum prohibeant ex aqua rosarum, plantag. bolo Armeno, sanguine draconis, acacia, albumine oui, & similibus. Hinc topica conuenientia oculo imponenda. Et quidem si vlcus cum inflammatione adhuc sit coniunctum, ea conueniunt, quæ in ophthalmia sunt proposita. Cataplasma ex ouo integro cum rosaceo & vino repidum, lana exceptum, sicut album: Sequentibus diebus fomenta fiant ex rosis, meliloto, fœnigræco, quibus nonnunquam semen papau. addere licet. Non minus enim doloris, quàm inflammationis, habenda ratio. Ideoque etiam dolorem lenientia admittenda, quæ infra, cap. 23. de dolore oculorum proponuntur. Admittenda etiam ea, quæ aliquantulum detergant & siccant, qualia sunt, sacchar. mel, crocus, myrrha, & collyria de olibano; quorum multæ reperiuntur descriptiones à Galenio, 4. de compos. medic. sec. loc. Paulo Aegineta, Aëtio, & Alexandro propositæ. In vfu tamen frequentior est siccif de thure Rhasis, quod ad Almanforem describitur, paraturque ex Ammoniâ, sarcocolla, ana Drach. v. thuris Drach. x. croci Drach. ii. quæ oculo excipiuntur mucilag. fœnigræc. atque in collyrii formam rediguntur.

Vtilis etiâ est aqua è fragorum partibus tribus, sacchari parte vna, vbi prius per octiduum in B. digesta, & postea destillata fuerint. Efficacius mundat myrrha, tutia, & tandem marrubium.

Vbi autem vlcus solum est, nec ei inflammatio vel dolor coniunctus, sed saltem illud duplex excrementum tollendum; tunc præcipuè desiccare decet, cum aliqua deterfione, quæ maior vel minor esse debet, prout maior vel minor sordium copia. Talia sunt; tutia præpar. corallium, aloë, sarcocolla, quæ commodissimè in nodulo è linteo raro in aqua euphragiæ, vel alia conueniente infunduntur, nodulusque postea exprimitur. Purgant etiam vlcus hydromel, & syrupus de rosis siccis.

Vbi vlcus mundatum fuerit, adhibendum siccif de plumbo Rhasis, primò in lacte muliebri, deinde cum aqua

aqua conueniente vsurpatum. Veile est & saccharum ac oleum hni. Cicatricem etiam efficaciter inducit sieff album Rhafis, Eleiſter vocatum.

Vel ſequens ex Thure:

℞. *Thuris* Drach. x. *gummi Ammoniacy*, *sarcocolla*, an. 3. *℞. croci* 3. ii. Cum ſucco ſanigraci F. l. a. Collyrium.

Vel ſequens de Plumbo:

℞. *l. lumbi uſti* & *lori, aris uſti*, tutia prepar. *gummi tragacanth.* an. Drach. j. Cum aq. *euphragia*.

F. Collyrium.

Vel ℞. *Corallior. rubr. prepar. C. C. uſti prepar.* an. 3. *j. ceruſſa lota* 3. b. & *crudi* 3. b.

Cum melle roſaceo,

F. Linimentum.

Pertinet huc etiam Aqua ophthalmica, cuius Crollius mentionem facit, & hoc modo paratur.

℞. *Succum chelidoniae* & *folia uerno tempore collectum*, cuiusque bonam quantitatem in B. digere, donec depuretur.

Deinde ℞. *Menſe Junio*, ☉ & ☿ in cancro coniunctis, (aliq. malum in plenilunio) *Cancror. num. xx.* & reſectis extremis pedum & caudarum durioribus cruſtis, conſunde in mortario, ut ſuccus inde exprimi poſſit, quem cum ſucco chelidoniae depurato coniunctū deſtilla ex Balneo.

Quod ſi de vix procidentia metuatur, ſtatim albumen oui cum globulo ex ſtuppa cannabina, vel lana aqua roſarum madida applicetur.

Habetque Rhafes, cap. proprio, quatuor collyria, quæ in vlcibus oculorum, ſi quodque ſuo tempore applicetur, magnæ ſunt efficaciz. Collyrium primum de thure ad maturationem & abſterſionem eſt compoſitū. Mollit enim & maturat, quæ diſcuti nequunt, ſieff ſecundum de plumbo generat carnem & vlcus explet. ſieff tertium carnem perditam inſtaurat, vix exitum prohibet, & cicatricem extenuat. ſieff quartum fortius adſtringit & glutinat, ac in primis veile eſt, cum meruitur, ne poſt vlcus magnum vicia procidat.

#### Diaeta.

Diaeta ex ſuperioribus de Ophthalmia ſatis patet. Hoc ſaltem de decubitu notandum, ut æger in principio iaceat ſuper latere ſano, ne maior affluxus humorū ad oculum fiat. Suppurato autem iam vlcere & rupto, ſuper latere affecto æger cubet, ut facilius & promptius ſanies eſſuat. Si tamen vlcus magnum, ſit, ut ruptura corneæ & effuſio humoris aquei metuenda ſit, ſupinum decumbere præſtat.

### CAPVT XIX.

#### De Cancro Corneæ.

Interdum in cornea tunica etiam Cancer exoritur, ex materia melancholica aucta corruptione. Nō multum diſſimile malum eſt, quod Græcis *αγρία* dicitur, vlcus ſcilicet *αγρία* in cornea tunica, quandoque etiam in palpebra, quandoque in vtraque.

#### Cauſæ.

Cauſa huius mali eſt atra bilis, ſequiturque hoc malum diuturnas ophthalmias, quarum cauſæ atra bilis permiſta eſt, & mulieribus, quibus menſes ſubſiſtunt, accidit.

#### Signa Diagnostica.

Cognoſcitur hoc malum, quod vlcuſcula nigra parua, dolorifica, cicatricem non admittentia, venas liuidas exiguas varicoſas habentia apparent. Percipitur dolor,

qui partibus vicinis communicatur, & vſque ad tempora extenditur, humorque paucus, tenuis & acris eſt. Dolor ad acriorum medicamentorum vſum valde exaceratur, appetitus deſicitur.

#### Prognosticum.

Malum hoc plerumque, & ſere ſemper incurabile eſt, ac in vicinas partes ſerpit, ægrumque viſu priuat, & tandem mortem affert.

#### Curatio.

Eſt verò malum ſere incurabile ſit: tamen, ne æger omni auxilio deſtituatur, mitigatio quædam eius & palliatio, ut loquuntur, tentanda eſt. Bilis atra videlicet euacuanda eſt epithymo, polypodio, lapide Lazuli. Eiusdem acrimonia & malignitas temperanda, quem in finem etiam lac exhibetur. Oculo imponitur & inſtilletur aqua mellis croco mixta, addito albumine oui; de quo videatur Acrius, *terribil. 2. ſerm. 3. cap. 3. 1.* Exemplum caneratae excrescentiæ ad pilæ quantitatem, & medicamenta ad eius mitigationem adhibita, deſcripſit Forſtius, *lib. 1. 2. obſeru. 1. 2.*

Interdum caneroſi tales tumores totum oculum corrumpunt, qui non, niſi exciſione & extirpatione, curari poſſunt; cuius rei hiftoriam notat dignam habet Guiljelmus Fabricius, *Centur. 1. obſeru. 1.*

### CAPVT XX.

#### De Vulneribus Oculorum.

SI cornea vel annata vulnerata ſit, primò, ſi opus, *Vulnera oculi.* Seuacuandum eſt totum corpus per phlebotomiam vel purgationem, prout vſus poſtulat. Et in primis venæ ſectio neceſſaria in magnis oculorum vulneribus; cum vix aliud efficacius inſit ad auxilium. Purgantia præcipue bilem, vſurpanda, ut & medicamenta bilem alterantia, refrigerantia, & caput reſpicientia; cum bilis aliorum humorum ſit ad caput vehiculum. Statim verò ipſi oculo repellentia adhibeantur ex albumine oui bene conquaſſato cum aqua roſar. cui pauillum boli Armeni addi poteſt. ſequentibus diebus albumen oui cum ſieff albo miſceatur.

Vel ℞. *Album ouor. ij.*

Conquaſſentur cum aqua, *tormentil. roſar. an.* Vnc. j. adde *alumin. croci, an.* Scr. j. Miſce.

Eadem repellentia temporibus & fronti imponenda Ad inflammationem prohibendam, & dolorem leniendum, cataplaſma ex meliloto, capitiſbus papaneris, croco, & pane imponi poteſt. In cataplaſmatis tamen adhibendis animaduertendum, ne oculus eorum pondere oneretur. Ideoque ſolum ſuper palpebram imponenda, ut oculus aperiri, & lachrymæ & ſordes eſſuere poſſint. Leniter quoque oculis detergendus, ne dolor inferatur. Poſtea addatur collyrio albo ſieff de plumbo, ſemper eius quantitatem augendo, donec ſolo hoc ad vlcus carne implendum vti tempus ſit.

Vel ℞. *Ceruſſ. amyli, an.* Drach. ii. *thuris* 3. j. *℞. sarcocolla, tragacanth. an.* 3. j. *camphora* 3. b.

Infundantur in aq. roſar. hinc vaſe clauſo in Balneo coquantur & colentur. Colatura vſui ſeruetur.

Vel ℞. *Gummi Arabic. aqua roſar. diſſol. 3. iii.* *cremoris rad. conſolid. maior. 3. j. b.* *pulueris ſubtilis thuris, aloes lota, an.* 3. i.

Vel ℞. *Sieff. alb. Rhafis ſopio 3. i. b.* *aq. roſar. 3. i. b.* *alumin. ouor. 3. ii.* *tutia præp. 3. b.*

M. in mortario marmoreo vel plumbeo.

Post diē ſeptimū magis ſiccantia & detergentia cōueniunt, quæ faciunt, ne caro craſſa, ſed tenuis generetur.

Vel

Aqua Oph-  
thalmica  
Crollii.

Cancer cor-  
neæ.



Vel ꝑ. Myrrh. sarcocoll. lacte nutrita, an. Drach. ꝑ. tutia  
prepar. Drach. i. mell. rosar. q. ꝑ. F. Linimentum.

Valde commendatur & hoc:

ꝑ. Bol. armeni Vnc. i. tutia, sang. dracon. gummi Arab.  
an Vnc. ꝑ. aq. rosar. lb. j.

In vitro clauso bulliant in B.M. vel vaporoso per ho-  
ram. Postea adde succi mali Punici Vnc. i. & colentur.  
Colatura ter & quater in oculum instilletur.

Vel ꝑ. Mell. opi. Vnc. ii. succi ros. rubr. Vnc. iiii. succin.  
Drach. lb. viridis aris Dra. j.

Digerantur in Balneo, & colentur, ac liquoris huius  
gutta ii. oculo, sæpe instillentur Eidem liquori addi po-  
test mucilago sem. fanigræc. & vitellus oui vnus, &  
cataplasmatibus loco oculo imponi. Ab Eustachio Rudio  
ad oculorum vulnera valde commendatur pars illa al-  
buminis oui, quam gallaturam vocant; de quo videat-  
ur infra, cap. 23.

Commendatur etiam hic aqua Ophthalmica Crol-  
lij, supra, cap. 18. descripta; & altera, quæ fit ex albu-  
mine ouotum ad duritiem coctorum in Balneo li-  
quefcente.

Commendatur & oleum rubrum Hni.

Tandem, vt cicatrice vulnus claudatur, siess Rhafis,  
Eleifer, ex vsu erit.

Si cum oculi globo etiam palpebra vulnerata sit, ca-  
uendum, ne palpebræ cum oculo agglutinentur. Ideo-  
que oculus interdum circumuoluendus si id commodè  
fieri possit, & oculo duplicatum vel triplicatum auri fo-  
lium, vel subtilissima auri lamina imponenda.

De mira suc-  
ci in vesica  
vulnorum  
colli, ad  
vulnora ocu-  
lorum sanan-  
da, vi.  
Historia  
Etm. ab  
Hær.

[Henricus ab Heer, Medicus Leodiensis, obseru. op-  
pid. rarar. 4. refert, se cum Lithuano quodam aliquando  
iter fecisse, qui ab omnibus Medicis, agyrtis, vetulis, ve-  
nificis, Chymicis, in totâ, quam obierat, Europâ & Asia,  
secreta (vt vocabat) plurima collegerat, atque cum gal-  
lum gallinaceum sibi obrulisse, & iussisse, vt oculum  
gelli sæpius acutissimo scalpello punctum, intèrque di-  
gitos pressum, orbitæ oculi reponeret. Quod ubi fecis-  
set, affudisse Lithuanum illum guttas duas liquoris, qui  
mense Maio in vesica vlni reperitur, obligatumque ca-  
pite gallum cistæ inclusisse, & post horas octo eduxisse,  
utroque oculo ita sibi simili, vt sectum oculum nullus à  
sano posset distinguere. Hoc quamuis pro ludicro, &  
foran magico, habuit Hær: ab Heer, accidit tamen  
postea, vt puella acui fortè fortuna ita oculum læderet,  
vt humor Aqueus, & pars vitrei efflueret. Tunc ergo  
hunc ipsum liquorem, vulneribus sanandis aliàs vri-  
lem, sub quartam pomeridianam applicauit, & sub me-  
diam noctem linteum admorum, si ficcaretur, eodem  
nouo liquore imbui iussit. Manè (testatur Deum & fi-  
dem) oculum externum sanum offendit, sed visu priua-  
tum, ita quidem, vt vigesimo post anno nullus excaca-  
tum oculum à vidente discernere poruerit, imò illa  
multis annis cum marito eius rei incio vixerit.]

## CAPVT XXI.

### De ruptura Corneæ.

Ruptura  
Corneæ.

Interdum vulnera tam altè penetrant, & vlcerâ tam  
profunda sunt, vt corneam tunicam totam erodant, in-  
terdum & ab aliis causis cornea rumpitur, ita vt hu-  
mor aqueus effluat, & interdum ipsa tunica vnea pro-  
cidat, de quo postea.

Causa videlicet rupturæ corneæ est vel interna, præ-  
cedens scilicet vlcus, aut magnus humorum affluxus, à  
quo oculus ita distenditur, vt medius creper, & humo-  
res effundantur; cuius rei historiam annotauit Am-  
brosius Paracelsus, lib. 6. cap. 13. vel externa, vt punctura  
aut vulnus.

### Signa Diagnostica.

Malum ipsum visui patet, præsertim si humor aqueus  
effluat, vel vnea procidat.

### Prognostica.

Malum hoc quò maius est, eò periculosius est. Si enim  
tantum sit, vt vnea procidat, plerumque malum incu-  
rabile est, vt postea dicitur, cum non facile sit, vneam pro-  
lapsum intèr reponere. Si verò vulnus sit angustum, mi-  
nus periculi habet. Et si enim humor aqueus effluat, &  
inde vitus aboleatur: tamen aqueus humor rege-  
neratur, quo instaurato vitus etiam restituitur. Hu-  
ius rei exemplum habet Galenus, 4. de sympt.  
causs. cap. 2. & Langius, libr. 1. Epistola 7. Anto-  
nius Beniuenius, de abdit. morb. caus. lib. 2. cap. 28.  
Coiter, in obseru. Chirurg. Atque ipse etiam tale exem-  
plum obseruauit in puero, qui, cum culpeide cultri ocu-  
lum læsisset, vt humor aqueus efflueret, & cornea inde  
tunica nonnihil corrugaretur, vitum illius oculi amisit:  
quem tamen paulatim humore aqueo restituto iterum  
recuperauit.

### Curatio.

Cum vulnus partium solutarum vnionem indicet,  
nulla alia cura rupturæ corneæ erit, quam vulnorum &  
vlcerum oculorum. Instilletur videlicet in vulnus pene-  
trans corneam vel annatam oui albumen cum tutia  
præparata mixtum. Et, vt vnea procidentia præcauea-  
tur, oculo fomentum imponatur ex adstringentibus si-  
ne asperitate, vt floribus rosar. foliis rubi, virgæ pastoris,  
polygon. coctis in vino adstringente, aut, si calor adsit,  
in aqua pura.

Vel cataplasma imponatur ex flor. rosar. & cydo-  
nis in vino adstringente coctis cum acaciæ Scrup. ij. &  
croci Scrup. sem.

Valentiora sunt hypocystis, balaustia, gallæ im-  
maturæ.

Vel tale Collyrium paratur:

ꝑ. Aloes lotæ, tutia prepar. sarcocoll. an. Scrup. sem. spi-  
ca, croci, sacchar. Hni, an. gr. v. ꝑ. j. Scrup. j.

Cum mucilag. tragacanth. & fanigr. F. Collyrium.

Alij hoc commendant:

ꝑ. Aq. consolid. Vnc. iiii. gummi Arab. shuris an. Dra. j.  
oculor. cancri Dra. lb. balaust. Scr. i. M. super igne & co-  
lentur. Colatura oculo instilletur.

## CAPVT XXII.

### De Sugillatione Oculorum.

Quam Sugillationem oculi, vel maculam eiusdem <sup>Sugillatio</sup>  
rubeam appellant, Auicennæ Altarfari est, Græcis <sup>oculorum.</sup>  
ὑπόσφαισμα, ὑπόσφαισις αἵματός ἐστι, & αἵμαλω. Galeno etiam  
ὑπόσφαισμα, nonnullis ὑπόσφαιον vocatur per α & i scri-  
ptum, quod alij tamen de faciei potius & partium ca-  
uarum sub oculis, quæ ὑπόσφαισμα Hippocrati sunt,  
cruenta ex ictu vel lapsu suffusione exponunt.

Est igitur hoc malum ex genere τῶν ἐκχυμωμάτων, teste  
Galeno, inisio 5. de comp. med. s. l. quæ sunt, quando cir-  
ca cutem vasculis contusis aut ruptis sanguis in spatia cir-  
cumiacentia effunditur, & quidem non acuatim aut  
ex grandioribus venis per διαίρεσιν & ἀνασφαισιν exit, sed  
lentè per διαίρεσιν, vel ἀνασφαισιν è minoribus, transu-  
sationis specie, ubi & progressu temporis liuescit &  
denigratur. Ita sugillatio oculi est sanguinis ex ictu vel  
lapsu, ruptis aut contusis, vel alio modo apertis, in ocu-  
lorum tunicis, annata vel cornea, in eadem effusio, co-  
lore primùm rubeo, postea liuido vel nigro, quem mor-  
tuum tum sanguinem appellant. Cui malo & hoc acci-  
dit, vt, si corneam magis occupet, obiecta omnia colo-  
rem

rem ad rubrum vergentem præ se ferant. Nam & ad corneam venula porriguntur, eâ parte, qua iridem spectat; & ex vicinis vasis sanguis in eam effundi potest. Et quidem sanguis ille interdum in annatam, interdum in corneam, interdum in utramque effunditur.

### Curatio.

Causa contusionis & ruptionis in his tunicis plerumque est externa, videlicet ictus aut plaga, aut clamor vehemens, vel tubarum inflatio, ob quam venæ tensæ aperiri possunt; nonnunquam etiam interna, vasorum scilicet repletio à sanguinis copia, ut effusio eius fiat, aut sanguinis ipsius feruor & acrimonia, ut per vasorum anastomosis ita excidat.

Differentia

Differentiæ huius mali sunt, quod suggillatio alia recens est, quæ rubro colore apparet; alia antiqua, quæ liuida, fusca, vel nigra. Sanguis enim extra vasa effusus, & proprio calore & spiritu destitutus, primò lineat, postea fit obscurus.

### Signa Diagnostica.

Malum hoc visu deprehenditur. Si à causa sit externa; ab agro id cognoscitur: si ab interna, abest externa. Et quidem à sanguinis copia color maculæ rubens erit; si à feruore sanguinis, ad citrinum verget. Et dum cornea suffusa est agris, quæ cernunt, rubra esse videntur.

### Prognostica.

1. Malum hoc non difficulter in initio curationem recipit; quoniam vitium vasorum in oculo exiguum est.
2. Sanguis extra vasa effusus tandem corrumpitur & nigrescit, ægerrimèque discutitur.

### Curatio.

Sanguis è vasis effusus discutiendus est. Ideoque si maior eius affluxus metuatur, venæ sectione & purgatione si opus, præmissa, principio parum de adstringentibus discutientibus permiscendum, ne sola discutientia plus sanguinis è vasis attrahant; qualia sunt, aqua fragorum, rosar. salic. caprifolij, plantaginis, myrtillorum.

Vbi autem effusio iam subsistit, & venæ ad suam naturam redierunt, sola discutientia conueniunt. Atque hæc ipsa inter initia, dum malum recens est, leniora esse debent; cum sanguis, qui effusus est, nondum conuersus sit in grumum, sicut hæc de re docet Galenus, 3. de compos. med. s. l. cap. 1.

In validiorum deinde usu caueatur, ne acrimoniâ suâ apertis venarum oculis sanguinem maiore copia proluciant.

Galenus ergo forum initio vsurpat ex decocto fœnigræci & meliloti. Deinde collyrium Nili, in 4. de compos. med. s. l. quod primum excipit aqua, ad inflammationem inhibendam, postea decocto meliloti & fœnigræci, ad sanguinem, qui effusus est, discutendum. Venis tandem per adstringentium usum clausis, samentum probat è solo fœnogræco, spongiam item infusam in melle, & collyr. è myrrhâ cum decocto fœnigræci.

In 4. de compos. med. s. l. cap. 8. statim in initio mali sanguinem columbinum, eum præsertim, qui ex teneris pennis exprimitur, (alij apertâ venâ sub ala sanguinem extrahunt) instillare iubet, tum ad inflammationem compescendam, tum ad sedandum dolorem; quo tempore & albumen oui probat. Postea ad vitellum oui accedit cum vino, & ad melilorum cum vino. Potest & columbarum sanguis tum adhiberi,

qui ob salem, qui ei inest, etiam vim discutientiæ habet. Vtilis etiam est sanguis palumborum, turturis, & hirundinis. Valet & lac muliebre calidè cum modico thure instillatum, & brassicæ folia cocta atque trita cataplasmatibus forma imposita, & caseus recens parum salis, qui mixtam habet facultatem, emplasticam quidem ex se ipso, discutientem verò, & nonnihil adstringentem ex sale, ut non absurdum sit eo in principio uti, teste Galeno, in initio 5. de compos. med. s. l.

Inueteratum malum & nigrescens fortiora remedia postulat, ut succum raphani, succum absinthij vel hyssopi, vel origani cum melle, myrrham, nitrum. Galenus ex Archigene hyssopi comam tritam, & linteo panniculo seu nodulo illigatam in feruentem aquam demittit, nodulumque postea oculo repidè admouet. Ita enim cruor elicitur ad eò, ut linteo adhæreat. Idque etiam verum esse, se expertum scribit Iohannes Riolanus. Commendatur & absinthium recens cum lacte muliebri & aqua rosar. cataplasmatibus forma impositum. Succum etiam radicis sigilli Salomonis, seu ex recenti radice, seu sicca vino macerata expressum, seu ipsam radicem continuam, suggillationes feliciter curare, supra diximus. In declinatione morbi etiam fel auium adhiberi potest, & fel vulturis inprimis, & fel arietis valde commendatur, ut & crocus, myrrha, aloë. Exempl. gr.

℥. Croci Drach. 8.

Teratur cum vini albi s. q. adde myrrhæ Dra. 18.

Iterum terantur, donec consistentiam linimenti acquirant; Cui add. mellis virginiei Drach. ij.

M. pro linimento, quod linteo inunctum oculo imponatur, & ter quotidie renouetur. Nonnulli simum columbinum in cinerem comburunt, quem cum aceto subigunt & exsiccant, ac rursum cum succo fœniculi, vel morsus gallinæ temperant & imponunt. Plurimum etiam commendatur Aqua fragorum viridis, quæ hoc modo paratur:

℥. Fraga benematura q. v.

Indantur pelui aurichalceæ vel cupreæ, ut ultra medium repleatur, adipergantur sale trito, & cooperta in cellam per octiduum collocentur, & appensio in patellam inclinatam filolaneo aqua viridis in subiectum vas recipiens colligatur; de quo liquore mane & vespere guttævna oculorum angulis instilletur. Auicennas in contumaci malo ascendit ad medicamentum ex vna parte sinapi, & duabus caricarum confecto. Laudant & nucem rancidam atque oleosam cum melle subactam, de qua aliquid in oculum immittunt, repetendo teris semper horis. Commendatur & aqua vitis, quæ vespere tempore ex palmitibus præcisus extillat. Ad antiquam suggillationem discutiendam utilis est & radix ariata, & cum melle subacta imposita.

## CAPVT XXIII.

### De Doloze Oculorum.

Cum morbos, qui duræ & corneæ tunicæ acciderent, iam absoluerimus, proximum est, ut symptomata, quæ in iisdem contingere solent, addamus; quæ sunt dolor & color vitiat. Verum cum de colore, cap. præced. & 18. dictum sit; hoc capite de dolore oculi tractabimus, qui etsi vulgo toti oculo tribuatur, ipsi tamen præcipue ob tunicas externas conuenit.

Est videlicet Dolor oculorum tristis eorum sensatio à solutione continui membranæ annaræ & corneæ. Causa solutionis continui est vel interna, vel externa. Interna est humor, vel copia vel acrimoniâ continuum soluens; quod plerique etiam referunt spiritum flatuosum. Externæ causæ variæ sunt, ictus & percussio, ventorum

Hyssopi s. eulæ.

Aqua fragorum viridis.

Oculorum dolor.

torum flatus, præsertim borealium, ærque nimis calidus, vel frigidus, pulvis, fumus, arenula, festuca, animalcula, vapor & succus cœpæ, alij, & simil. quæ causæ ple-  
ræque in ophthalmia sunt propolita; cum dolor ple-  
rumque ophthalmiæ sit symptoma.

*Signa Diagnostica.*

Et quidem ipse dolor ex relatione ægri patescit. Ex relatione eiusdem causæ externæ innotescunt. Causæ vero internæ iis signis, quæ supra de Ophthalmia fue-  
runt propolita, patentiunt.

*Prognosticum.*

Dolor oculorum acerbissimum malum est; cūque maioris affluxus sit causā, Ophthalmiam auget, & sæpe cæcitatē auctor est. Idem vigilias excitat, viresque valde deiecit.

*Curatio.*

Itaque etsi commodissimè tollatur dolor sublata causa, à qua pender, & proinde doloris oculorum eadem ferè curatio sit, quæ ophthalmiæ: quia tamen dolor sæpe viget; tum principali morbo nonnihil posthabito, aut certè antequam is planè tolli possit, statim, factā aliqua euacuatione & diuersione, de dolore mitigando cogitandum est; Adhibendum videlicet albumen oui exactè conuassatum: vel solum, vel cum aqua rosarum, aut lacte muliebri mixtum. Et imprimis pars illa albuminis, quam Itali Gallaturam, Germani *Das Ropchen* nominant, vsurpanda; quæ ex pluribus ouis colligen-  
da, vt eius sufficiens copia haberi possit, quam valde commendat Eustach Rudius, *Præf. lib. 1. c. 20. Admirabilissimum, inquit, tum in dolore, cum in vulneribus oculorum est remedium illa pars albuminis, quam Gallaturam vulgo appellant, qua debet exactè prius conuassari. Hoc remedium bonus quidam Practicus, qui eo solo omnia oculorum vulnera ferè curabat, Dei virtutem appellabat. Lac quoque muliebre vel asininum recens mulsu oculo instillari, vel, quod tutius, supra oculum imponi potest. Non diu tamen, vt supra etiam dictum, in oculo relin-  
quendum, sed singulis horis innouandum, ne morâ cor-  
rumpatur, acescat, acriusque enadat.*

Vtile est & pomum dulce maturum cum saccharo coctum & oculo applicatum.

Vel sumantur pomi dulcis affati Vnc. ß. camph. gr. xv. croci gr. v.

Et cum aqua rosarum & lacte fiat Cataplasma.

Prodest & mica panis albi in lacte muliebri infusa, addito momento decoctionis papaueris, vel emulsionis sem. papaueris: vitellus item oui cum lacte & aqua rosarum, vel ouum integrum cum aqua rosarum contu-  
sum. Et decoctum scæni-græci, quod Galenus parare docet, in *1. de med. facil. parab. cap. 10.* medicamentum item ex oui luteo, mica panis, & ol. rosaceo. Cauendum tamen, ne oleum oculos ingrediatur, quod dolorem auget.

Valentiora sunt, succus vel decoctum lactucæ, solani, rad. vel pomor. mandragoræ, capit. papau. albi, emul-  
sio sem. papau. albi, facta cum lacte muliebri, opium, sief album cum opio. Sed Auicennas opiatis non, nisi in acerbissimo dolore, vtendum censet, ex materia subtili & corrodeute, vbi syncope & virium extrema deiectio metuitur.

In quo tamen casu vsus talium moderandus est, quod visionem vehementer lædant, teste Galeno, *3. m. m. c. 2. & 1. 2. m. m. c. ult.* Et omnino præstat fluxionem ab oculis auertere per venæ sectionem, purgationem, & aliis modis; cum opiata sæpe sine istis auxiliis adhibita dolorem potius exasperare, quam lenire compertum sit: cuius rei exemplum refert Christophorus à Vega, *Art. med. lib. 3. sect. 2. cap. 1.*

CAPVT XXIV.

*De Pure sub Cornea.*

Cum pus sub cornea ante vream vel crystallinum colligitur, vt visus impediatur, Græcis appellatur *ὀφθαλμία* per o & v scriptum. Fit etiam aliquando, cum ab *Hypopyum* vlcere profundiore pus defluens, & inter runicas dela-  
tū in circuitu iridis figuram vnguis resecti refert, atque tum *ὀφθαλμία* vnguis nominatur: nonnulli à similitudine, quam habet, semicirculi, Lunellam nominant. Fit autem *ὀφθαλμία*, dum tumor sine cornea, siue vrea in abscessum degenerat, vt materia purulenta eo loco consistat. Actio non solum ex effuso & suppurato per inflammationem sanguine fit, sed etiam circa inflammationem & exul-  
cerationem, vbi dolor capitis, aut lippitudo, aut suggillatio præcessit. Si enim sanguis suppueretur, dolor exoritur, qui prius non aderat, & oculus quodammodo inflammatur, ac color sanguinis in albedinem mutatur.

*Signa Diagnostica.*

Si pus inter vream & corneam continetur, exactius illud conspicitur, & affectus oculus sano eminentior apparebit. Pus autem esse, cognoscitur ex præcedente inflammatione, lippitudine, aut suggillatione. Moto etiam & concusso capite aut oculo pus manifestè sub cornea simul commouebitur. Visus quoque solet intercepti, adestque dolor pulsatorius, & color oculi rubeus.

*Curatio.*

Indicatio curatiua est, pus euacuandum esse. Acrius igitur, *terrab. 2. sermon. 1. c. 28.* præmissis vniuersalibus collyriis vtitur ad inflammationes destinatis, in principio scilicet, cum materia ad pus tendit; quæ cum albumine oui aut lacti instillar. Exacto tertio die fomenta adhibet per spongiam vel linteam leniter discutientia. Quæ enim vehementer discutiunt, & exsiccant, quod tenuius est, euacuant, quod crassius, relinquunt & indur-  
rant, vt resolui deinceps nequeat. Iubet etiam vitæ ad-  
stringentia. Itaque probantur collyria ex melle, myrrha, croco, fellibus animalium cum succo scæni-græci, scæni-  
culi, fumariz; item collyrium album de thure. Commendatur quoque radix cucumeris asinini cum melle in cataplasmatibus formam redacta & imposita; vt & farina fabarum cum melle subacta. Vtilis est & nux rancida cum melle trita; vt & hyssopus & origanum. Efficax est etiam oleum de linteaminibus, quod & ad oculos exul-  
ceratos commendatur.

*℞. Linteam purum nouum & vitri pellucidi puluerisari q. s. F. s. s. in cucurbita ad dimidium eam replendo, & in cineribus destillentur. Oleum guttatim oculo instil-  
landum. Idem præstat oleum papyri, vt pote ex eadem materia factum.*

*℞. Croci, aloes, myrrh. an. Drach. i. vini Drach. iij. mellis Drach. vj.*

Dissoluatur crocus in vino, deinde cum aloë & myrrha misceantur, tandem mel addatur, de quibus in cura-  
tione suffusionis dicetur.

Vbi resoluera non suffecerint, alia præsidia tentan-  
da. Apud Galenum est, in *sine 14. m. m.* quod etiam Aë-  
tius repetit, Medicum quendam Romæ, Iustum, capitis concussionem pus loco suo dimouere solitum, ne visioni obesseret. Aëtius acu obliquè siue à latere immissa pus per puncturam corneæ educit, post albumen oui instil-  
lat, ac deinde ouum integrum cum vino emulso con-  
quassatum, & molli lana exceptum oculo imponit. Vi-  
de Aëtiū, loco allegato.

## CAPVT XXV.

## De Vuae procidentia.

Vua procidentia.

**P**ostquam corneæ & annaræ tunicæ affectiones p.n. explicauimus, iam vuae vitia explicanda veniunt. Inter quæ primò occurrit Vuae procidentia, quæ πρόπτωσης tunica προπίπτει vocatur (Nam alia πρόπτωσης totius oculi est, de qua postea dicitur.) Est autem situs præter naturam illius tunicæ à soluta vnitate corneæ proueniens. Soluitur continuitas vel per vulnera, vel per vlcera, vt antea dictum. Differentiæ siue species mali huius quatuor recensentur ex Ægineta, prout maior vel minor vuae portio procidit, & ruptura illa callum contraxit, vel non. Si enim parua vuae portio procidat, μισομήκης dicitur, quod formam capitis muscæ habeat: si verò maior portio excidat, vt acini vuae figuram referat, σαύλωμα: si maxima pars, & vsque ad palpebras excidat, ὤλον, id est, Pomum: si tandem callola facta fuerit, ἥλθ, id est, clauus, dicitur. Si vna cum vuae etiam portio quædam corneæ egrediatur, Auicennæ Orbicularis ruptura Corneæ vocatur. Estque similis extremis fusi, quo fila ducuntur, cui spondylus siue armilla sua est præfixa.

## Signa Diagnostica.

Vuae procidentia faciliè visu dignoscitur. Quomodo verò procidentia vuae à pustula superficiali corneæ differat, supra in signis pustularum oculi dictum. Nam pustula superficialis vndique nigra cernitur, & exactè rotunda est, nec pupilla diuulsa apparet, vt in vuae procidentia.

## Prognostica.

1. Hoc malum, testibus Græcis & Arabibus, ægrè admodum curatur; quia non faciliè est, vuae intro repellere, & ruptam corneam vnire.
2. Minus periculi est in ea procidentia, quæ μισομήκης dicitur, quàm in ea, quæ σαύλωμα, præsertim si non nihil sit inueterata. Cæteræ fere incurabiles sunt.

## Curatio.

Medicamenta hic locum habent adstringentia sine asperitate, qualiâ supra de Ruptura corneæ proposita. Quæ species Procidentia deteriores & inueterata medicamentis non cedunt, eas Paulus, Aëtius, & Celsus ferro tentandas esse censent, saltem ad imminuendam deformitatem. Quod quomodo commodè fieri debeat, docet Paulus, lib. 6. cap. 19. Aëtius, tetrabibl. 1. ferm. 3. cap. 35. Celsus, lib. 7. cap. 7. sub titulo de σαύλωματι οὐκὸς. Sed Auicennas metuit, ne materia ad sanum oculum feratur, præsertim si ille naturâ sit imbecillior, & exquisito sensu præditus. Ideo à ferro potius abstinendum censet. Vide Hieron. Fabric. ab Aquapendente, de operat. Chirurg. tit. de staphylomate. Refert etiam Riolanus, Pater, in Practic. sua, se vidisse intra oculum, palpitationem, quæ nullis remediis curari potuit: quæ procul dubio motus deprauatus vuae tunicæ fuit.

## CAPVT XXVI.

## De Pupillæ Dilatatione.

Pupilla dilatatio.

**A**lenus, 1. de Symptom. causis, cap. 2. pupillæ, quæ foramen vuae est, speciebus visibilibus transmittendis destinatum, quadruplex vitium recenset: eius

dilatationem, Imminutionem, in aliquam partem Detorsionem, & denique Ruptionem. Pupillæ dilatationem & angustiam quod attinet, debet pupilla seu foramen ita constitutum esse, vt non nimis sit amplum, ne externum lumen nimis copiosum admittat, nec etiam nimis angustum, vt species visibiles commodè admittat. Per pupillam verò nimis amplam lux peregrina, & quæ obiecta debita non vehit ingrediens; obliterat imagines, facitque, vt representatio debilior fiat. Ideoque à natura ita oculi fabricari, vt pupilla dilatari & constringi possit: & contractionis quidem duplex vsus est; prior, vt arceatur lumen superfluum ab oculi partibus interioribus, quas præstat esse obscuras, quàm nimis illuminatas. Sic enim imago rerum apparet illustrior. Alter, ne lux nimia oculum corrumpat, ratione illa, qua calor etiam intensissimus excitari potest vi refractionis ob coeuntes radios ad perpendicularem refractos in vno puncto, vt optici demonstrant. Dilaturatur contrà in loco obscuro pupilla, quia nullum adest lumen, quod species obliterare, vel euidentiam visionis infringere possit; deinde quia sic plures radij vnius puncti radiantis recipiuntur in oculum, qui quando in vertice coni coeunt, speciem reddunt illustriorem, quod, vt melius, natura semper appetit. Hoc loco tamen obseruandum, pupillam non solum constringi in loco illuminato, sed etiam in tenebricoso, si ex illo lucidum valde corpus adspiciatur. Nam, vt modò dictum, & species nimis lucidæ oculo noxiæ. Etsi verò aliter alij hac de re docent, & alij quidem foramen nimis angustum impedire exitum radiorum scribunt, ob amplum verò nimis dispergi radios putant: tamen falsa hac est opinio, quæ præsupponit, visionem fieri radiorum emissionem. Alij verò spiritu animali, qui ad oculum confluit, amplam pupillam minus commodè repleri posse existimant. Veruntamen commodior est sententia antea proposita, quæ pupillæ dilatationem & constrictionem visui obesse scribit, ob luminis externi maiorem vel minorem copiam, quæ pro augustiore vel ampliore pupillæ foramine maiore vel minore copia admittitur; qua de re in Institut. lib. 1. cap. 12. & lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 3. dictum.

Pupillæ autè dilatio, Græcis ἀνορία peculiariter dicitur, quasi ἀνορία, ab ἀνορία ὁράν, vt etymon faciunt, hoc est, à visione obscura. Pupillæ etiam dilatio semper visui incommodat, siue ab ortu sit contracta, siue post accesserit. Angustia pupillæ non semper, sed quæ naturalis est, potius ad acumen visus facit. Dicitur & pupillæ ἀνέκτος & ἀπαυκρία, ab ampliacione pupillæ. Morbus est in vitata conformatione, hoc est, in via siue meatu præter naturam dilatato, quando scilicet pupilla seu foramen illud, quo vuae tunica ad species visibiles admittendas donata est, ita præter naturam versus icidis circum ampliat, vt visio hac de causa lædatur. Fit enim tum imbecillior visio, atque æger etiam ex mediocri intervallo obiecta non exactè cognoscit. In clara etiam luce non satis acutè videt. Cuius rei causam quidem, vt modò dictum, nonnulli esse dicunt, quod amplius pupillæ spatium non ita impleatur à spiritu animali, prout opus erat, & quod spiritus animalis dispersus radios procul emitte nequeat. Sed malè hi præsupponunt, quod visio fiat spirituum emissionem. Causa verò huius rei est, quod externi luminis copia nimia in oculos per pupillæ foramen amplum admittitur, quæ visioni officit; vnde etiam, qui exactè aliquid inspicere volunt, oculis conuiuent. Errat verò hic quidam, qui multo lumine externo opus esse putat ad perceptionem minutissimarum specierum visibilium. Experientia enim contrarium docet, qua constat, ad perceptionem specierum in pariete obscuratæ camerae nullo planè opus esse externo lumine, excepto illo solo, quod species & colores per foramen deuehit, & in parietem itatuit. Lumen enim, vehiculum specierum, colorisque illustrati, radiant vt lux ipsa, vt ex opticis constat. Ergo externum



externum lumen multum, quod diluit imagines magnas in obscura camera, exiles imagunculas planè visui eripiet. Errandi autem causa hæc illi fuit, quod specierum visibilibus ab obiecto visibili reali radiantium representationem confundit cum specierum propagatarum ab obiecto, in quo intentionales & apparentes solum depictæ imagines, perceptione. Nemo enim in opticiis paullum versatus ignorat, literas in papyro existentes expressas realibus coloribus clariùs & euidentiùs cerni multo lumine præsentè, literarum autem imagines paruas in obscurata camera in papyro albo depictas eo obicuriùs, quò plus luminis cameram ingrediuntur clariùs, quò minus, videri.

#### Causæ.

Causa dilatationis pupillæ alia nativa est, ubi à primo ortu contractum est hoc malum; alia aduentitia: atque hæc vel interna, vel externa. Interna proxima Galeno, 1. de sympt. causis, cap. 2. est tensio vucæ tunicæ. Tenditur autem vucæ vel per se, ob intemperiem siccam, citra humoris aquei consumptionem, à vigiliis diuturnis, febribus, ac similibus exsiccantibus, non aliter, atque perforata coria, cum exsiccantur, patentiora foramina acquirunt; quo simili Auicennas rem declarat: vel per accidens, à subdito spiritu vel humore in modum vtris inflata aut distenta; quod & ab aqueo oculi humore supra modum aucto fieri posse docent. Auicennas etiam à tumore seu apostemate vucæ illam extendente. Aërio simpliciter est allapsus humorum, qui aut acervatim; aut paulatim ad oculum feruntur, & citra sensum vucam distendunt, ut pupilla dilaretur.

Externa causa est ictus aut casus ab alto, cuius vi vucæ tunica vel tenditur, vel planè rumpitur. Ad quas etiam referri potest anhelitus retentio in parturientibus, ut docet Auenzoar, lib. 2. tr. 8. cap. propr. quia in anhelitus illa retentione & enixu spiritus multi ad oculos conflunt, qui etiam humores & flatus ad oculos impellunt. Accidit hoc malum pueris magis propter tunicae debilitatem; iis quoque, qui magnos habent oculos.

Facere etiam potest ad amplitudinem vel angustiam pupillæ diuturna in loco lucido, vel opaco mora. Si quis enim diu in loco tenebricoso moretur, pupilla perpetuo dilatur, & in eo situ permanet, ut postea in lumine iterum contrahi nequeat.

Verum de siccitate, quam modò inter causas dilatationis pupillæ regulimus, inter autores controuersia est, & dubitatur, an illa pupillæ dilatationem inducere possit. Galenus equidem, loco allegato, hanc causam proponit: verum eam prætereunt Aërius, Aegineta, Actuarius. Et Rhases, 2. Contin. Galeni opinionem reicit: videturque ei ratio ad stipulati; siquidem siccitas potius videtur constringere & coarctare, quam dilatare. Verum notandum, vucam posse humectari & exsiccari vel ut pars similis est, vel ut organica. Humectatur ut pars similis, quando per totam substantiam ipsius tunica diffunditur humor; ut pars verò organica, quando meatus saltem & foramen vucæ repletur humore. Contra exsiccatur ut pars similis, quando tota substantia vucæ exsiccatur; ut pars verò organica, quando humiditas meatibus inclusa absorbitur. Itaque si vucæ tunica ut pars similis humectatur, fit pupilla angustior; quia tota vucæ substantia humectata, & in ampliorem molem extensa coarctat foramen vucæ; si verò humectetur ut pars organica, seu potius si meatus ille humoribus oppletur & distenditur, pupilla quoque dilatur: Sin exsiccatur ut pars organica, seu potius si humor in meatu absorbitur, ille in se concidit, & hinc foramen vucæ amplius redditur, sicut coria & alia corpora exsiccata dehiscere interdum videmus.

#### Differentia.

Differentiæ huius mali sunt, quod alia dilatatio

parua est, non multum excedens limites naturales; alia magna, ut iridis etiam circulum contingat: alia per idiomadiaz genita in oculo, alia per sympadiaz capitis ex vehementi eiusdem dolore, aut alia affectione.

#### Signa Diagnostica.

Malum hoc oculis intuentium patet; præcipue si Medicus antea oculos ægri inspexerit. Si verò, quæ latitudo pupillæ oculi sani fuerit, Medico notum non est, videndum, an visus simul cum latitudine pupillæ lædatur. Commune enim accidens est, quod minus acutè vident, & quòd visibilia grandiora apparent, sed indistinctè. Et si duo statuantur in vno loco luminoso, alter sanus, alter oculis æger, sani pupilla plus arctabitur, quàm ægri. Accedit, quod tales homines, cum aliquid intueri volunt, oculos non nihil comprimunt, & veluti conuident. Pro magnitudine autem dilatationis visus plus, vel minus offenditur. Præterea videndum, an vna saltem sit dilatata, an vtræque. Nam si vna saltem sit dilatata, certum est, eam affectionem morbosam esse: si verò vtræque pupilla sit ampla, alterius oculi pupilla consideranda. Si enim altero oculo clauso altera adhuc magis dilatur, amplitudo ea naturalis est: si verò non dilatur, est præternaturalis; quia iam præter naturam pupilla ita dilatata est, ut amplius dilatari non possit.

Causarum signa ex affectionibus præcedentibus haud difficulter cognoscuntur.

#### Prognostica.

1. Nativa pupillæ dilatatio incurabilis, teste Auicenna; aduentitia ægrè curatur. Nam conformationis vitium in hac parte ars corrigere non potest, & membranolum vucæ tunica corpus semel tentum induratur, ut non facile ad naturalem statum redeat, teste Aërio.

2. Dilatatio pupillæ ex siccitate orta difficulter admodum curatur; quæ verò ex humiditate, non ita difficulter. Galenus, 1. de sympt. causis, cap. 2.

3. Si post capitis dolorem vehementem magna sequatur pupillæ vique ad iridem dilatatio, exigua sanationis spes est, ob immodicam materiæ copiam.

4. Quæ à percussione oritur, incurabilis est, si vucæ sit lacerata. Curatio verò aggredienda, ubi solum vucæ tenditur ab humore subiecto.

#### Indicationes.

Quoniam pupilla ultra modum naturalem dilatata est, indicatur remedium foramen contrahens. Si autem à causa præsentè fouetur malum, eaque sit siccitas, humectandi oritur indicatio: si humor aut flatus tendens, is diuertendus & euacuandus est.

#### Curatio.

Græci & Arabes, dum malum ab humiditate est, & corpus plethoricum, venam secant in cubito; idque ideo, ut sanguis ad oculum confluent reuellatur. Postea etiam venas temporum, & venas in angulis oculorum, ad causam proximam deriuandam. Prosumt & cucurbitulæ in occipitio, & hirudines post aures applicatæ; frictions item deorsum factæ, & alia vniuersalia, quæ in affectibus oculorum adhiberi solent. Instituantur quoque purgatio humoris peccatis, si opus, ut hætenus dictum. Postea usurpentur materia illam resoluentia, & vucam leniter adstringentia. Resolunt aqua marina, in quam facies apertis oculis aliquandiu immittatur, aut, si marina desit, parum salis misceatur aquæ, aut posca aquosa usurpetur, iubente Aërio. Leniter adstringunt rosæ, nardus, crocus, pompholyx, spodium, item collyrium ex rosis, croco, corticibus thuris, acacia. Vel

Vel ℥. Rosar. rubr. siccat. Scrup. ii, croci, spica, cortic.  
thuris, an. Scr. ℥. i. ut. prepar. spodi, acacia, an. Scr. i.

In puluerem redacta ligentur in nodulo panni linei  
rari, & nodulus coniiciatur in *aqua rosar.* Vnc. iij.

Tempore vsus nodulus fortiter exprimatur; & aqua  
ista oculo instilletur.

Vel ℥. Gummi Arab. turia, sandaracha Arab. praga-  
cantb. an. ʒ. ii. boli Armen. ʒ. β. sem. lini, cydonior. croci, an.  
ʒ. i. succi granat. e toto ʒ. iβ. aq. rosar. lb. β.

Macerentur omnia in loco calido per noctem, postea  
ebulliant hora diuina & colentur.

Si à multis sit flaribus, vt rubicinibus nonnunquam accidit, illi discutiantur. Addenda adstringentia, quæ robur parti adiciant, vt si fofus fiat ex decocto fem. fœnicul. fol. rutæ, aneth. flor. rofar. cim. rubi, fol. myrti & hyperici, quæ decoquantur in aqua rofar. vel myrti, admixtâ vini albi parte quarta.

Si malum sit à siccitate, probantur humectantia, in quibus optimum est lac caprinum recens infusum in valculum oculo excipiendo idoneum, vt oculus aliquandiu in hoc derentus molliter foueatur.

Vbi à percussione ortum est malum, estque læsio non magna, atque abest inflammatio, facilis est curatio cum emplastro de farina fabarum, fol. plantag. fl. rosar. quod in principio ad repercutiendum valet; postea cum emplastro de farina fabarum Rhasis, quod magis resolvit. Ratione verò materiæ, quæ fluxit, Auicennas sanguinem turturis vel columbarum in oculum instillat, ac tandem ad dissipandum collyrio è myrrha & fellibus utitur. Si cum vulnere sit & ruptura vuez, non curatur. Maior tamen affluxus prohiberi potest venæ sectione, materiæ derivatione ac repulsione, & denique oculi roboratione,

CAPVT XXVII.

*De Angustia Pupilla.*

*Angustia  
Papilla.*

**D**iminutio vel constrictio pupillæ, Græcis *μύωσις*,  
vel vt Galenus, 10. *de usu part. c. 5.* nominat. *σφίγις*  
*τῆς κόρης*, (nam atrophia toti oculo tribuitur) est angustia  
præter naturam foraminis vucæ, quâ visio læditur.

Est videlicet morbus conformationis, scilicet in via;  
quia foramen illud pupillæ angustius est redditum,  
quàm naturaliter debebat.

Quomodo la-  
datur visus  
in angustia  
pupille.

Quomodo autem visus lædatur in pupillæ angustia, non ita planum est. Galenus, 2. de symp. caus. cap. 2. saltem visum aboleri scribit. Auenroës, 3. Coll. cap. 28. visum imminui docet. Orbasius verò, Aëcius, Paulus Ægineta, & Actuarius, etiam visionem deprauari, & res maiores videri, quàm reuerà sunt, scribunt. Quam Græcorum sententiam plurimi etiam ex Practicis secuti sunt, & in causâ huius symptomatis reddenda variè laborarunt. Visa est & mihi olim probabilis. Sed experienciâ & opticis principiis edoctus iam sentio, in pupillæ amplitudine nimia res quidem grandiores, non tamen maiores, quàm reuerà sunt, videri; minùs tamen distinctas in clara luce; cum nimia luminis copia simul ingrediens species nonnihil obliteret: contra in pupillæ angustia res quidem visibiles distinctè representantur, sed minutissimæ, & quæ à lateribus sita sunt, non videntur; cum eorum imagines per foramen angustum ingredi non possint: & contra in amplitudine pupillæ, etiam immoto capite, ea non solum, quæ rectà oculis opponuntur, sed & quæ ad latera sunt videantur.

*Causse.*

Causa proxima est contractio vixæ tunicæ. Contra-  
hitur autem illâ, vel cum laxatur à nimia humiditate,  
qua ab ambitu versus centrum contrahitur, sicut in cri-

brorum & coniorum madefactorum foraminibus acci-  
dit; (vt enim tensio vuez tunica pupillam dilatat, ita  
laxatio angustiorē reddit) vel à defectu humoris aquei,  
siue ex vulnere aut vlcere, siue ex alimenti inopia, quo  
humore consumpto indigens tunica concidit & corrui-  
gatur, ac pupilla angustior redditur. Paulo causa est  
densatio vuez à siccitate orta, si videlicet exsiccatio  
vuez à circumferentia ad centrum progrediatur; sin con-  
tra, si destillatio pupillæ. Aëtius dicit, contingere ex  
periculosus, cuiusmodi ab inanitione sunt, debilitati-  
bus, aut ex ingenti capitis dolore.

*Signa Diagnostica.*

Malum per se patet, præsertim si ad sanum oculum fiat collatio. Quoad signa causarum, si ab humiditate superflua malum est, præcesserunt causæ huicetantes: res: si à defectu humoris aquei, æger melius videbit in obscuro; quia species visibiles promptius occurrunt crystallino, qui à lucis præsentia offenditur. Commune verò huic vitio ex quacunque causa est, quod res visibiles quidem distinctè vident, sed minutissimè; & quæ à lateribus sunt, non ita vident, ac ij, qui pupillam ampliore habent.

### Prognostica.

1. Naturalis pupillæ angustia bona est, ob causam  
antea dictam.

2. Morbi vitio facta mala est: arque insanabilis quidem, si ex insigni & irreparabili defectu fiat humoris aquei; minus noxia, si ex vitia humectata. Difficiliter quoque sanatur, quæ ex siccitate & inanitione oritur.

*Curatio.*

Præmissis vniuersalibus, si vitium sit ab vicia humi-  
ditate, probantur siccantia, vt ruta, chelidon, fœnicul.  
collyrium ex tutia, felle, ruta, euphrasia, & similibus. Si  
à defectu humoris aquei, humectantia vsurpentur, vt  
lâc & aqua dulcis actu calida fronti & capiti admo-  
ta, vt caput alimentum ab inferioribus attrahat. Commo-  
dissimum est, si manus calida & humida super oculos  
derineatur: Paulus medicamentum rarefaciens & acre  
iuber oculis applicare, cuius scilicet rarefactione ali-  
mentum ab oculo suscipiatur, acrimoniâ verò attraha-  
tur. Attamen acrimonia illa moriû careat, neque nimis  
calida medicamenta sint, ne, quod attractum est dissi-  
perur. Verum natura sponte plerumque humorem  
aqueum reponere solet, qua de re postea, de defectu hu-  
moris aquei, dicitur.

## CAPVT XXVIII.

*De Suffusione.*

**Y**Πὸ χυμῶν & ὑποχύων, Latinis Suffusio, est humoris  
pr. natur. sub cornea ē regione pupillæ concretio,  
qua visio impeditur. Vulgus enim Barbaris Cataractam  
appellat, tanquam aquæ ad pupillam decubitus. (Est  
enim Cataracta præceps aquæ in flumine ex loco ab-  
rupto delapsus, ut aqua ruere potius, quam fluere vi-  
deatur) Vnde etiam aquam simpliciter, & aquæ des-  
censum nominant. Arabes gradus augescētis huius  
mali appellationibus quibuscumque distinguūt. Incipien-  
te enim suffusione culices & corpuscula quedam pi-  
lorum aut lanarum, vel aranearum texturis similia  
oculis obuersari videntur, pro humoris pupillæ suf-  
fusi qualitate, colore, figura: atque hunc gradum ap-  
pellant imaginationem, quod scilicet purantur res oculi  
obuersari, quæ non sunt. Augescente hoc malo sym-  
ptomata inualescunt, & pupillæ color marinus appa-  
ret, aut pupilla similis est vitro contaminato, vel aëri  
nebulis

nebulis repleto. Atque hunc gradum nominant Aquæ descensum siue Gutturam. Tandem, postquam malum perfectum est, ægërque amplius non cernit, & pupillæ color albus, aut alterius coloris apparet, non translucens amplius, Cataractam & ὑπὸ χυμῶν, seu Suffusionem appellant, ubi scilicet externum lumen cum speciebus visibilibus humorem crystallinum ingredi nequit, propter interpositum corneæ & crystallino humori humorem excrementitium. Et si enim veteres nonnulli, teste Æginetâ, eandem affectionem esse putarunt ὑπὸ χυμῶν & γλαύκωμῃ: tamen rectè discernuntur; cum γλαύκωμῃ non pupillæ obstructio sit, ut suffusio, sed crystallini humoris affectio, eius scilicet præ nimia humiditate in glaucum colorem mutatio, ut, *ibidem*, ab Æginetâ docetur.

*Suffusio vera quid.* Est igitur ὑπὸ χυμῶν pupillæ siue vucæ foraminis obstructio, facta ab humore præter naturam, eâ parte in oculo consistente, visionemque impediens. Morbus est in via; cum ob foramen vucæ obstructum species visibiles in oculum admitti non possint. Vnde symptoma sequitur initio actionis videndi imminutio aut depravatio, tandem, confirmato malo, penitus ablatio. Galepo, in *lib. de differ. morb. cap. 8.* est morbus in numero, & quidem in excessu; quoniam additum est aliquid præter naturam, seu adest oculo humor, licet alienus, in lentam & mediocriter duram *οὐσαν*, cuiusdam quasi membranz, concretus.

*Suffusio non ista.* Atque hæc, quæ dicta sunt, de vera suffusione sunt intelligenda, quæ *κατὰ τὴν φύσιν* ita dicitur, quamque humor circa pupillam præter naturam collectus efficit, non vapor. Nam præter hanc, quæ legitima & vera suffusio est, alia adhuc est, quæ Notha dicitur, quæ fit à vapore, & per consensum vel totius, ut in febrium ardentium vigore, fumis adustis per venas, & arterias simul cum sanguine & spiritibus sursum elatis, & instante quoque crisi, per hæmorrhagiam narium: vel cerebri, quando succis abundat aut crassis pituitosis, ut plerumque accidit, unde vapores eiusmodi ad oculos mittuntur; aut biliosis adustis, ut in phreneticis, teste Galenô, in *4. de loc. affect. cap. 2.* vel ventriculi, è quo vapor sursum ad oculos effertur, siue ex cruditate, præsertim nidorosa, siue ex bilioli humoris in ventrem confluxu, vel vteri, aliarumque partium inferiorum ab effumante ibidem alluvie: vel pulmonis, ut in peripneumonia, teste Galenô, in *1. Progn. aphor. 23.*

Denique fit vitio humoris aquei vel albuginei, quando is ita crassescit, & concresecit, ut crassitie visionem offendant. Nonnulli tamen hanc postremam suffusionis speciem ad primam illam referunt, & omnium suffusionis differentiam potissimam ac maxime propriam esse statuunt, utpote; quæ non per consensum fiat, sed oculo primario affecto, & causâ in ipso oculo consistente.

#### Subiectum & Causa.

*Locum suffusionis quid.* De loco suffusionis. Autores non planè consentire videntur. Autor *lib. de oculis* humorem, suffusionis causam inter humorem crystallinum & vucam tunicam constituit. Quam sententiam Arabes plerique sequuntur. Galenus, *10. de usu part. cap. 1.* suffusionis locum esse dicit regionem, quæ interiacet inter crystallinum & corneam tunicam, quem Græci, Paulus Æginetâ, Aëtius, & Actuarius sequuntur. Avicennas, *cap. proprio*, inter albugineum & corneam locum suffusionis statuit. Celsus, *lib. 7. cap. 7.* peculiarem sententiam fovet, & suffusionem fieri statuit post duas tunicas, scilicet corneam & vucam, eâ in parte, in qua spatium quoddam intercedat inter aqueum humorem & corneam.

Verum non magna est hæc sententiarum discrepantia. In toto enim illo spatio, quod intercedit inter cor-

Dan. Sennertus Tom. II.

neam & crystallinum, humor ille concresecere potest, totumque illud spatium locus suffusionis est; et si non semper in eadem spatio huius parte humor hic concresecat, sed modo in hac, modo in illa, nunc magis verius corneam, nunc verius crystallinum.

Nonnulli quidem statuunt, in crystallino quoque, & post crystallinum, in vitreo humore, posse consistere materiam suffusionis: verum ut non negamus, ob capacitatem & impuritatem crystallini quoque & vitrei humoris, et si rarius, visum lædi posse: tamen an id vitium suffusio dici possit, dubito.

*Causa suffusionis.* Veræ suffusionis, & quidem incipientis, causâ continens est humor tenuis intra corneam & crystallinum conclusus: continuatur, humor crassus & lentus, eodem spatio pupillæ obiectus, ibidem magis ac magis crassescens, siue ibidem genitus sit, siue à capite eo depulsus.

Humor is interdum sincerus est, & vnius generis, pituitosus scilicet, unde suffusio fit alba; interdum varij humores miscetur, ita, ut varios colores pro varietate mixtionis habeat, citrina, si bilis miscetur; nigricans, si humor melancholicus.

Colligitur verò hic humor eò loci, vel cum ibidem paulatim cumulat, ob nutrimentum oculi non bene concoctum & conuersum; vel cum excrementum pituitosum seu crassum, seu in toto, seu in cerebro præcipue cumulat, ad oculos vel ob nativam, vel alicuiam debilitatem transmissum fuerit. Ad nativam debilitatem pertinet & eminentia oculorum; quique eminentes habent oculos, facile suffusionem incurrunt. Aëtius, *lib. 6. cap. 9.* causam huius rei esse dicit, quod, qui habent oculos prominentes, habent crassos spiritus. Vbi verò crassus est spiritus, ob humores admixtos suffusionibus gignendis facile occasio dari potest. Verum cum magnitudo oculi sit à conformatione, ij, qui oculos magnos & eminentes obtinent, visum habent debiliorem, quia iam in magno spatio virtus diffusa infirmior est, ut Aristoteles, *5. de gen. anim. cap. 1.* docet. Præterea oculi isti prominentes & magni facile humores & vapores suscipiunt, atque externis iniuriis sunt expositi. Pertinet huc & viarum laxitas, quæ humoribus facile aditum præbet. Ad humorum in oculos influentium susceptionem faciliorem faciunt etiam causæ externæ, ut ictus, contusio, mora sub Sole, balneum, astringa & pluviosa cœli constitutio, & similes, quæ oculum debilitant, & fluxionem capitis, seu causam antecedentem internam, commouent, & faciunt, ut humores p. n. ad oculos fluant, ibique subsistentes temporis diuturnitate.

Via autem, per quam materia ad oculos differtur, triplex esse potest: 1. Venæ omnium tunicarum. 2. Vucæ tunica, à qua aliquid transsudare potest. 3. Nervus optici. Potest enim materia è venis frontis & temporum per pericranium derivari, & ad annatam, inde ad albugineum, hinc ad corneam & vucam confluere. Eadem derivari potest à dura matre ad duram tunicam, hinc ad corneam & humorem aqueum, atque ita inter corneam & vucam suffusionem excitare. Potest eadem derivari à pia matre, vel secundina & vucæ, & hinc ad humorem aqueum transsudare, & tunc suffusio inter crystallinum & vucam consistit. Potest & circumferentia vucæ ad pupillam effundi. Si verò à cerebro per nervos opticos effundatur, per retiformem & araneam tunicam ad crystallinum derivatur, & materia suffusionis crystallini superficiem adhæret.

#### Differentia.

Differentiæ suffusionis, & quidem veræ, sumuntur, *Differentia* 1. à magnitudine Nam in aliâ tota pupilla crasso hu- *suffusionis.* more obsidet, vel humor aqueus ita depravatus est,



vt totus sit opacus; atque tunc visio planè aufertur: in alia pars pupillæ est obtenebrata, vnde & obiecta directo intuitu integra non cernuntur, nec vno tempore multa, cum conus visionis sit factus angustior. Quod si in centro pupillæ exigua sit suffusio, ambitus verò sit purus, omnia quasi fenestris pertula esse putantur. Si diuulsa crassa corpuscula pupillæ obiciuntur, culicum species ante oculos versari videbuntur; quemadmodum Galenus hæc distinguit, 1. de sympt. caus. cap. 2.

2. A modo substantiæ. In alia enim materia tenuis & fluxa est, qualis in principio esse solet: in alia crassa, lenta, & tenax, vt membranæ speciem præ se ferat: in alia denique medio modo sese habet, quæ & acutius deponi potest.

3. A colore, quo humor ille tinctus est. Materia enim suffusionis alia est specie æris puri, margaritarum, argenti vini, gypsi, vel ex albedine tendit ad citrinum aut viridem; alia verò citrina est, alia viridis, alia aurei coloris, alia fusca vel plumbea, alia nigra.

4. A situ materiæ. Nam quædam sita est post vneam, inter hanc & humorem aqueum & crystallinum; quædam ante vneam, inter hanc & corneam, quædam corneæ vel vneæ accrescit; quædam non. Habet & notha suffusio suas differentias. Nam ægri videntur sibi videre modò pulices, modò pilos; modò circa candelam circulos, modò telas, modò aliud, quod in aëre voliret. Et omnino variaz imagines oculis obuersantur, prout figura est varia humoris consistentis circa pupillam. Non enim, quod videtur suffusio, est obiectum externum, sed humor in oculo cum latus. Galenus, 1. de sympt. caus. cap. 2. & 4. de loc. affect. cap. 2.

#### Signa Diagnostica.

Signa Diagnostica.

Cum suffusio non sit eiusdem generis, vera à notha distinguitur, primò, quod vera alterum tantum oculorum occupat, aut, si vtrumque, non tamen simul, nec similiter. In spuria enim tenebrosus quiddam in pupilla, in vera autem coloratum apparet. Secundò in verâ symptomata sunt contraria, nec vlla habent intervalla: in spuria remittunt in aëre puro, parciore & salubriore diata, cibique bona coctione, & tandem purgatione per hieram picram, vel reiectione succi biliosi per vomitionem, si morsus oris ventriculi præcesserit. Terriò, vera breui tempore, mensibus duobus vel tribus, aut sex vt plurimum, nonnunquam & paucis diebus incrementum suscipit: imò Fernellius refert, lib. 5. pathol. cap. 5. consummatam suffusionem vno die subortam. Spuria autem multos annos durat absque visionis insigni noxa, quod observatione peculiari confirmat Guil. Fabricius, Cent. 5. obs. 14.

Incipientis suffusionis signa.

Sed vt veræ suffusionis signa diligenter contempleremur, incipiente hac affectione culices aut caliginosa quædam, pilorum, lanarum, aut araneorum retibus similia, oculis obuersari videntur, pro humoris pupillæ suffusi qualitate, colore, figura.

Augescentis.

Augescente malo hæc symptomata inualescunt, & pupillæ color marinus apparet intuentibus, aut similis est pupilla vitro contaminato, vel aëri nebulis repleto.

Perfectæ.

Perfectâ hac æger non cernit, pupillæque color albus apparet, non lucens, aut alias præter naturam coloris differentias habet. Ex colore etiam ipso signa sumuntur, quod æreus materiam sub pupilla significat fluidam; gypseus crassam, non fluidam; citrinus pituitam cum bile mixtam; niger cum humore melancholico; vergens ad colorem margaritæ pituitam nonnihil diaphanam.

Quod verò ad dignoscendum locum suffusionis at- Locis suffusionis signa. tinet, residet illa inter vneam & corneam, primò, si cuiusmodi conspiciatur materia obtenebrata; quoniam materia magis propinqua est oculis intuentis, & pupilla ob humorem distendentem necessariò dilatur. Deinde si à principio ita manifesta non apparuit species volitantium ante oculos culicum; quoniam spatium intra corneam & vneam angustius est, in quo materia ita promptè moveri nequit. Opposita apparebunt, si materia inter crystallinum & vneam continetur.

Præterea si materia suffusionis in loco profundiore sita est, pupilla angusta est: si loco minus profundo, amplior illa est. Nonnunquam partibus vicinis materia suffusionis accrescit, & tunc albæ vel virides fibræ aut striæ supra iridem protensa conspiciuntur. Nonnunquam per vneam corneæ adhærescit materia, & tum puncta quædam albicantia conspiciuntur; ac, si à latere oculus inspiciatur, alba quædam filamenta ex vneâ ad corneam protensa conspiciuntur.

#### Prognostica.

1. Spuria suffusio non solum periculo vacat, sed faciliè etiam euacuato ventriculo aut toto curari potest. Vera autem difficulter; & alia quidem medicamentis foris intraque adhibitis, alia punctione cum acu.

2. In vera suffusione quibus altero oculo conuenientibus alterius pupillam dilatarì contingit, si punctio admittatur, recipiendi visus spes est. Quibus non dilatur, nemo vnquam visum recepit, teste Galeno, 3. de sympt. caus. cap. 2.

3. Si æger suffusione laborans lumen etiam non cernat, tum, etsi sano oculo clauso pupilla dilatur, tamen punctione facta visum non recuperabit; quia spiritus visuius turbidus plerumque & obscurus redditus est, cum quo etiam cernendi facultas perit.

4. Suffusio, quæ non ita diu cœpit, & in qua ægri obiecta communia, id est, magnitudines, figuras, numeros, motus adhuc discernunt, discuti potest; quia moderatè tenuis adhuc humor est. Vbi diutius constitit, & crassior aliquantum facta est, manus operam requirit. Et quæ semel tamen punctione sublata est, si leriosior fuerit materiæ, non longo post tempore specie fecis vini reuerri solet, teste Galeno, m. in fine.

5. Vt sciatur, quæ suffusio acu commodè disponi possit, suffusum oculum pollice preme, iterumque aperto oculo suffusionem considerabis. Quæ enim nondum concreta est, nec planè tamen adhuc tenuis atque cruda, ea ex digiti compressione nonnihil diffuit, ita vt aliquando latior appareat, statim verò ad pristinam magnitudinem, & figuram redeat. Id quod concreta suffusio non facit. Itaque si ex pressura, quæ digito fit, nulla consequatur figuræ humoris mutatio, porro videndum est, qualis eius color appareat. Si quidem ea, quæ moderatè concreuit, colorem ferri aut cœli, vel maris aut plumbi non admodum nigri, vel nucis castaneæ refert. Atque hæc commodè acu deponi potest. Quæ autem gypsi aut grandinis speciem colore præ se fert, supra modum concreuit, & punctione non sanatur. Itaque ipsius suffusionis maturitas quædam expectanda est chirurgi, nec punctio tentanda, donec humor peccans mediocriter concreuisse videatur.

6. Quæ suffusio nigra est, & quæcunque splendoris nitorisque omnis expers, nullo modo, neque medicamentis, neque acu curari potest; quoniam spiritus optici destructio significatur. Pura verò & pellucida cum pupilla, tum suffusio spem aliquâ curationis relinquit. Insanabilis



Insanabilis quoque ferè est viridis, obscura, & multum citrina atque dura, & quæ hydrargyrum colore & mobilitate repræsentat, & cuius oculus multum emarcuit. Videatur Auicennas, loc. propr.

7. Punctio, vbi conuenit, in pleniori oculo tuior est.

8. Si ex febre acuta, peripneumonia, phrenitide, aut dolore capitis acerbissimo suffusio exstiterit, aut si illa ad hanc accesserit, malum periculosius red- dicitur.

9. Suffusio in centro pupillæ consistens, acu ten- canda non est; quia periculum imminet, ne materiâ diffusâ tota pupilla impleatur, & homo visionem pla- nê amittat.

10. Senilis ætas ad curationem apta non est, quippe quæ suo vitio visum hebetem habet. Nec etiam pueri- lis, in qua humor nondum est maturus. Aprissima cura- tioni est ætas consistens.

### Indicationes.

In vtraque suffusione materia, quæ eius causa est, euacuari indicat; id quod in spuria, quæ à ventriculo præcipue, purgatione vel vomitu fit. Præsidii etiam di- uertentibus, & ventriculum atque caput roborantibus, ac legitimâ tandem diætâ opus est. In vera autem eua- cuatio humoris pupillam obstruentis instituenda, & materia illa è pupilla, quæ obstructa est, tollenda: quod fit vniuersalibus præmissis, vel per resoluentia; vbi materia tenuis, fluxa, & recens est; vel per transposi- tionem, quæ acu perficitur, vbi malum consummatum est, & materia ita concreuit, vt præsidium hoc commo- dè admittat.

### Curatio.

Curatio vera  
suffusionis.

Itaque in principio, si plethora adsit, & sanguinis affluxus metuatur, vena aperienda. Verum cum plerum- que ab humore frigido & crasso hoc malum ortum ha- beat, venæ sectio tum locum non habet; quia sanguinis spirituumque euacuatione cerebrum magis refrigera- tur, humorque crassior redditur, sed materia potius præ- paranda & euacuanda iis medicamentis, quæ supra, *part. I. de intemperie capitis cum pituita*, sunt proposita. Et quidem purgatio statim initio instituenda accura- tior, eaque maximam partem phlegmagogis perficien- da. In quem vsum valde utilis est hiera, & electuarium diacarthamum. Et vt purgatio felicius instituatur, præ- parantia præmittenda ex ocularibus medicamentis, in- primis euphrasia, calendula, betonica.

Quibus peractis semel atque iterum singulis septi- manis theriacæ vel Mithridatij Scr. i. vel Dra. ß. exhibere conuenit cum conferua betonicæ, anthos, aut simili. Possunt & alia medicamenta interna ad absumendum, & expellendum illum humorem vsurpari, vt decoctum ligni Guaiaci, sarsaparillæ, (assasfras cum plantis cepha- licis & ophthalmicis, vt:

*℥. China Dra. ii. sarsaparill. Dra. iij.*

Infunde horis 24. in lb. ii. aquæ puræ.

Coqu. ad medietatem. Sub finem adde *fol. euphrag. verbena, chelidon. an. M. i. sem. coriandri præparat. Drach. ij.*

Colat. seruetur pro vsu. Cuius dosis sint Vnc. vi. tem- pore maturino.

Caput nonnunquam lauetur lixiuio, in quo herbæ cephalicæ ebullierint, betonica, stæchas, maiorana, eu- phragia, agaricus, & alia, quæ supra, *part. I.* sunt pro- posita, vt:

*℥. Euphrag. maioran. an. M. ii. fol. lauri, roris marini, melilori, an. M. i. radic. asar. valeriana, an. Vnc. i. sarsapa- rill. Vnc. ii. sem. fenicul. Vnc. sem.*

Coqu. in lixiuio pro capitis lotionem.

Remedia.

Occipitio reuulsionis gratia cucurbitulæ vel vesica- *Dan. Sennert. Tom. I. l.*

torium, aut, quod efficacius est, setaceum applicetur, id- que diu apertum seruetur, ad minimum mentes sex. Ve- licatoria verò sæpius repetantur, & post aures applicen- tur. Pone aures enim, quod monent nonnulli, ramus à vena iugulari intro subit, qui ad opticos neruos vtrin- que vergit. Possunt etiam cauteria brachiis applicari. Atque hæc omnia fiunt, vt materia attenuetur, euacue- tur, resoluatur, & discutiat.

Ad discutendum verò vtilia sunt topica, forma fo- mentorum & collyriorum applicata, habita ratione du- ritiei & mollitiei temperiei oculorum, pro hominum ætate, sexu, & conditione. Sintque illa cuiusmodi, quæ paulatim attenuent, & leniter molliendo extergant; non quæ valenter exsiccent; ne reliquæ induentur.

Principio ergo fiant fomentationes vapore decocto- rum, qualia etiam antea fuerunt proposita. Vel fiat eua- poratio ex hederæ terrestris decocto, vsque ad remanen- tiam quartæ partis, quæ continetur per dies viginti aut plures.

Vel *℥. Hedera terrest. M. li. rad. valerian. ℥. i. lenisfici, euphrag. an. M. i. sem. fenicul. ℥. j.*

Coqu. in aqua simpl. & vapor calidus capite vndique tecto oculis excipiat.

Commendatur & vesicula piscis abluta, & decocto feniculi implera, tepidéque admota.

Postea pro extersione commendatur mel album pu- rum & despumatum; aqua è melle vel melle rosato aut scil- licito destillata, cuius gutta i. manè & vesperi oculis instilletur mixta cum pauco sacchari candi. Succus item ruta, feniculi, euphrag. & chelidonia maioris, verbena, calendula, marrubij, & aquæ ex iis destillatæ. Fortiora sunt fellis genera, vt perdiciis, galli, piscis lu- pi, accipitris, hirci. Galenus fel vulturis laudat. cum marrubij succo & melle addito, in lib. 4. de com- pos. medic. f. l. Vbi etiam plura huius generis remedia exponit. Collyrium quoque ex fellibus à Rhase descri- bitur. Valer & aqua ex anagallide flor. caruleo de- stillata.

Vel *℥. Pulu. maiorana, chelidonia maioris, euphrasia, ruta, an. ℥. i. fellis hœdi siccati Drach. iij.*

Infundantur simul & macerentur in aq. feniculi & euphrasia per dies tres, postea per filtrum colentur, & guttæ aliquot oculo instillantur.

Efficax est & aqua, quæ ex frumento paratur hoc modo:

*℥. Frumenti viridis, sed maturi, Vnc. iij. fol. ruta, ana- gallid. chelidon. maior. an. M. sem. fenicul. summit. eu- phrag. an. Vnc. i. cinamomi, caryophyll. an. Drach. ii. vini albi generosi q. l.*

Infundantur in vase vitreo, & radiis Solis exponan- tur diebus 30. sæpiusque agitentur, postea destillantur.

Commendatur & Aqua quædam Socialis dicta, quam descripsit Iohan Angelicus, in *Practica sua*. quam Rosam Anglicam appellat. Quia tamen omnia, è quibus com- ponitur illa aqua, sicca sunt; vtile est, duobus vel tribus diebus antè oculos vapore decocti herbarum emol- lientium & humectantium fomentare. Et omnino si in medicamentorum vsu spes adhuc sit posita, ad fortio- ra confugiendum, præparatione tamen per fomenta- tionem præmissâ. Hoc enim modo oculi tunicæ rare- fiunt, vt medicamenta discutientia facilius penetrare possint.

### Exempl. gratia:

*℥. Herb. maioran. verbena, malua, euphrasia, chelidonia maioris, an. M. i. sem. lini, fenic. an. Vnc. ß.*

Bulliant in aq. lb. iij. ad dimidium.

A nonnullis commendatur etiam hæc Aqua:

*℥. Euphrag. chelidon. pentaphyll. verbena, filer. mon- tan. capill. q. anthos, anisi, marrubij, baccarum lauri, ana- gallid. flor. cerul. pimpinell. an. p. i. rad. cyclamin. N. ii.*

Omnia simul consundantur in formam pulvis. Dein- de infundantur in vini optimi & vrinae pueri an. lb. iij. hor. 24. & in alembico vitreo destillantur.

Fomentatio  
oculorum.

In aqua infundantur, *churis, mastich. myrrha, tormentill. sem. ruta, feniculi, betonic. scarlea, sarcoroll. aloes, nucus moschat. calami aromati. an. Drach. ii. hepatis hirci lb. i. felis animum rapacium, bubuli, an. Vnc. i. fel. e gallinis duabus, rororis marini M. i. mell. opi. lb. j.*

Iterum destillentur & visui seruentur,  
Vtile etiam est hoc Collyrium;

*℞. Aq. feniculi Vnc. ii. chelidon. euphrag. an. Vnc. iß. pompholyg. Drach. ß. M.*  
Vel *℞. Felis grus, perdicis, vulturis, an. Drach. i. sagapeni Drach. i. cinamomi, caryophyllorum, an. Scr. i. myrrhe rubra, croci Orientalis, an. Scr. sem.*

Pulueriscentur omnia subtilissimè, & cum melle & succo feniculi permisceantur pro Collyrio.

Palmaris hoc frequenter vñs est;

*℞. Aq. chelidonia Vnc. iß. viuioli albi, tusa prep. an. gr. xv. viui. & gr. ix. sacch. candi Dra. sem. Misc.*  
F. Collyrium.

Commendatur valde etiam illud Collyrium, quod exstat apud Galenum, de medicamentis facile parabilibus.

*℞. Felis galli Vnc. ß. sanguinis muris Dra. iii. Cum lacte muliebri misceantur in formam Collyrij.*

Admodum forte est, quod ex merallis paratur hoc modo:

*℞. Viridis aris, viuioli, salis Armon. aris vñs, an. Scr. ii. felis hirci Scr. ij.*

Terantur terenda in puluerem subtilissimum, & cum succo maioranæ aut aquæ mellis destillata.

F. Collyrium.

Dum verò validiora hæc usurpantur sæpius oculus inspiciendus, & videndum, an periculum inflammationis alicuius imminet. Eo enim imminente statim ad inflammationem prohibendam oculus foueatur lacte muliebri, vel aqua rosarum, & aliis supra, de ophthalmiâ, & dolore oculorum, propositis.

Confirmata verò & inacerata suffusio non nisi manus operâ & punctione curatur, cum scilicet humor pupillam obstruens acu ab ea remouetur, & versus angulum oculi transponitur. Quia verò punctio ista inter operationes Chirurgicas subtilissima est, vt Celsus ait, nemo facile eam tentauerit, nisi qui alium sæpius operantem viderit, & cum non semper feliciter succedat, non temerè tentanda. Modum autem operationis huius planè & perspicuè satis descripsit Celsus, lib. 7. c. 7. Paulus Aegineta, lib. 6. c. 21. Et exstat idem in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 10. Guido, tractat. 6. doctrin. 2. alterius cuiusdam modi meminit, punctiois scilicet cum acu cannulæ vel canalis modo pertusæ, per quam sugendo suffusio extrahatur; quem tamen modum non probat, ac de eodem mentionem facit, Arculanus, in 9. Rhasis. Videatur etiam Hieronym. Fabricius, de operatione Chirurg. tit. de suffusione.

Antequam autem operatio instituat, videndum, primò, an materia satis crassa, & ad speciem quandam membranæ concreta sit. Nam vt nimia crassities, ita & immoderata tenuitas translationem impedit. Secundò, corpus prius conueniente modo purgandum. Tertiò, vbi de punctione tentanda initur consilium, attendendum, ne æger diuturno aliàs capitis, vel oculorum dolore laboret, ne tussi, aut sternutatione, aut vomitione frequenti eo tempore affligatur, quæ omnia præsidium hoc vel planè non admittunt, vel commodam eius administrationem impediunt. Eligendus est quoque dies serenus, tempus verum vel autumnale. Luna nec sit plena, nec silens, neque etiam lumine crescens, sed potius diebus duobus vel tribus à plenilunio, cum lumine decessit. Luna etiam secundum Astrologos non percurrat Arietem, quod ex signis celestibus capiti præficiunt.

Si notha sit suffusio, & ea, quod plerumque fit à ventriculo, ventriculus conuenienti modo, vt, libro tertio,

dicetur, enacuandus, deinde roborandus, atque ea, quæ os eius hiare, & vapores ad caput adicendere prohibent, exhibenda. Et proba victus ratio obseruanda, nec ventriculus onerandus.

#### Dieta.

In suffusione legitima, quæ discutiendo sanari potest, victus ratio sit attenuans. Abstineat ergo æger ab omnibus, quæ caput fumis crudis obnubilant, aut acris vellicant.

Conducantur cibi iis herbis, seminibus, aromatibus, quæ oculis profunt: pulvis etiam ad pastum ex euphrasia cum saccharo & cinamomo paratur. Panis paratur cum semine anisi & feniculi. Post cibum etiam tumentur cydonium, coriandrum, & quæ simul coctionem adiuuant, & vaporum ad caput ascensum prohibent. Alius semper sit aperta. Venus vitanda.

Si suffusio acuta est deponenda, victus conuenit non nihil incrassans ex oryza & similibus. Legumina autem & allium atque cæpe vitentur; quoniam caput ita replet, vt suffusio etiam sani oculi sit metuenda. Vbi ad puncturam accedendum, victus talis sit, qui inflammationem prohibeat. Ideoque æger abstineat à vino & calidis aromatibus aliquot diebus, post puncturam præsertim administratam.

Abstineat quoque æger à clamore, vitet lumen nimium, & omnia, quæ caput & oculos commouere possunt. Æger etiam per aliquot dies victu tenui regendus, ac in lecto, corpore supino, capite tamen elatiore, collocandus.

## CAPVT XXIX.

### De Vitiis tunicae Araneæ.

Inter tunicas oculorum est & Aranea dicta, quæ humorem crystallinum obregit, & ab aqueo humore fecernit. Hæc est læuis & subtilissima; quæ eius natura constitutio si vitietur, & crassa illa fiat, vt spiritibus visibilibus transitus satis non permittatur, visus hebetatur, & quasi per velum videnti omnia apparent. Potest tamen & colore alieno intici hæc tunica à vitiosis humoribus affluentibus, vnde visio deprauatur.

Redditur autem crassior hæc tunica, quia humores crassi in eam se insinuant.

Cognoscitur hoc vitium, quia homo non solum obscure, & quasi per velum videt, sed & quasi tela ante humorem crystallinum appareret. Præterea si hominis sani oculum quis inspiciat, imaginem suam in eo videret, quæ non appareret, si aranea tunica sit crassa & obscura reddita; quod sæpe in moribundis accidit. Vnde quamdiu in morbo aliquo huiusmodi imago in ægri oculo appareret, nullum plerumque adhuc mortis periculum est. Sunt tamen nonnulli, qui non ab aranea, sed à cornea imagines reflecti, & sic præsentari hominibus illum, quem vocant, scribunt. Idque probant vitro speculari pellucido, nullo opaco terminato, quod si ita statuatur, vt vmbrosus spectet locum, eius latus posterius reddit illuminatas species clarè, id quod noctu accidit, cum in cameris illustratis tenebræ foris fenestris obrenduntur. Verum ratio aliqua diuersitatis in isto simili videtur. Etenim in vitris illis tenebræ ex altera parte obtensæ sunt loco opaci, quod speculum facere solet; at in luce, etiam clarissima, quæ oculis satis illuminat, vt dici non possit, corneæ interiori lateri tenebras obtendi, nihilominus imago illa hominis appareret. An tamen forsitan opacitas, quæ in pupilla est, istam reflexionem excitare possit, rem Lectori iudicandum relinquo.

Curatur hoc malum vniuersalibus præmissis, medicamentis

Suffusio  
per chirurgiam  
curatio.

Aranea tunica vitia.

camentis attenuantibus & ophthalmicis, cum internis, tum externis; de quibus in visione læsa dicitur.

Rumpitur etiam interdum hæc tunica, & inde confunditur humor crystallinus cum aqueo, & ita visio vitatur.

Causæ autem fractionis huius sunt percussiones, cōtusiones, humores corroderentes. E quibus etiam causis, si præcesserint, malum hoc cognoscitur, ut & quod humor aqueus & crystallinus confundi videntur.

Malum hoc nullis medicamentis curabile.

Nonnulli & corrugationem, & omnino omnia vitia, quæ cornea patitur, & huic tunicæ tribuunt. Corrugatio equidem, sed raro, humori crystallino, tabefacto ei, accidere potest. Quod verò omnes affectus, qui corneæ accidunt, etiam araneæ accidere possint, non necessarium est: quia longè alia ratio est corneæ tunicæ, alia araneæ. Etenim cornea tunica propria firmitudine consistit, nec sustentatione indiget; aranea verò sua firmitudine non subsistit, sed crystallino humori debet, quod stabilis est. Huic enim firmiter adhæret. Secundò profunditatem notabilem habet cornea, vnde à quibusdam anatomicis in laminas secatur; qua tamen, tam notabili, aranea destituitur.

Foras & tunica vitreum humorem inuoluens eo modo vitari potest, quo aranea.

#### De Retina tunica vitii.

Retina tunica vitia.

Cum retiformis tunica proximum visionis organum sit, suamque peculiarem substantiam, formam, figuram, situm, vasa, connexionem cum reliquis partibus habeat, procul dubio etiam illa naturalis constitutio interdum vitari, & visus inde lædi potest.

Primò naturalis eius leuitas, quam mucosa constitutio ipsi præbet, mutari potest, ita, ut tunica illa inæqualis & rugosa fiat, & contrahatur, & in quibusdam partibus emineat, in quibusdam subsideat, & tum imagines obscure, indistinctæ, & confusæ representantur.

Inæqualitas autem hæc accidere potest vel à causis neruum opticum, cuius dilatata medulla est hæc tunica, nimis humectantibus, vel calidis, eundem exsiccantibus. Et procul dubio sæpe tunicæ huius vitio visus læsio accidit, quæ frustra nerui optici angustia imputatur.

Raritas quoque & densitas huius tunicæ visui incommodare potest. Insuper quod vehemens dolor in oculis percipitur, si illi radios solis rectà excipiant, ut cæcitas inde consequatur, vel quando ex translatione oculorum è loco tenebricoso in lucidissimum, & solariis radiis expositum palpebris abscessis (quod tormenti genus à Tyrannis nonnullis inuentum historiarum referunt) cæcitas secuta est: illud omne propter retinam hanc tunicam fieri putandum est. Hæc enim terminat lucis & specierum lucidarum actiones, estque exquisiti sensus, quia ipsius nerui continuata pars, & ad concipiendum dolorem aptissima est.

Nonnulli & situm mutatum ei accidere, eamque à crystallino vel nimis distare, vel ei nimis vicinam esse posse existimant; scribuntque, ratione vicinitatis nimis accidere, ut longinqua solum videantur, quod senibus quibusdam accidit; ratione remotionis verò solum percipiuntur constituta propius. Verum cum vndique aliis corporibus conclusa sit hæc tunica, & per se non mobilis, non probabile est, ei situm mutatum accidere posse.

Tandem etiam illæ intemperies, quæ crystallino à nonnullis tribuuntur, rectius tunicæ huic tribui, & venæ ac arteriæ retinæ tunicæ substratæ omnis generis humores noxios eò deuoluere possunt. Verum cum affectus hi nec facile cognoscantur, nec curentur, plura de iis non addimus.

### CAPVT XXX.

#### De Aegilope & Fistula lacrymali.

Postquam tunicarum oculi affectiones præter naturam explicauimus, antequam ad humorum vitia accedamus, prius de angulorum oculi & carunculæ lacrymalis vitiiis dicemus; quæ tamen, si ira libet, etiam statim post palpebrarum vitia tractari possunt. Inter quæ primò tumor in magno oculi angulo, Paulo Aeginetæ *αἰγίλω* & *ἀγχίλω* dictus: *ἀγχίλω* quidem, si nondum sit ruptus *αἰγίλω* verò, si iam ruptus sit, quod capræ huic vitio peculiariter obnoxia ferantur. Auicennæ Garab & Algarab.

Aegilops.

Anchilops.

Est videlicet tuberculum inter maiorem oculi angulum & nasi radicem ortum, plerumque cum inflammatione, nonnunquam tamen etiam sine inflammatione, quale atheroma, meliceris & steatoma: & aliquando quidem tumor hic in superficie se ostendit, aliquando magis profundum obsidet, & non nisi tactu ac compressione percipitur. Tumor hic ruptus & masse curatus in vlcus abit, quod vel simplex remanet, à quo pus coctum plerumque exudat, vel serpens & malignum euadit, à quo pus crudum effluit: quod etiam non raro sub inferiore palpebra viam sibi facit, & per tuberculum ibi eleuatum exulceratumque aquosam & purulentam materiam effundit; aut si abscessus post aegilopem tardius rumpatur, in sinum seu vlcus sinuosum, & fistulam oculi, quæ *κλῑπῶ* & *σπυγῆ*, degenerat. Et proinde hæc sese consequuntur, Anchilops, Aegilops, Fistula lacrymalis, & denique *ρῶς*, quæ est carunculæ in angulo oculi maiore consumptio.

Fistula lacrymalis.

#### Causæ.

Causa efficiens inflammationis proxima plerumque est sanguis tenuis aut biliosus, rarius pituitosus, aut melancholicus, qui è temporum, frontis, aut faciei venis motu naturæ critico aut symptomatico ad angulum illum oculi depulsus, tuberculum tale excitat, & abscessum gignit. Aëtio nonnunquam, ubi scilicet tumor est sine inflammatione, causa est lentus humor, melleus scilicet aut pultaceus, folliculo plerumque conclusus, ut in meliceride, atheromate, & steatomate fieri solet; vnde tumor tum sine dolore existit, qui etiam ferè non rumpitur, & *ἀγχίλω* ab eodem vocatur.

Causa antecedens est redundantia biliosorum & acrim humorum in massa sanguinis, qui ad oculi locum hunc fluunt, si ex quacunque causa is sit imbecillis. Idque facilius accidit, si externæ causæ accedant, ictus, casus, dolor materiam attrahens.

#### Differentia.

Tuberculum ipsum aliàs maius, aliàs minus est, in superficie eminens & visui expositum, aut in profundo latens, & cum solutâ ynitate coniunctum in aegilope, citra hanc in anchilope. Rumpitur autem intra versus oculum, aut extra per cutem, aut vtrinque. Interdum & os naris proximum perforat; nonnunquam cartilaginem palpebræ, ac ipsam palpebram corrumpit.

#### Signa Diagnostica.

Dignoscitur malum, quia locus affectus obscure vel manifestè tumet, rubore in ambitu perfunditur, dolore affligitur, eoque lacinante, si malum sit cōiunctum cum inflammatione. Vbi cure exulceratâ tumor rumpitur, fit abscessus cum vlcere; quod si legitime non curetur, pus diutius coercitum cuniculos subtrus agit, ex illaque carne sinum parit, per quem sanies intus collecta aut sponte effluit, aut presso angulo extruditur, tumor

tumorque nonnihil subsidet, donec noua illuies colligatur, quod paucis interdum fit horis. Sæpe sinus ad os subiectum penetrat, illudque arrodit, viamque in narem proximam, vt dictum, aperit, è qua graecolens quid continenter excidit, ita, vt portionem ossis illius cum pure crasso & fetido Platerus è nare procidisse viderit.

Quod ad signa differentiarum, si tumor sit inflammatorius, adest dolor, calor, color rufatus, & tumoris ipsius immobilitas. Contra si non sit inflammatorius, (qualis atheroma, meliceris, steatoma) tumor ille est mobilis. Præterea Meliceris est, vbi durities est minor; Atheroma, vbi maior; Steatoma, vbi summa durities.

### Prognostica.

1. Ægilops vitium est ægrè curabile, nisi maturè ei occurratur. Nam discutientibus medicamentis opus est, quæ cum pleraque calida & acria sint, affectæ partis inflammationem augent. Præterea cum liquida medicamenta esse oporteat, faciliè de his in oculum aliquid influit. Denique cum citra obligationem medicamenta non adhæreant, illa tam diu perferre difficile est. Quapropter veteres quidam Medici nulla prorsus, alij pauca ad ægilopas pharmaca præscripserunt, teste Galeno, *5. de comp. med. sec. loc. cap. 2.*

2. Difficilius autem hoc malum redditur, si cum magnitudine sit coniuncta soluta vnitas, & si tumor profundas partes occupet.

3. Si ruptio sit ad interna, peius est; quia metuenda subiectorum ossium corruptio.

4. Si tumor non sit inflammatorius, qualis est meliceris & atheroma, non tam medicamentis, quàm Chirurgiæ opus est.

5. Ægilopas ad canceri naturam accedentes curare periculosum est; cum mors acceleretur.

6. Fistula recens, & quæ orificium habet extrinsecum manifestum, faciliè curatur.

7. Fistula lacrymalis plerumque chronicum malum est, cum propter perpetuum materiæ affluxum, tum propter motum oculi continuum, tum quia ligatura vlceribus conueniens commodè ea parte fieri nequit, tum denique quia medicamenta debilia parum agunt, fortia verò lædunt oculum.

### Indicationes.

Indicationes hic sumuntur ab iisdem, à quibus aliis in tumoribus præter naturam sanandis peti solent, considerando vnde incitetur fluxio, quò feratur, per quas vias, quæ sit materia fluens, quæ denique tum fluxionis, tum tumoris ipsius sint tempora.

### Curatio.

Curatur videlicet Ægilops vel vt inflammatio incipiens, vel vt abscessus iam ruptus, vel denique vt fistula; atque tum aut medicamentis, aut Chirurgiæ. Anchilops quoque suam peculiarem curationem habet.

Incipienti ergo Ægilopi post venæ sectionem, si ea opus sit, aut post purgationem, conueniunt *αποκρηστικὰ* ad frontem, ex aqua seu succo rosarum, portulacæ, plantaginis, vitis, cum oui albumine, vel bolo Armeno. Imò eadem parti affectæ imponenda. Quibus processu temporis additur succus fœniculi, & aliquid thuris, myrrhæ, bdellij, galbani, aut ammoniaci in aceto dissoluti. Conuenit gummi tacamahacæ; apparente duritie mucilago althææ & fœnigræci. Et repellentium vsu incipientes Ægilopas, & nondum in pus mutatas, ne ad suppurationem prouenirent, se prohibuisse scribit Trallianus.

Perseuerante malo discutientia imponenda. Lauda-

tur à Paulo Ægineta ruta satiuæ, cum lixiuio, quod ex cinere & calce confectum est, contrita, cocta, & imposita. Quod medicamentum etsi in principio mordax est, statim tamen mitescit, & ad os vsque penetrat. Nux rancida tanquam multum discutiens à multis laudatur.

Si suppuretur, & ad abscessum tendat, iuuetur cum diachylo aut simili. Auicennas pane vitæ cum lacte muliebri & croco. Si sponte non rumpitur, aperiatur ferro; & quidem maturè hoc fiat. Si enim apertio differatur, pus partes vicinas erodit, & fistulam læpe incurabilem gignit.

Potest & cauterio aperiri; quod vbi fit, applicetur fronti & oculo spongia aquâ rosarum madida, vel stuppa cum albumine oui. Dolorem ex cauterio lenit vitellus oui cum oleo rosaceo per vnum vel 3. dies appositus. Aëtius lenticulam cum melle coctam adhibet. Ruptum vlcusculum abstergatur melle rosaceo, vel oxymel. simpl. Auicennas ad mundificationem inprimis commendat lanuginem interiorum in arundine iuxta radicem inuentam, si cum melle mixta imponatur. Laudatur & thus cum stercore recente columbino, & erui farina cum melle. Fortius est vnguentum Ægyptiacum. Æs viride per se solum pro lectreto habetur.

Vel *℥. Staphid. agr. Drach. ii. Ammoniac. aceto dissolut. Vnc. i. M. & impone.*

Si fistula orta sit, dilatetur eius orificium lentè ac paulatim cum tenta vel penicillo ex spongia, medulla sambuci, vel radice rapi exsiccata, aut gentianæ. Sanies expurgetur & abstergatur compressione, & postea instillatione mellis cum oleo rosarum.

Vel *℥. Mellis communis Vnc. ii. virid. æris Vnc. β. aq. vitæ Vnc. iij.*

Æs viride puluerisatur, & cum exteris lentè toquitur ad tertiæ partis consumptionem. Colatura tepens suauiter per lyringam infunditur. Si hoc medicamentum acius videatur, abluatur vlcus quotidie cum aqua rutæ, & deinde aliquid vnguenti Ægyptiaci imponatur. Expurgata fistula carne impleatur, & cicatrice obducatur cum farina erui aut fabarum, thure, aloë, myrrhâ, pompholyge, rad. irid. Illyr. aristoloch. cum melle aut rerebinth. aut hoc Medicamento:

*℥. Thuris, sarcocolla, aloes, sangu. dracon. balanst. ὄνυ, aluminis, an. Scr. i. stor. æris gr. v.*

Trita subtilissimè misceantur cum aqua rutæ ad formam collyrij liquidi.

Potest vlcusculum prius elipi vino, in quo tantundem mellis, & parum aristolochiæ bullierint. Ne cicatrix sit indecora, Auicennas folia rutæ imponit, cum aqua granatorum. Paulus rutam satiuam cum lixiuio è cinere & calce facto tritam & decoctam, vt dictum.

Priusquam verò fistula consolidetur, diligenter explorandum est, an in profundo callum contraxerit; id quod durities ostendit. Præterea an os sit corruptum; quod factum esse deprehenditur, si immisso specillo asperitas quædam in osse, aut sonitus quidam pulsio osse, periosteo absumpto, animaduerratur. Vtrumque enim, & callus fistulæ, & ossis corruptio solidationem impediunt. Itaque Chirurgiæ opera tum requiruntur. Atque os ipsum corruptum radatur ferro, aut tollatur cauterio actuali, munito prius, vt decet, loco affecto linteolis in aqua rosacea infusis, aut in oui albumine, aut alio succo frigido. Postea intus ponatur oui albumen cum oleo rosaceo aut vitello oui. Superponatur verò sieff album cum albumine oui, lacte vel aquâ rosarum, ne inflammatio sequatur. Fronti & temporibus repercussoria applicentur; quibus & locus affectus muniendus est, vt diximus, dum cauterium adhibetur. Quod si æger cauterium actuale abhorreat, dilatato vlceris orificio per sectionem vel penicillum os desquammetur, & super eo alumen rochæ combustum

Ægilops incipientis curatio.

Discutientia Ægilops.



combustum, ve peucedanum<sup>1</sup>, vel chalcantum vstum applicetur, quæ & squamam de ossè tollunt, & corruptam fistulæ carnem absumunt. Vide Hieronymum Fabricium, de operat. Chirurg. titulo de Agilope.

In Anchilope, qui Auicennæ Halcilus est, Aëtius superficiem dissecare iubet, vt materia vnà cum contento folliculo funditus eximatur. Postea, ne malum denuo gignatur, locum cauteriò inurit, & lenticulam cum melle applicat. Tandem vbi crusta decidit, terebinthinà alumine permixta cicatricem gignit.

Victus ratio sit tenuis; & ad frigidum declinet, atque eò magis, quò symptomata sunt fortiora præsertim dum Chirurgià per ferrum aut ignem administratur.

## CAPVT XXXI.

### De Encanthide & Carnis Lachrymalis Incremento.

Encanthis  
& Carnis  
lachrymalis  
incrementum.

IN ossibus angulorum lachrymalium duo foramina sunt, docente Galeno, lib. 10. de v. sup. part. cap. 13. quorum & is vsus est, vt oculorum excrementa per ea ad nares & palatum confluant; vnde & medicamenta ocularia quandoque per nares egeri solent. Ne verò per angulos excrementum effluat, homoque perpetuò lachrymetur, carnosa quædam corpuscula, quasi opercula, meatibus illis imposita sunt, quæ prohibent, ne excrementa continenter per angulos effluant, sed ea ad foraminula illa & meatus impellantur. Caro autem illa duos morbos pati solet. Aliquando supra modum augetur, quod malum *Eryas* nominatur; aliquando contra imminuitur vel absumitur, vnde lachrymæ perpetuò effluunt: quod malum Græcis *psas* dicitur.

*Eryas* videlicet est carnis in maiore oculi angulo excresecientia & augmentum, atque ita morbus in magnitudine aucta.

**Causa.** Ortum habet ex sanguinis & humorum ad hanc affluxu, & inprimis ex incuria Medici malè *πρὸς* curantis.

Visu facillè cognoscitur.

**Prognosis.** Malum hoc curationem vt plurimum suscipit: si tamen magnum & antiquum sit vitium, non nisi Chirurgià curatur; & curatio eius longa ac periculosa est.

**Curatio.** Indicatio est, id, quod præter naturam auctum, tollendum esse. Id quod præstat, vniuersalibus præmissis; vel carnem supra modum auctam absummentibus, vt vitriolo, flore æris, alumine vsto, vnguento Apostolorum, Ægyptiaco, vel ferro, quo caro superflua abscinditur; vel cauterio, quo inuritur. In horum verò medicamentorum vsu, vt & in abscissione & cauterio, hoc obseruandum, vt tota caruncula non absumatur, sed illud tantum, quod superfluum est, ne affectus contrarius, *psas* inducatur. Vide Aëtium, *teirab.* 1. *serm.* 3. *cap.* 21. 22.

Aliquando etiam maiores tumores ad oculorum angulos oriuntur, qui scirrholi euadunt, & vix sine manuali operâ remoueri possunt; cuius exemplum habetur apud Fabric. Hildanum, *Cent.* 1. *obs.* 2.

## CAPVT XXXII.

### De Rhyade, seu Carnis lacrymalis Diminutione vel Absumptione.

Rhyas &  
carnis la-  
crymalis  
absumptio.

Affectus contrarius est *psas*, hoc est, lachrymalis carnis in maiore oculi angulo diminutio vel

absumptio, qua foramen anguli patescit, per quod postea excrementorum continuus datur effluxus, ægerque continuò lachrymatur, à quo symptomate nomen huic morbo datum est, dictusque *psas*, *πσας* quod fluere significat.

Imminuitur autem vel absumitur hæc caruncula, si *Causa.* vel vngula nimis resecetur, vel medicamenta nimis corrodentia oculo applicentur. Vnde vix plurimum malè curato encanthidi vel agilopi aut pterygio succedit. Sæpe v. etiam epiphoram humoris acerrimi sequitur. Nonnunquam & à variolis vlcera profunda relinquentibus absumitur. Malum per se vitium patet.

Et si planè fuerit exesa caruncula, curationem non admittit. Est enim pars spermatica. Sin verò tantum ex parte erosa sit, regenerari potest, aut potius adaugeri caro deperdita. Hinc etiam, quod ex incisione factum malum, curari non potest, à corrosione verò curationem recipit. Ab incisione enim pars tam carnosa quam spermatica, quæ regenerari non potest, absumitur: à corrosione verò medicamento pars potius carnosa absumitur, quàm spermatica & nervosa, vnde regenerari potest.

### Indicatio & Curatio.

Quod imminutum vel absumptum, instaurandum: quod sit medicamentis sarcoticis & consolidantibus, qualia sunt, aloë, rosæ, myrtus, & vinum, in quo rosæ & myrtus, & nuges cupressi sunt decocta:

Vt *℞. Aloes, thuris, an. ʒ. ij. sangu. draconis, sumach. an. ʒ. j. Cum aqua rosar.*

*F. Collyrium.*

Vel *℞. Arii vsti, ʒ. ij. an. ʒ. iij. croci, spica nardi, an. ʒ. ij. malabathri ʒ. j. rosar. recent. ʒ. iij.*

Siccata terito, deinde rosas per se tulas addito. Paulus collyrio Diacrocū dicto vtitur.

## CAPVT XXXIII.

### De Pruritu Caruncule lachrymalis.

Nonnunquam etiam ad carunculam lachrymalem materiæ affluxus fit, vnde pruritus excitatur. *Pruritus caruncule lachrymalis.*

Ad quem tollendum Rhafes topica quædam tradit: vnum mitius, ex recenti endiuiâ trita, atque in globulos paruos redacta, quos cum oleo violarum, aut quod melius est, rosaceo subactos oculo applicat. Quod medicamentum suâ frigiditate & modicâ humiditate acrimoniam obtundit humoris pruritum efficientis, & oleum rosaceum additum suâ adstrictione imperum affluentis materiæ non nihil sistit. Cauendum tamen, ne quid olei in oculum incidat, quod dolores & inflammationes excitare possit: alterum validius, ex lentibus excorticatis, sumach, rosas rubris, & granatorum succo, quæ trita, & cum sapa aspersa, pruriginoso oculi angulo emplastri forma imponit. Mire quoque remedium est turia præparata subtilissimè trita, & cum vino Maluatico, aut vino optimo antiquo & aquâ rosarum mixta, sumendo plus aut minus de vino, prout magis vel minus exsiccare & resolvere est consilium. Instilletur quotidie ter vel quater in oculum.

Deinde verò, vbi hæc propter mali contumaciam non iuuant, ad maxima illa præsidia vniuersalia, ad phlebotomiam & purgationem accedit Rhafes, cum argumento sit, causam antecedentem in toto, vel capite adesse, à quâ coniuncta illa seu proxima in oculo fouetur. Illâ igitur demere iubet primò sectione cephalicâ, postea verò frontis, ac demum venæ in angulo lacrymali. Venter quoque ducendus est iis inprimis, quæ acres & biliosos humores purgandi vim habent. Postea balneû aquæ dulcis probat, quo & reli-

quæ dissipantur, & relicta intemperies oculorum & totius emendetur. Multum & hoc valet:

*℞. Sanguin. dracon. aloës hepatic. sarcocollæ lacte nutrit. an. 3. j. zingib. caryophyll. croci, camphor. an. 3. j. tutia prepar. 3. b.*

Teratur omnia subtilissimè, & in vini Maluatici atque aquæ rosarum an. lb. b. in vase vitreo, posito in vase altero feruentis aquæ, & quidem ad consumptionem tertiæ partis, bulliant. Postea vsui seruentur, vas vitreum sæpe agitando. Ante vsu collyrij huius vile fuerit, oculos fomentare decoctione aliqua emolliente, in curatione albuginis oculi descripta,

## CAPVT XXXIV.

### De Humoris aquei vitiis.

*Aquei humoris vitia.*

**H**isce oculorum vitiis hætenus explicatis proximum iam est, vt ad humorum morbos & vitia explicanda accedamus. Et primò quidem humorem quod attinet, is in oculo primo loco positus est, spatiumque illud, quod inter corneam & humorem crystallinum est, explet, præterea naturâ suâ tenuis est, purus ac perspicuus. A naturali verò ista constitutione variis modis recedere potest. Aliquando enim crassescit, & quidem vel totus, vel ex parte, ac tum fit suffusio. Nonnulli etiam vitium contrarium ipsi accidere, & nimis tenuem fieri posse putant. Verum id vix credibile est. Aliquando totus effunditur; aliquando imminuitur & tunc cornea concidit & corrugatur. speciesque non rectè recipiuntur. Nonnulli etiam nimis augeri posse statuunt. Sed nec hoc credibile est. In qualitatibus mutatur, cum, qui clarus & perspicuus esse debebat, fit turbidus, aut alienam qualitatem induit; de quibus ordine dicendum.

*Aquei humoris crassities.*

Crassescit primò humor aqueus ob humores vel vapores crassos admixtos, quales suppediunt cibi crassi & flatulenti, lentes, fabæ, & similia; & omnino crapula & cruditas humorumque crassorum in corpore, & præcipue in capite, collectio, & ad oculum confluxus.

Cognoscitur hoc vitium, quod vel imagines oculis obueriantur, vel visus imminuitur aut aboletur. Cognoscitur etiam inde, quod humor non, vt solet, tam clarus apparet.

Quâ ratione autem curari possit hoc malum, satis ex iis, quæ de curatione suffusionis dicta sunt, & de vsu abolito & imminuto dicentur, patet.

Quantitate vbi peccat, siue planè effluxerit, siue imminutus sit, oculi globus non satis distenditur, sed cornea tunica nonnihil corrugatur & concidit, vnde & pupilla naturalem amplitudinem nō seruat, & vna super crystallinum concidit, spatiumque, quod ob defectum humoris aquei vacuum fit, breuius redditur; vnde conus visibilis seu radiatura turbatur & abbreviatur, & visus vel aboletur, vel imminuitur, pro causæ magnitudine.

*Humoris aquei effusio.*

Effunditur enim hic humor aliquando totus, vt in ruptura corneæ, siue ex vulnere, siue ex vlcere id fiat. Et cognoscitur hoc malum non solū quod cornea tunica subsidet & corrugatur, sed etiam quod vlcus præcessit, vel vulnus oculo inflictu est, aqueusque humor affluxit.

Regignitur autem hic humor sponte; cuius exemplū extat apud Galenum, 1. de sympt. caus. cap. 2. Langium, lib. 1. ep. 7. Beniuenum, de abdit. morb. caus. & curationibus, c. 74. Columbum, lib. 10. anatom. Coiterum, in obseru. anatom. & Chirurgic. atque ipse etiam tale exemplum vidi. Ideoque vlcus aut vulnus saltem curandum est, ægerque boni succi cibis nutriendus; reliqua naturæ committenda.

Imminuitur autem vel ob calorem & siccitatē, in febre vehemēti, in febre hectica & phthisi, vnde oculi febribus laborantium subsidere quasi videntur, aut ob

immodicam euacuationem, Venerem nimiam, ætatemque senilem.

Cognoscitur hoc malum ex causis dictis præcedentibus, ex ætate, oculorū imminutione, viuis obscuritate.

Malum hoc curatu difficile, quia ferè cum totius corporis siccitate, quæ non faciliè emendatur, coniungitur.

Curatur autem cibus boni succi & sanguinem bonum multum generantibus, fomentis oculum humectantibus, vel decocto ex malua, althæa, meliloto, lacte. In primis vile est, si à puero sano halitus ore in oculum immittatur. Temperatus enim ille est & humectat.

Obscuratur, & alieno colore inficitur humor aqueus ob humores alienos admixtos, quorum colorem admittit; vnde idem naturalem pelluciditatem amittit.

Si obscuratur humor, non appareat imago intuentis in oculo, oculus & colorem mutat, & obscurior redditur. Et si colore aliquo inficiatur, eundem etiam species visibiles repræsentant.

Curatur hoc malum humores vitiosos euacuantibus vt hætenus sæpius dictum. Possuntque talia medicamenta non solū exhiberi, sed & naribus hauriri; aut si decoctum, vel infusum rhabarbari oculis immittatur, obscuritatem eorum ex bilioso humore tollit; quod idem alia purgantia aliis humoribus peccantibus, præstare possunt.

## CAPVT XXXV.

### De Humoris Crystallini vitiis.

**H**umor Crystallinus inter principes oculi partes facile primas obtinet, qui coloris ferè, expers est, pellucidus, figurâ sphericâ, nonnihil compressa præditus, vt Galenus, de vsu partium, lib. 10. c. vlt. docet. Situs eius, si linea per medium pupillæ ad principium nervi optici ducatur, in medio est; respectu verò anterioris & posterioris non planè in medio situs, sed versus anteriorem & pupillam oculi declinat.

Ex his igitur, quæ ad naturalem eius constitutionem pertinent, si aliquid mutetur, morbi humoris crystallini & inde variæ visus læsiones oriuntur. Inter quæ primū est γλαύκωμα γλαύκωσις, humoris crystallini in glaucū colorem mutatio. Γλαύκωμα ὅθεν autem vocabulum à posterioribus Græcis duplici modo accipitur: Primò improprie, pro coloris oculi ob suffusionem mutationem. Deinde pro crystallini humoris in glaucum colorem mutatione. Veteres equidem Græci, teste Ruffo, γλαύκωμα & γόγχυμα pro eodem morbi genere habuerunt. Vnde etiam Galenus, 3. aph. 1. scribit, τὸ γλαύκωμα τὰ ἔχον ἰδέας τῶν γόγχυμάτων. Posteriores tamen Græci proprie γλαύκωμα saltem pro humoris crystallini in glaucum colorem mutatione accipiunt. Quod vbi fit, visio impeditur. Neque enim species visibiles ob humorem crystallinum non satis pellucidum sed obscuratum rectè recipi, neque humor crystallinus glaucus redditus, & quasi condensatus rectè illuminari & irradiari potest.

Causa huius mali est exsiccatio, quæ fit seu ob ætatem, seu ob aliam causam exsiccantem, incrassantem, & condensantem. Vnde Galenus, 10. de vsu partium, γλαύκωσιν εἰναῖσιν ὁπότε καὶ πρὶν humoris crystallini scribit.

Cognoscitur hoc malum, quod circa pupillam insignis & profunda apparet albedo, & omnia tanquam per fumum aut nebulam videntur.

Curatu difficile hoc malum est, primò, quia omnes morbi humoris crystallini curatu difficiles sunt; cū in profunda oculi parte situs sit, ad quē nō faciliè medicamenta pertingunt. Secundò, vt in aliis partibus, ita & hic morbi exsiccitate orti vix corrigi possunt, in senibus præcipue.

Nonnulli

Nonnulli etiam contrarium vitium incurere posse humorem crystallinum, nimirum tenuem fieri posse statuunt, ut non sit aptus recipere & repræsentare visibiles species. Exemplumque afferunt spiritus vini & aquarum destillatarum quæ cum sint subtilissimæ & tenuissimæ, non ita recipiunt & repræsentant rerum imagines, ut aqua limpida. Verum malè hic præsupponitur, visionem & receptionem specierum fieri in crystallino. Non enim visio fit per species reflexas, ut in aqua, cui subest aliquid opaci; sed per refractas in tunicis & humoribus, tandemque in tunica retina repræsentatas. Nimia verò tenuitas crystallini receptionem specierum non prohibet. Si tamen nimia tenuitas crystallini visioni officiat, fit hoc ideo, quia refractionis leges violantur. Non tamen video, unde tanta tenuitas humori crystallino induci possit. Sit enim sanguis, unde nutritur, tenuis, nunquam tamen inde humoris crystallini natura constitutio mutabitur, ita ut inde visio lædi possit.

Nonnulli etiam maiorem & minorem fieri posse statuunt, & à quantitate naturali degenerare. Verum cum vix ad eum sensibilibus non peringant, ex nutritione vix hoc vitium incurere poterit. Neque videmus, in iis, quorum corpora insigniter augentur, tale quid humori crystallino accidere.

Minor si fiat, fit hoc in exsiccatione, præcipue in senibus, aut qui senili ætate ex alia causa simile quid patiuntur. Verum illud in magnitudine decrementum vix tantum est, ut inde visio, lædi possit. Et si accadat visus læsio, fit ea potius ob condensationem & coloris mutationem, ut modò de Glaucomate dictum.

Situm mutat humor crystallinus, ubi latiore sua parte, quæ lentis maioris instar compressa est, pupillæ formini non rectè opponitur, sed vel sursum declinat vel, deorsum. Et quidem si crystallinus humor situm mutet in vno oculo, in altero verò situm naturalem retineat, vel si ambo difformiter situm mutant, ita ut alter sursum, alter deorsum, vel ad latera vergat, res geminatae apparent. Sin autem accadat, ut utriusque oculi humor crystallinus æqualiter situm mutet, ita ut ambo superiora petant, vel ad inferiora demittantur, non apparent res geminatae. Quin etiam si alter oculorum quoad humorem crystallinum rectè sese habeat, alter ad latera moneatur, itidem fit geminata visio. Mutatur enim hic planum, ut loquuntur optici. Causa autem huius rei hæc est, quod, quando motu musculorum situs crystallini vitiosus corrigi potest, quod fit in strabismo, res geminatae non apparent; quando autem motu musculorum vitiosus ille situs crystallini non corrigitur, tum demum res geminatae apparent. Fit hoc nonnullis à natura, aliis à causis externis, oculique percussione & contusione; vitiumque hoc vix curabile est, nisi sponte sua ad suum locum naturalem redeat hic humor.

Potest & aliam in situ mutationem pati humor crystallinus, si videlicet à suo loco vel versus anteriora, vel versus posteriora declinet. Quomodo autem hoc fiat, & qualè hæc situs mutatio in visu mutatione excitet, valde obicuri. Quod versus anteriora humor crystallinus interdum vergit, hoc accedit nonnullis à natura, & prima conformatione; senibus verò ideo hoc accidere putat Platerus, quod toto ætatis tempore in legendo, & rebus quibuscumque tandem oculis propositis, manibusque tractatis oculos dimiserint, ideoque crystallinus humor ætatis decursu una cum vitreo ad interiora sensum prælapsus sit. Verum si crystallinus hoc modo versus anteriora prolaberetur, necesse erit, vel aliud corpus vel humorem, in spatium illud subire, quod inter crystallinum & vitreum, vel inter vitreum & tunicam retiformem interiaceret: quod fieri non potest. Potius in senibus, in quibus totum corpus exsiccatur, coarctatio quædam humorum à siccitate orta statuenda; ob quam accedit, ut remota rectius, quam propinqua videant; ut ex optici fundamentis patet.

Contrà nonnunquam crystallinus humor versus originem

nerui optici non nihil declinat, quod ubi sit, homo remota rectè videt, propinqua minus rectè. Accidit hoc plerumque à natura & prima conformatione, nec vitium infrequens est. Vnde etiam procul dubio factum, ut Anatomi nonnulli in talium corporum sectionem incidentes situm crystallini in medio oculi esse scripserint. Vitium etiam hoc incurabile est, & defectus hic perspicillis saltem compensatur.

Si tandem continuas humoris crystallini solvatur, fit, ut res diuina vel geminata videatur. Ut enim, si speculum in plures partes frangatur, singulae partes imaginem eandem exhibent: ita idem accidit in crystallino. Hoc vitium equidem facile accidere non potest; cum humor crystallinus in parte profundiore situs sit, & potius rotus oculus turbetur, antequam humor crystallinus in duas partes diuidatur. Si tamen fieri debet, non aliunde, quam ex causis externis & violentis, id accidere potest.

## CAPVT XXXVI.

## De Morbis humoris Vitrei.

Species visibiles ubi humorem crystallinum transierunt, in vitreo recipiuntur: cuius quis usus sit, in *Instit. part. I. c. 12.* dictum, quem ut præstare possit, naturalem suam constitutionem ut habeat, necesse est. Sit nimirum pellucidus, coloris expers, situm suum habeat post crystallinum. Hæc verò naturalis constitutio si mutetur, morbi humoris vitrei oriuntur, & visio inde læditur. Disputant quidem nonnulli, an vitreus humor à naturali constitutione deflectens possit immediate visionem lædere; an verò saltim quia nocet crystallino: & sunt quidam in ea opinione, inter quos Mercurialis, humorem vitreum non posse immediate visionem lædere, sed saltem quatenus crystallino nocet. Sed falsa est hæc opinio, & ex falsa hypothese orta. Præsupponit enim usum vitrei esse nutrire crystallinum. Verum aberrat à vero hæc opinio, & in *Instit. loco allegato*, monstratum, vitreum humorem æquè comparatum & necessarium esse ad recipiendas species visibiles, ac crystallinum. Neque enim in crystallino, ut in speculo, species sistuntur, & in eo visio terminatur: sed per eum transeunt, & in humore vitreo recipiuntur. Itaque si à naturali sua constitutione ille deflectat, ad species visibiles recipiendas fit ineptus.

Id quod fit primo, si fiat obscurior, & tale quid patitur, quale crystallinus in glaucomate. Id quod accedit, si impuro alimentis nutriatur.

Sed utrum hoc vitium sit in crystallino, an verò in vitreo; non facile dignosci potest. Neque etiam facile hoc malum curari potest; cum loco adhuc profundiore, quam crystallinus, hic humor situs sit.

Situm etiam aliquando mutat vitreus. Secundum naturam post crystallinum situs est: si verò accadat, ut pars eius suâ sede mota ante crystallinum feratur, eique præponatur, non quidem cæcitas; (nisi forsitan tanta eius pars eo sit detrusa, ut penitus crystallinum obtegat, & ita tota ferè oculi structura turbetur) sed visus aliqua hallucinatio accedit. Densior enim est humore aqueo.

Causa huius mali est ictus vel contusio oculi, vel punctura & acus in suffusione curanda nimis profundè adacta.

Cognoscitur verò, quod sub pupilla albuminis instar ipse humor apparet, visusque aliqua hallucinatio deprehenditur.

Curabile verò vix est hoc malum; nisi humor sua sponte in naturalem suam sedem redeat.

## CAPVT XXXVII.

## De Neruorum Opticorum vitiis.

Opticorum  
neruorum  
vitio.

**N**eruorum opticorum is vsus est, vt spiritum animalium ad oculos ferant. Sunt verò aliqua vitia, ob quæ hunc vsus præstare nequeunt; obstructio nimirum, compressio seu coarctatio, contorsio & conuulsio, vulneratio, ruptura.

Angustia.

Primo siue intus humores pituitosi in neruos illabatur, eosque obstruant, siue extra idem, vel etiam sanguis ex vase læso effusus origini neruorum opticorum incubat, atque angustiam in iis efficiat, visio aboletur; quod vitium vulgò gutta serena, Germanis *der schvvarze Schar* nominatur, quod pupilla equidem clara, sed tamen quasi nigricans apparet.

Transmittuntur enim pituitosa & aquosa cerebri excrementa ad basin cerebri, vbi nerui optici è cerebro egrediuntur, & ad infundibulum, & propè neruos in naves defluunt. Et quidem materia hæc interdum solū neruos opticos occupat, atque tum sola visio, reliquis sensibus integris, læditur; interdum simul principium neruorum, vnde etiam alij sensus læduntur. Nonnunquam etiam ex apostematibus eò loci ortis malum hoc originem ducit, & post cerebri inflammationem & phrenitidem in febribus malignis & pestilentialibus prouenit. Nonnunquam subito ex humoribus in cerebro agitatatis oritur. Sic memini, hic ante biennium studiosum cum ipsi à quodam medicamentum purgans fortius exhibitum fuisset, subito obcecatum fuisse, proculdubio humoribus in cerebro agitatatis, & in principium neruorum opticorum effusis. Interdum scæminis hoc malum accidit ob menses suppressos, & nonnunquam quidem recedit, mensibus fluere iterum incipientibus, nonnunquam toto vitæ tempore persistit.

Fœmina  
grauida ob-  
cecata.

Et in specie obseruatum, scæminas quasdam, cum in vtero concepissent, obcecatas ex neruorum opticorum angustia fuisse, malumque hoc ad menses quatuor, quinque vel sex durasse; nonnullis etiam vsque ad tempus partus.

Signa.

Cognoscitur hoc malum, quod oculi planè clari apparerent, nihilque vitij in iis animaduertitur, nisi quod pupilla nigrior & amplior apparet. Et si à vitiosis humoribus à cerebro eò delatis malum originem habet: excrementorum in cerebro redundantium signa adsunt. Si à sanguine in eum locum effuso id fiat, vulnus, ictus, casus præcessit.

Pronostica.

Malum curatu difficile est, neque humores semel neruos illos obsidentes & occupantes faciliè discutiuntur, vel loco dimouentur.

Est tamen aliqua curationis spes reliqua, si visio non sit planè abolita, & aliquid adhuc agnoscat æger. Si verò visus ita ablatum sit, vt lumen amplius non videat æger, neque, an dies vel nox sit, discernere possit, malum incurabile est.

In grauidis quibusdam mense quarto, quinto, sexto, vel post puerperium, malum hoc sponte cessare, modò dictum.

Curatio.

Curatur autem hoc malum, vbi adhuc spes aliqua curationis superest, si & corpus totum, & caput euacuentur; sicut supra, *part. 1. de Intemperie capitis cum plenitudine*, dictum. Et ferè talis curatio instituenda, qualis in suffusione. Nonnulli commendat largam sanguinis missionem è vena frontis. Possunt etiam vesicatoria ceruicis imponi, vel setaceum, quod efficacius est, ceruicis applicari. Hinc, vt humores pituitosi discutiantur, lotiones capitis adhibeantur.

Vt *℞. Stæchad. Arabic. betonic. euphrag. an. M. ij. sarsaparilla ʒ. ij.*

Coquantur in lixiuio pro lotionem capitis.

Vel *℞. Saponis Veneti lb. j. rad. iros ʒ. ij. styrac. liquid. ladani, an. ʒ. j. olei caryophyll. ʒ. B. moschi ambræ, an gr. iij.*

Misceantur in mortario, affusâ aquâ rosarum paucâ, & manibus oleo de been imbutis,

F. Globuli.

In eundem finem exhibeatur hic, Potus:

*℞. Ligni Guaiaci lb. j. sarsaparill. ʒ. iij. rad. distamni albi ʒ. j.*

Coquantur in aquâ lb. xij. ad tertiæ partis consumptionem. Manè & vespèri exhibeantur Vnc. vj.

Reliquis adde *euphrag. M. ij. granor. iuniperi, cinamomi, fænicul. an. ʒ. j.* Affunde *aqu. lb. xij. vini Rhenani lb. iij.*

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem pro Potu. Vel *℞. Sem. fæniculi ʒ. iij. sileris montani, piper. Zingiber. cinamomi, pulegi, hyssopi, euphrag. granor. iuniperi, flor. rorismarini, saxifrag. an. Drach. ij. chamadryos, rad. chelidon. cinamomi, apij, anisi, petroselin. an. Drach. j. Cum l. q. mellis.*

F. Electuarium.

Nonnunquam quoque accidit, vt in magnis conuulsionibus, vt epilepsia, nerui optici contorqueantur, & inflectantur, ita vt spiritibus animalibus transitus denegentur, vel, quod probabilius, vt natura excrementa, quæ ex cerebro expellit, in neruos opticos impellat, quod post fortiores sternutationem accidisse à Guilhel. Fabricio, *Centur. 1. obseru. 81. notatum*, & cæcitas inde inducatur, quæ nisi intra paucos dies desinat, & sponte visio redeat, immedicabile malum est.

Si ex vulnere, vel quacunque insigni læsione, ad neruum opticum vsque pertingente, cæcitas introducta sit, immedicabilis illa est.

Contorsio  
neruorum  
opti-  
corum.Vulnere  
ner-  
ui optici.

## CAPVT XXXVIII.

## De Spirituum Opticorum vitiis.

**A**tque hi sunt morbi & vitia, quæ singulæ partes oculorum incurrere possunt. Verum cum ad visionem perficiendam partes hæcenus enumeratæ non sufficiant, nisi spiritu animali perfundantur, atque ab illo vltimam quasi perfectionem accipiant, & denegatis spiritibus visio aboleatur, etsi reliquæ partes in oculo omnes saluæ sint, vt ex angustia neruorum opticorum, de quâ, *precedente capite*, dictum, patet; necessarium est ad visionem absoluendam, vt spiritus animalis oculos irradiet, & rectè sese habeat; quod nisi sit, etiam visio læditur.

Spiritus  
opti-  
corum  
vitio.

Cum autem spiritus optici lucidi esse, rectâ in oculos influere, & iustâ quidem quantitate, debeant; vitij patiuntur, si impuri sint, non rectâ in oculos ferantur, nec sufficienter, & iusta copia oculos irradiant.

Spiritus  
opti-  
corum  
naturalis  
constitutio.

Spiritus ipsi quidem per se non crassescunt, verum si vapores crassi & turbidi ipsis commisceantur, inde visio fit obscura, vel ægri ea se videre existimant, quæ reuerà non sunt, vt muscas, culices, floccos, filamenta, telas araneorum, vel alia corpora minuta: qui affectus à nonnullis Nubecula appellatur; eò, quod tali vitio affecti plerumque se nebulam quoque videre arbitrantur, aut res simplices geminas esse putant, vt ebriis sæpe accidit, vel rectas curuas, sicut accidit, militi, cuius mentionem facit Forestus, *lib. 1. obseru. 39.*

Spiritus  
opti-  
corum  
crassities.

Spirituum etiam nimia agitatio, quæ fit vel ob vapores commixtos spiritus turbantes, vel ob corporis agitationem, visionem turbat. Motus item corporis & capitis eodem modo diu continuatus facit, vt spiritus eadem ratione secuti agitarique eadem etiam formâ in oculum influant; de quare in vertigine dictum.

Nonnulli tamen affectionem, quæ à spiritu opticorum agitatione prouenit, à vertigine distinguunt, & falsam visionem cum rerum circumgyratione nominant, quæ qui afficiuntur, res, quas intuentur, etsi firmæ & stabiles sint, circumagi, & in gyrum circumrotari, vel



vel aliter inclinare, & subuerti existimant, ita, vt, licet falsam esse hanc imaginationem cognoscant, tamen, cum ex illa rerum circumuersione visus firmam, qua corpus subsistere possit, sedem non amplius cernat, idē quoque titubet, & vacillet. Nonnunquam quoque pānimentum, cui insunt, ipsis inuerti videtur. Hinc, nisi sustineantur, subito integris sensibus in terram cadunt, prius ter quateruē pedibus, quibus se sustinere cupiunt, terram pulsantes. Et quamuis hac affectio cum vertigine propriē dicta magnam conuenientiam & similitudinem habeat, resque non minus in ea, quā vera vertigine, circumgyrari videantur, ac propterea etiam *diu* & vertigo à plerisque vocetur: distat tamen à verā vertigine, quod in hac vt plurimum cerebrum cum oculis, seu potius spiritus in illis existentes afficiantur, sensuumque interiorum operationes aliquo vsque imminuantur; in falsā autem visione, quā hic describitur, soli oculi afficiantur, cerebro eiusque spiritibus nihil patientibus. Vnde fit, vt si in hoc affectu claudantur oculi, malum protinus cesset, resque non amplius circumrotari appareat. At in vertigine cerebri vitio natā, licet arctissime etiam palpebræ occludantur, nihilominus tamen omnia adhuc, ac si circumuertērentur, sensui communi offeruntur. Præterea in falsā visione res adhuc oculis repræsentantur, nisi quod circumgyrari videntur: at in vertigine vera acies oculorum etiam ferē hebescit, & quædam visus obtenebratio seu scotomia accedit cum aurium tinnitu, & graui auditu, nonnunquam & capitis dolore, ita vt res non distinctæ, sed quasi per nebulam vario colore tinctam oculis appareant.

Circumgyrationi spirituum opticorum cognata est illa inordinata motio spirituum, ob quam scintillæ ante oculum noctu apparent, quod fit, dum oculi fricantur, item ob sternutationem, & post narium emunctionem cum vehemēti spirituum impulsione; quod symptoma procul dubio spirituum opticorum agitatione accidit.

Si spiritus etiā in oculo deficient, vel minus copiose influant, visio vel aboletur, vel imminuitur. Spiritus autem in oculo deficient, vel quia à cerebro non transmittuntur; vel quia ob neruorum opticorum angustiam influere non possunt.

An verò ob spirituum vitium, crassitiem puta, & ob securitatem, visio lædatur; an verò ob humoris crystallini vel vitrei morbos, non ita facile est agnoscere Mercurialis equidem pollicetur, se signum à nemine animaduersum propositurum, quod sumatur à perspicillis, statuitque, si visus læsio corrigatur perspicillorum ope, vitium esse à spiritibus: vitium verò, quod sit in humore crystallino, vitreo, albugineo, vel tunicis, beneficio perspicillorum corrigi non posse. Verum etsi planē negare nolum, spirituum vitium aliquo modo per perspicillorum vsu corrigi posse; cum si spiritus sint vel pauciores, vel crassiores, atque ita obiecta minora non rectē videamus, perspicilla species obiectorum ampliores, & sub forma maiore exhibere possint: tamen iuuamentum hoc non certum signum est: vitij spirituum; cum extra dubium sit, etiam vitium humorum & tunicarum aliqua ex parte perspicilloꝝ vsu corrigi posse. Malo quoque hic assentiri Platæro, statuenti, visus læsiones plerasque, quæ vulgo in spirituum vitia referuntur, potius, in situ crystallini vitiosum, vel alia humorum vitia referenda esse. Talia enim vitia, vt in Instituit. lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 3. dictum, sæpe iuuenibus accidunt, in quibus nullum spirituum vitium vel defectus animaduertitur, & perspicillorum ope talia vitia corrigi possunt. Etenim cum cornea tunica, vt & omnes humores, ob admissionem & refractionem spirituum visibilia facti sint, si situ vel alio vitio peccent, refraction illa debito modo non fiet; quod perspicilloꝝ ope corrigi potest. Sic etiam aliās sanos perspicillorum vsu res longē diffitas & minimas videre animaduert-

timus; quod sit saltem ob peculiare specierum visibilia refractiones, nullo verò modo ob spiritus, quos perspicilla nec clariores, nec copiosiores reddere possunt.

Vitium autem spirituum corrigitur per medicamenta *ὀφθαλμικά*, quæ *ὀφθαλμικά* nominantur, de quibus proinde agere huius loci est. Sunt autem illa *feniculum, euphrasia, ruta, rad. valerian.* (de qua Tabernamontanus videatur) *verbena, rosmarinus, salvia, maiorana, betonica, radic. helenij, calendula, chelidon. maris, & aromata pleraque*; quæ quia cerebrum confortant, etiam simul faciunt, vt spiritus animales puri & copiosi generentur, præcipue nux moschata, calamus aromaticus, myrobalani chebulæ: quibus componuntur varia medicamenta. Commendatur Electuarium Humain descript. Mesue. in 1. c. de agris. oculor.

*℞. Euphrasia ʒ. ij. sem. feniculi ʒ. v. macis, cubebar. cinamomi, piperis longi, caryophyll. an. ʒ. j.*

Pulueriscentur & cribrentur.

Postea,

*℞. mellis destumati lb. j. succi depurati feniculi ʒ. j. ruta, chelidonia maior. an. ʒ. ʒ.*

Coqu. succi cum melle ad mellis fluidioris consistentiam, & adde species. F. Electuarium, cuius dosis sunt Drach. iij.

Habentur etiam medicamenta talia apud Valescum de Taranta, lib. 2. cap. 30. Electuaria duo visum confortantia descripsit Langius, lib. 3. Epistol. Et occurrunt passim talia alia, & proponuntur etiam aliqua infra, capite 44. Vnum atque alterum saltem hic addeamus.

Species Occonis:

*℞. Spec. diaphor. sem. fenicul. an. Vnc. ʒ. macis, cubebar. cinamomi, piperis long. caryophyll. an. Scr. ij. pulu. fol. euphras. salvia, ruta, verben. an. Drach. ij. & Scr. ij.*

Misce.

Vel *℞. Pulu. nucis moschat. ligni aloës, sem. siler, mont. mastich. euphras. sem. anisi, feniculi, carui prepar. an. ʒ. j. ʒ. ʒ. sacchari albi ʒ. ʒ.*

M. pro Tragea, de qua manē & vesperi, quantum duo culpidescultri capiunt, sumatur.

Vel hora decubitus sumatur de sequenti Electuario quantitas nucis moschatae:

*℞. Conseru. fl. euphras. ʒ. ij. rosar. ʒ. vj. salvia, anthos, an. ʒ. ʒ. succini albi prepar. ʒ. j. spec. diarrhod. ʒ. ʒ. margarit. prepar. ʒ. ʒ. essentia salu. ʒ. j. Cum syrup. de betonica.*

F. Electuarium.

Læsiō visus ex spirituum nimia agitatione cognoscitur ex vertigine coniuncta. Si spiritus deficient ob cerebri vitium, etiam alij sensus afficiuntur. Si ob neruorum opticorum angustiam, oculi partes reliquæ sanæ sunt; nihilque vitij etiam in cerebro animaduertitur.

In vsu tamen & delectu horum medicamentorum considerandum, an spirituum crassities & impuritas à materia melancholica, an verò à pituitosa proueniat. In illa enim conueniunt medicamenta tenuium partium cum immodica humectatione citra vehementem & exsiccantem calefactionem, vel exsiccationem; in hac verò calida & sicca, quæ cerebrum frigidum & humidum corrigere apta nata sunt.

## CAPVT XXXIX.

De Musculorum Oculos mouentium vitis.

VT homo nō solum quæ rectā oculis opponuntur, sed & quæ ad latera, & supra & infra sunt, sine capitis motione videre possit, dati sunt oculis musculi, quorū genera descripta videantur apud Coiterum,

*Spiritus opticos confortantia.*

*Electuar. Humain.*

*Species Occonis.*

*Opticorum spirituum defectus.*

*An spirituum opticorū vitia perspicillorum vsu corrigi possint.*

*Musculi cur oculis dati.*

intabulis, Bauhinum, Iul. Casserium Placentinum, Hier. Fabricium ab Aquapendente, & alios Anatomicos.

Musculorum  
oculorum  
vicia.

Horum vitia sunt paralytis & conuulsio, in quibus affectibus & motus oculorum, & situs vitari, & ex situ oculorum vitato ipsa visio ladi potest. Etenim si omnes musculi resoluantur, oculus extra tendit, & prominentior fit: si verò illi solum, qui ad anteriorem angulum mouent, resoluantur, oculi ab oppositis sanis musculis versus anteriorem angulum trahuntur. Sed si conuellantur musculi ad suum angulum, oculum secum trahunt & conuertunt. Si resoluantur musculi superiores, oculus versus inferiora inclinatur; si verò inferiores, versus superiora.

Causæ sunt eadem, quæ supra in conuulsione & paralyti sunt explicatæ.

Cognoscitur hoc malum visu, & strabismus inde oritur; de quo suo loco dicetur.

Paralytis curatur medicamentis caput euacuantibus, & humorem pituitosum absorbentibus; de quibus supra dictum. Nonnulli sanguinem turturis instillatum, vt peculiari proprietate efficacem, commendant. Si à conuulsione, relaxantia & humectantia exhibeantur, ex decocto seminis lini, maluæ & althææ; de quibus etiam supra, de conuulsione, dictum.

Ita  
in oculis.

Est etiam musculorum vitium, cum nimis graciles vel debiles sunt, vt continua quasi inter se lucta certantes alter oppositorum alterum vincere conetur, vnde instabiles & continuo mobiles oculi euadunt; quod vitium à Græcis *ἰσος* appellatum fuisse censent. Neque enim peculiaris est musculus oculo motum tunicum largiens, sed omnes sex musculi æqualiter constructi oculum in certo situ detinent. Si ergo debiliores sunt, id præstare non possunt. Vitium autem hoc plurimis à natiuitate contrahitur, & incurabile est. Obseruauit id in virgine quadam aliàs pulcherrima, cuius cuiusdam filia, cui oculorum globus planè instabilis erat. Vitium hoc contraxisse dicebatur à matre, quæ incendium domus cuiusdam spectauerat, & inde territa fuerat.

Vulnera mus-  
culorum oculi.

Ad musculorum morbos pertinent etiã vulnera, ictus, puncturæ profundæ, quibus variè & transuersim interdum secantur, lacerantur, & ad suas actiones obeundas inepti redduntur. Ita vir quidam nobilis, vt ad me perscripsit Dn. D. Iacobus Ianus, Sereniss. Elect. Viduz Lichtenburgi Medicus, equo insidens caput ligno acuminato ita allisit, vt ligni porcio ad interiora oculi penetrans musculum oculi sinistram attollentem rumpere. Hic conualescens oculum quidem habet saluum, sed omnia geminata videt. Cuius rei causa est, quòd, cum musculus oculum rectè regere nequeat, species visibiles in diuerso plano statuuntur, & sic retina tunica difformiter pingitur, & dupliciter obiectum percipitur. Vnde etiam si rem rectè iudicare velit, semper alterum oculum claudere necesse habet. Perinde autem est, siue claudat dextrum, siue sinistram. Nam species æquè in utroque recipiuntur. Hæc saltem est differentia, quod obiecta in alto posita oculus ille, cuius musculus læsus est, non videt, nisi se ceruice valde supinet.

## CAPVT XL.

### De Oculi defectu.

Oculi defectus.

Atque hi sunt morbi, qui singulas oculi partes infestare solent. Sunt præterea quidam morbi, qui toti oculo accidunt; de quibus iam dicendum.

Et primò quidè monstruæ oculi constitutiones occurrunt & nonnullos vno, nonnullos tribus vel quatuor oculis natos fuisse obseruari est; vt eius rei historias Schenckius, lib. 1. obseru. 278. collegit, quas tamen neque ars, neque natura corrigere vel tegere potest.

Deinde interdum oculus vnus deesse solet; id quod

fit per magnas inflammationes, ob quas oculus rumpitur, vel in pus mutatur, post ictus, vulnera. Quod vbi accidit, nulla equidem oculi amissi reparandi spes est. Vt verò deformitas illa regatur, alij linteolo serico locum tegere solent; alij in oculi deficientis locum alium factitium aureum argenteumve pictum reponi curant qui nativum oculum referat. Ita Iohan. Thomas Minadous, de externis affect. lib. 3. c. 14. refert, se Byzantij vidisse foeminam, quæ vno oculo deficiente factitium ex argenteo tectorio opere aded expolitum & pictum insertum habebat vt verum magnitudine, luciditate, colore æquaret. Modum etiam Paræus, lib. 22. Chirurg. c. 1. habet, quo oculus fictitius formari possit.

## CAPVT XLI.

### De Oculi Atrophia.

Aliquando verò solum imminuitur oculus, & minor, quàm naturalis constitutio, & ad corpus reliquum proportio requirit, redditur; cum scilicet omnes oculi partes imminuantur & contabescunt. Vnde non solum deformitas ob partium inconcinnitatem & proportionem læsam oritur, sed & visio læditur.

#### Causæ.

Quæ autem aliàs atrophie causæ esse solent, et in oculo locum habent, si partes corporis superiores, & præcipue oculum occupent, vt nimia euacuatio & exsiccatio, puta sterus continuus, humorum acrim in lipitudine diuturnus fluxus, vigilie diuturnæ, febris hectica, obstructio valorum oculis alimentum aduentanti.

#### Signa Diagnostica.

Ipsam malum per se facile cognoscitur: quæ verò eius causæ fuerint, relatio ægri patefaciet.

#### Prognosticum.

Malum curati difficile est. Neque enim siccitas in villa corporis parte facile curatur; & nisi maturè ei succuratur, causa cæcitatis esse solet.

#### Curatio.

Curatur medicamentis humectantibus lacte muliebri inprimis imposito; vel fomentetur oculus hoc Decocto.

℞. Rad. althææ, maluæ, an. ʒ. j. sem. fenigraci, althææ, maluæ, an. ʒ. ʒ.

Coqu. in aqua, & oculus decocto foueatur, vel ex his destilletur aqua, quæ oculo sæpe instilletur.

## CAPVT XLII.

### De Oculi proidentia.

Aliquando etiam accidit, vt oculi de naturali sua sede & orbita præter modum emineant, quod vitium Oculi proidentia dicitur; vel etiam excident, & ita propendeant, vt palpebris amplius regi nequeant, quod malum Græcis *ἐκτροπή* & *ἐκτροπή*. Latinis Oculi proidentia, exitus, prolapsus & expressio nominatur.

#### Causæ.

Causæ ad tria genera referri possunt. Ad primū pertinet omnia, quæ vi quasi oculum ex orbita sua extrudunt, vt vehemens inflatio & vocis intentio, vehemèntique spiritus

spiritus suppressio: id quod accidit in clamore nimio, tubarum inflatione, strangulatione, & suffocatione, quocunque modo ea fiat, vomitu, tussi, partu laborioso, cum maximo conatu feces detruduntur. Spiritus enim retentus cum sanguine & vaporibus versus cerebrum tendit, illud inflat; unde etiam oculi & vicinæ partes quasi intumescunt, & loco suo pelluntur. Quod pertinet casus ab alto, quo cerebrum valde concutitur.

Secunda causa est resolutio musculorum & nervorum in oculo, quæ fit ob humores pituitosos & aquosos à cerebro ad oculum confertim afflentes.

Tertia causa est vulnus annatae tunicae, quæ oculum orbitæ annectit, & propterea etiam coniunctiva dicitur, vel musculorum oculi.

Quibus & quartum causæ genus addi potest, tumor oculum ex orbita quasi extrudens; cuius rei historiam habet Trincavellius, *lib. 4. de ratione curandi partium corporis humani affect. cap. 6.* de quodam Veneto, cui dexter oculus adeo prominebat, ut uniuersam ferè faciem deformaret, quod contigerat à scirrhoso tumore, qui erat in interna parte, qua membrana annata oculum ossibus annectit.

#### Signa Diagnostica.

Malum ipsum per se insistentibus patet. Quænam verò sit causa, ex iis, quæ præcesserunt, patet. Et quidem si resolutio adsit, ac visio sit integra, musculi solum erunt resoluti; si verò etiam amittatur visio, nervus opticus.

#### Curatio.

Uniuersalia primò, si opus sit, præmittenda, & vel vena aperienda, vel purgandum corpus. Oculus verò ipse, quantum fieri potest, in locum suum reponendus, & conuenienti ligatura in eo derinendus. Postea cucurbitulae ceruici, ipsis verò oculis repellentia & roborantia, adhibeantur, ex decocto rosarum, balaustiorum, myrri, nucum cupressi, acaciæ, hypocistide; vel fucco psyllij, polygoni, plantaginis imponendus.

Christophorus à Vega, *lib. 3. cap. 1.* quendam, cui ex casu ab alto oculi extra palpebras exciderant, ita curauit. Primò oculos, quantum potuit, sensim reduxit, & iisdem linteolum duplicatum madefactum decocto rosarum & balaustiorum, & inspersa acacia, imposuit, & statim sanguinem ex cubiti dextri externa vena misit; decenterque victu adhibito ægrum restituit.

Si inflammatio oculo procidenti accadat, integrum ouum cum vino & rosaceo lana vel hapso lini exceptum oculis imponendum. Si procidentia sit à resolutione musculorum & nervorum oculi, apophlegmatismi usurpandi, humores pituitosos euacuantes, odora menta item eisdem absumentia, & oculos roborantia. Extra cataplasma usurpandum est à farina fabarum, rosæ, thure, spica, cum albumine oui. Et quia humores resolutionis causæ sæpe à partibus vicinis affluunt, fronti etiam adstringentia imponenda.

Vt 2℥. Florum rosar. rubrar. balaustior. myrrillor. acacia, rad. bistortæ, an. Drach. ii. boli Armeni Vnc. sem. cortic. thuris, croci, an. Drach. sem. aceri rosacei Vnc. j. olei rosacei q. s. F. Cataplasma.

Si cum humiditate flatus adsint, aliqua calida, quæ simul adstringunt, admiscenda, ut spica, radix cyperi, caryophylli, mastix, &c.

Vt 2℥. Fol. cupressi. Vnc sem. stor. chamamel. Drach. ii. thuris, mastich. an. Drach. i.

Fiat Sacculus in aqua rosarum madefactus, qui oculo imponatur. Vide Aëtium, *retrabibl. 3. ferm. 2. cap. 55.* Valesc. de Taranta, *lib. 2. cap. 23.*

Si verò oculus ita prolapsus sit, ut nulla de ejus repositione spes supersit, ut deformitas illa, quæ ex eo in

Dan. Sennerti Tom. II.

faciem propendente oritur, tollatur, totus oculus excindi potest. Ideoque corpore euacuato, ægro rectè collocato, instrumento idoneo, quale quidem apud Guil. Fabricium, *Centaur. 1. obseru. 1.* depingitur, vel alio conueniente, quod se orbitæ oculi accommodet, oculus excindendus; ne tamen palpebra lædatur, & noua deformitas inde fiat, cauendum; postea vulnus, ut alia oculorum, vulnera, curandum.

### CAPVT XLIII.

#### De Strabismo.

AD situm oculi vitiosum pertinet etiam Strabismus, cum pupilla rebus videndis non rectè, sed obliquè opponitur, neque ipsa in medio oculi apparet, sed ab eo declinat, ita ut in vna oculi parte plus albi appareat, quam in alia, & amborum vnus aspectus esse nequeat. Quo morbo qui laborant, cum res rectè intueri volunt, ut pupilla rebus rectè opponatur, oculos intorquent, toruūque aspectum exhibent.

#### Causæ.

Hujus mali causa à plerisque in vitiosam musculorum oculos mouentium dispositionem refertur. Et primò verum est, interdum conuulsis & contractis aut resolutis musculis oculum ad vnum latus mouentibus hoc malum excitari. dum oculi ita distorquentur, ut pupilla objectis, quorum species recipit, non rectè opponatur. Hoc quando accidit, oculi liberum & voluntarium morum amittunt, & res objectæ geminæ apparent, ut etiam Aristoteles, *sect. 3. 1. problem. 7.* docet; nisi æquabilis forsan fiat vtriusque oculi conuulsio, ita ut pupilla vtriusque oculi idem planum obtineat. Sic & sani, ac quorum oculi naturalem constitutionem habent, studiosè musculos contrahendo Strabismum quandoque imitantur. Conuulsio hæc accidere potest in epilepsia, in febribus malignis. Nonnullis verò à primo ortu accidit, contractis nonnihil, & in eo situ manentibus oculis. Quod fit, si mater vterum gerens moribundos, vel animalia mactata oculos conuertentia aspiciat, vel rerum fulgentium, ut pote gladiatorum, ignis vel fulguris intuitu obstupescat: sicut & ex consuetudine idem accidere potest, dum nimiam muscoli oculos mouentes ad vnum latus vel sursum, vel deorsum continuò mouentur, unde illi situi assuescunt, & in eo postea permanent. Sicut infantibus in cunis interdum accidit, dum sursum versus lucem, vel lucernam ardentem continuò oculos mouent, & quasi fixos habent. Ita memini, puellam in Patria, quæ etsi à primo ortu nihil vitij in oculis habebat, cum tamen noueram metueret, & post fornacem ferè semper sedens, limis oculis noueræ aduentum obseruaret, Strabismum contraxisse. Et quod ex conuulsione accidit, idem ex paralyti musculorum oculos mouentium fieri potest. Sic interdum post apoplexiam, aut ex affluxu humorum pituitosorum ad oculos, hoc malum contrahitur.

Verum secundò præter hanc causam, quæ ex situ musculorum est, alia adhuc Strabismi causa esse potest: situs nimirum humoris crystallini vitiosus; cum is pupillæ non rectè opponitur, sed ad latus alterutrum, vel sursum aut deorsum declinat ita, ut, qui hoc modo crystallinum situm habent, si rem rectè intueri volunt, oculum ad latus contorquere necesse habeant, donec vniformis fiat visio.

Vitium hoc etiam à primo ortu accidere potest; imò consuetudo detorto visu aliquid contemplandi in infantibus crystallinum quoque humorem in situ naturali turbare valet.

*Differentia.*

Sunt autem quatuor Strabismi differentia. Aliquando enim versus nares, aliquando versus tempora, aliquando sursum, aliquando deorsum pupilla declinat, & oculus contorquetur.

Præterea accidere potest, ut nunc vnus saltem oculus strabismum patiatur; nunc ambo; imò, ut alter oculorum versus nares, alter versus tempora, sursum vel deorsum feratur.

*Signa Diagnostica.*

Strabismus facile per se patet intuentibus, neque signis, quibus cognoscatur, opus habet. A qua causa verò pendeat, cognoscere non ita facile est: visionis tamen modus id patefacere potest. Si enim res geminae apparent, certissimum id signum est lésionis musculorum adhuc durantis. Si verò res non geminae apparent, causa est in cristallino; dum scilicet is ad planum rerum, & pupillam sese difformiter habet, unde oculi ita intorquendi veniunt, ut æqualis in utroque fiat representatio specierum. Si aliquis morbus præcessit, aut causa adit, quæ resolutionis & contractionis musculorum indicium exhibeat, musculis affectis Strabismus, pupillæ situs diligenter attendendus. Nam si à vitioso situ cristallini sit, pupilla non erit ad latera contracta, ut in Strabismo ex conuulsione. An verò ex mala assuetudine, vel defixo oculorum obtutu, contractus sit Strabismus, parentes, vel qui infantibus insuerunt, docebunt.

*Prognostica.*

Strabismus à primo ortu & mala conformatione non curatur; nec qui à mala assuetudine, vel etiam conuulsione aut paralyti, si sit inueteratus, vnquam curatur. Recens verò malum interdum curationem suscipit.

*Curatio.*

In infantibus hoc malum curatur, si larua aliqua vel cappa factei obducatur, ac foramen oculis oppositum ita disponatur, ut infans in partem oppositam ei, quo & pupilla & oculi præter naturam vergunt, oculos dirigere cogatur. Quod ut commodius fiat, ex lamina ferrea vel argentea canales instar infundibuli formantur, & foraminibus illis in larua vel cappa assuantur, ut per eam aspectus dirigatur. Vel lucerna in partem oppositam, quod oculi præter naturam declinant, ponatur, ut infans fixo obtutu eam aspiciens in contrarium oculos deflectat.

Non tamen certo rei intuitu solum musculi oculorum aliter atque aliter disponi, sed etiam humores oculi, puta crystallinus & vitreus, varias habitudines & situum differentias acquirere possunt.

Si à spasmo vel paralyti sit strabismus, curatur ut spasmus vel paralyti; de quibus supra.

## CAPVT XLIV.

*De Cacitate, & visus debilitate.*

Atque ita hactenus omnes morbos, qui tum singulas oculi partes, tum ipsum oculum totum infestare possunt, explicauimus. Restat, ut de symptomatibus, quæ circa visionem, & oculo accidunt, dicamus. Inter quæ cum primo loco sit læsa actio, primò de visione læsa dicendum.

Læditur autem visus tripliciter; vel quia planè aufertur, vel quia imminuitur, vel quia deprauatur.

De abolita & imminuta visione hoc capite dicemus. Cum planè aufertur visus, cæcitas nominatur. Græcis *πρόσβια* quacunque etiam causa inducatur.

Imminuitur verò visio plurimis modis. Primò enim res in quacunque etiam distantia non clarè videntur, quod vitium si citra manifestam oculi affectionem accidat, Græcis *ἀμβλυopia* & *ἀσέβησις* nominatur, ita ut etiam *ἀμβλυopia*, ut mox dicetur, per *ἀσέβησις* definiatur. Ant si quæ est inter ea differentia, mala sunt gradibus solum distincta. Nam si manifestum aliquod in oculo vitium appareat, ut accidit in suffusione, albugine, crassitie corneæ, & similibus affectibus, peculiare nomen à causa læsio illa visus accipit, ut ex superioribus patet.

Quantum sæpe & ista vitia generalibus nominibus exprimantur. Ita vbi senes humoribus & tunicis non nihil exsiccatis obscure vident, caligo oculorum appellatur. Idem vitium si iuuenibus accidat, heterado oculorum & obscuritas visus nominatur.

Pertinent huc & symptomata, quando homo noctu, & tenebris ingruentibus, vel nihil vider, vel contra melius, quàm de die, vider. Imò compertum est, testanturque id Viri doctissimi, quosdam noctu in densissimis tenebris vidisse, & literas legere potuisse, & Suetonius, in *vita Tiber.* & Plinius scribunt, Tiberium noctu expergefatum omnia primò videre potuisse non alio modo, quàm in clara luce, postea tenebris paulatim ingruentibus. Cælius Rhodiginus, lib. 1. 5. *antiqu. lect. cap. 2.* sanctè affirmat, sibi etiam quandoque obtigisse, ut noctu videre potuerit. Idem de se affirmat Cardanus, lib. 8. *de variet. rer. cap. 43.* Et solenne hoc etiam fuisse I. C. Scaligero, filius Iosephus, in *vita eius*, tradit. Et Hieron. Fabricius ab Aquapendente, de *visus organ. part. 2. cap. 4.* narrat, Pisis hominem quendam degisse, qui eam nactus erat oculi constitutionem, ut noctu probè videret. Idemque de aliis etiam narratur. Estque is affectus diuersus à nyctalopia Hippocratis. Hac enim qui laborant, noctu melius vident, quam de die, sed non in tenebris, seu de die, hoc est, luminoso aëre, parum vel nihil vident, noctu verò, vel in loco obscuro, non tamen totali luminis absentia, melius; illi verò, de quibus dixi, etiam de die bene vident, sed noctu quoque, & quidem in tenebris. Noctuas, nycticoraces, vel pertiliones, feles, glires, mures in tenebris videre, notissimum.

*Ἀμβλυopia* ergo (quæ & Hippocrati, in *Prognosticis*, *ἀμβλυωπὸς* est; sicut & quibus per morbos visus hebetescit, jdem *ἀμβλ. ὥσιν* & *ἀμβλ. ὥσιν* dicuntur) ut à Paulo, lib. 3. *cap. 22.* definitur, *ἀσέβησις τὸ ὄραν ἀπὸ πλεονεξίας αἰτίας*, *ἡνίκῃ*, est visus obscuritas sine manifesta causa oborta, seu heberudo oculorum, & videndi debilitas, sine manifesto in oculis vitio, quomodo & Actuarius, lib. 2. *πρὸ διαγν. παθ.* definit.

Eadem visus obscuritas & *ἀσέβησις* nominatur. Ita enim Gal. 2. *Prorrh.* definiunt, *ἀσέβησις ἢ ὁσόνως ἀσέβησις ἢ ὁσόνως ἢ ὁσόνως*, hebescent & languida instrumentorum sensatio absque vlla turbationis visione. Vbi *ἀσέβησις* καὶ τῆς ἐχλυσίας ὁρᾶς, hoc est, obtusæ & caliginosæ visionis constituit discrimen. Nam, inquit, cum in utrisque obtusus sit aspectus, in caliginosa tamen visione ægris ipsis veluti cuiusdam caliginis sensatio accedit; exterius verò cernentibus nullam humidi præter naturam consistentiam hebescentis oculi habere videtur. At in eo perit lucidus oculorum fulgor, qui in acutè cernentibus inest; suntque hebescentes oculi mortuorum similes; ac permultis morientibus & adhuc viuus ejusmodi oculi apparent, velut etiam in extrema senectute. At non omnibus caliginosi videntur, verum iis solis, quibus humor, qui circa pupillam est, & sanitatis tempore tum splendidus, tum albus erat, conturbatus cernitur.

Interdum tamen pro visione ablatâ *ἀσέβησις* accipitur, & est perfectum videndi impedimentum citra manifestum



manifestum oculorum vitium, & purâ apparente pupilla; vnde etiam, vt supra dictum, gutta serena (der schenurize Seear) à nonnullis appellatur. Ita αμαυρωσις Ifagoges auctori est, οταν πανταλης παρεμποδισμος η τὴ ὁραν, χαρις φανερὰς ἀειτας, totius visionis impedimentum abique vlla manifesta causâ. Sic Paulo, lib. 3. cap. 22. αμαυρωσις εστιν οδ πανταλης οδς εστιν πολὺ τὴ ὁραν παρεμποδισμος, χαρις φανερὰς πάδus πρὸ τὸν ὁφθαλμόν: id est, plerumque perfectum cernendi impedimentum, citra vllam manifestam oculi affectionem.

Secundò cum res in debito spatio, & eo, quo aliàs sani res videre solent, homo videre non potest, sed, vt eas videat, propius oculis admouere cogitur, nisi perspicillorum vsu hoc vitium corrigat; vnde sæpe accidit, vt amicos & notos prætereuntes non agnoscat. Vitium hoc nonnullis à primo ortu contrahitur. Imò sunt ex illis, qui, nisi res minores oculis planè admoueant, & vt vulgò dicitur, naso attingant, & conuiuentibus & clausis nonnihil oculis videant, eas planè non agnoscunt; quod vitium μυωπία nominatur. Contrarium nonnullis accidit, vt res nonnihil distantes rectius videant, quam propinquas, & proinde cum res minores exactè cognoscere cupiant, eas nonnihil ab oculis remouere coguntur; quod vitium senibus familiare est, & perspicillorum idoneorum vsu quodammodo emendatur. Iisdem plerumque accidit, vt, etsi de die sic satis videant, ad lumen tamen accensum res minores non satis agnoscant; ideòque lumine copiosiore opus habent.

Nyctopia.

Νυκταλωπία autem & νυκτάλωψ, (quanquam posterius vocabulum & hominem ipsum sic affectum significat, quem Plinius, lib. 28. c. 11. Lusciosum nominat) Latinis nocturna cæcitus, Celso generaliori vocabulo imbecillitas oculorum, ejusmodi affectio est, quâ detenti interdum quidem satis, occidente v. Sole obscurius, noctu denique nihil cernunt. Hippocrati contrà Νυκταλωπία, in 2. prorrhetic. dicuntur, qui noctu cernunt melius, quàm interdum; qua significatione & vocabulum in definitionibus Medicis, quæ Galeno ascribuntur, exponitur. In *introduc.* verò seu *Medico* utroque sensu hæc vox accipitur. Sed recentiores Græci eâ significatione vocem vsurpant, quâ diximus, quam & in præsentia retinemus. Est igitur Νυκταλωπία symptoma diminutæ facultatis videndi, quâ affecti mediocribus ingruentibus tenebris, quæ oculorum sanorum visioni nullum impedimentum afferrent, parum aut nihil cernunt, atque ita visus iis in nocte, vt Auicenna loquitur, hoc est, in obscuro, euanescit.

#### Causse.

Quia autem visio perficitur oculo, qui pluribus partibus constat, & spirituum animalium beneficio, causæ læsæ visionis aut in cerebro, & spiritibus opticis, aut in nervo optico, aut in humoribus, aut in oculi tunica cornea & pupillâ, aut in musculis querenda est.

Cecitas & visus debilitati causa.

Et quidem cecitas & visus debilitas ferè causarum magnitudine saltem differunt. Etenim si causa sit maior, cecitas; si minor, visus debilitas introducit.

Si visio cerebri vitio lædatur, plerumque reliqui sensus simul afficiuntur; quia spiritus animales in cerebro generati commune omnium sensuum instrumentum sunt, & in omnia sensuum organa diffunduntur. Si autem sensus reliqui integri sint, visione læsâ, non totum cerebrum afficitur, sed vel nervus opticus saltem, vel cerebrum eâ parte, quâ nervi optici prodeunt. Cerebrum autem afficitur vel intemperie simplici, aut cum materia; vnde spiritus exigui aut impuri gignuntur: vel debilitate ex nimia euacuatione, diuturno vel graui morbo, animi mœrore: vel denique angustia prohibente liberum transitum spirituum.

Quomodo visio lædatur vitio spirituum.

Si autem queratur, quomodo spirituum vitio visio lædatur, ex vulgata doctrina spiritus lucidus, tenuis, multus facit, vt exquisitè & distinctè omnia cernantur,

tam propinqua, quàm remota; lucidus, tenuis, paucus, tam propinqua tantum facile agnoscit, non perspicit etiam res valde luminosas; talique dicuntur μυωπες seu lusciosi, qui tantum conuiuentibus oculis cernunt; atque hi iuuantur perspicillis, vt vocant, minorantibus, quæ secundum illorum sententiam radios illos visuos tenues, paucos colligunt ac coercent, ne in longiore distantia deficiant. Lucidus, crassus, multus, remotiora melius cernit, crassitie ad intuitum remotiorum continente lumen, ne dissipetur, ad propinquiora hebetante; cum in ipso progressu largiore spiritus crassus nonnihil subtilior & purior reddatur. Iuuari hi dicuntur perspicillis, vt vocant, ingrossantibus, quibus res visa maiori specie offertur. Lucidus, crassus, paucus, nec propinqua, nec remota expedite cernit. Atque ad hanc causam referunt νυκταλωπία. Obscurus spiritus visioni incommodus est, & tantò magis, quò crassior fuerit.

Verum vulgata illa doctrina non sine causa in quibusdam suspecta est. Primò enim nititur falsâ hypothese, visionem fieri per emissionem radiorum. Spiritus equidem ad visionem necessarij sunt, sed non eo modo, quem ipsi statuunt. Deinde μυωπία, causa ponitur paucitas spirituum; cum tamen multi hoc symptoma in iuuentute patiantur, in quibus nullus spirituum defectus animaduertitur. Ideòque symptomatum horum in visu causâ potius ex humorum, & præcipuè crystallini, vitiis deducitur, vt postea dicitur. Hinc potius probabile est, eam solùm visus debilitatem à spirituum defectu & impuritate fieri, cum res minutæ & remotæ non videntur, atque etiam magnæ non satis distinctè percipiuntur. Atque tum proculdubio in sensibus etiam aliis vitium aliquod percipitur; cum cerebrum spiritus non solùm oculo, sed & aliis sensuum & motus organis suppeditet: quod si absit, proculdubio in humoris aquei, crystallini, vel vitrei obscuritate & impuritate, causa visus læsi & debilis querenda, vel etiam in nervo optico.

Nervus autem opticus læditur interdum ex nimia refrigeratione, si quis ventorum frigidorum flatum fronte & oculis minus rectis excipiat, frigore ad ea loca vsque, vbi nervi optici oculis inferuntur, penetrante. Idem ex oxyrrhodinorum frigidorum valde nimio vsu quandoque accidisse, & visum abolitum fuisse observatum est.

Nervorum opticorum.

Sed & alia nervorum opticorum vitia visum lædunt, & quidem, vt supra, cap. 35. dictum, angustia, ruptura vel contorsio, quæ pluribus de causis accidere possunt, à percussione, casu vel ictu, epilepticis convulsionibus, immoderata & violenta spiritus retentione, vt nonnunquam tubicinibus accidit, & scæminis in partu difficili, ex vehementi conatu; nonnunquam sine causa violenta, post morbos graues, pestem, vehementes capitis dolores, & similes causas, & quod frequentissimum est, ex cerebri excrementis pituitosis, seu extrâ nervos opticos comprimentibus & irrigantibus, seu intus obstruentibus. Neque enim video, quid obster, cur non etiam ex ipso cerebro humores in nervos opticos tam amplios infundi, eoque obstruere possint. Possunt tamen etiam vapores crassi melancholici in nervos opticos irruentes spirituum influxum prohibere. Ita enim memini Studiosum ex scabie in febrem incidere, cui asthma & cecitas accidebat, ita vt nullo vitio in oculo apparente per triduum nihil videret. Is medicamentis idoneis adhibitis & yrina nigra reddita conualuit. Puer verò ex eadem causa, scabie scilicet, in febrem & cecitatem incidit, qui epilepsia accedente mortuus est. Memini etiam quendam ex affectu hypochondriaco in cecitatem incidisse. Referunt quoque nonnulli inter causas læsæ visionis siccitatē nervi optici, quæ post febres ardentes relinquatur. Sed cū credibile nō sit, in cerebro & loco cerebro vicino tantā siccitatem induci posse, probabilius est, humorē aliquē vitiosū ibi relinqui, qui nervos opticos seu obstruat, seu cōprimat.

Humoris vi-

Humorum tandem & corneæ tunicae ac pupillæ vitio visus sæpe aut debilitatur, aut imminuitur. Cum enim istæ partes omnes ad specierum sensibilem receptionem comparatae sint, si debito modo sese non habeant, receptio illa impeditur; unde visus vel planè tollitur, vel impeditur, pro magnitudine causæ; de quibus omnibus capitibus præcedentibus & , Instit. lib. 2. part. 3. §. 2. c. 3. dictum.

Nyctalopia.

Vt de Nyctalopia saltem aliquid in specie addam. Aërius malum hoc oriri statuit propter aliquam cerebri imbecillitatem, & maxime ob spiritus visui, humorumque & tunicarum oculi crassitudinem. Et credibile est, humorem & spiritus crassos debiles species difficulter transmittere, & quasi obscurare. Ideoque Nyctalopes saltem in clara luce, & clara saltem, & sufficienter illuminata objecta vident. Deinde, & præcipue, pupillæ angustia nyctalopiæ causa esse potest. Non, ut quidam putant, quia per angustam pupillam modicum lumen admittatur, quod visum mouere nequeat. Nam, ut supra etiam dictum, lumen externum ad representationem specierum visibilium in oculo depictarum, non est necessarium, sed potius opacitas hic requiritur. Causa verò, cur angustia pupillæ nyctalopiam inducat, hæc est, quod in angustia pupillæ pauciores radij, qui à quolibet objecti visibilis puncto ad quodlibet pupillæ punctum radiant, debilitè illuminati oculum ingrediuntur. Unde accidit, ut, cum objectum non sit multum illuminatum, lumenque deuehens sit paucum, obscurior sit rei imago; quæ tamen illustrior fieret, si plures radij per amplam pupillam oculi cameram ingrederentur. Vbi & hoc notandum; animalia quædam, quæ noctu vident, pupillam non ita multum dilatant, ut homines faciunt; qui obscuriori loco imagines veniunt, quod in bubone observare cuncti et promptum est. Nam licet illa dilatatione opus habere videatur ad plurium radiorum visibilium debili luce radiantium perceptionem; tamen conuexitas illa, & protuberantia insignis, in primis etiam crassities notabilis, corneæ tunicae, ut mox dicetur, ita radios refringi facit, ut angustè coeant, coarctatque pupillam subire possint. Nam dilatio pupillæ in his animalibus lucidos oculos habentibus iridem contraheret; quam tamen visionis obeunda, & objectorum illuminandorum gratia conuenit esse ampliorem. Talis enim plus luminis spargit.

Cur quidam in tenebris vident.

Cur autem quidam etiam in tenebris & noctu videant, explicare non ita facile est. Vt aliorum sententias prolixè non recenscam, primò hoc extra controvertendam esse puto, illos, qui noctu vident, talem oculi constitutionem habere, qualem feles, & alia ejusmodi animalia noctu videntia, id est, habere lucem aliquam internam, non quidem in crystallino, vel aliis humoribus insidentem; (hoc enim si ita esset, res objectæ non viderentur, sed fulgor saltem quidam in oculo perciperetur) sed in vena tunica, & illa ejus parte, quæ iridem constituit. Et quidem non in parte interiore & concava, (Nam sic turbaretur visio; & præstar interiorē esse tenebrosam) sed saltem exteriorē superficie vena.

Qua ratione autem lumen illud vena inhaerens ad visionem nocturnam concurrat, non ita planum. Quidam ad quæstionis hujus solutionem præsupponit falsas hypotheses; nimirum lumen ratione objecti non requiri, & objecta visibilia quolibet tempore perenniter species suas emittere, non verò opus esse externo lumine quod eas exsuscitet. Verum rationes, quibus paradoxum hoc probat, nullas habet, nisi quod de felibus, nocturnis, & aliis animalibus noctu videntibus habetur. Verum nulla hæc probatio est, sed de hoc ipso quaeritur, qua ratione talia animalia noctu videant, & an objecta illuminata videant. Et rationi, ac omnibus Philosophis, imò ipsi experientia contrarium est, species visibiles nulla luce excitatas; posse per se radiare, adeoque ad oculum peruenire, ut circum illum versantes

tandem illuminentur. Immotum potius & Physicorum, & Opticorum principium est, objecta visibilia non nisi illuminata videri, lumenque colorum esse actum, & specierum visibilium vehiculum. Deinde & hoc certum est, ut antea etiam dictum, lucem quandam animalium quorundam vena tunicae & iridi inesse, quæ etiam de die apparet. Ex quo concluditur, lucem istam ex animalium istorum oculis coruscantem causam esse, ut videant, & quidem non propter illuminationem organi neque medij, sed objecti. Prodit enim illud lumen foras, & objectum illuminat; illuminatum hoc radiat vi lucis, & speciem oculo iterum sistit, licet circumstantes partes & objecta à latere sita illuminata non appareant. Fidem faciunt huic rei specula concava, quorum vi lumen in distans proicitur objectum, ita ut literas in remoto pariete legere liceat; cum tamen loca speculo proxima non sint illuminata, sed tenebrosa. Neque sententia huic obstat, quod lumen illud, quia debile, in longum spatium sese diffundere nequeat. Nam primò sphaera luminis longissimè exporrigitur; docentibus id opticis & experientia. Deinde nondum probatum, animalia illa lucidos oculos habentia objecta longè distantia percipere. Licet quoque objecta ab oculis eiusmodi lucidis illuminata ab aliis non videantur; tamen inde non sequitur, planè non irradiari. Nam primò nyctalopes in crepusculo nihil vident; non tamen sequitur, crepusculi lumen esse nullum adeoque objecta planè non illuminari. Deinde quod talia objecta ab aliis non videntur, ratio est, quod respectu aliorum oculorum non sunt satis illuminata, & quia alij remotius ab objecto abstant.

Vt ergo res hæc magis manifesta fiat, sciendum, ad visionem lumen requiri, quod objectum radiare faciat; hoc si sit exiguum, ita, ut radiatio sit obscurior, quod sit tempore nocturno, vel in crepusculo, opus esse, ut plures radij vi luminis radiantes, qui ab uno etiam visibili puncto continenter profluunt, oculum subeant. Sic enim ex pluribus radiis coagmentatio fit representationis speciei illustrior. Duabus autem de causis multitudine radiorum visibilium debilitè radiantium ob exiguum illud, quo deuehuntur, lumen, oculi cameram potest ingredi. Primò cum pupilla dilatatur. Sic enim fit, ut per amplam portam unius puncti visibilis radij plures oculi penitiora subeant. Et hæc est vera causa dilatationis pupillæ, nempe receptio plurium radiorum in oculum, non verò luminis externi admissio. Externum enim lumen visionem impedit; multitudo verò radiorum visibilis suo modo luminosorum speciem pingit in oculo clarissimam. Secundò cum propter amplitudinem tunicae corneæ plures radij visibiles recipiuntur, & propter ejus protuberantiam, & conuexitatem majorem ad majorem angulum refringuntur. Sic enim fit, ut radij visibiles, licet debiles, coagmentati, & copia aucti pupillam subeant etiam paruum, & tandem in retiformi tunica satis claram rei exhibeant imaginem. Et hæc est veratio structura oculi in bubonibus, & cur noctu videant. Habent enim bubones corneam tunicam non solum amplam, spatiosam, insigniter protuberantem, seu valde conuexam, sed etiam ita crassam seu profundam, ut vix in vilo animali, licet grandissimo, tam crassa reperiat. Unde unius puncti visibilis tot radij, quot in hac tunica cornea puncta, recipiuntur, & propter ejus conuexitatem majorem maxime refringuntur, & adhuc magis, quod hæc tunica profundior, tandemque breui spatio arctari pupillam non admodum amplam rectè subeant, speciemque notabilem retinae offerunt. Animalia enim, quæ noctu vident, pupillam in tenebris non habent multum dilatatam; quia non opus est multa dilatatione; cum species amplissimæ etiam cornea tunica susceptæ, hujus conuexitate & profunditate multum infraactæ omnes exiguam pupillam ingredi valeant.

*Signa Diagnostica.*

Cum verò à tot caussis visus debilitas & cœcitas ortum habere possit; quibus signis eæ discerni queant, videndum: quod factu difficilimum. Et omnino certitudo adeo exacta hic nulla datur, nisi plurima inter se conferantur: & vt Auicennas loquitur, cognitio ista existimatiua est, id est, coniecturalis. Et si enim visu discerni possit, an vitium sit in cornea: tamen si in cornea vitium non sit, an sit in humore aqueo, crystallino vel vitreo, aut neruo optico, distinguere non ita facile est.

Primo ergo oculus diligenter inspiciendus, & videndum, an in cornea aliquid vitij appareat. Si in hac nullo ad sit vitium, considerandum, an in neruo optico causa læsæ visionis hæreat.

*Nervi optici  
affecti signa.*

In neruo autem optico vitium non esse, ex eo cognosci posse putant, si fricando vnum oculum, & alterum comprimendo, in pupilla eius, qui fricatur, dilata-tio & constrictio percipiatur. Cum enim liberè transeunt spiritus, neruus opticus apertus erit. Verum si-gnum hoc, quod certissimum vulgò habetur, pro certo non habet Platerus; cum spiritus animales non statim instar oculum distendant, neque oculum adimpleant, sed in retiformi neruo persistant. Ideoque ea, quæ præcesserunt, considerata. Si in neruo optico vitium sit, causa eæ præcesserunt, quas supra recensuimus. Præ-terea plerumque subito inuadit visus læsio, quæ à ner-uo optico est; cum, si ab aliis caussis sit, paulatim gene-retur. Deinde etiam videndum, an homo oculi, vt rap-pellant, id est, imago illa & idolum adspicientis, in pu-pilla ægri appareat. Si enim non appareat, videndum, an cornea vel tota, vel parte, quâ pupillam obtegit, obscu-ra sit. Si enim obscura non sit, vel in humore aqueo, vel in aranea, quæ obtegit crystallinum, vel in hu-more crystallino vitium est. Si causa in humore aqueo sit, & initium suffusionis ad sit, vapores aut *παχυντα*, crassa quædam corpuscula, per humorem aqueum dispersa sint; tanquam pusilli culices, vt su-pra dictum, & lanarum filamenta, vel araneorum te-læ oculis obuersionantur. Vbi tamen considerandum, an continuò tales imagines appareant; an per intervalla quædam. Si enim aliquando tantum appareant, sit hoc per consensum partis alicuius inferioris: si continuò, est initium suffusionis. Si in cornea vel pupilla vitium sit, aspectu illud cognoscitur, an scilicet macula, vel aliud vestigium in ea appareat. Si causæ externæ præcesse-runt, ex ægri relatione cognoscuntur.

*Prognostica.*

1. Debilitas visus ex senio vix curationem suscipit.
2. Similiter quæ ex crystallini & vitrei humoris confirmata obscuritate vel siccitate ortum habet, aut ex pertinaci obstructione nerui optici,
3. Glaucedo crystallini vel vitrei ab ortu contra-cta, vel quæ senibus accidit, incurabilis est; item quæ ab humore existit post suffusionem congelato, teste Aëtio, & quæ à siccitate confirmata. Ita rectè dixit Galenus, in 10. de usu partium, cap. 7. glaucedinem potissimum parere cœcitatē.
4. Debilitas visus genita post euacuationes nimias vel morbos diuturnos, instaurato rursus corpore cor-rigitur.
5. Cœcitas ob fortem capitis plagam & casum ab alto subito facta interdum altero vel tertio die tol-litur.
6. Quæ paulatim fit visus obscuratio, non admo-dum difficulter curationem recipit, nisi senibus acci-dat: quæ verò subito fit ob fortem capitis plagam, aut casu ab alto, difficilior curatur; atque eò difficilior, si neruus opticus læsus sit.

*Dan. Sennerti Tom. I I.*

7. Si corneæ vitium sit magnum, visio in totum aboleretur. Incurabile etiam est vitium, si rugosa sit facta, vt in senibus.

8. Nyctalopia, præsertim inueterata, raro curatur, cum ob humoris, plerumque crystallini, vitium acci-dat. Reliqua prognostica e suis locis secundum causa-rum varietatem petantur.

*Curatio.*

Curatio visus debilis & aboliti variat secundum caussarum varietatem, vt ex singulis capitibus patet. Vt pauca saltem addamus; etsi, vt dictum, vbi nullum extra in oculo vitium animaduertitur, facile definiri non possit, in qua oculi parte causa visus læsi hæreat: tamen id adeo curandi rationem non facit. Siue enim in vitreo, siue in crystallino sit, eâ sublatâ visus restitui-tur, modò morbus sit curabilis. Non enim omnis visio-nis læsio ex partium internarum vitio curabilis est. Nam quæ vt dictum, ex crystallini & vitrei humoris confirmata obscuritate vel siccitate, incurabilis est. Si autem visum recuperandi spes sit, præcipuè cerebrum, quod oculo causam morbi suppeditat, euacuandum; & purgantia talia, tum apud alios, tum apud Platerum, lib. 1. Præst. describuntur. Nec omittenda masticato-ria, gargarismi, apophlegmatismi, vesicatoria, cau-teria, & similia, quæ vitiosos humores e cerebro euacuant.

Tandem usurpanda medicamenta *ὀφθαλμικά*, seu vi-sum roborantia, id est, quæ spiritus puriores reddunt, & obscuritatem in humoribus, quantum possibile est, tol-lunt, oculosque roborant.

Nonnulli hic multi sunt in externis describendis. *Topica an visum con-ferrent.* Verum cauendum, ne acerbis eiusmodi medicamentis oculi lædantur.

Externa talia sunt ex *euphrasia*, *fœniculo*, *chelidon*, *valeriana*, *astere Attico*, *ruta*, *calendula*, & similibus ophthalmicis: passimque multa extant.

Vt ℞. Aq. rosar. opt. Vnc. vi. cyani, euphrag. ana Vnc. is. vini Maluat. Vnc. i. tutia præpar. Drach. is. camphor. ḡ. iiii. caryophyll. crasse incisor. num. viii.

Bulliant simul in fictili, vel vitro moderato feruore. Fiat Colatura, in qua calente adhuc dissolue *vitriol. alb.* ḡ. vi.

℞. Euphrag. ruta, consolid. reg. an. Vnc. i. nucis moschat. macis, an. Vnc. is. caryophyllor. zingiber. an. Dra. i.

Contusis affunde vini optimi lb. iiii. vel q. s. Di-gerantur per aliquot dies, postea destillentur in bal-neo. Aqua quotidie manè & vespèri oculis instil-letur.

Vel ℞. Euphrasia, ruta, betonica, verbena, cheli-donia, flor. cyani, rorismarini, consolida Regalis, an. M. i. thuris, aloes, myrrha, an. Drach. ii. calami aro-matici, macis, caryophyll. an. Drach. ii.

Concisus affunde aqua rosarum lb. ii. ruta, vini Maluat. an. lb. i. urina puerorum lb. is.

Macerentur per dies 8. Postea destillentur.

Vel ℞. Euphrag. fœniculi, ruta, chelidonia, ver-bena, ana M. i. flor. rorismarin. M. is. sem fœniculi, anisi, carui, sileris montani, an. Vnc. is. rad. calami aromatici Vnc. is. macis, thuris, myrrha, an. Drach. i. aqu. rosar. ruta, vini Maluatici. an. lb. ii.

Macerentur per dies aliquot, postea destillentur.

Vel ℞. Mellis despumati Drach. i. succi fœnicu-li Vnc. i. fellis accipitris, lucij piscis, perdicis, an. Drac. i. Misce.

Vel ℞. Radic. gentiana minutim concisa q. v.

Coqu. in aq. & vini partibus æqualibus, & colatura oculo inspergatur.

Visum post morbillos & cicatrices ab iis relictas cla-rificat Aq. ophthalmica, quæ Maximiliano Imperatori tribuitur.

*℥. Stercus recens anserum iuniorum mense Martio vel Aprili, destilla aquam; quæ ter de die oculis instilletur.*

*Alia: ℥. Tutia preparat. Drach. ii. vitrioli albi, sarcocolla, nihili albi, aloës tota, an. Scrup. i. camphora ʒ. ʒ. aq. fœniculi, rosar. chelidonia, pîmpinella, nymphaea, an. ʒ. ii. off. sepia Drach. i. Misce.*

*F. Collyrium.*

Veteres, ac imprimis Arabes, vehementer commendant hepar hircinum, cuius vel assati saniem oculis instillant, vel vaporem apertis oculis suscipere, vel ipsum assum cum sale edere iubent.

Alij hepar ipsum cum felle assant. Ita enim destillans sanies plus virium acquirit.

Commendatur & hæc Aqua de hepate hirci:

*Aqua de hepate hircino.*

*℥. Succus fœniculi, chelidonia, ruta, euphrasia, an. ʒ. ii. mell. opt. Drach. x. tutia, sarcocolla, ʒ. crudi, aloës opt. an. Vnc. sem. nuc. moschat. caryophyll. croci, an. Drach. i. fel. caponis, gallor. gallin. an. Vnc. sem. sacch. candi de syrup. rosar. Drach. vi. hepatis hirci Vnc. i. ʒ. flor. rosar. rorismar. an. M. ʒ.*

Hepar frustillatum incidatur, reliqua contundantur omnia. Misce, & s. a. destillentur.

Auicennas & hepar Leporis ad hunc usum commendat. Fortius est & hoc, quod sic paratur:

*℥. Piperis longi in hepate hirci non castrati cocti Drach. ii. fellis hircini Vnc. ʒ. liquoris ab hepate hirci, dum assatur destillantis Drach. vi. M. & colentur.*

Commendatur & fel animalium, ac nonnulli omnibus fel viperæ præferunt.

*Aqua Sapphirica.*

Agittæ aquam Sapphiricam commendare solent, quæ tamen ex sapphiro non paratur, sed à colore ita dicitur. Paratur enim ex aqua calcis viuæ, in quâ parum ammoniaci dissolutum est, quæ in peluim æneam infunditur & per noctem relinquitur, donec sapphiri colorem acquirat.

Verum ista aqua, & similes, propriè, vt dictum, oculos non confortant, sed vlcera eorum sanant, cicatrices exterunt, crassitiem & obscuritatem corneæ tunicæ extenuant.

Plura vide apud Aëtium, *tetrabil. 2. serm. 3. cap. 46.* & apud Auicennam, *sub titulo de Nyctalopia.*

Internâ supra, *cap. 38.* descriptimus, vnum & alterum saltem adhuc addemus.

Vinum euphragiatum hoc valde vtile est:

*℥. Rad. helenij Vnc. i. ʒ. euphrag. M. i. ʒ. sem. fœnicul. sileris montani, an. Vnc. ii.*

Suspēdantur in musto, vel in hydromelite recens cocto, donec deferbuerit. De hoc æger singulis diebus mane & in prandio haustum vnum sumat.

Commendatur etiam sequens Vinum ophthalmicum:

*℥. Herba euphrag. M. ii. sem. fœnicul. Vnc. ʒ. cinamomi. Drach. iii.*

Concisa ligentur in nodulo, qui suspendatur in vini Rhenani mensur. ii.

Et euphrasia quocunque modo sumpta, & medicamenta ex ea parata, conserua essentia & sal, ad visum confortandum plurimum omnino conducunt.

Sequens quoque Aqua ophthalmica efficax est, si eius cochl. ʒ. vel i. mane ieiuno ventriculo sumatur.

*Aqua ophthalmica ad intra.*

*℥. Fol. ruta, euphras. verben. fœnicul. an. M. j. summat. rorismar. salvia, flor. rosar. an. P. ii. granor. iuniperi Vnc. i. cass. lign. Vnc. ʒ. ligni aloës Drach. ʒ. sem. fœnicul. Drach. ii. sileris montani Drach. i. ruta Drach. ʒ.*

*Infunde in vini Maluatici ʒ. vi.*

*Macerentur per dies quinque. Postea s. a. destillentur.*

*Aqua Ophthalmica D. Andr. Dôteri.*

*℥. Rad. valerian. communis, phs Pont. an. Vnc. ii. caryophyllar. ʒ. ʒ. fol. ruta, verben. fœnicul. euphras. cum flor. ana Drach. vi. baccar. iuniperi recent. Vnc. i. lauri recent. Vnc. ʒ. flor. calend. meliss. Turc. salvia, rorismar. rosar. alb. an. Drach. ii. sem. fœnicul. Vnc. ʒ. caryo-*

*phyll. cardamomi min. cubeb. an. Drach. i. cinamomi ac. Vnc. i. ligni aloës, Rhodij, an. Drach. i.*

*Præparatis s. a. affund. vini Maluatici ʒ. xii. postea in B. destillentur.*

*Spiritus Euphrasie compositus:*

*℥. Spir. cerasor. nigr. ʒ. i. aq. hirund. compos. maior. Vnc. vi. doronici veri, cass. lign. vera, amomi veri, rad. valerian. chelidon. an. Drach. ii. mari veri, fol. ruta, an. Drach. i. flor. euphrag. Vnc. i. ʒ.*

*Infund. per noctem in liquoribus his: manè per B. destillentur leni igne, destillatum seruetur.*

*Aqua visum fortificans alia:*

*℥. Spir. euphrag. comp. Vnc. i. ʒ. aq. epilept. Lang. elixir. vite Matthioli, ana Vnc. i. essentia rorismar. Vnc. ʒ. ambra gran. vi. moschi gran. i. ʒ. syrup. de cinamomo Vnc. i. ʒ. Misce.*

*Vel ℥. Succus fœniculi Vnc. i. ʒ. ruta, chelidonia, an. Vnc. i. mellis ʒ. i.*

*Coquantur ad iustam spissitudinem.*

*Denique adde pulu. euphrag. Vnc. i. sem. fœnicul. Vnc. sem. macis, cubeb. an. Drach. ii.*

*F. Electuarium.*

*Vel ℥. Conseru. euphrag. Vnc. i. ʒ. theriac. And. ʒ. ii. sem. succini albi prepar. Drach. sem. margarit. prepar. Scrup. i. spec. diapæon. Drach. sem.*

*Cum syrup. de rosis F. Electuarium, quo cubitum iturus vtatur æger.*

*Vel ℥. Elect. Humaim Mes. Vnc. i. ʒ. conf. euphrag. Vnc. ii. pulu. sem. fœnicul. Drach. i. sem. sileris montani. Drach. i. extract. rad. valerian. Scrup. i. spec. Occonis. Drach. i.*

*Cum syrup. de stœchade. Fiat Mixture.*

*Vel ℥. Conseru. euphrag. Vnc. i. sem. betonica, rorismarin. an. Vnc. i. rad. enula cond. Drach. ii. fœnicul. cond. Vnc. sem. myrobal. chebul. cond. Drach. iii. ol. ruta Scrup. sem. siler. montan. gran. vii. essent. vel spir. rad. valerian. Drach. i.*

*Cum syrup. de beton. q. s.*

*F. Electuar. de quo manè & vesperi capiatur aliquid, nucis castaneæ magnitudine.*

*Vel ℥. Cinamom. zingiber. nucis moschat. cubeb. caryophyll. macis, an. Drach. i. cardamomi, cumini, an. Drach. sem. sem. anisi, fœniculi, an. Drach. ii.*

*Add. sacchari ad pondus omnium. Fiat Electuarium.*

*Vel ℥. Sem. fœniculi Drach. i. rad. valerian. Vnc. ʒ. sem. anisi, piperis, zingiberis, cumini, pulegij, flor. rorismarini, baccar. iuniperi, galanga, caryophyllor. an. Drach. i. euphrag. Vnc. sem.*

*Pulueriscentur omnia subtilissimè, & cum melle despumato F. Electuarium.*

*Vel ℥. Euphrag. Drach. v. maioran. cinamomi, ana Drach. ii. sem. fœnicul. coriand. prepar. ana Drach. iii. anisi, carui, piperis longi, caryophyll. macis, nucis moschat. Zingiber. galang. an. Drach. i. spica Drach. sem. sacchari albi Vnc. ii. F. Puluis.*

*Vel hic Sal cibis admisceatur:*

*℥. Fol. euphrag. maioran. an. Vnc. sem. sem. fœnic. carui, an. Vnc. i. piperis longi, nigri, an. Scrup. i. cinamomi Drach. ʒ. salis Vnc. i. ʒ. F. Puluis,*

*Vel ℥. Fol. ruta, leuistici, flor. euphrag. an. Vnc. sem. rad. valerian. cinamomi, sem. fœnicul. an. Drach. ii. cubeb. Drach. sem. Sacchari ad pondus omnium.*

*F. puluis.*

*Vel ℥. Fol. ruta, euphrag. salvia, an. M. i. baccar. iuniperi Vnc. ii. cassia lignea elect. Vnc. sem. ligni aloës Drach. i. sem. fœnicul. Drach. ii. sileris montani Drach. i. ruta Drach. ʒ.*

*Infundantur in vini Maluatici ʒ. vi. macerentur diebus 14. postea destillentur. Exhibeatur manè cochl. i.*



## CAPVT XLV.

## De Visus deprauatione.

*Cum una res gemina apparet.*  
**N**on solum autem imminuitur vel aboletur, sed & deprauatur quandoque visus, & quidem variis modis. Primò enim fit visus hallucinatio, cum res vna gemina apparet; id quod ebriis sæpe accidit. Ita Forestus, lib. 1. *observ.* 39. refert, militi cuidam apertis oculis ambobus, quicquid videbat, duplex aperuisse, sed sinistro aperto, & dextro clauso, rectè eum omnia vidisse; & in Scholio, ex *Aggregatore*, refert historiam sacerdotis avari, qui cum haberet vnam candelam in manibus, credens esse duas propter auaritiã exstinxit vnam, existimans remanere aliam, & ita mansit in tenebris. Deinde cum, quæ recta sunt, curua apparent. Tertio cum omnia inuersa apparent. Memorabile est hic, quod Medico cuidam clarissimo Dresdæ accidit. Is cum forte scalam librum aliquem è forulis petiturus ascenderet, oculosque fortius sursum conuerteret, accidit, vt omnia ei postea inuersa apparerent, & homines in platea in capite ambulare viderentur. Adhibuit varia remedia, quæ tamen nihil profuerunt, durauitque hic affectus ferè quadrantem anni. Postea cum fortè iterum oculos sursum conuerteret, naturalis visio rediit, & omnia in recto situ vidit. Et ne quis, contra Christianam charitatem, causam imprecandi habeat, vt mihi malè sit, si temerariè id factum tradiderim; ter malè nuntio, si infideliter mihi retulerit: nomen viri exprimo, & fuisse eum D. Georg. Leuschnerum, Sereniss. Elector. Saxon. Archiatrum, idque mihi ab iis relatum aio, qui eum familiariter nouerunt, & quidam adhuc Dresdæ in viuis sunt.

*Alieno colore prædita. Iris, splendor.*  
 Pertinet ad visus deprauationem & ille affectus, cum res alio colore, quàm quò prædita sunt, apparent: vel cum circa candelam accensam iris quasi apparet: vel cum splendor fulguris modo, aut flammæ magnæ, oculis obuersatur; quod vitium ex inflata alapa interdum accidit, ita vt ignis scintilla quasi ex oculis exsillire videatur. Vt plurimum autem, si causã externa desit, dormientes infestat hoc malum; vnde Latinis splendores oculorum nocturni, seu oculorum coruscationes, Græcis *καυκιδες* appellantur. Vel dum res perforatæ & fenestratæ qd. apparent.

*Cum res, quæ non adsunt oculis obuersi videntur.*  
 Præterea fit visus deprauatio, cum res, quæ non adsunt, oculis obuersi videntur; vt culices, muscæ, filamenta lanarum, telæ aranearum, catenulæ quasi, vel dum nubeculæ oculis obuersantur.

Accidit visus deprauatio etiam, cum res, quæ firmæ & stabiles sunt, moueri & circumagi videntur; quod in vertigine contingit.

*Rhinoptes.*  
 Tandem ad visus deprauationem pertinet miranda illa historia, quam Schenckius, lib. 1. *observ.* 320. recenset, de Rhinopte quodam, qui ex malè curato vulnere per patentes narium meatus species visibiles recipiebat, & proxima quæque obiecta dignoscebat: de quo etiam in *Instituti. lib. 2. part. 3. sect. 1. cap. 6. & ibid. sect. 2. cap. 3.* dictum. Describit quoque illam historiam Smetius, *miscellan. lib. 10. pag. 531. & lib. 5. epist. 13.* vbi etiam rationem huius symptomatis reddit hoc modo: Cœcum, inquit, quendam utroque oculo orbum, naso pro oculis vtemem vidi, cuius beneficio obiecta omnia discernebat. Is dextro oculo ante annos multos, cum puer esset, priuatus fuerat. Tandem iuuenis factus (rusticus erat) ex ceraso in palum dum ligneum fastigiarum delapsus, vultum impexit, vt nasum vna cum oculo sinistro, gena, palpebra utraque, & supercilio disrumperet adeo fœdè, vt Chirurgus oculi globum euulsam profus crederet, eumque palo inhæsisse. Cicatrice tandem inducta post annum ab accepta plaga, dum in gramine apriatur, fortè lucem atque flolculorum candorem humi animaduerrere cocepit

per nasi cavitatem. Et iam per quinque aut sex annos continuos visionem eo modo exercuit, vt, quicquid offeratur, naso oculato distinguat exactè, sed depectando: suspectando enim lucem ferre nequit. Medicorum igitur collegio, vt examinaretur, pridie Cal. Martij iussu Electoris exhibebatur, cum suo enim Chirurgus in ius vocato contendebat. Portentosa itaque huius visionis modum, causamque esse deprehendimus, quod, sicut palpebra superior abrupto musculo attolli amplius non poterat, sed conglutinata quoque cum adnata oculi tunica coaluerat, ita etiam auulso musculo, qui oculum versus angulum acutum retrahere solebat, pupilla in angulum nasi se prorsus abdiderat. Et quia ossilla nasi non fracta modo, sed & luxata quodammodo, concinnè restitui non potuerunt, accidit, vt nasus pressior, latiorque, sinistra præsertim parte, euaserit, adeoque eiusdem naris meatum patentiore curatio reliquerit, per quem distorta latitansque pupilla videndi munus obibat, & res quaslibet naso obuias intenoscebat.

[Mira est historia de Rhinopte illo, qui per nares vidit, quam modò recensui, sed magis mira (nisi enim omnes circumstantiæ adderentur, ipse eam pro fabula haberem) quam recenset idem Henr. ab Heer, *observ. ead.* in hunc modum: Duo fratres nobiles inimicum, cuius vitæ insidiabantur, quia sorori vim vel fecerat, vel fecisse iactauerat, in campo, quod illum ad perdicum capturam pellexerant, arbori alligant, eique alterum oculorum cultro sectum omnino erunt, alterum digitis expressum ad extremitatem nasi pendulum relinquant, cæcum à bestiis noctu necandum reliquisse rati. Ille verò, sat commodè visu usus, vinculis se expedit, atque ante noctem in Chirurgi domum venit, qui oculum cavitati suæ repositum obligauit, sanumque hominem, probèque videntem dimisit. Affirmavit ille Henrico ab Heer, se cum pendulo oculo ambulanti viam quidem probè vidisse, sed cum agitatione vel fluctuatione quadam, qualem in superficie fluminum ventis agitatorum obseruamus. Id quod ab oculo & nerno optico motante se, inquietasque visibilibus species recipiente, prouenisse putat Henr. ab Heer; qui porro affirmat, se legentem scribentemque vidisse; & hominem quarto post anno, vtriusque familiæ rebus assiduâ lite ferè attritis, ab altero fratrum sclopeto occisum fuisse.

Quod si ita accidit, necesse est, vt omnia in oculo salua manserint, & oculus nihil præter naturam, nisi mutationem loci, passus sit, quod tamen quomodo sine detrimento musculorum oculi fieri poterit, mirum.

Addit idem adhuc aliam historiam de Viro, qui 64. *Alia.* annum agens affirmauerit, sibi puero ictu regulæ excussum oculum ultra dimidium nasi pependisse, sed eo reposito nihil in visu læsionis sensisse.]

## Causæ.

Primò geminata visionis, cum res vna duplex apparet, causa est, quod vnius obiecti species duobus temporibus recipitur, seu in vno oculo prius, quam in altero, recipitur, & ita duobus temporibus recepta duplex apparet; seu omnino cum duæ species rei visibilis binis oculis receptæ non in vno loco coeunt, sed distinctæ offeruntur.

Qua de causa autem hoc fiat, autores inter se non consentiunt. Nonnulli in nervis opticis causam quaerunt. Nervorum enim opticorum coniunctionem facere statuunt, vt res vna, etiamsi duobus oculis videatur, non duplex, sed vna videatur, abs qua si esset, singulas res duplices apparituras putant. Et quidem Antiqui quidam putarunt, nervos opticos sese medios per *χλαυδ* secare, & aduerso oppositi lateris oculi utrinque inseri, dextrum sinistro oculo, sinistrum dextro.

Verum aliter sese rem habere, Anatomia docet, quâ constat, dextrum nernum dextro oculo, sinistrum sinistro implantari; etsi in medio vniuntur. Cuius coniunctionis quænam causa sit, alii aliter senserunt, vt apud Galenum, 10. de usu partium & lib. de oculis, cap. 4. videre est, Galenus præcipuam huius rei causam esse putat, ne res vna duobus oculis aspecta gemina appareat. Verum vix hæc præcipua huius rei causa est. Porior illa ratio, quam Galenus tanquam secundariam affert, vt scilicet spiritus, qui à cerebro ad oculum vtrique mittitur, vno oculo clauso, aut alia occasione requirente, ad vnum oculum totus transmittatur. Idque ex eo patet, quod obseruatum est, quosdam neruos in toto ductu separatos, & nullibi coniunctos habuisse, qui tamen eodem modo, vt alii, res omnes simplices, non duplices, videntur. Cuius rei historiam habet Vesalius, lib. 4. de fabr. corp. hum. in cap. 4. Deinde etsi in vno oculo nerui optici coniungantur; tamen pauld post iterum separantur, & separati oculis & cerebro inseruntur. Præterea etsi duo sint nerui *αὐτοὶ*: tamen sonus non duplex, sed simplex auditur. Itaque non in neruis opticiis causa geminata visionis querenda est; sed in axium conorum oculorum humores transeuntium in cauâ retinæ superficie constitutione; quæ si sit vniformis, & in eodem, vel sanè parallelo, plano sit, vt retinæ tunicæ amborum oculorum similiter & æqualiter pingantur ab imaginibus, speciei que vnus planè figuræ & magnitudinis in eodem & simili planè loco existentes vnâ rem & obiectum notent. Si verò oculi ita distrahan- tur, vt nec eadem plana obseruentur, nec parallela, sed alter vel sursum, vel deorsum feratur, vel ad dextrum, vel ad sinistrum latus moueatur, gemina statim fit visio: quia tum retiformes tunicæ à speciebus dissimiliter & inæqualiter pinguntur, ita vt imago in sinistra oculi tunica retiformi ad dextram vel sinistram superiorem vel inferiorem, & inter mediam aliquam plagam declinet; in dextra autem oculi alium locum obtineat. Huius rei documentum est, quodd, si quis digito oculum vnum sursum vel deorsum trudas, vt cum altero æqualem situm non habeat, res omnes geminæ apparent. De quo Lucretius:

*Aut se forte oculo manus vni subdita subter  
Pressit eum, quodam sensu fit, vt videantur  
Omnia, quæ tuimur, fieri tum bina tuendo,  
Bina lucernarum florentia lumina flammis,  
Binæque per totas ades geminata supellex,  
Et duplices hominum facies, & corpora bina.*

Quod confirmat etiam historia, quam recitat Iohan. Langius, libr. 1. Epist. 7. de quodam, qui in cultellum cadens oculum ab inferiore palpebra ad supercilium vsque ad medium dissecuit, cui vulnere sanato omnia gemina apparebant, quia pupilla oculi ad palpebram inferiorem agglutinati depressior altera stabat, sed tandem oculus frequenti motu ab inferiore relaxatus palpebra à geminati visus fallacia liberabatur.

Interdum & ebriis ac furiosis euenit, vt res duplices videant de quo Virgilius 4. *Æneidos*:

*Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus.  
Et solem geminum, duplices se ostendere Thebas.*

Qua de causa verò ebriis & furiosis tale quid eueniat, non ita planum est. A vaporibus equidem, qui spiritibus animalibus permiscuntur, hoc fieri, certum. Sed quomodo vapores illi faciant, vt res eadem gemina videatur, obicrum. Nobis probabile videtur, id facere, quatenus musculos mouentes afficiunt. Hi enim à vaporibus irrigati, & à spiritibus animalibus vaporibus turbatis inæqualiter affecti, suo officio non satisfaciunt, oculosque firmiter ad obiecta dirigere, & in illis conseruare nequeunt; sicut videmus horum nec manus nec pedes suo officio fungi. Non enim omnes ebrii, licet caput habeant vaporibus refertissimum, du-

plicia obiecta vident; sed illi solùm, qui cum ebrietatis gradum consecuti sunt, vt facultas loco motiua sit labefactata, musculique in actione sua deficient. Licet verò illa distortio oculorum ad sensum non ita manifestè appareat: (aliquando tamen deprehendi, & ex oculis ebriis cognosci possunt) tamen leuissima etiam, & sensu non perceptibilis declinatio à plano causa esse potest, vt imagines in diuersis retinæ punctis appareant.

Quod verò Medico illi res omnes innerse apparuerunt, proculdubio ex crystallini situ murato accidit, ob quem species inibi refractæ oppositam plagam in tunica retiformi occupauerunt.

Alieno colore res apparet, cum vel cornea tunica, vel humor aqueus alieno colore infectus est; quem dum transit, species visibiles eundem colorem suscipiunt.

Iris illa, quæ nonnunquam circa candelas conspicitur, non est circa candelas, sed in oculo; quippe quæ non omnibus apparet, sed iis saltem, qui oculos habent debiliores, & ophthalmiâ laborant. Præterea accedendo imminuitur, & recedendo fit maior; cum tamen contrarium fieri deberet, si esset circa candelam. Est quidem, qui hanc meam sententiam reprehendit, sed parùm æquè. Neque enim vnquam negavi, quod cuius notum, & quod experientia testatur, aliquando circa lucernam iridem apparere; verum non oculi vitio, vt pote quæ ab iis etiam, qui oculos sanos habent, percipitur. Sed de hac iride quæstio non est, sed illa, quæ non omnibus, sed iis saltem, qui oculorum vitiosam constitutionem habent, apparet. Et talem iridem dari experientia testatur. Ponatur enim lucerna in loco minimè vaporoso, sed aère puro; tum ii, qui sunt oculis sanis, nullam iridem deprehendent, sed ii solùm, qui ophthalmici sunt, vel aliam oculi vitiosam constitutionem habent: quod certissimum argumentum est, iridem tum non in aère, sed in oculis lippientibus & ophthalmicis hæere. Accidit autem hæc Iris, quia radii lucernæ transeuntes humorem aqueum, qui non est purus, sed ob fluxionem quasi rorsidus, & guttulis multis conspersus, sese refringendo colores generant, qui omnes ad refractionem loca percurrentes circulum circa candelam rotundum efficere videntur; quia rotunda est pupilla.

Et reliqua etiam simulachra, quæ visioni offeruntur, ab humoris aquei vitio proueniunt, quando is vaporibus vel humoribus inquinatus est.

Platerus equidem vapores hosce ad oculos posse penetrare negat, & neque per venas & arterias, neque per nequos opticos in ipsum oculum peruenire posse putat, quia venæ & arteriæ saltem per annatam oculi tunicam discurrant, & nullibi neque in corneam oculi tunicam, neque in oculi interiora perueniant; per neruos etiam spiritu animali. plenos vapores turbidi deferri minimè queant.

Verum enim verò, etsi venæ & arteriæ sensibilibiter saltem ad annatam oculi tunicam perueniant: tamen cum & reliquæ omnes oculi partes nutriantur, necesse est, vt ex vasis illis nutrimentum suum hauriant, etiam si sanguis non rubeus, sed immutatus ad eas perueniat. Per venas itaque, per quas nutrimenta ad singulas oculi partes proueniunt, & per arterias, è quibus spiritum vitalem accipiunt, vapores etiam illi penetrare possunt, & in corpore viuente omnia sunt *ἐν ὅποις καὶ ἐν μέρει*; ac suffusiones, quæ ex vitiosis humoribus in aqueo humore cumulatis generantur, restantur, tum humores, tum vapores alienos, ad interiora oculi penetrare posse.

Splendores & lumen, quod interdum oculis obuersari videtur, quod attinet, contingit hoc ante suffusiones, & accidere putatur ex reflexu spirituum animalium. Spiritus enim animales lucidi sunt, quod Galenus, lib. 1. de causis symp. c. 6. & 7. de decret. Hippocratis & Platonis, exemplo quorundam animalium probat, quibus

quibus lucidi splendidique noctu sunt oculi.

Verum non omnibus in tenebris oculi lucent, qui tamen perfectè vident; & splendor ille in tenebris non est à spiritibus, sed à luce iridi in oculo implantata. Spiritus verò optici et si puri & sinceri sunt: tamen actu lucidi non sunt; & si actu lucidi essent, visionem impedirent. Ideoque sit iste splendor, quando spiritus in humore aqueo crasso reddito & opaco repercutiuntur, & non tantum crystallino & vitreo, sed & retinæ tunica offeruntur. Forſan tamen & illa lux, quæ in vasa est, tum concurrere potest.

Cum ergo humor aqueus supra crystallinum condensari incipit, spiritus animales repercutiuntur, & reflexi crystallino & vitreo offeruntur; unde æger splendorem se videre existimat. Quæ ipsa etiam causa est, cur obsecati ex suffusione splendorem ac lumen sese videre interdum existiment. Ideoque plerumque splendores ejusmodi futuræ cæcitatæ, aut aliorum gravium capitis affectuum indicia sunt; ut exemplis docet Marcellus Donatus, de histor. med. mirabil. lib. 2. cap. 9. Refert enim, feminam quandam, cum triennium pupillæ dilatatione laborasset, & ferè excæcata esset, subito splendorem instar radiorum Solarium sibi offerri putasse; & aliam quandam, quæ dolore capitis intensissimo vexabatur, & pro ejus curatione venam sibi aperiri curabat, quandam in media capitis parte interna crepitum, ac si vesica dirumperetur, percensisse, ex quo in lenem lipothymiam incidit, ac post non multos dies globulum igneum sibi videri visa est, qui postea in maximam flammam excrevit, ac deinceps morbis melancholicis & epilepticis symptomatibus vexata est. Ita Galenus, lib. 7. de placit. Hippocratis & Platonis, cap. 4. de obstructione nervorum verba faciens, scribit: *Novi ego quandam, qui, cum eodem malo affectus esset, narrabat nobis, se, priusquam in eam calamitatem incidisset, in somnis patefactis repente palpebris magnam ante oculos lucem solivum videre.* Et Hippocrates, 5. Epidem. Phœnicis affectio ex oculo dextro talis quadam erat, plerumque veluti fulgor elucere putabat. Cum autem non diu ipsum continuisset dolor, ad tempus dextrum instabat, & per totum caput & collum intumescerebat. & lib. 7. Epidem. in historia Mneſteanacti refert: *Deambulanti ipsi in foro splendores præ oculis obversabantur, & Solem non valde videbat. Cum autem parum discessisset, extra sensum erat, & collum convulsus est.*

Res perforata cur apparent.

Interdum res perforatæ & quasi fenestratæ apparent. Quod pertinet historia illius fœminæ, quam recenset Marcellus Donatus, de histor. med. lib. 2. cap. 9. qui cum globulus igneus ob oculos verſaretur, & melancholicis ac epilepticis symptomatibus vexaretur, sinistro tantum oculo videbat, verum non nisi dimidia, & quasi in medium dissecta objecta. Hujus symptomatis causam Galenus, 1. de sympt. caus. cap. 2. his verbis reddit: *Si in pupilla centro exigua consistat suffusio, partibus, quæ in circuitu sunt, puris manentibus omnia iis, qui ita laborant, veluti fenestras habere videntur. Nam quod in medio non videtur, excisum putatur.* Et omnino negandum non est, ob corpus opacum in oculo interjectum aliquid de objecti magnitudine & figura deperire; sed quod opacum illud non in aqueo, ubi est locus suffusionis, consistat, vel ex eo patet, quod ij, quorum pupilla albo corpore ex parte obducta est, nihilominus objecta integra, & propria figura vident. Ideoque credibilius, & fundamentis opticiis magis consentaneum est, corpus opacum, ut res perforatæ & fenestratæ appareant, consistere inter retinam & pupillam.

Imaginum phantasmatum oculis obversantium causa.

Res autem, quæ oculis obversari videntur, & Galenus, lib. 1. de symptom. caus. cap. 2. & 2. de loc. affect. lib. 2. & phantasmata nominantur, quod attinet, sunt ferè duorum generum. Vel enim fixæ & immotæ sunt; id quod accidit in suffusionibus, aut ubi macula quædam in cornea est: vel variè moveri videntur, variisque colores referunt; quod accidit ob humores & vapores hu-

mori aqueo permistos. Atque hi vel à cerebro communicantur, quando illud succis abundat, aut crassis pituitosis, quod plerumque accidit, unde vapores ejusmodi ad oculos mittuntur; aut biliosis adustis, ut in phreneticis, teste Galeno, 4. de loc. affect. cap. 2. vel à venis & arteriis totius corporis; id quod in febrium ardentium vigore accidit, fumis adustis per venas & arterias simul cum sanguine & spiritibus sursum elatis, & instante quoque crisi per hæmorrhagiam narium, vel à ventriculo, e quo vapores sursum ad oculos feruntur, siue ex cruditate, præsertim nidorosa, siue ex humoris biliosi in ventriculum confluxu; vel ab utero, aliarumque partium inferiorum effumante ibidem humorum illuvie; vel à pulmone, ut in peripneumonia, teste Galeno, 1. aphor. 23.

### Signa Diagnostica.

Signa diagnostica quod attinet, ea proponere opus non est; cum ex relatione ægri cognosci possit, qualem visus depravationem patiatur. Ex qua verò causa visus depravatio ortum habeat, ex iis, quæ hæcenus diximus, patet.

Imagines in specie quod attinet, ex materia humoris aqueo permista varia oriuntur symptomata. Nam primò variæ apparent, quarum aliæ mulcas, aliæ catenulas, vel capillos, vel puncta nigra referunt; aliæ sunt nigra, aliæ citrinæ, catenulæ quidem, quia impuritates illas aquei humoris sibi non continue coherentes, sed contiguè, radij à perpendicularibus remotiores, & oblique incidentes, ac sic debiliores, transire non possunt. Unde loco punctorum lucidorum, quæ effingenda erant in retiformi tunica, imagines obscuræ apparet.

Lucida etiam remotiora, ut Luna, candela, multiplicia videntur, quia debiles radios ad oculum spargunt, qui ob aquei diaphani inæqualitatem inæqualiter, & quasi interruptè refringuntur; unde vel imago multiplex, vel ampla confusa propter distractionem radiorum, qui in vertice coni coire debebant.

Res longinquæ videntur indistinctæ, quia debiles radios spargunt, & propterea ob medijs inæqualem pelluciditatem informibus refractionibus magis obnoxios, unde non nisi imago confusa efformari potest: vel quia objecta longè distita in humoribus crassioribus magis refringuntur, quam par erat; unde conus brevior, qui vix attingit retiformem.

### Pronostica.

Quid quoque de euentu cuiusque visus depravationis sperandum sit, ex iisdem similiter manifestum est.

Imagines quod attinet, non solum sit visus depravatio, sed & debilitatio, ut res obscure, & præcipue remotæ videantur; tandemque affectio hæc in suffusionem degenerat, atque nunc citius, nunc tardius, nunc planè non. Humores imagines has exhibentes citius suffusionem pariunt, tardius verò, vel non, vapores; & novi, qui annis viginti imò triginta tales imagines ante oculos obversantes habuerunt, & tamen suffusionem non passi, nec cæci facti sunt, etsi remotiora & minora objecta distinctè videre non potuerunt. Aui-cennas tria signa tradit, quibus discerni possit, quando imagines in suffusiones abituræ sint, quando non. Primò si per sex menses durauerint eæ imagines, nec visus offensus sit, nec oculus conturbatus, metus suffusionis non est: cum, si materia in suffusionem abituræ sit, id hoc temporis spatio præster. Secundum est, si imagines nò sint constantes, sed modò abeant, modò redeant, & visio tamen integra maneat. Tertium signum est, si imagines sint ex crassis vaporibus, & diu perdurèr, neque tamè visum aut oculum offendant. Quibus quartum addi potest, quod scilicet quò imagines sunt crassiores & opaciores, eò maior suffusionis metus est: si verò sint subtiliores, & minus opacæ, quales sunt quæ capillos & catenulas referunt, eò minus metuenda est suffusio.

Curatio

Curatio quoque pro varietate caussarum varia est, quæ etiam ex iis, quæ hætenus de morbis oculorum dicta sunt, patet.

### Q V Æ S T I O.

#### Cur Vapores & Humores intra oculum videantur.

Verum hic non sine causa queritur, quid fiat, quod, ut Aristoteles, 2. de anim. text. 106, docet, cum sensibilia supra sensum posita non videantur, vapores & humores intra oculum existentes videantur; appellatque Mercurialis hanc controuersiam grauissimam, difficilem, magnam, & quæ diu torserit multos Medicos. Et reuera multi Medici in ea soluenda valde se torserunt. Verum enim verò sequens sententia verò maxime similis est. Medium visionis est perspicuum. Verum illud duplex, externum, aer, aqua, & alia corpora transluccida; & internum, tunica cornea, & humor aqueus, quæ eâ ipsâ de causâ perspicua, & coloris expertia esse debent. A qua naturali constitutione si recedat, & vel cornea maculam aliquam acquirat, vel humor aut vapor in humore aqueo colligatur; id, quod medium esse debebat, ea quidem parte, qua à naturali constitutione desciscit, & coloratum euadit, medium esse desinit, & objecti rationem suscipit, & ipsum etiam coloratum, & non amplius perspicuum visui offertur. Quod autem res extra oculos imposita non videtur, corpuscula autem illa intra oculum hærentia videntur, causa diuersitatis hæc est. Res coloratæ non videntur sine lumine, ac lumen actus quasi colorum est, & res visibiles lumine non illustratæ non videntur. Ideoque si res aliqua oculis imponatur, non illustratur ab externo lumine, neque color ejus in actum deduci, & visibilis actu fieri potest. Contra verò corpuscula in humore aqueo hærentia etsi intra oculum sint, tamen à luce externâ, modo pupilla pateat, satis illustrari possunt; quæ si careant, nec ipsa videntur. Cujus rei documentum est, quod si quis oculos claudat, vel manum oculis imponat, corpuscula talia non videt.

Nonnullis equidem hæc sententia non probatur, & meliorem substituere conantur, sed hypothesi tali præsupposita, quæ an admitti possit, dubito. Nimirum, contra mentem Aristotelis & aliorum Philosophorum, sensibile etiam positum supra sensorium mouere sensum, seu coloratum supra oculum positum videri, & propterea medio ad visionem non opus esse, ajunt, seu rei visibilis illuminationem. Equidem concedo, res oculis propius admotas videri, etsi non distinctè, id est quia objecta nimis propinqua gignunt conum oblongum in oculo, cuius vertex non igitur in tunica retiformi, sed illam transgreditur, vnde fit visio confusissima, quia retiformis tunica punctum concursus radiorum visibilium conum constituentium non recipit, sed conum secat, & sic confusos & indigestos radios recipit.

Si tamen res oculo imposita videri debet, licet confusè, necesse est, ut à lateribus lumen affluat, quod objectum illuminet; si verò ita obiectum oculis imponatur, ut nullo lumine illustrari possit, nihil omnino videbitur, sed meræ tenebræ oculo obuersabuntur. Ideoque cum maneat hoc certum, ad visionem necessarium esse, ut objectum illuminetur, etiam procul dubio corpuscula illa in aqueo humore lumine, si videri debent, ut illustrentur, opus habent. Quod si quis à lumine externo fieri non admittat, quod corpusculorum istorum superficies externa saltem hoc modo illuminari possit; quæ verò introrsum spectant, non illuminentur: forsan à luce illa interna, licet exigua, vix tunicæ inhærente illuminari possunt, aut, cum corpuscula illa opaca & nigra sint, colorque niger priuationis locum & proportionem habere videatur, ut docet Scaliger, exerc. 325. §. 9. lu-

men requirete non videntur. Interim phantasia ex his corporibus varia phantasmata format, & putat, modo muscas, modo culices, modo alia oculis obuersari. Ideoque talia corpuscula opaca potius sentiuntur per species alienas externorum visibilium, quæ dum ab oculo recipiuntur, secundum naturam, id est, magnitudinem, figuram, & numerum corporis opaci in oculo hærentis modificantur.

Verum hisce hanc de læsa visione doctrinam concludo, quam maximis difficultatibus inuolutam esse fateor; cum nec antiquis Optica principia plerumque parum attendentibus omnia non satis enodata, nec etiam à Recentioribus diuersa sæpe principia secutis omnia satis discussa. Infinitus sapientiæ diuinæ The-saurus in vna oculi fabrica latet, quam admirari facilius est, quam inuestigare & explicare.

### C A P V T X L V I.

#### De Excretorum ab Oculis vitiis.

Cum autem, ut commoda fiat visio, oculus etiam motum obtineat: in læso oculi motu symptomata accidere possunt, Conuulsio & Paralysis. Verum de iis jam supra dictum. Restant tandem symptomata, quæ in Excretis ab oculis accidunt. Secundum naturam quidem in animi affectibus lacrymæ ex oculis effluere solent: verum præter naturam & alia ex oculis interdum excernuntur, ut *limum*, humores lachrymarum instar, quorum fluxus Epiphora nominatur, lachrymæ sanguineæ. Quandoque etiam vermes ex oculis erupisse obseruatum est; de quibus jam ordine dicemus.

#### De Lemis seu Oculorum sordibus.

Interdum copiosæ sordes, præsertim nocturno tempore, ex oculis excernuntur, quæ palpebris adherent, easque quasi conglutinant; quod vitium Græcis *limus* seu lema, appellatur. Originem habet hoc malum ex humorum ad oculos, præcipue palpebras, confluxu, sed qui jam coctionem suscipiunt & incrassantur. Et familiare hoc ophthalmiæ malum est, ideoque eandem generationem & curationem habet, quam ophthalmia. Corpus nimirum euacuandum, affluxus humorum ab oculis auertendus, sordesque ipsæ abstergenda sunt, & topica conuenientia oculis applicanda.

Ut *℞. Flor. sambuci, verbasci, verbenæ, euphrasie, an. M. j.*

Fiat Sacculus, qui aqua rosarum madidus oculis imponatur.

Vel *℞. Euphrasie, pentaphylli, verbenæ, chelidoniæ, an. M. ii. flor. fabar. M. iii.*

Affunde aquæ verbasci q. s. destillentur. Aqua manè & vespere oculis instilletur.

#### De Epiphora.

Quamquam *επιφορά* vocabulum in genere humoris in quamcunque partem influentis impetum significet, quo sensu Epiphoras vteri & ventris dixit Plinius: tamen de oculorum potissimum fluxione vox hæc à Medicis usurpatur; & Græcis vel Epiphora, vel, cum adiectione, *επιφορά δακρυματων* nominatur, qui vulgo affluxus lachrymalis, & oculi destillatio, Celsio pitiuitæ cursus, Plinio lachrymationes, Auicennæ lachrymæ. Intelliguntur autem lachrymæ non illæ naturales, quæ mœsticiam atque iram quoque comitantur, in pueris imprimis & mulieribus, de quibus videatur Iul. Caserius Placentinus, tractat. de lachrymis, sed inuoluntariæ, quæ non ab animi affectu aliquo, sed à causa morbifica proficiuntur.



Epiphora  
quid.

Est igitur Epiphora tenuis humoris impetus lachrymarum specie præter naturam in oculos factus; & humoris quidem aliàs frigidi aquosi, aliàs calidi, acris, & falsi, è cerebro in annatam, & ad angulos potissimum, delati. Comitatur hanc affectionem nonnunquam sola molestia ex perpetua illa destillatione, aliquando dolor, morsus, ardor, rubor ex materiæ acrimonia, interdum & visus hebetudo, præcipue cum origo mali est ab internis oculi partibus; aliquando denique vlcusculum ex palpebrarum asperitate & duritie, aut ex caruncula in angulo lachrymali corrosione.

Suntque inuoluntariæ istæ lachrymæ aliæ natiuæ, ex imbecillitate à parentibus contractæ, siquidem malum hoc quoque hæreditarium est; aliæ aduentitiæ. Et hæc species vel causas externas, item morbos nonnullos, vt febres acutæ, lethargum, & extremam virium imbecillitatem in morituris, vel causas internas sequitur, imbecillitatem scilicet retentricis & alteratricis cerebri.

Fluxionis illius ad oculum origo est vel, quod sæpissime accidit, à incipite & summo vertice inter cutem & cranium, vnde materia per pericranium in angulos & annatam destillat; vel à toto, aut parte aliqua corporis, quando materia serosa, quæ vehiculum est sanguinis, cum sanguine ad extremitates venularum oculi penetrauit, vbi ob partium imbecillitatem foras effluit.

Causa.

Causa itaque proxima Epiphoræ est humor excrementitius, tenuis ac serosus, præter naturam ad angulos oculorum fluens, qui, vt diximus, aliàs frigidus & aquosus est sine dolore, ardore, rubore; aliàs calidus, acris, vel falsus, cum dolore aut rubore molestus, vnde palpebrarum exulceratio sequi solet.

Remotæ causæ sunt partis affectæ, quæ oculus est, imbecillitas, roburque mittentium. Imbecillitas illa vel ab intemperie oculi est frigida & humida; vel à mala compositione, si oculi substantia sit rarior; vel à morbo in numero, si caro lachrymalis sit absumpta, quæ veluti operculum glandulosum addita est angulo majori, vt serosam è venis capitis fluxionem objectu suo deriuat ad nares, in quas & sanies interdum per communem oculorum ad nares meatum ex fistulis lachrymalibus exprimitur. Secundo serosi excrementi copia, siue in toto, siue in cerebro; & quidem vel geniti in cerebro ob vitiosam nutrimenti transmutationem, vel aliunde per vasa eò transmissi. Defertur à cerebro ad oculos, quia cerebrum aut non detinet illud, vel expellit, irritatum illius copia aut qualitate; sicuti in catarrho etiam fieri conuenit.

### Differentia.

Differentia Epiphoræ est, quod in alia materia serosa simplex & sincera est; in alia cum pituitâ & exigua bile mixta. Præterea materia in alia epiphora per vasa extra cranium affluit; in alia per vasa intra cranium. In alia item anguli oculi affliguntur; in alia etiam tunica annata, vel totus oculus.

Quod denique alia Epiphora à causis externis ortum habeat, alia ab internis, ex præcedentibus notum est.

### Signa Diagnostica.

Signa Epiphoræ per se manifesta sunt. Et cum à causis sit externis, æger de his docebit. Defectus quoque caruncula lachrymalis intuentium oculis patet, siue illa ablata sit corrosione, siue incisione.

Quoad causas internas, si punctio, rosio, ardor, & rubor affuerit, acrimoniæ aut salsedinis cuiusdam particeps est materia. Per venas denique externas, quæ à pericranio sunt, materia affluit, si partes circa frontem & tempora tument, & dolent, & caput quasi reuin-

ctum videtur. Per internas intra cranium, quando interni dolores sentiuntur, & sternutationes frequentes accidunt.

### Prognostica.

1. Infantes, qui lachrymantes habent oculos ex superflua cerebri humiditate, ij progressu ætatis solâ bonâ diætâ sanantur; nisi malum ipsis sit natiuum. Antiqua verò epiphora, & quæ senibus accidit, difficulter curatur. Imò frequenter in fistulam lachrymalem degenerat.

2. Lachrymæ propter ablatam incisione aut erosione carunculam in angulo prouenientes ferè sunt incurabiles, teste Auicenna; cum frenum quasi illarum sit sublatum. Quæ tamen à corrosione facta est, curatu est facilius. A corrosione enim potius pars carnosâ absumitur, quàm spermatica & nervosa; vnde regenerari potest: ab incisione verò tam carnosâ, quàm spermatica, quæ regenerari non potest, absumitur; vt etiam supra dictum.

3. Lachrymæ à vasis intra cranium deriuatæ difficilius etiam curantur.

4. Qui in febribus, aut aliis morbis voluntariè ilachrymant, absurdum non est. Qui verò citra & præter voluntatem, absurdus, teste Hippocrate, in 4. aphor. § 2. quoniam summa retentricis cerebri indicatur imbecillitas.

5. Quibus in febribus acutis atque adeò ardentibus inuoluntariè erumpunt lachrymæ, his (siquidem reliqua non sunt exitialia) sanguinis è natibus effluxio expectari potest. Qui verò malè habent, iis mortem significat, 1. epidem. 2. aphor. 80.

### Indicationes.

Indicatio curatiua est, fluxionis causam abscindere, siue illa consistat in cerebro, siue aliunde eò, & in oculos immittatur; deinde quòd influxit discutere; ac denique partem affectam, ipsamque caput roborare.

### Curatio.

Si fluxio augeatur, & dolor accedat, Galenus venam secat, 4. de compos. medic. sec. loc. cap. 8. vt inflammatio prohibeatur. Inprimis autem in curatione attendendum est, vtrum origo mali sit à toto, an à capite primum enim si sit à toto, atque humor ipse calidus sit & acris, ille conuenienter expurgetur, & à capite reuellatur, ac ab oculis deriuetur modis supra propositis. Postea caput roboretur cephalicis cerebrum exsiccantibus. Applicentur etiam topica adstringentia, ne venæ laxiores materiam recipiant, cuiusmodi sunt rosæ, myrtilli, succus plantaginis, balaustia, hypocistis, acacia, thus, mastix, bolus Armenus, sanguis draconis, quæ cum albumine oui excepta addito pauco aceto fronti & temporibus accommodantur.

Vt ℞. Acacia, sanguinis draconis, an. Vnc. sem. boli Armeni prepar. Drach. iii. mastich. Drach. iii. album. oui num. i. aq. plantag. q. s.

Misc. & linteo inductum fronti temporibusque admoveatur, & quoties exsiccatum fuerit, renouetur.

Vel ℞. Pulv. thuris Drach. iii. tacamahaca Drach. i. sem. lapidis hematita Drach. ii. balaustior. flor. rosar. an. Drach. i. sem. album. oui num. i. aq. rosar. q. s.

Vel ℞. Mastich. Drach. ii. gummi anima, tacamah. an. Drach. i. sem. juniper. Drach. i.

Cum pauca terebinthina & cera fiat s. a. Ceratum.

Quando materia ruit per vasa interna, nonnulli cauterium post aures commendant. Vtilia quoque sunt vesicatoria. Ipsi quoque oculo conuenit pannus lineus albumine oui vel aquâ rosarum irrigatus.

In frigido humore post ejus præparationem & enacuationem prodest lana infusa in vino adstringente, & juxta oculos apposita.

Aut *℞. Gallarum immaturarum, nucum cupressi, sanguin. dracon. an. Drach. i. croci* Scrup. i.

Excepta sufficiente quantitate tragacanth. panno lineo proxime super oculos applicentur. Ad oculos ipsos probatur tutia infusa in decocto meliloti, vel in vino crasso; deinde in aqua majoranæ, fœniculi, & euphrasiæ, addita myrrha, croco, & aliis. Inprimis commendatur aqua virgæ aureæ, in qua thus ignitum sit extinctum.

Aut *℞. Thuris, mastiches, an. Scrup. i. myrrha, aloës sicca, an. Drach. sem. tutia præpar. Drach. i. sarcocolla nutrita* Drach. sem.

Subtilissime trita excipiantur oui albumine, aut succo cydoniorum. Tempore vsus dissoluantur cum aqua fœniculi aut euphrasiæ, & mane atque vespere aliquid in oculum instilletur.

Ac summarim in quacunq; epiphora, tam calida, quam frigida, conueniunt adstringentia, præsertim in principio: postea siccantia, quæ materiam absumunt, sed citra morsum; & ubi materia calida atque acris est, etiam refrigerantia.

Si malum à capite ortum habeat, cerebro imbecillo vel generante in se materiam, vel à toto suscipiente, primò, quod genitum est, auferatur euacuando per nares & palatum, deinde prohibeatur, ne quid amplius gignatur, corrigendo capitis intemperiem, legitimamque diætam præcipiendo. Tandem oculus roboretur leniter adstringentibus, de quibus hætenus dictum est.

#### Lachryma Sanguinea.

Lachryma  
Sanguinea.

Præter naturam etiam est, si sanguis lachrymarum instar ex oculis excernatur; id quod fœminis quibusdam accidit, quibus menses subsistentes per oculorum angulos effluerunt: cujus rei historias aliquot ex Brasauola, Dodonæo, Mercato, Salomone Alberto, collegit Schenckius, *libr. 4. obseruat. 257.*

Curantur tales venæ in talo sectione, & aliis menses promouentibus remediis adhibitis.

Fir etiam aliquando sanguinis ab oculis eruptio, vt Aëtius *retrahib. 2. ferm. 3. cap. 63.* docet, pueris ob assiduos ejulatus, apertis circa palpebras valis. Qui curandi sunt poscæ frigida, aut aquæ frigida perfusione, tum super angulos, tum super caput factâ, infundendo etiam albumen oui per se, & cum aliquo collyrio ad tenues fluxiones conueniente. Utendum etiam internarum partium deligatione, & cibo crassefaciente.

Rarius est, quod Forestus, *lib. 1. 1. obseru. 13.* annotauit, de fœmina quadam octuagenaria, cui per tres fere septimanas sanguis ex oculis lachrymarum instar copiosè emanauit. Quæ cum ictica esset, proculdubio à bile vasa ed loci aperta fuerunt: quæ quomodo curata sit, videatur apud Forestum, *loco allegato.* Sicut & illud rarum, quod puella vndecimestris lachrymas sanguineas fudit; vt refert Philipp. Hechstetterus, *obseru. Med. dec. 1. cas. 1.*

[Zacutus Lusitanus de *Prax. Medic. admirand. lib. 1. obseru. 50.* refert, iuuenem quendam singulis mensibus vertigine graui corripitur solitum fuisse, & quasi fulmine ictum clausis oculis in lecto prouum iacuisse, fatuum, torpidum, & veluti stupidum. Huic tandem post validam corporis rotationem, sensum sanguinem merum per oculorum angulos, riuuli instar, emanasse, quatuor aut quinque vnc. quantitate, placide, sine dolore, pruritu, ardore, aut oculorum rubedine vlla; post cuius excretionem, sedatâ in totum vertigine, & lenitis symptomatibus, quæ bidui spatio alias durabant, eum rectè vixisse. Medici quidam laborarunt, vt sanguinis hunc cursum ad superiora impedirent, adhibitis

Observatio  
Zacuti Lu-  
sitani.

venæ sectione, alterantibus, euacuatione biliosi humoris, fonticulis in brachiis & cruribus excitatis; sed omnibus frustra. Natura enim singulis mensibus per oculorum angulos sanguinem euacuauit, & ita hominem à morbis immunem multis annis præstitit. Ita natura, semel inuentâ viâ, per quam cum commodo ægri vitiosos humores euacuare potest, ab ea non facile auerti se patitur.]

#### Vermis ex angulo oculi erumpens.

Vermem puellæ trimæ, aliàs rectè valenti, longitudo semipalmatis, coloris albi, crassitudinis tinea, viuum, nullâ noxâ à puella perceptâ, aut foramine villo euidente relicto, ex interno seu maiore oculi angulo extractum fuisse, refert Amarus Lusitanus, *Centur. 7. curat. 63.*



## LIBRI PRIMI PARTIS III.

### SECTIO III.

#### De Aurium Morbis & Symptomatibus.

#### CAPVT I.

##### De Intemperie Aurium.



B oculorum morbis & symptomatibus ad aurium affectus rectè accedimus, quarum vsum, vt Celsus loquitur, proximum à luminibus Natura nobis dedit. Atque vt visus per se conferrad eruditionem & sapientiam; quoniam res plurimas offert, quibus mens intus instruitur: ita auditus per accidens ad *ᾠδὴν* conducit. Nam sermo docentis, quem auribus haurimus: per se scientiam affert; quemadmodum hac de re docet Aristoteles, *lib. de sens. & sens. cap. 1.*

Quæ autem aurium sit constitutio, & ex quibus partibus componatur, ex Anatomicis petendum, & præcipuè è Iul. Casserio Placentino. Morbi autem, quibus aures infestantur, sunt intemperies simplex, & cum materia, inflammatio, vlcus, obstructio, ruptura tympani, vulnera.

Primò enim interdum aures, & præcipuè earum membranæ ac nerui, intemperie sine materia frigida, à ventis & aëre frigido afficiuntur, quæ grauem dolorem excitare potest, vt experientia sæpe testata est.

An verò similiter ex intemperie nuda calida à causâ externa aures affici possint, controuersum est. Græci quidem causæ hujus mentionem non faciunt Arabes tamen omnes inter causas externas aëris caliditatem recensent. Verum frigida equidem nervis inimica sunt, non verò item calida, & calor externus vix calidior esse potest cerebro & cæteris partibus internis, & ita calor per se vix intemperiem, quæ insignis alicujus læsionis causâ esse possit, inducere potest; per accidens verò id facile præstare potest: nimirum humorum ad aures confluxum concitando. Quo sensu & Hippocr. *3. aph. 2.* inter æstiuos morbos aurium calorem refert.

Frequentius verò patiuntur aures intemperiem frigidam & humidam, seu quæ cum pituita sit conjuncta. Deinde etiam intemperiem calidam cum bile. Et quidem materia vel in ipsa aure colligitur, ob coëctis, retentis, vel expultricis imbecillitatem, mearum angustiam.

Frigida &  
humida.

Donisella Mac  
Miranda amittit  
med. 63. in  
Donisella Mac  
Miranda amittit  
med. 63. in  
Donisella Mac  
Miranda amittit  
med. 63. in

angustiam, crassitudinem excernendorum. Aliunde vero ad aures confluit, vel à calore aut dolore attracta, vel aliunde transmissa. Solet autem materia ad aures transmitti nunc à toto; quod in crisi febrium fieri sæpe solet; nunc ab aliqua parte; in primis verò à cerebro, quod, ut vicinum, excrementa sua facile auribus communicare potest.

### Signa Diagnostica.

Si intemperies sit nuda, nulla grauitas, nulla tensio, nullus tumor percipitur; quæ si adsit, intemperies est cum materia: quo casu & auditus magis impeditur. Et si intemperies sit frigida, æger in aëre & vento frigidus, aut niue versatus est; quod si nonnunquam in longis peregrinationibus tempore hyberno: dolorque est citra ardorem, calidisque lenitur. Si verò tale nihil præcefferit, quod nudam intemperiem inducere potuerit, & caput sit grauius, proculdubio quædam materia adest, scilicet aut spiritus flatulentus; quod cognoscitur ex dolore vehementi sine pondere & grauitate, & tinnitu ac strepitu manifesto, & quod dolor non est continuus, sed per interualla quædam vel intermittit, vel nonnihil imminuitur: aut humor frigidus crassus, & tum signa frigiditatis adsunt; aut humor biliosus, & tum signa caloris adsunt.

### Curatio.

Si intemperies sit frigida, calefacientia, vaporis, summi, liquoris, vel aliâ formâ vsurpada. Et propterea calida vel instillanda, vel per infundibulum vapor decoctorum excipiendus, vel per spongiam, lanam aut linum extra applicanda. Fiat nimirum euaporatio decocti rutæ, origani, chamæmeli, absinthij: vel decocto lana vel spongia imbuatur, & auri applicetur. Vel instilletur oleum rutaceum, de castoreo, amygdalarum amararum, nardinum, irinum, maioranæ. Vtilis est & succus ceparum cum liquore aliquo conuenientemixtus. Oleum item è semine cannabæ & vitellis ouorum. Ante omnia verò commendat Scribonius Pisselæum, seu florem picis, quas vires etiam habent olea destillat. terebinth. ceræ, rutæ, juniperi, & similia. Si vehementior sit frigiditas, aliquid euphorbij admiscere licet.

Si ab intemperie calida affluxus aliquis humorum metuat, instillentur auri (sed tepide omnia) lac muliebre, & succus refrigerantium herbarum, lactucæ, solan. album. oui, oleum rosæ, violæ, de cucurbit. salic. Si spiritus flatulentus adsit, cum flatu præsupponat materiam, è quâ attollitur, primò materia illa, siue frigida, siue calida sit, expurganda; deinde topica, quæ flatum illum discutiunt, vsurpanda.

Vel *℞. Mili, furfuru, salis, an. M. j. sem. anisi, fecul. baccar. lauri an. Drach. iij.*

Calefiant in sartagine, & sacco inclusa calidè auri applicentur, vel vino forti prius aspergantur.

Vel fiat euaporatio ex ruta, betonica, maiorana, aneth. flor. chamæmel. melilot. sem. cumini, carui, castoreo.

Vel *℞. Cepam, & impone ol. chamæmel. rutæ, an. 3. ij. pulu. sem. cumini, anisi, piper. an. 3. j.*

Imponatur cepa cineribus calidis, vel ad ignem, donec oleum absumatur. Postea contrundatur, & succus exprimat, qui auribus instilletur. Et cum plerumque, ubi spiritus flatuosi adsunt, simul humor crassus & viscidus esse soleat, qui aurium meatus obstruit, ne flatibus exitus pateat, incidentibus, attenuantibus, & aperientibus vtendum, qualia modò sunt proposita.

Si verò ab humore aliquo sit intemperies, purgandum est cerebrum, ne plus materiæ affluat; postea topica medicamenta adhibenda. Et quidem si à materia frigida sit intemperies, humor præparetur & euacuatur iis medicamentis, quæ supra, part. i. c. 10. sunt proposita.

Dan. Sennerti Tom. I. l.

Purgationes autem per interualla, repetantur. Corpore toto euacuato, caput euacuatur apophlegmatismis, gargarismis, errhinis. Itemque calefacientia & siccantia medicamenta vsurpentur, interna & externa, quæ supra sunt proposita.

Vel lauetur caput lixivio ex cineribus sarmentorum vitis, & ligno Guaiaco, in quo maioran. beton. serpill. stœchas Arab. fol. lauri, sena, agaricum cocta sint. Nec velicatoria omittenda, & primò collo, deinde post aures apponenda, & diu aperta seruanda; imò si malum sit, pertinacius, setaceum adhibendum est.

Tandem Topica, seu quæ in aurem instillanda sunt, vsurpanda; & primò quidem à mitioribus incipiendum hinc ad fortiora progrediendum.

Talia sunt oleum amygdal. amar. juniperi, de castoreo, quibus admiscere licet spir. vini, succum rutæ, absinth. cyclaminis, ol. nucl. Persicor. cerafor. fœniculi, caryophyll. cinamomi, moschum, vinam arietis vel capræ, tauri, anguis senecta puluerisata & cum aceto mista.

Laudatur & tabula cupressi calida, quantum fieri potest auri applicata.

Vtiles sunt quoque euaporationes ex decocto chamæmel. origani, hyssopi, maioranæ, fol. lauri, cyclaminis. fol. & baccarum lauri, sem. cumini. Sed fiat decoctum potius in vino, quam in aqua; cum aqua nimis humectet.

Vt *℞. Fol. lauri, betonic. maioran. serpilli, origani, calaminthæ, stœchad. Arab. an. M. j. cepam confusam num. j.*

Coque in vino Rhenano, vapor tepidus in aurem per infundibulum immittatur. Vide etiam Instit. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 32.

Vel *℞. Ol. amygdal. amar. castor. an. 3. ij. succi ceparum Drach. sem. M. & guttæ ij. vel iij. mane & vesperi auribus instillentur.*

Vel *℞. Ol. amygdal. dulc. 3. iij. aq. vitæ 3. ij. fol. lauri minur. incisor. num. vj.*

Bulliant in vase duplici, & exprimantur.

Vel *℞. Colocynth. hellebor. albi, aloës, an. 3. j.*

Mista terantur in calido aceto, & postea exsiccentur. De hoc aliquid cum penicillo melli intincto auri immittatur, & per 3. aut 5. horas ibi relinquatur, ut pituita sensim inde extrahatur.

Crato plurimum commendat aquam cardui benedicti. Folia cardui benedicti sicca aspergit spir. vini, & postea affundit aquam cardui benedicti, & in vitreo vase per arenam destillat, & aquam istam auribus instillat. Efficacior est spiritus cardui benedicti.

Commendatur & hoc:

*℞. Formicæ cum ouis, affunde vinum, iisdem adde. rad. raphani rusticani confusæ, & baccas lauri confusas.*

Coquantur, & succus exprimat, aut quod consultius est, aqua inde destilletur. In liquorem istum gossypium intingatur, & auribus immittatur.

Alij olei sinapi quotidie gutt. j. instillant. Efficax est & Balsamum Orientale.

Vel *℞. Spir. vini 3. iij. rad. cyclam. 3. 3. nucleor. Persicor. amygdalar. amar. an. num. v.*

Stent in infusione per dies 3. deinde fortiter exprimantur. Succus guttæ ii. manè & vesperi auri instillentur & gossypio, cui gran. ii. vel iii. moschi inclusa sint, auribus obstruantur.

Vel *℞. Silices fluminales paruos & ignitos, insperge vrina & vapor aure excipiat.*

Vel *℞. Vermiculos intra cortices ligni querninatos n. xx. Bulliant in olei comm. 3. ij. Deinde excauetur radix cyclaminis, & cauitas impleatur oleo istorum vermiculorum, rutæ, castor. an. s. q. pulu. pyrethr. castor. an. 3. 3.*

Radix hoc modo repleta asserur sub cineribus, affa contundatur, & succus exprimat, qui quoridie auribus instilletur.

Vel *℞. Fol. lauri, origani, hyssopi, calaminth. an. M. 3. aristoloch. hedera terrestris, marrub. hellebor. nigri, an. 3. ij.*

DDd

Coqu.

Coqu. in vino, contundantur. Contusis adde fell. tauri, capra, pingued. anser. an. 3. ij. euphorb. galbani acet. dissolut. an. 3. j. myrrha, aloes, an. 3. B. piperis, nitri puluerisati, an. gr. v. succi cepæ Drach. j. farina tritici 3. j. B. nuc. mosch. express. irini, q. l. ad impinguan- dum.

F. Emplastrum, cuius particula linteo excepta auri inferatur; de reliquo fiat Emplastrum, quod auri applicetur. Galenus inter *ἐμπίσα* libr. 3. cap. 3. habet fel leporis cum mellis portione mixtum, quod & in cepæ tunica seu cortice liquefactum auri im- mittit.

Quidam tanquam singulare remedium commendant oleum murinum, quod fit è muribus recens natis. dum adhuc sine pilis sunt, in oleo maceratis. Alij aquam ex illis destillant, & in aurem immittunt. Efficax est & oleum destillatum è ligno Guaiaci.

## CAPVT II.

### De Aurium Inflammatione.

*Aurii In-  
flamatio.*

**N**on infrequens aurium malum est inflammatio, quæ & ipsa ad intemperiem cum materia pertinet. Quanquam enim auris fabrica præcipue ossibus constat: tamè membranas etiã habet, in quas exiles venæ im- mittuntur, per quas sanguis tenuis & biliosus è ve- nulis membranarum cerebri & vicinarum partium in aurem illapsus inflammationem parit. Quæ autem cau- sæ affluxus sint, ex iis, quæ in genere de inflammatione dicentur, & antea de oculi & aliarum partium inflam- mationibus dicta sunt, patet.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur auris Inflammatio ex dolore continuo pulsatili vehementissimo cum caliditate & rubore, ad malas & tempora vsque sese extendente, cum febre, in- terdum & cum delirio, motibus convulsivis, syncope, & extremorum frigiditate. Et prout inflammatio magis tendit ad interiora, eò pulsatio maior percipitur; quo- niam arteriæ maiores comprimuntur. Dolor quoque est vehementior ob vicinitatem cerebri, & febris in- tensior.

### Prognostica.

1. Inflammatio aurium malum periculosum est; cum delirium producere, & hominem in vitæ discrimen cō- iicere possit. Hippocrates, 3. *Progn. aphor.* 13. Solet enim cerebrum in consensum trahi; vel etiam fluxio, quæ inflammationis causa erat, ad cerebrum con- uerri, vnde ægri nonnunquam subito, tanquam attoni- ti, moriuntur. Galenus, in *Comm. in allegatum locum*, & Trallianus, libr. 3. cap. 2. Ideoque, monente Celso, lib. 6. cap. 7. mox inter initia succurrendum est, ne ma- iori periculo locus sit.

2. Et quidem iuuenes in aurium inflammationibus magis periclitantur, qui septimo die, aut citius moriū- tur, antequam suppuratio accidat, ob biliosi humoris in iis abundantiam, & quod febribus acutis magis sint obnoxij. Qui autem septimum diem superant, euadunt materia in pus conuersa; in primis si pus bonum efflu- xerit, & deinde æger melius habeat.

3. Senes autem in aurium inflammationibus minus periclitantur. Quanquam enim Galenus, 7. *aph.* 42. doceat, omnia mala peiora fieri propter ætatis imbecil- litatem, & 1. *Prognost.* 69. ex nullo morbo senes magis, quàm natu minores, conualescere, ne dum posse citius humorem suppurare: tamen hic aliquot causæ concu- runt, cur senes minus periclitentur, quam pueri. Pri- mò enim humores in senibus sunt frigidiores, & pro- pterea inflammationes, quæ in iis generantur, non

sunt exquisitæ, nec tantum dolorem excitant. Deinde pueri ob sensus acrimoniam minus dolorem su- stinere possunt: senes verò habent lenius hebetio- res, & propterea dolores non ita sentiunt. At- que inde accidit, vt inflammationes aurium in pueris raro ad suppurationem veniant, sed pueri se è morian- tur ob doloris vehementiam, antequam ad suppuratio- nem venit inflammatio.

4. Si inflammatio aurium in partibus interioribus hæreat, cum magno periculo coniuncta est; cum ner- uus *ἀκυστικός* sit affectus: vel si sanetur, difficultatem au- ditus relinquit.

5. Abscessus aurium, qui crisis modo obtingit, si accidat ante coctionem, & die non non critico, & cum aliis signis malis, peculiosior est, & contrà.

### Indicatio & Curatio.

Generalis inflammationes curandi ratio & hic rectè applicanda est. Primò ergo reuellentia vsurpanda; in- ter quæ valde utilis est venæ sectio, & quidem venæ cephalicæ; quæ etiam, si inflammatio maior sit, repeten- da. Aliis quoque modis sanguis ad aures fluens reuel- lendus, cucurbitulis, frictionibus. Humores etiam bi- liosi, si admixti sunt, expurgandi.

Repellentia hic, nisi ingens sit dolor, vix adhibenda sunt, ne materia intrò conuersa cerebrum & membra- nas eius inuadat; nisi forsàn pauca sit humoris quan- titas, è qua nullum cerebri malū vereri oportet. Et sint potius, quæ adhibentur, saltem mitigantia dolorem, & refrigerantia, quam astringentia; qualia sunt, lac my- liebre, succus auriculæ muris, succus cucurbitæ, cum modico aceti, mucilago sem. psyllij, cydonior. aqua ro- sar. extracta.

Vbi tamen repulsione opus, tale, vel simile instil- letur:

℞. Ol. rosar. vel violar. 3. iij. aceti rosacei 3. vj. nitri prap. 3. j. Misce.

Potius euulsionibus præmissis adhibeantur ea, quæ materiam concoquere, & simul dolorem lenire pos- sunt.

Vt ℞. Lenticul. palustr. M. ij. medull. panis in lacte mu- liebris infusi 3. jv.

F. Cataplasma, quod auri applicetur.

Vel ℞. Malua viriusque, violar. lactuca, salic. an. M. j. sem. cydon, malua, Drach. ij. flor. chamamel, melilot. ro- sar. rubrar. an. P. ij.

Coqu. & decocto aures foueantur.

Vel ℞. Ol. rosar. nymphae, an. 3. B. mucilag. sem. psyllij, cydonior. an. 3. iij. lact. muliebr. succi papauer. vel solani an. Vnc. sem.

Misceantur, & auri applicentur, atque aliquid auri instilletur. Si addatur farina & puluis flor. chamameli, fieri potest Cataplasma.

Reliquiæ tandem discutientibus tollendæ.

Verum si perseveret morbus, nec materia resoluti pos- sit, sed ad suppurationem tendat, quod ex dolore, pul- satione, & febre aucta cognoscitur, suppuratio adiuuân- da maturantibus adhibitis, quæ vim emplasticam ha- bent, leniterque calefaciunt, caloremque inducunt, & coctionem adiuuant: qualia sunt, rad. althææ, lilior. al- bor. flor. chamamel. meliloti, ficus, farina tritici, sem. lini, fanigræc. & mucilagine corundem, pinguedines animalium recentes, butyrum recens, oleum selami- num cum croco.

Vel ℞. Cepam rubram sub cineribus assatam num. j. butyri 3. B. ol. chamamel. 3. B. amygdal. dulc. 3. B. croci Scrup. j.

Misceantur, & calefacta Cataplasmaris modo auri applicentur.

Vel ℞. Fol. malua viriusque, violar. an. M. j. fl. chamamel. p. j. rad. althææ 3. j. B. lilior. albor. n. j. caricar. pinguium n. iij.

Coqu. in aqua ad mollitiem, & contundantur.

Contusis



Contusis adde farina tritici ℥. B. sem. lini, fanigrac. an. 3. ij. pingued. porci, gallinae, an. 3. iij. butyri 3. ij. ol. amygdalar. dulc. q. l.

F. Cataplasma.

Commendatur & hoc Cataplasma:

℥. Rad. althææ, lilior. albor. an. 3. B. flor. chamamel. melilot. an. Vnc. j.

Coqu. & contundantur minutim. Contusis adde, farina sem. lini, fanigrac. an. 3. B. bdellii aceto dissoluti 3. iij. croci Drach. j. vitell. oui j. ol. sesamin. butyr. recens. an. Drach. ij.

Fiat Cataplasma.

Umpira sunt ficus in lacte coctæ, & cum axungia porci trita, item puls auenæ.

Si maturatum sit apostema, ruptio eius expectanda & procuranda, continuatis eiusmodi medicamentis. Nonnulli instillant succum cyclamin. aut ranunculi cum quadruplo lactis muliebris.

Vel ℥. Succu cyclaminis 3. B. stercoris columbini 3. j. lactis muliebris 3. j. B.

M. & in aurem guttam vnâ atque alteram instilla, & lanâ lacte muliebri tepido madidâ auris occludatur.

Abscessu rupto sanies eluenda, atque abstergenda hydromelite, melle rosato colato, decocto lupinorum, succo absinthij, marrubij, centaureij minoris cum melle, aut syrupo, vel melle rosaceo.

Fortius id præstat succus cyclaminis cum melle. Et tandè vlcus consolidetur, & cicatrice occludatur; ideoque quæ maiorem exsiccandi vim habent, thus, myrrha, aloë, sarcocolla addenda.

Verùm de vlcere aurium in specie aliquid dicendum.

### CAPVT III.

#### De Vlcere aurium.

*auris vl-  
cera.*

**I**nflammatiō auris abscessu rupto sæpe in vlcus degenerat, quod peculiarem curationem requirit. Non tamen solum ab apostemate seu abscessu rupto vlcus auris gignitur, sed etiam à causis aliis. Sæpe enim acres & mordaces humores siue in auribus geniti, siue è cerebro ed effusi, acrimoniâ suâ aurem exulcerant. Nonnunquam à sordibus aurium diutius coëctis id accidit, quarum diuturnâ coaceruatione, præsertim si pituitosa sint, accedente putredine, quemadmodum ex sanie suppressa, vermes gigni possunt in auribus, quæ ὡς τὰ σκολινοῦντα, aures vermiculosas, nominantur. Interdum acris aliquis liquor, aut simile quid forinsecus in aurem illapsum mordendo vlcus efficit. Sæpiissime ab ictu vel à casu hoc fit, vt scilicet ad vulnus vlcus sequatur.

Ex quacunque igitur causâ vlcus producat, solutio illud est continui in aure cum sanie profluente.

Interdum tamen sanies ex auribus effluit absque vlcere, cerebro & vicinis partibus ab excrementitia humiditate & sordida, illunite sese expurgantibus, quæ mora longa in tortuosa illa via in eiusmodi cœnolum quid conuertitur, quod post diuturnos capitis dolores, aut post ictum seu contusionem capitis sine vlcere accidere solet. Imò etiam obseruatum, familiis quibusdâ hæreditarium fuisse, vt natura statis temporibus, citra vllū grauem morbum, magnam ichorum copiam è capite, imò forsan & reliquo corpore, euacuarit. Ita fit, vt, quibus cerebrum valdè humidum & impurum est, iis ex affluxu semper nouæ materiæ auris diu purulenta sanie fluat, quæ πρὸς τὴν αὔτη Græcis dicuntur. Aërio, tetrah. 2. ferm. 2. c. 81. sunt aures absque exulceratione humectæ, quæ veluti exsulant, & terosam humiditatem excludunt, ad quas & remedia quædam ibi exponit.

#### Differentia.

Differentiæ vlcum auris sumuntur aliæ à particula ipsa auris, quæ obsident, quæ vel externa est & oculis patet, vel interna, membrana scilicet, vel tympanum auris, neruis ipse auditorius, interdum & ossibus ille meatus, in quo, sicut & in aliis ossibus, hæc vnitate solutio respondet propriè, seu caries, nuncupatur.

Aliæ ab ipsis vlcibus; quæ ratione vlcis aurium vel recens, vel inueteratum est; mundum, vel saniosum, aut sordidum: quoddam præterea putridum, virulentum, corrosiuum; aliud denique superficiale; aliud verò ita profundum, vt in fistulam abierit.

#### Signa Diagnostica.

Cognoscitur vlcus auris ex sanguine vel sanie egrediente. Distinguendum tamen, vtrum sanies illa ab aure ipsa profluat, an à cerebro: ab hoc quidem vel rupto in ipso apostemate, vel citra apostema, sanies è venis cerebri in primis ad aures transmissa. Si enim sanies ab apostemate est rupto in cerebro, illa primò satis magnâ copiâ exit, deinde paulatim emittitur, donec omnis sit absumpta; præcesserunt etiam signa inflammationis cerebri, & capitis grauitas & dolor, quæ sanie exclusâ remittunt. Ab apostemate verò in aure rupto dolor, qui præcessit, in aure magis, quam in capite, perceptus fuit. Sin sanies absque apostemate cerebri in eius venis genito ad aures transmittatur, pruritus quidam in auribus sentitur, & sanies ipsa, postquam semel exhausta est, denud coaceruatur; quæ, nisi liber exitus pateat, vertiginem & alia cerebri symptomata affert. Sed veri vlcis auris indicia sunt, dolor, ardor, punctio vehemens, quæ tactu exacerbatur, egressio saniei, interdum & sanguis. Si in neruo auditorio vlcus sit, dolor acerbissimus adest, vel præcessit. Profundum vlcus pus copiosum & lentè emittit; mundum, bonam saniem; sordidum, crassam, copiosam; virulentum, saniem reuicem & citrinam; putridum, saniem fetentem; corrosiuum, sanguinem post saniem fundens: fistulosum denique ex vlcis antiquitate, saniei virulentia, carnis callositate & duritie cognoscitur.

#### Prognostica.

1. In Vlcibus aurium, sicut & aliis, pus & sanies spectanda sunt, quæ vlcis bonitatem aut malitiam arguunt. Pus enim, vel sanies alba, equalis, mediocris substantiæ, ita, vt non sit vna pars crassa, altera tenuis, vna rubra, altera alba, non fetens; vlcis non maligni nec prauis indicium est. Ex contrariis verò de prauo vlcere signum capitur.

2. Inueterata & diuturna vlcera peiora sunt; quia faciliè in fistulam degenerant. Aliquando & ad os petrosum penetrant, quod detegunt, teste Auicenna.

3. Sanie recēs effluente ab vlcere auris, cum prius capitis dolor, & sensuum perturbatio adesset, si hæc iam remittant, bonum est, & vlcis curatio paulò post spectanda.

4. In vlcere humido diuturno non corrodente, si non resicetur, metuendum est, ne ὑπερτροφία excrescat, quod auditum obturet.

5. Vlcera aurium, quæ ad os cranij pertingunt, raro, aut nunquam curantur; quemadmodum & fistulæ profundæ. Sæpe profunda & putrida eiusmodi vlcera continuè quadam ad cerebrum descendunt. Ideo Hippocrates, 6. Epidem. sect. 6. inquit. Propter aures & ex auribus plerumque tertia die moriuntur, hoc est, inflammationes, quæ circa aures sunt, ipsarumque inflammationes, & non tantum vlcera serpentina, tertia die occidere solent.

## Indicationes.

Generales indicationes ex iis, quæ in genere de ulceribus traduntur, notæ sunt: nimirum vlcus esse detergendum; quod amissum, instaurandum, & tandem vlcus consolidandum.

Atque hæc de simplici vlcere sufficiunt, corpore, ab humoribus prauis vacuato.

Quod verò cum intemperie aliqua, aut cum corporis impuritate, aut cum phlegmone, aut cum calore insigni coniunctum est, hæc ipsa remoueri postulat, priusquam curationem recipiat; de quibus *c. precedente*, dictum est.

Speciatim, quia auris est membrum natura sua siccum, (nā cartilaginibus inprimis & ossibus constat) medicamenta quoque, vbi ad alienam qualitatem, ad humiditatem scilicet, lapsus est, sicciora requirit, vt & naturalis temperies ipsius conseruetur, & quæ præter naturam accessit, humida constitutio corrigatur.

## Curatio.

Vlcera autem aurium interdum per se sanescunt, post puris effluxum sedatum, plerumque verò artis auxilium expetunt. Eluatur igitur auris vino calente veteri, vel solo, vel in quo lenticulæ aut rosæ ebullierint, repulsio- nis gratia, vt iubet Aegineta. Alij folia hederæ, & cortices mali Punici addunt.

Postea leniter detergunt, hydromel, succus absinthij, apij, marrubij, betæ, agrimonie, centaurei minor, cum melle aut syrupo, vel melle rosato; aut vinum, in quo betonica decocta sit: item decoctum hordei & lupinorum.

Vt ℞. Succus betæ ℥. β. marrubij ℥. β. mell. opt. ℥. vj. Coqu. parum postea admisce syrapi absinthij ℥. ij. vel extr. liquidi absinthij ℥. β. Misce.

Potest etiam admisceri fel animalium mitius, vt fel porci, veruecis, bouis castrati.

Fortius id præstant succus cyclaminis cum melle, vel aqua mellis, in qua radix hellebori albi prius ebullierit, additis, si maiore delicatione opus sit, & vt putredo prohibeatur, thure, myrrha, sarcocolla lota, gentiana, & modico succi betæ.

Vel ℞. Succus cyclam. ℥. j. myrrh. ℥. j. croci ℥. β. thuris, ℥. j. viridis aris ℥. j. vel Drach. β. vini antiqui Vnc. jβ.

Bulliant leniter ad vini consumptionem. De liquore isto vna atque altera gutta in aurē bis quotidie ad minimum instilletur, ac hydromelite iterum eluatur.

Efficax quoque est medicamentum, quod à Rhase in hunc usum descriptum est:

℞. Mellis ℥. v. aceti ℥. j.

Leniter bulliant ac deipumentur. Quibus adde viridis aris Drach. iij.

Liquor auri cum gossypio immittatur, qui præsentaneum in auris vlceribus remedium. Vlcus etiam ad curationem deducunt pompholyx, tutia, cerussa in vino decocta. Suffusus quoque ex mastiche, thure, myrrha, ladanio, gummi iuniperi, sarcocolla, galbano, & similibus, per infundibulum auri immissus utilis est.

Vt ℞. Gummi iuniperi ℥. β. thuris, myrrhæ, an. ℥. j. sarcocolla, ladanii, an. ℥. j.

M. F. Puluis, vel cum terebinthina F. Pastilli.

Veteres ad detergendum & exsiccandum vtiebantur glaucio ex aceto, quo Paulus recentia vlcera sanat, trochiscis item Polyidæ, Andronis, vel Musæ, cum sapā, & modico aceti solutis. Et, quod cætera superat, medicamento è scoria ferri cum aceto acerrimo trita vel cocta, vt docet Galenus, 9. de simpl. fac. & Aëtius. Habet hoc vim maximè siccandi, & durioribus corporibus conuenit. Clementius redditur aliis præparandi modis, de quibus Hollerius videatur, Periach. 3. ad lib. 3. Galen. de comp. med. sec. loc. cap. de vlceribus aurium, qui Arabes

melius præparare scribit. Scoria enim tritam ex aceto lauant, hinc siccant, siccata iterum aceto terunt, rursumque siccant, & hoc septies repetunt. Postea in pollinem redigunt, coquuntque longa coctione ex aceto acerrimo, dum ad mellis spissitudinem abeant, atque ita siccant. Valescus de Taranta, l. 2. c. 54. sequens ex Haly commendat, & scribit se eo presbyterum, qui aurium vlcere & sanie 8. annos laborauerit, sanasse.

℞. Mell. ℥. x. aceti ℥. viij.

Coquantur & deipumentur. Deinde adde viridis aris Drach. j.

Misce. & cum turunda auri impone. Potest & vnguentum triapharmacum vel Apostolorum, in aceto & hydromelite dissolutum, instillari.

Iisdem in diuturnis vlceribus aurium vti licet, absterfione tamen prius factâ diligenter per leniora. Vbi crusta adest, curandum, vt decidat, ne in molem aucta auditum impediatur. Valet etiam, & efficacissimum est in vlceribus antiquis, Aegyptiacum dissolutum cum vino vel œnomelite, vel vrina pueri impuberis. Aëtius hoc Medicamento vtitur:

℞. Aloës, thuris, myrrhæ, an. Drach. ij. myseos Drach. j.

F. Massa cum aceto, quâ resolutâ cum aceto aut rosaceo vtere.

Excrecentem in auribus carnem citra dolorem deprimat, cicatricemque obducit, hoc ascriptum ab eodem Medicamento:

℞. Alum. scissi, myseos vsti, an. ℥. ij. aruginis, terra Lemniæ, gummi Arabici, an. Drach. j.

Tritis iis cum aceto acerrimo F. Pastilli, qui vsus tempore cum vino vel aqua soluantur.

Mitius est, quod à Paulo in hunc usum præscribitur. Nasturij & nitri parum caricis excipitur, exemptis granis, & de factis pastillis aliquid in aurem immittitur, quod post triduum furus excernitur.

Scirrhum cancrum auribus innatum post abscessum ruptum describit Guilh. Fabricius, Centur. 3. obseru. 1. vbi & modum curandi cum variis instrumentis chirurgicis prolixè proponit.

Si vlcus fistulosum sanie perpetuâ fluat, iniiciatur per idoneum instrumentum, vel clysterem auricularem, fel tauri cum vrina pueri impuberis: aut vinum, in quo decoctum sit thus, aut helleborus albus & mel.

Ad fætores aurium Aëtius primo malicorij & lenitici decocto vtitur, quo aures illinit, postea inter alia fel vrsi liquidum instillat, aut, si aridum sit, cum aceto & sapā diluit. Concedit & commendat etiam Aegyptiacum cum ad hanc, tum ad similes omnes aurium affectiones. Vtilis est & succus oliuæ cum melle, aut betonica decocta cum vino, aut dracuntij succus cum melle & vrina pueri impuberis.

Ad sordium in auribus duritiem soluendam idem inspergit nitrum torrefactum, subtilissimeque tritum; postea acetum calidum instillat, & appositâ lanâ pernoctare sinat, sequenti die aquâ & oleo calefactis, eluit.

Si sanies ab aure fluat, absque huius vlcere, ex cerebri magna impuritate, quod in pueris frequens esse solet, Aëtius mity lindeolo inuolutum, & sub prunis crematum, vnâ cum exusto lindeolo terit, & per arundinem instillat; aut gallis tritis, lindeoloque illigatis & exustis similiter vtitur; aut alumine in testa vsto, & cum oleo trito.

Hæc, & similia topica, non nisi purgato prius corpore & capite vsurpanda esse, omnino attendendum.

Nonnunquam post ruptum abscessum pure etiâ per aures excreto, dolor tamen permanet, quod indicium est, de sanie aliquid, aut grumum sanguinis in profundum auris relictum esse, eamque materiam diuturnitate prauam & rodentem qualitatem contraxisse; aut à capite debili excrementitiam nouam semper materiam affluere. Tum igitur instandum mundificatione auris cum oleo amygdal. amarar. aut cum mulsa adiecto felle

felle tauri. Si suspicio sit de grumo sanguinis, prodest acetum tepidum cum melle optimo, aut cum oleo laurino, succo porri, addito oleo rosaceo.

Materia è capite in aurem fluente capitis simul ratio habenda erit, & materia ipsa, si mordax sit, attemperabitur, si crassa & viscida, incidetur ac detergetur, præmissis semper vniuersalibus, vacuatione nimirum, ab aure diuerrentibus, gargarismis, apophlegmatismis, er-rhinis, sternutatoriis, caputque roborantibus postea adhibitis.

#### CAPVT IV.

*De Vermibus, & alijs, quæ præter naturam in Auribus hærent, extrahendis.*

*Vermes in auribus.*

Solent nonnunquam tum alia forinsecus illabi in Saures, tum vermes quoque in has irrepere, præsertim dormientibus: imò etiam vermes interdum in auribus gignuntur, non solum ex sanie vlcèrum, sed & ex alia humiditate putrefacta. Ita Forestus, lib. 12. obseru. 8. in schol. refert, se vidisse in iuvene febre acuta laborante vermes duos tresque ad formam granorum pini paulò crassiores ex auribus expulsos, iuuenemque sanatum fuisse. Nam, vt Aristoteles, 2. de gener. animal. c. 3. scribit, non solum in seminibus animalium, sed etiam in excrementis spiritus quidam viuificus inest, elemento siderum analogus, à quo *zanthia* & *apuleia* ea accipiunt, quæ inde producuntur.

#### *Signa Diagnostica.*

*Signa diagnostica.*

Signa autem vermium in auribus sunt: titillatio & pruritus, dolor quidam mordicans, interdum & corrosiuus, quando vermes ad neruum auditorium irrepunt, ægri angustia & inquietudo; interdum & vermes ab aure egrediuntur,

#### *Curatio.*

*Cura.*

Sive igitur in auribus geniti sint vermiculi, sive in has irreplerint, opera danda est, vt extrahantur. Nam, vt Rhafes ait, si talia, sive vermiculi sint; sive aliquid aliud, diutius in aure relinquantur, præsertim vbi maligna aut venenata aliqua qualitate prædita sunt, acerbos dolores aut inflammationes aurium, atque hinc conuulsiones, & alia graua *ma* concitare possunt.

Quæ ratione autem tum vermes, tum alia res præter naturam in auribus hærentes extrahendæ sint, dictum Instituit. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 10. quæ hinc repetenda non censo: pauca saltem addam. Galenus, si reliqua ad vermes illapsos necandos non conferant, sulphur viuum & calcem melle excipit, & cum aceto in aurem instillat. Necant & vermes succus absinthij, centaurij min. fol. Persicor. vermicularis, cucumeris asinini. Nonnulli instillant succum sambuci, & cannabis. Alij radicem hellebori albi in vino infundunt, & liquorem auri immittunt. Alij castoreum in aceto decoquant, & calidè in aurem infundunt. Fumus etiam sulphuris per infundibulum exceptus vermes occidit. Chymici ad aurium vermes occidendos & extrahendos vtuntur ol. Philosophorum guttatim instillato, quemadmodum & oleo coryli cum pauxillo *Qii* dulcis misto.

#### *Exempl. gratia:*

*℞. Pingued. caponis Drach. sem. ol. coryli gutt. xv. Qii dulcis gr. iij. Misce.*

*Vel ℞. Colocynthid. Scrup. sem. hellebori albi Scrup. j. aloës Drach. sem. Cum succo persicaria vel fol. persicor. Misce instar Linimenti.*

*Aqua aurium illapsa.*

Si aqua in aurem illapsa sit, antiquum remedium est, oleum auri infundere, & aurem propriam seruare.

*Dan. Sennerti Tom. II.*

Aristoteles, sect. 3. 2. problem. 10. duas hujus rei causas affert, vnam, quod oleum lubricum reddat aurem; per lubricum autem facile effluat humor aqueus; quia oleum facile adhæret auri, propter lentorem; alteram, quia aqua facile adhæreat oleo, ideo, vbi oleum exit, simul aqua educitur. Verum hæc rei naturæ non videntur consentanea. Neque enim oleum facile adhæret aquæ, sed illam maximè auersatur. Ideoque probabilius est, cum oleum in aurem infunditur, & aurium partibus adhæret, aquam, vt sibi aduersam, non admittere, quæ propterea promptius effluit. Hinc etiam solent vrinatores oleo aures implere. Præterea oleum superiora petere, & aquæ supernatare solet. Ideoque aure inclinata aqua descendere necesse habet, vt oleum adscendat: unde aqua inferiora obtinens facilius ex aure effluit.

Est & alius modus aquam ex auribus extrahendi; si nimirum caulis cauius, vel cannula anethi vel fæniculi sumatur longitudine quinque digitorum transversorum, & dimidia pars illinatur oleo, & gossypio circumuoluitur, & in fine gossypij apponatur circulus ferreus digitum latus, eo fine, ne ignis aurem attingat, postea cannula hæc, quæ parte oleo non est illita, & gossypio caret, auri indatur, reliqua pars accendatur; sic calor communicatur auri, & ab eo attenuatur & discutitur humiditas.

Quidam cum ad liquida, tum ad arida extrahenda, cucurbitam magnam affigunt, quæ tota auris comprehendatur. Sed cum moderari ita illam tractationem non liceat, tutius est, exsuctionem, præsertim liquidorum, fieri ore per syringam aut cannulam perforatam, cujus extremitas, quæ auri immittitur, gossypio, vel, vt Ægineta præcipit, cera diligenter sit præcincta, ne spiritui trahenti vlla parte foris transitus pateat. Plures modi videantur apud Arculanum, in 9. Rhafis, cap. 41.

Interdum nonnulli post exempta ejusmodi in aurem illapsa aliquandiu malè loquuntur; cujus exemplum Forestus, lib. 12. obseru. 13. in schol. proponit, sed curauit illum infusione olei amygdalarum, amararum, frequenti. Ita enim humores cum fordibus extrahuntur. Vide Hieron. Fabricium ab Aquapendente, de operat. Chirurg. tit. de aurium Chirurgia.

#### CAPVT V.

*De Vulnere aurium.*

TAndem Vulnere aurium quod attinet, cum organum auris maxima ex parte intus reconditum lateat, auris verò externa injuriis externis pateat; vulnere magis auri externæ, quàm internæ infliguntur.

*Aurium vulnere.*

De vulneribus autem aurium præter ea, quæ aliàs in genere de vulneribus traduntur, notandum, si cum cute cartilago sit transcissa, vulnusque magnum sit, suendum esse; & cum externa auris è cute & cartilagine sit composita, & temperamento sicco prædita, siccantia & adstringentia requirit. Vitanda verò in aurium vulneribus omnia vinctuosa, crassa, graua, & emplastica, & ligaturæ arctiores. De quo Hippocrates, 2. de articul. In fractura auris quodlibet vinculum inimicum est, neque etiam ita laxum circumdabitur, quod si magis adstringatur, plurimum officit, quandoquidem integra auris sub vinculo adstricto dolet, pulsatione vexatur, atque inflammatione. Sed cataplasmata, quæ onerosa, penitus aliena sunt, pleraque etiam noxia, & abscessum excitant, plurimisque mucositates, suppurationemque infestam reddunt, quibus minimè opus auri comminutæ. Et post: Vbi quis aurem secuerit, abstinere ab omni cataplasmate debet, medericque vel medicamentis, quæ protinus cruentis vulneribus DDd 3 injiciuntur,

iniciuntur, vel alio, quod neque onere lædat, neque molestiam offerat. *Hæc Hippocrates.* Vt verò vulnerata auris in suo naturali statu conseruetur, inter caput & aures gossypium ponendum, & in opposito latere cubandum. Rumpitur quidem interdum etiam tympanum, sed quia malum id incurabile, nihil de eo dicemus.

## CAPVT VI.

## De Sonitu &amp; Tinnitu aurium.

Sonitus & tinnitus aurium.

**A**tque hi sunt morbi, qui auribus accidere solent. Iam ergo symptomata explicanda sunt.

Et primò actionem læsam quod attinet, auditus vel deprauatur, vel imminuitur, vel aboletur. Auditus deprauati vitium est, quando aures citra omnem externi æris commotionem intra se ipsas sonant. Græcis *ἡχώ* & *ὀψιγμός*, Latinis sonitus, sibilus, vel tinnitus aurium appellatur. Et si verò sanæ quoque auri accidat, vt admodum propius caua manu, vel concha auri apposita leuem quendam susurrum intus percipiat: tamen Medici sonitum aurium hic intelligunt, qui etiam citra talia obstacula externa intus sentitur, aure malè affecta, siue perse, siue per consensum, & à quo audiendi facultas offenditur, vt operam medicam desideret.

Sonitus, sibilus, tinnitus aurium, quod differant.

Nonnulli species appellationibus distinguunt. Articulano Sonitus est generale; Tonitus grauis & fortis sonus; Sibilus acutus; Tinnitus medius inter illos, vt pluuie, foliorum arborum. Fernelio Sibilus est ex tenui flatu leniter elabente; Tinnitus ex eiusdem cursu interrupto; Sonitus ex crassiore flatu plenius erumpente; Streptus ex eiusdem valido impulsu; Fluctuatio ex humoris inundatione: quibus tamen appellationibus Autores alij promiscue vti solent. Prouenit illa sonorum diuersitas à crassitie aut tenuitate maiore vel minore tum congeniti aurium æris, tum materie in primis ærem illum præter naturam impellentis; siue flatus sit, siue humor, quemadmodum dicitur.

Tinnitus aurium quid.

Tinnitus itaque aurium est sensus sonitus cuiusdam molesti intra ipsas aures, etiam cum foris omnia silent. Et si enim sonitus ille internus per se leuis est & exiguus, tamen magnus esse putatur, quia in parte est cerebro admodum vicina.

Affectio ipsa est symptoma deprauatæ facultatis audiendi, quoniam facultas sentit id, quod sentire non debebat, & cuius causa foris secundum naturam non offertur.

Pars affecta est porus *αὐστικὸς*, ea maximè sui portione, qua neruum quinti paris expansum siue dilatatum excipit, prope labyrinthum & cochleam dictas cavitates; quæ nerui expansi portio, vel finis potius porus, ubi dilatato neruo coniungitur, præcipua auris pars est. Nam minus principales partes auris censentur membrana tympano obtexta, ossa, quæ meatum osseum, & cartilagineas, quæ cartilagineum constituunt; tria verò ossicula intus, et si alij vsus ab aliis iis ascribantur, tamen ad firmitatem potius & tutelam membranæ, cui connexa sunt, condita videntur.

## Causa.

Causam sonitus & tinnitus aurium plurimi aut in ipsam facultatem audiendi, aut objectum aliquod internum siue materiam, à qua facultas illa, ejusque organa moueantur, referunt.

Vitium facultatis dicunt esse sensum exquisitum nimis, quæ Galeno est *ἀκριβὴς τῆς ἀκουστικῆς αἰσθήσεως*, leuem quoque impulsione percipiens etiam internam. Cum enim aer congenitus intus à validiore agitatione quiescat, (aliàs sonum externum non agnosceret, nec discerneret, sicut crystallinus quoque in oculo

coloris ipse expers colorata alia percipit) si leuis aliqua impulsio à causa siue interna, siue externa accidat, auditum acutiorem illam sentire statuunt. Actis autem illius auditus causam esse dicunt calorem partis modum excedentem, quo aer congenitus facile impellatur. Fieri etiam posse putant, vt meatus auditorius à prima conformatione vel nimis patens sit, vel nimis, quàm conueniebat, tortuosus, vel membrana tympani tenuior sit & siccior, vel nerui auditorij textura rarior, à quibus illud sensus acumen existit.

Auicennas debilitatem facultatis addit, quæ facultas ob dyscrasiam partis à qualitatibus omnibus, siue primis, siue secundis promptè afficiatur, atque ita lenissimo etiam quolibet sono cum molestia & offensione percellatur: sicut qui à morbo conualescunt, ob debilitatem corporis relictam facile à frigore aut calore externo offenduntur.

Verum vix credibile est, sensus *αἰσθητικὸς* symptomatis præter naturam causam, & actionis deprauatæ principium esse posse. Sit sanè, vt, qui sensum habet exquisitiorem alio, qui eundem obtulm habet, leuiora objecta percipiat: tamen objectum, etiam si leue, ad sit necesse est, quod sensui offeratur. Et cum, qui ita docent, acrimoniam sensus à calore partis mediocritatem excedente deducant, facile hinc patet, constitutionem illam non esse planè secundum naturam, sed à calore excedente agitationem aliquam fieri, & objectum, quod sensui offertur, ab eo excitari.

Minus verò probabile est, quod debilitas auditus facere possit tinnitum. Perfectio enim auditus est, non debilitas, exigua & leuiora objecta percipere.

Quod verò conualescentibus interdum aures tinnunt, non ex debilitate auditus est, sed quia in conualescentibus multi vapores ob calorem debilem attolluntur, qui auditui oblatis tinnitus causa sunt.

Igitur vnica tantum tinnitus aurium causa proxima est, objectum nimirum, siue materia intra aurem hærens, & facultatem præter naturam mouens.

Objectum autem hoc, vt vulgata fert sententia, est *αἰσθητικὸς*, id est, spiritus flatulentus, siue *αἰσθητικὸς*, hoc est, vapor crassior, ex crassa & frigida plerumque materia resolutus, qui congenitum aurium ærem agit & impellit. Spiritus ille flatulentus vel in auribus ipsis genitus est ex humore ibidem collecto, vel aliunde auribus communicatur. Et quidem vel à toto mittitur, vt in febribus, per initia potissimum paroxysmorum, ob humorum incipientem in venis & visceribus ebullitionem; in crisi quoque per vomitum aut per narium hæmorrhagiam futuram; vel in parte aliqua, vt à cerebro præcipue, à quo vapores & flatus auribus per quintum par neruorum, & per venas ac arterias, ad aures derivatas transmittuntur. A ventriculo item *αἰσθητικὸς* sursum continenter ascendentes tinnitum aurium efficiunt. Ita in biliosis famem diutius tolerantibus aures sonoræ fiunt, calore ventriculi in inopia cibi halitus ex grauis succis soluente, imò etiam ex bonis succis vapores excitante; & in ebriis quoque vaporibus ex ingurgitato potu ad caput magna copia eleuatis, qui dum exitum in angustiis illis quærunt, ad ossa & membranam tympani, expansumque neruum, allisi, tinnitus causa existunt. Ab vtero denique, hepate, liene, & visceribus aliis malè affectis, enaporationem sursum fieri in corporibus cacochymicis & repletis, minimè dubium est.

Nonnulli ab humoris in capite inundatione hoc malum oriri putant, vnde fluctuationis cuiusdam sensus auribus offeratur. Et flatus proxima materia semper est humor, à quo caloris vi ille resoluitur.

Auicennas etiam à sanici & puris in aure feruore & ebullitione sonitum in auribus accidere statuit.

Externæ causæ sūt, æris nimia refrigeratio & calefactio parentibus auribus, nimia cibi repletio & crapula à vino, vnde cruditas in capite & toto corpore cumulat,

An sensus acumen sit causa tinnitus aurium.

Debita auditus acumen sit causa tinnitus aurium.

Causa proxima tinnitus aurium.



tur, vomitus difficilis, fames, calore naturali in defectu cibi conuersio ad humores prauos in corpore, à quibus vapores noxij eleuantur, medicinæ quædam retinentes humores & flatus in capite, pharmacum commouens humorem, sed non educens; percussio in caput circa aures, fragor validus, qualis est tonitruum vehemens & bombardarum.

Circa hanc tamen communem, quam modò exposuimus, de causis sonitus & tinnitus aurium sententiam quædam monenda videntur. Et primò quidem notandum, aliud esse continuum, qui sæpe septimanas aliquot, & interdum menses, imò annos aliquot durat; aliud verò subitò exoriri, & subitò euanescere, aut certe non diu durare. Deinde in ipso sono aliquam esse differentiam. Breuè illum aurium sonitum à vapore tenui oriri, extra dubium est; cum ille è capite per angusta aurium foramina erumpere conatur, qui sonitus nunc strepitus, nunc sibili, nunc tinnitus modum refert, prout ille per angustiores vel latiores, rectos vel tortuosos meatus vagatur & mouetur.

Diuturni  
aurium soni-  
tus causa.

Verùm cum sonitus aurium sæpe non solum aliquot septimanas, sed & menses ac annos duret, & quidem continuò, ac sine vllò interuallo, vix à vapore exitum per auditus organum sibi quærente is fieri potest; cum vaporis continua talis generatio vix dari possit. Ideoque continui illius sibili causa quærenda videtur in arteriola, quæ aurem subit, si illa copioso & calidior spiritu impleatur. Tunc enim pulsu validiore subitò in auribus sonus talis percipitur: eodem modo, sicut, si quis digitum *ἀντιπρὸς* imponit, talem strepitum in arteria percipit.

Cur manu  
cauâ auri  
admotâ soni-  
tus percipi-  
tur.

Potest forsitan & alia huius rei ratio reddi, quæ pendet ex explicatione quæstionis, cur nimirum manu caua, vel concha, vel alia re caua, auri admotâ sonitus etiam in sanis percipitur. Alij rei huius causam esse putant, quia aer implantatus semper moveatur, morus verò ejus non percipitur, nisi aure recta. Alij verò aerem implantatum natura sua immotum esse statuunt, sonitum verò illum manu caua vel concha auribus admotâ fieri, quia aer, qui in anfractibus aurium continetur, semper natura sua exilire conatur, & sese diffundere; unde, cum ab obstaculo cohibetur, impingit, & hinc fit sonitus. Et quidem vero non videtur ab simile, aures, cum sint anfractuosa & cavernosa, in canis suis spatiis aerem continere, qui à calore auris ageretur erumpere conatur, ac, si cohibeatur ab aliquo obstaculo, percussus sonitum facit. Tamen etiam non videtur absurdum, cum calidum innatum auri sit aerem, & à spiritu *ἀντιπρὸς* ejusdem naturæ moveatur, spiritus verò ille influens sit in perpetua generatione & motu, ab aeris illius motu, si in obstaculum aliquod impingat, sonitum fieri posse. Et quidem non solum ab obstaculo externo, puta manu caua, aut concha id fieri potest, verùm etiam ab humore aures obstruente, aerisque illius motum impediante. Atque ita inter causas sonitus etiam referenda videtur obstructio aurium, quam alij prætereunt, ob quam spiritus illi *ἀντιπρὸς*, & aeris interni liber motus impeditur, & ad obstaculum allisione sonitus excitatur. Cujus rei argumentum est, quod plerumque cum sibilantium diuturno conjuncta est auditus difficultas, & sonitus aurium continuus tandem in difficultatem auditus, & surditatem degenerat; quæ ex obstructione meatus auditorij ortum habet.

#### Differentia.

Differentiæ à forma sunt, quod malum hoc vel sibilus est, vel tinnitus, vel sonitus, vel strepitus, aut fluctuatio. Et Galeno, in 3. de compos. medic. sec. loc. vel paulatim colligitur, vel acuatim irruit; denique vel per interualla reperit, vel continenter affligit.

#### Signa Diagnostica.

Externæ & antecedentes quidem causæ ex agro cognoscuntur. Et monet Galenus, loco allegato, adhibendum esse *πρὸς* quendam *συνάμωμον*, ex causis procatarteticis desumptum, quarum vi, sicut aliæ affectiones, ita & hæ varietatem suam accipiunt. Si paulatim malum coeperit, & recurrat per interualla, sonitusque clarior sit, à statu est plerumque frigidus & pituitosus; sicut pituita in primis flatuum materia esse conuenit, præcessit victus ratio, quæ pituitam & flatus coacervauit, & causæ aliæ caput refrigerantes & humectantes. Si continenter affligit, ab aurium affectione est priuata; per consensum verò, si subitò inuadens per interualla reperit. Et per consensum quidem cerebri, quando capitis dolor & grauitas adest, & plures simul sensus sunt affecti: à consensu verò aliarum partium, vel totius quando fiat, id suis signis etiam cognoscitur, & malum post inanitionem aut repletionem, post motum aut quietem, post vehementem calorem aut frigus quiescit, rursusque conuocatur. Si à crassis & viscidis humoribus fiat, non repente suboritur, sed paulatim increfcit, estque sonus magis confusus, & fluctuatio atque grauitas percipitur. Præcesserunt cruditates, balneum intempestiuum, & similia, ægerque calidis iuuatur. Si ab obstructione aurium fiat sonitus, est is diuturnus, & adest simul grauitas auditus. Si in febribus, aut harum, aliorumque morborum crisi sonitus aurium existat, à causis morbos illos excitantibus prouenit. Si fit ab apostemate, præcessit dolor auris, & sanies continenter emanat.

#### Signa Diagnostica.

1. Leuissimum hoc malum est, vbi est ex granedine; pejus, vbi ex morbis, capitisque longis doloribus incidit; pessimum, vbi magnis morbis venientibus, maximeque comitiali, prouenit. Celsus, lib. 6. cap. 7.
2. Si in febre ardenti sonitus aurium fuerit cum oculorum caligine, proueneritque è naribus grauitas; mente ex melancholia aberrat, in 1. Prorrhetic. aph. 18. In Coacis, addit; nisi sanguis ex naribus effluerit. Causas Aphorismi Galenus, in Comm. Prorrhetic. exponit.
3. Si in febribus sonitus aurium fiat ex spiritu vel humore frigido & crasso, sponte sonitus ille cessare solet, absque medicamentorum usu, calore febrili materiam discutiente. Galenus, in 3. de compos. medic. s. l. cap. 1. sub titulo, de sonitu aurium.
4. Bombus, id est, tinnitus grauior in acutis & sonitus in auribus lethale. Hippocrates, in Coacis. Si scilicet in febre acuta sonitus ille ex inflammatione cerebri, vel ex vehementius commoto habitu corporis, ab incendio interno existat, & praua alia signa, præsertim mentis perturbatio, conjungatur.
5. Pulsationes in capite, & sonitus aurium, hæmorrhagiam narium significat. Hippocrates, in Coacis. Commotione enim feruentis, & ad exitum concitati sanguinis suscitantur vapores, qui angustis aurium anfractibus sese insinuant sonitum efficiunt.
6. Sonitus aurium ex sensu *ἀντιπρὸς*, præsertim inueteratum, non facile curari etiam statuitur. Galenus tamen quendam ex hac causa laborantem se sanasse, stupefaciente ad accommodata alia medicamento admixto, 3. de compos. medic. s. l. loco antea allegato, scribit, cap. 1. tit. de sonitu aurium. Verùm quid de causa hæc sentiendum, supra dictum. Aduit procul dubio intemperies aliqua calida aurium, & feruor sanguinis.
7. Si aurium tinnitus biennium, vel longius durauit, raro curationem admittit, sed plerumque ad surditatem tendere solet; quod ipsum, ut supra in causis dictum, satis arguit, tinnitum talem aurium diuturnum ab obstructione aurium prouenire.

8. Sonitus aurium ex vento boreali flante post astringitum, capitis pleni subita calefactione, ex fame item, vel cibi repletionem facile remouetur, difficilior ex plenitudine aliqua diuturna, à nimia aliqua euacuatione.

9. Tinnitus aurium ex frequenti percussione in caput vel tempora non facile curatur. Verti enim solet in lurditatem, humoribus præ dolore ad organa auditus confluentibus, transiuntque spiritus auditorij impedientibus. Quod ipsum etiam confirmat, tinnitum fieri ab obstructione aurium, spiritui auditorio transitum denegante.

10. Sicut surditas biliosorum deiectione finitur, 4. aphor. 28. ita & de tinnitu aurium pronunciari potest, si ex viscerum repletionem ortum ille habeat.

### Indicationes.

Si tinnitus aurium à calore immoderato, & flatuoso spiritu in arteriola proueniat, vniuersalibus præmissis refrigerantia conueniunt. Galenus narcotica quædam admiscet, vt diximus. Si flatus causa sit, ille discutitur & reuellatur; si humor, præparetur & euacuetur: si sanies, abstergetur, & educatur; si obstructio adsit, aperiarur. Externæ quoque causæ, si quæ adsunt, remoueantur, habitatio semper totius & capitis.

### Curatio.

Pro varietate igitur causarum, à quibus sonitus aurium existit, alio atque alio modo curatio instituitur. Et quidem si malum sit ab intemperie calidâ, & sanguine ac spiritu feruidiore, utrimur refrigerantibus & humectantibus, vt decocto hordei, violarum, lactucæ, nymphæ, papaueris albi, pro fomento. Validiora sunt, succus portulacæ, mandragoræ, papaueris albi. Galenus, ex Archigene, castoreum & semen cicutæ, trita in aceto, in aurem immittit. Alij euaporationem ex semine cicutæ in aceto cocto excipere iubent. His non conferentibus, vtendum opio, sed exigua quantitate, & cum magna cautione opij gr. j. in olei rosacei Vnc. ss. dissoluto. Quæ tamen postiora non frigefaciendo, sed vi narcotica prosunt, sanguinis & spirituum feruidorum motum sistendo.

Si ex humore crasso & viscido affectus ortum habeat, totius corporis, aut saltem capitis, præmissa euacuatione, vt supra, parte 1. dictum, attenuantia & discutientia auribus adhibeantur. Quo in genere sunt oleum amygdal. amarar. rutæ, castorei auribus instillatum, vel solum, vel cum melle mistum, aut oleum, in quo castoreum, cuminum, ruta, anethum, nigella, nardus decocta fuerint, quibus & parum aceti admiscere licet, si attenuandum sit. Aërius castorei & spicanardi part. æqual. cum aceto & ol. rosac. miscet & instillat. Prodest etiam ceparum aut porri succus cum lacte muliebri vel oleo rosaceo coctus. Vel oleum oliuarum coctum similiter in cortice colocynthidis.

Experimento probatum est, prodesse vaporem aceti, & aceti cum felle bubulo; item fel. capræ cum succo porri. Alij panis recens cocto, & ex clibano adhuc calenti, spiritum vini affundunt, & panem auri applicant, vt vapor in aurem recipiatur.

Montanus sequens commendat Oleum, ejusque gutt. j. manè & vespere auri instillat, & deinde gossypio moschato aurem obstruit:

℞. Milleped. num. xxx. Lauentur, & bulliant in ol. amygdal. Vnc. ii. aceti Vnc. iiij. ad consumptionem aceti.

Factâ diligenti expressione Colatura vsui referuetur.

Aut ℞. Pulpa colocynth. Drach. sem. succi rutæ, majoran. an. Vnc. i. cumini, carni, an. Drach. ii.

Coquantur in vino & oleo amygdal. amar. ad vini consumptionem. De expresso & colato aliquid in aurem immittatur, aurisque bombace moschato obturatur.

Vel ℞. Helleb. albi Drac. iij. fol. lauri, rutæ, fraxini, an. M. sem. Coqu. in ol. amygdal. & Colentur.

Vel ℞. Sem. porri, caryophyllorum, an. Scrup. i. moschi gr. v. Cum succo majoranæ & ruta Misce, & auri instillato.

Aut ℞. Nitri, myrrhæ, an. Drach. j. hellebori albi Drach. sem. castor. Scrup. i.

Terantur cum olei rosacei & aceti p. æ. & guttatim in aurem immittantur.

Commendatur etiam valde fel lucij piscis, quod nonnulli ita præparant;

℞. Fella lucior. recent. num. iij.

Indantur vitro, quod diligenter claudatur, & fermento obducatur, ac in clibanum ponatur, & tandem coquatur, donec panis sit coctus. Liqueoris, qui in vitro inuenitur, vespere & mane gutt. iij. auri instillantur.

Efficaciora hæc erunt, si prius euaporatio fiat ex sequenti Decocto manè & vespere;

℞. Fol. calaminth, majoran, centaurij minor. rorismarini, an. M. j. baccar. juniperi electar. num. xv. fol. lauri, absinth. an. M. sem. lupinorum num. xij. lumbricorum vino lotorum & in sindone ligatorum p. ss.

Coq. in f. q. aquæ, & duplo vini albi, ad consumptionem tertiæ partis. Colatura pro euaporatione feruetur. Quâ dum æger vitur, fabas aut pisca aliquot in ore detineat & masticer, vt patente ita meatu auditorio fumus magis penetret.

Sacculus etiam parari potest ex foliis saluiæ, betonicæ, majoranæ, rutæ, hyssopi, calaminth. floribus chamæmeli stachad. Arabic. fol. pini & lauri, sem. carui, anisi, qui calefactus auri post euaporationem & liqueoris instillationem imponatur.

Qualis est sequens:

℞. Fol. majoranæ, saluiæ, an. M. ss. rutæ M. j. absinthij, summit. anethi, an. p. ii. baccar. lauri Drach. i. granor. juniperi Drach. i. sem. sem. cymini Drach. i. carni Drach. ss. fl. chamæmeli p. ij.

Cocisa indantur sacculis duobus ex tela linea paratis. Prosunt quoque pulueres & tabulæ, quæ flatu discutunt, à cœna sumptæ.

Non etiam omittendum, quin lenibus clysteribus aluus interdum eluatur, ne retentis excrementis noua in capite materia colligatur.

Ad Tinnitum aurium inueteratum, qui surditatem minatur, Montanus vitur olei de pice, olei amygdal. amarar. an. Vnc. sem. & mixta guttatim frequenter instillat; quo & cerebrum confortatur. Et omnino destillata olea ex plantis modò enumeratis efficacissima sunt, vt & spiritus ex iisdem parati. Maxime etiam sternutamenta ad tinnitum aurium curandum utilia sunt. Monendum autem de topicis istis, commodissime tempore matutino, & ante cœnam adhiberi. Cubitum enim ituris caput vaporibus repletum est, parumque commodi è medicamentis ejusmodi sperari potest. Reliqua ex iis, quæ capite sequenti de auditu grauitate & surditate dicentur, & supra de intemperie aurium cum humore frigido dicta sunt, patent.

Si in febribus tinnitus aurium fiat, aut in harum ad crisin apparatu, sinendus est, nihilque adhibendum, donec morbus finitus, vel crisis absoluta sit; quia, vt in prognosticis diximus, plerumque sponte sua sedatur, præsertim post crisin. Si quid superest, discutiente remedio vtendum, quale est absinthij decoctum ex aqua & paucis aceto pro fortis; aut decoctum ejusdem ex oleo rosaceo instillatum. Si quæ causa externa adest, illa quoque amouenda erit.

Si ex partis alicujus consensum malum oriatur, parti, quæ primò afficitur, succurrendum, vt supra, parte 1. cap. 6. dictum.

### Dieta.

Dieta in genere medicamentis pro varietate causarum respondeat. Abstineat æger à potu liberaliore vespertino, &

& sub ingressum lecti capiat cochlear j. de semine carui in aceto macerato & exsiccaro, vel tantundem seminis feniculi, anisi, coriandri. Vel his commixtis addatur aliquid macis, cinamomi, & cum duplo sacchari vlturpetur. Nonnunquam parum aeger Mithridat. sumat, aut de speciebus pliris Archontic. vel diomafchi dulcis, si malum à frigido ortum sit. Qui vino assueti sunt, iis diluatur cum aqua semin. coriandri præparati. Aures aeger occlusas habeat, & munitas aduersus frigus & ventos. Cogitationes & animi nimia intentio vitanda. Frictiones extremorum semper commodæ sunt, & matutinae exercitationes. Pectinationes item capitis, corpore & capite prius euacuato. Venus in hoc malo valde noxia, illudque inducere potest.

Obaudire.

Cognatum sonitui aurium vitium est, quod Græci ἀκουστική, Latini Obauditionem vocant, compositum quasi ex deprauato & graui auditu vitium; quo auditus confusa percipit, non aliter atque visus aliena cernit in suffusione ex consensu ventriculi orta. Existit illud ab ulcere non probè exterso & consolidato, quando spiritus per arterias impulsus auditum impetu suo offendit. Fit etiam in summo febrium ardore, vaporibus per arterias in caput ad aures effusis. Denique sine febre, dum è visceribus impuris calida copiosaque euaporatio continenter in caput effertur.

## CAPVT VII.

### De Graui Auditui & Surditate.

**B**ΑΡΥΚΟΙΑ & ΔΥΣΚΟΙΑ & ὑποκόφωσις, Latinis grauitas & difficultas auditus, & κώφωσις, id est, surditas, solum magnitudine causæ differunt; ideoque vno capite de his agemus. Si aeger solum sonos magnos audiat, leues verò non percipiat, βαρυκοία & δυσκοία & ὑποκόφωσις nominatur. Si verò neq; magnos, neque paruos percipiat, Surditas appellatur. Estque Surditas miserandum malum. Cum enim aures sint quasi porta mentis, per quam menti ea intromittuntur, quæ doctrina & institutione traduntur ad vitam coram Deo & hominibus rectè transigendam: miserum eum hominem esse necesse est, qui audiendi facultate destitutus adminiculo hoc ad salutem æternam, & ad præsentem incolumitatem vri nequit. Misericordiores adhuc sunt, qui simul cæci sunt. Miserrimi, qui cæci, surdi, muti. Cuius rei exemplum habetur apud Platerum, lib. 1. obseruat. de quodam Abbate, qui ex lue Venerea cæcus, mutus, surdus factus, mentem aliorum non alio pacto intelligere & percipere potuit, quàm illi supra brachium nudum literas sententiam aliquam exprimentes digito vel ligno ducendo, ex quibus singulis sensu perceptis verbum, atque ex pluribus verbis sententiam colligebat.

Graui auditui.

Surditas.

Surditas nimirum functio auditus est abolita; grauitas diminuta. Atque ita vtraque affectio est symptoma in genere læsarum functionum animalium, atque in his facultatis audiendi.

### Causæ.

Quia verò ad auditum perficiendum requiruntur & ipsum audiendi instrumentum, auris, & spiritus animales, & qui ad hunc defert, nervus ἀκουστικός: causæ etiam læsionis auditus querendæ sunt vel in spiritu animali, & nervo cum deferente, vel in auditu organo.

Primò ob vitium spiritus læditur auditus, cum in cerebro vel non generatur, vel ab eodem non transmittitur, vel à nervo auditorio, qui spiritum illum aduehere debebat, non deferretur. Cerebri vitium generale est, & ab eo, vt reliqui sensus, ita etiam auditus, læditur. Si verò è nervo ἀκουστικός extra cerebrum, & in eius ad aures progressu, causâ mali hæreat, auditus non reliqui-

sensus afficiuntur. Fit hoc sæpe in prima conformatione, dum vel ille non rectè formatus est, vel non rectè ductus; vnde surdi ab infantia fiunt: vel ab obstructione: vel à tumore aliquo.

Oritur & grauitas auditus à spiritibus factis panicioribus, crassis & impuris, siue ex errore victus tales gignantur, siue ex ambiente aëre. Hinc venti australes auditui nocent.

Organum verò auditus quod attinet, quodnam illud sit, dictum in Institutionibus, quæ hîc repetenda non censuimus. Vt rem paucis complectamur, cum instrumentum auditus primum non possit esse, nisi pars corporis viuens, res eò videtur redire, vt instrumentum auditus primum sit nervi auditorij ea portio, quæ meatui interno implantatur, vel potius, vt Galenus ipse definit, 1. de sympt. caus. cap. 3. τὸ ἐν τῷ νῆρῳ, hoc est, externus finis, siue extremitas pori ἀκουστικός, vbi extremitas illa dilatati nervi auditorij portionem excipit. Cumque eò loci ἀκουστικός aurium aëre contineatur, verisimile est, Galenum ipsum etiam mentione τῆς ἐν τῷ νῆρῳ, complexum esse. Vt enim vilus organum lucidum est, vt obiecto respòdeat: ita organum auditus aëreum. Et nervus auditorius, qui, vt alij nervi, communis soboles est cerebri, ad sonos speciatim percipiendos contrahitur & determinatur beneficio proprii & peculiaris sui organi, quod aëre aurium est congenitus, seu calidum, & spiritus aurium insitus, naturæ aëreæ. Auditio enim non fit, nisi illa extremi aëris commotio interno aurium aëri communicetur per tortuosos aurium anfractus, vbi membrana tympani allisus aëre externus qualitate soni affectus internum aërem ferit, qui deinceps ministro nervo auditorio ad cerebrum, sentiendi principium, sonum transmittit.

An alius instrumentum proximum.

Vitium verò nervi auditorij iam expansi & in aurem dilatati ferè à communi causâ semper dependet. Si enim ille nervus non rectè sit conformatus, vel non rectè auri inferatur, spiritus ἀκουστικός in aurem transire non potest: quod etiam accidit, si nervus idem obstruatur, vnde auditus læditur; & præterea implantato aëri necessarium alimentum & com meatus, quo foueatur, denegatur. Si verò humores vitiosi quicunque ad aurem ferantur; & obstruere interdum meatum possunt, & aërem illum inquinant, crassumque & impurum reddunt, & ad præstandum suum vsum ineptum. Materia illa plerumque est frigida & pituitosa, nonnunquam & biliosa, vt, ex 4. aphor. 28. patet, vbi biliosas deiectiones surdis prodesse Hippocrates docet: interdum & sanguinea; siquidem surditatem, quæ crisin scilicet comitatur, quoque fieri ex sanguinis per aures fluxu, comperitum est.

Nervi auditorij morbi.

Mittitur autem illa ad aurem interdum à toto corpore, vt in febribus; solèturque talis surditas, vel difficultas auditus, crisin antecedere, vapore vel humore ad aures detruso: quæ auditus læsio peracta crisi sponte cessare solet.

Aërem quoque congenitum crassum reddit & impurum vapor caliginosus & crassus sursum eleuatus, aëri innato sese permiscens, & non solum citra hunc oberans, & tinnitum aurium, qui auditus grauitatis & surditatis præludium est, excitans, verum etiam eidem sese permiscens.

Si tamen sit humor crassus vel copiosior, nonnunquam etiam post crisin difficultas auditus adhuc durare solet. Interdum etiam sine crisi à toto corpore ad aures materia mittitur. Aliàs materia, quæ auditum lædit, plerumque crassa & pituitosa est, atque à cerebro præcipue prodit, alimentum suum probè non coquente, & excrementis abundante. Vt in alias partes, ita & in aures, è capite materia catarrhosa fluit, & se in interiorem auris cauitatem per foramen, quod nervus auditorius transit, insinuat: id quod senibus propter excrementorum pituitosorum copiam familiare est. Obiecto proprio etiam, sono scilicet violento & nimio, subito & affatim per

per aurem ad cerebrum usque penetrante, offenso nervo, spiritibusque dissipatis, surditatem introductam fuisse, observatum est.

*Meatus auditorij morbi.*

Reliquas aures partes quod attinet, meatus auditorius externus, usque ad tympani membranam, nihil præter aerem continet, isque nonnunquam obstruitur vel totus, vel ex parte, & obstructus potius difficilis auditus, quam surditatis, causa est. Fit vero obstructio vel ab externis rebus, quales sunt lapilli, nuclei, vermes, aqua, & similia; vel tumore aliquo, & tuberculo in meatu illo post vlcus nato. Nonnunquam etiam sordes aurium, seu naturalia illa aurium excrementa, si diu retineantur, & incrassentur, aures obstruunt, præcipue si, quod interdum accidit, auriscalpio ad tympanum usque propellantur, ibique hæreant, ut non facile excerni possint.

*Membrana aurium morbi.*

Membrana quoque tympani, quam myringam vulgò appellant, auditui obesse potest, si vel ab externo aëre frigido (ut frigidum omnibus nervis & membranis inimicum est) contrahat frigiditatem, vel narcoticorum usu obstupescat; (quæ tamen vitia, si actio causæ vehemens sit, etiam penitioribus partibus communicari possunt) vel reddatur crassior, quod inflammatione in cerebrum conuersa accidere solet; vel ab humoribus affluentibus nimium humectetur, & crassior euadat: quæ satis frequens causa est difficultatis auditus in senibus. Ut enim oculorum tunica in senibus crassescunt, & obscuriores fiunt: ita etiam proculdubio ætatis progressu hæc membrana aliquam mutationem suscipit. Eadem nonnunquam rumpitur, vel tenditur & laxatur vi externâ, ut ab auriscalpio, vel alia re violentè immisâ, sonitu tubarum, & vehementi clamore; eroditur ab vlcere. Ita etiam si officula illa tria, quæ membranæ huic adiacent, loco dimoveantur, ictu vehementi, sonitu, vel humoris alicuius affluxu, vel quâcunque de causa, granitas auditus, vel surditas sequitur.

### Signa Diagnostica.

Verum ista causarum varietas suis signis discernenda est, ut curatio rectè institui possit. Si primò vitium sit in cerebro, epilepsia, lethargus, apoplexia, præcesserunt, vel adsunt, & aliæ animales facultates simul læsæ sunt. Si autem in solo nervo auditorio sit vitium, reliqui sensus integri erunt. Præcessit tamen aliqua cerebri debilitas, diurnus capitis dolor, & similia, quæ excrementitios humores in cerebro collectos, & ad nervum auditorium delapsos testantur. Ita quoque si aer impurus sit, signa aderunt imbecilli & excrementis repleti cerebri, aut æger versatus est diu in aëre impuro, qui spiritus turbidos & impuros reddit.

Utrum verò excrementitij humores, qui nervum obruunt, & aërem implantatum inquinant, à toto, vel à cerebro tantum prouenerint, propria signa testabuntur. Si à consensu ventriculi fiat malum, prout ventriculus vacuus, vel plenus est; augetur, vel minuitur. Præterea malum per intervalla reperit. Ab aëris etiam, vel spiritus vitio vix omnino surdi euadunt, sed surdastris, surdis tamen finitimi. Criticus motus in morbis latere non potest. Obstructionem etiam in nervo & meatibus internis sensim factam esse, indicio est, si capitis dolor diurnus, sibilus, & aurium tinnitus, lethargus, apoplexia, & affectus similis præcesserit; & natura morborum præcedentium naturam humoris obstruentis declarabit. Si calidus humor causa sit, dolor acutissimus accidit, adest febris, & calor in aure percipitur. Si verò ab humore sit frigidus, dolor absque sensu caloris, & sine febre est. Si obstructio sit in externo aures meatu, oculis id facillè cerni, & instrumentis explorari potest. Et si aliquid extrâ immisum sit, ex relatione ægri cognosci poterit. Ita quoque facillè patet, si phlegmone adsit, vel ab vlcere relictum tuberculum crassum. Si in membrana tympani sit affectio, dolor vehemens

præcessit, vel vulnus, à quo cicatrix in membrana relictâ.

Verum cum adeò exactè semper cognosci non possit, an in nervo auditorio extra aurem, vel in aure, & in qua parte aures vitium hæreat, vtilissimum fuerit, discernere, an à causis internis, an externis malum pendeat. Si enim quid in aurem missum sit, externum meatum obstructum esse, indicio est. Si vulnus præcessit, vel vehemens sonitus, membranam tympani ruptam vel laxatam, aut officula illa loco suo mota esse, argumento est. Si verò causa externa absit, an aliquis morbus præcesserit, considerandum. Ille enim facillè humoris naturam indicabit, qui rursus curationem præscribit; et si in qua aures determinata particula hæreat, non ita perspectum est. Si verò nullus morbus præcessit, an subito, vel sensim surditas, vel difficultas auditus orta sit, inquirendum. Illud enim facilius à calido humore, hoc à frigido accidit,

### Prognostica.

1. Granitas auditus non contemnendum malum est. Temporis enim progressu paulatim incrementum sumens in perfectam surditatem degenerat. Galenus, 3. de compos. medic. s. l. cap. 3. titulo, ad aures granitatem.

2. A primo ortu, aut post ortum, diuturna & perfecta surditas orta non curatur: quæ verò non perfecta est, sed ramen diuturna, nec ipsa curabilis, aut difficulter admodum curatur. Paulus Aegineta, lib. 3. cap. 23.

3. Obstructio in meatu externo facilius tollitur, difficilior in meatu interno, & meatu auditorio; præsertim si sit consummata: & difficilior soluitur obstructio, quæ à pituita est, quam quæ est à bile.

4. Membrana tympani rupta, vel cicatrix ab ea relictâ, aut officula luxata non curantur.

5. Surditas in febribus, & vrina absque sedimento, in quibus crassa quædam sublimis perunt, mentis alienationem significant. 1. Prorrh. comm. 1. aph. 31.

6. Surditas in acutis & malignis febribus non semper malum signum est, sed sæpe bonum; cum scilicet cum bonis signis coniuncta est, & delirium ac symptomata remittunt: id quod sæpe observavi. Denotat enim materiam à cerebro ad exteriora propelli.

[Hippocrates 4. aphorism. 49. scribit; in febre non intermittente, si labrum, aut supercilium, aut oculus, aut nasus perueritur, si non videt, si non audit, imbecillo in febribus. De surditate in febribus. ligo.]

iam corpore, quicquid horum acciderit, in propinquo iam mors est. Et 3. prorrh. aph. 35. post modicam sanguinis euacuationem, nigramque deiectionem, in acutis surditas, mala est. Et in Coac. aphor. 190. sec. distinct. Foëssij, surditas in acutis & turbulentis morbis mala est. Contra Auicenna lib. 3. fen. 4. tr. 1. c. 3. scribit: Nocuum est præterea auditus quandoque accidit secundum semitam crissum, & secundum semitam permutationis materia in fine agnitudinum acutarum. Et ipse sæpissimè observavi, & cuilibet observare facile est, si in acutis febribus delirium adest, vel imminet, & superuenit surditas, ægros conualescere.

De qua controuersia notandum, eam saltem surditatem esse bonam, quæ est critica, ut clarè Auicenna innuit; id est, cum natura noxios humores & vapores, cerebrum occupantes & delirium excitantes, à cerebro ad aures, ut partes vicinas, minus tamen nobiles detrudit. Quod cum accidit, delirium remittit, & æger melius habere incipit. Si verò æger obsurdescat, & delirium non minuatur, imò ingrauescat, & alia graua symptomata accedant, malum signum est. Indicium enim est. tantam materiam copiam adesse, ut cerebro tota contineri non possit, sed in aures sese diffundat.]

7. Quibus deiectiones sunt biliosæ, superueniente surditate cessant, & contra quibus surditas adest, biliosæ



lioforum deiectione finitur, 4. *aphor.* 24. *Eodem libro, aphor.* 60. addit, surditatem eiusmodi in febribus sanguine quoque è naribus fluente solui. Materia enim surditatem efficiens vel ad aures retrahitur, vel à cerebro ad venas colli, atque hinc ad cauiam, & tandem per hepar ad intestina deriuatur.

8. Surditas in acutis & turbulentis morbis mala, 1. *Prorrh. comm.* 1. 32. extincta scilicet per morbi vehementiam audiendi vi, aut humoris praua copia cerebrum & aures occupante.

9. Et omnino melius est, si surditas delirium, quàm si delirium surditatem sequatur. Melius enim est materia ab internis ad externa, quàm ab externis ad interna conuerti. Et si mala symptomata, vt vomitus, vigilie, & similia surditati coniungantur, delirium & morbum periculofum significant.

10. Surditas per interualla crescens & decrescens, vel ab humore tenui & exiguo est, qui interdum minuitur, vel à flatulento spiritu; quæ surditas etiam facilius curatur.

11. Surditas, quæ per idiopathiam aurium genita est, difficiliter curatur, quàm per sympathiam.

12. Ex surditate mansuetæ parotides existunt, cum aliis, tum si quid fastidiosi superuenit; sed & comare superueniente magis fiunt parotides. Hippocrates, in *Coacis*. Itaque surditas & coma commune signum sunt desipientiæ & parotidum. Nam in materia calida & acutiore magis desipientia, in non ita acuta, & quæ cruda est, magis parotides accidunt; vtrique vero proprium signum est translationis materiæ in caput.

13. Quibus surditas adest cum capitis grauitate, & hypochondrij tensione, & oculi ad splendorem perturbatione, iis sanguinis profluuium significat. Hippocrates, in *Coacis*.

### Indicationes.

Pro varietate caussarum etiam hinc Indicationes & cura variant. Si externus ille aurium meatus obstructus sit, impedimentum illud obstructionem pariens, qualecunque etiam sit, tollendum. Si ab humoribus vitiosis vel à congenitis inquinetur, vel aurium meatus obstructuatur, materia excrementitia debito modo euacuanda; nisi post crisis sponte sua cedat; Si facultas læsa sit ratione nerui auditorij, absitque obstructio, causa hanc fouens ac conseruans auferatur: si ratione cerebri, huius legitimæ curatione prospiciatur.

### Curatio.

Cum verò frequentissime ab humore pituitoso accidat surditas, si sanguis simul abundet, vena aperiatur. Si verò venæ sectione opus non sit, humor mox præparetur & euacuatur iis medicamentis, quæ supra, *part.* 1. *cap.* 10. de *Intemperie capitis cum pituita*, fuerunt proposita. Et purgatio per interualla repetatur. Et quidem in surditate medicamenta purgantia & frequentiora, & fortiora sunt, quàm in graui auditu. Corpore toto euacuato, caput etiam euacuatur apophlegmatismis, gargarismis, errhinis. Idemque exsicceatur sacculis, lotionibus, & aliis medicamentis, quæ etiam, *ibidem*, fuerunt proposita. Ad totum corpus euacuandum, & humores, flatus, ac vapores etiam in capite discutiendos, valde vtilis sunt thermæ; & quasdam peculiari vi grauitati auditus & surditati conferre creditur: & inprimis sulphureæ commendantur, in quibus æger non solum lauet, sed & spongia ampla, vel quæ totum caput tegat, capite imposita aquam thermarum per epistomium effluentem embrochæ modo excipiat. Inter particulares capitis euacuationes inprimis vtilia sunt masticatoria, quæ non tantum, dum excrementa cerebri euacuant, præstant, ne materia ad aures fluat, sed & per forami-

na in basi caluariæ auditus organum subeuntia expurgatio humorum aures obstructuentium iis fieri potest.

Vtilia sunt & errhina. Sternutatoria tamen hic non vsque adeò tuta sunt; dum incertum sit, quò motus humorum ex agitatione illa vehementi concitatus vergere possit.

Corpore toto & capite euacuato Topica etiam auribus applicentur & instillentur, quæ cum supra, *cap.* 1. de *Intemperie aurium*, sint proposita, ea hinc repetere opus non est: vnum atque alterum saltem addere libet.

Aqua origani ex sicca planta cum vino destillata commendatur.

Vtilis est & hæc Aqua:

*℞. Rad. raphani, porri, an. Vnc. i. cyclam. Vnc. ss. hellebori albi Drach. i. crigani Vnc. ss. ruta, maioran. an. Dra. ii. flor. lauridul. sem. fœniculi, cumini, castorei, an. Drach. i. baccar. lauri num. xv. fellis tauri Vnc. ss. vini albi q. s.*

Macerentur aliquandiu & destillentur.

Olea destillata vtilia sunt, rutæ, torismarini, maioranæ, saluiæ, seminis fœniculi, carui, baccarum lauri, caryophyllorum, cinamomi. Eadem medicamenta locum habent, si à nuda intemperie sit auditus grauitas. Fel etiam animalium vtile est, & inprimis perdicum, quod à proprietate prodesse dicitur, si inprimis cum olei succini parte æquali misceatur, & in aures immittatur. Crato valde commendat aquam carduibenedicti, cuius supra facta est mentio.

D. Brunnerus sequenti Oleo frequenter vsus est:

*℞. Ol. porror. nardini, an. Vnc. i. castorei Vnc. ss. spir. vini Vnc. iii. fellis tauri Drach. ii. hellebor. nigri Dra. ss. muschat. salis nitri, an. Drac. i.*

Ebulliant parum, & ad vsum seruentur. De quò oleo guttæ iii. auri instillentur, aurisque gossypio maci suffumigato obturetur, & sacculus ex sale, cymino & milio paratus, vel modò dictus imponatur.

D. Næuius sequenti Oleo feliciter vsus est:

*℞. Fol. ruta, serpilli, an. P. iii. origani Creic. P. ii. fellis apri in vesica sua exsiccati Scrup. i. euphorbij Drach. ss. hellebor. albi, castorei, an. Drach. i. lumbric. terrestr. Dra. ss. apum siccatarum Scr. i. pulp. colocynth. Dra. ss. viuriol. præparati Scrup. i.*

Incisa & contusa grosso modo infundantur in *ol. amygd. amarar. Vnc. i. ss. rutæ. Vnc. i. aq. vitæ Vnc. x. ol. laurini Drach. i. ss.*

Stent in loco tepido per 2. vel 3. d. dehinc bulliant ad aquæ consumptionem; postea colentur, & colatura seruetur.

Vel *℞. Rad. raphan. maj. porri, ceparum, an. Vnc. ii. cyclamin. Vnc. i. hellebor. alb. Vnc. ss. fol. origan. rutæ, maioran. an. Vnc. ss. flor. anthos, lauridul. salu. an. Drach. ii. sem. fœniculi, cymini, an. Drach. iii. baccar. lauri num. xxx.*

Contunde omnia grosso modo, add. *fellis vaccini Vnc. i. ss.*

Postea macerentur in *vini opt. q. s.* ac tandem destillentur.

Chymici Balsamum sulph. laudant spiritu vini extractum, alij aquam è ligno fraxini destillatam.

Capite euacuato clamores etiam & soni vehementiores, vt tubarum, vtilis sunt. Calefaciunt enim meatum auditorium, & residuum humorem discutiunt, & locis illis impactum elidunt.

Si verò surditas, vel auditus grauitas sit ab vlcere aurium, eius curatio instituenda, vt supradictum. Atque hic abstinendum ab oleis. Nam oleum est vlceribus inimicum, & maxime vlceribus aurium.

Si quid in aurem extra immisum eam obstruat, id eximendum, vt in *Institut.* & supra etiam fuit traditum, *l. d.*

Tandem si à materia biliosa per febres, absque insigni ali qua

aliqua instrumenti auditus læsione, auditus grauitas vel surditas ortum habeat, spõte ferè malum cessat, materiã per alium euacuata, vel per nares effusa, vt Gale- nus, 4. aphor. 60. habet, vel etiam insensibiliter discussa. Si tamen malum duret, medicamenta bilem euacuantia adhibeantur, & debita victus ratio: auribus etiam in- stilletur oleum violarum, nymphæ, & similia, ne in- flammatio excitetur.

Si verò citra febrem contigerit, bilioso redundan- te sanguine, curatio à phlebotomia inchoanda erit, venã humerali lateris eiusdem incisã; hinc humo- ris biliosi præparatio instituenda. Postea topica ad- moueantur; vbi vapor ex decoctione herbarum se- quentium per infundibulum in aurem receptus prodest:

℞. Fol. salic. lactuc. malu. alch. an. M. i. flor. violar. rosar. an. P. ii. Concisa coqu.

Vel iniiciantur guttulæ ii. aut iii. ol. lactuc. ex semine expressi, vel olei salicis, nymph. aut violarum; vel lac hu- manum cum albumine oui permistum immittatur. Vel sequens Iniectio paretur:

℞. Succ. sedi maior. recent. Drach. ii. lact. mulieris 3. j. Misce.

Regula in  
aurium cu-  
ratione obser-  
uanda.

Conclusionis loco saltem aliquot Regulas genera- les, quæ in omnibus aurium morbis curandis obseruan- da, proponemus.

1. Medicamenta, quæcunque auribus immit- tuntur, sint tepida, non intensè calida vel frigida.
2. Noua medicamenta non imponantur, nisi auris à sorde præcedentis medicamenti optimè expurga- ta sit,
3. Vna vice 3. vel 4. guttas immittere sufficit,
4. Post medicamenti in aurem immisionem æger su- per aure sana iaceat.
5. Eligantur autem ea, quæ auribus immittun- tur, quæ non valde vinctuosa & viscosa sunt. Talia enim in aures immissa, & in aurium anfractus penetrantia, vix iterum rectè extrahi possunt; ideoque, quæ for- ma euaporationis & suffumigiorum adhibentur, spiritiuosa medicamenta & destillata, commodissima sunt.
6. Caput tandem in omni surditate & difficili au- ditu diligenter roborandum, cum internis, tum externis medicamentis, supra, part. i. propositis,

#### Diata.

Diata medicamentis & varietati causarum respon- deat. Vt saltem de grauitate auditus & surditate dica- mus, quæ ex frigida & humida materia provenit, quæq; frequentissima est, ea diata tunc conuenit, quæ supra, part. i. c. 10. est proposita. Aër sit purus, ad siccitatem vergens; æger viter ventos, & præsertim austrinos, & æ- rem frigidum & humidum, atque ab eo aures muniat, absteineat à cibis, qui crassos humores gignunt, & va- pores multos in caput mittunt, atque in primis allium & cæpe comesta auditui nocent.

### CAPVT VIII.

#### De Aurium Dolore.

Aurium do-  
lor.

Inter aurium symptomata est etiam Aurium dolor, Græcis *otalgia*, grauissimum & periculosissimum malum; cui nisi tempestiuè succurratur, in symptomata grauissima, ac mortem denique hominem præcipitat. Et quidem malum quàm oculorum dolor grauius; cum oculorum dolores in oculis persistant, aurium verò do- lores cerebrum in consensum trahant, vnde delirium & mors sequi solet.

Cum autem dolor sit tristis sensatio à solutione con- tinui partium sentientium, membranarum puta, orta:

doloris etiam in auribus subiectum partes sunt mem- branosa illæ aures internæ, & nervus auditorius (quate- nus scilicet membranofus,) Quamquam autem partes externæ dolore quoque reptari aliquando possint: ta- men cum dolor ille magnus non sit, cum de dolore au- rium agimus, eum præcipuè intelligimus, qui interi- num meatum, ac membranam & neruum auditorium occupat.

#### Causa.

Subiectum, vt modò dictum est, vt in aliis corporis partibus, ita & hic, sunt membranæ, quæ aures cavitates inuestiunt, & sensu exquisito sunt præditæ. Afficitur autem membrana vel in exterioris aures cavitare, & sæpe affecta grauissimos dolores parit, qui etiam attra- ctu externo exacerbantur; vel interiore cavitare post tympanum.

Causa quidem proxima est solutio continui. Verùm oritur illa porro ab aliis causis. Atque hinc dolor au- rium vel fit ab externis rebus immisiss, vel à vulnere, vel ab intemperie, vel à flaribus, vel ab humoribus cali- dis & frigidis, vel ab inflammatione.

Quod intemperies frigida dolorem excitare queat, extra controuersiam est, & experientia id sæpe docuit. An verò intemperies sola calida à causa externa indu- cta dolorem inducere possit, controuersum est. Græci quidem huius causæ mentionem non faciunt: Arabes tamen omnes inter causas externas aurium doloris etiam aëris caliditatem recensent. Verùm frigida qui- dem nervis inimica sunt, non verò ita calida; ac calor ex- ternus aëris vix calidior est cerebro, ac aures parte in- terna, Atque ita aer per se tantum alterando vix dolo- rem aurium excitabit. Pruritus tamen in aure excitare valet. Per accidens verò id facillè præstare poterit, nimi- rum affluxum humorum ad aures commouendo; quo sensu proculdubio Hippocrates, 3. aphor. 2. inter æstiuos morbos aurium dolorem recenset. Solentque dolores, qui ab inflammatione oriuntur, in auribus esse frequen- tissimi, & grauissimi, punctorii, pulsantes & diuellen- tes, cum magno plerumque ardore; eoque plerumque febricula comitatur, solèturque is dolor maximè intendi, cum inflammatio ad suppurationem tendit, & rupto abs- cessu remittere. Solet autem materia illa, quæ aurium dolorem excitat, nunc à toto, vt in crisis febrium, vel etiam sine crisi quandoque; nunc à cerebro aut parte alia communicari. Interdum etiam materia maligna est, vt in lue Venerea, quæ circa periostia hærens cum diu- turnos in aliis capitis partibus, tum etiam aurium do- lores excitat.

#### Signa Diagnostica.

Signis ad ipsam affectionem cognoscendam opus non est, cum æger, qualis sit, satis prodatur. In infantibus autem ploratus augetur, si pars affecta tangatur, & præ- ter consuetudinem aliquid ex aure effluit, aut, quod ef- fluxit, iam retinetur.

Signis verò, è quibus causarum varietas cognosca- tur, opus est. Primò nimirum inquirendum, an aliquid extra auri immisissum sit, quod dolorem pariat, quod fa- cillè ex ægri relatione & auri inspectione & explora- tione cognoscitur. Si etiam vulnus auri inflatum, vel alia externa violentia illi allata sit, & illud ex ægri rela- tione parer.

Deinde, si sit ab intemperie nuda, nulla grauitas, nul- la tensio, nullus tumor percipitur; quæ adiunt, si intem- peries sit cum materia: quo casu & auditus magis im- peditur. Et si intemperies sit frigida, æger in aëre & ven- to frigido diu versatus est, quod sit nonnunquam in longis peregrinationibus tempore hyberno, idque ex ægri relatione cognoscitur, dolorque est citra ardo- rem, calidisque leuatur,

Si verò nihil tale præcesserit, quod nudam intemperiem inducere potuerit, & caput sit grauius, proculdubio quidem materia adest, aut spiritus turbulentus; quod cognoscitur ex dolore vehemente sine ardore & grauitate, ac rinnitu & strepitu manifesto, & quod dolor non est continuus, sed per interualla quidem vel intermitte, vel nonnihil imminuitur: aut humor frigidus crassus; & tum adest dolor leuior citra ardorem, & signa alia frigiditatis in capite adsunt: aut ex humore biliolo; & dolor est vehemens cum calore mordaci.

Frequentissima autem doloris causa est tumor calidus seu inflammatio, ut supra dictum, quæ cognoscitur ex dolore continuo, pulsatili, vehementissimo, & eodem ac rubore ad malas & tempora vsque sese extendente, cum febre, interdum & cum delirio, motibus conuulsivis, syncope, & extremorum frigiditate. Et prout inflammatio magis tendit ad interiora, eò pulsatio magis percipitur; quoniam arteriæ maiores comprimuntur: dolor quoque est vehementior, ob vicinitatem cerebri, & febris intensior.

Si verò ab vlcere & sanie sit dolor, rupto abscessu pus ex aure effluit, cum doloris aliqua mitigatione, vlcerisque relinquitur, unde sanies aliqua effluere solet.

Si ex nervi auditorij vitio dolor oriatur, auditus simul læditur, & sæpe vel caput compatitur, vel vnus aut plures ex sensibus internis aut externis.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Maius periculum est in aurium, quam oculorum affectibus. Nam vitium oculorum intra ipsos subsistit; aurium verò inflammationes dolorisque interdum cerebro communicantur, & hominem ad delirium & mortem deducunt, ut, de aurium inflammatione, Prognostico dictum. Ideoque monente Celso, c. 7. lib. 6. mox inter initia succurrendum est, ne maiori periculo locus sit.

2. Et quidem iuuenes in vehementibus aurium doloribus magis periclitantur, & septimo die, aut citius moriuntur; antequam scilicet inflammatio suppuratur: quoniam bilioli humores in hac ætate abundant, & temperamenti constitutio est calida & sicca, quæ febribus acutis & deliriis reddit magis obnoxios.

3. Senes verò in vehementibus aurium doloribus minus periclitantur; quia ob temperamenti frigiditatem, & pituitæ copiam, febribus acutis & deliriis ita facile non corripiuntur, & proinde aures ipsorum facilius suppurantur. Recidivæ tamen periculum magis sustinent; cum ob temperamenti frigiditatem materia dolorem aurium patiens exactè concoqui non possit, 3. Prognost. aphor. 14. & 1. aphor. 14. Quia etiam sensus tactus in senibus est obtusior, ideo facilius dolores illos tolerant.

4. Si dolor aurium vehemens sit, & in profundo hæreat, mortis periculum est; quoniam nervus auditorius ipse etiam est affectus. Aut si malum sanetur, noxa tamen quædam in sensu auditus relinquitur.

5. In doloribus aurium hypostrophæ interimunt, aut valde sunt periculosa. Materiam enim non integrè coctam, nec partem affectam restitutam esse significant. Itaque malignior redditur materia, & ægro magis debilitato, mortis periculum metuendum est.

#### Indicationes.

Commodissima quidem dolorem aurium, ut & alios dolores, curandi via est, si causa, à qua pendet, tollatur. Verum quia is sæpe ita vrget, ut, nisi tollatur vel mitigetur, ægro periculum minetur, dolor tum mitigationem indicat.

Primo ergo si dolor sit à rebus externis immixtis, quæ ratione illæ tollendæ sint, iam antea dictum.

Sicut etiam antea explicatum, quomodo intemperies cum & sine materia curanda sit.

Dan. Sennerti Tom. I I.

Si à spiritu flatulento sit dolor, cum status præsupponat materiã, à qua attollitur, ea primò, siue sit calida, aut frigida, expurganda, deinde topica, quæ flatum illum discurant, vsurpanda.

Frequentissima verò doloris causa est inflammatio: sed qua ratione & illa curanda sit ( antea quoque dictum.

Dolorem verò ipsum quod attinet, tollitur ille cum anodynis, tum, si opus sit, narcoticis seu stupefacientibus. Conueniunt igitur oleum calens amygdalarum dulcium, liliorum alborum, aut rosaceum siue solum, siue cum lacte muliebri aut oui albumine mistum; quæ cum specillo molli lana inuoluto tepidè in aurem immittantur. Serosus item cruor, qui ex carnibus bubulis, dum affantur, destillat, tepidè infusus utilis est. Item ol. rosæ cum succo rorismarini. ut & mucilago seminis psyllij, fœnigræci. Nonnulli folia tabaci viridia, aut saltem aqua propria vel aqua rutæ humectata auribus applicant, & læpius renouant. Commendatur & oleum scarabæorum, quod paratur, scarabæos num. iii. iniiciens in olei rosæ. Vnc. iii. & coqu. ac colando.

In vehementiore dolore succus portulacæ, lactucæ, hyoscyami, coriandri utilis est. Vbi denique acerbissimus dolor vrget, ut syncopes & mortis periculum imminet, stupefacientibus semel atque iterum uti licet.

Ut 2. Opj gr. iii. castorei, croci, an. gr. iß.

Cum lacte muliebri, vel albumine oui, vel sapa aut vino tepidè instillantur. Solum opium vix conuenit, utpote cuius vsu quendam vocem & sensum amisisse, refert Trallianus, lib. 3. c. 2. propterea quod cerebrum nervo auditorio affecto proximum est. Oleum etiam è ligno coryli acerbissimos aurium dolores subito sanat.

Si reliqua omnia non prosint, necessarium est, ut ægro sub somni horam exhibeatur Philonij Persici ʒ. iß. vel Scr. i. vel laudani opiat gr. iij.

Foris imponantur quæ dolorem leniunt, & materiam impactam concoquunt & resoluunt; quo in genere butyrum alia superat, in mollibus præcipue corporibus.

Aut 2. Lenticula palustris M. ii. medulla panis in lacte muliebri infusa Vn. iii.

Contusa applicantur formæ Emplastri. Fortius est paratum ex oleo dulci calente, adipe anserino, oleo amygdalarum dulcium, chamæmelino, lacte muliebri.

Aut 2. Fol. malua viridisque, violaria, lactuca, salicis, an. M. i. sem. cydonior. malua, an. Drach. ii. flor. chamæmeli, meliloti, rosarum rubrarum, an. P. ii. Fiat Decoctio, qua auris affecta tepidè lentèque foueatur.

Vtile est & hoc:

2. Ol. rosar. nymph. an. Vnc. ß. succi papauer solanis. an. Drach. ij.

Mista ponantur circa aurem; aliquid etiam immittantur. Addita farina hordei vel tritici, & puluere florum chamæmeli cum butyro recenti, Fiat emplastrum ad eundem vsu.

In applicatione remediorum monet Galenus, 3. de comp. medicament. secundum loca, ubi dolor valde vrget, aurem non tangendam esse, id est, neque manu, neque villo instrumento durius tractandam. Augetur enim hoc modo dolor, & malum redditur deterius. Quapropter quæ extra applicantur, aurem non grauent, & leniter applicantur, & quæ instillantur, blandè instillantur.

#### CAPVT IX.

De Excrementis præter naturam, & Fluxu aurium.

Tandem, ut etiam aliquid de symptomatis in Excrementis dicamus, habent equidem aures sua natura excrementa, sed ea pauca. Accidit verò sæpe, ut præternaturam multa ex auribus excreantur. Primum enim

E E c

Post







ut æget cum sibi, cum aliis terti spiritus vapore molestus sit. Si diutius duret, paulatim serpit longius, & vel alas narium, vel earum interstitium, vel tenella ossa exedit, paulatimque perforat, maxime si vel canceri speciem habeat, vel à lue Venerea contractum sit. Nam humor prauus & malignus veneni instar carnem & ossa corrumpit, ac sæpe ista prius, quam carnem. Tenuitate vero sua carnem, quæ rara est, & foraminibus quasi pertusa, facile transit, sine insigni primum offensione; os vero, quod densitate sua magis resistit, aggreditur, atque in eo hærens erosionem efficit. Recentibus vlcibus, non adeo prauis aut malignis, neglectis, caro plerumque enascitur, quæ *σάρκωμα* narium appellatur. Caro illa aut mollis est, alba, & doloris expers, aut rubra, aut denique liuida cum dolore, quæ in cancrum degenerat. Si in eam longitudinem excrescit, ut vel è nare foras propendeat, vel per palati foramina in fauces illabatur, Polypus dicitur; de quo postea.

Iam ut speciatim de Ozæna dicamus, vlcus illud est narium putridum & graueolens, sicut & nomen *ὀζῆνα* accepit.

Causa proxima acris est humor, simul & putridus. Nam, ut Galenus inquit, in 3. de f. m. f. cap. 3. si humor saltem acris esset, ægrè curabilia vlcera produceret, non graueolentia. Causa antecedens est cerebri intemperies humores ejusmodi coaceruans, aut venarum in toto corpore intemperies talis, quæ capiti communicatur. Interdum occulta viscerum & venarum est malignitas, ut in lue Gallica, Suffumigia etiam è Qio & cinnabrio incaute adhibita, vlcera narium & ozænas excitare possunt; cuius rei quatuor historias recenset Guilhelm. Fabricius, Cent. 2. obs. 23.

### Signa Diagnostica.

Vlcera externa oculis conspiciuntur; interna & occulta ex effluente sanie & crustis decedentibus cognoscuntur.

Munda, ex laudabili sanie; sordida, ex crassiore; putrida, ex fœtore; corrodentia, ex sanguinis cum saniei effluxu; cancræsa, ex canceri signis cognoscere licet. Si processus ipsi cerebri affecti sint, olfactus impeditur.

Ozæna in specie cognoscitur ex tetro odore ex putredine contracto, qui & ipsi ægro & astantibus molestus est. Olfactus etiam sæpe læditur, instrumento olfactus malè affecto à vapore, quem sanies putrida de se emittit. Et si malum sit diuturnius, & cartilago narium inter sepimentum erodatur, narium figura vitietur.

Læditur & respiratio, quia ab vlcis crusta nares obstruuntur; interdum etiam narium figura distorquetur. Vitietur & vox quandoque, eadem de causa, & malum palato communicatur, sub quo tanquam sub testudine sit vocis reflexio. Interdum & narium hæmorrhagia conjungitur, vas narium ab vlcere erosis.

### Prognostica.

1. Narium vlcera omnia curatu difficilia, & plerumque cacoethe sunt; ob humiditates & excrementa cerebri ad partem hanc defluentia.
2. Vlcera narium suspecta sunt, propter symptomata, quæ secum afferunt, quæ modò recensuimus.
3. Etsi narium vlcera externa, superficialia, recentia, munda, facilius curantur; occulta tamen, profunda, antiqua, immunda, crustosa, fistulosa, ossibus narium, & aduandis inprimis, communicata, difficulter; putrida, corrodentia, cancræsa, periculosa plerumque existunt.
4. Vlcera & ozæna narium, si omnibus rectè administratis non curentur, pro desperatis habentur; quia suspicio est, ne talia in cancrum degenerent, quem satius est, non attingere.
5. Si ozæna contumaciter pro ratione resistunt.

Dan. Sennerti Tom. II.

odoratum extinguunt vlcere ampliato, & fœtore contagiosæ putredinis ad cerebrum serpente.

### Indicationes & Curatio.

Quæ alia vlcera indicationes suppeditant, eadem in Curatio. narium vlcibus obseruanda. Propterea primò totius corporis ratio habenda, & humores superflui venæ sectione, cucurbitulis, vel purgatione euacuandi, & à capite omnibus modis auerendi, caputque ipsum, quod fons est fluxionis exsiccandum & roborandum. Postea ad partem ipsam affectam accedendum, vlcusque detergendum, exsiccandum, & consolidandum. Estque obseruandum, quod semper ozæna desiccanda sunt medicamentis mixta facultate præditis, repellentibus, seu adstringentibus & discutientibus. Etsi enim vlcera illa ab humoribus excitentur acris, qui potentiâ sicci sunt; tamen actu iidem sunt humidi; quam humiditatem tolli oportet.

Caput itaque, ut Celsus docet, lib. 6. c. 8. vsque ad cutem tondeatur, assidueque fricetur. Deinde imponatur oleum myrtinum, puluis coralliorum & santalorum, rosarum rubrarum siccat. mastich. manna thuris cum aceto penetrationis causa. Imponantur etiam alia medicamenta ad exsiccandum humidum caput supra, parte 1. proposita. Alexander Trallianus lib. 3. cap. 8. hoc vitur:

℞. Myrrha, thuris, an. Drach. ii. cochlear. integrar. num. v. addita l. q. cera & albumine ouorum duorum cum linteo capiti inducantur, diebus nouem continuis.

Vel ℞. Limacum num. vii. crusta panis filiginei testa Vnc. i. Contundantur, & admisceatur pul. balaustior. rosar. rubr. an. Drach. sem. gummi sandarach. Drach. j. thuris, mastiches, an. Drach. ij. album. ouor. num. ii. Contundantur, & F. l. a. Cataplasma.

Ad partem affectam postea, hoc est, nares ipsas quod attinet, interdum crusta ozæna prius auferenda est; quod sit aliquo pingui, ut asserino adipe, vel butyro recenti illito, loto prius aliquoties cum aqua rosarum, vel decocto plantaginis. Celsus mel cum exiguo resina aut terebinthina in nares iniicit, & spiritu succum attrahere iubet, donec in ore gustus ejus sentiat. Ita enim crustæ resoluuntur, quæ per sternutationem eiici debent.

Crustâ remotâ vlcus dimouetur eluendo cum saccharata aqua, aut cum vino albo, vel vino, in quo mel incoctum sit, vel vino decoctionis verbenæ aut agrimonie cum melle. Illinantur postea, vel inspergantur in nares, quæ adstringendo & desiccando glutinant. Ita Celsus puris vlcibus primò vaporem aquæ calidæ subicit; deinde adhibet lyeium vino dilutum, vel mentha aut marrubij succum, vel omphacium, horum cuius mel adjiciendo; eaque cum linimento oblongo in nares immittit, per hyemem & ver bis quotidie, per æstatem & autumnum ter. Corpora mollia & delicata, quæ à medicamentorum acrimia vsu facile offenduntur, rosas aridis confusis & linteis sanantur. In diuicibus in curatione ozænarum Galenus, 3. de compos. med. secund. loc. hedychroum in vino generoso solutum adhibet. Galenus calaminthæ succum naribus infundit, vel tritam herbam inflat; aut malorum puniceorum succum in vase æneo vsque ad medietatem coctum indit.

Vel ℞. Hordei non excocti. M. j. fol. lapath. M. ii. aq. q. l. F. Decoctum, quo crustæ detergantur. Ablatis crustis

℞. Succum granatorum, & misc. cum melle. Deinde add. bol. Armeni. C. C. vsti prepar. an. Drach. i. cortic. granator. Drach. sem. Misce.

Vel ℞. Cortic. granator. nucum oupressi, an. Vnc. sem. fol. scabios. M. j. Coqu. in aqu. lb. j. Colaturæ adde mellis despumari Vnc. i. sem.

Postea vsurpetur Vnguentum de rutia.

Vtilis est & aqua aluminis destillata, & aqua plantaginis,

raginis, in qua aliquid de Vio dulci dissolutum sit. Prodest etiam medicamentum ex cerussa, thure, cadmiâ, & scillâ interiore parte confectum, si hæc omnia cum melle misceantur, & cum specillo lana inuoluta vlcerebus, remotâ jam crusta, admoquantur, & linimentum deinceps huic remediis impletum in nares indatur quotidie bis aut ter.

Sequens etiam siccandi & consolidandi vi præditum est:

℞. Flor. rosar. rubr. p. ii. balaustior. Drach. sem. rad. tormentill. Drach. i. sem. fol. plantagin. p. iii. Coq. in aqu. communi pro Vnc. iii. in quibus colatis dissolu. mell. rosar. col. Vnc. sem. omphacii Drach. vi. Misc.

Sumatur specillum, ejusque cuspis lana gossypina obuoluitur, & in hunc liquorem intingatur, inunctum vlcere immittatur, quod bis vel ter in die repetendum. Deinde hoc Vnguentum illinatur;

℞. Aloës, myrrha, an. Drach. sem. gallar. Scrup. j. lithargyri, cerusse, Drach. i. sem. plumbi vsti & lori Scrup. ii. Cum olei rosar. q. s. F. Vnguentum.

Fortius erit, si aliquid aluminis adijciatur. Rondeletius ad exsiccatum vitur candela ex cera rubra confecta, cujus accensæ fuliginem naribus excipere jubet. Ita enim profundæ etiam partes exsiccantur. Idem & hoc habet.

℞. Ladani puri, hypocistidis, mastich, myrrha, an. Drach. ij. styrac. rubr. & calamith. corric. thuris, sandaracha, auripigmenti rubr. an. Drach. ij. Excipiantur cum terebinthina, & Fiant Trochisci, è quibus suffusus fiant in cucubitula manè & vespere.

Vel ℞. Gummi sandaracha, myrrh, an. Drach. sem. alibani, mastich, an. Drach. i. sem. ladani Drach. sem.

C. s. q. terebinthina F. l. a. Trochisci. Possunt & ex his trochiscis cum cera rubra candelæ parari, & fumus ex illis succensus in loco angustiore collectus excipi.

Efficax inprimis est Aqua viridis, à Platero, de curatione oris doloris, descripta, quæ hoc modo paratur:

℞. Aruginis aris Drach. i. auripigmenti Drach. j. Terantur subtilissimè, & coquantur in vini Vnc. iij. ad consumptionem mediæ partis: vbi refrixerint, adde aqua rosarum solani, an. Vnc. i. sem.

Aqua ad vlcera narium & oris. Efficax est & hæc Aqua, quæ non solum in ozænis, sed omnibus narium & oris fœtidis vlcerebus utilis est:

℞. Mellis rosacei Vnc. ij. sulphuris vini, aluminis crudi, an. Vnc. i. albi Graci, summitat. sabina, an. Vnc. sem. spongiar. sambuci Drach. j. fol. hyperici, ruta, rorismarini, plantaginis, saluie, pulegi, an. M. sem.

Coquantur omnia in vini & aquæ s. b. ij. ad consumptionem digiti transuersi, sub finem add. aruginis aris Vnc. j.

Et relinquuntur, donec refrixerint, postea colentur & seruentur vsui.

Tempore vsus in cochleari calefiant, & penicillo aqua madido locus exulceratus illinatur, vel lana mollis, aut linteam ea madidum, naribus immittatur. Vide Guilielm. Fabricium, loc. allegat.

Si suspicio sit inflammationis, vsurpetur vnguentum de cerussa, cum melle, aut cum adstringente aliquo oleo, vt myrrino vel omphacino.

Si corrosiuum sit vlcus, validiora pro absterfione vsurpentur, ne profundius depalcatur, vt aqua marina, muria, aqua nitri, acetum salitum, vinum salitum, ligni Guajaci decoctum, in quibus parum vnguenti Aegyptiaci dissolui potest. In vlcere antiquo valet hoc Acrij:

℞. Lithargyri, cerusse, an. Drach. iii. plumbi vsti & lori Drach. ii. myrrha, aloës, an. Drach. j. gallarum Drach. s.

Vino & oleo myrrino dilutis vttere, quod ad sedis rimas & vlcera utile est.

Fortiter exsiccat & conglutinat hoc medicamentum:

℞. Putamin. interior. mali Punici Vnc. j. thuris, myr-

rha, an. Drach. j. tragacantha Scrup. ii. gallar. offissum datylorum, myrobalanorum, Persicorum, omnium vstorum, an. Scrup. ii. chalcanti Drach. sem.

Trita omnia subigantur in mortario fortiter tundendo, addendoque mellis & vini odorati q. s. donec Linimenti formam acquirant.

Si dolor vlcerebus narium conjungitur,

℞. Olei rosar. myrrini, an. Drach. sem. plumbi vsti, lithargyri, an. Scrup. i. cerusse, boli Armeni, balaustiorum, an. Scrup. sem. cera alba q. s. F. Vnguentum.

In contumaciore malo corpus vlu decoctionis ligni Guajaci præparetur & munderetur.

### Diata.

In vltu videntur omnia, quæ acres & biliosos succos gignunt, causæ item omnes calefacientes corpus & exsiccantes, vt exercitia immoderata, vigiliæ, animi affectus, Histariam Ozæna grauissimæ cum ossis palati erosione feliciter curatæ vide apud Guil. Fabricium, Cent. 2. obseru. 22.

## CAPVT II.

### De Cancro narium.

Vlcera narium quandoque in cancrum degenerant, vt & polypus, si non rectè curatur.

Cognoscitur ex lignis cancri aliis notis: caro est callosa, sicca, malumque ad palatum vsque serpit.

Morbus hic in naribus vix curabilis est, sed præmissis vniuersalibus, & bile atra euacuata, mitigantia saltem requirit. Adhibenda ergo oleum rosaceum modico camphoræ addito, solani succus. Antiqui dracuncij semen tritum cum melle immittebant, vel hanc Mixturam:

℞. Miny, chalcitidis, sandaracha, an. P. i. atramenti sutorij P. ii.

Vtile est & hoc Medicamentum:

℞. Succo solani Vnc. iij. pompholyg. Drach. i. cerussa lota aq. rosar. & iterum exsiccat. Drach. s.

M. pauco oleo rosaceo adiecto, & cera alba liquata, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo. Chymici, vt ad aliarum partium, ita etiam ad narium cancrum, commendant Liquorem Arsenici, qui ita paratur:

℞. Arsenici albi, nitri puri, an. q. v.

Fluant simul in tigillo in igne circulari posito, cauendo fumum: (ideoque sub dio ventum obseruando commodissimè fit hæc operatio) vbi refrixerint, tantundem nitri iterum addatur, idque bis vel ter repetatur.

Arsenicum hoc modo fixum in humido loco resoluitur in liquorem. Huius paucillum, vt gustu saltem sapor parum percipiatur, in aqua plantaginis dissoluitur, quâ cancer oblinatur.

Aliquando processus mamillares defunt, de quo postea, cap. 6.

## CAPVT III.

### De Polypo & Sarcomate.

Sicut Ozæna vlcus est narium, ita Polypus tumor Squidam & excrecentia cancrum est in naribus. Nomen, vt Galenus, 2. meth. med. docet, accepit, sicut & alij nonnulli morbi, à similitudine rei alicujus externæ, à carne scilicet Polypi, quam substantiæ suæ proprietate refert; vt idem explicat, 3. de compos. medic. sec. loc. cap. 3. Etenim mollis & lubrica hæc caro est colorénique, vt piscis ille, alium atque alium habet, pro natura humorum, è quibus gignitur. Et, quod Paulus addit, lib. 6. cap. 25. sicut Polypus scirrhis vel pedibus suis venarum manus prehendit: ita hæc excrecentia radice, tanquam

tanquam pediculo vno, vel pluribus, sese ita in naribus affigit, ut ergo & respirationis & loquelæ vsum expeditum adimat. Nasi enim interna tunica ita humore repletur, ut enata hinc caro à tenui pediculo suspensa in latum & crassum sese extendat, & speciem hanc Polypi ventre amplo, rotundo & oblongo repræsentet. Arabibus Hæmorrhoids est narium, à similitudine excrescentiarum in ano, quas figurâ nonnihil imitatur. Eleganter Polypum sic Celsus descripsit, lib. 6. cap. 8. *Est caruncula inquit, modo alba, modo sub rubra, qua narium ossi inhaeret, & modo ad labra pendens narem implet, modo retrò per foramen id, quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeò increfcit, ut post unam conspici possit, strangulâque hominem, maximè Austro aut Euro flante, ferèque mollis est, raro dura; eoque magis spiritum impedit & nares dilatat, qua ferè non curatur, itaque attingi non debet. Illud ulceris genus ferè quidem ferro curatur, interdum tamen medicamentis inarescit.* Hæc Celsus. Breuiter; Polypus est caruncula mollis in naribus orta, ex radicibus quibusdam tenuibus pendens, & in latum se pandens, & nunc è naribus propendens, vel eas certè implens, nunc etiam in palatum descendens.

Cæterum differt à Polypo sarcoma, ut genus à specie; figurâ item & magnitudine. Nam sarcoma rudis quædam carnis massa est, certâ figurâ carens, & sæpe in magnam molem excrescit. Etiam carne à Polypo distat; quoniam durior est, & dolorem infert, ac nigrescit aut liuescit, ac venas circumquaque crasso sanguine turgidas habet, ac plerumque intus prope viciniam narium & palatum nascitur.

#### Causæ.

Causa Polypi est humor crassus & viscidus, qualis est pituita sanguinis portioni permixta, è cerebro defluens; quæ cum acris non sit, etiam non exulcerat. Rarius ex humore melancholico oritur, qui Polypus etiam facilius in cancerum degenerat. Quod verò ex narium nutrimento superfluo in carnem quasi luxuriantem commutato producit, Sarcoma potius, quam Polypus, vocatur.

#### Differentia.

Differentia Polypi à duritie vel mollitie, à nigredine, à figura & colore, à radicis tenuitate aut crassitie, à situ in naribus, à prauitate ad cancerum tendente sumitur.

#### Prognostica.

1. Polypus, si mollis fuerit & albus, & doloris expers, facilius curationem admittit; subrubeus difficilius. Qui autem fuscus vel liuidus est, curationem penè respuit; præsertim si simul liuidus & foetidus sit; quoniam cancro est cognatus.

2. Quanto profundius hæret Polypus, tantò est periculosior; quia propinquior est cerebro, & tractationi ac medicamentis minus aptus. Qui verò oculis cernitur, & foris nonnihil existit, facilius tractari & curari potest.

3. Polypus ex humore melancholico in corporibus melancholicis magis, ne in cancerum abeat, quam desiderat. Hippocrates, 6. aphor. 3. 2. Idco Celsus quoque illum attingi vetat.

4. Polypus inueteratus, qui cancriosi nihil habet, chirurgiam admittit. Ita Celsus hunc ferro ferè curari ait; interdum vsu medicamentorum inarescere.

#### Indicationes & Curatio.

Vniuersalis corporis euacuatio, ut in omnibus affectibus capitis, ita & hic præmittenda, quæ cum sæpius proposita sit, nihil de ea hic amplius addimus. Hinc ca-

Dan. Sennerti Tom. I L

put roboretur & exsicceretur admoto cataplasmate ex cochleis, & aliis formulis supra enumeratis, frontalique aliquo epithemate adstringente ad intercipiendam fluxionem applicato. Cucuphar etiam parentur ex saluia, maiorana, melissâ, lauend. betonica, stœchade, nuc. moschat. caryophyll. maci, ligno aloës, thure, mastich. & aliis iam sæpius declaratis. Quod verò particularem Polypi curationem attinet, caro illa præter naturam in naribus genita tollenda & eradicanda. Quod sit vel ferro, vel medicamentis. Et quidem si Polypus ita naribus inhæreat, tenui scil. pediculo, ut commodè eius sectio fieri queat, statim à radice ferro excindatur, fronti & temporibus defenso prius applicato, vlcusque, ut pars est, curetur; de quibus videatur Ægineta, lib. 6. cap. 35. Si quid post sectionem remanuit, id medicamentis acutis & elcharoticis, vel ferro etiam candente auferitur. Quidam narem discindunt, ut sit in equis, atque ita Polypum ferro rescant, aut cauterio absumunt. Sed tutius est, si fieri omnino possit, Polypum ligare circa radicem filo serico bene cerato, aut pilo caudæ equinæ. Ita enim inter septem aut decem dies sine omni negotio excidit, nutrimento destitutus.

Verum etiam radix Polypi loco penitiori hæreat, ut scalpello eximi non possit alio tamen modo per chirurgiam curari potest, quam semel atque iterum feliciter tentauimus. Forceps scilicet paretur instar rostri gruini vel anserini Chirurgicis dicti, sed extrema parte acutus, ita tamen, ut in se coire & claudi possit, ut sine læsione in nares immitti queat. Hic forceps clausus in narem vsque ad polypum detrudatur, hinc aperiatur, & eo, quantum fieri potest, de polypo prehendatur & abscindatur, ac postea medicamentum aliquod adstringens & exsiccans, qualia postea proponuntur, naribus indatur. Sequenti die iterum abscindatur, iterumque medicamentum naribus immittatur, & ita pergatur, donec polypus totus abscissus & absumptus sit.

Si verò abscissio fieri non possit, eò quod latiori basi naribus inhæreat, medicamentis curatio eius tantanda. Sint autem illa duplicia: alia mitiora, quæ partim adstringunt, partim extenuant & incidunt; partim exsiccant & discutiunt; alia erodentia & corrosiua. Quæ per pharmaca mitia sit polypi curatio, in mollibus præsertim corporibus, scopos habet ipsum attenuandi, incidendi, exsiccandi. Corpore itaque & capite purgato, caput tondeatur & exsicceretur, roboreturque, ut in ozæna, & supra, part. 1. dictum.

Topica, quæ naribus immittuntur, partim attenuant, partim discutiunt, & exsiccant. Galenus itaque, 3. de comp. med. sec. loc. quod & Aëtius, tetrab. 2. cap. 29. repetit, ex malis Punicis trium generum confectum medicamentum vsurpat, è quibus recentibus contusis succum exprimit, eumque ad mediocrem consistentiam coquit, naribusque infundit, feces expressas conformat in pessulos naribus indendos. Polypum citra mordacitatem absumit, etsi longiore tempore. Confert & dracunculi succus cum lana naribus impositus, teste Dioscoride; & ut Aëtius scribit, puluis rosarum siccarum exactissime tritus mirificè prodest; sicut & puluis balaustrorum. Confert & succus pomorum, austerorum quidem, si mollior sit polypus; acidorum verò, si durior; qui in mortario æneo diligenter agitur cum pistillo æneo, ut acquirat crassiorem consistentiam. Sæpiissime autem talia medicamenta repetenda sunt, nec permittendum, ut vnquam pars affecta medicamento vacua sit.

Si polypus aliquantulum durus est, nec tamen cancriosus, emollientia præmittantur foris forma, aut linimentum fiat ex medulla vitulina & adipe anserino, cui progressu temporis aliquid Ammoniæ & bdellij addi poterit. Postea exsiccantia illa & absumptoria vsurpentur, quæ modò proposuimus. Rondeletius aquam parat ex aquis adstringentibus & parum corrosiuis, ut:

*℞. Vnorum maturarum lb. iiii. cortic. malorum granator. balauſtior. ſumach. an. lb. ij.*

Macerata in aceto deſtillentur, poſtea add. *aluminis lb. i. vitrioli Vnc. iij.*

Iterum deſtillentur. Aqua hæc parti affectæ cum lin- teis applicetur.

Vel *℞. Terebinth. lota aqua plantag. ℥. iij. ſucci plan- tag. ſolani, acetofa. an. Drach. v. ſani hircini Vnc. ℔. plum- bi calcinati Drach. ii. lithargyri, ceruſſa, tutia, an. Drach. j. camphora Drach. iij. olei roſacei Vnc. i Cum ſ. q. cere. F. Emplaſtrum.*

Si verò malum pertinax ſit, ad validiora & cauſtica medicamenta accedendum.

Eſcharotica medicamenta nota ſunt, quæ ſunt ex chalcantio, miſy, chalcitide, ſquamma æris cum melle: oleum item vitrioli, vel aqua fortis, vnguentum Ægy- ptiacum. Commendatur & hic Puluis:

*℞. Pul. roſar. rubr. Drach. ℔. malicorij Scrup. i. lithargyr. alum. uſti, an. Scrup. iij. arugin. gr. v. M. pro Pul- uere.*

*℞. Chalcitidis uſte Drach. i. nitri Drach. ℔. ſucci vero- nica Vnc. ℔. Miſce.*

Vel *℞. vitriolum album, & miſce cum aqua roſarum & plantaginis, & polypus eo illinatur.*

Vel *℞. Aq. ſolani, roſar. an. Vnc. i. plantag. Vnc. ſem. camphora Drach. ℔. ceruſſa Scrup. i. Mercurij ſublimati gr. vi.*

Miſc. Efficax ad polypum remedium eſt.

His producta eſchara ſemper demitur, & denuo me- dicamenta illa imponuntur, donec radix etiam poly- pi ſit abiumpta. Sed tentare hæc non licet, niſi in po- lypo, qui canceri ſuſpicionē caret, & in corporibus du- rioribus.

Vtilis etiam ad Polypum tollendum eſt turunda ex radice gentianæ ſequenti Vnguento illita:

*℞. Pinguedinis caponis vel gallina. butyri recentis, ol. oliuar. an. q. ſ. add. cera parum F. Vnguentum.*

*℞. Vnguenti huius Vnc. i. ℞. ſublimati, vel arcani corallini, Drach. ℔. vel Scrup. ii. Fiat Vnguentum, quo turunda ex radice gentianæ illinatur & naribus inda- tut. Auſi polypus totam narem replet, eo Polypus in- ungatur.*

Tutius autem adhibentur medicamenta cauſtica per fiſtulam argenteam ita in nares inditam, vt cauſticum medicamentum in eâ inſuſum ſaltem polypum attrin- gat, partes autem naſi ſanæ à fiſtula intactæ conſeruentur. Polypus autem niger, cum ad cancerum accedat, cu- rã non verã, ſed palliativã tractari debet. Blandiendum igitur illi ſucco ſolani vel ſucco ſol. ſalicis rec. aut aquis earundem, in quibus parum tutiæ diſſolutum ſit, nec non puluere eorum inſuſſato.

#### CAPVT IV.

##### De Anguſtia narium,

Anguſtia  
narium,

**N**Ares naturaliter patere debent, non ſolum in mea- tu externo, ſed etiam inſus ad os ithmoides, vt odoribus tranſitus ad primarium olfactus organum pa- teat. Hi verò meatus cum interni, tum externi inter- dum anguſtiores redduntur. Anguſtiæ autem cauſſa eſt *thiſis*, id eſt, compreſſio & cauſſa aliqua externa, vt ab ic- tu ſeu contuſione; aut *phlegma*, id eſt, conſtipatio, facta à tumore aliquo præter naturam, vt à phlegmo- ne, ſcirrho, cancro; aut *emphyſema*, ſeu obſtructio, quæ vel à carne aliqua excreſcente ſit, vt à ſarcomate, & poly- po; vel ab humore craſſo & viſcido ad nares, & fora- mina membranæ, quæ os ethmoides intus ſubducit, deſtillante, ſeu putrido, ſeu non putrido, vt in cory- za & catarrho; vel à materia purulenta, vt in ozæna; vel à vermibus à materia putrida genitis; vel à grumo ſan- guinis, vt in hæmorrhagia narium accidere ſolet. Non-

nunquam etiam res externæ, vt piſa, & ſimilia, ab infan- tibus incaute naribus intruduntur.

#### Curatio.

Si nares à materia à cerebro effluente obſtruantur, & catarrhus adhuc durer, is primò tollendus, & caput cu- randum. Capite mundato & curato meatus obſtructi attenuantibus medicamentis aperiendi, quæ forma ſu- fimenti, liquoris, pulueris adhiberi poſſunt. Puluis ni- murum ex agarico, ſemine nigellæ & maioranæ, naribus excipiat.

Vel *℞. Aq. maioran. Vnc. iiii. aceti Vnc. ℔. Suspenda- tur in ea pulueris nigellæ Drach. i.*

Acetum etiam, in quo caſtoreum inſuſum ſit, nari- bus attrahere vtile eſt. Alia quoque erethina ſupra, *part. i.* propoſita hîc locum habent. Vel olfacienda aſſiduè adhibeantur calamintha, ſerpillum, ſemen nigellæ ace- to maceratum, caſtoreum.

Si ex ſarcomate vel polypo ſit obſtructio, curatio in- ſtituenda vt modò dictum.

Si quid extra in nares immiſſum ſit, extrahendum vt res auribus immiſſæ.

#### CAPVT V.

##### De Vulneribus narium,

**S**I naſus vulneratus ſit, vt aliarum partium vulnera *Naribus vul-*  
Scurandus. Hoc tamen monendum, ſi pars illa ante- *naria.*  
rior, quæ cartilaginea eſt, ita vulnerata ſit, vt parum na- ſo cohæreat, mox ſutura, ſiue ea acu, ſiue glutino fiat, prout commodius videtur, cum reliquo naſo coniun- genda, ne pars abſciſſa refrigeretur & emoriatur. Carti- lago tamen ipſa acu non eſt perforanda. Cauendum etiam in naſi vulneribus penetrantibus, ne excreſcen- tia aliqua carnis in parte interna oboriatur, quæ mea- tum illum anguſtiores reddat, & ſermonem deprauet. Ideoque turunda conuenienti vnguento illita nari in- denda; aut emplaſtrum in formam canalıs vel fiſtulæ ef- formarum. Si autem externa pars naſi planè amputata ſit, reparari illa nihilominus poteſt, ſicut de cunctorum Chirurgia in *Inſtit. lib. 5. part. 1. ſect. 2. c. 15.* dictum.

#### CAPVT VI.

##### De Leſo Olfactu.

**Q**uantum verò ad ſymptomata, quæ naribus acci- *Olfactum le-*  
dunt, & quæ ad actionem læſam pertinent, quem *ſit.*  
admodum alijs functionibus in corpore accidit, vt à cauſſa aliqua præter naturam vel minuatur, vel planè aboleantur, vel deprauentur: ita idem etiam odorandi fa- cultati euenit, quoties organo aliquid accurrit, quod naturalem eius conſtitutionem peruertit, aut aliena qualitate perfundit.

Quod autem Olfactus organum ſit, & quomodo ol- factus fiat, in Inſtitutionibus dictum, quod hîc non re- petimus. Ex illis autem facile patet, quomodo lædi ol- factum contingat, quod ſit, vbi aliquid vel in meatibus externis vel oſſi *nō ducendū*, vel membranıs huic oſſi, na- riũque internis anfractibus ſubſtratis, ac ipſis quoque cerebri meningibus, vel proceſſibus denique nemcis cerebri occurrit, quod impedit, quò minus odor à ſenſu olfactus percipiat. Neque enim ad vnum morbi ge- nus hæc læſio referri poteſt, ſed ſimilis morbus eſt, vbi ab intemperie hoc malum naſcitur; morbus com- poſitionis in via, vbi ab ic- tu, contuſione, vel vulnere,

Cauſſa



*Causa.*

*Aboliti ol-  
factus causa.*

Causa aboliti olfactus est intemperies, præsertim frigida & humida, cū materia plerūque pituitosa coniuncta, ut in coryza & catarrho cūenit, Et intemperies quidem aut in cerebri anteriore parte, aut processum illorum nervorum, qui olfactus organum statuuntur. Angustia verò, quæ morbus est instrumenti, est etiam aut cerebri, sicut fit in apoplexia, ubi spiritus animales ad organa sensuum permeare non possunt; aut processuum cerebri; aut nasi interni, & ossis *ἡθμοειδὲς*; atque membranae huius; aut denique nasi externi: de cuius causis capite præcedente dictum. Hoc saltem adhuc de obstructione narium monendum, interdum post catarrhos olfactum ita aboleri, ut toto vitæ tempore vix recuperari possit. Quod fit precipuè, cum quis coryza laborans balneum incautè ingreditur, cuius calore materia catarrhi & pituita ad foramina ossis *ἡθμοειδὲς* induratur, ut postea vix amoveri queat: unde meatibus illis obstructis permanentibus olfactus planè aboletur. Quibus verò in extrema virium imbecillitate & mortis articulo olfactus perit, iis hoc accidit ex resolutione spirituum animalium, ob quem & ceteri sensus omnes & vita tandem extinguitur.

Tandem etiam abolitio olfactus causa esse potest defectus processuum mamillarum, id quod cuidam ex nimio Nicotianæ per fumum usu, ex observatione D. Pavij, Anatomici Leidensis, Neander accidisse, in *Tabacologia*, refert.

*Imminuti  
olfactus  
causa.*

Eadem imminuti olfactus causæ sunt, minus tamen vehementes, quibus additur partium huic sensui inferuentium debilitas, siue nativa, siue ætatis decursu acquisita; ut in senibus, & mala etiam ab ortu cōformatio.

*Depravati  
olfactus  
causa.*

Depravati olfactus causa est, dum vapor putridus continenter nares ferit, siue in ipsis scaturiens, siue à cerebro, gingivis, ventriculo, aliisque partibus eò delatus; cuius ratione contingit, ut omnia ægro, etiam quæ suaviter olent, foetere videantur: sicut, quibus lingua bile suffusa est, omnia amara esse putant; ut Galenus declarat, 1. de *symp. caus.* cap. 4. Potest & humor præuus esse processibus nervis impactus, qui efficit, ut foetidis æger delectetur, aut certe ab iis non offendatur, propter assuetudinem; sicut cloacarum mundatores olea, ut & alia foetida, non sentiunt; quoniam organum olfactus specie foetorum iam repletum est, ut novi foetores accedentes illud immutare nequeant, cum ad perfectam *ἡθμοειδὲς* organum ab aliis suis obiectis denudatum esse oporteat.

*Signa Diagnostica.*

Si olfactus læsio causam habeat in cerebro siue intemperie affecto, siue à materia oblesso, cognoscitur id, quia noxa etiam aliis sensibus communicatur. Ferè etià aliàs gustatus offenditur, quod in grauedine siue coryza manifestum est, propterea, quod ab eodem tertio nervorum cerebri pari demissæ propagines quædam tenuiores narium tunicam, crassiores aliæ linguæ tunicam efformant. Et omnino aliquis olfactus & gustus consensus est. Novi belli ducem, cui olfactus iam multis annis periit. Is tamen, si quid valde odoratum & foetidum offertur, dicit, se gustu quasi odores percipere; unde etiam expuere, & os vel faciem auertere, & quandoque nauseam percipere solet. Si causa est in processibus nervis solis, nulla in cerebro & cæteris sensibus læsio percipitur, præterea nec vox obscura est, nec respiratio difficilis; id quod contingit, quando in osse *ἡθμοειδὲς*, vel in ipso naso est obstructio. Nam ut nares respiratori, ita voci simul inferuiunt. Quæ etià sit materia obstruens, dilatatis ad lucem naribus nunquam cerni potest; utrum scilicet tumor præter naturam, an caro vel pus, vel crusta, vel vermis,

vel grumus sanguinis. Si in apostemate narium pinæ earundem frigidiores & sicciore siant, periculum est à cancro. Intemperies cerebri vel organi olfactus ex sensu caliditatis vel frigiditatis, ex causis antegressis, ex iuvantibus & lædentibus, ex eo etiam, quod nihil per nares destillat, æstimatur. Humor obstruens ex grauitate, & si quid de hoc effluat, è colore, odore, consistencia, specie noxæ impressæ cognoscitur. Si inflammatio adsit, febris ferè adest, dolor, tensio, grauitas.

In deprauato à foetida materia olfactu, si materia illa in cerebro, aut processibus nervis sit intra cranium, ab ægro non percipitur: adstantes tamen foetorem sentiunt, si extra cranium materia consistat, tam ægro, quam adstantibus ille odor molestus est.

*Prognostica.*

1. Olfactus læsio à destillatione humoris, vel obstructione solà proueniens facilius curatur, & ferè olfactus læsio ob catarrhum catarrho cessante cessat; difficulter, quæ à confirmata organi dyscrasià existit. Non corrigitur, quæ à natura contracta est, maxime per malam narium conformationem, ut & quæ à senio vel alio morbo chronico prouenit olfactus abolitio.

2. Foetor olfactum ex putredine offendens ferè argumento est affectionis ægrè curabilis. Nam locum à materia malignâ insigniter esse affectum significat.

3. Quando æger in morbis acutis odores non consuetos sentit, odorabili re nulla præsentè, qualis est odor piscium, luti, butyri, aut similibum, & mala signa adsunt, mors imminet, teste Auicenna.

4. Olfactus læsio non negligatur, præsertim dū cerebrum materiâ est oppletum, quia sequi potest carus, apoplexia, epilepsia, humoribus ibidem auctis cerebrique meatibus occupantibus, ut spirituum animalium transitus impediatur. Id quod maxime fit, quando æger pleno cerebro supinus noctu cubat.

*Indicationes.*

Morbi cerebri quid indicent, ex superioribus clarum, Processus cerebri nervi si intemperie laborant, indicant alterans per contraria; si obstructione ex humore crasso & lento, attenuans & derogens. In externis narium partibus, quid grauedo, aut inflammatio aut tumor aliquis præter naturam, aut polypus, aut vermis, aut grumus sanguinis indicent, per se est notum.

*Curatio.*

Itaque si læsio olfactus ortum habeat ab intemperie cerebri, corrigitur contrariis, eo modo, sicut supra, *parte 1.* dictum. Si obstructio sit ab humore frigido & crasso, sicut plerumque est, præmissa eius præparatione & euacuatione, eaque aliquoties repetita ad particulares capitis euacuationes veniendum, ut pituita ex capite educatur; id quod fit apophlegmatismis, gargarismis, errhinis & ptarmicis, ut etià supra, *part. 1.* dictum. Sint autem soluentia illa obstructiones moderatæ, ne nimia caliditate & siccitate organum olfactus lædant, aut inflammationem excitent in membranis narium, aut humores nimis incrassent. Ut pauca saltem addamus; in pueris conuenit aqua & succus maioranæ, chamæmeli abrotani, origani in nares infusus. Narium radix inungatur butyro aut oleo amygdalarum dulcium, aut mucilage sem. althææ; maluæ, cydoniorum, aut pinguedine gallinæ vel anseris. In adultis succus betæ, in primis verò semen nigellæ quocumque modo usurparum vtile est, ut & castoreum, & omne fel immixtum; in primis masticatio radic. papaueris rhæados prodest. Fortiora & efficaciora sunt succus cyclaminis, ceparum, chelidonie minoris iniectus: puluis elaterij, & tabaci, euphorbij, & gummi gorte insufflatus, &c.

Inprimis Sternutatoriis vtendum, & primò quidem lenioribus, deinde fortioribus, quale hoc est:

℞. Fol. tabaci Drach. j. radic. helleb. albi Drach. β. elaterij gr. vij. piperis longi gr. ix. gummi gotte Scrup. j. F. Puluis.

Alij solam radicem cyclaminis recentem pro nasali indunt,

Nonnulli naribus olea destillata admouent.

Exempli gratia:

℞. Ol. nuc. mosch. express. 3. β. destill. ort. citri. 3. j. maiorana Scr. β. Misc.

Quidam nares balsamo rutæ, maioranæ, succini, & castorei inungunt;

Intus commendatur acetum scillit. quotidie ieiunis trium cochlearium mensura assumptum, ex Aëtio; castoreum item & theriaca.

Commendantur & extr. maioranæ, singulis diebus mane & vesperi, vt & sal eiusdem, vel per se gr. vj. vel vij. pondere in vino propinatum, vel cum extracto permistum. Pro sunt & balsamum & oleum maioranæ, gut. ij. vel iiij. pondere sumpta. Commendantur etiam sequentes Rotulæ;

℞. Extract. maioran. 3. β. vel olei g. vj. essent. pulegij 3. ij. sacch. optim. in aqua maiorana dissoluendi. Vnc. iiij. sem.

F. l. a. Conf. in Rotulis, quæ illinantur ol. destill. nuc. mosch. gutt. vij.

Nonnulli, si malum aliis remediis non cedit, tetractionem materię suadent ad frontem, illinendo fronti vnguenta calida ex succo chelidoniæ, scillæ, pyrethro, euphorbio, oleo laurino & cera: vel raso capiti sinapismum applicant, vsque ad frontem & nasum, ex Aëtio. Quæ si non ferat æger, ad thermas ducatur, vbi stillicidio supra futura coronali vtatur. Si olfactus læsio sit ab humore aliquo præter naturam, vel à carnis ex-crescentia, vel ab vlcere, illa suam peculiarem curam habet.

## CAPVT VII.

### De Fœtore narium.

Fœtor narium.

**M**olestum etiam est symptoma fœtor narium. Ille æquidem ab ipsis ægris non percipitur. Cum enim odoratus organum læsum, & humore fœtido infectum & occupatum sit, fœtorem illum non percipit. Adstantibus verò fœtor ille molestus est: vnde ij colloquia & conuersationem talium auersantur.

#### Causa.

Causa proxima est vapor putridus. Emitteretur autem vapor ille vel proximè ex ipsis naribus, cum aut humor putridus in toto aut interiore parte cerebri continetur, aut putredo est in osse *ἡ δὲ μὲν δὲ*, aut polypus, ozæna, aut vlcus sordidum in naribus; vel per consensum aliarum partium excitatur, dum aut ex ventriculo, aut thorace fœtidus vapor releuatur, & nares transit.

#### Signa Diagnostica.

Fœtor narium ipse ab astantibus percipitur. Quod verò materia fœtoris causa contineatur in naso, vel cerebro naribus vicino, cognoscitur ex eo, quod æquè post & ante cibum fœtor percipitur, & si nares claudantur, fœtor talis non percipitur. An verò à polypo sarcomate, vlcere proueniat, facile visu potest discerni. Si verò à partibus inferioribus vapor ille proueniat, assumpto cibo non ita fœtor molestus est; cum vapores illi fœtidi à cibo deprimantur & temperentur. Nares quoque si claudantur, ex ore idem fœtor exhalat.

An verò pulmones affecti sint, aut ventriculus laberet, suis signis dignoscitur.

#### Prognostica.

1. Fœtor, qui est per consensum inferiorum partium, facilius curatur, quam qui ex ipsis naribus aut cerebro est.

2. Fœtor ab ossibus narium corruptis vix curatur.

#### Indicatio & Curatio.

Si fœtor sit ab humoribus putridis, vel in cerebro & processibus nerveis, vel circa os *ἡ δὲ μὲν δὲ*, præmissis vniuersalibus euacuationibus & reuulsionibus per erethina caput euacuetur, tandemque ea adhibeantur, quæ abstergunt quicquid humoris corrupti naribus inhaeret, & quæ suauem odorem conciliant. Abluantur ergo nares vino albo odorato, vel vino in quo myrrhæ, solæ, cyperus, lignum aloës cocta sint.

Vel ℞. Myrrhæ, cinamomi, an. 3. j. rosar. siccar. Drach. sem.

Excipiantur melle despumato, F. Linimentum.

Vel ℞. Spica, gallia moschata, caryophyllor. an. p. æq.

Coq. in vino, quod naribus excipiatur.

Vel ℞. Hiera picra, schenani. an. 3. j. β. vini q. s.

F. Glandes, & naribus immittatur.

Vel ℞. Fl. rosar. rubr. p. j. β. spica nardi p. j. rad. cal. arom. 3. j. cinamomi, caryophyllor. an. 3. β. macis nuc. mosch. an. Scr. j.

Coqu. in vino albo odorato pro Vnc. iiij.

In colat. dissolu. extr. calami arom. 3. β. ligni aloës gr. iiij. Misc.

Vel ℞. Fol. maioran. M. j. rad. glycyrrh. Drach. ij.

Ebulliant in aq. s. pro Vnc. iiij. & colentur. Ol. etiam myrrinum naribus inunctum vtile est. Suauem odorem conciliat vinum, in quo gallia moschata dissoluta, quæ nares & os colluantur.

Si fœtor sit ab vlcere aliquo narium, succus foliorum hederæ naribus attrahatur.

Si ab ozæna vel polypo sit fœtor, iis sublati & ipse cessabit.

Si à ventriculo vel pulmonum vitio sit fœtor, eo ablato is cessat. Ad fœtorem tamè narium, qui stomachi vitio sit, commendantur à nonnullis mala Persica, item radices eryngij per se, vel conditæ.

## CAPVT VIII.

### De Hemorrhagia narium.

**N**ares et si sint propriè odoratus gratiâ factæ: tamè & alios vsus habere supra diximus. Et quandoque etiam natura sanguinem vitiosum per nares effundit, vel à venis & arteriis imam cerebri sedem perreptantibus, vel à vasis è palato ad nares descendantibus, quæ instar obtinent venarum hæmorrhoidalium in ano & vtero.

Vocabulum autem *αιμορρῆξις* sæpe apud Hippocratem simpliciter sanguinis profluvium significat, ex quacunque parte is fundatur, præsertim tamen copiosum & liberale. Interdum non additio partis nomine de ea vsurpatur, quæ per nares fit, sanguinis eruptione, teste Galeno, in 1. Epidem. comm. 1. aph. 9. Et in 6. Epidem. comm. 3. aph. 25.

Est autem hæmorrhagia narium symptoma in genere immodicè excretorum, & quidem toto genere p. n. cum natura aliàs sanguinem tanquam thesaurum vitæ diligenter asseruare studeat. Succedit hoc symptoma interdum alijs symptomati, actioni scilicet lætæ, quæ est venarum retentrix debilitata, interdum morbis, quibus

quibus referantur, scinduntur, rarefiunt vasa sanguinem continentia.

### Causse.

Quod ergo ad causas hæmorrhagiæ narium attinet fit illa per vasorum vel *ἀσθενειαν*, vel *διαίρεσιν*, vel *διαμύκνιν*.

*Ασθενεια* est osculorum in vasis paulò majoribus apertio, à causis, vel externis, vt calidiorum & acrium illitu, irritatione expultricis, ac titillatione, dolore; vel internis, quæ sunt primò vasorum *ἀσθενεια*, siue imbecillitas & mollities: secundò sanguinis aut copia, fusi calore, ira, motu corporis immoderatiore; aut praua qualitas, hoc est, eiusdem tenuitas, feruor, acrimonia, putredo in febribus ardentibus; tertio facultatis retentricis imbecillitas, vt vasa à modici etiam sanguinis copia aperiantur, aut expultricis irritatio à copioso sanguine, vel vitioso in cacochymia seu biliola, seu melancholica; denique natura criticè ac vtiliter expellente id, à quo molestiam sentit; quod in acutis non nunquam fit morbis, in quibus vitiosi humores cum sanguine miscentur. Ita febris synochus, & causus, & hepatis inflammatio, & morbilli ac variolæ, & phrenitis & angina, per hæmorrhagiam narium terminari solent. Interdum & pleuritis, rarius peripneumonia.

*Διαίρεσις* est vasorum diuisio, quæ fit, aut ab erodentibus per *ἀσθενειαν*, seu erosionem, ab humore videlicet acri, à vehemente medicamento, interdum & ab hirudine naribus per narationem in paludibus attracta; aut à vulnerantibus secando, pungendo; aut à contudentibus, vt ab ictu, casu; aut denique à rumpentibus, quibus vasa nimium distenduntur, vt nisu vehemente, saltu, cursu, quò etiam pertinet sanguis feruidus in flatus solutus.

*Διαμύκνις* soluta est vasorum continuitas, per quam sanguis è venis quasi transcolatus, aut sudoris modo transmissus effluit. Id quod contingit vel vasorum tunica rarefacta, ipsoque sanguine attenuato, vel gracillium vasorum ore adaperto; vbi etiam sanguis cum impetu & copia non emanat, sicuti in vasorum per *ἀσθενειαν* apertione.

### Differentia.

1. Hæmorrhagia narium alia est critica, quam natura gubernat & moderatur, expellens ea, quæ sibi noxia & molesta sunt; alia symptomatica, quæ non naturæ, sed morbi, aut potius causæ morbificæ opus est, idèoque certo modo à natura non gubernatur.

2. Alia è vasis fit ipsarum narium, alia è venis & arteriis cerebri, in ejus præsertim basi. Non semper enim sanguis ex venis capitis ad frontem tendentibus fluit, sed sæpe è vasis à tertio crassæ meningis sinu prodentibus gracilioribus. His enim dehiscenibus largæ nonnunquam & periculosa hæmorrhagiæ oriri solent, ita vt Bauhinus, in *Theatro Anatom. libr. 3. cap. 8.* ex hisce venis apertis 24. libras sanguinis aliquando effluxisse, obseruatum esse scribat. Atque in tali narium profluvio, vt non sine ratione idem monet, non fronti, sed parti cranii posteriori, occipiti nimirum, topica remedia reuulsionis causa adhibere accommodatissimum est. Per sinus enim posteriores sanguis adscendit, antequam in tertium deriuetur. Hinc legimus, Hippocratem, lib. 1. de morb. vulg. agr. 7. ægrotantis Meronis, cui hæmorrhagia narium superueniebat, occiput aqua tepida fouendum iussisse, vt è naribus cruor liberalius flueret. Probè itaque videndum, vt remedia loco conuenienti applicentur. Nonnunquam in violenta tussi aut vomitione sanguis simul per os & nares redditur; quæ tamen hæmorrhagia narium, propriè non vocatur.

3. Alia hæmorrhagia narium salutaris est, vbi scilicet

magna adest plethora, vel sanguis in venis est acrior & feruentior, ac natura modum excretionis seruauit; alia noxia, vbi modus exceditur, potissimum in corporibus frigidis & pituitosis.

4. A causa efficiente, alia ab *ἀσθενειᾳ*, alia à *διαίρεσι*, alia à *διαμύκνι* vasorum accidit.

### Signa Diagnostica.

Quando *ἀσθενεια* causa est hæmorrhagiæ narium, sanguis copiosè effluit. Et quidem si à copia est sanguinis, adest rubor in facie, atque venarum tensio, præcessit victus liberalior & calidior, & causa aliqua externa fundens sanguinem. Plerumque verò talibus hepatis dyscrasia calida laborat. Sin à qualitate vitiosa sanguinis fit hæmorrhagia, cognoscitur id tum ex sanguine ipso profluente, tum ex signis cacochymicum corpus arguentibus. Si facultatis irritatione, signa quoque adfunt cacochymia biliosa aut melancholica, vel etiam corruptionis & putredinis sanguinis. Si à retentricis imbecillitate, cetera etiam ferè facultates languent, & sanguis per interna exit, isque non multus, ac morbus præcessit quo hepatis in primis & venosum genus debilitatum fuit.

Quando *διαίρεσις* vasorum causa est hæmorrhagiæ, sanguis maiore adhuc copia & impetu profluit, & præcessit contusio, aut alia quæpiam causa violenta externa; vel signa adfunt cacochymia aut vlceris.

Quando *διαμύκνις* causa est, sanguis, qui exit, paucus est & tenuis, atque serosus, qualis & in cacochymicis & hydropicis conspicitur.

Ceterum & alia signa obseruanda sunt. Si enim sanguinis per nares fluxus criticus est, ægrum leuat: quia cum ipso morbus prior & symptomata euanescent. Sin symptomaticus, æger difficulter eum sustinet, & cum pulsu languidiore vires paulatim attenuantur.

Deinde si sanguis immediatè è venis narium prodit, nullus in capite dolor prægressus est. Facile etiam iste fluxus sistitur per adstringentium intra nares applicationem; cum via non sit longinqua. Contrarium accidit, quando è venis cerebri mittitur.

Postremum qui ab arteria sanguis profunditur, is calidus, rubens cum claritate, & subtilis est, & cum spuma atque impetu exilit; crassior & nigrior est, qui à vena.

### Prognostica.

1. Hæmorrhagia narium præcognoscitur ex humorum ad superiora conuersione, siue eorundem *ἀσθενεια*, quam capitis & colici dolor, temporum grauitas, oculorum caligo vel splendores, lachrymæ inuolutariae, rubor nasi & malarum, pruritus & titillatio narium, tremor etiam nonnunquam manuum significant. Præcessit diaphragmatis tensio, sine tamen dolore, inde respiratio facta fuit difficilior, sanguine per thoracem transeunte. Hippocrates, 1. prognost. aphorism. 3. 2. & 3. prognost. aphor. 3. 3. & 3. prorrh. aphor. 43. & aliquot sequentibus. Galenus, in 3. de crisi, cap. ult. & de præcognitione ad Posthum. cap. 13.

2. Quibus in febribus acutis atque adeo ardētibus lachrymæ inuitæ profluunt, his sanguinis è naribus eruptionem expectare oportet, si etiam alia perniciosè non habent. Nam his, qui malè habent, non sanguinis eruptione, sed mortem significat, 1. epid. comm. 2. aph. 80.

3. Et largiores sanguinis profusiones, & eiusdem suppressiones morbos excitant. Hæ conuulsionem, epilepsiam, carum, & similia. Illæ animi deliquia, syncope, cachexiam, hydropem, singultum, & conuulsionem quoque, 5. aph. 3. & in 3. prorrh. aphor. 53. & seqq.

4. Quibus principio hæmorrhagiæ largæ adfunt, rigor superueniens fluxionem sistit. Sin larga hæmorrhagia rigori superueniat, reuulsio fit, rigores verò longi

*Hæmorrhagia narium futura indicia.*

efficiuntur, 3. *prorrhæ. aph. 58. & 59.* Id Galenus ita explicat. Si hæmorrhagia narium morbum non sedauerit, & rigor illum exceperit, tum rigor, tum morbus in longum producantur. Nam corpus exhaustum spiritibus infrigidatur. Frigus autem morbos diuturnos parit, cum materia facile concoqui nequeat.

5. Quibus in febre ardenti (vt Galenus accipit) capitis dolores adsunt & ceruicis labor, & totius corporis cum tremore imbecillitas, sanguis è naribus profluens morbum soluit, 3. *prorrhæ. aph. 60.*

6. In affectibus hepatis aut lienis fluxus sanguinis è naribus *ἀναπναι* factus, siue è nare diuersa, hoc est, è dextra, si lien laborat; è sinistra, si hepar, malum. Non enim fit illa euacuatio *ἢ ἔξω, ἢ ἔσω, ἢ διὰ τῆς*, recto tramite; ideoque non motu naturæ, sed morbi, vel materię. Deterius autem est, si cum sudore thoracis aut capitis fluat, 1. *prorrhæ. 33.*

7. Fluxus sanguinis narium non tam aduersus est biliosis, quam pituitosis & melancholicis, teste Auicenna. Hi enim sanguinis profusione magis refrigerantur, & debilitantur. Ita & Hippocrates scribit, 7. *aphor. 82. Quibus in febribus quartanis sanguis è naribus fluxerit, malum.*

8. Quibus sanguis multus è naribus profluxit, si quidem immoderate decolorationes adsunt, (scilicet ob sanguinis penuriam, humorum impuritatem, & bilis flauæ admistionem) iis parum confert. Qui verò præ rubro sunt colore, non eodem modo afficiuntur; & quibus caput facile tolerat, prodest; quibus verò secus, minime, 6. *epid. 6.*

9. Quibus febricitantibus sanguis multus ex quacunque parte fluxerit, iis conualescentibus aliud humedatur, calore nativo debilitato, vt nec concoquere, nec in sanguinem conuertere, nec distribuere alimentum rectè possit; vnde initia hydropis existunt, 4. *aphorism. 27. & in Coacis.*

10. In febre ardente fluxio sanguinis è naribus quarto die mala est; (Multitudinem enim sanguinis in toto aut in corpore significat, teste Aëtio, *teirabibl. 2. s. 1. cap. 124.*) nisi aliquid boni coinciderit. Verum quinto die minus periculosa est. Hippocrates, in *Coacis*. Fortassis autem de stilla narium loquitur Hippocrates, quæ prauum signum est in febribus ardentibus, præsertim si quarto die accidat; quia absoluta morbi malitia indicatur. Ita scribit, 1. *epid. comm. 2. aphor. 63.* sanguinis è naribus largam eruptionem in febribus ardentibus multos seruasse, modicam verò occidisse. Nam, vt Galenus docet, nihil eorum, quæ critica sunt, exigue fecerni conuenit: alioquin aut copia tanta significatur, quæ à facultate regi nequeat, aut imbecillitas naturæ tanta, vt superflua, et si conetur, excernere non valeat.

¶ [Febres acutas interdum hæmorrhagiæ narium non solum criticæ, sed & symptomaticæ, & ante humorum coctionem, tolli & solui, experientia, & Medicorum obseruationes docent. In dubium tamen id vocat Fernellius, lib. 2. *meth. med. cap. 8.* Sanguis, inquit, qui in acutis per nares excurrit, licet vigilias, deliria, capitis dolorem, aliæque symptomata demulceat, vix tamen propriam morbi essentiam atque radicem euellit, nisi forsitan immoderatio succedat profusio, summâ virium dissolutione; quæ tamen nusquam videtur optanda. Vtiq; enim sanguis per nares postremus elabitur, nec nisi cum vitioris vis magna erit effusa. In his igitur febribus tamen si nares multo stillent sanguine; vena tamen cubiti secunda: quandoquidem sæpe deprehensus est è naribus tum colore, tum substantiâ laudabilis, cum ex cubito impurus sordidusque detrahatur. Hæc Fernellius.

Verum alij Medici, cum Antiqui, tum recentiores reliqui, contrarium statuunt, iisque ad stipulatur experientia, quæ constat, multos à grauissimis febribus hæmorrhagiæ narium liberatos fuisse, vt etiam in malignis, vt pote iis, quæ variolas & morbillos conjunctos

habent, accidit. Si enim hæmorrhagia narium ipsis superueniat, febris vel soluitur, vel mitigatur, & variolæ vel morbilli multo pauciores erumpunt, quàm si nulla hæmorrhagia superuenisset.

Quod autem Fernellius dubium reddidit, hoc imprimis est, quod sanguis, qui è naribus effluit, plerumque floridus & rubeus est; cum tamen, qui è vena in brachio secta emittitur, vitiosus & putridus appareat. Aliqui huius rei causam esse dicunt, quod sanguis, qui è naribus effluit, tenuis sit, & per vasa angusta quasi colatus exeat, crassiore parte intus manente. Verum hæc ratio non sufficit. Nam si tenuis solum efflueret, & crassus ac vitiosus intus maneret, non febris solueretur, nec cum commodo ægri efflueret; quod tamen accidit. Nonnulli, vt Zacutus Lusitanus, de *Princ. Med. hist. lib. 1. quæst. 23.* aliam huius rei causam asserunt, scribuntque, quod in sanguine, qui è vena secta emittitur, & vasculis excipitur, sat manifesta fiat partium separatio. Faculentum enim & fibrosum subsidere, innatare quod summè tenue est, & putrefactum, biliosum, aut ichorosum; in medio residere potissimum, & iuxta summum, sanguineum; idque fieri, quia vnitus maneat, & calorem diu conseruet, qui difficiles partes separat. Contrà, inquiunt, sanguis, qui è naribus effluit, licet putridus sit & corruptus, rubicundus apparet & exit, quia guttatim effluit, & in vasis ferè non colligitur, & ita eius calor paulatim ab ambiente refrigeratur, vt eius vi partes diuersæ segregari non possint. Quare ita concretus & confusus manet, & rubedinem diu seruat. Verum nec hæc ratio sufficit. Neque enim solum sanguis, qui è vena secta effluit, vasculis excipitur, sed & qui è naribus effluit, iisdem colligi potest. Deinde in sanguine è vena secta emissio partium separatio fit non à calore reservato & reliquo, sed potius, quia calor iam euauit; vnde partes dissimiles, quæ antea à calore vngebantur, iam secessionem faciunt & separantur.

Vera autem huius rei ratio est ea, quam *supra* attulimus, quod nimirum sanguis, qui in hæmorrhagia narium effluit, non semper è solis venis fluit, sed sæpe simul è venis & arteriis, puta è tertio crassæ meningis sinu; sicut & è venis ac arteriis, in basi cerebri per varias *ἀνασπώσας* concurrentibus, ista hæmorrhagia fieri potest. Cum ergo sanguis iste non solum è venis, sed & arteriis effluat, non mirum est si sit rubicundior, quàm is qui è venis in cubito sectis emanat.]

11. Quibus in febribus ardentibus aures obsurdue-runt, his non solutâ febre delirare necesse est. Soluit autem inter alia & sanguinis è naribus eruptio. Hippocrates, de *crisis*.

12. Quibus febre incipientibus sanguis è naribus sternutatione contingente destillat, & vrina subdenti-am albam in quarta habet, iis in septima solutionem significat. Hippocrates, in *Coacis*.

13. *Διαίρεσις* in magno vase, præsertim in arteria, periculosa est, & erosio vix curatur; quia leui occasione crusta iterum decedit. Et Auicennæ est, quod fluxus sanguis narium ex mistura venarum aut arteriarum in reti cerebri mirabili ferè incurabilis sit. *Ανασπώσας*, quæ à crisi, hoc est, à natura propriis viribus operante, fit, bona est, præsertim in febre ardente, phrenitide, viscerum inflammatione. *Διασπώσας* ratione accidentis mala est, quia sanguis tenuis cachexiam indicat.

14. Si sanguine è naribus erupente sudores exigui adsint, & perfrigeratio accidat, siue extremorū, siue totius corporis, malū; quia nimia virium exolutio indicatur.

15. Stillicidium sanguinis, id est, exigua sanguinis & stillatim è naribus fluxio, quæ ex partis, per quam fertur, densitate accidit, vt hyeme, ob frigus, minus periculosa est; ita deterior, quæ in acutis, æstate vel autumno; quia tunc flaua bilis abundat, & aer ambiens calidior est; quæ de causa sanguis promptius fluere debebat. Si ergo subsistit, arguit vel naturæ nimiam debilitatem, vel sanguinis adusti crassitiem tantam, vt excerni

An hæmorrhagia narium in febribus acutis utilis sit. Fernell. negat.

Contrarium tollatur experientia.

Ratio negationis Fernellii.

Vnde fit quod sanguis qui è naribus effluit, sit tam rubens.

Vera huius rei ratio.

Stillicidium sanguinis quid significet.





idem modus in omnibus statui nequeat, vt diximus.

*Hæmorrhagia curatio.*

*Reuulsio.*

*Vena sectio.*

Sed vt ad specialia perueniamus, immoderata nariū hæmorrhagia cohibetur præfidiis, quæ respiciunt vel sanguinem, prohibendo, ne is amplius profluat; vel vasa, claudendo illorum apertionem, vel vtrumque: quod tutissimum est. Prohibemus sanguinem fluere, eū ad contraria ipsum reuellendo, tum derivando ad vicina, vt docet Galenus, 5. meth. med. cap. 3. In præstat in primis venæ sectio. Itaque si æger adhuc terre potest, & nondum resolutus est, secetur media aut interna brachij dexteri vena, dum hepar membrum mandans est, & sanguis è nare dextra profluit; sinistri, dum è nare sinistra; vtriusque, dum è nare vtraque: non quidem enacuationis gratia, sed reuulsio, vt dictum. Fiatque foramen angustū, vt subtilis sanguis effluat, maneatque crassior minus ad fluendum idoneus. Et moderatè sanguis educatur, ad Vnc. j. vel Vnc. ij. atque iteratò post horæ spatium, vt maior fiat reuulsio, viresque non simul dissipentur. Sic enim cursus sanguinis à nariibus ad locum venæ apertæ conuertitur, nec exigua hæc quantitas in plures partes diuisa vires deijcit. Idque ideo tutius est, quàm ad animi deliquium sanguinem mittere.

Si caput magis sanguine abundare videatur, cephalica aperiatur. In magna plethora prius venam tali incidere licet, præsertim vbi ex suppressis mensibus & hæmorrhoidibus malum extiterit.

Adhibeantur & alia, de quibus diximus, reuulsoria præfidia, aut cucurbitulæ cum scarificatione in iuris, scapulis, & cernice; hirudines post aures, extremorum frictiones, ligaturæ eorūdem dolorificæ, lotiones quoque ex aqua feruefacta, vel sinapismi plantis pedum applicati. Aquā verò, aliisque frigidis vtendum est in his partibus, vnde sanguis promanat, quādoque non in iis ipsis planè, sed potius circa has vt Hippocrates docet, 5. aphor. 2. 3. Cucurbita magna sine scarificatione hypochondrio dextro, si è dextra nare sanguis fluat; sinistro, si è sinistra effluit; vtrique, si ex vtraque, applicetur. Sed diligenter animaduertendum, qualis sanguis profluat, ne viciosus aut malignus ad hepar, tanquam ad fontem, tractus ibi putrescat.

Vt verò hæmorrhagia narium præcaueatur, si à plethora ea proueniat, sanguinis nimium prouentum conueniente diætā impedire debemus, & si iam adsit, venæ sectione imminuere.

*Purgatio.*

Et quidem si hæmorrhagiæ narium causā est sola in corpore & capite sanguinis abundantia, sola etiam sanguinis reuulsio sufficit, nec purgatione aliqua opus est. Vbi verò vitiosi alij humores in corpore sanguini sunt admixti, purgatio instituenda est, quā simul humorum ad inferiora fiat reuulsio. Et quia bilis ferè peccat, vtendum tamarindis, myrobalanis citrinis vel chebulis, syrupo ex multiplici infusione rosarum, & similibus, quæ etiam nonnihil adstringunt.

Reuulsio, præfidiis administratis, ad medicamentum veniendum est quæ tam intrò sumpta, quàm foris imposita, sanguinis fluxionem compescunt.

Commodè hæc in quinque classes distribuuntur. Prima classis infrigidantia complectitur, è quibus intra corpus vsurpanda, syrupi refrigerantes è cichorio, iulepæ & syrupi rosarū, syrupi de succo acetosæ, de nymphæ, de papauere cum aquis portulacæ, lactucæ, plantaginis, semperuini, solani, & similibus. Conserua item, rosarum, violarum, nymphæ, radices cichorij condite, caules lactucæ conditi, species diatriæ santalon, diamargaritis frigidæ.

*Fluxus sanguinis sistentia.*  
*Frige factia.*

*Opiata.*

Ad hanc classem referunt etiam Opiata, vt philonium Persicum, Romanum, requiem Nicolai, Laudanū opiatum. Sed alibi monstratum est, opium non esse frigidum, sed calidum. Et quamuis in hæmorrhagiis narium exhiberi possit: tamen eam non sistit refrigerando, sed potius spirituum impetum sistendo. Verū

opiatas non nisi extremā vngente necessitate vtendum & dum vires adhuc constant.

Inter refrigerantia Iohan. Langius, lib. 3. epist. cap. 6. hoc habet:

℞. Syrupi papau. 3. B. aq. polygoni Drach. iij. philonij Persici vel Romani ʒ. j. lapidis hematitæ ʒ. B. M. F. Haustus.

Foris tanquam topica applicentur fronti, temporibus, collo, scapulis, hepatis, testiculis, aqua vel succus rosarum, lactucæ, plantaginis, polygoni, semperuini, solani cum aceto, quibus aliquid mandragoræ, hyoscyami, opij addere licet.

*Topica reperiuntur.*

Vt ℞. Aqu. rosarum 3. iij. aceti rosacei 3. j. bolus Armeni 3. j.

M. & frigidum fronti applica cum intincto panno lineo, qui vbi incaluerit, denuo intinctus imponatur. Fortius adhærebit, addito albumine oui. Vtilis est etiam spongia aqua simplici frigida, aut rosarum cum pauco aceto madida fronti frequenter adhibita.

Testiculis circumligetur pannus hoc Liquore madidus:

℞. Aq. plantag. portulacæ, bursa pastoris, an. Vnc. iij. pulueris rosar. seccar. 3. ij. trochisch. de camphora 3. j. Misc. pro Epithemate ad hepar:

℞. Aq. cichorij, endiniae, acetosæ, lactucæ, an. 3. iij. spec. diatriæ. santal. Scr. j. diarrhod. abbatis, trochisch. de spodio, an. Scr. j. lapidis hematit. 3. B. aceti 3. B. Misc.

Aut ceratum santalinum, vel vnguentum rosarum Mesue hepatis inungatur.

Manus quoque & pedes refrigerare vtile est, quod fit lotionem cum aceto & aqua, præcipuè si volis & plantis è carpi regione, vbi arteriæ pulsan, adhibeantur. Vel silices, ferrum, vel alia frigida manibus reneantur, aut pedibus laminæ plumbeæ vel lapideæ subternantur.

In secunda classe sunt adstringentia; quanquam & ex refrigerantibus, quæ attulimus, quædam eandem vim obtineant. Initio verò vtilia sunt, pentaphyllum, plantago, polygonum, bursa pastoris, myrtus, equisetum, pilosella consolida maior, minor, & media, fraga, quorum aquam hæmorrhagiam sistere experientia obseruatum. est, bolus armenus, terra sigillata, corallia rubra, kalamustia, acacia, hypocistis, cortices granatorum, cornu cerui vstum, sanguis draconis, lapis hematitæ, alumen vstum, quod tamè foris solū vsurpatur.

*Adstringentia.*

Seorsim intrò sumuntur, syrupus cydoniorum, myrtinus, de succoribes, de limonibus, de succo citri, de rosis siccis, de agrestæ, de granatis acidis, cum aquis conuenientibus, conserua rosarum rubrarum, acetosæ, radices consolida condita, rob. de ribes, de berberis, trochisci de terra sigillata, de berberis, de spodio, de carabæ, mina cydonior. sine speciebus.

Vel paretur tale Electuarium.

℞. Conserua. rosar. rubrar. antiquæ, mina cydonior. sine speciebus an. 3. j. trochisc. de spodio, de berberis, an. Drach. j. corallior. rubror. preparat. ʒ. j. C. C. vsti Scr. B. spec. diamargar. frig. Scr. ij. Cum syrup. de rosis siccis q. s.

F. Electuarium.

Dosis Drach. ij. vel Drach. iij. & postea bibantur 3. ij. vel Vnc. iij. aquæ plantaginis.

Vel ℞. Sem. plantag. portulacæ, lactucæ, an. ʒ. iij. rosar. rubrar. P. ij.

Coq. in aqua chalybeata ad Vnc. jx. in Colatura dissolue iulepi rosar. syrup. cydonior. an. 3. ij. trochisc. de carabæ ʒ. iij. M. pro tribus dosibus.

Vel Pulv. trochisch. de terra sigillata 3. j. corall. rubror. C. C. vsti, an. ʒ. j. syrupi myrtillorum 3. j. aqua vel succi plantag. 3. iij. Misc.

Vtilis est & corallinus syrupus, & tinctura coralliorum, essentia rosar. rubrar. tinctura lapidis hematit. Item crocus & extract. croci ʒ. si eius gutt. iij. in aqua plantagin. exhibeantur.

Laudatur

Laudatur & sperniolæ compositum apud Crollium, tanquam efficacissimum ad quamvis hæmorrhagiam sistendam remedium, si quantitate auellanz in aqua plantaginis exhibeatur. Efficacius verò fit medicamentum, si aliquid laudani opiatum addatur.

Vt *℞. Sperniola compositi Crollij* Drach. i. *extract. tormentilla* Drach. *℥. laudani opiatum* Scrup. *℥. vel* Scrup. j.

*F. Pilulæ mediocres.* Dentur 4. vel 5. in aqua bursæ pastoris vel plantaginis.

Pro Frontali:

*℞. Boli Armeni, sanguinis draconis, ana* Drach. iij. *maſtiche, farina volatilis, an.* Drach. ii. Cum albumine oui, vel succo plantaginis & aqua rosarum Fiat Massa.

Pulvis ad hæmorrhagiam narium ad extra D. Casp. Kegleri:

*℞. Lap. hamatis.* Drach. *℥. corall. rubr.* Drach. sem. *chalcitid. vſta* Drach. ii. *gummi Arab. aff.* Drach. sem. *trochisc. de spodio* Drach. i. *pulu. sanguinar.* Drach. ii. *sang. dracon.* Drach. *℥.*

Contusa misc. pro Pulvere.

Alius:

*℞. Pilor. lepor. combustor. farina volatilis.* an. Drach. *℥. boli Armen. preparati* Scrup. i. *succ. acacia, hypocist.* *sangu dracon. lapid. hamatis.* an. Scrup. sem. M. Fiat Pulvis.

Alius, D. Andr. Dôreri:

*℞. Spongiam marinam* num. j.

Lauetur aquâ bursæ pastoris. Imbuatur deinde aceto acerrimo. Imbuta intingatur in picem liquefactam; comburatur postea in vase fictili, & ad vsum tandem reponatur.

Vel *℞. Myrrha, thuris, sarcocolla,* an. Drach. ii. *boli Armeni, terra sigillata,* an. Drach. *℥. acacia, hypocistidis,* an. Drach. iij.

Terantur in pulverem, de quo aliquid ex aquis refrigerantibus prius enumeratis inspergatur, ac spongia his immersa ac leniter expressa fronti & temporibus applicetur.

Refrigerantia autem medicamenta etiam colli lateribus, vbi iugulares venæ & arteriæ ascendunt, & ramos ad nares quoque mittunt, commodè applicantur, ut ita viæ, per quas sanguis ad caput & nares fluit, intercludantur.

In hæmorrhagiis narium etiam commendatur aqua spermatis ranarum, si in ea addita pauca camphora & saccharo Saturni linteamina intingantur, & collo, vbi venæ iugulares descendunt, applicentur.

Non autem solum epithematum forma, sed & ex bolo & similibus cum aceto & albumine oui emplastrum fieri, & colli lateribus vtrinque, vbi iugulares venæ adscendunt, applicari possunt.

Tertia classis glutinantia continet, cuiusmodi sunt, *thuris, aloë, maſtiche, tragacantha, gummi Arabicum, farina volatilis, gypſum, lutum figulinum, tela araneorum, pili leporis combusti, lanugo arborum, flores & nucumenta salicis, vel populi arboris aceto macerata & iterum exsiccata, coryli item, nucis inglandis, cinis charta ex linteis confecta, spongia aceto macerata & cremata in vase fictili, quorum pleraque vel pulveris forma naribus instantur, vel cum aqua aliqua albuminis oui subacta naribus aut fronti applicantur.*

In primis verò ad sistendum sanguinem utilis est muscus crescens in craniis humanis, & fungus ille, quem crepitum lupi appellant. Galenus, in *euporistis ad Solonem, cap. 13. & alibi*, inter alia commendat thus maſculum & aloën, quæ in pulverem trita albumine oui excipit, & cum linteolo, aspersis prius pilis leporis, in nares immittit.

Vel *℞. Tela araneorum, farina volatilis, pilorum leporis combustorum, aloës, thuris, sanguinis draconis,* an. Dra. j. *succi plantag. q. l.*

Dan. Sennerti Tom. I I.

Gossypio excepta naribus imponantur.

Aur *℞. Gummi Arab. tragacanth. pilor. leporis, C. vſti,* an. Drach. i. *aloes, boli Armeni, sanguin. dracon. maſtiche, thuris,* an. Scrup. i. *succi bursa pastoris* Vnc. ij.

Subigantur cum albumine oui, naribusque aliquid indatur.

In quarta classe ponuntur, quæ à proprietate valere creduntur, ut sunt, *succus urticae, portulacæ, millefolij, succus ocymi maioris cum camphorâ.* Quod etiam referuntur, *muscus in craniis crescens, & alia supra secunda classe proposita, stercus porcinum, asininum, & succi ex his expressi cum bolo Armeno inditi, rana virides vſta & in pulverem trita, sanguis, qui effluxit, tostus & tritus, ut & sanguis columbarum, perdicum, turdorum, turturum, cinis combustorum, quæ sub hydris reperiuntur, asellorum, quæ scilicet in nares sufflentur: radix pæonia subiecta lingue, lapis item carpionum in ore detentus, radix equiseti trita & naribus imposita, aut herba trita fronti applicata. Radix melanthij maſticata & naribus indita, ac de collo suspensa.* A nonnullis plurimum commendatur radix cichorij albi circa festum Iacobi collecta circa meridiem, si dentibus teratur.

Quædam etiam collo appensa & manibus versata, ac cutim corporis attingentia, hæmorrhagiam narium sistere creduntur; ut folia urticae maioris, item flores bellid. maioris in manu detenti, donec incalescant: *umbilicus marinus, iaspis, quam valde ad omnem sanguinem non solum è naribus, & hæmorrhoidibus, verum etiam è vulneribus fluentem, sistendum commendat Anshelmus Boëtius, de gemmis, lib. 2. c. 102. sarda, seu carneolus, corallium corpori applicatum.*

Ita commendatur bufo transfossus Ole in *Ω* exi- *Peculiari vi* stente, exsiccatus & sindoni illigatus, ac regionis cordis *sanguinem* applicatus, vel brachio eiusdem lateris. Muscus item qui *sistentia.* in cranio humano concreſcere fertur (vſneam humanâ vocant) in sindone rubra de collo suspensus: herba anagallid. phænicea manibus detenta, radix cyani.

Laudatur & hoc Amuletum:

*℞. Cinerem bufonis vnius, lapidis hamatis* Drach. *℥. musci crani humani pulverisati, umbilici marini, corall. rubr. prepar.* an. Scrup. i. *rad. tormentill. bistorta,* an. Drach. *℥. bursa pastoris, flor. bellid. minoris, anagallidis rubre,* an. P. j. Fiat Pulvis, qui in sericum rubrum includatur. F. Sacculus collo appendendus. Aëtius tanquam expertum laudat vaporem ex aceto lapidi molari ignito insperso, si naribus excipiat. Prodesse etiam ferunt cochlearum carnes cum aceto tritas, aut cum thure naribus inditas; aut cochleas cum domesticis suis vſtas ac tritas, si fronti & naribus imponantur.

Plurimum hîc nonnulli commendant sperma ranarum vere collectum siccâtum, quod cum vino propinant. Postremæ classis sunt caustica, ut vitriolum & chalcitis, calx viua, alumen; quo etiam referri potest sulphur accensum, si extinguatur, & vapor naribus excipiat.

Diata.

Victus ratio in hoc malo sit infrigidans & adstringens, ratione vasorum apertorum & sanguinis feruidi atque acris; & tenuis quoque & parca, si sanguis copiâ peccet. Itaque aer ad frigidum & siccum declinet, sitque aliquantum obscurus; cum lucidus aspectus sanguinem commoueat: sicut & rubrorum intuitus, & calor externus immoderatus, & motus animi vehementior. Quapropter nec frequenter loquatur æger. Sit etiam parum coopertus, præcipue in collo & in capite. Caput non pronum teneat. Comedat pedes & capita veruecum, aliorumque animalium, quæ succum præbent lentum & glutinosum. Vtatur in cibis amylo, cremore ptisanæ, hordeatis, amygdalaris cum seminibus frigidis maioribus & saccharo rosato. Caueantur

F F F

omnia

omnia, quæ sanguinem multiplicant & calefaciunt, exacuunt, attenuant, fluxilemque reddunt. A vino abstineat æger, nisi virtus deficiens plus possit ad indicandum, quam affectio ipsa ad prohibendum, hoc est, ubi spiritus iam deficere incipiunt, & syncope imminet. Tum enim vinum conceditur, sed oligophorum & nonnihil adstringens, & cum aqua aliqua adstringente vel chalybeata temperatum, & quidem vinum in minima quantitate actum frigidum. Somnus sit multus, sed interruptus, ne sanguis ad pulmones vel ad ventriculum confluat.

## CAPVT IX.

## De Sternutatione.

Sternutatio.

**I**nter symptomata, quæ circa nares accidunt, est & Sternutatio, qua natura per nares, quod anteriori cerebro & membranis nasi molestum est, excutere conatur. Quod enim tussis est in pulmone, id sternutatio est in cerebro & naribus. Nam sicut per tussim natura ea, quæ pectori & gutturi molesta sunt, elicitur: ita in sternutatione, quæ naribus molesta sunt. Sternutatio tamen motus, quam tussis, vehemensior est. Ad tussim enim saltem pectoris motio requiritur: ad sternutationem & pectoris & membranarum cerebri. Vnde etiam sternutatio pro parua epilepsia habetur. Aer enim, qui è pectore egreditur, ei, qui per nares ad cerebrum attrahitur, coniunctus, quicquid molestum est membranarum, impetu quodam, & cum magno sono elidit, qui generatur, quoniam aer copiosior confertim per angustas narium vias transit. Et si verò à causa præternaturali originem habeat sternutatio naturam stimulantem: tamen quia naturæ molestum expellentis sit operâ, sæpe cum commodo accidit, & medicamentis concitatur, vnde lethargo, apoplexiâ, epilepsiâ, & similibus capitis affectibus subuenit. Ad partum etiam facilius edendum, ad secundinam expellendam, ad singultum sedandum utilis est. Si tamen immoderatio sit, etiam sua habet incommoda; dolorem capitis excitat, nocetque pectoris & pulmonis morbis, ut & herniæ.

Sternutatio-  
nis commoda.

Incommoda.

## Causæ.

Causa Sternutationis est, quicquid internam narium tunicam irritare potest; quod faciunt vel causæ internæ, humores, & vapores acres à cerebro eò delabentes: vel externæ, ut acia; puluis scilicet piperis, sinapi, nigellæ, pyrethri, hellebori albi, euphorbij, & alia prarmica; vapores item è capis, allio, raphano agresti, & similibus exhalantes; ventus & aer frigidus; radii item solis, & lux magna; quæ sicut lacrymas cedere oculos vellicando solent: ita & per consensum narium tunicam sensibilem afficiunt.

## Signa Diagnostica.

Affectio ipsa per se manifesta est. Si à causis externis ortum habeat, ex relatione ægri innotescunt: quæ si absint, prouenit à causis internis.

## Prognostica.

1. Sternutatio, ut antè etiam dictum, quandoque nihil nocet, sed pro bono signo & omine vulgo quoque habetur, ac in sanis illud, quod molestum est, excutit. Interdum etiam in morborum declinationibus finem illorum præfigit, validamque virtutem, & materiam attenuatam ac in halitum conuersam indicat. Si tamen sit immoderatio, & diu continetur, capitis dolorem parit, & spiritus dissipat.

2. Instantis quoque catarrhi indicium est quando-

que, ut & in dispositis quandoque epileptici paroxysmi, & aliorum capitis morborum prælagium est.

3. Mulieri vteri strangulationem patienti, aut difficulter parienti, si sternutatio superueniat, bonum. Hippocrates, 5. aph. 35.

4. Sternutatio in morbis, in quibus prouocari debet, ut in apoplexiâ, prouocata non adueniens, signum lethale est. Naturam enim succumbere significat.

5. Sternutatio in corpore plethorico in principio morbi cum destillatione mala est.

## Indicationes.

Sternutatio, quæ nimia est, sistenda est & impedienda; sicut & quæcunque in hæmorrhagia narium, quam commouet, in hernia, cum intestina suo loco depellat; in oculorum, pectoris, aliarumque partium dolorosis affectibus, quos exasperare solet. Quæ verò in declinationibus morborum, vel ante paroxysmum epilepticum accidit, impedienda non est. Impeditur autem & inhibetur sternutatio, si ea, quæ vim expultricem irritant, & narium sensilem tunicam vellicant, tollantur, & vellicatio ipsa inhibeatur.

## Curatio.

Itaque si à capitis excrementis sit sternutatio, caput euacuandum. Si à causis externis, illæ amouendæ. Vbi verò causæ sternutationem excitantes statim tolli non possunt, præsertim internæ, ut illa irritatio tollatur, nares demulceantur vapore aquæ tepidæ, vel inungantur lacte, butyro, oleo violarum, rosaceo, salicis, amygdalarum dulcium, seminis cucurbitæ, papaueris, vel albumine oui, & mucilagine seminis cydoniorum & psyllij. Eadem olea etiam auribus immitti possunt. Nonnulli os frigidâ fouent, & faciem etiam frigidâ lauant. Decoctum Basilici exhibitum ad sistendam sternutationem utile esse, nonnulli docent, ut & si eodem decocto caput lauatur. Anisum etiam cum apio olfactum sternutationem inhibere fertur.

Ut materia à naribus reuellatur & deriuetur, extrema ligentur & fricentur, aures vellicentur, oculi premantur aut fricentur, nasus trahatur, caput pectinetur, palatum digito fricetur. Spiritus recitatio, ut & valida attractio, sternutationem etiam sedat. Et cum lux ac splendor sternutationem excitent, tenebræ eam sedant. Si verò à frigore & boreâ proueniat sternutatio, olea calida sine mordicatione naribus attrahere, & in nares infundere, calida item olfacere conuenit.

## CAPVT X.

## De Coryzæ.

**T**Andem inter excretorum per nares vitia est Coryza, Latinis Grauedo, ita dicta, quod in ea in capitis parte anteriore circa frontem sensus quidam grauitatis percipitur, humoris scilicet excrementitii è cerebro per nares defluxus nimius.

Verum quia Coryza catarrhi species est, de catarrho verò supra satis dictum; ut in specie de coryza multa dicamus, opus non est. Hoc saltem monemus, inter reliquas catarrhi species leuissimam esse, quæ fit in nares, & minus periculosam, quam quæ fit in asperam arteriam vel pulmones. Et plerumque, si vniuersalia præsidia adhibeantur, & recta diætæ ratio instituat, sponte cessat. Ad compescendam tamen coryzæ iubent Medici excipere naribus vaporem è decocto maioranæ, chamæ, meliloti, violar, sisymbrij, vel aq. maioranæ naribus attrahere, vel acetum rosaceum ferreæ laminæ ignitæ infundere, vel rosas cum aceto laminæ iniicere, vel fabas integras aceto madidas, & vaporem naribus



naribus excipere. In fluxione frigida etiam nigellæ & cumini vel thuris vsti odor naribus suscipiatur, vel pulgum olfaciendum præbeatur. Odores enim ejusmodi & caussam proximam siccando absument, & remotam quasi, id est, intemperiem cerebri frigidam corrigunt. Qui Coryza laborant, balneum ingredi non debent, ne materia ad nares fluens circa os ethmoides exsiccetur, & obstructionem pariat; unde olfactus tollitur. Si nares ex continuo defluxu humoris acris exasperentur, & rubescere, atque exulcerari incipiant, unguento pomadæ inungantur.



# LIBRI PRIMI PARTIS III.

## SECTIO V.

### De Linguae Morbis & symptomatibus.

#### CAPVT I.

##### De Linguae Asperitate & Scabritie.

**P**OST QVAM Narium affectus explicauimus, & de olfactus læsione egimus: restat tandem, vt de morbis ac symptomatibus linguae, & gustatu læso dicamus, atque ita tractationi de morbis & symptomatibus, quæ in sensibus externis & eorum organis accidunt, finem imponamus. Etsi verò lingua non solum gustatus organum sit, sed & motum obtrineat, vt cibum in ore regere, & tanquam manus dentibus porrigere, deglutitionem promouere, collectionem quoque & ejectionem salivæ adiuuare possit; præcipue verò sermonis organum sit, & propterea affectus, qui linguae præter naturam accidere solent, non omnes hujus loci sint, vbi de læso gustatu ejusque organo præter naturam affecto agere nobis propositum est: tamen cum affectus hi magnam cognationem habeant, & vnus linguae morbus & gustatui & sermoni obesse possit, ob affinitatem, & quia vni subjecto insunt, de omnibus linguae morbis & symptomatibus hoc loco agemus.

Et linguae morbos quod attinet, primò quidem lingua sæpe aspera & sicca euadit, ita interdum, vt etiam rimas & fissuras agat. Idque accidit à vaporibus calidis, acerbis & putridis, linguam exsiccantibus & quasi comburentibus; quod fieri solet in febribus continuis, malignis, ardentibus, in inflammatione pulmonum, pleuræ, & partium thoracis, ac cordis calidis affectibus, vt & si à ventriculo, hepate, liene, & partibus vicinis, vapores tales per œsophagum ascendant.

Curatur quidem rectissime hoc malum, si morbi, à quibus fulgines illæ acres & calidæ suppeditantur, tollantur: verum quia ægri hæc ipsa etiam mala leniri cupiunt, calorem, asperitatem & siccitatem linguae, temperant collutione oris ex aqua portulacæ, rosarum, nymph. decocto hordei, cum exigua portione aceti, vel julepo rosarum aut violar. vel decocto violar. lactuc. cum syrupo violarum & diamor. Vel detineatur in ore succus citri, radic. lactucæ, cerasa acida, tamarindi, pulpa cucumer. cucurbitarum. Vel nodulus ex semine cydonior. cum pauxillo sacchari candi, decocto hordei, vel aqua rosarum aut violarum madidus.

Vel ꝥ. Mucilag. psylli, sem. cydon. aq. violar. extract. an. Vnc. sem. syrup. violar. Vnc. iii. sacchar. penid. Vnc. em. Misce.

Vel ꝥ. Hordei contusi, passular. an. Vnc. i. glycyrrh. Dan. Sennerti Tom. I I.

Drach. ii. sem. psylli, cydon. an. Vnc. sem. Coqu. & colentur, & addita sacchari s. q. ad syrapi formam coquantur. Vide plura in doctrina de Febribus, de Curatione symptomatum, quæ febribus accidere solent.

#### CAPVT II.

##### De Linguae Magnitudine nimia, Tumore, Calculis.

**D**Einde interdum lingua præter naturam augetur, & quidem non vno modo. Nonnunquam enim incrementum saltem quoddam linguae est. Ita Galenus, de diff. morb. c. 9. scribit, se vidisse cuiusdam linguam supra modum absque vilo doloris sensu excreuisse, vt neque œdema, neque scirrhus, neque inflammatio esse videretur. Neque enim prementi manui cedebat, neque omni sensu carebat, neque dolore infestabatur, sed hoc ipsum incrementum duntaxat erat, nihil ipsa substantiæ particulæ vitiatæ; quod accidit ob copiam vtilis alimenti in eius substantiam conuersi. Nonnunquam verò ex affluxu humorum p. n. vitiosorum lingua tumescit, & quidem cum vel sine inflammatione. Sicut Galenus, 15. de meth. med. cap. 8. scribit, se vidisse linguam ita tumefactam, vt ore contineri non posset: quod & Forestus vidit, libr. 14. obseru. 18. Id quod accidit plerumque ex materiæ calidioris ad linguam affluxu, ob quem interdum etiam inflammatur, & quandoque inflammatio in abscessum degenerat. Interdum verò tumor est ex pituitosæ materiæ affluxu: nonnunquam etiam à morbo Gallico, humoribus prauis & corruptis ad linguam affluentibus, unde ita intumescit, vt ex ore emineat; sicut Alexander Benedictus id annotauit, lib. 5. cap. 10. Idem interdum ex inunctione hydrargyri accidit. Nonnunquam verò & ex materia venenosa, vt esu fungorum venenatorum, vel alterius rei venenatæ, vel morsu bestię venenatæ linguae tumor excitatur.

##### Signa Diagnostica.

Magnitudo præter naturam aucta & tumor ipse visui patet: causæ verò ita discernuntur. Si magnitudo illa linguae sit saltem quasi nimium linguae incrementum, lingua secundum partes omnes æqualiter augetur, & dolor ac signa vitiosorum humorum absunt.

Si verò fiat ex affluxu humorum vitiosorum, signa eorum, & dolor plerumque adest, & ferè in vna parte magis apparet, quam in alia. Et quidem si tumor sit sanguine & materia calida, adest simul rubedo faciei & linguae, habitus corporis est calidior, & manifesta caliditas ac dolor plerumque percipitur. Si verò materia sit pituitosa, lingua albicat, multumque pituitæ effluit, saporque est insipidus. Si ex lue Venerea sit tumor, ejus notæ etiam alibi in corpore apparent. Si ex veneno, aut re venenata sumpta, id æger patefaciet, & alia etiam signa veneni aderunt.

##### Prognostica.

1. Linguae tumor malum est non contemnendum. Nam lingua motu suo & sermoni & masticationi infertur, qui in lingua tumida læditur. Imò interdum ex nimio linguae tumore periculū suffocationis imminet.
2. Si linguae tumor sit durus, liuidus, & ad canceri naturam ferè tendens, incurabilis est.

##### Curatio.

Materia ad linguam confluens auertenda, euacuanda, repellenda, & quæ influxit, discutienda, vel etiā suppuranda. Ideoque si sanguis abundat, vena cephalica in brachio aperienda, & cucurbitulæ ceruici apponendæ.

Deinde etiam venæ sectio sub lingua instituenda. Humor biliosus & pituitosus conuenienti modo euacuandus.

Præmissis vniuersalibus, & reuulsionibus ac diuersionibus adhibitis, in tumore à sanguine in principio vtendum medicamentis repellentibus, vt succo citri, limon. ribes, granatorum, acetosæ, succo lactucæ; quo solo Galenus, 14. m. m. cap. 8, purgatione præmissa, quendam sanauit. Nam succi hi & repellunt suâ frigiditate, & ratione acetositatis humiditatem cum salina educunt. In augmento addatur diamorum, versus declinationem acetum quoque admisceatur scilliticum.

In materia pituitosa in principio vtendum oxymelite simpli. In augmento addatur parum zingiberis aut salis gemmæ & Ammoniaci, vel os colluatur decocto origani, pyrethri, cum hydromelite.

Versus declinationem frictio fiat cum sale & aceto, vel cum cepis aut scilla, Frequenter expuendum: quemadmodum hæc à Rhase peculiari capite explanatur. Pituitam quoque ex ore efficaciter ducit hæc oris Collutio.

℞. *Malua cum toto*, violar. fol. scabiosa, hyssop. an. M. i. rad. althææ Vnc. β. flor. melilos. P. i. ficum Num. iii. passular. enucleatar. Vnc. i. sem. feniculi. z. ii. nid. hirund. dimid.

Coqu. in aqua communi:

Colaturæ, ℞. ℥. i. β. mell. rosat. colat. Vnc. iii. pro oris Collutione.

Si tumor pituitosus sit, & humorem melancholicum admisceri suspicio sit, humor is euacuandus, & lingua assidue lacte vel decocto caricarum, passularum maiorum, radic. althææ, glycyrrhyzæ, sem. feniculi fouenda,

Si lingua verò tumor callosus & cancrusus sit, cuius mali historias aliquot recenset Forestus, lib. 14. obs. 24. in schol. malum ferè incurabile est, & putredine ad radicem linguæ, vel sanguinis fluxu in venis exosis accedente tandem ægri moriuntur.

Si lingua tumor cum inflammatione coniunctus sit, secetur primò cephalica, hinc venæ sub lingua, & cucurbitulæ vsurpentur; postea curandum, vt abscessus rumpatur, colluendo os decocto tepido foliorum lactucæ, maluz, violarum, hordei, ficum, passularum maiorum, sem. cydonior. feniculi. addito syrupo violarum, & de iuiubis ac diamoro. Ficus etiam per medium scissæ, & continuò tumori impositæ, suppurationem promouent: vt & decoctum earum & vuarum in ore detentum. Furfures etiam, si in aqua coquantur, donec liquor lubricus fiat, & colatum decoctum in ore sæpius detineatur, abscessum aut rumpit, aut discutit.

Si tumor sponte non aperitur, scalpello aperiatur. Pure excreto decocto hordei, folior. scabiosæ, plantagin. agrimon. cicer. rubr. addito melle rosac. eluatur: absterfum vlcus ferè per se consolidatur; aut curatur vt oris vlcera.

Si ex lue Venerea sit tumor, curatio ad eundem morbum dirigatur.

In materia veneposa ex esu fungorum prauorum, aut alterius rei venenatæ, vel morsu bestię venenatæ, ad magnas antidotos, & propria remedia confugiendum est; & vitanda purgantia, quæ materiam ad centrum corporis trahunt, ac venenum intus retinent. Os verò colluendum decocto plantaginis, scabiosæ, syrupo vel melle rosaceo.

Observatum etiam, Calculum in spongiosa linguæ carne genitum fuisse, & tandem tumore, qui calculum continebat, emollito ac aperto, excidisse, cuius rei exemplum habet Forestus, lib. 4. obseru. 26.

Vlcera verò, quæ post inflammationem interdum relinquuntur, curantur vt reliqua oris vlcera; vt postea dicetur.

## CAPVT. III.

## De Lingua Vulneribus.

Lingua interdum etiam vulneratur, quod plerumque dentibus accidit, in conuulsionibus & lapsu; imò interdum particula linguæ hoc modo amputatur.

Vulnera autem talia nonnulli futuris coniungenda docent, verum vix commodè hic futura institui potest; idèoque solum medicamenta conuenientia adhibenda. Quia verò emplastra adhiberi commodè non possunt, linctus & linimenta ex syrupo de rosis siccis, melle rosato colato, syrup. vel similibus adhibenda. Vel paretur tale Decoctum, quo os colluatur:

℞. *Hordei mundi* M. i.

Coqu. in aqua pura, donec creper, sub finem adde folior. myrrill. summit. hyperic. fol. plantag. rosar. rubrar. an. M. β. baulastior. P. i.

Coqu. Decocto os colluatur. Potest & mel rosatum addi. Si verò, quod interdum accidit, linguæ particula amputata sit, ea non regeneratur.

Pertinent huc & faucium atque oris vlcera, quibus interdum linguæ quoque maximam partem absumptam fuisse, compertum est. De quibus lib. 6. part. 4. cap. 23. dicitur. Vtilia sunt & hæc medicamenta:

℞. *Plantaginis, cauda equina*, an. M. i. rosar. baulastiorum, summitat. absinthij, salicis, an. P. i. hordei integri Vnc. i. nucum cupressi, lenticular. sumach. an. Vnc. iii.

Decoquantur sufficienter in aq. part. 10. & vna acetis; & in colatura dissolve mell. rosat. vin. gran. diamor. an. Vnc. ii. Fiat Gargarismus.

Vel ℞. *Aq. plantag. rosar. caprif.* an. Vnc. ii. portulac. diamor. an. Vnc. i. rob. ribes mell. rosat. omphac. an. Drach. β.

Misce pro Gargarismo.

## CAPVT IV.

## De Ranula sub lingua.

Nonnunquam tumor sub lingua in oris molli parte, qua linguæ connexa est, oritur, pueris familiaris, rarius inflammationis, sæpius ordematis speciem præ se ferens, quem à figura, quam exprimit, *Ranula*, siue Ranulam linguæ, Aëtius & Paulus appellant. Quanquam interdum globuli rotundi speciem exhibeat. Aperto illo tumore mucus prodit, oui albumini colore & consistentia similis nonnunquam tamen & colore citrino. Compertum verò est, & lapillos simul cum muco, vel ipsos solos sine sanie & sanguine, ex apertis eiusmodi tumoribus excretos fuisse.

Causa mali est sanguis crassus & terrestris, seu, vt loquuntur, humor tartareus in venis sub lingua coaceruatus, aut pituita & humor lentus à cerebro edelatus, partibusque illis infixus.

Quod ad curationem attinet, post vniuersalia, phlebotomiam scilicet, diuersionem & purgationem, collutiones oris fiant ex incidentibus & resoluentibus, vt ex decocto origani, mentastri, pyrethri cum sale communi tosto, vel cum sale gemmæ.

Vel hic Pulvis vsurpetur:

℞. *Piperis zingiber.* an. Drach. i. sal. gemm. comm. an. Scrup. ii. *origan. calaminth. rad. ireos, hermodactyl.* an. Drach. β. mastich. Scrup. i.

F. Pulvis, quo Ranula fricetur.

Aliqua etiam pars pulueris huius incorporetur cum albumine oui, & cum petia imponatur, semper renouando, postquam æger crebrò id expuerit.

Auicennas laudat origanum, cortic. granator. & sal. quibus mixtis & puluerisatis ranulam fricare iubet.

Item

Lingua tumor cancerosus.

Lingua inflammationis.

Tumor lingua. Venereus.

Calculi in lingua.

Item tragacanthum vstum, & hermodact. mixta cum albumine oui, & sub lingua posita.

Aur ʒ. Balauft. alumin. gallar. an. Vnc. β.

F. Decoctio in aqua. Colatura sub lingua teneatur. Fortius est, si frictio fiat cum flore æris & tragacanth. Aërius ærugin. rasæ, chalcitidis & gallæ æquas partes miscet, & puluerisata inspergit, cauendo, ne quid de hisce deglutatur. Aut cum passo collutionem ex iisdem parat; aut iis vitur, quæ ad aphthas & vlcera oris valent.

Commendat & hoc, quod

ʒ. Nuc. ingland. veteres integras, unâ cum corticibus vstas, quibus tritis addit

Piperis ʒ. xii. thur. ʒ. iii.

Et cum melle mixta illinit.

Chirurgia.

Si his nihil perficitur, tumor scalpello vtrinque aperitur, & vbi humoris copia effluerit, os aliquot diebus colluatur cum posca exiguo sale addito, donec nihil amplius humoris in loco affecto reliquum sit. Alii acu per tumorem transfixa vulnus postea cum scalpello dilatant, vt materia contenta effluat, quâ exhaustâ aquam mulsam gargarizare iubent, quam & per siphonem in transfixum tumorem immittunt, & vlcus tandem legitime claudunt. Sunt, inter quos Ambrosius Paræus, lib. 7. cap. 5. qui potius ferro ignito tumorem aperiendum censent, ne malum reuertatur. Nigram verò vel fuscâ & durâ ranulâ, quæ cancrosa est, ne attingas.

## CAPVT V.

### De Lingua Adstrictione.

Lingua adstricta.

**A**ccidit etiam interdum, vt lingua freno aut vinculo suo arctius adstringatur, vt veluti decurtata liberè moueri ad sermonem formandum nequeat, siue id fiat à primo ortu, siue post ab vlcere aut cicatrice. Ac tales ἀγκυλώσεις & μυκταίος appellantur; vitium ipsum ἀγκύλωσις.

Malum hoc oculis patet, & sermoni impedimentum affert: infantes etiam co laborantes lac promptè sugere nequeunt.

Viculum ergo hoc transuersim incidendum est, vt Aëcius docet, retrab. 2. ferm. 2. cap. 26. Paulus Ægineta, lib. 6. cap. 29. Nimirum lingua sensim eleuanda est, & forcipe acurâ frenum, quantum opus, discindendum, cauendo, ne venæ sub lingua lædantur. Vid. Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 7.

Si verò cicatrix causâ est, vncino apprehensa extendatur, & quicquid durum est, & cum naturali carne non consentit, excindatur: sectione peractâ os posca abluatur, postea inspergatur manna thuris, imponatur linteam carprum & conuulsum, & os aqua mulsâ colluatur, vel mel rosatum illinatur.

Atque hæc de morbis linguae dicta sunt. Iam de symptomatibus dicendum.

## CAPVT VI.

### De Læso Gustatu.

**L**inguae à natura tum motus tributus est, quo promptè in omnem partem impellatur; qua de causâ etiam musculos plures accepit: tum sensus tactus & percipiendi sapores. Motum habet à nervis, qui musculis linguae implantantur; sensum ab iis, qui in extremam linguae superficiem & tunicam eius sparguntur. Ita fit, vt lingua partibus extremis sapores dignoscat, moueatur verò à musculis, vt scribit Galenus, 8. de vfu part. cap. 5. Nervi motui linguae inservientes sunt à septimo pari nervorum cerebri; qui gustui inserviunt, à tertio pari propagantur.

Dan. Sennerti Tom. II.

Quamquam autem gustus tactus quidam est, vt Aristoteles disputat, 2. de anim. cap. 10. & vtrumque habet à nervis tertii paris: tamen aliquando accidit, vt manente sensu tactus in lingua gustus pereat. Nam ad gustum, qui subtilior sensus est, exquisita admodum in organo sentiendi facultas requiritur, quæ faciliè ab aliqua præter naturam causâ hebetatur; hebetata tamen sufficere potest ad sensum tactus, qui non ita faciliè, vt gustus, in eadem parte læditur & afficitur.

Sed vt pereunte tactu in lingua gustus maneat, fieri nequit. Sæpe verò & hoc vsuvenit, vt constante gustu tactuque linguae, motus eius impediatur; cuius ratio manifesta est, ex diuersis sensus & motus nervis, vt diximus. Sensus igitur linguae inest, tum vt tactiles qualitates percipiat, tum vt gustabiles, qui sunt sapores, eorumque discrimina varia. Motus inest, vt cibum in ore regat, & tanquam manus dentibus porrigat, & etiam deglutitioni inserviat, & vt collectionem & expuitionem quoque salinæ adiuuet, præcipuè verò vt sermonis formandi sit instrumentum.

Postquam igitur de morbis linguae dictum; proximum iam est, vt de symptomatibus eius dicamus. Inter actiones læsas hic sunt, Gustus læsio, & Motus linguae læsio.

Vt lingua gustatus organum sit, non solum peculiarem substantiam, carnem scilicet ratam, spongiosam ac mollem obtinet, sed & nervos à tertio nervorum pari accepit: quæ eius naturalis constitutio si lædatur gustatus læditur.

Læditur autem gustatus tripliciter; vel quia imminuitur, vel aboletur, vel deprauatur. Imminuitur, cum saltem sapores excellentes percipit; aboletur, cum planè nullos; deprauatur, cum obiectum alterius, quàm est, saporis esse iudicat. Imminuitur & aboletur iisdem de causis, quæ in imminuto gustatu sunt minores, in abolito grauiore.

Fit hoc, cum vel spiritus animalis non transmittitur, quia paulatim deficit; quod fit in moribundis: vel quia eius influxus impeditur ab obstructione aut tumore pr. nat. in nervis tertii paris, & parte cerebri, vnde nervi illi originem habent: vel quia nervi tertij paris refrigerantur, aut lingua frigida, aut humidâ materiâ perfunditur; vt fit in catharro, aut pustulis: vel vlcere obsideretur.

Deprauatur verò gustus, quia vel linguae substantia, vel membrana illam inuestiens, vitioso aliquo humore imbuta est. Ita si bile lingua perfunditur, omnia, quæ gustantur, amara esse putantur, in aliis affectibus falsedo vel acor cibus inesse videtur. Nam succus extrinsecus à cibus accedens vitiosum linguae succum, qui prius quieuerat, excitat mouetque; gustandi autem facultas non eum, qui iam accessit, sed qui per linguam antea fusus erat, sentit ac percipit, atque ita quod intus existit in lingua, prohibet extraneum; quemadmodum hac de re docet Galenus, 1. de sympr. caus. cap. 4. Addit ibi Galenus, aliquando, quamquam rarius, accidere, vt lingua ob ἀρρίστην sensus gustandi succos, quos in se continet, prius sentiat, quàm aliquid ore acceptū guster.

Causa gustatus læsi.

Causa.

Vt ergo causas breuiter complectamur, imminuitur vel aboletur gustus, nervis suis perfrigeratis & emollitis, vel iisdem obstructis, aut malè affectâ ea parte cerebri, vnde illi prodeunt: aut malè conformatis nervis, neque ad linguam perringentibus; quod in Lazaro illo vittrivorce, qui nullo prorsus gustu, dum viueret, præditus erat, accidit, cuius mentionem facit Columbus, lib. 13. Anatom.

Deprauatur vel à causâ externa, vt assumptis quibusdam in os, quorum sapor non faciliè à lingua cluitur; vel internis, vt ab humore vel vapore, quo lingua imbuitur. Humor ille vel vapor defertur interdum ex ventriculo, vel intestinis, (quorum tunica communis

est cum linguæ & faucium tunica) item ex vtero, hepate, liene, pulmone, thorace malè affectis: interdum ex faucibus vlcere sanioso obsessis ad linguam mittitur: frequenter denique è cerebro ad fauces & linguam confluit.

### Signa Diagnostica.

An sapor imminutus, abolitus, vel deprauatus sit, æger patefaciet. Qualis verò ille humor sit, læsi gustatus causâ, ex sapore & linguæ colore dignoscitur.

Nam dulcedo & rubedo sanguinis est; amaror & color citrinus bilis; falsedo & albedo pituitæ putrescentis; acor & color ater humoris melancholici. Sapor abominabilis pranos in ore ventriculi humores hætere arguit. Pustulæ, tumor & apostema linguæ, oculis cernuntur. Si lingua sit sana & mediocriter rubra, & gustatus imminuatur vel aboleatur, ægritudo est in capite vel nervis, à quibus gustandi facultas dependet.

### Prognostica.

1. Gustus læsio diu perseverans facultatem naturalem lædit. Neque enim homo alimenta discernere potest.
2. Gustus læsio ab intemperie frigida & sicca difficilius curatur, quam ab intemperie calida & humida.

### Curatio.

In curatione observandum primò, an vitium hæreat in ipsa lingua; an verò cerebri vel nervorum vitio, vel ventriculi, pulmonis, aliarumque partium accidat; ut ad fontem mali, & membrum primario affectum, curatio dirigatur. Si gustus lædatur à causâ calida, eaque humor sit, is convenienter euacuandus. Deinde diu in ore teneatur leniter gargarizando acetum, vel succus malorum granatorum, item succus endiviæ, lactucæ, portulacæ, mucilaginis feminis psyllii & cydoniorum cum aqua rosarum vel acetosæ; fricetur lingua carne limonum & citriorum ad appetitum & gustum reuocandum. Si malum sit à causâ frigida, materia præparatur, & convenienter euacuatur; deinde gargarismus fiat ex hyssopo, glycyrrhiza, caricis, melle, cui aliquid de rob nucum admisceri potest, ad tollendum saporem extraneum. Si causâ sit in pustulis, vel vlcere linguæ, aut lingua per consensum alicuius partis afficiatur, his omnibus sua peculiaris curatio adhibeatur.

## CAPUT VII.

### De lingua Motu læso.

Lingua motu læsa.

Lingua motus læsio oritur, affectis nervis septimi paris cerebri prope spinalis medullæ initium, atque ita musculis linguæ affectis, siue intemperie nudâ frigidâ & humidâ, siue coniuncta cū materia, & nervos illos seu irrigante, seu angustiam in iis pariente; unde post apoplexiâ sæpe paralytis linguæ accidit, siue soluta vnitatem.

Interdum, ut dictum, lingua freno aut vinculo suo artius astringitur, ut veluti decurtata liberè moveri ad sermonem formandum nequeat; siue id ab ortu accidat, siue post ab vlcere aut cicatrice. Et qui à natura tales sunt, principiò quidem tardè in sermonem prorumpunt: vbi verò loqui cœperunt, citra difficultatem, & satis festinanter loquuntur. Impediuntur tamen in appellatione nominum & verborum, quorum aliàs difficilior est pronuntiatio, veluti in quibus R. & L. literæ, frequenter occurrunt, ut describit Aëtius, *tetrabibl.* 2. *serm.* 4. *cap.* 36.

Nonnunquam tumor sub lingua, quem Ranulam appellant, oritur, de quo, *cap.* quarto, dictum, quæ etiam motum linguæ impedit,

Læditur & linguæ motus, quando ea tota intumescit, ut etiam antea dictum. Ex ebrietate quoque linguæ motus impeditur, ut homo in loquendo vel titubet, vel mutus reddatur, & nonnunquam convulsus moriatur, nervorum principio nimia vini potatione obruto teste Hippocrate, *5. aphor.* 5.

Ex concussione quoque cerebri per ictum vel casum linguæ motus impeditur, eodem Hippocrate teste, *7. aphor.* 39. & Galeno, *1. de loc. affect.* *cap.* 6.

Tandem aliquando à vermibus in intestinis linguæ motus impeditur; cuius exemplum insigne est apud Alexandrum Benedictum, *lib.* 5. *cap.* 15.

Ex his igitur causis motus linguæ læditur, ut vel planè auferatur, vel imminuatur, vel depraveretur.

Aufertur motus linguæ, atque ita loquela simul, siue conformationis vitio, à primo ortu, aut post, quando spiritus animalis vel non transferatur ad linguam; siue ob cerebri obstructionem & nervorum angustiam, ut in apoplexia, caro, catoche; siue ob spiritum animalium consumptionem, aut ad interiora retractionem, ut fit in morti proximis, in syncope & vteri suffocatione: vel non recipitur in linguâ propterea, quod obstructio vel tumor est in nervis septimi paris cerebri. Ad hanc ergo nervorum angustiam, si perfecta sit, sequitur linguæ paralytis, eaque interdum citra gustus offensionem: sin leuior, ex intervallo modò loquitur homo, modò obmutescit sano corpore.

Imminuitur autem motus linguæ ut tarda seu difficilis euadat loquela, vel citra vitium linguæ, dum spiritus animales aliò auocantur, ut in ira, terrore, nimio gaudio; vel eiusdem vitio. Vitium autem hoc est vel nativum, & tales homines non possunt incipere loqui, nisi prius multoties linguam mouerint, & labia, atque hinc expedire loquuntur, aut multo tempore vnam dictionem proferunt, aut postquam loqui cœperunt, non possunt in sermone progredi, & sæpe eandem syllabam repetunt, quod vitium Græci *ισχυροφωνία*, & *lingua hystantia* hystantiam linguæ vocant; etsi hoc vocabulum exilitatem vocis potius significat: vel aduentitium, à linguæ vulnere aut apostemate, aut vlcere, ex crescentia magna sine apostemate, paralyti secundum medietatem dextram & sinistram.

Deprauatur motus linguæ, ut vna litera & syllaba pro altera præter voluntatem proferatur in vitio, quod *τραυλότης*, blæstias, & *ψαλότης* balbuties nuncupatur; quarum hæc literas aut syllabas quasdam inter pronuntiandum absorbet, vel quasi supprimit: illa literam vnam pro altera vitiosè effert inprimis literam R.

Causa primò est intemperies linguæ & nervorum atque musculorum huius, eaque plerumque humidior siue nativa sit, ut in pueris, qui post ætatis decursum, vel febre superueniente, absumptâ humiditate superuacantâ, rectè loquuntur; siue asscitiua ex humoris affluentis copiâ à cerebro humidiorè, vel ab ebrietate, ob quam humiditatem imbecilliores musculi linguæ eam non firmiter ad dentes primos stabilire & allidere possunt. Interdum verò intemperies linguæ siccior, ob quam lingua conuellitur & contrahitur, ut rectè extendi & dilatari nequeat. Deinde in causâ est mala conformatio, aut in nimia linguæ breuitate, longitudine, crassitie, aut in musculorum linguæ conformatione.

### Signa Diagnostica.

Lingua motus læsus ex sermone læso, ut & masticatione & deglutitione percipitur.

Causas quod attinet, si lingua lædatur per consensum à cerebro, noxa etiam in cæteris functionibus animalibus deprehenditur; quod non accidit, si vitium tantum sit in nervis septimi paris cerebri: atque tum, si tenuis humiditas linguæ musculos penetrat, ipsosque resoluat, paralytis linguæ existit. Convulsio verò cognoscitur ex linguæ contractione. Convulsa quoque lingua neque



neque ab ægro, neque ab alijs flecti & moueri facile potest: paralytica verò per alium non difficulter mouetur. Mala conformatio ligamenti oculis patet. Sicut & tumor, qui, ex quo humore constet, colore aliisque indiciis proditur. Si tumor est inflammatorius, durities, dolor, & febris adest.

*Prognostica.*

1. Grauitas & tarditas linguæ relicta post apoplexiam, carum, lethargum, & similes affectiones, raro, & difficulter admodum curatur.

2. Ex confirmata paralyfi omnes obmutescunt.

3. Dum lingua tota paralyfi afficitur, grauis metus Apoplexiæ impendit. Galenus, 4. de loc. affect. cap. 2. Scribit tamen Forestus lib. 14. obseru. 31. in Schol. se non raro obseruasse linguæ paralyfin obortam, quam nulla apoplexia consecuta est. Quod & ego obseruauit in Professore quodam huius Academiæ, qui ex catarrho subito decedente planè mutus reddebatur, & in tabulam scribere opus habebat, quid mali pateretur, (sensus & reliquarum partium motus integer erat) qui frictionibus adhibitis, & clystere iniecto, paulò post iterum loqui cœpit, & catarrho liberatus nunquam apoplexiam passus est.

*Curatio.*

Si linguæ motus sit à paralyfi, videndum, an sanguis simul peccet, & tum, præmissa alui lenitione, mittatur à cephalica primò, deinde è venis sub lingua; quod sæpè præsentissimum huius affectionis fuit remedium. Quidam etiam cucurbitulas cum scarificatione sub mento ponunt, quæ & scapulis applicari possunt. Nonnunquam etiam vsurpentur diuersiones per clysteres, frictiones, vincula, & similes.

Si à materia est frigida pituitosa, præparata illa ex-

purgetur. Vsurpentur etiam diuersiones omnis generis, vt supra, part. 1. de Paralyfi, ex hac causa traditum fuit.

Topica quod attinet, vsurpentur collutiones oris, gargarismi, apophlegmatismi, ex stæchad. hyssopo, origano, primula veris, salvia, puleg. thym. radic. cappar. calamo aromat. zingib. pyrethr. migella, pipere, & similibus.

Lingua fricetur pulu. spec. diatrion pipereon, diacalaminh. dianth. diagalang. cum conseru. flor. salvia, stæchad. primul. veris, pulu. sem. staphydis agr. sinapis, salis Ammoniac. cum theriac. Misbridat. aurea Alexandrin. quæ & fabæ magnitudine in ore detineantur, donec sensim liquecant.

Aut dissolui etiam possunt in spiritu vini, in quo aliquid castorei antea infusum sit, vel in oxymel. scilicet in quo calam. aromat. & hyssop. ebullierint.

Vtile est & Castoreum sub lingua detinere.

℞. Nuc. moschat. Drach. i. castor. Drach. ii.

Cum succo salvia.

Fiant Pastilli lupinorum formâ, qui in ore detineantur.

His & similibus & antecedens in capite causa, & coniuncta in lingua tollitur.

Foris probantur vnguenta & inunctiones ex oleo vulpino, nardino, costino, & similibus. Stillicidium item ad partem posteriorem capitis & primas colli vertebrae, ascendendo vsque ad phœnigmos aut cauteria, ad primam vel secundam colli vertebrae, quæ diu aperta seruentur; vsus denique thermarum.

Si linguæ motus impeditur ob linguæ conuulsionem, ceruici medicamenta conuulsioni commoda apponantur.

Si motus linguæ sit impeditus vitio vinculi linguæ, id transuersim incidendum, vt, cap. quinto, dictum.

Si ob tumorem lingua moueri non possit, vel non rectè moueatur, is curandus vt antea etiam dictum.

DANIELIS  
SENNERTI  
D. ET MEDICINÆ  
PROFESSORIS.  
PRACTICÆ MEDICINÆ  
LIBER SECVNDVS.



Illustrissimo & Celsissimo Principi ac Dn.

**D. GEORGIO,**  
**LANDGRAVIO HASSIÆ,**  
**COMITI CATTIMELIBOCI, DECIAE,**  
**ZYGENHAYNÆ, ET NIDDÆ, &c.**

**DOMINO MEO CLEMENTISSIMO,**

*Salutem & Felicitatem perpetuam P.*



**C**OR vitæ principium & caloris innati fontem esse, idémque primum vivere, postremúmque mori, & reliquas corporis partes ex eo vitam haurire, nec actiones suas obire, nisi vitali calore & spiritu per arterias ab eo transmissio perfundantur, scholis Philosophorum & Medicorum notissimum est. Nam, ut Hippocrates, *lib. de corde*, eleganter scribit, *ἡ ψυχὴ ἀπὸ τοῦ ὁρμῶντος καὶ τοῦ θερμῶντος, καὶ οἱ πνεύματα ἐν ταύτῃ εἰσὶν ὡς ἐν πύλῃ, καὶ ἐκ τῆς πύλης ἐκέρχονται εἰς τὰ μέλη, καὶ ἐκ τῶν μελών ἐκέρχονται εἰς τὰς ἀρτηρίας, καὶ ἐκ τῶν ἀρτηρίων εἰς τὰς φλέβας, καὶ ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς πόδας, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ διακινεῖ τὰ μέλη, καὶ τὰ μέλη τὴν ψυχὴν.* *Hi sunt natura humanae fontes, hincque flumina excurrunt, quibus corporis nostri tabernaculum irrigatur. Atque hac vitam homini conferunt, & si exsiccata fuerint, homo perit.* Et Galen. *6. de usu part. cap. 7.* *ἡ καρδία τῆς ἐμψύχου θηρίας, ἥ δὲ τοιοῦται τὸ ζῶον, οἷον ἐστὶν ἡς ἐστὶ καὶ τῆς ψυχῆς.* Cor caloris nativi, quo animal regitur, quasi fons quidam & focus est. Nimirum quod Sol est in maiore mundo, id cor est in minore. Ut enim Sol lumine suo vniuersum mundum illustrat atque exhilarat, & calore suo omnia viuificat, ac fouet: ita Cor calore suo & vitali spiritu totum corpus viuum & vegetum reddit, idque fouet, conseruat, spiritusque vitales, tanquam radij quidam ætherei & viuifici, à corde in vniuersum corpus dimanant. Et, ut Aristot. *3. de part. animal. cap. 7.* scribit: *Cor est οἷον ἐστὶα, ἐν ᾧ καίεται τῆς φύσεως τὸ ζῶον, quasi focus, quo natura fomites & primordia ignis nativi continentur.* Ac propterea etiam, ut, eodem in loco, Aristot. scriptum reliquit, locum suum *ὡς πύλη ἀνθρώπου τὸ σῶμα, veluti arcem corporis* occupat. Conditor enim rerum sapientissimus ipsi in thorace, media corporis regione, qui maxima ex parte offeus est, locum dedit, atque antè sternum, à tergo spinam dorsi quasi munimenti loco constituit, quibus ex latere utroque costas securitatis gratia adiunxit. Imò in dorso omoplatas seu scapulas, quas Celsus scoptula operta nominat, quasi scuta cordis, apposuit. Intus verò cor totum pulmonibus cinxit, quibus non solum tanquam puluino incumbit, (vnde etiam Auicennas pulmones cordis culcitram vocauit) sed qui etiam respirationis organa sunt, quo calidum, quod in corde est, conseruatur. Atque si hæ omnes corporis partes saluæ sunt, œconomia etiam corporis rectè administratur, & sicut in regno, cuius Princeps, cum iis, qui à secretis ipsi sunt consiliis & primariis administrationibus, valet & floret, omnia rectè atque ordine fiunt & administrantur: ita etiam, dum Cor in sua regione bene sese habet, calorem viuificum in omnia membra diffundit, eaque fouet; *πάντα φύεται, καὶ λάμπει χαρίτων ἕνεκα, omnia florent, & fulget* *ver Gratiarum*, ut est in antiquo Ariphronis Sicyonij hymno; nisi pars aliqua priuato vitio teneatur: quod ipsum tamen faciliùs toleratur, si cor hilaritatis auram adspiret. Contra verò, sicut, dum Rex ægrotat & de salute periclitatur, omnes subditi in mœrorem & squalorem coniiciuntur: ita etiam, corde male affecto, totius corporis salus simul in discrimen coniicitur; id quod non solum in lipothymia & syncope, sed & in respiratione læsa accidit, atque ubi illa caloris in corde ventilatio necessaria cessat, aëre, quem spiritu ducimus, denegato, homo in præsentissimum vitæ discrimen coniicitur, ut in iis, qui angina laborant, vel quibus à re aliqua in orificium asperæ arteriæ illapsa spiritus intercluditur, aut qui laqueo strangulantur,

vel

vel aqua aut carbonum fumo suffocantur, manifestum est.

Cum ergo libro primo Practicæ, quem anno superiore edidi, Capitis præter naturam affectionem complexus sim, secundo hoc libro morbos ac symptomata Cordis, & reliquarum thoracis, partium, quæ gratiâ cordis inprimis factæ sunt, complecti liber.

Ut verò Illustrissimo nomini tuo, *Princeps Celsissime*, hoc quicquid est operis inscriberem, causas, ut opinor, non leues habui. Primò enim satis superque notus est Illustriss. Celsit. T. erga bonas literas amor, & earum cultores incredibilis benevolentia, quam cum alia manifesta faciunt, tum id, quod insigni & Principe digna benignitate ac liberalitate Academiam Marpurgensem, bonarum literarum, virtutis & pietatis officinam Illustrrem, alit, fouet ac tueatur. Eum ergo Illustriss. T. Celsitudinis in bonas literas affectum etiam hanc qualicumque Dedicatione posteris notum facere & commendare volui. Deinde quia scripta mea omnia iure quodam illustrissimæ Domui Saxonicæ, utpote in Electorali Saxonica Academia nata, debentur; cum ea verò Illustrissimæ Domui Hassiacæ à multis annis fœderis sanctione contracta necessitudo, & Illustriss. T. Celsit. inprimis arctâ intercedit cognatio & affinitas: hoc opus iure Illustriss. T. Celsitud. deberi existimo.

Accipe ergo, *Princeps Illustrissime*, hoc quicquid est operis Medici, vultu beneuolo & fronte serena, atque eo affectu, quo alias bonarum litterarum cultores, & qui quocunque modo ad Illustrissimam Domum Saxonicam spectant, complecti soles, & meis conatibus faue. DEVS ter. Opt. Max. Illustriss. T. Cels. saluam, incolumem, & omni ex parte beatam, felicemque præstet, ac tueatur. VVittebergæ, Cal. Augusti, Anno Christi 1629.

*Illustriss. Tua Celsitud.*

Subjectissimus

DANIEL SENNERTVS D. Sereniss. Elect. Saxon.  
Medicus, & Facultatis Medicæ ibid. Professor ac Senior.



# LIBER SECVNDVS,

## PARS PRIMA,

DE ORIS AC FAUCIVM ET PARTIVM IN IIS  
contentarum aegritudinibus,

P R O O E M I V M.

**I**NTRA cranium & pectus, os, fauces, & collum interiacent. Os Gracis *Στὴν*, dicitur tota illa cavitatis, inter labia & buccas, ac initium gula & aspera arteria contenta. Et proinde ad os pertinent Labia, Lingua, Dentes, Gingiva, Maxilla, Columella, Tonsilla, Fauces, quæ sunt illa oris extrema pars, unde gula & aspera arteria incipiunt. Itaque postquam morbos & symptomata, quæ Capiti & Cerebro, ac Sensuum externorum organis accidunt, explicauimus, antequam ad aegritudines Pectoris accedamus, ordo postulare videtur, ut de harum partium vitiis agamus.

Dicendum ergo de Labiorum tumoribus, fissuris, & ulceribus, de Labiis malè conformatis & curtis, de Oscitatione, de Labiorum tremore, de eorundem convulsione seu spasmus cynico, de Ptyalismo, de Lingua asperitate, magnitudine nimia, inflammatione & tumore, de Lingua fissuris, vulneribus, combustione, de Ranula sub Lingua, de Lingua motu laeso, de Dentium corrosione & carie, vacillatione, ordine & numero vitioso, de dolore Dentium, de stupore, de colore eorundem vitioso, de Gingivarum

inflammatione, excrecentiâ, cruentatione, putredine, carnis diminutione, ulceribus, de Maxillarum vitiis, de Oris ulceribus, de Oris fœtore, de Columella laxitate, de inflammatione eiusdem, de ulceribus Columella, de absorptione & erosionem eiusdem, de Tonsillarum tumoribus & inflammatione, de earundem ulceribus, de iis quæ Fauces & Gutturum præter naturam inhaerent, extrahendis, de Angina, & Colli vitiis.

### CAPVT I.

*De Labiorum tumoribus.*

**L**abiorum vsus multiplex est. Primò enim os claudunt, ut per nares solum nisi aliud necessitas postulet, fiat respiratio, ac ne, si illud perpetuò, ubi semel, propter cibum vel potum sumendum, vel respiratio nem aperire necesse est, hians ac dilatatum maneret, omnis generis corpuscula, muscas, paleas, puluerem admittat, atque etiam dentes & gingivæ frigore ventis-  
Labiorum  
vsus.



etque ledantur. Præterea ad formandum sermonem sunt utilia, præcipue ad offerendas literas Labiales, ita dictas, quod ad earum prolationem labia maxime sunt necessaria. Seruiunt etiã ad potus faciliorem assumptionem, neque sine iis potus comode assumi posset. Utilia quoque sunt ad cibum in ore continendum iis, qui molaribus dentibus destituti, incisoriis tantum masticare coguntur. Faciunt etiam labia ad salivam ex ore eiciendam, ut & in ore detinendam, ne illa continuo ex ore profluere, & insignem turpitudinem pareret. Utilia sunt & ad sonos variandos tubicinibus, infantibus item ad sugendum. Tandem per se ad ornatum multum faciunt. Monstruosus enim omnino esset homo, si detuncatis labiis rictum irati canis ostenderet. Contra homo si labia lenia, rubicunda, magnitudine moderata, os debito modo claudencia obtineat, insignis inde gratia & ornamentum ipsi conciliatur.

Atque hæc omnia præstant labia, si naturalem suam conformationem habeant; præstare verò non possunt, si eam amittant, & vitia aliqua contrahant: de quibus iam dicendum.

Et quidem primò de labiorum Tumoribus & Magnitudine aucta dicemus. Nam primò nonnunquam labia nimis crassa & magna sunt. Et quidem in quibusdam labrum superius est magnum & crassum, & duplo sæpe maius; unde non tantum deformitas oritur, verum etiam vox & sermo aliquantum vitatur, aerisque efflatio quadantenus impeditur. Quibusdam verò labium inferius est nimis crassum, & quasi pendulum. Verum hæc vitia, cum naturalia sunt, corrigi non possunt.

Deinde interdum labia præter naturam intumescunt, quod fit ab apum, vel parum, muscarum venenatarum ictibus. Et tum decocto althææ cum aceto vel lacte fouenda, aut succus plantaginis imponendus, vel etiam, ratione veneni, theriaca illinenda. Interdum etiam intumescunt post hausta venena; & tum cura ad venenum dirigenda. Refert etiam Guilielmus Fabricius, *cent. 4. obs. 36.* cuidam Doctori, cum fungos manibus tractasset, & iis illotis postea labia attigisset, ea supra modum intumuisse, sed aqua Stapediana, quæ in Tract. nostro de Febribus, *capite de peste*, descripta existat, apposita conualuisse. Ex quo patet, in simili casu & alia alexipharmaca adhiberi posse.

Tertiò interdum etiam inflammantur ex iisdem causis, à quibus aliæ partes; ex contusione, & humorum affluxu. Et curatio etiam, ut in aliis partibus, instituenda. Talia tamen medicamenta usurpanda, quæ in oris inflammatione adhiberi possunt.

Quartò vidi etiam Tumorem durum, ad modum steatomatis, in labio inferiore cuiusdam Nobilis, qui eum nec diicuri, nec ad suppurationem duci posset, sectione feliciter curatus est.

Quintò quandoque & Cancer labia occupat. Qui quas causas habeat, & quomodo curetur, è doctrina de Cancro in genere petendum.

Sextò Iunenem quendam, qui ex Lue Venerea labia ulcerata, inflata, subnigra, tumida, carcinomatis instar, habuit, Forestus, *lib. 14. obs. 2.* curavit vniuersalibus ad morbum Venereum, & hoc decocto, panno eo imbuto labiis appposito;

*℞. Ligni Guaiaci P. ij.*

Bulliant in *aq. solani*. Deinde colentur.

Add. *aluminis* Drach. j. Iterumque semel ebulliant & colentur.

Septimo interdum Tumores aridi labia occupant. Ita in Oentadis Phœnici, & Andree, fratribus, mala altera intumuit, & labium, quod ex anteriore parte mala & oculo respondet, neque quicquam intro spectanti comparebat, neque foris ullam puris significationem edebat, sed, arida putredine intumescens, marcescebat, & mortuus est. Eadem quoque alteri contigerunt.

Mortuus autem est & hic die septimo, neque epotum medicamentum quicquam profuit. Phœnici verò putredo in circulum electa est, & vlcus ante mortem magna ex parte repurgatum fuit. Sed & hic mortuus, cum diu vitam traxisset. Hippocrates, *5. epid. sect. 4. in codice Foesij.*

Tumores autem isti ubi exulcerantur, ad caput de vlceribus pertinent.

## CAPVT II.

## De Labiorum Fissuris.

Utis carni in labris connexa est tanta tenuitate, tantã subtilitate ac teneritate, ut, nisi labiis laceratis, cutem ab iis separare non possimus. Ac proinde labia, cum sint tam tenera, mollia ac subtilia, facile à causis externis, ventis, frigore, ut & internis, humoribus & vaporibus, vitiantur, finduntur, & scinduntur, ut interdum etiam sanguinem fundant. Et quidem nonnullis sæpissime finditur labium inferius in medio, ubi duæ musculorum extremitates desinunt. Græci hoc vitium *παρ' ὅρας*, Latini Fissuras & Scissuras labiorum nominant. Partis enim affectæ nomen commodè additur. Aliàs enim vocabulum hoc commune est, & non tantum labiis competit, sed & cuti, ano, utero. Estque morbus in soluta continuitate Labiorum.

## Causa.

Causa proxima est siccitas nimia. Atque ita scissura labiorum est continuitas eorum soluta à nimia siccitate, & tensione.

Siccitatem autem hanc inducunt vel causæ externæ, frigus videlicet & calor, & præcipue ventorum, inprimisque Boreæ, flatus; venena item, ut catarthides, ephemerum, colchicum, ut habet Nicander. Pertinet huc & lac calidius, quod infantes fugunt: vel internæ, vapores calidi & sicci, falsi ac acres, per œsophagum, vel asperam arteriam ex partibus inferioribus ascendentes, vel humores à capite ad labia destillantes. Vapores autem illi nunc ex ventriculo, nunc ex intestinis, nunc ex pulmonibus, nunc ex hepate & venis, nunc ex corde ascendunt, imò & ex utero: & solet ista ex vaporibus labiorum, præcipue inferioris, fissura sceminis salacioribus ob veteri siccitatem esse similis. Ut enim linguæ valde resiccantur ex atra fuligine & utero, ut habet Hippocrates, *6. epid. sect. 5. r. 13.* ita & labia ob eadem causam, propter communem tunicam. Tandem etiam infantibus labia interdum finduntur, ob mammarum, quas sugunt, duritiem.

## Differentia.

Scissura labiorum differunt nunc ratione quantitatis, & aliæ sunt maiores, aliæ minores; aliæ plures numero, aliæ pauciores: nunc ratione subiecti quod aliæ solum vnum, aliæ utrumque labium occupant.

## Signa Diagnostica.

Affectus ipse per se oculis patet. Causæ verò signis cognoscenda. Si externæ illæ sunt, id ex ægri relatione cognoscitur: quæ si absuerint, causarum internarum id indicium est.

Et quidem si à vapore fissura accidant, sine pruritu, (neque enim vapores ita inhaerent, ut humores) sine ardore, sine multa duritie sunt, neque adeo frequentes, neque profundæ. Quæ verò ex humoribus calidis est fissura, cum pruritu est, & profundior. Et si humor à capite ad labia fluat, id etiam sensibus manifestum est.

## Progn.

## Prognostica.

- Prognostica.** 1. Labiorum fissuræ non planè negligendæ. Nam & turpitudinem quandam pariunt, & si diu durent, in vlceræ crustosa, callosa, & difficulter curabilia degenerant.
2. Rhagades à natiuitate contractæ non curantur reliquæ non ita difficulter; nisi ad cancerosam naturam degenerent.

## Indicationes.

- Indicationes.** Siccitas nimia corrigenda est humectantibus, & labiorum soluta vnitas vnienda. Causæ verò, à quibus hæc pendent, tollendæ. Causæ igitur externæ, si adhuc adsint, amouendæ. Si vitiosi humores adsint, euacuandi. Si vapores causa sint, illi quoque tollendi, & hepatis, vterò, vel etiam toti corpori, vnde illi proueniunt, succurrendum.

## Curatio.

- Curatio fissuræ à frigore.** Si ergo à frigore externo sit fissura, solo Vnguento pomato albo labia inungere sufficit; vel paretur tale Linimentum.

℞. Pinguet. gallin. ℥.ij. cera alba ℥.ij. Abluantur. sæpe aqua rosarum.

F. Linimentum.

Vtile est & oleum ceræ ac thuris.

Auicennas pinguedines, adipēs ac medullas cum oleo rosaceo & cera miscet, & adhibet. Sint tamen pinguedines recentes. Si enim sint vetustæ ac rancidæ, atque acredinem acquisierint, potius nocent, quàm profunt. Idem pelliculas ouorum & arundinum applicat.

**À causa calida.** Si à causa calida & sicca sint fissuræ, lineæ tenera succo semperniui & solani madida imponantur.

Vel ℞. Amyli, sacch. penid. Canariensis, conf. ros. an. Drach. ℞. Misc.

Vtilis est etiam mucilago gummi cerasorum cum aqua ros. extracta.

Si verò fissuræ altius penetrent, adeps anserinus & caponis, aut medulla crurum bubulorum cum semperniuo & terebinthina adhibeatur.

Vel ℞. Mucilag. sem. cydon. Ol. mastich. an. ℥.j. adipis gallinæ, medulla pedum vituli an. ℥.℞. vini albi subdulcis parum. Cum cera fiat Vnguentum, vel Ceratum molle.

Vel ℞. Pulv. anther. rosar. q. v. Cum mucilag. tragacanth. F. Linimentum.

Vel ℞. Sacch. penid. mucilag. tragacanth. aqua rosar. extracta q. s. Misc.

Potest & aliquid amyli addi.

Vel ℞. Terebinth. butyri sine sale, an. q. v. pulueris macis parum. Misc.

Vel ℞. Ol. macis destillat. ℥.j. pulv. nuc. mosch. Scr. ℞. mell. rosar. ℥.℞. Misc.

Vtilis est & tragacantha aqua rosar. dissoluta, amyloque mista, & illita: vel cum cera virginea, melle, & oleo communi fiat Vnguentum.

Vel ℞. Ol. rosar. ℥.℞. amygd. dulc. Drach. ij. butyri sine sale aqua ros. loti Drach. iij. terebinth. ℥.ij. pinguet. capon. Drach. j. ℞. mellis Drach. iij. succini ℥.j. ceruss. ℥.ij. cera alba q. s.

F. Vnguentum.

In omni causa vtile est, labium introuertere, & linguam humectare, maxime si mastiche, & alia idonea medicamenta prius masticata fuerint.

De seminis hyoscyami fumo vide caput sequens in fine. Vide & Aetium, retrah. 2. serm. 4. cap. 18.

## CAPVT III

## De labiorum Ulceribus.

**N**onnunquam & Vlceræ labia occupant crustosa, sæpe etiam manantia, quæ ortum habent ab humoribus acerbis, siue tales sint naturæ suæ, quales sunt biliosi & serosi, siue ex aduersione & putredine, vel acris humoris admistione, quo modo & humores pituitosi & melancholici, & sanguis, acres fieri possunt.

Atque talia vlceræ sæpe per modum crileos in febribus tertianis & acutis & malignis contingunt, & febris solutionem indicant. Sæpe etiam absque crisi ab humoribus vitiosis ex reliquo corpore eò protrusis ortum habent. Sæpe quoque in morbo Gallico proueniunt. Ita & in peste nonnullis labia exulcerantur, 3. epid. sect. 3. Causa etiam esse potest contritio & contusio musculi labij. Pertinent huc & venena, vt arsenicum, & similia vrentia, quæ etiam labia exulcerant.

## Signa Diagnostica.

Et quidem talia vlceræ oculis obuia sunt; causæ verò signis inuestigandæ. Si per erisim accidunt, febris adest. Si à morbo Gallico, is etiam suis signis se prodit. Si & febris & morbi Gallici signa absunt, è latente in corpore cacochymia proueniunt.

## Prognostica.

1. Vlceræ labiorum, quæ in febribus accidunt, plerumque bonum signum sunt, & febris vel perfectam solutionem, vel imminutionem significant, & per se facillè sanantur; si scilicet cum signis coctionis appareant. Hippocrates, 6. epid. sect. 8. r. 4. Alioquin, si cum viribus debilibus, & aliis malis signis, os, & labia exulcerentur, lethale; vt in Hermoptolemi vxore, 7. epid. sect. 13.

2. Difficiliora curari sunt & peiora, quæ à morbo Gallico proueniunt.

## Curatio.

Quæ in febribus fiunt, vlceræ labiorum, facile per se sanantur; quæ à lue Venerea ortum habent, quomodo curanda sint, è curatione morbi Gallici patet; & talium vlcerum curarum exemplum habetur apud Forestum, lib. 14. obseru. 2. Si sine febre & morbo Gallico talia vlceræ orientur, vniuersalibus præmissis tale adhibeatur Vnguentum.

℞. Lithargyr. rament. plumbi. hyoscyami albi an. q. v. ol. rosar. cera, an. q. ℞.

Misce in mortario plumbeo, Fiat Linimentum.

Vel ℞. Vnguenti rosati Mesuæ ℥.j. linimenti ex litharg. Vnc. ℞. M.

Vel ℞. Rosar. rubrar. mastich. an. ℥.j. plumbi vsti ℥.℞. F. Pulvis. Adde terebinth. mellis, an. q. ℞. F. Linimentum.

Applicantur autem medicamenta commodissime somni tempore Ita enim rectius retinentur.

Ioh. Baptist. Porta semina hyoscyami prunis iniicit, & fumum per infundibulum papyraceum excipere iubet. Illico enim euanescente tumorem, scribit, & glutinari fissuras nunquam amplius redituras.

## Diata.

Vitet æger cibos salios, acres, aromata, fermonem Diata multum.

## Cancer.

Pertinet huc & Cancer Labiorum, cuius generatio

&

& curatio è generali de Cancro doctrina patet. Paræus tamen, *lib. 6. cap. 29.* peculiarem curandi rationem tradit. Cancrum suis vtrinque sursum ad deorsum labiis acu filum ducente transigere iubet, vt fili beneficio cancrum tanquam in manu sinistra regere & tenere liceat, totum manu dextra voluclis vnico ictu amputare possis: ita tamen, vt labri ipsius interior quædam, quæ dentes contingit, restet substantia, (modò non ad intima vsque cancer radices agat) quæ regeneranda mox carni, & implenda cavitati, pro fundamento & basi esse queat. Hinc sanguine sufficiens effuso, vulneris oræ, dextra & sinistra, interna & externa parte scarificatu profundiore erunt nouacula pertundenda, vt cum mox sutura ex acu filum ducente, rostris leporinis propria, in vnum adducere vulneris oras ipsas & margines voluerimus, ipsam labri carnem magis sequacem, & trahenti acui filoque obsequentiorem habeamus. Reliquum curationis eodem planè modo prosequendum, quo in rostris leporinis.

## CAPVT IV.

## De Labiis Vulneratis, Leporinis, &amp; Curtis.

Vulnera labiorum.

**V**ulnera Labiorum ob sermonem & locutionem, qua partes vulneratæ coniunctæ dirimuntur, & saluam (de qua postea in quæstione) qua humectantur, tardius curantur.

Labia si vulnerentur absque carnis amissione, suenda si opus: vel aliàs, & diligenter coniungenda sunt, vt deformitas omnis vitetur; & medicamenta glutinantia extra imponenda. Ab interna verò parte mel rosaceum, & syrupus de rosis siccis sæpe illinendus.

Si autem carnis aliquid amissum sit, digerendo, detergendo, carne replendo, & tandem consolidando, vt aliarum partium vulnera, labiorum vulnera curantur.

## QVÆSTIO

## An salua conglutinationem vulnerum labiorum remoretur.

An salua conglutinationem vulnerum labiorum remoretur.

Plerique Practici id statuunt. Nicol. Glandorpius verò, in *speculo Chirurg. obs. 17.* id saltem concedit in homine malè temperato, vel lue Gallica affecto, vel aliquo morbo salso laborante: in sano verò id negat: in quo potius abstergat, & mundificet vulnus salua.

Cui etiam libenter assentimur, cum videamus, scabiem, serpigines, & similia mala, ieiuni hominis saluâ, sanari, & proinde eam abstergendi & mundificandi vim habere. Hoc tamen cauendum, ne nimium vlus saluâ humectetur. Quæ enim glutinari debent, non humida, sed sicca esse debent.

## Labia Leporina

Labia leporina.

Si autem labia ob vitiosam conformationem non cohæreant, Labia Leporina, nonnullis Rostra leporina, German. *Hafenschart*, nominantur, habentque causam plerumque imaginationem matris, quæ vel leporem, vel alium hoc malo laborantem adspexit. Aliam tamen etiam huius rei causam refert Olaus Magnus, dum, *lib. 18. cap. 12.* scribit, vnam infelicitatem plerumque mulieres Aquilonares vterum gerendo incurrere, vt vel esu, vel saltu super caput leporis facto, pariant, infantulos oris leporini, inter os & nares diuisa labra perpetuò retinentes, nisi statim à principio assuant particulam pectoris tenerissimi pulli adhuc sanguinolenti. Verum ex opinione vulgi hoc scriptum puto.

Dan. Sennerti Tom. II.

Præcipua verò curandi ratio à Chirurgia pendet. Perficitur autem illa 1. diffitorum & hiantium labiorum excoaratione. 2. Labiorum iam excoaratorum coniunctione & suturâ; quæ vbi facta sunt, reliqua naturæ, vt in aliis vulneribus, committenda; ita tamen, vt aliàs fieri solet, vt vnguentis & emplastris ad vulnera conglutinanda idoneis naturæ succurratur.

## Labia Curta.

Curta verò labia qua ratione curanda sint, in *Instit. lib. 5. p. 1. f. 2. c. 14.* dictum, quibus tamen vt quædam addamus, duplex curandi curta labia ratio est; vna fucata, altera vera. Fucata descripsit Ioh. Thom. Minadous de *humani corporis turpitudinibus*, *lib. 3. c. 40.* Is, dum Damasci in Syria esset, Mercatorem quendam pannorum sericorum vidit, qui labrum superius factitium habebat, quod, dum domi esset, vel edere vel bibere vellet, deponere, & domicum turpitudine ista viuere solebat, foris autem labrum factitium adaptabat, hoc modo: Foramina ille carni sub naso reliquæ, obducta iam dura cicatrice, sibi parari curauerat, qualia nonnulli in auribus ad gemmas vel annulos gestandos fieri curant, quibus crebris vinculis portionem larvæ ad labri deficientis magnitudinem & figuram conformatam adaptabat, cui ex humanæ barbæ pilis mistacè gûmi tragacanthæ agglutinauerat.

Veram autem curandi curta labia rationem Galenus *lib. 14. M. M. cap. 16. & 17.* tradit, & post eum Paulus Aegineta, *lib. 6. c. 26.* Cornelius Cellus, *lib. 7. cap. 9.* Diligentius tamen eam Recentiores, & imprimis Caspar Taliacotius, in *libello de Curtorum chirurgia*, tradiderunt. Vereres equidem non aliunde propaginem in curta inferendam petebant, sed è proximis cuti partibus, cute excisâ & carne aucta. At Taliacotius non solum è vicinis, sed & remotis partibus propaginem perit, qui *allegato loco*, videatur.

## CAPVT V.

## De Tremore &amp; Perversione labiorum, Sanguinis fluxu ex iis, &amp; Labiis Linidis.

**P**ræter enumeratos morbos etiam quædam symptomata labiis & ori accidunt; Labiis quidem Tremor & Perversion, Color eorum mutatus & Sanguinis ex iis fluxus; Ori verò Apertio læsa, Tortura, & Ptyalismus; seu crebra sputatio; de quibus iam dicemus.

Et primò quidem Tremunt interdum labia: id quod *Labiorum tremor.* accidit in ira & metu, interdum etiam ex nervorum debilitate, sicut Francisco Viario, Veneto, labium semper, dum loqueretur, tremuisse scribit Alex. Benedictus, *lib. 5. c. 18.* Tremunt & in nausea labium inferius, vel ex humore mordaci, vel ex oris stomachi nimia agitatione, ob consensum, qui hisce partibus per communionem membranarum intercedit.

Itaque cum labium inferius tremunt, nisi ab ira vel metu sit, vomitum plerumque prælagit, teste Galeno, *3. de Crisibus, cap. 11.*

Interdum etiam in cerebri aliquâ magnâ affectione labiorum tremor accidit. Ibi tenuior victus prodest; hic quæ cerebro & occipiti aliàs in nervorum affectibus adhibentur, conferunt.

Tremunt interdum etiam labia in summo frigore, cum dentium stridore: item à vermibus, vt seni illi *9. epid.* cui furiosum quiddam latens inerat.

Videtur interdum etiam motus quidam quasi convulsivus adesse, vt in Cydis filio, *7. epid. sect. 7.* de quo Hippocrates: *sine conatu semiperfecta loquebatur, & os solutum, & maxilla ac labia semper in motu erant quasi qui loqui cuperet.*

GG g

Pertinet

Labiorum peruersio.

Pertinet huc & labiorum Peruersio, de qua. Hippocrates, 4. aph. 49. In febribus non intercurrentibus si labium, aut palpebra, aut supercilium, aut oculus, aut nasus peruertatur, si non videat, si non audiat, debili iam existente corpore, quicquid horum acciderit, mors in propinquo est. Idem aphorismus habetur, prognost. 1. 2.

Causa.

Causa proxima huius symptomatis est affectio nervorum tertiæ coniugationis. Fit verò ista cerebro graviter affecto, propterea malum hoc in febribus continuis, & ubi ex peculiari organorum vitio accidit, viribusque iam debilibus, lethale signum est. Si verò virtus valida existat, eadem symptomata interdum sine periculo apparent, in criticis scilicet perturbationibus per *metastasis* materiæ ad caput: unde &, 2. Coac. habetur, labium contractum alui biliosæ eruptionem significare.

Fluxus sanguinis à labiis.

Interdum & sanguis à labiis effluit; quod in scorbuticis quandoque euenit, cum humores acres, serosi & salii labia erodunt, & naturam ad excretionem stimulant. Idem interdum in fissuris labiorum accidit.

Labia livida.

Tandem etiam labiorum color mutatur, livida plerumque fiunt; quod accidit in elephantiasi, morbo Gallico, qui color curato illo morbo cessat. Interdum etiam in febribus continuis fiunt labra livida: quod signum lethale est, 2. Coac. & caloris nativi extinctionem significat.

## CAPVT VI.

## De oris Apertione læsa.

Oris apertio læsa.

**A**que hi sunt morbi & symptomata, quæ labiis solis accidunt. Sunt verò & alia quedam vitia, quæ iis quidem etiam contingunt, non tamen solis, sed simul affectis vicinis partibus, inprimis musculis maxillarum & faciei. Qualia sunt Oris apertio vel ablata, vel imminuta, Olficatio, Oris tortura, Pryalismus: quæ propterea subiungemus.

Causa.

Et primò quidem Oris clausuram seu apertionem denegatam quod attinet, aperire homines os nequeunt ob distentionem cervicis ex vulnere nervorum, quia maxillæ veluti ossa rigescunt. Hippocrates, lib. de diebus indicatoriis. Ita Phœnici apud Hippocratem, lib. 5. epid. posteriorum colli vertebrarum contentio aderat, ac circum dentes durities, quos distentus diducere conabatur. De eodem, 7. epid. inquit: Quod si caput commouere, aut dentes aperire conaretur, non poterat, utpote admodum distentus.

Secundò, quando oris cardo, in quo gena vertitur, obrigescit, atque os strictius connuet, quò minus in actu queat expandi, squalido terrenoque humore in iuncturam illam & huius vincula altius imbibito. Id quod scorbuticis interdum accidit, ut, de Scorbuto, lib. 3. p. 5. s. 1. c. 4. dicitur.

Tertiò propter maxillam inferiorem adnatam capiti. Id quòd rarius est, quòd tamen Columbus, c. 15. de re anat. refert, dum scribit, in summi Pontificis penu esse caput gigantis, in quo maxilla inferior capiti aded adnata & coniuncta est, ut omni motu prorsus careat atque in viuento non potuerit.

Quartò, propter tumores circa iuncturam maxillarum: id quòd sæpe in inflammationibus maxillæ & tonsillarum accidit, ob quas os diduci non potest.

Signa &amp; curatio.

Signa causarum, ut & curatio, patet ex signis & curatione morborum modò enumeratorum, ob quos os aperiri non carere non potest.

Oris hians.

Contra interdum Os nimium hiat: id quòd sæpe fit in febribus ardentibus, ob vapores calidissimos ex inferioribus adscendentes. Idem fit ob luxationem maxillæ inferioris, de qua postea dicitur. In lethargo etiam oblata memoriam os claudere ægri obliuiscuntur. Si nares etiam obstructæ sunt, os apertum ægri seruant,

quòd copiosorem aërem attrahant. Idem fit in tumoribus faucium internis & angina. Nonnulli & ex malâ consuetudine os hians perpetuò seruant.

Affectus autem iste per se patet. Causæ verò è signis quæ è suis locis petenda, cognoscuntur.

Prognostica etiam inde petenda. In febribus autem acutis faucium sine tumore dolores & pusilli & strangulantes, & cum os hiat, nec promptè adduci & claudi potest, mentis amotionem portendi oportet, 1. Proverb. 11.

Curatio pender à causarum, à quibus hoc vitium prouenit, remotione.

## CAPVT VII.

## De Olficatione.

**P**eculiaris verò oris præter naturam apertionis species est Olficatio, Gellio, lib. 4. cap. 20. Olficatio. Est autem Olficatio vehemens oris diductio, ab halituosis vaporibus, in spatiis musculorum maxillæ inferioris & buccarum collectis, vel infra ascendentes, & copiâ, potius, quàm acrimonia, naturam ad excretionem stimulantibus, operantibus simul & concurrentibus musculis thoracis: unde pandiculationes sæpissime comites. Hinc & Hippocratis, de præf. Medicin. scribit, si pransi fuerint, quibus prandere non conducit, illi continuò graues, totoque corpore & mente lægnes euadunt, cum olficatione, somnolentia, multaque siti. Cum autem per istam vehementem diductionem auris meatus nonnihil comprimatur, ut aërem non satis admittat, hinc olficientes minus distinctè audiunt: quamuis forsan & propter nervorum compressionem id fieri possit. Videtur tamen adhuc alius esse olficationis modus, cum nimium aperto admodumque diducto ore aër primò affatim hauritur rursusque efflatur cum sono quodam, de quo Hippocrates, in libro de flatibus, scribit, quod olficationes febres prædicant, cum magna copia coaceruatus aër fuerit, conferimque ad superiora erumpens, tanquam machinatione aliqua os diducit, quòd hâc ei facilius exitus pateat. Accidit interdum etiam olficatio ab imaginatione, si quis alios olficientes videat. Facilius tamen id accidit pigris, & quibus vapores aliqui in musculis illis hærent, quàm aliis. Olficatio etiam crebra est in lethargo, ita, ut os claudere ægri obliuiscantur.

## Signa Diagnostica.

Affectus ipse per se patet, & causæ eius quoque faciliè innotescunt.

## Prognostica.

1. Olficatio si citra occasionem sit frequentior, prælagit morbos, & febrium incipientium præludium est. Citra verò morbos pigritiæ signum est, vel ex imaginatione proficiscitur. Vnde puniebat olim, si quis in iudicio clarè nimium & sonore olficeret, tanquam illud indicium vagi animi foret, & hallucinantis, ac fluxæ arque apertæ securitatis. Gellius, lib. 4. Noct. Attic. c. ult.

2. Ex nimia olficatione maxilla inferior luxari potest.

3. Olficatio in enixu lethale est; sicut sternuile à coitu, abortinum. Gellius, lib. 3. Noct. Attic. c. 16.

## Curatio.

Itaque cum olficatio nihil noceat, nisi forsan ex nimia oris diductione luxatio maxillæ accidat, sed potius iuuat, ipsa per se nullam curationem requirit, sed potius, ut morbo, quem prælagit, occurratur, admonet. Quia



Quia tamen ex nimia oscitatione & oris diductione maxilla inferior luxari potest, reprimenda est nimia oris diductio, quæ aliàs etiam inciuis habetur. Idque fit, si vinum cum pari portione aquæ exhibeatur, quod materiam importunè euaporantem discutit, modo corpus sit purum & sine febre, vt est apud Hippocratem, 7. aph. 56. & 3. epid. sect. 7. Assiduorum etiam oscitationum longam spirationem medelam esse, scribit Hippocrates, 6. epid. sect. 2. aph. 9. Auicennas masticationem acori commendat.

## CAPVT VIII.

### De oris Distortione.

*Oris distortio.* Cynicus spasmus Græcis à distortionis figura, quæ rictum iratorum canum exprimit, appellationem habet. Cello, lib. 4. c. 2. oris distortio, vulgò Tortura oris dicitur, & quidem rectius. Neque enim semper à spasmo est ista oris distortio. Interdum & risus Sardonijs nominatur, ab herba Sardoia, quæ est species Ranunculi, in Sardinia proueniens, & Apium risus dicitur, quæ vespertibus ora similiter rictu diducit, vt ridentium facie intereant.

### Causa.

*Causa.* Causas istius affectionis Aërius in paralyfin musculorum *μαστική*, siue mandibularum, refert, & Galenus, 4. de loc. affect. c. 2. à paralyfi neruorum & musculorum faciei hoc malum existere affirmat. In 3. de loc. affect. cap. 6. etiam conuulsionis meminit, dum labra sæpe numero conuelli scribit, item oculos, frontis cutem, totas mandibulas, & linguæ radicem; quod in Tortura oris etiam accidere solet.

Iraque Spasmus Cynicus, vel potius Oris Tortura, est deprauata oris & faciei figura, orta vel à conuulsione, vel à resolutione musculorum faciei, vnde in obliquum distorquetur os, nasus, vel oculus; & in summa dimidia plerumque faciei pars afficitur in hoc malo, vel dextra, vel sinistra, aliquibus verò omnibus sui partibus. Etsi verò aliquando tota facies distorta apparet: dicitur tamen Oris distortio, quoniam manifestius deprauatio illa figuræ in ea faciei parteprehenditur, quæ labiorum ambitu est circumscripta.

*Oris tortura quid.* Si tamen accuratè rem æstimare velimus, distinguendum esse videtur inter Oris torturam & Spasmodum Cynicum. Hinc Platerus Oris torturam appellat, quando oris parte deorsum tendente, vel sursum tractâ, os obliquum & intortum, vt in plorantibus apparere solet, redditur, siue id fiat ex paralyfi, siue conuulsione. Quod si verò in vtroque latere labia cum buccis simul contrahantur, tum os transversim diductum, veluti in ridentibus hominibus, vel in canibus, cum irati ringuntur & hiant, conspici, idque spasmus Cynicum vocari scribit. Petrus Salius Diuersus, in Annotationibus in Altimarum, cap. 15. inter Torturam oris & spasmus Cynicum etiam differentiam facit, Torturamque oris generalius accipi statuit pro omni figuræ oris deprauatione, eamque à duplici causa propendere, quarum altera est paralyfis, altera conuulsio. Spasmodum verò Cynicum, vt ipsa vox, si propriè sumatur, indicat, solum ex conuulsione fieri statuit.

Verum si has duas sententias coniugamus, differentia inter Torturam oris & Spasmodum Cynicum rectè constitui potest. Tortura oris est vel à paralyfi, vel à conuulsione. Conuulsio vel vnum tantum latus occupat, vel vtrumque. Si vnum tantum, conuulsio oris simpliciter, vel etiam, nomine generis, Tortura oris appellatur. Si vtrumque, propriè Spasmus Cynicus dicitur. Hæc, enim conuulsio exactè irati canis rictum exprimit. Non verò quæuis conuulsio oris rictum

iratorum canum exprimit. Vnde etiam vocatur risus Sardonijs. At ridentes non vnum tantum latus diducunt, sed vtrumque. Quæ verò à paralyfi prouenit, oris Tortura, Spasmus Cynicus appellari non potest; cum paralyfis non possit esse conuulsio. Vius tamen obtinuit, vt vocabulum spasmi non semper hic propriè accipiat, sed sæpe oris Tortura & spasmus Cynicus confundantur.

Quia verò musculi faciei, qui maxillas inferiores, pinnas narium, & labia ac buccas mouent, neruos maxima ex parte à tertia coniugatione cerebri accipiunt; musculosa verò latitudo illa, siue *μυώδης πλάσμα*, cuius Galenus, de loc. aff. c. 2. in fine, mentionem facit, quodque mandibulas, & narium pinnas, & buccam vtramque mouet, non à tertia coniugatione cerebri, sed à primis cernicis vertebris neruos accipit, & nonnullos etiam à quinta coniugatione cerebri: fons huius mali præcipuè querendus est, vel in neruis à tertia coniugatione, vel in musculosa latitudine.

Causæ verò remotæ Torturæ oris eadem sunt, quæ paralyseos & conuulsionis; cum ab alterutra hæc affectio oriri possit.

Auicennæ tamen frequentius fit à conuulsione. Quando igitur Tortura oris à conuulsione existit, musculis faciei versus sua principia contractis, tunc pars sana ad læsam siue conuulsam trahitur, & latus, in quo distortio cernitur, locus affectus est, & musculi dextræ partis conuulsi versus sua principia trahuntur, ac sinistræ partis musculi sanos ad se trahunt, affectioque dextram ipsam partem occupat.

In Tortura verò oris ex paralyfi, pars faciei distorta est sana; quoniam musculi sani actione sua fungentes trahunt resolutas partes ad se.

Quod tamen, lib. 1. part. 2. cap. 28. monuimus, paralyfin & conuulsionem interdum iungi, vt per vices & alternatim affligant, ita, vt pars modò conuellatur, modò resoluatur: id etiam hic quandoque accidere potest. Cuius generis affectus videtur fuisse, quem describit Anton. Beniuenius, de abditis morbor. causis & curat. c. 101. Cum enim imperitus quidam Medicus cuidam mulierculæ è gena dextra tuberculum furunculo simile scalpello abscidisset, non habita ratione neruorum ac venularum, illico subsecuta est inflammatio & dolor, è quo mulier in *κενὴν σπασμὸν* incidit, quo temerario motu pernecebat os & facies modò in dexteriores, modò in sinistiores partem. Cum enim facies modò in dextram, modò in sinistram partem distorqueretur, videtur fuisse mixtus affectus ex paralyfi & conuulsione, vt scilicet alternatim os modò conuelleretur, modò resolueretur.

Resolutio neruorum, & inde secuta oris peruersio, videatur apud Hippocratem, 2. epid. sect. 2. prope finem.

Præter paralyfin tamen & conuulsionem alia adhuc videtur dari causa oris torturæ, cuius mentio fit ab Hippocrate, lib. de articulis, malè scilicet curata maxillæ fractura. Si rectè quidem, inquit, coaptata fuerit, & vt debet, quieuerit maxilla, breui conualecet, ac dentes integri manent. Sin secus, longiore quidem tempore curatio accidit, eaque distorta, & dentes laduntur, ac inutilis existunt.

### Signa Diagnostica.

Tortura oris visui patet, quando os ægri ad alterum latus distorquetur, vt labiorum concinnus contactus, aut aliarum partium in facie consensus pereat. Præterea oculus, alter ritè claudi nequit. Ac denique æger exsufflare, vel expuere iussus, ex altero tantum oris latere id præstare potest, & sponte etiam saliuæ oris profluit. Nonnunquam fit Tortura oris non apparentibus in facie signis, neque spasmi, neque paralyfis. Atque tunc ægrum iubebis ridere aut pronun

*Tortura oris  
Causa remota.*

*Paralyfis &  
conuulsio iunguntur  
interdum.*

*Resolutio  
neruorum.*

*Maxilla fractura oris  
tortura causa.*

*Signa.*

pronunciare O literam: Hic animaduertetur, alteram oris partem liberè moueri non posse.

Quod ad causarum signa attinet, si malum hoc à conuulsione existit, pars affecta dura & tensa, trahit sanam, & plerumque dolor partis adest. Si verò hoc malum à resolutione oriatur, pars affecta laxa & mollis trahitur ad sanam, & sensus in parte affecta obtusus est, & palpebra oculi inferior ea parte decidit.

Traditur & hoc signum, ex conuulsione malum esse, si pars distorta ad naturalem situm & figuram restituatur per extensionem manibus factam; ex resolutione verò, si per retractionem. In paralyti etiam facies est extensa sine rugis, & inclinatio faciei continua est ad inferiora: in conuulsione rugosa est cutis in parte vna, & extensio eius in parte altera. Paucitas sputi & salina est, præcesseruntque vel adsunt causæ conuulsionis.

Cæterum si causa Torturæ oris hæreat in musculo faciei, vitiosa figura solum partem faciei, quæ ab illo musculo regitur, occupabit.

Sin in nervo, & quidem secundum eius principium; ita, vt cerebrum altero latere sit affectum, dimidium etiam cum faciei, tum totius corporis simul afficietur. Si secundum progressum, & noxa sit in tertio pari nervorum cerebri, vitiosa figura occupabit dimidium faciei secundum omnes partes: vbi scilicet ramus aliquis maior afficitur. Aliàs enim tortura tantum aliquas partes occupat. Si etiam tertia coniugatio afficiatur, magis laborat oculus: quia tertia coniugatio aliqua sui parte cum motoris nervis oculorum per eadem foramina prominet.

Si in quinto pari, leuis erit noxa buccarum: quæ denique insignis erit, si in primis ceruicis vertebra, illarumque nervis, causa mali sedem habebit, & minus tum laborabit oculus, nisi simul musculus temporalis affectus sit, in quem quinta coniugatio ramulum mittit. Tunc etenim per consensum laborat simul oculus: quia iuxta Columbum in quibusdam etià secunda coniugatio, quæ oculos mouet, eò ramulum quendam mittit, vnde consensus musculi temporalis & oculi. Minimè laborat oculus, si nervi ceruicis afficiantur.

#### Prognostica.

1. Tortura oris superueniens spasium aut paralytin reliqui corporis, apoplexiam vel epilepsiam portendit.

2. Si Tortura oris fortis aduenit, per spasium præcipue, intra quatuor dies interficit, materiâ in cerebrum translatâ. Valescus de Taranta tamen vidit morientem die duodecimo.

3. Tortura oris, quæ ultra sex menses producit, aut nunquam, aut difficulter curatur, teste Auicenna.

4. Quæ per spasium fit Tortura oris, in febribus ardentibus, perniciofa phrenitide, & morbis aliis acutis, lethalis est, teste Rhase.

5. In febre non intermittente, si labrum, aut supercilia, aut oculus, aut nasus peruertatur, imbecillo iam corpore, in propinquo mors est: 4. aph. 49.

6. Oris peruersiones, quæ nulli corporis parti consentiunt, celeriter aut sua sponte, aut ex necessitate sedantur; Hippocrates, lib. 2. prædicit.

#### Curatio.

Curatio.

Sicut Tortura oris aut à spasmò est, aut à paralyti: ita etiam curationem requirit diuersam. Ab vtrâ enim dispositione malum ortum habeat, ante omnia videndum est. Quod si ergo sanguinis copia adsit vena secetur primum cubiti, si sanguis in toto abundet, postea & quæ sub lingua. Aut cucurbitula cum sca-

rificatione primis vertebra, vel, quod tutius est, scapulis affigantur. Nam sapius appolita ceruici tremores corporis afferunt, teste Auicenna, 1. Canon. sen. 4. c. 21. de ventosis.

Auicennas, Paulus, Aëtius ligaturam probant, quâ tanquam capistro facies ad figuram naturalem reducatur; quod in Tortura oris ex paralyti locum habet.

Alij tamen etiam vtuntur ligaturis in conuulsione, ita, vt primò tendatur cutis frontis ad inferiora, deinde ligetur cum fasciâ, donec tortura cessauerit omnino.

Probantur & frictiones extremorum ad diuertendum, factæ manu sicca, vel intinctâ in aqua lauendula.

In inueterato hoc malo, si alia non prosint, Auicennas cauterium applicat supra venam, quæ ponè aurem est lateris affecti; quod & in cernice fieri potest. Non tamen vbi conuulsio est in nervis ceruicis. Ita enim augeretur malum. Nisi fortè applicetur inter primam & secundam vertebra. Nervi enim, qui in faciem distribuuntur, à tertiâ, quartâ, & quintâ vertebra originem habent.

Alij sinapismo & phœnigmo, vel dropace contenti sunt.

Medicamenta quod attinet, Auicennas verat pergere ad fortia purgantia vel digerentia ante quartum vel septimum diem, propter cruditatem materiæ; nisi metus sit ab imminente epilepsia vel apoplexia.

Post vniuersalem euacuationem prosunt 1. ethina, 2. apophlegmatismi & gargarismi; & si sint masticatoria, masticatio magis fiat in parte affecta. A principio autem, & ante ethina, gargarismis Auicennas non vtitur, ne materia partis affectæ in faciem trahatur.

Idem crebrò masticare iubet calamum aromaticum, nucem moschatam, & pyrethrum. Et de nuce moschata in ore tenenda. Rhases quoque præcipit. Alij & castoreum sub lingua tenere iubent: quæ omnia vim habent materiam resoluendi, nux moschata etiam nervos & cerebrum roborandi: ideo quoque nux moschi cum spec. diapliris exhiberi potest.

Vel fiat gargarismus ex ruta, lauendula, saluia, primula veris, & locus affectus inungatur vnguento Martiato. Fiant inunctiones partis affectæ cum oleo lumbricor. de castoreo, terebinth & aliis, quæ paralyti & spasmò conueniunt.

Vapores insuper è fomentis conuenientibus in faciem recipiantur. Vel capitis inunctiones, lotiones caput exiccantes, fiant in Tortura oris ex paralyti. Ex gr.

℞. Lixiuum è cineribus vitis, in eo bulliant stachas Arabica, salvia, fol. lauri, ruta, salvia, &c.

Vel applicetur hoc Cataplasma Bertricii.

℞. Rad. raphani contusas, & addito oleo laurino, rutaceo, de lateribus, & modico aceti ac su. furis s. q. F. Cataplasma.

Auicenna ex Indorum Medicorum sententia commendat carnes animalium syluestrium, vt leporis, vulpis, cerui, hirci syluestris, asini syluestris, quas elixatas parti affectæ & capiti applicat.

Possunt & interna medicamenta quæ ad paralytin & conuulsionem descripta sunt supra, libro primo, exhiberi; inter quas sunt aquæ duæ à Langio, lib. 3. epist. 14. cap. 1. descriptæ, quæ ita habent:

#### Prima:

℞. Fl. primule veris, roris marini, maioranæ, inu. arthetica, an. M. j. Spec. diamosch. amar. diapliris, diambre, an. ʒ. B. confect. anacardin. ʒ. j. cubebar. lign. aloes, nuc. mosch. caryophyll. macropiper. carpobalsam. an. ʒ. j. rad. acori, ireos, aristol. rot. an. ʒ. j. B. sem. sileris mont. pæonia, fenicul. an. ʒ. j. aq. herbe paralytis, salvia, betonica, an. ʒ. j. B. ilia ʒ. j. B. serapini, opopanis, myrrhe, gummi iuniperi, an. ʒ. j. B.

Secundæ

Sunt omnia simul mixta conquassatis conquassandis; in infusione per d.8. Postea extrahantur per alembicum ter in cineribus calidis, vel vapoze, siue balneo sicco.

### Altera.

℞. Rosar. rubr. fl. laeundul. an. M. i. sem. anihos M. j. stachad. M. sem. chamapit. stachad. M. sem. fl. hyperic. cum semin. an. M. j. mastich. Drach. iiii. castorei Drach. i. β. benzoes Vnc. sem. nuc. mosch. Drach. ii. Scrup. ii. gummi hederi hedera, an. Drach. ij. rad. enula contus. 3. vi. lumbricor. terra lotor. vin. Vnc. i.

Macerentur per diem & noctem in lb. ii. vini subtili trina destillationis, & lb. i. Maluatici, & destillentur per Baln. Mar. & in alembico in sindone suspendantur moschi gr. iiii. caryophyllor. contusor. Scrup. β.

### Dieta.

Dieta sit, qualis in paralyti & spasmo. Auicennas & Rhases ægrum iubent poni in loco obscuro, ne humores lucis præsentia agitari & fusi, ad nervos concurrant. Et solent ipsi ægri lucem & conspectum hominum fugere, ut deformitatem oris ab aliis tegant. Auicennas etiam vult ægrum assidue intueri in speculum ex chalybe factum, ut animaduersa oris deformitate faciem toris viribus in pristinam naturalem figuram perducere nitatur. Valescus de Taranta tibiam inflare jubet.

### Q V Æ S T I O.

#### An Spasmus Cynicus sit morbus vel symptoma.

Morbum esse negat Ant. Donat. ab Altomari, de mend. hum. corp. mal. cap. 15. Et si enim ad eam sequatur morbus, figura scilicet vitata: tamen ipsum spasmum non esse morbum, sed symptoma facultatis motricis læsæ, ad quam sequatur morbus figuræ.

Verum potius de nomine, quam de re lis est. Spasmus enim Cynicus si consideratur ut altera torturæ oris differentia seu species, omnino morbus, vitata scilicet figura: si vero consideratur ut causa huius morbi, & motus vitatus seu conuulsio; symptoma est.

### C A P V T IX.

#### De Ptyalismo seu crebra sputatione, & salina Defectu.

Ptyalismus & πτυαλισμός Hippocrati & Galeno, est immoderata & frequens salivæ exspuitio. Est enim inter excrementa corporis nostri etiam id, quod Græci σάλον, & σάλον & πτύαλον & πτύμα nominant, Latini salivam & sputum: unde σάλοχος Hippocrati dicitur, 2. epid. qui multam salivam ore effundunt.

Distinguunt nonnulli inter σάλον & πτύμα, seu salivam & sputum; & σάλον, seu salivam, appellat saltem id oris excrementum, quod sine tussi & excreatione rejicitur: sputum vero, quod cum excreatione ex thorace plerumque rejicitur, seu, ut etymologicum Græcum habet, πτύμα est, quod κατά πρῶτον exspuitur: σάλοχος vero, quod αὐτομάτως fluit, ut ita affectio, de qua agimus, potius salivatio, quam crebra sputatio dicenda esset. Verum quia salivæ propriè dictæ sæpe sputum, ita in specie etiam dictum, permiscetur, id, quod ore rejicitur, ab Autoribus, & sputi & salivæ nomine appellatur. Vnde etiam Autores voces has non semper distinguunt.

Quid autem saliva sit, notissimum est: at quomodo

Dan. Sennerti Tom. II.

generetur, & quis ejus sit usus, explicandum est. Salivam equidem excrementum esse, & ex ore, tanquam inutile, rejici, extra dubium est, & quidem aqua ista humiditas, quæ linguam irroratur, & mandentibus præsto est, natura sua insipida est; neque sapore, neque colore, neque visciditate excedit; quantitate etiam moderata est.

Cæterum cum omne excrementum coctionem aliquam præsupponat, materiam quidem huic excremento suppeditat partim coctio prima, quæ fit in ventriculo, partim tertia, quæ fit in cerebro, elaboratur vero in glandulis linguæ utrinque assistentibus, quas Tonsillas vocant (vnde Galenus, in com. in 1. prorrh. ἀδένες σαλῶχες nominat) ubi substantiæ modum ac naturam suam & nomen etiam accipit, consentientibus tamen & concurrentibus linguæ, & partium in ore calore. Et si vero ex ore & alia excrementa pituitosa rejiciuntur, & sæpe salivæ permiscetur, tamen saliva propriè tantum illud est, quod in tonsillis gignitur: quod vero à thorace ejicitur, πτύμα, seu sputum est, sicut, quod à cerebro defluit, μύξα & βλέννα, seu mucus appellatur.

Quamquam vero saliva excrementum est: natura tamen id etiam ad certos usus destinavit. Primum enim ad cibi in ore masticationem, & ad primæ coctionis præparationem utilis est, quæ commodè non perficeretur, si os saliva destitueretur; sicuti in febribus sæpe apparet, cum os siccum est, neque cibus saliva conspergitur. Imo in ipso ventriculo coctio difficilior fieret, si absque saliva esset, & si is panem & reliquos cibos aridos ab ore acciperet. Deinde locutio perfici non posset, si lingua ac labra saliva non conspergerentur, quod quilibet, si lingua & labia salivâ destituuntur, experitur. Tertiò etiam ad gustatum conducit saliva, & saporum quasi vehiculum est, & si lingua saliva destituatur, nullum, vel obscurum admodum saporem percipit.

Verum hæc omnia præstat saliva, si naturalem qualitatem, saporem, colorem, quantitatem obtineat. Sæpe vero à naturali constitutione deflectit, & pro insipida fit salsa vel amara, vel dulcis, vel acida; color pro albo croceus; pro aqua, crassa & spumosa; & tandem pro moderata in copia, copiosa, ut opus sit, hoc excrementum continuo ore rejici, quod Græcis πτυαλισμός, Latinis, crebra sputatio vel salivatio appellatur. Est videlicet Ptyalismus crebra & involuntaria sine tussi & scretu exspuitio, à nimia salivæ copiâ proveniens.

Et si enim etiam ex mala consuetudine quasi nonnulli hanc exspuitionem familiarem sibi reddunt, dum inter loquendum & perorandum toties, quoties sententiam absoluerunt, exspuunt, & ex medicamento sputum prouocantium usu quoque hoc prouenire potest: tamen de ea hic non est sermo, sed de præternaturali, cum objectum præter naturam, seu saliva copiosior, ad exspuendum inuitat.

### Causa.

Fit autem saliva seu sputum copiosius, dum pituitosus humor à capite ad os & fances defluens, salivæ se commiscet, eamque auget; atque tunc ptyalismi, & catarrhi eadem generatio & causa est, & soler ptyalismus, ut catarrhus, nonnunquam epidemius esse: id quod An. 1565, accidisse, refert Forestus, lib. 14. observ. 23. Eadem de causa cum columellæ laxatione plerumque sputatio multa conjuncta est. Accidit eadem etiam in inflammatione & vlcere oris.

Deinde dum ex ventriculo humidior & pituitus abundante ea sursum in os exsudat & exsurgit, sputoq; se miscet, quod manè, seu jejuno ventriculo accidere soler; idque sæpe post morbos chronicos accidit, ventriculo debilitato, & non rectè concoquente. Neque tamen semper primariò à ventriculo aquosa illa

pituita in os confluit, sed nonnunquam ex intestinis, ut in vermibus accidit, nonnunquam ex liene, unde lienosi & scorbutici sputatores & saliuatores sunt, de qua re, lib. 3. part. 5. sect. 2. cap. 4. dictum.

In pectoris quoque & pulmonis affectibus excrementa illic congesta si in os propellantur, sputum augere solent. Tandem etiam ex hydrargyri inunctione molesta & continua sputi ex ore rejectio & saluatio excitari potest. Interdum etiam infantibus saluatio ob humores vitiosos in utero cumulatōs familiaris est. De quo Hollerius, com. ad aph. 29. sect. 3. Nostis, inquit, pueris raro accidant aphthæ; quia Gallianarum matrum & nutricum frigidius est lac & humidius; sed aphtharum loco pustulas habent & ulcera serpentina per totam faciem, per caput, post aures & multam præterea saluationem,

#### Signa Diagnostica.

Malum per se notum est, & qui hoc laborant, coguntur sine tussi & exscreatione, ob saliuam copiosius ad labia affluentem, expuere. Quænam v. copiosa saliuæ causa sit, ex morbis, qui præcesserunt, vel præsentēs sunt, cognoscitur,

Post cibum si copiosa saliuā excernatur, indicat ventriculū malè affici, vel ob propriam illius imbecillitatem, vel ob ciborum qualitatem, aut quantitatem. Indicat enim cibum corrumpi. Atque hæc saliuæ expulsiō à Galeno, 4. de loc. aff. c. 10. è Diocle inter affectionis hypochondriacæ symptomata recensetur. De sputatione, quæ etiam scorbuticis familiaris est, videatur liber 3. loco alleg.

#### Prognostica.

1. Malum, prout morbus, à quo saliuā copiosa provenit, se habet, nunc grauius, nunc leuius est, & facilius vel difficilius curatur.

2. Ptyalismus interdum à magnis morbis præseruat, imò magnos morbos tollit, & acuta febre laborantes tandem ptyalismo, & copiosa saliuæ rejectione, sanatos fuisse, obseruatum est; cuius rei historiam habet Forestus, lib. 1. 4. obs. 23.

#### Curatio.

Et si ptyalismus à saliuæ copia proueniat, & proinde ipsa absumenda, & quæ resiccare & partes illas saliuam suppeditantes, tonsillas puras, roborare possunt, exhibenda sunt: tamen cum causæ sint plures, à quibus copiosa saliuā prouenit, ut scopo huic rectius satisfacere possimus, istæ prius tollendæ sunt.

Itaque si à Catarrho à capite labente & saliuam augente est ptyalismus, curatio ad catarrhum dirigenda.

Si à Ventriculi vitio suppeditatur, tum generatio pituitæ in ventriculo impedienda, genitæque expurganda, & ventriculus exsiccandus; quam ad rem inprimis aloë & hiera picra, & aloëticorum medicamentorum usus facit. Vtile est & thus ac mastiche cum vino sumpta, & sinapi cibus admixta: item diagalanga, diatrion pipercon. Vtilis etiam est vomitus. Ager famem toleret.

Si Lienis vitio proueniat saliuā copiosior, illi succurrendum.

Eodem modo & Pulmonum affectus, si saliuam augent, curandi.

Si ab Hydrargyri inunctione proueniat ptyalismus, illi succurrendum, ut de curatione luis Venereæ dicetur. Et exemplum talis Ptyalismī curati habet Forestus, lib. 1. 4. obs. 23.

Quibus pro varietate causarum expeditis & præmissis, tandem & ad os madidum exsiccandum, & tonsillas roborandas veniendum; decocta nimirum paran-

da ex fol. myrti, plantaginis, rosæ rubris, saluia, nucibus cupressi, balauistiis, acacia, hypocistide, mastiche, ligno aloës, alumine; quæ decocta in ore solum sunt detinenda, non verò gargarismi modo usurpanda, ne plus pituitæ ad os attrahatur. Potest & spongiæ particula in ore detineri, quæ copiosiores saliuam imbibat. Si tamen critica sit euacuatio, fluxus ille impediendus non est.

#### Salina defectus.

Causa est materiæ defectus. Deficit autem materia, quia vel non generatur, vel generata absumitur. Non generatur ob siccitatem cerebri, ventriculi, linguæ, & tonsillarum. Generata absumitur in febribus ardentibus, ut Pherecidæ, 7. epid. oris inflammationibus, vigiliis, nimis exercitiis, siti, longis sermonibus, à cibis calidis & exsiccantibus, fumis metallicis, & similibus.

Signa Diagnostica hic affectus non requirit, sed per se patet, Signa etiam causarum è præcedentibus & præsentibus, & iis, quæ de linguæ siccitate, lib. 1. part. 3. sect. 5. cap. 1. dicta sunt, manifesta sunt.

Prognostica etiam inde petenda & desumenda sunt. Curatio ut rectè fiat, causæ, à quibus pendent, tollendæ sunt, & exsiccationi humectantibus resistendum, Quod sit remediis, quæ, ibid. habentur.

Lingua ipsa etiam ore continetur, verum quæ de ejus morbis & symptomatibus dici possunt, supra, lib. 1. part. 3. sect. 5. proposita sunt.

## DE DENTIVM AFFECTIBVS.

### CAPVT X.

#### De Dentium Morbis.

Dentes soli ex ossibus quadam sui parte extra oris, seu alueolos suos prominent, ut masticationi ciborum, quod ipsorum munus est, inseruiant. Secundario verò sermoni & pronuntiationi verborum suam operam præstant. Ideo & in masticatione atteruntur, attriti verò incrementum denuò accipiunt, & cum toti exciderint in infantia, nonnunquam & aliis ætatibus, septenariis potissimum annorum, noui gignuntur, ita, ut quibusdam septuagesimo, octuagesimo anno dentes renatos fuisse compertum sit. Præsens enim est usque ad mortem in maxillis vis *αλυστη*, seu formatrix dentium, quæ ipsos producere potest ex idonea materia, peculiaribus in maxilla sinibus recepta, quæ in osscam quandam duritiem excrefcit. In ipsis etiam dentibus parte internâ semper aliquid humidæ mollitiei inest, quâ nutriuntur, & fluxionibus opportuni sunt. Ejus rei exemplum occurrit nuper Reichenbachij, in Silesia. Scripsit n. ad me Dn. D. Georgius Titschardus, viuere ibi honestam matronam ferè septuagenariam, viduam, quæ ante quadriennium postquam scilicet climactericum magnum, 63. annum superasset, omnibus dentibus abortu primo amissis, cœpit dolere caput & gingiuas tam atrociter, ut moritura putaretur, & præ doloris immanitate insaniam metueret, cœque, donec, elapsis aliquot diebus, dentes, perinde ut in ætate infantili fieri consuevit, primores protruderet, ac tum dolores mitigari, meliusque habere & viuere cœperit. Numerati autem sunt 20. Verum jam olim etiam talia accidisse, patet ex Aristotele, de hist. animal. l. 2. c. 4. Plinio, lib. 11. c. 37. Cardano, de rer. variet. lib. 8. c. 43. Alexandro Benedicto, de curandis morb. lib. 6. cap. 1.

Dentes verò considerantur quatenus vel gignuntur, vel geniti sunt. Et si enim dentes in ipso utero materno formentur,



formentur, ut in dissectionibus ab ortum sæpe obseruatum : tamen sapientissimus rerum Creator extra alucolos eos statim cernere noluit, ne papilla matris iis læderetur, sed gingiuis obducti latent usque ad quintum vel sextum mensem, vel etiam ultra, ac tum in infantibus cum dolore plerumque erumpunt. Dum geniti sunt, variis morbis & symptomatibus affici possunt.

Morbos dentium quod attinet, primò magnitudo perit, siue à violentia externa, siue à defectu alimenti, dum corroduntur & perforantur: deinde interdum longiores, quàm par est, fiunt. Sæpe mobiles fiunt, & vacillant; interdum excidunt & deficiunt: contra sæpe plures numero sunt, quàm par est. Nonnunquam situs & ordo eorum non rectè se habet. Interdum tophis obducuntur: de quibus jam ordine dicemus.

### De Dentium Corrosione & Carie.

Dentium  
corrosio &  
carie.

Primò sæpe dentes corrumpuntur & corroduntur ab acerbis humoribus ad ipsos defluentibus; à quibus simul plerumque dolor excitatur : vnde post frequentem dentium dolorem tandem eorum corrosio & caries sequitur, ita ut frangantur & frustillatim excidant. Faciunt tamen etiam ad dentium corrosionem, aut certe eam augent, cibi, ut Hippocrates, *lib. de affectionib.* docet, præsertim si dentes jam antea caui sint, ut cibi in iis retineantur. In primis hoc præstant dulcia, & præcipuè saccharum, vnde qui saccharum sæpe gustant, plerumque corruptos dentes habent.

Corrumpunt præterea dentes nimium calida assumpta. Vnde vulgatus versiculus:

*Pulvis feruens facit corrumpere dentes.*

Frigida contra idem præstant, & præsertim post nimis calida paruo intervallo assumpta. Vnde qui circa aquas gelidas habitant, corruptos dentes habent.

Dentes etiam lædunt fuci mulierum ex hydrargyro; vnde raro mulieres, quæ fucis ejusmodi vtuntur, albos dentes habent.

Fistulæ quoque nonnunquam in dentibus oriuntur, è quibus humor corruptus, & sanies sensim extillat. Et quidem hæc sanies nonnunquam in os cum fœtore defluit, cuius rei exempla duo habet Forestus, *lib. 14. obs. 7.* Nonnunquam verò per dentium radices & maxillæ illa foramina, per quæ vasa in eas subeunt, sensim extrâ effluit, & tubercula in malâ vel mento excitat, quæ nullo modo curantur, nisi dens extrahatur. Et si enim, ut aliquoties obseruavi, rumpatur illud tuberculum, & pus cellactum effluat, & tuberculum inde subsideat & probè curatum videatur : tamen post aliquod temporis intervallum, ex sanie è dente carioso ad eundem locum affluente aliud tuberculum excitatur, iterumque rumpitur, & pus effunditur; idque toties accidit, donec dens cariosus extractus sit. Eo enim exempto, tuberculum spontè euanescit. Interdum etiam vlcus semper manet apertum, & continuò saniem stillat, nequitque claudi, donec dens cariosus extrahatur. Extillat autem ista sanies, ut dictum, non per erosam maxillam, sed per foramina, quæ sunt in exteriori superficie maxillæ parte anteriore, per quæ vasa ad musculos, labium, & cutim eò loci deferuntur. Observationes hæc de re vide apud Beniuenum, *de abd. morb. & sanat. caus. cap. 22.* Guil. Fabricium, *cent. 3. obseru. 32. & 33.*

Tandem nonnunquam vermes in dentibus generantur, qui ipsos erodunt.

### Curatio.

Illud quidem, quod corrosum & carie absumptum est, in dentibus resarciri & reponi non potest : ne verò malum longius serpat, influens humor omni studio exsiccandus est, ac, dum paucus est iste humor, topica

sufficiunt; sin multus, capitis etiam prius ratio habetur, & totius.

Postea humiditas putrida absumatur, & ne ab ea amplius dentes corrumpantur, detur opera: quod præstat decoctum radic. cappar. pentaphylli, ciperi, tithymali, fol. saluix, menthæ, rorismarini, sem. nigellæ, baccar. lauri, in vino vel aceto. Aut galliâ moschata, vel sola, vel cum cypero & mastiche mixta, in cauum dentis indatur, ad prohibendam putrefactionem.

Ætius sulphur viuum lycio exceptum intrudit in cavitatem dentis, aut semen nigellæ torrefactum & aceto acri affuso tritum.

Vel sequenti Decocto os sæpius colluatur :

*℞. Cort. rad. cappar. Drach. vi. rad. pencedani Drach. iij. pyrethri Drach. ii. zingib. Drach. i. sem. nigell. Drach. i. sem. myrrh. rubr. Drach. sem. fl. rosar. rubr. P. ii.*

De coq. in aceti vini q. s. ad tertias.

Colat. *℞. Vnc. ix. Admisc. syr. de rosis siccis Vnc. i. M.*

Mizaldus commendat aquam rad. pyrethri cum vino destillatam, quæ os collui iubet. Nonnulli dentes erosos & cariosos camphorâ replent; alij radice pencedani, zingib. & pyrethri. Alij easdem radices in aceto macerant, deinde coquunt & exsiccant, & eodem modo adhibent. Marcellus cauos dentes sanat imponendo iis cinerem muscerdæ, quo ossa cariota restitui perhibet. Sunt, qui sequentem Aquam stillatitiam parant, qua dentem erosum sæpius fricant.

*℞. Alumin. sacch. lb. sem. sal. ammoniac. gemma, an. lb. j.*

Puluerisata indantur retortæ lutatæ, & s. a. destillantur.

Arceet quoque corrosionem & cariem dentium sequens Linimentum.

*℞. Pulv. myrrh. Scrup. ij. gummi juniperi Scrup. i. alumin. Scrup. sem. Cum mellis q. s.*

F. Linimentum, quo quotidie dentes putres & erosi fricentur.

Vel *℞. Radic. filic. quinque fol. oxylapath. an. Vnc. i.*

Coqu. in aceto, vel vino austero ad tertie partis consumptionem.

Colaturâ os, qua parte dens cariosus est, colluatur, postea hoc Pulvere, quem Galenus, *s. de comp. med. sec. loc. cap. 9.* describit, dens impleatur, qui ejus putrefactionem prohibet.

*℞. Melanth. Vnc. i. nitri Vnc. sem.*

Simul torrefiant, & in aceto acerrimo extringantur, terantur, & cavernæ dentis imponantur.

Rondelerius aquam fortem in cavitatem dentis immittit: quod tamen vix tutum puto, cum ab ea & vicinæ partes, & nervus denti insertus facile lædi possit.

Fricentur etiam dentes iis, quæ postea de dentium denigratione proponuntur.

Et ne dentes cariosi amplius corrumpantur, utile est, post cibum eos à cibis in iis retentis mundare; deinde os vino colluere, & denti mastichem, thus, cyperum imponere.

Nonnulli ceram indunt. Sed monet de ea Rondelerius, ne sola dentibus indatur; cum habeat vim emolliendi, nervos præsertim. Ideoque suadet, si ea vti velimus, ut admisceamus alumen, vel aliud, quod siccet & adstringit, vel ceram viridem, quæ vehementer siccet ob æruginem.

Cauteria etiam admittit Hollerius, *in perioch. s. in librum de compos. medic. sec. loca.* Verum vix eorum tutus est usus, propter exquisitum sensum nervorum; metiendumque, ne partes aliæ, & cerebrum ipsum in consensum trahatur. Granum etiam thuris vel myrrhæ denti inferere vtile est.

Sylva hujusmodi medicamentorum reperitur apud Galenum, *s. de compos. medicam. sec. loc. Aërium, tetrabibl. 2. ferm. 4. cap. 33.* Paulum Aeginetam, Tralianum.

Si fœtor dentium simul adsit, aliquid de myrrha, aut de folio Indo, aut radic. iros medicamentis miscetur.

Vt  $\mathcal{L}$ . Myrrh. mastich. corall. rubr. rorismarin. iros, an. Drach. i. cera q. s. pro incorporatione..

Fiat Massa, de qua aliquid in dentem cauum immitatur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Pulu. mastich. Drach. sem. corallior. rubr. Scrup. j. myrrh. rubr. Scrup. sem.

F. Pulvis, quo cavitas dentium repleatur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Flor. rosar. rubr. M. j. mastich. Drach. ii. radic. iros. Vnc. i. ligni cupress. Vnc. sem.

Fiat decoctio in sufficiente vini quantitate.

Colatura  $\mathcal{L}$ . lb. j. oxymell. scillit. Vnc. iij.

Misc. & decocto dentes eluantur; deinde repleatur cavitas mastiche cum cerâ mista. Dentes etiam mundat & à putredine præseruat sp. vitrioli.

Si vermibus dentes erodantur, necare illos scribunt exceptum per infundibulum fumum de sem. hyoscyami. Falsissimum tamen hoc putat Hollerius, lib. 5. perioch. in lib. Galen. de comp. medic. sec. loca, scribitque aliquid vermiculorum semper de accenso illo fumo trumpere, omni tempore in aëre etiam, quando ad dentes corruptos non pertingit. Alij fumum ex fructu halicacabi cum cera misto, & ferro candenti injecto ore excipere jubent. Alij fumum adhibent de trochiscis ex semine hyoscyami albi, succo cepæ vel porri, & nitro, cum seuo hircino formati; aut fiat collutio oris ex decocto radicum chelidon. Crato commendat decoctum radic. fraxini, vel vrticæ. Succus item folior. centaurij minoris, & persicæ arboris, aloë, myrrha, C. C. & alia, quæ contra vermes vsurpantur, vtilia sunt. Quidam os spicritu vini colluere jubent.

Dentium extractio.

Si dens maxima ex parte cariosus sit, & dolorem pariat, aut fistula inde facta sit, vel tuberculum, aut vlcus in maxilla, de quo antea dictum, extrahatur. In extrahendo tamen dente cautio adhibeatur, & non extrahatur, nisi vacillet, ut sine vi extrahi possit, aut, si nerui subjecti, ne inflammatio, & inde periculum imminuat. Erasistratus, qui dentes temerè non extrahendos putavit, ejus rei testimonium hoc adduxit, quod in templo Apollinis *Ophiostegion* seu forceps dentarius plumbeus suspenderetur, quo innuebatur, non esse extrahendos dentes, nisi vacillarent, ut plumbeo forcipe, & sine vlla vi extrahi possint. Si enim magnâ vi extrahuntur dentes, sæpe majores dolores, & sanguinis fluxus sequi solet, vel maxillæ pars auulsa simul extrahi, aut alia pericula excitari possunt. Ita memini hîc puero incautè dentem extractum, & procul dubio in extrahendo neruum læsum fuisse, unde postea fungus enatus fuit, qui totum os replevit, ac quamvis abscinderetur, brevissimo tamen temporis spatio iterum succreuit, majusque semper incrementum sumpsit, ac ægro tandem mortem attulit.

Vt autem dentes sine violentia euelli possint, quædam medicamenta adhibenda, quæ passim in Medicorum libris occurrunt: ut ranarum viridium in arboribus degentium pinguedo & pulvis, si dentibus affricetur; tithymali succus denti inditus, aut si ex eo & sale armoniaco globuli formentur, & cavitati dentis indantur, gummi hederae impositum, radix cucumeris agrestis per triduum in aceto macerata, semen hyoscyami, & radix ejusdem assata radici dentis calida applicata.

Alij hoc commendant:

$\mathcal{L}$ . Urina canis, thuris, dentis canis, an. q. s.

Pulveriscentur subtilissimè & cum urina permisceantur, & imponantur denti eximendo.

Tabernæmontanus hoc laudat:

$\mathcal{L}$ . Gummi ammoniacum dissolutum, & cum sem. hyoscyami, Misce. F. Vnguentum.

Monet tamen de hîc medicamentis Valescus de Taranta. 1. ut vicini dentes bene muniantur, ne &

ipsi à medicamento tangantur. 2. ut os apertum seruetur, & saliva effluere permittatur. 3. ne quid deglutatur.

Ne etiam dentes cariosi sub forcipe frangantur, ante extractionem tenui filamento replendus est dens cariosus.

Valescus de Taranta lib. 2. cap. 72. non facillè admittit dentium extractionem, primò propter masticationem: secundò quia dente vno euulso sequatur fluxio ad alterum; & sic continuò dentes extrahendos esse, donec tandem homo ad solas offas & pulmenta redigatur. Verùm etsi hoc suo modo concedi possit in dolore dentium à fluxione, & vbi per vasa pluribus dentibus communia materia affluit: tamen in dentibus corruptis, & præcipuè vbi sanies ex iis exesit emanans in maxillâ tubercula vel vlcus excitat, nulla alia curandi ratio est, quàm si dens extrahatur. Neque tum metus est, ne vicinus dens corrumpatur, cum talis corrosio non sit à fluxione recenti, sed quæ jam diu sæpe præterit.

### De dentium Imminutione.

Non solum dentes Imminuuntur, dum intus corroduntur, sed etiam cum breuiores fiunt. Fit autem hoc. 1. ob externas injurias, casum scilicet, percussionem, vbi pars aliqua dentis perditur. 2. vbi nonnunquam in dentium putredine ij non solum intus excavantur, sed etiam pars aliqua decidit. In adultis vix curabile malum est. In pueris, quibus adhuc spes est, dentes rursus renasci posse, sanationis ipes est.

### De dentium Elongatione.

Dentes nonnunquam etiam iusto Longiores & prominentiores fiunt, præcipuè anteriores. Id quod accidit, primò iis vacillantibus, vel eorum radicibus laxatis, vel percussione aut casu, atque externa violentia, ut in attentatâ, sed non perfectâ dentis extractione. Deinde etiam citra laxitatem & mobilitatem, quando nimirum augentur & longiores fiunt. Id quod plerumque fit, si dens oppositus deest, teste Columbo, de re Anatom. lib. 1. cap. 10.

Si à laxitate & vacillatione dentium fiat eorum elongatio, dentes iterum firmandi sunt, ut postea dicetur; aut si hoc non juuet, limâ atterendi; quod etiam faciendum, si ex incremento longiores sint. De qua re vide Aërium, de rarib. 2. serm. 4. cap. 30.

### De dentium Mobilitate & Vacillatione.

Sæpe etiam accidit, ut dentes vacillent: & inprimis incisorij mobiles fiunt, quia vnâ saltem radice nituntur.

Vacillatio dentium fit vel à causa externa & externe, vel interna.

Causa externa est ictus, vel casus.

Internæ sunt defectus alimenti, ut in senibus, interdum quoque conualescentibus, unde alveoli dentium ampliores redduntur; nimia humiditas laxans radices dentium, præsertim si peculiaris aliqua prauitas accedat: id quod in scorbuto, & in lue Venerea ab inunctione hydrargyri accidit; diminutio gingivarum ab erodente succo prauo, quod etiam in lue Venerea sæpe vsuvenit. Mobiles etiam fiunt dentes erosâ eorum radice.

Si ergo à casu aut percussione dentes mobiles sint redditi, adstringentibus & firmantibus vtendum.

Vt  $\mathcal{L}$ . Rad. pentaphyll. bistort. an. Vnc. i. cypri Drach. ii. flor. rosar. rubr. M. s. sumach. Vnc. sem. Coqu. in aqua ferratâ. Colat. adde alum. Drach. ii. F. Oris collutio.

Vel  $\mathcal{L}$ .

Vel  $\mathcal{L}$ . Corall. rubr. C. C. vsti prepar. rad. bistort. pentaphyll. mastich. rad. cyperi, an. Drach. i.

F. Pulvis, qui dentibus affricetur, vel cum syrupo de rolis siccis in Linimenti formam redigatur, & dentibus illinatur.

$\mathcal{L}$ . Succ. nasturt. aquat. express. Drach. iii. syr. ex rosis siccis Vnc. iß.

Coqu. l. a. ad spissitud. Add. rad. symphyti Scr. i. nuc. mosch. cupress. C. C. vsti pulv. vel prap. sang. dracon. an. Scr. j. alum. vsti Scr. ß. F. l. a. Linimentum.

a defectu  
alimenti.

Si vero malum sit à defectu alimenti, dentium equidem tenuitati & exsiccationi nullum remedium adhiberi potest. Dentium tamen relaxationi opitulatur adstringentia medicamenta, & quæ gingivas roborant.

a nimia hu-  
miditate.

Si à nimia humiditate, exsiccantibus & adstringentibus opus est. Vbi tamen eligenda ea, quæ dentes non denigrant, & quæ odorem gratum ori conciliant. Ea enim, quæ dentes denigrant, omittenda, ut cortices granatorum, balaustris, gallæ, vitriolum, & chalcitis.

Fiat nimirum decoctum ex rad. filicis maris, pentaphyll, bistort, lapathi, tormentillæ, cappar fol. myrti, lentisci, mespil, flor. rosar. rubrar. cupulis glandium in aqua vel vino austero: quibus si alumen, vel decocto si ol. vitriol. vel sulph. guttæ aliquot addantur, efficacius decoctum redditur. Ad humiditatem simul educendam radix pyrethri addi potest, & ob odorem suauem rosamarinus, salvia, cinamomum.

Pulveres etiam dentibus in eundem usum affricentur, quales postea de gingivis laxis proponuntur.

Vt  $\mathcal{L}$ . Aluminis, mastiches, an. Drach. sem. corall. rubr. C. C. vsti, eboris, sanguinis draconis, boli Armenæ, salis communis tostis, an. Drach. ii. thuris, balaustris, an. Drach. i. radic. ireos, bistortæ, nuc. cupressi, an. Drach. iii. piperis, pyrethri, an. Drach. i. testarum sepie, pumicis, an. Dra. iß. F. Pulvis.

Vel  $\mathcal{L}$ . Corall. utriusque an. 3. ii. mastiches, tragacantha, gummi Arabici, an. Drach. i. F. Pulvis.

Vel  $\mathcal{L}$ . Farina hordei Vnc. cxx. folior. parietariæ viridis q. l.

Contunde folia in mortario, & cum farina Misce ut fiat Massa, quæ utatur in olla igne patente hor. 24. massam exime, & adde mastich. Vnc. ii. rad. ireos Vnc. i. spica Indica, folij, an. Vnc. ß. F. Pulvis.

Vel  $\mathcal{L}$ . Off. dactylor. oliuarum combustar. oculor. cancri vstor. an. Drach. ii. sang. dracon. alum. vsti, an. Dra. i. F. Pulvis.

Vel  $\mathcal{L}$ . Flor. rosar. rubr. sumach, granor. myrt. cupul. glandium, an. Drach. iß. cort. rad. mori Drach. iii. cort. rad. cappar Drach. iß. radic. ireos, thuris, an. Dra. j.

Coquant. in vino adstringente pro Collutione oris.

Vel  $\mathcal{L}$ . Ros. rub. M. i. C. C. vsti Drach. i. rad. serpentaria Drach. i. tormentill. Drach. ii. alum. vsti Drach. ß. nuc. moschar. Scrup. ii. cortic. cass. lignæ Drach. i. Coq. in aq. plantag. iß. iß.

Vel  $\mathcal{L}$ . Herb. auriculæ muris, rad. serpentariæ, tormentilla, an. q. v.

Coq. in aqua ferrata ad consumptionem tertiæ partis pro Oris collutione.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. pentaphyll. bistortæ, an. Vnc. ß. flor. rosar. rubr. cupular. glandium Drach. ii. spongia marin. Dra. i.

Coq. in aquæ communis chalybeat. & rosar. part. æqual. ad terras, & colentur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Fol. myrtillor. sorbor. an. Mß. balaustris, sarcocoll. aluminis, an. Scrup. i. aceti scillit. Vnc. ii. aqua plantag. Vnc. vj.

Bulliant ad terras, & colentur.

Colaturæ admisce syr. myrt. Vnc. iß. Misc.

Efficax est & hoc:

$\mathcal{L}$ . Gland. Vnc. i. alumin. vsti Drach. i. acacia Drach. ß. flor. rosar. rub. Mß.

Coqu. in vini rubri iß. ij. ad tertiæ partis consumptionem: decocto os sæpe colluatur.

Vtilis quoque est sequens Aqua destillata:

$\mathcal{L}$ . Fol. salvia, rorismarini, an. M. iii. mentha, chamæpit. an. M. ii. schœnanthi M. i. cort. citri Vnc. i. ligni aloes, cyperi rot. an. Dra. ij.

Concisis affunde aq. fl. prunell. periclymeni, rosar. an. q. l. vini cydonior. iß. ß.

Stent per triduum in infus. deinde destillentur in MB. In fine adde moschi Scr. ß.

Posiunt & tali Linimento dentes mobiles fricari:

$\mathcal{L}$ . Diamori Vnc. sem. dianthi. Drach. ii. alum. vsti Drach. ß. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Pulv. gummi iunip. Drach. ß. alum. crudi Dra. i. origani Drach. ß. mellis Drach. vi. Cum aceto scillitico, Misc.

Aqua pro firmandis dentibus, quæ & in dolore dentium viurpari potest:

$\mathcal{L}$ . Herb. salu. urtic. rorismarini, rad. tormentill. nuc. ingland. bene lotar. & contus. an. M. iii. flor. salu. rorismar. rosar. rubr. fol. prunell. plantag. summi. rubi, marrub. an. M. ii. sem. myrtill. iß. i. hypocist. Vnc. iii. coriand. prap. cort. citri, an. Dra. ii. cinamomi Vnc. iii. nuc. cupress. num. x. boli Armenæ, mastich. an. Drach. ij.

Incisa & contusa infund. in f. q. vini nigri austeri, stent per triduum in macerat. Postea exprimantur fortiter. Expressum indatur cucurb. vitreæ. Destillentur lento igne. In destillato ebulliant vase bene cooperto aluminis Vnc. ii.

Percolentur. Seruentur vsui.

Alia:

$\mathcal{L}$ . Rad. tormentill. serpent. an. 3. ii. plantag. Vnc. i. prunell. cort. nuc. ingland. an. Vnc. iß. ligni guaiac. contus. 3. iii. sem. coriandr. prap. 3. ß. portulac. 3. vi. myrtill. 3. ii. fol. myrtill. M. i. herb. plantag. marrub. urtic. min. prunell. an. M. iß. rorismar. salu. min. an. M. ii. flor. rosar. rubr. M. iß. santali rubr. cort. citri, cass. lign. an. Vnc. ß. nuc. cupress. nuc. mosch. an. Dra. iii. pinear. rec. num. iiii. boli Armen. mastich. an. Drach. ii. cinamomi, myrrha, an. Drach. iß. rasur. C. C. Vnc. iß.

Præparata l. a. misc. & superfund. vini rubri antiq. iß. xij.

Stent per aliquot dies, postea per cucurb. vitr. destillentur.

Si ab imminutis & erosis Gingivis sit dentium mobilitas, illæ instaurentur, ut suo loco dicetur.

Ab imminutione gingivatum.

Vt  $\mathcal{L}$ . Alumin. scissil. vsti, flor. rosar. rubr. sumach, an. Drach. iß. ligni aloes, radic. cyperi, an. Drach. i. Fiat Pulvis, qui gingivas roborat & adstringit.

Vel  $\mathcal{L}$ . Corall. rubr. prepar. Drach. iß. mastich. radic. cyperi, an. Drach. sem. aristoloch. rotund. cass. lign. an. Scr. j. F. Pulvis.

In Lue Venerea materia putrida & maligna prius abstergatur oxymel. scillit. in quo maceratum sit Guaiacum cum succo plantaginis, vel ol. sulphuris aut vitrioli: postea adspargatur pulvis ex adstringentibus: tandem post detersionem dentes frequenter abluantur decocto ligni Guaiaci parato cum vino, mastiche, plantagin.

Si à Scorbuto sit dentium mobilitas, cura ad scorbuto dirigatur, & adhibeantur ea, quæ postea de gingivis laxis & corruptis proponuntur.

Emendatur structuram firmam dentium alligatio, facta filo aureo. Quia verò interdum hanc alligationem sequitur inflammatio, illa cautè instituenda.

Quibus dentes immobiles sunt, non multum loquantur, nec dentes digitis vel lingua moucant, nec aërem frigidum admittant, nec res duras mastitent, sed iuscula sumant, ova sorbilia, vel alios cibos, in quibus forti masticatione non opus est.

De dentium Casu, & numero Deficiente.

Dentes præterea sæpenumero Deficiunt: quod accidit, cum vel violenter excutuntur, vel spontè excidunt, quod

Dentium 18.

quod malum dentium Casus appellatur : id quod frequenter in infantibus accidit, & sæpe in iis dentes à nouis, qui emergunt, extruduntur, sed sine damno aliquo; cum paulò post renascantur. Molarium tamen appendix non decidit frequenter, quia ita cum dentibus committitur atque cohaeret, ut ipsorum pars esse videatur, nec facile demi possit. Columbus, *de re Anat.* lib. 1. c. 10. Molares proximos caninis nunquam decidere, vult Plinius; caninos elapsos nunquam renasci, lib. 11. cap. 37. Negat tamen hoc Fallopius, in *librum Galeni de ossibus*, qui maxillares dentes à se in puero euulsos renatos vidit. Atque omnes maxillares dentes excidunt & renascuntur, præter genuinos, qui si exciderunt, nunquam regenerantur. Adultis verò quando id euenit, raro renascuntur : aliquando tamen id accidisse, obseruatum est, ut historia à Schenckio, lib. 1. *obs.* 48. allegata, & exempla supra, *initio capitis*, proposita testantur.

### Causæ.

Causæ.

Et ferè causas easdem habet hoc malum, quas vacillatio & mobilitas dentium, de qua antea diximus, sed grauiores. Quia enim dentes alueolis suis affiguntur, atque alueoli dentibus aptitudine respondent, præterea gingiuarum carni dentes adhærescunt; si alueoli dentibus non respondeant, sed ampliores fiant, aut gingiuarum carni non firmiter adhærescant, mobiles primo fiunt, & deinde planè excidunt, siue id fiat ob inopiam alimenti, ob quam & alueoli & dentes ipsi exsiccantur, siue ob humiditatem nimiam, radices dentium laxantem, siue ob humorum prauitatem: quod in scorbutico, & lue Venerea, & vlceribus exedentibus, cuius rei exemplum est in puero apud Hippocratem, 4. *epid.* sect. vii. & inunctione cum hydrargyro euenit: siue ob gingiuarum carnem imminutam & absumptam.

### Signa Diagnostica.

Signa causarum quod attinet, (vitium enim ipsum per se patet) ex alimenti inopia vix vnquam alicui dentes excidunt, præterquam senibus; & dentium casus ex hac causa senectuti proprius & familiaris est. Si ex alimento vitioso, & humoribus prauis id accidat, ex viuendi ratione morbis, qui præcesserunt, ex destillationibus acerbis, dentium dolore cognoscitur.

Si ex humiditate nimia, os saliuâ abundat, gingiuæ sunt humidæ; lues Venerea, scorbutus, & vlcera etiam suis signis cognoscuntur.

### Prognostica.

1. Malum hoc non contemnendum est. Nam quia dentes masticationi inseruiunt, si dentes desint, masticatio non rectè perficitur, atque ita etiam coctio in ventriculo non rectè fit. Deinde & turpitudinem aliquam pariunt, quæ in loquentibus, ridentibus, & oscitantibus apparet. Imò sæpe inde sermo vitatur.

2. Dentium ab alimenti inopia vacillatio curari nequit; id quod senibus accidit. Quæ verò affectio phlegmonæ similis est, ex alimenti redundantia, ea iuuenes magis corripit. Galenus, 5. *de comp. medic. sec. loca*, cap. 8.

3. Dentes in infantibus siue spontè, siue ob violentiam aliquam excidunt, modò radices remaneant, spontè renascuntur. Quamobrem cauendum, ne cum pueris dentes casu, atque aliquo ictu effringuntur, quæ reliqua est, portio eruarur, sed accuratissime radix ipsa, quoad eius fieri potest, seruari debet. In ea enim, veluti in semine quodam, ipsius dentis regenerandi spes residet, eaque radicius euulsa dentes non amplius, vel rarisimè renascuntur. Columbus, *loc. alleg.* In adultis verò etsi hoc aliquando accidat; tamen plerumque, vbi radi-

ces seu appendices exactè coaluerint, si ita cum radice excidant, non regenerantur.

### Curatio.

Quæ dentium mobilitas ex humiditate nimia, vel humoribus prauis accidit, eodem modo curatur ut dentium vacillatio & mobilitas; cum easdem causas habeant. Dentes verò, qui ex alimenti defectu exciderunt, etsi reparari nequeunt: tamen quia deformitas aliqua inde oritur; præsertim in anteriore oris parte, vel qui exciderunt, modò non sint carioli vel dentes arte fabricati ex ebore & in amissorum locum arte inserti, deficientium numerum supplere possunt. Cautè tamen hoc præstandum, ne ex compressione gingiuarum vel neruorum inde inflammatio gignatur; quod interdum accidisse obseruatum est.

Obseruatum etiam est, quosdam loco dentium multorum vnum os continuum habuisse, ut historia à Schenckio, lib. 1. *obs.* 412. annotata testantur.

### De dentium Numero & Situ vitiato.

Præterea numerus dentium præter naturam quandoque augetur, & plures, quam secundum naturam, dentes reperiuntur. Quosdam enim, ut modò dictum, dentium loco vnicum os habuisse, refert Plinius, lib. 7. c. 16. Plutarchus, in *Pyrro*, & alij, quos citat Schenckius, lib. 1. *obs.* de dentibus.

Id obseruatum est, quosdam duplicem, vel triplicem ordinem dentium habuisse, quod incommodi aliquid vel deformitatis ferè non habet, si situm saltem ordinarium obseruent. Cuius rei historias collegit Schenckius, lib. 1. *obs.* 413.

Interdum etiam dentium numerus imminuitur, & pauciores quidam, quam vulgò homines solent, dentes habent, ut Valescus Taranta de seipso testatur.

Nonnunquam verò dentes, siue numerum iustum obseruent, siue eum excedant, situm rectum non obseruant, sed extra ordinem prominent, & ita quidem, ut interdum labia diducant, deformitatemque pariant, ac in masticatione impedimento sint. Et imprimis dentes incisores non raro duplices sunt.

Quibusdam etiam dentes in palato enati sunt, cuius rei historia habetur apud Schenckium, 1. *obs.* 411.

Verùm cum ista mala omnia à conformatione vitiosa dependeant, emendari arte non possunt.

### De Connexione dentium.

Non verò tantum in numero & situ, sed etiam in Connexione sunt dentium vitia. Connexio præter naturam dentium fit vel ipsorum inter se, vel cum maxilla.

Inter se connexi dentes interdum sibi coherent, sicut in Persia illo, de quo Herodorus, lib. 9. Post pugnam enim ad Platæas, in qua multi Persæ ceciderunt, cum cadauera comportarentur, inuenta est maxilla habens quidem distinctos dentes, verum ex vno osse. Cuius rei historia plures videantur apud Schenckium, lib. 1. *obs.* 412.

Connexio autem cum maxilla est, quando dentes maxillæ non inserti tantum, sed planè adnati sunt & coherent, ita, ut euelli non possint, nisi maxilla ossis frustum simul auellatur; quod obseruauit Columbus, lib. 15. *de re Anat.*

### De Sordibus ac Tophis dentibus accretis.

Tandem etiam dentibus Sordes & Lapides seu Tophi, quos Græci *πύλιν* appellant, annascuntur; atque obseruatum est, in quibusdam ita incrementum sumptum, & dentes istâ lapideâ materiâ ita obductos fuisse, ut

Curatio.

Dentium situm & numerum vitiatum.

Dentium Connexio.

Dentium sordes.

ut



ut nulla dentium distinctio amplius appareret, sed vnus tantum ossis speciem præ se ferrent.

Generantur autem isti tophi ex lentis & viscidis cibis, præcipue calco, dentibus adherentibus, & in iis, vt reliqui lapides in corpore, in hanc duritiem coagulatis. Tophi illi iam geniti scalpellis, vel aliis instrumentis è ferro, aut potius argento paratis, à dentibus separandi sunt. Ne autem iterum generentur, dentes post cibum diligenter mundandi sunt; idque faciendum non ferro & acie cultri, cum dentes inde lædantur, sed dentiscalpis ligneis, vel ossis firmo ac flexili: ideoque in hunc vsum commodum lignum lentis, cupressi, iuniperi, & huius generis alia; pinæ item piscium aliquarum; item ossicula & tendines ossi gallinarum. Postea os abluatur, vel aqua, vel vino, & dentes à sordibus diligenter abstergantur; id quod fit commodissime dentifriciis & pulueribus ad dentes mundandos idoneis, qui postea de Nigredine dentium curanda proponuntur.

## CAPVT XI.

### De dentium Dolor.

Dentium po-  
la.

**A**Tque hi sunt morbi, qui dentibus accidere solent. Symptomata dentium alia in actione læsa consistunt, vt quando dolore, stupore, vel algore afficiuntur; alia in qualitate mutatâ, dum stridorem excitant & dum nigrescunt, & sordido lentore obducuntur, de quibus iam dicendum.

Et primò *de dentium dolore*, quæ appellatio à parte affecta & symptomate sumpta est, vt docet Galenus, 2. m. c. 2. Dolent autem dentes, & quidem maximè molares (incisores verò rarè, vel nunquam) etiam ossa sunt, quia sensu non planè destituti sunt, vt alia ossa. Nam, vt Galenus, 16. de vfu part. c. 2. docet, dentes mollium cerebri neruorum participes sunt, quod extrinsecus occurrentibus calidis, frigidis, duris aliisque nudi sunt expofiti. Neruulus autem ille ad radicem dentis implantatur membranulæ cavitatem dentis intus succingenti: & quidem ex tertia & sexta neruorum propagine nerui, qui dentibus implantantur, originem habent.

Galenus tamen 5. de comp. med. f. loc. etiam corpus dentis sentit ac dolet, ex affectione scilicet phlegmonæ simili in substantia dentis, vbi dolorem ex hac causa ortum discernit à dolore inflammati nerui, qui radici dentis substratus est, & à dolore inflammatarum gingivarum. Quæ omnia suo experimento Galenus, ibidem, confirmat.

### Causa.

Causa.

Causa proxima doloris cum sit solutio continui in parte sentiente, etiam hic dentium dolor excitabitur, quatenus & ipsi neruum participant, huiusque membranae dentibus inseruntur.

Solutionem autem continui hic parit vel intemperies, vel humor, vt vulgò docetur.

Verum vix sola intemperies dolorem ciat, nisi forsitan alior sit, de quo postea, sed semper humor coniungitur; & intemperies illa, si quæ adest, humori inest.

Humor autem is est vel frigidus & pituitosus, vel calidus, vel serofus, salinus & acris; id quod frequentissime accidit: & qui dolores dentium à vapore à multis fieri docentur, eos potius ab humore seroso prouenire verisimile est. Interdum etiam illa materia in dentibus putret & corrumpitur, vnde vermes geniti doloris in dentibus causa sunt.

Confluit autem illa materia vel in membranas maxillarum & alueolorum dentium, vel ad neruulum in radice dentis, & membranam huius internam nerueam,

vel in ipsum corpus dentis, è capite. Et quidem in superiore maxillam per angulum oculi maiorem, in inferiore per venas temporum. Et principium huius fluxionis plerumque est è capite, nonnunquam tamen & ex inferiore corpore materia affluit, hepate scilicet, liene, vtero Cum enim vitiosi aliqui humores, præcipue serosi, in parte aliqua geniti, in venis cumulantur, natura eis teie liberare cupiens, eos cum ad alias partes, tum ad dentes protrudit; præcipue si sint debiles. Id quod maximè accidit, cum dentes sunt serosi.

Externæ causæ, quæ seu humores commouent, seu, vt facilius recipiantur, faciunt, sunt ictus & calus, vltus ciborum nimis frigidorum aut calidorum, maximè si mutuo mox se consequantur, acium item, acerborum ac dulcium frequens vltus, contactus, creber, qui fit ferro.

### Signa Diagnostica.

Primò vt certi simus, an dolor sit in dente vel gingiu, ante omnia inspicienda est gingiu, vtum inflammata sit, tumida, corrosio seu putrefactio in ea appareat. Si nihil horum cernatur, causa doloris erit in dente ipso, vel eius neruo. In dente quidem, si dolor non ita profundus est, & secundum latitudinem dentis extenditur, mutatio etiam quædam doloris in dente animaduertitur. Et fortassis dens tum cariosus est à verme intus obsessus: vbi etiam dolor interpolatus est ad motum ipsius vermis. In nerulo verò si dolor sit, profundior & vehementior est, qui dente exemplo nonnihil leuatur, quod ob viam patefactam materia iam melius diffilatur, dolor etiam secundum gingiuas se extendit in latitudine, aut ad aurem pertingit.

Signa causarum sic discernuntur: Humor, qui doloris causa est, suis signis se prodat, ex doloris specie, ex sapore, & habitu corporis. Sanguis cognoscitur ex dolore pulsante, sapore iudulci; pituita, dolore distendente, sapore salso aut insipido, bilis dolore punctorio, sapore amaro; humor melancholicus dolore profundo, & sapore acido; à sero dolor non est ita fixus, sed sæpe mutatur, ac generatim à calido humore dolor est acerbior, à frigido remissior. Habent hic locum signa, quæ supra, lib. 1. de intemperie capitis cum materia, sunt expofita.

### Prognostica.

1. Dolor dentium maximis tormentis annumerari potest, teste Celso, lib. 3. cap. 9. Et, vt Galenus scribit, 2. de comp. med. sec. loca, cap. 1. nonnullis tantus fuit, vt mortem sibi impatientia conscuerint. Ita dolor dentium periculosior videtur esse, quàm dolor capitis, symptomatis scilicet ipsius ratione, non causarum; cum causa dolorem capitis producat propior sit cerebro, & proinde grauius symptomata, vt cæcitatem, apoplexiam, & similia afferre possit.

2. Dolor dentium, pro causarum & loci affecti diuersitate, facilius aut difficilius curatur. Ex sanguinis affluxu citius tollitur: quanquam, si inflammationem pariat, multum sæuiat.

3. Atrociori dolore excitat humor tenuis acris, salinus & serofus, sed citius desinit, ob materiam illius mutationes subitas. Mitior dolor est à frigido & pituitoso humore, etsi diuturnior.

4. Si affectus fuerit in gingiu, dolor non remouebitur dentis euulsione; si in neruo, dolor exemplo interdum cessat, dum materia antea conclusa exitum iam habet, tensioque remittit, aliquando remanet, quando materia nimis crassa & lenta neruo adhæret. Auicennas, tert. can. fen. 7. tract. 1. cap. 5.

5. In vehementi dentis dolore si, nullo prius affectionis vestigio in gingiu apparente, tumor iam in iisdem, aut in malis oboritur, bonum est. Significatur enim, materiam ab internâ dentis cavitare ad externa verri

verti ac deriuari, siue naturæ robore, siue virtute medicamenti.

6. Dentium dolor cum eorundem stridore & febre ardente lethalis est: quod si iis accidit, quibus antea dentes stridere non consueuerunt, commotionem mentis, maniam, epilepsiam, aut conuulsionem portendit. Cum enim stridor fiat ob conuulsos temporum masticulos, argumento est, cerebrum affectum esse; cui si delirium coniungatur, mali confirmati est indicium, atque inde mors sequitur.

6. Quibus in dentium dolore à supercilio tenuia procedunt, his à pipere probè affricato postridiè crassiora discedunt, si stupefaciens prius adhibitum dolorem non sedauit sed potius auxit, vt Hegesippi exemplo docet Hippocrates, 6. *epidem. sect. 6.* Piper enim impactum à narcotico succum soluit, vnde dissipato eo mitigatio doloris sequitur.

8. Dolore dentium cessante interdum aures pus colligunt. Sic Athenæo puero sinistra parte dens inferior, dextra superior doluit. Huius auris dextra pus collegit, cum non amplius doleret. Hippocrates, 4. *epid. sect. vii.*

#### Indicationes.

*Indicationes.* Medicus in dolore dentium curando vel ad dolorem ipsum, vel ad causam respicit. Dolor equidem, qui maximè vrget, indicat anodynum: verum ea parùm proficiunt, nisi fluxio sit ablata. Ideò in primis causâ doloris remouenda, humor scilicet ad dentes confluens reuclendus, euacuandus, repellendus & euacuandus: si tamen dolor valde vrgeat, narcotica adhibenda.

#### Curatio.

*Curatio.*

Itaque si plethora adsit, & dolor dentium vel gingivarum sit cum inflammatione, vena cephalica eiusdem lateris, reuulsionis causâ, si materia à capite mittatur; vel basilica aut saphena aperiatur, si ab inferioribus, aut cucurbitulæ cum scarificatione scapulis apponantur. Deriuationis gratiâ venæ sub lingua incidantur. Quidam etiam post aurem, & in aurium meatu superiore parte venam aperiunt. Nonnulli quoque aurium scarificationes adhibent. Nec aliæ reuulsioniones omittantur, vt & deriuationes, per frictiones, ligaturas extremorum, lotiones crurum, vesicatoria brachijs & ceruici, vel post aures imposita. Vulgus carpo etiam flammulam vel ramunculum flammæum imponit eius manus, quæ est è regione & latere doloris. Exempla in Institutionibus & alibi sunt proposita.

Si verò alij humores peccent, ij conueniente modo euacuentur, prout humoris dolorem patientis natura & conditio id requirit.

Vniuersalibus præmissis, si materia adhuc in fluxu sit, adstringentia fronti & temporibus applicentur, ac intus vsurpentur, quæ os ventriculi astringunt ac roborant, si ab inferioribus etiam aliquid sursum mittatur.

Quin & errhina naribus immitti possunt. Imò etiam reuulsionis gratiâ brachijs & ceruici vesicatoria applicare licet.

Temporibus quoque applicare vtile est emplastrum ex gummi tacamahaca, mastiche, myrrha, gummi elemi. Quæ etiam dentibus ipsis topica applicantur, repellentia sunt, quamdiu aliquid influxerit.

Cautione tamen in repellentibus adhibendis opus est, præcipuè si maxillis applicentur. Nam licet, si materia in ipsum dentem saltem fluat, repellentes oris colutiones sine periculo applicentur; tamen, si materia sit copiosior, ita, vt etiam maxillam occupet, repellentia, præcipuè maxillis, non tutò applicantur; cum materiam intro ad fauces repellere, & ægrum suffocare possint. Ita refert Valescus de Taranta quendam bonum & peritum Medicum, cum aliquando dolorem haberet

dentium molarium cum inflatione maxillæ, apposuisse maxillæ oleum rosaceum cum aceto, cum ad lectum iret, vnde factus fuit fluxus materię ad guttur, & ægrum angina correptum & mortuum fuisse.

Fluxione cessante discutientibus vtendum, quibus tamen semper aliquid adstringentium commisceatur.

Ad stupefacientia non, nisi magna necessitate urgente, veniendum.

In materia igitur calida pro repulsione laudatur collutio oris cum aceto, in quo decocta sint fol. Myrt. flor. rosar. rubr. radix oxylapathi, filicis, rad. & fol. haliacabi. sem. hyoscyami. Vel detineatur in ore aqua rosarum cum tertia parte aceti, vel succus plantaginis, semperuiui, vel decoctum è rosis, lactucta, plantagin. acetos. salic.

℞. Flor. ros. rubr. fol. malu. minor. ana M. i. Coq. in vino austero ad tertiās. Colaturæ.

℞. Vnc. vi. Quibus admisce ol. sulphur. acidi Scr. ss. croci Scrup. i. M.

Vel ℞. Fol. quercus, plantag. ana M. i. hedera arbor. M. ss. rad. tormentill. ʒ. ii. vrtica ʒ. iii. Coq. in vini Rhenani q. l. ad tertiās, & colentur.

Rulandus aquâ solani cum oleo vitrioli mixtâ vtitur.

Vbi verò gingivæ simul sunt affectæ, acetum, momente Aërio, tanquam hostilis gladius, virandum est, ob mordacitatem, quâ gingivas erodit. Alioquin in dolore dentium, citra gingivarum inflammationem, siue corpus ipsum dentis doleat, siue neruulus eidem substratus, Galenus in aceto medicamenta præparare iubet, tam repellentia, quàm discutientia, ʒ. de comp. med. sec. loc. cap. 9. Et si enim acetum per se dentibus noceat: tamen repellentibus rectè admiscetur; quoniam penetrando illorum vim auget: discutientibus etiam, quia præterquam quòd penetrationem adiuvat, ipsum quoque incisoriâ vi suâ nonnihil ad discutiendum conducit.

Vel ℞. Sem. papau. albi, hyoscyam. ana ʒ. ii. rad. alibæ Vnc. ss. flor. chamem. rosar. rubr. ana P. j.

Coqu. in aquæ & aceti s. q. ad consumptionem tertiæ partis.

Vel radices oxylapathi. coq. in vino austero, & decoctum in ore detineatur.

Vel radices oxylapathi. aceto maceratæ dentidolenti & cauernoso indantur. Efficax est etiam medicamentum decoctum radic. prunorum syluestrium ablato cortice exteriori.

Vel ℞. Limatura ligni Guaiaci Vnc. ii. cortic. interior. virid. quercus, radic. prun. sylu. ana Vnc. i.

Coq. ad remanentiam lb. j.

Extra inungatur maxilla vnguento albastrino. Monet tamen Langius, vt vnguentum alabastrinum in materia calida misceatur cum frigidis, sicut in frigida cum calidis.

Vel ℞. Pomor. dulc. Vnc. ii. Adde furfuris Vnc. iii. croci Scrup. i. olei rosati Vnc. i. M. Fiar cataplasma extra loco dolenti apponendum.

Vel ℞. Medulla pomor. assat. Vnc. ii. ss. stercor. gallin. Vnc. i. ss. ol. rosati omphac. ʒ. vi. Misce exactè, & fiat Cataplasma.

In materia frigida Auicennas alumen vstum aceto extinctum cum salis pari portione misceat, eoque dentes fricat, & postea cum vino abluit. Resoluit simul vinum, in quo hyssopus & thymus coctus est. Vtilis est & collutio ex decocto origani, serpilli, sem. staphidis agriæ, rad. pyrethri, acori, ligni sancti, & similibus.

Vt ℞. Origani M. i. hyssopi M. sem. cort. aurantior. Vnc. sem. Coq. in vin. lb. i. ad consumpt. tertiæ partis, & colentur.

Vel ℞. Fol. betonic. salvia maioran. rosismar. ana M. ss. flor. stachad. Arab. P. ii. sem. nigella, rad. pyrethri, ana ʒ. ii. Coq. in vino albo & aceto, pari portione, pro Collatione oris.

Vel

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Origan. rorismar. salvia*, ana M. sem. *rosar. rubr.* P. i. rad. *pyrethr.* Drach. iij.

Coq. in  $\mathcal{H}$ . ij. aqu. ad dimidium. Colaturæ adde acet. *rosacei* q. s. ad gratam aciditatem.

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Limatur. lign. Guajaci* Drach. i. cort. *inter. virid. lign. querc. rad. pyrethri. filicis*, ana Vnc. sem.

Coq. in aqua pura  $\mathcal{H}$ . j.  $\mathcal{B}$ . ad  $\mathcal{H}$ . j. remanentiam.

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Rad. pyrethri* Drach. ij. *sarsa parilla* Drac. iij. *rasura ligni Guajaci* Vnc. sem. *pini* Drach. iij. *fl. ros. rubr. serpilli. origani*, ana P. j. *gran. junip.*  $\mathcal{Z}$ .  $\mathcal{B}$ . sem. *carni*  $\mathcal{Z}$ . iij.

Incisa & contusa coq. in aq. & vini *Rhenani* Vnc. xii. ad tertias, colentur.

Colaturæ  $\mathcal{Z}$ . Vnc. vi. In quibus dissolue *camph.* gr. v. M.

Vtile etiam est decoctum gummi juniperi cum vino paratum.

$\mathcal{Z}$ . *Gummi juniperi* Vnc. sem. *vini Rhenani* Vnc. viij.

Coq. & colentur. Colatura calida in ore detineatur.

Alij *camphoræ* *Scrup.* sem. in spiritus vini Vnc. ii. dissoluunt, & eodem modo vtuntur. Iuuat & sequens *Gargarismus*.

$\mathcal{Z}$ . *Rad. urtic. ardent.* M. j.

Lauetur ter in aqua, postea ex vino; terantur optime in mortario cum *rad. pyreth. zingib.* ana Drach. j.

Bulliant in *vini alb. opt.*  $\mathcal{H}$ . iij. ad tertias pro *Gargarismo*, qui sæpius adhibeatur. Commendatur etiam sequens *Liquor odontalgicus*:

$\mathcal{Z}$ . *Cortic. ligni Guajaci*  $\mathcal{H}$ . ij. *maslich.* Vnc. i. *vini bis destillati*  $\mathcal{H}$ . ii.

Digerantur in Sole per mensem bene agitando, donec rubescant, postea colentur & clarificentur. Hujus essentia gr. vj. vel vij. in ore detineantur.

Tædarum quoque & pinearum decoctum prodest pro collutione oris.

Ipsi etiam denti dolenti applicentur *rad. oxylapath.* aceto macerata, vt antea dictum; vel *spongia madida* decocto *staphydis agriæ*, *myrrhæ*, *cortic. radic. cappar.*

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Rad. helenij. oxylapath. pyrethri. filicis. aluminis vsti* partes æquales.

Contundantur in puluerem, & cum melle fiant *Pilulæ* dentibus imponendæ.

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Rad. pyreth.* Drach. j. *serpentar. filicis. oxylapath. alumin. vsti*, ana Drach.  $\mathcal{B}$ . *mellis* q. s.

Fiant *Pilulæ* dentibus imponendæ.

*Trochisci* de *pyrethro*:

$\mathcal{Z}$ . *Rad. pyrethri* Vnc. i. *bistort. hyoscyami*, ana Vnc. sem. *alumin. tragacanth.* ana Drach. ii. *aceti vini acerr.* q. s. F. l. a. *Trochisci*.

Aut olei destillati *caryophyllor.* gutta vna vel altera cum *gossypio* denti imponatur, cuius Drach. sem. aliquot *camphoræ* gr. admisceri possunt. Idem præstant olea destillata *spicæ*, *thymi*, *nuc. mosch.* *cinam.* *juniperi*, *ligni Guajaci*, & similia.

Suffitus etiam per tubulos conuenientes ore excipi possunt ex *radic. bryon. pyrethri. cortic. radic. cappar. myrrhæ*, *thure* in aceto & vino coctis.

Hodie fumum *Nicotianæ* ore excipere vulgatum est.

Vt sæpe à me compertum, & efficax in dolore dentium à quacunque ferè causa est remedium hæc *Oris collutio*.

$\mathcal{Z}$ . *Rad. filicis. pentaphyll.* ana Drach. iij. *bistort.*  $\mathcal{Z}$ . ii. *fol. ruta. salu. betonic. flor. rosar. rubrar.* ana M. sem.

Coq. in vini rubr. & adstringentis & aquæ communis, ana q. s. ad consumptionem tertiæ partis, pro *Collutione* oris.

Extra applicetur hoc *Cataplasmâ*:

$\mathcal{Z}$ . *Rad. malua* N. xii. Coq. ad mollitiem. Adde *farina fœnigraci. sem. lini. pulu. anethi. fl. chamameli*, ana Vnc. i. *farina hordei* Vnc. iv.

Incorporentur omnia simul, & in fine addatur *ol. chamamel. vel aneth.* F. *Cataplasmâ*.

Si ob doloris vehementiam aliquod periculum me-

*Dan. Sennerti Tom. II.*

tuendum sit, narcotica vsurpentur.

E. g. *Fiat* oris collutio cum decocto *rad. & fol. hyoscyami*, vt & sem. ejusdem, ac sem. *lactucæ*, & *papau.* cum aceto parato, cum  $\mathcal{B}$ . opij. Vel fiat collutio oris ex aceto, in quo opij grana aliquot sint dissoluta. Possunt & opij grana ij. cum æquali parte *croci* vel *castorei* bombace excepta in dentis capernulam indi, si erosus sit: sin minus, opium & crocus in pauxillo lactis vel aq. *papau.* aut *hyoscyami* dilui, & dentis dolentis radix eo fricari potest.

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Fl. chamam. anethi*, ana P. j. cort. *rad. mandrag.*  $\mathcal{Z}$ . j. sem. *hyoscyami. papau.* ana  $\mathcal{B}$ . ii. Coq. in aq. *solani. plantag. rosar.* ana Vnc. iij. Colentur, colaturæ admisce *aceti rosac.*  $\mathcal{Z}$ . i. *laudani opiat.* gr. iij. M.

Vel indatur denti *pilula* de *laudano opiato*, vel *pilula* de *cynoglossa*.

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Laudani opiat.* gr. iij. *sp. vitrioli* gut. i.

M. F. *Pilul.* & dentibus vna indatur.

Vel *theriaca recens* aut *Mithridatium*, vel *philonium Romanum*, aut *scorirella parua*, in *Dispensatorio Augustano* descripta, denti illinatur.

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Syrac. calamis. piper. albi. costi. opij. sem. hyoscyam.* ana  $\mathcal{B}$ .

Cum vino F. *Pilulæ* dentibus indendæ. Vel indatur *Pilula* vna de seqq.

$\mathcal{Z}$ . *Semp. apij. hyoscyami*, ana gr. iij. *opij* gr. iij.

Cum syr. de *papau.* fiant *Pilulæ* iij. vel v.

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Philon. Romani*  $\mathcal{Z}$ . j. *spir. ligni Guajaci*  $\mathcal{B}$ . i.

Vel  $\mathcal{Z}$ . *Rad. pyrethri. sem. apij*, ana gr. ii. *hyoscyami. opij.* ana gr. i. Cum syr. *papau.* fiant *Pilulæ* N. v.

Aut admoueatur cum *gossypio* oleum *hyoscyami*. Vel aliquid de sequenti *Mixtura* cum bombace denti dolenti applicetur:

$\mathcal{Z}$ . *Philon. Rom.*  $\mathcal{Z}$ . i. *opij* gr. vi. *ol. vitrioli* gut. v. M.

Balsamum ad dolorem dentium:

$\mathcal{Z}$ . *Opij Thebaic. spec. diamb.* ana  $\mathcal{B}$ . i. *camph.* gr. iij. *ol. nuc. mosch. expr.*  $\mathcal{B}$ . ii. *caryophyll.* gutt. vii. vel q. s. F. *Balsamum*.

*Decoctum Langij.*

$\mathcal{Z}$ . *Opij Thebaici*  $\mathcal{B}$ . ii. *succi hyoscyami*  $\mathcal{B}$ . iv. *cortic. mandragora*  $\mathcal{B}$ . v. *fl. chamamel.*  $\mathcal{Z}$ . i.  $\mathcal{B}$ . *pyrethri*  $\mathcal{B}$ . v. *croci integri*  $\mathcal{B}$ . i. Infunde in vini  $\mathcal{H}$ . i. aq. *rosar.* Vnc. iv. *aceti opt.* Vnc. vii.

Bulliant in vase duplici ad tertiæ partis cōsumptionem, & cum pāno intincto dētibus colatura applicetur.

Cautio tamen in narcoticorum exhibitione adhibenda. Refert enim *Alexand. Benedictus*, de cur. morb. l. 6. c. 13. *Jacobum Iustinianum*, *Patritium Venetum*, in dentis dolore oleo opiato imposito, *Patani* sopore perpetuo extinctum fuisse.

Dolore sopito post opiatorum vsum os illico abluitur decocto *saluiæ*, *rorismarini*, *majoranæ*, *hyssopi*, vt noxa ab opio impressa tollatur.

A proprietate etiam valere dicuntur sequentia: Suffitus ex canis mortui dente, aut vstus ille in fornace cum posca misceatur & imponatur; senecta serpentis in aceto cocta, aut vsta eadem & trita, atque cum melle vel oleo ad mellis spissitudinem subacta, imposita; dictamni quoque radix, & radix *chelidonij*, præsertim si vermes sint in dentibus.

*Plinius* *plantaginis* radicem in aceto coquere jubet. Decoctum etiam foliorum lappæ maioris cum sale in aceto commendatur. De *pastinacæ* etiam marinæ radio scribit *Plinius*, l. 31. cap. 7. si eo gingiæ scarificentur, dolorem dentium sedare.

A Recentioribus, consentiente experientia, plurimū commendatur oleum ligni heraclei per retortam destillatum, si gutta vna cum *gossypio* denti imponatur.

Nonnulla tamen horum ad manifestas qualitates reduci possunt, cum vel repellant, vel discutiant, vel dolorem sedent.

Si his nihil proficiat, dens corrosus extrahatur.

H H h Præpa

Præparatur autem ad extractionem, vt supra etiam dictum, imponendo in foramen lac tithymali vel solum, vel cum puluere radic. mori aut cappar. mixtum, Aut, quo Galenus vtiq; rad. pyrethri, 40. diebus in aceto maceratæ ac trita denti imponantur.

De pastinacæ etiam marinæ radio scribit Plinius, si tritus cum helleboro albo illinatur, dentes sine vexatione extrahi.

Facile quoque cadit dens, si cum aqua ex sale Armoniaco destillata tangatur.

#### Diata.

Diata pro caussarum diuersitate variet, & medicamentis respondeat. Inprimis tamen danda opera, vt dentes à corruptione præseruentur. Ideoque ratio inprimis ventriculi & capitis habeatur, ne crapulâ & cruditate infestentur. Lactis item & dulcium, vt ficuum, mellis, sacchari vsus frequentior cauendus. Raphanus quoque & masticatione & euaporatione nocet, sicut & porrum, quod à proprietate dentibus nocere, auctor est Auicennas. Vitentur quoque acerbæ valde & acidæ: præterea solida & dura inimica sunt dentibus, ac stupefacientia ac gelida, sicut & cæteris ossibus. Actu quoque vehementer calida, præcipue si frigida mox sublequantur. A cibo dentes diligenter mudentur, & vtiq; est, vt dentes semper à cibo sale fricentur, & os vino eluatur.

Præseruantia.

Quod ad remedia præseruantia, commendatur sal theriacale, Galeno, in lib. theriac. ad Pisid. c. 18. teste. A dolore dentium etiam præseruant collutiones oris ex iis, quæ adstringunt; inprimis si medius cortex fruticis berberis aqua maceretur, & aquâ mane os colluatur. Lauentur etiam dentes bis singulis mensibus vino, in quo tithymali radix cocta sit, eodem Galeno docente, 1. de Euporist. cap. 12. & 2. cap. 16. Quibus locis plurima huius generis medicamenta reperiuntur. Prodest etiam pro collutione oris aqua saluæ, vel vinum decoctionis saluæ, vel acerum decoctionis origani, & mentastri. Dentifricia quoque adhibeantur frequenter, de quibus postea, cap. 14. dicetur.

#### De dolore Puerorum dentientium.

Dolor infantium dentientium.

Et si, vt supradictum, infantes jam, dum in lucem eduntur, dentibus præditi sint: tamen gingiuis tum reguntur, & postea demum erumpunt. Infantes autem, cum dentes erumpunt, sæpe maximus dolor affligit. Et si enim & alia symptomata dentitioni infantium conjungantur: tamen de iis omnibus agere huius loci non est, sed dicendum de eo, de morbis infantium, vbi de Dentitione in genere agendum erit.

Adest autem dolor maximus, cum canini erumpunt, vnde etiam vulgatum est; Parentibus non esse gaudendum de liberis, donec hi dentes eruperint.

Cum verò dolor ille ferè à densitate & duritie gingivarum existat, hæ rarefaciendæ & emolliendæ sunt. Oblinantur itaque lacte canino, aut cerebro leporino, quod nonnulli crudum assument, mellique permiscant. Sed Galenus, in 1. de simp. med. fac. & Auicennas cocto vtuntur, toto scilicet capite elixo.

Valent & cerebella pullorum & auium. Aut gingiuarum pinguedine gallinæ aut anatis recent. inungantur, aut butyro recenti non salito, eoque vel solo, vel cum melle, vel cum decocto lactucæ permisto.

Commendatur etiam succus è cancri viuis contritus cum aqua flor. cyani extractus, si eo gingiue abluantur.

Si dolor vehementior sit, Auicennas succum solani cum oleo solarum calefacit & illinit. Alij malagmate vtuntur ex semine lini & althææ, & aliqua pinguedine, vel, si febris adsit, ex semine lactucæ.

Vel 2℥. Sacchari & butyri s. sale, succi althææ, ana Vnc. i. vitell. oui dimid. M.

Ambrosius Paræus, lib. 23. cap. 67. suadet, vt, si infantes ob gingivarum duritiem de vita periclitentur, scalpello gingiue aperiuntur; atque eius rei periculum cum felici successu in aliquot suis liberis se fecisse scribit.

Nonnulli & quædam periastra commendant. Aërius radic. colocynthidos syluestris laudat, si canali argenteo includatur, & collo pueri appendatur: alij dentem viperæ malculæ appensum, jaspidem item viridem, & dentem lupi dextrum, de quo Plinius, lib. 11. cap. 37. Dens dexter caninus lupi in magnis habetur operibus. Quæri tamen hic posset, an dens lupi id, quod præstat, gestatus præstet, an verò potius, quod, dum eum infantes sugunt, & gingiuis admouent, eas hoc modo rarefaciat.

## C A P V T XII.

### De dentium Stupore & Algore.

Stupor dentium, Græcis *αιμαδία*, est molestia & dolor quidam dentibus accidens ab acidis & acerbis præcipue rebus, qui sensu rectius percipitur, quàm verbis describitur. Id malum ita occupat dentes exteriores, vt non solum mandentes ex eo intoleranter doleant; verum etiam ipsimet dentes digitis suis attingere præ dolore vix sustineant. Quapropter non satis commodè stupor affectus ille appellatur, qui est abolitio sensus; sed potius ad dolorem pertinet. Vnde rectè Capiuaccius, l. 1. Pract. Medic. cap. 53. hæmodiam dolorem dentibus proprium esse asserit.

Dentium stupor.

Causa est sapor acidus, temperiem dentium immutans. Id quod accidit à cibis quibusdam huiusmodi sapore præditis. Idem euenit ab humoribus acidis & atrabile vomitu rejectis; id quod multis affectione hypochondriaca laborantibus accidisse memini, qui tam acida vomitu rejecerunt, vt dentes stupidi iis ita inde euaserint, vt per integrum diem vix aliquid comedere potuerint. Quod quandoque etiam præstant vapores acidi è ventriculo ad dentes elati. De quo Hippocrates, lib. 2. de morbis, sub morbo nigro. Aliquando & ipsis dentibus huiusmodi materia alieno sapore infecta innascitur, vel ad eos confluit.

Causa.

Contingit etiam, vt ab imaginatione stupor eiusmodi inducatur, quando alium res acerbis masticantem videmus, aut strepitum limarum vel similibus rerum audimus. Nam imaginatio occulto modo monet humores in corpore, atque eos præcipue qui cum re, quam imaginamur, analogiam aliquam habent.

Fracastorius tamen, & probabiliter, de sympath. & antipath. cap. 14. ad auditus organum affectum causam refert, dum scribit: Similiter & si acutus valde sit sonus & stridulus, applicatio vim patitur, quasi in angusto facta, tum & membrana auditus quasi ista offenditur, vnde contrahitur repente, ac cum ea simul & nervuli quidam vsque ad radices dentium, in quem locum subito incidens nouus aer horrorem quandam circa dentes facit.

Medetur huic affectioni portulaca masticata, cuius succus lentore suo dentibus adhærens affinitate quadam humiditatem acidam & acerbam è dentibus extrahit, vt disputat Aristoteles, 1. problem. 38. Et si hoc alij ad proprietatem substantiæ referunt, quæ & in apostematibus lienis portulaca prodest, & affricione verrucas tollat. Rhafes & amygdalas amaras, atque ceram masticatam commendat, quæ temperatâ suâ qualitate ac vinctuositate illam quasi congelationem remittunt. Salem item affricare iubet, qui materiam liquefaciendo acorem è dentibus extrudit. Alij panem calentem, vt è furno extrahitur, masticandum exhibent, aut radices vel succum glycyrrhizæ, aut pineas, auellanas, juglandes. Alij caseum recentem commanum,

Cura.



commansum, & calidum oui vitellum commendant. Egineta omphacinum inunctum, vt & amurcam vetustam in æneo vase coctam ad mellis crassitudinem inunctam laudat. Confert & frequens oris collutio cum vino calido. Collutio quoque oris commoda est ex aqua saluæ calente, vel decocto radic. aristolochiæ & baccar. lauri.

Cognatum stupori malum est, cuius Rhases meminit, cap. 44. quando dentes frigidi tactu inprimis offenduntur; quod malum Auicennæ est Eber dentium, ac dentes tum ita afficiuntur, vt neque frigidum neque calidum, neque durum quid tolerant. Causa est debilitas dentium ex intemperie siue frigida, siue calida, & eorundem debilitas, seu, vt aliis placet, nimia sensibilitas cum raritate texturæ. Plerumque verò ab intemperie est frigida. Ideò Rhases oleum excalefactum ore tenere iubet, & vitellum oui assatum calidum masticare, aut calentem panem. Auicennas hierâ simpl. aut theriaca dentes fricat; vel masticentur lauri baccæ, aristoloch. anetum. In calida materia Auicennas fricat dentes oleo rosaceo tepefacto, cui camphora & fantali sint admixti: aut mucilaginem sem. psyllii vel sem. portulacæ masticare iubet.

## CAPVT XIII.

## De dentium Stridore.

**D**entes naturâ et si moueantur, dum voci formandæ & masticationi inferuiunt: tamen motus ille fit sine sono. Interdum verò p. n. sonitus accidit, qui Stridor dentium appellatur.

Causa eius est imbecillitas muscutorum maxillæ à frigore, aut potius rigor quidam in ea accidens à frigore; vermes etiam, per consensum cerebro affecto vaporum multitudo, vt in paroxysmorum principiis.

## Prognostica.

1. Stridor dentium iminatur apoplexiam vel epilepsiam. Valescus de Taranta.

2. In febribus dentibus stridere, quibus à puero minimè est consuetum, insaniam & mortem significat. Quod si iam deliranti id accidat, admodum id exitiale est. Hippocrates, in Coacis. Potest tamen delirium cum dentium stridore dupliciter coniungi. Aut enim præcessit stridor, & secutum est delirium, vel contra. Si præcessit stridor, maniam & mortem prædicere potest Medicus; quia cerebrum simul afficitur. Si verò antecedar delirium, & sequatur stridor, non semper exitiale malum denotat; quia prouenire potest à facultate imbecilla, non semper cerebro affecto.

3. Stridorem dentium etiam inter conceptionis signa refert Hippocrates, de superfætatione.

Curatio ad ipsum stridorem dirigenda non est, sed ad causas.

## CAPVT XIV.

## De dentibus Nigris, malè Coloratis &amp; Sordidis, &amp; Sanguinis è dentibus fluxu.

**D**entes naturâ sua albi sunt, quæ res vt naturalem dentium constitutionem indicat, ita ad decorem & pulchritudinem hominisetiam facit.

Qui color si mutetur, quod sæpe accidit, dum dentes à naturali suo candore ad flauum, liuidum, nigrum colorem defleunt, vitium in qualitate mutatâ oritur, quod sæpe in dentium corruptionem & grauiora vitia degenerat.

Accidit autem ista dentium fœditas ab humoribus

Dan. Sennerti Tom. I I.

vitiosis in superficie illorum hærentibus; à vaporibus sursum exhalantibus, à frequenti dulcium esu, à masticatione fructuum nigrorum, vt myrtilorum, mororum, à cibis in vasis cupreis aut æneis asservatis, ab inunctione argenti vini, in lue Venerea, vel ab eadem in fucis & pigmentis faciei adhibitis, vnde fæminæ, quæ ad faciem pingendam fucis ex Mercurio vtuntur, plerumque dentes malè coloratos habent. Interdum tamen etiam ab humoribus vitiosis, & alimento prauo dentibus sese insinuante color eorum mutatur.

Ad dentium autem fordes tollendas, & colorem vitiosum emendandum, vñtatissima sunt Dentificia parata ex iis, quæ fordes abstergere possunt; vt ossibus sepia, pumice, præcipuè si igniatur, & vino albo bis extinguitur, ac tertia vice ignitus spontè refrigerari sinatur, & puluerisetur; cornu cerui, corall. margarit. ocul. cancri, lapid. spongia, alabast. cochl. testis combustis, radic. aristol. testis ouorum, mandibulis luy, silicibus combustis, arena alba, mastiche, sale, gummi iuniperi, tartaro, alumine. Quibus ad suauem anhelitum conciliandum addi potest cinamomum, lignum aloes, rad. ireos, rosmarinus, flor. lauendula, rosarum, moschus.

Vt ℥. Alabastr. pumic. an. Drach. iij. salis Dach. i. F. Puluis.

Vel ℥. Off. sepia Drach. ii. test. ouor. Drach. i. b. rad. ireos, coralli. albor. an. Scrup. i. alum. roch. Scr. b. mastich. rosar. rubr. an. g. v. mosch. g. i. silic. alb. combust. vel aren. albiss. subtiliss. ad pondus omn. F. Puluis.

Vel ℥. Mandibul. luy, C. C. vñti prapar. corall. prapar. an. Vnc. b. aluminis vñti, rad. ireos, an. Drach. ii. sal. gemmei Drach. i. F. Puluis.

Vel ℥. Off. sepia, corall. albor. margarit. prapar. an. 3. i. C. C. vñti Drach. i. b. pulu. rad. ireos, gummi iuniperi, an. Drach. b. aristol. rot. Scrup. i. lign. aloes Drach. b. mosch. g. ii. F. Puluis.

Vel ℥. C. C. vñti prapar. corall. albor. an. Drach. b. margarit. prapar. Drach. i. mastich. ireos, an. Drach. i. mosch. g. iv. F. Puluis.

℥. Corall. albor. rubr. an. Drach. ii. lapid. spong. off. sepia, an. Drach. i. C. C. vñti prapar. rasur. eboris, an. 3. ii. mastich. Drach. iii. gummi iuniperi Drach. i. b. sal. terre fact. Drach. ii. mosch. Scrup. b. F. Puluis.

Vel ℥. Pulu. crystalli Drach. ii. corall. rubr. scobis C. C. albiss. & subtiliss. an. Drach. ii. F. Puluis.

Vel ℥. Pulu. ossis sepia, lapid. silicis vñti, pumicis vñti, an. Drach. i. b. calaminar. Drach. b. C. C. vñti Drach. i. rad. ireos Drach. b. F. Puluis.

Anth. Boëtius puluerem osteocollæ commendat. Potest & pulueribus saccharum, mel, vel oxymel admisceri, & mixtura Electuarij instar parari, quæ dentes fricentur.

Vt ℥. Pulu. corall. rubr. lap. crystalli, an. Drach. i. off. sepia, lap. calaminar. myrrha, an. Scrup. i. alum. vñti, salis rosti, C. C. vñti, lap. pumicis, an. Drach. b. rad. ireos, calami odor. nuc. mosch. an. Drach. b. panis albi rosti Drac. iii. oxymel. scillit. q. s. M.

Hæc mixtura dentes alternatim fricentur, postea lauentur oxycrato vel aq. aluminosa cum aq. communi vel rosarum.

Alij solo melle rosato cum oleo vel spiritu vitrioli mixto vtuntur h. m.

℥. Mellis rosati col. Vnc. i. spir. vitrioli Drac. b. M.

Secreti loco nonnulli commendant carbonem & cineres stipitum rorismarini: quibus Neoterici præferunt, & pro certissimo experimento habent, cinerem Nicotianæ.

Cardanus aq. & succum limonum ac citri commendat.

Vel ℥. Summit. myrthi, lentisci, oleastri, saluia, rorismarini, an. M. i. corall. rubr. eboris, dent. equorum. an. Vnc. iv.

In fictili vase simul vrantur, addendo *salis communis* p.j. donec omnia dealbata sint, & reducantur in pulverem, cui adde *garyophyll. cinamomi, rorismarini*, an. Drach. iii. *moschi* Scrup. i.

F. Pulvis. Qui etiam excipi potest oxymel. scillitico, vel mucilag. gummi tragacanth, aut Arabici, & inde Styli formari.

Loco pulverum etiam Styli ad dentes mundandos fieri possunt:

℥. Corall. rubr. prepar. pumic. prepar. an. Drach. i. β. gallie mosch. Scrup. i. sanguin. dracon. caryophyll. cinamomi, mastich, an. Drach. i. r. mosch, ambr, an, gran. ii.

Cum tragacanth, in aqua rosar. dissol. F. Styli.

Vel ℥. Lapid. pumic. Vnc. β. corall. rubror. alb. C.C. prepar. an. Drach. β. sanguin. dracon. Drach. ii. gummi Arabici in aqua rosar. dissolut. & album, ouor. q.s.

In summa, ne dentes malè colorati euadant, & corumpantur, dentes à sordibus & cibis mundandi, verum non acumine cultri, cum dentes inde lædantur, sed dentifcalpiis ligneis, vel ex osse firmo ac flexili paratis, è spinis piscium aliquorum, ossiculis & tendinibus ossis gallinarum, item ligno lentisci, myrti, lauri, juniperi, cupre. F. Os verò post cibum colluatur aqua, salsa inprimis, vel vino, Commendatur ad dentes mundandos & hæc Aqua:

℥. Sacchar. lb. β. sal. ℥. iii. alumin. Roch. ℥. i. β.

Destillantur per alembicum. In aqua intingatur gossypium, & eo dentes fricentur.

Vel ℥. Salis ammoniaci, gemmei, an. Vnc. i. alum. Vnc. i. aq. rosar. q.s. Destillantur.

Laudatur & sequens Aqua:

℥. Sacchar. lb. ii. alum. rocha lb. i. vini albi generosi lb. i. β. Destillantur s.a.

Destillato liquore dentes sæpius fricentur & mundificantur.

Chymici oleum sulphuris commendant, vt aquam fortem communi temperatam, cum penicillo denti appositam. In ea nonnulli folia salinæ macerant, eisque dentes fricant, qui postea, vt glabri rursus fiant, melle rosato & sanguine draconis inungendi osque eluendum. Sic enim statim dealbantur, Sed cautè ista vsurpanda.

#### De Sanguinis è dentibus fluxu.

Nec prætereundum hoc loco, quod Balduinus Roussetus, libro de hominis primordiis, & hystericis affectionibus, refert. Nos, inquit, quod supra communem hominum fidem est, Furnis municipio Flandria, mulierem nominamus, cui forte fortuna, cum elisus esset dens molaris, soliti alioqui menses supprimerentur, naturâ noxium illum feculentumque sanguinem propellente, singulis mensibus ex elisi dentis vulnuscule sanguineus quidam gurgies, proportionem purgationi respondens, efflueret. Scribit etiam Hollerius, comm. 2. in sect. 2. lib. 2. aph. 18. Coacar. prædictionum, se vidisse è loculo dentis longo tempore sanguinem profluxisse, qui nullis remediis cessit, ægrumque tandem sustulit.

#### CAPVT XV.

##### De dente Aureo pueri Silesij.

**H**oc loco, vbi de colore dentium mutato agitur, non videtur omittenda quæstio, de Aureo dente pueri Silesij. Anno enim Christi 1593. circa F. paschatis rumor innouit, puerum quendam annorum septem, Christophorum Mullerum, in pago VVeigelsdorff, in Silesia, cum ipsi dentes excidissent, vltimi molaris

loco dentem aureum succreuisse; cuius rei historiam post anno Christi 1595. descripsit & publicè edidit D. Iacobus Horstius, Medicinæ professor in Academia Helmstadiana, qui ipsum partim pro naturali, partim pro prodigioso habet, & solatij loco Christianis à Turcâ tum afflictis exhibitum esse statuit. Eodem anno 1595. eiusdem aurei dentis historiam edidit Martinus Rulandus, cui sese opposuit Iohan. Ingolsteterus, anno 1597. contra quem suum iudicium eodem anno defendit Martinus Rulandus. De eodem aureo dente scribit etiam Andr. Libavius, part. 2. Singular. dissertat. 7. qui disputationes illas, in partem vtramque habitas, recenset, quas vt huc afferam, operæ pretium esse non puto. Non entis enim nullæ sunt affectiones, & dens ille aureus nullus fuit, sed fucus merus, qui Vraçislauiz demum detectus fuit. Eius rei historiam ad me perscripsit Dn. D. Michael Donringius, sicut illam ex Dn. D. Danielis Bucretii, Physici quondam Vraçislauiensis, relatione accepit, quæ talis est: Puer ille cum Vraçislauiam deductus fuisset, & omnes nouitatis istius miraculosæ (vt putabatur) cognoscendæ ac visendæ desiderio tenerentur, factum est, vt in doctorum virorum conuentum ac concionem, cui inter alios plures CL. D. Christophorus Rhumbaumius, p. m. etiam interfuit, vocaretur. Acciti & admissi dentem sedulo contemplati sunt, qui splendore aurum Rhenanum representauit. Adfuit simul aurifaber. Is iussus, affriccione lapidis lydij dentem examinauit. Linea affriccione inducta existimabatur reuerà esse aurum Rhenanum. Aurifaber igitur, rei veritatem penitus exploraturus, ipsi illeuit pigmentum aureum. Et ecce, linea illa absumpta disparuit. Protinus ergo de fraude suspicio concipitur. D. verò Rhumbaumius, vt erat ingeniosus & cautus, inspectionem reperit, atque superne dentem non integrum, sed foraminulo pertusum conspiciatur. Spatulâ igitur ferreâ admotâ, numquid lamina aliqua orichalcea solum denti esset inducta, explorat. Rem ita se habere, certissimè inuenit, & reliquis spectatoribus ostendit. Lamina enim illa, per spatulam mouebatur, nihilque erat aliud, quàm medietas (& forsitan inaurata) globuli, quales crumenis & marsupiis olim à fœminis in Silesia gestari solitis appendi consueuerunt. Detraxisset protus à dente laminam istam D. Rhumbaumius, ni deceptor restitisset, & se cum puero subduxisset. Fraudis enim hæc detectio pessimè habuit pueri istius circumductorem, vtpote qui nummos corradendi occasionem sibi ereptam esse videbat; atque ita cum aureo isto dente euauit ac disparuit. Quæ historia omnes naturæ scrutatores meritò monere debet, ne causas rei & non diu prius quærant, quàm non sit manifestum, & de re ipsa planè constet. In qua re tamen non rarò peccatur, dum de non entis affectionibus & causis sæpe acriter & magno conatu disputatur.

#### CAPVT XVI.

##### De Gingiuarum affectionibus.

**G**ingiuarum etiam affectiones p. n. variz sunt, Gingivarum enim Luxuries ipsarum, dum præter naturam augmentur, vt dentes propemodum integant: deinde Flacciditas, dum caro earum mollis euadit, & facile sanguinem fundit; quod vitium scorbuti familiare est: contra eorundem Corrosio & Absumptio: Inflammatio ad radicem dentis, quæ papeilis, Celso papeilis, (nisi mendum in textu est) abscessus papeilis sequens, qui si malè curetur, caruncula innascitur, ad intimos præcipuè molares, quæ eandem dicitur, & aliquando cum aduerso buccarum musculo coalescit. Nonnunquam abscessus in vlcera, cancrum

crum & fistulas, degenerat; interdum & gangræna gingivas corripit; de quibus jam dicemus.

*De gingivis Excreſcentibus, Laxis, Flaccidis, Sanguinem fundentibus.*

Gingivæ ex-  
creſcenti, &  
laxæ.

Gingivarum Caro ita sæpe Luxuriat & Incrementum sumit, ut dentes, præsertim molares, obtegat quod vitium *πλασάρη ἔλα*, gingivarum Luxuries, Excreſcentia, & dentium Superincarnatio nominatur. Plerumque illa caro laxa, sordida & flaccida est, & cruorem, si paulatim attingatur de se fundit & graucoler; id quod scorbuticis familiare est.

Atque accidit hoc vitium à sanguine seroso, vitioso, corrupto, copiosius ad gingivas confluente; ad quam rem imprimis facit, caro gingivarum suâ naturâ laxa, quæ humores affluentes faciliè suscipit.

Ut enim in vlcibus & vulneribus, ubi caro cute non tegitur, faciliè luxuriat: ita etiam gingivarum caro, quæ cute crassâ non tegitur, faciliè luxuriat.

Si luxuries ista carnis sit lenis, & sine putredine, faciliè reprimendum & astringentium vsu compescitur, ut collatione oris cum aqua aluminosa, cum decocto balauft. gallar. fol. pruni, cortic. mori, & aspersione puluer. ex balauft. radic. bistortæ, corall. rubr. & paucis alumine.

Si verò gingivæ putridæ sint, & grauem odorem spirent, fortiora requiruntur.

Commendatur hîc peculiariter Aquilegia, & vnguentum ex Aquilegia paratum in hoc malo vtile est. Imprimis verò efficax esse sequens Linimentum, multo vsu compertum est:

*℞. Pulu. fol. aquileg. salvia, menth. crisp. nuc. mosch. an. Vnc. sem. (Nonnulli etiam rutæ & myrrhæ tantundem addunt.) aluminis vsti Vnc. i. mellis puriss. ʒ. xv. vel q. s. Mel leni igne despumetur. Despumato & calenti pulueres inspergantur. F. Linimentum, quo gingivæ inungantur.*

Vel *℞. Mellis opt. Vnc. ij. aceri vini Vnc. i. flor. aris Drach. j. alum. Scrup. j. Bulliant, donec rubescant, adde pulu. sabina, nuc. mosch. an. Drach. sem. C. C. præp. Vnc. ss. F. Linimentum.*

Præstantissimum quoque hîc est decoctum summatum rubi Idæi. Vtile est etiam gingivas cruentas & defluxione tentatas sæpius attingere sale vsto. Idem præstat pulvis corallij rubri crudi, ut & antheræ rosarum, nec non collutiones ex vitriolo, alumine, myrrha, mastiche & aceto scillitico paratæ.

Vtilis est & oris collutio cum aqua saluæ, plantagin. prunell. & nasturt. aquar.

Vel *℞. Radic. tormentilla, cort. rad. prunor. sylvestr. hyperici, salvia acuta, an. M. j.*

Incisa coq. in vino lb. i. ad consumptionem tertiæ partis. Colaturâ os colluatur.

Efficax est & hæc Aqua, & in omnibus vlcibus sordidis gingivarum, tonsillarum, palati, faucium, narium, & ozanis utilis:

*℞. Mellis rosati Vnc. ii. sulfuris vini, aluminis crudi. an. Vnc. i. alb. Grac. cimar. sabin. an. Vnc. sem. spong. sambuc. Drach. i. fol. hyperic. rorismar. plantag. rutæ, salvia, puleg. an. M. sem. Coqu. in vini & aquæ lb. ii. ad consumptionem quartæ partis. Sub finem adde eruginis aris Vnc. j. stent donec sponte refrigerint, postea colentur.*

In colatura penicillum lana vel gossypio innolutum intingatur, & locus affectus tangatur; vel gossypium aut stupa loco affecto imponatur.

Acetius sumit alumin. vsti, thuris, myrrhæ, p. æ. quæ cum melle miscet & illinit, & postea os vino colluere iubet.

Eiusdem est, quod efficaciter carnem corruptam gingivarum absumit & putredinem sistit:

*℞. Chalcitid. crude Drach. iij. cadmia Vnc. j.*

Dan. Sennerti Tom. I I.

Cadmia in aceto ad æstium Solem aliquot diebus conteritur, deinde adjicitur chalcitis, & similiter cum ea teritur, affuso saepe aceto. Postea ambobus exsiccatis, tritis, & cribratis vtere siccis, sed cum cautione, ne quid ex pharmaco in os deglutatur.

Vel *℞. Alumin. scissil. flor. rosar. rubr. an. Drach. j. sal. fossil. Drach. ii. croci Drach. ss. Vtere sicco, aut cum melle cocto.*

Mel etiam rosatum, si vnciæ vni ol. vitrioli guttæ ij. addantur, vlcibus gingivarum & oris vtile est.

Vel *℞. Nuc. mosch. N. j. alumin. crudi Drach. ss. alb. Grac. succ. rut. mille fol. charesol. ana Drach. ii. mellis Vnc. i. Misce.*

Vtilissimum est, si ante & post cibum os colluatur aquâ, è qua sal, excoquitur.

*De Fluxu sanguinis è gingivis.*

Interdum non solum laxæ fiunt gingivæ, sed etiam *Fluxus sanguis ex iis fluit. De quo Hippocrates, in Coacis, guinis è gingiv. lib. 2. comm. 1. sect. 2. aphor. 14. sec. distinct. Hollerij.*

*Τὰ ἐκ τῶν ἀλυστὰ ἐκ τῶν κοιλῶν ὀφθαλμῶν, ὁ δὲ σπιν. Sanguis è gingivis ab alio liquida, lethale.* Significat enim virtutis debilitatem in hepate & venolo genere, & in ipso sanguine vitium, ubi scilicet is est acris & inopertus; qualis in scorbuticis colligitur. Si ergo is per gingivas effluat, & alius symptomaticè solvatur, malum signum est.

Cui malo si curatio adhibenda sit, medicamenta, quæ ad gingivas laxas conueniunt, vsurpanda. Interdum tamen ejusmodi fluxus criticus est, & non statim sistendus. Ita apud Dodonæum. *observ. 14. Latomo ecthymatis laboranti sanguis è gingivis erupit, quo represso, ad vrinarios meatus delatus, ac cruenta vrina subsecuta est, quæ cum reprimentibus talis esse desisset, iterum ad gingivas se contulit, nec fluxus cessavit, donec æger sanitati restitutus est.*

Ita refert Amatus Lusitanus, *cent. 5. curat. 5.* quibusdam hominibus sanguinem è gingivis effluxisse, qui, si fluxus non solito responderet modo, in capitis dolorem inciderint, ut eum reuocare necesse habuerint. Et Iulius Alexandrinus, in *annor. ad cap. 11. lib. 2. meth. med. Galeni*, scribit, socru suæ per intervalla quædam sanguinem è gingiva fluxisse, quasi venulâ aliqua inibi ex *ἀσπομῶς* apertâ. Et Zacutus Lusitanus, de *Prax. Med. admir. lib. 1. observ. 86.* refert, aurifabro cuidam febre ardente laboranti ex venula gingivæ inferioris per tres dies continuos sanguinis plus quam libras quinque criticè effluxisse, febrémque inde solutam fuisse.

*De gingivis Carne denudatis seu Carnis gingivarum consumptione.*

Ut gingivarum Caro aliquando Luxuriat: ita contra nonnunquam Imminuitur & Absumitur, ut dentes nudi conspiciantur & laxentur ac vacillent; quod accidit ex humore prano & acri ad gingivas confluente, easque erodente.

Danda igitur opera est, ut caro regeneretur.

Ergo *℞. Thuris, mastich. sarcocoll. sanguin. dracon. an. Drach. j.*

F. Pulvis, qui gingivis aspergatur. Avicennas sumit *thuris, mastich. aristolochiarotunda, sanguin. dracon. farin. orob. rad. ireos, an. Drach. j. Pulverisata cum melle & aceto scillit. subigit, & eo gingivas fricat.*

Possunt tali etiam Linimento inungi:

*℞. Syr. myrtini, mellis ros. col. ana Vnc. sem. diamori, dianuc. ana Drach. ii. pulu. mandibul. lucij pisc. rad. bistort. nuc. moschat. ana Scrup. j. Misce.*

HH h 3 Vel

Vel  $\mathcal{Z}$ . Mell. ros. col. Vnc. j. pulv. mastich. myrrh. thuris, nuc. mosch. an. Scrup. i. Milce.

Vel  $\mathcal{Z}$ . Rad. cyperi Drach. ii. aristoloch. rotund. sarco- coll. an. Drach. i. sem. myrrh. Drach. j. rad. ireos, terra sigil- lata, rasura C.C. an. Drach. sem. fol. myrti, flor. rosar. ru- brar. an. P. j. santal. albor. rubr. an. Drach. i. sem. alumin. vsti, balaust. ana Drach. ii.

F. Pulvis, de quo aliquid in aqua folior. quercus ebulliat, & decocto os colluatur.

$\mathcal{Z}$ . Cancros viuos N. vi. radic. lappa majoris Vnc. i. Contundantur in mortario ad pulvis consistentiam. Diluantur cum aq. fl. cyani Vnc. xvi. Exprimantur per pannum linteum, lauentur eo dentes & gingiua.

### De gingiuarum Inflammatione seu Paruli- de, Epulide, Ulcere, Cancro, Fistula.

Gingiuarum  
inflammatio.

Præterea etiam gingiua quandoque inflammatio- ne cum dolore corripuntur, apostema patiuntur, quæ in vlcera, interdum cancrum, fistulas, gangrænam desi- nunt. Inflammatione, quæ Græcis *παραλὴ* dicitur, gin- giuæ corripuntur à sanguine tenui, siue puro; siue cum aliis humoribus mixto, qui è capitis vasis in eisdem defluit. Familiaria etiam sunt vlcera gingiuarum scor- buticis, de quibus, *libr. 3. Pr. part. 5. sec. 2. de scorbuto*, dictum.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Malum ipsum per se visui pater. Et quidem, si ma- teria sit calidior & acrior, gingiua magis rubent & ca- lent, dolorque & punctio vehementius affligit. Si verò sanguis sit frigidior, rubor, calor & dolor est re- missior.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Inflammationes hæ, nisi statim reprimantur, in apostemata abeunt, quæ nunc citius, nunc tardius rum- puntur, pro tumoris magnitudine & humoris na- tura.

2. Non contemnendum est hoc malum, cum, nisi maturis prædiis ipsi succurratur, in apostema & vlcera diuturna, nonnunquam & in fistulam abeat. Sæpe & in cancrum incurabilem, ubi materia melancholica sic- ca & adusta fuerit, quandoque & in gangrænam abit.

3. Si gingiuarum inflammatio in gangrænam mu- tetur, insanabile plerumque malum est, vt aliquot exemplis demonstrat Guilielmus Fabricius, *cent. 1. obseru. 30.*

Curatio.

4. Æstate in aurium inflammationibus quinto die eruptiones sunt: sic & quæ circa gingiuas & nares suppurationes contingunt. Hippocrates, *6. epid. sect. 6. t. 24.*

### Curatio.

Vniuersalia quod attinet, eadem methodo curanda hæc inflammatio, quæ aliæ inflammationes. Vena ni- mirum aperiatur in brachio. Ita Melisandro apud Hip- pocratem, *7. epid. sect. ultima*, cum magno gingiua do- lore corripetur, & valde intumesceret, vena in bra- chio secta est. Potest & postea vena sub lingua aperi- ri, & cucurbitula collo admoueri. Nec Topica mul- tum discrepant; nisi quod gingiua, cum carne sint præ- ditæ molli, ac rara, fortia medicamenta non tolerant. Ideoque dum nondum putrescunt nec corrosæ sunt, conueniunt medicamenta, quæ asperitatis & mordaci- tatis sunt expertia. Nam acria insigniter nocent, & proinde in gingiua dolore ab aceto abstinendum. Et primum quidem phlegmones generatio impedienda est & reprimenda institutis oris collutionibus & gar- garismis ex decocto fol. quercus, nucum cupressi, ba- laustior. ros. rubr. aqua plantaginis, prunellæ, saniculæ,

portulacæ, veronica, fragor. fol. quercus, cum succo vel rob. moro, tum in iis dissoluto, vel rob. nucum, ribes, berberum, fragorum, syrupo granatorum, violarum, ro- sarum siccarum, myrtino, xyssaccharo simpl. melle ro- sato. E. g.

$\mathcal{Z}$ . Aq. plantag. prunella, an. Vnc. iij. ros. rubr. Vnc. i. β. diamori Drach. vi. mellis rosati col. Drach. iij. salis nitri præp. Drach. sem. Milce.

Vel  $\mathcal{Z}$ . Aq. semperni, plantag. centinod. min. an.  $\mathcal{Z}$ . ii. sem. mellis rosati Vnc. i. nitri præp. Drach. sem. M.

Vel paretur tale Decoctum:

$\mathcal{Z}$ . Herb. prunell. plantag. an. M. j. fol. ros. rubr. P. iij. balaustior. Drach. sem. rad. glycyrrh. Drach. i. cerasor. ex- siccat. Drach. ii.

Concisa & contusa coqu. in aq. hord. simpl. pro  $\mathcal{Z}$ . ix. In quibus dissolue rob. fragor. Drach. vi. syr. violac. Drach. iij. nitri præp. Drach. j. sem. M.

Galenus, *5. de comp. med. sec. loc. c. 91.* scribit, gingi- uis ex inflammatione dolentibus optimum remedium esse ol. lentiscin. temperatè calefactum in ore reten- tum, idque recens. Nam oleum quò verustius, eò cali- dius. Habet illud oleum vim moderatè reprimendi & discutiendi. Acrius prisana gingiuas colluere iubet. In causa frigida aliquid de resoluentibus calidis admis- ceatur, vt de alumine vsto vel sale. Aut decoctum fiat ex sem. lini, fol. agrimon. cum exiguo alumine, pro Col- lutione oris.

Vel paretur tale Decoctum:

$\mathcal{Z}$ . Hord. integri M. j. fl. malu. arbor. P. iij. rosar. rubr. P. ij. rad. glycyrrh. Drach. iij. jujubar. N. vij. caricar. ping. N. iij.

Coq. in s. q. aq. fluuiatil. ad tertias.

Colentur, colaturæ  $\mathcal{Z}$ . Vnc. viij. In quibus dissolue oxymel. simpl. mell. rosati colat. an. Vnc. i. diamori Vnc. β. lap. prunella Drach. ij.

M. pro Gargarismo. Alumen etiam vstum & tritum parotidas comprimit, testè Aëtio.

Si apostema ad maturationem tendat, gingiua bu- tyro inungantur. Deinde apostema aperiatur decocto caricarum, lini, scenigraci, & similibus. Vel carica per medium discissæ imponantur. Si abscessus sponte non aperiatur, scalpello aperi potest. Apertus abscessus hy- dromelite, collutionis & gargarismi instar adhibito, mundetur. Tandem vlcus exsicceretur & claudatur.

Interdum verò apostema in vlcus desinit, & quidem nunc vlcus simplex est sine corrosione & putrefactio- ne, nunc verò corrodingo serpente incipit, vt non tan- tum putrescat caro, sed & absumatur, & rosar. gingiua- rum fiat; quod accidit, cum humores falsi, acres aut prauis affluunt. Curantes autem talia vlcera, si sint sim- plicia, exsiccantibus & adstringentibus medicamentis, collutione scilicet oris cum decocto agrimoniz, rosar. balaustior. cupular. gland. aceto scilicet. alum. myrrh. vti debent.

Vt  $\mathcal{Z}$ . Agrimon. M. j. balaust. rosar. rad. aristoloch. ro- tund. an. Drach. ij. Coquantur in vino.

Colaturæ  $\mathcal{Z}$ . lb. j. acet. scilicet. Vnc. ij. M.

Vel  $\mathcal{Z}$ . Rad. aristoloch. rotund. balaust. flor. rosar. rubr. ana Vnc. sem. myrrh. alumin. ana. Drach. ij. cina- mom. spic. ana Drach. j.

F. Pulvis, qui diuidatur in duas partes, vna cum mel- le redigatur in formam Linimenti, quo dentes inun- gantur, Pulvis verò aspergatur vel affricetur.

Si vlcus in fistulâ transeat, fortioribus vtendum, vt:  $\mathcal{Z}$ . Gallar. cupul. gland. flor. rosar. balaust. cortic. gra- nator. an. Vnc. i.

Coqu. in vino pro Collutione oris. Ipsi verò gin- giuis hic Pulvis inspergatur:

$\mathcal{Z}$ . Gallar. sumach. gran. myrr. cupul. glandium, sem. plantag. an. Drach. i. vitrioli albi, alum. scissil. an. Scrup. iij. anther. rosar. Drach. ij. F. Pulvis.

Vel  $\mathcal{Z}$ . Mastich. gummi juniperi, acacia, hypocistid. an. β. β. iulie præpar. Drach. β. vitrioli albi β. ii. F. Pulvis.

Vtilissima



Vtilissima verò & efficacissima est hîc aqua viridis, supra de gingivarum excreſcentia & laxitate propoſita.

Si in cancrum degeneret vlcus, Gordonius hoc vritur:

*℞. Rad. hellebor. aristoloch. long. tartari. aluminis vsti gallar. balauft. p. æ. & cum succo fol. oliuar. vel agrimon. & melle.*

F. Vnguentum, quo gingiuarum carioſæ illinantur.

Si verò post inflammationem gingivarum carnis excreſcentia quædam emergat juxta dentes molares, quam Epulida vocant, quod accidit aliquando cum febre & vehementi dolore internæ mandibulæ, vritur Aëcius medicamentis, quæ inflammationem ſoluunt, atque os colluere hydromelite, priſana, decoct. ſemin. lini jubet, totam item mandibulam contegere cataplaſmate ex hydromelite & ſemin. lini. Poſtea ad ipſam carunculam ſiccantia medicamenta admovent, quale eſt puluis alumin. vsti aſperſus, aut qui Recipit *ſulphuris vini, piper. alumin. ſciſſil. p. æ.* Efficax hic eſt & vitriolum.

Vel *℞. Pulv. gallar. Drach. i. ſem. alumin. Drach. i. F. Puluis.*

Vbi verò tardius conſumitur, exedens apponit, quale eſt ærugo per ſe, vel cum æquali parte gallarum. Ager autem in æruginis uſu monendus, ne ſaliuam deglutiat, Exeditur etiam interdum aqua forti, aqua regis, & oleo vitrioli.

Vtilis eſt hîc aqua viridis, cujus antea facta mentio. Si nec his tollitur epulis, forcipe correptam ferro excindit, & vlcus, vt par eſt, curat. Debètque os poſt ſectionem illam cum decocto myrrhæ & pauco ſale collui.

## CAPVT XVII.

### De Maxillarum morbis, & ſymptomatibus.

#### Fungi maxillarum.

Maxillarum fungi.

Maxillæ etiam ſuos morbos patiuntur. Inter eos autem primò ſunt Fungi dicti, qui etiam interdum è cerebro naſcuntur, vt ſupra, lib. i. part. i. cap. 25. dictum eſt, læſa procul dubio aliqua fibra nervea aut membrana. Ita memini cuidam puero dentem ore extractum, & procul dubio neruum vel membranam nerveam ſubſtratam læſam eſſe, è quâ fungus poſtea enatus eſt, qui penè totum os repleuit, & puero etiam mortem attulit.

#### Syderatio maxillarum.

Maxillarum syderatio.

Syderantur etiam nonnunquam maxillæ poſt dentium dolorem. Ita 5. epidem. Metrodori puero ex dentis dolore syderatio, & ſupercræſcens in gingiuis caro, ac moderata ſuppuratio contigit: & tum molares, tum maxilla ipſa deciderunt.

#### Maxilla cum Capite connexio.

Maxilla cum capite connexio.

Maxillæ inferior pars capiti per articulationem coniungitur, vt liberè moueri poſſit. Contrarium tamen exemplum, vbi maxilla inferior capiti planè connata & conjuncta fuit, ſupra è Columbo, anatomia lib. 15. reculimus.

#### De maxilla inferioris iunctura ſoluta.

Maxilla inferioris iunctura ſoluta.

Aliis plerisque animalibus maxilla inferior ex offibus duobus per ſymphysin iunctis conſtat, & in homine etiam in infantibus biſida eſt, & cartilagine copioſa in medio mento iungitur: in adultis tamen ita coaleſcit,

vt nec coctione quidem ſeparari queat. Violentiâ tamen magnâ interdum hæc iunctura ſolui, & oſſa hæc ſeparari poſſunt.

Malum periculofum eſt, ſi in partem poſterioſam recedat. De qua Hippocrates, in Coacis: In neruorum diſtentionibus, & in iis, quæ in poſterioſam partem ſunt, diſſoluta maxilla mortem afferunt.

Quapropter curationem etiam tradit Hippocrates, *Curatio in lib. de articulis, com. 2. s. 3.* Si compago, inquit, maxillæ ad mentum diſſideat, reponere os cuiuslibet hominis eſt. Quod enim eminet, ad motus digiti ab exteriori parte introſum propellendum: quod intra inclinatur, injectis digitis repellendum extroſum eſt. Id autem diſtentione prius adhibita, ſic, vt oſſa diſtent, faciendum. Repoſita maxilla poſtea, vt, ibidem, docet, deliganda eſt.

#### De maxillarum Luxatione.

Luxationem etiam patitur maxilla inferior. Quod *Maxillarum luxatio.* quidem non facile accidit, cum ob articulationis naturam, quæ vndique oſſibus circumuallata eſt, tum ob mſculorum robur, quos plures & validos obtinet. Si tamen luxetur, tantum in priorem partem propellitur & luxatur, vt Galenus, *comm. 2. in lib. de articulis.* & Celſus, *lib. 8. cap. 12.* docent, & ex anatome patet. Ad poſteriora enim luxationem oſ impedit; ad dextram ſiniſtrum maxillæ caput; ad ſiniſtram dextrum caput. Et quidem luxatur vel altera tantum parte, vel vtraque. Vt autem luxetur maxilla, necesse eſt, vt proceſſus roſtro ſimilis, acutus etiam dictus, qui ſub jugali oſſe inferitur, ipſo oſſe jugali humilior fiat, & extra os jugale feratur. Fit hoc non niſi maxima oris apertione, vt in nimia oris in oſcitando dilatatione, vel ſi aliquid magnæ molis ore apprehendatur.

#### Signa Diagnostica.

Si maxilla luxata ſit, os claudi nequit, maſticatio tollitur, locutio deprauatur, ſaliua ore ægro inuito profluit. Et quidem ſi maxilla ex parte vtraque ſit luxata, os magis hiat, nec lingua ad loquendum liberè moueri poteſt, vnde ſit balbuties, & maxilla inferior cum ſuperiore non poteſt committi, ſed maxilla inferior tota magis prominet, etſi ordo dentium inferiorum & ſuperiorum respondeat, & canini ſint ſub caninis, molares ſub molaribus. Proceſſus etiam oſſis roſtrum referentis extra malas vtrinque eminens apparet, & temporales mſculi rigidi ac duri ſunt. Si verò ex vna parte tantum luxatio facta ſit, à parte illa in anteriorem maxilla magis prominet & in aduerſum ipſa & mentum inclinatur, & os diſtorquetur, nec ordo dentium inferiorum & ſuperiorum ſibi reſpondet, ſed ſub inciforiis ſunt canini.

#### Prognostica.

1. Periculo non vacat maxillæ luxatio, & propterea quamprimum reponenda eſt, priuſquam mſculi affecti cerebrum in conſenſum trahant propter neruorum, ramos, qui à ſecundo & quinto cerebri pari orti in mſculos maxillam mouentes inferuntur.
2. Si maxilla luxata ſuo loco non reſtituatur, periculum mortis imminet, & quidem plerumque circa diem 10. & febris continua excitatur, & dormiendi inexpugnabilis neceſſitas, & bilis ſyncera per aluum & vomitum reiſcitur.
3. Si ex vtraque parte maxilla luxata ſit, difficilius reſtituitur, quàm ſi ex vna tantum; & propterea luxatio ex vtraque parte periculofior eſt, & omnia ſymptomata ſunt vehementiora. Nam omnes quatuor mſculi maxillam ſurſum trahentes afficiuntur, & cum iis nervi inferi, vnde dolor exoritur, & ex dolore inflammatio

# 644 De Oris Inflammationibus & Vlceribus.

matio & febris acuta, & per consensum neruorum etiam os ventriculi afficitur.

4. Si post maxillæ restitutionem 12. dies elapsi sint. periculum relapsus non ita facile amplius metuumdum.

## Curatio.

Danda ergo opera, vt quamprimum maxilla restitatur, antequam dolor & inflammatio accedat. Si verò jam spatium aliquod temporis à facta luxatione elapsum sit, vtendum prius medicamentis emollientibus & laxantibus, antequam restitutio tentetur.

Videndum verò primo, an ex vna, an verò ex parte vtraque facta sit luxatio. Si ab vnâ saltem parte, æger vel in sedili collocetur, vel resupinetur in puluinari, & caput eius immobile à ministro teneatur. Postea Chirurgus pollices, lineis vel linteis vel fasciis subtilibus inuolutos, in eius os immittat & molaribus dentibus imponat, reliquâ manu extra maxillam ad mentum apprehendat, eamque deorsum trahat, deinde retrò versus guttur compellat, postea ad oppositum latus agitet, & simul rursum impellat, ægròque imperet, vt os claudat. Atque hæc omnia vno seclè momento fieri debent, vt Cellius inquit.

Si verò ex parte vtraque sit luxata maxilla, eodem modo restituenda est, præterquam quod ad latera non est agitanda maxilla, ideoque primò maxilla deorsum trahenda ob musculos, qui processum acutum rostro similem trahunt, qui infra ossis iuguli processum trahi debet. Secundò retrò æqualiter propellenda, quia luxatio in partem anteriorem facta. Tertiò sursum, & in locum suum compellenda. Maxilla in suum locum restituta, danda opera, vt in eo retineatur, & non iterum excidat. Itaque medicamenta ex oui albuminibus & pulueribus adstringentibus apponi debent, ac, si dolor adsit, musculi oleo rosaceo inungendi. Fascia quoque mento apponatur. Hinc ad aures adducatur, & tandem in capitis vertice colligatur, vt maxilla restituta in suo loco retineatur. Videatur Hippocrates, 2. de articul. & Galeni in eum commentar.

## De maxilla Fractura.

Maxilla fra-  
ctura.

Tandem maxilla aliquando frangi potest ictu, casu & similibus causis. Aliquando etiam in dentium extractione pars auelli potest. Quod malum per se facile patet.

Consolidantur autem ossa maxillæ facile, & quidem 21. diebus, & celeriter callus increscit; cum sint medullosa & laxa: quod si non rectè reponantur, dentes vitiuntur, atque inutiles redduntur.

Si verò quid de maxilla auulsum sit, id restitui non potest. Quomodo autem maxilla fracta componenda sit, docet Hippocrates, 2. de artic. qui ibi videtur.

## De maxilla inferioris Immobilitate.

Maxilla in-  
ferioris im-  
mobilitas.

Symptoma etiam quoddam occurrit circa maxillam inferiorem. Cum enim facta sit mobilis propter sermonem & masticationem; cum illa mobilitas tollitur, præter naturam sese habet. Fit autem hoc in tumoribus circa articulum, cum destillationes in articulum circa auriculæ radicem fiunt, & ibi tumores atque inflammationes accidunt. Idem accidit in fracturis, luxatione, maxillæ cum capite coalitu. Pertinet huc & rigiditas illa genarum scorbutica, cuius, lib. 3. Pr. part. 5. sect. 2. de Scorbutico, c. 4. facta est mentio. Non absimilis videtur illa maxillarum rigiditas,

cujus meminit Hippocrates, 5. epid. num. 23. in cod. Foesij, in Eumelo Larissæo, cui crura, manus, maxillæ rigeant.

Signa & Curatio patent è morbis, à quibus immobilitas ista pendet.

Signa & m-  
ratio.

## DE ORIS VITIIS. CAPVT XVIII.

### De Oris Inflammationibus & Vlceribus.

Sequuntur jam Oris vitia. E morbis sunt oris Inflammatio & Vlcera. E symptomatibus, oris For-  
tor; de quibus ordine decendum.

Curatio.

Et primò quidem oris Inflammationem quod attinet, nonnunquam ex sanguine & calidis ac biliosis humoribus partes oris internæ, Palatum scilicet & Fauces inflammantur. Interdum inflammationem excitanti sanguini etiam humores maligni conjunguntur, vt in Thaso accidit, apud Hippocratem, 1. epid. sect. 1. statu 1. Inflammationi etiam causam præbent inunctiones ex hydrargyro, è quibus sæpe inflammatio, gangræna & sphacelus excitatur, vt aliquot exemplis docet Guil. Fabricius, cent. 3. obseru. 92.

Oris inflam-  
matio.

Malum per se visui patet. Humoris etiam eam exci-  
tantis natura è suis signis cognoscitur.

Signa.

Est autem inflammatio nunc periculiosior, nunc minus periculosa pro humoris peccantis natura. Etenim inflammationes oris, quæ ex solo sunt sanguine, sunt mitiores; difficiliore, quæ ex sanguine cum bile misto generantur. Perniciosiores etiam sunt oris inflammationes, quæ cum febre fiunt, quam quæ sine eâ sunt.

## Curatio.

Vt in aliis inflammationibus; ita etiam hic, si in vniuerso corpore abundet sanguis, vena primò aperienda; si alij vitiosi humores, purgatione vtendum. Hinc ad topica veniendum.

Quod si neutrum horum assuerit, statim ad topica accedendum. Requiritur autem in principio, quæ refrigerant & repellunt atque adstringunt; in incremento & statu postea aliquid discutientium addendum.

Colluendum ergo os sero lactis, in quo flores rosarum, summitates rubi vel vitis cocta sint; aut decocto plantaginis, prunellæ, vel aquis inde destillatis; quibus diamorum, dianucum, syrup. violar. & similia addenda. Ad discutiendum flores chamæmeli addi possunt.

Si tumor discuti non possit, sed suppuratio expectanda sit, adiuuanda ea & maturanda. Cui rei teruiunt caricæ appositæ. Vel coq. surfur in aqua, dum lentescat. (commodum est etiam ficus addere) Colaturæ mel adde.

Eligenda autem semper sunt talia medicamenta, quæ neque sapore ingrata sunt, neque aliquam prauam aut venenatam qualitatem obtinent, qualia medicamenta Græci *συναιμα* appellauerunt; & apud Galenum, 6. de compos. med. sec. loca, describuntur.

Reliqua ex iis, quæ iam de oris vlceribus dicentur, patebunt.

## De Aphthis & oris Vlceribus.

*Αφθæ* equidem dicuntur in specie superficialia oris *Αφθæ* vlcera, quæ infantibus præcipuè accidunt. Interdum tamen etiam latius hoc nomen ab Autoribus extenditur, & aliarum etiam partium vlceribus tribuitur. Ita Hippocrates, lib. de natura mulieb. & de morbo mulierum,

*mulierum, ἀφθὰν τὰ αἰδία scribit. & de Coacis pranoctionibus, ἀφθὰν πύματι in orificio vteri nominat. Et, 2. de morbis, fistulam pulmonis aphthā, id est, vlcere feruido laborate dicit; Galenus, 9. de comp. med. sec. loca, ἀφθὺς ἀφθῶναι nominat. Verum, vt dixi, propriè aphthæ sunt exulcerationes quædam in summa oris superficie, igneæ quippiam caliditatis habentes, vt definit Galenus, 6. de compos. medic. sec. loca, cap. 4. Hærent enim in summa cute, & serpunt in palatum, gingiuas, linguæ latera, eiusque radicem. Interdum profundius sese demittunt, & palatum carnemque linguæ exedunt, cuiusmodi Gallicæ oris pustulæ esse solent, præsertim ab inunctione cum argento viuo. Galenus tamen, quæ putrescunt & exulcerantur, aphthas non amplius nominandas censet, sed erosiones potius & oris vlcera, quæ & remedia planè peculiariora postulant. Itaque etiam de oris Vlcerebus postea seorsim agemus. Ita Auicennas Alcolas vocat, quæ oris Vlcera esse dicit cum expansione & dilatazione, seu, vt vulgus appellat, Vlcera oris ambulancia. Mitius verò malum eidem est Bothor in ore, quæ pustulæ sunt non serpentes, sed tales, quæ facillè suppurantur & delentur, etsi nonnunquam leuiter eas suppurare contingat. Estque Bothor generalis appellatio etiam pustularum faciei, pulmonis, & aliarum partium; & variolæ ac morbilli etiam Bothor ab Arabibus nominantur.*

Affectio ipsa, cum exulceratio quædam oris sit, ad solutam vnitatem pertinet cum intemperie. Pars affecta est os internâ & summâ sui superficie, ita, vt malum etiam gingiuas, linguam, & nonnunquam gurgulionem comprehendat.

#### Causa.

Causa.

Gignuntur aphthæ interdum primariò in ore, dum ibi prauis humores collecti sunt, quos natura foras expellit; plerumque verò secundariò per consensum siue totius, siue alicuius partis. Totius, vt in febribus acutis & præcipuè malignis, vbi acres & feruentes halitus, per fauces, venas, arterias, & occultos corporis meatus ad os eleuantur. Vnde etiam febribus malignis malum hoc familiare est, atque in iis vlcera hæc potissimum fauces occupant, & sæpe tam sæua sunt, vt depascentia fiant, simulque cum faucibus etiam asperam arteriam & gulam attingant. Partis, vt quando vel à capite acres, feruidi & erodentes humores in os defluunt, præsertim biliosi, pituitosi & salii; vel à ventriculo, vt postea de Infantibus dicitur, pulmone, hepate, liene, vtero, eiusmodi halitus sursum mittuntur, à quibus primò pustulæ in ore excitantur, quæ sæpe postea in vlcera desinunt, pro corruptionis & materiæ in hac diuersitate. Cum enim summæ oris partes carne consent molli & tenera, quam cuticula tenuis inuestit, facillè ab occurso acrimie lædi possunt.

Non solum verò ab internis hisce causis aphthæ oris existunt, sed etiam ab externis, vt ab acredine eorum, quæ comeduntur aut bibuntur, aut alio modo assumuntur. Ita in lactentibus infantibus aphtharum causa est aut lac nutricis nimis serosum, acri suâ absterfione summas, easque molles admodum in ætate illa partes exulcerans, teste Galeno, 3. aph. 24. aut vt, in 6. de compos. med. sec. loca, addit, lactens ipse, si lac haustum non probè concoquat, vnde evaporatio acris vel putrida sursum è ventriculo attollitur. Nam lac in ventriculis intemperatis facillè corrumpitur, vt biliosum, acidum, vel aliter deprauatum euadat.

In vtrisque, in adultis scilicet & infantibus, adiungunt hanc malam affectionem constitutio aeris calida & humida pluuiosa, humores putridos gignens, ita vt epidemium nonnunquam hoc malum fiat. Hinc etiam in regionibus calidioribus, vt in Syria & Ægypto, frequentiora sunt ista vlcera; vnde etiam Ægy-

ptiaca & Syriaca antiquitus appellata, teste Aretæo. Cibi in ventriculo corrupti, elus fungorum & aliorum, quæ facillè corrumpuntur ac malignitatem acquirunt.

#### Differentia.

Quod ad differentias aphtharum, eæ ex Galeno, 6. de compos. sec. loca cap. ult. & ex 3. epidem. comment. 3. aph. 12. sic discerni possunt.

1. Tempore. Aphthæ enim aliæ incipientes sunt, aliæ vigentes, aliæ inueteratæ, atque ita quædam leuiiores, quædam deteriores.

2. Corporibus subiectis. Nam aliæ mollia infantium & puerorum corpora occupant, aliæ duriora adultorum.

3. Materiâ, eiusque prauitate. Quædam enim inflammata sunt, eæque calidæ & rubicundiores ex sanguine; quædam igneæ & flauiores ex bile; quædam non inflammata, minùsque feruidæ, ex pituita putrescente; quædam denique ex inueteratis atræ bilis malignitatem exurentem acquirunt. Vnde constat, aphthas ratione materiæ alias mitiores esse, alias, vt Galenus, 3. epidem. nominat, *κακονοίαις*, quæ ex putridis & malignis humoribus ortum habent.

4. A parte affecta, quæ sumitur, distinctio, est, quod aphthæ vel in palato hærent, vel in lingua, vel in gingiuis, vel in labiis, vel in faucibus & gurgulione. Quas partes vel superficie tenus vlcérant, vel profundius erodunt, latè serpendo, pro malignitatis gradibus.

Postremò, ratione accidentium & symptomatum quædam cum vehemēti dolore sunt coniunctæ, quædam absque eo sunt; aliæ cum febre sunt, aliæ febre carent: aliæ sunt mundæ, aliæ sordidæ; aliæ sine crusta, aliæ cum crusta: & crusta aliquando alba, aliquando flaua, aliquando liuida, aliquando nigra.

#### Signa Diagnostica.

Aphthæ facillè cognoscuntur. Partes enim oris calidiores deprehenduntur, & hinc inde vlcuscula seu tubercula quædam conspiciuntur. Et pustulæ rubicundiores sanguinem præualere ostendunt; flauiores, atram bilem; albescentes, pituitam: liuescentes & nigrescentes, atræ bilis succum: quæ serpunt & vicina depascentur, iis acridinem inesse significatur, & quidem malignitatis non expertem, si ad nigredinem tendant; si fœteant, putredo adest. Causæ externæ, vt eorum, quæ eduntur & bibuntur, acrimonia, atque alia, ex ægri & adstantium relatione cognoscuntur.

#### Prognostica.

1. Aphthæ recentes, præsertim in mollioribus infantium corporibus, facillè curantur moderatè astrigentibus, quoniam ex mitiore materia oriuntur: ægrè sanantur, quæ diuturnæ sunt, & progressu temporis putredinosum quid acquirunt; quæ generis vocabulo *ρογὰι* à Græcis dicuntur Galenus, 6. de compos. med. sec. loca, cap. 4.

2. Aphthæ antiquæ & exulceratæ longè periculossimæ sunt in infantibus. Hos enim consumunt. In adultis verò idem periculum non est. Pueris enim, præsertim lactentibus, imperari remedium aliquod (ad gargarandum imprimis) nequit, quemadmodum adultioribus. Celsus, lib. 6. cap. 11. Loquitur igitur Celsus de aphthis infantium non recentibus & mitioribus, sed de inueteratis & malignis, quæ à gingiuis incipiunt, & deinde serpendo palatum totumque os occupant, & ad gurgulionem faucibusque descendunt. Hæc cum validiora remedia postulent, quæ mollia puerorum corpora non ferunt, iisque vti ipsi per facultatis animalis in illa ætate imbecillitatem nequeant, malum ob has causas

causas ita inualescere necesse est, ut ægri infantes tandem ab eo consumantur.

3. Aphthæ ex pituita minus infestant, quàm ex sanguine aut bile, quæ verò ex bile atra ortum habent, ut malignitatis, ita nec periculi sunt expertes.

4. Aphthæ, præsertim inueteratæ, ideo quoque difficulter curantur, quoniam medicamenta, vel ritè applicata, tamen à saliva facillè eluuntur; præterea malum breui inualescit, ob loci naturam calidam & humidam; unde putredo sequitur & vlcus *ἡ δὲ ἀφθὴ*. Pars quoque, cum valde sensibilis sit, facillè ab acerbis medicamentis, quibus tamen vti interdum cogimur, irritatur. Ac denique metus est, ne quid cum periculo de medicamentis acrioribus in fauces delabatur. Galenus, 6. de compos. med. sec. loca.

5. Quæ aphthæ in pueris nigræ sunt, & veluti crustæ, pessimæ & mox lethales sunt. Paulus lib. 1. c. 10.

6. Quando aphthæ adhibitis conuenientibus remediis non cedunt, sed putrescunt, & corrodingo profundè descendunt, malignæ sunt, & fortioribus medicamentis opus habent. Si autem mala symptomata alia coniungantur, & æger sit debilis, mortem nunciant.

7. Quando pustulæ nigræ per febres acutas & pestilentes in ore & lingua apparent, mortem breui securam significant, teste Auicenna, ob materiæ malignitatem & virtutis infirmitatem. Et Hippocrates inquit, 1. prognost. aph. 15. Fauces exulceratæ cum febre difficiles sunt, quia, ut Galenus explicat, malitiam erodentis humoris indicat.

#### Indicationes.

##### Indicationes.

Aphthæ ipsæ, quatenus vlcuscula sunt, in principio adstringentia & repellentia requirunt. In progressu morbi addantur ea, quæ adstringunt & simul discutunt. Si ad suppurationem tendant, maturantibus illa adiuuanda.

Sordidæ aphthæ extergendæ & si putrescere vel etiam serpere incipiant, fortius adstringentia, & quæ escharotica sunt, adhibenda. Et quia in ore sapores percipiuntur, ingrata sapore medicamenta, quantum fieri potest, vitanda sunt. Deinde quia os ventriculo & pulmone cohæret, vtendum iis, quæ sine periculo (si fortè ita contingat) deglutiuntur, non catharticis aut septicis; aut si his vti necesse est, prouideatur, ne per gulam ab ægro demittantur. In corporibus etiam, quæ duriora & sicciora sunt, medicamenta valentiora conueniunt, molliora verò mollioribus, ut puerorum & senum corporibus.

#### Curatio.

#### IN INFANTIBVS.

##### Curatio in infantibus.

Si aphthæ sint ex vitioso nurricis lacte, id corrigatur iis, quæ acrimoniam vel falsedinem eius tollunt, bonumque sanguinem gignunt. Sin infans lac malè concoquat, parcius lactetur, & bona in ipso concoctio procuretur. Quando verò infans simul lacte nutritur & alio cibo vitur, Galenus, 6. de comp. med. sec. loc. cap. ultim. nutrice lentè præbet cum modico pane & medulla cerui aut vituli, quæ nutritrix mansa vel semimansa infanti exhibeat, ut ore ab ipso circumuoluta vlcuscula contingant.

Aliis quoque cibis à nutrice infanti masticatis admiscet cydonia, pyra, sorba, mespila, corna. Quandoque & lactucæ, portulacæ, solani aliquid addit, si aphthæ inflammatae ferueant.

Quod si infans mandere nondum possit, nutricem eiusmodi victu alit, eique simul de bona concoctione prospicit. Ipsi verò infanti linctus exhibeatur ex diamoro cum melle rosato, aut, si opus videatur, cum oxymelite. Aëtius ex Asclepiade gallas contrusas aquâ

decoquit, & cum decocto percolato patem portionem mellis permiscet, rursumque decoquit ad mellis crassioris spissitudinem, idque ut maximum remedium aphthis puerorum illinit affricando, aut tomento lanæ purpureæ digito circumuoluto aphthis apprimendo.

Inprimis autem in masticatione considerandus est color aphtharum, ut stomatica hæc dicta medicamenta pro varietate humoris, à quo aphthæ generantur, rectè administrari queant. Nam si subrubeant, primò moderatè adstringentibus, deinde citra mortuum discutientibus vtendum est. Qualia sunt syrup. è rosis siccis, de portulaca, de agresta, de succo granator, acetos. citri, diamorum, pulu. ex farina lentium, sumach, rosis, collutiones ex decocto lentis, viol. rubi, vitis, rosar. plantag. balauft. santal. sumach. acaciæ, admisto diamoro rob. ribes, rob. nucum, succ. malor. punic. vel uuz acerb. cum melle.

Si subflauæ fuerint, iisdem vtendum, & magis etiam refrigerantibus, ut succo vel decocto solani, portulacæ, acerosæ, semperuini.

Pituitosis adstringentia cum quâdam caliditate & discutientia conueniunt, ut thus, manathuris, mastich. mentha, nux cupressi, erui farina, rad. irid. Illyr. rad. aristol. quæ plura simul, vel pauciora cum decocto fol. myrti misceantur, iisque aphthæ illinantur.

Si denique liuidæ aut fuscae fuerint, fortiora discutientia adhibeantur, illinendo passulas exacinas & anisum tritum cum melle, aut puluere ex flor. chamæmeli, melilori, anethi, fænigræci, cum melle aut melle rosato mixtum; aut cum vino eadem coquantur, adiectis semper nonnullis adstringentibus, ut syrupo myrtino, aut diamoro.

Vel *℞. Rob. nucum. Drach. vi. diamori, mellis rosati, an. Drach. ii. aqua plantag. Vnc. sem. M.*

Tanquam expertum commendatur in aphthis puerorum, præsertim malignis & epidemiis, ranulam viuum admouere ori pueri, quæ sugendo malignitatem attrahat, quâ lassatâ & mortuâ alia apponatur, atque iterum alia, donec virus omne sit extractum. Sed vtrum fœdum ac abominandum hoc remedium rectè admoueri possit, non immeritò quis dubitauerit.

#### In Adultis.

In aphthis adutorum eiusdem generis remedia conueniunt, paululum tamen fortiora, pro natura corporum. Antequam igitur ad topica veniamus, si sanguinis copia adsit, vena secetur cephalica in cubito, aut cucurbitulæ scarificatæ affigantur collo vel scapulis. Auicennas etiam sanguinem mittit è venis sub mento & extremitatibus labiorum. Pro euacuatione materiæ proximæ in partibus oris venæ sub lingua tandem aperiantur. Si vitiosus humor aliquis in toto abundat, is conuenienti modo euacuetur.

Vniuersalibus præmissis ad topica veniendum. Quamquam in mollibus corporibus & in aliis, dum malum recens est, etiam ante vniuersi euacuationem iis vti liceat, ad prohibendum mali incrementum. Sint autem topica & *συνταγῆς* illa medicamenta in principio moderatè adstringentia & siccantia, cuiusmodi sunt, quæ parantur ex rosis, sumach, myrti foliis, cortic. granator. fol. vitis, rubi, pro collutione oris, in aqua vel vino adstringente coctis, addito syrupo granat, acetos. vel diamoro. Fortiora sunt collutio oris ex succis vel aquis rosarum, lactucæ, plantagin. portulacæ, virgæ pastoris, solani cum paucis aceto; item decoct. gallar. maturarum, balauftior. santalorum, acaciæ, cum rob. pyrorum, cornorum, sorbor. de ribes.

Ut *℞. Flor. rosar. rubr. balauft. ana P. j. fol. plantag. portulac. solan. prunell. an. M. i. sem. cydon. Drac. i. sumach. cortic. granat. an. Drach. ii. Coqu. in vini rubri adstringentis & aquæ part. æqual. pro lib. i.*



Colaturæ adde *diamor. Vnc. i. succ. malor. punic. acid.*  
 Drach. ii. Misce pro Collutione oris.

Cortex etiam aurantiorum cum melle & alumine  
 mixtus utilis est.

Vel *℥. Rad. tormentill. Vnc. sem. fol. plantag. M.*  
 sem.

Coq. in aqu. plantag. ad remanentiam *℔. j.* Colatu-  
 ræ adde *bol. Armenæ Scrup. i. alum. roch. gr. xv. Misce.*

Vel *℥. Prunell. plantag. caud. equin. salu. an. M. i. rad.*  
*tormentill. acor. tur. an. Drach. iii. spirit. vular. N. iij. flor.*  
*maluæ arborefc. rosar. an. M. sem.*

Coqu. in vino rubro & aqua ad remanent. *℔. j.*  
 sem.

Colatura os colluatur :

Vel *℥. Nucum viridium semimaturarum cum cortice*  
*contusarum q. v. adsperge aceto, destilla in balneo. Aqua*  
*felicitæ aphthas sanat, si in eâ spongiola madescat, quâ*  
*aphthæ illinantur, & aquâ simplici, cui pars quarta vini*  
*admixta sit, abluantur.*

In progressu ea misceantur, quæ adstringendo simul  
 discutiant, vt cyper. nux cupress. fol. oliuæ sicca,  
 myrrha.

In fine addatur cortex nuc. mosch. caryophyll. gallia  
 moschat.

Spiritus etiam vitrioli, si ejus gutt. ij. mellis Vnc. i.  
 Misceatur, utilis est.

Vel *℥. Vuarum immaturarum ℔. ii. sem. cortic. mali*  
*granat. balaustior. sumach. an. ℔. i.*

Macerentur in aceto & destillentur. Destillato adde  
*aluminis ℔. sem. vitriol. Vnc. i. sem.* Iterum destillen-  
 tur, & aquâ ista locus affectus illinatur.

Si aphthæ ad suppurationem tendant, juuetur illa  
 detento in ore lacte, præcipuè asinino, vel mucilagine  
 sem. althææ, lin. cydon. vel horum aut passularum de-  
 cocto.

Sordidæ aphthæ abluantur aqu. saccharata, aut sy-  
 rup. acetoso.

Utile etiam est decoctum hordei cum melle rosato  
 mixtum.

Vel *℥. Nuc. mosch. Drach. i. sem. caryophyll. Drach. i.*  
*radic. cyperi Drach. sem. ireos, corallor. rubr. an. Scrup. i.*  
*bol. Armen. caud. equin. an. Scrup. ij. mell. rosar. q. f. F. Li-*  
*mentum.*

Fortius extergunt mel cum tartaro aut alumine  
 mixtum, si spongiâ leniter affricentur: vel oliuæ mu-  
 ria conditæ masticatæ.

Si putrescere incipiant, vt aphthæ amplius appellari  
 non mereantur, sed in crustas & vlcera degenerent;  
 fortiora requiruntur, & curatio, vt vlcerum, jam insti-  
 tuenda.

Vbi tamen monendum, oris vlcera non semper aph-  
 thas sequi, sed etiam post inflammationes & per se, vt  
 in aliis partibus, ex affluxu vitiosorum humorum fieri,  
 vt & in Gallico morbo excitari. In quibus, vt dictum,  
 stomaticis vtendum, quæ adstringant, siccant & robo-  
 rent, quæ pro vlceris natura sint mitiora vel fortiora,  
 & curatio horum vlcerum ex iis, quæ postea de colu-  
 mellæ ac tonsillarum inflammationibus, vt & angina,  
 & hinc sequentibus vlceribus dicentur, patebit. Prodest  
 ex Aëtio centaurij minor. vsti cinis illitus cum melle.  
 Item nuc. cupress. vstæ.

Ad sordida oris vlcera utilis est etiam Aqua vitidis  
 Plateri.

*℥. Arugin. aris Drach. i. alum. Vnc. sem. vitrioli,*  
*minij, ana Drach. i. Coq. in vini albi Vnc. iv. aqua vita.*  
*Vnc. i. & cum penicillo loca in faucibus tangantur,*  
*cauendo, ne quid deglutatur. Postea lacte caprino, in*  
*quo calx ignitus extinctus sit, os colluatur.*

Vel vsurpetur aqua viridis, seu gargarismus supra  
 in ozænis propositus. Ad serpentes & depascentes  
 aphthas ac vlcera summè efficax est, teste Aëtio, radix  
 feniculi vsta per se, aut cum melle illita, amurca in  
 aneo vase ad mellis crassitudinem cocta & illita, alu-

men scissile tritum & cum gallis & oleo exceptum illi-  
 tumque. Auicennas gallar. alumin. balaust. p. æ. sumit,  
 & puluerisata per se cum melle applicat.

Vsurpatur etiam à multis vitriolum vstum & ærugo  
 & squamma æris cum melle illita. Et vnguentum  
 Ægyptiacum in aqu. plantag. cum pauco aceto dissol.  
 adjecto melle rosato. Monet tamen Guiliel. Fabricius,  
 cent. 3. obs. 86. cancrofis illud vlceribus esse aduersif-  
 simum.

Cauendum verò, ne quid de medicamentis eroden-  
 tibus in fauces illabatur.

Ardor relictus mitigetur lacte in ore retento, vel  
 aquâ plantaginis aut solani sæpius mutatâ.

In vlceribus Gallicis antiquis interdum caro putri-  
 da tota præscindenda est, & câ parte præcipitati pul-  
 uis admouendus cum gossypio in aqua plantaginis  
 prius infuso.

De Aphtharum curatione plura videantur apud Aë-  
 tium, terrab. 2. serm. 4. cap. 39. 42. 43. 44. & Oribasium,  
 lib. 4. de loc. affect. curat. cap. 68.

f Ad hoc caput referenda & illa vlcera, quæ ex aqua *Aqua fortis*  
 orti incautè haustâ, aut veneno sumpto excitantur, *hausta.*  
 quæ curantur lacte bibito, iusculis pinguibus & muc- *Venenum.*  
 lagine sem. cydonior. ac pŷllij, vt postea, de morbis  
 Oesophagi diceretur.

De vlcere magno & cancroso circa radicem linguæ  
 videatur Guilielmus Fabricius, centur. 4. obseru. 20.

#### Diatæ.

In infantibus lac nutricis corrigatur, cibus ac potu  
 laudabili & bona nutritio & alimenti in infante co-  
 cctio procuretur. Expedi in cibus vt cydoniis, pyris,  
 sorbis, mespilis, & si opus sit, lactuca vel portulaca. In  
 adultis victus ratio vt plurimum declinet ad frigidum,  
 vitentur acria salsa & acida, & quæ prauis succi sunt &  
 difficilis curationis.

#### De Osis Palati corruptione.

Aliquando etiam Os Palati perforatur, & corrumpi-  
 tur seu à vulnere, seu ab humore corrodente: id quod *Os palat.*  
 accidit sæpe in lue Venerea. Quod vbi euenit, sermo *corrupt.*  
 vitatur, cum aër, qui per os elidi debeat, simul per fo-  
 ramen illud ad nares penetret, & per eas egre-  
 diatur.

Si ex vulnere malum sit, & os sit purum, natura per  
 carnem vel callum illud tandem, etsi tardè, claudere so-  
 let. Si verò os nigrum sit, prius radendum. Antequam  
 verò foramen illud claudatur, vel si etiam planè claudi  
 non possit, vt vitium illud sermonis tollatur, fabricanda  
 est lamina aurea instar clypei, quæ in medio vmbonem  
 seu eminentiam habeat, cui spongiola sicca, foraminis  
 magnitudini respondens, alligetur, atque ita foramini  
 adaptetur. Vbi enim spongia humorem imbiberit, di-  
 latatur, vt lamina firmiter hæreat, & foramen oc-  
 cludat.

Historiam talis morbi & curationis in Instit. lib. 5.  
 part. 1. sect. 2. c. 10. proposui. Cum enim studiosus qui-  
 dam ad nasi radicem, internūque oculi dextri angu-  
 lum cultro vulneratus esset, & cultri fracti pars ferè  
 digiti longitudine, vulnere extrâ consolidato, ibi re-  
 mansisset, accidit, vt post menses quatuor cultri fracti  
 pars illa sponte suâ via facta in palato erumperet & exi-  
 meretur. Cum verò in superiore parte palati foramen  
 inde apertum fuisset, præter medicamenta abster-  
 gentia, exsiccantia, laminam auream, modo an-  
 tea exposito, applicaui: quâ instructus etiam con-  
 ciones habere potuit, sine sermonis impedimento.  
 Sensim tamen illud foramen carne impleri vidi, &  
 tandem etiam planè oclusum fuisse ad me relatum  
 est.

Verruca

*Verruca in gutture & lingua.**Verruca in gutture & lingua.*

Nec prætereundæ hæc verrucæ in gutture & lingua. Marcellus Donatus, *de histor. med. mirab. lib. 3. cap. 5.* refert, quendam Iohannem Iacobum Fugacinam, ciuem Mantuanum, verrucis quam pluribus guttur, fauces, & radicem linguæ occupantibus diu vexatum fuisse, quæ deglutitioni maximè officiebant: ut & alterum quendam Attilium Malegnanum vniuersam linguam eiusmodi verrucis, sed longè minoribus conpertam habuisse. Fuisse autem ex illis, quas myrmecias vulgò appellant. Habentque ortum ex iisdem causis, ut in aliis partibus, de quo suo loco dicemus.

## CAPVT XIX.

*De Foetore Oris.*

**S**ymptomata postea Oris quod attinet, pertinent huc Oris apertio vitiata, dolor Faucium & Foetor oris. Primò nimirum ad hunc locum referri posset oris Clausura, idque aperiendi impotentia, ut & oris p. n. Hiatus: verum de istis supra, cap. 6. dictum.

Pertinet deinde huc Faucium dolor sine tumore, de quo Hippocrates, *lib. 1. prædict.* & in *Coacis*: Dolentes fauces cum labore & molestia absque tumore manifesto ac suffocatione præceps exitum minantur. Et: Faucium gracilium dolores suffocantes convulsionem minantur. Verum quæ de his dici possent, è doctrina de Angina patebunt. Ideoque hæc solum de Foetore oris agemus.

Oris seu anhelitus & animæ foetor molestum, adstantibus præcipuè, symptoma est, cuius quidem causa proxima est vapor, seu halitus foetens ex ore egrediens. Verum ille multis ex causis ortum habere potest.

Primò quidem ex ventriculo, cum scilicet cibi foetidi sumpti sunt, ut allium, cepæ, & similes, quod & à vino & cereuisia copiosius hausto accidit. Deinde ubi quidem cibi, qui assumuntur, per se foetidi non sunt, sed in ventriculo corrumpuntur, è quibus eiusmodi vapores foetidi exhalant. Cæterum non semper immediatè è ventriculo foetidus iste vapor exhalat, verum etiam ex aliis partibus halitus ille foetens communicatur, ut ex vermibus in intestinis, ex ulcere intestinorum, vel ab ipsis intestinorum, excrementis, cum scilicet orificium ventriculi inferius, quo in intestina sese aperit, non arctè, & ut secundum naturam fieri debebat, clauditur. Tum enim foetida excrementorum exhalationes per laxam hanc viam in ventriculum ascendant, & foetore suo anhelitum inficiunt, qui propterea etiam stercorosus percipitur; id quod præcipuè in iis euenit, qui crapulâ continuâ orificium ventriculi inferius laxum & debile reddunt. Idem accidit ex humoribus prauis in venis mæstaraicis vel circa lienem contentis, ex vtero & foetu mortuo in eo.

Secundò foetidus ille halitus ore egreditur, cum in dentibus corrosis & cauernosis præcipuè, gingiuis aut palato aliquid foetidum continetur, cum scilicet cibi & care præcipuè in dentium interstitiis hæret, atque ibi putredinem, & hinc prauum odorem acquirit; aut cum vlcera sunt in ore, ut in scorbuticis, aut cum salua foetidis humoribus inquinatur; id quod interdum in catarrhis, febribus malignis, item lue Venerea contrigit.

Tertiò idem halitus foetidus exhalare potest etiam ex humore corrupto in osse colatorij derento, ut & ex vlceribus nasi & partium palato vicinarum.

Quartò ex pulmonibus & pectore; ut in pectoris vlceribus, vlceribus, empyemate; vnde etiam iis, qui gibbosi sunt, plerumque os foetet,

*Signa Diagnostica.*

Malum ab adstantibus facile percipitur. E qua parte verò halitus ille foetens attollatur, & proueniat, facile ex partium modò enumeratarum signis pater. Si à ventriculo sit, foetor maior est ante cibum. Si ab osse colatorij, ore clauso aqua pleno etiam percipitur.

*Prognosticum.*

Pro causæ ratione malum magis vel minus periculosum est. Si enim anhelitus foeteat in tabidis, ut plurimum lethale signum est.

*Curatio.*

Cum halitus ille foetens sit proxima foetidi anhelitus causa, vitium hoc aliquo modo quidem corrigi potest, iis adhibitis, quæ suauem odorem præstant.

Detinendi nimirum ore caryophylli, nux moschata, zedoaria, rad. angelicæ, imperatoriae, cyperii, ireos, lign. aloës, cortic. citri, fol. lauri, torismarini, cinamomum, sem. anisi, fœniculi, coriandri, carui, myrrha, moschus, ambra. E quibus varia parari possunt medicamenta, quibus vel os colluitur, vel quæ in ore detinentur pilulæ & trochisci.

Ut *℞ Caryophyll. nuc. mosch. an. Drach. j. rosar. Dra. ij. rad. ireos ʒ. ʒ. cardamom. ligni aloës, cinamomi, an. Scr. j. gall. moschat. ʒ. ʒ.*

Cum melle rosato F. Pilulæ, vel cum mucilagine tragacanthæ aqu. rosar. facta Trochisci in ore detinendi.

Sed cum hoc modo foetor odore suauis saltem obscuratur & causa non tollatur, causa etiam tollenda est, quæ non vna est, ut supra dictum. Si à cibis, qui grauem odorem spirant, sit foetor anhelitus, breui sponte euanescit: si vitiosi humores sint in ventriculo, illi euacuandi, & vitium, vnde proueniunt, corrigendum, ventriculusque ipse roborandus. In primis hæc aloë utilis & pilul. aloëphang. ut & absinthium vel vinum purgans cum absinthio.

Et ne cibi, præcipuè caro, in ventriculo putrescat facile, condiendi aromatibus, aceto & acetosis. Pani semen fœniculi, anisi & carui permisceatur. In fine mensæ sumantur, quæ ventriculum laxum claudunt, & suauem odorem spirant, ut cydonia, diacydonium, confectio semini. anisi, fœniculi, coriandri & similia.

Si à vermibus, vel aliis partibus foetens vapor exhalat, partium illarum vitia corrigenda. Si dentes immundi sint, mundandi, ut supra dictum. Si oris vlcera adsint, vel à causa alia salua inquinerur, vitium illud corrigatur. Si tandem à thorace aut pulmone proueniat foetens anhelitus, causa, quæ foetidum anhelitum supeditat, tollenda.

## DE GURGVLIONIS affectionibus.

## CAPVT XX.

*De Gurgulionis Laxatione.*

**F**auces, Græcis *ἐσφυγῆ*, ea dicitur regio, quæ, ut Gurgulionis laxatio. Galenus interpretatur, ante stomachum & laryngem, hoc est, ante gulæ & asperæ arteriæ extremitatem sita est. Nonnunquam tamen *ἐσφυγῆ* pro larynge, hoc est, summo asperæ arteriæ capite, vel ipsa quoque aspera arteria vsurpatur.

Et Suidas quidem atque alij Grammatici Græci genere distinguunt, ut *ἡσφυγῆ* propriè fauces significet, *ἐσφυγῆ* verò laryngem aut tracheam. Sed

Sed Galenus indifferenter utroque genere vocabulum *φάρυγγ* de summo tracheæ capite & de ipsa trachea accipit.

Eadem faucium regio etiam *ἰσθμὸς* nominatur per metaphoram, quod tanquam angustus terræ tractus inter duo maria veluti utrinque posita exporrigitur. Hinc *αἰσθμῆ* vocantur tonsillæ siue amygdalæ, hoc est, glândulæ insignes ad radicem linguæ in faucibus oppositæ, saluâ, quam copiosam continent, partes vicinas humectantes.

Inter tonsillas medius dependet gurgulio, Græcis *γάργυλον*, particula scilicet carnosa à palato in os propendens, soli hominum auiumque nonnulli generi propria, ob vocis potissimum modulationem condita, unde & *πληθὺν τῆς φωνῆς* à Paulo Aegineta nominatur, lib. 6. cap. 31.

Nomen gurgulionis, ut & Græcum *γάργυλον* factum videtur à sono, qui gargarizando fit ad illam oris particulam.

Atque hæc propria illius particulæ in summo ore appellatio est. *κίων* verò siue *κίον* & *σαφύλη* affectionum præternaturalium eiusdem partis nomina sunt. Quando enim gurgulio præter naturam intumescens in longum aequali crassitudine extenditur columnæ instar, *κίων* & *κίον* dicitur: *σαφύλη* verò, quando imâ parte in rotunditatem crassescens, suprà, quâ dependet, gracilior efficitur, utruæ à pediculo suo pendentis speciem præ se ferat. Aërius, *teirab. 2. ferm. 4. c. 40.* etiam tertiam affectionem addit, quam *κίον* asid est, lorum appellat, quando ex suffitu, ut scribit, nimium ignitus gurgulio, hoc est, desiccatus gracilescit, & lorum similis propendit. Accidit idem, cum ob *αἰσθμῆ* eius partis, tum ob paralytin (paralysis tamen vocem non propriè accipiendo) ut Aërius, *sequ. capite*, docet.

Differt igitur *κίων* τῆς *κίον*, quod in hac gurgulio non extenuatus est, ut in lorum, sed crassitiem ex fluxione magnam est adeptus. Aretæus *κίον* de membranarum utrinque circa gurgulionem in latum tanquam alarum vesperrilionum explicatione, de qua mox dicitur, interpretatur, 1. *de causis acutor. cap. 8.* Frequentiora autem duo mala sunt, gurgulionis laxitas & inflammatio eiusdem. Illam τῆς *γάργυλων* *χαλασὶν*, hanc *φλεγμωτὴν* nominant; de quibus iam dicemus.

*Κίων* ergo vel *κίον* absolute, & cum adiectione *κίον* *χαλασμένη*, est *γάργυλον* χαλασέν, seu gurgulionis laxatio, quæ affectio vulgò casus columellæ appellatur, *der Zäpfle ist gefallen oder geschossen.*

Fit autem, quando gurgulio multo humore præter naturam perfusus citra inflammationem laxatur & elōgatur, ut radici linguæ & faucibus incumbat; sicut in catarrhis continuis sæpe accidit. Humor plerumque puitosus est è cerebro demissus, partem illam nimium humectans. Columella sic laxata mollis est, albicans & concolor palato, sine dolore & calore.

Historiam gurgulionis mirè laxati describit Marcus Donatus, *de hist. med. mirab. lib. 3. cap. 3.* ex Leonh. Botallo, cuiusdam, cui repente ex labore columella ita laxata fuerat, ut ad anteriores dentes protenderetur. Aretæus etiam loco citato, miræ eiusdem columellæ laxationis meminit, ubi scribit, bicornem columellam reddi, geminis membranis hinc atque inde pendentibus, quæ ab utraque parte iaceant quasi vesperrilionum alæ.

#### Curatio.

Curatio eadem propemodum est, quæ gurgulionis inflammati, siue vix, de qua, *cap. seq.* dicitur. Fiant igitur per venæ sectionem, ac cucurbitulas, præmissâ, si opus, purgatione capitis ac totius corporis, diuersiones & euacuationes, ut decet. Capiti etiam prospiciatur erhinis aliisque remediis humorem puitosum

absumentibus; intemperiemque frigidam & humidam corrigentibus.

Topica autem initid sint adstringentia & repellentia; postea etiam paululum dissoluentia & exiccantia. Inprimis verò & præ cæteris prodest decoctum & aqua plantaginis, caprifolij, myrti, rosarum, fol. rubi, rad. caryophyllatæ, origani hyssopi, oxycraturum & acetum, quæ interdum sola sufficiunt. Fiat ergo Gargarismis vel Colutio oris talis:

*℞. Aqu. plantag. lb. i. diamor. vel dianuc. ana. Vnc. i. M.* vsurpentur leni Gargarismo.

Aut *℞. Flor. rosar. rubr. balauft. ana M. B. fol. acetos. plantag. ana M. i. gallar. immaturar. Dra. ii. alum. vst. 3. B. sem. cydon. Scr. iv.*

Coq. in l. q. aquæ ad tertias pro lb. j.

Colaturæ adde *diamori Vnc. i. aceti vini 3. B. M.* pro Gargarismo.

Vel *℞. Fol. plantag. mespilor. caud. equ. rosar. rubr. ana M. i. fol. scabios. M. B.*

Coqu. in aqu.

Colaturæ *℞. lb. ii.* adde mell. ros. aut *diamori Vnc. ii. aceti rosar. Vnc. B. M.*

Vel *℞. Flor. malv. arborea, ros. rubr. fol. prunell. veronic. salu. vulnar. (quam ob signaturam nonnulli hic commendant.) ana M. B. rad. tormentill. Dra. ii. alumin. erudi Drach. i. mellis Vnc. ij.*

Coqu. omnia in aqu. lb. ii. j. & aceti Vnc. vi. r. ad quartæ partis consumptionem.

Colaturæ utere pro Gargarismo.

Vel *℞. Decocti saluæ, hyssopi, ana lb. B. alumin. sacchar. Scr. i. diamori 3. i. mell. ros. Vnc. B. M.*

Vel *℞. Aq. tormentill. plantag. rosar. ana 3. iii. syr. de ros. siccis. myrtini, ana 3. B. spir. vitriol. Scr. i. M.*

Vel *℞. Aq. plantag. centimod. ana 3. ii. rosar. prunelle, an. Vnc. i. B. succi granator. 3. i. rob. berberum Vnc. B. M.*

Vel *℞. Sem. sumach 3. iii. balauftior. 3. i. B. rosar. rubr. P. i. B. rad. tormentill. 3. i. aq. plantag. fol. quercus, an. 3. iii.*

Ebulliant vnica ebullitione, & colentur.

Colaturæ admisce *syr. de ros. siccis 3. B. diamori 3. iii. essent. rosar. rubr. 3. i. B. spir. vitriol. Scr. B. M.*

Vel *℞. Rad. tormentill. & vulnar. an. q. f.*

Coquantur in cereuisia & cum modico melle dulcorentur pro Gargarismo. Commendatur & conferuæ rosar. vitriolatæ. Aut fiat talis Pulvis:

*℞. Rosar. siccar. balauft. alum. scissil. ana. 3. B. piper. zingiber. myrrh. ana Scr. i.*

Contusa & cribrata per calamus insufflentur, vel, ut mox dicitur, applicentur.

Galenus repellens & discutiens est ex gallarum immaturarum, alumin. scissil. & salis Ammoniac. partibus equalibus.

Vel *℞. Alumin. vsti, & boli Armenæ* præ quibus tritis, cochlearique siue *σαφύλων* instrumento impositis columella contingatur.

Ad pulveres hos & similes columellæ rectè applicandos vtile etiam est cochleare & folliis Guiljelmi Fabricij, quæ descripsit, *cent. 2. obs. 21.*

Aërius ad valde laxatam & rumentem columellam hunc Pulverem probat:

*℞. Piper. myrrh. ana. 3. i. alumin. scissil. gallar. ana 3. ij.*

Contritis utere, è vestigio enim columellam firmat & resiccat.

Si malum diutius protrahatur, validè discutientia cōmiscantur, ut pulu. piper. trium generum zingib. cinamom. macis, galang. pyrethr. sal. ammon. sinapi, hyssopi, pulegij, origani, prassij, calaminthæ.

Vulgus initid solo piperis longi contactu columellam sanat, ubi scilicet materia pauca est, & caput excrementis non plenum.

Aliàs intempestius eius vsus noxius est. Addi potest aliquid aluminis & boli Armenæ, vel myrrhæ, vel myrobal. citrinarum Nonnulli piperis loco zingibere vtuntur.

Quidam futura coronali applicant emplastrum confectum ex acacia cum aceto aut ex gallis vstis cum aceto, quo columella eleuatur. Alij ouum recens coctum ad duritiem per medium dissectum & thure vel zingibere conspersum calidè vertici imponunt. Alij folium quercinum melle inungunt, & vertici applicant. Potest & puluis olibani, succini, & ligni aloës ad-moueri.

Vel ℥. thus & gallas puluerisatas & cum fari na tritici & melle virgin. in formam emplastri redigantur & vertici imponantur.

Quidam nuces iuglandes cum spiritu vini contusas vertici imponunt. Alij fermentum verus sincipiti imponunt, linteolo inductum, cui nonnulli admiscunt puluerem succini albi. Alij matricariam recentem cum fermento contundunt & applicant, aut sincipiti illiunt axungiam leporinam. Ore verò excipere iubent suffitum ex succino albo, puluere caryophyllorum, lign. aloës, mastiches.

In non delicatis quidam vtuntur stercore albo canis ossa comedentis, siue pulueris formâ, quo columella attollatur, addito paucocinamomo, siue cocto illo in vino cum fol. rutæ formâ gargarisimi.

Vel ℥. Pul. cupul. glandium Dra. i. albi graci Dra. β. pip. long. zingib. ana Scr. i. M.

Nonnulli etiam ceruici topica imponunt.

Si defluxio ita acris & salia sit, vt columellæ erosionem efficiat, humore contemperato & euacuato, diuersionibusque vsurpatis, exulcerationi ipsi extergentia, adstringentia, & tandem solidantia adhibeantur.

Paretur ergo gargarisimus ex aqua & melle simpl. aut melle rosato & diamoro. Post extersionem partes erosæ saepe tangantur specillo lanâ obuoluto & intincto in hoc Liquore:

℥. Aq. rosar. plantag. ana Vnc. iii. mellis despumati Vnc. ii. licy Dra. ii. Ferueant vnicâ ebullitione.

Aut ℥. Succ. moror. rubi, moror. Celsi, de cornis, ana ℥. β. mellis despumati Vnc. ij.

Coquantur ad iustam consistentiam. Postea in eo dissolue. licy Dra. iii. alumin. scissil. Dra. i. β.

Iterum leniter coq pro columellæ erosæ illitione.

## CAPVT XXI.

### De gurgulionis Inflammatione & Exulceratione.

Gurgulionis  
inflammatio  
& exulceratio.

**A** Liquando etiam Inflammatur gurgulio, & græcis *κροῖς* φλ. *συμπίνα* nominatur; & quidem interdum retenta sui naturali figurâ, mole tamen auctus; interdum alienam, vuz scilicet à pediculo suo pendentis, figuram acquirit, & tunc *σαρδάνη* appellatur. Et quidem affectio, quæ *σαρδάνη* seu vuz dicitur, rarius gurgulioni accidit, frequentius verò is ita inflammatur, vt naturalem suam figuram magnitudine tantum mutata retineat. Galenus, 6. de compos. med. sec. loca, cap. 3.

#### Causa.

Causa.

Causa est defluxus humoris è capite ad gurgulionem; qui humor sanguis inprimis tenuis est, aut pituita cum sanguine mixta: de quo etiam Hippocrates, 2. de morb. Arabes & à cæteris humoribus deducunt, qui colore & specie doloris discernuntur.

Quod si materia acris aut salia sit, non solum inflammationem, sed & exulcerationem efficit, nisi maturè occurratur. Affectio ipsa cum sit inflammatio, morbus est intemperiei cum materia & magnitudine aucta, & si exulceratio sequitur, etiam cum solutâ vnitatem.

#### Signa Diagnostica.

Malum oculis est expositum, apertis ore & depressâ linguâ, adest tumor, dolor, ardor & rubor cum deglutendi difficultate, & suffocationis quodam periculo, interdum & cum febre.

Et quod ligna caussarum attinet, ex sanguine magis est affectio partis, si pars ipsa rubicundior sit, & dolor in eâ sentiat pulsatilis; ex bile, si colore sit citrina, & dolor adsit punctius; atque sic de cæteris.

#### Prognostica.

1. Quanto magis vuula est inflata in apostemate, & quanto magis elongata in relaxatione, tantò magis nocet operationibus, & tantò deterius est signum.

2. Gurgulionem inflammatione laborantem incidere aut scarificare, aut vrere periculosum est, præsertim, quândiu rubicundus tumidusque fuerit. Sequitur enim sanguinis fluxus, qui facillè sedari non potest, & à quo suffocationis periculum imminet ob decubitus ad pulmones. Vicinarum quoque partium inflammatio metuenda est, ratione doloris attrahentis. Hippocrates, 3. prognost. aphor. 21. Ideo ad excisionem non statim festinandum est, sed extrema prius remedia tentanda sunt.

3. Contractas & rotundas vias & sanguinolentas aut subnigras chirurgiâ aggredi non decet, sed tenues & oblongas & summâ parte imminutas ac resolutas & non valde sanguinolentas, sed albicantes; hæ enim inflammatione carent, cum venæ extenuatæ sint, & sanguine destitutæ. Paulus, lib. 6. cap. 31.

4. Quibus gurgulio totus excinditur vel eroditur, raro clarè & distinctè loquuntur. Obseruauit tamen Bauhinus, vt, in theatro anatom. refert, vt & Guilielmus Fabricius Hildanus, Cent. 2. obseru. 21. aliquos, quibus columella fuit erosa, distinctè & articulatè locutos fuisse. Si etiam gurgulio totus excinditur, periculum à *σάρδι* imminet; cum particula iam deficiat, quæ impetum irruentis frigidi aëris auertere, & aliquid de cerebri destillationibus excipere & à pectore auertere solita est.

#### Curatio.

Vt in aliis inflammationibus, ita & in gurgulionis inflammatione primùm vniuersalia præmittenda; & si plethora adsit, venæ sectio, inprimis cephalicæ, instituenda, postea etiam vena sub lingua aperienda, aut cucurbitulæ cum scarificatione ceruici aut scapulis affigendæ. Fiant etiam diuersiones per clysteres, frictions & ligaturas extremorum & similes. Si vitiosi humores abundant, ij euacuandi.

Topica remedia initid sint repellentia, quæ forma gargarisimi & pulueris vsurpentur, atque vbi moderata est fluxio, aultera illa sint, vbi vehementior, acerbæ, quæ fortius adstringunt & repellunt, docente Galeno, 6. de comp. med. sec. loca c. 3. His mel additur, ne exasperando dolorem pariant, fluxionemque irritent.

Moderata ergo sunt diamorum, succus ex moris cum melle. Diluantur hi succi cum aquis aut decocto rosarum, plantaginis, prunellæ, myrrillorum, rubi, sumach, balauft. gallar. hordei, pro gargarismo, vel collutione potius. Nam validâ & multâ gargarisatione plus materiæ ad locum affectum attrahi potest.

Vt ℥. Diamori ʒ. vi. vini granat. Vnc. β. decocti rosar. balauft. sumach. lb. β. M. pro Collutione oris.

Vel ℥. Aq. plantag. equiseti, prunella, an. lb. i. flor. rosar. rubr. M. β. balauftior. p. i.

Ebulliant vnicâ ebullitione, adde diamori Vnc. iii.

Aut ℥. Fol. plantag. portulac. prunell. an. M. i. flor. rosar. rubr. fol. myrt. an. M. β. cortic. granator. Dra. ij.

Coqu. in s. q. aquæ pro lb. i. β.

Colat.



Colat. adde succ. malor. granat. Vnc. i. acet. rosac. 3. B. rob. nucum Vnc. ii. sem. M. pro Gargarismo vel Collutione oris.

Vel 4. Aq. fragor. prunella an. Vnc. i. B. nymph. plantag. rosar. an. 3. i. syr. cerasor. 3. B. rob. ribes 3. iii. diamori 3. ii. nitri prap. 3. j. M. pro Gargarismo.

In primo principio, ubi exigua est fluxio, sufficit gargarismus ex posca vel vino granator. vel sine gargarisatione liquor resupinato capite in ore teneatur, immutando, quando inscalecit.

Fortiora sunt, rob de ribes, rob nucum viridium, syrup. de agresta, succus cornorum & sorbor. acacia, hypocist. melle etiam hæc subacta. Decocta item myrti & baccar. eius, fol. tenerorum quercus, melpillor. vitis, cupular. glandium. sumach, balaustrorum.

Pulueris formæ conueniunt rosæ, balaustria, cortic. granat. hypocist. gallæ, & prius enumeratarum plantarum folia exiccata.

E.g. 4. Pul. spong. sambuc. 3. i. summit. centinod. prunella, an. Scr. i. fl. rosar. rubr. Dra. 8. F. Pulvis.

Applicantur cum cochleari aut specillo concauo siue *καρλοπόρι* instrumento, vt Paulus nominat, vel instrumento à Guilhelmo Fabricio depicto, cent. 2. obseru. 21.

Eger etiam sæpius lambat mel rosatum vel rob nucum, quod multum commendat Galenus, 6. de comp. med. sec. loca c. 1. ex narratione de Hortul.

Vel 4. Fol. plantag. bdellij minor. an. M. i. prunell. M. B. flor. rosar. rubr. p. i. passular. maior. cum arill. confusar. Vnc. i. sem. cydon. Dra. j.

Coqu. in suffic. quant. aquæ.

Colat. 4. lb. i. mell. rosat. diamori, an. Vnc. i. B.

Vel 4. Fl. rosar. rubr. p. ii. balaustr. sem. sumach 3. i. B. fol. plantag. prunell. an. p. iii. cupul. glandium Dra. i. alumin. Scrup. i.

Coqu. in l. q. aq. f. ad tertias, colentur.

Colat. 4. 3. ix. in quibus dissolue, rob nucum, moror. syr. myrtini, an. 3. B. ol. 3. Scr. 8. M. pro Gargarismo.

Vel 4. Fol. quercus, alchimill. plantag. an. p. ii. hyssopi p. i. cort. granat. nuc. cupress. balaustr. an. 3. i. rad. glycyrrh. Dra. ii. alum. roche Dra. 8.

Coqu. in aq. plantag. lb. i. B. ad medietatem.

In colatura dissolue, mellis ros. colat. syr. fl. cyani, an. 3. sem. de ros. sic. myrtini, an. Dra. c. ii. phlegm. aluminis 3. B. M. pro Gargarismo.

Atque hæc ferè in principio conueniunt.

Postea repellentibus admisceantur nonnulla moderatè discutientia cuiusmodi sunt flor. chamæmeli, meliloti, anethi, sem. fœnigræci, folia althææ, maluæ, radix, iridis, cyperti, hyssopi, ficus, thus, myrrha.

Vt 4. Prunell. hyssop. an. M. i. fl. violar. bord. an. M. B. glycyrrh. 3. B. vuar. passar. exacinar. 3. i. caricar. N. v.

Coqu. in aq. simp. Colat. 4. lb. j. oxymel. simpl. mell. rosat. diamori, an. Vnc. j.

Vel 4. Rad. maln. alib. an. 3. iii. fl. violar. purp. bord. mundi, an. p. i. sem. maln. althææ, cydonior. an. 3. i. 4. frig. mai. an. 3. B. Coqu. in aq. comm. puræ l. q.

Colaturæ 4. Vnc. iii. in quibus dissolue, diamori Vnc. i. nitri. trochisc. Dra. M. pro Gargarismo.

Si fluxio fuerit frigida,

4. Piper. Dra. sem. rad. irid. Dra. ii. suc. glycyrrh. 3. i. B. sacchar. cand. Vnc. ii. mell. rosat. colat. 3. i. M. F. Lohoch, quod calidè æger sumat.

Rondeletius in muliere, quæ penè suffocabatur, feliciter vltus est eclegmate Scribon. Lari ex pipere myrrha & melle, cuius vltu maximam pituitæ quantitatem, quæ circa columellam & fauces collecta erat, reiecit.

Sæpe etiam, vt monet Galenus, 6. de comp. med. sec. loca cap. 3. in principio quippiam ex discutientibus addendum est, quando scilicet corpus ægri prauis humoribus refectum est, & particula affecta sua natura debilis.

Si verò simul dolor vehemens fuerit, mitigantia dolorem quoque misceantur, quale est contusa glycyrrhiza cum mellis & aquæ pari mentura, cocta & gargarifata, lac gargarifatum, vel emulsio sem. papaueris, vel ptisana.

Quod si inflammatio in duritiem vertatur, (quod tamen rarius fit, quoniam locus affectus est calidus & humidus, & materia tenuis ac fluxilis) emollientibus vtendum, vt radicibus & fol. althææ, mucilag. sem. lini, fœnigræci: postea discutientia addantur, vt glycyrrh. radix irid. puleg. Origan. calaminth.

Si ad suppurationem tendat, maturetur decocto caricarum cum aqua mulla, aut cremore ptisan. hord. vel auenæ cum decocto passul. decocto glycyrrh. aut fursur. tritic. lotura calida.

Vel 4. Rad. glycyrrh. Dra. ii. flor. maln. arborese. p. ii. fursuris tritici in petia ligati Vnc. 8. caricar. ping. N. i. v. insubar. N. v.

Cq. in aq. comm. pro Vnc. ix. In quibus dissolue, mellis passul. 3. i. B. cremor. ptisana, auenæ 3. i. M. pro Gargarismo.

Si non succedat, ferro aperiatur. Post puris effusionem extergentia & desiccantia vsurpentur, vt aqua mulla, aqua hordei cum melle rosato. Item succus agrimon. aut caulium succus cum melle.

Si columella putrescere & in gangrænam transire incipiat, tali Gargarismo vtendum:

4. Origan. hyssop. an. M. iij. scabios. M. i. glycyrrh. 3. B.

Coq. in aq. pro lb. j.

Colat. adde oxymel. f. Vnc. iii. M.

Si vlcus vuæ putrescat & serpat, chalcantio & similibus metallicis vtendum est. Et vtiles etiam hic est aqua viridis supra proposita, & aqua viridis Plateri.

Ad vlcera Gallica conuenit aqua fortis bene diluta, vel aqua, in qua decoctum est sublimatum, adhibita simul vniversalis morbi Gallici curatione. Mitius est hoc:

4. Vnguenti Egyptiaci 3. B. aluminis 3. B. mellis rosati colati 3. i. B. M. pro Linimeto, quo vlcus contingatur.

Si remediis hisce malum curari non possit, ad chirurgiam veniendum, vt Paulus monet, lib. 6. c. 3. ne ex astiduis irritationibus tussis & vigilæ, aliquando & suffocatio sequatur.

Itaque vuula corrupta & marcida, quæ non amplius tumet, nec rubicunda est, atque ita sanguine & vita destituta, abscindenda eo modo, quem monstrat Paulus, ibid. & cuius Aëtius meminit, terrab. 2. ferm. 4. c. 41. qui forcipe obtorquere, & prius illaqueare vuam iubet, vt stupida effecta minus sanguinis profundat. Sed hæc chirurgica operatio periculo non caret; refertque Valeriscus de Taranta, lib. 3. cap. 3. historiam cuiusdam presbyteri, cui plethorico cum vuula fuisset abscissa, sanguinis fluxus in tanta quantitate ad pectus secutus est, vt inde maxima pectoris angustia, & respirationis difficultas oborta ægerque cum anaplius sanguinem è pectore eiicere non posset, suffocatus sit. Ideoque ipse octo canones in vuulæ al. scissione instituenda obseruandos proponit, 1. est, vt vuulæ abscissio non tentetur, nisi corpore prius euacuato, vt & monet Hippocrates, 3. prognost. aph. 21. 2. ne fiat affluxu humorum adhuc durante. 3. nisi ubi alia remedia non satisfecerint. 4. nisi tumor ille valde lædat & molestus sit. 5. instituendam esse in aere lucido. 6. ante vuulæ abscissionem & post eam vsurpanda esse gargarismata adstringentia. 7. ne nimis rubra & tumida abscindatur, sed solum alba & versus radicem angusta. 8. non abscindatur, nisi quantum magnitudinem naturalem excedit.

Vbi etiam incisione opus est, aliquid, si fieri possit, relinquat ur, necessarij vltus gratiæ.

Ad vuulam tamen commodè & sine periculo abscindendam peculiare instrumentum inuenit Guiliel. Fabricius, idque depinxit, cent. 2. obseru. 21. Et si fluxus sanguinis metuat, & putrefactio aliqua adsit, cauterium

actuale commodissimum est, quod quomodo adhiberi debeat, docet Paulus, loco alleg. Et peculiare atque ad hanc rem idoneum instrumentum descripsit Guilielmus Fabricius, loco alleg. Hieron. Fabricius ab Aquapend. de operat. Chirurgicis, titulo de una chirurgia, præcisione factâ, quam forficulâ instituit, exiguum ferramentum in cochlearis formam factum bene calefactum non ignitum admovent.

#### Diaeta.

Diaeta.

Victus ratio talis sit, qualis in aliis inflammationibus præcipitur, inprimis quies & inedia in principio morbi competit. Viurpentur in cibis, quæ leniter adstringunt, ut succus cydonior. granator. moror vuarum immaturarum. Masticer æger tenera mori vel quercus folia. Virer laboriosas deglutitiones, respirationes, loquelam.

### CAPVT XXII.

#### De Tonsillarum Inflammatione, & Vlceribus.

Tonsillarum inflammatio.

Glandulæ duæ utrinque ad radicem linguæ paulo supra laryngem positæ sunt, quæ Latinis Tonsillæ, vulgo à figura Amygdalæ, Græcis ἀμυγδαλῆς & τριγλῶνα vocantur, cum quod inter se appositæ, tum quod circa isthmum oris sitæ sint. Galeno autem, 3. de sympt. causis cap. 4. & in lib. de tumoribus p. n. cap. vii. ἀμυγδαλῆς sunt illarum glandularum tumor aut inflammatio, τριγλῶνα inflammatio eorum, quæ circa isthmum sunt locorum, hoc est, partium, quæ os & gulam interiacent.

Tonsillæ igitur cum conditæ sint, ut congregata salina laryngem & trachæam rigent, sæpe humore nimio ex frigida destillatione opplentur intumescunt, sed sine inflammatione, ita ut colorem suum naturalem retineant, & dolore careant.

Interdum verò eas occupat inflammatio cum rubore, ardore ac dolore & siti, & cum quadam deglutitionis ac respirationis difficultate. Quâ inflammatione in abcessum degenerante pus intra fauces effunditur, unde sæpe vlcus sordidum & graueolens relinquitur.

Tonsillarum vlcera.

Fluunt tamen ibidem vlcera citra inflammationem ex destillatione falsâ vel acri molles illas partes exedente, aut tali halitu eò ascendente; quod lue Gallica infectis familiare est.

Nonnunquam maligna & serpentina vlcera in iis partibus oriuntur, tempore inprimis verno, & pestilente aeris constitutione, teste Aetio, terrabibl. 2. ferm. 4. c. 46. siue ex præcedente inflammatione efferata, siue ex quavis alia causâ, ut ex aphthis in pueris & adultis, qui prauis humoribus abundant.

Interdum etiam tonsillæ planè indurantur; unde Mercurialis, de morb. pueror. lib. 2. c. 12. Paulum Æginetam sub tonsillis etiam scrophulas seu tumores duros & scirrhusos complecti, scribit. Vide etiam historiam tumoris eiusmodi cancrofi apud Guiliel. Fabricium, centur. 3. obseru. 84.

#### Causæ.

Causæ.

Causæ eadem sunt, quæ inflammationis gurgulionis. Concitatur scilicet inflammatio tonsillarum ex affluxu humorum ad illas; qui cum calidi sunt, partes illas calidas & humiditas inflammant, in iis præcipuè, qui multo sanguine abundant; cum copiosi, tumefaciunt; cum acres & salsi, erodunt.

Et quidem tonsillæ magis obnoxie sunt inflammationi, quàm gurgulio, propter mollitiem & laxitatem substantiæ & temperamenti proprii ac loci caliditatem ac humiditatem.

Inflammatione etiam tonsillarum magis laborant; qui sanguine magis abundant. Priuatim verò, ut Aetius scribit, lib. modo citato c. 45. pueris hoc malum frequens est ob teneram corporis texturam, & ob adspersionem, & lactentibus è lactis vitio & praua qualitate.

Puellis quoque usque ad menstruæ purgationis tempora hoc malum frequens est. Aræteus lib. 1. c. 9. In adultis verò generatur hoc malum ex nimia meri potatione, ac multâ & audiore deuoratione, ciborum maximè acrimum & asperorum. Ita cerasa audius comesta facile aciditate sua tonsillarum inflammationem & gurgulionis laxitatem efficere prohibentur.

#### Signa Diagnostica.

Tonsillis tumefactis foris sub maxillis tumor tactu visuque deprehenditur, & intus ceu frustulum quoddam faucibus adhærescens mole sua premit, obstatque, ne facilis fiat deglutitio, idque sine siti & ardore.

Inflammatis iisdem præter deglutendi, & quod Paulus addit, lib. 6. c. 30. respirandi difficultatem, dolor adest, rubor, ardor, sitis, interdum & febres.

Maligna tonsillarum vlcera partim alba sunt, maculis similia, partim cinereo colore, aut similia crustis, quæ ferro inuruntur. Accidit ergo siccitas in deglutendo, & suffocatio confertim incidit, maximè cum rubor subit mentum; aut, ubi hac acrimonia præterierit, vnde loca illa infestans succedit, & cum hac putrefactio; ut docet Aetius, terrabibl. 2. ferm. 4. cap. 46.

#### Prognostica.

1. Tonsillarum inflammatio morbus acutus est, & sæpe suffocationis periculum minatur.

2. Tumor autem vel resoluitur, vel suppuratur, vel induratur.

3. Tonsillæ in febribus denigratæ & arefactæ mortem imminere portendunt.

4. Vlcera tonsillarum quædam familiaria sunt & mitia, quæ scilicet sunt munda, exigua, non altè descendunt, nec inflammata, nec dolorem excitantia; quædam aliena & pestifera, quæ lata sunt, caua, quodam concreto humore albo, aut liuido, aut nigro ludentia, quæ aphthæ etiam nuncupantur. Quod si concreta illa sordes altius descenderit, eschæra gignitur, quam rubor insignis, inflammatio & venarum dolor circumscindit, sicut in carbunculo. Exigua quoque & rara exanthemata oriuntur, quibus superuenientia alia in vnum vlcus coalescunt, latumque vlcus efficiunt. Id si interius in os depascendo serpit, columellam exedit, & linguam quoque & gingiuas ac alueolos dentium occupat, unde dentes labefactantur & nigrescunt. In columella etiam phlegmonode erumpit, atque non multis post diebus phlegmone, febris, fœtore, inediaque consumpti intereunt.

5. At si in pectus per trachæam id malum inuadat, eodem illo die strangulat, pulmo enim & cor neque talem odoris fœditatem, neque vlcera, neque serofos humores sustinent, sed tussis ac spirandi difficultas enascitur Aræteus, lib. 1. cap. 9.

6. Tonsillarum vlcera sine febre securiora sunt.

7. Tonsillarum vlcera æstate suborta peiora sunt, quàm quæ aliis oriuntur temporibus. Citò enim serpunt.

8. Serpentina circa fauces vlcera, quæ magnam molestem exhibent, & acuta magis sunt, vltimum spirandi difficultatem adferunt. Videantur plura eiusmodi prognostica apud Hippocratem, lib. de dentitione.

9. Glandulæ istæ facillè indurantur, & in scirrhum degenerant, qui nunquam aut raro curatur.

10. Aliquando tonsillarum tumores suppurantur & abscessus extrâ erumpunt, & ægri sanantur: cuius rei exemplum est apud Dodonæum, in obseru. cap. 16.

Curatio.

## Curatio.

Conti.

Si leuis sit inflammatio, circa initia gargarismi adhibeantur adstringentes, cauendo, ne mel multum admisceamus, quod suâ acrimoniam malum irritaret, vt monet Aëtius, loco citato cap. 45.

Remittente autem inflammatione, rectè & vtiliter illud admiscetur.

Vt 2℥. Aqu. plantag. ℥i. β. fl. rosar. rubr. M. β. sem. cydon. 3. i. β. Semel ebulliant. Colaturæ adde diamor. Vnc. i. β. diamuc. Vnc. β. M. pro Gargarismo, quo tepidè internabris colluantur. Nam inflammata neque frigus tolerant, neque multum calorem.

Aur 2℥. Fol. plantag. M. i. fl. rosar. rubr. P. i. cortic. granat. 3. iiii. gallar. immatur. N. iiii. fol. prunell. M. i. nuc. cupress. Dra. ii. Coq. in f. q. aqu. pro ℥b. j.

Colat. addè diamuc. 3. ii. β. Misc. pro Gargarismo.

Vbi vehemens est inflammatio, vt periculum sit à suffocatione, statim cephalica secetur, repetitâ sanguinis detractio in magnâ plethorâ; aut primùm basilica, postea cephalica aperiatur.

Vbi venæ sectio locum non habet, aurium sacrificatio vilis. Cucurbitulæ etiam venæ sectionis vicariæ esse possunt.

Friktionem longam in carpo rusticis familiarem esse, scribit Rondeletius, lib. 2. c. 4. Prodesse autem reuera ob diuersionem.

In fœminis, vbi opus, vena tali primò incidatur. Ad euacuandam postea materiam coniunctam prodest secare venas sub lingua. Si cum sanguine vitrioli humores simul redundant, clysteres & pharmaca leniter purgantia exhibeantur.

Deinde ad topica veniendum est, quæ primùm sint repellentia: vt decoctum ex rosis, balauistiis, fol. plantag. vitis, rubi, sorbis, cornis, mespilis, gallis, sumach, fol. & bacc. myrti, ac simil. quorum formulæ antea sunt propositæ. Repellentia autem Practici ferè omnes solum intrâ applicant. Ab iis tamen & vulgata consuetudine dissentit Rondeletius, qui, allegato loco, non vult adstringentia solum in parte interna, & relaxantia in externa applicari, sed ea intus & extrâ adhibet. Cum enim partes laxæ sint, non amplius esse laxandas censet, cum defluit materia, sed cum consistit fluxio, vt materia ad exteriora trahatur. In principio verò adstringentia extrâ etiam apponit in lateribus arteriæ sub maxilla inferiore. Quod in seipso expertum esse scribit, & anginam & defluxionem ad fauces prohibuisse, & multos à scrophulis incipientibus sanasse. Verùm omninò hic cautione opus est, & videndum, quæ materiæ affluentis sit copia. Si enim corpus adhuc plenum sit & affluxus magnus, nulli autor fuerim, vt repellentia extrâ apponant; cum facile fieri possit, vt materia ad interiora repulsa periculosam anginam exciter. Sempèrque tutius materia ad exteriora, quàm interiora fertur.

Post repellentia prisanæ succus gargarisetur, in quo decoctæ sint passullæ vel iuiubæ, aut fursur. decoctio, aut decoctum glycyrrhizæ, ficuum & hyssopi. Lac tepidum gargarisatum acrium collutionum mordacitatem temperat.

Extrâ etiam illinatur guttur oleo amygdalarum dulcium, liliorum alborum, chamæmeli, aut fomento cum spōgiâ ex decocto chamæmeli, melilori, althææ, maluæ, scabiosæ, sem. lini, fœnigræci: aut cataplasma ex iisdem paratum cum farina hordei, sem. lini, fœnigræci, althææ, hordei, ol. chamæmel. amygdalar. dulcium, butyro recenti, aut cataplasma ex pane albo & melle apponatur, vel emplastrum de meliloto. Soluetur ita tumor, & quod reliquum est, discutietur.

Post cataplasmatem, de quo dictum, ablationem, partes circa mentum tegantur, circumpositâ lanâ molli oleo nardino irrigata, ne partibus illis refrigeratis materia introcedat.

Interdum natura spontè suâ materiam ad externa

Dan. Sennertii Tom. I I.

conuertit; natis vtrinque in collo infra aures tumoribus, quibus vel spontè vel scalpello apertis pus effluit, arque ita tonsillæ abscessu liberantur; sicut & in angina fieri consuevit, teste Hippocrate, 6. aphor. 37.

Si tonsillæ inflammatae in abscessum tendant, quod deprehenditur augescente inflammatione & exacerbationibus circa vesperam fortioribus factis cum horrore & inæqualitate, nonnunquam & cum febre, vt docet Aëtius: tunc suppuratio sine mora adiuuetur gargarismis ex aqua multa calente, decocto caricarum & hyssopo cum glycyrrh. vel decocto caricarum in lacte, vel decocto passular. vel iuiubar. cum viol. & malua.

Vel 2℥. Farina triticea in peria ligata Vnc. i. caricar. Vnc. iiii. radic. malua Vnc. i. β. aq. communis ℥b. ij.

Coq. ad consumptionem quintæ partis. Deinde colentur. F. Gargarismus.

Foris cataplasma applicetur ex farina hordei, tritic. & fœnigræc. cum decocto ex caricis, rad. althææ, & melle, vel emplastrum diachylon.

Vt 2℥. Fol. maluæ, violar. ana M. j.

Coq. ad mollitiem & per setaceum traiciantur.

Addè farina tritici Vnc. i. β. croci Scrup. β. butyri ss. sale q. s. F. Cataplasma.

Celsus vaporem aquæ calentis ore excipere iubet. Confecto pure, quod ex dolore & tumore remittente cognoscitur, abscessus collutionibus acrioribus rumpatur, ex hyssopo, pulegio, thymo, calamintha in sapa aut mulla coctis & gargarisatis; aut ferro aperiatur, eo modo, quem Aëtius, tetrab. 2. serm. 4. cap. 45. & Paulus, l. 6. cap. 30. tradunt, aut deuoratis maioribus frustis panis. Rupto abscessu aqua mulla gargarisetur primùm per se, postea admixta lenticula & rosis, vel plantagine, quibus immorandum est, donec vlcus ad cicatricem perducatur.

Si ex longo valde refrigerantium & repellentium vsu, vel aliàs etiam tonsillæ indurescant, quod fieri solet non præmissâ phlebotomia vel purgatione, ante topica gargarismi emollientes & resoluentes conueniunt, vt:

2℥. Rad. althææ mundat. lilior. albor. ana. Vnc. β. fol. violar. maluæ, ana M. i. scabios. prunell. ana M. β. extremis sambuc. 3. ii. herd. P. i. ficus N. iiii. sem. fœnigræc. maluæ, ana 3. i. nidi hirund. Drach. β.

Coq. in f. q. aqu. addendo in fine, sem. cydon. lini, ana. Drach. β. aq. scabiosa, caprifol. an. 3. ii. pro ℥b. ij.

Colaturæ addè mell. rosar. colat. Vnc. iiii. diamor. Vnc. i. Misc. pro Gargarismo.

Si tonsillæ induratae deglutitionem & respirationem impediunt, medicamentis emolliiri nequeant; Celsus & Paulus ad chirurgiam accedunt, tonsillâque extrahere conantur. Sed chirurgia hæc neque facilis est, neque tuta. Qua de re videatur Hieron. Fabric. ab Aquapendente, de operationibus Chirurgic. titulo de tonsillis.

Ad nomas siue serpentina vlcera tonsillarum, præmissâ venæ sectione, corporis euacuatione & diuersionibus, conuenit diamorum ex aqua mulla, insperso puluere flor. rosar. rubr. vel sumach, Paulus succum exprimit ex malo punico dulci cum cortice contuso, cuius partes æquales sex miscet cum vna parte mellis & ad mellis spissitudinem cocta illinit. Vtilis est & hic gargarismus suprà propositus, cuius hactenus aliquoties facta est mentio. Possunt etiam aristolochia & iris & chalcitis adhiberi cum melle, aliquando & Andronis & Musæ pastilli, Mirabiliter Aëtio crustas aufert stercus caninum cum melle illitum, & vstarum hirudinum cinis cum melle, & centaurij minor. cinis cum melle.

Expertum quoque in vlceribus tonsillarum malignis linimentum ex puluere stercoris canini, si cum melle ad iustam spissitudinem misceantur. Addi potest aliquid de puluere radicis iridis. Vide Galenum, 10. de

*simpl. med. facult. cap. de stercore canino.* Tabernæmontanus commendat, tanquam experimentum, decoctum radic. morlii diaboli.

Omnia autem oris vlcera vehementioribus exsiccantibus & adstringentibus gaudent, quàm externà vlcera; cum ne amplius serpent, tum quia semper à salina fiunt humidiora, vnde & medicamentorum vis infringitur.

Post irritationes ab acrioribus hisce medicamentis factas gargarisetur decoctum glycyrrhizæ, quod paratur ex vino nigro dulci, ex mastiche, myrrha, croco, deinde etiam addito amylo, & tragacantha. Cohibito iam vlcere depalcente, lac gargarisandum cum terrâ Samiâ mixtum, Crustis sublatis & purgato vlcere hoc conuenit.

*℞. Flor. rosar. rubr. Vnc. ℞. croci Drach. ii. balaust. myrrh. an. Scrup. i. nuc. pinear. 3. j.*

Triticis & subactis cum melle vtere ad illitionem. Processu temporis addi possunt amyli Scrup. ii. alumin. sciss. Scrup. j.

Vide plura huius generis apud Aërium, loco citato, cap. 46.

### Diaeta.

Diaeta.

Abstinentum ab acerbis, à fumo, à Solis aestu, à vino, ab exercitio & motu corporis atque animi nimio, præsertim ab ira, balneo, & omnibus, quæ affluxum humorum augere possunt.

## CAPVT XXIII.

### De iis, quæ in Guttur vel Gulam inciderunt, eximendus.

Illorum quæ in gulam inciderunt exemptio.

**A**ccidit nonnunquam, vt siue dormientibus siue vigilantibus etiam per incuriam aliquid in guttur vel fauces illabatur, quod suffocationis merum & alia pericula affert. Quæ res qua ratione eximendæ sint, dictum quidem in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 10. Adde tamen quædam libet.

Sunt autem, quæ in guttur vel fauces incidunt, alia animata, alia inanimata. Ex animatorum genere sunt primum hircines, quæ vel per natationem in stagnis ore imprudenter excipiuntur, vel vnâ cum aquis minutissimæ ipsæ adhuc hauriuntur, & faucibus vel gulæ affixæ attracto sanguine grandescunt. Adherent verò vel palato versus superiorem nasi partem, & cum sanguis sine creatu egreditur, vel gutturi, vbi sanguis cum creatu excernitur: & quidem si in initio sit trachææ, tussis continenter affligit, vel gulæ, & tunc deglutitio impeditur vomitusque concitatur; vel denique ipsi ventriculo sunt affixæ, atque tunc nullum impedimentum in deglutitione sentitur, adest verò vomitus, cum quo sanguis reicitur.

Hircinorum nonnullæ venenatæ sunt, quæ & grauiora symptomata accersunt, vt syncopen, tremorem cordis, febrem acutam, & vlcera denique maligna. Agnoscuntur quod magna habent capita, corpore sunt lanuginoso, colore nigræ aut virides, maculis vel lineis variis distinctæ, quemadmodum eas describit Auicennas, 1. canon. fen. 4. doct. 5. cap. 22.

Vbiunque verò hircudo ore concepta hæret, titillationis sensum obscuro suo motu efficit, punctio quoque sentitur, dum sanguinem sugit, & sanguis ex ore tenuis ac paucus per intervalla expulsetur, quoniam ab exilibus seu capillaribus venis hircudo sanguinem allicit. De quo Hippocrates, 2. prædict. Quibus fauces sanguine frequenter & noctu & interdum replentur, cum neque capitis dolor progressus fuerit, neque tussis, neque vomitus, neque febris prehenderit, neque pectoris aut dorsi dolor tennerit: in his nares & fauces

inspicienda, numquid vlcus in collo aut hircudo appareat.

Quando igitur hircudo in ore ita hæret, vt oculis conspici queat, Chirurgus eam idoneo instrumento apprehendat, & caput eius fortiter stringat, ne si medio fortè corpore præcindatur, pars eius anterior cum capite intus affixa remaneat.

Vbi verò hircudo profundius latet, vt chirurgiæ locus non sit, medicamentis res peragenda erit. Itaque Rhases gargarismos præcipit ex acerbis, & amaris, quibus offensa hircudo sponte sese retrahat, vel quibus enecetur, qualia sunt sinapi, cum aceto gargarisata, aut sal cum aceto, aut cepæ succus. A proprietate valere creditur succus salicis. Iubent & nigellam ac sinapi tritum gutturi insufflare. Enecant etiam absinthium, abrotanum, lupini, mentastrum, nasturtium, sem. sanctum, aloë hiera, agaricus.

Amotam vel enecatam hircudinem æger scretu, tussi vel vomitu reicere conabitur. Si eductâ hircudine exspulsi sanguinis perseveret, venulis adhuc hiantibus, vnde hircudo luxit non statim ille suppressendus est, sed permittendus, monente Auicenna, vt moderatè effluat; ne retentus venenositate suâ, quam ab hircudine contraxit, noceat. Eadem quoque venenositas corrigatur exhibita theriacâ aut Michridatio, aut terrâ sigillatâ cum zedoaria, dictamno, tormentilla & similibus.

Postea sistatur sanguis gargarisatus ex decoctione cortic. mali granati, balaustiorum & sumach, vel pulvere insufflato ex balaustis, thure, sangu. draconis, amylo.

Quod si hircudo stomacho inhæreat, medicamenta Rhases exhibet, quibus vermes enecantur & eiciuntur, aut ægum in balneum siccum siue Laconicum ducit, vbi sit vehementi contractâ, postea aquam frigidissimam æger ore contineat, semper eam permutando, si incaluerit, vt hircudo æstu etiam afflicta prorepat in os ad reficiendum sese frigida, qua alioquin naturaliter delectatur.

Probatum & hoc:

*℞. Farin. lupinor. pulu. turbit. agarici, sem. nigell. ana Drach. ii.*

Incorporentur cum succo absinthij & fiant Trochisci pondere Dra. i. dissoluanturque vnus in decoctione sem. nigellæ, deturque vnus ieiuno stomacho.

Interdum animalia alia dormientibus in os irrepunt, quod de lacertis ac serpentibus compertum est. Hæc eodem modo in balneo sicco cum aquâ frigidâ ore retenta proluciantur, aut appposito ad os ægri vase lactis calentis pleno, cuius nidore siti etiam vexatum animal prorepat; præsertim si vas illud ita dispositum sit, vt splendentis Solis radios excipiat. Oportet autem ægum prono capite in ventrem incumbere. Quidam & affatim hoc bibere iubent ad vomitum vsque, vt simul cum lacte animal redditum, quod ingressum est, excutatur.

Inanimata, quæ vel casu, vel sponte deglutita in gutture aut gulâ subsistunt, siue mole suâ inhærentia, vt bolus panis vel carnis non masticatus, annulus, moneta grandior, nucleus pruni, siue acumine suo se ingentia, vt fragmenta vitri, acus, spina, piscis, os acutum & similia, suos etiam modos habent, quibus eximantur.

Et quidem si crassum quid deglutitum inhæreat, nisi immisso idoneo instrumento apprehendi & eximi queat, ægri ceruix, aliquoties pugno concutitur, ita vt depressam illam teneat, humerisque eleuatus sit, quâ concussionem res in gula hærens ad ventriculum delabatur; aut si prope fauces hæreat, tussi per os reiciatur. Iuscula etiam carniū pinguiā, vel cum butyro parata, liberaliter & affatim hauriantur, vel prisana cum melle aut oleo amygdalarum dulcium, vt lubrica redditâ gulâ facilius, quod illapsum est, in ventriculum descendat, aut vt vomitus saltem istis pinguibus prouocetur.



nocetur. Rhafes quoque ægrum in balneum aquæ tepidæ se demittere iubet vique ad mentum, vt viæ in gula emolliantur & laxentur.

Si his nihil proficitur, candela cerea mediocriter crassa, vel stylus plumbeus nonnihil incuruatus sumi potest, quo melle vel oleo oblito & in gulam demisso res ibi sublitens in ventriculum detrudatur.

Si acutum est, quodd infixum hæret, neque oculis ira patet, vt forcipe prehendi possit, tussis excitanda, oxymel continuo lambendo; aut sternutatio quoque, si locus affectus propior sit tracheæ arteriæ, vel ipsa etiam sit trachea. Vehementi enim hac corporis concussione, spiritus simul expulsionem adiuvante, res obhærens excludetur.

Si obliessa est gula, aquâ mulsâ crebro gargassetur, oleum etiam & pingues sorbitiones & albuginea ouorum cruda & lubricantia alia bibantur.

Vtilis est & continuus vsus eclegmatum emollientium, vt quod paratur ex mucilagin, semine maluæ, radic. althææ, ficubus, passulis, iuiubis, sebesten & similibus cum syrupo violarum. Tandem magni boli deglutiantur, vel ficus siccæ integræ, quo impetu id, quod sublitit, in ventriculum simul detrudatur.

Quod si his modis nihil perficitur, Rhafes instrumentum commendat ex plumbo factum, quod foraminulis multis exilibus pertusum est instar retis, quorum vsus est, vt, dum instrumentum vertitur retrahiturque, res gulæ infixæ illis foraminulis implicetur, simulque edueatur, & vt respiratio per illa non impediat. Quem imitatus est procul dubio Guil. Fabricius in fabrica sui instrumenti, quo ad res gulæ & faucibus infixas extrahendas vtitur, quodque *centur. 1. obseru. 36.* delineauit. Qui etiam videatur, eadem *centuriâ, obseru. 31. 32. 33. 34. 35.*

Si nec hoc modo suo loco moueri res immissa possit, naturæ & temporis negotium totum committendum. Progressu enim temporis calor naturalis coquendo & alterando rem illam mutat (si eius natura talis sit) & imminuit. Et vt maturius id fiat, natura in coctione adiuvanda medicamento ex radicibus althææ, ficubus, farina sem. lini, fœnigræci, hordei, aut mucilagine ex iisdem parata, flor. cassiæ, butyro, oleo amygdalar. dulc. chamæmeli, lilior. albor. pingued. gallin. & similibus.

Quod & faciendum, si officulum vel simile quid inflammationem in œsophago excitet. Hæc enim ad suppurationem perducta, & abcessu rupto, æger ab angustia & dolore liberatur Exemplum de spina gulæ infixæ habet Dodonæus, in *obseru. cap. 17.*

Comperit ab Arculano, officulum acutum gulæ infixum post bimestre spatium per cutem in collo apertâ sponte viâ exiisse. Beniuenius deuoratam acum decennio post perforato stomacho extrusam vidit. De acubus cum vrina emissis meminit Iohan. Langius, *lib. 2. Epist. 40.* De aciculâ per aluum cum grauissimis symptomatibus deiectâ videatur Guil. Fabricius, *allegata cent. 1. obser. 34.* Quod si tale quid naturam moliri videmus, ne ventriculus vel intestina lædantur, exhibendus ciemor hordei, iuscula pinguis, lac amygdalarum dulcium, oleum amygdal. dulcium, cassia.

## CAPVT XXIV.

## De Angina.

**A**ngina Latinis ab angendo, quæ vox à Græco ἀγγίζω, id est, suffoco & strangulo deducitur; Græcis *Συνάγγη* & *Κυνάγγη*, & masculinâ terminatione, vt ab Hippocrate, *lib. de loc. in homine, & 4. de rat. vict. in acut. aphor. 30.* vsurpatur. *Συνάγγη* & *Κυνάγγη* eodem etymo, à suffocando scilicet, dicitur. Etsi enim, vt postea in differentiis dicitur, posteriores Græci inter Græ-

cas voces, dum per *συνάγγη* & per *κυνάγγη* scribitur, differentiam quandam constituerint, & *κυνάγγη* quam à canibus ita appellari censent, seu quod canibus familiaris sit, seu quod ægri hiant ore & exerta lingua spiritum ducere cogantur, canum per æstum sitientium more, pro grauiori affectu habeant; *Συνάγγη* verò, quâ dictam putant, quod siues eâ frequenter corripiantur, pro leniore malo: tamen Galenus, 3. *prognost. text. 18.* hanc de literis contentionem tanquam inutilem contemnit; quod & 4. *de vict. rat. in acutis text. 30.* facit.

Etenim & *Συνάγγη* & *Κυνάγγη* apud Hippocratem & antiquissimos Medicos Græcos generale nomen est, quale apud Latinos angina, quod in genere sumptum omnem faucium & gutturis affectionem, spirationem, nullo in thorace vel pulmone vitio existente, difficultorem reddentem, & deglutitionem impediens, seu meatuum, per quos spiritum attrahimus, cibumque & potum assumimus, angustiam, spiritum difficilem reddentem & deglutitionem impediens significat. Etsi enim per morbos thoracis, pleuritidem, peripneumoniæ & alios respiratio lædatur: tamen affectus ille angina non dicitur, cum illælis faucibus fiat. Hippocrates tamen interdum distinguit inter faucium inflammationem & anginam. Ita, 6. *epid. sect. 7. t. 1.* inquit: *Quibusdam verò faucium inflammationes aderant, aliis angina.* Vbi procul dubio anginam intelligit inflammationem musculorum laryngis, quæ respiracionem difficilem valde reddit, & viam spiritus intercludit: inflammationem verò faucium, partium aliarum vicinarum, quæ spiritus & cibi viam non ita intercludit. Possunt enim & tonsillæ, & musculi ossis hyoidis, & musculi in radice linguæ inflammari, vt postea dicitur, quæ partes omnes etiam in faucibus sunt: quia tamen harum partium inflammatio à gutture longius distat, anginam per se non parit. Anginæ ergo in genere ita sumptæ causa erit, quicquid spiritus cibique & potus viâ angustiozem reddere, & hoc modo vtriusque meatus capite & principio quasi occluso respiracionem difficilem reddere, & deglutitioni cibi ac potus impedimento esse potest.

Quod cum pluribus de causis fieri possit, duplex *Differentia.* angina statuitur, vna propriè dicta & exquisita, quæ est ab inflammatione summarum gulæ & gutturis partium sanguine è venarum iugularium ramis in partes illas effluso; altera notha, quæ prouenit à frigida & pituitosa destillatione, è capite in fauces & cervicis ac colli musculos decumbente, & tumorem *οἰδηματώδης* sine febre, rubore ac dolore excitante; etsi dum primò fluxio concitatur, quidam inæqualis calor & horror sentitur, qui tamen paulò post desinit.

Possit tamen & illa in faucibus inflammatio, quam Hippocratem ab angina discernere diximus, forsan anginâ nothâ appellari & ita duplex angina notha constitui, vna ratione causæ, altera ratione subiecti. Nam harum partium inflammatio sæpe etiam respiracionem & deglutitionem non parum lædit.

Quod etiam referri potest angina illa, quæ fit à luxatione vertebrarum cervicis versus anteriora vel latera, siue à causis externis, siue ab humore frigido affluente fiat, idque citra inflammationem.

Si enim inflammatio accedat, vel ab inflammatione luxatio ortum habeat, ad exquisitam anginam pertinet, & acutissima angina est, vt postea de differentiis dicitur. Videatur etiam infra, *questio. 1.*

## De Angina exquisita.

Angina ergo exquisita est angustia summarum gulæ & gutturis partium seu faucium, ab inflammatione earundem ortum habens, difficilem respiracionem reddens, deglutitionemque lædens. Seu est inflammatio in faucibus & summo gutture, angustiam earundem

*Angina exquisita.*

dem partium, & hinc difficultatem spirandi inferens, ac deglutitionem impediens. Seu, ut Galenus breuiter definit, 4. de rat. viſt. in acut. text. 20. & 2. ad Glaucon. cap. 1. est *ολεσιμὴ καὶ τὰ φάρυγγα μέρη*. Per fauces autem intelligitur pars, quæ gulæ & gutturi præiacet, & duo dictorum meatuum ostiolum comprehendit. Imò ut supra dictum, *φάρυγγ* etiam pro larynge & summo asperæ arteriæ capite accipitur, ut ita, dum Galenus anginam per inflammationem *φάρυγγ* seu faucium definit, non solum intelligenda sit ea pars, quæ gulæ & gutturi præiacet, sed ipsa etiam larynx cuique musculi. Et quamuis simul vicina complecti soleat inflammatio, ut glandulas utrinq; circa radicem gutturis ad latera trachæe positas, & musculos ossis hyoidis, musculos item in radice linguæ, & glandulas, quæ tonsillæ dicuntur, & quæ sub auribus & inferiori maxilla consistunt: tamen partium harum à gutture longius distantium inflammatio anginam non parit, nisi malum faucibus, id est, parti ex gutture & gulâ constitutæ, communicatum respirandi impedimentum afferat.

Dodonæus etiam anginam statuit ex inflammatione pulmonum fieri, de qua postea in differentiis de Cyranche dicitur.

### Causæ.

Causæ.

Ergo causa ut aliarum inflammationum, ita & huius in angina est sanguis seu purus, seu biliosus, pituitosus aut melancholicus. Et is quidem è venarum iugularium ramis in has partes effusus. Nam frequentissimè fit hoc malum per viam fluxionis, raro per viam congestionis.

Affluit autem sanguis vel per modum attractionis, si fauces & guttur vehementer caleant & doleant; vel per modum transmissionis, si loca illa imbecilla sint laxa, & ad suscipiendam fluxionem idonea, pleonexia verò humorum adsit siue in toto, siue in capite, ac inprimis circa fauces. Vbi enim sanguis vel copiosus in corpore adest, vel impurus, atque is ad caput fertur, cerebrum verò robustum est, id eum non recipit, sed maximam partem per easdem venas ad subiectas partes retrudit, vnde inflammationes earum variæ gignuntur, parotides, ophthalmiæ, anginae & similes. Hinc etiam iuuenes senibus anginâ crebrius corripiuntur, quod multo biliosoque sanguine, qui aptissima huius mali materia, abundant, & qui habitu corporis sunt crasso ac multo sanguine, præsertim in capite, abundant. Viros quoque frequentius quàm fœminas anginâ corripipi, ex Cælio Aureliano statuitur; idque videtur observasse Hippocrates, 6. epid. sect. 7. i. i. vbi epidemiam sui temporis constitutionem describens, quâ anginâ, tussis, peripneumoniæ vagabantur, paucissimas fœminas ægrotasse scribit. Aliam tamen causam non reddit Hippocrates eo ipso in loco, quàm quod non perinde atque viri in publicum prodibant, & ita aëris externi iniuriis sese non obiciebant. Id tamen, quod dicitur, fœminas minus ex sua natura anginæ esse obnoxias, quàm viros, de vera & exquisita angina intelligendum. Habent enim fœminæ sanguinem frigidiorum, & præterea laryngem minorem, ac gutturis partes & venas angustiores exiliioresque, quæ sanguinem non ita facile admittunt. Interim tonsillarum, columellæ, ac laxarum in faucibus partium inflammationibus, quæ minus exquisitam seu notham anginam, quam Hippocratem loco allegato, simpliciter faucium inflammationem appellare, & ab angina distinguere diximus, gignunt, ob partium laxitatem, & excrementitiorum humorum abundantiam magis obnoxia sunt quàm viri. Ad pleonexiam etiam humorum, quæ anginam excitat, cumulandam faciunt hæmorrhoides & menses suppressi, videtur ratio multo & calido sanguini generando apta, potius vini meracionis.

Sæpe quoque angina accidit in febribus, vbi materiæ pars ad hunc locum depellitur, ut ita febris tum potius comitata sit, quam appellatur, quàm symptomatice; talesque anginae sunt ferè epidemice, quæ nonnunquâ publicè grassantur; qualis fuit illa, quæ anno 1517. multos sustulit, ut annotauit Forestus, lib. 6. obs. 2. in schol. atque illa, quæ anno 1544. & 1545. plurima Germaniæ inferioris loca Rhenumque accolæ vexauit. Sunt enim quandoque etiam anginae, ut pleuritides, peripneumoniæ & similes morbi epidemice. Nam etiam humores, qui morbos epidemicos excitant, præcipue si non pestilentes sunt, & inprimis à fluxionibus provenientes à manifestis aëris alterationibus, frigiditatibusque & caliditatis ac humiditatis excessu proueniunt: tamen occultæ etiam qualitates ab aëtorum influxu pèdentes miscentur. Atque hinc accidit, ut nunc ad laryngem & fauces, nunc pleuram, nunc ad pulmones humores fluant, ibique subsistant, nunc ad aluum perueniant.

Externæ causæ sunt, quæcunque fluxiones humorum ad istas partes concitare valent, quales sunt pluviosa anni constitutio & imbres assidui, ut est, 3. aphor. 16. *ἡμετέρι* item quæcunque caloris & frigiditatis in aëre & ventorum flatibus, quorum hæc comprimendo expellit humores ad guttur & fauces, illa laxando facit, ut humores ad fauces affluant. Præterea subita à magno æstu refrigeratio, haustus plenus potus frigidissimi; lorio capitis intempestiva pleno corpore, nimia capitis tectura vel nulla, vocis nimia intentio, denique ictus capitis, cervicis, aut locorum prope fauces, infixæ in faucibus vel gula spinæ vel ossicula, ut & vertebrarum cervicis luxatio; si nimirum non solum ipsa angustiam in locis istis pariat, sed & inflammationem exciter.

Quidam etiam à cibis quibusdam & medicamentis peculiari vi & proprietate anginam induci statuunt, ut cerasis, fungis quibusdam, andacocha, ut habet Auicennas, quæ trifolij species est, quæ scilicet in se vel vim suffocandi, vel qualitatem aliquam laryngi & faucibus occulto modo aduersam habent, easque sanguini inflammationem excitaturo suscipiendo aptas reddunt, aut quocunque modo has partes vellicant & offendunt, & sanguinis ad eas affluxui occasionem præbent, sicut cantharides vesicæ peculiari modo aduersæ sunt. Verum de hoc dicitur infra, quæst. 3. Nonnulli huc etiam referunt eam suffocationem, cuius Aræteus, lib. 1. passion. acut. c. 7. meminit, quæ accidit ex spiritus ad calidissimū & siccissimum conuersione, quod aliqui de aëre illo crasso, qui è carbonibus accensis & musto accereuissia feruente attollitur, explicant. Verum, ut postea, in quæstione 1. dicitur, non loquitur Aræteus de causa extrinsecus adueniente, sed intrinsecus hærente, vbi vitium præcipue est in pectore. Non tamen ista suffocatio huc pertinet, sed ad respirationem læsam ut postea dicitur. Neque enim omnis suffocatio angina dicenda est; alias enim & catarrhi suffocatiui ad anginam reducendi essent, sed ea saltem, vbi nullo in pectore vitio existente (quod tamen in suffocatione illa ab Aræteo descripta accidit) ob faucium inflammationem suffocationis periculum imminet. Vnde nec ardor in faucibus, qui in febribus ardentibus percipitur, & vulgò *die Brünne* nominatur, cum scilicet fauces & lingua exsiccantur exasperantur & denigrantur, angina nominandus est.

### Differentia.

Differentias anginae quatuor recentiores Græci, ut Differentia. ex Galeno, 4. de loc. affect. cap. 3. & Paulo Aegineta, lib. 3. cap. 27. & Tralliano, lib. 4. cap. 1. videre est, recent. Inflammantur enim seu *φάρυγγ*, id est, gulæ musculi; seu laryngis, id est, gutturis seu capitis trachæe arteriæ; sæpe etiam, quæ utramque hanc partem conne

connectunt. Has ergo differentias ut recentiores Græci etiam vocabulis distinguerēt, generica illa vocabula *κωάγχις* & *σινάγχις*, cum aliis specierum nominibus destituerentur, certis differentiis accommodauerunt.

Prima differentia nomine generis *σινάγχις*, ita dicta, ut Autoribus placet, quod suisbus sit familiaris (quæ tamen differentia Græcæ linguæ analogiæ non responderet, ideoque potius à præpositione *σιν* & *άγχις*, nomen hoc deductum videtur) nominatur; ubi interni faucium musculi vel ambitus faucium interior inflammatur, ceruice quoque ad linguæ radicem simul comprehensio, & tumor foris ac intus apparente.

Secunda *κωάγχις*, ubi externi faucium & colli musculi linguam & os hyoides contingentes, & qui œsophagum firmant ac retrahunt, sunt inflammari, tumor seclè nonnunquam etiam ad pectus diffundente.

Tertia *κυνάγχις* ita dicta, quod canes eâ frequenter corripantur, aut quod homines eâ laborantes veluti canes stridendi linguam exserant, cum inflammatio in internis laryngis seu gutturis musculis delitescit, & neque intus neque foris in ceruice tumor apparet, unde etiam Latens angina appellatur, tantulque est dolor & spirandi difficultas tanta, ut æger erecta ceruice & ore hiante, ac linguâ exsertâ, canum sitientium more, spiritum trahere cogatur.

Cuius generis & illa est angina, quam describit Galenus, 4. aphor. 35. cum, inquit, nullo, neque ore multum aperto in faucibus, neque extrinsecus tumore apparente, æger deglutire non potest. Symptoma n. perniciosum est ob inflammationem musculorum gulæ substratorum, interdum verò gulæ ipsius morbum. Est enim partibus illis per nervos & ligamenta commune quid & societas cum spinali medulla & membranis ipsam ambientibus, ac postea hisce extrinsecus adiacentibus vertebrarum ossibus. Cum itaque ad partes inflammatas ligamenta & nervi tenduntur, vertebrae quoque vel intro, vel ad latus trahi necesse est. Nam si in altero tantum nervorum exortu tensionem fieri contigerit, ad latus; si utroque, intro fiet vertebrarum distortio.

Hoc loco facienda est mentio anginae, quam describit Remb. Dodonæus, cap. 18. quam etiam latentem appellat, in qua circa laryngem & asperam arteriam talis dolor sit, ut nec contingi, quantumcunque leniter, circa gravissimum dolorem queant, sed nec moveri sursum, nec attolli. Quamobrem non spiritus tantum cum difficultate trahitur, sed & cibus & potus, æger timè, aut non dimittitur. Inflammari autem statuit Dodonæus per huiusmodi anginam non interiores ac latentes laryngis musculos, (id quod sectione se deprehendisse scribit) sed pulmonem.

Verum enim verò nulla est angina propriè dicta sine musculorum circa laryngem inflammatione. Itaque morbus, quem describit, vel non fuit angina, sed peripneumonia, quæ tamen ob communem membranam laryngem & vicinas partes in consensum traxit, unde respiratio & deglutitio fuit læsa; vel fuit angina, quæ tamen subito in peripneumoniam gravissimam mutata est.

Quarta est *ἀγνώγχις*, ubi externi præcipuè gutturis musculi inflammantur; tumor tamen intus manifestè conspicitur. ore diducto & linguâ depresso. Et cum hæc quarta differentia, nisi medicamenti occurratur, facile in *κωάγχις* degeneret, & si affectus augeatur, etiam interni tandem musculi inflammentur; Galenus, 4. de loc. affect. cap. 3. in hac differentia tam externas, quam internas gutturis partes affici scribit.

Verum istam accuratiorem nominum distinctionem à posterioribus Græcis introductam Galenus, loco modo allegato & 3. prognost. aph. 18. non magnificat, cum

omnis angina sit faucium, id est, partis ex gutture & gula constitutæ, inflammatio: & Hippocrates vno *κωάγχις* nomine omnes istas differentias complexus est. Non prætereundum tamen, Hippocratem, lib. 3. de morbis, etiam in nominibus quandam differentiam observare, & duas anginae species ponere: *κωάγχις*, quæ sit angina gravissima, & *ἀγνώγχις*, quæ initior sit.

Præter enumeratas istas quatuor anginae differentias Galenus, 4. de loc. affect. cap. 3. addit quintam, ex 2. epid. sect. 2. ex luxatione vertebrarum cervicis, quæ tamen potius ad anginam notham referenda est, nisi inflammatio ipsi coniungatur. Fit autem, ubi cervicis vertebrae ad anteriora luxatis fauces comprimuntur, cauo ponè in ceruice apparente. Quod accidit vel à causis externis, ictu, catu; vel ab affluxu humoris pituitosi vincula vertebrarum laxantis, & vertebrarum internodia lubrica reddentis, aut copia sua vertebrae sede suâ deficientis; vel à vicinis musculis inflammatis, quibus vertebrae ad anteriora trahuntur. Atque ubi anginae coniungitur inflammatio, vera angina est, dolorque etiam foris ad contactum in ceruice sentitur. Vide Hippocratem, 2. epidem. sect. 2. Galenum, 4. de locis affect. cap. 3.

Ærius, qui quatuor illas differentias in tres contrahit, hanc vertebrarum ad anteriora luxationem quartâ numerat, eamque propriè *κωάγχις* à veteribus appellatam, aut quoniam, linguâ à luxata vertebra iuxta radicem suam à proprio loco depulsâ, æger hiante ore ac exserta lingua spiritum ducere cogitur, canum per æstum sitientium more.

Sunt & aliæ quædam anginae differentia, quod scilicet inflammatio alia maior, alia minor est; unde etiam maius vel minus periculum expectandum; & quod alia est à sanguine puro, alia à sanguine cum aliis humoribus mixto: ut & quædam epidemia est & maligna, alia malignitatis experta.

### Signa Diagnostica.

Anginam exquisitam ex iis, quæ hæcenus dicta signa sunt, cognoscere non ita difficile est. Verum cum sit morbus periculosus & peracutus, qui celeri suo motu sæpe omnem Medici diligentiam superat, utile est, etiâ imminenti signa cognoscere, ut omni modo eius incrementum præcaueatur.

Si quis ergo sine manifesta causa collum vix movere & vix deglutire potest, ac difficulter spirare incipit, & dolorem accalorem insuetum circa fauces percipit, anginam imminere suspicio est, præsertim si tempus vernum & pluviosum ac humidum sit, aut angina aliàs populariter grassetur.

Præsentem anginâ, in quacunque etiam parte sit, adsunt in primis duo: primò difficilis respiratio, citra aliquod thoracis ac pulmonis vitium, ita ut sæpe & suffocationis periculum imminet; unde Plautus, in *Mossellaria*, act. 1. 3. v. 61.

*In anginam ego nunc me velim verti, ut venefica illi*

*Fauces prehendam & enecem.*

Deinde deglutitio difficilis, adeò ut nonnullis potus per nares resiliat. Neque enim deglutitio solum œsophagi ministerio perficitur, sed etiam musculi duo à larynge exorti, œsophagici dicti ac circulares, quod suis fibris transuersis semicirculum imitantibus œsophagum complectantur, cibi & potus deglutitionem atque ad inferiora detrusum adiuuant, dum laryngem deglutitionis tempore sursum trahunt, ut descendenti cibo locum concedat: præterea etiam musculi faucium, dum ad suum principium contrahuntur, cibum ad œsophagum detrudunt. Hi ergo musculi cum in angina afficiantur, non mirum est deglutitionem lædi. Postea dolor circa guttur & fauces percipitur, rubor item & calor,

calor, plerumque & rumor, febris adest continua. Lingua ipsa intus rure & rubet, quoddammodo coarctata est, unde etiam eius motus impeditur.

Et si enim in angina notha, quæ sit ab humore pituitoso fauces occupante, febris non semper ad est; in angina tamen exquisita febris continua semper adest; seu ut symptomatice ex inflammatione generetur, seu sit primaria, cui angina accedit.

Differentiæ quoque non difficulter patefunt. In cynanche est minor respirationis difficultas, deglutitionis verò maxima, ut etiam liquida vix transire possint, sed porus ferè per nares reiciatur. In paracynanche inter omnes differentias respirationis difficultas minima est, & rubedo foris in cervice conspicitur, dolorque percipitur, si locus contractetur; cum inflammatio foras vergat. Interdum etiam pectus rubet, quia ibi prorsum duo muscoli ad cartilaginem scutiformem. In cynanche verò neque in faucibus intus, neque extra in cervice, quicquam ruboris vel tumoris apparet, & tamen fauces vehementer interim dolent cum metu strangulationis, ita ut æger erecta cervice & aperto ore spirare cogatur, lingua est liuida & nigra, & ut scribit Hippocrates, 4. de rat. vi. in acut. inflexa vel rectora, ob summam venarum circa linguam repletionem; adest quoque febris acuta. Seu, ut Hippocrates, 3. de morb. describit; ex angina dicta homo suffocatur, & fauces magis occupare videtur, ut neque salivam, neque aliud quicquam deorsum trahat, oculi affecti sunt, & veluti is, qui strangulatur, prominent, & per eos contentè intuetur, neque eos convertere potest, crebrò se iactat & exsilit, fauces & facies incenduntur, ac etiam collum. His verò, qui intuentur, nihil mali habere videtur, & visus atque auditus hebescit, nihilque præ suffocatione intelligit, neque quid dicat, aut audiat, aut faciat, sed iacer ore hiant salivam effundens. In paracynanche respiratio non est tam difficilis, nec dolor tantus, & rubor ac tumor aliquis intus circa fauces deprehenditur. Si ex luxatione sit angina, plerumque id accidit à causis evidentibus & violentia. Postea et si sit ab inflammatione & affluxu humorum, deprehenditur ex inspectione cervicis. Cervix enim circa primam & secundam vertebra excauat, ob depressam vertebra, & difficilis redditur respiratio ob angustiam faucium ex compressione. Videatur etiam Hippocrates, 2. epid. sect. 2. ubi incipit: ἢν δὲ σφίγναι γλῆκον τὰ παθήματα τὰς, &c. Egregiè enim & prolixè eo loco describit Hippocrates, eam anginae speciem, quæ ex vertebrarum colli λυρδότης & σκολιάσις, inclinatione & perversione oritur quem locum propterea Galenus, lib. 4. de loc. aff. cap. 3. dignum indicavit, ut commentario eum explicaret. Videtur etiam lib. 2. prorrh. comm. 2.

Signa causarum & humorum ex aliis locis patent. Sanguis abundans ex habitu corporis aliisque signis cognoscitur, adest maior distensio, color faciei est rubicundus, faciesque ruborem & calorem habet insignè. Si adsit bilis, ardor & dolor maior est cum siti, oris amaritudo, & morsus circa guttur. Si ex pituitoso sanguine sit, dolor minor est, febris exigua, tumor citra insignè ruborem. Et, ut Galenus, 4. aphor. 34. & 4. de rat. vi. in acut. t. 30. docet, sanguis biliosus plerumque laryngis prius musculus quàm faucium, seu gulæ inflammationem parit, sicuti pituitosus sanguis potius faucium seu gulæ inflammationem, & glandularum, quàm laryngis excitat. Cum enim laryngis venæ sint exiles, in eas non nisi sanguis tenuis penetrat; crassus verò, qui eas penetrare nō potest, in faucibus potius & glandulis subsistit. Angina etiam biliosa maximè æstate & autumno proueniunt: quod in æstate bilis generatur, & in autumno retinetur, quæ æstate genita est, At pituitosa ferè sit ex pituita hyeme genita.

### Prognostica.

1. Angina, teste Galeno, 1. aphor. 12. & 2. aphor. 19. Tralliano, lib. 4. cap. 1. Celso, lib. 4. c. 4. peritissimum acutumque malum est, quod celeriter ad finem properat, ac periculo non caret, ægroque laquei modo strangulat & suffocat. Et si enim pars absolute princeps non afficiatur: ea tamen pars afficitur: sine qua cor, membrum nobilissimum, saluum esse non potest; quæ scilicet destinata est respirationi, & simul deglutitioni inseruit, quorū neutro homo carere potest. Adest simul febris continua, quæ & cordis & ipsius corporis vires labefactat, ideoque Galenus, 1. aph. 12. hoc modo laborantibus salutis spem in vitium robore consistere scribit. Et suffocatur plerumque æger, vel quia rumor eò usque creuit, vel tanta facta est vertebrarum colli luxatio, ut faucibus coarctatus spiritus planè percipiat, vel quia rupto tumore pus in pulmones ruit eosque implet.

2. Et quidem quò maior est faucium & gutturis angustia, eò periculosior est angina, præsertim, si febris & ipsa sit acuta. Atque ita κατὰ γὰρ à posterioribus Græcis in specie descripta omnium periculosissima est & grauissima, quæ intra vnam diem, plerumque intra 4. iungat: de quo Hippocrates, 4. aphor. 34. Si febrim habenti suffocatio repente superveniat, nullo tumore in faucibus existente, lethale est. Et 3. prognost. 16. & in Coacis, Angina grauissima sunt, & celeriter intereunt, quacunque nihil conspicuum faciunt in faucibus, neque cervice, plurimum verò dolorem inferunt atque orthopnæa. Hac enim in eodem die, & secunda, tertia, & quarta strangulant. Neque enim tum paritas mali significatur, quod nihil conspicui sese prodit, sed quia magnus dolor adest, & summa respirandi difficultas, significatur, tumorem in internis gutturis partibus hæere, ibique conclusum spiritui aditum præcludere, atque ita subito strangulare. Aliàs si respiratio & deglutitio non valdè lædatur, neque magnus dolor adsit, paritas mali significatur. Idem tamen Hippocrates, 3. de morb. κατὰ γὰρ ad nonum diem protrahi posse docet.

Παραπύρεξι paulò minori cum periculo coniuncta est, & potest diutius protrahi; de quo Hippocrates, 3. prognost. 17. Quacunque verò dolorem aliquin alteris similem inferunt, in faucibus verò tumorem & ruborem excitant, valde quidem lethales sunt, præcedentibus verò diuturniores, si magnus rubor adsit: quia tandem in cynanchen transit. Sic mortua quinta die Phytonis vxor, 3. epid. sect. 2. t. 7.

4. Minus periculi autem adhuc est à κατὰ γὰρ, in qua plus leditur deglutitio, quàm respiratio. Homo enim sine cibo & potu aliquantisper vivere potest, non verò sine respiratione, præsertim cum febris coniuncta est, eaque acutior. Et tumor ad interna vergens evocari longius & medicamentis digeri potest.

5. Leuissima est, & omnium minimè periculosa Paracynanche; quia inflammatio longius à gutture abest. Hinc Hippocrates, 6. aphor. 37. Angina correpto, si tumor in collo appareat, bonum. Foras enim morbus feritur. Et 7. aphor. 49. Ab angina detēto tumor & rubor in pectore superveniens, bonum; quia extra morbus feritur. Et 3. prognost. 18. Quibus verò fauces & cervice simul rubent, hæ sunt diuturniores, & maximè ex ipsis liberantur, quibus cervice & pectus ruborem contraxerit, nisi erysipelas intro recurrat. Et, aphor. 20. 3. prognost. Securissimum est, si rubor quàm maximè foras, in cervice scilicet & pectus, feruntur. In his nimirum duabus differentiis neque dolore nimium vexatur æger, neque difficultate spirandi tenetur. Etenim cum partes hæ sint glandulosa, molles & laxæ, affluentem humorem sine magna difficultate recipiunt, & quia laryngis muscoli non inflammantur, respirationis via non intercluditur. Eadem sententias iisdem ferè verbis tradit Hippocrates, lib.



*lib. de Coac. praeor.* Historias autem & euentus differentiarum, 7. *epidem. sect. 7.* ubi de signis anginae epidemiae loquens, tandem concludit: *In summa, qui solum deglutire non poterant, his valde mites, & toleranti faciles erant; pessime vero his, quibus una spiritus sublimis erat.*

6. Angina laborantes nisi celeriter cocta exspuant, male habent. Hippocrates, in *Coacis*.

7. Angina biliosa periculosior pituitosa; quia & dolorem maiorem & febrem, & maiorem respirandi adfert difficultatem.

8. Si in angina tumore, & rubore intus in faucibus apparente, rubor die non critico euanescat, remaneat vero tuberculum sine dolore, quod nec naturae nec artis beneficio suppuratur, mortem vel ruboris recidivam minatur, ex 3. *prognost.* 19. Mortem quidem, quia relicta foris crassa materia tenuior & feruentior intro ad guttur conuersa est, ruboris recidivam, quia, materia calidior ex accidente aliquo intro repulsa est, non autem discussa.

9. Si in angina tumore & rubore foris apparente ista subito intro euauerit, malum; quia materia ad interiora recurrens suffocationem parit, ex 6. *aph.* 25. Nisi tamen criticè discussa aut aliò depulsa materia hoc fiat, atque aeger melius habeat.

10. Si febre de repente collum intorqueatur, ac vix deglutire queat, nullo tamen tumore intus vel foris apparente, lethale est. 4. *aphor.* 35. ob luxationem scilicet vertebrarum.

11. Pueris angina ferè accidit ex vertebrarum cervicis intro luxatione, 3. *aphor.* 26. Huius curationem Paulus Aegineta, *libr. 3. cap. 27.* non aggreditur; cum nullam, vti censet, illa recipiat; quod tamen intelligendum est non de luxatione, quae ex crudorum humorum affluxu paulatim facta euenit, quae antequam planè perficitur, curari potest; neque etiam ex crudo tuberculo, modò vertebras non planè suo loco deiecerit; quales fuisse videntur anginae, quas Hippocrates, 2. *epidem. sect. 2.* describit ex vertebrarum colli luxatione facta, quorum tamen neminem; qui tum laborarunt, mortuum fuisse refert: sed quae sit ab inflammatione, vertebras distendendo violenter suo loco dimouente. Haec enim omnino incurabilis; cum quia ipsa inflammatio reductionem vertebrarum prohibet, tum quia respiratio & deglutitio valde laeditur.

12. Quibus ex angina in pulmonem mali sit conuersio, intra septimum diem moriuntur; si verò hos effugiant, *ἐμπνοί* id est purulenti euadunt. 5. *aph.* 10. & 3. *prognost.*

20. Si angina materia in pulmonem conuertatur, desipientiam afferit, & aegri magnà ex parte *ἐμπνοί* fiunt. *Εμπνοί* enim fiunt abscessu rupto & in pulmonem effuso; vapores verò calidi sursum exastuantes delirium excitant.

13. Si strangulatis & suffocatis, ita & anginosi, spuma circa os appareat, lethale signum est, 2. *aphor.* 43. Extremam enim cordis angustiam significat, feruoremque summum, à quo materiam agitante spuma illa excitatur.

14. Quando in angina magna sit spirationis angustia, & spuma iam in ore apparet, nulla sanitatis spes relinquitur, nisi aeger adhuc viribus valeat, & nutrimentum apperatur. Quando verò in infirmo aegro febris inualefcit, & facies aegri fit viridis, & sinus oculorum denigrantur, extremaeque frigent, & lingua nigra ac crassa cernitur, lethale est. Nam in forti febre multà inspiratione opus est, quam angina negat, teste Auicenna, *capite proprio*.

15. In anginosi subarida sputa gracilium mala. Hippocrates, in *Coac.* Angina enim talis est periculosa, si ne tumore in collo & faucibus, vti, *prognost.* 2. dictum, quod plerumque aegri suffocantur. Et licet, quod rarissime fit, suppuretur: si tamen sputum sit suba-

ridum, febrilem calorem maximè indicat, quod spumatum glutinosum & crassum redditur. Qui enim, vti, *dem*, habet Hippocrates, anginosi non celeriter exspuant cocta, lethalius habent.

16. Qui in angina tumores faucium sine vlla ratione repente euanescent, lethales sunt, in *Coac.* Etenim aliquando praecedente euacuatione vel repellentium vlu tumor subsideat: tamen si sine his, atque ita praeter rationem id fiat, malum periculosum est, cum non soluantur morbi manentibus iis, quae eas faciunt, causis. Significatur enim materiae ad interiora recessus; unde periculosior in partibus internis morbus excitari potest; vel quod interdum accidit, ad partem, unde discessit, repente iterum delata subito suffocationem inducit.

17. In anginis sine signis dolores in caput conuersi, lethales, in *Coac.* Etenim cum fiat sine crisi aut materiae translatione, & manente eadem gutturis & faucium angustia, ac difficili respiratione: malum non imminui & tolli, sed diffundi, & cerebro comunicari significant. Eodem modo si in hypochondriis vel cruribus dolor exciteretur, & angina non solvatur, morbi augmentum & humoris vitiosi etiam alias partes occupantis redundantiam significat.

18. Qui vehementer suffocantur, narium pinnae expirando contrahunt, inspirando verò dilatant. Galenus, 3. *epid.* 2. *comm. text.* 4. Cum enim ob extremum suffocationis periculum aut caloris vehementiam membranarum respirationi inservientium motus necessitati satisfacere non possit, natura ad cartilagineas illas diducendas sese conuertit, quasi aliquid commodi inde perceptura.

19. Soluitur autè angina vel tumoris *διαρροή*, causa eius reuulsa, distracta, euacuata aut discussa, aut tumoris maturatione, & puris ex illo aperto euacuatione, aut materiae ad aliam partem translatione; quod ex doloris & tumoris subita cessatione, pulsusque mutatione cognoscitur. Optimum autem est, materiam discuti, vel tumoris maturatam materiam euacuari; aliò eam transferri periculosum, vti iam dictum.

20. Transfertur autem materia vel ad cerebrum, vbi statim dolor capitis grauis, deliria & phrenitis sequitur; vel ad musculos colli, vbi dolor & tumor, interdum & conuulsio excitatur; vel ad pulmones & pleuram, unde dolor pectoris, tussis, difficilis respiratio oritur; vel ad cor, unde tremor eius, syncope & pulsus obscuritas excitatur.

### Indicationes.

Quas aliae inflammationes habent indicationes; eadem & angina obseruanda, saltem partis affectae habità ratione. Nimirum sanguis & materia, quae adhuc affluit, aut affluxura est ad partem affectam, reuellenda, deriuanda: quae iam affluxit, adhuc tamen in paruis venis consistit, vel in parte fluctuat, ne in partem recipiatur, atque in eo consistat, repellenda, & in parte affecta foras protrudenda per adstringentia: quae verò extra venas effusa est in partis spatia, & repelli non potest, insensibiliter discutienda est per digerentia, quod tutissimum est; vel si digerentibus non cedat, & ad maturationem tendat, maturatio adiuuanda, & diligenter simul cavendum, ne adstringentibus & refrigerantibus foris quocunque tempore applicatis materia intro repellatur; sed relaxantia potius extrinsecus adhibeantur, quibus materia foras euocetur, periculumque suffocationis euertatur.

### Curatio.

### VENÆ SECTIO.

Cum ergo angina sit inflammatio, & quidem eius partis,

Curatio.  
Venae Sectio.

partis, quæ præfens periculum suffocationis imminet, & à sanguine vel solo, vel cum alio humore mixto ortum habeat: in omni angina sanguinis missione & euacuatione opus est. Estque venæ sectio optimum præsentaneum & compendiarium in hoc morbo remedium. Ideoque ut sanguis ad fauces ruens reuellatur & euacuetur, periculumque maximè vrgens auertatur, venæ sectio statim & sine omni mora instituitur, præmissis, si licet, clystere.

Et quidem aperiatur in cubito cephalica aut mediana, aut utraque, si magna adsit plethora. Hoc enim modo, & venâ in brachio apertâ, & vniuersum corpus promptius euacuatur, & non parum sanguinis à parte affecta auertitur. Et primò quidem mediana, hinc cephalica aperiatur, si vtriusque sectione opus. Et si inflammatio alteram partem magis affligat, vena in opposito primùm brachio reuulsionis gratia, postmodum in latere eodem aperienda; aut si semel saltem venam aperire liceat, vena in eodem latere secetur. Si verò nullum lateris discrimen sit, aut dubitetur, vtra pars magis affligatur, sanguis ex dextro brachio emittatur; cum hepar sit plerumque pars mittens.

Si menses vel hæmorrhoides suppressæ sint, quæ vena primò aperienda sit, Auctores dissentiunt. Alij enim saphenam, alij venam in cubito primò aperiendam censent. Verùm distinctione hic opus videtur. Etenim si periculum non vrgeat, ex poplite vel talo sanguinis missio primùm instituenda, ut menses suppressi reuocentur, & sanguis ad partes distantes reuellatur: inprimis si purgationis tempus instet. Et si malum augeatur, mox vespere aut sequenti die cephalica aperienda; non tamen neglectis reuulsionibus, quæ in cruribus institui possunt. Si verò morbus vrgeat, & periculum instet, quod plerumque fieri solet, mox vena in cubito aperienda. Periculosum enim est, neglecta cephalica cum affecta parte communicante, in distantissima parte venam secare. Venâ autem brachij apertâ postea venam in poplite aut talo secare licet. Sic enim & vrgenti affectioni, ac celerem reuulsionem & euacuationem requirenti, & suppressæ euacuationi satisficit. Imò sunt optimi Medici, qui in angina periculosa non solum in suppressis mensibus venam primò in brachio secandam censent, sed etiam fluentibus mensibus. Et tali in casu, dum sanguis per venas superiores euacuatur, cucurbitulas femoribus affigendas censent, ut minor fiat sanguinis versus superiora retractio.

Euacuatur autem sanguis maiore vel minore copia, pro eiusdem abundantia, magnitudine ipsius affectus, & virium robore. Et si verò fuerint, qui in angina etiam vsque ad syncopen sanguinem euacuandum censuerint, persuasi sententiâ Galeni, qui, 1. aphor. 23. scribit, in ardentissimis febribus, in maximis inflammationibus & vehementissimis doloribus, vsque ad animi deliquium sanguinem detrahendum esse: tamen Græci, Aëtius, *teirab. 2. serm. 4. cap. 47.* Paulus Ægineta, *lib. 3. cap. 47.* Trallianus, *lib. 4. cap. 1.* ut & Arabes plerique, item Cælius Aurelianus, *lib. 3. acut. cap. 4.* & posteriores Medici plerique, sanguinem non semel atque confertim, sed sæpius & repetitis vicibus euacuandum censent; ne, si confertim euacuetur, animi deliquio superueniente, suffocatio, quæ antea vrget, augeatur, ægerque suffocetur. Quamquam enim ipsa inflammatio, si sit magna, tale præsidium requirere videatur: prohibet tamen id respirationis difficultas, & inprimis suffocationis periculum. Respiratio enim cum sit actio vitæ valde necessaria, quâ ne exiguo tempore viuis homo carere potest: plus valet hic prohibendo difficilis respiratio, quæ ex animi deliquio succedente ad largam sanguinis effusionem ita augeri possit, ut illico suffocatus

æger interiret, quàm magnitudo inflammationis eam indicando. Itaque vbi minor est spirandi difficultas, copiosius, si inflammationis ratio postulet, sanguinem mittere licet, ut inflammatis faucium musculis. Si autem respirationis difficultas valde vrgeat, id quod accidit, inflammatis laryngis musculis, cauendum est à larga sanguinis missione, quæ animi deliquium inducere posset, sed tum partitis vicibus, 4. vel 5. horarum intervallo sanguinem euacuare commodius est. Et repetita venæ sectio plus reuellit, quàm vna larga sanguinis euacuatio. Præterea cum sæpe accidere soleat, ut ad partem affectam nouus affluxus fiat, repetita venæ sectio etiam humores iterum affluentes auertit. Videndum tamen, ne nimis parçè prima vice sanguis euacuetur ne, antequam alteram aut tertiam sectionem adhibere possimus, æger interim moriatur.

Et quidem primò in opposita parte vena aperiatur, deinde in brachio lateris affecti. Et si malum fert inducias, manè vna vena aperiri potest, vespere vel sequenti die altera. Foramen non fiat nimis angustum, ne crassior sanguis intus remaneat, nec nimis amplum, ne spirituum magna copia dissipetur.

Grauidæ etli sanguine emisso interdum abortiant, tamen in morbo tam periculoso necessitas postulat, ut sanguis, sed minore copia, detrahatur. Et plurimæ grauidæ ita sanguine abundant, ut venæ sectionem sine abortus periculo tolerare possint. Imò compertum est, nonnullas fœminas, nisi sanguis iis detrahatur, abortire, aut in alia mala periculosa incidere. Fiat autem sanguinis euacuatio ex vena cubiti.

Si phlebotomiâ vires non ferant, aut saltem repetitam sanguinis euacuationem non tolerant, cucurbitulæ cum scarificatione apponantur cruribus, vel supra renes, postea etiam in brachiis, non in collo. Nam si statim in principio cucurbitulæ parti loco affecto propinquæ applicentur, maior ad partem affectam fluxus concitabitur, malumque augebitur. Postea verò in loco propinquo applicari poterunt; sicut venas sub lingua secare licet, ut postea dicetur. Simul etiam alia adhibeantur, quæ repellere possunt, ut lotiones & frictiones ac ligaturæ extremorum, & cucurbitulæ in partibus remotioribus, ut modò dictum.

### Purgatio.

Venæ sectione peractâ mox instituenda purgatio, præcipuè si bilis in corpore abundet, ut illâ pharmaci irritatione motus humorum fiat *ut 7. de diff. 20.*

Cum autem angina coniungatur febris, de purgatione initio angina instituenda Auctores dissentiunt, dum alij & plerique omnes Græci ac Arabes summum periculum attendentes, mox in principio purgandum esse censent; alij verò, inter quos præcipuus est Massariæ, ad cruditatem humorum respicientes, purgationem in principio prohibent.

Verùm febris natura hic attendenda. Nam, quod plerumque fieri solet, si febris vel præcedat anginam, vel simul cum ea inuadat, & materia peculiari motu naturæ humores vitiosos extrudere conantis ad fauces depellatur, atque ita humores turgentis materiæ conditionem referant, & errabundi quasi à natura è venis expellantur, nondum immobiles sint, & licet ad certam partem ferantur, vagabundi tamen adhuc quasi sint, & tales, qui etiam ad aliam partem mox moueri possint, sicut sæpe angina in pleuridem & peripneumoniam mutatur; ad turgentem materiam meritò referantur, & propterea ex consilio Hippocratis, 1. aph. 22. statim euacuandi sunt. Id quod etiam à doctissimis Medicis hæcenus cum commodo ægrotorum factum fuit, & ipse etiam Hippocrates præcepit, *lib. de locis in hom. & lib. 3. de morb.*

Et omnino sum in ea sententia, etli angina sit inflammatio:

**Inflammatio** : (quod & de pleuritide , peripneumonia , paroridibus & similibus affectionibus intelligendum) primam ramen occasionem ei præberi à cacochymia. (nisi causa externa sanguinis affluxum excitet, vt spinæ vel ossicula gulæ infixa vel vertebrarum luxatio) Natura enim irritata à prauis humoribus , eos ad partes corporis externas detrudit , ad latera , tonsillas , fauces , post aures , ad inguina , & alias partes. Verum vt in hæmorrhagiis narium criticis , quæ in febribus acutis à natura sæpe instituuntur , non præcipue sanguinis , sed cacochymia causa ea euacuatio à natura instituitur : ita & hæc natura quidem vitiosos humores expellere conatur , non tamen eos sine sanguine extra venas protrudit , sed cum sanguine permixtos extra venas in spatia partium effundit , vnde inflammatio excitatur. Et ipsi tales humores è venis effusi acrimonia & prauitate sua naturam stimulantem maiori sanguinis affluxui occasionem præbent.

Si autem inflammatio præcedat, neque ea ex humoribus vitiosis à corpore protrusis ortum habeat, & postea febris sequatur ; non aded multum commodi ex purgatione provenit, nisi forsân metuatur , ex affluxu humorum vitiosorum inflammationem augeri posse.

Et quidem maturè statim in initio instituenda purgatio. Narratque Alexander Trallianus , lib. 4. se eodem die sanguinem misisse & purgasse , his verbis : *Post missionem sanguinis, si nullus laxitatis sensus oriat, sed cibi & aeris transitus adhuc impediatur, etiam venas lingue subjectas incidere ne graueris, neque in crastinum differre, sed eodem die facio. Ego sanè memini, me, cum usus valde vrgeret, venam manè aperuisse, diluculo lingue subjectas secuisse, & vespèri ex cremore ptisana extractum scammony exhibuisse, atque ita laqueum ex inflammatione ortum vix potuisse dissolvere. Imò alium, quendam noui me, postquam brachiorum duorum venas in cubito secuissem, repurgasse, sequenti die non expectata. Et omnino affectus grauitas sæpe purgationem ita vrget, vt statim instituenda sit, nec tempus maturinum expectari possit. Et si enim & ad venæ sectionem , & ad purgationem horæ matutinæ sint commodissimæ, tamen vtraque etiam tempore vespertino institui potest, si quid mali impediatur , vel , vt venæ sectio vel purgatio maturetur , vrgeat. Itaque si suffocationis periculum vrgeat, manè instituta venæ sectione, vespèri exhiberi potest purgans. Sic non solum Trallianus, vt modò diximus, vespèri purgauit, sed & Galenus , 14. M. M. cap. 8. in quodam, cui lingua tumefacta erat, vt ore contineri non posset, purgans vespèri exhibuit.*

Elegantur autem purgantia , quæ febrim non augeant, nec humores valde agitent, cassia, manna, tamarindi, syrupus rosar. & violar. sol. rhabarbarum, electuarium diasebesten, diacatholicum. Si humor pituitosus admixtus sit, fortiora vsurpare licet.

Vt *℞. Syrup. rosar. solut. Vnc. iii. vel iv. aqu. cicchorij Vnc. ii. M.*

Vel *℞. Manna Vnc. i. sem. vel Vnc. ii.*

Dissolue in iusculo pulli , vel decocto prunorum, iterum colentur. Exhibeatur horis duabus ante prandium.

Vel *℞. Rhabarb. elect. Scrup. iv. cinamomi Scrupul. sem.*

Infunde in decocti communis flor. & fruct. vel aqu. endiu. Vnc. iii. vel Vnc. iv.

In colatura dissoluatur manna Vnc. i. vel Vnc. i. sem.

Colatura exhibeatur, postea detur feri lactis caprini lb. i. vel lb. i. sem. Ita enim purgatio sine insigni calefactione perficitur.

Vel *℞. Electuar. de psyllio Vnc. sem.*

Dissoluatur supra ignem in decocti florum & fructuum, vel pectoralis, vel aqu. cicchor. Vnc. iii. sem.

In colat. dissolue manna Vnc. i. Iterum colatur. Adde syrupi violar. Vnc. sem. M.

Dan. Sennerti Tom. I I.

In humore pituitoso addatur agaricus. In melancholia admixta sena & manna exhibeatur. Sena enim & manna in actionis modo & tempore valde conueniunt.

Recentiores Chymici hic etiam vomitoria & antimonialia exhibent, sed nulla euidenti ratione adducti. Neque ea tutò in morbo, qui aliàs suffocationem minatur, exhiberi possunt. Ita refert Trincavellius, lib. 5. cap. 7. de ration. curand. part. corpor. hum. affect. scemi, nam quandam sumpto medicamento purgante, & quidem cassia saltem, excitato vomitu, statim strangulatam interiisse.

Verum quia facultas deglutiendi plerumque est impedita in angina , frustra sæpe præscribuntur purgantia , quæ æger deglutire non potest. Rondelerius equidem pilulas dissoluit. Verum, vix hoc tutum est. Propter abominandum enim saporem facillè vomitus excitari posset, qui in hoc affectu minimè tutus. Et modò æger liquida deglutire possit , facillè alia purgantia concinnari possunt , vt pilulas dissolvere opus non sit. Vbi verò planè purgantia sumere æger non potest, clysteres aciores ex emollientibus, & cholagogis, & quidem, si febris acuta conjuncta sit, clementioribus constantes iniiciendi , & iterum atque deinceps reiterandi sunt.

Vt *℞. Malua, parietar. mercurial. centaurij minoris, ana. M. j.*

Coqu. in aqu. simpl. Colat. ℞. lb. j. adde electuar. diacathol. de succo rosar. an. Vnc. i. sem. mellis rosar. colati Vnc. i. ol. viol. Vnc. ii. salis Scrup. sem. F. Clyster.

Vel *℞. Decocti emollient. Vnc. ix. in quibus dissolue, elect. diasebesten. Vnc. i. diaphænic. Drach. iii. ol. violac. ℥. i. sem. sal. gemm. Scrup. sem. M. F. Clyster.*

Vel *℞. Decocti fl. & fr. Vnc. ix. in quibus dissolue, elect. lenitum. Drach. vi. de psyllio Vnc. sem. syr. rosar. sol. Vnc. i. sal. comm. Scrup. i. M. F. Clyster.*

### Repellentia.

Statim post primam sanguinis missionem purgantia vsurpanda sunt , ne inflammatio augeatur. Debent autem repellentia solum intrus in faucibus , non verò extrà adhiberi , ne materia magis ad interiora & versus fauces repellatur.

Vsurpanda verò sunt repellentia formâ gargarismorum & collutionum oris, vel linctuum. Et si enim quidam & suffumigij formâ talia exhibeant : tamen cum omnia , quæ in fumum resoluta ore & faucibus hauriuntur, guttur & fauces exasperare , & suffocationem augere soleant, à plerisque hic modus rejicitur. Et quidem forma gargarismorum seu collutionum vtilissima est. In infantibus tamen, qui gargarizare non valent, sæpe linctibus vtendum est.

In medicamentis autem inueniendis hæc non solum ad communem , quæ ex natura inflammationis sumitur, indicationem respiciendum, sed etiam ad partis affectæ conditionem. Nam cum, vt Galenus , 6. de comp. med. sec. loc. cap. 1. docet, non solum rarior & mollior sit superficies tunicæ oris quàm est cutis, quæ totum corpus ambit , & præterea ex medicamentis aliquid facillè in ventriculum vel pulmonem defluere possit : sint illa talia , quæ omnis acris & malæ qualitaris , quæ fauces lædere, vel deglutita nocere possunt, expertia. Et cum diutius in ore , vbi gustus sedes est , detinenda sint, quantum fieri potest , ingrato sapore careant , ne nobis accidat, quod Medico illi seu imprudenti , seu imperito accidit, qui cum, referente, *ibidem*, Galeno, gargarisma ex atramento sutorio constans adhibuisset, magnum cum insuauitate nocumentum gulæ & asperæ arteriæ extremitati ac ventriculo & pulmone intulit.

Commendantur à Galeno , 6. de comp. med. sec. loc. c. 1. quatuor medicamenta ; quod ex musto , quod

Quatuor medicamenta ex Galeno.

K K K ex

ex moris, quod ex rubi moris, & quod ex nucum corticibus viridibus cum melle, quod in suauitatem & nimiam adstringendi vim, quæ est in his succis, temperat, conficitur.

Primum ex musto fit, injiciendo ad decem musti heminas, tres heminas rhois coriariorum, aut ejus, qui obsoniis inspergitur, vel ex vtriusque parte æquali. Cujus quidem plures aliæ descriptiones ibidem leguntur. Alterum ex moris ita fit: ℞. succi mororum heminas vi. ad strigmentitiam (spissitudinem coquito. Deinde tritas croci Drach. j. myrrhæ Drach. ii. omphacij Drac. j. alumin. sciss. obol. iij. mellis heminam vnā addito. Vel ℞. croci Drach. sem. alum. Drach. iii. sem. inticiatur, & passi hemina vna, & vini maris expertis austeri hemina vna. Coctura autem fit vsque ad compagem melleam. Tertium fit ex mororum rubi succo, eodem modo, vt ex succo mororum. Quartum denique fit ex nucum corticibus viridibus, si eorum succus exprimatur, per linteum excoletur, coquatur, & tandem mel, veluti in eo, quod ex moris fit, admisceatur. Inter hæc autem medicamenta primum est mitissimum, secundum fortius, tertium adhuc fortius, quartum fortissimum, quod etiam præcipue à Galeno commendatur. Hoc enim vim adstringendi cum substantiæ tenuitate habet, atque ita profundius penetrat, cuius rei argumentum est, quod succus ille manibus tractatus ita altè inficit, vt facile abstergi non possit. Vario autem modo, vt Galenus, ibidem, docet, ad diuersa morborum tempora ejusmodi medicamenta parantur. Si enim in ipsis adstringens qualitas præualeat, principiis conueniunt; si verò mitigatoria & laxatoria ac concoctoria, in doloribus & vigoribus inflammationum. Imò si vnum saltem horum medicamentorum præstò sit, id ipsum per aquam simplicem solui & per additionem parabilium cuius temporis & scopo accommodatum reddi potest. Sunt autem parabilia ex adstringentibus, rosæ, & myrti baccæ, & myrtus & lentiscus, & rubus, & rubus caninus, & galla omphacitis appellata, & Ægyptiæ spinæ fructus; omniaque aluminis genera. Post hæc parabilia sunt rhus culinariis & coriariis, & succus, qui ex Syria affertur; atque hic quidem per se admiscetur, culinariis autem & coriariis rhus aqua prius decocti, vtilis mistura sunt. Est autem & glaucium ex parabilibus, & omphacium, & cytini, & balaustia. Ex disculforiis autem parabilia moderata sunt caricarum & fursurum decoctum & aqua multa, in qua organum, aut hyssopum, aut thymus, aut calamintha, aut pulegium, aut mentha odora, quam hedyosmum vocant, sint incocta; fortiora autem sunt etiam hæc, si diutius coquantur, amplius autem & nitri spuma, aut ipsum adeo nitrum vsum; fortius verò his est sulphur viuum. Vtilis est & succus malorum citriorum, & rob cornorum ac sorborum, syrupus granatorum, myrtillosum, de rosis siccis, diamorum, vt & decocta & aquæ prunellæ, plantaginis, polygoni, maluæ arboræ, folior. rubi, myrti, radic. pruni sylvestr. sumach. sem. rosar. balaust. cortic. granator. hypocistis, acacia. Arque ex his eligantur fortiora vel mitiora, prout maior vel minor fuerit inflammatio, humorumque affluxus, & prout corporum natura sese habet. Mollioribus enim & sceminarum corporibus mitiora, fortiora durioribus adhibenda. Ita etiam in laryngis inflammatione primò mitiora adhibenda medicamenta, ne dolor & symptomata fortiorum vsu exasperentur. Ideoque præcipue illa valida adstringentia, gallæ, balaustia, sumach. hypocistis, vix sola vsurpanda, sed modicè saltem, vbi opus est, reliquis admiscenda. Monendum & hoc, in angina, quæ à spina vel officulis, vel aliis rebus acutis gulæ inhaerentibus fit, adstringentia locum non habere. Talis enim inflammatio citè ad suppurationem duci postulat. Ab adstringentibus verò tum dolor in-

tenditur. Cum enim talia corpus acutum infixum magis parti impingant, dolorem intendunt.

Attendendum & hoc, pro humoris inflammationem excitantis varietate medicamenta etiam varianda esse. In sanguine enim & bile refrigerantium & repellentium vis intendenda; in pituita autem resoluentium; in melancholia emollientium.

Succi vel illipiuntur faucibus, vel dissoluuntur in decoctis aut aquis, iisque os colluitur potius; quam vt gargarismus fiat, ne nimia gargarisatione affluxus augetur. Eadem collusiones oris ex aquis destillatis & decoctis plantarum modò enumeratarum parantur.

In principio ergo sequens Gargarismus vel Otis collutio utilis est:

℞. Hord. integr. P. ij. fol. prunella, plantag. ana M. sem. flor. rosar. rubr. P. ii. balaustior. Drach. sem. fragor. exiccat. Drach. i. sem. sem. acetos. Drach. i.

Coqu. in aq. comm. pro ℥. j. in qua dissolue succi corr. nuc. jugland. virid. Vnc. j. syr. granat. Vnc. i. sem. M.

Vel ℞. Rad. althæa Vnc. sem. fol. rubi M. j. alumin. vsti Drach. ii. sacch. Vnc. sem.

Coq. in aq. comm. pro Vnc. x. In quibus dissolue mell. rosar. colat. Vnc. i. sem. succi myrtill. recent. Vnc. i. M. i. c.

Vel ℞. Aq. plantag. prunell. rosar. ana ℥. sem. acetos. faciei Vnc. sem. succi granator. Vnc. i.

In quibus dissoluatur diamori, rob. nucum, ana Vnc. j. sem. pro Oris collutione.

Vel ℞. Aq. radic. althæa ℥. i. Coq. in ea flor. malua arboræ. Colat. adde syr. de succo cydonior. Vnc. iii.

Vel colluatur os lacte, in quo lens palustris cocta sit.

Aliàs si dolor non vrget, sola repellentia vsurpanda.

Vt ℞. Fol. plantag. prunell. ana M. sem. flor. rosar. rubr. malua arbor. ana P. ii. balaust. sem. cydon. an. Drach. i.

Coq. in aqua hordei ℥. i. sem. ad tertiæ partis consumptionem.

Colaturæ adde diamori, dianuc. an. Vnc. i. M.

Vel ℞. Summitat. rubi M. j. balaust. cortic. granator. ana Drach. i. Coqu. in aqua simpl. Colaturæ ℥. j. adde diamori, rob. nucum, an. Vnc. i. M.

Vel ℞. Agrimonia, prunella, plantaginib. ana M. j. ros. rubr. cortic. granator. sem. acetosa, portulaca, ana Drach. ii.

Coq. in aq. f. ad ℥. i. Adde diamor. dianuc. succi granator. ana Vnc. i. sem. F. Gargarismus.

Vel ℞. Aq. prunell. acetosa, ros. rubr. ana q. s. diamori, rob. sambuci, an. cochlear. i. M. i. c.

Linctus etiam profunt, ex diamoro cum succo granatorum, vel ex syrupo de iunibis, myrtino, diamoro.

Si dolor sit vehementior, admiscenda sunt medicamenta, quæ dolorem leniendi vim habent, & præcauent, ne fauces exasperentur. In quem vsus lac vtilissimum, posuntque in eo coqui summitates rubi, reliquis etiam addi glycyrrh. jujubæ, passulæ.

Recentiores hic laudant sal. prunellæ, siue nitrum præparatum, in oris collutionibus.

Deinde ex Conradino, lib. de feb. Kngar. c. 19. hanc Aquam:

℞. Semperuini maj. q. v.

Contundatur succusque exprimatur, & singulis ℥. addatur salis ammoniaci Vnc. sem. reponantur in loco humido, donec sal liquecat. Postea aqua destilletur, quæ fauces colluantur. Si verò hæc aqua in promptu non sit, sumatur aqua semperuini vulgaris, & in ejus libra vna dissoluatur salis ammoniaci Drach. j. ac modo dicto adhibeatur.

Vel ℞. Cancros viuos Num. viij. sedi major. M. iij.



Contundantur, & succus exprimatur, quo fauces Colluantur.

Vel ℥. *Aq. semperni. maj.* ℥. i. ℥. & admisc. succum ex quatuor cancriis viuis expressum.

Verum ista etsi in angina etiam suum locum habere possint: tamen ab Autoribus horum medicamentorum inuenta & usurpata sunt ad linguæ ardorem, siccitatem, & nigredinem in febribus ardentibus, quod malum vulgò *die Breune* nominatur, quod ab Angina differt, supra diximus. Istud enim faucium & linguæ incendium & siccitas febrium acutarum symptoma est, neque ab eo tam subito suffocationis periculum, ut in angina, imminet.

Valde etiam in hoc affectu prodest cassia extracta cum aq. plantag. dissoluta, & collutionis loco adhibita, ut & decoctum cortic. ligni berberum, vel cortic. interioris coryli; ut & decoctum auenæ rubescens, item decoctum fol. & cymarum cerasi arboris. Pauperiores vtantur aqua fabrorum, vel aqua & aceto inuicem mistis, vel aqua hordei.

Norandum autem hic in vniuersum, quæcunque in calidæ valde & sanguinæ anginæ incremento & statu imponuntur, eadem pituitosæ initiis præscribi posse. Et quæ declinantibus illis, eadem vigentibus his debent adhiberi.

### Deriuantia.

*Deriuantia.*

Postquam venæsectio in cubito & purgatio est instituta, etiam venæ narium, & quæ sub lingua sunt, aperiantur, aut hirudines venis narium, frontis, post aures & ceruici applicentur. Nonnulli & scarificationes aurium adhibent. Trallianus, ut supra dictum, eodem mox die, non expectato crastino, venas linguæ subjectas incidit. Sed Galenus, neque sine ratione, in principio anginæ venam in cubito secat, ut reuellet, quod influit; post principium autem venas sub lingua, ut, quod in parte affecta vel locis vicinis collectum est, euacuetur, in *lib. de curand. ration. per sanguin. miss. cap. 9. & 4. de ration. vitæ in acut. aph. 30.* Si tamen morbus admodum velox esset, primo die venam sub lingua cum Tralliano secare liceret.

### Digerentia.

*Digerentia.*

Malo procedente & angescente, quod secundo & tertio die accidere solet, propositis repellentibus digerentia admiscenda. Monentque hic doctissimi Medici plerique, in angina rarissime solis repellentibus, & non, nisi cum imminet inflammatio, aut vbi primum incepit, vtendum esse, & contra solis discutientibus vix etiam vnquam vtendum esse, atque in eo differte curationem anginæ ab aliarum partium inflammationibus, in quibus in principio sola repellentia usurpantur; post statum verò repellentia omitti possunt: idque ob partis affectæ naturam. Cum enim partes, quæ in angina afficiuntur, ferè sint laxæ & molles, citòque inflammationem admittant, etiam in principio discutientium aliquid addendum, ne humor, qui influxit, nimio refrigerantium usu impactus hominem suffocet; in fine etiam aliquid adstringentium addendum, ut partes roborentur, & ne solo discutientium usu in parte laxa & molli major vel nouus humorum affluxus concitetur. Vbi ergo morbus augmentum sumpsit, gargarismis vtendum discutientibus ex decocto thymi, pulegij, calamint hæ, hyssopi, origani, betonic, glycyrrh. flor. chamæmeli, meliloti, sem. lini, fœnigraci, & similibus.

Vel ℥. *Glycyrrh. rec.* Vnc. i. *passul. mundat.* Par. x. *dactyl. caricar.* ana Par. iv. *sem. althææ, fœnigraci,* ana Drach. ii. *hordei integri* P. i. *flor. violar. chamæmeli,* ana P. sem. Coq. colaturæ adde *mell. ros. col.* Vnc. ii. *ciner. hirund.* Drach. ii. *croc.* Scrup. sem. F. Gargarismus.

*Dan. Sennerti Tom. I. l.*

Vel ℥. *Hyssopi, puleg. ana* M. sem. *betonic. P. ii. rad. glycyrrh.* Drach. iii. *passul. minor.* Vnc. i.

Coq. in *l. q. aq. flumiat.* pro Vnc. ix. In quibus dissolue *oxymel. simpl.* Vnc. i. *dianori* Drach. vi. M.

Vel ℥. *Aq. althææ* ℥. sem. *hyssop.* Vnc. ii. *syr. de betonic.* Vnc. i. sem. M.

Vel ℥. *Fol. plantag. prunell. ana* M. sem. *balauft. flor. resar. rubr. chamæmel. ana* P. j. *caricar. pingu.* N. iii. *hordei* M. sem. *sem. lini, fœnigraci.* ana Dra. i. Coq. in aqu. simpl.

Colaturæ ℥. ℥. j. Cui adde *mellis rosacei col.* Vnc. i. sem. *dianuc.* Vnc. i. sem. F. Gargarismus.

Commendatur & aqua è fol. & flor. periclymeni. In statu augeantur discutientia & emollientia. Galenus consistente fluxu crocum & myrrham addit, quæ concoquere & discutere valent, crocūque similiter leniter adstringit. Vt:

℥. *Fol. prunell. violar. ana* M. j. *scabios. malu. arbor. ana* M. sem. *flor. chamæmel. melilot. ana* P. j. *glycyrrh. ras.* Drach. iii. *sem. fœnigraci.* Drach. ii. *caricar. pingu.* N. iii. *passular.* Vnc. sem. Coq. in aqu. hordei *lad. tertiz partis* consumptionem.

Colaturæ ℥. ℥. i. In qua dissolue *cassia recent. extract.* Vnc. sem. *myrrh.* Drach. j. *croc.* Drach. sem. *mell. rosas. colat.* Vnc. i. Misce pro Gargarismo.

Ad dolorem leniendum valet succus ex pane albo in aqua vel lacte cocto expressus, item cremor ex fufuribus tritici expressus, ut & mucilago semini lini, cydonior. althææ, succus prisaux, lac amygdalarum dulcium, & sem. 4. frigid. major. item cassia cum parte æquali olei amygdalarum dulcium mista.

Declinante tandem morbo coquitur aliquid de nido hirundinis, aut dissoluitur in colatura cinis combustarum hirundinum & cochlearum combustarum, vel, quod nonnulli pro secreto habent, cancrorum combustorum, aut cribratum album canis, aut gallinæ. Illinite etiam licet faucibus illa stercora melle excepta.

Extra adhibenda:

### Exsiccantia, & resoluentia.

Dum hæc intus faucibus adhibentur, tentandum Externa. omni modo, ut inflammatio exteriora versus trahatur & discutiat, in quem usum multa passim ab Autoribus proponuntur, ut oleum dulce, amygdal. dulc. chamæmeli, anethi, lilior. alborum, quorum aliqua spongia vel lana succida applicari possunt, succus cucumeris syluest. melle subactus, & hujus generis alia. Inter quæ tamen ab initio, & vbi corpus non satis euacuatum fuerit, mitiora eligenda, ne humoribus attractis malum augeatur.

In principio ergo & prima statim die anterior colli pars illinatur oleo chamæmelino, amygdal. dulcium, vel liliorum alborum.

Vel ℥. *Ol. lilior. alb. amygd. dulc. violac. ana* Drach. ii. *pingued. capon.* Drach. i. *empl. de melilot.* q. s. M. F. Linimentum.

Vel ℥. *Mucilag. gummi Arabici, tragacanth. sem. cydonior. aq. ros. extr. ana* Drach. ii. *butyri recentis insulsi, pingued. porcin. ana* Drach. i. *stercor. hirund.* Drach. sem. *ol. irini, chamæmel. ana* q. s.

M. F. Linimentum.

Præstantius est Vnguentum Varandæi, quod

℥. *Pulu. nidi hirund. stercor. canis jejuno macerati, columbini, ana* Vnc. i. *rad. iræos, flor. chamæmel. ana* Drach. β. *pingued. gallinar.* Vnc. sem. *ol. lilior. alb.* Vnc. i. sem. *cera flaua* parum.

M. pro Vnguento, quo collum & partes tumentes inungendæ.

Vel parentur cataplasmata ex farina vel cremore sem. lini, fœnigraci, althææ, malux, hordei, flor. chamæmel. meliloti, & similibus.

KKk 2 Vel ℥.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Farina hordei*, *pulpa passul.* an. Vnc. ii. *pulu. rad. althæa* Vnc. i. Cum *ol. amygd. dulc.* Fiat Cataplasma.

Hoc etiam vtile est;

$\mathcal{L}$ . *Farin. bord.* Vnc. i. *mucilag. sem. lini & althæa cum aq. malua facta*, an. Vnc. sem. *pulu. flor. chamamel.* Drach. iii. Cum *oleo chamamel. amygdal. dulc.* an. f. q. F. Cataplasma.

Nidum etiam hirundinis cataplasmatibus modo foris applicandum admisceri vulgatum est, idque cum commodo ægorum fieri, vsu deprehensum; de quo postea, *quæst.* 4. dicitur.

Vt  $\mathcal{L}$ . *Nidum hirundin.* N. i. *fol. malua*, *viol.* ana M. j. *flor. chamamel. melilot.* ana M. sem. *rad. althæa* Drach. vi. *lilior. albor.* Drach. ij. *ficum* N. iiij. Coquantur ad molliciem. Contusis adde *farin. sem. lini, fenigrac. hordei*, ana Drach. iii. *croci* Drach. ij. *butyri recent.* Vnc. sem. *olei amygdal. dulc. chamamel. viol.* ana q. f.

Fiat Cataplasma ad anteriorem colli partem.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Nidum hirundinis*, Coq. in decocto *rad. althæa* ad pulvis consistentiam. Adde *ol. amygdal. dulcium*, *anethi*, ana Vnc. ii. *croci* Drach. j. *cassia* Vnc. i. sem. Fiat Cataplasma.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Farin. tritic.* Vnc. ii. *sem. lini, fenigrac.* ana Vnc. j. *caricar. pingu.* Vnc. sem. *nidi hirundin. contusi*, Vnc. i. Cum *oleo lilior. albor.* Fiat Cataplasma.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Stercor. hirund.* Vnc. i. *farin. fabar.* Vnc. ii. *ol. chamamel. lilior. albor.* ana q. f. Fiat Cataplasma.

Paratur & tale Emplastrum vel Cataplasma ex nido hirundinis:

$\mathcal{L}$ . *Nidi hirundinis* Vnc. ii. *unguenti dialthææ, æsypi*, ana Vnc. i. sem. *rad. iridis* Drach. ii. *ol. irini, lilior. alb.* ana Vnc. sem. *cere flava* q. f. Fiat Emplastrum.

#### Cataplasma de nido hirundinis D. Pauli Lutheri:

$\mathcal{L}$ . *Pulu. nidi hirundin.* Vnc. iii. *radic. alth. chamamel.* an. Drach. iii. *fenigrac.* Vnc. sem. *mucilag. ficum cum aq. chamamel. expr.* Vnc. i. *ol. chamamel. lilior. alb. amygd. dulc.* ana Vnc. sem. Fiat l. a. Cataplasma.

#### Aliud Emplastrum ex nido hirundinis:

$\mathcal{L}$ . *Nidor, hirundin.* N. j. Coq. in aq. *malu*, Vnc. vi. Postea colentur & exprimantur fortiter.

In colatura coq. *rad. malu. bryon. althæa*, ana Scrup. ii. *sem. lini* Drach. i. *nigell.* Scrup. i. *herb. violar. parietar.* an. Drach. ii. *ol. lilior. cheirini, axung. porcin.* an. Drach. iii. *cere* Drach. ii. F. l. a. Emplastrum.

Aliud ex cineribus hirundinum & albo græco paratur h. m.

$\mathcal{L}$ . *Ciner. hirund. stercor. canis per jejunium emaciati*, ana Vnc. sem. *pulu. croci, flor. spica*, ana Drach. i. *benzoës* Drach. sem. *mellis* Vnc. iii. F. Cataplasma.

Vtile est etiam cataplasma ex medulla cassiæ cum oleo chamæmeli, & vnguentum dialthææ, & emplastrum de meliloto.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Sem. cymini* Vnc. j. *absinthij viridis contusi, farina hordei* an. Vnc. sem. *albi graci* Vnc. iii.

Cum melle F. Cataplasma.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Furfuris tritici, albi graci*, ana q. v. Cum melle F. Cataplasma.

Laudatur etiam epithema ex aq. scabios. lb. j. & spir. vini Vnc. j. loco affecto admouendum.

Fortiora sunt emplastra, si aliquid fermenti vel cepa sub cineribus cocta addatur. Nonnulli etiam mel anacardinum & vesicatoria applicant. Notandum etiam, vt medicamenta ista semper calida actu applicentur.

Si materia rebellis digerentibus non cedit, etiam in parte affecta vel ei vicina cucurbitulas affigere licet, sub mento scilicet, si tumor circa fauces & maxillas existat; in collo verò inter 2. & 4. vertebra, cum affectis internis musculis tumor foris non apparet. Et si materiam ad externa vergere videmus, adjuuandus est motus materiæ appositis ceruici cucurbitulis cum scarificatione, vt sanguis ad circumferentiam extrahatur.

#### Maturantia.

Si verò malum discutientibus non cedit, indicio est, ad suppurationem tendere; quod plerumque quarto vel quinto die contingere solet. Quod si animaduertatur, adjuuanda est maturatio, tum externis, tum internis medicamentis. Intus quidem vtile est frequenter cassiam extractam, seu medullam cassiæ in ore tenere, vt paulatim liquefscens in gulam descendat. Lenit enim, maturat & resoluit. Gargarismi verò & collutiones fiunt ex lacte tepido cum saccharo, vel ex decocto *rad. althææ*, *maluæ*, *lilior. alb. caricarum*, *dactylorum*, *jubarum*, *passularum*.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Fol. malu. violar.* an. M. j. *scabios. summitat. meliloti*, an. M. sem. *nidi hirundin.* Vnc. sem. *caricar. pinguium* N. v. *passular.* Vnc. sem. *semin. lini* Drach. ii. *cydon.* Drach. i. Coq. in aqua *bord. simpl.* Colat. adde *sapa* Vnc. ii.

F. Gargarismus.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Passular. exacinar.* Vnc. i. *glycyrrh.* Vnc. sem. *caricar. pingu.* N. v. *sem. althæa* Drach. ii. *cydonior.* Drach. i. Coq. in *hydromel.* vel aqua pro Gargarismo.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Dactylos* N. ii. *caricar. pinguium* Vnc. sem. *chamamel.* p. i. *sem. lini. fenigraci*, ana Vnc. i.

Coq. in aq. f. ad mediet. consumpt.

Colat.  $\mathcal{L}$ . lb. j. in qua dissolue *sapa* Vnc. ii. M. F. Gargarismus.

Extra verò applicari possunt emplastra maturantia, ex farina & remanentibus decocti sem. lini & fenigraci cum butyro non salito, adipe gallinæ, & oleo lilior, alborum, & quæ antea fuerant proposita, ex nido hirundinis.

Vt  $\mathcal{L}$ . *Nidi hirund. pulu.* Vnc. sem. *sem. lini, fenigrac. rad. althæa*, ana Vnc. sem.

Coq. ad formam pulvis, & addatur *ol. chamamel.* Vnc. j.

Fiat Cataplasma.

Vt autem facilius rumpatur abscessus, aliquid niti vel cineris hirundinis vel stercoris canini addi potest.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Sem. sinapis* Drach. i. Coq. in *hydromel.* lb. j. Pro Gargarismo.

Nisi sponte abscessus rumpatur, æger, vt screatu & leni tussi vel vi id præster, conetur. Nonnulli præcipiunt, vt æger spongiolam filo alligatam, aut carnem falsam semicoctam deglutiat, vt filo attracto abscessus rumpatur. Alij panis crustam deglutire iubent. Verum cum liquidus cibus vix deglutiri possit, multò minus solida deglurientur. Commodum ergo, ceream candelam oleo amygdal. dulc. illitam in oesophagum immittere, vt ita rumpatur abscessus. Alij hiant ore linguam deprimunt, & cultro ligneo acuto, vel scalpello tumorem, si conspiciatur, aperiunt. Quæ omnia tamen cautè peragenda, ne in periculum suffocationis æger coniciatur.

Abscessu rupto, ne pus in pulmones aut gulam influat, id prono capite exspuat æger. Postea vlcus extergatur collutione vel gargarismo cum hydromelite vel aqua saccharata, vel decocto hordei adjuncto melle.

melle. Et si post puris euacuationem vlcus quiddam sordidum, vel putridum præ se ferat, fortius detergentia & putredinem inhibentia vsurpanda, qualia sunt, in ulceribus oris, proposita sunt.

Vel *℞. Fol. scabios. agrimon. an. M. j. nucum cupressi 3. j. radic. aristoloch. longa, iridis Florentina, an. 3. ℞. flor. rosar. rubrar. p. ij. myrrha 3. j.*

Coq. in hydromelite ad ℞. j.

Ad consolidandum vsurpetur linctus ex bolo Armena cum syrupo vel melle rosato; aut pulvis ex thutis, myrrha, rosarum, boli Armenæ æqualibus partibus. Qui si melle excipiat, forma linimenti exhiberi potest. Interdum tamen accidit, ut angina neque resoluatur, neque etiam intus tumor rumpatur, idque cum summo ægri periculo. Cum enim, ut supra etiam dictum, detur anginæ species, eaque deterrima, in qua nullus tumor, nulla rubedo, intus, vel extra apparet, ægroque tamen suffocationis periculum imminet, cuius Hippocrates, in prognost. Galenus, 4. de loc. aff. cap. 3. Acrius, ietrab. 2. ferm. 4. cap. 47. meminerunt, in qua aliis remediis nihil proficitur: in vltima desperatione sub maxillis & supra collum altioribus plagis scarificationem nonnulli instituerunt, & ægrum à suffocatione imminente liberarunt, nonnunquam pure, nonnunquam sanguine effluente, ægroque ita lenato: ut postea reliquis præsidii locus esset. Quæ de re scribit Anton. Beniuenius, de abdit. morb. caus. cap. 38. Angina laborabat Nicolaus Rosa, sed nullus tamen rubor, aut tumor, vel intus in gula, vel extra videbatur, & ipse nihilominus vix spiritum trahens, quicquid præterea edendum sumeret, per os statim & nares reiciebat. Quare cum arescente corpore, pallente iam facie, ac vertentibus oculis spes omnis sublata esset, & Medici, quibus cura demandata fuerat, ægrum non amplius adirent, me, licet iuniorem, conuocant, ægrum ostendunt, & quæcunque acta fuerant, exponunt. At ego cum & ægrum ipsum ad mortem tendere, & Medicos, quæcunque opportuna fuerant, præsidia adhibuisse intelligerem, cœpi mecum ipse cogitare, satius ne esset, ægrum ipsum Deo, & Naturæ, ut ceteri Medici, incuratum dimittere, an aliquid, licet insolitum, utile tamen auxilium experiri. Verum adhortantibus his, qui ægro assistebant, consilium capio, & locum altioribus plagis sub ipsis maxillis, ac etiam supra collum incido, ex quo cum sanies multa prorumperet, adeo morbus lenatus est, ut faucibus ipsis spiritum simul, & cibum capieribus facilis deinde ad bonam valetudinem ægro ipsis daretur regressio.

Hoc etiam in curatione anginæ animaduertendum, semper vsque ad morbi declinationem aliquid detergentis, medicamenti admiscendum esse, sicut in omnibus inflammationibus, quæ tenui cute reguntur, per quam semper aliquid resultat; id quod in angina copiosissima sæpe sputi reiectio monstrat. In quem finem mel commodè adhibetur.

Atque ut vsum topicorum hætenus propositorum in summam contrahamus; in principio vtendum repellentibus & nonnihil abstergentibus; in augmento abstergentibus & repellentibus parum digerentium admiscendum: in augmenti fine & circa principium status abstergentia cum æquali quantitate digerentium & adstringentium permiscenda; in declinatione tandem ferè solis digerentibus vtendum, & pauillum saltem roborantium & adstringentium admiscendum.

#### Specificæ medicamenta.

A proprietate prodesse traduntur fungus sambucinus coctus & bibitus, & foris etiam impositus. Lignum quoque hederæ à proprietate valere dicitur ad apostema gutturis. Vnde Iohannes Marquardus, in præctica, scribit, quod comedens ex cochleari de ligno hederæ, vel bibens ex vase hederaceo nunquam velratò in apostema gutturis vel vuulæ incidat. Com-

Dan. Sennerti Tom. I. l.

mendatur & ad tumores faucium rumpendos, si in decocto radicum althææ & ficuum cum momento zingiberis, addita vini quarta parte, maceretur, & decoctum diu in faucibus teneatur.

Commendant etiam tanquam expertum lupigutur seu asperam arteriam, si angina laborans per eam bibat. Laudatur & hirundinum pulvis, si sale aspersi vnâ cum pennis in fictili comburantur, & cinis melle mixtus illinatur. Galenus, 6. de compos. med. sec. loc. Et Celsus, lib. 4. c. 4. scribit: *Vulgò audio, si quis pullum hirundinis ederet, anginâ toto anno non periclitari, seruatumque eum ex sale, cum is morbus urget, comburi, carbonemque eius contritum in aqua mulsa, quæ potui datur, infricari & prodesse.*

Laudant & filum sericum purpura tinctum, quo vipera strangulata sit, collo circumligandum, Galenus, 6. de simp. med. facult. Varignana, l. 7. de cur. morb. c. 1. Commendantur & exuuiæ serpentis in oleo amygdal. dulc. coctæ, si in oleo illo linteam tingatur, colloque circumponatur. Stercus item canis ossa comedentis, ut & cochleæ cum testis vstæ, & cancri vsti. Item rasura dentis castorei Scrup. j. vel Drach. sem. pondere in aqu. scabiosæ propinata; vel rasura dentis apri, si eius Scr. j. cum ol. amygdal. dulc. recent. Vnc. sem. misceatur, & cum saccharo cando albo dulcoretur ac assumatur.

Reiicit tamen hæc à proprietate substantiæ medicamenta Petr. Paulus Pereda ideò, quod angina est morbus manifestus, non occultus. Et non abs re est medicamentorum quorundam, quæ à proprietate substantiæ hic prodesse creduntur, rationes reddi posse. Ita stercus hirundinis & canis, ut & cochleæ & cancri combusti proculdubio vi exsiccandi & discutiendi, quam à sale inprimis habent, hic profunt. Si quæ verò sunt medicamenta, quorum causâ faciliè reddi non potest, illa proculdubio causæ anginæ opponuntur, in qua aliquid maligni & occulti inesse potest. Quæ ratione forsan filum purpuræ tinctum, quo vipera strangulata fuit, prodest. Refert etiam Cardanius, lib. 7. de varietate rerum, cap. 25. quod rubeta cocta & pro emplastro imposita adeo anginosi proficit, ut quendam hoc auxilio iamjam moriturum liberarit; creditque & filum, quo rubeta suspensa interiit, conferre. Vide etiam Plinium, lib. 30. cap. 4.

#### Λ Α Ρ Τ Η Τ Ο Τ Ο Μ Ι Α

Si extremum suffocationis periculum immineat, & metuendum sit, ne antequam materia discutiat, vel maturetur homo suffocetur, ut æger seruetur, *λαρυγγολομία* quæ *εαρυγγολομία* à Paulo Ægineta, lib. 6. cap. 33. nominatur, seu incisio tracheæ sub larynge inter duos annulos tertium & quartum & quintum tentanda. Quod antiquum iam ab Asclepiade & Anthillo vsurpatum est remedium, ut ex Paulo Ægineta, loco citato; & Cælio Aureliano, lib. 3. acut. c. 4. videre est: de quo postea, quæst. 5. dicetur. Modus operandi in Institut. lib. 5. p. 1. s. 2. c. 7. propositus est.

#### Diaeta.

Ær sit temperatus. Sedeat aut decumbat æger erecto corpore & omnino ea figurâ, quâ se leuari senserit. Victus sit tenuissimus, cremor prisanæ, & in nostris regionibus ius pulli & carnis, ac, si vires requirunt, ouia forbilia. Vtilia quoque sunt pruna & passulæ cum saccharo decoctæ, & iuscula cum lactuca, portulaca, & sem. quatuor frig. maior. alterata. Porus sit aqua hordei, syrupo violato, vel syrupo de succo citri dulcorata, vel aqua mulsa, vel cereuisia tenuis. Vinum, & omnia quæ fluxionem humorum commouere & febrem augere possunt, vitentur.

Quod si æger planè deglutire non possit, non-

K K k 3 nulli

nulli cannulam intra gulam immittere iubent, ac deinde liquidum alimentum per eam infundere, modò inflammatio ad illas partes non pertingat, Alij fistulæ bubulam vesicam alligant, sicut in clysteribus fieri solet, eamque succo nutriente implent, eiusque extremitatem initio gulæ apponunt, vesicamque comprimunt, ut liquor in œsophagum descendat.

Quæ omnia si frustra tententur, ad clysteres nutriendes confugere licet, de quibus in Institut. dictum. Perfecta equidem nutritio inde sperari non potest; iuscula tamen talia bene nutriente & facilis coctionis, si in tenuiorem quandam chyli substantiam conuertantur, corpus nonnihil reficere possunt, donec via iterum alimentis per os assumendis pateat. Nonnulli etiam odore panis & carniū vaporibus ægrum reficiendum censent.

De epidemia angina anni 1365. videt Dodonæum, *observ. cap. 18.* Et de cynanche, quæ intra 10. horas jugulauit, Antonium Brassauolam, in *comment. aphor. 10. sect. 5.* & de alia, quæ 12. horis ægrum sustulit, Amatum Lusitanum, *Centur. 7.* & de alia, quæ horis 12. jugulauit, Antonium Brassauolam, *lib. 4. de vitæ ratione in acut. & Fernelium lib. 5. patholog. cap. 9.*

### De Curatione angina ex vertebrarum, colli luxatione.

Vnica hic indicatio est, vertebram è suo loco remoram in suum locum restituere. Ergo cucurbitula ceruicis parti, qua fouea apparet, affigenda, ut vertebra suo loco restituatur; aut quod tutius est, comprimatur per anteriora colli iuxta latera asperæ arteriæ vertebra illa, atque extra & in sedem naturalem pellatur.

### De Angina notha.

Angina  
notha.

Angina, quæ notha appellatur, oritur à pituitosa & frigida materia è capite in fauces, aut ceruicis & colli musculos decumbente & tumorem *oedematōdē* efficiente. De hoc loqui videntur Hippocrates, 2. de morbis dum scribit: *Oritur autem angina, cum pituita in capite agitata deorsum confertim fluxerit, & in maxilla ac citra ceruicem constiterit.* Abestque in angina notha inflammatio, quæ anginam veram constituit. Itaque etsi etiam à melancholia anginam fieri posse, postea ex Heurnio dicitur: tamen ea non est notha angina, sed quia melancholiæ admiscetur sanguis, parit veram anginam, etsi non puram.

### Signa.

Cognoscitur ista angina, quod inflammatio, calor, rubor, febris abest, dolor est exiguus aut nullus. Atque cum à materia in externis colli musculis hærente exciteretur, minus periculosa est hæc angina. Diuturnior contra est, ita ut dolores sæpe longo tempore durent.

### Curatio.

Eadem ferè indicationes hic sunt propositæ, quæ in angina vera. Nā humor qui affluit, euacuandus est, repellendus, repellendus qui affluxit, discutiendus vel maturandus & deinde euacuandus. An ergo venæsectio vsurpanda sit, docebit habitus corporis & plenitudo. Etsi enim humor anginam istam produçens venæ sectionem non requirit: tamen, ne à sanguine affluente morbus augeatur, si abundet, venæ sectione impediendus & repellendus est. Humor pituitosus per clysteres acres & medicamenta conuenientia euacuetur.

Vsurpentur etiam alia reuulsoria auxilia, ut vincula, frictions, lotiones extremorum & cucurbitulæ cum scarificatione cruribus & dorso supra renes impositæ.

Gargarismus primo die talis vsurpetur:

℞. Fol. plantag. prunell. flor. rosar. rubr. an. M. j. bal. laustior. 3. j. Coqu. in hydromelite.

Colaturæ ℞. lb. j. mell. rosar. colat. rob. nucum, an. 3. vj. F. Gargarismus.

Sequentibus diebus

℞. Nucis cupress. 3. lb. balust. 3. ij. mastich. 3. iij. Coqu. in hydromelite.

Colaturæ ℞. lb. j. Adde rob. nucum 3. j. mell. rosar. 3. lb. alumin. 3. lb. myrrha. croci, an. 3. ij. F. Gargarismus.

Malo procedente talis vsurpetur:

℞. Passular. 3. j. caricarum num. vj. sem. lini, fenigrac. an. 3. lb. sinapi, radic. pyrethri, an. 3. j. In colaturæ lb. ij. dissolue myrrha. croci, an. Scr. ij.

F. Gargarismus.

Celebre fuit apud antiquos medicamentum Diabesaka, id est, ex ruta syluestri dictum, quod descripsit Galenus, 6. de comp. med. sec. loc. c. 1. Quod quia hirundines recipit, appellatur etiam ab Aretæo Diachelidonium.

Si dolor vrgeat citra statum talis fiat Gargarismus.

℞. Sem. malua, caulis, an. 3. j. ficus num. iij. Coqu. in decoct. glycyrrh. lb. j. lb. Adde butyri recent. sine sale 3. lb.

F. Gargarismus.

Ad maturandum talis utilis est:

℞. Caricarum pinguium, datylor. an. num. vj. passularum, iunubar. an. Vnc. lb. fol. hyssopi M. j. myrrha 3. j. croci 3. lb.

Coqu. in hydromelite pro Gargarismo. Potest etiam addi puluis hirundinum.

Paratur autem puluis hirundinum hoc modo:

℞. Hirundines, truncentur capite, & sanguis supra plumas exstillare permittatur, deinde pauco tale confurgatur, & in fictili comburantur. Puluis hic gargarismis addi, vel etiam melli ad discutiendum admisceri potest.

Extra collum inungatur oleo chamæmelino, amygdal. dulcium, lilior. albor. vng. atro dialthæ. Postea imponatur cataplasma ex farina hordei, semine lini, fæ-nigræ. ficibus & similibus

In statu ℞. Malua cum radicibus, althæa, meliloti, an. M. j. Coquantur ad mollitiem. Contusis adde farinæ sem. lini, fæ-nigræ. an. 3. lb. pingued. porci sine sale 3. x. ol. amygdal. dulcium, chamamel, an. q. s.

F. Cataplasma.

Vel ℞. Nidi hirundinis Vnc. j. lb. emplastri de meliloto Drach. ij. medulla cassia Vnc. lb. Cum s. q. sapa. F. Cataplasma.

Cæterum annon meritò adhuc alia constituenda sit Angina & nothæ anginæ differentia, quæ ab humore melancholico & atro proueniat, Lectori iudicandum relinquo, Facit eius mentionem Heurnius, de morbis pectoris. Oritur autem ea maximè in fœminis melancholicis, quibus menses non fluunt; & sæpe in cancrum degenerat. Vidit talem ter Heurnius, bis in duabus puellis, & semel in nupta fere senescente. Nigredo quædam ad epiglottida fere apparuit. Nupta deglutiendi difficultate periit. Atque exesus œsophagus ac musculi sternohyoides, ita ut cibus per interiora profluere, ac exesis iugularibus hæmorrhagiâ interiret vna, altera sensim contabesceret.

### QVÆSTIO I.

#### An omnis angina sit ab Inflammatione.

Angina per Inflammationem vulgò, & quidem ex Galeni doctrina. 4. de rat. victus in acutis, text. 20. & 2. ad Glaucon. cap. 1. definiri, supra diximus. Galenus tamen, 4. de loc. affect. cap. 3. addita Hippocratis, ex 2. epidem. sententia, etiam inter anginæ species recenset eam, quæ ex vertebrarum ad interiora luxatione & peruer

An omnis  
angina sit ab  
inflammatione.



peruersione fit. Et Aretæus, de causis & signis acut. morb. lib. 1. cap. 7. aliam, quæ fit solius spiritus, praua conuersione ad calidissimum & siccissimum mutati, vitio, nulla corporis parte inflammatione laborante, addit.

Verum enim verò non omnis suffocatio, multò minus respiratio læsa est angina. Equidem si vocabulum anginae spectes, quod ab *αγγων* deducitur, omnis suffocatio angina dici posset: vltus tamen obtinuit, vt propriè & in specie illa suffocatio saltem dicatur angina, quæ saluo thorace à faucibus & gutturis & partium huc pertinentium læsione prouenit. Et quidem cum vulgarissimè à partium harum tumore & inflammatione accidat, angina etiam harum partium inflammatione determinatur. Luxatio verò vertebrarum ceruicis, etsi eandem suffocationem inducere possit: tamen cum rarius accidat, & à causa externa pendeat, inter anginae quidem in genere ita dictæ differentias referri potest; est tamen alterius curationis, quàm ea, quæ ab inflammatione prouenit. Angina verò, cuius Aretæus mentionem facit, vix ad anginam eommodè referri potest, sed potius ad respirationem læsam, de qua, *parte secunda*, dicitur, pertinet: cum, sicut ipse Aretæus scribit, in pectore vitium sit, vbi spirandi initium ponitur, quòque hominem celeriter eadem die iugulet. Neque tamen, vt nonnulli existimant, de ea suffocatione loquitur hic Aretæus, quæ ex aere crasso & denso, qualis è carbonibus accensis exhalat, originem habet. Expressè n. scribit Aretæus, causam mali non extrinsecus aduenire, sed intus excitari. Sed si ea, quæ tradit Aretæus, diligenter perpendamus, de acutissima aliqua pulmonis inflammatione, aut certè de æstuosissima & acutissima febre, qua spiritus calidissimus redditur, loqui videtur. Heurnius anginam hanc fieri existimat ob inflammationem nerui, qui enatus è colli vertebris, ac per pericardium elatus, etiam diaphragmati implantatur. Videatur etiam Hippocrates, 4. de ratione vltus in acut. text. 21. & seqq. & Galenus, in commentario. Et fortassis talis fuit angina, cuius mentionem facit Dodonæus, in obseruat. cap. 18. qui in dissecis talibus ægris demortuis pulmones purulentos fuisse deprehendit. Scribit autem eo loci Dodonæus, destillante à cerebro humore asperæ arteriæ ramos primò repletos fuisse: deinde eodem ad alia vasa transmissis, liberari quidem arteriam, pulmonis autem malè affecti partes à dolore occupari. Tale quid Polemarchi vxori 5. epid. sec. 61. accidit, quæ cum primùm angina teneretur, sanguine misso faucium suffocatio delit, sed humore ad pulmones proculdubio decumbente septimo mortua est.

## QVÆSTIO II.

*An humor anginam excitans à cerebro & capite defluere possit?*

*An humor anginam excitans à cerebro defluat.*

Docet id expressè Hippocrates, dum, 4. de rat. vltus in acut. text. 30. scribit, anginam fieri, dum hyeme & vere fluxio multa & viscosa ad iugulares defluerit. Venas: id quod ex capite fieri, Galenus, in comment. rectè docet.

Videtur tamen huic opinioni aduersari id, quod angina est tumor calidus à sanguine ortum habens: in hyeme verò, quæ pituitæ est metropolis, frigidi & crudi humores cumulantur, & inde excernuntur, vt in catarhis & coryza fieri videmus. Deinde quod excrementa cerebri per nares & palatum præcipuè euacuentur, per quas vias in spatia illa, in quibus angina generatur, perungere non possunt.

Verùm sciendum, excrementitios humores, qui in cerebro colliguntur, præcipuè eà parte, vbi venæ & arteriæ primùm in eius substantiam inferuntur, non omnes per palatum & nares euacuari; sed in vasa regurgitant, atque hinc, si post aures defluerint, parotidas, si

per iugulares ad faucium & gutturis venas, anginam excitant; vt istos varios defluxionum modos Hippocrates, in lib. de locis in homine, & de glandulis, explicauit. Vnde etiam isti humores non soli & separatim, vt dum per palatum & nares fluunt, in fauces irruunt, sed quia per venas feruntur, sanguinem seu comitem seu vehiculum adsciscunt, vnde inflammatio excitatur; sed huius vel illius humoris particeps.

## QVÆSTIO III.

*An vera sit angina, quæ à Fungorum esu, & similibus venenatis rebus oriri dicitur.*

Cognata quæstioni præcedenti est & ista, an illa suffocationis species, quæ à fungorum esu, & similibus venenatis infertur, sit angina. Etenim suprà, in causis anginae diximus, à nonnullis etiam inter causas anginae recenseri Fungos, & similia. Etenim fungi quidem pariunt quasi suffocationem; id quod Paulaniæ puellæ accidisse refert Hippocrates, 7. epid. Idem accidit ab helleboro albo & aconito; & auctor apud Harpalidem, lib. 7. epid. ex esu medicamenti purgantis suffocationem quasi incurrebat. Herba Bella donna dicta similem qualitatem habet, de qua Heurnius: *loci causa*, inquit, (verùm in talibus iocus locum ita tutò non habet) *scrupulus de radice derausus maceretur in vini Vnc. iß. horis ad summum duabus, & deinde percolato, ac digito presso id vini recentis additur, quod peculum repleat. Totum potandum parasitis præbatur. Fit inde, verpaud post, qui biberint, nihil prorsus edere possint, magno spectantium oblectamento. Discutitur fucus arisu aceto potui dato. Id enim præsentissimum antidotum. Idem habet Ioh. Baptista Porta, lib. 14. Magia naturalis.*

*An vera sit angina à fungorum esu, &c.*

Verùm sciendum, talia venenata, si saltem angustiam quandam & quasi suffocationem sine inflammatione inducant, ad causas anginae referri non posse, patèrque latius suffocatio, quàm angina. Si verò occasionem præbeant, vt sanguis ad fauces confluat, atque inflammationem excitet, inter causas anginae merito referuntur.

## QVÆSTIO IV.

*An Nidus hirundinis aliquem in angina curanda usum habeat?*

Vulgatum esse apud Practicos, vt Nidus hirundinis topicis medicamentis ad dirigendum & discutiendum in angina admisceatur, suprà dictum. Aliqui tamen id improbant. Reprehendit primò usum nidi hirundinis Mercurialis, scribitque Practicos pleròque, malè consilium veterum intelligentes, existimare, hanc vim inesse nido hirundinis, cum tamen eam habeat auis. Nam hirundo ad anginam commendatur; de quo Celsus, lib. 4. cap. 4. *Vulgò audio, si quis pullum hirundinis ederet, angina toto anno non periclitari, seruatumque eum ex sale, cum is morbus urget, comburi, carbonemque eius contritum in aqua mulsâ, quæ potui datur, infricari & prodesse.* Et puluisculus ex hirundinibus etiam gargarismis admiscetur. Verùm etsi vim aliquam peculiarem ipsa auis in hoc morbo haberet: tamen vsu deprehensum iam est, etiam nidum prodesse, atque vis illa proculdubio nido inest, ob excrementa pullorum hirundinum, eaque sale multo abundantia; sicut & vis stercoris canini, si biduo vel triduo tantùm ossa comederit, proculdubio à sale proficiscitur. Deinde Petr. Paulus Perda etiam usum nidi hirundinis hic improbat, quòd terrâ repellat. Verùm non omnes terræ æqualem vim repellendi habent, nec ipse negare potest, stercus hirundinis digerere. Id eoque si quis omnino metuat vim repellendi in terrâ, ea maxima ex parte, vbi stercore hirundinum destituitur, separari potest, vt vis resoluendi & attrahendi, quæ est

*An nidus hirundinis aliquem in angina curanda usum habeat.*

est à stercore, fiat fortior. Neque enim existimo, nidum hirundinis præcipue ob terram, quæ ei inest, adhiberi, sed potius ob stercus hirundinum, quod, ut Galenus, 10. de simpl. med. fac. & 6. de comp. medic. sec. loc. docet, acre & discussorium est; id quod ex historia Tobia patet, qui ex stercore hirundinis calido ipsi in oculos illapso excæcatus est. Quam acrimoniam cum admixta terra temperet, accommodatissimum discutiendis tumoribus, præsertim faucium & gutturis, est remedium, imprimis si hirundini aliqua peculiaris vis contra anginam inest.

## QVÆSTIO V.

*An Laryngotomia tuta & utilis sit?*

*An laryngotomia tuta & utilis sit.* Equidem nonnulli Laryngotomiam planè improbant, utpote quæ periculosa sit, cum primò ossa, & cartilagine, è quibus & trachea pulmonis arteria constat, coalescere nequeant, ex sententia Hippocratis, 6. aphor. 18. atque ita ægro interitus afferatur: deinde metuumdum sit, ne sanguis è vulnere effluens in pulmones rueret, ægrumque suffocare possit. Tertio etiam Aræteus & Aurelianus fide experientia hanc operationem destitui existimant.

Verùm vulnera tracheæ planè insanabilia non sunt, sicut exemplo docet Albucasis Chirurg. lib. 3. c. 43. atque aliquot etiam Schenckius, lib. 2. obs. 40. collegit. Atque ipse etiam arteriam ita vulneratam, ut vulnus in cauitatem eius penetraret, sanatam fuisse bis vidi. Et quamvis ipsa cartilago non coalescat: tamen carnis duræ & veluti calli interuentu, & membranæ, qua iunguntur annuli asperæ arteriæ, conglutinantur. Neque etiam de fluxione sanguinis in pulmones metus est, si sectio rectè instituitur. Nullum enim insigne vas est eò loci. Iis verò, qui experientia fidem in dubium vocant, meritò ea exempla, quæ passim apud Medicos occurrunt, opponenda, quæ Schenckius, loco allegato, collegit. Refertque etiam Anton. Musa Brassanolus, in comment. in 4. Hippocratis lib. de vict. rat. in acut. de suis manibus, cum chirurgus quidam imperitus id non auderet, angina laboranti mori propinquo guttur dissecuisse, quod & aliàs pluries cum felici successu se tentasse scribit.

## CAPVT XXV.

*De Strumis in Collo & Bronchocele, ac hydropse Gutturis.*

Struma.

Tandem inter colli vitia meritò etiam Strumæ dictæ explicandæ. Strumæ autem, quæ Græcis χοιρῶδες dicuntur, seu αἰνὸς χοιρῶδες, id est petris è mari prominentibus, seu σκροφῖς χοιρῶδες, id est, scrophis, vnde & vulgò Scrophulæ dicuntur, quod scrophis, id est, suis, frequenter in collo oriuntur, et si in genere pro omnibus induratis tumoribus & peculiari membrana conclusis, qui in glandulis, in collo, sub axillis, in inguinibus, ut & mammis oriri solent, accipiuntur, ut ex Celso, lib. 5. cap. 28. & Aëtio, tetrab. 4. serm. 3. cap. 5. videre est: in specie tamen à nonnullis Struma pro tumore in gutture accipitur, de quo agere huius loci est, de reliquis huius generis strumis de tumoribus in genere dicendum.

## QVÆSTIO.

*An Bronchocele & Struma in Guttura sit idem morbus.*

*An bronchocele & Struma in gutture sit idem morbus?*

Verùm, cum tumorum horum natura & curatio rectè explicari & tradi non possit, antequam hæc quæstio ex-

pediatur, eam, quæ aliàs postponenda esset, huic capiti præmittere libet. Fecit autem huius controuersia: iam mentionem Ioh. Langius, lib. 1. epist. 43. ubi scribit, bronchocele, seu herniam gutturis, longè diuturnum à Struma fuisse veteribus tumoris genus: Celso scilicet, lib. 5. cap. 28. Strumam esse tumorem, in quo subter contracta quædam ex pure & sanguine, quasi glandulæ oriuntur; id quod in ceruice, alis, inguinibus, in lateribus & mammis quoque accidat: bronchocele verò sit pendulus circa guttur tumor, à bocij, ventricoli poculi similitudine, bocium appellatur, inter cutem & asperam arteriam, in quo modò caro pituitosa, modò humor aliquis melli, adipi, aut puli similis membranulis includitur, interdum etiam pili minutulis ossibus mixti reperiuntur. Verùm cum consuetudo sit dicendi magistra, parum referre putat, bronchocele & charades strumas quoque appellari.

Verùm et si forsan hæc ita sese habeant, & Strumæ vocabulum pro tumore, in quo subter contracta quædam ex pure & sanguine oriuntur, quæ febres mouent, atque alio tumore, quàm qui hodie hoc nomine appellantur, (Strumæ enim hodie notæ febrè non excitant) & forsan pro apostemate aliquando scirrhoso acceperint: tamen de hoc etiam adhuc quæstio est, an Strumæ hodie notæ differant à bronchocele. Nam video & hæc de re etiam inter Autores discrepantiam. Alij enim bronchocele sub strumis comprehendunt, & bronchocele statuant esse Strumam in gutture; alij v. eos tractatione sciungunt & separant. Hieron. Fabricius ab Aquap. de oper. chirurg. hanc differentiam constituit, quòd bronchocele sit tumor non in glandula aliqua, sed supra arteriam asperam abortus; Struma verò in collo sit tumor in glandula aliqua ex iis, quæ asperæ arteriæ adjacent, potissimum in iis, quæ sub larynge statim hinc inde ad asperæ arteriæ latera ponuntur: atque ita bronchocele tumit pro abcessu aliquo penitiori membranæ incluso, ad βρόγχον, id est, asperam arteriam enato: Strumas verò tumit pro glandularum in collo turribus. Idem statuit etiam Franciscus Peccetrus, qui, lib. 1. chirurgiæ, cap. 23. & 27. Strumas glandularum tumores esse scribit; bronchocele verò tumorem seu abcessum magnum mollem & rotundum inter cutem & asperam arteriam: & ex Guidone scribit, si huiusmodi tumor in capite oriatur, talpam seu talpam dici, in collo bocium, in testiculis herniam (carnosam scilicet.) Distinguit etiam Strumas & bronchocele Platerus, etsi alio modo, ut postea dicetur. Ut ergo, quæ utriusque sit natura, videamus, seorsim de utroque affectu dicemus.

*De Strumis in Guttura.*

Strumæ ergo in Guttura sunt tumores in glandulis, quæ asperæ arteriæ adjacent, orti è pituita lenta & crassa, aliquando etiam peculiari carne geniti, peculiari membrana conclusi.

Hippocrates, in Coacis lib. 2. tertia sect. aphor. 2. ex dist. in Holliery, ab anno 14. ad 42. Strumas fieri docet; ab ea verò ætate ad annos tres & sexaginta Strumas fieri negat. Quod procul dubio verum est, ubi ab interno humorum vitio Strumæ fiunt; cum eà ætate materia amplius deesse videatur. Interim non videtur impossibile, etiam post 42. annum Strumas fieri posse ab aquarum vitiosarum potu; quod illis accidit, qui ad Alpinos populos veniunt. Tumores enim hi quibuldam locis endemij sunt, scribitque Hieron. Fabricius ab Aquapendente, tales tumores frequentes esse in quadam Bergomenfis agri parte, ubi cum viri, tum mulieres ferè omnes antèius in collo gestant tumores magnos, molles, mobiles & pendulos, doloris expertes. Idem morbus & Allobrogibus & Alpinis, ac Carinthiæ & Styriæ alpinæ inhabitatoribus, & Hispaniæ quibuldam locis familiaris est.

Tumores

Tumores hi, vt diximus, & strumæ & scrophulæ dicuntur. Platerus tamen inter eos talem facit differentiam, & strumas illos tumores in gutture appellat, qui sunt magni & penduli, & sæpe, cum gutturi profundè incumbunt, raucedinem vel dyspnæam aliquam efficiunt; scrophulas verò eos saltè tumores, cum vna simplex glandula, vel ex duabus tribusque nonnunquam instar vna complicata prominet, appellat. Nam etiam scrophis seu porcis tumores hi saltè prominent, non dependent.

#### Causa.

Oriuntur autem strumæ hæc inprimis ex humore crasso & lento, quem vulgo pituitosum esse statuunt, cui interdum etiam melancholicus admisceatur. Platerus tamen non sine causa hæc monet, non satis rectè vulgò statui, ex sola pituita aut melancholia hos glandularum tumores deduci. Ex his enim si strumæ & eiusmodi tumores alij ortum haberent, non tam diuturni essent, sed putredini & corruptioni obnoxij, & in pus mutarentur, vt alij ex humoribus simpliciter excrementitiis orti tumores. Ipse verò è succo nutriente hos tumores oriri statuit. Cum enim glandulæ, quàm aliæ carnes, crassiore succo nutrantur, si is quantitate & qualitate moderatus sit, eas in suo naturali statu conseruat; si verò qualitate, & inprimis quantitate excedat, tumores varij excitantur. Etenim si aliquid humorum planè excrementitiorum admisceatur, tumores eiusmodi citius in abscessum abeunt: si verò succus ille nutrens solus sit, sed copiosior, quàm vt parti omnis apponi possit, in eiusmodi tumores degenerat. Naturaliter enim talis humoris non plus in corpore generari debet, quàm vt partibus illis nutriendis sufficiat. Si verò plus eius generetur, talium tumorum causa est. Natura enim vt vitiosos humores alios ad alias partes prorruit, vt in scabie, erysipelate, bubonibus, arthritide videre est: ita etiam, quod in alimento est ignobilius, non partibus nobilibus apponit, sed glandulis, vnguibus, capillis. Quapropter etiam si talis ignobilis, feculenti, & crassi alimenti plus generetur, natura rectè agens ad illas partes, cum quibus conuenientiam habet, glandulas scilicet, protrudit, ex quo proinde etiam carnem aut carni quid simile generare tentat. Vnde etiam Autor definitionum Medicarum strumas dicit carnem siccam, & Aëtius, ex Leonidâ, carnem subalbescentem facile atrescentem. Et quidem peculiari membrana strumæ includuntur, quæ & ipsa à facultate formatrice, quæ omnibus partibus viventibus insita & nunquam otiosa est, producit. Dum enim ab affluente humore superfluo membrana distenditur & forsitan etiam rumpitur, natura nouæ quasi membranae texturam aggredditur.

Platerus his causis addit etiam semen & facultatem formatricem in vtero, & scrophulas has, vbi sunt alicui loco familiares, à parentibus in liberos propagari potius, quàm cibi vel potus alicuius peculiari causa euenire, statuit. Quod vt non rarò verum esse existimamus; ita potum & causas ante propositas reiiciendas non censemus; cum obseruatum sit, eos, qui sani in talia loca peruenerunt, si aliquandiu ibi degant, strumas tales contrahere.

Habet autem humor ille ortum è cibis crudis & crassis, vnde etiam ætati puerili, quæ tales humores cumulat, malum hoc familiare esse, ex Hippocrate modò dictum est, inprimis ex potu aquarum crudarum & niualium: quæ de causa, qui Carinthiam & Styriam, & alia ibi loca alpes versus incolunt, plerique bronchocele laborant. Langius equidem *lib. 3. epist. 4.* & *lib. 3. epist. 4.* qui eò loci videantur, in hyeme argyrum seu aquas ex montibus metallorum feracius scaturientes & Mercurium in se continentes causam huius rei refert. Et omnino negandum non est, argentum viuum peculiari

modo pituitam ad fauces & glandulas ibi protrudere, ita vt etiam extrinsectus saluationem exciter & dentium vacillationem pariat: quia tamen in Hungaria & Transsylvania, atque alibi etiam, in magna copia Mercurius prouenit, vbi tamen morbus ille epidemius est: malo simpliciter ex aquarum crudarum & ex niue liquecente resolutarum potu id fieri, quas Hippocrates, *lib. de aere, aquis & locis, v. d. a. l. a. q. u. a. l. a. d. e. s. a. b. a. & p. a. r. y. x. u. d. e. s. a. l. a.* nominat.

#### Signa Diagnostica.

Affectus ipse per se patet. Apparet enim tumor rotundus, pendulus, propriæ membranæ inclusus, qui propterea ad tactum mobilis est & à cute separari potest.

#### Prognostica.

1. Strumæ hæc vt omnes difficulter curantur, in pueris tamen facilius curantur, quàm in adultis.
2. Libera ac nulli vasi implicata strumæ curantur facilius, quàm quæ vasi implicata sunt.
3. Excisione sine periculo vix curantur, propter heruos recurrentes eò loci latentes, qui si læduntur, vox perit: quod cuidam accidisse refert Galenus, *1. de loc. aff. cap. 5.* qui cum strumas in profundo in collo incumbentes excindere, & inter secandum quoddam vas non specillo secaret, sed vnguibus enelleret, imprudens ob ignorantiam simul nervos recurrentes distraxit, atque hoc pacto puerum liberauit à strumis, sed mutum reddidit. Ideoque strumæ, quæ in anteriore colli parte sunt, periculosiores sunt, quàm quæ in posteriore.
4. Nisi folliculus radicitus excindatur, malum reuerti solet.

#### Curatio.

Materia tumoris causa tollenda est, & si quæ materia affluat, ea etiam euacuanda. Quod fit, dum vel insensibiliter absumitur ac discutitur, vel pus mutatur vel excinditur.

Primo ergo, si adhuc vitiosi humores, præcipue pituitosi, qui causæ antecedentis rationem habeant, in corpore abundant, ij tollendi, & corpus conuenienter euacuandum, cum per vniuersalia, tum per ea, quæ caput purgant.

Deinde corpore euacuato, ea medicamenta exhibenda, quæ materiam strumarum absumunt, absorbent, & exciscant. In quo genere primo est radix scrophulariæ, quæ nomen inde habere videtur, quod scrophulis medeatur, item radices vrticæ mortuæ, filipendulæ, gladioli. Laudatur & radix rusci, cuius efficaciam sibi quoque compertam esse testatur Fallopius, si eius in puluerem redacta drachma vna singulis diebus cum vino assumatur.

Vel *℞. Rad. rusci Dra. j. iridis g. x.*

Cum vino dulci vel mulsa exhibeatur diebus 40.

Plurimum etiam commendatur spongia, ac sequens medicamentum, vt secretum in multis probatum, commendatur.

*℞. Spongiam nouam, rudam, non lotam, quæ calculis & nodulis sit refertissima. Infundatur tota in s. q. cereuisiæ, ita tamen, vt aliquid de coctum sufficiat. Coque cum cereuisiâ, vt absumatur quantitas duorum transuersorum digitorum. De coctum bat æger vespere, cum cubitum itur, haustum calidum. Sin autem assueti illa potio præ nausea nequit addi possunt aromata pro libitu, aut radix polygodij querni.*

Arnoldus de Villanova hunc puluerem, vel potum a quo omnes infra vigesimum quinquaginta annum infallibiliter curentur:



*26. Cineris spongia marina & palea marina, sis se-  
pia, pipera longi & nigri, zingiberis, cinamomi, salis  
gemma, pyrethri, nucum cupressi, gallarum quercus, ro-  
sar. ana. Vnc. ii.*

F. Pulvis.

De quo æger saepius de die & nocte in ore aliquid  
teneat, & paulatim deglutiat. Idem & cibus inspergi  
potest.

Idem & alios pulveres proponit. Valdè etiam com-  
mendatur hic Pulvis:

*27. Rad. aristoteli, rotunda, raphani, spatula foeti-  
da, an. Drach. i. fol. pimpinella, pilosella, ruta maio-  
ris, an. Drach. ii. Scrophularia, filipendula, an. Vnc.  
sem. feniculi Drach. ii. zingiberis Drach. i. tur-  
bith, an. fol. sena elect. ana Drach. ii. sacch. albiss.  
Vnc. iij.*

F. Pulvis, de quo sumatur singulis diebus cochlear  
unum cum vino albo vel aqua genista.

Vel *28. lapidis spongia 3. iij. salis gemma 3. ii. salis tartari  
Drach. i.*

F. Pulvis. Sumantur à quadra vltima quotidie ex vi-  
no Drach. β. vel Scr. i.

Alius Pulvis contra strumas

*29. Spong. marin. pille marin. corall. rub. vst. 3. ij.  
Sapiri tenuiss. & albiss. omnium combust. ana Vnc. β.*

Quibus cinerib. admisc. Rad. Scrophular. maj.  
Drach. iij. off. sepie; sal. gemm. gallar. an. Drach. ij.  
muc. melle. piperis long. & alb. zingib. a. an. Drach. j.  
cinamomi neri Drach. j. sem. sacchari Vnc. j. sem. M. F.  
Tragma.

Ex pulveribus istis cum syrupo betonicæ vel alio  
condescente fieri possunt etiam Electuaria. Vel talis  
paretur Potio:

*30. Rad. Scrophularia, filipendula, ana Vnc. sem. fol.  
agrymonia, pilosella, pimpinella, an. M. i. flor. hyperici, ro-  
smarini an. β.*

Cum in vino albo vale clauso Colatura anlicoræ  
faciliat, & addatur aq. cinamom. Drach. iβ. pro duas  
vel tribus dosibus.

Tertio Topica vsurpanda, & primo quidem dan-  
da opera, ut materia tumoris causa insensibiliter  
discuti & solui possit. Et adhibentur ferè medica-  
menta, quæ scithis applicati solent, & primo qui-  
dem emollientibus, incidentibus & discutientibus  
utendum, & in primis ea eligenda, quæ strumis præ-  
stare prodesse comperita sunt, vt Scrophularia, & si-  
milis: atque vt corpus mollius vel durius, tumor re-  
centior vel antiquior fuerit, ita fortiora vel mitiora  
vsurpanda.

Vel *31. Rad. althea Vnc. i. mucilag. sem. lini. fenigraci,  
ana Drach. vi. pingued. gallin. humana, an. Vnc. i. pl. amy-  
gdal. dulc. Vnc. β. araci Drach. β. cera q. l.*

F. Unguentum.

Vel *32. Rad. Scrophularia autem effossa & purgata q. v.  
Contundantur cum aq. butyricæ centis, inque fictile  
operculo clausum loco humido reponantur per dies 15.*

Deinde lentè igne calefiant & colentur. Linimento  
hoc struma illinatur.

Vel *33. Folia cupressi, F. Pulvis*

Pulvis hic vino conspergatur, & in massam vnam  
redigatur. Hoc medicamento strumam illines & ter-  
tio die demum solues, tum locum exprimas, quem  
contractum inuenies. Denique medicamentum indu-  
ces, quod in obligabis per triduum, donec struma  
effusa sit.

Et talia plura passim à Galeno, Paulo, Celso, Ema-  
cucenna, & aliis describuntur, quæ omnia hic cu-  
mulare opus non est; præsertim cum plurimè diffidant  
huc citationem antiquis strumis. Quamquam nunc  
Celenus & alij curandas hoc modo strumas esse præ-  
dicant, ac Galenus de strumata in strumis vnius anni  
tumore relictis cum felici successu se vltimè esse  
curatos; tum enim sunt antiquiores & perfectæ, ac mem-

bris conclusæ, hoc modo integra curatio vix sperari  
potest.

Itaque vbi per emollientia & resoluentia tumor di-  
scuti non potest, ad maturationem & suppurationem  
veniendum.

Ut *34. Rad. lilior. albor. althea, iridis.*

Coq. ad mollitiem.

Deinde adiecta farina triticea & oleo dulci vel lilio-  
rum alborum, ac pinguedine anserina vel gallinacea,  
Fiat Cataplasma.

Vel alia maturantia applicentur, quæ passim nota  
sunt. Insistendum autem tamdiu vsui suppurantium,  
neque locus ante aperiendus, donec tota materia in-  
tus conclusa in pus mutata fuerit. Vnde enim  
huc conclusa calor etiam conclusus manet, atque etiam  
quum etiam materiam facilius in pus vertit. Quod  
mica citius aperiatur, cum humoribus etiam spiritibus  
calor effunditur, quo expirante reliqua pars materię  
postea tardius & cum difficultate suppuratur. Cui &  
hoc accedit, quod pars materię suppurata facit, vt & re-  
liquum facilius in pus vertitur.

Vbi verò struma fuerit in pus mutata, aperienda est  
vel medicamento, vel ferro, aut cauterio. Apertâ vomica  
pus euacuandum, deinde sinus expurgandus vn-  
guento Apostolorum, medicamento de apio, vel simili.  
hinc sinus carne implendus, & cicatrice claudendus. In-  
primis verò hoc Unguentum ad strumas suppuratas &  
apertas commendatur.

*35. Olei laurini Vnc. i. cerussa puluerisata & cum aq.  
vitalanigata itidem Vnc. i. alumnis rocha Vnc. β. salis  
communis Drach. ii. F. Unguentum.*

Vel applicetur emplastrum diachylum compositum.  
Vel *36. Rad. iridis Vnc. iij.*

Coqu. in aceti & mellis, an. Vnc. vi. Contundantur  
minutim & addantur terebinthina, unguenti dialthea an.  
Vnc. iij. pulv. cumini, fenigraci, an. Vnc. i. cera q. l. Fiat  
Emplastrum.

Vel *37. Galbani, bdellii, an. Vnc. i. ammoniaci Vnc. ii.  
alveariorum apum, asypi, an. Drach. ii. terebinthina  
spicis liquida, an. Vnc. iβ. baccar. lauri, staphidis agrie,  
cumini, pyrethri, an. 3. β. stercoris caprini, ouilli, anserini,  
an. Drach. iij. azungia porci, seni caprini, geruici, vrsini, an.  
3. i. q. chamamel. lilior. albor. cera an. q. l. F. Emplastrum  
quod potenter resoluit.*

Vel *38. Rad. bryonia, cycclaminis, cucumeris agrestis,  
ireos, an. Vnc. ii.*

Coq. in vino albo & terantur.

Deinde addo ammoniaci aceto dissoluti, bdellii, opopa-  
nisi in oleo sesamino dissoluti, an. Vnc. i. stercoris colum-  
bini, caprini, an. Vnc. iβ. Indani, styracis calamita, an. Vnc.  
β. spicis navalis q. l.

F. Emplastrum.

Vel *39. Emplastri de meliloto Vnc. i. bdellii aceto scilli-  
tico dissoluti Dra. ii. castorei pinguis Drach. iβ. pulv. radic.  
ireos, fol. cupressi, an. 3. i. ol. chamamel. lilior. albor. amygdal.  
lar. amar. an. q. l.*

F. Emplastrum.

Quod si nec hoc modo curatio sperari potest, extra-  
henda est struma: quod quidem fit primò sectione, quæ  
quomodo peragentia sit, in Instit. lib. 5. part. 1. sect. 2.  
cap. 13. dictum.

Quod si æger ferrum non admittat, alius modus su-  
perest strumas tollendi per medicamenta seu caustica  
& corrodentia, seu septica & putrefacientia. Hæc au-  
tem in re diligenter obseruandum, ne partes vicinæ à  
medicamentis his lædantur & inflammentur. Ideo mu-  
nienda sunt vnguento refrigerante Galeni, rosato Mel-  
le, & similibus. Perficitur autem hæc res duobus mo-  
dis. Alij scarificationem præferunt, & strumam in mi-  
nutissima scarificant, deinde inungunt puluerem para-  
tum ex morsus diaboli sicco, & cinabra Vnc. i. arsenici ru-  
bri, virgoli, lithargyri, auri puri, an. 3. i. Pulueri in-  
pone emplastrum diachylum, quod post 24. horas de-  
mum



num deme & vide, an struma sit castigata. Nisi fuerit, aufer scalpello cutem mortuam, deindeque insperge puluerem & emplastrum imposito. Post 24. horas castigatæ scrophulæ illinatur locus butyro & vitello oui mixtis in formam linimenti. Et ita singulis 24. horis linimentum mutabis, donec caro mortua deciderit.

Alij sine scarificatione mox medicamenta caustica & septica adhibent: alij tamen alia. Fallopius in corporibus rusticis vitru trochiscis de minio, quos describit Ioh. de Vigo lib. 8. cap. 13. vbi & similia medicamenta plura reperiuntur, pro quibus ille, vt mitiores, hos substituit.

*℞. Auripigmenti, arsenici crystallini, an. q. s. Misce cum pasta ex farina triticea & F. Trochisci.* Pro quibus etiam in apertam vomicam hoc medicamentum imponit:

*℞. Arsenici rubri, sandaracha Græcorum, an. Drach. ij. axungia suilla q. s.*

*M. fiat Vnguentum.*

Et plurimi quidem censent, arsenicum hac in re primum obtinere. Verum cautione opus est, & non temerè admoendum. Nam supra modum vehemens ac virulentum est, febres excitat, & plurima alia praua symptomata inducit, & in minima etiam quantitate multa præstat. Ideoque vltra quantitatem dimidij grani triticei non adhibendum, & quidem in corpore robusto, & loco à membris nobilibus remotiore. In corporibus vero mollioribus & iuxta membra nobilia minor quantitas adhuc adhibenda, semperque præstat minimam quantitatem vna vice applicare, & postea idem medicamentum, si opus sit, repetere, quam nimia quantitate ægrum lædere. Et cum per dies tres duret operatio eius, eo tempore æger semper, vt febricitans aliquis, regendus, & contra malignitatem muniendus. Itaque cum non sine periculo arteriæ applicetur, præstat lapide caustico, quo fonticuli excitari solent, quemque in Instit. lib. 5. cap. ult. descripsimus, vti.

Quando glandula iam corrupta & absumpta fuerit, crusta inducta à sana parte remouenda butyro loto cum farina triticea & axungia suilla. Crustà dempta si quid adhuc vitiosi reliquum fuerit, illud etiam per medicamenta erodentia, vt vnguentum Agrippæ & similia, tollendum, & tandem vlcus, vt fieri solet, sanandum.

Est tamen adhuc alius modus strumas sanandi, quæ ab exiliradice pendent. Illas enim serico filo, aut feris equinis, versus radicem constringere licet, & quidem indies arctius, donec resiccata fuerint, & spontè deciderint. Potest etiam medicamento exsiccante actio vinculi promoueri & adiuari.

Tandem de curatione strumarum non prætereundum, vulgo ferri, Reges Galliæ solo attractu sanandi strumas vim habere. De quo etsi alij aliter sentiant, & alij in imaginationem, alij in aeris mutationem, & mortui corporis causam huius rei reiciant: tamen vana hæc esse, facile patet. Cum autem hæc vis à Clodoueo primo Galliæ Rege profecta sit, atque inde ad successores per traducem, nullo respectu familiaris habito, translata sit, procul dubio donum est supernaturale diuinitus concessum. Nam cum dictus Clodoueus primus Galliæ Rex esset idolorum cultor, Clotildis vxoris monitu & precibus persuasus est, vt Christi nomen profiteretur. Cum ergo à Remigio, Rhemeni Archiepiscopo, baptisatus & chrismate vnctus esset, ab eo tempore hanc vim strumas sanandi accepit, & quasi per traducem in omnes suos successores deriuauit. Solent autem passim à venis & peregrinis locis quotannis strumis laborantes affluere, quibus rex manum imponit, & hæc verba Gallico sermone profert: *Le Roy te touche, & Dieu te guarit.* Rex te tangit, & Deus te sanat, atque appposito crucis signaculo, ab vno & eodem Deo vim eam deriuari, publice proficitur. De qua mirabili strumas sanandi

vi, solis Galliæ Regibus Christianissimis diuinitus concessa, peculiarem librum conscripsit Andreas Laurentius, qui videatur.

### De Bronchocele.

Bronchoceleum verò definit Celsus, lib. 7. c. 13. quod fit tumor in ceruice seu collo inter cutem & asperam arteriam, quæ modò caro hebes, modò humor aliquis melli aqueue similis inclinditur; interdum etiam minutis ossibus pili immixti.

Quæ autem & de causis eius & de curatione vulgo traduntur, parum ab iis, quæ de causis & curatione strumarum, dicta sunt, differunt. Ideoque ea etiam non repetemus. Hoc verò non prætereundum, Felicem Platerum aliam planè, & à vulgata opinione diuersam, de generatione & curatione bronchoceles, sententiam habere, quam proponere libet.

Ille autem statuit, bronchoceleum seu gutturis herniam esse tumorem in colli anteriore sede seu gutture amplo spatio extuberantem, qui tensus est admodum, vt cum pulsatur, sonum edat, & cum premitur, sicut vter inflatus cedat, sed mox iterum attollatur; quibus à struma facile secernatur.

Causam autem huius mali statuit esse flatum sub cutem membranamque generalem cuti substratam, adnexamque in colli anterioribus irruentem. Collectionis autem aeris eò loci causam esse statuit, laxationem seu auulsionem cutis, cum membrana illa, quæ eò loci crassior est & rubicundior, quam alibi, à subiectis asperæ arteriæ musculorumque colli anteriorum fedibus, spatiūque illic efficientis, in quod ob fugam vacui aer seu flatus è vicinis locis irruens, illud non solum implendo, cutem membranamque in tumorem eleuat, sed & continuatione distendens in immensum adauger, vnde nomen rectè accepit tumor, quod bronchocele, quæsi ruptura seu hernia gutturis, appelleretur.

Causam autem auulsionis membranarum statuit esse conatum vehementem, qui fit, dum spiritu retento excrementa vel fœtum in partu excludere nituntur, aut buccas vehementer inflant.

Verum enim verò etsi facile concedimus, causam principalem esse auulsionem cutis & membranæ illius à partibus vicinis; tamen vero vix simile viderur, solum flatum, vtpote mobilem, nec facile vno in loco hærentem, malum tam diuturnum procreare posse, & tangenti aliud etiam facile deprehendere est. Ideoque mihi probabile videtur, in vacuum illud spatium, præcipuè membranæ extensis, succum aliquem & nutrimentum crassius effundi, è quo natura carni quid simile former. Vnde etiam ipse Platerus statuit, nisi malo huic maturè occurratur, vix dum amplius abigi posse, sed toto vitæ curriculo permanere illic, quo p. n. excrescit, sese circa vicina vasa implicante, & iis pertinacius adhærescente.

### Curatio.

Curatio ergo vt ex Plateri sententia rectè instituitur, principio, ne tumor incrementum sumat, adstringentia sunt applicanda, vt emplastrum ad rupturam, & quæ in hydropse solent adhiberi, vt membranarum illa contiguitas soluta iterum jungatur.

Idem tamen etiam interna quædam adstringentia & siccantia exhibet, commendatque puluerem aluminis vsti vnc. s. pondere exhibitum. Possunt & alij pulueres antea de strumis propositi exhiberi.

Si verò tumor iam incrementum sumpserit, diffidentia antea in strumarum curatione proposita in hunc locum habere possunt.

*De hydrope gutturis.**Hydrope  
gutturis.*

Non prætereunda hîc rara affectio gutturis. Solent enim interdum partes quædam priuatæ ab aqua intumescere, non solum internæ, vt pulmo & vterus, sed etiam externæ. Et vidi semel atque iterum, & idem annotarunt alij, toto corpore saluo, manum tantum intumuisse tumore aquoso pertinacissimo. Idem in gutture factum in puella, vidit Montanus, qui etiam hydropem illam gutturis per incisionem curauit.



## LIBRI SECUNDI PARS II.

### DE ASPERÆ ARTERIÆ, pulmonis, mediastini, diaphragma- tis, thoracis, præter naturam affectioibus.

#### P R Æ F A T I O,

*Summam tractandorum continens.*

**P** O S T Q V A M hætenus morbos & symptoma-  
ta, quæ partibus inter caput & thoracem inter-  
mediis accidunt, explicauimus, vt ad vitia thoracis &  
partium in eo contentarum accedamus, ordo postulat.  
Hæc ergo secundâ libri secundi parte dicemus de affe-  
ctibus præter naturam Asperæ arteriæ, de Pulmonis  
morbis, p̄ta eiue intemperie, inflammatione, seu peri-  
pneumoniâ, obstructione, de grâdine & calculo ac, ver-  
mibus in pulmone genitis, de hydrope pulmonis, de  
pulmonis cum thoracis mēbranis coalitu, de ruptura &  
erosione vasorum pulmonis, de vulneribus & vlceribus  
pulmonis, de Mediastini inflammatione, de Diaphragma-  
tis inflammatione; de Pleuritide, seu inflammatione  
pleuræ & musculorum thoracis, de vulneribus & fistu-  
lis, de empyemate, de hydrope Pectoris, de vertebrarum  
dorsi luxatione & gibbositate, de fracturis Costarum &  
earum ad interiora compressione. Hinc dicendum de  
symptomatibus, quæ inde proueniunt, puta de Respi-  
ratione læsa, Asthmate, Suffocatione, Vocis & Locutionis  
læsione, Tussi, Dolore lateris & pectoris, Sputo sangui-  
nis, & Grandinis ac Calculorum & Vermiculorum à  
pulmonibus reiectione.

#### C A P V T I.

##### *De Asperæ arteriæ morbis.*

*Asperæ arte-  
riæ morbi.*

**F**aucibus & gutturi succedit Arteria, Græcis τρᾶχητις  
dicta, ad differentiam earum, quæ à sinistro cordis  
ventriculo in vniuersum corpus distribuuntur: item  
βρόγχος, quod ex bronchiis, id est, annulis cartilagineis  
constet. Habet ea naturalem constitutionem suam, vt  
passim ab Anatomicis describitur, à qua si deflectat va-  
rij morbi in ea oriuntur.

##### *Morbi Intemperiei.*

*Intemperies.*

Et primò quidem morbis intemperiei corripitur,  
quam inducit inprimis aër, quem inspiramus, vt &  
quem expiramus, qui si frigidior fuerit, asperam arte-  
ri refrigerat; si calidior, calefacit; si humidior, hume-  
dat; si siccus, exsiccat. Possunt idem præstare etiam  
cibus & potus. Hinc ab aqua frigida vel potu alio con-  
gelato aut glacie refrigerato aspera arteria refrigera-

tur. Eadem tamen intemperies accidere potest ab hu-  
moribus & materia, quæ eam præterlabitur, siue à ca-  
pite ad eam confluat, siue à pulmone & thorace reicia-  
tur. Possunt etiam intemperies partium vicinarum tra-  
cheæ intemperiem aliquam inducere. Ita œsophagus  
inflammatus calidam intemperiem arteriæ asperæ com-  
municare potest.

Cognoscuntur autem istæ intemperies à causis an-  
tecedentibus, scilicet vel calefacientibus, vel frigefa-  
cientibus, vel humectantibus, vel siccantibus, item ex  
vocis mutatione, oris ariditate, vel humiditate, calidita-  
te, vel frigiditate, deglutiendi difficultate vel facilitate,  
vt & iuuantibus ac nocentibus.

Si verò intemperies à materia in corpore contenta  
inducatur, arguunt eam tussis, sensus grauitatis, dolor,  
anhelitus difficultas. Materia autem & humoris natura  
etiam intemperiei speciem indicat.

Simplices autem intemperies & qualitates, sic-  
citatem si excipias, facile sanantur, remotis, quæ  
eam induxerunt, causis, & contrariis adhibitis; dif-  
ficilius verò intemperies sanantur, quæ à materia fo-  
uentur.

De curatione autem in genere hoc tenendum, cum  
partes, è quibus aspera arteria constar, sint frigidissi-  
mæ & exsangues, in refrigerantium vsu cautus esse de-  
bet Medicus. Cum etiam pars hæc sicca sit, & à cere-  
bro defluentia excrementa subinde recipiat, audaciùs  
siccantibus vti licet; exasperantium tamen vltus vi-  
tandus.

Intemperies autem simplices saltem remotionem  
causæ eam inducentis, & contraria medicamenta in-  
dicant.

Si adsit materia eam fouens, illa remouenda.

Si nimirum intemperies sit *calida*, alteretur frigidis,  
*syrupo violarum, rosarum, cucurbitæ, mucilagine semin.  
psyllij, & similibus.*

Si *frigida* sit intemperies, conueniunt *species & rotu-  
la diaireos, diacalamintæ, diabyssopi, syrupus de hyssopo  
de betonica.* Extrâ inungatur collum oleo *irino, costino, &  
similibus.*

Si intemperies sit *humida*, vtile est *decoctum & aqua  
hyssopi cum melle, species diaireos, diacalamintæ.*

Si intemperies sit *sicca*, vtendum *syrupo violarum, in-  
iubino, de glycyrrhizæ, lacte, emulsione seminis papaueris,  
amygdal. dulc. pinearum.* Extrâ collum inungendum oleo  
*violarum, amygdal. dulc.*

Si cum materia sit intemperies, eâ cura requiritur,  
quæ in catarrho ad pectus labente proposita est.

##### *Asperitas.*

Deinde aspera arteria patitur morbum superficiei, *Asperitas*  
cum scilicet, quæ intus & secundum tunicam interio-  
rem naturaliter læuis esse debet, aspera redditur & inæ-  
qualis.

Quod ipsi à rebus acerbis immodicè detergentibus *Causa*  
& erodentibus, vt salso & acri catarrho, rebus acidis,  
oleo, quod licet alias partes linire & lauigare possit,  
asperam tamen arteriam & oculos exasperat, præcipuè  
si sit rancidum, vel frixione tale euaserit, rebus item  
oleosis & rancidis aliis, vt nucibus & similibus, pul-  
uere item & fumo, vaporibusque acerbis, quos cum  
aëre inspirando attrahimus, accidit. Longa etiam ora-  
tio & vocis intentio asperam arteriam reddunt; humo-  
res item maligni, vt in lue Gallica; item vapores  
acres in febribus malignis ex inferioribus partibus  
elevator.

Asperitas asperæ arteriæ cognoscitur ex causis, quas  
modò enumerauimus, & ex utilitate, quam præbent  
lenientia, & damno, quod oritur ex acrim & acidorum  
vsu. Inprimis autem ex effectu cognoscitur, nimirum  
ex rauedine vocis, quæ ex asperitate arteriæ huius ex-  
citur.

*Asperitas*

Asperitas autem asperæ arteriæ lenientia & læuigatâ remedia, & emplastica morfu expertia postulat. Cuiusmodi sunt amyllum, tragacantha, bolus Armena, amygdala dulces, nuclei pini, dactyli, ficus, lac, vinum dulce, diapenidium, diatragacanthum frigidum, syrupus de iuinibus, diacodium, syrupus de glycyrrhizâ, loch de psyllio, de papauere, succus & extractum glycyrrhizæ. Inprimis hic profunt hypoglottides, ac pilulæ & trochisci sub lingua tenendi, vt pilula bechia, trochisci bechii, oleum amygdal. dulc. cum saccharo cando.

Arteriæ  
medicamentâ.

Atque omnino huius loci sunt arteriaca dicta medicamenta, quod membranæ arteriam asperam succingenti profunt. Composita talia ex Antiquis multa proposuit Galenus, 7. de compos. medic. secund. loca. Verum cum, vt idem Galenus, ibid. cap. 1. ait, omnium simplicium medicamentorum vires exquisitè nosse oporteat eum, qui compositum quoddam sit facturum, simplicia arteriaca hic proponere libet.

Est autem illorum triplex genus. Primum completur lenientia, quæ sine omni mordicatione læuigant, qualia sunt, butyrum recens s. sale, amyllum, lac, mustum dulce decoctum, passula, dactyli, iuinba, amygdala dulces, pineæ recentes, glycyrrhiza, tragacantha, gummi Arabicum, cremor pisanus hordeacea & triticea, mucilago sem. psyllii, cydoniorum, emulso seminum quatuor frigidiorum maiorum.

In secundo genere sunt, quæ abstergunt simul nonnihil, citra tamen rosionem. Et possunt etiam in hunc finem vsurpari medicamenta ex priore classe, si, quæ sunt huius generis propria, adduntur. Sunt autem talia, saccharum, mel, saccharum penidium, carica, syrupus violarum, iuinibus.

In tertio genere sunt paulò acriora, quæ exsiccant, abstergunt, & discutiunt, vt hyssopus, thymum, radix ireos, semen urtica, cinamomum, amygdala amara, spica, thus, myrrha, terebinthina, farina orobi, spec. diureos Salomonis.

Etsi verò pluribus modis talia exhiberi possunt, vt syruporum, linctuum: tamen commodissimè ferè in hypoglottidas, seu trochiscos sub lingua tenendos, qui paulatim liquecant, conformantur. Hærete enim necessum est.

Composita multa talia, vt dictum, apud Galenum, 7. de compos. medic. sec. loca, existant. Vnum atque alterum saltem addemus:

℞. Sem. cydonior. psyllii, spec. tragacanthi frigidi, an. Drach. i.

Fiat Nodulus, qui madesiat in decocto passularum & glycyrrhizæ.

Vel ℞. Glycyrrhizæ rec. in taleolas sectæ q. s. passul. minor. cass. extr. sacch. candi sem. cydonior.

Ebulliant parum, & pro vsu seruentur.

Vel ℞. Rad. alibæ Vnc. i. glycyrrh. branca vrsina, an. Vnc. β. passul. mundat. iuinbar. sebesten. ana N. x. flor. violar. malua. ana P. i. sem. 4. frig. maior. cydonior. an. Drac. iii. hordei mundat. P. i.

Fiat decoctio. In lb. i. dissolu. syr. violar. Vnc. iii. iuinbini Vnc. i.

M. pro tribus dosibus. Vel coq. ad spissitudinem, & addatur saccharum penidium. F. Lochoch.

### Angustia aspera arterie.

Angustia a-  
pera arterie.  
Causa.

Tertiò patitur aspera arteria morbos cavitatis, seu Angustiam, quæ fit à rebus extrâ comprimantibus, laqueo, manu, similibusque causis asperam arteriam extrâ coarctantibus; ab inflammationibus item & tumoribus asperæ arteriæ incumbantibus; bolis item grandioribus deuoratis. vel rebus aliis duris deglutitis in œsophago subsistentibus, & arteriam, quæ à posteriore parte gulæ adiacet, comprimantibus, luxatione vertebrarum ceruicis. Quò etiam referri potest natiua pectoris angustia, item nimia obesitas, vnde arteriæ comprimuntur, & angustiores reddun-

Dan. Sennerti Tom. II.

tur. Obstruitur à rebus extrâ in eam illapsis, humoribus crassis & glutinosis confertim à cerebro in eam illabentibus, vel pure ex rupto pulmonis abscessu, vel etiam abscessibus in faucibus ruptis, seu grumis sanguinis vndecunque in eam illapsis; glandine item & calculis in pulmone genitis, & tandem à carne, quæ post vulnera vel vlcera arteriæ in eam nata eius meatum claudit.

Asperæ autem arteriæ angustiam patefaciunt causæ. Signa. sæ cum externæ, tum internæ, quæ aptæ sunt canalem hunc comprimere vel obstruere. Monstrant eandem effectus, respirationis difficultas, & imminens suffocationis metus modò maior, modò minor, pro angustia, à qua prouenit ratione, ruffis item, præsertim si extrâ illapsa sit causâ angustia.

Et quidem inter morbos asperæ arteriæ angustia Prognostica. grauissimus & periculosissimus est, qui suffocando & spiritus intercipiendo hominem iugulat, siue id fiat à laqueo, siue à catarrho confertim in pulmones illabente, siue à sanguine in tracheam influente, siue à rebus aliis in eam illapsis. Cuius rei historias collegit Schenckius, lib. 2. obs. 14. Pro causarum etiam ratione malum nunc facilius, nunc difficilior curatur. Angustia enim asperæ arteriæ, quæ ob gibbum ex asthmate fit ante pubertatem, non curatur. Hippocrates, 6. aph. 46.

Ad prognostica pertinet & hoc, quod ea, quæ in asperam arteriam illabuntur, interdum magno conatu in ipsum pulmonem detruduntur; quæ postea tamen interdum tussi reiciuntur, interdum vomitum ibi excitant. Ita Alex. Benedictus, hist. de part. corp. hum. lib. 3. cap. 18. annotauit, Lucretiæ cuidam, cum nucem Ponticam dentibus frangeret, oborto risu, nucem in arteriam delapsam, & ancipiti conatu ad interiora propulsam, vbi ruptis venulis vomica in pectore exorta est, quâ tandem sanata, obsessis meatibus, vox rauca semper percepta est. Sic anno 1620. cum hic vir quidam cerasa comederet, nucleus cum maximo suffocationis periculo & tussi maxima in guttur, & tandem in ipsum pulmonem illapsus est. Vnde suffocationis periculo cessante, in eam venit opinionem, illum suffocationis metum non à nucleo, sed catarrho præcipiti, cui aliàs valde erat obnoxius, prouenisse. Verum durauit per interualla tussis ista tribus septimanis, & dolorem quendam grauantem in dextra thoracis parte sensit. Tandem cum nocte quadam vehementer integram horam tussisset, nucleum illum pituita obductum tussi reiecit, & ab ea liberatus est.

Curatur autem angustia asperæ arteriæ, causæ, quæ Curatio. eam excitat, ablatione, Si extrâ quid arteriam comprimat, illud tollendum. Si etiam extra quid in eam illapsum sit, tussi reiciendum. Si verò causâ obstruens interna sit crassus & viscidus humor, is incidendus, attenuandus & extergendus, vt facilius tussi eiici possit, syrupo scilicet de hyssopo, capill. Veneris, de prassio, glycyrrhizâ, oxymelite cum mulsâ, vel decocto aut aquis hyssopi, capilli Veneris, prassij, loch de pino, de scilla, & similibus, quæ postea in obstructionibus pulmonis proponuntur. Si superiore parte œsophagi quid hæreat, ac asperam arteriam etiam coarctet, tum conquassatis pugno dorsi vel intra scapulas vertebris, quibus gula adiacet, impacta in ventrem detruduntur, quò tandem larynx & dilatari, & libetius aerem admittere possit.

### Vulnera & Vlcers aspera arteria.

Tandem etiam morbos solutæ vnitatis patitur aspera arteria, Vulnera scilicet, quæ præcipuè à telis, gladiis, & aliis causis externis inducuntur. Quandoque etiam à tussi violenta, & magna vocis intentione, vt in pulmone, ita in aspera arteria vasa rumpuntur.

LLI

Exulce

Exulcerationem verò inducunt acres humores & erodentes, præcipuè salii & nitrosi, ut appellat Hippocrates, 4. de rat. viſt. in acut. à cerebro defluentes, ut & humores acres & venenati in lue Venerea.

Vulnera autem externa asperæ arteriæ sensui patent, & ægri vel adstantes referunt, quæ causæ ea induxerint. Et si dubitetur, an vulnus ad cavitatem arteriæ penetraret, id facile manu, candela, vel aliâ re vulnere admota, dum æger loquitur, & omnino ex aëris per vulnus egressu cognoscitur. Ruptura autem vasorum ex tussi nimia, ut & vocis intentione, quæ præcessit, ac præcipuè sanguinis sputo, quod sequitur, innotescit.

Interna autem exulceratio patet à causis, quæ præcesserunt, vel ad sunt; catarrhis salis, medicamentis acerbis, lue Venerea; ut & iis, quæ exulcerationem consequuntur, dolore, tussi, sputo sanguinis, in principio quidem pro, hinc purulento, aut materiæ purulentæ & sordidæ, ut & crustularum, quas Græci *σπυγία* vocant, reiectione. Interdum etiam bronchia & cartilagine asperæ arteriæ tussi reiciuntur, quod tamen ex pulmonibus frequentius accidit, ratio ex aspera arteria, quæ durior est, quam ut vivente homine tantam corruptionem pati possit. Symptomata equidem, quæ vulneribus & ulceribus arteriæ supervenire solent, recenset Hippocrates, 2. de morb. Verum ut mihi quidem videtur, non agit eò loci Hippocrates de aspera arteria extra pulmones vulnerata vel exulcerata, de qua nunc nobis sermo, sed de eius ramis iam per pulmonis substantiam dispersis; cum inter cætera expressè scribat, in vulneribus eiusmodi tandem *σπυγία* pulmonis reici.

Prognosis.

Vulnera autem asperæ arteriæ periculosa sunt, & plerumque insanabilia, præcipuè si substantia ipsa cartilaginea sint vulnerata, potissimum per transversum dissecta, quæ vix coalescit. Interdum etiam inflammatio accedit, & hinc gangræna & sphacelus, quæ ægrum subito iugulant.

Aliquando tamen sanantur, præsertim, si vulnus inter duos annulos, atque ita membranam cartilaginè connectentē incidat, cuius rei exempla collegit Schenckius, lib. 1. obs. 40. Et ipse bis vulnera arteriæ asperæ penetrantia sanata vidi. Si autem moriatur æger, iugulatur vel statim, sanguinis effusione, qui in arteriam illaplus ægrum suffocat, vel lentè, quod post aliquot septimanas factum vidi, cum aliquid carunculae vulnere succrescit, quod ægrum tandem suffocat.

Vlcera, quæ internam asperæ arteriæ partem occupant, difficilia quidem curatu sunt, ob partium firum & naturam, cui difficulter & non omnis generis medicamenta applicari possunt. Plerumque tamen sanantur, modò non sint profunda, & cartilagine exedantur & putrilago accedat.

Curatio.

Vulnere asperæ arteriæ curationem quod attinet, cutis labia distantia coniungenda, & deinde emplastris convenientibus extrà adhibitis vulnus, ut moris, est, conglutinandum. In ore verò, ut & intus conglutinatio iuuetur, continuè aliquid medicamenti detinendum, quod liquatum sensim per viam asperæ arteriæ delabatur; id quod facilius fiet, si æger supinus iaceat, ut rosula diatragacanth. frigid. diacodium, & similia.

Vel *℞. Spec. diatragac. frigid. 3. j. gummi Arabici, boli Armena, an. 3. ℥. rad. consolida sub cineribus coctar. 3. i. syr. myrtin. q. s.*

Fiat Electuarium.

Vel *℞. Conseru. rosar. rubr. rad. consolida maioris, an. 3. i. boli Armena, Spec. diatragacanth. frigid. gumm. Arabici, an. 3. ℥. syr. de rosis siccis q. s.*

F. Electuarium.

Potest etiam exhiberi loch sanum & expertum.

Æger verò non multum loquatur, & omnia, quæ tussim excitare possunt, præcaueat.

Vlcera quoque curantur detergentibus, siccantibus, id, quod amissum est, regenerantibus, & cicatricem inducentibus. Detergunt *mulsa, mel rosatum* & cum aqua *bordei*. Siccant & glutinant *bolus Armena, thus, myrrha, radix aristolochia* puluerisata, & cum melle in formam eclegmatis redacta. Et si ab humoribus acerbis & falsis vehementer detergentibus vlcera eiusmodi ortum habeant, lac commodissimum est, cuius solius usu humorum acrimonia temperatur, sordes detergentur, ac, quod deest, restituitur: inprimis si lac debito modo præparetur, & eas, quas debet, conditiones habeat, de quo vide Galenum, 5. meth. med. cap. 12.

## Q V Æ S T I O

An Vlcera aspera arteria sint sanabilia.

Galenus equidem, 5. meth. med. cap. 12. ubi ex professo de curatione vlcum asperæ arteriæ tractat, & propterea hæc de re videri potest, scribit, se non paucos eorum, qui hoc morbo laborarunt, curasse, quod & Aëtius, 1. et 2. serm. 4. cap. 64. se factitalle testatur. Marcellus Donatus tamen, de historia medica mirabili, lib. 3. cap. 1. recenset historiam cuiusdam, qui omni diligentia à Medicis adhibita nihilominus hoc morbo perierit. Et omnino non simpliciter affirmandum, esse sanabilia hæc vlcera, ut etiam de vulneribus dictum. Et enim cum sanies non nisi tussi reici possit, facile fit, ut isto conatu partes vlcerae lacerentur. Quibus accedit & hoc, quod aspera arteria non carnosâ est, cuiusmodi partium vlcera & vulnera facile sanantur, sed dura & cartilaginosa. Præterea cum membra vlcera siccatione indigeant, etiam hac de causâ asperæ arteriæ vlcera difficiliter sanantur, cum continuè humiditas quædam, præcipuè è vicinis consillis, destillet; & inprimis, cum aspera arteria naturâ suâ sicca sit, & vehementius siccare postulet.

Vlcera aspera arteria non sunt sanabilia.

Et omnino ista rationi consentanea sunt. Quapropter statuendum, ut & Auicennas, 3. can. fen. 10. et 4. cap. 18. docet, si vlcus in principio sit, & saltem externam superficiem asperæ arteriæ occupet, sanabile esse: si verò vlcus penetrauerit, & ipsas cartilagine asperæ arteriæ eroderit, tale vlcus vel planè insanabile esse, vel omnino difficulter curari.

## C A P V T II.

De Pulmonis Intemperie.

Aspera arteria in ipsum pulmonem tendit & infertur. Ideoque proximum est, ut de eius Morbis dicamus. Quæ autem naturalis sit constitutio Pulmonis, ex Anatomicis petatur. A quâ cum deflectit, varios morbos patitur. Inter eos sunt primò morbi Intemperiei, cum pulmo vel nimis calefit, vel refrigeratur, vel humectatur, vel siccatur; & quidem nunc sine materia, nunc cum materia.

Pulmonis intemperiei.

Causæ.

Morbum intemperiei sine materia inducunt causæ simili qualitate præditæ, inprimis aër, quem spiritu ducimus, quique ad pulmonem parùm alteratus defertur, præcipuè in iis, quibus columella deest. Quamcunque enim qualitatem aër habet, eam pulmoni imprimit. Hinc qui tempore hyberno per loca niuosa, aut ventis frigidis exposita iter faciunt, iis pulmones refrigerantur. Idem interdum euenit à potionibus nimis frigidis, inprimis quæ glacie refrigeratæ sunt, quatum portio aliqua, licet exigua, per asperam arteriam

Causæ.



arteriam in pulmones defluit. Pertinent & hæc, quæ torâ substantiâ pulmonibus aduersa sunt. Quamquam enim talia occultis qualitatibus præcipuè pulmonibus noceant: tamen & ipsæ sæpe vnâ qualitarum manifestarum excessus habent, quos & ipsos pulmonibus imprimere possunt. Extrâ quoque applicata thoraci medicamenta pulmonem alterare possunt. Itarefert Galenus, 10. meth. med. cap. 9. quod quidam imposito præcordiis refrigerante medicamento, difficultate respirandi laborauerit, alter verò tussierit. Afficiuntur etiâ & alterantur pulmones à vicinis quibusdam partibus, vt corde, hepate, liene. Hæ enim partes, si incalescant præter naturam, plerumque etiam pulmoni intemperiem illam communicant.

Intemperies autem cum materia fit, vbi ea in pulmone vel sensim, seu ob facultatis concoquentis seu expellentis imbecillitatem colligitur, vel aliunde confertim affluit. Inprimis autem à capite ad pulmonem materia transmittitur in catarrhis; sæpe à gutture & faucibus, quarum partium inflammatio nonnunquam in pulmonem conuertitur. Frequentissimè autem ab ipso hepate, imò per hepar à toto venoso genere, seu multo sanguine, seu vitiosis humoribus repleto transmittitur. Nonnunquam etiam à thorace materia, vt pus & sanies, pulmoni communicatur; quod interdum quoque; à membrana costas succingente, vt & à costarum musculis inflammatis, accidit. Nec extra culpam semper est vterus, à quo etiam sanguis ad thoracem conuertitur, teste Hippocrate: nisi quis malit à venoso genere, antequam ad vterum feratur, ad pulmonem mitti sanguinem.

### Signa Diagnostica.

Calida pulmonis intemperies cognoscitur ex causis, quæ præcesserunt, irâ nimia & diuturna vocis intentione, motu nimio, inspiratione aëris calidi, medicamentis & cibis nimis calidis, intemperie vicinorum viscerum calidâ, è rubore genarum, qui provenit à fumis calidis ascendētibus, siccitate linguæ & faucium, siti ingenti, quam potus non sedat, & frigidi aëris inspiratio, è magnitudine, celeritate & frequentia anhelitûs, vt & pulsû differentia simili, languore corporis, & quod æger causis, quæ calorem augendi vim habent, offenditur, inuatur ab iis, quæ refrigerant.

Frigida pulmonis intemperiei signa sunt causæ refrigerantes, quæ præcesserunt, inprimis mora in aëre frigido, & locis ventis borealibus expositis, inprimis si corpus, & præcipuè os, non muniatur aduersus hanc aëris iniuriam, potus frigidus, inprimis qui glacie refrigeratus est, aut antea frigore congelatus fuit. Respiratio est tarda, parua & rara, pulsusque similis, expiratio est frigidior. Æger frigidorum vsu offenditur; commodum ex calidis, præsertim aëre calidiore, percipit.

Signa pulmonis humidi petuntur à causis humectantibus, quæ præcesserunt, à vocis rauedine, anhelitu frequenti cum sibilo & stertore, sputo multo; & læsione ab humectantibus, & comodo ab exsiccantibus.

Sicca intemperies tandem cognoscitur, quod causæ exsiccantes præcesserunt, motus & vocis intentio diuturna & nimia. Morbo hoc inprimis aurifabri & Chymici, ac qui circa metalla occupantur, infestantur, à quorum valde exsiccantibus halitibus cum aëre, quem inspirant, attractis, pulmones exsiccantur. Morbo hoc affecti paulatim contabescunt, & si mortuorum pectus aperitur, nullum vlcus in pulmone apparet, sed pulmones veluti fumio exsiccati conspiciuntur. Respiratio est parua & frequens, sitis continua, sputum paucum. Exsiccantibus æger læditur, ex humectantibus emolumentum percipit.

Intemperies verò cum materia innotescit ex humorû

in corpore redundantium notis, quæ alibi, & quantum pulmones spectat, postea proponentur.

### Prognostica.

1. Intemperies sine materia, (siccâ exceptâ, quæ *Prognostica* plerumque incurabilis est) quàm quæ cum materia committitur, facilius curatur, nec suffocationis periculum coniunctum habet.

2. Periculosior verò est intemperies cum materia. Nam grauiora inde excitantur symptomata, atque ob visceris situm medicamenta difficilius eò penetrant, & maius & minus periculum coniunctum habet morbus pro virium robore & debilitate, & ipsius materiæ conditione, quæ coctionem vel facilius vel difficilius recipit, & facile vel difficulter excernitur.

3. Si pulmonis intemperiei catarrhus coniunctus sit, curari ea non potest, nisi catarrhus prius tollatur & sistatur.

### Indicationes.

Si simplex intemperies sit sine materia, indicat contraria alterantia; si cum materia, etiam ea, quæ materiam à pulmone reuellunt & euacuant. In frigidis tamen adhibendis cautè agendum, nec nimis frigida exhibenda, quorum vsu pulmo offenditur, ac tussis, inde & alia mala interdum excitantur.

Pulmo autem euacuatur commodissimè per tussim; cum per arterias per ipsam dispersas quæ in vnâ magnam tandem coeunt, materia rectissimè euacuatur. *Pulmo quomodo euacuatur.*

Licet autem per vrinam & aluum etiam aliquando, ista euacuation fiat; tamen hoc rarissimè accidit. Etsi verò tussis à materia conciteretur, expultrice excitatâ ad eiiciendum ea, quæ molesta sunt; ars tamen naturæ subsidio venit medicamentis, quæ bechica & tussim excitantia appellantur. Sunt autem ea, quæ facile per asperam arteriam in pulmonem destillant, & crassam & viscidam materiam incidunt atque extenuant, & ob acrimoniam aliquam, quâ prædita sunt, naturam ad tussim stimulant.

Medicamenta autem, quæ pulmoni adhibentur, vel interna sunt vel externa. Interna, quæ per os sumuntur, alia per asperæ arteriæ latera in pulmonem sensim destillant; alia verò statim in ventriculum descendunt, & per viscera reliqua ad pulmones transeunt. Priora ita sint comparata, & talia eligenda, quæ nec pulmonem offendunt, nec nimis liquida sunt, vt statim in ventriculum defluant, sed talia, quæ mediocrem crassitudinem habent, qualia sunt eclegmata siue lambilia: vel si sint duriora, talia tamen, vt in ore derenta sensim liquefcere & in pulmonem destillare possint. Posteriora, & quæ mox ad ventriculum perueniunt, quod attinet, cum circuitus viaque, per quàm ad pulmones talia medicamenta perueniunt, longus sit, & longæ ambages, medicamenta ea validiora sint, & maiore copia, & frequentius exhibeantur, vt, vbi ad pulmones perueniunt, vires adhuc morbo curando sufficientes obtineant.

Externa pectori applicantur extrâ, quod cum sit maxima ex parte osseum, vt validiora ea sint, oportet. Cauendum autem hic, ne refrigerantia, repellentia & adstringentia valida pectori applicemus. Nam & frigus pulmoni inimicum, & vitiosos humores talia medicamenta in pulmonem ab externis partibus compellunt.

### Curatio.

Calidum ergo pulmonem refrigerant medicamenta *Curatio.* ex violis, endiuia, papauere, hordeo, nymphaea, syrup. violar. decoct. hordei, loch. de psyllio. Extrâ inungatur thorax oleo violarum. Vel fiat epithema ex decocto lactucæ, violar. endiuia. *Pulmonis refrigerantia.*

Dieta.

Dieta medicamentis respondeat. Aër, quem spiritu trahimus, sit actu frigidus, qui nisi talis sit naturâ, arte comparatur, ut alibi dictum. Potus sit aqua hordei simplex, vel cum iulebo violarum. Ager à vino abstineat. Cibi quoque refrigerandi vim habeant, & condiantur endiuia, lactucâ. Vigiliis nimias æger vitet. Quies motui præferenda; cum motus calorem augeat; ut & silentium sermoni. Vitanda est ira & excandescencia.

Pulmones calidifacientia.

*Frigidam* verò pulmonis intemperiem corrigunt *hysopus, prassum, capillus Veneris, helenium, thymus, calamintha, ruffilago Nicotiana, radix ireos, crocus*, quem nonnulli pulmonis animam nominant, qui & ex ovo forbili vel cum aliis medicamentis sumi potest, & cum linimentis misceri. Et ex his parata *decocta & aqua, syrupi item capill. Vener. de hysopo, de glycyrrhiza, de prasso, de calamintha, species diatrageant. calid. diatreos Salomonis, diaprass. ut & suffitus aromaticum.*

Extra illinatur pectus oleo irino, amygdal. amarar. rutaceo, anethino.

Dieta.

Dieta medicamentis sit similis. Aër sit calidus, & nisi talis sit naturâ, ut antea comparatur. Potus sit vinum & mulsum. Cibus sit carnes animalium aromatibus conditæ. Vtilis est pulmonis & totius corporis exercitatio, quæ calorem viscerum excitat.

Pulmones siccantia.

*Humidam* pulmonum intemperiem corrigunt medicamenta calida modò enumerata. Habent enim eadem etiam vim siccandi, ut & decoctum ligni Guaiaci & cassiæ.

Extra pulmonem exsiccant aquæ salæ sulphureæ, bituminosæ, ut & sacculi milio ac sale pleni pectori impositi.

Dieta.

Aër sit siccus, vel suâ naturâ talis, qualis est maritimus & montanus, vel suffitu herbarum calidarum & siccarum modò enumeratarum, ut & aromaticum, & lignorum calidosum suaueolentium, ut & styracis, thuris, myrrhæ, benzoës, talis redditus. Suffitus etiam ad exsiccandum pulmonem ore excipi potest. Dieta medicamentis consentiat. Potus ergo sit vinum hysopo, marrubio, helenio, vel aromatibus conditum. Cibus etiam vim siccandi habeat, quales sunt aves montanæ. Vtilis est etiam corporis, ac imprimis pulmonis exercitatio, quæ sit multo sermone & locutione.

Pulmones humectantia.

*Siccis* pulmones humectant *cassia, glycyrrhiza, viola, jujuba, passula, amygdala dulces, sem. melonum.*

Extra conuenit aquæ dulcis tepidæ balneum & oleum amygdalarum dulcium. Inprimis verò ad siccitatem pulmonum corrigendam utilis est dieta.

Dieta.

Aër sit humidus naturâ, vel arte talis factus. Potus & ipse vim humectandi habeat, qualis est vinum album dulce, decoctum hordei, emulsio seminis melonum & amygdal. dulc. In cibis conueniunt oua forbilia, carnes hædinæ, vitulinæ, pullorum gallinaceorum, pisces saxatiles, castor, gammarum & cancrorum ac testudinum; lac inprimis recens. Vtilis est & somnus, quies, & animi tranquillitas.

## CAPVT III.

## De pulmonis Inflammatione siue Peripneumonia.

Post intemperies pulmonis de inflammatione eiusdem agere libet, ut intemperie cum materia. Etsi enim & magnitudo aucta accedere possit: ramen magis lædit intemperies. Vlous. verò, quod interdum accedit, ad solutionem continui pertinet, de qua infra.

*Περνευμονία* autem ἢ *πνευμονία*, Celso, l. 4. c. 7. morbus peripneumonicus, vulgo pulmonia, (est enim hic morbus ex eorum genere qui à parte affecta nomen acceperunt) est phlegmone pulmonum cum febre acuta, spirandi difficultate & tussi.

Morbus est primò intemperiei cum materia, quia sanguinis p. n. ad pulmonem affluxit; deinde in magnitudine aucta; quia est tumor parenchymatis pulmonum, quibus interdum & soluta vnitas accedit. Pars affecta est pulmo, interdum secundum vnum vel alterum lobum, interdum totus.

## Causa.

Oritur autem hic morbus ex sanguine, ut aliæ etiam etiam inflammationes omnes, vel toto, vel bilioso, vel pituitoso. Et plerumque, (interdum enim solam plethoram huius inflammationis causam, esse impossibile non est) ut etiam supra dictum, in talibus inflammationibus humores vitiosi in venis cumulati prima mali occasio sunt, quibus cum se naturâ exonerare cupit, simul eos cum sanguine ad partem aliquam corporis protrudit & deponit. Sanguis autem semper præualet, etsi motui primam occasionem alius humor præstare possit. Aliàs non esset inflammatio.

Infunditur autem sanguis in pulmonem è dextro cordis sinu per venam arteriosam. Nonnunquam aliis morbis succedit peripneumonia, ut angina, pleuritide, dum è faucibus & lateribus humor *ignis ut dicitur* repente in pulmones irruit. Etsi enim à pleura ad pulmonem nullus sit vasorum ductus: tamen quia pulmones cum pleura communem membranam habent, quæ omnes thoraci partes inuestit, per eam malum hoc vicinis partibus & pulmoni communicari potest, de quo postea, de *Pleuritide*, dicetur. Accidere tamen etiam potest, ut humores ad fauces aut pleuram ruentes in venas recurrant, quos cum natura iterum aduersus thoracem pellere conatur, eos per venam arteriosam in pulmones trudit, unde tum pleuritis in peripneumoniam degenerat, causâ antecedente, quæ pleuritidem auctura erat, ad pulmones conuersâ. Potest enim: ut Galenus, 7. aph. 11. docet, pleuritis in peripneumoniam mutari & degenerare, potest & pleuritide peripneumonia superuenire.

Degeneratio fit, cum priore cessante morbo alter succedit; superuenit verò, cum priori permanente alter accedit.

Sanguinis in pulmonem effusi pars aliqua in arteriæ asperæ ramos impulsa ichore primùm, hinc cryore sputum imbuat, tandem muratus & coctus per tussim copiosius eiicitur, illasâ pulmonum substantia. Hæc enim si lædatur, phthisis succedit.

Causæ autem, quæ faciunt, ut materia ad pulmones fluat, ferè omnes sunt, quas postea in pleuritide recensebimus, vehemens scilicet exercitatio post quierem longam & corpore repleto, clamor & vocis intentio nimia. Ira etiam sanguinem commouere potest, ut ad pulmonem confluat. De quo Hippocrates, 6. epid. com. 5. r. 9. *Præceptis atque acerba iracundia cor & pulmonem in sese, & ad caput calorem & humorem trahit.*

Aër frigidus & aquilonius, australem præcipue sequens; aër enim frigidus pulmoni est inimicus, qui facilius pectus afficit, si ab aère tepido partes thoracis laxatæ sunt. Facit huc & aquarum lacustrum & stagnantium vsus tempore hyberno: unde Hippocrates, de aère, aquis & loc. scribit, in regionibus lacustribus & paludosis frequenter observari pulmonias. Hyeme scilicet. Aqua enim eiusmodi non glaciata potius inferioribus partibus nocet, atque ipse Hippocrates per æstatem alui profluvia, intestinorum difficultates, lienes magnos, hydropem adesse scribit; de aqua viglaciata scribit 5. aph. 24. *Frigida, veluti nix & glacies pectori inimica, tussis mouent, venarum ruptiones & destillationem efficiunt.* Cum enim tales aquæ non defluant, sed aquæ pluuiæ noua semper inferatur, tempore æstiuo, cum Sol easurit, corrumpuntur, hyeme verò glaciuntur, & frigida ob niuem & glaciem euadunt.

Pertinent huc & medicamenta venenata, & præcipue

cipue lepus marinus, qui peculiari vi pulmones exulcerare, & hinc inflammationem eius excitare solet. Nonnunquam & in constitutionibus epidemiis talis est humorum malignitas, quæ peculiariter pulmones lacerare apta nata est. Hinc observata sunt epidemice peripneumonice quibusdā annis sine solæ, sine cum pleuritide coniunctæ, in quibus tempestive, id est, primo, secundo, aut tertio detractus sanguis profuit, quarto aut quinto die nihil iuvit, agro septimo vel octavo die extincto; qualis fuit ea, quæ anno 1564. & 1565. inferioris Germaniæ & Rheni accolæ inuasit. Vide Dodoneum, in observat.

Rarius ad catarrhum & asthma sequitur peripneumonia. Northam tamen seu spuriam quandam esse volunt, quando tenuis & acris destillatio è cerebro confertim in pulmones illapsa, ardore p. n. accenso febrem cum tussi & spirandi difficultate infert, quæ & sensim æger conficitur sine ulcere & cruoris expuitione. A pituita tamen è capite in pulmonem delapsa in pulmone putrescente facilius lædi, & tussi superueniente pulmo concuti potest, ut sanguinem inflammationis causam attrahat unde vera peripneumonia generatur: & tum catarrhus peripneumonice occasio potius est, quàm causa.

Causa verò proxima inflammationis pulmonis est calor putrescentis pituitæ, ob quem attrahitur sanguis copiosior, & antea calidus facile incalescit.

Magna autem est inter peripneumoniam & pleuritidem cognatio, imò sæpissime coniunguntur. Differunt verò præcipue loco affecto. Galenus equidem, 4. de caus. puls. cap. 12. respiciens ad diversitatem compositionis vel structuræ partium pulmonis & pleuræ, inter peripneumoniam & pleuritidem sic discernit, quod pleuritis à tenui & bilioso, peripneumonia verò à pituitoso & crassiore sanguine ortum habeat; cum tenuis & biliosus sanguis in rara & laxa pulmonum substantia non adhærescat. Sed commodissimum erit saltem loco affecto hos duos morbos distinguere, ita ut, si soli pulmones afficiantur & pleura non sit affecta, peripneumonia; pleuritis verò excitetur, cum pleura vel sola, vel cum pulmonibus inflammatur. Causam communem esse posse, & humorem, qui producit pleuritidem, peripneumoniam quoque gignere posse, & contrà, vel ex eo patet, quod angina & pleuritis sæpe in peripneumoniam mutantur; & cum pleurâ plerumque pulmones simul afficiuntur. Et sanguis etiam si biliosus, nihilominus in substantia pulmonis p. n. è effusus hæere potest. Quatuor enim laxa & mollis sit pulmonis substantia; talis tamen est, ut non minus tenues in ea humores, quàm in spongia aqua, contineri possint. Imò maiorem quantitatem tenuis humoris recipere posse videtur pulmo, quàm crassi. Crassa n. poros citò oblinunt seu obstruunt; tenuiora verò penitus sese insinuant. Neque ipse Galenus alibi id negat, ubi phlegmonem hanc ἐρυσίπτελιν esse statuit.

#### Differentia.

Differentia.

Dantur etiam aliquæ peripneumonice differentie. Prima est à parte affectâ. Afficitur enim vel totus pulmo vel eius pars, & quidem dextra vel sinistra. Secunda à causis. Sanguis enim, qui inflammationem pulmonis excitat, vel purus est, vel biliosus. Unde Hippocrates, lib. de intern. affection. etiam erysipelate pulmonem affici posse scribit. Verum Hippocrates non solum eam, quæ à bile multa admixta sit, inflammationem erysipelas hinc appellat, sed & illam, quæ à sanguine; quæ verò à pituita, bile, & sanguine permixtis, inflammationem, ut videre est, lib. 2. de morb. ubi de erysipelate pulmonis inquit, quod sanguis plurimus è venis magnis trahitur; & lib. de intern. affect. hunc tumorem potissimum è sanguine oriri scribit.

Dan. Sennerii Tom. II.

Contrà de inflammatione pulmonis, lib. 1. de morb. inquit, hanc fieri, cum pulmo commotam & humectatam pituitam & bilem ad se traxerit, & in lib. de intern. affection. pulmonis inflammationem fieri, cum ad sese pulmo aut sanguinem aut pituitam saltem traxerit; & paulo post morbum hunc ex pituita suam originem habere asserit.

Verum forsitan Hippocrates illam differentiam hic intelligit, quæ ex causa & generationis modo diverso provenit, cuius etiam supra facta est mentio. Aliquando enim causa inflammationis è venis magnis, id est, è vena arteriosa, è dextro ventriculo cordis affluit: qui sanguis cum sit calidior, inflammationem erysipelati similem excitat; aliquando verò pituita è capite defluens inflammationi huic occasionem præbet. Hanc enim ubi pulmo, naturâ suâ rarus, imbibit, atque ea calorem concipit, inflammatio excitatur. Aliquando verò sanguis est pituitosus, & melancholicus. Tertia à modo invadendi. Accidit enim peripneumonia vel per se, & à principio, nullo alio morbo præcedente, vel aliis affectionibus, ut anginæ & pleuritidi, superuenit.

#### Signa Diagnostica.

Esti peripneumonia plurima signa cum pleuritide habeat communia, quibusdam tamen distinguitur. Difficultas enim spirandi maior est, quàm in pleuritide, & cum periculo suffocationis, ut æger erectus spiritum ducere cogatur. Esti enim ægri in supino decubitu libenter permanerent, ut virium debilitati convenientiori: tamen ad erectum corporis situm ipsos cogit respirationis difficultas & angustia. Hoc autem situ thorax facilius dilatur, quippe qui decumbentibus in sese concidit, è quo pectoris partes ad spinam declinant, quæ erectâ thorax etiam simul fertur, non amplius seipsum grauens, ut Galenus, 4. de loc. affect. cap. 7. docet. Interdum nec bibere nec loqui commodè possunt, ob respirationis angustiam. Nam maior refrigerandi cordis necessitas urget, cum inflammatio sit cordi vicina, quàm in pleuritide, ut pulmo inflammatus humore plenus, esti plurimum distendatur, aerem, ut opus, excipere non possit. Itaque æger erectâ ceruice & confertim respirat, crebra anhelatione vexatur, intumescit, nates expandit, non secus ac equus post cursum, & linguam crebro exserit, pectus ei sonum edere videtur, & gravitas inesse, quam pectus capere nequit. Hippocrates, lib. 3. de morb. Difficilem hanc peripneumonice respirationem sublimem vocat Hippocrates, 3. epid. sect. 2. agr. 7. scribens; in ea summum moveri thoracem ad aperta scoptula vsque. Et quidem principio peripneumonice præsertim biliosæ, respiratio est frequens & magna, quæ tamen brevis, ob virium debilitatem, & instrumenta spirandi affecta in præuritatem mutatur, & frequentia augetur. Suspiratio est calida, & ubi plurimum efflant, alleviationem sentiunt, & multum aerem frigidum attrahere cupiunt. Cordis enim calor temperatur non solum refrigeratione, quam præstat aer inspiratus, sed etiam expulsionem fuliginum, quæ expiratione perficitur; quæ fulgines cum in peripneumonia ob magnum incendium, copiosissime colliguntur, ad earum subitam expulsionem vehementem expirationem æger molitur, ac sæpe tam magnam, ut exsufflationis nomen mereatur.

Pectoris angustia adest cum dolore, dolorque non est pungens, sed gravatius, spinam attingens, ubi membrana pleuram ambientes sustentantur, isque dolor remissior est, nisi membrana simul inflammata fuerit. Nam deprehensum est in dissectis peripneumonia mortuis, sæpe membranam pulmones ambientem simul inflammari, & aliquoties, ut dictum, simul cum pulmone pleuram quoque inflammatione

torreri; ubi dolor acutior & punctorius est; ubi verò ipsæ membranæ primariò non afficiuntur, sed visceribus, quæ ambiunt, inflammatis extenduntur, dolor tantum grauis excitatur.

Febris acuta est, & quidem acutior, quàm in pleuritide, ob cordis vicinitatem. Adest etiam anxietas & iactatio, ut Hippocrates, lib. 3. de morbis, habet, ægrique situm & figuram decubitus sæpe mutant; quod fit ob febris vehementiam, summam respirandi difficultatem, & virium debilitatem. Ob summam enim respirandi difficultatem & angustiam ægri sese frequenter erigunt, & sedere conantur, ex corporis hac erectione aliquam alleuiationem sperantes, ob virium tamen imbecillitatem erecti diu sedere non possunt, ideòque situm iterum mutare coguntur. Pulsus est magnus, ob vehementem arteriæ percussione, & vsum urgentem; languidus tamen, ob virtutis imbecillitatem.

Facies rubet ob vapores calidos ad caput exhalantes, & sanguinem simul secum rapientes, malæ inprimis, ubi cutis est tenuior, & propterea sanguinis color ibi euidentius efflorescit. Eadem de causa oculi & venæ temporum tument, lingua flaua est, vel lentore multo obducta, tandemque nigrescit, sæpe accidunt deliria, sitis magna adest, & potus frigidi, inprimis verò aeris frigidi appetentia, ob linguæ & faucium à calidis vaporibus ex inflammato pulmone exhalantibus inductam siccitatem, quæ ori ventriculi ob communem tunicam communicatur: vnde pulmones etiam membrum sicutulosum appellantur.

Signa differentiarum quod attinet, ac primò ratione subiecti, quia intersepimento quodam pulmo in partem dextram & sinistram diuiditur, propterea hæc vel illa afficitur, ita dolor & grauitas in dextro vel sinistro latere magis percipitur. Si verò vtrique pars sit inflammata, in toto pectore is dolor sentitur. Idem quoque ex altera clauicula vel hypochondrio condolente æstimari potest. De qua re videatur Hippocrates, in Coacis, text. 400. in codice Fœsij, vel, comm. 1. in lib. 5. sect. 2. aph. 47. in Hollerio: In pulmonis inflammationibus, si lingua tota fiat alba & aspera, vtrique pulmonis partes inflammatione laborant: quibus verò dimidia lingua, qua parte id apparet, inflammatio affligit. Et quibus quidem ad unam clauiculam dolor subit, in una superior pulmonis ala laborat; quibus verò ad ambas clauiculas dolor extenditur, amba superiores pulmonis ala laborant; quibus ad mediam costam, media; quibus verò ad septum transversum, inferior; quibus verò una tota pars laborat, qua ei parui respondent, omnia agrotant. Si quidem igitur suspensa vtriusque pulmonis partes aorta dicta tanta inflammatione detineantur, ut ad latus adhereant, illa corporis parte resolutionem patiuntur, qua morbo respondet, & ad costam foris liuores sunt, quos veteres Brachia ictos vel sideratos vocabant. Quod si tanta non est inflammatio, ut adhereant, dolor quidem totum occupat, neque tamen resolutionem sentiunt, neque liuores habent. Quibus verò totus pulmo una cum corde inflammatur, ut prociat in latus, resoluitur totus ager, iacet frigidus & sine sensu. Moritur autem secundo aut tertio die. Hæc Hippocrates.

Resolutionem autem seu paralyfin, quæ ex pulmonis inflammatione fit, quod attinet, triplicem eius causam reddit Desid. Iacotius, in comment.

Paralyfis in inflammatione pulmonis.

Prima est, quia primi intercostales recipiunt à pulmone noxam & tumore premuntur. Quoniam autem ab illis ad brachia derinantur nervi, ideò fit, ut eiusdem lateris brachium sensu & motu penè destituitur. Deinde, quia musculorum thoracem mouentium calor internus resoluitur, & facultas motrix labefactatur, cuius defectus resolutio est. Postremò quia extincto calore cordis, aut suffocato, morte repentina, citra syncope tamen, veluti attoniti, affecti moriuntur, depegata subitò vi mouendi. Verùm commodissimum est, statuere, fieri hoc ob consensum spinalis medullæ

& arteriarum intercostalium. Etenim si pulmones tanta inflammatione laborent, ut sanguis etiam in arteriam magnam copiosè irruat, ita ut etiam arteriæ intercostales repleantur & tumeant, & hinc etiam ramuli illi, qui per foramina vertebrarum thoracis in spinam penetrant, sit inde, ut & nervi à spinali medulla ibi progredientes comprimantur, atque ita paralyfis partium, in quibus nervi illi resoluuntur, excitetur.

Tussis molesta est, ob pulmonem primò affectum, cum qua spurum redditur sanie primò tenuiore, mox cruore, alias alio colore tinctum, nonnunquam spumofum. Et ipsum spurum, & hinc sequens stertor quasi quidam, peripneumoniam à similibus affectionibus discernit. Cuius rei exemplum est apud Hippocratem, lib. 5. epid. Larissa, inquit, Hippothesenes pulmonis inflammatione Medicis detineri falso tamen, videbatur. Principio quidem lucta se exercens, duro in loco supinus cecidit, superincidente ei aduersario, & lanis frigida, cenam sumpsit, & grauior sibi videbatur. Postridie verò febris & tussis siccior, ac spiratio crebra tenuis. Quinto autem die cruentum paucum creauit, & delirare cepit. Cum tussis urgeret, tum dolor pectus & dorsum infestabat. Sexto postquam sternutasset, sanguis ex naribus effluxit ad quatuor ferè beminas. Sub vespere neque loquebatur, neque quid fieret, aut quid diceretur, sentiebat. Undecimo mortuus est. Quinque autem diebus quandoque bene sentiebat, quandoque verò minimè, febre liber erat. Spurum verò nullum excernebatur, neque stertor detinuit, quoniam spurum non aderat.

Signa differentiarum ratione causæ quod attinet, patientia ex notis humorum in corpore redundantium, Signa differentiarum. An autem per venas sanguis affluerit, an verò catarrhus malo occasionem præbuerit, etiam facile patet. An suppressa aliqua euacuatio vel lochia retenta mali causa sint, etiam latere non potest. Et quæ purgationes in puerperio retentas sequantur symptomata, docet Hippocrates, de morb. mulier. lib. 1.

Diuersitatem a humorum, inflammationem excitantium, ex sputi colore & substantia cognoscimus; aut, si æger non exspuat, ex aliis humorum signis.

### Prognostica.

1. Peripneumonia vehemens & acutum malum est, quod plus periculi, quam doloris habet, ut Celsus, lib. 4. cap. 7. ait, paucique eâ correpti euadunt. Prognostica.
2. Estque peripneumonia periculosior, quàm pleuritis; quia pulmo præstantius viscus est, cordique vicinior, & soluta continuitas in hoc non facile coalescit.
3. Cum vna salus pleuriticorum & peripneumonicorum consistat in virium robore, teste Galeno, 3. prothet. aph. 4. & 10. meth. med. cap. 5. si magna adsit virium debilitas, valde periculosa peripneumonia est.
4. Periculosior est peripneumonia, in qua nihil exspuitur. Arguitur enim humoris contumacia & naturæ infirmitas, 3. epid. comm. 1. aph. 4. ac in ipsa peripneumonia, aut & pleuritide, sæpe plus iuuat, facile & copiosè exspuere, quam ipsa coctio, ac plerique ex defectu exspuitionis moriuntur.
5. Screatione flaua, & multum permista sanguine, si in peripneumonia inter initia excernatur, salutis indicium est; si septimo die tardius, minus securè, Hippocrates, 2. prognost. aph. 50. Nam in longius tempus morbus protrahitur. Interim verò multa ægro aduersa accidere, atque inprimis vires deici possunt. Quo quidem aphorismo non probatur spurum, vel quatenus flauum, vel rubrum est. Scretio n. flaua sincera improbat, 2. progn. 46. & rubra tanquam cruda improbat, à Galeno, 1. aph. 12. sed quatenus ex flauo & rubro mixtum conspicitur. Tunc enim aliquod coctionis signum exhibet, quæ statim primis, tertio scilicet vel quarto, diebus appareat, morbum non ultra diem centesimum duraturum significat.



6. Sputum quodcumque dolorem non tollit, malum; quod verò soluit bonum Hippocrates, in *Coacis*.

7. Si lingua initio nigrescat, celeriores sunt liberationes postea verò tardiores. Hippocrates, *lib. de dieb. indicatoriis*.

8. In pulmonis inflammatione quibus circa initium urinae crassae sunt, deinde ante quartum diem tenues euadunt, mors impendit. Hippocrates in *Coacis*.

9. Sudores circa ceruicem & caput oborti mali sunt, nisi urinae multae & crassae proruperint, & sputa cocta prodierint. Hi enim sudores mali sunt ex suffocatione, impetu & violentia. Hippocrates, *de ratione videndi in acutis*.

10. Iudicatur autem peripneumonia breuissimè in septem aut nouem diebus, longissimè octodecim vel viginti diebus. Vbi æger vigesimum diem transgreditur, non moritur peripneumonia, sed ruffit & pus exspuit & pectus dolet. Empyicus enim fit, nisi in diebus criticis pulmo expurgeretur. Hippocrates, 2. & 3. *de morbis*, & in *libro de internis affectionibus*. Et si enim, ut *prognost.* 2. dictum, peripneumonia periculosior morbus est, quàm pleuritis, & pauci ex ea euadunt, ac propterea etiam, vbi lethalis est, citius interimit, quàm pleuritis: tamen quæ mitior est, & salutis spem præbet, longiore indiget tempore, ut integrè iudicetur. Nam ut ex iis, quæ Galenus, 7. *aph.* 3. 1. tradit, colligi potest, in morbis pulmonis periculosis morituri breui moriuntur, qui verò euadunt, non nisi longiore tempore euadunt.

11. Si lethalis futura sit peripneumonia, vigilia adest continua, aut somnus levis, à quo delirium, ægerque morbi vehementiam non sentit, frigent extrema, vngues liuidi curuantur; hi quarto, aut ad summum septimo die moriuntur. Aetius, *tetrabib.* 2. *serm.* 4. c. 66. Si verò ad salutem permutetur, sanguinis è naribus fluxus fit, aut alia perturbatio, biliosis multis exeuntibus cum signis coctionis & in die critico. Vide infra *quest.* 1.

12. Si inflammatio in pus conuertitur, si per urinam & aluum excernitur, liberantur ægri. Per quam autem viam id fiat, dicitur, *de pleuritide*. Si autem in pulmones irruat, aut suffocantur ægri, aut ad ralem deducuntur. Aetius, *loco allegato*.

13. Pleuritide & peripneumonia detento diarrhæa superueniente, malum, 6. *aph.* 16. quod tamè solum verum est, cum non ab ingestis ea oritur, sed ob magnitudinem morbi etiam ventriculus & hepar afficiuntur, ut ventriculus nec cibum concoquere, nec hepar chylum attrahere possit. Aliàs & in mitiore peripneumonia bonum indicium est diarrhæa, cum coctionis signis antecedentibus criticæ euacuationis loco sit. Itaque tutior & utilior tum est diarrhæa, quæ fit in morbi principio, quàm quæ fit in fine vel statu. Illa enim causam antecedentem utiliter tollit; hæc verò nec antecedentem, nec coniunctam; sed vires potius prostermit.

14. Quibus ex angina in peripneumonia fit mali conversio, intra septem dies moriuntur; sin hos effugiunt, purulenti euadunt, 5. *aph.* 10. Membrum enim nobili ac principi inseruiens ac vicinum materiam vitiosam talem tolerare diu non potest, sed id efficit, ut morbus citò vel ad bonum, vel ad malum terminetur.

15. Qui empyi fiunt ex peripneumonia, si natu maiores sint, id est, inter senes & ætate virilis mediæ, potius intereunt, quàm natu minores; cum expultrix facultas in iis languida sit, ut pus reici sat nequeat, quo retento & pulmonem exedente, frustra curatio instituitur, 2. *prognost.* 69.

16. A pleuritide peripneumonia, malum, 7. *aph.* 1. 1. quoniam translatio fit ab exterioribus ad interiora, & à minus nobilibus ad nobiliora, cordique propiora. Sed cum, in *Coacis*, contra scribatur, peripneumonia, quæ post pleuritidem fit, mitiorem esse; sciendum ex Galeno in *comm.* 7. *aph.* 1. 1. aliud esse, morbum alium in alium transmutari; aliud verò, morbo morbum superuenire.

Nam transmutatio vnius morbi in alium fit; quando priore cessante alius aduenit; superuenit verò morbus alii, quando altero manente alter superuenit. Ideoque cum ut Galenus explicat, *loco alleg.* loquatur de peripneumonia superueniente pleuritidi, omnino ea periculosa est. Arguit enim humoris excitantis pleuritidem tantam copiam, ut in pleura affecta totus contineri non possit, sed in pulmonem redundet. Si pleuritis in peripneumonia ita mutetur, ut nullum pleuritidis signum remaneat, paucitas omnino humoris indicatur, quæ etiam peripneumonia aded periculosa excitare non potest.

17. Contra à peripneumonia pleuritis bonum, quia ex morbo periculoso minus periculosus excitatur, quamuis id raro accidat, ut Galenus, 7. *aph.* 1. 1. docet.

18. A peripneumonia phrenitis, malum, 7. *aph.* 1. 2. Facta enim materiae calidæ à pulmonibus ad caput translatione, si ad interiora capitis feratur, phrenitidem excitat, quæ periculosa est. Aliàs etiam ad peripneumonia delirium sequi solet, non cum tanto periculo calidis vaporibus ad caput ascendentibus, & cum spiritibus mixtis.

19. Quibus urina in peripneumonia crassa & cocta apparet, circa quartum verò attenuatur, lethale est. Hippocrates, in *Coac.*

20. Quibus in peripneumonia abscessus fiunt, ad aures, aut ad sedes thoracis inferiores, & in longum exeunt, seu in fistulam abeunt, ut materia euacuari queat, item abscessus ad crura omnes utiles sunt: optimi verò sunt, qui fiunt signis coctionis in sputo apparentibus. Criticæ enim expulsionis huiusmodi abscessus soboles sunt. Hippocrates, & Galenus, 2. *progn.* *aph.* 6. 4. 65. & in *Coac.*

21. Grauedines & sternutamenta per omnes morbos, qui in pulmone sunt, præuenire & superuenire, malum est. Hippocrates, 2. *progn.* 49. Et si enim, ut Galenus, in *comment.* docet, per se grauedines peripneumonice non efficiunt, cum humor inde ad pulmonem non descendat: per accidens tamen dupliciter malæ sunt, ut signum scilicet, & ut causa. Ut signum; quia monstrant aded magnam esse pulmonum affectionem, ut capiti etiam communicetur, idque repleat; ut causa, quia sternutatio, quæ grauedinem comitatur, thoracem concutit, pulmonemque inflammare lædit.

22. Peripneumonia, ut ex dictis patet, quinque modis finitur. 1. Coctione & sputi excreatione; qui modus tutissimus est. 2. Crisi, quæ deriuatio & euacuatio fit materiae per hæmorrhagiam natum, fluxum mensium, hæmorrhoides, sudores, aluum, urinam. 3. Abscessu post aures, vel in cruribus. 4. Suppuratione, ex qua empyema fit, aut phthisis. Et quidem post suppurationem rupto apostemate duo modi ad salutem, duo ad mortem tendunt. Si nimirum pus per sputum vel urinam, vel aluum excernatur, æger conualefcit; ad mortem fertur suppuratio, si propter copiam puris æger vel suffocetur, vel phthisis exulcerato pulmone sequatur. 5. Morte, ægro per sputi suppressionem strangulato. Nam vbi spirandi difficultas adest magna, ut ægri ferè suffocari videantur, febrisque est vehemens, & sputi nihil vel parum reicitur, virisque sunt debiles, lethalis morbus est.

#### Indicationes & Curatio.

Cum peripneumonia sit inflammatio, etiam aliarum inflammationum modo indicat, ut materia, quæ ad pulmonem fertur, auertatur, quæ affluxit euacuetur, ut postea de pleuritide pluribus dicitur. Est enim eadem ferè peripneumonia, quæ pleuritidis, curandæ ratio.

Curatio autem peripneumoniae omnino maturanda est, ob summum periculum, & in id omni studio

incumbendum, vt materia resoluatur & discutatur, ac materiae suppuratio praecaveatur. Aut si id fieri nequeat, vt sputum & pus quam citissime educantur, ne pulmonem corrumpant.

Itaque si vires & alia permittant, vena basilica eiusdem lateris, in qua inflammatio percipitur, aut vtriusque, si pulmo secundum vtramque partem inflammatus sit, aperiatur. Sanguinis enim missione venis exinanitis sanguis non solum affluens ad vacuum implendum introcedit, sed etiam ille, qui iam in parte affecta est, succedit. Euacuetur autem sanguis ea copia, quam sanguinis plenitudo indicat ac vires permittunt, & liberalius quidem, ob subitum, quod morbus minatur periculum. Vires tamen nullo modo liberaliore sanguinis missione deiciendae sunt; cum in hoc praecipue morbo, ob maximam respirationis angustiam, ex virium debilitate non mediocriter periculum imminet. Praestat potius, si vires id ferunt, venae sectionem in altero brachio repetere. Et si peripneumonia sit sanguinea, copiosius sanguis educatur; si biliosa, parcius; si pituitosa, adhuc parcius.

Si vero peripneumonia alteri morbo, qui iam aliquandiu duravit, succedat, & vena iam antea aegre aperta sit, videndum, quid vires ferant. Si enim vires ferunt, sanguis moderate adhuc euacuari potest. Si vero metuendum sit, ne venae sectione vires deiciantur, brachiis, & thoraci cucurbitulas scarificatas applicare licebit, quae a profundo thoracis ad cutem & partes externas sanguinem trahunt.

Primo tamen brachiorum musculis adhiberi cucurbitulas utile est, vt aliquo modo sanguis euacuetur & a pulmonibus auertatur, postea & scapulis vel pectori, si id carnosum sit. Etsi enim locus vicinus esse videatur: tamen a pulmonibus aliquatenus distat, & ab interioribus ad exteriora trahitur. Et cum adhibentur cucurbitulae, tum vel antea venae sectionem praemissa est, vel vires ob debilitatem venae sectionem non ferunt. Ideoque non tanta plethora tum adesse potest, ob quam attractio ad partem affectam metuenda sit. Quem in finem & ligaturae, frictiones ac cucurbitulae sine scarificatione extremis adhibendae.

In eundem etiam finem & clysteres infundere decet, & medicamentis aluum mouentibus primis diebus & materiae impetum a pectore auertere, & humores vitiosos, si turgeant, ac in corpore abundant, euacuare. Cauendum tamen, ne fortioribus medicamentis humores nimium agitentur, febris incendatur, viresque deiciantur: sed sufficiunt mitiora, quae alias pectori amica sunt, vt syrupus rosarum solut. violar. de cassia cum manna, diaprun. simplex, quibus tamen rhabarbar. agarie. & similia benigniora purgantia adde licet.

Vt ℞. Decocti pectoral. Vnc. iii. In iis dissolue manna Vnc. i. vel Vnc. i. ss.

Colat. adde syrup. rosar. sol. Drach. vi. M.

His peractis omni studio laborandum, vt materia per sputum a pectore eiiciatur, quod iis medicamentis sit, quae postea de pleuritide proponuntur. Valentiora tamen illa sint hic, & eorum vsus frequentior. Vt illa hic sunt, carica cum hyssopo cocta, hydromeli, in quo hyssopus, scabiosa, pulmonaria, salvia, radix iridis & similia sint cocta, item oxymel. Pro humoris tamen peccantis ratione delectu quodam medicamento opus est. Si enim materia sit calidior, vsurpentur viola, iuiuba, sem. 4. frigid. maior. hordei, rad. altheae, syrupus violar. iuiubinus. In frigidiore materia conueniunt aqua malsa, hyssopus, capillus Vris, origanum, Oxymel in vtraque causa hic locum habet:

℞. Rad. glycyrrhiz. Vnc. ss. capill. Vris, hyssop. an. M. ss. scabios. flor. papau. errat. an. p. ii. iuiubar. sebesten. an. N. 10. ficus N. iv. sem. maln. melon. an. Drach. ii. passular. Vnc. i.

Coqu. in aqu. suffic. Colat. dulcoretur sacchar. cand. Vel ℞. Sem. card. Maria Drach. ii. sem. 4. frigid. maior. excori. Vnc. ss. pinear. mundatar. amygdal. dulc. excori. an. 3. iii. aqu. scabios. capill. Vris endiu. papau. erratic. an. Vnc. iii.

F. Emulsio, quae dulcoretur. saccharo cando, vel in lebo violarum,

Vel ℞. Spec. diatrag. frigid. Drach. ii. diatr. simpl. Drach. ss. sacchar. penid. 3. ss.

Cum syrup. papau. errat. & violar. F. Loch.

Si validioribus expectorantibus & incidetibus opus sit, quando scilicet sputum crudeum & tenax est, oxymelite, loch de caulibus, tussilagine, prassio vti licet.

Topica quoque eadem ferè, quae in pleuritide, conueniunt, quae scilicet feruorem pectoris ac pulmonis nonnihil lenire ac mollire & digerere ac discutere possunt, sed omnia calide applicata. Fortiora tamen hic requiruntur, & quae ad interiora penetrant. Eam ad rem etiam forma medicamenti aliquid facit. Nam profundius penetrat vis ceroti & emplastri, quam vnguenti.

Cerorum tale fieri potest;

℞. Butyri recent. adip. anser. an. Drach. ii. ol. rutae, amygdal. dulc. amar. an. Vnc. ss. puluer. irid. Florent. hyssopi, marrub. an. Scrup. ii. Cera q. s. F. Cerorum.

Aut omisa cera eadem excipiantur terebinthina lota cum aceto forti, & Emplastrum conficiatur.

In peripneumonia biliosa parentur fomenta ex aqu. violar. cum modico aceti. Inunctiones fiant ex ol. viol. chamamel. amygdal. dulc. & similibus,

### Dietæ.

Dietæ quoque eadem ferè est, quae in pleuritide. Cibi non sint salsi neque acres, neque austeri, neque aluum adstringentes, sed potius extenuantes. Hinc commendatur praisana cum melle. Plerique etiam dulcia commendant, de quo postea, quest. 2. dicitur.

Postquam vero cessante defluxione sputum laudabile iam apparere incipit, iuscula pingua, monente Celso, exhibere conuenit. Laudatur etiam decoctum hordei vel simplex, vel cum passulis & glycyrrh. hydromeli, in quo fol. hyssopi cocta sint, vel oxymel dilutius, vel hydrosacchar, i. ex aqua pura.

Aur tale:

℞. Aqua pura lb. iv. sacch. cand. Vnc. iv. glycyrrhiz. Drach. iii. sem. anisi Drach. i. cinamomi. Drach. ss.

Coqu. ad tertiae partis consumpt. Colat. adde iulebi viol. Vnc. ii.

Omnis autem potus paulatim sumatur, nec frigidus sit. Abstineat aeger ab omni motu, praesertim sermone multo, & vocis intentione & clamore.

### Q V A E S T I O I.

An in peripneumonia haemorrhagiarum narium utilis sit?

Etsi Aëtius, retrab. 2. serm. 4. cap. 66. scribat, si ad salutem perueniat morbus, haemorrhagia narium copiosa solui; tamen Galenus, 3. de cris. cap. 3. scribit: contingere interdum, vt per sanguinem fluentem a naribus phrenitis soluatur; non tamen lethargus aut peripneumonia fluxum sanguinis amant. Praesupponit proculdubio hic Galenus, peripneumoniam, vt & lethargum, simpliciter a sanguine pituitoso fieri. Cum tamen vt supra dictum, peripneumonia a sanguine, & saepe etiam bilioso, fieri possit, haemorrhagia narium tum utilis est.

## QVÆSTIO II.

*An dulcia in peripneumonia conueniant.*

*Dulcia in peripneumonia conueniant.*

Hippocrates, 2. de morb. in peripneumonia curatione primis diebus dulces sorbitiones exhiberi iubet, ut, quod pulmonibus inhæret, eluatur. Et aliâs etiam dulcia pectori amica sunt. Verum alij dulcia improbât, utpote quæ calida & facillè bilefcentia febrem augent, & ad iccoris ac lienis inflammationem nocent. Et cum Hippocrates, ubi de pleuritidis curatione agit, acidas portiones exhibeat, quod sputum facilius proueniat, eadem quoque peripneumonia competere videntur cum eadem ferè sit cura pleuritidis & peripneumonia.

Verum enim verò sciendum; dulcia non vnus esse generis; alia enim sunt calidiora, aliâ potius temperata, imò nonnulla aquosa, è quibus posteriora non facillè nocere possunt. Et quæ sunt calidiora, non per se & sola, sed iis, quæ impediunt, ne facillè bilefcent, diluta exhibentur. Et quamuis dulcia magis hepar offendere possunt, quàm pulmonem, cum ad hepar integra & parum mutata perueniant; ad pulmonem verò exigua eorum portio proxime pertingat: tutius omnino est, dulcia minus calida eligere, & aliis permixta exhibere. Et si humores, qui in pulmone continentur, crassiores sint, acidis admixtis vis incidendi & extenuandi intendi potest. Vnde oxymel medicamentis thoracis affectibus conuenientibus admixtum ad viscidorum expulsionem accommodatissimum est remedium, 3. de rat. vict. in acut. 1. 2.

## CAPVT IV.

*De Vasorum pulmonis, & primò de Asperarum arteriarum, Angustia.*

*Asperarum arteriarum angustia.*

**A** Speræ arteriæ, quæ per pulmonem disperguntur, cum & aërem, qui inspirando attrahitur, admittere & fuliginibus exitum præbere debeant, causæ eâ de causâ factæ sunt, nullumque humorem, vel aliud quicquam in se continere debent. Quæ naturalis earum constitutio si lædatur, morbum in cavitare seu angustia patiuntur.

## Causæ.

*Causæ.*

Fit autem hæc angustia vel ab obstructione, vel à compressione, vel ab exsiccatione.

Obstructionem efficiunt humores crassi in bronchis pulmonis hærentes siue ibi sint geniti (quod tamen rariùs excidit, cum pulmones nutriantur sanguine tenui & puro, è quo succus crassus facillè colligi non potest) siue à capite transmissi, ut & à venis & reliquo corpore. Idem præstat crudum tuberculum, vapor crassus, calculi & grandines in pulmonibus geniti, caruncula item & vesicula, ut & vermes in pulmone procreati: sanguis item, qui ex gutture, œsophago, ore pulmone, thorace vulnerato ed effunditur, ut & pus post ruptum partium vicinarum abscessum in pulmonem illapsum, aut è thorace in pulmonem imbibitum.

Comprimendo asperas arterias angustiores reddunt eadem ferè causæ, si in arteriis læuibus & vena arteriosa ac substantiâ pulmonis consistant, asperasque arterias comprimant; humores nimirum crassi vel in pulmone geniti, vel per venam arteriosam in eum effusi, crudum item tuberculum extra arterias asperas consistens, easdemque comprimens, calculi, vermes Neque enim semper (quod de asthma & catarrho suffocatio notandum) materia per asperam arteriam tan-

tum in pulmones defluit, & bronchia pulmonis obstruit, sed sæpe etiam per venas in pulmones effunditur.

Idem accidit in hydrope pulmonis, in hydrope pectoris, in empyemate, quando humores seu in pulmone, seu in thorace consistentes asperas arterias comprimunt, in inflammationibus pulmonis, septi transversæ mediastini, in gibbositate & luxatione vertebrarum dorsæ, in lienis tumoribus, ventriculi, hepatis.

Tandem si asperæ arteriæ validè exsiccantur, angustiores redduntur, nec satis dilatari possunt ad aërem hauriendum. Quam siccitatem imprimis auras & vapores metallicos inducere posse, atque idè Chymicis, & aliis, qui metalla tractant, familiarem esse, supra dictum. Ita refert Heurnius, de morbis pectoris, typographo cuidam adeo siccatos fuisse pulmones, ut aridum pomum retulerint.

## Signa Diagnostica.

Angustia bronchiorum pulmonis in genere ex effectis cognoscitur, respirandi nimirum difficultate, ut & plerumque tussi. Signa.

Hippocrates, lib. 2. de morbis, etiam pulmonis repleti mentionem facit, eiusque symptomata describit hoc modo: Si pulmo repleatur, tussis, difficultas spirandi, quæ sit erecta cervice, & anhelatio detinet, linguam exerit, pustulis velut ex igne rubentibus impletur, pruritus occupat, dolor acutus pectus & scapulas vexat, neque sedere, neque recumbere, neque stare potest, sed infirmus est viribus. Hic quarto ferè die moritur, quem si superauerit, spes plerumque superest, sæpe tamen etiam septimo die periculum subit, quem si effugerit, conualescit. Verum inflammationem potius quandam pulmonis & acutum malum, quàm simplicem obstructionem describere videtur. Pulmo repletus.

Causas verò quod attinet, obstructio cognoscitur ex causis, quæ præcesserunt, nimirum catarrhis & humoribus pituitosis è capite in pulmonem delapsis, apostemate aliquo partium vicinarum, è quo rupto pus in pulmonem effunditur, empyemate & pure in thorace contento pulmonis & thoracis substantiam penetrantibus, ut & partium vicinarum vulneribus, è quibus sanguis in thoracem effunditur. Respiratio est difficilis cum sonitu, quandoque etiam cessat, & remittit, ubi pituita excernitur.

Speciem materiæ, id quod tussi eiiciunt, indicat. Si crudum tuberculum adsit, seu obstruendo, seu comprimendo angustiam pariat, difficilis est respiratio & assidua, nec citra stertorem & strepitum, nec vlla ancè fuit destillatio, malum sensim gignitur, & æger aliâs benè habens de difficili respiratione conqueri incipit, quæ indies augetur, tussis, quæ coniungitur sicca est, adestque maxima pulsus inæqualitas.

Si humores vitiosi in læuibus arteriis & pulmone hærentes comprimendo angustiam pariant, catarrhus adest, & vitiosorum humorum vel in hepate vel toto corpore redundantium signa adsunt, respiratio est difficilis, tussis adest, de quo postea dicetur.

Calculos & grandines in pulmone cognoscere, difficile est, & vix aliter cognosci possunt, nisi ex sputo præcedente & symptomatibus sequentibus. Si quis nimirum sputum crassum & viscidum valde expuat, postea verò eiusmodi sputum cesserit, & respiratio absque sonitu difficilior reddatur, suspicio est, materiam in calculos vel grandines conuersam esse.

Vermes etiam non facillè cognoscuntur, nisi ubi tussi reiciuntur, & præcessit plerumque tussis diuturna, quæ nullis remediis vinci potuit.

Tumores

# 682 De Asperarum Arteriarum Angustia.

Tumores pulmonum, diaphragmatis, mediastini, pus in thorace è suis signis cognoscuntur.

Si ex pulmonis & asperarum arteriarum exsiccatione proveniat angustia, cognoscitur ex defectu sputi, macie totius corporis, ac præcessit causa, quæ talem siccitatem in pulmonibus generare potuit.

## Prognostica.

### Prognostica.

1. Angustia asperarum arteriarum pulmonis nunc plus nunc minus periculi coniunctum habet, pro causa, à quibus illa pendet, varietate. Quod enim causa vehementior & pertinacior est, eò etiam plus periculi est metuendum. Simul tamen respiciendum ad respiratione læsam, tussim, pulsum, & alias actiones læsas, quæ magnitudinem morbi determinant. Ergo si obstructio sit à multis, crassis, crudis & viscidis humoribus, vel subito suffocationis periculum imminet, vel morbus diuturnus expectandus.

2. Angustia, quæ sit ex humore viscido & crasso, vel crudo tuberculo in leuibis arteriis consistente, cum pulsus magna æqualitate, solet cordis palpitationem, respirandi difficultatem, ac tandem suffocationem & mortem afferre, ut Antipatri Medici casus docet, de quo Galenus, 4. de loc. affect. cap. ult.

3. Angustia valorum pulmonis à siccitate plerumque incurabilis est, & tandem lenta morte hominem enecat. Reliqua ex iis, quæ de aliis pulmonum morbis dicuntur, patebunt.

## Indicationes.

### Indicationes.

Materia, quæ angustia bronchiorum pulmonis causa, seu obstruendo, seu comprimendo, id præstet, tollenda; quod sit, si materia viscida attenuetur, detergatur, expectoretur. Crudum tuberculū attenuatibus, & exsiccantibus absumatur. Grandines, calculi, vermes tussi eiiciantur; partes tamen materiam ad pectus mittentes simul euacuandæ & roborandæ sunt. Siccitas pulmonis emendanda est, ut supra, de intemperie sicca pulmonum, dictum.

### Curatio.

Curatio angustia arteriarum pulmonis ab humore frigido & crasso.

### Interna.

Ut igitur materia crassa commodè euacuari possit, primò præparanda est incidentibus & detergentibus medicamentis, è capillo ♀ is, hyssopo, prassio, pulegio, radic. enulæ iridis, & similibus, quæ postea proponuntur.

Ut 2℥. Capill. ♀ is, hyssop. scabios. prassij, ana M. ℔. rad. helen. ireos, ana Drach. ij. sem. anisi, feniculi, ana Drach. j. passular. glycyrrhiz, ana Vnc. sem. ficuum N. vj.

Coq. in aq. ad remanentiam tertiæ partis.

Colaturæ adde

Syr. capill. ♀ is, de hyssopo, an. Vnc. j. oxymel. scyllit. 3. ℔.

M. pro duabus dosibus, & portio hæc bis vel ter iteretur.

Vel 2℥. Rad. feniculi. glycyrrh. ireos, helen. an. Vnc. sem. capill. ♀. ussilag. scabios. hyssop. prassij saturia. an. M. sem. iuiubar. sebesten. an. N. xx. caricar. N. vj. passular. Vnc. sem. sem. anisi, feniculi, malua, ana Drach. j.

Coq. in f. q. aquæ puræ.

Col. 2℥. ℔. j. adde oxymel. scyllit. syr. de prassio de glycyrrh. an. 3. j. ℔. aq. cinamomi 3. ij.

M. pro 4. dosibus.

2℥. Syr. de prassio, de hyssopo, de glycyrrh. an. 3. j. oxymel. f. 3. j. ℔. aq. scabiosa, veronica, hyssopi an. Vnc. iij.

M. pro 3. dosibus.

Præparata materia euacuatur. E. g. in decocti supra

secundo loco parati suff. quantitate. agaric. trochiscati 3. j. sem. carthami 3. vj. ebulliant; ita aluum simul mouebit.

Vel 2℥. Pil. de agaric. 3. ij. assaiereth. 3. j. cochiar. 3. ℔. Cum oxymel. scyllit. Fiant Pilulæ xxiv.

Nonnulli frequenter ad purgandum in obstructione pectoris ab humore crasso videntur Trochiscis de violis, à Melue, cap. de asthma, descriptis; quos tamen reprehendit Alexander Massarias eà de causa, quod non sit compositio satis artificiosa, nec diagrydium satis correctum. Verum potest diagrydij loco sumi extract. scammonij. Possunt etiam sine scammonio hoc modo parari:

2℥. Flor. violar. Martiar. non nimium exsiccatarum, 3. iij. turbit. elect. 3. j. ℔. agaric. 3. j. succi glycyrrh. 3. ij. ℔. manna 3. j. ℔. Cum syrupo violarum.

Fiant Trochisci, quorum Drach. ij. vel iij. in decocto pectorali vel liquore conueniente exhibeantur.

Vinum medicatum tale fieri potest:

2℥. Rad. helen. ireos. an. 3. ℔. turbit. electi Drach. ij. scabios. cardui ben. an. P. ij. sem. anisi, cinamomi galanga, an. 3. j.

Affundatur vini mensura j. vel ℔.

Sumat æger manè iusculum galli, & superbibat haustum vini. Inprimis commendatur ius galli decrepiti purgans, in quo radix ireos & semen carthami coctum sit, Vel paretur hoc modo:

2℥. Galium antiquum enisceratum, in ventre eius confusa imponantur. sem. carthami. 3. j. rad. polypod. 3. vj. passular. 3. j. ℔. ficuum 3. j. sem. anisi, feniculi, an. 3. ij. agarici albi 3. ℔. turbit. elect. Drach. j. ℔. zingiber. Drach. ij.

Coq. donec caro ab ossibus separetur.

Vel 2℥. Gallum decrepitum enisceratum, ventremque eius sequentiibus reple:

2℥. Passular. ficuum, an. 3. j. ℔. glycyrrh. hyssop. saturia, thymi, an. Vnc. ℔. sem. feniculi 3. j. carthami. 3. ℔. turbit. elect. 3. ij. agarici trochisc. 3. ℔. zingiberis 3. j.

Coq. in aqua pura.

Decocti detur manè haustus, qui si non satis aluum moueat, addatur mannæ aliquid.

Quamquam autem purgantia talia humorem saltem in vniuerso corpore euacuare videntur: tamen hoc modo reuellunt, & humores ad pulmones tendentes retrahere possunt. Ideoque nec reuellentia & deriuantia omitterantur, ut vomitus, clysteres, & diuretica. Auicenna tamen fortia diuretica improbat, quod subtile extrahant, relicto crassiore.

Corpore toto euacuato, danda opera, ut continens seu proxima causa è pulmone tollatur. Ideoque ad materiam crassam & viscidam attenuandam, incidendam & detergentem adhibeantur capillus ♀, hyssop. prassium, puleg. calamintha, scabiosa, rad. ireos, pimpinell. helenij, sem. anisi, feniculi, scilla, ammoniacum, millepedes vsti, sulphur, & hinc composita, syr. capill. ♀ is, de hyssop. de prassio, scabiosa, oxymel. f. composit. scyllit. extr. ireos, helenij, spec. & rotula diaireos f. diar. Salomon. loch de canibus, scylliticum.

Videndum tamen, ne nimia medicamentorum caliditate humores exsiccetur, & magis crassiac lenti reddantur. Ideoque vtile est attenuantibus & incidentibus humectantia permiscere, ut glycyrrhizam, passulas, caricas, iuiabas, pineas, maluam, althæam.

Ut 2℥. Passul. 3. j. ℔. sem. feniculi. 3. ℔. hyopi, salvia acutifol. an. M. ℔. capill. ♀ P. j. iuiubar. sebesten. an. N. xi. d. ethylor. sine nucleis, ficuum, an. N. i. v. glycyrrhiz. a. f. sem. anisi. cinam. an. 3. ij. rad. helenij 3. ℔.

Conscindenda conscindantur & coq. in ℔. iij. aqu. in vase duplici.

Colatura dulcoretur sacch. albi 3. v. Fiat potio clara.

Vtile est & hic ius galli decrepiti, si in eo thoracica medicamenta coquantur.

Vtile



Vtile est & oxymel, quod à Cratone, *conf. 79.* commendatur.

℞. *Herb. hyssop. veronic. scabios. marrub. origan. pullegij, cardui benedict. an. M. j. rad. ireos incis. 3. vj. zingiber. 3. B. agar. alb. 3. B. Infunde in aceti lb. j. B. aqu. veronic, cardui ben. an. lb. B.*

Stent in vase vitreo obturato loco calido per triduum, deinde ebulliant lento igne & colentur.

℞. Colaturæ lb. j. B. mellis lb. B.

Coq. ad Syrupi formam, qui aromatizetur cinamomo, calamo aromatico; de quo sumat æger manè cochlearia duo vel tria.

Vel ℞. *Glycyrrh. rasa 3. ij. sem. anisi confusi. fœniculi. an. 3. B. spir. vini lb. vj.*

Stent in vase vitreo bene obturato. Macerentur dies duos.

Postea adde mellis lb. ij. ambra grysea gr. xij. moschi gr. x. sacch. alb. 3. ij. solutionis perlarum 3. j.

Stent per dies 10. quotidie agitando, postea clarum separetur. Dosis 3. B. cum 3. ii. lactis caprilli ieiuno stomacho.

Valdè etiam commendatur terebinthina, quæ non solum pulmones abstergit, sed & hepar, lienem, renes, simulque aluum citra noxam soluit: vt & oleum amygdalarum dulcium recens expressum ad 3. vj. cum saccharo sumptum, quod pulmones & pectus relaxat, & detergendo humores viscidos per aluum euacuat.

Inprimis hîc commendantur eclegmata, seu loch vulgò dicta, vt loch. de caulibus, de prassio, de pino, passularum, de hyssopo, de scylla, sanum & expertum, & quod ad asthma dicitur.

Nonnulli diabutrum commendant, hoc modo paratum:

℞. *Caricar. pingu. dactylor. passular. an. 3. ij.*

Contusa in aqua mullæ lb. iij. per diem infundantur. Hinc coquantur & exprimantur.

Colaturæ expressæ adde butyri recentis aquâ fontanâ diligenter loti & non falsi 3. iij. Iterum coquantur & colentur.

Postea adde *Amygdalar. amarar. pinear. mundatar. confusar. an. 3. ij.*

Et omnia simul in mortario misceantur addendo paulatim, *succi glycyrrhiz. 3. B. pulu. tragacanth. sem. vrtic. hyssop. ireos, thymi, satureia, prassij, an. 3. B. cinamom. zingiberis, pyreth. an. 3. ij. caryophyll. galang. piperis nigri, anisi, carui, cardamomi, an. 3. B. ligni aloës 3. j. pulmon. vulpis 3. ij. Milce.*

Galenus, in fine lib. 7. de comp. med. s. l. aliquot ex veterum scriptis medicamenta recenset, atque inter ea & hoc:

℞. *Succi scilla cruda, mellis part. æquales.*

Coq. lento igne Dosis Drach. ij. ante & longè post cibum.

Vel ℞. *sulphuris vini (flores commodiores essent) 3. j. sem. rute sylvestr. aristoloch. absinth. abrotan. ammoniac. an. 3. B.*

Terantur & fiant cum aceto Trochisci magnitudine fabæ, quorum manè & vesperi tres exhibeantur cum liquore conueniente.

Cum internis medicamentis & externa coniungenda. Illinatur nimirum pectus ol. amygdal. dulc. chamemel. anethino, lilior. albor. cheirino, additis, mucilag. nibus & pinguedinibus emollientibus.

Vt ℞. *Ol. amygdal. dulc. lilior. albor. rutacei, ana Drach. vj. adip. gallin. anser. an. Vnc. B. mucilag. sem. sanigrac. cum aq. scabios. facta Drach. iij. pulu. rad. ireos, belenij, croci, ana Scrup. j. cere parum.*

Fiat Linimentum.

Interea non omittantur diuersiones, & si à catarrho malum foueatur, omnia illa, quæ suprâ de catarrho diximus, hîc locum habent. Fonticuli etiam

in brachiis excitari possunt, quibus materia auertitur.

Pectore expurgato danda opera, vt exsiccantibus & absorbentibus reliquiæ in pulmone absumantur. In quem vsum medicamenta pleraque ad humorem crassum expectorandum hætenus proposita adhiberi possunt. E quibus tamen fortiora eligenda: Vt *rad. belenij, ari, scilla, sulphur, benzoes, & similia.*

Vt ℞. *Rad. ireos, 3. ij. helen. ari, ana 3. j. angelic. scill. ana Vnc. sem. glycyrrh. 3. j. hyssop. satureia pullegij marrub. calaminth. ana M. j. sem. fœnicul. anisi, an. 3. ij. vrtic. eruca, cartham. ana 3. j. B.*

Coqu. cum melle.

Fiat Syrupus.

Cui sub finem adde croci 3. B.

Commendatur & Syrupus de Nicotiana.

℞. *Nicotiana sicca M. iij. capill. 3. is, scabiose, an. M. j. hyssop. marrub. calaminth. an. M. sem. caricar. dactylor. an. N. x. rad. angel. fœnicul. an. 3. B. sem. fœnicul. anisi, an. 3. ij. vrtic. 3. B. rad. ireos 3. x.*

Coqu. in aqu. lb. iij. & addito melle & saccharo.

Fiat Syrupus.

Est & efficax decoctum ligni Guaiaci & sarsaparillæ, si pectoralia addantur.

Laudatur & ros Solis, si ei cum sem. botryos, glycyrrh. & marrubij sp. vini affundatur. Est & vtilis aqua cinamomi.

In senibus, & pituitoso ac frigido temperamento præditis, efficaces sunt aquæ pectorales dictæ, quæ humores crassos coquunt, eosque ac flatus dissipant, vires roborant, & sputum facilius reddunt.

Vt ℞. *Rad. ireos. helen. fœnicul. glycyrrh. russilag. an. 3. B. mors. diabol. 3. iij. veronic. scabios. hyssop. saluia, marrubij, capill. 3. is, M. ij. cinamomi, granor. iuniperi, an. 3. B. fœnicul. anisi, scilla prepar. an. 3. ij. ficum N. x. amygdal. amarar. pinearum an. Vnc. sem. croci Dra. sem.*

Affunde spir. vini optimi q. f.

Stent in infusione diebus 14. postea destillentur.

Hoc loco de aquis pectoralibus eiusmodi monendum, etsi multa in iis sint, quæ destillatò vires suas communicant: tamen multa etiam sunt, quæ per alembicum non eleuantur, vt glycyrrhiza, amygdalæ, pineæ, ficus, passulæ, & similia. Quare commodius esset, talia in spiritu vini vel aquis eiusmodi macerare, & liquorem istum postea aquæ pectoralis loco vsurpare.

Vel ℞. *Spir. vini optimi 3. iv. aqu. cinamomi 3. B. vngul. caballin. scabios. an. Drach. iij. sacch. candi 3. ij. Milce.*

Vel F. Eclegma.

℞. *Ammoniac. aceto scillitico dissol. 3. ij. sem. vrtic. malua, an. 3. i. flor. sulphuris 3. iv. croci 3. B. Cum melle scillis. Fiat Lohoch.*

Vel F. hic Puluis:

℞. *Rad. glycyrrhiz. ireos, helen. an. 3. i. ari. 3. ii. cinamomi 3. ii. sem. vrtic. nasturtij, an. 3. j. pulmon. vulpis prepar. 3. ii. croci 3. i. flor. sulphuris 3. i. benzoes 3. B. sacch. candi 3. vi.*

Fiat Puluis.

℞. *Flor. sulphuris 3. i. B. benzoes gr. vi. ammoniac. gr. iij. croci gr. iv. margarit. prepar. 3. j. mosch. 3. B.*

Fiat Puluis, de quo, quantum cupide cultelli capi potest, detur vesperi in ouo sorbili, vel oxymelite scillit. vel aqua scabiosæ.

Pueris datur semen fœniculi in lacte coctum.

Vel ℞. *Flor. sulphuris 3. i. B. benzoes 3. i. rad. belenij 3. sem. ireos 3. i. croci Scrup. j. sacch. cand. Vnc. sem.*

Fiat Puluis.

℞. *Ammoniaci 3. i. B. croci 3. B. flor. benzoes gr. vi. sacchari candi, succ. glycyrrh. an. q. f.*

Fiant Pilulæ xxx. sumantur vna vice vi. vel vii.

Vel

# 684 De angustia Læuium pulm. arteriarum.

Vel ℥. Flor. sulphuris 3. j. extrañt. helenij 3. j. sacch. albiss. in aqua scabiosa dissolut. Vnc. iij. ol. anise gutt. iv.

Fiant Rotulæ.

Vel ℥. Spec. diareos f. 3. i. diatrachal. calid. 3. ℔. balsam. sulphur. 3. ℔. sacchar. in aqua scabiosa dissolut. Vnc. iv. vel v.

Fiant Rotulæ.

## Dieta.

Dieta ab humore frigido.

Aër, quem spirando æger attrahit, sit calidus, siccus attenuans & liber. Ideoque in conclavi, in quo æger versatur, suffragigia parentur ex styrace, thure, myrrha, benzoë, moicho, ambra. Vitetur aër frigidus, humidus & crassus.

Cibus easdem qualitates habeat, ideoque condidatur hyssopo, thymo, fœniculo, baccis iuniperi, cinamomo, & inprimis croco. Utiles sunt passulæ, amygdalæ, pinæ, pistacia, & inprimis commodum est ius galli decrepiti cum thymo & croco. Melliti quoque cibi non inuiles sunt, si æger aliàs eos ferat. Vitentur verò adstringentes & crassi succi, ut pisces, caro suilla, lac, & similes. Potus sit vinum tenue & subdulce, vel melicratum aut mulsum, in quo thoracica medicamenta cocta sint. Possunt & cereuisiæ medicatæ fieri cum saluia, hyssopo, roremarino, & similibus. Utiles est & potus ligni Guaiaci. Ager sitim non ferat, sed sapius, verum moderatè, bibat; quia humectatione opus est, ad eam, quæ iam incisa & deterfa est in pulmone, materiam tussi eiciendam. Somnus sit nocturnus, moderatus, capite & pectore non nihil eleuato.

## Curatio angustia arteriarum pulmonis à reliquis causis.

Curatio angustia à reliquis causis.

Si à spiritu aut flatu crasso obstricta sunt vasa pulmonis, is discutiendus & dissipandus est, medicamentis flatibus discutiendis, quæ alibi proponuntur, & quibus thoracica eligenda, vel hæc iis admiscenda: & danda opera, ne flatibus iterum generentur.

Si tuberculum est causa angustia, danda opera, ut attenuantibus & exsiccantibus absumatur, qualem facultatem aromata habere, Galenus, 7. de compos. med. f. loc. in fine scribit.

Sunt etiam vilia hæc ammoniacum, sulphur, benzoë, theriaca, Mithridat. sales chymici, & similia enumerata.

Si à grandine & calculo sit angustia, locum habent millepedes & aselli, si nimirum in olla comburantur, donec albescant, & melle excipiantur. Potentius sit medicamentum, si adiciatur semen milij Solis.

Si à sanguine extra venas effuso proueniat angustia fluxus sanguinis cohibendus, ut postea de curatione sputi sanguinis, dicetur; qui verò in vasis pulmonis, præsertim asperis arteriis, hæret, si concretus sit, per poscam, oxymel, coagulum leporis, mumiam & similia dissoluendus, & per sputum ac tussim eiciendus.

Si à siccitate pulmonis proueniat angustia, lac amygdal. dulc. & semen melon, detur, syrupus de pomis, violis, borrag. iuiubæ, dactyli, ficus, passulæ, lac, & similia, ut supra, de intemperie pulmonum sicca, dictum.

riarum eiusdem facta sit mentio: quia tamen hæc etiam obstrui & angustiores reddi possunt, ut asperas arterias non comprimant, in specie & peculiariter de læuium arteriarum in pulmone angustia aliquid dicendum est, inprimis cum hæc tractatio doctrinæ de asthma non parum lucis allatura sit, & affectus ipse cognitu necessarius sit, cum hominem sæpe subito in vitæ periculum conicere possit, etsi ante nec de difficultate respirationis, nec de dolore & grauitate pectoris, nec de tussi, conquestus sit. Cuius rei memorabile exemplum recenset Galenus 4. de loc. aff. cap. ultimo. Locum, quia notatu dignus est integrum adscribere libet. Ea, inquit, qua Antipatro Medico acciderunt, nemo est, qui nesciat, ut pote qui Medicam artem publicè apud Romanos professus est. Agebat hic ætatem sexaginta quidem annis minorem, sed quinquaginta iam annos excefferat. Is correptus aliquando febre quadam ephemera, idque abeundi causa, declinante iam febre, ut, quid sibi facto opus esset, intelligeret, pulsus ipse suum tangere aggressus est. Cum igitur omne inæqualitatis genus in arteriarum motione inueniret, in primis quidem territus est, deinde verò, cum sese non febrile planè sentiret, ilico balneum subiit: quippe laboribus ac vigiliis corpus fatigauerat. Atque tenui quoque victu, donec diem tertium præterisset, usus est, quo, cum nulla appareret febris, ad solita negotia pertractanda prodiiit: atque arteriam in extrema brachij sui parte tangens admiratus est persuerantem in pulsibus inæqualitatē. Occurrens itaque mihi, extendit manum, ridens, iussitque pulsus tangere. At ego subridens, quid inquam, portendit hoc quod proponis ænigma? ille iterum ridens obnixè orauit, ut tangerem. Igitur inter tangendum omnigenam in pulsu inueni inæqualitatem, non solum in multarum pulsationum curculo quam systematicen (id est congregatricem) vocant, verum etiam in una arteria distinctione. Proinde miratus, quomodo adhuc viueret, cum talem haberet pulsus, interrogavi, num difficilis esset ei respiratio: illo verò nullam se sentire respondente, obseruavi equidem, an aliquando muaretur, quippe sex mensium spatio assidue arteriam tangebam. Cumque ab initio interrogaret, quæ corporis dispositio mihi videretur posse huiusmodi pulsus efficere, atque per quem modum, idque circa febrem: ad eam questionem respondi, in commentariis de pulsibus iam declarasse me huiusmodi inæqualitatem. Namque ob magnitudinem in pulmone arteriarum angustia id euenire putavi: angustia verò causam esse dixi visceris inflammationem. At tibi hanc ob causam id nunc accidisse impossibile est, quippe febre fuisses affectus. Relinquitur ergo, vel obstructionem ex liquidis & crassis & viscosis humoribus, vel crudi cuiuspiam tuberculi ortum in huiusmodi te dispositionem induxisse. Tum ille respondens, oportuisset (inquit) me suspiciosa orthopnoea laborare. At ego probabilia, inquam ipsum dicere, sed à veritate aberrare: quippe fieri nonnunquam huiusmodi orthopnoeam ob eam, quam diximus, causam: id verò cum in asperis, non in læuibus arteriis crassius & lentius humor cumulatur. Proinde omnem ei victus rationem, atque medicamenta quoque haud aliter, quam asthmaticis, adhibere iussimus: doinde sex (ut dixi) mensibus elapsis, leni quadam spirandi difficultate affectus est, accedente simul cordis palpitatione, in primis quidem semel, deinde bis atque ter, postea quater ac sapius quoque, aucta simul spirandi difficultate ad quindecimum usque diem: post quem difficillima derepente oborta spiratione, resolutus statim obiit, aliorum quorundam exemplo, qui cordis affectibus laborant.

## Causa.

Causa autem huius angustia est duplex: obstructio & compressio. Obstructio fit à crassis, viscidis & pituitosis humoribus, qui quidem vel in pulmone ex eius coctione vitiosa generantur, vel aliunde transmittuntur, id quod sæpe fit ex hepate, cum illud crudo & pituitoso sanguine scaret, cuius pars aliqua per venam

## CAPVT V.

### De angustia Læuium pulmonis arteriarum.

Angustia læuium arteriarum pulmonis.

ET si modò, ubi de causis angustia asperarum pulmonis arteriarum dictum fuit, etiam læuium arte-

nam arteriosam in pulmones transfunditur, & quidem sæpe certis intervallis, ut infra de *asthmate*, dicitur. Non verò materia huius obstructionis causa est capite defluit. Hoc enim si fieret, prius à bronchiis pulmonis reciperetur, & difficultas spirandi ac tussis excitaretur. Deinde eadem obstructio fit à crudo tuberculo, de cuius generatione postea dicitur.

Comprimuntur verò hæ læues arteriæ itidem à crudo tuberculo, si illud in pulmone generatum extrà læuibz arteriis incumbit. Idem fit ab inflammatione pulmonis, ut etiam Galenus, loco allegato, innuit.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Deprehenditur hoc malum è sola pulsus inæqualitate, nimirum tam systematica, quam quæ est in vna pulsatione, qui nunc est parvus, nunc magnus, celer, tardus, rarus, frequens, vehemens, atque inter pulsationes aliquæ decurrantur, aliquæ intermittunt, aliquæ intercident. Cum enim natura fulgines ob angustiam harum arteriarum non possit satis expellere, fit lucta quædam, & natura causæ morbificæ sese opposens, vi, quod molestum est, expellere conatur. Vbi autem natura hunc suum finem assequi non potest, aut dimidia facta est obstructio, syncopes aut suffocationis periculum imminet. Aliàs nihil molesti percipitur, nec difficultas respirandi, nec tussis, nec dolor, aut grauitas. Vbi tamen malum incrementum sumit, tandem ipsis arteriis communicatur, & tunc, quæ antea non aderat, difficultas spirandi superuenit, tandemque etiam palpitatio cordis, syncope, & suffocatio metus.

Causarum signa quod attinet, si à crassis humoribus fit obstructio, pulsus est durus per tensionem; si per tuberculum, durus per tensionem & siccitatem. Si ab humore fit obstructio, pulsus magis variabit; si à tuberculo, inæqualitas magis erit informis, utpote à causa magis fixa proveniens. In obstructione æquales, plures simul adesse possunt: at in tuberculo plures sunt inæquales.

Vbi tandem malo incrementum sumente, & materiâ asperis arteriis communicata, accidit difficilis respiratio, si malum fit à crassis siccis, difficultas respirandi non est vniformis, sed nunc maior, nunc minor, pro causæ ratione: si verò fit à tuberculo, vniformis est difficultas respirandi, nisi forsitan causâ aliqua externa accedat.

Si malum fit ab inflammatione, ea ex febre & aliis signis supra positis cognoscitur.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Malum hoc longè periculosum est, à quo homo sæpe accedente syncope vel suffocatione subito perimitur.

2. Quò in pulsus inæqualitate plures sunt magnæ, vehementes, celeres, intercidentes & æquales pulsationes, eò minus malum est: quò autem plures sunt languidæ, parvæ, decurrant, intermittentes & crebriores, eò maius periculum indicatur.

3. Quò minus actiones cordis læduntur, minorque est in syncopen propensio, eò malum minus est; quò verò hæc maiora, eò maius periculum imminet.

4. Quæ à crassis & viscidis humoribus est obstructio, non ita difficulter curatur, præsertim si recens fuerit; quæ autem angustia provenit à tuberculis; curatu difficillima est, ut postea, de *tuberculis pulmonis*, dicitur.

5. Quò maior cachexia coniuncta est, eò periculosius est malum, de cuius rei causâ postea in *questionibus* dicitur.

### Indicationes.

Indicationes.

Causa angustiam pariens est tollenda. Ideoque Dan. Sennert. Tom. I. I.

si humores crassi & viscidi sint, attenuandi, extergendi, & euacuandi sunt. Crudum tuberculum, seu arterias has obstruat, seu comprimat, attenuandum & rescicandum. Inflammatio si adsit, ea debito modo curanda.

### Curatio.

Curatio.

Crassi autem & viscidi humores quomodo præparandi & euacuandi sint è pulmonibus, cap. præcedente, iam dictum est, ut ea hic repetere opus non sit, & dicitur de eo etiam, in *asthmate*. Nam eius curatio ab huius causæ sublatione pendet. Vnum saltem hic moneo, quod etiam in curatione asthmatis repetendum, nonnullos paroxysmos asthmatici ingruente vomitu præcipere. Quæ res etsi alicui à veritate aliena videri possit: aliquoties tamen vidi, vomitu spontè superueniente à paroxysmo liberatos fuisse. Quærenda ergo huius rei causa: quæ nulla alia videtur, quam quod materia, quæ ab hepate ad pulmones ruit, ad ventriculum conuertitur. De quo postea, in *questionibus*, dicitur.

Crudum tuberculum quomodo curandum sit, dicitur postea, cap. 8.

Inflammatio pulmonis quomodo curanda sit, iam antea, cap. 3. dictum.

### Q V Æ S T I O

Quanam sit causa hydropis, quæ lenium arteriarum obstructione laborantibus superuenire solet.

P. Salius Dinerfus, de *affectib. part. cap. 21*. censet idè hoc fieri, quòd perseverante malo calor innatus, quoniam non sufficienter euentatur, languescat, atque inde hepar debilitetur, cuius ratione postea aliqua hydropis species succedat.

Hydrops in obstructione lenium arteriarum causatur a quanam?

Verum enim verò, cum sæpe satis maturè sese cachexia prodatur, ubi cor adhuc satis bene valere deprehenditur, & hepar nihil à pulmonibus, sed pulmones potius ab hepate accipiant, credibile est, vel à pulmonibus refrigeratis hepar refrigerari, vel, quod vero similis mihi videtur, primam mali causam in hepate hæere, quod, cum sit debile sanguinem pituitosum & frigidum generat, qui cum necessariò ad dextrum ventriculum cordis mittatur, porrò etiam ad pulmones pervenit, & huius mali causa est. Cum enim vena arteriosa & arteria venosa per totam substantiam pulmonis in minutissimos ramulos diuisæ dispergantur, & multis anastomosibus coniungantur, facillè ex vena arteriosa in arteriam venosam humores transferri possunt.

### C A P V T VI.

De Apertione vasorum pulmonis.

Angustia vasorum pulmonis opponitur eorum Apertio: & proinde de hac post illam meritò agitur. ad morbos enim pulmonis, & quidem meatuum vitia, & illi pertinent, cum vasa sanguinem continentia in pulmone, quæ clausa esse debent, aperiuntur. Id quod, ut in aliis etiam partibus, fit quatuor modis, à *ασπασι* scilicet, *διαπύκνωσης* & *διαρρύσεως*.

Apertio vasorum pulmonis.

À *διαρρύσει*, seu osculorum in venis vel arteriis apertio, fit primò à causa externâ evidente, quæ proximè & sola orificia vasorum aperire potest, medicamentis scilicet abstergentibus & orificia vasorum aperientibus, qualia sunt aloë & similia, vel causis nimis laxandi vim habentibus. Deinde à causa interna, quæ vel est proxima, sanguis scilicet vasorum orificia aperiens; vel antecedens, sanguis scilicet

Quatuor modis pulmonis vasa aperiuntur. À *διαρρύσει* causa.

licet aut copiâ peccans, aut calidus, aut acris, à quo facultas irritatur; quibus & motus sanguinis ad superiora addi potest. Vt enim à sanguine officia vasorum in pulmone aperiantur, causa non semper primariò in pulmone hæret, sed sæpe ad pulmonem ab aliis partibus transmittitur.

Procataretica causæ sunt, quæ vel sanguinem cumulant, vt suppressa eiusdè consuetudo per nares, hæmorrhoides, menstrua, euacuatio, & aliæ plethoræ causæ, vel calidiorem reddunt, vt corporum motus vehemens, acris, cibis, potus, medicamenta calida; vel ipsum ad pulmones & superiora commouent, vt motus nimius.

*Διαπνεύσις.*

*Διαπνεύσις*, id est, transcolatio siue transsudatio fit ob vasorum & tunicarum in iis raritatem, cuius causa est sanguinis tenuitas & serositas.

*Πνέξις*  
à causis externis.

*Πνέξις*, id est, ruptio vasorū fit primò à causis externis evidentibus, quæ proximè vasa in pulmonibus rumpere valent, vt lapin ab alto, vel percussione & contusione pectoris, ira cum clamore, intentione vocis subitâ & magna ac vehementi, non à leniore quasi per gradus ascendente, tussî nimîâ, conatu magno, graue pondus attollendi vel loco mouendi, saltu, inprimis post balneum, vbi vasa & totum corpus rarius redditum, cursu, lucta, retentione spiritus in conatu excrementa excernendi, & fecum excludendi. Hinc Hippocrates, 3. aphor. 29. scribit: Iuuenibus sanguinis exspuitiones, sicut & phthisin esse familiares: & 5. aphor. 9. eandem ab anno 18, ad 35. frequentius accidere. Id quod Galenus non tam ætatis ratione accidere docet, quàm propterea, quod in ea ætate constituti in vita & victu errores committunt. Etenim iuuenes pugnare, aliisque exercitiis vri solent, sæpe frigori nimio se exponunt, cibo & potu supra modum se replent. Quibus causis omnibus facillè vena iis, præsertim in pectore, rumpi contingit, vnde sputum sanguinis primo oritur, quod nisi tempestiuè curetur, phthisis subsequitur. Præterea sanguinem calidum & biliosum cumulant, qui non solum rupturam, sed & reliquas causas, quæ vasa in pulmone aperunt, inducere potest. Eandem ob causas viri etiam frequentius apertionem vasorum pulmonis patiuntur quàm fœminæ. Galenus, 4. de loc. aff. c. 5.

*Iuuenibus phthisis cur familiaris*

Deinde rumpuntur vasa pulmonis à causa interna, eaque vel proxima, quæ est sanguis pulmonis vasa distendens; vel antecedens, sanguinis abundantia seu sola, seu cum spiritu flatulento; vel procataretica, quæ scilicet vel sanguinem auget, vel ad pectus commouet; vt motus corporis nimius, animi pathemata vehementia & ira inprimis.

*À causis internis.*

Et præcipuè causæ istæ vasa rumpunt, cum vasa extensioni resistunt ob frigus externum. Tum enim illorum tunica frigore contractæ & indurata ad rupturam promptæ & paratæ sunt. Hinc Hippocrates, 6. epidem. sect. 3. aph. 10. τὸ ψυχρὸν ἐλβεὶν ῥυτίξαι, quod etiam habetur 5. aphor. 24.

Et præcipuè causæ istæ vasa rumpunt, cum vasa extensioni resistunt ob frigus externum. Tum enim illorum tunica frigore contractæ & indurata ad rupturam promptæ & paratæ sunt. Hinc Hippocrates, 6. epidem. sect. 3. aph. 10. τὸ ψυχρὸν ἐλβεὶν ῥυτίξαι, quod etiam habetur 5. aphor. 24.

Frigus verò ipsum per se vas aliquod frangere non potest, sed vel per motum aliquem, vel plenitudinem accedere necesse est, de quo Galenus, 4. de loc. aff. cap. 8. ita scribit: Frigus ipsum per se rupturas non facit, sed quia venarum tunicas frigiditate suâ duras & ad extensionem contumaces reddens, vt rumpantur, paratior efficit: rptionis verò causa est aut vehemens motus, aut humorum abundantia.

*Διάσπασις*

*Διάσπασις* seu erosio fit ab humoribus acris & salis, seu à capite destillantibus, seu aliunde ad pulmonem fluentibus. Quò faciunt actium & prauorum ciborum vltus, inedia acres humores coacervans & similia.

### Signa diagnostica.

*Signa.*

Si *διάσπασις* vasorum pulmonis sit, præcesserunt causæ vasorum officia aperientes, quæ modò enumeratæ sunt. Et sanguis è vasorum officiis apertis exit mediocri copiâ & sine dolore.

Si *διαπνεύσις* adsit, exit sanguis serosus, paucus, & sine dolore.

Si à *πνέξι* seu ruptura vasa pulmonis aperiantur, præcessit plethora, & causa aliqua rumpens antea propostita; & sanguis statim copiosus exit.

Si sit erosio, præcesserunt salis è capite destillationes, sanguis est acris, & propter humoris acris admixtionem malè coloratus apparet; percipitur sapor salinus & acris, præcesserunt causæ acres humores cumulant; & primò quidem sanguis purus exspuitur, progressu verò temporis, & erosione auctâ, copiosior, tandè quæ sputum puris sequitur. Quæ signa confirmantur, si nulla causa violenta præcessit.

Præterea an à copia sanguinis, quæ tam *ἀσπασις*, quàm rptionis causa esse potest, vt suprâ dictum, an verò ab acrimonia eiusdè proueniat vasorum pulmonis apertio, ex eo quoque discernitur, quod si à copia sanguinis, quæ naturæ oneri erat, ea proueniat, sanguinis copiâ euacuata is spontè subsistit, signaque redundantis sanguinis adiunt; si verò ab acrimonia sanguinis proueniat, sanguis ita facile sisti non potest.

### Prognostica.

1. *Διαπνεύσις* minimè omnium periculosa est, & adstringentibus facillè sanguis sistitur. *Prognostica.*

2. Post hanc minus periculosa est *ἀσπασις*, ob quam si sanguis reiicitur, is spontè sæpe copia nimia euacuata subsistit, osculis spontè iterum sese occludentibus. Obseruatumque sapius in consuetosanguinis, hæmorrhagiæ narium, hæmorrhoidum, menlium fluxu suppressio sanguinis superabundantem copiam absque vlllo damno è pulmone, osculis vasorum reclusis, euacuata fuisse: quod etiam Fernelius, lib. 5. de part. morb. & sympt. cap. 10. annotauit. Et Ludoticus Duretus de seipso scribit, in comment. super Coac. Hippocr. aphor. 46. sibi, cum olim familiaris fuisset narium hæmorrhagia, & quidem cum commodo valetudinis, vsque ad annum ætatis quinquagesimum, tùm eâ suppressa, nec tamen *ἀσπασις* itatis temporibus quiescente, quasi datâ portâ proruisse per *ἀσπασις* vasorum pulmonis atque quidem sæpe & multum; quæ tamen sedata nullam pulmonis offensionem reliquerit, præter summam corporis infirmitatem. Si tamen oscula vasorum vel nimium dilatata, vel motu continuo impulsâ iterum conuiere nequeant, interdum ex nimia sanguinis profusione mors sequitur. Aut si sanguinis effusi portio in pulmone retineatur, illic putrescens pulmonem corrumpere potest.

3. Periculosior est ruptura vasorum. Nisi enim intra tertium & quattum diem ruptura consolidetur, inflammatio facillè accidere potest, à qua, cum tussî pus expuendum sit, vulnus indies maius efficitur. Et quamuis callus vlceri obducatur: tamen leni de causa, vt vocis intentione, vel risu immoderato iterum rumpitur. Galenus, 5. meth. med. cap. 14. Celsus l. 4. cap. 4. de Tussi.

Admodum etiam periculosa est vasorum pulmonis apertio, quæ fit in vulneratione, percussione, & contusione thoracis.

4. Periculosissima verò est *διάσπασις* seu erosio vasorum. Etenim vlcus sordidum, quod tum inducitur, non facillè consolidatur; & vt vitium humoris corrigatur, longiore tempore opus est.

5. Si ruptura & erosio vasorum pulmonis sit recens, & antequam phlegmone accedit, non ita difficulter curatur. Si verò phlegmone accedat, exigua sanationis spes superest, eâ præcipuè de causa, vt dictum, quod pus & sanien tussî è pectore expurgare oportet, quâ vlcus semper maius & deterius efficitur.



ficitur Hinc Galenus, 5. meth. med. c. 13. & 14. scribit; se omnes curasse, qui è pulmone sanguinem expuentes mox primo die ipsius opera vñ fuerant; qui verò post biduum aut triduum ipsius opera vñ essent; horum aliquos sanatos esse, quos autem phlegmone sic occupauit, vt iam febricitarent, eorum sanè nullum perfectè restitutum fuisse.

6. Morbus reuersionem faciens magis, quàm ab initio virget. Hippocrates, de intern. affection.

### Indicationes.

*Indicationes.* Apertum vas, quocunque modo apertio facta fuerit, claudendum est. Modus verò id præstandi varius est pro causarum diuersitate. Si nimirum ab *ἀσθενείᾳ* sit apertum vas, orificium vasis apertum obturandum & adstringendum est. Si à *διαμόρῳ*, densantia & incrassantia requiruntur. Si à ruptura, ruptum vas vniendum atque agglutinandum. Si ab erosione, sarcotica primum, quibus, quod deperditum est regeneretur, & hinc consolidantia requiruntur.

Præterea si vitium sit à causa interna, eaque adhuc duret, aut vasorum agglutinationem impediat, ea tollenda. Sanguis nimirum ad pulmones affluens reuellendus & auertendus, copiosus imminuendus, calidus & acris refrigerandus & mitigandus, humores biliosi & acres alterandi & euacuandi sunt.

### Curatio.

*Curatio.* Cum à vase in pulmone aperto sequatur sanguinis effluxus & hinc spurum sanguinis, vas apertum claudi non potest, nisi prius sanguis sistatur, & si forsàn sanguis concretus circa vasa hæreat, is prius tollatur. Ideoque siue per *ἀσθενείαν*, siue per rupturam, siue per erosionem apertum vas in pulmone fuerit, commodissimè instituitur venæ sectio, quæ ferè plerisque scopis satisfacit. Etsi enim, vbi causa rupturæ amplius non adest, vt dum à contusione, lapsu, vel clamore nimio vas apertum est, sanguis saltem sistendus sit, & hinc vas claudendum & vniendum; vbi verò causa adhuc adest, id quod in plethora accidit, vbi à copia sanguinis vasa aperiuntur, non solum sanguis sistendus, & vas apertum claudendum sit, sed præterea etiam copia sanguinis minuenda: tamen his quoque omnibus satisfacit venæ sectio. Etenim dum sanguinem aliò auertit, eius fluxum sistit, dum verò eius copiam imminuit, causam morbi tollit.

Aperienda autem est vena in cubito. Si tamen consueuerat aliqua euacuatio suppressa sit, vena in pede etiam aperiri potest, vt ad remotiora fiat reuulsio, deinde vena in cubito aperiri potest, vt in inflammatione pulmonis dictum. Quæ in re tamen distinctione opus est; vt infra, part. 3. cap. vlt. in questione, dicitur. Et quidem, si necessitas id requirit, bis vel ter eodem die vel spatio bidui sanguis mittendus, si virium lapsum timeamus: Si enim venæ apertio sæpius repetatur, & in plures vires sanguinis missio distribuatur, efficacior sit reuulsio, viresque minus deliciuntur. Et quidem conuenientius sanguis mittendus, vbi copia sanguinis proxima & primaria apertionis vasorum causa est, in plethora scilicet, & vbi consueuerat aliqua sanguinis euacuatio suppressa est, sanguisque est calidior.

Si verò à prauitate humorum, qui vel orificia vasorum aperiunt, vel vasa erodunt, apertio vasorum proueniat; atque in iis, vt Galenus, 5. meth. med. cap. 14. scribit, qui parum sanguinis habere videbuntur: ad quandam succi probitatem reductis humoribus, detrachere aliquid sanguinis poteris, tum rursus reficere, eodè etiam rursus purgare, atque rursus reficere, denique si res suadeat, sanguinem mittere, potissimum

Dan. Sennerti Tom. II.

quibus veluti limus vitiosus & crassus totus sanguis est. At qui validi sunt, multiq̃ sanguinis, iis statim ab initio sanguis mittendus.

Quod si vires non ferant venæ sectionem, cucurbitulæ cum scarificatione partibus inferioribus reuulsionis gratiâ applicandæ, vel etiam hepatis, si à plethora sit ruptura. Hirudines etiam, præsertim si sanguinem antea fundere consueuerint, hæmorrhoidibus applicari possunt.

Et omnino danda est opera, vt, si consueuerat aliqua euacuatio, vel mensium vel hæmorrhoidum suppressa sit, ea reuocetur; sed per ista, quæ diximus, media. Nam menstrua per medicamenta mentes mouentia hinc mouere non licet. Cum enim sint calida, & sanguinem vehementer mouere, & venas aperire possunt.

Nec omittendæ aliæ reuulsiones, quæ sunt cucurbitulis sine scarificatione, frictionibus, ligaturis, & aliis, quæ citra euacuationem & virium deiectionem sanguinem reuellunt: Si defluxio sit à capite, ea reuulsio instituenda, quæ catarrhis deberetur, vt suo loco dictum.

Deinde si sanguini vitiosi humores permisceantur, quæ qualitate sua vitiosa vasorum apertionis causa sint, & qualitas illa vitiosa corrigenda, & vitiosi humores euacuandi. Ideoque & tum exhibenda alimenta boni succi, quæque acrimoniam sanguinis mitigant, vt ptiliana, amyllum, tragacantha, succus granatorum, syrup de portulaca, borragine, iuiubis, & similia.

Ad purgationem exhibenda pulpa tamarindorum, syrup. ros. solut. myrobal. manna, rhabarbarum. Scammonio cautè vtendum. Videndum enim, ne purgantibus fortioribus exhibitis sanguis magis agiteretur, & fluxioni aprior reddatur.

Tertiò danda opera, vt grumi sanguinis in pectore ac pulmone dissoluantur, cum non solum glutinationem vasorum impedian, sed & retenti graui symptomata excitent & pulmones corrumpant.

Grumos sanguinis in pectore resoluunt.

Exhibendum autem oxycratum seu posca, id est, mixtura ex aqua & aceto Vnc. vi. vel ix. mensur. Sit autem posca, vt Galenus, 5. meth. med. cap. 8. tradit, ita mixta, vt potu sit iucunda, & ne ob acetum copiosius tussim exciter. Ita enim & concretum sanguinem dissoluit, & ad glutinandum non nihil facit. Detur autem non frigida nec calida, sed tepida, & quidem bis vel ter de die, vel etiam trium aut quatuor horarum interuallo. Græci Recentiores, vt Paulus Aegineta, Aëtius, Oribasius, commendat coagululum cerni, hædi, leporis in primis, quæ vt dissoluta coagulant, ita coagulata dissoluant, vt docet Dioscorides, l. 2. cap. 67. Et quia acredinem non obscuram obtinent, vix magnitudine ciceris exhibent ex aqua calida adstringente aut oxymelite. Galenus tamen, 10. de simpl. med. fac. rit. Coagululum, propter acrimoniam formidat coagululum dare ad reiectionem sanguinis in thoracis affectu, scilicet adstrictionem requirente. Posca igitur vsus turissimus. Forestus ad sanguinem congelatum exhibuit mumiam & sperma ceti. Donatus post poscæ assumptionem commendat puluerem seq.

℞. Rhabarb. Dra. i. vel Scr. iij. mumia gr. v. vel vi. rubia tinctor. gr. iij.

Detur cum vino rubro, aut aqua plantaginis exigua aceto iniecto.

Langius, l. 2. epist. 31. hunc Puluerem commendat:

℞. Rad angelic. Scr. ii. coagul. lepor. Scr. β. succin. 3. β. farin. orob. rubr. Scr. iij.

Exactè contusa cribro excernantur, ac de illius pulueris farragine Dra. i. dissoluantur in stillarij cerefolij aut gingidij liquoris Vnc. iii. β. & oxymel. Dra. i.

F. Haustus.

De medicamentis verò grumos sanguinis in thorace dissoluentibus aliquid difficultatis oritur, quo scilicet tempore exhibenda sint, cum si iis vtamur, vasa non claudantur, sed potius aperiuntur. In ista au-

rem re perpendendum, an plus urgeat sanguinis impetus, quam sanguis concretus. Nam si ruptura sit in pulmonis vasis, & metus sit, ne inflammatio exciteretur, aut fluxus sanguinis augeatur, malique aliquid afferat, statim sistendus est. Vbi autem iam ex parte aliqua impetus sanguinis cessat, ut ex eo cognoscitur, quod iam minus fluit, & colore non est amplius admodum florido, grumos dissoluentibus uti, & postea agglutinantia exhibere licet: imò medicamenta ex utrisque composita exhiberi possunt; exempli gratia, oxymel & syrup. de portulaca cum bolo Armena. Si verò ruptis vasis pectoris exspuatur sanguis, & ex eo tantum periculum phthiseos imminet, primò eum expurgare & dissolvere, postea conglutinare licet. Idem faciendum: sanguisque concretus statim dissolvendus, si is è pulmonibus tantum per *ἀσθῆν* exeat, cum tum tantum inflammationis periculum non adsit.

Si catarrhus à capite defluens apertionis vasorum pulmonis causa sit, & vasa aperta conglutinari non possint, nisi catarrhus desinat, danda opera, ut primò catarrhus sistatur, de quo supra, lib. 1. part. 2. cap. ult. de catarrho, dictum.

His ita peractis, & omnibus, quæ consolidationem vasorum impedire possunt, remotis, danda opera, ut vas ipsum statim consolidetur, dum adhuc malum recens est, & præcipuè in ruptura & erosione vasorum, antequam phlegmone accedat, ut prognost. 5. dictum. In vasorum autem apertorum conclusione procuranda quædam pro causarum diversitate occurrit varietas. Si enim sit *δυσμῆν*, astringentibus utendum, sanguisque si sit tenuior, crasso victu emendandus, modò non adsit inflammatio, ut in pleuritide, vbi adstringentibus abstinendum, & potius secretus promouendus. *Ἀσθῆν* & rupturam curandi ratio ferè eadem est. Adhibenda nimirum adstringentia, emplastica & glutinantia medicamenta. Astringentia hîc utilia sunt: portulaca, quæ quocunque modo sumpta apertionem vasorum pulmonis, & sputum sanguinis inde proveniens curat; succus tamen eius est, plantago, polygon. millefol. germina & fructus rubi cynosbat. myrti, tenera quercus folia, rosa, rad. symphyt. maior. sumach, cortic. granat. balauftia, lapid. hamatit. corallia, crocus Martis.

Emplastica sunt bolus Armena, terra sigillata, sanguinis draconis, gummi Arabic. tragacanth. thui, mastich. amylium.

Glutinant hîc millefol. symphytum maius, lysimachia. Et quia medicamenta pleraque plurimis prædita sunt facultatibus, ita ut quædam adstringant, condensent, conglutinent, etiam Medici modò ad hanc, modò ad illam classem ea referunt. Et cum talia medicamenta non facillè penetrant, sed sibi ipsis potius viam quasi procludant, admiscendum aliquid medicamentorum, quæ calore & tenuitate partium prædita *ἀσθῆν* ac distributionem cæterorum medicamentorum adiuvant. In quem usum commodissima sunt & vehiculi vicem præstant mel & saccharum.

Ex his varia fiunt medicamenta, atque in usu potissimum sunt trochis. de terra sigillata, de carabe cum & sine opio, troch. ramieh. spec. diatrag. frigid. syrup. de portulaca, de succ. plantaginis, de rosis siccis, de papavere, myrtin. loch. de portulaca, conseru. rosar. rubr. antiq. de fol. quercus, syrup. de coral. ut & opiata, quam descripsit Ferne-lius, conf. 21.

℞. Boli Armena aqu. rosar. lot. Drach. ii. sem. portulac. lactuc. ana Drach. sem. gummi tragacanth. Arab. an. Scrup. ii. amyli. sem. nasturt. torrefact. ana Drach. β. rosar. rubr. sacch. cand. rosar. tabul. ana Vnc. i. Cum syrup. myrtillor.

Formentur Trochisci, qui in ore detineantur.

Vel ℞. Conseru. rosar. antiq. Vnc. iii. boli Ar-

mena, terra sigillat. ana Drach. ii. Cum syrupo de portulaca.

F. Electuarium.

Vel ℞. Conseru. rosar. rubr. antiq. symphyt. maior. ana Vnc. i. β. boli Armena, terra sigillat. an. Drach. i. lapid. hamatit. Scr. iv. Cum syrup. de portulaca.

F. Electuarium.

Vel ℞. Tragacanth. gummi Arabici, sanguin. dracon. boli Armena, amyli. spod. an. Drach. i. lapid. hamatit. sem. papaver. hypocist. ana. Drach. iii. Cum syrup. de succ. plantagin. & rosarum.

F. Electuarium sensim deglutendum.

Vel ℞. Syr. de portulac. Vnc. i. iunibin. Vnc. β. boli Armena aqu. rosar. prepar. syr. myrtini q. s.

F. Lambile.

Forestus in rupta vena tale præscribit Decoctum, lib. 16. obs. 16.

℞. Rad. consolid. mai. 3. i. burs. pastor. portulac. sanctul. pyrolæ, polygon. ana M. j. sem. endiu. acetos. portulacæ, urtic. ana Dra. i.

Fiat decoctio, ut artis est, in aqu. communi, pro lb. j.

Colaturæ addendo, syrup. myrtil. Vnc. iij.

Clarificentur pro Iulep.

Pulvis, qui Iulio Cæsari Scaligero & Medicis Parisiensibus in usu fuit, sed è Serapione, cap. 25. tract. 2. desumptus est:

℞. Spod. rosar. rubr. boli Armen. terra sigill. hamatit. ana 3. β. gummi Arabici, tragacanth. an. 3. ii. sem. papaver. portulacæ, arnogloss. C. C. vsti, amyli torrefact. an. Dra. iij.

F. Pulvis.

Descriptio Pulveris huius nonnihil varians apud Hollerium, exercit. Valerij in caput. 27. talis habetur:

℞. Spodij, ros. rubr. bol. Arm. terr. sigill. hamatit. an. 3. v. corall. rubr. carab. margaritar. non perforat. an. 3. ii. β. gummi Arabici, tragacanth. an. 3. ii. sem. papav. portulacæ, ros. rubr. arnogloss. cornu cervi combust. an. 3. iii. acacia, succi herbe hircine, glycyrrh. an. 3. ii. amyli torrefacti 3. iij.

Terantur, misceantur, F. Pulvis, cuius dosis sint 3. iij. Datur cum aqua pluviali.

Vel ℞. Syr. myrtin. de portulac. de rosis siccis, ana 3. ij. boli Armena, lapid. hamatit. C. C. ana Scrup. ii. aqu. portulac. plantag. bursa pastoris, an. Vnc. iii. F. Potus pro duabus vel tribus dosibus.

Vel ℞. Spec. diatrag. frigid. Drach. i. conseru. rosar. antiq. Vnc. i. β. rob. berberis 3. β. pilul. de cynogloss. Scr. ii. syr. de portulac. q. s.

F. Lambile.

Vel ℞. Syr. myrtin. de portulaca, an. Vnc. i. β. conseru. rosar. rubrar. antiqu. fol. quercus an. 3. vi. tragacanth. amyli, an. Scrup. ii. rad. symphyt. terra sigillata, boli Armena, lapid. hamatit. ana Scr. j.

F. Eclegma.

Interim & post sanguinis auersiones (ante has enim topica apponere tutum non est, ne ab adstringentibus sanguis intrò compellatur, & venæ, quæ in alto sunt, repleantur; ut & si ab externi aëris frigore vehementi sanguis intrò ad pulmones pulsus sit) nec topica omittantur, pectusque inungatur oleo myrtino, mastichino, rosarum, quibus addi possunt pulveres adstringentes.

Vel fiat tale Cataplasma:

℞. Fol. plantagin. portulac. polygon. an. M. i. rad. symphyt. maior. Vnc. i. cortic. granator. farin. bord. ana. Vnc. β. cydon. siccor. Drach. iij.

Coqu. in vino adstringente ad mollitiem.

Contusis adde thuris, mastich. boli Armena, an. 3. iij. corallor. rubr. 3. i. ol. rosar. & myrtin. ana q. s.

F. Cataplasma.

Si refrigeratio rupturæ vasorum pulmonis occasionem præbuit, Galenus, 5. meth. med. cap. 13. calefaciens ceratum ex thapsia pectori adhibet ad tollendam eam intemperiem. Sed si adhibendum est, diu tamen ibi non relinquendum, ne multum calefaciat, malum augeat,

augeat, ipsamque mortem inferat, cum magna Medici ignominia; qualem historiam recenset Forestus, lib. 16. obs. 16. in scholio.

Possent forsitan etiam, ut in hæmorrhagiis, periapta, ut jaspis, umbilicus marinus, & similia vlturari.

Si vulnere pectoris in pulmones vique penetrante sit facta apertio vasorum, vulnus curandum & conglutinandum, ut, cap. sequenti, dicitur.

Erosio autem vasorum pulmonis difficilius curatur, ut supra dictum: Statim autem initio (ut & in anastomosi ex sanguine bilioso) etiam bilis purganda, nec purgatio procrastinanda, ne, dum studemus acrimoniam humoris corrigere, ille acrimoniam suam maius malum inducat. Neque hic concoctionem expectare opus est; cum humor non sit putridus seu crudus, & præterea tenuis, qui ductum medicamenti purgantis facile sequitur. Validiora tamen & calidiora purgantia vitanda, ne humorem magis agitent & acriorem reddant, ut & aloë, utpote quæ venarum orificia aperire solet.

Peculiaris autem hic offertur indicatio regenerandi partem erosionem deperditam. Id quod præstant alimenta boni succi, ut pituita, lac, & quæ ex lacte conficiuntur, iucula gallinæ & carnes, & medicamenta carnem gignentia, qualia sunt thus, mastiche.

Catarrhi cum puro sanguine ciliis.

Si verò catarrhus adhuc adsit, qui è capite ad pulmones defluit, is primò cohibendus. Id quod triplici medicamentorum genere effectum dedit Galenus: 1. purgatione peccanti humori conueniente. 2. medicamento diaspermato, quod somnum conciliat, sensum doloris tollit, tussim sedat, & sicandi vim habet, cuius loco vti possumus theriacà recente, pilulis de cynoglossa, & similibus. 3. cerato ex thapsia, vel stercore columbino capiti imposito, ut catarrhi defluentis imperus prohibeatur, quod & alia huius generis medicamenta & cauteria præstare possunt. Postea ægrum reficit cibis boni succi, frictione, inambulatione, balneo. Inprimis verò lac exhibet, quo neglecto malum vix sanatur. Neque interim sanguinis missionem negligit, sed eam vel statim, si abundet, vel, si paucior sit, & prauus, vbi ægrum cibis boni succi refect, eam instituit.

Curationem hanc Galeni reprehendit quidem Trallianus, lib. 7. c. 1. verum quid de ea sentiendum sit, supra, libr. 1. part. 2. cap. ult. de catarrho, quest. 1. dictum.

Inter medicamenta autem, quæ vas erofum claudunt, Trallianus, allegato loco, commendat lapidem hæmatitem, in subtilissimum puluerem tritum, quem Scr. iv. pondere circa principium, si magna sit sanguinis reiectio, in succo mali punici vel succo polygoni, sin minor, cum sola aqua tepida exhibet.

Vel suspendatur lapis hæmatites tritus in linteolo in aqua, & nodulus exprimatur, ut aqua rubescat, addaturque syrup. de portulaca, vel myrtinus. Exsiccatur enim vlcus, & prohibet, ne pus generetur. Vtilis etiam est bolus Armena & terra Lemnia. Vt

℞. Boli Armen. Drach. ii. spec. diatrag. frig. Dra. i. sacchar. in aqua portulac. dissol. Vnc. iij.

F. Rotulæ, de quibus per interualla sumantur sex vel plures.

Vel ℞. Conseru. rosar. rubr. ℥. ii. rad. consolid. maior. coctar. vel conseruæ earum Vnc. i. boli Armen. mastiche shur. an. 3 i. hypocist. 3. ℞. Cum syrupo de portulac. F. Electuarium.

#### Diatra.

Diatra.

Ær sit tempeatus, aut moderatè ad siccum & frigidum declinet. Calidus verò ut alia incommoda habet, de quo postea, in questione, dicitur, ita etiam sanguinis profusiones inuehit. Victus sit tenuis primis diebus, & vim adstringendi habeat, vel emplastica. Vnde conueniunt sorbitiones, ex pituita, pultrisque ex oryza, auenâ, farinâ hordei, tritici, & amylo cum lacte co-

Dan. Sennerti Tom. I l.

ctæ, quibus si libet, addi potest conserua rosar. antiqua. A nonnullis commendatur caro suilla, ut glutinosa. Et recitat Suidas historiam Damini Philolphi, qui cum sanguinis sputo laboraret, oraculum de medicamento consuluit, à quo responsum accepit, ut carne suilla vesceretur, quam quoties comederat, sanguinem non reiciebat, vbi abstinebat, sanguinis fluor rediit. Lac etiam hic optimum alimentum est, refertque Trallianus, se solius lactis vltu plures curasse. Nec inutiles est cæcus recens, non falsus. Ex oleis conueniunt lactuca, acetosa, & præcipue portulaca, mala aurantia, granata. Abstinentum verò à cibis flatulentis, falsis, acris & aromatibus. Aceri quoque vltus, præsertim acris, non conuenit.

Potum quod attinet, exhibeatur aqua hordei cum melle vel laccharo, vbi abstergendum, vbi verò glutinandum, aqua hordei chalybeara. Vel bibatur cereuisia tenuior, aut lac amygdalar. dulcium, ut lac acidum ebutyratum. A vino verò abstinentum. Æger non moueatur, sed quiescat, non clamet, non excandescat, & quantum fieri potest, dormiat. In obærioribus tamen somnus sit interruptus, ne sanguis nimis in thorace collectus dormientem suffocet. Videatur etiam Hippocrates, lib. de intern. affection. mox ab initio.

#### QVÆSTIO.

Qualis Ær in apertione vasorum pulmonis ab aëre frigido conueniat?

Equidem principium est in methodo medendi, contraria contrariis curari: ac proinde etiam rationi consentaneum videtur, vbi ab aëre frigido vas aliquod in pulmone ruptum est, aërem calidum adhibere. Contra quia calidus aër dilatat, non tutum esse videtur, vase aliquo aperto eum adhibere.

Qualis aer in apertione vasorum pulmonis ab aëre frigido conueniat.

Verum enim verò etsi plura in ruptura vasorum pulmonis sint indicantia: tamen quod maximè vrget, est sanguinis fluxus; qui non solum sine vitæ detrimento largius effluere non potest sed & dum fluit, facit, ut vas claudi non possit, & quò diutius fluit, eo magis vas dilatat. Quapropter æger potius in aëre frigido, quàm calido, qui laxat, detineri debet. Etsi enim adhuc adsit aliqua intemperies frigida, quæ tussiculam aliquam excitare possit: tamen spiritus retentione facile sedari potest. Et ipse aër frigidus, in quo æger domi conclusus degit, non est tam frigidus ut ad rupturam vasis amplius aliquid facere possit. Et ipse, ut supra dictum, aër frigidus vasa non rumpit; modò plenitudo sanguinis dempta sit, & æger ab omni motu violento cesset, nullum ab eo periculum est. Aër tamen ille moderatè sit frigidus. Et quod in ruptura vasorum pulmonis in principio calida non conueniant, etiam vbi ab aëre frigido est ruptura, exemplo etiam docuit Galenus, 5. meth. med. c. 13. in iuvene, qui ex refrigerato pectore sanguinem expuebat; cui intro nihil calidi adhibuit.

#### CAPVT VII.

De Grauidine, Calculo & Vermibus in pulmone genitis.

Res planè alienas quandoque in pulmone generari obseruatum est, Grandines, Calculos, imò Ossa & vermes, quæ non solum angustiam vasorum pulmonum parere possunt, sed & aliis modis præter naturam sunt, & à plerisque ad morbos numeri referuntur: de quo iam non disputamus; cum ea de re dictum sit in Institutionibus.

Galenus, ut, 4. de loc. affect. cap. 8. refert, quendam vidit, qui grandines erui magnitudine è pulmone eiecit.

MM m. 3

Ipsè

Ipse idem in quodam viro docto & olim Professore huius Academiarum observavi, qui grandines colore albo & duros è pulmone eiecit, & tandem phthisi correptus ac mortuus est. Si materia illa sit copiosior, & in maiorem molem concresecat, calculi inde fiunt; id quod Trallianus, lib. 5. cap. 4. Paulus Aegineta, lib. 3. cap. 31. & alij Autores annotarunt, quos allegavi Institur. lib. 2. part. 2. cap. 9.

Olla pulmonibus impacta vidit Columbus, ut annotavit. lib. 15. Anatomia.

Carunculas etiam & vesiculas piscium vesicis similes interdum è pulmonibus eieci observatum, ut eius rei historias collegit Schenckius, lib. 2. observ. 50.

Tandem quoque vermiculos, & quidem non vnus figuræ, è pulmonibus eiectos, observatum à Medicis, ut apud eundem Schenckium, lib. 2. obs. 51. videre est.

### Causa.

Causa.

Galenus, loco allegato, ex lento humore, qui antea tussi reiciebatur, reento, siccato, induratoque grandines generari statuit. Et reuera humor crassus & viscidus calculorum in pulmonibus est materia, facitque ad concretionem etiam exsiccatio & pulmonum caliditas. Vnde Fernelius, lib. 5. de part. morb. & sympt. c. 10. inuenit in disiectis grandines alios veteris casci consistentia incipientes, alios gypseæ pituitæ duritie. Verum etiam interna vis ad coagulandum tendens, quæ in aliarum partium calculis generandis concurrat & hinc admittenda est; de quo alibi diximus.

Vermium quoque causa, quæ in aliarum partium vermibus concurrat, ut, in Institur. loc. alleg. diximus, etiam hinc locum habet.

### Signa diagnostica.

Signa.

Calculos & vermes in pulmonibus hærentes difficulter omnino cognosci, diximus, capite precedente 4. & vix certo cognoscuntur, nisi tussi reiciantur. Præcedit tamen plerumque hæc mala tussis diuturnior, quæ nullis, etiam efficacissimis, remediis tollitur.

### Prognosticum.

Prognosticum.

Rarè autem hisce malis correpti conualescunt, sed plerumque pulmones à calculis & vermibus, tum à conatu in tussi, quæ ad ea reicienda requiritur, læduntur, vnde phthisis & tandem mors sequitur, ut ex historiis antea allegatis videre est.

### Curatio.

Curatio grandinum & calculorum pulmonum.

Res istæ cum sint toto genere præter naturam, à corpore emotionem indicant, quod quomodo fieri debeat, porro videndum. Quomodo enim qui grandines & calculos è pulmone reiciunt, curandi sint, Galenus & Alexand. Trallianus dissentiant Galenus, 4. de loc. affect. cap. 8. medicamentum in poru dedit, quod asthmaticis exhibetur, vnde æger minorem quidem grandinem expuit, atque in longiore, quam antea intervallo, post plures tandem annos mortuus est. Trallianus verò, loc. allegat. Galenum reprehendit, quod refrigerantia neglexerit, & calida adhibuerit, Mithridatium, Athanasiam, theriacam, & similia acia & extenuantia medicamenta. Verum in eo quidem fallitur Trallianus, quod scribit, Galenum Mithridatium, Athanasiam & theriacam illis, qui grandines reiecerunt, exhibuisse; cum ad vlcus pulmonis ea adhibuisse, ad grandines verò ea, quæ asthmaticis conueniunt, constet. Rem tamen ipsam quod attinet, ea, quæ simpliciter calefaciunt, non adeò conuenire videntur in grandine & calculo iam facto in pulmonibus, cum exsiccando

duriores efficerent, nisi peculiarem vim calculum frangendi habeant, præsertim, si adhuc materia in iis continetur, quæ calefacientium & exsiccantium vñ potius indurari possit. Sed solum conueniunt materiæ grandinæ & calculos facturæ; modò non iam concresecere incipiat.

Dodonæus, ut, observ. med. cap. 11. docet, feliciter vsus est Syrupo hoc modo parato:

℞. Adianti veri, adianti albi, id est, rut. murar. an. 3. lb. glycyrrh. Vnc. ii. rad. rusci, asparag. ana Vnc. i. sem. malua, Dra. ii. aqu. pur. lb. iv.

Coqu. ad remanentiam lb. ii.

Colat. adde sacchari, Vnc. x i i. mell. candidi. Vnc. iij. aqu. hyssop. Vnc. iv.

Coqu. ad Syrupi consistentiam.

Si carunculæ & vesiculæ è pulmonibus reiciantur, exhibeatur loch sanum & expert. de pulmon. vulpis cum flore vel lacte sulphuris.

Ad vermes in pulmonibus genitos utilis est succus marrubij cum melle mistus, quem æger sapius lambat.

### Morbi pulmonis in numero Deficiente.

Aliquando vnus pulmo deest, idque vel ab ortu, ut observavit Columbus, lib. 15. Anatom. vel vbi post abcessus & vulnera corrumpitur. Verum mala hæc incurabilia sunt.

## C A P V T VIII.

### De Tuberculis pulmonis.

PRÆter inflammationem pulmonis, de qua supra dictum, quæ fit ex materia in pulmonis substantiam imbibita, & in totum viscus dispersa, etiam tubercula in pulmone generantur ex materia collecta in vna parte, & inde extuberante; de quibus agit Hippocrates, lib. 1. de morbis, & hoc loco agendum videtur. Sunt autem illa tubercula alia Cruda, quorum, capite 4. etiam mentio facta est, quæ ex materia, quæ nunquam suppuratur, generantur, quorum meminit Hippocrates, lib. 3. de artic. sect. 9. & Galenus, in comm. & 4. de loc. affect. c. vlt. in historia Antipatri, & 6. aph. 46. quæ nunquam ad suppurationem deducta & nulla febre comitante solâ magnitudine, cum admodum adaucta est, exclusis in totum spiritus viis, ægrum interimunt: alia quæ Suppurantur, de quibus præcipue, alleg. modò loc. Hippocrates agit.

Generantur autem ista dupliciter: vel per affluxionem materiæ, vel per congestionem: & per congestionem rursum dupliciter, dum materia in vna aliqua parte solum, sed sine vesiculâ conclusa colligitur, aut materia in cista peculiariter efformata coaceruatur. Materiam verò tuberculorum in pulmone Hippocrates duplicem statuit, bilem & pituitam, id est, humores calidos & frigidos. Proueniunt verò præcipue ab externâ aliqua violentiâ, ut Hippocrates, lib. de salubri dieta, docet his verbis: Quibuscumque autem dolores sunt ex visceribus sine ex exercitiis, sine ex aliquo alio labore, his quiescere conducit cibis abstinentes: potatione autem utantur, quæ quàm paucissima in corpus assumpta plurimum vrina ducat, quo vena visceribus insita non distendantur repleta. Ex talibus enim tubercula oriuntur & febres. Hæc Hippocrates. Etenim siue ex causâ internâ siue externâ venæ violenter distendantur, progerminant, & simul materiam loco distento subministrant, seu sanguinem naturalem, seu humores vitiosos, è quibus formantur tubercula.

Absurdum tamen non videtur, etiam sine externa violentiâ à causâ interna talia tubercula fieri posse. Si enim tumores alij maiores, in quibuscumque corporis partibus,



partibus, nulla externâ violentiâ concurrente, excitari possunt, cur non etiam tubercula hæc eodem modo generari possunt?

### Signa Diagnostica.

Tubercula hæc cognita sunt difficilia. Sic affecti tamen subliuido ferè sunt faciei colore, iisque lingua lentore quodam est oppleta, maximè cum longè à cibo absunt, & corporis agitatione, aut potu ciboque calidiore vrina faciliè tingitur, & pulsus citatur, citra tamen ullam spirandi difficultatem. Interdum verò post concitatioem corporis motum pilulæ parvæ & globuli instar pisi exigui redduntur è pulmone membranula inclusi, qui coneriti digitis pus reddunt interdum foetidissimum. Aliàs tubercula cruda, & quæ non suppurantur, cognitione difficilia sunt, & non, nisi, cum ad tantum incrementum peruenerint, ut spirationem lædant, cognoscuntur. Reliqua quod attinet, si hæc tubercula sint in arteriis læuibus vel in parte arterias læues comprimente, mutantur pulsus in ordine, & inæquales in magnitudine, celeritate, & frequentia fiunt; quæ in æqualitas indies pro ratione augmenti tuberculi augetur, ut quandoque pulsus intermittens intercitat. Si fiant in pulmonum substantia, tussim siccam & leuem quandam spirandi difficultatem excitant, quæ prout tuberculum augetur, & ipsa augetur. Si in arteriis asperis tuberculum tale generetur, statim tussis molesta & spirandi difficultas excitatur, ac pro morbi incremento tussis fit grauior & spirandi difficultas sæpe tanta, ut æger erecta ceruice respirare cogatur, & suffocatio impendat, tandemque æger suffocetur.

Præterea si tubercula sint vel in asperis arteriis, vel in externa pulmonum superficie protuberantia, dolor quidam leuis ægros continuò affligit, & inprimis, ubi vehementius & concitato motu mouentur, ibi spirandi difficultas simul inualefcit.

Si autem tubercula sint vel in arteriis læuibus, vel in pulmonis substantia, nullus dolor percipitur.

Si verò res jam eò redeat, ut suppuratio expectanda sit, febris accedit, nisi materia tuberculi proprio folliculo sit inclusa. Tum enim putridi vapores ad cor exhalare, & febrem accendere nequeunt. Inualefcite jam putredine, omnia accidentia fiunt maiora, dolores majores, tussis vehementior, quæ non amplius sicca est, sed humida, refundante aliqua materia particulâ. Et quidem dolores sunt vel antè vel retrò, prout tuberculum vel ad anteriorem, vel ad posteriorem partem vergit. Nam dum tubercula ista fiunt, & suppurari incipiunt, in membro sensum non habentè dolorem non pariunt; dum verò suppuratione facta extrâ prominent, & membranam pulmonis distendunt, dolorem excitant.

Pertinet huc & locus Hippocratis, lib. 2. de morbis. Si tuberculum, inquit, in pulmone exortum fuerit, tussis detinet, spirandique difficultas, quæ non nisi erecta ceruice obitur, dolor acutus pectus & latera occupat, & ad decimum quartum diem ita afficitur. Plerisque enim tot diebus inflammationem concipit, sed & caput, & palpebras dolor vexat, videre nequit, corpus subsolum euadit, & pusculis velut ex igne rubentibus completur.

Tubercula autem, quæ folliculo suo includuntur, cognoscere difficile est; quia febris hîc nulla excitatur; cum materia in folliculo suo conclusa ad cor vapores mittere non possit. Quo pertinet aphorismus Hippocratis, 41. sect. 6. Quibus suppuratio in corpore abdita non innotescit, ob crassitudinem vel puris vel loci se non prodit. Hinc interdum nonnulli, qui nullâ febre laborant, dilueto tali tuberculo, vel sani euaserunt, pure salubriter rejecto, vel à pure erumpente statim suffocati sunt.

### Prognostica.

1. Ut æger ex hoc malo conualescat, quinque conditiones requirit Hippocrates, loco allegato: 1. est, ut suppuratio citò fiat. 2. ut facta suppuratione pus citò erumpat. 3. ut non ad inferiora, sed ad superiora erumpat, & per tussim reiciatur. 4. ut totum pus euacuetur. 5. ut venter, id est, cauitas illa, in qua pus continebatur, perfectè agglutinetur.

2. Si verò aliqua ex hisce conditionibus desit, æger non conualefcit. Si enim pus non erumpat, æger tandem præcedentibus doloribus vehementibus, inediâ, tussi, febris ut plurimum interit. Si verò tardè erumpat, ægrique viribus jam deficientibus, iisdem de causis æger moritur. Si verò pus non per tussim reiciatur, sed ad inferiora conuertatur, morbus fit vel difficilis vel lethalis. Dum enim tuberculo rupto pus in pulmonem & supra septum transversum effunditur, si à natura id euacuetur integrè, & locus, in quo in pulmone pus continebatur, integrè coalescat, euadunt quidem ægri, sed cum difficultate. Si verò pus non statim euacuetur, vel ægrum suffocat, vel dum supra septum transversum moram agit, id praua qualitate inficit, & tandem corrumpit atque exulcerat, vnde mors sequitur. De quo Hippocrates s. 7. aphor. 8. A tuberculi intus eruptione exsolutio, vomitus & animi defectio fit. Si enim tuberculum subito rumpatur, vapores ex pure subito ad cor penetrant, vnde fit leue animi deliquium, & hinc vomitus vel syncope. Vomitus quidem, si pus extra prorumpit & excernitur (per vomitum enim intelligit omnem per os subito factam euacuationem) syncope autem, si ad interiora pus vergat, & ad cor ruat. Si verò pulmo non exactè sanetur, & cauitas, in qua pus continebatur, non agglutinetur, vlcus paulatim inde generatur, & tandem fit phthisis.

### Curatio.

Cum spes salutis vnica in hoc morbo sita sit in puris citâ & perfectâ euacuatione & pulmonis agglutinatione: id partim fit à natura, partim ab arte. Suppuratio & puris per tussim rejectio quidem à natura instituitur; ut autem pus totum & perfectè expurgetur, naturæ ars succurrere potest. Ita etiam si agglutinatio pulmonis naturæ opus sit: tamen & hîc ars naturam adiuuare potest, & quidem iis medicamentis, quæ postea, de vlcere pulmonis, proponuntur. Ut autem pus sursum vel deorsum erumpat, id prouenit ex situ tuberculi, quæ in re ars naturam nihil iuuare potest.

Curatio.

## CAPVT IX.

### De Hydrope & Hydatidibus pulmonû.

Nonnunquam, & forsân sæpius, quàm vulgò putatur, aqua in pulmone colligitur, quod malum Hydrops pulmonis appellatur; quod descripsisse putatur Hippocrates, 2. de morbis, his verbis: Febris & tussis tenet, & acernatim respirat, & pedes tument, & ungues contrahuntur, & patiuntur talia, qualia is, qui suppuratus est, sed debilius & diuturnius. Et si quid infundas, aut fortum aut suffum adhibeas, pus non sequitur, atque ex hoc sanè cognoueris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentaueris, ebullit intus veluti acetum, & hoc quidem aliquando patitur, postea erumpit ad aluum, & statim quidem sanus esse videtur ac à morbo liberatus. Verum progressu temporis aluus incenditur eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt, venter, scrotum, & facies. In quo loco hoc notandum, etsi in editionibus omnibus legatur, & olet, & ita etiam Foësius hunc locum vertit: quia tamen odor aure non percipitur, rectè vertit

Hydrops pulmonis.

# 692 De Pulmonum cum latere coalitu.

Ian. Cornarius, bullit ingus, & legendum procul dubio. Verum pulmo vix solus hydropem patitur, sed hydrops pulmonis & thoracis ferè concurrent, atque hic ipse locus Hippocratis, quem pro hydropse pulmonis allegant, potius de hydropse pectoris loqui videtur. Ideoque mali huius hoc loco saltem mentionem facere volumus. Postea verò, de hydropse pectoris, seu thoracis, plura hac de re dicentur.

## Hydatides pulmonis.

Hydatides pulmonis.

Cognatum hydropi malum sunt hydatides pulmonis, velicæ scilicet aquâ plenæ, quæ externam ejus superficiem occupant, quæque oriuntur ex seroso & renui humore, qui raram pulmonis substantiam pertransit, & sub membrana ejus, quæ densior est, hæret & subsistit. De quo Hippocrates, lib. de intern. affectib. Fit enim hydrops, si tubercula in pulmone fuerint enata & aqua repleta & in pectore rupta. Quod autem fiat etiam à tuberculis hydrops, testimonium habeo in boue & in cane & in sue. In his quadrupedibus maxime sunt tubercula in pulmone, quæ aquam habent. Si enim disseccatis, cito cognoscas. Nam fluit aqua. Hæc Hippocrates.

## CAPVT X.

### De pulmonum cum latere Coalitu.

Pulmonum cum latere coalitus.

Nonnunquam etiam pulmones cum membrana costas succingente coalescunt. Hippocrates, vel quicumque autor fuerit, pulmonis ad latus prolapsum appellat, & de malo hoc agit, lib. 2. de morbis.

## Causæ.

Causæ interna.

Ortum habet hoc vitium à causâ vel interna, vel externa. A causâ interna interdum à primo ortu & malâ conformatione hoc accidit; interdum postea membrana thoracem inuestienti pulmo agglutinatur, cum pituita aliqua viscida & tenax inter pulmonis lobos & thoracis inembranam inhæret, partesque has duas infarciens implicat ac veluti colligat.

Externa.

A causâ verò externa malum ortum habet, cum confosso aut vulnerato thorace, aut empyemate per sectionem curato, pulmo membrana huic agglutinatur. Quod etiam post pleuritidem fieri impossibile non est. Ut enim aliæ partes vulneratæ, vel exulceratæ; si non rectè tractentur, coalescere possunt; ita & pulmo membrana thoracem inuestienti agglutinari potest. Hippocrates, de locis in homine, addit exsiccationem à siti, dum scribit: Lateralis morbus siccus citra fluxionem oritur, cum ex vehemēti siti pulmo admodum resiccatus fuerit. Pulmo enim cum siccus existat, ubi amplius, quam pro natura, resiccatus fuerit, gracilis evadit, & impotens redditus, ad latus præ impotētia inclinatur, ipsūque contingit, eoque contacto cum humidum existat, ei adhaerescit, & morbum lateralem facit.

## Signa Diagnostica.

Signa.

Si, ut Hippocrates habet, pulmo ad latus prolapsus sit, iussis tenet & erectâ cervice spiratio, (nam pulmo non integer, sed ex altera tantum parte liberè moveri potest) & salina iussu rejiciuntur alba, (nam pituita peccat, isque humor solum ad asperas arterias residet) & dolor ad pectus aut dorsum emergit, & incumbens pulmo impellit, & graue quid in pectore incumbere videtur, & dolores acuti pungunt, (nam ex pulmonis motu eâ parte, quâ pulmo membrana coheret, dolor percipitur, & membrana reliqua huic membranae consentit, dolorque is propter membranam affectam est pungitius) & sanguis fridet veluti pellis, & spirationem prohibet, (sanguis

nimirum in vasis thoracis existens commotus edit sibilum illum, quem lora emollita & aquâ macerata excitant, sanguisque ad intra ex difficili respiratione commotus, & in angustias reductus, sibilum quendam edere videtur, qui tamen non nisi ab ipso ægro percipitur.) Et ad affectum quidem latus decubitus sustinet, non autem ad sanum, verum veluti graue quiddam ipsi de latere dependere videtur, & per pectus se transpirare putat. Etenim dum æger in latere affecto decumbit, pars affecta in proprio loco quiescit, dum autem in oppositum se conuertit, pars affecta distrahitur, & pulmo à latere, cui coheret, quasi auellitur, unde veluti pondus quoddam ex eo latere dependere videtur.

## Prognostica.

1. Malum hoc etsi lethale non sit, tamen molestiam & dolorem non paruum exhibet.
2. Si à primo ortu sit, incurabile est.
3. Coalitus ex siccitate periculosus non est. Intra septimum diem enim coalescit. Hippocrates, de loc. in homine.

## Curatio.

In hoc affectu curando, si malum ab interna causâ, pituita scilicet, ortum habeat, ea præparanda & euacuanda, vt, cap. 4. dictum. Reliquam curationem quod attinet. Hippocrates, loc. alleg. tria instituit. 1. est, vt materia concoquatur & leniatur, qua de causâ bis de die calidâ multâ lauare jubet. 2. Pituitam & materiam, quæ pulmones cum costis connectit, exsiccat & absumit, in quem finem à balneo vinum album modico melle admixto, & dauci & centaurij minor. seminibus tritis additis exhibet. 3. vt pulmo coherens lateri laxetur, & à membranis thoracis separetur, vesicam bubulam aquâ repidâ semiplenam lateri apponit & alligat. Quia tamen idem Hippocrates, 6. epidem. sect. 8. text. 5. eum, cui apex hepatis complicatus erat, concussione corporis sanauit: eadem & hîc, vt pulmo à latere separetur, usurpari potest. Alimenti verò loco prisanæ succum repidum & vinum aquosum suprabibendum præbet.

Si verò à causâ externa hoc malum proueniat, aut cum quis purulentus factus fuerit. Hippocrates mox duplici auxilio utitur. Primò inter os vulneris immittit vesicam fistulâ alligatam, quâ per flatum immixtum possint prædictæ partes separari: deindè penicillum stanneum indit, ac vterius propellit, quò pulmo à coherente membrana separetur.

## CAPVT XI.

### De Pulmonis Vulneribus.

SI thorax de cuius vulneribus postea dicetur, à re aliqua secante, vel perforante vulneretur, ita vt vulnus ad interiora penetret, sæpe pulmo simul cum suis vasis vulneratur.

## Signa Diagnostica.

Vulnerati autem pulmonis signa, vt Celsus, lib. 5. cap. 26. & Paulus Aegineta, lib. 6. cap. 88. docent, sunt, si cum penetrante thoracis vulnere adsit respirationis difficultas, tussis assidua & spumans ex ore sanguinis cum tussi reiectio, & ex pectore rubens spumansque sanguis sine dolore effluit. Cervicis venæ turgidæ sunt, linguæ color mutatur, facies modò rubicunda, modò pallida apparet, & si profundum sit vulnus, tandem pallida remanet.

An verò vas, an potius substantia pulmonis sit vulnerata,

*signa vasa pulmonum vulnerata.*  
nerata, etiam signis quibusdam cognoscitur. Vasorum vulneratorum signa sunt sanguis spumofus interdum rubicundus, interdum niger effluens, perpetua tussis, sicca vel humida, nisi virium imbecillitas aut pulmonum oppressio à sanguine adsit, aut nisi superficialium ac leue sit vulnus.

*signa carnis pulmonum vulnerata.*  
Cum caro pulmonum vulnerata est, nec cruenta exspuitio, nec tussis vlla vrget, quia sanguis in cauum thoracis destillat: sed respiratio est difficilis, vicissitudo caloris & frigoris, propter halitus è corde, qui statim discutuntur, crebra faciei characteris mutatio.

*historia vulnerati pulmonis.*  
Post signa hæc merito recenseo historiam sequentem, quæ de viis etiam, quibus materia è pectore euacuatur, cogitandi ansam præbet. Studiosus quidam anno 1623. mense Iulio, noctu vulnus accepit in pectore, gladio non lato in dextra parte circa costam tertiam propè alam in pectus adacto, & è regione prope spinam exeunte, vt de læso pulmone nihil dubitatum fuerit, cum & spiritus cum sono magno è vulnere exierit, & maxima sanguinis copia è vulnere effusa fuerit. Conquererebatur simul de dolore summo & contractione abdominis, quæ procul dubio à conuulsione partium membranosarum abdominis erat, orta à consensu membranarum thoracis cum membranis abdominis, & procul dubio à tendinibus musculi thoracis quarti læsis. Accedebat & hoc, quod thorax præcipuè circa diaphragma, imò collum etiam manifestè intumescerebat. Primo die sanguis satis copiosus è vulnere effluxit, postea verò nullus: post octo dies tamen è vulnere in dorso pus satis copiosum effluxit aliquot diebus. Tussit verò nihil, neque sanguinem per tussim alicujus momenti eiecit, per dies tamen aliquot sputum album satis copiosum, cum scretu potius, quàm tussi, vnde tumor in collo euauit. Tumor ille, qui ad musculos erat circa diaphragma, ubi humoris sub cure collecti fluctuatio etiam digitis percipiebatur, supra & infra diaphragma, cataplasmatibus discutientibus adhibitis euauit. Primis diebus semel atque iterum etiam aliquid sanguinis per aluum dejectum est. Ex quibus apparet, ad humorum translationem non semper viis manifestis opus esse, sed sufficere etiam Hippocratis occultam *ἐκπόσην*.

### Prognostica.

- Prognostica.*
1. Magna pulmonis vulnera, & præcipuè si vasa magna & bronchia læsa sunt (cum tum sanguis vix sisti possit) plerumque lethalia sunt.
  2. Parua verò, & ubi insignia vasa non sunt læsa, etsi satis periculosa sint, sæpe tamen curantur, cujus rei observationes passim extant. Et ille Studiosus, cujus modò mentionem feci, integrè ante finem mensis portionibus ex plantis vulnerariis & pectoralibus, aliisque conuenientibus medicamentis conualuit, & nunc etiam anno 1629. bene valet.
  3. Refert etiam Andr. à Cruce, *lib. 4. chirurg. tract. 2. cap. 5.* etiam pulmonum lobis, qui per thoracis vulnera prominebant, abscissis ægrum sanatum fuisse.
  4. Si pulmonis vulnere accedit inflammatio, exigua spes est de ejus curatione; quia pus, quod generatur, sine tussi expurgari non potest, qua vulneris conglutinatio impeditur.

### Indicationes & Curatio.

*Indicationes & Curatio.*  
In pulmonis vulneribus danda opera, vt primum sanguinis profusio, quæ ob insignia pulmonis vasa accidere solet, sistatur, & inflammatio, cui pulmo obnoxius est, sistatur, tandemque vulnus glutinetur, sanguis verò, qui in cavitatem thoracis effusus est, euacuetur. Itaque vt inflammatio præcaueatur, nisi antea nimia sanguinis profusione vires dejectæ sint, vena aperienda. Si vulnus sit angustum, vt sanguini exitus non pa-

teat, scalpello ampliandum. In operatione verò æger spiritum emittat, quò pulmones collabantur.

Deinde medicamenta adstringentia & emplastica adhibenda, quæ & sanguinem sistunt, & inflammationem prohibent & vulnus glutinant.

Sunt autem illa medicamenta alia topica, quæ in cavitatem thoracis induntur & infunduntur; alia interna, quæ ore sumuntur.

Topica autem eligenda talia, quæ minimè mordicant, neque malignam aliquam qualitatem obtinent. Atque ob id metallica ferè omnia & salinas qualitates obtinentia, etsi aliis vulneribus commoda sint, in vulneribus pulmonis omittenda.

Commoda ergo hæc sunt *bolus Armena, terra sigillata, thus, mastiche, balauſtia, acacia, tragacantha, gummi Arabicum*, & alia, quæ nullum visceribus internis damnum inferunt.

Fiat ergò puluis ex thuris, mastich. & boli Armenæ part. æqual. qui vulnere seu per cannulam infletur, seu vino nigro austero aut decocto plantag. rosar. rubrar. equiseti dilutus immittatur. Vt verò puluis pulmone vulnerato applicetur, iubendum, vt æger spiritum attrahat, quo pulmones inflentur, spiritumque eo vsque contineat, quò puluere vulnus conspersum sit.

Est & hoc in pectoris vulneribus vtilissimum:

*℞. Rad. consolid. major. sormentill. caryophyll. an. Vnc. sem. rosar. rubr. M. sem. mastich. fol. oliua, ana Drach. ii. myrrh. aloës, ana Drach. i. Coqu. in aqu. hordei.*

*Colat. ℞. ℥. j. syr. myrrin. de rosis siccis, an. Vnc. i. mellis rosati colati Vnc. ii. Misce.*

Interna autem, & quæ per os exhibentur, parantur ex herbis vulnerariis dictis, atque è quibus portiones vulnerariæ parari solent; de quibus in Institut. dictum: è quibus eligantur ea, quæ simul thoraci, pectori & pulmone dicata sunt, aut hæc iis misceantur.

Parantur nimirum ex *fragaria, veronica, scabiosa, alchymilla, virga aur. sanicula*, & aliis hujusmodi. E.g.

*℞. Fragar. sanic. scabios. pulmonar. vtriusque ana M. sem. alchymill. flor. rosar. rubr. scabiosa. an. P. ii. j. jub. N. x. Coqu. in s. q. aquæ hord. f.*

*Colaturæ ℞. ℥. j. Adde julebi rosar. Vnc. ii. Misce.*

*Vel ℞. Achillea, peruinca, veronica, fragar. pulmonar. Gallic. tussilag. ana M. j. fol. labri Veneris, prunell. agrimon. scabiosa, asfer. Attic. sanicul. arnogloss. ana M. j. rad. angelic. Vnc. i. Concisa infundantur in vini albi, aq. scabios. tussilag. ana Vnc. xxxi i. sacch. fini Vnc. iii. Coq. in vase duplici horis vi.*

*Colentur. Dosis Vnc. ij. manè & vesperti.*

Vel hoc, quod etiam in scelopetorum vulneribus commendatur.

*℞. Pulmonar. M. iij. artemisia, consolid. acuta, ana M. j. Adde sacch. opi. Vnc. iij.*

*Coqu. in vini & aq. ℥. sem. in vase duplici.*

*Vel ℞. Hordei mundi M. ii. bulliat ad crepaturam. Postea adde herb. tussilag. veronic. scabios. pulmonar. maculosa & quercin. an. M. sem. sanguisorb. consolid. Sarcenic. alchymill. ana P. ij. cinamomi Drach. iii. j. jubarum N. vi. passul. vino ablut. Vnc. sem. Coqu. & colentur.*

Commendatur in hunc vsu etiam medicamentum, quod diaspermaton appellatur, & Galeno frequenter in vsu fuit in vulneribus pectoris, *5. meth. cap. 13. & 14.* Verum quale illud fuerit, apud Galenum reperire non potui. Etiam si enim apud antiquos quædam diaspermaton descriptiones extant; tamen huic scopo non planè satisfaciunt. Quia verò Galenus id medicamentum exhibuit, vt somnum conciliaret, & sensum doloris lenaret, nonnulli ejus loco electuario diacodion vtuntur, vtpote quod, vt Galenus, *lib. 7. de compos. medicam. sec. loc.* docet, in his, qui somno indigent, & quibus à capite in asperam arteriam fluxiones fiunt, vtile est. Sed quia medicamenti diacodion

varia

variæ exstant descriptiones, hanc huic affectui magis conueniente experientia comprobauit:

*℞. Capit. papauer. albi N.x. nigri N.v. iujub. sebest. an. N.v. sem. laetinc. malu. an. Drach.j. scariol. Drach.ij. cydon. Drach.j. sem.*

Contusa infundantur in aqua *℥b. sem. vel q.s.*

Hinc coqu. ad tertiæ partis consumptionem.

Colaturæ adde *myrrh. croci, hypocist. acacia, ana Drach. sem.*

Atque iterum coqu. ad tertiæ partis consumptionem.

Postea adde *diarragacanth. albi, Vnc. ii.*

Tandemque add. vel mellis *℥b. sem. & coqu. ad mellis consistentiam ac colentur, fiatque Eclegma, vel decocto colato & ad mellis consistentiam cocto add. sacchari q.s. & fiat confectio in Rotulis.*

Æger in latere affecto decumbat, vt sanguis, qui in thoracem effusus est, per vulnus effluat commodius.

Si aliqua pars pulmonis è vulnere emineat, & liuescere ac nigrescere incipiat, atque ita corruptionis notas exhibeat, ea ferro abscindenda.

### Diata.

Diata.

Victus primò sit tenuis, vt bona nutritio etiam in pulmone procuretur. Abstineat æger ab acidis, acerbis, salis, pinguibus. Vratur cibis boni succi, qui mediocrem vim adstringendi & emplasticam habent, ex prislana, oryza, amylo, cydo niis, amygdalis. Vinum parum commodum est, nisi forsàn virium debilitas id requirat. Æger tussim, quantum fieri potest, præcaueat, nec multum loquatur, nec magnâ respiratione vratur, nec rideat. Etiam sanatus motum vehementem caueat, & propterea non statim vel curru vel equo vehatur, vitet iram, clamores, Venerem.

## CAPVT XII.

### De Ulceribus pulmonum, & Phthisi.

Cum post valorum pulmonis apertionem, vt vulnera pulmonis sæpe vlcus pulmonis sequatur, restat tandem, vt inter morbos pulmonis de ejus Vlcere dicatur. Quæ autem de Vlcere pulmonis dici possunt, plerique in capite de phthisi tradere solent; cum vlcera pulmonis phthisis ferè sequi soleat. Quapropter & nos hoc capite aliquam phthicos mentionem faciemus. Etsi enim ipsa phthisis non pulmonis, sed totius corporis affectio sit, causa tamen ejus à pulmone prouenit.

Phthisis.

*Φθίσις*, quam Latini Tabem appellant, vocabulum in genere pro omni totius corporis extenuatione & imminutione, quacunque de causa & occasione orta, accipitur, ita, vt sub eâ comprehendatur non solum ea corporis extenuatio, quæ ab vlcere pulmonis prouenit, sed & *ἀσθμία*, in qua corpus non satis nutritur, ob alimenti defectum, & *σύνις*, hoc est, colliquatio totius corporis, quæ in febribus quibusdã ardentibus, vt & hecicis diuturnis, accidit, vt & *μαρasmus*, seu immodica corporis totius ariditas & consumptio. Imò Cellus *lib. 3. cap. 23.* ad tabem in genere dictam etiam refert cachexiam. Nam etsi in hac corpus vniuersum laxum & humidum conspicitur & propterea non extenuari, sed potius augeri videtur; tamen in ea verum augmentum non est, sed potius, musculosarum partium ab humore aquoso & pituitoso repletio; partes enim ipsæ secundum suam essentiam alimento bono destituuntur. Vnde etiam ubi tandem malum in hydrope degenerat, partes superiores extenuantur, etsi abdomen aqua repletum tumeat.

Verum vltus obtinuit apud Medicos, vt in specie &

frequentissimè *Φθίσις* vocabulum de ea corporis totius extenuatione sumatur, quæ ab vlcere pulmonis prouenit, & Græcis aliàs *ιδίως* & propriè *φθόν* vt ex Galeno, *7. aph. 16.* & definit. *Medic. apparet, vt & αὐτὸν nominatur, vt Aræteus, 1. de caus. & sign. diuturn. cap. 8.* scribit. Quomodo phthisin definimus, quod sit totius corporis extenuatio & macies, à febris putrida & lenta, quæ ab vlcere pulmonis prouenit, ortum habens.

Occupat nimirum hoc malum totum, & phthisis totum corpus subiectum est, quo modo à priuata quorundam partium extenuatione differt.

Extenuatio autem hæc prouenit à febre putridâ, lentâ & tandem etiam interdum hecica, quæ concoctionem alimenti in toto corpore impedit, & calore illo præternaturali id, quod concoctum & appositum est, absorbit. Febris autem ea ortum habet à putridis vaporibus ex vlcere pulmonis ad cor continuè exhalantibus, calorémque præternaturalem in eo accendentibus, qui per arterias cum sanguine & spiritibus in totum corpus diffusus totum corpus calefacit. Febris hæc continua est, lenta & putrida, id quod cum alia, tum vrinæ satis testantur. Accidere tamen potest, vt cum lenta ista febre aliæ febres complicentur, aliàs erraticæ, aliàs tertianæ modo inuadentes. Nam humores intra venas contenti à calore febrili à pulmonis vlcere excitato accensi, putrescentes sui generis febrem sæpe excitant, vnde etiam deliria ante mortem aliquoties obseruauimus, & pro cacoehymia reliquum corpus occupantis ratione, paroxysmis quibusdã interdum ex interuallis seu certis, seu incertis redeuntibus, phthisicorum febres exacerbantur. Id quod etiam in epidemiis constitutionibus accidere potest, vt ex Hippocrate, *1. epidem. comm. 1.* in fine videre est. Febres enim, quæ tanquam populares ex cœli statu, quem ibi describit, ortum habuerunt, tabidos non minus, quàm alios homines corripuerunt. Accidere tamen etiam potest, vt calor ille lentus tandem hecicum sibi adsciscat & inducat.

### Causæ.

Vlcere verò pulmonis, de quo hîc agere præcipue propositum, causæ sunt, quæcunque vel acrimonia vel putredine pulmonis substantiam erodere & corrumpere possunt. Præstantque hoc causæ vel proximæ vel mediæ; internæ vel externæ. Interna & quidem proxima causa est humor acris seu naturâ suâ, scilicet biliosus & serofus; vel ratione acquisitæ putredinis talis, sanguineus nimirum vel humor pituitosus putrescens. Etsi enim si pituita sit dulcis & non nimis copiosa, in pulmone facili non putrescit, sed in sputum naturale abit: tamen si maiore copia ad pulmonem defluat, & bronchia pulmonis obstruat; ipsiusque substantiam humidior reddat, atque ibi diutius hærens ideo non satis ventilari possit, putredinem & acridinem concipit: inprimis si natura jam aliquid acridinis participet.

Materia ista vel in ipso pulmone colligitur & gignitur, vel aliunde influit. In ipso pulmone ortum habet, cum aut in eo humores vitium contrahunt, aut è vase ejus seu rupto, seu eroso, seu vulnere aperto, & omnino post sanguinis sputum, sanguis effusus putrescit, vnde Hippocrates, *7. aphor. 15.* scribit: *A sanguinis sputo, sputum puris malum est*: aut à peripneumonia aut pulmonis vomica introrsum rupta, aut à variolis vlcus in eo relinquitur.

Interdum verò aliunde in pulmonem influit, cum scilicet ex vicinis partibus inflammatis, pleura, mediastino, diaphragmate, aspera arteria materia eò fertur, vt & dum in empyemate pus pulmonem corrumpit; de quo Hippocrates, *5. aphor. 15.* *Qui ex pleuride empyi sunt, si àruptione empyematis intra dies quadraginta repurgantur, liberantur, alioquin transeunt in tabem.* Inprimis



Inprimis cum à capite caracchi frequenter ad pectus defluunt, quorum materia nunc naturâ suâ acris est, nunc, cum in pulmonibus corrumpitur, acrimoniam acquirit, de quo Hippocrates, 7. aph. 38. *Destillationes in ventrem superiorem ad suppurationes perveniunt intra dies viginti.*

Pertinet huc pulmonis à primo ortu vitiosa constitutio, quando pulmonis substantia vitio seminis parentum mollis est, & ad corruptionem propensâ, ut sensum ætatis decursu flaccescat & sponte corrumpatur. Nam ut liberi parentibus similes sunt quoad externa lineamenta; ita & quoad partes internas. Vnde in quibusdam familiis tanquam morbus hæreditarius grassatur phthisis, nullâ etiam humoris ad pulmones destillatione aut transmissione accedente. Et Galenus, 4. de loc. affect. cap. ult. scribit, nonnullos citra manifestum pulmonum vlcus phthisicorum more decessisse, qui primum flava quædam non acria, deinde purulenta, tandem etiam pulmonis particulas exspuerint, sine omni cruore, aut hoc admodum exiguo. Hos simili affectu laborasse censet, qualis in externis partibus aliquando conspicitur, vbi cum putrescente humore pars corrumpitur & pus aut sanies ab eâ emittitur, nullo cruore mixto. Et si enim in talibus neque vas ullum ruptum sit, neque aliunde etiam humor in pulmonem effundatur: tamen ob innatam debilitatem acris humor colligitur in eo, qui tandem pulmonis substantiam corrumpit, & vlceri simile quid inducit, vnde merito ad phthisin hic affectus refertur. Hos Hippocrates *ἰσχυρὸν* & *κατὰ φύσιν* appellat, 3. epidem. text. 70. de quibus postea dicemus.

Externa.

Inter causas externas, quæ proximæ & solæ pulmonem corrumpere & in eo vlcus excitare possunt, est primò Contagium: vnde rectè ab Aristotele, 7. problem. 8. & à Galeno, 1. de differ. febr. cap. 2. phthisis inter morbos contagiosos refertur, nec tuta satis cum phthisicis conversatio habetur; cum *μάρτυρα* illa, quæ phthisici exhalant, ab aliis cum aëre in pulmonem attracta similem in eo dispositionem inducant, & hinc vlcus & phthisin excitare valeant. Deinde Lepus marinus, & si quæ sunt alia venena, quæ occultâ proprietate pulmonibus aduersa sunt, eoque exulcerare possunt.

Mediata  
Internæ.

Reliquæ causæ omnes siue internæ siue externæ, mediæ & remotiores vlcis pulmonis causæ sunt. Inter mediatas seu antecedentes vlcis pulmonis causas, sunt humores vitiosi in corpore collecti, qui vbi postea vel à capite, vel aliunde ad pulmones confluant, vasa in iis aperire, pulmonemque exulcerare valent. Pertinent huc & menses suppressi, de quibus Hippocrates, lib. 1. de morb. mulier. Nonnullis mulieribus cum menses duorum mensium spatio in utero existerent, vbi intercepti fuerint, ad pulmonem feruntur, eademque omnia huius contingunt, quæ in tabe dicta sunt. Quò facit corporis constitutio ad phthisin proclivis, qualis est illorum, quos Hippocrates *ἰσχυρὸν* & *κατὰ φύσιν* appellat, 3. epidem. comm. 3. text. 70. qui, ut Galenus, in comment. & 1. epidem. comm. 1. text. 18. & 2. de temperam. cap. 6. explicat, aded angusto sunt pectore ac restricto, ut à tergo in morem alarum promineant operta scoptula. Præsertim si ob substantiæ mollitiem & hæreditariam constitutionem vitiosam, de quâ antea diximus, plurimum in ipsis excrementi colligatur. Sunt etiam ad phthisin proclives, quibus caput faciliè impletur, quodque ad spiritus organa multas destillationes demittit. Atque hæc duæ causæ si in vnam coeant, thoracis scilicet figura & capitis imbecillitas, eò facilius iis, quibus obrigerunt, tabem inducunt.

Externæ sunt aër vel nimis calidus, resoluens materiam acrem in capite, ut ad pectus defluat; vel frigidus constringens & exprimens, aut vasa pulmonis densando & angustiora reddendo, ea ad rupturam aptiora efficiens, aut etiam tuissimam vehementem, quâ vasa pulmo-

nis rumpuntur, excitans. Inprimis verò aër autumnalis, qui sua inæqualitate frigoris & caloris acutus & lassas destillationes mouet, & ad phthisin propensos insigniter offendit. Vnde Hippocrates, 3. aphor. 10. scribit: *Autumnus tabidis noxius esse*; &, ibidem, aphor. 13. *Æstate sicca & aquilonia, autumno pluvioso & australi vehementes capitis dolores in hyemem & ruses & raucitates & grauedines, nonnullis etiam tabes expectanda*; &, 22. *autumno æstivos etiam multos morbos & febres quartanas & erraticas, aquam inter cutem, phthisin fieri.* Quò pertinent & regionum constitutiones, quæ frigida & humida, huius effectus germanæ sunt, ut Aretæus, lib. 1. de sign. & caus. diurn. cap. 8. loquitur; fumi metallorum, & mora in specubus subterraneis. Deinde cibi potusque acres & lassi, & qui caput vaporibus ejusmodi replent, & alia omnia, ob quæ excrementa acria in capite generantur & pulmoni communicantur. Præterea causæ omnes, quæ vasa pulmonis rumpere & aperire possunt; thoracis contusio, vocis nimia intentio, & similes, thoracis vulnera penetrantia. Vnde Hippocrates, lib. de aëre, aquis & loc. tabem etiam frequenter à partu contingere scribit. Violentiâ enim rupturis & vulneribus prehendantur.

Pertinent huc aphorismi Hippocratis, 3. aphor. 29. *καὶ τῶν αἱμάτων ἐκσπυήσεις, τὰς, febres acuta, epilepsia, aliique morbi, sed præcipuè nunc dicti.* Per *καὶ τῶν αἱμάτων* autem & adolescentes & iuvenes intelligit, ut ipse, 5. aphor. 9. explicat, dum scribit: *Tabes iis maximè ataribus fit, quæ sunt à decimo octavo ad tricesimum quintum.* Non quidem, ut Galenus, in comment. explicat, secundum ætatis naturam, sed ex accidenti ipsius quoque, quia scilicet vel vulnus acceperint, vel contusi sint, vel saltauerint, vel vehementius & consentius vociferati vel refrigerati fuerint, vel humi cubauerint, vel plenitudine nimia aut ejusmodi occasione aliqua in sputum sanguinis inciderint. Ad sanguinis verò sputum tabes consequitur. Quibus & hoc addi potest, quod hac ætate sanguis abundat & à calore funditur, humoresque acres cumulantur, vnde sanguis abundans & calidus vasa rumpere, & humores acres à capite in pulmones elapsi eos erodere possunt.

### Differentia.

Differentias tabis quod attinet, eas quidem nonnulli plures recensent: verum propriè & in specie dictæ tabis, de quâ hîc nobis sermo, tales differentiæ non sunt, quæ omnem corporis contabescientiam, extenuationem & siccitatem, à quacunque causâ profectam, comprehendit. Ob curationem non prætereunda videtur differentia, quod phthisis alia ortum habet à catarrho à cerebro ad pulmones defluente; alia citra hunc ex vasorum pulmonis aut pleuræ inflammatione suppuratâ.

Differentia  
phthisis.

### Signa Diagnostica.

Signa & notas huius mali quod attinet, cum vlcus pulmonis & phthisis saltem in principio curationem suscipiat, confirmata verò & inueterata non curetur; & incipientis & perfectæ ac desperatæ phthiseos notas perfectas habere vritè est. Incipientis autem phthisis signa sunt, tussis diuturna & sputum rotundum diutius apparens, quod materiam crassam à calore excedente in pulmone condensari indicat, quæ temporis tractu acredine acquisitâ pulmonem exulcerat, ut ex Galeno, 6. epidem. comm. 3. t. 36. videre est. Interdum aliquid cruenti rejicitur, & hoc subsistente sordidum & purulentum aliquid. Corpus totum extenuatur, & nullum post cibum sumptum corpori robur accedit, febris adest lenta & continua. Quæ signa omnia confirmantur, si *ἰσχυρὸν* illa corporis dispositio, de qua supra dictum, adit,

Signa phthisis incipientis.

addit, aut familia illa phthisi obnoxia sit, parentesque vel fratres aut sorores phthisi perierint. Praecesserunt causae, quae pulmonem exulcerare possunt, sputum sanguinis, destillatio acris & falsa diu perseverans, & aliae causae supra propositae.

Signa phthi-  
sis perfecta.

Perfecta autem phthisis ex iisdem signis cognoscitur, sed jam evidentioribus & augmentum sumentibus. Si quis enim vel plebeius hominem viderit pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum, hunc verà phthoe laborare pronunciat, ut Aretaeus, 1. de sign. & caus. diuturn. morb. cap. 8. scribit. Cognoscitur nimirum perfecta phthisis ex pulmonum ulcere, febre lentà, continuà & hinc sequente totius corporis macie & extenuatione, ac difficili respiratione.

Signum ul-  
ceris Pulmo-  
nis.

Vlceris autem pulmonis signum est pus per tussim reiectum. Ulcere enim serpente ac sordescente pus excernitur, ac sputa sordida reijciuntur, quorum ut Aretaeus, loco allegat. loquitur, infinita prope sunt species, lividorum, atrorum, purorum ac sincerorum, aut pallido albòque, aut albo & viridi mixtorum, latorum, rotundorum, durorum, glutinosorum, aut rarorum diffusentium, aut odore carentium aut foetide olentium. Quia verò pituita crassa & ipsa puri similis est, imò catarrhi interdum in pectus delapsi, praesertim in juvenibus, deducuntur ad quandam consistentiam puri similem, unde ob putredinem fiunt febres, & corporis macies sequitur, phthisis tamen reuera non est, cum caro aliqua regeneretur: affectus hinc à vera phthisi discernendus est. Vulgò docetur, pituitam à pure duobus discerni, primo, quod pus vel per se, vel certè igni & carbonibus injectum foetidum odorem reddat, qui in pituita non deprehendatur. Deinde quod pus in aquam tepidam projectum descendat, quod pituita cruda non facillè faciat; agitatam quoque facillè dissolvatur, quod à pituita è capite delapsa & in pectore concocta non accadat, quae ob lentorem non facillè dissolvitur.

Verum Aretaeus, loco alleg. hanc explorationem non ita necessariam esse existimat, scribitque: *quicumque aut igne aut aqua humiduantes hic explorat ac notat, hunc videri haud ita multum phthoe dignoscere.* Nam, ut addit, visio quolibet alio sensu certior est, non modò iis, quae reijciuntur, intuendis, sed & agrotantis specie consideranda. Si quis enim, ut antea dictum, vel plebeius hominem viderit pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum, hunc reuera phthoe laborare pronunciat. Neque, ut in aliis etiam partibus, omne pus foetidum est, sed in vlcerebus saltem sordidis. Ideoque Hippocrates non omni phthisi sputum graniter olens tribuit, sed lethali saltem ac pernicioso, 5. aphor. 11. Sunt tamen graueolentiae quidam gradus. Raro omnis foetor à verà phthisi abest, quod vel anhelitus foetidus testatur, ipsique aegri expuentes ferè granem odorem percipiunt; major tamen est graueolentia in lethali phthisi. Febris est continua, lenta, putrida, ut supra dictum, quae tamen noctu exacerbatur & emicat. Totum corpus absumitur & extenuatur. Quibus accedunt & alia: tussis est molesta, quae, qualia memorauimus, reijciuntur. Respiratio est difficilis, non solum ob facultatis imbecillitatem, sed & quia bronchia pulmonis obstruuntur, tum ob puris copiam, quae ab ulcere in ea transmittitur, tum ob multa excrementa, quae in pulmone debilitato colliguntur. Quibus accedit, quod ipsum viscus ulcere debilitatum & saepe magna ex parte consumptum materiam collectam satis rejicere non potest. Pulsus inaequaliter sese habent, modò sunt languidi, modò sunt celeres, nunc duri, nunc molles: molles quidem ob materiam humidam arterias humectantem; duri autem, ubi calor corpus exsiccauit. Sapius etiam sudant phthistici, ob facultatis naturalis debilitatem, quae & naturales humores

& excrementitios retinere nequit. Malo tandem confirmato inueteratoque pus indies magis foetidum redditur, & saepe putris pulmonum portio, ac bronchiorum ac vasorum pulmonis ramenta aut crustulae quaedam tussi reijciuntur. Fauces, ut Hippocrates, lib. de intern. affect. habet, sono implentur, & veluti per arundinem sibilum reddunt. Tandem capilli destuunt, ob alimenti corruptionem & penuriam. Vngues incuruantur, absumpra carne, quae in summis digitis exstebat, vnguèque firmabat. Mala liuescunt, nisi, quod post sumptum cibum sit, vaporibus sursum eleuatis, rubescant. Pediculi copiose generantur ob alimenti corruptionem. Extrema & pedes calore languescunt intumescunt. Superuenit denique his omnibus diarrhoea ex reentricis ventriculi & intestinorum imbecillitate, imò & humorum corruptione. Nonnulli etiam ante mortem mente vacillant, sed sine aliqua furoris commotione. Atque ita tandem ob febrem, sudores, alui profluvium, consumpto toto corpore, sputoque ob virium imbecillitatem retento, mors sequitur.

### Prognostica.

1. Omnis phthisis grauis & periculosus morbus est, tum ob causam, vlcus scilicet pulmonis, quod curatu est difficillimum, tum ob symptomata & quae id consequuntur, febrem, totiusque corporis consumptionem. Est verò vlcus pulmonis curatu difficile, non tam ob pulmonum motum continuum, quam quod sanies & pus in molli & spongiosa illa carne haerens citra tussim expurgari nequit, quae pulmones indies magis laeduntur. Quibus accedit, quod medicamenta integris viribus tanto intervallo ad pulmones non perueniunt. Reddit quoque febris adjuncta & hanc sequens corporis consumptio curationem difficilem. Febris enim & macies corporis humectantia requirunt, quae vlceri nocent: contra vlcus detergentia & siccantia postulat, quae adjunctae febris & corporis consumptioni non conueniunt. Hinc Galenus, 5. meth. meth. cap. 8. concludit, quod rupto in pulmone vase, nisi statim, antequam phlegmone accedat, vlcus sanetur, exigua sanationis spes supersit. Licet enim diligentia adhibita vlcus interdum siccetur, & labris ejus nonnihil induratis, & quasi callo obductis, spes aliqua affulgere videatur: tamen leni occasione callo decedente malum recrudescit, ut idem, 4. de loc. affect. cap. 5. docet.

2. Et si verò phthisis, si vlcus sit profundum & diuturnum, planè incurabilis, quae verò ab ulcere paruo & non diuturno provenit, & ipsa curatu difficilis est: non tamen planè incurabilis est, si maturè ei conuenientia remedia adhibeantur; & passim exempla curatorum phthisticorum à Medicis annotata reperiuntur, quorum aliqua collegit Ioh. Schenkius, lib. 2. obseru. 144. 145. 146. de qua re infra, in quaestione, dicetur.

3. Est praeterea phthisis saepe malum diuturnum, & quod in multos annos prorahitur. Refertque Auicennas, lib. 3. fen. 10. tract. 5. cap. 18. se vidisse mulierem phthiscam vixisse circiter viginti tres annos: & Matth. de Gradibus, in 9. Rhaf. cap. 5. 4. aliam mulierem phthiscam, quae citra furnum & ignem quotidie occupabatur, plus viginti octo annis vixisse scribit. Cujus rei exempla alia apud alios Medicos occurrunt.

4. Phthisis ex ulcere, ex erosione in pulmone facto, ferè insanabilis est. Nam longiore tempore ad hoc vitium corrigendum opus est, ut Galenus, 5. meth. med. cap. 8. & 14. docet. In tempore autem longo alterum duorum fiat necesse est. Velenim, si vlcus vehementer exsiccare conamur, antequam acrimonia humoris satis obtusa sit, id non consequimur; vel si humoris acrimoniam corrigere studemus, sordidum interea fiet vlcus & incurabile.

5. Hippocrates, 2. prorrh. sex signa proponit, quae

in conualituro apparere debent. Eum, inquit, qui probè liberati volet, oportet facillè sputum per ruffim reuicere, idque album & æquale, & eiusdem coloris & ἀπλὴν. Quod verò à capite defluit, oportet ad nares conuerti; (ne scilicet malum ex affluente in pectus humore augeatur) febrem autem non inuadere, (putridam scilicet noctu) quæ cœnam prohibeat, neque sitim faciat. Alius autem quotidie deliciat, & id, quod egerit, durum sit. (scilicet consistentia mediocri, non fluidum,) copia iis, quæ assumuntur, respondens. Hominem verò ipsum quàm minimè extenuari conuenit: pectus autem quadratum & hirsutum, cuiusque cartilago exigua & admodum carnosâ est. In quo hæc omnia inueniuntur, maximè superstes erit: qui verò nihil horum habet, interitui proximus est.

6. Si nimirum sputum, quod phthisici exspuunt, vel per se vel carbonibus iniectum grauiter olet, & capilli defluunt, periculosum signum est, 5. aphor. 1. 1. quod magnam corruptionem in substantia pulmonis, & alimenti penuriam vel corruptionem significat. Superuiente autem alui fluxione tabidi moriuntur, & in propinquo mors est, ibid. aphor. 1. 2. quam & facies Hippocratica dicta, 1. prognost. descripta denotat. Quod idem docet, lib. 2. de morbis. Siquidem, inquit, autumnus, jam capilli ex capite huic defluunt, caputque velut ex morbo nudatur, & super prunas exspuens sputum grauiter olet, hunc intra breue tempus periturum asseritur, & ex alui profusio periturum. Vbi enim jam pus circa cor computruit, id prunis impositum nidorem exhalat, & unâ incallescens cerebrum saluginem emittit, quæ aluum ciet; cuius rei indicium est, quod capilli à capite defluunt. Hunc cum ita habuerit, non curatio. Quo loco Autor fluxus alui phthisicis superuientis vnicam causam ponit humorem saluginosum à capite defluentem. Verum frequentior huius symptomatis causa est virium naturalium summa imbecillitas, & interdum etiam acris sanies à pulmonibus ulceratis resultans.

7. A puris sputis phthisis & fluxio, cum verò sputum retentum fuerit, moriuntur, 7. aph. 16. Tamdiu enim, ut Galenus, in comment. addit, phthisici viuunt, quamdiu extussire: & per sputa pulmonem expurgare possunt. Vbi verò intus ipsa remanent, respirationis obstruuntur viæ, & ægri suffocantur.

### Indicationes.

Indicationes. Cum ergò phthisis malum tam periculosum sit, maturè ei occurrendum. Et quamuis incurabilis plerumque videatur, tamen ægri sine auxilio non sunt relinquendi: cum non solum, quod Aretio dixit, quandoque monstra in Medicina fiant & qui desperati videbantur, sanitati restitutos fuisse, sed etiam nonnullos, licet non planè conualuerint, adhibitis idoneis medicamentis, vitam diu protraxissè, historiarum medicarum passim annotata testentur.

A tribus autem hæc indicationes sumuntur: ab ulcere pulmonis, à febre, quæ coniungitur, & à corporis totius, macie & consumptione. Indicatio autem præcipua in phthisi ab ulcere pulmonis, ut fonte & causa huius mali, petitur, quo sanato & febris euanesceat, & corpus iterum incrementum sumit. Vlcus autem abstergendum, substantia pulmonis regeneranda tandemque vlcus consolidandum. Febris refrigerantia & humectantia indicat. Corpus tandem exsiccatum & extenuatum humectandum & nutritione instaurandum. Quæ indicationes cum sint contrariæ, ita moderandæ, ne, dum vni attendimus, alterum negligamus. Et quidem si spes sanandi vlcus adhuc supersit, cura præcipue ad vlcus dirigenda. Quod si res iam planè deplorata & nulla spes vlcus curandi amplius supersit, humectantibus solum, refrigerantibus & nutrientibus corpus extenuatum reficiendum. Sic enim vita aliquandiu protrahitur. Quo in casu etiam medi-

camenta, quæ vlceri conueniunt, & corpori extenuato profunt, ita misceri & temperari possunt, ut medicamenta vna parte vlcus purgent, abstergant & siccent, alterâ verò corpus reficiant.

### Curatio.

Primò ergò vlcus curationem quod attinet, etsi Curatio. plerumque hunc scopum, ut difficiliorem, minus accurate persequuntur: tamen cum reliqua curatio, febris puta & corporis extenuati instauratio, fieri non possit, nisi vlcus sanatum fuerit, omnino de vlcus curatione diligenter dispiciendum. Etsi autem vlcus consolidatio naturæ opus sit: tamen Medicum remouere oportet impedimenta, quæ naturam in opere suo remorari possunt.

Primò nimirum humores siue in toto corpore, siue in capite consistentes & ad pectus affluentes, sunt euacuandi, & corpus à cacochymia liberandum. Si enim cacochymia in toto adsit, & humores affluentes malum augeant & foueant, febremque ipsam grauiorem reddant, tabesque ipsa nondum confirmata sit; lenia purgantia, quæ simul thoraci & vlceri prodesse, & fluxionem humorum auertere possint, exhibenda. Tale medicamentum est rhabarbarum cum infusione rosarum & sero caprino datum. Item rhabarbarum cum passulis maioribus sumptum, aut conserva rosar. cum rhabarb. data: syrupus item rosar. solut. ius galli antiqui, in quo manna dissoluta sit. Potest & cassia usurpari.

Ius galli antiqui sic paratur:

℞. Gallum antiquum, & in ventre eius ponantur sequentia:

℞. Passular. mundat. par. xx. iuiq. sebesten. an. N. x. medulla sem. carthami Vnc. vj.

Coq. in aqu. lb. vi. ad consumptionem tertiæ partis. Utatur manè iusculò. Potest & manna Vnc. j. vel ℥. ij. addi.

Vel ℞. Decocti scabios. ruffilag. sem. melonum, trium flor. cordialium, an. ℥. iij.

In quibus dissolue manna Vnc. i. sem. syr. viol. ℥. j. Misce.

Vel ℞. Flor. cassia Vnc. i. pulu. glycyrrhiz. Scrup. j.

Cum saccharo.

Fiat Bolus.

Vtiles sunt & clysteres lenientes, qui excrementa non solum euacuare possunt, sed & corporis caliditatem & siccitatem emendare. Validioribus verò purgantibus medicamentis hæc nullus locus est, ut & sanguinis missioni; cum corpus extenuatum & consumptum, viresque deiectione eam non admittant. Et licet Hippocrates, 5. epidem. & Galenus, 6. epidem. cum. 3. text. 29. tabidis seu extenuatis venam cum commodo aperuerint: phthisici tamen ij non fuerunt, sed graciles & extenuari, vel ob calorem sanguinis nimium, vel ob eiusdem euacuationem suppressam. Et licet etiam nonnulli purgantibus fortioribus, ut pilulis coctiis, & similibus vtantur: id tamen potius imminente, & præsertim ob catarrhum, phthisi, quàm iam præsentem locum habet. In primis verò videndum, an malum adhuc à catarrho à capite destillante foueatur. Tum enim danda opera, ut is quamprimum sistatur & à pectore auertatur. Nam frustra in curatione vlcus pulmonis tempus teritur, nisi fluxio prius cohibita vel aliò conuersa fuerit. Quâ ratione autem hoc præstandum sit, ex doctrina de catarrho pater. Et si fluxio sit diuturna, nullo tutiore inter initia remedio materia aliò auertitur, quàm fonticulo in altero vel utroque brachio aperto. In morbi verò progressu æger iam imbecillior frustra cauteriis vel fonticulis cruciatur.

Deinde ipsum vlcus pulmonis quod attinet, ad eius curationem duo medicamentorum genera requiruntur: abstergentia & consolidantia. Primò ergò adhibeantur

Curatio mali à catarrho.

Ipsius vlcus pulmonis curatio.

beantur ea, quæ vlceris deterfioni inferuiunt, & quod deterium est, tuffi & fputo leniter educere valent, (expectorantia vocant) ne sordes in pulmone subsistant, eumque amplius corrumpant. Huic vsui inferuiunt, *aq. saccharata & aq. mulsæ*. Nam mel crudum valde abstergit. Fortiora sunt *succus caulium, tussilago, capill. Vener. hyssopus, scabiosa, marrubium, agrimonia, radix iridis, aristolochia, heleny, terebinthina, & ex his parata medicamenta*.

Vt *℥. Marrubij M. j. hyssopi, scabiosa an. M. ℞.*

Coq. in aq. ℥. iij. ad tertiæ partis consumptionem.

Adde mellis ℥. ℞.

Iterum ebulliant & despumentur.

Vel *℥. Butyri recent. s. fale. ℥. ij. terebinthina abietis pellucida. ℥. j. mel. el. ℥. iij. M. F. Bolus.*

Postquam vlcus detersum est, glutinationi incumbendum. Inter glutinantia autem medicamenta facile primas obtinent *rosæ, bolus Armen. terra sigillata*. Quibus addi possunt *lapis hamatis, radix symphyti maior, consolida media, plantago, scabiosa, pulmonaria, pulmonaria Gallica tenuifolia Tabernamontani, nonnullis herba costæ dicta, quæ speciei hieracij est, veronica, hederæ terrestris, botrys, ros Solis, sanicula, flores hyperici*: è quibus varia medicamenta parantur, quibus etiam *pulmo vulpis* & alia peculiariter pulmoni dicata admisceantur. Auicennas: *lib. 3. fen. 10. r. 5. cap. 6.* miris modis commendat *conseruam rosarum*, refertque mulierem quandam phthysicam & morti destinatam eius vsu ita curatam fuisse, vt non solum sana, sed & pinguis redderetur. Idem Mesueus, *cap. de phthisi*, & alij Medici testantur. Vis enim abstergendi & consolidandi rosæ inest, saccharumque etiam abstergit simulque nutrit. Sunt tamen quædam conditiones in vsu conseruæ rosarum obseruandæ. Prima est, vt Mesues, *loco alleg. monet*, vt abstergentia & mundificantia præmittantur, ac proinde initio conserua rosarum recens, quæ plus succi, ac proinde vim abstergendi maiorem habet, adhibeatur. Secunda, vt magna quantitate exhibeatur, & quotidie imò cum pane & cibo ac potu sumatur. Tertia, vt si ob eius vsu sputum retineatur, & difficilis respiratio reddatur, syrupus de hyssopo vel alia expectorantia per interualla exhibeantur. Vtilis est & *conserua pilosella*.

Conseruæ rosarum & alia enumerata medicamenta commodè miscentur, vt *terra sigillata, bolus Armena, syrupus vel puluis symphyti maj.*

Vt *℥. Conseru. rosar. ℥. iij. pulu. rad. consolid. ℥. j. ℞. boli Armenæ, pulmon. vulpis, an. ℞. ij. Cum syrupo myrtino F. Electuarium.*

Vel *℥. Conseru. rosar. ℥. iij. loch. de pulmon. vulp. ℥. j. spec. diatr. frig. Drach. ij. boli Armenæ, terr. sigill. lap. hamat. rad. symphyt. an. Drach. j. Cum syrupo myrtino.*

F. Linctus.

Vel *℥. Radic. tormentill. M. j.*

Coqu. in vino ad consumptionem tertiæ partis.

Adde conseru. ros. antiq. ℥. iij.

Vel *℥. Millefol. vulgaris M. iij. millefol. purpurei M. ij. herbar. & radic. tormentill. sanguisorba pimpinella, an. M. j.*

Contusis adde conseru. rosar. antiq. ℥. iij. Affunde aq. symphyti, plantag. an. ℥. xxxi. tormentill. pimpinell. an. ℥. xvi.

Coq. in vase duplici. Colentur,

Vel *℥. Pulu. pulmonar. aurea ℥. j. conseru. rosar. antiq. ℥. iij. Cum syr. myrtino.*

F. Electuarium.

Langius aquam hederæ terrestris cum sacch. ros. antiquo nouem diebus potam laudat.

Pertinent huc & aquæ, quæ ex pulmone & hepate vituli destillantur.

Vt *℥. Veronica, hederæ terrestris, botrys, salvia, pulmonaria aurea, pilosella, an. M. j. radic. tussilag. Vnc. j.*

Infundantur in aq. hederæ terrestris, pimpinell. sanguisorba, an. q. l. vini albi. ℥. j. ℞.

Horis 24. addito pulmone & hepate vituli conciso. Postea destillantur. Potest & conseru. rosar. addi, vel in destillato dissolui.

Vel *℥. Cancror. N. L. X.*

Coq. in lacte caprino.

Postea *℥. pulmones & hepar vituli*. Similiter decoquantur in lacte caprino & probe contendantur, iisque adde *fol. salvia minor, passul. minor. ana ad pondus cancerum & pulmonum*. Misce.

Postea *℥. Glycyrrh. ℥. ℞. fol. scabiosa cum flor. quart. j. hyssopi ℥. ℞.*

Agitentur probe & destillantur per alembicum. Aqua seruetur in vitro, cui iniice *manus Christi perlat. q. v.* Dosis manè, in meridie & vesperi cochlear. ij.

Mercatus hunc Syrupum commendat:

*℥. Hordei torrefacti ℥. iij. cancerorum fluuiatilium bene lotorum & crasso modo conseruorum N. xii. capill. verneris, polyrichi, an. M. ℞. parietaria, hyssopi, heleny, verbenæ, verbasci, fol. vrticæ. an. M. j. baccar. lauri, sem. papau. albi, an. ℥. ℞. inubar. sebesten. passular, an. Vnc. j. carnis testudinis prius lora vino albo ℥. ij.*

Bulliant omnia ad perfectam coctionem.

Colat. *℥. ℥. iij. sacch. albi ℥. ij.*

F. Syrupus, de quo æger sumat manè ℥. ij.

Insignem quoque phthysicorum vlcera curandi vim habet decoctum ligni Guaiaci & à plurimis doctissimis Medicis, Francisco Arceo, *lib. de vulneribus & febribus curandis*, Thoma Erasto, *in consiliis à Scholtzio collectis, consil. 88.* atque aliis commendatur. Est & vtile decoctum radicis China. Quanquam enim ista decocta corpus exsiccare videantur: tamen commodum, quod ex vlcere pulmonis sanato prouenit, longè maius est. Cum enim macies illa corporis ex vlcere pulmonis ortum habeat: decocta talia causam extenuationis corporis tollendo, vitiosos humores acsumendo & vlcus curando, faciunt, vt corpora extenuata iterum benè nutrantur, & pingua reddantur: id quod ipsa experientia sæpe docuit. Febris tamen ratio habenda. Nam si hectica coniungatur, ab his abstinendum. Veteres valde exsiccantibus utebantur, quibus callus vlceri pulmonis induceretur, vt *theriacæ, Mithridatio. Galenus, 5. meth. med. cap. 6.* ad sputum sanguinis ex erosione, vt materia purulenta in vlcere absumatur, vlcusque claudatur, *pastillis, Pasonis, Andron. Polyda* vtitur. Dioscorides sulphur vinum exhibet. Hinc Chymici commendant contra phthysin è sulphure parata medicamenta, vt *sulphuris flores, balsamum & lac.*

Exempl. gr.

*℥. Lactis Sulphur. Drach. ℞. magister. corallor. perlar. an. Scrup. ℞. emuls. sem. melon. cum aq. tussilag. vel veronic. factæ ℥. ij. iuleb. rosar. 3. vj. aq. cinamomi, manus Christi. perl. an. 3. ij. Misce.*

[ Crollius, in Basilica Chymica, scribit, quod De vsu lactis sulphuris sit balsamum humidi radicalis, virisque confortet naturales, hecticas & aridas peculiariter suæ confortatione proficit, si cum aqua cinnamomi misceatur. Verum vt in suis medicamentis sæpe nimius & falsus est Crollius: ita etiam hic lectorem suis istis lactis sulphuris encomiis in errorem maximum inducere potest. Sit enim sanè, vt phthysicis & tabidis ab vlcere pulmonis prodesse possit, de quo iam non disputo; tamen id non facit humidum radicale augendo, quod vult Crollius, sed vlcus exsiccando; quo modo phthysicos decoctum ligni Guaiaci curat.

Quod verò lac sulphuris humidi radicalis balsamum sit, & hecticas propriè dictis, seu tabidis à febre, sine vlcere pulmonis, prodesse possit, & rationi & experientia repugnat. Humidum radicale nonnisi alimentis humectantibus conseruatur & instauratur. Ac sulphur, vt pote minerale, non alit, sed instar ignis consumit & exsiccat, & sudores potèter mouet; ynde tantum abest, vt

De vsu lactis sulphuris in hectica.



ut hecicis utile medicamentum sit, ut potius iis plurimum nocere possit.

Non solum autem ad exsiccationem vlcis glutationem interna medicamenta faciunt, sed & externa utilia sunt, si scilicet eorum vapor & halitus vel per os vel per nares inspiratione attrahatur. Quod vel aer docet, de quo infra in dieta dicitur. Per os ut attrahantur medicamenta idonea in vino vel liquore conueniente coqui, & eorum vapor excipi atque attrahi potest, vel pulvis conueniens ex *thure, mastiche, rosis, myrrha, benzoe* carbonibus aut ferro candenti inspergi, idemque fumus spiritu attrahi potest. Dioscorides etiam, suffitu sulphuris vitur.

Per nares quæ attrahuntur, sint suaueolentia, quorumque vapor inspiratione attractus vlcus exsiccate potest. Talia describit Aëtius, *tetrab. 4. serm. 4. cap. 113, 114, & 115*, ad quorum imitationem & alia componere licet ex *thure, myrrha, rosis, ladano, benzoe, santalis, cinamomo*. Recentiores commendant suffitum ex *Nicotiana* seu *tabaco*. Habentque hæc, quæ cum aëre attracto miscentur, suffumigia & odoramenta præ reliquis hanc prerogatiuam, quod vlcus siccant, reliquum tamen corpus non ita afficiunt. Aëtius, *tetrab. 2. serm. 4. cap. 67*, etiam topica applicat in phthisi. Initio quidem, dum materia præparatur ad educationem per tussim, cataplasma ex *althæa & sem. lini contusis & cum decoctione malui & sanigraci & cum oleo & melle mixtis*. Dum tussi expurgandum est, epithema ex *terebinthina oleo irino, butyro, medulla cervi, adipe tauri, farina iridis, æsypo*, partibus æqualibus mixtis. Dum cicatrix inducenda est, oleo *rosar. myrrino cum acacia, malicorio, hypocistide, alumine scissili, gallis, sumach, additis*, postulate vsu, quoque aliis, sicut apud ipsum videre licet. In concoquentibus tamen & tussi expurgantibus ea cautio adhibeatur, ne intempestiuo illorum vsu exulceratus pulmo magis offendatur. Tutius *κολλητικοί & επωλυστικοί* suo tempore vitur.

Corporis extenuationem & maciem ac febrem quod attinet, illi per ea, quæ ad corpus nostrum instaurandum faciunt, succurrendum; hæc per refrigerantia & humectantia tollenda. Ad corpus instaurandum faciunt, quæ alimentum boni & multi succi præbent, quæ ex *pulpis carniū gallinarum, caponum, phasianorum, perdicum, cancrorum fluuiatiliū, vel nostrorum gammarorum* sumuntur, de quibus postea, in dieta dicitur. Et commodissima hinc sunt iura instaurantia seu consummata dicta. Vtiles sunt & alij cibi, ut & medicamenta, quæ parantur ex *hordeo, amygdali dulci, pineis, pistaceis, seminib. frig. maior. ex corticis, amylo, tragacanthæ, gummi Arabici, saccharo penidi*. Hinc exhiberi potest cremor hordei vel *anena cum emulsione amygd. dulci*. cui aliquid *pulueris Haly*, de quo postea, cum *conserua rosar.* addi potest.

Commodissima autem hinc sunt medicamenta, quæ omnibus scopis satisfaciunt, vlcus nimirum consolidant, corpus emaciatum instaurant, caloremque febrilem mitigant. Inter quæ primas facile Lac tenet, & quod, ut Galenus, *3. de alim. facult. cap. 15. de cibis boni & mali succi cap. 4. 5. meth. med. cap. 12. 7. meth. med. cap. 6.* docet, curandis phthysicis vix quid præstantius datur, ut postea, de dieta, dicitur. Et ut efficacius sit lac, viretque medicamentosa, quæ expetuntur, acquirit, potest animal, cuius lac expetitur, in conuenientibus pascuis nutriti, qualem ad pascua locum describit Galenus, *5. meth. med. cap. 12. & 10. meth. med. cap. 11.* vel capris plantæ phthysicis conuenientes loco pabuli præberi possunt. Vtile est & hoc:

*℞. Oxygala seu lactis, è quo butyrum sit separatum lb. sem.*

Stet nocte vna sub dio, & postea fortiter agitur, & spuma detrahatur.

Postea adde *conserua rosar. 3. lb. boli Armena 3. j. Misce.*

Commendatur à plurimis etiam pulvis Haly Abbatis, lib. 6. præf. c. 2. descriptus.

*℞. Papan. alb. Drach. x. gummi Arabici amyli, an. 3. iij. sem. portulac. malua, althæa, ana Drach. v. cucurb. cucum. citrull. cydonior. ana Drach. vij. spody, glycyrrhiz. tragacanth. an. 3. iij.*

F. Pulvis.

Valefcus de Taranta addit *sacchari penidi* ad pondus omnium. Atque isto puluere & sequente Electuario Valefcus de Taranta Monachum phthysicum iam deploratum se curasse refert.

*℞. Corall. rubr. carabe, lycij, terra sigill. hypocistid. amyli, spody, glycyrrhiz. & succi eius, sem. 4. frig. maior. minor. gummi Arab. tragacanth. rosar. rubr. an. Dra. j. pinear. mundat. pistacior. amygd. dulc. an. 3. j.*

Torrefacienda torrefiant &

F. Pulvis.

*℞. Pulueris huius 3. j. lb. sacchar. q. s. conserua capill. Veneris symphyt. testudin. an. 3. lb.*

M. F. Electuarium.

Rondeletius Puluerem istum hoc modo præstantiorem fore scribit:

*℞. Sem. papau. albi, Drach. lb. gummi tragacanth. Arabici farina orobi an. Drach. j. sem. sem. althæa portulaca, cucumer. melon. citrulli, bombac. ana Drach. iij. lb. cineris cancrorum fluuiatiliū, corall. alb. vst. preparat. succi glycyrrh. ana. Drach. j. lb. sacch. rosar. tabulati ad pondus omnium.*

F. Pulvis.

Dentur 3. ij. cum syrupo de papanere vel iuinbino.

Est & sequens utile:

*℞. Nuc. Indic. pistacior. sem. 4. frig. maior. amygdal. dulc. an. 3. j. lb. sacch. penid. 3. lb. gummi Arabici 3. ij. sem. malua, lactuca, an. 3. ij. tragac. sem. cydonior. macis, caryophyll. an. 3. lb. anisi 3. j. glycyrrhiza rasa 3. j. lb. cinamom. Drach. ij. carnis testudinis, vel pulpa phasianæ aut caponis, 3. vj. sacch. opt. lb. iij. aq. rosar. opt. q. s.*

Fiant Morsuli vel panis Martius Plinius etiam, lib. 28. c. 17. medicamenta quædam ad phthysin habet.

Nonnulli etiam balnea aquæ dulcis repida adhibent ad corpus humectandum. Verum id potius hecicis simpliciter, quàm phthysicis, conuenit. Et in phthysicis, etsi ad hecicam declinent, non habet locum nisi vlcus ab omnibus sordibus repurgatum & consolidatum sit, corpusque siccatum balneo ad alimentum re-ctius succipiendum præparandum sit.

### Dieta.

Phthysici omnem aëris in calore & frigore excessum Diata, nimum, subitaque eius mutationes, ut & aërem pluuiosum vitent. Siccus verò aer ad vlcera pulmonis sananda utilissimus est, siue natura talis, siue arte comparatus. Antiqui hac de causa suos phthysicos ad Tabios mittebant, monticulum inter Surrentum & Neapolim, locum nonnihil calidum & præcipue siccum ob Vesunij montis, instar Aetnæ perpetuo flammam euomentis, viciniam, quem describit Galenus *5. meth. med. cap. 12.* Commodum quoque est hac de causa loca piceis & similibus arboribus abundantia incolere. De quo Plinius, lib. 24. cap. 16. Constat, inquit, illum celi aëra plus ita, quam navigationem Agyptiam proficere, plus quàm lactis herbidos per montium aestuaportus. Possent ergo etiam ligna hæc resinosa in phthysi curanda possit, testatur trita illa mulieris historia, quæ cum annis aliquot ad furnum artem pistariam exercens versaretur, sicco aëre inspiratione attracto, & vlcere ita exsiccato, vitam diu protraxit. Quod tamen intelligendum est, ubi spes aliqua sanitatis recuperanda superest. Si enim de vlcere curatione desperetur, ægerque ad extremam maciem iam sit deductus,

aër talis vlcus non sanabit, ægro verò mortem accelerabit. Celsus hac de causa navigationes longas præcipit, iis quidem, qui tam robusti adhuc sunt, ut peregrinationem suscipere possint: cum ut Aretæus, de curat. morb. diurn. lib. 1. c. 8. scribit, *pulmonis vlceribus quiddam siccum marina salsedo communicet*. Eadem de causa ex Italia in Ægyptum nauigare suadebant. Aliàs æger ab omnibus animi & corporis motibus vehementibus sibi temperet.

Cibus.

Cibi sint boni succi, faciles coctu & multi nutriti, cuiusmodi parantur ex hordeo, auena, amygdalis, ut & alica, amylo & oryza. Et quidem in principio cibi abstergendi vim habeant, hinc glutinandi & consolidandi. Parentur igitur in principio ex hordeo, hinc alica, amylo & oryza. De alica tamen, amylo, & oryza & eiusmodi cibis notandum, quod etsi mali succi non sunt, succum tamen præbent lentum & crassum, ideoque sola & sine præparatione non sunt exhibenda, sed aliis coctu facilibus admistis, & quidem in forma forbili, & propterea cum iusculis bonarum carniū præparanda. Quo modo & reliquis cibis vim melius nutriendi inprimunt, & à calore debili facilius concoquuntur. Id quod Galenus, 7. meth. med. cap. 6. docet, dum scribit. *Nec planè quod maximè nutriat, optimum est iis corporibus, quæ refici magis egent, utpote quibus concoquendi facultas non est, neque etiam quod facilissimum concoctu est, cum scilicet ipsum nequeat esse maximè nutriendum. Cum igitur hæc duo indicationes ex aduerso pugnent, committendum non est, ut dum alteri nimium sis intentus, alterius omnino obliuiscaris, sed utriusque memor, quo adliceat, utrumque misceas.*

Et quia phthifici multo nutrimento indigent, ob caloris verò natiui debilitatem multum cibum vnà vice concoquere non possunt, ideo sæpe cibus, sed eius parum vnà vice præbendum.

Inter alimenta autem præcipue, ut supra etiam dictum, primum locum Lac obtinet. Optimè enim corpus nutrit, sanguini bonam materiam præbet, acrimoniam vitiosorum humorum temperat, parte serosa vlcus abstergit, caseosa consolidationi inferuit, butyracea humectat & corporis exsiccationi resistit. Inprimis autem laudatur lac muliebre, quod naturæ corporis nostri maximè cognatum est. Asininum est tenuius & serosius & ad vlcus abstergendum commodius. Inter hæc medium locum habent caprinum & vaccinum. Ne autem lac in ventriculo coaguletur, aliquid sacchari vel mellis admisceatur. Dandum etiam vacuo ventriculo & mundato ventre: alioquin facile acescit & corrumpitur. Ea etiam quantitate dandum, ut à ventriculo bene ferri, & concoqui possit. Ideoque à minori quantitate ad maiorem ascendendum, & primò quotidie semel, deinde bis de die dandum. Post lac sumptum æger non statim dormiat, nec alium cibum, præsertim vinum, capiat, ne lac in ventriculo corrumpatur. Si tamen adsit febris manifestè affligens, dolor capitis, vasorum obstructions, & flatūs; à lacte abstinendum. Potest lac etiam hoc modo præparari:

℞. Lactis caprini vel vaccini mensur. iij. Adde aq. fontan. puræ mens. j. sacch. alb. ℥. 3.

Coq. lento igne ad aquæ consumptionem.

Lac hoc modo præparatum vel potandum detur, vel pani albo trito affundatur, & comedatur.

A plerisque maximè commendatur caro cancrorum & cochlearum, quæ scilicet propter substantiæ crassitiem vlcus consolidare possit. Verum enim verò hac de re dubitatur; cum hæc animalia sint crassæ & terrea substantiæ, & proinde non nisi crassum, terreum, & vitiosum succum generent, difficilimè coquantur, & maximè excrementosa sint. Ideoque non nisi parçè aliis cibis admiscenda, ut reliqui cibi cum iis permixti solidius alimentum præbeant. Aut potius ius eorum, quàm substantia, præbendum, & pars quæ-

dam in limacibus, quam *μύκωνα*, id est, papauer, Aristoteles, 4. de histor. animal. c. 4. nominat, quæ non difficulter coquitur. Ideoque nonnulli cancrum & cochleas in lacte coquunt, & postea ius saccharo coniungunt, vel etiam, farinam hordei & lac amygdal. dulc. addunt. Vide infra, quæst. 2. Vel hoc modo præparetur.

℞. Cochleas, quæ separatis excrementis omnibus incidantur, & in vase vitreo optimè clauso coq. in balneo. Liquorem per seraceum traice, traiectum lento igni expone, ut omnis pars aquosa resoluitur, & remaneant partes solidiores, sed in liquorem reductæ. Hic liquor pro cibo dari poterit, qui si alteretur cichoraceis vel similibus, euadit medicamentosus, & refrigerabit & humectabit.

Porus, ubi abstergendum, sit aqua mulsæ bene diluta vel aqua hordei cum panco melle. Cum glutinandum, aqua hordei, in qua saccharum rosar. dissolutum sit. Vino tamen etiam locus est, sed sit illud debile ac modica quantitate exhibeatur. Commodum etiam potum præbent *cereuisia hordeacea & triticea*.

### Peculiaris pulmonis vlcera, Sphacelus, & Cancer.

Facienda sub finem huius capituli & aliorum vlcerum, quæ phthisin tamen non introduxerunt, & Sphaceli ac Cancri pulmonis mentio.

Interdum enim Apostemata in pulmonibus reperiuntur, quæ nullam febrem coniunctam habent, nec tussim. Ita refert Nicolaus Massa, in Introductorio anat. f. 57. se anno 1533. quendam secuisse, & in substantia pulmonis in parte sinistra Vlcus magnum concavum & putridum ad quantitatem multo maiorem, quàm sit dimidia pars corticis vnus oui gallinæ cum sua profunditate, in qua cavitare fuit sanies multa & praua, deprehendisse: cum tamen iste, quem bene nouerat Massa, nunquam conquestus sit de aliquo dolore, neque tussierit. Sed procul dubio iste tuberculum habuit, quod tandem in pus mutatum est.

Post sanguinis spurum pulmonis partem quandam nigricantem & Sphacelo correptam, & in ea profundum sinum, sine vllo pure & sanie inuentam fuisse, refert Dodonæus obs. cap. 24.

Refert etiam Iacorius, comm. 1. in lib. 5. sect. 2. aph. 67. *Cancer pul. Coac. Hippocr.* interdum partem superiorem pulmonis in Cancrum abire, atque ad iuguli partem superiorem trahi, ut sub alis lateat, unde compressa aspera arteria stertor quidam obauditur, non à puris multitudine, aut alterius humoris, sed ab angustia & interceptione meatūs, in quo refractus & agitatus humor aliquis in gutture feruerit.

### QVÆSTIO I.

#### An Vlceris pulmonis sint sanabilia.

Vlceris pulmonis satis periculosa esse, & paucissimos quibus pulmones exulcerati fuerint, euadere, ipsa experientia testatur. Imò nonnulli in ea sententia sunt, nullos planè è pulmonis vlceribus euadere, ea de causa, quod pulmo in perpetuo motu sit, atque ita labra vlceris, ut & vulneris, coalescere non possint. Quam rationem etsi Galenus, 5. meth. med. cap. 8. reprehendit, & reuera motus ille pulmonis naturalis in respiratione tam vehemens non sit, ut sanationem impediatur, & vulnera pulmonis sanari posse experientia testatur: tamen aliam causam, loco allegato, Galenus affert, nimirum tussim. Cum enim vlcus nullum possit sanari, nisi à pure prius mundatum fuerit, pus verò è pulmone sine tussi euacuari non possit; facile hinc patet, motu illo, qui in tussi est vehementior, vlceris labia iterum lacerari. Quibus accedit & hoc quod

quod idonea vlceri sanando medicamenta adhiberi non possint. Nam illud, quod rectâ in pulmones ex ore destillat, exiguum est: quoddâ in ventriculum descendit, non nisi per longas ambages & alteratum atq; imminutum ad pulmonem peruenit. Hinc & Galenus, 5. meth. med. cap. 13. & 14. omnes illos, qui sanguinem è pulmonibus exspuentes primo die se curandos ei tradiderunt, quidam etiam post duos aut tres dies se sanatie prædicat. Quotquot autem phlegmone sic occupati, ut iam febricitarent, horum nullum in totum perfanatum esse scribit.

Alij contrâ vlcera pulmonis sanabilia esse statuunt, adducuntque primò autoritatem Hippocratis, qui, 6. aph. 18. velicæ quidem, cerebri, cordis, diaphragmatis, intestinorum tenuiorum, ventriculi, hepatis vulnera mortem asserre docet, pulmonum verò vulnere non meminit, Franciscus Arcæus, de febribus, cap. 8. à vulneribus argumentum petit, & cum pulmones transfossi, quod sæpe fit, feliciter curentur, etiam vlcera pulmonis sanari posse putat, idque se felicissimè præstisse affirmat, & quidem vsu decocti ligni Guajaci, quod & Philippus Ingrassias & Thomas Erastus se facturâsse scribunt. Conseruâ etiam seu saccharo rosatum phthysicos curatos referunt Auicennas, lib. 3. fen. 10. tract. 5. cap. 6. Mesues, capite de phthysi, Valerius de Taranta, lib. 3. cap. 11. Valeriola, lib. 5. obs. 5. Crato, in consil. Mont. 152. P. Forestus, lib. 16. obs. 58.

Et omnino cum experientia rem definiat, disputatione multa opus non est. Rarò tamen hoc accidit, non quidem ob naturalem illum pulmonis motum, sed ob saniem, quæ pulmones corrumpit, & non nisi tussis, & vix turò eiici potest, vnde pulmones lacerantur; & quoddâ medicamenta ad pulmones viribus integra vix perueniunt, vnde si quid præstare debent, continuanda, & in magna copia medicamenta talia vsurpanda sunt, sicut Montanus retulit, phthysicum quendam Venetiis nihil ferè aliud comedisse, quàm saccharum rosatum, ut pharmacopolæ Veneri id amplius ipsi vendere nollent.

Notandum tamen hîc, etsi suo modo sanabilia pulmonis vlcera dici possint: suo modo tamen etiam rectè dici insanabilia, dum insanabile sumitur pro eo, quod ad pristinum statum reduci nequit. Et si enim callus quidam obducatur: tamen perfecta ea sanatio non est. De quo Galenus, 5. meth. med. cap. 14. Sed qui postea, inquit, sic per omnia præsidia ritè transierunt, ut siccaretur vlcer, in tantum saltem lucrifecerunt, ut illud nec ultra progredere, nec maius fieret: sed siccarum ac callo duratum longiore vitâ frui hominem sineret, Et 4. de loc. affect. cap. 5. Quæ verò in pulmone longo tempore iam permauserunt, quamuis aliquando curentur; relinquuntur tamen in eo res quædam callosa fistulosaque, quæ tractu temporis à leni occasione excoriantur.

Deinde & hocij monendi sunt, qui sæpius se vlcera pulmonis & phthysicos sanasse dicunt, ut attendant, ne decipiantur, & pulmonem exulceratum putent, cum tamen thorax saltem laborauerit, aut catarrhus & pituita iæ pulmonibus in similem puri substantiam, illâs pulmonibus, mutatus sit.

## Q V Æ S T I O II.

An in phthysi Cochleæ utiles sint?

Antiquiores æquidem, qui de natura & facultatibus Limacum scripserunt, Dioscorides, Galenus Aëtius, P. Ægineta, Oribasius, non meminerunt, quoddâ phthysicos prosint: Recentiores tamen, & superiorum sæculorum Medici eas phthysicis & hecticis commendarunt, adducti procul dubio autoritate Galeni, qui, 3. de aliment. facult. cap. 3. limacum carnem potentissimè nutrit affirmat.

Verum enim verò, cum, ut, ibidem, Galenus & Dan. Sennertus Tom. II.

res ipsa docet, caro cochlearum sit difficilis coctionis, & succum non ad eò bonum præbeat, facile hinc patet, cochlearum carnes phthysicis pro cibo non conuenire. Cum enim phthysici febre lenta putrida laborent, & propterea vis naturalis in ventriculo, hepate, imò toto corpore sit debilis, cibum difficilis coctionis rectè concoquere non potest, atque hinc multa excrementa cum alibi, tum in pulmonibus etiam colligi necesse est; inprimis cum ex se succum bonum non præbeant. Ideoque, quod in vulneribus accidit, quoddâ nimirum, si ægri cibis mali succi vtantur, copiosior sanies generatur: idem in pulmonis vlceribus euenire credibile. Cum verò ob pus inprimis phthysici periclitentur, Limacum etiam vsu iis potius nocere, quàm prodesse, vero consentaneum est. Et quanquam iuscula ex iis parata, & pars illa, quam Aristoteles, lib. 4. de histor. animal. c. 4. phnava id est, papauer appellauit, dentibus statim cedens, & caseosâ substantiæ paulò magis duratæ, sine factæ nuper è sanis ceræ, non absimilis facilius concoquatur: tamen saltem respectu aliarum cochleæ partium est facilioris coctionis: absolutè verò & simpliciter facilis coctionis non est; succi verò, quàm aliæ cochlearum partes, est melioris, & crassum ac melancholicum nutrimentum præbens.

## CAP V T XIII.

De Mediastini Inflammatione.

Mediastinum seu septum, quod pulmonis lobos *Inflammatio mediastini.* disiungit, & ipsum Inflammationem interdum patitur, oriturque ea præcipuè à sanguine, eoque plerumque bilioso. Ideoque causæ, quæ peripneumoniam *Causa.* & inflammationem pulmonum excitare solent, & hîc locum habent.

Signa Diagnostica.

Febris adest continua & ardens, cum cor ob inflammationem vicinam valde incalescat, quam magna inquietudo sitisque inexhausta comitatur. Respiratio est frequens & celer, & in thorace maximum incendium, vnde calidum spiritum efflant ægri, & frigidi aëris inspirationem desiderant. Dolor est exiguus, & saltem molestia quædam in inspirando ad sternum percipitur. Etsi enim locus affectus sit pars membranosâ, tamen dolor non est pungens, ut in pleuritide, quoniam membrana non ut pleura ita in costis firmatur, sed in laxa parte thoracis consistit: ad sternum saltem dolor quidam percipitur, quoniam ibi alligatur hæc membrana. Tussis in principio in quibusdam est sicca, post humida, & rûbra quædam ac flaua reiiciuntur, plurima tamen flauis coloris, paucissima rubri, verum non admodum copiosa, quia inter duplicem quasi membranam materia colligitur, vnde non facile nisi eâ erosa euacuatur. Pulsus qualis pleuritico, durus & inæqualis, non tamen æquè manifestâ inæqualitate, sed aliquanto maiore.

Si in pericardio affectio fuerit, aderit æstus, & phlogosis maior, ad syncopen laborans facile & frequenter accedit. L. Mercatus, lib. 2. de morb. int. c. 6. p. 158.

Prognosticum.

Plerique hoc malo correpti moriuntur. Estque hic morbus, quàm pleuritis, vehementior; cum locus affectus cordi sit vicinior. Et si protrahatur ægri phthysi correpti tandem moriuntur. *Prognostic.*

Curatio.

Curandi ratio eadem ferè est, quæ inflammationis pulmonis *Curatio.*

pulmonis & pleuræ. Sanguis nimirum & humores ad mediastinum fluentes euacuandi, reuellendi, repellendi, & per sputum euacuandi. Ideoque statim in principio vena aperienda, & sanguis satis copiose euacuandus, & venæsectio, si vires ferant, vel eadem, vel sequenti die repetenda, cum venæsectio non saltem euacuet, sed & reuellar & refrigeret.

Venæsectione autem adhibita ea pectori applicanda, quæ feruorem humoris mitigant, sanguinemque aliquo modo reprimunt, medicamenta scilicet, quæ frigida quidem potentia sunt, sed astrictione carent, ut facilius penetrare possint. Quem in usum commodissime adhibetur oleum violaceum, quo tepido totum pectus inungatur, vel panni eo imbuti pectori imponantur.

Si tempus æstiuum sit, & inflammatio erysipelatodes, etiam actu frigidum adhiberi potest. Etsi enim frigida alias thoraci sint inimica, & in pleuritide frigida actu non adhibeantur: tamen quia hic incendium magnum est, & inflammatio est in penitioribus thoracis partibus, frigida non facile ad locum affectum penetrant. Oleo violaceo admisceri potest lac recens & aqua endiuiz, vel paretur cataplasma ex farina hordei cum succo endiuiz, & lactucæ, & oleo violarum.

Vbi incendium nonnihil remisit, ol. chamæmel. admisceatur, ut & mucilagines sem. althææ, malu. fœnigr. & similes.

Interim etiam propinentur ad materiam alterandam & expectorandam aqua vel decoctum hordei, violar. de iuiub. de glycyrrhiz de tussilag. Syrupi tamen in minore quantitate admisceantur; cum saccharum facile bilescat.

Externa.

Tandem etiam ad reliquias materiæ discutiendas extra applicetur cataplasma ex radic. althææ, violar. scabios. carick. Quibus coctis & contritis addatur farina sem. lini, fœnigræc. pulu. flor. chamæmel. & cum oleo chamæmelino & amygdal. dulc. Fiat Cataplasma.

Quod si materia hoc modo euacuari vel absumi non posset, non planè incommodum esset, perforato sterno materiam purulentam extrahere, quod etiam Columbus, lib. 1. anat. cap. 3. monuit.

Dia.

Dietæ ratio sit eadem quæ in peripneumonia & Pleuritide.

## CAPUT XIV.

### De Diaphragmatis Tumoribus:

Diaphragma etiam interdum tumoribus corripitur, & quidem nunc calidis & inflammatoriis, nunc frigidis & diuturnis.

Diaphragmatis inflammatio.

Inflammationem diaphragmatis quod attinet, fit ea à sanguine calido & bilioso eo modo & iis de causis, ut aliarum partium inflammationes. Crassior enim in membranam densam sese non facile penetrat.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Coniungitur autem cum hac inflammatione febris continua & acuta non solum ratione humoris calidi, qui tumorem hunc excitat, sed & ob viciniam cordis & connexionem cum eo per arteriam magnam. Adest dolor & respirandi difficultas, ac respiratio est parua & frequens, antequam delirium accedit, ut & pulsus, ut docet Galenus, lib. 5. de loc. affect. cap. 3. Præcordia tenduntur, nullo tumore in hypochondriis apparente. Ad locum diaphragmatis apparet interdum quædam palpitatio vel saltus quasi, ut docet Hippocrates, 3. prognost. t. 9. Galenus, in comment. & 1. epid. comm. 3. t. 18. Procedente malo, quia cerebrum à diaphragmate, quod membranofum est, in consensum trahitur, delirium continuum excitatur; quæ de causis veteres etiam diaphragma *φρένας* appellarunt, quod

eius inflammatio mentem turbet, & delirium exciter. Respiratio est inæqualis, modò parua, modò magna, modò frequens, modò rata. Solent etiam nonnunquam accedere conuulsiones, ut Galenus, lib. de pulsibus, cap. 11. de pulsu inflammatorio, docet. Et tum pulsus fit durus, paruus, creber.

### Prognosticum.

Inflammatio hæc pleuritide adhuc periculiosior est, & plerumque ægrum ad mortem deducit, ob connexionem & consensum, quem hæc pars habet cum corde, cerebro & hepate. Vnde acutissimus hic morbus est, & ægrum citò in summum vitæ discrimen adducit, curationemque reddit difficiliorem, quòd ægri delirant, nec facile Medicis in sumendis medicamentis obtemperant.

Prognostica.

### Curatio.

Communes inflammationes curandi leges & hæc locum habent, & ferè eadem huius inflammationis curandæ est ratio, quæ peripneumoniæ & mediastini inflammationis. Itaque statim in principio aluo clyster emolliens & refrigerans iniiciatur, & hinc vena brachii dextri aperiatur, ac, si vires tolerant, vel eadem, vel sequenti die venæsectio reperatur.

Curatio.

Extra thoraci ad locum diaphragmatis apponantur ea, quæ feruorem humoris mitigare, sanguinemque affluentem repellere possunt, potentia sunt frigida, actu verò subcalida. Igitur inungatur locus oleo rosaceo; vel fiant epithemata ex decocto herbarum refrigerantium, violar. endiuiz, lactucæ & similium. In progressu morbi addatur oleo rosarum chamæmelinum, & epithematibus malua, althææ, chamæmelum, melilorus, sem. lini, fœnigræci. Ob delirium lotiones extremorum ex refrigerantibus herbis instituuntur, quæ actuali caliditate renellere à capite, & potenciali frigiditate humores demulcere possunt. Syncipiti, temporibus & fronti etiam ea applicentur, quæ somnum conciliandi vim habent, ex suprâ, lib. 1. part. 2. cap. 1. propositis.

Externa.

### De tumoribus diaphragmatis Frigidis.

Generantur hi tumores à materia cruda & tenui. Crassa enim & viscida non possunt in diaphragma ob eius densitatem penetrare. Dantque occasionem materiæ collectioni percussio vel compressio diaphragmatis, qualis etiam fieri potest, si quis inter scribendum vel legendum mensæ sæpe pectore innitatur.

Tumores diaphragmatis frigidi.

### Signa Diagnostica.

Si tumor sit frigidus in diaphragmate, malum est diuturnius, adest tensio hypochondriorum, nullo apparente in his tumore ad tactum, & spirandi difficultas, pulsus est durus & paruus, dolor adest, sed non ita magnus, abest febris, aut, si febris accidit, non est acuta, delirium etiam abest, & non nisi morte instante interdum accidit.

Signa.

### Prognostica.

1. Si morbus sit recens & adhuc in fieri, ægri interdum sanari possunt.  
2. Si verò malum sit diuturnius, ægrum ad tabem deducit.

Prognostica.

### Curatio.

Principio ne maior materiæ fiat affluxio, materia affluens debito modo præparanda & euacuanda, ut cum materia ista sit pituita aquosa & serosa, medicamentis,

Curatio.



mentis, quæ pituitosum & serosum humorem euacuât, agarico, mechoacanna, turbit & similibus vtendum. Et si quæ caussa adsit, ob quam talis materia in visceribus generetur, ea tollenda, & viscerum debilitas, vel obstructio corrigenda.

Vntuersali corporis euacuatione præmissa, materiam discutientia simulque emollientia, (nam sensibilibiter eam euacuantia hic locum non habent) vsurpanda, vt butyrum recens, pinguedo gallinæ, anseris, medulla vitulina, ceruina, omnes recentes. Progressu autem temporis validiora discutientia adhibenda, vt oleum chamamel. anethin. vel sem. lini, fœnigræci, quibus aliquid terebinth. vel ammoniac. addi potest. Vtile est & emplastrum de meliloto.

Vel *℞. Malua, althæa, betonic. origin. ana M. i. sem. anisi, fœnicul. carui, an. Drach. i. flor. chamamel. verbasci, an. M. ss.*

℞. Sacculi duo ex linteo albo, qui coquantur in vino, & expressi ac calidi alternatim pectori imponantur.

Intrò exhiberi possunt digerentia & discutientia ex rad. ruffilag. helen. capillo ♀ marrubio, hyssopo, scabiosa, sem. vrticæ, & simil. Vel exhibeatur decoctum sarsaparillæ cum pectoralibus. Non tamen nimis tardè, vbi humor iam indurari cœperit. Ita enim tenuè discuteretur, crassum verò magis induraretur. Sensibilis verò euacuatio, vt dictum, hic sperari non potest: cum diaphragma à parte superiore pleuræ, à parte inferiore peritonæo cingatur & inuestiatur. Nisi forsan abscessu rupto in cavitatem thoracis effundatur, & inde per tussim eiciatur. Quod si fiat, malum reliquum, vt empyema, curandum est.

Victus ratio sit attenuans, non tenuis; cum morbus sit diuturnus. Cibus sit boni succi, facilis coctionis: aluus sit laxa, ac si subsistat, sæpe clysteres iniiciantur.

## CAPVT XV.

## De Vulneribus Diaphragmatis.

Vuln. dia-  
phragmatis.

Hist. dia-  
phragmatis  
vulnerati.

Cum Diaphragma Vulneratum est, ponderis sensus eo loco molestus est, tussis & dolor eo loci percipitur, vt sæpe delirium accedat. Risus adest cum perturbatione; ilia sursum conuelluntur aded, vt respirandi vehementia contingat. Aliquando ventriculus & intestina per vulnus in thoracis cavitatem rapi solent. Cuius rei historias duas recenset Ambrosius Paræus, lib. 9. chirurg. cap. 30. Memorabile & singulare huius rei exemplum etiam annotauit Dominus D. Andreas Schato p. m. Socer meus quondam Academiae huius Professor. Est autem tale: Anno 1582. die 20. Septembr. Studiosus quidam, Henricus Buscheronius, Riualiensis Liouonis, cum melancholiâ variisque renationibus vexatus esset, ante portam oppidi huius proprio gladio se confodit, vulnere intra quartam costam in thorace adacto, & sub nona costa in tergo gladio penetrante: quod vulnus tamen intra duos menses sanatum fuit, vt æger satis bene sibi habere videretur. Verum accidit, vt post menses aliquot iterum absurdis cogitationibus vexaretur, & postea 28. April. Anno 1583. malè habere inciperet, & seqq. diebus mense Majo nigra quater, eaque magnâ copiâ vomitu reiiceret, cum sudoribus frigidis & lipothymia, tandemque post vltimum vomitum expiraret. Corpore aperto deprehensum est vulnus per diaphragma & pulmones penetrasse, & quidem diaphragma transfossus fuit in ipso nerueo circulo. Pulmonis ferè nihil repertum est in sinistro latere confosso, cum proculdubio is corruptus cum putre eiectus fuerit. Exigua saltem particula aderat costis adnata. Ventriculus totus ascenderat in sinistram thoracis latus, & cor cum capsula sua depulerat in dextrum latus, vbi & vix ille post acceptum vulnus iubebar obseruare pulsus cordis.

Cor aridum & tabefactum erat, copiosa autem aqua in capsula cordis. Omentum & pancreas totum ferè circa ventriculum computruerat.

Habentur autem diaphragmatis vulnera sanabilia, si saltem pars carnosâ diaphragmatis sauciata & perfossa fuit, etsi tunc conglutinatio sit difficilis ob perpetuum motu diaphragmatis. Si verò in neruosâ eius parte vulnus sit, insalubre habetur. Verum Galenus, 6. aph. 18. docet, etiam neruolarum partium vulnera, si non sint magna, quandoque sanari posse, ac proinde & diaphragmatis vulnus in parte neruosa si magnum non sit, consolidari aliquando potest.

Exemplum talis vulneris est apud Hippocratem 5. epid. Cum enim Tychon in oppugnatione circa Datum catapultâ vulnus in pectus accepisset, paulò post paruus risus ei aderat cum perturbatione. Videbatur autem Medicus, cum lignum eximeret, circa septum transversum hastilis partem aliquam reliquisse. Primam noctem implacide egit, sub diluculum melius habere visus est. Prædictum est conuulsione accedente celeriter periturum. Posterâ die implacitus in somnis egit, & sub tertij diei exortum conuulsione tentatus tum temporis mortuus est.

Ratio curandi eadem est, quæ Pulmonis & Mediastini vulnerati.

## CAPVT XVI.

## De Pleuritide, seu Inflammatione Pleuræ &amp; Musculorum thoracis.

Inflammatur sæpe & pleura seu membrana costas succingens, musculique intercostales; quod malum Græcis Pleuritis dicitur, & pleuritici, qui inflammatione pleuræ laborant. Blandi etiam Antiquis dicuntur, qui ex lateris aut pulmonis inflammatione, repente difficultate spirandi suffocati, latera liuida habent, tanquam plagâ percussi aut siderati, Hippocrates, 1. de rat. victus in acut. aphor. 35. & in Coacis vltra dimidium. In pleuriticis enim, si subito difficultate spirandi suffocentur, vt & in peripneumoniis, sanguine inflammationis in cutem diffuso, liuor fit, totumque latus, in quo fuit inflammatio, post mortem liuescit; eodem modo sicuti in apoplecticis & epilepticis idem interdum accidere videmus.

Est videlicet pleuritis, eaque vera & exquisita, (nam dari & notham, infra de dolore lateris dicitur) inflammatio membranae costas succingentis, quæ quandoque pulmoni communicatur, ex affluxu sanguinis per ramos seu venæ causæ ascendentes seu ἀνατομικὰς, eo impulsu ortum habens, cum febre continuâ acutâ, dolore lateris pungente, tussis, pulsu duro, celeri ac frequenti, & difficultate spirandi. An verò pleuritis etiam fieri possit, sine notabili & manifesta inflammatione pleuræ, dicitur infra, quæstione 1. Sub pleuritide rectè etiam comprehenditur inflammatio musculorum μεστωλεῶν, præsertim internorum, ob pleuræ ex vicinia consensum.

Datur deinde & notha pleuritis alia quædam, quædammodo talis, sed & ipsa vera inflammatio, ratione sitûs & partis affectæ saltem notha, quando sanguis, per ramos venæ axillaris in extrema thoracis sparsus, in musculos illos externos, qui costis & musculis μεστωλεῶν extra incumbunt, illabitur, quæ ob communiter propaginum venarum externarum & internarum, (cum interiorum venarum extrema foras emergant, & externarum ora intrò subeant) sæpe in pleuritidem veram permutatur.

Quæ autem pars in pleuritide afficiatur, an sola scilicet pleura, an verò etiam pulmo, & Antiqui & Recentiores dubitarunt, diciturque de eo infra, quæstione 2. vt rem hic breuibus complectamur, statuimus,

Qua pars afficiatur in pleuritide.

non quidem in omni pleuritide necessariò pulmonem affici; semper tamen ferè hoc accidere, vbi superior pleuræ pars afficitur. Est enim pleuræ cum membrana pulmonis communio, & præcipuè versus collum; & circa exortum asperæ arteriæ per fibras multas cum pleura pulmo coheret. Imò, vt suprà, cap. 10. dictum, scribit Nicolaus Massa, in sua *introduc. anat. cap. 29.* se ferè semper inuenisse adhaerentiam pulmonis cum pleura, & non sine difficultate partes superiores pulmonis à pleura separari. Itaque facillè fieri potest, vt, si sanguis in pleuram præter naturam infuat, etiam simul in pulmonem effundatur. Atque tùm sanguis & sputum, quod tussi reicitur, non tam à pleura, quàm à pulmone simul affecto prouenit. Si verò inferiores pleuræ partes afficiantur, non necessarium est, pulmones simul affici; cum ibi nulla pleuræ & pulmonum sit communio.

### Causa.

Est autem inflammationis pleuræ, vt omnium aliarum inflammationum, causa proxima sanguis, siue sincerus & purus sit, siue humores alios admistos habeat, qui è vasis thoracis loca hæc nutrientibus, ex furculis scilicet & ramis venæ cauæ ascendenti, per ramum subalarem venasque mammarias, quibus nutriuntur costæ quatuor superiores, vel ex ægry ramis quibus reliquæ octo costæ inferiores nutriuntur, eò effunditur. Refert tamen Vesalius, lib. 3. c. 7. de *fabrica corp. humani*, se in quibusdam corporibus talem constitutionem venæ ægry reperisse, vt omnes thoracis costæ ab eius ramis nutrimentum accipere potuerint. Sed & pleuritidem nonnunquam à sanguine ex arteriis, (quibus membranam hanc destitui non rectè sentit Mercatus) quæ venas hæc comitantur, in membranas effuso excitari posse, à vero alienum non videtur. Frequentius tamen humores calidi, tenues, biliosi & acres sanguini permisti pleuritidem pariunt, aut aliorum humorum sunt vehiculum; cum vasa, quæ membranam hanc percingunt, sint parua, ipsaque membrana densa. A sola verò bile, pituita vel melancholia, pleuritis non generatur.

*Bilis, pituita vel melancholia sola pleuritidem non generat.*

Est enim pleuritis inflammatio, cuius causa proxima est sanguis, & proinde sine sanguine reliqui humores pleuritidem non excitant, etsi sanguini pleuritidem parienti admisceri possunt, vt ita sanguis inflammationem producat modò purus sit, modò bilem, vel pituitam, vel melancholiam admistam habeat. Quamquam verò Galenus, 6. aph. 33. scribit, pleuritidem aliam cum flauis & ruffis sputis esse, eamque ex biliosis humoribus ortum habere; aliam cum spuineis, eamque ex pituitosis prouenire; aliam cum nigris, eamque ex melancholia; aliam cum cruentis, eamque ex sanguine; tamen id saltem accipiendum est de humore vitioso sanguini permisto, cuius signa ex sputo deprehenduntur. Postquam enim, vbi pleuritis coqui incipit, non sanguis crudus, sed alteratus & in substantiam albam redactus reicitur; si sanguis is laudabilis sit, copiaque potius quam qualitate peccet, in principio quidem sputum tenue rubrum reicitur, paulò post verò album. Si verò alius humor admistus sit, quæ natura, vt mox dicetur, præcipuè expellere nititur, non planè album, sed flauum, vel alterius coloris, pro humoris peccantis ratione.

*Causa remota.*

Causas remotas quod attinet, aliæ materiam suppeditant, aliæ eam mouent, & vt ad pectus fluat, faciunt. Antecedens causa materiam suppeditans est cacochymia vel plethora seu in toto, seu in parte aliqua. Et quidem frequenter pleuritis generatur, cum vitiosis humores in venis febres continuas accendunt, quorum pars ad thoracem effusa pleuritidem facit. Natura enim animalis salutis intèta non solum perfectà coctione humores vitiosos è corpore expellit, & perfectas cri-

ses instituit sed quandoque etiam vel copia vel prauitate humorum stimulata, initio tales humores aggreditur.

Et quidem rectissime agit, dum tales humores planè eiicit atque exterminat. Si tamen quacunque de causa id præstare nequeat, à conatu suo non statim desistit, sed vt vasa communia & cordi vicina, regiam quasi corporis sedem & vias publicas, ab humoribus vitiosis repurget, ad minores venas & partes priuatas ac remotiores eos depellit: quæ si sint ignobiliores, vt glandulæ sub cute & ipsa cutis, ea suum finem assequitur, & id in ægri commodum cedit. Si verò quacunque de causa in partem aliquam nobiliorem, aut quæ nobilem in consensum trahere possit, materiam detradat, sine suo frustratur, & febris inde non leuior, sed grauior ac periculosior redditur. Quæ de re insignis est locus apud Hippocratem, lib. 4. de morbis. *Quicquid, inquit, in morbo copia abundat, dum turbatio in principis contingit, ad locum fertur, in quo plurimum superat. In turbatione autem amplam capacitatem natum secretum voluitur, & corpus calefacit, aut in aliqua corporis parte adhaerescens vna cum alio humore, qui in alio loco est, dolorem & calorem exhibet. Quod verò incalcescit, reliquum etiam corpus calefacit, ex eoque febris contingit, fereque ex bile, pituita & sanguine ortus quæ calidissima existunt. Et si quid horum in aliquam corporis partem incubuerit, plerumque inde morbus nominatur, & appellationem habet.*

Itaque etsi Antiqui febres, quæ pleuritidem, vt & anginam, peripneumoniam, & similes partium internarum inflammationes coniunctas habent, pro symptomatibus agnouerint, vt symptomatum more inflammationi, vt morbo primario, succrescere crediderint, adeò quidem, vt, referente Hippocrate 4. aph. 73. eos, qui propter lateris aut pulmonis, aut alterius eiusmodi partis inflammationem febricitarent, iam non febricitantes appellauerint, sed pleuriticos aut peripneumonicos; aut similibus aliis nominibus nuncupauerint: tamen si quis rem diligenter perpendat, animaduertet, non febres ab hisce inflammationibus, sed potius inflammationes istas à febribus eo, quò dictum modo suam originem habere. Experientia enim testatur, quod pleuritis & eiusmodi aliæ inflammationes non præcedant febrem, sed febris inflammationem; aut certe febris simul cum inflammatione incipit, animaduertimusque, materiam inflammationis causam non in parte inflammata fixam consistere, & calorem p. n. à se diffundendo febrem accendere, sed sæpe vagam & quasi turgentem hinc inde vagari: id quod ex morborum, qui febres hæc comitantur, commutationibus patet, quod ex pleuritide & peripneumonia angina fit, ex peripneumonia phrenitis, materiâ, materiâ ex vna parte in aliam translatâ, vt ex 5. aph. 10. & 7. aph. 11. & 12. videre est. Atque hinc sæpe accidit, vt inflammationes tales aliarum febrium acutarum more per vniuersales euacuationes & crises soluantur, & coctionis humorum signa in vrina conspiciantur.

Et tales pleuritides sunt plerumque eæ, quæ aliorum epidemiorum morborum more plurimos corripunt, & cum malignitate coniunctæ sunt, & quæ à causis communibus & malignis ac contagio ortum habent. Vt enim venena alia aliis partibus infesta sunt: ita materia maligna, quæ morbos epidemios parit, nunc huic, nunc illi parti magis infesta est, & nunc pleuritidem, nunc anginam, nunc phrenitidem, nunc dysenteriam, nunc alios morbos gignit.

Ad pleuritidem autem excitandam facere possunt omnes causæ, quæ ad plethoram & cacochymiam generandam faciunt, vt suppressæ sanguinis consuetæ euacuationes, per nares, menses, hæmorrhoides, item humorum vitiosorum, qui ad articulos depelli, vel per vlcera inueterata euacuari solebant, retentio, & alui fluxus intempestiuus detentio, sicut ex dysenteria intempestiuè suppressâ pleuritidem excitatam fuisse, sapius

*Febres pleuriticas.*

sapius obseruatum est. Et in summa sex rerum non naturalium vsus immoderatus, qui plethoram & cacochymiam excitare valet, huc pertinet.

Vt autem seu sanguis abundans, seu vitiosi humores ad pectus fluant, & actu pleuritidem excitent, facit pectoris debilitas, ad materiam affluentem] facile suscipiendam apta, vel à primo ortu, vel à morbo aliquo contracta; calor aut dolor attrahens. Huc faciunt, quæ sanguinis ad latus affluxum concitare valent, ictus, casus, contusio pectoris, vehemens exercitium, æstus humores fundens, frigus exprimens, vini meracioris ingurgitatio, potus frigidi, præcipue post exercitia, flatu aquilonij post austrinos, 3. aph. 5. corporis post sudorem in aëre frigido denudatio.

### Differentia.

Differentia.

Pleuritidis differentia à nonnullis plures recensentur præcipue, & quæ ad curationem aliquid faciunt, sunt, quæ sumuntur à loco, affecto & causis. A loco affecto & doloris situ, ex 2. de rat. victus in acut. 10. & 11. diuiditur pleuritis in ascendentem, cum dolor ad superiora & iugulum versus extenditur; & descendentem, cum versus hypochondria vergit. Nonnunquam etiam versus dorsum magis tendit, cuius mentionem facit Hippocrates, lib. 3. de morb. nunc magis versus anteriora.

Ratione causæ secundum sanguinis inflammationem patientis varietatem est differentia. Sanguis enim modò purus est, modò ei bilis, quod plerumque accidit; modò pituita, modò melancholia admiscetur.

Est tamen & illa differentia notatu digna, quod pleuritis alia dicitur sicca, in qua nihil, vel parum omnino & nullius momenti expuitur; non solum in morbi principio, sed etiam in eius progressu; quod vel ob humoris cruditatem, vel eiusdem crassitiem & visciditatem, vel facultatis imbecillitatem, vel doloris vehementiam, vel propter bronchiorum obstructionem accidere potest: alia verò humida, in qua sputum mox circa principium apparere incipit, 1. de victus ratione in acut. 21. & 23.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Signa pathognomonica, quæ in omni pleuritide animaduertuntur, ipsiusque ideam complectuntur, & à Galeno, 5. de loc. affect. cap. 3. 1. aph. 12. & de constit. art. med. c. 15. recensentur, sunt 1. dolor lateris acutus, qualis in membranis fieri solet, à sanguine in eam effuso ortus, qui & ad vicinas partes, nunc versus iugulum, nunc versus hypochondria extenditur, quod membrana hæc totam thoracis cavitatem inuestiat. Atque doloris ratione peripneumonia à pleuritide discernitur, & in peripneumonia sola lateris dolor est exiguus vel nullus. Quod tamen tum solum verum esse putat Platerus, cum pulmonis interna magis, quam externa inflammantur. Si enim ad externa vsque extendatur inflammatio, non solum fibris, quibus succingenti membranae annectuntur pulmones, contractis, sed & inflammatione succingenti membranae communicata, dolores in latere excitari existimant.

2. Febris continua acuta, ex phlegmone in loco cordi vicino accensa, sæpe verò ex natura sua talis & ante phlegmonem orta, quæ tamen accedente pleuritide & inflammatione rursum ab ea incrementum sumit atque augetur. Atque febris hæc plerumque, tertianæ typum obseruat, quod frequentissime pleuritides à sanguine bilioso ortum habeant.

3. Respiratio difficilis, frequens, parua, quia ob inflammationem & dolorem instrumenta respirandi sat distendi nequeunt. Itaque cum vsui magnitudine satisfieri non possit, defectum in magnitudine per celeritatem & frequentiam natura compensare studet. Et ob dolorem

rem natura cogitur, vt ad secundam respirationem statim pergat, cum primâ, vt pote nimis parua, vsui satisfactum non sit. Nam velocitas non ita dolorem parit, simul dilatationis magnitudo; cum hæc motus vehementia partem dolentem distendat, illa breui tempore motum efficiens ad quietem festinet.

4. Pulsus est durus, paruus & frequens, ob tensionem arteria, & quia membrana dura & densa inflammata non permittit arterias ita distendi, quemadmodum calor & vsus id requirit. Ideoque pulsus sit celerior & frequentior, atque ea pulsus differentia oritur, quæ à Medicis Serrina nominatur, eò quod, dum pulsus tangitur, ferræ dentes representat, cum alia pars attolli, alia non attolli videatur.

5. Tussis ægro valde molesta est: quæ accidit tum ob tumorem, membranam, quæ costas succingit, occupantem, qui cum minus liberum spatium, in quod distendantur, spirandi organa permittat, natura ad expellendum, id quod impedimento est, insurgit; tum quia portio aliqua materiae pulmoni communicatur, quæ cum sputo per tussim excernitur. Et quia initio à loco inflammato parum exit, plerumque initio tussis sicca est, postea humida, materia copiosiore penetrante; sputumque coloratum & cruentum apparet. Quando autem pulmones simul inflammantur, magna materia pars è pulmone prouenit. Quod autem sputum à pleura in asperam arteriam proueniat, & hinc per tussim excernatur, de eo dicitur infra, quæst. 3.

Atque qui hæc signa pathognomonica diligenter in conspectu habet, facile veram pleuritidem ab aliis affectibus omnibus, qui cum ea similitudinem habere videntur, discernet. Neque enim in vlllo alio morbo omnia hæc simul reperiuntur. In notha quidem pleuritide, quæ fit ab inflammatione muscutorum intercostalium & externæ partis thoracis, febris vel nulla adest, vel non adeo acuta: tussis, nisi forsitan aliquid à capite destillet, est nulla, & nihil, præsertim cruenti, excernitur. Pulsus non percipitur adeo tensus & durus, dolor est mitior, isque pulsans, non pungens, & neque ad iugulum neque ad inferiora extenditur, locusque manu pressus dolet; nonnunquam & dolor foris apparet, qui suppuratus per cutem erumpit, teste Galeno, 5. de loc. affect. c. 3. Quandoque tamen accidit, vt in vera pleuritide phlegmone versus exteriores musculos ob magnitudinem tendat, ac dolor etiam extrâ percipiatur, atque ita pleuritis nothæ speciem præ se ferat; cum tamen internæ inflammationis saltem incrementum sit. Itaque ad alia signa, ne fallamur, simul respiciendum.

Si dolor à flatibus inter musculos intercostales & membranam conclusis ortum habet, etsi aliquis sensus punctionis adsit; nulla tamen adest febris, nulla tussis, nulla ferè respirandi difficultas; dolorque ferè est vagus, neque perpetuus, sed per intervalla recurrens, & sæpe de vna parte in aliam transit.

Inflammatio verò pulmonis seu peripneumonia valde similis est pleuritidi; nullus tamen, si solus pulmo inflammetur, dolor in eo percipitur, vel exiguus, & nullo modo pungens, isque non in lateribus, sed in medio potius thoracis; pulsus etiam non est durus, sed latus & vndosus; difficultas spirandi maior, vt ægri sæpe rectâ cervice spirare cogantur.

Ab inflammatione diaphragmatis differt, quod dolor in latere non vrget, sed extrema costarum ad finem sterni dolent, ventrisque pars, vbi diaphragma est, turget, deliriumque adest.

In mediastini inflammatione dolor non ita in lateribus percipitur, neque est extensus.

Inflammatio hepatis, quæ etiam habet quandam cum pleuritide similitudinem, ita vt Siculus Medicus, vt refert Galenus, 5. de loc. affect. cap. 7. dum eam experiretur, pleuriticum se factum existimaret, à pleuritide differt loco doloris, qui perpetuò est in dextro latere,

Vera & notha pleuritidis differentia.

Pleuritidis & peripneumonia differentia.

Inflammationis diaphragmatis & pleuritidis differentia.

Hepatitis inflammationis & pleuritidis differentia.

latere, & circa dextrum hypochondrium collectus, neque is pungens est, sed grauius, tumorque infra costas nothas percipitur; pulsus est vndosus, non tensus, tussis est minor & sicca, respirandi difficultas quoque minor; vrina est citrina, nigra, alui excrementa sanguinolenta.

Signa humorum  
in pleuritide  
parientium.

Quis autem humor pleuritidem, pariat, tum ex signis humorum vniuersalibus, tum ex iis, quæ pleuritidem comitantur, & præcipuè sputo cognoscitur, cum quo tussi reicitur pars eius humoris, qui inflammationem excitat. Si videlicet sanguis purus pleuritidem pariat, adest repletio & tensio venarum, maximè circa tempora & frontem, cum sensu grauitatis circa oculorum cavitates, & capitis anteriora, rubor faciei; sputum est rubrum & malum mitius. Si bilis adsit, sputum est subflauum, dolor admodum pungens, febris est acuta & ardens, quæ ferè typum tertianæ seruat, sitis est vehementior, pulsus durior & velocior, vigilie & anxietudo maior, oris amaritudo, vrina citrina tenuior. Si pituita admiscetur, sputum albicat, viscidum & glutinosum est, febris est mitior & minùs acuta, quæ ferè typum quotidianæ observat, & circa vespèram exacerbatur. Si melancholicus, sputum ad nigrum & liuidum tendit, nisi insignis corruptionis & pleuritidis lethalis sit indicium, quod accidit, si præcessit sputum rubicundum, & postea nigrum sequitur.

Si malignus sit humor, sputum plerumque est malè coloratum, adest magna virium deiectio, pulsus est languidus, & alia febrium malignarum symptomata apparent.

Tempora pleuritidis.

Tempora morbi huius ex sputo præcipuè cognoscuntur, vt docet Galenus, lib. 1. de cris. c. 18. Si enim sputum sit nullum, vel paucum, vel crudum, & cum difficultate reiciatur, morbus adhuc in principio est. Postea vbi sputum copiosius nonnihil & post tenue crassius expuitur, idque faciliùs, incrementum est. Quod si sputum iam coctum, id est, album, læue, æquale, consistentiæ mediocris, & quod faciliè reicitur, apparet, idque copiosius expuitur, status est. Declinatio tandem, vbi post copiosius sputum paucius reicitur, & febris, dolor, & omnia symptomata remittunt. Cum verò febris, quæ pleuritidi coniuncta est, non rarò sit primaria, non symptomata, coctionem humorum etiam ex vrinis animaduertere licebit.

Differentia  
ratione subiecti.

Rondeletius etiam, capite altero de pleuritide, signa, quæ ratione pleuritidis ratione subiecti differat, proponit, quæ Lectori perpendenda relinquimus. Pleuritis, inquit, duplex est, altera, quæ extenditur per partem interiorem omnium costarum. Altera verò, quæ costam undiquaque inuestit, tanquam periostium costarum, & in utraque membrana sit inflammatio. Distinguitur autem species ex decubitu. Nam si ager in partem affectam decumbere potest, & non in oppositam, argumento est, affectum esse in membrana extensa, quæ hyposcota dicitur & hoc fit, quia, cum in oppositam partem decumbit ager, pondere materie collecta illa membrana distenditur magis, & diuellitur à costis. Illa autem, quæ sit in periostio, contrario modo se habet. Nam in oppositam partem dormire possunt, in affectam verò minime. Sed quia hæc nota communis est pleuritidi vera & non vera, ob id aliam notam adiungere oportet ad distinctionem harum. Nam si affectus sit in musculis externis, si digito premantur, dolorem sentiunt. Quod non accidit his, qui inflammationem in periostio habent, nisi supra modum comprimantur costa. Fit etiam pleuritis in musculis intercostalibus, quæ species pulsatione deprehenditur. In multa enim inflammatione costarum arteria comprimitur, præterquam in inflammatione musculorum intercostalium. Hæc nota certissima deprehenditur, & in utrumque latius dormire possunt. Conueniunt omnes in dolore punctorio, in pulsu duro, in difficultate anhelandi; febre verò & sputo distinguuntur. Nam omnes inflammationes interna febre

habent, sed dolor lateris sine febre, à materia frigida vel flatulenta excitari solet. Nulla tussis, nulla expectatio sequitur, quia materia in parte externa continetur. Omnibus aliis difficultas respirandi est maior, & dolor magis pungens, sputio magis sanguinolenta, vel flava, vel spumosa. In inflammatione membrana interna semper adest pauca, aut multa in morbi processu. Nam in salubribus tantum mox apparet sputum. Verum in inflammatione musculorum intercostalium minor sit resudatio, ob id expectatio minor. In ea parte, quæ est in periostio, ferè nulla apparet, & resoluitur per insensibilem transpirationem & sudorem, modò missio sanguinis prohibuerit incrementum. Nam talis inflammatio à pauca materia fit.

### Prognostica.

1. Euentus pleuritidis triplex est: vel enim ad salutem, vel ad mortem terminatur, vel in alium morbum commutatur. Vt autem, quis euentus futurus sit, sciamus, vires naturæ & morbi componere conuenit. Vires corporis ex actionibus corporis vitalibus, naturalibus & animalibus cognoscuntur. Quod enim ipsæ actiones rectius sese habent, eò maius naturæ robur significatur. Morbi conditiones autem etsi plurima signa ostendant; tamen inter ea in pleuritide signa coctionis & cruditatis sputi primas obtrinent.

Prognostica.

2. Hinc crudæ pleuritides morbi diuturnitatem vel mortem; coctæ breuitatem & salutem ostendunt. Salutem quidem ostendit coctio, quatenus coctio; breuitatem verò, quatenus hoc vel illo tempore apparet. Nimirum in omni pleuritide salubri sputum maturè coctionem recipere, & in calore ac substantia sese bene habere, ac faciliè & promptè excerni debet: & quod meliora coctionis signa adsunt, & quod citius sputa apparent, eò citius morbus terminabitur. De quo Hippocrates 1. aphor. 12. In pleuritide si sputum statim appareat in initio intra tertium diem, breuem morbum indicat: sin verò posterius, longum.

3. Periculossima verò pleuritis est, in qua nihil expuitur: (nisi tamen ita leuis sit vt insensibiliter vel per sudorem discuti possit) secundum locum obinet, atque ita leuior est, in qua ichores tenues saltem expuuntur; tertio loco est, in qua crassiora apparent; quarto, in qua sputum perfectè coctum apparet. Quod si circa tertium vel quattum diem contingat, morbus ultra septimum non extendetur.

4. De sputi conditione passim extant aphorismi apud Hippocratem. Flauam bilem sputo admodum permixtâ apparere intra initia, bonum est, si multò post apparet, malum: quia naturam nihil aduersus morbum rebellem tentare significatur, 2. prognost. t. 44. & 45.

5. Sputum flauum sincerum aquositati multæ permixtum periculosum est; album verò glutinosum ac rotundum inutile, 2. progn. aphor. 46. Et, 1. de rat. vitus in acut. c. 37. sputum glutinosum *χαλκόν*; pleuritidis signum habetur; cum ex igneo calore materiam adurentem lentor & visciditas contrahatur: idque propterea alibi *χαλκόν* *χαλκόν* *χαλκόν* nominat, id est, admodum glutinosum sine coctione. Quod enim coquitur modicè glutinosum euadit. Hoc verò saltem ab adustione lentorem contrahit.

6. Malum quoque est *χλωρόν*, id est, æruginosum, vel admodum viride, & quod spumofum excernitur, 2. prognost. 47.

7. Sputum nigrum sincerum pessimum est, 2. prognost. 48. Indicat enim & humoris prauitatem, & caloris natui extinctionem.

8. Nimirum quod humor mitior est, à quo pleuritis provenit, eò & ipsa Mitior est, quæ à sanguine cum bile mixto excitatur. Contumax & diuturna est, quæ à pituitoso humore. Pessima, quæ ab humore melancholico & maligno provenit.

9. In pleuritide, vbi excretio dolorem, tussim ac spirandi



aspirandi difficultatem non sedat, malum. Copia enim vel malignitas materiæ, vel expultricis debilitas significatur.

10. Qui pleuritide laborant, nisi intra 14. dies superne per sputum repurgentur, iis in empyema fit transmutatio, 5. aph. 8. Aretæus tamen hic interdum vigesimum diem terminum constituit: & Galenus, in comment. non solum empyema, sed quamlibet in pus mutationem intelligit.

11. Materiam autem ad suppurationem tendere dignoscitur ex eo, quod sputum parcius eiicitur, nec expectorandi finis est intra decimum quartum. Et cum fit suppuratio, omnia symptomata ingrauescunt, dolor, febris, linguæ siccitas, difficultas respirandi; sæpe etiam accedunt deliria.

12. Qui verò ex pleuritide empyici fiunt, si in 40. diebus repurgentur à die, quo ruptio facta est, liberantur; alioquin in tabem transeunt, 5. aph. 15.

13. Pleuritis maximâ ex parte die decimo quarto terminatur, aut si non hoc, saltem vigesimo, & quidem si quarto die exspuat æger album, læue, æquale, idque ter vel quater tussiendo, in septimo terminabitur. Si in septimo tale sputum primum appareat concurrentibus aliis bonis signis, morbus ultra undecimum & decimum quartum diem non extenditur.

14. Si tardius æger spucare cœperit, tardior etiam morbi solutio erit. Contrà quò citius signa mala apparent & ingrauescunt, eò citius æger moritur.

15. Præterea sunt & alia signa, quæ ad euentum huius morbi significandum faciunt. Maximum indicium exitialis pleuritidis est, si pulsus summoperè durus sit, & præterea etiam parvus, atque ob calorem frequentissimus. Pleuriticus enim cum tali pulsu nullus sanatus fuit, ut Galenus, 4. de præfag. ex pulsu cap. 5. scribit.

16. Quicumque dolor circa thoracem & pulmonis sedem affligens neque sputi expurgatione, neque alui deiectione, neque sanguinis missione, neque medicamentis, neque victus ratione desinit, eum in empyema conuerti sciendum est 1. prognost. 52. si tamen nulla signa lethalia apparent; aliàs mors expectanda.

17. Ad salutem enim terminatur pleuritis vel materiæ expletæ atque excretionem per sputum, quæ ratio frequentissima est & tutissima; vel diarrhœæ atque dissolutione. Conspertumque est, pleuritidem biliosam septimo die iudicatam fuisse per icterum, vel euacuatione materiæ per hæmorrhagiam narium, urinam, aluum, sudorem; vel permutationem in empyema; vel, quod rarissimum est, per mutationem materiæ ad articulos & glandulas, vel parotidas, aph. 38. f. 2. libr. 5. Coacat.

18. Hinc fluxus sanguinis è naribus signum bonum est in pleuritide, ut & hæmorrhoidum & mensium fluxus. Et præcipue si fluxus sanguinis in die critico fiat, & post signa coctionis accadat, bonum præfagit, nec inhibendus, nisi vires ad extremum deiceret. Si verò in principio contingat ex multitudine materiæ à natura gubernatæ, & anhelitus difficilis inde minuat, & febris vehementia cesset, utilis quoque est. Si contrarium verò eueniat, & symptomata non alleuiuntur, contingit plerumque ægrum mori in quarto.

19. Diarrhœam quidem, quando superuenit pleuritidi vel peripneumoniz, malam esse, 6. aph. 16. scribit Hippocrates: sed hoc intelligendum de pleuritide, in qua inflammatio tanta est, ut hepate & ventriculo in consensum tracto, nutrimentum non bene concoquatur. Si verò pleuritis non adeò grauis sit, nec hepar, nec ventriculus in consensum trahatur ob mali grauitatem, aliquando bonum signum est, materiâ per aluum euacuata; maximè si coctionis signa adsint, nec fluxus ab alia causa existat: cuius rei historia habetur apud Valeriolam, lib. 1. obseru. 4.

20. Pleuritidi si peripneumonia superueniat, malum

7. aphor. 11. Fit enim translatio materiæ ad membrum nobile. Pulmonis tamen inflammationes, quæ ex morbo laterali permutationem accipiunt, iis, quæ ab initio fiunt, securiores esse, in Coacis comm. 1. lib. 5. sect. 2. aph. 44. apud Hollerium, scribitur. Quod cur fiat, parum constare scribit Hollerius. Desiderius Iacotius verò locum hunc corruptum, & pro *peripneumoniz* legendum esse *emphysematosis* putat. Forsan verò hoc loco Hippocrates non instituit collationem pleuritidis cum peripneumonia sed peripneumoniz, quæ per se incipit, cum ea quæ pleuritidi succedit. Est enim bonum non sit, pulmonem inflammari sanguine à latere ad eum delato: tamen adhuc periculosius est, si *emphysematosis* & per se peripneumonia incipiat. Tum enim toto impetu materia ad solos pulmones ruit. Si verò materia prius ad pectus feratur, in plures partes diffunditur, nec tanta inflammatio inde excitatur. Quando verò transit pleuritis in peripneumoniam, dolor lateris cessat.

21. Si pleuriticus dolore sputis biliosis absque ratione euauerit, ægri in delirium incidunt, 3. prorrh. 1. 5. Humor enim biliosus sursum in caput trahitur, & tum vrina tenuis atque alba redditur.

22. Quando pleuritis accedit prægnantibus, periculosum est, sicut & senibus, cum in his ob virium imbecillitatem & caloris naturalis inopiam materia non concoquatur, utriusque verò phlebotomiam & victum tenuem, quæ in pleuritide maximè necessaria sunt, non facile ferant.

23. Pleuritis post alium morbum diuturnumque plerumque lethalis est. Periculosa illa, quæ in corpus cachecticum incidit.

24. Densa & exercitationi dedita corpora citius ex morbo laterali & pulmonis inflammatione intereunt, quam quæ sine exercitatione degunt in Coacis.

25. Quibus morbo laterali plurimus exspuato strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculusque aurigine suffusus & caligine obductus, in his mors expectanda. Ibidem.

26. Quibus in morbo laterali lingua circa initia biliosa est, hi intra septimum iudicantur: quibus verò tertio aut quarto die, circa nonum.

27. Et ut signa reliqua etiam, quæ pleuritidi cū aliis morbis communia sunt, coniungamus, & quid de euentu pleuritidis sperandum sit, in summam quasi contrahamus, ægrum conualitutum hæc significant: Leniter & moderatè morbum perferre, corpus esse æqualiter calidum ac molle, urinas & alui deiectiones, somnūque rectè sese habere, sitim esse moderatam, facile respirare, dolorem esse sedatum, sputum facile ac maturè excerni, idque in substantia & colore sese bene habere.

28. Contrà mortem significant, grauiter ac cum anxietate morbum perferre, corpus inæqualiter affici, ut si thorax & venter vratur, extrema frigeant, alui deiectiones, sudores non bene sese habere, non dormire, siti ardere, dolorem non sedari, nihil aut paucum & cum maximo conatu excerni. Delirium si accedat, cum septo affecto hoc contingere soleat, mortale est signum. Si vrina tenuis & subtilis fuerit, nec habens aliam malitiam, indicat materiam raptam esse ad locum inflammatum, & plerumque mortem notat. Propria tamen signa maioris momenti sunt, & plus ad mortem significandam vnum signum proprium, quam ad salutem plurima communia faciunt.

#### Indicationes.

Cum pleuritis sit inflammatio, quæ ex affluxu sanguinis fit, eæ, quas inflammatio suppeditat, indicationes & hæc dantur. Humores videlicet affluxuri & affluētes repellendi; fluentes intercipiendi, repellendi, deriuandi; quod denique afflixit, & in parte inflammata hæret, discutendum, aut quoquo modo è parte tollendum. Repellentibus

Pleuritidis  
salutaria  
terminatio.

Signa salutis.

Signa mortis.

Indicationes.

pellentibus tamen hîc & intergipientibus locus non datur; cum per ea materia ad interiora repelli & inflammatio augeri possit. Ideoque in pleuritide materia saltem affluxura & affluens reuellenda: & quæ quidem influxit, in venis tamen patris adhuc fluctuat, nondumque impacta est, deriuanda, & quod influxit discutendum, aut si id fieri non potest, maturandum, concoquendum, & curandum, ut quamprimum tussi ac spuito reiciatur atque euacuetur.

Deinde dolor, si magnus sit, & ad sanguinis missionem non leniatur, mitigantia indicat.

Tertiò cum febris, quæ pleuritidi coniungitur, sæpe sit primaria, ea non negligenda, sed ei necessaria remedia adhibenda. Tandem quod in omni morbo fieri debet, virium habenda est ratio, & conueniens victus præscribendus. Quæ omnia quomodo expedienda sint, iam dicendum.

#### Curatio.

##### Curatio.

Atque à quo auxiliorum genere curatio inchoanda sit, an à fomentis discutientibus, an à purgatione, an à venæsectione, inter Autores non conuenit. Hippocrates quidem, 2. *de rat. victus in acut. 1.1.* scribit: *Lateralis dolorem, siue is per exordia fuerit, siue postea obortus sit, tentare medicamentis calidis dissolvere, non absurdum est.* Aliis tamen hoc tutum non videtur; cum eiusmodi calefacientibus auxiliis facile maior humorum affluxus concitari, atque ita inflammatio augeri possit. Verūenimvero non loquitur Hippocrates eò loci de pleuritide, seu inflammatione pleuræ in specie, sed in genere de lateris dolore, qui ab aliis etiam causis, & quæ fomentis discuti possunt, non solum ab inflammatione pleuræ ortum habere potest, ut infra, *part. 3. c. 6.* dicetur. Ideoque in vera pleuritide vix venæsectio, si vires eam ferant, differenda, & fomenta præmittenda sunt. Nisi forsitan planè, ut Galenus, 6. *epid. comm. 3. text. vi.* scribit, pleuritis exigua & levis sit, neque à magno humorum affluxu oriatur, & fomenta ad humorum discutendum sufficere videantur. Tum enim leuia fomenta adhibere conuenit, præsertim si à causâ externa ut aëre frigido pectus lædente, dolor exciteretur, absque sanguinis in reliquo corpore abundantia.

##### Venæsectio.

##### Fomenta.

Nam fomenta duo commoda habent, & per ea materię pars euacuatur, partique affecta propterea minùs distenta mitius dolet. Ita Galenus, *loco modò allegato*, cuidam pleuritide laboranti venam non aperuit. Atque his fomentis si dolor mitigetur, signum est; nullam adesse plethoram; aut pleuritidem potius notham esse, quæ à flaribus ortum habuerit. Itaque audaciùs tunc fomentis uti licebit, quibus hoc, quod inflammationem aut dolorem parit, discutitur. In fomentis tamen illis adhibendis cauendum, ne nimis calida & discutientia sint; sed planè leuia adhibenda. Vnde etiam Hippocrates aquam calidam & milium applicat. Et applicamus ista, ut & lac commodissimè in vesica, quæ pondere latus non grauat, ut vasa ænèa. Videndum etiam, ne, quæ calida admouentur, refrigerant, vnde linteis calidis fouenda. Si verò dolor augeatur atque acerbior euadat, indicio est, plethoram subesse, quam ad se trahant partes calefactæ, aut omnino, si signa adsint certi sanguinis affluxus, tunc statim à fomentis desistendum, vel etiam fomenta planè omittenda, & aliqua euacuatio instituenda.

##### Fomentorum duplex commodum.

Vtra autem præmittenda sit, venæsectio aut purgatio, etiam ab autoribus in controuersiam trahitur. Quæ præcipuè orta est ex loco Hippocratis, 2. *de rat. victus in acut. 1.10. & 11.* ubi ita scribit: *Si dolor ad claviculam pertigerit, aut molesta sit vel brachio, vel mamma, vel partibus septo transverso superioribus grauitas, internam cubiti venam secare expedit. Si verò eas, quæ sub septo transverso sunt, partes dolor infestat, nullumque ad claviculam signum fecerit, ventrem vel nigro vera-*

##### Vtra præmittenda sit in pleuritide, venæsectio, an purgatio?

ut vel peplio mollire oportet. Præterea, ut alibi etiam dictum, pleuritidis & talium inflammationum causâ principalis est plerumque cacochymia, quam natura in principio febrium talium è corpore depellit, aut certe ad exteriora protrudere conatur.

Verum Galeno, in *comment.* cui & Paulus Ægineta, *lib. 3. cap. 33.* Rhases, & alij Medici assentiuntur, tutius videtur in vitroque casu sanguinem primò mittere. Est enim pleuritis inflammatio cum febre acuta, in quâ secundum Hippocratem, 1. *aph. 24.* rarò purgandum, & quidem in initio & cum ingenti præmeditatione; cum sine omni periculo sanguinem mittere liceat. Et sit, ut in pleuritide etiam purgatione opus sit; venæsectio tamen præmittenda, ut Hippocrates, 4. *de rat. victus in acut. 1. 21.* & Galenus, 6. *epidem. comm. 1. text. 6.* docet. Venæ sectione verò peractâ tutius medicamentum purgans exhiberi potest, si cacochymia magna sit, & illa præsertim in prima corporis regione contineatur, aut eò vergat; quod ex vomitu, alui incrementis liquidis, anxietate, & circa ventriculum grauitate cognoscitur. Et Hippocrates, *loco allegato*, non loqui videtur de pleuritide propriè dicta, sed, ut modo dictum, de dolore lateris in genere, qui non solum ab inflammatione pleuræ; sed & ab aliis causis ortum habet; quod etiam Rondelerius, *lib. 2. cap. 15.* animaduertit. Etenim dolor, qui sub septo transverso est, non est in pleura, & intelligit proculdubio Hippocrates alium dolorem, qui prouenit ab affectu aliquo in ventre inferiore eius partis, quæ cum intestinis consensum habet. Quæ de causâ etiam purgantia exhibet. Et Hippocratem de flatulento aliquo affectu potius loqui, quàm de vera pleuritide, patet ex eo, quòd daucum, fœli, cuminum & anisum veratro nigro & peplio addit.

Tutissimum ergo & maximè necessarium pleuritidis auxilium est venæsectio, quæ etiam summum ægro commodum affert: modò sanguis per venas affluat. Maximas enim, ut etiam Heurnius existimat, pleuritides etiam nasci sanguine ex arteria aorta affluente vero consentaneum est. Et tum non satis iuuat venæsectio. Virium tamen habenda est ratio, & an illæ venæsectionem ferant, videndum. Et cum quædam sint, quæ vires robustas vel debiles indicant, quæri hîc solet an pueris & senibus pleuritide laborantibus vena aperienda sit? Item an grauidis pleuritide correptis venam aperire liceat? & an mulieri, si sub ipsum mensium fluxum pleuritide corripiatur, sanguis mittendus sit.

Et primò pueros quod attinet, etsi Auerrois referat, quod Auenzoar, maximi apud Arabes nominis Medicus filio suo trimo venam aperuerit, alique idem sex-to anno & octauo fecisse legantur; tamen non facile id tentandum, & vix ante annum 14. vena aperienda; cum vires eâ ætate debiles sint, & ob mollitiem ac raritatem aliàs insignem dissolutionem corpus patiatur. De qua re etiam in *Institut. lib. 5. part. 2. sect. 2. cap. 17.* & de febribus, *lib. 2. cap. 5.* dictum. Si tamen morbus valde virgeat, & puer sit pleno corporis habitu, ac sanguine redundet, corpusque non sit nimium molle, circa annum ætatis nonum vel decimum hirudines venis apponere licet. Egyptiis hodie crurum scarificationem in talibus etiam in pueris in usu esse, in *Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 7.* ex Prospero Alpino dictum. Senibus autem, si adhuc validi sint, sanguinei carnosique, venam aperire nihil impedit; cum vires non annorum numero, sed robore ac corporis habitu æstimandæ sint.

An verò grauidis & sub ipsum mensium fluxum foeminis pleuritide correptis venam aperire fas sit, de eo in *Institut. loco priùs alleg. dictum.* Quæ autem vena & quo in latere aperienda sit, non ita planum est ob plurimas & grauissimas hac de re moras controuersias. Non enim solum antiqui (puta Græci & Arabes) non planè inter se consentire videntur

Vena sectio  
tutissima  
pleuritide  
an aperienda

Ante annum  
14. vena  
aperianda

napa  
autem

quis  
crurum

qua vena &  
que in latere  
aperta.

videntur, sed superiore etiam seculo hac de quaestione variè disputatum, atque, ut Thaddæus Dunus, lib. 2. de art. reuelli. cap. 4. hac de re scribit, acerrimè in hac controuersia altercatum; ac doctiores quique Medici, Itali, Galli, Hispani, (adde & Germani) plurimùm sunt commoti, ita vt ad magistratum ea res delata fuerit, quo Principis autoritate & gladio tumultuosæ istæ disputationes sedarentur. Qua de re infra pluribus, quest. 4. dicitur; hîc saltem veriore, quam putamus, sententiam proponemus.

In pleuritide, vt in aliis inflammationibus, reuulsionem, quæ sanguinem affluxurum, aut etiam, qui jam affluit, à parte inflammata, quantum fieri potest, longissimè auertat, atque ita incrementum inflammationis prohibeat, necessariam esse, tentandamque eam mox esse in principio, dum fluxio humorum adhuc durat, & inflammationis incrementum metuitur, extra controuersiam est. Materiam autem, quæ ad vicinæ inflammationis loca jam influit, aut etiam in partem inflammatam jam influxit, nondum tamen in ea impacta est, deriuationem requirere, etiam extra dubium est, sicut & illud, reuulsionem ad contraria, deriuationem ad vicina, & vtramque *τὸ κατὰ τὴν* seu secundum rectitudinem fieri debere. Hoc autem jam in controuersia est, an reuulsio, vena in latere affecto aperta, fieri, & an vna & eadem venâ apertâ simul reuulsio & deriuatio fieri possit; & an rectitudo saltem secundum latitudinem considerata sit. Nihil horum concedimus, statuimusque præsentè plenitudine venâ in eodem latere apertâ sanguinem potius ad partem affectam attrahi, quàm ab eo reuelli, & quòd reuulsio, vbi vtroque auxilio opus est, tempore præcedere debeat deriuationem, neque vtraque eadem venâ apertâ peragi possit, asserimus. Et si hoc non negamus, quod plethora etiam in eodem latere vena aperta demi, atque ita morbus aliquando præcaueri possit. Veruntamen commodius est, si in latere opposito vena aperiatur, quâ & sanguis minuitur, & à loco affecto reuellit. Statuimus hinc, *τὸ κατὰ τὴν* non solum secundum longitudinem corporis, sed etiam secundum latitudinem considerari posse.


Primum quod attinet, cum focus & fons quasi, è quo sanguis affluit ad partem affectam in pleuritide, non sint venæ brachij in latere affecto, sed truncus venæ caux, à quo vtriusque brachij venæ originem habent, & plus sanguinis sit inter latus oppositum & locum affectum, quàm inter locum affectum & brachium loco affecto vicinum, si in principio, præsentè adhuc plenitudine, vena in eodem & parti affectæ, vicino brachio aperiatur, facile fieri potest vt sanguis, qui post venæ sectionem ratione vacui ad brachium, in quo vena aperta est, fluere debet, ad partem inflammatam, vt pote debilem, dolentem & calentem, præter naturam ruat & trahatur, atque ita inflammatio augeatur. Præcipuè si fluat sanguis per ramum subclauium, aut mammarium, aut thoracicum. Tum enim venâ in eodem latere sectâ non conciliatur motus contrarius, sed augeretur influxus.

Sitenim aa. ramus subclauius, b b. vena mammaria, cc. thoracica, dd. cephalica, e e. basilica, f. truncus venæ caux. Secetur ejusdem lateris cephalica vel basilica, manifestum est, motum contrarium hoc modo non conciliari. Ex fonte enim f. seu trunco venæ caux, dum vena d. vel e. aperitur, simul fluit versus a. b. c. Neque etiam, si per intercostalem venam sanguis influat, tunc in eodem latere vena aperiatur; cum, vt Hippocrates, *de ossibus*, docet, danda sit opera, vt quam maximè procul à locis, in quibus dolores fieri & sanguis colligi solet, sectiones faciamus.

Contrà verò si in opposito brachio vena aperiatur, sanguis, qui ad affecti lateris venas & per eas in partem affectam fluxurus erat: in contrarium trahitur, & sine vlllo periculo.

Dan. Sennerii Tom. I I.

[Lector beneuole, cum Liber I I. Præf. typis primò imprimeretur, accidit, vt septimanis aliquot peregrè abessem. Amanuensi ergo commisi, vt schema hoc venarum ex opere Vesali Basilea, anno 1555. edito infereret. Is verò cum incidisset in schema venarum, quod pag. 450. extat, non animaduertit, vitiosum in eo schemate venæ axillaris exortum exhiberi; sed illud ipsum Practica mea inseri curauit; cum potius alterum, quo prius corrigitur, pag. 505. exstans inserere debuisset. De qua re Te moneo, & schema correctum hîc exhibere volui.]



Et licet è venis ejusdem lateris, vtpote quæ parte affectâ in pleuritide superiores sunt, sanguis fluat; tamen venæ illæ reuera fons non sunt, è quibus sanguis fluit; cum is ex internis & majoribus venæ caux ramis ad hos & per has ad partem affectam mittatur. Et quamuis eadem vicinitas est vtriusque brachij cum vena caua, tamen, vt dictum, si venæ in latere affecto aperiantur, facile fieri poller, vt cum majore imperu ad locum vicinum affectum fluat. Et confirmat ipsa experientia, quod rectè fiat, si in opposito brachio vena aperiatur. Per tot enim annorum secula quibus Arabes, & post hos Barbari, vt ob stylum nominantur, Medici in pleuritide in initio morbi in oppositâ parte venam aperuerunt, nihil incommodi ex eo Medici illi non imperiti perceperunt, nihilque damni ægris ex venæ sectione hoc modo administrata inferri animaduertuerunt. Imò Matthæus Curtius, vt postea, in quest. 4. dicitur, cum ipse pleuritide corripere, & à Medicis, quos in consilium vocauerat, rogaretur, an secundum suum dogma in brachio lateris affecti, an verò in opposito secundum Arabum doctrinam venam sibi aperiri vellet: in opposito latere venam sibi secari maluit, procul dubio non ignarus, quod aliis etiam eadem sine incommodo, imò cum vtilitate aperta esset.

Neque ex vnâ venâ apertâ simul reuulsio & deriuatio fieri potest. Cum enim reuulsio fiat ad remota & contraria, deriuatio ad vicina; vna & eadem pars remota ac vicina esse non potest, atque eodem tempore vtramque fieri non posse, clarè docet Galenus, *de cur. rat. per sanguinis missionem*, c. 19. Vt summariè dicam, inquit, incipientes inflammationes reuulsione curare oportet, quæ verò jam inueterata sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectis partibus. Quod si fieri nequeat, saltem ex vicinis. Ideoque cum Hippocrates & Galenus in eodem latere venam aperire præcipiunt, id non reuulsionis, sed deriuationis gratiâ fecerunt. Quod vel ex eo apparet, quod eo vique sanguinis missionem continuari vouerint, donec color mutaretur, qui sanguinis è parte affecta jam affluentis signum est; reuulsio verò è parte affecta non euacuat.

*Τὸ κατὰ τὴν* verò & rectitudinem quod attinet, quamuis in opposito latere vena aperiatur, nihilominus secundum Hippocratis & Galeni præceptum sit *τὸ κατὰ τὴν κατὰ τὴν*. Neque enim *τὸ κατὰ τὴν* obseruatur solum secundum longitudinem corporis,

Vna vena  
aperta reuulsioni &  
deriuationi  
inferuire non  
potest.

*Τὸ κατὰ τὴν*  
& rectitudinem  
quid?

sed & secundum latitudinem, id quod clarè docet Galenus, in comment. 3. ad lib. Hippocr. de fractur. s. 10. *et ita, inquit, semper pro ex directo ponit, aliquando per longitudinem corporis, aliquando per latitudinem.* Et idem Galenus, 2. ad Glaucon. c. 2. vno crure laborante, ex altero sanguinem mittere jubet. Non enim requiritur, ut vena, quæ reuulsionis gratiâ aperitur, communionem cum parte affecta habeat, id quod in deriuatione est necessarium; sed cum parte mittente communicare debet. Nam cum deriuatio è parte affecta, aut certè vicinis euacuare debeat, necesse est, ut per venas, quæ cum parte affecta communionem habent, fiat, & quidem vicinas. Cum verò reuulsionis finis sit, sanguinem ad partem affluxurum aut jam affluentem ab ea ad contrarium auertere, necessarium est, ut per eas venas fiat, quæ cum parte mittente communionem habent, à parte verò recipiente seu affecta remotæ sunt. Quod in pleuritide optimè fit in latere opposito. Cum enim e trunco venæ cauæ sanguis ad latus affectum affundatur: vena in brachio opposito aperta habet cum venæ cauæ trunco, utpote à quo oritur, communionem; remotior verò est à loco affecto, quàm venæ ejusdem lateris.

Quæ cum ita sese habeant & medicinæ fundamentis consentanea sint, si Medicus mox in principio ad ægrum vocetur, & plenitudo corporis insignis adsit, & vehemens ad partem affectam affluxus, virisque venæsectionem ferant, in opposito brachio vena aperienda est, longinquioris reuulsionis gratiâ; & ne, corpore adhuc pleno & durante humorum affluxu, secta in eodem latere vena affluens humorum copia ad latus inflammatum moueatur. Postea verò in eodem latere deriuationis gratiâ vena aperiri potest. Et in primis id fieri debet in iis regionibus & hominibus, qui largam & repetitam sanguinis missionem faciliè ferunt.

Neque refert, quod, ubi vena in opposito brachio aperitur, euadens auxilium non statim inde percipitur. Etenim nemo primo die vel moritur, vel sanatur, & satis est, si postea commodum ex ista venæsectione percipitur, quod satis magnum est, dum à loco inflammato sanguis qui inflammationem aucturus erat, aueritur, & ex deriuatione plus postea commodi percipitur, si reuulsio præmissa sit.

Si verò, quod sæpe fieri solet, Medicus non statim in primo morbi principio vocetur, & sanguinis, qui morbi vehementia, febrili calore & inedia minui solet, non adeò magna sit abundantia, nec magnus etiam amplius affluxus, aut si pleuritis sit mitior, sanguinisque nec copia magna, nec magnus affluxus, & vires etiam iteratam sanguinis missionem laruræ non sint, statim in loci affecti latere venam aperire licet. Nam si initio pleuritis, in qua magnus humorum affluxus non est, solum fomentis curari potest, cur non etiam in tali miti pleuritide, aut in qua non est amplius magnus humorum affluxus, solum ejusdem lateris venam aperire sufficiat?

Cæterum & hoc in controuersia est: utrum mulieribus mensium aut hæmorrhoidum suppressionem patientibus & pleuritide correptis vena: in brachio an verò in poplite aut pede aperienda sit. Arabes quidem nonnulli etiam aliàs à vena in pede secta fecerunt initium, & sentiunt nonnulli, morbos à menstruorum in fœminis & hæmorrhoidum in viris & fœminis suppressione originem trahentes venarum in crure sectione tantum sanandos esse; id quod in morbis diuturnis, & quidam inducias, faciendum esse, libenter concedimus. In morbis verò acutis, qualis est pleuritis, non semper in poplite aut pede vena aperienda est, sed distinctio adhibenda. Nam si in talibus euacuationibus, quæ statis temporibus fieri solent, repente omninoque suppressis, sanguinis ad superiora motus & in latus affluxus manifestè deprehendatur,

à venæ poplitis vel tali sectione curatio omnino inchoanda est. Si verò suppressio jam antiqua sit, per quam paulatim plethora vel cacochymia aliqua & humorum abundantia in superioribus partibus cummulata sit, neque etiam tempus mensium instet, tum à venarum brachij sectione curatio inchoanda. Acutus enim morbus id requirit, nec moram fert, donec rursum vel menses vel hæmorrhoides prouocentur, fierique potest, ut dum in mensibus vel hæmorrhoidibus prouocandis laboratur, æger vehementiâ morbi iuguletur. Mensium verò & hæmorrhoidum suppressio moram fert, eiusque postea, cum acuti morbi periculo æger liberatus est, ratio haberi, & ut sanguis suppressus prouocetur, opera dari potest.

Nec hîc prætereundum, cum pleuritis non raro febrem & morbum primarium sequatur vel comitetur, quæ sæpe malignitatem insignem conjunctam habet, id quod frequenter in pleuritide epidemia accidere solet; diligenter tum malignitatis esse habendam rationem, & an ea venæsectionem ferat, attendendum esse. Mentionem facit Gesnerus, lib. 1. epistolar. pag. 19. cuiusdam epidemiciæ malignæ & contagiosæ pleuritidis, quâ multi perierunt, & in qua venæsectio in brachio nihil profuit, sectio verò ad malleolos, & in principio sudor ab antidoto aliquo plus opis tulit. Et omnino in talibus malignis primò malignitas expugnanda, & hinc reliqua, quæ opus peragenda.

Tempus quod attinet, cum sanguis vel reuulsionis vel deriuationis gratiâ mittatur, & reuulsio humori fluenti debeat, fluxio autem fiat in principio, sanguis statim reuulsionis gratiâ in initio morbi quacunque diei hora mittendus, neque venæsectio hîc diu differenda, ut postea deriuatio fieri possit. Veteres, teste Galeno, 3. epidem. comm. 3. non mittebant sanguinem post quartum diem. Verum certus dierum numerus hîc definiri non potest, sed interdum post quartum diem sanguinem mittere non licet, quandoque & octauo licet. Nam si quarto die jam materia concoqui, & persputum expelli cœpit, ne natura ab hoc suo opere auertatur, post quartum diem venam secare facile non licet. Si tamen corpus sit valde plethoricum, tutius id facere licet, ut natura oneris parte leuata reliquum facilius concoquat. Si verò tale quid non obseruetur, etiam post quartum diem venam secare fas est, quod & Hippocrates, loco allegato, fecit, qui Anaxioni venam aperuit octauo die, vel quod citius non fuerat vocatus, vel quod in pleuritide crudissima, quæ vndecimo die vix coqui cœpit, morbus inducias tulit.

Quantum sanguinis mittendum sit, ex ejus copia & virium robore æstimandum est. Ita etiam vires docebunt, utrum confertim & vnâ vice, an verò partitis vicibus sanguis mittendus sit. Hippocrates, 2. de rat. vi. etus in acutis text. 10. vacuationis modum statuit esse coloris in sanguine mutationem, si scilicet à crudo etiam aquoso rubicundus vel flauus fluat, aut à rubicundo vel flauo liuidus vel niger ob adustionem. Indicium enim est, sanguinem ex ipsa phlegmone, vel vicinis huic venis alterarum, & transmutatum jam euacuari, qui ob calorem & adustionem ibi colorem mutauit. Verum id tantum locum habet, cum in eodem latere deriuationis gratia sanguis mittitur, non verò, cum in opposito reuulsionis gratiâ.

Neque tamen, cum in eodem latere vena aperitur, illam coloris mutationem semper expectare licet, sed prius cessandū est, cum scilicet aut vires infirmæ sunt, ægerque habitu corporis molli teneroque est, qui facile resoluitur, aut tēpus anni admodū calidū, aut inflammatio ita praua, ut de impacto ei sanguine nihil emittatur. Antiqui etiā ad lypothymia vsque sanguinem mittebant. Verum corpora nostra talē venæsectionē, præcipue in pleuritide, non faciliè ferunt, cum propter dolorem, febrem, tussim viribus opus sit, quæ constare nequeunt, si initio statim sanguis tam copiose euacuetur.

Vicaria

Mulieribus  
mensium  
suppressione  
laborantibus  
quamam  
vena secanda  
in pleuritide.

Quando secanda sit vena.

non oportet  
venam  
secare  
in pleuritide  
si non sit  
concoctio  
materiae

Quantum  
sanguinis sit  
mittendum.



*Continua.* Vicariæ phlebotomiæ in corporibus infirmis & materiæ copia non magna sunt cucurbitulæ cum scarificatione infernis lumbis vel partibus inferioribus appositæ.

### Purgatio.

*Purgatio.* Postquam sanguinis missione impetus ejus aliquo modo conquieuit, & pars aliqua humoris inflammationem patientis euacuata est, si ex missi sanguinis colore & aliis signis cacochymiam in corpore subesse, quæ malum foueat, augeatque, Medicus coniiciat, ad purgationem accedendum est, inprimis si eam ad primam ~~regionem~~ regionem vergere ex ventris murmure, vomitu, excrementis alui liquidioribus, anxietate circa ventriculum cognoscatur. Atque id maturè faciendum. Autor quidem, *lib. 4. de rat. victus in acut. aphor. 76.* diem quartum simpliciter purgationi determinat. Verùm rectè scribit Galenus, *in comment.* talia ægro secundum numerum dierum simpliciter injungi non posse; sed quod Hippocrates statuit, esse sequendum, idèque statim initio medicandum, vel postea, quando ad maturitatem perducti sunt humores; quam ob causam & prima interdum die, & secunda & quarta & interdum quinta se purgans medicamentum dedisse scribit. Idèque humores, qui in communibus ductibus redundant & faciliè ad partem affectam confluent, initio, quo tempore auersio maximè desideratur, purgandi; postea verò vbi morbus viger, & humores à natura coquuntur, melius est quietere.

Exhibenda verò talia medicamenta, qualia sunt apta ad euacuandum cum humorem, qui in corpore abundat, & in latus jam fluere cupit, vel saltem ad fluxionem paratus est, modò illa mitia sint & lenia, qualia sunt tamarindi, manna, cassia, syrupus rosar. & violar. solut. quibus & rhabarbari, mechoacannæ, fol. fenæ, agarici vel fortiorum aliquid addi potest, diaprunum, diacatholicum.

A fortioribus verò purgantibus medicamentis abstinendum, ne commoti ab his humores majori impetu in partem affectam ruant.

E. g. *℞. Decocti fl. & fruct. Vn. ii.* In quibus dissolu. manna el. Drach. vi. cassia extr. Vnc. sem. diapruni simpl. Drach. iii. extr. rhabarb. Scrup. i. spir. vitriol. g. v. Misce.

Nonnulli quocunque humore redundante exhibent oleum amygdal. dulc. recens, per quod faciliè sine mole, stia aliùs mouetur. Cui quidam aliquid visci querni vel dentis apri addunt. Conradus Gesnerus, loco allègato, in pleuritide illa epidemia oleum lini propinatum fuisse, & aluum copiosè mouisse scribit.

*Oleum lini in pleuritide epidemia aluum mouit. Alterantia.* Alterantia quoque febris & humoris peccantis causâ exhibenda, humorque, si nimis calidus, acris, tenuis, aut contrà crassus sit, aptis medicamentis alterandus & corrigendus. Quæ tamen etiam commodè cum illis, quæ humorem jam in latere hærentem respiciunt, misceri possunt, vel ex alterantibus ea eligi, quæ simul peculiari proprietate causam morificam respiciunt. Et si conjiciamus, febrem illam, quæ pleuritidi conjungitur, esse malignam, qualis ferè semper in pleuritide epidemia, vtile, imò necessarium est, vt statim initio etiam medicamenta sudorifera exhibeantur, qualia aliàs febribus malignis dicata sunt; quæ tamen ita parari debent, vt simul peculiari vi hunc morbum respiciant.

*Das medica- mentorum genera in pleuritide.* Vniuersalibus euacuationibus hoc modo præmissis, ad ipsam continentem causam & humorem inflammationem excitantem curatio dirigenda est. Vbi duo inprimis medicamentorum genera requiruntur. Alia proprietate & vi peculiari pleuritidis vtilia; alia expectorantia & expuitionem faciliorem reddentia, vel materiam insensibiliter discutientia.

*Specifica.* Priora quod attinet, etsi inflammatio morbus notus sit, & propterea medicamenta occultâ vi agentia re-

Dan. Sennerti Tom. I I.

quirere non videatur; tamen caussis, quæ eam excitant, plerumque peculiaris malignitas inest, quæ propterea etiam medicamenta occultâ qualitate agentia requirunt. Talia sunt flor. papauer. errat. seu rhæados siue per se sumpti, siue illorum succus, siue aqua, siue syrupus. Nonnulli flores istos recentes in succo betulæ, inspersis aliquot guttulis spir. sulphuris acidi per campanam facti, ad gratam conciliandam acredinem, non secus, quàm rosas aut violas macerant, atque inde ter aut quater reassutis ~~in~~ floribus diluto cum saccharo serapium ~~rum~~ limi coloris conficiunt, quo postmodum prospero successu in pleuritide suo tempore vtuntur. Nam non solum imperum humoris tenuis affluentis refrenat, ardoremque & ebullitionem sanguinis compescit; verùm etiam acutæ febris præsens est auxilium. Huc referuntur carduus Mariæ & præcipuè semen, carduus bened. scabiosa, radix lappæ major. seu bardanæ, radix aristolochiæ, cortex auellandarum rubrarum, oculi cancrorum, vel eorum magisterium, dens apri, castoris, lign. visci querni, mandibulæ lucij cum dentibus, oculi item lucij, & cruces in capite ejus inuentæ, lapis carptionum, percarum, priapus tauri, cerui, talus leporis, capreoli, sperma ceti, corallia rubra, quorum g. i. vel etiam plus cum aqua conuenienti exhiberi potest; millefolij item radix contusa & cum aceto exhibita; succus pimpinellæ Italicæ seu sanguisorbæ; aqua prunorum syluestrium, sal hyperici, quæ inprimis iuuant, si post eorum vsum sudor exciterur. Idèque Chymici & alia sudorifera exhibent, vt bezoarticum minerale, & diaphoreticum, & spiritum illum tartari compositum. Peculiariter etiam à nonnullis commendatur jus pauonum pingue.

De horum autem viribus, & quomodo pleuritidis prosint, alij aliter disputant. Nobis probabile videtur, ea inprimis ratione pleuriticos iuuare, quod vim humores dissipandi & discutendi habent, & ex iis etiam quædam malignos humores expellunt, ac cum pectore peculiarem cognationem habent. Vnde pleraque ex iis lapsis & contusis ad sanguinem concretum dissoluentum exhibentur, quædam in malignis febribus vsurpantur. Sicut nimirum venena alia aliis partibus nocent: ita & humores vitiosi alij ad alias partes à natura seu protruduntur, seu ruunt, & vt cancer, erysipelas, similesque tumores non in omnibus æquè partibus excitantur, & humor, qui dysenteriam excitat, intestinis peculiariter insensibilis est: ita & humoris pleuritidem excitantis ea plerumque natura est, vt ad pleuram, non ad alia membra tendat. Hinc etiam, sicut dysenteria, ita & pleuritis nonnunquam est epidemia. Medicamenta ergo, quæ peculiari vi pleuritidi prosunt, occultam illam humoris vitiosi qualitatem expugnant. Quapropter etiam commodissimè dantur initio, vt scilicet malignum illud, quod naturam stimulat, & hujus fluxionis causa est, discutiarur.

Vt *℞. Fl. papau. errat. M. j.* Infunde in aq. scabiosæ, cardui Mariæ, an. lb. sem. Colentur & cum saccharo cando dulcorentur.

F. Iulebus.

Vel *℞. Cardui Mariæ Scrup. ii. flor. papau. errat. ocul. cancri, ana Scrup. i.*

F. Puluis, qui detur cum aqua endiuizæ.

Vel *℞. Vnicor. C. C. præp. margaritar. corallior. rubr. ocul. cancri, mandibular. lucij, lapid. percar. ana Drachl. j.*

F. Puluis.

Detur Drach. sem. in aq. prunor. syluestrium.

Vel *℞. Carduiben. cort. auellandar. rubr. ana Scrup. ii. ocul. cancri, mandibul. lucij, corallior. alb. an. Drac. i.*

F. Puluis.

Vel *℞. Rasura dentis aprugni Drach. iij. sem. ligni visci querc. rad. bardanæ, ana Drach. i. sem. F. puluis tenuissimus.*

Vel  $\mathcal{L}$ . Sem. cardui Mar. Drach. i. sem. cardui bened. Drach. sem. Cum aqua cardui Maria Vnc. iiii. cardui bened. Vnc. i. F. emulsio, cui adde syr. violar. papau. errat. an. Vnc. sem. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Sem. melon. Drach. ii. papauer. albi Drach. i. cardui bened. cardui Maria, ana Drach. i. sem. aq. scabios. cardui ben. ana Vnc. iii. hyssopi Vnc. i.

F. Emulsio, in qua dissolu. mandibul. lucij vstar. rasura dentis apri, an. Scrup. i. crystalli prep. Scrup. sem. syr. de althaa Drach. iiii. manny. perlat. cum aq. rosar. Vnc. sem. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Succ. sanguisorb. syr. papaueris errat. an. Vnc. j. aq. cardui Mar. Vnc. ii. vel iii. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Dent. apri Scrup. i. flor. papau. errat. Scrup. ii. syr. papau. errat. capill.  $\mathcal{Q}$ . ana Vnc. i. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Aq. scabios. Vnc. xv. i. pimpinella, sanguisorba, an. Vnc. viii. flor. papau. errat. sic. M. j. sacch. penid.  $\mathcal{Z}$ . iii. Ebulliant in vase duplici clauso & colentur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Aq. charesol. cardui Maria, papau. errat. ana Vnc. ii. ocul. lucij Scrup. sem. mairis perlar. prep. succini albi prep. ana gr. xv. extr. enula gr. v. syr. de hyssopo Vnc. sem. de succo violar. Drach. ii. essent. papau. errat. Drach. i.

M. de quo die noctuque per quatuor vices tria cochlearia calide propinentur.

Vel  $\mathcal{L}$ . Aq. carduiben. scabiosa, an. Vnc. i. sem. papau. errat. Vnc. ii. ocul. cancri prep. C. C. prep. ana Scrup. i. syr. de succo violar. de iuinbis, ana Vnc. sem. de althaa Drach. ii. spir. sulphur. acidi Scrup. ii. Misce.

Quod verò medicamenta, quæ ad materiæ per sputum sensibilem euacuationem faciunt, attinet, pro humoris & temporis morbi ratione hæc nonnihil variant. Cum enim humores ad exspuendum aptissimi sint, ubi mediocritatem quandam obtinent inter crassum & tenue: medicamenta ita comparata esse debent, ut eam humoribus inducant. Humores enim tenues, & qui pro tenuitate aëris tussi expulsi imperum effugiunt, ab initio incrassantibus ad mediocritatem reducendi, & ad excreationem aptiores reddendi sunt. Crassos verò attenuare, viscidos incidere, adhærentes abstergere & abluere, simulque vias expulsionis aptas reddere, conuenit.

Incrassant rad. althæa, flor. violar. bugloss. jujuba, sebesten, gumi tragacanth. amyllum, papauer. syrup. violar. jujubin. de papau. diacod. diapenid. diatrage. frig. loch de psyllio, decoctum pectorale, quod ex hordeo, passul. jujub. glycyrrhiz. ac  $\mathcal{Q}$ . sem. frig. major. conficitur. Exemp. gr.

$\mathcal{L}$ . Sacch. penid. Vnc. i. rotul. diaireos s. diatrage. frig. an. Drach. iiii. passul. enucl. Vnc. sem. sem. malu. Drach. i. papau. Drach. sem.

Cum s. q. syrup. violar. M. in formam Linctus.

Vel  $\mathcal{L}$ . Syr. violar. de jujubis capillorum Veneris, conserua violar. sacch. candi, amyli, ana Vnc. sem. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Amygd. dulc. contusar. pinear. in aqu. hordei infus. & contusar. ana Vnc. j. sem. melonum, cucurbitæ ex cortice. ana Drach. ii. sacch. candi Vnc. sem. syr. capill.  $\mathcal{Q}$ . jujubini, ana q. s. F. Lohoh.

In crassa verò materia conueniunt hydromel, oxymel, hyssopus, capillus  $\mathcal{Q}$ is, scabiosa, tussilago, syrupus capill. Veneris, de glycyrrh. de farfar. de hyssopo, de prassio, de scabiosa, loh. de farfara, de pino, de prassio, de scilla, diatrageanth. calid. decoctum pectorale ex passul. sebesten, jujubis, dactyl. caricis, hord. glycyrrhiza, capill.  $\mathcal{Q}$ . hyssopo paratum.

Vel  $\mathcal{L}$ . Syr. capill. Vener. de glycyrrhiza, an. Vnc. i. de tussilag. oxymel. sana Drach. vi. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Lohoh de penid. de farfar. an. Vnc. sem. spec. diaireos s. Drach. j. Cum syrupo de glycyrrhiza. F. Lohoh.

Vel  $\mathcal{L}$ . Ol. amygd. dulc. vel lini vel utriusque, oxymel. sana Vnc. sem. sacch. penid. q. s. F. Lohoh.

Bortonnus, Medicus Italus, sequenti Eclegmate feliciter vsus est:

$\mathcal{L}$ . Ol. amygd. dulc.  $\mathcal{Z}$ . ii. oxymel. scillit. sacchari candi,

ana  $\mathcal{Z}$ . i. succi cepar. Drach. i. M. de quo sapius cochlear sem. propinetur.

Verum medicamenta, quæ ad crassos humores temperandos adhibentur, non sine omni distinctione usurpanda; cum crassum sit varium. Crassum enim aliud naturâ suâ tale est, aliud ob coctionem. Primo conueniunt incidentia & attenuantia; crasso ex coctione, quæ abluunt & abstergunt; adustis ea quæ humectant. Si materia sit cruda & contumax & febre remittente non cedat materiæ exicreatio, validioribus vtendum, ut loh. de caulibus, de farfara, sano & experto, & aliis, quæ pulmonem à pituita & pure expurgare possunt. Atque medicamentis reliquis acetosi aliquid interdum addere licet, ad maiorem incisionem, ut ad tussim æger nonnihil stimuletur. Aliàs bechicis non vtendum, nisi cum facultas languida est, ut satis non expellat; cum ipsa causâ naturam satis ad ipsam tussim irriter.

Antiquis in omni vera pleuritide in magno vsu erat oxymel, sed dilucius, de quo Hippocrates, 1. de rat. viſt. in acut. t. 43. & 3. de rat. viſt. in acut. t. 24. & seqq. videatur. Dictum etiam est de eo in Institut. lib. 5. pars. 3. sect. 3. cap. 4.

Atque ex enumeratis hæcenus plerumque parantur medicamenta, quæ plures fines respiciunt. Nimirum quæ simul vim habent febri, cuius ferè soboles est pleuritis, ut & malignitati, si quæ adsit, resistendi, materiæ per sputum reiectionem adiuuandi, & pleuritidi peculiariter resistendi.

Vel  $\mathcal{L}$ . Lohoh de farfar. Vnc. i. spec. diatr. f. Vnc. sem. ocul. cancri Scrup. sem. conserua violar. Vnc. sem.

Cum syrupo papauer. errat. F. Lohoh.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. fenicul. tussilag. ana Drach. iiii. spec. decocti pector. Drach. vi. Coqu. in suffic. quant. aqua simpl.

Colaturæ  $\mathcal{L}$ . lb. j.  $\beta$ . Adde syrup. acetos. f. papau. errat. violar. an.  $\mathcal{Z}$ . i. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Scabios. P. j. cardui Maria M. sem. jujub. Vnc. sem. rad. glycyrrh. sem. melon. card. Maria, an. Drach. ii. Coq. in s. q. aq. hordei.

Colaturæ  $\mathcal{L}$ . Vnc. vii. syr. papau. errat. Vnc. i. violar. Drach. vi. Misce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. glycyrrh. Drach. vi. flor. violar. papau. errat. ana P. j. jujubar. sebesten, an. N. vii. passul. Vnc. j. ficum N. vi. sem. cardui Maria, melon. an. Drach. ii. Coq. in aq. hordei.

Colaturæ  $\mathcal{L}$ . lb. ii. dulcoretur saccharo cando.

Vel  $\mathcal{L}$ . Fol. farfara M. ij. fragor. violar. an. M. j. rad. belenij Drach. iiii. glycyrrh. Vnc. i. sem. fenicul. Drach. i. caricar. N. iv. passul. Vnc. ii. Coq. in aq. hordei mensur. iiii. ad tertiæ partis consumptionem. Detur manè & vesperi haustus.

Vel  $\mathcal{L}$ . Sem. fenigraci Vnc. i. lini Vnc. sem. jujubar. N. vii. dactylor. ficum, an. N. iiii. passul. exacin. Vnc. sem. rad. glycyrrh. Drach. iiii. Coq. in aq. hordei s. pro  $\mathcal{Z}$ . viii. Quibus add. pulu. rad. bardana Scrup. i. spec. diatrage. frig. Drach. sem. liquor. visci querc. gr. xiii. sal. cardui ben. Scrup. i. syr. de jujub. de althaa, ana Vnc. sem. Misce.

Ad dolorem mitigandum, materiam euacuandam, inflammationem resoluendam, sudorem eliciendum, ut admirabile præsidium aq. è flor. chamæmeli destillata commendatur, cuius Vnc. iiii. cum sacchar. Vnc. sem. vel Vnc. j. exhibentur.

Neque solum interna medicamenta post vniuersalia illa præmissa necessaria sunt, sed & externa quædam medicamenta adhibentur, quæ materiam insensibiliter resoluunt, simulque dolorem leniunt; ad materiæ concoctionem faciunt, pedusque, ut ægri facilius exspuere queant, dilatare possunt. Quorum alia sunt mitiora, ut spongia vel linteum madefactum in aqua dulci tepida vel lacte, aut vesica his repleta: item ol. dulce, viol. amygd. dulc. mucilago sem. althæa, cydon. adeps suillus, gallin. buryrum, omnia recentia, vnguentum dialthæa, Alia medioctia, quæ vim aliquam

Crassum de  
plures modo  
accipitur.

Extrema.

Mitiora.

quam discutiendi & aperiendi habent, vt chamame-  
lum, anethum, hyslopus, origanum, melilotus, sem. li-  
ni, fœnigræci, flor. cheiri, & olea ex his composita. Alia  
fortiora vt sal, dictamnus Cretic. ruta, galbanum, lepi-  
dium, sinapi. Et quidem mitiora in corporibus mol-  
lioribus, vt pueris & fœminis, locum habent, & initio  
morbi sufficiunt, vt dolorem leniant, quo sedato influ-  
sus sistatur. Validiora viris & robustioribus ad mouen-  
da; sicut & thorace à materia per expectorantia maxi-  
mâ ex parte expurgato ad fortiora accendendum. At-  
que ex his varîæ medicamentorum formæ componun-  
tur: fomenta, inunctiones, cataplasmata, emplastra, sac-  
culi, sed sicca & arida veræ pleuritidi minùs quàm no-  
thæ conueniunt. Atque in maiore dolore molliori-  
bus, vt fœmentis & illinitionibus, vtendum. Vbi verò  
dolor non est adeò vehemens, cataplasmata, cerata,  
emplastra adhibere licet.

Vt *℞. Mucilag. sem. albæ, psylli, cydon. an. Drach. iii. ol. violar. amygd. dulc. an. Vnc. ℞. cere parum F. Vn-  
guentum.*

Vel *℞. Ol. amygd. dulc. chamam. lilior. albor. vnguen-  
ti dialth. an. Drach. iij. pingued. gallin. butyri recent. non  
saliri, an. Drach. i. sem. cere parum. F. Linimentum.*

Vel *℞. Vnguenti dialth. Vnc. sem. pulu. rad. ireos  
Drach. sem. ol. amygd. dulc. medull. crur. vituli, an. q. s. F.  
Linimentum.*

Vel *℞. Rad. alib. ad mollitiem coctar. & per setaceum  
transmissar. lb. sem. farin. fabar. sem. lini, fœnigræci. ana  
Vnc. sem. pulu. flor. chamam. Drach. iii. pingued. gallin.  
anserin. an. Vnc. sem. vitell. or. or. duorum, croci Scrup. j.  
M. F. Cataplasma.*

Vel *℞. Rad. lilior. albor. alib. an. Vnc. i. malv. violar.  
flor. hyperici, consolid. regal. an. M. j.*

Coq. ad mollitiem, & per setaceum trahantur.  
Deinde adde *farin. sem. lini, fœnigræci, pulu. flor. chamam.  
an. Vnc. i. ol. amygd. dulc. vel butyri recentis sine sale q.  
s. F. Cataplasma.*

Aëtius, *teirabibl. 2. ferm. 4. cap. 68.* post septimum  
diem, si dolor persistat, cucurbitam lateri affigere & cu-  
tim scarificare iubet, manifestissimamque in pleuriti-  
cis vilitatem ex cucurbitulæ appositione percipi scri-  
bit. Vulnusculis verò scarificati loci salem aut nitrum  
inpergere, si sustinere queant; in aliis linteolum oleo  
madefactum ac sale contersum imponere præcipit;  
sequenti deinde à scarificatione die rursum cucurbi-  
tam affigere iubet, quâ sanguis saniosus ex vulnusculis  
extrahatur. Paul. Aegineta, *lib. 3. cap. 33.* post de-  
cimum quartum etiam diem vitur cucurbitulis. Com-  
mendat Trallianus, *lib. 6. cap. 1.* hoc auxilium, vt  
quod cum admiratione dolorem, licet vehementissim-  
um, leniat, vt neque fomentis, neque alio auxilio  
opus sit. Verum enim verò validum hoc est auxilium,  
& quod vel insigne commodum vel dampnum afferre,  
& à paucis tolerari potest, præsertim si ad Aëtij præ-  
scriptum adhibeatur. Quapropter vsurpandum cautè,  
& cauendum, ne vel nimij dolores, vel noua fluxio  
concitetur, tum scilicet, cum affectus diuturnior cau-  
sæ potius parri impactæ contumaciam, quàm multitu-  
dinem præ se fert, & cum venæsectione & purgatione  
adhibita dolor eodem modo intensus non ad septi-  
mum solum diem, sed ad vndecimum etiam & deci-  
mum quantum perseuerat, & neque manifestè eua-  
nuantibus neque resoluentibus cedit; nulla tamen ple-  
nitudinis & cacochymiae in corpore relicta suspicio  
reliqua est.

Vigilia si vrgeant, hisce subuenitur illis, quæ affe-  
ctui quoque conuenire possunt, vt lacte amygdal. cum  
emulsione sem. papau. & croco dato, vel syrupo de pa-  
pauere, &c.

Tandem si materia non rejicitur, nec vilo modo à  
parte amoueri potest, sed phlegmone in pus mutatur;  
curandum, vt quamprimum maturetur, & abscessus  
rumpatur. Ad maturationem tale habet emplastrum

Dan. Senneri Tom. I. l.

Benedict. Fauentinus, quod & Forestus commendat,  
*lib. 16. obseru. 40.*

*℞. Fol. malu. cum radic. violar. ana M. ij. rad. alth.  
mund. Vnc. ii. lilior. alb. Vnc. i. enula Vnc. sem. flor.  
chamam. meliloti, an. M. j.*

Bulliant omnia in f. q. aq. ad mediet. Colat. adde  
*farin. fœnigr. frumenti, an. P. i. fermenti Drach. ii.  
pingued. porci, butyri, an. Vnc. sem. ol. amygd. dulc.  
communis an. q. s. ad impinguandum emplastrum, cui  
adde croci Drach. sem.*

Vt verò abscessus rumpatur, æger voce intenta lo-  
quatur, de latere in latere, ruffi aut cum cona-  
tu. Rumpitur etiam abscessus, si vomitus aut sternu-  
tatio exciteretur. Ad quod etiam faciunt becchica adhi-  
bita, commendanturque scabiosa, prassium, carduus,  
bened & aquæ ac syrups ex his compositi.

Vel *℞. Radic. alth. helenij, an. Vnc. i. iujubar. se-  
besten. an. N. xv. glycyrrh. passul. an. Vnc. i. sem. da-  
ctylorum, ficuum, an. N. vj.*

Coq. in aq. lb. ij. ad tertriæ partis consumptionem.

Colat. adde sacch. q. s. F. Iulebus.

Vel *℞. Fermenti tritici q. v.*

Et F. Pulvis cum decoct. ficuum & edatur.

Vel panis bene fermentatus in aqua mulsa mace-  
retur.

Extra cataplasmati adjiciatur aliquid stercor. colum-  
bini, & galbani.

*℞. Rad. lilior. alb. contusar. Vnc. iij. ficuum N. x.  
fimi columbini Vnc. ii. fermenti Vnc. iii. axungia porci,  
butyri, an. Vnc. ii. F. Cataplasma.*

Quæ si non prosint, nonnulli partis apertionem  
suadent. Sed raro tumor extra vergit.

Abscessus ruptus detergendus hydromelite, deco-  
cto pectorali. Ad consolidandum utilis est confertua  
rosar. mediæ ætatis, thus, bolus, terra sigillata. Om-  
nes verò intentiones complet lac chalybeatum, nisi  
febris ejus vsus prohibeat.

Cum verò abscessus ad interiora ruptio in pleuriti-  
de periculum faciat, & suffocatio vel phthisis ex eo im-  
mineat, suadent nonnulli, vt extra aperiatur abscessus.  
Neque abs re hoc fore videtur, modò locus, in quo vo-  
mica contineatur, certò & exactè cognosci possit. Ne-  
que enim eo loci, quo in empyemate & pure jam in  
thoracis cavitare collecto sectio fieri solet, de quo po-  
stea dicitur, sectio tum instituenda, sed ex pondere,  
dolore & calore diligenter locus, in quo vomica hæ-  
ret, inuestigandus, atque is intra duas costas ape-  
riendus leniter & paulatim, donec pus, exeat, cau-  
dumque ne simul tunica interior perforetur. Verum  
nisi planè exactè locus perspectus habeatur, sed is in-  
certus sit, aut vires debiles eam non ferant, sectio non  
instituenda.

Jacobus Fontanus, *med. pract. lib. 2. cap. 3.* refert, in-  
terdum malignas & vulgares pleuritides grassari, qua-  
lem Anno 1598. vidit, quæ generabatur ex humore  
tenui virescente, & omnibus, qui ea corripiebantur, fe-  
rè lethalis erat. In cadaveribus dissectis sub mammis  
reperiebatur vomica plena virescente liquido humore.  
Huic pleuritidi in sectione est vnicum remediū. Cum  
enim in humore prauo nulla sit coctionis & mitiga-  
tionis spes, materia sectione vt extrahatur, necesse est.

Si materia ad vias vrinæ vergat, diuretica exhibeantur.

Vt *℞. Radic. aperientium in vino maceratar. an. Vnc. i.  
glycyrrh. Vnc. i. sem. 4. frig. major. an. Vnc. sem. adianthi  
M. j. cicerum rubr. M. sem. Coq. in f. q. aq. pure ad dimi-  
diæ partis consumptionem. Colatura saccharo dulco-  
retur.*

Si ad intestina vergat, clysteres abstergentes & abluen-  
tes exhibeantur, & ne dysenteria exciteretur, etiam syrups  
nonnihil adstringentes propinentur.

Dieta.

Cum pleuritis ex acutorum morborum numero sit.

Dieta.

000 3 victus

viſtus rationem accuratam, & qualis acutis conuenit, requirit; de qua pluribus Hippocrates, 1. *de rat. viſt. in acut.* vbi pleuritidem exempli loco tractat, & Galenus, in *comment.* Itaque in principio ad dies 4. ſi ægri vires ferant, tenuiſſimo viſtu vtendum. Veteres tenuem viſtum præſcribebant ex melicrato primũ, poſtea ex cremore priſanæ hordeaceæ vſque ad ſeptimum vel nonum diem, vbi integram priſanam aut oua aut carnis aliquid exhibere licebat. Et omnino accurati erant Antiqui in præſcribendo pleuriticis viſtu; habeturque, *ibid.* 3. dolorem in pleuriticis augeri, ſi ægro priſana datur alio reſenta & non prius aperta; imo ægrum ad mortem præcipitem agi, ſi dolore non remittente ſputoque reſento priſana præbeatur, non præmiſſâ euacuatione corporis, ſiue per venæſectionem, ſiue per alui ſubductionem.

Noſtri tamen homines tenuiſſimæ illi viſtus rationi non ita aſſueti ſunt. Itaque ægris præberi poſſunt forbitiones ex cremore priſanæ primũ ſponte colato, poſtea expreſſo. Priſanæ enim hordeaceæ cremor in pleuritide præſtantiſſimum alimentum eſt. Nam ejus viſcoſitas læuis, continua, jucunda, lubrica, & mediocriter humens ſitrim minimè inferit. Et ſi quid abluui vel excerni debet, probè abluui, vt Hippocrates habet, 1. *de rat. viſt. in acut.* 18. pituitam diſſoluit & abſtergit, atque per ſuperiora, quæcunquẽ deduci poſſunt, abſque dolore educit, aluumquẽ facilem reddit, ad deglutendum facilis eſt, dolorem & calorem mitigat, maturat & omnia emollit. Vtilis eſt & emulſio amygdal. dulc. cum aqu. hordei facta, addito ſaccharo. Licet quoque amygdalas cremori priſanæ miſcere; biliſis tamen cremor priſanæ commodiùs ſolus exhibetur. Addi etiam poſſunt ad refrigerationem ſem. 4. frig. majora. Morbo cedente panatella dari poſteſt ex jure gallinæ cum oui luteo & jura carniũ tenuiã: cibi item ex amygdal. & pineis parati. Tandem ad oua, carnes coctas & aſſas pullorum ac gallinarum & piſces bonos tranſeundum.

Porus ſit aqu. hordei cum pauxillo cinamomi & item glycyrrhiz. item oxymel. aquoſius vel decoctum pectorale ex jujubis, paſſul. glycyrrh. & hordeo:

Vel ℥. Aq. coſte tb. ii. mellis, aceti, an. Vnc. ſem. ſacchari Vnc. ii. Miſce.

Vino abſtinendum, & quanquam æger auidiſſimè id appetat, tamen ei non eſt concedendum; cum ante morbi declinationem pleuriticis inſtar veneni ſit. Ideo ante 14. diem raro vinum concedi poſteſt. Porus, qui aſſumitur, non ſit actu frigidus, ne ſputum, & quod inſenſibiliter tranſpirare debet, retineatur. Videntur in cibo & potu omnia acida, ſalſa, fauces exaſperantia & adſtringentia. Compertum enim, nonnullos pleuriticos à lenticularum cum aceto ac ſaſamentorum piſcium vſu & à frigidæ liberali potu extinctos fuiſſe. Aër temperatus ſit. Motus animi & corporis vehementer caueantur, ita vt æger quoque parum loquatur. Aluus lenientibus clyſteribus aperta ſeruetur.

## QVÆSTIO I.

*An in omni pleuritide detur inflammatio Pleura?*

*An in omni pleuritide detur inflammatio pleura?* Vt hîc dubitare quis poſſit, anſam præbuit Heurnius, qui, *cap. proprio*, ſcribit, hanc membranæ amertiam & dyſcraſiam oculis non ſemper in cadaueribus ſectis patere; ſe ſecuiſſe pleuriticum immani delirio abreptum, cui nihil in menynge, nihil in cerebro, nihil in toto corpore *παρά quoniam* notari potuit.

Verũm diſtinguendum eſt inter pleuritidem ſeu inflammationem pleuræ, & dolorem lateris ſeu pleuræ. Neque enim, vt infra diceretur, omnis dolor lateris eſt ab inflammatione pleuræ, ſed etiam ab alijs cauſis ortum habere poſteſt. Et memini, in morbillis infantes

quandoque acutiſſimos lateris dolores paſſos eſſe, antequam morbilli erumperent, à materia maligna & acri pleuram vellicante. Dolorque hic, vt rectè Heurnius, *ibid.* ait, à materiã mole ſæpe non magnã ortum habere poſteſt. Ac proinde ille, quem mortuum ſecuit Heurnius, non fuit propriè pleuriticus, ſed febre acutã malignã laborauit, in qua pars materiæ malignæ & febrilis ad pleuram effuſa dolorem ibi excitauit, pars in caput elata delirium procreauit.

Atque talis proculdubio fuit ille dolor pectoris, cujus Quercetanus meminit, quanquam falſò pro pleuritide eum habuit, qui à vermibus & malignis vaporibus ex iis adicendentibus ortum habuit; & tales dolores ſcabioſis etiam ſæpe accidiſſe animaduerti. Talis eſt etiam, qui ſcorbuticis accidit, & proinde pleuritis vera non eſt. Si tamen talis dolor diutius durer, & afluxus humorum cauſa ſit, pleuritis inde & quidem non notha, ſed vera excitari poſteſt.

## QVÆSTIO II.

*An in pleuritide ſola Pleura, an verò ſimul Pulmo inflammetur?*

De loco in pleuritide affecto & Antiqui & Recentiores dubitarunt, an ſcilicet in pleuritide ſola Pleura, aut muſculi intercoſtales, an verò ſimul etiam Pulmones afficiantur? Membranam equidem coſtas ſuccingentem inflammari in pleuritide, vt pote quæ à parte affecta nomen habet, dubium nullum eſt. Cum enim dolor ſit adeò vehemens, vt ægri quaſi terebrã lateris perforari conquerantur, neque coſtis, quæ omni ſenſu deſtituuntur, neque earum membranæ, quæ ob nimiam tenuitatem ac venarum paruitatem atque exilitatem tantam inflammationem ſuſcipere non poſteſt, neque iſſis muſculis, qui ſenſum adeò exquisitum non habent, neque ſoli pulmoni, qui ipſe non ſentit, niſi parum ratione membranæ ambientis, iſ competere poſteſt, ſed in membrana coſtas ſuccingente eum conſiſtere neceſſe eſt. Hoc tamen negandum non eſt, interdum muſculos intercoſtales ſimul in conſenſum trahi, cum membrana coſtas ſuccingens & hi muſculi adeò connexi ſint, vt vnum ſine altero affici vix poſſit.

De hoc verò quæſtio maxima eſt, an ſolũ membranæ coſtas ſuccingens, an verò ſimul pulmones in pleuritide afficiantur. Noſtro ſeculo Felix Platerus, vir in re medica peritiſſimus, ſemper ſimul pulmones inflammari, ex ſeſtione pleuritide mortuorum ſe deprehendiſſe, ſcribit. Idem Ioh. Zecchius, in *conſult. Medic. conſ. 26. in appendice*, ſentit, dum ſcribit, ſemper ſe fuiſſe in ea ſententiã, quod lateris dolor magna ex parte ad pulmones pertingat, raro autem ad membranam coſtas ſuccingentem; cum in pluribus corporibus poſt mortem diſſectis ægrotantium, qui communiter ac certè pleuritide periſſe iudicabantur, non membranam affectam fuiſſe, ſed pulmones obſeruãrit cum ſua membrana laceratos & corroſos. Deinde & experientiam & rationes pro ſua ſtatuenda ſententiã adducit Platerus. Sanguinem enim, quem tam cito exſcreant, ab vnica ſuccingente membrana inflammatã, tam ſubito præſertim, ad pulmones prouenire, ejusque vaſa ad exſpuitiõnem permeare, nec ſupputatione factã pus ex eo loco tranſitum ſibi per pulmones, illis non laſis & exulceratis, facere, & ſic ad excretionem vſque peruenire minimè poſſe, ſed potiùs, ſi inde emanaret, in thoracis cauitatem deſluxuram materiam, & inde empyema facturam exiſtimat. Et licet concedat, ſuccingentem tunicam quandoque ſolam inflammari: tamen talem pleuritidem inde fieri non concedit, in qua cruenta & purulenta exſpuuntur; cum ſuccingens membrana ſeſe ed exonerare non poſſit, ſed ſi inflammatio ſuppuratur, extrinſecus potiùs, quàm intrinſecus



intrinsecus vergat, vel si intro rumpatur, pus in cavitatem pectoris potius, quam in pulmones effundatur.

Verum enim verò equidem negandum non est, sæpe cum pleura pulmones etiam inflammari, & vero valde consentaneum videretur, tantam copiam sputi ac mæritæ, quæ à pleuriticis sæpe tussi reicitur, pulmonibus salvis vix eiici posse. Atque id accidit, cum superior pars pleuræ afficitur. Cum enim illa cum membranâ costas succingente communione habeat, & circa partem superiorem pulmones cum pleura connectantur, dum sanguis præter naturam in pleuram influit, facile etiam simul in pulmones illabi potest. Contrà tamen etiam negandum non videretur, solam membranâ costas succingentem aliquando inflammari, & veram pleuritidem, quæ propterea à pleura nomen habet, inde generari posse; cum membrana hæc inflammationis capax sit, utpote quæ duplex est, interior & exterior, inter quas venæ arteriæque præterlabuntur, ac sanguine præter naturam affluente ipsa adeò in tumorem nonnunquam attollitur, excrescitque, ut decuplo crassior, quam cum sana est, euadat, ut ipsemet Platerus observavit, & lib. 2. de corp. hum. structura pag. 168. annotavit. Atque id accidit, cum inferior pars pleuræ inflammatur, quæ cum pulmonibus non connectitur. Neque planè impossibile est, sanguinem & pus è membrana succingente per superiora eiici: quamvis facile concedam, id in tanta copia non exspui, ac cum pulmones simul sunt affecti. Et si enim antiqua dubitatio sit, ut ex 1. de loc. affect. cap. 5. videre est, quomodo sanguis & pus è thoracis partibus in pulmonem eiusque asperas arterias penetrare, & tandem tussi reici possint: tamen id fieri posse, plurima experimenta ostendunt. Si enim aqua mulsâ in cavitatem thoracis, in vûneribus & vlceribus eo vsque penetrantibus, infundatur, tussiendo reicitur, & æger aquæ mulsæ saporem deprehendit. Conglutinatis quoque extra vûneribus, antequam intus perfectè sanantur, cruoris & saniei è vulnere in cavitatem thoracis effluentis notæ in sputo apparent. Et empyicos pus tussi reicere notissimum est. Quandoque tamen suppuratam inflammationem pleuræ empyema sequitur, ut ex Hippocrate, 5. aphor. 8. & 1. de morb. p. 9. in codice Fœsy, videre est. De qua re mox etiam, in quæstione tertia, dicitur.

### QVÆSTIO III.

*Per quas Vias materia in pleuritide ad asperam arteriam perueniat, & inde tussi eiiciatur.*

Per quas Vias sputum in pleuriticis in asperam arteriam perueniat, & inde tussi eiiciatur, & excernatur, non ita planum est. Si pulmones simul afficiantur, res manifesta est. Si autem sola pleura afficiatur, res dubia est & obscura, de qua prolixè agit, & contra Erasistratum disputat, Galenus, 5. de loc. affect. cap. 3. qui hac de re videatur. Galenum plerique Medici sequuntur, & statuunt, per pleuram materiam transsudare, aut eâ pertusâ, erosâ, vel quouis modo rarefactâ in thoracis cavitatem peruenire, atque inde, tussi thorace compresso & pulmone dilato, in asperas arterias, quarum orificia in pulmonis ambitum tenui tunicâ obducta definunt, cogi, primò quidem in minores, hinc maiores, donec tandem per canalem amplissimum trachæ è faucibus tussi eiiciantur.

Verum enim verò etsi non negandum sit, tenuius quid, quale mulsâ est, quam exempli loco affert Galenus ad probandum, humores in cavitatem thoracis contentos in pulmonem penetrare; & si quid tenuius è pleura transsudat, & illud à pulmone imbibiri posse: tamen non credibile est, materiæ tantam copiam, qualis sæpe à pleuriticis per tussim reicitur, per pleuram transsudare, (neque enim in principio vel augmento pertusa esse

potest,) & quidem eam tam crassam sæpe per angustos illos meatus è thoracis cavitatem in pulmonis substantiam penetrare posse. Neque etiam credibile est, mox in principio sanguinem purum, qualis sæpe à pleuriticis tussi eiicitur, è pleura in thoracis cavitatem effundi; cum id in aliis inflammationibus fieri non videamus, neque densitas membranæ id faciliè admittat. Atque hoc modo etiam omnes pleuritici fierent empyici. Ideoque ubi sputum magnâ copîa tussi reicitur, pulmonem simul affici, credibile est. Et præcipuè vero non est consentaneum, sanguinem in principio pleuriticis purum planè reicitur, per pleuram transsudasse in cavitatem thoracis, & à pulmonibus imbibitum fuisse, nullam tamen in iis alterationem accepisse: sed vero magis consentaneum est, è vasis, quæ asperæ arteriæ nutrimentum aduehunt, quæque partes illas, quæ in parte superiore pulmones lateri annectunt, nutriunt, hiantibus ob copiam sanguinis in pleuram vicinam ruentis, effundi.

### QVÆSTIO IV.

*Qua Vena in pleuritidis principio aperienda sit?*

De vena in pleuritidis principio aperienda magna verborum contentione superiore seculo pugnatum est, alique Græcos, alij Arabes secuti sunt; alij suas peculiaris opiniones proposuerunt. Ideoque etiam hanc quæstionem plenius explicare, & totam huius certaminis historiam & præcipuorum Medicorum sententiam, secundum ordinem temporis, quo vixerunt, proponere libet. Hippocrates, 2. de rat. victus in acut. 1. 10. in pleuritide aperire iubet cubiti venam, verum non addit, in utro brachio: id verò, 4. de rat. vict. in acut. 1. 73. declarat; ubi eo in latere venam aperire præcipit, quo æger laborat.

Archigenes ut ex Aëtio, 2. serm. 4. cap. 68. videre est, ex opposito brachio sanguinem mittit. In his inquit ex Archigene Aëtius, qui acuto morbo infestantur siquidem circa mammas ac claviculam heret dolor, venam incidere oportet in brachio, non eo, quod rectè à ab inflammato latere procedit, sed opposito.

Galenus cum Hippocrate consentit, scribitque, lib. de curand. rat. per sang. miss. cap. 16. Pleuritis, quæ è directo lateris laborantis adhibita fuit sanguinis missio, clarissimam sæpe utilitatem attulit, quæ verò ex brachio opposito, aut omnino obscuram, aut post temporis interval-lum.

Galeno assentitur Oribasius, dum, lib. 1. synopsis. cap. 10. Oribasius. & lib. 7. collect. c. 5. Galeni modò allegata verba recitat. Aëtius etiam 1. serm. 3. c. 12 in pleuriticis venam è directo lateris affecti secare iubet.

Cælius Aurelianus ex alio latere, quod fuerit dolenti lateri contrarium, sanguinem mittere iubet. Cælius Aurelianus.

Celsus, lib. 2. cap. 30. vsu se docuisse scribit ex longinqua & opposita sanguinem mittendum esse. Celsus.

Si ad Arabes veniamus, Serapion, qui antiquissimus inter eos habetur, tract. 2. c. 21. fecat primò & materia fluente basilicam oppositi lateris, tum si adhuc materia fluat, in loco contrario ei ex dorso ad longitudinem, id est, saphenam eiusdem lateris, ut plerique interpretantur: quod si malum confirmatum est, & non amplius materia fluat, venam in brachio eiusdem lateris.

Rhases non idem sentire videtur. Nam, 9. ad Almanf. cap. 57. si dolor vsque ad claviculam perueniat, sanguinem ex axillari lateris dolentis mittere iubet, nisi forsan sanguis in toto abundet. Tum enim in opposito brachio venam aperire iubet. In opposito verò latere lib. diuis. cap. 54. venam aperire præcipit, postea tertio die ex latere dolente. 5. autem contin. initio ex brachio lateris

lateris oppositi, tum ex saphena lateris affecti, tandem ex brachio lateris dolentis sanguinem detrahit.

**Auenzoar.** Auenzoar etiam primò venam basilicam oppositi lateris aperuit.

**Haly Abbas.** Haly Abbas, qui cum Isaaco idem Autor censetur, *pract. lib. 6. cap. 13.* primò lateris oppositi basilicam, at si malum processerit, eiusdem lateris venam secare præcipit. Idem facit Alzaharavius.

**Alzaharavius.** Auicennas, *lib. 3. fen. 10. rr. 5. cap. 1.* præcipit primò sectionem saphenæ oppositæ secundum longitudinem, id est, eius lateris, non, ut *Camiliacius* interpretatur, oppositi; deinde nigram, id est, medianam oppositi brachij, aut hæc non apparente cephalicam; tandem & post aliquot dies venam brachij in latere opposito aperit.

**Auen Rois.** Auen Rois, *7. collect.* venam in parte opposita aperit.

**Mesues.** Mesues idem facit. Si tamen magna sit plethora, saphenam lateris oppositi, exempli gratia, saphenam pedis sinistri, si dextrum latus afficiatur, primùm aperit.

Cum verò postea ab Arabibus ad Gallos & Italos cum aliis artibus Medicina perueniret, & iis seculis Græcorum de Medicina libri penè omnes in tenebris delitescerent, aut, quos habebant, ex Græco in Arabicum versos legerent, & hinc Latinos redderent, Medicinamque præcipuè ex Arabum libris dicerent & docerent; Medici illi, qui post Arabes in Italia & Gallia de Medicina Latine seu potius Latinobarbare scripserunt, plerique etiam Arabum opiniones secuti sunt. Atque ita post Arabum tempora ferè ad annum Christi M. D. Medici omnes, Gentilis, Arnold, de villa noua, Gordonius & ipse Gallus, & apud Monspelienfes Medicinæ Professor, Valescus de Taranta, Petrus Apponensis, cognomento Conciliator, Nicolaus Florentinus, Matthæus de Gradibus Mediolanensis, Antonius Guainerius & Gattinaria, Ticinenses Medici, Alexand. Benedictus Veronensis, Iohan. Arculanus & plurimi alij omnes, initio pleuritidis aut saphenam aut basilicam oppositi lateris aperuerunt. Nemo autem inter omnes repertus, qui initio morbi in affecti lateris brachio venam aperire auderet. In morbi verò progressu venam eiusdem lateris aperuerunt.

Circa tamen annum Christi 1500. de vena initio pleuritidis secanda factio quædam inter hos ipsos Medicos extitit, dum Veneti initio pleuritidis saphenam aperirent, Medici verò Bononientes ac Florentini basilicam oppositi lateris. Circa illa tempora bonæ literæ renasci cœperunt; & Græcorum libri vel Græci vel in Latinum melius conuersi in manus Medicorum perueniunt, vnde nonnulla Arabum dogmata, quos antea vnanimiter secuti fuerant Medici, à nonnullis in dubium vocata sunt. Arque inter ea etiam sententia de venæ sectione in pleuritide.

**Matthæus Curtius.** Ita Matthæus Curtius, Ticinensis Medic. Professor, in pleuritidis initio venam cubiti eiusdem lateris aperiendam statuit. Ipse tamen pleuriticus factus contrarium in se fieri voluit, maluitque vitam sibi seruari, quam libri sui, quem de venæ sectione in pleuritide scripserat, fidem.

**Petrus Brisotus.** Eandem opinionem secutus est Petrus Brisotus, Medicus Parisiensis. Eandem sententiam in Germania defendit Leonhardus Fuschsius, etsi non semper eodem modo. Petri Brisotti, vt Magistri sui, sententiam secutus est Martinus Acakias. Matthæo Curtio & Pet. Brisotto sese opposuit Andreas Thuringus, Piscienfis, Medicus inter eos nobiliss, qui tum temporis Arabum dogma sequebantur, epistola ad Brisottum anno 1526. & peculiari libello, *de cur. pleurit. per sanguinis missionem* scripto. Leonhardus Iacchinus, Emporiensis, etsi Medicinam Græcorum sectaretur, & tum temporis Græcorum scriptis addictus esset, hic tamen Arabibus assentiri voluit, & initio morbi saphenam, hinc

lateris affecti venam aperire voluit. Iohan. Mahardus an. 1531. Curtij aduersus Thuringum patrocinium suscepit. Benedictus Fauentinus, edito hac de re libro anno 1534. venæ sectionem in pleuritidis initio in eodem latere defendit. Ariabum contrà sententiam & eorum qui in opposito latere venam aperire initio iubent, defendit Iulius Cæsar Scaliger, *in comm. in lib. Hipp. de insomn. anno 1539. edito.* Idem fecit Victor Trincauella, qui peculiari scripto Curtium ac Brisottum refutat, edito Veneriis anno 1539.

Andreas Vesalius, vir rei Anatomica peritissimus, peculiarem hac de re opinionem defendit. Is enim, *in epistola ad Nicolaum Florenatem scripta*; siue dextrum siue sinistrum latus afficiatur, semper in dextro latere venam aperiendam censet: nisi costæ tres superiores sinistri lateris afficiantur. Tum enim in sinistro latere venam aperiendam censet, qui hoc modo *de 17. 18. 19.* Hippocratis & præterea etiam fibrarum rectitudinem obseruari statuit, idque idèd, quod vena *αζυγ.* à caua exorta prope cor per latus dextrum excurrentes & dextri & sinistri lateris octo costas inferiores nutrit, vt ita, etiam si sinistrum latus laboret, vena in dextro brachio, ad quod magis pertinet vena *αζυγ.*, aperta sanguis commodissime trahi possit. Si tamen sinistri lateris costæ superiores inflammentur, cum eæ non à ramis venæ *αζυγ.*, sed à ramis, qui à caua statim exoriuntur, nutriantur, etiam in sinistro brachio venam aperiendam esse statuit, atque ita Græcorum doctrinam sequi voluit. Hanc tamen suam sententiam non constanter defendit, dum, *lib. 3. cap. 5. & 7.* nihil interesse scribit, dextrinè an sinistri cubiti venâ secetur in laterali morbo.

Ioannes Fernelius, *lib. 2. therapeut. c. 5.* reuulsionem quidem esse tractum in contrarium concedit, non tamen dextra sinistris, sinistra dextris aut alio modo opposita contraria esse statuit, sed fibrarum hic ductum præcipuè attendendum existimat, quarum recto cursu hic opus sit. Ideoque etsi, cum vnum crus laborat, in altero venam commodè aperiri posse statuit, quia communis & directa sit venarum ob fibras societas: tamen idem in pleuritide non fieri posse putat, quod hic fibrarum communio & venarum societas desit.

Iohan. Baptista Montanus obscure satis hac de re loquitur; vt ex *commentario in fen. 4. Canonis Auicennæ*, edito Veneriis anno 1556. p. 247. & *comm. ad aphor. 21. lib. 1. Hippocratis ibid. anno 1555. edito*, patet. Diuidit enim phlebotomiam diuersam vniuersalem in simplicem & compositam. Simplicem vocat, quam solum imperus nobis indicat; compositam, quando simul cum impetu plethoræ consideratur. In diuersione simplici considerandos esse duos terminos docet, ad quem, seu locum affectum, & terminum à quo, seu frõntem, vnde materia transmittitur. Terminum à quo esse nunc totum corpus, seu totum venosum genus nunc partem aliquam corporis determinat. Si igitur in dextrâ succingentem materia communicetur à capite, ratione vnus diametri sanguis deorsum ruenens sursum trahendus esset. Verum quia supra caput nihil, & ita altera diametris, quæ scilicet inferna superioribus respondent, deest, mittendum censet sanguinem ab opposito latere; quia saltem habemus vnam diametrum, quæ est inter dextrum & sinistrum. Ita si ab hepate communicetur materia, venam non in brachio aperiendam censet, (ita enim traheretur ad partem affectam) sed potius saphenam aperiendam, vt sanguis ad inferiora reuclatur. Si verò membrum mandans seu fons sit totus ambitus venarum, tantum de termino ad quem sollicitum esse iubet, quia fluit à singulis materia; seruandumque debitum spatium & rectitudinem, non tantum respectu viarum, sed & qua sanguis commodè potest progredi; vnde tunc venam aperiendam in eodem, v.g. dextro latere. Nam hic quanto magis seruamus ductum rectæ lineæ, tanto commodius sanguis euacuatur; quia in angulis sequitur impedimentum sanguinis. Si verò diuersio sit composita

posita, i. e. cum impetu simul consideretur plenitudo, tunc semper ab opposito latere ducendus; quia si in eodem latere vena aperiretur, & quidem copiose sanguis efflueret, & vsque ad syncopen, homo moreretur, vel fieret peripneumonia; si parum, æger suffocaretur. Vnde Auicennas primò aperit saphenam ad euacuandam multitudinem, deinde in opposito brachio, vltimò eodem latere.

Marcus Antonius Montisianus Geminianensis conclusiones de sanguinis missione in morbo laterali conscripsit, & Florentiæ anno 1556. edidit, in quibus Curtium & Thurinum ambos sibi familiares, vt & Monardum & Brissotum hinc inde perstringit. Statuit autem 1. Incipientem in regione costarum phlegmonem, quam appellamus pleuritim, reuulsu primò curandam esse, nisi nos interpellat plenitudo, illa scilicet, quæ vasa respicit. 2. Reuulsionem nihil aliud esse, quàm humorum in partem aliquam influentium ad sibi oppositam maximèque distantem retractionem. 3. Opposita in corpore humano tria esse, superius scilicet & inferius, dextrum & sinistrum, antè & retrò siue intus & extrà. 4. Omnem reuulsionem fieri aut à superioribus ad inferiora, aut contrà, fluentem (hoc est, vt ipse postea explicat, à sinistris ad dexteris secundum modò dictas oppositiones) materiam reuocando. 5. Licet longitudinis, latitudinis & altitudinis extrema reuulsionem respiciant, non pari tamen vtilitate in hac passione reuellere.

Vnde Auicennam quidem non damnat, quod incipiente phlegmone in opposito latere venam secuit; vt gere enim rationes, quia sinistro nihil aliud opponitur, quàm dextrum, & contrà. Pari ratione non arguendum esse Galenum & Hippocratem, si in eodem latere venam secuerunt. Nam si materia superiora petit, ad inferna esse trahendam, quod optimè fiat sectâ venâ in eodem brachio: maximè verò approbandam & præferendam hanc illi, quæ est in opposito latere; quia prior manifestum auxilium & statim affert, altera non nisi post interuallum. Quia igitur conueniant cum Græcis Arabes in oppositorum ratione, in reuulsione, & in exacta ferè lateralis morbi curatione, sola in oppositione altera dissidentes, non insudandum esse putat, inter Galenum & Auicennam hanc litem componere, vt Thuringus voluisse visus est. Irritum enim esse laborem, inter illos concordiam meditari, qui consulto volunt esse discordes.

Hollerius ex basilica eiusdem lateris sanguinem mittendum statuit, nisi suppressa sit aliqua, quæ per partes inferiores fieri solet, euacuatio, vel adsit insignis plenitudo, vel materia maligna, aut ea statim ad caput rapiatur. Tamen in cruribus venam aperiendam esse censet.

Rondeletius basilicam vel medianam eiusdem lateris aperit, & inde sanguinem vsque ad eius mutationem & doloris mitigationem extrahit, aut si dolor non remittat, venæ sectionem iterat, idque ideo facit, non quòd fibrarum seu villorum rectitudinem obseruandam putet, sed quia naturam incitandam censet, quæ solet facere suas excretiones secundum rectitudinem.

Thaddæus Dunus, Medicus Tigurinus, libris 4. de arte repellendi, deriuandi, simpliciterque euacuandi per venæ sectionem scriptis, & epistolica cum Leonhardo Fuchsio concertatione, ferè Vesalij sententiam sequitur, & in omni pleuritide, vt, lib. 1. cap. 7. scribit, & laborantibus costis seu dextri seu sinistri lateris, semper internam cubiti dextri venam aperiendam censet. Cum enim à vena sine pari tam dextri quàm sinistri lateris partes nutrimentum accipiant, exceptis tribus costis superioribus; vena: verò sine pari cum dextri cubiti venis maiorem consensum habeat: etiam in dextro cubito venam aperiendam putat. Venarum verò rectitudinem & consensum ideo spectandum esse docet, quod per rectas fibras,

quæ in venis sunt, sanguis ab vna parte in aliam celeriter & copiose trahatur, si venarum fibrarum connexionem habeant, & ea vena, quæ secatur, & quæ membrum alit, fibris conueniant. Si tamen contingat id, quod tamen vel rarò, vel nunquam fieri statuit, vt tres costæ superiores primariâ affectione teneantur, sinistram axillarem secare concedit. Cum enim à vena sine pari non nutrantur, sed ab alio ramo paulò supra illius exoritur enato ex sinistro magnæ venæ latere; cum axillari sinistra fibris suis multò magis procudubio consentire, quàm cum dextra, imò eum hac nullum profus habere consensum statuit.

Atque hæc sunt præcipuæ præcipuorum Medicorum de venæ sectione in pleuritidis initio sententiæ, quas postea alij Medici recentiores etiam secuti sunt, & omnino omnes sententiæ ad tres classes redigi possentur.

Omnes hæc sententiæ proposita ad tres classes redigende.

Alij enim Græcorum opinionem sequuntur, qui 1. venam secandam, atque in eodem latere aperiendam censuerunt. Nonnulla tamen hæc inter eos occurrit differentia, quod alij simpliciter 2. venam secant, & reuulsionem, alij etiâ fibrarum rectitudinem obseruandam censent. Et Mercatus hæc statuit, aliud esse in aliarum partium inflammatione sanguinem mittere reuulsionis gratiâ, aliud in pleuritide & membrorum principalium inflammatione. Nam in aliarum partium affectibus ob partis naturam & securitatem fieri posse reuulsionem ad partem oppositam citra vitæ periculum aut aliud damnum statuit; pleuritidem verò periculosam esse, atque illud omnino, quod in parte affecta colligitur, etsi paucum sit, tantum tamen periculi minari, vt subitum auxilium postulet. Ideoque pleuritidis grauitatem omnino requirere, vt à parte affectâ fiat sanguinis euacuatio, per quam à parte affectâ & reuulsio & deriuatio fieri possit. Idem ferè Platerus sentit, qui in pleuritide, quia latus dolet, à brachio eiusdem lateris sanguinem detrahere, quàm ex opposito, vtilius censet, non tam rectitudinis vasorum occasione, sed quod in pleuritide ob dolorem dolentis lateris venæ magis, quàm sani lateris venæ impleantur. Quo nomine si in dextro latere dolor sit, in dextro brachio venam aperire multas vtilitates afferre scribit, si in sinistro, propter affluxum sanguinis à dolore concitatum ab ea parte sanguinem reuellere conuenientius putat. Nonnulli tamen ex iis, qui in eodem latere venam aperiendam censent, aliquos casus excipiunt: vt si suppressa sit aliqua per inferiores euacuatio; si adsit insignis plenitudo; si materia sit maligna, vel ad caput tendat.

Prima classis.

Alij Arabes sequuntur, & quidem nonnulli primò saphenam, alij verò statim venam oppositi brachij reuulsionis gratiâ aperiendam censent, postea, ad deriuationem, eiusdem lateris.

Secunda classis.

Alij tandem Vesalium secuti sunt, & semper in dextro latere in pleuritide venam secandam censent; cum, si fibrarum rectitudo spectetur, longè maior sit inter dextram axillarem, regionemque costarum quamcunque consensus, quam inter eundem locum affectum & sinistram axillarem. Cum enim vena sine pari à dextro caua latere enascatur, & axillaris dextræ similiter, huius & illius fibrarum quàmplures, quæ secundum longitudinem corporis ipsarum sunt porrectæ, inuicem consentiunt, rectoque tramite murò se respiciunt.

Tertia classis.

Verum si ista omnia diligentè perpendamus, & fundamenta suprâ proposita, vbi de venæ sectione egimus, diligenter attendamus, non ita difficulter ex hac obscura & tot annorum seculis agitata controuersia nos expeditè poterimus. Primò rationes omnes eorum, qui statim venam in brachio lateris affecti secare iubent, siue id fiat ob fibrarum communionem, siue saltem ob reuulsionem & rectitudinem, quam natura in suis euacuationibus obseruare solet, siue ob dolorem, qui valde vrget, ed tendunt, vt monstrent, commodius per venam è dextro lateris affecti apertam è loco affecto materiam euacuari,

Diversa controuersia.

euacuari, quàm ex opposito brachio. Verùm cum venæ sectio in pleuritide reuulsionis gratiâ instituat, in reuulsione autem non requiratur è parte affecta euacuatio, sed deriuationis hoc sit: reuulsio saltè prohibet, ne pars affecta amplius sanguine repleatur, & id agit, vt sanguinem eò, vnde fluit, retrahat eique contrarium ei, qui est ad partem affectam, motum versus fontem, à quo fluit, conciliet. Atque ideo commodissimè in latere opposito in principio venam aperiri censemus, vt pote quæ contrarium motum sanguini conciliat, & eum à parte affecta auertit; quod vena è directo lateris affecti aperta præstare non potest. Et id rectè fieri, primò experientia confirmat, cum per aliquot annorum secula, quibus Arabum secta floruit, vena semper in opposito brachio aperta est; & si aliquid incommodi ex eo accidisset, id Medicos illos aliàs diligentes non latuisset. Ipse etiam Iulius Cæsar Scaliger hac de re suas obseruationes annotauit, vt ex eius *comment. in libr. Hippocrat. de somniis* videre est. *Finem*, inquit, *in quem intendimus, hunc esse par est, prohibere sanguinis copiam, ne ad malè affectum concurrat locus. Ergo ab opposita parte sanguinis detrahendus. Nam si dolor in latere sinistro, aperta indidem vena plus trahit à dextro in sinistrum, quàm dextra incisa in sinistrum. Plus enim humoris est inter circumferentiam dextram, & doloris locum, quàm inter eundem locum & circumferentiam sinistram. Vnum habent, quo profugiant: non prodesse, quoniam nulla sit, vt appellant, colligantia. At nos dicimus non nunc agere, vt quod fluxit, detrahamus; neque enim magni momenti est. Neque quisquam prima statim die mortuus est, sed post multam affluxionem, quam tollit vena contraria remota: vena autem eiusdem lateris non solum non tollit, sed etiam trahit ad locum malè affectum. Itaque toto post facto fluxu, ex eadem parte nos quoque detrahimus. Ac de ratione quidem hac, de experientia quid dicamus, facile in promptu est. Iam duodeviginti annos non nisi vnum vidimus, ex eadem parte incisa vena euasisse. Et sanè corpus erat athleticum; vt etiam magis miraremur. Verùm scimus, multos etiam sine phlebotomia sanos factos. At plus octoginta redegit in commentarium quinto ab hinc anno, qui omnes eo curandi genere sint extincti: cum plus quingenti his duodecim annis euasisset, quibus in aduerso cubito vena aperta fuerat. Hæc Scaliger. Et ipse Galenus, *lib. de cur. var. per sanguin. mission. cap. 16.* nullum in pleuriticis ex vena in latere opposito secta detrimentum, sed utilitatem prouenire statuit, etsi obscuram & post temporis interuallum.*

Deinde rationes satis firmæ idem suadent. Nam licet etiam venæ sectio simpliciter euacuationis gratiâ institui possit; tamen ea quacunque etiam venâ apertâ fieri potest. Neque de vena euacuationis gratiâ aperienda hîc tantum quæstio est, sed de vena ad reuellendum & deriuandum aptâ. Nam præter euacuationis scopum duabus de causis præterea, vt etiam in aliis inflammationibus, sanguis in pleuritide mittitur, reuulsionis scilicet & deriuationis gratiâ. Illa debetur sanguini ad locum affectum affluenti vel affluxuro; hæc sanguini, qui in venis parti affectæ vicinis continetur. Vtraque autem hæc euacuatio, reuulsio scilicet & deriuatio, ita institui debet, vt partium consensus obseruetur, vt venâ vnus partis sectâ altera, & quæ cum illa consensum habet, euacuetur, & consequenter humor vel reuellatur vel deriuetur.

Aliter verò omnino se habet hic consensus in reuulsione, aliter in deriuatione. In reuulsione enim cum id agatur, vt sanguis, qui ad partem affluit, vel affluxurus est, ad fluxionis initium & fontem reuocetur, vena, quæ reuulsionis gratiâ aperitur, cum fonte, vnde fluxionis initium, aut si venâ eò loci aperiri non possit, cum venis initio fluxionis vicinis consensum habere debet, ita vt venâ hanc apertâ sanguis, qui ad partem affectam fluere cœpit, iam amplius eò fluere desinat, &

in contrarium trahatur. In deriuatione verò ea vena aperiri debet, quæ cum parte affecta consensum habet, & ab ea vel locis vicinis euacuare possit. Igitur quò propius fonti & initio fluxionis vena aperitur, eò rectius & propriè magis reuelli dicitur; quò verò magis à fonte fluxionis recedimus, & vena affectæ parti propinquior aperitur, eò minus propriè reuellere dicitur.

Notandum tamen hîc, quod nonnullos turbauit & eò adduxit, vt statuerent, non semper ad originem fluxionis esse reuellendum, per originem fluxionis non intelligendam esse causam fluxionis procatarticam, puta calorem & dolorem, qui sæpè est in parte affecta, sed fontem & locum, à quo sanguis ad partem affectam fluit. Ad eum enim sanguis, quantum fieri potest, retrahendus. Interim non incommodum est, vt causâ illa fluxionem irritans & sanguinem attrahens in parte affectâ mitigetur vel tollatur. Locus verò, in quo instituitur venæ sectio reuulsionis causâ, nunquam vicinus esse potest, sed remotus sit, necesse est. Docet hoc clarè Galenus, *4. meth. med. cap. 6.* Si, inquit, *perpetuum est, quod ab eo didicimus, incipientem fluxionem ad contraria trahendam esse, fixam verò iam in laborante particulâ vacuandam esse, vel ab ipsâ particulâ, quæ affligitur, vel à maximè vicinâ, in promptu nobis de sanguinis detractione colligere est, quod in principio hæc à longinquo, postea ab ipsis laborantibus partibus sit instituenda. Quod & alibi passim docuit.*

Itaque cum in pleuritide fons & principium fluxionis non sint pedes, vel caput, vel brachia, vel venosum genus, seu venæ cauæ rami maiores, naturæque hoc obtemperare soleat, vt partes principes, quantum fieri potest, tueatur, & publicam corporis regionem à prauis humoribus liberare, eòque propterea ad extremas partes protrudere soleat; at verò in principio pleuritidis non deriuare, sed reuellere animus sit; facile hunc apparere, non venam loco affecto vicinam eligendam esse; cum facile fieri possit, vt in loco vicino venâ apertâ sanguis maiore cum impetu ad partem dolentem & calentem ruat: sed quæ à loco affecto remota sit, & cum parte mittente consensum habeat, sanguinisque ad partem affectam ruentis impetum sistere, eumque ad contrarium reuocare possit; quod sit commodissimè venâ in brachio opposito apertâ. Neque enim datur vlla vena, quæ à parte affecta remotior sit, cum parte tamen mittente, seu hepate & venâ cauâ, maiorem consensum habeat. Neque est, vt quis cum Matth. Curtio, Manardo & aliis ad imaginariam quandam oppositionem confugiat, quæ etiam in brachio eiusdem lateris fieri possit, quando scribunt, dum inciditur vena eiusdem partis, primùm adesse oppositionem intus ad extrâ, quatenus sanguis extrâ emittitur; deinde oppositionem à dextra ad sinistram, pro vario brachij situ; rursum oppositionem in longitudine, quatenus humor sursum trahitur, qui deorsum vergebat. Non enim sufficit hæc imaginaria oppositio, sed talis requiritur, quæ ad fontem, vnde fluit sanguis, quantum fieri potest, eum retrahat. Hoc optimè præstat vena in latere opposito aperta, etsi id videre non potuerit Argenterius. Hæc enim vena ex axillari sanguinem primò euocat, hinc ex vena cana, atque ita sanguis non amplius tam copiosè confluit. Arabes quidem nonnulli, vt suprâ dictum, vt planè ad remota reuellerent, venam in pede primò aperuerunt; sed locus iste ab hepate nimis remotus est, neque facile motus sanguinis, qui per venæ sectionem in pede concitatur, vsque ad sanguinem ad latus affectum fluentem pertingere potest, quod venâ in brachio apertâ optimè fieri potest. Etsi verò mensibus & hemorrhoidibus suppressis plethora vel cacoehymia cumulata sit, tamen si suppressio antiqua sit, non sperandum, vnicâ ista venæ sapienter sectione eos reuocari posse. Interim morbus acutus non fert moram, sed

Causa missionis sanguinis in pleuritide.

subitum



bitum auxilium requirit. Atque in hac sanguinis missione, quæ sit in brachio opposito, non opus est coloris mutationem expectare. Neque enim eum euacuare animus est, qui iam in parte affecta mutationem accepit, sed eum, qui ad locum affectum affluit.

Vesalij tandem opinionem, quia peculiaris est, ut seorsim perpendamus, si reuulsionis gratia in dextro brachio, sinistro latere affecto, instituitur, commodum id sanè est. Verùm si dextrum latus laboret, in eo reuulsionis gratiâ vena aperiiri non potest, cum faciliè hac occasione maior ad partem affectam affluxus fieri possit. Si verò, quod sentire videtur, deriuationis aut euacuationis gratiâ ex parte affecta venæsectionem instituit, via illa nimis longa esset, si è latere, præcipuè sinistro, sanguis in venam sine pari reflueret, atque in cauam venam & dextrum brachium retrahi deberet. Imò sunt, qui nullo modo ex vena sine pari ad venam cauam sanguinem reflueri posse statuunt. Scribitque Hollerius, lib. 1. de morb. intern. cap. 26. in schol. venam sine pari sanguinem, quem à vena cauâ accepit, non amplius ad eam remittere posse; valuulas enim habere, sicut vesicam & cor; idque eo probat, quòd, si quis venam cauam in parte superiore secet, & fistulâ immittat, in inferiorem partem sufflet, tora ipsa vena cauâ in parte inferiori simul cum vena sine pari infletur; ut si venam sine pari in parte inferiore secemus, immittâque fistula ore ventum sursum impellamus, vena cauâ non infletur, quòd aer in vena sine pari contentus exire non potest. Vnde concludit, si aer à vena sine pari ad cauam non penetrat, multò minus sanguis reflueri poterit. Eadem penè omnia proponit Amatus Lusitanus cent. 1. curat. 52. in schol.

Verùm istam de valuulis venæ sine pari doctrinam Gabriel Fallopius, in obseru. anatom. irridet, & Thaddæus Dunus risu & sibilis potius explodendam, quàm refutandam censet; cum nemò peritissimorum etiam Anatomicorum eas inuenire potuerit. Et quod experimentum illud de inflatione venæ cauæ attinet, id ita refutat Thaddæus Dunus. Venam cauam, inquit, prius secuit, ut ex ea æquor inflaret; postea æquor quoque secuit, ut inflaret cauam, Mirum autem non est, cauam non potuisse intrumescere, siquidem dissecta erat. Neque enim spiritus non penetrauit ad eam, sed non continebatur eâ reclusâ. Vinculum igitur iniiciendum erat venæ cauæ.

Atque hæc de valuulis venæ æquor controuersia postea ab Anatomicis variè agitata est, nec tum tamen satis discussa, dum alij dari aiunt, alij negant, et si in eas diligentissimè inquisuerint. Et qui eas dari affirmant, inter quos Riolanus, in sua Anthropographia, non tamen eodem modo, quo Hollerius & Amatus Lusitanus, dari statuunt, sed ita sitas esse non ut recurrenti sanguini obfisterent, sed potius, ut impetum affluentis sanguinis sustinerent. Neque vlla valuula est in venis, quæ totam cavitatem occludit, sed ferè saltem dimidiam partem occupant, vbiunque sunt, eoque sine factæ sunt, ut sanguinis fluxum & motum moderarentur.

Sint ergo valuulæ, vel non sint in vena sine pari, & si sint, tales, ut sanguinis refluxum impedire non possint: tamen non ideo vena dextri brachij semper aperienda est, deriuationis & euacuationis ex parte affecta gratiâ. Via enim hæc nimis longa esset, & datur breuior, si vena lateris affecti aperiatur, ut iam dicitur.

Est ergo initio pleuritidis vena in brachio lateris oppositi commodissimè reuulsionis gratiâ aperiatur: tamen cum postea etiam deriuatio è loco vicino requiratur, post reuulsionem in latere opposito factam, vena etiam in latere eodem aperienda est; quod etiam faciendum, si tardiùs Medicus ad ægrum vocetur, morbusque iam progressus sit, & tempus reuellendi, sanguine iam in loco inflammationis maximâ ex parte recepto, præteritum.

Esti verò, quòd præcipuè Vesalium mouit, saltem superiores tres costarum ramis è vena axillari enatis nutriantur, reliquæ costarum inferiores ramis venæ æquor; tamen vena in brachio lateris affecti aperta sanguis è latere inflammato, vbiunque etiam inflammatio consistat, satis commodè euacuari potest. Et de costis quidem superioribus tribus nullum dubium est. Annotauit tamen Gabriel Fallopius, & alij etiam Anatomici diligentiores, consensum axillaris cum venâ sine pari, docentque, ab axillari prodire venam, cuius tres vel ad summum quatuor rami aliquando iungantur cum tribus aut quatuor propaginibus venæ sine pari, videlicet inter tertiam & quartam, quartam & quintam, quintam & sextam, & inter sextam & septimam. Imò interdum etiam in sinistro latere truncus inuenitur. Et Columbus annotauit peculiarem ramum, qui à dextro trunco, dum reflecti incipit, exit, ad ascendensque ramos mittit superioribus intervallis supremarum costarum alendis dicatos, neque solum in dextris, sed & in sinistris.

Montani sententiam quod attinet, rectè ille quidem monet ad fontem respiciendum esse, ut & ad sanguinis copiam, ne si sanguis sit valde copiosus in latere affecto venam secemus, metu maioris affluxus ad partem affectam. At in eo fallitur, quod vbi venosum genus (quod ut plurimum, si non semper, accidit) fons est, ex eodem brachio detrahit. Nam & in opposito latere seruatur recta linea respectu venæ cauæ. Est enim eadem latitudo. Si verò rectitudinem respectu partis affectæ intelligit, confundit deriuationem, seu euacuationem potius & reuulsionem.

Marcus Antonius Montisianus eodem in errore est, dum per venam in eodem latere reuulsionem instituit, cum mera sit euacuatio, ut supra dictum, Magis adhuc errat, quod sectâ venâ in eodem brachio ad inferna trahi scribit.

Atque hæc euacuatio, cum & ea à loco affecto sit nonnihil remota, à Galenò quandoque etiam reuulsio appellatur, sed minùs propriè, ut ex 2. de rar. vi. in acut. 1. 10. & præcipuè, 6. epidem. comm. 2. 1. 3. 2. patet, vbi diuersionem, quæ ab oculis ad palatum fit, reuulsionem appellat.

Atque ut hæc tandem concludamus, hanc venam secandi rationem in pleuritide obseruauerunt, ut dictum, Hippocrates & Galenus. Quanquam enim de mente Hippocratis & Galeni nonnulli variè disputent, & iis, quæ lib. de rar. vi. in acutis, habentur, vbi in eodem latere venam secare iubent, alia ex Galeno loca opponant, vbi in principio inflammationum in parte opposita venam aperire præcipit: tamen, quod Mercato & aliis etiam placere diximus, Hippocrates & Galenus in aliis quidem inflammationibus, in quibus in morâ nullum periculum, in opposito primò latere venam aperiunt; in pleuritide verò, vbi dolor valde urget, statim in directo lateris affecti venam aperiunt, ac vnicam venæsectionem instituunt; quod & nos, si tardiùs, & post morbi principium ad ægrum vocemur, imitari possumus. Sanguinem autem, largius, & ad coloris mutationem miserunt; & vnâ venæsectione tantum sanguinis detraxerunt, quantum Arabes geminâ. Verùm cum non solum tutius sit sanguinem bis euacuare, quàm semel copiosa sanguinis missione vires deicere, sed etiam aliæ, quas supra proposuimus, rationes suadeant, commodissimum esse in principio sanguinem in loco à parte affecta remoto euacuare: rectissimè primò in brachio opposito instituitur venæsectio; ita tamen, ut post etiam in eodem brachio deriuationis gratiâ venâ aperiatur.

Montani  
sententia  
examinatur.

Marci An-  
ton. Monti-  
siani opinio  
examinatur.

x optimè, d.  
monti præcipi  
iam galenum  
sequimur.

malè, not. h.  
d. si.

## QVÆSTIO IV.

*Per quas Vias è thorace materia ad aluum  
& vesicam peruenire & hinc euacuari possit.*

*Per quas vias  
è thorace  
materia ad  
aluum &  
vesicam per-  
uenire, &  
hinc euacu-  
ari possit.*

Sanguinem, vt & pus, non solum per tussim, sed & per vesicam cum vrina ex thorace quandoque excerni, Galenus, 6. de loc. affect. cap. 4. docet, & se vidisse testatur, quod & alij Medici plures, Græci, Arabes, & Latini obseruauerunt. Scripsit etiam nuper ad me amicus quidam, quendam in sinistro latere thoracis vulneratum fuisse gladio, super costas nothas sursum adacto, ita vt vulnus vnus & dimidij digiti longitudinem æquaret. Vulneratus etsi de dolore nullo conquereretur, tussi non affligeretur, nihilque sanguinis expueret, vt inde colligi potuerit, tantum externos thoracis musculos fuisse vulneratos: tamen accidit, vt sequenti nocte difficultate meendi corripere, post quadriduum verò copiosum sanguinem emingeret, partim grumolum partim floridum, quæ sanguinis mixtio ad duas septimanas durauit, donec æger conualuit.

Per quam autem viam istæ euacuationes fiant, non ita planum est. Et cum materia in thoracis locis consistere possit in pulmone, in lateribus seu musculis thoracis, & in cavitare thoracis, de singulis seorsim inquirendum, & per quas vias materia è pulmone, è lateribus, è cavitare thoracis cum per vrinam, tum per aluum euacuari possit, explicandum. Pulmones primò quod attinet, Galenus, 6. de loc. affect. cap. 4. leuem arteriam pulmonis, quantum puris ex ruptâ vomica suscepit, id ad sinistram cordis sinum deferre statuit, quod inde in magnam ipsius arteriam incidens, per renes transeat ad vesicam. Verum viam hanc alij reiciunt, & inter eos P. Andreas Matthiolus, qui, lib. 1. Epist. ad Iulium Alexandrinum, scribit, credibile non esse, vt pus, quod foetens & corruptus sanguis est; non solum transeat per arterias, in quibus vitales spiritus continentur, sed & sinistram ventriculorum cordis, vbi vita humana & sanguis ille purissimus cum spiritu vitali continetur, quin grauissima symptomata, adeoque ipsam mortem inferat, quod pluribus ibi probat. Ipse verò putat, transmitti pus ad venam sine pari, vel ad alias fortasse, quæ circa pulmones vel thoracem habentur, & inde in cauum, in renes & vesicam.

Iulius Alexandrinus, in epist. responsor. Galenum tueri conatur, scribitque, aliud longè esse, si quid naturaliter fit, atque quod præternaturaliter; cum à facultate quadam, atque cum ab affectu; cum pars valet atque imbecillis est; cum expellitur noxa, atque cum recipitur. Ideoque licet in syncope, tremore cordis, pestilente aëre attracto, cor valde afficiatur: tamen si valida expultrice facultate utatur, longè venientem noxam repellere. Idque tum etiam facere naturam, cum pulmonis abscessus ruptus est. Tum temporis enim robore suo constare cor, spiritibusque præditum validis cum aliis vnâ insurgere ad rei noxiæ celerrimam quandam expulsionem. Deinde Matthioli sententiam improbat, statuitque longè faciliorem è pulmonibus esse materiæ transitum in asperas lenesque arterias, quam vt primò in pectoris cavitatem è pulmone effundatur, & hinc venæ sine pari exiguis oculis sese insinuet; quod omnino fieri debet, si materia è pulmone à vena sine pari recipi debet.

Verum enim verò sit sanè cor validum, & quamprimum affluentem à pulmone materiam à se repellere conetur: tamen id sine grauibz symptomatibus, palpitatione cordis, lipothymia & similibus, fieri non posset, cum videamus saltem status ex hypochondriis ascendentes talia symptomata excitare, licet cor aliàs saluum & validum sit. Nisi forsàn quis hoc pus non confertim, sed sensim ad cor deferri, neque id adeo ma-

lignum, sed à natura satis elaboratum esse statuat. Idcoque non quidem planè nego per hanc viam naturam pus quandoque euacuare; cum constet, eam interdum miras vias quærere: & Nicolaus Massa anno 1533. vt, in introductor. anatom. fol. 56. & 57. refert, obseruauit abscessum in cuiusdam dextro ventriculo cordis & auriculam sinistram ulceratam totam cum sanie manifestâ, qui tamen sanus visus fuit, & Beniuenius, obseru. 89. reperit abscessum in sinistro cordis ventriculo pituitâ redundantem in quodam, qui egregius fur fuerat. Veruntamen non puto, naturam facile viam hanc affectare; cum tutiores habeat, vt mox dicetur.

Nonnulli ad vias nobis quidem occultas & ignotas, naturæ tamen cognitæ, & illam Hippocratis, in lib. de alimentis, ἐν πύλαις & ἐν ἀνοίαις confugiunt. Verum non est opus ad occultas vias confugere, cum manifestæ dentur.

Viam autem manifestam, vt dictum, Matthiolus & alij statuunt esse per venam ἀγγειον. Verum non videtur de nihilo quod Matthiolo obicit Iul. Alexandrinus difficilem satis esse transitum, si materia primò è pulmone in pectoris cavitatem deberet effundi, atque ibi empyema efficere, deinde demum sese exiguis venæ sine pari ramis insinuare, & quidem per membranam adedensam, quæ thoracem intus succingit.

Itaque alia manifestæ viæ quærendæ, per quas etiam ex ipsis pulmonibus materia ad renes & vesicam peruenire possit. Viarum autem istarum prima est arteria venosa, vt Bauhinus, lib. 2. theatri Anatom. cap. 26. docet, quæ per pulmones distribuitur, si per eam ad ventriculi sinistri principium, non verò in ipsum sinistram ventriculum cordis deferatur, & deinde per eius ramum peculiarem & insignem, quem, cap. 22. describit, ad emulgentes, indeque ad renes & vesicam deferatur. Altera via in quibusdam est vena pulmonaria, quæ à venæ cavae trunco non procul ab exortu venarum diaphragmaticarum ad pulmonem in nonnullis corporibus mittitur. Obseruauit hanc venam superioribus annis Nicolaus Sanmichelius Nouocomensis, vir suo tempore in diffecandis corporibus exercitissimus, qui in cadaueribus quibusdam venam magnam, vbi diaphragma excessisset, priusquam in cor se insinuat, ramulum quendam rectâ ad pulmones misisse obseruauit, vt refert Iohan. Costæus, in annot. in Auen. lib. 3. fen. 10. rr. 4. cap. 1.

Si autem in latere contineatur materia, quod in pleuritide accidere solet, viæ manifestæ ad renes sunt; primò vena ἀγγειον, per quam sanguis vel pus in venam cauum effunditur, & hinc in renes ad vesicam porro transmittitur, & cum vrina euacuatur; obseruatumque est à Recentioribus Anatomicis, à sinistro ramo venæ ἀγγειον interdum ramulum ad venam emulgentem rectâ referri. Deinde materia è thorace peruenire potest ad renes & vesicam, ex intercostalibus arteriis ad arteriam magnam deducta, & hinc ad renes transmissa. Terriò etiam materia per phrenicam venæ cavæ & ductum arteriæ à Bauhino descriptum ad vrinæ vias peruenire potest. Atque per has vias materia cum è pulmone, tum è lateribus cum vrina euacuari potest.

Per aluum autem puris euacuationem quod attinet, plerique hinc ad occultas vias, quas sibi natura quærit, confugiunt: sed & hic manifestæ dantur. Et primò quidem vias è pulmone ad aluum quod attinet, potest è pulmone materia euacuari per aluum primò per ramum illum arteriæ venosæ, modò dictum, & à Bauhino descriptum siue delata in arteriæ magnæ ramum cœliacum, qui ad ventriculum effundatur, & ab hoc in intestina, siue feratur per arteriæ magnæ ramum alterum mesentericum dictum, qui supra emulgentes ad mesenterium & intestina mittitur.

*Obseruauit  
Nicolaus San-  
michelii de  
ramulo venæ  
cavæ.*

Alij volunt, quod materia per venam arteriosam in dextrum ventriculum cordis, & ex hoc in truncum venæ cauæ, & inde per hepar ad ramos venæ portæ transmittatur, tandemque per ramum mesentericum in intestina perueniat. Verum etsi per hanc viam euacuationem fieri non impossibile sit, longa tamen est, & per ambages.

Tertio si vena illa pulmonaria à Nicolao Sanmicheo obseruata adsit, per illam etiam è pulmone ad aluum mediante vena portæ peruenire potest.

Puris autem in pleuritide & lateribus affectis per aluum euacuationis via manifesta est primò per venam sine pari, per quam in venam cauam, & hinc in portam transire potest. Deinde per truncum arteriæ magnæ transire potest, si scilicet materia ex ramis intercostalibus in aortam, & hinc siue per ramum celiacum, siue per mesentericum ad intestina mittatur. Neque impossibile, per arterias materiam, præcipuè natura id agente, euacuari posse, cum aliàs etiam arteriæ in morbis ab humoribus vitiosis non semper planè immunes videantur.

Si verò materia in thoracis cavitare contineatur, verisimile est, eam potius in pulmones, quorum membrana rarior est, penetrare, & hinc seu per vrinam, seu per aluum per vias modò dictas euacuari, quàm per membranam densam in latus sese insinuare. Et obseruatum est, materiam interdum satis crassam è cavitare thoracis in pulmonem receptam, & hinc per tussim reiectam fuisse; sicuti historia habetur apud Guiliel. Fabricium, *cent. 1. obseru. 46.* de quodam, qui cum in pectore vulneratus esset, duas turundas, quæ ex incuria per vulnus in cavitatem thoracis illapsæ erant, tussi reiecit.

## CAPVT XVII.

## De Thoracis Vulneribus.

Thoracis  
vulnera.

**T**horacis vulnera alia sunt non penetrantia, in quibus scilicet membrana succingens adhuc integra est; alia penetrantia, in quibus non solum muscoli thoracis, sed & pleura perforatur, vt ita vulnus in ipsam thoracis cavitatem penetret. Penetrantia rursus sunt vel sine partium in thorace contentarum læsione, vel cum earum læsione, puta pulmonis, mediastini, pericardij, cordis, venæ cauæ, arteriæ aortæ, asperæ arteriæ, gulæ.

## Vulnera thoracis non penetrantia.

Vulnera tho-  
racis non pe-  
ntrantia.

Si thoracis vulnera sint simplicia, neque in cavitatem eius penetrent, & nullus alius affectus coniungatur, eandem, quam alia vulnera, indicationem habent. Itaque 1. sanguis sistendus, si opus sit, modo in aliis vulneribus vitato, vulnusque fascia ligandum, quæ talis sit, vt tutò contineat, nec tamen tam alta, vt premendo dolorem excitet. Et si vulnus paruum sit, breui temporis spatio sanari solet. Quod si amplius sit, digestiuum aliquod vnguentum imponendum, quem in vsum terebinthina clara odorata præcipuè utilis est. Partes vicinæ oleo chamæmel. rosæ inungendæ. Tandem vbi in vulnere coctio apparet, emplastrum aliquod conueniens, vt barbarum, basilicon Mesue, aut diapalma imponatur.

## Vulnera penetrantia.

## Signa diagnostica.

Vulnera pe-  
ntrantia.

Signa.

Vbi verò vulnus profundius est, primò diligenter inquirendum, an penetret vsque ad cavitatem thoracis, an non. Cognoscitur autem hoc visu in magnis

Dan. Sennerti Tom. II.

vulneribus, in aliis tactu, specillo scilicet, seu stylo exploratorio, vel candela ceræ immissa, item auditu, dum aer per vulnus cum strepitu exit. Aeris tamen per vulnus exitus, qui penetrationis signum est, aliis etiam modis explorari potest: si nimirum penna, vel lanæ floccus vulneri imponatur, vel candela accensa admoveatur, & retento aere inspirato, atque ore & naribus clausis, æger efflare conetur. Tunc enim exeunte aere lana moueri, & flamma ventilari ac moueri solet. Hæc autem per aërem egredientem exploratio fallere potest, si vulnus obliquum aut tortuosum sit, aut costa aliqua fracta vel depressa, aut muscoli intercostales situm hominis ab eo, quem habebat, dum vulnus acciperet, euariant, vulnusque regant, vel pars externa vulneris, quod turunda non immissa sit, conglutinata sit. Tum enim aer egredi non potest, imò nec specillum vel stylus adigi. Ideoque ægrum, dum vulnus explorare volumus, eo sita collocare debemus, quo erat, cum vulnus acciperet. Ex instrumento quoque, quo vulnus infictum est, aliquo modo profunditas vulneris agnoscì potest. Angustiora enim instrumenta penetrationis suspicionem præbent, præsertim si vulnus extrà nonnihil latum sit. In penetrantibus quoque & amplis thoracis vulneribus respiratio interdum læditur, & voce æger priuatur parente vulnere; vulnere verò clauso respiratio & vox redit. Postea & alia signa accedunt, dum sanguis aut pus in pectore cumulantur. Tussis est molesta, sputum fit cruentum vel purulentum, lateris dolor, grauitas ac pondus circa costas nothas percipitur. Febris sæpe accedit, & vbi æger se in ægrum latus conuertit, fluctuatio in thorace percipitur, si sanies in eo continetur.

De pulmonis & mediastini vulneribus iam dictum; de cordis, œsophagi vulneribus suo loco dicitur.

Si vena caua in thorace vulnerata sit, magna sanguinis crassi copia effluit, virisque valde deiciuntur, facies pallor, & paulò post mors sequitur.

Si arteria magna vulnerata sit, sanguis clarus & renuis, copiosus ac cum saltu exit, si ei via pateat. Pulsus tremulus adest, vires collabuntur, syncope accedit, & paulò post mors.

Si aspera arteria sit vulnerata, parum sanguinis effluit, dolor in dorso percipitur, vox fit rauca & tussis acris.

## Prognostica.

1. Vulnera hæc, quàm non penetrantia, longè sunt periculosiora; etiam vbi viscera interna non sunt læsa; quia aer externus per vulnus non alteratus ingreditur, internasque partes offendit, & aere interno & calore expirante virtus debilitatur. Et cum vulnus penetrare non possit, nisi pleura perforetur, illa verò densa & sensu exquisito prædita sit, ac reliquis thoracis partibus communis: dolores, tussis, inflammationes, febres hinc excitantur.

2. Præterea nisi vulnera hæc diligenter curantur, facilè in empyema & fistulas degenerant. Quod vbi accidit, sæpe pus foetidum redditur, tandemque ægro mors attrahitur.

3. Interdum accidit, vt licet externum vulnus conglutinetur & consolidetur, in sputo tamen adhuc notæ sanguinis appareant; quod accidit, quia partes internæ non sunt consolidatæ, è quibus cruoris aliquid & saniei in cavitatem thoracis emanat, vnde empyema generari potest.

4. Si simul quidem tum interna tum externa parte sanescat, cicatrix autem intus debilis, aspera & liuida existat, quandoque refricatur, eoque modo purulentus euadit. Iterum verò etiam exulceratur, si quid plus iusto laborarit & extenuatus fuerit, pituitaque & bilis ad cicatricem affigatur, & si morbo

PPp alio

alio derentus extenuatus fuerit. Hippocrates, *lib. 1. de morbis.*

5. Vulnera hæc in dorso periculosa sunt, quàm in parte anteriore; quia ibi plures & maiores nervi ac tendines sunt, ibique transit vena cava, arteria magna, aspera arteria, gula, & omnia spiritalia organa dorso alligantur. Cava autem vena & aorta arteria vulnera lethalia sunt, ex sanguinis, qui vitæ thesaurus est, profusione, qui eò loci fitti non potest, solentque varia prava symptomata superuenire.

6. Si autem prava symptomata non superueniant, sanitatis recuperanda spes est. Vnde de thoracis vulneribus Albucasis scripsit: Si prætereat dies tertia vulneris, & non accedat infirmo spasmus vel tremor cordis malus, vel structura anhelitus, & vides eius dispositiones bonas, tum scias vulnus esse sanum, & virtutem fortem, cui nihil impossibile.

#### Curatio.

Curatio.

Indicationes quidem vulneris, quatenus tale, eadem sunt, quæ vulneris non penetrantis: quia verò sanguis in cavitatem thoracis effundi solet, & humores vitiosi e corpore reliquo ad vulnus affluere; danda opera, ut sanguis sistatur, humorum ad vulnus affluxus prohibeatur, & sanguinis qui in thoracem effusus est, saniesque, quæ ibi colligitur, euacuetur.

Itaque 1. ut sanguis sistatur, turunda oui albumine & aliis medicamentis sanguinem sistentibus illita immittenda. Quod si nihil efficiat, etiam per os medicamenta sanguinem sistentia exhibenda, ut conserva rosarum, bolus Armena, terra sigillata, succus portulacæ, trochisci de carabe, terra sigillata, & similia, de quibus in sputo sanguinis dicitur.

Deinde, si grauia symptomata metuenda sint, & sanguis non valde effluerit, sanguis e latere opposito euacuandus, aut corpus, si cacochymicum, euacuandum.

Tertio, ubi magna vasa non sunt vulnerata, sanguis, que in pectus non multus effusus, vulnus statim consolidandum, ne ab aere externo, in vulnus se infinuante, pulmones lædantur. Alias etiam obseruandum, ut vulnus, quoties opus est, celeriter obligetur, ne aer per vulnus patens in thoracem transeat. Si verò de sanguine in thoracem copiose effuso suspicio sit (quod cognoscitur, si Medicus anatomix peritus loco vulneris perspicat, an magnæ vel parvæ venæ vel arteriæ vulnerata sint) vulnus turundis apertum seruandum, dandaque opera ut sanguis quamprimum effluat, ne intus corruptatur. Vbi notandum, ut turundæ filo alligentur latis longo, ut in cavitatem thoracis decendant, sicut in obseruat. Guilielmi Fabricij *cent. 1. obseru. 46.* habetur, cuidam duas turundas in pectus delapsas, ac post tres menses ruffi reiectas fuisse. Est & adhuc obseruandum, ne turundæ nimis sint longæ, ne pulmones lædant. Ut etiam facilius sanguis effluat, iaceat æger super latere vulnerato. Et si sanguis in thoracem effusus non spontè effluat, extrahendus instrumento, quod Græci *πυλὼν* nominant. Et si vulnus nimis angustum sit aut obliquum, paululum dilatandum cute sectâ, aut si æger sectionem admittere nolit, turunda ampliandum. Si accepto vulnere nullus sanguis effluat, idque in pectore detineatur, æger granum vnum moschi sub lingua teneat. Ita enim statim sanguis fluere incipit, quod nonnulli profecto habent.

Si etiam ob materiæ copiam in thorace contentam æger malè habeat, ut materia continuò effluat, nec ibi putrescens, febrem, anhelitum difficultatem & tussim exciter, canulam plumbeam vel argenteam pluribus in locis perforatam, extra verò alis munitam, immittere decet, quæ digestiuo medicamento prius illinenda est.

Si sanguis sit concretus, ut exire non possit, attenuandus & incidendus liquore conueniente in cavitatem pectoris infuso. In quem usum commodum est melicratum, ex vna parte mellis & duabus partibus aquæ ad tertia partis consumptionem coctis, vel mullum, vel mel rosatum, in aqua hordei aut consolidæ, aut veronicæ vel agrimonie dissolutum. Et si materia sit viscida & tenax, aliquid oxymelitis addere vtile est. Liqueor autem hic tepidus iniciendus; ut & topica omnia medicamenta hic calida vsurpanda; cum frigus sit pectori inimicum.

Extra verò applicentur medicamenta vulnere idonea, exsiccandi vi prædita; humectantia verò & oleosa vitanda. Valde in hisce vulneribus commendatur sequens Vnguentum.

*℞. Resina pini rec. clara & odorat. ℥. xij. ol. lauri puri, terebinth. ana ℥. ij. gummi elemi puri ℥. iij.*

Resina & gummi super igne liquefiant, deinde addantur olea & terebinthina, parum bulliant, donec vnguenti crassitiem acquirant, tandem colentur.

Et ne partes vicinæ in consensum trahantur & dolore afficiantur, loca vicina æstate oleo rosaceo, hyeme chamæmelino inungenda sunt. Interna etiam medicamenta vsurpentur thoraci dicata, quæ materiam exsiccant, eius corruptionem prohibent, & si ad pulmones quid perueniat, quæ ad eius expectorationem profunt. ut syrupus e iuiabis, capill. ♀. de glycyrrh. scabios. cum aqua scabios. tussilaginis, veronic. capill. ♀. Tandem etiam medicamenta, quæ intus conglutinationem adiuuant, vsurpanda, ut syrupus myrtinus, conserva rosarum, mel rosarum, consolidæ, plantago, bolus Armena & similia. In tota verò curatione omnia metalla hic omittenda; cum valde noceant.

Sæpe verò accidit, ut vulnus extra conglutinetur, antequam intus planè exsiccatum & consolidatum sit. De quo Hippocrates, in *Coac. lib. 6. sect. 2. comm. 1. aph. 5. secundum Hollerij distinct.* Quicumque vulnerati in thorace, externa vulneris parte sanati, interna verò non, periclitantur, ne empyici fiant; ac quibus internâ parte infirma cicatrix obducta, vulnus ea parte reficatur, rupta cicatrice. Ideo, quod supra etiam dictum, danda opera, ut vulnus probè mundetur & intus insuper consolidetur, antequam extra fiat consolidatio. Si verò tale quid accidat, ægri ut empyici curantur. Si per vrinas materia & pus euacuetur adiuuanda vrinam mouentibus.

#### Dieta.

Aër sit temperatus & potius ad calidum, quàm frigidum declinet. Victus sit initio tenuis; donec inflammationis terminus præterierit. Cibi in principio adstringentes vitentur, ne sanguis concretus in cavitatem thoracis detineatur. Conueniunt in cibis amygdalæ, passulæ, hordeum. Ager quiescat, nec moueatur, vel multum loquatur, caueat quoque iram, & alios affectus nimios.

### CAPVT XVIII.

#### De Fistulis thoracis.

Nonnunquam post tumores aut vulnera thoracis male curata fistulæ in pectore excitari solent, quæ difficilis sunt curationis, præsertim si oïla, sternum, spina dorsæ, aut costæ simul afficiantur.

#### Differentia.

Sunt autem fistulæ aliæ penetrantes, aliæ non penetrantes.

Signa



*Signa diagnostica.*

Cognoscuntur facili & oculis patent; & si penetrant, stylo vel aëris egressu cognoscuntur.

*Prognostica.*

*Prognostica.* 1. Fistulæ hæc curatu sunt difficiles; cum partes hæc non solum perpetuo moueantur, sed etiam præcipue si penetrant, multæ superfluitates in iis colligi solent.

2. Quæ in dorso sunt fistulæ, periculosiores sunt, ob maiorum neruorum copiam & spinalem medullam vicinam, ac raro curantur. Quæ in musculis sunt circa magna vasa, non satis tuto curantur.

*Curatio.*

*Cautio.* Ideoque Medicus certus sit, quæ vasa circa fistulam ducantur, ne curatione venas, arterias, nervos lædat, ægroque noceat. Ac proinde vbi dilatatio fistulæ requiritur, turundis illa tutius, quam ferro peragitur.

*Curatio.* Cæterum medicamenta quod attinet externa, quæ in fistulam iniiciuntur, parantur ex hydromelite vel mulso, decocto rad. caryophyllat. gentiana, ireas, aristolochia, veronica, valeriana, salvia, millefolij, hyperici, rosar. cauda equina, pilosella. Quæ in vino coquantur & colaturæ mel clarum addatur. Potest & thus ac myrrha addi.

Vt ʒ. Hyperic. fl. rosar. rubr. cauda equin. centaur. minor. an. M. i. rad. caryophyllata, aristoloch. ireos, an. ʒ. j.

Coqu. in vino,

Colaturæ ʒ. lb. i. mell. opt. ʒ. iii. Dissolue thus, myrrh. ana Drach. i. lb.

Decoctum hoc vel simile toties in vlcus iniiciatur, donec mundum fuerit.

Post iniectiones tale vel simile medicamentum cum turunda immitti potest.

ʒ. Terebinth. ʒ. i. farin. lupinor. ʒ. i. fabar. ʒ. ii. succi apij, agrimon. plantag. ana ʒ. i. mellis ʒ. i. lb. myrrh. mastich. thus, ana ʒ. ii. Misce super igne.

F. Vnguentum.

Vlcere mundato, iniectiones & vnguenta exiccantia & conglutinantia, vt in aliis vlcibus, adhibenda ex ros. radicibus consolida balaustris, sumach, myrrhâ, thure, mastiche, aloë, radice ireos, therebinthina & similibus.

*Interna.* Dum verò externa adhibentur, intus etiam vsurpentur medicamenta ex iis, è quibus portiones vulnerariæ parari solent, nimirum ex agrimonia, plantagine, veronica, scabiosa, hyperico, betonica, sanguisorba, hederâ terrestri, salvia, rosis.

Vt ʒ. Fol. scabios. M. ii. agrimon. caryophyllata, sanicula, veronica, ana M. i. tussilag. pulmonar. lingua ceruina, ana M. lb. rad. caryophyllata ʒ. i. vince toxicæ ʒ. lb.

Coq. in vini albi & aq. fontana, ana lb. i. in vase duplici.

Colatura saccharo dulcoratur.

## CAPVT XIX.

*De Empyemate.*

*Empyema.* Pleuritidem, peripneumoniam, & alios thoracis affectus non raro sequi solet malum, quod Græcis ἐμπίμνα appellatur, quo qui laborant, ἐμπίμνοι & ἐμπίμναι, suppurati & purulenti dicuntur. Etsi enim, si nominis proprietatem spectes, ἐμπίμνα omnem suppurationem & puris collectionem significat: vsus tamen obtinuit, vt in specie id suppurationi seu purulentæ in thorace tribuatur.

Est ergo ἐμπίμνα puris in cauitate thoracis collectio. Dan. Sennerti Tom. I I.

atio. Solent quidem nonnulli empyema appellare, cum non solum in cauitate pectoris, verum etiam inter pleuram vel costas, aut in pulmone pus colligitur: verum magis propriè & specialissimè solet empyema nominari, cum tantum in cauitate thoracis sit puris collectio.

*Causse.*

Colligitur autem pus in cauitate thoracis ex præcedente aliqua & in abscessum mutata ac rupta partium vicinarum inflammatione, vt pleuritide, peripneumoniâ, anginâ, interdum & rupto tuberculo ad spinæ partem interiorē. De quo Hippocrates, 5. aphor. 10. Quibus ex angina in pulmone mali fit conversio, ij intra septem dies moriuntur. Si verò hos effugiunt, purulenti fiunt.

Nonnunquam etiam sine inflammatione pus in pectore colligitur, quod fit, quando sanguis è vasis suis in cauitatem thoracis effusus, ibique detentus putrescit, & in pus mutatur. Et quidem si post venam in pulmone ruptam vlcus sequatur, quod continuo saniem in thoracem effundat, verum fit empyema. Si verò sanguis copiosus effusus in loco alieno corrumpitur, materia illa pus minus propriè dicitur. Plerique addunt destillationem è capite, de qua Hippocrates, 7. aphor. 38. Destillatio in ventrem superiorem ad suppurationem peruenit intra dies viginti. Nonnulli tamen pituitam in pectore immutatam minus propriè pus appellari censent. Est enim hæc purulenta materia non merum pus. Nam hæc est ex humore excrementitio; cum merum pus ex nutrititia materia fiat.

Omnes autem modos, quibus pus in thoracem effundi potest, proluxa oratione descripsit Hippocrates, lib. 1. de morbis, qui hæc de re videatur. Cuius summa hæc esse potest: Empyema verum esse, quando in ipsa thoracis cauitate pus continetur, idque quatuor modis fieri. 1. ex pleuritide non satis expurgatâ. 2. à pituita ad cauitatem thoracis à pectore defluente 3. ex vena in thorace rupta. 4. ex vena in pectore aperta. Non verum autem empyema esse, cum non in cauitate pectoris, sed in pulmone materia hæreat, idque etiam quatuor modis fieri. 1. in peripneumonia suppuratâ & non expurgata. 2. ex pituita è capite descendente & in pulmone putrescente. 3. ex vena rupta in pulmone 4. ex varice in pulmone generato & rupto.

*Differentia.*

1. Pus interdum totam thoracis cauitatem occupat, interdum eius alteram partem, dextram vel sinistram.

2. Ex differentia materiæ datur empyematis differentia, quæ nunc benigna est, nunc acris & fœtida.

*Differentia.*

*Signa Diagnostica.*

Signa quod attinet, quæ inflammationem aliquam in thorace in abscessum, è quo post empyema futurum est, mutari significant, si pleuritis & peripneumonia, vel alia in pectore inflammatio, remediis idoneis adhibitis non cessat, ac præterea rigores & febres subsequuntur, & grauitas: morbum in empyema mutari indicio est. Si enim materia intra dies quatuordecim non expurgatur, in pus mutatur. Rumpitur verò vomica circa diem vigesimum, interdum trigesimum aut quadragesimum, Hippocrates, 2. prognost. aphorism. 57. Rigor verò fit, dum à pure genito vicina membranosa corpora vellicantur. Ponderis verò & grauitatis sensus in thorace pro dolore percipitur, quod humor, qui antè in partem inflammatam dispersus erat, in vnum locum iam totus colligitur.

Signa verò iam facti ex vomica rupta empyematis

P P p

propo

proponit Hippocrates, 2. *progn.* 60. & 61. Et quidem recens ac nuper facti empyematis signa sunt eadem, quæ inflammationis suppuratæ modò esse diximus, quibus difficilior respiratio accedit. Quamvis enim rupto abscessu dolor sedetur, & hinc diaphragma & musculi thoracis liberius moveri possint: tamen quia pulmo à circumfuso pure grauatur, ut liberè moveri non possit, & præterea aliqua puris pars à rara pulmonis substantia imbibitur, & hinc pulmo humidior & grauior redditur, bronchiaque eius à pure imbibito obstruuntur, respiratio redditur difficilior Galenus, 4. *de loc. affect.* cap. 8. addit fluctuationem. Nam, inquit, ubi quis subito à decubitu transmutatur, idque maximè si ab uno latere in aliud se conuertens destituere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri haud dubia coniectura est. Quin etiam in his fluctuario sæpè numero, haud obscurè auditur. Nisi forsàn puris crassities aut copia, quæ omnem penè thoracis capacitatem implet, impediatur fluctuationem illam audire.

Diurnioris autem empyematis signa sunt, quod febris quidem mitior redditur, sed lentè, partim putrida, partim hæctica, perpetuòque infestat, quæ de die quidem mitior, sed circa vesperam exasperatur, & noctu vehementior est. Tussis est perpetua, sputumque tandem fit purulentum, adest anxietas & cibi fastidium ex vapore putrido orta, sudores multi superueniunt; sed inutiles & non copiosi, sed frequentes ob vitium imbecillitatem. Ex enim debiles alimentum etiam non in nimia quantitate sumptum superare & rectè apponere non valent. Tandem oculi fiunt caui, maxillæ ruborem contrahunt, ob vapores puris acres calidiorque faciem ipsam calefacientes, pustulæ circa pectus erumpunt, subtiliore ac acriore puris parte ad extremam cutem penetrante, pedes intumescunt.

Signa differentiarum quod attinet, primò locum, in quo pus continetur, ita nosse docet Hippocrates, 2. *progn.* aphor. 59. Si empyema in altera parte tantum existat, hos conuertere & discernere oportet, doleantne in altero latere, & an alterum altero calidius sit, atque cubantem supra latus sanum interrogare, an sibi videatur onus aliquod desuper suspendi. Si enim ita est, in quocunque latus pondus insit, in altero suppuratio existit. Quemadmodum si vtrinque calor & pondus sentiat, in tota thoracis cavitate pus continetur. Auicennas hoc, quod habet ex Hippocrate, lib. 3. *de morbis*, addit: Applicetur, inquit, linteam madidum thoraci secundum vtramque partem, dextram & sinistram: citius enim exiccatur illud, quod supra partem pus continentem appositum est.

Puris verò conditio si reiciatur, ex fœtore & aliis qualitatibus cognoscitur.

### Prognostica.

*Prognostica.*

Prognostica empyematis recensuit Hippocrates, 2. *progn.* 63.

1. Si cum abscessus ruptus est, febris eadem die dimiserit (id est, ita mitis reddita fuerit, ut si præcedenti vehementiæ conferatur, propemodum pro nulla habeatur. Nam planè non cessat,) æger cibum appetat, siti careat, (nam vapores fœtidi ac tetri à thorace ascendentes ad linguam ac palatum ob communem tunicam simul orificium ventriculi afficiunt, & hinc appetitus deiicitur, sitisque excitatur. Quapropter si breui tempore post eruptionem hæc symptomata remittant, puris exigua quantitas, idque benignius significatur. Si verò hæc symptomata non remittant, puris ingentem copiam & prauitatem significant) venter exigua & consistentia deiiciat, pus læne, album sit & æquale, & pituita vacans, absque dolore, & valida tussi expurgetur, ægrum euasurum spes est,

2. Si verò contrarium accidat, & horrores post puris eruptiones maneant, febris non desinat, aut cum videtur desinere, recrudescat, ægerque sitiat, nec cibum appetat, aluus sit humida, sputum sit prauæ substantiæ, ut & coloris mali, flauum, viride, nigrum, fœtidum, pituitosum, inæqualis substantiæ: percunt, quibus hæc omnia adsunt. At qui alia adsunt, alia non, horum quidam moriuntur, quidam in multo tempore euadunt.

3. Plerumque verò empyema in phthisin transit, & tum collum ac tempora valde extenuantur, pedes intumescunt, ungues curuantur. Etenim qui seruantur, ubi pleuritis vel peripneumonia in empyema transit, intra dies quadraginta pus per sputum eiici debet, quod si non fiat, in phthisin transit. 5. *aphor.* 15. Non quidem opus est, ut quadragesimo die æger planè ab omni pure liberatus sit, sed sufficit, si eo tempore tanta eius copia reiecta sit, ut reliquæ exiguæ, quæ supersunt, faciliè postea euacuari possint, cuius euacuationis non ita certus terminus definiri potest. Nam ultra diem quadagesimum mollis & rara pulmonis substantia pus sine damno vix sustinere potest. Ideoque opus est, ut intra eum terminum maxima eius pars reiciatur.

4. Quibus in magna puris copia intra thoracem & pulmonem collecta totus thorax in respiratione attollitur, celerim suffocantur, Galenus, 4. *de loc. affect.* cap. 7.

5. Malum periculosius est, si pus totam cavitatem thoracis occupet, quàm si in altero solum latere contineatur.

6. Empyema tamen, quod vnum saltem latus occupat, periculosius est, si sinistrum latus occupat, quàm quod dextrum; quia sinister cordis ventriculus ut nobilior plura magis afficitur.

7. Quicunque empyi vruntur aut secantur, si album pus effluat, euadunt; si verò subcruentum & fœtidum, pereunt. 7. *aph.* 44.

8. Quandoque empyi vruntur aut secantur, si pus aut aqua vniuersim effluerit, certò moriuntur. Hippocrates, 6. *aph.* 27.

9. Purulentos moderatius habentes si sputa graueolentia consequuntur, recidiua interimit. *In Coacis.*

10. Quibus specillum à pure velut ab igne coloratur, ij ferè moriuntur. *In Coacis.*

11. Ex suppurationibus quas pulmonum morbi excitauerunt, ferè senes moriuntur, ex cæteris verò iuuenes. *Ibid.*

12. Inflammatio lateris aut pulmonis in suppurationem versa, quandoque sursum rumpitur; id quod periculosius est. Si enim pus quam citissimè per sputum non reiciatur, rabidi fiunt. Quandoque verò per aluum & vesicam euacuatur, quod per quas vias fiat, supra, cap. 16. *quest.* 5. videatur, id quod cum minore periculo coniunctum est, Paulus Aegineta, & Aetius. Cum enim ut æger citò à pure liberetur, euacuatio per tussim ac sputum non sufficiat, siquidem per eam sensim & lentè pus euacuatur, & interea temporis à pure in thorace & pulmone moram trahente substantia pulmonis faciliè corrumpitur: commodior est, & minore cum periculo coniuncta, per aluum vel urinam puris euacuatio.

### Curatio.

Si prohiberi à Medico nequit suppuratio, adiun- *Curatio.*  
tur moderatè calidis & humidis cataplasmatibus & emplastris impositis, de quibus in Pleuritide dictum. Maturato abscessu ut maturè rumpatur, opera danda, ne pus partem ampliùs corrumpat, forti locutione, sternutatione irritatà.

Rupto abscessu, ut is abstergatur & consolidetur, ma-  
gister

teria verò euacuetur, danda opera. Euacuatur autem, materia vel sensibiliter, vel insensibiliter. Sensibiliter rectius & commodius euacuatur, & quidem frequentius ac tutius per sputum vel thoracis perforationem, vel per aluum, vel per urinam. Itaque considerandum, quò materia vergat.

Si tussis vergeat, ut per sputum expurgetur, detergunt aqua saccharata, hordei, hydromel & prislana cum melle, quæ ut alimentum medicamentosum & medicamentum familiare in omni empyematis genere ac quouis tempore conuenit. Radix iridis cum mulla, hyssopus, decoctum glycyrrh. tyrop. de prass. capill. ♀. Inprimis efficax est aqua mulla, in qua lota sit terebinthina, vel cremor terebinthinæ.

Vel ℥. Succi hederæ terrestris, ℥. iv. prassij ℥. ii. thuris, myrrh. an. ℥. i. diapenid. ℥. β. F. Lohoh.

Vel ℥. Folia brassica recentis ruberrima concisa.

Coq. in balneo vase clauso. Liquor saccharo dulcoratur, & manè ac vespèri bibatur.

*Medicamentorum delictum.* Materie ramen expectorandæ in delectu medicamentorum habeatur ratio. Si enim pus fuerit bilio. um, acre & erodens, eligenda & usurpanda, quæ acrimoniæ eius mitigant & leniant, ut *hordeum, iuinba, passula, sebest. glycyrrh, amygdal. dulc. pinea, viola, capillus ♀. semen malua, syrup. violar. capillorum ♀. rotula diatragacanth. frigid. diatreos simpl.* Si verò pus non acre, sed crassius sit, attenuantia, incidentia & abstergentia usurpanda, ut *hyssopus, tussilago, radic. helen. semen carthami, anisi fœniculi, carices, syrup. de hyssop. de glycyrrh. de tussilag. loh. sanum & expertum.*

Si verò pus nimium crassum sit & picuitosum, validius incidentia & attenuantia usurpanda, sed moderatè, & cum arteriacis ac thoracicis lenientibus miscenda; quo modo & pus crassum incidetur & attenuabitur, & humectatione dilueretur, & ad exspuitionem aptius reddetur.

Si verò ad vias urinæ vergat, ea, quæ extergendo urinæ meatus purgant, vel quæ serosam humiditatem suppeditant, medicamenta exhibeantur, ut decoct. ex *rad. aperientibus, granis Alkekengi, ciceribus rubris, capill. ♀. sem. 4. frig. maior.*

Ut ℥. Radi. aperientium maceratarum in vino albo, glycyrrh. an. ℥. i. sem. 4. frigid. maj. ana. ℥. i. β. adiant. M. j. cicerum rubror. M. β. Coq. ad dimidias. Aromatisentur cum radic. ireos ℥. ii. & dulcorentur saccharo.

Si verò ad intestina feratur, exhibeatur ius galli decrepiti, decoct. betæ, caulium, graminis, prass. cassiæ, quæ thoracem lenire & aluum mouere possunt, ut & terebinthina: vel clysteres abstergentes iniciantur. Tandem syrupus aliquis abstergens & adstringens non nihil adhibeatur, qui intestinorum exulcerationem prohibeat, ut syrup. de rosis simpl. infus. de rosis siccis cum decocto plantaginis. Vel etiam ad prohibendam intestinorum exulcerationem clysteres ex lacte, fufuribus & semine psyllij iniciantur.

*Sitio & viti.* Si verò tanta puris copia in thorace collecta sit, ut neque tussi, neque per aluum aut urinam expurgari possit, vel etiam natura eas euacuationes non tentat, aut suffocationis periculum imminet, ut maxima adsit difficultas respirandi, thorax aperiendus. Id quod sit non solum sectione, sed & vitione, ut ex Hippocrate, 6. aph. 27. patet. Per vitionem autem hic ab Hippocrate non talem intelligi putat Mercatus, quæ ad pus vsque penetrat, sed solum efficiat exterius vlcuscula manantia, per quæ pus sensim exspirat. Verum aliud ipse textus Hippocratis docet, qui ita habet: *Quicumque empyici aut hydropici, vruntur aut secantur, si pus aut aqua, vniuersim effluerit, omnino moriuntur.* Si enim vitione saltem talia vlcuscula parari deberent, per quas pus sensim exspiraret, nullo modo semel confertim euacuari & inde mortis periculum attrahi posset. Accusat verò hîc Rondelietius, lib. 2. c. 15. timiditatem Medicorum assistentium & ægrotorum, scribitque se vitione liberasse

Dan. Sennerti Tom. I. l.

iuuenem, qui per annum pus in thorace collectum post pleuritin gestavit, & multos alios quorū nomina supprimat. Verum sectio non solum tutior est, sed & minore cum dolore & ægri consternatione coniuncta.

Verum in hacre cautione opus est, ut primò attendatur, an vires ægri istam operationem sustinere possint; deinde an aliquid commodi æger ex sectione illa percipiturus sit. Etenim si pulmo respirationisque organa ita corrupta sint, ut nulla conualeſcentiæ spes adsit, frustra æger sectione cruciatur. Itaque matutè & ante diem 40. & priusquam pulmones à pure corrumpan- tur, sectio instituenda. Qua ratione autem ea fieri debeat, dictum in Instit. lib. 5. part. 1. s. 2. c. 7. de sectione thoracis, & dicitur etiā de eo in fine huius capituli, quæst. 2.

Columbus, l. 1. c. 3. etiam inter mediastinum, id est, duplicem pleuram, thoracem in duo secantem, materiam aliquam colligi posse statuit, quæ perforato sternoturo satis extrahi possit, à diligenti chirurgo reique Anatomice peritissimo.

Thorace aperto pus non confertim, sed sensim euacuandum; cum si confertim euacuatur, æger moriatur, ut modò ex Hippocrate dictum. Et sufficit, si primò lb. j. β. extrahatur, postea singulis diebus paulò minus.

Si denique neque per tussim, neque per urinam, neque per aluum materia euacuatur, neque etiam æger sectionem admittat, vel tolerare possit, vix euadet; sed phthisi morietur. Nonnulli tamen suadent, ut materia insensibiliter discutiat & absumatur decocto ligni Guaiaci, sariæ parillæ, Chinæ & similium, extrà verò impositis emplastris & fomentis discutientibus. Et tentari potest illa curatio, sed vix ægrum liberabit. Si tamen experiri libeat, potest fieri tale Fomentum.

℥. Rad. aristol. rotund. ireos, an. ℥. i. acori veri, althææ, an. ℥. vi. hyssop. origan. prass. scabios. an. M. i. flor. melil. chamam. an. M. β. agarie. ℥. ij.

Coqu. & decocto spongia imbuatur & thoraci imponatur. Post fomentationem pectoris regio inungatur oleo nardino, irino, anethino: Vel imponatur hoc Emplastrum.

℥. Emplast. diachyl. magni, de melilot. an. ℥. i. β. ol. irini ℥. vi. pulm. rad. ireos, spica, puleg. an. ℥. i. cera q. l. F. Emplastrum.

Vel ℥. Cortic. radic. ulmi, radic. lilior. albor. an. ℥. iiii. malua, violaria, hyperici, chamameli, an. M. ij.

Coq. & contundantur.

Adde fermenti ex atro pano ℥. iiii. farin. sem. lini, fenu-graci, an. ℥. i. β. ol. amygd. dulc. vel buryri s. sale, ol. violar. an. ℥. ii. F. Cataplasma.

#### Diaeta.

Curationem non parum diæta adiuuat. Sit nimirum victus ratio siccans, attenuans & abstergens. Ideoque cibi condiendi hyssopo, fœniculo. Vtiles sunt amygdalæ, pineæ: optima est prislana cum melle, si ad aluum vergat materia. Vtilis est & betæ & brassica cum butyro cocta. Si ad renes, ius cicerum cum petroselino. Abstineat æger à leguminibus, fructibus. Potus conueniens est hydromel, præcipuè hyssopo coditum. Vinum oligophorum etiam concedi potest, nisi febris sit magna.

#### QVÆSTIO I.

*Qualisnam sit Febris, quæ empyemati coniungitur.*

Febrem empyemati coniungi certum est. Vapores enim putridi ex pure cordi vicino communicantur, quod inde incalescit, caloremque p. n. in totum corpus diffundit. Verum qualisnam sit febris illa, non eadem videretur esse omnium sententia. Nos supra diximus esse illam lentam putridam, quæ interdum mitior est, circa vesperam exasperatur, & noctu est acerbior, tandemque hecticam inducere potest; quod iam porro explicandum.

Nonnulli quidem febrem istam saltem hecticam planè esse putant. Verum putridæ notæ satis adsunt, &

PPP 3 inter

Cautio in  
sectione in-  
stituenda.

Pus sensim  
euacuandum.

Insensibiliter  
discutientia.

Qualisnam  
sit febris, quæ  
empyemati  
coniungitur.

inter reliquas etiam circa noctem exacerbatio. Galenus equidem, 1. *de differ. febr. c. 9.* empyicorum febrem etiam ad hecticas refert; quod verò interdium minus, noctu magis infestat, ad alimentum assumptum & vaporem ex eo ad solida membra calentia distributurum refert, 2. *prognost. l. 60.* Verum etsi non negemus, si febris empyicorum hecticam tandem sibi asciscat, post sumptum cibum ob causam modò dictam exacerbari posse: tamen si illud hac saltem de causa fieret, non solum vesperi post cœnam, sed etiam de die post prandium, & ita bis, non verò præcipue sub noctem, exacerbari deberet.

Alij hæc fieri dicunt, quia pus propius ad sanguinem pituitosum (pituita autem circa vesperam mouetur) quam alium quemvis humorem accedat. Verum pus ad naturam pituitæ non accedit, sed potius à calore p. n. fit, & in thorace detentum incalescit. Ideoque aliqui id ob humores adustos & melancholicos accidere existimant, qui cum vesperi & noctu moueri soleant, non mirum esse putant, etiam febris empyicorum exacerbationem vesperi incipere & noctu durare. Quod cuilibet perpendendum relinquimus; cum & alij morbi, qui non sunt melancholici, noctu exacerbari soleant. Scribitque Hippocrates, lib. 3. *de morbis*: In omnibus lateris morbis dolores ferè interdium, quam noctu, leniores sunt. Cuius rei causa, saluo cuiusque iudicio, & hæc esse posse videtur, quod nocturno tempore pus magis elaboratur, secundum Hippocratem, 2. *aph. 47.* Dum pus fit, dolores ac febres magis fiunt, quam confecto. Cum enim nocturno tempore calor & spiritus ad interiora vergant, natura eo tempore ad concoquendam materiam magis apta videtur. Etsi verò in empyemate pus iam confectum sit: tamen quia natura nunquam est otiosa, ea materiam purulentam; quamdiu in corpore hæret, magis magisque elaborare nititur.

## Q V Æ S T I O I I.

### Quo in loco Sectio thoracis in empyicis instituenda sit?

Quo in loco  
sectio thora-  
cis instituenda.

Quo in loco sectio thoracis in hoc morbo sit instituenda, non omnes idem docent. In Instit. l. 5. p. 1. *sect. 2. cap. 7.* inter 5. & 6. costam sectionem faciendam esse diximus, fecimusque id auctoritate Pauli Æginetæ, lib. 6. c. 44. & Hieron. Fabric. ab Aquapend. *de operationibus chirurgicis, cap. de thoracis sectionibus*, qui pluribus ibi hac de re agit & consuli potest. Alij tamen aliud sentire videntur. Hippocrates, 2. *de morbis*, de suppuratione ex peripneumonia agens, si utroque in latere pus sit, sinistrum latus eligit, quod eo loci minus lethalis sit operatio, propterea proculdubio, quod hepar gibbâ sui parte diaphragma sursum eleuat, & ut locus magis tumidus est & dolet, sectionem instituit; sed locum determinatum seu costam ibi non definit. Alibi verò, in libro de internis affectionibus, cutem & carnem usque ad tertiam costam ab vltima secatur, & postea terebrâ cauâ costam perforat.

Guido de Cauliaco, *Chirurgia sua doct. 2. c. 5.* apertionem thoracis fieri iubet inter 3. & 4. costam; securius tamen inter 4 & 5. Amarus Lusitanus, *cent. 5. curat. 61.* etiam inter 3. & 4. costam sectionem feliciter institui docet, idque in Anatomia Ferrariæ se deprehendisse. Scribit imò, etiamsi intra 2 & 3. costam sectio instituitur, id sine læsione septi transversi fieri posse; aliisque, qui loco altiore sectionem instituunt, reprehendit. Henricus Smerius *Miscellaneor. lib. 7. p. 355. & lib. 10. p. 533.* sectionem inter 10. & 11. & costam notham, seu proximè & contigè vndecimæ, hoc est, inter penultimam & antepenultimam costam à iugulo deorsum numerando, seu inter secundam & tertiam sursum ab vltima costa notha numerando sectionem feliciter, & cum ægri commodo ac salute instituisse refert.

Ex hoc dubio ut nos expediamus, sciendum, duo in loci electione attendenda esse: primum ut operatio tuto instituat, id est, nihil in thorace, unde ægro aliquod periculum imminere possit, violetur, pericardium scilicet, pulmones, diaphragma, venæ item & arteriæ insignes ac nervi: secundo, ut per locum, in quo sectio instituitur, pus commodè euacuari possit. Ne ergo pericardium violetur, thorax neque in anteriore, neque in posteriore parte perforandus est, sed in latere. Ne autem violetur diaphragma, sectio in loco non nimis humili peragenda est, ne diaphragma, quod pleuræ annectitur, & quod in respirando eleuatur. De quibus prolixius agit Hieronymus Fabricius, *loc. allegat.* Ut autem pus commodè effluere possit, sectio loco non nimis alto instituenda, è quo pus non facile effluere possit.

Ex quibus decisio huius quæstionis facile patet. Ij enim, qui inter 5. & 6. costam, aut certè inter 4. & 5. sectionem instituunt, tutissimum locum eligunt. Alias enim si loco humiliore sectio instituat, metus est, ne simul diaphragma lædatur, quod non fit sine periculo, cum pars sit nervosa. Quod ipsum etiam præcaueri iussit Hippocrates, 3. *de morbis*: Quod si, inquit, præ crassitudine humor non fluat, vix spiritum frequenter trahat, & pedes intumescant, & sufficula aliqua adsint, ne te decipiant hæc, sed thoracem pure plenum esse probe noris, proinde in terra Erytriade liquida, vel trita acetipida lintum tenue tingito, eoque thoracem circum circa integio, & quâ parte primum resiccatum fuerit, eâ secato aut vrito, quam proximè ad septum transversum, cauendo tamen, ne hoc ipsum ladas. Qui verò inter 3. & 4. inter 2. & 3. costam sectionem instituunt, locum ad puris euacuationem commodissimum eligunt. Quo enim foramen propius est diaphragmati, pus facilius effluit, sicut videmus, ex dolio liquorem omnem facilius effluere, si verius fundum proximè foramen fiat. Itaque ut hæc concludamus consultiſſimum est, Hippocratis consilium, in 3. *de morbis*, sequi, & explorare, quo loco pus maximè hæreat, & in eo sectionem instituere, quam proximè ad septum transversum, cauendo tamen, ne id lædatur. Et credibile est, diaphragma à puris copia deprimi, ut non tantum eleuetur, quantum in homine sano; & proinde loco etiam humiliore sectio sine periculo & læsione diaphragmatis institui possit. Si verò de hoc dubitetur, & proinde quis tuto omnino agere velit, & Paulum Æginetam at Fabricium ab Aquapend. sequi, is ægrum postea ita locare debet, ut pus commodè effluere possit.

De thoracis etiam in empyemate sectione videatur Vesalius, in opusculo hac de re edito, quod allegat Schenckius, lib. 2. *observ. 131.*

## C A P V T X X,

### De Hydrope pectoris.

Empyemati cognatus affectus est, quem v. d. Gregor. & Hydropem pulmonis ac pectoris nominant. Ut enim in empyemate pus in thoracis cavitate colligitur, ita in hydrope pectoris aqua & serosi humores in cavitate thoracis colliguntur; quibus & ipse pulmo sæpe repletur. De quo Hippocrates, 2. *de morb.* quem locum supra, cap. 9. adscripsimus. Et aliquot morbi huius historias ex variis Autoribus collegit Schenckius, lib. 2. *obs. 52. & seqq.* Vnum etiam exemplum habet Dn. D. Gregor. Horstius, in *epistol. Medic. sect. 11. pag. 44.* annotauitque etiam similem observationem Dn. D. Doringij, lib. 4. *de febr. cap. 12.*

Cum autem affectus hîc, etsi forsân satis frequens, cognitu sæpe satis sit difficilis, ac plerumque mali causa in obstructa pulmonis vasa solum referatur, nam atque alteram eius historiam è Caroli Pisonis lib. *de morbis ex illuvie serosa*, addere libet. Primò refert, Nobilem virum



virtutem annos octoginta jam excedentem sensim gravi difficultate spirandi opprimi cœpisse, & ea, quidem, quæ de nocte potissimum ei negotium exhiberet sub primum somnum. Tum enim suffocationis periculum subito somnum interrupisse, ut è lecto surgere & ad fenestras liberiores aërem captare cogeretur, & spiritum altum traheret, nullibique locorum consistere placide posset. Quæ angustia sensim die proueniente remittebat, & sub noctem iterum vrgebat, in mortui caduere repertus pulmo & præcordia in plurima aqua sepris thoracis interclusa innatantia.

Alius nobilis cum inueterata orthopnœa multis annis ac febre laborasset, morbi vi tandem subito jugularus est. In ejus caduere, præter inflammatorium in hepate tumorem repertus hydrops thoracis, sed in vno duntaxat latere, & pulmo vesicis humore consistente lentoque ac pellucido instar albuminis oui prægnantibus refertus.

### Causæ.

Causa.

Statuunt quidem nonnulli, etiam à cerebro per asperam arteriam serosam illam materiam descendere. Verum probabile non est, tantam copiam à cerebro defluere; & si id fieret, in pulmones destillaret, & diuturna tussis præcessisset, de qua tamen, qui hoc malum incurrunt, sæpe conqueri non solent. Credibile magis est, humorem serosum vel colligi primario pulmonis vitio, dum is frigidus est & debilis, & alimentum suum non bene concoquit, sed in aquosum humorem mutat, vel in toto corpore, vel ac præcipuè, circa hepar & lienem in abdomine colligi, atque inde aut cum ipso sanguine ad pulmonem mitti, aut ex abdominis cavitatibus in thoracem penetrare; quod in hydropicis sæpe animaduersum. Hinc accidit, ut malum quandoque in thorace initium sumat, & tandem in hydropem degeneret: & contra sæpe euenit, ut in hydropicis humor serosus ex abdomine in cavitatem thoracis penetraret. Per quas vias autem humor serosus in cavitatem thoracis penetraret, non adeò planum, & potest id forsitan variis modis accideret. Nam vel vaporis specie humor in cavitatem thoracis penetrare potest, ibique rursus condensari: quod facile fieri potest, cum membrana thoracem intus succingens satis densa sit: vel etiam serum sub propria forma è vasis thoracis, in quibus abundat, ut in ventre inferiore in abdomen: & ut Hippocrates, 6. epid. loquitur, ἀνυπὸν καὶ ἀνὰ τὸν σπλῆνός τε καὶ ἐκ τῶν αἰσθητῶν. Inuenit natura etiam si ratione sibi ipsi vias.

Et pletumque in ventre inferiore causa mali hæret, ac nutritionis viscera scirrhusa aut vesicis aqua plenis refertaprehenduntur: unde etiam pedes intumescunt, facies pallor & cachexiæ signa adsunt. Accedit autem hoc malum præcipuè iis, quibus thorax ac pulmo vel à primo ortu, vel ab occasione aliqua debilis est, & ad recipiendos superfluos humores aptus. An verò etiam à corde vel pericardio humor hic prouenire possit, considerandum Lectori relinquo. Semper enim humor aliquis in pericardio reperitur, qui præter naturam etiam augeri potest, cum sanguis arteriosus admodum serosus sit, & hinc ad thoracem penetrare. Videatur etiam Columbus, lib. 15. anatom. de hydropica, in qua hepar & lien saluus inuentus fuit, abscessus verò & putredo in corde. Et Dodonæus, in anat. cap. 35. observat. Beniuenny.

### Differentia.

Differentia.

Differentia præcipua est, quod aliquando aqua in toto thorace continetur, aliquando in altera saltem ejus parte.

### Signa Diagnostica.

Percipitur in thorace dolor grauius ob materiæ Signa. aquosæ abundantiam, & plerumque sonitus aquæ fluctuantis, dum æger corpus mouet, deprehenditur. Tussis est sicca. Etsi enim materia multa in pectore abundat: tamen natura eam nec coquere, nec ob tenuitatem expellere potest. Respiratio est difficilis, frequens & parua, ægerque quasi suffocari videtur, ob organorum respirationis angustiam, & diaphragmatis à materia incumbente compressione, & inprimis illa in respirando difficultas & crebritas somni primo tempore ægrum subito inuadit. Siris est molesta, ob pulmonem exsiccatum. Etsi enim aqua in thorace abundat, ea tamen falsa est. Appetitus dejicitur: accidunt interdum animi deliquia & palpitatio cordis, color faciei pallidus est, & palpebræ ac pedes intumescunt: latus intrinsecus acutum olet, non tamen semper, si scilicet materia in thorace moram trahat & corrumpatur. Accedit interdum etiam febris, cujus quoque Hippocrates, allegato loco, meminit. Materia enim ista serosa in thorace moram trahens acrimoniam acquirit, tandemque putrescit & febrem accendit.

### Prognosticum.

Malum est curatu difficile & raro sanatur. Ut Hydrops ex caloris natui viscerumque debilitate prouenit, ita & hic ex eadem causa ortum habet. Et licet quandoque morbus spontè solui videretur, erumpente ad aluum aqua: tamen paulò post malum, & quidem grauius, recrudescit, & incrementum paulatim sumit, tandemque in hydropem vertitur ægerque suffocatur.

### Indicationes & Curatio.

Materia aquosa pectus & pulmones replens euacuanda, eiusque generatio, vndeunque etiam proueniat, præcauenda. Et quia humor hic coctionem nullam recipit, eam etiam expectare opus non est, sed statim eum euacuare conuenit iis medicamentis, quæ aquas è corpore educere solent. Ut viæ tamen, per quas effluere debet, aperiantur, commodum fuerit. Hinc etiam Autor libri de morbis, loco supra, cap. 9. allegato, scribit, si materia ad aluum erumpit, ægrum statim sanum & à morbo liberatum videri. Et obseruatum, morbum hunc permutatum fuisse in herniam aquosam, simulque per aluum effluxisse aquam, & sic euasisse ægrum, & integrè restitutum fuisse. Id quod accidit, ubi non ex toto materia ad pectus fertur, nec viscera naturalia, nec pulmones insigniter læsi sunt. Secus enim si res se habeat, temporis progressu aluus incendetur, eademque illa, vel adhuc amplius patietur æger, ut idem Autor, ibidem, loquitur.

Utilia autem hic sunt inprimis mechoacanna, radix gialapa, gummi gotte, succus radicum sambuci ad Vnc. j. vel Vnc. i. sem. sumptus, succus radicum iereos, elaterium ad gr. iii. exhibitum. Educenda est autem materia paulatim, & medicamenta purgantia repetenda sunt: Hippocrates & antiqui etiam sectionem thoracis instituebant, de qua, capite præcedente, dictum. Verum cum ea præsentem solum materiam exhauriat, futuræ autem regenerationem nequiquam prohibeat, si pulmones vel viscera sint corrupta, omnino inutilis est, & Medico ignominiam parit.

Potest tamen etiam serum per urinam euacuari. Atque ab hoc auxilio Cæsar Maximilianus II. plurimum commodi sensit, qui cum pectoris hydrope cum cordis palpitatione ad annos viginti laborasset, vno interdum die ad sex libras minxit, cumque motus ille materiæ impeditus esset, suffocatus est, ut refert ipsius

# 728 De Vertebr. dorsi luxatione & gibbos.

ipſius Medicus, Ioh. Crato, in *epiſt. à Scholiſtio collect.* *epiſt.* 136. Diuretica autem talia proponuntur, de *hydropſe.*

*Aqua D. Doringij.*

Est etiam utilis aqua hæc D. Doringij:

*℞. Rad. calam. aromat. raphani marini, ana Vnc. iiii. ruſci Vnc. i. cortic. & ſem. ebuli, an. ℥. ſem. agrimonie M. j.*

Incisa & commixta cum *hepate & pulmone vituli* infundantur hor. 24. in *aq. apy, corula ſeride, ana lb. iiii. vini Rhenani lb. ij.*

Fiat *℥. a. deſtillatio ſuſpenſa in alembico cortic. citri ſiccior. in nodulo ligat. Vnc. ſem.*

*Cautio.*

Verum etſi modis his omnibus materia quandoque euacuari poſſit: tamen id ſemper tentare adeo tutum non eſt; cum à calore medicamentorum agitata materia difficilem reſpirationem, ſuffocationemque excitare poſſit. Ideoque tutiſſimum videtur, vt materia ſenſibiliter euacuetur, aperto thorace. Et quidem maturè id faciendum, ſecundum præceptum Hippocratis, 6. *epidem. ſect. 7. ὁ δὲ ἰσθμὸς δάσσει τὴν πύλιν, ne ab aqua pulmones corrumpantur.* Materiam euacuandam opera, vt ejus generatio prohibeatur, viſcerumque morbi, intemperies, obſtructio, ſcirrhus, medicamentis, de quibus in doctrina de hydropſe dicitur, emenderetur. Et cum materia ſeroſa facile ruſum generetur, ejus purgatio per interualla repetenda.

*Cauteria.*

Cauteria quoque, in cruribus præcipuè, & fonticuli excitandi per quos ſemper materia aliquid euacuetur.

*Diaſa.*

Viciuſ ratio ſit, qualis hydropicis præſcribitur.

## C A P V T X X I.

### De Vertebrarum dorsi luxatione & Gibboſitate.

*Vertebrarum dorsi luxatio.*

**S**пина dorsi è multis vertebris componitur, quæ peculiari articulatione inter ſe coherent & conſtuntur, vt ad inflectendum, in anteriora præſertim, apta ſint, in quo motu ne ſedibus ſuis excidant vertebræ multis & variis ligamentis firmatæ ſunt. Quandoque tamen cauſarum præternaturalium violentia è ſede ſua exturbantur, & quidem nunc tota, quæ Luxatio eſt; nunc ex parte ſaltem, quæ Subluxatio nominatur.

*Prima vertebra luxatio.*

Et quidem primæ vertebræ caput inſidet, è qua tamen quandoque verſus poſteriora etiam excidit, quo fit, vt ſpinalis medulla comprimatur, mentumque ad pectus ſectatur, vnde & eloquendi & ſpirandi potentia tollitur, homòque ſubito jugulatur.

*Cernicis vertebrarum luxatio.*

Cernicis verò vertebræ & luxantur, & ſubluxantur. Et ſi integrè luxantur, celeriter homo interit. Etenim ſpinalis medulla in prima origine & nervi ab ea oriundi comprimuntur, vnde ſpiritus animales in membra inferiora influere non poſſunt, & ipſa reſpiratio tollitur. Subluxatio verò fit in partem anteriorem, & tum collum diſtorquetur, caput moueri nequit, facies liquet, locus affectus dolet, & ſpirandi ac loquendi difficultas adest. Malum tamen minus periculoſum eſt, quàm luxatio. Statim verò iis occurrendum, Quod ſit, ſi æger in humili ſella ſedeat; Chirurgi verò miniſter toto corpore ſcapulis & humeris ægri incumbat. Chirurgus autem caput vtrinque ad aures comprehenſum concutiat, & in omnem partem moueat, donec vertebra ſuo loco reſtituatur. Quod vbi factum, dolor ſtatim remittit, caputque iterum moueri poteſt.

*Gibboſitas.*

Frequentiſſima verò luxatio dorsi eſt, quæ in genere Gibboſitas nominatur, & qui ea laborant, Gibbi dicuntur. Luxatio autem iſta non eſt ejusdem generis. Luxantur enim vertebræ vel extra, vel intrò, vel ad latera alterutrum. Et quidem ad latera id fit frequenter; extra frequentiſſime, intrò rariſſime, eà de cauſa, quia

in ſpinæ parte, quæ cavitatem thoracis ſpectat, inter vertebras eſt cartilago multa & craſſa, quæ prohibet, ne ſpina facile verſus anteriora luxari poſſit, in reliquis verò poſitionibus nullum adest impedimentum.

Cum verſus exteriora vertebræ luxantur, & ſedibus ſuis excidunt, tumor in dorſo apparet, malumque hoc propriè Græcis *κύλινος, κύβωσις & ὕβωσις*, Latinis Gibboſitas nominatur. Si verò verſus anteriora fiat luxatio, cavitatem in dorſo apparet, tumor verò ante & circa ſternum, & tum *λόρδωσις* appellatur, quod verterunt Repanditatem, Recuruitatem & Gibboſitatem ad interna. Si autem in latera alterutrum fiat luxatio, dicitur *σκολιωσις*, Obliquatio & Tortuoſitas.

Galenus, 3. *de artic. ſexti. 2. & 6. aph. 46.* quantum adhuc vitium vertebrarum ſpinæ dorsi adiungit, quod *σπίσις*, id eſt, Quallationem nominat, quando vertebrarum junctura & compages dimouetur, vertebræ tamen in ſede ſua manent. Quod malum, aut certè huic cognatum, forſan eſt illud malum, quod Germani *das Vveheihun* appellant, & quod nonnulli frequenter pati dicuntur. Conqueruntur hoc modo affecti de dolore dorsi & circa ventriculum, appetitus deſicitur, nonnulli vomunt, caput dolet, nonnullos etiam & præcipuè infantes calor quaſi febrilis corripit, imò ſæpe febris ſatis magna, quæ ob ſymptomata conjuncta malignam quandoque ſimulat. Atque hoc ſibi accidere dicunt, cum graue onus aliquod ſuſtulerunt, vel alio modo vehementer & inordinatè ſpinam dorsi mouerunt aut inflexerunt.

Curandi rationem hanc habet. In infantibus candellam ceream accenſam ymbilico applicant, & ollulam imponunt, tamque inſtar cucurbitulæ affigunt & adharere permittunt, donec ſpontè decidat. In adultioribus verò quaſi luxationem hoc malum curant, atque alij aliter. Plerique brachia decuſſatim pectori injiciunt, manibus in tergum reflexis, quas alius à tergo ſedens, & genua ſua dorſo applicans apprehendit, ægrumque hoc modo concutit, donec quidam ſtrepitus audiatur. Tum enim vertebris ſuam compagem reſtitutam eſſe dicunt. Exhibetur etiam cum commodò *unguentum rubrum potabile, oculi cancrorum*, & ſimilia, quæ lapſis & percuffis exhiberi ſolent medicamenta. Mulierculas etiam ſæpe falſò ad hoc malum præcipuè in infantibus, recurrere ſcio, & licet infantes ſcleribus laborant, id huic malo impurant. Si quid tamen tale ſeu infantibus, ſeu adultis reuera accidit, cauſa eſt *σπίσις* ſeu quallatio vertebrarum ex cauſa aliqua violenta, & quidem vndecimæ vel vicinæ alicujus vertebræ, vbi oriſcium ventriculi dorſo alligatur, è cujus & membranarum id dorſo anneſcentium extensione præter naturam iſta ſymptomata oriri credibile eſt.

Nonnulli adhuc quintum genus addunt, curuitatem ſcilicet, quæ decrepitis accidit, quod tamen potius incuruitas, vt dixi, quàm gibboſitas, nominandum; cum iis, qui corpore ſunt præcero, in decrepita ætate corpus in anteriora incuruetur, vertebris quidem non luxatis, ſed torâ ſpinâ incuruatâ.

### Differentia.

E quibus, quæ luxationis vertebrarum ſint differentia, patet. Addo & hoc, quod aliquando ea accidit in thorace, aliquando ſub diaphragmate.

### Cauſa.

Cauſæ à quibus vertebræ loco ſuo dimouentur, ſunt vel Externæ, vel Internæ. Externæ ſunt caſus, percuffio, inflexio nimia, & ſimiles cauſæ violentæ. Quò pertinet etiam nutricum imprudentia, quæ infantes falſiſ nimis ardè aut inæqualiter conſtringunt,

*κύλινος, ſeu gibboſitas.*

*λόρδωσις, ſeu repanditas.*

*σκολιωσις, ſeu obliquatio.*

*σπίσις, ſeu quallatio vertebrarum.*

*Cernicis.*

*Cernicis decrepitorum.*

*Differentia.*

*Cauſa. Externa. Nutricum incuria in infantibus ſcleribus conſtringentia.*

gunt, aut in brachiis gestant, antequam spina tam firmata est, ut erecti sedere possint, aut si, dum infantes à cunis eleuant, dorsum manu altera non fulciunt. Huc referenda est & vestium nimia constrictio, ob quam causam puellæ gibbosæ interdum fiunt, dum matres, ut eas iunceas reddant, thoracem arctius & violenter constringunt. Consuetudo etiam frequenter corpus in partem anteriorem vel latera flectendi malo huic materiam præbere potest.

Causæ Internæ sunt, primò nativæ & vitiosæ in utero conformatio; unde etiam sæpe hæreditarium malum est. Deinde humores vitiosi, qui ligamenta spinalis medullæ laxiora reddunt, siue aliunde affluant, sicut id à capite factum esse annotavit Guilielmus Fabricius, *cent. 1. observ. 45.* siue circa spinam à nativæ vel ascititiæ eorum partium imbecillitate colligantur. Quò facit maximè ligamenti nervosi, quo vertebræ connectuntur omnes, debilitas. Id enim cum renaci & glutinoso humore ob motus vertebrarum commoditatem circumfusum sit, ei nonnunquam alius frigidus crassus humor per catarrhos commiscetur, unde ligamentum hoc & nexus vertebrarum laxior redditur, vel tumor excitatur. Tertio tumor intus ad spinalem medullam natus, de quo Hippocrates, *16. aphorism. 46.* Talia enim tubercula, ut & musculi adjacentes, si intumescant, vertebras loco suo dimouent. Trahuntur autem & dimouentur à talibus tumoribus vertebræ nunc intrò, nunc extra, pro situ tumoris. Si enim tumores duo obsideant ligamenta interna duarum aut plurium vertebrarum, inter quas una, duæ aut plures interjectæ sunt vertebræ nullo tumore occupatæ, tum vertebræ à suis ligamentis tumensibus trahuntur, compelluntque vertebras, quæ sunt intermediae, à suo loco dimoueri, & fit *κωλύσις*, perinde ac ramus viridis, si ejus duo extrema in se contrahantur in medio curuatur. Si verò vnus vel duo, vel plures tumores, inter quos nulla interjecta est vertebra, adsint, ligamenta, quæ occupant, ad se trahunt in partem anteriorem, & sic simul vertebra intrò trahitur, & fit *λόρδωσις*.

### Signa Diagnostica.

Malum hoc visui & tactui patet. Et quod vertebræ suo loco motæ sint, & quo in loco, visu & tactu explorari potest. An etiam vertebræ versus interiora vel exteriora vel ad latera luxatæ sint, visu dignoscitur. Symptomata tamen etiam prouenientia mali ejus qualiteram edocent. In *κωλύσει* vertebrarum thoracis spiritus difficulter & cum sono trahitur, sternum fit strictius. In *λόρδωσει* maxima adest spirandi difficultas, mouendique in partibus inferioribus impotentia. In *σκολιώσει* plerumque excitatur paralytis in parte luxata, & conuulsio in opposita. Quibus spina ad lumbos gibba est, renum & vesicæ vitia superueniunt, & plerumque sunt infœcundi. Ad paralytin tamen partibus inducendam inprimis modis luxationis multum potest. Si enim luxatio fiat repente & sit magna, compressa spinali medullâ, & nervis inde oriundis, accidit paralytis. Si verò sensim vertebræ luxentur, interim spinalis medulla, quæ mollis est, extendi potest, unde nihil mali patiuntur. Qua de re videatur Galenus, *4. de loc. affect. cap. 3.* Symptomata, quæ ex luxatione duarum vertebrarum lumborum ex lapsu ab arbore superueniunt, recenset Guilielmus Fabricius, *cent. 5. observ. 680.* Post casum, inquit, superuenit dolor acerbissimus, qui longum tempus durauit, cibum indigestum euomit, nihilque cibi & potus per aliquot dies retinere potuit. Febris quoque ardentissima, sitis inexhausta, vigiliæ, inquietudo, ariditas linguæ, tandemque delirium superuenit, Strati-

timque post casum inferiores partes corporis ab umbilico paralyti correptæ fuerunt; quapropter nec excrementa alui, nec urinam continere potuit. Gibbis plerumque anhelitus fœtet; quia, ut Aristoteles docet, thorax est angustior, quam ut pulmones satis dilatari possint, unde humores & vapores in eo corrumpuntur.

### Prægnostica.

1. Morbus hic est curatu difficilis, præsertim si malum amplius non sit recens, & sæpe est incurabilis.

*Prægnostica.*

2. Hæreditaria, & quæ à primo ortu & conformatione obtingit, gibbositas incurabilis est.

3. Quæ à caussâ externa fit gibbositas, sæpe est sanabilis, at quæ ab interna, vix vnquam sanatur.

4. Si plures vertebræ ordine sese consequentes simul luxentur, minus periculosum malum est, quam si vna saltem luxetur. Vna enim vertebra si saltem luxetur, cum in acutum angulum desinat, spinalem medullam comprimit, & eam valde lædit. Si verò plures vertebræ simul luxentur, & obtusum angulum efficiant, minus spinalem medullam comprimunt.

5. Luxatio integra longè periculosior est, quam subluxatio, quia grauiora symptomata infert.

6. Luxatio intransum facta ferè habetur pro incurabili ab Hippocrate, *libr. de artic.* Paula Aegineta, *libr. 6. cap. 117.* Auicenna, *libr. 4. fen. 5. tract. 1. cap. 21.* Quomodo enim quis ab anteriore parte per ventrem coactionem facere possit? Guilielmus Fabricius tamen, *cent. 5. observ. 69.* id non planè pro impossibili habet, & modum curandi ibi proponit, ut infra diceretur; sed videtur difficilis, modò non sit planè impossibilis.

7. Quicumque gibbi ex asthmate vel tussi fiunt ante pubertatem, moriuntur. Hippocrates, *6. aphorism. 46.* Calor enim circa annos pubertatis auctior maiorem & liberam respirationem requirit: ipsa quoque viscera in thoracis cauitate, cor & pulmo, augentur. Quia verò tuberculum in maiorem molem excrescit, & ipse thorax non fit amplior, impedita spiratione calor insitus paulatim languescit, tandemque suffocatur. Et cum ob ipsam asthmaticam dispositionem difficilis fiat respiratio, malum duplicatur, gibbositate accedente, ut non sit mirum, hominem in adoleſcentia mori.

8. Qui verò gibbi fiunt ex aliis causis, quam humoribus frigidis, ut tussi, ietu, humorum defluxu, non necessarîo tam brevis vitæ sunt, sed sæpe diu viuunt.

9. Qui verò gibbi fiunt post pubertatem, cum in iis thorax jam naturalem magnitudinem habeat, non tam citò moriuntur.

10. Quicumque ab infanzia statim gibbi fiunt, iis costæ vel parum, vel nihil in latum crescunt, sed foras antrosum porriguntur, unde pectori sua latitudo decedit, atque inde fiunt astmatici, pulmonibus compressis. Quin etiam ceruicem ad magnam vertebram in anteriorem partem recuruatam habere coguntur, ut & his caput prouum sit. Id igitur magnam faucibus angustiam exhibet, cum intrò vergat.

### Curatio.

Indicatio hîc vnica est, vertebram sua sede, è qua prolapsa est, restituere, id quod in tenellis corporibus fieri potest, in luxatione extrorsum facta, si spina dorsa, qua ad extra gibba est, quotidie ab axillis ad os sacrum versus leniter manibus intrò comprimatur. Iisdem corporibus adhiberi possunt thoraces ferrei, quibus vertebræ ad sua loca intrò comprimuntur & compelluntur, qualem depinxit Ambrosius Paræus, *lib. 22. cap. 8.* vel saltem lamina ferrea thoraci insuitur,

insuitur, & emplastra & inunctiones ex medicamentis nervos roborantibus & consolidantibus adhibentur; de qua vide Guilielmum Fabricium, *cent. 5. observ. 67.*

In adultis verò gibbositas non nisi Chirurgiæ opera, & plerumque per peculiaria instrumenta, quæ depingere facilius, quàm describere, curantur. Quæ de re videatur Hippocrates, 3. de articul. & Galenus, in comm. Oribasii, de machinis cap. 35. Paulus Aegineta, lib. 6. cap. 117. Cornel. Celsus, lib. 8. cap. 14. Paræus, lib. 15. cap. 15. & 16.

Luxationis verò spinæ dorsæ ad interiora curatio ab omnibus penè habita est pro impossibili. In corporibus tamen tenellis, si malum sit recens, emplastra fortiter adhaerentia applicari possunt, quibus avulsis spina versus exteriora retrahi potest; de quibus dictum, lib. 1. p. 1. cap. 20. de cranij depressione, & etiam capite 25. dicitur.

In adultis verò etiam aliquid tentandum censet Guiliel. Fabricius, *cent. 5. observ. 69.* primò quidem extensione, & spinæ ejusdem nunc in dextrum, nunc in sinistrum latus concussione, & ventris in altum elevatione, per instrumenta ab Oribasio & Paræo locis allegatis, depicta. Deinde dorsæ incisione, usque ad vertebram luxatam, & vertebræ, quæ post incisionem tenaculis aptis in appendice deprehendenda est, in altum elevatione. Verùm modus hic tutus vix videtur, & pauci tam ancipiti curationi sese subjiciunt.

## CAPVT XXII.

## De Fractura Spina, &amp; Vulneribus spinalis Medullæ.

Fractura  
spina.

**I**nterdum etiam accidit, ut à causis externis & violentis spina dorsæ, & ejus vertebræ frangantur & contendantur. Fractura plerumque lethale malum est, ob spinalis medullæ & nervorum læsionem. In contusione hoc usurpetur Cataplasma:

Contusio  
spina.

*℞. Farin. hordei, fabar. an. Vnc. i. semin. fœnigrac. Vnc. sem. pulv. flor. chamamel. absinth. cumini, an. Drac. ii. croci Scrup. sem. rad. consolid. major. minoris, ana Vnc. j. sem.*

Radices ad mollitiem coquantur & per seraceum trajiciantur, postea adde reliqua, & fiat s. a. Cataplasma.

Vulnera  
spinalis  
medullæ.

Si spinalis medulla vulnerata sit, cum ex ea partes inferiores nervos accipiant, inferiores partes omnes vel resolvuntur, vel conuelliuntur, malumque est periculosum, quia cerebrum in consensum trahitur, ac dolor & febris excitatur, raroque ægri, præsertim si vulnus sit magnum, convalescunt. De quo etiam Hippocrates, 2. prædict. Si spinalis medulla aut ex casu, aut aliâ quâpiam causâ externa, aut suâ sponte laborarit, & crurum impotentiâ facit, ut ne tactum quidem percipiat æger, & ventris & vesicæ, adeò ut primis quidem diebus stercus aut urina nisi coactè reddatur. Quod si morbus inualuerit, & stercus & urina agro inscio prodit, tandemque non longo post intervallo perit.

Cum autem spinalis medulla quasi cerebrum oblongatum sit, eadem etiam medicamenta ei, quæ supra, lib. 1. part. 1. cap. 24. de vulner. cerebri proposuimus, adhibenda.

## CAPVT XXIII.

## De Tabæ Dorsali.

Tabes  
dorsalis.

**F**acit etiam Hippocrates, lib. 2. de morbis, mentionem tabis dorsalis. Dorsalis tabes, inquit, ex spinali me-

dulla aritur, præcipuè verò recentes sponsores & libidinosos corripit. Febris sunt experies, benè comedunt & colliquantur. Quod si ita affectum perconteris, asseres, sibi videri ex superioribus partibus à capite velut formicas in spinam demitti, cumque urinam aut stercus reddis, semen genitale copiosum & liquidum ei prodit, neque generatio fit, & inter dormiendum, cum uxore dormiat, nec ne, Veneris ludibria patitur. Cumque aliàs, tum præcipuè per locum arduum iter fecerit aut ecurrerit, anhelosus & imbecillus evadit, caput granatur, & aures sonat. Hic temporis progressu vehementibus febribus correptus perit ex lippitya febre.

Quatuor autem, ut, in commentario, addit Petrus Salius Divesus, tabis dorsalis apud Hippocratem occurrunt differentiæ. Prima est ex nimia Venere; altera, ex sanguine copiosiore in spinalem medullam irrudente; tertia, ex ejusdem resiccatione; quarta, ex prava destillatione in eandem incumbente.

Primam differentiam quod attinet, potest illa confirmari historiâ Saryri, 6. epid. sect. 8. text. 52. qui cognomento Grypalopax vocatus, annos 25. natus non solum sæpius per somnum genitale semen excrevit, sed & per diem illi multoties promanavit. Cum autem jam annum trigessimū attrigisset, tabe correptus mortuus est.

Hippocrates morbi hujus causam proculdubio hanc esse statuit, quod semen ex cerebro per spinalem medullam ad membra genitalia proveniat, ut, ex lib. de aëre, aquis & locis lib. de genitura & natura pueri, videre est; quæ de re hîc non disputo. Hoc tamen certum est, & totum corpus ex nimio seminis profluvio contabescere, & cerebrum insigniter lædi, & proculdubio etiam spinalem medullam, quæ cerebrum oblongatum quasi est; unde succedit tanta corporis impotentia; ut ex omni motu validiore, ut cursu vel in locum acclivem adscensu difficultas spirandi sequatur. Etsi verò in principio nulla adsit febris: temporis tamen progressu, & facultatibus omnibus debilitatis febris tandem putrida succedit, quæ plerumque est malignarum genere, in quibus interiora vruntur, exteriora frigent. Vniuersalibus autem præmissis Hippocrates lac asininum, deinde bubulum per 40. dies præbet, & postea cibis mollioribus, ipsum reficit.

Secunda tabis dorsalis differentia est, cum calor spinalis medullæ insitus à copiosiore sanguine obruitur & ferè extinguitur.

Tertia, cum oclusis meatibus, per quas nutrimentum ad eam defertur, exsiccat.

Quarta, cum prava destillatio in eam decumbit; cuius exemplum habetur apud Guilielmum Fabricium, *cent. 1. observ. 45.*

De ista tabe dorsali pluribus agit Balduinus Rosseus, epistol. 32. quæ etiam, tract. de scorb. epistol. 4. habetur, quam hîc proponere libet, Morbus, quem Græci λόρδωσι, Latini Lumbaginem appellant, est Hollandis tum propter rationem victus, tum loci ipsius qualitatem vliginosam prorsus, familiaris planè, ac propemodum indigena, quanquam & aliis locis illos soleat inuadere, qui immoderatiore viuntur Venere. Nam, sicuti, lib. 2. de morbis, auctor est Hippocrates, corripit maximè sponsores, atque Veneri deditos, proditque ipsis genitale semen multum ac liquidum, & genitura in utero non manet, & in somnis semen profundunt, siue dormiunt cum uxore, siue non. Verùm hanc tabis dorsalis speciem, sicuti puto, non est quod metuamus: quando verisimile magis sit, morbum tum originem traxisse à materia pinnitosa sanguini, aut flatibus, aut melancholia mixta, per modum catarrhi à capite per venas in spinalem medullam defluente. Siquidem cum septem sint catarrheumaton, aut defluxionum species, ut auctor est, de glandulis, Hippocrates, quibus cerebrum sese exonerare solet, per nares dico, per aures, per oculos, per palatum in guttur ac gulam, ac reliqua per venas in spinalem medullam, & sanguinem; necessum est, locum, in quem defluxio decumbit, variè affici, pro materia ipsius

Differentia.

Prima.

Causa.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Lumbago.

Catarrhi septem spec.



ipsum tum qualitate, tum quantitate. Nam si recrementa aut sordes, quæ à cerebro in aliam partem defluunt, non prorsus malignæ sint, ac quantitate pauca, dolor ipse & affectus talis erit, qui à natura facile euinci ac discuti possit: si recrementa tum qualitate, tum quantitate peccant, credendum est, eadem gravissimorum symptomatum occasionem præbitura. Ac proinde quoniam reliquis sex omissis, de ea tantum defluxionis specie, quæ à capite per venas in spinalem medullam decumbit, nobis sermo est: sciendum est, quod quoties frigidi ac lentī humores in spinā defluunt, vicinas partes primum occupare, atque afficere, quæ nisi ita robusta sint, ut conceptam materiam statim euincere, ac dissipare possint, easdem ad subjectas, ac maxime vicinas partes vicissim transmittunt, quæ dum nervosum genus distendit, gravissimis doloribus totum hoc corpusculum lancinat, incipiendo à scapulis, & sensim serpendo ad lumbos, atque interdum etiam ad ipsum os coxendicum. Atque ita affecti vix progredi, aut sese loco mouere possunt, quam affectionem proprie Lumbaginem, aut lōp-don vocamus. Si quis tamen Neotericorum Guttam dicere malit, quod tanquam gutta à cerebro defluat humor, rectius fecerit, quam ille, qui generaliter ad omnes articulorum dolores gutta nomen accommodare voluerunt. Habet autem hoc cum quartana commune, quod omnibus anni temporibus innadat, ætate tamē sit breuior, autumno longior, maximeque si hyemem attingat. Ceterum si acrior simul, & tenacior sit humor, qui à cerebro defluit, atque maiore cum impetu feratur, jam non solum in subjectam spinam decumbit, verum etiam in acetabula ossis coxendicis, ac tum demum tabem dorsalem, aut spinalem, aut ossis sacri dicti Hippocrati, conciliat, malum tale, in quo vitam cum morte commutare pro solatio est, quando semper magis ac magis ingruentibus doloribus, requiei tempus nullum conceditur, siquidem, ut libro de glandulis, Hippocrates ait, oritur morbus, ex defluxione capitis per venas in spinalem medullam, inde autem in os sacrum impetum facit, quod medulla ipsa fluxionem producit, & in coxendicum acetabula seu iuncturas deponit, & si tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo contabescit, & vivere non expetit. Statim enim scapula dolent, ambobusque pedes & crura consequuntur, & semper tandem pereunt multo tempore curati, atque sic deflorescit homo & moritur. Habet præter cetera cum reliquis tabidis commune, quod autumnum ei magna ex parte exitialis sit, verum autem ad pharmaciam opportunissimum. Porro quod spinalis medulla arescat, atque marcescat, in causa est obstructio orificiorum, ac venarum, atque vasorum à cerebro ad spinam sanguinem atque spiritum deferentium; quo fit, ut curandi methodus in eo consistat, ut reseratis poris materia peccans euacuetur. Quod si pletoricum quoque corpus sit, primum tundenda erit vena, aut humeraria brachij dextri, aut media sinistri, aut etiam, si usus exigat, poplitis, & si forte tumeant ora illa venarum, quas hemorrhoidas Græci appellant, consultum erit easdem, aut admotis sanguifugis, aut alio quouis modo adaperire. Solet enim, ut ante diximus, lumbaginis causa esse humor melancholicus, qui quamvis crassior esse videatur, quam ut commodè ad spinam transmitti possit: quotidiana tamen experientia ita fieri posse docet, quando lienosis lumbaginem indies superuenire conspiciamus, quemadmodum in sceletyrbe nostra annotauimus. Et Galenus, commento tertio in primum protheticon Hippocratis, idem aperit demonstrat, dum dicit, lumbis dolentibus expectandam euacuationem per hemorrhoides, quod propter earundem retentionem non raro doleant lumbi, magisque si ejus temperatura, qui ita afficitur, melancholica sit, aut si abscedentes, ut sic loquar, precedentis morbi reliquia, ad ora illa venarum delata exitum non habeant.

Curatio Lumbaginis. Post sanguinis igitur missionem decoctis res tentanda est, quæ materiam fluidam reddant: deinde medicamenta purgantia, pro humoris peccantis ratione propinanda erunt, incipiendo à clementioribus, habita semper ratione capitis, tanquam partis primariæ affecta. Deinde si res

exiget, fortioribus etiam utendum erit, in quem usum claterium suum Hippocrates summè commendatum habet. Ego magis probarim globulos ex agarico, cum surperhi portione aliqua maceratos, idque aut in decocto foliorum sene, cui nonnihil seminis aut fœniculi additum sit, aut alio quouis, prout res exigere videbitur. Post purgatum corpus consultum erit fomentationibus, frictionibus, inunctionibusque uti, quæ simul & euocent materiam, & dolorem mitigent, & robur addant affectæ particula. Poteris etiam in eundem usum, si locus, tempus & agri consuetudo admittant, preparari balneum, aut aqua dulcis, aus quod artificiosè confectum sit, ex verbena, rosæ, salvia, libanotide, chamamelo, meliloto, atque aliis id genus aqua incoctis. Quod si per se non satis fluxa sit alvus, suadet Hippocrates, ut eandem, injecto lacte, eluamus. At si forte humor tenacius inhaerit, atque alius quodammodo impactus fuerit, ac status utcumque fuerit particeps: non solum jam dictis hypothefibus exequendum erit negotium, verum etiam medicamentorum illas cucurbitulas in usum vocare par erit, ut videlicet humor ille, earundem attractione, foras euocetur, cautione interim habita, ne copiosior sit materia, quam ut commodè per easdem educi possit, siquidem alioqui periculum esset, ne novus quidam fomes morbo suppeditaretur. Viçtus ratio incidens, atque attenuans, & quæ non omnino tenuis sit, injungenda est. Protenditur enim malum hoc, ut reliqui articulares morbi, ad minimum, in vigesimum diem; ut plurimum, in quadagesimum: quanquam non raro metas has excedat. Potus sit interim vinum ôλκωπό, or, quod nos villum dicimus, vel cereuisia tenuis, diligenter cocta. Somnus sit temperatus, & qui concoctioni ciborum sufficiat. Nihil enim catarrhis obnoxium reddit cerebrum. Exercitium moderatum esto pro virium robore, ac tolerantia ratione citra defatigationem. Hæc Ronslæus.

## CAPVT XXIV.

## De Vermibus dorsi.

VT vermes in aliis corporis partibus pluribus, ita *Vermes dorsi.* quandoque etiam in dorso generantur in infantibus, nonnunquam etiam in brachiis, imò quandoque & in aliis externis partibus, (cū autem in dorso præcipuè nascantur, de iis hoc loco agere libet) quos nonnulli Crinones nominant, alij Dracunculos, ob similitudinem cum Dracunculis, qui Ægyptiis & Indis sunt familiares, & ut Aërius, *tetrab. 4. serm. 2. cap. 85.* & Paulus, *l. 4. c. 59.* testantur, in musculosis corporis partibus, brachiis, cruribus, lumbricorum formâ sese exerunt; quorum capita apprehensa si trahantur, vehementem dolorem excitant. De quo affectu Auicenna, *l. 4. fen. 3. tr. 23. cap. 21. & 22.* Guido de Cauliaco *Patrus, l. 7. chirurg. c. 21.* Scholtzius, in *epist. med. epist. 27.* Reusnerus, *Vviers, in tract. Germ. de Dracunculis.* Forestus, *observ. medic. l. 20. in fine.* Germani *Mireffer.* quod alimentum infantium absumant, nominant. Qui enim hoc morbo laborant infantes, contabescunt fere, & licet satis comedant, & aliâs benevaleant, non nutriuntur, & pruritum molestissimum in dorso percipiunt.

Generantur autem hi vermes ex materia viscosa in venis capillaribus, præcipuè in dorso, conclusâ subter cutem, & ob cohibitam transpirationem in hoc vermium genus transmutata. *Causa illorum.*

Cognoscuntur autem hi vermes & sui suspicionem præbent, dum infantes quidem comedunt, sed non rectè nutriuntur, & ferè contabescunt, & sunt inquieti, ac pruritus sentiunt molestissimum, & sæpe lancinatione indefinente admodum diuexantur, ac quasi spinularum aculeis punguntur, ita, ut huc illuc sese jactantes quieti manere non possint. Quæ res ut certius cognoscatur, infantes in balneum & sudatorium inferendi, & manibus fortiter fricandi. (Potest etiam panis

Curatio.

panis cum melle pro frictione adhiberi.) Ita enim quasi capilli quidam cineritij aut nigricantes è cute prorepunt.

Curacionem quod attinet, refert Andreas Dudithius, in *epistol. medic. à Schol. 1210 collect. epist. 27.* in Polonia in labrum aquæ calidæ, in quo pueri lauuant, iniici panis in micæ friari manipulum, cineris item parum, lotis infantibus aquam percolari, & panem illum in massam compingi, quæ, ubi in diuersas partes manibus distrahitur, magnam subtilissimorum pilorum vim oculis offerat primo die, posterioribus diebus pauciores, postquam conualescunt infantes, planè nullos.

Noltris vlitatum est, dorsum, vt & brachia, si opus sit, linimento ex farina triticea & melle confecto inungere, & partes illas bene fricare.

Alij *℞. Radic. bryonia Vnc. ii. Coqu. in lixiuio è cineribus quernis parato* in formam puliculæ, quæ pueros illinunt.

Vbi vermiculi illi capitella sua instar pilorum, vel feminis papaneris è poris cutis exserunt, nouacula acutâ statim detruncâda sunt, ne iterum retracta sese abscondant. Alij sterus gallinaceum sacculo inclusum in lixiuio per noctem macerant, & postero die infantem vique ad collum ed immergunt, ac peracta sudatione melle inungunt, tandè quæ nouaculam adhibent, infanti semen nasturtij præbent, ter illud reperendo. Atque id aliquoties interjectis aliquot diebus repetendum est, donec frictione illâ nihil amplius eliciatur. Mulierculæ certos dies & dierum interuallum eligunt, sed superstitiosè.

Accidunt & alij morbi interdum spinæ ac dorso. Ita Columbus, *lib. 15. anat.* vertebram primam occipiti planè adhaerentem obseruauit. Ex abscessu in dorso pediculos erupisse refert Forestus. Fabro cuidam lignario in abscessu quinquaginta oua (seu vesiculas) tenuissimâ membranulâ obducta, intrus limpidissimâ aquâ plena reperta fuisse, refert ex relatione Laurentij Scholtzij Schenckius, *lib. 5. obseru. 46.* Cornua quoque in dorso innata fuisse obseruatum est; cuius rei exempla annotauit idem Schenckius, *loco allegato, obseru. 50.*

quod, *capite precedente 23. propositum*, vel Diachylum iracum. Vide Paræum, *lib. 15. cap. 20.*

### Fractura Costarum.

Franguntur quoque interdum costæ iridem ex causis violentis, calu vel percussione.

Signa ejus rei sunt, quod quædam inæqualitas & cauitas tum visu, tum tactu deprehenditur, strepitus quoque quidam auditur. Quibus accedunt & alia symptomata. Adest dolor grauis, & præcipuè si internæ costæ pars fracta sit, isque pleuriticorum dolorem æmulans, respiratio est difficilis, tussis molesta, & nonnunquam etiam sanguinis spurcum superuenit, dum ex vasis ruptis sanguinem effluentem pulmo imbibit, febris accedit. Præcipuè verò duo mala fracturam costarum comitari solent. Primum est carnis superjacentis costæ inflatio, quæ & tactu & visu deprehenditur, & si manu locus comprimatur, æris cedentis strepitus auditur. Cui nisi succurratur maturè, inflammatio, & febris atque abscessus succedere solet. Cujus rei causa est carnis ab ossè separatio, & imbecillitas partis ictu inducta, quæ alimentum, quod doloris ratione attractum copiosius affluit, satis concoquere nequit, quod partim crudum ideo remanet, partim in vapores & flatus resoluitur. Malum hoc interdum & costarum corruptio sequi solet. Cum enim caro ab ossè abscedit, succedit in locum aer, cuius contactu os offenditur & corrumpitur.

### Prognostica.

1. Equidem per se vacat periculo costarum fractura: verum quoniam graua, quæ diximus symptomata contusionis carnis circa costas accidunt, ea de causa periculo non vacat, imò quandoque lethalis est.
2. Quò pauciora symptomata praua adsunt, eò malum mitius est; quod fit, ubi costa solum fracta, non verò intrò compressa est. Solet autem costa per callum die vigesimo coalescere & ferruginari.

### Curatio.

Costa fracta primò rectè componenda & coniungenda est; secundò ejus per callum vnitio procuranda; tertio symptomata, & præcipuè carnis inflatio, auerenda.

Primò quidem videndum, an tussis & spiritus retentione, an verò manuum operâ fracta costa in locum suum restitui possit. Quod nisi succedat, emplastrum aliquod attrahens, & quod adhæret, qualia supra, *lib. 1. part. 1. cap. 20.* sunt proposita, imponendum, & cum impetu auferendum, vt costa in locum suum reducat. Conueniens huic vsui etiam est hoc Emplastrum.

*℞. Farina volatilis Vnc. ii. tragacanth. thuris pulu. an. Drach. v. visci querni (glutinis scil.) 3. vi. ichthyocoll. Drach. i. sem. album. ouor. Vnc. ii. Aqu. rosar. q. s. Misce.*

Vel Emplastrum ex terebinthina, resina, pice nigra, farina hordei vel fabarum, mastiche, aloë compositum. Et talia emplastra sæpius applicanda & auellenda sunt, donec æger melius spirer. Et memini me ante aliquot annos victori, cui in latere dextro à perrica, quam pro dolij vinculo parando flectere volebat, reciprocante, costa fracta & depressa erat, ita, vt difficulter respiraret, tussiret, nec se erigere valeret, tali emplastro imposto costam in suum locum reduxisse.

Nonnulli quidem cucurbitulis costas fractas in locum suum reducere conantur: verum improbant id plerique Medici; cum mens sit, ne plus humoris attrahatur, & aliàs caro supra costas inflari soleat. Si verò fragmentum costæ membranam pungat, atque inde acerbissimi dolores & alia praua symptomata oriantur, atque ipsa mors ingruenda sit, pars, quæ costa fracta

Vertebra prima capiti admodum.  
Pediculi in dorso.  
Oua in dorso.

Cornua.

## CAPVT XXV.

### De Luxatione & Fractura Costarum.

#### Luxatio.

Costarum luxatio.

Costæ etiam interdum à percussione vel lapsu luxantur, nunc supra, nunc infra, nunc intrò. Si supra vel infra, vel si in latus luxatio sit costæ, inæqualitas visu & tactu deprehenditur & hinc cauitas, illinc extuberantia apparet. Si intrò luxata sit, saltem cauitas apparet.

Eius symptomata.

Sequuntur autem varia luxatas costas symptomata, difficultas spirandi, thoracem mouendi, & corpus erigendi, dolor pleuritidem referens, musculoræ carnis, quæ costæ superjacet, inflammatio.

Curatio.

Costa autem vt quamprimum sedi suæ restituatur, danda opera. Si luxatio sit in latus superius, æger rectus suspensus ex januæ vel fenestræ alicujus parte superiore brachijs statuatur, & costæ capitulum eminens comprimatur, donec in locum suum redeat. Si verò versus inferiora luxata sit costa, æger pronus incuruetur manibus supra genua innixus, & costa, quæ eminet, comprimatur, ac in locum suum compellatur. Si verò intrò facta sit luxatio, manus opera nihil præstare potest, sed emplastrum aliquod attrahens apponendum, qualia supra, *lib. 1. part. 1. cap. 20. de cranij depressione*, sunt proposita. Et talia emplastra non semel sed sæpius applicanda & auellenda sunt.

Si inflammatio carnis superjacentis adsit, cataplasma aliquod conueniens imponatur, quale etiam est,

fracta est, incidenda, ut fragmenta purgantia vel eximere, vel præcidere liceat. Si etiam contusio adsit, vena secanda, ne inflammatio accedat.

Costis in locum suum reductis natura quidem sponte callum generat: cui, ut subueniatur, emplastrum aliquod ad fracturam ossium conueniens imponendum, inter quæ & hoc valde celebratur:

*℞. Pulv. myrtill. rosar. rubr. ana Vnc. i. farin. bordei, orobi, lentium, fabarum, mastich. ana Drach. ii. cupular. glandium, nucum cupressi, cortic. granat. balaust. ana Vnc. sem. hypocistid. acacia, cortic. thuris, sang. draconis. terra Lemnia, aloës, myrrh. ana Drach. ii. olei myrtin. rosac. omphacini, ana Vnc. ix. Cera & terebinth. clara, ana lb. sem. Fiat Emplastrum.*

Nonnulli in morbi progressu fascias aquâ roris marini imbuunt, quam efficacissimam in ossium fractura esse scribunt.

Si caro humida & flaccida sit, medicamenta, antea proposita imponenda, & locus fasciis ac plagis constringendus, ut caro ossi conjungatur.

### Dieta.

Victus sit in principio tenuis & talis, qualis in aliis acutis requiritur. Ager quiescat, non tussiat, non sternuter, quantum potest, non loquatur multum, non rideat, non irascatur. Vide Hippocratem, 3. de artic. 5. 4. & seqq. & Galenum, in comm.

Sunt & alia interdum costarum vitia. Quandoque numerus variat, refertque Columbus, lib. 1. anat. c. 19. se aliquando costas tantum vndecim inuenisse, & lib. 15. aliquando 25. & 26. Aliquando duas aut tres connexas idem, lib. 15. obseruauit. Costas etiam in notatu dignum tumorem excreuisse vidit, ibid.

## CAPVT XXVI.

### De Mucronata cartilaginis Prolapsu.

**A**Ntequam à morbis pectoris digrediamur, noui, & ab aliis non explicati morbi facienda mentio, nimirum Mucronatæ cartilaginis Prolapsus, quem peculiari libello Baptista Codronchius descripsit. Ex eo ergo, quæ ad rem facere videbuntur, hoc loco afferemus.

### Nomen & natura morbi huius.

Scribunt autem quod in Italia hunc morbum vulgo appellent animæ, aliqui verò ossiculi vel surculæ calum, & linguâ materna *l' anima caduta*: ipse autem mucronatæ seu xyphoidis cartilaginis prolapsus, proidentiam, depreffionem, plicationem & flexionem appellat. Primam appellationem peritissimus Mercurialis in quadam epistola ad Codronchium missa improbauit, eò quod ignari homines partem hanc affectam animam appellauerint, tanquam sit quoddam animæ domicilium, quo descendente simul anima ipsa cadat, & eo restituto, simul anima ad propriam sedem redeat; quod sanè est merum figmentum. Ipse verò putat, vulgus ideo forsân hanc partem animam nominasse, quod apra sit, animam ex corporibus eximere, ob angustias & ingentia mala, quæ excitare solet, cum ad infernas partes labitur; vel potius vocasse hanc partem animam, ob situm aut ob similitudinem. Cum enim populares nucleos fructuum, qui in medio ipsorum sunt, animas vocent, videntes hanc partem in corpore nostro medium sortitam esse locum, illi animæ nomen indiderunt. Vel quoniam opinati sunt, hanc partem esse similem aliquibus fructuum nucleis, ut amygdalis. Ipse verò Codronchius gratia facilioris doctrinæ hunc affectum Mucronatæ cartilaginis prolapsus nominat. Galenus enim & cum eo omnes Anatomici testantur, à natura

procreatum esse in pectore os quoddam, à Græcis *σέπρον* appellatum; pro stabiliendis illis costis, quæ *σέπρον* orbicularim thoracis amplitudinem efformant, & ut propugnaculi vicem gereret. Ex hujus ergo ossis imâ parte exoritur cartilago quædam longa & triangularis, quæ etiam aliquando bifida, geminâque occurrat, ut plurimum tamen acuta, ut gladij mucro, spectatur, cui multa fuerunt imposita nomina. Nam Græci Xyphoidem appellant, eò quod ensis imaginem referat, ut testatur Galenus, 7. de usu part. cap. 21. Alij mucronatam cartilaginem, quod ad gladij mucronis formam accedat, & Iuniores clypealem, gladialem & ensiformem nuncupant. Quidam & malum Punicum, eò quod balaustij formam gerere videatur. Et nonnulli epiglottalem, ab imagine operculi laryngis, huic cartilagini specie non admodum absimili, vocare voluerunt. Sed quod ad formam gladij seu ensis, si rem, ut est, considerare velimus, multò melius ac verius totum pectoris os pugionis Hispani speciem præ se ferre apparet. Nam primum os, seu prima ossis pars, rotundæ pugionis parti responder, quam minimus digitus apprehensione tangit, & vulgò dicitur ensis pomum. Secundum, vel secunda ossis pars, responder illi parti, quam tota manus complectitur, & capulum seu manubrium nuncupatur. Tertium os, vel tertia ossis pars, vnâ cum ipsa cartilagine reliquæ parti pugionis assimilatur, & ideo vniuersam hanc ossium struem nonnulli xyphoidem ab ensis imagine vocarunt. Amatus Lusitanus, cent. 3. cur. 93. in schol. refert, in dissectione corporum cognouisse cartilaginem hanc à natura perforatam esse, quod tamen alij Anatomici silentio prætereunt.

Cum autem nulla pars sit in homine, quæ non sit ob aliquem usum à natura facta; aliter enim superuacanea esset, & potius abscindenda, quam opranda, teste Galeno, lib. 17. de usu part. cap. 1. ideo exquirendum, quem usum, quamve actionem habeat in corpore hæc cartilago. Galenus, lib. 6. de vf. part. cap. 3. lib. 7. cap. 21. ait, hanc cartilaginem esse factam, ut sit propugnaculum oris ventriculi, & partis septi transversæ, quæ illic est, ut & cordis similiter. Quam tamen sententiam Realdus Columbus, lib. 1. de re anat. cap. 20. refellit, eo quod pars hæc in sinistro latere à ventriculi regione plurimum distet. Et ipse existimat, hanc membranam esse progenitam, ut cordi præsit, & septum transversum muniat. Iohannes Valuerda, lib. 1. sua anat. cap. 161. aliam habuit sententiam, hanc videlicet partem esse munimen anterioris patris jecoris, ac ventriculi. Quidam celebris ac doctissimus nostræ ætatis Anatomicus arbitratur, xyphoidem jecori tantum superstare, & à ventriculi orificio superiore longissimè distare. Vesalius scribit, hanc cartilaginem subditarum illi partium esse propugnaculum, quæ vero partes ei subjiciantur non explicat. Videre tamen se non posse scribit Codronchius cur cartilago hæc à loco suo dimoueri ac situm mutare non possit. Nam quamuis dura sit, aliis partibus collata, est tamen mollis præ ossibus, ita ut flecti, ac sedem suam valeat mutare, quamuis non sine aliquo labore, ut animaduertit Columbus. Et sicut epiglottis, quæ tota est cartilaginea, curuatur & inflectitur, cum esculenta ac potulenta deglutiuntur, & illis cedit in ventriculorum demissis; ita huic parti, cum sit ejusdem naturæ ac substantiæ, non repugnat, ut ipsa quoque possit flecti, ac deprimi. Imò fuit sententia Nicolii, in ferm. 7. & Piccolominei, hanc cartilaginem à summo rerum omnium Opifice in humano corpore factam esse, non solum ad tutelam ventriculi, verum etiam ob motum ipsius, id est, ut cedat motui ac dilatationi ventriculi, qui cum copia alimentorum tur-

gescit, jecur antrorsū, simulque sursum propellit, adeo ut ex his grauissimis viris pateat, membranam hanc esse mobilem ac flexibilem. Præterea Excellentissimus Flaminius Rora, Bononiensis Medicus & Anatomicus apprimè peritus, in hanc venit sententiam, hanc cartilaginem non posse quidem luxari propriè dicta luxatione, sed luxatione improprie acceptâ, id est, depressione ad inferiora. Verum vnusquisque in contrectandis hypochondriis exercitatus, si voluerit, & occasio se obtulerit, hujus cartilaginis depressionem facili negotio percipere poterit extremâ ac interna digitorum parte, in qua quidem sensus tactus maxime viget.

*Quæ sit morbus.*

Morbum autem istum Bapt. Codronchius refert inter morbos in compositione seu mala constitutione ad viciatum situm, siue etiam deprauatam figuram pertinentes. Nam cartilago compressa situm variat, & figuram, quamuis hæc morbi differentia potius ad partes instrumentales ac oppositas videatur attinere, nec morbo tantum in compositione laborat ista pars, verum etiam intemperie composita cum materia affici potest, ut quando à frigido ac humido succo irrigatur, qui saltem est causa antecedens, seu mediata ipsius depressionis. Nam sic affecta ex quacunque leui occasione ac vi illata potest à sua sede moueri. Non esse autem morbum in solutione continui, docet. Nam cum pars sit dura, non nisi cum magna difficultate potest solui illius vnitas. Est enim substantia quædam media inter ossa & ligamenta, ossibus tantò mollior, quantò ligamenti durior, propterea nulla ratione frangi potest, cum vbique sua mollitie cedat, neque adeo resistat, sicut ossa faciunt, præterquam quod soluto continuo minimam læsionem subiectis partibus imperiret.

### Causa.

*Causa manifesta.*

Causæ prolapsus siue depressionis hujus cartilaginis & obscuræ & manifestæ esse possunt. Manifestæ sunt illæ, quæ extrinsecus fiunt, ut sunt casus, ictus, violenta ac incongrua corporis extensio, distorsiove aut peruersio nimia totius corporis, vel inordinata circumuolutio, vel etiam, ut aliqui volunt, molesta ac magna tussis. Obscuræ verò causæ sunt illæ, quæ ab intrinseco principio ortum habent, ut est humor vel tenuis, vel lentus ac crassus circa ipsam coaceruatus, qui ipsam laxando facit, ut ex leui quapiam occasione depumatur, sicut vltuvenire nouimus vertebris spinæ, quæ propter destillationes irruentes ad ipsas facili laxantur.

*Quæ partes in hoc morbo afficiantur?*

Ex hujus ergo cartilaginis mutatâ figurâ subiecta membra, ventriculū, jecur, ac septum transversum, vel cor etiam, sed mediante diaphragmate, aut ore ventriculi, premi & lædi, atque hinc aliqua symptomata excitari posse statuit. Et quoniam cum Realdo Columbo nonnulli alij affirmant, ventriculū vel ventriculi partem superiorem lædi non posse à mucronata cartilagine, eò quod pars hæc ab illa valde absit, ut omnis (si fieri potest) remoueat scrupulus, responderet, posse considerari ventriculū duplici respectu; primo ut est pars corporis mortui, secundo, ut est pars corporis viuentis. Si priori modo consideretur, hi viri peritissimi vera farentur; si secundo, facili hallucinari potuerunt. Nam cum partes vita & motu priuatæ concidant & contrahantur, & illæ præcipue, quæ in viuente turgere solent, idque eueniat potissimum in hominum cadaueribus, qui vel ex longo morbo extincti sunt, vel post mille tormenta & ærumnas in carceribus toleratas morte violenta perimuntur, ibi non est mirum, si eorum ventriculi tum Anatomicis videantur valde distare à mucronata cartilagine: qui ramen cum in sanis ac viuentibus crassi sint, & cibo ut plurimum

*Ventriculus dupliciter consideratur.*

repleti turgant, superius elati adherent, vel propinqui sunt mucronatæ cartilagini. Quare fuit rectè scriptum à præclarissimis illis viris, hanc cartilaginem non solum ob munimen ventriculi, verum etiam ob motum illius procreatam esse, ut scilicet cederet motui ac dilatationi ventriculi ex alimentî copîa turgentis. His adde illud: Quo ablato & alterum aufertur, & eo posito alterum existit, illius quidem causam esse fateri debemus: sed est obseruatum, nonnulla symptomata ventriculi, potissimum cum deprimitur ista cartilago, fieri, ac nullo remediorum genere posse profligari, & restituta cartilagine quamprimum aboleri: quis ergo negare audeat, horum causam esse hujus cartilaginis procidentiam? Addit porro. Neque verò ex imperitia vel auaritia aliquorum hominum statuere debemus, esse hunc morbum fictitium, & inuentum duntaxat pro extorquendis hominum pecuniis, sed potius horum imperitiam ac auaritiam redarguere & Deum omnium bonorum largitorem laudare, summæque gratiarum actione prosequi, qui dignatus sit, hunc fortasse antiquum, sed non cognitum morbum nobis patefacere. Codronchius quidem non solum concedit, aliquando accidisse, & accidere etiam posse, ut ex nequitia, vel imperitia aliquorum, qui violenter, vel quando opus non est, illam partem contrectant, ubi morbi non sunt, morbi fiant, & ubi sunt, augeantur, potissimumque, si ab alia causa ortum habeant. Verum etiam hanc rationem, ab Excellentissimo quodam viro adductam, suam firmare potius opinionem existimat. Nam si hæc cartilago, cum sit sensus experta, dolore affici non potest, & ea malè ab istis tractata, vel ob vicinitatem jecoris, vel diaphragmatis, aut diaphragma & jecur, vel etiam os ventriculi, consensu ratione afficitur, & varia sublequantur symptomata, cum ea fieri non possint, nisi partes eæ vim huic cartilagini factam recipiant, & illi vicinæ sint; videre se non posse scribit, cur ab aliqua externa causa vel interna allata huic parti læsione, ac vi pariter earundem partium symptomata varia non sublequantur.

*Error nullus.*

### Symptomata ac signa.

Symptomata verò, quæ sequuntur prolapsū hujus cartilaginis, plura recitat. Primum enim ut i cibis receptus, præsertim durioris substantiæ, & non admodum dentibus fractus, ad os ventriculi peruenit, ob pressionem cartilaginis angustius factum, aliqualem dolorem parit, & ægrè ad ventriculum pertransit, sæpiusque euoni consuevit. Virtus enim expultrix, percipiens læsionem cartilaginis, irritata insurgit, ut noxium expellat, in quo conatu frequenter alimentum ipsum rejicit, deinde laborantes pondus quoddam & sæpe dolorem, circa ventriculi regionem percipiunt, potissimum post assumptum cibum. Præterea cum appetentia sit oris ventriculi propria functio ex Galeno, 2. aph. comm. 20. & 1. de rat. victus in acut. comm. 18. si hæc pars à cartilagine mucronata prematur, ac lædatur, sit, ut appetitus ipse imminuatur, vel ferè aboleatur: & quoniam cartilago hæc reclinata aliquam etiam viam infert diaphragmati, hinc insurgit aliqua spirandi difficultas, qua ægrotantes potissimum laborant, cum mouentur, vel altiora loca, ut scalas & montes ascendunt. Quemadmodum enim septum transversum à ventriculo & jecore, vel etiam liene, cum maximo tumore laborant, premi potest, & difficilem respirationem excitare, ut scriptum reliquit Galenus, lib. 2. de difficult. respiration. cap. 10. ita etiam illo à mucronata cartilagine presso idem symptoma oriri sine dubio potest, quamuis id nec à Galeno, nec alio quopiam fuerit animaduersum. Quod si cartilago hæc jecur ipsum comprimat, cum ex hac compressione & coarctatione non possit biliosus succus



ad propria loca transmitti, per vniuersum corpus diffunditur, ac regium morbum excitat: & cum læpenu-mero ex morbis morbi fiant, si inappetentia, vomitus & regius morbus diu perseuerauerint, in atrophiam vel cachexiam incidunt; in illam ratione priuationis alimenti, in hanc verò causâ vitiosi alimenti. Præter enarrata mala, si laborantes sursum brachia extendant, vel in lecto supini jaceant, ingenti vel majore dolore circa præcordia afficiuntur, in reliquis sunt anxij, ac loco stare nesciunt, vigiliisque valdè molestantur. Non est autem necessarium, vt omnia commemorata symptomata in singulis hisce ægrotantibus reperiuntur, sed alia in aliis, modò intensiora, modò leniora, pro majori vel minori cartilaginis depressione ac læsione illata.

### Prognostica.

Prognostica.

Cartilago mucronata, sicut & cæteræ cartilaginee, si præscindatur, non recrefcit: & si rumpatur, nunquam reparatur, vel solidescit, auctore Aristotele, lib. 3. de hist. animal. cap. 8. & lib. 2. de part. animal. cap. 9.

Mulieres consueuerunt magis hoc morbo laborare, quàm viri; cum in iis mucronata cartilago sit minus dura, habitûque sint humidior, & excrementis potissimum frigidis abundant.

Hæc cartilago depressa à principio facili negotio ad propriam sedem restituitur: sin autem depressio negligatur, ac diu ita perseueret, ratione duricie parris maxima cum difficultate ad situm reduci potest.

### Curatio.

Curatio.  
Varij carti-  
laginum re-  
pendendi mo-  
di.

1.

Ideo operæ pretium est, quamprimum operam dare, vt ad naturalem situm extollatur, quod pluribus rationibus effici poterit. Nam si adesset in corpore humorum abundantia, vel humores ad partem affectam fluere, antequam manus intrò adhibeantur, plenitudo auferri, vel saltem imminui, & fluxio aliò defecti ac inhiberi debet. Igitur peritus artifex ventrem fascia sursum, versus deuinciat, & ab utroque hypochondrio subtus costas inchoando partes illas manibus comprimat, vt impulsu turgentium partium cartilago depressa ad locum proprium redeat: à quâ tamen curatione abstinendum in mulieribus grauidis. Nam si ne manifesto abortûs discrimine minimè adhiberi potest, vt contigit annis elapsis vxori cuiusdam. Equisonis prægnanti, quæ cum febre tertianam imitante cum quibusdam ventriculi perturbationibus afficeretur, à quodam pro restituenda cartilagine ad locum suum, posthabita omni fœtus custodia, supra ventrem ætissimè vineta altero die partum abegit, & sequenti nocte ipsa obiit: & accessit Codrochius, vt opem huic mulieri ad interitum properanti afferret, audiens ex viri hujus audacia & inscirtia fœtum mortuum excussum esse, & videns miseriam illam fœminam jam interemptam esse, non potuit non maxima animi sui molestia hanc dementissimam temeritatem detestari, & simul cogitare & perquirere, an verum esset, cartilaginem hanc præter naturam deorsum prolabi posse, & si procidat, quæ symptomata ac mala excitare posset, & tandem, quænam esset germana ac tuta hujus procidentie cura, quam pluribus modis fieri posse postea cognouit, quorum vnus jam explicatus.

2.

Cui succedit alter, quem ægrotus ipse propriâ industriâ assequi poterit, si videlicet rem aliquam grauem ac ponderosam, quantum ferre valet, manibus strenuè capiat, tantumque extollat, vt à terra magis distet, quàm capitis ipsius summities, & sic eam sublimem summa vi tenens se hinc inde aliquantisper, modò ad dextram, modò ad sinistram vertat.

Cum tamen non omnes, & potissimum mulieres, ob virium imbecillitatem id efficere possint, succedat

Dan. Sennerti Tom. I I.

tertia ratio curandi, & est, vt artifices manibus cartilaginem lapsam leniter cõrectando eleuent, & ad naturalem sedem reducant, ad quod præstandum inueniuntur plures mulieres peritæ, quàm viri; cuius rei hanc esse causam ait Excellentissimus Masinus, (quem vnum inuenit in tanto Medicorum numero, qui hanc fieri depressionem ac morbum asseruerit) quoniam mulieres crebrius ab hac ægritudine capiuntur, & ob vercundiam & honestatem libentiùs mulierum, quàm virorum manibus se committunt. Hinc vsu euenit, vt mulieres ob magis frequentem operationem & vsum peritiores, & magis idoneæ fiant.

Quod si his tribus expositis modis cartilago non possit ad naturalem situm restitui, fortasse non erit sine fructu, supra regionem hujus parris apponere cucurbitulam superius perforatam cum leni tamen flamma. Nam cum ventosa habeat insignem vim sursum trahendi, rationi consonum est, vt & hanc delapsam partem sursum eleuet ac trahat: cum tamen aliquantisper cucurbita manserit, non vi auferatur, sed aperto foramine permittant, vt per se remoueat. Antequam verò ministri hujus cartilaginis restitutionem aggrediantur, vt facilius id consequi possint, cum ea pars, vt sæpe dictum, sit duriuscula, regionem totam superioris partis ventriculi illinere solent vel butyro solo, vel butyro & oleo amygdalarum dulcium, quibus aliqui parum croci adjiciunt, quod faciendum ipse magis probat, cum prolapsus est factus ab aliqua causâ externa, quàm cum ab interna, in quo casu magis exsiccatione egemus, quàm humectatione. Si tamen id fiat, vt faciliorem aditum manui præbeat, vt videlicet curis muscoli huic cartilagini suppositi à linimento laxati manus contrectationi magis cedant, id se non improbare asserit, dummodo parçè fiat. Quod si prolapsus sit antiquus, & qui spatio temporis callo fere obduruit, adhibenda sunt, quæ molliant, laxent, & partem extensioni aptam efficiant, vt est fœtus cum decocto maluæ, althææ, fœnigraci, atque id genus aliorum, atque siue fiat spongiâ, siue aliquo instrumento molli, parum refert.

Cartilagine in propriam sedem repositâ, insurgit alia indicatio ipsam firmandi & roborandi, ne amplius prolabatur, sed in sua sede constanter firmiterque consistat, quod facili negotio perfici poterit, si locus affectus aliquibus vicibus foueatur spongiâ aliave re simili madefacta in vino nigro parum austero, in quo mastix, thus, absinthium, balauitia, rosæ rubræ, nuges cupressi, & id genus alia ebullierint, & postea admoveatur sequens Ceratum.

℞. Mastich. Vnc. ii. ladan. Vnc. i. rad. bistort. nuc. cupress. medull. interioris thur. ros. rubr. balauit. an. Vnc. sem. corall. rub. Scrup. i.

Misce & cum pice nauali ac terebinth. q. s. f. l. a. Ceratum, quod per 6. vel 8. dies parti adhæreat. Nec laudandos censet illos, qui cerati vice albumen oui apponunt, quoniam nimis refrigerat, quod in parte adeò frigida vitari debet.

Atque ista è Baptista Codrochio proponere libuit, quæ Lectori perpendenda & cum experientia conferenda relinquimus, atque hoc etiam considerandum damus, an non affectus, quem Germani das Vvehe-  
thun nominant, cujus supra, c. 21. de luxat. ver-  
tebrarum dorfi, mentionem fecimus, quan-  
doque etiam ad hanc causam re-  
ferri possit.



## LIBRI SECVNDI PARS III.

### DE SYMPTOMATIBVS, quæ pulmonibus & thoraci accidunt.

#### P R O O E M I V M.

**P**OSTQVAM precedente parte huius libri absolvimus morbos, qui pulmones & thoracem infestare solent; restat, ut jam Symptomata, quæ ipsæ accidunt, subjungamus. Et quidem primò Actiones læsas quod attinet, cum pulmones cum aspera arteria & thorace respirationis organa sint, simulque voci & sermone in homine formando inferuiant, dicendum 1. de Respiratione læsa; quod pertinet Asthma, & Suffocatio ac Strangulatio, 2. de Vocis & Locutionis vitiis, 3. de Tussi, item Convulsione diaphragmatis, quæ ad Motus symptomata pertinet, 4. Dolore lateris & pectoris, qui etiam insigne est in pectore in sensu Tractus symptoma.

Qualitatis mutata, quæ in sensu incurrant, symptomata hic non dantur. In Excretis verò est Sputum, & Puris ac sanguinis, Grandinis, Calculorum ac Vermiculorum & pectore ejectio, de quibus ordine dicemus.

#### C A P V T I.

##### De Respiratione læsa in genere.

Respiratio  
læsa in gene-  
re.

**R**espiratio, Græcis ἀναπνοή, motus est pectoris & thoracis, quo aer attrahitur in pulmones & expellitur. Et quidem pulmones naturali vi, vbi aeris attrahendi vel expellendarum fuliginum necessitas percipitur, dilatantur & contrahuntur: quod ut commodè præstare possint, & locum, in quo moueantur, inueniant, facultas animalis simul cum pulmone thoracem dilatat & contrahit, pulmonisque & thoracis motus in vnum finem conspirant. Ideoque etiam hic motus non planè liber est & voluntarius, sed μάθηται & necessitatibus corporis subiectus, & thoracis motus naturæ virginti cedit. Qui enim motus voluntarius & planè liber est, is nullum tempus, nullam mensuram præscriptam habet. Cohibitum autem spiritum ducere iterum cogimur; cum suffocatio vrgeat, quam natura reformidat.

Suffocatio  
serui barba-  
ri.

Peculiare enim quiddam fuit, quod de seruo Barbaro refert Galenus, 2. de motu muscul. cap. 6. qui cohibito sponte spiritu seipsum suffocauit; cum alioquin natura superior tandem ad respirandum impellat.

Respiratio autem duobus motibus perficitur, inspirationis scilicet & expirationis. In inspiratione pulmo & pectus dilatatur, & aer attrahitur. In expiratione pulmo & thorax contrahitur, & aer fuliginosus expellitur. Inter hos duos motus duæ intercedunt quietes; sicut in pulsu inter systolen & diastolen. Differentia tamen hæc quædam est inter pulsum & respirationem. Quia enim pulsus planè naturalis est, motus ille est continuus & non interruptus, nisi quod duæ quietes inter systolen & diastolen intercedunt: quia verò ad respirationem etiam facultas animalis concurrat, non nihil pro arbitrio nostro hic motus regi, & interdum aliquandiu differri potest.

Differentia  
inter pulsum  
& respira-  
tionem.

Tria autem ad respirationem naturalem concurrunt: 1. Facultas mouens, 2. Organa respirationi inferuentia, quæ sunt pulmones diaphragma, thorax variis musculis instructus & agitur, trachea, quæ via est, per quam aer ingreditur, & egreditur; quod pertinent & nares ac os & fauces; quæ ipsa etiam acri tran-

situm permittunt. 3. Vfus, qui est caloris in corde temperatio, spirituumque generatio. Ideo enim sic respiratio, ut cordis calor ventiletur, & in statu naturali conferuetur, cordisque actiones rectè perficiantur.

Quibus fortasse quartum addere licet, ipsum aërem qui inspiratur. Is enim ita dispositus sit necesse est, ut calorem cordis ventilare & refrigerare possit; si verò is sit crassus, fuliginosus, qualis est in quibusdam cauernis, aut si nimis æstuosus, ad refrigerandum ineptus est, & quandoque suffocationem inducit.

Ratione autem organorum respirationis quædam differentia est, & ἀναπνοή alia est ἀβιάσος, cuius instrumentum est diaphragma; alia βία, quæ à musculo fit in summis scapulis sito, & ab interna intercostalium parte. Sic ἀναπνοή ἀβιάσος instrumenta sunt musculi circa abdomen; βιάσος autem externa intercostalium pars. Nerui, qui ad diaphragma pertingunt, inter 4. & 5. vertebrae cervicis prodeunt, qui ad intercostales musculos & thoracis vertebrae progrediuntur. Atque hæc ad naturalem inspirationem necessaria sunt, quæ si lædantur, respirationem lædi necesse est.

Est nimirum respiratio læsa pulmonis ac thoracis motus à naturali statu deflectens, propter vitium aliquod in facultate mouente, organis respirationis, vsu mutato, vel etiam aëre, qui attrahitur, consistens.

Læditur autem respiratio, vel quia planè aufertur, quæ ἀναπνοή dicitur, vel deprauatur, quæ ὁστροπία appellatur. Platerus tamen, nec incommode, dyspnœam omnem ad respirationis defectum seu diminutionem refert; deprauatam autem solùm respirationem appellat quando non rectè fit respiratio, ut dum est frequens, citata, vel interrupta; quod etiam suspirium refert.

Respiratio  
quomodo læ-  
datur.

#### Causse.

Respiratio læditur 1. læsâ facultate; idque fit, vel cum facultas motrix per se læditur, vel per accidens, vbi eâ saluâ, ac spiritu animali præsentem, aliundè in motu impeditur. Cum autem vis mouendi seu respirationem efficiendi & in pulmone & thorace consistat, vtriusque facultatis lætio perpendenda.

Pulmonis, præcipui respirationis organi, motus peculiari ejus vi perficitur, quæ ejus facultas, tam diu salua esse dicitur, quamdiu ejus temperies & calidum innatum saluum est. Ideoque læsa pulmonis facultas per se tantum dici potest, cum ejus temperamentum vitatur, & calidum innatum deficit, id quod in phthisicis & moribundis sæpè accidit. Impeditur verò facultas pulmonis motrix, licet salua sit, & ita per accidens læditur, & in operatione sua impeditur, dum spatium, in quo liberè, moueatur, non habet; id quod fit in pectoris angustia quacunque de causa profecta, ut in gibbositate, empyemate, hydrope pectoris, aut dum ab abdomine diaphragma comprimitur & sursum pellitur.

Thoracis verò motus ab animali facultate pendet, quæ per se equidem lædi propriè dici non potest; per se tamen lædi à Medicis dicitur, cum spiritus animalis, qui ad motum animalem necessarius est, deest, & cum spiritus animalis ad thoracis musculos & diaphragma non influit. Fit autem hoc, vel quia non transmittitur, vel quia non recipitur, ipsiusque influxus prohibetur. Non transmittitur, vel quia spiritus animalis deficit, ut in moribundis & in nimis euacuationibus, & aliis causis spiritus dissipantibus; vel ejus influxus à cerebro non fit, ut in apoplexia & soporosis affectibus. Non verò recipitur influens spiritus animalis propter vitium nervorum spiritum animale ad musculos thoracis & diaphragma deferentium. Et si verò etiam ex sexta & septima conjugatione thorax nervos accipiat: tamen quia seprum transversum, cuius motus ad mediocrem respirationem sufficit, nervos etiam à dorsali medulla insignes vtrique accipit, raro respiratio sola & seorsim, citra aliarum actionum læsionem, nervorum sextæ & septimæ conjugationis vitio læditur,

Causse.

læditur, sed dorsali medulla & conjugationibus dictis simul læsis, quod non nisi circa exortum in cerebro fieri potest, ut in apoplexia, respiratio læditur. Nervi autem majores à dorsali medulla progressi, si seorsim afficiantur, id, quod in catarrhis eò decumbentibus, ut & intemperie frigida, vulneribus & tumoribus fit, respiratio seorsim læditur. Quò etiam refertur potest spinalis medullæ ob luxationem, vulnera, vel alias causas, vitium.

Per accidens verò læditur facultas & motus thoracis, inprimis ejus dilatatio, dum facultate integrâ, & spiritibus præsentibus motus impeditur, vel ob dolorem lateris & diaphragmatis, colli, abdominis, intestinorum, hepatis, ventriculi, aut harum partium vulnera, aut dum ob aquam, vel pus, vel sanguinem in cavitare thoracis contentum is liberè moveri non potest, & diaphragma comprimitur, ut liberè distendi nequeat, ab hepate vel liene tumente, aut flatibus & vaporibus in intestinis contentis. Vapores etiam vel flatus in abdomine collecti & circa diaphragma subsistentes illius liberum motum impediunt, & nunc respirationem difficilem, nunc suffocationis metum inducunt, quibus sæpe & cerebri ac cordis alia mala accedunt, ob insignem cum cerebro & corde diaphragmatis consensum, præsertim si materiæ magna sit copia. Vapores autem hi à venis mesaraicis & hypochondriis, ventriculo, intestinis, interdum & vtero atrolli solent. Viscera quoque in abdomine circa septum transfusum appensa, si obstruantur valde, vel intumescant, pondere suo diaphragma infra trahendo illud liberè moveri non permittunt; id quod fit in hepatis obstructionibus & tumoribus; quæ difficilis respiratio sæpe diu hydropem præcedere solet. Ventriculus quoque cibo repletus eodem modo difficilem respirationem efficere solet; quod & ab ingestorum ciborum qualitate interdum evenit. Quod & in gravidis accidit ab vtero, qui distensus diaphragma comprimit, & difficilem respirationem efficit.

II. Ratione organorum læditur respiratio, dum ali-quod in iis est vitium. Organa autem respirationis alia ad motum faciunt, ut pulmo, diaphragma, musculi thoracis & abdominis; alia aëri ingressum & egressum permittunt, ut nares, os & fauces, larynx, aspera arteria, ejusque rami per pulmonem dispersi, quique ad pulmonis substantiam pertinent.

Pulmonis ergo vitio respiratio impeditur, dum pulmonis asperæ arteriæ angustiores, quàm par est, fiunt, nec satis dilatarì possunt, dum scilicet obstruuntur à catarrhis eò defluentibus, qui si confertim & ad ipsos ruunt, Suffocatiui nominantur, & pituitoso humore in iis collecto, à sanguine eò effuso, ut & pure, vel in pulmone collecto, vel aliunde effuso grandinibus item, calculis & vermiculis; aut comprimuntur à pituita in lœvibus arteriis & pulmonis substantia, vel tuberculis, vel aquâ in pulmone collectâ. Connexus etiam pulmonis cum concauo thoracis strictior pulmonis motum liberum impedit, respirationemque difficilem reddit, quod nonnullis à primo ortu, aliis post casum aut pleuritidem accidit. Si etiam pulmo à prima origine sit minor, quàm par est, aliquod respirationi impedimentum affert. Faciunt etiam huc pulmonis vulnera & vlcera.

Diaphragmatis verò & musculorum respirationi inferuentium vitio fit respiratio læsa, dum diaphragma vel inflammatur, vel vulneratur, aut dum catarrhus, qui in musculos intercostales lapsus est, ad diaphragma vsque etiam penetrat. Aut dum musculi contunduntur, inflammantur, vulnerantur, vel exulcerantur, ut & musculi abdominis, respirationi inferuentes: aut si catarrhus in eisdem musculos decumbat.

Pertinet huc & costarum & vertebrarum vitium, dum vel franguntur, vel luxantur, ac thoracis motui obsunt.

Tandem inter thoracis vitia est hoc, si cartilagine thoracis, quæ ad motum faciliorem edendum pectoris circumferentiam constituunt, in ossiam substantiam indurantur. Nam & tunc thorax satis dilatarì nequit.

Partium autem, per quas aër transire debet, vitio, puta narium, oris & faucium, ut & tracheæ angustia, difficilis respiratio, imò suffocatio interdum induci potest. Quod fit, si nares vel à pituita, vel à tumore aliquo obstruantur & obturètur, si tumor aliquis sit in musculis faucium, laryngis in tonsillis, vel columella delapsa sit, vel si vertebræ cernicis luxatæ viam hanc intercludant. Inprimis verò si aspera arteria, & præcipue ejus caput seu laryngis rimula vel obstruatur vel adstringatur & coarctetur, vel à quacunque causa angustior reddatur. Quò pertinent & asperæ arteriæ vulnera.

III. Ob vitium respirationis seu finem mutatū, atque ita cordis vitio, respiratio læditur. Si enim ille non vrget, nulla aut quàm exigua fit respiratio: & quamdiu motus cordis cessat, tamdiu etiam cessat respiratio, quod fit in syncope & suffocatione vterina. Si verò vsus vrget, respiratio fit magna vel frequens & celer, id quod in febribus ardētibus accidit, & plurimæ respirationis læsæ differētiæ ab vsu & fine mutato proueniūt.

IV. Tandem etiam aëris, quem spirando attrahimus, vitio, respiratio lædi potest. Si enim is crassus, caliginosus, & fuliginosus sit, qualis est in quibusdam cauernis, qualēque faciunt fumī, qui à carbonibus accensis exhalant, ut & vapores à multo & cerevisia feruente, vsui non satis fit, aded, ut etiam à tali aëre nonnullos suffocatos fuisse, compertum sit. Ita in Cypro à venis chalcæthi fumus atrollitur, qui hominē suffocat, teste Galeno, 9. de simpl. med. facult. tit. de Chalcantho.

Has causas omnes ut in numerum redigamus, fit respiratio læsa.

1. Ab insigni intemperie & pulmonis corruptione.  
2. A pectoris angustia, quacunque de causa profecta, ob quam pulmo & diaphragma liberè moveri & dilatarì non potest.

3. Ob defectum spiritus animalis, in moribundis, in apoplexia, & frigidis affectibus.

4. Ob nervorum insignium ad thoracis musculos & diaphragma tendentium læsionem quancunque, quæ spiritus animalis influxum prohibere potest.

5. Ob dolorem in musculis thoracis & aliis partibus vicinis, quæ respirationi quocunque modo inferunt.

6. A diaphragmatis motu impedito, ab aqua, pure, vel sanguine in thoracis cavitare contento, vel à vaporibus & flatibus ab inferioribus ascendētib; & circa diaphragma subsistentibus, seu viscerum in abdomine obstructione, distensione & tumore.

7. Pulmonis vitio, dum scilicet ejus arteriæ vel obstruuntur quacunque de causa, vel comprimuntur, aut dum pulmo pectori agglutinetur aut vulneratur.

8. Diaphragmatis vitio, dum illud vulneratur, inflammatur, vel dum catarrhus in id decumbit.

9. Musculorum thoracem mouentium vitio, dum illi contunduntur, vulnerantur, inflammantur, exulcerantur, aut dum catarrhus in eos decumbit.

10. A costarum & vertebrarum dorsī luxatione & fractura; ut & cartilaginum pectoris induratione.

11. A musculorum abdominis morbis, ob quos liberè moveri non possunt.

12. A narium, oris, faucium angustia.

13. A laryngis & asperæ arteriæ obstructione, compressione, vulneribus.

14. Ab vsu mutato, qui varius est.

15. Aëris quem inspiramus, vitio, si is calore refrigerando & ventilando non sit idoneus.

Atque tot quidem sunt respirationis læsæ causæ. Verum enim verò plurimæ à morbis, quos jam explicauimus, ut & apoplexia, febribus, & similibus dependent, atque ita de respirationis læsæ, curatione vno in loco tractari non potest. Ideoque alios Medicos secuti,

Respirationis læsa.

Causæ 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

hic saltem de ea respirationis læsæ curatione dicemus, quæ vulgò Asthma vel Orthopnœa dicitur; deinde de Suffocatione & Strangulatione, quæ peculiare respirationis læsæ differentia sunt.

## CAPVT II.

## De Asthmate &amp; Orthopnœa.

Asthma.

**A**sthma, Latinis Anhelatio, etsi interdum in genere & amplo vocis significato pro quacunque respiratione difficili & anhelosa quacunque de causa profecta, siue cum febre, vel sine febre accipitur: stricta tamen vocis significatione Hippocrati est πύκνυς, hoc est frequens seu densa & difficilis respiratio sine febre, qualis est eorum, qui ex cursu & celeri exercitatione subsistunt; & quidem cum sono, ut Celsus addit, à spiritu humorem in pulmone contentum dissolventem. Quando verò malum eò usque crevit, ut æger erecto corpore propter suffocationis metum respirare cogatur, *ὀρθόπνοια* appellatur. Imò, ut Galenus, 6. *aphor.* 46. scribit, qui Hippocratem ætate secuti, affectionem quandam diuturnam, nonnulli asthma simpliciter, nonnulli quoque *ὀρθόπνοια* nominant, cum sine febre æger continenter difficilem habet respirationem.

Vnde etiam Asthma definitur læsa respiratio eaque densa & frequens ferè, ut æger sine anhelatione respirare nequeat, sine febre plerumque ab angustia bronchiorum pulmonis proveniens. Quando malum (differt enim asthma & orthopnœa saltem magnitudine) ita incrementum sumpsit, ut æger non nisi erecta ceruice spirare possit, Orthopnœa nominatur.

Locus affectus est pulmo, & quidem secundum bronchia, id est, asperæ arteriæ cartilaginosa propagines per pulmones dispersas, quæ spiritus via sunt. Quamquam enim thorax & pulmo etiam suo modo satis dilatentur; tamen propter harum viarum angustiam satis aëris inspirando attrahi non potest; vnde, ut quod magnitudini & sufficientiæ deest, compensetur frequentia & velocitate, frequens ac velox inspiratio oritur.

## Causa.

Causa.

Etsi verò ut dictum, respirationis difficilis plurimæ causæ sint: asthmatis tamen in specie dicti duas tantum ponit causas Galenus, humores scilicet crassos ac pituitosos, & crudum tuberculum, quibus tamen huc una atque altera addi potest.

Est nimirum proxima asthmatis causa angustia bronchiorum pulmonis, seu usus auctus propter angustiam bronchiorum pulmonis. Angustia autem illa oritur, non à quacunque causâ, cum, ut dictum, asthma sit respiratio difficilis non quævis, sed anhelosa & diuturna ac curatu difficilis sine febre, ab obstructione vel compressione pertinaci. Vtrumque enim, obstructionem & compressionem scilicet, efficiunt primo humores sæpe crassi & viscosi, nonnunquam & tenues ac serosi, sed copiosi, deinde crudum tuberculum vel grando & calculi in pulmonibus hærentes. Quibus nonnulli & flatum crassum addunt. Hæc enim siue intus bronchia pulmonum obstruant, siue in substantia pulmonis; venis ejus & læuibz arteriis hærentes ea comprimant angustiam efficiunt, & ita respirationi obstant, ut postea, *questione.* 1. diceretur.

Materia autem bronchia pulmonum seu obstruens, seu comprimens, nunc in pulmonibus sensim colligitur, ob debilitatem & cachexiam illius visceris, ut docet Avicennas, 3. *can. fen.* 14. *tract.* 4. *cap.* 3. & bronchia obstruit, quæ interdum etiam in calculum & grandinem induratur: nunc verò aliunde affluit. Fit

hoc interdum à capite, cum catarrhi à capite lapsi in pulmonibus subsistunt; id quod vulgò frequentissime fieri putatur. Verum ego id rarius accidere puto, ut *Frengier* ma. *asthma* tu. *causa*. postea, *quest.* 2. dicitur, & frequentissimam asthmatis causam esse puto materiæ per venam arteriosam in pulmones effusionem, dum scilicet circa hepatis in venoso genere crudi humores colliguntur, & per venam arteriosam in pulmones effunduntur, & bronchia pulmonis comprimentes respirationis difficilis & asthmatis propriè dicti, mali scilicet diuturni & contumacis illius, causa sunt. Etsi enim in hydropicis humor serosus ad thoracem penetrans respirationem difficilem efficere possit: tamen ea respiratio difficilis propriè asthma non est, sed ab hydrope, morbo primario, dependet. Et quidem ille humor, qui è venis per venam arteriosam in pulmones confluit, non semper crassus est, sed sæpè tenuis & serosus, qui in venis & arteriis collectus nunc motu corporis, nunc irâ, sæpè verò ad aëris & tempestatis mutationes agitur in pulmones irruit; vnde paroxysmus sæpè secundum Lunæ motum & quarto fere die exacerbatur. Non impossibile tamen videtur, ut humor etiam talis (cum arteriæ multo sero abundant) per arteriam venosam in pulmones infundatur. Eodem modo à crudo tuberculo oriri potest asthma, non solum in asperis arteriis consistente, sed & extra eas constituto, easque comprimente. Et quidem si crudum tale tuberculum consistat solum in aspera arteria, vel circa eam, tantum asthma parit; si etiam circa leues, cor in consensum trahitur, & pulsus inæqualis efficitur, id quod in Antipatro factum refert Galenus, 4. *de loc. affect.* *cap.* ult. Ideoque siue materia in læuibz arteriis consistat, & asperas comprimat, siue utraqzque pulmonis arterias oblideat; & asthma, & inæqualitas pulsus inducitur.

Possunt quidem & alij tumores, qui suppurantur, respirationem difficilem efficere, ut non solum Galenus, 4. *de loc. affect.* *cap.* 8. & Aërius, *tetrab.* 2. *serm.* 4. *cap.* 57. docet, sed & res ipsa loquitur; cum tum etiam bronchia pulmonis comprimantur: tamen si strictè vocabulum asthmatis accipimus, ea læsa respiratio asthma non est; sed cocto ac rupto abscessu ac pure per spiritum rejecto cessat; asthma verò propriè dictum saltem ab humore crasso & crudo tuberculo oriri docet Galenus.

Hisce causis nonnulli addunt etiam vapores ex utero ascendentes & flatus crassos. Verum etiam negandum non sit, ab hisce causis interdum respirationem planè difficilem fieri; tamen quia illa subito inuadit, & cito cessat, asthma propriè dictum non constituit. Ille flatu potius ad asthma pertinet, qui se materiæ asthmatis causæ jungit, paroxysmiqz autor est; cum scilicet humor crassus à motu nimio vel alia causa in flatum resolvitur.

Quod autem flatui tribuitur, sæpius rectius humori seroso, ut modò dictum,tribuendum esset, cum is in ramis venæ cavæ majoribus quacunque de causa feruens & motus *ad pñs* & confertim per dextrum ventriculum cordis in pulmones irruit, & asperas arterias comprimit; quæ non infrequens paroxysmi asthmatici causa est, ob quam æger difficili respiratione, sæpè nulla causa manifesta præcedente, sed imminente aëris aliqua mutatione & tempestate corripitur.

Affinis etiam est asthma illa difficilis respiratio, quæ à siccitate nimia pulmonis provenit, ob quam pulmones satis dilatari ad aërem hauriendum non possunt; quam siccitatem imprimis metallici vapores inducunt, & propterea iis, qui metalla & mineralia tractant, familiaris est. Ita refert Heurnius, *de morb. pecc.* *cap.* 4. typographo cuidam adeò siccatos fuisse pulmones, ut aridum pomum retulerint.

Differentia



*Differentia.**Differentia.*

Asthma aliud est recens, aliud inueteratum. Aliud est periodicum, quod per intervalla redit, ubi scilicet materia interiecto quodam temporis intervallo vel contluit, *ἀδρός*, id quod potissimum per venas fieri puto, vel paulatim antea in pulmonibus collecta moveri & agitari incipit. Hinc fit, ut præter causas proximas antea enumeratas, etiam remotiores cognoscendæ sint, ut vitentur. Tales sunt cibi flatulenti, aer crassus ac nubilosus, aeris caliditas aut frigiditas nimia, corporis & animi motus nimius.

Deinde asthma aliud est gravius, aliud mitius. Si enim æger quidem difficulter respiret & anhelosus sit, simpliciter asthma appellatur. Si verò ita incrementum sumat difficilis respiratio, ut æger non nisi erecta ceruice respirare possit, orthopnoea nominatur, ut antea etiam dictum.

Tertio asthma aliquando est etiam hæreditarium, habentque nonnulli congenitam ad asthma propensionem, quæ sita est in pulmonum laxitate quadam & debilitate ad recipiendum affluentes aliunde humores, vel etiam eos cumulandos apta.

*Signa Diagnostica.**Signa.*

Imminentis asthmatis signa ita tradit Aretæus, lib. 1. de sign. & caus. morb. diuturnor. cap. 11. Morbi incipientis seu impendentis notæ sunt huiusmodi; gravitas pectoris, tarditas ad solitum opus, & aliud quodlibet agendum, in cursu & in acclivi itinere difficilis & ægra spiratio, raucescunt & rursiunt, flatu in præcordiis atque eructationes præter rationem excitantur, vigilant, noctu parum & obscurè incallescunt, nares acutas & ad spirationem paratas habent.

Malum autem præsens facillè signis suis pathognomicis cognoscitur. Ægri nimirum plerumque sine febris, de quâ postea, *quæstione* 3. dicitur, & alia euidente causa, quæ respirationem difficilem inducere potest, frequenter, ut ij, qui cursu velociore aut motu alio vehementi sunt defatigati, & si malum sit vehemens, etiam erecta ceruice respirare coguntur. Et fit hæc respiratio læsa quandoque cum stertore & sonitu, quandoque sine eo, ideo quod materia quandoque hæret in bronchiis & asperis arteriis, quæ dum spiritu disploditur, sonitus excitatur, aliquandoque extra asperas arterias. Scribit tamen Iohannes Zechius, *Consultat.* 18. hoc quidem ut plurimum fieri, se tamen in quam plurimis obseruasse, respirationem, accessionis præsertim tempore, rarâ & admodum tardam, longèque difficiliore inspiratione expiratione ipsa esse. Atque ipse causam huius rei hæc reddit, quod cum duo sint respirationi interuenientium instrumentorum genera, quorum alia aerem suscipiunt, ut arteria cum pulmone, alia mouent, ut ipse etiam pulmo cum thoracis musculis: si accidat, ut non solum bronchia pulmonum, sed & ipsa pulmonis substantia cum suis venis & læuibus arteriis afficiatur, facultasque thoracem mouendi languida sit, accidere, ut nec pulmones humore granari, nec thorax facillè moueri & distendi possit. Quapropter tum natura non sine labore & conatu maximo ac longiore temporis intervallo inspirationem moliri potest; unde etiam partes pectoris supernæ mouentur; quam inspirationem sublimem Hippocrates appellare solet, in qua obeunda, ut vires deiectas interposita quiete aliquâ natura nonnihil reparare possit, inspirationem alteram non admodum maturat & accelerat; & ipsa expiratio expeditior est inspiratione, quoniam huius operis instrumenta sine multo labore mouentur, & ferè sponte sua concidunt. Idè tamen, *consultat.* 53. addit, respirationem hanc simul magnam esse. Cum enim rara respiratio vsui non satisfaciatur, ab urgente postea necessitate coacta natura magnam pro viribus respirationem efficit; ita

ut non solum septum transversum cum musculis intercostalibus manifestè moueatur, sed etiam musculi superiores omnes, ita ut sublimis fiat appellata respiratio.

Quomodo autem asthma à difficili respiratione, à virium imbecillitate, & calore magno in cordi discernenda sit, docet Galenus, 4. de loc. affect. cap. 7. Subiciamus, inquit, aliquem omnes simul mouere musculos, ut pectus una cum scapulis manifestè subleuetur. In hoc opere ex tribus unum aliquod conicere necesse est, aut virium imbecillitatem, aut viarum spiritus angustiam, aut vehementem in corde & pulmone calorem. Quamvis interdum dua, ac nonnunquam (licet raro) tres quoque etiam dictis causis concurrere possint. Igitur ubi vires dumtaxat fuerint infirma, ad tria mouentium musculorum genera venire, eosque omnes ad motionem excitare solent, uno genere vehementer pectus mouere nequeunte, & propterea non solum diaphragma, sed vniuersi thoracis musculi mouentur: motum tamen & sensum efficiunt; & propterea neque frequens omnino, neque raro omnino eorum actio existit. At præterea thoracis dilatatio hautquamquam magna erit, nullaque ex ore fiet exsufflatio & spiritus ex solis naribus emitti solent. Quod si per inspirationem narium pinna manifestè trahi videantur, id prostrati roboris efficax indicium erit. Aucto verò in corde & pulmone calore, omnibus quidem thoracis musculis peragitur quoque respiratio, sed magna, velox, frequens vehemensque percipitur, & præterea calidus exsufflando spiritus emittitur. Tandem qui ob viarum spiritus angustiam difficulter anheloseque respirant, totum quidem thoracem magna ex parte & celeriter & frequenter dilatant, sed neque exsufflare, neque calidum spiritum emittere consueverunt. Id enim acuti caloris est indicium.

Cum verò angustia ista bronchiorum pulmonis quæ *Signa causæ* proxima est asthinatis causa, à pluribus, ut dictum, *farum*, causis provenire possit, & ex discernendæ sunt. Ut verò de causis, quæ respirationem difficilem in genere excitare valent, nihil dicamus, ut de pure vel sanguine in spiritus vias illapsis, & aliis quæ ex suis locis patent: si à crassis humoribus fiat asthma, & iis quidem in pulmone collectis, sensum difficulter respirare incipit æger, estque difficultas spirandi continua. Si verò aliunde affluat materia, respiratio difficilis eodem modo continua non est, sed per intervalla infestat vel exacerbatur. Et si enim asthma, quod ob materiam in pulmone collectam excitatur, ob iram, aerem austrinum, & similes causas, exacerbari etiam possit: tamen in asthma, quod fit à materia aliunde affluente, exacerbatio illa longè manifestior est.

Exacerbatur autem hoc malum magis tempore autumnali & hyberno & noctu. Cum enim, ut Galenus, 6. epidem. sect. 1. text. 15. docet, dies toti anno proportionem respondeant, ut matutino tempori ver sit simile, meridiei æstas, vesperi autumnus, nocti hyems; pituita verò noctu moueri solet: non etiam est mirum, asthma, quod est morbus pituitosus, noctu magis exacerbari. Siue enim humor aliunde affluat ad pulmonem, noctu is magis moueri solet, siue in pulmonibus congestus contineatur, nihilominus ibi agitur, & proprietas qualitates intendens, vel ad maius spatium sese extendit, vel vapores de se emittit, & omnino euidentia sui exhibet indicia. Et quidem si materia à cerebro delapsa sit, catarrhi signa adfunt: quod si catarrhus absit, per venas materiam affluere indicio est, hepatisque affecti signum tandem exhibet tumor pedum & cachexia. Ac si humor ille crassus obstructionem efficiat in bronchiis pulmonis, difficilis est respiratio cum sonitu & rursi, malum quandoque etiam cessat vel remittit pituita excretâ; si verò pituita & humor in venis & pulmone hæreat, abest sonitus & rursis & raro aliquid excernitur, ac malum pertinacius & diutius hominem exerget.

Quod si à crudo tuberculo sit asthma, æger ab initio, dum bene adhuc habere videtur, paulatim incipit difficulter spirare, accrescitque deinceps quotidie anhelatio citra stertorem ac strepitum. Quod si huiusmodi tuberculum temporis diuturnitate calefactum, & tandem quandam coctionem recipiens, in abscessum mutetur, febris accedit, deinde rupto tuberculo pus vel puri simile quid excreatur, & pure euacuato sit respiratio leuior.

Grandinis, & calculorum signa antea sunt proposita.

Si à siccitate pulmonis proveniat asthma, præcesserunt causæ, quæ talem siccitatem inducere potuerunt, spiritum deficit, & macies totius corporis adest.

### Prognostica.

#### Prognostica.

1. Asthma etsi sit morbus diuturnus, tamen paroxysmos habet acutos, ob loci affecti nobilitatem, qui organum respirationis est, quo grauiter affecto homo diu vivere nequit; compertumque est, nonnullos in platea ambulantes hoc malo subito extinctos fuisse.

2. Iuuenes hoc malo difficulter liberantur, senes vero nunquam, sed eos asthma ferè comitatur usque ad mortem 2. aph. 40. Infantes autem suffocat, nisi maturis auxiliis sistatur & auertatur.

3. Asthma hereditarium vix vnquam curatur.

4. Qui gibbi ex asthma aut tussi fiunt ante pubertatem, ij statim moriuntur, 6. aph. 46. Galenus, in comm. causam refert in angustiam pectoris & tubercula spinæ intus annata, quæ si cruda & cocti difficilia sint, hominem astmaticum diu vivere non sinit. Sin humida, quæ tandem suppurantur, tussi aliquando vexatos citò tandem suffocant & interimunt. Et quamvis aliàs calor circa pubertatem incrementum sumens multos morbos curare soleat: tamen calor hic gibbositatem tollere non potest. Et quia adhuc pulmones incrementum sumere solent; spina vero in gibbis amplius non crescit, atque ita pulmoni crescenti in angusto pectore satis loci non datur; is non satis ventilari potest, caloremque natium suffocari necesse est.

5. Periculosum valde est asthma in febre acuta. Nam materia & causa asthmatis à calore febrili valde exsiccat, & ad efficiendum ineptior redditur. Mulra quoque inspiratione in febre ob calorem vehementem opus est, quæ ob angustiam pectoris, quæ est in asthma, fieri nequit. Materia præterea calore febrili agitata asthma grauius reddit, & simul ob eam febris inualefcit.

6. Asthmate laborantibus cum tussi, si tussis cessat, difficultate respirationis aut perseverare, aut incrementum, periculosum est. Contumaciam enim materiæ, & virtutis expultricis debilitatem significat.

7. Ad Asthma inueteratum, si noua repente accesserit influxio, quæ pulmones obruat, ut in catarrho suffocatio sit, lethale est.

8. Astmatici ij maximè periclitantur, qui viribus sunt infirmi. Citò enim suffocantur & in synopen incidunt; cum autem pulsus inæqualis admodum redditur, ægrum morti vicinum esse indicio est, & multò magis, si intermittat.

9. Postquam etiam astmatici difficulter respirant; ut omnes muscoli intercostales superiores scapularum, & ipsæ scapulæ attollantur, periculosum asthma est. Virium enim imbecillitas, calor vehemens, & angustia partium respirationi inservientium adest. Ne tamen in præagitatione ex pulsu & respiratione Medicus decipiatur, videndum. Sapissime enim, qui bonum pulsum habere videntur, subito moriuntur, & suffocantur; & contra, qui pulsum prauum habent, auxilio aliquo adhibito, aut flatu, vel seroso humore discusso, subito restituntur. Idcircoque ad causam morbi, eius magnitudinem, aliàsque functiones attendere decet, non ad solam respirationem & pulsum respicere.

10. Asthma nonnunquam in peripneumoniam mutatur, idque febre superueniente cognoscitur, nonnunquam in hydropem & cachexiam degenerat.

### Indicationes.

Materia, quæ angustia bronchiorum causa est, tollenda: quod fit euacuando eam: idque ut commodius fieri possit, eius crassities, si adsit, attenuanda, visciditas detergenda. Partes etiam materiam in pectus mittentes euacuandæ & roborandæ, & materia ad pectus ruens ab eo auerrenda. Flatus si coniungantur, discutiendi; crudum tuberculum attenuantibus & exsiccantibus absumendum, Pulmonis siccitas humectantibus emendanda.

### Qua tempore paroxysmi facienda?

Et quidem tempore accessionis omnis danda opera, ut æger à præsentis periculo liberetur, nec suffocari permittatur. Hoc enim maximè vrget, & propterea ad hoc maximè respiciendum. Cum verò paroxysmus à tribus causis oriri possit, nimirum vel ex commota materia, quæ in pulmone quiescebat, vel ex noua in pulmones affluxione, quam & flatus & vapor aliunde transmissus terrore augere potest; materiam verò moueat corporis atque animi motus nimius, mora sub radiis Solaribus, ad ignem, suppeditet autem & augeat ebrietas & crapula, vsus ciborum crassorum & flatulentorum: initio perpendendum est, à quâ causa paroxysmus ortum habeat. Nam si à causa ortum habeat, quæ præsentem antea materiam agitare solet, non ita opus est frictionibus, ligaturis, cucurbitulis & aliis reuulsionibus, sed quiete potius, & iis, quæ materiam motam discutere possint. Si vero aliunde materia ad thoracem affluat, seu ex toto, seu ex aliqua parte, omni studio laborandum, ut materia à pectore auerti & distrahi possit. Ergo tum æger corpore erecto, ut spiritui via, & dilatato pulmoni spatium maius detur, nullo modo supinus, ne confidente ad dorsum thorace angustia augeatur, collocetur, pectore nudo, aut certe leuib. saltem vestibus recto, non verò onerato aut coarctato, in aëre temperato & ad frigidum declinante collocetur, & inutilium adstantium importuna turba arceatur. Hinc magnæ frictiones, ut & ligaturæ, in partibus inferioribus instituantur, quæ humores ad superiora ruentes reuellunt, eos verò, qui in pectore sunt, non agitant. Si verò pectus & dorsum etiam fricare libeat, fiat id sane leniter, ut meatibus saltem dilatatis facilius fiat transpiratio, quæ respirationis defectum aliquo modo compensare possit. Suppositoria quoque hic indantur.

Clysteres verò non admittit Ludouicus Septalius, cum viribus prostratis, & suffocationis periculo incumbente, commodè iniici non possint. Sed tamen vires non semper ita prostratæ sunt, ut clysterem non admittant, qui à pectore satis commodè reuellit.

Si sanguis in corpore abundet, & virtus valida sit, vena basilica secetur, vel mediana, & tantum sanguinis detrahitur, quantum vires & morbus ferunt. Si verò menses vel hæmorrhoides substiterint, saphena aperienda. Possunt & cucurbitulæ & cruribus applicari reuulsionis & auersionis gratia.

Si humor sit crassus, equidem non satis commodè purgantia exhibentur. Verum si humor sit tenuior & mobilis, ad periculum suffocationis vitandum satis commodè purgantia exhibentur; de quo quasi 4. dicitur.

Ad materiam verò discutiendam pectori applicanda Topica laxantia, discutiencia, ex oleo amygdalarum dulcium, chamæmelino, liliorum alborum, vino, pinguedine gallinæ & similibus.

*Vel 2℥. Pulu. rad. althæe, iridis; ana. 3. i. b. farin. sem. lini, fenigrac. ana. Dra. ii. ol. amygd. dulc. irini, chamamel. an. 3. b. pingued. gallin. 3. ii. ammoniaci vino dissoluti 3. b. cera q. l.*

*F. Linimentum.*

*Vel 2℥. Micilag. sem. lini. fenigrac. cydonior. cum aqua scabios. vel iussilag. extrah. an. 3. v. i. pulu. rad. ireos, hyssopi, an. 3. b. croci 3. i. ol. lilior. albor. amygdal. dulc. amarar. an. Vnc. i. b. Cum cera,*

*F. Linimentum.*

Si tamen flatus coniungantur, cauendum, ne subito & confertim calefacientia medicamenta extra adhibeantur. Si enim flatus à materia foueantur, metuendum est, ne his calidis medicamentis ea attenuetur & fundatur, flatusque augeantur, atque ira respiratio difficilior redatur.

*Exhibeantur medicamenta interna lenientia, attenuantia, detergentia & expectorantia, qualia sunt amygdal. dulc. & amara, ficus, passula, scabios. capill. 3. is, marrubium, hyssopus, radix aristoloch. rotunda, ireos, ari, beleny, gentiana, scilla, sperma ceti, crocus, moschus, ammoniacum sulphur, benzoe, & medicamenta ex his parata, vt:*

*2℥. Rad. ari 3. b. Coqu. in vino albo, & cum lob. de pino vel syrup. de hyssopo.*

*Misce & Eclegmatis forma exhibeantur.*

*Vel 2℥. Aqu. cinamom. 3. ii. oxym. scillitic. 3. i. M. aliquid sensim sorbeat.*

*Vel 2℥. Ammoniac. 3. b. fl. sulph. vel lactis eiusdem, croci, an. gr. v. mosch. gr. i. oxymel. f. 3. ii. vini albi 3. iii. M.*

*Vel 2℥. Ammoniac. 3. i. b. Adde pulu. glycyrrh. & sacchar. penidi q. l.*

*Formentur Pilul. xxv. quarum 4. vel 5. exhibeantur.*

*Brunnerus, consil. 3. 4. vt expertam & vsu probatam sequentem Potiunculam commendat:*

*2℥. Ammoniac. 3. i. b. aqu. hyssop. Vnc. iiii. vini Rhenani Vnc. ii. M.*

Maiores tamen videtur Ammoniaci quantitas, quam quæ pro vna dosi exhibenda. Theriaca etiam vel Mithridatium in ore teneri potest, & sensim aliquid deglutiri.

Commendatur & pomum excavatum, & 3. i. thuris repletum & assatum.

*Vel 2℥. Flor. sulphuris 3. i. b. benzoes gr. v. ammon. gr. iiii. croci gr. ii. margaritar. prap. 3. i. moschi 3. b. F. Pulvis, cuius quantum cuspide cultelli capi potest, cum iure puli aut oxymelite aut aqua scabiosæ sumatur.*

Auicennas cuminum cum aceto, vel semen sinapis alb. cum æquali portione mellis ad formam electuarij mistum exhibet.

*Vel 2℥. Oxymel. f. 3. i. scillitic. aqu. cinam. an. 3. b. ammoniaci 3. i. croci gr. iiii. Misce.*

*Vel 2℥. Croci 3. i. moschi gr. i. fl. benzoar. gr. ii. succi oxy-mi depurati 3. ii. vini albi calefacti 3. iiii. M.*

Commendatur & tanquam vsu probata aqua è floribus raporum destillata, & cum croco ac pauxillo moschi mixta.

Vtiles etiam sunt *Aqua pectorales dictæ (Luffr. wasser)* Item aqua saluæ, anisi, rorismarini.

*Aqua pectoralis temperata D. Andr. Doerer:*

*2℥. Rad. glycyrrh. ras. polypod. q. mund. ana 3. i. b. iussilag. 3. i. beleny. borrag. an. 3. ii. dactyllor. rec. encl. zibeb. rec. exactn. an. 3. iiii. conseru. viol. purp. 3. i. b. rosar. incarn. rec. 3. b. nic. mosch. croci orient. garyophyll. arom. cinamom. elect. an. 3. i. b.*

Incendantur & contundantur, postea affundantur. *Seri lactis capill. rec. & puriss. lb. ii. b. aq. scabios. lb. i. veronic. prunell. an. lb. b.*

Relinquantur in infus. in loco calido vel B. per nouendium, destillentur deinde per organa vitrea collecti liquoris lb. iiii. adde sacch. candi albiss. 3. vi.

*Alia aqua pectoralis à me præscripta:*

*2℥. Herb. veronic. scabios. an. M. ii. capill. 3. hyssopi, saluæ, marrubij, an. M. i. rad. ireos Florentin. glycyrrh.*

*eryngij, beleny, fœnic. an. Vnc. sem. cinam. opt. granor. iuniperi an. Dra. iij.*

Affund. *spir. vini opt. q. l.* Stent in infus. dies xiv. postea destillentur, Destillatum funde super *dactylos N. x. iunib. sebesten. an. N. xxx. ficuum N. x. passular. minor. maior. exacinar. an. 3. ii. croci 3. b.*

Digerantur & filtrentur. Neque enim è dactylis, iunibis, sebesten, ficubus, passulis, multum per alembicum eleuatur.

Commendantur & millepedæ vel aselli, qui sub vasis aquariis stabulantur, si scilicet panno lineo excepti in vino macerentur & vinum sine expressione propinetur.

Quando paroxysmus vltra quartum diem protrahitur, vesicatoria in dorso, è regione pulmonis, applicentur. Nonnulli sinapismos in anterib. parte thoracis applicant, & vesiculas diu apertas seruant.

Victus interea sit tenuissimus, atque utilis est prisana cum croco & saccharo, cibique croco condiantur; cum is utilissimum sit in asthma remedium.

### Quomodo extrà paroxysmum ager curandus sit?

Quando æger à paroxysmo vehementiore & suffocationis periculo liberatus est, laborandum omnis generis prædidiis, ne malum reuertatur. Idèoque si plenitudinis signa adsunt, & vires permittant, vena aperienda basilica, præsertim vbi vaporum calidiorum copia magna in corde & pulmone vrget. Et vbi à mensium & hæmorrhoidum fluxu suppresso malum originem habet, vel augetur, vena tali vel malleoli aperiatur. Cucurbitulæ quasque in eundem finem femoribus & cruribus adhiberi possunt.

Postea præparetur materia & euacuetur. Præparetur autem attenuantibus, incidentibus, & abstergentibus iis, quæ thoraci dicata sunt. Vbi tamen videndum, ne nimis calida & exsiccantia exhibeantur, quæ partes tenues materiæ absumere, reliquâque incrassare, & ita malum curatu difficilior reddere possunt. Quapropter commodè glycyrrhiza, passulæ, & similia medicamenta humectantia simul admiscantur.

Vtilia & hæc medicamenta sunt; *hyssopus, scabiosa, capilli 3. is, prasinum, passula, calamintha, fœniculum, scilla, iuniba, ficus* & ex his composita, *syrup. capill. 3. is de glycyrrhiza, de iuniba, de scabiosa, de hyssopo, de calamintha, de prasio, oxymel simpl. compos. & scillitic.*

*Vel 2℥. Capill. 3. is, hyssopi, scabios. prassij, an. M. b. rad. hel. ireos, an. 3. ii. sem. anisi. fœnic. an. 3. i. passul. glycyrrh. rasæ, an. 3. b. ficuum N. vi.*

*Coqu. in aqua simpl.*

*Colat. 2℥. 3. v. i. adde syrup. capill. 3. is, hyssopi, oxymel. scillit. ana 3. b.*

Misce pro duabus dosibus: & potus hic bis reiteretur.

*Vel 2℥. Rad. ireos, glycyrrhiz. beleny, fœnicul. an. 3. b. hyssopi, capillor. 3. is, iussilag. scabios. satueria, calaminth. ana M. b. iunib. sebest. an. N. x. caricar. N. vi. passular. 3. b. semin. anisi, fœniculi, maluæ, ana 3. j.*

*Coqu. in aqu. f.*

*Colat. 2℥. lb. i. oxymel. scillit. syrup. de prasio, de glycyrrhiz. an. Vnc. lb. aqu. cinamom. 3. j.*

*M. pro 4. dosibus.*

*Vel 2℥. Aqua veronica, scabiosa, an. 3. iiii. syrup. de prasio, capill. 3. an. 3. i. b. sp. sulphuris 3. b. M.*

*Vel 2℥. Syrup. de prasio, de hyssopo, de glycyrrh. an. 3. i. b. fl. sulph. 3. j. succi glycyrrh. inspiss. 3. i. b. vel potius. extrah. glycyrrh. 3. b. aqu. veron. iussilag. an. 3. iiii. M.*

Sumat æger manè & ante cœnam cochlearia 2. vel 3.

Præparata materia euacuanda est, & primò per purgantia. Etsi enim materia, quæ in thorace continetur, ita facile per aluum euacuari non possit: dum tamen materiam ex vniuerso corpore purgantia euacuant, eadem à pulmone reuellunt. Imò aliquid retrahi posse non

*Quid extra Paroxysmum faciendum?*

*Purgantia.*

non impossibile est. Præterea cum antea dictum sit, uti & postea, *questione 2.* dicitur, materiam, quæ paroxysmos asthmaticos cõcit, non semper totam in pulmone consistere, sed ex hepate & venis affluere: commo-  
dissime per purgantia ea tollitur.

Antiqui etiam fortioribus purgantibus utebantur, ut ex Aetio, *retrab. 2. sem. 4. c. 57.* Paulo Aegineta, *lib. 3. cap. 29.* Oribasius *synops. lib. 9. c. 5.* imo ipso Galeno, *7. de compos. med. sec. loc. cap. 6.* videre est.

Verum tutius est, à mitioribus inchoare, atque ea sæpe repetere, & ita per *ἐνίπρασιν* materiam euacuare. Cum enim materia crassa, viscida & contumax sit, & sæpe satis copiosa, vna vice expurgari non potest; ideoque per intervalla eam præparare & euacuare decet, medicamentis mediocribus, qualia sunt agaricus, mechoacanna & similia; quibus tamen stimuli loco fortiora quadam in minore quantitate addere utile est. Quoniam verò purgantia medicamenta diutius continuanda, ne natura iis assuescat, eorumque vires ob longam consuetudinem contemnat; ea mutare utile est.

Itaque in decocto preparante supra proposito infundantur, agaric trochisc. Vnc. i. sem. carthami Drach. vi.

Colentur, & exhibeantur Vnc. iiij.

Vel ℥. Pilul. de agaric. Scrup. ii. assaiereth. cochiar. ana Scrup. sem. extract. panchymag. gr. vi. Cum oxymel. scillit. F. Pilul.

Vel ℥. Agaric. Drach. is. turbit. 3. i. sem. fanicul. Zingib. an. Scr. j.

Infundantur in oxymel. f. 3. i. vini albi, aqu. hyssopi, an. Vnc. ij.

Colat. adde manna Dra. vi. Iterum colentur.

F. Haustus.

℥. Rad. ireos 3. ii. tussilag. Dra. i. B. pulmonar. M. B. ligni Guaiaci Dra. i. rad. helenij, hellebor nigri, an. 3. is. fol. sen. Vnc. ii. zingib. galanga, an. 3. j.

Coqu. in f. q. decocti pectoralis.

In colat. infundantur agar. troch. Vnc. B. rhabarb. 3. j. cinamomi 3. B. Cum f. q. sacchari.

F. Syrupus liquidior, cuius 3. iij. manè exhibeantur.

Nonnulli frequenter ad purgandum in asthmate trochiscis de violis utuntur, à Melue, *cap. de asthmate*, descriptis, quos tamen reiicit Alexander Massarius, quòd compositio minus sit artificiosa, & diagrydium non bene correctum. Verum diagrydium facile correctius reddi potest.

Vel ℥. Polypod. q. Vnc. B. mechoacann. opt. 3. i. agaric. albiss. 3. B. glycyrrh. 3. B. fol. sen. 3. vi. zingiber. galanga, an. 3. i. passular. 3. i. sem. anisi. fanicul. an. 3. ii. fol. tussilag. capillor. 3. is. an. M. j.

Infundantur in vini mensura vna. Detur manè haustus.

Oxymel de Nicotiana purgans anhelosis utile descripsit Quercetanus *pharmacop. dogmat. rest. c. 10.* & Syrup. de Nicotiana, *ibid. cap. 12.*

Inprimis vulgò commendatur ius galli decrepiti purgans, quod tamen à Lindou. Septalio planè reiicitur, ut postea, *quest. 5.* dicitur. Paratur autem hoc modo:

℥. Gallum decrepitum eniscerat, ventremque eius sequenti pulvere replei

℥. Pulmon. vulpis 3. i. passular. ficu, an. 3. i. B. glycyrrh. 3. i. hyssop. saturiea, thymi. an. 3. B. sem. fanic. 3. i. cartham. 3. B. turbit. elect. 3. ii. agaric. trochisc. 3. B. zingib. 3. j.

Postea coqu. in aqua pura.

De iure detur manè haustus, qui si non satis purget, dissoluatur in eo aliquid manna.

Vix verò quicquam commodius est ad pulmones expurgandos, quàm oxymel cum agarico. Efficax quoque est oxymel helleboratum Gesneri. Sed omitti potest helleborus albus & augeri pondus agarici.

Corpore toto euacuato danda opera, ut causa continens seu proxima è pulmonibus tollatur, idque medicamentis tum internis, tum externis effectum dandum.

Ad crassam & viscidam materiam attenuantia, incidentia & detergentia adhibenda, citra tamen insignem caliditatem, ne humores exsiccati magis crassi & lenti reddantur. Hinc Auicennas etiam diuretica fortiora improbavit, quod subtile extrahant, crassiore relicto. Ideoque utile est attenuantibus & incidentibus humectantia permiscere, ut glycyrrh. passulas, caricas, pines, mel, saccharum, maluan, altheam. Atque talia medicamenta supra inter præparantia proposita sunt. Valde etiam laudatur terebinthina, quæ non solum pulmones abstergit, sed & hepar, lienem, renes, simulque alium citra noxam soluit.

E supra enumeratis varia componuntur medicamenta. In vulgari usu sunt loch. de canibus, de tussilag. de pino, de passulis, de pulmone vulpis, de scilla, & quod ad asthma dicitur, species diaireos, diaireos Salomon, diatragacanth. calid, diapenid. diabyssop. diaprassij, conditum rad. helenij, extract. helenij, ireos, ol. anisi, fanicul. oxymel. scillit. flores sulphuris, lac & balsamum eiusdem, flores benzoes. Galenus, *7. de comp. med. sec. loc. in fine cap. 6.* ex veterum scriptis aliqua recenset, inter quæ & hæc:

℥. Succ. scille crude, mellis part. æqu.

Coq. lento igne. Dosis Drach. ii. circiter, ante & longè post cibum.

Vel ℥. Sulphur. vini. sem. ruta sylu. an. 3. i. aristoloch. absinth. cinamom. abrotan. an. 3. B.

Terantur cum aceto & F. Trochisci, magnitudine fabæ, quorum Dra. i. manè & vesperi exhibeatur cum Vnc. iii. oxymelitis.

Utile est & hoc:

℥. Ammon. aceto dissol. Scr. i. essent. zedoar. Scr. ii. aqua cinamomi 3. B. veronic. 3. ii. flor. chamamel. Vnc. iij.

Misce pro 2. dosibus.

Cum autem malum sit diuturnum & contumax, usus medicamentorum continuandus, & medicamenta sæpe repetenda, simulque permuranda, ne materia vni assuescat. Per intervalla quoque theriacæ Dra. sem. vel Scr. ii. exhibeantur. Utiles quoque sunt millepedæ seu alelli, ut etiam supra dictum, quorum & Galenus *7. de comp. med. f. l. in fine* mentionem facit; feruntque, *ἐνίπρασιν* & vulgatum Græcæ plebeculæ hodie esse medicamentum ad pulmones infarctos à crassis humoribus liberandos.

Vel ℥. Hyssopi, veronica scabiosa marrub. origan. pulegij, cardui benedicti, an. M. i. rad. ireos Dra. vi. zingib. 3. j. B. agaric. albiss. Vnc. sem.

Infunde in aceti vini lb. i. B. aqu. veronica, cardui bened. an. lb. B.

Stent in vase vitreo obturato loco calido per tri-  
duum, deinde lento igne coquantur & exprimantur.

Colat. ℥. lb. B. mell. opt. lb. B.

Coq. lento igne ad syrupi formam, qui aromatisetur cinamomo, caryophyllis & calamo aromatico in petia ligatis. Dantur manè 2. vel 3. cochlearia. Crato, *consil. 29.*

### Syrupus Augeny de helenio.

℥. Rad. helenij, polypod. q. in vino alba macerat. ana 3. ii. passul. Corinth. 3. B. sebesten. N. xv. farfara. pulmonaria, fol. saturiea, calaminth. an. M. i. fol. tabaci vnum magnum, glycyrrh. 3. ii. sem. verrica, bombacis, an. 3. i. B.

Coq. in multa ad remanentiam lb. i. sem. & cum pari quantitate sacchari F. Syrupus, cui oleum sulphuris addi potest.

Vel ℥. Rad. gemian. helen. an. 3. vi. ireos galanga, an. 3. iii. agaric. spica, an. 3. i. B. sacch. albi 3. ii.

F. Pulvis.

Vel ℥. Hyssopi sicci, sem. anisi. an. Vnc. i. glycyrrh. Vnc. sem. sem. fanicul. cinamom. an. Drach. ii. cardamomi Scrup. ii. ireos Florent. Drach. v. sacch. ad pondus omnium.

F. Tragea vel cum melle Electuarium.

Laudatur

Purgantia  
mutanda  
sunt.

Ius pulli de-  
crepiti.

Oxyme' hel-  
leboratum  
Gesneri.

Attenuan-  
tia, inciden-  
tia & deter-  
gentia.

Syrupus de  
genij de he-  
lenio.



Laudatur & Diabutyrum Benedicti Victor. Faudentini.

Diabutyrum  
Bened. Victor.  
Faudentini.

℞. Butyri recent. bene lot. Vnc. iij. caricar. pingui. melleor. pini, dactylor. amygdal. amar. an. Vnc. ii. succi glycyrrh. tragacanth. an. Vnc. i. hyssop. ireos, thymi, satureia, prassij, pulegi, sem. urtic. an. ℥. β. cinam. zinzib. pyrethri, an. ℥. iij. caryophyll. galang. piperis nigri, sem. anisi, carui, cardamomi, an. ℥. ii. ligni aloes, nucis, moschat. an. ℥. i. aqu. mellis lb. iij.

Caricas, passulas, dactylos bene contusos in aqua mellis triduo infunde, postea lento igne coque & succum fortiter exprime, cui succo adde butyrum & præterea mellis despumati lb. vii. & iterum lento igne vnica ebullitione ebulliant, iterumque colentur. Colaturæ adde nucleos pini & amygdalas bene contusas & in mortario omnia diligenter misce: quibus reliqua omnia subtiliter pulueriata, vt & pulmonis vulpis subtiliter puluerisat. Vnc. ii. insperge, & super igne miscendo. F. Electuarium de quo Vnc. β. manè, meridiè & vesperi exhibeatur.

Vel ℞. Conseru. betonic. botryos, an. Vnc. ii. violar. loch de pino, an. Vnc. i. pulmon. vulpis prepar. Dra. i. β. extract. glycyrrh. ireos, an. Scrup. i. Cum syrupo de hyssop. vel capill. q. s.

F. Electuarium. Dos. Drach. β.

Et commodum fuerit, si superbibatur haustus iuris galli decrepiti cum herbis pectoral. & ligno Guaiaco facti.

Vel ℞. Pinear. mundat. Drach. ii. radic. ireos, glycyrrh. an. Scrup. ii. tragacanth. Dra. β. sem. anisi, feniculi, urtica, an. Scrup. β. radic. angelica Dra. β. cinam. Scr. iv. styrac. calam. Scrup. sem. sacch. penid. candi, an. q. f. Cum aq. scabiosa & feniculi.

F. Rotulæ vel Morfuli.

Vtile est & sequens medicamentum.

℞. Radic. irid. Florent. helenij, an. ℥. β. pulpa dactylor. & passular. mundatar. ana ℥. iij. cortic. arantior. siccor. citr. siccor. an. ℥. ii. benzoes ℥. i. croci ℥. sem.

Infunde bidui spatio in spiritu vini optimè rectificato. Postea liquor per inclinationem separetur, cui adde sacch. candi pulu. q. f. spiritum vinum accende, & liquorem continuo agita, donec flamma spontè extincta liquor olei ferè consistentiam acquirat, cui adde ol. sulphuris q. f. ad gratam aciditatem.

Alia etiam medicamenta, supra in paroxysmo exhibenda, proposita hic locum habent, eorumque vsus continuari potest. Si verò materia aliunde, seu ex hypochondriis, seu venis communicetur, ea ex iis locis conueniente modo euacuanda & à pectore auertenda, & ne iterum generetur, curandum.

Externa.

Cum internis medicamentis externa coniungenda. Illinendum nimirum pectus oleo amygdal. dulcium, chamemel. anethino, cheirino, liliorum alborum, rutaceo, additis mucilag. inibus & pinguedinibus emollientibus & discutientibus:

Vt ℞. Ol. amygdal. dulc. lilior. albor. rutac. an. ℥. vi. adipis gallinae, anseris an. Vnc. β. mucilag. sem. fenigrac. cum aqua iussilag. extracta ℥. iij. pulu. rad. ireos, helenij, croci, an. Scr. i. Cera parum. M.

Vel ℞. Sem. carui, Vnc. iij. anisi, summit. absinth. an. Vnc. ij.

Puluerisatis adde mica panis similaginei Vnc. iij. mell. crudi ℥. iv. serebinth ℥. ij.

Coq. in vino ad consumptionem vini.

F. Emplastrum, applicetur calidè pectori & dorso.

In topicotum tamen horum vsu obseruandum, ne cutis pori occludantur: ideoque emollientibus, commode medicamenta attenuantia ac poros aperientia, & nitriliquid admiscetur.

Nonnulli etiam in malo inquietato & quod nullis aliis mediis cedit, canteria actualia adhibent, secundum collum, pectus & dorsum, circa medium vertebrarum & costarum, de qua vstione videatur Aëtius, tetrab. 2. ferm. 4. cap. 57.

Canteria  
actualia

Si à catarrho malum sit vel foueatur, eius ratio habenda, & vt supra, lib. i. part. 2. c. 34. de catarrhi curatione, diximus, in brachiis fonticulos excitare vtile est.

Pectore expurgato, danda opera, vt per exsiccantia & absorbentia reliquæ in pulmone absumantur: in quem vsum pleraque medicamenta humorem crassum è pectore expurgantia adhibentur, à quibus tamen hic fortiora & magis siccantia eligenda. Cum enim, vt antea dictum, in principio & præparantia & expectorantia validius siccantia non sint satis commoda, quia tenui parte absumptâ crassior relinquitur & induratur: vbi materia per incidentia & attenuantia præparata, vt & per expectorantia conuenientia euacuata fuerit, reliquum postea tutius per validius siccantia absumere licet. Qualia sunt, helenium, arum scilla, Nicotiana, ammoniacum, sulphur, benzoe, theriaca, Mithridatum.

Vel ℞. Rad. ireos ℥. ii. heleni, ari, ana ℥. i. scilla. angelica, an. ℥. β. glycyrrh. ℥. j. hyssop. satureia, pulegi, marrub. calaminth. an. M. i. sem. feniculi, anisi, a. ℥. ii. urtic. eruca, cartham. an. ℥. β.

Coq. & cum melle vel saccharo,

Fiat Syrupus. Sub finem adde croci ℥. β.

Vtilis est & Syrupus de Nicotiana:

℞. Nicotiana sicca M. iij. hyssop. marrubij, calaminth. ana M. sem. capill. q. scabios. ana M. i. caricar. dactylor. ana N. x. rad. angel. fenicul. ana ℥. sem. sem. fenic. anisi, an. ℥. iij. urtic. ℥. β. rad. ireos ℥. x. Coq. in aq. lb. iij.

Et addito melle & saccharo,

F. Syrupus.

Vel ℞. Rad. helenij, aristoloch. rotund. vtra, glycyrrhiza an. ℥. sem. sarsaparilla ℥. i. fol. hyssopi, origani, prassij, iussilaginis, scabiosa an. M. i. sem. fenigraci, urtica, an. Vnc. sem. dactylor. caricar. pingui. an. n. x. passular. exacinat. Vnc. j.

Coq. ad remanentiam lb. iij. adde succi scilla ℥. ii. sacchari q. f.

Coq. f. q. & addendo sub finem balsami Orientalis vel liquidambra ℥. ij.

Fiat Syrupus.

Laudatur & ros Solis, si ei cum semine botryos, glycyrrhiza & marrubio S. V. affundatur.

Vel fiat hoc Eclegma:

℞. Ammoniacy aceto scillit. dissoluti ℥. ii. sem. nasturij vnic. an. ℥. i. flor. sulphur. ℥. sem. croci ℥. i. pulmon. vulpis, prep. ℥. ii. Cum axymel. scillit.

Fiat Electuarium.

Vel hic Puluis:

℞. Rad. ireos, glycyrrh. helenij, an. ℥. ii. ari ℥. ii. cinam. ℥. ii. sem. urtic. nasturt. an. ℥. i. pulmon. vulp. prep. ℥. ii. croci ℥. i. flor. sulphur. ℥. i. benzoes ℥. sem. sacch. candi ℥. vj.

F. Puluis.

Vel ℞. Flor. sulphur. vel lactis sulph. Dra. β. benzoes ℥. sem. fecul. ari ℥. β. rad. ireos ℥. i. croci ℥. j. sacchar. candi Dra. vj.

Fiat Puluis.

Vel ℞. Ammoniacy ℥. i. β. croci ℥. sem. fl. benzoes gr. v. extract. glycyrrh. q. f.

Fiant Pilulæ xxx. Dentur manè 5. 6. 7.

Vel ℞. fl. sulphur. Dra. i. extract. helen. ℥. j. sacchari albiss. in aq. iussilag. dissolut. ℥. iij. ol. anisi g. iij.

Fiant Rotulæ.

Vel ℞. Spec. diaireos simpl. Dra. i. diatrageac. calid. ℥. sem. balsam. sulph. ℥. sem. sacchari in aqua scabios. dissolut. Vnc. v. ol. anisi gut. v.

F. Rotulæ.

Vel ℞. Lact. sulphur. fl. benzoes gr. vi. ammoniacy gr. iij. croci ℥. sem. margar. prepar. ℥. i. magister. oculor. ℥. moschi an. ℥. sem. sacchar. candi Dra. ii.

Fiat Puluis, de quo, quantum cuspidè culrelli bis capi potest, detur in ouo sorbili vel aqua scabiosa.

Est & efficax decoctum ligni Guaiaci, sassafras, sarsaparilla, si pectoralia addantur, non quidem ad sudores

dores ciendos, sed ad reliquias materiae in pectore absumendas.

Vt *℞. Ligni Guaiaci Vnc. iiii. sarsa parilla vel ligni sassafis Vnc. i. sem.*

Infundantur horis 24 in aq. lb. iij.

Deinde adde *conseru. violar. boiynos, an. Vnc. ix. daty-  
lor. N. x.*

Coq. in balneo vase clauso.

Colatura exhibeat.

Ad easdem reliquias absumendas viles etiam sunt sufficiens ex thure, myrrha, mastiche, styrace, benzoë, gummi juniperi, oriana, cinamomo & similibus. Nonnulli etiam cum suffumigiis istis admiscendum censent, sed inane, vt postea, *quest. 6.* dicitur.

Hæc tamen omnia ferè humorem crassum & viscidum spectant. Si verò ab humore tenui & seroso sit asthma, sæpius is euacuandus. Postea etiam per sudorifera discutendus.

Curatio  
asthmatis  
tuberculo,  
grandine vel  
calculo.

Si à tuberculo, vel grandine aut calculo in pulmonibus genito, aut siccitate pulmonis hoc malum proveniat, qua ratione curatio instituenda sit, ex iis quæ supra, *part. 2.* de morbis pectoris dicta sunt, patet. Nam si tuberculum sit sanguineum, citò suppuratur & rumpitur etiam sine medicamentorum ope, idque ex puris excreatione, febris & anhelationis remissione cognoscitur, & tum hydromelire, aliisque medicamentis, quæ in pleuritide sunt proposita, ad extersionem vtendum, ne vlcus relinquatur. Si verò tuberculum crudum sit & coctum difficile, medicamenta calefacientia, attenuantia & absumentia, quæ supra sunt proposita, etiam hic locum habent. Quod si tandem in abscessum mutetur tuberculum, abstergentia requiruntur. Hinc Galenus, 4. *de loc. affect. cap. vi.* ad absumenda talia tubercula vtitur. Athanasia, theriaca & similib. valde exiccantibus medicamentis. Vix tamen aliquis talium ægrorum sanitati restituitur.

#### Dietæ.

Dietæ.

Quia asthma plerumque à causa frigida & crassa ortum habet, victus ratio sit calefaciens & attenuans, de quo postea, *quest. 7.* dicitur. Aër nimirum, quem inspirat æger, sit calidus siccus, attenuans, liber & perflabilis. Ideo etiam in cubiculo in quo æger degit suffumigia frequenter fiant ex styrace, thure, myrrha, benzoë, moscho, ambrâ. Vitetur verò aër frigidus & humidus & crassus. Cibus easdem qualitates habeat; ita tamen calefacientia & attenuantia moderanda, vt humectantia quædam admisceantur, vt materia facilius expectoretur. Nam si cibus & potus exhibeatur, qui solum calefaciat, attenuet, & simul siccet, facile fieri potest, vt humor maiorem crassitatem acquirat, & tenacius asperis pulmonis arteriis adhærescat. Ideoque cibi condiantur saluâ, satureiâ, thymo, hyssopo, feniculo, baccis juniperi & cinamomo, & imprimis croco. Vtiles quoque sunt passulæ, amygdalæ dulces, pineæ, pistacia, & imprimis commodum est ius galli decrepiti cum hyssopo & croco, atque aliis pectoralibus. Melliti quoque cibi non inutiles sunt, si æger aliàs eos ferat. Vitentur verò cibi adstringentes omnes & crassi succi, vt pisces, legumina, caro suilla, lac & caseus.

Potus sit vinum tenue, subdulce, vel mellicratum, in quo thoracica medicamenta cocta sint. Possunt etiam cerenisa fieri cum saluâ, hyssopo, roremarino & similibus. Vtilis etiam potus est decoctum ligni Guaiaci. Ager sitim non ferat, sed largius bibat; quia humectatione indiget ad eam, quæ iam incisa & deterfa est in pectore, materiam tussi eiiciendam, vt docet Galenus, 7. *de comp. med. sec. loc. cap. 6.* Vnica tamen vice & cum cibo potus copiosus non assumatur; cum repletus potu nimio ventriculus difficultatem spirandi parere soleat, sed, si opus, cibo iam concocto potus aliquid sumatur. Somnus sit nocturnus mode-

ratus. In paroxysmo somno, quantum potest, æger abstineat, aut si vires imbecillæ somnum requirant, brevis sit & interruptus. Dormiat æger capite & pectore nonnihil eleuato. Vtilis est & ambulatio ante cibum, & frictio partium extremarum. Vehementia autem exercitia, quod humores commoueant, omnino intermittenda. Vitentur animi perturbationes, ira, & omnis nimius animi ac corporis motus; cum humores commouere & paroxysmum accersere soleant. A Venere etiam abstinendum ægro.

#### QVÆSTIO I.

*An humor asthmatis causa hereat etiam quandoque extra bronchia pulmonum?*

Alexander Massariæ Auicennam reprehendit, quod statuat, humorem asthmatis causam contineri quandoque etiam extra bronchia pulmonum in ramis læuium arteriarum, quarum propagines multæ per pulmonem distribuuntur, statuitque, si in pulmonibus obstruantur propagines læuium arteriarum, non asperæ arteriæ, cor laborare, pulsusque fieri inæquales, minimèque asthma excitari, nisi bronchia pulmonum simul obstruantur.

An humor  
asthmatis  
causa hereat  
quandoque  
extra bron-  
chia pulmo-  
num.

Verum enim verò materiam asthmatis causam quandoque etiam extra bronchia pulmonum in aliis pulmonis vasis, imò in ipsa pulmonis substantia consistere, multæ Medicorum observationes docent. Ita Hollerius in quodam pulmonem tanquam spongiam imbutum multo humore pituitoso inuentum esse scribit. Et patet id ex eo, quod qui asthma laborant, non continuò cum stertore & sonitu respirant, neque etiam semper tussunt, aut si tussunt, tussis tamen sicca est; quod minimè fieri deberet, si materia in asperis pulmonum arteriis semper consisteret. Nam aër materiam transiens & displodens sonitum & stertorem excitat, & quicquid in aspera arteria eiusque ramis existit, tussim excitare solet, vt postea, *in capite de tussi*, dicitur. Et licet verum sit, leuib. arteriis affectis mutationem in pulsu fieri: tamen & respiratio tunc quoque affici potest, si obstructio illa tam magna sit, humorisque tanta copia, vt & asperas arterias comprimât, angustioresque reddat; docentque hoc satis paroxysmi asthmatici, qui per interualla materiâ agitatâ in vasis excitantur. Ideoque siue materia in læuib. arteriis consistat, & asperas comprimât, siue in veroque arteriarum genere consistat, simul & asthma & pulsus inæqualitatem parit. Et ipsa origo asthmatis de qua, *questione sequenti*, dicitur, satis docet, causam asthmatis potius in venis & pulmonis substantia, quàm asperis arteriis contineri.

vel  
tunc  
tussis  
est  
sicca.

#### QVÆSTIO II.

*An asthma frequentius à Catarrho, an verò ab Humore crudo è venis in pulmones effuso excitetur?*

Vulgata opinio est, frequentissimè à cerebro frigido & humido atque excrementis abundante materiam pituitosam ad pulmones descendere, atque ibi hærentem asthma parere. Verum etsi non nego, quandoque post catarrhos aliquid pituitæ in pulmone restare, eiusque bronchia obstruere, & asthma excitare posse; tamen rarius hoc fieri existimo, sed frequentissimè asthma generari puto ab humoribus crudis circa hepar, imò in vniuerso venoso genere collectis, & per venam arteriosam in pulmones effusis. Etenim si materia à cerebro descendens causa asthmatis esse debet, necessariò catarrhus asthma præcedere debet, atque tussim adesse

An asthma  
frequentius  
à catarrho,  
an verò ab  
humore cru-  
do è venis in  
pulmones ef-  
fuso excita-  
tur.

necesse est; quod tamen non semper obseruatum. Etenim, si vel leuiter saltem asperæ arteriæ afficiuntur, tussis excitatur, vt postea, ex capite de tussi, patebit. Nonnulli quidem; vt Zecchius; *consult. 12.* aliam huius rei causam reddere conantur; statuuntque, tussim in asthma quandoque non excitari ob partium spiritalium æqualem intemperiem, quæ cum tristem sensum non inducat, etiam tussim non exciter. Cum enim spirandi organa ex longa patiendi consuetudine in morbosum quendam habitum commutata ferè sint, æqualique intemperie cum humore per omnem partem æqualiter disperso afficiantur; nonnum dolorem seu molestiam non sentire, atque ita tussim non excitari, nisi quando noua accedit materia, vel prior certo loco collecta & commota vias exasperando, & aëris ingressum & egressum præpediendo nouam affert molestiam.

Verum cum idem Zecchius, *conf. 8.* causam cur asthma non semper cum sterore & sonitu fiat, hanc reddat, quod materia non semper in asperis, sed quandoque in lauibis pulmonis arteriis consistat, causam eandem hic etiam multò rectius afferre potuisset, quàm istam æqualem intemperiem. Neque enim quæ tussim excitant, saltem ob intemperiem, quam inducunt: id præstant, sed etiam, quia aëris ingressum prohibent; quod ipse confitetur; id quod materia asthmatis, si in bronchiis pulmonis hæreret, perpetuò faceret, & ita perpetuò tussim excitaret, eodem modo, vt grandines tussiculam perpetuam excitat, neque longa patiendi assuetudine ullus talis habitus induci potest. Sunt & alia, quæ idem probant. Refert idem Zecchius, *conf. 18.* Cardinalem Paliotum, asthmaticum simul vrinæ ardore & difficultate laborasse, & ita quidem, vt cum vrinæ ardor & difficultas vrgeret, spirandi difficultas interim euidenter imminueretur, & rursum cum maiore impetu, stranguriâ cessante, repeteret. Quod certè indicio fuit à communi causa hæc duo mala prouenisse, & vitiosos & crudos humores, qui antea è venis ad pulmones ruentes asthma faciebant, postea ad renes & vesicam transmissos difficultatem vrinæ excitasse. Et licet non omnibus asthmaticis vrinæ difficultas & ardor adsit: tamen durante accessione ægri vrinas crassas & turbidas mingunt; quia scilicet humorum crassorum & crudorum in venis agitatorum pars etiam ad renes & vesicam ruit. Arguit idem & hoc, quod asthmatici plerumque sunt cachectici; vt de eodem Cardinale Paliotto refert Zecchius; pedesque tandem asthmaticis penè omnibus intumescunt; quod indicio est, causam asthmatis circa hepar potius contineri, siue ibi ob hepatis imbecillitatem generetur, siue ab vtero in foeminis, quibus menses suppressi sunt, sanguis eò mittatur. Neque id ideo fit, quod pulmones hepar refrigerent, cum si diligenter signa omnia perpendamus, crudorum humorum in venis cumulatorum signa adsint. Insuper idem & hoc probat quod asthma interdum citrà tussim desinit, nec materia excreatur & è pectore eiicitur, dum scilicet ea vel per halitum digeritur, vel per vrinæ vias expurgatur, aut in venas recurrit. Sicut & hoc id persuadet, quod suppressis mensibus & hæmorrhoidibus ac aliis consuetis euacuationibus, asthma nullo præcedente catarrho, succedit. Quod tandem & hoc confirmat, quod Aræteus inter signa imminenti asthmatis status in præcordiis, & eructationes præter rationem recenset; quæ proculdubio à materia cruda in hypochondriis agitata proueniunt. Neque enim, vt nonnulli volunt, status hi proueniunt, quod ventriculus ob pulmonis consensum afficiatur. Nam Aræteus eos non inter signa asthmatis, quod diu durant, & in quo pulmonis temperies valdè labefactata est, sed incipientis asthmatis signa recenset, vbi pulmones non ita labefactatos esse credibile est, vt ventriculum refrigerare possint. Materiam autem

*Dan. Sennerti Tom. I I.*

hanc, quæ è venis in pulmones effunditur, non semper crudam & pituitosam, sed quandoque etiam serosam esse, non sine ratione statuit Carolus Piso.

### QVÆSTIO III.

*An asthma semper sit sine Febre?*

**V**ulgata est opinio, asthma sine Febre esse, & differre asthma à respiratione illa læsa, quæ fit in febribus, quod illa sit ob vsum auctum, hæc verò saltem ob vasorum angustiam.

*An asthma semper sit sine febre.*

Suspectam tamen habet hanc doctrinam Carolus Piso, *de morbis à colluue serosa, pag. 220.* cum febris in nonnullis etiam sensui sese prodar, etsi calor non sit siccus & acer, sed halituosus plerumque, humidusque & blandus. Etsi verò vrinæ sæpe sint copiosæ in asthma, ac tenues, & instar aquæ perspicuæ, atque ideo diffimiles vrinis familiaribus & propriis febrium putidarum, suspicionem absentiae febris præbeant: tamen id familiare febribus, quæ ab humoris serosi feruore sunt, esse putat, idemque in arthritide, aliisque à fluxione & feruore humoris serosi morbis accidere posse. Idque etiam historiis aliquor adductus comprobatur.

Et omnino non est de nihilo hæc Caroli Pisonis sententia. Etsi n. sæpe febris absit, cum humor est crassior, aut tuberculum aliquod adest: tamen vbi à seroso humore asthma originem habet, quale plerumque circa insignes temporum mutationes in quibusdam ei obnoxiiis excitatur, tum febrem aliquam simul adesse experientia testatur: sed est ea blanda & halituosa, qualis etiam alios morbos à feruore & motu serosi humoris ortos, vt arthritidem, catarrhos, & huiusmodi fluxiones alias comitatur.

### QVÆSTIO IV.

*An Purgantia in paroxysmo asthmatico conueniant.*

Disuadent id nonnulli ea primum de causa, quod humor, qui asthma excitat, crassus sit, viscidus, neque euacuari facile possit, nisi prius præparetur, & postea modico sensim ac per vices euacuatur; id quod etiam in aliis morbis pituitosis faciendum.

*An purgantia in paroxysmo asthmatico conueniant.*

Deinde ob suffocationis periculum, quod maximè vrget, cum metuendum sit, ne, si medicamenta purgantia exhibeantur, materia à medicamento agitata non ad ventrem inferiorem, sed potius ad locum affectum confluat, atque ita suffocationis periculum augeatur.

Contra verò Carolus Piso statim post sanguinis detractionem purgationem auertendi gratiâ instituentiam censet: cum non nisi cum periculo suffocationis purgatio protrahi possit, & humor ipse per se satis sit fluidus, neque magno apparatu indigeat.

Verum distinctione hic opus est, & humoris natura consideranda. Si enim humor sit crassus viscidus, sine fructu initio statim instituitur purgatio, isque potius agitur, quàm educitur, atque hinc paroxysmus augeatur. Si verò humor sit tenuis & serosus, atque è venis in pulmones effundatur: quod præsupponit Piso, commo- dissimè mox initio instituitur purgatio.

### QVÆSTIO V.

*An Ius Galli decrepiti asthmaticis conueniat?*

Ius Galli decrepiti non solum cum pectoralibus coctum ad alterandam & expectorandam in asthma materiam, sed etiam cum purgantibus ad purgandum in omnibus

*An ius galli decrepiti asthmaticis conueniat.*

R R r

omnibus ferè Medicorum, post Arabum tempora, libris præscribitur. Vnus, quod sciam, Ludouicus Septalius, *animaduers. medicar. l. 6. num. 137.* id, tanquam noxium reicit, utpote quod experientia non respondeat, & rationi aduersetur: scribitque, se Mediolani ubi frequenter exhibetur à Medicis præsertim secundum descriptionem Benedicti Victorij Faurentini, in Empirica, id aliquoties irritò successu exhibuisse. Obesse autem potius, quàm prodesse, hisce de causis putat. In longa, inquit, ebullitione nitrosæ illæ partes, quibus maximè prodesse ius galli veteris creditur, tanquam terrestres, subsident, atque in percolatione reiciuntur, viscidæ agglutinosa crassæ, tum & præpingues, ex cute, pedibus alarum extremis, musculosis denique & nervosis partibus prouenientes, maximè remanent. Qua de causa non solum non adiuuare materia ex pectore excretionem, sed crassiore & viscidior materia, & antecedente & coniuncta causa, reddita, humorem contumaciorem magisque rebellem ad excernendum reddere. Neque etiam quæ cum gallo coquantur, aliquid prodesse putat. Quæ enim pro soluenda alio adduntur, agaricus, sena, sem. carthami, cum paucissimam admittant ebullitionem, vim omnem purgandi perdere ex longa coctione, alterantia etiam, ut capill. q̄is & alia, cum vires suas in superficie positas habeant, ex longa coctione eas amittere; alia, ut origanum, botrya, farfaram, ex longa coctione putrilaginosa euadere.

Verum enim verò hæc, quæ ex Ludouico Septalio protuli, non tanta videntur, ut ideo à communi opinione sit recedendum. Etenim à multis hætenus Medicis obseruatum, ius galli decrepiti in asthmate profuisse. Neque refert, quod Septalius id aliquoties irritò conatu exhibuit. Incidit enim forsitan in astmaticos desperatos, quibus omnia, etiam efficacissima remedia, frustra adhibentur. Rationes verò, quæ ab ipso afferuntur, etiam quod debent, non persuadent. Quæ ut rectius intelligantur, ius galli decrepiti Bened. Victor. Faurentini, quod allegat, prius proponendum. Ita autem habet eius descriptio:

℞. Gallum antiquum ad minimum trium annorum, quem flagellato & multum defatigato, postea decollato & sine aqua deplumato, ac visceribus mundato, & vino forti eluito, parumque salito: Deinde

℞. seminis caribami, anisi, anethi, an. ʒ. ii. rad. helenij, iridis, fol. hyssop. prassij, an. ʒ. ss. glycyrrh. passul. enucleat. an. ʒ. vi. tartari albi, ʒ. j. pulmon. vulpis puluerisati ʒ. ii.

Omnibus hisce crasso modo contusis venter galli repleatur, gallusque in aqua lb. xxx. coquatur, donec caro ab ossibus separetur. Deinde facta colatura cum forti expressione, colatura in frigido loco relinquatur, ut quod feculentum est, subsideat, pars verò clara separetur & vsui referuetur.

Primo ergo verum quidem est, quod vis iuris galli decrepiti in partibus quibusdam nitrosis & abstergendis vi præditis consistat. Hoc autem falsum, quod Septalius opinatur, illas partes nitrosas subsidere, & postea, tanquam sæculentas, abiici. Etenim terrestres quidem, crassæ, viscosæ ac sæculentæ subsident; nitrosæ autem propriè terrestres non sunt, sed salis suo modo quæ clauo lignori permiscetur salis more, non subsident. Deinde etsi verum sit, coctione nimia vim tam purgantem quam alterantem dissipari: tamen hoc facile præcaueri potest, si in vase clauso & duplici in balneo feruenti fiat decoctio; & tum minus aquæ, cum nihil absumatur, affundendum. Aut si hac coctione vim omnem ex gallo extrahi non posse, sed coctione in vase aperto opus esse quis existimet, gallus primò solus coquatur, deinde in decocto in vase clauso infundantur vel ebulliant medicamenta purgantia & alterantia. Pinguedo etiam facilè separari potest.

## QVÆSTIO VI.

An Arsenicum suffumigiis in astmaticis curandis rectè admisceatur.

Plerique Medici post Arabes inter suffumigia, quæ ad exiccandas & absumendas reliquias materiæ in astmaticis adhibent, etiam Arsenicum admiscere iungunt: sed quàm rectè, non video. Notum enim est, arsenicum esse summè venenosum. Sunt quidem nonnulli, inter quos etiam Vascus, qui id excusare eomodo volunt, quod in exigua quantitate admisceatur, aliisque medicamentis castigetur, & suffitu eius facultas elicit non adeo corrodens, malignaque existat; cum venosæ qualitates non in partibus tenuibus, igne resolutis, sed in crassioribus ac terrestribus insint.

Verum enim verò hoc modo se non expediunt. Primo enim Medici non in parua quantitate arsenici puluerem admiscunt, sed ad pondus omnium. Imò etiam in parua quantitate nocere potest. Deinde thus, myrrha & similia, quæ admiscuntur, venenosam arsenici vim corrigere non valent. Præterea notissimum est Chymicis, etiam fumos arsenici, dum calcinatur, esse summè noxios; nec partes heterogeneæ sunt in arsenico, ut aliæ sint terrestres & crassæ, aliæ volatiles. Nam dum arsenicum calcinatur, in fumos, utpote totum volatile, resoluitur, qui summè venosus & noxius sunt. Ergo arsenicum omnino in eiusmodi suffumigiis omittendum.

Error verò inde manauit, quod vocabula Sandarax Arabum, & Sandaracha Græcorum, malè confusa sunt. Sandarax enim Arabum, vulgò vernix gummi iuniperi est, vi eximia siccandi præditum; unde Arabes in suffutibus illis, qui ad reliquias humorum in pulmone in astmaticis absumendas adhibentur, illud rectè præscripserunt. Sandaracha verò Græcorum, arsenicum rubrum est. Cum ergo, qui in Arabum scripta inciderunt, sandaracen Arabum, & sandaracham Græcorum idem esse putarent, malè pro gummi iuniperi, quod Arabum sandarax est, arsenicum, seu sandaracham Græcorum, quæ arsenici species est, substituerunt. Scio equidem nonnullos id probandum suscipere ipsos etiam Græcos sua sandaracha, id est, arsenico in suffumigiis hisce vsos fuisse; & sit, ut obtineant, tamen quibus maligna arsenici qualitas non ignota est, non facilè eos imitabuntur.

## QVÆSTIO VII.

An Victus attenuans simulque tenuis astmaticis conueniat?

Mouent nonnulli quæstionem, an victus attenuans astmaticis conueniat, & in ea soluenda multum laborant. Nam etsi Galenus, in principio libri de attenuante victu, scripserit, solà victus ratione attenuante, sine vllis medicamentis, difficiles respirationes, arthritides, epilepsias & aliòs morbos diurnos se sanasse: tamen in contrarium adducunt Hippocratem, qui, 1. aphor. 4. scribit in morbis longis victum tenuem & exquisitum semper parum tutum esse.

Verum res plana est. Aliud enim λέπτυν δίαίτα, victus tenuis est, de qua Hippocrates, aphor. allegato, aliud λεπτόν τε καὶ λεπτὴν τροφήν, victus attenuans, vel attenuandi vim habens. Nam λεπτή δίαίτα, victus tenuis, solam victus formam ac quantitatem respicit, cum scilicet ægro cibo coctu facilis, & quidem in exigua quantitate, & minus ferè, quàm possit concoquere, offertur: cui opponitur διαίτα ἐδρότερη, plenior victus, qui scilicet maiore copia exhibetur: διαίτα verò λεπτόν τε καὶ λεπτὴν τροφήν solam qualitatem respicit, & victus attenuans est qui viscidus & crassos humores in corpore extenuat, cui incrassans victus opponitur, qui crassos humores



humores in corpore nostro gignit, vt docet Galenus, loco allegato. Et agunt de tenui diætâ, cum alibi, tum lib. de victus rat. in acut. Hippocrates & Galenus, De victu verò attenuante agit Galenus peculiari libello, de eo conscripto, describitque ibi cibos attenuantes, quod sensus mordeant & acres sint, cibosque illos, lib. alleg. Galenus enumerat & describit. Et tales cibos asthmaticis vtiles esse nullum dubium est; an verò victus tenuis conueniat, valde dubium est, cum, vt aphor. alleg. Hippocr. docet, in morbis longis parum tutus sit.

Valeus equidem hanc, quam ipsa linguæ Græcæ proprietates suggerit; solutionem non probat; victumque attenuantem & tenuem re ipsa non differre statuit; idè quod victum attenuantem constituentia alimenta, cum tenuia & debilia sint, alimentum copiosum victumque plenum præbere non possint, aut si adèd magna quantitate exhibeantur, vt copiosum nutrimentum æquare valeant, à facultate concoqui non possint.

Verum enim verò diuersa planè victus ratio est, tenuis & attenuans; cum, vt dictum, tenuis victus saltem formam & quantitatem, attenuans qualitatem respiciat. Et diuerso planè fine diætâ tenuis & attenuans instituantur. Finis diætæ tenuis est, vt natura à coctione morbi ad coctionem cibi non auocetur; ideoque paulò minùs cibi exhibeatur, etiam si cum aliqua vi-ri-um iactura id fieri videatur. Attenuantis verò victus finis est, vt cibi qualitate humores crassi attenuentur, atque ita, quod forsitan medicamentis fieri non poterit, quotidiano cibi vsu præstetur. Interim nullo modo in victu attenuante requiritur, vt de consuetâ quantitate aliquid subrahatur. Et si hoc etiam attendendum sit, vt æger eiusmodi cibi copiâ sese non oneret, & plus assumat, quàm concoquere possit. Et omnino victus attenuans non semper tenuis est, & cibi, qui victum attenuantem constituunt, etiam diætâ plenam præbere possunt, sicut hoc ex allegato Galeni libro, de victu attenuante, patet, vbi, cap. 8. aues montanas pisces saxatiles, carnem gallinarum, perdicum carnes, quæ victum plenum præbere possunt, in attenuante victu admittit. Ideoque si asthmaticis auculæ montanæ, perdices, gallinæ ac similes cibi, qui victum incrassantem non præbent, præcipuè cum hyslopo, satureia, thymo & similibus, dentur, victus erit is attenuans, non tenuis.

## CAPVT III.

## De Suffocatione seu Strangulatione.

Suffocatio seu strangulatio.

Causa

**A**D læsam seu potiùs abolitam & interceptam respirationem pertinet & suffocatio, cuius species est Strangulatio, de qua aliquid in specie dicendum:

Suffocatur autem homo, cum aer ventilando calori cordis necessarius non attrahitur, fuliginisque calidæ expiratione non emittuntur.

Fit hoc 1. cum viæ aëri attrahendo dicatæ occluduntur; quod fit interdum ore occluso seu obstructo, simulque naribus mucò obturatis, vnde interdum apoplecticis periculum suffocationis imminet.

2. Si fauces, præsertim circa laryngem, occluduntur, id quod fit in tumoribus musculorum faucium, laryngis, glandularum, columellæ, sicut & in luxatione vertebrarum cervicis.

3. Si asperæ arteriæ caput seu rimula illa per quam aer ingreditur, à re quacunque obstructatur. Et si enim hoc facile non fiat, sed natura ob imminens summum periculum per tussim magno conatu omnia talia excutere conatur: tamen si res ita pertinaciter & fixè rimulæ illi inhæreant, suffocationem inducunt. Ita Hadrianum Pônticem à mulca in fauces inuolante

Dan. Sennerti Tom. II.

suffocatum esse, historiæ referunt; aliosque vix acinis, infantes quosdam nummis seu aliis rebus deglutitis suffocatos esse, ex historiis patet. Potest referri hinc suffocatio ab aqua. Quamquam Platerus ob defectum aeris eam fieri putet.

4. Ipse quidem asperæ arteriæ ductus non facile obstruitur; cum sit satis patens: à vi tamen externa collo constricto, vt fit in strangulatione, via omnis spiritui intercipi potest. Et notabilis est hic historia, quam in viro quodam docto obseruavi. Is enim cum cerasa comederet, accidit, vt cerasi nucleus in asperâ arteriam incideret, & in pulmonem ipsam delaberetur, atque ibi etiam quandam grauitatem pectoris excitaret; post aliquod verò tempus accidit, vt nucleum illum pituita tenaci inuolutum cum vehementi tussi reiceret. Præterea fungorum quorundam esus, vt & alia venena strangulare solent; quod proculdubio fit, cum ob membranam, quam œsophagus habet cum aspera arteria & larynge communem, laryngis rimâ contrahitur & coarctatur. Ita ex medicamento sursum ac deorsum purgante ferè suffocatus Vnctor apud Harpalidum, lib. 7. epidem.

Accidit etiam in apoplexia suffocatio, cum motu thoracis omni & membrorum respirationi interuentum læso nulla sit respiratio.

Tandem etiam in catarrho subito & confertim ad pulmones ruente suffocatio fieri potest, qui catarrhus idcirco Suffocatiuus appellatur, de quo, lib. 1. part. 2. in fine dictum.

Pertinet huc & aer, qui attrahitur, ventilando calori ineptus & suffocans, qualis est ille, qui è carbonibus accensis, vt & qui ex cloacis, sentinis & puteis exhalat; cuius rei exempla duo habet Christoph. à Vega, Ariæ med. lib. 3. f. 5. cap. 8. & aliquot etiam Marcellus Donatus, de hist. med. mirab. l. 2. c. 6. Disputatur quidem hac de re inter Medicos, vt etiam, lib. 1. part. 1. cap. 7. dictum est, an magis cerebrum, an verò magis pulmones & cor afficiantur. Et quidem Marcellus Donatus, loco alleg. cerebrum præcipuè affici statuit, Et negari non potest, cerebrum & spiritus animales affici, vt exempla ab eodem allegata testantur. Quidam enim postea resoluti sunt, quidam delirarunt. Verum nec hoc negandum, organa respirationi dicata simul affici. Aer enim istis fumis infectus calori cordis ventilando ineptus est: cuius rei indicium est, quod nonnulli periculo suffocationis cessante febris correpti sunt.

Pertinet huc & illa suffocatio, cuius Aretæus, lib. 1. c. 7. de caus. & sign. acut. morb. mentionem facit, cuius etiâ suprâ, part. 1. c. 4. d. Aëngina, mentionem fecimus, quæ fiat spiritus praua conuersione ad calidissimū & siccissimū, nulla corporis parte inflammatione laborante. Et si verò alij aliter hac de re disputent, & in loco illo Aretæi explicando multum laborent, tamen comodissimè mihi explicari videtur, si dicamus, spiritum sæpe ita esse inflammatum, calidum & siccum, vt ei refrigerando aer externus, qui spiritu attrahitur, nõ sufficiat. Cui hoc addi potest, quod spiritus ille habere potest prauam qualitatem & insignem exsiccandi & constringendi vim, ob quæ organa spirationis constringuntur & coarctantur, vt respiratio libera fieri non possit. Similem huic affectum describit Hippocrates, 4. de rat. vict. in acut. text. 31. ad 35. cum quo tamen catarrhus fuit coniunctus.

## Prognosticum.

Strangulati aut suffocati, non tamen mortui, ad se non redeunt, quorum circa os collecta spuma apparet, 2. aph. 34. Non tamen hoc vniuersaliter verum est, vt Galenus. in com. addit: Nonnulli, quibus strangulatis spuma circa os apparuit, sibi sunt restituti, vt etiam duo exempla obseruauit Christoph. à Vega, loco alleg. quamuis id rarò accidat.

Prognosticū.

R R 1 2

Curatio.

## Curatio.

Curatio.

Cum verò morbi plerique à quibus istæ suffocationes pendent, suprà cum curatione explicati sint, saltem hic, quomodo strangulatis & aquâ & fumo suffocatis succurrendum sit, dicemus.

*Laqueo strangulati quomodo curandi.*

Qui laqueo penè strangulati sunt, iis laqueo soluto acerum cum pipere, aut pulegium tritum, vel semen vrticæ cum vino aut mulso, vel aromata cum vino propinanda sunt, & collum lanâ oleo irino calente madidâ inuoluendum. Possunt etiam commodè exhiberi aquæ epileptica, vitæ, cinamomi, & reliqua, quæ ad manum sape sunt.

*Ex vaporibus seu fumis suffocati.*

Eadem etiam iis, qui ex vapore eloacatum, puteorum, cauernarum, seu fumis carbonum suffocantur, exhibenda, vt & ea, quæ suprà, lib. 1. part. 1. cap. 17. sunt proposita.

*Ex submersione in aquam.*

Si verò ex submersione in aquam quis suffocationis periculum incurrat, is aquâ ereptus moueri debet, & capite deorsum inclinato ac pedibus eleuatis, ac pennâ oleo intinctâ, vel digito ori immisso vomitus prouocandus; vel exhibeatur decoctum hordei, ficium, glycyrrhizæ, adiecto butyro & saccharo; vel decoctum florum chamæmeli cum cereuicia. Postea verò vinū meracius vel mulsa exhibenda, & etiam aliquæ aquæ vitæ. Simul æger in calido conclaui seruandus, & suffumigia instituenda, sorbitiones quoque decocto farinæ cicerum exhibeantur.

*A fungis venenatis.*

Si suffocatio à fungis venenatis immineat, vomitus statim concitandus decocto raphani cum oxymelite, vel salis vitrioli ʒ. ʒ. cum oxymelitis ʒ. iij. propinanda. Postea absinthium & melissa in vino infundantur, & vinum exhibeatur.

Cum Pausaniæ puellam, lib. 7. epid. suffocatio ex fungi esu apprehendisset, ei profuit mulsa calida epota & vomitio balneumque calidum. In balneo fungum vomitione reiecit, & cum cessatura essent symptomata, sudore detenta est.

## CAPVT IV.

## De Vitiis Vocis &amp; Sermonis.

*Vitia vocis & sermonis.*

Cum in homine aer, quem spirando attrahimus & efflamus, non solum ventilando cordis calori, sed & voci & sermoni formando inseruiat, ordo postulare videtur, vt post respirationis vitia etiam de Vitiis Vocis & Sermonis dicamus.

*Non omnis sermo vox est.*

Non verò omnis sermo vox est, sed qui solum ab animalibus prouenit; & quidem, vt Iulius Cæsar Scaliger, de causis ling. lat. c. 4. definit, est vox sonus ex ore animalis: sermo verò dispositio vocum articulatarum, ad interpretandum animum. Et omnis vox, vt, ibidem, Scaliger docet, est ab animi affectu.

*Vox animalibus cur data?*

Est enim data animalibus ad expressionē voluntatis. Neque tamen omnis vox articulata est, sed multæ voces ab affectu proficiunt, quæ sunt inarticulata, vt gemitus & sibilus venenatorum.

*Vox articulata.*

Est autem vox articulata, quæ scripto excipi atque exprimi valet; inarticulata, quæ non. Et articulas voces à brutis non excludit Scaliger; cum ouium voces adedè clarè scribi possint vt ab ipsis vocabulum apud nos sumptum, balare. Et sit, vt pleræque brutorum voces non sint articulata; ad animi tamen affectum significandum compositæ sunt; de quo Lucretius, lib. 5.

*An etiam sit brutorum.*

quod secla ferarum  
Dissimiles soleant voces variasque ciere,  
Cum metus, aut dolor est, & cum iam gaudia gliscunt,  
Quippe etenim licet è rebus cognoscere apertis.  
Irritata canum cum primum magna molossus  
Mollia ricta fremunt, duos nudantia dentes,  
Longè alio sonitu rabie distincta minantur,

Et cum iam latrant, & vocibus omnia complent.  
At catulos blandè cum lingua lambere tentant,  
Aut ubi eos iactant pedibus morsuque petentes,  
Sussensos teneros nituntur dentibus haustus,  
Longè alio pacto gannitu vocis adhalant,  
Et cum deserti banbantur in edibus, aut cum  
Plorantes fugiunt submisso corpore plagas.

Verum de humana voce hic agere nobis propositum est. Et si verò vox ex aëris è pectore efflatione fiat: tamen non quælibet efflatio vocem parit. Si enim sit illa lenis, saltem sit expiratio sine voce. Vt verò vox fiat, vehementiore efflatione opus est. Neque tamen omnis vehemens efflatio vox est: neque tussis propriè vox nominatur, sed quæ sit anima & voluntate dirigente ad sensus animi patefaciendos.

Materia autem vocis est aer seu spiritus, qui expirando emittitur & ad organa vocis alliditur.

Organa verò vocis & sermonis formandi quod attinet, equidem ad aërem efflandum etiam requiritur pulmo & musculus thoracis, vt & arteria aspera, quæ aëri transitum præbet: verum propria instrumenta vocis edendæ non sunt.

Quod primò ex eo patet, quòd, si infra caput arteria incidatur, expiratio quidem fit, sed non vox editur, quæ non fit nisi aër per asperæ arteriæ caput seu laryngem, & quidem per eius rimulam, emissio. Atque ita larynx proprium & primum vocis formandæ organum est. Atque idedè etiam rerum opifex laryngi varios musculos tribuit, vt pro libitu eius rimula dilatari & constringi possit. De cuius constitutione artificiosissimè videantur Anatomici, & inter eos præcipuè Hieronymus Fabricius ab Aquapend. lib. de larynge & vocis organis. Et si verò vocis organum primum sit rimula illa laryngis seu γλάρτις: tamen ad vocem articulatam & inprimis sermonem formandum non sufficit illa aëris è pulmone per rimulam laryngis efflatio, sed præterea requiritur gurgulio, qui inde plectrum vocis nominatur, lingua, palatum seu oris cælum, quod appellant, dentes. Vnde videmus, si harum partium aliqua defit, vel vitiata sit, vt gurgulio præfectus seu erosus, lingua præcisa seu alio modo vitiata, si palatum vlcere perforatum, si dentes elisi sint, seu exciderint, ex his omnibus vitiis vocem vitari.

## Differentia.

Sunt autem variae vocis differentiae. Aliæ quidem naturales voces, vt sunt magna seu grandis, & parua; lenis, aspera, acuta, grauis, de quibus non nostri instituti, sed Physici est, agere: aliæ voces præternaturales cuius etiam differentiae multæ ab Autoribus recensentur, & ab aliis aliter. Verum commodissimè voces p. n. secundum differentias actionum læsarum distinguuntur, quod scilicet vox vel aufertur, vel immittitur, vel deprauatur. Vocis defectus ἀγρωία appellatur, cum scilicet homo planè vocem edere non potest qui verò loqui non potest, mutus dicitur; qui difficulter verò loquuntur, ὀμιχάλοι nominantur. Deprauata verò vox est, rauca, obscura, tremula, abrupta, clangosa, de quibus postea in causis dicetur. Pertinet huc & Balbuties & omne illud vitium, cum homo sermonem non facilè, & non nisi cum magno conatu ac crebra hæsitatione, inchoare potest.

## Causæ.

Cum autem ad vocem & sermonem formandum concurrant larynx, eius musculi, & qui iis inseruntur nerui recurrentes, aspera arteria; & ad aëris efflationem pulmo, & thorax cum suis musculis, præterea lingua, cælumella, palatum, dentes necessarij sint: vocis & sermonis læsi causæ in his quærendæ sunt.

Primo

Primo ergo vocem abolitam & interceptam ac imminutam quod attinet, tollitur seu imminuitur vox vel principio neruorum affecto, vel vocalibus instrumentis, vel deficiente vocis materia. Vox & sermo aboletur ob cerebrum, neruorum principium, affectum in apoplexia; epilepsia, cerebri concussione & commotione, vt & in syncope, & vteri suffocatione ac similibus affectibus, ob quos spiritus animalis influxus prohibetur. Inprimis vero in affectu illo, qui *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀποπληξίας* appellatur, & neque ad apoplexiam neque ad epilepsiam commodè referri potest, sed inter eos quidam affectus medius videtur. Quem etsi in praxi saepe obseruauerim, vt ex historiis annotatis, quas suo loco proponam, patet, descriptum tamen inuenire haecenus apud Autores non potui, nisi nuper apud Adrianum Spigelium, lib. 2. de *Semiviv. cap. 16.* his verbis: *Est morbus in Germania & Pannonia frequens, quem Austriaci, Moravi, & Styri Timorem appellant, inter apoplexiam & epilepsiam quodammodo ambigens. Cadunt enim velut apoplectici sine sensu, non autem motu priuantur, neque tamen conuelluntur, vt epileptici: aliquando stertunt, nec tamen discusso morbo paralytin alicuius membri incurrunt.* Si tamē causa magna sit vehementia, in apoplexiam vel epilepsiam degenerare potest tandemque aliquos hoc modo affectos subito vt apoplecticos mortuos vidi. Talis *ἀπὸ πνεύματος* etiam procul dubio est, quæ fit ex ebrietate, de qua Hippocrates, 5. *aph. 5.* Oritur autem ferè à consensu partium infernarum, & vapore narcotico spiritus animales in cerebro sopiente, seu perturbante; & propterea commodissime inter affectus cerebri refertur.

Instrumentorum verò vocalium causa vox & sermo aboletur seu imminuitur, cum laryngis membrana madefit, & humectatur ab humoribus à capite defluentibus.

Deinde si laryngis rimula angustior redditur seu occluditur à tumore, & compressione vt in angina, & luxatione vertebrarum ceruicis fieri solet.

Tertio, cum musculi laryngem mouentes seu resoluuntur, seu vulnerantur, seu contunduntur.

Quarto, vbi nerui vocales & quicunque voci edendæ inferuientes inciduntur, diuelluntur, intercipiuntur, refrigerantur aut quocunque modo læduntur. Ita refert Galenus 1. *de loc. affect. cap. 6.* cecidisse quendam ab alto in terram, ita vt dorsi initium affligeretur, cumque tertio die, exiguum admodum vocem edidisse, quarto die omnino obmutuisse, resolutaque simul fuisse crura manibus illæsis, sed neque spirationem amisisse, neque difficulter spirasse. Cum enim tota sub ceruice spinalis medulla esset resoluta, accidit thoraci, vt per septum transversum & musculos supernos numero quidem sex, moueretur: quippe nerui ex spinali medulla, quæ in ceruice est, ipsis adueniunt. At intercostalium musculorum nerui, per quos exsufflationem fieri diximus, omnes affecti erant. Cum itaque frustra Medici negotium subirent circa crura quidem, vt pote resoluta, circa guttur verò propter vocis affectum: equidem id interdixit, atque affecto duntaxat loco curationem adhibuit. Proinde finitâ tandem spinalis medullæ inflammatione, à septima die vox restituta est inueni, & crura motionis facultatem recuperauerunt. *Ibidem* refert, fuisse quendam, qui cum ex ceruice strumas in profundo excinderet, ac inter secandum quoddam vas, membranas non specillo secaret, sed vnguibus euelleret, imprudens ob ignorantiam simul neruos recurrentes distraxit, atque hoc pacto quidem puerum liberauit à strumis, sed mutum reddidit. Alium pariter in puero strumas secantem, læso altero neruo recurrente, ipsum sensum fecisse. Similem historiam recitat Amat. Lusitanus, cent. 2. *cur. 70.* Molier Illyrica, inquit, quæ ad caput montis habitat, cum strumam à Gallica scabie originem ducentem in collo haberet, mendicum quidem officio

Dan. Sennerti Tom. II.

Medici fungentem pro sua valetudine accessit, qui indiscretè cum pro ea propulsanda multis vltus esset medicamentis, ita sublimatum, vt eius rescaret radices, loco indidit, à quo alter neruorum ex pectore recurrentium, qui vocem effingunt, inibi corollus est, vnde ipsa paulatim rancefacta vocem verè in torum amisit.

Quintò, si aspera arteria incidatur, etiam vox & sermo perit; cum spiritus voci & sermomi formando necessarius desit: quod etiam fit, si aspera arteria comprimatur; quod fit in strangulatione.

Tandem ob defectum materiæ vox perit, vel imminuitur, vel, vt modò dictum, cum aspera arteria vulneratur, aut compressa spiritui transitum non concedit, seu ob thoracis musculos resolutos. Eius rei exemplum habet Galenus, 3. *de loc. affect. cap. 1.* de quodam, qui nullo in vocalibus instrumentis vitio existente, sed musculis intercostalibus ob casum ex alto resolutis, vocem amisit.

Idem fieri potest, si iidem musculi & membrana constas succingens vulneretur & perforetur. Cum enim thorax contrahi non possit, vocis etiam materia, spiritus, qui efflatur, deest. Non tamen semper ob musculorum intercostalium lesionem vox tota perit, sed solum cum læsio illa magna est. Aliàs enim pro læsionis magnitudine vox saltem ex parte amittitur. Præterea pulmonis vitio idem euenit, qui si sanie vel humore repletus sit, aut aliàs debilis, vt fit in catarrhis suffocatiuis & tabe, vox valde imminuitur.

Accidit idem cum pauca sit efflatio, & spiritus deficit, vt in deliquio, syncope, vteri suffocatione. Quia verò ad sermonem formandum etiam lingua facit, sermo etiam ob linguæ motum impeditum læditur, de quo supra, lib. 1. *part. 3. f. 5. c. 7.* dictum. Vnde etiam citra vocis læsionem locutio interdum aboletur; id quod fit in mutis in priuata resolutione linguæ, qui tamen vocem quandam inarticulatam edere possunt; & fit hoc ob nerui, qui ad tertiam coniugationem tendit, vitium. Quod si magnum sit, & præcipuè si vitium sit à prima conformatione, auditus tum ferè simul, ob illius cum dicto neruo communicationem, læditur; vnde plerique, qui sunt muti à natiuitate, simul surdi sunt. Idem accidit, si defluxio aliqua & humor in musculos linguam ac laryngem mouentes decumbat. Reliqua videantur, loco allegato, de motu linguæ impedito.

Causas vocis deprauatæ quod attinet, sunt nonnullæ congenitæ, & à natura quibusdam est vox aspera; quæ cum propterea à nonnullis inter naturales vocis differentias numeretur, saltem de iis vocum differentiis p. n. agemus quæ à causis p. n. proueniunt.

Et quidem frequentissimè accidit vox rauca, quæ fit à membrana, quæ laryngem & asperam arteriam inuestit, p. n. affectu, exasperata & inæquali reddita. Cum enim aspera arteria læuis facta sit, & si ea bene sese habeat, vox lenis & moderata edatur: si illa naturalis læuitas & æqualitas tollatur, inæqualiter etiam aer allisus repercutitur, atque inde vox rauca efficitur.

Vox rauca.

Accidit hoc primo à nimia humiditate vocis hoc organum irrigante; id quod frequentissimè à catarrho à cerebro delabente, & in organa vocalia irruente accidit, qui in specie Branchus appellatur; de quo Hippocrates, 3. *aph. 13.* *Æstate sicca & aquilonia, autumno vero pluuiofo & australi, vehementes capitis dolores in hyemem incidunt, & ruses & branchi seu rancedines, & granedo, nonnullis etiam tales expectanda.* Deinde idem accidit à ruffi vehementi, qua arteria ob crebram materiæ reiectionem exasperatur; id quod in phthisicis & thoracis suppuratione accidere solet. Idem præstant humores & vlcera vocalium instrumentorum. Vnde lue Venerea laborantes vocem raucam habent. Atque hæ causæ internæ sunt.

Etiam causæ internæ.

Externæ causæ sunt clamor nimius & vociferatio, *Externæ.*

R R r 3

quæ

quæ similem affectionem membranz laryngis & asperæ arteriæ inducunt lassitudini inflammatoriæ in musculis. Aer quoque frigidus inspiratione attractus, vt & succus, venenatus; & vaporibus, fumis & pulvere inquinatus arteriam exasperandi vim habet. Idem præstat potus aquæ frigida, vini vel austeri vel meracioris nimius, cibus & potus falsi & acres.

*Vox obtusa.*

Vox obtusa seu tenebricosa & turbida, vt nonnullis appellatur, fit à pituita crassa & viscida, quæ organis vocis adhærescit, vel abscissione columellæ.

*Tremula.*

Vox tremula fit ex virtutis imbecillitate, cum ob defectum spirituum natura organa respirationis æqualiter mouere non potest; id quod in quibusdam febribus accidit. Interdum idem euenit, vbi in musculos laryngis seu linguæ & nervos his inferuientes humor aliquis decumbit, partesque illas relaxat quasi; id quod ebriis accidere solet. Fit idem etiam ex timore, cum calore & spiritibus ad cor recurrentibus, tum aliæ partes, tum etiâ respirationi & voci edendæ inferuientes iis destitutæ officio suo rectè fungi non possunt; vnde & qui valde timent, pedibus & manibus tremunt.

*Abrupta.*

Abrupta vocis etiam Hippocrates, 4. de rat. viet. in acutis, text. 33. mentionem facit, quam in lib. de Coacis pranotionibus, effractam nominat. Habet autem ea ortu ex imbecillitate facultatis mouentis, & organorum qui spiritus efflationi inferuunt. Vt n. si is, qui folles, quibus organa musica inflant, mouet, sit debilis, nec æqualiter moueat, sed aliquandiu quiescat, sonus interumpitur: ita si muscoli, qui aëri, qui vocis materia est, efflando inferuunt, ob imbecillitatem à mouendo aliquandiu cessent, fit vox interrupta.

*Tarda.*

Vox tarda fit, cum humor in spinalem medullam & nervos musculis thoracis inferuientes effunditur. Tum enim facultas supprimitur, vt libere thoracem mouere non possit.

*Clangosa.*

Vox clangosa est subrauca, sed acuta ferè & sonora, qualem pleraque animalia, quæ collum habent oblongum, vt grues, edunt. Habet ortum hæc vox, vt Galenus, 7. de usu part. cap. 71. prorrhet. com. 1. text. 3. & 17. docet, à siccitate nimia laryngis & asperæ arteriæ, & defectu humiditatis, qua naturaliter arteria irrigatur, & quasi læuigatur; id quod fit in febribus ardentibus & phrenitide.

*Lupi conspectus vitiata vocis causa.*

Tandem referunt etiam inter causas, raucedinis & vocis vitiatæ lupi conspectum, si is hominem obuium prior aspiciat; quam vulgò opinionem etiam Virgilius secutus est, dum scribit;

*Vox quoque Mærin*

*Iam fugit ipsa: lupi Mærin videre priores.*

Vnde etiam habet ortum prouerbiū. *Lupus in fabula*; quo vtimur, cum is, de quo sermo, superuenit, & ita præsentia suâ sermonem interruptit: de quo varij variè disputant, & alij aliam huius affectus causam reddere conantur. Verum prius hic *πότε*, & an sese res ita habeat, quam *πότε* inquirendum censeo.

*Causa sermonis vitiati.*

Easdem ferè ob causas sermo & locutio vitiatur.

1. Quidem ob instrumentorum vocalium & laryngis præcipuè, vitium. Nam si vox sese non bene habet; nec sermo bene sese habet; de cuius causis modò dictum.

2. Propter motum linguæ impeditum; de quo supra, *part. 1. huius libri, c. 9. diximus.*

3. Ob labiorum dentium, palati vitium.

*Balbuties.*

De Balbutie & blæitate eiusque causis, agit Galenus & alij authores *ad aph. 32. sect. 6.* & docet Galenus quod *παραλίζεν* & *παραλίσεν* non vocis, sed linguæ vitium fit, cum scilicet lingua eas voces, quæ per T & R scribuntur, articulatè proferre non potest. Idque acciderè, quia lingua sit molliore ac humidior temperaturâ ac constitutione: quam ob causam pueri balbutiunt; cum muscoli molliores & infirmiores linguam satis stabilire non possint, eo modo, vt in ambulando titubant, Inde etiam ebrii balbutiunt.

### Signa Diagnostica.

Vox & sermo ac locutio læsa, & quodnam vitium sit, facile ab audientibus cognoscitur. Causæ verò signis cognoscendæ. Et quidem externæ faciliè ex relatione ægri atque adstantium cognoscuntur. Internæ etiam suis signis patefunt. Si raucedo sit à catarrho, is adfuit vel adhuc adest, qui faciliè patet. Si à phthisi seu pure & sanie in pectore contentâ & tussi crebrius reiecta raucedo oritur, etiam signa eius aderunt. Ita etiam aliarum causarum, à quibus vox seu aboletur, vel imminuitur, seu deprauatur, signa in morbis, à quibus illa pendent, explicantur.

### Prognostica.

1. Raucedo orta à causis externis seu euidentibus facilius curatur, quàm quæ à causis internis fit.

2. Branchi & coryzæ in valde senibus coctionem non admittunt. 2. *aph. 40.*

3. Vocis vitium, quod fit à columellâ abscissâ vel erosâ, lingua mutilatâ, dentibus elisis vel elapsis, nisi factitij substituantur, non curatur.

4. Ita & motus linguæ inhibitus à ruptione vel contusione nequi, non sanatur.

5. Raucedo per annum vel duos confirmata, vix sanatur.

6. Impeditus motus linguæ in pueris superueniente adolescentiâ & iuuentute interdum cessat, absumptis & exsiccatis superfluis humiditatibus.

7. Balbi alui profluuium maximè corripuntur, 6. *aph. 32.*

8. Raucedines, quæ ob suppurationem vel tabem fiunt, ferè mortem futuram indicant.

9. Cum voce tremula alui præter rationem solutio in morbo acuto, lethalis. Cum enim vox tremula fiat ex insigni debilitate virium, si alui profluuium accedat, vires magis deiicit.

10. Voces clangosæ malæ, & vacillatio mentis cum voce clangosa, linguæque conuulsiones cum tremore, & voces ipsæ obmutescences, mentis alienationem significant. *In Coacis.*

11. Vox effracta ex hypercatharsi ob musculorum thoracis conuulsionem, periculum portendit.

12. *Ἀπώτια* cum singultu pessimæ, 1. *prorrhet. com. 1. text. 23.*

Plura ex voce vitiata in febribus prognostica videantur apud Hippocratem, in *Coacis pranot. & libris prorrheticis.*

### Curatio Raucedinis.

Cum vocis & abolitæ & diminutæ ac deprauatæ varietatis causæ sint, etiam curatio varia pro cassarum varietate instituenda. Cum autem morbi illi, à quibus vocis & sermonis vitia pendent, iam ante explicati sint, pauca hic dicenda restant.

Etenim si cerebri vitio malum hoc accadat, curatio ex iis, quæ, *lib. 1. de apoplexia & paralyfi* explicata sunt, patet.

Cæterum quoque supra, *lib. 1. c. 9. de linguæ motu impedito, eiusque causâ & curatione actum. Dictum, ibidem, de faucium & dentium morbis: parte verò secunda, de asperæ arteriæ, pulmonis & thoracis morbis. Quos qui curauerit, simul & vocis & sermonis vitia, quæ ex iis morbis pendent, tollit. Ideoque saltem quædâ de raucedinis curatione hic adiiciemus; cum vox obtusa & similes eandem ferè curationem habeant. Vox verò clangosa, cum ferè cum febribus acutis coniungatur, ab earum curatione & huius mali curatio dependet.*

Primò ergo si raucedo à catarrho dependeat, irrigante & inæqualia reddente vocis organa, primò dan-

*Curatio raucedinis.*



da opera, vtcarrhus remoneatur, quo præsente vix raucedo tolli potest. Qua ratione autem catarrhus curari debeat, dictum, lib. 1. part. 2. cap. 34.

Deinde danda opera, vt asperitas & inæqualitas à catarrho inducta tollatur, & præcaueatur, ne, si catarrhus adhuc fluat, ab eo amplius vocis organa exasperentur; quod præstant medicamenta Arteriaca ab vsu dicta.

Si ergo catarrhus sit frigidus & tenuis, medicamentis calefacientibus, siccantibus & lenientibus opus est vt diatragacantho calido, melle rosato cum syrupo myrtino mixto, succo glycyrrhiz. amygdalis dulcibus.

Si verò materia sit crassa & viscida, incidenzia, abstergentia, simulque lenientia & vocis instrumenta, lænigantia requiruntur, quæ parantur ex caricis, vuis passis, melle, hyssopo, glycyrrhiza, succo brassicæ cum melle mixto, thure, myrrha, croco, terebinthina, saccharo penidio, cubebis cum passulis tritis mixtis. Et si pituita sit viscida, etiam oxymel scilliticum admisceri potest. Conuenit etiam hic lohoh sanum & expertum de althæa, de pino, de caulibus, syrup. de glycyrrhiza, de hyssopo, pilulæ seu trochisci de benzoë.

Vtile etiam est sequens Eclegma.

℞. Succ. prassij bene depurati ℥.ij. sacch. penid. ℥.j. oxymel. s. vel si maiori incisione opus sit, scillis. q. s.

F. Lambile.

Vel ℞. Pomum, & seminibus exemptis repleatur myrrha, croco, thure, & affetur, ac manè & vespere comedatur.

Vel ℞. Succ. glycyrrhiz. ℥.β. croci ℥.j. myrrh. thuris an. ℥.j. β. gummi tragacanth. Arab. an. ℥. iij. carnis vrium dactylorum, vini dulcis. q. s.

F. Pilulæ sub lingua tenendæ.

*syn. de erys.* Matthias Lobelius syrupum de erysimo, quod laudatissimum arteriacum nominat, commendat, scribitque se eius vsu iuuentulam decennali raucedine laborantem curasse, & alios diuturna & prope inuisa raucedine laborantes erysimi vsu restitutos fuisse.

℞. Erysimi totius recentis M. vj. rad. helenij, tussilag. succo adhuc pregnantium, glycyrrh. an. Vnc. ij. borrag. cichor. capill. ♀, an. M. j. β. flor. cordial. anthos, stœch. vel beton. an. M. β. sem. anisi ℥. vj. passul. mundat. ℥. ij.

Coquantur in s. q. aq. hordei, & hydromelitis, & succi erysimi, ℥. vj. ad lb. ij. vel iij.

Colaturæ adde sacchari q. s.

Fiat Syrupus.

Vel ℞. Rad. glycyrrh. althæa, an. ℥. iij. ireos. fol. erysimi M. iij. tussilag. prassij recentium, an. M. ij. sem. psyllij. cydonior. an. ℥. β. iunib. N. xij. passul. enucleat. ℥. ij. cubebæ. ℥. j. β. Coquantur, & cum s. q. sacchari,

Fiat Syrupus.

Quod si catarrhus sit calidus & tenuis, frigida in crassantia & lenientia requiruntur, vt diatragacanth. frigid. conferva rosar. viol. diacodium, syrup. & lohoh. de papauere, Syrup. rosar. violar. de iunibis, myrtinus.

*d. pur.* Si à pure in pulmone contento raucedo ortum habeat, ad morbum quidem præcipuè cura dirigenda; simul tamen lenientia & lænigantia asperam arteriam modò enumerata vsurpanda.

*d. causis ex-ternis.* A causis externis fit raucedo, iisque siccantibus & calefacientibus. Leuiter itaque refrigerantia & lenientia vsurpanda, vt diatragacanth. frigid. conferva rosar. viol. syrup. & lohoh. de papau. de iunib. & similia.

Si ab aère, potu vel alià causâ frigidâ, calefacientia, modò in raucedine à pituita proposita, vsurpanda.

Tandem si à nimia vociferatione clamore & vocis intentione sit excitata raucedo, conueniunt hîc medicamenta Arteriaca dicta, quod scilicet peculiariter asperæ arteriæ & laryngis affectibus conueniunt. Parantur autem ex amylo, tragacantha, gummi Arabico, glycyrrh. sacchar. cando & penidio, passulis, dactylis, iunibis, sebesten. amygdal. dulc. mucilag. althæa: vnde fiunt syr. iunibinus, capil. ♀, de althæa de glycyrrh. & similia.

Vel ℞. Mucilag. sem. althæa ℥. j. β. conferva. viol. ℥. iij. amyli ℥. ii. sacch. in aqua rosar. solut. q. s.

F. Lohoh.

Vel ℞. Tragacanth. gummi Arab. an. ℥. j. syr. iunib. violar. an. q. s. mucilag. sem. althæa ℥. ij.

F. Lohoh.

Atque hæc inprimis in principio conueniunt. Vbi raucedo iam imminuitur, vt humiditas in parte relicta absumatur, exsiccantibus, discutientibus & extergentibus, sed sine acrimonia opus est. Qualia parantur ex terebinth. melle, amygdalis amaris, iride, styrace, croco, myrrha.

Vel ℞. Gummi iuniper. tragacanth. an. ℥. ij. sacch. penid. ℥. j. succi glycyrrh. ℥. ij. thuris ℥. j. β. styracis calamita ℥. j. croci ℥. j. Cum melle,

F. Eclegma.

Vtile etiam est eclegma de succo brassicæ antea propositum.

Vel ℞. Hord. excort. pass. enucl. an. ℥. j. glycyrrh. ℥. ij. caricar. ping. N. vj. capill. Veneris, hyssop. an. M. j. sem. brassic. ℥. j. pincarum non rancidarum ℥. β.

Coquantur in s. q. aquæ puræ.

Colaturæ pro qualibet libra adde mellis despumat. sacchari albi, an. ℥. vj.

Misce, de quo læpius aliquid bibendum.

Plura videantur apud Galenum, 7. de compos. medic. sec. loc. cap. 1. Aëtium, tetrabil. 2. serm. 4. cap. 51. & 52.

## CAPVT V.

## De Tussi.

**A**D deprauatōs organorum vocis respirationis motus Tussis quoque pertinet, atque inter eos motus est tussis, qui quidem à naturâ sunt, irritata tamen & coactâ, atque à causâ morbificâ stimulata ad expellendum id, quod molestum est; cuiusmodi motus habetur oscitatio, pandiculatio, sternutatio, singultus, vt docet Galenus, lib. 2. de causis sympt.

Est nimirum tussis motus deprauatus seu vehemens efflatio, à veloci pulmonis & thoracis contractione edita, vt id, quod spirandi organis molestum est, excutiat. Seu, vt Auicennas definit? Tussis est motus Naturæ, quo conatur expellere, quicquid lædit, è partibus pulmonis, & partibus proximis pulmonum. Sicut enim in sternutatione cerebrum, in singultu & vomitu ventriculus: ita in tussi thorax insurgit, & plurimo spiritu in pulmonem immisso, forasque iterum, celerimè exploso, atque imperu quodam id, quod molestum est, expellere conatur. Etenim aspera arteria, & eius ramuli per pulmonem sparsi tunica intus obducti sunt, cui exquisita vis inest sentiendi ea, quæ molestiam pulmōni creant, ita vt minimum quodque in asperam arteriam illapsum statim sentiat. Atque ita tussim nihil excitat, nisi quod hanc membranam, quæ intus asperam arteriam, eiusque ramos inuestit, afficit. Sic igitur irritatus pulmo non solum ipse mouetur, sed & in auxiliū musculos thoracis & diaphragma sibi adsciscit, & quod sibi molestum est, expellere nititur.

## Causæ.

Atque ita causâ proxima tussis est, quicquid pulmones, asperamque arteriam, & quidem membranam, qua intus inuestiuntur, afficere potest. Quæ autem id præstant, causæ sunt variæ, vt mox dicemus. Ad duo tamen genera referri possunt. Vel enim hoc præstant, quia angustiam in respirationis organis pariunt, vel quia mordicant, asperitatemque inducunt, atque adeo quocunque modo molesta sunt.

Causas vero omnes tussis, seu angustiam pariendo, seu irritando quocunque modo id præstent, in classes quasdam digeremus & ordine enumerabimus.

Et 1. inter causas tussis est intemperies, & quidem sola ac sine materia etiam tussim excitare potest, sed leuiorem, quam quæ est cum materia. Et frequentissime quidem & maiorem tussim parit intemperies frigida, ut pote quæ pectori maxime inimica est, quæ excitatur ab aëre frigido, de quo Hippocrates, 3. aph. 23. *Hyeme morbi laterales, pulmonis inflammationes, raucedines, tussis fiunt; & ibidem, aphor. 5. Aquilo tussis mouet.* potu aquæ frigida, & præcipue ex niue solutâ, medicamentis frigidis seu assumptis, seu thoraci applicatis. Excitat etiam tussim intemperies calida, sed minorem, qualis est, quæ febribus ardentibus superuenit, quæque ut est apud Hippocratem, 6. epid. sect. 2. sext. 24. est arida & parû irritans, & quæ nõ fit, nisi quâdo loquitur, aut hiat.

Quando autem non loquuntur neque hiant, non tussunt. Siccitas autem præcipue cum frigiditate conjuncta exasperando & irritando tracheam tussim excitat. Hinc, ut Hippocrates, 3. aph. 5. scribit, Aquilo tussis mouet fauces exasperando, & ut Paulus Aegineta, lib. 3. cap. 28. docet, in Aquilonaribus constitutionibus non pauca, neque contemnenda tussis fiunt. Humiditas autem, ut qualitas minime omnium actiua, & quæ potius lenit, quam exasperat, vix tussim inducit; nisi forsân inæqualiter primum inducatur, ubi breuiter leuissimam quandam tussiculam excitare potest, quod tamen rarum. Et dictum est supra de causis, quæ intemperiem pulmonis inducere possunt.

Deinde tussim excitat materia quæcunque in pulmonem & asperam arteriam incidit, aut in ea præter naturam continetur. Materia autem hæc varia est, catarrhus nimirum à capite defluens; atque ita omnes causæ quas supra, lib. 1. catarrhum excitare posse diximus, etiam tussim excitare valent: ut & humor aliquis in cerebro collectus, qui per accessiones febrium mouetur, & à calore febrili funditur; de quo Hippocrates, in *Coacis* *Qui circa accessiones tussunt, & leniter resudant, malignè habent. Et ibidem; Ex insania in raucedinem cum tussi sit abscessus.* Sicut & materia parotides excitans: de quo idem Hippocrates eodem libro, & in *prorrhet.* *Abscessus ad aures solunt tussicula cum spurationibus.* Idem efficit sanguis è vase in pulmone rupto fluens, vel erosâ in pulmones irruens. Item humor in pulmone collectus in phthisi, peripneumonia, vomica pulmonis; vel aliis vicinis partibus communicatus: ut in pleuritide & hydrope pectoris fieri solet. Pertinent huc & grandines, calculi, ac vermiculi in pulmone geniti. Idem præstant etiam res externæ in tracheam illapsæ.

Cum enim spiritui, quem trahimus, diu carere non possimus, organa, per quæ ille admittitur, vacua esse decet. Ideoque ne aliqua substantia præter aërem in asperam arteriam eiusque ramos per pulmones dispersos ingrediatur, caput asperæ arteriæ epiglottide seu operculo quodam Creator sapientissimus muniuit, ut sic quidem aëri ingressus pateat, à cibi verò potusque pondere depressum esculentis & potulentis aditum denegat, ut Galenus, 4. de usu part. cap. 8. docet. Quod tamen si fortuito fiat, ut interdum inter loquendum & ridendum, & infantibus inter lac sugendum accidere solet, periculum suffocationis inde imminet, à quo ut natura se se liberet, vehementissimam tussim excitare, nec prius desistere solet, quam omne id quod molestum est, excusserit.

Tertiò inter causas tussis est soluta vitas vasorum in pulmone, siue illa sit vulnus, siue vlcus & erosio.

Quartò excitatur tussis, dum in pleuritide materiæ aliquid ad pulmones mittitur, vel ob membranarum consensum pulmones irritantur. Pertinent huc & diaphragmatis inflammatio & tubercula in spina enata; quod gibbis familiare est, teste Galeno, 6. aph. 46. Imò ipsa luxatio vertebrarum dorsæ.

Ex quibus omnibus colligitur, tussim propemodum omnium thoracis & pulmonis morborum symptoma inseparabile esse, ut pleuritidis, peripneumoniæ, vomica pulmonis, sputi sanguinis, phthisis, & similibus.

Causæ verò extrapulmonem & thoracem consistentes, & quæ ita per *συμπύκνωσιν* tussim efficiunt, etiam variæ sunt.

Quintò nimirum tussis excitatur hepate, liene, ventriculo intumesciente aut inflammato, ut & in hydrope, siue id fiat, quod pulmo comprimitur, siue quod obstruitur, aut molestatur à materia ad pulmonem redundante, siue quod partium vicinarum membranæ affectæ membranas organorum respirationis in consensum trahunt & vellicant, siue quod vapores aliqui ad organa respirationis transmittuntur, eaque siue obstruunt, siue mordicant, id quod etiam interdum in febribus accidere solet.

Externæ tandem causæ etiam variæ sunt.

Sextò enim præter aëris intemperiem, ut & potus ac medicamentorum qualitatem, quæ asperæ arteriæ intemperiem inducunt, tussim excitare valent causæ aliæ quoque externæ, irritando & exasperando nimirum asperam arteriam, ut, fumus, puluis, & ut Auenrohis, 3. coll. cap. proprio monet, præcipue puluis ex lino, dum pectinatur, & ex veteri tritico, dum cribro excutitur. Puluis item & vapor calcis, & metallorum ac mineralium. Quò pertinent austera, acida, adstringentia, pingua & rancida præcipue, ut nuces, & oleum rancidum. Vocis item intentio nimia. Referendi huc & lumbrici ac vermes in intestinis, & ventriculo geniti, qui ipsi etiam tussim excitant, vapores, ut nonnullis placet, putridos & malignos ad pulmones mittendo, vel, quod probabilius est, membranam œsophagi vellicando, quæ membranam asperam arteriam inuestientem in consensum trahit. Profundior etiam styli purgatorij in aures immissio tussim excitat, communicatâ scilicet hac irritatione tracheæ per neruulum quinti paris utrique parti communem.

### Differentia.

Primò est tussis differentia secundum magnitudinē. *Differentia.* Nam datur tussis quædam planè exigua, aut potius ad tussendum quidam impetus, & tussendi initium, quod Græcis *κίχρυς* dicitur. Ut enim vomitum nausea præcedit, ita tussim *κίχρυς*, ut docet Galenus, 2. de caus. sympt. c. 4.

Deinde tussis alia est arida & sicca, quæ *διήκων* facit, nec pituitam citat. ut Celsus, lib. 4. cap. 4. habet: alia verò humida. Sicca seu arida est, in qua nihil expuitur, atque fit hoc, vel quia causa, quæ tussim excitat non in organis respirationis hæret, vel licet ibi hæreat, inepta est ad excretionem. Prius accidit; cum aspera arteria vel intemperie afficitur, vel exasperatur, vel membrana asperam arteriam & eius ramos inuestiens vellicatur à vaporibus ab inferioribus ascendentibus, siue comprimitur, aut à vicinis membris affectis in consensum trahitur, vel tenuis paucusque humor à capite destillat. Aut aliunde transsudat, ut Galenus, 4. aphor. 5. 4. docet. Posterius verò accidit, ubi in respirationis instrumentis humor hæret, qui eiici non potest, vel quia ob lentorem & crassitiem bronchiis pulmonis nimis tenaciter adhæret, vel quia ob tenuitatem inter eiiciendum disploditur à spiritu, ut & in pulmonem relabatur, ut Galenus, 1. epid. comm. 1. text. 12. docet. Humida tussis est, quando humor aliquis tussiendo eiicitur, atque oritur ab aliqua mediocris consistentiæ materia pulmones & tracheam irritante, quæ cum spiritu tandem expellitur.

Tertiò tussis aliqua vehemens est, quæ suppressi nequit; alia mitis. Vehemens Hippocrati, *σφοδρὴ* ut nominatur, atque oritur ab humore magna vi destillante, vel

vel vlcere organa respirationum obsidente, vel ab abscessu genito ibidem, vel ab empyemate.

Mitis fit ab intemperie organorum respirationis; vel ab asperitate faucium & tracheæ, vel à pulvere, & aliis exasperantibus, vt & ab ambiente aëre, vt docet Galenus, 6. epid. comm. 2. aph. 24.

Quartò tussis quædam frequenter molestat, & ferè continuò ægrum affligit; quædam per certa intervalla corripit, prout causâ tussim excitans nunc semper præsens est, nunc per intervalla colligitur & recurrit.

Verùm præcipuæ & ad curationem maximè cognitiuæ necessariæ sunt differentiæ, quæ à causis desumuntur. Ideoque secundum causarum differentiam postea etiam curationem in certa quædam capita distinguemus.

### Signa Diagnostica.

Tussis ipsa aded evidens symptoma est, vt signis ad eius cognitionem opus non sit. Verùm cum causæ, à quibus excitatur, variæ sint, omnino signis opus est, quibus illæ cognoscantur, ne Empeiricorum more cum ægri damno cuilibet tussi quodvis remedium applicetur. Signa ergo causarum, vt supra eas recensuimus explicabimus.

Ab intemperie nuda primò si fit tussis, abest catarrhus, alique morbi, qui materiam tussis causam suppeditant, vel etiam in consensum pulmonem trahere possunt: contrà præcesserunt causæ, quæ intemperiem aliquam pulmonis inducere potuerunt, quæ ipsæ etiam hoc capite, & supra, part. 1. huius libri, de intemperie pulmonis enumeratæ sunt. Adest difficultas spirandi, tussis ipsa est sicca, nec ita vehemens & pertinax, facilè quoque supprimitur.

Qualis autem intemperies sit causæ inprimis, quæ præcesserunt, vel ad sunt, indicabunt, iuvantia item & nocentia. Etenim si à frigiditate sola sit tussis, cohibito spiritu non solum reprimitur sed & sanatur. Audus enim tum in organis respirationis calor intemperiem illam corrigit, ægrotique aliis etiam calidis, vt potu & cibo, iuvantur; frigido offenduntur. Ideoque ægri calidum aërem amant, & linteolo manibus & ori admoto, spiritum trahunt, ne mox frigido aeris impulsu tussis irriteretur; vt hac de re scribit Galenus, 6. epid. comm. 2. s. 24. Sitis etiam abest in hac intemperie.

Contrà si tussis sit ab intemperie calida, sitis molesta est, quæ potius aeris frigidi inspiratione, quàm potu frigido sedatur, vt docet Galenus, art. med. c. 64.

A catarrho tussis proveniens, è signis catarrhi supra, lib. 1. propositis, patet, tussisque est vehementior & perseuerans. Si verò absque catarrho à materia in pectore contenta tussis concitetur, aderunt morbi tales, vt pleuritis, peripneumonia, empyema, phthisis, grandines, calculi, vermes, hydrops pulmonis, & similes morbi, in quibus materia tussim excitans colligitur, qui supra part. 1. huius libri, explicati sunt.

Quæ tussis quibusdam intervallis, vt bis terte anno affligit, ex irruente destillatione proficiscitur: quæ verò continenter, aut minimâ intermissione fatigat, aut vitiosam pulmonum affectionem, aut obstructionem veterem, aut aliam stabilem intus causam habet.

Si verò asperitas à causis externis inducta sit, vt à fumo, pulueribus, cibis vel medicamentis exasperantibus, illæ per se parent, Si tandem morbi extra thoracem, pulmones in consensum trahendo quocunque modo, tussis causæ sunt, vt hydrops, ventriculi, hepatis, lienis tumores & inflammationes, affectus illi ex suis signis parent.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Tussis frequens & diuturna plerumque ad sangui-

nis sputum perducit, teste Avicenna, propter vehementem thoracis motum, à quo ruptura vasorum pulmonis metuenda est, ac præsertim in adultis, quorum membra duriora concussionis violentiæ non ita cedunt. Quod si materia tussis non eiiciatur, intus putrescens vel febrem putridam aut hecticam gignit, vel vlcus excitat. In prægnantibus talis tussis abortum ciere solet.

2. Tussis vehemens interdum suffocat, non tam re aliqua obstruente, quàm iteratâ sine intermissione, valida efflacione, & quod aer inspiratus priusquam ad cor perveniat, è pulmone mox iterum eliditur.

3. Tussis valida pectoris pulmonisque partes calefacit, ideoque febrem accendit & sitim augeat. Quæ verò exiguæ tussis sunt, ac per longiora intervalla excitantur, tantisper membra illa concutiunt, donec ad ea humiditas aliqua irruens deferatur, quo fit, vt ægri intus sicciosi reddantur. Galenus, 6. epid. Comm. 2. text. 24.

4. Tussis caput nihil iuvat. Galenus, 2. de sympt. causis, cap. 4. ac si violenta fuerit, ipsum replet, 6. epid. f. 3. text. 18. Neque enim, vt sternutatio, morum cerebri in expellendo iuvat, sed ipsi potius nocet.

5. Tussis ex intemperie organorum respirationis periculosa equidem non est: Negligi tamen non debet; sicut exemplo docet Galenus adolescentis, qui ex tussi à causa frigida dimidiam heminam sanguinis reiecit, 5. meth. med. cap. 13.

6. Tussis ex catarrho periculosior est, quàm ab intemperie nuda, & si frequens ac diuturna sit, ad sanguinis sputum sæpe deducit, teste Avicenna, imò experientia, propter vehementiorem thoracis motum, à quo ruptura vasorum pulmonis metuenda est, præsertim in adultis, quorum membra duriora motui violento non cedunt; aut si materia tussis non reiciatur, intus putrescens vel febrem, vel vlcus & hinc phthisin generat. Periculosa etiam est tussis, si materia è capite destillans tenuis & acris est. Nam siue retineatur in pulmone, intus putrescens pulmonem erodit & exulcerat, siue eiiciatur, tussis violenta metum affert, ne vas aliquod rumpatur. Galenus 6. epid. com. 3. text. 18. Ideoque diligenrer est laborandum, vt destillationes tales acres à pectore auertantur, ne hominem in tabem deducant.

7. Tussis etiam à catarrhis in senibus periculosa sunt, quoniam in iis non maturantur, 2. aph. 40. & vt Galenus inde rectè colligit, eos usque ad mortem committantur.

8. Hydropi si tussis superueniat, malum, 6. aph. 35. Serosa enim humiditas ita tum augetur, vt contineri tota in abdomine nequeat, sed pars quædam in thoracem, & asperas pulmonis arterias transponatur.

9. Tussis, quæ ex vicinarum partium consensu oritur, per se periculosa non est, sed sublati illis morbis earumque causis tollitur.

10. Tussis à fumo vel alia causa asperæ arteriæ inæqualitatem & asperitatem inducente absque periculo est, & ferè causa ablata cessat.

11. Tussis infantium diuturnæ & vehementes deterrimæ; quoniam respirationem & somnum impediunt. Sæpe etiam ex multâ agitatione febres acutas & epilepsiam excitant. Non raro denique herniam.

12. Qui gibbi ex asthma & tussi ante pubertatem fiunt, ij statim moriuntur. 6. aph. 46.

13. Tussis in febribus abscessus futuros sæpe prænunciant, non quod ipsa materia ex pectore ad articulos decumbat, sed potius, quod febres, quæ tales tussis habent comites, in abscessus terminantur; de quo vide Hippocratem, 2. epid. f. 2. & Galenum, in com. ubi verba enarrat: Quæ tussi parum & nihil notabile reiciebat, ei manus dextra & crux sinistram resoluta sunt.

14. Tussis in febribus cum destillatione coniunctis quando exacerbantur, febriles accessiones instare indicant,

indicant, & aliquando malum significant, vt Hippocrates docet, in *Coacis*, dum scribit: *Qui circa accessiones tussium: ac leniter desudant, malignè habent*; ij scilicet, qui vehementer tussunt, ita, vt tussi vehementi vires deliciantur, somnusque turbetur, vt ex fatigatione magna circa collum & frontem sudare incipiant.

15. Febres cum tussi si soluantur, tussis verò remaneat, recidiuz periculum minatur.

### Indicationes.

**Indicationes.** Ad duo in omnis tussis curatione attendendum, primo ad causam, quæ tussim excitat; secundo ad ipsam tussim. Causæ tussim excitantes cum variæ sint, vt ex iis, quæ de causis dicta sunt, patet, quælibet etiam peculiarem indicationem suppeditat. Intemperies nimirum per contraria alteranda; si à catarrho sit tussis, curatio catarrhi modo, *lib. 1.* descripto, instituenda. Si à materia citra catarrhum in pectore hærente, vt pure, grandine, vel vermibus fiat tussis, materia illa eiicienda. Si à causâ externâ exasperante tussis proueniat, causâ illa amouenda, & aspera arteria læuiganda. Si à partium vicinarum morbis, & pulmonis seu compressione, seu irritatione fiat tussis, morbi illi conueniente modo curandi.

Ipsam verò tussim quod attinet, etsi, vt alia symptomata, etiam commodissimè tollatur causâ sublata, & propterea si mitis sit tussis, ipsa neglecta à causâ ablatione curationis initium faciendum sit: tamen sæpe tussis tam vehemens est, vt omnem curationem Medicique consilium ad se trahat, & postpositâ causâ, ipsi statim succurrendum sit: id quod sæpe accidit, cum tussis tam vehemens est, vt ne vasa rumpantur, meruendū sit, aut ne à continuis vigiliis febris accendatur, aut timendum sit, ne in grauida abortus aut in infante ruptura accadat. Tum igitur danda opera, vt tussis sedetur.

### Tussis, quatenus talis, Curatio.

*Curatio tussis quatenus talis.*

Cum verò tussis illa vehemens sit ab asperitate aliqua in aspera arteria, eiusque ramis, & irritatione organorum respirationis, quæ naturam ad expulsionem stimulat; duobus omnino modis tussis mitigari potest, vel asperitatem leniendo & læuigando, vel sensus acrimoniam obtundendo, & quasi sopiendo. Prius præstant pægorica, aut lenientia dicta medicamenta, quæ lentore quodam viarum respirationis asperitatē æqualem reddunt, qualia sunt, lactis omne genus, amyllum, prifana, oleum amygdalarum dulcium, tragacantha, gummi Arabic. mucilag. sem. cydon. psyllij, syrupus de iniubis.

Sensus verò acrimoniam retundunt & tollunt papauer, & medicamenta ex papauere parata, vt syrup. de papau. & diacodion, vt & ex opio confecta, quæ somnum inducunt, & sensus acrimoniam obtundunt, qualia sunt, theriaca recens, Philonium Roman. pilulæ de cynoglossa, trochisci de carabe, laudanum opiatum.

### Curatio tussis ab Intemperie.

*Curatio tussis ab intemperie.*

Qua ratione intemperies tracheæ & pulmonis curanda sit, *suprà, part. 1. huius libri cap. 1. & 2.* dictum quæ omnia etiam in hac tussis specie curanda locum habent. In tussi nimirum ab intemperie frigida aër, in quo versatur æger sit calidus, spiritus retineatur, vt ab eo pulmones incalescant, cibus & pus sint calidi, atque in primis vtile est vinum generosum subdulce. Exhibeatur succus de glycyrrh. & de hyssopo. Topica pectori applicentur, pectusque inungatur oleo chamæm. lilior. albor, & similibus. Eodem modo intemperies reliquæ curentur, vt, loco allegato, dictum.

### Curatio tussis à Catarrho.

Qua ratione catarrhus seu materia ad pectus tuens euacuanda, auerenda, deriuanda, intercipienda sit, *suprà, lib. 1. de curatione catarrhi, dictum.* Frustra enim in tussi curandâ laboramus, nisi catarrhus, eius causa, prius sistatur & tollatur. Hic ergo nihil aliud restat, nisi vt dicamus, quid materia, quæ in pectus illapsa est, requiratur.

Cum autem materia illa sui euacuationem indicet, compertum quidem est, materiam è pectore etiam per vrinam & aluum euacuari posse: verum id rarissimè & in aliis potius pectoris affectibus, quàm tussi accidit. Ideoque nullus alius commodior modus est, quàm vt materia in pectus illapsa per tussim reiciatur.

Medicamenta autem, quæ hoc præstant, inæqualitatem & asperitatem leniunt, & humectant, & humores ad expulsionem aptos reddunt, viasque disponunt, vt minore cum dolore reiciantur; sopitam item & imbecillum facultatem ad eiiciendum per tussim materiâ stimulant, quæ medicamenta, *ἀσπληνὰ* & *βήχικα* nominantur, quæ tamen pro diuersitate materiæ habent aliquam varietatem.

### Syrupus catarrhalis. vel pectoralis D. Casp. Kegleri.

*℞. Rad. polypod. ℥. j. B. glycyrrh. rasa, farsara, an. ℥. vj. herb. salua, hyssop. betonic. an. M. ij. prassij M. j. B. sem. 4. frig. maj. c. cori. conuass. ℥. B. bombac. ℥. iij. passul. enuc. ℥. j. B. sebesten. ℥. ij. iuiubar. ℥. j. caricar. N. vij.*

Bulliant l. a. in aq. hord. ad tertias.

Circa finem add. sol. sena Alex. s. st. ℥. ij. zingib. ℥. B. agar. troch. ℥. iij. turbit. gum. ℥. ij.

Huius colatura clara *℞. ℥. iij.* postea add. sacch. candi *℥. j. croci ℥. j.*

Denuo .coq. parum ad syr. consistentiam,

Vltimò depuretur per resident, & clarificetur.

### Aqua catarrhalis.

*℞. Herb. veronic. scabios. an. M. j. capilli ♀. hyssopi, adia. rh. nigr. fragar. meliss. marrub. an. M. iij. rad. neos, angelic. eryng. glycyrrh. an. ℥. j. myrrha ℥. ij. croci integr. ℥. ij. piperis alb. ℥. j. caricar. N. viij. scilla præp. ℥. ij. Drach. iij.*

Infund. cum spir. vini puriss. *℥. vij.* aq. fragor. scabios. an. *℥. j.* aceti vini *℥. j.*

Destillantur per M, B.

### Curatio tussis à Materia calida, tenui & acri.

Si ergo materia sit calida, tenuis & acris, post vniuersalia illa præsidia euacuantiâ, reuellentia, intercipientia, & catarrhum sistentia, vtendum est medicamentis refrigerantibus, humorem incrassantibus, acrimoniam eius obtundentibus, atque omnino cum concoquentibus, & ad mediocrem quandam crassitiem redigentibus, & ad exclusionem præparantibus, arteriamque asperam lenientibus. Cum enim, vt Galenus, *3. de rat. viſt. in acut. 1. 2.* ait, aër tanquam manus sit, quæ sursum humores è pulmonibus effert, spiritum, vt non nimis crassum & viscidum esse decet, quodque visci instar organum respirationis adhærescat; ita nec nimis tenue esse oportet. Tenuis enim humor inter tussendum ab aère disploditur, & non eiicitur, sed in pulmones relabitur. Galenus, *2. de caus. sympt. cap. 4. 6. epid. f. 3. t. 1. 8. 4. de loc. affect. cap. 8. 2. de crisp. cap. 10.* Talia medicamenta sunt syrupus de iniub. de violis, de papauere, diacodion Montani, mucilago sem. psyllij, cydon. succus glycyrrhi, cum amylo, coaserua rosatum



rosarum & violar. cum bolo Armeno, emulsio seminis papaver. albi.

*Syrupi.*

℞. Hord. M. B. sem. 4. frigid. maior. an. 3. j. papau. albi Drach. ii. glycyrrh. 3. i. B. iunib. N. x.  
Coq. in f. q. aqua f.  
Colaturæ ℞. Vnc. x.  
Add syr. violar. de iunibis, de papau. an. Vnc. ij.  
M. pro 4. Dosibus.  
Vel ℞. Iunib. sebesten. an. N. xv. passul. Vnc. B. glycyrrhiz. sem. althæa, an. 3. ii. cydon. Drach. i. rad. alth. Drach. ii.  
Coq. in aq. hord. f.  
Colaturæ ℞. ℥. j. syr. viol. de iunib. an. Vnc. ij.  
Misce.

*Alius syrupus contra tussim.*

℞. Rad. tussilag. glycyrrh. rase, an. 3. v. helenij, althæa, ireos Florent. an. 3. iii. fol. malue, cum radicib. capill. ♀ tussilag. an. M. j. violar. veronic. scabios. an. M. B. hordei mundi M. j.  
Ebulliant aliquoties, add. hyssop. M. j. sem. malu. cydonior. an. Drach. i. fœnic. Drach. j. B. ficum ping. dactylor. an. N. iii. iunbar. sebesten. an. N. v. vuar. passar. ab arillis mundat. 3. j.  
Decoq. omnia cum aq. f. ad ℥. j.  
Factâ colatura cum forti express. add. syr. de glycyrrh. de iunibis, an. 3. i. capill. ♀, 3. B. sacch. cand. albi 3. j. penidij, q. f.  
Ebulliant ad consistent. Syrupi.  
Alius: ℞. Rad. glycyrrh. 3. B. tussilag. 3. iii. althæa, helenij, an. 3. j. B. herb. capill. ♀. endiu. scabios. an. M. j. fol. tussilag. betonic. hyssopi, veronic. an. M. B. hordei mund. M. j. ficum, dactylor. an. N. iii. iunbar. sebesten. an. N. v. passular. sine arill. 3. B. flor. viol. borragin. cichorij, malu. an. P. j. sem. cydonior. malua, cucumer. an. Drach. j.  
Coq. in aq. scabiosa & tussilag. an. q. f.  
Colaturæ ℞. ℥. j. & 3. ij.  
Add. syrup. de iunibis, de glycyrrh. an. Vnc. B. capill. ♀ 3. j. sacchar. cand. penid. an. Vnc. j.  
Coq. ad formam. Syrupi.

*Rotula & Trochisci sublinguales.*

*Trochisci sublinguales.* Sub lingua teneantur rotulæ diatragacanth. frigid. diapenid. trochisci bechici albi.  
Vel ℞. Boli Armena prapar. ver. Vnc. j. B. amyli 3. j. gummi Arabic. tragacanth. an. Drach. B. sacch. cand. penid. an. 3. ij. Cum mucilag. sem. psyllij aq. ros. extract.  
F. Trochisci sub lingua tenendi.  
Vel ℞. Confect. diacodij Mesue cum sacch. parat. spec. diatragac. frigid. sacch. penid. an. 3. ii. boli Armena. 3. B. Cum syrupo myrrino, aut mucilag. tragacanth.  
Fiant Trochisci sub lingua tenendi.  
Vel ℞. Spec. diatragac. frigid. 3. ii. boli Armen. 3. B. sacchar. in aqua rosar. solut. 3. iii.  
Fiant Rotulæ.  
Pastilli vel Trochisci contra tussim:  
℞. Pulv. glycyrrhiz. el. 3. ii. B. sem. 4. frig. maj. an. Scr. ii. anisi, fœnic. an. 3. B. spec. diapenid. diatreos, an. Scr. j. sacch. penid. 3. i.  
Cum infus. tragacanth. cum aqu. hyssopi.  
Fiant Trochisci.

*Eclegmata.*

*Eclegmata.* ℞. Conferu. viol. nymph. an. 3. B. spec. diatragath. frig. diapenid. spec. an. Drach. B. succi glycyrrh. Drach. i. tragacanth. 3. B. Cum syrupo iunib.  
Fiat Lohoh.

Vel ℞. Conferu. ros. viol. an. 3. i. B. spec. diatrag. frigid. 3. i. B. boli Armena prapar. 3. i. Cum syrupo de papau.  
F. Lohoh.

Vel ℞. Mucilag. sem. alth. 3. vi. sem. psylli 3. ij. amygdal. dulc. pinear. mundat. an. 3. B. sacch. penid. amyli, an. 3. ii. spec. diatrag. frigid. 3. i. gummi Arab. succ. glycyrrhiz. an. 3. B. sem. 4. frigid. maior. an. 3. ii. papau. alb. lactuc. an. 3. iii. cydon. 3. B.

Cum syrupo violar.  
Fiat Lohoh.

Narcoticis non vtendum, nisi quando metus est, ne vel vas rumpatur in pectore ex vehementi illa & continuo assurgente tussi, vel vigiliis continuis febris accersatur, viresque deficiantur. Tum enim pilul. de cynogloss. theriac. rec. Phil. Rom. laudan. opiato vti licet.

Extra etiam inungatur thorax hoc vel simili Linimento.

℞. Ol. viol. amygdal. dulc. an. 3. ii. mucilag. sem. psyllij cum aq. rosar. extract. an. Vnc. B. cera. alba q. f.  
Fiat Linimentum.

Vbi materia in pectore hærens satis inspissata est, ab huiusmodi remediis cessandum, ne nimio eorum vsu crassa reddatur, & ad excernendum ineptior, sed tum ad detergentia accedendum, vt syrupo de glycyrrh. capill. Veneris, & similia.

*Curatio tussis ab Humore pituitoso.*

Si à materia frigidâ & lentâ sit tussis, post vniuersalia illa suprâ, lib. i. de catarrho. proposita, vtendum est calidis attenuantibus, incidentibus & abstergentibus, vt capill. ♀. hyssop. fœniculo, scabiosa, helenio, & aliis pectoralibus calidis, & ex iis compositis, syrupo de capill. ♀. de hyssopo, de glycyrrh. de prassio, oxymel. simpl. compos. scillitico, cum aquis hyssopi, capill. ♀. prass. scabiosa.

Vt ℞. Ficum. N. x. glycyrrh. rase, passul. an. Vnc. B. sem. anisi, fœnic. an. 3. ii. capill. ♀. hyssop. ana M. i. Coq. in aq. purâ.

Decoctum melle vel saccharo dulcoretur. Vtile etiam est lohoh sanum & expertum, & de pulmone vulpis.

Ad inueteratam tussim Aëtius commendat mellis, butyri, an. Vnc. iii. cumini pulueris. 3. i. Mellis despumato butyrum admisceatur, simulque calefactis cuminum inspergatur, & ægro delingendum cochlear. præbeatur.

Vel ℞. Cumini, piperis, sem. vrtic. an. 3. i.

Trita subigantur cum mellis despumati sextario, & parumper feruefacito, reponantur ad vsu, & cochlear. delingendum offeratur.

Laudatur & hoc:

℞. Pulegy, piper. hyssop. calam. an. 3. ii. petrosel. 3. i. Mellis despumati sextarium. M.

*Aqua pectoralis calida Dorncreilij.*

℞. Rad. Enula 3. i. B. polypod. q. mundi pimpinell. an. Aqua pectoralis 3. i. althæa, myrrhid. an. 3. B. aristolochia, rotund. 3. iii. ralis calida pœonia masculi. decrescente Luna in signo piscium collecta. Dorncreilij. ireos Illyric. an. 3. ii. B. zingib. 3. i. asparagi, apij, an. 3. ii. herb. capill. Vener. hyssopi, carduib. veronica, pulmonaria maculos. an. M. iii. sem. fœnigræc. seselios an. 3. ii. anisi 3. iii. quatuor frigid. maior. exortie. an. Scr. iv. carthami Drach. iii. B. lini 3. ii. flor. cordial. an. M. B. ficum ping. recent. N. vii. passul. maior. enucleat. 3. ii. dactylor. ping. enucleat. N. xii. iunbar. sebesten, an. paria ix. succi glycyrrh. f. q. aqu. scordij dissoluti 3. i.

Puluerisanda pulueriscentur subtilissimè, reliqua vero incidantur & contundantur minutim, & infundantur. aq. scabios. marrub. an. ℥. iii. fœniculi, betonic. tussilag. cardui Maria, Nicotiana, an. ℥. i.

Stent in infusione in loco calido per octiduum, vase aliquoties

aliquoties singulis diebus agitato, deinde adde. mellis passul. Corinthis. lb. β. croci Orientalis 3. β.

Misce & destillentur igne lentissimo in B. M.

Pro vlu quotidiano in tussi idem Aëtius ficus siccas pingues in vino dulci meraco madefactas vnā cum vino exhibet. Alij ficus ad ignem parum tostis sub noctem deuorare iubent.

Vtile est & hoc:

℥. Succi tussilag. lb. β. mucil. sem. vel rad. ulth. extract. cum aq. hord. 3. ij. Cum sacch. penid.

Fiat Lohoh.

Vtilis est & radix tussilaginis melle condita.

Plura huius generis vide etiam part. 2. huius libri c. 4. de angustia arteriarum asperarum pulm. & apud Galenum, 7. de compos. med. sec. loc. c. 3. & in lib. euporist.

Vt efficacissimum in materia crassissima sequens Eleuatium commendat Mercatus.

℥. Succi tussilag. 3. iij. rad. pulegij 3. j. apij virid. M. j. Infundantur in lb. j. mellis opt. aceti lb. β.

Coq. lento igne, & facta expressione adde prædictum succum, & fœnigraci sapius antea loti decoctum pond. 3. x. Mithridat. aut theriac. 3. j. β.

Porrige summo mane & ante cœnam cochl. ij. quibus admiscere potes. syrup. de prass. de hyssop. lohoh de pino.

#### Rotula contra tussim pro pueris.

℥. Spec. diaireos, s. diatrag. frig. an. 3. j. β. extr. glycyrrh. 3. β. enula 3. β. sacch. cand. albi, 3. iij. albi in aq. scabios. dissolut. 3. vj.

Fiat conf. in Rotulis.

Extra pectus inungatur hoc vel simili Vnguento.

℥. Mucilag. sem. alth. fœnigraci an. 3. β. buiyr recent. axung. gall. an. 3. j. bdellij, styracis, an. 3. β. croci 3. β. ol. li. lior. albor. amygd. dulc. an. 3. ij. cera q. s.

Fiat Linimentum.

Tandem reliquæ exsiccantibus & detergentibus absumendæ, vt etiam supra dictum.

Detergentia tamen & exsiccantia non sint nimis calida nec acria, ne dissipata parte humoris tenuiore crassior remaneat. Ideoque Auicennas monet, vt vbi ob pituitæ crassitiem nihil exspuitur, humectantia addantur.

Celsus ouum sorbile præbet cum paucis sulphure. Extat etiam descriptio antidoti diasulphuris apud Serapionem, de antidot. cap. 8. quod ad tussim, sputum sanguinis & asthma commendat; & apud Mesuen, de antidot. cap. 3. Recentiores flores sulphuris, lac sulphuris & balsam. sulphuris exhibent, cui & benzoën & eius flores addunt.

#### Exempli gratia:

℥. Flor. sulphur. 3. ij. spec. diaerag. fr. 3. j. β. diaireos 3. j. croci 3. j. ol. anisi gut. x. i. sacch. in aq. tussilag. & scabiosa dissol. 3. vj.

F. l. a. Rotulæ.

Vel ℥. Rad. ireos Florent. helenij, tussilag. an. 3. β. benzoe 3. β. flor. sulphur. Drach. j. croci gr. vij. cors. aurantior. 3. β. sacch. albiss. in aq. tussilag. solut. 3. iij. & Drach. ij.

Fiat conf. in Rotulis, instillando spir. serebinth. gut. v. Pulvis pectoralis, seu pulmonicus.

℥. Glycyrrh. rasa 3. iij. sem. anisi, fœnic. an. 3. β. spec. diatrag. fr. 3. j. diaireos 3. β. flor. sulphur. 3. ij. pulm. vulpis præp. 3. iij. sacch. cand. albi 3. j. β.

Fiat Pulvis.

Ad tussim & pectus roborandum commendatur pulmo animalium, præcipuè vulpis; vnde & lohoh paratur, quod in officinis præstat. Item ex pulmone vulpis, additâ saluâ, hyssop. capill. & similib. thoracis aqua destillatur, atque saccharo dulcorata propinatur. Laudatur & pulmo ceruinus, si cum gula sua exsiccatus in furno & puluerifatus cum melle exhibeatur.

#### Curatio tussis à reliquis causis.

Si verò absque catarrho à materia in pectore contenta tussis exciteretur, id quod in pleuritide, peripneumonia, phthisi calculis pulmonis fieri solet, curatio è suis locis, atque ex iis, quæ suprà de his aff. tribus dicta sunt, petenda. Ita & reliquæ tussis differentia, quæ ab asperitate & inæqualitate arteriæ, vel consensu diaphragmatis, aut irritatione pulmonis in morbis vicinorum viscerum excitantur, qua ratione curandi sint, ex iis, quæ suprà de iis dicta sunt, & suo loco dicentur, patet.

#### Diatra.

Si tussis sit, ab intemperie frigida, æger degat in Diatra aëre calido, seu naturâ tali, seu arte parato. Utendum cibis calidis & pectoralibus calidis ac aromatis conditis. Potus sit vinum generosum dulce vel mulsum. Inter bellaria vtilis sunt pineæ & pistacia. Si ab intemperie sicca sit tussis, humectante diatra utendum, butyro, oleo amygd. dulc. cum saccharo, malua, borrag. Galenus, 7. de loc. affect. cap. 3. commendat aquæ dulcis tepidæ balneum, scribitque, se tragædos, guttur & asperam arteriam cantu & vocis intentione resiccata habentes, hoc modo humectasse & curasse. In catarrho cibi sint dulces, lenientes, & pectus dilatantes; vitentur omnia amara, acria, salia, acida, acerbata. In causa calida conuenit prisana hordeacea, malua, emulsio amygdal. dulc. & sem. 4. frigid. maior. Lac caprinum & vaccinum, si febris absit. Potus sit aqua saccharata. In frigida causa vtatur æger calidis vel temperatis. Panis sit bene fermentatus, & semine fœniculi ac anisi conditus Potus sit hydromel. Æger temperanter viuat, vitet somnum mox à cibo, & diurnum.

#### Q V Æ S T I O I.

An tussis sit solum ab angustia trachea arteria, & eius ramorum?

Plures esse tussis causas, ex superioribus patet. Verumtamen in eo omnes conueniunt, quod aliquam pulmonibus molestiam creant.

Verum quomodo, non omnes idem sentiunt. Non nulli quidem omnes illas causas tussim excitare statuunt, quod angustiam aliquam in asperis arteriis pulmonum creant. Verum si causas, quas supra proposuimus, consideremus, manifestum euadet; non solum angustiam pulmonum, sed etiam dolorem aliquem & molestiæ sensum in organis respirationis tussim parere, quo modo partes membranosa vicinæ affectæ, ob consensum, quem habent cum membrana asperam arteriam intus inuestiente, tussim excitare solent. Cum enim membrana hæc sit exquisitissimo sensu prædita, si vicina aliqua membrana distendatur, vellicetur vel quocunque modo molestè afficiatur, membrana hæc in consensum tracta & ipsa obiectum ingratum & dolorificum percipiens, illud excutere nititur, tussimque excitat. Atque id manifestè in tussi ab intemperie nuda patet, vbi nulla angustia adest, sed sensus saltem molestus in aspera arteria. Idem etiam ex eo manifestum sit, quod, vt supra dictum, stylus purgatorius auri profundius immisus tussim siccam excitat, non angustiam pariendo, sed saltem ob membranam communem asperam arteriam irritando. Idem etiam clarum euadit ex similitudine, quam habet tussis cum sternutatione & singultu, quæ symptomata excitantur solummodò vellicando & molestiam pariendo partibus. Idque Galenus etiam multis in locis docet, vt, 2. de sympt. causis, cap. 4. de differ. morbor. c. 7. Et præcipuè 2. de simpli.

*simpl. med. facul. cap. 16. vbi tussim excitare posse docet omne, quod asperæ arteriæ molestum est.*

## QVÆSTIO II.

*An aliquid in pulmonem ex ore delabatur?*

*Quid in pulmonem ex ore delabatur?*

Solet & hoc loco hæc controuersia moueri, an aliquid ex ore in asperam arteriam illabatur? Nam negare id videtur Hippocrates, 4. de morb. & Galenus, 4. de usu partium cap. 8. vbi docet, ne aliqua substantia præter aërem in tracheam ingrediatur, laryngis caput & rimulam epiglottide seu operculo quodam regi, vt sit obturatum, sed non omnino aëri salutem viam concedens, ab ingredientis cibi potusque pondere depressum ligula ipsa magis conclusum esculentæ potulentæque substantiæ aditum non præbeat. Hinc etiam si mica panis vel porus portiuncula inter mandendum vel loquendum bibendumve ad arteriam asperam deferatur, tussis continua excitatur, donec excutitur.

Contrà verò in pulmones aliquid influere, ipsa experientia docere videtur. Testatur enim Hippocrates, in libell. de corde, si quis sui vel alteri pecudi aquam cœruleo colore tinctam sitienti bibendam dederit, deinde statim laryngem eius secuerit, colore eo infectum guttur inuenturum esse. Quod idem Galenus, 8. de plac. in fine, docet. Et videtur antiqua hæc fuisse sententia; vnde illud Alcæi: *πρυγι πνεύματος οἶνον τὸ γὰρ ἀσπὶν ἐπιτάλλεται. Riga pulmones vino: nam canicula astrum exoritur.* Deinde nisi aliquid in pulmonem descenderet, frustra eclegmata, syrupi, trochisci & rotule sublinguales à Medicis in thoracis affectibus præscriberentur. Tandem videmus sæpe multa excrementa in pulmonibus subsistere, quæ tamen vt & interdum magna sanguinis copia, sine suffocationis periculo per asperam arteriam reiciuntur.

Verum sciendum, etsi rimula laryngis epiglottide claudatur, quia tamen non exactè clauditur aut non nihil laxatur; vbi ea, quæ vtilia sunt, admitti debent, impossibile non esse portionem aliquam potus & medicamentorum in eam fluere; quod si sensim & lentè fiat etiam tussim non excitat. Neque enim respirationis viæ tum angustiores redduntur, vt docet Galenus, 8. de plac. Hippocr. & Plat. in fine, & 2. de simpl. med. fac. c. 17. Si quid verò in ipsam cavitatem, & quidem confertim irruit, tussis, & si magnum sit, etiam suffocationis periculum tum maximè suboritur, cum laryngis rimula occluditur. Vbi verò res asperæ arteriæ cavitatem illapsa est, non ita suffocationis periculum timendum; cum canalis ille satis amplus sit; tussis tamen inde excitatur. Et, vt modò dictum, si calculi, si pituita crassa, si pus, si sanguis, & quidem sæpe magnà copia, è pulmone per asperam arteriam reici potest sine suffocatione: etiam sine eiusdem periculo aliquid in illam labi potest. Notabilis huius rei historia est cuius etiam suprà cap. 3. huius partis, facta mentio. Anno 1620. vir quidam doctus, cum cerasa arbore decerpta in horto comederet, atque subitò in strangulationis & suffocationis periculum cum maxima tussi coniceretur, nucleum cerasi in guttur illapsum, & tussis & strangulationis causam esse existimans, chirurgum, qui illum eximeret, accessit: verum cum chirurgus nullum nucleum deprehenderet, & suffocationis periculum cessaret, tussis verò nihilominus perseueraret, in eam opinionem venit, nucleum nullum in guttur illapsum fuisse, sed hoc symptoma ex catarrho subito & vehementi prouenisse. Deambulauerat verò in horto tempestate pluuiosa, & aliàs catarrhis valde obnoxius erat. Durauit ista tussis per tres septimanas, & per interualla quædam ægrum valdè afflixit, quo tempore etiam dolorem quendam grauium in dextra thoracis parte deprehendebat. Tandem cum noctu ve-

*Dan. Sennerti Tom. II.*

hementer integram horam tussiuisset, nucleum illum pituitæ crassæ adhærescentem tussi reiecit, atque ita tussi illa liberatus est.

## Convulsio diaphragmatis.

Ad motus deprauatos organorum respirationis pertinet & convulsio diaphragmatis, quæ plorantibus infantibus accidere solet, cum scilicet ex nimio animi affectu spiritus in lacrymando eò effunduntur, & cum spiritibus aliquid materiæ, quæ nervos ad diaphragma tendentes irritat. Verum cum causa illa euidenti iubarâ sponte hoc symptoma cessare soleat, de eo nihil amplius hic addimus.

*Convulsio diaphragmatis.*

## CAPVT VI.

## De Doloze Pectoris.

**D**E pleuritide equidem, quæ membranæ costas succingentis inflammatio est, doloremque insignem coniunctum habet, diximus suprà. Verum cum alij adhuc dolores pectoris dentur, de ijs in genere hoc loco agendum, qui tamen in genere sæpe pleuritidis nomine veniunt. Cum enim membrana costas succingens densissima sit, & exquisito sensu prædita, non solum ipsa primario afficitur, verum etiam cum vicinorum musculorum membranæ vellicantur & afficiuntur, ipsa facilè in consensum trahitur, & inde dolor excitatur; imò membranæ etiam musculorum externorum affectis dolor oritur, vnde pleuritidis vocabulum hoc modo & in genere pro omni dolore lateris accipitur, & pleuritis alia vera, alia notha est. Pleuritis vera ex inflammatione membranæ costas succingentis oritur, de qua suprà diximus: Notha verò varias causas habet.

*Dolor pectoris.*

*Pleuritis duplex.*

*Pleuritis notha.*

Primo excitatur cum sanguis per ramos venæ axillaris in externa thoracis spatia, & in externos musculos thoracis illabatur; quæ tamen inflammatio ob continuam propaginum venarum externarum & internarum sæpe in veram pleuritidem permutatur.

Secundò, dum materia à capite per ceruicem & homoplasas in musculos externos laterum decumbit.

Tertiò, cum spiritus flatulentus membranas costarum & musculorum thoracis distendit. Atque accidit hoc facilius, si vociferatione & labore, tussi, vel aliis motibus muscoli pectoris distendantur, ac flatus eò commoueantur, & si pectus refrigeretur. Vnde sæpe contingit, vt si pectus post validos motus denudetur, & frigori exponatur, subitò tales dolores excitentur, qui quiete & calore mitigantur.

Quartò, quando membranæ pectoris in morbis hepatis & lienis mediante diaphragmate deorsum cum dolore trahuntur. Aerius, *reirab. 2. f. 4. c. vli.* affectionis cuiusdam meminit, quæ pleuritis non sit, specie tamen pleuritis fallat, quæ ex victu crudo & crasso oriatur, cum cumulat in corpore humor crudus & lentus subitò in vacuum thoracis spatium, aut in pulmonem ruat, membranisque adhærens dolorem distendendo inferat cum magna spirandi difficultate. Verum credibilis est, in musculorum membranas humores tales, & præcipuè serosos & acres effundi, quàm in ipsam cavitatem thoracis. Sæpe enim accidere solet, vt serosi, interdum etiam maligni humores ex venis in externos lateris musculos effundantur, & grauissimos sæpe dolores, non tamen diurnos efficiant, & quidem sine inflammatione. Ita memini infantes aliquot grauissimos dolores in pectore perpeffos esse, antequam morbilli erumperent, qui morbillis erumpentibus postea cessant. Aliquoties etiam obseruavi, ex scabie intertempestinè curatâ pectoris dolores & nothas pleuritides ex salis & serosis humoribus sine inflammatione

excitatos fuisse, sed qui non fuerunt diurni. Idem accidit sæpe in febribus malignis, ut & in scorbuto. Nec solum humores, sed & vapores hos dolores excitant, uti à vermibus putrescentibus eleuati.

Verum, quod diligenter notandum, dolores pectoris in primis in scorbuticis & hypochondriacis familiares sunt, qui non solum ex humoribus & flatibus per venas, sed & per arterias transmissi ortum habent, & maxima sæpe fluxionum pars in corpore nostro per arterias perthicitur. Cum enim lien quinto plures arterias, quam venas habeat, si in eo, & circa eum, vitiosi humores cumulentur, fieri non potest, quin in arterias maximam partem deriuentur. Cum vero arteria à natura potens sit, à vitiosa materia laceffita, ad expellendum facile surgit, & ut eam ad pectus detrudat, facilis via est per arterias intercostales. Hæ enim à trunco arteriæ magnæ descendente oriuntur, & per costarum spatia excurrunt, & cum in membranosa & nervosa loca definant, imò propagines quasdam per foramina nervorum ad spinalem medullam & ad musculos dorsi vertebrae incumbentes restantium transmittant, facile dolores grauissimos in pectore, flatus & vapores per arterias eo transmissos excitare per se manifestum est.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Dolor ipse pectoris per se notus est, & ex ægrogum querelis patet. Cum vero dolores pectoris à variis causis ortum habere possint, signis ex discernenda sunt. Quæ pleuritidis veræ signa sint, supra, de pleuritide, dictum. Reliqui vero dolores pectoris, & nothæ pleuritides à verâ non difficulter discernuntur.

Nam in vera pleuritide signa omnia pathognomonica, quæ suprâ recensuimus, adesse necesse est, quorum si vnum absit, ea pleuritis notha est, non vera. Deinde in notha pleuritide signa omnia, quæ ad sunt, sunt ferè mitiora. In notha enim pleuritide febris vel nulla adest, vel mitior adest. Respiratio equidem, si dolor sit vehementior, parua est & frequens; cum per validam respirationem dolor irriteretur: non tamen tam parua & frequens est, ut in vera pleuritide. Tussis nulla adest; nisi forsitan aliquid à capite destillet: & nihil cruenti, præsertim tussi, excernitur. Pulsus neque tensionem habet, neque duritiem; dolor neque ad iugulum, neque ad hypochondria sese extendit. Locus manu pressus, dolo, inflammatis intercostalibus musculis externis, vel musculis costis incumben- tibus. Nonnunquam & tumor apparet, qui suppuratus per cutem erumpit, teste Galeno, 5. de loc. aff. c. 3. Si à flatu dolor est, vagus est, neque perpetuus, sed per intervalla recurrens.

Si à catarrho dolor est, in ceruice & scapulis primùm percipitur, postea in latus descendit, vbi tactu exacerbatur, & versus inferiora descendit, nec in vno loco subsistit. Dolores ab humore seroso plerumque paulò acutiores sunt, sed febris ferè abest, suntque vagi, & scabies, vel similes morbi præcesserunt vel ad sunt. Si è maligna materia est dolor, febris malignæ signa ad sunt, si à scorbuto, & eius signa aderunt.

### Prognosticum.

Prognosticum.

Quid in vera pleuritide præfagiendum sit, suprâ, de pleuritide, dictum est. Reliqui dolores pectoris minus periculosi sunt, & facilius curantur.

### Curatio.

Curatio.

Et quidem ut aliarum partium dolores commodissimè curantur causâ sublata: ita & pectoris dolores. Verum quia nullum symptoma est, quod plus ægrum afficit, quam dolor, in omni etiam pectoris dolore, si is vehemens sit, danda opera, ut dolor mitigetur, quod præ-

stant Anodyna. Hinc Hippocrates, 2. de rat. viſſ. in acut. in pleuritide fomentis statim in initio vitur, aquâ nimirum tepidâ, aut sale & milio torrefactis & sacculo conclusis. Hodie plura alia adhuc in usu sunt, ut:

℞. Fol. malua, parietar. branc. urs. an. M. i. sem. lini, fenigr. ana ʒ. ii. fl. chamam. sambuc. an. P. i.

Coquantur in aqua.

Colatura calida vel spongiâ, vel linteolo triplicato lateri dolenti applicetur.

Vulgatum est hodie decoctum florum chamameli cum lacte in vesica pectori applicatum.

Vel ℞. Parietariam, coq. in oleo chamamelino, & loco dolenti applicetur, quod efficacissimum est remedium. Vtilis est & sacculus fursure plenus, si in decocto florum chamameli prius ebullierit.

Et omnino dolorem sedare vtile. Nam dolore sedato non tantus sit humorum affluxus; cum dolor fluxioni occasionem præbeat, ut Galenus, 1. 3. meth. med. c. 3, docet. Ideoque vbi vel pleuritis est parua, aut etiam si sit paulò maior, si corpus sit purum, & externa potius causa morbo originem dederit, vel si signum aliquod deficiat, Medicumque dubium reddat, an sit vera pleuritis, an verò febris aliqua, cui dolor pectoris ex humore seroso & acri, vel flatu coniungatur, fomentis statim vti licet.

Quibus de causis Hippocrates procul dubio, loco allegato, fomentis vti præcepit, & re ipsa tentauit, 3. epid. s. 2, in historia Anxionis, quod & Galenus, ibidem, confirmat. Nam ut solum exploraret fomentis, an dolor fuerit à flatu, non est credibile. Nam dolorem pectoris à flatu prouenire, ex febris absentia, pulsu & excreatione nulla agnoscere non difficile est. Si verò certum sit, pleuritidem esse veram, ægrique corpus sanguine abundare, aut vitiosis humoribus refertum esse, ante venæ sectionem & purgationem fomenta tunc non adhibentur. Nam, ut Galenus, 6. aphor. 3. 1, docet, fomenta quidem dolorem leniunt non nihil, aliam tamen fluxionem excitant.

Quod verò causas doloris pectoris attinet, dolor, qui à vera pleuritide venit, qua ratione curandus sit etiam supra dictum.

Si verò pleuritis sit notha ab inflammatione in musculis intercostalibus externis, aut iis etiam, qui costis incumbunt, vena primò etiam secatur, si cætera consentiunt. Postea focus fiat ex violaria, parietaria, malua, flor. chamamel. melilot. summit. anethi, rosæ rubris. Vel vsurpetur tale Vnguentum:

℞. Pingu. gallin. butyri recent ana Vnc. i. pulv. chamamell. Drach. i. ol. rosar. amygdal. dulc. Vnc. sem. cera q. s. M.

Vel ℞. Ol. amygdal. dulc. violar. lilior. albor. an. ʒ. ii. butyri rec. ʒ. i. pingued. gallinae Dra. vi. cera noua q. s.

F. Vnguentum.

Interdum inflammatio in cutem erumpit, teste Galeno, 5. de loc. aff. c. 7. in fine, vbi danda opera, ut tumor suppuretur; & suppuratio adiuuanda emplastro diachylo (& aliis conuenientibus medicamentis, & nisi tumor spontè rumpatur, aperiendus est.

Qui ex destillatione à capite per ceruicem in pectus dolor ortum habet, is catarrho sublato tollitur.

A flatu frigido & crasso si sit dolor, venæ sectio omittatur, ne materia crudior, dolorque maior reddatur, si signa simul plethoræ ad sunt. Fomentis verò ille discutatur è floribus chamameli, fol. rutæ, semini cumini.

℞. Flqr. chamam. sambuc. ana p. i. summ. anethi vna cum semine an. Vnc. sem. sem. feniculi, cumini. rutæ an. Drach. j.

F. Sacculus intersutus, qui vino irroretur,

Efficaciora sunt calamintha, pulegium, thymus, rosamarinus, folia lauri, saniculæ, alchymillæ, bacc. iuniperi, sem. nigellæ.

Extenuatis ita flatibus, tempestinum erit, quatuor aut sex



sex digitis sub loco dolente cucurbitulam magnam sine scarificatione ac cum multa flamma bis aut ter affigere, ut extractus spiritus flatulentus dissipetur.

Interim vniuersalia præsidia non omittenda. In dolore ab humore seroso & præcipue maligno ea, quæ supra à proprietate pleuritidi prodesse diximus, hîc locum habent, ut *sem. card. Maria, card. bened. oculi cancri, aqua cardui Maria, card. bened. aqua & syrupus papaueris erratici.*

## CAPVT VII.

## De Sputo Sanguinis.

Sputum sanguinis.

**A**tque hæc sunt symptomata actionum læsarum, quæ organis respirationis accidunt. Symptomata in excretis quod attinet, inter ea primum est Sputum Sanguinis. Et verò in genere sputum sanguinis, Græcis *αιμασπυον*, omnem sanguinis per os reiectionem significat, atque ita eam etiam, quæ sanguis à capite, gingiuis, palato, & faucibus, œsophago, ventriculo, liene & locis vicinis per os reiciatur: tamen propriè *αιμασπυον* seu sanguinis sputum, de quo hîc agimus, est sanguinis cum tussi, ex partibus respirationi dicatis, reiectio. Et quanquam etiam, quæ in pleuritide & peripneumonia sit sanguinis reiectio hoc nomine appellari possit: tamen in specie ea solum sanguinis cum tussi reiectio, quæ citra harum partium inflammationem accidit, sanguinis sputum seu *αιμασπυον* appellari solet. Est nimirum sputum cruentum symptoma è genere excretorum, quæ toto genere sunt præter naturam, è pulmone & valis eius. Quanquam enim naturaliter in foeminis, tum viris sanguis per hæmorrhoidas euacuari soleat: tamen naturaliter è pulmone euacuari non solet.

## Causa.

Causa.

Cum sanguis præter naturam reici non possit, nisi vas aliquod præter naturam pateat, hîc etiam nisi vas aliquod in pectore aperiatur, sanguinis sputum excitari non potest. Morbi autem in, ob quos vala aperiuntur, sunt *απασσους* & *διαρρεσις*, & quidem *πρηξις* s. ruptio præcipue, ad quam etiam referri potest contusio, ut & vulneratio seu incisio venarum. *Διάσπασις* enim, erosionem, seu exsionem ab humoribus acerbis quod attinet, à Platero, *tomo 3. pract. lib. 2. cap. 8.* hæc non recipitur. Nam cum exsitis pulmonum valis & pulmonum substantia simul erodatur, sensimque hoc fiat, moxque vlcus inde sordidum potius, quam sanguine madens prodeat, phthisis potius, quam hæmoptroica passio exoritur: cui tamen, vti in aliis vlcibus, sanguinem interdum, cum impelluntur, exsulantibus, cruenta exspitio aliquando iungi potest. *Διαιμόρρηξις* verò vix sputum sanguinis inducit. Hi autem morbi à quibus causis oriuntur, supra, *hoc libro part. 2. cap. 6. de apertione vasorum pulmonis*, dictum, ut ea hîc repetere opus non sit.

Hoc saltem hîc addimus, non semper pulmonibus primariò affectis, sed sæpe secundariò quasi, sputum sanguinis excitari, sicut idem sanguis & per vomitum hoc modo reicitur, transmissus scilicet ab hepate, & vena cava, à liene, ab hæmorrhoidibus, vtero, per nares effluere consuetus, ut ex Galeno, *de vena sect. aduers. Erasistratum cap. 5. & 6. Aretæo, lib. 2. de causis & signis acut. morb. cap. 2.* Celso, *lib. 4. cap. 4.* Auicenna, *lib. 3. fen. 10. tr. 3. cap. 5.* Actio, *retrahibil. 2. ferm. 4. cap. 59.* videre est, & ipsa experientia testatur. Et quidem obseruatum est, interdum per interualla quædam sanguinem è pectore quasi citricè sine omni incommodo reici, & à retentorum menstruorum malis, atque aliis, quæ ex sanguinis copia proueniunt, incommodis liberare.

Dan. Sennerti Tom. II.

Ita refert Plinius, *lib. 11. cap. 38.* Volustum Saturninum omnibus annis statò tempore sanguinem exipuisse, & nihilominus ad annum 90. vixisse. Et noui virum nobilem plethoricum in vicino Anhaltinatu, qui per interualla sæpe è pulmone sanguinem copiosum sine omni incommodo reiciebat, in senectute verò per eandem viam quotidie magnam pituitæ copiam sine omni damno reiciebat, qui nihilominus ad summam senectutem peruenit.

## Differentia.

Differentiæ sputi sanguinis sumuntur:

1. Ab excreto. Potest is sanguis esse sincerus, vel cum aliis humoribus mixtus; itque purridus, vel non, aliòque colore, sapore, consistentia præditus, copiosior vel paucior.
2. A parte, vnde prodit, à vena scilicet vel arteria, eaque vel pulmonis vel pectoris, ut vulgò docetur. Quod tamen à venarum in conuexo pectoris reserationibus aut læsionibus sputum sanguinis oriri possit, Cl. Platerus, *loco allegato*, non concedit, sed sanguinem illic subsistentem corrumpi, & vel phthisin, vel empyema tandem inducere scribit. Qua de re quid sentiendum sit, supra, *de inflammatione pleura*, dictum.
3. à Causa efficiente, quæ est vasorum vel anastomosin, vel diæresis.

## Signa diagnostica.

Signa sputi sanguinis etiam supra, *part. 2. cap. 6.* sunt proposita. Hoc loco ergo saltem explicanda restant, quibus sanguinis ex aliis partibus effusi per os reiectio ab è thorace aut pulmone exeuntis sputo distinguitur, ne in prognostico vel curatione fallatur Medicus. Principio ergo modus reiectionis attendendus, an scilicet cum tussi, vel sine tussi reiciatur; præterea eius copia consideranda. Etsi enim sanguis, qui à thorace prodit, omnis tussi reicitur: tamen non omnis, qui cum tussi reicitur, è pectore prodit. Nam si sanguis confertim è capite & naribus in fauces & gutturis partes dilabatur, etiam tussim excitat. Ideoque si sanguis paucus cum tussi reiciatur, signum quidem est, à thorace prouenire. Si verò multus cum tussi reiciatur, cum tum æquè à capite & thorace prouenire possit, signis id discernendum est, quæ sanguinem è capite fluentem indicant; quæ sunt, si sanguis simul è naribus fluat; vel nuper fluxerit, si ægro hæmorrhagia narium consuetæ sit, eaque iam suppressa, si ex ore & naribus simul sanguis reiciatur, (dum modò & alia signa adsint. Nam aliquando & sanguis è pulmonibus erumpens ascendit in fauces & per os ac nares reicitur) si rubor, calor & dolor capitis adsit, si tussis in principio sit vehementior, dum scilicet sanguis per asperæ arteriæ caput transit, quàm dum aliquid confluxit. Si sanguis sit nigrior, crassior & copiosior, ac qui primò excernitur, spumâ omni careat, reliquus verò parum spumofus sit, qui scilicet arteriam ingressus nigrescit, & egressus agitur; si adsit palati titillatio; si sanguinis sputum percipitur ante tussim, si crebra adest spitio, & omnino thoracis affecti signa adsint.

Si verò hæc signa absint, aut post casum, percussione, clamorem magnum, tussim vehementem, similesque causas, sputum sanguinis sequatur, è pectore prouenire indicio est. Si verò sine tussi sanguis vomitu vel screatu solo reiciatur, certum est eum à thorace non prouenire, à quocunque etiam loco prodeat, quod definire huius loci non est. Videatur Galenus, *4. de loc. affect. cap. 5.*

Porro si à partibus respirationi dicatis reiciatur tussis sanguis, duo amplius inquirenda sunt; 1. à quâ parte determinata sanguis proueniat; cum partes respirationi dicatæ sint plures. 2. à qua causa.

Ergo si leuissima tussi & sreatu potius quàm tussi, sanguis reiciatur, isque paucus, & parùm spumofus, & cum obscuro aliquo doloris sensu, ab aspera arteria prodire indicio est. Si verò maiori cū tussi, maiore quantitate & cum maiore spumæ copia sanguis reiciatur, à pulmone provenire argumento est; cum aliter in asperam arteriam è substantia pulmonis peruenire non possit. De quo Hippocrates, 5. aphor. 13. *Quicumque spumofum sanguinem exspuunt, is è pulmone eductio.* Quanquam verò ex aliis partibus sanguis profluens ex viscidæ & aeræ substantiæ permistione spumofus fieri possit: tamen ex toto spumofus esse, solius sanguinis, qui ex pulmone provenit, proprium est. Et quidem cum plurimum spumat, è pulmonis bronchiis erumpit: cum verò totus ferè spuma est, secundum partes internas & externas, non tantùm in superficie spumas habens, è pulmonis substantia provenit. Qui verò è pectore sanguis reicitur, liuidus est ac nigricans ac multum alteratus; cum à loco longinquo proveniat, & extra vasa diutius immoratus sit. Dolor etiam in aliqua parte thoracis percipitur. Contrà sanguis, qui è pulmone exit, est tenuis, floridus, spumofus, vt dictum, & citò reicitur, ac sine dolore. Qui è membranis exit, paucus est, sputo pernixtus, & cum tussi molesta est, ac dolore pectoris.

Causarum verò signa quod attinet, dictum est de iis suprâ, p. 2. c. 6. Videatur etiam Galenus, 4. de loc. affect. c. 5. Aræteus, lib. 2. de causis & signis acut. morb. c. 2.

Hoc saltem addendum, diligenter inquirendum esse, num priuato pulmonis vitio sanguis reiciatur, an verò aliunde, ab hepate scilicet, liene, vel quod consuevit aliqua sanguinis per vterum, hæmorrhoides, hæmorrhagiam narium, euacuatio suppressa sit, & is ad pulmones transmittatur. Neque enim ea, quæ hætenus proposita sunt, & ab Autoribus proponi solent, id satis determinant. Nullum autem hic habetur signum pathognomonicum, sed *σοχαρισμὸς* artificioso opus est, exercitarumque id Medicum requirit, qui ex antea obseruatis id colligere possit, & præcipue per negationem & remotionem aliorum. Si enim signa & indicia, quæ pectus primariò affici indicant, abfuerint vel omnia, vel multa, atque alterius partis in corpore affectus, quas modò enumerauimus, signa adsint, probabile est, sanguinem, qui sputo reicitur, non ob priuatum pulmonis vitium reici, sed aliunde ad pulmonem transmitti. Quod magis confirmatur, si, antequam sanguis erumpere incipiat, dolor aliqua in parte in ventre inferiore, circa hepar scilicet, lienem, vterum, vel alibi percipiat.

Addendum tamen & hoc, si ab aliis partibus sanguis ad pulmones mittatur, non solum per pulmonem eum reici, sed obseruatum est, sputum & vomitum sanguinis vno tempore accidisse, naturâ superfluum sanguinem partim ad pulmones, partim ad ventriculum propellente.

#### Prognostica.

##### Prognostica.

1. Vt sanguis ex quacunque parte profusus mortem afferret: ita etiam si è pectore multus effundatur, hominem interimere potest. Si tamen sedetur sputum sanguinis, sæpe in tabem transit.

2. Etli verò omne sanguinis sputum periculo planè non vacat: tamen aliud aliò periculosius est. Primò quidem ratione causæ, de quo suprâ, loco modo allegato, prognost. 1. 2. 3. 4. dictum.

3. Deinde loci affecti ratione. Nam sputum sanguinis, quod ex pectore provenit, minus periculosum est, quam quod ex pulmone. Et ex pectore sanguinis reiectio triplex beneficium habet præ ea, quæ sit in pulmone, 1. quia vasa pectoris minora sunt, 2. sanies in spatium & cavitatem pectoris effunditur. 3. quia pectus magis carnosum est, quàm pulmo; ideòque vlcera pectoris facilius carne replentur.

4. Sanguinis sputum principale magis periculosum est, quàm non principale, quale est in pleuritide: quia non principale rupturam apostematis significat, ac pus euacuari denotat.

5. Sanguinis è pulmone reiectio, quæ intra tres dies non curatur, superueniente phlegmone, incurabilis rediditur, Galenus, 5. meth. med. c. 13. & 14.

6. A sanguinis sputo puris sputum malum, 7. aphor. 15. quod scilicet ab inflammato & eroso pulmone provenit. Id enim rarò aut nunquam curatur; cum phthisis inde & tandem mors sequatur, teste Hippocrate, ibid. aph. 16.

#### Indicationes.

In sputo sanguinis indicatio præcipua est, sanguinem sistere; quod fit, si sanguis ad partem non confluat, vel vas, è quo sanguis erumpit, claudatur, vel vtrumque præstetur. Ideòque si vitium sit à causa interna, ea tollenda; sanguis nimirum copiosus, & ad partem affluens, reuellendus; calidus & acris refrigerandus & mitigandus; humores biliosi & acres euacuandi; ipsum verò vas, è quo fluit sanguis, occludendum. Et quidem si ab anastomosi sit sputum, vas obturandum & adstringendum. Si verò vas sit ruptum, vnire atque agglutinare oportet. Sin erosum, sarcoticis simul opus est, quod deperditum regeneretur. Si à *siamesis* provenit, densare, & incrassare conuenit. Concretus etiam sanguis in pulmone, si quis adsit, dissolvendus & detergendus.

#### Curatio.

Ideoque ad duo omnis curatio hic dirigenda, vt sanguis fluens sistatur, & vas, quod sanguinem effundit, occludatur. Quæ quomodo præstanda sint, suprâ, loco allegato de apert. vasor. pulmon. explicatum, quæ hic non repetimus. Pauca saltem addemus.

Et primò quidem generales quasdam regulas in sputo sanguinis curando obseruandas.

1. Reuulsio sanguinis fluentis fit per phlebotomiam, frictions, ligaturas, & cucurbitulas. Et quidem venæ sectio plerumque fit in brachio; quandoque tamen in talo, in mensium suppressione, de quo infra, in questione, dicitur.

2. Mala sanguinis qualitas corrigatur & temperetur. Si tamen ab acri sanguine & biliolo humore referto sit vasis erosio vel apertio, purgandus est ab initio statim biliosus humor, ne dum eum alterare & temperare studemus, malum augeat & grauius reddat. Purgantia tamen non sint calida & forria, ne acrimoniam humorum augeant, eosque valde commoueant. Quà de causa aloë & scammonium non vsurpanda.

3. Inflammatio in ea parte, vbi sanguis exit, omni ingenio prohibeatur.

4. Grumi sanguinis dissoluantur. Ad quod etsi acetum vtile sit: solo tamen & sincero eo non vtendum; cum partes exasperet, tussimque excitet, & fluxionem augeat. Ideòque vel melle aut saccharo dulcorandum, vel aliis diluendum.

5. Vitentur, quæ sistunt, aut nimium adstringunt, ante auertentium vsum. Nam sanguinem intrò in pulmones impellunt, vnde eius putrefactio pulmonisque vlcera sequuntur. Ideoque remedia ex adstringentibus & agglutinantibus mixta sint, ita quidem, vt in aperto per anastomosi in vase adstringentia, in rupto glutinantia, & citra mordacitatem siccantia superent.

6. Topica frigida valde esse non debent. Frigida enim non solum pectori inimica sunt, sed & sanguinem intro pellunt, atque fluxionem augent.

Deinde hoc monendum, si reliqua, quæ, loco allegato, opitata sunt, medicamenta ad sanguinem sistendum non sufficiant, ad opiata accedendum, & Philonium

nium Romanum, requies Nicolai, pilul. de cynogloss. aut laudanum opiatum exhibendum, cum aqua porculacæ, vel plantag. aut horum syrupis, quorum vñ sanguis ad morum torpidior redditur, somnūque concitatur, ne perpetua tussī pulmones vehementes concutiantur. Galenus prima mox die medicamentum diaspermatum dictum ante somnum exhibuit, aut theriacam recentem quatuor mensium. Referri huc potest aqua contra sputum sanguinis Dorncreilij, in dispensens. quæ non tantum sanguinem, qui in pulmones, aut in capacitatem thoracis se effudit, sistere, sed etiam iam effusum & concretum tutò dissolvere, & blandè ac leniter expurgare perhibetur, si 3.iii. dosi cum syrup. de symphyto Fernelij vel syr. myrtin. composui Vnc. 8. sumatur. Est autem talis.

℞. Rad. symphyt. maioris Vnc. ii. plantaginis, Dra. ii. tormentilla, Drach. vi. pimpinella, Drach. i. herb. bursa pastoris, prunella, polygoni, capsulida media, sanicula cum radicib. an. M. i. 8. flor. rosar. rubr. M. i. trochisc. de terra sigillata Dra. j.

Puluerisanda pulueriscentur subtilissimè: herbæ verò & flores minutim incidantur & contundantur ac infundantur in aqua symphyti maior. plantag. bursa pastor. ana lbii. pectoral. frigid. lib. i. 8. scabios. marrub. an. lb. 8. oxymellis compos. Vnc. iij.

Misce & stent in infusione in loco calido per octiduum, vase quotidie aliquoties moto; deinde destillentur in alembico vitreo per M. B. igne lentissimo.

Possent fortasse & ea hîc usurpari, quæ occulta proprietate sanguinem sistere dicuntur, quæ suprà lib. i. part. 3. sect. 4. c. 8. de hæmorrhagia narium proposuimus, & inter ea radix nigellæ, de qua in Practica Kentmanni M. S. hoc habetur.

℞. Rad. nigellæ, & si quis habet fluxum sanguinis narium, da ei ad masticandum, & postquam masticauerit, impone naribus, restinguit sanguinem; hoc similiter facere poteris in vulnere, sed magis appropriatum naso.

Historiam curatæ à se mulieris nobilis habet Galenus, 5. meth. med. cap. 13. quæ ex catarrho & hinc sequenti tussī vehementi sanguinis sputo laborare cœperat, proculdubio ob catarrhum & tussim vehementem valerupto: quæ exemplum nobis præbere potest curandi sputum sanguinis ex catarrho simplici sine pulmonum erosione. Mulieris huius, cum statim prima die Galenum consulisset, capiti, post vsum clysteris acris, frictionum, & vinculorum applicauit medicamentum calidum è stercore columbino. Post horas tres medicamento illo amoto ægram in balneo deduxit, quia cum illa iam prius per inediam euacuata esset, timendum non erat de fluxione noua concitanda, & caput balneo incalescens ipsum quoque à pectore reuellerat. Postea fructum autumnalem austerum edidit, post sorbitionem, qua cibata fuit. Tandem dormitura theriacam quatuor mensium exhibuit, vt fluxura per noctem ad pectus materia interciperetur & sisteretur. Sequentibus diebus eadem penè administravit, nisi quod tertia die mel coctum exhibuit, quo materia in pulmone ad expectorationem sensim præpararetur, & pro sorbitione cremorem prisanæ concessit. Quarto die, cæteris non mutatis, theriacam vigentis ætatis dedit, cum fluxio iam cessasset. Quinto autem die, postquam ægrum præcedenti tempore in quiete continuisset, pectus per tussim expurgare cœpit, dehinc rursus capiti emplastrum calefaciens & siccans apposuit, vt materia catarrhi planè exhauriretur.

Meminit, *ibidem*, adolescentis, qui non è catarrho ex capite, sed ex refrigeratis spiritus instrumentis tussī cum sanguinis reiectione laborauit. Ei primo mox die sanguinem misit, eum fricari & ligari iussit, medicamentum diaspermaton ad vesperam exhibuit, & pro

Dan. Sennerti Tom. II.

cibo sorbitionem. Secundo die iterum bis sanguinem detraxit, ceratum è thapsia pectori tori admouit, vesperi id auferens, diaspermaton quoque & sorbitionem dedit. Tertio die, postquam ceratum è thapsia per tres horas apposuisse, hominem lauit, cremore prisanæ ac pleniore aliquo cibo nutriuit, sed vesperi diaspermaton dedit. Quarto denique die instrumentis respirationis ad temperiem iterum redactis, & euacuato toto corpore pectus tussī expurgare aggressus est: theriacam exhibuit vigentis ætatis, & ægrum tandem ad Tabias, prohibendo ibi lacte, misit. Vide Galenum, 5. meth. med. cap. 12.

### Diata.

Diata ratio etiam suprà exposita est; hoc saltem addamus. Cælius Aurelianus & Autor libri de subfiguraticne emperica & alij prohibent aspectum rerum rubrarum, ne, imaginatione commota, sanguinis fluxus concitetur. Neque enim de nihilo est, imaginationem & spiritus ab aspectu rerum externarum moueri. Nimirum & tenebræ & color niger timorem incutit, ac tristitiam excitat; contra color albus, & lucidus exhilarat; vnde etiam color rubeus, cuius natura in fulgore quodam consistit, spiritus non parum commouet, notumque est, elephantos, tauros, gallos Indicos rerum rubrarum aspectu ad iram concitari. Animi pathemata, præsertim ira, quæ sanguinem & spiritus commouet, studiosè vitentur.

Diata.

### QVÆSTIO.

An in Sputo cruento sanguinis semper è brachio; an verò etiam è talo & cruribus, præcipue in fœminis mittendus sit.

Galenus equidem, 5. meth. med. cap. 8. in sputo sanguinis internam cubiti venam secat, eamque sequenti die repetit, Alexander tamen Trallianus, lib. 7. cap. 1. etiam vena in talo sectâ se sanguinem misisse & multò magis profuisse, quàm in cubito, scribit; cum sanguinem ad longinquas partes auocantia fortiolem multò reuulsionem efficiant. Mesues & Auicennas distinctione vti videntur, & in præseruatione rectius ad inferiores partes sanguinem retrahi, in curatione verò è cubito miti censent. Nonnulli tamen sunt, è quibus Valescus de Taranta, & Hieronymus Capiuaccius, qui etiam in curatione saphenam secandam existimant. Videturque his fauere Hippocrates, 5. aph. 31. dum scribit: Mulieri sanguinem enamenti mœstruis erumpentibus solutionem fieri.

Vnde in sputo cruento sanguis præcipue mittendus?

Verum enim verò rectissimè hîc sentire videntur Mesues & Auicenna, dictumque est supra de pleuritide; non semper licere ad remotissima reuellere, sed vbi ia morbis pectoris præsentaneo auxilio opus est; venam in brachio esse aperiendam. Ideoque cum vel nondum ad pectus sanguis decubuit, sed fluxurus metuitur, aut parum omnino affluxit, prouidentia & præseruationis gratia, ad remotissima sanguinem reuellere, & venam in talo aperire licet. Vbi verò materia iam affluxit, & adhuc copiosè affluit, vt inflammationis metus sit, vena in talo secta nimis tardum auxilium affert; sed tum in cubito vena aperienda, vt de pleuritide dictum.

In mulieribus verò mensium habenda est ratio, vt pote quorum fluxus eas à morbis multis præseruat & liberat. Distinctione tamen opus est. Cum enim menses statò tempore fluentes mulieribus prosint, alio verò tempore facilè concitari non possint; si mulieri sputo sanguinis, seu ex suppressione mensium, seu abique ea, laboranti menses iam instent, vena in talo aperienda est. Ita enim Medicus socias

naturæ operas præstat, atque in sanguinis ad vterum reuulsione natura Medico se coniungit. Atque hoc sensu accipiendus est allegatus aphorismus Hippocratis. Si verò fluxus mensium nondum instet, distinctione iterum vtendum. Nam si sanguinem in fœminis circa vterum cumulatam esse constet, nondum verò manus eius sit ad pectus fluxus, tum æque in fœminis ac in viris è talo sanguis mittendus. Si verò ad pulmones magnus eius sit impetus, magna tamen ex suppressione mensium etiam in vteri venis sit eius copia, ex vtriusque venis quidem sanguis mittendus, veruntamen si mensium fluxus nondum instet, in cubito primum vena aperienda; cum præsentaneum & subitum, quod vena in talo aperta præstare non potest, auxilium requiratur.



## LIBRI SECVNDI

## P A R S I V.

DE MORBIS AC SYM-  
ptomatibus Cordis.

## CAPVT I.

## De Morbis Pericardij.

**E**ST AN T tandem in hoc secundo libro morbi & symptomata Cordis. Cum autem cor sit vitæ principium, caloris natini fons, primum viuens & vltimum moriens, ac ceteræ corporis partes ex eo sanguinem, spiritus ac calorem vitalem accipiant, atque actiones suas exercere non possint, nisi calore & spiritu à corde sint persusæ; omnino cordis actiones ad vitam summopere sunt necessariæ. Ideoque etiam natura cor maxime ab omnibus iniuriis tueretur, & cor vitali calore copioso præditum maxime omnibus iniuriis resistit, & noxia à se repellit, & hinc rariùs quàm aliæ corporis partes, morbis afficitur. Sùntque etiam morbi cordis difficiles cogniti, atque plerumque non nisi in mortuis anatome deprehenduntur. Et si cor paulò grauius præter naturam afficiatur, mortem id homini accersere solet. Est nihilominus cor etiam multis morbis obnoxium. Et cum cor membrum tam nobile ac necessarium sit, peculiari capsula regitur, quæ pericardium vocatur. Ideoque morbi alij ipsius cordis, alij pericardij, de quibus seorsum dicendum. Symptomata verò præcipua sunt palpitatio cordis: virium imbecillitas, ac lipothymia & syncope.

De Aqua in pericardio Aucta &  
Deficiente.

Aqua in pericardio aucta.

Aqua quædam secundum naturam, vt in aliis animalibus, ita in homine reperitur in pericardio; id quod non solum docuit Hippocrates, in libello de corde, sed & ex viuorum animalium sectione patet.

Hanc tamen aquam interdum præter naturam Augeri, vt cor non liberè moueri, & ita palpitatio cordis causa esse possit, docet Galenus, 5. de loc. aff. c. 2.

Deficiens.

Contra si ista aqua præter naturam Deficiat, causa marasmi esse solet.

## De Vermibus in pericardio.

Vermes in pericardio.

Vermes aliquando in capsula cordis seu pericardio genitos fuisse obseruatum est, annotauitque aliquot eius rei historias Schenckius.

Difficulus autem cognoscuntur, & raro exactè, nisi post mortem. Solet autem tales ægros infestare cordis tremor, anxietas, animi deliquium & syncope, ac plerumque tandem ægri subita morte extinguuntur. Si ergo talia symptomata adsint, & medicamenta cordia-

lia exhibita nihil proficiant, vermem talem adesse suspicari licet.

Nonnulli Lunaticæ cuiusdam passionis mentionem faciunt, quæ ex vermibus in pericardio ortis pueris & infantibus accidat, vnde ij sæpe semimortui appareant. Verum mihi probabilius videtur, hoc quicquid est symptomatis, quod infantibus accidit, ex vermibus prouenire in intestinis genitis, & in ventriculum ascendentibus & orificium ventriculi molestantibus, quod etiam *cap. 5. a* appellatur.

Contra vermes autem in corde commendatur allium, obseruatumque est, vermes, qui in mortuis in capsula cordis reperti sunt, necatos fuisse succo allij, dum in circulum ex allij succo in mensa figuratum concluderentur. Vtile est & hoc:

*℞. Succum allij, raphani, & nasturtij, & exhibeatur.*

Ad Lunaticam verò illam passionem, quæ ex vermibus in capsula cordis ex nonnullorum opinione, aut potius ex vermibus orificium ventriculi seu cardiacum molestantibus oritur, commendatur ranacetum. Ramuli eius tenues in ymbra siccentur & addantur sequentis pulueris Dra. ii.

*℞. Rad. gentiana peonia, an. 3. ii. myrrha 3. j.*

F. Puluis.

Puluis hic aquâ humectetur, & ori infantis inungatur.

## Defectus pericardij.

Aliquando planè Deest pericardium. Id quod obseruauit Columbus, qui, lib. 15. anat. refert, se discipulum in Romana Academia secuisse, cui pericardium deerat: itaque subinde in syncopem incidebat, & mortuo similis conspiciebatur, quo genere morbi etiam exanimatus est. *Idem vult in puero nonnulli obseruatum esse, & Lipothymia cuiusdam oblat. magis tamen.* Tumores pericardij.

Tumores etiam in pericardio deprehensi sunt. Galenus, 5. de loc. affect. cap. 2. scribit, se simiam quandam quæ in dies emaciebatur, post mortem secuisse, & cæteris omnibus partibus saluis, inuenisse in pericardio tumorem præter naturam, qui humorem in se, qualem hydatides emittere solent, contineret. Atque in gallo quodam se vidisse aliquando cordis tunicam scirrhoso tumore affectam, perinde ac si plures membranæ crassæ inuolutæ altera alteri fuissent. Vnde coniecturam sumit, homines similibus affectibus obnoxios esse posse. Quem secutus Petrus Salius Diuersus, de morb. rarioribus cap. 4. colligit, idem in homine accidere posse. Nam si quis emacietur, nulla præsentè destillatione, nec sputo vel cruento vel purulento, nullaque naturalium partium ita læsa videatur, vt hinc macies & atrophia subsequi posset, suspicari licet, posse hoc accidere ex pericardio malè affecto. Etsi enim membrum per se non sit nobile: tamen quia cordi proximum est, id in consensum trahit & afficit. Affectus autem hic vt difficulter cognoscitur, & non nisi coniecturâ, ita curatu est impossibilis, scribitque Petrus Salius Diuersus, loc. alleg. se, etsi multa tentarit, nihil profecisse, omnesque tandem tæbe consumptos & emaciatos, vltimò quadam accedente leui febricula, cui syncope coniungebatur, interiisse.

## Vulnera, Putredo, &amp; Corruptio pericardij.

Vulneratur etiam interdum pericardium, interdum exulceratur, & putrescit. Galenus, 7. de administ. anat. cap. 13. refert, se in puero quodam in palæstra icto, & inflammationem in pectore passio, regione pectoris detecta & osse exciso nudum cor inuenisse, vtpote cuius inuolucrum putruerat. Ita ex Francisco Rota, de torm. vulner. cap. 23. refert Schenckius, in suppurato quodam torum ferè pericardium corruptum deprehensum fuisse.

Beniue



Beniuenius, de abdit. morb. caus. c. 5. narrat, quendam in pericardio vulneratum sua cura conualuisse. Et Cardanus, in comm. ad 18. aph. l. 6. Hippocrat. refert, se partem pericardij vidisse ablaram, ægrumq; tamen sanatum, sed suspiria alta duxisse, nec multis annis superuixisse.

Notabile est & hoc, quod ex observat. Iohan Bauhini refert Schenckius, in cadauere quodam dissecto pulmonem repertum fuisse planè consumptum, thoracis cavitatem plenam putrido & concreto sanguine, in pericardio verò plus quam mensuram puris albi contentam fuisse, totà cordis superficie absumptà & extenuatà. Symptomata, quæ passus est, erant tussis, febricula, dolor in thorace, & in anteriore ventris parte, difficilis respiratio, paucis diebus ante mortem deliquium animi, mens constabat. Verum quia Medici operari in his parum præstare potest, plura de iis non addimus.

## CAPVT II.

### De Cordis Intemperiebus.

#### Intemperies cordis calida.

Requentissimè cor intemperiem calidam patitur, & quidem à causis externis & internis: & omnes causæ, quæ febrem excitare solent, etiam intemperiem calidam cordis excitant, cum nulla febris excitari possit, nisi cor prius incalescat. Causæ tamen, quæ intemperiem calidam cordis excitant, non verò in toto, mitiores sunt; & quamuis cor per animi affectus & alias causas etiam per se incalescere possit; tamen per consensum aliarum partium sapissime intemperiem calidam contrahit; & præcipuè à partibus inferioribus incalescit, è quibus vapor calidus cordis communicatur. Ideoque de causis intemperiei calidæ cordis multa hic addere opus non est, cum satis de iis in doctrina de febribus dictum sit.

Cognoscitur intemperies calida cordis præcipuè ex actionibus ejus mutatis, respiratio fit magna, celer, frequens, pulsus similiter est celer, frequens; magnus si vires sufficiunt; adest propensio ad iram, calor adest præter naturam, & in totum corpus diffunditur, halitus, qui ore egreditur, calidus est, ut ferè palatum, linguam & labia exsiccet. Præcesserunt causæ cor calefacientes: iuuant frigida, nocent calida.

Quò major autem excessus est caloris, eo morbus periculosior est, patetque id maximè ex effectis, & virium robore vel deiectione; de quo de febribus dictum.

Curacionem quod attinet, calida intemperies refrigerantia indicat. Vbi primò in genere monendum, extremè frigida vel nimis cor alterantia non vsurpanda esse. Cum enim cor caloris natiui fons sit, & maiorem calorem, quam nulla pars alia corporis, obtineat, & ab eo vita hominis pendeat, calor is studiosè fouendus, nec quicquam adhibendum, quod ipsum extinguere possit, utpote quo extincto mors sequitur. Deinde quia cor spiritus vitales generat, suaeuolentia cordi maximè vtilia sunt.

Medicamenta autem cor refrigerantia sunt acetosa, flor. rosar. violar. nymphæa, flor. borrag. bugloss. succus citri, limonum, granat. cerasor. poma odorata acidiuscula, fructus ribes. berber. rubi Idæi, citri, C. C. terra sigillata, bolus Armena, corallia, margarita.

Ex his parantur alia medicamenta.

#### Interna.

Aquæ, rosar. violar. nymphæa, borrag. bugloss. fragor.

Syrup. acetosi. citri, granator. acetos. acetosell. de succo ribes, berberis, helen. nymph. borrag. cerasorum, coralliorum.

Conseruæ, rosar. borrag. nymph. viol. acetos. acetosell. flor. aurantiar. citri.

Condita, caro citri, cerasa, ribes, berberis.

Species diamargarit. frigid.

Rotula, & mortuli manus Christi perlai, diamarg. frigid. de succo citri, ribes, berberis.

#### Aqua cordialis.

℞. Conseru. bugloss. borrag. violar. rosar. nymph. cor. citri, ana Vnc. ii. spec. el. diamarg. frigid. de gemm. an. Drach. ii. diamb. Drach. i. croci Drach. i. sem. sem. citri, oxalid. cydonior. an. Drach. iij. 4. frig. maj. scariola an. Scrup. i. lactuca Drach. sem. herb. lactuca, oxalid. portulac. endiu. an. M. sem. Addendo caponem exenteratum, purgatum & incisum, ut decet, succi acetosell. citri, granator, ana Vnc. i. sem. aqu. rosar. borrag. bugloss. meliss. ana lb. j.

Incidantur & contundantur ac misceantur in mortario lapideo & postea lento B. M. calore destillentur.

#### Externa.

Eadem pleraque extra applicari possunt. Vnde fiunt Epirhemata, ex aqua rosar. nymph. acetos. rosar. santalo, margarit. coralliis, quibus aliquid camphora additur.

Sacculi ex herbis, floribus, & foliis antea enumeratis cum serico rubro vel albo & floccis panni coccinei.

Olea, rosar. violar. nymphæa.

Vnguenta, rosar. santalinum.

Talia autem Topica commodissimè ad sinistram partem applicantur. Etsi enim cor in medio pectoris sit situm: quia tamen thorax in medio planè osseus est, commodè ibi non possunt penetrare. Circa papillam verò sinistram, quò pars inferior cordis vergit, facilius penetrant.

Vitus ratio medicamenti respondeat.

Si verò cum materia calor conjungatur, & quidem si sanguis abundet, is euacuandus; si bilis, expurganda syrupo rosar. solut. & viol. sol. pulp. tamarind. manna triphera.

#### Intemperies cordis frigida.

Rariùs verò cor intemperie frigida laborat. Cum enim sit calidum membrum, causis frigidis fortiter resistit. Aliquando tamen etiam frigida intemperie corripitur, quam inducit retentio excrementorum frigidorum, & vapores frigidi ex aliis partibus ad cor adscendentes. Animi perturbationes, præcipuè mœror & timor, quibus calor cordis torpidior redditur, & penè suffocatur, immodica exercitia, otium nimium, ob quod spiritus torpent, & calor remittitur. Cibi & potus; ut & medicamenta frigida, aer ambiens frigidus, siue inspiratione attractus, siue ob vestium defectum pectore nudo extra ad cor penetrans, ut & nimia pluiarum ad pectus appulsio. Et omnino omnes morbi, qui interitum homini afferunt, cor tandem refrigerant; cum mors ab extinctione calidi innati cordis proueniat.

Cognoscitur intemperies cordis frigida ex cordis pulsu paruo, tardo, raro, & respiratione simili; aerque, qui expiratur, frigidus percipitur. Et si sit excessus frigoris magnus, & calor cordis jam penè extinctus, corpus vniuersum frigidum sentitur. Præcesserunt causæ cor refrigerantes; iuuant calefacientia cor, nocent refrigerantia.

Curatur autem intemperies cordis frigida calefacientibus. Sunt autem medicamenta cor calefacientia simplicia, melissa, ocymum, rosmarinus, card. benedict.

SSs 4 calamintha.

*calamintha, rad. helen. angelic. flor. roris marini, tunicis, la-  
uendul. lily conuall. sem. citri, grana alcherm. lignum  
aloës. Aromata pleraque cinamom. caryophyll. zedoar.  
macis, nux moschat. ambra, moschus.*

Atque ex his varia componuntur.

### Interna.

#### Interna.

Aquæ & spiritus, meliss. roris mar. flor. citri, aurantior.  
cinamom.

Conseru. anthos, meliss. tunicis, lauendula, lilior.  
conuall.

Syrupi, tunicis, meliss. lauendula, cinamomi, cortic.  
citri.

Conditæ, cortices citri, aurantior. rad. helen. nuc.  
jugland.

Olea destillata, citri, meliss. cinamom. caryophyll.  
macis.

Species & confectioes aromaticæ, diamargarit.  
calid. confect. de hyacinth. species cordiales, diamosch.  
diamb. diaxyloaloes, arom. caryophyllat. & præcipue  
confect. alcherm. thetiaca itidem & Mithridatum.

### Externa.

#### Externa.

Eademque pleraque etiam extra applicantur, vt po-  
stea dicetur.

Ex his porro varia composita sunt:

Aquæ vitæ omnis generis, quæ passim extant, aqua  
virtutum, aqua carbunculi dicta, elixir vitæ Matthioli.  
Videantur Institut. l. 5. p. 3. sect. 3. cap. 5.

Vel paretur talis Aqua.

℞. Meliss. M. ii. ocymi M. j. flor. anthos, cordial. tunic.  
an. M. sem. cortic. citri Vnc. sem. sem. citri Drach. ii. ca-  
ryophyll. Drach. iii. cinamom. Vnc. i. ligni aloës, macis,  
zedoaria an. Drach. i. croci Drach. sem. moschi, ambr. ana  
Scrup. sem.

Affundatur vini Maluatici q. s.

Digerantur aliquandiu, postea destillentur. Detur ab  
Vnc. sem. ad Vnc. i.

### Rondeletij Aqua & Iulebus,

#### Rondeletij aqua.

℞. Cord. porci N. ij. cerni vel bonis N. iii. caryophyllor.  
galange mar. & min. sem. basilici, an. Drach. iii. flor. bu-  
gloss. borrag. an. p. ii. anthos p. iij.

Macerentur in vino maluat. & destillentur in vitro  
Aqua seruetur vsui.

#### Iulebus eius- dem.

℞. Aqua prædict. Vnc. iii. sacch. parum. F. Iulebus.

### Aqua virtutis.

#### Aqua virtu- tis.

℞. Rad. buglossi Ital. Vnc. iv. fl. borrag. bugloss. ana  
Vnc. ii. roris mar. croci, ana Drach. i. succi cydonior. ma-  
lor. Borstorf. citri cum corti. incis. an. Vnc. i. sem. vini  
Rhenani albi lb. iij. aqu. meliss. borrag. bugloss. ana lb. s.

M. Stent in infusione per dies 10. in loco calido,  
postea fiat destillatio.

### Aqua cardiaca D. Georgij Leuschneri.

#### Aqua car- diaca D. Leuschneri.

℞. Fol. basilic. c. floribus, meliss. an. M. j. sem. pule-  
gij, mentha, fl. rosarum rubr. ana M. j. borrag. bugloss. tunic.  
peonia, violarum, betonica, an. M. sem. sem. meliss. basilici,  
cubeb. ana Drach. j. caryophyllor. Drach. ij. zedoar. ga-  
lange, enule, doronici. ana Drach. i. sem. macis Scrup. ii.  
santali citrini, albi, an. Drach. i. sem. ligni aloës Drach. i.  
cortic. citri exsiccat. aurantior. an. Drach. ii. sem. cinamom.  
acutissimi Vnc. i.

Hiscæ contus. & conquass. superfund. vini Rhenani  
puri lb. v.

Ssent infusa hor. xxxv i. ad cineres calidos, postea de-  
stillentur s. a. in B. adicianturque tandem. Fol. auri N. v.

( æstate sumantur recentia & viridia, & medietas tan-  
tum vini. )

### Aqua virtutis alia.

℞. Galang. Zingib. caryophyll. granor. Paradisi, ana  
Drach. iij. cubeb. piperis longi, an. Drach. i. sem. macis,  
nuc. mosch. an. Drach. ii. sem. ligni aloës Drach. iii. cinam.  
el. cortic. citri, an. Vnc. sem. calam. arom. Drach. i. sem. ro-  
ris marini, salvia, an. ℥. i. fl. lauend. ℥. vi. ruta ℥. ii. rosar.  
rubr. borrag. an. ℥. s. fol. lauri Vnc. sem. Contund. & in-  
fund. in vini boni mens. iii. Destillentur. s. a.

### Alia.

℞. Roris marini, meliss. basilici, pulegij, serpilli, an. M. j.  
cortic. citri exter. Vnc. j. ligni aloës, santali citrini, rhody-  
rasp. an. ℥. i. sem. caryophyll. ℥. ii. croci ℥. i. spica, Celtica,  
Indic. an. Scrup. i. nuc. mosch. Drach. i. sem. cortic. cydo-  
nior. recent. Vnc. j.

Concisa infund. per dies 3. ad Solem, vel in loco ca-  
lido in aqu. rosar. spirit. vini opt. an. lb. i. sem. acet. ro-  
sar. lb. j.

Destillentur postea in M. B. In destillato liquore  
dissolue moschi, q. s. ad gratiss. odorem.

Vel suspendatur moschus in alembici rostro.

### Alia.

℞. Fl. lily conuall. M. ii. lauendul. cichor. an. M. j. car-  
damomi vir. galang. cyperi rotund. macis, nuc. mosch. ligni  
aloës, piperis longi, nigri, mastich. zingib. an. Drach. i. sem.  
cinamomi Vnc. ii. vini sublimat. lb. ix.

Infundantur per aliquot dies, postea destillentur.

### Elixir vita.

℞. Cinamom. elect. Vnc. vi. caryophyllor. cardamomi,  
ligni aloës opt. an. Drach. i. sem. santali citrini Drach. ii.  
nuc. mosch. macis, ana Drach. j.

Puluerisatis mediocriter omnibus adde spirit. vini  
puriss. lb. vi i. sem.

Et permistis omnibus in vitreo vase clauso officio  
ita referuentur per mensem, singulis diebus ter quater-  
ve agitando & commiscendo. Postremo die, vbi perfe-  
ctè referuerint, percolentur, & colaturæ benè clara add.  
syrupi è cortic. citri lb. j. sem. moschi ambr. an. ℥. sem.

Referuetur, in vitro bene obturato.

### Aliud.

℞. Cinamom. elect. Vnc. ii. Zingib. Drach. vi. caryo-  
phyllor. nuc. mosch. ana Drach. ij. gran. paradisi Scrup. ii.  
cal. arom. Vnc. sem. galang. Drach. j. fl. rosar. Vnc. j. ro-  
ris mar. Drach. iij. cort. citri Vnc. i. sem. majoran. meliss. an.  
M. j. ligni rhodij Drach. iij. santali citrini Drach. ii. rubr.  
Vnc. i. vini sublimat. lb. x i.

Infund. per mensem, deinde colentur, & colaturæ  
claræ add. syr. de cort. citri, min. cydonior. ana lb. i. sem.  
Misce.

### Electuaria.

℞. Conseru. borrag. bugloss. anthos. tunic. ana Vnc. i.  
ros. Vnc. sem. cortic. citri condit. Drach. vi. nucis mosch.  
condita Drach. j. pulu. caryophyll. Scrup. sem. Cum syrup.  
innic. F. Electuar.

### Rotula & Morfuli.

℞. Spec. diamb. diaxyloaloes, an. Drach. i. ol. cina-  
mom. citri, an. gutt. iii. confect. alcherm. Scrup. j. sacch. in  
aqua rosar. solut. Vnc. iij.

F. Rotulæ.

Illinantur

Illinantur *ambra in aqua ros. dissol. gr.iii.*

Vel *℥. Spec. diamb. aromat. caryophyll. diamosch. dulc. an. Scrup.ii. lapid. bezoar. Scrup. sem. cortic. citri condit. Drach.ii. sacch. albi in aqua rosar. dissol. Vnc.iii. F. Morfuli.*

Vel *℥. Amygd. dul. pistacior. an. Vnc.i. pinear. Drac. vi. carn. citri cond. Vnc.i. nuc. mosch. in Ind. cond. Drach. vi. cort. citri cond. Drach.iii. zingib. in Ind. cond. Vnc.β. macis Drach.j. cinamomi Drach.i. sem.*

Fructus macerentur per noctem vnam in aqua rosarum, & aromata cum eis incidantur & frangantur mediocriter. Add. *sacch. albiss. Vnc.xx. in aqua rosar. dissol. In fine admisce, mosch. opt. gr. ix. ol. cinamomi gr. vi. F. l. a. Morfuli deaurandi.*

Externa.

Ex medicamentis hactenus enumeratis etiam externa varia componuntur.

#### Epithemata.

*℥. Aqu. flor. aurantior. meliss. anthos, an. Vnc.ii. carbunculi. virtut. an. Vnc.i. spirit. rosar. Drach.i. confect. alchem. Drach. sem. cortic. citri siccor. Scrup.ii. croci Srup. sem. M.*

#### Balsama & Linimenta:

*℥. Ambra liquida, olei nucis mosch. express. confect. alchem. an. Drach. sem. olei destil. citri, meliss. an. Scrup. sem. F. Linimentum.*

#### Sacculus:

*℥. Flor. anthos, cordial. meliss. laur. dul. an. M. sem. cortic. citri siccor. caryophyll. macis, an. Drach.i. Cum sindone rubro, F. Sacculus.*

#### Intemperies cordis Humida.

Intemperies cordis humida.

Intemperies cordis humida fit à causis, quæ aliàs totum corpus humectare possunt: verum non facile eam recipit; cum sit valde calidum & siccum. Præcipue verò aer humectandi vim habet, utpote qui per pulmones ad cor penetrat, nebulosus scilicet, crassus & humidus. Humectat etiam totius corporis intemperies humida, qualis est in anasarca.

Cognoscitur ex talibus causis, quæ præcesserunt; ex effectis item, ut pulsus molli, & toto corpore humidore.

Curatur siccantibus medicamentis hæc intemperies, qualia sunt omnia calida modò proposita. Omnia enim talia siccandi vim habent.

Exsiccant præterea cor humidum, quæ frigida siue temperata sunt, *margarita, corallia, C. C. os de corde cerui, bolus Armena, terra sigillata, lapides pressosi.*

Diæta medicamentis respondeat.

#### Intemperies cordis Sicca.

Intemperies cordis sicca.

Cor siccant corporis atque animi motus nimij, curæ, mœror & sollicitudines, vigilæ nimix: unde quibusdam ex hisce causis mortuis cor tanquam pyrum rostum inuentum fuisse historix testantur, aer calidus & siccus, qualis est in locis montanis, & sæpe etiam maritimis, cibi & potus siccandi vi præditi, inprimis vini potentis usus, medicamenta ejusdem generis, febris biliosa, tumores pericardij, & aliæ causæ, quæ febrem hecticam inducere valent.

Cognoscitur siccitas cordis à causis his, si præcesserint; sequitur verò totius corporis, & inprimis pectoris extenuatio, pulsus est durus.

Curatur verò humectantibus, *borrag. bugloss. violis, semin. frigid. major. passulis, amygdalis*, Prodest etiam balneum aquæ dulcis tepidum, in quo malua, althæa, fœnumgræc. cocta sint. Fomenta etiam pectoris ex iisdem parantur, post quæ pectus inungatur ol. amygdal. dulc. viol. mucilag. semin. althææ, maluæ.

Diæta etiam sit humectans, & omnino curatio & diæta talis instituenda, qualis hecticis conuenit.

#### Morbi totius substantia.

Inprimis verò & frequenter cor à morbis totius substantiæ seu formæ, ut appellant, vel qualitarum occultarum infestatur. Pleraque enim venena, quocunque modo in corpus sese insinuant, cor hoc modo afficiendi vim habent; de quibus suo loco dicitur, & etiam libro 2. Instit. part. 2. c. 12. & de peste dictum.

Cognoscuntur autem hi morbi à causis, quæ præcesserunt, ad tales morbos producendos idoneis. Et si de causis ejusmodi non constet, ex effectis deprehenduntur, quæ supra vires caussarum manifestarum sunt grauiora, ut anxietas & inquietudo, subita & summa virium dejectio, animi deliquium, & syncope, pulsus summa imbecillitas, & inæqualitas. Maculæ hinc inde in corpore erumpentes, & similia symptomata, quæ pestilentibus ac venenatis morbis sunt propria.

Morbi autem hi longè sunt periculosissimi, & hominem inopinatè sæpe jugulant.

Curantur autem hi morbi alexipharmacis. Et quidem cuilibet veneno suum alexipharmacum opponendum; de quibus in Institut. lib. 5. part. 1. s. 1. cap. 21. & de Peste dictum, ac suo loco, de venenis, dicitur. In genere, & præcipue si de natura veneni non constet, antea enumerata vsurpanda, & inter composita theriaca & Michridatium.

#### Elect. Bertruci confortans cor in omni causa.

*℥. Smaragd. hyacinth. sapphir. ana Drach. sem. auri & argenti puri foliati, ana Drach. i. margarit. perforat. & non perforat. Drach. i. sem. bugloss. meliss. flor. borrag. ocymi, zedoar, been alb. & rubr. caryophyllor. ligni aloës zingiberis, cinamomi elect. ana Vnc. sem. serici contusi, non combusti, cubeb. cardamom. calami aromatici, spica, galang. mosch. camphor. off. de C. C. ambr. ana Drach. j. corall. alb. rubr. santal. rosar. spodi, myrobalan. belliric. terr. sigill. coriand. ana Drach. ii. sem.*

Elect. Bertruci.

Terantur omnia subtiliter, & pro qualibet uncia specierum sumatur *sacch. albiss. lb. i.*

Fiat Elect. Deauretur.

Cum etiam ad calidum nativum & naturalem corporis constitutionem conseruandam spiritus virales pertineant, atque hi etiam varia vitia pati possint, etiam de iis hoc loco dicendum esset. Verum de iis postea de lypothymia & syncope dicitur.

### C A P V T III.

#### De reliquis cordis Morbis.

Præter morbos intemperiei & totius substantiæ, qui cor frequentissime infestant, adhuc alij morbi cordis dantur, qui quia rariores & rarè curabiles, eos vno hoc capite conjungemus.

Reliqui morbi cordis.

#### Sinistri cordis Ventriculi defectus.

Cordis ventriculum sinistrum in quibusdam defuisse, vel planè exiguum fuisse, obseruauit Columbus, anatom. l. 15. vt & septum, quo ventriculi cordis distinguuntur, cartilagineum.

Sinistri cordis ventriculi defectus.

#### Cor Hirsutum.

Quosdam cor hirsutum habuisse, annotauit Plinius l. 11. nat. hist. cap. 25. Valerius Max. l. 1. cap. 6. Benignus, de abdit. morb. & curat. caus. cap. 83. Antonius Muretus, l. 1. variar. lect. cap. 10. Amar. Lusitan. cent. 6.

Cor hirsutum.

Curat.

curat.66. Omnes autem hi, qui cor hirsutum habuerunt, fuerunt audacissimi & famosi latrones.

*Vermes, Calculi & alia prater naturam in corde reperta.*

*Vermes, calculi &c. in corde reperti.*

Vermes aliquando in pestilentibus febribus in ventriculis cordis fuisse genitos, audiuisse se ab hominibus fide dignis, qui huiusmodi ægrotantia corpora secuerint, refert Vidus Vidius, *cap. de morbis cordis*. Idem etiam scribit, quod lapides in corde fuerint geniti, se neque audiuisse neque legisse. Referunt tamen id alij quamplurimi. Hollerius; *comm. 1. in lib. 6. sect. 2. aph. 4. Coac. pradiet. Hippocr.* Scholiographus in Hollerium, *ad cap. 29. & 50. lib. 1. de morb. intern.* Iacotius, *cōm. 1. lib. 6. sect. 2. aph. 4. Coac. Hippoc. & comm. 1. ad aph. 5. lib. 3. sect. 2. Coac. Hippocr.* Et in Maximiliani I I. Imperatoris corde inuenti sunt tres lapides vt refert VVierus, *de præstig. demon. lib. 4. cap. 6.* Et Erastus, *in consil. & epist. à Scholiz. collectis*. Atque horum alij palpitationem cordis frequenter passi sunt, alij vrinam purulentam per multos dies, imò menses, saluis renibus & vesicâ, minxerunt.

Carnosæ quoque excrescentias in cordis dextro ventriculo vel sinistro repertas fuisse in iis, qui dolorem cordis & syncopen passi fuerint, & pulum intermittentem habuerunt, refert Vesalius, *l. 1. cap. 5. de hum. corp. fabric.* Beniuenius, *de abdii. & morb. & curat. causs. c. 35.*

*Cordis Tabes.*

*Cordis Tabes.*

Cor quoque in quibusdam contabuisse & exsiccatum fuisse, obseruatum est. Idque etiam ex tumore pericardij accidisse, antea, *c. 1. dictum*. Ad cordis verò tabem prodesse succum raphani, ex Ægyptiorum traditione refert Plinius, *hist. nat. lib. 19. cap. 5.*

*Situs cordis mutatus.*

*Situs cordis mutatus.*

Cor etiam Situm quandoque mutasse obseruatum est, vt in Liuno illo VVitebergæ, cuius supra, *lib. 2. part. 2. cap. 15.* mentio facta est.

*Vulnera cordis.*

*Vulnera cordis.*

Cor etiam interdum Vulneratur & quidem vt Galenus, *5. de loc. aff. cap. 1.* scribit, si ad ventrem cordis vulneris penetrat, protinus magno cum sanguinis fluore hominem mori necesse est. Idque præcipue si sinister ventriculus cordis fuerit vulneratus. Si verò non ad ventrem vsque pertingat, sed in cordis substantia constitit, viuere ita affectus non solum ea die, sed etiam sequenti nocte potest. Vid. *lib. V. part. 4. cap. 3.*

*Corde vulnerato hominem aliquandiu viuere posse.*

*Historia Henr. ab Heer.*

[Cordis vulnera esse quidem lethalia, aliquandiu tamen eo vulnerato hominem viuere posse, historiis, *lib. 5. Pr. part. 4. c. 3.* probauimus: quod accidit, si sola cordis substantia sit læsa, & vulnus ad ventriculos, præcipue sinistram, non penetrat. Hi enim tandiu viuere possunt, donec inflammatio superueniat. Historiis illis duæ adhuc, quas Henr. ab Heer, *obseru. 1. 1.* recenset, addi possunt. Quidam, vt scribit, duobus globis in thorace vulneratus, septimo post acceptum vulnus, die mortuus est. Thorace aperto, basis cordis, eiusque conus, cum insigni laceratione, globulis duobus transuerberatus inuentus fuit. Idem, *ibid.* refert se vidisse alium, cui quatuor bombarbæ globulis medium cor traiectum fuerat, ad 5. diem superuixisse.]

*Apostemata & Vlcera.*

*Apostemata & Vlcera.*

Imò cor Apostemata & Vlcera pati potest, quæ tandem hominem subitò per syncopen tollunt. Quia tamen breui tempore contrahi non potuerunt, inde

etiam ægri tales frequentissime lipothymia fuere obnoxij, collegitque huius rei exempla. Schenckius, *in obseru. med.* Refert quoque Henricus Smetius, *miscell. t. 10.* se vidisse in Mercatoris cuiusdam dissecto corpore dextrum cordis sinum interiore sui parte durum, exasperatum vndique & quodammodo squamosum, quo in loco continebatur frustum condensati humoris pituitosi, lenti, albicantis, longitudine medij digiti, crassitie pollicis, sanguini mistum. Verum quia talia non nisi post mortem demum deprehenduntur, nec curationem recipiunt, plura de iis non addimus.

CAPVT IV.

*De cordis Palpitatione.*

Atque hi sunt morbi, quos cor patitur. Restat, vt de symptomatibus quæ in eius actione accidere solent dicamus, palpitatione scilicet, & animi deliquio ac syncope. Palpitatio Græcis *παλμὴ* vocabulo generaliter accepto, est *διαστολή* p. n. in quacunque corporis parte, quæ distendi & dilatari, iterumque concidere potest, cuiusmodi sunt partes molles, vt cutis & subiecti huic muscoli, quarum hi non obscuras canitates habent, inter cutem autem & musculos etiam spacia quædam interjecta sunt, in quibus materia palpitationem efficiens colligi & contineri potest. Causa enim palpitationis ita generaliter acceptæ est halitus crassus, qui in parte collectus cum exitum non reperiat, partem attollit, quæ suâ grauitate iterum concidit. Atque ita ad hunc motum seu palpitationem generaliter dictam natura præter expulsionem materię nihil confert, neque palpitatio hæc voluntariæ virtutis & organorum huius actio est, aut motus ex voluntario & naturali mixtus, qualis in tremore, sed simpliciter *παρὰ φύσιν & ἀντὶ παθῶν* à sola causâ morbifica partem dilatante & attollente. De quo videatur Galenus, *in lib. de tremore palpit. & conuuls. cap. 4. & 5.*

Deinde tribuitur etiam eadem appellatio motui cordis præter naturam, qui *παλμὴ* & palpitatio cordis nominatur. Nonnulli etiam, teste Galeno, *5. aph. 65.* per *καρδιαγωγὸν* cordis ipsius motionem crebram & celerem, palpitationi similem intellexerunt, quam alteram *καρδιαγωγμὴ* speciem Erotianus, alij notham palpitationem faciunt, verum propriè *καρδιαγωγὸς* & *καρδιαγλία* oris ventriculi affectiones sunt ortæ ab humore acri & mordace, quam partem Antiqui *καρδίας* dixerunt. *Παλμὴ* & palpitatio cordis à nonnullis etiam tremor cordis & saltus cordis & formido cordis appellatur. Distinguunt quidem nonnulli, inter quos Mercatus, inter tremorem cordis, & palpitationem cordis, quod palpitatio à solo morbo fiat, tremor verò à morbo & facultate; deinde quod palpitatio in ipsius partibus proueniat, quæ dilatari possunt, tremor verò in iis tantum, quæ voluntariè moueri possunt. Verum errandi causa pluribus ista fuit, quod palpitationis, vt & tremoris, vocabulum vniuocè cordi & aliis partibus competere existimant; quod tamen falsum. Nam sunt plurimi in ea sententia, cordi quoque tale quid accidere posse, quale in cute & musculis fit, à spiritu & flatu frigido & crasso à quo impletum iterumque euacuatum cor moueatur, instar vtrium, in quibus tale aliquid à liquore violenter infuso vel spiritu inflato & rursum compresso contingit. Verum magna palpitationis in partibus externis; & palpitationis cordis est diuersitas. Cutis enim & partes externæ nullo modo sponte se dilatant, sed solum à causis morbiticis in altum eleuantur & attolluntur. Cur verò cum facultatem insitam, quæ dilaretur & contrahatur, habeat, palpitatio cordis sine motu ejus fieri non potest. Neque enim credibile est, cor, cuius motus proprius ad vitam



vitam summè necessarius est, & quo cessante, vires omnes collabuntur, instar vtris vel vesicæ, à flatibus distendi posse. Hoc enim si fieret, cordis naturalem motum cessare necesse esset. Et frustra à nonnullis hic multa loca è Galeno congeruntur quibus probare conantur, palpitationem cordis fieri non à natura, sed à morbo, aut potius causâ morbifica. Galenus enim in iis locis omnibus tantum de palpitatione in cute & partibus externis, non verò de palpitatione cordis, quæ alterius naturæ est, loquitur. Et ipse Galenus, 2. de sympt. caus. cap. 2. palpitationem cordis & arteriarum ab aliarum partium palpitatione discernit. Atque hinc etiam accidit, ut Autores alij aliter de cordis palpitatione vel tremore sentiant, nonnulli etiam planè falsa dogmata habeant. Alij enim in specie eum saltem cordis motum, qui fit à causâ cor molestante, seu ab expultrice cordis stimulata ad expellendum id, quod cordi molestum est, palpitationem cordis appellant. Imò nonnulli specialissimè cordis palpitationem ad eum saltem motum deprauatum restringunt, qui fit à materia crassa & flatulenta cor grauante, & quidem nonnulli, ut dictum, eodem planè modo, ut in cute, in corde à flatu palpitationem fieri docent.

Alij verò omnes motus cordis deprauatos nomine palpitationis cordis comprehendunt, siue sint parui & tremuli, siue magni & cum saltu quodam. Hinc nonnulli palpitationem & cordis aliam faciunt legitimam & veram, aliam notham; & legitimam eam saltem nominant, quæ fit à vapore crasso: ab alijs autem causis ortam notham appellant. Sed sufficiens causa nulla est, cur non & illa palpitatione, quam ex vulnere ortam describit Forestus; quæ tam vehemens ac violenta fuit, ut etiam extra domum, in qua æger decumbebat, à transeunte, si fenestræ aures admoueret, exaudiretur, & illa, quam Fernelius thoracis vicinas costas effregisse, vel de sua sede depulisse scribit, aut quas Hollerius recenset, legitimæ & veræ cordis palpitationes nominari non debeant.

Ideoque definimus *palpitationem cordis motum deprauatum pulsantis cordis facultatis, stimulata & irritata à re molesta, & usu eius actionis aucto*. Quamquam enim in febribus in æstu vehementiore & alijs causis nonnunquam etiam cor vehementius mouetur: tamen nisi motus ille insignis sit & deprauatus, palpitatione cordis non dicitur.

#### Causæ.

Causæ.

Irritatur autem facultas motrix tribus de causis, nimirum à re aliena & molesta, quam cor expellere nititur, spirituum vitalium defectu; & caliditate præter naturam.

Prima ergo palpitationis causa est alienum & molestum quid cordi occurrens, quod à se amouere cupit. Et quia hæc causa frequentissimè facit, ut cor ita moueatur, ut ejus motus deprauatus appellari possit, reliquæ verò duæ sæpius vehementem aliquem motum potius, quam deprauatum efficiant, nonnulli, ut dictum, palpitationem cordis in specie appellant, quæ fit à causâ cor grauante, siue ab expultrice cordis stimulata ad expellendum id, quod cordi molestum occurrit. Dum n. cor grauatur, & in motu impeditur, fit, ut pulsans vis, dum valida est ad expellendum id, quod molestum est, concitetur, & subito ad motum instigetur, vel resarciat motus impeditos, vno majore pulsu, vel vtraque de causâ motum vehementiorem efficiat, aut si vis imbecilla sit, pulsus paruos & crebros faciat. Neque mirum est, quod à corde tam vehementes motus proficiuntur. Cum enim cor principium vitæ sit, vim etiam expultricem, quam vlla alia pars, robustiorem habet, quæ nihil, quod cordi dampnum inferre possit, tolerat. Ideoque quotiescunque ipsi aliquid molesti occurrit, contra illud vehe-

mentissimè insurgit, & hinc edit motus vehementissimos.

Sunt autem causæ, quæ cor molestant & expultricem ejus stimulare possunt, variæ. Primò vapores & flatus non solum copia, sed & qualitate manifesta, vel occulta, vel vtroque modo cor molestantes, cordis palpitationem excitant. Vnde à venis, ut & in febribus malignis & pestilentibus, ab humorum putredine & corruptione palpitatione cordis excitatur. Hinc quoque euenit, ut foemina mensium suppressione laborantibus, & qui melancholia hypochondriaca laborant, cordis palpitationes familiares sint. Per arterias enim melaïcas, & quæ multæ per lienem diffunduntur, itémque ex vtero prauis vapores cor subeunt, cujus vis irritata vehementiore palpitatione nititur, quod noxium est, expellere. Hinc etiam euenit ut in corporis motu nimio, ira, metu, tristitia, æstu, balneis, Venere, nimio vini potentioris potu, inedia, palpitatione cordis præcipuè in dispositis excite-tur. Ira enim, gaudium, timor, non solum sanguinem & spiritus, sed & humores ac vapores quietos commouent; quod idem & corporis exercitia præstant, & leue exercitium in iis, qui hu. c malo obnoxij sunt, palpitationem cordis excitat.

Deinde humores putridi, acres, calidi, vel etiam copiosi cor molestant & grauare possunt. Qualem sanguinem in arteriis ex summo calore veluti retorridum bilique atræ cognatum, se deprehendisse testatur Fernelius. De qua etiam re videatur Platerus, lib. 2. Pract. cap. 11. qui prolixè hac de re agit, & palpitationem cordis, quæ virginibus menstruum suppressione laborantibus familiaris est, ad hanc causam refert. Malim tamen in prauos & foetidos vapores causam referre palpitationis cordis in virginibus causa suppressorum menstruum malum habitum acquirantibus, quam cum Platero in copiam sanguinis feruidi & biliosi, qui cum cachexia, ac malo corporis habitu vix consistere potest. Aliàs non negarem, retorridam ac inflammatam in hypochondriis, & in arterias effusam bilem atram cordi communicari posse, cujus malignitate & acrimoniâ cor irritatum vehementiorem hunc motum edat. Idem tamen à prauis vaporibus ex eodem humore eleuatis fieri potest.

Fiunt & cordis palpitationes, dum humiditas illa in pericardio incrementum sumit, ut cor premat & grauet. Huc pertinet sanguis, qui interdum in vulneribus ad cor effunditur, quod accidit proculdubio iuueni illi apud Forestum, lib. 17. obseru. 1. de quo antea dictum. Molestant & cor tumores in pericardio excitati, siue illi sint scirrhosti & humoris expertes, siue humorem in se contineant. Refert Platerus; in quodam, diuturniore cordis tremore è medio sublato, osseum quiddam & cartilagineum in corde deprehensum fuisse. Et Schenchius, lib. 2. obseru. 214. refert, in Sacerdote quodam, qui à teneris vnguiculis vsque ad annum 42. quo mortuus est, palpitatione cordis laborauerat, in cordis basi carnis excrescentiam repertam fuisse, quæ sex drachmas ponderaret, & alterum corculum repræsentaret. Refert quoque Dodonæus, in annot. ad cap. 35. obseru. Beniuenij, se callum in arteria magna loco cordi proximo obseruasse. Vnde palpitatione orta est per multos annos durans. Huc etiam referendi vermes, quos in capsula cordis genitos causam palpitationis cordis fuisse referunt. Nonnunquam etiam externum quid cordi occurrere potest, quod illud pungat, rodât & rumpat.

Secundò, si ob inediam, vel morbos vehementes spiritus subito aut nimium dissipentur, vel animi affectus, iram, gaudium, metum, pudorem spiritus subito hinc inde propellantur ac dissipentur, nec ut par est, in totum corpus distribuuntur, ut huic defectui cor occurrat, & quod sui officij est, omnibus partibus spiritus necessarios suppeditet, ejus motum intendi, vehementioremque

Causa cor molestantes.

tiorémque reddi necesse est. Hinc quibus aliàs spiritus defunt, & qui debiles ac huic morbo obnoxij sunt, iis vel leue exercitium cordis palpitationem accerere potest.

Tertio, si calor præter naturam in corde augeatur, non solum spiritus intus absumuntur & dissipantur, sed & accenduntur, ac propterea motus cordis & artiarum augetur, ut, quod absumitur, restituatur, & calor refrigeretur. Fit autem hoc à caussis tum internis, tum externis, irâ, motu. Itâ obseruauit Platerus, iuuenem quandam admodum calentem, cum in exercitio pilæ irâ corripere, atque ita duæ causæ conjungerentur, ita palpitatione cordis affectum fuisse, ut cum recolligere se non posset, nec hi motus remitterent, subito exstingueretur.

Hæc duo tamen caussarum genera posteriora valde excedere oportet, si cordis palpitationem excitare debent. Aliàs enim saltem vehementiorem aliquem, non verò deprauatum, artiarum & cordis motum excitant. Ideoque nonnulli, ut dictum, primum solum caussarum genus admittunt, utpote quod frequentissimè palpitationem cordis excitare solet.

Et omnino frequentior est palpitatione cordis, quæ fit per consensum aliarum partium, quàm quæ per primarium cordis affectum oritur. Habet enim cor cum pluribus partibus corporis consensum, & ab iis vapores ac flatus & humores recipere potest. Ab utero quidem per artias cum spermaticas, tum hypogastricas, quæ à corde ad uterum descendunt; à liene, per artias frequentiores per lienem dispersas, id quod scorbuticis non raro accidit; ab hepate, per artias ad hepar tendentes, & venam insignem dextro ventriculo cordis insertam; à pulmone etiam per communia vasa.

#### Differentia.

##### Differentia.

Differentiæ ex hæcenus dictis ferè patent & à caussarum varietate præcipuè petuntur. Patet ex iisdem affici cor vel per idiopathiam, cum causa morbi in ipso corde aut ejus vasis consistit, vel *ἢ ἀπὸ συστάσεως*, cum aliunde communicatur ex utero, liene & aliis partibus.

#### Signa Diagnostica.

##### Signa.

Malum hoc etiam ab ipso ægroto proditur & cognoscitur, manûque supra cordis regionem apposita deprehenditur. Estque hic motus in corde aliàs debilior, aliàs validior, & nonnunquam tam validus & vehemens deprehensus fuit, ut ab adstantibus audiretur, ut refert Christ. à Vega, *art. Medic. lib. 3. cap. 8.* & quidem etiam ex intervallo, ut ex Foresto dictum, aut ut costas vicinas cordi effringeret, vel sua sede dimoueret, aut in arteria *ἀνὰ πύλον* pomi magnitudine efficeret. Quiere hoc malum remittit; exasperatur motu, æstu, balneo, ira, crapula, usu vini potentioris, Venere. Caussarum autem varietatem discernere non ita facile est. Si à vapore & flatu originem ducat cordis palpitatio, repentina fit accessio, & à leui corporis motu excitatur, ac facilius quoque discutitur; respiratio est difficilis, sæpe accedunt tremor in genuis, oculorum tenebræ, sonitus aurium, & non raro circa aliquam partem dolor, qui sponte statim cessat, percipitur. Qualis autem flatus sit vel vapor, ex humorum signis cognoscitur, cum vapor humoris, è quo eleuatur, naturam referat & retineat. Si verò humor sit causa palpitationis, non ita subito humor inuadit, & diutius durat, quàm cum à vapore palpitatio ortum habet. Qualis autem humor sit, ex signis humorum abundantium faciliè innotescit. Et omnino siue humor siue vapor ab aliis partibus communicetur, ex partium illarum affectuum signis cognoscitur, & in primis affectio hypochondriaca & mensium suppressio in fœminis latere non possunt. Difficilius aqua in pericardio abun-

dans cognoscitur. Malum tamen etiam est continuum, & ægri conqueruntur, cor in aqua quasi detineri & suffocari, tandemque emaciantur, ut hæcicæ correpti. Si humores sint prauis, corrupti, maligni, venenati, magna varietas in pulsu apparet, præcipuè in magnitudine & paruitate. Magna enim est naturæ pugna. Accedit lipothymia, atque alia signa humorum venenatorum & malignorum adsunt. Si ab alia substantia cor grauante & premente est palpitatione, tum motus valde est præternaturalis, & inæqualiter ac præter naturam cor quasi exilit, ut vel propulset, quod molestum est, vel ibidem motu diastolæ majori resarciat. Atque tales causæ faciliè à suis signis patent. Si tumor sit causa palpitationis, notabilis in cordis pulsu apparet varietas, motus valde è naturali statu recedit, & ferè inæqualis ac inordinatus est. Et si tumor sit calidus, maxima in corpore erit inflammatio, sitis magna, difficilis respiratio, accedit lipothymia, & tandem mors sequitur. Si autem tumor durus sit in pericardio, motus est continuus, & æger sensim sine manifesta causa & euidenti contabescit. Si caro vel simile quid cordi à primo ortu adnascatur, palpitatio quoque à primo ortu ad mortem vique hominem comitatur.

Si verò ex spirituum defectu palpitatio cordis exciteretur, patet hoc non solum ex caussis, quæ præcesserunt, spiritusque dissipauerunt & assumpserunt, verum etiam ex eo, quod pulsus crebrior est, & interdum celer, simulque paruus, ob virium imbecillitatem.

Tandem si ob caliditatem nimiam præter naturam palpitatio cordis accadat, cognoscitur id ex signis febris, aliisque caussis calefacientibus; & præter frequentiam & celeritatem in pulsu magnitudo adest, dū vires constant. Præterea motus hic paulatim deprauatur, & major est ac vehementior in diastole, quàm sistole.

#### Prognostica.

##### Prognostica.

1. Palpitatio cordis omnis periculosum & non contemnendum malum est, ob læsum cordis motum, quo vita conseruari debet, & quæ frequenter ad syncopen deducit, tandemque hominem è medio tollit. Docetque Galenus, *2. aph. 4. 1. c. 5. de loc. affect. cap. 2.* omnes, qui iuuenes, aut in declinante ætate sani subito, sine ullo manifesto symptomate, palpitatione cordis correpti sunt, omnes ante senectutem mortuos esse, alios per febres acutas, alios cum sani degenerent subito syncope correptos, alios etiam citrà syncopen apoplectico more. Frequens enim palpitatio signum erat, cor & partes vicinas debiles fuisse.

2. Palpitatio per idiopathiam cordis periculosa est, quàm quæ fit per sympathiam: quæ item ab interna causa, quàm quæ ab externa; nisi magna sit externa causæ vehementia, ut veneni & ictus violentia.

3. Malum hoc sæpius recurrens tandem hominem jugulat, & quidem si à pericardio affecto proueniat, hominem lentè enecat, & ad tabem deducit.

4. Si proueniat à soluta vnitatem vel tumore cordis, malum desperatum & insanabile est.

5. Periculosum quoque est, si à causa venenata & maligna originem ducat ægrique tales raro euadunt, sed citò moriuntur.

#### Indicationes.

##### Indicationes.

Curatio autem, ubi malum curam suscipit, ad duo in primis dirigenda. Primum est, ut causa qualibet, prout natura ejus postulat & indicat, tollatur. Alterum, ut cor familiaribus & calorem ejus innatum fouentibus roboretur. Nonnulli censent, & quidem ex Galeni, ut opinantur, sententia, omnes palpitatione cordis laborantes adjuuari sanguinis missione. Verum & ipsa hæc sententia à veritate aliena est, & falsum, Galenum hoc scripsisse. Non enim Galenus, *5. de loc. affect. cap. 2.* omnes palpitatione cordis laborantes adjuvos phlebotomia scribit, sed omnes, qui iuuenes aut in declinante

declinante ætate constituti sani repente cordis pal-  
patione correpti sunt, eos scilicet, qui palpitatione cordis  
laborabant ex sanguine vitioso cor opprimente, aut  
ex flatu crasso vel frigido, vel cum plethora pura aut  
impura, quæ adiuuat impetum huius flatu ad cor, aut  
eius generationem per oppressionem diminuto calore,  
aut etiam impediēbat sua præsentia vsum remedium  
sanatium calidorum. Si verò palpitatione cordis sit ex fri-  
gidis, pituitosis, crudisque humoribus, sanguinis mis-  
tio non conuenit; cum humores illi sanguine detracto  
crudiores reddantur: sic & in aliis causis, quas non  
colleat venæsectio, sanguinem mittere inutile est.

*Curatio palpitationis cordis à Flatu  
& Vapore.*

Curatio pal-  
pationis  
cordis à flatu  
& vapore.  
Venaesectio.

Sed ut de hisce in specie secundum causarum va-  
rietatem dicamus, primò si à flatu & vapore cor mo-  
lestante sit palpitatione, sanguisque simul redundet, ve-  
na aperienda est. Alioquin enim calidis flatu discuti-  
entibus commodè vri non possumus, quin potius ca-  
lidiorum vlu materia affluxus ad cor augetur. Ape-  
riatur autem vena vel in dextro vel sinistro brachio,  
provt pulsus in hoc vel illo brachio magis inquietus  
est & pro redundantia eius ac virium robore sanguis  
emittatur. Vtile quoque forer, crurum venas aperire, vt  
materia deorsum retrahatur, præsertim in fœminis,  
quibus à mensibus suppressis malum originem habet.  
Licet & cucurbitulas cruribus affigere.

Hæmorrhoi-  
des.

Hæmorrhoides, si prouocari possint, magnum in hoc  
malo auxilium afferunt, cum vix commodiore via san-  
guinem euacuare tum liceat.

Hæmorrhoi-  
des.

Reliqua quod attinet, cum flatu & vapores ab hu-  
more sui generis foueantur, humores vitiosi tollendi  
medicamentis, non violentis, sed lenibus sæpe repe-  
ritis, vt materia per vena tollatur. Et cum malum  
hoc multorum morborum, imprimis melancholiæ hy-  
pochondriacæ & mensium suppressorum vterique  
morborum comes sit, curatio ad illos morbos dirigen-  
da, cordialibus semper additis.

Vapores dis-  
cutientia &  
corroborantia.

Postea vapores discutientia & corroborantia exhi-  
beantur, & ex iis nunc calidiora, nunc frigidiora, vt  
causa morbi requirit. Monētque Auicennas, in omni-  
bus morbis cordis fugienda esse vehementer calefacien-  
tia, quæ vires cordis dissoluunt; vehementer refrige-  
rantia, quæ calorem labefactant, & spirationem diffi-  
cilem reddunt; vehementer adstringentia, quæ fuligi-  
nes & excrementa retinent. Quæ autem cor calefa-  
ciunt, quæ item refrigerant, suprâ, de intemperie cor-  
dis, sunt proposita. Temperata sunt, aurum, margarita,  
corallias, de C.C. lapides pretiosi bezoar, bolus Armena,  
terra sigillata.

Oleum citri  
in hoc malo  
valde efficax.

Oleum citri quoque cum conserua aliqua vel alio  
modo exhibita valde efficax est ad flatu crassos discuti-  
endos & cor roborandum. Insignem quoque vim ha-  
bet rhaponticum verum Scr.ii. pōdere exhibitam cum  
vino, aut vinum, in qua eadem radix macerata est.

Electuarium.

Vel ʒ. Conseru. meliss. antbor, bugloss. an. Vnc. i. cortic.  
citri condit. rad. cond. scorzonera an. Vnc. ʒ. spec. diamosch.  
dulc. diambra, an. Scrup. i. confect. alcherm. Drach. i. Cum  
syrupo tunie.

F. Electuarium.

Aliud: Vel ʒ. Conseru. boraginis, tunie. an. Vnc. ii.  
confect. alcherm. theriac. an. Drach. i. spec. elect. de gemm.  
aromatic. ros. letitia Galeni, an. Scrup. i.

Cum syrupo bugloss. & de cortic. citri.

F. Electuarium.

*Electuarium Langij.*

Elect. Langij.

ʒ. Conf. ros. Vnc. iiii. st. tunie. Vnc. i. meliss. Vnc. ʒ.  
spec. diamarg. frig. Scrup. iv. galanga Scrup. ʒ. cinam. intè-  
rior. Scrup. iv. garyophyll. Scrup. ii. doric. Scrup. i. succin.

Dan. Sennertii Tom. I I.

alb. Drach. ʒ. nuc. mosch. condit. Drach. ii. zinib. condit.  
Vnc. ʒ. cortic. citri, pinear. præp. an. Drach. ii. sem. melonum.  
Drach. i. manus Christi cum perlis Vnc. ʒ. marg. præp. ʒ. v.  
fol. auri N. iv. Cum syr. acetos. citri. F. Elect.

Vel ʒ. Confect. alcherm. Drach. ii. lapid. bezoar, mar-  
garit. præp. an. Scrup. ʒ. ol. citri gutt. iii. M. Syrupi & po-  
tiones.

Detur Scr. ʒ. vel vnus cum aqua vel syrupo borrag.

Vel ʒ. Aqu. flor. borrag. in balneo destillat. ʒ. vi. flor.  
citri ʒ. ii. syrup. flor. borrag. tunie. an. Vnc. i. spiritus rosar.  
Drach. ii. aqu. cinamomi ʒ. ʒ. carbunc. ʒ. ii. magister.  
perlar. ʒ. i. confect. alcherm. ʒ. ʒ. M.

Dentur cochlearia duo vel tria.

Extra quoque applicentur sacculi de melissa, flor. la-  
uendul. rosis mar. borrag. bugloss. & aliis suprâ enumeratis  
cordialibus paratis, ac vino albo & aqua rosar. irrorati.

Vt ʒ. Flor. rosar. rosis mar. an. Drach. ii. lauend. Drach. i.  
sem. angelic. cortic. citri, caryoph. cinamom. macis, an. ʒ. ʒ.  
croci Scrup. i. moschi, ambrâ, an. gr. vi. Cum sindone  
rubra.

F. Sacculus.

Aut applicetur epithema ex aqua rosar. melissa, la-  
uend. borrag. card. benedict. cinamomi, carfuncl. vel me-  
lissa viridis contrita & aqua rosar. ac maluatico irrorata  
super latere ignito calefacta cordi applicetur. Inungi  
etiam potest cordis regio oleo citri, melissa, caryophyll.  
macis, cinamomi, vel solis, vel cum vnguento rosaceo  
mistis.

ʒ. Vnguent. rosar. ʒ. ʒ. ol. citri ʒ. ʒ. cinamom. caryo-  
phyll. an. gutt. vi. Mosch. ambrâ, an. gr. iii.

M. Fiat Liniment.

Vel ʒ. Ladani puri ʒ. ʒ. styrac. calamita, terebinth.  
mastich. an. Drach. ii. ol. citri, caryophyll. cinamom. ana  
gutt. vi. mosch. ambr. an. gr. iii.

Subigantur in mortario pistillo calido addendo sub  
finem. ol. nucis mosch. expressi Scrup. ii.

F. Emplastrum.

Vid. Vidius, lib. 7. de cur. membr. c. ult. p. 292. cucurbi-  
tulas sine scarificatione applicare iubet, iisque magnam  
in discutiendis ac digerendis flatuosis spiritibus, qui in  
partibus internis inclusis continentur, inesse scribit.

Sunt & odoramenta valde vtilia; cum via non longa  
ad cor tendant, viresque valde reficiant.

ʒ. Fol. meliss. ocymi caryophyllati, an. Drach. ii. cortic.  
citri, santal. citrini, caryophyll. an. Drach. i. croci ʒ. ʒ. ambr.  
ʒ. vi. mosch. ʒ. iiii.

Ligentur in nodulo & irrorentur aqua cinam. & ro-  
sar. Vel Balsama ex enumeratis modò oleis olfacienda  
naribus illinantur.

Tandem in hac palpitationis cordis specie, quæ à  
flatibus prouenit, opera danda, vt materia flatuum di-  
strahatur, & propterea clysteres purgantes & resoluen-  
tes flatu sapius iniciantur.

*Curatio palpitationis cordis ab Humore.*

SI palpitatione cordis ab aqua in pericardio contenta  
originem habeat ea euacuanda & absumenda, ac  
corroborandum est. Curatio pal-  
pationis  
cordis ab hu-  
more.

Nonnulli hîc etiam venæsectionem præcipiunt, sed  
malè. Tantum enim abest, vt venæsectio eam euacuet,  
vt potius ad augendam faciat, calore debilitato.

Quidam purgantibus humores aquosos vtuntur, Purgantia hu-  
mores serofos.  
verum causam antecedentem & humores serofos in  
corpore, quæ aquam augere possunt, talia euacuant:  
ipsam verò aquam in capsula cordis contentam eua-  
cuare non valent. Itaque efficacissima hîc sunt medi-  
camenta aquam illam absumenda & discutientia tam  
interna, quam externa.

Intèr interna sunt confect. alchermes, spec. diambra, Aquâ in pe-  
ricardio di-  
scutientia  
interna.  
diamoschi, aromat. rosati, theriaca, Mithridat. &  
alia cordialia calidiora, vt, decoct. ligni Guaiaci, sarsa-  
parill. sassafra cum corticibus citri.

Extra verò vtile est, panem calentē à furno regioni  
cordis

T T t

cordis applicare, item spongiam vel linteum triplicatum decocto vel aqua aliqua cordiali discutiendi & exsiccandi vim habente madidum.

℞. Spec. aromat. rosat. diamosch. an. Drach. ii. pulv. mac. caryoph. cortic. citri, an. Drach. i. flor. bugloss. citri, an. Vnc. β.

F. Sacculus ex sindone rubro, qui vino albo irroretur, & cordis regioni applicetur. Simul odorata medicamenta cordialia patibus admoueantur & cibis admisceantur.

#### Vesicatoria.

Nonnulli vesicatoria cordis regioni applicant, quæ quomodo è cordis capsula per spatium thoracis in cavitatem, in musculos & cutem aquam attrahere possint, non video.

#### Curatio pal- pitationis cordis ex hu- moribus aliis de transmissis.

Quæ verò ex humoribus è ventre inferiore transmissis oritur cordis palpitatio, eandem ferè curationem habet, quàm ea, quæ ex flatibus provenit. Et omnino si palpitatio cordis per consensum fiat, præcipua curationis ratio est, ut pars affecta, quæ eam communicat, diligenter curetur.

#### Purgatio.

Itaque primò universales corporis purgationes instituendæ, & vel vena aperienda, vel humores vitiosi expurgandi, vel utrumque agendum, pro humoris peccantis & membri materiam suppeditantis natura & ratione. Humores etiam ad cor ruentes reuelli. Hercules Saxonia hoc Electuarium commendat, ad humorem tam pituitosum, quàm melancholicum in hypochondriaca affectione & cordis palpitatione:

℞. Meliss. ocymi, bugloss. borrag. betonic. agrimon. pulg. an. M. i. cortic. citri Vnc. β. sem. citr. Vnc. i. caryoph. cinamom. ligni aloes, macis, an. Drach. i. fol. sem. elect. Vnc. vi. Epithymi, polypod. q. an. Vnc. iiii. mirobalan. chebul. citrin. an. Vnc. i. passul. enucleat. lb. i.

#### Indicationes.

Aromata ligentur in nodulo, & omnia bulliant in f. q. aquæ ad dimidiæ partis consumptionem, vel quod commodius est, dimidium saltem aquæ, quæ aliàs ad coquendum sumi solet, affundatur, & in vase clauso in Balneo per triduum macerentur, exprimantur & clarificentur.

Hinc adde pulp. prunor. lb. i. cinam. el. Vnc. β. sacch. albi q. f.

Coquantur ad iustam consistentiam, vel potius saccharum sufficienter inspissatum addatur.

#### Cauteria & vesicatoria.

Ad materiam reuellendam in diuturnis & frequentibus cordis palpitationibus cauteria & vesicatoria vel brachiis, si materia à capite defluat, vel cruribus, si palpitatio cordis sit per essentiam, aut à partibus inferioribus ad cor transmittatur, utilia sunt.

#### Cautela.

De vesicatoriis tamen hoc monet Mercurialis, ne cantharides vsurpentur; cum vim malignam & cordi aduersam habeant, sed potius ranunculus, flammula Iouis, sinapi & similia.

#### Corroboran- dum.

Hinc corroborandum medicamentis modò enumeratis, & inter ea inprimis lapide Bezoar, margaritis, lapid. pretiosis. Et quidem in materia frigida, theriacam, præsertim extra adhibitam, valdè commendat Mercurialis, narratque, Maximilianum Imperatorem, cui palpitatio cordis familiaris erat, sibi retulisse, se nullum remedium theriacà melius inuenisse.

Nonnulli quadrupedum & avium corda, ut cerui, bouis, porci, turturis commendant, & præsertim assa peculiari proprietate prodesse docent. Valeriola, lib. 4. obseru. 6. succum ex veruëcum cordibus cum caryophyllis sine liquore vñlo in vase duplici paratum commendat. Qualis succus & ex aliorum animalium cordibus parari; hincque hæc Aqua additis medicamentis cordialibus destillari potest:

℞. Cor cerui vel bouis N. i. meliss. M. i. flor. cordial. M. β. cortic. citri Vnc. β. sem. ocymi Drach. i. caryoph. cinamom. fantal. citrin. an. Drach. i. croci Drach. sem.

Affundatur vini q. f. ac destillentur. Aliæ duæ descriptæ existant in Institut. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 9.

Efficaciores fiunt aquæ, si moschi, ambre, an. Scrup. sem. in alembico suspendantur.

Mercatus hanc commendat:

℞. Corda turturum N. ii. ceruorum vel bouis N. iiii. caryophyll. galanga, an. Drach. ii. sem. macis Drach. ii. flor. bugloss. borrag. an. p. i. rorismar. p. ii.

Affundatur vini q. f. Stent per noctem, postea destillantur.

Efficax est & elixir cordiale in Institut. loco allegato, propositum, Vt & hæc Aqua.

℞. Flor. borrag. rorismar. rad. bugloss. an. Vnc. iij. croci Drach. i. succi cydonior. lb. β.

Vini q. f. Stent in infusione per dies 14. postea destillantur. Dosis ab ʒ. β. ad ʒ. i. cum ʒ. ii. vini albi generosi vel maluatici in causa frigida; in causa calida cum aqua borraginis. Vel propinetur hoc Vinum:

℞. Rad. helen. Angelic. zedoar. galanga scorzon. ana Drach. ii. cortic. citri Vnc. i. caryophyll. cinamom. an. ʒ. ii. sem. coriandr. prepar. ʒ. β. flor. anibos ʒ. ii. meliss. M. i.

Affundantur vini albi lb. xviii. Plura talia vide apud Rondelerium, l. 2. c. 17. Iohan. Langium, l. 3. epist.

#### Curatio palpitationis cordis à reliquis causis.

Si à Vermibus in capsula eius palpitatio cordis fiat, vermes interficiendi, ut supra, de vermibus in capsula cordis genitis, dictum. Ad eisdem autem euacuandos & lapis Bezoar adhibetur.

Si à Spirituum defectu sit palpitatio, curatur spiritus reficientibus & corroborantibus, inter quæ inprimis, si morbus id patitur, vile est vinum odoratum, & aquæ ac spiritus cordiales, quorum hæcenus facta est mentio.

Quæ ex Calore nimio & in Febris accide cordis palpitatio, tollitur medicamentis calorem febrilem temperantibus, & iis, quæ supra, de intemperie cordis calida, proposita sunt.

#### Dieta.

Victus ratio à medicamentis non discrepet. Aer sit purus & alteretur cordialibus compositis, provt causæ ratio id postulat. Eodem modo cibus & potus sese habeat, qui causæ aduersetur, cor verò roboret. Si causæ sit frigida, flatu crassi, materia melancholica, cibo attenuante & calefaciente opus est; & propterea cibi condiantur aromatibus, & aliis cordialibus calidis. Vinum sit tenue, odoratum, & ad dulcedinem vergens, vel cereuisia clara & defecata, qui potus herbis & aromatibus conuenientibus condiri possunt. In causa calida cibi condiantur acetosis cordialibus, vt succo citri, limonum, arantiorum granatorum, acetosæ, ribes.

Potus sit aqua hordei cum succis iisdem & eorum syrupis aut cereuisia tenuis. In spirituum defectu nihil utilius vino odorato, quod subito spiritus reficit. Animi & corporis motus nimii, vigiliæ, exercitia nimia, Venus præcipuè, ira, tristitia, aliæque animi perturbationes vitentur.

## C A P V T V.

### De Virium Imbecillitate.

VT in palpitatione cordis eius pulsatio deprauatur; ita quandoque accidit, vt eodem modo eius & arteriarum motus imminuatur: quod malum vulgò virium imbecillitas, Germani, Schwachheit, appellatur. Etsi enim virium nomine etiam aliæ functiones intelligentur: tamen præcipuè vitales actiones per eas accipiuntur; & propterea hoc loco de ea agere placet. Itaque Virium defectus & Imbecillitas dicitur, cum vires vitales

Virium im-  
becillitas.



vitales atque cordis & arteriarum præcipue læduntur. Adest quidem & tum motus impotentia, sed differt ea ab ea motus impotentia, quæ, *lib. 1. part. 2. cap. 26.* fuit explicata, quod illa, viribus & actionibus cordis saluis, nervoso genere inprimis affecto, accidit; hæc verò potissimum corde læso & spiritibus deficientibus ortum habet, unde labes illa etiam animali facultati communicatur, dum spiritus vitales animalium materia, non sufficienter generantur, nec calidum nativum omnium partium influente calore & spirituum vitalium influxu satis fouetur. Hinc in hac virium, imbecillitate vniuersum corpus actiones suas difficulter perficit, & ægre etiam mouetur, partibus non resolutis, ut in motus impotentia, sed languidis & conquassatis. Arteriarum quoque motus seu pulsatio tunc etiam imminuitur, nec eæ, ut solent & debent, dilatantur, sitque pulsus vel paruus, vel languidus, vel tardus, vel rarus, vel intermittens, vel obscurus, aut minus, aut formicans, aut vermiculans, propterea imbecillitas hæc maior, vel minor est. Eodem modo ut arteriarum motus, ita & cordis motus sese habet. Estque hæc virium imbecillitas maxima paulò ante mortem in agone dicto.

*Causæ.*

*Causa.*

Imbecillitas autem hæc ortum habet à spiritu & calidi innati seu substantiæ spirituosæ, à quo vita & robur partium dependet, defectu, Spiritus autem hic insitus cum foueatur à spiritu vitali, in sinistro cordis ventriculo genito, & per arterias in vniuersum corpus diffuso, qui inde influens spiritus dicitur: si primò spiritus ille vitalis non satis copiose & rectè à corde in partes omnes influat; insitum etiam atque hinc omnes totius corporis vires debilitari necesse est. Quæ ratione autem & quibus de causis spiritus vitales deficere possint, *capite sequenti*, dicitur, scilicet, quod vel non generantur, vel quod generati dissipantur aut suffocantur. Quæ causæ omnes etiam hic locum habere possunt, nisi quod in lipothymia & syncope spiritus vitales penè toti & subito deficiunt, in virium verò imbecillitate pauciores, quàm debebant, partibus communicantur.

Deinde cum spiritus insitus non solum influente foueri debeat, sed etiam humido primigenio, quod appellatur, cui infideat, tanquam pabulo indigeat, si humidum istud deficiat & imminuatur, etiam spiritum insitum debilitari, & vires labefactari necesse est.

Tertiò si etiam ipsa spirituosæ partium substantia, seu spiritus insitus vel calor innatus dictus imminuitur in toto, virium in toto corpore imbecillitas sequitur. Accidit autem hoc ab iisdem causis, quæ spiritum influentem dissipare vel suffocare possunt, quæ, *capite sequenti*, proponuntur. Fit nimirum cum humidi primigenij, tum caloris insiti, seu, ut verumque vno nomine complectamur, calidi insiti imminutio à nimia Venere, sanguinis, & aliis euacuationibus, quæ spiritus dissipant; dolore nimio; animi affectibus, & præcipue timore & mœstitia diuturnis; morbis acutis & longis, inprimis febribus, quæ & cordis & omnium corporis partium humidum primigenium exhauriunt, & calidum nativum dissipant, calore & æstu externo; labore & exercitio nimio; frigore nimio; ut & otio, quo calor nativus quasi suffocatur & torpidus redditur; humoribus vitiosis, qui per totum corpus diffunduntur, & calidum nativum opprimunt, unde insolita virium debilitas imminenti morborum signum esse solet; venenis tandem & venenatis qualitatibus, quæ cordi & calido nativo totâ substantiâ aduersa sunt.

*Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Ipsam malum per se patet, ægrique de virium omnium.

*Dan. Sennerti To m. I I.*

num debilitate conquerantur. Causæ verò ex iis quæ præcesserunt vel adsunt, cognoscuntur, & *capite sequenti*, etiam explicabuntur.

*Prognosticum.*

Quid autem periculi portendat, id omne ex causis. *Prognosticū.* farum gravitate vel leuitate æstimandum. Propterea enim causa, quæ virium debilitatem inducit, grauior vel leuior est: ita etiam virium imbecillitas plus vel minus periculi portendit.

*Indicationes.*

Curatio in duobus consistit, primò ut causæ, si adhuc adsint, tollantur, nimirum si euacuatio aliqua nimia sit, supprimatur; si à dolore spiritus dissipentur, ut is leniatur & mitigetur; si ab animi affectu nimio, ut ei modus adhibeatur; si morbus vel febris adsit, curetur; si immineat, humores vitiosi expurgentur; si ex otio calor torpeat, corpus exerceatur; si à qualitate maligna calor destruat, ea expugnetur. Secundo ut calidum insitum & spiritus vitales influentes conseruetur.

*Curatio.*

Quæ ratione autem causæ istæ tollendæ sint, aliunde & ex sequenti quoque capite patet. Quapropter saltem hic, quæ ratione calidum insitum & spiritus influentes conseruari, instaurari & augeri possint, dicemus: etsi etiam supra, *de intemperiebus & morbis cordis*, hæc de re dictum sit, quod ibi videri, & huc transferri potest. In medicamentis tamen exhibendis ad causas simul respiciendum, ne dum spiritus reficere volumus causam augeamus. Ideoque in imbecillitate virium à febre acuta vel hectica calefacientia & exsiccantia non conueniunt, sed temperata exhibenda.

Veilia autem hic sunt inprimis medicamenta cordialia supra proposita, è quibus pro causæ ratione conuenientia eligantur. Ideoque hic composita quædam saltem proponemus; è quibus cuilibet morbo commoda eligi poterunt. Inprimis verò gratum odorem spirantia spiritus valde recreant; præcipue si aliorum odoratorum vi imprægnentur, qualia sunt, *moschus, ambra, cinamomum, caryophylli, macis, crocus, zedoaria, cortices citri, lignum aloes, santalum, styrax, ladanum, rose, viola, laudula, rosmarinus, spica nardi, melissa, ruta, salvia, &c.* Vitale etiam est acetum, præcipue ex maluatico, & inprimis rosis, fl. lilior. conuallium, ruta, pulegio, succo rubi Idei imprægnatum.

*Odorata spiritus reficiunt.*

*Aqua odorifera cordialis, pro naturis calidioribus.*

℞. Caponem, abscinde caput & pedes, exenteretur, & pinguedo remoueatur. Incidatur minutim & assundatur atque addatur.

*Aqua cordialis pro calidis.*

Aq. buglosse, cort. citri, borrag. cichori, acetose, rosar. an. canth. f. flor. stœchad. Arabic. chamamel. Romani, borrag. buglosse, ana M. j. spec. aromar. rosati, diarrion. santal. cinamom. acuriss. ana Vnc. ℞. santali citrini odoriferi ℞. j. pomor citri recent. N. iiii.

Incidentur incidenda minutim fiatque destillatio secundum artem: datur ad placitum sumentis ab uncia semis ad unciam unam.

*Aqua instaurans dicta.*

℞. Iuris capi & cordis bonis vel cerui simul perfecte cocti mens. j. vini maluatici, pomum arantiū vel limonium vel aliud ut dictum, dissectum in partes, vnum vel duo. rad. galange, fol. melisse, an. ℞. j. cinamomi ℞. ℞. caryophyll. ℞. ij. sem. coriandri, acyni, flor. rosar. rubr. scabiosa, bugloss. T T t 2 viriusque

*Aqua instaurans.*

utrinque an. Drac. i. croci Scr. i. rasura C. C. choris, an. 3. i.  
Misce eliciatur Aqua.  
Quæ per se datur, vel cæteris commixta.

### Aqua odorifera pretiosa:

℞. Flor. lilior. conualli. M. ii. rosar. rubr. opt. M. vi. lauen-  
dula M. i. borrag. bugloss. an. M. ii. fol. salvia. maiorana. hyf-  
sopi. rorismarini. an. M. iii. melisse. mentha crispa. an. M. i.  
cinamom. acutiss. cubeb. styrac. calamita. an. Vnc. i. ma-  
cis. piperis long. cardamomi minor. nuc. mosch. garyophyll.  
ana Vnc. 6.

Tulis & incisis minutim, ac repositis in cantharum  
magnum, affunde vini maluat. & aq. rosar. opt. ana cāth.  
ii. digerantur ad triduum, quotidie ter agitando: dehinc  
fiat destillatio igne lentiss. & in capitulo vel rostro po-  
natur ambr. moschi ana Drach. 6. cum sindone rubr. De-  
tur imbecillo vel naturā vel vi morbi cochleare vnum  
sæpe, & humectentur in hoc destillato linthea pura, quæ  
admoveantur cordi, temporibus, pulsibus ac naribus.

### Aqua vitæ odorifera pro naturis frigidioribus & adultis:

℞. Spiritus vini rectificati lb. ii. croci. caryophyll. gra-  
nor. paradisi. nuc. mosch. macis. cinam. mastiche. carda-  
momi. zedoria. cubeb. rosar. rubr. ana Drach. i.

Pulueriscentur crasso modo, fiatque infusio ad octi-  
dium, dehinc fiat colatura citra expressionem, & adde  
minu cydonior. Vnc. vi. Misce. Datur pro vice cochleare  
vnum: roborat stomachum, hepar, splenem, & cor, re-  
nibus etiam in expellenda serositate vires addit: potest  
manere, ac sero sumi ante somnum.

### Alia aqua odorifera:

℞. Flor. rosar. opt. recent. Vnc. vi. spica nardi vulgar.  
rec. berb. rorismar. maiorana. ana Vnc. i. basilici. thymi. sa-  
tureia ana Vnc. 6. cortic. citri recent. Vnc. ii. ligni aloes  
odoriferi. cinam. elect. an. Vnc. i. garyophyll. Vnc. 6. rad.  
ireos Florent. Drach. vi. storac. calam. asa dulcis an. Vnc. 6.  
vini maluat. aq. rosar. an. lb. iiii. lauendul. meliss. an. lb. i.

Viridia incidantur, arida verò in puluerem redigan-  
tur, Solique exponantur per 7. vel 9. dies: deinde  
destillentur lento igne in vase duplici. Præparanda est  
hæc aqua tempore æstiuo: datur intra corpus vncia se-  
mis, extra eā pulsus & nares humectentur: potest etiam  
manibus irrorandis ac lauandis adhiberi.

### Inlebi & potiones:

℞. Confect. Alkermes Scr. i. pulu. diamarg. frig. 3. 6.  
syr. de acetos. citri 3. 6. de papauere 3. iii.  
Cum aq. rosar. bugloss. & cinamomi,  
Fiat potio.

Hæc & in doloribus hominem prostermentibus vti-  
lis, auctā præsertim syr. papauerini quantitate.

### Alia, quæ & in veneno sumpta conueniet.

℞. Confect. de hyacinth. Drach. 6. syr. acetos. citri 3. i.  
aq. scabios. meliss. an. q. s.

Fiat Potio.

Rotulæ manus Christi & diamargariti frigidi sint  
in frequenti usu, vel rotulæ & morsuli supra, partis hu-  
ius cap. 2. propositi.

Vel pareretur talis Mistura: ℞. Pulu. sacch. opt. q. v.  
Humectetur probè cum aqua cinamomi optima, quo  
nonnihil fluidum reddatur saccharum, cui adde ali-  
quot guttas spiritus vitæ pro acetositare manifesta; vl-  
terius admisce

ol. cinamomi gutt. iiii. caryophyllorum gutt. ii. macis,  
nucis mosch. destillat. anisi. ana gutt. iiii.

Probè inuicem miscendo detur cum cochleari ar-  
genteo ad placitum.

### Electuarium confortans.

℞. Conf. rosar. rubr. borrag. bugloss. tuniois, melissa,  
ana Vnc. i. spec. diaxyloales Vnc. 6. cortic. citri condit.  
Drach. vi. rad. condit. eryngij, saryrij. ana Vnc. 6. confect.  
alkermes Drach. ii. spir. rosar. essentia citri, ana Drach. 6.  
ol. cinamom. gutt. vi.

Cum syr. fl. borragi.

Fiat Elect.

Plura eiusmodi medicamenta videantur, cap. præced.  
vt & sequente.

Externa quoque antea proposita pulsibus, cordi &  
naribus applicentur.

### Diæta.

Eger nutriatur alimentis, quæ bonum & multum  
succum præbent, ac facillè concoquuntur, eaque in  
quantitate parua, sed sæpe exhibeantur, potissimum  
senibus, & qui è morbo conualescunt, aut ex magnis  
euacuationibus vires perdiderunt. Et si vis coquendi  
sit debiliior, vt crassiores cibos concoquere non pos-  
sit, dentur iura instaurantia, in Institut. lib. 5. part. 3.  
sect. 3. cap. 2. proposita. Præcipuè vinum odoratum,  
quale est Rhenanum & Neccaricum, & panis albi mica  
eo madida vires valde instaurat, cui pro morbo exi-  
gente succus citri, vel granatorum, vel simile quid ad-  
di potest.

## CAPVT VI.

### De Lipothymia & Syncope.

Q Vandoque verò accidit, vt arteriarum motus fe-  
rè tollatur: quod malum, provt varios gradus  
minoris & maioris ratione differentes habet, ita etiam  
variis nominibus exprimitur.

Εκλυσις leue est animi deliquium, λιποθυμία & λι-  
ποψυχία & απωψυχία grauius; συγκοπη grauissimum.  
Quæ si eo vsque deueniat, vt in toto corpore pul-  
satio aboleatur, ασυζία nominatur, quæ proximus  
ad mortem gradus est. Differre autem εκλυσις à λι-  
ποθυμία vel λιποψυχία, pater ex eo, quod Hippocra-  
tes, 7. aphor. 8. scribit; Α τινος τινος inrrosur eruptione εκλυσις καὶ λιποψυχία oritur. Et Ægineta, lib. 3.  
cap. 34. inter syncopes signa εκλυσις & λιποψυχία  
nominat. Apud Hippocratem quidem & antiquos  
Græcos vox συγκοπη vsitata non fuit, qui affectum  
hunc λιποθυμίαν & λιποψυχίαν & ασυζίαν appella-  
runt: paulo tamen ante Galeni tempora hæc vox in-  
uenta, & in specie tribuitur grauiori malo, quam est  
λιποθυμία & λιποψυχία. Hæc enim inter has voces  
genuina est differentia. Nam vt docet Galenus, de  
art. curatiu. ad Glauc. lib. 1. cap. 14. λιποθυμία est synco-  
pe imperfecta, & præterea syncopen semper præcedit,  
atque in λιποθυμία sensus nondum planè aboletur, &  
in ipso paroxysmo ægri vident, audiunt & intelli-  
gunt, quæ audiunt, licet non possint nutu aut signo  
demonstrare cogitationes. Præterea, vt Aetius, te-  
trab. 2. ferm. 1. cap. 101. docet, in λιποθυμία ægri non  
sudant, in syncope verò sudationes accidunt, quæ  
ideo etiam syncopica dicuntur. Cum enim in synco-  
pe vires magnopere prosterantur, & calor ad interio-  
ra refugiat, humidum partium solidarum rectore desti-  
tutum ad exteriora defluit. Ac frigidi sunt ii sudores,  
quia calor naturalis regens partes solidas in syncope  
vel extinguitur, vel extinctioni proximus est; quod  
à partibus illis profluit. In lipothymia verò sudores  
non exeunt, quia vires in hac non ita collabuntur.

Quidam

Diæta

Lipothymia  
& syncope.

Εκλυσις à  
λιποθυμία  
& λιπο-  
ψυχία dif-  
fert.

Syncopes vix  
Hippocrati  
non in usu  
fuit.

Quidam tamen hanc Actij sententiam & differentiam non simpliciter admittunt, putantque, etiam in lipothymia aliquando aliquem sudorem accidere posse, & in syncope corpus ita dispositum esse posse, ut vix aliquis sudor erumpat.

*Lipothymia  
& syncope an  
sunt gradus  
eiusdem differe.*

Sunt quidem nonnulli, qui lipothymiam & synopen non solum maioris & minoris ratione discrepare putant; & longè maiorem esse differentiam existimat Mercatus, atque lipothymiam esse affectum cerebri, & in ea solum & primariò cerebrum offendi, seu esse casum subitum animalis potentiae, qui fiat retrocedentibus spiritibus animalibus ad cerebrum ipsum, quo accidat, ut instrumenta sensuum & motus spiritibus destituantur, atque ita actiones suas exequi non possint: synopen verò esse proprium cordis affectum, & in eo cor primùm pari, & hinc ob dependentiam, quam cum corde habent, alias actiones omnes lædi. Verum falsa & tanto viro indigna est hæc opinio, & in lipothymia non tam spiritus animales, quàm vitales læduntur, id quod symptomata, quæ in lipothymia adsunt, & causæ, quæ eam excitant, ac cor, non cerebrum afficiunt, solumque à causis synopes magnitudine differunt, satis docent. Ideoque in omni lipothymia pulsus (quanquam Mercatus sine ratione contra experientiam, id negat) aliquo modo læditur, nec planè saluus est. Quod verò simul facultas animalis afficitur, ideo fit, quia spiritus animales salui esse non possunt, si vitales rectè sese non habent, cum illi ex his generentur. Quapropter lipothymia non cerebri, sed cordis affectus est, in quo sensus & motus ideo læduntur, quod spiritus vitales cerebro non communicantur.

Cælius Aurelianus & Aretæus, in inscriptione cap. 3. lib. 2. de morbis acutis, cardiacam in genere appellat. Quia tamen *καρδια* non solum cor; sed & officium ventriculi significat, in specie nonnulli eam synopen, quæ oris ventriculi consensu fit, cardiacam appellant. Alii verò & magis propriè eam synopen simpliciter cardiacam vocari debere censent, quæ primario cordis affectu fit, eam verò, quæ ex oris ventriculi fit consensu stomachicam esse nominandam, ut docet Galenus, 5. de loc. affect. cap. 2. 12. meth. med. cap. 5. 5. de victus ratione in acutis text. 59.

### Definitio.

*Definitio.*

Est ergo animi deliquium, ut Galenus, 12. meth. med. cap. 5. definit, præceps virium lapsus, id est, subita actionum vitalium, & consequenter animalium, imminutio, sicut syncope penè earum abolitio, ob spirituum vitalium virium, & denegatum in alias partes influxum.

### Causa.

*Causa.*

Itaque pars primariò affecta est Cor. Causa proxima est spirituum vitalium, sine quibus cor, nec vlla alia pars in corpore suas actiones edere potest, subitus defectus; id quod subita huius mali inuasio satis testatur. Spiritus autem vitales ad alias partes non influunt, vel quia non generantur, vel quia generati dissipantur & dissoluntur aut suffocantur. Non generantur, vel defectu materiæ, vel generatrice eorum facultate sese non rectè habente. Deficit materia in nimia sanguinis euacuatione. Quanquam & tum spiritus simul dissipantur. Quod etiam facere potest calor intensus & perseverans, qui non solum spiritus dissipat, sed & eorum materiam absumere potest. Spiritus a vitales ex tenuissima sanguinis parte generantur, quæ à corpore magno & diuturno absumitur, idque in iis facilius accidit, qui humores tenues, & corpus ad *διασποράν* aptum habent; de quo Galenus, 12. meth. med. cap. 6. Facultatis autem generatricis causa spiritus non generantur, cum ipsa cordis substantia, quæ spiritus generat, sese rectè non habet; quod fit in mor-

bis, qui temperiem cordis valde immutant, calidumque eius natium absumunt, quales sunt febres syncopicae, malignæ, pestilentes, colliquantes, hæcticæ, *μοραιοειδές*, item morbi compositionis, & solutæ unitatis, qui si sint paulò grauiore, à syncope ad vitam nullus datur regressus, sed hominem iugulat.

Spiritus verò generati absumuntur & dissipantur ac corrumpuntur variis de causis. Primò spiritus corrumpuntur aut certè insigniter mutantur & afficiuntur à maligna ac venenata cordi ac spiritibus vitalibus peculiariter aduersa materiâ, siue illa in corpore generetur, id quod accidit in febribus malignis, aut cum vermes in aliquo loco stabulantur, vel sanguis menstruus, aut alius humor corruptus alicubi in corpore delitescens putres ac malignos vapores ad cor mittit, siue extra adueniat, id quod fit, cum aer malignus & venenatus vel venenum admotum, vel morsu aut ictu animalium venenatorum corpori communicatur. Quod pertinent & peculiare antipathia, cum quidam rerum aliis non ingratarum odorem, conspectum, vel præsentiam ferre non possunt, sed eâ de causâ animo deficiunt. Deinde à corde auertuntur, resoluuntur & dissipantur spiritus vitales variis de causis. Nimirum calor insignis spiritus ad exteriora euocat & dissipat. Quod pertinent febres ardentes, æstus aeris, balnei, corporis motus nimius, perturbationes animi nimia, ira, *πρηχάρεια* seu effusum gaudium, quo alios syncope correptos, alios mortuos esse legimus, vigiliæ, fames & inedia diuturna, Venus nimia, dolores vehementes, colici, oculorum, dentium, oris ventriculi & aliarum partium, inprimis earum, quæ magnum cum corde consensum habent, euacuationes nimia, vel sanguinis per nares, utræque, hæmorrhoides, vulnus; phlebotomiam, vel humorum excrementitiorum, per vomitum, aluum, urinam sudores, quæ excretiones, inprimis si cum dolore coniungantur, id quod fit in dysenteria, vires valde prosterunt; aut si abscessus subitò rumpatur, de quo Hippocrates, 7. aph. 8. *A tuberculi intrus rptione exolutio, vomitus & animi deliquium accidit*: aut si hydropicorum aquæ aut empyicorum pus subitò euacuatur. Et ut spiritus facilius dissipentur, facit corporum & humorum natura in iis, qui tenues succos habent, ut facilius exhalent, & *διασποράν* patientur; de quibus Galenus, 12. meth. med. cap. 6.

Tertiò suffocantur & obruuntur spiritus vitales, vel cum spiritus & sanguis subitò ad cor confluit, quod fit in febre syncopali, ex humore crudo cum oris ventriculi offensione, de quo Galenus, 12. meth. med. cap. 3. & consternatione nimia & repentina, quam Græci *ἐκλυσις* nominant, Galen. 12. meth. med. cap. 5. vel in vulneribus partium vicinarum vel cum vapores crassi à ventre inferiore attolluntur, & humores crassi ac frigidi arterias replent, ut spiritus liberè moveri non possint, vel cum circa cor & membra vicina copiosè fuligines cumulantur, & læsâ respiratione non expelluntur.

Hiscæ causis hætenus enumeratis addit adhuc aliâ Carolus Pifo, de morbis ab illuvie serosa, cap. de morbis thoracis, statuitque, etsi causæ hætenus enumeratæ omnes absint, tamen accidere posse synopen, quæ hominem in momento ferè iugulet, ab interceptione seu obstructione nerui sexti paris cordi implantati, ab humore seroso è cerebro repente in eum defluente. Docet enim cor accepto à cerebro motus principio moveri, ideoque si ætate florente vel consistente & in corporibus calidis & humidis & *ωαίρως* serosa in capite colluvies abundet, & in principium nervorum irrumpat, ac vel guttula saltem eius in nervum cordi insertum aberrat, spiritu animali non denegato, cordis motum subitò intercepti, hominemque inopinatò mori. Quod ante ipsum etiam docuit Piccolomineus, qui statuit, nervulos illos exiles, qui à sexta coniugatione cordi inferuntur,

inferuntur, ei vim motoriam præter sensum tribuere.

Verum in hac opinione illud magnum paradoxum est, motum cordis pendere à facultate animali, & non sui generis ac peculiarem esse, qui vitalis dicitur. Et si ab hoc neruulo obstructo fieret non solum syncope, sed & mors, accidere idem deberet, ubi in apoplexia totum neruorum principium affectum. At videmus in apoplecticis nihilominus cor moueri & pulsus durare, Et experientia etiam se didicisse scribit Spigelius, falsam esse Piccolomini sententiam, cum plurimum animalium corda exempta à corpore abscesso penitus neruo aliquandiu mota fuisse obseruauit. Ideoque cuilibet perpendendum relinquo, annon illi, quorum, ut syncope subito extinctorum, allegat historias Carolus Piso, apoplexia forti extincti fuerint, & memini aliquos iis similes, quos Piso describit, habitu scilicet corporis carnoso, ætate consistente, subito concidisse, & nullum verbum protulisse, ac post horas non multas mortuos fuisse, qui tamen reuera fuerunt apoplectici, cum motus cordis & pulsus in iis permanserit aliquandiu, facultatis verò animalis affectæ signa euidentia adfuerint,

### Differentia.

#### Differentia.

Differentia illa, quæ secundum maius & minus est, non ita magni momenti est, cum curationem non ita variet. Magis illa attendenda, quæ à causarum diuersitate sumitur, & quod alia sit per primarium cordis affectum, alia per consensum vteri & lienis. Nimirum quinque, quæ curationem variant, differentiæ sunt attendendæ, quarum tamen singulæ rursus aliquas particulares differentias habent.

Prima est, cum materia spiritibus generandis subtrahitur quocunque modo; quod præcipue accidit in corpore raro, & quod humores tenues habet, qui facile dissoluuntur.

Secunda, cum ob morbum aliquem cordis œconomia eius & spirituum generatio læditur.

Tertia, cum maligna & venenata materia spiritus corrumpit, vel insigniter mutat, seu in corpore genita, in febribus malignis, seu extra communicata; quod pertinet & opiatorum vsus.

Quarta cum spiritus dissipantur & absumuntur à calore nimio, motu corporis & animi, vigiliis, inedia, euacuationibus immodicis, abscessuum eruptione, & aquarum sub cute euacuatione confertim facta, doloribus.

Quinta, eum suffocantur spiritus vel ab humore crudo in febre syncopali aut animi consternatione, aut à vaporibus, seu intra genitis, seu extra communicatis.

### Signa Diagnostica.

#### Signa.

In lipothymia, quæ syncopen antecedit, pulsus est languidus, parvus, inæqualis, facies pallore suffunditur, ex recursum spirituum & sanguinis ad interiora: quæ de causa & extrema frigent, oculis tenebræ suffunduntur, aut viride vel flauum quid iis obuersari videtur. Sudor sæpe diaphoreticus apparet, præcipue circa frontem; quoniam partes calore destitutæ humiditatem continere nequeunt, & cerebrum aliqua ex parte compacitur: frigidusque erumpit, quia per cutim ob reuocationem caloris ad interna refrigeratam transit. Quæ signa omnia diligenter attendenda sunt, cum vtilissimum sit imò summè necessarium imminuentem syncopen præuidere, ut, quantum fieri potest, præcaueri possit. Nam sicut Menon, filius Zoar, aut, ut refert Rabbi Moyses, 6. aphor. qui syncopen non præuidit, aut præuisam annunciauerit, hominis mortui, homicida est.

In syncope verò symptomata hæc omnia vehementia sunt, pulsus quo ad sensum cessat, mentis actiones & motus sensusque corporis ac vox quoque perit,

Quod ad signa causarum, humorum tenuitas & corporis constitutio ad διαφύσιν apta suis signis cognoscitur, & tales præcipue syncope corripiuntur, si febris accedat, vel ambientis æstus; atque in his celeriter facies Hippocratica apparet, ut docet Galenus, 1. meth. cap. 6. Humores maligni in corpore geniti, aut venena extrà quocunque modo communicata è suis signis patent. Causæ resoluentes à suffocantibus non ita difficulter discerni possunt. Si enim corpus extenuatum sit, & causæ etiam spiritus dissipantes præcesserint, ex spirituum resolutione & dissipatione, homo plus iusto edat aut bibat, frigidorum ac crudorum humorum signa adsint, aut phlegmone vel obstructio, vel dolor circa cor adsit, aut *μετάσται* materiæ subitæ ad partes illas facta sit, aut repentino timore aut terrore homo consternatus sit: suffocati spiritus argumento est.

Ex cuius autem partis vitio cor afficiatur, ex cuiusque propriis accidentibus, quæ syncopen necessario antecedunt, cognoscitur. Ex vtero v.g. si syncope prodeat, vteri affecti signa sunt. Ex affecto ventriculo si proveniat, præcesserunt oris ventriculi dolor & morsus, & nausea, vomitus, & eius generis signa alia. Et quidem si ob flauam bilem os ventriculi molestantem accidat, cognoscitur ex maiore oris ventriculi dolore, ex vellicatione, anxietate, oris amarore, siccitate & siti. Idem de aliis partibus esto iudicium.

Si verò nullum alicuius partis affectæ est indicium, nullusque alius affectus, nec febris, nec inflammatio, nec alicuius partis affectæ signa adsunt; ex primario cordis affectu lipothymiam provenire indicio est.

Quid autem mali cor pariat, cognoscitur ex ægri facie, modo, quo in syncopen incidit, & ex his, quæ præcesserunt. Ex spirituum corruptione, aut venenatâ aut maligna alteratione si sit syncope, livida & valde frigida apparent extrema, facies pallida & plumbea est, nec tamen collapsa, respiratio non ita est immutata, licet sit frigida, præcessit subitus ægri lapsus, & si venenum sumplerit, vel ab animali venenato morsus vel ictus sit æger, nec id latere potest.

Ex spirituum dissipatione syncopen provenire, ut dictum, cognoscitur ex iis, quæ præcesserunt, labore & exercitio nimio, dolore vehemente, vigiliis & similibus causis.

Ex spirituum suffocatione fieri cognoscitur, si causæ istæ non præcesserunt, æger plurimis & crassis humoribus abundet, adsit ventriculi anxietas, & nausea, cum præcordiorum tensione ac dolore.

Ex quibus omnibus syncopen à cognatis affectibus discernere facile est. Distinguitur syncope ab epilepsia, quod licet interdum animi deliquium, aut potius quædam animi seu sensuum perturbatio epilepsiam præcedere soleat, nulla tamen adest in syncope convulsio, sicut in epilepsia. Ab apoplexia verò differt, quod in apoplexia pulsus insigniter non muratur, nisi morte instante. Ab vteri strangulatu, quod in ea aufertur respiratio, sed non pulsus, cum contra in syncope pulsus ad sensum penitus auferatur, respirationis autem difficultas tanta non adsit. Interdum tamen cum suffocatione vteri syncope coniungitur, atque tum pulsus interdum non percipitur.

### Prognostica.

1. Qui sæpe & sine manifesta causa animo linquantur, ii repente moriuntur. Hippocrates, 2. aph. 41.
2. Omnis syncope mala; sed pessima, quæ fit in corpore debili, quæ vetusta, quæ confirmata. Cognoscitur autem syncopen esse confirmatam & consummatam, quod color faciei viridis apparet, & collum, ut in strangularis, inuertitur. Auicennas, 3. canon. fen. 11. tract. 2. cap. 6.
3. Syncope, à qua homo non restituitur, post irrigationem faciei cum aqua rosarum, post vini exhibitionem



bitionem post par mica etiam, lethalis est.

4. Cor primaria affectione laborans auxilium non admittit, puta phlegmone, erysipelate, dyscrasia vehementi, per febres acutissimas, vulnera præsertim sinistri ventriculi. Per consensum verò affectum à cerebro, hepate, ore ventriculi, à subita & vehementi animi perturbatione, curationem recipit, nisi vires planè deiectæ sint. Paulus Aegineta, lib. 3. cap. 34.

5. Syncope ex cordis intemperie simplici mitior est, quàm quæ ex instrumentariis eius morbis, aut soluta unitate oritur. Simplex etiam spirituum animalium alteratio minus offendit, quàm eorundem suffocatio aut resolutio & euacuatio.

6. Syncope, quæ fit ab intemperie cordis frigida vehementi, ægerimè curatur, Nam à nulla alia corporis parte calor naturalis cordi communicatur, sicut cor, quod est caloris principium, & calorè aliis comunicat.

7. Qui ob magnam humorum crudorum copiam febricitantes in syncopen incidunt, si ventriculus & hepar in his inflammatum fuerit, desperata salus est. Similiter qui ob humores tenues omnino concidunt per febres, & ventriculum aut hepar inflammatum habent, viribusque languent, in his celeriter lethalis constitutio in facie apparet. Galenus, 12. meth. med. c. 3. & 6.

8. Non statim salus promittenda, cum quis à syncope sibi redditur. Nam si pulsus non redit, nec calor viuidus; & æger frigidus semper manet, mox in syncopen relabitur.

9. Syncope, quæ ex immodicis euacuationibus, timore, tristitia, aut alia euidenti causâ prouenit, minus periculosa est, quàm quæ ab interna orta est.

#### Indicationes & Curatio.

Indicationes  
& curatio.

Curatio autem syncopes in duo tempora diuiditur, vnum paroxysmi, alterum intermissionis. In paroxysmo ut æger excitetur & reuiuiscat quasi, primò spiritus conseruandi, fouendi & instaurandi sunt; secundò facultas animalis atque vitalis excitanda; tertio causæ, quæ spiritus lædunt, tollendæ sunt, pro quarum diuersitate diuersa præsidia requiruntur. Si spiritus non generentur ob nutrimenti defectum, corpus quamprimum nutrimento reficiendum: si non generentur ob cordis aliquem morbum, ei, quantum possibile, occurrendum: si spiritus corrumpantur, vel causâ maligna alterentur, illæ causæ per contraria tollendæ: si dissipentur & resoluantur, non solum per odoramenta & alimenta spiritus instaurandi & fouendi, sed & causæ illæ, quæ spiritus resoluunt, tollendæ, pori corporis, ne nimia fiat resolutio, claudendi, euacuationes immodicæ sistendæ, dolores leniendi, & reliquis etiam causis occurrendum. Si à spirituum suffocatione fiat syncope, materia ad cor affluens reuellenda; si copiosa sit, euacuanda; si cruda & crassa, alteranda.

Primum ergo quod attinet, spiritus conseruentur, roborentur, foueantur, & ad naturalem statum reducantur cum internis, tum externis auxiliis. Nimirum aqua rosacea, vinum, acetum, aqua cinamomi, carfunkuli, moschus, ambra & similia alia cordialia admouenda, iisque facies irroranda & tempora illinenda. In paroxysmo tamen obseruandum 1. ut in morbis calidis frigida vsurpentur, rosæ & earum aqua, violæ, flores citri, santalum, acetum. In frigidis autem morbis calida. Licet tamen in frigidis aliquid de calidis admiscere ob spiritus subito reficiendos. 2. in sceminis odoramenta suauia naribus non admoueantur, sed potius graueolentia, ut castoreum, ruta, ne vteri suffocatio conciteretur, atque ita periculosius malum redatur. Cordis quoque regioni epithemata, fomenta, facculi, inunctiones ex cordialibus, theriaca, Mithridatio, oleo citri, spiritu aliquo vel aqua cordiali admouenda. Atque hic etiam valde utilis est melissa vino

odorato vel maluatico conspersa & in latere calente calefacta, atque cordis regioni imposita. Exhibendum simul vinum generosum vetus, aut panis eo madidus. Vix enim aliquid magis & citius vires, quàm vinum reficit. Quamquam verò aliàs & extra paroxysmum iis, qui inflammatione viscerum aliqua laborant aut capite dolenti vel simili malo infestantur, vinum non conueniat: tamen in ipsa syncope, in qua vniuersum corpus refrigeratur, plus vrgent spiritus reficiendi, quàm illæ causæ prohibere possint. De delectu autem vini in syncope videatur Galenus, 12. meth. med. cap. 4. Si verò sit causâ frigida, non solum vinum conuenit, sed & moschus, ambra & aromata, confectio alkeremes, syrupus de corticibus citri, confectio diambræ, diamoschi vsurpari potest, & inprimis ad spiritus subito reficiendos plurimum possunt aquæ & spiritus cordiales passim descripti, quales liquores etiam supra, cap. 4. & capite precedente fuerunt propositæ. Inter eas autem facile primum locum obtinet Aqua vitæ alba Dresdensis, quæ quia nimis operosa visa fuit, ad istum modum à D. Andrea Dôtero correctâ & contracta est:

Aqua vitæ  
alba Dres-  
densis.

℞. Spirituum bonorum seqq. lento igne seorsim paratorum ex vino: Spirit. vini moschatellini, Maluatici, rub. maturi & veteris, ana Canth. vi. beton. meliss. roris-marin. veronica, card. bened. menth. crispi. absinth. vulg. hyssopi, salvia minor. artemissia rub. è ligno tamarisci, è cerasis, fruct. punor, syluestr. uuarum passarum, flor. sambuci, è baccis iuniperi, cortic. aurant. citri, ana Canth. iii. euphrasia, scolopendr. ruta, ana Canth. i.

Hiscæ spiritibus commistis adde radic. enula pimpinell. polypody, ana Vnc. iii. men. valeriana, ana Vnc. i. & fol. salvia minor. Vnc. i. scolopendr. menth. crispi. pulegi. matricaria, an. Drac. vi. nucl. persic. s. a. prap. 3. ii.

Relinque in infusione per triduum. Colat. adde panes triticeos perfecte coctos, & è farina optima paratos, N. x. ita, ut singuli pugnum æquent humanum, frangantur è clibano extracti feruentes adhuc minutim, relinquantur iterum in infusione per triduum. Fiat postea destillatio in arena moderato igne, ita, ut tantum, quod spirituofum est, separetur & colligatur. Reseruetur diligentissimè hoc destillatum, ne exhalat.

℞. Præterea caponem annosum corpulentum, ac suspendio enecatum N. i. cum perdicibus duabus bonis, aut phasianis bonis, N. j. deplumentur sine aqua, exenterentur, in frustra diuidantur, remota pinguedine omni, ac vino Rhenano bono abluantur. Præparatis hoc modo adde

Cinamom. elect. caryophyllo. galange, zingiber. macis, an. Drach. vi. nuc. mosch. N. v. gran. parad. piper. long. cardamom. cubebæ. an. Drach. iii. croci Scrup. ii. sem. & rad. peon. an. Drach. vi. fol. maior. Drach. ii. amygd. dul. excort. Vnc. ii. passul. Corinth. Vnc. iii. zylbebar. Vnc. i. & sacch. cand. 3. ii. zedoar. 3. 3. manna 3. x.

Affunde postea vini Maluat. & Alacanth. opt. q. s. ad perfectam coctionem in duplici vase instituendam. Vbi sponte post coctionem sufficientem refrigerit decoctum, incidantur minutissimæ carnes caponis & phasiani & contundantur probè. Fiat deinde destillatio lenta in arena.

Cui destillationi potè commisce destillatum de panibus triticeis, adde insuper spirit. vini moschatellini. opt. Canth. iii. Adde præterea sequentes species in duplo:

Caryophyll. Vnc. i. nuc. moschat. macis, piper. long. nigr. an. Drach. vi. rad. aristoloch. long. calam. aromat. dipram. alb. caryophyllat. tormentill. angelicæ, bistortæ, leuistici, rhabarbar. per noctem prius seorsim infus. in vini Rhenani q. s. zinzib. an. Vnc. 3. styrac. calam. ingran. Drach. vj. santal. alb. rub. citrin. ana Drach. vi. croci Drach. ii. sem. anisi. fanicul. coriandr. prap. aquilegia, carui, an. Vnc. 3. ligni aloes, carpo-balsami, an. Vnc. i. & cinamom. Vnc. ii. ligni rosacei 3. x.

off. de cord. ceru. N. vi. pomum citrium recens N. j. matr. perlar. prap. Vnc. i. s. fl. stachad. Arab. 3. x. primul. veris Vnc. ii. borrag. bugloss. an. Drach. vi. lil. conual. recent. Vnc. i. s. ponia, anihos, tunicis plen. violar. rosar. rub. incarnatarum, spica, lauendula, nymph. alb. centaur. minor. an. Vnc. i.

Adde porro spec. aromat. caryoph. Mesua, diarrhodon. abb. cum mosch. & camph. diamargarit. frigid. calid. latitia Galeni, dianthos, diacinamom. an. Drach. ii.

Stent in infusione per 9. dies, Fiat deinde per organa vitrea destillatio accurata, & postrema in M. B. ita, vt tantum, quod spirituosum est, colligatur.

Tertia pars sine moscho & ambra conficienda & reseruanda.

Reliquis duabus partibus adde moschi opt. aq. rosar. bona prius soluti, Vnc. s. ambra pari modo prius solut. Drach. vi.

Et si perfectum est hoc opus, reseruetur & custodiatur diligentissime in organis vitreis bene munitis.

Secundo spiritus excitantur & ad exteriora reuocantur extremorum frictionibus, corporis concussionibus, acclamatione, nomine ægri inprimis expresso frictionibus linguæ & palati ore diducto cum theriaca & aqua cinamomi & similibus, Si tamen à spirituum dissipatione sit syncope, frictiones & ligaturæ non conueniunt, sed æger quiescat.

Tertio quod causarum diuersitatem attinet, de qua Galenus, 1. ad Glaucon. cap. 14. si Spiritus non generentur ob nutrimenti defectum, corpus quam primum reficiendum; quod commodissime fit vino & pane vino madido exhibito, quo simul spiritus reficiantur, vt diximus.

Si syncope accidat, quod humores tenues adsint, qui facile exhalant, corporisque habitus rarus sit, odoramentis & cibis boni succi fiat instauratio corporis. Corporis præterea summa cutis densanda est oleo rosaceo, myrrino, mastichino, cydoniorum; ærque corpus ambiens refrigerandus, Cibi sint, qui non facile diffilantur, vt sorbitiones ex alica & similibus, de quo videatur Galenus, 2. meth. med. c. 6.

Si ob morbum aliquem cordis accidat syncope, morbo contraria, vt supra dictum, & cordi amica medicamenta exhibenda.

Si ex spirituum alteratione & corruptione fiat syncope, & quidem qualitas vel aura venenata ab vtero communicetur, inferiora fricentur, cucurbitæ ad coxas & pubem ponantur, pessi subdantur, & alia, quæ in suffocatione vteri fieri solent, peragantur. Si fiat à materia maligna & venenata, vt in vomitu æruginoso, ea exhibeantur, quæ materiam illam eluant, & humores temperent, postea cordialia medicamenta hætenus proposita exhibeantur. Si venenum haustum sit, alexipharmaca conuenientia exhibeantur. Si à morsu animalis venenati accidat, itidem alexiteria vsurpentur, & parti læsæ cucurbitulæ scarificatæ, atque alia venenum euocantia apponantur. Eodem modo & aliis causis malignis resistendum.

Si à spirituum resolutione syncope fiat, cum id rursum variis de causis, vt dictum, accidere possit, singularum habenda ratio, & modus, quo causa agit, considerandus, atque aduersus illum pugnandum. Et si enim omnes euacuationes nimie spiritus dissipant; alio tamen modo compescenda euacuatio, si per sudorem nimium fiat; alio, si ab alui fluxu; alio, si à vomitu; alio, si à sanguinis profusione. Calor ergo si sit nimius, per contraria temperandus & alterandus. Si ab immodica euacuatione accidat syncope, euacuatio sistenda, ægerque odoribus, cibo, potu, somnoque ac quiete reficiendus. Cohibetur euacuatio frictionibus, ligaturis cucurbitulis in aduersum administratis; vt in hæmorrhagia narium fricentur, & ligentur inferiora, cucurbitulæ sine scarificatione apponantur, suris & hypochondrio dextro, si à nare dex-

tra, in sinistro, si in sinistra fluat sanguis & administrentur alia, quæ hæmorrhagiam narium sistere solent. Ita mensium profluuium debito modo sistatur. In hypercatharsi dentur cibi & medicamenta adstringentia, theriacæ non admodum vetustæ Drach. s. vel Drach. i. cum aqua plantaginis. Concilietur somnus, qui omnes euacuationes sistit, excepto sudore. In syncope autem, quæ sit euacuationibus nimis, corpus frigidis non conspergendum, neque alia frigida & cutim adstringentia adhibenda; cum talia humores intro pellendo fluxiones augeant.

In sudore largo neque frictiones, neque ligaturæ locum habent, sed ea, quæ cutim adstringunt. Facies igitur irroretur aqua rosarum; collum, thorax, axillæ, inguina inungantur oleo rosaceo, myrrino, cydoniorum; æger quiescat, olfaciat frigida, assumatur syrupus granatorum, citri, limonum, ribes, acetosellæ. In ruptione subita apostematis instauratio fiat cibis, odoribus, quiete. Si à vehementi dolore syncope accidat, qui & per se spiritus resoluit, & per accidens vigiliis immixtis, remoueat ille anodynus, & causa doloris tollatur; & si à stomacho syncope oriatur, quod nausea indicat, atque æger facile natura sua vomat, vomitus proderit. De quibus Galenus, 1. 2. meth. med. cap. 4. 5. 7. 8.

Si tandem ex suffocatione spirituum fiat syncope, ad ambitum corporis spiritus reuocandi, frictionibus, ligaturis, cucurbitulis & aliis externis partibus adhibitis. Et quidem si ex plenitudine fiat Syncope, venæ sectio primum instituenda, vt suffocationis periculum auertatur, cum sanguinem euacuando, tum reuellendo, præsertim si sanguis cum impetu ad vitales partes feratur. Quando enim in hoc casu mittitur sanguis, perinde fit; ac si quis exiguo igni, qui sub strue lignorum suffocatur, aliquid de lignis subtrahat, vt ignis reuiuiscat; qua similitudine Galenus vritur, 4. de rat. victus in acut. aph. 121. Aperiat autem basilica, vt à fonte sanguis educatur; nisi à mensibus suppressis morbus sit, vbi vena tali aperienda, modò malum derinducias, Sanguis autem iteratis vicibus mittatur, ne vires vna vice nimium labefactentur.

Ex crudorum succorum copia genita syncope, vbi os ventriculi simul affectum est, & habitus ac calor, qualis ferè hydropicorum est, apparet, nec phlebotomiam, nec purgationem sustinet æger, sed vacuatio conuenit per frictiones deorsum factas, primò crurum, deinde brachiorum & spinæ dorsi, quoridie aliquoties iteratas, quæ & calefaciunt & discutiunt. Post frictiones inunctio fiat cum oleo aliquo laxante, quale est chamæmelinum & anethinum. Mulla primis diebus detur, aut oxymel cum decocto hyssopi, origani & similibus. A cibo alio absteineat æger, si vires ferant, vt per inediam humores crudi coquantur, Quia tamen pulsus subito ad imbecillitatem mutatur, panis ex vino exhibeatur ad vitandum præsens periculum: postea ad abstinentiam redeat æger. Aer neque calidus nimium sit, ne liquati humores ad cor confluant, neque nimis frigidus, ne concoctio, & discussio materiæ impediatur. Epithematis cordis non vtendum, nisi materia prius concocta & discussa fuerit. Videatur etiam Galenus, 1. 3. meth. med. c. 3.

Si à repentino terrore & metu syncope oriatur, ne ex affluxu sanguinis obstructio aliqua in vasis, aut inflammatio exciteretur, euacuatio debita instituatur ad periculum illud prohibendum.

Extra paroxysmum curam quod attinet, danda opera, vt auferantur illæ causæ, quæ iterum possent syncopen excitare, viresque debilitatæ reficiantur, & cor roboretur. Ideoque in syncope, quæ ex veneno, nimis euacuationibus, aère calido, sudore prouenit, illa ipsa, quæ in paroxysmo requiruntur, etiam extra illud locum habent: neque aliquid noui ferè agendum. Si autem ex dolore sit syncope dolores leniendi,

& causæ dolorem excitantes tollendæ. Stupefacientibus tamen cautius & parcius utendum; eodem modo etiam purgantibus, si ea ob causæ rationem necessaria sunt, virium semper habenda ratio, & in omnibus medicamentis, quamcunque etiam causam respiciant, admiscenda sunt cordialia. Si ex inflammatione oriatur, extra paroxysmum seu syncopen ipsam, vinum non est dandum. Si acris tenuisque materia ventriculum laceat, aloë & pilulis aloephanginis euacuari potest, vel de cocto tamarindarum cum manna, & syrupo rosarum laxatio. Sic enim & causæ morbi tollitur, & ventriculus roboratur. Ita & aliis causis omnibus debito modo occurrendum per conuenientia medicamenta.

#### *Dieta.*

Aër ab omnibus inquinamentis purus sit, atque alteratus cordialibus pro causarum diuersitate. In paroxysmo, vel imminente hoc, aër frigidus sit, ubi malum est à causâ resolvente: moderatè sit etiam frigidus, ubi à causâ suffocante, ob refrigerandi corpus necessitatem, ne calor extinguatur. Cibus quoque secundum causarum diuersitatem conueniens ordinandus. Vinum extra paroxysmum non conuenit, ubi plethora

adeat, aut calor vehementior, & febris ardens, aut inflammatio interna alicuius visceris, aut delirium aut dolor grauis. Galenus in syncope ex crudorum humorum copia, vel ex flaua bile, vel ex succis tenuibus & facili exhalantibus, vinum concedit tenue, boni odoris, & quod celeriter muratum in corpus distribuatur; sed nec tum insigniter eam febricitare ægrum oportet, nec phlegmone internâ affligi.

In syncope verò à resolutione probatur vinum odoratum, ut & iuscula carniū consummata, gelatinæ, & confusa, qualia in Institutionibus, *lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 2.* sunt proposita.

In syncope à spirituum corruptione & alteratione in febre pestilenti, aut à causâ aliqua venenata, vinum vel iuscula condiantur succo citri, acerolæ, melissæ, terrâ sigillata, margaritis & similibus.

Somnus in syncope ex resolutione & euacuatione periculosus est; quia debilis calor intrò reuocatus syncopen auget. Et proinde per somnum æger assidentibus diligenter obseruandus est, nec statim post syncopes solutionem ad somnum est admittendus. Nocet quoque ubi syncope est ex materia venenata, rapiendo venenum ad cor. Vtilis est in syncope ex materia cruda, eam coquendo, quâ vigiliæ temperatæ postea discutiunt.

DANIELIS  
SENNERTI  
D. ET MEDICINÆ  
PROFESSORIS.  
PRACTICÆ MEDICINÆ  
LIBER TERTIVS.

DANIELIS





Magnificis, Nobilissimis, Amplissimisque Viris,

D. CAPITANEI,

ET

RELIQVIS INCLYTÆ

VRATISLAVIENSIS REIPUBLICÆ

SENATORIBVS,

*Dominis & Fautoribus suis admodum honorandis, S. P. D.*



**E**t si iam ante annos ferè octo & triginta, *Viri Magnifici, Nobilissimi, & Amplissimi*, patria abij, & studiorum gratia ad peregrinos me contuli, atque ita maximam ætatis meæ partem extra patriam transegi: non tamen vel locorum intervalla, vel temporis longinquitas Eius amorem & memoriam labefactare & animo meo eripere potuerunt. Quamvis enim, ubi bene est, ibi Patria esse dicatur, & reuera VVitteberga hæc mihi altera Patria habenda sit: tamen ut eius loci, qui me in hanc lucem prodeuntem primùm suscepit, postea fouit, aluit, Christianæ pietatis & bonarum literarum rudimenta docuit, parentum piè defunctorum corpora ad gloriosum Supremi mundi Iudicis aduentum custodit, obliuiscar, facere non possum. Et sunt præter ista priuata in me merita etiam publica Vratislaviæ ornamenta, quæ eius memoriam subinde mihi in mentem reuocant. Neque enim Vratislavia vilis pagus vel ignobile oppidum, cuius me pudere debeat, sed è Splendidissimis & Amplissimis Germaniæ ciuitatibus non postrema est. In cuius laudes si vellem excurrere, non epistola, sed liber scribendus esset; quod factum ante me ab aliis. Vnius ut hîc mentionem faciam, non præter rem & institutum meum videtur; Vratislaviam nimirum Virorum Doctorum, & Medicorum inprimis eruditissimorum, semper fuisse feracissimam. Si enim intra vnus proximè elapsi seculi spatium vel centum Medicos è nostra Vratislavia prodiisse dixerò, in numero, si aliquantum, non tamen multum forsan aberrauero. Ut enim eos, qui adhuc in viuis sunt, & nunc cum laude, cum in patria, tum alibi medicinam faciunt, præteream; neque etiam eos, qui in viuis esse desiderunt, omnes recenseam, (forfan etiam omnium nomina ad memoriam nostram non peruenerunt) sed aliquos saltem, qui vel suis scriptis, vel aliorum Medicorum monumentis, vel suis in Rempubl. Vratislaviensem meritis inprimis noti sunt, nominem, Vratislaviæ nati sunt *Antonius Niger, Andreas Aurifaber, Andreas Bûthnerus, Iohannes Crato, Iohannes Moibanus, Iohannes Sprembergerus, Balthasar Scheiderus, Abrahamus Seylerus, Sigismundus & Iohannes VVoysseij, Paulus Boreck, Caspar Backischius, Paulus Friedewaldt, Paulus Hesus, Petrus Monavius, VVenestaus Raphanus, Ioachimius Baudisius, Iohannes Henneman, Iohannes Iessenius, Daniel Rindtsteisch sen Bucretius, Georgius Rumbaum, Carolus Greuserus, Elias Bonuinius, &c.* omnes Medicinæ Doctores Clarissimi & Experientissimi. Cum ergo & me Vratislaviæ, anno Christi 1572. die 25. Nouembr. circa occasum Solis, **D E V S** nasci voluerit, & Patriæ iste genius ac tot Clarissimorum Virorum exempla me ad Medicinam discendam allicerent, dedi operam, (absit verbo iactantia) ne in studio & diligentia in me quid desiderari posset, aut tantâ Patriâ, tot doctissimis Medicis clarâ, me indignum gererem: benedixitque Deus Opt. Max. cui sit Laus & Gloria, ita meis conatibus & laboribus, ut Serenissimi Electores Saxonie Professionem Medicam in hac Academia Illustrissimâ mihi commendarent. Quod officium ubi, cum Deo, suscepi, & hîc VVittebergæ sedem fixi, mearum partium esse putavi, Spartam, quam na-

æus


Atus sum, ornare, & non solum artem Medicam discantibus publice fideliter tradere, sed & tempus, quod à publicis Lectionibus & operis Practicis subtrahere potui, priuatis exercitiis & Scriptis quibusdam edendis, quibus artis Medicæ Studiosis pro mea tenuitate prodessem, tribuere.

Inter quæ cum iam Liber Tertius Practicæ Medicinæ in lucem prodeat, amor meus erga Patriam, ac promissum iam ante plures annos factum me mouit, vt Vobis, *Viri Magnifici, Nobilissimi & Amplissimi*, hoc quicquid est operæ offerrem, & Vestro honoratissimo Nomini inscriberem, & quod verbis testatus sum, re aliquo modo declararem. A V. autem Mag. Nobil. & Amplit. maiorem in modum peto, vt quicquid hoc muneris est, serena fronte suscipiatis, & meum in Patriam amorem Vestræ beneuolentiæ aurâ foueatis. Vos verò totamque dulcissimam Patriam Dei Optimi Max. fauori, tutelæ, & protectioni commendo, eumque supplex oro, vt omnes calamitates, quæ hisce turbulentissimis temporibus multas pessunderunt Respublicas, à Vestris muris, mœnibus, templis & focis Clementer & Potenter auertat atque auerruncet, & Patriam, ac Vos in ea florentes conseruet ac tueatur. VVittebergæ, pridie Calend. Ianuar. Anno Christi 1631.

V. M. N. & Ampl.

Obseruantiss.

DANIEL SENNERTVS, D. Medic. Professor, &  
Sereniss. Elect. Saxon. Medicus.



# PRACTICÆ MEDICINÆ

## LIBER TERTIVS.

*De Morbis ac Symptomatibus infimi ventris.*

PROOEMIUM.



*I rem recta ratione pensitare velimus, eundem de morbis ventris inferioris primo loco agendum videbatur. Continet enim is organa nutritioni dicata, à quibus vt vniuersum corpus nutrimentum suum accipit: ita ab iisdem partibus reliquo corpori morborum causa suppediatur, vt rari morbi sint, qui non ab hisce partibus primam suam originem habeant; cum quotidie ferè errata in diata committi soleant, eaque in reliquis partibus corrigi non possint, atque inde in ventre inferiori multa excrementa & vitiosi humores cumulari, & hinc reliquis corporis partibus communicari soleant. Practicorum tamen ordinem vulgatum sequi libet. Itaque cum morbos & symptomata capitis & thoracis ac partium in hisce contentarum absoluerimus, proximum iam est, vt de affectionibus p. n. ventris inferioris dicamus. Continet verò venter inferior partes plures, nutritionis scilicet & generationis organa. Ad nutritionem pertinent, eique inserviunt Oesophagus, Ventriculus, Intestina, Mesenterium, Pancreas, Omentum, Lien, Hepar, vesicula fellea, Renes Vreteres, & Vesica. Ad generationem pertinent Testes & his inservientes & annexa partes, de quarum morbis & Symptomatibus iam ordine dicemus.*



PARS I.

De Morbis ac Symptomatibus  
Oesophagi & Ventriculi.

SECTIO PRIMA.

*De morbis oesophagi & ventriculi.*

CAPVT I

*Morbi Oesophagi.*

*V*entriculus cibum potumque corpori nutrimento vtilem & necessarium recipit, & in Chylum, è quo postea fit sanguis, mutat. Via autem, per quam cibus & potus ex ore in ventriculum fertur, oesophagus est. Patitur autem is etiam suos morbos & symptomata.

*Intemperies*

*Intemperies Oesophagi.*

Primò enim intemperie corripitur, Calidâ, frigidâ, humidâ, siccâ, & quidem vel cum vel sine materia. Calidâ, vt & siccâ, plurimum afficitur in febribus ardentioribus, vbi à vaporibus calidis ascendentibus incalefcit & siccatur. Idem interdum accidit, vbi humores acres vomitu rejiciuntur: imò vbi in ventriculo continentur, propter continuitatem oesophagum afficere possunt. Vapores etiam ab vtero adscendentes intemperiem oesophagi inducunt, reperiunturque fœminæ, quæ de perpetua siccitate & asperitate oesophagi hâc de causâ conqueruntur. Humectatur etiam sæpè à catarrhis hûc defluentibus, vt & in saluatione. Præter causas internas autem, etiam intemperiem suæ materiæ cognatam inducunt, causæ Externæ: Aër nimirum calidus, frigidus, fumi item, fuligines & pulueres, cibi potulque & medicamenta insignem aliquem excessum qualitarum primarum habentia.

*Signa Diagnostica.*

Cognoscitur autem intemperies oesophagi in genere ex deglutitione impedita, toto oesophago æqualiter affecto sine vlla angustia & doloris sensu. Et quia propter vicinitatem interdum trachea simul afficitur, ex voce nonnunquam etiam de intemperie oesophagi judicari potest.

Differentiæ autem causarum primò cognoscuntur ex iis, quæ in ore & lingua apparent. Habent enim hæ partes communem tunicam, ideòque affectio, quæ in lingua apparet, ferè etiam oesophago communis est. In calida intemperie rubor & asperitas in lingua percipitur. In frigida & humida humiditas. Deinde à causis quæ præcesserunt vel adsunt, quæ sibi similem dispositionem oesophago imprimunt. Terriò à iuuantibus & nocentibus. Nam in calida intemperie profunt frigida, nocent calida: Ira & in reliquis. In calida & sicca inprimis adest sitis, & salua abest; In humida abest sitis, & multa adsunt sputamina.

*Prognostica.*

- Prognostica.*
1. Per se autem hæ intemperies periculosæ non sunt, sed si quod periculum habent conjunctum, id à causis, à quibus proueniunt, pender.
  2. Intemperies oesophagi tandem & asperæ arteriæ communicari potest.
  3. Calida & sicca intemperies si diu durat, tandem excoriationem excitat.

*Indicationes & Curatio.*

*Indicationes & Curatio.*

Qualibet intemperies contraria sibi indicat, & eadem ferè medicamenta adhibentur, quæ in ventriculi intemperiebus proponuntur. Intemperies calida indicat refrigerantia, & curatur julebo & syrupo violar. granator. mucil. sem. psyllij, aqua portulacæ, nymphææ & similibus refrigerantibus, quæ simul lentorem quendam habent, vt adhærere possint, & excoriationem prohibere, quæ propterea etiam sensum deglutienda sunt, ne subito transeuntia parum aut nihil alterent. Non solum autem potantur & deglutiuntur talia medicamenta, sed & formâ collutionum oris ex succis & aquis refrigerantibus parantur. Detinentur quoque in ore crystalli & alia refrigerantia. In cibis conueniunt lac acetosum, è quo butyrum est separatum, & alij cibi & potus refrigerantes.

In Intemperie frigida conueniunt medicamenta calida, quæ postea de Intemperie frigida ventriculi proponuntur.

In Intemperie sicca sorbitiones fiât ex ptisana, iure

Dan. Sennerti Tom. II.

pulli; detur butyrum recens sine sale, oleum amygdal. dulcium; modò alij morbi ejusmodi medicamenta non prohibeant. Vel parentur trochisci sub lingua tenendi.

*℞. Sem. malu. melon. cydonior. excortic. gummi Arabici, tragacanth. an. Drach. j. sem. lactuc. Drach. sem. Cum syrupo violar.*

F. Trochisci sublinguales.

In Intemperie humida adhibentur medicamenta calefacientia, quæ simul siccant.

Suffitus etiam hic viles sunt, & inter alia fumus è caule leuistici.

Topica quoque applicari possunt, & quidem in lateribus colli potius, quàm in anteriore vel posteriore colli parte.

*Tumores Oesophagi.*

Aliquando etiam Oesophagus tumore afficitur, & quidem hi tumores vel sunt calidi vel frigidi, habentque ortum à causis, quæ in aliis etiam partibus tumores excitare solent: affluxusque humorum etiam hîc sunt causæ eadem, quæ in aliis partibus: inter quas causæ etiam sunt externæ, percussio, res duræ & asperæ in oesophagum illapsæ eiqûe infixæ. Dolor enim ex re infixa excitato affluxus sanguinis concitatur, unde inflammatio oritur.

*Signa Diagnostica.*

In genere tumor cognoscitur ex dolore, qui in deglutendo percipitur, & deglutitio impeditur, ita quidem, vt aliquando potus per nares refluat. Dolor quoque in parte affecta magis percipitur, quàm in aliis: quo loco quoque cibus & potus subsistere solent. Dolor etiam magis in parte posteriore & dorso, quàm in pectore sentitur; Aërique erecti magis sedere cupiunt, cum hoc modo facilius deglutiant. Et si pars inferior sit affecta, cibi aliquo vique descendunt, postea verò in transitu hærent, ægròque inde molestia conciliatur.

Tumorem autem calidum esse cognoscitur ex dolore majore, qui etiam continuus est, siue æger deglutiât, siue non; ex siti; ex caloris etiam in lingua indicis, adestque febris. Vbi materia in pus mutatur, calor, dolor & febris augetur, & cum tumor rumpitur, rigor aliquis superuenit, & febris ac dolor remittunt.

*Prognostica.*

- Prognostica.*
1. Gula vix patitur tumorem & abscessum, quin cor illi vel cerebrum vel vtrumque compatiatur.
  2. Sunt autem hi tumores curatu non faciles, & cum magno periculo conjuncti, ægrumque, arteriæ asperæ viâ compressæ, penè suffocant, & in vitæ periculum conjiciunt, cujus rei historiam refert Beniuennius, de abditis morborum ac sanas. causis cap. 104.

*Curatio.*

Tumores autem oesophagi easdem indicationes suppeditant, quas aliarum partium tumores; Simul ramen partis affectæ habenda ratio. Nam cum medicamenta, quæ assumuntur, ad ventriculum & viscera perueniant, talia esse debent, vt non modò sapore non sint ingrato, sed & nullum damnum ventriculo & visceribus inferant. Deinde repellentia, quæ extra applicantur, talia esse debent, ne partes vicinas sanas constringendo lædant. Cauendum quoque in Tumoribus oesophagi à vomitu; nisi ad rumpendum abscessum necessarius sit, Primò quia vomitu materia ad locum affectum mouetur; deinde si materia ad oesophagum mota ob tumorem ibi subsisteret, & ejici non valeret, facile suffocationis causâ esse posset.

V V v

Tumores

Tumores verò calidos in specie quod attinet, in principio, nisi quid prohibeat, vt & in aliis tumoribus, sanguis mittendus, & alius etiam vel clysteribus, vel lenientibus medicamentis euacuanda. Extra verò applicantur in principio medicamenta repellentia ex succo plantaginis, portulacæ, mucilag. psyllij & similibus. Vt

*℞. Ol. rosac. cydonior. succi plantag. portulacæ part. aequal. aceri parum. Coqu. & addita Cera q.s.*

Fiat Vnguentum.

Aut imponatur Cataplasma ex farina hordei & lentium.

Assumantur verò & paulatim deglutiantur. *Syrupus rosar. viol. granator. de succo ribes, berberis, cum speciebus diatragac. frigidi.*

Cibus verò sit ex hordeo & aliis refrigerantibus addito pauco aceto.

In augmento adduntur Resoluentia: Topicis, nimirum, *ol. chamamel. anethin. fœnumgracum, bdellium, Ammoniacum.* Internis verò *glycyrrhiz. & radices ireos, vt;*

*℞. Spec. diatreos Drach. j. diapenid. Drach. sem. Extr. glycyrrh. Scrup. j. Syrup. violar. vel rosarum q.s.*

F. Linct.

In statu discutientia ferè sola vsurpentur & aliquid saltem repellentium addatur. Ideoque conueniunt tum extra *ol. chamamel. lini & Cataplasma ex flor. chamamel. fœnugraci & simil. paratum.* Exhibeantur verò intra *Loch de pina vel Eclegma ex speciebus diatreos, diapenid. cum Syrup. de jujub. glycyrrh. vel hyssopo.*

Si tumor ad suppuratorem tendat, pinguis & Emplastica intus & extra, & internis medicamentis addantur *Rad. althææ, ficus, passulæ, jujubæ & similia, vt*

*℞. Branc. ursin. M. j. Coqu. ad mollitiem & contundantur.*

Contusis adde *farin. hordei, puluer. rad. althææ, ana ʒ. j. Vnguenti dialthææ, q.s.*

F. Cataplasma.

Vel *℞. Rad. althææ, lil. albor. malu. cum rad. an. Vnc. j. flor. chamamel. verbasci an. M. l. ficum num. iii.*

Coqu. ad mollitiem, Contusis adde *farin. sem. fœnugrac. lini an. Vnc. i. vitell. onor. num. ii. ol. amygdal. dulc. q.s.* F. Cataplasma.

Si materia iam in pus mutata sit, vt tumor facilius rumpatur addantur *Rad. iridis, marrubium, sinapi, crocus;*

Vel exhibeatur hoc Eclegma.

*℞. Ficum pinguium num. vj. jujub. cubebarum. an. Vnc. i. dactylor. sossibus num. viii.*

Contundantur in mortario & addantur *spec. diapenid. diatreos san. Drach. j. pulu. glycyrrh. Drach. ii. Croci Drach. j. Syrup. violar. & jujub. an. q.s.*

F. Looch.

Vlcus abstergatur aqua hordei cum saccharo rubro & melle rosato.

Si tumor sit frigidus, eadem quidem indicationes sunt, & eadem medicamenta requiruntur; repellentia tamen sint mitiora & minus frigida. Sufficit inunctio cum oleo rosac. aceto permixto, & cataplasma ex farina hordei cum oleo rosaceo & aceto.

Lambat etiam æger Looch ex Syrup. Iujub. & speciebus Diatrageanthi frigid.

In augmento verò resoluentia sint fortiora.

Si non discutiat tumor, maturantia adhibeantur.

*℞. Branc. ursin. ad mollitiem coctæ & contuse Vnc. ii. farin. tritici, sem. fœnugrac. lini. pulu. flor. chamamel. an. Vnc. j. axung. porcin. q.s.*

F. Cataplasma.

Exhibeatur v. Looch è ficibus, dactylis, rad. althææ. Syrup. jujub. & de glycyrrh.

Vt rumpatur apostema addantur *radic. iridis, hyssopus, Sinapi.*

Ruptum abstergatur hydromel, cum melle rosato.

### Angustia Oesophagi.

Oesophagus interdum etiam angustior redditur, vt cibo & potui transitus denegetur. Fit autem hoc primo in tumoribus Oesophagi, vt modo dictum. Deinde ob luxationem vertebrarum cernicis & dorli ad interiora. Terrio ob pituitam crassam, lac coagulatum vomitu reiectum & in œsophago hærens. Quarto ob res externas deglutitas, vt ossa, spinas, bolos ciborum magnos, nummos, hirudines, & similes res duras in eo hærentes. Quinto ob vermes ex ventriculo & intestinis ascendentes. Non impossibile videtur etiam coalescere posse, aut certè angustior reddi Oesophagum ex vlcere vel vulnere: etiam eius rei exemplum non meminerim: cum in aliis partibus idem accidat. Ita de oris coalitu (an in labiis, an verò in principio œsophagi fuerit, dubitari posset) historia habetur in *Epistolis D. Horstij sect. 19. de molitore quodam, cui os ita coaluit, vt infundibulo illum vti oportuerit, cui tandem omnino os clausum fuit, quod per incisionem denuo apertum, iterum clausum, & secunda sectione apertum rursum clausum fuit & coaluit, vt ita ægro fame pereundum fuerit.*

Sexto etiam aliquando in Scorbenticis & Hypochondriacis à vaporibus & flatibus ascendentibus, & œsophagum replentibus ac distendentibus, & arteriam asperam vicinam comprimantibus, vel tale quid, quale pyra & alij fructus austeri afferre solent, inferentibus, & sibi ipsis adstrictoria vi exitum quasi præcludentibus, non solum deglutitionem impediti, sed & suffocationem, si quid deglutire vellent, intentatam aliquoties obseruauit.

Tandem inter causas œsophagi angustiae referenda medicamenta constringentia. Ita D. Philippus Hæchterus, *obseru. Dec. 3. casu 5.* refert, Rustico cuidam vinum Matuaticum exhibitum fuisse, in quo per noctem radices symphyti majoris maceratae fuerant, atque inde ei fauces ita præclusas fuisse. vt maxima cum difficultate deglutiret: Sed aceto hausto à strangulationis metu liberatum fuisse.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur autem angustia Oesophagi ex difficultate deglutendi, & quidem cibo ac potu in certo loco subsistente. Causas verò quod attinet, Tumor deprehenditur ex signis, quæ antea sunt posita: Si verò ex re externâ illapsa angustia sit, cognoscitur ex ægri & adstantium relatione. Si à vermibus, signa vermium adsunt. Si à flatu crasso, abest tumor, & nil illapsum est in gulam, adsunt verò signa hypochondriacæ affectionis, malumque non est diuturnum, sed potu assumpto sedatur, ac præcipuè ventriculo vacuo accidit.

### Prognostica.

1. Pro causarum verò ratione malum nunc facilius, nunc difficilius curatur, & est vel periculosius, vel minus periculosum. Res deglutitæ pertinacius œsophago inhærentes asperam arteriam comprimendo suffocationis periculum inducere possunt. Ita refert VVierus, *de præstig. demon. l. 4. cap. 1.* quendam, dum ouum gallinaceum integrum deglutiuiisset, suffocatum fuisse, asperâ arteriâ compressâ.

2. Interdum verò ex dolore & longa contrectatione inflammatio excitatur, accedenteque longâ inedia & virium prostratione homo jugulatur, quod cuidam deuorato neruosa carnis bolo accidisse refert Marcellus Donatus, *de histor. Med. mirab. l. 3. cap. 8.* Refert quoque Guil. Fabricius, *cent. 5. obs. 35.* iuueni cuidam, cum inter cœnandum ossiculum in gula remansisset, totum collum vndique durum, tensum, & supra modum vique ad pectus intumuisse cum dolore maximo, respiratio-



ne difficili, pulsu celeriac debili & deglutitione læsa, unde nono morbi die mortuus est. Post obitum incisio collo Oesophagum cum vicinis partibus, & eo præcipue loco, ubi officulum infixum fuerat, planè sphacelo correptum, cum maximo fœtore inuentum, officulum verò nuspiam, imò nec in ventriculo. Putatque Fabricius statim prima nocte in maximis istis conatibus, quos immisso in gulam digito ad excludendum officulum excitauerat, aut per superiora rejectum, aut in ventriculum vel intestina delapsum, malum verò immisissis sæpius à barbitonioribus instrumentis exacerbatum fuisse.

3. Aliquando res deglutita in gula hærens exitum sibi querit per vicina loca. Ita refert Ambros. Patreus, lib. 24. chirurg. cap. 19. Studiosum quendam adolescentem graminis ramulum deglutiuisse, qui postea integer per intercostale spatium magno cum adolescentis vitæ periculo eruperit. Non potuit enim eò penetrare, inquit rectè Patreus, nisi antea pulmonum, succingentis membranæ & intercostalium musculorum pertusa & perrupta substantia. Superstes tamen euasit adolescens. Imò si in oesophagum fuit illapsus, ipsum etiam in tracheam penetrare oportuit. Verum non addit Patreus, an in Oesophagum sit illapsus. Quod si factum fuit, duobus modis per intercostale spatium erumpere potuit caulis ille graminis, vel pertulo statim Oesophago, hinc statim pleura atque intercostalibus musculis, vel pertusa gula, trachæa & pulmonibus, quod tamen minus probabile videtur. Quod si statim in asperam arteriam illapsus fuit graminis caulis, confirmat me id in mea sententia, quam supra, lib. 2. de rebus in asperam arteriam illapsis proposui, nimirum interdum res aliquas sine suffocatione per asperam arteriam in ipsum pulmonem delabi posse.

#### Curatio.

Quomodo tumor curandus sit, antea dictum. Si res externa illapsa sit, vomitu rejicienda, si possibile id sit. Si os vel spina ipsi inhæreat, tollenda, ac danda opera, ut in ventriculum delabatur: Vulgus dorsum eà de causâ concurrere solet, ut res facilius in Oesophagum descendat. Tussis etiam res in gula hærentes excutit. Quod si hoc modo dimoueri non possit res illapsa, exhibeatur lambenda fistula, oxymel, ol. dulce, amygdal. dulce, iuscula pinguis, & cereuisia butyro mulco condita. Extra verò cataplasmata & olea emollientia & humectantia imponantur. Et, si res pertinaciter inhæreat, nonnulli candelam ceream oblongam Oesophago immittere, eamque extrahere jubent. Alij spongiam nouam auellanae magnitudine, eamque compactam, filo longo & foris alligatam & oleo amygdalarum dulcium inunctam agro deglutiendam suadent, filum tenente chirurgo: Fieri enim sic potest, ut deglutita ab agro spongia secum simul in ventriculum depellat id, quod gutturi inhærebat, aut retracta filo eadem simul nonnunquam extrahatur, vomituque rejiciatur. Alij, ut globulus plumbeus filo alligatus deglutiatur, atque iterum extrahatur, suadent. Sed commodissimum est instrumentum, quod Guil. Fabric. Hildanus depingit & describit, centur. 1. obs. 36.

Est autem fistula argentea aut ænea incuruata, crassitie pennæ oloris, longitudine verò vnius pedis cum dimidio aut circiter. Est & vndique perforata. In sua extremitate vero habet spongiolam nouam auellanae magnitudine firmiter alligatam. Hæc fistula in oesophagum immisâ & circumducta, postea extractâ, officulum, aut quicquid simile fuerit, extrahitur. Si enim accidit, ut foramen aliquod fistulæ officulum aut spinam excipiat, tum simul cum fistula extrahitur: sin minus, asperitas ossis spongiæ adhærebit, & suo loco amouebitur. Schema habetur in fine capis.

Dan. Sennertii Tom. I. I.

Quod si res omnino pertinaciter oesophago inhærens inflammationem excitat, danda opera, ut quamprimum inflammatio suppuretur. Abscessu verò rupto res ipsa simul suo loco mouetur.

Si à vermibus ascendentibus sit angustia, exhibeantur ea, quæ eos expellunt. Si causâ sit pituita crassa, conuenienti modo euacuetur. Exhibeatur etiam sæpe oxymel scilliticum lambendum, quod humores crassos incidit, & postea vomitus prouocetur.

Si à vertebra vicina loco depressa comprimatur Oesophagus, illâ restitutâ angustia cessat. Si à flatibus sit malum, potus assumatur, qui eos deprimat, & postea materia flatuum causâ tollatur.

#### Oesophagi Relaxatio.

Angustia Oesophagi opponitur ejusdem relaxatio nimia, ubi pars inferior Oesophagi, & os superius ventriculi sic relaxatur & hiat, ut ventriculus non bene claudatur, cibumque non rectè contineat, unde vapores multi in caput ascendant.

Causæ hujus mali sunt intemperies humida oesophagi & superioris oris ventriculi, item catharri à capite in oesophagum delabentes, vomitus item frequentiores.

Curatur adstringentibus sumptis & extra applicatis. Exhibetur caro cydoniorum, succus & syrupus granatorum, ribes, & omnino viles sunt hic pulueres peptici dicti, qui postea de intemperiebus & imbecillitate ventriculi, cap. 9. proponuntur.

Extra etiam adhibentur sacculi, linimenta, emplastra, quæ ibidem traduntur. Inter ea vtile est & hoc.

℞. Coriæ. malor. granator. myrtillor. sem. coriandri an. Drach. ij. acacia, corallior. rubr. an. Drach. j. hypocistid. dani an. Drach. sem. spica nardi, cyperi caryophyll. an. Scrup. j. ol. nuc. mosch. express. Drach. sem. mastich. myrtini, cera an. q. s. F. Linimentum.

#### Vulnera Oesophagi.

Vulneratur quandoque oesophagus, cum à spinis & officulis deglutitis, tum à telis inflictis.

Cognoscitur verò eum esse vulneratum vel ex officulo, aut spina deglutita, vel è firu vulneris inflictis, præcipue si stylus immittatur & vulnus exploretur; & vomitu, qui sequitur, & quod potus & cibi aliquid per vulnus excerni solet.

Quantum autem periculi officula vel spinæ deglutitæ & oesophago infixæ afferant, paulò ante de angustia oesophagi dictum. Vulnus autem inflictum si sit magnum, curatu est difficile; cum deglutitionem impediatur, & hoc modo agro mortis periculum intenter.

Curantur autem talia, ut aliarum partium vulnera; nisi quod hoc obseruandum, medicamenta non solum extra applicari posse, sed & deglutienda exhiberi. Medicamenta tamen talia sint, ne, quod antea etiam monui, si in ventriculum delabantur, ei noceant. Talia sunt, syrupus de rosis siccis, myrtinus, consolidæ, tragacantha, gummi Arabic. bolus Armenus.

Vel detur hic potus.

℞. Pilosella, cauda equina alchimilla an. M. sem. radic. consolid. major. pentaphylli, tormentilla an. Drach. i. balaustr. Drach. sem. coriandri Drach. ii. cinam. Dra. iii. Coqu. in aq. bordei s. In colatura dissolue conf. rosar. rubr. Vnc. j. Coletur.

Quæ colatura non solum agro exhiberi, sed & per chirurgum vulnere injici potest.

Linimenta etiam & vnguenta, vulgo digestiua dicta, quæ vulnere imponuntur, talia sint, quæ ventriculum non offendant. Ut

℞. Syr. de rosis siccis Vnc. sem. boli Armeni Drach. j. mastich. sang. draconis an. Scrup. i. vitell. oui dimidium cerebinth. Cypria q. s. ad incorporandum.

V V V 2 Vlcera

*Vlcera Oesophagi.**Vlcera Oesophagi.*

Exulceratur tandem etiam Oesophagus, id quod accidit vel post vulnera & res acutas illapas eique infixas; vel post tumores & apostemata; vel ab humoribus acris vomitu rejectis, vel è supernis in ipsam delabentibus, ut & vaporibus acris adscendentibus in febribus ardentibus; vel à rebus externis erodentibus assumptis, ut aqua forti, mercurio sublimato, arsenico, & similibus, quæ excoriationem oesophagi inducunt.

Et si verò excoriatio & vlcus inter se non nihil differant, quod excoriatio est summæ saltem partis derosio, Vlcus verò etiam ad interiora penetrat: tamen causa sæpe est eadem, quæ nunc magis, nunc minus lædit, & inde nunc excoriationem solum nunc, vlcus etiam inducit. Excoriatio verò fit à causis externis, aqua forti hausta, vel re exasperante assumpta. Interdum etiam à catarrhis, & humoribus acris vomitu rejectis.

*Signa Diagnostica.**Signa.*

Vlcus Oesophagi cognoscitur ex mordicatione & dolore: præcipue dum deglutiuntur acris, austera, salia, acida; quo modo à tumoribus Oesophagi distinguitur. Nam in tumore oesophagi, si res mole magna deglutiatur, accidit dolor, si verò res mole exigua, et si sit acris, deglutiatur, dolor ferè non excitatur; cuius contrarium accidit in vlcere. In vlcere enim dolor tum percipitur, cum ægri vel comedunt vel bibunt acris, salia, austera, acida, et si sint mole exigua. Rejicitur interdum aliquid purulenti vel acris. Causæ Externæ, ut aqua fortis hausta, vel venenum, ex ægri relatione cognoscuntur, quæ etiam saporeprehenduntur.

*Prognostica.**Prognostica.*

1. Vlcera post vulnera sunt periculosa; cum deglutitio impediatur, homòque alimentis destitutus contabescat. Et aliàs oesophagi, ut partis membranosa, vlcera difficulter coalescunt, & medicamenta necessaria non satis diu in vlcere morantur, sed in ventriculum descendunt.

2. Senes omnes ferè vlcere in gula excitato de vita periclitantur.

*Curatio.**Curatio.*

Primo autem vlcus tale abstergendum melicrato, aut aqua hordei cum saccharo rubro, aut decocto apij vel hyssopi cum saccharo, & talia medicamenta sapius exhibenda sunt. Videndum tamen, an simul inflammatio adsit, quæ curationi obstat. Tum enim sanguis, si opus, primum mittatur, deinde detur cremor hordei, qui refrigerat, detergit, dolorem lenit, vel decoctum sebesten, aut mucilaginis sem. cydonior. & emulsio papaveris albi cum aqua rosarum facta, vel Syrupus de papavere vel diacodium.

Vel *℞. Sem. psyllij non conquassati cydonior. an. 3. iij. papav. albi 3. iij.*

Infundantur in aq. rosar. & extrahatur mucilago. Ad-datur parum sacchari ad dulcedinem.

Vtile etiam est lac caprinum chalybeatum.

Postea ad consolidationem exhibeantur sensim deglutienda medicamenta ex Syrupis de rosis siccis, myrtino, gummi Arabico, tragacantha, mastiche, rhure, coralliis, & bolo Armeno, terra sigillata & similibus.


Si verò aqua fortis vel simile quid rodens haustum sit, exhibeatur mucilago sem. cydonior. cum syrup. violar.

Si venenum sumptum sit, vomitu reiiciatur, Vomitorio tali exhibito, quod simul veneni acrimoniam

obtrudat, eique contraria medicamenta opponantur, & mucilago sem. cydoniorum, iuscula pingua, lac & similia ad præhibendam excoriationem exhibeantur. Vel hoc, quod etiam in aqua forti hausta vel humore acri locum habet.

*℞. Passular. 3. j. Sebesten, iniub. Prunor. dulc. an. n. xx. glycyrrhiza rasa 3. j. tamarindorum 3. ij. semin. cydonior. quat. frig. maior. an. 3. ij.*

Coqu. in aqua simplici, & de colatura aliquid sæpe hauriatur.



## CAPUT II.

*De læsa Deglutitione.*

Officium Oesophagi est cibum potumque ab ore receptum beneficio fibrarum, quibus eius tunica prædita sunt, in ventriculum demittere. Hæc verò eius actio interdum læditur, ita ut aliquando nihil omnino deglutiri possit, aliquando non nisi difficulter. Et percipitur interdum inter deglutendum aliquis dolor, interdum verò sine omni dolore deglutitio nihilominus impeditur. Accidit interdum etiam, ut solida & dura faciliè, liquida verò difficulter & non sine suffocationis metu deglutiantur, de quo infra in questione.

*Causa.*

Læditur autem deglutitio vel læsa facultate, vel instrumenti deglutitionis vitio. Læditur læsa facultate, cum vel nervi sextæ & septimæ conjugationis ad faucium musculos & Oesophagum tendentes resolvuntur aut conuelluntur, vel cum fibræ oesophagi resolvuntur. Si ex vulnere fiat conuulsio hæc, spasmus ad stomachum à Chirurgis appellatur. Et si verò Platerus statuit, non propriis fibris, sed faucium musculis deglutitionem peragi, tamen id simpliciter verum non est. Et si enim hoc verum sit, musculis illis faucium cibum & potum è faucibus in oesophagum demitteret; tamen is in oesophagum demissus non pondere solum decidit, sed & fibrarum ope in eum detruditur, quod in maioribus bolis deglutendis manifestè interdum percipi potest.

Organi ratione deglutitio impeditur in exsiccatione oesophagi in febribus ardentibus, ob ejus angustiam, de cuius causis modò dictum. Tandè etiam Deglutitio læditur, cum oesophagus erosus præ dolore cibum & potum transire non patitur. Capiuaccius addit vitium objecti, cum res ingrata deglutienda sunt; quia deglutitionem

Si Hirudo in fauces irreperit, & in œsophago hæ-  
reat, (etsi id rarius accidat) qua ratione tollenda sit, do-  
cet Rhazes, in 9. ad *Almanforem* cap. 48.

Ad deglutitionem vitiatam & illa pertinet, cum quidam cibum & porum deglutiunt, immotis deglutitionis organis, cujus rei exemplum habet Cardanus, *lib. 8. de rer. variet. cap. 40.* & vidi ipse simile exemplum in quodam fatuo, qui integrum cochlear confectionis saccharatæ & poculum cerevisiæ simul sine omni motu organorum deglutitionis deglutiebat.

*De rebus alienis deglutitis.*

**N**onnunquam verò accidit, vt res alienæ vel spon-  
tè ac temerè, vel casu & inopinatò deglutiantur. *Res aliena deglutita.*  
Ita refert Vesalius, *lib. 5. de hum. corp. fabr. c. 3.* Hispanum quendam vniones grandiores 40. cum aurea cruce quinque gemmis instructa, & fide, qua comprehendebantur, meretrici, cuius noctem conduxerat, obdormienti de collo suffurata, deglutiuisse. Quendam vtreos vitreos, clauos ferreos, aliæque multa modica mercede conductum deuorasse, Cardanus, *de variet. rerum lib. 8. c. 40.* narrat. Quendam coria, testas, & frusta vitri comedisse narrat Amatus Lusitanus, *cent. 2. cur. 69. in schol.* Keckermannus *lib. 3. system. Physici cap. 12.* scribit, fuisse Dantis Comitem quendam, qui in gratiam amici vitrum deuorauit, sed postea tantos sensit dolores, vt moriendum ipsi fuisset, nisi Medicus arte quadam id auertisset. Nam coxit frumentum Saracenicum excorticatum, eique comedendum ita crassiusculè dedit, vt nempe particulæ vitri sese immiscerent pului ipsi crassiori, & ita simul excernerentur. Mirum etiam illud est, quod de Lazaro vitriuorace Realdus Columbus, *lib. 1. 5. anat.* hunc in modum scribit: Lazarum vitriuoracem vulgò dictum patricij omnes Veneti, immo Veneti omnes, omnes Ferrarienses de facie nouerant. Hic nullo prorsus gustu, dum viueret, præditus erat, nullam in edendo voluptatem, nihil in iucundum sentiebat: insipida, amara, dulcia, pinguis, salsa, acrida non distinguebat: vitrum, saxa, lapides, ligna, viuæ animalia, carbones, pisces è viuariò extractos adhuc salientes vorabat. Vorabat lutum, lineos, laneosque pannos, scænum, stipulam, & vt breui omnia complectar, quicquid homines, quicquid animantia vorant, quicquid illi edendum, seu deglutiendum potius offerebatur, mercede proposita dictum ac factum ingurgitabat. Testis est inter reliquos Martinus Aromatarius Patauij ad Angeli insigne, cui sacculum carbone refertum, & saccum insuper deuorauit. Quo viso persoluit, quod pollicitus fuerat, comminatus, ne ad pharmacopolium amplius accederet: veritus ne se cum taberna & vasis esitaret. Cum igitur hoc naturæ monstrum mihi dissecandum esset Patauij, cœpi huiusce rei diligenter, quoad ejus fieri potuit, causam venari, quam me tandem, Deo duce, ex particulari illius structura asscetum esse, confido. Nam quarta neruorum conjugatio, quæ gustus gratia in aliis hominibus producta est, in hoc Lazaro vitriuorace neque ad palatum, neque ad linguam reprobatur, sed ad occipitum reflectebatur. Quendam deglutiuisse ensis mucronem tres digitos longum, duodecimoque postea die per anum reddidisse, testatur Paræus, *lib. 24. cap. 19.* Puerum quendam mendicum quæstus gratia lapides quâ plurimos, juglandis quoque magnitudine deglutiuisse, vt eorum mutuo sese adhærentium sonitus in ventriculo audiretur, & per aluum sine labore ejecisse, ablutosque rursus deuorasse, refert Platerus. Nautam viam anguillam deuorasse, integrâque & viam aluo reddidisse, scribit Gesnerus, *lib. 4. Histor. animal.* Quendam mucronem cultri, alium lignum digiti cras-

V V v 3 sitic

1. Si à resolutione musculorum faucium proveniat deglutitio læta, periculofum malum est, gravémque morbum significat ; nisi hujus tantum partis sit Paralysis, quæ & ipsa pertinax satis plerumque malum est, & gravius minatur.

2. Periculosum etiam malum est, si à luxatione vertebrarum ortum habeat.

3. Difficultas quoque de glutiendi ab intemperie frigida vel conuulsione non recipit in senibus curationem, vel saltem difficilem.

4. Minus periculosum malum est, si à defluxione aliqua humoris in œsophagum resolutio & deglutitio laesa fiat. Si verò ob virium resolutionem & spirituum defectum, quod in febribus acutis sæpius accidere solet, id eveniat, pessimum signum est, & mortis instantis indicium, si cum sonitu quasi in lagenam vacuum potus decidar.

5. Periculosum etiam malum est, si in vulneratis à contusione fiat læla deglutitio. Ita apud Hippocratem, 5. *epid. sect. 7.* Qui iaculo acuto in posteriorem partem paulò infra cervicem saucjatus est, vulnus quidem accepit aspectu minimè effatu dignum, Neque enimalè penetrabat. Non longè autem pòst sublaro iaculo distendebatur in posteriora contractus, veluti qui in scapulas rigescunt, & posteriorum partium distensione rentantur, maxillæque constrictæ erant. Si quid etiam humidi ore contineret, & deuorare tentaret, in nares regerebatur, ac in reliquis statim deterius habebat, alteraque die mortuus est.

**Careful**

Medicamenta, quæ aliàs in paralyſi & præcipuè lin-  
guæ uſurpari ſolent, & hæc conueniunt, ſi à paralyſi  
malum ſit. Ideoque ea lateribus colli, ceruici toti &  
ſpinæ applicanda. Vtile etiam hæc eſt ſinapi vel ſola  
vel cum aceto maſticata. Conueniunt & hæc Gargarif-  
mi in paralyſi linguæ propoſiti. Vt :

24. Rad. acori veri Vnc. sem. ireos Drach. ii. salnia, rorismar. an. M. j. ruta, flor. laueudul. an. P. i. nuc. mosch. num. ii. caryophyll. Drach. j. Coq. in vase clauso in f. q. hydromel. & vini.

Colaturæ ℥. lb. j. sem. mellis anthosar. Vnc. ii. aceti  
scillæ. Drach. i. Misce pro Gargarismo.

A caussis reliquis proveniens deglutitio laesa, quomodo curanda sit, ex iis, quæ capite præcedente dicta sunt, patet.

sitie & longitudine ; puerum globum plumbi , alium denique halecem cum cereuisia deglutuisse , & per alium postea excreuisse narrat Forestus , *lib. 15. obseruat. 18. in Schol.*

Quod si tale quid accidat, & res per œsophagum in ventriculum delapia ad alium tendat, alius lubricanda decocto malua, althææ, semini lini, oleo , & iusculis pinguib. ac postea purganda, & si res acuta sit, cibi exhibendi, qui lentî & viscidî sunt, vt cum iis quasi inuoluta per alium descendat.

Sæpe verò accidit, vt per alium res tales antea deglutitæ non ejiciantur, sed in corpore retentæ lōgo post tempore sæpe per aliam viam , naturā exitum moliente, expellantur. Ita refert Arculanus se vidisse, quod os acutum gutturi infixum tandem post duos menses per cutim exierit. Ambrosius Paræus, *lib. 14. cap. 29.* narrat quendam à prædonibus coactum gladium semipedem longum cum coriaco manubrio pollicis crassitie deglutuisse , eumque tandem post semestre spatium sub inguine abscessu oborto, cum magna puris fœtidi copia extractum fuisse. Antonius Beniuinius , *de abdit. morb. & sanation. causis cap. 20.* refert, mulierem quandam acum æneam deglutuisse, quæ post 10. annos , & longos cruciatus terebrato ventriculo e paruo foramine prodiit. Paræus, *allegato loco*, scribit, studiosum quendam graminis ramulum deglutuisse, qui postea per intercostale spatium eruperit. Nota est quoque historia rustici ; quæ nostra adhuc memoria Pragæ accidit. Is enim cum cultrum breuem , vt aliis ludos faceret, in faucibus occultare posset, accidit aliquando, vt incauto culter in ventriculum delaberetur, qui post longum tempus per abdomen perforato ventriculo extractus est. Acuum deglutitarum , & longo tempore post per vrinam excretarum aliquot historiæ à Medicis recensentur, Alex. Benedictus, *lib. 2. anat. c. 9.* narrat, crinalem acum quatuor digitos longam à virgine deglutitam post 10. menses per vrinam excretam fuisse. Ita virgo quædam in aulâ Ducis Iuliacensis , dum ad speculum se ornaret, & quinque acus ore teneret, ab amasio clanculum accedente in scapulis percussa, eas perterrita deglutit, & post triduum per vrinam reddidit. Lang. *l. 2. Epist. 40.*

Interdum tamen accidit, vt res tales deglutitæ nullo modo ejiciantur, sed vel in œsophago subsistentes hominem longâ inediâ jugulent, vt testatur Marcellus Donatus, *de histor. mirabil. lib. 3. cap. 8.* vel alibi hærentes sint in causa, vt homo tandem tabe intereat. Hujus rei exempla sunt apud Forestum, *lib. 15. obs. 23. in Schol. obseruat. 27, 28.*

## Q V Æ S T I O.

*Qui fiat, quod solida faciliè , liquida verò difficulter , & non sine suffocationis metu deglutiantur.*

*Cur solida faciliè, liquida difficulter deglutiantur?*

Accidit interdum, vt solida & dura faciliè, liquida verò difficulter & non sine suffocationis metu deglutiantur, quod ipse aliquoties obseruauit, habetque ejus rei historiam Gulielmus Fabrit. *cent. 5. obs. 34.* de quodam viro sexagenario, cui cum catarrhus ad sinistrum latus lapsus esset, paralysis secuta est, & deglutitio ita deprauata, vt liquida omnia, præsertim vinum , non sine suffocationis metu deglutire posset , reliqua verò, quamuis solidissima, faciliè deglutiret.

Quænam autem hujus mali causa sit, non ita planum est. Guil. Fabrit. equidem causam mali in epiglottide esse statuit, istamque , & simul adjacentes partes cum paralyti corripere, humore viscido imbutas fuisse existimat, atque hinc faciliè fieri potuisse putat, vt, cum epiglottis laryngē asperamque arteriam exadè obregere nō posset, liquida, & in primis vinum, quia tenuius est partium, ad ipsam arteriā asperā peruenerint,

& suffocationis metu excitarent; duriuscula verò ratione crassitie & ponderis operculum asperæ arteriæ depressisse, & proinde sine difficultate ad ventriculum peruenisse. Quam sententiā, vt non impugno: ita nec absurdū esse existimo statuere, cū solida difficiliter, liquida facilius deglutiantur, id fieri ob fibrarum internarum œsophagi tunicæ rectarū debilitatem: cum verò solida facilius, liquida difficiliter deglutiantur, id accidere propter paralytin partium detractioni ciborum inferuentium. Majore enim facultatis motricis robore, & instrumentis fortioribus indigent liquida , vt comprehendantur & detrudantur, quàm solida, quæ facilius comprehenduntur.

## C A P V T IV.

### De Intemperiebus ventriculi.

Et primò.

#### De Intemperie in genere.

Ventriculi officiū est cibū & potum deglutitum in chylum seu substantiam cremori ptisanæ similem transmutare, quæ sanguinis, totius corporis futuri alimentum, est rudimentū. Vnde etiā ventriculus, *4. de usu part. c. 1.* *χλωστός* officina dicitur, & *1. de caus. sympt. c. 7.* publicum alimenti τομειον seu promptuarium appellatur.

Munus autem suum exsequitur ventriculus vi infinita, quam *ἀλλοιωτική, πικτική* & *χλωστοειτική* nominant; cui facultati inferuiunt vis retentrix & attractrix. Vis autem coctrix calore infuso vitur, qui ab influente perficitur , & in actum quasi deducitur. Eundem tamen etiam fouent Hepar, Diaphragma, Lien, Omentum, ac partes vicinæ calidæ ac pinguedine perfusæ.

Hoc autem munus suum rectè perficit ventriculus, si omnia, quæ ad ejus constitutionem pertinent, rectè sese habeant, nimirum temperies & similis constitutio, organica conformatio & vnitas Si quid autem horum desit, malè suum opus perficit ventriculus.

Inter morbos autem, qui ventriculi constitutionem lædunt, est primò **INTEMPERIES**, ventriculi scilicet morboſa, siue præternaturalis partium similium ventriculi, in primis qualitatibus constitutio.

#### Causa.

Ortum autem habet illa vitiosa ac p. n. qualitarum primarum proportio à causa alterate, siue alteratio fiat per se, siue per accidens. Causa autem hæc est vel externa, vel interna. Externa est cibus potusque aliquem excessum in qualitatibus primis habens, seu insigni vi calefaciendi, frigefaciendi, humectandi, siccandi præditus. Medicamenta item assumpta , vel extra applicata similem qualitarum excessum habentia. Aëris item intemperati ad regionem ventriculi appulsus, similisque causæ externæ. Internæ verò causæ sunt membrum aliquod vicinum, vt omentum, hepar, lien, intemperatum, vel humor, vel vapor ventriculum afficiens.

#### Differentia.

Vt autem omnis Intemperies est vel simplex, calida, frigida, humida, sicca; vel composita, calida humida; calida sicca, frigida humida, frigida sicca; & rursum vel sine materia, vel cum materia conjuncta: ita eadem Intemperies in ventriculo etiam locum habent.

#### Signa Diagnostica.

Cognoscitur autem in genere Intemperies ventriculi potissimum ex læsa alimenti coctione & apperentia, & quidè præcipuè si nullus in victu error tum præcesserit, (alias enim à cibo & potu ventriculi temperies mutari



mutari potest,) & nullus in ventriculo tumor vel vlcus vel alius morbus adfit; si, vt iam dictum, cibus & potus assumptus, qui in manifestis qualitatibus excedat. Ita etiam partium vicinarum morbi de ventriculi intemperie indicia præbent. Apparet etiam quædam in excrementis mutatio. Fluctuatio item ventriculi intemperiem arguit. Similiter sæpè in ventriculo grauitas percipitur; quia cibus tardius coquitur, & adfunt alia læsæ coctionis symptomata.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Facilius curantur Intemperies, quæ ex caliditate & frigiditate sunt, (modò non sint in habitu) quia maxime actiuis contrariis curantur.

2. Difficilius curantur, quæ in humiditate & siccitate sunt intemperies; quia imbecillioribus, & minus actiuis qualitatibus curatio eorum perficitur: & præcipue cum humectandum est. Humida etiam intemperies facilius curatur; cum calida etiam siccandi vim habeant.

3. Tempus quidem caliditatis, frigiditatisque corrigendæ par quodammodo est; maiore tamen cautione & prudentiâ opus est in refrigerantibus, quam calefacientibus adhibendis. In sicca verò intemperie tempus ad curandum longius requiritur, & siccitas tardius corrigitur. Quod enim in sanis senium est, id sicca intemperies in ægris, quæ propterea insanabilis est, si prius confirmata sit.

### Indicationes.

Indicationes.

Quæ Intemperiei corrigendæ conueniant, ex generali methodo med. pater. Intemperies enim indicat alterans per contrarium, simplex vel compositum, prout ipsa est talis. Causæ externæ, si adhuc durant, remouendæ. Internæ verò quæcunque sint, tollendæ contrariis & conuenientibus remediis. Tandem peculiaris ventriculi naturæ habenda est ratio, & per stomachica medicamenta, habito tamen intemperiei respectu, fouenda; & calor eius innatus, quo tanquam proprio in actionibus suis instrumento vtitur, conseruandus per conuenientia alimenta & adstringentia & ventriculum roborantia medicamenta, quatenus morbus ea fert.

### Curatio.

Curatio.

Itaque cum ventriculus ab aliis non accipiat multum, sed potius aliis partibus nutrimentum præparet atque transmittat, & intemperies, quatenus talis, venæsectionem non requirat, eâ hîc opus non est. Si tamen aliquis affluxus sanguinis & inflammatio ventriculi metuenda sit, ea statim instituenda.

Ventriculi conuenientia medicamenta.

Medicamenta autem quod attinet, cum orificium ventriculi sit admodum sensile, & cor facile in consensum trahatur, ac propterea foetidum & ingratum saporem abhorreat, contra verò delectetur suauolentibus & sapore gratis, danda opera, vt omnia, quæ ventriculo laboranti exhibentur, illi grata sint, nec nausæam pariant. Etsi quid omnino minus grati saporis exhibendum, danda opera, vt odor & sapor à palato & naribus minus percipiatur, & proinde talia pilulis includantur, vel alio modo saporis & odores ingrati occultandi sunt, quod fit, si ob saporem os prius aquâ aceto dilutâ colluatur; ob odorem verò poculum linteo aceto madefacto tegatur, vt non plus pateat, quam labiis admouendis opus est.

Danda quoque opera, vt medicamenta aliquandiu in ventriculo hæreant, nec mox ad alias partes, quæ forsân ea intemperie non laborant, penetrent, quibus de causis cibi medicamentosi in alterandis intemperiebus ventriculi commodissimi sunt. Sine nausæa enim à ventriculo recipiuntur, & diutius ibi retinentur. Posteriori de causa medicamenta ad ventriculum forma aliqua solida exhiberi solent. Et hac ipsâ de causâ non statim à sum-

pris medicamentis bibendum, ne cum potu è ventriculo elabuntur. Medicamenta quoque non tepida, cum soluant ventriculi tonum, sed potius frigida vel calida actu exhibenda sunt. Vitentur quoque semper nimis relaxantia, vt & nimis attenuantia, neque absque adstringentium admixtione vsurpentur. Vt enim per laxantium vsum vires ventriculi resoluuntur: ita per vsum adstringentium conseruantur, vel labentes retinentur. Idque non solum de internis, sed & externis medicamentis obseruandum. Vitanda quoque acrida, nimium falsa, erodentia, ne orificium ventriculi superius, quod sensu exquisito præditum est, lædatur, vt & fortia purgantia, quæ omnia sunt ventriculo inimica. In quacunque ventriculi intemperie commendatur corallium ad 3ß datum. In frigida tamen & sicca intemperie calidis ac humidis medicamentis corrigatur. Auicennas etiam corallium collo appendere iubet, vt ventriculi regionem attingat. A nonnullis etiam lassis commendatur, si collo eodem modo appendatur. Laudantur quoque interiores tunicæ ventriculi gallinarum, vt & aliarum aniui, præcipue Mergi. Galenus tamen, 1. 1. de simpl. med. facult. scribit, se vanam hanc promissionem expertum esse. Mesue Myrobolanos Chebulas & Emblicas conditas melle vel saccharo commendat.

Externa medicamenta mucronatæ cartilagini versus umbilicum, & in dorso ad duodecimam & decimam tertiam vertebrae applicantur.

### Diaeta.

In quacunque ventriculi intemperie cibi & potus nimia copia vitanda, quæ ventrem grauat. Abstinedum etiam ab iis, quæ ingrata sunt ventriculo & aduersa; à lubricantibus item, quæ tonum ventriculi laxant. Cauendum etiam ægro à vomitu laborioso, ne vires ventriculi dissoluantur. Cætera ex speciali singularum intemperierum cura patebunt.

Diaeta.

## C A P V T V

### De frigida intemperie ventriculi.

Cum autem intemperies ventriculi frigida sit frequentissima, de ea primo loco agemus. Solent autem Autores ventriculi Intemperiem frigidam distinguere in positiuam & priuatiuam. Positiuam dicunt, quæ per se à simili causa inducta est; cum scilicet ab agente frigido frigiditas ventriculo inducitur, & calor eius debilitatur. Atque huius causæ sūt vel externæ vel Internæ. Externæ sunt, frigidus cibus & potus, præsertim dum corpus aestuat; medicamenta frigida, aer frigidus, in primis, si quis in eo ventriculi regione non bene tectâ versetur, aut in ediam patiat, Internæ sunt vicinæ partes, vt hepar, lien, omentum, mesenterium & musculi abdominis frigidiores redditi.

Frigida ventriculi intemperies.

Priuatua verò vel per accidens dicitur, vbi quidem non à causâ refrigerante intemperies ventriculi inducitur, sed cū ea sit ex defectu calidi innati; atque hæc nunquā sine siccitate consistere valet; cum prior etiā sine siccitate induci possit. Atque talis sit ex humidi radicalis, & per consequens calidi innati ventriculi absorptione, quam inducere possunt etiam calefacientia nimium exhibita, vnde malè sæpè suis rebus consulunt, qui debilitate ventriculi ex hac causâ laborantes aromatibus fortiter exsiccantibus, spiritu Vitrioli & similibus vtuntur. Prouenit etiam hæc intemperies ex musculorum abdominis & omenti siccitate & gracilitate, ite ex alimenti, quod calidum & humidum est, defectu. Huc facit etiam nimia Hepatis caliditas, quæ humidū illud ventriculi caliditatis naturæ subiectū dissipat & absumit. Atque ideo accidit, vt qui iecur habent calidius & intemperatum, plerumque habeant ventriculum frigidiores & debilius coquant.

An. & cur,  
qui hepate  
sunt calidio-  
re, debilem  
ventriculum  
habeant.  
De hepatis  
caliditate et  
debilitate  
ventriculi.

[Vulgaris querela est apud Medicos, accusare debilitatem ventriculi, & caliditatem hepatis, Et res non est de nihilo. Et enim calor hepatis calorem ventriculi fouere possit: tamen per accidens etiam eum labefactare possit, modo diximus, quia nimirum caliditas hepatis nimia humidum illud ventriculi, caliditatis naturae subiectum, dissipat & absumit. Atque istam rationem adhuc etiam suum locum habere posse existimo. Potest tamen & alia addi, quam suppeditat Galenus, 2. aph. 35. dum scribit: Quaedam hypochondria sunt tenuiora, quadam crassiora, & haec sunt meliora: tenuiora sunt mala, ut signa, & ut causa. Signa sunt imbecillitatis in partibus aliquibus: causa vero, quod coctio non bene fiat in ventre, neque sanguificatio in hepate: quia à crassitie hypochondriorum concalescentium virumque, ventis & hepatis inuariantur. Nimirum coctio in ventriculo fit quidem ab innato eius calore; viscera tamen circumiacentia illum calorem fouent, conseruant, & augent. Idque in primis faciunt viscera in hypochondriis, si non sint calida & sicca, sed calida & humida, ac multà pinguedine praedita. Ideoque etiam hepar calidum per se coctionem ventriculi non laedit, sed potius adiuvat: tamen quia hepar calidius pinguedinem absumit, & hypochondria reddunt tenuia, ea calorem ventriculi ita fouere non possunt, ut crassiora. Habet & hoc incommodi ventriculus frigidus, & hepar calidum, quod qui ventriculum frigidum habent, tardius coquunt, hepar verò calidius chylum auidius, & saepe adhuc semicrudum, ad se rapit, qui postea in venis mesentericis haeret, & obstructiones in iis parit; unde fluctuationes, flatus, dolores intestinorum, exhalationes in caput, & alia incommoda ortum habent.]

E quibus patet, hanc esse inter frigiditatem ventriculi positiuam & priuatiuam differentiam, quod in priuatiua frigiditate nulla causa refrigerans praecedit, quae aliquos frigiditatis gradus ventriculo impresserit, sed quia caliditas inhaeret humido radicali, si illud absumatur, vna etiam calor euanescit: In positiuam verò frigiditate salua quantitate humidi radicalis à causa refrigerante gradus aliquot frigiditatis praeter naturam inducuntur.

### Signa diagnostica.

Signa.

Frigida ventriculi intemperies cognoscitur ex sequentibus. Si quis nulla adest, ardor nullus in ore ventriculi, cibi appetentia plerumque intenditur, nisi frigiditas sit maxima, quae actiones aboleat. Concoctio cibi vel tollitur vel imminuitur vel vitatur pro maiore vel minore frigiditatis vehementia. Sequuntur ructus acidi, praesertim si cibi ingerantur frigidi. Quia tamen ructus acidi à pluribus causis prouenire possunt, ut docet Galenus, 2. de rat. victus in acut. sect. 22. scilicet & propter ventriculi frigiditatem & propter pituitam in eo contentam & propter ciborum multitudinem, & eorum frigiditatem, ructus acidus frigidi ventriculi certum signum est, cum neque cibi multi, neque frigidi sunt assumpti, neque pituita in ventriculo redundantis signa adsunt. Salua est copiosa, flatu egrediuntur, à quibus aeger leuamen sentit. Praecesserunt causa refrigerantes, delectatur aeger calidis atque ex iis commodum percipit, laeditur verò frigidis. Priuatiua vero frigiditas potius ex signis stercitatis ventriculi cognoscitur.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Positiua frigiditas facilius curatur, quam priuatiua.
2. Pro causarum tamen ratione, & pro ut à naturali statu magis vel minus recessit, facilius vel difficilius curatur.

### Curatio.

Intemperies frigida calefacientia indicat. Medicamenta tamen calida non sint valde calida, quia talia exsiccando humiditatem minuunt & priuatiuam frigiditatem inducunt. Ideoque quae calidiora sunt, commodè allumuntur cum iure carniū & humectantibus miscentur; his verò, quae foris applicantur, olea & pinguedines admiscuntur.

### Calefacientia ventriculum.

#### Interna.

#### Simplicia.

Herbae; *Mentha*, *absinthium*, *betonica*, *calamintha*, *salua*, *organum*, *rosmarinus*, *serpillum*, *pulegium*, *basilicum*, &c.

Calefacientia.  
Interna.  
Simplicia.

Flores; *rosmarin*, *betonic*, *salua*, *spica*, *schananthi*.

Radices; *acori*, *pimpinell*, *helenij*, *cyperij*.

Semina; *Anisi*, *feniculi*, *carui*, *cumini*, *coriandri*, *sinapi*.

Fructus; *Baccar*, *juniperi*, *lauri*.

Ligna & cortices; *Aloes*, *cortic*, *citri*, *aurantiorum*.

Aromata; *Calamus aromaticus*, *nux mosch*, *caryoph*, *Zinzib*, *cinamom*, *galanga*, *cardamom*, *Zedoaria*.

Gummi, *Balsama* & cognata; *Mastiche*, *aloe*, *thuris*, *styrax*, *succin*, *ambra*, *balsamum*.

Ex quibus praeparantur & componuntur.

Aquae & Spiritus, *Menthae*, *absinthij*, *betonicae*, *anisi*, *rosmarin*, *cinamom*, *mastich*, *spiritus vitrioli*.

Composita.

Vinum & Cerenisia, *Absinthij*, *rosmarin*, *caryophyll*, *cinamom*.

Vina composita, seu *Claretum*, aquae vitae, *Elixir*.

Ut *℥. Cinamom*. *Vnc. ii. caryophyll*. *Vnc. β. galang*, *granor*, *paradyfi*, *Zinzib*. an. *℥. ii. piper*, *cardamom*, *nuc. mosch*. an. *℥. j.*

Crasso modo contusa in vase clauso macerentur per dies aliquot, in spiritus vini *℔. iiij*. Postea spiritum vini tinctum per inclinationem separa. Huius drachmae aliquot & sacchar. *q. v.* vini mens. *j.* misceantur, & habebis vinum aromaticum vel claretum.

Vel *℥. Cinamom*. *℥. i. Zinziber*, *galang*. *Dra. ii. caryoph*. *nuc. mosch*. *calam. aromat*. *macis* *piper. nigri* an. *Dra. i. spir. vini opt.* *℔. iiij*.

Stent in infusione vase clauso per dies 4. vel plures. Post spiritum tinctum separa.

Admisce *Syrupi citri* *℥. ii. mique cydon*. *℥. iiij*. Misce.

F. Aqua vitae.

*℥. Spec. aromat. ros*. *℥. i. diambri*. *℥. β. cinamom*, *nuc. mosch*, *galang*, *sem. carui* an. *℥. iii*, *cardam. ligni aloes*, *Zinzib*. an. *Dra. i. spiritus vini* *℔. iiij*.

Digere, post cola & adde *syrupi cydon*. *℥. viij*.

Stent in vase clauso aliquot diebus & post per chartam bibulam colentur.

*℥. Cinamom*. *℥. i. β. Zinziber*. *℥. β. galanga* *cardamom*. *piper rotund.* an. *Drach. i. sem. nucis mosch. macis*, *caryoph*. an. *Drach. ii. sacchar. candi* *℔. ii. vini optimi mens. v.*

F. Claretum.

Extracta & tincturae siue essentiae, *calam. aromatici*, *galanga*, *absinthij*, *ligni aloes*, *aromat. ros*, *stomach*, *Quercetani*, *Elixir proprietatis*.

Olea destillata, *calami aromat*, *caryophyll*, *cinamom*, *nuc. mosch*, *macis*, *cortic. aurant*, *carui*, *anisi*, *feniculi*.

Conseruae, *absinth*, *beton*, *anthos*, *mentha*, *salua*, *diacydonium cum aromatibus*.

Condita, *Zinziber*, *acorus verus*, *galanga*, *bacc. juniperi melle condita*, *cortices citri*.

*Syrupi*, *cinamomi*, *absinth*, *mentha*, *betonic*, *cydonior*, *do cortic. citri*, *mastich*, *mel. ros*, *scillit*, *rob. iuniperi simplex* & *compositum*.

Species Aromaticae, *aromat. rosat*, *caryophyllati*, *diacynamom*, *diagalang*, *diatriopip*, *dianis*, *diaxyloaloes*, *rosata nenella*, species Imperiales, *diamoschi*.

Trochisci,

Trochisci, *Gallia moschata, de rosis.*

E quibus postea componuntur varia electuaria & antidoti vřuales vulgo noti: *Theriaca, Mishridatum, diacorum.*

Plurima quoque parantur in rem prřsentem Magistralia.

℥. *Conseru. rosar. vitriolat. lb. β. betonic. ℥. iii. spec. arom. ros. ℥. i. caryoph. concis. ℥. i. ambr. g. vi. calam. aromat. condit. ℥. ii. Cum syrupo conseruationis zinzib.*

Fiat Electuarium.

Vel ℥. *Conseru. rosar. ℥. iii. diacydon. ℥. i. nuc. mosch. codit. n. ii. corall. rubr. prep. ℥. i. spec. arom. ros. caryophyll. incis. an. ℥. β. Cum min. cydon.*

F. Electuarium.

℥. *Cinamom. ℥. ii. galang. ℥. i. β. caryophyll. cortic. citri, macis, corall. rubr. an. ℥. i. conseru. rosar. ℥. iii. spec. arom. rosat. ℥. i. Cum syrupo cydonior.*

F. Electuarium.

### Electuarium Langy.

℥. *Conserua rosar. ℥. ii. β. flor. rotismarin. ℥. i. flor. la- uendula ℥. β. galanga cubeb. xyloaloes an. Scrup. i. sem. anisi ℥. β. cinamomi Dra. i. calami aromat. conditi Dra. ii. zinzib. conditi. Vnc. sem. pinear. prep. Dra. vi. Cum syr. conseruat. citri.*

F. Electuar.

### Rotula & Morfuli.

℥. *Extract. aromat. rosat. g. xv. calami aromat. Scr. sem. ligni aloes g. vi. sacchar. albi in aqua rosar. soluti ℥. iii. ol. cinamom. g. iii. macis, gr. ii. caryophyll. gut. i.*

F. Rotula.

Vel ℥. *Spec. arom. ros. ℥. ii. diaxyaloes ℥. i. sacch. in aq. menth. q. s. & cinamom. ℥. β. dissolut. ℥. iii.*

F. Rotula.

℥. *Spec. imper. ℥. ii. pinear. mundat. incisar. ℥. iii. spec. arom. rosat. Dra. β. sacchar. in aqua rosar. dissolut. ℥. v. ol. cinamom. g. v. carui g. iiiij.*

F. Morfuli.

### Pulueres & tragea.

Tales Pulueres efficaciores sępe sunt, quam rotula & morfuli, cum in saccharo calefacto specierum aromati- carum & ambra vis facile dissipetur.

℥. *Spec. arom. ros. ℥. iii. ambr. g. vi. sacch. ℥. iiij.*

F. Puluis.

Cuius cochlear paruum (Dra. ii. circiter) vel per se, vel cum pane vino madido sumatur.

℥. *Sem. coriandr. prep. anisi, cinamomi, macis, sem. carui an. ℥. iij. β. zinzib. albi ℥. i. caryophyll. Scrup. ii. nuc. mosch. Drach. i.*

F. Puluis.

℥. *Cinamomi ℥. sem. galanga zinzib. nuc. mosch. cube- bar. an. ℥. ii. sacch. ad pondus omnium.*

F. Puluis.

℥. *Confect. sem. anisi, faniculi, coriandri, carui, glycyrrh. rasa, galanga, zingib. p. a.*

F. Tragea.

℥. *Coriandri preparat. ℥. i. cinam. Dra. ii. Mastich. ℥. i. macis ℥. β. panis albi tost. ℥. ii. sacch. albi ℥. iiiij.*

F. Puluis post cęnam sumendus.

℥. *Cinamom. ℥. i. fl. rosar. rubr. ℥. β. zingiberis caryoph. nuc. mosch. galang. an. ℥. ii. coriandr. prepar. ℥. iii. ligni aloes ℥. i. β. sacch. ad pondus omnium.*

### Externa.

Parantur ex speciebus antea enumeratis & pręterea, ladano, gummi tacamahaca, terebinthina, ballamo Pe- ruiano.

Tutius autem applicantur versus vmbilicum & re-

gionem sinistram; quia in dextra Hepar facile nimium calefieri potest.

Balsama, *nucis moschata, garyophyllorum, cinamomi, anisi masis.*

### Inunctiones, Linimenta & Vnguenta.

℥. *Olei nardini ℥. i. mastichini ℥. β. spec. arom. ros. ℥. β. ol. destillat. caryoph. gutt. vi. cera parum.*

F. Linimentum.

Vel ℥. *Olei absinth. nardini an. ℥. β. olei destillati men- tha ℥. β. nuc. mosch. express. ℥. β. pulu. caryoph. calam. aro- mat. an. ℥. β. cera q. s. F. Linimentum.*

### Oleum Stomachale, quod Cratoni in usu fuit.

℥. *Ol. absinth. lb. i. caryoph. santal. citrin. an. ℥. ii. ros. ru- br. macis an. ℥. β. mastich. ℥. ii. β. vini odorati lb. β.*

Coq. ad vini consumpt. & Soli exponantur.

Vel ℥. *Ol. rosac. completi mastichini an. Vnc. i. spec. arom. rosat. Drach. i. ol. nuc. mosch. express. ℥. β. ol. destill. menth. absinth. an. gutt. iiiij. cera q. s.*

F. Linimentum.

### Cerata & Emplastra.

Ceratum stomachale ad vřsum quotidianum in officinis prostat.

Vel ℥. *Mastich. thuris, galang. caryoph. macis an. ℥. i. calami aromat. ℥. ii. coriandr. prep. rad. cyperi an. Dra. β. corall. virisq. an. Scr. i. gran. paradisi an. ℥. β. styrac. ca- lamit. ℥. ii. ladani puriss. Dra. vi.*

Pulueris crasse, & cum cera & pice nauali pistillo calido F. Massa, quę alutę inducatur & tegatur sindone.

℥. *Spec. arom. ros. Dra. i. caryoph. macis an. ℥. i. taca- mahaca ℥. i. ol. nuc. mosch. express. ℥. β. ol. destill. caryoph. absinth. an. gutt. vi. ladani, cera. an. q. s. F. Emplastrum.*

### Fomenta.

℥. *Menth. absinth. an. M. ii. schœnanth. M. β. Rad. cype- ri, galang. caryoph. an. Dra. ii.*

Coqu. in vino pro Fomento.

Possunt etiam fieri Embrochę ex modo enumeratis cum aquis thermalib.

### Sacculi.

℥. *Absinthij, menth. an. M. i. origani, betonic. an. M. β. rad. cyperi, caryoph. macis, nuc. mosch. galang. an. ℥. i. Cum sindone rubra.*

F. Sacculus.

℥. *Galanga, cinamom. macis, caryoph. an. ℥. ii. cyperi, ca- lam. aromat. cortic. citri. baccar. lauri an. ℥. i. β. gummi tacamahaca, styrac. calamit. an. Dra. i. F. Sacculus.*

Cataplasmata.

Efficax est Cataplasma, quod Rhases 9. ad *Alman- sar.* ex styrace, spica, absinth. calamo aromat. mastich. cu vino veteri & succo cydon. aspersis componit.

℥. *Spec. diarhod. abbat. aromat. ros. corall. an. Drach. i. caryoph. Dra. sem. carnis cydon. vino coctę ℥. ii. pulu. absin- thij, p. i. Cum vino F. Cataplasma.*

De medicamentis ventriculum calefacientibus videat- ur etiam Fernelius, lib. 5. *method. medend. c. 22.*

### Dieta.

Cibi pręcipuę sint carnes boni nutrimenti, non dif- *Diet.* ficles coctu, condiantur pipere, zinzibere, cinamomo, macere, caryoph. & aliis aromatibus, saluia item, carui, rore marino & aliis, quę tamen saporem non nisi sua- uem exhibeat. Vinum sit antiquum, vinosum, vel etiam medicatum absinthio, saluia, caryophyll. cinamomo & similibus.

similibus. vel cerenisia vel aqua. mulla aromatibus alterata aut crenomeli. Videntur cucurbita, cucumeres, melones, persica, atriplex, blitum, lactuca, hordeum, & alij cibi frigidi. Somnus sit longior. Exercitia & labores corporis valde conferunt.

## CAPVT VI.

## De Calida Intemperie ventriculi.

## Causa.

Calida ventriculi Intemperies. Eius causa.

Calidam ventriculi Intemperiem pariunt, rerum calidarum adhæsus & occurfus, calidi cibi & præcipue eorum condimenta, aromata, potus calidus, inprimis vini potentis & meracioris, mulsum. Calida item medicamenta assumpta & extra applicata. Febres quoque ardentes vt vniuersum corpus, ita & ventriculum calefacere possunt.

## Signa Diagnostica.

Signa.

Cognoscitur Intemperies hæc à siti, cibi inappetentia, mala coctione, cibi adustione & corruptione, & in primis cibi coctu facilis & facile corruptibilis, vnde & ructus nidorosi & cholera suum originem habent. Percipitur etiam caliditas circa ventriculum, salua est lentæ, viscida & rotunda, lingua, fauces labia, arida sunt. Progressæ sunt vel præsentæ adiunt causæ calefacientes enumeratæ. Frigida profunt, calida nocent.

## Prognosticum.

Prognostic.

Intemperies ventriculi calida minus periculosa est, quam frigida. Nam Intemperies ventriculi frigida, præsertim si magnus sit à natura recessus & caloris ventriculi quasi extinctio, summopere noxia est, & actionibus ventriculi valde aduersaria, ac nonnisi longo tempore & cum maxima difficultate corrigi potest. Caloris verò excessus etsi alimenta corrumpit, & in alienam substantiam mutat: ramen alimentis & medicamentis refrigerantibus adhibitis facile corrigitur.

## Indicationes.

Indicationes.

Intemperies ventriculi calida etsi refrigerationem indicat: ramen quia ventriculus calore coctione perficit, ideo minus refrigerandum & vix tantum, quantum affectus præter naturam postulat. Refrigerantia quoque nec maxima quantitate exhibenda, nec in eorum vsu diu persistendum, ne calor innatus ventriculi, qui à calore extraneo & præternaturali dissipatur, & ob humidæ substantiæ absorptionem paucior factus est, magna refrigerantium copia, & diuturno eorum vsu extinguatur. Et cum ventriculus sit nervosus, facile à refrigerantibus læditur. Refert enim Beniuenius, de abditis morbis. & sanat. causis cap. 15. Quendam ex Emplastro frigidissimo. Romacho appposito singultu correptum ac tandem mortuum fuisse, & ibidem cap. 16. Iuuenem, quendam frigidissimæ aquæ potu intra paucas horas extinctum fuisse. Quanquam tum proculdubio non solum ventriculus, sed & alia viscera à potu aquæ frigidæ offensa fuere.

## CVRATIO.

Curatio. Medicamenta ventriculi refrigerantia. Interna. Simplicia.

## Medicamenta ventriculum Refrigerantia.

## Interna.

## Simplicia.

Herbæ & Folia, Acetosa, portulaca, lactuca, endinia. Flores, rosarum, violarum.

Radices, Cichori, nymphæa, acetosa. Semina, Quatuor frigid. maiora & minora, bordei, acetosa, lactuca. Fructus, Mala citria, succus granator. aurantia acida, tamarindi, Persica, fraga, cerasa, mora, sorba, mespila, ribes, berberis, melones, cucumeres, pyra, poma acida, pruna acida, vaccinia nigra. Lignum, Santali. Lapides & Gemmæ, Corallia. Succus & Liquores, Citri & aliorum fructuum frigidorum modo enumeratorum, vinum austerrum, serum lactis.

## Composita.

E quibus componuntur & parantur varia. Aqua, violarum, rosar. fragor. portulaca, acetosa, quod possunt etiam suo modo referri spiritus vitrioli & salis. Emulsiones, sem. quatuor frigidor. maior. vt. ℞. Sem. quat. frigid. maior. excortic. an. Dra. ii. aquæ bordei simplic. lib. i. aqu. fragor. sine vino Vnc. iiii. ros. Vnc. j. F. Emulsio, cui adde iulebi violar. ℞. i. ℞. Misce.

## Decocta.

Hordei, santalorum, Vel ℞. Rad. cichor. ℞. ℞. santal. citrin. Dra. ii. (adde rubrum si placet) tamarind. ℞. ℞. Coq. in aqu. hordei simpl. lb. j. In colatura conseru. rosar. ℞. i. dissolui, iterumque colari & aliquot gutt. spiritus vitrioli addi possunt. Talia decocta duo habentur in Institut. Syrupi & Iulebi. Rosar. violar. acetosa, acetositaris citri, limonæ, granator. cydonior. de agresta, oxysacchar. ribes, iulebi rosar. violar. ex hisque compositi, quales habentur in Institut. Conseruæ, Rosarum, præcipue vitriolata, violar. cichori, acetosa, pulpa citri. Rob, Ribes, berberis, sorbor. agresta. Conditæ, Rad. Cichori, caules lactuca, persica, cerasa, ribes, berber. sorba, mespila, cydonia. Species, Diamarg. frigid. diatrion. santal. diarrhod. abbat. Hinc iterum parantur Electuaria. vt. ℞. Conseru. rosar. ℞. ii. rob. ribes. rad. condit. cichori caules lactuca condit. an. ℞. ℞. corall. rubr. præp. spec. diamarg. frigid. santali citrini an. ℞. i. Cum syrupo violar. F. Electuarium. Vel ℞. Conseru. violar. Vnc. ii. rosar. vitriolata Vnc. j. lactuca condita ℞. ℞. spec. diamarg. frigid. santal. citrin. an. Drach. ℞. Cum syrupo acetositaris citri, F. Electuarium.

## Rotula.

℞. Spec. diamarg. frigid. diarrhod. abbat. an. ℞. ii. santali citrini corall. rubr. præp. an. Scr. i. sacch. in aqua rosar. dissolut. Vnc. ii. F. Rotula.

## Externa.

Ex iisdem externa medicamenta parantur, ita tamen applicari debent, ne diaphragma attingant.

## Inunctiones, Linimenta &amp; Vnguenta.

Parantur ex oleo rosaceo, violar. nymphæa, cydonior. mucilage semin. psylli, Vnguento rosaceo, infrigid. Galeni. vt. ℞. Ol. rosac. violar. nymph. an. ℞. ℞. mucilage. sem. psylli aqu. rosar. extracta ℞. iiii. cera parum, Fiat Vnguentum.

Vel



Vel ℥. Ol. ros. omphacini Vnc. i. santal. albi flor. ros. rubr.  
an. Scr. B.

F. Vnguentum.

Vel ℥. Vnguenti rosacei ℥. i. B. ol. violar. ℥. i. santal. al-  
bor. rosar. rubrar. an. ℥. B. Milce.

### Cerata & Emplastra.

Santalinum.

Vel ℥. rosar. rubr. santali albi, rubr. an. Drach. ii. ba-  
laust. myrrillor. corallior. rubror. an. Drach. i. olei rosac. cera  
an. q. s.

F. Emplastrum.

### Sacculi.

℥. Rosar. rubr. M. j. viol. P. i. santal. omnium an. ℥. i. B.  
corall. rubr. Dra. i.

Incisa & contusa infuantur sacculo ex sindone  
rubra.

### Fomenta & Epithemata.

Fiunt ex decocto hordei, rosar. rubrar. lactuca, & aliis  
ante enumeratis, item ex succis acetosa, cydonior. oleo ro-  
sarum & similibus. vt:

℥. Ol. rosac. omphacini an. ℥. ii. succi portulac. ℥. iii. vi-  
ni austeri, Vnc. i. sem.

Cum spongia aut linteamine.

Fiat Fomentum.

Vel ℥. Aqu. Endiu. ℥. v. rosar. ℥. ii. portulac. ℥. i. aceti  
ros. ℥. B. santal. omnium Dra. ii.

M. pro Epithemate. Vel sacculus antea compositus  
coquatur in vino austero & ventriculo applicetur.

### Cataplasmata.

Fiunt ex carne cydonior. cocta in vino rubro, aceto, agre-  
sta, farina hordei, rosar. violis cum oleo rosac. & aliis, vt:

℥. Succ. cydon. pomor. agrest. an. Vnc. ii. panis Vnc. iii.  
farin. hordei ℥. B. pulv. ros. rubr. ℥. i.

### Dieta.

*Dia.* Cibus & potus cum medicamentis conspiret, Ideo-  
que alimenta sint naturæ frigida, & facili distribui-  
tionis, vt antequam adurantur, distribuuntur, quales  
sunt prafana hordeacea, aut hordeum cum iure carnis,  
præcipue aceto condito; poma austera, fructusque re-  
frigerantes alij modò propositi, qui tamen non facile  
corrumpuntur; Lactuca, portulaca & similia, quæ in  
acerariis exhiberi solent. Cibi succis acidis condian-  
tur, contra vitentur cibi aromatibus, & aliis calidis  
conditi, pingua item, salsa, dulcia, quæ in bilem fa-  
cile mutantur, vt mel, ficus. Melones item & cucu-  
meres, qui etsi frigidi sint, tamen facile corrumpun-  
tur. Acris, vt allium, cæpe, nasturtium. Lac etiam in  
hac intemperie non commodum est, quod facile cor-  
rumpitur; vt & oua, quæ etiam in nidorofam crudita-  
tem vertuntur. Potus assuerus sit aqua vel acidula, vel  
decoctum hordei, quibus iulebum violar. rosar. & gut-  
tul. aliquot spir. vitriol. & sulphur. addere vtile est,  
Emulsio item sem. 4. frigid. maior. cum aqua hordei.  
Concedi etiam potest vinum *ὀλιγορόπον*, vel aqua dilu-  
tum. Galen. 3. de simpl. med. facultat. cap. 6. oxyga-  
la seu lac acidum concedit. Aer sit frigidior;

Ager se non valde exerceat: somnus  
humectando, vt & animus  
tranquillus utilis est: ira  
verò nocet.

## CAPVT VII.

### De humida ventriculi intemperie.

#### Causa.

Humida intemperiei causæ sunt cibi humectantes, Humida  
aquæ potus, medicamenta humectantia, orium & ioru-  
nus nimius, aer humidus. *ventriculi  
intemperiei  
Causa.*

#### Signa Diagnostica.

Cognoscitur è siti diminuta, fame exigua, appeten- *Signa*  
tia cibi sicci & assi, salina copiosiore, sensu inflationis  
circa ventriculum, ructibus, fluctuatione, aluo laxiore;  
antecefferunt causæ humectantes, sicca iuuant, humida  
nocent.

#### Prognosticum.

Humida intemperies siue sola constet, siue cum ca- *Prognosticū.*  
lore aut frigiditate coniuncta sit, omnium facillimè cu-  
ratur. Galen. 7. meth. med. c. 9.

#### Curatio.

Humida Intemperies siccantia indicat, & propterea *Curatio.*  
siccantia medicamenta adhibenda, sed citra insignem  
caliditatem & frigiditatem. Calida itaque & frigida  
corrigena sunt, vt aptum & idoneum huic intempe-  
rici sint remedium.

#### Interna.

Calida Exiccantia sunt: Betonica, mentha, absinth. sal- *Medicamen-  
ta Interna,*  
uia, Radic. acori, galanga, sem. coriand. carui, mastich. scil-  
la, tunica interiores ventriculi gallinar. Lignum Guaiacum,  
saffras, & alia calida antea cap. 4. enumerata.

Frigida aut certe calorem excedentem non habentia:  
Rosa, santal. corall. bolus Armenus, terra sigill. cormen-  
tilla. In quibus eligendis respiciendum ad reliqua viscera,  
an nimirum aliud sit laxa vel adstricta; apertione  
vel adstrictione opus sit. Pertinent huc & Theriaca,  
quæ salem & sulphur continent. Galenus, 1. de  
med. facil. parab. Vbi nimia salina vitio humidi oris  
ventriculi profluit, aridam conyzam frequenter masti-  
care iubet.

Ex his parantur: Aquæ mentha, cinamomi, cal. aro-  
matici.

Decoctum: Guaiaci, saffras.

Syrupus; Myrrhinus, de betonic. ros. mastichin.

Conseruæ, Boton. ros. vitriolata in primis, Diacydonium  
cum aromatibus.

Condita: Noces iuglandes cum aromatibus condita, ca-  
lamus aromat. zinziber.

Confectiones; Sem. coriandri, carui, cinamomi, Acetum  
scilliticum.

Olea; Nuc. masch. caryoph. carui, anisi.

Species Aromaticæ; Aromat. rosar. diatriopip. diaga-  
langa, diacalamintha.

Electuaria; Theriaca. Mithridat. diacorum.

Vel ℥. Conseru. ros. beton. an. ℥. ii. ℥. in India condit.  
Vnc. sem. Spec. diarrhod. Abbat. aromat. rosar. corall. rubr.  
prepar. mastich. an. Dra. B. Cum syrupo cydonior.

F. Electuarium.

Vel ℥. Conseru. rosar. Vnc. i. sem. absinth. Vnc. sem.  
Mithridatij ℥. i. cum syrupo rosar.

F. Electuarium.

#### Pulueres.

℥. Tunicar. intern. ventric. gallin. ℥. iii. cicamom. garyo-  
phyll. ligni aloes an. ℥. i. F. Puluis.

Vel

Vel ℥. Sem. coriand. prep. anisi, fœniculi, carui an. ℥. β.  
 tunicar. ventriculi gallin. interior, prep. ℥. ii. corall. rubror.  
 prep. ℥. β. galanga, caryoph. macis, an. ℥. i. panis albi tost.  
 ℥. iii. sacchari rosati tabulat. Vnc. iβ.  
 F. Pulvis, cuius usus ante & post pastum esto.

### Externa.

#### Inunctiones & Unguenta.

Externa.

Fiunt ex oleo mentha, absinth. cydon, mastich, vt:  
 ℥. Ol. omphacin. ros. myrtin, mastich, an. Vnc. sem. spec.  
 aromat. rosat. ℥. ii. Cera q. s.  
 F. Unguentum.  
 ℥. Ol. mastich. cydon. an. ℥. i. corall. caryoph. an. ℥. iβ. ol.  
 nuc. mosch. express. ℥. ii. cera q. s.  
 F. Unguentum.

#### Epithemata & Fomenta.

Fiunt ex balastis, betonica, & aliis calefacientibus  
 supra enumeratis, pane tosto cum vino Maluatico.

### Sacculus.

℥. Absinth. menth. an. M. f. maioran. Mj. flor. ros. rubr.  
 M. f. rad. galang. cyperi, calami aromat. an. ℥. i. sem. anisi,  
 cumini an. ℥. ii. caryoph. macis an. ℥. i. mastich. ℥. iij.  
 Cum linteo albo vel sindone rubra, fiat sacculus,  
 qui si liber vino maluatico irroratus ventriculo impo-  
 natur.

### Emplastra.

Emplastrum de crusta panis, cerotum stomachale.  
 Vel ℥. Carn. cydon, mastich. an. ℥. β. caryoph. galanga,  
 macis an. ℥. β. rosar. rubr. ℥. β.  
 Cum oleo absinth. & mentha pistillo calido subigantur  
 in formam Emplastri.  
 ℥. Mastich. ℥. ii. thuris ℥. i. styr. calamit. ℥. β. hypocistid.  
 acacie an. ℥. ii. Dissolve in maluatico.  
 Hisce adde subtiliss. puluerisator. Rad. cyperi, fol. ab-  
 sinth. an. ℥. ii. menth. fl. rosar. rubrar. sem. cumini an. ℥. iβ.  
 alipte moschate ℥. i. caryoph. nuc. mosch. an. ℥. i. β. santal.  
 omnium, spicanardi an. ℥. i. corall. rubror. ℥. β. Cum ol. ma-  
 stichin. nardin. resine pini, cera an. q. s.  
 F. Emplastrum.

### Dieta.

Dieta.

Cibi & ipsi sint exiccantes, quales sunt aulculæ mon-  
 tanæ, carnes assæ potius, quam elixæ, panis bis coctus.  
 Galenus, 8. de f. m. fac. palmæ fructus seu dactylos com-  
 mendat, & per se & cum aliis cibis sumptos. Condi-  
 antur cibi aceto & sale, sed mediocriter. Potus sit parcius,  
 vt & cibus. Nam, vt Hippocrates, 7. aphor. 59. habet.  
 Corporibus carnes humidæ habentibus famem adhibere  
 vile. Fames enim ex accidente siccat. Potus loco, detur  
 vinum rubrum medicatum absinthio. Ager exercitio  
 vtatur, quod exiccat.

## CAPVT VIII.

### De sicca ventriculi intemperie.

#### Causa.

Sicca intem-  
 peries ventri-  
 culi.  
 Causa.

Siccæ Intemperiei ventriculi causæ sunt, quæcun-  
 que humiditates ventriculi naturales, vtpotè materiam  
 nutritionis proximam absumunt, de quibus Galenus 7.  
 meth. med. c. 6. Tales causæ sunt hepar calidum, immo-  
 derato suo calore sanguinem & humiditates inde geni-  
 tas in ventriculo absumens, fames & potus cibique inop-  
 pia. Diæta siccans, cibi multis aromatibus conditi, potus  
 exiccans, euacuatio nimia per vomitum aut aluum,

aquæ thermæles, medicamenta omnia exsiccantia & ca-  
 lefacientia, quæ humiditates absumunt, & per halitus  
 resoluunt, adstringentia quæ eisdem exprimunt, & me-  
 tus contrahunt, fumi metallici.

### Signa Diagnostica.

Vbi Intemperie sicca ventriculus laborat, adest sitis, <sup>Signa.</sup>  
 appetitus cibiliquidi & elixi. Cibus solidior difficiliter  
 coquitur, expuitio est pauca, contractio & extenuatio  
 circa ventriculi regionem & ventrem: imò tandem totū  
 corpus gracilius euadit & contabescit, totiusque corpo-  
 ris gracilitas inseparabile ventriculi siccioris signum,  
 vbi scilicet propria naturalis humiditas absumitur. Est  
 verò gracilitas totius inseparabile signum sit siccioris  
 ventriculi, non tamen est proprium signum, cum etiam  
 ab hepate & corde originem possit habere, & præter-  
 ea à calido quoque & sicco corporis temperamento. Id-  
 eoque vt gracilitas & extenuatio corporis, quæ à ven-  
 triculi siccitate ortum habet, à reliquis discernatur,  
 propria signa intemperiei ventriculi, item hepatis, cor-  
 dis & totius corporis diligenter perpendenda sunt. Nam  
 ex siccitate cordis citius extenuatur; Iecoris ratione mi-  
 nus citò; ratione ventriculi tardius. Humida in hac in-  
 temperie profunt, sicca nocent. Quod si vomitio acce-  
 dat in hac intemperie, caloris innati summa inopia in-  
 dicatur, & multa excrementa & cruditates indicat: &  
 propterea non statim, vbi magnus pituitæ prouentus  
 est, credendum, adesse frigidam & humidam intempe-  
 riem ventriculi, quæ propterea calefacientibus & sic-  
 cantibus (in quo à multis peccatur) corrigenda sit, cum  
 etiam à frigida & sicca prouenire possit. Præcesserunt  
 causæ exsiccentes, & euacuationes nimia.

### Prognostica.

1. Intemperies sicca pessima est. 7. meth. med. c. 7. & Prognostica.
10. & in ea tempus curationis longius requiritur. Quod enim senium est in sanis, id sicca intemperies in ægris.
2. Sicca intemperies ventriculi sine febrili calore ducit in marasum, & cum febrili calore in hecticam.

### Curatio.

Sicca Intemperies humectantia indicat. Humectatio <sup>Curatio.</sup>  
 autem hîc optimè alimentis perficitur, ac propterea ma-  
 ximè conuenit cibus, qui facile coquitur, & in corpus  
 facile distribuitur. Vid. Galenus, 7. meth. med. cap. 7.  
 quæ ramen potius totius corporis, quam ventriculi  
 siccitati pleraque conuenire videntur. Sunt ramen &  
 medicamenta humectantia vtilia, quæ etiam si non re-  
 plent, vt nutrimenta, tamen humectant, & meatus con-  
 tractos dilatant, nutrimentumque in vicinas partes re-  
 pulsus attrahunt.

Medicamenta talia sunt; Malua veraque, borrago, bu- <sup>Medicamen-</sup>  
 gloss. passula, amygd. dulc. pinea, pruna dulcia, glycyrrhiza. <sup>ta.</sup>  
 Syrupus; Borraginis, bugloss. violar. papauer. <sup>Interna.</sup>  
 Conditæ; Rad. Eryngy.  
 Conseruæ, Borraginis & bugloss.  
 E quibus alia parantur, vt:  
 ℥. Conseru. bugloss. borrag. violar. an. ℥. i. rad. condit. sa-  
 tyræ ℥. β. pinear. mundatar. ℥. iij. sem. 4. frigid. maior. an. ℥. i.  
 i. Cum syrupo borrag. vel cydonior. sine speciebus.  
 F. Electuar.

### Externa.

Adeps gallina, omentum castratorum, lac, oleum vio- <sup>Externa.</sup>  
 lar. amygdal. dulc. lilior. albor. mucilag. sem. alibæa mal-  
 na, vt:  
 ℥. Ol. amygdal. dulc. Vnc. i. lilior. alb. adipis gallinae an.  
 Dra. ii. cera parum.  
 F. Linimentum.

Vel

Vel *℞. Carnis cydonior. bene maturorum in vino dulci*  
*℞. 3. ij. farina tritici 3. j. Mastich. 3. ij. ol. amygdal.*  
*dulc. q. l.*  
*F. Cataplasma.*

### Dieta.

Alimenta sint facilis coctionis, multi & boni succi; carcant multis excrementis, & ad humiditatem vergant. Panis sit fermentatus, non multum salus: utilis est cremor Prisanæ, ova recentia, pisces bonæ notæ, pulli gallinacei, caro vitulina, hædina, agnina & molles aliæ; non tamen suillæ. Amygdala, passulæ, pineæ, pistacia, & ex his parati panes Martij, poma dulcia. Cibi non condiantur aromatibus multis. Inter alimenta valde vile est lac, quod facile coquitur, distribuitur, & multum nutrit. Eius tamen quantitas in principio exigua sit, ut ventriculus eius vsui sine noxa assuecat. Postea augeatur, & tantum detur, quantum concoqui possit. Diligenter tamen attendendum, an Lac in ventriculo acefcat aut corrumpatur, quod ex ructu & grauitate ac tensione circa ventriculum percipitur. Quod si animaduertatur, minori copia exhibendum. Vitentur austera & adstringentia, quæ residuum naturalem humiditatem absument. Potus, nisi febris adsit, sit vinum *οαζοπόρ*, leniter adstringens, ut calor innatus ventriculi conseruetur: non verò austerrum, quod humidum naturale tolleret. Cibi & potus modici sint, ne ventriculus grauent, aut tensionem vel inflationem in eo pariant. Ter igitur de die cibetur æger, ubi paulum restitutus est, bis.

## CAPVT IX.

### De Intemperiebus ventriculi compositis.

*Composita Intemperiebus ventriculi.*  
**C**ompositarum Intemperierum ratio facile ex his, quæ hæcenus de Intemperiebus dicta sunt, patet. Et Compositarum intemperierum causæ ex causis simplicium hæcenus enumeratis facile colligi possunt.

### Signa Diagnostica.

*Signa.*  
 Cognoscuntur eadem ex complicatione signorum, quæ simplices intemperies indicant. Præditi intemperie calida & sicca ventriculi paucum habent sanguinem, acutum & ineptum ad nutriendum: quoniam alimentum acquirit in tale ventriculo qualitatem, quæ ab hepate postea corrigi non potest, sed remanet ipsum alimentum contrarium complexioni radicali membrorum. Vnde tales ut plurimum sunt macri, habentes aluum adstrictam, venas eminentes & aliquando scabiem siccam, propter acrimoniam humorum sanguini permistorum.

### Prognostica.

*Prognostica.*  
 Calida & humida Intemperies facile emendatur; post hanc frigida & humida. Prior enim dyscrasia per refrigerantia & siccantia corrigitur, & sunt in promptu medicamenta antè proposita, quæ vtrumque præstant.

Pessima verò & omnium curatu difficilima est frigida & sicca. Galenus 7. meth. med. cap. 7. & 11. & lib. de marc. cap. ult.

### Curatio.

*Curatio.*  
 Ut simplices intemperies medicamentis excessum contrarium primarum qualitatum habentibus curantur, ita & compositæ.

In calida & humida Intemperie conueniunt medicamenta refrigerantia & siccantia, & si humiditas maior calorem obtundat, adstringentia, vtilia sunt. Atque rû utilis est conserua rosar. rubrar. cum corall. rubris, syrupus myrtinus; cydonior. acidor. miua cydon. rob berberis.

Extra applicatur ol. rosar. myrtin. Epithemata è succo plantag. portulac. cum bolo Armeno. Cataplasma ex farina hordei & lentium cum succo plantaginis & Nymphaeæ.

Dieta sit etiam refrigerans & siccans. Si verò siccitas sit intensior, ea ferè curandi ratio instituenda, qualis febri hecticæ conuenit.

Frigida & humida Intemperies, quæ frequentior est, curatur medicamentis calidis & siccis, acribusque mistis cum acerbis citra manifestam frigiditatem. Hinc conueniunt species arom. rosar. diatrionpip. diacalaminth. diacyminum, conserua betonicæ, rorismar. zingib. condit. acorus conditus, Mithridat. theriaca quibus conseru. rosar. præsertim vitriolata addi potest. Item vulgare illud Electuarium dicaorum, quod quidè etiam ex radicibus acori veri, quem calamum arom. vulgo vocant, componi posset, & omnino dicaorum Mesuæ, ut quod affectibus capitis & neruorum designatur, meritò ex radicibus acori veri parari debet: tamen ut hoc obiter moneam, in illa vulgari compositione affectibus ventriculi apud Germanos dicata, quam *Älterman Latwerg* nominant, etiam rad. iridis luteæ seu pseudo-Acori non incommode sumi posse videntur. Habet enim radix illa vim quandam exsiccandi & adstringendi, & si miscetur cum aromatibus acribus, non incommodum, imò gratum ventriculo medicamentum præbet. Vtiles sunt & spiritus, Aquæ vitæ, elixir, clareta & vina medicata, ut & alia medicamenta, quæ supra de Intemperie ventriculi frigida curanda proposita fuere; Cum omnia ferè simul cum vi calefaciendi vim etiam siccandi obtineant. Turius verò mitioribus & longiori tempore, quam fortioribus, quæ humiditatem ventriculi absumere & Hepar calefacere possunt, cura perficitur.

Extra etiam Medicamenta supra de Intemperie frigida proposita applicentur.

Vinum conuenit antiquum & meracius, sed in exigua quantitate: Potus enim omnis in hac intemperie sit paucus, cibi etiam formâ sicca præditi.

Frigida tandem & sicca Intemperies curatur calefacientibus & humectantibus. Et quidem si frigiditas sit remissa, conueniunt conseru. flor. borrag. buglossi. addita sextupla parte conseru. betonic. Calida enim eiusmodi sint, ne modum excedant, & magis exsiccent. Si frigiditas intensa sit, vtere conseru. melissæ & melle.

Extra adhibeatur ol. nardin, mastich. Galenus 7. meth. med. c. 7. picem aridam liquatam cum oleo amygdal. dulc. calidè applicat. Nonnulli in eum vsum catellos pingues ventriculi regioni apponunt. Omentum quoque animalium castratorum oleo calente mastich. & amygdal. dulc. madefactum & ventriculo impositum vtile est. Ut & ceratum ex parte vna Ladani, & partibus duabus ceræ compositum, quo nihil conuenientius & vtilius ad ventriculi calorem fouendum Crato se comperisse scribit, *consilio 191.*

Vinum sit minus aquosum & antiquius. Cibi condiantur aromatibus, sed moderatè. Mellis copia in lacte quod præbetur, augeatur. Imò eiusdem despumati vsus, ut potè minus excrementitij, utilis est per se in ventriculo frigido, sicut calido noxium est.

Reliqua ex iis, quæ in simplicibus Intemperiebus dicta sunt, facile patent. Videatur quoque Galenus, 7. meth. med.

à cap. 4. ad 10.

\* \* \*

## CAPVT X.

## De Intemperiebus ventriculi cum materia.

## E T

## Primo in genere.

Intemperies  
ventriculi  
cum mate-  
ria.

**I**ntemperies ventriculi sine materia, vt Galenus, 6. de *tuenda sanitate* cap. 2. docet, non diu sola consistit, sed materiam sibi alliscit, (nam vitiosa coctio multa facit excrementa) & nudæ intemperies non diu durat, raroque materia ab intemperie abest. Materia autem hæc vel in ventriculo generatur, vel aliunde ad eum transmittitur. Et rursum consistit, vel in eius capitate, vel eius tunicis impacta est. Et generatur pituitosa materia in ventriculo à causis refrigerantibus & humectantibus: Biliofa à calefacientibus & exsiccantibus. Flaculenta vt plurimum à causa frigida est; nonnquam etiam à causa calida. Dum enim bilis in ventriculo pituitosa & viscida materia subternitur, inde flatus resoluuntur, qui à calidis discurrentibus exhibitis magis cumulantur, molestique sunt donec materia ex ventriculo sit expurgata. Pituita verò in ventriculum ex capite sapissimè destillat. Bilis ex hepate; melancholia ex liene & locis vicinis effunditur,

## Signa Diagnostica.

Signa.

**I**ntemperies cum materia, quatenus quidem Intemperies, cognoscitur ex signis Intemperiei sine materia seu simplicis seu compolitæ. Materia autem coniuncta etiam sua signa habet. Nimirum eam demonstrant causæ, quæ præcesserunt, ad talem materiam generandam aptæ: Deinde quod profunt, quæ eam euacuant, nocent, quæ eam augere possunt: Tandem etiam effecta, præsertim excreta, quæ per aluum aut os eiciuntur, vt postea in specie patebit.

An verò materia in cavitare ventriculi, an intra tunicas confineatur, distinguitur, quod cum in cavitare ventriculi continetur materia, fluctuationem & nauseam parit, quam vomitus vel alui defectio sequitur. Si verò in tunicis impacta est, nausea est sine vomitu, & sæpe singultus accedit.

An autem materia in ventriculo genita sit, an aliunde affluat, cognoscere non ita facile est. Et vt id cognoscatur, primò totum corpus perscrutandum & considerandum, an alicubi excrementitij humores hæreant; an consuetæ euacuationes suppressæ sint; an æger à consueto exercitio destiterit; aut consuetam dietam mutarit. Considerandum quoque, an per periodos æger in membro aliquo malè aliquid senserit, idque iam cesserit. Tum enim suspicio est, materiam, quæ antea ad aliam partem ferebatur, iam ad ventriculum fluere. Si in toto corpore nil appareat, viscera omnia perlustranda sunt, ac videndum, an in hepate, liene vel alio membro humor vitiosus cumulus sit. Si enim in toto, vel in parte aliqua humor vitiosus cumulus sit, facile ad ventriculum mitti potest. Si verò & totum corpus & omnia membra salua ac munda inueniantur, materiam in ventriculo genitam fuisse colligitur.

Si quoque symptomata, quæ ventriculo affecto accidunt, continuò apparent, indicio est, in ventriculo materiam generari; Si intermittant, aliunde eam affluere. A qua parte autem in specie affluat, partis illius affectæ signa docebunt. Vid. Galen. 1. de loc. affect. c. 4.

Quoniam etiam nonnunquam accidit, vt in ventriculum frigidum bilis ex hepate per peculiarem meatum fundo ventriculi insertum; aut in calidum pituita à capite fluat, Galenus rectè monet, attendendum esse, ne decipiamur, & materiam, quæ aliunde affluit, in ven-

triculo genitam puremus, idque ex temperamento totius, ac ex iis, quæ per aluum excernuntur, distinguendum docet, 2. de Temperam.

## Prognostica.

1. Materia Intemperiei coniuncta quæcunque curationem difficiliorem reddit.

2. Quod si materia suis qualitatibus intemperiei ventriculi contraria sit, v. g. Si calida materia sit in frigido, vel frigida in calido ventriculo, curationis difficultas adhuc magis augetur, & imprimis, si frigida materia adhuc sit crassa & viscida, & ab hepate vel alia parte continuò materia transmittatur, foueatur & augeatur.

3. Difficilius tollitur materia tunicis ventriculi impacta, quam quæ in spatio & cavitare eius continetur.

4. Pessimum verò est, si homo nec deiciat facile, nec facile vomat, Galenus, 6. de tuenda sanitate. c. 10.

## Indicationes.

**I**ntemperies cum materia alterans indicat, simulque euacuans pro natura & conditione ipsius materiae: seu ratione intemperiei alterantia; ratione materiae purgantia, ac si opus sit, etiam prius præparantia pro humoris natura requiruntur.

## Curatio.

A materiae euacuatione incipiendum. Nisi enim materia prius tollatur, alterantia parum profunt. Et quidè si humores in ventriculo fluctuēt, & faciles sint ad euacuationem, per vomitum eiciendi, vel per aluum lenientibus educendi sunt. Si materia quali impacta sit, prius præparanda & postea euacuanda est.

Ad vomitum ciendum post cibum sumptum oxymelitis Vnc. ij. ß. cum decoct. rad. vel sem. raphani Vnc. ʒ. exhibendum.

Vel ʒ. Radic. raphani ʒ. j. asari ʒ. j. agarici. ʒ. j.

Coq. in mulla vel oxymel. ad Vnc. vj.

Fortiora vero vomitoria, præcipue ex mineralibus petita locum hic non habent; cum non solum ex reliquis corporis partibus vitiosos humores ad ventriculum commoueant; sed & eum insigniter offendant ac debilitent.

Simul quoque attendendum, num ab alia parte materia affluat. Id epim si accadat; ea euacuanda & membro mittente curato præcauendum, ne ad ventriculum amplius confluat. Materiam sublatam, postea intemperies, non secus ac si nulla fuisset materia, per contraria alterantia tollenda. Cibi quoque ea (vt supra dictum) quantitas exhibeatur, quæ à ventriculo languido facile concoqui possit. Qualitas cibi talis sit, quæ contraria sit humori peccanti, ita vt quam minima eius qualitas iterum colligatur. Cautè quoque medicamenta purgantia vsurpanda. Frequens enim purgantium, præsertim fortiorum, vsus ventriculi debilitatem auget, & natura tandem iis ita assuescit, vt sine fructu vsurpentur. Itaque ultra aloën, agaricum, mechoacannam, rhabbarum, senam vix ascendendum.

## De Intemperie Ventriculi cum Bile.

Ortum habet hæc Intemperies, quemadmodum antea dictum, à causis calefacientibus & siccantibus, item ab vsu ciborum, qui facile in bilem mutantur, quales sunt dulces.

Quantum ad signa, quando cum intemperie bilis adest, præter signa intemperiei calidi ventriculi supra enumerata ad est nausea, cibi fastidium, oris amaritudo, rosionis cuiusdam sensus & vomitus nonnunquam bilis.

Curatur



Curatur hæc intemperies refrigerantibus & humectantibus ac bilem euacuantibus. Et quidem tenuis bilis vel vomitu reiiciatur, vel euacuetur manna, cassia, syrupo rosar. vel violar. solutio, tamarindis, cum decocto & aliqua aqua refrigerante. Vtilis est & mulla, in qua decoctum sit absinthium. Nam scribit Auicennas, absinthii decoctum remedium esse vitii à materia, bile scilicet, quam deterget & subducit, si non alius fuerit impacta. Pituitam verò ventriculo inhaerentem absinthium potius affigit, nisi decoctum eius condiatur aromatibus incidentibus, calefacientibus & melle vel saccharo, quod detergat. Eligendum verò absinthium, quod est aromatici, non verò horridi saporis. Si verò bilis sit crassior aut ventriculi tunicis impacta, euacuanda aloë, rhabarbaro. Electuario lenitivo simplici, diacatholico, Et quidem ubi aliquando crassior est hic humor, ac pertinacius ventriculi tunicis adhæret, vix præstantius medicamentum haberi potest, quam Hiera.

Vel ℥. Pilul. de aloë ros. 3. j. stomachicar. 3. j.

F. Pilulæ mediocres.

Vel ℥. Rhabarb. 3. j. cinamom. 3. j. infundantur in s. q. aquæ Endiuia. Colatura ℥. 3. iij. manna. 3. j.

Iterum colentur atque tunc addatur syrup. rosar. solut. Vnc. 3. Vel si bilis sit crassior, mellis ros. solut. Vnc. 3. Misce.

Si aliunde affluat bilis, eodem modo, vt dictum expurganda, & partis, quæ mittit eam, habenda ratio: Simul etiam ventriculus per medicamenta adstringentia roborandus, quorum vsu sæpe ita confirmatur, vt affluentes aliunde humores non facillè recipiat, vel eas ad alias partes, vel quod commodius est, extra corpus propellat. Vtilis est hic conferua rosar. item absinthium.

Extra verò inungatur ventriculus ol. ros. mastich. absinthij, foueatur decocto rosar. balaustior. absinthij, cum vino austero parato. Vel imponatur Cataplasma ex malo cydonio tocto, rosis, balaustis addito oleo rosar. & mastichino.

Purgatio valida, ubi materia aliunde affluit, omnino fugienda, ne materia ad ventriculum magis attrahatur.

#### Diata.

In cibo vtilis est ptisana. Cibi condiendi sunt succo citri vel granator. accidor, vnde ventriculus confirmatur & præcauetur, ne si fortè diutius in ventriculo detineantur, corruptantur. Vtile est & ius pullorum, in quo lactuca & endiuia cocta sint. Potus sit aqua hordei, vel cereuisia tenuis.

#### De Intemperie frigida & Humida cum pituita.

Intemperies ventriculi cum pituita, signa.

Ortum habet hæc Intemperies à causis refrigerantibus & humectantibus, cibisque pituitæ generandæ aptis.

Signa quod attinet, si cum Intemperie frigida humor frigidus crassus coniungatur, præter signa Intemperiei frigida supra recensita, grauitatis sensus in ventriculo percipitur; præcipue post cibum aliquot horis. Adest nausea, clidones & fluctuationes ad ventriculi regionem percipiuntur. Sentitur post pastum ad somnum propensio; Lingua albicat, ructus accidunt & sæpe acidi. Si pituita tenuis & aquosus humor in ventriculo continetur, salua multa effluit, & frequens est expitio sine tussi.

#### Prognosticum.

Intemperies hæc cum coctioni maximè obstat, satis noxia est, & sæpe difficulter curatur, præsertim si à Dan. Sennerti Tom. II.

partibus vicinis intemperies foueatur.

#### Curatio.

Curantur autem medicamentis calefacientibus & siccantibus ac pituitam euacuantibus. Itaque pituita vomitu primò eiicienda, post aluum lenientibus vtendum. Et quidem si pituita sit tenuis in ventriculo.

℥. Mellis rosar. solut. 3. ij. manna 3. j. decocti vel aquæ betonic. q. s. F. Haustus.

Si pituita sit crassior, oxymelite vomitus prouocari potest, cum decocto raphani.

Si æger ad vomitum pronus non sit, euacuetur melle ros. solut. pilul. ex hiera. Ad vomitum Chymici etià vtuntur sale vitrioli scrup. 3. ad Drach. 3. vel vitriolo albo in iusculo pingui vel cereuisia calida cum butyro exhibitis.

Si vero pituita crassa impacta sit, prius præparanda & alteranda, Syrupa de betonica, melle rosato colato, Syrupo acetoso simpl. oxymel. simpl. vel scillitico cum decoctis vel aquis betonic. mentha, calaminth, hyssopi.

Vel ℥. Mellis lb. j. aqua pura lb. iij.

Coqu. ad dimidiæ partis consumptionem & despuentur. post adde aqu. cinamom. 3. j. 3. Misce.

Vel ℥. Mellis rosati 3. ij. Syrupi de betonic. 3. j. Spiritus vitrioli gut. ix.

Misce. Exhibeatur cochlear. j.

Possunt etiam talia vsurpari forma conferuarum, electuorum ac rotularum, quæ diutius in ventriculo morantur. Galenus in ventriculo frigido valde commendat Diatrion pipereon, diacalaminth, diaspolition. Hieram picram.

Aqua, quæ ventriculo imbecilli vtilis est, eundemque à mucilaginosi humoribus adhærescentibus purgat, simulque cachexiæ medetur, & vermium generationem prohibet.

℥. Gentian. centaurij min. an 3. iij. galanga, cinamomi, macis, caryoph. an. Vnc. j. flor. salu. hyperici, roris marini an. M. 3. vini albi lb. iij.

Digerantur per octiduum, postea destillentur.

Vel vsurpetur hic puluis:

℥. Rad. acori veri, imperat. zedoaria an. Drach. j. centaur. minor. an. Drach. j. 3. zingiber. sem. carui an. Drach. 3.

F. Puluis.

Vel cum syrupo betonicæ & oxymelite simpl. redigantur in formam pilularum.

Præparata materia postea agarico, pilul. de hiera cum agarico, aloëphang. mastich. stomach. & similibus expurgetur.

Vel ℥. Aloes rosat. 3. 3. caryophyll. nucis mosch. an. 3. 3. Zinzib. 3. j. croci 3. 3. Cum syrupo vel aqua mentha.

F. Pilulæ.

Dosis 3. j. horis 2. ante cibum.

Imò purgantibus præparantia admisceri possunt vnâ operâ & quidem cum emolumento; cum partes, quarum functiones publicæ, continuo nouam p. n. affectæ congerant materiam, & vtile sit materiam præparatam statim euacuare.

Si pituita à capite vel aliunde ad ventriculum fluat, vt dictum, euacuanda, & curandum, ne pars illa amplius suggerat materiam, quod fit, si vitiosa illa dispositio in parte ea tollatur.

Nec roborantia omittenda, dandumque diacydoniū cum aromatibus, conferua mentha, beton. hyssopi, aqua cinamomi cum vino parata, & alia supra in Intemperie ventriculi frigida propofita, quibus pauca addeamus.

℥. Cinamom. 3. j. zingib. 3. 3. nuc. mosch. caryoph. rad. galang. an. 3. j. 3. piper. nigri 3. j. sacchari lb. j. vini mens. iij. F. Claretum.

℥. Zingib. 3. j. piperis 3. 3. nuc. mosch. 3. ij. cinamomi 3. j. sacchari ad pondus omnium. F. Puluis.

XXx 2

℥. Cinamomi

℥. Cinamomi ℥. ℔. zingib. ʒ. vi. nuc. moschat. maciā,  
cardamom. galang. caryophyll. an. ʒ. i. coriandri ʒ. i. sacch.  
℔. v. F. Tragea Aromatica.

℥. Culeb. ʒ. ii. zingib. Vnc. i. maciā, calami aroma-  
tici an. ʒ. i. sacch. ʒ. vi.

F. Tragea Stomachalis,

Vel talis pulvis post pastum sumatur;

℥. Semin. coriandri prepar. ʒ. ℔. nuc. mosch. maciā,  
caryophyll. zingib. an. ʒ. i. sem. carui ʒ. ℔. cinamom. ʒ. ii.  
rad. acori veri, galanga cortic. citri sic. an. ʒ. i. sacch. ros-  
fab. ad pondus omnium.

F. Pulvis,

Vel fiat tale Electuarium,

℥. Conseru. rosar. vitriolat. ʒ. i. maioran. betonic. an-  
thos. an. ʒ. i. ℔. zingib. in China conditi, cortic. citri condit.  
acori veri condit. an. ʒ. ℔. spec. arom. rosar. diagalang. an. ʒ.  
ij. Cum syrup. conseru. zinzib. F. Electuar.

Extra verò inungatur ventriculus oleis supra dictis,  
& de intemperie frigida propositis.

Vel ℥. Mastich. ʒ. vi. rad. cal. arom. galang. cyperi  
an. ʒ. ℔. bacc. lauri. nuc. mosch. caryophyll. an. ʒ. ii. menth.  
absinth. an. ʒ. i. ℔. vini maluatici ʒ. ii. ol. mastich. q. s.

Stent in loco calido aliquandiu, postea coeantur.

Vel ℥. Ol. nuc. mosch. express. ʒ. i. ol. destill. absinth. ca-  
ryophyll. menth. cinamom. an. gutt. vi. gallie mosch. ʒ. ℔.  
Misce.

Vel ℥. Rad. acori veri, galang. cyperi an. ʒ. ℔. caryo-  
phyll. menth. absinth. an. ʒ. ii. spic. Indic. rosar. rubrar. an.  
ʒ. i. ℔. mastich. ʒ. i. thuris, ladani an. ʒ. ℔. styrac. calamit.  
zacamahac. an. Drach. iii. ol. nardini, cera an. q. s.

F. Ceratum, quod extendatur supra alutam & illina-  
tur guttis aliquot olei caryophyllor.

℥. Ladani puri ʒ. iii. mastiches ʒ. ii. ligni aloes san-  
tali citrini galanga caryophyll. nuc. mosch. an. ʒ. i. ol. sto-  
machal. cera an. q. s. F. Scurum.

Vel ℥. Rad. acori, cyperi an. ʒ. ℔. absinth. menth. maior.  
flor. rosar. rubr. an. M. i. caryophyll. nuc. mosch. galang. an.  
Drach. ii.

Coqu. in vino pro Fomento.

Vel ℥. Caryophyll. nuc. mosch. an. ʒ. ii. cinamom. ʒ. j.  
absinth. menth. an. M. ℔. rosar. rubr. p. i. thuris, mastich. an.  
ʒ. iij. cortic. citri sic. ʒ. ij. alipte mosch. ʒ. j.

Qui insuatur facculo ex sindone rubra, qui vel sic-  
cus vel vino madidus aut maluatico ventriculo impo-  
natur,

### Dieta.

Dieta.

Alimenta sint natura calidiora, aut condiantur aro-  
matibus, Potus sit vinum generosum vel mulsum. Et  
omnino talis sit diæta, qualis supra in Intemperie ven-  
triculi frigida & humida proposita fuit.

De Intemperierum ventriculi curatione accurate, &  
prolixè agit Galenus, 7. meth. med. qui ibi videatur.

## De Tumoribus Ventriculi.

### CAPVT XI.

#### De Inflatione ventriculi.

Post Intemperies ventriculi merito agitur de Tumo-  
ribus eiusdem; cum intemperiei cum materia sæpe  
tumores accidunt. Augetur autem ventriculi magnitu-  
do cum vel distenditur saltem, etsi substantia reuera  
maior non fiat, vel dum substantia eius & magnitudo  
ac moles simul augetur, id quod fit in tumoribus pro-  
priè dictis. Primò dum à flatu in eius capacitate con-  
cluso ventriculi magnitudo augetur, dicitur Græcis  
Εμφύσησις & Εμφυσήματα, Latinis Ventriculi Inflatio  
seu tensio; Barbari etiam ventositatem stomachi no-  
minant. Aliàs vocabulum Εμφύσησις in genere de omni

spiritus flatulenti in spatiis quibuscunque collectione  
vsurpatur.

### Causa.

Prouenit autem flatus ventriculum distendens ab ef-  
ficiente & materia. Efficiens est calor ventriculi debilis,  
item calida ventriculo applicata, vel etiam assumpta,  
quæ crudum humorem vel cibum in flatum quidem  
resoluunt, sed dissipare non valent. Nam pura frigiditas  
flatus non generat, cum humores atque alimenta non  
attenuet nec discutiat. Fortis verò calor cum vi sua hu-  
mores & alimenta superet, & magis, quam pro flatu  
generando illa attenuet, flatus non generat, nisi ali-  
mentum aut humor aliquis in ventriculo per se flatuo-  
sus sit, aut copia excedat, ita vt à calore etiam sa-  
tis forti superari non possit. Calor enim vel sim-  
pliciter, imbecillus est, vel non simpliciter, sed vt  
ad materiam refertur. De quo Galenus, 3. de sympr. caus-  
fiscap. 2.

Itaque Inflationem ventriculi generare possunt,  
quæcunque calorem ventriculi debilitant, & coctionem  
imbecilliolem faciunt, de quibus suo loco dicitur, &  
quæ cibos ac humores in eo in flatum dissolunt. Et  
proinde ad causam efficientem etiam pertinent cibi &  
potus quidam, qui vim habent agendi in subiectam  
humiditatem, cuiusmodi est Allium, quod quamois  
sua natura flatus discutiendi vim habet, tamen, si in-  
cidat in materiam crudam & flatulentam, illam dis-  
solvit & hoc modo flatus excitar. Quæ ratione quan-  
doque etiam humores ad causam efficientem perti-  
nent, vt cum bilis in pituitam vel melancholiam vici-  
nam agit, eamque in flatum resoluit.

Flatibus verò materiam suppeditant cibi & potus  
naturæ suæ flatulenti, vt fabæ, lentesc, pisa, milium dacty-  
li virides, rapum crudum, lac, bulbi, mel crudum, ca-  
staneæ, mustum & cereuisia recens, item humores cru-  
di & flatulenti in ventriculo geniti, humor Melan-  
cholicus ventriculi fundo substratus, aut in eum effu-  
sus, vnde Melancholici quædam & ad hunc morbum  
procliuēs sunt.

### Signa Diagnostica.

Noscitur hoc malum ex tensione, quæ ventriculi re-  
gionem supra umbilicum infestat, ac tumore & resistē-  
tia tactus circa ventriculi regionem obuia, & quod vē-  
ter percussus sæpè quasi Tympani sonum edit; Imò &  
visu ferè inflatio cognoscitur, præcipuè cum æger sese  
erigit; aliquando etiam accedit distensio, quæ pectus  
& oppositas retrò dorsi partes occupat. Ructus edun-  
tur, flatus per aluum non emittuntur; quibusdam appe-  
titus delicitur: malum lenitur alimento ad fundum  
ventriculi descendente, & flatibus supra & infra ex-  
clusis.

An autem ex alimentis flatulentis malum ortum ha-  
beat, faciliè ex ægri relatione cognoscitur; an coctionis  
vitio id fiat, ex iis, quæ de debilitate coctionis ventri-  
culi eiusque causis & signis dicuntur, patebit. Et cum  
ex debilitate coctionis sit inflatio, si dentur cibi facili-  
coctionis in pauca quantitate, inflatio non ita mole-  
sta est. Remittit etiam inflatio, cum vsurpantur ea, quæ  
coctionem adiuvant. Inflatio quoque ex debilitate  
ventriculi diutius durat, quam quæ ex cibis; hæc  
enim cibis mutatis tollitur.

Vbi horum nil adfuerit, verisimile est, pituitosos hu-  
mores in ventriculo contineri, qui flatibus materiam  
suppeditant, & tum alia quoque signa pituitæ in ven-  
triculo aderunt, de quibus antea dictum. Quod si à  
materiâ feruida fundo ventriculi substrata, aut ab hu-  
more melancholico in ventriculum infuso inflatio fiat,  
istorum humorum & plerumque affectionis hypo-  
chondriacæ signa adsunt,

### Prognostica.

Ventriculi  
Inflatio.

*Prognostica.*

1. Quando inflatio accidit in ventriculo conualescentis, recidivam significat.
2. Inflatio ventriculi in febribus acutis & malignis mala, significatque nativum calorem à calore præternaturali absumi & dissipari.
3. Inflatio ventriculi si diu duret, in hydropem sicum terminatur.

*Indicationes.*

Flatus, qui ventriculum distendunt, tollendi ac discutendi sunt. Ne verò mox iterum reuertatur inflatio, causa, quæ flatus parit, tollenda. Et quidem si inflatio levis est, ac præcipue à causa primitiva proveniens, sola flatus discutientia sufficiunt; si autem magna sit inflatio, ea sola non sufficiunt, neque ab eorum vi curatio inchoanda: Nisi enim materia prius evacuetur, flatus discutientia seu intra seu extra adhibita materiam in flatus resolvunt, & inflationem augent.

*Curatio.*

Ergo si inflatio non sit magna, flatus discutientia intus & extra adhibeantur. Si verò materia multa adsit, unde flatus generantur, illa statim vel vomitu, vel alui deiectione expurgeretur. Si tamen crassa & viscida sit, prius præparetur. Quæ ratione autem materia præparanda & evacuanda sit, ex iis quæ antea de intemperie ventriculi cum materia dicta sunt, patet.

Flatus autem discutunt & dissolvunt, cucurbitula magna sine scarificatione cum flamma copiosa ventriculo apposita, galanga, radix Imperatoria, angelica, Zedoaria, gentiana, sem. anisi, fœniculi, carui, cumini, species diacymini, diagalanga, dianisi, diacalaminta, Galenus dat castoreum ex oxycrato seu posca, 11. de simpl. med. fac.

Efficax est etiam ol. carui gutt. iij. vel iiij. quantitate in iusculo vel vino exhibitum, & rotulæ ex eo paratæ.

Utiles sunt & aquæ viræ stomachales dictæ, item clareta seu vina Hippocratica:

℞. Sem. anisi, fœniculi, cerui, an. ʒ. ij, zingiber. cinnamomi, galanga, an. ʒ. j. caryophyll. macis, Zedoaria, cardamom. an. ʒ. j. sacch. albiss. ʒ. ʒ. B.

F. Pulvis, qui coctionem adiuvat & flatus dissipat.

Extra inungatur ventriculus oleo communi, in quo ruta, sem. cumini, apij, dauci, castoreum, bacca lauri, cocta sint, vel vsurpentur horum olea. Efficax est & oleum, quod.

Recipit baccar. lauri, ruta sicca, sem. cumini ammeos, nigella, pyrethri, costi, an. ʒ. ij. ladani, ʒ. B. ol. laur. rutac. an. ʒ. iij. vini malvatic. ʒ. iij.

Coqu. ad vini consumptionem & colentur, atque oleo isto ventriculus inungatur. Magnam etiã ad flatus discutendos vim habet emplastrum de baccis lauri. Possunt & sacculi sicci parari è milio solo, vel misto cū fursuribus, vel baccis lauri, sem. cumini, rutæ, flor. chamæmeli, calidæque vetriculo imponi. Vel Cataplasmata fiant ex farina sem. lini, cumino, origano, centauro minore, sem. anethi, fœniculi, baccis lauri cum oleo rutaceo, laurino. Vel panis à forno calens per medium scindatur, & medulla tota oleo communi vel rutaceo & melle calefacto, aut aquâ menthæ & rutæ perfundatur & calidus applicetur.

Antonius Beniuenius, de abdit. morb. & sanat. causis c. 40. refert, Adolescenti cuidam sedecim annorum cernicem ventriculi sine ullo doloris sensu ita à statibus eleuatam fuisse, ut magnitudinem pomi cydonij æquiparet, ita ut tumor ille & ossa in altū eleuauerit, quæ etiam talem situm retinuerint, nec ad pristinum statum

Dan. Sennerti Tom. II.

reuerfi figuram illam inpressam, tanquam naturalem seruauerint. Quod malum ille ferrea lamina, quæ ex circulo quoque surgebat ferreo, stomachum compimente sanauit.

*Dieta.*

Victus ratio sit attenuans & flatus discutiens, minime flatulenta: cibi sint boni succi, cocti faciles, quantitate exigui. Inflatione ventriculi & hypochondriorum laborantibus lac valde noxium est. Somnus solito sit longior, æger supra ventrem mollior interdu decumbat, Potus multus non conuenit, potusque sit vinum meracius, quod in parua quantitate haustum leuem inflammationem sanat. Efficacia sunt quoque Clareta & vina Hippocratica: alius aperta seruetur.

*Dieta.*

## CAPVT XII.

*De Inflammatione ventriculi.*

Cum verò ipsum corpus ventriculi intumescit, duplici causa id fieri potest, ab humore scilicet vel calido vel frigido; atque hinc oriuntur duo ventriculi tumorum genera, inflammatio & tumores frigidi; de quibus in specie agemus. Quædam tamen, quæ vtrique tumorum generi communia sunt, præmittemus.

Intumescit autem ventriculus vel secundum partem anteriorem vel posteriorem, superiorem vel inferiorem; dextram vel sinistram. Rarè verò totus ventriculus tumore corripitur.

Cognoscitur tumor ventriculi in genere ex læsa coctione ventriculi & sensu tensionis, interdum tumor tactu quoque & visu deprehenditur. Si tumor totum ventriculum occupat, quocunque etiam sita æger decumbat, dolore afficitur. Si parte externa, dolor post cibi coctionem magis intenditur, ob fibras transversas ibi intensas, quæ tensæ ad intestina expellunt. Appetitus sese melius habet, quam vbi interna tunica afficitur: ab assumpto cibo non ita grauatur, nil de abscessu vomitu eiicitur. Si interna parte, dolor sit intensior, dum cibus assumitur & coquitur; quia tenduntur ea parte fibræ rectæ, quæ attractioni ventriculi inferunt, & cibus ipse contactu suo internæ ventriculi tunicæ grauis est, & symptomata omnia sunt vehementia atque abscessu rupto pus vomitu vel per aluum eiicitur. Vtrum dextra vel sinistra ventriculi pars afficiatur, facile ex ægri relatione cognoscitur. Si superior pars afficitur, cum exquisito sensu sit prædita, grauissima accidunt symptomata, & angustia maximè sub finem deglutitionis, vbi attractio viger, percipitur. Affecta inferiore parte, dolor magis in cibi coctione intenditur: In anteriore ventriculi parte tumor tactu deprehenditur, atque æger compressionem eò loci non fert. Si posteriorem ventriculi partem, & quidem externam tunicam tumor occupat, æger grauiter decumbit supinus; Si internam, pronus. Cuius contrarium obseruatur in discernendis tunicis anteriore ventriculi parte dolente & tumente.

*Causæ.*

Prolixè equidem hîc nonnulli de causis agunt: verù sunt pleraque illa generalia, & quidem omnibus inflammationibus in quacunque parte conueniunt. Ideoque saltem, quæ huius loci propria sunt tractabimus.

Vt autem aliarum partium inflammationes, ita & ventriculi inflammatio oritur ex sanguine præter naturam in ventriculi tunicas, per venas per quas alitur, è porta

XXx 3

porta deriuatas effuso, ibique putrescente, & quidem à sanguine vel puro, vel cum bile, pituita aut melancholia mixto. Vnde etiam appellationes variantur. Mouetur verò & affluit, vt ex generali de inflammatione doctrina notum est, sanguis præter naturam ad ventriculum, vel quia attrahitur, quod fit à calore & dolore, concitatis siue à causis internis siue externis, vt cibo, potu, medicamentis calidis, aut percussione super ventriculum, fomentis & emplastris calidis corpore repleto adhibitis, cucurbita apposita, vomitu: Aut transmittitur à partibus robustioribus ad ventriculū debilem. Transmittitur autem vel à toto, quando illud plethora abundat, aut à parte aliqua.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Cognoscitur autem inflammatio ventriculi ex signis tumorum ventriculi in genere; Deinde in specie, quod dolor est vehementior, adest æstus, sitis inexplata, corporis iactatio, vigilæ & febris ardentissima coniungitur. Ingesta aut vomitu aut per aluum deiiciuntur; nisi cum forte eius orificium aut pylorus obsidetur: cum his, coarctatis nihil elabatur. Nonnunquam accedunt deliria cerebro in consensum tracto, vel etiam animi deliquia, corde consentiente. Et quidem illa symptomata mitiora sunt, si inflammatio à sanguine puro ortum habet; vehementiora, si bilis admisceatur; mitiora, si pituita.

Monet autem hîc Fernelius, de part. morb. & sympt. lib. 6. cap. 2. Inflammationi ventriculi affinem esse inflammationem, quæ vel summum iccoris lobum, quæ ventriculus obtegitur, vel incumbentem illi abdominis regionem occupat. Tumor n. prominens & circumscriptus cum dolore in ventriculi situ inest, & febris & sitis & aliarum notarum plurimæ, vt proinde vel experientissimos Medicos interdum fallat. Distinguitur autem solâ symptomatum vehementia & pernicio: quandoquidem in ventriculum omnium sæuissima incidunt.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Tumor omnis ventriculi, præcipuè inflammatio, morbus satis periculosus est; cum afficiatur pars, cuius functio toti corpori necessaria est, & quæ debilitata omnes totius corporis partes, alimento scilicet denegato, debilitari necesse est, quæque cor & cerebrum facile in consensum trahit. Imò in his, quibus vires sunt debiles, malum plerumque lethale est.

2. Abscessus, qui in ventriculum incidunt, meliores sunt, qui in tunicam eius internam abeunt, in quam plerique etiam sese aperiunt, mali verò, qui sub peritonæo. Galenus, de ineq. intemp. c. 3. Nam infusum in cavitatem ventriculi pus facile per intestina expurgatur; quod fieri non potest, si sub peritonæo colligatur.

3. Periculosus est tumor, qui vel totum ventriculum, vel partem eius superiorem occupat.

4. In inflammatione ventriculi si nausea ac conturbatio ventris plurima ac frequens fiat, vomatur verò nihil vel parum, id prauum est, non solum vt signum, ostendens vitiosum humorem ventriculo pertinaciter inharere, sed & vt causa continuæ vellicationibus ventriculum laceffens. Galenus, 3. Proorrh. t. 25.

5. Ventriculi, vt & hepatis inflammationi, si non recta cura adhibeatur, sequitur marasmus, non tamen prius, quam cor in consensum trahatur. Galenus, de diff. febr. cap. 9.

Nonnulli quidem ea etiam, quæ Hippocrates, lib. 1. Prognost. aph. 37. 40. & 41. habet, de tumoribus ventriculi explicant, verum si quis diligenter loca inspiciat & quæ antecedunt, diligenter perpendat, animaduertet, Hippocratem ibi non loqui de tumoribus ventriculi, sed tumoribus ventris, qui in musculis abdominis fiunt: siquidem tumores abdominis quidem, qui foras ape-

riuntur, boni sunt, non verò ventriculi, quos in cavitatem eius aperiri bonum esse ex Galeno modò dictum.

### Indicationes.

In Inflammatione ventriculi, vt in aliis partibus, materia, quæ affluit, auertenda, fluxusque eius inhibendus; quæ affluxit, & proxima tumoris causa est, tollenda. Affluxus inhibetur reuulsione ad contraria, ac ventriculi roboratione & materiæ repercussione. Euacuatur materia collecta vel sensibiliter vel insensibiliter, & quidē, (præter repulsionem materiæ nōdum impactæ & crassæ) vel insensibiliter per resolutionem & dissipationem impacta, & ad repercussionem inepta euacuatur; quæ si crassior sit, simul emollientia postulat; vel sensibiliter, dum in abscessum colligitur, eoque aperto tandem euacuatur. Quod vt facilius fiat, suppurantibus interdum, quando scilicet de dissectione desperamus, & maturantibus naturā adiuuanda, apertoque tandem abscessu vlcus deregendum & consolidandum. Interdum quoque accidit, vt si tumor in parte externa consistat, & puris copia magna sit, abscessus foris aperiendus sit. Intemperies coniuncta indicat alterans per contrarium.

### Curatio.

Itaque si vires adsint, statim vena aperienda: Sed nisi adsit magna plethora, sanguis paucus euacuandus; cum partis dignitas largam vnâ vice factam sanguinis euacuationem non ferat. Ideoque, si opus, repetenda potius venæsectio. Reuulsio quoque fieri potest cucurbitulis scarificatis & non scarificatis cruribus apposis, item frictionibus. Lenes quoque clysteres in aluum iniiciantur.

Purgatio verò seu per vomitum, seu per aluum initio (nam postea ad puris collecti eruptionem utilis est vomitus) non conuenit, ne humores ad locum affectum attrahat, & inflammationem augeat. Quia tamen excrementa quædam ab inflammatione in ventrem refudant (sicut in inflammationibus, quæ membrana teguntur tenuiore, accidere solet) ea per clysteres lenes aut pulpam cassiæ cum decocto prunorum ac tamarindorum, vel syrup. rosar. solutiuo, vel sero lactis exhibito abstergere & educere non inutile erit.

Statim verò post venæsectionem, dum materia fluit, aut dum fluctuat, & nondum impacta est, repellentia seu reprimentia vsurpanda, cum interna, tum externa.

Repellentia externa parantur de rosæ, santalis, balaustris, cortis, granator. cydoniis, myrtillis, portulacæ, corallis, bolo Armeno, sumach, succo limon. ol. rosar. cydon. myrt. mastich. cerot. santalino, vt:

℞. Carnis cydon. cocta Vnc. ʒ. pulu. rosar. rubrar. santali rubri, myrtill. balaustris. an. Drach. i. farina hordei. Vnc. ʒ. ol. cydonior. myrtin. an. q. s.

F. Cataplasma.

Vel ℞. Farin. hord. Vnc. j. rosar. rubr. ʒ. ʒ. santal. rubr. Drach. ii. boli Armeni, Drach. ʒ.

Coqu. in aqua purâ & addatur ol. ros. q. s.

F. Cataplasma.

Ob maiorem refrigerationem & penetrationem ali-quid aceti, succi cydonior. plantaginis, portulacæ, acetosæ addi potest, vt:

℞. Ol. cydon. rosar. an. Drach. vj. boli Armeni, balaustris. an. Drach. ʒ. camphoræ, ʒ. vi.

M. Fiat linimentum.

℞. Aqua rosar. lb. ʒ. succi cydon. ʒ. iij. santali rubri, albi, an. ʒ. iij. camph. ʒ. ʒ.

Fiat Epithema.

℞. Rosar. rubr. M. j. balaustris. P. j. santal. ʒ. iij. Coqu. in vino rubro austero pro fomento.

Internarepellentia saltem in primo principio conue-

Indicationes.

Curatio.  
Vena sedis.

Purgatio.

Repellentia.

Externa.

Internæ.



ueniunt, & sunt succus aut syrupus cydonior. granator. ribes, syrup. de ros. siccis, cerasorum, rob. ribes, mespilorum, sorborum, diacydonium, s. aromas. rosa rubra, santalum, corallum rubrum.

Præstat tamen succus vel decocta harum absque saccharo, quam syropos, & cum saccharo, aut certè saccharum parcius admiscere. Et quidem in exigua quantitate dentur medicamenta, vt diutius hæreant in ventriculo, sed sæpius. Itaque de succo aliquo conueniente Vnc. j. vel Vnc. ii. sæpius de die dentur, præsertim si ventriculi pars superior sit affecta, vt:

℞. Vini granator. succi ribes, an. Vnc. i. sem. syrup. acetosa, Vnc. j. aqua plantaginis, acetos. an. Vnc. iii. rosar. Vnc. i. Milce.

Et quidem in tali tumore medicamenta interna actu moderatè frigida exhibeantur, vt affluxus materiæ impediatur, nec tamen calor naturalis ventriculi labefactetur. Externa verò moderatè calida.

In Incremento verò morbi repellentibus pars aliqua resoluentium addenda, vt flor. chamamel. melilot. sem. lini, adeps anserin. ol. chamam. anethin. lil. alb. In statu medicamenta ex vtrisque pari portione mixtis vsurpanda, vel resoluentium dosis augenda, ne tamen careant adstringentibus.

Cum dolor vrget, anodyna etiam addantur. Ergo tum ventriculus inungatur adipe gallin. mixto cum ol. mastichin. & rosar. vel cum oleo rosar. absinth. liliorumque albor. vel omentum castrati calefactum imponatur cum ol. rosar. aut pulu rosar.

Vel ℞. Flor. rosar. M. j. sem. coriandr. Drach. j. lini, alth. an. Vnc. sem. flor. chamamel. P. ij. absinth. P. i.

Coqu. in vino rubro pro fomento.

Vel ℞. Farin. sem. lini, Drach. ii. hordei, Vnc. sem. pulu. rosar. rubr. flor. chamamel. an. Drach. ii.

Coqu. & cum ol. ros. & chamamel.

F. Cataplasma, cui etiam camphor. Drach. sem. adde- re licet.

Vel inungatur ventriculus ol. ros. absinth. & chamamel. cum spica nardi & pauxillo croci.

Vel ℞. Flor. chamamel. meliloti. rosar. rubr. an. M. j.

Coqu. in vino pro fomento.

Vel ℞. Farin. hord. sem. lini, an. Vnc. i. rosar. Drach. ii. mastich. Diach. i. absinth. Drach. sem. ol. mastich. absinthij q. s.

F. Cataplasma.

Vel ℞. Farin. hord. fœnugraci, sem. lini, an. Vnc. ii. pulu. absinth. Vnc. i. flor. chamamel. rosar. rubr. an. Vnc. sem.

Cum succo apij & ol. chamamel.

F. Cataplasma.

Hoc etiam Cataplasma vsque ad declinationem ferè locum habet.

℞. Pulu. rad. alth. flor. chamamel. absinthij, meliloti, ana Vnc. i. santal. alb. Drach. ii. croci, Scrup. i. ol. chamamel. ros. an. q. s.

F. Cataplasma, vel additè cerà Emplastrum.

Intra corpus verò exhiberi potest aqua vel decoctum absinthij cum trochiscis de ros. Si dolor vehementer vrget, dandus syrupus de papauere Vnc. j. vel Vnc. ii. pondere.

Post statum ferè solis resoluentibus vtendum, ali- quibus tamen adstringentibus ob partis præstantiam additis, & quidem resoluentibus lenibus, quæ ferè emollientia sunt, & calorem tepidum habent, atque humiditatem mediocrem, quâ ratione materiam fundunt & resoluunt insensibiliter. Eiusmodi sunt medul- la cerui, adeps gallinac. anserinus, taurinus. Herbx emol- lientes, malua, althæa, melilorus, fœnugracum & similia. Passula maiores, carica, semen lini. Gummi emollientia, vt bdellium, styrax calamita, ammoniacum, emplastrum diachylon simplex: Quibus tamen, ne nimia fiat relaxa- tio, oleum absinth. mastichin. vel mastiche admiscea- tur, vel ol. rosaceum, si calor maior sit, vt:

℞. Medulla crurum viuli, adip. anser. an. Drach. iii.

ammoniac. bdellij, an. Scrup. ii. mucilagin. sem. althæa, lini, an. Drach. j. sem. mastich. Drach. j. ol. chamamel. q. s.

F. Linimentum.

Applicentur autem hæc actu calida, vt concreta ma- teria facilius fudatur ac dissipetur.

Intra corpus verò exhibeatur decoctum caricarum, passular. glycyrrhizæ, malua, althæa, emulsio amygd. dulc.

Si verò (quod tamen commodius esset) inflamma- tionis suppuratio prohiberi nequeat, id quod ex dolo- ris intentione, tumoris incremento, ac febris augmen- to cognoscitur, adiuuanda est, fouendo calorem natura- lem partis. Pro calore autem foliando vtendum mode- ratè calidis, humidis, viscidis, calorem naturalem intro concludentibus.

Extra applicanda medicamenta parari possunt ex farina tritici sine fursuribus (nam fursures abstergunt) caricis pinguibus, dactylis, althæa, malua, ol. commun. amygdal. dulc. butyro, pingued. gallin. Porci. medull. vitu- lin. & similibus.

℞. Rad. althæa sub cineribus coctar. adipis porcin. ana Vnc. sem. farina tritici, Drach. vi. ol. amygd. dulc. q. s.

F. Cataplasma.

Vtile etiam hic est emplastrum diachylon simplex.

Interna sunt ex amygdal. dulc. syrupo de glycyrrh. de- cocto caricarum, passular. quæ sensim parua quantitate deglutienda præbeantur.

℞. Caricar. pinguium, dactylor. an. Vnc. sem. Emulsion. amygdal. dulc. sapa, an. Drach. vi. M. dosis à Drach. ii. ad Vnc. i.

Vel ℞. Passul. major. exacinat. sebesten, an. Vnc. i. sem. althæa, glycyrrh. an. Drach. ii. dactylor. num. iv. Coqu.

Pure genito, danda opera, vt quamprimum abscessus rumpatur. Cognoscitur autem maturum apostema ex doloris remissione, diminutione duritiei in loco tumi- do & mollitie tumoris tactui cedentis.

Exhibenda ergo tunc sunt medicamenta, quæ atte- nuant & laxant quasi abscessus parietes, vt egressus pu- ri facilius concedatur, vt:

℞. Caricar. pinguium, num. iii. passul. Vnc. sem. gly- cyrrh. rasa, Drach. iii. capill. veneris, malua. an. M. j.

Coqu. in suffic. quant. hydromelitis, ad tertias vel Vnc. vij.

Adde rad. ireos Drach. sem. piperis, Scrup. sem.

Detur actu calidum.

Vtile etiam est lac recens mulsum exhibere, nisi alia prohibeant. Inprimis verò commendatur succus sca- biozæ vel solus vel cum melle datus, quæ omnia inter- na apostemata vel resoluit, vel maturat vel rumpit.

Extra etiam applicatur cataplasma ex ficibus, fœnu- græco, & similibus.

Vel ℞. Sem. fœnugrac. Vnc. iii. fermenti, Vnc. i. sterco- ris columbini, Vnc. sem. ol. chamamel. Vnc. ii. mellis, Vnc. i.

F. Cataplasma.

Post sumpta verò medicamenta vt abscessus facilius rumpatur, fiat corporis agitatio, vel tussis, sternutatio, aut vomitus etiam, si opus sit, concitetur.

Rupto abscessu nulla propinetur, cum syrupo rosar. solutiu. aut melle ros. vel viol. aut decoctum hordei cum melle ros. vel hydromel, cui aliquid mannæ thu- ris, addi potest, & quidem sæpius parua, cochlearis vi- delicet, quantitate, vt materia purulenta abstergatur, & per aluum expurgetur.

Tandem vlcus consolidandum & conglutinandum est. Extra nimitum imponatur emplastrum, quod Ga- lenus ex Heraclide, 2. de comp. med. sec. gen. c. 7. describit.

℞. Litharg. ceruss. an. Drach. x. cera, Drach. iii. resin. arid. Drach. vi. gummi ammoniaci, Drach. v. galban. Scru. iiii. ol. veteris, Vnc. ij.

Coq. F. emplastrum, quod calidum ventriculo im- ponatur.

Intus fumatur decoctum agrimonizæ cum vi- no.

Vel ℞. Thuris, Drach. ii. mastich. Vnc. sem. mumia,



Postea danda opera, vt Apostema maturum rumpatur, ruptum abstergatur, & vlcus consolidetur, vt in inflammatione dictum.

Ad hoc caput pertinet & historia illa, quam Fernellius, lib. 6. *Pathol. c. 1.* recenset, de muliere quadam gruida, cui duro tuberculo os ventriculi obturabatur, vt quicquid indebatur, attracto oris ventriculo mox remeasset, atque repelleretur. Sic astantium omnium iudicio, nil cibi potusque bimestri vel conatu maximo vorauit. Tandem morbo febreque consumpta discessit, edito partu, quem vitæ superstitem reliquit. Vt & alia, quam refert Volcherus Cojater, in *observ. anat. & chirurg.* de muliere quadam Noribergensi, quæ toto octennio quasi clauum vel globulum orificio ventriculi infixum sensit, & summa difficultate deglutiendi laborauit, similique morbo & patrem & sorores & alios cognatos occubuisse affirmavit. Quæ tandem cum nutrimento destituta atque ad extremam maciem deducta exincta esset, aperto corpore in orificio ventriculi scirrhus pugni magnitudinem excedens substantiæ gulæ innatus repertus est.

#### CAPVT XIV.

De Extenuatione, angustia, adstrictione, & situ mutato ventriculi.

**T**ymoribus ventriculi contrarium malum est Extenuatio eius. Nam corpus ventriculi suam conuenientem crassitiam habere debet, quæ non parum ad coctionem bene perficiendam facit. Hinc videmus animalia, quæ durissimos cibos concoquunt, crassum habere ventriculum, imò auius, quæ lapillos etiam deuorant, & parenchymate crassiore ventriculum constare. Habet ergo & hominis ventriculus sibi conuenientem crassitiam, quæ si mutetur, etiam coctio læditur; id quod præcipue fit in crapulâ, vbi ventriculus cibo & potu nimis extenditur, eiusque tunica hoc modo extenuatur, & debitam crassitiam amittunt. Quod si sæpius fit, malum immedicabile oritur, & ventriculus se iterum contrahere nequit, ac tunica eius ita distenta manent, vnde debilitas coctionis & perpetua fluctuatio in ventriculo sequitur. Sanitatis itaque studiosus cauere debet, ne in iuuentute hunc morbum contrahat, qui postea toto vitæ tempore emendari non possit.

Secundo etiam ventriculus suam naturalem magnitudinem, conformationem & capacitatem habeat necesse est, vt cibis & potui capiendos sufficiat; hæc si mutetur, morbosa est, & quidem angustia illa primò est naturalis aliquando, sicut Galenus, *art. med. cap. 87.* de quodam scribit, qui ventriculum paruum simul atque rotundum, atque aduersus septum transversum habuit incumbentem, in quo magnitudo & conformatio ac situs erant deprauata, temperamentum quoque frigidum existerat. Hic nullo artificio ad habitum naturalem transferri potuit: At ne adeo infestaretur, Galenus hoc consilij dedit. Nam quoniam repleto ventriculo spirandi difficultatem patiebatur, minus cibi, & magis alimento opportuni, & qui non difficulter coquebatur, ter de die assumebat. Similem morbum obseruauit Forestus, lib. 18. *observ. 34.* in puella quadam Delphensi, quæ perpetuò malè habebat in ventriculo ob naturalem eius angustiam, quod ex eo coniecit, quod cibo distentus ventriculus lædebatur, exhibito verò exiguo cibo minus offendebar. Quod malum quia etiam incurabile fuit, Galenum secutus id consilij dedit, vt parum semel & frequenter comederet.

Deinde interdum contrahitur ventriculi angustia à diuturna inedia, vbi ventriculus diu à cibo non distentus quasi contractus manet, & angustior redditur, vt si postea paulò plus cibi sumatur, statim offendatur. Hi igitur non statim ad consuetam cibi quantitatem

sumendam post inediam longam transire debent, sed parum cibi & sæpius sumere, vt ita ventriculus sensim iterum distendatur.

Tertiò hoc loco etiam facienda est mentio affectus cuiusdam, quem Petr. Sal. Diuersus, de affectibus, particul. cap. 70. adstrictionem ventriculi nominat, fierique putat, quando os ventriculi ita adstrictum est, vt nec flatus, nec vapores extra possint erumpere, nihilque etiam extracorpore ob curis adstrictionem vel exiccationem erumpere queat, solumque Aërium, *terrabil. 4. serm. 1. cap. 13.* hunc affectum descripsisse putat. Verum cum mihi nil aliud videatur hic affectus, quam dolor aliquis ventriculi è cruditate ortus, quem describit Galenus, de præcognitione ad Posthumum c. 11. dicam de eo affectu infra, c. de dolore ventriculi.

Quartò etiam situs ventriculi aliquando mutatur, etsi rarius, ita vñ modò dictum ex Galeno, qui *art. med. cap. 87.* cuiusdam mentionem facit, cui ventriculus nimis, quam par erat, diaphragmati incumberebat. Notabilis verò est historia, quam annorauit focer meus, D. Andreas Schato p. m. cuiusdam studiosi, cui, cum in Melancholia diaphragma & thoracem gladio sibi perforasset, ita situs ventriculi mutatus est, vt per diaphragma in sinistram thoracis partem ascenderit, & cor cū capsula sua à sede sua in dextrum latus depulerit, quam *Instit. lib. 2. part. 2. cap. 13.* recensui.

#### CAPVT XV.

De Rebus præter naturam variis in Ventriculo reperiis.

**D**isputatur equidem, vt de morbis numeri in *Instit. di. dictum*, an res præter naturam alicubi in corpore contentæ morbos numeri constituent, verum disputatione illa hoc loco omiſſa hic non incommode recenseri posse videntur res variæ præter naturam in ventriculo contentæ, Nam naturaliter nil nisi cibus & potus, ac inde generatus chylus in ventriculo contineri debet: Si verò præter naturam in eo quid contineatur, præternaturalis dispositio in eo inde oritur. Obseruatur verò sæpe multa præter naturam in eo reperiri aliquando, & sæpe etiam vomitu reiici. Et quidem alia per os & œsophagum in ventriculum delabuntur, & extrinsecus subeunt; alia in eo generantur, aut quocunque modo producuntur; alia etiam in eum ex inferioribus ascendunt.

Primò enim compertum est, acus, nummos, globulos plumbeos, clauos, mucrones gladiatorum & cultorum, gemmas, metalla & alia deglutita fuisse, quorum historias varias collegit Schenckius, lib. 3. *observ. 2. 3. 4. & seqq.* quarum etiam aliquot supra in fine cap. 2. recensuimus. Deinde quoque serpentes, lacertos, aliaque animacula per os incautis in ventriculum irrepsisse obseruatum est. Idque obseruauit Hippocrates, lib. 5. *Epidemior.* Petrus Apponensis Conciliator dictus, *differt. 107.* Sauonorola, *tractat. 6. cap. 7. rubrica 4.* Cardanus de causis signis & locis morborum parte 3. num. 122. Tragus de historia stirpium lib. 2. c. 114. Antonius Mizaldus, *memorabilium centur. 8. aph. 76.* Gattinaria in *notum Rhasis ad caput de præfocatione matricis*, & ex eo Matthiolus, in *Dioscoridem l. 2. c. 42.* Omnibonus Ferrarius, lib. 2. de *art. med. infantium c. 9.* Muscam etiam ore hiantem in ventriculi cavitatem penetrasse, & die sequenti per vrinam excretam fuisse refert Marcellus Donatus, de *historia medicâ mirabili lib. 1. c. 12.*

Secundo varia & monstrosa etiam sæpe in ventriculo genita, aut quocunque modo producta & vomitu reiecta fuisse obseruatum est. Frustum carneum magnū album, albuminis oui instar vomitu reiectum fuisse à puella moniali refert Forestus, lib. 18. *observ. 19.* in *Schol. lia.* Idem obseruauit. Thomas à Vega, ad c. 5. lib. 1. *Gal.*

Adstrictio ventriculi

Situs ventriculi mutatus

Res p. n. in ventriculo reperiæ

Res deglutitæ & in ventriculo illapsæ

Res varia p. n. in ventriculo genita.

de hoc. affect. Globum pituitosum carniformem, in quo vermiculus brucho similis conclusus fuit reiectum fuisse refert Beniuenius, *de abdit. morb. & sanati. causis. cap. 88.* Et Hieronymus Gabucinus, *de lumbr. c. 18.* Vermes quoque è ventriculo vomitu reiectos à plurimis Medicis etiam obseruatum. Gabucinus *loco citato*, & Antonius Beniuenius, *c. 77.* Et Scholiographus Hollerij *ad cap. 54. lib. 1.* Ambros. Paræus vermes Erucis similes vomitu reiectos vidit *lib. 2. cap. 19. vt & Forestus, lib. 18. obs. 19. & in schol.* Præterea ranas, bufones & alia animalia vel ex haustis eorum seminibus, vel interna putredine in ventriculo genita fuisse, & vomita reiecta obseruatum, collegitque eius rei historias aliquammultas Schenckius, *lib. 3. obseru. 29.* Lapidis etiam oui gallinaei magnitudine ibidem generati historiam idem habet, *eodem lib. obseru. 9.*

Capillorū veluti glomos vomitu reiectos fuisse refert Monardes, *lib. 3. de histor. simpl. medicam. ex nouo orbe alator. c. 73. de verbera*; & Carolus Clusius, *in annotat. in eū locū.* Imò pannum, claues, ferramenta vomitu reiecta scribit Forestus, *lib. 18. obs. 26. in schol.* Et Iohann. Langius, *lib. 2. Epist. 38.* narrat rusticum quendam, cum crudelibus doloribus in ventre cōficeretur, subito clauū ferreū sub illa cute manu apprehendisse, & licet chirurgus eū excinderet, tamen dolores non cessasse, inde doloris vehementia adactum, sibi ipsi cultro guttur abscidisse. Cadauere aperto in ventriculo repertū est lignū æres & oblongum, quatuor ex chalybe cultri, partim acuti, partim instar ferræ dentati, ac duo ferramenta aspera, quoramsingula spithamam longitudine excedebant, & præterea globus capillorum conuolutus, vt mirandum fuerit, quomodo omnia in ventriculo contineri potuerint.

Tandem vermes, qui in ventriculo reperiuntur vel ex eo vomitu reiciuntur, non omnes in ventriculo generantur, sed sæpè ex intestinis ascendunt. Præterea clysteres & glandes & alui excrementa ad ventriculum prouenisse ac vomitu reiecta fuisse refert Iul. Alexandrinus, *in comment. ad cap. 17. lib. 13. Method. med. Galeni*, Antonius Guenerius, *cap. 2. tr. 5.* Valleriola, *in comment. ad cap. 2. lib. 6. de causis symptom.* Et clysterem vomitu reiectum ipse etiam vidi.

Et res quidem Externæ inanimatæ in ventriculum illapsæ si sint, patet id ex ægri relatione. Eæque, si parue & non acutæ sint, facillè per aluum reiciuntur; interdū post breue, interdum post longum interuallum: Et quidem plerumque sine damno. Res verò magnæ aut acutæ plus periculi coniunctum habent, & interdum perforato ventriculo aut intestinis & abdomine post longa interualla sæpè egrediuntur. Quædam cum vrina excernuntur, aculque deglutitas per vrinam exiisse obseruatum est. Interdum in corpore hærent, præcipuè si sint metallica, quæ rubiginem contrahunt, ac lentæ tabis & tandem mortis causa sunt.

Quæcunque autem sint talia deglutita, vt facilius per aluum descendant, exhibenda, quæ vias lubricas reddunt, decoctum scilicet maluæ, althææ, femin. lini, oleum commune & amygdalarum dulcium, iuscula pingua, cereuisia cum multo butyro; postea, si opus, etiam purgantia.

Et vt facilius, & minus impeditè ex ventriculo per Pylorum in intestina res deglutitæ possint descendere, æger in dextrum latus libero ventre, non compresso decumbat; Vbi è ventriculo ad intestina rem deglutitam iam transiisse suspicio est, æger, sed corpore erecto & moderatè obambulet, vt facilius per intestina exeat.

Notabilis, sed certa est historia, quæ Pragæ anno 1602. accidit. Rusticus quidam Matthæus nomine, cū cultrum nouem digitos transuersos longum deglutiuisset, is in ventriculo subsistens maximos ei dolores concitauit: postea hoc consilij inuentum; Magnes & alia attrahentia medicamenta ventriculi regioni sunt

apposita: ita factum, vt conspis ventriculi circa superius os ventriculi eminere cœperit, tandemque in re aliàs desperatâ ad sectionem ventum est, & à chirurgo culter ille, qui septimanas septem & duos dies in ventriculo hæserat, & colorem, qualem ferrum post ignitionem acquirit, contraxerat, extractus & vulnus idoneis medicamentis consolidatum est, ægerque viuus euasit.

Cum autem acus deglutitas per vrinas redditas fuisse interdum obseruatum sit, per quam viam id factum fuerit, dubitatur. Alex. Benedict. *lib. 2. anat. c. 9. & lib. 5. cap. 13.* Dum refert historiam virginis Venetæ, quæ crinalem acum quatuor digitos longam per somnum deglutiuit, & per vrinam post decem menses reddidit maximis cruciatibus; quoniam in vesica collectis mucosis humoribus lapis oui gallinaei magnitudine circa illam concreuerat, statuit, acum acie suâ paulatim multoque tempore intestina penetrasse, viamque sibi fecisse in vesicam, qua parte carnosa est, atque inde per vrinam redditam fuisse: eosque reprehendit, qui vias patentes quærunt, & per venarum mesaraicarum orificia inter intestina in viuentibus plus quam in cadauere patentia ad mesaraicas & hinc ad hepar, & porro per venam cauam ad venas emulgentes, atque inde ad renes, & tandem ad vesicam peruenisse arbitrantur. Verum enim verò omnino certum est, quod orificia vasorum in corpore viuentis magis hiant, quam in cadaueribus, vt vel ex vteribus, & vesica patet, in quibus è renibus calculi sæpè satis grandes excipiuntur, per eas vias, quæ in vesica postea in cadauere nec oculis patent. Quod autem ad acum illam quatuor digitos longam per vesicam redditam, longitudo equidem alicui dubium mouere posset; contrâ tamen breuitatem tempore ad vesicam peruenisse, & ibi diu hæsisse illud arguit, quod calculus tam grandis circa eam concreuerit, quod breui tempore non factum. Et cruciatus illi, quos mulier passa est in excernendo calculo, potius ab eius magnitudine, quâ ab acu prouenerunt. Aliàs verò compertum est, exiguo satis temporis spatio, etiam illæsis aliis partibus, acus deglutitas cum vrina redditas fuisse. Quod etiam illud confirmat, quod Marcellus Donatus, *de historia medica mirabil. lib. 2. cap. 12.* refert, cuidam mulcam magnam ore hiantem ad ventriculum peruenisse, & die sequenti ab ingressu cum vrina excretam fuisse: quæ certè non perforatis intestinis, sed per patentes vias eò deuenit. Et quidem si per venas mesaraicas ac venam portæ ad hepar & hinc ad venam cauam, postea ad emulgentes, hinc ad renes, vteret, tandemque ad vesicam acus istas peruenisse aliquis statuatur, cum eo non pugnabo.

Viam autem adhuc breuiorem posse dari mihi videtur. Videmus enim eos, qui multum bibunt, vix hausto potu aqueam potus partem rursus emingere; quod fieri vix posset, potu ad intestina transmissio, & à venis mesaraicis attractio, sed probabilius est id fieri immediatè à ventriculo per vasa gastrica, & breue inprimis, potu ad lienem attracto, & hinc per arterias, quæ in liene sunt, ad arterias emulgentes transmissio. Itaque etiâ credibile est, acus per eandem viam, vtpote breuiorem, ad renes & hinc ad vesicam transmissas fuisse.

Quapropter in tali casu si non per aluum acus vel aliæ res deglutitæ exeant, naturæ eorum negotium committendum est, quæ tandem sibi vias idoneas quærunt, interdum per vrinam, interdum per abscessum foras apertum.

Si viuum aliquod animal in ventriculum irreperit, quod cognoscitur è morsu & motu eò loci, præsertim ante cibum, & quod homo in loco, vbi talia animalia degunt, dormiuit, ac quod lacte & similibus dulcibus assumptis, animal quiescit, amaris verò assumptis irritatur & mouetur, plerique suadent, vt lac repidū ori apponatur, vapor eius hiantem ore excipiantur,

Res externa  
deglutita  
quid periculi  
offerant.

Res externa  
deglutita  
quomodo à  
corpore ex-  
turbanda.

Cultri deglutiti è ventriculo extracti historia.

Acus deglutita è corpore per quam viam redditam?

Animalia quæ in ventriculo irreperunt, quomodo exturbanda.



ut eius suauitate allecta fera egrediatur. Et quidem obseruatum est hoc modo tales feras è ventriculo proleatas fuisse. Quia verò interdum etiam accidit, ut hoc modo allecta talia animalia per Oesophagum ad os ascendant, sed non planè egrediantur, necessarium est, ut in procinctu stet Chirurgus idoneis instrumentis instructus, qui proserpentem feram apprehendat & extrahat. Si verò hoc modo per os elici fera non potest, danda opera, ut per alium exeat, atque hoc modo fumo ex coriis seu veteramenti accensis ore per infundibulum, haustum per alium expulsum fuisse serpentem testatur Marcus Gattinaria, ad nonum Rhassisi in cap. de praefocatione matricis; Et Hieronymus Tragus, de stirp. lib. 2. cap. 114. Cardui benedicti aqua hausta serpentem, qui dormienti per os irreperat, per inferiora secessisse. Vitale etiam est lac copiosè bibere & postea vomere.

Animalia in  
ventriculo  
genita ut  
curbunda.

Res verò in ventriculo genitæ præter naturam difficulter & vix, nisi reiiciantur, cognoscuntur. Et quidem bufones, ranæ, & lacertæ in ventriculo interdum generantur ex spermato earum cum aqua hausto. Vermes verò eodem modo ut in intestinis etiam generatos fuisse compertum est. Ad talia animalia abigenda vtilissimum est dictamnium Creticum Drach. j. pondere cum aqua gentianæ sumptum, præsertim si zedearia aut citri semen puluerisatū addatur. Omne enim talium vermium genus abigere compertum est. Decocto etiam ex centaur. minor. & carduibened. præparato hausto plures ranas vomitu redditas fuisse, obseruatum est. Theriaca quoque cum spiritus vini quartario hausta serpentem viuum longitudine vlnæ vomitu reiectum fuisse item obseruatum: Ut & animal lacertæ figura antimonio sumptò vomitu reiectum fuisse. Vitale est etiam in talibus casibus clysteres ex lacte singulis diebus pene iniicere; exhibere verò per os antidotos theriacales & interdum purgantia.

Vermes in ventriculo geniti expellendi sunt medicamentis, quæ suo loco de lumbricis proponuntur. Præstant idè etià pleraque ex iis, quæ modò sunt proposita.

Lapides in  
ventriculo  
geniti.

Lapides in ventriculo geniti equidem grauissimos dolores in ventriculo excitant, sed vix signa clara, quibus ab aliis perfectè cognoscantur, habent, nisi diuturnitatem doloris. Nonnunquam vomitu reiiciuntur: quod nisi fiat, diuturnitatem tandem cruciatibus hominem iugulant.

Pili in ventri-  
culo geniti.

Pituitosum quid concretum, imò pilos etiam in ventriculo generari non impossibile est. Solet enim natura nunquam otiosa esse, sed semper laborare, ut in subiectam materiam formam aliquam, quamcunque etiam, inducat. Si verò pannus, clauis, cultri, ferramenta & alia artificialia vomitu reiiciantur, cum nullà vi naturali in ventriculo produci possint: meritò ad dæmonis ludibria & præstigias talia referuntur.

Clysteres & glandes si vomitu reiiciantur, fit id à motu Intestinorum inuerso, de quo postea suo loco, part. 2. sect. 2. c. 1. dicetur.

## CAPVT XVI.

### De Vulneribus ventriculi.

#### Signa Diagnostica.

Signa vuln-  
erum ventriculi.

SI abdomen vulneratum sit, & quidem è regione ventriculi vulnere profundiore, ventriculum etiam vulneratum esse suspicio est; quæ confirmatur, si singultus & bilis vomitus insequitur, aut cibus potusque assumptus vomitu reiicitur. Ventriculus etiam vulneratus nec appetere, cibum nec continere, nec coque- re rectè potest. Interdum crudus cibus & potus; interdum chylus per vulnus emittitur; sputum est sanguineum; & dolor etiam in ventriculo percipitur. Si superior pars ventriculi vulnerata sit, & accedat in-

flammatio, febris, delirium, syncope, & alia mala accedunt.

#### Prognosticum.

Si ventriculus vulneretur ac perforetur, equidem id lethale esse dicit Hippocrates, 6. aph. 18.

Verum non simpliciter & ex necessitate ventriculi vulnera lethalia sunt, sed id plerumque ita accidit. Quandoque ventriculi vulnera sanata fuerunt, ut docet Galenus, in dict. aph. & de loc. aff. c. 5. & postea etiam dicitur. Perpendendum igitur, quale vulnus sit, an scilicet totus ventriculus perforatus sit, an verò aliqua eius tunica saltem; an circa fundum; an verò circa orificium superius. Etenim si totum corpus ventriculi sit perforatum, periculosum & lethale plerumque malum est; cum ventriculus membranofus sit, & primæ coctionis summopere necessariæ officina: Si verò eius exterior saltem tunica vulnerata sit, non desperandum. Si etiam ventriculus in fundo vulneretur, vulnus id aliquando curatur; cum pars illa carnosæ sit, & medicamenta eò loci subsistere possint. Si verò superior ventriculi pars circa orificium superius vulneratur, exigua sanitatis recuperandæ spes est, cum pars ea sit exquisito sensu prædita, & medicamenta ibi non hæreant, ac præterea cibus & medicamenta transeuntia dolorem excitent.

Verum etiam desperata planè ventriculi vulnera aliquando præter spem sanata fuisse obseruatum est. Ita Iulius Alexandrinus, in cap. lib. 6. therapent. meth. Gale- ni, refert, Bohemo cuidam rustico vulnus, & quidem latum, ac venabulo, ut Matthias Cornax narrat, in ventriculo inflictum fuisse, ac cœpisse rusticum per id cibum reiectare, & cum vulnus, ut desperatum, negligentius haberetur, occaluisse tandem vulneris labia, & per ea semper cibi partem exiisse; Rusticumque huic vitæ conditioni relictum vulnus tandem linteis pannis texisse, ac fasciis obligasse, atque ita annos aliquot vitâ produxisse. Et capite precedente retulimus historiâ alterius rustici Bohemi, cui culter in ventriculum per oesophagum delapsus extractus est, qui nihilominus vulnere cōsolidato superuixit. Testatur similiter Christoph. à Vega, ad aph. 18. lib. 6. Hippocrat. quendam sanatum fuisse, cui è ventriculo vulnerato chylus exierat, & Fallopius, de vulneribus capitis, c. 12. narrat, se sanasse mulierem & virum, qui in ventriculo fuerunt vulnerati, ut chylus egrederetur.

Vulnus ven-  
triculi rohi-  
tū viuente  
homine.

Historia Ru-  
fici Bohemi  
cultri vtra-  
ci.

#### Curatio.

Et si plerique censent, Naturæ tum negotium esse committendum, & reuera etiam naturæ potissimæ in hisce, ut & aliis vulneribus curandis, partes sint, quæ interdum etiam id præstat, quod penè impossibile videbatur; tamen à medico hac in re quantum fieri potest, adiuuanda est.

Si ergo confluxus sanguinis ad ventriculum & inflammatio metuatur, primò vena aperienda est, si eam vires ferant: Si verò adsit cacoehymia, exhibere per os quidem purgantia non licet, ne ad locum affectum humores viciosi truantur, sed clystere aliis eluenda est.

Vulnus verò ipsum quod attinet, si id non sit penetrans, naturæ negotium committatur. Si verò vulnus penetrat, & amplum sit, consueundum abdomen, inferiore tamen parte orificium relinquendum, ut pus effluere possit, ac turunda immittenda, quæ quidem ventriculum non ingrediatur, extra tamen eius vulnus tangat conueniente vnguento illita, quale est & hoc:

℞. Ol. abietin. Vnc. j. mastich. Vnc. ij. manna thuris, Drach. ij. rad. tormentill. consolid. maioris, an. Drach. j. lumbricor. terrestr. num. v. croci ℞. j. vini albi austeri. Vnc. ij.

Coqu.

Coqu. ad vini consumptionem.

F. Linimentum.

Vel ex terebinthina cum oleo hyperici & vitello oui vnius mista fiat linimentum.

Ore verò sumenda exhibeantur *Syrupus myrtinus, de rosis siccis, cum decocto equiseti, pilosella & radic. consolidida*, quibus addere licet *trochiscus de terra sigillata, de carabe. Mastiche* verò hîc omnibus modis sumpta utilis est.

Vel sumat æger sæpe aliquid *conseru. rosar. rubrar. diacydon. sine speciebus, aut diatragacanthum frigidum.*

Extra verò abdomen inungatur ol. rosaceo & chamamelino ac mastichino.

Ipsi vulnere imponatur emplastrum Barbarum.

#### Diata.

Vitæ sit tenuis, & parcissimè æger edat, ne ventriculus cibi copia distendatur, sed corrugatus maneat, & sic facilius conglutinetur. Cibi verò ipsi in parua quantitate magnam alendi vim habeant: sint boni succi & cocti faciles. Ab omnibus acerbis & mordentibus in cibo & potu abstinendum.

### C A P V T X V I I.

#### De Vlcerebus ventriculi.

*Vlcera ventriculi.*

*Causæ.*

TAndem etiam, sed rarius, aliquando ventriculus vlcere laborat, quod est compositus morbus ex soluta vnitæte, diminuta magnitudine, & ferè etiam in temperie. Excitatur verò vlcus in ventriculo, vel à causis internis: quales sunt humores acres, seu in ventriculo geniti, seu aliunde, præcipuè ex capite, affluentes qui aut naturâ suâ mordent ac rodunt, vt bilis flaua & atra, vt & pituita salsa, aut ratione putredinis, qua corripuntur, seu ob longam in ventriculo moram; seu apostematis in ventriculo genitis ac postea apertis, seu post vulnera non rectè curata; vel ab externis, vt medicamentis acerbis, colocynthide, euphorbio, venenis erodentibus, vt arsenico, æruginè & similibus. Et quidem frequentissimè generantur vlcera in ventriculo post vulnera & rupta apostemata.

Pertinent huc & rupturæ venarum præcipuè ex vomitu laborioso.

#### Differentia.

*Differentia.*

Hæ primò sumuntur ab ipso vlcere, quod magis aut minus latum, profundum, sordidum est. Deinde à parte affecta prout ventriculi partem superiorem vel inferiorem obliadet.

#### Signa Diagnostica.

*Signa.*

Vlcus ipsum ventriculi indicatur à dolore pungente & vlceroso & ardore, præsertim dum aliquid acre vel calidius aut frigidius in ventriculum descendit, & dum cibus concoquitur ac in intestina transmittitur, & quidem dolore supra vmbilicum assiduo & fixo. Ac si gnium hoc cerrius est, si inflammationis signa ac præcipuè febris adsit. A deiectione itidem cibi appetentia, à fœtu foetido, ex pure, vomitu vel per alium reiecto, vt & sanie ac sanguine. Præcesserunt causæ vlceris, & febris lenta cum pulsu frequenti laborantem consumit.

Causas autem vlceris quod attinet, si eæ sint externæ, ex relatione ægri cognoscuntur. Si verò internæ sint, inflammatio, tumor, quæ suppurata sint, necesse est, eorum signa præcessisse. Si ab acri fluxione, aut humore putrido, eius quoque signa adsunt. Si à ruptura venæ, præcessit sanguinis vomitus.

Cuius autem formæ seu naturæ sit vlcus ventriculi

aliquo modo colligi potest ex prauis humoribus in corpore abundantibus, ex vlcere ipsius duratione, symptomatum magnitudine, & potissimum ex iis, quæ vomitu vel per alium excernuntur. Locum & partem, quam vlcus obliadet, dolor indicat. Nam qua parte dolorem percipit æger, eâ proculdubio vlcus est. Quando orificium ventriculi vlcus occupat, acutissimos dolores gignit, cum nausæa & siti molestâ, præcipuè ante cibi descensum in fundum, nonnunquam sudores excitantur frigidi, & lipothymia accedit. Mitiora sunt symptomata, vbi vlcus in fundo ventriculi est, & dolores sunt mitiores, qui tamen coctionis & distributionis tempore augentur.

#### Prognostica.

1. Vlcus ventriculi morbus periculosus est, & plerumque lethalis; nisi solum in superficie sit, & ipsum exiguum; quia non solum tunica ventriculi affecta est, quæ vt pars spermatica exactè refici nequit, verum etiam quia alimentum venter ante coctionem excernit morsu lancinatus; quamuis id ex temperatis sit, & apud sanos molestare non soleat, & quia ventriculus vlcere debilitatus malè coquit, qua ratione & cibi non bene coquuntur, & deperdita substantia non faciliè regeneratur. Præterea cum vlcus omnino abstersione indigeat, detergentia medicamenta dolorem excitant, præsertim in orificio ventriculi, cui faciliè cerebrum & cor comparitur. Exiccatione tandem opus est, vt vlcus cicatrice claudatur. Impeditur autem à chylo, & ingesta alimenta vim medicamentorum infringunt.

2. Periculosius est vlcus ventriculi quò maius & sordidius est, & quod superiores partes ventriculi occupat, quia superiores partes in consensum trahit, vnde grauius symptomata oriri solent; & quod à materia est virulenta, vt in Gallico vlcere.

3. Quæ absque inflammatione sunt vlcera ventriculi facilius adstringentium vsu curantur; quæ verò inflammationem simulque febrem coniunctam habent, non solum curationem non admittunt, sed nec in eadem magnitudine possunt permanere. Nam indies maiora & maligniora fiunt, quandiu scilicet durat inflammatio. Galenus, 7. aph. 37.

4. Inueteratum hoc malum linteriam affert, & ex atris & corruptis humoribus dysenteriam.

#### Indicationes.

Vt in aliis vlcerebus; ita & hîc vnitæ soluta vnienda, substantia deperdita regeneranda, capitas implenda, & tandem cicatrix inducenda est. Remouenda quoque impedimenta, quæ naturam in opere suo remporari possunt. Ergo si vlcus sordidum sit, abstergendum & mundificandum; Si adsit intemperies, illa corrigenda, & omnia, quæ in vlcere curatione requiruntur, peragenda, de quibus Galenus, 3. meth. med. c. 3. Si quoque membrum aliquod sit, quod humores vitiosos ad ventriculum mittat, illius habenda est ratio.

#### Curatio.

Ergo si sanguis abundat, & vires ferunt, in initio vena aperienda: Si autem malum diu durauit, venæ sectio omittenda. Postea si prauus aliquis humor adsit in ventriculo, lenientibus saltem, vt syrupo rosar. solutiuo, aut hierâ picrâ vtendum. A fortioribus verò purgantibus abstinendum, quod & ventriculum debilitant, & humores ad eum trahunt. Vomitus quoque planè vitandus, ne quod exulceratum est, magis dilaceretur.

Hinc detergentia & moderatè siccantia medicamenta vsurpanda, quæ nisi præmittantur, consolidantia nil

nil utilitatis afferunt. Et nunc lenioribus, nunc fortioribus, prout opus, vrendum, eaque omnia per os exhibenda, cum nulla alia ad ventriculum via sit.

Detergentia sint in ventriculo calidiore, aqua hordei simplex, aqua mellis, quæ & loco porus vsurpari possunt; Aqua saccharata vel hordei cum emulsione seminum 4. frigid. maior. conferu. rosar. aqua hordei dissoluta & colata.

In ventriculo frigidiore mulsâ & iure cicerum vti licet, item decocto hyssopi ac schœnanthi cum melle vel sine eo. Fortius abstergunt farina orobi, & radix iridis cum melle, ac si vlcus sit sordidius, ad hieram simplicem accedere licet, quæ pondere Scrup. i. vel Scrup. ii. exhibetur, & aqua hordei vel serum lactis superbibitur. Si vlcus sit valde sordidum ac virulentum, folia oleæ, rutæ & agrimonie coquantur in vino rubro & colaturæ mane & vespere ante cibum hauritus detur.

Mundato vlcere, quæ carnem generant vlcusque consolidant, vsurpanda; quæ quidem & extra exhibere licet. Extra quidem sola adhibere licet; quæ verò intrò dantur, cum quotidie nouæ aliquæ sordes generentur, iis aliquid mediocriter abstergentium admiscere vtile est; id quod duobus modis fieri potest. Primò, quod commodius, vt præmittantur mundificantia, & postea subiungantur abstergentia; Deinde, vt misceantur adstringentia cum abstergentibus. Indies tamen abstergentia minuantur, donec tandem solis consolidantibus locus sit.

Tandem vt vlcus consolidetur & claudatur, epulotica ac cicatricem inducentia conueniunt. Exsiccant & glutinant, *thurs, mastiche, gummi Arabic. tragacantha, sanguis draconis, C. C. vsum ad pondus Scii. vel Dra. i. exhibita cum aqua mulsâ, aut in formam pastillorum redacta, trochisci de carabe, syrupus cydoniorum, myrtinus.*

Efficax est & hoc medicamentum.

*℞. Thur. Mastich. tragacanth. an. Dra. iii. succini, 3. i. sang. dracon. 3. B. Cum syrupo cydonior.*

Fiant Trochisci pondere 3. j.

Cicatricem inducunt *acacia, balauſtia, hypocistis, bolus Armenus, sumach, terra sigillata, conserua rosarum anisiqua.* Et dantur hæc & similia in ventriculo calidiore cum aqua plantaginis, in frigidiore verò cum aqua menthæ, aut vino nigro austero.

*℞. Tragacanth. ʒ. ii. succi plantag. 3. i. B. santali rubri, corall. rubror. an. ʒ. i. conseru. rosar. antiq. 3. ii. syr. cydon. q. s. F. Electuarium.*

Vel *℞. Thuris, sang. dracon. an. 3. ii. B. rosar. balauſt. succini, boli Armeni, an. 3. j.*

*F. Puluis, cuius Drach. i. detur cum succo vel mius cydoniorum.*

*℞. Rosar. rubr. boli Armeni, gummi Arab. an. 3. i. B. granor. myrti, tragacanth. spody, balauſt. acacia, an. ʒ. ii. 3. succini, mastich. sangu. draconis, an. 3. i. Cum aqua plantaginis.*

*F. Trochisci.*

Vel *℞. spec. diatrag. frigid. pulueris sumach, mastiches, sangu. draconis, an. 3. B. Cum syrupo myrrino.*

*Fiat Electuarium.*

Licet & ventriculo adstringentia extra apponere, vt cicatrix intus producat. Vngatur ergo ventriculus oleo cydonior. mastich myrrino cum puluere corallior. & emplastrum de crusta panis imponatur.

Vel *℞. Boli Armeni, mumia aloes, myrrh. mastiches, an. Drach. ii.*

*Incorporentur cum resina 3. vj.*

*F. Emplastrum, quod ventriculo imponatur.*

Et talia externa medicamenta consolidantia omni tempore applicari possunt; cum ventriculum confortent, vlceris augmentum prohibeant, & ad conglutinationem præparent.

*Diatra.*

Diatra medicamentis respondeat. Ideoque cum animus est vlcus mundificare & abstergere, abstergentia cum cibo & potu misceantur, & maxime in principio cœnæ & prandij, atque abstinendum ab adstringentibus. Cum verò vlcus iam consolidatum, aut cum fluxus ventris cum vlcere adest, admiscenda adstringentia, vt pani admisceatur mastiche; cibi reliqui condiantur succo granatorum vel cydoniorum. Et in primis cibis ad consolidandum puluerem ex fructu sorbi maturo exiccato, plantagine, radicibus consolidæ maioris admiscere vtile est. Cibi ipsi sint facili coctionis ac leni succi, actu & potestate siccantes. Videntur verò amara, acrida, salia, acida, item nimis dulcia & pinguis. Conueniunt pulles ex amylo, farina hordei, psilana, oryza, amygdalis, ouorum vitellis. Viret æger motum vehementem.



## LIBRI TERTII

### PARTIS I.

#### SECTIO SECVNDA.

#### DE SYMPTOMATIBVS

##### Ventriculi.

#### CAPVT I.

##### *De Anorexia & Appetitu ventriculi Deiecto.*

**T** Q V E hætenus absoluiſimus morbos, qui ventriculo accidere solent; explicanda iam sunt Symptomata, quæ ei & circa actiones eius contingunt. Et primò actiones læsas quod attinet, equidem primaria actio ventriculi est *χύλων*, seu cibi assumpti in chylum pro totius corporis nutritione mutatio. Verum huic primariæ actioni aliæ quasi ministræ inferuiunt, Nam primò appetitus vt aliis animalibus, ita homini etiam datus est, quo, vbi defectum alimenti percipit, cibum & potum desiderat.

Deinde data est ventriculo vis retentrix, qua cibum & potum tamdiu retinet, & arctè amplectitur, donec à facultate coctrice in chylum mutatus sit.

Tertiò cibus coctus & in chylum mutatus ad intestina transmittatur, vt inde ad Hepar transeat, & in sanguinem totius corporis alimentum mutetur. Atque in his actionibus omnibus varia symptomata accidunt.

Abutitur tamen natura quandoque etiam ventriculo, qui primariò coctioni destinatus est, & per illius orificium cum superius tum inferius vitiosos humores interdum expellit. Præterea quia nervi etiam sextæ coniugationis ventriculi orificio inferuntur, & tunica eius membranosæ sunt, in tactu quoque symptomata, dolores scilicet, ventriculo accidunt.

Atque ita agendum erit secundum ordinem, quo actiones hæc sese consequuntur. Primò de appetitu cibi & potus læso, cuius plura sunt symptomata. Deinde de symptomatibus & actionibus læsis, quæ circa retentionem accidunt, qualia sunt palpitatio, conuulsio, tremor, vibratio ventriculi, ruminatio, cœliaca passio & lienteria, quæ duo ramen symptomata, potius vel simul intestinorum affectiones sunt. Tertiò de Coctione læsa & imbecillitate ventriculi, seu coctione debili, & *ἀνίστα* seu cruditate, item ciborum corruptione. Quarto in retentricis symptomatibus explicanda erunt singultus, ructus, nausea, vomitus, cholera. Quintò agendum erit de cardialgia, dolore & anxietate ventriculi, ardore stomachi, attritione ventriculi ac stupore eiusdem.

Secundò accidunt etiam ventriculo symptomata in excretis p.n. vt cum sanguis, menstrua, vermes, glandes, clysteres & alia p.n. è ventriculo seiciuntur.

Tandem quod qualitates mutatas attinet, etiam maculæ p.n. in ventriculo repertæ sunt: de quibus symptomatibus iam ordine agendum est.

Atque vt à laeso appetitu incipiamus, cum animalium corpora in perpetuo fluxu sint, & dissoluantur, ne præmatura morte obeant, continua nutritione & instauratione opus habent. Ideoque iis & interea etiam homini insita est nutrimenti ad corpus conseruandum necessarii appetentia, & sensus quidam, quo defectus alimenti percipitur. Qui etsi toti corpori insit, maximè tamen viget in ventriculo, ceu penu & promptuario alimenti, in quo primò ciborum pro totius corporis nutrimento fit concoctio, & præcipue in orificio eius, quod propterea à sexto pari neruorum nervos satis grandes accepit. Et quidem, vt à Galeno, 1. de symptom. causis cap. 7. recensentur, quinque sese ordine in appetitu alimenti consequuntur.

In alimenti appetitu quinque sese consequuntur.

Primum est euacuatio, & dissipatio substantiæ corporis per continuum illum effluxum; hinc sequitur *quærit opus*, seu naturalis alimenti, quo corpus nutriatur & instauretur, appetitus: Terriò suctio venarum inanitarum in toto corpore, qua venæ minores à maioribus, & hæc rursus ab aliis partibus sugunt, donec tandem ad ventriculum, vt cibi promptuarium, peruentum est: Quarto locò est sensus in orificio ventriculi, quod tactu maximè valet: Ac tandem Quintò appetitus animalis, quo animal vellicationem in orificio ventriculi percipiens ad famem & sitim explendam quærendumque cibum & potum sese confert. Atque ita fames naturalis est appetitus secundum naturam nutrimenti, à sensu suctionis venarum ex penuria alimenti in ore ventriculi excitatus, vt absumpti instauration fiat, atque ita corpus conseruetur.

Læditur autem appetitus variis modis, vel quia imminuitur, vel quia oboletur, vel quia depauperatur; de quibus iam ordine agemus, & primò de appetitu deiecto. Nam aliquando cibum quidem appetit homo, sed minus, quam par est; aliquando planè eum auersatur.

Appetitus diminutus est *δυσπεψία*: ablatas, *ἀνυπεψία*, & *ἀνομία*. Donatus ab alto mari etiam *ἀνυ* cibi fastidium appellari censet s. *aphor.* 6. Verum non simplex cibi fastidium est *ἀνυ*, sed morsus potius officij ventriculi, & inde proueniens anxietas; & quasi nausea, & ad vomitum inclinatio ab humoribus vitiosis ad excretionem ventriculum stimulantibus.

Appetitus deiecti diffinitio.

Appetitus tamen deiecti magna est varietas. Primò enim interdum homo per morbum appetitum per dies aliquot saltem amittit, vt cibum nullum omnino desideret; aliquando verò non solum per dies, sed & menses, imò & annos aliquot nonnullos sine cibo vixisse compertum est. Quæ res cum satis mira sit, agam de iis, qui diu sine alimento vixerunt, *Capite sequenti*.

Deinde aliquando cibum homo non appetit, sine nausea tamen vel fastidio, non secus ac sani, qui dum saturi sunt, cibos aliàs etiam sibi gratos non appetunt, sed sine nausea & abominatione; aliquando verò ægri cibos non solum non appetunt, sed ita quoque auersantur, vt non solum ad eorum gustum vel odoratum, verum etiam visum vel mentionem exhorrescant, & nauseam concipiant, imò quandoque ad vomitum concitentur. Vbi ergo æger cibum tantum non appetit, sed sine nausea & abominatione, Inappetentia appellari potest. Cum verò cibum æger etiam abhorret & auersatur, id fastidium ciborum & nausea dicitur. Qui affectus cum etiam causis differant, seorsim exelicandi sunt.

Inappetentia & fastidij ciborum diffinitio.

### Inappetentia Causæ.

Et primò inappetentiam quod attinet, cum proxima *Inappetentia Causa* appetitus seu famis causa sit sensus suctionis in ventriculo, & præcipue in eius orificio, hinc patet, deiecti appetitus causam esse deficientem sensum suctionis in ventriculo, appetitumque cibi non fieri, vel diminutè fieri (nam appetitus abolitus & diminutus ferè causarum magnitudine saltem differunt) dum vel nulla, vel exigua sit suctio; vel suctio non percipitur, & sensus suctionis vel amissus vel diminutus est.

Suctio non fit, vel exigua fit, quia alimentum in corpore abundat, & nulla ferè fit in corpore absumptio. Hoc modo vt appetitus plane deiciatur, vix aut certè rarius fieri potest, cum calor innatus, quamdiu vixit homo, aliquid continuò absumat; quamuis nunc plus, nunc minus, prout ipse calor est debilior vel fortior.

Diminui tamen non rarò appetitus potest hac de causa, Si corpus nimis plenum est, & multis crudis humoribus abundat, aut aliqua consueta euacuatio, vt mensium, vel hæmorrhidum suppressa est, aut consuetum exercitium homo omisit, ac otio & quieti nimis indulsit. Pertinet huc & curis constipatio ab aere seu ab aliis causis, ob quas naturalis *diagnos* impeditur.

Secundò suctio non fit, quia multi crassi & lenti humores in ventriculo abundant, siue in eo geniti sint, siue à capite affluant. Sic & cibi crassi & pingues appetitum deicere solent. Idem accidit si lentore illo, quo, vt lubrica essent, ventriculus & intestina naturaliter intrus obducuntur, nimium ventriculus abundet. Si enim lento illo humore quasi incrustetur, sensus eius obrunditur. Posset tamen hæc causa etiam ad sequentem referri, nimirum cum suctio, sensu obruto, non percipitur.

Terriò suctio non fit, si obstructio aut tumor p.n. venas melsaraicas vel hepar occupet, vt chylus pereas non satis distribuatur, sed in ventriculo immoretur. Vt enim inanitus ventriculus nouum cibum appetit: ita quando chylus in ventriculo subsistit, fames non excitatur.

Suctio verò non percipitur, vel minus percipitur, etsi fiat, primò vitio facultatis sentiētis. Et primò quidem ob resolutionem neruorum à sexto pari prodeuntium, aut quia Spiritus animalis, proximum facultatis sentiētis organum, ad os ventriculi non dimittitur, vel transitus eius impeditur, vt in Apoplexia & similibus affectibus fieri solet, vel cum Spiritus deficiunt ac languent, vt in morbis grauib, febribus in primis acutis & malignis, accidit, aut quia facultas aliò conuertitur, vt in phreneticis, melancholicis, & forti imaginatione occupatis accidere solet.

Secundò suctio non percipitur vitio officij ventriculi læsi à morbo, qui vel est Intemperies, vel mala compositio, vt tumor p.n. vel soluta vnitas, vt vlcus. Et quidem Intemperies est vel sine materia vel cum materia, eamque excitant vel causæ internæ, vt humor, aut vapor, vel à toto, vel à parte, vt vermibus in intestinis vel vtero immixtus: vel externæ, vt medicamenta, aut venena, quæ tamen potius oculam dispositionem p.n. quam manifestam intemperiem inducunt. Pertinent huc omnia caloris ventriculi cum insiti, tum influentis, qui temperamentum eius absolunt, vitia. Cum enim caloris proximè sit animæ instrumentum, si lædatur, actiones bene fieri non possunt. Hinc accidit, vt non solum quæ calorem naturalem lædere, sed & quæ influentem dissipare ac euertere possunt, inappetentiam excitare soleant. Inde sæpe euenit, vt in febribus & aliis morbis appetitus deiciatur, cum & influens & innatus calor corrumpatur: ita & in timore ac aliis animi affectibus, spiritibus turbatis, vel aliò auocatis appetitus deicitur. Tandem huc pertinet & stupor ventriculi, sensu tactus eius labefactato; quod exhibitis narcoticis



marcotici fieri potest: feruntque solanum furiosum vino infusum appetitum deiicere.

De intemperie tamen ventriculi est controuersia, & inter auctores disputatur, an tam ab intemperie calida, quam frigida inappetentia fieri possit. Verum sciendum, intemperiem nunc esse magnam, nunc paruat. Si sit insignis, tam calida, quam frigida appetitum deiicere potest; cum omnis insignis Intemperies actiones partis destruat. Si verò non sit insignis, frigida potius facit inappetentiam laxando & replendo orificium ventriculi.

### *Cibi fastidij Causa.*

Cibi verò fastidij, cum homo non solum cibum non appetit, sed & auersatur & abhorret, causa est, potentia appetitiua imbecilla vel errans, quæ alimentum non vt iucundum, verum vt odore & sapore ingratum odio prosequitur, quasi naturæ esset summè noxium. Accidit hoc, cum prauis succi, præcipue biliosi, putridi & corrupti, aciditatis tamen & fædæ expertes, orificium ventriculi occupant. Calor enim ventriculum laxat, humores in eo liquat, ac vires ventriculi deiicere solet, vnde in febrium principiis cibi appetitus deiicatur. Dum verò in morbi progressu humores putridi & corrupti ad eum confluunt, etiam alimentum abominari & abhorre ægri incipiunt. Humores enim illi corruptunt orificium ventriculi, & temperamentum eius euertere solent. Et naturalis appetitus sibi similia appetit, noxia verò auersatur. Videmusque in eodem agro plantas diuersas quamlibet sibi similem succum attrahere, diuersum verò & sibi minis conuenientem relinquere. Ita etiam accidit, vt quauis corpus alimentum indigeat, quia tamen succus, qui in ventriculo est, corpori alendo aptus non est, natura eum etiam auersatur, nec venæ eumingere cupiunt. Hinc postea euenit, vt facultas appetens cibos etiam, qui offeruntur, eodem modo quasi noxios auersetur; nec facile hoc malum emendatur, nisi prauis illi succi sint sublatis, & venæ humores vitales iterum sugere incipiant. Ad quod pertinet & illud, quod ex nimio alicuius cibi vsu, aut minus dextro vsu, fastidium eiusdem nonnunquam oboriri solet. Accidit quoque, vt quibus in morbo fastidium cibi aut potus alicuius cœpit, ij quoque à morbo liberati eum fastidiant, nausea illa & fastidio impresso manente, de quo etiam capite tertio.

### *Signa Diagnostica.*

Ipse quidem appetitus deiectus vel cibi fastidium signis, quibus innotescat, opus non habet, ægerque ipse conqueritur, se nihil aut parum appetere, vel etiam cibum abhorre. Idemque ab adstantibus obseruatur; modò mens agrotantis constet, neque homo simulet affectum, qui reuera nullus est.

Causæ verò, quæ inappetentiam ac cibi fastidium excitant, vt cognoscantur, signis opus est. Et quidem si suctio non fit, idque ob alimenti abundantiam, vires non prosternuntur, etsi æger aliquandiu à cibo abstinere. Apparentque indicia repletionis totius, aut densitatis cutis, aut imbecillitatis caloris naturalis, aut redundantia humorum crudorum adest, homo vitam otiosam sectatus est, atque aliæ causæ repletionis totius ante enumeratæ adfunt, & ex calefacientibus, siccantibus, attenuantibus vtilitatem percipit æger, lædatur verò à contrariis. Si verò vitio venarum mæsaricarum non fiat attractio, alius liquidiora & humidiora excernit. Si autem suctio non sentitur, vires ob alimenti defectum deiiciuntur, corpusque gracile euadit, atque extenuatur. Causa etiam læsæ tensionis cognoscitur è signis cerebri, vel neruorum sexti paris læsis. Externa quoque causæ suis signis se produnt, at-

que etiam antecesserunt causæ insigniter refrigerantes vel stupefacientes, ac tum æger, si acria vel mordacia sumat, nullam mordicationem percipit, nec singultus exciratur, adsuntque præterea, quæ calorem ventriculi debilitandi vim habent, quæ ex intemperie ventriculi, eiusque morbis patent.

### *Prognostica.*

1. Anorexia malum est non contemnendum; quia corpora siccant, ad omnes operas imbecilliora reddit, ac instaurationi animalis aduersatur. Maius tamen vel minus malum portendit pro magnitudine ac paupertate causæ, à qua oritur.

2. In omni morbo constare mente & bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bonum. Contra verò habere se, malum, 2. Aph. 33. Languetis enim & facultatis animalis & naturalis indicium est, & spem de recuperanda salute exiguum præbet. Et 3. Epidem. com. 3. aph. 30. Galenus ait; Respiratio & ciborum appetentia in agrotante magnum ad salutem pondus habent.

3. In morbo diuturno seu cibi fastidium, & sinceræ deiectiones, malum, 6. aph. 6. Significatur enim extinctio facultatis appetentis in orificio ventriculi, seu ob maximum frigiditatis excessum, seu ob materiam insigniter putrefactam. Cumque diuturno morbo affecti vires aliter, quam nutrimento recuperari nequeant, si illud nec assumatur nec apponatur, viribus tandem planè consumptis ægrum extinguere necesse est.

4. Malum & facultatis appetentis collabentis signum est, si æger, quos desiderare se aiebat, cibos, postquam gustauit, fastidiat, nec comedat: peius tamen ij adhuc habet, qui nil appetunt. Extrema enim facultatis appetentis deiectio significatur. Galenus, 2. Epid. com. 2. text. 3.

5. Incommodè hoc malo pueri afficiuntur, vt potè, qui naturæ edaces sunt, & plurimo alimento indigent. Magnus enim p. n. excessus significatur, si puer anorexiâ afficiatur. Galenus, 2. aph. 20.

6. Anorexia, si iuxta principium ac vigorem accidat morbi, non ita periculosa est. Mediocri enim tum alimento æger opus habet, & si multum appetat, multumque comedat, plus damni quam commodi inde percipit, ac sublato morbo spontè appetitus redit. Si verò in declinatione totius morbi deiiciatur appetitus, seu ex morbi diuturnitate, seu virium debilitate, seu aliquâ immodicâ euacuatione, malum signum est, cum caloris naturalis extinctionem & virtutis naturalis deiectionem significet, & medici curam id postulat, metusque est, ne æger vel reciduiam patiat, vel alius morbus sequatur.

7. Prostratio appetitus ex læsione neruorum sextæ coniugationis à cerebro, venientis difficulter curatur.

8. Si in morbo aliquo appetitus sit prostratus, & subito postea plurimum cibum æger sumperit, non præcedente crisi aliqua & morbi imminutione, lethale signum est, quia cerebri læsionem & virtutis sensitivæ extinctionem significat.

### *Curatio.*

Cum appetitus læsus à variis causis dependeat, curandi ratio etiam simplex esse non potest; Sed pro causarum varietate variè instituenda, causæque singulæ suo modo tollendæ. Quapropter si nulla fiat suctio, causam, quæ suctionem impedit, tollere & remouere oportet. Si succi naturales abundant, ea, quæ plenitudinem imminuunt, conueniunt, vt sunt inedia, exercitium, frictions validæ & multæ, frequens balneorum vsus. Quæ si non sufficiunt, aut nimis tardè, quod expetitur, præstant, sanguinis missio instituenda. Eadem media iis competunt, qui ex intempestiua & immodica ciborum ingestione cruditatibus in ventriculo cumulatis in

anorexiam incidunt. Si tamen in ventriculo vitiosi humores abundant, vomitu vel per aluum euacuentur, & inprimis amara eligantur, quæ simul abstergunt, atque hinc aloë ventriculo amica dicitur. Fortiora verò medicamenta, vt scammonium & colocynthis, quæ os ventriculi, & in hoc appetentiam lædunt, non conueniunt. Si homo ex otio & exercitiis omnis cibum non appetit, motus imperandus. In frigida & humida corporis constitutione calida & siccantia conueniunt. Si constipatio & condensatio pororum cutis adsit, laxanda cutis, quod commodissimè præstat balneum aquæ dulcis. Vtiles sunt & frictiones lenes totius corporis.

In ventriculi imbecillitate & venarum ac hepatis obstructione utilis est hic potus:

*℞. Rad. petroselin. feniculi, apij, cichorij an. ʒ. ʒ. absinthij, taraxaci, an. M. i. flor. rosar. M. ʒ. cichorij. p. i. sem. coriand. præp. ʒ. i. fol. sen. elect. ʒ. vi. sem. anisi ʒ. iii. vinarum passar. ʒ. j.*

Infundantur in tribus partibus aquæ & vna vini rhenani pro lb. i. ʒ.

Stent in infusione hor. 24. vase clauso in loco calido.

Colaturæ expressæ adde syrup cichorij cum rhabarb. de meniba de absinthio an. ʒ. j.

Cum albumine oui depurentur & clarificentur. In decocto clarificato suspendantur in nodulo

*Rhabarb. elect. agarici trochiscati spec. aromat. rosar. diarrh. abbat. an. Drach. sem. spica, schananth. an. gr. vj.*

Dof. Cyathus vnus horis tribus ante pastum.

Si verò suctio non percipitur, itidem causa, quæ suctionis sensum impedit, tollenda, siue aliqua sit intemperies, siue humor, de quo supra dictum. Præcipuè tamè bilis & pituita appetitus sensationem impedire solent.

Et quidem bilis, præcipuè in febribus, ventriculum affligit, quæ qua ratione tollenda sit, ex iis, quæ supra de intemperiebus ventriculi dicta sunt, patet. Nimirum bilis euacuanda, & ventriculus postea roborandus. Euacuatur commodissimè vomitu vel per aluum: cui rei inseruit absinthium, si eius P. i. coquatur & decocti Vnc v. vel Vnc. vi. cum Syrup. rosar. solutiuo exhibeantur, aut hiera, si bilis tenacius adhærescat. Qua ratione intemperies cum pituita citanda sit, etiam supra dictum. Hoc saltem addimus; etsi pituita, vt frigida, calefacientia indicat; tamen non confertim & subito hoc faciendum, ne humores subito fusi status generent, & in vniuersum corpus distribuantur, ac obstructiones pariant. Quapropter cautè hic agendum, & primò curandum, vt æger parçè comedat, & bibat, & victu attenuante vtatur. Possunt etiam in prima mensa concedi ea, quæ salia sunt, cum sal incidendi & attenuandi vim habeat; & postea ea, quæ vim detergendi habent, vt usurari, quale est ius Brassicæ primum non exquisitæ coctæ. Ad extenuandam verò pituitam commodum est, primò oxymel exhibere cum mellis rosarum parte quarta. Postea medicamentum, quod Diatriopipercon appellatur, & quidem simplex, quod tantum ex tribus piperum generibus conficitur. Etsi enim validius calefacit piper; tamen tenuis substantiæ est, & tenuium partium, quæ propterea citius discutiuntur, nec hepatis inde calor imprimatur. Pituita hoc modo incisa & deterfa euacuanda est vel vomitu vel per aluum, medicamentis supra propositis.

Tandem ventriculus roborandus, quam ad rem utile est aromaticum rosatum; item absinthium, siue decoctum, siue in vino, quod præterea etiam insignem facultatem appetitum excitandi habet. Simul etiam appetitum excitantia vturpanda, quæ in causa calidæ refrigerantia esse oportet, ex aceto, succo limonum, agrestis, aurantis acidis, granatis acidis, quibus cibi condiri possunt. Conuenit etiam lactuca aceto condita. E Chymicis Spiritus vitrioli & salis, aliæque de intemperie

ventriculi calida proposita. Contra in causa frigida vturpanda calefacientia ventriculum, itidem supra proposita: quæ & coctionem adiuuant, & appetitum reparant. Hinc panem ex vino maluatico sumere, cibos aromatibus condire vtile est. Conuenit etiam hic oxymel scilliticum. In vtraque causa oxymel simplex, Spiritus vitrioli & salis.

Quod si ob facultatis sentientis vitium non fiat appetitus, curatio ad causas & morbos, à quibus ille provenit, dirigenda. Si nimirum ob melancholiam vel aliud quodque delirium ægri cibum sumere derectant, ad morbum illum Curatio dirigenda; Interim ægro quantum fieri potest persuadendum, vt cibum sumat. Si ex humore maligno in febribus appetendi vis extingatur, ad febrem curatio dirigenda, & interim vt æger cibum sumat, ei persuadendum.

Si propter læsionem nervi sextæ coniugationis fiat appetitus prostratus, cerebrum confortandum.

Causis sublati etiam hic appetitus excitandus. Danda nimirum salia, acida & acria, quæ similem suctionem illi, quæ fit à defectu alimenti efficiant. Pingua verò vitanda. Et inprimis acrum vtile est, quod si maiore quantitate bibatur, fastidium illud à vini potu, in quo radices solani furiosi macerata fuerint, ortum, vt & ab aliis narcoticis profectum, tollit. Eligenda tamen ea, quæ contrariam causæ morbificæ dispositionem inducunt. Simulque præbenda ea, quæ gustu & olfactu sunt grata, vt ex quibus appetitus excitatus sæpe in desiderium cibi erumpit.

Cibi verò fastidium à calore & humore corrupto os ventriculi occupante proveniens, curatur iis, quæ calidam intemperiem corrigunt, & humorem euacuant. Verum hæc appetentia, cum plerumque accidat, febricitantibus, febre eiusque causa sublata etiam cibi fastidium cessat.

### Diata.

Vitentur omnia, quæ os ventriculi laxant, vt pingua, Diata. oleosa, buryrum, cerebrum animalium inprimis, & omnia, quæ ingrata & nauseabunda sunt, ac ingratum odorem habent. Vt enim Galenus, 8. de compos. medicam. secund. loc. cap. 3. monet omnia, quæ bonum gratumque odorem spirant, ventriculo grata sunt, & appetitum excitant, sicut quæ malè olent, eundem turbant & subvertunt. Non omnibus tamen omnia pariter grata & ingrata sunt. Vturpentur etiam ea, quæ vim habet sensum appetitus stimulandi, qualia sunt salia & acria. Idcoque condimenti loco sumatur acetum, citria poma, aurantia acida, cappares, oliuæ, gingidium cum aceto, teste Galeno, 2. de alimentor. facultat. cap. 34. & 55. & 3. eiusdem operis c. 31. Cibus ita præparatur, ne multa masticatione opus habeat, alioquin & si diu ore versandus sit, ingratus euadit, & appetitum euertit. Vinum in causa frigida sit *ὀλιγοπόρον* & subastringens. Commendatur & absinthites, quod tamen etiam in bile in ventriculo redundante vtile est, modò appetitus deiectus non à calore nimio proficiscatur. In calida causa frigidus potus assuetis permittitur, quia constringendo os ventriculi appetitum excitat. Hinc Hippocrati, 6. epid. comm. 4. text. 20. Aqua vorax est, id est, cibi appetentiam efficit. In diuturna tamen ventriculi imbecillitate aquæ potus non permittendus. Sed forsan loquitur Hippocrates loco allegato, non de potu aquæ, sed de mora & verlatione circa aquas. Vnde piscatores & nautas auidè cibum appetere videmus.

Qui cibos notæ deterioris appetunt, cibos verò boni succi auersantur pertinaciter, iis cibis parum deterior permittatur ex cōsensu Hippocratis, 2. aph. 18. Quæ enim auidè appetuntur, & valde oblectant, modò copia non excedant, auidius attrahuntur, firmiter retinentur, melius concoquuntur, minùsque excrementa relinquunt.

Si à corporis constitutione frigida & humida. deiciatur appetitus, potus & cibi calefaciendi, siccandi, attrahendi vim habeant, calorque sopitus quasi excitandus exercitio & laboribus, exercitiumque in iis, qui id ferre possunt, summopere vtile est, cum distributionem ciborum promouendo appetitum plurimum excitet. Hinc videmus eos, qui laboribus dediti sunt, etsi ter vel quater de die comedant, tamen cibum auidè appetere, cum in otio degentes vix semel eum auidè appetant. Somnus non sit nimius; cum distributio cibi per vigilias potius fiat, quam per somnum, eaque peracta appetitus redeat. Hinc accidit, vt vigilantes citius esuriamus, spatiumque, quod inter prandium & cœnam est, breuius sit, quàm quod est inter cœnam & prandium, eoque elapso non minus appetamus, quam hoc.

## CAPUT II.

## De longa à cibo &amp; potu abstinencia.

**C**ORPUS nostrum, vt & aliorum animalium in perpetuo fluxu esse, continuoque eius aliquid dissipari & absumi, & propterea alimentis, quibus id, quod absumitur, instauretur, indigere, ac nisi alimento reficiatur, tandem de vita hominem periclitari, nemini ignotum est. Id quod Hippocrates, lib. 1. de xōv, septimo die fieri scribit, ceterique lethalem esse inediam, quæ septimum diem excedit: Cuius sententiæ subscribit Macrobius, lib. 1. in somn. Scipion. c. 6. Plinius verò, lib. 11. c. 24. longius assignat spatium, vnde cum scilicet dierum. Et experientia ipsa testatur, nonnullos vltra septimum diem sine cibo vixisse. Tempus tamen varium est. Cardanus, lib. 11. de subtilitate refert, quendam Leonhardum Pictoriensem se sensim ed traduxisse, vt semel tantum in septimana cibum sumeret. Et fossorem quendam, quum puteum foderet, terræ ruina oppressum sub tabulato, quod obiecerat, septem dies noctisque sine cibo & somno solâ urinâ epotâ vixisse Bartholom. Anplius, in picta possi, scribit. Ferunt etiam nonnulli & nunc Græcos monachos ad septimum diem vsque ieiunium extendere & omni cibo abstinere. Citesius quoque Medicus, in tract. de abstinate Confolentanea, narrat, Petrum Alchantaram, Monachum Hispanum, singulis mensibus octo diebus continuis ab omni cibo abstinuisset. Et Iſocratem Rhetorem ab aliis 4. ab aliis 9. dies à cibo abstinuisset accepit Plutarchus, refertque in opusculo de vita decem Rhetorum, Auicennas lib. 1. fen. 3. doct. 5. c. 2. scribit, quendam à potu vnus libræ olei violacei, in qua cera & adeps dissoluta fuerant, donec in Emplastri formâ coisissent, diebus 10. cibum non appetuisse. Et sæpe in morbis obseruatum, ægros multis sæpe diebus nullum cibum vel appetere vel assumere. Beniuenius, de abdit. morb. & sanat. caus. c. 108. scribit, monialem quandam montis Cælij suffocatione vteri laborantem ad 10. diē solâ panis buccella vitam traduxisse, Plato, de Republ. Etum Pamphilium inter eos, qui in acie ceciderant, 10. dies veluti mortuum iacuisse, posteaque rogo positum reuixisse. Horatius Aug. de sang. miss. c. 15. lib. 4. testatur, se vidisse rusticam mulierem, quæ grauida & vlcere ventriculi laborans viginti diebus sine cibo vixerit, tandemque mortua fuerit, mortuæ vtero aperto vius fœtus extractus sit. Cardanus, 11. de subtil. scriptū reliquit iuuenem quendam Scotum sub Clemente VII. Pontifice vndecim diebus in custodia sine cibo detentum fuisse, qui aliquando ad 20. aliquando ad 30. dies sine cibo perdurauit. Et fœminam, quæ sine cibo quandocumque dies 30. transegerit, in Germania vixisse author est Albertus Magnus, lib. 7. de animal. tract. 3. c. 3. Idem eodem in loco regnante Friderico II. Imperatore, Coloniæ fuisse virum melancholicum refert, qui clausus arcto in loco, & custoditus saluis sigillis sine cibo septem hebdomadas vixit, quotidie aut alternis diebus semel

haustum aquæ frigidæ bibens & præterea nihil assumens. Augustinus, Epist. 86. ad Casulanum, scribit, temporibus suis quendam 40. diebus sine cibo vixisse. Ex Plutarcho, in Symposiasticis & Athenæo, in Dypnosopisticis notum est, Timonis auiam siue amitam, siue nutricem quorannis vrsarum more bimestre tempus in Ciliciæ spelunca sine alimento semianimem deliruisse. Et Fernelius, lib. 6. Patholog. cap. 1. narrat, se vidisse grauidam, cui tuberculo duro & magno ita os ventriculi obturabatur, vt quicquid indebatur mox remearet, atque sic nihil cibi potulque bimestri spatio sumperit, tandemque mortua sit.

An verò quæ de Lucomoriæ Muscouiæ populis narrantur recensere debeam, cum multis proculdubio fabulosa videri possint, dubito. Recenset tamen ea Sigismundus L.B. in Herbestein, in rerum Muscovitic. Comment. pag. 82. scribitque, quod Lucomoriæ populos vltra Obi fluium in montibus sitæ, in singulos annos nempe 27. diē Nouembris, quæ apud Ruthenos S. Gregorio sacra est, mori ferant, ac vere insequente, maxime ad 24. Aprilis, ranarum instar, denuo reuiuiscere. Cum his quoque Grustintzj & Sperpanomortzj populi noua, & aliâ inconſueta habent commercia. Cum enim statum tempus moriendi, seu dormiendi ipsis imminet, merces certo loco deponunt, quas Grustintzj & Sperpanomortzj, relictis suis interim aqua commutatione mercibus, auferunt: eas illi rediuiui, si iniquiori æstimatione abductas esse viderint, rursus repetunt, vnde lites plurimæ & bella inter eos oriuntur. Eandem historiam Franciscus Citesius, in opusculo de abstinate Conſolentanea, fide dignorum virorum testimonio confirmat. Tota autem narratio sic se habet: Id omni exceptione maius est, Heinricho etiam Tertio in Polonia agenti à Principibus fide dignissimis testatum. Aderant quamplurimi Gallia proceres, Senatores. Aderant & aula Medici, inter quos D. Iohan. Piduxius, primicerius noster & Decanus, non artis Medica solum, sed totius etiam naturalis historia scientia Clarissimus, Illustrissimi Principis Ludonici Gonzaga Niuernensis Ducis valetudinem tunc regere solitus, sed & ipsi Regi consilij copiam præbere, à quo id primum didicimus. Relatum est ab Alex. Guagnino Veronensi peditum in arce Vitebska finitima Moschonia Præfecto, in sua Moschonia descriptione. Quosdam igitur populos, refert, Lucomoriam Vterioris Sarmatia regionem incolentes, quotannis 27. Mensis Nouembris diē, velut hirundines & ranas, præ intenso brumali frigore mori (siue potius obrigescere) Postea redeunte vere 24. Aprilis diē eos denuo reuiuiscere. Ipsos a. hoc modo commercia cum Grustintziis & Sperpanomortziis populis sibi vicinis habere. Cum iam futuram mortem imminere sentiunt, tunc merces suas certis in locis deponunt, quas Grustintzj, & Sperpanomortzj, suis mercibus interim æquivalentibus eodem loco relictis, auferunt. Illi autem reuiuiscences illas merces, si aqua commutatione sibi placuerint, pro suis accipiunt, sin minus iusta fuerint, à Grustintziis & Sperpanomortziis suas repetunt, vnde lites & bella hac de causa sæpius oriri dicuntur. Ceterum per soporem illum non exstinguitur innatus horum corporum (alioqui huic aëri assuetorum, gelique, vt loquitur Albertus Crantzius, recoctorum) calor: quia is, omnibus poris, meatibus, ductibusque frigore conuenientibus & obseratis, circa viscera colligitur, atque hac veluti antiperistasi se ipso in proximum ver auctior & vegetior efficitur. Periclitaretur inter omnes corporis partes maxime cerebrum, multis isque amplis foraminibus, narium præsertim patens, nisi dum rigere incipiunt, tenuis illis & aquea pituita enaribus stillaret, quæ (ex relato eiusdem D. Piduxi.) non minus congelatur, quam sputum ipsum, quod Sigismundus ab Heberstein frigore concreſcere testatur, antequam terram attingat: Sic noua subinde descendente, subinde concreſcente ad terram vsque, eodem plane modo ea pituita produciunt, quo apud nos per ipsam hyemem pēdula è proſectis stillicidia, vnde naribus obturatis cerebrum aëris in-

Historia de  
Lucomoria  
populi.

*clementia minus peruium & penetrabile est. Nam si quis aduersus hanc aeris insuriam tum pellium amittit tum curruum mole instructior, styriam istam vi diuellere tentet, statim irrumpente, qua data porta, in cerebrum aëre frigidiore, nauis eius calor extinguitur, iacentesque aeternum percutit Lucumori: Sin tempestatis serenioris leni aurâ decur frui, fusa illa pituita, sensim calor redit ossibus, redit suis membris vigor & sensus, idemque, qui prius inerat, functionum omnium ordo.*

Atque hæc, etsi satis admiranda longioris abstinentiæ exempla sint, tamen quæ sequuntur, admirabiliora & penè miraculis similia sunt, atque ea pleraque non à remotioribus seculis petita, aut dubiæ fidei, sed quæ nostra patrūque & aorum memoriâ acciderunt. Patavij Anno Christi 1598. ut hanc historiam Alexander Viguntia, ibidem Professor consignauit. Virgo sub occasum caniculæ febre, hinc tumore sinistri brachij, atque eo cessante dolore in articulis, ore ventriculi ac postea totius abdominis correpta fuit, insuperque motum sinistri brachij amisit, atque omnia alimenta vomitu reiecit. Hinc omnia edulia auersari, imò ad eorum mentionem & imaginationem nauseam concipere cœpit. Medicamenta tamen faciliè ingerebat, retinebat, aluo egerebat. Atque ita dum nihil cibi caperet, omnes excretiones naturales substituerunt, alius fuit suppressa, per vesicam lotium non reddidit, clysteres injecti nullas feces eduxerunt. Et sic vnum & alterum mensem traduxit, ad aspectum sana viua fuit, color fuit viuus, & nulla apparuit in corpore macies. Assumpto tum puluere, nescio quem humorem & vermem viuum vomitu reiecit. Hinc per 3. menses continuos quotidie vel alternis diebus sanguinem libræ pondere per aluum reiecit, primum floridum, mox aquosum & nigricantem, qui demum aluo subsistente vomitu reiectus fuit, & cum circa brumam paralytis remississet, cæca euasit ac delirare cœpit, & ita octimestri spatio ab omni cibo abstinuit, atque interim sapius catalepsi correpta fuit, hinc iterum cibum capere, vrinam reddere, atque aluum egerere cœpit. Rursum verò 1. Augusti vomere cœpit, atque eadem ferè, quæ prius, redierunt symptomata & iterum per duos menses sine cibo vixit.

Sedecim mensibus in Hetruria in agro Lucensi puella 14. annorum Anno Christi 1603. planè contabescens & solo aquæ simplicis potu vtens sine vilo cibo languida, somnolenta, taciturna, cruribus contractis, viuens, nullaque excrementa, præter vrinam, reddens visa fuit, quæ tamen postea iterum cibum sumpsit ac sana euasit.

Duobus annis quendam ieiunasse testatur Cælius Rhodiginus, lib. 13. *antiq. lect. cap. 24.* & Stendalensem monialem itidem biennio sine cibo vixisse, Petrus Aponensis Conciliator dictus, *diff. 12.* & alium quendam etiam biennio sub Pontificatu Nicolai V. Citesius narrat.

Tres annos sine cibo vixit puella 14. annos nata Confolento, vrbe in Lemouicum & Pictonum confinio ad Vigennam oriunda, cuius historiam descripsit Franciscus Citesius Medicus, edito libello, quem de abstinate Confolentanea inscripsit. Correpta est ea Anno Christi 1599. ætatis 11. circa 13. Calend. Martij febre, & cum aliis symptomatibus, tum vomitu conficta fuit; Febre remittente obmutuit; & totos 24. dies sine voce fuit. Voce reddita, quanquam deliraret, omnium infra caput partium sensus & motus torpere, & ælophago etiam resoluta omnem cibum abhorreere cœpit. Post 6. menses tamen artuum motus restitutus est, manente cibi fastidio. Vniuersum abdomen contabuit, ut ab imis costis ad pubem vsque nihil pristini aquiliculi superfuerit, ut omnes abdominis musculos, intestina, viscera, & reliquas vètris partes detractas putasses: Cætera corporis partes minus exhaustæ apparuerunt. Nam pectus amplum, vbera turgidula, brachia, cru-

ra modicè torosa, facies rotunda, sed fusca, labia rubra, lingua quidem contractior, expeditus tamen sermo, caput pilis longissimis contextum erat, pilique & ungues, imò totum corpus augebatur. Nulla corporis parte excrementa procedebant, non aluo feces, non vesica lotium, non vtero menstruum, non cute sudor aut sordes. Vniuersa v. corporis cutis frigida & licca tangentibus apparebat; vixque vilo motu incallescerebat, etsi in rem familiarem operam suam conferret, obsonium è foro peteret, pauimenti sordes euerteret, colum teneret, fustum rotaret, atque alia huiusmodi ministeria obiret, nullius partis sensu aut motu deficiente. Historiam puellæ in Gallia Narbonensi, quæ tres annos sine cibo & potu vixit, recenset Guilielm. Rondeler. 1. *lib. de piscibus c. 13.*

Guilielm. etiam Fabricius, *cent. 2. obs. 40.* refert, Anno 1595. puellam annos 14. natam è Ducatu Iuliacensi Coloniam adductam fuisse, quæ tribus annis omni cibo abstinuit; ambulauit tamen, cum æqualibus lusit, saltauit, & alia negotia perfecit. Puella Spirensis, quæ quadriennium ab omni cibo abstinuit, Anno 1552. à Ferdinando Romanorum Rege, aliisque Romani Imperij proceribus inspecta est, cuius historiam annorauit Iohan. Langius, *lib. 2. epist. 17.*

Imò & qui longiore temporis spatio ab omni cibo & potu abstinuerunt, comperti sunt. Nicolai cuiusdam Vnderunaldensis Heluetij, qui quindecim annis sine cibo vixit, cum alij, tum D. Iacobus Zuuingerus, in *Epist. obs. 13. cent. 5. Guilielmi Fabricij annexa*, mentionem facit. Mulieris, quæ 18. annis nihil comedit, meminit Petrus Apponensis, in *Commentario in problem. Aristotelis*: Puellæ quæ viginti annis nihil comedit Rogerius Bacho & Martinus Del Rio, *lib. 2. disquisition. magicar. quest. 21.* Fœminæ, quæ 30. annis ab omni cibo abstinuit. Iohan. Bocatius. Alterius, quæ 36. annis nihil cibi sumpsit, Conciliator, *diff. 112.* Viri, seu sacrifici, qui 40. annis Romæ à cibo abstinuit, Rondelerius & Iouberrus; scribitque Rondelerius, *lib. 1. de pisc. cap. 13.* de eo, id ex Leonis Pontificis & multorum Principum custodia & Hermolai Barbari historia fidèque certissimum esse. Et somnus diurnus Epimenidis Philosophi passim notus est, quem in æstu meridiano diuersum in specum somnòque correptum alij 40. alij 47. alij 50. alij 77. annos dormiuisse ferunt, qui etiam vigilans adeo temperans fuit, ut Plutarchus, in *sympoticis & lib. de facie in orbe luna* scribat, illum re ipsa ostendisse, exiguo admodum fomento naturam sustentare animal, si nutrimentum vel oliuæ quantitate summat. Et ex historia Ecclesiastica Nicephori, *lib. 14. cap. 45.* notum, Decio Imperante apud Ephesios septem pueros corporibus iuxta ac animis fratres Christi fideles ob metum tyranni extra urbem in antrum aufugisse, cuius aditum cum persecutores probè extra muniuissent, ij in somnum profundum præ anxio animi mœrore delapsi sunt, atque ita annos 373. dormiuerunt, & diuina prouidentia ita sunt detenti. ut neque corpora neque vestimenta eorum defluerint vsque ad Theodosij tempora. Et extant tales historiæ passim apud authores plurimæ. Vnam atque alteram saltem, quæ in recenti sunt hominum memoria, & nostro seculo acciderunt, addere libet.

In Palatinatu, in pago *Schmidtueiser* præfecturæ Cæsaro-lautreanæ puella fuit Catharina nomine, Viteroris rusticani filia, quæ septem annis sine cibo & potu vixit, quam iussu Iohannis Casimeri, Comitiss Palatini Henricus Smerius & Iacobus Theodorus Medici 24. Nouemb. Anno 1584. & rursum eiusdem Principis iussu Iohan. Postius Medicus aulicus & Valentinus Hennerus Medicinæ Doctor 14. Aprilis Anno 1588. visitarunt, quo tempore parum iterum edere & bibere cœpit, quorum de eius morbo & symptomatibus relationem Henricus Smerius, *lib. 10. suorum miscellaneorum* inseruit. In qua notabile, quod nona hebdomade intensissimi



intensissimi doloris eam vexauerunt, & quod crassam lentamque pituitam, quantam oui gallinacei testa dimidia capere posset, admisto sanguine euomuit, & quod intra sex annos semel saltem octauâ horæ parte dormiuit. Genuenses etiam Medici referunt, Anno Christi 1601. puellam quandam Pedemontanam, 22. circiter annos agentem, hilarem, agilem Genuam translatam fuisse, & custodiâ traditam, deprehensumque nihil præter aquam eam ingessisse, & ita plurimum annum jejuniū tolerasse.

Puellam Mœriensem vltra annos 29. sine cibo vixisse, refert Guilielmus Fabricius, cent. 5. obs. 35. Narratio autem hæc est: Anno 1612. 13. Iulij, cum dictus Guilielmus Fabricius Mœriam veniret, agebat puella illa, nomine Eva *Flegen*, annum 37. vixeratque jam in annum 16. sine vlllo cibo & potu, ab ineunte ætate valerudinaria fuit, & perpetuis capitis doloribus obnoxia, statura fuit corporis mediocri, facie pallida, extenuata. Anno 1597. post F. Paschatos, qui fuit ætatis 21. paulatim ab omni cibo & potu abhorreere cœpit, ita ut intra anni spatium potulenta omnia planè auersata sit. Primo inde quinquennio quolibet tertio die circa ortum Solis se splendido quodam lumine circumfundi, & mellita quadam substantia linguam atque os irrorari, seque inde refocilari aiebat. Cum etiam anno 1612. 11. Octobris in hortum ad preces fundendas descendisset, apparitiones varias habuit. Calor externarum partium erat temperatus, pulsus languidus, obscurus & ferè nullus, interim ordinatus. Incedebat in publicum, sed innixa baculo. Vixit adhuc sine omni cibo ac potu Anno 1619.

Notissima etiam est Apollonia Schreieriana, puella nata in oppido Gars ditionis Bernensis, quæ primo sensum panis, deinde ciborum aliorum omnium appetitum amisit, & iusculis tantum nutrita paulatim illorum etiam vsum abhorruit, & tandem saltem aliquot cochlearia vini aquâ diluti assumens & ejus vsum postea respuit, atque ita aliquot menses sine cibo & potu vixit. Fama ad Senatum Bernensem delata, iussit is & matrem & filiam adduci & in Xenodochio vrbis custodiri & obseruari, num mater filiæ quid clanculum porrigeret. In quam rem cum omni diligentia inquisitum esset, cognitum tandem, eam sine alimento viuere. Fuitque in Helueria circa Annum 1600. & seqq. à plurimis visa, ejusque historiam edidit D. Paulus Lentulus. Notabile in ea hoc, etiam si mulsæ, quarum in hypocausto, vbi illa jacebat, magna erat copia, per faciem aliâque corporis partes denudatas oberrarent, illas tamen nullo modo se percipere, imò ne tempore hyemali se à frigore magnopere lædi affirmavit. In hoc statu perstitit vsque ad annum 1612. vbi circa festum natiuitatis Christi appetitus paulum redire cœpit, pedetentim coctio in ventriculo, hepate aliisque partibus perfici, abdomen, quod antea extenuatum & induratum erat, rursus emolliiri & eleuari, excrementa per consuetas vias iterum excreuit, musculorum, robur recuperavit, & quæ vltra 10. annos à cibo & potu abstinens inualida fuerat, motum recuperare, ambulare, aliâque negotia perficere cœpit. Mentis tamen operationes, quæ per totum inedia tempus integræ fuerant, deprauari cœperunt & *υποψία* quadam affecta fuit.

Tandem historiam recentissimam, quæ ab aliis in literas relata nondum est, asserre libet, puellæ Halberstadensis, quæ annis decem sine cibo, non tamen sine potu vixit. Nata ea est Halberstadij, Anno 1601. 21. Novembris, patre Marthia Bornemann. Anno 1614. mense Nouembri in morbum, procul dubio febrem acutam incidit, quâ 14. dies grauiter laborauit, morbi tempore nihil cibi sumpsit, atque etiam, vbi sana rursus euasit, cibum auersata est, ita ut de die vix plus, quam nummo emeretur, ederet. Accidit postea, ut ad nuptias inuiteretur, vbi cum ab æqualibus ad largius edendum cogeretur, cibumque paulò largius sumeret, iterum per

otidium ægrotare cœpit, ut de vita ejus desperaretur. Hinc ad finem vque vitæ nihil cibi assumpsit, sed potus loco cereuisim, quæ ibi coquitur, singulis diebus ferè sextarium. Si erò ipsa inscia etiam panis in cereuisiam injiceretur, eam non bibit. Corpus quidem satis incrementum sumpsit, bonique fuit coloris: Ipsa tamen fuit debilis, ut viam sedentariam continuò agere cogeretur. Anno 1613. mense Nouembri, accedente terrore & mœstia, obmilites insolentes, quos mater hospitio excipere cogbatur, vitam finiuit.

Verum historiarn satis est. Id jam agendum, ut in ram insolitæ & admirandæ abstinentiæ causas inquiramus. Vbi mira opinio num occurrit varietas. Primò enim nonnulli, ut breuiter sese absoluant, & ne in causis inuestigandis labare cogantur, omnia ea, quæ hætenus narrata sunt, pro fabulosis habent, & multos simulasse potius, quam reuera præstitisse istam inedia dicunt. Et quod Epimenidem in specie attinet, Plinius, cujus tamen scripta rebus mirabilibus & fabulis similimis refertissima sunt, quod de illo fertur, eum puerum æstu & itinere fessum 57. dormiuisse annis, rerum faciem mutationemque mirantem, veluti postero expositum die, pro vero venditare non audet, sed magna fabulositate tradi scribit, lib. 6. *Natural. Histor. cap. 52.* Et Aristoteles, lib. 4. *Physic. cap. 11.* ea, quæ de iis, qui in Sado ad Heroas diu dormiuisse dicuntur, in fabulis natari scribit: neque res ipsa rationi consentanea videtur. Cum enim vita sine calore naturali consistere non possit, qui in humido radicali consistit, calor verò hic humidum innatum depopuletur & id proinde necessario instaurandum sit: Omnino consequi videtur sine cibo vitam consistere non posse. Verum enim verò sit, an, ut fabulosa quædam hisce admisceantur, & apud Poëtas præcipue & fabularum Scriptores talia quædam occurrant, in quorum veritatem, quia remota longè seculis accidisse dicantur, inquirere fas non est: tamen & nostra & patrum & aorum memoria plurimæ hujus rei extant historiæ, vbi ipsius magistratus iussu omni diligentia & cautione adhibita in rei hujus veritatem inquisitum est, eamque ita sese habere certissimè compertum. Quapropter res multorum fide dignorum testimonio confirmata, in dubium non vocanda, sed causa potius quærenda, quo modo cum tam diuturnâ inedia calor innatus & vita consistere possit.

Secundò sunt alij, qui etiam sese breuiter expediunt, & ad miraculum confugiunt; & cum Hippocrates, lib. de principiis scribat, hominem si 7. diebus nihil comedat, moritutum, & Plinius id ad 11. diem extendat, existimant, si qui vltra id tempus jejuniū tolerauerint, id virtute diuina præstitisse, idque probant exemplo Moysi, Eliæ Prophetæ, historia septem dormientium, & Ludouici Pij Galliar Regis, qui vltimis 40. vitæ diebus post sumptum SS. Eucharistiæ Sacramentum ab omni cibo & potu abstinuit, ut & Nicolai Heluetij Eremitæ & aliorum quorundam vitæ sanctimonia clarorum. Et omnino fatendum est jejuniū illud Moysi, Eliæ, 7. dormientium miraculosum fuisse, neque negandum, Deum O.M. idem omnipotente virtute præstare potuisse & posse. Verum in causis rerum reddendis non statim ad Deum causam supremam recurrendum, neque credendum, Deum sine causa miracula edere. Ideoque in iis, qui vitæ sanctimonia non excellerunt, nec aliud quid diuinæ præ se rulerunt, jejuniū hoc ad diuinam potentiam non referendum, neque credibile puellâ illâ Pedemontanâ, quæ Genuæ ad cytharæ choreas ducere & canere consueuerat, ut & alios plurimos, imò etiam Ethnicos, in quibus nulla miraculi causa subfuit, diuinâ virtute sine cibo cōseruatos fuisse.

Tertiò eadem ratio est illorum, qui ab angelis bonis talibus hominibus clam, & aliis non animaduertentibus cibum suggeri asserunt. Etenim cum boni angeli nihil, nisi quod ipsis à Deo Opr. Max. mandatur, agant, nihil, nisi quod ipsis à Deo Opr. Max. mandatur, agant, non

*Causa longa abstinencia.*

*An qua longa abstinencia habentur exempla, omnino fabulosa sint?*

*An in reddendis diuturnis abstinencia causis statim ad miraculū confugiendum sit?*

*Deum non edis miracula sine causa.*

*An ad Angelos bonos in causa reddenda confugiendum?*

nondum probatum, Deum tale qui iſtis injunxiſſe. Et, vt ante dictum, inter eos, qui à diurna abſtinentia clari ſunt & Ethnici fuerūt, & alij, in quibus nihil ſingulare & quod miraculum requirere debuiſſet, apparet.

An illa corpora, quæ diu abſtinuerūt, venera fuerint vincta?

Quartò, ſunt nonnulli in ea opiōne, ea corpora, quæ diu ab omni cibo abſtinuerunt non fuiſſe verè viuentia, ſed cadaueria à Dæmone aliquo aſſumpta & mortua. Verum enim verò etſi non negemus, Diabolum cadauer aliquot diebus à putredine præſeruare poſſe, & tale cadauer etiam Louanij ex ædibus Cornelij Agrippæ in forum deduxiſſe, de conſenſu & diſſenſu Chymicorum cum Galenicis c. 18. dictum eſt; tamen in iis, qui diu ſine omni cibo & potu vixerunt, id factum non fuiſſe, eorum actiones ſatis teſtantur. Et in primis, quod obſeruatum, ſcæminas quaſdam & iis poſt diuturnam abſtinentiam iterum cibum ſumpſiſſe, nupſiſſe & liberos procreaſſe.

An à Dæmone fuerint obſeſſa?

Quintò, ſunt alij, qui quidentalia corpora cadauera non eſſe, ſed verè viuentia concedunt, ſed à Dæmone obſeſſa eſſe ſtatuunt, cujus op. jejuniū tam diuturnum ferant, qui clanculum iſti cibum in corpus inſinuet, etiam iſtis non animaduertentibus, & clam quoque excrementa tollat. Ita Proper Aquitanicus, lib. de promiſſ. & prædeſt. cap. 5. refert, iuuenem quandam Arabiam, quæ Carthagine à Dæmone obſeſſa fuerat, tres ferè menſes jejunaſſe, & tandem ſumpto S. S. Euchariſtiæ Sacramento liberatam fuiſſe, & retuliſſe, noctu ab aue liquorem quendam in fauces ſibi inſtillarum fuiſſe. Et quidem negandum non eſt, homines à malo ſpiritu obſeſſos diu jejuniū ferre poſſe, Dæmone vel clam cibum ſubminiſtrante, vel alio modo corpus ſine cibo conſeruante: quod tamen omnes diu abſtinentes obſeſſi fuerint, nulla ejus habentur indicia, imò plurimas ex iis precibus, lectiōni S. S. Literarum, & aliis pietatis exercitiis deditas fuiſſe, ex iſarum hitoriis patet. Et licet Dæmon, qui homines obſidet, ſæpe diu latet: tamen tandem ſe prodat, quod in his non factum. Et cum quædam animalia tota hyeme ſine cibo viuunt, cur non etiam in hominibus diuturnæ abſtinentiæ cauſa naturalis dari poſſit?

An peculiare caſi influxus huius abſtinentiæ cauſa ſint?

Sextò ſunt, qui cauſam diuturnæ abſtinentiæ ad peculiare cœli influxus referunt. Cum enim certum ſit, cœlum in hæc inferiora non ſolum lumine & motu, ſed & occulta influentia agere, & multas rerum multarum cum cœlo ſympathias eſſe, etiam huius mirandi effectus cauſam in cœlum referendam putant. Verum enim verò non negandum cenſemus, cœlum etiam occulto modo & influentia in hæc inferiora agere, & quidem non ſolum vt cauſam communem hæc inferiora afficere, verum ſingulorum etiam hominum temperamentum à cœli influxu determinari: tamen hiſce omnibus conceſſis, cœlum non eſt proxima huius diuturnæ abſtinentiæ cauſa, ſed iſum corporis temperamentum & conſtitutio, quæ qualis ſit, & à quo cœli influxu ea fiat, & cur tam rari ſint, qui hanc inediaſſe poſſunt, nondum explicatum. Imò ſi hitorias plurimorum, vt puellæ illius in pago Schmidtwiler, & Apolloniæ Schreierianæ, & puellæ Halberſtadienſis perpendamus, abſtinentia iſta non à naturali corporis conſtitutione, ſed morboſa & præternaturali prouenit.

An occultæ qualitates eius cauſa ſint?

Septimò reperiuntur, qui ad occultas proprietates confugiunt, & quidem eas, quæ indiuiduis propriæ ſunt, qui prolixè & multis exemplis adductis probant, dari multas rerum ſympathias, quæ ad cauſas manifeſtas reduci non poſſunt, ſed procul dubio ab occultis qualitibus dependent, vt quod alij caſeum, alij poma, alij vinum auerſantur, alij felis præſentiam ferre non poſſunt. Et omnino verum eſt, dari tales occultas qualitates, & operam ludunt, ac deridendos ſe propinant, qui omnium, quæ in natura accidunt, cauſas ad qualitates primas referre conantur, vt alibi plurib. probaui. Verum hoc loco ad talem indiuidualem proprie-

tatem recurri non poſſe vel ex eo patet, quod nemo eorum, qui diu jejunaſſe, toto vitæ tempore jejunaſſe. Ideoque potius ad cauſam præternaturalem, quam congenitam indiuidualem proprietatem hic recurrentum. An verò in illa ipla cauſa præternaturali aliquid occulti ſit, poſtea dicetur.

Octauò, inueniuntur, qui iſtam diuturnam abſtinentiam in conſuetudinem referunt, quæ habitum quaſi contraxerint, quo diu abſtinentiam tolerare poſſint. Cum enim compertum ſit, medicamentis, imò veneno quodaſdam ita aſſueuiſſe, vt ejus uſu nullo modo læderentur, ſicut de puella illa Napello nutrita hitoria narratur, & Galenus, 3. de ſimpl. med. facult. c. 18. refert, anum Athenienſem ab exigua portione cicutæ incipiendo magnam eius portionem poſtea ſine damno deuoraſſe: Exiſtimant etiam impoſſibile non eſſe, hominem conſuetudine eò adduci poſſe, vt diu inediaſſe tolerare poſſit, & occurrunt exempli in hitoriis eorum, qui ſitim tolerare aſſueui, in tota vita poſtea amplius non biberunt. Et Cardanus refert, quendam Leonhardum Pictorienſem ſenſim eò ſe traduxiſſe, vt ſemel tantum in hebdomade cibum ſumeret; Inueniuntque Scorum aſſuetum fuiſſe uſque ad 20. vel 30. dies inediaſſe tolerare. Verum conſuetudinis maximam quidem vim eſſe certum eſt; non tamen in omnibus locum habet, ſed certa ſaltem opera ſunt, in quæ jus habet conſuetudo. Etenim in ſenſus actiones nullam poteſtatem habet, neque quis poteſt aſſueſcere, vt non olfaciat, ſentiat, vel non reſpiret: in quo genere etiam eſt nutritio. Neque quis conſuetudine efficere poteſt, vt non nutriatur vel augeatur, & proinde etiam aſſueſcere non poteſt, vt nutrimentum corpori nutriendo & augendo neceſſarium non aſſumat & ſine vilo cibo uiuat. Etſi qui parçè viuere aſſueui ſunt, diutius, quam alij voraces, tamem tolerare poſſint. Aſt ſi hitorias eorum, qui diu ſine alimento vixerunt, perpendamus, animaduertemus, pleròſque & ferè omnes non conſuetudine inediaſſe tolerantiam contraxiſſe, ſed nonnullos ſubito & repente ab omni cibo & potu abſtinuiſſe, plurimos etiam eorum ad priſtinum edendi uſum ſine damno rediſſe: Cum quæ longiore conſuetudine in habitum quaſi abierunt & conſumata ſint, facile mutari non poſſint. Longè verò alia ratio eſt eorum, qui venenis ſunt aſſueui. Venena enim talia è plantis perita (nam vt metallicis illis, quæ nihil habent alimenti, homo aſſueſcat, fieri non poteſt,) cum partes quaſdam habeant admixtas, quæ corpori alendo aptæ ſunt, ſi exigua quantitate ſumantur, vincuntur à calore corporis, & portio alimentaris quidem in nutrimentum corporis abit, venenatum verò è corpore ejicitur, quæ tamen aliquantiſper corpus alterat, quæ alteratio ſæpius repetita latenter corpus pro ſua naturæ ratione diſponit, vt poſtea etiam in maiore copia ſumptum venenum corpori amplius non noceat. At ſine alimento viuere, cum naturæ corporis planè & abſolutè repugnet, nulla conſuetudine ad id homo deduci poteſt.

Nonò, Plurimi, ijque non vulgares Philoſophi & Medici in ea ſunt ſententia, eos, qui diu ſine cibo vixerunt, aëre, quem inſpiramus, nutritos fuiſſe; etſi eo non puro, ſed cum aliis elementis mixto. Cum enim corpus noſtrum triplici ſubſtantia conſiſt, ſolidis partibus, humoribus & ſpiritibus, triplici etiam alimento id egere, cibo, potu, aëre. Et ſi accidat, aut vi morbi alicujus calor ita debilitetur, vt ſolam tantum aëream ſubſtantiam diſſipare poſſit tunc etiam ſolum aërem ad corpus nutriendum & reficiendum ſufficere. Atque huius rei documentum, afferunt Chamæleonem qui referente Plinio, lib. 8. cap. 33. hiantem ſemper ore ſolus animalium nec cibo nec potu alatur, nec alio, quam aëris nutrimento nutriatur. Quod etiam de cane leui apud Indos ferunt, & vt apud Scaligerum, exerc. 228. & 229. ſect. 2. videre eſt, auem illam Indicam apodem, vulgò Manucodiatam, incolis etiam auem paraſi dictam, quia

An conſuetudo diuturnæ abſtinentiæ cauſa eſſe poſſit?

Quam ab cauſam venenis homo aſſueſcere poſſit?

An aëre nutriti fuerint, qui diu abſtinuerunt?

quia primum ex incompertis locis deciduum Mahumerani sacrificuli paradiso Molucarum Regi olim missam esse, imperitis persuaserunt, perpetuò in aëre vivere, nec terram unquam nisi mortuam contingere scribunt. Verum etsi hoc loco de nutritionis causis & alimentum necessitate nonnulli multa disputant, iis tamen omisissis, hoc, quod ab omnibus concessum, præsupponimus, nutritionem esse conuersionem alimenti in corporis nostri substantiam, & proinde alimentum corpori nutriendo simile esse debere, atque ita non solum spirituum refectione, quam per aërem fieri posse sanè jam admittamus, corporis nostri nutritionem absolui posse, sed solidiori alimento opus esse. Et cum sanguis solus sit totius corporis nutrimentum, aërem, siue ut simplex, siue ut impurus consideretur, in sanguinè mutari non posse, & ita ad nutritionem, qua totum corpus conseruari debet, non sufficere. Illa enim solum ad animalium corpora nutrienda apta sunt, quæ sunt perfectè mixta, & quidem non omnia, sed solum vel partes vel fructus animatorum. Quæ verò ad istam sententiam probandam de Chamæleone afferuntur, longè aliter se habent & qui diligentius in hujus animalis naturam inquisierunt, animaduertunt, ut Scaliger, *Exerc. 196. sect. 4.* refert, animal hoc habere linguam sesquipalme longam, exsertam & vibratam mucosque oblitam, qua locustas, muscas, formicas, scarabæos & alia insecta capiat iisque alatur. Eadem ratio est canis leuis apud Indos, qui cum sit animal pingue admodum ac tardissimi motus, non credibile est, ipsum aëre ali, sed etiam insectis, quibus aër ille est refertissimus. Ita nec Manucodiatarum aëre solo vivere credibile est; nec sufficit, quod Scaliger scribit, qui dedit illi aërem pro cibo, dare potuisse concretionem aëris ad cibum. Neque enim quid Deus possit, hic quæstio est, sed quæ ratione Deus hanc naturam constituerit? Is animalibus sua corpora dedit, eaque similibus ali voluit, non puris elementis. Quapropter & apodibus Molucanis linguam dedit, quam & Brasilicas habere credibile est. Habent & ventriculum, qui non aëris causa factus. Neque simpliciter sunt Apodes.

Decimò. Cum ergo alij viderent, minus probabile esse, animalia aëre simplici ali posse, statuerunt, istos, qui diu sine cibo vixerunt, odoribus seu exhalationibus, quæ aëri permiscuntur, nutritos fuisse. Ex corporibus enim sublunaribus perpetuò *ἀπορροιαί* & effluvia fieri certum est, patetque id maximè in rebus odoratis, quæ continuè odorem spirant, qui plerumque cum exhalatione & corpore vaporoso conjunctus est. Et quidem exhalationes eæ non solum sunt corpora imperfecta mixta, sed exactissimè mixta, corporisque ejus naturam, à quo exhalant, referentia. Imò nihil aliud sunt ejusdem exhalationes; quam corpora mixta, in minimas atomos sui generis resoluta. De quibus Lucretius;

*Vsq̃ adeo omnibus ab rebus res quæque fluenter  
Fertur, & in cunctas dimittitur undique partes,  
Nec mora nec requies inter datur ulla fluendi.*

Hos ergo vapores, si cum aëre, quem inspiramus, attrahantur, & ejus calor sit analogus, in sanguinem, è quo totum corpus nutriatur, conuerti putant. Imò existimant, extra corpus humanum tales vapores in materiam corpori alendo aptam, in rorem scilicet, quo cicadæ nutriantur, esse Aristotele, *5. de histor. animal. cap. 30.* Mannam, quæ non solum est medicamentum sed & alimentum; mel, quod è floribus apes legunt, quodque homini optimum alimentum suppeditat mutari. Atque ad hujus probationem afferunt exemplum canis leuis Indiæ Occidentalis, & Manucodiatæ, quorum etiam antea facta est mentio, & præterea Pyraustæ animalis pennati, paulò muscis majoribus grandioris, quod ut Aristoteles, *5. de Histor. anim. cap. 19.* refert, viuit in ærariis Cypri fornacibus inter flammæ; ut & Democritij Abderitæ, qui teste Diogene Laertio, *in eius vita*, cum jam morti proximus vide-

retur, merentem sororem, quod ipse in festo Cereris moriturus impediret, ne vota Deæ exsoluere posset, bono animo esse iussit, panesque calidos sibi quotidie afferri mandauit, eosque naribus admouit, & ita toto triduo, quo festum Cereris durauit, vitam sustentauit. Et videmus in Lipothymia spiritibus deficientibus nihil hominem citius reficere, quam odores. De quo Hippocrates *lib. de alimentis*; quicumque veloci refectione opus habent, his humidum ad vires reficiendas remedium optimum, quicumque adhuc velociori indigent, per olfactum.

Verum sit sanè, aërem istum, in quo viuimus, nunquam planè purum esse, sed exhalationibus permixtum: tamen exhalationes illæ aëri permixtæ corpori nutriendo non sufficiunt. Cū enim, quod antea dictum, totius corporis nutrimentum sanguis sit, sanguis verò in hepate è chylo generetur, exhalationes autem illæ in sanguinem conuerti non possint, etiam corpus nutrire non valent. Et si cor sufficeret ad vapores hosce in sanguinem mutandos, cur non vbiuis multi viuunt, qui cibis abstinent, & solis istis vaporibus nutriuntur? Et quod odores alendi vim non habeant, pluribus ab Aristotele, *de sensu & sensibili cap. 5.* & Interpretibus in eum locum demonstratum est, quæ breuitatis studio hîc non afferro. Quod verò exempla illa attinet, quibus probare conantur, exhalationes illas etiam extra corpus animalium in materiam alendo corpori idoneam mutari, & primò quidem rorem, quo cicadæ alantur, saltem vulgi sententiam, Aristoteles, *5. Hist. animal. cap. 30.* refert, & Virgilius recitat, dum canit:

*Dumque thymo pascuntur apes, dum rore cicadæ;*

Ipse verò Aristoteles, dum è sua sententia loquitur, *4. de part. animal. cap. 5.* docet, cicadas habere partem in usum tum oris tum linguæ aptissimè constitutam, qua veluti radice cibum ex humoribus trahat. Aluntur nimirum cicadæ misturâ ex rore & excremento quodam quasi melleo arborum constante. Vnde etiam Aristoteles, *5. Histor. animal. cap. 30.* cicadas non oriri docet, vbi arbores defunt. Eadem ratio est mannæ & mellis. Nam ut de Manna, quâ Hebræi quadraginta annos in deserto vixerunt, jam non dicam, utpote quod non à causis naturalibus, sed solius Dei infinita potentia prouenisse multa testantur, vulgare manna ex solo rore non constat. Etenim ros calore non concrescit, sed attenuatur & in auras abit; Manna verò calore coquitur, & mistum corpus est ex rore & humore quodam è plantis quibusdam exsudante. Etsi enim & super lapidibus quibusdam concrescit: tamen in iis non immediatè generatur, sed ex herbis & arboribus in eos decidit; imò manna ex arboribus quibusdam resudat, refertque Iohan. Baptista Porta, *in sua Villa lib. 6. cap. 5.* in quibusdam locis emanare manna fere melleum. Et in Calabria præcipuè in ornis & fraxinis colligitur, quarum frondibus adhæret. Imò si vesperti ornus & fraxinus linteo tegatur, ne rorem excipiant, nihilominus manna ex iis colligitur. Eodem modo sese de melle res habet. Neque enim illud ex solo rore constat, sed est liquor è rore & vapore ac humore è stirpibus & floribus exsudante mistus, ab apibus collectus & in mel mutatus. Quamquam enim, ut Galenus, *3. de alimen. facult. cap. 39.* hac de re pluribus scribit, etiam mel sub plantarum foliis colligitur, & in monte Libano agricolæ coriæ supra terram extendunt arborisque excutunt, & quod ab eis defluit excipiunt, & ollas ac fictilia melle illo, quod roscidum appellant, implent: tamen mel illud non est ros, sed vapor è plantis in altum eleuatus, mellis naturæ cognatus, qui in aëre condensatus super plantarum folia decidit, & quia non purus est, sed etiam aliquâ acrimonia præditus, plantarum folia corrumpit. Manucodiatas & canem leuem Indicum solo aëre aux vapore non ali, antea dictum.

dictum, Pyraustas quod attinet, etſi in flammis viuunt, tamen & in iis materiam ſuo corpori alendo apam inueniunt, ex lignis accenſis. Et ſit ſanè, animalcula quædam imperfectiora vaporibus in aëre eleuatis alit: tamen non ſequitur, etiam hominem iſdem nutrirī poſſe. Etenim homo animalium perfectiſſimum, ideoque etiam alimento maximè elaborato indiget, nec ipſi omnia, quæ aliis animalibus alimentum præbent, id præſtare poſſunt. Democritus vero Abderita licet in extrema ſenectute conſtitutus & calore naturali & ſpiritibus jam deficientibus odore panis calorem influentem jam emorientem, ſpiritusque deficientes non nihil refocillarit, atque ita quatrimum vitam protraxerit: tamen non ſequitur, per multos meſes & annos idem fieri poſſe. Eadem ratio eſt in Lipothymia reſectionis illius ſubita, de qua Hippocrates, in qua vinò & aliis rebus odoratis & ſpirituosis tum hauſtis tum naribus admotis ſpiritus deficientes recreantur: Non verò hoc modo vlla vera nutritio perficitur, qua homo in plures annos vitam protrahere poſſit.

An aqua ſimplicis poſſit abſtinentiam vitam produxerint?

Vndecimò ſunt, qui vno ſimplicis aquæ potu abſtinentes illos, de quibus agimus, vitam produxiſſe opinantur. Atque ad id probandum vtuntur eo, quod non ſolum plantæ, ſed & animalium multa genera ea nutriantur. De plantis enim res manifeſta eſt, quod aqua irrigatæ creſcunt & augentur ſine terræ, in qua hærent, vt putatur, imminutione. De piſcibus etiam ſcribit Ariſtoteles, 3. de part. animal. cap. 8. eos aquam allumere, non potus, ſed cibi gratia. Et puella illa Spireniſis Ferdinandi Imperatoris tempore ſolius aquæ uſu aliquot annis vixit. Etenim aqua illa, quæ vtimur, non elementum ſimplex eſt, ſed aliorum alimentorum aliquid admixtum habet, & propterea ad alendum incommoda non videtur.

Verum enim verò etſi negandum non eſt, etiam ad corporis noſtri, vt perfectè mixti, conſtitutionem aquam requiri: tamen aqua ſimplex hoc non præſtat, ſed quæ jam pars eſt perfectè mixti. Simplex verò aqua non cedit in nutrimentum corporis, ſed inferuit tantum ad calorem refrigerandum & eſt οὐκ ἔστι τροφή & vehiculum, quo alimentum commodius per vniuerſum corpus diſtribuitur. Corporis enim noſtri nutrimentum mixtum eſt corpus & in corporis noſtri ſubſtantiam, cuius forma eſt anima, mutari debet. Et propterea potentiam habeat neceſſe eſt ad induendam formam corporis viuientis; quale miſtum non eſt aqua, etiam ſi impura ſit. Et omnino ſi aqua corpori alendo utilis eſſet, impura & craſſa conuenientior eſſet; cum tamen certum ſit, quod purior aqua eſt, eò ad cibos coquendos eſſe conuenientior. Quod verò ea attinet, quæ ad contrarium probandum afferuntur, id non euincunt. Primò enim ſit, vt aliquis eorum, qui diu ſine alimento vixerunt, ſolam aquam biberit: tamen contra plurimi ſunt, qui nec aquam biberunt. Et licet vna illa puella Spireniſis aquam biberit: tamen eam in alimentum ceſſiſſe nondum probatum. Plantæ verò ſola aqua non nutriuntur, ſed radicibus ſuccum à terra miſtum attrahunt, cui aqua tantum vehiculi loco eſt, ideoque plantæ ſine terræ imminutione non aluntur. Et propterea ſtercoratione opus eſt, quæ niſi fiat, plantæ commodè ali & conſeruari non poſſunt. Eadem ratio eſt piſcium, qui non aqua pura nutriuntur, ſed craſſo quodam ac limoſo ſucco, qui ad fundum ſubſidet, vel aquæ permiſtus eſt.

Plantæ ſola aqua non nutriuntur.

An terræ etiam ingeſtæ vitam ſubſtituant?

Duodecimò ſunt quidam, qui tales, qui diu ſine cibo vixerunt, terræ clam ingeſtæ vitam ſuſtentariſſe putant. Compertum enim eſt, ſæpè infantes & grauidas terram ac cretam auidè comedere; & Ariſtoteles, 8. de hiſtor. animal. lupos fame cruciatos terram deuorare, & propterea γαστήρας appellari ſcribit; & ſerpentes ac buſones terra ali vulgò fertur. Et Monardes, lib. 2. de med. India Occidentalis, refert, reperiri apud Indos animalia, nomine Armadilli & Ca-

dart, quæ in terra veluti talpæ degentia terra nutriantur.

Verum enim verò nec hoc cum experientia conſentit. Cum enim plurimi ex iis, qui diu vixerunt ſine alimento, diligenter cuſtoditi ſint, non animaduertimus, eos vel terram ingeſſiſſe. Deinde licet compertum ſit, infantes & grauidas terram, cretam & ſimilia ingeſſiſſe: tamen ea nullo modo ceſſerunt ipſis in alimentum, aliſque cibis nutriti ſunt. Quæ verò exempla afferuntur animalium, quæ terræ veluti dicuntur, non ſatis clara ſunt, neque extra dubium; cum & illa animalia plantis veſcantur. Et ſit ſanè, quod animalia quædam ignobiliora terram vorant, ea tamen propterea homini alimentum eſſe non poſſunt.

Atque hi autores omnes materiam, qua iſi, qui cibo & potu vulgari omni diu abſtinerunt, nutriti ſint, extra hominem quaſiuerunt: Sunt jam alij, qui eam in ipſo corpore hominis reperiri putant.

Eorum, qui in ipſo homine huius rei cauſam quaerunt, ſententia.

Decimotertiò enim ſunt non pauci, qui diuturnæ huius abſtinentiæ cauſam, in pituitam crudamque ſuccum in corpore redundantem reſciunt, ſtatuantque, ubi in corpore calor eſt debilis, multum crudi humoris & pituitoſi ſucci generari & cumulari, qui cum à calore debili non niſi lenſim & longo tempore abſumi poſſit, homini diu ad corpus nutriendum ſufficere, atque ita illum diu ſine aliorum ciborum uſu viuere poſſe, præſertim ſi cutis denſitas accedat, ob quam parum exſpirat, idemque ipſis accidere, quod animalibus, quæ hyeme latent, & ſine cibo meſes aliquot viuunt.

An pituita in corpore redundantis abſtinentiæ cauſa ſit?

Verum enim verò nec hæc opinio veritati conſentanea eſt. Etenim non omnes, qui diu ſine cibo vixerunt, pituitoſi fuerunt, & crudo ac pituitoſo ſucco abundarunt. Cum enim qui crudo ſucco abundarant, præcordia inflata, & totum corpus tumidum habeant, in plerisque nihil tale conſpectum eſt, ſed plerique ventrem contractum & totum corpus emaciatum habuerunt, & plerique poſt febres acutas in hunc morbum lapſi ſunt, & potius melancholici, quam pituitoſi humoris ſigna adfuerunt; cum puellæ pleræque taciturnæ ac meticuloſæ fuerint, atque etiam delirant. Et ſi pituitoſus humor cum calore debili cauſa huius mali eſſet, plerique ſehes diu ſine cibo viuere deberent, cum pituitoſo ſucco abundent, & calorem debilem habeant. Neque ex voracitate & inglutie in hunc morbum inciderunt, ſed ex aliis cauſis, & præcipue morbis acutis. Neque etiam cutis eorum frigore occluſa fuit, vt animalibus nonnullis tempore hyberno accidit. Atque in cæteris etiam longè alia eſt ratio brutorum animalium, quæ tempore hyberno à cibo abſtinent. Hæc enim animalia ad meſes tres vel quatuor ad ſummum cibum non ſumunt, Et fieri poſſet, vt tantam crudorum ſuccorum copiam antea congerant, quæ ad alendum ea per meſem vnum atque alterum ſufficiat, præcipue accedente frigore hyberno, quod calorem debilitat, ne potentiùs in corpus animalis agat, poroſque claudit, ne multum diſfluat. At longa alia eſt ratio hominum, qui pluribus annis à cibo abſtinent, & nihil tale, qualiæ bruta quædam tempore hyberno, paſſi ſunt.

Decimo quarto fuerunt, qui corporis nutrimentum in diu à cibo abſtinentibus in colliquamentis quibuſdam partium internarum quaſiuerunt, ſtatueruntque, colliquari poſſe non ſolum adipem, ſeu pinguedinem, ſed & humiditates illas ſecundarias, per partium ſubſtantiam diſperſas, nondum tamen illis oppoſitas: imò ipſam partium ſubſtantiam, atque talia colliquamenta in ſanguinem, è quo primum generata ſunt; mutari, probantque id eo, quod illi, qui diu à cibo abſtinent, emaciantur, & inprimis venter eorum extenuatur, pinguedine, quæ in eo plurima eſt, planè abſumpta.

An colliquamenta quædam partium internarum abſtinentiæ cauſa ſint?

Verum etiam ſi à vero alienum non ſit, tales colliquationes



tionem in corpore humano fieri: tamen id, quod colligatur, non in ventriculum confluit, & in chylum, atque ex hoc in sanguinem mutatur, sed vel per ambitum corporis & cutem, seu sensibilibiter seu insensibiliter discutitur, vel in ventrem confluit, & per alium excernitur. Et licet in inedia pinguedo absumatur; tamen hoc non ideo fit, quod in reliquarum partium substantiam mutetur: sed quia facilis est dissipatio, citissime, nisi continuo per alimentum instauretur, absumitur.

Decimoquinto, Alij ad humorem melancholicum abstinentiae causam referunt, historisque abstinentiam suam sententiam probant. Scotus enim ille, qui quadraginta diebus in turri Londinensi clausus sine omni cibo vivebat, erat melancholicus & fatuus, & ex Alberto Magno referunt fuisse melancholicum, qui diebus pene 30. ab omni cibo abstinuit, solo aquae potu contentus.

Et ut Brassauolus, 3. de viſt. rat. in acut. text. 44. scribit, quod Philippus Riminaldus, qui per multos dies ab omni cibo potuque abstinere consueverat, succo melancholico erat refertissimus; & plures puellae, quae sine cibo diu vixerunt, delirarunt & Epilepsiam passae sunt; nonnullae etiam ex metu in hoc malum coniectae sunt.

Verum etsi simpliciter in Melancholiam diuturnae abstinentiae causa referri non possit, cum multi sint melancholici, aut qui melancholico humore abundant, nec tamen à cibo abstinent, quin potius nonnulli voraces sunt: tamen veri etiam aliquid hanc sententia includit, cum certum sit, omnes penè, qui diu à cibo abstinerunt, humore melancholico abundasse.

Verum cum affectus determinati determinata causa quaerenda sit, qua ratione ad affectum hunc producendum melancholicus humor concurrere possit, postea dicemus.

Tandem praeter ceteris prolixè & operosè de hac affectione scripsit Fortunius Licetus, Professor Patavinus clarissimus, quatuor libris de his, qui diu vivunt sine alimentis, editis. In quorum tertio, ubi suam sententiam explicat, probandum suscipit, in talibus omnibus, qui diu sine alimento vixerunt, nutritionem corporis cessasse. Cessare autem posse nutritionem in corpore vivente probat, seminibus plantarum, quae diu viventia & vegetantia sine nutritione conservantur; quorum, quae etiam diu sine nutritione integra manent; ramorum arborum, radicum & bulborum, quae etiam diu saepe integra & viventia sine nutritione servantur; imò plantarum, quae tota hyeme à nutritione oriantur. Praeterea animalia etiam multa longo tempore nihil cibi assument, ut supra multis exemplis probatum, eaque non solum imperfectiora, sed & perfectiora, ut Aristoteles habet, 8. Histor. animal. cap. 16. Et de hirundinibus res certa est, plurimas non in Africam avolare, sed adveniente hyeme in unam congeriem quasi colligatas, sub aquis demersas jacere, & à piscatoribus saepe rebus earum magnam copiam pedibus, rostris, & alis mirum in modum quasi conglomeratarum extractam fuisse, quae hypocaustis illata reviviscere coeperunt. Testantur quoque Indicarum rerum scriptores in Brasilia anicula esse, quae rostro ex arbore suspensa sex integros menses sine pabulo vivunt, & postea quasi à morte ad vitam redit, unde Incolae Sulcitarum vocant.

Verum haec plana sunt, & cum experientia consentiunt, neque operosa probatione indigent. Acciduntque haec hisce animalibus secundum naturam & singulis annis. Verum cum homo nobilioris naturae sit, nec, dum secundum naturam se habet, unquam comperitur sine alimento vivere; etiam hinc planum est, nutritionem in eo nunquam cessare posse. Probare quidem conatur Licetus etiam in homine nutriendi functionem aliquandiu cessare posse, neque necessarium esse putat, ut ea etiam ad longum tempus cessante vita periclitetur; Idque ratione animae, tum ratione corporis, tum ratione

totius demonstrare conatur. Primum enim animam quod attinet, cum functio nutriendi animam posterior sit, & ab anima fluat, ipsam animam, utpote prius & non dependens, sine functione esse posse, & sicut homo longo tempore potest jacere & non ambulare; ita etiam à nutritionis actu cessare posse. Praeterea cum homo à ratiocinationis & sensus actionibus, in quibus animae perfectio consistit, diu cessare possit, multo magis à nutriendi facultatis actionibus, quae ignobiliores sunt, cessare posse existimat.

Verum enim verò concedimus sane, actiones ad essentiam animae non pertinere, sed ab ea fluere, & ea posteriores esse. Verum nutritio non animae, sed compositi, & corporis viventis affectio est, & hoc probandum est, quod homo secundum naturam sese habens à nutritione vacare possit, vitam, quae, ut Scaliger, Exerc. 102. sect. 5. habet, est actus animae in corpore, saluam. Longè enim alia est ratio actionum facultatis ratiocinantis, sentientis & mouentis, quam nutriendi. Haec enim simpliciter ad vitam necessaria est, & homo sine nutritione vivere non potest: Illae verò saltem ad vitam meliorem vitam sunt necessariae, clauduque & caecus etiam homo est.

Verum etiam ratione corporis & totius compositi, nutritionem non semper necessariam esse, sed quandoque etiam cessare posse, porro probare conatur Licetus. Neque enim vel ad corporis augmentum, neque ad substantiam, quae indies deperditur, reparationem, neque ad generationem, nutritionem simpliciter esse necessariam putat. Etenim homines non solum in senectute, & post aetatem consistentem non amplius augentur, sed & in juventute augmentum corporis saepe impediri certum est. Deinde etiam sine reparatione substantiae deperditae homines durare posse, eo probare conatur, quod in senibus non tantum apponitur, quantum absumitur, unde contabescunt, & nihilominus multos annos vivunt, quod & iis, qui in juvenili vel virili aetate aetate laborant, accidit. Tandem etiam generatio multis annis intermitteri potest. Et quidem primum & ultimum quod attinet, facile concedimus, sine augmento & generatione vitam integram diu persistere posse. Neque enim istae actiones simpliciter ad vitam, sed ad meliorem & perfectiorem sunt necessariae. Et propterea etiam omnibus aetatibus non competunt. De substantiae verò deperditae necessaria instaurazione sententia Liceti simpliciter admitti non potest. Neque enim senes & aetate laborantes plane non nutriuntur, sed minus saltem, quam par est, unde etiam alimentum assument, quo indies id, quod in iis absumitur, si non totum, saltem ex parte instauratur. Neque enim anima, ut ab aliis actionibus, quae liberae sunt, à nutritione cessare potest, cum necessitati naturae haec actio adstricta sit, unde rectè dicitur: *Venter caret auribus.*

Si verò observetur hominem aliquando sine cibo praeter solitum longo tempore vivere, aliquid praeter naturam ipsi accidisse putandum est, ob quod instaurazione nulla opus sit. Etenim sola appetitus dejectio non sufficit, sed si appetitus solum aboleatur, & nihilominus corpus instaurazione indigeat, nihil verò cibi assumatur, vires deici, & hominem tandem de vita periclitari necesse est.

Quia verò historiis & exemplis multis supra probatum est, plurimos sine vitae dispendio, sine cibo tempore satis longo vixisse, eos instaurazione opus non habuisse colligitur. Cujus rei quae causa sit, jam investigandum. Quod ut commodius fiat, principio explicandum, quae sit necessitas alimentum assumendi.

Vulgata sententia est, ideo id fieri, ut quod quotidie à calore absumitur, instauratur & reponatur. Fortunius

Causa vera, cur nonnulli diu sine alimento vivant?

Cur abimta necessaria sint?

Licetus

Licet verò aliud ſentit, ſtatuique, alimentis ideo opus eſſe, vt calor natiuus à celeri conſumptione humidi primigenij auocetur. Verùm parum rectè. Etenim alimentum non ſaltem ideo aſſumitur, vt objectum præbeat calori natiuo, in quod agat, atque vt is ab actione in humidum primigenium auocetur, ſed reuera alimentum in locum ejus, quod abſumitur, reponitur, & in corporis ſubſtantiam mutatur: Vnde etiam augmentum fit corporis, & ex infante corporis mole paruo homo in ætate adulta in magnam ſtaturam excreſcit, & qui in morbis extenuati ſunt, iterum augentur, & ſæpe craſſiores, quàm antea fuerunt, euadunt. Si enim ſaltem calor natiuus in alimentum ageret, idque abſumeret, illud corpori non apponeretur. Ideoq; cum alimentum eo præcipuè ſine aſſumatur, vt id, quod quotidie abſumitur, inſtauretur, & non poſſibile ſit, ſi quotidie aliquid abſumatur, nihilque in ejus locum reponatur, hominem viuere poſſe, & nihilominus compertum ſit, quoddam ſine cibo diu vixiſſe: hoc jam inueſtigandum eſt, quæ cauſa fuerit, cur in talibus nulla inſtauratione opus fuerit. Rectiſſimè autem hæc reſpondetur, hoc ideo factum, quia nihil abſumptum fuit, aut certe non niſi longo tempore aliquid abſumptum fuit. Atque ita primaria quaſtio in hac controverſia hæc emergit, cur in nonnullis corporibus nihil diſcutiatur, aut abſumatur, vt nullo alimento quo aliquid deperditum inſtauretur, opus ſit. Nonnulli quidem duas cauſas afferunt, & nunc à calore debili, nunc à materiæ diſpoſitione id pronenire ſtatuunt. Calorem enim quandoque tam debilem quandoque tam debilem eſſe ſtatuunt, & tam exiguum, vt nihil de corpore animalis deprædetur, ſed in eo ſtatu, quo id inuenit, relinquat. Verum enim verò hæc equidem de cauſa muſcæ & ſimilia infecta hyberno tempore quaſi mortua delireſcunt, & hirundines in aquis, ſerpentes & glires, ac muſes montani, & hujus generis alia animalia in cauernis ſuis latent, calore ipſorum ab ambiente aëre frigido valdè alterato, & ad interiora repulſo. At cum ii, qui diu ſine cibo viuunt, non ſolum animæ vegetantis operationes perficiant, ſed & alias animæ ſentientis & rationalis actiones expeditas habeant, ſentiant, moueantur, rariocinentur, in iis cauſa diuturnæ abſtinentiæ in caloris debilitatem aut tranſpirationem prohibitam referri non poſſe ſed in materiam, quæ ita ad calorem ſeſe habeat, ſicut materia lucernarum perpetuatur. Et proinde cauſa diuturnæ abſtinentiæ ſtatuenda eſt, humoris, qui corpus noſtrum conſeruat, ea diſpoſitio, vt à calore noſtro abſumi non poſſit. Hoc tamen interim non negamus, inter iſtam materiam ad calorem variam eſſe poſſe proportionem. Nam calor nunc fortior eſt, nunc debilior. Si calor ſit ſaris validus, materia tamen ſaliter diſpoſita, quæ actionem ejus ſuſtinere poſſit, hoc modo affecti integros habent ſenſus, expedite mouentur & ſuas actiones peragunt. Si verò calor ſit debilis, tantus tamen, vt non ſolum ad actiones animæ vegetantis, ſed & ſentientis edendas, verum debiliter edendas, ſufficiat, hoc modo affecti ſunt ſomnolenti, taciturni, ad motum pigri, lecto plerumque affixi, ſenſimque contabescunt, vitæque tam diu durat, quam diu calor natiuus, is verò tam diu, quam diu humidum ſuppetit, à quo foueatur. Atque ita diuturnæ abſtinentiæ cauſa eſt humidi ad calorem ea proportio, vt illud ab hoc non niſi longo tempore abſumi poſſit.

Cur in nonnullis corporibus nihil diſcutiatur aut abſumatur?

Cauſa vera diuturnæ abſtinentiæ.

Poſſe a materiæ, quæ caloris & ignis quaſi pabulum eſt, ita diſponi, vt ab eo non facile abſumatur, ſed diu duret, nihilominusque calor in ea, tanquam in propria materia & ſubjecto, diu hære poſſit, teſtantur Lucernæ illæ antiquorum, quæ Romæ & in aliis pluſimis Italiæ locis repertæ ſunt, quarum flammæ aliquot ſecula durauit. Notiſſima eſt illa, quæ in monumento maximi Olibij in agro Patavino reperta eſt, quæque annos 1500. aſiſſe ferrur, quam deſcribit Petrus Appianus, in *Antiquitat. Hermolaus Barbarus, in Corollar. in*

*Dioſcorid. lib. 5. c. 849. Ludouicus Viues, in lib. 27. c. 6. de Ciuit. Dei. Auguſtini, Iohan. Langius, lib. 2. epiſt. 52. Sedente etiam Paulo III. inuentum fuiſſe ſepulchrum Tulliæ filiæ Ciceronis, in quo lucerna fuit etiam tum ardens, ſed admiſſo aëre extincta eſt, arſeratque annos plus minus 1550. ſcribit Guido Pancirollus. Scribit etiam Auguſtinus, loco modo allegato, fuiſſe quoddam Veneris Phænum, atque ibi cadelabrum, & in eo lucernam, ſub Diuo ſic ardentē, vt eam nulla tempeſtas, nullus imber exſtingueret, vnde ſicut ille lapis, ita iſta λύχρον ἀρόβης, id eſt, lucerna inextinguibilis nominata eſt. Quæ autem ratio conſiciendi lucernas illas fuerit, hodiè tere ignotum eſt: etſi olei ſiue ignis iſtius perpetui diſcudam deſcriptionem extare apud Hieronymum Roſcelli in ipſius opere, cui titulus eſt, *le imprefſe Illuſtri*, Pancirollus ſcribat, Alia tamen etiam exempla occurrunt, quæ docent, quæ ratione materia aliqua aliàs exhalabilis vel inflammabilis in igne ſubſiſtere, vel tardè ab eo abſumi poſſit. Sic reſert Scaliger, *Exerc. 328. Chymicos ſcribere, è junipero factorum carbonum tantam vim eſſe, vt per annum integrum ignem reneant incorruptum. Quod non crederem, niſi ipſe expertus eſſem, carbones leui artificio adhibito accendi poſſe & ignitos diu detineri, vt tamē nihil ipſis decedat, ſed ubi ruſum exſtinguuntur, & quidem ipſe ac ſine aquæ affuſione, integri maneat. Præterea Chymici res inflammabiles plurimas arte eò deducere poſſunt, vt non inflammantur vel non facile inflammantur. Et quidem quod res inflammabiles non facile deſlagrant, ſit hoc vel fixatione, vt loquuntur Chymici, vel denſitate. Priori modo corpora multa, quæ ante accendebantur, & exhalabant, ac volatilia erant, vt Chymici appellant, fixa redduntur, vt in igne durare poſſint: Ita puluis Pyrius eò deduci poſſe, vt non amplius, vel nō facile inflammetur. Ita ſulphur ſigi valet. Denſitas vero & raritas facit, vt magna inflammabilitas ſit differentia. Etſi enim omnia inflammabilia vt inflammantur à ſulphure, vt Chymici loquuntur, habent; tamen vt facilius inflammantur, ipſis accidit à raritate. Hinc naphtha & petroleum & ſpiritus vini facile accenduntur, quia ſunt rariſſima. Oleum, cera, pinguedines & ſimilia etſi & ipſa ſunt inflammabilia: tamen quia denſa ſunt, non facile accenduntur, ſed ellychnio addito opus eſt, in quo materia inflammabilis diſfundatur & rareſcat, vt poſtea facile accendatur. Et humorē in animalibus etiā ita diſponi poſſe, vt ab igne non abſumatur, Pyrauſta docet, quæ ſunt animalia humidū ſuū radicale habentia, ac nihilominus in igne durare poſſunt, & ab eo non abſumuntur.**

Si ergo etiam in homine humidum illud pingue & oleoſum, quo calor innatus, tanquam flammā oleo, alitur, ita diſponatur, vt à calore non abſumi, vel non niſi tardè abſumi poſſit, & nihil vel parum diſſipetur, etiam nullo alimento opus eſt. Etenim partes tum non attrahunt è venis, quia ipſis nihil de eſt. Venæ etiam nihil ex hepate, & hoc nihil è ventriculo trahit, atque ita quia nulla ſit attractio, nullus ſit appetitus.

Quo modo autem & qua de cauſa humidum ita diſponi poſſit, explicare difficiliſimum eſt. Si tamen ea, quæ aliàs in natura accidunt, eoſque, qui diu à cibo abſtinent, perpendam, in eam venio ſententiam, ab humore melancholico id præcipuè euenire. Nam animaduertimus, ſulphur & alia inflammabilia, vt vel non accendantur, vel tardè deſlagrent, admiſſione acidorum & falſorum, & vt Chymici appellant, fixorum admiſſione, talia fieri. Eorum naturam cū æmuletur humor melancholicus & bilis atra, quæ tam acida ſæpe eſt, vt etiā ſtuporem dentibus inducat, ab iis alimentum corporis ita diſponi poſſe, vt actioni caloris reſiſtat, incredibile non eſt. Cum verò nō omnes melancholici, aut qui humore melancholico abundat, à cibo abſtineant, peculiarem diſpoſitionem (vt aliàs hic humor ad miras diſpoſitiones & occultas qualitates recipiendas aptiſſimus eſt) inducere, & alimento per minima miſceri debet.

Et

Lucerna Antiquorum poſt aliquot ſecula reperta.

Cur res inflammabiles non facile deſlagrant?

Inflammabilium differentia.

Quæ ratio & quæ de cauſa humidum ita diſponi poſſit, vt ab igne non abſumatur?

Ab humore melancholico.

Et omnino mirabilis est humoris melancholici natura, præcipue si corumpatur ac peculiarem & occultam aliquam dispositionem acquirat, ut in melancholia, mania, scorbuto, aliisque ejusmodi morbis videre est. Et stupor, qui scorbuticis & aliis sæpe accidit, recte ad humorem melancholicum refertur. Scribit quidem Rodericus à Castro, *cent. 1. consult. 17.* Chymicos non sine ratione asserere, paralyfin fieri frequenter ex pituita acida, tenui, quæ & sua frigiditate & aciditate, sicut dentibus, ita nervis stuporem inducat. Verum rectius hoc humori melancholico tribuitur, qui in scorbuticis & hypochondriacis abundat, unde etiam Apollonia Schreieriana totam curam ita stupidam habuit, ut etsi multæ mûsæ illi insiderent, id non perciperet.

Talis igitur humor si per vniuersum corpus diffundatur, fieri potest, ut alimentum fixius fiat & non facile discutatur. Monardes de Nicotiana refert, Indos Nicotiana famem sitimque solari hoc modo: Conchyliam quædam cochlearum flumiatilium vrunt, deinde terunt, calcis modo. Horum & foliorum tabaci æquas partes sumunt, manduntque, donec in vnam quasi massam conglobentur, ex qua trochiscos pisco majores efformant, quos in umbra siccatos seruant vsui. Iter per desertum facturi, in quibus nec cibus nec potus præstod est, subjectum labiis imis que dentibus globulum inter eundem sugunt, liquorémque inde manantem cibi potusque loco deglutientes in ventriculum congerunt, quo absumpro ingerunt alium. Hac equidem industria famem sitimque per triduum tolerantes, aut quadri-duum, ut ne minimam quidem virium jacturam sentiant. Id quod fit, non, ut quidam opinantur, quod assidua trochiscorum masticatione pituitosos humores è cerebro eliciant, eosque in succi melioris penuria in suum nutrimentum conuertat ventriculus, (pituita enim excrementitia nutrire non potest) sed quod partim sensus obrundatur, partim humores ita figantur & disponantur, ut non facile dissipentur. Si enim ob sensum obrusum saltem famem sitimque non perciperent, interim corpus diffunderet & alimentum dissiparetur, fieri id sine virium jactura non posset. Abundasse autem omnes ferè, qui à cibo abstinuerunt, humore melancholico, historiarum testantur. Talis enim fuit ille Scotus, cujus supra mentio facta est. Melancholicus fuit ille sub Friderico II. Imperatore Coloniae; Puella illa Parauij, cujus historiam Vigontia descripsit, sanguinem atrum rejecit, paralytica fuit, delirauit, catalepsin passa est. Puella Confolentanea ex febre in morbum hunc incidit, obmutuit, delirauit, corporis cutem frigidam & siccam habuit. Puella, quam è Ducatu Iuliacensi Coloniam adductam vidit Guilielmus Fabricius, erat facie tristi & melancholica. Aliorum etiam historias si consideremus, paucos inuenimus, in quibus non melancholicæ dispositionis aliqua fuerint indicia.

Verum procul dubio humor iste, quicumque sit, qui diuturnæ hujus abstinence causa est, dispositionem peculiarem accipit in plerisque ab utero. Idque vel id persuadet, quod pleræque fuerint puellæ, & eâ ætate constitutæ, quâ menses erumpere, & semen in ipsis generari solet, nimirum annorum 14. Annorum enim 14. fuit puella illa in agro Lucensi, puella Confolentanea, Iuliacensis illa, Halberstadtensis, & forsitan aliz, quarum ætas non est expressa. Notissimum enim est Medicis, quàm mira symptomata à mensibus & semine retentis ac corruptis accidere soleant, atque inter ea etiam cibi & potus appetitus abolitus. Scribitque Lud. Mercatus, *lib. de morb. mulier. cap. 8.* fœminam illustrem quandam vteri vitio potum auersatam fuisse; & aliam potum nullo modo potuisse admittere, & hydrophobiæ simile quid passam esse, ita ut 60. diebus sine potu vixerit. Causamque ille refert in halitum prauum ex semine, aut sanguine ascendentem. Talis igitur halitus si totum corpus peruadat &

penetret, non impossibile, facultatis nutrientis hoc mirum symptoma in toto corpore produci posse.

E quibus etiam de terminis diuturnæ illius abstinence aliquid statuere possumus. Triplex autem est exitus & euentus istius jejuniij. Vel enim homines iterum conualescunt & edere incipiunt, vel moriuntur, vel in alium morbum incidunt. Qui tamen in alium morbum incidunt, alij rursum comedere incipiunt, alij simul perpetuam inediam ferunt. Qui ergo ad sanitatem redeunt, & cibis iterum assuescunt, in iis humor ille vitiosus planè absumitur, & enacuat. Qui vero moriuntur, in iis vitiosus humor calorem natuum tandem superat, & extinguit. Qui in ægritudine aliam incidunt, iis humor vitiosus in partem aliquam priuatam decumbit, unde nonnullos melancholicos, alios epilepticos, alios catalepticos factos fuisse deprehensum est. Et quidem pro humoris natura & resistentia majori vel minori jejuniium hoc nunc citius soluitur, nunc diutius durat. Quod & in aliis morbis fieri videmus, dum quartana sæpe intra paucas septimanas soluitur, nunc ad plures annos durat, sicut & epilepsia sæpe citò soluitur, nonnullos vero vsque ad finem vitæ comitatur.

Exitus vel euentus diuturni jejuniij triplex.

## CAPVT III.

## De Certorum Ciborum fastidio.

Peculiare appetitus dejecti vitium est, cum qui alios quidem cibos appetunt & comedunt, certos tamen auerantur, etsi iidem grati aliis & iucundi sint. Ita plurimi sunt, qui caseum vel butyrum auerantur, alij qui vinum non bibunt, qui propterea abstemij, quasi abs temero dicuntur. Marcellus Donatus, *de hist. med. mirab. lib. 6. cap. 3.* refert, quendam Stephanum Surdastrum Hispanum à piscium esu ita abhorruisse, ut si pisces aliis cibis clanculum commixti proponerentur, in animi angustias, cum vomitu alique dejectione incideret. Et Brassauolus, *in 2. de morb. acutis sect. 34.* refert, Iuliam Taraconensem, Friderici Regis Neapolitani filiam natu minorem, carnes non edisse, imò ne gustasse, & si bolum ori ingereret, in lipothymiam & syncopen incidisse. Perrus Apennensis, Conciliator dictus, lac abhorruit, referentè Iohan. Matthæo de gradibus. Aliquos oua non comedisse, Marcellus Donatus, *allegato loco*, scribit. Iulius Cæsar, Scaliger, *Exerc. 274.* scribit, se nouisse quibus mala afferrent fastidium, (quales & ego noui, qui nec odorem pomorum ferre possunt) seipsum ad oletis Cressonei aspectum adeò tremere, ut horrore quassatus abire cogeretur. Iulius Alexandrinus, *lib. 2. salubrium cap. 13.* scribit, se quendam nouisse, qui ita allium auersabatur, ut nunquam illud comederet, raro admodum panem, rem tamen naturæ admodum conuenientem. Fuit, qui solis ouis viuens à panibus, carnibus, piscibus, caseis, & aliis abhorrebat, mustelæ inde nomen adeptus, ut narrat Libanius, *singularium parte secunda.* Idem refert quendam malorum aspectu è conuiuio exactum fuisse.

Felix Platerus, *in obseruat.* refert, Antonium Postellum Gallum puerum, conuictorem patris sui, nihil quod coctum, siue elixum, assum aut fixum esset, comedisse, contentum solo pane, fructibus & lacte. Pane autem non puro, sed furfuraceo, quali Platerus canem suum alere solebat, tantum vesebatur, ex pura farina pistum fastidiebat. Fructibus æstatis tempore, & hyemis iisdem siccatis, pomis, pyris, cerasis, nucibus, &c. vtebatur. Lactè quoque frigidum tantum vesebatur: nihil enim quod calefactum erat, attingebat. Bene habitus interim coloréque viuido. Hanc consuetudinem viuendi, aliquot annos cum

Certorum ciborum fastidium.

Abstinencia ab omnibus cibis coctis.

parente suo degentem, vt & postea continuasse, idem Platerus narrat. VVeintrichius, *de monstris* testatur, se quēdam nouisse, qui anguillas non modò non ederet, & eorū aspectū non ferre posset, sed ne quidē in ædibus manere posset, in quibus anguilla viua occultabatur.

*Panis fastidium.*

Guilielmus Fabricius, *cem. 2. obseru. 41.* refert, puel- lum quinque vel sex annos natum VVerdini ad Rorem fluium ex grani morbo liberatum incidisse in hoc symptoma, vt quoriscunque panem videret, imò etiam intelligeret nominari, in terram motuus quasi proster- neretur, etiam loquela, visu, auditu & intellectu priua- tus, qui tandem quasi ex sopore expergefactus surre- xit, & puerilia sua negotia, vt antea, peragebat.

Et nemo ferè est, cui non talia exempla nota sint, ac propterea plura allegare, superuacaneum puto.

### Causa.

*Causa.*

Causas verò huius rei, vt & aliarum sympathiarum, & antipathiarum inuestigare difficillimum est, & ple- rumque ad idiosyncrasiam & peculiarem ventriculi cō- stitutionem, à primo ortu contractam, quæ explicari nō potest, causa huius fastidij referenda est. Et quibus ta- lis constitutio est, ii non solum cibos certos auersan- tur, sed & si iis clanculum offerantur, valde læduntur, & interdum in morbos ac vitæ discrimen conjiciun- tur. Et hæc quidem ventriculi peculiaris constitutio sape ab imaginatione matrum prouenit, quæ dum gra- uidæ sunt, certos cibos appetunt vel fastidiunt, idem- que fastidium, vt alios corporis natus, in sobolem de- riuant. Verum vt aliarum sympathiarum & antipathia- rum causa; ita & huius facile reddi non potest, & lon- gioris atque alterius operæ est de sympathia & antipa- thia in genere disquirere.

Altera causa est consuetudo. Hæc enim cum sit qua- si altera natura, iis maxime delectamur, quibus à tene- ris assueri sumus, contrà eos cibos fastidimus, quibus nunquam vel raro vsi sumus.

Quibus accedit Imaginatio, vt qui cibi semel dis- plicuerunt, postea etiam fastidiantur. Nonnulli ranas, cochleas, carnes vrsinas, vulpinas, equinas, felinas ita fastidiunt, vt ne gustare sustineant: Si verò insciis præ- beantur, nil mali inde sentiunt: rursus si iis etiam post longum temporis interuallum significetur, eos tales ci- bos comedisse, malè inde affectos quosdam, imò in vi- tæ periculum coniectos fuisse passim historia testan- tur. Quod omnino saltem ab imaginatione accidit, quæ cibos illos vt summè noxios concipit. Ita noui quen- dam, qui cum de lepore assato satis largè comedisset, ab alio postea per jocum persuasus, fuisse vulpem, mox omnem cibum vomitu rejecit. Idem accidit in iis, qui cibo aliquo immoderatè & non decenter apparato vsi sunt, illumque sibi noxium imaginantur, atque inde nauseam concipiunt. Ita refert Schenckius, *lib. 3. ob- seru.* Cementarium quendam, cum in symposio caput vitulinum semicrudum & cruentans adhuc mensæ il- larum fuisset, tanta nausea correptum fuisse, vt aliquot annorum spatio ab omnium carniū esu abhorreret. Hanc ipsam ob causam post febrem nonnullos postea ab omni carniū esu aliquot menses vel annos, vel etiam semper abstinuisse, sæpe obseruatum est.

### Curatio.

*Curatio.*

Hoc autem ciborum fastidium si sit ab ortu, vix emendatur. Consuetudo tamen multum hinc potest, quæ sæpe præstat, vt iis, quæ antea planè fastidie- bant, sensim assuescant, & tandem sibi planè familiaria reddant, sicut exempla multa habentur eorum, qui cum infantes caseum auersarentur, ei sensim assuefacti cum voluptate postea eum comederunt, & qui ex abstemiis egregij poratores euaserunt. Multò verò magis con- suetudo consuetudine mutari potest, ij verò, qui ex

imaginatione saltem cibum aliquem auersantur, etiam- si necessarium, ad cibos sumendos cogendi sunt: Et modò semel cibum capere incipiant, postea facile ei al- fuciscunt.

## CAPVT IV.

### De ingenti Fame, canina Appetentia, & Bulimo.

**A**ppetitui dejecto contraria affectio est nimia ap- *Nimia appe-*  
petentia, & quidem ea præternaturalis. Nam hinc *tentia.*  
initio monendum, non sermonem nobis esse hinc de vo-  
racitate illà nimia, quæ nonnullis naturalis vocatur.  
Reperiti enim sunt quidam ad miraculum vsque vora-  
ces sine vllò detrimento: quorum exempla notatu di-  
gna collegit Iustus Lipsius, in *Epistolis, Centuria Mis-*  
*cellanea, Epist. 51.* Sed de iis hinc sermo est, qui aliàs  
non ita assueti comedere præter naturam in hoc ma-  
lum incidunt.

Appetitus autem ille nimius *Bulim.* & canina ap-  
petentia dicitur. Canina appetentia interdum etiam  
*canina* nominatur, nomine, quod aliàs vlceribus cor-  
rosiuis & serpentibus conuenit, ad hunc affectum trans-  
lato, vt Valenus, *6. Epid. comm. 3.* testatur, vt & author  
definitionum Medicarum, Plinius, *hist. natur. lib. 26.*  
*cap. 11.* Caelius Aurelianus, *libro passionum chronica-*  
*rum cap. 3.*

Quomodo autem hi affectus differant, & quas caus- *Bulimica-*  
sas habeant, apud autores satis intricatum est. Bulimus *nina appe-*  
equidem in genere ingens fames est seu vehemens *tia differe-*  
esuritio, particula *β*, significationem vocabuli au-  
gente & intendente. Barbaris inepte vaccina appeten-  
tia vel fames nuncupatur, quasi ex *β* componeretur:  
qua ratione etiam caninæ appetentiæ, quæ etiam  
magna est, attribui posset. Vfus tamen apud plerosque  
obtinuit, vt Bulimus & canina appetentia distin-  
guantur; primò quidem, quod canina appetentia  
sit conjuncta cum vomitu, cum qui hoc modo labo-  
rant, continuò cibum appetant, vt vix saturari ci-  
bo possint, & primo nondum satis coctò nouum  
subinde appetant, ita vt, ventriculo non ferente cibi  
copiam, eum vomitu rejiciant, canum more, vnde &  
nomen accepit. Quibusdam verò Diarrhœa potius,  
quam vomitus accidere solet, naturâ superfluum illam  
cibi copiam per aluum detrudente, estque appetitus can-  
inus perpetuus. In Bulimo vero vomitus non acci-  
dit, sed eum Lipothymia comitatur, quæ non adest in  
canina appetentia. Sunt tamen quidam, qui insatia-  
bili comedendi desiderio laborant, non tamen vo-  
munt, sed etiam cibum, quem sumpsere auide, con-  
coquunt, & nisi mox alium sumant, male habent. Ita  
nouī ante aliquot annos hinc studiosum, habitu corpor-  
is nigrum, qui hoc morbo laborabat, & non solum de  
die, sed noctu etiam comedebat, cibum tamen, quem  
sumebat, sine vomitu concoquebat, imò cibis delicatis  
saturari non poterat, sed crassos expetebat, vnde nec  
panem à nostris pistoribus confectum, sed à rusticis in  
vicinis pagis emprum, vt solidiorem, comedebat. Sæpe  
mane tempore æstiuo pastinacæ satiuæ radices tot,  
quot sex nummis emuntur, crudas sine damno come-  
debat. Vt ita si distinguere hæc libet, caninus appeti-  
tus sit continua, inordinata & ferè inexplibilis fames;  
Bulimus autem etiam quidem appetitus magnus, sed  
non continuus, imò qui sæpe in nauseam desinit cum  
Lipothymia & virium dejectione.

### Causa.

Pars quidem proximè affecta est orificium ventricu- *Causa.*  
li, vt pote in quo desiderium cibi & potus viger, &  
suctio



suctio illa famem excitans percipitur : Causæ tamen plures esse possunt. Et quidem appetitum caninum quod attinet, à duabus causis ille oritur, vt Galenus, *1. de causis Sympt. c. 7.* docet : vel ab humore vitioso mordicante ventriculum, vel alimenti defectu. Id est, Fit appetitus etiam sine alimenti defectu, ab humore vitioso orificium ventriculi mordicante, & suctionem similem illi, quæ fit ab alimenti defectu, ob quem suctio ista excitatur.

Humor, qui ventriculum mordet, & suctionem illam efficit, est Melancholicus, qui ventriculi orificium corrugando ralem in eo affectum excitat, qualis alias à venarum suctione in fame naturali oritur. Et quidem si humor is ventriculi orificio impactus sit, etsi ventriculus cibo assumpto adhuc plenus sit, tamen quia continuò fit ab humore isto vellicatio, ferè etiam continua fames excitatur.

Platerus equidem ab aciditate humoris melancholici hoc Symptoma fieri negat, & putat, quod à talibus causis prosternatur potius, quam augeatur appetitus, nisi occulta qualitas humori insit. Ipse igitur venenata & malignæ qualitati, quæ ex effectu potius cognoscatur, quam describi possit, in humoribus certo modo corruptis in ventriculum effusis, vel etiam ex cibo in illo genitis, appetitus huius causam attribuit; cum & venena quædam sint, quæ extrinsecus illata vel assumpta talia accidentia excitant. Verum enim verò etsi qualitates illæ, quæ mordicationem istam efficiunt, ita planè determinari non possint, nec corruptionis modus ita exactè describi : tamen aciditatem vel acrimoniam vt planè rejiciamus, & statim ad occultam qualitatem confugiamus, & venenum ac malignitatem simul adesse statuamus: cum ipsa aciditas sufficiat, ad affectionem similem suctioni naturali producendam, neque suctio naturalis à causâ occulta fiat, neque alia venenati humoris indicia ad sint. Humor autem ille melancholicus & acidus è liene & vicinis locis in ventriculum effunditur, non verò naturaliter in ventriculo continetur, de quo infra in quest. dicetur.

Verum hæc causa in iis quidem locum habet, qui plus appetunt, quam possint concoquere, & propterea cibum, quem avidius comedunt, euomunt. Sed cum, vt ante dictum, etiam dentur, qui cibum copiosius, quam par est, non solum appetunt, sed & concoquunt ac digerunt, nihilque inde mali patiuntur: in iis etiam sequens causa, secunda scilicet, conjungenda videtur. Et cum Humor melancholicus aliàs quasi fermentum sit, potest etiam ad coctionem cibi maturandam aliquid efficere. Atque hæc causa non solum in ventriculo, sed & in aliis membris locum habere potest. Ob hanc primam causam Famem quandoque etiam Epidemiam & in morbis quibusdam excitatam fuisse, observatum. Brasavol. in com. ad aph. 2. 1. 2. Hipp. refert, Anno 1538. Caninam Appetentiam Ferrariæ fuisse morbum Epidemium, & fuisse ex atra bile, cum plerique ex infusione folior. senæ fuerint restituti, & plurimi in quartanam inciderint. Alex. Benedictus, l. 2. 2. pract. cap. 20. scribit, se pestilenti morbo correptum incredibili aviditate cibum sumendi laborasse, dum quater de die cibum sumere cogeretur. Et Leonellus Faentinus, de med. morb. c. 34. refert, Anno 1535. Prutenos febre correptos octies cibum postulasse, singulis diebus, & ne sic quidem potuisse exsaturari.

Secundò magna fames fit ob alimenti defectum, ob quem venæ continuò sugunt, suctioque in ventriculo continua est. Nam si partes inanitæ supra modum attrahant, attractio tandem etiam ad ventriculum pervenit & famem p.n. in eo excitat. Accidit hoc primò, cum corporis partes inanitæ avidius & copiosius attrahunt & sibi apponunt alimentum : quam causam plerique prætermittunt. Ita refert Corn. Gemma, Cosmocr. l. 1. c. 6. feminâ quâdam vix ad momētum absque ingestione cibi & potus vivere potuisse, idque vitium à teneris

Dan. Sennerti Tom. I I.

incœpisse, & cum ætate incrementum sumpsisse. Causa postea in mortuâ reperta fuit Hepatis constitutio, & præcipue abdominis partium *ἰσχυρὰ*, ob quam adipem copiosum generavit. Corpore enim aperto detractæ sunt libræ propemodum 20. adipis, & hepar impensè rubrum, mole insigni ac sanguine turgidum.

Deinde potest alimentum deficere & hinc suctio magna fieri ob corporis raritatem, & calorem robustum alimentum consumentem, & magnam *διαρροήν* efficientem. Cum enim corpus nequeat refici & instaurari, si alimentum copiosius diffusetur & dissipetur, partes inanitæ à venis sugunt, atque hæc tandem è ventriculo.

Verum ab huius causis plerumque fames aliqua magna saltem, quæ adhuc naturalis dici potest, excitatur, qualis est & illa, quæ post exercitia vehementia, evacuationes sanguinis, inedia, morbos diuturnos, ob corporis inanitionem excitatur, non verò præternaturalis, de qua hic sermo est.

Ad causas alimenti deficientis plerique etiam Facultatis Retentricis Imbecillitatem referunt. Cum enim corpus nequeat refici & instaurari, nisi alimentum tam diu retineatur, donec corpori apponatur, si facultas Retentrix sit debilis, diffuset alimentum, antequam corpori apponitur, atque ita defectus fit alimenti. Verum vix puto à læsa facultate Retentrice per se alimenti defectum fieri posse, cum nullibi via sit, per quam id sponte dilabatur. Per accidens saltem hoc fieri potest, dum scilicet quacunque de causa corpus nimium dissolvitur, vt Retentrix Facultas, quamvis sit fortis, id retinere non possit. Et quamvis allegetur pro Retentrice læsa locus Galeni, 6. de loc. aff. cap. 3. tamen ibi saltem de celeri dissipatione & diffusionem alimenti loquitur. Ita autem Galenus : *Alius interdum affectus occurrit Diabeti perquam similis, & quidem à multis cibis, qui neque crudi sunt, neque per alium deiciuntur, neque plenitudinē efficiunt, neque etiā probe alere possunt, sed dissipantur discutiunturque celeriter, cuius ut crebrior est, quā Dysfaci euentus, ita faciliore curatione admittit, quippe priusquā ad summum pervenerit, cognitus haud ita difficulter curabitur. Nam ubi quis duplū consuetorum alimentorum adsumpserit, neque corpus ali videtur, idque citra alui fluorem, hunc affectum non solum privati, sed etiā Medici percipiunt. Cum verò triplū ingerit, idoneis auxiliis liberari potest, priusquā scilicet ad quadruplum vel quintuplū perveniat. Igitur rationi consentaneum est, hunc affectum & celerem dissipationem incipere omnibus partibus Attractricē atque ei coniugatā Facultatem, quæ proprie Appetentia vocatur, servatibus.* Hæc Galenus.

Ad alimenti defectum & absumptionem faciunt & vermes, qui alimentum in ventriculo confectum absumunt, antequam ad hepar deferatur, unde reliqua membra alimento destituta humores è ventriculo trahunt. Qua de causa etiam Infantes sæpe voraces sunt, vt vix saturari queant. Huius rei annotavit exemplum Alex. Trallian. lib. 7. cap. 14. de quadam muliere, quæ cum immodica cibi appetentia laboraret, post Hieræ vsum vermem 12. cubitos longum excrevit, & postea ab hoc Symptomate liberata est.

Rondeletius tertiam adhuc causam addit, longum scilicet vsum alimentorum detergentium, vt ficuum, vel gari, idque in se ipso se expertum scribit. Cum enim se veller cogere ad vsum piscium, vtereturque frequentissimè garo parato ex Lycoctonis & oxyleo, ficus etiam Massilienses ferè omnibus horis comederet, ita fuit pituita illa ventriculi & intestinorum deterfa, vt superveniret ipsi appetentia canina, deinde bulimus.

De Bulimi verò causâ res intricatior est. Plerique quidem à frigidâ ventriculi Intemperie famem istam provenire statuunt. Et omnino res certa est, à frigore magno famem magnam induci. Idque Plutarchus, in sympos. lib. 5. cap. 8. iis præcipue accidere scribit, qui per altam nivem iter longum faciunt. Et si quis in Alpibus Rhæticiis iter tempore hyberno faciat, etsi in quibusdam

Quomodo à læsa facultate retentrice alimenti defectus fieri possit

Bulimi Causa.

quibusdam locis ab vna radice montis ad alteram vsq; vix bina milliaria Germanica intersint: nemo tamen jejunos hyeme eas superare audet. De modo tamen, quo frigus Bulimum excitet, non consentiunt. De quo infra *questione prima* dicitur.

### Signa Diagnostica.

*Signa:*

Affectio hæc facile cognoscitur, quod ægri assidue cibum appetunt, & nunquam ferè satiantur: Atque ita sese cibo replent, vt cum vomitu rejiciant vel per aluum excernant. In Bulimia verò in specie dicta initio multa appetuntur, post robore ventriculi dissoluto cibi fastidium sequitur, etsi corpus alimento indigeat. Hinc imbecillitas ventriculi animi deliquia, partium externarum frigus, pulsus obcuri.

Causarum signa quod attinet, si nimia appetentia sit ab humore acido, crudi ructus percipiuntur, & alia huius humoris abundantis signa adsunt.

Si fames sit ex defectu alimenti, ægri emaciantur, & quidem si ea fiat caloris nimiam *διαφορική* efficientis excessu, ejus in toto corpore signa adsunt, alui dejectiones sunt pauciores & sicciores, quam cibi modus postulat. Si verò Bulimi causa externum frigus vehemens sit, ex ægri relatione id innotescit.

### Prognostica.

*Prognostica.*

1. Qui caninā appetentia laborant, sæpe ex hoc malo in vomendi consuetudinem delabuntur, sæpe etiam aliis affectionibus sunt obnoxij, Cœliacæ scilicet passioni atque hydropi, idè quod antequam priores cibi cocti sint, alios ingerunt, Aëtius, *tetrab. 3. f. 1. cap. 21.*

2. Fames magna, quæ sit post Febres & alios morbos, recidivam minatur. Cum enim appetitu urgente ægri ac conualescentes illi plus comedant, quam ventriculus morbo debilitatus concoquere possit, accidit, vt inde cruditates multæ cumulentur, quæ postea recidivam pariunt.

3. Bulimus periculosum malum est. Nam ægri repente animo linquntur, cum externarum partium refrigeratione: Quidam etiam auxilio destituti pereunt. Aëtius, *tetr. 3. serm. 1. c. 6.*

4. Si vino sumpto æger ab animi deliquio statim reuocetur, bonum signum est, indicatque vires non esse ita prostratas.

5. Bulimus in morbis chronicis, vt febre quartana, quotidiana, hydrope lethalis.

### Curatio.

*Curatio.*

Si canina Appetentia sit ab humore vitioso ventriculi officium vellicante, is vt euacuetur opera danda. Itaque valde vtilis est vomitus. Et licet in Appetentiā caninā sæpe sponte vomant ægri, nihilominus in principio, antequam vomitus inualescit, ad materiam vitiosam educendam vomitus conuenit. Levis quoque per aluum primò euacuatio institui potest.

Postea dentur cibi & medicamenta, quæ sensum sytationis in ventriculo imminuunt. Deinde, quæ materiam alterent & præparant, vt tandem euacuari possit.

*Famem compescenda.*

Famem compescunt pinguis, lenta, carnes bubulæ, caro porcina, oleum amygdal. dulc. cerebrum animalium, amyllum recens, malua cum oleo vel butyro & jure pingui. Quibus tamen magis in principio locus, dum vomitum prouocare volumus, postea verò dum vomitus virget, omittenda. Simul in horum usu cauendum, ne is sit nimius, & æger in contrarium affectum deducatur. Proinde cum melius incipit habere æger, pinguis, & quæ concoctioni resistunt, imminuenda.

*Narcotica hic caute usurpanda.*

Narcotica verò, quæ famem imminuere possunt, caute usurpanda. Fortia autem vitanda sunt, sicut infu-

sio solani furiosi cum vino facta & bibira subito omnem cibi appetentiam etiam in summè famelico euertit.

Vinum tamen potens, & spiritus vini vsurpari possunt, quæ Platerus etiam ad hanc classẽ refert, & non tam calefaciendo, quam stupefaciendo famem tollere scribit; sicut & theriacam & Mithridatium eadem vi narcoticā caninam appetentiam sedare censet. Abstinendum autem ab acidis & abstringentibus.

Alterantia & Præparantia sunt anisum, thymum, origanum, satureia & similia supra in Intemperie ventriculi frigida proposita. Iisdem cibi condiantur, & in robustioribus ac rusticis cœpis & allio.

Vinum sit Saluiatum vel aliud conueniens, quod ventriculum calefaciat, & acidus humores corrigat. De vino vide Hippocratem, 2. *aph. 21.* & commentatores.

Materia præparata euacuanda. Commodissimum medicamentum est Ftera. Vtilis est & Mulla, in qua agarici Drach. j. ss, vel Drach. ii. macerata sint.

Materia expurgata ventriculus roborandus calefacientibus, cum Internis tum Externis, de quibus supra de Intemperie ventriculi dictum. Et si humor acidus è liene ad ventriculum transmittatur, reliqua cura ad Lienem dirigenda.

Reliqua fames, quæ à maiori totius corporis euacuatione accidit, curanda causis inanitionis resistendo, vt cibis crassis, viscidis, ac multum nutrientibus. Acrius cibos, qui tardè coquuntur, distribuuntur, nec tamen facile consumuntur, probat, cuiusmodi sunt cochleæ, cancri, caro suilla, oryza & similes. Foris etiam adhibeantur cutem densantia, vt pleum omphacinum, myrrinum, rosaceum, quæ tamen omnia ita administrentur, ne obstructio aut febris, aut aliud malum graue oriatur. Vinum attenuantia, & calida omnia vitentur, aer sit frigidus, æger quiescat, & diutius dormiat.

De Bulimo et si in causis discrepent auctores, tamen in curatione ferè conueniunt. Quamuis enim ante animi deliquium calidum ventriculum esse nonnulli statuunt, vt supra dictum; tamen consentiunt in eo, in deliquio & post deliquium ventriculum esse imbecillum & refrigeratum, & propterea tum etiam esse moderatè calefaciendum.

Curatio ergo Bulimi duplex: Vna in paroxysmo, hoc est, animi deliquio, alia extra paroxysmum. In paroxysmo laborandum, vt æger reuocetur frictionibus, odore panis, vini, panis vino madidi, aceti, & aquarum destillatarum conuenientium, inter quas est aqua carfunkuli. Commodum etiam est micam panis vino madidi, si eam deglutire possit æger, exhibere, vel guttam vnam atque alteram aquæ carfunkuli cum vino. Et si æger imminere animi deliquium animaduerat, vtilissimum est, vt mox panis, præcipue vino madidus, præbeatur.

Postquam ab animi deliquio reuocatus est æger, non statim cibis exhibeatur, nisi forsan pauxillum panis vino madidi, sed paulisper quiescat, donec vires nonnihil restituantur, postea præbeantur cibi, qui citò ac multum nutriunt, vt panis vino madidus, oua sorbilla, iuscula & similia, de quibus in curandā intemperie ventriculi frigida & Syncope est dictum. Extra quoque ventriculo calefacientia moderatè applicanda, quæ ibidem sunt proposita.

### QVÆSTIO I.

#### Quo modo frigus Bulimum excitet?

Frigus quomodo Bulimum excitet, Auctores non consentiunt. A plurimis quidè docetur, frigus comprimere, & compressione sua succulentā substantiam à parte expellere, è cuius defectu fames oriatur. Verum probabile hoc non videtur Ludou. Mercatp. Cū enim frigiditas actu

actu tantum constituta vim habeat comprimendi, constringendi, & expellendi; Ventriculus verò Animalis viuentis tantam frigiditatem actu habere nequeat, vt condensando comprimat: etiam hoc modo famem excitare non posse existimat. Ipse verò statuit, frigiditatem potius mordendo & irritando appetitum excitare. Alij contrà à frigiditate ventriculi famem oriri negant, existimantque Platerus, frigidum potius sensum obrundere, quam accendere, ac si accidat, vt frigiditate appetitus augeatur, id fieri, vel quod frigiditas calorè, à quo appetitus deiectus fuit, corrigat, atque ita ad naturalem temperiem reducat; vel quod frigus externum calorem ad interna repellat, atque ita, ob calorem ad interiora collectum & abundantem copiosiore alimento corpus indigeat. Atque hæc ipsa sententia fuit Aristotelis, 8. probl. 5. & Alex. Tralliani, l. 1. cap. 4. qui causam nimiae appetentiæ statuit esse calorem ventriculi auctum ab ambiente aëre frigido, qui calorem ad interiora pellit, vt etiam Hippocrates, 1. aph. 15. ventres hyeme ac vere esse calidiores, & propterea per ea tempora plus cibi dandum esse scribit. Aristotelem & Trallianum sequitur ac defendit Hieronymus Mercurialis ac Donatus ab Alto mari & alios recentiores reprehendit, qui statuunt ab insigni refrigeratione ventriculi fieri Bulimum. Neque enim putat tantam posse ab externo aëre fieri refrigerationem, vt ipse ventriculus insigniter refrigeretur, atque alias etiam, quæ tamen non sunt ejusdem ponderis, rationes contra hanc sententiam affert. Ipse verò hac de re ita statuit: Calefacto ventriculo propter frigus aëris externi intro calorem influentem pellens fieri inanitionem & dissipationem alimenti. Post hanc indigentiam fieri impotentiam, eò quod exinanito ventriculo paulatim Spiritus dissipentur ac resoluantur. Post impotentiam calorem, qui prius auctus erat, in corpore languescere, & introduci frigiditatem calore nativo debilitato, quæ frigiditas non solum inducat inappetentiam, verum etiam cibi abominationem facit.

Quas quidem opiniones, si diligenter perpendamus, id quidem verum videtur, quod frigus externum calorem ventriculi internum & naturalem augendo aliquam famem excitare possit: quod tamen illa famis sit præternaturalis, & talis, de qua jam agimus, vix probabile est. Et omnino sæpe vocabulum Bulimi non eodem modo ab Autoribus accipitur, sed interdum in genere pro fame magnà; interdum verò in specie de fame, quam antea descripsimus. Ideoque si cum Galeno, 2. aph. 21. Bulimum non sumimus pro eo, quod nomen sonat, scilicet pro ingente fame, sed pro virtutis prostratione ab externâ refrigeratione profectâ, quæ quidem ab esuritione principium sumit, sed famem amplius non habet conjunctam, ventriculo valde languente, ac ejus calore pene extincto, ita scilicet, vt membra sint famelica & nutrimento indigeant, ventriculus verò illud respuat: huius causa statuenda videtur intemperies frigida à causa maximâ & summa efficacia orta, aëre scilicet frigidissimo, in quo æger diutius moratus est. Etsi enim frigus externum calefaciat ex accidente, calorem influentem intro pellendo: tamen quia in diuturnâ in aëre frigidissimo morâ non solum per eum ventriculus affici potest, cum os ventriculi non multa carne repletum sit, sed aliquid subinde etiam per os aëris attrahitur, potest hoc modo ventriculus valde refrigerari, atque ex illâ refrigeratione constricto ore ventriculi famis quædam suboriri: postea tamen refrigerato valde ventriculo Liporhymia & reliqua, quæ enumerauimus, symptomata. Si verò alicui hæc causa non satisfacit, is perpendat, num probabilius statui possit, ab externo aëre frigido calorem omnem ad internas corporis partes pelli, atque ab eo ibi valde aucto & concentrato quasi alimentum absumi, vnde accidat, vt membra valde trahant à ventriculo; quam fusionem dum sentit ventriculus, eum vehementem ap-

petitum excitare, statim verò hominem animo linqui, nisi cibo reficiatur, ac simul fame, sed non longè post reuocato ægro ac sensim reuiuiscente redire ciborum appetentiam. Sunt etiam, qui aërem talem diaphoreticum esse, & vim habere alimenta absumendi & dissipandi statuunt. Quo modo referri posset & huc aqua, quæ, vt supra dictum, ab Hippocrate, 6. Epidem. comm. text. 20. vorax dicitur.

## QVÆSTIO II.

*An humor melancholicus & acidus, qui appetitum excitat, in ventriculo naturaliter contineatur.*

Sunt nonnulli in ea opinione, non equidem è Lie-  
ne in ventriculum eructari humorem acidum, qui appetitum exciter: esse tamen in ventriculo humorem acidum ingentem & connatum, quem relicta cibi portio bene elaborata augeat & foueat, qui non sit crassus, sed tenuis & spiritibus corrosiuus prægnans, qui grato quodam acore ventriculi corpus neruolum afficiat, & sua mobili virtute permeet omne ingestum, illudque soluat in liquorem seu chylum, & omnino se habeat, vt fermentum, quo cereuisia fernesceat, fermentaturque, vt crassæ partes à tenuibus, & viles ab inutilibus separentur. Atque hunc humorem, si abundet, causam esse famis nimiae docent. Famem etiam cibo sumpto statim sedari, antequam alimentum dissolutum sit, ob hunc humorem statuunt, dum nimirum à cibo sumpto supprimitur, vt ita moueri, & instar fermenti ebullire non possit. Verum enim verò hæc omnia nec experientia consentiunt, nec rationibus satis firmis nituntur. Nam cum omnibus aliis partibus viuentibus insita sit vis coctiones sibi conuenientes perficiendi, non verò ab humore aliquo ea perficiatur, vel adiuuetur; Cur ea vis integra ventriculo deneganda sit, non video. Neque id eo probatur, quod humor acidus vomitu rejicitur. Etsi enim hoc iis accidat, qui plus comederunt vel biberunt: tamen ex cruditate acidâ id euenit, quæ tum ob cibi & potus copiam generatur; & totus ille chylus talis est: non verò in sanis hoc accidit. Ideoque præter naturam potius aliunde humorem illum in ventriculum effundi, credibile est.

*An humor acidus in ventriculo contineatur.*

## CAPVT V.

*De Pica & Appetitu vitioso.*

Non solum Appetitus interdum dejicitur & valde  
Naugetur, sed & nonnunquam deprauatur, quæ appetitus deprauatio Græcis *κίτλα*, vulgò Pica nominatur, appetitus nimirum præter naturam prauus & alienus à naturâ cibi. *κίτλα* autem siue Pica alijs à pica aue ita dicitur, siue quod in eâ pennarum, siue quod vocis sit magna varietas, siue quod ipsa hoc affectu laboreat, vt existimat Paulus Aegineta, lib. 1. cap. 1. quod tamen parum aptum videtur; cum nulli picæ appetitus sit cognitus. Alij verò, vt Aetius, *setrab. 4. serm. 4. cap. 11.* ab Hedera, quæ Græcis *κίτλο*, ita dictam putant, quod sicut hæc variis, prout occurrunt, plantis adhæret, atque iis se implicat: ita mulieres hoc malo laborantes varia edulia appetunt, atque ea sæpe contraria, quæ cum voluptatem, tum insauitatem gustui exhibent. Flerique etiam Malaciam appellatam censent à Plinio, lib. 23. cap. 6. Sunt tamen, qui Malaciam alium à Pica affectum esse statuunt, quod & Mercurialis fecit, ideo quod Malacia propriè significet mollietatem. Mollietates autem alius sit à pica morbus, languor scilicet & laxitas, ob quam ventriculus nec appetere cibum, nec concoquere possit; Deinde quia Plinius laudat Malicorium ad malaciam, cum tamen adstringens sit medicamentum, quod quidem in laxitate ventriculi conuenit,

*Pica vel Appetitus vitiosus.*

*An Pica & Malacia sint idem?*

sed non in pica. Verum enim verò malacia dicitur molities & impotentia quasi, quâ cibos quoddam quasi languentes & animo impotente appetunt. Neque Plinius scripsit, quod malicorium contra grauidarum malaciam expectatur, sed simpliciter, expectitur (scilicet malum Punicum) grauidarum malaciæ. Si quis tamen hæc duo vocabula discernere velit, appelleretur Pica deprauata appetentia, quando homo vitiosos & à naturâ alienos cibos, e.g. cretam, calcem terram & similia appetit. Malacia verò ea appetentia, quando prægnantes non quidem alienos à natura hominum cibos, sed alios consuetos appetunt, auidius tamen & cum animi quasi impotentia, ita ut nisi eorum participes fiant, abortum patiantur, vel stigma aliquod infanti imprimant, ad quod præcauendum malum Punicum expecti scribit Plinius, quoniam gustatum mouet infantem, & periculum abortus præcauet, ut non opus sit Plinij textum cum Mercuriali mutare & pro infante famem legere.

Utrumque malum frequens est mulieribus cacochymicis, præcipue primis duobus aut tribus mensibus. Tum enim fœtus adhuc minor est, parumque alimenti & id purius fugit, à quo relictum impurius affectionem hanc in grauidis excitat. Quarto verò mense cum fœtus jam grandior fieri incipit, copiosiore alimento indiget, ut omne, quod in promptu est, attrahat. Vomitus quoque grauidis mulieribus primis mensibus familiaris est, quo vitiosi sucçi euacuantur, quibus euacuaris etiam hoc symptoma cessat. Appetitus autem hic varius est. Interdum enim mulieres, ut dictum, consuetum aliquem cibum appetunt, sed tam auidè, ut nisi eum nanciscantur, cum fœtu periclitentur. Aliquando verò (id quod non solum grauidis fœminis, sed & viris quandoque accidisse compertum est) rerum à natura planè alienarum appetentia nonnullis accidit, ut cretæ, calcis, terræ &c. Noui virginem quandam nobilem, quæ annorum duodecim arenam scriptoriam auidè deuorabat. Viuit etiam hîc fœmina, quæ aliàs bene valet, quæ arenam & lapides molares contritos copiosè ingerit, & semper secum in sinu gerit, & vna die sæpe, quantum mensura lb. ij. capit, ut affirmet, se jam tantum arenæ, quantum lapidem molarem æquare possit, deuorasse. Platerus, in obseruat. narrat, fœminam quandam grauidam libras aliquot zinziberis maxima voluptate sine vilo incommodo vna vice deuorasse, nec, quod mirum erat, ardorem vllum in faucibus, multò minus in ventriculo sensisse. Se etiam iuuenem Monspeffuli frequenter & aliquoties de die cochlearia aliquot theriacæ deuorasse, nec vllum damnum inde sensisse.

Virgo & fœmina arenam deuorantes.

Zingiber & theriaca vltra modum ingesta.

Mira historia Viri cuiusdam, res à cibo humano alienas deuorantis.

[Anno 1632. d. 8. Decembr. Vir Clariss. D. Ioan. Nesterus, Medicus Rochlizensis, amicus meus honorandus, hæc ad me perscripsit: In vicinia nostra, inquit, hodierno tempore quendam, nomine Claudium, natione Lotharingum, vir Nobilis ac Strenuus, Georg. Vvilh. à Berbisdorff in Schwveickerstheim, pro seruo alit, annorum circiter 58. breuioris stature, & rarioris texture hominem. Hic nihil fœridum, nihil iniucundum abhorret: vitra, lapides, ligna, carbones, ossa, leporinos, & aliorum animalium pedes cum pilis, lineos laneosque pannos, viua animalia, & pisces adhuc salientes, imò etiam metalla, patinas, & orbes stanneos dentibus confringere, & vorare sæpissimè visus est. Vorat præterea lutum, seuum, & candelas sebaceas integras, testas cochlearum, animalium stercora, cum primis bubulum, calidum adhuc, proiit è matre venit, potat aliorum urinas cum vino & cereuisia mixtas. Vorat fœnum, stramen, stipulas, & nuper duos mures viuentes adhuc deglutit, qui ipsius ventriculum ad semihoram vsque creberrimis moribus lancinârunt, & ut breuibus complectar, quicquid illi à Nobilibus deuorandum offertur, vilissimâ mercede propositâ, dictum ac factum ingurgitat, ita ut intra paucos dies integrum

vitulum crudum & incoctum cum corio & pilis se effaturum promiserit. Testis inter alios quamplurimos ipse ego sum, quippe qui illum ante triennium Geringsvalde, in Monasterio, integrum caput de porco assatum, necnon duas candelas sebaceas, eaique crassiusculas & ardentes deuorare, oculis hîsc meis vidi, & probè adhuc memini.

Vir tamen quidam nobilissimus, Nobilis illius à Berbisdorff cognatus, qui Claudium istum bene nouit, & omnia ista se ita habere confirmauit, mihi retulit, Claudio huic aliquando in abdomine abscessum aperum fuisse, è quo res eiusmodi deuorata eruperint, sanitati tamen, licet omnes de eius vita desperarent, nullis ferè medicamentis adhibitis, restitutum fuisse.

Cum verò annis aliquot nihil mihi de Claudio isto ampliùs innotuisset, mense Majo huius anni 1636. eundem Dn. D. Nesterum, quid de homine hoc ageretur, percontatus sum, qui 23. Maij, epistolam Pastoris, Ecclesiæ eius loci, qui superiora omnia confirmat, misit, & ad hunc modum respondit: Claudium Lotharingum quòd attinet, cuius ante literis meis mentionem feci, est ille adhuc in viuis, aucupio deditus; & ob miram dexteritatem in capiendis perdicibus omnibus ibi notus. Nobilis verò eius herus, qui futura sectionis spem non semel mihi fecit, ante biennium febre acutâ extinctus est. Vorat adhuc omnia illa, quorum in prioribus literis memini, quamuis non ita crebrò, ut antea; cum iam apud viduam non sit, qui eum instiget, & procul dubio ei dentes ob ætatem ingrauescentem hebetiores fiant, ut ossa & metalla non ampliùs confringere possit. Inter plurimas voracitatis eius historias in primis hæc est ridicula, quam Nobilis ille, dum adhuc in viuis esset, mihi narrauit: se nimirum aliquando domesticis suis, ob calidam & siccam æris constitutionem diutius durantem, annonæ caritatem, & famem prædixisse, futurumque, ut in frugum defectu homines gramine & fœno vesci necesse haberent. Sed quid sit? Claudius statim omnium conspectui se subtraxit, & cum diu illum per omnes domus angulos quæsiuissent, tandem in conclau quodam clauso eum inuenerunt post fornacem, ad fœni quod congefferat, acruum sedentem, fœnumque assatim comedentem. Quæsitus, quid isthic ageret, respondit: quid stulti quæritis? Nonne ex hero audiuitis, grauem annonæ caritatem ante fores, hominibusque gramine & fœno vescendum esse? Eapropter periculum feci, ut ventriculus meus nouo isti cibo paulatim adfuesceret.

Causam huius voracitatis etiam in cadauere inuenire, procul dubio erit difficillimum. Posset quidem ad illud, quod in cadauere Lazari vitruoracis obseruauit Columbus, quidam confugere, & statuere, quartam illam neruorum conjugationem, quæ gustus gratiâ in hominibus à natura producta est, neque ad palatum, neque ad linguam pertendere. Verum hoc modo saltem gustus aboliri causa redderetur, nondum verò causa daretur, cur res tam miras assumere sine ventriculi læsione, imò concoquere potuerit. Quæ procul dubio in ιδιουρπασία & peculiari constitutione ventriculi & intestinorum querenda esset: quæ tamen oculis inuestigari non potest, sed saltem ex effectu pater.]

Affici autem in hoc affectu orificium ventriculi extra controuersiam est: Idque etiam testatur Galenus, s. de loc. aff. cap. 6. cum orificium ventriculi sedes appetentiz sit. Quia tamen idem Galenus, 1. de sympt. caus. cap. 7. in pica etiam tunicas ventriculi prauis humoribus imbutas esse scribit, sciendum, affectus huius sedem propriam esse orificium ventriculi: causam tamen & humores vitiosos præcipue in tunicis hæerere. Si enim omnes isti humores orificium ventriculi occuparent, cardialgiam & morsum excitarent, sed

fata.



faris est, si in tunicis hæcant, è quibus vel pars aliqua eorum vel vapor ad orificium ventriculi ascendens appetitum hunc vitiosum excitat.

### Causa.

Causa huius appetitus est humor vitiosus prava qualitate præditus tunicis ventriculi inhærens, & hinc orificium ventriculi affligens. Quænam autem huius humoris natura sit, & quænam illa qualitas, quæ hanc affectionem excitat, integrè vix explicari potest. Hinc Platerus venenatam & malignam qualitatem esse scribit. Occultam esse facile concedimus: venenata verò ut sit, necessarium esse non putamus, neque venenati humoris indicia & effectus hic adsunt. Humor autem ille plerumque ab utero in gravidis & aliis mulieribus à mensibus suppressis suppeditatur, interdum & à liene vel aliis partibus: Quandoque in ventriculo à vitiosis alimentis & mala coctione generatur. An autem in picâ humori pravo contraria, an verò similia appetantur, vide infra in quæstione.

### Signa diagnostica.

Affectus hic facile cognoscitur, & ex solâ ægrotantis relatione percipitur, qualia appetat. Adest præterea languor, cum ciborum salubrium fastidio, interdum ventriculi morbus, anxietas, crebræ exspirationes, nonnumquam & vomitus, quæ materiam in ventriculo cõtentam patefaciunt.

### Prognostica.

1. Melius est, si qui hoc affectu laborant acida & acuta appetant; peius si res planè à naturâ alienas, teste Auicenna, 3. Can. fen. 13. ar. 2. c. 20.
2. Periculo hoc malum non vacat, & sæpe in caco-chymiam, hydropem, & plurima alia mala degenerat. Quamquam enim fæminas præcipuè, quæ tali affectu laborant, sæpe talia præter naturam sine damno comedisse observatum sit; tamen si malum diu duret, fieri non potest, quin pravi humores inde generentur. Neque semper sine omni noxa talia ab iis assumuntur, refertque Braslausolus, 5. aphor. 24. in Comm. se novisse mulierem, quæ mota desiderio bibendi glaciem in maxima incidit mala.

### Curatio.

Humor pravi in ventriculo symptomatis huius causa euacuandus & tollendus est; ventriculus verò, si quam intemperiem conceperit, alterandus & roborandus, ne pravi humores deinceps facile recipiat.

Ad humores vitiosos in ventriculo euacuandos hic commodissimus est vomitus, qui decocto raphani aqua tepidâ cum butyro moveri potest, etiâ in prægnantibus, cum experientia doceat, prægnantes sæpe spontè primis mensibus sine omni damno vomere. A fortioribus tamen vomitoriis abstinendum in prægnantibus. Auicennas, si æger lutum appetat, illud in aqua dissolutum miscet cum medicamentis vomitoriis & sale, & de exsiccatò in Sole præbet Dr. i. cum aqua vel decocto vomitorio, ut provocato vomitu æger à luto deinceps absteat. Alij eadem intentione de carbonibus, creta & aliis, quæ appetuntur præter naturam, aliquid in spiritu vini dissolutum propinant, & post horam vomitorium medicamentum, si æger sit facilis ad vomitum; sin minus, medicamentum aliud quod purgans exhibent. Ita enim præsentia rei exhibitæ eius desiderium tollit, & humor pravi illius desiderij causa simul è corpore euacuatur. Si humor vomitu commodè purgari non possit, præparandus & per alium euacuandus est. Et quia humoris huius natura

& peculiaris qualitas planè occulta est, medicamenta ita præparanda, ut omni ferè humorum generi accommodata sint.

Ut *℞. Meliss. ruta, betonic. origan. an. M. β.*

Coquantur in f. q. aquæ.

Colaturæ *℞. ℥. v. Syr. de menth. beton. oxymel. f. an. ℥. j. M. pro 2. dosibus.* Deinde

*℞. El. diacathol. ℥. iii. confect. hamech. ℥. ii. agar. trochis. rhubarb. elect. an. Scrup. i. cinamom. macis. schœnanth. an. gr. vi. Cum sacch.*

F. Bolus.

Vel exhibeantur pilulæ polycrestæ.

Si fœmina, quæ non sit grauida, ab obstructione mensium in hunc affectum inciderit, vena in malleolo, vel poplite secetur, & postea medicamenta menses promouentia exhibeantur.

Postea danda opera, ut homines tunicis impacti absumentur, & ventriculus roboretur, quod fit diamoscho, diambra, aromatico rosato, theriaca, Mithridatio.

Mercurialis ut singulare experimentum commendat hoc:

*℞. Sem. sinapi, 3. β. offium columbar assatorum & in cinerem redactorum, 3. β. sem. portulac. 3. ii. succi cydon. 3. ij. sacchar. albiss. 3. iij.*

Misce ad ignem lentum. Dosis Vnc. β.

Alij hoc laudant.

*℞. Conserv. rosar. borrag. bugloss. an. 3. i. spec. diamarg. virisq. an. 3. i. fragm. lap. v. pretios. Scr. ii.*

Subtilissimè misceantur cum syrupo rosar.

F. Electuarium, cui adde, si liber, folia auri duo. Dosis est ad magnitudinem nucis moschatæ.

Ad ventriculum roborandum commendat Aëtius succum mali punici cum pulvere menthæ siccæ, quod grauidarum malaciæ expeti, ad abortum præcauendum, antea etiam è Plinio diximus. Item portulacam, quam Rabbi Moyses, 2. aph. 6. à proprietate occultâ valere contra appetitus depravationem scribit. Trotula, de pass. mulier. cap. 15. Fabas laudat coctas vel conditas cum saccharo, quod omnes pravi appetitus in mulieribus adimant. Laudatur & ruta in hoc affectu. Item semen cucumeris excort. polygoni atque anethi decoctum, atque alia, quæ videantur apud Aëtium, tetrab. 4. f. 4. cap. 11.

Extra Aëtius formâ cataplasmatismatis imponit cenanthen, balaustria, rosas, myrrum, smyrnij succum, sem. fœniculi coctum cum vino, dactylorum carnes, vino coctas & tritas formâ emplastri, aut malacydonia trita cum oleo rosar. seu nardino, cuius generis alia plura supra de intemperie ventriculi sunt proposita.

### Dieta.

Cibi varij & iucundi ægro offerantur, quibus à pravi appetitu auocetur. Dulcium tamen vñ sit moderatus, vel cum adstringentibus misceatur. Si æger appetat cretam, Auicennas & Aëtius amyllum recens præbere iubent. Ad discutiendos pravi in ventriculo humores, vñ est, ante cibum oliuas vel cappares sale & aceto conditas exhibere. Excitant etiam appetitum naturalem, & os ventriculi deterunt, amygdalæ amaræ cum pane exhibitæ. Item cichorij decoctum in aqua & sale oleo & aceto conditum. Olei loco iusculum carnis sumi potest. Roborat etiam ventriculi os panis in succo cydoniorum, granatorum, limonum, aut arantiorum acidorum maceratus. Potus sit vinum generosum subastrigens.

An autem cibi pravi & alieni à natura hominis, qui auidè ab ægris eiusmodi appetuntur, sint concedendi, consideratione dignum est. Historiæ quidem à medicis passim annotatæ sunt, quod à plurimis cibi eiusmodi alieni à natura hominis sine damno assumpti fuerint in maximâ copiâ. Observatum tamen quoque est ab eiusmodi pravis rebus, & à naturâ humanâ planè alienis quosdam

quosdam læsos fuisse. Itaque existimant nonnulli, si res planè absurdæ sint, ac præter naturam, non esse concedendas. Cum gravidis tamen omnino cautè & prudenter agendum; quoniam si planè denegentur res, quas avidius expectant, offenduntur, vel abortum patiuntur, vel stigma infantibus imprimunt. Contra tamen etiam vix fieri potest, quin à talium terum usu offendantur. Itaque danda opera, ut illis blandè persuadeatur, ne sibi in talibus indulgeant, atque ea, quæ dāni & ipsis & foetui aliquid afferre possunt, non nimis avidè appetant, aut certè si appetitum cohibere non possint, parcè saltem degustent. Suadent quidem nonnulli, gravidas huiusmodi mulieres decipiendas esse edulibus ex saccharo & amylo figuram & colorem rei, quam appetunt, referentibus: Sed rectè monet Herc. Saxonia, talia non multum posse conferre & vix appetitum explere; cum non colorem & figuram, nec amyllum & saccharum, sed substantiam certam appetant.

### QVÆSTIO.

*An in Pica humori pravo contraria an vero similia appetantur?*

An in Pica humori pravo contraria an verò similia appetantur, inter autores disceptatur. Cum Avicennā plerique hīc statuunt, naturam hīc poscere contraria, quasi remedia ad profliganda ea, quæ præter naturam sunt in ventriculo. Alij contrarium sentiunt, idque idèd, quod vomitu reiiciantur humores non contrarij, sed similes; acida nimirum appetentes nihilominus acida euomant: & si appetunt contraria, causam non patere putant, cur non appetant contraria consueta potius, quam insueta, & à natura alienissima. Ipsi verò similia appeti existimant. In qua sententia est Rondeletius, cum quo consentit Mercatus, de intern. corp. morb. crat. l. 3. cap. 3. Idque idèd, quia humores ij pravi quasi connaturales & eorum tēperamentum quasi habituale factum sit. Cum enim humores vitiosi quasi domestici & familiares facti sint, natura ad eorum quasi similitudinem conservatorem similia appetere. Aliis nec ista opinio placet. Si enim appetant similia, iisque fruuntur, augetur malum; cum tamen sæpe nil tale accidisse compertum sit. Videmus præterea prægnantes sæpe vomitu reiicere humores falsos vel acidos, & tales tamen non appetere. Quæ etiam calci, carbonibus, crudis carnibus ac similibus cum humoribus convenientia? Ergo hīc non in qualitatibus manifestis acquiescendum, cum ex iis huius symptomatis & appetentiæ tam mirabilis causā reddi non possit. Ideoque etsi probabile sit, ex simili potius, quàm contraria qualitate appetentiam hanc provenire: tamen quænam illa sit qualitas integrè explicare difficile, imò impossibile est: cum res, quæ appetuntur, nullam cum humoribus vel dulcibus, vel salsis vel acidis, in manifestis qualitatibus convenientiam habeant.

### CAPVT VI.

*De Potus appetitu læso, & primò de siti deficiente.*

**V**T circa appetitum cibi quædam symptomata contingunt: ita etiam circa potus appetitum quædam accidunt. Et ut appetitus cibi seu fames nunc imminuitur, nunc aboletur, nunc intenditur, nunc deprauatur: ita quoque appetitus potus seu sitis vel imminuitur, vel aufertur, vel intenditur, vel deprauatur. Verum rarius est, ut quis potum omnino contra

naturam appetat, ideoque saltem de siti deficiente & nimia dicemus.

Et primò quidem interdum sitis vel exigua vel etiam nulla percipitur, refertque Platerus, in obseru. Marchionem quendam, Legatum à Rege Gallorum in Italiam missum, nihil penitus bibisse, idque à teneris sibi confuerum fuisse ipsum fassum esse. Cum autem, ut famis, ita & sitis sedes sit orificium ventriculi, & sitis fiat ob defectum humidij; etiam sitis nulla fiet, cum defectus ille humidij non adest vel non percipitur. Prius sit, cum intemperies ventriculi frigida & humida adest, aut humor frigidus dulcis multus orificio ventriculi inhaeret, aut cum aer frigidus & humidus aut cibi tales id humectant. Causæ denique, quæ venarum suctionem, & corporis euacuationem impediunt, ac excessus omnino humoris ac frigoris in corpore, faciunt, ut sitis nulla exciteretur, de quibus in ablatâ & imminuta cibi appetentiâ dictum.

Defectus autem humidij siue fames non percipitur ob easdem causas, ob quam læsa facultate sentiente suctionem non percipi diximus. Id accidit sæpe in delirantibus. Ita Hippocrates, 3. Epid. comm. 3. aph. 44. scribit: quosdam in febre ardente non sitiisse, qui iidem phrenerici non senserint, quicquid parerentur, impedita facultate animali sentiente ob cerebri vitium. Conuersus etiam huc multum facit, videmusque quotidie poculis assuetos continuò sitire: aliàs contra rarò & per diem, imò biduum non sitire,

### Signa Diagnostica.

Quod æger sitim nullam habeat, ex eius relatione facile cognoscitur. Et si non deliret, ac facultas sentienda salua sit, indicio est, ex humiditate & frigiditate ventriculi vel totius id fieri, nisi forsitan consuetus sit rarò bibere.

### Prognostica.

1. Ablata vel imminuta sitis curationem per se ferè non desiderat, dommodò appetitus cibi adhuc constet, qui in nutriendo animali primatum obtinet. Et multos rarò & parcè omnino bibere, aliquos etiam diu à potu abstinuisse compertum est.

2. Infaustus morbi exitus metuendus est, ubi vel deficit sitis, quando maximè adesse debebat; vel intentia, quæ aderat, euanescebat præter rationem, ut in febre, præsertim ardente. Tum enim vel virtutis animalis oppressæ, vel natiui caloris & appetentis facultatis in ventriculo extinctio significatur. Galenus, 3. Epid. comm. 3. aph. 14.

### Curatio.

Si ob humidam & frigidam intemperiem & humores in corpore abundantes sitis non adit, eadem curandi ratio est, quæ appetitus à simili causâ deieci, & appetitus cibi restitutus plerumque etiam potus appetentiam reparare solet.

Si à Delirio sit sitis, & ægri à potu abstinencia incommodi aliquid allatura sit, ægro multis modis persuadendum, ut bibat. Idem faciendum, si qui parcius bibant, & inde alui obstructio sequatur, vel ciborum distributio impediatur.

### De Liquidorum auersione & Hydrophobia.

Interdum etiam accidit, ut æger potum non solum non appetat, sed & auerferetur ita, ut ad aquæ etiam conspectum tremat, aut conuellatur. Imò non solum aquam sed & liquida omnia quosdam auersatos fuisse ita, ut nec sonitum eorum, nec nomen ferre potuerint, compertum

compertum est. Refertque Platerus, *lib. 1. obseru.* Mulierem quandam nec aquam, nec vinum, nec iuscula, nec aliud liquidum deglutire potuisse, sed hisce oblati suffocationis periculum incurrisse. Imò ex contactu & conspectu rerum liquidarum, & quod mirum, vbi aërem nonnihil agitarum vel auram lenem sensit, idem passam esse. Plerique hunc affectum & rabiem caninam pro eodem habent. Verum ut etiam dictum, *lib. 1. pract. part. 2. cap. 16.* etsi qui rabie Caninâ laborant, omnes etiam hydrophobiâ corripantur: tamen etiam sine rabie ex aliis causis hoc malum induci potest, ut historiae ibidem allegatae testantur. Nam mulier, cuius P. Salius Diuersus, *de affect. part. cap. 19.* meminit, illa post febrem pestilentem & dysenteriam in hydrophobiam incidit, & octavo die mortua est. Et femina, cuius Platerus mentionem facit, ex terrore hoc malum contraxit. Ut ita hydrophobia latius pateat, quam rabies: cum rabies solum ab alio rabioso animali communicetur: Hydrophobia verò etiam ex interno humorum vitio generari possit, ut historiae allegatae satis testantur.

Quæ autem causa sit: cur ita ægri hi aquam & omnia liquida auerfantur, de eo dictum est in *Institut. lib. 2. part. 3. sect. 2. cap. 4.* & prolixè hac de re disputat Io. Baptista Codronchius, *lib. 1. de hydrophob. cap. 13.* (qui tamen hydrophobiam & rabiem pro eodem affectu habet, sed male.) Verum operæ pretium non videtur pluribus hac de re disputare; cum res tandem eò redeat, & omnes confiteri necessum habeant, malum hoc non à primis & manifestis qualitatibus, sed occultis ortum habere, & peculiarem à morbo huic veneno seu ab animali rabido communicato, seu in corpore genito cum omnibus liquidis habere ita, ut siue gustentur, siue tangerentur, siue audiantur, homo summè lædatur. Ut enim à tarantulâ demorfi musicæ sono iuuantur; ita liquidorum vsu vel aspectu hi valde læduntur. Frustra verò se macerant, qui ex manifestis qualitatibus huius rei causam reddere conantur.

Malum verò hoc planè periculosum est, & vix aliqui euadunt, testanturque historiae à Marcello Donato, Petro Salio Diuerso, & Platero allegatae alios tertio, alios quinto, alios octavo die mortuos esse. Si quid tamen remedijs adhibere licet, ea proculdubio adhibenda, quæ rabidis dantur; cum venenum hoc cum illo convenientiam sine dubio habeat. de quo *lib. 1. part. 2. cap. 16.* actum. vbi etiam ex Celso dictum, ad præseruationem ab hydrophobia remedium esse, non opinantem in aquam proicere: scribitque hac de re etiam Lemnius, *de occultis nat. mirac. lib. 3. c. 5.* Oceani accolæ demorfos à cane rabioso certatim ad mare rapere, etiam brutas pecudes, & septenis vicibus immergere, non superstitione obseruato isto numero, sed ut efficacius virus eluatur.

## CAPVT VII.

## De siti Nimia.

**F**requentissimum autem malum est sitis nimia. Potus nimirum nimia appetentia, cum scilicet extra tempus cibi capiendi, quo alias naturalis sitis oboriri solet, sitis hominem vrget, ut & maiorem potus copiam & frequenter eum appetat. Et quidem plerumque cum febribus, aliquando & sine his Symptoma hoc hominem molestat.

## Causæ.

Causæ autem sitis nimia rectius inuestigari non possunt, quam si sitis naturalis causam expendamus. Hæc enim si nimia & vehementior reddatur, sitim ni-

miam parit. Fit autem sitis naturalis ab appetentiâ humidi, quod absumptum est, ob quod suctio in orificio ventriculi excitatur. Ideoque causæ omnes, quæ sitim nimiam excitant, ad siccitatem seu humoris inopiam redigi posse videntur: Galenus tamen, *1. de simpl. med. facult. cap. 30.* causas in duas dispescit, & sitim prouenire scribit vel ob humoris inopiam, vel ob caloris copiam. Vnde Mercatus sitim nimiam duplicem constituit, non naturalem & præternaturalem. Illam fieri docet, ex defectu roridæ substantiæ, quam sequitur appetitus naturalis, in cuius subsidium venæ usque ad os ventriculi sugendo sensum tristem inferant, quem sequitur sitis, appetitus scilicet frigidi & humidi, qui quidem naturalis appellari posset, quod naturæ ordine procedat ab inanitione ad appetentiam. Quia tamen proficiscitur à causis, quæ præter naturam modum operantur, non naturalem nominat, quæ non solum à causis præter naturam, sed & contrario siti naturali modo excitatur. Incipit hæc sitis à calore & desinit in siccitatem, & primario expetit frigida, secundario verò humida, atque incipit non ab inanitione membrorum, sed consumptione roridæ substantiæ ipsius ventriculi, ac postea desinit in consumptionem reliquarum humidi partium.

Excitant autem sitim priorem & non naturalem à Mercato appellatam omnia, quæ roridam totius corporis, & consequenter etiam ventriculi substantiam dissipant, siue extrinsecus accidant, siue intra corpori inhæreant. Ita labor, vigiliæ, inedia, immoderata aliqua corporis euacuatio, & huius generis alia, quæ humidum absumere possunt, sitim excitant. Atque hæc sitis non solum potu, sed & alimento liquidiore ac humidiores sedatur. Sitis verò præternaturam, quæ à calore incipit, & mox sibi siccitatem accersit, causæ possunt esse omnia, quæ humidum ventriculi nimium calefaciunt, & in eo feruorem excitant, siue ea Intemperies in ipso ventriculo excitetur & consistat, siue ob vniuersi corporis aut partis ventriculo vicinæ vel connexionem, vel consensum cum ea habentis calore ea accendantur.

Ita pulmonibus calefactis & excalescentibus maxima sitis excitari solet. Idem accidit calefacto & inflammato hepate. Item, ob Renes.

Causæ, quæ calorem illum, siue in ventriculo, siue in aliis partibus excitare possunt, sunt aer calidus, cibi nimium sale, pipere & aliis calidis conditi, & calidorum medicamentorum, itemque vini meracioris vsus, ut & medicamenta fortius purgantia, aut venena exiccantia, ut viperæ morsus, aut vinum, in quo viperæ extincta est. Item motus vehemens linguæ & partium vicinarum, ut diuturna lectio & peroratio; ac omnia, quæ facile in bilem mutari, aut calorem præter naturam vel in ventriculo, vel toto corpore, vel membro aliquo, à quo ventriculus calefieri possit, excitare valent.

Ego tamen malim sitim istam præter naturam non solum à calefacientibus, sed etiam à siccantibus primò deducere; cum videamus quædam non tantum primò calefaciendo, sed & primò siccando, sitim excitare. Etsi enim ad dispositionem, quam sequitur sitis, præcipuè caloris actio multum possit: tamen sine insigni calore siccantia non raro idem præstant. Et si vtriusque qualitatis excessus coniungatur, sitis vehementior excitari solet. Hinc in febribus acutis & ardentibus vehemens sitis ægros affligit.

Siccando autem sitim excitant cibi sicci: & sæpius humores serosi, atque hinc Hydropici valde sitiunt, ob nimiam humoris falsi copiam.

Atque ut hæc contrahamus, sitis nimia, siue non naturalem siue præternaturalem appellare libeat, causæ sunt illa omnia, quæ humiditatem ventriculi absumunt, aut calefaciendo, aut siccando, aut utroque modo: siue id fiat in toto corpore, ita ut suctio tandem usque ad orificium ventriculi pertingat, siue tantum & præcipuè in ipso

Sitis duplex  
secundum  
Mercatum.

lib. 1. pract. part. 2. cap. 16.

lib. 1. part. 2. cap. 16.

Causæ.

ipso ventriculo vel gūlā, vel lingua ac palato, quæ partes communem cum ventriculo tunicam, quā reguntur, habent.

### Signa Diagnostica.

Signa.

An ægri sitiant, & quantum sitiant, ipsi patefacere solent. Vt verò causā rectè dignoscatur, signis opus est. Sitis nonnaturalis, quam appellat Mercatus, cognoscitur è causis, quæ præcesserunt, neque cibi fastidium facile adest. Sitim verò, quæ ex calore & siccitate dissipante & absorbente humidum ventriculi provenit, indicat cibi fastidium, calor & siccitas ventris & vicinarum partium, & sapor aliquis præter naturam amarus, saluginosus, nitrosus; fauces sunt asperæ.

An verò calor & siccitas primò in ventriculo sit excitatus, an verò è toto corpore, vel parte aliquā vicina, aut cum ventriculo consensum habente, facile è signis cognoscitur. Febres enim sua signa habent, & facile ex iis innotescunt. Ita etiam patet, an à causā aliqua evidente, ut æstu aeris, ita, usu ciborum calidorum vel saliorum vel aliorum, quæ supra recensuimus, sit excitata.

Et quidem an sitis solum ex humore bilioso vel falso ventriculum obsidente, aut è primis viis vapores calidos ad os ventriculi mittente; an verò ex pulmonis & cordis æstu excitetur, discernere & utile est, nec difficile. Nā quæ ex pulmonis & cordis calore excitatur sitis, cognoscitur ex calidissimi spiritus effloratione; à quo & os aridum redditur, difficilisque est sermo propter tracheæ & laryngis siccitatem sitisque illa potū parum vel nihil sedatur, cum parum eius ad pulmones perveniat; sed potius frigidi acris inspiratione. Ita si hepatis vel alterius partis ventriculo vicinæ inflammatio ac æstus adsit, ea è suis signis cognoscitur.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Sitis præter naturam malum non est contemnendum, quoniam & nutritioni corporis obest, & vires valde deiecit, & quia sitientes sæpè appetitui indulgent, & nimiam potus copiam assumunt, inde in cachexiam, & alios gravissimos morbos incidunt, imò sæpe mortem sibi attrahunt, ut postea dicitur.

1. Sitis immoderata insignem in corpore ariditatem & exustionem arguit, quam non externa aliqua causā, sed acutissima febris attulit, & adhuc fouet, & propterea periculum arguit.

### Curatio.

Curatio.

Sitis illa nonnaturalis nominata, cum ob substantiæ toridæ defectum, & quidem non solum in ventriculo, sed & in toto corpore oboriatur, cibo potius, quam potu sedatur, & propterea eam potus, ut potus, non sedat, sed potius alimentosa partes, quæ in potu sunt, qua ratione Hippocrates scripsit, 2. aphor. 11. *Facilius est, refici potu, quam cibo.* Ideoque hanc sitim aqua non exstinguit, licet eam aliquo modo leniat, quinimò aquæ potu sæpè in hac siti vomitus, alui fluxus & alia mala facile excitantur. Cum enim sitis ista aquæ potu non sedatur, eam copiosius ingerunt ægri, atque ita corpori nocent. Ideoque initium curationis fiat ab humectatione, cui mox succedat lenis refrigeratio, & hæc sitis solum humidi deperditi instauratione mitescit. Ac propterea ad sitim hanc sedandam etiam potus vini prodest.

Sitis verò præternaturalis indicat humectantia & refrigerantia, & refrigerantia ac humectantia sitim hanc quacunque de causā genitam tollunt. Simul tamen ad causam respiciendum, & an sitis sola, & sine alio morbo succreuerit, an verò alium morbum secuta sit, considerandum. Si per se orta est, à causā vel interna vel externā oriri poterit. Si ab externā, illā remotā, &

eius providentia habitā, frigidis, frigidoque potu sedatur. Si verò à causis internis ortum trahat, causā quælibet convenienti modo tollendā, & ad quamque causam potus ratio moderanda.

Quæ enim ex ingenti calore oris ventriculi provenit sitis, quam humiditatis naturalis in eo excitavit effluencia, frigida aqua potus tollit, præsertim si cibi eiusdem qualitatis sint participes, & sufficit tum bis tervè bibere. Verum si siccitatem iam contraxerit orificium ventriculi naturali eius humiditate resolutā & absorptā, idem potus quidem requiritur, frequentius tamen & parcius dandus hic, humectantibus admixtis, qualia sunt: Symplicium violarum, buglossæ, item mucilagines, cum iusculis ac alimentosis poribus. Si verò sitis cum alio morbo coniungatur, humectantia & refrigerantia eam quidem leniunt, vix tamen planè tollunt, neque sitis integrè cessat, nisi affectu, cuius socia est, sublato.

Humectantia & refrigerantia quod attinet, primò quidem oris refrigeratio sitim valde sedat. Ergo sæpe os colluatur aquā frigidā, præcipuè addito modico acetri, aquæ hordei, lactucæ, emulsionis sem. 4. frigid. maior. papaveris. Detineantur in ore pruna acida, vux passæ, frustum mali citrij, melonis, persici, grana mali punici, cydoniorum; folia acetosæ, caules lactucæ, portulacæ, rad. glycyrrh. recentes, in frigidā singula mactata.

V E I

℞. Glycyrrh. Drach. vi. sem. cucum. satini Vnc. β. tragacanth. Drach. ij.

Misceantur & fiant Trochisci sublinguales.

℞. Sem. portulacæ, tragacanth. an. ʒ. β. sem. 4. frigid. maior. ex cortice lactucæ an. ʒ. iiii. santali gummi Arab. an. Drach. β.

Terantur & cribrentur, ac cum aq. rosar. & mucilag. sem. psyllij

F. Trochisci.

Vel semina psyllij aut cydoniorum excorticata ligentur in nodulo ex linteo albo, raro, qui maceretur in aqua frigida, & super lingua ponatur.

Utiles sunt & mucilagines sem. psyllij, cydoniorum, ut:

℞. Sem. psyllij cydonior. an. ʒ. i. aqu. f. f. β.

Macerentur per noctem, deinde diligenter conqualsentur, & abiectionibus seminibus addatur violar. ʒ. i.

Nonnulli & crystallum ac corallium in ore detinere iubent. Utile est & Rob ribes, succus de agresta, de acetosa, acetositis citri, vinum granatorum, caules lactucæ conditi: de quibus etiam aliquid deglutire licet.

Optimè autem aqua actuali sua frigiditate sitim pellit, eaque omnibus animalibus ad sitim sedandam communis potus est; de cuius recto usu in doctrina de febribus dictum. Cautè enim usurpanda, cum, si avidius potetur, gravissimorum malorum & mortis sæpe causā sit.

Ita refert Antonius Beniuenius, de abditis morborum & Causis in sanat. causis, cap. 6. Iuvenem quendam Febre ardente correptum, cum siti urgente frigidissimam aquam potasset, intra paucas horas mortuum esse. Et Amatus Lusitanus, cent. 2. cur. 2. historiam iuvenis ex aquæ frigida potu mortui recenset. Narrat quoque Forestus, lib. 1. observ. 13. in schol. magnæ spei adolescentem Valentium Cordum, cum in itinere Romam versus siti urgente aquam gelidam bibisset, febre ardentissima correptum Romæ mortuum esse. Eadem ratio est cerevisiæ. Novus enim faminam, quæ cum in febre urgente siti cantharum ferè cerevisiæ renuieris exhaustisset, in hydropem incidit, à quo postea tamen idoneis medicamentis adhibitis evasit.

Galenus acetum commendat in siti ex calore, quia refrigerat. Improbatur verò in siti ex siccitate vel humidi inopia. Quod si simul coniungatur humiditas & caliditas, eius sitis optimum medicamentum acetum esse scribit. Sin ex caliditate & siccitate sit affectio, ut in febribus



bus, oxyctatum seu poscam, hoc est, aquam modico aceto mistam probat, 1. *de simpl. med. fac. cap. 30.*

Eadem ratio est sp. vitriol. & nitr. quæ aceti loco commodè admiscuntur. Vbi tamen sciendum, non frigiditate hæc, cum sint calidissima, sitim sedare, sed quia inflammationem humorum calidorum & inflammabiliū, qui sitim excitant, sistunt, abs quo si sit, & solum ex siccitate & defectu humidi sitis proveniat, potius nocent.

Vtiles sunt & Emulsiones semin. 4. frig. maj. & Iulebi ex aqua simpl. vel destillata, & syrupi acidi cum aquis destillatis misti, quales sunt syrup. acetosilatis citri, granator. de ribes, de agrest. oxytaccchara.

Extra quoque nonnulla adhibentur, lotiones præcipue pedum & manuum, & epithemata regioni ventriculi, Hepatis & cordis applicata, quæ omnia calorem totius corporis temperando sitim sedant, possuntque regioni Hepatis applicari succus cichor. Endiu. portulac. cum aceto & spec. diarrionisantal. quo modo, sapius & felicius, quam internis, se sitim sedasse scribit Heiculus Saxonia.

In calibus tamen frigidis ipsi ventriculo adhibendis cautione opus est; cum facile ventriculum, & diaphragma vicinum lædere possint. Refert enim Antonius Beniniensis, *de abdit. morb. & sanati. causis. cap. 15.* ab emplastro nimium frigidum stomacho applicato primo difficilem respirationem, hinc singultum, & postea mortem secutam fuisse.

Si æger absque febre sit, & bilis aut falsa pituita sitim excitent, & adhuc foueant, humores illi per interualla purgandi sunt pilulis de hiera, mastichinis, agarico trochiscato & aliis commodis medicamentis, ac postea intemperies corrigenda, ut supra dictum.

Si autem à febre sit sitis, in principio paroxysmi, agroti potus non est dandus, ne æstus maior in corpore accendatur, & materia in motu suo impediatur; sed fallenda sitis iis, quæ in ore detinentur. In vigore paroxysmi deglutienda quædam præbere & collutionibus oris refrigerantibus ac humectantibus uti conuenit. In declinatione potus conceditur, nisi æger abstinere velit, ut excitatus huius frigiditate calor foras erumpat, sudoresque promoueat. Quæ de re plura de febribus dicta sunt.

In siti ex pulmonum caliditate aeris frigidi attractio utilis, & propterea is frigidus alterandus, & continuò flores rosar. violar. nymphaeæ olfaciendi.

Si ex Hydrope fuerit sitis, nitrolo salso ac corrupto humore ad ventriculum transmissio, non potu ea sedanda, cum is malum augeat, sed his, quæ vapores & humores demulcent. Ad quam rem mucilagines & pinguis proliunt.

Quod ad Dietam, cibus sit refrigerans & humectans, ubi causa sitis est humor biliosus, ut lactuca, prislana hordeacea & alij, de quibus in calida & sicca ventriculi Intemperie dictum. Fugienda, acrida, salia, amara. Ager os clausum teneat, nec multum loquatur, de consilio Hippocratis, 6. *Epid. comm. 3. text. 33.* ubi os claudere & silere sitim sedare ait.

Quibus noctu bibendi est auiditas, iis admodum sitientibus obdormire bonum, scribit idem Hippocrates, 5. *aph. 7.* Sæpe enim contingit noctualiquem sitire, siue quod parcius in cœna bibit, siue quod liberalius vinum hausit, siue quod cibus salis & acris usus est. Hic igitur, si sitis leuior & *επιόλαος*, ut appellat Hippocrates, 6. *Epid. comm. 4. text. 23.* non bibendum, ne coctio ventriculi turbetur, sed dormiendum, ut in somno materia sitis causa corrigatur, siue illa crudus succus sit, siue vapores feruidi & acres, fauces ac d's ventriculi exsiccantes. Per somnum enim intro collectus calor naturalis & sanguis viscera humectant, cibique & potus acrimoniam temperant. Si verò sitis valde urgeat, dandus est potus, præsertim si ex humidi defectu

illa orta sit, sed moderatius initio, prius quam coctio absoluta sit. Tutius tamen semper est, noctu à potu abstinere & somno indulgere.

## CAPUT VIII.

*De Symptomatibus, quæ in Retentione cibi & potus accidunt.*

Postquam Symptomata, quæ circa appetitum in ventriculo accidunt, absoluiimus, proximum est, utiam ea, quæ circa retentionem contingunt, explicemus. Et si enim post appetitum sequitur deglutitio, & illa etiam lædi possit, tamen de ea supra inter affectiones gulae seu oesophagi egimus.

Ventriculus equidem circa cibum & potum, quem coquendum accepit, rectè coarctari, eumque rectè complecti debet. Verum hoc non semper accidit, unde Retentionis deprauatæ symptomata accidunt. Sunt autem illa quatuor, Palpitatio quædam, veluti conuulsio, veluti tremor, veluti vibrans motus, ut ea Galenus, *de diff. symptom. cap. 4.* recenset. Palpitatione afficitur ventriculus, quando eleuatur & deprimitur interdum totum corpus, ut in reliquis parribus fieri solet, dum à flatu crasso in eos erumpente eleuantur, & postea sponte concidunt. Appellat autem Galenus non palpitationem absolute, sed palpitationem quandam, cum non in substantia ventriculi, seu intra eius tunicas flatu attollens contineatur, sed in ipsa ventriculi cauitate. Huius enim Symptomatis causa est status in ventriculo contentus, eumque distendens, ex cruditate & inprimis cibo flatulento ac potu copioso ortum habens. Habetque hoc Symptoma eadem causas, quas inflatio ventriculi, & propterea etiam signa & curationem eandem.

Deinde accidit ventriculo quædam quasi conuulsio, cum scilicet ventriculus immodicè exinanitus postea circa cibos sese constringit subito, & cum violentia quædam, ac quasi singultu, & proinde etiam, quæ de hoc Symptomate dici possent, ex capite de singultu infra, & supra de intemperie ventriculi sicca petantur.

Tertiò veluti tremor quidam quandoque ventriculo accidit, quem Galenus, loco allegato, ita describit: Vbi à comedendo nec *κλύδων* aliquis seu fluctuatio cum sonitu te infestat, nec inflatio, nec palpitatio vlla, nec singultus, sed difficultas aliàs insueta in ventre sentitur, grauaturque is ac laborat, cupitque celeriter opus vel per inferiores vel per superiores partes abicere, accidit præterea ructus quispiam cum displicentiâ alienâ, nec facile interpretabilis in anhelitu difficultas sequitur: existimabis, ventriculum circa cibos constringi quidem, cæterum id veluti cum tremore fieri. Symptoma autem hoc ortum habet vel à ciborum copiâ nimia, vel à frigida intemperie, de qua supra dictum.

Tandem etiam conuulsio veluti quædam circa ventriculi corpus, sicuti in febribus accidit, ægrique se quædam molestiam in ventriculo percipere aiunt, qualis in initio intermittentium febrium fieri solet. Fit autem hic motus, dum ventriculi tunicæ, quo tempore se circa cibum constringunt, ab aliquâ mordaci materia irrigantur, quæ ut plurimum biliosa existit & tenuis. Cuius Symptomatis causæ & curatione ex iis, quæ de Intemperie ventriculi cum bile dicta sunt, parent.

Curantur autem hæc Symptomata causis, à quibus pendent, sublatis. Si nimirum cibi vel potus copia sit maior, quam ut eam ventriculus complecti possit, ea minuenda. Si cibus sit crassus, flatulentus, durus, talis vitandus, & is eligendus, qui minimam in ventriculo extensionem pariat, & facile concoquatur. Si autem aliquod vitium sit in ventriculo, corrigendum,

*Symptomata Retentionis deprauata in ventriculo.*

*Palpitatio.*

*Conuulsio.*

*Tremor.*

*Conuulsio.*

*Curatio.*

ut supra de morbis ventriculi dictum. Imperfecto etiam ciborum amplexui succurritur per medicamenta & cingulum astringens. Constricto enim & compresso peritonæo constringi quoque ventriculum necesse est, unde alimenta rectius complectitur.

### Ruminatio.

#### Ruminatio.

Circa Retentricem ventriculi (etsi alij, sed minus commode, ad expultricem referunt) accidit interdum rarum Symptoma, Ruminatio nimirum. Equidem ruminatio quibusdam brutis naturalis est, ex peculiari ventriculi constitutione. Verum si homo cibum, quem ventriculus ad coquendum assumpsit, antequam planè coctus sit, in os resumit iterumque mastiget, id planè præter naturam est. Rarum verò, ut dictum, est hoc symptoma: Eius tamen duo exempla refert Hieron. Fabric. ab Aquapend, in tractatu de varietate ventricul. Vnus, inquit, fuit nobilis Patavinus, qui interrogatus de ruminatione, num esset illi libera, respondit, minimè liberam esse, sed coactam. Cogebatur enim ab assumpto cibo, circiter horam plus minusve in os cibum attrahere & rursus mandere. Cogebatur autem ab insigni oblectatione, qua ruminandu cibum tenebatur, idque sibi esse perpetuum omnibus temporibus passus est. Dicebat præterea omnem cibum, suo solidum suo mollem se semper ruminare, & dum assumebat, deglutire statim absque ullo fere diuturno officio, quamvis dentes sortitus esset in utraque maxilla, ut alij homines, & os aliquando latius ac gulam, propter quam causam literam S. proferre agere poterat: item sibi videbatur intra os, aliquid quasi bolum continere, quod expeditam illi locutionem impediret: Ruminatioque ei & motus maxilla ad latera longe facilius obtingeret ac ceteris. Habebatque in usu bibendi vinum nigrum ac potens, alium verò abhorrebat, præter malvaticum. Cum agrotabat, nequaquam ruminabat, sed ab omni ruminatione tunc temporis cessabat, ut boves quoque faciunt, cum agrotant, quod tanquam signum certum, boves agrotare rustici habent. Obiit, & aperto cadavere inuentus ventriculus est insignis magnitudinis, & in interna superficie valde asper. His omnibus addendum omnino est, quod eius pater paulo supra frontem in capite corniculum durissimum crassitie digiti minimi, longitudine verò olivæ Hispanicæ habebat extuberans, substantia ungui persimile. Ex quo colligi potest, parentis semen aliquam habuisse affinitatem cum cornigeris animalibus, neque mirum fuisse filium simile quid a parente contraxisse.

Alter qui similiter ruminabat, fuit monachus iisdem conditionibus affectus, qui tamen marcere obiit, propterea, quod tanta aviditate, cibum regerebatur in os, ut ventriculus & consequenter iecur cibi indigentia quasi perpetua laboraret.

Terrium Exemplum, quod Clariss. Prænotius auditoribus suis Patavij recensuit, est de quodam viro quinquagenario Genuensi, eodem vitio ab ineunte ætate usque in præsens tempus correpto, qui aliam rationem reddere nequit, nisi quod ipse adhuc infans matre mortua per biennium lac ex ubere vaccæ calidum hauserit.

Verum talia vitia ut rara sunt, ita procul dubio à primo ortu à præternaturali aliqua ventriculi constitutione ortum habent, & propterea curati non possunt.

## CAPVT IX.

### De Chylosi seu coctione ventriculi læsa, & Imbecillitate ventriculi.

Χολώσι  
læsa.

PRima & propria ventriculi actio est Chylosis, seu cibi & potus concoctio, & in substantiam cremori præsanæ similem, quam chylum vocant, mutatio. In ventriculo enim cibus assumptus primum fu-

turi alimenti rudimentum accipit, unde etiam ventriculus publicum alimenti *τακτοῦ* seu promptuarii appellatur.

Læditur autem Chylosis & ventriculi coctio variis modis, & variis de causis. Nam 1. interdum nulla cibi fit alteratio vel mutatio, quod vitium *ἀνοχία* seu cruditas nominatur. 2. Interdum longior, quam par est, mora in coquendo consumitur, aut omnes cibi partes perfectam coctionem non recipiunt, & alimentum semicrudum relinquitur, quod vitium *σπασμὸς* nominatur, tarda & imperfecta concoctio. 3. Cum cibus corrumpitur, & aliam, quam debebat, naturam accipit, *δυσωχία* & *τῆς πύλως διαφθορά* dicitur. Cruditas tamen ventriculi interdum generaliter accipitur, & de omni coctionis in ventriculo *ἀνοχία* & frustratione usurpatur. Nonnulli etiam hoc malum ventriculi Imbecillitatem & debilitatem nominant. Propriè tamen prioribus duabus tantum differentiis competit. Etsi sint, qui in genere Imbecillitatem ventriculi nominant, cum non solum coctrix, sed omnes iunctim facultates malè habent, & eà duntaxat ratione ægrotant, ut nimirum non extinguantur vel evertantur, seu cum inceptum opus nequeunt perficere, & in medio quasi actu subsistunt. Cruditas verò duplex constituitur, nidorosa, cum alimentum in nidorosanum, & vltam quasi materiam mutatur, ut ructus vel oleum fixum vel pisces corruptos, vel simile quid referat, quæ accidit in biliosis & calidis naturis. Acida verò est, cum cibus in acidam naturam mutatur, unde & ructus acidi percipiuntur; quæ fit à ventriculi frigidityte. Potest tamen & tertia cruditatis differentia addi, cum ob calorem debilem cibus imperfectè coquitur, & in pituitosum quid mutatur, citra tamen aciditatem.

### Causa.

Frustratur autem facultas ventriculi in coquendo, *Causa* vel læsa facultate, vel ob errorem externum. Facultas *Læsa* ventriculi, ut & *ἀνοχία* eiusdem seu tonum laxatum, & laxitatem præter naturam, cum scilicet necessarius iustusque fibrarum coalitus laxatur. Quod vitium etsi alij aliò referant: tamen rectissime ad anorhos conformationis refertur. Impeditur verò facultas ventriculi à tumoribus, vulneribus, vlcerebus & similibus morbis supra enumeratis. Ut enim ventriculus bene coquat, naturalem constitutionem in temperie, conformatione, & unitate habere debet. Frequentissime verò læditur ventriculi coctio ob calorem eius debilem. Coctio enim ventriculi primariò per eius calorem perficitur. Constat autem is calor, qui coctionis autor est, ex calido innato & influente: & ut uterque ad coctionem necessarius est, ita etiam utriusque ratione coctio ventriculi lædi potest; ac coctio ventriculi male perficitur non solum, quia calor innatus ventriculi languidus est, sed & quia influens deficit & debilis est, id quod ægris & convalescentibus accidit. Atque hac de causâ in affectibus animi, cum calor & spiritus aliò auocantur, coctio sæpe læditur. Ideoque ad hoc genus causæ pertinent non tantum, quæ intemperiem ventriculi innatam debilitant, sed & quæ calorem influentem vel auocant vel dissipant. Præterea non solum calor ipsius ventriculi, etsi is primaria coctionis causa sit, sed vicinarum etiam partium aliquid ad coctionem facit. Dextra enim parte ventriculum hepar amplectitur, sinistra lien, supra diaphragma, ante & infra omentum ac intestina. Hæ ergo partes, si calorem ventriculi non la-  
ris foueant, vel etiam intemperie laborent, eorum vitio calor debilitatur, & non rectè coctio perficitur. Eæ quæ causæ sint, quæ temperiem ventriculi evertunt, supra dictum.

Ob errorem verò externum coctio læditur, cum nullo ventriculi vitio, sed ob aliud quid, quod extra eius constitutionem est; coctio non rectè perficitur. Galenus, 3. de sympr. caus. cap. 1. errorem externum hic triplicem constituit: alium in excrementis in ventriculo hærentibus; alium in cibis; alium in tempore somni. Excrementa primò in ventriculo seu in eo genita, seu aliunde affluentia coctionem turbant, dum cibos, etsi boni, inquinant & corrumpunt: quæ si sint frigida, faciunt, ut acida cruditas inde generetur, aut si in magnâ quantitate adsint, etiam *ἀνέψια* efficiunt. Si sint calida & biliosa, nidorofam cruditatem pariunt, quæ modò crudos vel corruptos pisces, modò oleum fixum, modò aliud quid referunt.

Ciborum verò causâ coctio vitatur, dum vel in cibi substantiâ, vel in quantitate, vel in tempore, vel in ordine sumendi aliquis error committitur. Ob cibi ipsius substantiam coctio lædi potest, dum cibi vel naturâ suâ sunt corruptioni obnoxij, vel nimis duri & crassi ac coctu difficiles, ut à calore nostro satis vinci non possint; vel iam corrupti; vel crudi & non rectè præparati, id quod fit, dum vel ad focum non rectè coquuntur, aut non rectè masticantur; vel cibi natura pravi, ut sunt fungi; vel quidem suâ naturâ non pravi, quos tamen nonnulli ex individuali & peculiari proprietate auerfantur, assumuntur. Qui enim caseum, vel pisces, vel aliud quid naturâ abhorrent, illud ingestum vel assumptum nunquam in bonum chylum mutant. Pertinet huc & ciborum varietas, quando cibi multiplices, & qui facultates diuersas habent, in eodem prandio vel cœna sumuntur. Cum enim alij aliis facilius, alij difficilior coquantur, diuersasque naturas habeant, turbatio inde fit in ventriculo, teste Galeno, 3. de vit. rat. in acut. t. 35.

In quantitate peccatur, cum cibi nimis magnâ copia, vel prauâ assumuntur. Tantum enim cibi assumendum, quantum ventriculus vincere & satis elaborare potest: si verò nimia cibi copia ingeratur, ut à facultate vinci & coqui non possit, crudi humores inde oriuntur. Qui verò ventriculum satis robustum & calidum habentes cibum nimis parcè assumant, his cibis aduritur & corrumpitur.

Qualitatis error est, si cibis sit calidior, qui facile nidorofæ cruditati materiam præbet, vel frigidior, qui, si sit magna frigiditas, *ἀνέψια*, si minor, aciditatis causa est.

Temporis ratione in cibo error accidit, quando alius cibis assumitur, antequam prior sit concoctus. Ordinis etiam aliqua ratio est. Ad coctionem enim turbandam facit, si primo loco cibi dures & coctu difficiles; posteriore verò molliores & coctu faciliores assumuntur.

Ob somnum coctio læditur, quando homo tempore consueto non dormit, vel parum dormit. Cum enim calor à sensuum & reliquarum actionum ministerio in corpore reuocetur ad interiora, ob caloris copiam coctio tunc facilius obitur, quam in vigiliis.

Sunt tamen præterea adhuc alia quædam, quæ si modum non seruent, etiam coctionem lædunt & turbant, pleraque calorem ventriculi debilitando & auocando. Si calor externus immodicus dissipando calorem internum, coctionem debilem efficit: ita vehemens & nimius animi & corporis motus post cibum coctioni multum obest. Et quantum terror vel ira in coctione lædenda & cibo corrumendo possit, notissimum. Ita balneum vel exercitia à cibo mox instituta calorem exhauriunt, & à ventriculo auocant. Pertinent huc & omnia, quæ faciunt, ut cibus in ventriculo non rectè contineatur: quando scilicet non debitus sit cibi amplexus, vel cibus ante iustum tempus, & antequam coctus est, à ventriculo excernitur. Quæ omnia à vitio retentricis & expultricis pender. Nam sine retentione cibum rectè coqui impossibile est. Si enim ventriculus

non tam diu, quam par est, cibum retineat, non rectè ventriculus cibum amplectatur, fit inde coctionis turbatio, rugitus, flatus, & similia symptomata, de quibus capite præcedenti dictum.

Nonnulli tamen causas has aliter dispeſcunt, atque frustrationem chyloſeos fieri docent, vel primariò & per se, vel secundariò & ex accidente. Primariò, dum sine reliquarum ventriculi actionum (retentricis puta & expultricis) vitio non rectè coctio perficitur, siue id fiat læsa facultate, siue ob errorem externum, de quibus hætenus diximus. Secundariò verò & per accidens, dum ob retentricis vel expultricis vitium coctio læditur. Retentrix autem frustratur itidem vel læsa facultate, ob morbos scilicet ventriculi, intemperiem frigidam & humidam; aut malam compositionem, naturam scilicet paruitatem ventriculi, ob quam iustam cibi copiam nec capit nec retinet, aut solutam unitatem; vel ob errorem externum, qui est vel causa interna, hoc est, excrementum flatulentum cibi complexum prohibens, vel externa, ut cibus flatulentus humidus, copiosus, præcipue verò potus nimia copia, quæ fluctuationem in ventriculo efficit, & retentionem impedit.

Ob expultricem verò coctio læditur, cum ea vel affertur, vel imminuitur, ut in ileo, vel deprauatur, ut in singultu, vomitu, cholera, quod ipsum accidit vel ob morbos ventriculi, & præsertim qui fibras transversas occupant; quales sunt intemperies, porissimum frigida & humida, mala compositio, id est, angustia secundum officium inferius ventriculi; obstructio & compressio à tumore, siue in hoc, siue in intestinis; vel ob errorem externum, scilicet humorem peccantem substantiâ, quantitate, qualitate, quando materia aut in eo genita p. n. calida, aut transmissa causa est expulſionis deprauatæ, frigida diminuatæ. Quo pertinent & externa, ut medicamenta purgantia & similia.

Atque hæc causæ omnes nunc *βλαδυνέψια*, nunc *ἀνέψια*, nunc *δυσεψία* inducunt, prout variò modo sese habent. *Ανέψια*, vel *βλαδυνέψια* causas easdem habent, quæ in *ἀνέψια* sunt maiores, in *βλαδυνέψια* minores. Calor nimirum ventriculi debilis, ciborum vitia & omnia, quæ facultatem coctricem vel debilitare, vel ei resistere impedimento & esse possunt. *Δυσέψια* verò calida oritur præcipue ab intemperie ventriculi calida, quæ cibos adurit & corrumpit. Præbent ei etiam causam cibi naturâ suâ calidi & biliosi, facile corruptioni obnoxij, & pravi succi varii, humores bilioli in ventriculo collecti vel ad eum transmissi. Corruptionis verò acidæ causæ sunt intemperies nimis frigida, humorum pituitosorum redundantia, & ipsa alimenta valde frigida.

### Signa Diagnostica.

Coctionis ventriculi vitium præcipue ex effectis excrementis mutatis, ructibus & similibus, quæ in coctione accidunt, symptomatibus ac nutritione læsa cognoscitur.

Et quidem *ἀνέψια* cognoscitur ex ructu, qui etiam post sex vel septem horarum spatium, quo alias in sanis cibi si non perfecte coqui, tamen mutari solent, ciborum naturas ac qualitates refert. Si cibi incocti & non mutati vomitu reiiciantur, vel per alium excernantur. Si præcesserunt causæ ventriculum valde refrigerantes, vel assumpti cibi sint coctu difficiles, & adsint alia signa frigidi ventriculi: & tum æger læditur ab iis, quæ ventriculum refrigerant, & coctionem debilem reddunt. Commodum verò percipit ab iis, quæ calorem augent, ut aromatis & similibus.

Coctio debilis ex iisdem signis cognoscitur, quibus coctio ablata, sicut debilioribus. Ructus sunt acidi, grauitas, tensio, & inflatio in ventriculo percipitur, vomitum

κύλωσης  
duplici modo  
ladi dicitur.



vomuntur pituitosa, deiectiones sunt humida, cruda ac pituitosa, atque alimenta etiam coctu facilia vix longo tempore coquantur.

Depravata coctio cognoscitur ex ructibus nidorosis, & sapore in palato, qui similem putredinem ac corruptionem referunt. Atque ita sæpe à vaporibus eiusmodi lingua inficitur, ut omnes cibi etiam suauissimi prauum aliquem & abominabilem saporem referre videantur. Atque is sapor maximè percipitur, cum eiusmodi cibi corrupti vomitu reiciuntur.

Causæ verò cognoscuntur hoc modo. An cibi coctu difficiles, prauis, maiore copia, non opportuno tempore, modo ac ordine sint assumpti, facile ex ægri relatione cognoscitur. Si verò nihil tale præcesserit, ventriculus considerandus, & an signum aliquod morbi alicuius ventriculi supra enumerati adsit perpendendum, & inde, ob què morbum facultas lædatur, discendum.

An verò ex accidenti, & ob retentricem ac expultricem læsam coctio lædatur, è suis signis cognoscitur. Ablata quidem retentio innotescit ex eo, quod alimentum statim, ut fuit ingestum, euomitur vel deiecitur. Imminuta verò cognoscitur ex eo, quod citius, quam par est, deiecitur, unde humidiores & crudiores plerumque feces deieciuntur, quemadmodum in henteria accidit. Amplexus verò ciborum viciatus è fluctuatione, murmure, & rugitibus, prauisque ventriculi motibus deprehenditur. Expulsio tandem ablata cognoscitur ex illo; diminuta, è tardâ deiectione, deprauata, è prauis motibus tempore expulsionis, ex fluxu alui cum dolore, acri morfu, ex celeri ac intempestiua excretionem.

Causæ verò horum symptomatum è signis morborum ventriculi antea propositis cognoscuntur.

### Prognostica.

#### Prognostica.

1. Cruditas ad malorum succorum, morborumque plurimorum generationem facit, siue ea boni seu mali succi cibos sequatur; cum errata primæ coctionis non corrigantur in secundâ. Deterior tamen cruditas est jâ mali succi cibus. Atque ex hac prauorum succorum varietate morbi varii oriuntur, febres, tumores, erysipelata, scabies, nutritionis defectus vel imminutio, aut nutritio vitiosa, qualis est in leprâ & similib. malis.

2. Coctionis vitium, quod ab errore externo oritur, facilius corrigitur, quam quod ex imbecillitate facultatis accidit. Externis enim illis causis ablatis, & errore in victu mutato, ferè citra aliud auxilium symptomata tolluntur.

3. Facilius etiam emendatur vitium coctionis, quod fit ab humoribus aliunde in ventriculum bene valentem influentibus & cibum corrumpentibus aut coctionem impredientibus. Humoribus enim illis expurgatis, antequam morbum aliquem in ventriculo exciterent, symptomata omnia enascuntur.

4. Pessima amara bile abundantibus cruditas est, citissime febrim accendit, in qua cibi nidorosam qualitatem corrumpuntur. In qua verò cruditate cibi in acidam vertuntur qualitatem, ea minus nocet.

5. Minus quoque noxia est iis hominibus nidorosa cruditas, quibus aluus est aperta; grauis autem, quibus adstricta: quia in febres promptius incidunt, præsertim si ad solita opera reuertantur. Galenus, 7. meth. med. c. 7.

### Curatio.

#### Curatio.

Ut autem viciata coctio emenderetur, à qua causa illa originem habeat, primò inquirendum, & causa illa remouenda. Ea enim sublata coctio rectè perficitur. Quomodo verò morbi ventriculi curari debeant, in præcedentibus iam dictum. Errores quoque in victu commissi si emendantur, & rectior diætæ modus obser-

uetur, facile symptomata illa euascunt. Ideoque ablata vel imminuta coctio cum à frigido ventriculo veniat, curanda calefacientibus & alterantibus ventriculum, quæ supra in intemperie ventriculi frigida fuerunt proposita. Eodem planè modo corrigitur cruditas acida, cum & illa à caloris diminutione, vel frigidis cibis ortum habeat.

Ad ventriculum roborandum Chymici imprimis commendant spiritum vitrioli Veneris, quem acetositatem escurinam Veneris nominant, seu spiritum vitrioli Vngarici, atque de seo scribunt, quod tantis polleat viribus, ut omnia, quæ in ventriculo contineantur, siue tartarea, siue sulphurea impuritates fuerint, consumat, ventriculumque vsque adeo confortet & roborèt, ut omnia concoquere queat, ut struthio ferrum concoquit ac digerit. Verùm *ὑπερβολικὸς* ista dicuntur. Non quidem abs re est, cum commodo sæpe eum exhiberi. Cautione tamen non exigua opus est. Neque enim in quavis ventriculi imbecillitate & morbo usurpandus, sed vbi crassi, & ut loquuntur, tartarei humores in ventriculo adsunt, quos consumit. Postea etiam adstringendo ventriculum roborat. Videndum tamen etiam hic, ne quid nimis, & humidum radicale ventriculi ab eo dissipetur & absumatur, quod sæpe ab intempestiuo & nimio spiritus vitrioli vsu accidit. Vbi verò calor ventriculi languet, & humidum radicale deficit, plus obest, quam prodest spir. &c.

Ad ventriculum roborandum utilis est etiam aqua cinamomi cum succo cydoniorum destillata, mastiche, ut & spiritus mastiches, præcipue hic.

*℞. Mastiches cl. Vnc. iij. galanga, Vnc. j. spiritum vini opt. lb.ß.*

Digerantur ac destillentur.

Vbi verò nidorosa cruditas percipitur, atque illa originem habet à prauis succis in ventriculo contentis, & cibos corrumpentibus, nihil vtilius est, quam prauos succos mox per aluum & vomitum expurgare, imò in omni cruditate præcipuum remedium est excrementorum alui deiectio quotidiana. Vbi verò solum ob caloris ventriculi excessum fit illa corruptio, necessum est, alimenta duriora exhibere, & cibos aceto, succo citri, & aliis acidis condire.

### Diætæ.

In omni verò coctione viciatâ & cruditate, quacunque etiam de causa ortum habeat, bonam diætæ rationem obseruare necessarium est. Ideoque panis sit optimæ notæ, de quo Galenus, 1. de aliment. fac. cap. 2. & 4. Reliqui etiam cibi in debili coctione sint coctu faciles, & quæ causæ debilitatis aduersentur. In iis autem, quibus biliosus humor, aut aliud excrementum prauum in ventriculo colligi solet, cibi facilis coctionis facile corrumpuntur, quod & iis accidit, qui calorem ventriculi non temperatum, sed igneum quasi obtinent. Ideoque talibus cibi coctu paulò difficiliore dandi: Succis tamen, qui è talibus cibis, qui alias coctu sunt difficiles, conficiuntur, si in corpus distribuuntur, prauam naturam retinent, ut docet Galenus, 2. de aliment. facult. cap. 6.

In omni etiam coctione læsa is cibus & potus fugiendus, qui ventriculo est ingratus, de quo Hippocrates, 2. aph. 38. Atque in eo respiciendum ad peculiarem ægri naturam, ob quam accidit, ut nonnullis grata vel ingrata coctu facilia vel difficilia sint, hæc, vel illa. A cibis autem prauis succi omnibus abstinendum, etsi coctu sint faciles. Nam licet principio nihil damni afferre videantur: tamen nobis non aduertentibus progressa temporis in venis colliguntur prauis humores, & ad corpus alendum inepti, qui exiguum postea occasionem nacti putredinem concipiunt, atque inde febres malignæ oriuntur. Ideoque Celsi sententia, l. i. c. 1. simpliciter adinittenda non est, dum statuit, qualitatibus ciborum nullam habendam esse rationem, modò eoquantur.

*Spiritus vitrioli Veneris aut in imbecillitate ventriculi communi.*

*Spiritus mastiche, ventriculum roborat.*

*Diætæ.*

*Cibi prauis succi vitandi.*

*An qualitas ciborum rationem habenda?*



coquantur. Nam licet exquisitè coquantur; nunquam tamen ex iis notæ planè bonæ succus generatur.

Repentina etiam ad contraria in alimentis mutatio sanis cauenda, & multò magis ægris, ut docet Galenus, 2. de rat. vict. in acut. rext. 8. & seqq. Varietas quoque ciborum vitanda, ut & potus. Qui cibi pridie sumti in ructibus qualitates percipiunt, & quibus hypochondria eleuantur, iis somnus longior conuenit. Somnus enim & quies coctioni & retentioni ciborum maximè inferuiunt. Decubitus in somno primò fiat super latus dextrum, ut cibus ad fundum ventriculi, ubi coctio maximè viget, citius & facilius descendat; postea verò supra latus sinistrum, ut epar ventriculo incumbens coctionem adiuuet. Auicennas tamen, ubi cibus non supernat, mox supra sinistrum latus decumbere iubet. Corpus ante cibum exerceatur, post cibum verò quiescendum est. Moderata tamen à cœna ambulatio non inuicilis est.

## QVÆSTIO I.

An Chylificatio fiat à calore?

COctionem ventriculi calore eiusdem innato percipi communis ferè opinio est. Ab eâ tamen recessit Ferriolus, in tract. de debilit. ventr. ob sequentes, sed non magni momenti, rationes: 1. est, quod chylificatio non fiat calefaciendo. 2. Quod in solo ventriculo fiat chylificatio; cum tamen calor per totum corpus dispersus sit. 3. Quia in ventriculi fundo, qui tamen membranofus est, & intestinis frigidis adhæret, præcipuè fit chylificatio. 4. Quia, si calor chylificationis causa esset, eò melior fieret chylificatio, quo calor maior esset; cum tamen in febribus & aromatum vsu etiam coctio ventriculi lædatur. 5. Quia chyli calor albus; cum tamen res, quæ calore generantur, potius flauæ vel rubræ sint, ut ex vrina & bile apparet. 6. Quia chylus temperatus est. 7. Quia homini non minus frigida, ut potus, quam calida in victu necessaria sunt; cum hæc tamen calorem alterent. 8. Quia ventriculus naturâ frigidus est. 9. Quia humida & aquea siccioribus citius concoquuntur; cum tamen hæc in calorem reagant, atque ita eum debilitando tardius coqui deberent. 10. Cancris & conchyliis, quæ sunt frigida, ea concoquunt, quæ animalia calidissima non possunt concoquere.

Verum ad omnes has obiectiones facilis est responsio, si explicemus, quomodo accipiendum sit, quando dicitur, calore ventriculi chylificationem perfici. Equidem non calor primarium agens est, sed anima & forma ventriculi, quæ vi *χυλοποιητική* instructa cibum & potum in chylum mutat. Calor verò solum animæ instrumentum est. Cum verò anima sit immutabilis; calor verò mutari possit: Medicus de hoc potius, quam illâ sollicitus est. Calorem autem quando dicimus, non quemuis intelligimus, sed proprium ventriculi, & actioni eius conuenientem, qualis id nulla alia corporis parte est, sicut nec vlla alia corporis pars est, quæ suâ substantiâ ventriculo exactè respondet. Neque tamen etiam hîc excludimus qualitates occultas, sed eas etiam hîc simul includimus, utpote ad hanc actionem necessarias.

Proinde respondendum 1. Calor, quatenus calor, chylum non generat, sed quatenus animæ & formæ ventriculi, à quâ, ut agente primariò, dirigitur, instrumentum est. 2. Non quiuis calor, sed cuiuslibet actioni conueniens necessarius est, alius in corde, alius in epate, alius in ventriculo. 3. Ventriculi parenchyma, etsi membranofum videatur, ad hanc tamen actionem conueniens est. 4. Non quilibet calor optimum chylificationis instrumentum, sed proportionatus. Cordis n. calor ad chylificationem esset intensior: sicut

Dan. Seimerti Tom. III.

contra ventriculi calor ad actiones cordis esset debilior. 5. Chylus albedine responderet substantiæ ventriculi, sicut sanguis rubedine epati. 6. Non generatur Chylus à calore excedente, sed temperato. 7. Potus, si sit valde frigidus, non iuuat coctionem, sed eam potius lædit. 8. Ventriculus non absolute frigidus est, sed respectu saltem aliarum partium calidiorum ita dicitur. Accipit enim à Creatore quælibet pars tantum caloris, quantum ad suam actionem est necessarium. Habetque & Cerebrum & nerui & partes membrose suum calorem, & sine calore nihil viuunt, ut habet Seneca, lib. 1. quæst. natur. cap. 10. Et Galenus 2. aph. 15. calorem innatum omnium actionum naturalium causam esse censet. 9. Humida & aquea, quatenus ralia, in chylum non mutantur, sed quatenus partes alimentofas in se continent, quæ cum sint humido dilutæ, non ita coctioni resistunt, ut sicca. 10. Cancris & conchyliis alimentum sibi conueniens appetunt, & coctio illa est sui generis, nec ut in homine perfecta.

## QVÆSTIO II.

An calor vicinarum partium etiam aliquid ad coctionem faciat?

ET si calor ipsius ventriculi tum insitus, tum influens, & ita temperamentum hoc modo absolutum & perfectum proxima & sufficiens chylificationis causa sit, atque ita alterius operâ indigere non videatur: tamen ita sapientissimus rerum Creator corpus nostrum disposuit, ut inter partes sit amicus & mutuus consensus, & unaquæque alterius actionem promoueret potius, quam impediret. Itaque & ventriculo addidit Epar, lienem, omentum, intestina, diaphragma, quorum calor, dum naturalis est, ita comparatus est, ut calorem ventriculi blandè foueat. Quod si non fiat, calor ventriculi vitiatur, & inde eius actio læditur. Hinc accidit, ut si Epar supra modum sit calidus, ventriculi calorem amplius amice non foueat, sed eum potius dissipet, atque ita coctioni eius obsit. Contrâ si sit frigidum, scirrhum, calorem ventriculi extinguit. Omentum si sit pinguius, calorem ventriculi etiam fouet, & hoc modò coctionem adiuuat; contra si nimis extenuetur, coctioni obest. Eadem partium reliquarum vicinarum ratio est, quarum calor quidem non proxima chylificationis causa est, calorem tamen ventriculi eius causam fouet.

An calor vicinarum partium aliquid ad coctionem faciat?

## CAPVT X.

De Singultu.

POST coctionis in ventriculo seu chylificationis læsæ Symptomata, restant explicanda Symptomata, quæ circa expultricem facultatem accidunt. Cibus in Chylum mutatus non in ventriculo tetineri, nec per vomitum reici, sed suo tempore ad intestina transmitti debet. Sed tamen natura sæpe abutitur ventriculo, & per eius orificium cum superius, tum inferius, quæ sibi molesta sunt, expellit.

Singultus.

Symptomata autem, quæ circa expulsionem læsam ventriculi accidunt, sunt Singultus, Ructus, Nausea, Vomitus, Cholera, Coeliaca affectio & Lienteria; quæ duo posteriora Symptomata ad alui fluxus differemus.

Inter expultricis facultatis irritatæ Symptomata omnium penè Medicorum consensu Singultus, qui Græcè *ἀγγελισμός* & *γύγῃ* est, refertur, ut mixer, Platerum eum ad deprauatam respirationem retulisse. Quam enim in singultu sonitus quidam auditur, & vocis organa in consensum aliquo modo trahuntur: tamen ex accidenti id euenit, & primarium

An singultus ad deprauatam respirationem sit referendus?

malum est ventriculi motus deprauatus ab expultrice præter naturam stimulatâ pendens, dum, quod ipsi molestum est, & tunicis eius infixum, elidere conatur. Galeno 4. de rat. viſt. in acut. text. 69. & 1. prorrh. text. 23. est *σπασμὸς τῆς κίνας, ἢ δίδωρς* hoc est, conuulsoria quædam motio & affectio, & 1. de diff. symptom. cap. 4. & 3. de caus. symptom. cap. 2. *σπασμὸς* est, propterea, quod vera conuulsio solis musculis propriè conueniat. Alibi tamen simpliciter conuulsionem nominat, vt 5. aph. 4. & 7. aph. 3. & accidit ventriculo in singultu omnino aliquid conuulsioni simile, quale in Ructu, Nausea & Vomitu non animaduertitur.

Est autem singultus Symptoma Expultricis ventriculi, quæ quod molestum est ventriculo, illo motu excutere conatur. Motus autem is ex duobus motibus compositus est. Nam vt ventriculus id, quod molestum est, excutere queat, primò se tunicasque dilatat, postea se veluti collectis viribus constringit, corporisque sui contractione interdum aliquid à tunicis expressum elidit, sæpe etiam conatu suo frustratur. Secundariò & Retentrix in motu isto laeditur, ac ventriculus cibos non rectè complectitur.

Secundùm quam partem autem ventriculus afficiatur, authores dissentire videntur. Galenus, 5. de loc. aff. cap. 6. & 6. aph. 39. Singultum proprium oris ventriculi affectum esse docet. Plerique alij singultum esse affectum totius ventriculi tradunt, quod & Galenus, 2. de sympt. caus. cap. 6. docet, è quo loco etiam nonnulli probare volunt, ad gulam quoque singultum pertinere. Verum enimverò quod essentiam singultus attinet, eius sedes est orificium ventriculi superius. Illud enim exquisito sensu est præditum, & propterea ad expulsionem molestorum mouetur. Si verò causas huius mali spectes, totus ventriculus earum sedes est, ac causa singultus modò in ore ventriculi, modò in ipso eius corpore continetur. Quod verò gulam attinet, ad eam singultus non pertinet; cum nullo alio, quam attractionis motu moueatur, & humores acres ipsi, cum lubrica sit, adharere non possint. Errandi verò causam hic quibusdam dedit mala versio. Non enim Galenus, 2. de sympt. caus. cap. 6. Singultum in gula fieri dicit, sed in stomacho, idest, orificio ventriculi.

Plateri opinio  
nova de sin-  
gultu.

Contra communem hanc omnium medicorum sententiam, qui singultum ventriculo tribuunt, sentit Platerus, qui malum hoc non ventriculo, sed septo transuerso attribuit. Singultum enim fieri statuit primò à vaporibus malignis in febribus perniciosis septum transuersum irritantibus. Secundò, Vbi ventriculi facultas expultrix primò quidem irritatur, irritatio tamen cum septo transuerso communicatur, à quo motus ille deprauatus primariò proueniat. Cum enim septum transuersum non solum ventriculo propinquum sit, sed & communem cum ventriculo sortiatur tunicam, eosdemque neruos in ventriculi orificium insertos acceperit, etiam septum ventriculi incommoda persentire, & cum ventriculus, vt illa excutiat, insurgit, seque aperit, septum quoque motu suo ventriculū, vt illud rectius præstare possit, impellere & concurrere, adiuantibus, si magna vi opus sit, reliquis thoracis musculis existimat.

Verum enimverò etsi negandum non sit propter communem tunicam, quam habet septum transuersum cum ventriculo, id in consensum à ventriculo singultiente trahi, imò & thoracis, vt & abdominis musculos quandoque: tamen idem & in vomitu accidit, & vt facilius vomitus fiat, Diaphragma, musculi thoracis, imò & abdominis suam operam conferunt; quod etiam accidit in sternutatione. Non tamen idcirco vomitus vel sternutatio thoracis aut abdominis musculis primariò tribuenda est. Ideoque quia facultas expultrix ventriculi in singultu primariò irritatur, & proximè atque immediatè hunc motum efficit, merito ventriculo, vt & vomitus ascribitur, sicut sternu-

tatio cerebro; etsi à vicinis motus iste partibus adiuuari possit.

Quanquam autem singultus sub eodem deprauatorum ventriculi motuum genere cum vomitu contineatur: tamen inter eos quædam est differentia, & ex Galeno, 6. aph. 29. vulgò statuunt fortiolem & vehementiorem motum esse singultum. In vomitu enim ea tantum, quæ in capacitate ventriculi consistunt, reici & conatu sæpe non adeo magno; singultu verò ea, quæ in ipsius orificij tunicis penitus insident, non nisi magna vi excuti. Verum enim verò cum omnis nausea & vomitus fiat à materia in capacitate ventriculi contenta, & singultus sæpe vomitum antecedit, idemque vomitionis initium sit, quasi natura id, quod per singultum propellere nequit, per vomitum tandem, tanquam per vehementiorem motum, extrudere annitatur: ratio differentie non semper in loco materie & vehementiæ motus consistere videtur, (etsi quandoque solum hoc modo differant) sed præcipue in loco affecto, & in modo, quo facultas in utroque affectu agit. In vomitu enim totus ventriculus simul mouetur; in singultu verò imprimis orificium. In singultu enim expellit naturali, vel potius expellere conatur modo simili ei, quo facultas animalis vitur, fibras scilicet ventriculi quasi concutiens, vnde singultus *σπασμὸς τῆς κίνας* conuulsivus motus appellatur, quod ad eum ferè modum in singultu ventriculus moueatur, quo in conuulsionibus muscoli contrahuntur, & concutuntur. In vomitu verò totus ventriculus ad expulsionem insurgit, & imprimis fundum eius versus superiora contrahitur, eoque motu quicquid in eo continetur, versus superiora excluditur. Nam licet omnes corporis partes vim habeant molesta à se expellendi: non omnes tamen concussione, & motu sensibili id præstant, sed ex solum, quæ fibras habent.

Singultus & vomitus quomodo differant

Omnes partes  
motu sensibili se  
expellunt, sed  
diverso modo.

Hinc ventriculus in singultu, musculosæ partes in rigore, cerebri meninges in Epilepsia, concussione, & vibratione quadam, id, quod molestum est, expellunt: at nihil tale fit in parenchymate Epatis, lienis, glandulis & similibus.

Qui autem fiat, quod ab eadem materia nunc nausea & vomitus, nunc singultus excitatur, causa redditur hæc, quod in singultu irritatio & mordicatio saltem fit in orificio ventriculi, in vomitu autem pleræque ventriculi partes vellicantur. Hinc accidit, vt singultus quandoque vomitum præcedat, vbi scilicet ex materia vitiosa in ventriculo contentâ vapor aliquis vel pars humoris ascendens orificium ventriculi saltem vellicat: vbi verò materia postea totum ventriculum vellicare incipit, etiam totus ventriculus ad expellendum insurgit, & ita vomitus excitatur.

### Causæ.

Vulgata equidem doctrina est ex Hippocrate, 6. aph. 39. Singultum cum spasmo eandem habere causam, & prouenire ab inanitione & repletione. Nonnulli verò addunt vellicationem à materia acri. Verum si rem diligenter perpendamus, vellicatio sola vera & proxima huius mali causa est. Cum enim singultus, quod negari non potest, fiat à facultate expultrice irritatâ, quid ad hanc rem opus vel repletionem vel inanitionem; cum sola vellicatio sufficiat? Et quanquam in singultu humores interdum copiosius ad ventriculū confluant: tamen non quatenus replent, singultum efficiunt, sed quatenus ventriculum irritant & vellicant. Etsi quoque in singultu causæ sæpe coniunguntur, quæ corpus exsiccant, quod sæpe in magnis euacuationibus & acutis ac malignis febribus accidit: tamen singultus oritur à causis illis, non quatenus inaniant corpus, sed quia causæ illæ ventriculū mordicant & vellicant, aut quia ex inanitione sequitur suctio & mordicatio in ore ventriculi: & si ex inanitione & repletionem ventriculus contraheretur in singultu, non possit

Causa.

posset iterum extendi, neque talis vibratio fieret. Et omnino ex generatione Epilepsiæ & conuulsionis facile colligere est, quænam causa singultus sit.

Mercurialis equidem Hippocratis sententiam excusare & defendere conatur: sed parum feliciter. Vt enim illud saltem asseram, ut acres humores ad plenitudinem referre possit, scribit, acres humores facere conuulsionem, quia plenitudinem inducunt. Nam, inquit, sicut vasa dicuntur inanita, quoniam carent eo, quod continere debent: simili modo plena dici debent, quando continent id, quod non debebant. Quapropter quoniam in ventriculo sunt humores acres, manifestum est, ibi posse esse aliquam plenitudinem. Verum appeller sanè humorum acrium in ventriculo præsentiam plenitudinem: (quod tamen commodè semper fieri non potest; cum sæpe etiam humores quantitate pauci singultum inducere possint.) quaeritur tamen, an humores tales, quatenus copiâ peccant, singultum excitent; quod certè concedi non potest, cum eundem à piperis vno vel altero grano oriri videamus, quæ tamen plenitudinem excitare & constituere nullo modo dici possunt.

Proxima ergo singultus causa est materia ventriculi, & præcipuè eius orificium, irritans & vellicans, siue caliditate, siue frigiditate, siue acrimonia, siue praua ac maligna qualitate id præster, vel etiam res dura pungens & premens ventriculum vellicans. Ita observamus nonnunquam ex potu frigida aquæ hausto singultum fieri, qui vel sola spiritus cohibitione curatur; Ita post acrium ciborum & piperis usum singultus excitatur. Ita pueri, qui se supra modum cibo replent, crebro singultiunt. 1. aph. 13. Quod tamen magis exquisito sensu præditum est os ventriculi, eò facilius singultum patitur.

Materia autem hæc est vel Alimentum, cibus nimirum aut potus caliditate vel frigiditate, vel acrimoniâ ventriculum vellicans; vel medicamentum acrius, quale est piper puluerisatum, imprimis si vinum superbibatur, quod profundius id intro adigit; vel humor aut ichor acris & prauus; vel vapor similis; vel vermes siue mordentes, siue prauos vapores ad os ventriculi mittentes. Sunt & quædam venena, quæ singulari proprietate singultum inducunt, sicut Nicander viperam singultum excitare scribit.

Epatis etiam inflammationi singultus superuenire solet, tum quod prauus vapor aut sanies ad ventriculum mittitur, tum quia ab ipso tumore ventriculus Epati subiectus comprimitur, eiusque expultrix Facultas assidue irritatur; quibus & communio neruorum à sexto pari descendendum addi potest. Atque ab epatis & aliarum partium vicinarum, quæ ventriculum in consensum trahere possunt, inflammatione, febris oritur, quæ singultuosa seu *λυγγέδης* nominatur, in qua scilicet Symptoma hoc diu permanet; vel etiam per totum morbum cum febre durat, non verò solum circa crisis accidit, & reiecto per vomitum humore acri mox cessat, teste Galeno, 4. de rat. vif. in acut. text. 79. Quæ accidit non solum epate inflammato, sed & in Ileo intestino, item Herniosis acutâ febre febricitantibus, ut & femoris & brachij gangræna & calcis sphacelo, ut Hippocrates docet, 2. de fract. text. 23. & 3. de fract. text. 43.

Præter hæc enumerata etiam res duræ ventriculum prementes vel vellicantes singultum excitare valent.

A recentioribus enim obseruatum est, nonnullos singultuisse ex intorâ & versus ventriculum reflexa costæ extremitate ventriculum extrinsecus premente. Et apud Hollerium l. 1. cap. 33. in comm. est historia puellæ, quæ bubulis pulmoribus largiter vsa fuerat, quorum frustulum cùm in œsophago restitisset, singultum excitauit, qui remoto frustulo illo cessauit. Auicennas docet, singultum quoque à capitis percussione fieri.

Dan. Sennerti Tem. III.

Atque hinc patet, singultum aliàs per ventriculi *ιστορῆσαι* fieri, dum materia ventriculum vellicans in eo colligitur, aliàs verò per Sympathiam, causa aliunde ex epate, liene, intestinis, aliisque partibus, vel etiam toto corpore communicata. Ita ex cerebro propter neruorum communionem, ut & à pulmonibus singultus excitari potest, de quo Galenus ad locum Hippocr. 1. prorrh. text. 23. *Aphonia cum singulta pessima*, scribit, Singultum cum Aphoniâ non fieri ex humiditate descendente ad laryngem, sed ex quodam neruorum sextæ coniugationis consensu, qui est cerebro cum stomacho, ut & vicinarum partium.

### Signa Diagnostica.

Singultus auditu ab adstantibus percipitur, & ab ipso agro indicatur; ut aliis signis opus non habeat. Causæ verò signis dignoscendæ sunt.

Qui vomitu sedatur, est à materia seu copia seu qualitate ventriculo molesta. Qui succedit euacuationibus nimis & in febribus acutis accidit, illum à siccitate prouenire vulgò statuitur: malo tamen ad materiæ prauitatem illum referre. Considerandæ etiam sunt causæ antecedentes, & manifestæ, quæ malo huic originem præbere possunt.

Si est per essentiam, est magis continuus, & adsunt humorum in ventriculo contentorum signa, speciesque humorum ex oris sapore, vomitu, ructu & similibus cognoscitur.

Qui à cerebri, lienis, epatis, intestinorum, vteri, aut alterius partis morbo prouenit, non est sine partium illarum affectuum signis.

### Prognostica.

1. Singultus, qui à causa primitiua, ut frigore, cibo ac potu, aut alia simili, quæ nondum alium affectum induxit, oritur, leuior & minus periculosus est: grauior est, qui alium affectum, aut eius causam sequitur.

2. Periculosus est singultus, in quo fit insignis fibrarum in ventriculo tensio ac dilatio, & qui ab affecto ore ventriculi oritur, & in quo lipothymia metuenda est.

3. Singultum patienti sternutatio superueniens singultum soluit, 6. aph. 73. Sternutatio enim vehementi illo motu humorem ventriculum vellicantem excutit.

4. Si senibus supra modum purgatis singultus adueniat, non bonum est, 7. aph. 41. Cum enim omnibus hominibus malum sit singultum purgationi superuenire, id senibus præcipuè malum est, propter virium imbecillitatem.

5. Ab Epatis inflammatione Singultus, malum. 5. aph. 58. & 7. aph. 17. Non enim semper ad inflammationem Epatis Singultus sequitur, sed ubi illa maxima est, quod periculosum.

6. A vomitu singultus & oculorum rubor, malum. 7. aph. 3. Qui enim singultus fit ab humoribus ventriculum, præcipuè verò eius os infestantibus, si vomitione illi humores expellantur, merito cessat. Quod si humoribus vomitu reiectis singultus perduret, vel cerebrum, vel ventriculum, non paruam pati inflammationem indicio est. Quandoque tamen singultus post vomitum periculosus non est; cum scilicet à reliquiis humorum saltem prouenit: sed tum reliqua Symptomata mitiora sunt. Oculorum autem rubor vtriusque partis, cerebri scilicet, & ventriculi inflammationem sequitur, sed cerebri magis.

7. In vomitibus sinceris Singultus, malum. Mala quoque conuulsio. In Coacis Omnis enim *ἀκπατος*, s. meraca purgatio Hippocrati, malum, præsertim fluxibilis. Magnum enim aliquod incendium partium circa ventriculum significatur, à quo exusta materia ventriculo communicata cum ita lancinat.

AAA 3

8. Ab

De dura singultum exci-

8. Ab Ileo Singultus, malum. 7. *aph.* 11. In tali enim intestinorum inflammatione partem illam nervosam, quæ cerebro consentit, affici indicio est. In senibus tamen Singultus ob prolapsa intestina sine inflammatione non ita periculosus. Sola enim intestinorum repositione evanescit.

9. Aphonia; seu vocis interceptiones cum singultu pessimæ. 1. *pyrrhet. cap. 23.* Ob consensum scilicet organorum vocis cum cerebro & ventriculo, ut in causis dictum.

10. Delirium lethale in spiritu s. difficili respiratione & singultu. Cum enim cum singultu delirium accidit, aut à ventriculo inflammato calor & vapores acres ad caput attolluntur, aut à cerebro inflammato malum cum nervis orificij ventriculi communicatur, quod utrumque malum est.

11. Singultus in omni febre periculosus est; nisi fiat ob crisin instantem, & signa coctionis materiæ in morbo manifestè appareant. Sic enim indicat crisin vomitu futuram.

12. Singultus in somno profundo, aut animi deliquio, aut tetano obortus, mortem non longe abesse indicat. Atque in lethali eiusmodi singultu præclara remedia non sunt exhibenda. Aetius, *tetrab. 3. ferm. 1. c. 5.*

13. Singultus sæpe diuturnum malum est, ægrumque valdè affligit, refertque Marc. Gattinaria, Iur. Doctorem Papinientem 12. dies singultu laborasse, & Epiphan. Ferdinandus *histor. 43.* curavit Augustinianum Theolog. Prof. qui 20. dies cum mortis periculo singultu laboravit, & mechoacan. Vnc. β. in vino albo infusâ & aliis purgantibus liberatus est: Massaria etiam Vincentiæ curavit tabellarium, qui 40. dies & plures singultu laboravit, & tandem aquis thermalibus liberatus fuit.

#### Indicationes.

Indicationes.

Curacionem quod attinet, non quilibet singultus Medici operam requirunt. Quidam enim sunt ita leues, ut spontè vel spiritus retentione vel tenui diætâ cessent. Quidam verò contumaciores sunt, ut medicamenta possulent.

Curatio verò ad duo dirigenda, ad ipsum symptoma, & ad causam, à quâ pender. Et si enim singultus rectissime curatur causâ, à qua pender, sublatâ. Quia tamen nonnunquam tam gravis & molestus est, ut nisi sedetur, meruendum sit, ne aut ægri vires deiciat, aut aliud periculosum malum inducat, curacionem aliquando ad se trahit. Atque tum remedium motum illum mitigans & sedans est necessarium, quod scilicet mordicationis & vellicationis sensum in ventriculo obrundat.

Causæ verò ipsæ singulæ ratione sibi conueniente tollendæ sunt, quæ cum variæ sint, de singulis in specie dicendum.

#### Curatio.

Curatio.

Quantum ad ipsum singultum, si ita vehemens sit, ut curacionem ad se trahat, ea exhibenda, quæ sensum ventriculi nonnihil heberant, & doloris vehementiam obtundunt, nisi vomitu materiam reiicere liceat. Faciendum autem est initium à lenioribus. Aetius offert succum endiuiz vel portulacæ, semen excorticam cucumeris vel lactucæ tritum, vel decoctum sebesten, imprimis lac recens mulsum, aut portulacam mandere iubet.

Vel detur Syrupus violarum, portulacæ, de papaure, vel decoctum florum chamæmeli & sem. anethi. Fortiora sunt Philonium Romanum, cuius dosi scrup. j. non facile excedat, quod granis duobus croci vel cinamomi corrigi potest, rheriaca recens ad scrup. j. data, Laudanum Opiatum.

Causam verò singultus quod attinet, consideran-

dum 1. An singultus alium morbum, qui peculiarem curacionem requirit, sequatur. In causâ enim ablatione tota curatio consistit. Primum ergo si à refrigeratione tantum singultus proveniat, spiritum cohibere conuenit. Spiritus enim retentus pulmones & partes vicinas calefacit. Deinde intus & extra medicamenta ventriculæ calefacientia usurpanda, qualia supra de Intemperie ventriculi frigidâ curandâ sunt proposita. Exhibeatur nimirum vinum Hippocraticum, mastice cinamomum, vel aqua cinamomi bibatur. Galenus & Aetius laudant usum castorei cum olfaciendo tum assumendo.

Dorsum verò & ventriculus inungatur oleo de pipere, mentha, Balsamo & similibus. Vel Cataplasma imponatur ex vino, aqua vitæ, & pulueribus calidis. Vel

2. *Rad. cyperi iunci odorati caryophyll. an. scrup. j. castorei scrup. β. sem. anethi ruta an. Drach. j. fol. plantagin. menth. absinth. an. M. β.*

Conquantur in vino, & ventriculus fomentetur.

Cibus & potus calefaciendi vi sit præditus: ideoque aromatibus, seminibus & herbis odoratis conditi potest, ut pulegio, mentha, anetho, origano, fœniculo, aniso, cinamomo & caryophyllis.

2. Si à flatibus sit singultus, eadem calefacientia conueniunt, & vinum, in quo anisum, bacca lauri, rosmarinus, sem. coriandri, bacca iuniperi, caryophylli macerati sint. Item aqua vitæ, zedoariæ, diacuminum, theriaca vetus, Mithridatium.

3. Si post nimiam euacuationem fiat singultus, siue hoc accidat à siccitate & corrugatione ventriculi, siue à medicamenti aut humorum ventriculæ vellicantium prauitate, conueniunt, quæ humectant & refrigerant moderatè, humoresque mulcent, ut aqua hordei cum emulsione amygdalar. dulcium, lac recens mulctum, ol. amygdal. dulcium cum aqua hordei repida. Emulsio item sem. quatuor frigid. maior. & papau. albi, mucilago sem. psyllij, cydon. iuleb. violar. succus granator. prisanæ cremor vel per se, vel cum pullorum carne, iuscula è carnibus pullorum & gallinarum contusis & expressis parata: Conserua borrag. bugloss. nymphetæ. Ventrem quoque & dorsum inungere vtile est ol. violar. & similibus.

4. Si ab alimentis vel medicamentis acerbis singultus excitatus sit, hausto oleo amygdal. dulcium recenti, vel butyro recenti assumpto, vel prisanæ cremore sedatur.

5. Si à corrupto cibo & repletionem orrum habeat singultus, humorè illum aut per vomitum, aut per alui deiectionem euacuare necessarium est. Ad purgandum vtilis est hiera, pilulæ de aloë losa, & rhabarbarum. Postea exhibenda, quæ ad deterfionem & resolutionem materiæ faciunt, ut:

26. *Spica, zinziberis, galanga, sem. anisi, ruta, dauci, cumini, ana Drach. i.*

F. Pulvis. Cuius dosi Drach. β.

Cum melicrato aut vino.

6. Si ab humoribus calidis & acerbis fiat singultus, ii vel per vomitum, si æger ad vomitum pronus sit, vel per alium expurgentur; prius tamen exhibitis iis, quæ humorum acrimoniam retundunt, eos temperant & detergunt. Qualia sunt decoctum vel prisa hordeacea, lac caprinum, succus portulacæ & endiuiz, syrup. citri, acetosæ, rosar. simpl. infusionis. boraginis, buglossi, portulacæ. Emulsio sem. quat. frig. maior. & papau. albi, decoct. prunor. & tamarind. decoct. sem. anethi, portulac. papau. albi in aqua hordei vel cereuisia tenuiore factum. Item potus aquæ calidæ, in qua dissolutum sit butyrum vel oleum aut lac amygdal. dulcium. Lenis purgatio fiat cum infusione rhabarb. manna, syrup. rosar. solutio. Vtile est & absinthij decoctum cum infusione rhabarb. Fortiora verò locum non habent.

Postea



Postea assuetis etiam frigida præberi possunt. Extra applicetur ol. rosar. cydon. violar. de nymph. cerorum fantal. Atque si ista medicamenta non iuuent, stupefacientia supra enumerata vsurpanda.

7. Si ab humore frigido ventriculo, impacto fiat singultus, extenuandus is & incidendus, ut supra de intemperie ventriculi cum pituita dictum, melicrato scilicet, oxymelite simpl. & compos. scilicetico, hyssopo, pulegio, calaminthâ, ruta, dictamno, nardo Celticâ, helenio, sem. cumini, anethi, dauci, seselios, catiophyll. galanga, in mulla vel vino decoctis, castoreo item Stup. j. vel Drach. s. pondere sumpto, syrupo de duabus & quinque radicibus, de hyssopo, de calamintha, Dianis. Diacimin. Diatriopiper.

Peculiaris & utilis descriptio oxymelitis habetur hæc apud Trallianum, lib. 7. cap. 13.

℞. Scilla partis interme tenerioris lb. ij. aceti albi acris sextarios xv. piper. Vnc. ij. sem. dauci Cretici, fœnicul. cumini, an. Vnc. s. petrosel. Macedon. Vnc. ij. zinzib. pyrethri, an. Vnc. j. laseris, Vnc. ij. nard. Celtic. ligustici, an. Vnc. s. hyssop. puleg. an. Drach. j. menth. virid. apy virid. an. M. j. cardamom. Drach. ij. ruta viridis turiones quinque mellis sextarium, spodijs, Vnc. s. costi. Vnc. j. sapa sextar. ij. garrici, spica nardi, amomi, an. an. Vnc. j.

Omnia hæc contusa diligenter seorsum habeto, & scillam in aceto coniectam per dies 7. macerari finito, deinde eâ sublatâ reliqua omnia contusa ubi valde leuigaueris, & aceto indideris, alios dies septem finito. Deinde per linteum densum exprimito & fiat oxymel.

Vel ℞. Pulegi, iunci odorari, an. M. s. sem. anethi, carui, an. Drach. ij. Coquantur. Colaturæ ℞. Vnc. iij. Adde mellis rosar. colat. Vnc. ij. Misce.

Postea materia vel vomitu reiicienda, vel per aluum euacuanda hierâ simplici, mechoann. agarico, pilul. mastich. de aloë, de agarico, cum momento turpethi, el. diaphanico.

Si malum non cesset, iterum ad præparantia redeundum, & præparantia ac purgantia per vices assumenda.

Vt: ℞. Galanga, Vnc. j. cinamom. sem. aneth. an. Drach. s. castorei, Scrup. s.

Coquantur parum in vini albi, Vnc. vj.

Singulis diebus sumat æger, Vnc. s.

Vtile est & elixir proprietatis.

Cum internis coniungendus est externorum vsus. Utilia sunt: Olea, vnguenta, emplastra, cataplasmata supra de intemp. ventriculi frigida proposita, ut:

℞. Ol. Mastich. de castor. aneth. an. Vnc. j. ol. destill. ruta, Scrup. s. caryophyll. gut. iij. Misce.

Vel coquantur in aceto cuminum, pulegium, calamintha & origanum, ac spongia aceto eo imbuta ventriculo calida imponatur.

Non etiam inutile fuerit cucurbitam cum multa flammâ ventriculo applicare, & dorso ea parte, qua stomachus vertebris annectitur.

Alij ad materiam singultus discutiendam, aut certè è ventriculo, cui inhæret, excutiendam plura addunt, ut sternutationem, vociferationem, deambulationem concitaram, gestationem atque equitationem, ut & subitum retrorem, iram, gaudium, quibus cum spiritus intrò ad cor, & rursus ad ambitum corporis reuocantur, accidit, ut ventriculus vellicationem materiæ non ita sentiat, dum agitatione caloris & spirituum materia antea quieta nonnihil concutitur, & loco affecto dimouetur: quæ tamen & in singultu ab aliis causis locum habere possunt.

8. Sit materia maligna sit, efficax est hoc medicamentum.

℞. Sem. anethi, car. bened. citri, an. Scrup. j. melissa, cortic. citri, an. Drach. s. corall. rubr. galanga, macis cinnamom. an. Scrup. s. margarit. smaragd. an. gr. viij. cornu cerui, lapid. bezoar. an. Scr. j. vel q. v.

Fiat puluis, aut cum sacch. s. q.

F. Rotulæ. Vel cum syrup. de cortic. citri aut alio conueniente F. Eleæuarium.

Vel sumatur thetiaca aut aqua theriacalis, terra item sigillata, bolus Armen. succus citri. Galenus, 8. de compos. med. sec. loca cap. 3. medicamentum ex Asclepiadè describit, quod occulta proprietate contra singultum prodesse dicitur.

9. Si à vermibus singultus proveniat, ad vermes cura dirigenda, & reliqua etiam, quæ singultui conuenire possunt, vsurpanda.

10. Si v. aliis morbis singultus coniungatur, & primò quidem cum febre, materia morbi caussa singultui occasionem præbeat, & humores ad ventriculum confluentes hoc malum excitent, considerandum, an singultus accidat in principio febris, ab excrementis primarum viarum in ventriculum effusis. Tum n. leni pharmaco per aluum purgante, vel vomitu materia illa tollenda. An v. in statu, quo tempore crisis per vomitum futura signum est, ac tum nihil metuendum, sed naturæ omne negotium permittendum; aut tandem in augmento accidat, quod si contingat, perpendendum, an humor vitiosus & feruidus à iecore & venoso genere per venas mēaraicas infundatur in cavitatem ventriculi; an verò per venas, quibus ventriculus & eius orificium alitur, effundatur in ipsam vetriculi substantiam; id quod hoc modo discernere licet. Si humor ad ventriculi cavitatem confluat, singultus est rarior & leuior, & assumpto cibo vel potu aut leni aliquo medicamento sedatur. Si verò in ventriculi substantiam influxerit, singultus est frequentior & grauior, ac quasi vera conuulsio, nec sedatur ingesto cibo, & nonnihil in longiore temporis spatio quiescit, ac præ frequentia singultus æger suffocari videtur, cum id, quod singultus causa est, ventriculo infarctum sit.

Prior singultus, qui fit à materia in cavitatem ventriculi effusa, tollitur vel vomitu, vel leni purgatione. Quæ verò à materia ventriculo infarcta originem ducit, difficilior curatur. Vt a. curetur, si corpus antea purgatum sit, vel ob vehemētiā febris purgare non liceat, stupefacientibus, & sensum obtudentibus, de quibus antea dictum, vtendum. Et si humor malignus sit, etiam alexipharmaca & contra malignitatem ac venenaram qualitatem pugnantia vsurpanda, de quibus etiam antea dictum, quæ tamen ita temperata sunt, ne febrem augeant. Si verò corpus nondum purgatum fuerit, & calor febrilis non prohibeat, aut statim purgatione per infusum rhubarb. & folior. fenæ, manna, syrup. violar. rosar. solutio vtendum, aut clysteres applicandi, & humorum acrimonia ac caliditas cremore ptisanæ, emulsione anygdal. dulc. sem. 4. frigid. maior. papau. albi cum cum aqua hordei, portulacæ, lactucæ, aut aqua lactucæ & portulacæ temperanda. Ventet simul ob æstum & calorem inungendus oleo rosarum & aliis, quæ intemperie ventriculi calida sunt proposita.

11. Si denique singultus accidat ab inflammatione ventriculi, epatis, cerebri, vteri, vel alterius partis, curatio ad inflammationem & morbum principalem & causam huius symptomatis dirigenda: quâ sublatâ & singultus cessat. Si tamen nimis vehemens est singultus, ea, quæ sensum nonnihil obtundunt, & singultum mitigant, vsurpanda, quæ supra fuere proposita.

Nonnulli amuleta hîc etiam vsurpant. Castoreum, inquit Trallianus, alligatum citò singultum sanat. Idem facit cuminum panniculo linteo inditum & carpo sinistrae manus alligatum. Alyssum commendatur à Dioscoride & à Plutarcho, 1. symposiac. probl. 3. Habet & Trallianus, allegato loco, sed quæ superstitiosa sunt.

Dista.

Victus ratio singulis causis respondeat, & pro varietate causarum varia sit, quæ ex iis quæ supra de intemperibus ventriculi curandis dicta sunt patere potest.

AAAA 4

CAP.

## CAPVT XI.

## De Ructatione.

Ructatio.

Soli homini  
accidit.

**I**nter expultricis facultatis ventriculi symptomata est & Ructatio, quæ est motus deprauatus ventriculi, factus à facultate expultrice concitata, quo vapores & fumi à cibo non rectè cocto per os expelluntur. Et soli homini hoc vitium accidit, non brutis, cum vt Aristoteles, 10. probl. 43. docet hæc ventrem sicciorē habeant, quibus humidum statim absorbitur, vt in flatum conuerti non possit; forsan etiam, quia in cibo & potu sumendo sunt temperatiora.

Ructus autem nunc insignem nullam qualitatem præ se fert, nunc verò est acidus, nunc nidorosus, nunc foetidus, nunc cibi assumpti qualitatem præ se ferens.

## Causæ.

Causæ.

Causa proxima Ructationis est flatus in ventriculo conclusus, & per os eius superius confertim, & cum sonitu erumpens. Is autem flatus nunc generatur in ventriculo ob eius coctionem læsam, de cuius causis supra dictum. Et provenit nunc à cruditate nidorosa, nunc acidà, cuiusque index est: illa quidem ab intemperie ventriculi calida, hæc frigida. Cibi tamen etiam assumpti, qui facile corrumpuntur, vel flatulenti sunt, ad ructus generandos faciunt, quales sunt castaneæ, ficus recentes, rapa, raphanus, cepæ, melones, cucumeres, portulaca, oua & pisces oleo vel butyro frixa & similia. Nunc verò flatus è partibus inferioribus ad ventriculum ascendunt ex intestinis, epate, vtero, imprimis liene & vepis mesaraicis, suntque ructus hypochondriacis nonnullis familiares. Ita non virum, qui continuâ spuratione & ructibus ita molestabatur, vt sæpe intra vnâ atque alterâ horam vel centies ructaret. Pertinet huc & morbus ructuosus ab Hippocrate, lib. 2. de morbis, descriptus. Dolor, inquit, corripit acutus, & dolitat vehementer, & ipse seipsum iactitat, & vociferatur, & frequenter eructat, & vbi eructarit, melius se habere videtur. Sæpe etiam bilem reuomit modicam, populi parui mensura, & dolor corripit à visceribus ad inum ventrem & laterum mollitudinem: & vbi hoc factum fuerit, melius sese habere videtur, & venter inflatur, & indurefcit & strepit, & flatus non egreditur, neque stercus. Morbus hic, si iuuenem corripit, tempore decedit, si seniore, commoritur. Cuius infra etiam de mesenterij præter naturam affectibus & affectione hypochondriaca mentionem faciemus. Atque ita tres causæ sunt ructus, ventriculi intemperies, ob quam cibi non bene coquantur; vitiosi humores in ventriculo vel aliis partibus cumulati; cibi corruptioni facile obnoxij, & cruditati vel acidæ vel nidorosæ materiam præbentes, vt & flatulenti. Faciunt tamen etiam ad ructum excitandum causæ externæ, quæ materiam seu in ventriculo, seu aliis partibus contentam commouent, vt balnea, exercitium nimium & intemperstium post cibum, venus immodica.

## Signa Diagnostica.

Signa.

Ructus ipse per se manifestus est, nec signis opus habet: causæ verò signis indigent. Si quis ergo ructet, inquirendum primò, quibus cibis vsus sit. Nam si quis vel raphanum, vel cepas, vel oua frixa, vel placentam nodorosam comederit, & ructum nidorosum similem emittat, manifestum est, è cibo sumpto ructum esse, ventriculusque tum potest esse saluus. Si verò qui nidorosum talem ructum emittat, & nil tale, quod nidorosa cruditati materiam præbere possit, comederit,

procul dubio à calore ventriculi nimio cibos hoc modo corrumpente erit ructus: vbi porò inquirendum, an ipse ventriculus intemperie calidâ laboret, an verò bilis ex epate in eum fuerit infusa, de quo supra de intemperie ventriculi dictum.

Si verò ructus acidus accidat, inquirendum, an à cibis difficilis coctionis, an verò ab intemperie ventriculi frigida iste veniat, quod cognoscitur ex eo imprimis, quod non solum cibi frigida naturæ, sed & calidæ, vt mel, saccharum, vinum, & alia eiusmodi in cruditatem acidam abeant; an verò aliunde materia acida in ventriculum effundatur, quod hypochondriacis familiare est, ac tum affectionis hypochondriacæ signa alia etiam adsunt.

Si verò sine sapore emittatur, habet originem à cibis flatulentis, vel ciborum copia. Si longo post cibum sumptum tempore ructus adhuc cibi assumpti saporem & odorem referat, magnam coctricis facultatis imbecillitatem significat.

## Prognostica.

1. Ructationes multæ & frequentes malæ sunt. Nam & causæ vehementiam significant, & motus illæ coctionem turbat, quæ in ventriculo perficitur. Prognostica.

2. Ructationes acidæ, si diu continuentur, hydropem vel linteriam minantur.

3. In longis intestinorum leuitatibus & alui fluxu, si ructus acidus accidat, qui prius erat, bonum. Aliquam enim iterum coctionem fieri significat.

4. Ructum asthmatis superuenire, bonum.

5. Ructantes acidum, non facile pleuritici fiunt, 6. *aph.* 33. Videantur Commentatores.

6. Qui supra modum ructant ante cibum, dispositi sunt ad colicam: qui verò post cibum, ad hydropem; præcipue tympanitem.

## Cursatio.

Ructus si moderati, non cohibendi sunt. Fit enim per eos excrementorum flatulentorum euacuatio: si verò ructus frequens & molestus sit, diu duret, tollitur causis, à quibus pendet, sublati. De quibus cum supra de Intemperie ventriculi, & ventriculi inflammatione dictum sit, non opus est, vt ea hic repetamus. Intemperies nimirum frigida vel calida alteranda, cum internis, tum externis, humores vitiosi euacuandi, flatus discutiendi. Cruditas parca diætâ & cibis boni succi corrigenda. Cibi corrupti vel vomitu vel alio modo euacuandi. Si lien vel aliud membrum vicinum flatus suppeditat, ei succurrendum. Cursatio.

## CAPVT XII.

## De Nausea &amp; Vomitu.

**P**ertinent ad hanc symptomatum classē etiam Nausea, Vomitus & Cholera, quæ cognata mala sunt, symptomata scilicet facultatis expultricis ventriculi, & motus, quibus per os excernit, aut excernere conatur illa, quæ ventriculo molesta sunt. Et quia nausea & vomitus easdem fere causas habent, de iis hoc capite, sequenti de cholera, agemus.

Nausea quidem, Græcis ναυτία & ναυτίας nil aliud est, quam inane quoddam vomendi desiderium, in quo ventriculus quidem ad vomendum incitatur, nihil verò expellit. Vomitus verò est, cum ventriculus id, quod molestum sibi est, per os reiecit. Si enim ventriculus vel copia vel qualitate materiæ laceffatur, virisque eius in fundo sint robustæ, natura materiam illam versus orificium ventriculi superius attollit, & per os euacuare conatur; quod si effectum dat, vomitus, Nausea.

rus, seu humoris per os reiectio, sequitur: Si autem seu ob naturę imbecillitatem, seu materię contumaciam id obrinere non possit, tum conatus saltem fit, qui nausea dicitur, ventriculi propria affectio. Interdum tamen & aliis partibus hoc nomen tribuitur, sicut Hipp. in libello de fracturis, ναυσίωσις βλεφάρων dixit, quę ἐκχυμώσις aliàs nominatur, quando venę veluti nauscabundę sanguinem emittunt, siue ob partis inflammationem, siue ob sanguinis ipsius copiam aut prauitatem. Vulgo suggillatio nominatur. Sunt etiam apud Galenum, 8. de comp. med. s. loca cap. 3. Vocabula ὑπινιασμός, supinitatis, & ἀναστροφῆς τῆς τροφῆς, quibus τρώδης δέσσεις significantur, post cibum accidentes, ita vt si æger paulò vehementius sese moueat, vomitus sequatur.

Esti verò naturale sit ventriculo, vt cibos per os recipiat in se, & postea coctos per orificium inferius emittat, ac per fibras rectas cęsophagus cibos attrahat, motusque fibrarum principium sit in parte superiore, concurrentibus circularibus, qui ab cęsophago in ventriculum pellunt, quorum motus etiam à parte superiore incipit: tamen natura aliquando abutitur fibris rectis, & tum principium motus istarum fibrarum incipit à parte inferiore, & tendit versus superiora: ac tum vomitus fit, qui ratione facultatis expultricis actio quidem naturalis est; quia tamen fibrę non sua sponte tunc operantur, sed stimulatae ac impulsę ab obiecto præter naturam, actio præternaturalis appellari potest. Atque ita symptomata hæc sunt in genere actionum læsarum, si facultas expultrix, vt caussa efficiens spectetur, vt Galenus facit, 3. de sympt. caus. c. 2. Habito verò respectu ad materiam, vomitus in excretorum genere præter naturam collocatur à Galeno, in lib. de sympt. differ. c. ult. Quia tamen illud, quod exit, licet loco, non semper tamen substantiã aut qualitate à naturali statu mutatum est, rectius ad actiones deprauatas refertur.

### Causa.

Causa vomitus & nausę, eadem ferè sunt, secundum magis & minus differentes, nimirum omnia, quę facultatem in ventriculo expultricem stimulandi vim habent; quanquam & retentrix concurrere possit dum debilitata actionibus contrariis expultricis resistere non potest: sola tamen vomitum eiectionem non valet.

Causa verò vomitus est vel vitium aliquod ventriculi, vel materia irritans vel vtrumque. Ventriculi vitium intemperies, tuberculum, vlcus, vulnus, ob quę etiam probus cibis, & qualitate non peccans facultati expultricis molestus esse, eamque irritare potest. Materia verò, quę facultatem expultricem irritat, varia est, & vario modo id præstat. Materia enim vel extra assumpta est, quales sunt cibi, medicamenta, venena; vel intus producta; & quidem vel in ventriculo genita, quę aut alimentalis, vt chylus coctus vel crudus, aut excrementitium quiddam, vt cibis corruptus, pituita, bilis: vel alibi genita in corpore & in ventriculum illata, eaque vel animata, vt vermes, vel inanimata, vt sanguis, humores, pus, quę in ventriculum mittuntur ex intestinis, mesenterio, epate, cerebro, toto corpore, per epatis venas. Pręgnantes etiam quædam primis mensibus vomere coguntur. Cum enim menses subsistant, materię pars aliqua ad ventriculum etiam transfertur, & per eum vomitu reiicitur, donec foetus grandior factus plus alimenti ad se trahat, vel etiam natura humoribus illis magis adsuescat. Materia autem quęcunque & vbicunque genita sit, vel pondere ac grauitate, vel acrimonia, mordacitate & qualitate, ventriculo aduersa est, vel alio modo ventriculum irritat & molestat. Atque hoc facilius accidit, si materia illa agitur, vnde iis, qui curru vehuntur, si non assueri, ventriculus subueri solet interdum, maximè verò nauigantibus. Nam & Hippocrates, 4. aphor. 24. motio-

ni tribuit, quod nauigantes vomere solent; alij terro odor magis, quo affectus odoratus stomachum agitatur. Aliquando etiam vi imaginationis vomitus concitatur, quando ad cęspectionem alicuius vomentis, aut obiecti iniucundi, vel odoratum expultrix ad talem motum stimulat. Ductus quoque, qui bilem vehit ad intestina, quandoque vomitus causa est, & facit, vt etiam, qui aliàs biliosi non sunt, quandoque vomant. Ductus enim ille nunc vnicus, est nunc duplex, & quidem simplex saltem, ad intestina naturaliter fertur; si duplex, maior ad intestina, minor ad fundum ventriculi tendit. Si verò hic naturalis situs mutetur, & vel vnus ille ductus in ventriculum, vel maior in ventriculi fundum inferatur, homines bilis vomitu crebro infestantur, qui μικρόχολοι λέγονται, biliosi supra nominantur. Tumores quoque & vlcera ventriculi vomitus excitant. Quibusdam etiam natia est angustia ventriculi, ob quam si paulò largius cibum sumunt, vomunt, de qua supra inter morbos ventriculi actum.

Quę vomitus causę sunt, easdem etiam Nauseę esse diximus, differentes saltem secundum magis & minus. Nā si materia minus copiosa minusque acris, vel vaporosa potius, aut tunicis magis impacta, aut tenacior sit, nausea fieri solet: contrariis materię conditionibus vomitus excitatur. Nonnunquam tamen etiam excitari potest: si virtus expultrix sit debilior.

### Differentia.

Vomitum per morbum aliquem fit, alius citra hunc. Qui per morbum aliquem fit, alius Criticus est, qui, vt opus naturę, tempestiuè fit, & in commodum ægri, & morbum resoluit, totā materiā euacuatā, vel eundem imminuit, parte aliquā materię vel ob virtutis expultricis debilitatem, vel ob materię contumaciam relicta; alius Symptomaticus, qui intempestiuè fit, naturā à caussa morbifica nimium irritata. Qui citra alium morbum fit, plerumque crapulam & ingluuiem sequi solet, vt debilitatem ventriculi. Sunt & differentię materię, & aliàs sanguis, aliàs humor biliosus, aliàs pituitosus, aliàs vermes, alias pus & sanies elicitur. Interdum etiam crines, clauī, ferramenta, ligna, frusta carnea, & huiusmodi alia è ventriculo vomitu reiiciuntur, vt supra dictum, quę tamen omnia supra naturam & magicę operationis sunt. Interdum etiam Clysteres vomitu reiectos & alij obseruauerunt, & ego memini: similiter & glandes & excrementa alui in ileo vomitu reiiciuntur per motum fibrarum in intestinis inuersum, vt de scorbutis, & de ileo dicitur. Notabilis quoque est historia, quam Guilielmus Fabricius Hildanus, Cent. 4. obs. 32. refert, Monialis cuiusdam, quę ab anno ætatis 13. vsque ad annum 44. continuis vomitibus fuit molestata & singulis diebus semel vtpurimum pituitam viscidam, nonnunquam & bilem vomitu reiiecit. Vomitus huius tam diuturni causam quidem Philibertus Saracenus in responsione, ad retentum semen refert. Verum non absuit affectio Hypochondriaca, vt ex iis, quę à Fabricio referuntur, & quę de Affect. Hypochondriaca dicuntur, patet.

### Signa Diagnostica.

Nausea & vomitus in genere per se manifesta sunt, neque signis, quibus innoscant, opus habent. Causę verò signis, quibus manifestentur, indigent. Et primò an vitio ventriculi, an verò per consensum fiat vomitus, cognoscitur, quoddā vitio ventriculi fiat vomitus, tam ante, quàm post cibum sumptum vomit æger, & signa affecti ventriculi sunt, perpetua inappetentia, grauitas, tensio & inflatio ventriculi, & similia; & signa debilitatis, & intemperiei humidę, quę totus

totus ventriculus laxatur, adsunt. Si verò per consensum fiat, nec vomitus, nec symptomata ista adsunt perpetuò, sed quandoque ægrum affligunt, quandoque & signa partium affectarum aliarum adsunt.

Si fiat vomitus ob meatum biliarium, vt supra dictum, ventriculo insertum, homines aliàs satis rectè valent, nec ventriculi vel alterius partis affectus, vel etiam bilis copiosæ signa adsunt; Bilis tamen vomitu reieicitur. Si ex vlcere vel tumore ventriculi vomitus fiat, id è suis signis cognoscitur.

Si fiat vomitus ob ventriculi angustiam & paruitatem, vitium hoc non solum visui est conspicuum, vt Galenus, *art. med. cap. 71.* habet: sed tales etiam à naturitate parum comedunt, & si paulò plus comedant, vomitu id reiciunt.

Si cibus & potus, cum vel sine pituita, post sumptum cibum reiciatur, signum est superioris oris laxati & debilitati: nonnunquam & signum est debilitatis ventriculi, qui cibum coquere non potest.

Vomitus, qui fit à causis externis, ex iis antecedentibus cognoscitur, iisque sublatis cessat. Vt si obiectum capitis vomitus fiat, latere non potest.

Quod si ob materiam irritantem fiat vomitus, aut cibus vel potus nimia copiâ assumptus est, vel venenum haustum, vel praua aliqua materia in ventriculo fuit genita, aut ad eum confluxit. Qualis verò sit materia, non solum ex vomitu cognoscitur, verum etiam antequam vomitu reiciatur, ex ructu, qui nunc acidus est, nunc nidorosus, nunc amarus. Et quidè iam imminens vomitus ex bilioso & mordaci humore signa sunt oris ventriculi morsus, dolor capitis, vertigo tenebrosa, tremor labij inferioris, sputum multum ac tenue profluens, Galenus, 3. *de Crisibus, cap. ult.* Quorum Symptomatum causas Galenus, 1. *Prorrh. 1. t. 30.* refert.

Si humor in ventriculo est genitus, qualiscunque sit, iam dudum illum afficit ac torquet, & in victus ratione peccatum fuit, ac nausea ferè est continua, atque appetitus non satis probus. Et si cibus in ventriculo corrumpitur ex nidorosa aut acida cruditate eius, quod vomitu reieicitur, cognoscitur.

Si verò aliunde affluit humor, signa eius partis affectæ, quæ materiam suppeditat, adsunt; vt si ex totius corporis vitio, quod nonnunquam se in ventriculum euacuat, vomitus accidat, ex deprauato totius corporis colore, iuxta humoris proportionem, manifestum euadit, præcessit praua victus ratio.

Sin è cerebro humor mittatur, pituitæ aut salis humoris in ventriculum destillantibus signa adsunt; vomitus quoque sunt spumosi & nausea eius magis molestat, quo tempore cibum ingerunt.

Si ex Epate bilis transmittitur, cognoscitur id ex humoris per vomitum reiecti natura, ex Epatis dolore, tumore, & tum vomitus ieiunos magis molestat, quam post sumptum cibum.

Si ex Intestinis est vomitus, adest dolor colicus, vel intestini Ilei.

Si ex vtero, vel conceptio facta fuit, vel menses suppressi sunt, atque alia signa affecti vteri adsunt.

Qua autem in parte ventriculi humores continentur, etiam signis distinguendum est. Si enim in ventriculi cauitate latent, leuissimo conatu reiciuntur, & inest in ventriculo ex alimento tensio & anxietas, quæ non cessat, donec humores vomitu sint reiecti. Quibus verò humores adhærent tunicis, iis alimenta sine humoribus eiciuntur. Præterea si in cauitate ventriculi sunt humores, etiam sine cibo fit vomitus, & post vomitum alimentum retinetur. Si verò tunicis adhærent, non vomunt nisi ingesto cibo; citra verò cibum nausea admodum molestat, & quod excutitur, pituitosum & crassum est, ac magno conatu eicitur.

Si sanguis vomitu reieicitur, & quidem à ventricu-

lo, est qualitate exiguus & rubeus. Si aliunde infunditur in ventriculum, est multus & nigrior; & quidem niger, si ex liene, rubicundior verò, si ex Epate vel toto corpore.

### Prognostica.

1. Accidit nonnunquam, vt post mediocrem nauseam vomitus sequatur; nonnunquam verò conturbatio quædam magna & frequens fit, vomatur verò parum aut nihil. Prauum hoc est, & vt signum, humorem in ventriculo contumacem indicans, & vt causa, continuâ scilicet ista vellicatione vel inflammationem excitatura, vel præsentem iam auctura. Galenus, 6. *Prorrh. comm. 3. t. 25.*

2. In vomitionibus, quæ spontè sunt, si qualia oportet euacuentur, confert & facilè ferunt ægri; sin minus, contrarium fit, 1. *aph.* 2. Euacuatur enim materia, quæ natura siue qualitate, siue quantitate, siue vtroque modo molesta est. Ideoque si vomitus id euacuat, quod corpus lædit, atque inde æger commodè aliquid percipit, bonum est; sin autem euacuatur, ægri tamen ideo morbo non leuantur, malum est.

3. Quicunque sanguinem vomunt, sine febre quidem salutare est, verum cum febre, malum. 7. *aph.* 37. Viscerum enim aliquam inflammationem hoc significat.

4. Vomitus chyli malus est, præsertim ratione vlceris; fecum lethalis, vt in Ileos; saniei pessimus, quia vlcus adesse significatur. Vermium, ratione signi quidem malus est, quia putredinem magnam humorum indicat, verum ratione causæ, bonus, si vniuersi, vel maiori ex parte expellantur, ac præsertim si id criticè fiat.

5. Peior vomitus est atræ bilis, quam pituitæ, & pituitæ putridæ rursus peior, quam copiâ saltem peccantis. Vomitus commodissimus est ex bile & pituita maximè permixtis, & non crassus valde, neque multus. Sincerior enim deterior. 2. *Progn. aph.* 38. Biliosus enim sincerus bilis copiam, pituitosus frigiditatem indicat. Præterea sincerus humor crassior redditur. Pituitosus quidem frigiditate, biliosus verò propter exsuperantiam caloris, quâ quasi assatur. Galenus, *ibidem.*

6. Si homo omnes colores vomat, valde perniciosum est. Plures enim difficiles in corpore affectiones significantur. Celerrimam mortem minatur vomitus liuidus, si grauiter oleat. Putredinem enim significat, cum caloris natui extinctione: & omnino subputridus & fœdus odor in omni vomitu malus est. Deterior enim levis affectio redditur, si ei putredo accedat, Hippocrates & Galenus, 2. *Progn. aph.* 40. 41. 42.

7. Si vomitus prasinus aut liuidi aut niger fuerit, malum. Hippocrates, 2. *Progn.* 39. Nam causam admodum vehementem hæc colorum mutatio indicat. Prasinus enim, seu Porracenus calorem insignem in venis & magnam humorum corruptionem indicat. Si tamen ex quorundam ciborum & olerum cruditate proveniat, minus malum significat. Niger interdum salutatis est, dum scilicet humor melancholicus criticè & cum ægri commodo euacuatur; peior verò est, cum alia materia eicitur, quæ sua natura nigra non est, sed ex corruptione in corpore hunc colorem acquisiuit.

8. Vomitus in capitis doloribus æruginosus, cum surditate & vigiliis citò vehementem surditatem adfore pronunciat, 1. *Prorrh. comm.* 2. *aph.* 12. Flaua enim bilis supra modum assata primò in æruginosam, deinde in atram vertitur. Id quando in capite contingit, vigiliæ, dolores capitis & surditas accidit: vnde *μανία δὲ παραφροσύνη* oritur. Cerebro autem grauiter affecto ab humore calido, tenui, mordaci, os ventriculi per consensum afficitur, & vomitus excitatur, vt à plurimis hîc aphorismus explicatur. Exemplum est in Philisca, 3. *Epid. com.* 4. Putarem tamen talem vomitum, & affectiones has potius accidere, humore tali non solum



lum in cerebro cumulado & ventriculum in consensum trahente, sed etiam, si bilis talis in inferioribus cumuletur & subito ad caput rapiatur, talia Symptomata excitari posse, in ventriculo quidem vomitum, in capite surditatem, vigilias & delirium.

9. Quibus cerebrum vulneratum est, his febrem & bilis vomitum super venire necesse est, 6. aph. 22. Febris quidem sequitur, quando ab illo eiusque membranarum vulneratis calor cordi & hinc toti corpori communicatur. Vomitum verò fit ob consensum cerebri cum ore ventriculi.

10. Qui pectus angustum habent, ac inde pulmonem compressum ad vomendum ineptissimi sunt. Facile enim vas ex iis, quæ spirationi inserviunt, rumpitur. Sunt & inepti ad vomitum, qui collum habent longum, & qui ad sanguinis sputum & tabem sunt propensi, & quibus tumor est in gula. Prægnantibus quoque vomitus commodus non est: metus enim est, ne abortiant.

11. Vomitiones luxuriæ causa fieri non oportere, confido. Interdum valetudinis causa, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere vult, hoc quotidianum habeat. Celsus, lib. 1. cap. 3.

12. Vomitum interdum malum satis diuturnum est, habetque eius rei exemplum Guil. Frabritius, cent. 4. obs. 32. de quadam nobili religiosa, quæ ab anno 13. ætatis usque ad 44. & ita 31. annos singulis diebus semel euomit, ut plurimum pituitam viscidam, nonnunquam & biliosam materiam.

Plura de vomitionibus prognostica possent addi: verum cum illa solum febres spectent, videantur passim apud Hippocratem & Galenum, in Prognostic. Proverber. & Coacis prædictionibus.

#### Indicationes.

Indicationes.

Si vomitu reiiciatur materia bona & utilis, eaque sit cibus vel chylus, qui ob ventriculi imbecillitatem reiicitur, vomitus ille statim reprimendus, ventriculum roborando & adstringendo. Si sanguis sit, isque critice reiiciatur, non statim supprimendus est, nisi modum excedat. Similiter si consuetus sit sanguinis vomitus; in Plethorica corporis dispositione, aut Epatis imbecillitate, aut vteri mala affectione, non mox cohibendus est, sed toti corpori & affectæ parti prius prospiciendum. Si verò humores excrementitij reiiciantur, & quidè criticus sit vomitus vel consuetus, moderatusque, non supprimendus, sed sinendus. Imò etiam diminutus adiuvandus leni vomitorio. Si verò Symptomaticus sit vel immoderatus, qui vires prosterнат, cohibendus. In quo ad duo respiciendum, primò ad ipsum vomitum, seu Symptomata, secundò ad eius causam. Si enim vomitus sit nimius, à quacunque etiam causa proficiscatur, & plus damni ex eo, quam commodi sperandum sit, cohibendus est, quod sit roborantibus & adstringentibus. Quod si sedari non possit, ad singulas causas cura dirigenda. Et quidem si parvi humores copiam peccant, per inferiora euacuentur, reuellendo, si qualitate praua expultricem lacestant, attemperantur, & ad temperiem redigantur. Sed & dum vomitus diminutus est, per inferiora vacuare licet in morbo, qui cum vomitu non inceptit, & ubi æger ad vomitum non procliuus est, nec assuetus. Si contra accidat, vomitus vomitu rectè curatur. Sin quoque materia, quæ vomitur, ingrata & noxia sit, vel acris & abradens, qualis atra bilis est, ad inferiora reuulsa illa expurgeretur.

#### Curatio.

Quod ergo vomitum ipsum attinet, si sit nimius, curatur per reuellentia & roborantia, ac Expultricis motum nimium comprimentia. Repellunt acres & fortes clysteres, ac suppositoria, quæ humores ad aluum deducunt, imò etiam purgantia, quæ materiam per aluum

euacuant; Calida item extremitatibus, & præsertim frigidis applicata, ut lotiones pedum ex aqua calefacta, & crurum phoenigni ac Sinapismi. Ita Auicennas, 3. Can. fen. 13. tr. 5. cap. 12. Mirabile esse dicit, quod calefactio extremitatum sedat vomitum, scilicet deorsum trahendo. Quod verò innox addit; Infrigidationem extremitatum sedare vomitum velocem calidum, id ita planum & perspicuum non est; cum frigida pedibus frigidis adhibita calidos & tenues humores potius ad superiora repellere videantur.

Verum videtur hic Auicennas respicere ad naturam humoris ipsius, qui vomitus causa est, ob cuius caliditatem is celer est & continuus. Refrigerata enim extremitates qualitatem eandem humori communicant; atque eo modo motus humorum & vomitus non nihil sedatur.

Retentrix facultas roboratur remotâ Intemperie & præsertim humidâ, à qua debilitas reentricis ortum habet. Ergo in causa calida exhibeatur Robribes, berberis, succus & Syrupus granatorum, cydoniorum, de rosis siccis, myrtinis. Et quidem offerantur ab vncia vnâ ad uncias duas, sine aquis vel decocto, aut cum exigua horum quantitate, ne ab humidis maior fiat relaxatio ventriculi, & fluctuatio in eo augeatur.

Roborantia.

Atque exhibeantur talia ante cibum. Conuenit etiam panis vino austero madidus, confersa rosarum antiqua imprimis Data, Diacydonium, Syrupus corallior. spir. & j. Post cibum sumantur cibi adstringentes, cydonia, pyra, mespila, sorba, Diacydonium simplex & alia supra de Intemperie ventriculi calida proposita.

Si non ita ferueat ventriculus, Galenus, in Euporistis cap. 15. hoc medicamentum exhibet.

℞. Succus mali granati cum suis acinis expressi part. iij. mentha part. j.

Coquantur in vase fictili assidue agitando, cumque iam crassa fiunt, sublata reponantur in usum. Dosis ante cibum mystrium siue cochlear vnum magnum vel duo.

Extra adhibeantur fomenta ex rosis, myrtillis, sumach. cortic. granator. & postea applicetur pulpa cydonior. sub cineribus coctorum cum puluere myrtillorum, mastiches, sumach, boli Armeni, terræ sigillatæ, trochisc. de spodio. Vel imponatur Emplastrum de crusta panis.

Aut ℞. Carnis cydonior. sub cineribus coctor. Vnc. ij. puluer. hypocyssidis, balaustiorum boli Armeni mastiches, an. scrup. j. ol. myrrh. cydon. an. q. f. F. Cataplasma.

Aut panis tostus aquâ rosarum vel vino adstringente malidus, additis pulueribus modò enumeratis, ventriculo imponatur.

Vel ℞. Crusta panis in aceto horis duabus macerata. Vnc. ij. spodij, mastiches mentha. corallior. santal. rub. albi an. Drach. j. ol. mastichini, cydoniorum an. Vnc. ʒ. farin. hordei. q. f. ab subigendum F. Cataplasma.

Vel applicetur Cerotum Stomachale oleo rosaceo subactum.

Si causa sit frigida & materia crassa ac viscida, adstringentibus attenuantia & abitergentia misceantur. Sumatur ergo Diacydonium compos. miua cydoniorum aromatica, Conserua rosarum antiqua cum puluere mastich. mentha. thuris, sumendo ad singulas uncias conseruæ pulueris scrup. j. vel Drach. ʒ. quæ cum syrupo de mentha in liquidiorum formam redigantur: Conserua rosarum Data, aut Spiritus Vitrioli, qui in vtraque causa locum habet, theriaca antiqua, Mithridatium.

Vel ℞. Cortic. citri siccor. ligni aloës, mastiches, sem. coriandri præpar. portulaca. santali citrini an. Drach. j.

Fiat Puluis, cuius usus sit in cibo.

Vel ℞. Caryophyllor. crassiuscule incisor. Drach. ij. mastiches Drach. ʒ. rosar. P. j.

In vase clausa in vini rubri f. ʒ. ebulliant parum & colentur. Colatura ante cibum exhibeatur.

Aqua

Aqua etiam cinamomi vomitum compescit, præsertim si cum succo cydoniorum, destillatur. Et potest nunc succi, nunc cinamomi plus vel minus sumi pro humoris peccatis natura & ventriculi constitutione.

Alia etiam supra de Intemperie frigida ventriculi proposita hic locum habent.

Extra adhibeantur fomenta ex absinthio, mentha, calamo aromatico, nuce moschata, radicibus cyperi, garyophyllis, mastiche cum vino rubro, & apponatur emplastrum de crusta panis cum pulvere menthae siccae, mastiches, absinthij, cumini, caryophyll. cum oleo absinthij, menthae & mastichino.

Efficax est & crusta panis vino maluatico vel aqua menthae cum vino destillata madefacta & aspersa pulvere menthae, caryophyll. macis, cinamomi, speciebus aromaticat. rosat. ventriculo imposita.

Vel ℞. *Ladani* Drach. ij. *styrac. calam.* Drach. iij. *thuris, mastiches* an. Drach. j. *caryophyllor. corallior. rubr. nucis moschat.* an. scrup. j.

Cum cera & resina F. Emplastrum.

Vel ℞. *Fermenti fecalini* lb. ss. *pulu. menth.* M. j. *mastich.* Vnc. j. ss.

Terantur simul in mortario, & cum oleo mastichino incorporentur. Fiat Cataplasma quod calidum ventriculo applicetur.

Infantibus fermentum cum duorum ouorum vitellis bene subactum & pulvere caryophyllorum admixto in tegula calente calefactum ventriculo imponatur.

In quacunque etiam causa utile est, odoramenta convenientia natibus admouere. Itaque efficacissimus est panis tostus aceto rosarum maddius, & pulvere menthae, caryophyllor. rosar. conspersus, odor quoque mali cydonij utilis est.

Cucurbita etiam magna cum modica flamma fundo ventriculi sine scarificatione apposita prohibet, ne tam facile is subuertatur, atque ea, quæ in fundo sunt, ad superiora compellantur.

Medicata ad vomitum Galeni.

Plurima etiam medicamenta ad vomitum utilia ex Asclepiade descripsit Galenus, 8. de compos. med. sec. loca cap. 3.

Opiata.

Inter quæ etiam sunt Opiata quædam. Et licet magno & vehementi vomitu, & ubi materia irritans admodum praua est & maligna, ac ventriculus valde debilis, Opiatis confectionibus uti, ut Theriaca recenti, Philonio Romano, & imprimis Laudnao Opiato aliis convenientibus medicamentis admixto.

Si verò hoc modo vomitus sedari non possit, danda opera, ut causa eius tollatur.

Si ergo ex debilitate ventriculi is proveniat, curatur vomitus ventriculum roborantibus & adstringentibus, modo & medicamentis supra de morbis ventriculi propositis cum internis, tum externis.

Si ex inferioris orificij inflammatione ortum habeat, curatur ut inflammatio ventriculi reliqua.

Si ex ileo & intestinorum inflammatione, de eo suo loco dicetur.

Si ex angustia & paruitate ventriculi naturali, curari non potest, sed parcius comedendum & bibendum.

Si potus aut cibi nimia copia ingesta, vel vitiosus cibus vomitus causa sit, per inediam, quietem ac somnum coctio eius procuranda; aut si id non succedat, vel etiam cibus aliquid vitij contraxerit; vomitu reiiciendus est, quo excreto omnis molestia cessat.

Si verò ex humoribus ventriculum molestantibus, & quidem in eo coaceruatis fiat vomitus, humoris, si opus sit, præparandus & postea euacuandus est, quæ euacuatio non solum per alium, sed & per superius os ventriculi institui potest: imprimis si vomitus diminutus sit, unde vomitus vomitu curari dicitur. Proinde si materia sit pituitosa, crassa & viscida, tale vomitorium conuenit.

℞. *Iuris pulli* lb. ss. *oxymel. simpl. succi raphani* an. Vnc. j. M. pro vomitorio.

Si materia minus crassa, minusque viscida sit, Galenus, 7. meth. med. cap. 11. aquam mulsam cum aceto in cremore prisanæ exhibet, ut:

℞. *Mulsa* Vnc. ij. *aceti* Vnc. ss. *cremoris prisanæ hordei.* Vnc. vij. M. pro vomitorio.

Potest etiam Album vel sal in iusculo pingui vel cereuisia cum butyro vsurpari.

Fortiora verò vomitoria, quæ humores in toto corpore commouent, hic locum non habent.

Si materia biliola sit,

℞. *Aqu. tepid. vel hordei.* Vnc. vij. *syrup. acetos. simpl.* Vnc. j. ss. Misce.

Si materia acris & mordax sit, loco aquæ tepidæ uti licet iure pingui.

Si materia melancholica sit, & si periculosum sit, materiam, præsertim atrabilariam sursum efferri, non ea mox cohibenda, sed vomitus aliquantisper, permittendus, vel etiam leniter adiuuandus, postea clysteribus & purgantibus per inferiora educatur, de quibus supra de intemperie ventriculi dictum est. Hoc saltem monendum, ne quando ventriculus per se afficitur, valentioribus utamur, sed sufficiunt pilulæ ex aloë, mastichinæ, manna, mel. rosat. solut. & similia, prout natura humoris requirit.

Facilior redditur vomitus, si ventriculus, manus & pedes moderate calefiant. Ex Auicennæ consilio ab assumto vomitorio post cenæ horam utilis est inordinata motio. Sumto vomitorio abstinendū in cibo & potu ab acerbis & acidis: sumenda potius dulcia & pingua.

Si causa vomitus venenata est, vel venenatum medicamentum sumtum, vomitu vel per secessum id educatur, & dentur antidota appropriata, ac ventriculus ac nobilia membra roborentur.

Eodem modo etiam si à medicamento vomitorio sumto vomitus supra modum continuetur, curatio ut in hypercatharsi à purgante nimis forti sumto, instituenda, ut infra cap. de cholera dicitur. Experimenti certi & secreti quasi loco nonnullis habetur, ut ab usu antimonij nimis vomenti spiritus vini cochlear vnum vel alterum propinent, atque in momento iuuamen inde pollicentur.

Si verò aliunde affluant humores, euacuandi, & si vomitus sit nimius, ac commodè per ventriculum non euacuentur, à ventriculo auertendi & per alium euacuandi, cum hæc sit via à natura huic rei destinata. Atque euacuatio hic commodissime fit per myrobalanos, quæ non solum laxant, sed & stomachum confortant, & ventriculum roborant, ne humores aliunde affluentes ita facile recipiat. Aliàs si vomitui homo sit assuetus, cumque homo facile ferat, non statim sistendus. Deinde videndum, an humores à toto vel à parte aliqua confluant. Et enim si adsit in toto abundantia sanguinis, aperiatur vena in brachio. Id etiam fiat, si affluat sanguis ab epate vel liene. Idque in initio fiat, dum vires adhuc constant. In mulieribus, si ex mensium suppressione morbus sit, saphena aperiatur. Utile est & cucurbitulas cum scarificatione cruribus apponere ad materiam à superioribus reuellendam. Deinde si humor aliquis vitiosus ex aliqua parte in ventriculum mittatur, is ex mittente parte euacuandus est.

Euacuatio.

Præter euacuanda etiam vsurpanda quædam adstringentia, quæ ventriculum roborant. Possunt ergo purgantibus myrobalani addi. Verum ista omnia ex iis, quæ supra de Intemperie ventriculi cum materia dicta sunt, satis patent.

### De vomitus sanguinis.

Sed ut de vomitu sanguinis in specie aliquid dicamus, si sanguis ideo vomitu reiiciatur, quo in corpore redundet, post abscissionem membri alicuius grandioris, & post suppressam consuetam sanguinis euacuationem

Vomitum sanguinis.

nem per menses, hæmorrhoides, nares sanguinis abundantia minuenda, simulque videndum, ne sanguis in ventriculo concreseat, & syncopem excitet. Propinquetur ergo *mulsæ* Vnc. iij. vel Vnc. iv. aut *oxymel. simpl.* Vnc. ij. Et si iam concretus sit, dissoluatur *oxymelite*, in quo *thymus* vel *radix ebuli* cocta sit.

Sanguis dissolutus per aluum educatur, nisi vomitu sponte sua natura eum reiicerit.

Idem fiat, si vas aliquod ruptum vel apertum sit; postea sanguinis fluxum inhibentia & adstringentia exhibeantur. Qualia sunt *syrupus de rosis siccis*, *myrtinus*, *cydon. ribes*, *succus plantaginis*, *portulacæ*, *cydoniæ*, *mespilæ*, *pyræ austriacæ*; pulueres item ex bolo Armeno, terra sigillata, corall. lap. hamatitæ, cum aqua plantaginis vel bursæ pastoris. Inter efficaciora medicamenta sunt trochisci de carabe, de spodio, de terra sigillata, qui vel in pulueres vel pilulas redacti cum conuenienti liquore exhibeantur, vt:

*℞. Trochisc. de carabe, de terra sigillata*, an. Vnc. β. aqu. bursæ pastoris, portulacæ, plantaginis, ana Vnc. j. Misce.

Vel *℞. Lap. hamatit. Drach. j. baccar. myrti*, Scrup. ij. acaciæ, boli Armeni, corall. rubror. ana Scrup. j. Fiat puluis. Dosis Drach. j. Cum aqua plantag. & pauco aceto.

Vel *℞. Conserv. rosar. antiqu. Vnc. j. rad. symphyti maioris, fol. quercus*, ana Vnc. β. boli Armeni, Drach. j. extr. tormentilli lapid. hamatit. ana Scrup. j. cerall. rubr. Scrup. β.

Cum *syrupo myrtino* vel *portulacæ* fiat electuarium molle. Si liber, potest vnum atque alterum granum laudani opiati addi.

Extra quoque applicari possunt adstringentia.

*℞. Balauft. flor. rosar. rubr. sumach. myrti*, ana. q. v.

Coqu. in aqua plantaginis & aceto, ac decocto spongia imbuatur, eaque ventriculus foueatur. Postea inungatur hoc vnguento,

*℞. Ol. Myrtini, cydonior. mastich. ana Vnc. β. hypocyssid. boli Armeni, corall. rubr. acaciæ*, ana Scrup. ij. cera, q. s. Misce.

### Diaeta.

In vomitu victus ratio semper analogiam ad causam & remedia habeat, & propterea alimentis nunc adstringentibus & vomitum reprimentibus, nunc vomitum adiuuantibus, vtendum. Si vomitus superfluous est sistendus, dentur cibi abstergerendi & ventriculum roborandi vi præditi, Cydonia, pyra, carnes assæ. Intinctus fiat ex vino granatorum, aceto rosar. succo rubes; & cibi reliqui faciliis sint coctionis, ne diutius in ventriculo retenti vomitus causa sint. Si virium lapsus metuatur, ac vehementia febris id non prohibeat, vinum nonnihil adstringens parca detur. Conuenit & absinthites, vt & cereuisia eiusmodi. Somnus, quantum fieri potest concilietur, cum quies & somnus non solum omnes euacuationes, præter sudores, sistat, sed & somnus moderatus biliosos humores temperet crassosque concoquat.

Si autem vomitus diminutus adiuuandus sit, æger cibos varios, dulces, pingues maxime ingerat, quibus & de sicubus, raphano, & similibus vomitum adiuuantibus aliquid admisceri potest, vt vomitus facilius subsequatur. Ab adstringentibus verò tum abstinendum, cum ex vsu eorum humores ventriculo magis impingantur.

## CAPVT XIII.

### De Cholera, & primò de cholera humida.

**A**D expultricis facultatis symptomata pertinet & is affectus, quo ventriculus per vtrumque orificium.

Dan. Sennerti Tom. II.

cium materiam sibi molestant expellit. Nominatur autem cholera vel cholerica passio, τὰ χολεϊκά, 7 epidem. 1. 90. in editione Foëssi Hipp. appellatione à causa, χολή, id est, bile sumpta; sicut Galenus, ex sententia Cnidiorum Medicorum docet, 2. meth. med. c. 2. Celsus lib. 4. cap. 11. & Cælius Aurelianus, lib. 3. acutorum cap. 19. cum ex bile flaua & humore prauo bilem æmulante supra atque infra erumpente hoc malum oriarur. Qui morbo hoc laborant χολεϊκῶντες & χολεϊκοὶ appellantur. Quo sensu & vocem cholericum Plinius, lib. 23. c. 6. accepit, non vt vulgo fieri solet, vbi cholerici appellantur, qui biliosam habent corporis constitutionem; etsi bilem supra ac infra non reiiciant. Alex. Trallianus tamen, lib. 7. cap. 14. aliunde hoc vocabulum deducit, licet ab intestinis, quæ veteribus χολαῖδες dicta sunt. Distinguitur autem cholera ab autoribus in humidam & siccam. Humida appellatur, in qua humores supra & infra excernuntur; sicca, in qua solum spiritus flatuosus supra & infra erumpit. De vtraque in specie agemus; & primò de humida, quæ etiam in specie Cholera plerumque appellatur.

Cholera duplex.

Est nimirum Cholera, & quidem humida, assidua & immoderata humoris prauis per superiora & inferiora reiectio, à facultate expultrice ab eodem valde irritata ortum habens. Neque enim solum ab imbecillitate ventriculi, sed expultrice valde irritata fit cholera. Et quanquam vehementior & grauior sit hic motus, si facultas retentrix elpultricis facultatis motui non resistat; tamen ob solam retentricis debilitatem hic affectus non oritur, sed si facultas retentrix solum sit languida, paulatim potius humores sibi molestos deponit, & lienteria vel cæliaca affectio sequitur. Sæpe tamen, vt in causis postea dicetur, accedit ventriculi debilitas, ob quam cibi corrumpuntur, qui corrupti ac naturam prauam adepti expultricem valde irritant. Vt ita cholera sit symptoma in genere actionum læsarum, & quidem facultatis expultricis, quam tamen aliæ actiones læsæ quandoque antecedunt & sequuntur, vt postea dicetur.

Cholera humida.

De subiecto. Auctores nonnihil dissentiunt, & alij quidem ventriculi, alij intestinorum, alij ventriculi & intestinorum affectum esse statuunt. Verù vt rectè sentit Galenus, 3. de sympt. caus. cap. 2. Pars primariò affecta est ventriculus, cuius facultas expultrix irritatur, vt per vtrumque orificium humorem molestant expellat; secundariò verò simul gula, & intestina afficiuntur.

### Causa.

Causa proxima huius mali est materia acris, praua & corrupta ventriculum vellicans, ac lacerans, vt id, quod sibi molestum est, supra & infra reiicere conetur. Ad quem vehementem motum sæpe non solum humor is, qui primò in ventriculo est, expellitur, sed & ex vicinis partibus, & toto corpore effluit. Materia autem ista varia est, plerumque bilis, nunc chylus & cibus corruptus, nunc alius humor, & quidem vel genitus in ventriculo, vel aliunde affluens. In ventriculo generatur vitio eorum, quæ in cibo & potu assumuntur, quando cibi suâ naturâ faciliè corrumpuntur & in prauam substantiam mutantur, quales sunt barbi piscis oua, quæ comesta, instar alicuius veneni, choleram excitant, fungi, melones, cucumeres, pruna, Persica & alij fructus fugaces, præsertim si ieiuno ventriculo, aut eò cibo repletò sumantur, & assatim illis sumtis bibatur; præterea cibi pingues dulces, acres, venena item & venenata medicamenta, vt & purgantia, quæ modum excedunt. Et quidem ex fungorum genere solum botulum neminem strangulasse, choleram tamen in quibusdam excitasse traditum est; aliorum verò vsu quosdã diarrhœa aut cholera correptos, aut de suffocatione periclitatos non procul à morte abfuisse, Gal. de cibis bonis & malis succi, cap. 4. docet. De his Hipp. 7. Epid. 1. 90. in Codice Foëssi, ita scribit: Cholera morbus ex vsu carnis conciliatur,

Causa.

BBB b.

ciliatur,

ciliatur, præsertim verò suillæ crudioris, ex cicere, vini-  
que odorati veteris ebriate, insolatu, ex sepia esu, lo-  
custarum & gammarorum, olerumque, maximè porri  
& caparum. Quandoque etiam ex lactucis coctis, bras-  
sica, lapathio crudiore, ex bellariis, dulciariis, pomis,  
cucumere, pepone & portione, quæ ex vino & lacte mix-  
tis conficitur, eruo, polenta recenti. Deinde generan-  
tur humores pravi, cum ob maiorem copiam quæ inge-  
sta sunt, cruda relinquuntur, aut corrumpuntur, aut ob  
ventriculi debilitatem, præsertim æstate & autumno,  
ob defectum calidi innati, quo facit, & aer prauus, vt  
& valde calidus & æstuosus. Hinc Hippocrates *loco al-  
legato*, scribit æstate posse cholera fieri, & autumno  
vere minus, minimè omnium hyeme, quia iis temporibus  
tales humores ob æris intemperiem & caloris  
innati debilitatem magis cumulantur. Quod tamen &  
fructuum multorum eo tempore consuetus usus ali-  
quid facere potest. Est & cholera iis familiaris, qui æta-  
tem iuuenilem exceßerunt. Hippocrates, 3. aph. 30. Ætas  
ea est καθεσκημία & παρακμή, quam Galenus cum  
autumno comparat. Vt enim in autumno flava bilis æ-  
statis caloribus collecta magis aduritur, ita & ætas, quæ  
iuuentutem sequitur, non modò bilem colligit, sed &  
biliosum, qui ex iuuenili ætate reliquus est, humorem  
magis assat. Vnde cholera frequentius gignitur. Faciunt  
ad cibos in ventriculo corrumpendos etiam animi pa-  
thematia, imprimis ira & exandescencia, terror subitus  
& inæstia. Causæ tamen hæc etiam ad sequentem clas-  
sem referri possunt; cum scilicet humores pravi albi ge-  
nerati in ventriculum effunduntur. Causæ enim hæc  
etiam in epate & venis humores corrumpendi vim ha-  
bet.

Secundò verò materia ventriculo ex aliis partibus  
communicatur, à venis mesaraicis puta, quando aqua  
frigida, imprimis ieiuno stomacho, hauritur, & postea  
cibus crassus ac coctus difficilis ingeritur. Nam ob ine-  
diam chylus crudus auidè in venas mesaraicas trahitur,  
qui corruptus ibi talem perturbationem efficit. Aliis  
tamen etiam de causis in mesenterio & pancreate pra-  
uus humor cumulari, atque in ventriculum transmitti  
& cholera excitare potest. Deinde ab epate commu-  
nicatur, quando ob eius intemperiem humor biliosus  
copiosius gignitur, quod in febribus malignis sæpe ac-  
cidere solet. Potest & lien tales humores in ventricu-  
lum transmittere. Nonnunquam & ex toto corpore &  
ex venis omnibus biliosus ac flauus humor in ven-  
triculum confluit, solèturque hoc nonnunquam in criti-  
tico naturæ motu, plerumque tamen symptomati-  
cè, fieri.

Vnde humo-  
rum copia in  
cholera pro-  
ueniat?

Consideratione autem dignum est, vnde tanta hu-  
morum prauorum copia, qualis in cholera sæpe vomitu  
& per aluum reicitur, proueniat. Existimant quid-  
em nonnulli, in mesenterio & proximis locis eos con-  
tineri; nonnunquam etiam ex toto corpore confluere.  
Sed non hoc absurdum videtur, humorem seu in  
ventriculo seu in vicinis locis corruptum & maligna  
qualitate, qualis in antimonialibus & aliis medicamen-  
tis nonnunquam est, præditum, humores quoque bo-  
nos corrumpere, eosque naturâ irritata ad ventrem  
protrudi & confluere. Id quod in hypercatharsi etiam  
à medicamentis purgantibus valentioribus, vt & ve-  
nenis assumptis, accidere solet.

#### Signa Diagnostica.

Signa.

Malum ipsum facilè cognoscitur; quia æger frequen-  
ter simul & vomit, & per aluum biliosos ac prauos hu-  
mores excernit, idque cum maxima difficultate & an-  
gustia. Dolor enim ventris & intestinorum vehemens  
adeft, inflatio ac distensio, cardialgia, sitis, pulsus par-  
uus, celer ac frequens est; quibus sæpe externorum re-  
frigeratio, animi deliquia ac conuulsiones acce-  
dunt.

Causarum verò, quæ ob curationem distinguendæ  
sunt, signa quod attinet, si malum ortum habeat ab ali-  
mentorum prauitate vel copia, id ex ægri vel adstantiū  
relatione cognoscitur; vt & si ex medicamenti pur-  
gantis valentioris usu, vel veneno sumpto, aut ex aqua  
frigida, vel niue aut glacie refrigerata potu, aut alia  
caussa externa originem traxerit.

Humoris natura ex propriis & alibi enumeratis si-  
gnis cognoscitur, nimirum ex siti, vomitibus, amaris,  
acidis, doloris specie.

Si materia in ventriculo genita sit, adeft nausea, an-  
gustia, morsus ac dolor ventriculi: materia est ærogi-  
nosa, prassina, viridis, sed plerumque conuulsio & fe-  
bris abest. Si verò in venis sit genita, ferè febris mali-  
gna adeft, & conuulsio accidit.

#### Prognostica.

1. Cholera acutissimum & periculosissimum ma-  
lum est; cum præter omnia symptomata, quæ ventri-  
culum infestare solent, etiam alia in hoc malo con-  
iungantur, quæ modò in signis enumerauimus. Quibus  
concurrentibus non mirum est, si quis subitò moriatur.  
Neque tamen vlli morbo minori momento succurritur,  
Celsus, lib. 4. cap. 11. Contra verò si idonea reme-  
dia negligantur, homo à morbi vehementia vna vel  
altera vel certè paucis diebus iugulatur, & eò qui-  
dem citius, quò frequentius animi deliquio & syn-  
cope corripitur, maximè si conuulsio & singultus acce-  
dat, & adhuc magis si cum interceptione pulsus frigi-  
dum sudauerit, & quæ euacuantur, peiora sunt, vt  
postea diceretur.

Prognostica.

2. Proinde vt in omnibus aliis morbis periculosis  
cunctatio periculosa est: ita in hoc affectu exigua etiam  
& levis curandi mora pessima. Trallianus, lib. 7. cap. 14.

3. Cholera, quæ est à causa primitiua, minus pe-  
riculosa est, cæteris paribus, etsi sit cum minoribus  
& paucioribus symptomatibus.

4. Quò perturbatio ventris maior est, & quo ven-  
triculus magis afficitur, eò periculosius malum est. Est  
& periculosior ea, quæ à bile ortum habet æruginosa,  
vt pote à naturali statu magis recedente, & cum lotu-  
ræ carnis simile quid excernitur, & longè adhuc magis,  
si liuida aut nigra reiciuntur. Et quæ in febre mali-  
gna & pestilenti accidit, & quæ ex veneno, aut  
materia ad hoc ἀναλογίαν habente ortum habet, pes-  
sima.

5. Sunt tamen quibus diarrhœa & cholera certis  
interuallis omnem corporis redundantiam euacuat. Ga-  
lénus, 7. meth. med. cap. 11. Salubris igitur aliquando  
hæc affectio, vbi critico motu ex robore facultatis  
venarum expultricis materia euacuatur, & ea intra 18.  
aut ad summum horas 20. euacuata ipsa affectio spon-  
tè desinit, vt præfidiis medicis opus non sit. Nonnun-  
quam materia ad vias vrinæ conuertitur, vnde vrinæ  
ardor, cuius profluvio etiam hoc malum finitur.

Cholera ali-  
quando salu-  
bris.

#### Indicationes.

Cum malum hoc sit acutissimum, curatio maturan-  
da est. Consistit autem curatio in duobus: In causa ab-  
latione, & symptomatum, quæ sunt, mitigatione, ac  
virium conseruatione. Causam quod attinet, conti-  
netur ea, vt supra dictum, & generatur vel in ventri-  
culo, vel ex epate, liene, mesenterio, vel ex toto corpore  
ac venoso genere in ventriculum ac ventrem confluit.  
Sex igitur scopi Medico in huius affectionis curatio-  
ne sunt propositi. Primò vomitus promouendus, si  
minus parcè prodeat, aut euacuatio per aluum sit ni-  
mia. Secundò purgandum leniter, cum vel naturæ in  
euacuatione per aluum defectus supplendus, vel mate-  
ria ad inferiora retrahenda est. Terriò humores tempe-  
randi, & eorum acrimonia & mordacitas corrigenda.

Indicationes.



da. Quartò partes roborandæ. Quintò, vires conseruandæ & spiritus reficiendi. Sextò symptomata mitiganda & corrigenda.

### Curatio.

Primò ergò si à cibo quocunque modo corrupto, aut alia materia praua in ventriculo contenta cholera excitetur, vomitus ille non statim sistendus, ne materia praua retenta malum grauius & periculosius postea reddatur. Imò si natura ad exernendum non satis insurgat, leniter adiuuetur, exhibendo ea, quæ simul prauorum humorum deiectionem adiuuant, materiamque temperant & abstergunt. Quò enim citius materia praua ventriculum vellicans externitur, eò citius æger ab hoc malo liberatur. Nimirum si euacuatio satis copiosa sit, & cum ægri tolerantia, aut saltem virtus non valde deiiciatur, et si aliquo modo debilitetur, fluxus neque cohibendus neque adiuuandus, sed naturæ res permittenda, ac symptomatibus saltem occurrendum. Si verò irritatio, anxietas & dolor maior sit, quam pro euacuationis quantitate, & euacuatio abundantia humorum non satis respondeat, sed parciore sit, promouenda euacuatio. Ad vomitum igitur adiuuandum detur aqua mulsa vel hordei tepida, aut sola aut adiecta sacchari exigua quantitate, aut syrup. rosar. simpl. infus.

Vt: ℞. Ag. hordei. simpl. Vnc. iv. syr. rosar. simpl. infus. vel violar. Vnc. j.

Misce. Aut serum caprinum vel vaccinum detur cum syrupo rosar. vel viol. A fortioribus vomitoriis omnino hic abstinendum, quod sunt & ventriculo inimica & morbum augment. Hippocrates quidem, 5. epidem. 1. 10. in Cod. Foësi, quendam epoto elleboro cum lentiscalæ succo sanatum fuisse scribit. Locum tamen cum Cœl. Aurelianus, lib. 3. acut. cap. 2. exagitat. Verum, ut Foësius scribit, valde iniquum est, ab iis, quæ peregrinationis procinctu temere sunt ac leuiter animaduersa, exactæ curationis leges petere velle. Et multi sæpe contra omnem spem conualescunt, quorum tamen curationem ideo pro curandi norma vniuersali semper habere non licet. Si verò materia magis ad vomitum urgeat, aut æger acriter immoderate vomat, ut metuendum sit, è ventriculi symptomatibus & vomitu nimio ægrum periclitari posse, per aluum educenda est materia. Et quidem si euacuatio maior sit, quam irritatio, vtendum iis, quæ simul purgant, adstringunt & roborant, ut syrup. rosar. sol. cum decocto myrobalanor. rhabarb. Verum si naturæ major sit conatus & irritatio, quam humorum euacuatio, abstinendum à roborantibus & adstringentibus, atque iis vtendum, quæ laxant, & abstergunt. Detur ergo in sero lactis vel iusculo manna Vnc. j. syrup. rosar. solut. Vnc. j. β. Atque clyster applicetur materiam temperans atque abstergens, ex decocto hordei vel sero lactis addito ol. viol. & sacch. rubr. ouique vitello. Fortioribus verò aluus non irritanda, ne difficilis aliqua diarrhoea vel dysenteria excitetur. Et quod vomitum attinet, id, quod modò dictum, in omni cholera obseruandum, ut non solum quò materia vergat, eò ducatur, verum etiam, si alterutra euacuatio sit nimia, & æger vel nimium vomat, vel per aluum copiosius excernat, atque inde vires deiiciantur, ut per contrariam partem materia reuclatur atque euacuetur. Nimirum si materia immoderate per inferiora excernatur per vomitum aliquid humoris euacuetur. Contra verò si æger immodice vomat, ut metuendum sit, ægrum inde periclitari posse, leniter purgetur. Talibus tamen vtendum, quæ simul nonnihil roborant, quale medicamentum est diacatholiceum cum pulpa tamarindorum. Idem ferè faciendum, si medicamentum malignum purgans & venenatum assumptum sit: abstergens nimirum, quod simul vomitum prouocat, exhibendum, ad quam rem utilis est aqua hordei. Postea

Dan. Sennerti Tom. II.

medicamenta, quæ peculiari vi malignitati & veneno illi resistunt, danda.

Non alia etiam euacuatio est, si materia aliunde ad ventriculum confluat. Quæ in fluxu iam est materia, permittatur, ut sponte sua moderate euacuetur, & potissimum ad partem, quò materia vergat. Imò leniter & blandè materia eò ducenda, atque euacuatio adiuuanda, si necessitas postulat. Verum enim & hic verum est, quod Hippocrates, 1. aph. 2. habet: *In turbationibus alui & vomitionibus, quæ sponte fiunt, si qualia oportet, purgentur, confert.* Ergo si materia vitiosa sit, ægerque id ferat, non sistendus statim est vomitus. Nam si is intempestiue cohibeatur, natura cum ægri periculo aliò transfert humores vitiosos. Si verò euacuatio continuetur, & plus, quam pro humoris in corpore redundantia opus erat, & quam vires sustinere possunt, euacuetur; motus ille nimius sistendus, quod fieri, si venter per idonea medicamenta roboretur, ut minus facile affluentes aliunde humores recipiat. Partis verò transmittentis intemperies & mala constitutio corrigenda, ipsique humores acres & expultricem stimulant temperandi, & vel ad cutim per sudorifera, vel per vrinæ vias, sed non per acriter medicamenta, auertendi, simulque idonea victus ratione, & per alimenta quantitate pauca, qualitate verò refrigerantia, & aliquantum adstringentia, similium humorum generatio præcauenda. Si itaque malum hoc ingrauescat, & euacuatio sit nimia, siue ex humoribus in ventriculo corruptis ortum habens qui vellicando stimulant expultricem partium vicinarum, vel etiam totum corpus in consensum trahunt, siue ex humoribus aliunde affluentibus proueniat, & Symptomata grauius ac periculum minantia accedant, fluxio sistenda, humores aliò reuocando, eisdem temperando atque adstringendo partem recipientem cum internis, tum externis.

Vt ergo Natura à doloris sensu & expellendi opere auocetur, & materia ad exteriora retrahatur, ligaturæ & frictiones artuum fortes instituantur; modò superiorum, si materia maiori impetu per aluum ruat; modò inferiorum, si vehementius per os; modò vtrorumque si æqualiter vtrique via præter modum exeat. Rhases quoque ad vehementem excretionis motum inhibendum, præsertim vomitionis, cucurbitam magnam cum multa flamma sine scarificatione ventriculo affixam vi reuellit, quam secundò aut terriò appositam, iterumque auulsam plurimum emolumenti ægro afferre affirmat.

Simul materia temperanda, partesque recipientes roborandæ sunt. Itaque si materia biliosa sit, æger valde sitiat & æstuet, Intybacea vtilia sunt, limones, mala citria, cydonia, mespila, succus & syrupus granator, citri, de portulaca, de agresta, ribes, de rosis siccis, emulsiō sem. 4. frig. maior. panis vix acerbæ, vel granator, vel cydonior. succo madidus, Rob. ribes, berber. confert. rosar. rubrar. vitriola imprimitis, ut

℞. Conseru. rosar. antiqu. acacia rob. ribes an. Vnc. β. corall. rubr. scrup. j. β. diacydon. sine speciebus vel cydon. condit. Drach. vj. Cum syrupo granator. F. Electuarium.

Vel ℞. Conseru. rosar. vitriolata diacydon. sine speciebus an. Vnc. β. santalor. omnium, boli Armeni an. scrup. j. Cum syrupo conseruationis myrobalanor. F. Electuarium.

Probatissimum & præsentissimum in cholera remedium est Crystallus, ut testatur Langius, lib. 1. Epist. 1. cap. 4. Cuius Drach. β. vel per se exhiberi potest, vel etiam electuariis & aliis medicamentis admisceri.

Si materia non ita calida fuerit, species arom. ros. nux moschata, succus absinth. & menthæ vel aqua eius addi potest.

Antiquis erat in vsu remedium, cuius etiam supra mentio facta est, quod coquitur ex succo granator. & succo menthæ. Rhases trochiscos de thure exhibet, quorum etiam descriptionem tradit.

Foris quoque refrigerantia & adstringentia ac roborantia adhibenda. Et sæpe ea utiliora sunt, quam interna, cum citra nauseam & ventriculi subuersionem officium suum præstant; assumpta verò faciliè nauseam pariant, & vomitu reiiciantur. Talia sunt succus endiuizæ, acetosæ, portulacæ, plantaginis, granator. ex toto pommo extractus, si cum farina hordei & pane misceatur & ventri imponatur, aut cydonia vel pyra in vino aut aceto cocta, lenteisque inducta ventri applicentur. Utiles etiam sunt fomentationes & inunctiones, quales supra de vomitu præcipuè bilioso traditæ sunt. Aut panis nuper coctus vino granat. madidus applicetur, vel Emplastrum de crusta panis, aut Diaphænicon.

Vel *℞. Panis tostus lb. ss.*

Coquatur in aceto & aqua, & addatur  
*mentha viridis M. ss.*

Omnia contundantur & per setaceum reiiciatur, addaturque

*Pulueris rosarum corall. crystalli an. Drach. j. F. Cataplasma.*

Si materia non ita ferueat, præcedentibus addi potest mentha, quæ ab Alexandro Tralliano, quod peculiari proprietate huic malo medeatur, commendatur; masticho, radix cyperi, venterque inungantur ol. mastich. absinth. menth. nardino.

Aut componatur Emplastrum, quod recipit.

*Medulla panis tostus in aceto & vino coctus lb. ss. menth. M. j.*

Per setaceum traiciantur & addatur

*Pulueris caryophyllor. nucis mosch. cinam. an. Drach. j. spicanardi, cyperi nucis cupressi an. Drach. ss. F. Cataplasma.*

Vires quomodo reficiendæ sint, ex Diæta patebit. Qua ratione autem Symptomatibus, quæ huic malo coniunguntur, vt conuulsioni, animi deliquio & syncope occurrendum sit, ex peculiari de iis doctrina petendum.

Si tamen medicamenta supra enumerata, & quæ symptomatibus occurrere debent, nil proficiant, viresque prosternantur, ad narcotica confugiendum. Quo in casu scrup. j. Drach. ss. Philonij Persici aut Romani, vel Laudani Opiati g. ij. vel iij. exhibere conuenit.

### Diæta.

Diæta.

Aër sit temperatus, non feruidus, ne Spirituum nimia fiat dissipatio, qui etiam ad vires reficiendas suauibus odoribus inficiendus est, sicut & naribus ad eandem instaurandas panis recens aqua rosar. vel vino madibus admouendus. Malo quiescente cibi boni succi & faciles coctu exhibeantur, ac proinde non probanda sententia Tralliani, qui ostreas commendat, quæ refrigerant quidè, sed sunt durioris coctionis. Probatum potius expressum carniū bonarum & præcipuè assatarum. Exhibeatur verò cibus singulis vicibus exigua quantitate, vt natura audior reddita facilius humores complectatur. Syncope imminente panis detur imbutus succo granatorum & vino, vel etiam solo vino, scribitque Trallianus, se multos nouisse, qui cholera ex humorum aut ciborum prauitate laborantes solo vino præter spem euaserunt: sed febrem adesse oportet. Cibi condiantur aqua rosarum, succo granatorum. Aspergenturque pulueres ex margaritis, coralliis crystallo, macere. Panis intingatur succo granator. citri, cydonior. ribes, aceto rosar. Laudatur & absinthium in potu sumptum, quod non solum ventriculum roborat, sed & prauitatem humorum corrigit. Si tamen hæc nil proficiunt, scribit Aretæus, lib. 2. acutor. cap. 4. Si omnia euomat æger, & stomachus nil retineat, ad calidas potiones veniendum esse. Calida verò calidissima, inquit, sunt. Si de causa huius auxilij quæretur, Auicenna scribit, ideo prodesset, quoniam calida, cum penetrant in venas, humores retrahant in ventriculum tendentes. Mercuria-

lis verò idè talia iuuare statuit, quod dissipent, euacuent & dissipare faciant humores. Mihi probabilius videtur, calida actu vomitum sistere, quod ventriculi calorem, qui in hoc affectu valde debilitatur, foueant ac roborent. Somnus in hoc affectu utilissimus est. Reliqua victus ratio medicamentis respondeant, & sit talis, qualis in vomitu curando propostæ.

## CAPVT XIV.

### De Cholera sicca.

**V**T in cholera humida, de qua hætenus dictum, humores per superiora & inferiora excernuntur, ita in sicca nihil liquidi vel per os vel per aluum & os erumpit, venterque cum dolore laterum distenditur, & spiritu illo flatuoso discurrente cruciatur, ac dolores varij in vniuerso excitantur, & partes, per quas spiritus transit, ob eius acrimoniam exasperantur & vellicantur, vt ita cholera sicca sit Spiritus flatuosi per inferiora & superiora excretio, cum inflatione ventris & strepitu, ac dolore laterum & lumborum.

Flatus autem ille aut Spiritus flatulentus vel ratione ventriculi vel ratione assumptorum generari à plerisque docetur. Ratione ventriculi, cum is ob igneum quasi, quo præter naturam præditus est, calorem cibos, licet ipsi omni vitio careant, ita corrumpit vt in nidorofam materiam & acres vapores conuertat: ratione verò alimentorum cum cibi ipsi acres & flatuosi sunt, seu rales, vt sint apti, vt in nidorofam substantiam mutantur, quales cibi sunt; raphanus, semen erucæ, oua frixa & similia. Verum enim verò etsi hoc interdum accidere possit: tamen si malum continetur, id quod 2. lib. Inst. part. 3. sect. 2. cap. 1. diximus & de affectione Hypochondriaca monuimus, hæc etiam locum habere posse censemus. Nimirum causam huius mali non solum in calorem ventriculi nimium, & alimenta praua referendum esse, sed etiam in bilem atram, prauosque humores ventriculo substratos in hypochondriis & venis Mesaraicis contentos, è quibus flatus & spiritus flatuosi eiusmodi generari possunt.

Quantum enim Spirituum copiam, sales & spiritus salini cum spiritibus acerbis permisti suppeditent, ex olei vitrioli & aquarum fortium cum sale tartari mixture apparet. Tale ergo quid etiam in corpore humano accidere, & ex humoris falsi atque adusti cum aliis spiritibus commixtione magnam Spiritus flatuosi copiam excitari posse, incredibile non est.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur autem cholera sicca ex iis, de eius natura dicta sunt. Vt autem sciamus, à qua causa originem habeat, inquirendum, quo genere cibi vsus si æger. Si enim bonis cibis vsus est, hinc colligitur, vel ratione affectus hypochondriaci, quæ signis discernere faciliè est, ortam esse. Si verò paruus cibus assumptus sit, vitio cholerae prouenire argumento est.

### Prognosticum.

Non tamen tam periculosum hoc malum per se est, sicut cholera humida, nec à flatibus erumpentibus tantum imminet periculum, quantum à crebra per aluum & ventriculū euacuatione. Si autem quid periculi metuendum est, id potius à primaria affectione accidit.

### Curatio.

Curandi ratio in duobus consistit, in spiritus flatuosi educatione & contemperacione, & in causæ, à qua spiritus ille flatuosus subnascitur, ablatione. Hippocrates,

res, 4. de rat. viſt. in acut. à text. 104. ad 109. vbi de hoc affectu agit, hanc curandi methodum præſcribit. Primò prohibet vomitum, cū præſupponat, materiã in inteſtinis contineri, parumque eius in ventriculo hætere, & flatum vomitu non diſcuti. Secundò iubet ventrem oleo ſubducere, vt cò retundatur acrimonia ſtatum, & tum ſtatu tum materia corũ per aluum educatur. Tertio ordinat balneum & perſuſionem olei & aquæ dulcis, quod & ad coctionem & attemperatõe ac diſcuſſionẽ actium ſtatum facit. Quarto ſomnum impetrat, qui coctionem promouet, & omnium cruditatũ maximum remedium eſt. Quintò vinum antiquum & meracius exhibet, quod & ad materiæ diſcuſſionẽ & ſtatum diſſipationem facit. Sextò ſi malum perſeuerat, oleum per os propinat, quod cum dulce & pingue ſit, acres ſtatu temperat, & aluum ſubducit. Septimò, vt coctio faciliſior fiat, ægrum abſtinere ab omni cibo & potu iubet. Non enim crudis cruda ſuperingerenda ſunt, & quies multum ad coctionem facit. Vltimò ſi malũ perſeueret, materiã peccantem enacuare iubet. In quem finem exhibet Lac aſini, quod cæteris omnibus medicamentis in hoc caſu præfert, cum ſimul euacuet & refrigeret. Si autem humorum corruptio talis ſit, vt ex cruditate nidoſa febris accendatur, qua ratione ea curanda ſit, docet Galenus, 8. meth. med. cap. 5.

perſeuerans  
chole-  
ram ſiccã  
retunditatio.

Ex quibus omnibus patet, choleram ſiccã rectiſſimè curari, ſi ſtatu educantur, diſcutiantur, temperentur, & cauſa eorum tollatur. Quod ſit, ſi primò iniiciatur Clyſter ex oleo dulci, vel ſem. lini receti vel chamæmelino, cui, pro retundenda acrimonia humorum, aliquid pinguedinis anſerinæ vel gallinæ addi poteſt. Aut ſi ſtatu valde moleſti ſint ac crucient, decoctum ad ſtatu conueniens paretur, eiſque oleũ amygdalor. dulcium addatur. Inungatur etiam ventriculus & abdomen, ſi aſſumptorum vitio hoc malum proueniat, oleo maſtichino, abſinthij, nardino & ſimilibus. Aut ſi id ventriculi calidioris ratione fiat, oleo roſar. vel etiam omphacino, quod Galenus, 4. de ſimpl. medic. fac. cap. 3. & 12. ad æſtuantia hypochondria commendat; aut paretur cataplaſma è pulpa cydonior. additis roſis rubris ſiccis, hypociftide, balauſtiis, farina hordei, quæ omnia miſceantur cum oleo roſar. & fiat Cataplaſma. Quod ſi adhuc dolor perſeueret, remedia exhibenda, quæ ſimul materiã temperare & euacuare poſſunt, quale eſt oleum dulciſſimum, aut ol. amygdal. dulc. recens, aut oleum lini recens exhibitum. Quod ſi horum uſu nondum ceſſat affectio, ad ſtatum diſcuſſionem & coctionem Hippocrates, vt dictum, vinum antiquum & meracum exhibet: Galenus Diatriopipereon, ſi ſcilicet ex aſſumptis, non ex ignea ventriculi caliditate ſit cruditas nidoſa. His omnibus non conferentibus materiã euacuanda. Ad quam rem clyſteres & alia lenientia vtilia ſunt, vt ſyrup. roſar. ſolutiuus, manna item cum oleo amygdal. dulcium in iuſculo vel vino Maluatico.

Dilect.

Viſtus medicamentis reſpondeat, & ſit talis, qui materiã temperare poſſit, vt priſana, ac pulli gallinacei, & eorum iuſcula, & id genus alia.

## CAPVT XV.

### De Doloꝛe & anxietate ventriculi.

Dolor Ventriculi.

HActenus abſoluimus Symptomata, quæ actionibus ventriculi propriis accidunt. Reſtant adhuc Symptomata, quæ circa communem cum aliis partibus actionem ipſi conueniunt, ſenſum tactus puta, dolor ſcilicet & ſtupor ventriculi. Habet enim ventriculus neruos à ſexta cõiugatione inſignes, ob quos etiã ſenſu inſigni præditus eſt, qui, ſi deprauatur, & obiectum ſit minus conueniens, dolor ventriculi oritur.

Eſt verò, ſi nomen ſpectes, ventriculi dolor omnem eius & omnium eius partium dolorem ſignificat: tamen vſus obtinuit, vt dolor ventriculi ſimpliciter ſic dictus

Dan. Sennert Tom. II.

de cuiuſcunq̃e in hoc partis dolore accipitur, excepto eius oriſicio. Huius enim dolor in ſpecie Cardialgia appellatur.

Cardialgia.

Cardialgia enim nomen accepit à Symptomate & loco affecto, id eſt, ore ventriculi. Nam καρδια Græcis Antiquis, reſte Galenò, 2. meth. med. cap. 2. os ventriculi eſt.

Vnde appellatur Cardialgia ob grauiffima Symptomata, quæ ex huius partis affectione oriuntur, ſimilia iis, quæ cordi accidunt, & cor ſtatim in conſenſum trahunt. De eodem dolore & καρδιαγῆς vox uſurpatur, qua alias etiã cordis crebriorem & celèrem motionem ſignificari ſupra diximus; de qua plura videantur in Oeconomia Hippocratis Foefij.

Apud Hippocratem, 5. aph. 57. etiam occurrit vox ἀλγῆς, & ἀλγῆς alibi, quam Galenus, in comment. de anxietate interpretatur. Deinde etiam recentiores ventriculi anxietatẽ nominant, cū ſcilicet cum dolore tantus angor & anxietudo coniuncta eſt, vt quemadmodũ Galenus 2. Pror. t. 44. & 5. de uſpart. cap. 5. docet, egri nequaquam ſe vno loco continere poſſint, ſed frequenter cogantur mutare locum & figuram, & ſitum omnem egre ferant, translatione ſumprã ab iis, vt Galenus 7. aph. 58. tradit, qui in negotiis ſuis adeo anxii & moroſi ſunt, vt ea, quæ præ manibus habent, ſemper quaſi faſtidiant, atque illis relictis mox ad alia tractanda ſe transferant.

Inuenitur & τῆς καρδιακῆς διατέως appellatio in definitionibus medicis, & Cardiaci mali nomen apud Celſum, lib. 3. cap. 6. quando languente oriſicio ventriculi corpus immoderato ſudore digeritur, ſudorque ſupra conſuetudinem & tempore & modo ex toto thorace & ceruice, atque adeo capite prorũpit, pedibus tantum & cruribus ſiccioribus atque frigidoribus. Tral- liano, lib. 7. cap. 9. ex mordicante ſimul & virulento in ore ventriculi humore ſit, vbi ſi os ventriculi ſit εὐαισθητόν, hominem repente nonnunquam ingulat malo communicato cum corde, vt ſyncope cardiaca ſue ſtomachica accidat, de qua ſuo loco dictum.

Hercules Saxonia equidem inter Cardiacam & Cardialgiam diſtinguit hoc modo, quod Cardialgia ſit ex humoribus erodentibus ſolum, non venenatis: Cardiacã verò ex venenatis erodentibus. Verum ſine authoritate id facere videtur. Mercatus diſtinguit inter cardialgiam, ſue dolorem oris ventriculi, & inter exſolutionem ventriculi, Cardialgiãque à ſolutione vnitatis & triſti ſenſu prouenire ſcribit, & eſſe mordicationem oris ventriculi: angorem verò ſue exſolutionem ſubſtantie oris ventriculi citra vllum doloris ſenſum fieri ab intemperie ſenſim & paulatim diſſipante & diſcutiente ſubſtantiam, quæ ſeparatur, & comitem ſemper habere febrem malignam, cum cardialgia plerumque febre careat, ſicut & ſudore diaphoretico; niſi in fine mali. Ad quem affectum pertinet & virium ſtomachi reſolutio à Beniuenio, de abdit. morbor. cauſ. & curat. cap. 66. deſcripta, quæ ab intemperie ventriculi accidit, vbi hitoriam Nobilis recenſet, qui cum calidior ventriculi habitu fuiſſet affectus, eum frigidis medicamentis curauit. Verum cum huiuſmodi affectus ſint ſine dolore ventriculi, non pertinent ad hoc caput, ſed potius ad intemperies ventriculi.

Omnino verò huc pertinet affectio illa, quam Attritionem ventriculi nominant, (ὀλίσθησις enim ventriculũ dicit Galenus) quam Galenus, de præcogn. ad Poſt- humum cap. 11. deſcribit, in Imperatore Romano, qui cum ventris torminibus & profluuiò tota nocte vexatus fuerat, atque Medici alij initium febris adſeſſe dicerent, id Galenus pulſu explorato negauit, atque ventriculum atteri ab aſſumpto cibo, antequam excerneretur, exæſtuanta affirmavit, atque nardino Vnguento cum lanã ventriculo appoſito, atque vino Sabino cum pipere eum ſanauit. Similem affectum ſibi bis tantum oblatum fuiſſe ſcribit Petrus Baiæns, lib. Pract. 11. cap. 9. Primò in Nobili quodam, qui cum cœnaſſet, totus

Attritio Ven-  
triculo.

BBB 3 frigidus

frigidus factus est, pulsus omnino contractus, ita ut vix sentitur, cum tanta angustia & compressione anhelitus, ut statim præfocari videretur, quem etiam oleo nardino calido ventriculo imposito & piperis Drach. j. cum vino exhibita sanauit. Deinde in pedissequa quadam, quam eodem modo curauit. Notandum autem hic, quod, loco allegato scribit Galenus, Imperatorem in hunc morbum incidisse, dum attereretur ventriculus *καὶ τὸ ἱεροφάνης φλεγμὰ παθεῖν περὶ τῆς ἐκκρίσεως*, id quod vulgo vertunt, *ab assumpto cibo, antequam excerneretur, exastuante*. Et quidem verum est, ut ex Oeconomía Hippocratis Fœsij patet *φλέγμα* sæpe ab Hippocrate & Galeno sumi pro inflammatione, & deriuata inde verba pro inflammati vsurpati: malim tamen hic exponere, ventriculum fuisse attritum vel afflictum à cibo in pituitam conuerso; id quod curatio indicare videtur: cum hoc malum calidis medicamentis, vnguento & oleo nardino ac pipere cum vino forti sumpto & Galenus & Bajerus curauerit. Et simile quid nuper in nobili viro animaduerti, qui etsi bene habere videretur, dum esset ieiunus, tamen horis à sumpto cibo quatuor vel quinque elapsis tantis ventriculi cruciatibus, qui ad dorsum se extendebant (vnde etiam à nonnullis pro calculoso fuit curatus,) & anxietate vexabatur, ut nullo loco quiescere posset, nec finis malorum erat, antequam cibus & potus vomitu reiiceretur, qui maximam partem crudus adhuc erat cum multa pituita. Hoc tamen non negarim, anxietatem hanc non provenire simpliciter à pituita, sed quatenus in flatu resolvitur, qui in ventriculo conclusi illam anxietatem pariunt.

Huc ergo pertinet etiam illa affectio, cuius Petrus Salius Diuersus *affectio. particular. cap. 12.* mentionem facit, quam adstrictionem ventriculi appellat, quamque solum Actium *tetrab. 3. ferm. 1. cap. 13.* describere putat, quæ, ut ipse statuit, fiat, cum & superius & inferius os ventriculi ita adstringitur, ut nec flatus nec vapores erumpere possint, nihilque extra corpus ob cutis adstrictionem vel exiccationem euaporare queat, qui vapores cum accenduntur, febris speciem præbeant; quæ tamen affectio perfecta coctione & descendente cibo solet quiescere.

Verum enim verò puto hanc affectionem etiam aliis non fuisse incognitam, & sub anxietate ventriculi comprehendendi posse, & fieri à cibo in phlegma, eoque porro in flatum conuerso: qui cum ob ventriculi orificium superius clausum erumpere non possit, neque etiam inferius ei, utpote non utili, sed corrupto, exitum det, in eo hærens & conclusus angustia huius causa est. Ut verò cutis adstrictio accedat, quod vult P. Sal. Diuersus, opus non est; cum flatus non per cutem è ventriculo, sed per eius orificia satis ampla erumpere soleant. Et quod conualescentibus, ut idem Salius scribit, hoc malum frequentius accidit, non fit ob exiccationem cutis, sed quod conualescentes habent ventriculum debilem, qui cum cibo, qui supra modum sæpe assumitur, operatur, cruditas talis accidit.

Verum cum affectus hi omnes, quocumque etiam nomine appellentur, in eo conueniant, quod sint sensus tactus deprauatus in ventriculo, & à solutione continui in eo ortum habeant, seu, ut verbo dicam, sint dolores ventriculi, de iis coniunctim agemus. Quia tamen est quædam differentia secundum locum affectum, ut & causam efficientem, de eo postea in differentiis dicetur.

Definimus ergo dolorem ventriculi sensum eius tristem seu molestum à causa continuum soluente excitatum; qui si sit in orificio præcipue, Cardialgia in specie appellatur.

Est nimirum dolor ventriculi Symptoma sensus tactus ventriculi, cuius subiectum sunt vel tunica ventriculi, quæ sunt membranosa, vel orificium eius, quod nervis maioribus & pluribus à sexta coniugatione descendentibus à natura donatum, ut animali

per hos sensus alimenti deficientis insit, quæ fames appellatur. Nam ut ex naturali suctione molestiam, & causam præter naturam dolorem sentiret, exactissimo sensu pollere oportebat. Vterque enim affectus & fames & *καρδίαλγία*, sunt orificij ventriculi: sed hæc est differentia, quod fames sit à suctione naturali, *καρδίαλγία* à causa præter naturam.

### Causæ.

Proxima equidem & continens causa doloris ventriculi est solutio unitatis in eo, quæ à re vel distendente vel mordicante oritur; mediata tamen causæ plures esse possunt. Soluitur enim unitas ventriculi vel propter morbos, vel propter causas morificas. Morbi sunt vel in ipso ventriculo, vel in vicinis partibus. Morbi in ventriculo sunt primò intemperies frigida, quæ ut nervosis aliis partibus, ita & ventriculo aduersa est, & dolorem in eo, cum rosionis sensu, accedente veluti animi deliquio, excitat. Eaque sæpe ortum habet ab externo frigore, si nudo ventriculo occurrat, præcipue in macilentis, imprimis dum calent & sudant. Eadem à potu frigidissimo, aquæ præsertim, contrahi potest; idque imprimis ubi corpus æstu calet. Deinde tumores & imprimis inflammatio, quæ ardentem dolorem excitat, de qua supra dictum, & multò magis Erysipelas: nonnunquam verò tumor durus magnus, aut callus vel scirrhus in eo genitus, qui dolorem gravantem parit, imprimis assumpto cibo. Tertiò soluta unitas & vulnera ac vlcera. A vicinis verò partibus dolore afficitur ventriculus, dum ab incumbenibus visceribus inflatis, obstructis, tumentibus premitur. Nonnulli etiam ab osse xyphode introrsum flexo ventriculum, imprimis cibo plenum & distentum, premi atque molestia & dolore affici posse existimant, qui tam diu durat, donec cibus coctus descendere, vel decubitu introrsum facto ventriculus ab osse hoc recesserit, de quo *lib. 2. part. 2. c. 26.* dictum.

Causæ verò morificæ, quæ dolorem ventriculi excitant, sunt vel internæ, seu intus genitæ, vel externæ. Internæ sunt vel flatus vel humor: Si flatus, isque in ventriculi capacitate conclusus, simplex dolor oritur è ventriculi distensione, de qua supra, *cap. de ventriculi inflammatione* dictum, ubi etiam causæ explicatæ, à quibus flatus ventriculum distendentes proveniunt. Si verò acris & feruidus halitus os ventriculi infestat, dolor pungens & mordax producit. Si verò sit humor, is vel copiam suam ventriculum grauat, vel qualitate prava & mordace, vel etiam maligna ventriculo molestus est. Et humor quidem, ut & flatus, vel in ventriculo gignitur, ab eius intemperie aliqua aut errore in victu, vel aliunde in ventriculum confluit. Et quidem ab humoribus in ventriculo genitis ortus dolor ventriculi aliàs sumpto cibo mox sedatur, aliàs post, aliàs etiam sumpto cibo exacerbatur & excitatur. Excitatur dolor ab assumpto cibo, cum humores crudi & mordaces ventriculi tunicis adhærescentes sumpto cibo agitantur & incalescunt ad cibi coctionem, aut qui in fundo ventriculi hærent, sumpto cibo eleuantur & ascendunt, atque ita commoti ad orificium ventriculi accedentes dolorem in eo excitant. In aliis, cum cibus coquitur, saltem halitus & vapores acres & mordaces eleuantur qui os ventriculi vellicant. Sedatur verò dolor cibo assumpto, vel quia est humor melancholicus, ut Avicennas censet, vel quia admistis cibis minus acris euadit.

Humores, qui aliunde affluunt in ventriculum, vel fluunt à toto, dum illud febre correptum est, ut fit in paroxysmorum principiis (quamquam & tum è vicinis locis confluere possint) aut citra febrem, dum corpus vel humorum copia aut qualitate vel symptomate aliquo p. n. aut inedia affligitur, de quibus videatur Gale-  
nus



*pus, 2. de articulis. 22. & 2. de rat. viſt. in acut. t. 44. & 2. de plac. Hippoc. & Plac. c. 8.* Vel ab aliqua parte & potiffimum ab epate, à quo bilis flaua & ichores bilioſi in ventriculū effunduntur, id quod præcipue per inediā accidit, aut liene ac vicinis locis, vnde humor melancholicus & ater, aut à capite, vnde pituita tenuis & falſa in ventriculū defluit. Vermes præterea in ventriculo ſeu geniti, ſeu ab inteſtinis ad eum adſcendentes dolorem excitāt. Tandem etiam lapides in ventriculo geniti dolorum ſæpe intolerabilium ventriculi ac diuturnorum cauſa ſunt. Cuius rei hitorias aliquot collegit Schenckius, *lib. 3. obſeru.*

Inter cauſas verò externas, ſiue ea, quæ extra aſſumpta dolorem ventriculi pariunt, ſunt primo cibi, vel qualitate moleſti & acres, qui in calidiori præſertim ventriculo ſingultum, roſionem & dolorem excitant. Et quod à cibo per ſe tali accidit, idem etiam à cibo aliàs non malo, ſed corruptionem paſſo & acrimoniam adepro fieri poteſt, puta à dulcibus, pinguibus, rancidis, & cibis facile corruptioni obnoxiiſ. Vidi etiam, qui dolorem ventriculi grauiffimum paſſus eſt à lacte in ventriculo coagulato, quo vomitu reiecto ſanatus eſt. Idem etiam à cibo quantitate nimia & copioſius deuorato accidere poteſt. Imò mulierem ſenem extinctam hæc de cauſa obſeruauit Platerus, quæ die Paſchatos carne & ouis nimium ventriculū repleuerat. Deinde idem accidere poteſt à rebus, quæ ventriculū grauare vel pungere poſſunt, vt nucleis ceraſorum vel aliis deglutitis, aut vitro, acubus, oſſibus & ſimilibus. Ita refert Guilielmus Fabricius, *cent. 4. obſeru. 33.* Matronam quandam, cum vltra duos annos de dolore ventriculi conqueſta eſſet, tandem vomitorio ſumto fruſtrum corii lardi fumo exſiccari, quod ante duos annos deglutiuerat, euomiſſe, & breui planiſſimè conualuiſſe. Sicut & dolorem ventriculi pariunt medicamenta & venena ſeptica, cauſtica atque exulcerantia. Item validiora purgantia ſine correptione maiori doſi exhibita.

### Differentia.

Quæ ſint doloris ventriculi differentia, facile ex iis, quæ haſtenus dicta ſunt, patet, & ſumuntur præcipue à loco affecto & cauſa efficiente atque hinc dependente modo & ſpecie doloris. Aliquando in ipſo ventriculo quædam compreſſio percipitur & diſtenſio, quā Germani *das Hertz druſten oder Hertz geſpan* nominant, qui dolor plerumque cum ventriculo poſtrato & nauſea, accidit, ſuperuenientibus etiam aliquando vomitibus & diarrhœa. Aliquando idem dolor in ventriculi ore conſiſtit, qui Cardialgia nominatur, qui etiam plerumque rodens eſt, & καρδιαγμος dicitur, habetque ortum ab humoribus acribus, cum in morbis quibuſdam, tum etiam in ſanis, *πικρόχολοι* nominantur, quibus eiufmodi roſiones familiares ſunt cum oris amaritudine. Dolor quoque aliquando rodens eſt, ex cauſa modò dicta, aliquando grauans à cauſa ventriculū diſtendente vel premente.

### Signa Diagnostica.

Symptoma hoc ipſum per ſe facile deprehenditur, ægerque de dolore conqueritur, locumque affectum indicat, niſi mens ſimul læſa ſit. Neque etiam animi deliquium & ſyncopen, quæ dolorem hunc ſequuntur, deprehendere difficile eſt; cum ægri quaſi exanimati & mortui iaceant, qui paulò antè de grauiffimo ſtomachi dolore fuerunt conqueſti.

Cauſæ verò peculiaria ſigna, quibus innotescant, requirunt, quæ ex iis, quæ ſupra de morbis ventriculi dicta ſunt, patent. Nam intemperies frigida vehementior è ſuis ſignis ſupra propoſitis cognoscitur; vt & tumores ventriculi vel partium vicinarum, & vulnera ac vlcera ventriculi. Flatus etiam deprehenduntur ex

iis ſignis, quæ ſupra de inflammatione ventriculi ſunt propoſita. Si humor ſit cauſa doloris, ex iis, quæ ſupra de intemperie ventriculi cum materia dicta ſunt, innotescit, præcipue humor bilioſus, qui frequentiffimè cardialgiā inducit, cognoscitur è linguæ amaritudine, nauſea & inappetentia, virium deiectione, ſyncope. Si materia è primis viis aut toto corpore confluat, vt in febribus fieri ſolet, & potiffimum in paroxyſmis earum, ac ſi humor ſit malignus, adſunt febrium malignarum ſymptomata. Venenatus & prauus vapor ab vtero ad ventriculū aſcendens cognoscitur è propriis vteri affectibus, imprimis è ſuffocatione, in quam mulieres frequenter incidunt; ex ſeminis & menſium ſuppreſſione. Vermes, aut venena aſſumpta, acus, ſpinæ piſcium deglutitæ & ſimilia è ſuis ſignis & ægri atque adſtantium relatione innotescunt.

### Prognostica.

1. Oris ventriculi dolos grauius malum eſt, quam ſimplex ventriculi dolor, ob partis huius ſenſum exquisitum, & cum corde ac cerebro conſenſum. Minus tamen periculofus eſt ventriculi dolor, qui ſit à cauſis externis, & qui ſit propter partis illius ſenſum exquisitum; niſi cauſa externa nimis vehemens ſit & graue aliquod malum attulerit; vlcus nimirum, putredinem aut inſignem corruptionem, aut qualitate malignā vires deſiciat.

2. Deterior verò eſt ille dolor, qui à cauſa interna, & ab acri mordaci humore excitatur. Peſſimus, ſi maligna & venenata ſit illi materia. Et omninò pro minori vel maiori materia, quæ cardialgiā excitat, prauitate, ſymptomatumque, quæ cum cardialgia cōiunguntur, grauitate aut leuitate, ſalus vel mors expectanda eſt.

3. Auget nimirum ſemper periculum ſyncope, quæ grauior, frequentior & abſque cauſa manifeſta accedit. Periculum verò minus eſt, quando leuior, minus frequens, & à cauſa manifeſta oritur.

4. Ita & febris periculum auget, præſertim continua & acuta, in qua magnus æſtus eſt circa ventriculū, proueniens à bile tunicis ventriculi impacta, de quo Hippocrates, *5. aph. 65.* in febribus circa ventriculū vehemens æſtus & καρδιαγμος malum. Magnam enim inflammationem ventriculi, vel copiā magnam humoris vitioſi in ore ventriculi contineri indicat, vnde febris intenditur, & malo cordi communicato ſyncope periculofa & ſæpe lethalis ſequitur.

5. Qui Cardiacō affectu laborantes os ventriculi admodum ſenſile habent, valde periclitantur, & ſæpe ſtatim intereunt, dum immodicam humorum roſionem ſuſtinere nequeunt.

6. Frequenter quoque lumbrici ad os ventriculi adſcendentes hoc malum & ſyncopen excitant, vnde nonnulli ſtatim, cum à lumbricis roduntur, intereunt. Alex. Trallianus, *lib. 10. cap. 9.*

7. In cardialgia ſi extrema frigent, periculofum.

### Indicationes.

Tota curandi ratio in duobus conſiſtit: in doloris, ſi vehementer vrget, mitigatione, & in cauſæ amotione. Dolor omnis anodyna indicat; & ſi nimis exquisitus ſit ventriculi ſenſus, obtundendus eſt. Cauſæ verò, quæ dolorem excitant, ſui amotionem indicant: quæ cum ſint diuerſæ, pro diuerſitate earum variæ indicationes oriuntur. Si dolor ortum habeat à cauſa externa, puta alimento vel medicamento ingeſto, illud ſeu vomitu ſeu per alium euacuandum eſt. Idem faciendum, ſi humores vitioſi in ventriculo redundant. Iidem ſi nimis acres & mordaces ſint, temperandi. Si materia maligna ſit, ſimul alexipharinacis oppugnanda. Quæ in tunicis ventriculi infixæ eſt, per reſoluentia, & validè exiccantia euacuanda, vt de intemperiebus ventri-

culi cum materia dictum. Admiscenda sunt hinc medicamenta adstringentia, quæ exsolutum quodammodo os ventriculi roborant, solutioni continui, unde dolor est, resistunt, dissolutionem calidi innati prohibent, materiam pravam ab orificio ventriculi ad partes inferiores protrudunt, & ne noua affluat, cauent, exiccant & incrassant, quæ reliqua sunt, ne tunicis ventriculi impingantur. Vnde Galenus, 5. de comp. med. sec. loc. cap. 7. inquit: Plurima horum, quæ per experientiam inuenta sunt, ex mista materia componuntur, ex adstringente videlicet & calefaciente. Vbi & veteres nonnullos reprehendit, qui in affectibus oris ventriculi, epatis, lienis & similibus, ac imprimis in horum inflammationibus, adstringentium vsum magno cum ægrotum detrimento omiserunt.

### Curatio.

Curatio.

Si ergo dolor vehementer vrgeat, ita vt non permittat primum aduersus causam pugnare, exhibenda sensum orificii ventriculi obtundentia, anodyna, aut etiam narcotica. Heberant sensum, quæ mucilaginosæ, pinguiæ sunt, ac vim emplasticam habent, qualia sunt oleum dulcissimum, oleum amygdal. dulc. recens, earum emulsio, emulsio sem. papau. albi, mucilago sem. psyllii, cydoniorum, maluar, amylium, lac. Dum verò malum magis vrget, stupefacientia & narcotica vsurpanda, vt syrup. de papauere, diacydon. Philon. Rom. trochisci de carabe, pilulæ de cynoglossa, requiruntur Nicolai, quorum dosi raro Scrup. j. excedit, laudatissimum opiatum. Post horum tamen vsum & dolore sedato, calefacientibus & roborantibus calorem ventriculi horum vsum nonnihil debilitatum iterum roborabimus. Somnus quoque mirum in modum dolorem sedat, & calorem ac spiritus reficit, modò spiritus non nimium sint antea debilitati, & ægroti horum medicamentorum vim sustinere possint. Ideoque primò lenioribus & quidem externis vtendum, & per frontis ac narium illinitionem somnus prouocandus. Quod si hæc non proficiant, modò dicta narcotica adhibenda.

Quod si causa externa, alimentum scilicet aut medicamentum, dolorem produxerit, per aluum aut vomitum reicienda. Idem faciendum in venenis, quæ commodissimè per vomitum reiciuntur. Si dolor sit à causa interna, humore scilicet prauo, idem faciendum, & materia vel per aluum vel per vomitum euacuanda. Tutius tamen est, humores vitiosos per aluum, quam per vomitum euacuare. Metuendum enim, ne si per os reiciantur, ventriculi orificium magis offendant. Et cum humorem ob eius acrimoniam & doloris vehementiam tutò euacuare non licet, eius acrimoniam temperare conuenit, modo, qui sæpè iam expositus est. Quæ etiam sint medicamenta ventriculum euacuantia, supra de Intemperiebus ventriculi cum materia est expositum, quæ hinc repetere opus non est.

Postea os ventriculi cum internis tum externis adstringentibus roboretur. Intus roborant, præsertim cum febris adest, rob. & syrupus cydonior. de agresta, de rosis siccis, de granatis, acetositis, citri, conseru. rosar. corall. margaritar: ex quibus composita etiam supra sunt proposita. Galenus, 7. meth. med. cap. 11. & alibi mulsam dat, in qua absinthium sit decoctum, quod medicamentum & bilem euacuat, & adstringendo roborat. Extrinsecus, vt Aëtius docet, conueniunt folia rubi cum pane, item myrti folia & bacca, aut pampini vitis aut folia plantaginis cum pane, aut mala cydonia cataplasmatibus modo stomacho imposita.

Vtilis est & Fomentatio ex vino rubro cum rosis, absinthio & mastiche parata.

Vel ʒi. Flor. ros. rubr. chamamel. summitat. absinth. an. M. j. Coqu. in vino rubr. pro lb. j. ʒ. Fiat Fomentum.

Vel ʒi. Absinth. flor. chamamel. ros. rubr. menth. ana M. j. Coqu. in aqua lb. j. ʒ. Adde spec. diarrh. abbat. aromas.

rosar. an. Scrup. ij. aceti rosar. Vnc. ij. Fiat Foment.

Quod autem Galenus, 8. de comp. med. sec. loc. cap. 1. iubet adstringentia præmittere ante purgationem, quemadmodum & Trallianus, id quidem locum habet, vbi ob immoderatam caloris naturalis dissipationem syncope adest vel imminet, vt dissolutionem nimiam prohibeat. Aliàs quando à syncope metus non est, vacuantia adstringentibus præmittenda.

Exhibenda quoque alimenta optimæ substantiæ. Nihil enim citius pravam qualitatem compescit & temperat, quam admistio alimenti optimæ substantiæ.

In dolore ventriculi ex pituita Galenus cuidam beatam & porrum cum sinapi exhibuit; quorum ope incisam pituitam largiter is per aluum excreuit, atque sic sanatus fuit, de alim. fac. cap. 1. Aliàs vtile est, bis teruè vomere ex oxymelite cum succo raphani, & postea hiera & agarico aut terebinthina purgare, & reliquias medicamentis ventriculum calefacientibus absumere.

Verum de Hiera, quam in doloribus ventriculi à frigida materia, aut flatu ex ea genito ortis Galenus commendat, notandum, quod tardè operatur, & dum in viscida materiam ventriculi tunicis adhaerentem agit, halitibus inde excitatis facit, vt venter distendatur & dolor augeatur. Ideoque consultum esse, aliud purgans admiscere, quod vires Hieræ intendat, & operationem acceleret.

Si res aliæ in ventriculo hærentes dolorem in eo excitent, commodissimè vomitu reiciuntur. Ita, vt supra dictum, Guilielmus Fabricius refert, Matronam quandam, cum duos annos de dolore ventriculi conquesta esset, nec ullis remediis sanari posset, tandem exhibitio vomitorio frustum corii lardini fumo exiccato, quod ante duos annos deglutierat, euomisse, & breui planissime conualuisse.

Si flatus infestent, curatio instituenda, vt de inflammatione ventriculi dictum. Nimirum post aliquam doloris remissionem ventriculo fomenta adhibenda, è decocto chamæmeli, menthæ, anethi, absinth. cum vino dulci. Clysteres etiam flatus discutientes iniicere non inuile est. Postea ventriculo cucurbita affigatur, modò humoris crudi & pituitosi copia non sit in ventriculo. Hic enim si adsit, & magnum dolorem excitet, prius euacuandus est. Vtile est & Theriacam veterem medicamentis admiscere, item ol. anisi & carni, & similia flatus discutientia exhibere. Commendant nonnulli in hoc affectu allii esum, ab aliis verò, vt ab autore, 4. de rat. vult. in acut. 1. 90. damnatur, quod æstuationem & dolorem ventriculi pariat. Sciendum autem, si magna adhuc humorum copia adsit, ab allio abstinendum, cum iis agitatibus & resolutis plus flatum generet: si verò soli flatus adsint, allium ad eos discutiendos vtile est.

Si humor aut vapor malignus aut venenum assumptum causa cardialgiæ sit, alexipharmaca simul vsurpentur, & inter cætera etiam Theriaca, si febris absit, vel non valde vrgeat: & de hac in libro de theriac. ad Posthumum, & de theriaca ad Pisan. c. 11. scribitur, quod cardiacos, dolore ventriculiliam deficientes, exhibita quasi ad viam reuocant. Theriaca enim & antidoti magnæ aliæ resoluunt, exiccant, dissolutionem calidi innati prohibent, vim alexipharmacam habent, oris ventriculi ac cordis robur tuentur.

Si humor ex epate vel liene, vel aliunde etiam ad ventriculum effundatur, illarum partium habenda est ratio, humores ad ventriculum fluentes aliò avertendi.

In dolore ex inflammatione ventriculi lenientibus opiatorum aliquid, sed ià minima quantitate, admiscere interdum vtile est, vt sensum stupefaciant, & molestiam ex acrimonia humorum calidorum mitigent.

Si sudores syncopici vires deficiant, sistendi inunctionibus ol. rosar. cydonior. myrrino aut aspersione quæ rosar. & æris frigidi per flabellum aspirationes, qui aer ipse sit frigidior naturæ, vel arte concilietur, vt

Hiera in doloribus ventriculi.

l p. 1. c. 1. cum parandi ratio exposita est.

Commendantur etiam quædam, quæ occultis proprietatibus contra cardialgiæ prodesset perhibentur, ut corallia suspensa supra ventriculum, cochleæ marinæ in puluerem redactæ, & in vino sumptæ, tunicæ Gallinarum ventriculi.

Nec hoc omittendum, si vicinarum partium, ut epatis, lienis, coli, septi transversi tumore ventriculus comprimitur, curationem ad partes illas dirigendam esse. Nisi enim hic affectus tollatur, frustra in dolore stomachi, & plerumque accedente difficili respiratio- ne tollenda laboratur.

Quod si à cartilagine *ἐνδοστέϊ* introrsum flexa & ventriculum comprimente sit dolor stomachi, cura- tio è *libr. 2. part. 2. cap. 26.* petenda. Sed plerumque in- curabile est hoc malum, & post cibum sumptum adeo graue euadit, ut ægri nullam doloris remissionem ha- beant, donec supini recumbant, quo modo ventricu- lus à cartilagine comprimente recedit, vel cibis coctis ventriculus subsideat.

#### Dieta.

Aër sit temperatus. Cibus sit boni succi, & qui non facile corumpitur, & qui acrimoniam humorum, si quæ adest, obrundit, ac orificium ventriculi roborat. Vtilis igitur est in humoribus actibus, à quibus fre- quentius hoc malum orrum habet, panis succo gra- natorum vel agrestæ, vel vino tenui imbutus. Con- uenit & cremor hordei cum succo granatorum. Tra- lianus primò offert cum grana mali granati, tum eius succum, poma item & pyra adstringentia, panem ex a- qua frigida, vinum austorum. Postea cibus vti iubet, quidem sunt boni succi, difficilis tamen coctionis, ne calori illi ingenti in ventriculo cedentes corrumpantur, & qui acres humores simul temperent, cuiusmodi sunt carnes boni succi, auculæ montanæ & similes, succo citri & granatorum conditæ. Tempestiuè quo- que æger cibandus, ne inedia grauiora mala attrahat, & ubi vires debiles sunt, parum vini detur, tenuis, albi, subadstringentis. In causâ verò frigidâ victus sit cale- faciens atque exiccans, & propterea conuenit vinum generosum, si non adsit febris. In cibus vtilis ruta, satu- reia, cinamomum & similia. Somnus sit moderatus, & potius longior, quàm breuior. Quies vtilis est; cum hoc malum motu exasperetur, & humores agitentur. Aluus quotidie suum officium faciat.

### CAPVT XVI.

#### De Ardore Stomachi, & ventriculi resolutione ac stupore.

Doloris ventriculi peculiari species est, quæ tamen simul etiam œsophagum molestat, quam *τὸ σπαστικὸν καύσωνα*, ardorem stomachi & nonnulli ardorem stomachi ebullientem, Germani *den Sode* nominant, quando ardens quidam dolor in ventriculo & gula percipitur, qui vrendo quasi molestat. Malum hoc sa- nis aliquando etiam sæpe familiare est, cum cibo sum- pto, tum ieiunis; & imprimis cum eructare volunt, in- tercluso quasi flatu igneo & erumpere non valente. Nonnunquam tamen & in febribus biliosis accidit.

#### Causæ.

Causa mali est halitus acris, qui è bilioso humore, aliàs flauo, aliàs porraceo, aliàs æruginoso, aut corrupto & nidoroso cibo eleuatur, & dum erumpere cogitur per œsophagum, ibi hærens eum & ventriculi orificiū quasi vrit, quo dissipato, & malum cessat, sed sæpe mox simili flatu redeunte iterum affligit, donec vel coctio sit absoluta, vel assumptis cibis & medicamentis acri- monia humoris temperetur ac sedetur. Solet enim ma-

lum hoc nunc diutius durare, nunc citius sedari, prout materia, quæ halituum fomes est, nunc copiosior est, nunc paucior, crassior vel tenuior.

Fit autem ebullitio hæc præcipuè, dum cibi coctio accidit, & imprimis si valido corporis motu ventricu- lus turbetur, & quæ in eo sunt, agitentur. Tunc enim quasi quædam ebullitio fit in eo, è qua halitus acres & flatus sursum ad stomachum & gulam eleuantur. Fit verò hoc è cibo natura sua acri, ut cœpis, porro, allio, caseo putri, imprimis in iis, qui sunt *πικρόχολοι* & cali- diore ventriculo. Idem accidit etiam ab aliis cibis, qui vel facile corrumpuntur, vel in bilem abeunt, ut sunt dulces, pingues, rancidi, fructus horarij.

Cæterum si quis ebullitionem, vel ebullientem istum dolorem, quem vulgo *den Sode* nominant, & ar- dentem dolorem pro eodem habere velit, (si enim dif- ferentia inter hos constituenda, hæc quæ de ardente ventriculi dolore dicuntur, ad caput præcedens referen- da erunt) etiam bilis flaua & atra huius mali causa esse possunt, si pertinaciter ventriculo adhæreant. Bilis au- tem hæc in ipso ventriculo generatur ex assumptis, ut modò dictum, vel in illum per duodenum effunditur, & huc in eo dolorem excitat, in *πικρόχολοις* præsertim, iisque maximè ieiunis. Et quidem dolorem hunc diu- turnum etiam fieri posse, docet Platerus, si ipsa ventri- culi substantia bile quasi imbuatur; quod interdum ac- cidit, quando ob contactum bilis vesiculæ ventriculi regio illi incumbens & contigua afficitur; croceoque colore tingitur, maculaque crocea ad internam illius membranam quandoque penetrat, quod sectione in il- lis, quibus ardor ventriculi perpetuò ferè molestus erat, sese deprehendisse, testatur. Idque iis facilius ac- cidere statuit, quibus copiosior bilis in vesicula colli- gitur, eaque dilutior, ut transudare possit, ventriculum- que vicinum tingere. Quod eò facilius accidit, si ven- triculus in erapula deditis cibo perpetuò distentus sit, ut & in iis, qui scribendo, aliudve agendo corpus in- flectunt, ut ventriculus bilis vesiculam comprimat, at- que ex ea bilem quasi exprimat.

#### Signa Diagnostica.

Malum ipsum per se manifestum est, atque ægri de quodam quasi ardore in gula conqueruntur, & sæpe in ore amaritudo percipitur. Sitis est molesta, actus ad- sunt nidorosi, appetentia est deiecta.

Signa. *Il semble qu'il y ait un peu de bile dans la bouche. Il y a une amertume dans la langue. Il y a un mal de gorge.*

#### Prognosticum.

Malum ipsum per se quidem non periculosum est: Prognosticū. molestum tamen. Causa verò à qua pendet, non ne- gligenda.

#### Curatio.

Curatio duobus perficitur. Primum est, ut ardor il- le sedetur; alterum, ut causa ista tollatur, ne idem ma- lum reuertatur.

Curatio.

Prius perficitur iis, quæ feruorem illum humorum temperant, & ebullitionem tollunt. Vnde datur sili- qua, conserv. rosar, fructus acidi & eorum succus, ut malum citriū, granatum, herberis, vinum absinthites, panis medulla aceto & aliis succis acidis imbuta. Vel *℞. Conserv. vitriolar. Vnc. ss. cydon. condit. Drach. ij. rob. ribes Vnc. ss. spec. diatriopsant. diarrb. abbat. an. Drach. ss. Syrup. cydon. q. s.*

F. Electuarium.

Imprimis verò vtilia sunt, quæ istam ebullitionem tollunt, humorem quasi imbibendo & præcipitando, vel ut facilius deferueat, faciendo, aut eius qualitatem tollendo. In quem finem præcipuè commendatur creta alba, quam vulgus etiam inter *ἐνρόπισα* numerat, nux moschata, bolus Armen, oculi cancri, cornu cerui, lapi- des carptionum, grana thuris.

Hinc sequentia commendantur,

℞. Nuc.

℥. Nuc. mosch. Drach. j. creta. Drach. ij. sacch. Drach. iij.  
F. Pulvis. Dosis Drach. β. vel Dr. j.  
℥. Nuc. mosch. macis rosar. an. Vnc. β. sacch. alb. Vnc. j.  
creta Drach. ij. F. Pulvis.  
Vel ℥. Nuc. mosch. Drach. β. craci g. ij. cornu cervi vsti  
scrup. ij. creta Drach. β. sacchar. in aqu. portulac. dissoluti  
q. s. F. Rotulæ.  
Vel ℥. Creta Vnc. j. boli Armeni scrup. ij. ros. rubr. mar-  
garit. præp. an. Drach. β. macis scrup. j. sacch. alb. in aqua ro-  
sar. dissol. q. s. F. Morfili.  
Vel ℥. Conserv. ros. vet. Vnc. j. ocul. ☉ præpar. boli Ar-  
meni an. Drach. β. Cum syr. conserv. nuc. mosch. F. Electua-  
rium.

Ventriculi  
supor.

Hoc loco vitij, quod dolori contrarium videtur esse,  
mentio etiam facienda, quod stuporem ventriculi no-  
minant, ut apud Forestum, lib. 8. obs. 28. videre est, cum  
vis in stomacho attrahens læditur, simulque sensus ta-  
ctus vel minuitur vel aboletur.

Verum sensus appetitus inest præcipue orificio ven-  
triculi & dictum de eius læsione supra, ubi de cibi &  
potus appetitu læso actum. Vis verò attractrix præci-  
pue in Oesophago viget, de cuius læsione etiam supra  
dictum de deglutione læsa, ut plura de iis hic adde-  
re opus non sit.

## C A P V T XVII.

De Excretis præter naturam è Ventriculo, &  
eius qualitatibus mutatis.

Atque fuerunt Symptomata, quæ ventriculi actio-  
nibus accidunt, restant adhuc duo; excreta præ-  
ter naturam, & qualitates mutata, de quibus pauca di-  
cenda.

Excreta p. n.  
è ventriculo.

Excreta quod attinet, ventriculus equidem non fa-  
ctus est, ut per eum vlla fiat excretio; sed Chylifica-  
tionis organum est, quod cibum retinet, coquit, mu-  
tat, & tandem coctum & in chylum transmutatum per  
inferius orificium ad intestina transmittit.

Interdum tamen etiam natura eò abutitur ad humo-  
res vitiosos, qui seu in eo sunt geniti; seu è corpore ad  
eum transmissi, euacuandos, quod vomitu fit. Id ergo  
si cum commodo naturæ sit, tolerari potest ea euacua-  
tio, neque ita valde præter naturam est. Interdum ta-  
men accidit, ut res planè præter naturam è ventriculo  
eiiciantur, de quibus equidem supra, atque etiam in-  
ter actiones ventriculi læsas, expultricem scilicet, facta  
est mentio. Quatenus tamen res ipsæ planè præter na-  
turam, sunt, earum etiam hoc loco inter excreta p. n.  
facienda est mentio.

Sanguis vo-  
mitu reiectus.

Compertum verò est, sæpe sanguinem per vomitum  
reiectionem fuisse, de quo supra etiam de sanguinis vom-  
itu dictum. Ut saltem pauca addamus, etsi sanguinis vo-  
mitus aliàs toto genere p. n. sit, statis tamen tempori-  
busdam accidere, imò salutaris esse solet. Ita san-  
guinis profluvium per os stato tempore accidisse Ma-  
crino Visco Viro Prætorio, & omnibus annis Volusio  
Saturnio Urbis Præfecto, qui 90. tamen annum excelsit,  
refert Plinius, lib. 11. cap. 38. Sic scæminam quandam,  
quæ 58. annum excesserat, quotannis dolore, hypo-  
chondriorum corripit solitam, spontaneo sanguinis vo-  
mitu ab eo liberatâ fuisse, scribit Langius, lib. 1. Epist. 58.

Menses vom-  
itu reiecti.

Menses per vomitum à scæminis fuisse reiectos, à  
multis observatum, refertque idem Langius, loco alle-  
gato, Mulierem Florentinam, quæ cum intolerabili  
capitis dolore affligeretur ex retentione mensium, his  
vomitibus reiectis conualuisse, & ne morbus recrudescer-  
et, venæ sectione sibi cauisse. Similem historiam refert  
Brassa vol. ad aph. 31. sect. 5. Beniuentus etiam, de abdit.  
morb. & sanat. caus. cap. 41. refert, Scæminam quandam  
acerbissimo capitis dolore ob mensium suppressionem  
laborasse, à quo fuit liberata mensibus vomitu reiectis;  
quam sanitati restituit solâ venæ, quæ sub talo est, se-  
ctione. De via si quæretur, plerique quidem statuunt,

per venam matricis, quæ à caua oritur, sanguinem in  
Epar, & inde in ventriculum per venas, quæ eius ori-  
ficium & fundum ambiunt, effundi. Hieronymus Reuf-  
nerus verò, ad caput 31. Iodoci Mellichij de urinis, sta-  
tuit, Venas vteri cum mesenterij venias anastomosi ma-  
nifesta committi, per quam in intestina & ventriculum  
transponatur sanguis menstruus. Possunt tamen etiam  
humores ad ventriculū ab vtero transmitti per arterias.

Res etiam alias præter naturam admirandas & mon-  
strosas per ventriculum reiectas fuisse observatum est,  
& dictum de eo supra, nimirum clysteres, glandes, alui  
excrementa, vermes, crines, pannos, clauos & similia,  
de quibus omnibus videatur Schenckius, lib. 3. obser. ubi  
de vomitu agit. Guil. Fabricius, cent. 2. obs. 41. refert, ado-  
lescentem in pago quodam prope urbem Metam longo  
& intricato morbo detentum fuisse, tandemque paten-  
tes, Necromanticum accessisse, cuius consilio cum vo-  
mitoriū hausisset, aciculas, clauiculas, euspides cultel-  
lorum, aliaque ferramenta plurima eiecit, & breui  
conualuit.

Tandem Qualitates mutatas quod attinet, equidem in  
corpore viuente percipi non possunt: in mortuorum  
tamen ventriculis reportos fuisse colores alienos, ob-  
servatum. Ita post intemperstium vsum magisterij per-  
larum tunicas ventriculi nigras repertas fuisse in Ca-  
sparo Logo, Episcopo Vratislaviensi, testatur Iohannes  
Crato, in Epist. à Scholtzio collectis Epist. 163. Et Pla-  
terus observauit in ventriculo cuiusdam maculam ni-  
gram. Idem interdum à bilis vesiculâ incumbente  
ventriculum flauo colore tinctum fuisse annotauit.

Res monstru-  
se per vomitum  
reiectæ.

Ventriculi  
qualitates  
mutata.

## LIBRI SECVNDI P A R S II.

### DE INTESTINORVM Morbis ac Symptomatibus.

#### P R Æ F A T I O.

**C**HTLV M in ventriculo coctum intestina acci-  
piunt, eumque amplius elaborant, & si quid in ven-  
triculo non bene elaboratum est, ulteriore coctione perfici-  
unt, & quod in eo vtile est ad corpus alendum, per an-  
fractum illum longum à vasis Mesaraicis attrahendum, &  
ad Epar ac lienem transmittendum distribuunt; tandem-  
que quod inutile est & corpori alendo ineptum, ad alium  
transmittunt, & per eam deiiciunt.

Ad quas actiones cum mora quadam & temporis spa-  
tium requiratur, vim retentricem etiam intestina obtinent.  
Neque enim feces ab utili succo separatas accipiunt è Ven-  
triculo intestina, sed chylum inutilibus partibus permixtum,  
qua demum in Intestinis separantur, & quod vtile est, è  
Mesaraicis vasis attrahitur, inutile verò in feces alui mu-  
tatur.

Sunt autem Intestina numero sex; tria tenuia, duode-  
num, ileum, ileum: tria crassa, cæcum, colon & rectum,  
de quibus videantur Anatomici. Ut autem quæ diximus  
præstent, suam naturalem temperiem habent, suam confor-  
mationem, suam sedem ac locum, & alia, quæ ab Anato-  
micis prolixè describuntur. Habent præter ea & sensum ex-  
quisitum & Spiritus animales à nervis sexta coniugationis  
accipiunt. Venas etiam habent à vena porte: arterias par-  
tim à celiacoramo, partim ab utroque mesenterico. Bilio-  
sum præterea excrementum, à quo facultas intestinorum  
ad expellendum irritatur, à vesicula fellis accipiunt.

Atque hæc omnia cum bene se habent, chylus ad vasa me-  
saraica rectè distribuitur, fecesque debito modo expelluntur.  
Multis tamen morbis præter naturam afficiuntur: Imtempe-  
rie scilicet frigida, calida, humida, sicca, cum & sine mate-  
ria. Inflamur etiam & in maiorem molem distenduntur.

e omni



contra angustiam patiuntur ac obstruuntur: Lanitatem etiam præter naturalem acquirunt: Res p. n. in iis generantur. Interdum situm mutant & conuoluntur, ut in hernia intestinali & umbilicali: vulnerantur: Sphacelam patiuntur. In specie verò Intestinum rectum, & quæ sunt in co-sphincter & hemorrhoides, patiuntur rhagades, condylomata, fici, ulcera, fistulas. Anus etiam quandoque coalescit.

Hinc postea varia sequuntur Symptomata, coctio læsa, motus Intestinorum inuersus, dolor Intestinorum, alui re-tentio, fluxus alui varij, fecum alui per aliena loca excre-tio, res alienæ per aluum excreta, ventris murmura, ani paralysis & sensus amissio, tenesmus, ani pruritus, hemor-rhoidum dolor, fluxus, suppressio, de quibus iam ordine dicendum.

## SECTIO PRIMA.

## De Morbis Intestinorum.

## CAPVT I.

## De Intemperie Intestinorum, &amp; primò de frigida.

Intestinorum  
intemperies  
frigida.  
Causa.

Requenter satis intestina intemperie frigida labo-rant, quam ab iisdem ferè causis contrahunt, à qui-bus ventriculus refrigeratur. Quod etiam faciunt crudi succi, qui cum ex ventriculo, tum vicinis membris alijs in ea effunduntur, & omnino omnes causæ seu inter-næ seu externæ, quæ seu per accidens ea refrigerandi earumque calorem imminuendi vim habent.

## Signa Diagnostica.

Signa.

Cognoscitur Intemperis Intestinorum frigida è do-loribus & flatibus, qui in iis generantur, & imprimis excreta per aluum eorum intemperiem & coctionem læsam patefaciunt, quæ cruda sunt & non satis cocta, ac pituitosa.

## Prognosticum.

Prognostici.

Prout maior vel minor est frigiditas & causarum eam inducentium maior vel minorvis, ita etiam peri-culosus vel minus periculosum malum est.

## Curatio.

Curatio.

Generalia in  
Intestinorum  
curatione ob-servanda.

In genere autem de intestinorum morbis curandis obseruandum, etsi non eam dignitatem habent inte-stina, quam ventriculus; & ignobiliora videntur: tamen eorum robur etiam modicè adstringentibus conser-uandum; cum chylum aliquandiu retinendi & conco-quendi vim habeant. Vbi tamen crassi & visceri humo-res iis inhærescunt, adstringentia vtilia non sunt; cum eos magis impingerent. Cum etiam sensum satis exqui-situm intestina obtineant, ea, quæ ipsa irritare possunt, quale est oxymel, vitanda.

Quæ autem adhibentur iis remedia, si graciliorum gratia dantur, commodissimè per os exhibentur; cras-siorum verò causa per clysteres iniiciuntur; etsi & per os exhiberi possunt, quæ tum validiora requiruntur: cum vis eorum in via infringatur. Et cum quæ per os dantur medicamenta in morbis Intestinorum, primò à ventriculo excipiantur; videndum, ne vltò modo eum lædant. Et quæ extra applicantur, ita applicari debent, ne ventriculum tangant, nisi is simul eadem intempe-rie laboret.

In specie verò Intemperiem frigidam quod attinet, intemperies frigida calida requirit.

Intestina ca-lidissima.

Calefaciunt ea: mentha, absinthium, cuminum, piper,

zingiber, bacca lauri, sem. carui, Diatrion pipereon, Diani-sum, El. de bacc. lauri, theriaca & alia supra de intemperie frigida ventriculi proposita, cum intus assumenda tum extra applicanda.

Paulò tamen calidiora eligi debent, vel in maiore quantitate exhiberi; cum in via vis illorum nonnihil alteretur.

Extra applicentur sacculi ex milio, ruta, sale calefa-ctis, item cineribus calidis; lapides etiam serpentini ca-lidi; olea; mastichinum, mentha, rutaceum, absinthij, ane-ebi, Emplast. de bacc. lauri.

Clysteres quoque iniiciantur è ruta, calamintha, ane-ibo, fl. chamemeli, bacc. lauri, sem. carui præcipue in vino decoctis, oleo rutaceo, chamamel. irino, laurino & simili-bus, El. de baccis lauri. Clysteres item è Maluatico.

Victus ea ratio instituat, quæ in ventriculi intem-  
perie frigida est proposita.

Diatæ.

## De Intemperie Intestinorum Calida.

Rarior est intemperies Intestinorum calida. Indu-cuntque eam causæ, quæ ventriculum calefacere pos-sunt, & humores calidi ex vicino mesenterio vel Epa-re, vel etiam venoso genere in ea affusis.

Et cognoscitur maximè è fecibus: alui siccis & aluo tardiore.

Intestinorum  
intemperies  
calida.

Signa.

## Curatio.

Calida intemperies frigida requirit: qualia sunt; endinia, lactuca, portulaca, hordeum, semina frigida maio-ra, viola, rosa, ribes, cerasa. Quæ cum ore sumenda ex-hibentur, cum per clysteres iniiciuntur; tum extra ap-plicantur. Vtiles sunt & acidulæ, quæ calidam intesti-norum intemperiem corrigunt, simulque ea robo-rant.

Curatio.  
Intestina re-frigerantia.

## De Intemperie Intestinorum Humida.

Humectant intestina etiam causæ omnes, quæ Ven-triculi intemperiem humidam inducere valent.

Cognoscitur ex aluo fluidiore & fecibus liquidio-ribus.

Intemperies  
humida.  
Signa.

## Curatio.

Intemperies humida siccantia requirit: quæ forma liquidiore commodius exhibentur, cum facilius ad Intestina penetrent. Talia sunt cormentilla, pentaphyllum, plantago, salvia, myrtilli, cydonia, sumach, corallia, quæ vino cocta aut ex vino vel aqua chalybeata forma po-tus exhibeantur. Vtiles etiam sunt; Conserua. rosar. rubr. betonica, salvia, condita cydonia, mespila, syrupus, myrtinus, de rosis siccis. Vel per clysteres decocta ex his facta ini-ciuntur: vel extra applicentur forma sacculi ex mi-lio, rosis, balaustris, myrtillis, sale, auena; Cataplasmiata è carne cydoniorum, pyrorum syluestrium, cornorum; sorbo-rum, in vino rubro coctorum; farina fabarum, lupinorum lentium; Inunctiones ex ol. rosac. myrtino; Emplastrâ, vbi in vsu Diaphanicum calidum & frigidum.

Curatio.  
Intestina  
exsiccantia.

Victus etiam ratio sicca sit, potusque paucus.

Diatæ.

## De Intemperie Intestinorum Sicca.

Sæpè etiam siccantur Intestina à causis, quæ ven-triculum exsiccare valent.

Cognosciturque præcipue ex aluo tardiore, & feci-bus siccioribus.

Intemperies  
sicca.  
Signa.

Curatur humectantibus cum assumtis, tum præci-pue per clysterem iniectis; decocto scilicet radicum, florum & seminum malua & althea, semine lini, lacte, butyro, ol. amygd. dulc. passulis: quibus & victus ratio respondeat.

Curatio.

Intestina hu-mectantia.

De

*De Intemperie Intestinatorum cum materia.**Intemperies  
intestinatorum  
cum materia.*

Verum plerumque humor aliquis & materia coniungitur. Et quidem materia illa vel in Intestinis ipsis cumulat paulatim, aut ob prauam victus rationem, aut facultatis expultricis debilitatē, aut materiæ ipsius crassitiem & multitudinē, aut viarum, per quas expelli debet, angustiam, & quod aliud, quæ expellere debet, non expellit; vel aliunde ad intestina confluit, attracta aut dolore, aut calore, aut, quod frequentius accidit, dū natura ad intestina, vt partes debiliores & excrementorum euacuationi destinatas, & totius corporis quasi sentinam, humores vitiosos è locis vicinis, imò toto corpore expellit. Nonnunquam & è cerebro materia in ventriculum destillat, & hinc in intestina dimanat. Interdum & à medicamentis purgantibus attrahitur, ibique hæret.

Materia autem hæc vel biliosa est, vel pituitosa, vel melancholica, & nunc hæret in tenuibus intestinis, nunc in crassis, & quidem vel in cavitare intestinorum, vel in eorum tunicis.

*Signa Diagnostica.**Signa.*

Cognoscitur autem materia ex causis, quæ præcesserunt, & ad eam generandam facere potuerunt, cibo nimirum & potu, qui nunc ad pituitosum, nunc ad biliosum, nunc ad melancholicum humorem generandum dispositus: ex signis etiam, quæ hunc vel illum humorem in mesenterio, liene, epate, imò toto corpore abundare & ad intestina confluere monstrant. Deinde ex affectibus, doloribus scilicet & tumoribus ventris, iisque, quæ per aluum deiciuntur, & nunc sunt pituitosa, nunc biliosa, nunc melancholica.

*Prognostica.**Prognostica.*

1. Difficilius curatur intemperies cum materia, quam quæ est sine materia. Et quidem nunc difficilius, nunc facilius, prout ipsa materia est magis vel minus contumax, & grauiora vel mitiora symptomata coniuncta habet. De quibus omnibus postea in specie plura dicentur.

2. Facilius euacuatur materia quæ in cavitare intestinatorum hæret, quàm quæ ipsorum tunicis impacta est.

*Indicationes & Curatio.**Curatio.*

Ipsa intemperies corrigenda est per contraria, materia verò euacuanda, eiusque generatio vel affluxus, nisi criticus sit, & patura rectè agente fiat, inhibendus.

*Lenientia Me-  
dicamenta.  
Quomodo dif-  
ferant à pur-  
gantibus.*

Medicamenta autem, quæ materiam in ventriculo, cavitare intestinatorum & orificiis venarum mesaraicarum in intestina dehiscientium præter naturam contentam euacuant, dicuntur lenientia, laxantia, *εμπερωτικά*. Differunt à purgantibus, quod actione sua, nisi nimia quantitate assumantur, extremitates venarum mesaraicarum non transcendunt, neque etiam, vt electiuè purgantia, humorem certum eligunt. Est tamen inter ea quædam differentia. Quædam enim simpliciter obuium quemcunque humorem educunt, vel emolliendo & lubricando, vt oleum & viscetosa, vel irritando, vt salsa, acrida, nitrosa, & omnia abstergendi vi prædita, qualia antiquis ferè in vsu fuerunt, & pleraque simul alimentosa sunt, vt oleum commune, amygdalarum dulcium, seminis lini, lac, præsertim alinæ, serum lactis cum sale & melle, mel, saccharum, ficus & caricæ, vnae recentes & passæ, mustum, pruna, brassica, mercurialis, atriplex, beta, blitum, malua, mora matura, cerasa, terebinthina: alia verò magis ad purgantium naturam accedunt, ac interdum, si copiosius exhibeantur, extremitates venarum mesaraicarum transeunt, & licet electiuè humores non euacuent, vt verè purgantia, tamen sine de-

*Lenientium  
differentia.*

lectu non exhiberi debent, quod, licet non occulta qualitate humores certos seligant, ob manifestam tamen qualitatem huic vel illi humori euacuando magis conueniunt Cassia nimirum, quia non calefacit, bili ac commandata est, non vero pituitæ, quia flatus parit; mel rosatum magis conuenit pituitæ; syrupus rosarum solutius magis bili. Cum ergo vel saltem feces euacuandæ sunt, vel pituitosi vel melancholici vel serosi humores, cuilibet medicamenta conuenientia eligenda sunt.

Fecum deiectioni leniora satisfaciunt, præsertim per clysteres iniecta.

*Feces deiectionis.*

Pituitæ euacuandæ satisfaciunt mel rosatum & anthosatum, terebinthina, hiera simplex, species hiera, pilula alexiphantina, myrobalani chebule, bellirica, emblica.

*Pituita euacuanda.*

Bilem euacuant, lac serosum, serum lactis, infusio rosarum, syrupus rosarum solutius, cassia, manna, sebesten, tamarindi, aloë, diaprunis lenitium, pilula de aloë rosata, myrobalani citrina.

*Bilem euacuanda.*

Melancholiam euacuant sumaria, epithymum, polypodium, syrupus de polypodio, de epithymo, elect. lenitium.

*Melancholia euacuanda.*

Serosos humores euacuant manna, quæ etiam bilem educit, syrupus violarum solutius, cassia.

*Serosi humores euacuanda.*

Doses horum medicamentorum in Instit. lib. 5. part. 3. sect. 1. cap. 5. pag. 1248. traditæ sunt.

Medicamenta autem hæc vel ore assumuntur, vel per clysteres immittuntur, vel etiam glandis modo adhibentur. Per os commodius assumuntur, quando simul ex ventriculo & intestinis tenuibus euacuare animus est, aut cum æger clysteres non admittit, vel anus laborat, vt in hæmorrhoidibus. Per clysteres verò iniiciuntur medicamenta, si laboret ventriculus, subita euacuatione opus sit, si intentio sit solas feces euacuare, aut aliud, quod in crassis intestinis continetur, si abhorreat æger ab assumendis medicamentis, vel ad vomitum procliuius sit. Plerique etiam sunt in ea sententia, clysteres saltem ex intestinis euacuare: cum verò etiam è venis mesaraicis vel locis remotioribus euacuare animus est, clysteres non sufficere, sed medicamenta ore assumenda esse. Verum si clysteres è fortioribus medicamentis componantur, etiam è venis mesaraicis, imò vniuerso corpore euacuare possunt, testaturque id experientia, qua constat, glandibus ex elleboro albo factis applicatis, eadem symptomata excitata fuisse, quæ iis, qui elleborum sumserunt, euenire solent, & vitri antimonij granis tribus glandi inditis non solum aluum copiosè motam, sed & duos vomitus excitatos fuisse. Neque ratio deest. Cum enim colum Intestinum vim medicamenti suscipit, per arterias humores in trunco aortæ mouet, vnde etiam accidit, vt post medicamenta purgantia umbilico applicata purgatio sequatur; quia per arterias vis medicamenti purgantis attrahitur.

*Modus euacuandi.**An clysteri  
saltem ex in-  
testinis euacu-  
entur?*

Exhibentur autem talia commodissimè hora vna vel duabus ante cibum, non post cibum, & quidem vel ante prandium, vel ante coenam.

*Quando le-  
nientia exhibenda?*

Materia hoc modo euacuata danda est opera, ne iterum cumuletur, recta victus ratione adhibita & victu parciore exhibito, quique contrariam habeat humori peccanti qualitatem.

Si autem in ipsis intestinatorum tunicis materia continueatur, frequentiore euacuatione indiget, & ea medicamenta vsurpanda, quæ non nihil ad purgantium naturam accedunt, qualia commodissimè ex aloë parantur.

Et quidem si aliunde humores ad intestina conflunt, vt in alijs partibus & fluxionibus, partis recipientis & mittentis habenda est ratio. Idèoque, si intestina vel propter dolorem vel calorem humores attrahant, dolor mitigandus, calor verò temperandus; si verò ob solâ imbecillitatem fluxionibus recipiendis obnoxia sunt intestina, roboranda sunt per modicè adstringentia, vel assumpta ore, vel per clysterè iniecta potius, quàm extra applicata, quorū vsu facilè humores ad interiores partes

res compelluntur. Talia sunt, quæ parantur ex rosâ, mentha, plantagine, polygono, absinthio.

Materia verò, quæ in intestina confluit, ab iis auerenda. Cum autem intestina corporis intimum occupent, sit commodissimè auersio venæ sectione in cubito. Reuellit etiam ab intestinis, non tamen per purgantia fortiora institutus: item frictiones brachiorum & crurum, cucurbitulæ dorso & scapulis appositæ.

Repellentia quod attinet, ea cum intus assumuntur, & per clysteres iniiciuntur, tum extra applicantur. Quanquam enim externa nonnulli suspecta habeant ideo, quod ex venis partium externarum humores ad intestina protrudant: tamen quia humores, qui fluunt ad intestina, non fluunt per venas, quæ partes externas abdominis percrepant, sed per mesaraicas, non sine commodo applicari possunt.

Deriuatio fit commodissimè per venas hæmorrhoidales.

Illud verò materiæ, quod postea intestinis impactum relinquitur, vel sensibiliter euacuandum, vel insensibiliter discutiendum. Sensibilis euacuatio fit per lenientia medicamenta antea proposita cum ore sumpta, tum per clysteres infusa. Insensibiliter verò discutiunt digerentia medicamenta, vt oleum chamæmelinum, anethinum, rutaceum, laurinum; Cataplasmata etiam è radicibus, floribus, feminibus variis medicamento- rum discutiunt parata; quibus tamen admisceri debent, quæ modice adstringendo intestinorum robur conseruant, ne fluxionibus aliunde recipiendis fiant opportuna.

## CAPVT II.

## De Inflammatione Intestinorum.

ET si Inflammatio sit morbus compositus, & in ea non solum intemperies cum materia, sed & magnitudo aucta reperiatur, & proinde post sumptiles morbos demum de ea agendum videatur: tamen quia inprimis intemperies cum materia in ea manifesta est, & maximè actiones lædit: statim post intemperies cum materia de ea agere libet. Inflammari autem possunt omnia Intestina, frequentius tamen tenuiora inflammantur, ob venarum copiam & sanguinis abundantiam.

## Causæ.

Accidit autem intestinorum inflammatio affluente sanguine per venas, quibus intestina, tenuiora præcipue, abundat. Quod euenit, vel vbi ob tenuitatem sponte ad intestina fluit, id quod in dysenteria sæpe accidit, & quidem autumnno frequentius, 3. aph. 22. quia æstate geniti humores tenses & mobiles autumnî frigore inæquali in profundum corpus ad intestina pelluntur, vbi phlegmonem sæpe efficiunt: vel cum à calore, aut, quod frequentius accidit, à dolore attrahitur, id quod fit post vehementes intestinorum dolores, post percussiones & lapsus, & imprimis, cum intestina è sua sede in scrotum vel umbilicum excidunt, vbi compressa dolorem patiuntur.

## Signa Diagnostica.

Dolor fixus, distendens, ingens in parte affecta intus percipitur: in loco autem tumor nonnunquam percipitur, cuius ratione, vt Galenus, 6. de loc. aff. cap. 2. docet nonnulli hunc morbum *χρόνις* appellarunt, quod in eo tenue intestinum tactu deprehendatur conuolutum instar chordæ. Febris & febrilia symptomata adsunt: aluus occluditur, & omnia per os reiciuntur, qui affectus ileos appellatur, vt infra dicetur, vrina supprimitur, quod vesica in consensum trahitur, venter inflatur, respiratio est difficilis, vires omnes languent.

Dan. Sennæri Tom. II.

Vtrum autem tenuia vel crassa intestina inflammantur, ita dignoscitur. Si tenuia intestina affecta sint, stomachi distensio adest, & spiritus angustia, & nausea, atque vomitus assidui & vehementes, ita vt nec porus contineri queat, paulò post & stercorum vomitus sequatur: dolor & tormina magis ad superiora vergunt. Si in crassis inflammatio consistat, vomitus non ita continuò durat, dolor ad hypochondria magis pertingit ac lumborum adest grauitas, vomitus stercoris tardius superuenit.

## Prognostica.

1. Inflammatio intestinorum periculosa malum est, & præsertim tenuiorum, vt quæ Ileum & alia grauiâ symptomata inducit, & pauci hoc modo affecti euadunt.

2. Malum etiam acutum est, & citò ad statum properat.

3. Sæpe inflammatio intestinorum in gangrænam & sphacelè abit. Vidi hoc in fœmina & iuvene, quibus cum ex hernia intestinali intestina inflammata essent, tandem sphacelo ea corrupta sunt, quæ putredo superficiali peritonæo & abdominis musculis circa inguina communicata eas ipsas partes infecit, vt sphacelo corripereur, ac viâ per corruptam partem facta feces alui cum summo fœtore per inguen excernerentur, atque ita vterque mortè oppeteret. Plura vide infra de Ileo.

## Indicationes.

Qui scopi & indicationes in aliarum partium inflammationibus dantur, eadem & hic locum habent. Sanguis nimirum affluens à parte affecta auerendus, eiusdem feruor temperandus, ac id, quod influxit, discutiendum. Nam vt ad suppurationem ducatur, minus tutum est, & non sine periculo id fit, ac præcipue si ad interiora abscessus rumpatur.

## Curatio.

Ideoquæ mox (leniem tamen clysterem præmittere nihil prohibet) basilica aperiatur, etiam ante topica, & si opus sit, ac vires ferant, etiam reperatur venæ sectio. Trallianus in inflammatione ita aucta, vt vrina etiam supprimitur, venam tali aperit, qua ratione & alui & vrinæ excretionem sæpe secutam fuisse ait.

Sanguine euacuato statim quæ repellunt, refrigerant, & dolorem mitigant, vsurpanda. Ideò iniunctiones fiant ex oleo rosaceo, aut panni vel lana oleo rosaceo & vino austero imbura ventri imponantur, quibus aceti aliquid addere non inutile fuerit.

Cataplasmata quoque applicantur ex plantagine, endiuia, portulacâ, & similibus, è quibus contusis exprimatur succus, & oleum rosaceum addatur: vel mala cydonia in posca dilutiore cocta oleoque rosaceo mista applicantur, eaque omnia tepide.

Per aluum, & præcipue vbi intestina inferiora inflammata sunt, in morbi principio iniiciantur clysteres ex cremore ptisanæ, oleo rosaceo, succo plantaginis, endiuia, portulacæ, luteis ouorum recentium.

Omnia simul Reuulsionum genera instituantur, quæ materiam ab internis partibus ad externas reuocent, vt frictiones, ligaturæ, cucurbitulæ scarificatæ & non scarificatæ, cruribus & artubus applicatæ, lotiones item extremorum.

Per os exhibeantur, quæ circa adstrictionem refrigerant, vt decoctum maluæ, lactuæ, violariæ, ptisanæ.

In augmento addantur aliqua, quæ vim discutiendi & leniendi habent, vt oleum chamæmelinum, anethinum, cataplasma ex semine lini, fœnugræci, chamæmelo, farina fabarum. Vtile est & emplastrum Alexandri, quod fit ex vitellis ouorum sex, farina fabarum, olei rosarum, chamælini ana Vnc. ij. B. cera Vnc. v. mucilaginis seminis lini q. s. ad faciendum emplastrum.

CCCC

Clysteri

Prognostica.

Indicationes.

Curatio.

Venæ sectio.

Anodyna & refrigerantia.

Reuellentia.

Discutientia & lenientia.

Clysteribus verò in progressu morbi addatur oleum chamæmelinum, semen fœnugræci, lini, flores chamæmeli. Clysteres a acres, & suppositoria acia omittenda, ne inflammationem augeant: quæ v. acia non sunt, etiâ si superiora intestina inflammentur, in progressu morbi ad euacuandum excrementa quæ in inferioribus intestinis hærent, vtilia sunt.

Purgantia  
prorsus omi-  
tenda.

A purgantibus verò planè abstinendum, cum & locum affectum exasperent, & humores vitiosos versus partem affectam deducant, quod in omni inflammatione interna, ex monitu Hippocratis, 4. de vi&it. nat. in acut. s. 22. cauendum.

Et licet excrementa retenta purgationem suadere, & exigere videantur: tamen longè maius damnum ex inflammatione à purgantibus aucta accidit, quàm commodum ex purgatione, quæ frustra, renitente & obstante inflammatione, tentatur. In delinatione tamen leuia adhibere vtile fuerit.

Dolorem le-  
nientia.

Si dolor valdè virgeat, cum lenientia, quæ infra in curatione colica proponitur, vsurpanda. Itaque hic vtilis erit emulsiõ seminis papaueris albi, vel syrupus papaueris, diacodium, philonium, laudanum opiatum; quæ posteriora tamen viribus iam valdè languentibus non vsurpanda, ne mors acceleretur.

Inflammati-  
o ab Enteroco-  
le.

Si malum sit ab Enterocoele, danda opera, vt intestina quam primum in suum locum reponantur. Itaque clyster emolliens præmittatur, & postea forus fiat ex oleo chamæmelino, anethino, & liliorum simul mixtis, quibus locus rupturæ inungatur, vel cataplasmata emollientia eidem imponantur, & tandem intestina prolapsa manu suauiter in suum locum reponantur.

Ab exompha-  
lo.

Eadem curandi ratio est, si sit Ileos ab exomphalo. Pareretur ergo talis clyster.

℞. Rad. alb. Vnc. 6. malua, alibæ, parietaria, ana M. j. flor. chamæmeli, M. 8. Prunorũ nam. x. Sem. anisi Drach. ij. Coqu. in aq. communi, vel iure caruim.

Colaturæ ℞. lb. j. cassia extr. Vnc. j. 8. ol. aneth. chamæmelini ana Vnc. j. salis Drach. 8. F. Clyster.

Fotus efficacior erit, si illa emollientia, vt radix althææ, malua, flores chamæmeli, meliloti coquantur in lacte, & contundantur, ac contusa, additis oleo amygdal. dulc. chamæmelino, lini, lilior. albor. omnia in vesicam, vt dimidia eius pars repleatur, coniciantur, & venter inferior versus pectinem & circa anum calidè cum constricta bene vesica foveatur.

Per os etiam iuscula pinguis, in quibus malua cocta fuerit, sæpius propinentur.

Inflammati-  
o à contusio-  
ne.

Eodem ferè modo procedendum, si inflammatio sit à contusione. Hoc saltem tum observandum, vt reliquis, quæ inflammationis causa adhibentur, aliquid lenientium, & aliquo modo concoquentium addatur.

#### Diaeta.

Diaeta.

Victus in inflammatione Intestinorum sit tenuis & refrigerans. Ideoque æger sola pitana sit contentus, vt inflammatio refrigeretur, & ne ob copiam alimentorum excrementa cumulentur, cui aliquid vini granatorum admisceri potest. A vino planè abstineant, & ab omnibus calefacientibus.

### C A P V T III.

#### De Angustia Intestinorum.

Angustia In-  
testinorum.

Cum intestina canales quidam sint, per quos chylus in ventriculo coctus distribuitur, aut à vasis mesaraicis exsugitur, & quod inutile est, in feces alui mutatum per ea excernitur, si meatus hic in corpore claudatur vel angustior fiat, varia mala & symptomata excitantur.

#### Causæ.

Causæ.

Angustiam autem in Intestinis varix causæ indu-

cunt. Primò nonnulli à causis exsiccantibus & adstringentibus ea angustiora reddi posse statuunt, vt acerbis, austeris & similibus. Verum lubricitatem potius intestinorum ab iis plerunque immutari & feces exsiccari credibile est, quam vt ipsa intestina ab ipsis contrahantur, præsertim cum mutata demum in chylum ad intestina perueniant. Nisi forsan accidat, vt cruda ad intestina perueniant, atque ibi hæreant, & simul obstruendo angustiam pariant. Tale exemplum habet Fernellius, lib. 6. de part. morb. & sympt. cap. 9. Septennis puella, inquit, diarrhœa correpta cum per dies complures subalbidam ac putrem olidamque materiam indolentem albo redderet, diurnitatis suoris eiusmodi pertasa eius ania consilium de cohibendo cum aliis mulierculis cepit. In eam ren. cydoniato larga manu exhibitio sic est eius vsu aluius repressa, vt eo die & sequenti nocte nil omnino reddiderit, sed excitatis sensissimis ventris doloribus & torsionibus usque eò intumuerit, vt hydropica derepente euasisse putaretur. Accitus Medicus quid rei esset suspicatus, clystmau primum lenibus, dein etiâ acrioribus identidem iniectis hærente alui noxiâ materiam foras euocare, foris dolores lenire tentat: sed id frustra. Inualescentibus quippe doloribus immanibus cum crebris animi deliquiis, tandemque liquidioris stercoris vomitione intra biduum miserabiliter extincta est. Aperto corpore cæcum intestinum coangustatum, constrictumque adeo obhærescente, interioremque ductum obturante cydoniato deprehensum est, vt illac nullo modo prorsus quicquam posset peruenire: unde accidit, vt acris illa & corrupta materia meatu prohibito obiectaque mora restagnans inusitata sibi viam in abdominis spatium patefecerit, paulo supra obstructum locum per se perforatoque intestino, quo velut emissario & cuniculo alio exsiciens abdominis totâ cavitatem repleretur. Hinc acerbissimi dolorum morsus, hinc distentio, hinc animi defectiones, obortoque fœdo vomitu crudelissima mors breui consecuta. Credibilis est, per longam inedia in intestina quasi collabi, constringi & angustiora reddi: sicut alias videmus, animalia, quæ voraciora sunt, habere intestina ampliora, quæ minus comedunt, angustiora.

An exsiccantia & adstringentia Intestinorum angustiam pariant?

Secundò fiunt intestina angustiora, dum inflammantur, de quo capite præcedente dictum.

Tertiò coalescunt interdum intestina. Ita refert Marcellus Donatus, de histor. medic. mirab. lib. 4. c. 10. Nobilissimum quendam equitem Carolum Nuolanum anno 1559. ex suppressione alui mortuum, & in dissecti cadavere observatum fuisse, quod intestinum rectum in parte superiore ita per digiti transuersi longitudinem coaluerit, vt vix tenuioris funiculi crassitudinem æquaret, vtrinque in confinio intestini partibus in tumorem quendam veluti glandulosum elevatis, à quo factum, quo minus feces in superioribus intestinis genitæ per consuetam viam decederentur, nec aqua thermalis partem potuerit pertransire, sed in monoculo congregata reperta fuerit. Sorori etiam Rondeletij intestina multis in locis mutuo connexa spatio ferè duorum digitorum, & colicorum dolorum ac mortis causam fuisse testatur Ioubertus, in vita Rondeletij.

Intestinorum coactio.

Interdum intestina & parte inferiori seu in ano coalescunt, compertumque est, quosdam ano clauso natos fuisse, ut testatur Cælius Rhodiginus, antiq. lect. l. 4. c. 9. Ani clausi exemplum & curationem etiam descripsit Guilielmus Fabricius, centur. 1. obs. 43. vbi refert, infan- tulum natum fuisse clauso ano, qui cum talis vsque ad sextum ætatis diem maneret, maximo angore & torminibus cruciabatur, & in vitæ periculo versabatur. Venter enim inflatus, extensusque erat, lipothymix & sudores frigidi aderant, anus obducta erat membranâ prædurâ, in qua nullû ferè indicium, aut vestigiû ani, præter quâ macula nonnihil liuida apparebat. Illic factâ parvâ incisione, (ne sphincter læderetur) nonaculâ linteis iuxta aciem innolutâ; deinde immisso speculo ani, & quod reliquû dilatato, statim eiecta est excrementorû colluvies. Hinc venter cõfestim subsedit, reliqua; sympto- mata

Ani coactio.



māta remiserunt. In anum demum immissa est, per aliquot dies, fistula plumbea inuncta vnguento quodam deficcante: veluti de cerussa, de minio, diapompholygos, & similibus. His facta cicatrice plenissime conualuit. Nonnunquam verò post vlcera coalescit, vt *Argent. lib. 2. c. 10. de causis morb.* Beniuēnius; *de abditis sanant. & morb. causis cap. 30. & 86.* & alij, quorum obseruationes collegit Schenckius, *lib. 2. referunt.*

Quartò comprimuntur Intestina, præcipue tenuia, dum conuoluuntur & contorquentur, quod fit, dum è sua sede & abdominis cavitatē rupto peritonæo vel in scrotum decidunt, vel per vmbilicum elabuntur.

Quintò obstruuntur Intestina interdum à fecibus induratis, quæ *ovibala* dicuntur; quod accidit præsertim eò loci, vbi tenuia desinunt, & in crassa terminantur; nonnunquam & intestini recti sine idem accidit. Indurantur autem feces, vel quia ex materia crassiore & sicciore generantur, & potu minus diluuntur, vel siccantia multa alia miscentur, vel quia partium vicinarum, epatis præcipue, calore, quicquid est humidum in iis, exsugitur, quod imprimis accidit, si alui feces ob longam sessionem vel alias occupationes diu in Intestinis detineantur.

Prætera & alia, quàm feces, intestina obstruere possunt. Calculos & vermes in iis generari, postea dicitur, quæ angustiam quandam pariunt, at integram obstructionem vix excitant. Ita interdum corpora quædam dura deglutiuntur; sed & ipsa angustiam quidem pariunt, verum si œsophagum transeunt, rarò etiam intestina integrè obstruere possunt. Interdum tamen id accidit, vt antea ex Fernelio dictum.

Quin etiam pituita crassa & viscida in Intestinis generata eadem obstruit. Et si vero sæpe diu ea cum vitæ, tum debilis in Intestinis caloris ratione cumulata rarò integram obstructionem parit: tamen si diu ibi hæreat, ita crassescit, vt intestina prorsus obstruat, & difficile symptomatum causa fiat. Ita narrat Fernelius, *de part. morb. & sympt. lib. 6. cap. 9.* Caroli Quinti Imperatoris Legatum quendam dolore, nec non tumore, à dextro hypochondrio per ima ventriculi in sinistru exporrecto affectum fuisse. Huic cum sexennio toto remedij genus omne, tanquam emolliendo scitro adhibitum fuisset, iniecto tandem acriori clystere datum ac firmum quippiam medio ductu petrusum, pedis longitudine detractum est, quod ille intestini portionem esse metuebat. Sed cum repente leuatus videretur, adhibito consilio iterum ac tertio clystere perlutus est, rursusque similia euulsa materia continuò pristina est valetudini restitutus. Alteri verò cuidam, vt idem Fernelius *ibid.* refert, similis, sed grauior affectus aluum prorsus cohibuit, qui tandem ventre supra modum intumescente decessit è viuis; inuentumque est colum Intestinum vsque ad eò infarctum pituita concreta, vt solidum prorsus censeretur, nihilque omnino fecis in aluum delabi sineret. Simile quid, quod Lipsio accidit, videatur *infra, cap. 7.*

### Signa Diagnostica.

Ipsa intestinorum angustia in genere ex eo præcipue cognoscitur, quod alimentum non rectè per intestina distribuitur, fæcesque alui non rectè per aluum excernuntur.

Causæ autem suis signis discernendæ sunt. Si à siccantibus & adstringentibus assumtis angustia fiat, id ex relatione ægri & adstantium cognoscitur, vt & si inedia præcesserit.

Inflammatiō è signis *capite præcedente* propositis manifesta sit.

Coalitus Intestinorum vix satis rectè signis cognoscitur, & non nisi post mortem dissectione deprehenditur. Si verò anus vel à natiuitate, vel ab vlcere clausus sit, tactui & visui patet.

*Dan. Sennerti Tom. II.*

Si intestina vel in scrotum prolapsa, vel per vmbilicum elapsa angustiora ex compressione redduntur, nec illud vel medicum vel ægrum latere potest.

A fecibus induratis si intestina obstruantur, nullus adest dolor, nullus tumor, & nihilominus feces alui non redduntur, & causæ, quæ feces exsiccare possunt, præcesserunt.

A pituita verò crassa ea obstrui non facile cognoscitur; morborum tamen diuturnorum & difficilium, vt ex historiis supra enumeratis patet, ea causa est, corpus languet & tabescit, cruditas adest, tarda alui deiectio, flatus, plurimi, venter friget, nonnunquam & dolore colico vexatur.

De vermium tandem & calculorum signis diceretur postea suo loco.

### Prognostica.

1. Pro causarum varietate etiam angustia intestinorum plus minusve periculi & difficultatis portendit.

2. Ab assumtis adstringentibus & exiccantibus angustia curatu non est difficilis, & adhibitis emollientibus & humectantibus remediis non ita difficulter curatur.

3. Inflammatiō intestinorum quid periculi portendat *capite præcedente* dictum.

4. Coalitus intestinorum incurabilis est.

5. Quantum periculi habeat Intestinorum compressio & conuolutio, *infra capite 6.* patebit.

6. Intestinorum obstructio à fecibus induratis non ita difficulter curatur: quæ verò est à pituita crassa viscidaque, longorum latentiumque morborum causa est, & magna cum difficultate tollitur; vt & quæ à vermibus vel calculis est.

7. Si anus clausus sit, & totus musculus coluerit, malum incurabile est. Si verò meatus membrana tantum obductus sit, curari potest.

### Indicationes.

Si angustia sit ab exiccantibus & adstringentibus assumtis, humectantia & emollientia requiruntur, quæ etiā necessaria sunt, si ab inedia diuturna sit angustia. Inflammatiō Intestinorum quid indicet, & quomodo curanda sit *capite præcedente* dictum. Si ex Intestinis è suo loco delapsis & compressis sit angustia, intestina in suum locum restituenda sunt, de quo *infra* dicitur. Si à fecibus induratis sit obstructio, emolliendæ sunt feces & euacuandæ. Si à pituita crassa & viscida est, incidenda & abstergenda est. Si à vermibus, vel calculis, tollendi. Anus clausus aperiendus.

### Curatio.

Ergo si ab astringentibus & siccantibus assumtis sit angustia, humectantia & emollientia cum assumenda, tum per clysterem iniicienda. Assumenda nimirum caro mollis vitulina, hædina elixa, pinguis & mucilaginosæ, iuscula pinguis, butyrum, oleum, malua, atriplex, lac. E medicamentis sumenda cassia, syrupus violarum solutius, clysteres emollientes passim notè iniiciantur.

Si ex diuturna inedia sit angustia, commodissime cibis emollientibus & humectantibus modò enumeratis tollitur. Cauendū tamen, ne post longam inediā corpus cibo multo oneretur, sed sepe & parū comedere præstat.

Feces induratae emolliendæ sunt, & per medicamenta lenientia supra c. 1. proposita, tum clysteres educendæ.

Vtilia autem hic sunt iuscula pinguis, prunorum decocta & eorum ius, passula, ficus, spinachia, malua, betæ, atriplex comesta, oleum amygdalarum dulcium, quod vel solum sumitur, vel manna additur, vt

℞. Manna Vnc. j. vel Vnc. j. β. dissoluatur in iusculo gallinae vel carnis, adde ol. amygdalar. dulc. Vnc. j. β. M. Aut si opus sit ol. amygd. dulc. Vnc. ij. addantur diagrydij gr. v. vel detur cassia, passula laxativa & alia medicamenta lenientia supra enumerata.

CCCC 2 Clyste

Clysteres etiam emollientes ex malua, albaea, parietaria, violaria, branca, vrsina, mercuriali, sem. lini, fœnugraci, ficubus, passulis, cassia, elect. lenisino, f. diacatholico, ol. communi, amygdal. dulcium, violarum, lilior. alborum, vitello ou. iniiciantur.

Ex iisdem emollientibus modò dictis cataplasmata parari, & ventri imponi possunt. Vel inungatur venter olei modò enumeratis & vngueto Dialthææ. Emolliet etiam feces duras balneum aquæ dulcis. De quibus etiam de aluo pigra dicitur.

Si pituitam crassiorem in intestinis hæere suspicio sit, acrioribus clysteribus, iisque sæpe repetitis opus est, vel medicamentis pituitam incidere, abstergere & euacuare valentibus, de quo de dolore colico dicitur.

Si anus clausus sit, nullo alio modo, quam sectione aperiri potest, quæ tamen ipsa non semper institui potest. Nam si totus musculus coaluerit, frustra & non sine periculo instituitur sectio; vt & si natura aliam viam, vt ad vuluam, cuius rei exemplum habet Mercurialis, de morb. pueror. lib. 1. cap. 9. sibi machinata est.

Si verò meatus hic saltem membrana obductus sit, aut extrema eius coaluerint, instrumento conueniente via aperienda. Caendum tamen, ne dum perforatur anus, sphincter lædatur.

#### CAPVT IV.

##### De læuitate Intestinorum, & magnitudine aucta.

**R**vgosa est interior intestinorum tunica, vt chylum nonnihil remoretur, ne nimis citò per intestina transiens suctionem vasorum mesaraicorum, quorum officia internæ intestinorum tunice inseruntur, anteverteret.

Contra naturam verò interdum læuia fiunt intestina, imprimis ex cicatrice post vlcera, de quo infra de Lien-teria dicitur.

Augetur quoque præter naturam interdum intestinorum magnitudo, & quidem nonnunquam secundum totam substantiam in inflammatione, de qua supra c. 2. dictum; nonnunquam verò à flatu solum distenduntur, & in maiorem molem attolluntur. Ita refert Fernelius, lib. 6. de part. morb. & sympt. cap. 10. quibusdam flatibus cohibitis intestinum colum ita dilatatum fuisse, vt brachij amplitudinem æquaret, de quo dicitur de dolore colico.

#### CAPVT V.

##### De Rebus præter naturam in Intestinis reperiis, & in specie

###### De Vermibus.

**R**es præter naturam in Intestinis quandoque generantur & reperiuntur, quas vulgò ad morbos in numero referunt, quod an rectè fiat, iam in controuersiam non vocabo, cum in Instit. de eo dictum sit. Eas tamen res omnes hoc capite coniungam & complectar.

###### Lapides.

Primò autem lapides quandoque in Intestinis reperiiri compertum. Galenus equidem id nò vidit, neque audiuit, vt lib. 1. de loc. aff. cap. 5. & lib. 6. cap. 2. testatur. Alij tamen viderunt, vt Rhases lib. 10. continet. c. 2. Gentilis in comment. ad cap. Auic. lib. 4. fen. 1. tract. de feb. sext. Et Matthæus de Gradibus vidit à fœmina quadam colica laborante, lenientibus supra & infra immisissis, insignes tres lapides durissimos excretos, quorum quilibet fuit quantitatis oui gallinæ, vt testatur in comm. ad 9. Rhasis c. de colica. Et Antonius Guainerius, c. 1. de calculosa passione refert à quodam, qui quindecim sæpe diebus aluū non reddebat, non vnum, sed plures lapides ad nucis magnitudinem eiectiones fuisse. Idem testatur Sauanarola,

tract. 6. c. 16. rubr. 19. Francisc. Pedemontanus, cap. 3. sem. 1. part. 4. addit. ad Mes. Beniuenius, de abditis sanati. caus. cap. 19. Brasauolus, comm. ad aph. 79. lib. 4. Hippocratis. Thomas à Vega, comm. ad lib. 1. de loc. aff. cap. 5. Hieron. Montuus, li. 4. cap. 1. anasc. morb. lul. Cæsar Scaliger, exer. 108. sect. 3. Kentmannus, de calculis. Trincauellus, li. 10. c. 6. de rat. curandi partic. corp. human. affect. Columbus, lib. 15. Anat. Mercurial. lib. 2. cap. 4. de excrement. & lib. 1. cap. 20. variarum lectionum. Capiuaccius, lib. 3. pract. cap. 13. Paræus, lib. 2. chirurg. cap. 19. Petrus Sal. Diuersus, in annot. in Alt. cap. 79. Forestus, lib. 1. 4. obs. 26. in scholio. Crato, in epist. ad Thomam Iordanum & alij.

Non autem facilè calculi & non nisi coniectura cognoscuntur, vbi nimirum dolor diuturnior in Intestinis cum ponderis sensu & sæpe cum duritie percipitur.

Euacuantur sæpe sponte; sed commodum est naturam adiuuare lenientibus & lubricantibus sæpe exhibitis, ac per clysteres iniectis.

###### Pituita.

Pituita etiam lænta interdum in Intestinis colligitur, concrefcitque, cuius rei duo exempla ex Fernelio, lib. 6. de part. morb. ac sympt. cap. 9. supra cap. 3. allegauimus, quæ ibi videantur. Notatu quoque dignum est id, quod in vita Ioh. Heurnij extrat. Cum clarissimus Lipsius rædiosisimo malo conflictatus fuerat, febriles insultus varios expertus, stomachus, totumque corpus ei flaccidum & marcidum: contigit quodam die, vt assumpto pharmaco, aluum exoneraret. Sensit autem, dum naturæ necessitati pareret, ingentem se copiam aluo effundere, eamque continuam & cohærentem. Intuetur quid sit rei, videt attonitus se eiusmodi massam effudisse, quæ formam & characterem intestinorum planè exprimeret. Consternatur, illicoque Heurnium vocat, de vita sua actum dicens, nam omnia se intestina effudisse. Inspicit alui proluiem Heurnius, & læto vultu ad Lipsium versus, Respice, inquit, trophæa de tuo morbo; hîc focus & sentina totius mali iacet. Nam erat lenta & viscida pituita, paulatim in tota intestinali fistula coaceruata, à sedentaria & in studiis contabescen- te vita, eius figuram referens; quæ cum computruisset & vicinis partibus noxam suam communicasset, sentinam malorum in totum propagauerat. Hoc morbi fomite expurgato recreatus est vir Clar. & ad pristinam sanitatem rediit.

Res etiam aliæ præter naturam in Intestinis inueniuntur, de quibus infra de rebus præter naturam per aluum excretis dicitur.

###### De Lumbricis.

Et si vermes in pluribus corporis partibus generantur, vt in Instit. pag. 338. dictum: tamen cum frequentissimè in intestinis reperiuntur, hoc loco de iis agere libet. Et quidem sæpe magna copia vermium in intestinis continetur, vt non solum supra centum, sed & mille excretos fuisse obseruatum sit, de qua re videantur obseruationes Schenckij.

Appellantur autem hi vermes Græcis ἐντερικὸς in genere. Antiqui quoque ὄνεια, id est, feras, vt quæ ferocius in corpus sæuiant, appellaunt, vt ex Hippocrate, 6. Epidem. sect. 7. text. 6. & 6. Epidem. sect. 1. text. 3. & 4. de morb. Galeno, in libro, quem de Hippocratis antiquorum nominum interpretatione scripsit, apparet. Latinis Lumbrici dicuntur. Quandoque tamen nomine lumbricorum teretes tantum significantur.

Et si alios etiam hoc nomine accipi volunt, vocem Latini addunt. Plinio, li. 11. cap. 33. tæniæ quoque Lumbrici appellantur. Quanquam enim hîc tinea legantur Marcellus tamen, Virgilius & alij tæniæ legere malunt. Tænia enim Græcis fascia est, hosque vermes ita dici statuunt, quod instar fasciarum sint lati & longi, & proinde

Intestinorum læuitas.

Intest. Magnitudo aucta.

Res p. n. in Ventriculo reperiæ.

Lapides.

Lumbrici. In intestinis sæpe copiosissime generantur.

proinde latos tantum lumbricos hoc nomine significari censent, qui *κασιπας*, ob similitudinem, quam ad infestas habent, dicuntur. Ij verò Lumbrici, qui in ima sede procreari solent, *ἀσκαρίδες* in specie nominantur.

Lumbricorum verò tria genera Aristoteles, *de histor. animal. lib. 5. cap. 19.* & prisca medicinarum scriptores fere omnes numerant; Teretes, qui frequentissimi; Latos, atque Ascarides. Hippocrates verò, *3. aph. 26.* & Celsus, *lib. 4. cap. 17.* duo tantum recensent: Ille quidem teretes & Ascarides, hic verò Latos & Teretes, Latumque lumbricus ab Hippocrate omissus censetur, quod nulli determinatæ ætati conveniat, & omnino ratus sit. Idem tamen, *4. de morb. latorum* etiam lumbricorum facit mentionem. Recentiores quidam quartam speciem addunt, Cucurbitinos scilicet, sed alij aliter. Quidam enim latos in duas species distinguunt, in longos nimirum & breves; illòs Ascarides, hos cucurbitinos nominant. Quidam cucurbitinos pro genere sumunt, quod in distinctas & coniunctas veluti species diuidunt. Sunt & qui latos ad cucurbitinos referunt. Alij quoque dubitant, an reperiantur Lumbrici, qui sint cucurbitæ semini similes. Paulus enim, *lib. 4. cap. 38.* corpuscula illa cucurbitæ seminibus persimilia non in lumbricorum numero, sed inter lumbrici lati notas recenset, quod proculdubio ex *lib. 4. de morb. delumit*, ut mox patebit.

Verum enim verò ut quomodo se res habeat, & quorū lumbricorum sint genera certi sumus, principio quid latum lumbricus sit, dispiciendum, de quo non exigua apud authores occurrit controuersia, quæ omnino discutienda est, si de generibus lumbricorum certi esse velimus. Hippocrates seu author *lib. 4. de morbis* Lumbricos latos nasci in puero, dum adhuc in utero est, ex lacte putrescente, & aucto puero etiam augescere hos lumbricos à cibis, quos assumit editus infans, & intestinis æquales fieri scribit. Latum verò hunc lumbricum parere, & id quod veluti cucurbitæ semen cum stercore excernitur, partum lumbrici esse negat. Paulus Aeginetas, *lib. 4. cap. 57.* latum lumbricum mutationem internæ intestinorum membranz in quoddam animatum corpus esse dicit, quod quandoque per partes plerumque totum simul excernitur incredibilem magnitudinis speciem præbens. Aetius quoque *lib. 9. c. 40.* Latum lumbricum transmutationem membranz tenuia intestina intus succingentis in animale quoddam corpus esse dicit. Hieronymus Gabucinus latum lumbricum nihil aliud esse existimat, quam abrasionem veluti intestinorum albam tota complectentem intestina, intra quam cucurbitæ semini similes animantes procreantur: quæ quidem abrasio rarissime tota excernatur, frequenter per partes exeat. Atque hæc si excretionem frangatur seu rumpatur, tum apparere lumbricos illos cucumeris semini similes seorsim excretos, atque interdum complicatos, interdum pauciores, atque ita statuit, non rotum illud corpus abrasum, quod latum lumbricus appellatur, viuere, sed solum cucumeris vel cucurbitæ semini similia animalcula intra ipsum viuere. Cum enim talem latum lumbricum se mouere vidisset, diligentissime eum contemplantem, tandem per eius totam cauitatem cucumeris semini similia animalcula sese inouentia ipsi morum præstare, se animaduertisse scribit, quæ ex eo prodibant, interdum vnum, interdum duo simul complicata, plerumque quatuor pluravè, atque eam abrasionis portionem, quæ vacua ab eiusmodi cucurbitinis segmentis animatis erat, nullo pacto moram fuisse, imò subsedisse. Atque hinc statuit, latum lumbricum nihil aliud esse, quam mucum intra intestina genitum, vel mucosam pituitam intestinorum frigiditate densatam, lorice modo intestina intus ambientem, è qua cucurbitæ semini similia animantia conceptus more producantur. Hinc secundum Gabucini sententiam latum illud intestinorum spoliū lumbricus latus quidem vulgo vocatur; verum

per se non mouetur, nec animale est, sed animalculum illud cucurbitæ semini simile in eo mouetur; quod tamen per se peculiarem & quartam lumbricorum speciem non constituat, nec per se latus lumbricus appellandus, sed nota potius lati lumbrici sit. Et pro sua sententia allegat Aristotelem, qui, *lib. 3. histor. animal. cap. 19.* scribit, latum solum lumbricum intestino adhaerentem parere simile cucumeris semini, quo indicio id genus lumbrici inesse intelligunt.

Platerus duo tæniæ intestinorum genera constituit. Vnum quod fasciam quandam referat membraneam, intestinorum tenuiorum substantiæ similem, earum longitudinem adæquantem, minime tamen uti illa, cauam, sed digitum transversum latum, quæ rectius tænia intestinorum, quam Lumbricus latus appelleretur, cum nec viuat, nec loco moueatur, uti lumbricus, nec irritationes aut rosiones in intestinis efficiat. Alterum aerò genus lumbricorum numerum admittit, & tæniā illam ex portionibus multis coherentibus, & quæ abscedere inuicem possint, cucurbitæque semina quadrata nonnihil referant, constitui dicit, hocque vermis genus propriè cucurbitinum nominari censet, quod rarius integrum, plerumque in frustra diuisum excernitur. Tales omnino vermes fuerunt, quos à scemina quadam rejectos fuisse annotauit Antonius Beniuennius, *cap. 87. de abdit. morbor. caus. & curat.* quos ita inter se iunctos, & mordicus quasi coheruisse scribit, ut, cum sua ipsi serie quatuor cucurbitorum longitudinem excederent, vnum tantum corpus, vnumque duntaxat vermem præ se ferrent.

Verum enim verò si hæc opinioniones omnes diligenter perpendamus, & cum iis, quæ authores de hisce lumbricis obseruauerunt & annotauerunt, conferamus, primò omnino statuendum videtur, contra Gabucinum & Platerum, omnino tæniam seu fasciam hanc esse animal; ideòque ab Hippocrate, Aristotele, Galeno & aliis Medicis antiquis rectè animal appellari, & inter lumbricos, qui sunt animalia, referri, non verò esse tantum lumbricorum receptaculum. Idque apparet ex capite, quo hic vermis præditus, quod verrucosum in eo vidit Amatus Lusitanus; Rondeletius oblongum, paruum; Forestus in mucronem tanquam subulam desisse. Molliorem tamen hanc partem habet lumbricus latus, unde punctiones illas, quales à teretibus ægri nonnunquam satis graues in ventre percipiunt, ij, qui laborant lato lumbrico, non experiuntur. Ideòque hinc Platerus parum firmiter concludit, quod hic vermis non viuat. Deinde ex motu, qui etsi obscurior & tardior, quam teretrum lumbricorum, tamen aliquis est, ut plurimi authores obseruauerunt; visumque vna eius parte abrupta reliquam in ventrem retractam fuisse; imò quandoque in glomum quasi se rotum conuoluisse, vbi medicamentorum vi ex ventre hominis totus propulsus fuit. Atque ad istum morum proculdubio comparatæ sunt illæ incisiones seu genicula & intermedia, quibus reliquorum insectorum more per transversum distinguitur, quæ à nonnullis vermes cucurbitini, quod cucurbitæ semina, quando abruptuntur, singula referunt, sunt nuncupati. Hæc vbi alimento sunt repletæ, colorem fuscum, & nigras quasi maculas exhibent, humore verò vacuæ prorsus, sunt albæ, atque cū in his internodiis motus sit in hoc lumbrico manifestior, id persuasit Gabucino, ut crederet, non lumbricum latum moueri, sed vermes cucurbitinos in eo, cum tamen non peculiare & singuli vermes sint, sed totius illius longi partes. Cucurbitinos enim vermes quod attinet, nihil aliud sunt, quam partes lati lumbrici, quæ, quando abruptuntur, singula cucurbitæ semen referre videntur.

Sciendum tamen hic duum generum esse latos lumbricos, vnum quod communiter authores describunt, quodque solum prisca videtur fuisse notum, & quod Platerus & Gabucinus viuere negat. Hicque lumbricus omnino longissimus est, de quo Plinius, *lib. 11. hist. natur. c. 33* scribit,

Lumbricus latus an sit animal?

Cur nullas punctiones in corpore efficiat?


Cucurbitini vermes quid?

Lati Lumbrici duo genera.

scribit, quod nascantur intra hominem tania tricennum pedum, aliquando & plurium longitudine, id quod ab aliis quoque est observatū; & Platerus aliquot, qui quadraginta pedes longi fuerint, se vidisse scribit. Galenus quoque seu autor libri, qui Introductio, seu Medicus inscribitur, nonnullos hominum vermes tam longos esse, ut in tota portigantur intestina, scribit. Vnde etiam recte seu fasciæ nomen antiqui iis indiderunt, cum fascias illas ex lino & lana intexta cōstātes, quibus infāres inuoluuntur, exacte referant. Huius lumbrici partes seu incisuræ non ita exacte semen cucurbitæ integrum referunt, sed ubi abrumpuntur, & moram aliquandiu iam

emortua vel semimortua in corpore trahunt, pars eius, quæ ad latera est tenuior, tanquam facilior ad suscipiendum corruptionem putrescit; qui verò in medio, veluti nodus, figuram seminis cucurbitæ vel cucumeris refert.

Alterum taniæ genus rarius est: eius tamen partes in viuento & integro exactius & clarius, cucurbitæ semina referūt, quale descripsit secūdo loco Platerus & Cornelius Gemma, in lib. de occult. natura characteris, quod lūbrici genus ex partibus multis, quorū singulæ semen cucurbitæ referunt, cōstat. Neque annotatum est ab autoribus in hoc genere tam longos lumbricos repertos, fuisse, sicut in priore. Videatur Schema.



Talis etiam proculdubio fuit lumbricus, quem Antonius Beniuenius, loco allegato, vidit, quemque vnicum corpus & vermem vnicum retulisse scribit. Et fuit reuera vnicus vermis vno corpore cōstans, etsi ille ex multis vermibus sibi inuicem inordicus cohærentibus conexum fuisse dicat. Atque has partes nonnulli partum lumbrici & vermes cucurbitinos esse putant, cōsque in lato lumbrico seu tania generari crediderunt; cum tamen reuera vnus saltē vermis sit ex multis nodis veluti articulis & geniculis cucurbitæ vel cucumeris semen referentibus compositus; & cum alterū lumbrici genus parum à lato lumbrico, quem vulgò describunt, discreper, pro peculiari specie lumbrici haberi non debet. Lati lūbrici historias quatuor recēset Guilielmus Fabricius, cent. 2. obs. 71, 72, 73. quas hīc describere non liber: consulantur allegata loca.

*Alii vermes  
in intestinis  
geniti.*

Atque ita cum cucurbitinus vermis nullā peculiarem differentiam constituat, sed lati (cuius tamen duas species esse diximus) saltē pars sit, tres ita lumbricorum erunt differentiæ; Latus, de quo iam pluribus diximus; Rotundus siue teres; Ascarides. Etsi enim vtrumque genus hoc teres sit, tamen illi, qui longi sunt, in specie teretes dicuntur; qui verò breuiorēs, Ascarides vocantur, quandoque & tinea ventris, quod tineis quæ in lanis & vestimentis proueniunt, similes sint.

Ab his tamen lumbricorum speciebus, quæ frequentiores sunt, non parum discrepātes vermes in intestinis genitos & quandoque eiectos fuisse observatū est, vermes nimirum cornutos, hirsutos, quadrupedes, centipedes, multipedes, bicipites, tricipites, caudā bifurcatā præditos, de quibus videatur Schenckius, Obs. 211. & seqq. aliquot.

#### Causa.

*Causa.*

Qua ratione autem in intestinis vermes generentur, à multis prolixè disputatur: quæ mea sit sententia, lib. 3. Institut. pag. 255. & de Chymic. cum Aristotel. & Galen. consensu & dissensu c. 2. exposui, quam iam confidentius tunc, cū pluribus eam defendere videam Philosophum

doctissimum Fortunium Licetum, in libro de spontaneo viuentium ortu.

Quamquam autem melius esset, vermes in homine nunquam generari, & geniti grauissima mala, ac sæpe ipsam mortem homini inferant: tamen in naturæ cuius vis indiuidui potestate non est eiusmodi vitia declinare, sed necessitate materiæ vniuersalis naturæ, cuius officium est, eas formas ad vniuersi perfectionem excitare, ad quas suscipiendas quælibet materia apta est, imperio & potentia subicitur & parer.

De materia quoque in Institut. diximus: illis tamen quædam, quæ ex vñ Medico sunt, addamus. Plerique humores excrementitios causas esse statuunt, & quidē Auicēn. 16. text. tract. 5. cap. 1.° pituitam materiam lumbricorum esse dicit, quando ea incalcescit in intestinis ac putrescit, ibidemque consistit. Idem, cap. 2. eosdem ex humiditate excrementitia à iecoris attractrice facultate imbecilli in excrementis relicta fieri statuit. Verum si corporum constitutionem, in quibus lumbrici generantur, consideremus, statuendum videtur, non præcipue ex humoribus pituitosis excrementitiis, sed alimentariis, & chyli portione iis admista vermes generari. In iis enim præcipue vermes producuntur, à quibus cibi confertim, nullōque ordine, & priore nondum concocto, ingeruntur, ut ita cocti cum semicrudis ad intestina descendant, & cum omnes partes alimenti ob copiam à mesentericis vasis non attrahantur, succus ille alimentarius cum excrementis mistus in intestinis hæret, & seu putredine, seu calore loci incalcescit in animal mutatur, dum forma, quæ in materia illa delitescbat, verum officio formæ nonungebatur, iam à calore illo temperato excitata in actum erumpit, & materiam illam informare incipit. Hinc causa præcipua vermium est ad stuporā & voracitas infantium, qui subinde alios cibos, prioribus nondum concoctis, ingerunt, & præcipue si tales cibos assumant, qui facile putrescunt, vel ad vermes producendos dispositionem habent, ut si nimis maturæ carnibus infantes vescantur, vel fructibus fugacibus, ac aliis, quæ sunt humidioris naturæ. Et cum sit magna differentia ciborum, quibus homi

*Materia lum.  
bricorum.*

*Præcipua  
vermium  
causa.*



homines videntur, non mirum etiam est, in vermibus aliquam apparere varietatem, & sæpe monstriosi quid generari, prout in cibo ad hanc vel illam animalis formam suscipiendam dispositio est. Ut enim aliqua, quæ sponte nascuntur animalia, testacea & alia quælibet determinatam materiam requirunt, neque quælibet ex qualibet generantur: ita etiam ex alia sunt teretes, ex alia rursus ascarides, ex alia iterum monstriosa alia.

An verò dulcia ad vermes generandos faciant, in dubio est, negatque id Gabutinus, & statuit, dulcia, quæ dulcia sunt, lumbricos non generare; cum dulcia eo consentiant temperamento, ut facili in quouis corpore in bilem vertantur. Cum enim à calore temperato dulcis fiat sapor, & dulcia, si venter ea concoquere & mutare debet, suo calore ea alterare necesse habeat, vltiore coctione saporem adipisci anatum, & hinc facili in bilem commutari, ex qua nec extra, nec intus vllum procreatur animal. Dulcia verò in corpore iam prædictos lumbricos saltem commouere, & rursus ad ventriculum ducere statuit. Verum enim verò negandum, dulcia tale habere temperamentum, ut in quouis corpore in bilem facili vertantur. In iuuenibus quidem, & calido & sicco hoc fit; verum ut in infantibus, qui calidi & humidi sunt, hoc fiat, non est necessum, in quibus nulla rerum dulcium amplius fit adustio.

Imprimis verò de generatione lati lumbrici anxie Medici disquirunt, modumque generationis inquirunt, saltem tamen in calore hærentes statuunt, mutari pituitam copiosissimam in membranam vermiformem magnitudinis ac formæ talis, qualis ipse vermis cernitur, quæ ita figurata post demum animetur. Putantque se rem habere sicut, in semine & pane. Ut enim semen, dum in vterum peruenit, in calido loco constitutum extra membranam contrahit, aut panis dum coquitur, tenuis quædam pellicula in superficie excitatur, quæ crusta appellatur: ita etiam pituitam in intestinis copiosam, & ratione loci, & à calore putredinali putrescentem in membranæ coriaceæ formam abire. Quod verò striis quibusdam ea membrana prædita est, id ex inæqualitate subiectæ materiæ provenire.

Verum enim verò & falsa est ista sententia, & falsis nicitur præsuppositis. Non enim membrana, quæ foetus includitur, saltem fit à calore semen exiccante; sicut crusta panis fit à calore fornacis, sed, ut ipse foetus, à facultate formatrice. Ideoque idem etiam de lato lumbrico statuendum, cum scilicet totum à facultate formatrice in materia illa latente à calore corporis excitata formari, & sicut arbores, & animalia reliqua à parua mole primordia sua habent, ita & lumbricus latus proculdubio ab exigua mole, attracto alimento prægrandis euadit. Neque compertum, vilius animalis corpus primum ea magnitudine, quam habere debet, formari, & postea formatum demum animari.

Atque ex his, quæ hæcenus dicta sunt, patet, quæ ætas magis generationi vermium obnoxia sit; nimirum ea, Hippocrate, 3. Aphor. 26. autore, quæ media est inter illam, in qua pueri dentire incipiunt, atque eam, in qua ij degunt, qui pubertati proximi sunt. Et imprimis nascuntur tunc in iis teretes & ascarides; quia pueri in ea ætate constituti ob lætis & pulmentorum frequentiore vsum & nimiam voracitatem, magnam semicodorum humorum copiam cumulant. Obseruatum tamen etiam est, in ipso matris vtero lumbricos in infantibus genitos fuisse, & ab editis paulò post excretos; quod etiam annotauit autor, lib. 4. de morb. In fetibus tamen quandoque etiam generantur, sicut à vetula annorum 80. maximum lumbricum excretum fuisse, vidit Hercules Saxonia.

Latus lumbricus, siue tania etiam in omni ætate producit, sicut in puella annorum duorum, in muliere annorum 23. & in senne annorum 80. obseruauit Gabutinus, in matrona vidit Beniuenius, Amatus Lusitanus & Rondeletius, in viro Dodonæus, Valeriola, Atque la-

tus lumbricus in omni ætate generatur; ascarides in ætate, quæ est pubertati proxima, tum in pubertate atque adolescentia. Atque hi frequentius generantur; rarius ascarides, rarissime lati lumbrici.

Quod de ætate dictum, idem etiam de temperamento accipiendum. Hi nimirum lumbricis magis obnoxii sunt, qui in vtre & intestinis crudum semicodumque humorem cumulant, caloremque bladum habent. Vnde quoque accidit, ut foeminae frequentius lumbricos generent, quam mares, utpote quæ & matribus frigidiores sunt, & ocio magis deditæ, plusque talis humoris ad lumbricos generandos apti cumulant. In aliis tamen quoque temperamentis lumbricos generari nihil prohibet, si crassis & lentis cibis copiosius vtantur, otio dediti sint, & omnino victus rationem tali succo cumulando aptam obferuent.

Quantum ad tempus anni, plerique quidem potissimum autumno, hinc vere, minimè verò hyeme lumbricos produci statuunt. Verum si experientiam consulamus, comperiemus, frequentissime vere generari. Et si enim ver sit tempus anni saluberrimum: tamen hyemen cum sequatur, in qua multi crudi succi congeruntur, tempore verno, qui hyeme cumulati sunt humores, moueri ac putrescere incipiunt, ex quorum corruptione tum etiam vermes frequentissime vere generantur.

Circa generationem vermium etiam hoc non prætereundum, an lumbrici geniti alios rursus generent. Autor quidem lib. 4. de morb. tantum teretes parere dixit, latos verò non. Et sanè latos lumbricos quod attinet, etsi nonnulli cucurbitinos eorum partum esse existimant: tamen antea iam monstratum, quæ excernuntur semini cucurbitæ similia, non partu lati lumbrici, sed eiusdem partes abruptas esse. Quamquam enim alii aliis sint crassiores, alii tenui filo vix persimiles, quorum illos vulgus matres, hos partum appellat: tamen id non accidit, quod hi illorum partus sint, cum sæpe tenues tales tot excernantur, ut à maioribus genitos fuisse non credibile sit, sed quod ex eadem materia alii ante, alii post geniti sint. Neque etiam vlla sexus distinctio in iis apparet, neque vnquam lumbricus aliquis prægnans repertus est, quamquam alius alio sit crassior.

Multorum autem malorum & prauorum symptomatum causæ lumbrici sunt, & sæpe tanta pessimorum symptomatum congeries concurrit, ut Medicos nunquam de causâ ancipites reddat, & vix credibile videatur, tot & tanta mala à solis lumbricis provenire. Obseruatum est, lumbricos aliquando intestina & ventriculum perforasse & per vmbilicum atque inguina foras erupisse.

Quod etsi negat Platerus idè quod nec rostro acuto, vel aperto, nec dentibus præditi esse conspiciantur, & sugendo hoc minimè præstare possint, atque ideo statuit, si in locis istis vermes prodeant, eos in sedibus eiusmodi exterioribus in abscessu aliquo facto natos fuisse, & minimè lumbricos esse, sed vermes, quales in vlceribus gignuntur, vel si ab intestinis prodeant, vulnus in his locis necessariò præcessisse: tamè à communi sententia planè descendendum esse non putamus. Etsi enim confiteamur, exempla illa, quæ à nonnullis ad probandum, vermes ex intestinis perforatis per cutem abdominis prodisse, omnia satis clara non esse, & concedamus, sæpe ex abscessibus in ventre inferiore ruptis vermes tales prodisse, qui lumbrici non fuerunt: tamen si omnia illa, quæ Schenckius, lib. 3. obseru. 205. collegit, perpendamus, interdum etiam ab intestinis perforatis prodisse animaduertemus. Quod confirmat id, quod refert Spigelius, qui anno 1061. in mulieris cuiusdam consistentis ætatis, quæ ad tantam maciem redacta erat, ut vix cute & ossibus hæreret, corpore quatuor lumbricos teretes spiramæ vnius longitudine in ipsum truncum venæ portæ sese insinuasse, ac toti corpori alimentum aditum obstruxisse obseruauit.

Sæpe à lumbricis vomitus, cardialgia, syncope.

CCCC 4 singultus

Quod temperamentum lumbricis magis obnoxium sit?

Quod anni tempus?

An lumbrici geniti alios rursus generent?

An lumbrici intestina & ventriculum perforare possint?

Dulcia an ad vermes generandos faciant.

Lati lumbrici generatio.

Qua ætas vermium generationi magis obnoxia sit?

In ipso matris vtero vermes in infantibus geniti.

Latus lumbricus cui ætati familiaris sit?

tingultus, tormina intestinorum & dolores colico affecti similes, capitis dolores, sopor grauis, deliria, motor, tristitia, concussiones per somnum, febres ardentes, angina, pleuritis, atque alia grauia symptomata excitantur, & nomnunquam ipsa mors inferitur. Antonius Beniuenius, *de abdit. morb. caus. & curat. cap. 82.* refert, se curasse puerum, qui ex lumbricis nullo modo quiescere poterat, sed semper hinc inde temeratio quodam impetu ac inordinato motu ferebatur, vt etiam stare volens iterum ticubaret ac caderet, Gabucinus, *cap. 13.* narrat, se puellum curasse lumbricis laborantem, in quo cuncta symptomata spectabantur, quæ pleuritide correptis solent venire, de quibus iam plura in *signis* dicentur.

### Differentia.

*Differentia.*

Differentiæ iam antea enumeratæ sunt. Alii nimirum sunt lumbrici teretes, lumbricis terrestribus similes, plerumque tamen longiores, frequentissimi & notissimi. Ascarides sunt vermiculi, iis qui in carnibus & caseo nascuntur, non ab similes, & in intestino recto præcipue generantur. Lati, de quibus pluribus iam antè diximus, non sunt aggregatum quiddam ex vermibus coherentibus mordicus, vel etiam membranæ inclusis, sed vnus vermis geniculis quasi quibusdam & nodis distinctus, cuius singulæ portiones vermes cucurbitinos, aut cucurbitæ referunt. Spigelius à Germanis etiam nominibus has differentias discerni scribit, & teretes appellari *Spulwurme*, latum *VVasserkalb*. Verum quid Belgæ posteriore vocabulo appellent, certò quidem mihi non constat; sed hoc scio, foeminas nostras eo nomine non appellare quid præter naturam ex intestinis excretum, sed ex vtero, aqueum nimirum humorem vesicæ quasi cuidam inclusum, & molæ instar in vtero generatum, cui etiam ista appellatio satis bene quadrat, cum lumbrico verò lato nullam conuenientiam habet, utpote in quo nihil ferè aquei cernitur, sed qui corpore quasi membranaceo constat.

*VVasserkalb.*

### Signa Diagnostica.

*Signa.*

Si vermes per aluum excernuntur, vel vomitu eliciuntur, aliis signis opus non est. Verum quia sæpe diu in ventre, antequam excernuntur, delitescunt, signis vt cognoscantur, opus est. Teretes ergo, qui & frequentiores sunt, & grauiora inducunt symptomata, hæc signa produnt. Morsus & vellicatio in abdomine, dentium stridor præter solitum, præsertim in somno, tussis assidua & sicca, narium pruritus, quas propterea infantes digitis immixtis sæpius scalpunt, facies squalida, & malæ per intervalla modò rubentes, modò liuidæ, oculi concaui, circa quos interdum insueti splendores obuersantur, labiorum & linguæ siccitas nonnunquam, aliis tamen os saliu repletur, foetor quidam peculiaris ex ore percipitur, nausea ferè assidua, in quibusdam & vomitus, interdum insatiabilis appetitus; singultus, dolor ac grauitas capitis, ad somnum propensio, concussiones quædam & horrida per somnum expersicentia; nonnulli in somno tremunt & surgunt, ac rursus sopiuntur, ventris adest distensio, qui pulsatus tympani more resonat, & interdum supprimitur, plerumque tamen plus æquo fluit, & excrementa, quæ emittuntur, bubulum stercore referunt, & corrupta multa excernuntur, reliquum corpus præter rationem decrescit, & alia symptomata concurrunt, quæ supra enumerata sunt. Nonnulli experientiâ constare aiunt, lumbricos esse in ventre cognosci posse, si manè ieiunis pueris supra hos ventriculi frigida spargatur. Nam in vnum congregari lumbricos. Et signa ista plus ponderis habent, si ætas sit ea, quæ vermibus generandis aptior est, ac præcesserit ea victus ratio, quæ ad vermes generandos facit. Signa tamen hæc non om-

*Teretium.*

nia in omnibus, sed quædam in his, alia in aliis apparet.

Latos lumbricos qui habent, appetentiâ cibi nimiam & perpetuam laborant, ac nisi cibis offeratur, dolor & morsus in ventre percipitur, corpus extenuatur & imbecillum redditur. Certissimum ergo signum est, quod cum alui excrementis corpuscula quædam cucurbitæ seminibus similia excernuntur. Non verò ita facile iis, qui lato lumbrico laborant, accidit epilepsia, deliria, vigilia, febres ardentes & acutæ, & alia, quæ antea enumerauimus, vt iis qui teretibus molestantur, nisi præter latum teretes forsan accesserint. Est enim latus lubrius ignauior quasi, intestinisque adhærescit, nec vt teretes ita facile de loco in locum mouetur. Neque etiam signa, quibus latus lumbricus deprehenditur, statim cum genitus est, & dum adhuc parvus existit apparent, sed tum demum, vbi incrementum sumpsit, nisi aut mutauerit locum versus stomachum propter aliquam insolitam inediam, vel medicamentum, aut cibum, vel alia de causa tormina excitet, vel per intestinum rectum pars prodeat, vel in ætate valde tenera generetur, vbi propter loci angustiam nequit diu latere.

*Latorum.*

### Prognostica.

*Prognostica.*

1. Etsi omnes lumbrici mali sint, & grauissima symptomata, vt dictum, quandoque inferant; tamen alii aliis deteriores sunt. Sunt verò ex iis minus noxij ascarides parui; quia longius absunt à membris nobilioribus, & facilius expelli possunt. Si verò magni sint, omnibus deteriores sunt. Fiunt enim ex deteriore materia.

2. Lati lumbrici omnium pessimi ea de causa, quod difficilius curantur. Alias enim teretes grauiora inducunt symptomata.

3. Circa febrium initia geniti lumbrici subsistentiam ex subiecta recipiunt corruptione, circa statum ex morbi malignitate, circa declinationem ex transmutatione ad melius, qui celeriter excernuntur, & natura eos ad exteriora, non secus atque excrementa, expellit. Deteriores verò sunt maiores minoribus; multi, paucis; rubri, albis. Paulus Aegineta, *lib. 4. cap. 29.* & Aëtius, *lib. 9. cap. 39.*

4. Bonum est, lumbricos teretes exire ad crisin eunte morbo. Hippocrates, *lib. pronostion.*

5. Incipientibus acutis morbis, si lumbrici teretes viui deiciantur, pestilentes morbos indicant; inclinantibus autem, mortui, malum signum sunt.

6. Leuinus Lemnius, *lib. 1. cap. 22. de occult. nat. mirac.* hæc ita explicat: Si in sanis alioquin lumbrici teretes sursum per os vel nares egrediantur, periculo hoc vacat, Si enim homo diutius ieiunet, cum expleri cupiant, naturali instinctu ad partes illas, per quas alimentum in ventriculum dimitti solèt, in sublime feruntur, & vel per os vel per nares egrediuntur. In ægrotantibus verò hoc non absque imminentis mali præsagio euenit. Tantà est in eiusmodi corporibus humorum putredo & malignitas, vt exitialem eorum vim præferre nequeant. Itaque erumpunt foras morbi sæuitiâ, non natura robore expulsi. Cum verò declinante morbo cum reliquis excrementis propelluntur, salutare id esse Hippocrates statuit. Spontè verò nullòque naturalis facultas impulsu egredi, quod in moribundis conspicitur, ægrotati noxium. Sentiant enim naturæ quodam instinctu corpus defecturum, seque alimento destitutum iri, idèoque stationem suam deferunt.

7. An mortui si excernantur viuientibus excreteris deteriores sint, in dubio est. Aëtius viuientes mortuis deteriores esse statuit, *lib. 9. cap. 39.* ea procul dubio de causa, quod viuientes, si exeant, amplius in corpore alimentum non inueniant. Rhases verò quem sequitur Auicennas, si mortui excernuntur, deterius esse, quam si viui egrediantur, putat, quod id fiat vel propter alimenti defectum, vel materiæ malignitatem. Verum distinctione hæc opus est, & ad symptomata coniuncta, tempus

tempus morbi, & medicamenta vsurpata simul respiciendum. Nam viui, dum hærent in corpore, multa maiora mala inferunt, quàm mortui; cum ipsa intestina quandoque perforent, & alia grauius symptomata, imò mortem ipsam quandoque inferant, vt supra dictum. Ergo si vel naturæ robore, vel medicamento- rum vsu excernantur, bonū id est, neque multum refert, an viui, an mortui excernantur. Si verò in febre exeant, reliqua symptomata, & tempus morbi considerandum; vt iam antè dictum.

8. Lumbrici sanguine conspersi deiectioni, malum. Intestinorum enim læsionem indicant.

9. Frequens puellorum anhelitus ac frigidus, liuescente ad hoc corpore, lethale. Sequenti enim die mortem prænunciat.

10. Latum lumbricum in specie quod attinet, scribit autor, lib. 4. de morb. habenti latum lumbricum toto tempore nihil admodum graue contingere, & si non curetur, sponte exire, mortem tamen non inferre, sed consensescere. Verum hoc tantum accipiendum est, si nulla occasio accadat, ob quam latus lumbricus moueatur & irritetur. Nam si æger aut motu aut exercitio delinquat, victum lumbrico contrarium vsurpet, aut medicamenta assumat, aut humor aliquis in intestinis generetur, multa mala, imò ipsam mortem inferre potest. Sicut & nonnullos hydrope & atrophia ab hoc verme mortuos esse, experientia docuit.

### Indicationes.

Indicationes.

Vermes cum toto genere sint præter naturam, sui è corpore remotionem indicant; quod fit si interficiantur, & per aluum expellantur, ac ea victus ratio instituat, quæ nutritioni & generationi vermium materiam non suppedit. Inprimis verò, vt interficiantur, danda opera. Quamdiu enim viuunt, occasionem & vim nocendi habent, ac difficulter expelluntur: interfecti autem facilius excluduntur. Ideo prius interficiendi, vel certè stupefaciendi ac ferè exanimandi. Ita enim cum fecibus alui à natura expelluntur, vel medicamentis purgantibus educuntur. In curatione tamen videndum, an febris absit nec ne, item an aluus sit fluida. Nam si febris absit, & homo alioquin sit sanus, calidiora quoque medicamenta tutè vsurpare licet. Si verò febris adsit, acris, amara, salsa & omnino calidiora tuta non sunt, sed frigidis vel temperatis opus est.

Si aluus non sit fluida, ea medicamenta vsurpanda, quæ simul aluum mouent. Si verò aluus fluida sit, facilius est, vermes enecare; aluum verò mouere, cum vltro fluida sit, opus non est.

In vsu quoque remediorum cauti simus. Nam vehementioribus medicamentis sæpe adeo irritantur, vt conuulsiones, animi deliquia extent, & sæpe ad ipsam mortem deducant.

### Curatio.

Curatio.

Medicamenta autem, quæ vermes interficiunt, alia amaritudine, acrimonia, salsedine, aciditate, alia etiam peculiari proprietate id præstant. Inter medicamenta autem, quæ vermes enecant, faciliè principatum obtinet *Corallina*, qua præstantissimum Medicorum testimonio nullum magis præsentaneum contra vermes est remedium, quæ omnibus lumbricis necandis conuenit. Exhibetur autem commodissimè in puluere Drach. j. potest. In Græcia etiamnum ad omnis generis lumbricos occidendos in magno vsu est, cuiusque puluerem Circæforanei publicè vendunt per plateas ac vicus, clamantes; *σχολητότατον* corruptâ voce, quasi *σκοληκοφόνον* vellent dicere. Vtile & est *Santonici semen*, vt & *semen tanacetæ*, & *radix primula veris*, è quibus duobus Circæforanei nonnulli puluerem suum contra vermes pa-

Vermes necantia.  
*Corallina.*

rant. Item *absinthium*, *abrotanum*, *verbena succus*, *marubium*, *zedoaria*, *dictamnus Creticus* & *albus*, *gentiana*, *angelica*, *amygdala amara*, *scordium*, *semen citri*, *brassica*, *succus galega*, *farina lupinorum*, vel cum melle linctæ, vel cum posca pota, ipsi quoque lupini macerati & comesti, vel decoctum ipforum. Laudant nonnulli & puluerem ipforum lumbricorum ablutorum & siccatorum. Verum res mihi suspecta videtur. Etsi enim certum sit, post talem puluerem sumtum lumbricos plures deiici: tamen de hoc quæstio est, an antea ij fuerint in corpore præsentis, an verò è puluere lumbricorum geniti.

An puluis lumbricorum tutè vsurpandus?

[¶ In eo quod statim heic, de puluere lumbricorum, an tutè vsurpandus, statui me confirmat Hent. ab Heer, obseru. Medic. oppidò rarar. 9. dum scribit, se non probare consilium, vel vulgi, vel Medicorum, verminosis pueris vermes vino lotos, & in tegula siccatos exhibentium. Certò enim sibi, se experientiâ edoctum, persuadere, materiam illam vermium putrem putri puerorum pituitæ remixtam, à magno illorum calore iterum animati, vt videmus muscas submersas multis diebus mortuas, si non premantur, sed simpliciter extinguantur, Soli denuò expositas, nouo calore iterum vitam volatunquæ recuperare.]

Temperata & frigida sunt, quæ cum febris adest, tutè exhibentur, vt aqua & decoctum radicum graminis, auricula muris, cornu cerni, rasura eboris, succus limonum, portulacæ, plantaginis, punicum malum contusum ex tribus vini heminis decoctum ad heminam, decoctum radicis mori, endiuie, lactuca agrestis, acetum acre.

Infantibus comodissimè dari potest ad dies quatuor aqua graminis cum pauxillo aceti ac sacchari ad Vnc. j. aut syrupus de limonibus, vel acetositis citri, & cum molesti sunt, grana aliquot salis ori immittantur.

Ex chymicis commendatur *Spiritus* & *li*, oleum *Æris per campanam*, *elixir proprietatis*. *Brassauolus*, in exam. simp. med. & *Matthiolus*, lib. 5. cap. 70. commendat argentum viuum, quod scrup. j. pondere exhibet, sed viuum, non præcipitatum aut sublimatum. Verum etsi viuum argentum præcipitato & sublimato longe tutius sit, & in casibus desperatis contulisse atque vtile fuisse negandum non sit: tamen vbi necessitas non vrget, & alijs mitioribus medicamentis res peragi potest, iis vtendum, cum aliquam prauam dispositionem corpori faciliè imprimere possit, sicut etiam contactu sensum stupefacere potest.

An argentum viuum in lumbricis vsurpandum.

Commendantur etiam quædam ad certum genus lumbricorum. Teretes, inquit Galenus, *absinthium* interimere potest; Lati vehementiora præsidia postulant, qualis est *flix*, cuius radicis puluis ad Dr. ij. cum mulla datur. Latos etiam expellunt nuces iuglandes largius assumptæ, & radicis mori cortex decoctus in aqua & potus, non solum aluum soluit, verum etiam latos lumbricos excutit. Et omnino curatio lati lumbrici peculiare quid requirit. Teretes quidem enecari & expelli sine magna difficultate possunt; parui enim sunt, & corpore rotundo, minusque dearticulato, nec tam pertinaciter intestinis adhærent, & vires medicamentorum exhibitorum facilius admittunt, ac in aluum deuoluuntur & excluduntur. Lati verò & longiore & maiore difficultate excutuntur. Longissimi enim sunt, & corpore plano ac lato, plurimisque incisuris præditi, atque internæ intestinorum tunice validissimè adhærent; & sub mucosa earum interna superficie sese occultantes medicamentorum transuentium vim non faciliè percipiunt.

Lumbricos teretes necantia.

Latos necantia.

Teretes lumbrici facilius enecantur & expelluntur.

Ideoque fortioribus medicamentis opus est, vt interficiantur. Quapropter etsi in teretibus purgantia cum interficientibus commodè admisceantur: præstat tamen, in latis nulla iis purgantia primùm admiscere, cum purgantia non sinant medicamenta vermes interficientia diu in intestinis herere, sed ea citò per aluum secum educant.

In lato lumbrico enecando nulla purgantia admiscenda.

*Medicamen-  
ta lorum lū-  
bricum debi-  
litanlia.*

Si verò prius exhibeantur medicamenta quæ ipsum debilitant, totus rotundus factus ad pilæ figuram exit, & homo sanus euadit, vt Autor lib. 4. de morbis scribit. Commendatur verò imprimis filix, è qua recenti aqua destillata datur, vel puluis Drach. s. pondere, infantibus natu maioribus Dr. j. adultis Drach. iij. pondere, cum aqua galegæ, quæ sine vllis molestiis vermem & lentè & citò, si velis, enecat.

Commendatur & cortex radices mori. Et corallina duplici pondere, ad Drach. ij. scil. datur. Vtilis est & Theriaca aceto, vel succo limonum dissoluta; decoctum centaurij minoris, lupinorum, scordij, sicut & vsus aloës cum croco & myrrha atque vsus Hieræ cum Scammonio.

Vermibus interfectis, vel debilitatis, nisi spontè excernantur, ea vsurpentur, quæ aluum mouent, aut quæ vim habent & vermes interficiendi, & aluum citandi, qualia sunt aloë, agaricus rhabarbarum, senna, colocynthis.

Præ compositis omnibus ad vermes necandos Diatribith cum rhabarbar. in rotulis commendatur. Inter temperata sebeten expertissimum medicamentum, quorum decoctum infantibus singulis diebus ante cibum propinari potest. Vtile est & Electuarium Diasebeten.

Vel ℥. Cassia Drach. iij. manna Drach. j. s. vel Drach. ij.

Misce cum Syrupo acetosi citri. Vtile & gratum infantibus medicamentum est.

Ex his varia parantur composita. Vini absinth. vsus hic valde commendatur. Vel tale paretur vinum:

℥. Rad. zedoar. distamni Cretici an Drach. ij. corallin. Vnc. s. radic. angelic. Drach. ij. fol. absinth. M. s. vel j.

Infundantur in mensur. j. vini, de quo manè & vesperi detur haustus.

Vel ℥. Lumbric. terrestr. prapar. Dr. j. cornu cerui vsti prapar. corallin. distamni Cretici, semin. santonici an. Dr. s. F. Puluis. Dosis à scrup. j. ad scrup. ij.

Vel ℥. Corallin. lumbric. terrestr. C. C. vsti prapar. semin. tanacetis an. Drach. j. F. Puluis.

Vel ℥. Semin. lumbricor. (id est, santonici) Vnc. vij. rasur. C. C. Vnc. iij. flor. persic. Vnc. j. aloës epatic. Vnc. s.

Redactis in puluerem in vitro affundatur aqua filicis, fol. persicor. absinthij an. lb. ij. stent per dies tres in B. M. in digestionem, postea destillantur. Destillatio ter repetatur, semper aquam, quæ extillat, restanti materiæ affundendo. Dosis ab Vnc. s. ad Vnc. ij.

Antidotus lumbricos interficiens præcipuè in febribus malignis talis parari potest.

℥. Semin. portulac. oxalidis an. Drach. j. coriandr. brassic. myrrha an. scrup. j. distamni Cretici Drach. s.

Coqu. in aceto, in colatura macerentur triduum.

Semin. santonici, corollina, sem. apij syluestr. C. C. vsti an. Drach. ij. Postea siccantur, addaturque sem. malor. aurantior. Drach. iij. citri Drach. j. Cum sacchar. succo granat. dissoluto omnia excipiantur ac trochisci parentur.

Vel ℥. Rad. gramin. M. j. distamni albi, scordij Cretici an. p. ij. sem. santonici, corallina an. Drach. j.

Coqu. in aqua simpl. Colaturæ adde sacchar. albi lb. s.

Coqu. s. a. ad syrupi consistentiam.

Sub finem adde acetis acerrimi Vnc. j. F. Iulebus, de quo mane detur Vnc. s. vel Vnc. j.

Composita quæ simul vermes interficiunt & expellunt, talia parari possunt.

℥. Corallina sem. plantag. C. C. vsti radic. distamni albi an. scrup. j. rhabarb. agarici trochiscati an. scrup. ij. sacchar. q. s. F. Rotulæ.

Vel ℥. Corallin. Drach. ij. tanacetis sem. santonic. di- ni albi an. Drach. rhabarb. elect. agarici trochiscati an. Drach. j. sacchari in aqua graminis dissoluti q. s.

F. Morsuli, qui dentur à Drach. j. ad ij. vel iij.

Vel ℥. Aloës scrup. ij. rhabarb. scrup. j. myrrha scrup. s. trochisc. alhandal. gr. iij. pulu. corallin. Drach. s.

Cum succo vel extract. absinth. F. Pilulæ xxj. Pueris scrup. j. sufficit.

Efficaces quoque sunt Pilulæ Pestilenciales cum extracto absinthij.

Vel ℥. Rhabarb. elect. Drach. ij. semin. sancti radic. distamni scrup. ij. s. C. C. vsti vel ditioribus unicornu scrup. j. sacchari in aqua graminis dissoluti Vnc. vj. F. Rotulæ vel Morsuli.

Vel ℥. Sem. santonici, corallina scordij zedoaria, nigelle an. Drach. j. s. gentiana, centaurij minoris, aloës, agarici an. Drach. j. C. C. vsti semin. acetos. angelic. an. Drach. j.

Conspergantur succo limonum cum aceto & aqua rosacea. Hoc fiat aliquoties, Vltimò adde

Croci Drach. s. moschi, ambra an scrup. s.

Cum syrupo de corticibus citri. F. Massa pilularum, de qua detur Drach. j. vel Drach. ij.

Vtilis est & syrupus ex foliis persici. Infantibus dari potest cornu cerui cum mechoacanna.

Quia verò medicamenta infantes, qui tamen frequentissimè lumbricis laborant, amara præcipuè non admittunt, antiqui instrumentum quoddam habuerunt, quod ab ipsis *ῥωμῆς* vocatur, quod supinis ipsis dentis ori immittebant & per clysterem validum habentem *ἀυλίσκον* inuitis tales liquores infundebant, vt apud Paulum Aeginetam, lib. 4. de re medic. cap. 57. videre est.

*Instrumentum quo m. qui in ian- bua medica- menta in ian- debant.*

Non solum autem interna medicamenta ad vermes vsurpantur, sed & externa ex farina lupinorum, centaurij minori, foliis persici, absinthio, felle tauri, &c. Vt, fiat cataplasma ex farina lupinorum, quod efficacius est, si succus absinthij, martubij, foliorum persicorum addatur.

Vel ℥. Succo absinthij, folior. persicor. fellis tauri an. Vnc. s. sem. coriandr. aloës an. Drach. j.

Cum modico ceræ F. Linimentum.

Vel ℥. Olei absinth. rutacei an. Vnc. s. fellis tauri Dr. ij. distamni albi Drach. j. petrolei Drach. ij. aloës, myrrha an. Drach. j. cera q. s.

F. Vnguentum.

Vel ℥. Olei amygdal. amarar. Vnc. j. rutacei petrolei an. Vnc. s. fellis tauri Drach. iij. aloës Drach. ij. cera q. s.

F. Linimentum.

Vel ℥. Pomum aurantium aut citri paruum, excand tantam partem, qua capiat theriaca scrup. ij. aloës scrup. j. croci gr. vj. Assa pomum, & succum exprime quo regio ventriculi & vmbilicus inungantur.

Vtilis est & theriaca aceto vel succo limonum dissoluta illita.

Vel ℥. Farin. lupinor. Vnc. j. myrrha, aloës an. Drach. j. pulpa colocynth. scrup. iij. croci Drach. s. fellis bonis Vnc. j. s. acetis Vnc. s. M.

In teretibus lumbris clysteres non conueniunt, nisi sint uortui. Nam dum percipiunt vim medicamenti, superiora versus repunt, & varia mala excitant. Nonnulli tamen clysteribus vtuntur, sed dulcia & pingua satis magnâ copiâ permiscant, quibus alliciantur & quasi ludificentur vermes. E. G.

*An in tereti- bus lumbricis clysteres con- ueniant?*

℥. Lac recens multum, eique partem alicuius hieræ addunt. Verum in latis rectius conueniunt. Non enim ita facile ij versus superiora mouentur, sed intestinis pertinaciter adherent. Fortioribus tamen clysteribus opus est, iique sæpius iniiciendi, & maiore copia.

Vt ℥. Absinth. scordij abrosani, corallin. summit. tanacetis distamni Cretici an. M. j. semin. santonici Vnc. s. centaur. minor. M. s. cocynb. in petia ligati Dr. j. s.

Coqu. Colaturæ ℥. lb. j.

Elect. hieræ simpl. Drach. ij. mellis rosati colati Vnc. iij.

F. Clyster. Atque eo tempore, quo clyster iniicitur, simul propinetur aliquod medicamentum vermes necans, & extra quoque ventriculo applicetur.

Ascarides



*Ascarides,  
quomodo edu-  
cantur.*

Ascarides quia sunt in intestino recto, suppositoriis rectissime educuntur, quibus admiscuntur resinae. Iis enim vermes adherent & educuntur. Fiant quoque clysteres, sed exigna quantitate, ex decocto centaurij minoris, absinthij, corallinae, abrotani, dictamni & similium cum melle rosato. Qui plura huius generis medicamenta cognoscere cupit, sylviam eorum apud Platerum lib. 3. Practic. reperiet.

### *Diata.*

*Diata.*

Cum in curatione vermium ed respiciendum sit, ut non solum vermes tollantur, verum etiam ipsorum generationi & augmentationi materia non suppediretur, cibis ita comparatus esse debet, ut ad generationem vermium non faciat, sed ei potius resistat. Cibus ergo eorum, qui pariuntur lumbricos, ut Paulus Aegineta lib. 4. cap. 49. tradit, sit boni succi, qui facile distribuatur, atque ad membra transeat, nec causam foueat.

Quare vinum conceditur aquosum, non dulce, si febris absit, at si febris adsit, detur aqua destillata graminis, acetosae portulacae cum oxysacchar. simp. vel Syrupus acetositis citri, vel cereuisia pura. Panis non sit ex purissima farina, sed aliquid furfuris contineat, sitque bene fermentatus, & sale condidatur. In cibis etiam lupini, nasturtium, beta, raphani, apium conveniunt. Lac & pisces vitentur, ut & legumina. Cibi condiantur aceto, succo aurantior. limonum, citri, acetosae, lactucae, portulacae. Cibus exhibeatur parce, sed frequenter, ne morsu suo molesti sint vermes. Pueris in potu sante omnem cibum decoctum Sebesten detur, ut antea quoque dictum.

## C A P V T V I.

### *De Situ Intestinorum mutato, & de Hernia.*

*Intestinorum  
situs muta-  
tum.*

Situs etiam interdum intestina mutant. Ita Columbus, lib. 15. Anat. refert in Cardinali Campegio intestina omnia ad hypochondria retracta fuisse, ita ut cavitates inferioris abdominis intestinis destituta esset, & spina detecta. Quamvis brevis medico licuisse abdomen Cardinalis attrectanti magnae arteriae motum & una cum illo duritiem persentire. Illa vero durities nihil aliud erat, quam vertebrarum corpora.

*Intestinorum  
convulsio.*

Conuoluuntur etiam interdum tenuia intestina & contorquentur, ut via fecibus & flatibus pracludatur, quod in Ileo accidit, qui inde etiam conuolutus & volutus appellatur. Conuolutionis autem est plerumque inflammatio, interdum etiam flatus, si tenuia intestina ita impleantur, ut instar farciminum inflatorum distenta appareant, de quo in Ileo dictum.

### *De Hernia.*

*Hernia.*

*Hernia vera  
tantum duae  
sunt.*

Praecipue vero mutant situm intestina in Hernia dicta, quae & ramex ac Ruptura & Graecis κήλη dicitur. Quamquam & nomen hoc non solum intestinorum, sed & omenti procidentiae tribuatur. Verae herniae enim duae tantum dantur, nempe Intestinorum & omenti extra abdomen elapsus. Natura siquidem ut aliarum partium cavitates, ita etiam totum abdominis spatium intus peritonaeo circumsepserit, ut nihil ex iis, quae in abdomine continentur, excidere possit. Verum cum testibus in viris extra abdominis spatium locus destinatus sit naturalis, atque ductibus seminariis necessario per membranam hanc transeundum fuerit, natura in utroque latere non simpliciter peritonaeum perforauit, ne quid patentiore via in scrotum descenderet & cau-

itate abdominis elaberetur, sed e membrana ista veluti canalem & processum quendam eduxit & produxit, per quem haec vasa sine omni periculo transeunt. Atque in hoc fere seu laxato seu rupto omnis Herniae causa posita est. Nam haec membrana si rumpatur aut laxetur, partes in abdomine descendere, & pondere inferiora versus atque in scrotum ruere solent. Et quidem ubi Intestinum Ileon maxime excidit, hernia intestinalis seu εντεροκήλη dicitur: si vero omenti aliqua pars descendat, επιτοκήλη, hernia omentalis, vulgo etiam zirbalis nominatur. Alij tertiam addunt, quae ex veraque mista est, ubi aliquid omenti & simul intestina elapsa sunt. Porro si intestina in ipsum vsque scrotum descendant, completam & perfectam οσχεοκήλην nominant, & in specie, ut dictum εντεροκήλην & επιτοκήλην. Si vero eadem partes ultra inguina non descendant, nec in scrotum debeant, imperfectam ac incompletam herniam ac bubonocèle appellant. In foeminis vero tumor hic equidem in inguine suboritur: interdum tamen cutem valde extendit & sub eam exportigitur, magnumque tumorem excitat. Tumor hic si prematur cum in viris, tum in foeminis, vel si homo supinus iaceat, plerumque evanescit, rursusque homine ambulante redit.

*Hernia  
fecta.*

*Imperf.*

His deinde veris & praecipuis herniae differentiis alij alias reddunt, quae huius loci non sunt, sed ad tumores scroti pertinent: si nimirum scrotum a flatu intumesceat, herniam flatuosam, & πνευματοκήλην ac φουροκήλην nominant: si ab ea aquea materia, aquosam & υδροκήλην, quae infantibus saepius accidunt, sed proprie ramices non sunt, cum peritonaeum nec ruptum nec laxatum sit.

*Alia Hernia  
differentia.*

Inter Hernias deinde referuntur duae aliae species, quae in ipso maxime canali crescunt & vniuersum scrotum expleant; quae videlicet ex varicibus seu venis implexu diuaticatis & intertextis intumescuntibus nascitur, varicosus ramex seu κυρτοκήλη appellatur; quae ex carnea mole ibidem succrescente oritur, σαρκικήλη nominatur, cornosa hernia. Sed nec haec proprie dictae herniae sunt, cum nihil in iis ex abdomine in scrotum descendat: de quibus infra, part. 9. cap. 5. inter morbos scroti dicitur.

Ad situm vero intestinorum mutatum recte refertur εζομφαλος, id est, vmbilici tumor seu prominentia, seu ομφαλοκήλη, cum luxatus vel ruptus vmbilicus, nunc nucis, nunc pomi magnitudine sese exferit, imò interdum sacci instar tumor aliquando excitatur.

*Εζομφαλος.*

Non tamen solum in vmbilico, sed in vicinia etiam, ibi laxato vel rupto peritonaeo praecipue in partu, eiusmodi tumores in foeminis quibusdam vidi, quae generali κήλης & herniae nomine appellantur.

### *Causa.*

Generatur autem hernia, sitque prolapsus intestinorum in inguina & scrotum, processu illo ex peritonaeo ducto vel laxato vel rupto. Siue enim laxetur peritonaeum, siue rumpatur, pondere suo intestina praecipue, tum etiam omentum, solet in locum patentem, vel inguina, vel etiam ipsum scrotum descendere. Causae autem, quae peritonaeum rumpunt, sunt motus quicunque violentus, casus ex alto, percussio, saltus, equitatio in succursore equo, vomitus, tussis, oneris grauioris eleuatio, dura alius & quae cum difficultate redditur, conatus in partu, flatus in intestinis, vocis intentio, spiritus retentio, & quodcunque, quod spiritum concitare, septoque transuerso & abdominis muscoli tensis impetum in inferiorem regionem abdominis inferre potest. Tandem etiam vulnus in peritonaeo alicubi acceptum, & quidem cute consolidata apertum relictum causa herniae esse potest.

*Causa.*

Eadem etiam omnia, si minorem vim inferant, & non violenter processum illum rumpant, sed sensim & saepe

sæpe illum impetant, peritonæum laxare possunt: quod maximè facit peritonæi & inguinum debilitas & humiditas. Partes enim debiles ac humidæ facillè laxantur, vnde pueri in herniam sæpius incidunt. Fernelius processum hunc in interiorem & exteriorem illius tunnicam distinguit, & in enterocèle & epiplocele tunnicam interiorem necessario disrumpi, externam vero duntaxat luxari scribit. Neque absurdum est, hæc idem fieri posse, quod in aneurismate. Neque enim *aneurisma* fit, utraque arteriæ tunica rupta, sed interna saltem patente, externa verò dilatata.

In fæminis idem accidit, si in inguine peritonæum laxatur, ubi vas quoddam ex utero per illud in inguina extorsum fertur.

Si verò in umbilico peritonæum laxetur, atque intestina vel omentum illic sub cutem procidant, omphalocèle, seu exomphalon & umbilici procidentia nominatur. Si autem alibi circa umbilicum, nomen generis, ut dictum, retinet. Si verò in conatibus magnis, præcipue in partus difficultate, ubi processus ille umbilico infertur, qui in fœtu valis umbilicalibus viam præbuit, posteaque coaluit, peritonæum distendatur, umbilicus aliquando in tumorem attollitur, qui tamen cessante conatu iterum recedit. Si verò rumpatur, tumor permanet.

#### Signa Diagnostica.

Signa.

Signa herniæ Intestinalis sunt quod tumor modò accrescit, modò minuitur, interdum etiam ferè totus evanescit, prout maior vel minor portio intestini descendit, vel intestina magis vel minus replentur, vel etiam planè retrocedunt. Compressio enim tumore aut resupinato ægro relabruptur Intestina in abdomen & quidem cum murmure. Sine dolore etiam ferè hic tumor est, nisi forsan feces delapsæ sint in intestinum, ut repelli non possint. Tum n. vehemens dolor adest. In omentali verò hernia tumor est mollis, latus & lubricus, & ferè semper idem, cum omentum non ita facillè reponatur, ut intestina. An verò in inguina sint delapsa intestina vel omentum, aut in scrotum vsque descenderint, visu dignoscitur. Etenim in bubonocèle tumor rotundus est in inguine, qui pressus facillè intrò pellitur: in scroto verò herniâ intestina vel omentum in ipso scroto apparent.

An autem peritonæum ruptum vel laxatum, si ex eo cognoscitur, quod rupto peritonæo tumor subitò excitatur, qui subitò etiam incrementum sumit: laxato verò saltem peritonæo tumor sensim crescit. Laxato quoque peritonæo non descendit, quod delapsum est ad fundum vsque testiculorum: cum rupto peritonæo ad fundum vsque testiculorum prolatur.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Omnis autem hernia difficulter curatur. Neque enim membrana illa tenuis & nervosa facillè vnitur, nisi sit ruptura parva, recens, & in corpore puerili: aliàs nunquam perfectè curatur.

2. Præterea etiam magnum periculum in herniâ coniunctum est. Nam etsi sæpè sit adeo magna ruptura, ut intestinorum magnus acervus in scrotum descendere possit sine magno dolore & vitæ periculo, & propter rupturæ ac loci amplitudinem feces sine periculo ac impedimento liberè transire possint: tamen si feces indurentur, aut intestinum elapsum flatibus turgat, ut reponi non possit, tum nisi maturè malo obuiam eatur, æger intestinis inflammatis in præsens vitæ discrimen conicitur in ileum, & hic superuenientia symptomata. Sæpè etiam accidit, ut intestina inflammata sphacello lethali corripiantur, ut infra de vlceribus intestinorum dicitur. Rarum est, quod annotavit Guilielmus Fabricius, cent. 1. obs. 55. nobilem quandam foeminam se-

predecim annis hernia laborasse, & circa annum ætatis 63. torminibus maximis vexatam fuisse, intestinumque in abdominis rupturam impulsam, ac inibi retentum dolores non leues, simul & inflammationem, aliaque graviora symptomata concitasse. Vocatus ad curam Fabricius inuenit dextrum inguen gangræna affectum. Scarificato itaque tumore & cæteris, quæ ad gangræne curationem attinent, adhibitis, caro putrida & callositas rupturæ exciderunt: vnde symptomata, dolores, inflammatio, febris, tormina, liporhymia, nausea & vomitus sedata sunt: sed intestinorum materia, nondum penitus excrementosa, velut ilei & cæci, per abdominis rupturam excernebatur, circiter menses duos. Ægra tamen multum mirantibus adstantibus, fauente numine, sanata & à raptura perfectè curata fuit, nullâ relictâ fistulâ.

#### Indicationes & Curatio.

Itaque prima cura hic esse debet, ut intestina reponantur; quod quidem non difficulter præstare licet, si intestina sint flaccida & vacua. Tū enim resupinato ægro & cruribus eleuatis manu sensim repellenda & superiora versus comprimenda sunt intestina. Si autem turgeat, ut reponi non possint, videndum est, an sint flatūs in intestino, an verò stercus. Flatūs ex eo cognoscuntur, si æger percipiat totum abdomen ferè à flatibus distendi, si flatūs emittat & rugitus in intestinis audiantur, dolorque extendens adsit sine gravitate. Feces verò alui si intestina distendat, aluus supprimitur per aliquot dies, tumorque sensim crescit & pondus maius, maiorque durities percipitur. A flatibus ergo si intestina repleantur, discutientia vsurpanda, eaque per os exhibenda, ut semen fœniculi, anisi, cumini, galanga & similia, atque eadem per clysteres iniicienda, & extra ex dictis seminibus, item seminibus fœnugræci, foliis lauri, pulegij & similibus fomenta applicanda, quibus, si dolor adsit vehemens, addere licet mitigantia dolorem, ol. rosac. chamæmelinū, amygdalarū dulcium. Quod si flatūs illi foueantur à cruditatibus & materia pituitosa, difficilis curatio. Valida enim illa discutientia si adhibeantur, materiam illam pituitosam in flatūs vertunt, & tumorem ita augent. Hoc in casu exhibent nonnulli ol. amygd. dulcium, quod lubricando materiam tollit, aut alia lenientia, quæ illam euacuant. Verum quamuis hæc, si non magna sit materiæ copia, adhiberi possint: tamen si maior sit copia, suspecta sunt, & verendum, ne materia illa ad locum affectum præcipitetur. Quare tum danda opera, ut materia illa sensim per clysteres & glandes educatur, & pituita per incidentia attenuetur & eliquetur, non per discutientia in flatūs vertatur: quo fine imponi potest oxymel cum medulla panis vel farina triticea, aut oleo antiquo vel chamæmelino. Ipsa verò pars quantum fieri potest, laxanda iis, quæ iam dicuntur, ut dolor minuat.

Si autem feces induratæ adsint, longè periculosissimum id est, ideoque maturè adhibenda emollientia ex rad. althææ, librorum alb. foliis malvæ, parietaria, semine lini, fœnugræci, vel farina seminis lini & fœnugræci, butyro recenti sine sale, pinguedine gallinacea, oleo liliorum, communi, amygd. dulcium, & similibus, quæ cataplasmatibus modo sunt applicanda. Si cataplasmata non sufficiunt, aut non suffectura videntur, potest balneum aquæ dulcis adhiberi, in quo modo dicta emollientia coqui possunt, additis etiam oleis. Nonnulli in solius olei communis balneo ægrum per tres horas desidere iubent. In omenti prolapsu rarò hisce medicamentis opus est; cum in inguine id plerumque subsistat, & ægro resupinato vel sponte, vel manus opera adhibita in locum suum redeat. Si tamen, quod interdum accidit, in scrotum vsque prolatur, eodem modo, ut de intestinis iam dictum, reponendum.

Cum autem sæpe omnia hæc parum proficiant, atque ægro

ægro præsentissima mors imminet; extrema etiam tentanda sunt. Qua de causa Paræus, lib. 5. cap. 15. ad chirurgiam accedere, & ductum illum, per quem intestina elapsa sunt, sectione dilatare suadet, quæ qua ratione sit instituenda, ibidem docet. Sed, ut ipse etiam monet, diligenter in tali casu perpendendum est, quid ægri vires perferre possint, & videndum, quousque iam malum processerit. Nam si inflammatio intestina iam occupauerit, & alia extrema mala adsint, vix hoc modo quicquam perficitur. Præterea intestina distenta cutique firmiter incumbencia facile sectione lædi possunt. Et licet non lædantur sectione intestina: tamen nuda minus commodè, quam cute tecta, præcipue dolore ex sectione accedente, tractari possunt, & parum eâ plerumque præstatur, sed si mors subsequatur, eius à medico acceleratæ suspicio præbetur. Si verò in aliis abdominis partibus abdomen ruptum sit, tutius sectio, si opus ea sit, institui potest; cum intestina non adeo ibi distendantur, locusque peritoniæ facilius inueniri & digito ad-moto intestina intus sensim protrudi possunt.

Vbi iam intestina reposita fuerint, proximum est, cauere, ne iterum excidant. Qua in re maximi momenti sunt fasciæ seu subligacula, adeo ut in iunioribus & recentioribus rupturis tota ferè curationis spes in hoc sita sit. Natura enim vel paululum arte adiuta sanat sæpè morbos qui insanabiles existimabantur, & experientia sæpè obseruatum est, etiam in adultioribus, modò intestina suo loco diligenter retineantur, herniam curatam fuisse, & si ruptura vniui non potuit, saltem circa processus foramen quid generasse, quod intestinorum lapsum prohibere potuit. Et quamuis integræ sanitatis spes sæpè non sit: tamen ad necessarias actiones sine damno & periculo exercendas plurimum facit fasciæ aptæ vsus. Fasciæ autem parandi commodissima hæc videtur ratio. Paretur cingulum seu fascia ex corio, quæ molliori lineo vel gossipino panno, atque etiam gossipio nonnihil suffulto inducatur, ligulâ stringi possit. Fascia hæc ventri infra hypochondria supra coxendicem proxime inguina applicetur, ita tamen, ne partes, quæ sunt supra ilia & ossa, lædat & atterat.

Huic fasciæ seu cingulo alia fascia cum splenio seu puluinati quodam ita adaptari debet, ut quantum opus est, constringi possit, ipsumque splenium rectâ loco affecto, seu illi parti, vbi intestina excidere solent, incubat, atque incubitu suo intestinorum prolapsum prohibeat. Præcipua autem cura esse debet in concinnando & adaptando splenio. Hoc verò non pilæ modò rotundum esse debet, ne protuberantia illa interna inguina nimis comprimatur, & faciat, ut foramen rupti peritonæi dehiscat; sed sit triquetrum, solidum quidem & compactum, intus tamen nonnihil cauum, ut inguinum naturalem cauitatem aptè excipiat, & labia rupti peritonæi contineat, non laxitate nimia intestina protuberare permittat, nec compressione efficiat, ut labra dehiscant. Splenium hoc extra obducunt nonnulli lamina argentea, vel duplicato aut triplicato corio: sed idem ex panno gossipino, gossipio bene intertexto & suffulto satis commodè parari potest, ut nec premat, nec lædat, intestina tamen contineat. Ut autem rectius hoc præster, fasciæ, quæ ventrem ambit, nonnulli geminas habenas adaptant, quæ ad humeros adscendunt & collum ambiunt.

Pro fascia paratur etiam cingulum ferreum cum scuto ferreo, quod locum, vbi intestina procidunt, arcu tangat, & intestinorum prolapsum prohibeat.

Verum instrumenta hæc parandi ratio commodissime Aretæa docet, & figuræ quæ habentur apud Paræum, l. 7. c. 15. & optimè apud Platerum, Pract. tract. 3. quæ ibi videri possunt.

In aliis abdominis partibus, ut umbilico & vicinis locis, si intestina excidant, cingulum parari debet, quod abdomen eò loci, vbi intestina procidunt, ambiat, pul-  
noque locum affectum premat. Et ne cingulum hoc ver-

sus inferiora procidat, vel propendeat, fasciæ, quæ humeris sustententur cingulo adaptandæ, vel pectorali id allegari potest.

Hoc modo fasciæ adaptatæ faciliè intestina, ne relabantur, continere possunt: quod vbi factum, danda opera, ut excrementa potius mollia sint, quam dura, & alius non supprimatur; & in eiciendis fecibus obseruandum, ut manu inguina & scrotum contineantur, ne feces emittendo intestina extrudantur, deinde cauendum, ne flatu, qui intestina distendunt, ex cibis flatum generantibus assumtis producantur. Porro etiam omnis motus vehemens, saltus, cursus, oneris grauioris gestatio, vociferatio, & alia exercitia vehementiora vitentur: & in tussi, sternutatione idem obseruandum est, est quod modò in egerendis alui fecibus obseruandum esse diximus. Et si manu tum comprimere non liceat, crura saltem comprimenda, aut decussatim implicanda sunt, ut ruptura contineatur & comprimatur. Frigus etiam constringendo prolapsum intestinorum promouet, & imprimis, si prolapsa iam sint intestina, valde iis nocet, & ut intumescant facit. Ideoque herniosis cauendum.

Repositis hoc modo intestinis si malum sit maius & curatu difficilius, atque in corpore iam adultiore, ut felicius ac citius succedat curatio æger in lecto per dies aliquot se contineat & supinus decumbat.

Medicamenta autem, quæ adhibeantur, duplicia sunt, alia topica, alia quæ intrò assumuntur. Topica sunt glutinantia, quæ idem sunt adstringentia, sed non solum siccantia, verum etiam aliquam visciditatem habentia. Non etiam omnia adstringentia & vulnera consolidantia æquè hic prodesse, sed peculiariter quædam commodè adhiberi, obseruatum est. Inter quæ primas tenet *symphytum maius seu consolidam maiorem, sanicula, iacea alba & nigra, herba Trinitatis, sigillum Salomonis, pentaphyllum, tormentilla, nuxes cupressi, filix præcipue fœmina, hypoglossum, pilosella, perfoliata, herniaria*; quibus alia etiam postea addantur, *galla, balaustra, bolus Armenus, terra sigillata, sanguis draconis, malicorium, ichthyocolla, thuris, myrrha, mastiche, bdellium, pix Græca, resina pini, terebinthina, cera*, ex quibus composita varia concinnare licet.

Et si verò peritonæum ruptum vix consolidari amplius potest: tamen horum medicamentorum vsu, præsertim si malum recens sit, caro accrescere solet, quæ foramen claudit. Quod ut rectius fiat, diligenter interim cauendum, ne intestina vllò modo procidant, exitumque quærentia foramen iterum aperiant. Itaque toto curationis tempore vel æger in lecto supinus decumbere; vel fasciis & subligaculo intestina, ne procidant, continere debet. Quæ omnia si rectè & decenter fiant, sæpè desperatæ herniæ curantur. Refertque Ambrosius Paræus, lib. 7. cap. 15. etiam quadragenarios interdum hoc modo restitui, & à se monachum quendam integrè restitutum fuisse, qui cum post sexennium pleuritide mortuus, & post mortem apertus esset, inuenta est circa foramen processus peritonæi substantia adiposa oui magnitudine eò loci tenaciter adhærens. Primas autem inter alia tenet emplastrum de pelle arietina dictum Arnoldi de villa noua, quod describit *Breuiarij lib. 2. cap. 44.*

*℞. Lithargyr. lapid. hamatii. sang. draconis; boli Armeni; mastiches. gummi ammoniaci, mumie, galbani, thuris, costi, lumbricor. terrestr. an. Drach. 8. rad. consolid. maioris, medice, & minoris, rosarum, myrrha, aloës, ana Drach. iij. palæ marina vsta, gallarum immaturar. succi hypocistidis, balaustrorum, aristoloch. rotund. an. Drach. vj. picis natiualis, Græce, cera, alba, rubra, ana Drach. j. visci querni, terebinthina, ana Drach. ij. sanguinis humani Vnc. ix.*

Coquatur pellis arietina cum omnibus pilis per integrum diem, quousque planè dissoluatur & liquore assumpto gluten restet. Eius colari *℞. lb. j. vel q. s. in qua viscum bulliat ad lentum ignem continuo agitâdo:*

DDDD postea

Medicamen-  
ta in herniâ  
vsurpanda.  
Topica.

Emplastrum  
de pelle Ariet.  
Arnoldi de  
Villa noua.

Fasciæ pa-  
randi ratio.

postea reliqua in puluerē redacta, cera iidem, pix, terebinthina iniicienda, & tam diu coquenda, donec gutta super marmor proiecta coagulentur: sanguis verò humanus ipse etiam prius in furno moderato calore exicari debet, ut possit in puluerem redigi & cum reliquis inspergi.

Plura etiam alia apud Arnoldum de Villa noua loco allegato reperire est. Potest & tale fieri:

℞. Nucum cupressi, rad. tormentilla, ana. Drach. j. balaustrorum, cortic granatorum, an. Drach. s. rad. consolida, perfoliata, herniaria, ana Drach. j. s. mastich. bdelly, thuris, ana Drach. j. boli Armeni, Drach. ij. sang. draconis, Drach. j. picis Græca. Vnc. j. resina pini, picis naturalis, ana Vnc. s. terebinthina, cera ol. hyperici compositi Solenandri, ana q. s.

Fiat Emplastrum.

Oleum autem hyperici, quod in hoc affectu & in aliis affectibus, ubi membranæ aut neruosum genus læsa sunt valde commendat Solenander, hoc modo paratur.

Oleum hyperici Solenandri.

℞. Ol. opt. lb. j. s. sem. & florum hyperici Vnc. ix. vini maluatici Vnc. viij. rad. tormentill. Drach. iij. myrrha, gummi elemi, sarcocolla, auris, aloës epatica Vnc. j. s. lumbricorum vino lotorum Vnc. iij.

Concisa & contusa misceantur & bulliant ad consumptionem humidi in vase duplici: deinde exprimatur oleum.

Cui adde croci Scrup. iij. olei seu lacryma abietis vel terebinthina pure lb. s. flor maturorum hyperici, M. j.

Infund. per dies 8. ad Solem aut in alio loco calido; deinde expressis atque abiectis floribus alij recentes inficiantur, idque quater repetatur.

Simplicius in hernia medicamentum est hoc.

℞. Rad. consolida maioris Vnc. j. rosar. rubr. farina fabar. ana Vnc. s.

Omnia in puluerem redacta cum pinguedine capri misceantur in formam linimenti, aut cera addita, vnguenti, & linteo induta loco affecto applicentur, singulis diebus renouentur, & per plures dies vsurpentur. Potest etiam aliquid addi de pinguedine vrsi.

Sed talia passim plurima in lectione autorum occurrunt, & ex supra enumerata materia plura cuius componere licet. Sed antequam talia applicentur, vel etiam cum medicamentum nouum imponendum est, vtiliter locus affectus foueri potest fomentis ex sequentibus paratis, rad. consolida, sanicula, sigillo Salomonis, rosas rubris, bursa pastoris, plantagine, auricula muris, cauda equina, radice tormentilla, alumine, corticibus thuris. Post fotum inungi pars vel oleo hyperici Solenandri, vel oleo destillato terebinthinæ vel tali aut simili linimento potest.

℞. Ol. mastichini Drach. vj. myrtini Drach. iij. absinth. aloës, myrrha ana Drach. j. axung. cerni Drach. ij. succi rad. consolida Vnc. j.

Bulliant ad consumptionem succi, colentur, atque addatur aliquid de oleo terebinth. & hyperici.

Interna verò medicamenta quod attinet, etsi omnia illa, quæ ad vneratas potiones adhibentur, hæc etiam non incommode adhiberi possint: tamen & hoc obseruandum est, alia aliis esse efficaciora in hoc affectu, ut sunt illa nuper recitata, symphytum maius, herba Trinitatis, hippoglossum, cuius puluis in decocto radicum consolida assumtus mira hic præstat; pilosella, cuius puluerem in cibis exhibitum certò etiam prodesse compertum est; perfoliata, quæ per signaturam æternam, ut vulgo loquuntur, seu peculiarem characterismum in foliis, quæ caulibus media perforantur, à natura proposita ad hunc affectum videtur, atque experientiâ teste, quocunque modo assumpta herniam curat. Imprimis verò ad affectum hunc commendatur herba, ab Hollerio in vsum ducta, idcirco Holleriana appellata, & ab hoc affectu herniaria nominata. De hac enim scribit Hollerius, quod ex ea succus expressus vino rubro & per 9. dies potus

Interna.

Herniaria aliàs Holleriana dicta.

hernias perfectè sanat. Et Antonius Valetius, in exercit. in Hollerium, scribit, eius aqua stillatâ, cum alia remedia non iuuarent, curatum esse adolescentem herniosum. Sunt & alia vtilia, ut radix caryophyllata, consolida media, & micor, Saracenicæ, virga aurea, plantago, ophioglossum.

Ex his & similibus varia, quæ medicamentorum internorum loco vsurpari possunt, confici solent. V. g. puluis talis.

℞. Herniaria perfoliata, rad. consolida maior. an. Drach. ij. millefol. Drach. j.

F. Puluis,

Saporis gratioris causa saccharum, vel saccharum ros. tabularum addi potest. Vel saccharo, additis ventriculo gratis medicamentis, fiant rotulæ.

Vel ℞. Rad. consolida. herniar. perfoliata ana q. s.

Et succo herniarie vel syrupo de rosis siccis.

F. Pilulæ.

Idem etiam puluis placentulis, iusculis, aliisque cibis quocunque modo admisceri potest.

Vel etiam talis potus parari potest.

℞. Consolida maioris, minoris, media, fol. plantagin. perfoliata, herniaria millefolij, rad. valeriane ana Vnc. j. rhabarb. Drach. ij.

Coq. in vino bono in vase duplici.

Dosis sit Vnc. iij.

Vel ℞. Rad. consolida Drach. vj. sigill. Salomonis Dr. iij. sanicula, herniaria, frigaria ana M. j. sem. anisi, fœniculi ana Drach. j. s.

Coq. in s. q. aqua pro lb. j.

Colatura dulcorentur saccharo cando.

Vel ℞. Rad. consolida maior. pimpinella ana Vnc. j. tormentill. Vnc. s. bislingua, herniaria ana Drach. v. sem. fœnicul. anisi, cinamomi ana Drach. j. myrrha Drach. s.

Cum aqua rosarum chalybeata, vel syrupo rosarum siccarum.

F. Elect. de quo aliquid manè sumatur, & haustus maluatici, vel aliquid conuenientis liquoris superbibatur.

Vel ℞. Conseru. ros. rubr. Vnc. ij. symphyti maior. herniarie, tormentilla, acori palaustris, ana Vnc. j. salvia, Vnc. s. cinamom. Drach. ij.

Cum syr. myrtillor. vel corallino.

Fiat Electuar.

Si cui pulueres vel decocta sumere molestum est, plantæ selectiores aridæ vino macerentur, & colatura instar clateri propinetur, quod minore cum nausea sumitur.

Et omnino hic danda opera, cum medicamentorum continuatione opus sit, ne illorum vsu ventriculus lædatur. Ideoque ventriculo grata addi possunt.

Nonnulli hanc curam ut certissimam, nec sine ratione, commendant.

1. ℞. Rad. cichori flore albo (circa festum D. Iacobi effodi volunt) part. iij.

Pulsatilla part. ij. sem. perfoliata part. j.

F. Puluis, de quo in prandio & cenâ quantum tribus digitis primotibus capi potest, in iure carnis capiat æger vsque dum interdum integrè restituatur.

2. ℞. Rad. enula, sanicula, diapensia, consolida maioris, solidaginis Saracenicæ, agrimonia, ana. q. v.

F. Decoctio in vino & aqua ad consumptionem medietatis. Hoc decocto calido petiæ madesiant, iisque quotidie locus affectus sapius fomentetur & postea sequenti vnguento inungatur.

3. ℞. Ol. vitell. ouorum, pulueris tormentill. q. s.

F. Vnguentum.

Refert etiam Paræus, quendam chirurgum hoc modo herniâ laborantes curasse. Magnetem in tenuissimum puluerem redigebat & in abis exhibebat: inde verò locum rupturæ per quem descendebant intestina, melle inungebat, & ferri limaturam aspergebat, atque id per dies 10. vsurpauit, fasciâ simul adhibita.

Ac



Ac si aliqua fuit efficacia, proculdubio ex vi magnetis ferrum attrahentis dependebat.

Atque hæc frequentissima sunt, quæ in hernia intestinali vel ex rupto, vel ex laxato peritonæo ortum habente, adhibentur. Verum si ex iis integram sanitatem æger consequi non possit, fascia contentus erit, qui periculosiora medicamenta tentare non cupit. Hæc n. sola si rectè contineantur intestina, omnibus vitæ actionibus sine magnò impedimento vacare poterit.

Qui verò his contentus non est, sectionem admittere poterit, & curationem per chirurgiam, quam describit Fallopius, Paræus, Platerus, Fabricius & alij, cuius is est commodior modus, qui fit sine testium excisione, atque etiam sine vasorum spermaticorum læsione, quod vulgò empirici parum curant, & dum vnum morbum curant, alium fortasse grauiorem reponunt. Sed antequam alia tententur, omnia diligenter prius perpèdenda sunt, nec nimis citò ad sectionem properandum, sed alia prius auxilia tentanda, cum sæpè etiam præter omnem spem curentur herniæ.

Alum tamen adhuc modum per chirurgiam, sed sine sectione, hernias curandi proponit Platerus, quem Gallus quidam vsurpauit, cui feliciter medicamenti spectator Platerus adfuit, & ex literis testimonialibus cognouit, eum multos hoc modo sanasse. Quæ ratio cum sine dolore aut saltem exiguo fiat, citraque hæmorrhagiam, est commodissima & tutissima; siquidem vasa sanguinea neutrquam tinguntur, ideoque melius conspici & tractari queunt, eoque magis optanda in masculis, quod citra testiculi ablationem & castrationem perficiatur, hoc modo.

Cauterium potentiale paulò supra testiculi regionem lateris rupti, vbi peritonæi processus saccum subit, collocauit, eà quantitate, vt semidigiti longitudine cutem mortificando escharam inuaserit, quàm mox discissâ, aliud cauteriũ imposuit, donec cute integrè ablata pinguedo apparuit, quam forcipe discidit eo vsque, vt processus vasa seminaria deferens pateret. Quibus biduo peractis vasa illa digitis à processu artificiosè separauit, & acu curuatâ filum subduxit, processumque leuiter strinxit, nullum planè dolorem tunc inferendo. Filo postmodum successu temporis sponte elapso, admotis vnguentis sãptoticis, carnem calli instar sensim illic produxit, quæ eò facilius huic processui, cum tunica illa elythrois rubra, carnosa musculosaque sit, accreuit, & sic premendo ac opplendo locum deperditæ substantiæ viam prolapsus visceribus occlusit, sicque curam integrè & feliciter citra castrationem absoluit.

Quæ hæcenus de cura herniæ intestinalis dicta sunt, applicari quoque possunt herniæ ex omenti prolapsu ortæ. Idem etiam in eius curatione sunt scopi. Primò videlicet reducendum est omentum, quod manuum sit opera; deinde prohibendus elapsus, quod fit fascia & dicamentis adstringentibus, quæ modò enumerata sunt. Quod si hernia non curetur, etiam per sectionem curari poterit. Eadem etiam plane ratio est omphalocelen curandi.

## CAPVT VII.

### De Ani procidentia.

**P**rolabitur interdum & anus seu podex ac intestini recti pars exterior ita, vt post consuetam illam, quæ in excrementis alui egerendis accidere solet, eminentiâ, rursus in locum suum & intra corpus reduci nequeat, sed extra promineat; quod malum *Ani procidentia* nominatur.

#### Causa.

Accidit autem ani procidentia variis de causis: primò ex magno conatu, si anus adeo propellatur, vt partem intestini recti secum trahat, eamque à membrana mesenterij, quæ intestina suspensa retinet, nonnihil auellat.

Dan. Sennerti Tom. II.

Et si enim anus musculos oppositos habet, qui eum naturaliter in excrementorum expulsionem exsertum retrahunt, tamen si nimis exseratur, aliisque vinculis non sustineatur, soli id præstare nequeunt. Fit autem hic conatus nimis in fecibus alui duris excernendis, item in partu difficili & laborioso. Præterea sæpè hoc accidit ob magnam irritationem, vnde ani procidentia sæpè in dysenteria & hanc sequente tenesmo contingit. Ex incisione etiam in Perinæo iuxta anum pro vesicæ lculi extractione & ob cruciatum illum podicem propulsum fuisse Platerus vidit.

Deinde accidit ani procidentia ob musculorum, qui post alui egestionem anum propulsum retrahere solent, imbecillitatem aut resolutionem. Atque ob hanc causam prolapsus quidem anus extra remanet, vetum non nisi magno conatu præcedente prolabitur. Accidit autem hæc imbecillitas musculorum, vel quia ani procidentia frequens & diuturna accidit, vel à refrigeratione eorum sessione super lapide frigido aut mora in aqua frigida. Quibus nonnulli & mollitiem nimiam ac humectationem addunt, qua de causa infantibus hoc malum familiaribus est. Resolutio verò, de qua infra suo loco dicitur, à defluxione ex superioribus quidem fieri non potest; cum impossibile sit, vt humor ex superioribus defluens tantum in eos exiles nervos sese insinuet, vt non simul superiores & vicinos afficeret. Verum si nervi circa ossis sacri aut coccygis regionem contundantur, aut valde refrigerentur, musculos hos resolui, & anum inde procidere posse, non impossibile est. Idem etiam fieri potest ab abscessu vel fistula circa musculos sphincteris; vbi tamen etiam irritatio locum habet.

#### Signa Diagnostica.

Malum ipsum per se patet, & visui manifestum est. Causas quod attinet, si magnus feces excernendi conatus, vel partus laboriosus & difficilis causa sit, id ex relatione ægri patet. Si ex irritatione sit, æger dolore insignem percipit. Si ex debilitate musculorum, frequens fuit hoc malum, aut refrigeratio musculorum ani præcessit. Eadem etiam resolutionem inducere potest, vt & percussio vel lapsus in eum locum, quod ex relatione ægri innotescit. Et prolapsus ani ex imbecillitate musculorum eum retrahentium hoc habet peculiare, quod anus non procidit, nisi per conatum prius extrudatur.

#### Prognostica.

1. Difficilius hoc malum curatur in senibus, quam in iuuenibus.
2. Si ob conatum solum vehementem, nulla alia causa accedente, podex prolabitur, interdum sponte in locum suum redit, vel manus opera facile reducitur.
3. Si cum fluxu ventri & dysenteria ac tenesmo sit ani procidentia, vix curatur, ni causa sublata.
4. Si ab imbecillitate aut resolutione musculorum originem, habet & quotiescunque alius excernitur, procedit, vix curatur.
5. Omnium periculosissima, & quæ vix curatur, ani procidentia est, quæ accidit ob auulsionem intestini recti à membranis, quibus retinetur.

#### Indicationes & Curatio.

Anus prolapsus intra corpus, reponendus molliter manu ægri vel Chirurgi. Quod si intumuerit, & inde repositio impediatur, fouendus decocto maluæ, althææ, florum chamæmel, seminis scœnugræci, lini, & inungendus butyro vel oleo chamæmelino, vel æger collocandus in balneum è modo dictis paratum.

Repositus autem anus in suo loco retinendus partim adstringentibus, partim causticis, quæ ani procidentiam excitauerunt, ablatione. Proinde podex repositus

DDd 2 frequen

Sedio.

Herniam curandi modus chirurgicus sine sectione.

Ani procidentia.

Causa.

Curatio.

fouendus decocto corticum granatorum, flor. rosar. rubrarum, plantaginis, balaustrorum, bursæ pastoris, baccarum myrti, sumach, thuris, facto vel in aqua calida, vel in vino rubro adstringente: postea locus inungendus oleo rasaceo, myrtino, & inspergendus puluere è thure, mastiche, sanguine Draconis, floribus rosarum rubrarum, balaustris, gallis, sumach, myrtillis.

Causæ ut declinentur & auertantur, si conatus vehemens ob difficultatem egerendi causâ sit danda opera, ut aluus laxa sit, ac feces molliores, & ad facili excrenendum aptæ reddantur, ne tanto conatu in excernendis iis opus sit. Si ab acrimonia humorum, quod in dysenteria & tenesmo fieri solet, sit ani procidentia, humorum acrimonia temperanda, itque auferendi, ut de Tenesmo dicitur. Si quæ solutio continui facta sit, & membranæ ac vincula illa, quibus intestinum rectum vicinis partibus connectitur, rupta, consolidantia exhibenda, qualia ferè in hernia vsurpari solent. Si ab imbecillitate vel resolutione musculorum, ea, quæ in paralyti vitia sunt quæque anum roborant ac firmannt vsurpanda. Vtiles hic imprimis sunt suffitus & fumus ex thure, mastiche, ladano, colophonia, rosis rubris, bdellio, nucis moschata, caryophyllis, macere. Vel foueatur anus decocto, aut immergatur balneo, quod vim nervos roborandi, & intemperiem frigidam corrigendi habet parato è consolidida, foliis quercus, millefolio, betonica, salvia chamæpithy, primula veris, stachade & similibus. Vel inungantur oleo nardino, laurino, castino & similibus. Vid. Amatus Lusitanus, centur. 1. cap. 39.

Guilielmus Fabricius etiam, ut refert cent. 3. obs. 76. Virum quinquagenarium, cui cum in via aluum exonerare veller, intestinum rectum prolapsum erat, & ex aère frigidior dolor maximus in eo exortus, & intestinum rectum prolapsum ad magnitudinem ouis struthij tumefactum & excrementa continuè, eaque liquida & viscida effluebant, sic curauit.

Primò sequens applicuit fomentum.

℞. Fol. & flor. verbasci albi, flor. meliloti, chamæmeli, rad. & fol. alib. an. M. j. sem. lini sænugr. an. Vnc. j. anisi Drach. j.

Coq. in lacte vaccino recenti: in decocto isto linteamina duplicata intinxit, & per horam integram calidè applicuit.

Deinde toti intestino sequentem insperxit puluerem.

Nuc. cupressi mastich. thuris croci martis plumbi vsti an. Drach. j.

F. Puluis.

Tandem caput ægri in terram inclinauit, pedes verò in altum à duobus fortibus viris eleuantur, curauit, mox indice manus dextræ linteo molli inuoluto, & decocto præscripto intincto, ac medium intestini, quod prolapsum fuerat, immisso, id in locum suum feliciter reduxit; & postea etiam, quæ necessaria erant, peregit.

## CAPVT VIII.

### De Vulneribus Intestinelorum.

#### Causæ.

Intestinelorum  
vulnera.  
Causæ.

Intestina, ut alias corporis partes, à variis telorum generibus vulnerari interdum, notissimum est. Hoc verò rarum est, intestina à causâ interna & statibus rumpit. Obseruauit tamen id bis Beniuenius, ut de abdit. sanat. causis. cap. 67. refert, primò in muliere quadam, quæ cum intolerabili ventris dolore modò infra ritus erumperet, scisso seu rupto tandem intestino vitam finit: deinde in rustico, qui cum post longas ventris torsiones diem obiisset, & mortui corpus incideretur, longa in intestino fissura inuenta est, è quâ etiam recentes vuz, quas paulò ante comederat proruperunt.

Præterea à vermibus quandoque intestina perforan-

tur, ut annotatur Paulus Aegineta, lib. 4. cap. 57. Auic. lib. 3. fen. 16. tr. 5. cap. 1. Petrus Apponenfis differ. 101. Nicolaus Florentinus, serm. 5. tract. 8. cap. 54. Paræus, lib. 19. cap. 13. Thomas à Vega, ad cap. 5. lib. 1. de loc. aff. Galeni. Trincauellius, lib. 9. de rat. curandi particulas corporis humani affect. cap. 11. Petrus Forestus, lib. 7. obs. 35. in schol.

Tandem etiam obseruatum, ut in Schenckij obseruat. lib. 3. obs. 266. habetur, fracta cocta spuria eiusdem particulam palmæ longitudine in abdomine penetrasse, intestinum rectum perforasse, & summo cum cruciatu septima die per aluum excretam fuisse.

#### Signa Diagnostica.

Si vulnus in abdomine acceptum in cauitatem eius usque penetrat, intestina vulnerata esse suspicio est. Quia verò vel gracilia, vel crassa vulnerantur, gracilia intestina, & præcipuè ieunum, vulnerata esse cognoscitur, quod cibus & potus per vulnus exeant, præcordia duriora reddantur, bilis vomitu reiciatur, dolores fiant magni, febris adsit. Si crassa vulnerata sint, ex stercoris per vlnus egressu, vel eius è vulnere odore cognoscitur, aluus suppressitur.

#### Prognostica.

1. Intestinelorum tenuium vulnera habentur lethalia, ut est apud Hippocratem, 6. aph. 18. & Gal. 6. meth. med. cap. 2. quia eorum tunica nervosa est, multis vasibus repleta, bilemque recipit, ac ipsa epati propinqua sunt. Quandoque tamen & tenuium intestinelorum vulnera sanata fuisse, obseruationes Medicorum passim docent.

2. Crassiorum verò intestinelorum vulnera, si sint parua & secundum eorum longitudinem, facilius curantur; cum quia pauciora & minora vasa habent, tum quia medicamenta per clysteres injecta facilius penetrare ad locum affectum possunt. Si verò sint magna, & per transversum, sunt periculosa.

3. Si ab aère alterentur intestina, & liuida reddantur, malum incurabile est.

#### Indicationes & Curatio.

De Intestinelorum vulnerum curatione diligenter agit Galenus, 6. meth. med. cap. 4. Nimirum primo intestinum vulneratum, si fieri potest, consuendum. Secundò Medicamenta ei applicanda. Tertio si prolapsum sit, in suum locum reponendum. Quarto curandum, ne feces in transitu ipsi noceant: tandemque abdominis vulnus consolidandum. Ne tamen affluxus humorum fiat, venæsectio, si opus, instituenda.

Primò ergo si vulnus amplum sit, & intestinum vulneratum sit prolapsum, statim vulnus suendum, si opus sit, & in suum locum reponendum. Nisi n. id statim fiat, ab aère ambiente alteratur, ac liuidum euadit, & omnis curationis spes præciditur. Et si verò varij intestina consuendi modi ab Autoribus traduntur: tamen commodissimum est acu subtili breui & rotunda & filo lineo, forti & æquali ea consuere, eo ferè modo, quo pelliones pelles & vulgo linteamina consuere solent. Sutura autè facta filum non abscindendum est, sed vtrique extremitas eius extra vulnus propendere debet, ut postea suo tempore extrahi possit, postea vino albo tepido, vel in quo rosæ, chamæmelum, absinthium coctum sit, abludum, & puluere aliquo adstringere & glutinare ex aloë, mastiche, thure, sanguine Draconis, mumia conspergendum, ac in locum suum reponendum, & manibus leniter id & blandè intromittendum. Quod si facili fieri non possit, & intestina aëris ambientis frigiditate alterata inflata sint, ac intumuerint, statim fouenda spongiâ aqua calida madida, interimque vinum calefaciendum, & cò

Intestina  
vulnerata  
consuendi  
modus.

& eò spongia imbuta intestino apponenda. Quod si nondum satisfecerit, fomententur intestina decocto calefaciente ex floribus chamæmeli, anetho, absinthio, baccis lauri, semine anisi, fœniculi, vel columba aut galina per medium secetur, & intestino tumentis admoueat. Vbi iam intestinum detumuerit, inungatur oleo mastichino & chamæmelino, & suo loco reponatur, ægro ita collocato, vt pars abdominis vulnerata sit loco superiore, & in altu attollatur. Quod si hoc modo intestinum reponi non possit, incidendum tantu cutis & peritonæi, quantum ad intestinum, quod excidit, reponendum satis est.

Instrumentum verò ad sectionem hanc commodissimum est, quo ad fistulas incidendas chirurgi vtuntur, & syringotomum appellant, quod in extremitate, ne viscus aliquod inter secandum lædatur, globulo ferreo vel plumbeo munitum sit.

Sectione facta candela cerea imponenda est, quæ non extrahenda, donec reposta fuerint, intestina. Vbi reposta fuerint, spleniis & fasciis munienda, ne iterum excidant, & victus recta ratio ineunda, ne flatus, qui intestina distendunt, generentur. Tandem etiam abdominis vulnere prospiciendum: quod qua ratione fieri debeat, infra suo loco dicetur.

Vt verò facilius vulnus intestinorum consolidetur, medicamenta consolidantia vsurpanda, & quidem si vulnus sit in Intestinis superioribus, exhibendum decoctum florum rosarum, consolidæ majoris, pilosellæ, equiseti & aliarum plantarum vulnerariarum, vel diatragacanthum frigidum, vel cõserua rosarum rubrarum, cum bolo Armeno, terra sigillata, vel Diacydoniu cum puluere aut conserua rosarum rubrarum. Si verò crassa intestina vulnerata sint, clysteres ex istis medicamentis parati iniiciendi. Cibis quoque admisceantur pulueres ex coralliis, bolo Armeno, rosis: in potu mastiche dissoluatur.

## CAPVT IX.

### De Vlceribus & Sphacelo Intestinorum.

Differentia.  
Vlcera intesti-  
norum.

**E**xulcerantur quoque sæpe intestina. Id quod fit, cum ab assumtis medicamentis acerbis, tum ob affluxum humorum acrim; id quod imprimis in dysenteria euenire solet. In cuius explicatione cum ea etiam, quæ de vlceribus Intestinorum dici possunt, proponi soleant, hic plura de vlceribus Intestinorum non addimus, sed lectorem ad caput de Dysenteria remittimus.

Sphacelus In-  
testinorum.

Præterea quoque Intestina sphacelo interdum corripiuntur. Id quod accidere solet in vulneribus abdominis, in quibus intestina extra abdomen prolapsa ab aere externo alterantur, & liuida ac nigra euadunt, & tandem putrescere incipiunt. Imprimis verò id accidit in hernia, ileo, & intestinorum Inflammatione, quæ tadem in sphacelum degenerare solet, qui incurabilis est, hominique mortem adfert. Imò interdum non solum intestina putrescunt, sed & superiacentes partes abdominis putredine corripiuntur ita, vt tadem foramine aperto fæces per id egrediatur. Id quod bis vidi, primò in fœmina quadam, quæ cum hernia in dextro ingruine laboraret, nec de eo quippiam significasset, ac pondus quoddam eleuasset, intestinis eò loci prolapsis, de grauissimis doloribus cõqueri cœpit; sed cum quis reuera morbus esset, aperire nollit, tãdẽ intestina prolapsa inflàmata sunt & sphacelo correpta; imò partes intestinis incumbentes eò loci putredine corripere cœperunt, vt foramen tandẽ aperiretur, per quod fæces cum summo fœtore exibant. Deinde in iuvene quodam, qui cum herniâ laborans curâ velociter vectus intestinorum prolapsum passus esset, nec in pago qui ei succurreret, aliquẽ haberet, intestina inflàmata, & tãdẽ sphacelo correpta sunt, à quorũ putredine aliquot locis muscoli & cutis abdominis putredine & sphacelo correpta sunt.

Dan. Sennerti Tom. II.

Tandem patiuntur interdum & cancrum intestina, vt infra sect. 2. cap. 1. ex historia, quam Petrus Sal. Diuersus refert, constabit.

## CAPVT X.

### De Intestini recti morbis in specie.

**I**N specie verò Intestinum rectum multis morbis, imprimis tum oribus & vlceribus corripitur; patiturque præter naturam intestinum rectum inflammationes, hæc morrhoides, condylomata, ficus, cristas, rhagades, vlcera, fistulas. Præter naturam etiam clauditur interdum, de quo supra cap. 3. dictum.

### Inflammatiõ ani & hamorrhoides.

#### Causse.

Primò anum interdum inflammatio corripit, sanguine per venas ei inferris in eum effuso. Id quod accidit ex longa & dura equitatione, vel percussione aliisque causis violentis, item ab hamorrhoidibus restrictis vel à cauteriis & medicamentis corrodentibus dolorem excitantibus, & sanguinem eò trahentibus.

Inflammatiõ  
ani.  
Causse.

#### Signa Diagnostica.

Cognoscitur ani Inflammatio, vt aliarum partium è tumore calido, dolore acuto, qui premendo irritatur, alius difficulter redditur, & sæpe dies aliquot subsistit, accedit febris.

Signa.

#### Prognostica.

1. Inflammatio ani malum est curatu difficile & periculolum. Afficitur enim pars acuto sensu prædita, quæque medicamentis acrioribus facile irritatur. Præterea excrementa alui excernenda medicamentorum applicationem impediunt.

Prognostica.

2. Ob loci caliditatem & humiditatem inflammationes facile in vlcera degenerant.

#### Curatio.

Vt sanguis à loco affecto auertatur, vena primò in cubito aperienda. Postea detiuationis gratia, si opus sit, etiam in talo vena aperiri potest.

Curatio.

Venæ sectione peracta parti affectæ repellentia applicanda, mixtis tamen anodymis. Hinc in augmento aliquid discurrentium addendum, quæ versus statum & in statu augenda. Si suppuratio prohiberi non potest, in statu maturantia apponenda.

In principio ergo apponantur folia solani aut portulacæ, mica panis aqua rosarum madida, oleum rosaceum cum vitellis ouorũ coctorum mistum. In augmento apponatur medulla panis triticeæ cum oleo amygdalarum dulcium mista. In statu fiat fomentatio ex decocto maluæ, althææ, florum chamæmeli, meliloti, aut cataplasma ex iisdem, addita farinâ seminis lini. Si ad maturationem tendat, radix althææ & farina tritici addi potest. Et quidem si inflammatio ad suppurationem tendat, statim adiuuanda & abscessus aperiendus, antè quam plenam mutationem assecutus sit. Etenim pus diutius retentum intestina & vicina loca corrumpit, & vel gangrænam vel fistulam excitat.

Ad tumores ani etiam Hamorrhoides pertinent. Quandoque enim extremitates venarum in ano intumescunt, quandoque etiam inflammantur & magnum dolorem coniunctum habent. Verum eadem venæ etiam sanguinem fundere sæpe solent, atque insigne id in multis morbis est symptoma, infra in symptomatibus, quæ intestinis accidere solent, explicandum. Quapropter ibidem coniunctim ea, quæ de hamorrhoidibus à Medicis traditi solent, proponemus.

Hamorrhoides.

*Condylomata, thymi, ficus, crista.*

Vt in aliis corporis partibus varia verrucarum genera oriri solent: ita etiam in ano, quæ in specie condylomata, thymi, ficus & cristæ appellari solent. Ideoque quæ in genere de verrucis dici possunt, huc non afferemus, sed ad suum locum referuabimus; ea verò, quæ ano propria sunt, hic saltem explicabimus. Condyloma tamen nonnulli ad verrucas non referunt, sed pro peculiari tuberculi genere habent. Cum enim cutis ani sit rugosa, si ruga aliqua intumescat & indurescat, condyloma appellatur, seu, vt Aëtius *tetrab. 4. serm. 2. cap. 13.* scribit, CONDYLOMA est tumor quidam pelliculæ ani; tuberculum nimirum durum & obcalescens, ex humore melancholico eò affluente sensim excresecens, & tædio potius plerumque, quam dolore molestum. Interdum tamen etiâ inflammationem cõjunctam habet.

Condylomata.

Thymi.

THYMI verò sunt verrucæ asperiores, angustam basin & latam superficiem habentes & ad rubedinem tendentes, thymique florem referentes, quæ in superiore parte facile sanguinem fundunt.

Ficus.

Si thymi multum excresecant, FICUS seu SYCOSES appellantur. Et quidem è thymis aliqui sunt mansueti, aliqui maligni, & ex malignis aliqui cancrofi.

Crista.

CRISTÆ tandem sunt carnis excresecentiæ circa anum pullulantes, ex præpostera venere ortæ, ad quarum radices plerumque scissuræ seu rhagades adsunt. In Germania nostra, Dæo gratia, rarissimū malum est, sed pueris Romæ agentibus accidere, scribit Amatus Lusitanus, *centur. 2. cur. 87.* morbumque hunc se Romæ & Bononiæ in Nosocomio vidisse refert Forestus, *lib. 23. obs. 7. in schol.*

*Signa Diagnostica.*

Signa.

Tumores hi faciliè visu cognoscuntur, & ab hæmorrhoidibus discernuntur. In hisce enim affectibus sola cutis afficitur, nulla verò vena, id quod in hæmorrhoidibus accidit. Hæmorrhoidides etiam sanguine turgidæ magis nigricant.

*Prognostica.*

Prognostica.

1. Thymi pessimi sunt, & maximè vbi sanguinem effundunt, & si maligni ac cancrofi sint, praua symptomata inducunt, dolores ingentes, inflammationes, febres, & depascentia vlcera.
2. Periculosiores hi morbi sunt quòd sunt diuturniores; & præcipuè si malignitas luis venereæ cõjuncta sit.

*Curatio.*

Curatio.

Hæc mala quidem in principio medicamentis curantur: si vero jam diuturna sint, ad manuum operam confugere oportet. Apponantur autem folia rubi viridia, vel ferrugo cum succo verbasci imponatur.

Vel ℞. *Squama aris*, Drach. j. *auripigmenti*, Drach. ss. *alum. scissil.* Drach. ij. Et cum *ol. rosaceo* in formam vnguenti redigatur.

Vel ℞. *Spuma argenti, cerussa, ammoniaci, bdellii*, ana Drach. ij. *terebinth. Vnc. j. cera*, Vnc. ss.

Arida cum succo solani conterantur & reliquis miscantur.

Vt verò condylomata, ficus & thymi non renascantur,

℞. Cinerem sarmentorum vitis & cum aceto illinatur, quod etiam exstantes tollit, vt Aëtius scribit. Plura vid. apud Aëtium, *tetrab. 4. serm. 2. c. 4.*

*Rhagades ani.*

Rhagades ani.

*Paydēs* Græcis, Latinis scissuræ, fissuræ, rimæ, vt

in aliis corporis partibus accidunt, manibus, pedibus, labris, vteri ostio: ita etiam in ano, ac recti intestini extremitate, aut in sphinctere seu musculo anū claudēte accidere possunt. Suntque rhagades seu scissuræ ani oblonga quædam in eo vlcus sine tumore, iis similia, quæ interdum in manibus à magno frigore excitantur.

Differencia.

Suntque alia superficialia saltem, alia profundiora: alia sine duritie & callo, alia callosa latera habentia: alia humida & saniem fundentia, alia sicca & cancrofa.

Fiunt autem talia vlcera vel ex affluxu humorum acrimum & erodentium, & lentorē quendā, ob quem partibus adhærent, participantium, bilis scilicet, & salis pituitæ, id quod accidit sæpè in dysenteria & hæmorrhoidum fluxu, vel ob partiū harū siccitatē, ob quam anus finditur, & rimas quasi agit. Interdum etiam intemperies sicca acres humores coniunctos habet. Humor affluens quandoque etiam malignus est: id quod in lue venerea accidit. Excitantur & ob condylomatū inflammationem extensionemque. Fiunt quoque in ano istæ fissuræ ob fecum siccitatem & duritiem nimiam, quæ in exitu anum distendendo cutem ibi rumpunt. Idem præstare possunt glandes acres, clysteresque acres iniecti, vel non rectè iniecta clysteris, fistula, emplastra item calida & siccantia admodum.

*Signa Diagnostica.*

Morbus hic oculis expresso ano patet. Si ab acribus humoribus ortæ sint rhagades, pruritus & dolor acerrimus cum ardore anum infestat. Si humor sit virulentus, ex ardore, tetto odore & sanie praua effluente id cognoscitur. Et vtum saniosa, callosa vel cancrofa sint hæc vlculcula, etiam visu percipitur.

Signa.

*Prognosticum.*

1. Importunissima sunt hæc vlcerum genera; cum maximos dolores, resmum, & ingentes molestias creare soleant.

Prognosticum.

2. Rhagades ani difficulter curantur. Primò cum sint in parte exquisito sensu prædita, & quæ acribus medicamentis faciliè irritatur: secundò quia ab excrementorum transitu læduntur: tertio quia medicamēta debitum temporis spatium ad vires exserendas non habent; cum sæpè æger intempestiuè ad feces alui excernendas stimuletur.

3. Malum hoc, si recens sit, medicamentis cedit: at si diuturnum sit, labra callosa fiunt, vlcus fit corrodens, vel in fistulam abit, malumque fit pertinax, quod remediis amplius non cedit, sed chirurgiam requirit.

*Curatio.*

Curatio in eo consistit, vt causæ mali, si adhuc præsentes sint, tollantur, deinde ipsum vlcus sanetur.

Curatio.

Si ergo ex siccitate nimia sint rhagades, intemperies sicca corrigenda humectantibus, vt

℞. *Medulla crurum vituli, pinguedinis gallina, anatis, butyri recentis, ol. amygd. dulc. papauer, sesamini* an. Dr. iij. *lichargyri* Drach. ss. *tragacanth.* Drach. j. *cera q. s.* F. Vnguentum.

Si ex humorum vitiosorum affluxu malum sit, ii temperandi, alterandi & euacuandi. Fortiora tamen medicamenta vitanda, sed lenia vsurpanda, cassia scilicet, manna, syr. ros. solutius, rhubarbarum, electuar. diacatholicum: & si ab epatis vel alterius visceris intemperie vitiosi humoris generatio proueniat, ea temperanda & corrigenda, vt alibi dicitur.

Si quoque aliæ causæ sint, quæ vlcera hæc inducunt, tollendæ, vt si dysenteria vel hæmorrhoides fluentes ea excitant, ea mala curanda. Si fæces duræ sint, emolliendæ clysteribus & aliis modis.

Fortiora medicamenta in fissuris ani vitanda.

Vniuersalibus præmissis topica vsurpanda, respectu

Topica tamen



tamen ad causam habito. Si sicca rimæ sint, sequens vnguentum utile est.

*℞. Pingued. gallin. anatis, medulla cervin. vitulin. butyri f. sale, ana Drach. ij. lithargyri Drach. j. ol. amygd. dulc. Vnc. β. Misce.*

Si humidæ sint, saniosæ & virulentæ, fomententur sequenti decocto.

*℞. Fol. plantag. rubi, flor. ros. rubr. ana M. j. hordei non excoriatati M. β. alumin. Drach. j.*

Coq. in aqua pura; sub finem adde vini albi tertiam partem.

Post fomentationem sequenti vnguento illinantur.

*℞. Cerussa lota, lithargyri, aloës, mastiche, thuris, sarcocolla, boli Armeni ana Scrup. ij.*

Pulverisata subtiliter cum *ol. ros. f. q.* misceantur in mortario plumbeo, & addendo patum ceræ fiat vnguentum.

Vel *℞. Cerussa, plumbi vsti, lithargyri, alumin, thuris ana Drach. j. pingued. gallin. anat. suilla non falsa, ol. amygd. dulc. papav. ana Vnc. j. β.*

Lento igne misceantur, & cum *cera f. q.*

Fiat vnguentum. Habentur & apud Galenum 9. de compos. med. f. loc. c. 6. plurima medicamenta ad ani vitia ex antiquis descripta.

Si feruor adsit & canceri suspicio,

*℞. Succ. plantaginis, portulacæ, solani an. Vnc. ij. ol. ros. Vnc. j.*

Agitentur in mortario plumbeo, & addito *cera* modico fiat vnguentum.

### Vlcera ani.

Vlcera ani.

Vlcera etiã ani ex affluxu humorum vario ac præcedentibus inflammationibus & abscessibus varia sunt, quædam benigna & simplicia, alia corrosiva, putrida, callosa ac fistulosa.

### Causæ.

Causæ.

Causæ horum vlcera sunt, inflammatio, tubercula varia, hæmorrhoides, vulnera, equitatio longa, aliæque externæ læsiones: humorum ad partem hanc affluxus varius.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Si vlcera externa sunt, oculis parent: quæ verò intus latent, ea ex emanante sanie & dolore percipiuntur.

### Prognosticum.

Prognosticum.

Externa & benigna vlcera vt facilius deprehenduntur: ita etiã facilius curantur. Quæ verò maligna sunt & occulta, difficulter curantur; cum pars hæc exquisito sensu prædita sit, & medicamentis acrioribus facili exasperetur, & à transeuntibus excrementis inquinetur. Ideoque talia vlcera, si magna sunt, lethalia sunt.

### Curatio.

Curatio.

Medicamentis autem indigent valde exsiccantibus & adstringentibus; quæ tamen citra mordacitatem id præstent. Ideoque primò vlcus abstergere & mundare oportet, vel lacte, si dolor sit, vel decocto hordei, vel vino mulso.

Exsiccantia autem parantur ex *aloe, thure, aristolochia rotunda, charta combusta, pompholyge*, quibus, si per siphonem injici debent, additur succus plantaginis, equiseti, centumnodiæ.

Vel *℞. Vng. diapompholyg. albi camphorati, an. Vnc. j. β. ol. myrsini, rosacei, ana Vnc. β. manna thuris, aloës, ana j. β. lithargyri argenti Drach. β. succi solani, verbasci, plantagin. ana q. s.*

Misceantur in mortario plumbeo, & fiat vnguentum.

Vel *℞. Cerussa, spuma argenti, ana Vnc. β. thuris, alumin. scissil. ana Drach. iij. aloës Drach. j. croci Scrup. ij. cera, ol. myrsini, ana q. s. Fiat Vng.*

### Fistula ani.

Fistula ani.

Si inflammationes, tumores, & vlcera ani vel Medici negligentia, vel ægri morositate non rectè curentur, ex humore corrupto & sanie intus relicta fistulæ excitantur. Humor enim ibi hærens cuniculos quasi agit, vicinâque partes corrumpit.

### Differentia.

Differentia.

Fistulæ autem ani aliæ vnum sinum habent, aliæ plures; & aliæ vel in intestinum rectum vel ad vesicam penetrant, aliæ ad vicinâs partes non penetrant.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Cognoscuntur vt aliæ fistulæ ex figura, vnde & nomen habent, quod orificium vlcera est angustum, sinus verò intus latens, & labia eius plerumque intus sunt callosa. Excernitur etiã inde sanies, (modò orificium eius non claudatur. Tum enim nihil excernitur, & vicinæ partes tumidæ fiunt) aliquando aquosa, aliquando virulenta.

Notandum tamen hic, quod aliquoties obseruauimus, interdum accidere, vt ichor quidam & aqua citrina, quasi ad nigrum declinans, ex ano per hæmorrhoides effluat, cum alius excernitur, aut potius post alii excretionem, aliàs verò non. Quem fluxum à nonnullis pro fistula ani habitum & in explorando eo cum damno hominis, qui fluxum hunc patiebatur, laboratum fuisse memini. Ego talem fluxum pro fistula ani habere non potui, cum sciam ad annos viginti eum interdum durasse sine omni incommodo, neque etiam alio, quod in fistulis accidit, tempore, nisi dum excrementa redduntur, effluat, etsi per diem vel biduum, æger non excernat; neque quid exulceratum sit, sed ex hæmorrhoidibus saltem ichor effluat. Cum enim natura aliàs sanguinem, eumque sæpè ichorosum, per has vias expellere soleat, in quibusdam etiam continuò ichorem quendam melancholicum ad has venas protrudit, qui in extremitate earum hærens, dum excernitur alius, exprimitur.

Fluxus alui citrinus pro fistula habendus.

An verò vnus per plures sinus sint, stylo immisso exploratur. An in intestina, fistula penetret, etiã stylo immisso deprehenditur, qui digito in anum immisso tangi potest. Si tamen fistula sit tortuosa, vt stylus in anum facili penetrare non possit, ex excrementis id deprehenditur; cum aliquando per fistulam feces alui reddantur, & liquor in fistulam injectus per anum exeat, & contra in anum infusus per fistulam egrediatur. Si ad vesicam penetrat fistula, vrina per eam redditur. Interdum ad intestinum rectum & vesicam simul penetrat, ac tum mictione crepitus è pudendo, perinde atque podice, emittitur: deinde puris atque etiam fecis non nihil mistum vrinæ prorupisse obseruatum. Si fistula est in musculo sphincterem claudente, feces alui non retinentur debito modo, sed præter voluntatem exeunt.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Ani non penetrantes fistulæ penetrantibus minus periculosæ sunt, Paulus Aegineta, lib. 6. cap. 68.

2. Non penetrantes fistulæ si copioso fluxu aut fetore, aut alio modo nihil incommodi afferant, sed potius natura superfluos humores è corporibus cacoehymicis & cachecticis cum ægri commodo per eas euacuet, curari non debent, sed solum conuenientibus lotionibus & linteis mundandæ sunt.

3. Penetrantes fistulæ omnes difficulter curantur, scribitque de eo Albucasis: Quod si fistula penetrat ad vesicam, vel ad intestinum rectum, vel ad ossa antheri, vel caudæ, non curatur: quoniam curatio earum non est nisi labor infirmorum, & fatuitas stultorum Medicorum. Ideoque cum curâ palliativâ, quam appellant, saltem vrendum.

4. Fistulæ, quæ quatuor digitos penetrant, & per musculos progrediuntur, curari non debent. Curando enim fit, ut alius excrementa retinere non possit.

5. Fistulæ antiquæ ani & callosæ, ac quæ canceri naturam referunt, curationem non recipiunt, sed servari debent.

6. Fistulæ verò, quæ curantur, & sine periculo, sunt simplices, recentiores, & quæ per carnem saltem progrediuntur.

#### Curatio.

Curatio.

Fistulas ani non semper curabiles esse modò dictum, & plerumque non sine graui molestia curari. Si ergo incommodum, quod affert fistula, non magnum sit, nec multum saniei effluat, nec fœtor adsit magnus, multi medici suadent, eam non attingendam esse vel fortibus medicamentis vel chirurgia, cum natura interdum superfluos corporis humores per eam expellat, & vitium hæmorrhoidum suppleat. Mundæ tamen servandæ sunt fistulæ. Ideoque singulis diebus abluendæ decoctione agrimonie & fol. oliuæ, cui aliquid aluminis vsti addatur, quod per syringam immittatur. Si foramen etiam sit nimis angustum, aperiri potest medullâ sambuci aut radicis gentianæ, ne sanies in ea retineatur, & partes vicinas corrumpat.

Si verò curari debent ac possunt fistulæ, vniuersalibus præmissis, bona scilicet diæta instituta, & corpore conuenienter euacuato, danda primò opera est, ut callus absumatur. Eluenda ergo fistula vino & Iside medicamento, aut decocto hordei, cui myrrha, alumen & paxillum viridis æris admistum sit, & postea turunda cum vnguento Ægyptiaco vel simili imponenda. Imprimis commendatur ab Arabibus collyrium sen sief algarab, quod ita paratur.

*℞. Aloës, thuris, sarcocollæ, sanguinis draconis, balaustiorum, antimonij, aluminis partes æquales, aruginis æris, quantum est quinta pars vniuers.*

Fiat sief, quod dissolutum in fistulam mittitur.

Multum quoque prodest collyrium supra propositum ad fistulam mundandam.

Si orificium angustum sit, dilatandum turunda ex radice gentianæ, brionie vel aristolochie. Reliqua curatio postea, ut in aliis vlcibus, peragenda. Si fistula non sit profunda, sed superficialis, ideoque sine periculo incidi possit, ægro supino collocato & firmiter ligato, ut moueri non possit, specillo immisso, fistula angustissimo gladiolo circa cuspidem aliquantisper incuruo incidenda, & postea callus conuenientibus remediis absumendus.

Si verò fistula sit antiqua, & quæ medicamentis non cedat, non tamen penetrans, & in parte carnosâ, neque proxima intestino recto aut vesicæ, rectissime actuali cauterio nonnulli curari eam censent. Verum quia non absque periculo est hæc operatio, ab aliis præteritur, nec à Celso, Paulo Ægineta fit eius mentio, & à plerisque incisio modo proposita magis probatur.

Et si vero fistula in intestinum rectum penetrans raro, ut dictum, curatur: Hippocrates tamen duobus modis ad curandum vitur, medicamentis & incisione. Medicamentis, dum linteam molissimum vel turundam, cui filum sit alligatum, ut extrahi possit, succo tithymali imbutam, & flore æris vsti conspersam in fistulam immittit, ut callus absumatur.

Ne verò rectum intestinum his medicamentis acerbis offendatur, in anum corneam glandem, creta detergente illitam, immittit, atque ibi relinquit vsque in quintum diem, vel eo vsque, donec callus exedatur, quam, dum alius excernenda est, detrahit, & rursum immittit. Callo absumpto glandem ex alumine contrito immittit, & relinquit, donec alumen madeat. Post alumen tandem myrrham imponit, ut citius consolidetur.

Incisionem quod attinet, si ea sine periculo, ne scilicet musculus ani lædatur, & feces præter voluntatem egrediantur, tentari possit, sit vel filo seu laqueatione ut appellant, vel ferro. Filio ita fit: Sumatur filum ex serico vel seta equina, aut aliud, quod non facile putrescat, id immittendum in extremitatem specilli stannei, vel plumbei, instar acus perforati, & in fistulam intrudendi, digitoque, oleo rosaceo inuncto, in rectum intestinum immisso, filum apprehendendum, specillum extrahendum & duæ extremitates eius connectendæ, & quotidie vel à chirurgo vel ab ipso ægro arctius constringendæ, donec tota fistula incisa sit. Hinc callus absumendus & vlcus curandum.

Incisio quomodo fiat.

Ferro incisio celerius hoc modo fit. In fistulam specillum plumbeum immittendum, vsque in intestinum rectum penetret, & hinc istrumento falcato, digito in anum immisso, secundum styli plumbei fistula incidenda, cauendo tamen, ne hæmorrhoides lædantur & hæmorrhagia exciteretur. Incisione peracta, penicillum albumine oui ac pulueribus adstringentibus illitum immittere decet. Die sequente Hippocrates æris flore vsto conspergit, & frustulum spongiæ melle illitum intrudit, ut fistula aperta seruetur. Idque diebus septem continuat, donec callus absumat. Interim spongia vino austero madida imponenda, ut humores reprimantur.

Videatur Hippocrates, lib. de fistulis. Celsus, lib. 7. cap. 4. Aëtius tetrab. 2. serm. 2. cap. 10. Paulus Ægineta, lib. 6. cap. 78. Valescus de Taranta lib. 4. c. 36.

#### De Intertrigine.

Est intertrigo non ani vitium sit, sed partium vicinarum: quia tamen Practici hoc loco de ea agere solent, nec eam omittam. Est autem intertrigo partium ano vicinarum seu inter femora excoaratio, vel pelliculæ abrasio à motu vehementiori, præcipue equitatione orta.

Intertrigo.

Curatur autem seu inuncto, imprimis ceruino & hircino. Vulgò candela sebacea vtuntur calefactâ, qua intertrigo inungitur. Vtiles sunt & adipēs anseris, gallinæ, anatis, ut & oleum rosaceum, myrrinum, vitellorum ouorum, vel argentina herba imponatur & succus eius illinatur. Confert & mucilago tragacanthæ cum aqua rosacea parata. Vtilis est & puluis gallarum cum oleo & vitellis ouorum mixtus. Vel vstata vnguenta de lithargyro, de cerussa vsurpentur, Aëtius, tetrab. 2. serm. 2. c. 11. chalcitide aqua subacta illinit; vel plumbago cum aceto & vinò vsurpetur.

Curatio.

Vel *℞. Plumbagin.*

*gallarum Vnc. ss.*

*alumin. Drach. j.*

*myrrha Drach. ij.*

Fiat puluis, qui inspergatur.

Fistula in intestinum rectum penetrantis curatio.



## LIBRI TERTII

## PARS II.

## SECTIO SECUNDA

DE SYMPTOMATIBVS,  
quæ Intestinis accidunt.

## CAPVT I.

*De Intestinatorum actione laesa, & præcipue de motu Intestinatorum inuerso & Ileo.*

**I**NTESTINIS etiam varia Symptomata accidunt, & primò quidem actiones lætas quod attinet, triplex est intestinatorum actio, prima chyli à ventriculo accepti vberior elaboratio & concoctio: secunda eiusdem distributio, tertia fecum expulsio.

Primum quod attinet, habent intestina internam tunicam ventriculo non dissimilem, ob quam chylum, quem à ventriculo accipiunt, amplius elaborant, vt Galenus, 4. de vf. part. c. 17. & 18. docet. Læditur autem hæc intestinatorum, intemperie eorum læsa, de quo supra dictum, & etiam de lienteria dicitur. Idem accidit in diarrhæa & dysenteria, in quibus chylus etiam non bene in intestinis elaboratur.

De fecum expulsionem, tertia Intestinatorum actione, postea dicitur.

Distributio verò chyli equidem ab omnibus Intestinis perficitur, præcipue tamen à tenuibus. Vnde etiam horum intestinatorum tunica interna fibras obliquas habet, extetna transversas. Obtinent etiam intestina nervos, non solum vt grata arripiant, ac noxia expellant, sed etiam vt moueantur. Habent enim intestina tenuia obscurum quandam motum, quo chylum à partibus superioribus ad inferiora promouent, qui aptissime comparatur lumbricorum terrestrium motui, qui partes corporis successiue mouent. Atque hic motus secundum naturam fit, à parte superiore seu inferiore ventriculi officio incipiendo, versus inferiora, quo modo & chylus per vniuersum intestinatorum ductum distribuitur, & feces corpori alendo ineptæ versus inferiora protruduntur, vt per aluum excernantur.

*Ilum.*

*χολδαλός.*

*Miserere mei*

Motus intestinatorum hic aliquando læditur & inuertitur, vt intestinatorum fibræ, quæ à superioribus versus inferiora debent contrahi, versus superiora contrahantur, & ita omnia, quæ sunt in intestinis, non versus aluum, sed versus ventriculum protrudantur, quod malum Ileo Græcis ab εἰλεῖν, id est, conuoluendo dicitur, Latinis voluulus, quod intestina, quæ aliàs obscuro quodam motu mouentur, hic manifestè conuolui, & quidem versus superiora moueri videntur. Nominatur & χολδαλός ἀπὸ τῆς ἀπλεῖας, quod qui manum loco dolenti in ventre admouet, quasi chordæ intensæ & duriter conuolutæ speciem sentiat. Hollerius, in comm. 2. in lib. 3. Coac. Hipp. p. 365. Pythagoricos Medicos hoc malum etiam φάγμον appellasse scribit, quia reuerà opilatio quædam, & via, quæ per intestina ducitur, impedimentum sit: nonnullos & tormentum nominasse. Barbari superioribus seculis Miserere mei, ob insignem, & acutissimum dolorem, & foedam excrementorum alui per os reiectionem nominarunt, quod scilicet commiseratione dignum malum sit.

Est enim ileos intestinatorum motus inuersus, in quo nec chylus rectè distribuitur, & excrementa, quæ per aluum excerni debent, retinentur, & tandem per os reiciuntur, ob motum intestinatorum inuersum, ob quem etiam via intestinatorum, per quam alui excrementa deorsum feruntur, intercipitur, ita, vt nec fæces, nec flatus ullus per aluum emittatur, sed per vomitum pri-

mò alimenta assumpta, & cibi murati, seu corrupti, tandem procedente malo etiam alui fæces magno ægri fastidio & tædio per os reiciantur.

*Causæ.*

Oritur autem hoc malum ex vulgata sententia plerumque ab inflammatione intestinatorum, quæ vehementer ea comprimendo, atque vndique constringendo prohibet, ne fæces deorsum descendere valeant; & quia hoc malum plerumque in intestinis tenuibus consistit, communicatur ipsi ventriculo, vnde cibi fastidium, nausea, vomitus oritur. Secundò idem vitium oriri docetur ex abscessu intestinatorum tenuium, qui itidem in iis angustiam pariat. Tertio statuitur, malum hoc provenire à copia fecum, quæ adeò obduruerint, vt propterea ineptæ sint ad motum excretionis, sed in ductu intestinatorum hæreant, & tandè ad ventriculum regurgitent, ac per os reiciantur. Provenit & ab hernia quandoque Ileo: sed causæ ista ad inflammationem reduci potest, cum non pariat Ileo, nisi intestina compressa, & dolentia inflammentur. Addunt nonnulli & venenum haustum: sed & ista causæ vel inflammationem vel exulcerationem inducit.

*Causæ Ilei.*

Verum si quis rem diligentius perpendat, in ista vulgata doctrina desumpta ex Galeno, 6. de loc. aff. c. 2. 3. aph. 22. 3. Epidem. comm. 2. text. 6. 3. de nat. fac. c. 13. aliquid desiderari, eamque veritati non omnino consentaneam esse animaduertit. Nam licet concedimus, ab inflammatione & retentis fæcibus duris ileum accidere posse; tamen causæ proxima, & immediata non est, quod vulgò statuitur, magna intestinatorum obstructio, & coarctatio, ob quam eorum viâ occlusâ nihil descendere possit. Nam si intestina tenuia planè occlusa & coarctata sunt (etenim in intestinis tenuibus vel semper, vel certè omnium consensu frequentissime inflammatio Ilei causæ consistit) quomodo fæces, & stercora, quæ in crassis cumulantur, per ea transire & vomitu reici possunt? Et quomodo clysteres & glandes vomitu reici possunt, si intestinatorum viâ plane præclusa est?

*An intestinatorum obstructio à fecibus facta ileum pariat?*

Quapropter in ea sum sententia, proximâ huius mali causam esse facultatis distributricis chyli & expultricis motum inuersum ac præter naturam. Nam cum secundum naturam distributio chyli & expulsio fiat in intestinis, contrahentibus sese per fibras intestinis à superiore parte deorsum, id est, à ventriculo versus intestinum rectum, si motus inuertatur, & circulares intestinatorum fibræ à parte inferiore sursum versus ventriculum contrahantur: quæ per inferiora deici debebant, ad ventriculum adscendunt, & per os reiciunt. Habet enim sese sicuti in ventriculo in vomitu. Nam dum fibræ oblongæ œsophagi à parte superiore versus ventriculum se contrahunt, fit deglutitio ciborum. Cum verò inuerso hoc agendi ordine à parte inferiore versus superiora sese contrahunt, fit vomitus. Ita etiam dum fibræ intestinatorum à parte superiore versus inferiora sese coarctant, fit cibi distributio, & fecum; contra dum versus superiora sese contrahunt, malum hoc excitatur. Atque hoc non raro fieri, & veram esse hanc Ilei causam multa testantur. Clysteres enim quandoque vomitu reici ob motum hunc naturæ inuersum, sæpè obseruatum est. Imprimis notabile est, quod Matthæus de gradib. in prætic. c. de vomitu, refert, de quadam puella annorum duodecim, quæ ileo laborans non solum nihil per aluum reddidit, sed & fæces, & postea etiâ clysteres injectos non multò post vomitu per os reiecit. Idque cum totum triduum continuasset, & postea suppositorium longum immisum fuisset, & illud intra temporis spatium, quod dicitur Pater noster & Ave Maria, vt loquitur autor, per intestina ascendit ad stomachum & vomitu fuit reiectum. Postea cum suppositorium aliud filo ad coxam alligaretur, statim rupto filo adscendit sursum ad stomachum illudque egra cum parte filii appensi enomavit. Et cum tertio suppositorium aliud quatuor filis fortibus

*Verior ilei causa.*

*Notabilis ilei histria in puella quædam.*

*Suppositoria & clysteres vomitu reiecti.*

bus alligaretur, & illud paulò post ruptis filis per os cū parte filorum reiectum fuit. Tandem cum Medicus iuberet, vt mater aliud suppositorium immitteret, tanta violentia sursum attractum fuit, vt mater, ne sursum taperetur, illud extrahere cogeretur. Curata tamen fuit ista puella iusculis pinguibus, quæ virtutem attractricē laxant, exhibitis. Quæ quamuis sæpius primò vomitu reiicerentur; accidit tamen, vt, secunda die iterum per aluum deicere inciperet. Ita narrat Guainerius, *tract. 5. c. 2.* suppositorium per os reiectum fuisse: & Doctor Iacobus Oertheus obseruauit vxorem cuiusdam fabri ferrarij Toldani, puerperā, partē candela sebacæ, quod loco suppositorij ano immiserat, postera die vomitu reieciisse. Quæ omnia satis testantur, in ileo viam intestinorum non ita oclusam esse, vt vulgo statuitur, sed potius motum facultatis expultricis in intestinis inuersum. Tenuit hæc causam Galenus satis clarè *2. de sympt. caus. c. 3.* vt mirū sit, à Practicis non esse animaduersum: cum tamen non sit p̄ui ad curationem momenti, sed laxatis fibris, vt ex historiā Matthæi de gradibus antea recitatā apparet, motus hic remittat, ipsaque experientia restetur, euacuationes tales sæpè per roborantia & adstringentia augeri; contrā prohiberi per laxantia & emollientia.

*Candela se-  
bacæ vomitu  
reicta.*

*Vera ilei  
causa Gale-  
no nota fuit.*

*Causa motus  
intestinorum  
inuersi tri-  
plex.*

*An Causa  
motus inuersi  
in tenuibus  
intestinis con-  
sistat?*

Causas autem cur motus ille intestinorum ita inuertatur, triplices agnosco. Primò intestinorum inflammationem, siue ea per se accidat, siue ob herniam, aut intestinorum aliquem abscessum, seu alium tumorem. Secundò fecum retentionem, quæ vel distendendo, seu vellicando & mordendo naturam ad hanc præposterā excretionem irritant. Tertiò intestinorum exulcerationem, humoresque acres & vellicantes, quæ irritando causa sunt, vt natura hunc deprauatum motū instituat. Quò procul dubio & venena adsumta pertinent. Secundum quam causarum varietatem etiam iam de ileo agemus. Quotiescunque enim natura ab his causis impeditur, vt deorsum pellere non possit, ad excernendū tamen stimulat, motus ille facultatis expultricis inuertitur. An verò in tenuibus, an verò in crassis intestinis causa hæc consistat, alij aliter sentiunt. Verior est sententia, plerumque in tenuibus consistere, quæ ob venarum copiam & sanguinis abundantiam facilius inflammantur, & naturā suā angustiora sunt. Quandoque tamen etiam crassis affectis hoc malum generari potest; cum causæ omnes, quæ ileum producant, etiam in crassis reperiri possunt. de qua re prolixè agit Petr. Saluius Diuersus, *de affect. partic. cap. 11.*

#### Signa Diagnostica.

*Signa.*

Signa ilei Galenus, *7. aphor. 10.* ita recenset: *In Ileo nihil descendit per inferiora, atque id affectus huius propriū est, & inseparabile signum*, de quo tamen postea, in quæstione dicitur. *Vomitibus verò non semper adest, sed cū perniciosè agrotat: quod si diutius cū nausea consistenter, stercus ipsum sursum remeat, & singultuant. Quidam etiam desipiunt & conuelluntur, nervorum principio in officio ventriculi per consensum affecto.* Aetius plura addit: (& sunt omnino plura addenda) dolorem in ventre sese conuoluentem, & murmura, ructus nihil iuuantes, malo aucto omnia sursum remeant, accidit vomitus bilis & pituitæ, frigiditas totius corporis, dolor plurimus, spirandi difficultas. Morituris tandem sudor aduenit frigidus, vrinæ difficultas, podex ita adstrictus est, vt neque specilli extremū admittat, stercus demum per os reicitur. Ex quibus non difficile est ileum à colica discernere. Etsi enim magna sit horum affectuum cognatio, tamen etiā non parum differunt. Colicæ enim natura præcipuè in dolore consistit, & ad colicam satis est insignis intestinorum dolor, etsi alia symptomata non adsint: ilei verò imprimis in defectu expulsionis per inferiora, & inuerso naturæ ac facultatis expultricis in intestinis motu. Licet etiam vomitus in colica accidat: tamen non ita violentus est in ileo neque omnia alimenta, multo mi-

nus excrementa, per os reiciuntur, id quod in ileo accidit, in quo etiam clysteres & glandes ano immitti superiora versus trahuntur, & per os reiciuntur.

Vtrum autem tenuia vel crassa afficiantur intestina, ita dignoscitur. Si tenuia intestina affecta sint, stomachi distensio adest, & spiritus angustia ac nausea, atque vomitus assidui & vehementes, ita vt nec potus contineri queat, paulò post & stercoris vomitus sequitur, dolor & tormina magis ad superiora vergunt.

Si in crassis causa consistat, vomitus non ita continuò durat, dolor ad hypochondria magis peruenit, & lumborum adest grauitas, vomitus stercoris tardus superuenit.

#### Prognostica.

1. Omnis quidem ileus periculosus est: is tamen, cui etiam stercoris vomitus succedit, exitialis, & ab eo vix ullus saluatur, vt docet Galenus, *7. de loc. affect. c. 2.* Aliquos tamen conualuisse vidit Petr. Saluius Diuersus, qui ex intestinorū in scrotum delapsu in hoc malum inciderūt.

2. Iliacus dolor magis periculosus est, si tota intestina afficiantur: minus, si secundum partem, & adhuc minus, si secundum partem inferiorem, à ventriculo & hepate remotiorem.

3. Iliacus affectus est familiaris ætati puerili. Euadunt tamen facilius, cum calidum innatum habeant robustius, & humores in iis minus acres, & mordaces sint. Senibus verò non valde est familiaris: si tamen iis accidat, ferè nunquā conualescunt. Aetius *tetrab. 3. ser. 1. c. 28.*

4. Quibus in stranguria ileos superuenit, intra septē dies moriuntur, nisi febre accedente copiosior vrina fluxerit. Hippocrates, *6. aphor. 44.* Non intelligitur autem hic stranguria, quæ ab inflammatione est, sed quæ ab humore vitioso. Et plerique quidem hic accipiunt humorem frigidum, crassum, pituitosum. Ita enim putant in corpore augeri pituitam, vt & in vesica illa abundet, vnde straguria excitetur, & in intestinis, vnde ileos, dum scilicet pituita copiā & lentore suo feces per aluum descendere non sinat. Febre verò superueniente his morbis, cum materia frigida concoquatur, & per vrinam euacuetur, spem esse soluta illa stranguriā ileū quoque à natura facilius superari posse, vt æger euadat. Verum enim verò non credibile est, crassam illam pituitam, quæ in intestinis est, per vrinam & tot ambages euacuari, nec necessum est, vt si quid abundet in intestinis, simul etiam abundet in venis, cuius tamen euacuatio è venis id quod, in intestinis est, non tollit. Itaque verò magis consentaneum esse poto, talē ileum, qui post stranguriam superuenit, provenire ex humoribus acris, qui etiam stranguriam excitare possunt, quorum euacuationem & expulsionem si natura per vrinam tentet & non perficere possit, atque hinc in intestina tenuia mittatur, ibi non solum dolorem colicū, sed inflammationem atque ileum excitare potest, qui lethalis esse solet ob copiam & acrimoniam humoris ac materiæ, nisi ea rursus ad venas regurgitet, & hinc per vrinam copiosè euacuetur, qui motus vix sine calore aliquo febrili absolui potest, vt in talibus naturæ motibus sæpe obseruatur.

5. Ab ileo vomitus, aut singultus, aut conuulsio, aut desipientia, malum. *7. aphor. 10. & 6. de loc. affect. c. 2.* Singultus accidit, quando stercus ventriculum attingens morsu illum fatigat, aut etiam dum orificium ventriculi à motu illo intestinorum peruerso in consensum trahitur. Delirium verò superuenit propter consensum oris ventriculi cum cerebro.

6. Et voluulis malè olentibus cum febre acuta, hypochondrioque sublimi diutius perseuerante parotides exurgentes perimunt. Hippocr. *3. prognost. text. 66.* Galenus ibi voluulum *δυσώδην* seu malè olentem intelligit, in quo primò stercus euomitur, quod signum est maximè lethale; deinde in quo respiratio, ructus, & totum corpus malè olet. Vbi igitur præter hæc ad fe-

*Colica & ilei  
differetia.*

brem.



brēm acutam parotides acceſſerint, lethale magis malum efficitur; quoniam indicio eſt, malum eſſe cum febre malignā (procul dubio primariā, quam inteſtino- rum inflammatio & parotides comitantur) & caput in extremo quaſi naturæ conatu in conſenſum trahitur.

7. Ileo laborantibus vomitus & ſurditas malum. Hippocrates, in *Coac.* intelligit autem vomitum multum, & grauiter olentem ſtercoribus ſimul excretis. Aliquando ſurditas accedit, materiā ad caput conuerſā, quod ferè indicio eſt febrem ſeu acutam ſeu malignam coniungam eſſe, cui ileus coniungatur.

8. Arabes quinque gradus quaſi Ilei conſtituerunt. Periculofiffimus iſ eſt, cum ſtercus vomitur: ſecundus, ſi ſudor è toto ſit foetidus: tertius, cum ſpiritus, qui reſpiratione emittitur, foetidus eſt: quartus, cum tactus eſt foetidus: quintus, cum per aluum crepitus foetidus exit.

#### Indicationes.

Cum expultricis facultatis motus inuerſus ſit, danda opera, vt naturalis motus reſtituatur, & faeces ruſus per inferiora expellantur. Reliqua in ſpecie patebunt. Si dolor valdè vigeat, ei occurrendum, vt de dolore colico & iliaco dicetur.

#### Curatio.

Itaque podex cum ſpongia in decocto aliquo emolliente imbuta foueatur, ſi naturā adſtrictus ſit, vt glans melius ſubiſci poſſit. Aetius inditam glandem fouet ſpongiā ſucco calente cyclaminis madidā. Ventri poſtea emollientia & humectantia adhibeantur, quæ ita comparata ſint, vt cauſſam non augeant, ſed potius tollant. Obſeruatum enim eſt, cum interdum plures clyſteres & ſatis fortes infuſi nihil profeciſſent, exter- nas alui emollientes per foras, inunctiones, cataplaſmata, balnea ex humectantibus, vel ex oleo communi calente plurimum profuiſſe. Venter ergo inungatur oleo amygdalarum dulcium, chamæmelino, anethino, aut balneum fiat ex oleo communi tepido. Foras adhibeantur ex decoctis foliis althææ, maluæ floribus chamæmeli, meliloti, ſeminis anethi, lini ſcœnugræci & ſimilibus. Aut contuſis iſdem addatur farina hordei, ſeminis lini, ſcœnugræci, & cum oleis chamæmeli, amygdalarum dulcium fiat cataplaſma. Clyſteres etiam emollientes iniici poſſunt.

Neque inutile fuerit talia emollientia, vt oleum amygdalarum dulcium, & iuſcula pinguiā, in quibus malua & althæa cocta fuerint, ore ſumenda exhibere, cum puella illa apud Matthæum de gradibus, fruſtra aliis medicamentis adhibitis, iuſculis pinguibus curata fuerit.

Et quamuis ſemel atque iterum talia vomitu rei- tiantur, continuandus tamen eorum vſus. Ita enim ſibris inteſtino- rum laxatis peruerſus inteſtino- rum motus ſedatur. Verum in genere plura de curatione ilei dici non poſſunt: reliqua in differentiis patebunt.

#### De Ileo ab Inflammatione.

Ileus ab inflammatione, quæ quidem frequentiffima eius cauſſa eſt, accidit, cum per venas, quibus præcipuè inteſtina tenuia copioſioribus prædita ſunt, ſanguis in membranas inteſtino- rum exit, teſte Galeno 3. *Epidem. com. 2. & 6. de loc. aff. cap. 2. & 6. aph. 44.* Et autumnio quidem potiſſimum Ilei generantur. 3. *aph. 22.* Quia æſtate geniti humores tenues & mobiles autumnii frigore inæquali in profundum corporis ad inteſtina pel- luntur, vbi phlegmonem ſæpe efficiunt, atque hinc ileum. Qua ratione autem inflammatio inteſtino- rum generetur ſupra de inflammatione inteſtino- rum dictum.

#### Signa Diagnostica.

Si ab inflammatione ſit ileus, malum eſt acutiſſi-

mum, citò ad ſtatum properans, cum febris & vehemen- tiſſimis fixisque doloribus; vires omnes languent, nec cibum nec potum continere poſſunt ægri, ſingultiant, ſudant, aliquando conuelluntur, in loco dolente non nunquam tumor apparet, cuius ratione, vt docet Gale- nus, 6. *de loc. aff. cap. 2.* nonnulli hoc malum *ἰλεὸς ἀπὸ φλεγμονῆς* appellant, quod in eo tenue inteſtinum tactu depre- henditur cōuolutum inſtar chordæ; vrina ſupprimitur, quia veſica comprimitur, & in conſenſum trahitur, ven- ter inflatur, reſpiratio difficilis & velox efficitur. Præceſſerunt cauſſæ calefacientes, vſus atomatum nimius, cibi acres, & cruditates nidoſæ, vini generoſi potus nimius, item medicamenta calida, lapſus, percuſſio, inteſtino- rum in ſerotum delapſus, venena.

#### Prognosticum.

Vt aliæ internæ inflammationes periculofæ ſunt: ita & ileos ex hac cauſſa, vt pauci hoc modo affecti eua- dant. Et quantum in ſpecie ileus ex inflammatione or- tus periculi coniunctum habeat, etiam Prognostica an- tea in genere propoſita docent.

#### Indicationes & Curationes.

Eadem hic ſunt indicationes, quæ in aliis inflamma- tionibus internis. De quo cum ſupra cap. 2. de inflam- matione inteſtino- rum dictum ſit, non opus eſt, ea hic repetere: videantur loco allegato.

#### De ileo ab aliis Tumoribus, & ab exulceratione.

Non ſolum autem ab inflammatione, ſed & ab abſ- ceſſu, aliſque tumoribus, & ab exulceratione natura ita irritari poteſt, vt inuerſum motum in inteſtinis inſti- tuat, & omnia ſuſum verſus moueat, vt docet Galenus, 6. *aph. 44.*

Ilei à cancro exemplum habet Pet. Sal. Diuerſus, de affect. particul. cap. 11. vbi ſcribit, fabrum quendam ferra- rium, qui cum in colo per plures meſes cancerum paſ- ſus fuiſſet, ex quo in tranſitu ſecum quotidie vehemēti cruciabatur dolore, maximas perſentiens punctiones, perinde ac ſi acubus perforaretur, factum tandem eſſe iliacum, & præcedentibus ſtercoris vomitibus miſerè vita functum eſſe.

#### Signa Diagnostica.

Si ſit ab abſceſſu aliquo, dolor adeſt, ſoletque cum ad ſuppurationem tendit, febris ſuperuenire, tumor tactu percipitur, & præceſſere ea, quæ inflammationem præ- cedere ſolent. Si ſit tumor ſcirrhofus, præceſſit diutur- na inteſtini durities. Neque enim à ſcirrho ſubito hoc malum excitari poteſt, & durities illa tactu deprehen- di poteſt, ſi in inteſtinis exterius ſita ſit: ſi autè ſit in in- terioribus, licet tactu ita facile non deprehendatur, ta- men ſemper grauitas percepta fuit, quæ inteſtina infra quaſi detrahi, præcipuè cum æger ſtat, videntur, & ad detrudenda excrementa æger ob inteſtino- rum angu- ſtiam non ita promptus eſt.

Si cancer ſit cauſſa, durities ad tactum percipitur, punctiones & dolores ſunt continui, qui à fecibus tranſeuntibus valdè exacerbantur, malumq; fuit diuturnū.

Si à veneno exulcerante & erodente ſit ileos, id aſ- ſumtum fuiſſe, æger vel aſtantes docebunt.

#### Prognostica.

1. Qui à ſcirrho, cancro vel ſimili tumore excitatur ileus, incurabilis eſt. Morbi enim hi vel ipſi incurabiles ſunt, vel ſi curationem admittent, ea non niſi longo tempore perfici poſſet. Ileos verò malum acutum tam longam moram non fert.

2. Qui

Quinque Ilei  
gradus ab  
Arabibus co-  
ſtituti.

Indicationes.

Curatio.

Prognosticum.

Curatio.

Ileos ab aliis  
tumoribus, &  
exulceratione.

à cancro.

Signa.

Prognostica.

Ileus ab in-  
flammatione.

Signa.

2. Qui à veneno est ileus, periculosus omnino est; cum malo aliàs periculoso venenum coniungatur.

ruptionem acquisiuerunt ( epilepticus enim etiam fiebat ) vel acres alios humores admixtos habuerunt.

### Curatio.

Curatio.

Qui à cancro, scirrho est ileo, vix, vt dictum, curabilis est. Eius, qui à veneno ortum habet, eadem ferè curandi ratio est, quæ Ilei ab inflammatione: nisi quod venæ sectione opus non est, & medicamentis cum internis, tum externis alexipharmaca, & quæ veneno peculiari modo resistunt, admiscenda.

### De Ileo à fecibus induratis.

Ileus à fecibus induratis.

Si feces induratae intestina occludant & excrementa in intestinis tamdiu cumulentur, vt natura amplius ea ferre nequeat, hunc peruersum motum instiuit: id quod ab omnibus causis, quæ aluum obstruere & feces retinere possunt, fieri potest.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Cognoscit id ex eo, quod præcessit diuturna alui obstructio, dolor in principio non adest, sed postea accedit, nec tamen est adeo acutus & vehemens, vt in inflammatione, sed potius adest grauitas ventris, & abdominis tensio, intestina ad tactum stercore duro turgida sunt, flatus frequenter supra erumpunt, febris ferè abest, vomunt biliosa & pituitosa, & tandem morbo crescente ipsas alui faeces. Præcesserunt causæ alui adstrictæ, & faciem diutius retenturam, de quibus infra, cap. 4.

### Prognostica.

Prognostica.

Minus periculosus est hic ileos, quam qui ab inflammatione vel aliis tumoribus, vel intestinorum exulceratione prouenit.

### Curatio.

Curatio.

Fæces induratae emolliendæ sunt, postea emollicæ educendæ. Et eadem curandi ratio est, quæ colicæ à fecibus induratis. Extra nimirum inunctiones, fomenta, cataplasmata, clysteres, balnea ex emollientibus vsurpanda: inter quæ ab antiquis imprimis comendatur balneum ex oleo dulci, clystere emolliente præmisso. Post balnea & humectantia talia applicata aciores paulò clysteres iniici oportet, quò irritata natura id, quod emollium est, facilius excludat. Sedes verò sæper foueatur spongia calida decocto emolliente imbuta.

Intus assumenda iura pingua, oleum amygdalarum dulcium, lini, sesaminum ad Vnc. ij. vel iij, butyrum recens, decoctum althææ, maluæ & similia. Vel sumatur hora vna ante coenam vel prandium cassiæ extractæ Vnc. j. vel Vnc. j. s.

Hippocratis in ileo remedium.

Si his malum non cedat, ad Hippocratis remedium, quod postea in curatione colicæ proponitur, accedendum censent autores, vt scilicet folle intestina inflata à stercorebus separentur, & postea clyster ad ea dissoluenda & extirpanda iniciatur.

Nouum ilei genus.

Obseruauimus adhuc aliud Ilei & motus intestinorum inuersi genus, quod neque ab inflammatione, neque enumeratarum causarum vlla ortum habuit, sed simpliciter ex *ἀναπνεῖα* humorum in quodam viro hypochondriaco. In eo enim ita humores sursum ex hypochondriis vergebant, vt non solum epilepticus, & cæcus fieret, sed vt etiam clysterem vomitu reiiceret. Posset forsitan causam hic quis referre ad multitudinem crudorum & crassorum humorum, vna cum vehementi refrigeratione, cuius Galenus, 6. aph. 44. mentionem facit, qui etiam supra prognostic. 4. adductus est, (& abundauit ille vir multis crudis humoribus.) Non tamen facile dixero, ab iis, quatenus refrigerant, malum hoc induci, sed potius, quatenus peculiarem aliquam cor-

## Q V Æ S T I O.

An in ileo nihil per aluum excernatur?

In ileo nihil per aluum excerni, atque id eius inseparabile signum esse docet Galenus, 7. aph. 10. vt supra dictum. Hippocrates tamen contrarium testatur, lib. 3. epid. sect. 3. text. 7. in historia mulieris voluulosa, quæ apud Tasimenum decumbebat, dicens: deiectiones tenues, crudæ, pauca. De quo loco Petrus Sal. Diuersus de affect. particul. cap. 11. Verba hæc sicuti Galenus in comment. neglexit, ita posteritas conuenientibus oculis pertransiit, & tamē hæc in iliaca passione aliquid descendere affirmant. Ego diu locum hunc consideravi, remque ipsam obseruavi, tandem experientia & ratio me docuit, in ileo aliquid descendere posse. Vidi enim plures iliacos, in quibus nonnulla, licet pauca, excernebantur, hocque tantum, dum generaretur morbus, animaduerti fieri; factum autem, & completo morbo, nihil postea descendisse vidi. Hoc autem non sine ratione factum iudicavi: quoniam dum fieret ileos, infra locum affectum descenderant excrementa, quæ vel à natura vel ab arte excludi poterant, antequam omnia intestina in consensum affectu ducta essent, propriamque naturam & facultatem omnem amisissent. Hinc Hippocrat. lib. de morb. cap. 3. in ileo ex inflammatione genito, ad extrudendas faeces infra locum affectum contentas, suppositorium ex melle, taurino felle oblitum, decem digitorum longitudine imperabat, quæ non post morbum factum, sed antea in inferioribus intestinis congesta erant. Cum autem oppositum Galenus scripserit, intelligatur de morbo completo locutum esse, & in eo casu, in quo omnia intestina in consensum loci affecti deducta adeo aliquando angusta redduntur, vt nec amplius flatum, nec stercorem, nec podex etiam specilli acumen admittant. Quæ conciliatio omnino clarior erit, si proximam ilei causam, vt supra dictum, statuamus non intestinorum obstructionem, sed motum inuersum.

An in ileo nihil per aluum excernatur?

## De Intestinorum doloribus.

### C A P V T II.

#### De Colico dolore.

Intestina quoque varia symptomata patiuntur, inter quæ satis frequens & grauis est dolor intestinorum, qui nonnunquam adeo acerbus est, vt nonnulli eum perferre non valentes necem sibi ipsi intulerint, vt refert Galenus, 2. de comp. med. sec. loc. cap. 1. Atque is cum frequentius intestinum colum, vtpote in quo natura suâ longo & anfractuoso materia dolorem excitans diutius moratur, nomen accepit, & dolor *κολικός*, ac *κολικὸν διάσπασιν* appellatur, vulgo colica passio. Nomen huic malo inditum est à parte affecta, quod intestinum colum præcipuè hoc malo afficitur. Etsi enim negandum non sit, quandoque etiam tenuia intestina affici: tamen à parte præcipuè affecta dolor ille denominatur. Et iliaca affectio non solum tenuium intestinorum nomen est, sed & peculiare malum plerumque denotat, in quo excrementa alui retinentur, & difficiles vomitiones adsunt. Celso hoc malum, lib. 4. cap. 14. morbus intestini plenioris est.

Dolor colicus intestinorum.

#### Causæ.

Cum aliàs dictum sit, subiectum doloris & tactus proximum esse membranas: etiam hæc intestina secundum membranas, tam internas, quàm externas dolore patiuntur.

Causæ verò doloris colici etsi plurimæ sint: tamen omnes in eo conueniunt, atque eâ ratione dolorem excitant, quatenus continuum solvunt.

Causæ, quæ continuum solvunt, faciunt id distendendo, rodendo & mordendo. Addunt quidem nonnulli

Causæ.

nulli intemperiem. Verum enim verò tantum dolorem ab intemperie, quatenus tali, induci posse, credibile non est. Et licet pituita vitrea, sanguis in inflammatione, sicut & bilis, colicos dolores excitent: tamen id non præstant saltem alterando, sed distendendo, ut postea questione 2. dicitur.

Materia autem, quæ continuum soluit, vel in intestinorum cavitatibus consistit, atque est aut flatus, seu excrementa, quæ ibi retinentur ob angustiam intestinorum, quæ fit ab obstructione à fecibus induratis, aut à calculo, aut à vermibus, aut ab intestinorum compressione, aut conversione, ut in hernia; vel consistit in intestinorum tunicis, seu rodatur, seu distendatur, seu utrumque faciat; atque id fit ab humoribus nunc frigidis vel crassis, nunc calidis, nunc sine, nunc inflammatione: quandoque etiam materia, quæ colicam excitat, est venenata & maligna, sicut Paulus Aegineta, lib. 3. c. 43. refert, colicam pestilentem in Italia exortam multas Romanorum prouincias afflixisse.

Neque etiam prætereundum illud, quod Platerus obseruauit, & lib. 3. obs. sub finem inseruit, nimirum præfectum quendam colicis cruciatibus diu vexatū conuulsionibusque laborantem post clysmatum usum casei concreti induratiq; magnam per aluum copiam eiecisse, quam diu in intestinorum anfractibus hæsisse & latuisse ex eo colligebat, quod nullum longo tempore, ob interdictum à Medicis illius usum, caseum comedederat, prius verò antequam agrotaret, immoderatè se eo sæpe repleuerat.

#### Differentia.

Differentia.

Et si doloris colici differentiarum plures, secundum dolorum differentias, in genere, de quibus Galenus, lib. 2. de loc. affect. capitibus aliquot agit, recenseri possent: tamen maximè momenti sunt illæ differentiarum, quæ sumuntur à subiecto & causa efficiente. Subiecti ratione dolor intestina afficit vel omnia, quod rarius accidit, vel aliqua eaque vel tenuia, vel crassa. Si fit in tenuibus, propriè iliaceus; si in colo, colicus dolor appellatur. Nonnunquam tamen & Colicæ nomen utrique dolori tribuitur.

Deinde causarum ratione, doloris colici non parua est differentia, quæ supra explicata sunt.

#### Signa Diagnostica in genere.

Signa colica in genere.

Dolor generatim in abdomine circa intestinorum regionem percipitur, qui aliàs in vno locus fixus, maximè sub umbilico, palpi infixi, vel terebræ perforantis speciei præ se fert; nunc instabilis, & vagus; supra verò umbilicum de latere in latus, vel etiam infra de loco in locum vagatur, doloremque colicum situs ipse dolor ostendit. Incipit n. cum colo à sede dextri renis, ubi & dolor sæpe figitur, & ascendit ad iecoris gibbum, hincque secundū ventriculi fundum ad lienem, & sinistrum renem quasi zona tendit, atque ibi deorsum flectitur usque ad intestinum rectū, & ita nunc iuxta splenem, & sinistram renem, nunc & frequentius in dextro dolor percipitur. Trahitur a. in dolore colico plerumque in consensum ventriculi, unde appetitus deiectus, nausea & vomitus sæpe excitatur, quo pituitosa, cruda, nonnunquā biliosa, portacea & æruginosa reiciuntur. Plurimi inter signa colicæ & hoc referunt, quod aluus ita adstricta sit, ut nec flatus excludatur; & si quid excludatur, illud esse durum ac cum flatibus excerni. Verum hoc signum non omni dolori colico competit, sed cuidam tantum, & qui à fecum obstructione ortum habet, ut postea diceretur.

Ventriculi dolor & colica differentia.

Cum a. plures in abdomine partes contineantur, quæ dolorem pati possunt, accurata opus est distinctione. Et primò quidem ventriculi dolorē à colico distinguere, non adeo difficile est. Ventriculi n. dolor supra umbilicum semper consistit, & non raro ad spinam quoque inter scapulas pertingit; cum ad nonam vertebrā ventriculus spinæ alligeretur, præterea ructibus & vomiti-

Dan. Sennerti Tom. II.

bus leuatur, & per os assumptis lenitur facillè, quod in dolore colico similiter non accidit. Deinde etiam non adeo difficile est dolorē, qui est in abdominis musculis, aut peritonæo, ab intestinorum dolore discernere ex doloris sublimitate & profunditate. Præterea hi dolores leniores sunt minus periculosi, nec hinc inde vagantur.

Difficilius verò est, dolorem colicū à nephritico discernere, ita ut Galenus ipse se in hoc deceptū fateatur, 2. de loc. affect. c. 5. & 6. de loc. affect. 2. Cōmunia n. sunt quædam utrique dolori, nimirū dolor abdominis, nausea, vomitus, alui constipatio, dolor dorsī, impotentia corpus flectendi; quæ tamen ipsa in utroque dolore differunt, & præterea signa quædam utrique affectui propria sunt. Dolor enim in intestinis est pungitius & intensior; in renibus grauatius & remissior. Deinde colicus dolor amplū spatiū occupat, nephriticus angustū. Tertiò, dolor colicus ductum intestini coli sequitur, ut modò dictū. Nephriticus a. semper in eadem parte permanet, & qui calculo è renibus promotus accidit, à supernis ad inferiora descendit versus pubē secundum ductum vterū, & semper à dorso incipit, & ad posteriores potius partes circa spinam vergit, sicut colicus magis ad anteriores, qui & in loco renibus alteriore consistit. Quartò, dolor colicus cibo assumpto intenditur; quia ventriculus repletus colū comprimit; nephriticus verò augetur cibo ad inferiora descendente, intestinis renes premantibus. Quintò Colicus dolor non in vno loco fixus est, sed vagabundus; nephriticus in vno loco stabilitus, donec calculus secundum vteris ductum in vesicam delabitur. Vomitus quoque, nausea, alui adstrictio in dolore colico vehementiora sunt, citiusque adueniunt; in nephritide grauius affligit dolor dorsī & crurum, ac flectendi & erigendi corpus impotentia, propterea quod intestina magis cum ventriculo sunt coniuncta; renes cum dorso ac cruribus.

Propria verò nephritici doloris signa sunt arenulæ & calculi excreti; urinæ in substantia, colore & contentis mutatio, stupore femoris è directo affectu renis. Hæc ergo signa si absint, dolor colicus indicatur. Deinde dolor nephriticus lenitur arenularum, calculi, urinæ crassæ & fabulosæ mictione; Colicus verò vomitu vel alui deiectione. Nephritici initio aqueas & puras urinas reddunt, postea inæquale quid in iis subsidet, tandem arenosum. Colici verò flatulosum quid per aluum deiciunt.

Est etiam cognatus colico dolori vteri dolor, solentque mulieres à partu, vel cū mensium fluxus instat vel supprimitur, dolore torqueri colico non ab simili. Verum is inguinibus & coxis communicatur, ac supra ilia non ascendit; præcessit etiam partus, vel instant menses, aut iidem retinentur. Interdum vteri suffocatio accedit; quæ symptomata in colicis non apparet. Dysenteria quoque à colica fluxus alui coniunctus facillè discernit.

An autem cōm vel ileum afficiatur discernitur, quod dolor colicus magis extensius & grauatius est; & rei perforantis speciem exhibet, magisque infra umbilicū affligit, cui & membra superiora minus consentiunt, atque iis, quæ per sedem eiciuntur, valde lenitur. Iliacus magis pungitius est, & supra umbilicū fertur in hypochondriis, & membra superiora in consensum trahit, eum plerumque ab inflammatione ortum habet, de cuius signis plura dicentur capite sequente.

De loco verò in colo affecto sciendum, quod si totū dolore detinetur, ille circa utrumque ilium & infra ventriculi regionem prope umbilicū percipitur. Cum autem pars tantum afficitur, & quidem principium, dolor ilium dextrum occupat; si medium sinistrum; si finem, umbilici regionem à sinistro proximam, ut ex coli intestini situ manifestum est.

#### Prognostica.

1. Dolor intestinorum malum non contemnendum est; quoniam dolor omnes vires ac spiritus dissoluit ac dissipat,

Doloris colici & nephritici differentia.

Vteri dolor colica cognatus.

Prognostica.

EEE e

supat,

fiat, & partes principes in consensum trahit. Et quamquam plerumque ad salutem, & quidem breui temporis spatio terminatur: tamen quandoque dolor vehementissimus est, & vires valde deiecit; atque ubi ad salutem malum terminatur, dolores sunt remissiores, nec constantes, neque vno in loco pertinaciter hærent, sed quandoque intermittunt, & excrementa non prorsus retinentur. Contra si malum lethale futurum sit, dolores sunt acerbissimi, vno loco fixi perpetui & constantes, excrementa planè detinentur, præterea urgent vigilæ, sequitur singultus, vomitus, extremorum refrigeratio, sudores frigidi, syncope.

2. Periculosus est, si totum cōlum afficiatur dolore, quàm si pars saltem; & minimum periculum est, si secundum umbilicum colique finem dolor consistat, quòd clysterum vis magis peruenire potest: maius, si in eius medio & in sinistro ilio: adhuc maius, si in coli principio & in illo dextro; quoniam inde difficilior materiæ exitus patet & clysteri virtus huc ægrè penetrat.

3. Colica nonnunquam in dorsi dolores mutatur, materiâ, quæ in hypochondriis continebatur, fusâ & in spinam delatâ, nonnunquam in arthritidem, materiâ ad articulos transmissâ: sæpiissime in paralyfin. De via autem per quam materia ad ista loca fertur, dictum in Institut. lib. 2. part. 3. sect. 2. c. 5. & dicitur etiam de scorbuto. Atque hoc malum quandoque epidemium esse solet, vt Ægineta meminit, lib. 3. c. 28. & 43. Quod si materia illa, præsertim biliosa & tenuis, progressu temporis acrimoniam & malignitatem aliquam acquisuerit, epilepsia gignitur. Et addit Ægineta, eos, qui ex tali colica in epilepsiam delapsi fuissent, plerisque periisse, qui in paralyfin, plerisque sanatos fuisse, critica quasi materiæ ex alto corpore translatione, & tandem discussione. Verum Prognosticum hoc ei in specie dolori colico competit, qui ab humore acri & scorbutico est, de quo infra.

4. Prauus est colicus & iliacus dolor, ubi vomitus crebrior adest, ac potus retineri nequit, & nihil vel parû infra excernitur, extrema refrigerantur, atque alia signa doloris colici lethalis antea enumerata adsint.

5. Colicus etiam dolor nonnunquâ in abscessum coli intestini lethalem mutatur. Sic refert Guilielmus Fabricius, cent. 2. obs. 74. sceminam quandam gravissimo dolore colico cum ventris cōstipatione ac vomitu correptam fuisse, indeq; febrem exortâ, neglectoque morbo dolorem ita auctum præcipuè in sinistro latere sub costis nothis, vt per octiduum nullum somnum capessere potuerit. Ventrem fuisse tumidum instar tympani extensum, & neque flatum, neque excrementa toto octiduo eiecisse, tandemque ruptum esse abscessum in sinistro hypochondrio, ea scilicet coli parte, ubi est angustius, (id quod Fabricius inde cognouit, quod non parum puris per aluum excreuit) & superueniente sudore frigido ac syncope ægram mortuam fuisse.

### Indicationes.

#### Indicationes.

In colica curanda duo scopi Medico propositi sunt; primus quidem, vt causam, quæ dolorem hunc excitat, amoveat; quæ cum multiplex, quælibet pro sua natura sui amotionem indicat, vt postea de singulis in specie diceretur; atque hæc curatio maximè regularis est. Quia verò dolor interdum ita vehemens est, vt ad se curam trahat; nonnunquam ad tempus dilata curatione, quæ causæ debetur, si ægrum seruatum velit Medicus, dolori primum occurrendum est, qui alter in colica curanda scopus.

### Curatio.

#### Curatio. Anodyna quid sint

Ad dolorem autem vehementem tollendum opus est anodynis, & interdum etiam narcoticis. Anodyna sunt, quæ temperata sua qualitate & humiditate partes, dolore afflictas suauiter demulcent laxantque, de

quibus in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 1. c. 7. Narcotica verò sunt, quæ peculiari vi stuporem parti inducunt, vt dolorem non sentiat, causâ doloris relicta. Anodyna autem nunc assumenda exhibentur, nunc per clysterem infunduntur nunc extra applicantur. Intus sumitur oleum amygdalarum dulcium recens ab Vnc. iij. ad Vnc. v. cū sacchari albi Vnc. 8. Si calor adsit, aliquid syrupi violacei, aut etiam specierum diarrhodi abbatis modicum addi potest.

In materia frigida oleo amygdalarum dulcium dimidia pars olei amygdalarum amararum addatur; quidam & vini maluatici aliquid addunt. Decoctum quoque chamæmeli præstantissimum est anodynum. Vtile est & decoctum anethi.

Si hæc æger abhorreat, clystere, quorum aliàs etiam semper in colica magnus vsus est, cum dolores hîc plerumque in crassis intestinis consistât, ex anodynis seuiis, quæ calida & humida, parètur, chamæmelo, anetho, malua, althæa, branca ursina, parietaria, semine lini, fenugraci, caricis pinguibus, butyro recenti, adipe vitulino, gallinaceo, oleo communi dulci, & similibus, vt:

℞. Malua, parietaria, flor. chamæmeli an. Vnc. j. summitat. anethi M. 8. sem. lini, fenugraci an. Vnc. 8. Coquantur in 1. q. aquæ. Colaturæ lb. j. ol. amygdalarum dulcium recentis Vnc. ij. pinguedinis gallina vel anserina Vnc. j. Fiat clyster.

Licet & clysteres ex oleis, puta amygdalarum dulcium, chamæmelino, anethino iniicere, quibus & portio aliqua adipis gallinæ, vel anseris admisceri potest.

Extra, post alui lenitionem, conueniunt fomenta ex iisdem parata, quæ vel in vesica, vel spongia, vel lana, vel linteo applicantur. In causâ frigida conueniunt olei lini, amygdalarum amararum, chamæmelinum, anethinum, aut horum decocta. In calida oleum violarum, rosaceum cum vitello oui, hydreleum, lac bubulum, ouillum, mucilago seminis althæa, malua, omentum castrati in oleo rosaceo calefactum, emplastrum ex mucilagine seminis psylli, oleo rosaceo & vitellis ouorum. Commodus etiam vsus balnei, quod & ipsum dolores valde lenit, & vt efficacius sit, herbæ modò enumeratæ prius in aqua coqui possunt.

Internis autem illis vrimur semel atque iterum pro doloris violentia: modò dolor colicus non sit ab inflammatione. Tum enim, vt postea diceretur, mox adhibenda est phlebotomia.

Externorum vsus frequentior esse potest: sed præcedat aliqua euacuatio. In horum tamen etiam vsu hoc notandum, ne valde calefacientia, ubi saltem dolorem sopire animus, vsurpentur. Insigniter enim calefacientia anodyna non sunt, sed potius causam respiciunt, de quo suo loco.

Si verò anodyna nihil proficiant, & dolor vehemens admodum sit, vt syncope, vel vitæ periculum imminet, ad narcotica accedendum, & vsurpantur commodius in mordaci & acri humore, non quod refrigerent, vt vulgò creditur, sed quod humoris acrimoniam mitigandi, cum incrassandi morsumque & motum eius inhibendi etiam vim habent. Et quamuis aliqua intemperies vel stupor inducatur: tamen melius est, intemperiem ex narcoticis relictam longiore tempore curare, quam breui deiectionis viribus ægrum mori. In frigidis autem & crassis ac lentis humoribus narcotica, & opiatâ ita commoda non sunt, cum causam morbosam deteriores & curatu difficiliorum reddant. Et quamuis qui à frigidis humoribus colicam patiuntur, initio aliquid commodi è narcoticis percipere, & dolores leniri videantur: tamen postea maiores fiunt, humore ipso crassiore, & ad motum magis inepto reddito, tunicisque intestinorum magis addensatis.

Sunt autem talia remedia varia, simplicia, vt opium, radix madragoræ, semen hyoscyami & alia composita, theriacâ & mirhridatium recens, requies Nicolai, philonium Persicum, philonium Romanum, laudanum opiatum & similia.

Simpli

Narcotica  
quid s

Interna.

Externa.

In qua colica  
narcotica co-  
ueniant.

Narcotica  
simplicia.  
Composita.



Simplicibus raro vel nunquam solis, ob vehementiam, quam habent, utimur. Compositis tutius & frequentius, de quorum recto usu, & compositione videatur Galenus, *lib. 9. de compos. medic. sec. loc. c. 4.* Aëtius, *teirabil. 3. serm. 1. cap. 32.* & supra *lib. 1. part. 2. cap. 1.*

Narcotica autem illa tribus modis usurpari solent, ac vel ore assumuntur, vel clysteres iniiciuntur, vel extra applicantur. Et rarius quidem ore sumenda exhibentur; tutius per alium infunduntur cum iure vel decocto conueniente.

Inter interna, ubi necessitas exigit, exhiberi possunt, requies magna, philonium Romanum, aut Athanasia, Dr. j. pondere cum decoctis florum chamæmeli Vnc. iij. & syrupi papaueris Vnc. β. Et quidem antiquis vtitissimum & laudatissimum medicamentum est philonium. Hodie in usu est laudanum opiatum, quod ij. vel iij. gr. pondere exhibetur. Hoc tamen etiam circa narcoticorum usum, tum in hoc, tum in aliis morbis, in quibus usurpanda, monendum, ut, cum iis opus est, adhibeantur, dum vires adhuc constant. Nam si viribus iam prostratis, & ubi ferè mori vicinus est æger, usurpetur, non solum non profunt, sed ægro etiam interitum accelerant, & cum sensu vitam auferunt, dum spiritus iam antea languentes, aut deficientes sopiunt quasi & calori nativo obsunt.

Deinde per clysteres talia iniiciuntur cum decocto conueniente, & clystere infuso æger in latus dolens recumbat. Exempli gratiâ paretur clyster ex decocto hordei & capitibus papaueris.

Vel ℞. Decocti flor. chamæmeli, vel alterius lb. j. philonii Romani, aut requiei Nicolai Vnc. j. β. ol. amygdal. dulcium. Fiat clyster.

Tandem eadem extra applicantur, ut:

℞. Fol. parietarie, hypoficiami ana M. j. Conquantur & contundantur. Contusis adde Pulv. florum chamæmeli, farina seminis lini, fenugraci an. Vnc. β. croci Drach. β. opii Scrup. β. vel Scrup. j. vitellorum ouorum num. iij. ol. de papauer. Vnc. ij. chamæmel. anethini an. Vnc. j. Fiat cataplasma.

Cum materia dolorem excitans in cavitatem intestinorum continetur, Rhafes necessitate urgente opiaris vitur, addito scammonio in causâ calidâ, ut bile provocatâ simul aliquid è ventre educatur. Vel paretur talis clyster.

℞. Parietarie, malua, althæa, flor. chamæmeli an. M. j. sem. lini, fenugraci an. Drach. iij. Coquantur in aqua simplicis. Colaturæ ℞. lb. j. Benedicte laxatiua Vnc. β. dianthici Drach. ij. philonii Romani Drach. j. ol. chamæmeli, lini, an. j. β. Fiat clyster.

Comendantur ab antiquis & à recentioribus quædâ quæ occulta proprietate dolores colicos lenire creduntur. Inter ea imprimis laudatur stercus lupinum album, quod in spinis repertum in terram non cecidit. Datur à Drach. β. ad Drach. j. cum pauco sale, vel pipere in vino albo tenui, vel etiam aqua. Phlegmonem tamen abesse oportet. Imò laudatur etiam foris ilibus suspensum, ut videtur apud Galenum, *lib. 10. de simpl. medic. facult. cap. de stercoribus.*

Commendatur & intestinum lupi ex analogia fortasse membri. Galenus galericitæ auem, seu alauidam, quæ apicem in capite gestat in iure elixam dat. Dioscorides assam probat: alij tostæ puluerem ex aqua propinant Rhafes, Auicennas & alij cornu cerui Drach. j. in potu exhibent. Dantur & lumbrici terrestres, & talus suillus, & intestina gallinæ tosta & trita à Scrup. j. ad Dr. j. in vino vel aqua, prout materia frigida vel calida id admittit. Lysius quidam Medicus stercus gallinæcum vtiliter præbuit ex œnomelite vel aceto, vel vino aquâ diluto, teste Galeno, *lib. 10. de simpl. medic. facult. cap. 10.* Rodericus Fonseca, *consult. 57.* remedium singulare, tanquam maximè secretum ad dolores colicos tam curandos, quam præcauendos, & quod à proprietate totius substantiæ operetur, & in seipso & in aliis

multis expertus fuerit, commendat testiculos equorum. Lauat eos vino generoso, deinde in taleolas incidit & in furno exsiccat lento calore, atque vsui seruat, & cum opus Drach. j. in puluerem reducit cum Drach. β. seminis anisi, & post euacuationem per clysteres, vel lenè aliquod medicamentum in iure vel vino exhibet, & ægera tribus horis à cibo & potu abstinere iubet. Plura videantur apud Aetium, *teirabil. 3. serm. 1. lib. 3. cap. 31.* & apud Trallianum, *lib. 10. cap. 1. sub titul. ult. de amuletis*, ubi tamen & superstitiosa quædam enumerat.

Verum enim verò cum colica sit malum à causis manifestis ortum (etsi causæ distendendo vel morden-do colicam excitanti malignitas etiam quandoque inesse possit) non sine causâ dubitatur, an dentur medicamenta, quæ peculiari & occulta proprietate dolores colicos sanent: & si ex iis quædam iuuant sumpta (nam de extrâ appensis, maior adhuc videtur esse dubitatio, & pleraque ex his videntur esse superstitiosa) effectus illius causæ ex qualitatibus notis reddi potest; qualia sunt sterces lupi, gallinarum, lumbrici terrestres, quæ facultatem attenuandi abstergendique & nitrosi quid habent, omnemque vim suam à sale obtinent. Alia verò quæ occulta omnino proprietate iuuare videntur, ut intestina lupi, gallinæ & similia vim potius intestina confortandi ob similitudinem, quandam habent; atque ita non immeditè Colicæ profunt; idèoque ista medicamenta non sine iudicio in omni colica à quacunque causâ ortâ adhibendæ, sed prius diligenter dispiciendum, an causâ, cur profint talia, si profint, reddi possit.

De Diætâ in genere dici nihil potest, cum pro causarum diuersitate varia sit.

*De Colica à flatibus & excrementorum copia, in cavitatem Intestinorum retentis, & distendendo dolorem excitantibus.*

Flatus sæpe cum excrementorum magna copia in intestinis colliguntur & cumulantur, eaque distendunt & dolorem excitant. Quibus si exitus liber pateat, dolor non diu durat, sed materia per aluum excernitur, eaque excretâ dolor cessat: id quod post purgantia medicamenta sumpta, post usum fructuum fugacium, potum musti, cereuisiæ recentis, cruditateque & omnino post eorum usum, quæ corrumpuntur, & quasi fermentationem quandam in humoribus & intestinis excitare videntur, accidit.

Vulgo cruditatis nomine istud in Colicis vitium nominatur; & est omnino in coctione quoddam vitium; sed tale, quod non fixum aliquem & quietum humorem generat, sed flatuosum; & tale omnino quidem, quod aliàs à medicamentis purgantibus, musto & similibus excitari solet. Neque enim sola obstructio & fecum retentio ad colicam generandam sufficit, sed talis fermentatio, & ut sic dicam, flatuositas humorum necessaria est. Sæpissimè enim accidit, ut multis diebus aluus obstruatur, & nulla colica sequatur, sicut Brasolus, *c. 6. tract. de remed. purgat. narrat*, se iuuenem sæpe per spatium nouem dierum, imò per spatium duodecim dierum, nihil per aluum excreuisse; & tamen sani hominis muniis perfunctum fuisse: qualia exempla alia etiam Schenckius, *lib. 3. de alui suppress.* annotauit.

Contra verò etsi aluus pateat, imò, quod sæpe accidit, etsi frequentius, quàm par est, excernat: tamen si crudi eiusmodi & corrupti ac flatulenti humores adsunt, colica generatur. Id quod iis, accidit, qui ventriculum & Intestina debilia habent. Hi enim si vel cereuisiâ sæculentâ bibant, vel cibum coctum difficilem aut corruptioni obnoxiam capiant, ut brassicam, intestina bubula, carnem porcina, vel aliâ pinguem, & cereuisiam frigidam deinde bibant; cibis is non in chylum conuenienti modo muratur, sed corrumpitur, & in humore ac flatulentum conuertitur, qui colicam postea excitat, quæ non cessat, nisi humores hoc vel vomitu vel per aluum euacuato.

An datur vera medicamenta quæ occulta proprietate dolores colicos lenire aut tollere possint?

Diætâ.

Colica à flatibus, & excrementis retentis.

Sola obstructio & fecum retentio ad generandam colicam non sufficit.

Multo tamen facilius hoc accidit, si materiæ isti flatuosa & excrementis exitum quærentibus exitus denegetur & hæreant cumulenturque in intestinis, eaque distendant, obferuanturque Fernelius & alij, à flatibus vultum nonnunquam ita distensum fuisse, vt brachij vel femoris magnitudinem æquaret, nonnunquam etiam flatuum vehementiâ & copiâ ruptum fuisse.

Accidit autem hoc frequentius in coli intestini anfractibus, & flexuillo eius, quem descendens in latere sinistro in initio facit: quo loco sæpe, dum excrementa exitum ad latus quærunt, quasi perterebrari, & in tumorem, qui tactu deprehendi potest, eleuari videtur.

Denegatur verò flatibus & excrementis transitus, dum ipsa excrementa copiâ vias has coli anfractuosa subito replent & occludunt; vel ob siccitatem, duritiem & tenacitatem ibi subsistunt, reliquisque, quæ indies acceruantur, flatibus, & excrementis transitum denegant. Idem & ab aliis corporibus duris accidere potest, vt à nucleis copiose comestis, caseo duro pituita concreta, calculis, quæ tamen & ipsa per se distendendo dolorem parere valent, obseruatumque est, lapides in intestinis genitos homines admodum excruciasse, vt breui expiraturi viderentur, nisi vel sponte vel artis operâ excreti morbum soluissent, cuius rei exempla in obseruat. Schenckij lib. 3. obseru. 145. videantur.

In tenuibus etiam intestinis quandoque hoc impedimentum est, dum scilicet, præcipue in meatu illo angustiore ad initium intestinorum crassorum, iuxta reñem dextrum obstruuntur, ibique dolor iliacus grauissimus, qui tamen etiam vulgò colicus appellatur, excitatur; & circa dextrum latus fixus est, & propter retentionem in intestinis tenuibus excrementa circa umbilicum percipitur cum alui suppressione. Fitque hæc obstructio in intestinis tenuibus nonnunquam à causis externis, rebusque crassioribus assumptis; sicut Fernelius à cydoniato meatum illum iuxta cæcum obstruente dolorem iliacum grauissimum & lethalem excitatum fuisse, fecesque in abdomen decidisse obseruauit.

Præter obstructionem etiam à contorsione & conuolutione ac compressione intestina tenuia occludi, dolorque in intestinis tenuibus excitari potest. Cuius conuolutionis causa non saltem esse potest inflammatio, de qua postea dicetur, sed & flatus, qui vel soli, vel cum excrementis tenuia intestina admodum implent, vt instar farciminum inflatorum contorqueantur; quod tamen facilius accidit, si obstructio aliqua præcessit, & flatus retinentur. Eadem contorsio & conuolutio, ac hinc sequentia reliqua Symptomata, ex situ intestinorum mutato exoritur, siue ab externa vi accidat, ob rupta vel sensa eorum ligamenta, siue ob ruptum peritonæum, id quod in Hernia, & intestinorum extra abdominis cavitatem in scrotum delapsu non raro accidere solet. Tandem & intestina nonnunquam coalescunt, de qua re supra, sect. 1. cap. 3. de angustia intestinor. dictum.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Cognoscitur autem dolor hic ex fœcum duritie, aluique suppressione, ex ventri tensione, rugitu & murmure, & imprimis si præcesserunt causæ flatus generantes, & cibi vel potus assumpti sint, qui talem fermentationem humorum, de qua antea diximus, producere apti nati sunt, quales sunt fructus fugaces, vuar, mustum, cereuisia recens vel feculenta, & omnino cibi, qui facile corrumpuntur; refrigeratio item ventris, unde cruditates oriri solent. Ex talibus enim omnibus, si exitus pateat, Diarrhæa vel cholera excitari solet. Si verò occludatur aluus, colicus dolor.

Quæ verò causa intestina occludat, etiam suis signis discernendum. Si feces alui causa sint, dolor est compressius, & alui adstrictio adfuit, diuturniorque fœcum in intestinis mora, seu ægri calidioris & siccioris, seu diætæ vitio, id est, ciborum excrementitiorum

& aridorum, adstringentium; exercitiorum & laborum magnitudine id contingat.

Quod si calculus in intestinis contineatur, dolor est contusius & fixus, ac diu diuturnus, & signa materiæ calculum generantis adfuerunt, collectaque ibi est pituita vitrea, & humores alij tæci. Hernia & inflammatio etiam suis signis cognoscuntur.

### Prognostica.

1. Obstructio, quæ in crassis intestinis fit, facilius tollitur, colicusque dolor inde ortus facilius sanatur; difficilior verò, si meatus intestinorum tenuium obstruati sint, & continuè excrementa cumulentur.

2. Lenius malum significatur, si excrementa sponte, & per lenes clysteres naturâ irritatâ deiciantur, & excrementa liquida, flatusque multi per aluum excernantur, dolorque locum mutet. Si verò remediis non cedat malum, periculosus morbus est, qui interdum in hydropem siccum vel ileum mutatur.

3. Calculus difficilior educitur, quam feces induratae.

4. Si intestina coaluerint, malum incurabile est.

5. Si ab intestinorum in scrotum prolapsu dolor exciteretur, nisi intestina reponantur, antequam inflammantur, periculosum & sæpe lethale malum est.

### Indicationes.

In colica à quacunque causa obstruente orta primus scopus est, obstructionem tollere, feces nimirum emolliere, aluum laxare, humores educere, flatus discutere, calculum tollere, intestina suo loco mota & contorta naturali sedi restituere, & quæ communis est omni colicæ indicatio, dolorem lenire.

### Curatio.

Et si verò flatus proxima doloris causa sint & proinde in leuiori colica flatus discutientibus finem optatum sæpe attingere liceat: tamen in colica grauiore tantum abest, vt prosint ea primò administrata, vt etiâ plurimum nocere possint, cum pituitam in intestinis contentam in flatus dissoluant, & hoc modo dolorem augeant. Itaque antequam flatus discutientia vsurpentur, necesse est, vias inferiores aperiri, fecesque alui induratas educi. Ac proinde rectissime à clysteribus cura plerumque inchoatur cum causa mali plerumque in intestino colo hæreat, ad quod clysteris facile penetrant; parenturque illi ex emollientibus & aluum lenientibus, ac fluidam reddentibus; materiam viscidam, si adsit, incidentibus & abstergentibus, quibus interdum, cum summa adest alui constipatio, humoresque tenaces in intestinis adherent, flatus discutientia ac calefacientia in causa frigida adiiciuntur. Anodyna quoque iisdem admiscere, & clysterem pluribus scopis inservientem parare licet. Neque protinus si vnus clyster successu careat, desistendum, sed continuandus clysterum vsus, donec obstructio à retentione fecum orta tollatur. vt:

℞. Parietaria, malua, althæa an. M. j. rad. althæa, lilior. albor. an. Vnc. ℥. ficum num. v.

Coqu. in aqua simplici. Colatura ℞. ℥. j. cassia pro clysteribus Vnc. j. olei violar. aneth. an. Vnc. j. ℥. vitelli ouis num. j. F. Clyster emolliens.

Vel ℞. Radic. althæa Vnc. j. parietar. violar. branc. vrsin. an. M. j. flor. chamamel. M. ℥. sem. lini; fenugraci an. Drach. iij.

Coquantur in aqua simplici. Colatura ℞. ℥. j. cassia pro clysteribus Vnc. j. olei amygdalar. dulcium chamamelin. an. Vnc. ℥. vitell. ouis num. ij.

F. Clyster emolliens ad dolorem leniendum. Vel ℞. Parietaria M. j. veronica M. iij. flor. sambuci M. j.

Cola

Varia corpora dura & concreta in intestinis dolorem colicum parere possunt.

Ab intestinorum contorsione, conuolutione & compressione etiâ colica induci potest.

Colaturæ ℥. lb. j. sacchari Vnc. ij. olei amygdal. dulc. Vnc. j. aloes Drach. ij.

Fiat Clyster dolorem leniens & abstergens.

Alius, qui emollit, dolorem lenit, simulque flatus discutit & materiam euacuat.

℥. Mercurialis, parietaria, malua, althæa an. M. j. ruta, flor. chamæmeli, meliloti, an. M. B. sem. anethi, carui, baccar. lauri an. Drach. ij.

Coquantur in aqua simplici.

Colaturæ ℥. lb. j. electuar. diaphanici, benedict. laxatiu. an. Vnc. B. de baccis lauri Drach. iij. olei rutacei, anethini an. Vnc. j. B.

Fiat Clyster.

Et si maxima sit alui constipatio, ea, quæ magis intestina irritant, addenda, ut agaricus, electuarium hieræ simplicis, Indu, Episcopi, diaphenici, Benedictæ laxatiuæ.

Si autem Clysteres, quod sæpe accidit, nihil proficiat, & materia in superioribus intestinis hæreat, in clysterum usu, diu non persistendum, cum facultatem expultricem seigniorum reddant, & intestinorum temperiem sæpe lædant; sed satius est, leui aliquo aluum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moueat. Obseruatum est, cum æger quidam triginta clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum manna Vnc. j. B. cum olei amygdal. dulc. Vnc. ij. in iusculo gallinæ pingui exhibuisse, & ægum à dolore liberasse.

Vel oleum amygdalarum dulcium loco butyri iusculis admiscetur; additur quandoque oleo amygdal. dulcium & sperma Ceti.

Si flatus imprimis vrgeant, qui interdum sua copia sibi ipsi exitum præcludunt, duo imprimis agenda, primo ut pars tensa laxetur, deinde ut flatus dissipentur; quæ tamen expediri non possunt, nisi simul causa, à qua flatus proueniunt, ablata fuerit. Generantur autem flatus vel ob lentam & crassam pituitam, à quâ leui de causa seu externa seu interna, quæ materiam agit, flatus generantur; vel ob calorem debilem, qui flatus, quos eleuat, discutere nequit. Primo ergo emollientibus clysteribus utendum, quæ tensam partem laxant, postea discutientibus cum internis, tum externis.

Ideoque si flatus discutere imprimis animus sit, talis pareatur clyster.

℥. Origani ruta, Veronica an. M. j. flor. chamæmeli, meliloti an. M. B. baccar. lauri, iuniperi an. Vnc. B.

Coqu. in aqua simplici.

Colaturæ ℥. lb. j. Electuar. Hiera, picra simplicis diaphanici. an. Vnc. B. baccis lauri Dr. iij. olei anethini, rutacei an. Vnc. j. B.

F. Clyster.

Ad intestina calefacienda, flatusque discutiedos nonnunquam vini Maluatici, vel alterius potentis aut aromatici lb. j. vel etiam plus iniicitur. Et si simul detergere ac lenite velimus, vino olei communis, chamæmelini, anethini, amygdalar. dulcium Vnc. iij. mellis Vnc. j. adici possunt.

Galenus, 2. ad Glaucon. cap. 6. in oleo communi ebullire finit, quæ, cum tenuitate partium, calefaciendi vim habent, ut semine cumini, apii, petroselinii, leuistici, seseleos; & in frigida partis dolentis constitutione, rutam, baccas lauri, & ipsum oleum laurinum per clysteres iniicit. Vbi verò calor coniunctus est, temperatis potius utitur resoluentibus, ut anetho & similibus.

Clysteres autem tunc flatus discutientes tum anodynos non semper ad integras libras infundere opus est, sed sufficiunt Vnc. viiij. vel Vnc. x. ut diutius subsistentes efficacius vim suam in intestina exerant, modo ea sit liquoris mensura, ut ad locum affectum perueniant.

Ysurpantur & interna ad flatus discutiedos; Et sunt causa frigida ad aluum soluendum, & apertam seruandam, dolores leniendos, flatus discutiedos utilia vina purgantia.

Ut ℥. Radic. feniculi, acori veri helenij, imperatorie an. Dan. Sennerti Tom. II.

Vnc. B. absinthii Drach. v. calaminth. origani, rosis marinæ, sambuci an. Drach. ij. cortic. malor. aurantior. citrior. an. Vnc. iij. sem. feniculi, carui an. Drach. ij. baccar. lauri, iuniperi an. Drach. iij. folior. sene elect. Vnc. j. B. agarici trochiscati Vnc. B. turbit. Drach. ij.

Conquassatis effundatur vini q. s. de quo, cum aluus constipatur, æger bibat haustum.

Exhibetur quoque decoctum florum chamæmeli in cereuisia vel vino albo tenui ad Vn. iv. quod ad dolores leniendos, & flatus in colicis discutiendos præsentissimum est remedium; sicut & aqua florum chamæmeli. Decoctum tamen efficacius est. Utile est & decoctum seminis cumini, solius, solius, vel cum floribus chamæmeli: ut & ius galli repleti iis, quæ flatus discutiendi vim habent. Castoreum quoque utile est scrup. j. vel Drach. B. pondere, dissolutum in vino cum paucis cinamomo & croco.

Commendatur valde ad colicam etiam veronica, quæ simul ita à proprietate colicis utilis à Cratone commendatur, quæ non solum decocta clystere iniicitur, sed & in vino decocta cum myrrhæ scrup. B. bibitur.

Veronica in colicâ commendata.

Idem Crato commendat radicem Imperatorie seu cardopatæ, quam in vino maceravit, & per triduum ante coenam haustum propinavit. Quæ cum aliquid malignitatis, præsertim humida, habeat, postea Dr. B. myrrhæ cum vino, & tantundem Theriacæ cū extracto calami aromatici exhibuit. Idè tenera ceruorum cornua in taleolas secat, & in puluerem redigit. Huius pulueris Vnc. ij. addit myrrhæ Dr. ij. piperis albi Dr. j. Dosis Dr. j.

Radix Imperatorie.

Utile est & zedoariæ Puluis à scrup. j. ad Dr. j. ut & aqua eiusdem cum veronica aqua destillata, ut & extractum calami aromatici ad scrup. j. cum syrupo conuenienter.

Aqua contra colicam. ℥. Cinamomi Vnc. B. sem. anisi lb. B. dauci syluestris Drach. ij. rad. mei Drach. iij. caryoph. macis, nuc. mosch. an. Drach. j.

Macerentur per dies aliquot in spiritus vini Rhenani lb. ij. Vnc. iij. Destillatum dulcoretur syrupo cinamomi vel saccharo.

Rhases probat confectiorem de baccis lauri; Datur cum Vnc. i vel ij. vini calefacti.

Auicennas efficax medicamentum parat ex æqualibus partibus castorei, piperis & anisi. Vtiles sunt & species diacumini, dianisi, diacalaminthæ, diagalantæ diarrion, piperon, theriaca, & Mâhridarium antiquum, item oleum destillatum carui, cumini, feniculi, anisi, radicem angelicæ, caryophyllor. si gutta vna vel altera in iure vel vino vel cereuisia exhibetur.

Vel fiant cum saccharo, rotulæ, Ut:

℥. Olei anisi vel carui gut. viij. vel scrup. B. sacchari in aqua cinamomi dissoluti Vnc. j. B. F. Rotulæ. Utile est & hic puluis:

℥. Cinamomi optimi, cortic. aurantior. flav. an. Dr. ij. galangæ, calami aromatici an. Dr. j. baccarum lauri Dr. j. B. seminis cumini Dr. ij. cornu cerui vsti preparati Dr. j. B. seminis carui Dr. B. anisi, feniculi an. scrup. iij. caryophyllor. zedoariæ an. Drach. j.

Puluerisatis adde spec. dianisi Dr. j. B. F. Puluis, de quo datur Dr. j. circiter.

Extra quoque ad flatus discutiendos vsurpari possunt sacculi de floribus chamæmeli, summitatibus anethini, foliis calaminthæ, rutæ, milio, sale lenitet torrefactis parati, qui vino valente irrorati calidi ventri applicentur. Vel F. tale Emplastrum:

Externa medicamenta.

℥. Emplastri de baccis lauri Vnc. iij. de meliloto Vnc. j. Misce cum oleo chamæmelino & rutaceo.

Fiat Emplastrum, quod abdomini imponatur.

Vel ℥. Emplastri de baccis lauri Vnc. j. B. vnguenti Appripæ Vnc. B. Misceantur & ventri imponantur.

Nonnulli regulam lateritiam ad ignem calefactam, & linteo vino inadefacto inuolutam ventri imponunt; alij asserem quernum calefactum; alij panem de furno calentem. In vulgari usu est & Lapis ophites calefactus.



Atus, quem vulgò serpentarium appellant.

Commendatur & gummi racamahacæ & carannæ umbilico imposita, imprimis si postea cucurbita major umbilico, vel parti dolenti affigatur. Efficax est & Galbanum, quod in Maluatico dissolutum & cum castoreo mixtum umbilicò imponatur. Eidem & olea addi possunt. vt:

*℞. Galbani in aqua vite dissoluti Drach. ij. olei nardini rutacei an. Vnc. j. croci gr. vj. Misce. F. Linimentum.*

Vel eidem oleum destillatum rutæ addatur.

Efficacius adhuc est oleum ex Galbano, vt & quod ex sapone destillatur, & in Institutionibus describitur.

Verum non semper illa ipsa materia (vt & hoc doctrinæ causâ addimus) quæ dolorem excitat, etiam obstructionem parit, sed quandoque alia materia est, quæ dolorem parit, alia quæ obstructionem. Flatus enim copiosus cum excrementorum retentione affluens & continuum soluit, doloremque parit, & obstructionem generat. Dum verò flatus non est ita copiosus, feces verò sunt induratae, aliud est quod dolorem parit, aliud quod obstructionem excitat. Compertunt enim est sæpissimè aluum ad multos dies fuisse obstructâ, & feces retentas sine dolore colico; accedentibus postea flatibus, demum colicam excitatam fuisse. Si ergo à fecibus alui induratis reliquis fecibus & flatibus exitum præcludentibus fiat colica, vsurpanda sunt emollientia, & postea acria, expultricem irritantia. Abstinentum verò in hoc casu principid ab omnibus purgantibus per superiora exhibitis. Cum enim talia versus aluum excrementa moueant; exitus verò à fecibus induratis sit præclusus: augebunt potius malum, quam minuent. Sed à clysteribus emollientibus & pinguibus curatio inchoanda, paratis scilicet ex iuribus pinguibus, oleo communi dulci, amygdalor. dulcium, butyro, mucilage althææ, malux, seminis lini, scœnugræci, ficubus & similibus. Extra simul eadem emollientia adhibenda, vt & vnguentum Agrippæ & similia.

Exhibenda quoque emollientia, vt ius galli decrepiti, præcipue cum anhero, polypodio, quandoque & carthano parati; prunorû, spinachii, violariæ, beræ, oleû, amygdal. dulc. deglutitis prius granis iij. diagrydii.

Postea succedant clysteres acriores, quibus feces dissoluantur atque euacuentur. Quidam ægrû in balneum collocant actu calidum ex oleo, aut ex aqua, in qua herba emollientes coctæ sint, vnguedo prius eius ventrem oleo amygdalarum dulcium, butyro, pingdeninibus humectantibus. Deinde clysterem mediocriter acrem iniiciunt, atque ita aluum proritant.

Nonnulli in malo desperato argentum viuum exhibent, quod pondere suo descendens feces simul protrudat: alii plumbum in eundem finem exhibent. Narratque Ambrosius Paræus, lib. 16. cap. 28. quendam, cum nullis remediis à dolore colico liberari potuisset, tandem haustis olei amygdalar. dulcium Vnc. iij. cum vino albo, aqua parietariæ mixtis, deinde deuorata glande plumbea argento viuo illita, eademque aluo reddita, cruciatu colico mox liberatum fuisse.

Trallianus Hippocratis remediû vsurpat. Follis enim ano adaptatur, atque intestina adeo inflantur, vt à stercoribus interna sua superficie separentur, postea clyster immittitur, qui feces alui solutas vnâ secum educit. Videatur Hippocrates. in lib. de affect. vbi ileum extremo hoc quasi remedio sanari docet. Et Trallianus, lib. 10. cap. 1. de colica ex stercoris duri obstructione.

In colica à culculo in intestinis concluso lubricantia & expultricem irritantia requiruntur.

Eius, quæ à vermibus curatio ad vermes necandos & eiiciendos dirigenda.

Dolor colicus ex intestinorum transpositione & conuolutione, & qui ex rupto peritonæo, & intestinorum in serotum descensu ortum habet, curationem herniæ postulat, de qua supra.

### Diata.

Diata in omni dolore colico ab humore frigido & crasso sit attenuans & parca, cibique attenuantibus & discutientibus condiantur. Galenus maximè alliû commendat, quia flatus discutit, & sitim non infert, nisi in ventriculo bilioso. Datur robustis erudum, cæteris coctum. Vitetur oua asæ & dura, pyra, cydonia, & similia. Potus sit vinû album, potens, tenuium partium, non adstringens, hydromel cum pipere paratum vtile. in hoc casu videatur apud Rhafin. lib. 9. ad Almanfor. cap. 22.

### De Colica à vermibus.

Colicæ modò explicatæ non incommode subiungi potest ea, quæ sit à vermibus, cuius mentione facit Guilielmus Fabricius, cent. 1. obs. 57. vbi refert puellâ 12. annos notâ grauissimis doloribus colicis vexatâ fuisse, cû febre, cõtina & syncope. Ad quâ ille vocatus enemata aliquot anodyna & flatus discutiendi adhibuit; exterius fomentationem ex floribus chamæmeli, meliloti, semine carui, anisi, fœniculi, scœnugræci, foliis & radicibus bus malux, althææ, & similibus applicauit. Sequenti die infusionem rhabarbari ex aqua absinthii, parumque benedictæ laxatiuæ propinauit: quibus tamen dolor non cessauit. Tandem exhibitio clystere ex lacte recës mulæo, globulum vermium pugni magnitudine, vltra septuaginta lumbricos adeo intricatos & conglomeratos complectentem, vt separati vix potuerint, aluum exonerando excreuit. Quo facto dolor, reliquæque symptomata, quibus antea vexabatur, illico sedata sunt, & breui post tempore pristinæ sanitati restituta fuit.

### De Colica ab humoribus crassis, & viscidis in tunicis intestinorum hærentibus.

Frequenter etiam dolor colicus grauissimus excitatur à pituita & humoribus crassis ac viscidis, non, vt plurimi existimant, in cavitatibus intestinorum, sed intra colitunicas contentis, vt testatur Galenus, 12. m. m. cap. 7. Non enim credibile est, dolorem, à quo perforari quasi intestina videntur, excitari tantum à pituita, intus cavitati intestinorum adhærescente, eaque refrigerante.

Et causa ista non in tenuibus, sed crassis intestinis consistit. Nam tenuium intestinorum tunica rarâ tenuique substantia constant, vt non diu eiusmodi causas continere possit. Sed probabile est, frigidos eiusmodi & viscidos humores, ac flatuosû spiritû in corpore crasso densoque genitû, sed egredi nequeuntem, dolorem excitare, vehementem quidem ob maximâ partis, in qua continetur tensionem; longum verò seu stabilem, quia difficulter euacuatur ob corporis ambientis crassitiem & densitatem, Galenus, 6. de loc. affect. cap. 2.

Colligitur autem eiusmodi pituita in iis, qui crapulæ dediti sunt, ociosis item, & in quibus bilis, quæ expultricis stimulus est, ad ea loca nō defluit. Quæ quidem factis diu hære, antequâ dolorem exciter, potest: vbi verò ad quantitatem notatam dignam peruenerit, & flatus ex dimiuto partis calore excitari incipiunt, vel ab externa aliqua occasione, quæ vel calefaciat vel refrigeret, vel quocunque modo moueat, agitur, flatusque excitentur (hi enim in dolore colico ab hac causa orto ferè præsentibus sunt) subito grauissimi dolores dum tunice intestinorum distenduntur & diuelluntur, excitantur. Vnde & humore hoc euacuato, dolor cessat: alterantibus verò non cedit; quod fieri tamen deberet, si à pituita in cavitatibus intestinorum hærente, eaque refrigerante, solum hic dolor excitaretur.

### Signa Diagnostica.

Causa hæc ex eo præcipue cognoscitur, quod dolor palii infixi, vel terebræ perforatis speciem exhibeat, ob

Non semper materia colicum dolorem parit: obstructioem etiam inducit.

In colica à fecibus induratis per superiora non exhibeantur purgantia.

Argentum viuum quomodo vsurpetur in colica?

Hippocratis in colica remediū per intestinum inflammationem.

Curatio colicæ à vermibus. Ex intestinum conuolutione & transpositione.

Colica à vermibus. Exemplum in puella.

Colica ab humoribus crassis & viscidis. An in cavitatibus intestinorum, num verò in ipsis intestinum tunicis humoribus hæreat.

Signa.



ob tunicarum violentam eò loci, vbi pituita ista hæret, distensionem: quod à reliquis causis non accidit. Licet enim dolores vnicunque graues vel acuti existant, non tamen ij fixi & perforantes quasi sunt.

*Prognosticum.*

*Prognosticū.*

Colica à pituita & humore crasso intra tunicas coli concluso pertinax est, ob partis, in quâ humor continetur, crassitiem & densitatem, & humorum visciditatem.

*Indicationes.*

*Indicationes.*

In colica à pituita crassa & lenta vitendum est, alio prius aperta, pituitam attenuantibus, fundentibus, discutientibus, iis tamen non insigniter calidis, ne materiâ subito resolutâ flatus multiplicentur; & materiam ad excretionem parantibus, ac denique euacuantibus.

*Curatio.*

*Curatio.*

Initiò itaque clyster paretur ex emollientibus cum beta & ruta, ac semine carui, decoctus in iure carnis pingui, & dissolutis in hoc electuarii diacatholici, hiera simplicis an. Vnc. ß benedicta laxatiua Drach. ij. cum oleis lenientibus & salis Drach. j.

Vel ℥. Herb. emollient. an. M. j. flor. chamameli, meliloti an. M. ß. sem. fenugrati Vnc. ß. Coquantur in aqua simplici. Colaturæ ℥. lb. j. Adde olei chamam. rutacei an. Vnc. j. Misce. F. Clyster.

Clysteres verò fortiores à principio inieci, & præcipue sæpius iterati, nocent potius, quàm profunt; cum materiam quidem agitent, sed, ob eius ineptitudinem, non euacuent, naturamque non parum labefactent.

Per os quoque initiò leniora exhibeantur, vt mel rosar. solutiuum, hiera simplex. Ab agarico Auenennas abstinere iubet ob metum vomitionis; quæ in colica cum alui suppressione minimè tuta esset. Vtilis est & syrupus è spina insectoriâ, vulgo Domesticus appellatus, descriptionis Matthioli, in 1. Dioscorid. cap. 102.

*Attenuantia.*

Materiam attenuant mel rosatum colatum, syrupus de duabus & quinque radicibus, de hyssopo, oximel compositum & similia.

Materiâ nonnihil attenuatâ & præparatâ, ad fortiores clysteres, qui etiam vim abstergendi habent, ascendendum, adjiciendo cæteris folia calaminthæ, centaurij minoris, semen carthami contusum, electuarium benedictæ laxatiuæ in maiore quantitate, oleum rutaceum. Licet & theriacæ vel Mithridatii Drach. j. addere. Et si malum pertinax sit, post horas sex vel octo alius iniciatur, in quo agarici albi Drach. j. ß. & pulpæ colocynthidis in nodulo ligatæ Drach. ß. coctæ sint. & in colatura electuarij diaphœnici, hieræ simplicis, benedictæ laxatiuæ ana Vnc. ß. dissoluatur.

*Purgantia.*

Purgant per os sumpta hiera cum agarico, diaturbith cum rhubarbaro, pilula mastichina, elect. diaphœnicum, Indum, episcopi, benedicta laxatiua.

Maximè etiam confert terebinthina cum aliis purgantibus mista.

Fortiora verò purgantia rarè in hoc affectu vsurpanda: si tamen mitiora non prosint, dictis medicamentis diagridij gr. ij. vel iij. vel hieræ diacolocynthidos Scrup. j. adiere licet. Fortior etiam est hiera Logadij descript. Aëtij, tetrab. 1. ferm. 3. c. 3. Idem pomum colocynthidis excauat, semina eximit, post vino dulci veteri replet, & per noctem relinquit, manè vinum per linteum exprimit & diligenter colat, cauendo, ne quid de medulla in vino remaneat, vinum calefactum propinat ægrumque deambulare iubet; tetrab. 3. ferm. 1. cap. 3. Idque aliqui pro secreto habent in colica ex pituita crassa vitrea. Sed fortius est medicamentum, quàm vt omnes ferre possint.

*Opiata.*

Atque in hoc causæ genere opiata vix conueniunt;

& licet in principio iuuare videantur, tamen dolor postea maior fit, humore ad motum ineptiore reddito, tunicisque intestinorum magis addensatis, flatuum discussionem prohibet. Itaque succi isti frigidi & crassi intra tunicas intestinorum conclusi incidendi & concoquendi sunt, & quidem eiusmodi medicamentis calidis, quæ non plus resoluunt, quam digerant, sed quæ simul flatus discutiendi vi polleant; in quorum censu etiam Galenus allium habet. Etsi enim nonnulli putant flatus gignere allium: tamen rectissime scribit Galenus, 12. meth. med. c. 8. Allium, inquit, omnium planè edulcorum flatus maxime discutit. Itaque ipse rusticorum theriacam id appellat. Habet enim manifestè excedentem calorem, & qui pituitosum humorem non gignat, sed manifestè ei repugnet. Et omninò hic delectu calefacientiu opus est, quæ talia sint, vt etiam vehementer digerant, qualia sunt attenuantia non vehementer calida. Atque, vt loco alleg. vbi diligenter de colico dolore ex humoribus crassis orto tractat, Galenus scribit; A nullo in eiusmodi succis tam est metuendum, quàm à calore, qui eos liquet atque in flatum vertat, sed digerere non valeat.

*Calefacientia*

*Allium in colica vti solet.*

Attenuandi & discutiendi vi etiam valet marrubium album in vino coctum exhibitum, & summitates thymi in aqua ad tertias coctæ, si colaturæ mellis despumari aliquid addatur. Aëtius inter alia commendat decoctum verbenacæ rectæ per nouem dies bibitum, decoctum item menthæ viridis per tres dies continuatū. Castorei etiam Drach. j. datur in hydromelitis optimi cyatho vel Vnc. iij. vel Vnc. v. circiter.

Vel ℥. Castorei Drach. iij. sem. ammios feniculi ana Drach. j. Pulueriscentur, & detur Drach. j. in hydromelite.

Aut ℥. Cumini Vnc. ß. piperis albi, summittat. thymi, fol. ruta, nitri an. Drach. j.

Tritis iis cum aceto fiant trochisci pondere Drach. j. Detur vnus cum hydromelite.

Vel ℥. Fal. absinthii, pulegii, piperis albi, sem. cumini, baccarum lauri an. p. æ. Pulueriscentur. Dosis Drach. j.

Interea cum incidentia & attenuantia vsurpantur, clysteribus, fomentis, balneis, & aliis externis vitendum; quæ partem laxant, ne extensa doleat, & flatus facilius erumpant, ac pituita viscida facilius & cum minore dolore ad cauitatem intestinorum transeat. Totâ ergo abdominis regio inungenda oleo amygdal. dulcium, chamalino, anethino, laurino, liliorum alborum fomenta item humida ex decocto florum chamameli, meliloti, semine fenugrati, lini, ruta origano, calamintha & similibus adhibenda, quæ si calidiora expectantur, in vino coqui possunt.

*Fomenta sicca.*

Si dolor perseveret, ad sicca fomenta transeundem, quibus id, quod liquatum & attenuatum fuerat, exsiccetur & discutatur, sacculis nimirum ex milio, sale, fursure, puluere chamameli, ruta, anethi lauri, cui vsui etiam inferuiunt vasa testacea calefacta, & pannis inuoluta vulgò, vt & familiariter vsurpatur lapis ophites, serpentinus vulgò dictus, de quibus antea dictum.

Extra etiam adhibeantur discutientia & euacuantia; vt unguentum de arnita, Agrippa & alia, quæ in curatione hydropis tympanitæ proponuntur. De fomentis monet Trallianus, quod, nisi eorū ope dolor mirescat, non transeundum sit ad fortiora: quia materiæ copia prohibeat. Eius ergo partem maximam prius euacuandam esse, reliquam postea fomentis dissoluendam.

*Externa.*

*Dieta.*

Victus primò sit parcior ad excrementa absumenda, & pituitam extenuandam; postea cibus exhibeatur, qui sit boni succi, & coctus facilis, admistis iis, quæ incidendi & extenuandi vim habent. In quem vsu & vinum exhibere licet.

*Dieta.*

*De Colica ab humore acri, & scorbutico.**Colica ab humore acri & scorbutico.*

Oritur & colica ab humore bilioso & calido, non illo quidem in cauitate intestinorum hærente, vel per eam moto, sed per tunicas & vasa eorundem. Nam si in intestinorum cauitate redundaret, potius diarrhoeam vel choleram, vel intestinorum tunicis adhærens, & dysenteriam excitaret. Atque id vel ex eo quoque patet, quod ex biliosis & acris humoribus non solum colica, sed si aliud conuertantur, etiam icterus, febres, conuulsio, paralytis & alia grauius symptomata oriri solent.

*Colica Austria, Morauia & Franconia familiaris.*

Atque ex hac causâ, humoribus nimirum non frigidis & crassis, sed tenuibus, acris, quos omnes vulgò biliosos appellare solent, cum tamen magna sit eorum differentia, ortum habet colica, quæ Morauia, Austria, Franconia & aliis quibusdam locis, vbi vina fortia, sulphurea & tartarea in vsu sunt, familiaris est, & frequenter in paralytin, arthritidem, epilepsiam transit. Siue enim causas, quæ præcesserunt, siue signa ipsorum spectes, vtrique humorem non pituitosum & crassum, sed tenuem & acrem indicant. Nam vina quod attinet, lib. 2. Instit. pag. 241. dictum, quæ in terra calcaria vel lapide calcario, sulphureo, vel simili aliqua materia minerali abundante crescunt, cum partes tales multas in se contineant, quæ ad corpus alendum ineptæ sunt, tandem in corpore cumulatae variorum morborum & inter eos etiam colicæ causæ sunt. Humores enim tales cum à naturâ ut inutiles protrudantur ad intestina, venas & membranas eorum præter naturam distendunt, atque ita non solum doloris, sed & alui suppressionis causa sunt. Fibræ enim si hoc modo distenduntur præter naturam, officium suum facere & feces protrudere non possunt. Atque non solum obstructionem fecum retentorum causam esse, sed potius intestinorum distensionem, & fibrarum motum quasi contrarium, vel ex eo apparet, quod omnia euomuntur. Clysteres enim infusi rarè aliquid educunt; & quamuis aliquid educatur, alius tamen statim iterum clauditur, & dolores perseverant: imò clysteres, ut & glandes, sursum attrahuntur, & vomitu eliciuntur, ut sæpius annotatum; quod fieri non posset, si obstructa essent à fecibus intestina.

Perpendendum tamen hîc etiam hoc relinquo, an illi humores falsi & teres aliquam qualitatem adstringentem & mordicantem, qualis in vitriolo & alumine reperitur, habere possint, à qua siccitas intestinorum & suppressio alui originem habeant. Atque hi humores cum sæpe ad intestinorum cauitatem penetrare non possint, & vel copia sibi exitum præcludant, vel ob partis distensionem permeare non possint, ad venas regurgitant, & vel ad caput ruunt, & epilepsiam vel conuulsionem excitant; vel ad extrema corporis, & paralytin, arthritidem, aliisque dolores vagos procreant.

Signa quoque, quæ præsentem humorem arguunt, non frigidos & crassos, sed tenues & acres humores indicant. Appetitus enim perit, sitis crescit, vrinae rubicundiores apparent, facies colore etiam citrino tingitur, vomuntur non solum pituitosa, sed & æruginosa ac porracea, dolores vagi in toto corpore percipiuntur. Atque hoc malum quandoque epidemium esse solet atque contagiosum, ut Ænigeta, lib. 2. cap. 18. & 43. & Aui-cenna, lib. 3. fen. 16. cap. 6. testatur, ortumque ex humoribus acris, malignis & contagiosis habet. Talis colica an. 1621. incunte vere in Silesia, in ducatu Teschinenfi grassata est, cuius historia ita ad me per-scripta. Primò morbus cum dolore capitis inuasit; hinc dolores colici acerbissimi aborti sunt; postea iidem dolores dorsum, pedes, & hinc omnia exteriora occuparunt: Quamprimum dolor inuadebat, alius obstruebatur, ut nec fortibus medicamentis laxari posset: & licet laxaretur, sequenti tamen die iterum obstruebatur, appetitus deiiciebatur, & quicquid vel cibi vel potus as-

sumebatur, vomitu reiiciebatur: atque hoc malum contagione in alios translatum fuit, ut pauca ædes ab hoc malo immunes essent.

*Signa Diagnostica.*

Antecesserunt causæ humores acres & biliosos generantes, dolor est acutus, adest sitis, oris amaritudo, vigilæ, vomitus & singultus nonnunquam, aluus ferè adstringitur. Et licet à primo clystere feces eiiciantur, postea tamen nihil fere euacuatur, vrinae ardor & rubor adest; læditur æger ab hac causâ colicam patiens ab iis, quæ alias in colica à flatu pituita prodesse solent, contra profunt refrigerantia, sæpe coniunguntur febres tertianæ continuæ, duplices nothæ.

*Signa.**Prognostica.*

1. Dolor colicus ab hac causa nonnunquam in dorso dolores, materiâ, quæ ad intestina confluebat, eò delatâ, interdum in arthritidem, materiâ ad articulos transmissâ; sæpius in paralytin definit, nonnunquam epilepsiam excitat, materiâ ad caput delatâ. Et quidem eos, qui ex tali colica in epilepsiam delapsi fuissent, plerosque periisse Paulus Ægineta testatur; qui in paralytin, plerosque fuisse sanatos, criticâ quasi materiæ ad ambitum corporis translatione, & tandem discussione.
2. Satis periculose laborant, quibus infra nihil, vomitu verò corrupti & vitiosi humores eiiciuntur, imprimis si epilepsia & conuulsiones accedant.
3. Morbus etiam diuturnus est, & crebris recidiuis ægrum affligere solet, ita ut ægri sæpe multis annis in lecto decumbant, modò cum febre, modo sine febre doloribus singulis ferè mensibus, vel longiore etiam interuallo recurrentibus.

*Prognostica.**Indicationes.*

In colica ab humoribus calidis & acris refrigerantia & humectantia requiruntur, etsi malignitas coniuncta sit, & illi resistendum. Aluus si subsistat, aperienda; cum nisi aluus aperta sit, reliqua medicamenta parum profunt, id quod humectantibus & laxantibus rectissime perficitur.

*Indicationes.**Curatio.*

Trallianus frigida potum laudat, vbi vires robustæ sint, & partes internæ non læsæ. Iniicit etiam copiose oleum rosaceum cum adipe anserino, aut cum vitellis ovorum, vel cremorem ptisanæ cum oleo chamæmelino. Ægineta, lib. 3. c. 43. de Italo quodam Medico scribit, quod contagiosam colicam ex acris & mordacibus humoribus curauerit victu & medicamentis frigidis, etiam aquâ frigidâ propinatâ, qui allegato loco cõsulatur.

*Curatio.*

Et secuti hoc nonnulli ex recentioribus, Amatus Lusitanus, cent. 1. curat. 48. cent. 7. cur. 21. & Forestus, l. 21. obs. 12. qui in colica ex humoribus acris & biliosis, calidis medicamentis non solum non iuuantibus, sed & lædèntibus, non tantum frigida propinarunt, sed & lintea in frigida intincta & expressa vmbilico admoerunt; aut Epithematis frigidis vsi sunt successu non infelici. Aquâ tamè colica affectione laboranti dare, non cuiusvis triualis Medici est, ut scribit, loco allegato, Amatus Lusitanus.

Aluo non fluente refrigerantibus euacuantia addatur, eiusmodi sunt Syrupi rosarum & violarum solutiu, tamarindi, manna, rhabarbarum; ut:

℞. Syrupi rosarum solutiu Vnc. ij. serilactis Vnc. iij. vel iij. Misce.

Et sæpe cum felici successu in hac colicâ vsurpauit, & alii etiam vsurparunt ol. amygd. dulcium. Dissoluantur nimirum in iuris pulli, in quo flor. chamæmeli P. j. ebullierit, f. q. manna Vnc. j. vel Vnc. β. Colatur & addatur ol. amygdal. dulciū recenter expressi Vnc. j. β. vel Vnc. ij. Vel detur ol. oliuæ recens, in quo flor. rosarum solutiuarum

narum infusi fuerint cum iure mercurialis & radic. althææ.

Si tamen in colica biliosa ventriculus biliosus, humidus & laxus sit, melior est hiera picræ vsus, quâ mordaces humores in intestinis absterguntur, cum calidioribus aliis medicamentis exhibitis dolor potius irritetur, sicut exemplis aliquot docet Galenus, 12. *meth. med. c. ult.* Ne caliditate sua hiera noceat, cum refrigeratè aliquo detur. Clysteribus quoque Gal. 6. *epid. comm. 6. text. 5.* vritur, qui mordaces humores in intestinis eluunt, quorum materia esse potest melicratum, & cremor ptisanæ.

Vel ℥. Decocti hordei lb. j. mellis rosar. vel violar. sacchari rubri an. Vnc. j. vitell. oui num. j. F. Clyster.

Vel ℥. Rad. alibæ Vnc. β. parietaria, mercurialis, violarum flor. chamam. an. M. j. sem. lini, fœnugraci an. Drach. ij. caricarum pinguium num. iij.

Coq. in f. q. feri lactis.

Colat. ℥. Vnc. x.

Elect. diacathol. Vnc. j. hiera f. Drach. ij. melle ros. solut. Vnc. ij. ol. violacei Vnc. iij. stercoris canini albi Drach. ij. Misce.

F. Clyster.

His excretis, iniicit per sedem, quæ melius mitigant, & quæ in intestinis adhærentia, eorumque tunicas aperientia eadem à mordacibus humoribus ex supernis in illa defendentibus tuentur. Cibos quoque boni succi, & quidem coctu faciles offert, vt ita probo alimento humorum in corpore prauitatem & acrimoniam temperet, paulatimque corrigat. In hunc finem lac calidum cum saccharo iniici potest. In 2. *de simpl. medic. facult. c. 12.* Si dolor intestinorum à bile aut falsa pituita sit, clysteres infundit ex cera liquefacta cum oleo rosaceo & adipe hircino, aut ex solo oleo dulci. Serum lactis quoque per sedem iniectum mordaces humores abstergit.

Et si colica talis ex humoribus tartareis ortum habeat, quæ non tam in ipsis intestinorum cavitatibus quàm eorum vasis & tunicis consistat, eaque distendat, atque motus naturæ inuersus sit, ita vt omnia sursum propellat, & intestina calida & sicca intemperie laborent, fecesque rententæ exsiccentur, clysteres humectantes, emollientes iniiciendi sunt, qui simul atque vna opera, vt dolorem leniant, parari possunt. In quos vsus lac caprinum cum cassia iniici, & aliquid olei communis addi potest.

Quandoque tamen plus prosunt, & tensa ac sicca intestina magis laxant per os assumpta, quam in aluum infusa, vt oleum amygdalarum dulcium, & similia humectantia, non verò fortiter purgantia. Obseruatumque quosdam his doloribus, & alui obstructione detentos ex magna prunorum recentium comestorum copia solutos fuisse, cum antea nullis etiam vehementioribus purgantibus solui possent, aliisque idem ex vuarum recentium larga comestione accidisse. Tutius id præstat manna cum oleo amygdal. dulc. recenti sumra, vt antea dictum. Ad dolores verò leniendos vtile est decoctum fl. chamæmeli cum iure carnis vel cereuisia ad Vnc. iij. datum, cum spec. Diacymini Drach. β. & butyri recent. vel ol. amygdal. dulc. recent. Vnc. ij.

Possunt & alia vsurpari, quæ supra de colicæ curatione in genere sunt proposita. Et cum non sufficiat semel ægrum à malo liberasse, sed opus etiam sit præcauere, ne redeat, postea ea medicamenta adhibenda, quæ venarum obstructions aperiant, humoresque vitiosos e corpore euacuent. Vbi alius est liquida, vt Dysenteria metuenda sit, Gal. 12. *m. m. cap. 7.* alicam in aqua additis granis mali punici coctam exhibet, aut decoctum rhois obsoniorum præbet, aut fructus austeros.

Si dolor valde vrgeat, imprimis in hoc causæ genere, ad narcotica accedendum. Extra quoque aluo laxatâ, ventrem inungere oportet oleo violarum, amygdalarum dulcium, rosarum maluarum, althææ. Videatur etiam infra part. 3. cap. 7. de colicâ ab humore acri & scorbutico, vt

& Adr. Spigelius de febr. semiterr. cap. 4. & 13. vbi pluribus de hac colicæ specie agit.

#### Diata.

In colica ab humore calido vtilis est victus tenuis & refrigerans: inedia tamen cauenda, cum acriorem reddat materiam, & plus bilis generet, vnde omnia symptomata ingrauescunt & augentur. Danda ergo ptisana, cui interdum aliquid vini granatorum admiscetur, præcipuè si alius non sit adstricta. Cucurbitæ fructus naturali quadâ proprietate colo aduersatur, teste Tralliano. Vinum parçè bibatur & tale, quod malum hoc exasperare non possit. Videatur etiam Galenus de curatione colicæ ex humore calido acri, loco antea allegato 12. *meth. medend. cap. 7.*

#### De Colico dolore ab Inflammatione Intestinorum.

Quandoque etiam sanguis eo loci seu ob copiam, seu ob tenuitatem effusus, plerumque verò ad dolorem grauem, qui præcessit, eò attractus, aut ab alia læsione intestinorum eò concitatus inflammationem in colo excitat, quæ & ipsa distendendo, & fecibus alui ac flatibus viam præcludendo dolorem excitat.

Colica ab inflammatione intestinorum.

#### Signa Diagnostica.

Dolor fixus distendens, pulsansque in parte affecta intus percipitur, febrisque & febrilia Symptomata adsunt, aluus occluditur, licet adsit inane deiiciendi desiderium. Quod si tenuia intestina inflammentur, illis occlusis & conuolutis nihil per inferiora descendit, sed omnia per os, reiciuntur & inflammationis signa alia supra proposita adsunt.

Signa.

#### Prognostica.

Dolor colicus ab inflammatione maximè periculosus est; quia materia est impacta, & transitum in Ileum minatur. Et quanquam qui in ileo est, periculosior sit: tamen nec ille, qui in colo est, periculo caret, præsertim si inflammatio tanta sit, vt vrina supprimatur.

Prognostica.

#### Indicationes.

Qui scopi in aliis inflammationibus, iidem & hic sunt propositi, sanguis nimirum affluens à parte affecta auertendus, eiusdem feruor temperandus, ac id, quod influxit, discutiendum. Nam vt ad suppurationem ducatur, minus tutum est, & non sine periculo id sit, ac præcipuè si ad interna abscessus rumpatur.

Indicationes.

#### Curatio.

Curatio supra sect. 1. cap. 2. proposita est, quæ ibi videatur.

Curatio.

Præter dictam intestinorum inflammationem φλόγας eiusdem seu feruoris intestinorum, qui in tenuibus præcipuè intestinis accidit, mentionem facit Platerus, qui grauem & diu durantem dolorem inferat, atque oriatur ex bile nondum in intestinorum cavitare contenta, sed in ipsorum substantiam sese insinuante, eaque vellicante ac rodente. Cum enim bilis in intestinis hæreat, vel continuò de nouo affluat, dolores adeo pertinaces & diuturnos generari, qui licet mitigentur, mox tamen redeant atque eò sint sauiiores, quò bilis, quæ illas efficit, deterior est, atque hanc bilem à vesicula fellis interdum provenire docet, plerumque ex vitioso chylo genitam, in venis mesaraicis sanguini adhuc confusam, nec ab eo propter illius copiam, vel obstructions sufficenter in vesiculam fellis expurgatam, vnde cum

φλόγας eiusdem intestinorum.

tum sanguine per ramos venarum melsaraicarum intestina amplexantes illorum substantiæ infundi, & nisi per oscula venarum in spatium illorum exsudet, & diarrhœam exciter dolorem excitare. Et cum magna eius est copia, non solum ad intestina delata Colicum & Iliacum dolorem, sed & in aliis partibus alios morbos, sæpe etiam febres excitare scribit.

Verum enim verò nulla peculiari colicæ hæc est species, sed illa ipsa, quam antea à bile ac humore scorbutico provenire diximus, & in iis locis, ubi vina tartarea & impura bibuntur, & familiaris, qualis quoque scorbutico sæpe infestare solet. Hic enim quod antea etiam factum est, iterum monendum, hunc humorem falsum & acrem vulgò quidem bilem nominari, non parum tamen à bile illa flava, quæ in vesicula fellis colligitur, differe, & omnem colluviem humorum acrum adustorum & serosorum hoc nomine accipi.

## QVÆSTIO I.

### An Colica antiquis nota fuerit.

An colica antiquis nota fuerit?

De malo hoc illud primum in controuersiam venit, an Antiquis notum fuerit? Etsi enim causæ, quæ hoc malum excitant, semper in corporibus humanis inuenti sint, atque hinc probabile videatur, hoc malum semper homines afflixisse; & apud Celsum iam medicamenti colici Cassij mentio fiat: tamen dubitandi occasionem præbet Plinius, qui lib. 27. cap. 1. scribit, colicum morbum primo omnium expertum esse Tiberium Imperatorem, & nomen huius mali populo fuisse incognitum; & quod apud Hippocratem & antiquos Medicos nomen colici doloris non occurrat.

Verum enim verò, cum, ut antea dictum, causa huius mali etiam apud antiquos reperta sit, pro morbo nouo & qui Tiberij tantum tempore ignotuerit, non habendus. Nomen tamen hoc antiquis vñtatum non fuit, sed eum vel in genere doloris intestinorum nomine expresserunt, ut ex 3. Epidem. agrot. 9. & lib. de morbis & πεπταδῶν apparet, sicut & Diocles Carystius apud Celsum plenioris intestini morbi ileum vocat. Postea verò mutata nominis significatione, & colici & iliaci doloris nomina distincta sunt, & iliaci mali nomen saltem intestinorum tenuium affectioni; coli vero dolori colicæ passionis nomen tribuitur. Ita enim Celsus lib. 4. cap. 13. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum χορδαῖον, plenioris ἐπλεον, nominauit. A plerisque video nunc illum priorem ἐπλεον, hunc κοιλῆον nominari. Ideoque cum Dioclis Carystij tempore morbus hic notus fuerit, etsi ilei nomine appellatus, non primum Tiberij tempore innotescere potuit. Hoc forsitan accidit Tiberij tempore, ut colica quædam pestilens & epidemia in multis Romanæ Reipublicæ locis grassata sit, & ab Italiæ regionibus initium cepit, ut scribit Paulus Aegineta lib. 3. cap. 43. Simul etiam dubium est, quem morbum intelligat Plinius, cum non colicum nominet, sed colum.

Seqq. pertinent ad p. 876. col. 2. lin. 64.

Dolor colicus sic plerumque in sinistro latere.

Etsi vero colum intestinum totum huius doloris subiectum esse potest: tamen hic monet Guil. Fabric. cent. 1. obs. 58. dolores colicos ut plurimum in sinistro latere obseruari, idque accidere propter coli in ea parte angustiam. Cum enim excrementa in superiori & capacissima coli intestini parte in globos magnos, prout capacitas intestini ferebat, indurata, à flatu versus hanc angustiam magna cum violentia pellantur; accidit, ut non nisi summo cum dolore permeare possint. Id quod diligenter animaduertendum, ne huiusmodi dolores colici cum dolore splenico, nephritico, & zgotantium damno confundantur.

Dolor colicus cum splenico & nephritico non confundendus.

## QVÆSTIO II.

### An sola intemperies dolorem colicum inducere possit?

Qui id affirmant, primo pituitam vitream producunt, eamque acerbissimos dolores colicos excitare, ita ut perforari intestinum quasi cerebra videatur, in cavitatem intestinorum tunicis adhærescentem frigiditate proximè tales dolores parere putant. Verum etsi negandum non sit, in corpore ex cruditate humorem frigidum crassum & viscidum generari posse, qualis quandoque etiam euacuatur: tamen hoc probabile non est, primò humorem hunc tantam frigiditatem in corpore humano actu obtinere posse, ut actuali frigiditate dolorem tam acutum generet. Deinde nec hoc vero consensaneum est, eum in cavitatibus intestinorum ipsis adhærendo hunc dolorem; & quidem frigiditate tantum excitare. Nam si sola frigiditas causa doloris esset, non tam subito inuaderet, & tam subito cessaret. Et cur tum decimum doloris causa est, & non antea etiam fuit, cum diu ibidem (ex ipsorum etiam sententia) hæserit & frigidus fuerit? Et si sola frigiditas causa est, calefaciētibz medicamentis dolor sedaretur, quod tamen non accidit, sed calefaciētibz solis adhibitis magis intenditur, & non prius cessat, quam hic humor euacuetur.

An sola intemperies colicam inducere possit?

Vero proinde magis consensaneum est, non solum frigiditate dolorem à pituita vitrea excitari, cum, dum quiescit, nullum dolorem excitet, sed dum mouetur, distendendo, dum scilicet humor hic per venas in tunicas intestinorum penetrat, easque distendit, aut flatus à se emittit, qui itidem distendendo dolorem excitant. Vnde accidit, ut dum humor hic crassus & viscidus membranas ita distendit, ut dolorem quasi infixi pali, vel terebræ perforantis speciem præ se ferat, quod in reliquis intestinorum doloribus, ubi humor per ea transit, non euenit.

Pituita vitrea non frigiditate solum dolorem excitat.

Eadem ferè inflammationis & humorum biliosorum ratio est, quibus etiam nonnulli probare volunt, à sola intemperie colicam produci posse. Neque enim vel sanguis in inflammatione, vel bilis solum calefaciendo tantos dolores excitare valent; sed dolor ille grauissimus oritur, dum in inflammationibus sanguis tunicas intestinorum distendit, aut dum bilis non per intestinum cavitatem, sed per eorum venas & tunicas mouetur, easque distendit.

Inflammatio tamen alio etiam modo dolorem colicum excitare potest, dum angustiam pariendo excrementorum euacuationem impedit.

Inflammatio quomodo colicam excitat?

Refrigerationem tandem intestinorum quod attinet, quæ fit ab aëre externo, vel ab assumptis frigidis, sunt quidem nonnulli in ea opinione, quod & ab ea, cum frigida partibus nervosis & membranosis inimica sint, dolor colicus excitari possit. Verum probabile non est, frigus externum, & quidem sæpe non adeo magnum, ita ad intestina per pinguedinem & musculos penetrare posse, ut tantum dolorem frigiditate sua iis inducere valeat: sicut nec assumpta ita inalterata ad colum descendunt, ut frigiditate sua tam vehementem dolorem excitare queant. Cum verò id negandum non sit, à refrigeratione quandoque dolorem colicum induci, causam aliam intercedere necesse est. Mercurialis putat, duplici de causa à frigiditate dolorem colicum induci, primò quoniam indurentur feces à frigiditate; deinde quia propter frigiditatem corrugentur intestina, quæ corrugata dolorem inducant. Verum non credibile est, frigus tantum viuente corpore induci posse, quod contrahat intestina, ut inde dolor excitetur: neque frigus tam subito excitare potest feces, sicut sæpe subito à frigore dolorem induci videmus.

Quomodo refrigeratio intestinorum colicam excitat?

Probabilius ergo est frigida, dum frigidam intemperiem inducunt, & calorem naturalem debilitant, conditioni obesse, quæ debilitata, cum flatu, tum alij crudi



& corrupti humores generantur; qui cum alios morbos, tum etiam dolorem colicum excitare valent.

### C A P V T III.

*De dolore Iliaco. vel passione iliaca.*

**V**icinum colicæ ab inflammatione malum est Ileus, utpote in quem non raro colica ab inflammatione degenerare solet. Nomen autem vel à parte affecta accipit, Ileus scilicet, hoc est, intestino tenui, vel à symptomate, quod in hoc malo intestina *ειλεῖν* id est, conuolui videntur. Appellatur & Iliaca passio. Potest tamen distingui inter Ileum & Iliacam passionem, ut Iliaca passio sit dolor intestinorum tenuium, qui tamen, ut *capite precedente* dictum, sæpè etiam colicus dolor appellatur; cum frequentius intestinorum dolor in colo contringere soleat; ileus verò is affectus, in quo excrementa, quæ per aluum excerni debent, retinentur, & per os reiciuntur, ob inflammationem imprimis intestinorum, & plerumquidem tenium, quandoque tamen & coli. Et quidem non necessarium est, ut semper intestinorum dolori motus ille intestinorum inuersus coniungatur, ac feces per os reiciantur: & tunc propriè dolor Iliacus vel Iliaca passio appellatur. Vbi verò motui intestinorum inuersæ etiam magnus dolor coniungitur, sine discrimine & Ileus & Iliaca passio appellari potest. Verum cum quæ de dolore hoc Iliaco dici possunt, iam explicata sint partim *cap. 1. de ileo*, partim *capite precedente* de dolore colico, nihil de eo hic amplius addimus.

Pertinet ad intestinorum dolorem & tenesmus. Verum cum doloris intestini recti & ani proprius sit, de eo *infra* de ani symptomatibus dicemus.

### C A P V T IV.

*De Alui retentione.*

*Alui retentio.*

**Q**uicquid in cibo superfluum, & alendo corpori ineptum est, idque crassius (nam aquosum per vesicam excernitur) per aluum eiici debet. Fitque id recte dum omnia naturaliter sese habent, & aluum homines sani alij bis, alij semel singulis diebus deiciunt. Verum multis modis hæc actio vitatur. Aliquando enim aluus tardè & nonnisi tertio, vel quarto die redidit; aliquando plures dies planè suppressitur.

Et contra aluus interdum sæpius quàm par est, deicitur; id quod in variis alui fluxibus accidit. Interdum feces alui per aliena loca excernuntur: aliquando alia præter feces per aluum eiiciuntur, de quibus ordine dicemus.

*Alui diutius suppressæ exempla.*

Aluus primò interdum vel rarius, quàm par, vel minus, quàm par est, vel magno cum conatu excernit. Reperiri aliquos, quibus aluus ita segnis est, ut non nisi tertio, quarto, septimo, vel decimo aut duodecimo die excernant, etiam si bene comedant, neque aliàs malè habeant, sæpè obseruatum. Ita refert Brasauolus *de medic. in purgantib. cap. 6.* se anno 1535. iter equitando fecisse, & cum esset apud D. Virginem Lauretanam, semel excreuisse, postea Romæ profectum dies duodecim in itinere consumsisse, & Romæ demum iterum excreuisse, atque interim se maximè sanum vixisse. Similiter se Ferrariâ Venetias profectum, in accessu & recessu, & morâ, qua Venetiis fuit, nouem scilicet dierum spatium, nihil excreuisse. Idem aliis interdum accidit, eiusque rei exempla annotata ab Alexand. Benedicto, *lib. 19. de curandi morb. rat. cap. 36.* Fernelio, *lib. 6. de part. morb. & sympt. cap. 10.* Hieronymo Triueto, *comm. ad aph. 20. lib. 2.* Petro Foresto, *lib. 2. obs. 34. in schol.* Præterea Schenckius *lib. 3. obs.* exemplum habet Melancholicæ puellæ, quæ tribus mensibus nihil aluo excreuit, & virginis cuiusdam nobilis, quæ annis amplius octo aluū, vrinam, menses & sudores cum periculosissimis sym-

ptomatibus suppressa habens vitam, tertio quoque die aluum clystere proluendo, duxit.

*Mira alui suppressiones.* [Henr. ab Heer, *obs. 29. refert*, se nouisse Illustriss. fœminas, quæ cætera sanæ maximè, & quotannis vterum gerentes, nunquam, nisi vigesimo, vel etiam longiore spatio, fœces alui deponerent, ne quicquam inde commodi, etiam puerperæ, sentirent. Idem notum habet Sacerdotem quendam, qui à puero nunquam, nisi post 24. diem, alui beneficium sensit, & sanus vixit, nec vnquam vllum pharmacum expertus est. Idem, *ibid.* refert, Geneuensem quendam iam multos annos fœces nullas per aluum excernere, sed, postquam lautè edit ac bibit circa meridiem, sub horam primam surgere à mensa, pridianum prandium reuomere, retentis accuratissimè omnibus recens ingestis: postridie istum, ut hesternum, vomitu reiecturum, putridissimum, atque ab alui stercore non differentem. In vomitu, ut addit, conatus nullus, simul & semel in magna quantitate euenit. Abluto aquis odoratis ore, ad mensam redit. Ientaculo & cœnâ non vititur, solo prandio contentus. Idque iam ultra vigesimum annum continuat.

*Historia Henr. ab Heer.*

Dignum omnino fuisset, ut mortuus sectus, & quæ constitutio ventriculi & intestinorum apparuerit, annotatum fuisset.]

*Causæ.*

Cum autem ad naturalem fecum excretionem necessarium sit, primò ut adsint feces, quæ sui copia, tum qualitate intestinorum expultricem irritent, eæque ad excernendum aptæ sint; secundò ut irritatio seu stimulus hic ab intestinis percipiatur; tertio ut facultas naturalis irritata ad expellendum insurgat; quartò ut facultas animalis beneficio musculorum abdominis expulsionem hanc adiuuet: Si horum aliquod desit, fecum exercitio vel imminuitur & tardior fit, vel planè cessat.

Primò feces non stimulant, vel quia nullæ adsunt, vel paucae adsunt, vel licet adsint, mordacitatis & acrimoniæ sint expertes. Cum autem irritatio ista fieri debeat in intestino recto, licet in reliquis intestinis feces adsint, tamen si ad intestinum rectum non descendunt, nulla fit irritatio. Ita si intestina ore reiciantur, id quod fit in Ileo, vel per alium locum, ut *infra* dicitur, excernantur, vel intestina superiora occludantur aut obstruantur, feces ad intestinum rectum non descendunt. Idem accidit, si intestini recti pars superior coalescat, id quod nobili cuidam Equiti Carolo No-uolano accidisse refert Marcellus Donatus, *de hist. med. mirabili lib. 4. cap. 10.* Huic enim cum aluus suppresseretur, nec aliis modis aperiri posset, vndecimo die mortuus est. Corpore aperto intestinum rectum ita in parte superiore per digitum transuersi longitudinem coiuisse & coaluisse inuentum est, ut vix tenuioris funiculi crassitiem æquaret, vtrinque in confinio intestini partibus in tumorem quendam veluti glandulosum eleuatis.

Paucae feces fiunt, dum paucus cibus assumitur. Secundò expertes acrimoniæ sunt feces, vel dum frigidae sunt & ex cibo frigido genitæ, vel, quod frequentius accidit, dum bilis flaua, quæ ad intestina transmissa & excrementis admixta ea ad excretionem stimulat, deest, vel aliò fertur, id quod fit in ictericis, vel euacuata est. Vnde post purgationem ac clysteres aluus subsistere sæpè ad diem vnum vel alterum solet. Quod tamen etiam eâ de causâ accidere potest, quod intestina omnibus excrementis euacuata ad excretionem non stimulantur, donec iterum repleta sint.

Tertio irritationem non sentiunt intestina, dum vel fecibus quasi assuescunt, ob diuturniorem earum retentionem, ut iis accidit, qui propter forensia vel alia negotia feces præter debitum retinent, vel quia stupore laborant

laborant intestina, de quo infra de stupore ac paralyfi ani, dicitur.

Quartò etsi facultas irritatur, & irritationem sentit, tamen excretio non sequitur, vel læsâ facultate, vel errore externum. Facultas vel labefactatur vel impeditur. Labefactatur ob intemperiem intestinorum, imprimis frigidam & siccam. Pertinet ad læsam facultatem & id vitium, cum musculis abdominis opem expultrici facultati non ferunt, quia vel in ipsis, vel in vicinis abdominis partibus affectus aliquis est, qui dolorem parit, ob quem ipsorum motus impeditur. Facultas impeditur in excretionem vel ob viarum angustiam, dum tumore aliquo intestina crassiora aut comprimuntur, aut constipantur, aut conuoluuntur, aut pituitâ viscidâ obstruuntur; vel ob retentricis facultatis robur, quâ de causâ excrementa diutius retenta sicciora fiunt. Pendet autem retentricis robur à siccitate moderata, quam propterea etiam augent adstringentia & retentricem roborantia, vt mespila, cydonia, præsertim si primâ mensâ sumuntur. Pertinet huc locus Galeni, dum Hippocratis verba, 6. Epidem. comm. 5. text. 27. Refrigeratio, quæ in ventre sunt, durat, ita explicat: Refrigerationem exteriorum semper ventrem siccare cognoscimus, interiorum autem contra humectare atque lenire, quæ coeliacos etiam, qui vocantur affectus, id est, ventris profluvia interdum concitat, quo tempore ipsa quidem interiorum membrorum corpora, duriora fieri contingit, humores autem cibi non rectè concoctis neque distributis descendere. Quod autem cum calum nos ambiens frigidus fuerit, quæ in ventre sunt, diutius ibi morantur, euenit, quod imis partibus musculi sedem claudentes impositi sunt, qui per frigus coguntur, constringunturque. Hæc Galenus. Ob errorem autem externum seu obiecti, quod expelli debet, fecum scilicet ratione alui deiectio læditur, dum feces alui nimis sunt crassæ, viscidæ aut duræ. Generantur autem feces crassæ & viscidæ à cibis crassis & viscidis: duræ autem fiunt, quia nimis exsiccantur; quod accidit, quia aut cibi, vnde generantur, nimis sicci sunt, aut paucò nimis potu diluuntur, aut humiditas ipsorum in transitu per intestina omnis exauritur, id quod fit aut propter epatis & lienis caliditatem, aut propter vehementem motum imprimis equitationem, & in curru ventionem velocem, aut propter diuturnam in intestinis moram, aut propter habitum corporis calidiorem, ob quem multum per ambitum corporis distribuitur & discutitur. Quò pertinet etiam inedia, quâ intestina & feces alui exsiccantur, & ob quam etiam postea, dum eam amplius non patitur æger, sed cibum rursus assumit, nihilominus feces exsiccantur, dum natura famelica quicquid humoris in chylo est, per venas melsaricas exugit, vnde feces exsiccantur. Atque hac de causâ accidit, vt qui post morbos acutos conualescunt, etsi auidè comedant, nihilominus aluum sicciorẽ habeant; quod & iis interdum, qui benè nutriuntur, accidit. Fecum autem hæc siccatio & durities, quæ alui suppressæ causa est, præcipuè accidit in intestino recto, & eò loci, vbi tenuia intestina in crassâ desinunt.

In hac autem causarum explicatione non prætereundi Aphorismi Hippocratis, 20. sect. 2. Quibus iuuenibus adhuc aluus humecta est, iis senescentibus, exsiccat. Quibus verò iuuenibus adhuc aluus sicca est, iis senescentibus humectatur; & 23. eiusd. sect. Quicumque aluus humidus habet, melius degunt iis, qui siccas habent, ad senectutem verò deterius. Nam senescentibus magna ex parte exsiccat. Hi enim Aphorismi eatenus saltè vteri sunt, si eadem victus ratio seruetur. Si vero victus ratio, quam quis iuuenis obseruauit, in senectute mutetur, non mirum etiam, id quod Hippocrates scribit, non fieri. Variantur autem alui deiectiones secundum ætates, ob eam, quæ in illis fit, corporis dispositionis mutationem. De quæste prolixè Galenus, in comm. in aphorismos allegatos, & alij interpretes.

Neque etiam inter causas alui tardioris prætereunda

videtur pituita illa crassior, vniuersum intestinorum ductum obducens, qualem Lipsius aliquando & alij quidam excreuerunt, vt supra, sect. 1. cap. 3. & 5. dictum. Hæc enim pluribus modi alui tardioris causa esse potest, dum & intetnam intestinorum tunicam oblinendo facit, vt stimulus fecum ab iis non percipiatur, & visciditate sua feces quasi desinunt, ne facillè versus aluum moueantur.

Vt ita si causas has omnes, quas per diuisionem inuenimus, in numerum redigere velimus, alui retentæ sint hæ causæ. Fecum in intestino recto defectus, dum illæ vel ore, vel per aliam viam eiciuntur, vel via ex superioribus intestinis ad rectum iis non patet. Fecum paucitas; vel eæ acrimonie expertes, ob bilis, quæ admiscetur aliâs, defectum; fecum diutina retentio: stupor ani, intestinorum frigidas & siccitas, musculorum abdominis vitium, intestinorum angustia, facultatis retentricis robur, fecum crassities, visciditas vel durities.

### Signa Diagnostica.

Cum autem causæ à quibus alui retentio prouenire potest, plurimæ sint, vt modò dictum, atque ob curationem eas discernere & vtile & necessarium sit, danda opera, vt quæ mali huius causa sit, manifestum fiat. Primò ergò inquirendum, an causa aliqua externa præceserit, & an cibus, potus, aer, equitatio, vectio & similes causæ alui suppressioni occasionem præbuerint. Si nihil horum præceserit, causæ internæ perpendendæ sunt; an nimirum morbus aliquis in intestinis superioribus adsit; feces alui per os vel aliam viam reiciantur; an icterus adsit, vel ani stupor, in musculis abdominis vel vicinis partibus morbus aliquis dolorem patiens, vel calidioris epatis indicia sint conspicua, vel feces duræ & crassæ in intestino recto hæreant, aut si quæ aliæ huiusmodi causæ adsint.

### Prognostica.

1. Aluus tardior vel intercepta semper capitis symptomata augeat. Vapore enim è fecibus retentis caput repletur, corpus ingrauescit, ventriculi coctio læditur, atque etiam reliquæ coctiones malè se habent. Præstat propterea tam in sanis, quàm in ægris aluum quotidie suum officium facere, quàm adstrictam esse.
2. Alui autem tarditas vel retentio nunc periculiosior, nunc minus periculosa est, pro causarum, quæ eam excitant, varietate. Si enim ab intestinorum inflammatione fiat, grauissimum & plerumque lethale malum est. Satis etiam sæpè pertinax est alui obstructio, è fecibus induratis, quæ colicos dolores diuturnos parit. Vt n. ex observationibus Doctoris Oethæi refert Schenkus, lib. 3. etsi interdum purgantibus aluus probe euacuata videtur, & excrementa liquida egeruntur: tamen excrementa alui sicca & dura plurima nihilominus in iis subsistunt, & nouas obstructions aut dolores pariunt. Excrementa epim liquidiora præterfluunt, & sicca ac dura hærent. Ideoque in tali casu primo clysterem vñ atque alterum ad feces emolliendas iniicere vtile est, & postea purgantia exhibere, quæ si vel operari tardius videantur, vel pauca educere, deuuo clysteres iniicere conuenit. Eadem etiam aliarum causarum ratio est.

### Indicationes.

Causæ externæ omnes, occasionesque, quæ aluum tardiorẽ reddunt, tollendæ sunt. Deinde & causæ internæ; atque hæc cum variæ sint, quælibet conuenienti modo amouenda. Si nimirum adsit intestinorum inflammatio, si icterus, si ani stupor, & similes causæ, tollendæ. Quod qua ratione fieri debeat, ex iis, quæ hactenus dicta sunt, & dicentur, patet. Neque enim ratione

tôt & tam varias causas tollendi vno loco explicare conuenit. Vt pauca ex Galeno, 1. *de tuenda sanit. cap. 14.* saltem afferamus, retentionis causæ contrariam semper causam admouere oportet. Si enim ciborum paucitate & siccitate aluus sit restricta, cibi plures & humidiores exhibendi. Si siccitate, humidiora: si austeritate & acerbitate, dulcibus & pinguibus cibandi erunt ægri. Si in ordine ciborum erratum sit, & primò sicca, adstringentiaque sumpserint, humida, pingua & dulcia secundo loco, error corrigendus. Si cum bis edendum erat, semel comederunt, non bis modò, sed etiam amplius pascendi. Eodem modo & recens contractas interperies contrariis remediis tollere oportet, scilicet, quod siccatum est, humectando, quod refrigeratum est, calefaciendo, & reliquos affectus simili ratione corrigendo. Quæ tamen ætatis mutatione remoueri possunt, iis vel nullum vel leue auxilium adhibeatur, vsque interrim cibis lubricantibus laxa per vices seruetur, & omnia contraria & adstringentia vitentur.

Tertiò ipsa aluus ad excretionem stimulanda aut viæ lubricæ reddendæ, ac fæces, seu duræ fiant, quia diutius retinentur, seu diutius retineantur, quia sicca & duræ sunt, emolliantur. Vbi notandum, ad hanc rem commodiores esse cibos, & ea, quæ cibis admiscuntur medicamenta, aut quæ paulò ante cibum sumuntur; Medicamenta verò purgantia & præcipuè fortiora ad hanc rem inutilia esse; cum post eorum vsum aluus sisti & adstringi soleat, ob causam supra propositam.

#### Curatio.

Curatio.

Exhibendi ergo cibi aluum lubricantes, vt attrplex, malua, spinachia, blitum, oleo vel butyro condita, pasulæ, ficus, oleum, butyrum, & quæ simul acria ac nitrosa sunt, vt brassicæ succus, beta mercurialis. Et si vero & fructus plurimi sint, qui emolliant ac laxent: tamen quia faciliè corrumpuntur, præsertim si diu in ventre retineantur, ab iis abstinendum. Ideoque tutius est oleosis & pinguibus feces emollire, & nisi sponte exeant, per lenes planè & humectantes clysteres educere. Pessimum verò est, naturam ita assuefacere, vt nisi fortioribus & acribus clysteribus ac glandibus irritata officium suum faciat. Vtile est & serum lactis cui tantum mellis, quantum ad suauem saporem citra stomachi subuersionem sufficit, addendum; & quia Hippocrates, 4. *aph. ult.* scribit, mictio noctu plurima facta paruam deiectionem significat, documentum nobis hoc præbet, vt iis, quibus aluus siccior est, plus potus demus, & quantum possibile, distributionem eius inhibeamus, quod fiet, si non nisi cibi iam bona parte sumta bibatur.

Inter medicamenta vtilissima est aloë, & species hietæ cum octoginta partibus aloës confectæ, quæ à Dr. s. ad Dr. j. exhibendæ horæ vna ante coenam. Nam, vt Galenus, 2. *de compos. med. sec. loc. in fine* scribit, intestina & ventriculus roborant, & eorum expulsionem ac sensum vegetiorem reddunt, pituitam iis substratam abstergunt, & vim expultricem irritant. Earum tamen vsum frequens, præsertim in iis, qui intestina sicciora habet, vitandus. Neque etiam aloë senibus propter siccitatem satis conuenit, sed potius cibis mollientibus & lubricantibus in prima mensa sumtis aluus iis laxanda. Et præstat in eorum vsum subsistere, etsi biduo saltem aluus soluiatur, quam valentioribus, nisi necessitas valde urgeat, medicamentis vti. Neque etiam lenientia hæc copiosè exhibenda. Nam si copiosè sumantur, & aluus valde laxetur, sequentibus diebus adstringitur. Qua de causa etiam acria per aluum infundenda non sunt, sed humectantia & pingua solum sufficiunt, quale est oleum. In infantibus & tenellis ventrem oleo, adipe, vel vnguento Agrippæ inungere vtile est.

Rari alui ducenda modi.

Rari præterea quidam alui ducendæ modi apud Auctores occurrunt, qui non prætereundi. Hieronymus Thriuerus, *comm. in aph. 20. sect. 2. Hippocratis* scribit, Dan. Sennerti *Tom. II.*

rusticos iam dudum nosse experientia, quod si nudis pedibus humi obambulent, ventrem pertinacem solui. Atque eius rei historiam refert Brasauolus, c. 6. *tract. de medicinis purgant.* dum scribit, Ferrariensium Ducem Borsium in alui duritiem incidisse & per triduum nihil excreuisse, & consultum ea de re Medicum eo tempore insignem Michaëlem Sauonarolam suasisse clysterem iniici, quo nihil proficiente iussit pavimentum, quod erat marmoreum, frigida aqua copiosiore conspergi, & Ducem lecto surgere, ac nudis pedibus ambulare. Non quinquaginta passus perrexerat Dux, & per ventrem dolorem ac *βορβορυμὸν* sentire cœpit, sedem petiit, & potentissimè excreuit; quo facto iussit Sauonarola aquam, in qua herbarum calidæ essent decoctæ, Ducis pedes ac crura ablui, quod consilium Dux centum aureis remunerari iussit. Quod proculdubio accidit ob pedum, quem cum partibus neuosis & membranosis, qualia etiam sunt intestina, habent, consensum, atque ob intestinorum refrigerationem; sicut aliàs etiam, si venter frigori exponatur, dolor colicus & alui excretio copiosior excitari solet. Verum Brasauolus hoc periculosum auxilium esse putat, & non tentandum; cum tormina inducere possit, & alui profluuium, quod alias etiam accidit, si ilia & partes inferiores detectæ sint.

Nonnullis sorbilibus ovis sumtis ventrem solui refert Brasauolus, *eodem tractatu*, & Marcellus Donatus, *de Mechoacanna*; quod proculdubio evenit, cum cruditate hidorosa ova, quod in quibusdam accidere solet, degenerant, quam natura per aluum eiicit.

Pilulis compressis & altera parte saliuâ madefactis, atque ventriculo extra apposis Abbatisam quandam sufficienter purgari solitam refert Fallopius, *cap. 2. tract. de purgant.* Sed supra iam dictum, purgantia etiam extra applicata, dum se per orificia venarum & arteriarum in corpus insinuant, ventrem mouere posse, de quare etiâ in *Institut. lib. 5. part. 1. sect. 1. cap. 11.* dictum.

Nonnullis quoque ex solo purgantium odore aluus laxatur, cuius rei exemplum habet Alex. Benedictus, *in præf. in lib. de peste.* Barthol. Maranta, *meth. cognoscendi simplicia* 1. 3. c. 15. & alij. Noui etiam Medicum, cui, si in vola manus pomum colocynthidis contineret, donec inualesceret, aluus laxabatur.

F. Platerus, 1. 1. *obs.* scribit, se in quibusdam excrementa alui, quæ ob duritiem excerni non poterant, tussi & sternutatione concitata eiecisse.

### CAPVT V.

#### DE ALVI FLUXIBVS IN GENERE,

##### Et de Coeliaca affectione ac Lienteria.

VT præter naturam est, si excrementa alui longiore, quam par est, tempore retineantur: ita æquè præter naturam est, si citius & frequentius, imò copiosius, quam par est, excernantur, quæ præter naturam excretio alui fluxus appellatur.

#### Differentia.

Cum autem variæ alui fluxu sint differentiæ, ratione materiæ, quæ excernitur; partis & loci, à quo in intestina materia confluit; causæ efficientis; atque ob differentiam hanc variæ curandi ratio exigatur; prius differentiarum alui fluxuum explicandæ, & alui fluxus in suas species distinguendus.

Differentia.

Materiæ ratione alui fluxus varij sunt. Aliquando enim cibi nondum concocti, aut imperfectè cœcti per aluum deiciuntur, qui fluxus Lienteria, & Lientericus, item Coeliacus appellatur. Aliquando chylus per aluum excernitur; aliquando humores excrementitij, bilis, pituita, melancholia per aluum excernuntur, qui fluxus cum sine exulceratione intestinorum est, Diarrhoea

Lienteria & fluxus. Coeliacus.

FFFF rhœa

Diarrhea.  
Dysenteria.

rhoea dicitur: si cum exulceratione, dysenteria. Aliquando etiam sanguis sine intestinorum exulceratione excernitur.

Ad materiae considerationem pertinet & motus eius, qui vel symptomaticus est, vel criticus. Symptomaticus est, cum natura à copia vel prauitate materiae stimulata intempestiue & præposterè materiam expellit. Criticus verò est utilis, cum consueto vel opportuno tempore materia euacuatur. Qua de re Galenus, in fine libri de sympt. different. scribit, quædam etsi toto genere sint præter naturam, vt hæmorrhagia narium, vomitus, sanguinis per aluum deiection, hæmorrhoids, aut aliud huius generis, præter naturam simpliciter non sunt, modo ἐναισθη, id est, tempestiue fiant. Fiunt autem tempestiue, quando id, quod molestum est, expellitur. Et 7. meth. med. cap. 11. Sunt, inquit, quibus diarrhoea & Cholera certis intervallis omnem corporis redundantiam educit.

Ratione loci, à quo materia confluit, fluxus alius à toto est, qui colligatiuus dicitur, & familiaris est febribus pestilentibus, caussò, hectica, phthisi, atrophie nonnunquam & viscerum inflammationibus: alius à ventriculo, epate, liene, mesenterio, cerebro, intestinis, vel etiam toto venoso genere, raro à pulmone, & thoracis cavitare fluxus oritur, vt phthisicis, & empyicis ante mortem accidere solet.

Tandem ratione causæ efficientis fluxus differunt, quæ est vel interna vel externa. Internæ causæ ratione fluxus differunt, quod vel intestina magis, quam par est, stimulantur, vel retinere nequeunt, vel paralyti affectus est sphincter.

Causa externa alui fluxuum.

Externæ causæ sunt omnia, quæ ad producendos humores vitiosos faciunt. Quod pertinent & venena ac fortia medicamenta purgantia adsumpta, quæ ὑπερπύδα γαστρίῳ excitant.

Fluxus lientericus & coeliacus quomodo differant?

Verum commodissime, & ad methodum curandi instituendam rectissime fluxus alui ita distinguuntur, quod alius est, quando cibus nondum planè concoctus excernitur, qui Lienteria, & Lientericus appellatur. à quo Coeliacus tantum ratione minoris cruditatis differt; alius, cum humores alij quicunque sine exulceratione intestinorum excernuntur, qui diarrhoea appellatur; alius, cum humores cum vètris dolore & torsione ac intestinorum exulceratione excernuntur, & proinde deiectiones cruentæ sunt, qui fluxus dysenteria nominatur; alius cum sine dolore ac intestinorum exulceratione sanguis effluit: de quibus ordine dicendum, & de coeliaco fluxu ac lienteria, de diarrhoea, de dysenteria, de sanguinis per aluum profluvio agendum.

### De Lienteria & Coeliaca affectione.

Coeliaca affectio & lienteria.

Coeliaca affectio & Lienteria tantum ratione minoris & maioris differunt, eandemque curationem postulant. Lienteria enim dicitur, cum alimenta prorsus cruda statim, vt assumpta fuerunt, per aluum excernuntur, vt alimenti assumpti genus aperte agnosci possit. In coeliaca verò affectione diutius non nihil in ventriculo alimenta morantur, neque tam citò per aluum descendunt, & iam aliquam coctionem adepta sunt, nondum tamen perfectam. Κοιλιακή autem à parte affecta, hoc est, ventriculo nomen accepit, tanquam peculiaris sit ventriculi affectio. Λιεντερία verò quasi λείπτως τὸν ἐντέραν, quod qui primi hanc appellationem huic malo indiderunt, id à lenitate seu glabritie intestinorum superficie fieri existimarunt, perditâ illorum naturali asperitate. Verum Galenus id reprehendit, 6. aph. 1. quia intestina ingestos cibos, non asperitate quadam retineant, sed amplexu suavi, arcto tamen, quo effluere illos intestina, cum naturaliter habent, prius non sinant, quam legitime sint concocti, atque ita tempus complectendi cibum cum concoquendi tempore exaquetur, vt loquitur Gal. de sympt. diff. cap. 4. Attamen hanc causam in-

An ob lenitatem intestinorum p. n. fiat lienteria.

ter alias quoque causas admittit Aëtius, vt postea dicitur, & λείων lubricum etiam significat. Neque affectio semper nomen à propiore symptomate, sed frequenter à manifestiore & vulgo notiore accipit. Hoc tamen verum est, non tantum intestinorum, sed simul & præcipue, ventriculi affectionem esse lienteriam, quorum facultas retentrix læditur, vt patet ex Galeno, 4. aph. 1. 6. aph. 1. 3. aph. 2. 2.

Est nimirum Lienteria, vt Galenus, de different. sympt. c. 4. definit, celer per ventriculum ad intestina esculentorum potulentorumque transitus, quo talia eiiciuntur, qualia fuere assumpta.

### Causa.

Coeliacæ affectionis & Lienteriæ causa proxima est retentrix facultatis ventriculi, atque intestinorum læsio, ob quam cibi, antequam cocti sunt, per intestina descendunt, atque per aluum deiiciuntur. Vt enim coctio fiat, necessum est, cibos aliquādiu in ventriculo retineri; quod si non fiat, cibi crudi ad intestina descendunt, & per aluum excernuntur: atque ita non quia incocti permanent cibi, idè deiiciuntur, sed quia citò & ante tempus debitum deiiciuntur, ideo coqui & immutari non possunt. Quia tamen diu homo sine alimento vivere non potest, non omne alimentum, quod assumitur, per aluum deiicitur, sed breui illo, quod retinetur, tempore tenuiores & subtiliores esculentorum & potulentorum partes alterantur & coquuntur, quæ corpori in alimentum cedunt. Etsi verò quandoque etiam coctricis facultatis vitio cibi incocti & crudi deiiciuntur, dum ventriculus vel ob calorem debilem innatum, vel quia omentum, aut epar, aut vicinæ partes frigida ventriculū refrigerat, cibos concoquere non valet: tamen tum propriè dicta lienteria non generatur, si retentrix adhuc se bene habet. Non enim celeriter & paulò post, quam assumpta sunt, alimenta deiiciuntur, id quod in lienteria propriè dicta accidit, sed satis diu in ventriculo morantur; ob caloris tamen ventriculi debilitatem, etiam in diuturniore mora, & quæ, si calor ventriculi se rectè haberet, ad coctionem sufficeret, coqui non possunt. Et quidem quandoque retentrix tam ventriculi, quam intestinorum læditur: quandoque tamen vel solius ventriculi, vel solum intestinorum retentrix læsa coeliacæ affectionis vel lienterie causa esse potest. Cum enim intestina vim habeant chylum in ventriculo genitū amplius elaborandi, si intestinorum vis retentrix læditur, etsi ventriculus bene sese habeat, tamen quia non tam diu, quam par est, alimentum in intestinis retinetur, illam, quam debet, elaborationem, & perfectionem non suscipit, sed crudum quodammodo per aluum deiicitur, atque Coeliaca affectio oritur. Si vero intestina bene sese habeant: ventriculus tamen cibum satis diu non retineat, præpropere ad intestina descendit, atque coctionem, quam debebat in ventriculo accipere, in solis intestinis recipere non potest, atque ita crudus, & intempestiue per intestina descendit, lienteria oritur.

An læsa solè coctrice facultate ventriculi lienteria generari possit?

Læditur autem retentrix facultas vel per se, vel per accidens. Per se, dum vel labefactatur ab insigni intemperie frigida & humida, quæ instrumenta retentionis laxantur, & ad retentionem parum apta redduntur: eaque aut sola aut cum humore pituitoso coniuncta, qui nonnunquam è cerebro in intestina, & ventriculū decumbit, sicut & pinguium & lubricorum immoderato vsu mollis & laxior factus ventriculus cibum retinere non potest.

Hinc etiam dysenterie superuenit lienteria, 7. aph. 76. & 1. de morb. quia in dysenteria intestina prauorum humorum trāitu affliguntur, & calor natiuus ac tonus eorum labefactatur. Hinc quoque lienteria & hydrops ferè reliquis morbis desinentibus superueniunt, cum non queat facile ventriculus ab accepta humiditate exsiccari. Hipp. in lib. de aëre, aquis & locis.

Cur dysenteria lienteria superueniat?

Impeditur retentrix à cicatrice densa & læui, vt loquitur



loquitur Aëtius, quæ dysenteria magnæ, & exulcerationi profundæ succedere solet; ubi ob densitatem cicatricis ciborum per corpus distributio impeditur, osculis venarum mesaraicarum obturatis, ob læuorem verò cibibus ad perfectam coctionem retineri non potest; sicut idem docet, *tetrab. 3. ferm. 1. cap. ult.* Rarò tamen hanc ob causam lienteria accidere videtur. Non enim credibile est, viuente homine, ita posse intestina exulcerari, vt omnia, aut maiori ex parte vasorum osculo obturentur. Et quamuis post dysenteriam interdum lienteria sequitur; vero tamen consentaneum est, & eam fieri ob insignem ventriculi & intestinorum labefactionem. A pituita lienteriam fieri posse, magis credibile est, quæ cum intestina lubrica & laxa reddere; tum oscula venarum mesaraicarum obturare, tum calorem obtundere potest.

Per accidens verò læditur retentrix, dum expultrix valde irritata cibos nondum concoctos mox deorsum propellit. Citius enim, quam par est, expultricem excitari, est retentricem lædi. Fit hoc ab vlcerosâ ventriculi aut intestinorum ex acerbis & mordacibus humoribus dispositione, eo modo in superficie illorum membrorum factâ, sicut aphthæ in ore puerorum fieri consueverunt, teste Galeno, *3. aph. 22.*

Atque hæc vlcerosâ dispositio, si longo tempore perseueret, in dysenteriam abit. Galenus, *6. aphor. 1.* Interdum & ab occulta alienaque qualitate ventriculum obsidente idem malum accidit, ex esu fungorum, & fructuum putrescentium, ex veneno, ex praua aëris constitutione, à quorum postremo epidemiarum lienteriarum originem ducunt.

Atque hæc causæ præcipuè frigida & humida intemperies & pituitosus humor, vel vlcerosâ intestinorum dispositio, si sint remissiores, coeliacam affectionem generant, quæ est minus velox cibi & potus, & quidem nonnihil mutati excretio; quibus affectio coeliaca à lienteria differt.

Hinc Lienteria Dysenteria autumnò maxime fiunt, *3. aph. 22.* Cum enim lienteria fiat, vel retentrix ventriculi intestinorum læsâ ab intemperie frigida & humida, vel ob eorum exulcerationem ab humoribus mordacibus, hæc duo, viscerum scilicet intemperies, & humorum acrimonia, autumnò potissimum ex inæquali aëris constitutione gigni possunt. Eandem ob causam in ætate consistente lienteria frequentius accidit, *3. aph. 30.* Causæ enim lienteriarum magis in iis, qui ultra iuuentutem sunt prouecti, reperiuntur.

Fernelio non solum cibi semicocti, sed chyli etiam absoluti imperfecta est distributio, ob epatis, lienis & mesenterij obstructionem, aut ob trahentis in hisce partibus facultatis imbecillitatem, aut ob alimentorum, præsertim cacoehymicorum, & potus quoque copiam & corruptionem. Atque ita ipse coeliacam à ventriculi vitio non fieri statuit. Galenus tamen, *6. de loc. affect. cap. 2.* vt lienteriam, ita & coeliacam, tum ventriculi, tum intestinorum vitio fieri scribit, & κοιλιακή à parte affecta, hoc est, ventriculo nomen accepit, quia peculiaris sit ventriculi affectio. Ita etiam Aëtius, *tetrab. 3. ferm. 1. cap. 32.* scribit, coeliacam affectionem fieri, quando humida excrementa egeruntur ventre præ imbecillitate nequeunte digerere. Et fluxum istum, qui fit à chylo non distributo, aut alimentis corruptis, alij autores malunt ad diarrhœam, quam ad coeliacam affectionem referre.

Bauderonius adhuc vnam lienteriarum causam addit, atque ex frigore & resolutione nervorum sextæ coniugationis lienteriam fieri posse, & neminem eorum, qui tempore hyemis per alpes iter faciunt, id negare scribit. Veruntamen hoc rarum esse ait. Quod si accidat, ad diarrhœam potius, quam lienteriam pertinere videtur.

Cum autem secundum has causas curatio coeliacæ affectionis & lienteriarum variet, dicendum erit de lienteria ob læsam retentricem ab intemperie frigida & hu-

mida, & humore pituitoso, deinde de lienteria ab expultricis irritatione, seu ab vlcerosâ dispositione, & vlcere ventriculi: si prius, quæ de lienteria in genere dicenda restant, expediuerimus.

### Signa Diagnostica.

Et quidem cognoscuntur hæc mala, quod per alium continenter cibi crudi, hoc est, nihil aut parum ab assumptorum consistentia, colore, odore, aliisque qualitatibus immutati excernuntur, & colore; imprimis sub alba & cinerea sunt, liquida, spumosa, æger ex cibo assumpto non nutritur, corpus contabescit, adsunt rugitus, inflammationes.

Et quidem in coeliaca affectione post 6. vel 7. horas cibis assumptis deiicitur, aliquo modo quidem mutatus, sed non perfecte coctus. Et plerumque coeliaca est præuia ad lienteriam dispositio, eamque sæpius antecedit. Debilitata n. aliquo modo facultate retentrix, & propterea concoctrix officium suum præstare non valente, crudiora, molliora & humidiora excrementa per alium eiici incipiunt, quæ & interdum foetorem aliquem habent, dum pro coctione putredinis initium contrahunt, hominesque sunt nauseabundi, extenuantur, quæ vitia in dies magis augentur, tandem res ad Lienteriam peruenit. Quandoque tamen sine præuia coeliaca affectione Lienteria excitari potest.

In Lienteria cibi, paulò postquam sunt assumpti, tales quales sunt assumpti, deiiciuntur, ita vt cibis ipse cognosci possit.

### Prognostica.

1. Lienteria & coeliaca mala sunt non contemnenda; quia vniuerso corpori nutrimentum subtrahunt; unde atrophia vel cachexia & hydrops, præsertim tympanites sequuntur. Lienteria tamen periculosius malum est, quam coeliaca; siquidem à maiore caloris natui prostratione, & toni ventriculi debilitatione provenit.

2. Lienteria, quæ acutis & chronicis morbis superuenit, difficilem curationem admittit, ob virium deiectionem.

3. In coeliaca res ferè desperata est, si morbus diutius duret, ægris ad conuenientem dietam pigrescentibus. Si itaque morbus autumnò incipiens ad hyemem se extendat, difficilior omnino curatur. Aëtius, *tetrab. 3. ferm. 1. cap. 7.*

4. Coeliaca si absque manifesta causa desisse videtur, iterum inuadit, ubi ex leui errore iam denuò suboritur.

### Curatio.

Coeliacæ & Lienteriarum curatio duobus perficitur, auferendo causam, quæ curatio maximè regularis est; & Symptomata, quod fit celeriori, & propterea copiosiori, crudiori & humidiori deiectioni occurrendo: quorum posterius, cum omni Lienteriarum commune sit, de eo in genere dicemus, & quomodo huic Symptomati, si valde vrgeat, sit occurrendum, simul dicemus. Commodissimum tamen est, si vnâ operâ & medicamento & causæ Symptomati occurrere possit.

Vt autem fluxus hic sistatur, requiruntur, quæ intestina & ventriculum roborant, & adstringendo prohibent, ne tam citò cibis per alium descendat. Itaque inter interna viles sunt fructus adstringentes, tam per se sumpti in prima mensa, quam cum aliis cibis cocti, vt cydonia, pyra austera, sorba, mespila, corna: item Symplicium de rosæ siccis, ribes, de mentha, de absinthio, diacydonium, rob ribes, berberis, coriandrum, terra sigillata, corallia, trochisci de carabe, semen oxylapathidis, species diarrhodi, sp. vitrioli, salis; ex calidioribus, aromaticum rosatum, theriaca.

Extra viles sunt inunctiones ventris, quæ sunt oleo mastichino, absinthii, nardino; & Unguenta & Emplastra de nuce moschata, mastiche, galanga, schœnantho, calamo aromatico, maci, absinthio; Emplastrum de crusta panis, cui ali-

Lienteria & Dysenteria, quomodo & in qua ætate frequentius fiunt?

Signa.

Prognostica.

Curatio.

Interna Medicamenta.

Externa.

qua pars *Emplastri de baccis lauri* addi potest.

Vel *℥. Absinth. menth. an. M. j. rosar. rubr. pij. medulla panis torrefacta & macerata in vino Vnc. ij. cinamomi. galanga, ligni aloës an. Drach. j. uucis moschat. mastiche, boli Armeni an. Drach. ℥. medulla cydoniorum in vino coctorum Vnc. ij. vini in quo cydonia cocta fuerunt q. f.*

F. Cataplasma, quod actū calidum ventriculo applicetur.

Fomenta quoque conveniunt per spongiam, vel pannum vino rubro madidum, in qua cocta fuerint *rosa rubra, mentha, absinthium, cyperus, galanga, schœnanthum, &c.* Et postea inungatur venter oleo nardino, in quo mastiche dissoluta sit, vel cerotum imponatur cum pulveribus aromaticis.

Verum cum ista medicamenta ita moderanda sint, ut causam non augeant, & commodissimum sit, talia parare, quæ simul & causam & symptomata respiciunt, iam qua ratione causis occurrendum sit, dicendum.

### De Lienteria à Retentricæ labefactata.

*Lienteria à Retentricæ labefactata.*

Lienteria & Cœliaca à retentricæ labefactata fit, ut dictum, ob intemperiem frigidam & humidam, cum vel sine materia, & omnino cum tonus fibrarum retentrici facultati servientium in ventriculo & intestinis laxatur. Id quo fit ex errore victus, ut si quis longo tempore utatur oleosis & pinguibus, multa aqua, vel si pituita ventriculum laxans e cerebro in eum destillet, vel aliis etiam de causis in eo colligatur. His causis Bauderonius, ut dictum, addit resolutionem sexti paris nervorum à frigore.

### Signa Diagnostica.

*Signa.*

Si Retentricæ labefactata Lienteria accidat, Cœliaca antecedit; quod non fit, quando per accidens expultrice irritata læditur, sed Lienteria mox excitatur; nullus etiam dolor percipitur.

### Prognostica.

*Prognostica.*

1. Difficilius curatur Lienteria, quæ ab intemperie hæctica ortum habet; facilius quæ à materia pituitosa.
2. Lienteria, quæ acutos & chronicos morbos sequitur, difficulter curationem admittit Job virium debilitatem.
3. In diuturnis Lienteriis, si ructus acidus superveniat, qui prius non aderat, bonum signum est. *6. aph. 1. & 2. Epid. sect. 2.* Significatur enim, naturam antea labefactatam ad concoctionem cibi iam excitari, atque ita operis sui reminisci: vel, ut Aëtius loquitur, ventriculum atque intestina non veluti inanima cibum sinere pertransire, unde paulò post Lienteria cessabit. Qui verò ructus acidi inter initia mox accidunt, nullum prælagium edunt, sed tantum indicia sunt intemperiei frigidae, aut etiam pituitæ frigidae, ac imprimis acidæ ventriculum obsidentis.

### Indicationes.

*Indicationes.*

Intemperies frigida & humida contrariis alteranda; materia, si adsit, præparanda & euacuanda; & laxatus ventriculus ac intestina roboranda & adstringenda.

### Curatio.

*Curatio.*

Materia ergo, si adsit, præparetur, *syrupo de betonica, de absinthio, de mentha, melle rosato, cum aquis vel decocto foliorum betonica, salvia, mentha, ferninis fœniculi, & similibus.* Decoctorum tamen sit minor quantitas, ne fluxus augeatur.

Vomitum ad materiam pituitosam, quæ ventriculi facultatem retentricam labefactat, & tunicis ventricu-

li adhærens eum lubricum reddit, excludendam vilis est, præsertim si æger sit nauseabundus & ad vomitum facilis.

Per aluum verò lene purgans tale paretur.

*℥. Cortic. myrobalanor. chebulor. an. Drach. ij. sem. fœnic. scrup. j. zingiber. scrup. ℥. agarici albi Drach. j. flor. rosar. rubr. absinth. Romani an. p. j.*

Coqu. in f. q. aquæ communis.

Colaturæ expellæ *℥. Vnc. iij.*

*Syrupi vel mellis rosat. solutiu. Vnc. j. M.*

Vel *℥. Agarici trochiscati scrup. j. hiera simpl. pilul. alæphangin. an. Drach. ℥. F. Pilulæ.*

Euacuata materiâ vsurpentur medicamenta interna, quæ simul intemperiem ventriculi corrigant, cumque adstringendo roborent, qualia sunt, mentha, absinthiū, mastiche. garyophylli, calamus aromaticus galanga, quibus tamen & alia adstringentia supra proposita, quæ non sunt calida, admiscere licet, modò ita temperentur, ut non frigida in hoc casu, sed calida potius excendant, à frigidis tamen adstrictionem accipiant.

Ex internis est hoc.

*℥. Conseru. rosar. Vnc. iij. theriac. opt. Drach. ij. spiritus viirioli gutt. viij. Cum mīna cydoniorum aromatica.*

F. Electuarium, de quo mane detur portio, quæ nucem iuglandem æquat.

Vel *℥. Conseru. rosar. antiqu. Vnc. j. diacydonij cum speciebus, cortic. citri condit. an. Drach. ij. specier. aromat. rosat. scrup. j. diarrhodi abbat. trochiscor. de spodio, de carabe, corall. rubror. præpar. an. scrup. ℥. tunice internæ stomachi gallina præparat. scrup. j. Cum syrupo myrtino & de mentha F. Electuar.*

Vel *℥. Myrobalanor. emblicor. conditor. carnis cydonior. condita, cortic. citri an. Vnc. j. specier. aromat. rosat. diarrhod. Abbat. carallior. rubror. præpar. Drach. j. zinziberis in China conditi Vnc. ℥. Cum syrupo cydoniorum F. Electuarium.*

Ad ventriculum roborandum, ita tamen, ut pituita ei non impingatur, efficaces sunt sales, ut menthæ, absinthij, cinamomi & similes, quæ vel soli vel cum Zingibere, cinamomo, galanga & similibus exhiberi possunt, ut & sales Theriacales.

Efficax est & Elixir proprietatis, ut & spiritus viirioli.

A proprietate prodesse traduntur interiores ventriculi gallinæ tunicæ, sicut & coagulum leporis vel hædi siccatum & Drach. j. pondere cum liquore idoneo exhibitum.

Extra inungatur ventriculus oleo absinthij, menthæ, nardino, quibus admisceri possunt pulveres aromatici, ut:

*℥. Olei absinth. nardini, mentha an. Vnc. ℥. pulver. caryophyll. mastich. mentha an. scrup. j. ligni aloës, corall. rubror. præpar. flor. rosarum rubr. an. scrup. ℥. cera parum.*

F. Linimentum.

Vbi intemperies habitum contraxit, Aëtius, capite proprio, ad sinapismos & Dropaces ascendit, quos ventriculi regioni applicat, corpore prius expurgato & cavendo regionem Epatis.

Exempli gratiâ talis fieri potest.

*℥. Myrrha, thuris, aloës, schœnanth. an. Drach. j. mastich. Vnc. ℥. ammoniaci aceto dissoluti Dr. j. sinapis, euphorbi, piperis, picebri an. Drach. j. ℥. cera & picis q. f.*

### Diata.

Cibus sit paucus, & æger in ediam, quantum potest, ferat. Cibus tamen sit boni succi & facilis coctionis & ficior. Ideoque carnes assæ elixis præferendæ. Vitentur omnia frigida, humida, lenta, ut & iura pingua. Cibi condiantur nuce moschata, zingibere, caryophyll. salvia. Potus sit vinum rubrum aut cerevisia bona. Reliqua perantur ex iis quæ supra, *part. 1. cap. 9.* de intemperie ventriculi frigida & humida dicta sunt.

*De*

*De Lienteria à facultate expultrice irritata.*

Lienteria à facultate expultrice irritata.

A læsa expultrice fit Lienteria, cum vlcerosa adest dispositio in ventriculo & intestinis, vt antea dictum, propter humores acres, cibos tales, medicamenta venenata, præsertim si crasso modo contusa fuerint. Et cum vlcerosa dispositio hoc præstare possit, ipsa vlcera ventriculi id non minus præstabunt.

*Signa Diagnostica.*

Signa.

Si ab vlcerosa dispositione & irritata expultrice fit Lienteria, cœliaca non præcessit; & sensus morsus, & dolor ventriculo inest.

*Prognostica.*

Prognostica.

1. Quæ ab humoribus acerbis fit Lienteria, si longiore tempore duret, in dysenteriam transit, teste Galeno, 6. aph. 1.

2. Lienterica vitia cum difficili spiritu & lateris punctura in tabem desinunt. Hippocrates, in Coacis. Loquitur autem de Lienteria, quam catarrhus excitauit, ex humore acro, bilioso, aut falsa pituita. Huius enim humoris parte quadam in thoracem decumbente fit spiratio difficilis, & lateris punctura, quæ tantum præludia sunt phthysios; parte altera in ventrem influente, Lienteria existit. Quod si non simul hæc tria inuadant, sed Lienteria prioribus superveniat, significatur, quod interna in thorace suppuratio nondum rupta sit, ichor autem quidam tenuis è parte excidat, qui in ventrem descendens intestina mordeat, unde Lienteria sequitur. Mala autem eiusmodi Lienteria est, quia diuturna est, & alleuationem ægro nullam affert. Nam in Lienteriis malis Hippocrates etiam eas numerat, quæ continuæ & diuturnæ sunt, excrementis exeuntibus crudis ac nigris aut graecolentibus. 2. Prorrhet. 30.

3. Qui in longis Lienteriis cum lumbricis torminibus & doloribus malè afficiuntur, solutis iis intumescunt, atque hic incidens rigor malus est. Hippocrates in Coacis. Particularis autem est hæc observatio & non admodum frequens, præsertim quod lumbrici in Lienteria appareant. Ergo quidam per bupia malignam aliquam causam in ventre intelligunt, vel habitualementem phlegmonem, vlcerum, è quibus Lienteria existit. Proinde mala est Lienteria, quæ diuturna est, ob causæ efficientis pertinaciam; quæ maligna est, ob humorem talem, aut phlegmonem, aut exulcerationem ventriculi vel intestinorum; quæ cum torminibus coniuncta est, ob conclusos flatus, aut morsum; quæ denique cum doloribus est ab acro bile aut pituita falsa, non à frigida intemperie. Solutis iis doloribus, quod videlicet calore naturali debilitato paulatim tot flatus amplius non procreantur, æger intumescit, hydrope imprimis sicco & accidens tandem rigor, retracto ad interiora exiguo etiam illo calore naturali, non criticus est, sed lethalis, vt pote in ægro iam debili, & viribus omnibus extinctis.

*Indicationes.*

Indicationes.

Humor acris temperandus & educendus; & tandem humorum prauitate cessante adstringentibus fluxus curandus.

*Curatio.*

Curatio.

Imprimis autem considerandum, an locus affectus sit ventriculus vel intestina. Si vlcerosa dispositio sit in ventriculo, vomitoria vitentur, ne materia per locum affectum euacuetur; sed ad alium leniendum detur Symplicium rosarum solutivum cum decocto tamarindorum, vel hordei, aut sero lactis.

Dan. Semmeri Tom. II.

℞. Mirobotan. citrinor. Drach. j. rhabarb. opt. Drach. j. B. tamarindor. Vnc. j. Infundantur in decocto hordei & succi rosar. an. q. s.

Colaturæ expressæ adde syrupi rosarum solutivi Vnc. j. vel manna Vnc. s. aut Vnc. j.

Pinguia etiam in hoc morbo non conueniunt, ne vlcerum sordidum reddatur, sed abstergendum, mox exsiccandum & adstringendum.

Si in intestinis sit vlcerosa dispositio, vomitoria in ægro ad vomitum prono vtilia sunt, ratione reuulsionis: quæ autem per os conueniunt, in curatione Dysenteriae dicetur.

Si malum diu perseveret, rhabarbarum, præsertim aqua rosarum præparatum, magnæ efficacis est.

Materiæ alteratio & præparatio, ubi opus est, perficitur hordeo, cichoraceis, & similibus refrigerantibus, additis, quæ parum adstringunt, vt causa efficiens compescatur & frenetur. vt:

℞. Aqua acetosa endivia, cichorij an. Vnc. j. syrupi granator. de portulaca an. Vnc. j. M.

Vel ℞. Conseru. rosar. rubr. Vnc. ij. cichorij Vnc. s. corall. rubr. præpar. specier. diarrhod. abbas. boli Armeni. an. scrup. j. Cum syrupo cydoniorum F. Electuatum.

Diuretica etiam vtilia sunt, quia fluxionem deriuant; Extra admoveantur fomenta, vnguenta Cataplasmata & emplastra ex medicinis frigidis adstringentibus composita, vt:

℞. Olei myrtini rosacei an. Vnc. ij. mastiches, semin. coriandri, sanguinis draconis boli Armeni, absinthij an. scrup. j. cera parum. F. Vnguentum.

Si exulceratus planè sit ventriculus, eius curatio supra tradita est. Si à veneno sit fluxus, Alexipharmaca admiscenda; & commendatur imprimis succus dictamini cum syrupo acetositis citri.

*Diatæ.*

Aër ad temperatum frigus declinet, cibis refrigerantibus adstringens aliquid addatur, vt pyra, cydonia, mespila. Potus sit vinum tenue, aquosum, subastringens, vt lac chalybeatum, vel hydromel cum syrupo cydoniorum vel granatorum. Potus sit paucus. Nam, vt Aëtius scribit, multus potus fluxionibus ventris infestissimus est. Somnus more solito sit longior. Plura de hac re in doctrina de Dysenteria dicentur.

Diatæ.

*Cœliaca affectio.*

Eadem curandi ratio est Cœliacæ affectionis, vt pote quæ secundum maius & minus saltem à Lienteria, ex plerorumque medicorum sententia, differt. Quia tamen aliter paulò ex Aretæi, lib. 2. de causis morbor. diuturn. c. 7. de Cœliaca sentit Mercatus, & illud breuiter addendum. Ita autem Aretæus: Cœliacus, inquit, morbus fit ob coquentis caloris imbecillitatem, frigisque ventriculi, cum liquefit quidem à calore alimentum, sed non concoquit calor, neque in succum proprium vertit, semicottum imperfectumque relinquens, cum perfectionem assequi non possit. Id vero coctione destitutum ad prauum mutatur & colore & odore & consistencia: Albus enim est bile priuatus color, olidum excernitur & lutulentum, liquidum & inconsistens ob profligatam coctionem substantia est.

Cœliaca affectiois curatio.

Hinc Mercatus non solum retentivis vitio cœliacum malum fieri docet, sed omnibus potentiis læsis, ob frigidam cum sordida humiditate totius ventriculi intemperiem cum innati calidi & humidi proprii imminutione. Hinc pluribus modis cœliacam à Lienteria differre scribit. Primò quod in Lienteria retentionis debet tempus non obseruetur; in cœliacis verò solus complexus cibi non rectè fiat; atque ita in Lienteria cibi immutati exeant, quia satis diu in ventriculo retenti non sunt. In cœliaca verò licet diu ibi morati sunt, formam tamen chyli non adepti sunt, quia ventriculus non valuit eam inducere. Secundò; quia in Lienteria solum ex-

Cœliaca & Lienteria discrimen.

cernuntur alimēta immutata: in Coeliaca v. mutata, humidiora, corrupta & variis vitiis cōspurcata. Tertiò quia in Lienteria reliquæ potentiaē actu priuentur, defectu temporis, non vitio sui: in Coeliaca verò omnes potentiaē læsæ sint, & propterea non faciunt officium, quāvis diu moretur in vētre alimentum, ita vt etiā ventriculus impedire non possit, quò minus putrescat, vitieturque alimentum, sed potius ob defectū distributionis corruptionē maiore suscipiat. Quarto, quod in liēteria salte internæ tunicæ superficies afficiatur; in Coeliaca verò vniuersa vētriculi substantia. Quintò, quod Lienteria sit fluxus cōtinuus; Coeliacus autē per intervalla fiat; sicut & distribuēs facultas læsa sit, & propterea singulis diebus non excernat: vnde copiosa excremēta cōgregētur, quæ postea facultatem expultricem laceſſant, & copiosam alui deiectionem excitent.

Verum enim verò cum alij autores Coeliacam & Lienteriam solum ratione maioris & minoris differre statuunt, vt dictum; ista, quæ prolixè de Coeliaca scribit Mercatus, potius ad Diarrhoeam, quæ sit ē ciborum in ventriculo corruptione, pertinere videntur.

## CAPVT VI.

## De Diarrhoea.

Diarrhoea.

**E**tsi in genere omne alui profluvium Diarrhoeæ nomine appellari possit: tamen propriè & in specie Diarrhoea is alui fluxus est, quē immoderata humoris alicuius, præter alimentum crudum & sanguinem, sine exulceratione intestinorum per aluum excretio excitat.

Causa quidē in genere Diarrhoeæ est copia humorū, vel prauitas, quæ naturā ad expellēdū immoderatè stimulat. Verum humorū ad excretionē istā præter naturā stimulantium magna est varietas, ratione materiae, loci, modi ac causæ efficientis, quæ rectè distinguere ad curationem magni omnino momenti est.

Primò ratione materiae, aliàs chylus excernitur, qui non rectè distribuitur, sed in intestinis hæret, aliàs humor aliquis excrementitius, nunc pituitosus, crassus, mucosus, nunc biliosus, nunc melancholicus, ater, nunc serosus, nunc pinguis & oleosus quasi.

Secundò ratione loci, vnde profluit materia, nunc diarrhoea ortum habet à ventriculo, quando in eo corrupti & vitiosi humores cumulantur, nunc à splene, nunc ab epate, nunc à mesenterio, nunc à cerebro, nunc, sed rarius, à thorace, nunc ab utero, nunc à venis & toto corpore. Ideoque in Diarrhoea non solum ad ventriculum & intestina respiciendum, sed diligenter inquirendum, vnde materia suppeditetur; aliàs curatio rectè institui non potest.

Tertiò, modi & causæ efficientis ratione, alia diarrhoea est critica, & fit naturā rectè agente, quādo scilicet ea de salute hominis sollicita vitiosos humores, & quod sibi molestum est, virtutis robore & hominis cōmodo expellit, & quidē *ἐκ τῆς φύσεως*, id est, tempestivè, quod fit in febribus apparentibus signis coctionis, & in die decretorio, & quam ægri facillè tolerant, atq; inde commodum percipiunt; alia symptomatica, quæ contra rationem accidit, & à qua nulla utilitas ad ægrum redit.

His ergo ita se habentibus, agendum erit in specie: 1. de fluxu chyloso, seu diarrhoea, in qua chylus excernitur; 2. de diarrhoea, quæ fit à toto, & quidē cum vel sine febre, vbi etiam de fluxu colliquatiuo dicendum; 3. de diarrhoea à ventriculo; 4. de diarrhoea à vermibus; 5. de diarrhoea à venis mesaraicis; 6. de diarrhoea ab Epate; 7. de diarrhoea à Liene; 8. de diarrhoea ab utero; 9. de diarrhoea, quæ accidit à catarrho seu fluxu cerebri vulgo dicto; 10. de diarrhoea, quæ accidit in infantibus, dum dentes erumpunt; 11. de diarrhoea à pharmaco fortiori, item à veneno assumpto.

Prius tamen, quæ in genere de diarrhoea dici possunt, proponuntur.

## Causa.

Causam Diarrhoeæ in genere diximus esse humorem quemcumque, & vbiq; in corpore cumulatam, quem natura ab eo molestata immoderatè excernit. Ad cumulos autem tales humores faciunt causæ externæ, cibus & potus copiosus vel vitiosus, & omnino errores in victu commissi, aeris intemperies, omiſsa corporis exercitatio, cutis in toto corpore adstricta. Hinc vt Hippocrates, 3. aphor. 17. scribit, quotidianæ austri- næ constitutiones tum corpora solvunt & laxant, tum alium humectant.

## Signa Diagnostica.

Cognoscitur Diarrhoea in genere ex frequenti & copioſiore, quam pro humore & modo naturæ, alui humida deiectione, absque manifesto dolore, & intestinorum exulceratione, & hinc sine sanguinis permissione.

## Prognostica.

1. In turbationibus alui, & vomitibus, quæ sponte fiunt, qualia oportet, purgentur, confert, & facillè ferunt; sin minus, contra. 1. aph. 2. Etsi enim, vt supra dictum ex Galeno, in fine libri de sympr. diff. toto genere præter naturam sint hæmorrhagia nariū, vomitus, sanguinis per alium deiectione, hæmorrhoids, & alia huius generis; tamen præter naturam simpliciter non sunt, modo *ἐκ τῆς φύσεως* fiunt, & id, quod molestum est, expellatur. Ita aliquibus diarrhoea & cholera certis intervallis omnem humorum redundantiam educunt. Quando autem tales euacuationes bonæ vel malæ sint, dictum est in Institutionibus, lib. 3. part. 3. cap. 10.

2. Vno die fluere aluum, sæpe pro valetudine est, atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimū diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, & quod læsurum erat, vtiliter effunditur. Verum spatium periculosum est. Interdum enim tormina ac febriculas excitat, virēsque consumit. Celsus, lib. 4. cap. 19.

3. Longa diarrhoea laboranti sponte superueniens vomitus, malum soluit. 6. Aphor. 15. Reuulsio enim fit materiae ab inferioribus ad superiora.

4. Ophthalmiā laborantem alui profluvio corripit, bonum. 6. Aphor. 17. Reuulsio enim materiae morbi ad inferiora fit, & euacuatio: id, cum sponte sua aliquando faciat natura, Medicus eam imitari debet, deorsum euacuando per pharmaca & clysteres.

5. Si Leucophlegmatiā detento fortis diarrhoea superuenerit, malum soluit. 7. Aphor. 29. Nam materiae morbum facientis à toto habitu per aluum fit euacuatio. Id autem verum est, si morbi initio & integris viribus, ac saluis visceribus accidit. Aliàs profluvium alui non morbum tollit, sed ægrum.

6. Mulieri vterum gerenti si aluus multum fluat, periculum est, ne abortiat. 5. aph. 34. Cum enim pauca fiat alimenti ob fluxum in corpore distributio, foetus alimento suo defraudatur, & ob frequentes deiectiones vires magis exsoluuntur, vincula vteri crebra illa agitatione corporis laxantur, foetus & vterus tetto vapore excrementorum continenter deiectionum, præsertim biliosorum, offenditur. Magnam etiam causam adesse oportet, quæ profluvium hoc in gravidis excitet; cum ea alioquin aluo duriorē esse soleant.

## Indicationes.

Vt diarrhoea quævis rectè curetur, causa, à qua provenit, spectanda est. Si enim proficiscitur à copia vel prauitate humorum, siue in ventriculo & intestinis genitorum, siue aliunde affluentium, partium illarum affectibus occurrendum est. Externæ quoque causæ remouendæ sunt; de quibus plura in specie dicentur. Deinde in omni diarrhoea motus materiae fluentis conside



considerandus. Si enim ille est criticus & bonus, quo vel totum corpus, vel pars aliqua cum ægri tolerantia & utilitate expurgatur, sistendus non est, ne materia in aliam partem conuersa febrim, pleuritidem, aut visceris alicuius periculosam inflammationem excitet: imò si imperfectus sit motus, adiuuandus blandis purgantibus, ne relictæ materia nouum morbum generet. Quæ n. in morbis post crisin relinquuntur, recidiuam facere consueuerunt, 2. aph. 12. Nec symptomaticus tempore mox coercendus, dum æger facillè fert; nec qui diuersorum colorum est, dum vires constant, secundum Hippocr. 1. aph. 2. Si verò immodicus est, & diutius perseueret, viresque deiciat, transacto primo impetu sistendus & compescendus est. Ita etiam qui ex hypercatharsi ortum habet, sistendus statim; cum insigniter vires debilitet: sicut & colliquatiuus in febribus ardentibus & malignis. Videantur Institutiones, loco antea allegato, lib. 3. part. 3. cap. 10.

### Curatio.

Curatio.

Cohibetur autem fluxus materiam euacuando, reuellendo, & sistendo fluxum.

Si aliqua sanguinis euacuatio suppressa materiam fluxui suppediret, vel aliàs sanguis peccet, quandoque venam secare licet.

Purgantia.

Purgantia medicamenta huic negotio apta sunt, quæ simul adstringunt & roborant, vt rhabarbarum, præcipuè in substantia sumptum, myrobalani, tamarindi, syrupus & succus rosarum.

Reuellentia.

Reuellit non solum venæsectio, sed & vomitus, frictions, ligaturæ, euacuationes per vrinas, sudores. Sistunt fluxum roborantia & adstringentia capite præcedenti proposita.

Narcotica.

Si fluxus vehemens sit planè, & vigilæ ac dolores vrgeant, neque aliis remediis tolli possint, ad narcotica veniendum, sed cautè nec viribus valde deiectis, ne æger sopitis spiritibus planè extinguatur.

### De Diarrhœa in specie, & primò De Fluxu Chyloso.

Fluxus chyloso.

Si Chyli distributio non fiat, & chylus à venis mesaraicis aut potius lacteis, ac epate non attrahatur, coaceruatus in intestinis copia sua, & sæpe etià acrimonia, cum corrumpitur prauisq; humoribus miscetur, intestina stimulat, & per aluum elicitur, ac diarrhœam excitat. Non distribuitur autem chylus, vel ob venarum, à quibus ad epar defertur, & epatis obstructionem, vel ob viscerum sanguificationi dicorum imbecillitatem, dum chylum ad se non trahunt.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Cognoscitur hæc diarrhœa species, cū materia liquida, aliquo modo tamen crassa quasi prisana, sine fœtore per aluum excernitur. An autem ex venarum obstructione, an verò ex debilitate epatis chylum attrahere non valentis oriatur, ita distinguitur; quod cum à venarum obstructione sit diarrhœa, chylus excernitur albus, cum non recipiatur in venas. Cum verò in venas recipitur, sed ab epate non attrahitur, colore subrufo nonnihil tinctus est, & signa etiam epatis debilis adsunt.

### Prognosticum.

Prognosticū.

Malum hoc non est contemnendum, sed quam primum curandum; cum, si diutius duret, ægrum ad atrophiam deducat, & si ob epatis imbecillitatem euenit, facillè in cachexiam & hydropem degenerare possit.

### Curatio.

Curatio.

Si ab obstructione venarum mesaraicarum, seu lacteæ

tum & epatis etiam obstructione, ab humore lento & pituitoso, proueniat diarrhœa hæc, primus scopus sit, obstructiones aperire, iis imprimis medicamentis, quæ simul epati vtilia sunt, aluum tamen non irritant. Videntur & astringentia, tam in medicamentis, quam cibis, nisi apertis obstructionibus alia diarrhœa subsequatur.

℞. Rad. aperientium æteto preparat. Vnc. ij. agrimon. endiu. capill. veneris an. M. j. absinthii M. ss. sem. anisi, fœniculi ana Drach. j. passular. Vnc. j. Coq. in aq. simpl.

Colaturæ ℞. ℥. j. syr. de duabus radicibus, byzantin. simpl. an. Vnc. ij. F. Potio, pro quatuor dosibus.

Vel ℞. Rad. aperient. an. Drach. ij. cichorii Vnc. ss. sem. endiu. fœniculi an. Drach. j. passular. Vnc. ss. Coq. in aq. simpl.

Colaturæ ℞. Vnc. vj. syr. byzantini Vnc. ij.

Misce pro 2. dosibus. Vtilis est & in hunc finem spiritus salis. Hinc fiat purgatio.

℞. Rhabarb. Drach. j. ss. agarici trochisc. Drach. j. cinamomi Drach. ss. spica, schœnanth. an. Scrup. j. Cum succo endiu. vel absinthii F. Pillulæ mediocres quarum dosis Drach. j.

Vel ℞. Agarici albiss. Drach. rhabarb. Drach. ss. spica, schœnanth. cinamomi an. Scrup. j.

Infundatur in aqua absinthii, agrimonie & endiu. Colaturæ ℞. Vnc. iij. mellis rosar. colar. Vnc. j. Misce. F. Haustus.

Vel ℞. Rad. fœniculi, cichorii an. Vnc. ss. agrimonie, absinthii, capill. veneris an. M. ss. myrobalanorum chebularum Drach. ij. sem. anisi, fœniculi an. Drach. j. Coq. in aq. simpl.

In calaturæ s. q. infundantur, agarici alb. Drach. ij. rhabarb. Drach. j. zingiber Drach. ss. schœnanth. Scrup. j. Colaturæ ℞. Vnc. vj. syr. byzantini simpl. de cichorio cum rhabarb. ana Vnc. j. spiritus salis gutt. iv. vel v.

Misce pro duabus dosibus. Postea si opus sit, iterum aperientia vsurpentur. vt:

℞. Rad. fœniculi, cichorii, petroseleni, eryngii an. Vnc. ss. endiu. capill. veneris ana M. ss. cicerum rubr. P. ij. sem. coriand. petroseleni ana Drach. j. Coq. in aq. simpl.

Colaturæ ℞. Vnc. x. syr. endiu. compos. byzantin. simpl. an. Vnc. j. ss.

F. Potus pro tribus dosibus. Vel infundatur in vino Rad. fœniculi, eryngii, raphanici, rubia ana Vnc. j. absinth. agrimon. capill. veneris ana Vnc. ss. De quo æger bibat.

Postparetur tale Electuarium.

℞. Conserv. cichorii, capill. veneris ana Vnc. j. ss. Rad. condit. cichor. eryngii ana Drach. vj. spec. diarrhod. abbat. Drach. j. Cum syrupo byzantino simpl.

F. Electuarium.

Post sumptum Electuarium, si libet, bibatur haustus aquæ fœniculi, cichorii, petroseleni, aut decocti harum radicum. Dentur etiam rotulæ diarrhod. abbatis.

Similiter quæ extra ventri adhibentur, non adstringant, sed aperiant.

℞. Vt Ol. amygdal. amar. chamamel. anethi ana Vnc. j. ss. M.

Cum quibus succus apij, vel fœniculi coqui potest: aut iis puluis radicum asari, schœnanthi addi & cum ceræ pauca quantitate vnguentum parari. Vel applicetur emplastrum diachylon simplex cum puluere radic. asari, schœnanthi & similibus mistum.

Si ab obstructione epatis, & quidem infimæ partis proueniat, remediis, quæ in venarum mesaraicarum obstructione conueniunt; si gibba, diureticis vtendum, & quidem nunc temperatis, nunc frigidioribus, nunc calidioribus, prout ægri constitutio requirit.

Si verò ab imbecillitate epatis ortum habeat hic fluxus, roborandum epar, vel venæ mesaraicæ iis, quæ calefaciunt, simulque aperiuunt; cum debilitas attractionis vt plurimum fiat ab obstructione; &

*Nimium calefacientia  
epati noxia.*

epar debile facile in obstructions incidat, vt sunt spica schoenanthum, absinthium, cinamomum, cyperus, rubia tinctorum, agrimonia, spec. diarrhod. abbatis, diatrion santalon, aromatici rosati, trochisci de rhabarbaro, de absinth. de rosis, de curcuma, syrupus byzantinus, crocus martis. A valde tamen calefacientibus abstinendum, cum vis epatis potius in moderato, quàm nimio calore consistat.

Interea etiam frictions totius corporis fiant, quibus alimentum ad id attrahitur. Imprimis verò magnam hîc habent efficaciam, & cum minore periculo adhibentur medicamenta externa, vt emplastrum de farina lupinorum cum oleo nardino & similibus.

Sunt & aliæ causæ, quæ faciunt, vt alimentum ad epar non perueniat, sed chylus cum aliis excrementis eliciatur: verùm pertinet ille fluxus ad diarrhœam & cibis corruptis, de quo postea.

## De Diarrhœa, quæ fit à toto, & primò

*De ea, quæ est cum febre.*

*Diarrhœa à toto cum febre.*

Sæpe in febribus Diarrhœæ accidunt, quæ tamen aliàs Criticæ, aliàs symptomaticæ sunt, & propterea diligenter distinguendæ.

Si Criticus sit fluxus, & naturæ opus, deiciuntur qualia oportet, id est, humores peccantes iam cocti, & victi à natura, ac signis coctionis præcedentibus. Vnde sequitur tolerantia & vilitas; aut sine insigni vitium deiectione & molestia, quæ vires prosternat, vitiosi humoris euacuatio perficitur, & eam sequitur morbi, qui hominem affligit, solutio. Hæc verò conditiones si desiderentur, aut potius contrariæ adsint, symptomaticam esse euacuationem concludendum est, præsertim si cruda admodum, humida & aquosa, vel frequenter & paulatim, siue etiam multum & confertim cum stridore per aluum deiciantur, & alia mala signa, de quibus iam dicitur, adsint.

### Prognostica.

*Prognostica.*

Ex quibus, quid de futuro morbi eventu coniiciendum sit, manifestum euadit.

1. In turbationibus alui, & vomitionibus, quæ sponte fiunt, si, qualia oportet, purgentur, confert, & facile ferunt; sin minus, cõtra, vt sapius ex 2. aph. sect. 1. dictum.

2. Humida inter initia alui deiectionis, morbo ad crisin transeunte, crassior duriorq; reddatur, oportet. Hippocrates & Galenus, 22. Prognost. aph. 16. Significatur enim concoctricem facultatem validiorem redditam esse.

3. In fluxionibus alui mutationes excrementorum, non tamen in deteriora, iuuant; quia iis mutationibus corpus exactius expurgatur, nisi colliquationis aut putredinis signa habeat. Mala enim est excrementorum mutatio, cum nimis liquida illa sunt, albicantia, pallida, spumantia, nigra, exigua, glutinosa, liuentia, rubra, pinguis & valde olida, de quibus Hippocrates, 2. Prognost.

4. In morbo diuturno cibi fastidium, & sinceræ deiectiones malæ, 7. aph. 6. ἀκριτοὶ αὐτὲν ὑποχρῆσις Galeno sunt, quæ nullam humiditatem aquosam permixtam habent, solo humore, qui euacuatur, per intestina transeunte. Nam eiusmodi deiectiones exustam & consumptam humiditatem nativam à febrili calore indicant.

5. Deiectionis alui nimia ex usu est, si nec strideat, neque crebrò, paulatim verò excernatur. Frequens enim desidendi labor insomnia facit. At si vniuersum & sæpe deiciatur, periculum defectionis animi imminet. Hippocrates, 2. Progn. 14. Stridor enim deiectionem symptomaticam, & crudam vitiosorum humorum indicat, per quam epar, lien, aut totum corpus inutiliter

expurgatur, præsertim si crebrò & confertim id fiat. Vigiliæ enim & deliquia animi sequuntur.

6. Si crassa admodum, aut alba, aut viridia, vel crocea aut spumantia deiciuntur, hæc omnia mala sunt. Indicant enim vel cruditatem vel impeditum fluxum bilis in intestina, vel copiam æruginosæ aut flauæ bilis, aut commixti cum humore spiritus flatulenti. Hippocrates & Galenus, 2. prognost. 10.

7. Mala est deiectionis pauca, glutinosa, alba, subpallida, lubrica. Exitiosa verò est nigra, pinguis, liuida, æruginosa, foetida. Verticolar quidem diuturnior est, sed nihilominus exitialis. Hippocrates, 2. prognost. aphor. 21, 22, 23. Causæ ibidem, apud Galenum videantur. De ποικίλοις seu varii coloris deiectionibus ait, omnes eas signum esse, quod multæ adsint affectiones malæ, quæ multum temporis ad concoctionem requirant, aut cum quibus natura tanquam cum vitis pluribus pugnatura multum temporis consumat.

### Curatio.

Vt curatio rectè instituat perpendendum est, an critica, an verò symptomatica sit euacuatio. Si sit critica, & de critico, apparentibus signis coctionis accidat, totum negotium naturæ committendum, secundum Hippocratem, 1. aphor. 20. *Quæ excernuntur, decretæ sunt iussu, nec mouere conuenit, nec aliud quippiam nouare, seu medicamentis, seu aliis irritationibus fiat, sed omittere.* Nam si sistere talem fluxum vtilem Medicus conetur, humores vitiosi, quos natura rectè expellere incepit, corpore retenti recidiam, erysipelata, & viscerum inflammationes, ac alia mala excitare solent. Ideoque solum conuenientem victum Medicus ægro præscribat; & si quæ adhuc supersint in corpore vel humoribus intemperies, eam alterantibus, ægrumque roborantibus tollat, donec æger integram sanitatem recuperet.

Si verò natura opus integrè non absoluerit, non solum non sistendus fluxus, sed natura etiam iuuanda, ne relicta materia recidiam pariat, 2. aph. 12. In quo casu talis institui potest purgatio.

℞. Tamarindor. Vnc. ℥. radicum cicborii, spec. decoct. flor. & fruct. ana Drach. iij. myrabalanor. cirrinor. (Si adsit, pituita) chebulor. an. Dr. ij. rhabarb. Drach. j. spica Scrup. ℥. schoenanth. cinamom. ana Scrup. j.

Coqu. an. aqua simpl. Vnc. iij. In iis dissolue manna Vnc. ℥. vel Drach. vj.

Iterum colentur. Adde syrupi rosarum solutini Vnc. ℥. Misce.

Si autem fluxus nimius sit, viresque deiciat, humor abstergendus, temperandus, & fluxus sistendus iis medicamentis, quæ postea in fluxu symptomatico proponuntur. Etsi n. natura tales motus inchoat, & rectè quidem; tamen materia mora, si ob copiam, seu prauitatem & acrimoniam effrenis quasi reddita, à naturæ regi non potest, & reliquos humores ad fluxum concitat, vires deicit. Nullus verò criticus fluxus, qui rectè, fit, vires nimium deicere, sed ab ægro facile tolerari debet, 1. aph. 2. Ideoque, si vires deiciat, sistendus.

Symptomaticum fluxum quod attinet, distinctione quadam opus est. Quidam enim tempore solum talis est, quem naturæ quidem à materiæ copia, vel qualitate stimulata ante coctionem absolutam instituit, cum virtutis tamen robore, quique criticus q. est, crisin imitatur, ac quem ægri facile tolerant, imò ex eo commodum percipiunt; qui fluxus non sistendus est. Non tamen adiuuandus vel promouendus; neque etiam semper naturæ planè permittendus, sed naturæ succurrere oportet, materiam euacuando, reuellendo. Ideoque vt materia minuatur & reuelleretur, præcipuè si febris id simul postulet, & vires permittant, venam aperire in tali fluxione, quæ in principio morbi accidit, non inutile fuerit.

Deinde

Deinde ne fluxus nimius fiat, abstergentia, humores alterantia, eorumque acrimoniam temperantia exhibenda, quæ etiam clysteribus infundi possunt. vt:

℞. Decocti hordei Vnc. jv. syr. rosar. simpl. infusionis vel etiam solutini Vnc. j. Misce.

Vel ℞. Myrobalan. citrinor. Drach. ij. rharbari elect. Drach. j. spica Scrup. s. spec. diarrhod. Abbat. Scrup. i. Infundantur in aqua acetosa, & endivia. Colaturæ ℞. Vnc. iij. s. syr. rosar. solutini Vnc. s. vel j. Misce.

Vel ℞. Decocti hordei lbj. sacchar. rubri, mellis rosati colati an. Vnc. j. ol. rosacei Vnc. j. s. F. Clyster.

Postea detur syrupus de succo ribes, granatorum, acetosa, acetosella, oxysacchara cum aqua acetosa, endivia, cichori, plantaginis, tormentilla, portulaca.

Vbi fluxus perseverauerit, magis adstringentia usurpare oportet, vt sunt conserua rosarum rubrarum antiqua: Rob ribes, berberis; syrupus myrtinus, granatorum, cydoniorum. vt:

℞. Syr. granator. succi ribes, iulebi rosarum ana Vnc. j. aqua plantaginis, endivia, acetosa ana Vnc. j. Misce pro duabus dosibus.

Vel ℞. Conser. rosar. antiqu. Vnc. j. s. rob ribes Drach. vj. boli Armeni, corallor. prapar. ana Drach. s. Cum syrupo cydoniorum F. Electuarium.

Extra quoque venter inungatur oleo cydoniorum, myrtino, mastichino, absinthij; aut imponatur emplastrum ex ceroto stomachali, & santalino, mixtis cum oleo cydoniorum.

Si verò fluxus planè symptomaticus sit, & saltem à facultate, à causâ morbificâ irritata, fiat, eaque quasi inuita, & quicquid excernitur, symptomatis ratione fiat, nullo cum naturæ robore, nec ægri évacuationis aut commodo; talis fluxus omnino prauæ dispositionis signum est. Ideoque nec iuuandus, neque etiam naturæ, vt pote cuius ferè in expellendo nullæ partes & vires sunt, permittendus, sed cohibendus.

Quare si ferant vires, vena aperienda est, vt, qui humores ad aluum confluunt, reuellantur & euacuentur, atque ita alui profluuium sistatur. Non tanta tamen sanguinis copia euacuanda, quâta, si absque fluxu alui esset, euacuari posset. Aliis quoque diuersionibus, vt frictionibus, ligaturis vtendū. Postea medicamēta materiā alterantia & temperantia, abstergentia, fluxumque sistentia modò proposita usurpanda, & cum exhibenda, tūm per clysteres infundenda, atque extra apponenda.

### De fluxu Colliquatiuo.

Fluxus colli-  
quatiuus.

In febribus ardentibus & malignis ac pestilentibus, vt & febris hectica, & phthisi, & nonnunquam in viscerum inflammationibus, à calore vehemēti non solum humores in venis, sed corpus, seu id, quod proximum partium alimentum est, colliquatur, & cum tenuius est, vel per ἀδρῶν διαπνοήν, aut sudorem discutitur, vel per renes & urinam euacuatur; vel, præcipuè si id, quod liquatur, est crassius, in ventrem confluit, & fluxum alui, qui συντηνὴς id est, colliquatiuus vulgo dicitur, excitat, vt lib. 4. de febribus cap. 13. dictum. Calor autem hic nunc pinguedinē solum, nunc ipsas quoque carnes seu proximum partium alimentum colliquat. Et quidem in febribus malignis & pestilentibus humores non solum colliquantur, sed & corrumpuntur, & ad prauam dispositionem & putredinem ac malignitatem deducuntur; vnde quæ deiciuntur foetorem coniunctum habent; aliisque etiam prauis qualitatibus prædita sunt.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur hæc diarrhoea ex eo, quod id, quod eicitur, plerumque est vario colore præditum, aliquando flauum, aliquando liuidum, plerumque foetidum, aliquando pingue & viscosum; adest febris vel ardens,

vel maligna, vel hectica: corpus statim præter modum extenuatur, nares fiunt acutæ, oculi concaui, tempora collabuntur, & alia, quæ in facie Hippocratica, initio prædictionum, enumerantur, adsunt.

### Prognostica.

1. Periculosus hic fluxus est, vt qui non solum corpori omnia alimenta subtrahit, sed & spiritus dissipat; & cum à vehemēti causâ, quæ ita facile expugnari non potest, dependeat, plerumque lethalis. Cum enim calor ille febrilis ardens, & malignitas aliàs ad hominem iugulandum sint potentes, multò facilius id præstabunt, si fluxus talis vires valde deiciens accedat.

Prognostica.

2. In Hecticis, & marasmo fluxus Colliquatiuus plerumque lethalis.

3. Quibus phthisicis capilli defluunt, iis Diarrhoea superueniente, in propinquo mors est, 2. aph. 12. & 13. Capilli enim defluunt ipsis ob alimenti defectum in partibus solidis. Superueniens autem fluxus non humoris morbum efficientis, sed humoris alimentarij, ac pinguedinis partium solidarum præ nimia siccitate colliquatarum mortem in propinquo esse significat.

### Curatio.

Curationem istarum febrium trahit Galenus, 10. meth. med. cap. vlt. Et, est opus auxiliis, quæ corporis dispositionem & consumptionem impediunt, nimirum refrigerantibus & humectantibus, & nonnihil simul adstringentibus, & fluxum sistentibus. Medicamenta autem ista non tam extra sunt adhibenda, ne caloris præter naturam effluxus impediatur, quàm assumenda, vt partes roborentur & firmentur, ne facilè causæ præter naturam cedant. Cordi tamen & epati talia adhibere nihil prohibet. Hippocrati duo imprimis auxilia in vsu fuerunt, cremor prisanæ & aqua frigida.

Curatio.

Aqua potest assuetis dari, & vbi potius ab æstu vehemēti, quam à malignitate est iste fluxus, tantamque eius necessitatem esse scribit Galenus, 5. meth. med. cap. 6. vt sine hac ægri labantur in marasimum. Huius loco, & vbi ab aquæ potu aliquid mali metuitur, dari potest aqua hordei, serum lactis, aqua acetosa, endivia, cum syrupo de ribes, de agrestu, granatorum, acetositis citri, acetosa, acetosella, de nymphæa, de portulaca, cydoniorum.

Aqua in  
fluxu colli-  
quatiuo ægri  
præbenda.  
Medicamentum  
interiū.

Vel ℞. Conser. rosar. acetosa an. Vnc. i. diacydonij sine speciebus Dr. iij. rob ribum, terra sigillata, C. C. vsti praparati an. Scrup. ij. Cum syrupo cydoniorum F. Electuarium.

Nonnulli hac acetolum deinto butyro cum foliis acetosæ coctum exhibent. Et cum æger nutrimento indigeat, ius gallinæ vel pulli dari potest, quod medicamentis talibus alteratum sit. Et quia aliquando acrimoniam excrementorum intestina exulcerari solent, clysteres iniicere vtile fuerit, quæ refrigerant, humectant, leniunt, de quibus in capite sequenti, de dysenteria, dicitur.

Epithemata refrigerantia cordi & epati vtiliter applicantur ex aqua rosacea, acetosa, borraginis & similibus.

Externa.

### Dieta.

Aer ad frigidum declinet; Cibi refrigerent, humectent, & nonnihil adstringant. Dentur ergo hordeata, amygdalata additis seminibus quatuor frigidis maioribus, & semine papaueris, quibus & corallia & margaritas præparatas admiscere licet.

Dieta.

### De Diarrhoea à toto corpore sine febre.

Sæpe etiam Diarrhoea accidit citra febrē, cum venter quidem ab affectu & vitio omni liber est, per eum tamen totum corpus expurgatur, & natura vitiosos humores è venis, & toto corpore euacuat, atque ita sæpe

Diarrhoea à  
toto, sine febre.

sæpe certis intervallis in quibusdam omnem corporis redundantiam per talem diarrhœam educit, ut Galenus, 7. meth. med. cap. 11. docet.

Atque talis fluxus ab omnibus humoribus, seu copia seu qualitate prauâ naturam irritantibus, provenire quidem potest: raro tamen accidit, ut non membrum aliquod particulare, ut epas, lien, affectum sit, & materiam vitiosam suppediter, epasque bilem, lien humorum melancholicum, caput sæpe pituitam suggerat. Proinde pauca de Diarrhœa à toto sine febre dicentur, reliqua ex reliquis, quæ de fluxibus à ventriculo, epate, liene, cerebro dicentur, petenda erunt. Nonnunquam & serosi humores, qui Leucophlegmatiam pariunt, per aluum euacuuntur, 7. aphor. 29. De seroso tamen humore notandum in specie, ab eo non solum Diarrhœam in Leucophlegmatia accidere, sed etiam hominibus aliâs sanis, quibus tamen setum in venis plurimum redundat, tempore autumnali frequenter contingere. Frigus enim autumnus nocturnum vel matutinum apertos à calore meridiano, vel tepore lecti poros offendens, & propterea altius sese in corpus penetrans à vasis exterioribus serosos humores, qui facile à sanguine separantur, & ad fluxum proni sunt, versus interiora & in maiores venæ causæ meatus repellit, qui tandem ad viscera delati, & ad mesenterij ramos repentes in intestinorum cavitatem conflunt, atque ita præterfluentes, si bile abundantes eas offendant, ut ferè offendunt, bilem secum ad aluum rapiunt, & in intestinis pinguedinem, ac omnino obuios in mesenterio humores abstergunt, & secum ducunt: unde diarrhœæ tales serosæ & aqueæ sunt, maxima ex parte tamen etiam biliosæ, pituitosæ, pingues, limosæ.

Atque ita omnia, quæ cacochymiam in corpore producere possunt, talis Diarrhœæ causa esse valent. Quia tamen epatis & viscerum vitiosa constitutio ferè cacochymiam generat, vix citra eorum vitium talis Diarrhœa accidere potest.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Si à toto conflunt humores, signa cacochymia in toto adsunt, quæ tradit Galenus, in lib. de plenitud. & 4. de sanit. tuend. Præcessit vita otiosa, aut crapulæ dedita, signa verò, quæ partem aliquam in specie affectam significant, absunt. Et ubi à toto corpore confluit humor, raro sub propria forma, sed mutatus excernitur; neque vlla etiam signa sese offerunt, quæ à nimis, & multis alimentis ingestis, & corruptis facultatem irritari testentur.

### Prognostica.

Prognostica.

1. In turbationibus alui & vomitibus, qui sponte fiunt, si qualia oportet, purgentur, confert, & facile ferunt; sin minus, contra, 1. aph. 2. Et vno die aluum fluere, pro valetudine est, atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra diem septimum id quiescat. Purgatur enim totum corpus, & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. Verum ipatium periculosum est. Interdum enim tormina & febriculas excitat, viresque consumit, ut supra ex Celsi lib. 4. cap. 14. dictum.

2. Si Leucophlegmatia detento fortis Diarrhœa superuenerit, malum soluit 7. aph. 29. Nam materia morbum facientis à toto habitu per aluum fit euacuatio.

### Indicationes.

Indicationes.

Si fluxus consuetus sit, quod sana aliâs corpora certis temporibus cum utilitate corripuntur, isque sit moderatus, non sistendus, nec etiam augendus: si verò diminutus, blandis purgantibus adiuuandus: si nimius, compescendus. Si non consuetus sit, nec is statim sistendus. Humores enim vitiosi in corpore con-

tenti euacuuntur, & proinde talis fluxus in nondum agrotantibus ad plurimos morbos præcauendo facit. In morbis verò à cacochymia dependentibus ad eos tollendos plurimum valet, habetque & hic locum sapius allegatus aphorismus 2. sect. 1. Si verò nimius sit, & vires prosterнат, compescendus; quod fit, si humorum acrimonia obtundatur, humoresque leni pharmaco educantur, vel etiam vena aperiatur, si plethora simul adsit. Imminutâ enim materiâ grauantem, natura ad expellendum amplius non irritatur. Postea, si persisteret fluxus, sistatur, semper respectu ad peccantis humoris naturam habito. Et si enim, ut supra in signis dictum, in Diarrhœa, quæ sit à toto, materia excrera nullius humoris naturam exactè referat, sed variis modis corrupta excernatur: tamen nunc huius humoris, nunc illius naturam magis æmulatur, & alia etiam humoris peccantis signa apparent.

### Curatio.

Euacuantia per os sumpta lenia sunt, & quæ roborandi simul vim habeant; ut in fluxu bilioso, tamarindi, myrobalani citrini, rhabarb. syrupus rosar. solus. Diaprun. lenitum sine scammonio, quæ cum santalis, rosis aut coralliis rubris dari possunt. E. G.

℞. Pulpa tamarindor. Vnc. j. conferv. rosarum recentis Dr. iij. F. Bolus.

Vel dissoluta in decocto vel aqua endiuia vel plantaginis cum corallior. rubr. scrup. j. propinentur.

Rectius tamen in forma solida exhibentur, ne in liquida fluxum augeant, ut:

℞. Pulpa tamarindor. Vnc. β. diaprunis lenitivi Drach. ij. pulver. rosar. rubr. scrup. j. rhabarb. scrup. β. F. Bolus.

Si magis adstringere & roborare animus sit, quam euacuare.

℞. Rhabarbar. leniter siccatur. Dr. j. conferv. rosar. antiqua Dr. ij. F. Bolus.

In materia pituitosa conueniunt, mel rosarum solutionum, cum decocto menthae, myrobalani chebuli, agaricus.

In materia melancholica utile est serum lactis caprinum, flores cassia cum conferva rosarum, vel diacatholicon, vel folia senæ, & myrobalani.

Attemperantia materiam in fluxu bilioso sunt rosæ, sonchus, & cichoracea, corallia, smaragdus. In pituitosa, betonica, mentha syrupus Byzantinus simplex, de lupulis, borraginis, oxysacchara composita.

Quod ad reuellentia impetum fluentis materiae, si ille magnus, vomitoria ex usu erunt. Abstinentum tamen ab oleo.

Postquam his ita facta reuulsio, tutius ad diuretica, quæ ab aluo deriuant, descenditur. Sunt hæc alia frigida, ut semina melonum; alia temperata, ut ceterach, asplenium, betonica, è quibus nunc his, nunc illis pro natura humoris peccantis utendum. Si non solum febris, sed & feruor materiae, aut calor epatis absit, calidis potius utendum, quæ etiam chyli distributionem adiuuant. Sudor etiam mouetur diuersionis causa.

Denique iis, quæ incrassando & abstergendo iuuant, utendum, & quidem fortioribus, ubi magnus est materiae impetus; aliâs lenioribus, ne vitiosi humores, quos natura expellere conatur, intempestiue in corpore retineantur. Leniora sunt, rosæ, spodium, conferva rosarum rubr. primò recens, postea antiqua, cui tandem puluis boli Armeni, terra sigillata, corallior. rubror. præpar. myrti addi potest, ad singulas vncias confervæ rosar. sumendo puluerum Drach. β. Magis etiam adstringit conferva rosarum vitriolata. Et possunt hæc misceri cum Sympo de rosis siccis, myrtino, vel cydoniorum. In frigidiore materia puluis menthe admiscetur, aut usurpatur absinthium. Validiora sunt, balaustra, myrtilli, acacia, hypocistia, rhum obsoniorum, malicorium, mespila, & alia, quæ

Curatio.

Materiam temperantia.

Diuretica.

Abstergentia.

Diarrhœa ab humore seroso quomodo producat.



quæ videtur apud Platerum *part. 3. pag. 129. & seq. & alios.*

Si à seroso humore frigore ambientis aeris ad interiora repulso fiat Diarrhœa, non statim sistenda. Nam & ipsum serum, munere suo defunctum, in corpore vtile amplius non est; & humores, qui in eius defluxu ac refluxu absteruntur, excrementitij & inutiles sunt. Quia tamen talis etiam fluxus alimenti & chyli distributionem & perfectionem interturbat, danda opera, ut quamprimum talis fluxus absoluat, quod fiet, si corpus ab iniuria externi aeris vindicetur, & homo potius in tepido, quam in frigido loco sese contineat. Deinde materia fluxura, id est, serosus humor subtrahatur sicca victus ratione, & feri per renes & vesicam deriuatione, & partium, quæ serum affluens recipiunt, roboratione. In quam rem vtile est vinum absinthites dilutum decocto cichorii, aut aqua chalybeata, conferua rosarum.

Abdomen inungatur oleo chamæmelino, mastichino, rosatum, absinthij: vel imponatur Emplastrum de crusta panis.

### *De diarrhœa à ventriculo & cibis corruptis.*

*Diarrhœa à Ventriculo.* In ventriculo occasio Diarrhœæ datur, dum vel cibi, qui facile corrumpuntur, assumuntur, ut, melones, cucurbitæ, fructus fugaces, lac post cibum sumpsum, fungi; aut in copia vel modo sumendi aliquis error adsit, ob quem cibi non rectè coquantur, sed corrumpuntur; vel ob ventriculi intemperiem, dum is debilis est, ut cibos concoquere non possit, sed semicoctos relinquat, qui longiore in eo mora corrumpuntur, & alienam ac prauam naturam induunt, aut dum idem alimentum adurit, aut alio modo corrumpit. Qui humores ex vitata coctione geniti, cum non solum ab epate, utpote ad alendum corpus inepti, non satis artrahantur, & hoc modo in intestinis cumulentur, sed & acrimonia, & prauis, quibus præditi sunt, qualitatibus, expultricem ad expellendum stimulent, hoc modo Diarrhœam excitant. Itaque omnia, quæ coctionem vitare valent, seu ventriculi temperiem immutent, & talem in eo dispositionem inducant, ut non bonum chylum, sed prauos succos generet; seu cibi prauis sint, seu quicumque in cibis sumendis error, ob quem coctio vitatur, Diarrhœæ causa esse possunt, dum humorem vitiosum suppeditant, qui facultatem intestinorum expultricem ad immoderatam excretionem stimulat.

### *Signa Diagnostica.*

*Signa.* Ut autem de causa certi simus, principio dispiciendum, an humores illi in ventriculo generetur (de quo causæ genere solum iam agimus), an verò aliunde in ventriculum confluant. Nonnunquam enim ex venis mesaraicis, vel epate, vel liene, vel ex capite materia ad ventriculum affluit, quæ vel copia vel acrimonia facultatem expultricem irritat, ut & ipsam & simul chylum ante tempus per aluum expellat; et si alias in ventriculo vitium nullum sit, neque etiam in cibis error commissus sit. Itaque diligenter primò inquirendum, an aliarum partium affectarum signa adsint, quæ indicent, aliunde humorem in ventriculum affluere. Si enim hæc absint, in ipso ventriculo vitiosos humores generari, argumento est, quod & alia signa indicant.

A ciborum quidem prauitate vel errore in victu commissio diarrhœam oriri facile cognoscit Medicus, si inquirat, quibus cibis, & quo victus genere vsus sit æger. Si enim cibos prauos, & qui facile corruptioni obnoxij sunt, sumpserit æger, vel aliquem errorem in victu comiserit, argumento est, à ciborum copia fluxum hunc oriri, & mutato victus genere, fluxus talis non ita difficulter cessat.

Si verò à facultatis concoctricis vitio id fiat, signa

intemperiei ventriculi supra, *part. 1. cap. 4. de intemperie ventriculi*, proposita adsunt, & quidem ob frigiditatem excrementa alui sunt liquida & aquosa, non graueolentia, & potius ad album, quam ad croceum vergentia.

### *Prognostica.*

*Prognostica.* 1. Si Diarrhœa à nimia ciborum ingestorum quantitate accidat, periculosa non est; siquidem illa cocta, & à natura deuicta, facile fluxus sedatur.

2. Periculosior verò est, quæ ob prauos cibos accidit. Nam naturam valde irritare, & reliquos in corpore humores concitare, imò malam dispositionem ventriculo & intestinis inducere, ac in Dysenteriam degenerare potest.

### *Curatio.*

*Curatio.* A quacunque autem causâ Diarrhœa ista proueniat, hæc generalis curandi ratio omnibus conuenit, ut quod causæ diarrhœam concitantis adhuc restat, tollatur & euacuetur; materiæ vitium ad excretionem stimulans emendetur; & ventriculus ac intestina roborentur, vel temperatis, vel calidis, vel frigidis, prout humoris & affectus natura id requirit.

Itaque non statim fluxus sistendus, sed primò ventriculus, & intestina ab humore vitioso expurganda, sed lenioribus medicamentis, ne aliunde attracta materiâ fluxus augeatur. Ergò si humor sit pituitosus, vtendum pilulis stomacho vtilibus, & quæ mastichen recipiunt, ut mastichinis, assaiereth, de hira simplici, de hiera cum agarico: si biliosus, rhabarbaro, pilulis de rhabarbaro, myrobalanis citrinis.

Et quidem si à cibis prauis, & errore in victu commissio sit Diarrhœa, ac eorum coctio frustra expectetur, statim eos educere conuenit.

Aptissima autem via est vomitus, quo non solum humores vitiosi euacuantur, sed & materia fluxura reuellitur. Si verò homo ad vomitum aptus non sit, per aluum eos euacuare oportet, sed pharmaco, ut dictum, leni, & quod nullam violentiam habeat, aut Clystere iniecto.

Vtile ad hos humores euacuandos est rhababarum, cum humores hi ex cibis prauis & corruptis orti aciores plerumque sint, & biliosorum humorum naturam æmulentur.

Cibi quoque tales, à quibus humores corrupti orti sunt, vitari, & ij exhiberi debent, qui qualitate & quantitate iis opponuntur.

Postea adstringentibus ventriculum roborare cum internis, tum externis conuenit.

Si verò à ventriculi intemperie, & quidem à debilitate, à frigiditate & humiditate orra, proueniat Diarrhœa, ventriculus roborandus iis, quæ supra in Capite de intemperie ventriculi frigida & humida curanda, & de Apepsia sunt proposita. Si tamen à natura sola cruditas vinci non possit, euacuandi humores iis, quæ simul ventriculum roborant, ut pilulis aleophanginis, mastichinis, stomachicis; postea quæ coctionem adiuuant, tum interna tum externa adhibenda.

Dixit etiam talis instituenda, qualis supra de Intemperie ventriculi curanda proposita est. Imprimis inedia, quiete & somno cruditates coquendæ. Potus quoque sit paucus; cum à potu abstinentia ad fluxus alui curandos multum faciat.

### *De Diarrhœa à vermibus.*

*Diarrhœa à vermibus.* Quandoque, sed rarius, Diarrhœa ex vermibus excitatur, cum scilicet multi prauis humores cum vermibus in intestinis cumulantur, & tandem naturam ad excretionem stimulant.

Cognoscitur ex signis vermium, cardialgia nimitum, dolore ventris, pruritu narium cum dentium stridore in

in sommo, tussi sicca, & aliis, quæ in capite de vermibus traduntur.

Curatur autem remediis, quæ vermes necant, & per aluum expellunt.

### De Diarrhœa ab epate, ac bilioso Humore.

*Diarrhœa ab epate & bilioso humore.*

Supra quidem alui fluxum à mesenterio proposui: verum cum ille fiat, vel quia venæ mesaraicæ obstructæ sunt, ob quam causam chylus distribui non potest, atque de hoc fluxu, & eius causis iam supra dictum sit; vel quia in eo vitiosi humores cumulati à natura per aluum effunduntur; hi verò vel ab epate, vel à liene, vel à toto ad mesaraicas conflant: in specie de Diarrhœa ex mesenterio agere vix opus erit; ideoque rectè ad Diarrhœam ab epate ac humore bilioso accedimus. Nam cum bilis in epate colligatur, vñà operâ de Diarrhœa ab epate ac bilioso humore dicemus, ut etiam sequenti capite de Diarrhœa à Liene & humore melancholico agemus.

Cum epar vel nimium bilis generat, vel meatus expurgandæ bili dicati obstructi sunt, bilis in epate retinetur, & tandem à natura ad intestina expellitur, vnde fit Diarrhœa biliosa ab epate. Præcipua tamen hîc causa est intemperies calida & sicca epatis, ob quam calidi & acres humores generantur, qui cum naturæ molesti sint, quandoque per ventrem expelluntur; id quod etiam in epatis Inflammatione accidere potest.

Atque huc pertinet Aphorismus 20. sect. 2. *Quibus in iuuentute aluus est humectatus, in senectute siccatur; quibus verò adstricta est iuuenibus, in senibus humecta laxaque redditur.* Aluus enim laxior in iuuenibus à bilis stimulantis copia est, & ob virtutis expultricis robur, senescentibus iis aluus exsiccat, bilis videlicet copia deficiente, & expultrice non parum labefactatâ. Contrâ aluus sicca est iuuenibus ob corporis & cutis raritatem, & ob calidam etiam intemperiem, & ob motum bilis ad superiora; si iidem senescant, aluus humectatur, habitu corporis addensato, quo humores intrò coguntur, & calore epatis diminuto motuque bilis deorsum conuerso.

### Signa Diagnostica.

*Signa.*

Quia verò epar, ut Galenus 2. *Prognost.* 13. scribit, non solum sui ipsius excrementa, ichoresque & humores præter naturam demittit in ventrem, sed etiam totius corporis; & per hepar venter omnibus corporis partibus copulatur, ac per id excrementa illa partium recipit: quod supra de ventriculo dictum, etiam hic monendum, ut diligenter attendamus, an humor, quem epar ad intestina demittit, in ipso generetur, vel aliunde affluant.

Nimirum si ab epate solum proveniat Diarrhœa, aliarum partium affectarum signa aberunt, epatis verò vel intemperati vel obstructi signa aderunt, ob quam Intemperiem humores in eo corrumpuntur, vel ob obstructionem bilis à sanguine rectè separari non potest, quæ signa in affectibus epatis explicabuntur, & humor, qui Diarrhœam excitat, biliosus est.

### Prognosticum.

*Prognostic.*

Non sine periculo est Diarrhœa; quæ ad magnas & graues epatis affectiones sequitur. Materiam tamen conditio etiam attendenda, quæ quò peior vel mitior est, eò periculosior, vel minore cum periculo coniuncta est Diarrhœa, ut supra de Diarrhœa in genere dictum.

### Indicationes.

*Indicationes.*

Cum causa omnium primùm tollenda sit, ideo si intemperies epatis calida sit in causa, illa alteranda, bilis temperanda & euacuanda, ac ad alias partes deriuanda; tandemque fluxus sistendus, & epar roborandum. Et

cum alteratio commodè fieri non possit, nisi humor prius tollatur, primò ab euacuatione inchoandum; & quidem maturè euacuatio instituenda, ne bilis suâ acrimoniâ Dysenteriam excitet. Inflammatio quo modo sananda sit, suo loco dicitur. Si obstructio epatis adsit, & ea aperienda.

### Curatio.

Ad euacuandam bilem hîc vtile est rhabarbarum, myrobalani citrinæ, syrupus rosarum & violarum solutius, clysteres abstergentes cum commodo ægri iniiciuntur.

℞. *Decocti hordei non excorticati* ℥b j. *sacch. rubri* Vnc. ij. *mellis rosati* Vnc. ℥. *olei rosar.* Vnc. j. *vitell. ouorum* num. ij. M. F. Clyster.

Vel ℞. *Decocti hordei, turis pulli* an. ℥b. ℥. *sacchar. rubri, syrupi rosarum simplicis infusionis* an. Vnc. j. *vitell. ouor.* ij. F. Clyster.

Aut ℞. *Decocti hordei* Vnc. iiij. *syrupi rosarum simplicis infusionis* Vnc. j. F. Potus abstergens.

Contemperant bilem, *syrupus de cichorio, de endiuia, de succo acetosæ, de agrestæ, acetositis citri, granatorum*, ut & horum simplicium decocta vel aquæ. vii.

℞. *Rad. acetosæ, fragariæ, cichori* an. Drach. iij. *endiuia* M. j. *sem. endiuia* Drach. j. *portulacæ* Drach. ℥. *passular. maior. exacinarum* Drach. vj. Coq. in decocto hordei. Colaturæ ℞. ℥b. j. *syr. de cichor. simpl. acetosæ* an. Vnc. ij. Misce. F. Potus 4. dosibus.

Vel ℞. *Aq. endiuia, cichori, plantaginis*, an. Vnc. ij. *syr. endiuia simplicis* Vnc. j. *acetosæ, portulacæ* ana Vnc. ℥. *spir. vitrioli gurr.* v. Misce. F. Potus pro 2. dosibus. Lene euacuans hoc est:

℞. *Myrobalanor. citrinar.* Drach. ij. *rhabarb.* Drach. j. *spica* Scrup. ℥.

Infundantur in ℥. q. *aquæ cichori & plantaginis.*

Colaturæ ℞. Vnc. iij. *syr. de cichorio simpl. vel rosar. simpl. infus.* Vnc. ℥. M.

Aut detur rhabarbarum in substantia cum conferua rosarum, ut supra dictum.

Si post purgationem fluxus alui perseveret, alterantibus & adstringentibus ei est resistendum.

Adstringit hoc.

℞. *Conseru. rosarum antiqu.* Vnc. j. *pulv. corallior. rubr.* Drach. ℥. *boli Armeni, terra sigillatæ* ana Scrup. ℥. *rob. ribes* Vnc. ℥. Cum *syrupo granatorum* F. Electuarium.

Vel ℞. *Rad. acetosæ, tormentilla, consolidæ maioris, plantaginis* ana Vnc. ℥. *rosar. rubr.* M. ℥. *passularum non exacinarum* Vnc. ℥. *sem. portulacæ* Drach. j. Coqu. in aqua simpl. Colaturæ ℞. Vnc. x. *syr. myrtini, ribes, granator. ana* Vnc. j. Misce. F. Potus pro 3. dosibus.

Vel omittantur rosæ in decocto, & in colatura dissoluantur *conserua rosarum rubrar. antiqu.* Vnc. ij. iterumque colentur, F. Potus.

Vel ℞. *Sem. acetosæ, corallor. rubror. prepar. terra sigillatæ, spec. diarrhad. abb. flor. rosarum rubr.* an. Drach. ℥. F. Pulvis.

Vtiles sunt & trochisci de terra sigillata & de spodio.

Plurimi commendant caseum antiquum præparatum. Præparatur autem, si comminutus sæpius abluatur aqua aliqua refrigerante & adstringente, ut rosarum, plantaginis, portulacæ; postea diligenter in sartagine exiceetur, & in puluerem redigatur, cuius Drach. j. vel cum cibo, vel cum aqua aliqua conueniente exhiberi potest.

Extra quoque imponi possunt epithemata ex succo vel aqua plantaginis, acetosæ, portulacæ, endiuia, rosarum, cum santalis, coralliis, rosis rubris vel cerotum santalinum eidem admoueri.

Neque præter rem fuerit, materiam aliò deriuare, siue promouendo sudores; cum sudores & cutis raritas aluum siccant, materiam, quæ ad aluum impetum faciebat, ad ambitum corporis conuersâ, siue ad renes & vesicam.

vesicam, medicamentis, quæ urinam mouent: è quibus eligenda sunt minime actia & mordacia, qualia sunt radices graminis, asparagi, fœniculi, petroselinii recentis, semina melonum, capilli veneris, &c.

*De Diarrhœa à liene & humore melancholico.*

Diarrhœa à liene & humore melancholico.

Quandoque humor melancholicus in liene & vicinis vasis cumulatus à naturâ copiosius in aluum effunditur, & diarrhœam excitat. Interdum etiam deiectione adeo atra apparet, vt picem liquefactam & dilutam repræsentet, quæ tamen à sanguine est ex aperto aliquo in hypochondriis vase in intestina effusa, ibique in nigredinem illam exusto, aut cum humore atro mixto. Nam sanguis is non purus est, sed plerumque melancholicus, in liene & vicinis vasis præter naturam cumulatus: qui quidem rectius per hæmorrhoides euacuari solet, quandoque tamen à natura ad ventriculum atque intestina expellitur, & vomitum ac alui profusum excitat. Vt enim in febribus, vbi natura hæmorrhagiam naturam instituit, primariò quidem humores prauos euacuare intendit, id tamen obtinere non potest, quin simul sanguinem bonum effundat; ita hic etiam naturæ scopus est, humorem atrum & melancholicum exturbare: cum verò id fieri non possit commodè, nisi sanguis, cui permixtus est, simul euacuetur; hunc sanguinis attri vomitum & fluxum instituit.

*Signa Diagnostica.*

Signa.

In hac diarrhœa præcesserunt signa lienis affecti, tensio & grauitas in sinistro hypochondrio, & alia, quæ in hypochondriacis morbis apparere solent, deiectiones sunt nigrae. Si est à sanguine, intincta lintea rubent, & cruenta vomitio comitatur vel præcessit.

*Prognostica.*

Prognostica.

1. Et si periculo hæc diarrhœa non careat, ob prauitatem humoris, & sanguinis copiosa per aluum deiectione ad malum habitum & hydropem deducere soleat, & natura irritata talibus prauis & adultis humoribus sæpe bonos simul profundat, viresque valde deiciat: tamen sæpe etiam à multis morbis, si tantum modum non excedat, huiusmodi diarrhœa præseruat.

2. Si materia, quæ excernitur, nullum fœtorem habeat, maior salutis spes est: si fœteat, & ex atro colore in viridem vergat, exigua salutis spes est.

*Curatio.*

Curatio.

Imprimis hæc respiciendum ad causam, humorem scilicet melancholicum & atrum, siue is calore epatis genitus sit, siue ab obstructione ac vitio lienis cumulatus.

Itaque, præmissâ tamen, si opus sit, venæ sectione, primò humor melancholicus euacuetur polypodio, epithymo, myrobalanis Indis, foliis sene, syrupo rosarum, solutino, diacatholico cum decocto florum & fruct. vel alio conueniente liquore. Non verò statim fluxus sedandus, ne materia retenta deterior reddatur.

Humor melancholicus purgantis.

Deinde quæ humorem atrum temperent, eiusque generationem prohibeant, vsurpanda, syrupus nimirum de pomis, de borragine, de buglosso, de endiuia, de lupul. byzantinus simplex, de fumaris: simulque obstructiones in liene, si adsint, aperiendæ, radicibus aperiensibus, corticibus radic. cappari, tamarisci, ceterach. capillis veneris, semine agni casti, syrupo byzantino. Et ne intestina humor mordax in transitu exulceret, utile est, sæpius clysteres iniicere ex iis, quæ leniter deterunt, & humoris acrimoniam temperant, vt decocto hordei, cremore prifani, iure carnis, lacte cum melle rosaceo & violaceo.

Adstringentia tandem, si fluxus non cessat, adhibenda. Dan. Sennerti Tom. II.

da, conferua rosarum, absinthij cum terrafigillata, vel bolo Armeno, aut corallis.

Dixta quoque instituat, qualis in melancholicis, & hypochondriacis affectionibus conuenit, & vitentur omnia, quæ crassum, fœculentum & adustum sanguinem generant.

Si verò diarrhœa sit à sanguine atro, quam vomitus sanguinis comitatur, nec is statim sistendus. Nam si sanguis ille ater, & præcipue iam extra vasa sua elapsus & concretus ac corruptus, sistatur, lipothymiam & alia grauiora mala excitat. Itaque potest statim exhiberi hic puluis:

℞. Rhabbarbari Drach. j. cinamomi, myrobalanor. citrinor. an. Scrup. ss. succini albi gr. vj. F. Puluis. Detur in vini albi Vnc. iij. aqua plantaginis Vnc. j. syr. rosarum simplicis infusionis Vnc. ss. Hinc dentur adstringentia, vt:

℞. Trochiscor. de carabe Drach. j. ss. lapid. hamatit. Drach. j. C. C. vsi præparati, boli Armeni ana Drach. ss. F. Puluis. Dosis Drach. j.

Potest exhiberi cum sequenti liquore.

℞. Vini granator. acidorum Vnc. j. succi citri Vnc. ss. iulebi rosarum Vnc. j. aq. plantaginis, tormentill. cauda equina an. Vnc. iv. Miscet.

℞. Conferua rosar. antiq. Vnc. j. tormentilla Vnc. ss. pulv. radicis consolida maioris Drach. iij. philony Persici Drach. j. trochiscor. de carabe Drach. j. ss. Cum syr. de rosis siccis vel cydoniorum F. Electuarium.

Cum verò tales diarrhœæ statis temporibus, vel singulis annis, vel semestribus recurrere soleant, vt illæ præcaueantur, curatio præseruatoria, qualis affectibus hypochondriacis conuenit, instituenda, nimirum certis interuallis, & præsertim imminente tempore, quò vomitus & fluxus ille sanguinis accidere solet, sanguis, si opus, mittendus, & corpus ab humoribus vitiosis liberandum, ac ne ii in corpore cumulentur, præcauendum, obstructionesque in liene & venis melaraicis aperiendæ.

Quandoque in diarrhœa ab humore melancholico vitium quoque scorbuticum concurrat. Ideoque in diarrhœa ab humore melancholico semper diligenter considerandum, an dispositio scorbutica adsit, ac tum medicamenta scorbutica propria admisceantur.

*De Diarrhœa ab utero.*

Vt interdum ob menses retentos, & vitiosos humores inde cumulos vomitus fœminæ patiuntur: ita interdum & diarrhœa excitatur in iis, humoribus per venas, quibus uterus nutritur, ad epar, & hinc ad intestina effusis.

Diarrhœa ab utero.

Cognoscitur hoc malum ex eo, quod symptomata vteri affecti adsint, & plerumque tales alui fluxus periodos quasdam observant, & eo tempore magis affligere solent, quo menses fluere consueverunt.

Curatur iis medicamentis, quæ venas vteri, si obstructæ sint, aperiunt, & vitiosos humores, qui in vtero, & vicinis locis cumulantur, euacuant. Nisi enim illi prius tollantur, frustra adstringentia & fluxum sistentia adhibentur: cum materia retenta aliò regurgitet, & mala sæpe periculosiora excitet; de quibus in morbis vteri, & mensi suppressione dicitur. Materia euacuata, ea, quæ robur ventriculo, intestinis & vtero addunt, vsurpanda, ne facillè affluentes ex aliquo corpore humores excipiant.

*De Diarrhœa à cerebro.*

In alui fluxu, vt vocant, cerebrali vel catarthali materia à cerebro imbecillo, pituita multâ seu insipida, seu salsa abundante per fauces in stomachum & intestina defluit, præsertim noctu, & ægro supino dormiente. Materia illa vel reddit lubrica ventriculi & intestinorum tunicâ, unde retentrix debilitatur, vel cibum inquinando concoctionem labefactat, vel molesta qualitate sua expultricem stimulat. Excitatur hic fluxus magis abstinentia (nam tam benignior succus, quò humoris malitia

Diarrhœa à cerebro.

*Gur balbi alui profluuium corripiantur?*

temperatur deest)quàm cibo;contrà atque in lienteria fieri solet. Præcessit debilitas cerebri, & spumum multum, excrementa sunt spumosa & pituitosa, teste Hippocrate, 3. sect. 6. Balbi alui profluuium maximè corripuntur. Causa est, quod plerique ii humidius habent cerebrum, vnde excrementa humida in ventriculum decumbentia diarrhœam efficiunt, eamque diurnam, ob hecticam quasi illam cerebri intemperiem. Atque hanc intemperiem etiam balbuties arguit, quæ ex lingue nimia humectatione & emollitione, vel quasi quadam paralyti oritur; quanquam etiam aliis de causis nasci possit. Solut autem hic fluxus à capite descendens satis diurnus esse, & longo tempore durare.

Curatio instituatur, vt supra de catarrho traditum, præparando & euacuando materiam. Diuersiones etiã fiant per frictions, ligaturas, cucurbitulas in scapulis. Iuuant etiam erthina & sacculi capiti impositi.

A masticatoriis & gargarisimis abstinendum, ne materia catarrhi in stomachum & intestina trahatur. Vitandus somnus supinus, nec à cœna mox dormiendum. Non solum autem cerebri & membri mandantis ratio habenda, sed etiam ventriculi, vt recipientis, qui internis & externis medicamentis conseruandus ac roborandus est.

Si hæc diarrhœa sæpe recurat, ceruici primam & secundam, vertebram admoueat vesicatorium & cauterium potentiale, vel seraceum, vt humores catarrhum excitantes deriuentur; vel fonticulus in brachio aperiatur.

In eundem vsum, si ætas & alia ferant, theriaca, Mithridatium decoctum ligni guaiaci, sassafras, sarsaparillæ per plures dies vsurpandum, vt corpus exsicceretur, & materia catarrhum generans per sudores discutiatur.

#### *De Diarrhœa, quæ accidit infantibus, dum dentes erumpunt.*

*Diarrhœa infantium dentientium.*

Interdum etiam infantibus diarrhœa accidit, dum dentes ipsis errumpunt; quod euenit, vel pituita falsâ in ventriculum defluente, vel lacte per febrem, quæ tum temporis infantes plerumque affligere solet, in ventriculo corrupto.

Vtra autem causa locum habeat, ex iis, quæ excernuntur, faciliè indicare est.

Hic fluxus non statim sistendus, ne materia retenta peior euadat, & febrè, quæ ex dolore excitatur, augeat, aut cerebrum nervosque in consensum trahat, & conuulsionem excitet: sed si à pituita falsa sit hæc diarrhœa, syrupus rosarum solutius, vel mel rosatum, vel syrupus de cichorio cum rhabarbaro, cohlearis vnius aut alterius quantitate exhibendus. Deinde ventriculus & venter inungendus oleo mastichino, cydoniorum, rosarum, absinthij, vel imponendum cerotum stomachale, aut emplastrum de crusta panis.

Si à lacte corrupto diarrhœa hæc accadat, illud, vitiosusque humor inde genitus, è ventriculo dictis modò syrupis deturbandus, dandaque opera, vt nutrix bonum lac infanti suppeditet, quæ idèd exquisitè, & cibis boni succi alanda. Infantis gingiuarum butyro cum melle mixto, vel cerebro leporis fricentur.

#### *De Diarrhœa ab hypercatharsi & veneno sumpto.*

*Diarrhœa ab hypercatharsi & veneno.*

Tandem interdum etiã profluuium alui excitatur post nimis fortium purgantium vsum, aut venenum assumptum.

Vtraque enim intestinis inhærendo naturam continuè ad excretionem stimulant, & è toto corpore humores ad aluum proritant, & humores etiam bonos corrumpunt, ac vt ad aluum moueantur, faciunt.

Præcessisse autem talem causam, faciliè ex ægri, vel adstantium relatione cognoscitur. In tali fluxu primò omnium abstergens ex decocto hordei cum paucis sac-

charo conuenit, siue bibitum, siue per clysterem injectum.

Vt *℞. Decocti hordei Vnc. i. v. sacchari rubri Drach. vj. vel sy. opi rosarum simplicis infusionis Vnc. j. Misce.*

Dolorem lenit lac chalybeatum, itidem vel bibitum vel clysterem infusum, & lac coctum cum radicibus althææ, & injectum.

Simul ligaturæ & frictions, & focius extremitatum instituuntur, & cucurbitulæ siccæ inter scapulas & ad hypochondria, vel inter umbilicum & stomachum apponantur.

Postea dentur adstringentia; vt:

*℞. Conserv. rosarum antiquæ Vnc. j. diascydij sine speciebus Vnc. ss. Pulu. seminis plantaginis sanguinaria, sumach. hypocistidis, acacia, cornu cerui vsti an. Scrup. j. Fragmentorum lapidum pretiosorum ss. Cum liq. syrussi ribium, vel cydoniorum. F. Electuarium.*

Vel *℞. Succu plantaginis, decocti rosarum, mespili, sorbi, rad. tormentilla ana ss. ss. athanasia Vnc. ss. Fiat Clyster.*

Cui etiam vitellum oui vnius vel alterius, seu hircini, sanguinis draconis, tragacanthi, gummi arabi an. Scrup. j. addere licet.

Si fluxus non cesset, ad opiata confugiendum, & propterea exhibenda theriaca recens, laudanum opiatum. Cibi & potus quoque facultatem adstringendi habeant.

Si à veneno assumpto sit fluxus, primò itidem abstergentibus tam sumptis, quàm per clysterem injectis opus est. Deinde si venenum notum sit, proprium alexipharmacum illi opponendum; si verò ignoretur, ad vniuersalia antidota confugiendum; qualia sunt, theriaca, mithridatium, lapis bezoar. Commendatur hic etiam smaragdus, cuius grana vij. in conueniente liquore dentur, vel succus dictamni cum pari vini quantitate exhibitus.

Extra quoque cordi medicamenta cordialia applicentur.

## C A P V T VII.

### *De Dysenteria. Nomen & Natura Dysenteria.*

**D**ysenteria, quam Celsus, lib. 4. c. 15. Tormina, & vulgo intestinorum difficultatem nominant, à parte affecta, intestinis scilicet, quæ Græcis *εντερια* sunt, nomen habet, teste Galenò, *meth. med. cap. 2.* Et quidem generale hoc nomen est, nihilque aliud per se, quam intestinorum difficultatem significat, & hoc modo pluribus affectibus, in quibus intestina torquentur & affligantur, attribui posset. Vtus tamen obtinuit, vt vocabulum dysenteria proprie & in specie tantum accipiat pro intestinorum exulceratione cum dolore & deiectione alui frequenti ac cruenta. Cœlio Aureliano est intestinorum *πευμαλισμός* cum vlcere: Paracelsò morbus dissolutus: Germanis *die rote Ruhr*, *Darm, Blut-Ruhr*, oder *rote VVebe*.

Malum plerumque Epidemium est, in iuuenes maximè, nonnunquam tamen in senes etiam grassans. Interdum & certæ temperaturæ ac constitutionis homines tantum inuadens; quo qui laborant, per aluum interdum copiosa, interdum pauca, eaque non naturaliter, verum præter naturalem modum sese habentia, sæpe, ac cum frequenti conatu, cum ventris dolore ac torminibus deiciunt, & quidem cum sanguine, nunc paucò, nunc copioso, permixta. Præter sanguinem, & cum sanguine, ac fecibus illis præternaturalibus in morbi progressu etiam mucosum quiddam excernitur, nunc copiosum, nunc paucum; quod, si sanguis copia superet, Germani in specie *die rote Ruhr* nominant. Si verò plus mucu illius albi, quàm sanguinis eiiciatur, appellant *die weisse Ruhr*. Quid

*Dysenteria plerumque epidemica est.*



Quid autem illud mucosum sit, inter medicos non conuenit, ut postea dicitur. Nonnunquam & bilis, & præcipue in principio, cum à fluxu bilioso ferè dysenteria incipiat, & quidem frequenter flaua, interdum & viridis ac atra admiscetur; sæpe & pituita.

Est nimirum dysenteria *deiectio alui frequens & cruenta cum dolore ventris & intestinorum exulceratione; seu intestinorum exulceratio cum deiectione frequenti, cruenta & purulenta, ac ventris dolore & torminibus, à materia acris & intestinis peculiariter aduersa, eaque erodente ortum habens.* Qua definitione ab omnibus aliis alui fluxibus, ut & sanguinis per aluum excretionum differentiis discernitur. Equidem, ut apud Galenum, de sympt. caus. cap. 2. & 2. de loc. affect. cap. 5. videre est, apud Medicos quatuor cruentarum alui deiectionum occurrunt differentiæ, quibus omnibus nomen dysenteriae interdum attribuitur.

1. Cum per aluum sanguis euacuatur, in iis, quibus membrum aliquod abscissum est, & cum sanguis, qui in nutrimentum partis abscissæ absumi debebat, ad fontem suum recurrit, & ut superfluous à natura ad aluū depellitur & ibi euacuatur. Quod & iis interdum accidit, qui consuea exercitia subito dimiserunt, non imminuta interim quantitate alimentorum, qua, cum validius exercerentur, uti solebant: aut quibus consuea aut familiaris hæmorrhagia narium supprimitur, cuius exemplū habetur apud Forestum, lib. 2. obs. 20. ut & mulieribus, quibus menstrua supprimuntur, ut docet Galenus, 5. de loc. affect. c. ult. Sanguis n. per vterum euacuari solitus per venā cauā regurgitat, & hinc per venas mesaraicas ad intestina profunditur. Nonnulli & hæmorrhoides addant; cum, iis præter naturā suppressis, sanguis vel immediatè & ab hæmorrhoidibus internis, vel epate mediante & ab externis ad venæ portæ ramos remeare, & inde ad intestina effundi possit.

2. Cum ob epatis debilitatem aquosus sanguis, instar loturæ carniū, excernitur, qui alui fluxus epaticus nominatur; Tralliano, lib. 13. c. 3. est dysenteria epatica.

3. Quæ melancholica appellatur, cum sanguis propter longiorem moram in epate vel circa lienē adustus & cum humore melancholico mixtus per venas mesaraicas ad intestina à natura protruditur, & niger atque splendens per aluū, sæpe etiam per vomitū simul elicitur.

Accidit præterea interdum, ut iis, qui ex alto deciderunt, vel in hypochondriis ac lumbis grauiter percussi sunt, sanguis, & quidem sæpe longo tempore, retentus, postea per aluum excernatur, isque nigricans, interdum & graueolens, qui proculdubio in venis loci contusi collectus est & hæsit.

Verum hæc cruenta deiectionis differentiæ improprie dysenteriae dicuntur: ea verò sanguinis deiectionis species, quam modò descripsimus, solum proprie *Dysenteria* dicitur: is scilicet alui fluxus, in quo cruenta cum intestinorum dolore ac torminibus eiiciuntur.

In dysenteria ergo adest soluta vnitas, seu vlcus, plerumque & intemperies, ac mala intestinorum constitutio, & quidem cum affluxu materiæ.

Pars affecta sunt intestina, nunc tenuia, nunc crassa, nunc vtraque. An tamen omnia simul exulcerari possint, in dubium à nonnullis vocatur. Equidem impossibile non videtur, ut omnia intestina, si non tota, tamen singulorum partes exulceratio corripiat. Verum si hoc accadat, grauissimum id malum est, ex quo æger vix conualescit.

Nonnunquam tamen & vicinæ partes ut epiploon, ventriculus, thorax & pulmones in consensum trahuntur, cuius rei exemplū Scholiastes apud Holleriū recitat.

Symptomata, quæ hinc præcipue vrgent, sunt intestinorum læsæ functiones, alimenti scilicet concoctio & chyli ac fecum debita elaboratio; alimenti, cui inferuiūt etiam suo modo intestina, distributio; frequens deiectio ac excretio, & quidem sanguinis simul; tandemque dolor. Quibus accedunt interdum & alia, de quibus

Dan. Sennerti Tom. II.

postea de signis dicemus.

### Causa & generatio Dysenteriae.

Ut verò natura huius mali clarior fiat, causæ & generationis modus, & quæ in illo accidunt, consideranda sunt. Et quidem fluxus huius præternaturalis causa proxima est intestinorum irritatio, facultatisque in iis excreticis stimulatio, ut continuò, quod molestum est, excernere nitatur, quam excitant acres humores, siue in ventriculo & intestinis geniti sint, siue à toto, siue à parte aliqua ad intestina conflant, eaque ad excretionem stimulent. Nimirum bilis flaua, à qua plerumque Dysenteria incipit: Bilis atra, quæ ferè lethalem Dysenteriam excitat: Pituita falsa, quæ secundum Galen. 3. aph. 12. aliquando gignitur in capite à caliditate maiore, aliquando talis efficitur putredine in ventre, unde ad intestina delata, & lentore suo diutius iis inhærens, assidue extergendo tandem illa exulcerat, quem admodum docet Galenus, 3. Epid. com. 3. aph. 70. Sanies quoque acris & purulenta & humores maligni ac pestilentes. Quod etiam pertinent purgantia fortiora, vel etiam lenia intestina nimium vellicantia & stimulantia.

De omnibus autem humoribus, qui Dysenteriam excitare solent, non sine causa hoc dubiū mouetur, quod etiam Ludovicus Mercatus & alij animaduertunt, quæ fiat, quod humores mordacissimi, feruidi, æruginosi, prasini, & omnino summam malignitatem præ se ferentes, Diarrhoeam sæpe saltem pariant, & non Dysenteriam; & quæ fiat, quod Diarrhoea etiam ab humoribus acris sæpe longo tempore durans in Dysenteriam non mutetur: Contra vero sæpe humores minus mordaces Dysenteriam, & quidem prauo temporis spatio fluxu durante, excitent. Et quidem alij aliam huius rei causam reddere conantur, & eam vel à circumuolutione intestinorum, quæ humores detineat, petunt; Vel quod omnibus simul venis mesaraicis humor communicatur, eū detineri, putant. Verū cum hæc omnibus aliis fluxibus communia esse possint, non sufficiunt.

Ludovicus Mercatus ad hoc dubiū responder, solam acrimoniam & mordacitatem humorum per se (licet ad Dysenteriam necessaria sit) ad Dysenteriam gignendam non sufficere, sed insuper requiri visciditatem & lentorem, ob quem intestinis adhæreant, eaque continuò rodant. Atque ita proximam & adæquatam causam ponit humorem acrem, lentum & viscidum intestinis adhærentem, eaque abradentem & exulcerantem.

Verum etsi hæc opinio satis probabilis videatur: hoc tamen in ea mihi dubiū adhuc videtur, quod sæpe alui fluxus dantur; qui ab humoribus hisce qualitatibus præditis sunt, & tamen Dysenteria non excitatur: imò sæpe illa visciditas & lentor abest in biliosis & aliis humoribus, qui Dysenteriam pariunt.

Ergo mihi probabile videtur, humores qui Dysenteriam excitant, peculiarem & occultam qualitatem habere, quæ peculiariter intestinis infestis sunt, eaque exulcerant; sicut pulmo marines pulmoni, & cantharides vesicæ infestæ sunt, eaque, non verò alias partes, exulcerant: qualis quidem vis in colocynthide, cucumere asinino, esula, euphorbio, laureola & aliis purgantibus occurrit. In quorum quibusdam si acrimoniam examinemus, vel etiam visciditatem consideremus, longè minor est iis, quam in aliis multis, quæ *ὑπερκαθάρσιν*, tandemque alui fluxum & Dysenteriam excitant. Imò cōpertum est, leniora etiam, ut mannam, cassiam, Syrup. rosar. solut. in quibusdam *ὑπερκαθάρσιν* excitasse, ob vim, quam habent, intestina vellicandi, & humores ad aluum commouendi.

Atque ita rem se habere facilius credet, qui, qua ratione contagium Dysenteriam inducat, & quomodo medicamenta purgantia vim suā exerant, perpenderit.

Etenim cum *μιασματα*, siue ex fecibus & excrementis Dysentericorum, siue ex corpore eorūdem expirantia, seu per cibum & pocula communia comunicata, seu

Causa proxima Dysenteriae.

Humores dysenteriam excitantes quales.

Sola acrimonia humorum dysenteriam non facit.

Humorum Dysenteriam excitantium natura.

Contagium quomodo Dysenteriam exciter.

per pulmones & inspirationem, seu per œsophagum, seu per anum, aut quocunque modo ad admissa, fluxum similem excitent: non video, quomodo alia ratione id præstare possint; quam quâ purgantia medicamenta suam operationem efficiunt.

*Purgantia quâ ratione opus suum perficiant.*

Et si verò vulgò dicatur & doceatur, medicamenta purgantia humores ad se trahere: tamen id rectè explicandum est. Cum enim purgantia medicamenta, non solum ore sumpta, sed & vmbilico applicata, manibus tractata, imò naribus admota & olfacta, alium mouere & purgare soleant: aliter statuere non possum, quàm medicamenta ista per vmbilicalia vasa, vel per poros cutis & vasorum extremitates in venas vel arterias penetrantia fermentationem quandam & agitationem in humoribus ibi excitare, quâ vitiosi humores à bonis separantur, à quibus postea natura stimulata eos ad cōsuetas euacuationis vias pellit, adiuvante procul dubio vi medicamenti purgantis, quod non ad ambitum corporis tendit, sicut sudores mouentia, neque ad vesicam, sicut Diuretica, verum solum ad intestina: sicut & cantharides non solum intus sumptæ, sed & extra applicatæ urinam mouere, & vesicam exulcerare feruntur.

*Generationis Dysenteria modus.*

Eodem ergo proculdubio modo Contagium & *μιασμα* Dysentericum quocunque modo & loco intra corpus admissum, quandam fermentationem in humoribus efficit, & similem sibi dispositionem (qui omnium venenorum seu contagiosorum inquinamentorum, mos est) imprimat. Humores verò mori, & peculiarem hanc malignitatem adepti vñ cum *μιασμα* ad intestina, quibus peculiariter infensa, ruentes, non solum purgantium medicamentorum more fluxum alui concitant, & naturam ad crebram excretionem stimulant, sed & ea exulcerant, ac pravam dispositionem iis imprimunt, & ita cum intestinorum vinitatem soluendo, rûm naturale temperamentum & similem constitutionem lædendo, concoctricem facultatem in iis lædunt, vt neque chylus affluens illam, quam debet, in intestinis & vasis mesaraicis, dispositionem seu accipiat, seu retineat, sed in humorem vitiosum mutetur, neque excrementa, & feces alui naturalem elaborationem & qualitates in iis accipiant. sed & ipsæ in præternaturale quid mutantur. Vnde frequenti fluxui materia supeditatur, & natura ad frequentem excretionem stimulat.

Neque mirum alicui videatur, quod hi humores peculiariter intestinis infensi sunt, cum idem in aliis morbis Epidemiis eueniat, in quibus certæ corporis partes infestantur. Ita quandoque angina, pleuritides, tussis & catarrhi Epidemici ac contagiosi grassantur: Imò obseruatum est, Podagram Epidemiam fuisse, vt apud Athenæum, in *Dynosoph. lib. 2.* videre est. Atque hoc modo cum à contagio introducat Dysenteria, proculdubio & reliqui humores, qui intra corpus generantur, eodem modo Dysenteriam efficient; cum necessarium sit, vt cumplura eundem effectum producant, ad vnam & communem agendi modum reducantur.

*Proxima Dysenteria causa.*

Et ita proxima causâ Dysenteria sunt Humores quicunque peculiarem hanc qualitatem & vim adepti, vt instar medicamentorum purgantium humores in toto corpore mouere, eos ad intestina concitare & ipsa intestina peculiariter lædere valeant. Et licet hic humor non semper malignus sit: (proprie malignitatem sumendo) tamen peculiarem qualitatem & dispositionem obtinet, qua differt ab aliis humoribus biliosis diarrhoeam sæpe longam facientibus.

*Quid sit mucosum illud, quod in Dysenteria excrenitur.*

Et hic, quem modò exposuimus, generationis Dysenteria modus est. Circa quem tamen hoc adhuc explicandum restat. Quidnam sit illud mucosum & album, quod sæpe vna cum sanguine excernitur, & non rarò ita copiosè, vt sanguinem copia excedat, de quo *questione 1.* dicitur.

Atque hæc de causâ proxima & generationis Dysenteria modo, & de iis quæ circa eam accidunt, dicta sint.

Causas verò Antecedentes & Remotas externas & internas quod attinet, omnes ferè humores in corpore hunc corruptionis gradum induere possunt, vt intestina exulcerent, & Dysenteriam excitent. Frequentissimè tamen humor Dysenteriam excitans est biliosus, à quo etiam plerumque fluxus Dysentericus incipit: vnde etiam æstate magis & in principio autumnii, quam hyberno tempore, grassatur Dysenteria. Biliosus autem ille humor nunc in ventriculo & intestinis gignitur, nunc è vesica fellis, aut venis mesaraicis, nunc à toto corpore, quod in febribus sæpe fieri solet, ad intestina effunditur, & vel venarum mesaraicarum orificia patefaciendo, vel erodendo, & inflammationem aut exulcerationem excitando, fluxus sanguinolenti & Dysenteria causa est.

*Causa Antecedentes & Remota Dysenteria.*

A bile prasina & æruginosa equidem Sauanarola, *tract. 6. cap. 16.* Dysenteriam fieri posse negat; cum tam praua sit, vt statim à natura è corpore expellatur, vel corpus corruptat: quod ante ipsum etiam statuit Conciliator, qui *differ. 201.* scribit: Non reperio aliquem autorem authenticum scribentem ex bile prasina & æruginosa Dysenteriam causari. Verum Aetius, *sect. 2. serm. 1. cap. 42.* Dysenteriam à bile prasina admittit, etsi periculosa eam esse statuat. Et Solenander, *sect. 4. consil. 9.* refert, quod ipse aliquando dysenteria grauiter decumbens æruginosam bilem bile vitellina, mucos sanguineque permixtam copiosè deiecerit. Et licet, quod obiicit Sauanarola, natura bilem æruginosam, vt valde prauam, statim è corpore eicere conatur: tamen easdem vires etiam erga alios humores vitiosos, vt & medicamenta cathartica exserit. Interim id non semper tam velociter peragere potest, vt nullum in transitu corpori damnum inferatur, præcipue in ista intestinorum circumuolutione, quæ humores, quos natura expellere conatur, non parum remoratur. Quibus accedit, & hoc, quod humores non quatenus tales, sed quatenus peculiarem corruptionis gradum accipiunt, dysenteria causa sunt, quem vbi acquisiuerunt, statim dysenteriam inducere possunt.

Eodem modo & alij humores prauis in corpore diutius detenti, præcipue aliqua causa externa accedente, tandem illam acrimoniam, malignitatem & dysentericam dispositionem, quam diximus, induunt, & vel soli vel cum bile mixti dysenteriam excitant. Vnde ij præcipue, qui prauis humoribus scatent, facilius dysenteriam incurrunt, & ad præseruationem à dysenteria prauorum humorum è corpore euacuatio necessaria est. Et non rarò in febribus malignis & pestilentibus, vitiosis eiusmodi humoribus ad intestina vel vi naturæ protrusis, vel sponte sua ruentibus, dysenteria eaque sæpe Epidemia excitari solet.

Hinc omnia, quæ ad generationem vitiosorum humorum faciunt, vel genitis pravam illam dispositionem Dysenteria peculiarem imprimunt, & vt intestina confluant, faciunt, inter Dysenteria causas remotas numerantur. Inter quæ est 1. Ciborum & assumptorum natura, vt facile in acres & mordaces eiusmodi humores conuertantur, facileque putredini & corruptioni tali sint obnoxij. Quo in genere recensentur vulgò Fructus Auruminales, qui in fine æstatis maturescentes & *πρωγά* vocantur, auideque ingesti facile putrescunt. E quorum vsu pueros frequentius Dysenteriam incurrere vulgata sententia est; præcipue si non satis maturi comedantur: qui, vt nonnulli censent, non ideo solum Dysenteria causa sunt, quia facile corrumpuntur, sed etiam quia eos, qui, quod facile corrumpuntur, statim excerni debebant, in corpore adlietione sua retinent. Quod vt negandum non est; cum Experientia doceat, multos ab esu fructuum, vt prunorum, nucum auellanae & similibus, præcipue non satis maturorum in dysenteriam incidisse. (Sic Cuspinianus refert, Imperatorem Romanorum Albertum Austriacum, cum calore feruenti Augusti mensis insolito vexatus sedare æstum pepo-

*Cibi & potus Dysenteriam excitantes. Fructus autumnales.*

*Fructus Autumnales non semper Dysenteria causa sunt.*

nibus elaboraret, in dysenteriam lethalem incidisse: Cui simile quod idem Cuspinianus de Friderico III. recenset. Ita Dysenteria causa non semper in talium fructuum esum referenda; cum obseruatum sit, etiam pueros, lactentesque infantes, & eos, qui à talibus fructibus planè abstinerant, nihilominus in Dysenteriam incidisse. Sicut & quæ anno 1624. passim grassabatur Dysenteria Epidemia soli fructuum esui adscribenda non est: cum & ipse infantes lactentes & alios, qui fructus nullos comederant, laborantes dysenteria curauerim; & tum mense Maio in vicinis oppidis, antequam ulli fructus maturescerent, grassari cœperit dysenteria, & demum sub finem Autumni, cum omnes fructus maturi & in quotidiano vsu sunt, vel mitteret, vel cesseret, quæ propterea aeris constitutioni potius, de qua mox dicemus, quam fructibus adscribenda est.

Ad hoc causæ genus etiam referri potest uuarum esus & musti potus. Nam non solum fermentationem in humoribus excitant; verum sæpe etiam ex nebulis, rubigine & carbunculo, araneis, aliisque vermibus multa inquinamenta vis & musto insunt, quæ humores inficiunt & concitant, ut diarrhœæ, & hinc dysenteria causæ sint, præsertim si corpus dispositum sit.

Uuarum esus & musti potus causæ dysenteria.

Exempla Dysenteria ex esu uuarum & musti potu habentur apud Forestum lib. 22. obseru. 3.

Cibi prauis & insolis causæ dysenteria.

Non solum autem fructuum esus, sed & aliorum ciborum minus commodorum & corruptioni obnoxiorum vel insuetorum vsus Dysenteriam inducere potest. Vnde in exercitiis Dysenteria sæpe familiaris est, ut ex historiis passim notum, & nulla ferè in Ungaria expeditio suscepta est, in qua non ex insuetæ & incauta victus ratione plures ferè dysenteria, quàm ferro perierint. Refert quoque Ælianus lib. 5. varia histor. cap. 1. quod Tachus Ægyptius, donec vsus est vernaculo victu & frugaliter vixit, omnium hominum fuit sanissimus: postquam verò ad Persas venit, & in illorum luxum dilapsus, cum non posset ferre insolentiam ciborum, vitam dysenteria finiuit. Et Amatus Lusitanus, cent. 2. curat. 45. in Schol. cur in India & Ægypto dysenteria frequens sit, causam esse scribit, quod homines eò loci carnibus vescuntur animalium, quibus cassia fistularis purgatoria pro pastu & cibo est. Nutrimetum enim è carnibus eiusmodi purgatoriam vim habentibus humorem torridum & acrem ad intestina deriuare & diuertere; vnde homines plerumque dysenterici fiant, raro phrenetici aut pleuritici.

Venenata pharmaca causæ dysenteria. Aqua per plumbeos canales fluentes asinus causæ dysenteria.

Pertinet huc & venenatorum pharmacorum potus, colocynthidis & antimonij: ut & acetum in plumbeo vase asseruatum. Imò aqua, quæ per plumbeos canales defluunt, suspectæ nonnullis habentur. Experientiam tamen contrarium testari alij putant. Neque enim aqua pura & quæ acidi & salis nihil in se continet, facile aliquid à plumbo abluat. Vnde Renodæus, Amidotarij lib. 1. sect. 1. c. 7. scribit, aquarum per plumbeos canales deductarum vsus Luretiæ Maris esse frequentem, nec tamen insalubrem. Si tamen canales plumbei ita veritate iam corrupti sint, aut aquæ ita comparatæ, ut à canalibus aquæ aliquid de substantia plumbi communicari possit, tales aquæ innoxie planè non sunt. Vnde Aëtius, terrab. 3. ferm. 1. cap. 45. ea de causa aquam illam pluuialem damnat, quæ defluxit per recta plumbea. Baccius, lib. 21. cap. 9. aquas quasuis, quæ per regulas metallicas defluunt, vituperat; additque, ipsam aquam pluuialem, quæ per tonitrua decedit, ea de causa, quod aqua hæc pluuialis acrem quandam & prauam qualitatem concipiat, stomacho & intestinis præcipuè, noxiâ. Idem Baccius, loco allegato, vsu aquarum medicatarum, quæ metallorum & mineralium vires obtinent, cum cibis valde damnat, & prolixè contendit, aquas illas parcius sumptas è corpore rursus non excerni, sed vnâ cum alimentis ad interna viscera transire, ibique hære, ac mora sua vel corrumpi & in vitiosos humores transire, vel metallica sua natura partium naturalium dispositionem

euertere: vnde postea prauis humores generentur, & insperatè nonnunquam dysenteria periculosa & alij perniciosi morbi excitentur. Verum non in omnibus aquis medicatis talem noxam metuendam esse, cum rationibus experientiâ suâ & aliorum probat Ioh. Bauhinus lib. 2. de aquis medicat. cap. 7. Cuspinianus etiam ex Zonara refert, Theophilum Imperatorem ex aquæ frigidissimæ continuato potu in dysenteriam lapsum, & morbi illius vehementiâ mortuum fuisse.

Referunt huc plurimi & adamantem, quem ut alias venenatum, ita quoque eius puluerem dysenteriam excitare statuunt, de quo quest. 2. dicitur.

Pertinent huc & vehementiora, ut dictum, putgantia, imò etiam mitiora maiori dosi exhibita. Et non solum medicamenta talia ore sumpta, sed hydrargyrum etiam extra illitum, teste Nicolao Malsa, de lue venerea tract. 4. cap. 4. humores ad intestina (quod aliàs ad fauces facere solet) concitare, & Dysenteriam introducere posse, à nonnullis statuitur.

Hydrargyrum dysenteriam excitat.

Deinde satis frequens causa Dysenteria est Aer, de quo Hippocrates 3. aphor. 11. Inter anni partes, si hyemis sicca & Aquilonia, ver pluuiosum & Australe fuerit, necesse est, æstate febres acutæ fieri & ophthalmias & Dysenterias, mulieribus præsertim & viris naturâ humidioribus. Quia, ut Galenus, in comm. habet, ambientis aeris humiditas, humores in corpore redundantes desiccari prohibet, eaque ratione adiuuat vim putrefacientem; & materiâ putridâ in corpore manente febres fiunt; si eadem per ventrem euacuetur, Dysenteria. Et reuera Aer humidus & calidus Vernus ad humores in corporibus nostris corrumpendos & ad putredinem inducendam maximè dispositus est. Non tamen solam verni aeris humiditatem & caliditatem, sed etiam caliditatem & siccitatem ad dysenteriam generandam facere, testatur ipsa experientia. Plerumque enim in fine æstatis ac autumnii initio morbus hic excitatur, & potissimum in regionibus calidis, ut in Ægypto, Arabia, Africa, India, in quibus torridus, acris & exsiccatus sanguis gignitur. Testatur idem Dysenteria, quæ anno 1624. populariter in multis locis grassabatur. Ea enim caliditas & siccitas aeris Verni fuit, qualem vix ullus hominum hîc meminit, cum post vltimam niuem, quæ circa Paschatos festum delapsa est, per menses ferè tres subsequentes exigua, imò ferè nulla pluuia decideret; sed perpetuus æstus, qualis sæpe vix est in Canicularibus, in hisce regionibus vigeret. Cuius causa proculdubio fuerunt magnæ illæ & frequentes Planetarum coniunctiones, quæ ea æstate inciderunt, de quo est Astrologorum iudicare, qui aliàs etiam in H & A coniunctionem Dysenteria Epidemia causam reiciunt.

Aer Dysenteria causa.

Constitutio anni 1624.

Cum ergo à Calido & Humido, & Calido & Sicco aère, imò ut ex Hippocrate, 1. Epid. com. 2. t. 1. & seqq. & præcipuè 7. patet, etiam post frigidam & humidam aeris constitutionem Dysenteria excitari possit: in qualitatibus primis solum causa Dysenteria querenda non est; sed in iis, quæ ab astrorum influxibus, adminiculantibus tamen istis qualitatibus primarum excessibus, producantur. Et si enim, quæ de fructibus Astrorum Chymici quidam scribunt, non probemus, neque iis assentiamur, qui ab iis, quæ Hippocrates, 3. Aphor. de morbis, qui ab anni temporum mutationibus proveniunt, scribit, qualitates primas planè excludunt: tamen hoc interim non negamus, si in qualitatibus primis subsistendum non esse, sed etiam in aère & humoribus, seu malignitatem & venenositatem, & omnino qualitatibus primis, quid potentius in morbis producendis ponendum esse. Neque enim in eadem aeris constitutione secundum qualitates primas iidem morbi grassantur, sed nunc Dysenteria, nunc Pleuritis, nunc Angina, nunc Carbunculi, nunc variolæ & Morbilli; qui diuersi morbi proculdubio ex diuersis & occultis ac malignis aeris constitutionibus ortum habent.

*Astrorum influxus causa Dysenteria.*

Et Dysenteriam Epidemiam quod attinet, oritur ea proculdubio ex astrorum influxu & aeris constitutione tali, quæ in corporibus nostris seu generat seu iis communicat tale quid, quod cum colocynthide, esula, helleboro, scammonio & similibus cognatam aliquam vim obrinet. Et ita se hæc habere, quæ modò diximus, deprehendent ij, qui quæ quotidie in natura fiunt, diligenter perpendunt. Vidimus anno 1624. Mense Maio auram malignam arbores aspirasse, unde vnica die (caliditati & siccitati id adscribi non potest, cum in æquali, vel etiam maiori æstu sæpius idem non fiat, nec in omnibus locis id simul acciderit) in quibusdam locis, arborum & quidem non omnium folia ita exsiccata & emortua fuere, ac lignis combusta fuissent, vt postea ipso Iulij mense deciderent, ac arborum cortices q. flauo puluere aut Auripigmento conspersa fuisset.

*Rubigo. Vredo.*

*Carbunculus.*

Vnde proculdubio rubiginis nomen, de qua Plinius, lib. 18. cap. 1. *Cæleste frugum vinearumque malum, nullo minus noxium est Rubigo.* Appellatur & eadem de causa Vredo ac Carbunculus, teste eodem Plinio, lib. eod. c. 28. Omnia enim hæc nomina frugum & arborum huic vitio indita sunt, quod fruges, vites & arborum folia q. comburat. Videatur etiam Plinius lib. 17. c. 24. Disputat quidem Plinius lib. 18. c. 8. An à Luna vel Sole hoc vitium proueniat, scribitque plerosque dixisse, rorem inustum sole acri frugibus rubiginis causam esse & carbunculi vitibus: quod ipse ex parte falsum arbitratur, omnemque vredinem frigore tantum constare Sole innoxio statuit, idque ex eo manifestum putat, quod non nisi noctibus & ante Solis ardorem deprehendatur. Verum & hoc falsum, atque experientia testatur, sæpe circa meridiem talia aeris inquinamenta, in fruges, vites ac arbores decidere, & causam esse Rubiginis & Vredinis. Plinius etiam saltem interlunio & ☽ plena decidere putat, quod an ita sese habeat, experientia docebit. Nebulas etiam maligni & venenati quid sæpe obtinere vel vulgus & rustici norunt.

*Oculis qualitates causa dysenteria.*

Ideoquo malo in hisce & aliis morbis eorumque causis ad necessarium illud in hac humanæ mentis caligine ignorantie asylum, occultas qualitates, confugere, & causas veras saltem nominare, si eas non satis explicare possum, quam falsas ac fictas asserere, quod nonnulli hodie faciunt, qui vt Antiquitatis egregij Patroni & defensores videantur, vanissimo & irritato conatu omnia ad qualitates primas deducere & incerta per æquæ incerta probare conantur. Non mirum ergo est, si cæleste illud malum, quod Plinius appellat, & aeris inquinamentum in arbores, fruges, prata, fructus, aquas decidat, imo cum aere inspirando attrahatur, & bruta & homines infici. Hinc proculdubio factum, vt boues prata illa depascentes, passim perierint. Hinc etiam Dysenteria ista proculdubio ortum habet; cum homo aërem continuò respirando attrahat, & oleribus, fructibus, aquis ab huiusmodi causa inquinatis necessariò vtatur. Eiusmodi enim inquinamenta, seu cum aere attracta, seu cum cibo ac potu assumpta, cum à corpore nostro aliena sint, aliquandiu quidem in eo latent, & reliquos humores inficiunt, donec tandem coaceruata ita fuerit materia, vt natura ab ea stimulata per aluum & humores vitiosos & venenum illud eiciat, à quibus intestina, quibus inimica sunt, exulcerantur.

*Cur non omnes Dysenteria epidemia corripiantur.*

Quod verò non omnes æquæ Dysenteria corripiuntur, causa est, quod inquinamento isto non totus aer inficitur, sed sparsim saltem & certis tractibus. Cui accedit & illud, quod corpora alia puriora, alia impuriora, & ad corruptionem hanc suscipiendam magis idonea sunt, & proinde ad resistendum vel minus resistendum magis vel minus disposita.

Imò etiam absque his, occulto modo, occultas illas astrorum influentias in corporibus nostris humores tali modo corrumpere posse, patet inde, quod etiam infantes lactentes, qui aliis cibis, quàm lacte materno aut nutriticis non vtuntur, & in aërem liberum nunquam vene-

runt, sed in cubilibus suis conclusi à primo ortu manferunt, nihilominus dysenteria correpti fuerunt; quod & ipse supra dicto anno semel atque iterum factum vidi.

Occultum autem hoc humorum vitium, quod dysenteria causa est, si quis antimoniale, vel helleborinum, vel tichymallinum, vel alio nomine appellare velit, ob cognatas vires & effectus, quos cum hisce habet, per me licet. Eadem de causa vel aloëticum vel colocynthinum non incommodè etiam appellari posset.

Chymici quidè & Paracelsus ex principiis Chymicis causam huius mali reddere conantur, & dysenteriam morbum ex sale resolutum appellant. Et verum est, sale, dum à reliquis humoribus seceratur, & seorsim, vt Hippocrates, de prisca Medicina docet, consistit plurimum morborum causam existere, & ad fluxum etiam alui facere. Verum cum iidem omnes alui fluxus à sale resolutum deducant, nihil, quod dysenteria proprium sit, afferunt, neque docent, quomodo alij alui fluxus, qui etiam ab humoribus falsis & acris fiunt, nec tamen dysenteria sunt, à dysenteria differant; neque quomodo sal resolutus in dysenteria à sale resolutum in aliis diarrhoeis discernendus sit, monstrant.

Tandem inter dysenteria causas meritò numeratur contagium, cum, & antea sæpius, & in illa ipsa dysenteria quæ anno 1624. hic grassabatur compertum sit, vnum ab altero infici, & hinc totas familias dysenteria corripit. Maximè verò illud communicatur per excrementa alui. Etenim hoc commune omnibus morbis contagiosis, vt excrementa eius patris, quæ maximè laborat, præcipuam vim contagium propagandi habeant, & vt illa pars maximè inficiatur, à qua excrementum contagiosum separatum est. Ita in ophthalmia excrementa & effluua oculorum aspicientium oculos inficiunt, non alias partes. Et in phthisi exulceratorum pulmonum contagiosa exspiratio pulmones, non verò alias partes inficit. Hinc etiam dysenteria tum maximè contrahitur, si quis in loco, in quo dysentericorum excrementa iacent, aluum exoneret, & halitus ac vapores contagiosos ex iis per gutturem inferiorem admittat. Quia tamen in dysenteria non solum aluus afficitur, vt in ophthalmia & phthisi pars vna reliquis saluis afficitur, sed sæpe tota malsa sanguinea inquinata est (vnde etiam febres dysenteria sæpe coniunguntur) nec conuersationem cum dysentericis satis tutam puto, & dysenteriam ex lecto dysenterico communi vel communibus poculis aut patinis aut aëre inspirato attrahi posse existimo; cum experientia doceat, non paucos ex conuersatione seu dysentericis in dysenteriam incidisse, qui nūquam in locum communem aluum exonerarunt.

### *Gradus & differentia dysenteria.*

Galenus, 4. aph. 26. & 6. de loc. affect. cap. 2. gradus quosdam dysenteria, secundum quos differentia eiusdè constituntur, proponit, docetque, abradi primò & excerni adiposa quædam & pingua corpora, exiguo cruore perfusa, atque hunc primum dysenteria gradum esse. Deinde superficiem internam intestinorum tenuem, quæ membranosorum ramentorum speciem præ se ferat, cum excrementis excerni; secundumque hunc dysenteria gradum esse. Tandem etiam intestinorum substantiam, ex vtraque tunica constantem, & carunculas quasi de intestinis; atque hunc tertium dysenteria gradum esse, de quo Hippocrates, 4. aph. 26. Si dysenteria laboranti veluti caruncula deiciantur, lethale. Illam Galenus *γινώσκουσιν* Fientem dysenteriam; hanc *πυρρὴν* & *αἱματωδὴν* Factam & consummatam nominat. Quæ sententia vulgata & communis omnium fere Medicorum est: consideratione tamen & explicatione indiget; cum quædam in ea occurrant, quæ experientia magistra hodie à doctissimis Medicis non saltem pro dubiis, sed & falsis habentur: de quo postea, quæst. 3. in specie dicemus.

Hoc iā vt certū habeamus, intestina nūc magis, nūc minus

*Chymicorum de dysenteria opinio.*

*Contagium causa dysenteria.*

*Gradus & differentia dysenteria.*

*Dysenteria Fient & Facta.*



minus exulcerari, & ita quidem interdum, etiam perforantur. Imò scribit Auicennas, l. 3. *fen. 16. tr. 1. c. 2.* non solum intestina perforari interdum, sed & mirach seu ventrem è regione vlcis & foraminis ob communicatam illi putrefactionem, ita vt sterco per abdomen excernatur, & nihilominus hominem viuere posse. Additque etiam quamuis sit possibile, esse tamen de possibilibus, quæ raro accidunt. Matthæus de Gradibus tamen, 2. *part. præf. c. 12.* scribit, se vidisse Papæ quendam, cui hoc acciderit, & feces per vlcus excretae fuerint, qui tamen annos 20. postea vixerit; & non esse impossibile, vt ex vlcere intestinum etiam abdomen putredinem concipiat & perforetur, ex historia morbi supra etiam *sect. 1. c. 9.* allegata, quo hic foemina quædam extincta est, patet. Laborauerat ea iam aliquot annos hernia intestinali; quæ cum pondus grauius eleuasset, & inde in inguen intestina prolapsa essent, nec rem alicui detegere vellet, intestina prolapsa inflammata sunt, tandemque gangræna correpta: à qua pars abdominis ad inguinis regionem posita & ipsa putredinem concepit, similique malo correpta est, vt foramine ex putredine aperto ipsæ feces alui per illud cum maximo foetore excernerentur: quo malo intra paucos dies extincta est.

Præter hanc, quæ à gradibus hisce sumitur, differentia alia adhuc est, quod intestina nunc crassa, nunc tenuia, nunc vtrique afficiuntur. Interdum & ventriculus aut partes vicinæ in consensum trahuntur ac eodem morbo corripiuntur; cuius rei exemplum est in obseru. Schenckii. Plerumque; tamen crassa intestina afficiuntur. Natura enim hoc ferè obseruat, quod diligenter notandum, vt humores, quos ex corpore per venas mesaraicas in intestina effundit, non per omnes æquè expellat, sed plerumque per inferiores, & quæ in intestinis crassis inferuntur. Hinc etiam Tenesmus tam frequens dysenteriae comes est.

Sunt & aliæ dysenteriae differentiae, quod nunc est epidemia, nunc ex morborum *σποράδων* numero; nunc cum febre, nunc sine febre. Quæ epidemia est, plerumque maligna etiam est, seu malignitatem, vt & febrem coniunctam habet.

#### Signa Diagnostica.

Dysenteria in genere cognoscitur ex frequenti alui deiectione, dolore ventris ac torminibus, præsertim excernendi tempore, & paulò ante excretionem. Quæ excernuntur, sunt toto ferè genere à naturali excrementorum alui constitutione & modo aliena, biliosa ac varia, mucosa ac cruenta simul. Quæ signa diligenter enumerat Galenus, 6. *de loc. aff. cap. 2.*

Plerumque dysenteriae febris iungitur. Hippocrates tamen eam interdum sine febre vidit. Hollerius, *comment. in aph. 8. sect. 6.* Docet etiam Fernelius, *lib. 6. de part. morb. & sympt. c. 10.* non omnem dysenteriam statim & necessario febre comitari, sed eam tantum, cuius humor est acerrimus, isque è visceribus aut è venis magna corporis perturbatione profusus. Annotant etiam alii, quamuis dysenteriae febris iungatur, non semper in principio id fieri, sed vbi per aliquot dies durauit affectio, propter inquietudinem & putredinem. Quandoque tamen cum dysenteria statim febris coniungitur, vel etiam eam præcedit, vbi scilicet in febre natura hanc excretionem instituit.

Dysenteriae situs quoque, inquietudo, singultus, quandoque & lipothymia coniungitur, vt & interdum contulsiō. Plerumque; prostratus appetitus, frequentissime verò, Aëtio teste, tenesmus; nò raro intestini recti prociçdètia.

Fluxus etiam hic erit plerumque; sit continuus, Diomedes Coronarius tamen, *consil. 2.* obseruauit fluxum dysentericum periodicè redeuntem de tertio die in tertium; additque, id sæpe fieri, ac diligenter notandum esse, ne decipiamus, cum & hæc sint veræ dysenteriae.

Quamuis verò cruenta in aliis alui fluxibus etiam deiciatur: tamen in eo differunt, quod in illis sanguis solus, copia & qualitate peccans copiosè excernitur: in

dysenteria verò humorum reliquorum copia plerumque; maior eiicitur, sanguis verò minus copiosus. Et licet interdum in dysenteria etià copiosè excernatur: tamè id nò fit sine aliis humoribus & cū torminibus, quod non accidit in reliquis alui fluxibus. Et in fluxu epatico, qui etià dysenteria quadoque; sed improprie dicitur, repressa vna vel altera die euacuatio postea iterum redit. In dysenteria v. parum & per breuia intervalla excernitur, & plerumque; aliquid puris ab intestinis exulceratis redditur, & quidè cum frequenti ac sæpe redeunte conatu eiiciendi, cū vètris, torminibus ac torsionibus, sanguisq; excrementis & fecibus permixtus redditur. Deinde cum sanguine etiam mucus quidam excernitur, interdum aded copiosè, vt plus eius quam sanguinis reddatur, atque tum vulgò appellatur *die vuisse rubr.* vt supra dictum.

Cæterum abscessus etiam in intestinis aliquando oboriuntur, vt Aëtius, *tetrab. 2. serm. 1. cap. 42.* docet, ad eorum eruptionem eliquationes quasi puris consequuntur; quo viso ignari decipiuntur, dysenteriam hanc affectionem esse putantes. Et sanè, vt hac de re Aëtius porro scribit, si post eruptionem diuturna sit exulceratio & perseverans, eo modò, quo dysenteria, curatur, verum in principio neutiquam. Affectiones ergo has hoc modo distinguere docet Aëtius. In abscessu semper præcedit dolor pulsantis iuxta affectum locum innitens, neque morsus neque decursus adsunt, quales in dysenteria præcedere consueuerunt; Deinde mutatione in suppurationem incipiente, rigores inæquales consequuntur, febresque circa vespèram maximè irruentes: postea vbi perfecta mutatio humidi fuerit facta, omnes molestiae minores fiant, vehementesque dolores remittunt, deinde eruptionis tempore accidente rursus dolores intenduntur; aliquando autem perfecta ventris adest adstrictio. Post eruptionem verò humor qualem prædiximus excernitur; cum nihil tale in dysenteria oboriatur. Curationem *ibidem* ponit Aëtius. Et omninò licet aliquod vlcus aut abscessus sit in intestinis, cum alui fluxu, modo materia fluxus causa intestina non exulceret, non est dysenteria, sed diarrhœa solùm.

Quantum ad signa causatum, sumuntur ea ab excrementis, quæ aliquando sunt citrina & biliosa, aliquando albicantia, & pituitosa, interdum viridia, interdum nigricantia & atrabilaria, saniosa, cruenta, purulenta. Hisce adiungenda sunt signa abundantium in corpore humorum, sumpta ab ætate, temperamento, tempore anni, vitæ genere.

Imprimis verò considerandum & querendum. An maligna & pestilentialis sit dysenteria nec ne. Cognoscitur autem id ex præcedenti anni temporum statu. Si enim is præter solitum ad excessum aliquem deflexerit, & humores in corpore corruerit, malignam dysenteriam id indicat. Symptomata quoque sunt peiora & grauiora; sæpe accedit angina, delirium, exulceratio circa anum & excrementa valde foetent, ac varios colores habent. Plures etiam eodem tempore dysenteria corripiuntur & moriuntur.

An tenuia, an verò crassa intestina affecta sint, quod ad curationem rectè instituendam non parum facit, etiam cognoscendum. Plurimi quidem statuunt, si dolor supra vmbilicum percipiatur, tenuia intestina, si infra, crassa affici. Verum cum tenuia intestina & supra & infra vmbilicum sint, & colon etiam statim sub vmbilico ducatur, eoque illic affecto dolor quoque supra vmbilicum percipiatur, non solum ad hoc respiciendum, an dolor supra vel infra vmbilicum sit, sed totus intestinorum ductus & circuitus considerandus, & reliqua etiam signa, quæ mox dicentur, coniungenda. Plerique etiam, si tenuia intestina affecta sint, tamenta minora & tenuiora esse; si verò crassa, tamenta maiora ac crassiora cum copiosiore pinguedine excerni docent, de quo quid sentiendum, sit, antea dictum. Hoc tamen non inficior, illud quod ex intestinis crassis excernitur, differre ab eo, quod à renibus prouenit. Sunt enim intestina crassa

*Abscessus in intestinis à dysenteria differentiâ.*

*Signa causarum.*

*Dysenteria maligna ac pestilentialis signa.*

*An tenuia an crassa intestina afficiantur.*

*Signa dysenteriae.*

*Dysenteria ab aliis cruentis alui fluxibus discrimen.*

cartiosa magis, quam tenuia, & extra pinguedine copiosiorum obducuntur. Ideoque iis exulceratis valde carni simile quid excerni potest, de quo Hippocrates, 4. aph. 26. Dysenteria laborati si veluti carunculae exeant, lethale. Potest n. carni simile quid ab intestinorum crassorum substantia exulcerata valde excerni, aut, quod Cardanus, in comm. huius aphorismi existimat, tota substantia intestinorum exesa, partes mesenterii absumuntur, & quae extra intestina sunt, & caro & corpus glandulosum, cui colon insidet, & pinguedo excerni possunt.

Tenuium in-  
testinorum  
affectuum  
signa.

Vt ergo rectè cognoscatur, An intestina crassa, an tenuia affecta sint, consideranda sunt, dolor, locus doloris, tempus exitus excrementorum, & mixtio sanguinis ac purulentae materiae cum excrementis alui. Si enim tenuia affecta sint, dolor est acutissimus, ita ut aegri q. aciculis ventrem compungi sibi conquerantur. Intestina enim tenuia sunt magis membranosa, & sensu exquisitiore praedita. Aluus non statim post dolorem aut tormina ventris excernitur; cruor cum stercoribus vniuersis mistus est. Atque eò euidentior erit cruoris & ab vlcere excrementorum mixtura, quod locus affectus altior est. Etenim cum via illa ab intestinis superioribus ad anum longior sit, sanguis & purulenta materia antequam per aluum excernantur, diutius in ea commorantur, atque ita facilius & exactius stercoribus permiscuntur. Aëtius addit, biliosa & porracea ac omnino variegata eiici, stercore commixto, cum torminibus & virium exsolutione, agrotumque febris & siti infestari.

Ieiunij inte-  
stini affecti si-  
gna.

Si ieiunum intestinum exulceratum sit, quod raro accidit, dolor est maximus, excrementa crudiora apparent, sanguinem nigriorem valde immistum habentia, ob longum transitum per vniuersa intestina; bilem item abunde flauam: adest nausea & cibi fastidium, interdum & vomitus, ardor linguae & vigiliae; quandoque & febris acuta. Vires ita deficiunt, ut non procul ab interitu aegri esse videantur, & signa alia concurrunt, quae apud Aëtium, *tetrab. 3. serm. 1. cap. 43.* reperiuntur.

Crassorum in-  
testinorum  
affectuum si-  
gna.

Vbi verò intestina crassa afficiuntur, dolor magis infra umbilicum percipitur, isque non ita vehemens ac diuturnus. Intestina n. crassa tenuibus sunt magis suo modo carnosa, atque ideo sensu minus exquisito praedita, sicut id ex differentia doloris in colica & iliaca passione videre est. Nam etsi in colica dolor etiam satis vehemens est: in iliaca tamen longè acerbior est. A torminibus & cruciata ventris statim sit excretio: Cruor & purulenta materia, alui excrementis supernat, aut tantum iis extra adheret. In maiori exulceratione veluti carunculae excernuntur, ut modò dictum.

Vlceris in dy-  
senteria con-  
stitutio ut co-  
gnoscatur.

Vlceris constitutio & tempora etiam ex deiectionibus colliguntur. Primò enim biliosa, hinc sanguis, postea mucus vel etiam quasi carunculae excernuntur. Vbi putrida & malè olentia deiciuntur, vlcus corrosiuum & malignum indicatur. Hoc tamen etiam hinc non praeterendum, interdum mox in principio, & cum diarrhoea potius, quam dysenteriae nomen affectus meretur, sanguinem saepe satis copiosum, rarius purum; frequentius concretum & nigrum excerni, ob irritationem validam, sicut & interdum fit in *ὀνυχαδάρου*, nondum exulceratis intestinis, cum id statim in principio diarrhoeae accidat, sed osculis venarum mesaraicarum saltem referatis. Tum ergo & alia signa dysenteriae etiam consideranda sunt, de quorum absentia, & quo mox in principio alui fluxus cum excrementis reliquis sanguis excernitur, non dysenteriam, sed diarrhoeam saltem esse, colligi potest, curaturque talis fluxus longè facilius, quam vera dysenteria. Potest tamen in dysenteriam degenerare. De signis omnium dysenteriae differentiarum secundum vlcerum varietatem & loca affecta agit Aretaeus, de sign. morb. diut. lib. 2. cap. 9.

Signa tempo-  
rum.

Quomodo gradus dysenteriae cognosci possint, ex superioribus satis patet. De temporibus eius cognoscendis ut aliquid addamus, cognoscuntur ea ex materia, quae excernitur, cruditate & coctione. Principium

quidem facile cognoscitur, cum excrementa alui sunt fluidiora, sanguinisque aliquid admiscetur. Augmentum, quando feces iam planè à naturali suo statu recedunt, & maiora iam exulcerationis signa adsunt. Quae vbi summa sunt, status est. Declinatio tandem, quando feces alui iterum ad statum naturalem redire incipiunt, nec aeger toties aluum deponere cogitur, appetitusque redit.

Signis tandem ex Polybii lib. 6. *stratag.* addimus, Amphitretum à pyratibus, ut magnum ab ipso *λύτρον* extorquerent in Lemno detentum, à cibo abstinuisse. & rubricam aquae marinae permixtam bibisse. Itaque cum sanguinis fluxu eum laborare crederent, ne moreretur, à vinculis eum liberarunt, atque is fugà elapsus est.

Dysenteria ut  
simulari pos-  
sit.

### Prognostica.

Vt in aliis morbis de euentu praesagium sumitur ex naturae robore & morbi vehementia, eorumque inter se collatione: ita idem in dysenteriae euentu praesagiendo obsetuandum. Colligitur autem magnitudo morbi & naturae robur ex loco affecto, causis, effectis & vlceris constitutione ac aegri natura & dispositione.

Prognostica.

1. Periculosior est dysenteria, & difficilius curatur, in qua intestina superiora afficiuntur. Grauiora enim symptomata accidunt superioribus intestinis affectis, nempe fastidium cibi vehemens, nausea, vomitus, vigiliae cum dolore, & virium deiectio, sicut & vulnera intestinorum gracilium difficilius curantur, praesertim ieiuni, cuius vulnera lethalia sunt, secundum Hippocratem, 6. aph. 18. Galenum, 6. m. m. c. 4. cum propter magnitudinem multitudinemque vasorum, tum quod denique tunica eorum nervosa est, tum denique quod intestinum illud bilem sinceram excipit, ac medicamentum non diu retinet, epatque proximum est. Facilius autem curantur vulnera & vlcerata intestinorum crassorum & inferiorum. Aëtius, *tetrab. 3. serm. 1. cap. 43.*

Dysenteria  
affectus supe-  
rioribus inte-  
stinis.

2. A sincera deiectione dysenteria malum, 7. aph. 23. Sinceras autem deiectiones Galenus interpretatur nulla aquosa humiditate permixtas, solumque cum habentes purum & simplicem humorem, qui per inferiora deiecitur, siue sit flaua bilis, siue atra. Per tales n. deiectiones intestina exulcerantur.

3. Pessima sunt dysenteriae, in quibus quae excernuntur porri speciem habent, suntque nigra, plurima, varia, graecolentia. Aëtius *tetrab. 3. serm. 3. c. 43.*

4. Dysenteria si ab atra bile incipiat, exitiosa est. Hippocrates, 4. aph. 24. quod ibidem etiam, aph. 22. docet. Quia nihil differt à cancro exulcerato, qui cum in exterioribus corporis partibus raro curationem admittat, multò minus in intimo intestinorum curabitur, ut Galenus, in comm. alleg. aph. explicat: Qui etiam videatur in l. de attrabile cap. 5. Seu, ut Aëtius, loc. alleg. ista proponit. Si ab acerbis cibis aut flaua bile dysenteria oborta, ferè in totum ipsam curamus. Si verò ab atra bile initium sumat, siquidem ratione *ἁλότης* febrilium morborum bilis ista excernatur, etiam hanc sanare non desperamus. Si verò suam sponte, nullo praecedente febrili morbo neque coctione bona apparente, atra bilis excernatur, immedicabilis dysenteria ea existit, nihilque à cancro exulcerato differt. Nimirum bilis atra sincera & absque signis coctionis semper lethaliter excernitur: si autem praecedentibus signis coctionis excernatur, non pura & sincera atra bilis erit. Hercules quoque Saxo. *panth. lib. 3. c. 23.* quendam curatū vidit laborantem dysenteria primò ex flaua, postea ex atra bile cum singultu & vomitu.

Dysenteria ab  
atra bile.

5. Dysenteria è pituita salsa proueniens crudelissima est quoniam biliosus humor transiendo quidem affligit; hic autem cum sit lentus, moram trahit, & cunctatione sua amplius exulcerat. Galenus, in com. ad aph. 12. sect. 3. 48. Humores enim crassi & melancholici, qui lieni erant infarcti, transponuntur & euacuatur. Non verò proprie dicta atra bilis intelligitur, cuius ante facta est men-  
tio

Dysenteria à  
pituita salsa.

Dysenteria  
lienosis acci-  
dens.

mentio, sed humor melancholicus, à quo dysenteria salutari existere potest, nisi dysenteria illa diutius durer, ubi hydropes aut lenteria superueniente ægri moriuntur, teste Hippocrate, 6. aph. 43. Itaque in dysenteria descernendus est humor melancholicus, sanguis item in intestinis concretus, qui pici similis eiicitur, ab eo, qui verè atra bilis nominatur. Quoniam ab humoris melancholici & sanguinis talis excretionem multi euaserunt, quemadmodum eius rei exempla, siue absque ea ægri fuerint, Hollerius affert, 1. de internis morbis, scholio in c. 43. in cap. de dysenteria, & nos aliquot eius rei exempla obseruauimus.

Dysenteria post maniam & hydropem.

7. A mania dysenteria aut hydrops, aut ecstasis bonum. 7. aphor. 5. Nam dysenteria aut hydrops mania superueniens remedio est, ratione translationis materia à capite ad inferiora corporis. De proximis tamen duobus prognosticis hoc etiam notandum, dysenteria vocabulum interdum non propriè accipitur, sed diarrhœæ quoque tribui, in qua humores, qui excernuntur, ita prauis sunt, ut tormina & difficultates intestinorum, quod vox dysenteria exprimit, inferant, licet exulceratio nulla adhuc adsit. Nam si exulcerata essent ab humore atro intestina, tantum abest, ut tali alui fluxu mala melancholica prædicta sanentur, ut potius insanabile malum introduceretur. Et licet in tali dysenteria quandoque sanguis vnâ excernatur, potius ex reseratione venarum melaraicarum id accidit, quam ab intestinorum exulceratione, quæ omnino lethalis esset. Per veram enim dysenteriam ab atro humore nullus morbus feliciter solui potest.

8. In profusis alui mutationes excrementorum iuant; nisi in praua commutentur. 2. aph. 14.

9. Si dysenteria ructus vel crepitus ventris superueniat, bonum. Indicium enim est, naturam iterum in cibum iam agere & coctionem incipere.

10. Effusio puri sanguinis dysenteria adueniens mala. Venas enim maiores erolas indicat.

11. Conuulsiones & rationis perturbatio dysenteria superuenientes mortem significant.

Post abscessum eruptiones dysenteria.

12. Quæ post abscessum eruptiones sunt dysenteria, graues sunt, propterea quod vires deiectionis iam sint, per coincidentes inflammationibus febres ac dolores. Graues quoque sunt, quæ cum vehementi inflammatione oboriuntur, quæque cum febre ac amisso appetitu. Aëtius, loco allegato. Irritatur enim febris assiduo dolore ac vigiliis, & corporis agitatione per frequentem alui deiectionem, & propter humoris prauitatem febris mali moris significatur.

Caruncula in dysenteria excrescit.

13. Si dysenteria laboranti veluti caruncula deiiciuntur, lethale est, 4. aph. 26. Cum enim id magnâ exulcerationem significet, substantia intestinorum neque regni, neque cicatrix tam magna exulcerationi obduci potest. Perit ergo æger vel breui tempore, si cum acuto morbo dysenteria coniungatur, vel longiore, cum malum aut in marasmodum desinit, aut in vlcerum profunda & serpentia. Et communiter interpretes, id quod Hippocrates veluti carnes appellat, interpretatur de secunda intestinorum tunica, quæ excernatur, eamque dysenteriam insanabilem pronunciat Hippocrates: licet Brasauolus, in comm. etiam eam sanasse dicat. Cardanus tamen, in comm. id, quod simile est carni in dysenteria, à mesenterio & vicinis partibus erosis intestinis, excerni statuit.

14. In longis Dysenteria cibus fastidium malum, & cum febre peius, aph. 3. Ventriculo enim per consensum cum intestinis affecto labefactatur concoctio, ut dixerunt æger fiat. Quod si febris simul coniungatur, vel vlcerosa aliqua in intestinis putredo aderit, vel inflammatio, vel febris mali moris.

Vomitum biliosum in Dysenteria.

15. Dysentericis vomitus biliosus initio malum. Hippocrates in Coac. Magna enim vis bilis æstuantis indicatur, quæ ventrem superiorem & inferiorem turbat. Præterea symptomatica est illa excretio; siquidem initio

nihil bene planè euacuatur à natura, & semper prauum est, stomachum per sympathiam intestinorum in Dysenteria affici.

16. Periculosa est Dysenteria cum continua alui deiectione, aut si cessante deiectione cruenta nouus fluxus dilutus cruentus, instar epatici, aut alia fœda Diarrhœa subsequitur, in qua excrementa fœtida sunt valde, & cadauerosum humorem præ se ferunt. Significat enim hoc intestina valde exulcerata & corrupta esse.

17. Si Dysenteria sit symptoma febris malignæ, pestilentis & contagiosæ, periculosa ea est, & plurimi ea intereunt.

Dysenteria cum febre maligna.

18. Dysenteria, si cum febre inuaserint, aut variis alui deiectionibus, aut cum epatis inflammatione, aut hypochondrij aut ventris, aut quæ dolorosa fuerint, aut quæ cibos intercipiunt, sitimque inducunt, hæ omnes malæ sunt. Videantur, quæ sequuntur 2. Prorrh. 29.

19. Si Dysenteria febris accesserit, quæ antea non non aderat, aut si, quæ exigua, intendatur, vel putredinem circa vlcerum maiorem factam, vel inflammationem aliquam accessisse significat, quorum verumque periculosum est; & imprimis si ad cibi fastidium febris accesserit, res desperata est.

Febris Dysenteria accidet.

20. Si quis ex morbo aliquo acuto releuatus Dysenteria corripitur, ut plurimum breui moritur. Vires enim primo morbo absumptæ morbo tam graui sustinendo non sufficiunt.

Dysenteria post morbum acutum.

21. Dysenteria superuenit Lenteria. 7. aph. 76. Læsis enim transitu humorum vitiosorum intestinis, ventriculi etiam intemperies naturalis per consensum debilitatur, unde chylus crudus deiicitur ipsorumque temperi à Dysenteria læsâ chylum in ventriculo elaboratum amplius, ut par est, ea retinere & elaborare non possunt.

Lenteria dysenteria superueniens.

22. Singultus Dysenteria superueniens plerumque lethalis est. In principio tamen morbi minus periculosus est, quam si in morbi progressu accidat.

Singultus in dysenteria.

23. Circumfertur etiam passim hoc prognosticum. Si in dysenteria pustula nigra post aurem appareat sinistram, similis orobo, cum sit magna, mortem in vigesimo futuram significat. Cuius tamen quæ sit ratio, non ita planum est. Nisi fortasse sit à malignitate, ob quam interdum parotides & tumores post aures erumpere solent. Et omnino, quod plura signa praua, quæ in morbis aliis acutis mortem præagiunt, adsunt, eò dysenteria periculosior est.

Pustula nigra post aurem in Dysenteria.

24. Dysenteria, quæ in ardentibus febribus à critico naturæ motu fit, intempestiuus suppressa inflammationes aut abscessus gignit in lateribus, visceribus & articulis, via inferiore præclusa, & materia ad interiores partes regurgitante; quandoque etiam in hydropem & alios grauissimos affectus degenerat. Imò in quacunque dysenteria, si intempestiuè supprimatur, talia vel similia mala metuenda sunt cum materia tam praua nunquam in corpore sine detrimento detineri possit. Hippoc. in Coac. aph. 462. 465. de rat. in acut. sect. 4. sec. cod. Foësi pag. 73. Galen. de ven. sect. aduer. Erasist. 6.

Dysenteria intempestiuè suppressa incommoda.

25. Mulieres, quam viri, senes & pueri, quam iuuenes, & in ætatis vigore consistente, difficilius curantur in dysenteria. Aëtius, loco allegato. Mulieribus & pueris hoc accidit, quia ob imolliciem vires citò deficiunt, minusque præceptis medicis obtemperant. Præterea ipsorum intestina humidiora sunt, & propterea putredini aptiora; siue, ut loquitur Aëtius, ad vlcerum serpentia longe proniora. In senibus verò magnitudo causæ significatur, ob quam in corpore minus dispositio tam biliosa & acria excrementa generantur & cumulantur, cui accedit virium & caloris natui imbecillitas, quæ causæ morbificæ minus resistere potest. Dysenteria Infantium, quæ cum vomitu & verinibus est, plerumque lethalis est, præcipuè si coniungatur febris acuta. Maximam enim humorum corruptionem & putredinem, atque intestina superiora affici significat.

Mulieres pueri & senes curantur in dysenteria grauius decumbant.

*Grauida dysenteria laborantes.*

26. Mulieri utrum gerenti si aluus plurimum profuatur, periculum ne abortiat; quoniam non solum prauis humores euacuantur, sed simul chylus succi ad alendum utiles cum iis abripiunt & excernuntur; atque ita foetus nutrimento suo defraudatur, unde in utero emoritur, vel etiam viuus erumpit. Et praeterea irritatio expultricis facultatis intestinorum in consensum trahit expultricem uteri.

*Mulieres grauida post partum Dysenteria liberantur.*

27. Mulieres grauidae dysenteria laborantes post partum plerumque Dysenteriam liberantur. Ita Epicharmi uxori ante partum dysenteria, dolor & alui deiectiones subcruentae, mucosae fuerunt; ubi peperisset, statim sanata fuit. Hippocrat. l. c. & 5. Epid. t. 33. & 7. Epid. 49. Eius rei exempla etiam duo obseruauimus in duabus foeminis nobilibus, quarum una anno 1624. mense Augusto, iam partui vicina dysenteriam correpta fuit, quae cum peperisset, statim a Dysenteria liberata fuit. Verum quod mirum, infans quem edidit, sequenti anno, eodem mense & septimana, quo ante annum mater, dysenteriam correpta & mortuus fuit; cum tamen nemo in ea familia dysenteriam tum aegrotasset. Altera vero anno 1625. mense Augusto, dysenteriam correpta, cum a pariendi tempore adhuc abesset longius, abortiit & foetum mortuum edidit, sed ipsa a Dysenteria liberata est. Si vero post foetus & secundinae exclusionem tormina eodem die aut non multo post non remiserint, puerperae periculum denunciat, Hippoc. 2. praedict.

28. Mors nunc citius, septimana prima vel secunda, nunc tardius, tertia septimana superuenire solet, si Dysenteria sit lethalis. Quod si in vlcus sordidum desinat, tunc cessante dysenteria aegri diu postea purulenta deiectione laborantes consumuntur & tandem extinguuntur.

#### Indicationes.

*Indicationes.*

Cum in dysenteria sit intestinorum exulceratio, seu soluta vnitas, solutam continuitatem vniendam, & id, quod abrasum seu erosum & amissum est, quantum fieri potest reponendum & instaurandum esse indicatur. Verum cum id feliciter expediri non possit, nisi prius causa tollatur, humor erodens & abradens euacuandus & abstergendus, simulque eius acrimonia & prauitas mitiganda ac corrigenda est; sanguis & alij humores ad intestina confluentes reuellendi & deriuandi sunt; fluxusque adstringentibus sistendus. Dolor, si vehemens sit, leniendus & tollendus. Et quidem in principio, & dum vires adhuc constant, maxime legitima dysenteriam curandi ratio est, causae primum rationem habere, postea vlceri & dolori prouidere. Nam si causa in principio Dysenteriae negligatur, & fluxum sistenda adhibeantur, vlcera & dolor magis exasperantur, & malum incurabile redditur. Et si dysenteria a maligno contagioso humore proueniat, aut cum febre maligna coniuncta sit, malignitatis maxima habenda ratio est, & alexipharmacis ei resistendum. Ideoque ut haec in pauca contrahamus, & curandi scopos in dysenteria breuiter complectamur, cum id, quod primum est in indicatione, sit vltimum in executione, & contra; acres & vitiosi humores euacuandi sunt eorumque acrimonia temperanda est, & si maligni simul sint malignitas & alexipharmacis expugnanda; ab intestinis auocandi, fluxusque sistendus, dolores mitigandi, vlcus mundandum & consolidandum; de quibus iam ordine dicemus.

#### CURATIO.

##### Vena sectio.

*Vena sectio.*

Primo autem loco dispiendum, an venae sectio in Dysenteria opus sit. Estque aliqua inter Medicos hac de re controversia. Sunt enim nonnulli, qui venae sectionem nec necessariam esse, nec locum habere existimant; cum in Dysenteria bilis potius, quae purgationem, non venae sectionem requirit, quam sanguis peccet; & ad vlceris

curationem nihil facere venae sectio, sed vires potius assidua deiectione & vigiliis ac febribus saepe debilitatas deicere videatur. Et Galen. l. ad Glauco. c. 14. & 1. de rat. viilus in acutis. 16. Aluo fluente sanguinem detrahere prohibeat.

Verum Aëtius, Al. Trallianus & alij plurimi Medici venae sectionem probant: neque sine ratione; cum & indicationes sanguinis euacuationis, & permittens in dysenteriam adesse possint. Sanguinis nimirum copia, motu aut qualitate, vel etiam hisce modis omnibus vel pluribus peccans viresque adhuc satis fortes. Si igitur magna sanguinis adsit copia, aut humori peccanti sanguis admixtus sit, aut vehemens eius ad intestina sit impetus, aut magna adsit, vel metuenda sit inflammatio intestinorum, aut Dysenteria ex Phlegmonode intestinorum dispositione ortum habeat, dolorque sit vehemens, aut febris continua sit coniuncta, aut epar male affectum vel valde calidum materiam fluxioni suppeditet, aut consueta aliqua euacuatio sit suppressa: omnino venae sectione opus est; modo vires eam permittant. Potest enim omnibus hisce requisitis & scopis satisfacere venae sectio, sanguinisque copiam, si quae adest, imminuere; inflammationem, si adsit, tollere vel imminuere, si imminuat, praecavere; epatis calorem temperare, febrim mitigare; dolores demulcere: seu ut Aëtius ait etiam paucus sanguis per vices emissus, inflammationes mitigat, eius impetum ad intestina reuellit, eiusdemque ac epatis calorem superantem sensim refrigerat, somnum affert, qui optimum dysentericis remedium est. Testaturque experientia, venae sectionem saepe profuisse in dysenteria, annotauitque aliquot venae sectionis in dysenteria feliciter administratae exempla Antonius Donatus ab Alto mari, de medend. corp. hum. mal. cap. 24. & Iulius Caesar Claudinus, Respons. 6. scribit, se iurato affirmare posse, se in Dysenteria sui temporis Epidemia complures hoc praesidij genere seruasse, & citius sanitati restituisse.

Et quamuis Galenus aluo fluente venae sectionem prohibeat, & aeger duas euacuationes simul sustinere posse non videatur: tamen id tantum de eo fluxu intelligendum est, ad cuius amolitionem nihil conferre potest venae sectio, & qui vires iam valde deiecit. Cum ergo multis de causis necessaria sit venae sectio, ubi ea opus, non omittenda: maturè tamen, ut mox dicetur, dum vires adhuc constant, instituenda. Euacuandus autem sanguis neque copiose, neque confertim, sed paulatim & potius per vices. Ita enim commodior sit reuulsio, nec vires ita deiciuntur. Atque aperienda est in cubito vena Mediana, vel Epatica; & quidem Augusto foramine, ut paulatim sanguis emittatur. Si tamen suppressa sit aliqua sanguinis euacuatio, ut haemorrhoides, potius vena in talo aperiatur; nisi forsitan copiosa in vniuerso corpore sanguinis redundantia Basilicam aperire iusserit. Et quidem mox initio & intra primos dies vena aperienda est, dum vires adhuc constant, ut prohibeatur sanguinis ad partem affectam affluxus, intestinorumque inflammatio, atque acrium humorum generatio. Si quid prohibeat venae sectionem, cucurbitulae cum scarificatione scapulae affigendae.

##### Purgatio.

Dysentericum fluxum non statim supprimendum esse, iam antea dictum. Ut enim Galenus, de venae sectione aduersus Erasistratum cap. 6. docet, ex Dysenteria, ut & aliis fluxibus intempestiue suppressis, Melancholia, insania, pleuritis, dolor renum, sanguinis vomitus, epilepsia, hydrops oriri possunt. Et Hollerius, comm. 1. ad aphor. 30. lib. 6. sect. 2. Coac. refert, ex dysenteria, materiam ad manum conuersam, fordam densamque scabiem lepraesimilem excitatam fuisse. Et Herculus Saxon. praesect. part. 2. cap. 20. §. 8. narrat, se duos curasse, qui in ophthalmia & articularum dolorem inciderant ex importuno remedij adstrictorij vsu in Dysenteria ex pituita falsa. Et Foësius, in comm. Coac. pag. 180. refert, se vidisse quendam



quendam ex suppressa dysenteria infanum factum; & mulieri in reliqua vita ita aluum fuisse adstrictam, ut nō nisi septimo quoque die egeret.

Ut ergo Humor qui intestinis adhæret, eaque erodit & exulcerat, abstergatur, & qui aliunde nonnunquam affluit, euacuetur, Purgatione opus est, de qua tamen cum Medici dissentiant, de eā questione 4. dicitur.

Quibus autem Medicamentis purgatio instituenda sit porro disquirendum. Neque enim eadem planè omnium hac de re videtur esse sententia. Alij quidem, quando humorum vitiosorum adest magna copia & ad intestina confluit, statim, & quidem copiosiore ac subita euacuatione humorem vitiosum expurgandum existimant, cum ut modò diximus, in ea, quæ lentè ac paulatim sit, expurgatione, longiore ac lentior humorum vitiosorum per intestina transitu, ac diuturniore in iis mora maior intestinorū exulceratio facile fieri possit. Plerique verò medicamentis lenioribus vtuntur. Inter leniora tamen laxantia non conueniunt, quia aluum iam antè laxam & lubricam offendunt, & laxiorem efficiunt; unde Cassia à plerisque improbat: sed potius mitioribus electiue purgantibus, & quæ simul adstringendi aliquam vim habent, qualia sunt Syrup. Rosar. solutius, Rhabarbarum, Myrobalani & similia, purgationem absolvendam statuunt: fortiora verò prohibent. Verum utraque sententia, si rectè explicetur & distinctio adhibeatur, admitti potest. Etenim hoc omnino verum est, fortiora medicamenta purgantia, qualia sunt Colocynthis, Scammonium & similia, hic locum non habere; cum non solū humores copiosius ad intestina moueāt, ipsosque ferociore reddant, verum etiam ea de causa hic admitti non possint, quod, ut supra de causis dictū, ipsi humores dysenteriam excitantes qualitatem quandam & dispositionem hisce medicamentis cognatam habent, quæ talibus medicamentis non augenda, sed potius infringenda est. Itaque solum mitioribus illis & lenioribus purgantibus vtendum. Imò si humorum prauorum pauca omnino est quantitas, satis interdum esse potest, eorum acrimoniam obrundere, & medicamenta purgantia omittere, ac naturæ opus relinquere.

Interim tamen iisdem medicamentis mitioribus nūc copiosior nunc parciore purgatio institui potest, prout opus. Nam si humor vitiosus multus est in toto corpore, & ad intestina quasi turgens affluit ac dysenteriam excitare incipit, non incommodum videtur, mox in principio vna copiosiore euacuatione maiorem humoris peccantis partē euacuare. Postea verò statim ea, quæ simul purgandi & adstringendi vim habent, sed in minore quantitate exhibere conuenit. Si verò alia causa Dysenterix sit, neque ea à Critico quasi fluxū originē habeat, parciore purgatio instituenda, atque ea, quæ leniter purgant, simulque roborāt, statim vsurpanda. Neque etiam copiosius purgandum, cum humores prauī, attraharij & maligna aliqua qualitate præditi sunt. Hic enim prius temperandi, & cum aliis succis miscendi sunt, ut mitescant, & postea medicamento leniore expurgandi.

Inter Purgantia autē, quæ in Dysenteria locū habent, est primò Syrup. rosarū ex infusione rosarum pallidarū paratus, cum simplicis tū multiplicis infusionis. De vsu rosarum enim in Dysenteria hoc monendum, in principio rosas pallidas seu Prouinciales dictas vsurpandas, quatum succus aluum mouendi vim habet, non rubras, quæ magis adstringūt, & postea in progressu morbi, vbi adstrictione opus est, vsurpari possunt. Et quidem simplex, & ex vnica infusione paratus Syrupus mitissimus est, & ferè saltem abstergit; fortior verò est ex multiplici. Datur autem vel solus vel cum palpa tamar. aut diapruno simpl. in decocto hordei, vel sero lactis, aut decocto, vel aqua destillatā conuenienti.

Myrobalani deinde in omnibus humoribus vsurpari possunt, quæ non solum humores peccantes euacuant, sed etiam adstrictionem relinquunt, ac intestina roborant, è quibus decoctum in Dysenteria vtilissimum

paratur, de quo infra de potionibus.

Tamarindi Foresto in Dysenteria suspecti sunt: Heurnius tamen, l. 2. meth. ad prax. c. 11. eisdem laudat. Et cum insignem humores acres & calidos temperandi vim habeant, non sunt reiciendi.

Vtilissimum verò est Rhabarbarum, eoque in Dysenteria ferè nihil præstantius est. Ludouicus Septalius e quidem, in animad. Med. lib. 7. num. 92. planè rhabarbari vsu improbat, quod igneas partes habeat, & quod in substantia sumptum tunicis intestinorum & vlceribus adhærescens dolores pariat implacabiles, id quod sæpe obseruat. Verum enim verò nullus vnquam Medicorum rhabarbarum idè suspectum habuit, quod intestinorū tunicis adhærescat: & partes illæ igneæ, quas metuit, sunt in succulenta eius parte, quæ facile à substantia separatur, si inde aliquid incommodi metuetur. Atque existimo, dolores illos implacabiles, quos animaduertit Septalius, potius à bilis acrimonia, quam à rhabarbaro excitatos fuisse: neque in hoc ipsi attentior, quod scribit rhabarbarum mediocriter torrefactum vehementius & minore dosi purgare, quàm integrum; cū certum sit, vim purgantem in subtili & volatili parte subsistere, quæ etiam tritura aliqua ex parte dissipatur. Verum cum ille experientiam testem citet, cuiuslibet eam consulere facile est.

De rhabarbaro verò, ut & myrobalanis, hic notandū, nonnunquam in substantia dari, nonnunquam infundi, & macerari vel decoqui, vel etiam ex eo parari extractū. Cum verò Rhabarbarum duplicem habeat substantiā, vnam tenuem & subtilem, in qua vis est purgandi; alteram crassiorem, in qua vis est adstringendi: in infusione & decocto, ut & extracto, vis purgandi præualeat, adstringitio verò pauca est: in substantia verò maior est vis adstringendi. Ideoque infusum vel decoctum vel extractum exhibetur, cum ferè solum purgare animus est, quod in principio statim fieri debet. Vbi verò simul adstringere volumus, in substantia exhibendum.

Nonnulli ut vim purgandi minuant & adstringentē augeāt, rhabarbarum torrere iubent. Inter quos Matth. qui, in Apologet. aduers. Amatum Lusitanum, disputat, & fusè cum experientia, & Mesues autoritate, tum etiam rationibus adductis comprobatur, rhabarbarum tostum non solum non nocere dysentericis, sed potius iis plurimum prodesse, additque se scire sexcentos homines rhabarbari tosti potu fuisse seruatos. Sic etiam Forest. lib. 22. ob. 9. rhabarbarum parū torret, ut parte subtili & acri dissoluta acrimoniam exuat. Verum tostio cautè institueda, & cum purgare volumus, ea non nisi leuis esse debet. Ideoque cum facile fieri possit, ut tostum omnem vim purgandi, quæ in tenuibus ac volatilibus partibus consistit, amittat rhabarbarum, vel tostione aliquam acrimoniam acquirat, vtilissimum est, imprimis in principio, cum materiam euacuare animus est, rhabarbarum sine tostione exhibere. Et si omnino maior aliqua adstringitio requiritur, possunt myrobalani, quæ satis adstringunt, in maiore quantitate admisceri, vel rhabarbarum in aqua plantaginis, tormentillæ vel alio conueniente liquore exhiberi; vel in hisce aquis & liquoribus rhabarbarum macerari & infundi, atque infusione abiecta substantia cum syrupo vel conserua rosarum exhiberi. Ita enim vis purgandi maxima ex parte separatur & remanet adstrictoria. Vel, quod valde commodū est, rhabarbarum aqua rosar. humectatur & conspergitur, iterūq; lento calore exsiccat, idq; aliquoties reperitur.

Locum in Dysenteria etiam habet Mechoacanna, quæ ob saporem, quem ferè nullum obtinet, infantibus, ac delicatioribus, qui rhabarbarum abhorrent, ut & aliis, exhiberi potest, purgatque sine noxa, & serofos humores leniter educit, atque adstrictionem etiam quandam post se relinquit, & aluum siccatur, quod Ioan. Crato, cōsil. 57. monet; Mechoacanna vsu, inquit, non improbo; minus tamen frequentem esse volo, cum certum sit, ex vsu frequentiore aluum plurimum siccari. Pueris datur scrup. j. adultis

Rhabarbarum quomodo in dysenteria exhibendum.

Rhabarbarum an torrendum.

Mechoacanna.

Aspurgantia exhibenda sunt in dysenteria.

Qualia purgantia in dysenteria vsurpanda.

Vsu purgantium in dysenteria.

adultioribus Dr.j. vel dr.jß. in hoc morbo cum iufculo carnis commodiffimè.

*Agaricum.*

Dioscorides etiam Agaricum ad Dr. j. dysentericis exhibet. Cautè tamen exhibendus, præcipuè in substantia. Cum enim Auicenn. lib. 3. fen. 16. tr. 4. c. 1. agaricum in colico dolore idè improbet, quod intestinis firmiter adhæreat, eaque vellicet; eandem ob causam etiam in Dysenteria adeo commodus esse non videtur. Et quidè myrobal. chebul. emblic. mechoacan. agaric. magis locū habent, cum materia Dysenteria causa est pituita vel humor ferofus: si verò pituita falsa est, ex adustione & putredine ortum habens, quod sit in febribus diuturnis & acutis nonnuquam, aut humor melancholicus vel adustus admistus est, myrobal. Indæ, Polypod. epithym. fol. fenæ, etiam locum habent.

E compositis vsurpari possunt, El. lenitiu. diacath. tryphera Persica, diaphœnicum; quod licet scammoniū & turbitu recipit, eorum tamen vires ita à palmulis & cæteris ingredientibus infringuntur, vt illius operationes & vires secur non accendant, nec aliunde attrahât, quâ sibi propinquissimis particulis, vt Amatus Lusitan. cent. 2. cur. 44. in schol. censet. Ex his variæ formulæ in rem præsentem fieri possunt.

#### Potiones.

*Potiones purgantes in dysenteria.*

℞. Aq. Hord. simpl. Vnc. iv. syrup. rosar. solut. Vnc. j. vel Vnc. ij.

M. Addi etiam potest pulp. tamarind. Vnc. ß. præcipuè si magnus humorum feruor adfit.

Vel ℞. Tamarind. Vnc. ß. cortic. myrobal. citrin. Dr. ij. Coq. in aq. hord. & plantag. In col. infundantur rhabarb. Dr. j. ß. spic. gr. vij. Colat. ℞. Vnc. iv. adde syrup. rosar. solut. Vnc. j. M.

*Decoctum Myrobalanorum.*

Commendatur etiam valde à Pantaleone, in pilular. Decoctum myrobalanorum, quod ipsi appellatur Hippocras de myrobalanis, & pro secreto habetur, quo & ipse & alij Medici hæcenus feliciter vsi sunt. Paratur autem hoc modo:

℞. Cortic. myrobal. chebulor. Dr. x. citrinor. Drach. v. passul. minor. Vnc. ij. Coq. omnia in aq. Vnc. xxvj. ad consumpt. 3. part. Postea colentur cum aliquali expressione. Colat. add. sacchar. Drach. x. Clarificetur aromatizando Cinamom. Drach. vj. Si phlegma admistum sit.

℞. myrobal. chebulor. emblic. an. Drach. j. ß. mechoacan. rhabarb. an. Drach. j. Coq. in aq. plantag. & hord. Colat. ℞. Vnc. iv. mell. ros. Vnc. j. M.

Vel ℞. Rhabarb. Drach. j. fol. fen. el. Drach. ij. spic. gr. vj. Infundantur in s. q. aq. plantag. Colat. addatur syrup. rosar. soluti. Vnc. j. ß. M.

Si humor Melancholicus vel adustus admistus sit,

℞. Polyp. q. myrobal. Indor. fol. fen. an. Drach. ij. epithym. Drach. j. sem. anif. Drach. ß. fl. cordial. an. P. j. Coqu. in sero lactis. In col. Vnc. iij. ß. dissolu. el. diacathol. Vnc. ß. Iterum coletur. F. Haustus.

#### Boli.

*Boli purgantes.*

℞. Pulp. tamarind. Vnc. ß. rhabarb. scrup. ij. conseru. rosar. recent. Drach. ij. Cum sacchar. F. Bolus.

Vel ℞. rhabarb. Drach. j. vel scrup. iij. sp. diarrhod. abbat. vel diatrionsantal. scrup. ß. conseru. rosar. Vnc. ß. Cū saccharo F. Bolus.

Vel ℞. Agaric. trochiscat. mechoac. an. Drach. j. conseru. rosar. Vnc. ß. Cum sacch. F. Bolus, si pituita, præcipuè falsa, admissa sit.

#### Pulueres.

*Pulueres purgantes.*

℞. Rhabarb. Dr. ß. ad scrup. iij. vel v. pro ratione ætatis. F. Pulvis, qui vel cum vino rubro, vel aqua plantaginis, vel iufculo aliquo exhibeatur.

Vel ℞. Rhabarb. Drach. j. cort. myrobal. citrin. Scrup. j. vel Drach. ß. F. Pulvis, qui similiter exhibeatur.

Vel ℞. Rhabarb. Drach. j. vel Syrup. iv. myrobal. citr.

spec. diamarg. frigid. an. Scrup. ß. F. Pulvis.

#### Panis Martius.

Pro infantibus & delicatioribus paratur ex mechoacanna panis martius laxatius talis.

*Panis martius purgans.*

℞. Amygdal. dulc. excort. Vnc. j. ß. sem. melon. excort. Drach. iij. pulv. mechoacan. Vnc. j. sacch. albissim. Vnc. ij. C. C. preparat. mucilag. tragacanth. cum aq. rosar. facta an. Drach. j.

Cum suff. quant. aq. rosar. F. sa. Panis martius, de quo infantibus Drach. ij. iij. vel iv. adultioribus Drach. ij. iij. vel iv. adultioribus Drach. vj. vel etiam plus datur.

#### Syrupus.

Si humores misti sint, talis syrupus parari potest.

*Syrupi purgantes.*

℞. Rad. oxylapath. cichor. cort. frangul. polypod. q. an. Vnc. ß. fol. plantag. veronic. agrimon. an. M. ß. myrobal. citr. Indor. an. Vnc. j. Coqu. in aq. In colatura infund. rhabarb. opt. mechoacan. albif. an. Vnc. j. fol. fen. el. Drach. vj. flor. cordial. prunor. syluest. an. M. ß. cinamom. Drach. iij. spic. Scrup. j.

Manè ebulliant & colentur.

Colat. adde sacch. q. l.

F. secundum artem syrupus.

Cui sub finem adde syrup. vel succi rosar. solut. Vnc. j. ß. De quo infantibus à Drach. ij. ad Vnc. ß. adultioribus Vnc. j. ß. vel Vnc. ij. exhibentur.

Efficax est syrup. Abstersiuus, qui sub nomine D. Caspari Packschij, quondam Physici Vratislaviensis, in eius Reip. officinis præstat, ad imitatione decocti è myrobalanis Pantaleonis antea propositi paratus. Cuius descriptionem mihi communicauit vir Clariss. Dn. D. Michaël Doringius, eius Reip. Physicus, Affinis meus honorandus.

*Syrupus abstersiuus de myrobalanis.*

℞. Cortic. myrobalan. chebul. Vnc. ij. citrinor. Vnc. j. ß. passul. minor. contrusar. Vnc. iv.

Fiat horum omnium s. a. decoctio in s. q. aq. pur. ad dimidias. Colaturæ. ℞. lb. iij. ß. sacch. alb. lb. ij. ß.

Coqu. lento igne ad spissitudinem syrupi, qui clarificetur albumine oui, & aromatizetur cum puluer. cinamomi elect. Vnc. j. ß.

Si verò æger omnino purgantibus vti nolit, antequam adstringentia exhibeantur, iufcula carni bubul. aut gallin. per dies iij. vel iv. quotidie bis vel ter exhibenda, quæ intestina abluunt, mundificant, dolorem mitigant, præsertim si vitellum oui vnus vel alterius addatur.

Purgantia autem, vt etiam Galenus, j. meth. med. c. 11. docet, per os assumpta maximè quidem conueniunt intestinis tenuibus affectis: vtilia tamen etiam sunt, si crassa afficiantur; cum etiam ad ea pertingant, eaque transeant, & malum ab intestinis crassioribus sæpe superioribus communicetur. Si verò tantum intestina crassa affecta sint, clysteres omnino necessarij sunt, & purgantibus præmittendi, atque iis etiam subiiciendi. Clysteres verò in maiore copia iniici debent, cum dextensione & purgatione opus est: cum verò & consolidare volumus, minore quantitate adhibendi.

#### Clysteres.

Vt ℞. Decocti hord. lb. j. vel lb. j. ß. sacch. rubr. Vnc. iij. syr. rosar. solut. Vnc. j. F. Clyster.

Vel ℞. Aq. hord. lb. j. vitell. onor. num ij. sacchar. Them. Vnc. ij.

F. Clyster intestina à bile & mordaci muco lauans, ita præstans, vt interdum curandæ dysenteria sufficiat, vt Amatus Lusitanus, cent. 2. curat. 44. scribit.

Vel ℞. Decocti gallin. lb. j. mell. rosar. Vnc. ij. vitell. onor. num. ij. F. Clyster.

Vel ℞. Decocti gallin. lb. j. Vnc. ij. vitell. onor. num. ij. F. Clyst. Vel

Vel *℥. Hord. mund. M. j. rosar. pallid. fursur. an. M. β. Coq. in lacte recenti. Colaturæ ℥. lb. j. vitell. ouorum. num. ij. F. Clyster.*

Vel *℥. Flor. verbasf. rosar. rubr. an. M. β. Coq. in aq. bord. Colaturæ ℥. lb. j. Add. mell. rosar. Vnc. j. β. vitell. ouor. num. ij. F. Clyster.*

Vel *℥. Herb. violar. malu. mercurial. an. M. β. rosar. rubr. M. j. Coq. in aq. bord. Colaturæ ℥. lb. j. Add. elect. diacathol. Vnc. j. ol. rosar. Vnc. ij. mell. rosar. colat. Vnc. j. F. Clyster.*

Vel *℥. Flor. verbasf. rosar. rub. an. M. β. fursur. macri. M. j. Coq. in aq. bord. Colaturæ ℥. lb. j. Add. mell. rosar. colat. sacch. rubr. an. Vnc. j. vitell. ouor. num. ij. F. Clyster.*

Habetur & alius in *Institutionibus*, pag. 1475.

De Clysteribus verò abstergentibus idem Septalius, *ibidem num. 97.* scribit: medicos, qui in principio dysenteriae sæpe numerò mucositatibus quibusdam apparentibus ad abstergentia confugiunt, ne adhærescente diutius tunicis intestinorum eiusmodi humore falso, vt putant, exulcerentur intestina, in maximo errore versari. Mucositatem enim eiusmodi non aduentitiam esse, neque præternaturalem, sed naturalem, quæ à natura intestinis indita sit, vt muniantur à bile, quæ cum fecibus indies euacuatur, ne intestinorum interna pars abradatur. Quæ cum in diarrhœa ab acris humoribus commota & abrafa exire incipiat, si clysmatibus magis abstergatur, denudatam tunicam eo, quo munitur, facilius exulcerari posse putat. Ideoque diligenter curam adhibendam esse monet, vt mucosi & vitiosi humores à capite aut ventriculo defluentes ad intestina à naturali mucositate discernantur: quod licet difficile sit, eo tamen hanc mucositatem naturalem à præternaturali discerni putat, quod hæc frequentius cum pinguedine cōiuncta esse soleat, & cum rasura aliqua interioris tunicæ: atque tunc non solum esse abstergendum, sed potius inctassandum pinguibus & viscidioribus iniectis.

Verum enim verò quod admitionem pinguedinis & rasuram internæ tunicæ attinet, quid de eo sentiendum sit iam supra dictum. Cum n. nulla intus sit in intestinis pinguedo, falsum hoc est signum, quo mucositatem naturalem à pituita præternaturali discernere iubet. Et raro mucus ille naturalis copiosius excernitur, nec ita crassus est, vt pituita vel pus, quod in dysenteria delicitur, vt supra dictum. Et abstergentes clysteres, qui initio iniiciuntur, raro tam acres sunt, vt intestina abradere, & naturalem illam mucositatem ab iis abstergere possint, sed abluendo potius intestina ac detergendo bilem præcauent, ne ab ea intestina abradantur.

Non inutile tamen fuerit, post abstergentes clysteres eos, qui ex emplasticis medicamentis componuntur, quique internam intestinorum superficiem contra affluens humoris morsum & acrimoniam oblinunt, vsurpare: Quo modo omnia ea, quæ metuit Septalius, pericula præcauentur.

Vt *℥. Decoct. bord. lb. j. album ouor. conquass. num. ij. gum. Arabic. Drach. ij. tragacanth. Drach. iij. adip. caprin. Vnc. β. ol. rosar. Vnc. ij. boli Armen. Drach. j. F. Clyster.*

Et ne talibus clysteribus materia mordax affluens in intestinis detineatur, clysteres abstergentes atque hos per vices iniicere vtile est.

Purgantia autem ista, & clysteres statim initid vsurpari debent antequam à causâ morbifica intestina grauius lædantur & maior exulceratio excitetur. Neque solum semel purgandum, sed aliquoties hoc faciendum, donec humor vitiosus maxima ex parte sublatus sit. Et si tutum non videtur, vt æger continuis diebus purgetur, alternis id fieri potest, & interim clysteres iniici possunt, quos vel vno die reperere licet. Si enim prius desistatur, antequam materia euacuata sit, ac fluxus intempestiuè sistatur, & supra enumerata mala sequuntur, & materia detenta deterior redditur, ac maiore cum impetu & periculo fluxus reddit. Et quamuis satis ante excernere videatur æger: tamen hoc non sufficit, hæret

enim subinde aliquid de materia in intestinis; imò quicquid æger vel cibi vel potus etiam boni assumpsit, corrumpitur, & in vitiosam materiam conuertitur, vnde nulla excrementi naturalia redduntur.

#### Vomitoria.

Vomitória quod attinet, habent illa quidem locum, quando à pharmaco maligno vel veneno dysenteria ortū habet, & cum materiæ venenatæ portio aliqua adhuc in ventriculo hæret. Verum si ab aliis causis dysenteria proueniat, cautè hic agendum. Materiam equidem ab intestinis auertit vomitus, eamque, quæ sæpe pertinaciter in vasis mesaraicis & splene hæret, ac sensim ad intestina affluit, confertim educit, ipsumque fluxum sistit, secundum Hippocratem, 6. Aph. 15. *Ad longo alui profusio habito spontaneus vomitus superveniens malum soluit.* Verum cum dysenteria alia, quam diarrhœa sit ratio, & periculosius laborent, quibus superiora intestina afficiuntur, & ventriculus in consensum trahitur: non facile suaserim, vt vomitoria propinentur, ne materia versus intestina superiora & ventriculum trahatur, isque lædatur, & naturæ motus interuertatur, quæ per loca magis conuenientia vitiosorum humorum euacuationem instituere solet.

#### Diuretica.

Postquam maxima materiæ pars per aluum euacuata fuerit, etiam ea, quæ reliquias ad vias vrinæ ducunt & derinant; conueniunt, diuretica scilicet, parata ex decocto vel emulsione 4. frig. maior. ex sero lact. rad. fœnic. & petrosel. in iusculo carnis coctis, additis iis, quæ robur ventriculi tuentur. Nullo verò modo in principio & antequam corpus purgatum sit, diuretica exhibenda, ne materia, dum ad renes tendens epar transit, ei aliquid damnum afferat. Monet quoque Celsus, iis tantum diuretica in hoc casu conuenire, quibus alioquin facile prodesse solent. Si verò effectum suum non facile consequantur, malum potius augetur.

#### Sudorifera.

Sudorifera quoque non inutilia sunt in iis, qui aliàs ad sudandum faciles sunt, & præsertim si adsit malignitas. Quâ de causâ æger, quantum potest, in lecto se contineat, & ab æris externi iniuriis sese defendat, vt acres vapores, qui in venis extremis continentur, libere expire possint, & ad intima corporis non repellantur, & natura potius adsuescat per aluum materiâ euacuare. Ideoque, vt Sauonarola hac de re scribit, cum intus administratur frigida stiptica, extra adhibenda, quæ poros dilatant ac sudare faciunt. Et compertum est, sudore copiosiore materia euacuata, & malignitate per sudorifera & bezoartica expugnata dysenteriam cessasse. Ita refert Guilielmus Fabricius, de dysenteria cap. 10. Principissam quandam, cum post esum fungorum dysenteria aliisque symptomatibus tam grauitè laboraret, vt in agone versari videretur, sumptis lapidis bezoar gr. 40. in sudorem calidum vniuersalem incidisse, & mox secutum somnum esse, ipsamque intra paucos dies sanitati fuisse restitutam.

#### Alexipharmaca & acrimoniam humoris mitigantia.

Ideoq; mox in principio, & dum reliqua fiunt, attendendum diligenter, quænam sit humoris dysenteria excitantis natura. Si enim is malignus sit, qualis in epidemia dysenteria esse solet, frustra laboratur in dysenteria curanda reliquis medicamentis, nisi simul, & quidem statim in principio alexipharmaca, malignitatem humoris expugnantia, simul exhibeantur. Imò interdum

Alexipharmaca.

HHHh purgantibus

Purgantia quando vsurpanda.

purgantibus omiſſis ad alexipharmaca ſtatim confugiendum; cum aliquando fluxus hic dyſentericus ſymptoma ſaltem ſit quali morbi primarii, febris ſcilicet malignæ & peſtilentis, quæ tandem etiam in veram peſtem degenerat. Habent hic locum omnia ferè, quæ in febribus malignis & peſtilentibus contra malignitatem uſurpari ſolent, ut C.C. terra ſigillata, bolus Armenus, vnicornu, corallia, ſmaragdus, ſapphirus, qui teſte Fernelio, *ſ. meth. med. c. 21*. inteſtinatorum ulcerationes ſanare creditur; ſcordium, quod teſte Dioſcoride, ad inteſtinatorum tormina bibitur, plantago, tormentilla, pimpinella ſanguiforba.

Locum etiam hic habeant pulvis noſter Bezoardicus, qui pro hoc affectu, paucis mutatis, ita parari poſteſt.

*℞. C.C. ſ. vſt. præpar. Drach. i. β. terr. ſigill. Sileſ. ocul. cancri præpar. bol. Armen. tormentill. ſuccin. præpar. margarit. præpar. corall. rubr. præpar. an. Scrup. i. offis de cord. cerui Scrup. β. ſmaragd. præpar. ſapphir. præpar. lap. bezoar. veri an. Scrup. i. ſel. auri num. iii. F. Pulvis. Doſis Scrup. i. vel Drach. β.*

Alias D. Andreæ Doteri, qui Dreſdæ in uſu eſt.

*℞. Tormentilla, zedoaria, C.C. vſti præp. an. Vnc. β. margarit. præp. off. de cord. cerui veri an. Dr. ii. raſura cranij humani maris femina an. Scrup. ii. ſol. auri num. xiii. ſacch. candi albiff. Vnc. iii. F. Pulvis.*

Imò purgantibus iſtis C.C. corall. margaritæ, terra ſigill. bol. Armen. ſmarag. præpar. ſp. diamargar. frigid. el. de gemm. frigid. admitceri poſſunt.

Eparis quoque in dyſenteria ſemper habèda ratio eſt; ideoque poſt purgatiã & aliàs etiam ſp. diarrhod. abbat. diatrion. ſantal. & ſimilia uſurpanda. Vel tale electuarium parandum.

*℞. Conferu. cichor. roſar. an. Vnc. i. ſpec. diarrhod. abbat. diatrion. ſantal. diamarg. frigid. C.C. vſt. præpar. an. ſcrup. ii. Cum ſyrupo cydonior. vel granat. F. Electuarium.*

Si verò humor malignitate careat, & ſaltem acrimonia peccet, ea mitiganda plantagine, portulaca, endiuia, acetofa, roſis, ſucco ganatorum, ribes, berberis & aliis, quæ poſtea de fluxu ſiſtendo proponuntur. Pleraque ex iis etiam humorum acrimoniam temperare poſſunt.

### Dolorem Lenientia.

Quia verò dolor ſæpe vehementer vrget, ex quo inquietudo, vigilæ, febres, lipothymia, & alia grauiſſima ſymptomata oriri ſolent, danda opera, ut iis ſederetur. Et ſi uero id rectiſſimè ſit, ſi cauſſa auferatur, & acrimonia ac malignitas humorum temperetur: tamen quia dolor tã diu ſæpe non dat inducias, donec id fieri poſſit, dolorem mitigantiã & anodyna uſurpanda, ſed non quæ ſimpliciter laxandi vim habent, verum quæ ſimul moderatè frigida & viſcida ſunt, atque acrimonia materiæ doloris efficientis obtundunt. Talia ex iis, quæ aſſumuntur, ſunt lac vaccinum & caprinum coctum, de quo poſtea dicitur; modò corpus prius purgatum ſit: febricitantibus verò, ut Trallianus, *lib. 8. c. 8. ait.* lac non facilè dandum, quod in ventriculo aceſcat & corrumpatur, ac ex calore in caſeum coaleſcat, & maiores cruciatus, viſcerum tẽſiones, capitis dolorem ac cibi faſtidium excitet; Itẽ iuſcula pinguiã carniũ vel alia butyro recenti, vel ol. oliuar. recenti, aut quod melius eſt amygdal. dulc. recenti, aut etiam ol. roſar. omphacino non rancido condita: poſſuntque olea talia ad Vnc. iij. vel iv. in iuſculis uſurpari. Vtile eſt & hoc Electuarium.

*℞. Ol. oliuar. recent. Aut quod commodius, ol. amygdal. dulc. recent. nullo verò modo rancidi.*

Admiſceatur ſacchar. tantum, ut acquirat Electuarij conſiſtentiam, de quo ſapius ager aliquid lingat. Lenit dolores, & inteſtinatorum excoriationem ſanat. Quia verò nonnulli ol. oliuar. ut & amygdal. dulc. auerſantur, poſteſt ex butyro recenti ſine ſale cum ſaccharo eodem modo parari Electuarium.

Guainerius, *tract. 4. de flux. c. 3. C.C. uſtum præparatum*

commendat, doloresque internos mirabiliter ſedare ſcribit; item pſyllium vitum, ſpodium, ac plantaginis ſemen.

Per clyſteres verò dolorem leniunt iniecti adipēs gallin. anſerin. imprimis hircinus, ac, qui magis oblinet & adſtringit, caprinus, ſeu de hircio caltrato ſumptus, ſuillus denique in magno dolore cum aliquo adſtringente mixtus. Auicennas butyrum cum ſanguine draconis miſcet.

Nonnulli & vnguentum roſaceum vel infrigidans Dr. vj. vel Vnc. j. pondere infundunt.

Parantur etiam clyſteres anodynii ex ſolo lacte vaccino vel ouillo, in quo ſapius lapides igniti extincti ſunt, additis vitellis ouorum, vel mucilag. ſem. cydon. aut ſcœnogræci, aut pſyllij.

Fiunt quoque clyſteres ex decocto capitis veruecis aut inteſtinatorum cum M. ij. hordei, additis vitellis ouor. num. ij.

Non diu tamen clyſteres tales ex pinguiſſimis continuandi ſunt, ne vlcus ſordidum & curatu difficilius efficiant, ideoque abſtergentes interiiciendi.

*℞. Rad. & ſol. althææ an. M. j. ſlor. verbaſci. melilot. chamam. an. M. β. ſem. ſcœnogræci. lini an. Vnc. β. Coq. in lacte vaccino. Colaturæ ℞. Vnc. x. vel lb. i. ol. roſar. butyr. ſ. ſale an. Vnc. i. β. vitell. ouor. num. ii. F. Clyſter.*

Nonnunquam vna opera leniens & abſtergens clyſter parari poſteſt, vel etiam nonnihil abſtergens.

*Ut ℞. Iuris decoction. inteſtinator. Vnc. viii. ſeni hircini, ſacch. rubr. an. Vnc. i. F. Clyſter.*

*Vel ℞. Decocti hord. lb. i. ſacch. rubr. Vnc. i. ol. roſac. omphacin. adipis renũ capre an. Vnc. ii. vitell. oui vnus. F. Clyſter, qui lenit & ſimul abſtergit.*

*℞. Laſt. vaccin. in quo lapides igniti extincti ſunt, Vnc. viii. ſucc. plantag. Vnc. iii. ol. roſac. omphacin. Vnc. ii. vitellor. ouor. num. ii.*

F. Clyſter, qui ſimul abſtergendi & dolorem leniendi vim habet.

*Vel ℞. Rad. althææ, plantag. an. Vnc. i. ſlor. verbaſci, chamamel. roſar. an. M. β. ſem. ſcœnogræci. cydon. an. Vnc. β. Coqu. in lacte vaccin. ad conſumpt. tertia partis. In Col. diſſolu. vitell. ouor. ii. ol. roſac. recent butyr. ſine ſale recent. an. Vnc. ii.*

F. Clyſter, qui dolorem lenit, & nonnihil ſimul adſtringit.

E recentioribus quidam hunc clyſterem miris modis commendat & miraculoſum appellat.

*℞. Caput ouinum crudum per medium diſſectum, lingua- que exempta cum cerebro, bulliat in ſq. aq. donec caro ab offib. abſcedat. Iuri colato adde ſummit. hyperic. M. ii. vel iii. rad. tormentill. craſſo modo pulueriſ. Vnc. i. vel ii.*

Infundantur per horas 4. in cineribus calidis. Colat. ægto bis terve clyſteris loco iniiciatur.

Neque ſolum interna exhibenda vel clyſteres ad dolores leniendos iniiciendi, verum etiam externa dolores lenientia uſurpari poſſunt.

*Ut ℞. Abſinthij, mentha, plantaginis, ſummitatum rubi, cauda equina, centummodiæ, an. M. i. ſlor. verb. cham. melilot. roſar. rubrar. an. M. β. myrtill. ſiccior. Vnc. i. ſem. ſumach. plantag. coriandri an. Drach. vi. caryophyll. nucis moſchat. an. Vnc. β. ſurfuris. M. β. ſem. cydonior. lini an. Vnc. β.*

Coquantur in vino rubro & aqua, & decocto calido venter ante cibum foueatur ad dolorem leniendum & fluxum ſiſtendum.

Vel venter inungatur ol. roſaceo & cydon. & poſtea imponatur omentum veruecis in oleo roſaceo calefactum. Hippocrates, *lib. de affect.* ſi dolor in dyſenteria vrgeat, partes ſub umbilico calida multa lauare iubet.

Quod ſi dolor valde vrgeat, ut animi deliquium & virium diſſolutio imminere videatur, uſurpentur ea, quæ vim quandam narcoticã habent, parata ex lactuca, nymphaea, papaneris albi ſeminibus & capitibus, aut ſucco papaueris erratico, mandragoræ, hyoſcyamo & ſolano.

Dum igitur malum eſt in inteſtiniſ ſuperioribus, poſteſt fieri talis emulſio.

*℞. Sem.*

Pulvis bezoardicus.

Epar rob-  
rancia.

Acrimoniam  
humorum  
mitigantia.

Dolorem Le-  
nientia.

Clyſteres do-  
lorem lenien-  
tes.

Fomentum  
dolorem le-  
nientia.

Narcotica.



*℞. Sem. melonum exorciat. papau. albi an. Vnc. β. amygdal. dulc. Drach. iij. decocti hordei lb. j. F. Emulsio.*

Vel *℞. Aq. lactuc. nymph. plantagin. an. Vnc. ij. syr. papau. albi Vnc. j. β. cydonior. Vnc. β. spec. diamarg. frigid. Scrup. j. β. Misce.*

Aut paretur decoctum ex plantag. lactuc. nymphæa, in quo conferua nymphææ dissoluatur.

Tandem ad opiata veniendum, ad philonium, pilul. de cynoglossa, laudan. opiat. quæ rectè exhibita sæpe magnam utilitatem afferunt; cum non solum dolorem leniant, & somnum prouocent, sed & fluxum sistant.

Vel *℞. Philon. Persic. Drach. β. theriac. recent. Scrup. j. spec. diamarg. frig. Scrup. β. syr. rosar. cydon. an. Vnc. β. lap. bezoar. vel pro pauperibus C. C. Scrup. i. Misce.*

Vel *℞. Laudan. opiat. gr. iiii.*

Dentur cum syrupo cydonior. vel formentur inde pilulæ tres.

Si in crassiss intestinis dolor sit, clysteres fiant, ex lactuc. nymph. decoctis, capitibus papau. præsertim nigri, mandragor. additis opii gr. v. vel vi.

Vel *℞. Rad. plantag. consol. maior. an. Vnc. i. flor. verbasc. melilos. an. M. i. rosarum rubr. M. β. sem. papau. albi Drach. vi. hyoscyam. Drach. iiii. Coqu. in lacte. Colaturæ ℞. Vnc. viii. vel x. Philon. Roman. Drach. i. vel Drach. i. β. ol. ros. vel amygd. dulc. Vnc. ii.*

M. F. Clyster, qui dolores lenit & simul consolidat.

Commendatur etiam, vt in sanguinis deiectione, ita in dysenteria, pro doloris lenitione & fluxus adstrictione, pastilli quidam Andromachi, quibus Galenus ipse vsus est, & pastilli de succinò, & confectio Clysterium appellata, & quæ Paulina dicitur: quorum medicamentorum aliorumque huc facientium descriptio videatur 7. de comp. med. secundum loca c. 4. & 5. & in 9. eiusd. operis cap. 5.

Inter narcotica etiam nonnulli commemorant suppositorium Rhasis de lycio, quod is, lib. 9. ad Almanfar. describit. Verum monent ultra dimidiam horam in ano relinquendum non esse, & propterea filo alligari debere, vt ad libitum extrahi possit. Monet præterea etiam Guainerius, de flux. tr. 5. cap. 2. nimiam opii quantitatem in eo suppositoio esse. Cir. 4. de flux. cap. 7. narrat, quendam tenesmo laborantem ex vsu suppositorii opiatum mortuum fuisse.

Post opiatorum vsum intestina vino infuso vel decocto aliquo abluatur, vt noxa ex opio corrigatur.

Semper autem hoc notandum, opiatum non vtendum esse, nisi dolor valde vrgeat, & in corpore delicato, raræ texturæ, sensusque exquisitoris. Diu tamè in opiatorum vsu non persistendum, neque iis nimis fidendū. Etsi enim somnus ab iis concilietur, fluxus sistatur, dolor minuatur, & hoc modo morbus iam victus videatur: tamen nisi malignitas expugnata, vlcusque sanatum sit, morbus recrudescit, & nouo dolore superueniente noua fluxio excitatur.

Imò, quod alibi etiam monuimus, vbi virtus est debilis, quod ex pulsu, corporis infrigidatione & aliis cognoscitur, nullo modo narcoticis est vtendum. Alia etiam quædam vtilia in exhibitione narcoticorum obseruanda habet Guainerius, tr. 4. de fluxib. cap. 7.

#### Fluxum sedantia.

Postquam dies quatuor aut quinque circiter elapsi sunt, atque euacuationes necessariae præcesserunt, dolorque ex parte sedatus est, febrisque, si adest, remittit, (nam quamdiu febris aut dolor adhuc vehemens est, significatur materiam non planè euacuata, & propterea fluxum non subito, nec omnino comprimendū esse) ad ea, quæ vim adstringendi, aluumque sistendi habent, accedendum, & cum pleraque ex iis, quæ modò enumerauerimus, vim malignitati resistendi habeant, ea potissimum eligenda. Ideoque seqq. diebus tum exhibeantur, tum ventri iniiciantur, aut etiam ventri extra imponan-

Dan. Sennerti Tom. II.

tur, quæ vim adstringendi maiorem, simulque acrimoniam humoris temperandi & corrigendi habent.

#### Simplicia.

RADICES. Tormentilla, quas plurimi & merito, vt peculiare secretum commendant; Plantaginis, Consolida maioris, quæ etsi vim adstringendi manifestam non habent, lentore tamen suo ad omnem sanguinis fluxum sistendum vtilis sunt; Nymphae exsiccata, acetosa, alcea, filipendula, pæonia, quas aluum sistere scribit Galenus, 6. de sirap. med. facult. quæ si in cereuisia coquantur, decoctumque butyro conditur, & manè ac vespèri bibatur, tormina ac fluxum in dysenteria sistere, non neglectis abstergentibus, & in dysenteria quadam Epidemia superiorum annorum reliquis non iuuatibus, multis profuisse amicus quidam retulit. Caryophyll. pseudoacori seu gladioli lutei, fragaria, bistorta, rhapontici veri, rhapontici vulgaris, seu centaur. maioris, quæ commendatur à Fuchio, lib. 1. comp. med. cap. 84. Radices etiam graminis profunt dysentericis siccando, & per vrinam diuertendo, teste Diomede Cornario, consil. 1.

FOLIA; Plantaginis, quæ non solum, vt & radices, adstringendi & siccandi vim habent, verum etiam venenis resistunt, & proinde ad dysenteriam valde profunt, teste Dioscorid. lib. 2. cap. 73. Centummodia, gnaphalij, acetosa, lysimachia, cuius succus & decoctum exhibitum seu clystere iniectum in dysenteria prodest, teste Dioscorid. lib. 4. cap. 3. Conyza, cuius decoctum vinumque in quo illud coctum sit, efficax ad curandam dysenteriam esse scribit Dioscorid. l. 3. cap. 113. Absinthij, mentha, quercus, pimpinella sanguisorba; & pleraque plantæ vulnerariæ, millefolium, sanicula, virga anrea, solidago viraque, pyrola, pilosella, consolida media, ophyoglossum, bellis maior, opuris, numularia, pa. leonis geranium battrachiodes, agrimonia, potentilla, quam etiam Matthiolas, lib. 4. in Dioscorid. cap. 37. recentè nudis pedibus applicat, fragaria, ruta lunaria, lagopus, muscus arboreus, acetosella, salix præsertim in clysteribus, artemisia puluis Drach. j. pondere cum aqua propria vel alia conueniente, verberna puluis Drach. i. vel ii. pondere, præcipuè in Epidemia, rubi folia.

FLORES. Rosar. rubr. granator. seu balaustias, hedera, sciss. palma Christi puluerisati, ex aqu. chalybeata vel propria sumpti, Matthiol. lib. 3. in Dioscorid. c. 127. Malua maioris, iuli item corili, præsertim in dysenteria alba.

SEMINA. Plantaginis, acetosa, porulaca, oxylapath. rosar. papau. oryza, alcea, nasturtij, quod à plurimis valde commendatur; quia tamen acre est, torrendum non nihil, vel alia adicienda, Aquilegia cum æquali parte seminis plantaginis, perfoliata, Sanguinaria, quod à plurimis valde commendatur, nec immerito; alii Sophia Chirurg. vsurpant.

FRUCTUS; Cydonia mala, mespila, quibus solis dysenteriam & alios alui fluxus, qui aliis remediis curari nō poterant, curatos fuisse refert Forestus lib. 22. obseru. 1. Berberis, sorba, de quibus Bruerynus, lib. 8. de re cib. cap. 22. scribit, se desperatâ dysenteria laborantem, de anus cuiusdam consilio sorba cruda largissimè deuorasse, indeque sanitati restitutum fuisse; mala punica integra cocta, pyra, poma austera, quæ tamen cocta potius, quam cruda vsurpanda, cum cruda facillè corrumpantur & aluum turbent; Corna, castanea, anellana rubra tunica inuestita, quas Lombardicas vulgò vocant, glandium quernarum nuclei ass. tribuli aquatici fructus, myrtilli, mora immatura siccata.

LIGNA & CORTICES; Satalum rubrum, macer. cortex puluerisatus, Dioscor. l. 1. c. 94. & Galen. 7. de simpl. med. facult. Cortices mori, interior castanearū tunica, qua albicans pulpa circumuestitur. Spongiola item, quæ rosarum sylustrium frutici solet adnasci, si puluerisetur, & ex vino detur, in quo summitates quercus, vel simile quid coctum fuerit.

Vt etiam quercina, cuius puluere nihil præsentius in dysenteria & omni sanguinis fluxu esse, refert Martinus Rulandus, in lexico Alchymia, scribitque esse concretitiū quiddam in forma vuz ad radices quercuum sub terra

HHHh 2 tempore

Simplicia.

Vna quercina.

Opiata.

Fluxum sedantia.

tempore veris saporis stiptici, calore foris purpureo, intus candido, & quasi lactifero, quæ in æstate pereat, & quasi fiat lignea, ideoque tempore verno debeat exsiccati in umbra, & deinde pulverisari. De eadem scribit Encelius, lib. 3. de lap. c. 21. citante Casp. Bauhino, in *Pinnac. theart. Botan. p. 422*. Vua quercina à me inuenta, quæ nihil præstantius in Dysenteria etiam deplorata. Et Schenckius, filius, lib. 3. obs. refert, hanc vnam experimentum esse contra omnes hæmorrhagias, cum primis alui profluvia, etiam cruenta, propter laxatiuum impenduntia.

**SYCCI; Plantaginis, Vnc. iij. vel iiij. exhibitus, præcipue si inflammatio adsit, vel per clysteres infusus, Lysimachia, hedera terrestris,** quo plurimos à morte liberatos fuisse scribit Hollerius.

**AROMATA; Nux moschata,** quæ ob diuersas facultates in hoc malo viles valde commendantur. Terrestris enim substantia adstringit, roborat, vlcera exsiccant, cicatricem inducit: oleosa substantia dolores lenit, intestina oblinat, ne ab humorum acrimonia lædantur. Aromatica qualitate epar & ventriculum ac eius orificium roborat, flatus discutit. Vbi ob febrilem calorem aliquid mali ab eius caliditate metuitur, stupis cannabinis inuoluta sub cineribus calidis leniter torrenda, vel potius assanda; non verò, ut vulgò fieri solet, lamina ferri candente torrefacienda; cum non solum oleosa pars hoc modo pereat, sed adustione quoque acrimoniam facile acquirere possit: Item *spicanardi, Zedoaria, Caryophylli.*

**GUMMI & LACRIMÆ; Thus, myrrha, mastiche, gummi Arabicum, tragacanth.** Arabico tamen uti mauult Matthæus de gradibus, scribitque, tragacanthum etiam si glutinet, fluxum augere, & ex mente Rhasis non nisi toto vtendum censet.

**LAPIDES, GEMMÆ, TERRÆ; Bolus Armenus, Terra sigillata, Lapis hematites; smaragdus, sapphirus, Lapis Bezoar,** qui simul & malignitati resistit, scribitque Caspar. Bauhinus, c. 32. de lapid. Bezoar, in Dysenteria Epidemia Lugdunensi feliciter eo vsum esse Philibertum Saracenum; & supra ex Guilhelmo Fabricio historia allata foemina illustris, quæ Dysenteria lethaler decumbens lapidis Bezoar largo vsu sanitati breuiter restituta fuit;

[Aloysius Mundella equidem, *epist. 1. vires Smaragdi*, quæ ipsi in curandis malignis febribus, epilepsia, dysenteriaque maligna, tribuuntur. extenuare conatur rationibus quibuscumque sed iis non adeo magni momenti: & ipsa experientia contrarium probat. Ut de aliis eius viribus non dicam, multum in dysenteria maligna præstare testatur Auenzoar lib. 2. thez. ir. tr. 2. cap. 5. ubi refert, se ex esu herbe venenosæ in dysenteriam incidisse, apppositoque supra ventrem smaragdo, & in ore detento, absque trituratione, subito fuisse liberatum. Et eod. in capite, & prefat. operis. Smaragdum ad curandam dysenteriam venenosam, *g. viij.* pondere commendat. Eundem valde commendat Guainerius, de venris fluxu venoso. Langius, lib. 2. epist. 49. Et Zacut. Lusitanus, de Medicor. Princip. histor. lib. 1. histor. 22. narrat, nobilem Lusitanum, cum ab amasia tria pira oblata deuorasset, illico alui profluuiis, cum diris cruciatibus, captum, & diu cruciatum fuisse: & cum plura primò abstergentia, postea adstringentia medicamenta exhibita, & per aluum infusa fuissent, sed sine omni fructu, febricula accessisset, viresque deiectionis essent, puluerem tandem Smaragdi subtilissimum, alternis diebus, *g. xij.* pondere, exhibitum fuisse, & superbibisse aquam, in qua tragacanthum coctum fuerat, quod cum quinquies fecisset, curatum fuisse.]

**CrySTALLUS** item tenuissimè tritus seu præparatus, & in aqua conveniente Dr. s. pondere sumptus singulare est in dysenteria, præsertim à porracea ex flana bile orta, remedium. Langius lib. 3. Epist. 1. c. 4. Si & alabastrum candidum in puluerem redactum, & cum lacte bibitum, scrup. j. pondere, dysenteriam certo experimento sanare, cum vehementer adstringat, scribit Anshelm. Boëtius,

lib. 4. c. 270. Præterea Hollerius in ouo forbili Dr. j. aluminis potrigit, quod medicamentum Aetius etiam laudat ad diuturnas dysenterias, in quibus cruenta excernuntur, & monet post assumptum alumen aquam superbibendam esse. Gabelkoverus & Mindererus, medic. militar. cap. 7. rubricam fabrilis factitiam, quæ Rottelstein vulgò appellant, in vino rubro præscribunt. Ioh. Theodor. Tabernæmontanus etiam argillam rubram sernacum combustam in portione exhibet, ut postea de portionibus dicetur.

**ANIMALIA & ab animalibus sumpta. C. C. prepar. spodium, genitale cerui exsiccatum, & lima aut scalpro rasum, ebur vstum, turturis in olla clausa in furno combustipulvis, ut & caro,** quæ imprimis commendatur, si deplumatus infaciatur granorum myrti & ceræ ana Drach. ij. & coctus vel assus potius tribus diebus continuis comedendus detur: Leporis combusti pulvis, cochlea tota cum testis vsta, interiores tunica ventriculi gallinarum, cera, de qua postea in fine horum medicamentorum dicetur; Lumbricorum terrestrium decoctum: Coagula, de quibus dantur infantibus gr. xv. cum liquore conuenienti, adultis Drach. j. hædi nimirum & imprimis leporis, de quo Auicennas, de cura fluxus in genere, scribit, quod statim ventrem sistat; sanguis cerui hirci caprae, leporinus imprimis exsiccatus: Stercus canis, de quo Galen. 10. de simpl. med. facult. ita scribit, Sanè memini mirandum in modum me canini stercoreis facultatem expertum fuisse, quo vi cōsuevit quidam Præceptorum nostrorum, qui sola ossa canis edenda exhibebat biduum, è quibus durum, candidum ac minimè foetens stercus colligebatur, quod tū ille desiccabat, ut in puluerem facile redigi possit: ille autem utebatur cum ad alia, tum ad dysenteriam lacti illud immiscens, in quo ferrum antea & lapides igniti extinguiti essent. Atque ille Medicus eiusmodi medicamentum clam iniiciebat, & id solum generosiores quoque discipulos docebat. A nonnullis etiam usurpatur dentes lucii, onorum pyramina & anserinorum cum primis, notante Galeno, de remediis fac. cap. 20. cancri vsti ossa humana combusta, Epar arietinum, vituli lactantis, vel alterius animalis, quod prius in aceto coquatur, & Drach. j. pondere detur. Epar lura præparatum commendat Heurnius, lib. 2. method. ad prax. cap. 11. Præparatur autem ita: dies ferè 13. aceto acerrimo maceretur, hinc in furno supra tegula siccetur.

**E Chymicis commendantur, Crocus & adstringens & tinctura ac magisterium coralliorum, Tinctura Smaragdi.**

De his omnibus tamen notandum, alia esse calida, alia frigida, aut certè caloris excessum nullum habentia: è quibus, nunc hæc, nunc illa eligenda, prout calor vel febris coniuncta id admittit.

Etiam medicamenta ista, quæ ad fluxum sedandum adhibentur, non sunt planè eiusdem generis. Quædam enim sunt propriè adstringentia, quæ sunt frigida & sicca, & substantiam habent crassam, mordacitatis expertem, vnde venarum orificia, omnesque ductus angustiores reddunt, ut materia tenuis affluens sistatur, & reprimatur. Inter quæ sunt radices tormentillæ, bistortæ, rosæ rubræ, balauitia, mespila, sorba.

Quædam sunt Emplastica, quæ glutinosa substantia partibus adhærent, humoribusque sese admiscunt, & eos ad fluxum ineptiores reddunt, ut gummi Arabic. tragacanth. mastiche, althæa, malua, cera.

Incrassantia sunt, quæ substantiæ crassitie humores tenuiores, quibus se permiscunt, crassiores, & ad fluxum ineptiores reddunt, ut bolus Armenus, terra sigillata, cornu cerui, lapis hematites, stercus caninum, ostrea-rum & cancorum testæ.

Sunt etiam quædam, quæ feruorem humorum mitigant & compescunt, ut mala cydonia, ribes, berberis.

Sunt tamen, quæ ad has classes, facile non rediguntur, sed quæ proculdubio peculiarem vim habeant humorem dysenteriam excitantem alterandi, & prauam qualitatem, quæ intestinis inimica est, tollendi.

Medicamentorum fluxum sedantium differentia.

*Astringentia  
in Dyse-  
nteria conue-  
niens.*

De posterioribus nullum dubium est, quin in Dysenteria sine omni periculo exhiberi possint. De astringentibus verò nonnulli dubitant, & putant, eorum usu fluxum humorum nimis subito sisti, & ex humoribus retentis ea mala, quæ supra recensuimus, sequi, intestina quoque eorum usu exsiccari, ut postea perpetua ferè alui additio & siccitas continua remaneat.

Verum enim verò ista tantum de intempestivo, præproprio & nimio astringentium usu vera sunt. Etenim, quod supra dictum, hoc omnino attendendum, ut ante septimum diem, & priusquam intestinorum ulcera probe abstergantur, astringentia, præcipue fortiora, non usurpentur; præmissis verò abstergentibus suo tempore etiam astringentia tuto usurpari possunt.

*Notanda in  
usu fluxum  
silem.*

Præterea in usu omnium horum medicamentorum obseruandum,

1. Ut aliàs calida, aliàs frigida eligantur, prout natura humoris id requirit, ut antea etiam dictum.

2. Ut refrigerantibus aliquid subinde calidorum, & quæ concoctionem iuuat, addatur, qualia sunt, mentha, absinthium, nux moschata, macis, spicanardi, cinamomum, mastiche, thus & similia. Nam cum assiduo fluxu ventriculi & intestinorum calor debilitetur, id quod excrementorum cruditas demonstrat, valde refrigerantia sola adhibenda non sunt, & imprimis clysteres valde refrigerantes & astringentes crebro non iniiciendi.

3. Medicamenta ista in parua quantitate & sæpius exhibenda sunt. Parum dandum, ne fluxus subito sistatur, & natura medicamenta facilius in actum deducere possit: sæpius autem, cum ob alui fluxum frequentem medicamenta diu in intestinis non hæreant.

### Composita.

Ex his parantur varia medicamenta; Pulueres, Conseruæ, Syrupi, Rob, Potiones & Claretæ, Electuaria, Aquæ, Emulsiones, Tincturæ, Extracta & alia.

### Pulueres.

1. *℞. Terra sigillat. Drach. iij. boli Armeni Drach. j. rasura C.C.C.C. vsti prepar. an. Drach. β. sem. plantag. acetosæ, macis an. Drach. j. croci gr. iv.*

Fiat Puluis, etiam infantibus conueniens.

2. *℞. Terra sigill. Drach. j. corall. rubr. prepar. Dr. β. margar. prepar. boli Armen. an. scrup. i. C.C. sine vstione prepar. Drach. i. lapidis bezoar. smaragdi prepar. an. scrup. β.*

F. Puluis.

3. *℞. Mastiches, thuris, corall. rubr. preparat. C. C. vsti preparat. an. Drach. β. lapid. hematite preparat. scrup. ii.*

F. Puluis.

Dosis à scrup. i. ad Drach. β.

4. *℞. Rad. tormentill. Vnc. i. croci & trochisc. de charabe an. scrup. i. sem. plantag. acetos. an. scrup. ii. sanguinar. Drach. i. santali rubri, boli Armeni, C.C. prepar. an. Dr. β.*

F. Puluis.

5. Vel *℞. tragacanth. Vnc. β. nucis moschat. Drach. β. rad. torment. Drach. i.*

F. Puluis.

Laudatur & puluis turturis, quo Nicolaum de Metri, olim Sigismundi, Archiducis Austriæ Medicum & Chirursum, multos dysenteria laborantes curasse refert Guilhelmus Fabricius, de Dysenteria c. 10. qui paratur, si turtur cum pennis & visceribus in furno comburatur. Huius pulueris *℞. Vnc. i. Radicum tormentill. Vnc. β. F. Puluis*, de quo singulis diebus mane, aliquando verò etiam vespere Dr. i. cum aqua tormentillæ exhibeatur.

Arnoldus de Villa Noua Turturem pennis mundat, viscera eximit, & mistura ex puluere boli Armeni, sanguinis Draconis, mumie cum aceto & vitellorum sufficiente quantitate confecta ventrem implet, & in olla noua in fornace figulina comburit, & eius pulueris ali-

Dan. Sennerti Tom. II.

quid cum succo plantaginis vel aqua aut saccharo rosarum exhibet.

Laudatur & leporis combusti puluis, qui hoc modo paratur: Lepus detractâ pelle & intestinis exemptis in frusta conscinditur, & illotus in vase fictili bene clauso in clibano siccatur, donec in puluerem redigi possit, cuius Drach. i. exhibetur. Nonnulli malum punicum fictili vase conclusum in furno combustum laudant.

*Leporis com-  
busti puluis.*

Hercul. Saxon. præf. part. 2. c. 20. §. 9. hunc puluerem valde laudat, polliceturque, eo omnes recentes Dysenterias, nisi fluxio admodum vergeat, statim & certo sanari posse.

*℞. Ossis sepia vsta & puluerisat. Dr. ii. sponsia pice imbuta & in ollula vsta & in puluerem redacta, cortic. ouorum indurator. ablata pellicula interiore, & puluerisator. an. Vnc. β. margarit. preparat. boli Armeni an. Drach. i.*

F. Puluis: detur eiusdem Dr. i. in liquore conueniente.

Crollius hunc puluerem commendat.

*℞. Succini sanguinis Draconis, lapidis hematit. corall. rubror. preparat. sem. portulac. plantag. anthera rosarum. radic. tormentill. terra sigill. Strigenis an. Vnc. β. balauft. Drach. ij. nuc. mosch. num. j. cinamomi Drach. i. croci & calci calcinati, matris perlarum, ossium humanorum combust. an. Drach. ii. F. Puluis. Dosis à Drach. β. ad Drach. i. β.*

Commendatur & à multis puluis ex pane & succo baccarum sambuci paratus, quem tragacanthæ granorum actes nonnulli nominant.

*Tragacanthæ  
granorum actes.*

*℞. Succ. baccarum sambuci*, ex quo & farina secalina conficiatur massa, è qua panis formetur, qui bis in fornace ad duritiem coquatur, ut in puluerem redigi possit. Ex puluere isto cum succo baccarum sambuci iterum formetur panis, & priori modo coquatur, idque ter repetatur, & tandem fiat puluis.

Vel *℞. Panem secalinum* è furno calentem, eumque succo baccarum sambuci imbue, iterumque in furno sicca, siccatum rursus succo sambuci imbue, idque quater vel quinquies repetere: tandem panis hic in puluerem redigatur, cuius vel solius Drach. i. vel dimidia cum nucis moschatæ æquali parte exhibeatur.

Placenta quoque, quæ post aq. rosar. in Balneo Mariæ destillatam in cacabo remanet, exsiccata in puluerem redigitur & commodè exhibetur.

Vel *℞. Genitalis Cerni Drach. ii. C.C. vsti. boli Armeni, sem. oxylaparb. plantag. an. Drach. i. F. puluis.*

Vel *℞. Radicum tormentill. Vnc. β. nucis mosch. Drach. ii. sem. plantag. terra sigill. an. Drach. i. F. Puluis.*

### Conseruæ.

Et si saccharo condita, quod facile bilescant, Dysenteria non ita conueniant: tamen quia infantibus sæpe alia, quam saccharo condita & dulcia, exhiberi non possunt, necessariò interdum ad conseruas, syrupos, rotulas, & similia confugimus.

*Conserua.*

E Conseruis viles sunt, Conseru. rosarum rubr. antiqua, imprimis verò tormentillæ, cuius componendi ratio à Tabernæmontano in Herbario traditur, Rob berberis, ribes.

### Syrupi.

De Syrupis hoc notandum, quod modò de conseruis etiam dictum, cum omnia dulcia facile, ubi epatis caliditas adest, in bilem conuertantur, cautè eos. & non nisi parcè ac dilutos usurpandos esse, magis verò conuenire decocta.

*Syrup.*

Sunt verò viles, de rosis siccis, cydonior. de succo portulac. plantaginis, myrtinus, ribes, berberis & corallinus à Quercetano descriptus; item acetosa, de agresta.

In fine dysenteria valde confert succus absinthij & menthae bene purificatus, & cum saccharo in syrupum redactus. Habet enim mentha cum absinthio mixta miram vim corroborandi ventriculum & discutiendi flatus. Diomed. Cornar. consil. 1.

HHHh 3

Vel

Vel ℞. conf. Alchermes de hyacintho an. scrup. j. trochisc. de charabe. Drach. j. Aqu. plant. Vnc. ij. Syrup. de ros. siccis Vnc. j.

F. Mistura, quæ fluxum sistit, malignitati aduersatur, dolorem lenit.

Vel ℞. Succ. plantag. Vnc. ij. centummod. pentaphyll. an. Vnc. j. sacchar. Vnc. ij. F. Syrupus.

Vel ℞. Rad. tormentill. oxylapath. acetose an. Drach. iij. alcea Drach. ij. centummod. veronic. plantag. an. M. j. flor. rosar. rubr. prunor. sylvestr. balauisticorum, malua arborea. an. M. ss. Coq. in aq. s. addatur sacchar. q. s. F. Syrupus.

Syrupum & adstringentem & consolidantem describit Ioh. Langius, lib. 3. epist. 4.

### Potiones & Clareta.

Potiones & Clareta.

℞. Fol. plantag. veron. agrimon. an. M. j. sem. 4. frigid. maior. Vnc. ss. portul. acetos. an. Drach. ss. Coq. in aq. bord. simpl.

Colat. ℞. Vnc. ix. Adde Syrup. de succo portul. ribes, y donior. an. Vnc. j.

M. F. Potio pro tribus Dosibus.

Vel ℞. rad. torment. plantag. an. Drach. ij. rosar. rubr. M. ss. sumach. balauistic. an. Drach. ss. sem. oxylapath. acetos. plantag. an. Drach. j. myrtillor. Vnc. ss. anthera ros. Drach. ss.

Coqu. in Balneo vase clauso in aq. plantag. flor. acacie & torment. an. Vn. vj.

Postea stent. in infusione horis octo vel 10.

Colat. add. succ. planta. depurat. Vnc. ij. sacchar. Vnc. ij. F. Iulebus, qui condiatur pulu. nuc. moschat. Drach. j.

Vel ℞. Consolid. maior. plantag. polygon. virentium an. M. ij.

Minutissime contundantur affusis lact. caprin. lb. ij. & succus exprimat, in quo ebulliant, sem. plantag. myrtill. an. Drach. ij. rad. tormentill. Drach. j. ss. veronic. M. j. Coquantur.

F. Potio clara.

Vel ℞. Rad. tormentill. plantag. bistort. an. Drach. j. agrimon. veronic. sanicul. plantag. flor. rosar. rubr. an. M. ss. rasur. C. C. C. C. vsti. an. Drach. ij. santal. rubr. Drach. ss. nuc. moschat. num. ij.

Crasso modo contusa infundantur in vini rubri lb. vj. Postea add. sacchar. lb. ss.

Coletur & potro addatur succ. cydonior. lb. ss. & per manicam Hipp. traiciantur.

Vel ℞. Succ. cydon. lb. iij. In eo infundantur conseru. rosar. rubr. Vnc. j. ss. vel rosar. rubr. siccar. M. ss. cinamom. Drach. ij. macis Drach. j. conseru. tormentill. Vnc. j. Per manicam Hipp. traiciantur.

Vel ℞. Conseru. tormentill. rosar. rubr. antiq. an. 3 j. ss. rad. bistort. santal. rubr. an. Drach. iij. nuc. moschat. num. ij. myrtill. sic. Vnc. j.

Infundantur in vini rubri lb. iv. horis 24. Hinc per manicam Hippocr. traiciantur. Commodè etiam addere licet veronic. sanic. alchymil. an. M. ss.

Potest & hic locum habere porus, qui, vt Prosp. Alpinus, de med. Egypt. lib. 4. cap. 1. refert, in febribus pestilentialibus & alui fluxibus, qui hisce febribus accidunt, Egyptiis familiaris est.

℞. Fr. Berber. lb. j. aq. lb. xij. Adde aliquid sem. fenic. & frustum panis, & horis xxiv. macerentur, deinde sacchar. rosar. rubr. vel Syrup. acetosi citri. M. & colentur.

Referunt quidam in sæuissima dysenteria profuisse aquam, in qua filices extincti fuerunt, vel vinum rubellum, in quo ichthyocollæ frustum duabus vel tribus ebullitionibus coctum fuerit.

Tabernæmontanus, lib. 2. Theaur. aquar. cap. 74. hanc potionem commendat.

℞. Argille rubre fornacum combustæ lb. j. contus. opt. affunde mensur. iij. aquæ fontan. Bulliant parum.

Deinde extingue chalybem ignitum quater vel quinque.

Postquam subsedit, cola per pannum lineum vel manicam Hippocratis.

Bibat de ista aqua æger ad sitim restinguendam pro lubitu.

Vtile est etiam decoctum gnaphalii; vinum etiam, in quo illud coctum sit, efficax ad dysenteriam curandam esse, scribit Dioscorides, lib. 3. cap. 150.

### Aqua destillata.

Aquam dysenteriacam descripsit Quercetanus, in Pharmacop. restit. lib. 1. cap. 7. quæ simul est Narcotica.

Aqua destillata.

Dorncreil. in suo dispensat. Potest & talis parari.

℞. Rad. tormentill. acetos. pimpinell. bistort. pentaphyll. an. Vnc. j. vincetox. zedoar. an. Drach. ij. fol. acetos. plantag. millefol. burf. pastor. veronic. scabios. mentha crisp. an. M. j. sem. acetos. oxylapath. plantag. portulac. endiu. coriand. prepar. papau. albi. an. Drach. vj. citri Vnc. ss. flor. rosar. rubr. malua arbor. verbasc. an. M. j. cort. thur. citri. macis an. Drach. ij. nuc. mosch. num. iv. succ. prunor. sylvestr. Vnc. iij.

Puluerisanda pulueriscentur, incidenda incidantur, & infundantur in aqua fol. quercus, plantag. tormentill. rosar. an. ss. q. Stent in infusione per aliquot dies, hinc destillantur. Dos. Vnc. iv. vel per se, vel cum syrupo conueniente.

Aquam contra dysenteriam vel restrictiuam D. Doringij vide infra de Trochiscis.

Iohannes Theodorus Tabernæmontanus laudat aquam destillatam à mica panis secalini lb. iij. nucis mosch. num. viij. quibus superfundatur pyroran sylvestrium succi q. s. & coct xxiv. horas in balneo destillantur. Dosis infanti Vnc. ss. vel Vnc. j. adultis Vnc. ii. vel iii.

### Emulsiones.

℞. Sem. papau. alb. Vnc. i. ss. acetos. Drach. iij. amygdal. dulc. excortic. Vnc. i. aq. dysenter. Vnc. xiv.

Emulsiones.

F. Emulsio, cui adde rotulas manus Christi perlat. vel diamargarit. frigid.

### Electuaria.

Commendatur Micleta Nicol. Drach. i. vel Drach. i. ss. pondere exhibita cum aqua plantaginis.

Electuaria.

Electuarium de sorbis Mesue, in Anidotar. dist. 1. cuius dosis Vnc. i. vel Vnc. ss. mane & vespere ante cibum. Ad cuius modum etiam electuarium de mespilis parari potest.

Theriaca à Galeno & aliis Medicis commendatur, præcipuè recens, cum idoneo liquore exhibita, imprimis ubi intestina inflammatione carent. Vim enim habent, vt Galenus, de theriac. ad Pison. c. 12. docet, etiam purgantium medicamentorum vim supprimendi. Præterea dolorem lenit & somnum inducit. Imprimis magno cum emolumento exhibetur in dysenteria epidemia & maligna, teste Valesco de Taranta, lib. 4. cap. 2.

Vel ℞. Conseru. rosar. antiq. Vnc. ii. tormentill. Drach. vi. nuc. mosch. Drach. ss. Cum syrupo cydonior.

F. Electuarium.

Si simul fluxum sistere & dolorem lenire velimus & roborare, tale paretur.

℞. Theriac. recens. vel media ætatis, confect. alchermes an. Drach. ss. trochisc. de charab. vel terra sigill. Drach. i. Syrup. de ros. siccis & riba ana q. sm.

Vel ℞. Conseru. rosar. Vnc. i. ss. citr. Vnc. i. tormentill. cortic. citr. condit. an. Vnc. ss. margarit. preparat. corall. rubr. preparat. an. Scrup. i. smaragd. preparat. Scrup. ss. sem. acetos. Drach. ss. boli Armen. aerr. sigill. C. C. vsti preparat. an. Scrup. ii. Cum syr. acetosell. granat. vel cydon.

F. Electuarium, quod fluxum sistit, & simul malignitati aduersatur.

Electuarium sequens naturam viuificare, ac omnia membra, & esse bezoardicum fluxus dysenterici, coque,



que, qui iam morti destinati erant, seruare, scribit Sauerola.

*℞. Pulpa cydonior. medull. panis madefacti in aqu. vel pluuiali vel fontana, vel chalybeata, cortic. citri an. Vnc. j. sapphiri, hyacinth. sardi, granat. fenugreci (ego malim sinaragdi legere) an. Drach. j. zedoar. Scrup. ij. tragacanth. & macis, corallor. rubror. ligni albei, anisi, cinamomi. rasura eboris, calami aromat. sangu. draconis an. Drach. j. s. ambra Drach. s. auri Vnc. s. argenti Drach. v. moschi gr. ij. myrrh. Drach. iij. Cum saccharo & aqua zedoar. F. Electuarium. Dosis Drach. ij.*

### Morsuli & rotula.

Morsuli.

*℞. Rad. symphyt. sub cineribus costar. Morsuli. & per cribr. traiectar. pulp. turtur. vel perdic. assat. an. Vnc. j. amygdal. dulcium, sem. papau. alb. an. Vnc. s. plantag. acetos. an. Drach. ij. corall. Drach. j. spec. diamarg. frig. Drach. s. sacch. albi in aq. rosar. dissol. ℥. vj. F. Morsuli.*

*Vel ℞. Corall. rubr. prepar. margarit. prepar. an. Scrup. ij. boli Armeni prepar. Scrup. iv. spec. rosar. nouell. diamarg. frigid. diarrhod. abbat. an. D. s. conferv. symphyt. rosar. cortic. citri condit. an. Drach. j. sacch. in aq. ros. dissol. q. s. F. Morsuli.*

Rotula.

*℞. Corall. rubr. prepar. Drach. j. margar. prep. Drach. s. spec. ros. nouell. rad. tormentill. boli Armen. an. Scrup. s. sinaragd. prepar. gr. vj. sacchar. alb. Vnc. ij. F. Rotula.*

### Pilula.

Pilula.

*℞. Trochisc. de terra sigill. de charabe, spod. an. Scrup. ij. gran. myrt. sem. acetos. an. Drach. s. Cum syr. cydon. F. Pilula.*

*Vel ℞. Gummi Arabici, mastiches, thur. succini, sanguinis draconis, lapidis hemat. sem. plantaginis, coaguli leporis vel hadi ana Drach. s. Cum syrupo de rosis.*

*F. pil. mediocres, quarum Drach. s. sumat æger bis in die, horis duabus ante cibum.*

### Trochisci.

Trochisci.

*Trochisci de berberis, de charabe, de spodio, de terra sigillata*

*℞. Rad. tormentill. Drach. ij. C. C. prepar. Drach. j. sem. plantag. Drach. j. s. nuc. mosch. num. j. amyli, Vnc. s. croci martis Scrup. ij.*

*F. Massa, cui add. boli Armen. terr. sigill. an. Scrup. j. F. Trochisci Drach. ij. pondere; qui in furno vel patina calida exsiccentur, de quibus singulis diebus tres exhibeantur per dies sex.*

*Valde etiam commendatur pulmentum paratum ex pinguedine vernecis, quæ circa renes est, rubro vino, ouis recentibus, farina triticea & nuce muschata; quod & dolores valde lenit, & si nux moschata addatur, fluxum sistit.*

*Dn. D Doringii trochiscor., extracti & aquæ contra dysenteriam seu restrictiua hæ sunt formulæ.*

*℞. Herb. centumnodia, summitat. rubi, globulor. tilie, vne quercina an. Vnc. s. rad. tormentill. bistort. pentaphyll. fragaria, rhapontici veri, cortic. myrobalanor. chebulor. thuris an. Drach. ij. nucis moschat. opii Thebaici, santal. rubri flor. rosar. rubr. an. Drach. j. s. sem. coriandri, anisi, hyperici, an. Scrup. iv. plantaginis, acetosæ, bursa pastoris, urtic. mortue an. Drach. j. cupular. glandium. nuc. cupress. styracis calamit. cort. granator. an. Scrup. ij. aurantiorum, citri, tunicarum rubrarum auellandarum an. Drach. s. croci Scrup. j.*

*Incisa minutissimè & conuassata infundantur in aquæ primorum germium quercus oclies chalybeatæ & sp. Acidulæ factæ s. q. ita vt emineat tribus transuersis digitis. Stent in loco calido ad saturatam tincturæ extractionem, agitenturque quotidie. Vbi aqua affusa colorari desierit, coletur per chartâ emporeticam duplicem;*

*affundatur recens alia, & relinquatur ad perfectam tincturæ residuæ imbibitionem. Postea tincturæ omnes commisceantur, & abstrahitur humiditas in balneo Mariæ ad iustam extracti consistentiā. Aqua extracta seruetur seorsim in vitro pro aqua restrictiua: in pyxide autem terrea extractum. Trochisci sic conficiantur.*

*℞. Spody ex ebore preparati, terra sigill. Siles. an. Vnc. j. C. C. vsti, prepar. boli Oriental. veri, corall. rubror. prepar. an. Vnc. s. lapidis hematit. preparati, croci martis per simplicem. reuercationem preparati an. Dr. ij. gummi Arabici, tragacanth. an. Drach. j.*

*Puluerisatis subtilissimè, & commixtis diligentiss. affundatur tinctura præcedens vniuersa. Stent simul in loco calido diebus septem & agitentur quotidie. Postea in balneo abstrahatur aquositas ad iustam consistentiā. Massa relicta subigatur in mortario marmoreo, cum pistillo ligneo, eoque, donec exquisitè & æqualiter omnia vniantur. Hinc formentur trochisci, qui lento calore siccantur. Seruentur in pyxide terrea. Aquositas ponatur cum priore pro aqua restrictiua.*

### Extracta.

Extracta.

*Huc pertinent & alia extracta, tam simplicia, quam composita, vt extractum radic. tormentillæ, pentaphylli, bistortæ &c.*

*Ceræ quoque in pomo asso vsus multum in dysenteria laudatur, & medicamentum hoc hodie non infrequensè Valeriol. lib. 3. obs. 4. innotuisse puto. Is enim cum virum desperatâ dysenteria laborantem, & qui iam moriturus credebatur, curaret, ac medicamentâ multa frustra tentaret, tandem ægrum medicamento hoc à muliere suggesto sanatum fuisse refert. Iussit nimirum mulier pomum integrum excuare, & cauum cera alba vel citrina mundissima replere, & indito operculo prunis admoueri, donec cera liquefceret, & pomi substantiæ admisceretur, idque ante omnem cibum ægrum esitare mandauit. Quod medicamentum nec Valeriola improbat, & à multis hætenus felici cum successu vsurpatum est. Etsi enim Serapio, lib. simpl. part. 2. cap. 10. de cera scribat: Ceram non esse ex medicamentis, quæ corpus ingrediuntur, sed tantum quæ extra imponuntur: tamen si moderatè sumatur, vim habet emplasticam, quâ agglutinare vlcerâ intestinorum, & lentore suo lenire potest. Et iam olim Dioscorid. lib. 2. cap. 76. de cera scripsit, eam dysentericis in sorbitione dari. Et Galenus, 2. de simpl. medic. fac. cap. 12. Ceram interdum intestinis infundi posse concedit, vt humores mordaces temperet. Etsi verò putat Valeriola, vim ceræ ad intestina vlcerata perungere non posse, quod crassitie sua emplasticâ vi in primis hæreat partibus, glutinis modo sese affigens: tamen quod minus id fiat, pomum assatum facit, cuius substantiæ per minima permiscetur, quæ ipsi loco vehiculi est: quod ipsum etiam fatetur & agnoscit Valeriola. Mauult tamen in malum cydonium ceram liquandam imponere, quam intra pomum, vt simul adstrictoriam & glutinatoriam vim idem medicamentum habeat, quod facillè concedimus. Nisi forsan pomum ideo conuenientius sit, quod aptissimum vehiculum est, ad ceram per intestinorum gyrum deducendam. Alij non tantum ceram sumunt, sed quidam gummi Arabici & ceræ alb. an. Drach. s. vel Drach. j. pomo, pyro vel cydonio superiore parte excuato includunt, & sub cineribus pomum stappâ canabina inuolutum assant, vt mollescat, idque mane & vespere exhibent. Quidam ceram albam & mastich. gr. iij. vel iv. sumunt. Solenander, lib. 4. conf. 9. turtorem ceræ Vnc. j. infarcit, in aqua coquit, & postea cum carnem edendam, tum iusculum cum pane sumendum porrigit. Non tamen statim in principio hoc medicamentum vsurpandum, sed in contumaci dysenteria, vbi vlcus satis abstersum est.*

*Aqua Thermales.**Aqua thermales.*

Commendantur & aquæ thermales cum potu sumptæ, tum per clysteres iniectæ; testanturque plures Medici Itali, multos dysenteria laborantes, cum constante ætate, tum pueros & senes decrepitos, qui innumera alia remedia frustra experti fuerant, re penè iam desperatâ, hoc vno auxilio euasisse. Commendant a. imprimis Villenses, Calderianas, Teruccianas, B. Virginis. Videatur Andreas Baccius, Vidus Vidius Fallopius, Hercul. Saxon. Fonseca, tom. 2. conf. 91. Refert etiam Ioh. Bauhin. ex Rulando, dysenteriam sanare aquas plumbarias, Cellenses, VVerdingenses. Idem lib. 3. de aqu. medic. c. 44. ex Ranzio ad dysenteriam valde commendat fontem quendam Narbonensem appellatum, qui totus argillaceus sit, nec aliud, quam argillam exhibeat, & proinde huic affectioni ferè totus & vnicè dicatus sit. Et ipse Bauhinus, loco citato & lib. 2. c. 21. fontem suum Bollensem, quod item argillæ sit particeps, nec non ob bitumen, saltem & alia admixta purgandi nonnihil & abstergendi vi polleat, præmissis præmittendis, in dysenteria prædicat. Nec mirum thermas in dysenteria multum præstare; cum vna opera pluribus scopis satisficiant, acres scilicet humores diluant & deturbent, fordes ulcerum detergant, & ulcera ipsa egregiè consolident.

*Clysteres.**Clysteres.*

Si malum sit in intestinis inferioribus, etiam clysteres adstringentes parari & iniici possunt.

℞. Hord. parum torrefacti, fol. plantag. myrti, verbasci an. M. j. flor. rosar. rubr. M. ℞. Coq. in aqua simpl.

Colat. ℞. ℥. j. vel Vnc. xv. Add. succi plantag. Vnc. ij. pinguod. hircini Vnc. j. F. Clyster.

Vel ℞. Centumnodia, Plantag. an. M. j. verbasci, burs. pastor. flor. rosar. rubr. an. M. ℞. Coq. in aqua bordei simpl.

Colat. ℞. ℥. j. mell. rosar. colat. Vnc. ij. F. Clyster.

Vel ℞. Rad. tormentill. consol. maior. an. Vnc. ℞. plantag. centumnodia an. M. j. rosar. rubr. M. ℞. Coq. in lacte, in quo lapides igniti extincti sunt.

Colaturæ ℞. ℥. j. mucilag. sem. cydon. Vnc. ℞. succi plantag. Vnc. ℞. F. Clyster.

Operosior est hic, quem Amatus Lusitanus, cent. 2. curat. 44. habet, quem ideo propono, quia omnia ferè medicameta continet, è quibus tales clysteres parantur.

℞. Rad. tormentill. rosar. rubr. siccat. fol. symph. plantag. polygon. verbasci. an. M. j. sumach. bursa pastor. cortic. granat. balaust. gallar. oryza tosta an. P. j. rad. symphyt. Vnc. ℞. Coq. in aq. pluui. chalybeata ad consumpt. tertiæ partis.

Colaturæ express. ℞. ℥. j. succ. plantag. Vnc. j. acacia, hypocist. an. Drach. ij. sang. dracon. bol. Armen. terra Lemn. an. Drach. ℞. seu hirc. Vnc. j. ol. rosar. myrtillor. an. Vnc. ℞. F. Clyster.

Tales v. clysteres sæpius iniicere vrile est, solisque interdum clysteribus morbus hic curatur: & possunt clysteres abstergentes cum adstringentibus permutari & per vices nunc hi nunc illi iniici.

*Topica.**Topica an in dysenteria vrilia.*

Non solum a. assumenda, vel per clysteres iniicienda talia medicamenta, sed & extra ventriculo & toti ventri applicanda Sunt quidem nonnulli, qui putant topica frustra vsurpari; cum per cutem, musculos abdominis, peritonæum, omentum, faciliè ad intestina penetrare non possint. Imò sunt, qui eadem nocere existimant, utpote quæ ex venis partium externarum humores exprimant, & ad intestina protrudant; atque citant Gal. qui 1. ad Glauco. c. 14. scribit, quod eo magis fluxus augetur, quò quis magis cutem densauerit. Verùm rectè

Aëtius, tetrabib. 3. serm. 1. cap. 45. scribit, si tormina augeant, ad cataplasmata confugiendum esse, quæ multis non dolorum modò, verum etiam totius mali obliterationem induxerint. Et postea, mirificè etiam emplastra, quæ cruentis vulneribus adaptata sunt, conducere scribit, postquam quieuerint inflammationes, ventri ac lumbis totis, vsque ad dorsum imposita; qualia sunt Barbara appellata, & quæ ad fracturas apparantur. Vnde bene Alexand. Massarias illis, qui topica improbant, experientiam opponit, quæ sæpenumèrò demonstrat, huiusmodi externa medicamenta ad partes etiam penitiores deferri, atque inde dolorem lenitum, & intestina roborata fuisse. Neque metuendum est, ut maior ad intestina affluxus eorum vsu concilietur. Etenim humores, qui ad intestina feruntur, non fluunt per venas, quæ ad externas abdominis partes pertingunt, sed per venas mesaraicas; quæ cum ab adstringentium vsu etiam contrahantur, fluxus hoc etiam modo sistitur. Galenusque, allegato loco, nihil aliud docet, quam vbi ex toto corpore humores ad intestina confluunt, poros cutis non occludendos esse, sed dandam operam, ut ij pateant, ut postea quoque de diætâ diceretur.

De cataplasmatibus tamen & fomentis idem Aëtius, loc. alleg. hoc monet, ea in dysenteria à bilis acredine, ut & in cancriosis & malignis vlceribus non conuenire; cum aquosam pattem absument, mordacitatem verò relinquant.

Adstringentia quod attinet, Gentilis, in Auicenn. lib. 3. fen. 16. tr. 4. monet, adstringentia extra applicata in obesis quidem non conuenire, cum penetrare non possint. Concedit verò in macilentis & pueris. Monent quoque plerique de adstringentibus, iis acutum vel vinum album tenue admiscendum esse, quò medicamentorum facultas facilius penetret, eaque eligenda esse, quæ nec actu admodum sunt frigida.

Applicantur formâ linimentorum, vnguentorum, cataplasmatum, emplastrorum, fomentorum; quò & infessus pertinent.

Emplastra tamen maiorem habent efficaciam, quam cerota: Cerota rursum, quam vnguenta, ut habet Sauonarola.

*Linimenta & vnguenta.*

Venter nimirum inungatur oleo mastichino, cydonior. myrtino, rosaceo, ablinth. menth. & postea ceratum aliquod vel emplastrum conueniens imponatur; ut vnguentum comitissæ, Varignanæ, item vnguentum de corticibus castanearum, quod Montagnana, Antidotar. cap. 1. describit.

Vel ℞. Ol. cydon. rosar. mastich. an. Vnc. j. seu hircini Vnc. ℞. ol. nucis mosch. express. Drach. j. corall. rubr. prepar. Drach. ℞.

F. Linimentum.

Vel ℞. ol. rosar. omphac. myrtin. an. Vnc. j. mentha. ablinth. an. Drach. ij. flor. rosar. rubr. mastich. nuc. mosch. corall. rubr. an. Drach. ℞. Cum modico cera.

F. Vnguentum.

*Cataplasmata.*

℞. Panis alb. ℥. j. carn. cydon. ℥. ℞. absinth. siccat. menth. an. M. j. balaust. Vnc. ℞.

Coqu. in vino rubro ad mollitiem, contendantur minutim & per setaceum trahantur, addaturque pulu. nuc. moschata Drach. j. mastich. Drach. j. galang. caryophyl. an. Drach. ℞. Cum ol. absinth. & mastich.

F. Cataplasma.

Vel ℞. Diacydon. crassius (grob Quittenbror) Coqu. in ol. rosar. & vino rubro chalybeat. quod toti ventri imponatur.

Vel ℞. Rosar. rubr. santal. omnium, myrtill. an. Vnc. ℞. bol. Armen. sang. dracon. aut rad. tormentill. an. Vnc. ij. puluerisata misceantur cum succo plantag. cydon. & pauco aceto. F. Cataplasma.

Laudatur

Laudatur & Cataplasma ex Theriaca & Terra sigillata ventri impositum.

### Emplastrum.

Emplastrum.

Inter reliqua præcipue hîc celebre est Emplastrum Diaphænicum Mesue, frigidum imprimis, quo calente torus venter obtegatur.

Vel *℞. Carnis Cydon. sub cineribus coctior. Vnc. 14. radic. consolid. maior. similiter coctar. contusar. & per tribrum traiectionum hypocyfid. acacia. bol. Armen. tragacanth. mastich. an. Drach. j. β. ol. cydon. myrtin. an. Vnc. j. β. succ. cydon. plantag. acet. rosacei & passular. an. Drach. vj. farin. milij q. s. Addatur cera, & fiat Emplastrum, quod à Cratone commendatur.*

*℞. Ment. absinth. an. M. j. rosar. rubr. balaust. an. M. β. granor. & fol. myrtill. an. Dr. j. β. sumach. nucis moschat. rad. pentaphyll. serpentar. an. Drach. ij. gallar. acacia. an. Drach. j. β. hypocyfid. cortic. thur. mastich. an. Drach. j. lapis hamatit. Drach. β. ol. myrtin. mastichin. resin. cera an. q. s.*

F. Cetatum.

Reinerus Solinander, *sect. 4. consil. 9.* Emplastrum sequens in omni fluxu tam hepatico, quam dysenterico excoriatiuo, antiqua Diarrhæa & similibus mirè profuisse scribit, neque ob adstringentia formidandum esse, cum eadem sint multis epaticis & roborantibus temperata.

*℞. Eupatorii, schœnant. an. M. j. spice Indic. pag. β. mastich. macis. an. Vnc. β. ligni aloes opt. Drach. iij. myrobalan. Chebular. Emblicar. torrefact. an. 3. j. boli Armeni terra sigillata, lapid. hamatita an. Drach. vj. coriandri preparat. Vnc. j. β. spody Drach. ij. rosar. Vnc. j. spec. diorion. santal. sine camphora. Vnc. β. scoriar. ferri preparat. Vnc. j. farina hordei Vnc. ij. olei mastich. myrt. an. q. s. ad impinguandum, cum modico aceti.*

F. Emplastrum, quo totus venter tegatur, à cartilagine scutiformi ad os pectinis.

Emplastrum plurima describuntur à Sauonarola.

### Sacculi & Fomenta.

Sacculi & Fomenta.

*℞. Rosar. M. ij. absinth. menth. an. M. j. nucis moschat. rad. cyperi, mastich. galang. an. Drach. j.*

Cum linteo albo F. Sacculus iustæ magnitudinis, qui vel siccus vel in vino calefactus ventri imponatur.

Aut *℞. Centummod. verbasco. plantag. rosarum an. M. j.*

Coq. in aqua fabrorum & vino rubro profotu ventris.

Aut *℞. Absinth. menth. plantag. fol. quercus. summit. rubi. caud. equin. centummod. an. M. j. flor. chamamel. P. ij. rosar. rub. M. β. gran. myrtill. Vnc. j. sem. sumach. plantag. coriandr. an. Drach. vj. nuc. moschat. num. iij.*

F. Decoctum in aqua chalybeata & vino rubro, quo venter foueatur.

Vel *℞. Crusta panis* parum torrefact. & affund. acet. vini q. s. atque inspergatur pulvis conueniens & ventri imponatur.

Vel *℞. omentum veruueis calefact. in ol. hyperici, & ventri imponatur, quod simul dolorem lenit, & fluxum sistit.*

Vel *℞. Emplastri contra rupturam, diaphænic. cerot. stomachal. an. Vnc. ij. mastich. thur. boli Armen. sangu. dracon. an. Dr. j. lap. hamatit. Dr. ij. succi plantag. Vnc. ij. ol. myrtill. cydon. an. Vnc. j. β. cera, terebinth. an. q. s. F. Emplastrum.*

### Inseffus.

Inseffus.

Nonnulli & infestatione vtuntur: inter quos est Leonhard. Iacchinus, qui in *9. Rhasi. c. 10.* hanc commendat.

*℞. Tenera germina quercus, baccas cupressi virides, nucis pineas virides, vel pini folia & coricem, Coquantur in aqua ad infestationem, quam secretum maximum ad pueros esse dicit, & se primum esse; ac calore actuali quidem auertere nonnihil ad cutem, qualitate verò medicamentorum strictiua, quæ per anum penetret vsque ad vltim.*

Vtetur etiam balneo in alui fluxu, qui ex medicamentis purgante ortum habet, Iohan. Anglicus, in *Practica.* Et quidem facit autotitate Auicennæ, qui in *Usurpatione* balneum præcipit, *lib. 1. sect. 4. doct. 5. c. 7.* Et Galeni, qui in *4. aphor. 5.* calida balnea purgationibus aduersari docet. Suo etiam tempore inseffus in decocto florum verbasci, fol. quercus & aliorum adstringentium in usu fuisse docet Sauonarola. *Matth.* quoque de *gradibus* infestationem vsque ad vmbilicum in decocto plantarum stipticarum commendat, ad fluxum sistendum, membra confortanda, acrimoniam materiz mitigandam, & dolorem leniendum.

Quamuis verò Hippocrates, *3. de vult. rat. in acut. text. 59.* fluente aluo balneum prohibeat: tamen id intelligendum est, vbi excrementis adhuc corpus abundat, atque aluus sua sponte fluit, & natura humores vitiosos eò protrudit. Tum enim balneis humores superflui ad aluum fluentes non sunt ad vniuersum corpus reuocandi, ne vel retenti & deteriores redditi postea maiori cum impetu & periculo ad intestina ruant; vel alium morbum grauiorem excitent. Vbi verò corpus maxima ex parte euacuatum est, & ex nimio fluxu periculum imminet (quod etià in dysenteria accidit, in qua vtilis quoque humores ob dolorē & irritationē ad intestina confluere solent) sine periculo humores ad intestina fluentes ad ambitum corporis reuocari possint. Et cum Hipp. *de affect.* si dolor in dysenteria vigeat, partes sub vmbilico calida multa lauare iubeat: triplicem usum balneum à Iacchino propositum, vel aliud simile habere potest, dolorē lenire, humores ad ambitum corporis ab intestinis, calore actuali reuocare, & tandem adstrictoria vi fluxum sistere. Neque metus est, vt ex cutis densatione fluxus versus interiora augeatur. Si frigida actu adhiberetur ista medicamenta, metuendum quidem aliquo modo hoc esset: at calor aquæ actualis omnē istum metum adimit. Et quanquam Iacchinus putet, ista medicamenta vim suam saltem per anum exserere: ego tamen existimo, per ipsam quoque cutem penetrare; quo modo felici cum successu sæpè alia topica ex talibus medicamentis composita & in dysenteria & in aliis alui fluxibus sistendis ventri adhibentur. Et omnino eadem ferè ratio est infestationum, quæ fomentorum, sacculorum, cataplasmatum, linimentorum, vnguentorum, emplastrorum, quæ omnia tum ad dolores leniendos, tum ad fluxum sedandum vsurpari solent, de quibus supra in genere de Topicis dictum.

Usus balnei in dysenteria.

Hoc tamen de infestationibus monendum, si fomenta, cataplasmata & reliqua topica non sufficere videantur, & propterea ad infestationem accedendum quis putet, non temerè hoc faciendum, sed naturam dysenteriz & totius morbi constitutionem, ægri vires & alias circumstantias diligenter considerandas esse. Si enim corpus humoribus vitiosis plenum sit, dysenteria sit maligna, febremvè coniunctam habeat: quiuis facile intelligit, ex balneo eiusmodi tum plus damni, quàm commodi sperandum esse.

Infessus quia cum cautione usurpandi.

Sauonarola & Matth. de Gradibus cum Auicenna *16. tert. de cum flux. absolut.* expertum esse dicit, quod cucurbitulæ supra ventrem positæ fluxum sistunt, & ipse quidem magnam super vmbilicum, & si fluxus fuerit vehemens, duas alias in lateribus ponit. Verù forsan hoc in aliis potius fluxionibus, quàm dysenteria locum habet.

Cucurbitula ventri applicata.

Nonnulli & suffumigia ano excepta commendant, & inter ea præcipue ex anguillis vltis, vt & corticibus pini. Benedict. Viêt. Faurentinus, in *Empir.* valde commendat hoc; si æger per tres vel quatuor dies manè & vespere sedeat super lamellam ignitam, cui terebinth. opt. vel resinæ pini Vnc. j. sit imposita. Mirabile porro, præsertim in dysenteria puerorum, docet esse, si singulis diebus manè & vespere ægri anus suffumigetur puluere stercoris asini iuuenuli, in furno cautè siccato, ne aduratur, carbonibus ignitis insperso. Laudat etiam acetum ignitæ ferri laminæ inspersum & ano exceptum.

Suffumigia ano excepta.

Possunt

Possunt quoque fomenta ipsimet ano subinde imponi. Quale hoc est, quod idem Fauentinus valde laudat.

*℞. Melissa lb j. verbasco. M. j. Incluantur sacculo oblongo, qui postea in vini rubri stiptici & aceti fortissimi an. f. q. coquatur ad tertias, & postea calidus ano imponatur.*

Nonnulli ad Dysenteriam sistendam lauant pedes ex decocto radic. & fol. tormentill. Alij iubent pedes imponere per horæ quadrantem acetum, in quo scoriæ ferri sunt calefactæ.

Gattinaria & Benedict. Viç. Fauentinus eiusmodi decoctis & manus & pedes lauant Bened. Viç. Fauentinus *℞. scoria ferri aceto prepar. limatur. chalybis aceto prepar. an. lb. j. ebullire sinit in lb. ij. aceti fortissimi, ad consumpt. medietat. Diebus singulis mane & vesperi per dimidiam horam plantas pedum, & volas manuum in aceto hoc ægrum detinere iubet, scribitque, esse hoc secretum ad sistendum fluxum dysentericum.*

### Mundificantia vlcus.

*Mundificantia vlcus.*

Etsi verò sapissimè ista, quæ hætenus proposuimus ad fluxum sistendum, medicamenta etiam ad vlcus sanandum sufficiant, si morbus nihil aliud mali adiunctum habeat, quam vitium humoris affluentis, & intestina abradentis; & propterea eo absterfo, euacuato, eiusque fluxu sedato vlcus facile sanetur: tamen si dysenteria perseueret, & vlcus sit profundius vel sordidius, vel putridum, serpens, vel phlegmonodes, alia medicamenta potè adhibenda, atque ea vsurpanda, quæ non solum abstergunt, sed & mundificant vlcus, implent & agglutinant. Quamquam ex superioribus multa sint, quæ scopis hæc satis facere possint, & abstergentia antea enumerata plerumque sufficiant. Medicamenta Mundificantia leniora sunt; Decoctum hordei, furfuris, parietaria, lupinor. amygdal. amar. addito saccharo rubro, serum lactis, hydromel, quæ per os tutè exhibentur.

Valentiora sunt: Decoctum prassij, gentiana, aristoloch. muria oliuar. urina hominis; atque hæc per Clysterem iniiciuntur.

Vehementissima sunt, quæ à Galenò proponuntur. 9. de compos. medic. secundū loc. c. 5. charta combusta, cadmia, sandaracha, calx viua, squama, aris, as vstum. sulphur. Et inter composita trochisci de charta combusta, quorum descriptio ibi circa finem reperitur.

Iniiciebant hæc veteres per Clysteres, & quidè in sordidis & putridis intestinorum vlcibus ad pondus Drach. j. vel circiter, in suff. quant. feri lactis chalybeati.

Sed mitiora semper vsurpare præstat; præsertim vbi exulceratio exigua est, ne fortiorum vsu humores sua natura mordaces aciores ac deteriores reddantur, & temperies ac calidum natium intestinorum lædatur.

In exulceratione etiam magna corrosiua, quæ intestina superiora occupauit, mediocribus; in ea, quæ inferiora, vehementioribus in minore dosi vrendum. Verum desperata propemodum res est, vbi ad talia confugere necessitas postulat. De omnibus autem mundificantibus & detergentibus hoc obseruandum, cum eorum vsu dolor exasperetur, reddito clystere, alium ex lacte iniiciendum esse, qui intestina oblinat & dolorem leniat.

### Implentia cauum vlcus.

Vbi vlcus mundatum fuerit, plerique autores etiam implentia cauum vlcus, & consolidantia præscribunt. Non ramen malè monet Gattinaria, de curat. agriud. corp. cap. proprio, medicum semper magis sollicitum esse debere de absterfione & mundificatione, quam consolidatione: quia post abstergentia bene adhibita Natura ex se possit incarnare, etiam non adhibitis consolidantibus.

Implentia cauum vlcus *Σαρκωτινὰ* dicta parantur ex sarcocol. mastich. tragacanth. ladan. hypocistide, cort. thur. sangu. dracon. C. C. vsto, bol. Armeno, terra sigil.

Quibus & per os sumptis plerisque vti licet ad scrup. ij. vel Dr. j. cum vino adstringente vel conseru. rosar. & per inferiora iniectis cum lacte chalybeat. Vnc. vij. vel viij. à Drach. ij. ad Drach. iij. vel iv. E. g. Clyster talis Fiat.

*℞. Flord. excortic. fol. plantag. burf. pastor. sanguinar. equiset. an. M. j. fl. rosar. rub. M. B. Coq. in f. q. aqua vel lact. chalybeat. pro Vnc. viij. vel x. Colat. add. pulu. bol. Armen. sangu. dracon. mastich. thur. gumm. Arabic. tragacanth. an. scrup. ij. succ. plantag. Vnc. j. vitell. oui assati. F. Clyster.*

### Agglutinantia & Cicatricem Indacentia.

Ad agglutinandum etsi ferè ea, quæ supra ad fluxum sistendum proposita sunt, sufficere possint: tamen quædam repetere & iis adhuc addere libet.

Inseruiunt huic vsui Spica nard. myrrh. thus, cortic. thur. iris, aristoloch. rad. cyperi, caryophyllat. tormentill. acetos. bistort. consolid. solidag. verbasco. polygon. equiset. sanicula, fragar. pileoll. pyrola. potentilla, lysimachia, virga aur. veronica. Vt:

*℞. Rad. Consolid. maior. Dr. vj. fol. plantag. alchymil. fragar. sanic. an. M. ij. balanst. myrrill. an. Drach. ij. rosar. rubr. M. B. Coq. in aq. f. lb. j. ad consumpt. tertia partis, Colat. add. syrup. de rosis siccis. myrrill. vini cydon an. Vnc. j.*

M. pro 3. vel 4. dosibus. Clysteribus etiam addi potest Drach. j. vel ij. trochisc. de charabe. de sp. & seui hircini Vnc. j. & similia.

Tempore æstiuo & cum copia est recentium herbarū, *℞. Succ. plantag. polygon. equiset. seui hircin. an. Vnc. iij. Mixtis adde boli Armen. sangu. dracon. vel lapid. hamatis. mastich. an. scup. ij. F. Clyster.*

Galenus, in *Εὐνοσις*, c. 20. plantaginem cum oryza exactè coctam dat in cibo. Eius quoque succum adiecto adipe hircino pro clystere iniicit, & myrti baccas cum vino coquit, vbi febris abest, præsentè verò eà, cum aqua.

Videantur plura ibid. & in 9. de compos. medicament. secundum loca, cap. 5. & apud Aetium, qui diligenter hæc persecutus est, tetrabil. 3. serm. 1. cap. 45. Lang. l. 3. Epistol. ir. 3. Pract.

### Curatio Dysenteria à medicamento purgante & veneno.

Etsi quæ ratione Dysenteria à medicamento purgante vehementiore, aut veneno hausto concitata curanda sit, ex superioribus patere possit: tamen ut quædā in specie de iis dicamus, si à medicamento purgante vehementiore, ut scammonio, colocynthide vel simili sit dysenteria, primò abstergentia exhibenda, ut Decoct. hordei, cum syrupo rosar. solutiuo vel simpl. infusion. Deinde exhibenda Theriaca, quæ non solum, quatenus vim habet narcoticam, & humoribus contrarium motum, à centro scilicet ad circumferentiam conciliat, prodest; sed etiam, quatenus malignorum medicamentorum & venenorum est antidotum. Prodest & lactis tepidi potus. Extra inungendus venter oleo mastich. cydonior. ablinthij. menthæ, vel cerotum stomachale aut simile imponendum.

Si à veneno hausto sit dysenteria, primò, quod in omnibus etiam alijs venenis ore sumptis primum esse debet, danda opera, ut statim vomitu reiiciatur. Secundò cum pleraque simul acrimoniam habeant, & intestina vellicent, ea, quæ eam obtrudunt, exhibenda iuscula pinguia, lac, oryza, amyllum, ptisana. Tertio simul exhibenda Antidota, ut Theriaca vel alia. Imprimis hic commendatur Smaragidus, cuius præparati gr. vj. exhibentur, & decem horis æger à cibo abstineat. Sudor enim solet paulò post sequi, quo erumpente ægri liberantur. Tinctura eiusdem etiam hîc efficax est. Extra quoque ventri applicari potest. Atque Auenzoar, cum in itinere in Siciliam, herbam quandam ignotam comedisset, atque inde in dysenteriam incidisset, supra ventrem Smaragidum

*Agglutinantia & Cicatricem Indacentia.*

*Dysenteria à medicamento purgante & veneno.*

*Dysenteria à veneno.*

*Smaragidus*

*Lotiones pedum & manuum.*

*Implentia cauum vlcus.*



ragdum apposuit, quo modo à dysenteria liberatus est. Vtilis etiam est Crystallus.

*Dieta.*

Medicamentis Dieta respondeat. Aer sit temperatus, & potius ad caliditatem, quam frigiditatem declinet. Erit enim sæpe causa morbi calida sit: tamen ægrum in aere frigido versari non conuenit. Etenim cum acrimonia quædam humorum, & plerumque etiam malignitas in dysenteria adsit: vtile est, corporis poros semper patentes seruare, vt maligni acres vapores exhalare possint; quod nisi fiat, & pori constringantur, humores vaporesque magis ad interiora corporis pelluntur, malumque augent. Ideoque tempore paulò frigidore, præcipue in locis hisce septentrionalibus, cubiculum ægri calefacere vtile est, commodumque, vt æger in lecto rectus se contineat. Et cum alui deiciendi gratiâ sæpe ægrum è lecto surgere necessum sit, cubile, in quo æger decumbit, non sit frigidum.

Cibum & Potum quod attinet, ad frigidum is declinet, cum morbus est à causa calida, simulque vim adstringendi in morbi progressu, atque intestina & ventriculorum roborandi habeat, omni verò acrimonia, falsedine, & nimia aciditate careat. Initio victus sit tenuis, quantum vires permittunt, præsertim si febris sit coniuncta. Non solum enim ob febrem facultas animalis læditur, sed imprimis in ventriculo & intestinis vis coëctrix & retentrix est labefacta. Auicenna equidem famem biduanam præcipit: cuius tamen loco hoc æuo præstat dietam tenuiorem adhibere. Hinc Galen. lib. 2. de med. facil. parab. cap. 20, ait, optimum dysentericæ remedium esse cibi paucitatem.

Cibi ipsi sint simplices, facili coëctionis. Ideoque iis, qui delicate viuere consueuerunt, non facile cibi duriores & cocti difficiliore exhibendi, quamuis astringendi vim habeant; ob facultatem coëctricem ventriculi & intestinorum languentem, quæ tales non facile concoquere potest. Quia in re vulgus sæpe peccat, qui Dysentericis cibos durissimos & difficilis coëctionis exhibet, modò vim adstringendi habere videantur, atque ita cruditates cumulat & malum auget. Imprimis verò ij peccant, qui oua indurata aceto cocta ægris exhibent. Nam & ipsa oua indurata difficilis coëctionis sunt, ac in ventriculo debili facile corrumpuntur; & acetum intestina mordicat ac vellicat. Hinc etiam lentes, fabæ, pisa, panicum, panis bis coctus ater, & castaneæ, non omnibus conuenire videntur; cum sint difficilis coëctionis, sed iis tantum, qui iis sunt assueti, & ventriculorum adhuc robustum habent. Exhibenda potius iuscula ex hordeo & ptisana hordeacea vel auenacea: item iuscula ex pane albo in vino cocto addito butyro & vitellis ouorum. Nec inutiles sunt fructus cynosbati, cerasa acida siccata, myrtilli nostri. Et imprimis ij cibi vtilis sunt, qui visciditatem & vim aliquam emplasticam ac humorum acrimoniam obrudendi habent, quales sunt ex oryza, amylo, &c. Commendatur & lac vaccinum, si febris absit & nihil aliud eius vsum prohibeat, de quo postea quaestione 5. dicitur. Si acrior sit fluxus, aqua vel simplici vel destillata aliqua temperari potest. Vtile est & lac mulieris boni habitus, victusque bonam rationem seruantis, refertque Guiliel. Fabricius, de Dysenteria c. 7. se cum puerum trium annorum circiter longo alui fluxu modò dysenterico, modò lienterico curandum haberet, & medicamentis nihil proficeret, authorem fuisse matri, quæ denuo pepererat, vt puerum ablactatum iterum lactaret, idque feliciter successisse, puerumque hoc modo bonam valetudinem & vires recuperasse.

Dum vlcus abstergendum est, exhibeatur aqua hord. aut hydromel. vel serum lactis. Dum adstringendum & consolidandum est, etiam similis victus conuenit. Ideoque vsurpatur oryza vel sola vel cum lacte cocta. Non solum enim nutrit, sed & consolidat: potestque

vbi magis adstringere animus est, C. C. vsum, corall. terra sigillata. genitale cerui siccatum, tormentilla addi, vt & amyllum. Vtile est etiam plantaginem cum oryza coquere. Conueniunt quoque cydon pyra. poma acida sub cineribus assata, melpila, lentes biscoctæ, abiecta priore aqua.

Præstans etiam in hoc morbo auxilium lac amygdal. dulc. cum aqua, plantag. vel tormentill. & rosar. paratum, & parua sacchari quantitate adiecta.

Lumbricos terrestres lotos concisos, & cum carne castratorum coctos, si eorum iusculum ægro exhibeatur, mirum in modum dysentericis prodeesse sæpissime se expertum esse scribit Guilielmus Fabricius: dolores enim lenire, & quæ in intestinis sunt vlcera & vulnera facultate quadam specifica consolidare; teste etiam VViero de Scorbut. Sed quia simul urinam potenter mouent, non nisi expurgato corpore & ante cibum tales exhibendos monet.

Carnes in hoc morbo secundum Serap. non ita vtilis sunt: si tamen morbus protrahatur, iis quoque vtiliter licet. Vescendū autem potius animalibus syluestribus, quam domesticis, & volatilibus potius, quam quadrupedibus. Commendatur hic caro turtur. perdix. turdus. gallin. leporis, capreoli, cerui, præcipue epar gallin. splen capræ assatus, vt & epar veruecis in dysenteria commendatur. Acrius carnes ebullire sinit in posca additis myrti baccis, quas deinde assat. In virium lapsu ius consummatum conuenit, cui modo dicta adstringentia addi possunt.

Pinguedo castratorum iusculis admista dolores valde lenit, & vlcera intestinorum sanat. Parantur etiam ex cydon. pomis acidis, pyris varia edulia huic morbo conuenientia. In principio pastus æger semper aliquid styptici assumat: vt confert. rosar. diacydon. s. vel simile quid. Vtilis est & panis bis coctus albus. A iusculis & forbitionibus absteineat æger, nisi facultate adstringendi sint præditæ. Vitentur pisces, caro suilla, & omnia, quæ humectant & difficulter coquantur, cibi item peregrini & quibus æger non est assuetus. Cibi item calidi & multis aromatibus conditi. Sacchari & mellis vsus multis noxius est: cum facile in bilem mutantur, & humoribus admisti eos acriores reddant, & sua acrimonia intestina ad excretionem incitent.

De saccharo in specie hoc notandum, non solum illius vsum in dysenteria parum esse debere, sed quoque farinam sacchari potius vsupandam esse, quam saccharum finum dictum: cum in clarificatione & depuratione lixiuium è calce viua adhibeatur: vnde sacchar. aliquid acrimonie acquirit.

Quantum ad potum: Parcè bibere præcipuum auxilium est. Paulus & Aëtius aquam pluuialem præbent, in qua fructus adstringentes sint decocti, præsertim sumach, acetos. plantag.: sed hæc non nisi assuetis conuenit. In nostris regionibus vtilis est cereuisia pura. Amatus Lusitanus, cent. 2. curat. 46. refert, Iuuenem biliosum, cum biliosis deiectionibus vigente ætate dysenteria affligi cœpisset, cumque Medicorum consilio destitueretur, copiosiore aqua frigida vsum, atque inde sanitari restitutum fuisse. Quod tamen non nisi in regionibus calidis, tempore calido & bile valde abundante alios imitari decet.

Vinum etiam, in quo gnaphalium coctum sit, efficax, ad dysenteriam curandam esse scribit Dioscorid. lib. 3. cap. 115. Possit etiam hic locus habere potus Tabernæmontani, cuius supra facta est mentio, ex argilla fornacum: ego tamen malim ex terra, vel bolo Armeno talem potum parari.

De lacte iam anrea diximus. Vbi hoc dare non licet, talis potus paratur:

℞. Hord. M. j. malor. cydon. exiccat. prun. sylu. exiccat. an. Vnc. j. glycyrrh. assular. an. Vnc. s. sem. papau. albi Dr. ij. Coq. in aq. lb. vj ad remanentiam lb. i v.

Postea adiectis cinamomi Dr. vj. vase recto calens adhuc

Lumbrici terrestres, quo modo dysentericis exhibentur

Potus.

*[Handwritten signature]*

huc decoctum aliquandiu aſſeruetur, & poſtea per manicam Hippocratis traiciatur. Vel fiat talis Emulſio.

*℞. Amygal. dulc. excortic. Vnc. j. ſem. melon. excort. papav. albi. an. Vnc. ſ. aq. bord. ſ. lb. j. ſ. fragor. ſ. vino, tormen-til. plantag. an. Vnc. iij.*

F. Emulſio, quæ & dolores lenit & acres humores temperat.

Vbi vires deficiunt, vinum adſtringens rubrum, aqua fontana, ſi opus ſit, in quâ chalybs vel aurum ignium exſtinctum ſit, dilutum, aut in qua plantago cocta ſit, vel macerata, commendatur.

Et cum facultas coctrix hic laborer, vini uſus ſæpe utilis & neceſſarius eſt, eumque hâc ipſâ dyſenteria epidemia aliquot bene ceſſiſſe obſeruavi.

Imprimis vtile eſt vinum, in quo pruna ſylueſtria exſiccata infuſa ſint; addi etiam poteſt vino ſuccus vel ſyrupus mali punici, citri, ribes, berberis.

Quies maximè probatur: motus vitetur, ne magis fluxus irriteretur.

Indulgeat ſomno æger ſeu noctu ſeu interdium, quando poteſt: cum ſomnus & quies omnes fluxus ſedat, dolores ſopiat, viresque reſiciat. Ideoque ne æger ob alui deiectionem ſæpe de lecto ſeſe mouere, & proinde etiam aëri frigidiore ſeſe exponere neceſſe habeat, commodum eſt, peluim ægro in lecto ſubiicere, cuius generis aptiſſimam deſcripſit Guilhelmus Fabricius, *de dyſenteria cap. 7.* Caueat immodicos affectus animi, quibus humores in corpore agitantur & perturbantur.

Excrementa ægrotum ſtatim remoueantur, ne aliis moleſta ſint, & contagio eos inficiant. Et propterea vel in profluente abicienda, vel defodienda & calce viuâ tegenda. Stragula lecti ſubinde mutantur.

### QVÆSTIO I.

*Quidnam illud mucosum & album ſit, quod in dyſenteria excernitur?*

*Quid ſit mucosum illud, quod in dyſenteria excernitur?*

Mucosum & album quid cum ſanguine ſæpe in magna copia in dyſenteria excerni, notiſſimum eſt. Quid autem illud ſit, dubium. Nonnulli quidem exiſtimant, eſſe pinguedinem inteſtinorum abraſam: ſed maximè falluntur, decepti eo, quod viderunt inteſtina animalium maſtatorum cocta pinguedine intus inducta; cum tamen inteſtina à laniis inuerſa ſint, & pinguedo, ſi quæ adeſt, extra inteſtiniſ illis obducatur, intus vero omni pinguedine inteſtina deſtituantur.

Alij mucum illum, quo inteſtina ad excrementorum faciliorem tranſitum oblinuntur, eſſe ſtatuant. Verum tanta copia, tanta craſſitie & tamdiu, eſſi ex omnibus inteſtiniſ abraaderetur, excerni non poſſe, cuius hanc rem diligentius perpendenti facile patebit. Alij pituitam eſſe putant. Verum & id falſum; cum dyſenteria à pituita frequenter non oriatur, & ſi admiſceatur, non tamen tanta copia admiſceri poſſet, quantâ hic eiicitur. Platerus verò puſ eſſe ſtatuit, quod ab vlcerata inteſtinorum ſubſtantia veniat, quæ cum membranofa ſit, puſ eiſmodi viſcoſum, vti & in veſicâ vlcere fieri ſolet, proferat, quæ ab initio, dum recens eſt vlcus, ſanguinis notas, mox mucum illam tinctum adhuc, poſt vbi vlcus fordeſcere incipit, album magis producat.

Quam ſententiam vt planè non improbamus, ita rectè explicandam & ampliandam cenſemus, vt nimirum per puſ intelligatur id, quod non ſolū ex inteſtinorum & membranarum eorum corruptione & exulceratione, ſed etiam ex affluente humore & ſanguine provenit. Si enim mucosum illud ſolum puſ eſſet, quod ex membranis inteſtinorum intus exulceratis proveniret, ſine omni dolore & torminibus, vt in aliis partibus, efflueret. Quia verò cum torminibus & ſummo ventris cruciatu excernitur, è venis effluere ſimul, & membranas in tranſitu diſtendendo dolorem hunc excitare indicio eſt. Habent nimirum partes quælibet non ſolum vim ſanguinem & nutrimentum affluens in ſibi ſimilem ſub-

ſtantiam mutandi, ſed & puſ atque excrementa & humores præter naturam affluentes aliter atque aliter mutandi. Hinc aliud puſ ex læſa carne, aliud ex læſo neruo, membrana, tendine, ligamento redditur, atque illud ſæpe ſatis copioſum, & nunc aliter atque aliter ſeſe habens, prout pars bene vel malè conſtituta eſt, & plus vel minus humoris affluit. Ita ex neruis læſis & malè ſe habentibus magna ſæpe copia ſaniei profluit, quàm vulgò *das Gliedruaſſer* nominant, quod nihil aliud eſt, quàm ſanies, quæ ex partibus neruoſis læſis & calore præter-naturali præditis, & affluentes humores copioſos con-coquere non valentibus provenit. Ita ex articulorum iuncturis, tendinibus & ligamentiſ vulneratiſ magnam interdum puris copiam inſtar muci vel albuminiſ oui promanare videmus. Sic in pleuritide & peripneumonia, qui per pulmonem & tuſſim expurgatur ſanguis, in principio quidem interdum ſub ſua forma, in progreſſu verò morbi & coctione apparente, formâ ſputi albi, tuſſi reiicitur. Idem accidit in vterino fluore, ſeu menſibus albis, cum ſanguis, qui menſtruo tempore conſertim effluere ſolet, poſt tempus illud in veniſ iſſidem, per quas antea euacuabatur, hæret, ibique mutatatur & alteratur, & in mucosum illud, quod per vterum poſtea euacuatur, conuertitur, nunc album, nunc viſcens, nunc inodorum, nunc foetidum, pro natura ſanguiniſ & humorum ſanguiniſ permixtorum, ac ipſa vteri diſpoſitione, & per eaſdem vias, per quas aliâs ſanguis ſolet, eiicitur. Hæc enim duo puris & excrementorum varietatem faciunt, humores ſcilicet ſeu ſanguis affluens, & ipſa partis diſpoſitio, quibus aliter atque aliter ſeſe habentibus etiam illud, quod excernitur, aliter atque aliter ſeſe habet, & nunc tenue, nunc craſſum, nunc album, nunc ſpaſum, nunc viride, nunc varium, nunc inodorum, nunc foetidum redditur; id quod manifeſtè etiam in dyſentericorum excretis apparet.

Si quem tamen vocabulum puris, quo Platerus vitur, offendiſ, fateor & ipſe atque antea etiam monui, non ita propriè & non niſi lata quadam ſignificatione vocabulum puris excremento huic mucoso tribui poſſe. Veri enim puris alia eſt natura, quod etiam quandoque ex inteſtiniſ exulceratiſ excernitur: mucus verò hic ſæpe ſtatim in principio dyſenteria & quidem ſatis copioſè excernitur; & non tam ab inteſtinorum ſubſtantia in puſ mutata, quam ex ſanguine & humoribus ad inteſtina affluentibus, & ibi ab inteſtinorum *φλεγμονώδην διαθεσιν* habentium, temperie quæſa originem ducit. Eandem enim originem & generationis modum, vt modò dictum, habet hic mucus, quem ſputum in pleuritide, aut peripneumonia; aut *λίμνη* illa in ophthalmia ſæpe tam copioſè proveniens, vt ab ea palpebræ conglutinentur; vbi tamen nulla adhuc vera eſt exulceratio. Et rectè monet Fernelius, *lib. 6. de part. morb. & ſymp. cap. 10.* interdum mucosam quandam fordem ſubalbidam, & veluti limum faecesque ſanguiniſ melancholici, podiciſ venas exſpuere, atque multo interdum tempore eructare, poſt diuturnos ferè morbos melancholicos, duramque & laborioſam equitationem, quæ tamen puſ non ſit, nec ab inteſtinorum vlcere proveniat, multos tamen puris ſpecie ſefellerit. Non tamen propriam appellationem inuenit hoc inteſtinorum malè affectorum excrementum, ſicut in aliis partibus, cum in peripneumonia & pleuritide ſputi, in ophthalmia *λίμνη* nomine appellatur. Vnde forſan ob commodioris vocabuli defectum Platus puſ id appellavit.

### QVÆSTIO II.

*An Adamas venenum & cauſſa dyſenteria ſit?*

Adamantem venenatum eſſe, pulueremque eiſ dyſenteriam excitare plurimi ſtatuant. Ita Sant. Ardoyn. *li. 2. de venenis*, peculiare caput, quod ordine 23, eſt, proponit, in quo modò docet curandi dyſenteriam ab adamantis

*An Adamas venenum ſit & cauſſa dyſenteria?*

mantis scobe assumti excitatam ; quin etiam opobalsamum ex Auerroë hinc præcipue laudat. Sic Philip-  
pus Camerarius, *cent. 1. hor. succis. cap. 7.* ex Ioh. Ant. Me-  
nauij, *hist. Turcic. lib. 2. cap. 22.* refert, Baiazetem patrem  
Selimi Turcar. Imperatoris veneno ex Adamante con-  
trito à Medico quodam ludæo esse interfectum. Et A-  
ventinus, *lib. 7.* annotat, venenum illud, quo Henricus  
V II. Luztelburgius, Imperator Romanorum, à prædi-  
catorum ordinis Monacho in Eucharistia interfectus  
est, fuisse ex Adamantis polline paratum. Ita Paracelsi  
discipuli Paracelsum, cui omnes desperatos morbos  
curandi peritiam tribuunt, adamantis puluere, vt in-  
curabili veneno, ab aduersariis necatum narrant.

Alij contra vtrumque negant. Inter quos est Anshel-  
mus Boëtius, *de gemm. lib. 2. cap. 4.* qui ex Garcia ab Hor-  
to, *lib. 1. histor. arom. c. 47.* refert, mancipia quædam pluri-  
ma adamantes, vt furtum regerent, deuorasse, quos  
postea integros, absque iactura valetudinis, egresserunt:  
Mulierem etiam quandam marito antiqua dysenteria  
laboranti adamantis scobem per multos dies propinasse,  
absque vilo detrimento. Et Hieronymus Cardanus  
(et si postea *lib. 3. de venen. c. 23.* eundem inter venena re-  
ferat) *contradiçt. medic. lib. 2. tr. 5. contradiçt. 9.* scobem ada-  
mantis venenum esse negat, imò potius egregium &  
singulare cuiusdam difficilis morbi medicamentum  
esse affirmat. Atque hanc suam assertionem duabus hi-  
storiis comprobat: Scio, inquit; *Gemmarium quendam,*  
*qui mihi fassus est, se pluribus vicibus cuidam adamantem;*  
*drachma vnus pondere, sub forma pulueris seu scobis de-*  
*disse, non tamen magis obfuisse; quam si panem comedisset.*  
*Alius pariter nomine Franciscus Todefcbinus cum insani-*  
*ret, plures acies & frustra adamantis deuorauit, nec quic-*  
*quam passus est.* Hæc Cardanus. Ioh. Ant. Saracenus, in  
*Comm. de pest. cap. 7.* scribit, adamantem adeo Lugdu-  
nensibus in medico vfu efficacem haberi, vt seu hau-  
stus, seu sinistro brachio alligatus; venena omnia ir-  
rita facere, & pektiferis causis eximie resistere creda-  
tur. Imò iam olim Plinius, *lib. 37. cap. 4.* adamantem Cy-  
prium in medicina efficacissimum esse scripsit. Andreas  
Cæsalpinus, *lib. 3. Spec. medic. cap. 32.* negat & ipse, ada-  
mantem venenum esse, putatque, communem illum  
errorem inde exoriri, quod ea, quæ de Argyrodaman-  
te veterum, seu Talco dicta sunt, vero & genuino ada-  
mantis male tribuuntur.

Verum cum teste Auicenna, *lib. 2. tr. 2. cap. 693.* talcum  
non erodendo & dysenteriam excitando, sed potius  
strangulando sumtum noceat, & quidem in lamiellis ex-  
hibitum, puluis verò vtiliter contra sputum sangui-  
nis & dysenteriam exhibeatur: nec illa vis venefica  
Argyrodamanti ( si modò Talcum est Argyrodamas)  
tribui potest. Ideoque cum de vero adamante hinc con-  
trouersia esse videatur omnino, experientia amplius  
consultenda est. Historiæ tamen, quæ adamantem ve-  
nenatum non esse probant, & numero plures, & eu-  
dencia facti fide digniores esse: quæ verò in contra-  
rium adducuntur, non extra dubitationis aleam posi-  
tæ videntur.

Interim tamen hoc etiam monendum est, rationes,  
quibus probare conatur Anshelmus Boëtius, adaman-  
tem non esse venenatum, non satis firmas esse Vt de reli-  
quis non dicam, occulta qualitate homini noxium  
esse non posse ideo præt, quia à calore nostro alterari  
& in actum deduci non possit, sicut & aurum & alij la-  
pides. Verum illa in actum deductio saltem necessaria  
est in iis, quæ manifestis qualitatibus agunt. Cum  
enim, vt Zabarella, *lib. 2. de mist. gener. & inter. cap. 9.*  
docet, in actum deduci sit, cum qualitates, quæ in mistio-  
ne contrariorū contemperatone atque amicitia quasi  
absconditæ latebant, mistione soluta sensibiles fiunt:  
Id saltem imprimis ab his pendentibus elementorum  
qualitatibus necessarium est. Qualitates verò occultæ  
corpore, cui insunt, etiam integro manente, nihilomi-  
nus sese exferere, & in alia agere possunt, vt in magne-

te, vitro & nij, & similibus manifestum. Vnde, vt hoc o-  
biter attingam, eorum ratio firma non est, qui aurum  
nullam in corpus nostrum habere efficaciam statuunt,  
ideo quod à calore nostro solui non possit.

De quæstione, *An Adamas, venenum, & causa dysen-*  
*teria sit,* abundè hætenus diximus quibus addere liber,  
quæ hac de re habet Zacutus Lusitanus, *de Prax. Med.*  
*lib. 2. obs. 16.* Is de Adamante ita sentit, cum venenum  
non esse; cum experientiâ constet, plurimos citra noxam  
illum furtim deuorasse, & deinde cum excrementis de-  
iecisse. Ergo solum nocere putat, cum in frustra dillectus;  
vel impolitus deuoratur. Tum enim, vitri instar, asperita-  
te suâ, intestina pungere, ferire, vulnerare, & exulce-  
rare, & vulnera ab eo inducta esse lethalia. Cum enim  
altius depascant & penetrent, illic obortâ putredine,  
fieri vlcera sordida. Idque probat exemplo serui cuius-  
dam Mercatoris, qui cum malo dolo tres adamantes  
impolitos deuorasset, in tormina postridie lapsus est;  
& ob intestina vulnerata cruenta deinceps eiecit, fe-  
bris citare cæpit, & nullis remediis conualescere potuit,  
sed vlcere magis ac magis sordido facto, tabefactus  
obiit. Ex quibus patet, Adamantem potius vulnerando,  
quàm vt venenum, nocere. Verum in hac historia hoc  
adhuc dubij occurrit, annon Adamantes illi politi acui-  
ti, æquè ad vulnerandum apti sint, quàm impoliti.]

De Adaman-  
te, sententia  
Zacuti Lu-  
sitan.

Historia.

### QVÆSTIO III.

*An pinguedo & ramenta intestinorum tanta, vt  
vulgo fertur, in dysenteria externantur?*

Vulgata quidem, vt supra diximus, est ea sententia:  
non paucis tamen dubiis inuoluta. Inter quæ ptimò  
est, quod de pinguedine dicitur, quam in primo dysen-  
terix gradu excerni, eamque ipsam esse statuunt, quæ  
interior intestinorum tunica oblinatur: quod tamen  
falsum est, vt iam etiam antea dictum. Et si magni etiam  
viri hunc errorem errant, & intestina intus pingue-  
dine obducta esse crediderint; cum tamen nulla intus  
in intestinorum cavitare sit pinguedo; sed extra ipsis  
saltem obducatur, vt cuilibet, qui experientiam & ocu-  
los suos consulere vult, cognoscere facile est. Et si for-  
san initio pinguedo quædam excernitur, est ea procul  
dubio ex colliuatione pinguedinis, quæ extra intesti-  
nis inhaeret.

Intestino in-  
tus pinguedi-  
ne non obdu-  
cuntur.

Deinde, quod ramenta Intestinorum attinet, illa  
in secundo dysenterix gradu excerni vulgo dicuntur,  
eaque sæpe satis magna, vt Medicus quidam in obseru.  
*Schenck. lib. 3. obseru. 152.* ramenta intestinorū spithamæ  
longitudine in dysenteria etiam non lethali excreta se  
videsse scribat. Imò refert Hercules Saxonia, *lib. 3. panth.*  
*cap. 23.* Venetiis excretam fuisse membranam longitu-  
dine vlnæ cum maxima puris copia; item alibi por-  
tionem similem. Præterea se sanasse mulierem, quæ  
ab ulcerato intestino recto membranam itidem vlnæ  
longitudine excreuerit. Idem Hercules Saxonia, *part.*  
*2. sect. c. 20. §. 2.* narrat, se quatuor vidisse dysentericos,  
qui singulis diebus excreuerint portiones tunicarum  
intestinorum tam magnas, vt sæpe excederent mensurâ  
duorum vel quatuor digitorum; quibus duæ foeminae  
sanatae sunt, duo verò viri mortui. Ego quidem ea, quæ  
alij viderunt, in dubium non voco; cum multa fieri  
possint, quæ ego non viderim: tamen quia illud, quod  
modò de pinguedine dixi, & quod plerique se vidisse  
affirmant, plerumque falsum est: sit, vt de reliquis du-  
bitare incipiam; imprimis cum ramenta talia & mem-  
branas quas describunt, hætenus videre non potuerim,  
neque ab iis, qui ipsi dysenteria laborarunt, vel labora-  
rib. dysenteria ministrarunt, visa esse audire potuerim.  
Sicut & I. Crato, dum, *consilio 201.* ægroti proculdubio  
dysenteria laborantis historiam describit, refert, se talia  
ramenta videre non potuisse. Præterea rationes quædâ  
obstare videtur. Etenim etsi plurimi internâ intestinorū  
tunicam crusta quâdam, vt loquuntur, quam epider-

Ramenta an  
ex intestinis  
in dysenteria  
excernantur.

midl comparant, obduci docuerint: tamen an crusta illa epidermidi, quæ cuti obducitur, respondeat, non satis certum. Talis enim si esset, quatuor essent tunicæ intestinorum. 1. (Si à cavitare eas incipiamus enumerare) Epidermis ista; 2. Interior tunica. 3. Externa, & 4. quarta, quam vulgo communem vocant.

Quam verò crustam nonnulli vocant, eam recte describit Fallopius, *Institut. Anatom. cap. de Intest.* docerque, quod tunica interior fibris quibusdam in profundum tendentibus contextatur, eoque modo, ut in linteis sericis villi spissi admodum tanquam ab inferiore superficie nati, exteriorem superficiem afficiunt, ut in panno serico villosa videre est, quale quid etiam in lingua apparet. Qui villi, vel crusta, si ita appellare libet, data est ob longiorem retentionem coctionis & distributionis gratia, seu ut Hieronymus Fabricius ab Aquap. *de intestinis* hac de re scribit, ad chylum detinendum, quò minus ocus deorsum descendat & elabatur, sed cum vasis diutius versari cogatur, & ita in venas assumatur, sicut eundem ob finem linguæ tales villi quoque insunt, & asperitatem in ea afficiunt, ad retentionem perpetuam humoris, ad gustum & sermonem necessarii. Hi ergo villi abradi cum nulla ramenta efficere possunt, necessum esset, ut ab ipsa interna intestinorum tunica decidantur, quod etiam Medici vulgò docent, ut cum ex aliis, tum ex Brassauola, in *comm. 26. aphor. sect. 4.* patet, dum ibi scribit; diu ægotantibus, magnam intestinorum partem putrescere, ut multis partis tota interna depereat tunica, etsi ægri conualescant. Verum nec hoc satis probabile videtur. Etenim si vlcera aliarum partium contemplerur, videmus quidem in partibus ulceratis multa excerni, verum saniem & pus, in quod partis exulceratæ substantia mutatur, non verò integram partium substantiam. Et quanquam in musculosis partibus, in femore, crure, brachiis, in magnis abscessibus, membranosa quædam musculorum partes, utpote quæ putredini longius resistunt, à chirurgis extrahantur, putredine à reliquis separatæ: tamen intestinorum longè alia est constitutio, quàm ut tale quid in iis fieri possit. Vbi enim membrum ex carnosa substantia, membranis, nervis, venis & arteriis constituitur, caro ipsa, ut mollior, facilius putrescit, partibus reliquis siccioribus salvis adhuc manentibus, ut in gangræna interdum fieri videmus, in qua sæpe caro subito putrescit, ut nervi, tendines & aliæ partes duriores nudæ relinquantur. Intestina verò cum talem partium diuersitatem, & talem mollem carnem non habeant, sed ipsæ tunicæ intestinorum substantiam constituent, non video, qua de causa una earum pars in pus mutari & putrescere, alia salva relinqui, & inde tam longæ partes tunicarum liberari, & à reliqua earum substantia separari possint: præsertim cum quæ narrantur, sæpe minus credibilia sint, ut dum Herculus Saxonia refert, se vidisse ab exulcerato intestino recto membranam vnam longam excretam fuisse; cum tamen intestinum rectum vix vlna, sed saltem, ut Bauhinus, *theatr. Anatom. lib. 1. cap. 17.* habet, palmum vnum & semissem longum sit. Deinde, quia intestinorum tunica interior etiam suas fibras habet, quæ si semel erosæ sint, restitui non possunt, non video, quomodo tanta fibrarum parte erosa & excreta, qui ex dysenteria conualuerunt, satis commodè valere possint, cum tunica illa interior ac fibræ in ea, æquè necessaria sit ac exterior. Quod vel illa historia docet, quam habet Schenckius, *lib. observ. 142.* ex Beniuenio, *de abdit. morbor. causis cap. 95.* de quodam, qui postquam per 40. dies dysenteria vexatus esset, sublati doloribus, & deiiciendi cupiditate nihilominus aluum liquidiorum semper habuit, ac sæpius excreuit, quam diu vixit, nec ullis auxiliis curari potuit, sed ubicunque eum cupiditas deiiciendi vrsit, ibidem excrementa deposuit, erosis villis, quibus vis retinendi fulcitur. Quanquam enim quis suspicari posset, hoc sphinctere an læso accidisse: tamen Beniu-

nus expressè scribit, erosis villis, quibus vis retinendi fulcitur, hoc accidisse, nullam verò tenebræ vel læsionis sphincteris facit mentionem. Hinc etiam lienteria post dysenteriam periculosa est, quod internam intestinorum tunicam corruptam indicat.

Ex quibus colligi potest, in iis, qui conualescunt, tantæ magnitudinis ramenta ab interna tunica abradi & excerni vix posse; & si quid tale excernatur, esse mucosum illud excrementum, quod in intestinis hanc formam accipit. Etenim cum procul dubio humores vitiosi in intestina confluentes secum chylum omnem obuium & crudiorum sanguinem secum abripiant, non necesse est, ut ipsi seu sua seu sanguinis forma semper excernantur, sed possunt aliâ induere; & videmus quotidie fibras sanguinis in aquâ calidam effusas albescere.

Pituitosos etiam & viscidos humores diu in intestinis coaceruari & istorum formam æmulari & tandem per purgantia inde euacuari, vel in alui fluxibus excerni, Medicorum observationes docent: ut etiam Hier. Gabucinus & Felix Platerus in eam venerint sententiam, ut crederent, lumbricos largos, qui ita dicuntur, non viua animalia esse, sed mucosam pituitam in intestinorum substantia densatam, eamque intrus ambientem & inde abrasam. Illustre huius rei exemplum extat in *vita Iob. Heurnij*, quod supra *sectione 1. cap. 5.* proposui.

Neque ea probatio pinguedinis ac ramentorum in excretis, quæ vulgò habetur, satis firma est, quod sc. pinguedo, si in aquam proiciatur, ei innatet, in carbonibus coniecta, pinguedinis assatæ odorem præ se ferat; tunicarum verò particulæ in prunas coniectæ, pellicularum & membranarum instar contrahantur. Supernatat enim & pituita sæpe; neque ex odore rei combustæ satis semper ea cognosci potest, qualis sit; & pituita etiam vel pus lentum, si exsiccet, contrahitur.

Ista tamen de ramentis intestinorum circa vulgatam opinionem dubia eo saltem sine proposui, ut Lectori hac de re diligentius cogitandi occasionem præberem, & monstrarem, non semper tutum esse è libris quæcunque obuia describere, sed experientiam sæpius consulendam esse, quod nisi fiat, facilis in errorem lapsus est, quod iis accidit, qui experientia neglecta è libris sua de pinguedine intestinorum transcripserunt.

## Q V Æ S T I O IV.

### *An purgantia exhibenda sint in Dysenteria?*

Vulgus quidem, & homines rerum medicarum imperiti mirantur non raro, in Dysenteria à Medicis purgantia exhiberi, vel clysteres iniici; cum aliàs plus iusto ægri deiiciant. Nonnulli etiam Medici ex Auicenna, *lib. 4. cap. 1.* illud allegant: *ventrem in ventris solutione solvere plenum est timore*: & Vallesius, *comm. 4. in 4. Epid. text. 96.* Hipp. exponens casum Leambij scribit: *Purgare in Dysenteria nihil aliud est, quam maiorem humorum colluuiem ad locum antea affectum & intestina dolentia attrahere & periculum augere.*

Imprimis verò contra purgantium vsum prolixè disputat L. Fuchsius, *lib. 2. paradox. cap. 13.* & *lib. 1. de comp. med. cap. 84.* purgationemque hodie à Medicis institui & contra auctoritatem antiquorum & contra rationem putat. Hipp. enim, in *lib. de morb.* ut Al. Trallianum, *lib. 3. c. 21.* non purgantia, sed lac decoctum exhibuisse, Galenum etiam, ubi *9. de comp. med. lib. 1. c. 5.* prolixè agit de curatione dysenteriae, nullam purgationis mentionem fecisse. Imò *13. m. m. c. 3.* cum circa sedem vel aliquam huius vicinam partem sit initium inflammationis, purgationem prohibuisse. Errandi autem occasionem fuisse Recentioribus, quod malè Rha Barbarum pro Rhe Græcorum seu Pontico, quod adstringendi vi præditum, vsurpauerint.

Eodem modo Alexand. Massaria prolixè contra vsu purgantium in Dysenteria disputat, & imprimis au-

*An purgantia in Dysenteria exhibenda*



toritate Galeni vrget, qui cū in aliis methodi medendi locis, tum præcipue, 3. *meth. medend. c. II.* pluribus docet, & exemplis demonstrat, ad partem affectam non esse trahendum, neque per eam euacuandum. Cum ergo in Dysenteria intestina cum fluxione, tum vlcere, sæpe etiam inflammatione laborent, non licere putat, purgantia exhibere, quæ fluentes humores ad illa magis attrahant, doloremque vlceris & alia symptomata augeant. Neque etiam Galenum vel vllum alium probatum Medicum purgantibus in curanda Dysenteria vsū statuit. Et quanquam Galenum, Dioscoridem & alios Medicos Rhabarbaro vsos fuisse legamus: tamen id non rhabarbarum, quo hodie vtimur, sed rhaponticum fuisse docet, quod non solum nullam ducendi alui facultatem habeat, sed contra etiam non leuem adstringendi vim, vt quoque exspuentibus sanguinem, phthificis, Dysentericis conferat; reprehenditque Trincauellium, quod scripserit, Medicos antiquos in curanda Dysenteria omnes rhabarbaro vsos fuisse.

Verum enim vero eorum sententia probabilior est, quam & experientia confirmat, qui purgantibus in Dysenteria vtuntur. Etenim præstat, paucioribus vicibus medicamento humorem euacuare, quam permittere, vt pluribus vicibus à natura expellatur, & diuturniore transitu ac mora in intestinis ea lædat & maius damnum afferat. Præterea si humorum vitioforum copia medicamento minuat, reliquos facilius temperate & coquere potest & medicus & natura, vt inter exeundum postea minus nocere possint. Insuper si Medicamenta humores temperantia & dolorem lenientia vsurpentur, antequam corpus purgatum sit, corrumpuntur & parum proderunt. Atque ipse Galenus, 2. *de simpl. med. facult. cap. 12. & 14.* docet, non esse exhibenda medicamenta, quæ acrimoniam humorum mordicantium temperant, nisi prius humores medicamentis abstergi atque euacuati fuerint. Et quamuis ipse melle solum loco allegato ad abstergendum vtatur, tamen proculdubio etiam rhabarbaro & myrobalanis vsus fuisset, si eo tempore cognita fuissent. Neque dum probauit Massarias, quod Antiqui Medici præclari omnes sine purgantibus medicamentis Dysenteriam feliciter curauerint. Etenim Hippocrates, Galenus, & Al. Trallianus abstergentibus vsi sunt, & inter reliqua lacte, de quo infra dicetur, & Auicennas, 3. *Can. fen. 16. tr. 2. cap. 7.* purgantibus vtitur, etsi cum cautione.

Quamuis verò per locum affectum, quod in methodo medendi prohibitum, euacuari hoc modo, atque aliquid damni intestinis transitu humorum vitioforum per ea inferri videatur: tamen damnum illud exiguum est; commodum verò, euacuatio scilicet humoris vitiosi, longè maius; cum impossibile sit Dysenteriam curare, manente, quæ eam facit & auge, causâ. Et quidem si Medicus alias vias haberet, per quas humorem vitiosum, qui omnino euacuandus est, euacuare posset, esset sanè id commodum; verum aliud commodior locus non datur. Neque enim tutò per vomitum licet omnem illam materiam euacuare, neque id fieri potest: neque etiam nisi purgatio præcesserit, commodè per vrinam euacuare licet, & medicamenta diuretica fortiora caliditate & siccitate sua acrimoniam humoris dysenteriam excitantis potius augebunt. Neque in principio sine periculo humores ad intestina fluentes ad alia loca ducuntur; cum incommoda, quæ ex intempestiue suppressâ Dysenteria ingruere solent, nora sint. Neque insigne aliquod incommodum metuendum ex ista ad partem affectam attractione. Tum enim humorum ad partem affectam attractio periculosa & noxia est, cum humores ad partem affectam attrahuntur, ibique subsistunt; quod hic non accidit. Neque vlcus intestinum simpliciter à fluxione, & quatenus ea talis, ortum habet; cum sæpe Diarrhoea fiat, & fluxio ad intestina, quam tamen nulla exulce-

ratio sequitur. Hæc enim ab erosione solum prouenit, quæ accidit, si humores simul acres sint, & in intestinis moram trahant. Quod cum in purgatione rectè instituta non fiat, sed potius prohibeatur, incommodum etiam nullum ex ea metuendum. Mitioribus tamen, vt modò dictum, medicamentis purgatio peragenda, non fortioribus, quæ à valde remotis fortiter attrahunt. Videatur etiam Horat. Augustinus, lib. 10. *epist. 3.*

Si tamen maligna febris coniungatur, malignitatis etiam habenda ratio est. Ideoque, si ea vrgeat, parçè vsurpari vel etiam posthabitis purgantibus ad medicamenta properandum, quæ humorum acrimoniam & malignitatem temperant.

## QVÆSTIO V.

*An lactis vsus in Dysenteria conueniat?*

Lac non solum in diæta Dysentericorum præscribi, sed & loco medicamento vsurpari, & cum solum exhiberi, tum alia medicamenta in eo coqui, tum per clysterem iniici, è libris Medicorum notissimum est. Contra tamen nõ semper tutò exhiberi etiam certum, imò, vt Amatus Lusitanus, *centur. 2. curat. 44.* scribit, interdum si detur, instar veneni se habet, & Hipp. 5. *aph. 64.* capite dolentibus, febriculosis, & quibus hypochondria elata sunt, siticulosis, quibus item biliosa alui deiectiones sunt, aut febres acutæ, lac præbere malum esse scribit. Quapropter de recto eius vsu specie quædam subnectere libet.

Lac cum tribus substantiis constet, caseosa, quæ præcipue nutrit, & quæ vlcerata sunt intestina sanat; pingui & butyrosa, quæ dolorem lenit, digerit, & intestina oblinat, quò minus ab acris humoribus lædantur; & tandem serosa, quæ abstergit & mundificat: omnino pluribus de causis in dysenteria vtile est. locumq; habet non solum vt nutrimentum, sed etiã vt medicamentum, aut cerè vt nutrimentum medicamentosum.

Ideoque Antiqui frequenter lacte vsi sunt; non tamen in eundem semper vsum. Primò quidem cum illi lenioribus purgantibus ita instructi, vt hodiè sumus, non essent, ad abluendos, & euacuandos humores mordaces, eosque temperandos eo vsi sunt: deinde etiam ad fluxum sedandum vsurparunt, vt & ad dolorem leniendum. Patet id ex Aetio, qui, *terrabibl. 3. ferm. 1. c. 45.* ita scribit: *In principio igitur post tertiam diem, permittentibus febribus, lacte recens multo adhuc calido vtendum est, melle tepido ei admixto, atque in eius vsu ad tres dies persenerandum, quantum nutriendo corpori suffecerit: sequentibus deinde diebus melle adempto, & modica aqua (quarta nimirum lactis partis mensura) affusa paulum decoquimus & exhibemus: deinde post alias tres ad dimidium decoquimus, & post alias tres ad tertias, similiter per tres dies, atque ita eis præbemus. Primum enim lac purgat simul ea, quæ in corpore sunt, contemperando: postremum vero aluum sistit.* Alexander verò Trallianus, lib. 8. *cap. 8.* ita scribit: *Imprimis lactis calefacti & inter coquendum sapius agitati cyathos tres exhibemus, & post horas duas tantundem rursus potui damus, quibusdam etiam tertio offerimus, vt integra hemina absamatur: & si eo die repletus ager videatur, cibo eum abstinere iubemus. Hoc igitur modo bilis educitur, & humores corrupti modicè purgantur mitiganturque, &c.*

Vetuntamen in eius vsu aliqua curatione opus est. Nam primò, quia serum aluum mouere solet; lac crudum & recens multum primis diebus ad aluum mouendam & bilem educendam exhibuunt antiqui, vt ex Aetij allegato loco patet. Vbi verò iam fluxum sistere animus est, præparatione opus est, & serum decoctione vel chalybis, aut, quod aliis comodius videtur, auri vel silicis in eo extinctione, maxima ex parte absumendum, & vt lac ad aluum sistendam commodius fiat, præstandum. Nam, vt Dioscor. lib. 2. *cap. 75.* & Aetius, *terrabibl. 1. ferm. 2. cap. 95.* habet: si lac coquatur, serumque con-

*An lac in Dysenteria conueniat?*

*Lac tribus substantiis constat.*

*Antiqui quomodo lacte vsi vsini?*

ſumatur, omnino ventrem non ſubducit. Secundò, quia Hipp. 5. aphor. 64. capite dolentibus, febriculofis, & quibus hypochondria elata ſunt, ſiticolofis, quibus item bilioſæ alui deiectiones ſunt, aut febres acutæ, lac præbere malum eſſe ſcribit; in Dyſenteria verò febres plerumque coniunguntur, & humor dyſentericæ cauſa ferè bilioſus eſt: cautè lac exhibendum, & ſi quid tale adſit, quod eius uſum prohibet, omittendum: neque ſemper, quod nonnulli faciunt, ſine ullo diſcrimine tanquam ſecuriſſimum remedium vel exhibendum, vel per clyſteres iniiciendum, de quo pluribus Amatus Luſitanus, cent. 2. curat. 44. Lac, ſi febris adſit, tanquam præſens venenum damnat, neque in dyſentericis bilioſas deiectiones habentibus admittit.

Lactis præparandi modi.

Duo verò Lac præparandi modi ſunt, ut docet Aetius, loco modò allegat. Vel enim coquitur; vel chalybs, aurum aut ſilices igniti in eo extinguntur. Ita enim ſeroſa ſubſtantia abſumitur, & pingues etiam ac igneæ partes diſſipantur, ne vel aluum mouere, vel in bilem facile verti poſſit, & caſeoſa ac incrassans relinquitur; & præterea à lapidibus & ferro adſtringentem facultatem nanciſcitur. Et ſi verò Aetius præparationem, quæ per coctionem fit, præfert, cum ob alias, tum hanc ob cauſam, quod cinis ex ignitis lapidibus lacti commiſceatur: tamen hoc incommodum facile euitari poteſt: neque credo ſolum ad ſeri conſumptionem hanc præparationem inſtitui, ad quam coctio non minus eſſet commoda, ſed ut aliquam adſtringendi vim à ſilicibus & chalybe accipiat, & aliquæ partes pingues abſumantur, ut modò dictum. Poteſt & ſacchar. roſar. lacti commode addi.

Antiqui tamen, præſertim ſi febris vrgeret, neque tamen lacte facile carere poſſent, ut eius incommoda vitarent, quartam aquæ addebant. Et omnino ſi lac chalybeatum ſit ingrati ſaporis, potius docòcto vtendum. Vnde Hercules Saxo. prælect. part. 2. cap. 20. §. 7. interdum ſine aqua coquit lac, interdum recipit lb. j. lactis, aquæ plantag. vel ſonchi Vnc. vj. & coquit ad conſumptionem medietatis: quo ipſo ſe non modò dolores ſuſtulſiſſe, ſed & incipientes dyſenterias ſine alio auxilio ſanāſſe teſtatur.

Eſt verò inter lactis genera vaccinum conuenientiſſimum, quod crasſatum eſt partium. Mulieris tamen boni habitus & bona victus ratione vtentis naturæ humanæ adhuc conuenientius, ut poſtea in diata dicetur.

## QVÆSTIO VI.

An Chalybis uſus in Dyſenteria conueniat?

An Chalybis uſus in Dyſenteria conueniat?

Maiores verò longè difficultas occurrit, de Chalybis in dyſenteria uſu. Equidem non ſolum in potu, ſed & in lacte & aliis medicamentis, quæ cum exhibentur, tum per clyſteres iniiciuntur, chalybem extingueret plerique Medici iubent. Verum ſuſpectum hodie multis reddidit uſum chalybeatorum medicamentorum in Dyſenteria Iohan. Crato, dum, Conſil. 201. ſcribit: In recta viſturatione nihil prætermittatur, nec deſit potius chalybeatus, ut fieri ſolet. Non enim adſtringit, ut falſò exiſtiant Medici, ſed turbat aluum.

Platerus etſi in Practica aqua & vino chalybeato vtatur: tamen, in Epistoſola ad Guiliel. Fabricium, quam is c. 7. de dyſenteria, inſeruit, Cratonis ſententiam non planè improbat. Eſt enim, quod ipſa experientia teſtatur, in chalybe viſ quædam aluum turbadi, imò ſi paulò copioſius ſumatur, etiam vomitum mouendi. Hoc verò incommodum ut euitetur, ipſe quidem, ut crudæ partes in aqua & ſeroſæ abſumantur, chalybem in iis extingueret commodum putat, verum non ſapius hoc fieri vult, ne vi� illa vomitum vel aluum eiendi in aquam tranſeat, & aqua ſaltem leuiter chalybeata vtendum, aut planè omittendam cenſet.

Foreſtus quoque etſi in dyſenteria chalybeatis medi-

camentis vtatur: tamen crocum martis probare non videtur, dum, l. 4. de febr. obſer. 4. in ſchol. puerum quendam nouem annorum, cum Empirici cuiuſdam conſilio crocum martis accepiſſet, poſtea nigra per ſuperiora euomuiſſet, & nihil continere potuiſſe ac mortuum eſſe ſcribit. Metallica enim eiuiſmodi ventriculū lancinare.

Verum ſi in Antiquorum Medicorum ſententiam inquiramus, facultatem aluum ſiſtendi & aluum mouendi ac aperiendi chalybi & ferro tribuunt. Dioſcorid. lib. 5. c. 53. rubiginem ferri ſiſtere ſceminarum profluuium, vinum & aquam, in qua candens ferrum ſit extinctum, potu cæliacis, dyſentericis, cholera laborantibus & diſſolutis ſtomacho prodeſſe ſcribit. Galenus, lib. 11. de ſm. fac. cap. de Lacte, Lac deſiccantem facultatem accipere, & omnes alui fluxiones ſiſtere, ſi lapides igniti aut ferrum candens in eo extingatur. Quod ex eo repetiit Paulus Aegineta, de re medic. lib. 7. §. 7. idem & ibidē §. 7. vbi ſcribit, quod ferri ſquama magnā adſtrictionē habeat. Aetius, terrabibl. 3. ſerm. 1. c. 48. vinum, in quo chalybs ignitus ſit, dyſentericis exhibet. Auicennas, lib. 2. tr. 2. cap. 253. ferrum ſtipiticum eſſe ſcribit. Antiquos ſecuti ſunt poſteriores Medici ferè omnes, Valeſcus de Taranta, Gattinaria, Fuchſius, Rondeletius, Donatus ab Alto mari, de med. hum. corpor. malis cap. de Diarrhœa, Amatus Luſitanus, cent. 6. curat. 2. & 11.

Plurimi tamen etiam medici ferro & chalybi non ſolum adſtringendi & fluxus alui ſiſtendi vim, ſed & aperiendi, imò etiam aluum & vomitum mouendi facultatem attribuerunt.

Aetius, terr. 3. ſect. 2. c. 11. ſcribit, Aqua, in qua chalybs extinguitur, præclare ſplenem liquefacit, utpote quæ conſumendi facultatem habeat. Oribāſ. Medic. collect. lib. 15. & Aetius, terrab. 1. ſect. 2. c. 59 §. 7. vbi docent, quod omnes ſquamæ multū mordaces ſint. Cornelius Ceſſus, lib. 4. c. 9. aquam à ferrario fabro, in qua candens ferrum ſubinde extinctū ſit, lienem coercere, & animaduerſum eſſe ſcribit, animalia, quæ apud hos fabros educata ſunt, exiguos habere lienes. Auicennas, lib. 2. tr. 2. cap. 251. in ſcoria ferri vim ſoluentem aliquam eſſe ait, & vinum, in quo extinguitur ferrum, fluxum alui antiquum & dyſenteriam ſanare ſcribit. Idem Haliabbaſ & alij Arabes ſtatuunt. Idem ſentiunt poſteriores Medici, Iohan. Langius, lib. 1. epiſt. 48. Antonius Beniuenius, obſer. medic. c. 5. Iohan. Baptiſta Montanus, conſil. 249. Mercatus, de morbis mulierum lib. 2. c. 18. & lib. 2. de indication. cap. 7. Reinerus Solenander, ſect. 3. conſil. 6. 8. 21. 22. ſect. 4. conſ. 9. & alij plurimi. Imò chalybem etiam vomitum mouere experientia docet, annotauitque id de vino chalybeato Platerus, lib. 1. obſer. pag. 225. Vnde Cæſalpinus, lib. 3. de metall. c. 6. rubiginem, in quam ferrum conuertitur, maleficam eſſe ſcribit, & ibi c. 13. ferruginē in multa quantitate ſumptam vomitum prouocare & ad necē ducere. Vnde Auicennas, lib. 4. ſen. 6. tr. 1. c. 8. ferri limaturam & ſcoriam inter venena refert.

Cum ergo tot Medici ferro & chalybi vim etiam adſtringentē tribuant, ac vinum & aquam, in qua chalybs extinctus eſt, cū dyſenteriam, tum alios alui fluxus ſanare ſcribant: nolim ego tot Medicis ſimpliciter contradicere. Quia tamen Dioſcorides & Auicennas & alij præclari Medici vim quandam aluum mouendi ferro & chalybi etiam tribuunt, atque experientia ipſa id teſtatur, & præterea ad obſtructiones viſcerum & lienis aperiendas felici cum ſucceſſu à Medicis uſurpatur, quā ratione hæc conciliari poſſint, videndum.

Ludouicus Mercatus, de morbis mulier. l. 2. c. 18. ut hæc conciliet, ferrum & chalybem adſtrigēdi & meatus obſtuctos aperiendi, item vim purgandi habere ſcribit, eamque obrinere ob maximam copiam Aſis & Huij, quā habeat: purgandi tamen vim non talem eſſe docet, qualis eſt in aliis medicamentis purgantibus; ſed quia liquandi, fundendi, & attenuandi maximam vim & efficaciam obtineat, accidere, ut ſi copioſius id faciat, per vomitū & aluum purget: ſi verò partes illæ ſulphureæ &

Chalybs alui ſiſtit.

Chalybs obſtructiones aperit.

& mercuriales absumantur, id quod fit igne fortius & sæpius adhibito in croci ♂ ris præparatione, medicamentum adstringendis fluxibus idoneum parari scribit. His addit & hoc: Sulphur & Mercurium in ferro duobus modis contineri; Vno, quatenus iam sunt in ferri substantiam mutata; Altero, cum veluti futura sunt ferri alimentum. Priori modo, quatenus scilicet iam cocta & in ferri naturam mutata sunt, vim purgandi habere; Posteriori vero, utpote crudiora & quasi excrementitia nocere, corrumpere & perniciose esse. Hinc porro concludit: Alio modo ferrum præparandum esse, ut aluum sistat, alio ut obstructions liberet & purget. Ad aluum sistendam ♀ & ♂ ium auferendum & separandum esse, quod fiat vel igne valido, vel aqua valida, dum in crocum ♂ ris dictum mutatur. Hoc enim modo præparatum fluxus quosvis validissime sistere & flaccidas partes corroborare scribit; si vero meatus aperire & purgare animus sit, partem illam in qua vis illa est, propriè usurpandam, scilicet ♀ ur & ♂ ium coctum, separatam parte illa cruda excrementitia & extranea. Atque ita triplicem chalybis præparandi modum esse docet. Primus est, si in alio medicamento pars purgans citra aliam chalybis substantiam colligatur, chalybis limatura vel laminis cadentibus sæpissime in aquam vel liquorem alium immixtis, à quo liquor vim purgandi sortitur. Ideoque cum fluxum alui sistere volumus, primam aquam, in qua chalybs extinctus est, abicere iubet. Secundo modo, secundum Mercatum præparatur sine igne chalybs, comminuta, liquata & separata recrementitia illa parte aliqua vitæ aut aceto, donec ex toto vniuersa limaturæ substantia comminuitur. Acetum enim totum illud, quod extraneum est, ocyssimè conterere scribit, relictam parte nativam. Nec obstare rubiginem, quæ acquiritur, quæ facile igne, aqua feruentissima vel oleo separari possit. Tertius est, cum igne sæpissime comburente pars illa superflua separatur, manente puriore & vtiliore. Rodericus à Castro id hoc modo exprimit: cocta & vtilia principia in eius substantia inueniri, ac in eius partibus penitioribus; cruda & excrementitia naturam ad superficiem truisse Et Mercatum in eo recentiores alij etiam sequuntur, quod primam aquam, in qua chalybs ignitus sit extinctus, abicere iubent, utpote quæ aluum moueat, & postea in noua aqua sæpius eundem chalybem extingui volunt.

Verum enim vero quædam circa hanc Mercati opinionem monenda sunt. Primò enim illud non concedi potest, in stomomate seu chalybe esse duas partes, vnam coctam & chalybi iam propriam factam; alteram crudam, alienam, & excrementitiam, quæ separanda sit. Etenim sit sanè, ut in ferro tale quid reperiatur: tamen chalybs ita purpuræ & homogeneæ naturæ est, ut tale nihil in eo reperiatur, sed tota eius substantia vnius naturæ est. Itaque effectus quicunque à chalybe proueniunt, ab ipsius substantia proficiunt. Ex quo deinde sequitur falsum & illud esse, quod putat, aquam vitæ, aut aceto, dum ab iis vniuersa limaturæ substantia comminuitur, illud quod extraneum & excrementitium est, conteri & absumi, relictam parte nativam, & æruginem etiam, quæ relinquitur, facile separari igne aut aqua feruentissima. Nam aquam vitæ seu Sp. vini quod attinet, ille non sufficit ad ferrum corrodendum aut soluendum, nisi alia calcinatio vel solutio præcesserit. Acetum verò quidem hoc præstat, sed nihil separat, sed totam chalybis substantiam comminuit & soluit, imò sal aceri sese chalybi vnit, ut ita facile separari non possit. Rubigo quoque non alterius naturæ est, sed ipsa chalybis substantia in hanc formam redacta. An verò in chalybe duæ partes sint, vna adstringens, altera liquans, fundens, & attenuans humores, aluumque mouens, de eo mox dicetur. Cornelius Celsus certè, loco allegato, aqua fabrorum ferrariorum ad lienem coercendum vitur, à qua nihil abiicitur, & in qua ferrum candens non vnum, sed varium, idque sæpissime extinguitur.

Iulius Cæsar Claudinus, in append. lib. de integr. ad infirm. sect. 2. & ipse admittit, in chalybe esse vim adstringentem, ac præterea attenuantem & obstructions aperientem, imò aluum mouentem. Has autem diuersas qualitates & facultates pendere à diuersis partibus, quibus chalybs constat, aliis frigidis, aliis calidis; chalybem verò aluum soluere non trahendo, sed irritando statuit.

Chymici Recentiores etiam non vnius opinionis sunt, sed alij duplicem crocum ♂ statuunt; vnum adstringentem, & alui atque alios fluxus sistentem, qui fiat per fortes calcinationes, & ignem reuerberij, quæ vis ♀ ris & ♂ rij separatur: alterum aperientem, qui sit baculis ferri vel chalybis ignitis ♀ radiorum, aut aquarum acutarum vel sp. Oli vel ♀ ri aspersione & illitione.

Libavius verò hinc distinguere non videtur, sed comment. alchym. part. 2. lib. 1. c. 10. crocum martis reuerberatione factum non solum ad hæmorrhagias, sed & lienis morbos vtilem esse docet.

Ita & Crolius croci martis essentiam, quam describit, tam sistendis fluxibus, quam epatis & lienis obstructionibus aperiendis vtilem esse tradit. Idem à Chymicis aliis plerisque docetur.

Ex hac ergo difficultate & controuersia, ut ex iis, quæ hæcenus dicta sunt, patet, nondum satis explicata, ut nos expediamus, & nostram etiam sententiam tandem subiungamus. Primò hoc omnino præsupponendum, quod non solum tot Medicorum scripta docent, sed & ipsa experientia approbat, ferrum & chalybem atque ex iis parata medicamenta vim habere sanguinis & alios fluxus sistendi; præterea obstructions epatis, lienis & venarum mesaraicarum aperiendi, imò aluum turbandi, & nonnunquam etiam vomitum ciendi.

Secundo sciendum, notas illas qualitates, adstringendi, liquandi, fundendi, attenuandique vim, imò aluum turbandi & vomitum ciendi non prouenire à ferro & chalybe integro, sed resoluto. Ferrum enim & chalybs, ut & alia metalla, tam compactæ & solidæ naturæ sunt, ut integra nullo modo notis qualitatibus aliquid in corpus nostrum agere possint: Resoluta verò id præstant, quod præstant, ut mox dicetur. Estque hoc verum non solum de ferro, sed & aliis metallis, imò de ipso auro. Fulminans etiam aurum dictum aluum mouet; quod integrum non facit.

Tertio, An tamen occulto modo aliquid etiam integrum, præcipue ignitum, agere possit, Chymicis considerandum relinquo. Cum enim omnia metalla suam soliditatem & compactionem ab interno principio, spiritumque quodam coagulante obtineant non planè absurdum videtur, etiam integra, præcipue si incandescant, occulto modo & per spiritum quandam coagulandi vi præditum, alia liquida compingere & coagulare, & proinde etiam fluida sistere posse. Documenta huius rei Chymicis non pauca nota sunt. Si plumbum liquefiat, & in liquefactum fovea aliqua imprimatur, & mercurius viuus in eam fundatur, mox ille fluiditatem amittit, & instar plumbi coagulatur. Talem ergo figendi, & humores fluidos sistendi vim à ferro ignito, vino, aquæ, lactis, in quibus extinguitur, communicari posse, ut credam, id persuadere videtur, quod non solum chalybs, sed & silices igniti, imò aurum eundem in finem usurperet: cum tamen certum sit, auri substantiæ ignitione nihil decedere. Neque est, ut aliquis dicat, ignitionem hanc, & in lacte extinctionem eo fine institui, ut serosa pars absumatur. Nam si hic saltem finis esset huius extinctionis, posset idem coctione fieri. Et quid in aqua absumeret aurum ignitum? Verum hac de re cuique suum iudicium liberum esto.

Quarto præparationem & resolutionem chalybis quod attinet, et si ferrum & chalybem resoluendi plures modi sint, scilicet per longum ignem & reuerberationem, per aquarum fortium, spir. vitrioli, sulphuris, aceti affusionem vel aspersione, sulphuris affricationem, quæ ignito adhibetur: tamen omnium harum solutionum fundamentum in mutatione in vitriolum aut vitriolatam naturam consistere videtur. Ut enim Chymici quidam



docent, vitriolum est proxima metallorum materia, & in eam tanquam proximam naturæ metallicæ omnia metalla recurrere possunt, ut in cupro & ferro notissimum: de quo iam non disputo. Hoc certum est, salem quendam vitriolatum omnibus metallis inesse, & ut ex omnibus metallis crystalli, seu quoddam vitrioli genus: ita etiam ex omni ferro & chalybe quocumque modo calcinato vitriolum martis dictum iterum fieri potest. A quo crocus martis non multum differt. Ergo siue substantia, quæ à chalybe ignito liquore communicatur, siue scoria ferri, siue ferrugo, siue crocus martis, siue chalybs præparatus sumatur, omnis horum vis à vitriolo pendet, omniæque hæc vitriolata esse vel gustus docet. Verum cum vitriolum qualitates diuersas habeat, secundum diuersas partes, quibus constat, attingit, calorem & effervescentiam humorum restingit, calefacit, desiccatur, ulcera claudit, vomitum excitat, vomitum sistit. Seu, ut Galenus, 9. de simpl. med. facultat. hac de re scribit, *Mirari subit de hoc medicamento, quo pacto vehemensissima adstrictioni admixta est caliditas non instrenua. Constat ergo, quod maxime condire & seruare carnes humidæ potest, nimirum caliditatem humiditate absumens, atque adstrictione substantiam contrahens & constipans. Hoc enim opere nonnihil etiam humiditatis ipsius exprimit. Constringit verò, desiccatur, atque contrahit in se substantiam carnis. Resolvitur enim vitriolum in phlegma, spiritum & oleum rubicundum, colcothar, salem, terram, quæ ut singula, peculiare qualitates obtinent, ita & inuicem variè mista.*

Quinto & hoc monendum, chalybem & ferrum & medicamenta ex iis parata, ut & vitriolum, equidem multis morbis, etiam hausta, utilia esse: tamè quia omnia metalla naturam corpori nostro aduersam obtinent, omnino dosin certam in iis exhibendis diligenter obseruandam, quæ si transcendatur, id quod medicamenti loco esse poterat, venenum euadit. Ita, ut antea diximus, ferrum & scoriâ ferri (maiori scilicet copia sumpta) inter venena refert Auicennas, & Cæsalpinus, lib. 3. de metall. c. 13 ferruginem, quam iusto pondere inter medicamenta admittit, in nimia quantitate vomitum prouocare, & ad necem ducere scribit. Aduersa tamen illa nostro corpori vis nunc magis, nunc minus sese exferit, pro vario præparandi modo. Dum enim ferrum à naturâ sua adhuc parum recessit, minus stimulat; magis verò, ubi iam ad ferruginis & vitrioli naturam tendit. Ita scoria ferri tutius medicamentum est, quam rubigo ferri, quod etiam Cæsalpinus monet, l. 3. c. 19.

Ex quibus omnibus tandem conclusionem huius quæstionis hanc colligimus: Aquam, lac & vinum chalybeatum non planè reicienda esse; cum seu spiritus aliquis coagulans & humores fluidos sistens, seu scoria quædam adstringens liquori communicetur. Extinctionem tamen hanc cum Platero moderatâ esse volumus, neque nimis sæpe fieri; cum certû sit, si multum de ferri substantia assumatur, aluum turbare, imò si copiosius sumatur, vomitum quoque citari. Et omnino parcius chalybs in dysenteria exhibendus est, quàm in cachexia vel viscerum obstructione; cum adstrictione solum aliqua, non aliis chalybis effectibus hic opus sit. Neque distinctio inter chalybem recentem & sæpius ignitum locum habet; aut partes ferri, quæ in prima ignitione liquori communicantur, saltem vim aluum mouendi habent: sed quia chalybs homogeneæ naturæ est, omnes eius partes eandem vim habent, & quò plus de eius substantia liquori communicatur, eò magis aluum vel vomitum mouet. Neque etiam aquam primam abicere opus est: nisi forsitan chalybs non purus sit, sed quandam rubiginem extra contraxerit. Hæc enim cum aquæ in extinctione communicetur, eam abicere non incommodum est.

Monendum & hoc puro, liquores illos chalybeatos recentem paratos usurpandos esse, præcipuè si chalybs ignitus sæpius in iis extinctus sit. Chalybis enim substantia principio & statim ab extinctione saltem scoriarum naturam retinet; si verò diutius in liquore illo ma-

neat, in rubiginem quasi mutatur, & tum vim potius aluum turbandi, vomitumque ciendi ac humores fundendi, quam sistendi habet. Cuius rei indicium præbent vina chalybeata, quæ ad obstructiones epatis & lienis exhibentur, & si copiosius sumantur, & aluum & vomitum mouent. Non enim statim postquam chalybs in vinum injectus est, exhibentur, sed in Sole vel loco calido aliquot diebus agitantur, ut chalybs melius resoluatur.

Si autem quærat de croco martis & chalybe præparato in dysenteria exhibendo, eum martis croco usurpandum potius censeo, qui solius ignis & reuerberationis beneficio paratus est. Is n. nondum adeo vitriolatam naturam adeptus est, sed ut eam acquirat, alia adhuc resolutione opus habet, idcirco adstringendi potius, quàm aliâ vi pollet. Reliquæ præparationes chalybis omnes, siue sint chalybis præparati in vino vel alio liquore infusiones, siue per aqu. fortem, spir. A. D. X. um, solutiones, omnes iam vitriolatam naturam magis sapiunt, & croci hoc modo præparati aliquid de liquore solvente participant, saltemque aceri & aquarum forrium sibi vniuerunt; & proinde etiam quandam adstrictionem habeant, & propterea in cachecticis viscerum laxorum totum roborant: tamen quia vis aperiendi, humores fundendi & liquandi, ac si copiosius sumantur, aluum turbandi & vomitum ciendi in iis prævalent, in dysenteria locum non habent, sed potius in viscerum obstructionibus & cachexia. Cum enim præparationibus istis partes omnes, in quas aliâs vitriolum resolui potest, separatæ non sint, sed instar vitrioli à terra crassiore separati & parum calcinati sese habeant, & propterea in iis adhuc spir. vitrioli cum sale mistus sit, non mirum est, si & aperiant, interdum etiam vomitum ac aluum moueant; cum salis vitrioli maxime proprium sit vomitum mouere. Et si omnino crocum martis hoc modo præparatum exhibere libeat, dosis omnino sit minor, ne acrimoniâ, quam obtinet, intestina vellicet, aut vomitum cieat, ac aluum turbet, quod Empirico illi apud Forestum, lib. 4. obseru. 4. in scholio, accidit. Quæ verò de chalybe, qui aperiens viscerum gratiâ exhibetur, dici possent, hæc, cum huius loci non sint, prætermittimus & in alium locum commodiorem reiciimus.

Tandem vnum hoc circa vsum medicamentorum chalybeatorum monendum censeo, accidere plerumque & post vsum medicamentorum talium, sicut & post potum acidularum & thermarum vitriolatatum accidere solet, ut nigra per aluum deiciantur; quæ vulgus, imò & sæpe Medici incautiores pro humore melancholico & atro, quem talia medicamenta educant, habeant; cum tamen sæpe color ille saltem sit à vitriolo, & vulgo etiam notum sit, ex ferri rubigine atramenta & tinturas nigras fieri.

## C A P V T V I I I .

### De fluxu alui sanguineo & hepatico.

Quandoque sanguis per aluum, etiam sine intestinorum exulceratione, & plerumque nullo cum dolore excernitur, cui sanguinis fluxui à veteribus dysenteria nomen quoque attribuitur; ut cap. precedente dictum, ubi cruentatum alui deiectionum quatuor differentias explicauimus.

Illis tamen addi posse videntur & aliæ sanguinis excretiones, ut quando ruptâ aliquâ in epate venâ sanguis & per aluum & vomitum excernitur: item sanguinis per hæmorrhoides euacuatio.

#### Causa.

Emittitur autem sanguis per intestina, quia vel expellitur siue à toto, siue ab epate per mæstaraicas ob copiam aut acrimoniâ, vel exit apertâ seu ruptâ venâ; vel non retinetur iusto tempore in epate ob imbecillam eius facultatem. Modus, quo vasa aperiuntur est, & vasorum nonnunquam & ruptura. Quidam & per hæmorrhoides in

Vitrioli facultates.

Croci martis in dysenteria vsus.

Chalybs an dysentericis conueniat.

Feces alui nigra.

Fluxus alui sanguineus.

Causa.



in epatis imbecillitate fieri volunt, vbi sanguis serofus ob tenuitatem in epate egreditur per rarefactas vasorum tunicas, aut certe referatis exilium vasorum osculis. Fluxus sanguinis, qui ab epatis imbecillitate provenit, propriè & in specie Hepaticus dici solet: reliqui in genere fluxus sanguinolenti dicuntur. Qui fluxus cum caussis & curatione differant, seorsim tractandi.

*De fluxu sanguinis à copia eius.*

Fluxus sanguinis à copia eius.

Primo quidem quandoque sanguis profluit rupta aut aperta aliqua vena in epate, atque tum non solum per aluum, sed & per vomitum sanguis effunditur. Et cognoscitur hæc causa ex relatione ægri, qui an percussus vel lapsus fuerit, aut aliud aliquid graue onus eleuauerit, vel simile quid passus fuerit, referet. Verum pauci ab hoc profluvio sanguinis euadunt, partim ob copiosum sanguinis fluxum, partim quia ex concreto sanguine in ventriculo in lithothymiam incidunt, partim in hydropem. Si quæ tamen salutis spes sit, ea cura adhibenda, quæ supra in sputo sanguinis proposita est.

Deinde sanguinis per aluum fluxui occasionem præbet. Primò Intemperies epatis natua calida. Hæc enim cum naturalis sit, alimentum attractum totum ferè in sanguinem vertit, cuius copiam cum natura absumere non possit, superfluum sæpe per hæmorrhagiam narium euacuat, quandoque ad intestina effundit. Secundò defectus alicuius membri. Cum enim ea pars sanguinis, quæ membro deficienti alimentum præbere debebat, abundet, natura eam ad intestina ablegat. Tertio consuetæ alicuius euacuationis suppressio, vt si menses, hæmorrhoides, hæmorrhagia narium consuetæ substituerit.

*Signa Diagnostica.*

Signa.

Si sanguis à toto prodeat, & sola quantitate peccet, repente ille & copiosè per interualla mediocria egreditur, & profusus ilicò concreuit, exitque sine norabili in ventre & intestinis molestia, & sine virium aliqua deiectione, & ferè etiam sine coloris in facie mutatione; & præcesserunt causæ, de quibus antea diximus. Ideoque ægrotus interrogandus, an euacuatio aliqua consuetæ suppressa sit, an membrum aliquod amissum sit; quorum si nihil acciderit, in Epate causa hæret.

*Prognostica.*

Prognostica.

1. Si sanguis sola copia peccet, minus periculosus est eius fluxus, quam si simul qualitate, tenuitate scilicet atque acrimonia, quia talis longius à naturali statu recedit.
2. Difficilius toleratur, cæteris paribus, fluxus sanguinis, si materia in vias intestinorum superiorum prodeat: quia digniora illa & distributioni chyli destinata sunt, doloresque ibi vehementiores existunt ob consensum cum partibus principibus.

*Curatio.*

Curatio.

Si ex sanguinis copiâ, aut suppressa euacuatione fluxus eius accidat, non sistendus est adstringentibus, & iis, quæ sanguinem condensant, ne suppressus aliò tendat, & grauiorem aliquem affectum excitet: sed victus parciore imperandus, & frictionibus, cucurbitulis, lauacris ad crura & brachia retrahendus & distrahendus, vt natura auaquaasi facta sanguinem auidius postea retineat.

Eodem modo curatur fluxus, qui ex redundantia sanguinis ob membrum aliquod amputatum ortum habet. Neque enim ille fluxus sistendus, sed sanguis minuendus victu parciore, & fluxus præcauendus statis temporibus bis vel ter in anno, sanguine emisso, prout eius redundantia postulare videtur.

Si verò solum ex epate nimiam sanguinis copiam generante proueniat, & æger bene toleret, non sistendus

fluxus, sed sinendus; cum sæpe cum valetudinis comòmodo fiat, & ætatis progressu sponte quiescat.

Si verò immodicus sit, venæ sectione euacuatio & deriuatio fiat. Interim epas paulatim temperare, & victum nonnihil minuire conuenit, ne nimia sanguinis copia generetur. Prodest & serum lactis chalybeatum, aut in quo semina melonum cocta sint. Succus item aut decoctum endiuie vel plantaginis cum puluere rosar. rubrar. & corall. rubror. Clysteres quoque ex sero chalybeato cum adstringentibus cocto vtiliter iniici possunt. Si sanguis bilis, quæ dum acrem & ad fluxum promptiorem reddere solet, sit admista, hæc prius leniter euacuetur iis, quæ simul adstringendi vim quandam obtinent. vt: *℞. Myrobalanor. citrinar. Drach. ij. rosar. rubr. Scrup. β. sem. acetosa Drach. j. Coq. in aqua plantaginis.*

Dosis sint Vnc. iij. quib. rhabarb. Scrup. ij. addi possunt.

Postea adstrictio fiat cum trochiscis de spodio, terra sigillata, syrupo de rosis siccis &c.

*Dieta.*

Qui plethorici sanguinem deliciunt, iis consulit Galenus, 4. de articul. vt minus comedant, quam prius, & cibos quidem pauci alimentis: frequenter aluum ducant, quantum possunt exerceantur, frictionibus vtantur: ante cibum sæpe, post nunquam lauentur.

Si qui aquis vti possunt digerendi vim habentibus, id vel maximè faciant. Abstineant à vino.

Dieta.

*De fluxu hepatico.*

Fluxus hepaticus ab imbecillitate epatis sanguinem rectè generare non valentis originem habet. Vt autem virtus epatis, sicut & aliarum partium, non consistit tantum in téperie, sed in calido & humido innato, spirituque insito, qui est præcipuum instrumentum omnium facultatum: ita imbecillitas epatis non consistit tantum in temperiei mutatione, sed in defectu calidi innati. Calidum autem innatum exstinguitur vel à causa frigida, vt intemperie frigida vicinarum partium, puta mesenterii, intestinorum, ventriculi, aqua pota, medicamentis frigidis; vel absumitur & dissipatur à calore vehemèti, seu in epate, seu in partibus vicinis excitato, vt in febribus ardentibus: vel absumitur à causis siccantibus ex temperie scilicet sicca, fluxionibus & euacuationibus immodicis: vel suffocatur ab humida totius corporis constitutione.

Virtus epatis in quo consistat, & quomodo debilitetur?

Platerus aliam adhuc causam ponit, caliditatem scilicet epatis & sanguinis mesaraici summam tenuitatem, quæ oscula venarum aperiat, de quo infra in questione dicetur.

Vt autem causæ, quæ imbecillitatem epatis inducunt, eiusque naturalem constitutionem vitiant, non sunt eiusdem generis: ita ipse fluxus non semper est eiusmodi. Nam aliquando solum sanguis serofus crudus & semicoctus excernitur, qui legitimus est fluxus hepaticus. Fluxus enim hepaticus legitimus provenit ab imbecillitate epatis, ob quâ sanguificatio non rectè perficitur, seu ab intemperie ipsam facultatem & calidum ac humidum nativum vitante: Spuria verò ab intemperie non lædere facultatem, sed corrumpente eius opus, sanguinem scilicet; ita vt loco puri sanguinis impurus & corruptus proueniat, & ob quem etiam bonus sanguis in malum degenerat; cum in legitimo fluxu sanguinis nunquam bonus & perfectus sanguis in epate generetur.

Fluxus hepaticus legitimus.

Atque hic spurius hepaticus fluxus fit, dum sanguis acrimoniam & mordacitatem acquirit ob bilem flauam aut atrâ permistâ; vel dum ex diuturna in epate, & locis vicinis mora crassus redditur, & aduritur, sæpe etiâ putrescit, vel dū epas limosum & feculentum sanguinem generat lienis vitio, qui id, quod feculentum est, ad se nõ trahit.

Spurius.

Atque ita quamuis epas varias dispositiones pati, & variè alterari possit, tamen sola temperamenti & qualitatum in epate mutatio fluxum hepaticum propriè di-

# 932 De fluxu sanguineo & hepatico.

Etum & legitimum non producit, sed saltem spurium. Cum verò sanguis nonnisi crudus & imperfectus generatur, id non accidit, nisi vi sanguificatrice epatis læsa ob calidum & humidum epatis læsa ob calidum & humidum epatis innatum imminutum: atque hinc accedit, quod febres ardentes, immo læsæ euacuationes, & aliæ causæ calidum, humidumque innatum epatis absumentes & dissoluentes, hydropem, & hunc hepaticum fluxum excitent, reliquæ alterationes non item.

## Signa Diagnostica.

Signa.

Fluxus hepaticus ab imbecillo epate, & præcipue legitimus, facile cognoscitur. Id n. quod exit, dilute rubet, ut lotura carnis animalis recens mactati, neque concrefcit & frequentius effluit, ob læsam simul epatis retentricem, sine aliqua mordicatione, nisi plus bilis simul efferatur.

Distinguiturque hic fluxus à diarrhoea, quod in diarrhoea nulla adsit imbecillitas epatis; in fluxu verò hepatico signa hepatis imbecillitatis manifesta adsint. Nam cum epas est frigidum, color totius corporis est pallidus, palpebræ sunt quasi inflatæ, pedes tument, excrementa sunt cruda & aquosa, abest sitis & cibi appetentia. Et cum incipiente tali fluxu notum habere utile sit, à qua causâ originem duxerit, facile ex antecedentibus morbis id cognoscere licet.

## Prognostica.

Prognostica.

1. Omnis fluxus hepaticus malus. Ducit n. ad cachexiam, hydropem, tabem, & tandem mortem. Hippocrates & Galenus, 2. *Prognost. text. 17. & seqq.*
2. Incipiens, & in iuuenibus difficulter curatur: in ætate & in senibus ferè nunquam.
3. Quibus hepaticis sputum cruentum siue subpallidum siue biliosum meracum, statim lethale. Hippocrates, 6. *Coac. text. 21.* Magnum n. affectum indicat, in quo neque epas per loca conuenientia expurgari potest, sed partes supra septum transversum in contentum trahit.

## Curatio.

Curatio.

In legitimo sanguinis hepatico fluxu ab euacuantibus abstinendum, sed epas roborare, & calidum innatum reficere oportet, ut aucta calidi innati substantiâ ad pristinam constitutionem epas reducat. In hunc usum nec calefacientia, nec refrigerantia per se satisfaciunt, sed potius ea requiruntur, quæ epatis substantiam reficiant, simulque moderatè calefaciunt; ut & in atrophâ & tabe, ita & in hoc affectu calidi innati substantiam potius augere, quàm in qualitatibus mutandis solum occupari conuenit.

Atque ita cum ista sese habeant, tutissimum est, alimenta medicamentis, & medicamenta alimentis ita temperare & miscere, ut faciliè in epatis substantiam vertantur, securusque maiorem caloris naturalis copiam acquirat; quo aucto postea alimenta facilius concoquere possit. Ideoque inter cibos perpetuò vnus exhibendus, qui epatis substantiæ sit similissimus, isque condiendus medicamentis, quæ intemperiem epatis corrigere valent; qua in te etiam ad causas, quæ præcesserunt, respectum habere non inutile est. Commendatur ad hunc usum epas & sanguis anseris, anatis, gallinarum, testudinum, pullorum testes, è quibus varia ciborum genera parari possunt, quæ aromatibus, cinamomo, caryophyllis, macere, croco & similibus condire utile est. Imprimis commendatur epas lupi præparatum. Ludouicus Mercatus hanc aquam commendat, eamque omnibus cibis admiscere iubet.

℞. Epas lupi recentis, aqua vitæ & sale abluti Vnc. iv. sanguinis testudinū Vnc. ij. pulu. santal. omnium Vnc. j. schœnanth. Drach. j. eupatorij viridis M. ij. rosarum P. j. pulu. cina-

mom. cassia lignea, nardi, iunci odorati, calami aromant. croci, myrrha an. Drach. ij. rasura eboris, cornu cerui an. Drach. iij. passular. Corinbiacar. Vnc. vj. theriaca magna, Mithridatij, confectiois alchermes, dissolutor. in spiritu vini an. Vnc. 8. terebinthina abietis Vnc. j. mellis, sacchari an. Vnc. v. vini albi & rubri odorati, aqua eupatorij an. lb. iij.

Macerentur per triduum & postea destillentur.

Atque ita in prima mensa semper aliquid cibi medicamentosi offerendum, postea is, quem æger audius appetit, modò non sit crassæ & prauæ substantiæ.

Exhibeatur quoque pulvis epatis lupi præparati cum conserua rosarum, cinamomo & passulis.

Vel ℞. Pulpa passular. Corinbiacar. cum vino veteri & generoso extrah. lb. 8. cortic. citri conditor. Vnc. 8. specier. aromatici rosati Drach. j. diarrhodi abbatis diarragacanthi. an. Dr. 8. diamargar. frigidi 3. ij. puluer. corallior. Drach. j. 8. epatis lupi præparati Drach. iij. santalorum omnium Dr. j. M.

Vel fiat talis pulvis.

℞. Epas lupi præparati Drach. ij. spec. diarrhod. abbat. sine camphora aromatici rosati an. Drach. 8. rhabarbari Drach. j. corticum thuris Drach. 8. spody, spica an. scrup. 8. F. Pulvis.

Possunt etiam hæc aquæ, aut potius decocta epatis vitulini, cum herbis epaticis, additis quibusdam moderatè adstringentibus, vsurpari.

Si epas serosa humiditate abundare videatur, utile fuerit rhabarbarum aqua rosarum & cinamomo præparatum in substantia sumere vel solum vel cū conserua rosarum.

Extra quoque epati roborantia adhibeantur.

## Diata.

Vitus ad calidum vergat, cibi que sint *εὐχρηστοί* & *εὐπυργοί*, passulæ imprimis utiles sunt; quoniam epas confortant, & si vitiosum aliquid in eo contingatur, id in benignum commutant, teste Tralliano.

Videatur etiam infra part. 6. sect. 2. cap. 1. de Imbecillitate epatis.

## QVÆSTIO.

Quenam fluxus hepatici causâ proxima sit?

Calidi innati defectum proximam fluxus sanguinei causam esse, *supra* dictum. Verum à vulgata illa doctrinâ dissentire videtur Platerus, qui sanguificationis defectum ad fluxum hepaticum gignendum sufficere non putat, sed causam aliam adhuc in epate & illi annexis venis mesaraicis, eamque insolitam, addendam censet, statuitque, eam esse sanguinis mesaraici summam tenuitatem, seu ipsius ichorem, hoc est, tenuiorum partium copiam, osculorumque venarum amplitudinem & dilationem, cuius causam esse statuit epatis caliditatem potius, quàm frigiditatem, à qua, accedente insuper sanguinis constitutione tali, venarumque *αυαροδοσι* eueniat, ut serum rursus per hanc viam exiguis guttis sanguinis tinctum in intestina relabatur, huncque fluxum serosum & cruentum efficiat.

Verum enim verò si non de spūrio, sed de legitimo fluxu hepatico loquitur Platerus, res ferè eodem redire videtur. De hoc enim ipso quæstio est, unde illa tenuitas sanguinis mesaraici sit, quæ oscula venarum dilatat ac aperit. Atque hæc procul dubio à peculiari epatis vitiosa constitutione & calidi innati in eo defectu ortum habet, quæ pro sanguine bono, & suo modo crasso hunc serosum generat: sicut idem in hydropse euenit; imò & in aliis partibus euenire videtur, præcipue in neruis & nervosis partibus affectis; quæ, dum sanguinem affluentem rectè mutare & sibi assimilare non possunt, is in serosam quandam naturâ & ichoré quasi degenerat, quem vulgo *das glieder vasser* appellant. Atque ista constitutio non solum in qualitatibus primarum mutatione, sed & in calidi

calidi innati diminutione consistit. Ideoque cum causam huius morbi statuit esse Platerus potius caliditate, quam frigiditatem, id de incipiente potius, quam iam confirmato fluxu verum est. Et si enim calor in febribus ardentibus malum hoc quandoque excitet: tamen id non fit, nisi per calorem illum calidum innatum dissipetur, & absumatur. Quo absumpto epar etiam refrigerari necesse est, idque tale euadere, ex facie & aliis epatis notis apparet.

## CAPVT IX.

## De Fecum alui per aliena loca excretionē.

Excrementorum alui reiectio per os.

**F**eces alui, quæ secundum naturam per intestinum rectum & anum euacuatur, quandoque præter naturam per alia loca excernuntur. In ileo ore ea reijci supra dictum, quod malum plerumque lethale est. Sed & hoc obseruatum, quosdam toto vitæ tempore excrementa alui per os reddidisse: id quod Romæ à quodam factum narrat Mercurialis, lib. 2. de excrem. cap. 4. & Schenckius, ex obseruationibus D. VVolfij, refert, Constantiæ circa annum 1530. quendam fuisse, qui viginti annos excrementa sicca omnia euomit, aluo nihil reddens, interim mediocriter sanus & suo officio fungens vsque ad multam senectam. Et idem ex obseruat. D. Ioh. Posthij refert anno Domini 1579. Coloniz puellam fuisse viginti annorum, quæ ferè tertio quoque die alui excrementa per os reijcere solebat, idque iam ultra triennium continuauerat, clysteribus & aliis medicamentis frustra adhibitis. Decumbebat autem illa perpetuo, quod crura habebat omnia contracta, interim satis benè colorata, ingeniosa admodum & facunda. Et Thomas à Vega, com. ad cap. 2. lib. 6. Gal. de loc. aff. refert virginem quandam ex retentione excrementi integram perpetuamque omnis excrementi & humidi & sicci retentionem incidisse, & exigam alimentum summissee, per os crebro reieciisse, & vixisse epilepticam.

Causa huius grauissimi symptomatis fuit motus fibrarum intestinorum inuersus. Cum enim secundum naturam motus & contractio incipiat à parte superiore, & versus inferiora progrediatur, donec excrementum per aluum reijcitur: si ex voluntaria fecum retentione vel alia de causa natura semel atque iterum frustra hunc motum tentet, inuerso ordine eum aggreditur, & ab ano inchoat, & versus ventriculum tendit, idque sæpe tanta vi, vt anum planè occludat & constringat, & quæ in eum intruduntur, vel infunduntur, versus superiora protrudat, vt supra etiam de Ileo dictum.

Cui malo nisi maturè succurratur, medicamentis lenientibus & laxantibus, vt eodem loco dictum, malum plerumque incurabile manet.

Per umbilicum.

Per umbilicum post abscessum inter pectinem & umbilicum ruptum puero cuidam Mediolanensi octo annorum feces alui egressas, puerumque tamen ab hoc malo liberatum fuisse, refert Cardanus, lib. 18. de subtil. Et Alex. Benedictus, Practic. lib. 20. cap. 34. narrat, cuidam Veneto puero ex abscessu intestina perforata fuisse, vt per umbilicum magnam excrementorum patrem singulis diebus emitteret; sano tamen similem per domum ambulasse.

Per alia loca diuersa.

Per alia etiam loca perforatis intestinis & excitatis fistulis feces alui sæpe longo tempore excretas fuisse obseruatum, vt referunt Auicenna. Rhazes, in 1. continentiis. Matth. de gradibus, de fluxu ventris, Fernelius, de part. morb. & symp. lib. 6. cap. 4. Marcell. Donatus, de histor. medic. mirab. lib. 5. cap. 4. Fallopius, de cap. vulnerib. cap. 12. Platerus, lib. 3. obseru. sub finem.

Refert etiam Guil. Fabricius, cent. 1. obseru. 51. se vidisse adolefcentem, duodecim annos natum, qui tumore musculorum rectorum abdominis laborabat, quo ru-

pro excrementa per quatuor aut quinque hebdomades per eum locum, nil verò per aluum egressit. Quæ in eius cadauere inuenta sunt, ibidem videantur.

Quomodo autem hoc accadat, & quomodo fiat, vt feces in cauitatem abdominis non excidant, si causa quaratur, vero consentaneum est, id fieri, si Intestinarum vulnera eo in loco incidant, vbi carnes musculorum abdominis portiones existunt & intestinorum, ac mucosæ carnis labia mutuo conglutinantur. & ita via paratur, per quam feces extra corpus educi possint.

Talia autem mala omnino incurabilia sunt.

Refert etiam Schenckius ex obseru. D. Iohann. Helli, quandam Salomen Sueuam, cum incidisset in colicam, & à mulierculis applicarentur multa calida, contraxisse abscessum in intestinis, quo rupto materia defluxit ad partem femoris superiorem pedis dextri, per quatuor digitos à peritonæo infra, & ibi fecit saccum, quo aperto effluxit pura sanies, deinde per multos menses quoties egerat feces, tenuiores per illum locum effluebant. Curata tamen fuit perfecte, corpore purgato, & exhibitis primo decoctis ad vulnera consolidanda vitilibus per multos dies, & imposito emplastro ad rupturam, vt tamen in lecto iaceret, & tandem decocto ligni propinato. Refert etiam Guil. Fabricius, centur. 1. obseru. 74. iuuenem quendam per inguen excrementa alui gessisse. Cum enim ex alto in terram cecidisset, atque eo casu, cuspide pali abdominis musculos peritonæumque vulnerè in cauitatem abdominis penetrante confodisset, intestina per vulnus exciderunt, quæ cum nec reponi commode nec retineri potuissent, excrementa ab eo tempore nunquam per aluum, sed per intestinum hoc exonerauit iuuenis, atque varietum medicorum, Chirurgorumque consilia & medicamenta frustra adhibuit. Vid. loc. alleg.

Per penem quoque cum vrina feces euacuatas fuisse refert Ferrandus Senior, libell. de nephritide. Scribit quoque Guil. Fabricius, centur. 1. obs. 75. Honestam quandam matronam Geneuensem peperisse filium, qui clauso ano excrementa per ductum vrinarium simul & vrinam exercebat. Accersitum fuit Chirurgorum & Medicorum collegium, sed nullus in ea fuit opinione, vt de ani incisione quicquam tentaretur. Tandem cum excrementa indurescerent, nec per ductum illum angustum amplius perire possent, inflatus est venter, exorta est febris, aliaque symptomata, ita vt decimo septimo ætatis die à vita disceserit. Aperto cadauere, inuentum est intestinum rectum adnatum fundo vesicæ.

Obseruatum etiam in multis dissectione vesicæ exemplo calculo, aut alio modo vlcere contracto, læso quoque intestino recto feces & vrinam per vlcus defluxisse, vt scribit Desid. Iacotius, comm. ad aph. 15. lib. 2. sect. 3: Coarctat. Hippocratis.

Tandem etiam foeminis quibusdam per pudenda muliebria feces alui redditas fuisse obseruatum & annotatum à Beniuenio, de abditis sanatis causis cap. 86. Dodonæo, in annot. ad cap. 11. Beniuenij. Amato Lusitano, cent. 2. cur. 10. Mercuriali, lib. 3. de morb. pueror. cap. 9. Marsili. Cognato, lib. 1. cap. 1. Var. obseru. Schenckio, lib. 3. ex obseru. D. Ioh. Helli.

## CAPVT X.

## De rebus variis, alienis &amp; monstrosis per aluum excretis, &amp; ventris murmure.

**V**ia ista per aluum eo fine à natura facta, vt superflua à cibo feces per eam euacuentur. Accidit tamen aliquando, vt præter naturam res aliæ etiam, quæ non vnius generis, per eam excernantur.

Res alienæ per aluum excretæ.

## Nigra deiectiones.

Accidit interdum, vt planè nigra deficiant per aluum. De quo quidem Hippocrates, 4. aph. 21. Deiectiones

Nigra deiectiones.

An nigra deiectiones semper pessima?

*nes nigra sanguini atro similes sponte prodeuntes, siue cū febre siue sine febre, pessima sunt.* Petrus Salius Diuersus tamen monet medicos, ne sēper nigras deiectiones, cū sēpissimē omni periculo vacent, timeant. Sed rectissimē addit: si vltæ excretiones contingant in morbis acutis, & materiaeducta; non sit atra bilis, sed verē melancholicus humor, qui est fex sanguinis, quandoque eueniunt, omni carere discrimine, ad bonumque terminari, exoneratā per has à graui materia naturā ipsā. Si enim splen præter naturam sese habeat, limosa hæc materia plurima accumulatur circa viscera, in venisque illis communibus, & si abundantior colligitur, etiam in mesenterio & circa pancreas, quæ totius corporis veluti altera sentina est, aggregatur, quæ tandem cum grauis admodum naturæ fuerit, insurgente virtute expultrice, natura eius excretionem tentat, hincque deiectiones fiunt nigerrimæ, quibus aliquando & simul connectitur eiusdem superfuitatis vomitus, vt species Cholera videatur. Supra enim & infra eandem materiam nigram excernunt ægri.

Deiectiones nigra triplices.

Sunt nimirum deiectiones nigræ triplices. Prima est ex sanguine, qui è venis excidens in grumos concreuit, aterque fit, quam Hippocrates μέλον αίμα, Galenus μέλαν δέν appellat. Secunda est ex humore Melancholico naturali, seu fece illa sanguinis, quæ circa lienem colligitur, & fusa liqua quataque manet, nec in grumos concreuit. Tertia est ex bile atra, quæ colore nigra est, splendens, atque acris. Primi generis deiectio non ita putrescat, atque veneni naturam induat, aut causa sit magna, vnde illa sanguinis collectio provenit. Secunda equidem sæpe fit cum ægri cominodo, vt dictum: lienis tamen & vasorum splenicorū debilitatem arguit. Ideoque videndum, an talis euacuatio fiat per crisin, & à naturæ robore, an verò symptomaticè. Tertia pessima est, vt pote quæ accidit ab humore pessimo.

Et si vero ex secundi generis illa deiectione vires non nihil languidiores reddantur: tamen materiā euacuata æger in meliorem statum deducitur. Medici ergo officium tunc est, in ipso paroxysmo intestina saltem clysteribus abstergere & munire, ne à materia trāseunte offendantur; Abstergentia etiam exhibere, & si vomitu simul materia reiiciatur, eum lenioribus medicamentis faciliorem reddere; ab oxymelite verò & omnibus acidis, ac quæ acētum recipiunt, abstinere, simul verò vitare ventriculum roborantia & adstringentia, siue intus exhibita, siue extra applicata, ne materia derineatur. Postea autem dispicere, an alimentorum ratione, an verò lienis vitio hoc accadat. Si alimentorum vitio id fiat, meliores præbendi. Si vitio lienis id contingat, videndum, an ob eius imbecillitatē vel obstructionem id accadat, vitiumque id corrigendum, vt postea de lienis præter naturā affectibus dicetur. Si quid etiam materiæ eiusmodi reliquum sit, id per intervalla euacuandum. Et enim si materia tota non euacuatur, vel etiam causæ eam generantes non tollantur, recidiva fieri solet, ægerque tandem vel in hydropem vel malas ventriculi affectiones conicitur, vel materia detenta acrimoniā acquirens & in atram bilem degenerans naturam ad excretionem vehementer stimulare, ægrumque vnica enormi euacuatione de medio tollere solet, quod iis præcipuè accidit, qui vina generosiora & aromata multa in continuo vsu habent.

Pus.

Pus per aluum deiectum.

Pus etiam interdum per aluum deiecitur. Idque ex partibus vicinis, vt cauo epatis, vel abscessu aliquo, in mesenterio latente facile fieri potest.

Cur à partibus remotis pus per aluum euacuetur?

Hoc verò admiratione dignum est, quod etiam à partibus remotis, vt artubus, materia per aluum euacuatur, id quod comiti Mansfeldiano tormento manuali ad sinistri cubiti articulum vulnerato accidisse refert Ambros. Paræus, lib. 10. cap. 12. Egro enim diarrhœa superuenit, qua purulentam & foetidam saniem à brachio &

vulnere manantem reddebat. Idem aliis etiam duobus accidisse testatur, lib. 16. cap. 49. Neque hoc impossibile est. Si enim in febribus natura sponte sæpè, tum etiam medicamentis irritata in aliis membris vitiosos humores in vena caua passim litantes à bonis humoribus separare, eosque per ventrem euacuare potest: cur non etiam saniem à magnis vulneribus in proximas venas sese insinuantem per aluum expellere possit?

Vermes.

Vermes quoque per aluum aliquando euacuari notum est, de quo supra sect. 1. cap. 5. de vermibus dictum. Imo etiam lacertas per aluum excretas fuisse refert Gēma Cosmocrítica lib. 1. cap. 6. Et anguillam viuam cubiti longitudine, quam instar foetus nouem mensibus gestarat, puellam annorum 14. per sedem excreuisse idē lib. 2. cap. 2. narrat. Scarabæi genus omne cornutum per aluum excretum fuisse ab anu pleuritica, scribit Gesnerus, lib. 3. epistol.

Vermes per aluum excreti.

Lacerta.  
Anguilla  
viva.

Scarabæi cornuti.

Lapides & Tophi.

Lapidum & tophorum varia genera per aluum excreta fuisse testantur Gentilis, comm. ad Can. Auicenn. lib. 4. fen. 1. tract. de febre sextana. Gordonius, part. 5. cap. 18. Pract. Matth. de gradibus, ad 9. Rbas. capit. de colica. Sa- uanorola, tr. 6. cap. 16. rubr. 17. Gainer. cap. 1. tract. de calculosa passione. Thom. à Vega, comm. ad cap. 5. lib. 1. de loc. aff. Galeni. Beniuē. de abdit. sanat. causis cap. 14. & alij plurimi, quorum obseruationes collegit Ioh. Schenckius, lib. 3. obseru. Retulit mihi etiam vir nobilis, se in acidulis Egranis aliquot calculos nigros excreuisse. Monstrauit mihi idem aliquot magnitudine pisii, colore terræ sigillatæ Strigenis, sed duriores, quos excreuerat. Globum tophaceum tunicā inuolutum suberis substantia à fœmina quadam excrementum fuisse testatur Scholiographus, ad cap. 56. lib. 2. Hollerij de morb. internis. D. Iacobus Oethæus refert filium suum tres menses natum, cum grauissimis & continuis doloribus vexaretur, post exhibitam tribus diebus continuis cassiam cum betonicæ syrupo mixtam excreuisse globulos plurimos, inquit putrida & saniosa materia refertos, extra vero membrana quadam obductos.

Lapides & tophi per aluum excreti.

Offa.

Mirum tandem hoc est, quod è Christophori Rumbaumij Medici quondam Vratislauiensis obseruationibus refert Schenckius, lib. 3. obseru. Anno 1577: anum quondam Lipsiæ in ædibus D. Simonis Simonij cum latus afflixisset, particulam costæ spuria palmæ vnus longitudine satis acutam ab integra effractam per abdominis cavitatem ad intestinum rectum delapsam, eo perforato, per aluum eiecisse, intestino breui consolidato.

Offa per aluum excreta.

Officula praua è pedibus gallinarum, quæ aliquot annis in intestinis hæserant, per aluum reddita fuisse, refert Platerus, in fine lib. 3. obseruat.

Casci etiam concreti indurati quæ & diu in intestinis retenti magnam copiam quendam post diuturnos cruciatus per aluum reddidisse supra ex Platero dictum.

Casci concreti & indurati.

Murmura & Rugitus Ventris.

Tandem etiam intet symptomata intestinorum, & quidem quæ auditui occurrunt, sunt ventris murmura & Rugitus. Qui sanè virginibus sunt frequentiores & molesti etiam; aliis tamen quoque accidunt, & morborum quorundam ventriculi & intestinorum sunt symptomata.

Murmura ventris & rugitus.

Habent enim ortum à flatibus in intestinorum cavitatē conclusis, & hinc inde discutientibus, nec exitum inuenientibus, præcipuè verò circa sinistram hypochondrii

Causa.



drium & in colico, vt & circa vmbilicum, quod eò loci intestina tenuia maximè conuoluantur. Occasionem etiam huic malo præbent virgines interdum, dum ventrem nimis arctè constringunt, vt graciles sint. Ita enim flatus in intestinis compressis retinentur.

Ipsam hoc symptoma nihil per se periculi habet; nisi quod præcipuè in virginibus, turpitudinem quandam parit. Si quid verò periculi portendit, id est à causis, à quibus flatus pendent, de quo *supra* dictum.

Tolluntur autem ista murmura causis, à quibus pendent, ablatis: cruditates scilicet amouendæ, flatusque discuriendi, cum exhibitis tum extra applicatis medicamentis, de quibus *de imbecillitate ventriculi & colica ex flatu* dictum, quæ hic repetere opus non est.

## DE SYMPTOMATIBVS ANI.

## CAPVT XI.

## De Ani Paralyssi, stupore &amp; dolore.

**A**NUS musculo suo, qui sphincter ani appellatur, clauditur, ne feces quouis tempore excidant, sed pro arbitrio hominis, vbi stimulum excretionis sentit, excernantur. Sensu etiam exquisito anus est præditus, vt stimulum excrementorum sentiat, ne ea iusto diutius retineantur. Interdum autem vtraque hæc actio læditur. Platerus equidem hoc negat, & licet in Apoplexia adsit omnium partium resolutio, vt & si in alia paralyssi partes inferiores omnes resolutæ sint, nihilominus feces alui reici, podicemque spontè retrahi posse putat. Verum memini aliquoties in Apoplecticis muscolum hunc ita resolutum fuisse, vt anus planè hiarit; vnde etiam clysteres inieci retineri non potuerunt. Verum accidit hoc saltem in Apoplexia grauissima, & Apoplexiæ plerumque lethalis indicium est.

Interdum etiam sensum, quo præditus est, anus perdit, vt stimulum excrementorum non sentiat.

Vtraque affectio ortum habet neruo sexti paris, à quo intestina nervos accipiunt, affecto, & quidem quod spiritus animalis in eam vel non influit, idque ideo, quia aut in cerebro aut neruo sexti paris est angustia, vt in apoplexia & paralyssi accidit; vel licet influat, non recipitur, idque aut ob intemperiem frigidam & humidam, aut etiam vim narcoticam; quod fieri potest, si quis in lapide frigido sedeat, aut opiatum medicamentum ano sit inditum.

Curatur autem hæc paralyssi & stupor eodem modo, vt aliarum partium paralyssi & stupor.

## De ani Pruritu.

Vt anus sensum interdum amittit: ita contrà quandoque pruritu & dolore corripitur.

Pruritus atque ani assidua mordicatio ab iisdem ferè causis ortum habet, à quibus tenesmus. Primò nimirum ab humore salso, viscido & mordaci sphincteri inhaerente; deinde à fecibus acris ibi relictis & adhærentibus; tertio à vermibus in intestino recto, ascaridibus putata: quarto ab vlcere in ano.

Curatio pro causarum diuersitate instituenda. Nam si cum tenesmo sit coniunctus pruritus, curatio eodem modo peragenda, vt mox de tenesmo dicetur.

Si ab humore salso sit pruritus, eadè ferè curandi ratio est: humor nimirum salso & acris euacuandus, podex abluendus vel fouendus decocto foliorum maluar, violariz, salicis, florum verbasci, rosarum, vel aquà plantaginis, cui parum aluminis sit admixtum, vel succo ebuli.

Si à sordibus & fecibus relictis, ex abluendæ decocto verbasci.

Si à vermibus, curatio instituenda, vt de ascaridibus dictum, vermesque expellendi clysteribus & glandibus conuenientibus, vel gossypio terebinthina illito extrahendi.

Si ab vlcere sit pruritus, curatio ad vlcus dirigenda, vlcusque mundum semper conseruandum. Vtile est tum hoc vnguentum:

*℞. Tragacamb. sulph. cir. litharg. an. Drach. j.*

Terantur & cum aceto atque oleo rosac. F. Linimentum.

## De Ani dolore.

Interdum etiam anus insigni dolore corripitur: id quod accidit præcipuè hæmorrhoidibus, inflammatione, erysipelate, aliisque tumoribus & vlceribus. Causæ etiam externæ eundem dolorem excitare valent. Ita refert Platerus, lib. 2. *observ.* Medicinæ quendam studiosum, cum chartâ, quâ capfici semina asseruârat, nates absterfisset, subito tantum ardorem & dolorem sentire cœpisse, vt nullibi quiescere posset, & præ dolore ferè insaniret. Idem alij cuidam, qui podicem chartâ, in quâ piper contentum erat, absterfisset, accidisse idem refert. Idem scribit, rusticum quendam talpam viuam in sacco lineo caligis insuto inclusisse. Cum autè ille in mensa apud sodales moram traheret, talpam exitu quærentem primò panem, quem tum in sacco gestabat, mox & saccum perterebrasse, & in clunium interstitium se ingerentem ad podicem vsque progressam pedibus anterioribus, quibus terram fodere solet, anum dilataste, & in eum irrepsisse, magnumque dolorem ibi excitasse, quam cum adstantes extrahere niterentur, talpa contranitente, pedibusque & acutis vnguibus intestino infixis sese firmantè, cruciatus summus excitatus est, vt ab opere desistere cogeretur, donec tandem æger exagitatus dolore posteriora supra scamnum saepe & validè concutiendo talpam attonitam redderet, ita vt vlterius in podicem tota se non ingereret, sed viribus amissis extrahi posset.

Periculosum malum ani dolor est, & quod vires valde deicit ægroque interdum mortem affert. Curatur autè rectissime, causis, à quibus dolor pèdet, sublatis, de quo *suo loco*. Et si à rei alicuius externæ acris contactu dolor excitetur, locus aquâ tepidâ vel lacte abluendus, vel æger balneo aquæ dulcis tepidæ insideat. Ad dolorem autem leniendum anodina, & si opus sit, etiam narcotica, adhibenda, vt:

*℞. Pingued. gallin. recent. butyri recent. ana Vnc. j. vitell. oui num. j. mucilag. sem. psyll. Drach. iij. croci Scrup. ss. cera parum. F. Linim.*

Vel *℞. Mucilag. sem. psyll. Vnc. j. cremor. lact. Vnc. iij. emuls. sem. 4. frig. maior. Vnc. j. vitell. ouor. num. ij. Misce.*

Vel *℞. Thuris, myrrhæ, croci, opij ana Scrup. j.* Puluerisata excipiantur mucilagine sem. psyllij & vitello oui ac pomata. Fiant suppositoria mollia.

Si dolor valde vrget, etiam laudanum opiatum vel alia opiata exhiberi possunt.

## CAPVT XII.

## De tenesmo.

**P**ECULIARIS verò doloris ani species est Tenesmus, qui dysenteriz sæpe accidit, imò à Galeno, 3. *de causis sympt. cap. 2.* inter dysenteriz species refertur.

Dicitur à Græcis *tenesmus* (quam vocem & Latini imitati tenesmus & tenasmus dixerunt) à tensione; cum in eo assidua & molesta tensio in podice percipiatur.

Est enim tenesmus nihil aliud quàm assidua per aluū deiciendi cupiditas cum dolore, in qua vel nihil, vel pauca mucosa & cruenta deiciuntur.

## Causæ.

Causa continens huius mali & proxima est, quicquid facultatem expultricem in intestini recti extremitate stimulare potest. Propria n. huius intestini actio est excretio, & præcipuè in extremitate eius vis illa viget. Hinc pars affecta in hoc malo est podex, seu extremitas recti

Prognosticū.

Curatio.

Ani Paralyssi & Stupor.

Nam in Apoplecticis ani sphincter resoluatur?

Causa.

Curatio.

Ani Pruritus.

Eius Curatio.

Ani Dolor & eius Causa.

Prognosticū & Curatio.

Tenesmus.

Causa.

recti intestini. Hæc enim solâ, non verò quavis intestini recti parte affectâ hoc malum excitatur. Nam fissuræ ani non inferunt tenesmum, nisi insint huic parti, cui egeredi cupiditas naturaliter insita est. Quotiescunque igitur vis illa in hac parte stimuletur à quacunque causâ, deiiciendi desiderium, ac conatus excitatur, etsi sæpe inanis. Sed ut hoc fiat, causâ illa intestino adhærere & quasi affig. debet. Nam si facillè præterlabatur, consuetam saltem egerendi cupiditatē excitat, non verò præternaturalem. Ac hinc accedit, ut licet bilis flaua maximam stimulan- di vim habeat: quia tamen præterlabitur facillè, & ob tenuitatem parti non adhæret, rarè tesmū exciter, & non nisi cum osculis vasorum ad intestinum hoc tendentium adhæret; id quod interdum ex nimio conatu excernendi accedit, referatis præter naturam osculis.

In dysenteria quidem vel exulceratio eiusdem intestini, vel humor acris, mordax, & salsus inferiori intestini recti parti adhærens eamque vellicans huius mali causâ est. Præter hæc causâs etiam expultricem stimulare valét calculus vesicæ, præcipuè in collo vesicæ hærens, tumor patrum vicinarum, ut vteri, quod grauidis sæpe accidit; hæmorrhoidum, vasorum seminaliū; vermes, vlcus muscoli vesicam clauderis. Intemperies quoque frigida contracta ex sessione super lapide frigido, aut mora in aqua frigida. Nonnulli quidem eum tenesmum, qui citrà exulcerationem sit, nothum tenesmum dicendum putant; verum sine causâ. Nam etsi secundum causâs, & mali grauitatem non exigua sit differentia: tamen quia tenesmi natura & ratio in assiduo & ferè inani deiiciendi conatu consistit; quandocunque causâ aliqua adest, quæ hoc reiiciendi desiderium excitat, tenesmus meritò appellari potest.

#### Signa Diagnostica.

Signa.

Facillè hoc malum cognoscitur. Assidua enim adest deiiciendi cupiditas cum dolore, etsi sæpe nihil deiiciatur; interdum verò pauca, mucosa & subruenta. Prolabitur nonnunquam & intestinum rectum ex nimio excernendi conatu; & vrinæ difficultate stillicidium accidit, propter vicinitatem ac consensum harum partiū. De quo Hippocrates, 5. aph. 58. Ad recti intestini & vteri inflammationem, purulentosque renes accidit stranguria.

Causâ discernuntur ex iis, quæ excernuntur, & affectibus coniunctis. Etenim si à dysenteria causam habet, pituitosus & salsus humor visu, & ex maiori conatu ac paucis excrementis colligitur; biliosus ex maiori mordicatione & pruritu; reliquæ causâs ex affectibus coniunctis cognoscuntur.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Tenesmus facillè tollitur, neque vnquam per se iungulat. Cellus, lib. 4. cap. 18.

2. Quia tamè non leuia symptomata & mala sæpe secum trahit, tum satis periculosus est. Nam, ut Hippocrates, 7. aph. 27. scribit, Si prænati tenesmus supervenerit, abortus causâ est: siquidem contentione seu sollicitatione assidua ac molesta cum totum corpus, tum maxime vterus laborat, utpote recto intestino cognatus & affinis: unde non mirum, si frequentius exurgendo desidendoque & vehementius connitendo abortus fiat, ut Galenus, in comment. ait.

3. Quod causâ, à quâ oritur, grauior, eò periculosior tenesmus, unde qui ab atra bile excitatur tenesmus omnino periculosus est, cum quasi cancer exulceratus sit.

4. Sæpe neglecto tenesmo vlcus relinquitur sordidum, idque in fistulam transit, quæ ægrè curatur.

#### Curatio.

Curatio.

Curandi ratio varia est pro causarum varietate. Si

ab eadem cum dysenteria causâ oritur tenesmus, & dysenteria succedit, eadem ferè curandi ratio est, quæ dysenteria, & propterea vniuersales euacuationes, prout opus, instituendæ. Postea parti affectæ succurrendum; humores stimulant abstergeri; vlcus, si adsit, sanandum; pars roboranda, dolorque leniendus. Ideoque talis clyster paretur.

℞. Hordei, flor. verbasci, an. M. j. rosar. rubrar. M. ℞. lumbricor. locor. & incis. Vnc. j. sem. psylli, cydonior. fœnu-graci an Drach. j. Coq. in lacte recenti. Colaturæ ℞. lb. ℞. Adde olei rosæ Vnc. ij. vitellos ouorum ij.

F. Clyster, qui abstergit & dolorem lenit.

Quantitas clysteris praua sit, cum saltem intestinum rectum abluere debeat: frequentius tamen iniiciatur.

Foucantur & vicinæ partes circa os sacrum, & inter-femineum decocto violar. alibæ, verbasci, flor. chamamel. meliloti, sem. fœnu-grac. lini, anethi; & inungantur oleo rosaceo, chamamelino, anethino, lumbricorum, vel communi, in quo sem. dauci, cumini, angelicæ cocta fuerint.

Si dolor sit vehemens, & vigilæ ægrum vexent, aliquid laudani opiatum cum syrupo de papauere exhibeatur.

Dolore sedato, si vlcus restet in intestino recto, illud abluendum & consolidandum. ut:

℞. Hordei M. j. rad. consolida Vnc. ij. plantaginis, santicula, rosar. rubr. an. M. ℞. Coq. in aqua simpli. Colaturæ ℞. lb. ℞. Adde mellis rosati Vnc. ij. vitellos ouorum ij. F. Clyster.

Abluto vlcere semel atque iterum vel etiam ter de die talis clyster iniiciatur.

℞. Decocti modò parati Vnc. v. boli Armeni, thuris, myrrha sanguinis draconis an. Drach. ℞. Misce.

Commodiora adhuc sunt suppositoria; cum ipsi loco affecto rectius & diutius adhærere possint, suntque ex seuo hircino cum puluere thuris, tutia & similibus. Et si vehemens dolor adsit gr. ij. vel opij vel laudani opiatum admisceri possunt.

Vel paretur tale suffimigium:

℞. Mastichis Drach. j. thuris, styracis calamita an. Dr. ℞. flor. verbasci, rosar. rubrar. an. Scrup. ij. F. Puluis pro suffimigio.

Aut paretur suffimigium ex pice eum semine rutæ, anisi, fœniculi, thure.

Vel fiat tale Linimentum.

℞. Mucilaginis, sem. psylli cydonior. extract. cum decocto florum verbasci, & plantaginis an. Vnc. j. seui hircini Vnc. ℞. vitellum oui, boli Armeni Drach. ℞. thuris Drach. j. F. Linimentum.

Si absque dysenteria tenesmus accidat, causâ eius tollenda. Quapropter si absque dysenteria à lentis & salsis humoribus intestino adhærentibus excitetur, abstergeri ij decocto hordei, maluæ, melle rosato.

Si à biliosis humoribus, iidem abstergeri decocto hordei, lacte, iure carniū, addito saccharo rubro.

Si à calculo, vel etiam fecibus induratis, (quam causam etiam quidam ponunt) fiat tenesmus, primò clysteres emollientes infundendi, qui feces emolliant & vias laxent, postea acres, qui emolliatas feces & calculos educant.

Si à vermibus intestino recto adhærentibus, idque mordentibus accidat tenesmus; clysteres, qui vermes necent, ex foliis persici, absinthio, prassio, hysopo, hiera simplici & similibus iniiciendi.

Si à refrigeratione nimia intestini recti oriatur, calefaciendum id est mentha, semine lini, anethi in sacculum inclusis, coctis & ano appositis. Vel fomentetur anus decocto horum; vel vapor ex decocto talium ano excipiat, vel infusus ex decocto isto paretur: vel sedeat æger super tabula ex ligno cupressi, vel iuglandis calefacta & seuo hircino illita.

Si à patrum vicinarum affectibus per consensum excitetur tenesmus, iis sublati & ipse tollitur.

CAPVT XIII.

De Hamorrhoidibus.

Hamorrhoides.

**T**Andem hanc de intestinorum affectibus tractationem claudant hamorrhoides, earumque præter naturam affectiones.

Ampoiss equidem quandoque pro omni sanguinis ex quacunque parte effusione & fluxu accipitur, & dum Hipp. 2. *Prorrh.* scribit, *ἡ αιμορροΐδας ἐξ υἱοῦ*, Celsus locum exprimens, sanguinem aliqua parte prorumpentem dixit, *lib. 2. cap. 8.* In specie tamen saltem de sanguine è venis ani & vteri effusione vsurpatur, vt ex eodem Celso, *lib. 6. c. 18.* videre est. Imò vsus obtinuit, vt specialissimè pro eo sanguinis fluxu, qui fit è venis ani, accipiat. Nec solum de sanguinis fluxu ex hisce venis, sed & de iis ipsis venis vocabulum hamorrhoidum vsurpatur.

Patiuntur autem hæ venæ varios præter naturam affectus. Aliquando enim intumescunt, aliquando quoque inflammantur, doloremque patiuntur, aliquando verò sanguinem fundunt, qui fluxus hamorrhoidum nominatur.

Hamorrhoidum differentia.

Vnde hamorrhoidum variæ sunt differentie. Primò enim sunt hamorrhoides duplices, aliæ internæ, quæ è ramo splenico venæ portæ oriuntur, & per mesenterium circa colum & intestinum rectum extensæ terminantur in musculis ani & intestino interiore. Eaque est vnica, sociamque habet arteriam à mesenterica infra ramos producentem. Externæ verò à ramo venæ clauæ epigastrico oriuntur, & in externas recti intestini partes, ani musculos scilicet disseminantur. Suntque duplices, vtrique vna, & vtraque habet comitem arteriam ab hypogastrica deriuatam. Et hamorrhoides à porta ortæ solum intestinum rectum nutriunt; quæ verò musculos nutriunt, à caua vena oriuntur. Et quia partes, quæ hoc loco à caua nutriuntur, plures sunt, quatuor scilicet musculi, vnus sphincter, qui in orbem intestinum rectum cingit, & alij duo intestinum attollentes & quātus cutaneus anum adstringens, hinc etiam, vt modò dictum, hamorrhoides à caua deductæ duæ sunt, à porta verò vna tantum. Et propter hanc diuersam hamorrhoidum originem internæ quidem sanguinem & humores ex vena portæ & visceribus, ad quæ illæ pertingunt; externæ verò sanguinem in vena caua redundantem euacuāt. Quia tamen eidem intestino recto inferuntur, communionem quandam horum vasorum esse, & osculis sibi mutuo occurrere, & ex hamorrhoidibus internis humores vitiosos externis etiam communicari, & per eas effundi, probabile videtur. De qua re pluribus infra, de affect. *hypoch. c. 1.* dicitur. Videatur etiam Hieronymus Fabricius ab Aquapendente, de operat. *chirurg. cap. de hamorrhoidibus.*

Hamorrhoides cæcæ & aperta.

Deinde quia sanguis ad hamorrhoidas affluens modo per earum orificia effluit, modo in iis subsistens eas in tumorem attollit, duplices inde hamorrhoides constituuntur, cæcæ & aperta. Cæcæ (clausas vel dolentes rectius dici putat Platerus) illæ dicuntur, quæ tātum tument & nihil excernunt; aperta verò sunt quæ suo tempore sanguinem effundunt. Et cæcæ quidem sæpè magno cum dolore intumescunt, dolorque, cum excrementa excernuntur, exacerbatur; imò interdum à dolore & sanguine effluente, neque exitum inueniente inflammatio excitatur.

Quinque hamorrhoidum differentie secundum Galen.

Galenus, in *lib. definit. medicar.* quinque adhuc proponit differentias, à magnitudine, numero, figura, loco constitutione desumpta. A magnitudine, quod aliæ sunt magnæ, aliæ paruæ, aliæ mediocres; à figura, quam intumescences acquirunt, & inde etiam varia nomina fortiantur, & à verrucis, acinis vuarum, moris, sicubus, quæ repræsentant figuram, dicuntur verrucæ, vucæ mora, *ονόδους* seu ficus, Latinis mariscæ, vnde Martialis; Cæduntur tumida Medico vidente mariscæ. A loco, quod aliæ

Den. Sennerti Tom. II.

in ano sunt, aliæ in sphinctere, aliæ in intestino recto; A constitutione, quod aliæ mites sunt, aliæ malignæ cancrodes, gangrænosæ.

Hamorrhoides a. quatenus tumēt, pettinent ad morbos magnitudinis præter naturam auctæ: si verò sanguinem præter naturam fundūt, pettinent, vt Galenus, 3. de *sympt. causis. cap. 6.* scribit, ad symptomata in genere excrutorum toto genere præter naturam. Neque n. omniū hominum est, sanguinem ex his venis effundere, sed quorundam atque aliis etiam regionibus, vt meridionalibus magis sunt familiares, alius minus, vt septentrionalibus; quod illarum incolæ sanguinem calidiorem & magis adustum, harū frigidiores habent. Et quibus hoc accidit, à causa præter naturā accidit. Neque enim solum tum præternaturales sunt, cum præter modum fluunt, sed etiam cum moderatè fluunt. Etenim quam moderatè fluunt, viles sunt, & à multis morbis præseruant: tamen humor, qui ad excrétionem naturā stimulat, naturali modo se non habet, neque sanguis vnquam, nisi in foeminis, secundum naturā excernitur.

Accidit autem fluxus hic præcipuè maribus, & quidè maximè in virili ætate constitutis; nonnunquam & foeminis. Et noui ipse nobilem foeminam, corporis constitutione sanguineam, affectioni tamen hypochondriacæ obnoxiam, quæ singulis mensibus ordinariè, & quidè die post menstruum fluxū decimo quarto hamorrhoides patiebatur. Rarè vero ita ordinatè singulis mēsis fluunt hamorrhoides, vt menstrua, sed quibusdam duotum vel trium mensium spatio, nonnullis singulis annis semel vel bis, prout humorum naturam stimulantium maior vel minor copia est.

Excitatur verò in hamorrhoidibus cæcis dolor, non ob ipsam venam affectam, quæ sensu prædita non est, sed ob partes neruosas & membranosas exquisito sensu præditas, quibus intexta est, idque eò magis accidit, si inflammatio accedat. Tum enim sanguis vt excernatur, in extremitatem venæ delatus, nec exitum inueniens extremitatem huius venæ, simulque partes, quibus inserta est, distendit. Accidit hoc etiam interdum iis, quibus hamorrhoides nunquam fluxerunt, & primum fluere incipiunt, cum oscula venarum nondum satis pateant.

Causa.

Causa proxima, quam insequitur hoc symptoma, est morbus compositionis, seu vasorum horum apertio & *ἀνατομία*. Fit autem ista hamorrhoidum apertio à sanguine vitioso, & imprimis adusto, vt postea, *questione prima*, dicitur. A quibus autem causis humor melancholicus & ater atque adustus generetur, alibi dictum.

Mouentur verò hamorrhoides ferè sponte & naturæ beneficio; & quidem aliæ statim tempus obseruant, & fluunt vel singulis mensibus, vel singulis anni quadrantibus, vel alia periodo, aliæ verò sine vllò certo ordine mouentur. Interdum verò mouentur à causa aliqua externa, præcipuè fortium purgantium vsu vt colocynthidis scammonij, vt aloës, quæ hamorrhoides aperienti vim habet, vt ipsa experientia id testatur, quod qui negant, inter quos est Leonardus Fuchsius, *lib. 1. paradox. cap. 1.* experientia scuticæ digni sunt, vt Iulius Cæsar Scaliger, *exerc. 160. sect. 3.* loquitur.

Signa Diagnostica.

Affectus ipse per se manifestus est, siue fluant hamorrhoides, siue non fluant, & saltem intumescant, siue etiam doleant. Ita enim facillè agnoscitur, an hamorrhoides sint internæ. Externæ enim & tactui & visui sunt obuiæ. Internæ verò non patent, nisi in ani expressione, vel si anus speculo ani aperiatur. Figuræ magnitudo & numerus visu quoque deprehenditur. Quæ autem sanguinis, qui euacuatur, qualitas & dispositio sit, è signis humorum alibi propositis patet.

Hamorrhoides ad quam rem p. n. classē referendæ?

Quibus regionibus fluxus hamorrhoidum magis sit familiaris?

Cui sexui potissimum accidat fluxus hamorrhoidum?

Qua periodo fluxant hamorrhoides?

Cut in hamorrhoidibus cæcis dolor excitetur?

Causa.

Signa.

K K K

Ryogno

## Prognostica.

## Prognostica.

1. Hæmorrhoides moderatè & conuenienti tempore fluentes à multis morbis hominem præseruant, & à præsentibus liberant, vt docet Hippocrates, dum, 6. aph. 11. scribit, *Melancholicis & nephriticis hæmorrhoides superuenientes bonæ sũnt, & ibid. aph. 21. Insanis si varices & hæmorrhoides superuenerint, morbi sũt solutio, & 6. epid. com. 3. r. 37. Sanguisuius venis laborantes, neque morbo laterali, neque pulmonario, neque phagedana, neque inflammatoriunculis, quæ dothiones vocantur, neque iis, quæ termentib; fortasse verò neque lepra, fortasse neque aliis morbis corripuntur.* Et 6. aphor. 12. *Diuturnas curanti hæmorrhoides nisi vna aperta seruetur, periculum aquæ inter cutem vel tabis impendet.* Idem docet Galenus, 6. epid. comm. 5. text. 25. 3. de naturalib. facultatib. cap. 3. & 1. ad Glaucon. cap. 15. Obseruatum quoque est, vt testatur Scholiographus, ad cap. 55. lib. primi Hollerij de morb. internis, grauidis quibusdam quatuor menses in vtero habentibus hæmorrhoides vitiliter fluxisse, iisque subsistentibus peius habuisse. Habent & hoc commodi hæmorrhoides, docente id Hieronym. Fabricio ab Aquapendente, quod menses prouocant & faciliores ad fluxum reddunt, id quod de operat. chirurg. capite de hæmorrhoidib. exemplis probat, & ista ratione, quod in venis vteri sanguinem propter copiam & crassitiem infarctum & impactum quasi ad ore venarum sedis vi vacui trahunt, aut potius deriuant, vt ita vteri venas ab infarctu liberent.

2. Ex iisdem tamen patet, hæmorrhoides corporis constitutionem non planè perfectam arguere, sed talè, quæ vitiosos simul, præcipuè melancholicos & adustos humores, generat, quos ad corporis œconomiam in statu naturali conseruandam cum sanguine per hæmorrhoides natura euacuare solet.

3. Habent contra hoc incommodi hæmorrhoides, quod si supprimantur vel immodicè fluant, ægrum in hydropem, phthisin, & alios morbos præcipitant, de quo Galenus, 3. de naturalib. fac. c. 8. *Ex hæmorrhoidibus diuturnis suppressis vel immodicè profluentibus ad extremam frigiditatem deuenientes ægri sæpe in quam inter cutem incidunt;* & 4. aph. 25. scribit, euacuationi per hæmorrhoides non esse naturam assuefaciendam, quoniam periculosus est excessus, siue supra modum sanguis excernatur, siue ex toto supprimatur. Aëtius, æt. tab. 4. serm. 2. cap. 3. inquit; *Hæc affectio malorum plurimorum hominibus causa existit. Nam & deformitatem & miseram vitam hominibus inducunt; multos verò etiam vitam priuant. Et deformitatem quidem propter coloris totius vitiationem ex euacuatione succedentem; miseram verò vitam propter corporis debilitatem. Quandoque autem de vita periclitamur sic affecti, cum ob excedentem euacuationem perfrigeratum per aquam inter cutem operatur.* Idem docet Paulus Ægineta, lib. 3. c. 59. Quæ tamen omnia intelligenda sunt, si affluxus modum excedat. Et vt hæc omnia paucis complectamur, si aperiantur hæmorrhoides, quando sanguis in corpore vitiosus, & forsàn etiam copiosus adest, vtilis sunt, & corpus sanum conseruant. Contrarium si fiat, contrarium etiam accidit. Similiter si, cum morbus adest vel imminet, aperiantur, sanitatem promittunt. Si vero tum occludantur, morbum certo ingruerè, vel præsentem auctum miri significant.

4. Diuturnas curanti hæmorrhoides, nisi vna quæpiam seruetur aperta, periculum aquæ inter cutem vel tabis imminet, 6. aph. 11. Non tamen tantum hydropem & tabem, sed & alios morbos retentæ hæmorrhoides excitare possunt, atque interdum repente materia & atrabile ad caput mania excitatur, vt Alcippo, 4. Epid. accidit. Interdum etiam dysenteria inde oritur. Generatur autem hydrops ex suppressis hæmorrhoidibus, vitioso & feculento sanguine, hac via interclusa, ad epar uente, eiusque calorem natium suffocante. Phthisis verò humore adusto, salso & acri ad pulmones conuer-

so, eiusque vasa erodente, vnde sputum sanguinis, & tandem phthisis oritur. Ita Amatus Lusitanus, cur. 3. cent. 5. narrat, virum quendam annos 45. singulis mensibus euacuationem per hæmorrhoides passum esse, quæ cum illi obstruerentur, sanguinem subflauum & rubrum & coaceruatim per os sine febre & tussi eiecisse, cui cum quatuor hirudines ilico hæmorrhoidibus apponi iussisset, & syrupum ex endiuia, fumaria ac lupulo earundè herbarum decocto dilutum exhibuisset, hinc purgans ex manna, rhabarbaro & particula elect. diaphanica propinasset, tandemque conseruam fumarie ieiuno superbibita aqua cichorii dedisset, consuetum fluxum hæmorrhoidum rediisse & bene valuisse.

5. In hæmorrhoidibus valde valentibus nisi maturè succuratur, metuendum est, ne ratione magnæ attractionis & humorum confluxus inflammatio & apostema, vel vlcus, vel fistula, vel aliquod aliud graue malum excitetur.

6. Cæcæ hæmorrhoides internæ si versus virgam tendunt, periculosæ sũnt; quia inflammatae pletumque vrinæ viam constingunt, & stranguriam excitant.

7. Cæcas hæmorrhoides, nisi maxime tumeant, & magnum dolorem inferant, potius naturæ committere, quàm aperire præstat.

8. Insignes & maiores sanguinis effusiones sũnt ab hæmorrhoidibus à vena caua ortis: quia maiores, & plures sũnt, & propterea etiam maiori cum periculo accidunt.

## Indicationes.

Hæmorrhoides cæcæ, vt fluant, opera danda; quod si obtineri non possit, sanguis ad eas fluens aliò reuclendus & deriuandus, ac inflammatio prohibenda, & dolor mitigandus. Indicationes.

Si verò fluant hæmorrhoides, & quidem moderatè, naturæ totum negotium committendum, & fluxus nullo modo impediendus; si verò parcius fluant, motus naturæ promouendus; si nimium fluant, aut fluxus diutius, quam par est, duret, aut sæpius redeat, fluxus sistendus.

## Curatio.

Si ergo hæmorrhoides saltem tumeant, non verò sanguinem fundant, danda est opera, vt aperiri possint, frictione facta foliis mercurialis, parietariæ, borraginis, fici, vel illitione succi betæ, cyclaminis, centaurij minoris & similibus, quibus, ne dolor excitetur, anodyna addi possunt, quæ Galenus, 6. de comp. med. sec. loc. cap. 7. describit. Curatio.

Si verò magnus adsit humorum affluxus & dolor vehemens, & inflammatio metuenda sit, humores in contraria reuellendi; quod commodissimè fit sectione in brachio, quæ nisi suffecerit, in poplite vel malleolo secare licet.

Corpus euacuationibus nisi dolor & tumor minuat, hirudines applicari possunt, vt sanguini exitus detur. Ante verò euacuationem hirudines applicandæ non sũnt ne maior humorum affluxus concitetur. Verum de hirudinum ad hæmorrhoides applicatione dicetur infra, quæst. 3.

Locum autem applicandi hirudines cum ad dolorem eorum leniendum, tum ad varios morbos præcauendos & curandos quod attinet, prout euacuare superfluos humores à vena caua aut porta volumus, etiam in anò locus eligendus est, aut extra & ad latera, aut intus & retro. Idcirco Hieron. Fabric. ab Aquap. in lienis vitiis tum intrinsecus tum posterius coccygem versus, tum nonnihil ad sinistram affigere iubet. In obstructionibus autem cum in sima, tum in gibba epatis parte, cum interius, tum posterius, tum ad latera, atque vndique ad podicem applicat. In renum verò affectionibus, nec non pleuritide, peripneumonia, vt & in externis affectionibus exterius magis, tum verò & ad podicis latera

Quo loco hirudines applicandi?



latera hirudines applicat. In febris cum exterius, cum interius, atque vndique affigit. In mania cum exterius, cum interius, si adusti humores in toto redundant, in melancholia similiter. In phrenitide exterius magis & ad latera, ut eius verbis utat.

Modus applicandi hirudinis.

Modum applicandi quod attinet, triplex modus executionis sanguinis ab ano ex hirudinibus repletis, ubi turgida facta vel ex se deciderunt, vel salis momento admoto decidere coacta sunt. Primus est, ut delapsis hirudinibus sinamus sanguinem fluere, donec sponte sistatur: secundus modus est, ut aeger supra balneum aquae calidae desideat, cuius vapore sanguis mouetur, vasculo aquae in natante, quod sanguinem effluentem excipiat: tertius est, ut si aeger non possit surgere, corniculo instar cucurbitae sanguis extrahatur.

Alius quoque laxa & mollis seruanda, ne feces durae in transitu dolorem augeant, id quod fiet exhibitis in iusculo oleribus emollientibus, cassia item & manna.

Ad dolorem vero leniendum, simulque calorem, qui plerumque adest, temperandum, inflammationem prohibendam refrigerantia & anodyna medicamenta applicanda, quae vel saltem illinuntur, vel cum bombace aut linteo imponuntur, vel etiam, si ferre possit aeger, ano per fistulam infundantur. Fiunt vero ex lacte, pane, oleo rutaceo & vitello oui, vel ex recenti butyro, croco & oui albumine, vel vnguentum rosaceum, refrigerans Galeni & populum inungendum, vel oleum commune aut amygdalarum dulcium, in quo momordicae poma, ut herbae Paridis baccae coactae sint.

Vel ℞. Mucilag. sem. psyllij aq. ros. extract. Vnc. ℥. ol. rosac. violac. an. Vnc. ℥. Misce.

Vel ℞. Butyri recentis ol. rosac. an. Vnc. j. cerussa lota Vnc. ℥.

Diu in mortario plumbeo agitentur. F. Linimentum.

Si dolor sit vehemens, vsurpetur oleum expressum de semine cucurbitae, papaueris, aut hyoscyami.

Vel tale adhibeatur Vnguentum.

℞. Fol. maluae, lactuca, violaria, flor. verbasci an. M. j. fol. mandragorae flor. chamomilla an. M. ℥. sem. lini Vnc. ℥. Fiat decoctum pro fomento.

Post fomentationem tale vnguentum adhibeatur.

℞. Ol. papau. Vnc. j. ros. Vnc. ℥. succi solani Drach. ij.

Misceantur in plumbeo mortario. Vel apponatur hoc cataplasma.

℞. Fol. maluae, violaria, an. M. j. solani flor. verbas. an. M. ℥.

Coq. in lactis ℥. q. Contundantur minutim, & addatur

Farina tritici, hordei an. Drach. iij. vitellum oui j. olei ros. q. s. F. Cataplasma.

Folia etiam portulacae, solani & hyoscyami recentia contusa & parum sub cineribus cocta, vel in patella cum oleo frixa, & in cataplasmatum formam redacta dolorem leniunt.

Si dolor valde vrgeat, opium addi potest.

Vel ℞. Vnguenti populei Vnc. ℥. olei papau. Vnc. j. opij scrup. j. croci scrup. ℥. Misce cum ovo integro.

Si vero nunquam fluere consuevit sint haemorrhoides, nec spes sit eas fluxuras, danda opera, ut exiccantur, ne iterum intumescant, adhibitis digerentibus & siccantibus, citra morsum ramen, quibus & dolorem lenientia semper admiscenda sunt.

Medicamenta autem in hanc rem utilia parantur ex acacia, bolo Armeno, ligno Guajaco, sulphure, alumine, item de verbasco, scrophularia, plantagine, millefolio, hyperico, scabiosa, cynoglossa, porri foliis, de quibus fons & infusus fieri possunt, vel etiam vapor coctarum herbarum ano excipi:

Utile est & vnguentum de scrophularia paratum, quod & a Matthiolo commendatur, & ab aliis etiam ob singnaturam radicum laudatur.

Vel ℞. Radic. lilior. alb. scrophular. an. Vnc. j. fl. verbasci M. j. chamameli M. ℥. hyperici P. j. dactylor. num. vj. Coq. in aqua ad mollitiem & contundantur. Adde farina sem. lini, fenugraci an. Vnc. j. myrrha thuris an. Drach. ij. croci

Dan. Sennerti Tom. II.

Drach. j. vitell. ouor. num. iij. butyri ssale Vnc. ij. F. Cataplasma.

Vel bulbi caparum aut porri sub cineribus coquantur, ut acrimoniam amittant, & cum oleo rosac. fiat Cataplasma, quod fortius erit; si radices dracunculi & ari similiter coactae addantur.

Vel ℞. Mastich. thuris, myrrha, an. Drach. ij. bdellij hypocistidis an. Drach. j. croci scrup. j. mucilag. sem. lini, gummi tragacanth. an. Vnc. ℥. vitellum oui num. j. olei rosac. verbas. an. q. s. F. Vnguentum.

Possunt eidem lithargyrum, tertia, cerussa addi,

Fumus etiam de lolio, verbasco, scrophularia, quibus sulphur addi potest, super carbones vel ferrum candens proiectis, ano exceptus haemorrhoides sanat & absumit: Ore quoque sumenda quaedam exhibentur ad haemorrhoides tumentes absumendas. Dioscorides decoctum ononidis probat. Verbasco etiam pulvis cum lacte vel alio liquore conueniente exhibitus, ad haemorrhoides tumentes absumendas utilis est. Ex eo cum aequali portione farinae tritici, atque vitello oui & butyro placenta fieri potest, cuius portio singulis diebus exhibeatur, vel succus verbasco propinetur, vel ex eo cum saccharo fiat syrupus, vel cum pulvere glycyrrhizae Electuarium. Bdellium quoque cum succo verbasco emollitum & in pulueris formam redactum Drach. j. pondete exhiberi potest.

[ Si quis haemorrhoidum coecarum insano dolore torqueatur, minimum quid scrophulariae, vel foliorum, cum cibo aut potu capiendo, statim dolore liberatur, siue ipsam plantae substantiam siccata aut viridem, siue decoctum eius assumat. ]

Apertae vero haemorrhoides si minus, quam par est, sanguinis fundant, & quidem cum dolore, motus naturae iuuandus, quod sit fomentis & suffumigiis paratis de foliis maluae, althaeae, chamamel. meliloti, semine lini fenugraci. Aloë etiam sumta haemorrhoides promouet, ut & vinum generosius haustum.

Si vero nimium fluant apertae haemorrhoides; aut fluxus diutius duret, aut frequentius redeat, fluxus is suppressendus & sistendus. Si ergo magna adsit sanguinis copia, vena in cubito aperienda. Et licet haemorrhoides internae cum venis, quae in cutem desinunt, per se nullam communionem aliquo modo euacuata ex epate, & epar de mesaraicis sanguinem rapit, atque hoc pacto ab haemorrhoidibus sit reuulsio. Si vero venae sectionem non ferant, cucurbitulae scapulis, lumbis & hypochondriis affigendae, ac partes superiores fricandae, & vinculis fortiter constringendae.

Sanguinis vero acrimonia & tenuitas medicamentis refrigerantibus & incrassantibus corrigenda, ut Syrupus portulacae, de rosis siccis, cydoniorum, acetosae, ribes, myrrino & similibus, ac aquis ex iisdem plantis destillatis. Fortiora sunt lapis haematites, terra sigillata, trochiscus de spodio, de carabe, & alia medicamenta de dysenteria, ad fluxum sanguinis sistendum propofita.

Et si fluxus sit nimius, etiam opiata exhibenda, ut theriaca recens, philonium, requies Nicolai, laudanum opiatum.

Si vires ferunt, primo humores serosi & acres, qui sanguinis sunt ventriculum & stimulus, ut natura hanc sanguinis euacuationem instituat, euacuandi, & hoc modo simul deriuandi, & lenibus medicamentis humores, qui ad haemorrhoides fluxuri erant, ad intestina diuertendi. Talia sunt syrupus rosae, solutiuus, de spina ceruina, manna, myrobalani, triphera persica. A fortioribus vero medicamentis plane abstinendum, ne humores agitati ad partem affectam ruant. Ad praecauitionem tamen, antequam fluxus ingruat, medicamenta bilem flauam & atram purgantia commodè exhibentur iis, qui immoderato haemorrhoidum fluxui sunt obnoxii, ne tales vitiosi humores cumulentur, naturamque ad excretionem stimulent.

KKKK

Topica

Remedium ad haemorrhoidum coecarum dolorem, ex Henric. ab Heer.

Topica sint, vim adstringendi, venasque claudendi habent. cuiusmodi sunt καλλυπικά & quæ alias in vulneribus ad sanguinem sistendum adhibentur; ac nisi hæc sufficiant, tandem medicamenta caustica, & ipse ignis actualis, semper incipiendo à mitioribus, & cauendo, ne sphincteri, qui exquisito sensu est præditus, acia medicamenta, vt nec ignis applicetur, ne dolor & conuulsiones excitentur.

Primo ergo medicamenta è foliis plantaginis, quercus, rosæ rubris, bolo Armeno, thure, sanguine Draconis, balaustis, aloë & similibus applicanda. Vt

*℞. Fol. verbasci,*

quæ peculiarem vim in fluxu & dolore hæmorrhoidum habent, *M. ij. quercus, an. solani M. j. flor. ros. rubr. M. ss.*

Coq. in vino rubro, & fomenti loco applicentur. vel contulis adde ol. amygdal. d. F. Cataplasma.

Ex vnguentis vtile est vnguentum Comitissæ.

Vel *℞. Boli Armeni Drach. j. ss. radic. bistortæ, nuc. cupressi, flor. ros. rubr. an. scrup. iv. balaustior. baccar. myrsi, hypocistides an. Drach. j. sang. Draconis Drach. ss. corall. rubr. Drach. j. thuris Drach. ij. ol. rosac. q. s. ad incorporandum, cera q. s. F. Vng.*

Pinguedo etiam anguillæ, quæ, dum assatur, exillat, proprietate quadam hic prodesse scribitur, & propterea etiam vnguentis admisceri potest.

Inter Emplastra vtile est Emplastrum contra rupturam vel sequens,

*℞. Aloës, thuris, boli an. Drach. ss. sang. draconis Drach. ij. puluerisata excipiantur oui albumine vel mucilagine gummi tragacantha facta in aq. plantag. Emplastrum autem hoc antequam planè siccetur, amouendum est, cum exiccatum sine dolore æelli non possit.*

Vel *℞. Thuris, colophonia an. Drach. iij. boli Vnc. ss. cerussæ, plumbi vsti an. Drach. j. acacia Drach. ss.*

Trita excipiantur oui albumine, vel tragacantha & cera, ac fiat suppositorium.

Vt verò ad sanguinem è vulnerib. fluentem sistendū vtilissimus est fungus ille, qui crepitus lupi appellatur: ita & in podicem inditus hæmorrhoides fluentes sistit.

Hæc si non sufficiant, caustica usurpanda, *as. vsum, chalcanthum, misy, sory,* quibus admisceri possunt: vnguentum de Lythargyro, de Tutia & cerussa & glandium calice, vel alia capsula, ne vicinæ partes simul adurantur, hæmorrhoidibus apponi debent, deinde escharæ casus modo aliàs vtitato procurandus.

Quod si his omnibus nihil proficiatur, & fluxus pertinaciter perseueret, tum etiam si hæmorrhoides exicare & earum fluxum impedire animus esset, antiqui ad manus operam deueniebant, & ægro recte collocato ac vincto hæmorrhoides scalpello vel alio conuenienti instrumento liberabant, deinde acu filum trahente hæmorrhoides perforabant, & arctè vinciebant, tandem hæmorrhoidum caput abscindebāt, & ferro ignito vrebant, ac postea escharæ, casum & vlcis curationem consueto modo peragebant, vel etiam sine incisione eas statim vrebant, de qua re pluribus agit Hippocrates, *lib. 2. de hæmorrhoidibus*, vbi etiam scribit: rectum intestinū & secans & resecans & consuens & vrens, & putrefaciens etiam si grauissima hæc sint nihil læseris. Verum non sine causa scribit Hieron. Fabritius ab Aquap. se experientia non potuisse vnquam hæc comprobare; neque à plerisque hæc tolerari & sustineri cum pars hæc, si quæ alia sit sensu exquisitissimo prædita. Ideoque ipse mauult hæmorrhoides tumentes medicamentis, quam chirurgiā curari, vt in sessione in aquis thermalibus, & spongiis ex aqua thermalis expressis & arctè supra anum ligatis; item radicibus porri, in oleo communi vel myrtino decoctis, scrophulariæ radice, in aqua decocta, contusa & imposita, spongia ex aqua calcis expressa.

In ista autem intentione peragenda non negligendū monitum Hippocratis, *6. aph. 12. diuturnas curanti hæmorrhoides nisi vna quæpiam aperta seruetur, periculum aqua inter cutem vel tabis impendet.* Vt etiam alij Authores

docent. Acrius tamen *tetrab. 4. serm. 2. cap. 5.* dissentit, statuitque omnes hæmorrhoides sanandas, nullaque apertam seruandam esse, nihilque ægro inde periculi imminere; modò æger conuenienti diætâ vtatur, & venæ sectio & purgatio suo tempore instituat. Imò ipse etiā Hipp. idem sensisse videtur, dum *lib. de hæmor.* omnes vrere iubet, veratque vllam citra vitionem relinquere. Verum corpora, quæ ita disposita sunt vt humores tales vitiosos, qui naturam ad hanc excretionem stimulent, generant, vix tam exactè diætâ regi possunt, vt non aliquid vitiosi humoris generent, neque etiam illud omne venæ sectione vel purgatione tolli potest, imò antequam sanguinis missio vel purgatio instituat, de improviso homini aliquid damni afferri potest. Ideoque Hippocratis consilium allegato aphorismo sequi totius est. In libro vero de hæmorrhoidibus cum contrarium sentire videatur, proculdubio loquitur de hæmorrhoidibus recentibus, non verò diuturnis.

### Diætâ.

In cæcis hæmorrhoidibus diætâ sit tenuis ad humidum declinans, & aluum laxam seruandi vim habens, ne feces indurentur, & indurata in excretionem dolorem excitent. Cum cibus ergo sumi possunt horrago, blitum, spinachia, malua, passulæ. Cassiam etiam fistularem sumere vtile est. Aromata verò dulcia & acia vitentur. Potus sit aqua hordei, vel cereuisia conueniens, vinum dilutum, generosa vero vina vitentur. Si feces duriores sint, ne in excretionem earum dolor exciteretur, clystere ex iure pingui vel decocto emolliente cum oleo communi eas emollire vtile est.

Si nimium fluant hæmorrhoides, cibus, sit incrassans ex oryza, similagine & similibus in aqua chalybeata coctis, quibus bolus Armenus, corallia admisceantur. Conueniunt etiam mala cydonia, pyra, & similia. Vinū sit austerum stipticum. Quies utilis est, omnis vero motus animi & corporis nimius vitandus.

## QVÆSTIO I.

*Qualis sit sanguis qui per hæmorrhoides euacuatur?*

Qualis sanguis sit, quem natura per hæmorrhoides euacuare solet, Authores non plane consentiunt. Gal. *6. aph. 11. & 12.* hæmorrhoides fieri statuit à sanguine melancholico, & institui hanc euacuationem à natura suum melancholicum purgante. Hippocrates tamen, *6. Epid. comm. 3. aph. 37.* dum morbos recenset, à quibus ij, qui hæmorrhoidibus laborant, immunes sunt, eos recēset, qui non à sanguine melancholico, sed & aliis humoribus proueniunt. Et res ipsa id testatur. Neque enim semper sanguis crassus ac ater, sed sæpe etiam floridus ac rubens per hæmorrhoides excernitur. Adrianus Spigelius quoque *de humani corp. fabr. lib. 5. cap. 3.* Galenum reprehendit, quod solum humorem melancholicum hæmorrhoidum causam esse statuit, atque à bile & pituita hæmorrhoides quoque excitari posse docet, idque probare vult ratione. Auctoritate quidem Hippocratis, qui *in iis libris de hæmorrhoidibus*, hæmorrhoidum morbum fieri testatur, cum bilis aut pituita ad venas intestini recti decubuerit, sanguinemque qui in venis est, calefacit. Ratione verò, quod insaniam etiam fiat à bile & pituita, teste Hipp. *lib. de morbo sacro*, qui tamen *6. aph. 21.* scribit Hæmorrhoidibus prouenientibus insaniam solui; refertque se in Germania vidisse molestatos à caratrho salso sanatos fuisse hæmorrhoidum longa fluxione.

Verum enim verò sciendum hic per sanguinem melancholicum accipiendum esse non solum sanguinem frigidum & siccum, aut qui melancholicum humorem frigidum & siccum admistum habet, sed etiam adustum, & qui sero melancholico abundat, vnde etiam floribus, vbi excernitur,

*Hæmorrhoidum sectio & vstitutio.*

*An intra sit?*

*Qualis sanguis per hæmorrhoides euacuatur?*

excernitur, apparet. Et solent in venis mēfaraicis imprimis humores adusti & biliosi cumulari, qui febres intermittentes excitare solent, quos natura interdum per hēmorrhoides internas expellit. Atque iidem, si in eam venam penetrant, per hēmorrhoides externas euacuari solent. Et omnino ij magis sunt hēmorrhoidibus obnoxij, qui sanguinem adustum habent, & qui in iuventute fuēre sanguinei, quibūque in adulta ætate sanguis aduritur, quique affectioni hypochondriacæ sunt obnoxij.

Fallitur vero Spigelius in eo, quod à pituita etiam insaniam fieri posse putat. *φλέγμα* enim vocabulum non solum humorem frigidum, sed & calidum (quæ etiā genuina eius significatio est) significat, & Hippocrati quoque sæpe pro humore calido & retorrido, qualis insaniam inducit, accipitur, ut ex libro *πείσι φύσας πείσι* & aliis locis Hippocratis plurimis patet, de quibus videatur Anutius Foësius, in *æconom. Hippocratis ad vocem φλέγμα*. Et in illo loco Hippocratis ex libro de hēmorrhoidibus à Spigelio allegato *φλέγμα* non sumi pro humore frigido ex eo patet, quod ex eo sanguinem, qui in venis est, calefieri Hippocrates scribit.

Non tamen hoc prætereundum, quod Fernelius, lib. 6. de part. morb. & symp. c. 10. annotavit, atque ego etiam aliquoties observaui, interdum è podice sine dolore & sine sanguine prodire mucosas quasdam & subalbidas sordes, quas falsò nonnulli pro pure habent, quas ille veluti limum fecemque sanguinis melancholici esse putat, quam podicis venæ eructent interdum multo tempore, post diuturnos ferè morbos melancholicos duramque & laboriosam equitationem; Platerus verò fieri hoc eadem ratione scribit, ut in albis vterinis fluoribus, ut sicut in illis per venas menstruas, sic hic per hēmorrhoidales natura ab alba illa materia, menstruis albis renacibus non absimili, se repurgat. Et omnino non pus est illa materia alba, cum in iis etiam prodeat, qui nullo vlcere eo loci laborant, sed sanguis quidam crassior, in materiam talem albam & viscosam albumini oui non ab similem mutatus.

Quamquam verò Galenus 6. Epid. comm. 5. text. 25. naturam etiam sanguinis plenitudinem per hēmorrhoides euacuare scribat, atque id negandum non sit: tamen hoc iis ferè accidit, qui simul sanguinem calidiorem habent.

## QVÆSTIO. II.

*An Aloë venarum ora aperiat, & hēmorrhoides cieat?*

Affirmat id Serapio, cap. 201. de med. simp. Mesue, lib. de simp. med. facult. cap. 1. & Arabes plerique. Leonhardus Fuchsius vero Arabibus parum æquus, lib. 1. paradoxorum c. 1. id negat, & primò quidem autoritate Græcorum se tueretur, Dioscoridis puta, qui lib. 3. cap. 24. Aloëν *δύναμιν συσπικνύει*, vim adstringentem habere, & cum aqua frigida potam sanguinis excretionem cohibere, & hēmorrhagias hēmorrhoidum sistere scribit; Galeni, qui lib. 6. de simpl. med. facult. docet, aloëν esse *φάσμακον κολλητικόν* seu glutinare, & clarius, lib. 5. meth. med. c. 4. optimum, quod nouerit, ad sanguinis, etiam membranarum cerebri, eruptiones esse remedium, quod paratur ex thuris parte vna & aloës parte dimidia; Plinij, qui lib. 27. c. 4. scribit, aloëν sanguinis excreationes, si modicæ sint, drachmæ pondere ex aqua sedare, vulnere quoque sanguinem, & vndeunque fluentem sistere; imò ipsius Auicennæ, qui c. 67. canon. 2. scribat, aloëν, quando ponitur cum vino supra hēmorrhoides & rimas ani, tunc sanguinem ex iis manantem resistere. Experientiam vero cum negare non possit, certumque sit, quod interdum aloës assumpta hēmorrhoides aperiat, putat id fieri non per se, sed & accidenti, quia videlicet acres humores, qui suâ acrimoniam ani venas aperiunt, commouet, quod etiam Galenus docet, 6. aph. 47.

Dan. Sennerti Tom. II.

Verum vno verbo hæc controuersia componi potest, si dicamus, aloëν extra admotam venarum orificia claudere, & ita sanguinem vndeunque fluentem sistere, intus verò sumtam, ut in venas penetraret, sanguinem ciedere. Habet enim extra admota vim quandam densandi, adstringendi & glutinandi. Eadem etiam quia valdè attenuat, sanguinemque feruidiorem reddit, & quasi fundit, illique eam quasi qualitatem inducit, quam aliàs sanguis obtinet in iis, qui ad hēmorrhoidum fluxum sunt dispositi, accidit, ut inde veni ani aperiantur. Frustra verò hanc huius controuersie conciliationem impugnat Fuchsius, & quidem solum autoritatibus, dum scribit, Dioscoridem & Plinium statuere, aloëν etiam in potu sumtam sanguinem profluentem compescere. Etenim & Dioscorides & Plinius non loquuntur de hēmorrhoidibus, sed de sanguinis expuitione; quæ sit venâ aliquâ apertâ. Tūc enim aloë hausta externi medicamenti loco est, quæ orificio venæ aperto pota affluens illud claudit, nō minus ut extra vulnere alicui applicata.

## QVÆSTIO III.

*An hirudines hēmorrhoidibus applicanda sint?*

Victor Trincauellius, de rat. cur. part. corp. hum. prat. nat. affectus lib. 9. cap. 14. apertionem hēmorrhoidum per hirudes dissuadere videtur, idè quod primo ea consuetudo licet frequens in præsentia sit, tam Patavij & Veneriis, quam in reliquis ferè totius Italiæ ciuitatibus, nouum sit inuentum iuniorum Medicorum, nec meminerit eius esse mentionem factam ab aliquo Græcorum aut Arabum Medicorum. Deinde quod Galenus, 4. aph. 25. apertissimè consulit, non esse assuefaciendum euacuationi per hēmorrhoides, quoniam periculo ea consuetudo non vacet: cum si nigra fluat, vtilis quidem sit ea euacuatio, si verò vel clarior & tenuior sanguis, vel copiosior excernatur, eadem vtilis non sit. Obseruasse se vero scribit, quod sanguis per hirudines detractus, præsertim quando hēmorrhoides sponte non intumuerint, aut doluerint, effusus clarus sit, non niger.

Contra Hieronymus Fabricius ab Aquapendente, de operat. chirurg. cap. de hēmorrhoidibus statuit, etiam in iis, quibus nunquam sanguis per venas ani fluxerit, neque ea tumida fuerint, nihilominus per hirudines appositæ tentari euacuationem debere in morbis curandis, utpote: in melancholia, pleuritide, peripneumonia, capitis dolore, febribus, liene affecto, renum passionibus, & aliis affectionibus ab Hippocrate & Galeno commemoratis. Et primo quidem id probat autoritate Galeni, qui 4. aphor. 25. scribit, sanguis supra id est, per os excretus, qualiscunque fuerit, malum: infra vero, id est, per hēmorrhoides bonum, quando hominis natura multum talem accumulauerit sanguinem. Aliter autem non esse assuefaciendum ei, quæ sit per hēmorrhoides, euacuationi, ut quæ periculosam habeat vtramque immoderationem, siue supra modum sanguis excernatur, siue ex toto supprimatur. Deinde multis rationibus id probat, quarum prima est, quod natura, cum per hēmorrhoides sanguinem euacuat, hominem à multis morbis liberat; ideoque naturam in hac euacuatione esse imitandam & adiuvandam: Secunda, quia natura in hunc vsum hæc vasa construxit, & propterea, vbi munere suo non fungitur, esse aperiendas, si nimirum materia noxia in corpore abundat: Tertia quia euacuationes, quæ fiunt à natura aut à Medicis, quotiescunque adest materia noxia, sunt bonæ, quia morbos tollunt: Quarta quia si non licet sanguinem melancholicum per hēmorrhoides euacuare, etiam in aliis morbis nec secandam venam esse, nec purgandum: Quinta quia natura, quæ est morborum medicatrix, est imitanda, quæ raro alias, quam has venas ad superfluum euacuanda aperit. Imò existimat Hieronymus Fabricius

*An hirudines hēmorrhoidibus applicanda sint?*

ab Aquapendente, euacuationem sanguinis ex hæmorrhoidibus à vena caua plus conferre in febribus malignis, quam venæsectionem in cubitu. Cum n. in febribus malignis putredo sit in vena caua, hæmorrhoides sunt viciniore venæ cauæ, vbi maximæ est in lumbis, quàm venæ in brachiis.

Et omnino satis probabiles sunt rationes Hieronymi Fabricij ab Aquapendente, neque dissentit ab eo Hippocrates & Galenus. Hæc saltem attendenda, primò, quæ hæmorrhoides aperiendæ sint applicatis hirudinibus, deinde qui humores & vbi peccent. Quo pertinet etiam naturarum & regionum varia constitutio. Etenim si in vena caua humores peccent, externæ hæmorrhoides, etiam fluere non consuetæ, modo tumeant, aperiiri possunt; cum magno venæ cauæ trunco in brachiis proximæ sint. Eadem tamen externæ etiam aperiiri possunt, si tumeant, vel fluere consuetæ sint, vbi humores vitiosi sunt in ramis venæ portæ, ob consensum & ἀναστροφὴν hæmorrhoidum internarum & externarum, vt infra part. 5. sect. 1. cap. 1. de aff. hypoch. dicitur. Si verò humores vitiosi sint in venæ portæ ramis, internæ, modo id commodè fieri possit, aperiuntur, siue turgeant, siue non turgeant, ob rationes ab Aquapendente adductas; externæ verò, si non tumeant, non debent, cum naturæ conatus tum desit. Ipso tamen faciente Fabricio, ista hæmorrhoidum apertio maiore cum comodo sit in Italis & meridionalibus, vtpote qui sanguinem magis calidum & adustum habent, & propterea fluxui hæmorrhoidum magis sunt obnoxij, quam Septentrionalibus, quorum sanguis est frigidior, quibusque hæmorrhoides propterea minus sunt familiares.

## LIBRI TERTII PARS III. DE MORBIS MESENTERII, Pancreatis, & omenti.

### CAPVT I.

#### De Mesenterio & vasis mesaraicis venisq. lacteis.

Mesenterium  
unde dictum?

**M**ESENTERIUM quasi μέσων τῶν ἐντέρων, Ciceroni, 2. de nat. Deor. & Macrobio, in somn. Scipion. c. 6. circa finem, medium intestinū, id est, medium viscerum & intertaneorum. (Ita enim antiqui Romani nomen intestinorum accipiebant) dictum, nonnullis & μεσαγαῖον nominatum, interpretibus Latinis aliquibus lactes, sed malè appellatum, quasi ligamentum & vinculum quoddam intestina connectit, & vasa ad intestina excurrentia tutè deducit.

De cuius naturali constitutione, figura, situ, magnitudine, ex variis partibus compositione, connexione, & similibus Anatomici consulantur, qui de eis diligenter tractant. Non tamen abs re facturi videmur, si de vasis mesaraicis, vt parte mesenterij præcipuâ, & quorum gratiâ mesenterium factum, quædam, antequam morbos mesenterij explicemus, proponamus.

Vasa mesaraica  
quomodo  
placita?

Vasa mesaraica Antiqui, imò ad hunc vsque tempus omnes Anatomici & Medici triplicia constituerunt & descripserunt, venas, arterias, & nervos; etsi de eorum usu & actione non omnes idem docuerint, vt postea dicetur.

Lactea vena,  
nomen eorum  
genus quando  
à quo inueniuntur.

Primus hoc seculo nouum vasorum mesaraicorum genus propalauit & descripsit Caspar. Asellius Cremensis, Anatomicus Ticinensis, in libro posthumo de lactibus, siue lacteis venis, quod 1622. primum inuenit. Cum

enim fortè fortunà venæ hæ lacteæ in cane, quem viuum secundum sumplerat, ipsi occurrissent, totum se postea earum inuestigationi dedit, vt nulla ferè hebdomada, nullus certè mensis abierit, sine viua vnâ & altera sectione non canum tantum, sed & brutorum aliorum plurimorum, felium, agnorum, porcorum, vaccarum, imò equorum. Ex eo ergo quædam, quæ de hoc quarto vasorum genere ex eius libello primò percepimus, & postea auctoriâ confirmauimus, proferemus.

Quomodo is ad vasorum horum inuentionem peruenit, cap. 9. docet. Eisdem tamen venas cuius inuenire ac videre promptum ac facilè, si canem vel aliud brutum ad satietatem vsque pascat, & horis 5. vel 6. post ventrem eius statim aperiant. Tum enim in animali adhuc viuente venæ lacteæ ita dictæ, quod colorem lacteum referant, & humorem lacteum contineant, à reliquis tribus vasorum mesaraicorum generibus distinctæ, eo modo quo eas depinxit Asellius, eaque albißimæ, apparebunt. in animali verò ieiuno, aut vbi chylus iam distributus est, vt & in mortuo non apparent. Appellat autem Asellius hoc vasorum genus albas & lacteas venas, quod, vt dictum, colore præditæ sint albo & lacteo, ac succum lacti similem in se contineant. Idem quoque lactes nominat, de quo vocabulo prolixè & crudité, cap. 10. agit.

Dari autem ea, & dispergi ramulos candentium vasorum per omnem mesenterij ab vsque centro eius regionem, inde in intestina deferri, ad ipsa scindi in propagines penè infinitas, his propaginibus vndique intestina ambiri ac comprehendi, & quidem à reliquis vasis mesaraicis distingui, cavitare à nervis, tenuitate tunicarum ab arteriis, à venis candore, ab omnibus simul succo, quem includunt, qui nervis nullus, in venis & arteriis colore & tota substantia dispar est, ad ipsam oculorum fidem rectè prouocat. Neque hîc facilè aliquis ei contradicet, qui visum suum consulerit & oculis suis fidem habere voluerit, quod in Anatomicis & operibus naturæ contemplandis omnino faciendum, vt monet Galenus, 2. de usu part. cap. 3. in fine.

Quod verò tam diu & ad hoc vsque tempus vasa hæc latuerint, & ante annos paucos primum in notitiam hominum peruenerint, causa proculdubio est hæc, quod in demortuis animalibus, in quibus venæ hæ non apparent, plerique anatomiam exercuerint. Sed quod & eos, qui etiam viua animalia secuerunt, & ipsum Galenum, qui tamen sexcentas viuas sectiones se administrasse gloriatur, & plurima animalia à pastu saepe secuit, latuerunt, prorsus se ignorare scribit Asellius, cap. 14. Verum & huius rei ratio reddi potest. Etenim causa, ob quam animalia viua secuerunt Antiqui, est, vt vel motum cordis, vel diaphragmatis, vel vocis instrumenta, vel motum cerebri, & sensum membranarum eius viderent & inuestigarent, vel, quomodo cibus in ventriculo mutaretur, agnoscerent: quæ dum sunt, interim animal moritur, & postea lacteæ venæ non apparent. Neque etiam mox à pastu conspiciuntur, sed vbi chylus confectus est. Qui verò ob venarum lactearum inuestigationem sectionem viuorum primario instituerit, nemo fuit ante Asellium. Erasistratum tamen eiusque sectatores venas istas vidisse, verum non agnouisse, sed pro arteriis habuisse, patet è Galeni lib. an sanguis continetur in arteriis c. 5. & 7. de administrat. anatom. cap. ult. vbi scribit Galenus, Erasistrati assecras statuere, simul ac mesenterium denudatum fuerit, arterias aëri similes apparere, postea lacteo succo repletas conspici.

Qui autem fiat, quod moriente animali succus ille lacteus mox euanescat, atque venæ istæ non amplius apparent, dicere non ita facile est, habetque suas coniecturas Asellius. Mihi vero consentaneum videtur, quod ex ingenti dolore, qui fit ex sectione, spiritus dissipantur, ad quarum instaurationem materiam nouam ex epate cor rapit, epar rursum ex hisce vasis lacteum illud alimentarem succum attrahit.

Quæ occasione  
inuenta sunt?

Modus illud  
inquirendi.

Nomen hoc  
vasorum genus  
cur venarum  
lactearum nomen  
adeptum sit?

Vasa  
quæ à reliquis  
vasis  
raicis  
distinguantur?

Cur vena  
lactea tam diu  
latuerint?

Cur veteres  
viua animalia  
lactea secuerint?

Erasistrato  
vena lactea  
nota fuerunt.

Cur moriente  
animali succus  
venarum  
lactearum  
euanesceat?

Habent



Stru-  
ctura  
la-  
tearum.

Habent autem hæ venæ suam structuram & compositionem, ut reliquæ venæ. In qua illud admiratione dignum esse scribit Asellius, c. 18. quod pluribus valvulis siue ostiolis intestina sunt, quas valvulas sæpius, evanescente iam chylo, instar minutissimorum veluti marisupiorum, aut concretarum guttularum stillarumve dependere ex illis, non modò quâ committuntur intestinis, sed etiam in reliquo ductu animadverterit; quales etiam Columbus in extremitatibus aliarum venarum mesaraicarum constituit. Hanc tamen differentiam esse docet Asellius, quod illæ Columbi valvulæ foris intro ferantur, istæ verò contrâ intus foras spectent. Cuius diversitatis ratio est, quod venæ lacteæ chylum ex intestinis sugunt, qui in intestina remeare non debet; venæ verò vulgatæ mesaraicæ sanguinem, & interdum quoque humores excrementitios, ad intestina ferunt, quæ refluerè non debent.

Cur venarum  
lactearum  
valvulæ foras  
spectent?

Ab aliis venis  
& arteriis  
quomodo dif-  
ferant venæ  
lacteæ?

Ad qua inte-  
stina magis  
tendunt venæ  
lacteæ?

illarum in in-  
testina infer-  
tio & origo.

Pancreatis  
usus nobilior.

Venarum La-  
tearum pro-  
gressus.

Sunt verò hæ venæ ab aliis venis & arteriis seiunctæ, & sunt partes unius trunci, ut venæ alteræ & arteriæ. Magnitudine quidem à vulgatis, siue truncum siue ramos spectes, superantur, sed numero illas excedunt, adeò ut iis ferè duplo plures videantur; quod ideò factum, quia plus chyli ad totius providentiam epati, quàm sanguinis intestinis ad priuatam nutritionem debetur. Plures tamen tendunt ad intestina intenuia, pauciores aut ferè nullæ ad crassa; cum intestina tenuia alibilem succum, crassa verò excrementa potius contineant, & illa potius chyli distributioni, hæc excretioni inferuiant.

Insertio earum in intestina satis manifesta est. Vbi autem origo & principium *mesaraicas*, seu truncus & caudex sit, non ita planum. Quia tamen omnes inferuntur pancreati & in eo coeunt, & mitis anfractibus ac gyris toto eius corpore sunt intextæ, indeque tum deorsum tum sursum ad epar porrigi apparent, rationi consentaneum putat Asellius, earum originem esse in pancreate. Atque ita longe nobilior usus esset pancreatis, quàm vulgo creditur. Quanquam enim Asellius suæ opinioni hoc obstat putat, quod venæ lacteæ videantur iccoris gratiâ factæ, cuius manus sint; tamen nihil obstat, quin prius in pancreas inferantur, atque inde chylus aliquam alterationem suscipiat. Vnde quæ de usu pancreatis respectu venarum portæ scribit Varolius, illud rectè mihi ad venas lacteas accommodari posse videtur. Nimirum quemadmodum sanguis maternus, antequam epar ingreditur, sordes suas ac viscosam humiditatem deponit in molem carneam innumeris venis & arteriis umbilicalibus refertam, quæ Placenta dicitur: ita in natis perfectis que corporibus, ante epatis & lienis portas pancreas factum, ut chylus per venas lacteas subintrans, cœnosa humiditate repurgatus purior in epar influat. Neque enim pancreas solum glandula, sed peculiare parenchyma, quod nobiliorem usum habet, esse videtur, & proculdubio peculiarem aliquam chyli coctionem & alterationem præstat, de quo etiam postea, cap. 7. de pancreatis morbis, dicitur.

Inferuntur autem venæ lacteæ in omnia intestina, etiam duodenum, & plurimum in gracilia intestina, præsertim in ieiunium, nulla verò in ventriculum. Hiant verò hæ venæ in intestina instar hirudinum spongiosis capitibus, quæ radicem officium obtinent, quæ in ipsam intestinorum capacitatem sese penetrant. Desinunt autem in crustam, quâ interior intestinorum gracilium tunica oblinatur, rugosam.

Progressus earum, ut cum quidem diligenter descripsit Asellius, hic est. Ab intestinis per mesenterium obliquo ductu inter duas eius tunicas, partim seorsim à vasis reliquis, partim cum illis vnâ, modò recto ductu, modò eadem transcendentes & veluti decussantes per plures glandulas in pancreas usque perferuntur; In pancreate variè, cancellorum in modum vel speciem retium aut capreolorum, implexæ sibi mutuo, & corpore confusæ in plurimos eosque inexplicabiles gyros anfractu-

que hac illac intorquentur. Ab eo rursum maioribus iam ramis per portæ latera, quam quibusdam locis collaræ instar siue annuli incingunt ambiuntque, missis quandoque etiam in cauam propaginibus, in iccoris caua subeunt. Inde illarum in epar ipsum, & discissæ in minutissimas fibras, veluti capillamenta quædam in eius carnem quaqua versum tam diu disseminantur dispergunturque, dum prorsus obliterantur.

Actio venarum harum propria (præter communem, quæ est nutritio) est chyli ad epar distributio, quod ex ipso sensu patet, qui chylo eas scaterere docet. Simul tamen ut reliquæ venæ sanguinem: ita hæ chylum conseruandi, ne corrumpatur, vim habent. Seruiunt huic actioni & valvulæ, quas habent, quæ impediunt, ne quod semel attraxerunt, refluat in intestina, quod hic adeò exactè præstant, ut nec digitorum compressu chylum semel haustum in intestina remeare sinant.

Atque his vasis ita inuentis facilè illa controuersia componi potest, quæ tot ingenia exercuit, nec tamen, sine vasorum horum cognitione, hætenus ita decidi potuit, ut animus veritatis audis acquiesceret, per quam viam nimirum chylus ad epar, & rursus sanguis ab Epate & Liene ad intestina & vicina viscera nutrienda feratur?

Octo enim certè, nisi plures, hac de re discrepantes sunt sententiæ.

Alij enim per solas ventriculi venas ad epar chylum deferri, per mesaraicas verò nutriti intestina statuunt.

Alij vtrisque vtrumque munus attribuunt, numero saltem eas discernunt.

Alij de mesaraicis saltem disputant, & tamen quatuor sectarum sunt: alij solum chylum ferre venas mesaraicas putant. Alij & chylum & sanguinem, ita tamen, ut aliæ venæ mesaraicæ sint, quæ sanguinem, aliæ, quæ chylum ferant. Alij vtrumque munus omnibus assignant; sed diuersis temporibus, nunc huic nunc illi officio vacare statuunt. Alij eodem tempore omnes vtroque officio fungi existimant. Et quidem alij præcipuè chylo deferendo, secundariò sanguini destinatos esse putant. Tandem sunt, qui disputant, an toto venarum horum ductu vterque humor feratur, an in parte & latere vno chylus, in reliquo & dimidio sanguis.

Quæ opinioniones tamen omnes maximis premuntur difficultatibus, ut videre est apud Mercatum, lib. 3. part. 4. class. 3. art. 8. Laurentium, l. 4. Hist. anatom. quest. 5. Petrum Laurembergium, in Procestr. Anatom. c. 8. Hisce verò vasis inuentis controuersia hæc facilè componi potest. Lacteæ enim venæ chylum vehunt, reliquæ mesaraicæ sanguinem; id quod oculi testantur, qui docent; Lacteas chylum vehere, vulgares verò mesaraicas nutritioni destinatas esse, siue succum spectes, quem intra se continent, siue in ipsa intestina insertionem. Et quam absurdum naturam vna parte ad operationes tam aduersas & repugnantes uti, cuius etiam nullum aliud exemplum in toto corpore humano exstat? Et cum natura distributionis opus, quod omnes consentiunt, fibrarum opera perficiat, quomodo eadem fibræ motibus contrariis inferuire poterunt.

Et si hæc de venis lacteis ita se habent, ut habere puto, & diligens inquisitio clarius docebit, multa in Physicorum & Medicorum scriptis (quæ & me secutum fateor) vel mutanda vel explicanda rectius erunt. Inter quæ primò sunt illa, quæ de venarum mesaraicarum sanguificatione vulgo docentur, quasi primum rudimentum sanguinis in venis mesaraicis chylus accipiat. Inuentis enim venis lacteis hoc docere opus non est, sed quicquid est sanguinis in mesaraicis, id ab epate & liene est.

Lucem etiam harum venarum inventio affert intricatè illi quæstioni de sanguinis generationis, an ea scilicet in epate & ab epatis substantia & vi innata, an verò in venis fiat? Cum enim hæ venæ lacteæ in ipsam Epatis carnem disseminantur; atque in ea obliterentur, nullâ

Actio earum.

Per quam  
viam chylus  
ad Epar, &  
sanguis ab  
Epate & lie-  
ne ad intesti-  
na feratur?

Autorum dis-  
crepancia.

Decisio.

Venarum La-  
tearum vi-  
litas indagā-  
da sanguinis  
generatione;  
& aliis du-  
biiis denun-  
ciandis.

que earum cum aliis venis communio deprehendatur, atque ita chylus in ipsam Epatis substantiam ab iis confundatur, in ipso etiam epate sanguine mutari, qui postea à venis excipitur, vero maximè consentaneum est. Sanguinis autem in epate generati crassiores partem à ramis venæ portæ, subtiliorem a cauæ radicibus excipit statuit Asellius, cap. 31. Et inde, cap. 32. Galeni de officio Lienis sententiam defendit, nihilque è ventriculo ad Lienem proximè peruenire, cap. 33. statuit. Verum etsi Asellio concedatur, crassiores & impuriorem chyli partem à vena portæ attrahi: tamen hinc nondum concludi potest, Lienem nullam sanguificationem obire, & solum excremento melancholico excipiendo destinatum esse, vt postea, parte 4. cap. 1. dicitur. An verò Lien saltem sanguinem ad ventriculum mittat, & nihil ab ea excipiat, altioris est indaginis.

*Dubia quedam  
circa vasa  
lactea.*

Et omnino sunt dubia quedam, quæ adhuc circa hæc lactea occurrunt non pauca, inter quæ ista præcipua: primum, quod truncus venarum lactearum non apparet, vt mesaraicarum truncus vena portæ. Cum enim epati chylum omnes afferant, in truncum quendam coire eas necesse est, quem certè sat conspicuum esse oportet. Sit enim vt succus ille lacteus euanescat: tamen quia hic truncus è vasorum numero est, suam cavitatē, & suam tunicā habere oportet, quæ certè euanescere non possunt. Vt mirum sit, quomodo tot laboriosissimos & exercitatissimos anatomicos qui omnia epatis vasa diligenter rimati sunt, hæc vasa latere potuerunt. Sit enim, vt liquorem illum lacteum in eo non inuenerint, & vsum eius propterea ignorauerint, vas ipsum tamen videre debuerunt. Quod certè aded exile esse non potest. Cum enim venæ lacteæ tot numero sint, certè si eæ in vnum truncum coeunt, is non aded exilis erit. Alterum, quod inter venam cauam & truncum hunc proportio esse debet. Cum enim truncus venæ cauæ, qui sanguinem confectum toti corpori distribuit, tā amplius sit, certè truncum venarum lactearum, qui epati chylum, è quo sanguis fit, aduehit, proportionem ei respondere debet. Verum forsitan dies ista tandem etiam docebit, & in lucem protrahet.

Interim sua laus debetur Asellio, cuius diligentia factum, vt etiam hic illud Comici locum habeat.

*Nunquam ita quisquam bene subducta ratione ad vitam fuit.*

*Quin res, atas, usus semper aliquid apportet noui,  
Aliquid moneat; et illa, quæ te scire credas, nescias,  
Et quæ tibi putaris prima, in experiundo repudiet.*

## DE MORBIS MESENTERII.

### CAPVT II.

#### De Intemperie Mesenterij.

*Mesenterium  
multis morbis  
est obnoxium.*

Multis autem morbis obnoxium est mesenterium, multorumque morborum & symptomatum causæ in hoc latent. Hæc enim sentina quasi est corporis, in quam nobiliora infimi ventris membra sua excremēta deponunt: suntque hæ partes ignobiliores, & habent multas glândulas, quarum substantia est σφοδρστέρη & humores promptè imbibit, ac, vt Hippocrates libro de glandulis, docet, μέγζονας ἢ καὶ ἄλλοθεν τῷ σώματι; καὶ νέμονται αἱ ἀδένες ἐν τοῖσιν ἐντέροις ἐκ πλεξίμεναι τὸν πλάσθον, id est, glandula verò ad intestina maiores sunt quam alia corporis partes, & expressam ex intestinis redundantem humiditatem de pascuntur & imbibunt. Et præterea sensu nullo vel exquisito præditæ sunt, vnde diu humorum colluuiem tolerare sine molestiæ sensu aliquo possunt.

*Mesenterium  
cur Medicorū  
dicatur nutri-  
culæ.*

Vnde à nonnullis non immeritò Mesenterium Medicorum nutricula appellatur, cū ab eo infiniti penè morbi oriantur, vt pote quod sentina quasi corporis est, ad quā totius corporis colluuiem confluit per venas & ar-

terias, quibus innumeris contexta est, vt rectè Fernelius, 6. de part. morb. ac sympt. cap. 7. scripserit, se Cholera, melancholia, diarrhæa, dysenteria, cachexia, atrophia, languoris, lentarum errantiumque febrium, latentium denique morborum, melancholia hypochondriacæ, vomitionum crebrarum, dolorū colicorum, tumorum, abscessuum causas in hisce plerumque sedibus adinuenisse. Commota tandem materia solet grauissimorum Symptomatum, conuulsionis, epilepsia, lipothymia imò mortis sæpe causa existere. Id quod in praxi sæpissime obseruare est, & id superiori anno in nobili quodam in vicinia accidisse memini, qui cum annos aliquot langueret, & non satis bene haberet, intemperanter tamen viueret, tandem per aluuium, proculdubio ex his sedibus, nigra & foetidissima magnā copiā eiicere cepit & intra horam expirauit. Idem etiam aliis accidisse memini.

Vt verò morbi hi sat frequentes sunt; ita obscuri & ab antiquis, si ferè Hippocratem excipias, seu incogniti, seu non explicati.

#### Intemperies Mesenterij.

Sunt autem morbi Mesenterij varij, inter quos primò sunt morbi Intemperiei: Et pertinet huc, ἀναρτη τῆς ἐνερτικῆς νόσος, vt exponit Galenus in exegeſi, morbus siccatorius seu calida & sicca intemperies vasorum mesaraicarum, quem morbum descripsit Hippocrates 2. de morb. quique affectionis Hypochondriacæ autor est, cuius propterea etiam mentionem faciemus infra de affect. hypochond. part. 5. sect. 1. c. 1.

Solet autem ista intemperies raro esse sola, sed cum materia coniuncta, quæ tamen non facile cognoscitur. Et sæpe in signis tanta est obscuritas & confusio, vt ἐν σοφίᾳ Medici etiam solertis eludat & fallat. Et hæc ipsa causa esse videtur, quod de hisce morbis ab antiquis parum aut nihil scriptum est.

Solet verò materia, quæ intemperiei & aliorum morborum mesenterij causa est, vel in eo colligi vel aliunde eò transmitti. Cum enim chylus per vasa mesaraica & secundum Asellij inuentionem, per venas lacteas ad epat mittatur. Si chylus ob errores in victu non bene sese habeat, facilè tum in ipsis venis lacteis, tum in glandulis, quibus fulciuntur, vitiosi humores sensum colligi possunt.

Deinde iidem etiam ab epate & liene & venæ portæ ramis, imò & vniuerso corpore ad vasa mesenterij mitti possunt. Solet enim natura per venas mesaraicas non solum alimentum intestinis & mesenterio transmittere, sed etiam vasis abuti ad vitiosos humores euacuandos. Vnde per easdem venas mesaraicas humores in purgatione arte instituta ad intestina confluere solent.

Non solum autem venæ, sed & arteriæ mesaraicæ, vt rectè Adrianus Spigelius, lib. 6. de hum. corp. fabr. cap. 4. monet, vbi homo à sanitatis limite declinat; vitiosos humores & excrementa corporis suscipiunt, vt ad intestina deponant; & multorum morborum ac symptomatum causæ in hisce arteriis hærent. Est enim proculdubio arteriarum harum præcipuus vsum, vt calorem partium per se imbecillium & ignobiliū atque excrementis multis scatentium, coctioni tamen dicatarum, foueant & augeant: vnde non solum sunt tot numero, sed etiam vt aliæ arteriæ, quæ in externas corporis partes terminantur, acrem frigidum non attrahunt. Quod si non præstent, omnes illas coctiones turbare & vitari necesse est. Fit autem hoc, cum quæ spiritu vitali repleri & calore abundare debent, vitiosis humoribus scatent, qui suam quam habent, intemperiem, partibus per quas disseminantur, imprimunt. Vnde calor narius partium debilitatur, eæque ad officia sua & coctiones perficiendas ineptæ redduntur, vt multi crudi & vitiosi humores generentur: & bile quidem frequenter in continuis & intermittētibz febribz biliosis, quarum crisis interdum per alui fluxum accidit; nonnunquā etiā pituita & melancholia,

*Humores in  
purgatione  
arte instituta  
per venas me-  
saraicas ad  
intestina con-  
fluunt.*

*Vsum arteria-  
rum in mesen-  
terio.*

lancholia: vnde Adr. Spigelius *lib. 6. de fabr. corp. hum. cap. 4.* scribit, splenicam arteriam, si duos ramos mesentericos addas, melancholice hypochondriacæ sedem esse. Qui humores postea sæpe hæmorrhoides excernuntur. Vnde etiam Hippocrates *6. Epidem.* scribit, qui hæmorrhoides habet, neque dolore lateris neque pulmonis inflammatione neque furunculis neque terminthis pariter neque lepra, cancro & aliis morbis corripuntur.

Pectorisque omnino maximus cum hæmorrhoidali arteria consensus est, quod truncus ex qua arteria oritur, à corde descendens in primo statim exortu intercostales ramos propagat. Vnde accidit, ut qui Hypochondriacæ affectioni & scorbuto sunt obnoxij, sæpe de acerbissimis pectoris doloribus, iis tamen non diuturnis, ut & pectoris constrictione conquerantur, materia flatulenta, serosa, tenui & acri per dictas vias in musculos thoracis effusa, membranasque ibi vellicante & distendente. Atque has ipsas arterias esse statuit Spigelius, per quas colici dolores in Arthritidem, & contra Arthritis in colicam permuratur, ut est apud Hipp. *6. Epid. sect. 4.* dicentem *Qui articulari morbo derentius intestini dolore dextra parte vexabatur, lenius habebat, ubi verò hic morbus curatus fuit, magis dolebat.* Quod ex translatione materiæ fit, dum ex arteriis cruralibus in truncum & ex hoc in mesentericos ramos, & tandem ab his ad intestina deferuntur. Idem etiam causam cur dolores colici in paralyfin mutantur, ex his arteriis petit, idque fieri docet materia ad mesentericas arterias transmissa ad lumbras, à quibares facile, cum ad spinalé medullam, tum porro ad cerebrum mitti potest. Lumbarum enim arteriarum in lumborum vertebrae per communia foramina & ipsarum medullam excurrunt; quin & ad medullæ latus, dum vertebrae ingressæ sunt, utrinque ad cerebrum una cum venis lumbaribus ascendunt.

Solet autem intemperies Mesenterij hydropem siccum præcedere, & si hæctica sit, incurabilis est, neque ullo præfidiorum genere tolli potest.

Curationem quod attinet, patet ea ex iis, quæ de intestinatorum intemperiebus dicta sunt.

Et quia ista intemperies vix est sine materia, etiam è capite sequenti, qua ratione curanda sit, manifestum fiet.

Circa curationem autem horum affectuum monet idem Spigelius, per dictas arterias non solum primas vias, sed & vniuersum corpus, & quidem non tantum per purgantia sumpta, sed & per clysteres infusus euacuari posse. Cum enim totum colum materiam clysteris suscipiat, vis medicamenti purgantis per arterias extrunco aortæ noxios humores trahit. Vnde etiam rationem licet reddere, cur ex helleboro albo facta suppositoria aut antimonium clysteribus admixtum eadē inducat symptomata, quæ solent eos inuadere, qui helleborum album vel antimonium ore hauserunt. Hinc quoque causa peti potest cur medicamenta purgantia vmbilico applicata aluum moueant. Per arterias enim medicamenti purgantis vis attrahitur, humoresque in iis commouet.

### Q V Æ S T I O III.

#### De Mesenterij Vasorum Angustia & Obstructionibus.

Frequentissimus quoque Mesenterij morbus est vasorum eius angustia, vnde multi alij morbi oriuntur. Est autem vel in vasis lacteis, vnde chyli distributio impeditur, vel in venis mesaraicis.

Fit autem venarum lactearum angustia vel ab earum obstructione vel compressione. Obstruuntur venæ lacteæ à chylo crasso, crudo, lento, viscido è similibus cibis genito. Quod facit motus intempestiuus vel balneum post cibum, quæ alimentum adhuc crudum in hæc vasa rapiunt. Comprimuntur à glandularum tu-

more, vel aliis mesenterij tumoribus:

Venæ mesaraicæ etiam obstruuntur ab humoribus crassis & viscidis cum sanguine ad eas effusis, quales sunt pituita bilisque diu ibi hærens & incrassata. Comprimuntur à tumoribus intestinatorum.

#### Signa Diagnostica.

Cognoscitur venarum lactearum angustia ex chyli *Signa.* distributione, quæ ipsorum officium est, læsa, ad quam duo symptomata imprimis oriri solent, alui fluxus chylusus & albus, & totius atrophia, Si enim venarum harum orificia obstruantur, planè chylum ex intestinis sugere non possunt; si verò in medio canali sit angustia, vi perruptis valvulis & dilatatis osculis in intestina chylus refunditur. Atrophia verò sequitur, vtili & necessaria ad alendum corpus. materia denegata, atque chyli com meatu intercluso, quod ob scirrhum obsessas mesenterij glandulas sæpe accidisse medicorum observationes docent.

Venarum autem mesaraicarum obstructions si accendant, multa inde mala & symptomata accidere solent. Humores enim coerciti & flatus inde excitati distensionis & grauitatis sensum excitant, vapores in caput attolluntur, vnde capitis grauitas dolorque circa dorsum excitatur, murmurata ac tormina ventris concitantur, ructus & rugitus febresque generantur, & alia mala de quibus de affectione hypochondriacæ dicitur.

#### Prognosticum.

Periculosum autem & pertinax sæpe hoc malum est, *Prognosticū.* & multorum malorum fomes. Cum enim hæc pars sensu exquisito destituatur, vitiosi humores diu ibi latere pertinacesque obstructions parere possunt.

#### Curatio.

Curatio perficitur causarum angustiae ablatione. *Curatio.* Proinde si accadat obstructio, aperientia requiruntur. Si compressio, tumor comprimens tollendus. Aperientia autem sint moderata in primis qualitatibus, ne, si nimis calefaciant, calorem augeant, & humores aciores reddant, bilemque cumulent.

Purgantia quoque non sint fortia, ne humores vitiosos plures ad partem affectam commoueant, sed per epicrasin purgatio fiat medicamentis lenioribus, quæ venarum mesaraicarum orificia extergunt, humoresque leniter educunt, humoribus prius ad euacuationem præparatis & idoneis redditis. Nisi enim humores prius præparantur & ad fluxum apti reddantur, flatus excitantur, materiaque non educitur, ægrique valde affliguntur.

Ad obstructions aperiendas & humores attenuandos viles sunt,

Radices *aperientes dictæ, Polypodij querni, cichorij, taraxaci, ari, chelidonii maioris, gentiane.*

Cortices *rad. capparum, tam. irisci.*

Folia *cichorij, fumarie, scarriola, endiniae, cuscute, chamadryos, agrimonie, ceterach, centaurij minoris, cardui benedicti, absinthij.* Flores *geniste, cichorij, borraginis.*

Sem. *endiniae, scarriola, geniste, quatuor frigida maiora, Tartarum.*

#### Et ex his preparata & composita varia.

Syrupi *byzant. simpl. & compos. de duabus radicibus, de cichorio, de endiniae simpl. & compos. de cichor. cum rhabarb.*

Conseruæ *cichorij, fumarie, cardui ben. chamadryos.*

Essentia *absinthij, chamadryos, centaurij minoris, cardui benedicti.*

Extractum *cichorij, centaurij minoris cardui bene dicti, gentiane.*

De pectoris cum hæmorrhoidali arteria consensus.

Per quas vias materia feratur, dum dolor colicus in arthritidem, & rursus hac in illam transmutatur?

Cur dolor colicus in paralyfin mutetur.

Intemperies Mesenterij Curatio.

Cur helleborus albus in suppositoriis aut antimonium in clysteribus eadē qua ore sumpta symptomata inducant?

Cur medicamenta purgantia vmbilico applicata aluum moueant?

Mesenterij vasorum angustia & obstructio.

Causæ.

Aperientia & humores attenuantia.

Ex tartaro medicamenta, cremor & crystalli tartari, tartarum vitriolatum.

Spiritus salis, vitrioli. Trochisci de capparibus, de Rhabbarbo, de absinth. de eupator.

E quibus cuique morbo & humori peccanti conuenientia eligenda. Dulcia & saccharo multo condita hic non sunt commoda: contra amara maximè utilia. Quæ quia gustui non sunt grata, commodissimè in pilulas formantur. Vt tamen facilius penetrent, post eas assumptas liquor aliquis conueniens hauriri potest. Et vsu talium sæpe pertinaces nothæ tertianæ tolluntur.

Vt ℞. Trochisc. de cappar. absinth. an. Drach. j. extract. gentiane, carduibened. centaurij minoris an. ʒ. j. F. Pilulæ.

Vel ℞. Rad. taraxaci, graminis, cichor. fœnicul. polypod. querni an. Vnc. ʒ. folior. endiuia, cichorij, agrimonia, cuscute an. M. j. fumar. centaur. minor. an. M. ʒ. fem. frigid. maior. Vnc. ʒ. fœniculi, genista an. Drach. j. flor. cichorij, buglossa an. p. j. tartari albi Drach. ij. passul. minor. Vnc. j.

Concisa infundantur in vase clauso in seri lactis, aqu. cichor. & fumarie an. q. s. donec vis omnis extracta sit. Hinc colitur. Colaturæ adde sacchari quantum satis, & stent iterum in vase clauso in loco calido per diem, postea iterum colentur. Dosis Vnc. iv.

Fortiora sunt oxymel. compos. quorum formulæ passim extant. E. G. tale parari potest.

℞. Rad. aperient. an. Vnc. ʒ. cichorij ari, cortic. fraxini, tamarisci, cappar. an. Drac. iij. fol. endiuia, fumarie agrimonia, ceterach. an. M. j. card. benedict. centaurij minoris an. M. ʒ. flor. cichorij, hepatica alba, borraginis, an. p. ij.

Concisa infundantur in vase clauso in aceti passulati & aqu. cichorij an. q. s. Addito spir. salis scrup. j. per triiduum in Balneo Mariæ. Colaturæ expressæ adde mellis despumati vel sacchari q. s.

Iterum per diem in Balneo digerantur, vt fiat oxymel ver oxysacchara.

Quibus medicamenta ista ingrata sunt, iis vinum vel cereuisia medicata parari potest & corticibus tamarisci, absinth. carduibened. centaur. minor. chamædry.

Hoc loco non sine causa aliquid de medicamentis ex tartaro paratis monendum. Adeo enim hodie cremor & crystalli tartari & tartarum vitriolatum sunt vulgaria, vt à non paucis vix vlla medicamenta præscribantur, quibus hæc non admisceantur: imò à Crollio tartarum Vitriolatum vniuersale digestium appellatur.

Et fateor sanè, è tartaro parata medicamenta in humoribus melancholicis crassisque incidendis & attenuandis, adeoque obstructionibus aperiendis magnam vim habere. Cum vero sæpe accidat, vt in affectione hypochondriaca bilis atra, humoresque falsi & acerbis, atque omnino acies, & qui ignis quasi seminaria in se continent, reperiantur: talibus certè humoribus tartarum vitriolatum & huiusmodi actia medicamenta non conueniunt, cum eorum acrimoniam non retundent, sed ea potius vsurpanda, quæ prauas qualitates talium humorum temperent: & omnino contrariæ qualitates contrariis opponendæ.

Humoribus ita præparatis eorum euacuatio instituenda. Et commodum hic omnino est, si venæ ani à natura aperiantur vel si natura sit segnior, hirudinis appositis prouocentur.

Purgantia.

Purgationem quod attinet, ea instituenda pro peccantis humoris ratione & natura. Et extant passim talia composita plurima, vt Syrupus de cichorio cum Rhabbarb. diasereos, de fol. sene, oxymel prapar. Gesneri, pilul. tartarea, extracta purgantia composita & panchymagoga varia.

℞. Absinth. sicci M. ʒ. carduibenedict. M. j. centaur. minor. flor. prunor. siluestr. an. M. ʒ. fol. sene elect. Vnc. ij. agaric. albi, turbit. elect. an. Drach. ij. rad. hellebori nigri præparati Dr. j. ʒ. cortic. citri Vnc. ʒ. zinziberis, galangue, caryophyll. an. Drach. j. sem. anisi fœniculi an. Drach. ʒ.

Herbæ concidantur, aromata & semina crasso modo contundantur, & affundatur in vitro vel vase fictili

vini Rhenani q. s.

Vomitus verò planè utilis est (modò nihil absit, quod eum prohibeat, de quo alibi dictum) Solet enim humores, qui pertinentes in mesenterio obstructiones excitant, exturbare, quos purgantia medicamenta educere non valuerunt. Materia autem vomitiorum alibi proposita est.

Reliquæ, si quæ supersint, continuatis aperientibus supra propositis & diureticis exhibitis extirpanda. In quem etiam finem commodè exhibetur radix & semen spatulæ foetidæ, & radix centaurij maioris seu rapontici vulgaris.

Vel ℞. Extracti absinthij, centaurij minoris, carduibenedicti, gentiane an. Scrup. j. trochiscor. de capparibus Dr. j. spicanardi, schœnanthi, sem. apij, petroselini, an. Scrup. j. Cum succo endiuia. F. Pilulæ.

Et imprimis hæc sunt efficacia medicamenta è chalybe parata, interdum & acidulæ, de quibus plura infra de affectione hypochondriaca, dicentur.

De vasorum in mesenterio obstructione curanda dictum est etiam supra part. 2. sect. 1. cap. 6. de fluxu chyloso.

## QVÆSTIO IV.

### De Mesenterij Inflammatione.

#### Causa.

Si verò humores & præcipue calidi cum sanguine quo mesenterium & partes vicinæ nutriuntur, non solum in cavitatibus venarum & arteriarum mesaraicarum subsistant, sed & ex earum orificiis in mesenterij spatia effluant, φλόγωση vel inflammationem excitare solent. Non verò hoc facile fieri potest, quin simul in intestina, in quæ vasorum horum orificia dehiscunt, excidant, & in iis simul inflammationem pariant. Et si verò de intestinorum inflammatione, & qui hanc sequitur dolore colico supra de intestinorum p. n. affectibus, part. 2. sect. 1. c. 2. dictum sit: tamen & hic quædam addere libet. Neque enim tam rarus hic est affectus, vt nonnulli forsan opinantur, sed satis frequens, & vt existimo, non malè febrium semitertianarum originem hinc deduxi, lib. 2. de febr. c. 21. & nisi nescio quæ religio impediret, mortuorum cadauera sæpius aperire, inueniremus in iis talium inflammationum vestigia. Quibus licuit id facere, certè sæpe inuenerunt. Inter quos est Adrianus Spigelius, qui lib. 1. de semitertiana c. 15. & 16. tales historias recenset; & lib. 4. cap. 13. vbi de colicis doloribus ex his inflammationibus ortis agit, ita scribit; In omnibus, quoque vnquam aperire potui, veram inflammationem conspeximus, qui modo ileon vel ieuni intestini partem aliquam, modò verò colon tantum occupauit. Vidi etiam, quibus omnia intestina & ventriculus erant inflammata cum omento, & mesenterium tantum inflammatum cum leui tenuiū intestinorum inflammatione, &c. Nimirum cum natura aliàs vitiosos humores ad hanc quasi corporis sentinam à partibus nobilioribus depellere soleat, iidem nunc sensim cum fecibus, alui excernuntur, nunc varij alij fluxus excitantur: si verò via illa ad intestina præcludatur, vt in ea vitiosi humores effundi non possint; hærent in mesenterio & venis mesaraicis, vnde mesenterium & plerumque etiam intestina, nunc hæc, nunc illa, prout per hunc vel illum ramum mesentericum humores affluunt, inflammantur.

Occluduntur autem venarum mesaraicarum orificia à causis nunc internis, nunc externis. Causæ internæ sunt humores crassi & lenti, vel etiam copiosi; qui confertim ad intestina ruentes exitum non inueniunt. Causæ externæ sunt, potus & cibus ac medicamenta adstringentia, vt vinum austerum & crudum; obseruatumque post dysenteriam intempestive curatam vitiosos humores detentos in mesenterio inflammationes excitasse. Fieri etiam potest, vt humores vitiosi in glandulis altius impacti extempore calore accedente putrescant, calorem

Vomitoria.

Diuretica.

Chalybs, Acidula.

Mesenterij inflammationis Causa.

Febrim semitertianarum origo.

Causa.



lorēque concipiant, febribusque variis, nec non abscessibus causam præbeant. Tandem & causæ externæ, vt percussio, lapsus, vulnera, humorum affluxum concitare valent.

### Signa Diagnostica.

signa.

Vt autem malum hoc maturè cognoscatur, operæ pretium est. Medicus enim non raro fallit, & in foeminis pro vterinis doloribus, in viris pro dolore ventriculi, colico, & nephritico (cū nausea & vomitus accedere soleant) habetur. Verum ab iis discernitur, quod in iis dolor modò infra vmbilicum, modò supra eam vel circa ipsum, vel in lateribus tātum percipitur, modò per totum ventrem extenditur; hic verò dolent lumbi nunc ex parte vtraque, nunc in dextra, qui dolor se postea extendit ad anteriorem regionem ventris supra & circa ventriculum. Excrementa per aluum non redduntur, aut ægrè redduntur, & si clysteres inniciantur, post primas feces nihil nisi clyster excernitur. Vrina est tubra bilis portione ad renes transmissa. Adest oris amaritudo, inappetentia, sitis, vigiliæ, febris, si intestina simul occupantur, est continua, plerunque semitertiana, de quo de febribus l. 1. c. 2. egimus. Si tamē profundius & circa glandulas ac loca mesenterij ignobiliora materia putrescat, febres sunt lentæ, sine siti & grauibus symptomatibus, & tensionis ac grauitatis saltem sensus infra ventriculum percipitur. Quod enim locus, qui inflammatur, & in quo materia putrescit, est epari maioribusque arteriis vicinior, eò febris est ardentior, & symptomata sunt grauiora; quò verò ab iis est remotior, eò febris, & symptomata sunt mitiora.

Nonnullis motus conuulsui, epilepsia, apoplexia, paralytis accidere solet, humoribus vitiosis ad spinalem medullam & cerebrum delatis, per vias quas antea, c. 2. exposuimus, & de scorbuto, postea explicabimus. Principiò etiam sanies quædam rubra, deinde factò abscessu pus album defluit ex aluo, & quidem modò permixtum fecibus, modò seorsim & sincerum, cū scilicet inflammatio est in intestinis inferioribus.

### Prognostica.

prognostica.

1. Malum hoc periculosum, & sæpe etiam longum. Si enim inflammatio sit maior, febris etiam magna excitatur, & intestinis vel mesenterio corrupto & putrescente æger moritur, nonnunquam in abscessum periculosum inflammatio mutatur. Et sæpe malum tunc ad quadragesimum diem, interdum & ad octuagesimum extenditur; si verò febris sit lenta, æger contabescit, & lenta morte enecatur.

2. Sæpe verò materia à natura aliò transuertitur, non tamen planè tollitur, vnde malum recrudescit, & sæpe per multos annos, imò totum vitæ tempus durat, nunc febre redeunte; nunc eadem in colicos dolores permixta, ac cessante febre singulis mensibus, vel alio intervallo colica redeunte, & si non inflammatione, tamen φλογώσι excitata.

### Indicationes.

indicationes.

Vt in aliis inflammationibus, ita & in hac humorum affluxus inhibendus, iique reuelliendi, repellendi, deriuandi, & expurgandi ac discutiendi, eorumque intemperies & acrimonia temperanda & corrigenda; dolor, si sit magnus, mitigandus.

### Curatio.

curatio.

Principio ergo, si sanguinis aliqua copia adsit, viresque ferant, vena in cubito aperienda, ne maior humorum confluxus fiat, imprimis si epar vicinum ab inflammatione incalescat, aut si causa externa, vt lapsus vel percussio malo causam dederit. Si autem ex suppressione menstruum vel hæmorrhoidum malum originem habeat, etiam venam in talo aperire licet.

Esti verò refrigerantia exhibere turd non sit, ne materia magis impingatur: ad maiorem tamen affluxum prohibendum, & calorem temperandum, refrigerantia modicè cū ore sumi, tūm per clysterem iniici possunt, parata ex hordeo, violaria, malua, violis, rosas, fero lactis & similibus.

Refrigerantia.

Purgantia in principio locum non habent; cum facile plus materiæ ad locum affectum attrahere possint: inflammatione tamen ad coctionem tendente lenia purgantia locum habent parata ex syrupo rosarum solutiuo, manna, rhabarbaro, (quibus & sena addi potest,) cum fero lactis, vel alio conueniente liquore exhibita, myrobalani verò & tamarindi, atque alia adstringendi vim habentia non vsurpanda, clysteres etiam ex malua, mercuriali, parietaria, oleo violarum, rosaceo, electuario lenitiuo simplici & aliis vsurpari possunt.

Purgantia.

Tandem declinante inflammatione, quæ reliquias materiæ abstergant, & per vrinas educant, exhibenda, qualia capite præcedente de obstructione vasorum sunt proposita.

Diuretica &amp; abstergentia.

Si dolor valde vrgeat, is leniendus, quod qua ratione fieri debeat, supra part. 2. sect. 2. c. 2. de colica ex humoribus calidis dictum, & postea cap. 6. dicitur.

Dolorem lenientia.

### Dieta.

Victus sit tenuis, & feruorem sanguinis mitigandi vim habens, simulque abstergendi & aperiendi vi pollens. Itaque conueniunt ptisana & cremor hordei, iuscula gallinæ cichorio vel endiuia alterata, emulsiones feminum quatuor frigidorum maiorum, & cibi, qui nec crassum chylum suppeditant, nec calefaciunt. Potus sit aqua hordei vel cereuisia hordeacea tenuis, & in declinatione vinum ελιγοφύρον. Quies utilis est, vt & somnus ad iuuandam coctionem. Animi παθήματα nimia vitentur. Aluus sit laxa.

Dieta.

## C A P V T V.

De Mesenterij aliis tumoribus, abscessibus, supuratione & corruptione.

Non solum autem inflammatur mesenterium, sed & alij tumores ex humoribus crassis & ratratis in eo oriuntur, qui vel in scirrhos & tophos ac calculos degenerant, vel in abscessus, sed lentè ac tardè mutantur. Si enim ex ingluvie nimia atque erratis in victu magna bilis, pituitæ crudorumque ac crassorum & tartareorū humorum copia proueniat, neque maturè euacuetur, ea in hisce locis cumulat, & laxa glandularum substantia imbibitur, vnde facilè exitum non inuenit, sed ibi congesta primum molles tumores excitat, postea humoribus sicciscentibus & concrecentibus, scirrhi, tophi, imò lapides in eo generantur.

Mesenterii tumores alii.

Causa.

Ita refert Beniuenius, de abdit. morb. & sanati. causis c. 37. cuiusdam Petri Altimarij filium octauum annum agentem incidisse in corruptum appetitum, & calculos acruderā comedisse, ac postea in lentam febrem incidisse, tandemque malo procedente, & vomitu ac fluxu alui accedente puerum è vita discessisse, atque in eius cadauere aperto repertum callum inter venas mesaraicas. Ambrosius Paræus, lib. 23. cap. 36. narrat, (locum integrum adscribere liber, cum plurima notatu digna contineat) Anno 1572. Luteriæ foeminam quandam Isabellam Rolandi è vita migrasse, & cum semper in mesenterio morbi causam delitescere medici suspicari essent, dissecto cadauere Doctorem Melerium mesenterium in suas ædes deferri iussisse, vt id cum aliis Medicis diligenter contemplaretur. Inuentum autem est cū eo pancreas tumore miro, prope incredibili, turgēs, adeo vt libras decem & dimidiam penderet, scirrholum omnino extrinsecus, solisque postica parte lumborum vertebris adhærescens, antica autem peritonæo scirrholoso pariter ac penitus cartilaginoso. Suberant infiniti in

in eodem mesenterio abscessus sua quique cysti inclusi, alij quidem oleoso, alij melleo, alij sebaceo, alij albugineo, alij aquoso humore & liquore differti, quorum conclusa materia puliculæ similis esset: denique quot ferme abscessus erant, tot erant materierum contentarum species & ideæ. Octauus iam annus agebatur, ex quo tumor ille inceperat sensim ac sine sensu & dolore ad tantam magnitudinem progredi, quod mesenterium ipsum doloris fere sit expertus. Aegræ interim ipsi, perinde fere ac sanæ, licebat naturæ, animæ, ac vitæ munera omnia obire, nisi quod duobus antequam moreretur mensibus, coacta fuit lecto se tradere, quod febris continua, quæ illi ad extremum vsque vitæ diem perpetua fuit, superuenisset: & quod præ tumoris pondere mesenterium suis velut radicibus & sedibus diuisum fluctuaret, non sine molesto oneris & doloris sensu. Nam, ut prædiximus, lumbaribus modo vertebra ac peritonæo adhærebat, nullatenus autem intestinis & aliis partibus, quibus velut connatum alligatur. Itaque sua id mole & corpore vesicam premens & coarctans difficilem mictionem faciebat: intestinis verò incumbens, ut alius pigrior esset, in causâ erat: adeo, ut, nisi deuorato laxante aut purgante medicamento, fæces nō descenderent. Nam quod ad clysteres spectat, subire illi in intestina tumoris vias coarctantis magnitudine prohibebantur, intrusæ verò glandes nihil proficiebant. Respiratio ob diaphragmatis à tumore compressionem difficilis erat. Ita Iohannes Philippus Ingrassias, *tratt. 1. de tumor. præter naturam c. 1.* refert, Anno 1539. Panormi seruum quendam nigrum ob furtum suspensum dissectum fuisse, in cuius mesenterio strumæ circiter quadraginta inuentæ, præter quas in glandulis existentes totidem ferè externæ intestinorum, præcipue crassiorum, tunicæ adhærentes tumores, prope singuli membranula, cuiusdam vesiculæ instar, conferti, & vtriusque quidem generis tumores varia quantitate, atque inter extremos, qui ad oui gallinacæ magnitudinē perueniebant, & minimi ciceris prauitatem, quamplurimi intermediæ quantitatis visi sunt. Continebant autem nonnulli lapideum gypsum, nonnulli vero glutinosam, mucosamque substantiam. In reliquis corporis partibus, salubria omnia deprehensa, atque ab iis, qui eum viuum cognouerant, vnanimiter relatum, sanissimum donec suspenderetur, extitisse. Quod inde procul dubio factum, quod natura ad eas partes vniuersi corporis excrementa transmittendo reliquorum, maximeque naturalium viscerum sanitatem conseruauit. Guilielmus Fabricius etiam *Centur. 1. obser. 70.* refert, puellâ quandam Coloniensem anno ætatis decimo paulatim in tabem incidisse, & quatuor sequentibus annis penitus extabefactam fuisse, appetitu tamen eius vix vnquâ imminuto. Nam comedebat & bibebat non parcius, quam si sana fuisset, & exercitia sua puerilia vtplurimum peragebat, neque lecto decumbibat, nisi per sex aut septem hebdomadas ante obitum. Febriculâ tamē & tussi vexabatur continuâ. Cum autem anno 1600. ætatis 14. mortua esset, & mortuæ corpus aperiretur, mesenterium inuentum fuit refertum tumoribus duris, scirrhis atque steatomatibus, præcipue a. circa vasa & venas, quæ ad portam tendunt, circumcirca portam tumore scirrhi inueniebantur multi, quorum nonnulli oui gallinacæ, alij nucis & castanæ magnitudinem excedebat.

Platerus etiam *lib. 3. obser. 70.* refert, in Anatome in mesenterio quodam deprehensos fuisse tumores glandulosos albos, dueros, nucis magnitudine, hinc inde in diuersis locis intestinorum mediæ sedi aded connatos; ut intestina eo in loco sic intumuisse viderentur, atque indurata: quam duritiem in ventre, dum vivebat adhuc æger, prominentē tactu deprehendere potuit, præsertim quando excrementa dura & sceuala in ea sede, vbi tumores hi angustia in intestinis pariebant, diutius subsistebant, atque intestina amplius in tumorem eleuabant, vnde alius illi constipabatur, colicique dolores illum

excruciabant, quibus tandem euictus, occubuit.

Fuit etiâ in vicinia hic Quæstor quidam à multis annis valetudinarius, qui ventrem crassum habebat, crura inflata, & in eis sæpe vlcera *δυσπύλωτα*, cum virium debilitate & appetitu læso. Is et si variis medicamentis atque inter ea etiam thermis vsu esset, nil tamē melius habuit, sed res eò deuenit, ut humoribus serosis ad crura descendentes ipse ad ambulandum planè impotens redderetur, & sella gestandus esset. Accidit tandem ut supra dextrum inguen in abdomine tumor emergeret, atque in vlcus gangrænosum abiret, imò ad manus latitudinem eadem gangræna musculos & cutem abdominis eo loci occuparet. Vnde etiam mors tandem secuta est. Cuius morbi causâ procul dubio fuit tumor aliquis durus & diuturnus in mesenterio: qui postquâ tandē exulceratus fuit, putredine partes superiacentes vsque ad cutē corruptit, & eâ gangrænam ibi excitauit.

Imo lapides etiam in mesenterio repertos fuisse, Medicorum obseruationes docent.

Quandoque tamen materia, sed tarde ac lente, in pus mutatur, atque abscessus generantur in mesenterio. Anton Beniuen. *de abd. morb. & sanat. causis c. 13.* refert, iuuenem quendam diuturnis alui torminibus vexatum, & tandem iis extinctum fuisse, in cuius cadauere aperto remotis intestinis abscessus magnus in mesenterio repertus est, quo præciso materia multa nigra foetensque profluxit encausto sutorio similis. Et supra retuli nobilem quendam in vicinia cum diu male habuisset, & nescio de quo languore conquectus esset, tandē rupto abscessu, qui procul dubio in mesenterio latuerat, subito per aluum nigram & foetidissimam materiam magna copia eiecisse, & intra horam expirasse. Narrat quoque Marcellus Donatus, *de histor. med. mirabili lib. 4. c. 7.* virum quendam febre valida correptum per aluum sanguinem nigerrimum corruptum, pessime olentem ad quindecim librarū pondus excreuisse, in cuius cadauere aperto in eius mesenterio ea parte superiore, qua intestino recto connectitur, vlcus fordidum ad spithamæ longitudinem inuentum fuisse; cum tamen æger nunquam, nisi extremo vitæ die, quo illi venter intumuit, de illius partis dolore conquectus esset. Ita Volcherus Coiter, *in obseruat. & chirurg. refert*, in patricii cuiusdam Noribergensis, qui affectione, hypochondriacæ non ab simili, laborarat, & tumorem in sinistro genu & abdominis parte habuerat, cadauere aperto magnam colluuiem materiæ purulentæ ac foetidæ inter duas mesenterij tunicas, quæ maiorem inferioris ventris partem occupauerat, & epar sua putredine infecebat, repertum fuisse.

Imo mesenterium gangræna vitiatum repertū fuit in Rondeletij vxore, ut refert Ioubertus, *in vita Rondeletij.*

Et procul dubio tales mesenterij abscessus in multis reperirentur, qui lentis ac diuturnis morbis, variisque symptomatibus, quorum causas reperire non facile est, quæque medicos sæpe suspensos & dubios habent, exercentur, & moriuntur, si eorum cadauera aperire liceret. Sed obstat plerunque præpostera quædā erga mortuos reuerentia, quâ ramen impediri non potest, ne eadem cadauera putrescant, & vermium esca fiant, interim rei medicæ incrementum hoc modo non parum impeditur.

#### Signa Diagnostica.

Cognitu autem omnino difficiles sunt isti mesenterij tumores & abscessus, & quamuis suspicionem aliquam de se præbeant, quales tamen sint, vix integre, nisi post mortem, cognoscuntur. Interim danda opera, ut quantum licet in eorum notitiâ veniamus. Qua ratione a. cognosci possint, Fernelij verbis proponere libet. Ita a. ille *l. 6. de part. morb. & sympt. c. 7.* Si ampla & vasta mole venter totus præter naturam prominere, idque circa fluctuationē, citra alui suppressionem diutinâ, citra hydropis suspicionem, vnde & qua id ex causâ obtige-

Lapides in mesenterio reperti. Abscessum.

Gangræna.

Signa.

rit, tactu ita quidem discernendum. Cum adipis copia venter prominet, quoniam cuti summæ is inhærescit, manu totus comprehendi, secernique potest à musculis abdominis, ac præterea reliquus corporis habitus oberior existit. Cum tumor insertus est musculis abdominis, primò is contactui occurrit, & cum premitur, plerumque etiam citra eius pressum, dolore afficit, quod pars ea sensu prædita sit: intestina non coarctat, neque alui deiectionem remoratur. Mesenterij vero tumor, quoniam altè sepultus est, non nisi pressu animaduertitur, nullo dolore affligit, quod pars ipsa sit doloris expers. Quin etiam sua is mole intestina premens atque coarctans sæpe efficit, ut aluus pigrior sit, tardiusque fæces descendant. Vtrum præterea tumor vniuersum mesenterium, an partem duntaxat, & quamnam occupet, mollisne sit an durus, tactu etiam internoscendū. Cæterum quisnam in mesenterio humor exsuperet, iā non tactu, sed iis ipsis notis, quibus in iecore aut liene proditum est, cognoscitur, sed quæ tamen tum obscuriores, tum leniores existunt. Hæc a. obscuritas multis fuit causa ignorantia, cur harum partium affectus prætermitti fuerint, nec veterū scriptis celebrati. Hæc Fernelius. Et omnino sæpe tam occulti & alte sepulti latent isti tumores, ut nec tactu etiam deprehendi possint; & sensus adeò hebes est huius membri, ut nec insigniori aliquo dolore sese hi tumores prodant. Ideoque etiam alia symptomata perpendenda. Adest enim interdum nausea & vomitus, sine ventriculi affecti signis, alui cruentæ vel fœtidæ deiectiones, vigilæ, febres lentæ inordinatæ, rufis, vitium languor. Et quidem tumores indurati & abscessus delitescentes ob sensum hebetem mesenterij vix animaduertuntur, ubi vero rūpuntur, euidenter sese produnt, ut postea in Prognosticis dicetur, & pus vel sincerum, vel fecibus permixtum, citra dolorem tamen insignem, excernitur; id quod in ventriculi, epatis, lienis inflammatione, in quibus dolor & graua symptomata vrgent, non accidit. Et si quis omnino signa inflammationis, epatis, lienis, diaphragmatis, musculorum abdominis diligenter perpendere velit, ea in hisce tumoribus locum non habere animaduertet, etsi vel tumor vel grauitatis sensus, aut dolor percipiatur, aut febris etiam adsit.

Prognostica.

Prognostica.

1. Affectus hi diuturni sunt, & tandem in tabem vel hydropem ægrum præcipitant, ac vix curantur.
2. Abscessus ruptus per aluum plerumque euacuatur. Si verò aliò, quàm in aluum vomica rupta fuerit, neque exitum materia repererit, colicæ similis dolor excitatur. Si verò in abdominis cavitatem eruperit, seu intermedium membranarum mesenterij spatium, humor putridus vicina corrumpit, & sæpe sphaceli author est.
3. Nonnulli quidem pure per aluum euacuato sanantur: accidit tamen etiam, ut si materia valde praua sit, ægri paucarum horarum spatio moriantur. Pro natura enim humoris & affecti loci conditione, ac viscerum vicinorum, quæ à putridâ materiâ morâ ac vaporibus inde eleuatis afficiuntur, diuersitate & nobilitate varia oriuntur symptomata, ac mixti naturæ in expellenda materia conatus animaduertuntur, & variæ viæ à natura in expellenda materia quærantur. Nonnunquam enim pus per proximam venam in coli aut recti intestini cavitatem effunditur, nonnunquam quasi per cuniculos per vmbilicum pus erumpit, nonnunquam etiam per renes expurgatur.

Curatio.

Curatio.

Tumores duri, scirrhi & calculi in mesenterio curari vix possunt. Si tamen quid tentari liceat, ea medicamenta, quæ ad pertinaces obstructions adhibentur, & quæ etiam de affectione hypochondriaca proponuntur, in hisce affectibus vsurpari possunt. Vbi autem in

Dan. Sennerti Tom. II.

abscessus mutantur, naturæ etiam primariæ partes sunt, quæ nisi aliquid in euacuando pure tentauerit, vix æger feruatur. Ars tamen naturæ succurrit, dum materiam detergit, & quod reliquum est discutit, tandemque vlcus consolidat. Partes quoque, per quæ pus transit, & imprimis renes, muniendæ, ne à pure transeunte lædantur, quod diligenter præstandum. Solent enim interdum, nisi cura rectè instituatur, postliminio quasi reuerti. Vtilis est hic terebinthina cypria, quæ vel in bolum cum modico thabarbari conformanda, vel cum vitello oui in lacteum liquorem redigenda, ut in Instr. p. 954. dictum.

Exhibenda sunt & alia exiccantia & consolidantia, ut decoctum radicum sarsæ parillæ cum radice fragariæ factum.

Vel hoc ℞. Rad. sarsæ parillæ, china an. Vnc. j. β. caryophyllata, fragaria an. Drach. j. fol. scabiosæ, alchimilla, veronica, hedera terrestris an. Mj. ligni rhodij Dr. vj. passularum minorum lotarum Drach. ij.

In vase clauso bulliant in s. q. iuris pulli vel seri lactis, vel aqua chalybeata, & postea per manicâ Hipp. traiciantur.

Vel ℞. Rad. sarsæ parillæ lb. β. china, acerosa an. Vnc. ij. fragaria Vnc. j. veronica, alchimilla, scabiosa persicaria an. M. ij. saluæ, flor. verbasci, chamameli, hyperici, sem. coriandri, feniculi, an. Drach. ij. melonum Vnc. β.

Concisa infundantur per triduum in vini albi, aqua veronica, flor. chamameli Romani, cardui Maria ana parte vna, brody caponis partib. iij. postea destillantur. Dosis Vnc. iij. Si libet addatur aliquid syrupi veronica, scabiosa, granatorum, cinamomi, inlebi rosarum. Vtile est & hoc Electuarium,

℞. Conf. ros. rubr. veronica, cichor. an. Vnc. ij. scabiosa Vnc. j. roob iuniperi Vnc. ij. pulv. radic. sarsæ parillæ, china, ligni aloes, rhodij an. Drach. ij. marg. præp. corall. rubr. præp. an. scrup. ij. Cum syr. de Cinamomo. F. Electuarium.

Dietæ.

Cibus sit boni succi & facilis coctionis, ac temperatus, non crassus, non viscidus, non acidus, non dulcis, sed potius sine acrimonia, tamen moderatè abstergens. Potus sit vinum tenue vel cereuisia tenuior. Potest & decoctum chinæ cum glycyrrhiza & passulis vsurpari, nec inutile est lac asininum exhibere.

Dietæ.

CAPVT VI.

De Symptomatibus ex humoribus in mesenterio cumulatis ortis, & præcipuè dolore.

Atque hæc de morbis mesenterij. Symptomata inde orta quod attinet, sunt ea varia. Nam etsi diu sæpe humores in hisce locis latent, antequam sese prodant: tamen vel tandem commoti quacunque de causa varia symptomata excitant, & pro varia inclinatione, nunc vomitu per superiora eiiciuntur, nunc deorsum tendentes per aluum euacuantur, nunc ad vicinas membranas delati dolores, eosque pertinaces & sæpe recurrentes excitant; vel suis sedibus conclusi & coerciti & à calore partium vicinarum putredinem concipientes febres vagas & erraticas pariunt; vel glandulas implentes, & vicina vasa aut comptimentes aut obstruentes cachexiam, atrophiam, languorem gignunt, aut partes in tumorem attollunt, & omnia omnino symptomata, quæ affectione hypochondriaca & scorbuto laborantes experiuntur plurima, de quibus postea de affect. hypoch. & scorbuto dicetur, ex hisce sedibus ortum habent. Egregium vero symptoma, quod ex materia in mesenterio contenta proficiscitur, est doloris illa peculiaris species, quam supra, part. 2. sect. 2. cap. 2. explicauimus. Pauca saltem hic addemus.

Mesenterij symptomata.

Mesenterij dolor.

Mentionem autem mali huius facit Hippocrates & Νόσος ἐνυμωμένη, morbus ructuosus ab eo nominatur, & ita describitur: Dolor acutusprehendit, vehementer

L.L.L.

mentis

menterque dolet & ipse seipsum iactat, & vociferatur, frequenter eructat, ac ubi eructauerit, melius habere videtur. Plerumque vero paucam bilem vomitione reiicit, poculi parui mensura, dolor ex visceribus ad immum ventrem & laterum mollitiem pertingit, cumque contigerit, melius habere videtur, venter inflatur & indurefcit, sonitum edit, neque status neque stercus dimittitur.

Materiam autem huius doloris & reliquorum, quæ postea dicentur symptomatum causam in mesenterio contineri multa docent. Solent enim hi dolores febribus diuturnis succedere, cum natura humores prauos, frustra eorum per alium euacuatione tentata, in membranas has detrudit. Accidunt etiam iis, qui ictero sunt obnoxij, & ad cachexiam dispositi. Et cum mesenterium nihil fere aliud sit, quam peritonæum ad lumbos duplicatum, iisque affixum, aut certe oriatur à ligamentis vertebrarum lumborum, iisque validissime alligetur: doloris huius, & omnium, quæ ipsi coniunguntur symptomatum, causa rectissime ex mesenterio reddi potest.

Ob hanc enim mesenterij cum lumbis connexionem doloribus istis dolores lumborum perpetuo sunt coniuncti, imo interdum in vniuersum abdomen extenduntur. Hinc etiam paralyticos & Epilepsia causa reddi potest, dum scilicet materia, ab arteriis mesentericis ad lumbares transmittitur.

Habent autem hi dolores originem ab humoribus calidis siccis & acerbis in hac corporis sentina collectis ob causas, quas hæcenus exposuimus.

#### Signa Diagnostica.

Signa.

Signa huius doloris supra *part. 2. cap. 2.* proposuimus. Instantis tamen etiam doloris, ut præcaueri possit, signa animaduertere utile est. Arguit autem instans hoc malum icterica quasi in oculis dispositio & luridus faciei color, grauitas hypochondriorum, sitis aucta, urinae rubicundiores, alui suppressio, in lumbis dolor.

Hinc dolor ventris & lumborum oboritur, qui in vno loco fere fixus est, venter nisi inflatus, ad interiora & dorsum quasi retrahitur, medicamenta vomitu reiiciuntur, ac dolor postea per vniuersum ventrem diffunditur, dolorque lumborum perpetuo est coniunctus, quod citra communem causam, qualis est venarum & arteriarum quæ per totum ventrem inferiorem diffunduntur, structura, fieri non potest.

Proprium doloris Mesenterij signum.

Habet enim hic dolor hoc proprium, quod subinde per intervalla recurrit, & sæpe multis annis ægrum affligit, & toties, quoties in hisce locis noua materia collecta est; id quod sine certis intervallis accidit, nonnullis post menstruum spatium, nonnullis post semestre, nonnullis post annum, tempore tamen autumnali plerumque magis affligere solet. Tandem materia per intestina exitum non inueniente ad lumbos & hinc in caput, & artus distribuitur, vnde paralytis, conuulsiones, epilepsia, deliria sequuntur, & ubi humores prauis viscera debilitarunt, sanguinemque per totum corpus inquinauerunt, in toto, & præcipue in brachiis ac cruribus atrophia sequitur, quæ sæpe vix vlla arte & non nisi longo tempore curatur.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Dolores hi ut diuturni & pertinaces esse solent: ita sæpiissime etiam ægrum in grauissima mala modo enumerata, tandemque mortem ipsam præcipitant.

2. Diuturnis circa lumbos, tenue intestinum, ac præcordia doloribus vtgentibus si ægri cibos auersentur vna cum febre his dolor intensus ad caput progrediens repente illos occidit conuulsionum modo, Hipp. in *coac.*

3. Quibus tormina adsunt, & circa umbilicū cruciatus, & lumborum dolor, qui neque medicamento neque aliter soluantur, in siccum hydropē firmanur 3. *aph. 11.*

4. Post multorum annorum tormina succedit vel hæctica & incurabilis intemperies, vel peritonæi ac partium vicinarum abscessus.

#### Curatio.

De curatione supra *part. 2. sect. 2. cap. 2.* dictum. Ut quædam addamus, curatio in duobus consistit, in causæ ablatione & doloris lenitione.

Curatio.

De causæ & humorum vitiosorum, qui in mesenterio colliguntur, ablatione, hæcenus dictum, & quibus patet, ubi doloris huius imminentis signa adsunt, dandam operam, ut materia doloris causa euacuetur. Ideoque clysteres crebri iniiciendi, ut materiae ad intestina transitus & exitus patetur. Plus tamen aliquoties vomitum ab ipsa natura prouocatum, quo acida, amara, humoresque acres prauis ad aliquot libras reiecti sunt, profuisse & inde à doloribus breui temporis spatio ægrum liberatum fuisse memini. Neque caret res ista ratione. Etenim cum materia ista plerumque circa lienem & in vena portæ colligi in magna copia soleat, ubi per omnes vasorum, qui in mesenterium & intestina disperguntur, ramos diffunditur; grauissimos & diuturnos dolores excitare solet. Imo ubi exitum non inuenit, & natura de eâ per intestina euacuandâ desperat, regurgitat, naturæque eam ad alias partes detrudit, vnde conuulsiones, paralytis, & alia mala excitantur. Si vero natura hos humores per viam compendiarum, quæ est per vas breue, in ventriculum effundit, ut vomitu reiiciantur, omnes isti dolores & reliqua mala evitantur.

Clysteres.

Vomitum.

Si autem natura eò non vergat, & præcipue si motus intestinorum inuersus sit, ac metuendum, ne vomitu concitato natura magis ac magis motui versus superiora assuescat, danda opera, ut intestinorum fibræ tensæ laxentur, vasorum mesaraicorum orificia aperiantur, atque ita materiae exitus patetur. Clysteres ergo iniiciendi ex lacte caprino, vel decocto maluæ, altheæ, parietariæ, brancæ vrsinæ, mercurialis, florum chamæmeli, vel decocto galli cum cassia, melle rosato & violato solutiuo, Syrupus de cichor. cum Rhabarb. diafercos, oleo amygdalarum dulcium, liliorum alborum, violarum, chamæmeli, vitello oui, quibus maioris absterisionis gratia hiera simplex addi potest.

Potandum vero exhibeatur oleum amygdalarum dulcium recens expressum cum manna, ut supra loco allegato dictum.

Venter extra inungatur oleo amygd. dulcium, violarum, liliorum alborum, chamæmeli, & cataplasmata ac alia loco allegato proposita applicentur.

Externæ.

Arque ista cum simul anodyna sint, dolorem etiam mitigare possunt. Si vero is valde vrgeat, narcotica addenda. Quapropter semen papaueris dictis medicamentis addere utile erit. Quod si non sufficiat, ad narcotica accedendum, de quibus loco allegato dictum.

Dolorem lenientia.

## CAPVT VII.

### De Morbis Pancreatis.

Pancreatis vsum plerique anatomici eum saltem esse statuunt, ut vasa saltē fulciat, ne ruptionis periculo sint exposita, & ut ventriculo subternatur, ne repletus duritie vertebrarum lædatur. Verum cum pancreas non simpliciter glandula sit, sed peculiare parenchyma & suam carnem, vnde & nomen obtinet, habeat, & præterea ut supra *cap. 1.* dictum, venæ lacteæ omnes in pancreas tendant, atque in eo miris anfractibus disseminentur: nobiliorem procul dubio vsum habet, atque ideo factum, ut quicquid cernosi in chylo est, ad se trahat, ut ita chylus purior fiat, & forsitan etiam chylum aliquo modo alteret. Vnde etiam Clarissimus Riolanus *Anthropog. lib. 2. cap. 16.* in morbis & melancholicis corporibus secundarium lienem seu lienis vicarium viscus appellat pancreas, quod scilicet lienis vicem suppleat, quâdo vitiatū hoc viscus marcescit. Idque multis natura sua

Pancreatis vsum vulgari.

Nobilior & verior eius vsum.



sua & corporis habitu melancholicis se obseruasse scribit, in quibus, dum uiuerent, lien nec tumebat, nec dolebat, sed pancreas epatis molem æquabat. Idque confirmat etiam Illustrissimi viri Augustini Thuanii exemplo qui habitu corporis melancholico conquerebatur, per quadriennium de dolore colico circa regionem coli intestini cum sensu ponderis ad regionem stomachi, dum staret erectus vel ambularet: hypochondria vero ei nec tuebant, nec dolebant etiam duriter attrita vel percussa.

Tandem repentinâ & inopinatâ gangrênâ correptus pede dextro ad suprema celeriter reptante cum diris cruciatibus inter sex horas exspirauit. Aperto cadauere, deprehensum iecur induratum rotundum instar sphaeræ fractum & transfixum gypsea pituita seuum referente, pancreas vero amplitudine sua & pondere ipsum epas æquabat, totum scirrhum multis globulis specie oui, columbini differtum: Lien adeo exilis erat, ut vix vñscam ponderasset.

Habet autem pancreas, ut iam ex iis, quæ modo dicta sunt, etiam suos morbos, & præcipue tumores & abscessus. De tumore enim exemplum in Thuanio è Riolano modo adductum est. Abscessus historiam habet Aubertus, *Progymn. ad libr. abdit. Fernel. exerc. 44.* in mercatore quodam Lugdunensi, qui nihil dormire poterat, & cum dormire conaretur, in Lipothymiam & totius corporis frigidum sudorem incidebat, donec tandem mortuus est. Corpore aperto pancreas, integro saluoque vitæ principio & stomacho, duntaxat repperit abscessu putrefactum. Guilielmus Fabricius etiam *cent. 1. obs. 71.* in fabro quodam, qui biennio variis per intervalla morbis dolere coeperat, viscerum obstructionibus & cachexia laborauit, in mortuo inter cætera reperit tumorem scirrhum, suppuratum, instar steatomatis magnitudine duorum pugnorum ortum ab inferiore parte pancreatis, qui intestinum duodenum circumdederat, sic ut peritonæo testus alterum quasi ventriculum mentiretur.

Possunt autem varia ex pancreate obstructo & tumefacto oriri symptomata: Ventriculus enim ob vicinitatem affici potest, dolores & ponderis sensus circa regionem ventriculi, & in dorso excitari, ut & pulsationes ob compressionem artæriæ celiacæ, difficilis respiratio ob consensum diaphragmatis.

Curatio iisdem medicamentis perficitur, quibus lienis obstructiones & scirrhii curantur. Nec est incommodum emplastra illa, quæ lienii applicari solent, dorso ad regionem pancreatis imponere.

## CAPUT VIII.

## De morbis Omenti.

Omentum tandem etiam suis morbis obnoxium. Cum enim vena à portæ ve na capiat, & quidem superior membrana vramque gastroepiploidem dextram & posticam arterias totidem à coeliaco & mesenterico ramo; facile humores vitiosi omnis generationis in id confluere possunt. Et cum omentum iis tantum partibus adhærescat, ad quos rami splenici sutculi perueniunt, facile etiam à liene humores vitiosos & feculentos suscipere potest, & præcipue ea in parte omenti humores vitiosi multi sæpe cumulantur, quæ est inter lienem, septum & ventriculum, & imprimis in cavitare illa omenti in sinistro hypochondrio sub Diaphragmate ex ventriculi, omenti, coli & viscerum connexu orta, & exitum non habens, sed ita conclusa, ut aquam continere possit, quam Doctor Salomon Albertus Antecessor meus p. m. de Scorbuto thes. 71. stagnare aquâ vidit, & postea etiam diligenter descripsit Hieronymus Fabricius in historia seu structura omenti. De quo accipiendus aphorismus Hippocratis 54. sect. 7. qui-

bus inter ventriculum & septem transversum phlegma clauditur & dolorem affert, in alterutrum ventrem viam non habens, iis per venas in vesicam verso phlegmate morbi fit solutio. Et non raro accidit, ut humoribus, imo & flatibus in hisce locis culumulatis lien frustra accusetur, materiâ in omento consistente & sæpe abdomen in sinistra parte versus umbilicum in tumorem attollente. Accidit etiam nonnullis, ut dum ventrem attollunt vel comprimunt, aut moventur, sonum & strepitum quandam in ventre audiant; quod euenit ob humores & flatus in hac omenti cavitare conclusos; hosque nonnulli *εγγασσομένους* appellari putant, de quo postea de affect. hypochondr. dicetur.

Et per hanc viam humores etiam in abdominis cavitatem irumpere possunt, ut docet Hipp. 7. aph. 57. & lib. 4. de morbis, & lib. 1. de morb. mulierum. De qua re infra de hydropo dicetur.

Sæpe vero intumescit omentum ex humoribus affluentibus. Vesalius omentum quinque librarum pondus æquasse vidit: cum naturaliter sese habens vix semilibræ pondus excedat. Riolanus *Anthropog. lib. 2. cap. 11.* in nobili adolescente annos 19. nato omentum vidit versus umbilicum ad formam orbiculi latitudinē palmi conglobatum, multis glandulis differtum, quod totum illuuiem exceperat, liene penè consumto & mesenterio ac pancreate putrefacto ex abscessu. Lutetia in corpore secto inuentum fuit in Epiplois ad vesicam vsque pendentis membraneo quodam veluti sacco apostema, pure ibidem coaceruato distentum. Rousserus de parte Casareo.

Omentum abdominis musculis & peritonæo adnexusum vidit Columbus lib. 15. *Anatom.*

Nonnunquam etiam locum mutat, & probabitur omentum, viditque Columbus, ut loco allegato refert, in scroto omenti libram & amplius. Et sæpe in Hernia accidit, ut non solum intestina, sed & omentum in scrotum delabatur, delapsumque ventriculum deorsum trahat, & singultus ac aliorum symptomatum causa sit.

Extra umbilicum quoque prolapsum fuisse omentum, Columbus, ut loco allegato testatur, obseruauit.

Putrescit etiam interdum omentum, vidique in studio quodam scorbuto & hydropo laborante & in Nosocomio Academiz mortuo totum ferè omentum putredine absumtum fuisse.

Vulneratur tandem etiam interdum, imo abscinditur omentum.

Difficiliter autem humores vitiosi in omenti venas & substantiam effusi euacuantur. Neque enim venarum illarum orificia in locum euacuationi conuenienter dehiscunt, ut venæ mesaraicæ, & si euacuari debent, necesse est ut regurgitent ad loca, per quæ sunt illapsæ, quod raro fit, cum expultrix huius partis sit valde debilis. Ideoque non tolluntur humores ex omento, nisi e continuato thermarum vel acidularum potu.

Vulnera vero omenti non semper sunt lethalia, imo etsi pars eius abscindatur, mortem non affert. Ita refert Galenus 4. de usu part. cap. 9. se cuidam gladiatorio vulnerato fere totum omentum abscondisse, & hominem nihilominus sanatum fuisse, qui tamen facile postea lædebatur à frigore externo, ut non sustineret nudum habere ventrem, sed lanis assidue esset obuolutus.

Si vero putrescat vel abscessum patiatur, mala vix sunt sanabilia.

Verum de hisce, quæ de morbis mesenterij, pancreatis & omenti dici possunt, etiam quædam infra de affectione hypochondr. & de scorbuto dicentur.



## LIBRI TERTII

## PARS IV.

DE LIENIS PRÆTER  
naturam affectibus.

## CAPVT I.

## De Vsu Lienis &amp; Natura humoris melancholici.

**P**OSTQVAM chylus in ventriculo genitus per intestina & vase mesaraica ad Lienem transmittitur, inde sanguis generatur pro partium in ventre inferiore nutritione. Et si enim antiqui plerique saltem pro humoris melancholici receptaculo lienem habuerint; tamen doctiores Medici plerique hodie eum etiā sanguificationis organum esse statuunt, ut in *Instit. lib. 1. cap. 9.* dictum, quæ huc transferantur.

Docui nimirum ibi lienem primum sanguificationis organum esse, quod partem chyli crassiorem per splenicum ramum, & procul dubio etiam arteriæ Coeliacæ sinistræ seu splenicam arteriam attrahit (nam duo vasorum genera in liene per anastomases coeunt, ut humor, qui crassior est, facilius coquatur) & inde sanguinem quidem bonum, sed respectu sanguinis, qui in epate ex reliqua chyli parte puriore generatur, crassiorem paulò generat, pro viscerum in ventre inferiore nutritione, atque per venæ portæ ramos deferitur. Quapropter etiam, cum chylus prius ad lienem, quam epas deferatur, primò de lienis morbis dicemus. Ut autem commodius id fiat, iis, quæ in *Institut. loco allegato de Vsu Lienis, & lib. 2. part. 2. cap. 6. & 8.* de natura humoris melancholici docuimus, & hinc repetenda non censemus, quædam addemus.

Et quidem vsum lienis quod attinet, ansam aliquid adhuc addendi nobis præbent Viri doctissimi, Carolus Piso in libro de morbis à serosa colluvie oris, & Casparus Asellius in libro de Venis loquens.

Est autem Carolus Piso in ea sententia, cor minimè esse officinam sanguinis arteriosi, sed lienem esse officinam sanguinis tenuis, & calidi, qui in arteriis continetur, quem sanguinem ex tenuiore chyli portione attracta gignat, genitumque pulsu in vniuersum corpus distribuatur, respondentem in nobis carnosa substantiæ; simulque docet, lienem esse principium radicationis venarum gastricarum, & epiploicarum, nec non radicationis arteriarum, fontemque alterum, cumque præcipuum, feri in corpore necessarij.

Et primò quidem lienem etiam aquosa attrahere, antiquum dogma est Auctoris *lib. 4. de morb. & Aristotelis*, qui 3. de part. animal. cap. 7. scribit: ὁ σπλὴν ἀντιστοιχεῖ ἐν τῇ κοιλίᾳ τὰς ἰσχυράς τὰς σπληνικές: ut & Hipp. qui *lib. 1. de morb. mult.* scribit: αἰσθάνεται ὁ σπλὴν ὑπὸ πολλῆς καὶ μακροῦ, ὡς ὕδατος ὡς τὸ πόλον. Consentit verò id cum ipsa experientia. Nam ut quæ alibi diximus, hinc non repetamus, patet hoc primum ex eo, quod observatur, eos, qui plurimum bibunt, præsertim vinum, & cerevisiam tenuem, vix hausto potu, primum à mensa surgentes aqueam potus partem mingere; quod fieri vix potest, potu ad intestina transmissio, & à mesaraicis attracto (cū pylorus tunc clausus sit, & per viam tam longam, ac perplexam tam brevi tempore potus transire non possit) sed immediatè à ventriculo per vasa gastrica, & breue imprimis fieri necesse est, potu ad lienem transmissio, & alimentaria eius parte in liene restitante, aquea ad renes transmissa. Vnde quoque accidit, ut spleneticis, postquam seu aquam, seu cerevisiam copiosius biberunt, non ita multò post murmura, & rugitus circa lienem oboriantur. Deinde liquidiorē alimenti partem statim ad lienem trahi, vel ipsa famis sedatio, quæ fere

statim sumto cibo, præsertim liquido, accidit, testatur. Nam cum fames non aliter sedetur, nisi ubi venatum ad ventriculum pertingentium suctio quiescit & sedatur, quod euenit, cum pars alimenti à valis trahentibus in viscera deferatur, & ita tractioni eorum satisfacit: at verò tractioni venarum mesariarum, & quæ ex intestinis immediatè chylum alliciunt; statim sumto cibo satis fieri non possint; cum sumto cibo orificium ventriculi inferius per plusculas horas arctè claudatur, nihilque à ventriculo ad intestina statim sumto cibo descendat: sequitur, famē, quæ sumto cibo sedatur statim, non à suctione & tractione venarum mesariarum ortum habuisse, sed à venarum, quæ ipsi ventriculo inferuntur, tractione. Hæ autem sunt venæ gastricae, & epiploicae, atque imprimis vas breue; ex porta splenica propagata, & ventriculo immediatè inserta.

Deinde crassa etiam attrahere lienem satis, *lib. 2. Instit.* monstratum opinor. Neque ad contrarium probandū illud satis efficax est, quo dicitur, in prima, quæ fit in ventriculo, coctione terrenas partes inutiles ita separari, ut in secunda coctione non nisi igneas, & aqueas separari necesse sit: cum per vasa angusta chylus non nisi defæcatus, & liber prorsus à partibus crassis distribui, & transire queat, utpote quæ admodum sunt angusta, & puncti cuiusdā instar exigua. Etenim si coctiones in corpore humano consideremus, satis apparet, naturam per gradus quasi, & pederentim ad perfectionē tendere, neque in prima coctione omnia crassa planè separari: id quod vel ex eo apparet, quod lien ita facilè obstructionibus, & scirrhis obnoxius est; quod non fieret, si tantū tennes humores attraheret. Et quam crassæ partes sæpe ad officinas secundæ coctionis perueniant, vel ex urinis satis apparet. Imò ipsi, qui contrariū statuunt, affirmant, chylum esse mixtum quiddā ex quatuor diuersis substantiis, totidem elementis primis respondentibus, iisque imperfectè coalescentibus, ac vnitis aggregatum. Nec diffiteri possunt, sed ex iis, quæ ipsi admittunt, fundamentis concedere necesse habent, lienē, quia celeriorē epate facit attractionem, & ex ipso ventriculo chylum statim trahit, multa terrena, & lutoſa cum aquea chyli parte, per vas breue quidem, sed amplum alioquin, attrahere; quod si intemperantius fiat, obstructiones in liene excitantur. Et quamvis viæ illæ in cadaueribus ferè connueant, & puncti instar angustæ sint: tamen in viventibus longè patentiores esse, extra dubium est, ut id vel calculorum è renibus in vesicam transitus docet, etsi in cadaueribus viæ multò minus, quā in mesaraicis apparent. Et quam patula sint vasa in corporibus viventibus, quæ in demortuis planè conclusa cernuntur, vel historia docere potest, quam Ioh. Langius, in *epist. de morb. nouis*, recitat, de iuenculâ quadam in Principis cuiusdā Germani gynæceo, quæ cum sese ad speculum adornaret, detentis in ore aliquot acubus, quibus peplum affigeret, ab amasio à tergo clanculum accedente intra scapulas percussa, acus deglutiuit, quas post biduum illæsis vreribus eminxit.

Magnum verò valdè postulatum est, statuere officinā sanguinis arteriosi non cor esse, sed lienem, eundemque principium radicationis arteriarum: cum sensibus satis manifestum sit, quod sicut circa epas, quod principium est radicationis venæ cauæ, maximus venæ cauæ truncus est: ita etiā ad cor maximus arteriæ, à quo omnes arteriæ, quæ in lienē tendunt, ortum habent. Ductosque ipsi etiā, è quibus sanguis ex epate ad sinistram cordis ventriculū transmittitur, satis manifesti sint; ut dubitare de materia (quod illi faciūt) è qua in corde possit sanguis generari, nullo modo opus sit. Ex epate n. sanguis per venam cauam in dextrum ventriculū cordis; ex hoc per venam arteriosam in pulmones; à pulmonibus cum aère per arteriam venosam in sinistru ventriculū cordis transfertur. Neque illud sufficit ad probandum, lienē esse officinā sanguinis arteriosi; quo fluxibiliorē chyli partem attrahit. Ipsi n. concedentibus etiam aqueas attrahit.

Lienis  
Vsu.

Car. Pisonis  
sententia.

Lien aquosa  
attrahit.

Idem etiam  
crassa attrahit.

Acus degluti-  
ta & per v-  
rinā reddita.

Lien non est  
officina san-  
guinis art-  
eriosi.

attrahit: unde & Hipp. aquæ sedem esse affirmat, & hinc sæpe in tumores aquosos incidit. Quid v. aqua ad sanguinis arteriosi generationem facere potest: hoc probabilius est, aqueas chyli partes ad lienem eo sine transire, ut crassiores diluant, ne illæ facile obstructiones pariant.

Casparus Asellius verò de *venis lacteis* c. 32. planè sententiam Galeni defendit, & tam eos reprehendit, qui statuunt, lienem melancholicam chyli portionem, antequam ad epat perueniat, per ramum splenicum attrahere, quàm illos, qui chyli portionem crassiorem à ramo splenico attrahi & in sanguinem in lienem mutari existimant, ea de causa, quod nulla vel minima venarum lactearum ad lienem penetrat, à qua chyli aliquam partem capere possit. Ipse verò ita statuit, totum chylum in epatis carnem exonerari, ibique in sanguinis formam elaborari, unde crassiorem eius partem in ramos portæ, subtiliorem verò vtilioremque in cauz radices excipi, atque ita lienem crassam & terrestrem sanguinis partem ad se rapere, eandemque in sui alimentum mutare, & quod eius edomari non potest, per constituta ei rei vasa abicere.

Verum an vasa à lienem prodeuntia nihil è ventriculo trahant, quod vult Asellius, adhuc in controuersia est, ideoque, quæ ea de re cum aliis doctissimis Medicis docui, nondum reuocare volo: cum venarum lactearum natura & officium nondum satis exploratum sit. Interim etsi concederem hoc Asellio, sanguinis partem crassiorem à lienem ex epate trahi: tamen nondum hoc sequitur, cum saltem pro sui nutritione cum attrahere, & reliquam, ut excrementum, abicere. Structura enim lienis & tot vasa ad eum tendentia & egredientia aliud docent. Neque enim vasa, quæ à lienem ad ventriculum & vicinas partes prodeunt, excrementum melancholicum, sed reuera sanguinem continent.

Ideoque si iis, quæ de vsu lienis antea diximus, aliquid addendum est, hoc saltem: Lienem non solum sanguinem venosum (sive eum in epate elaboratum, sive à vena portæ in epat redentem accipiat) sed & arteriosum attrahere. (Habet enim lien arterias plurimas à coeliacæ ramo sinistro, & quidem quintuplo plures, quàm venas.) Et ex sanguine arterioso & venoso mixto (unde etiam antequam arteria, lienem ingreditur, inferior ramus cum inferiore ramo venæ insignem anastomosim facit) in lienem peculiare sanguinis genus ad partes quasdam ventris inferioris nutriendas necessarium generari. Omnia enim nutritioni dicata viscera, præter mesenterium & intestina nutrit ramus splenicus, & quidem ventriculum eius surculus pyloricus, gastricus, utraque gastroepiplois & vas breue. Neque id sine ratione factum. Cum enim viscerum in ventre inferiore substantia sit ignobilior iis partibus, quæ à sanguine venæ cauz nutriuntur, merito etiam sanguine crassiore nutriri debent. At cum eadem partes membranosæ sint, ventriculus verò cibum & potum, qui sæpe frigidi ingeruntur, concoquere & in chylum mutare debeat, eorum intestinum crassa excrementa contineat, omentum etiam crassam illuuiem excipiat, nisi partes hæ sanguine feruidiore & ex venoso & arterioso mixto nutrentur, officio suo recte fungi non possent.

Alterum verò quod attinet, nimirum naturam humoris melancholici, diximus de eo satis, lib. 2. *Instit. p. 2. cap. 8.* Hic saltem quod addimus, posse fieri, ut quandoque crassæ partes præcipue abundant, qui humor tunc propriissime melancholicus appellatur, id quod sæpe in corporibus siccis, scabie sicca & similibus morbis ex humore melancholico laborantibus, accidit.

Frequenter vero multo sero diluitur, utpote quod simul à lienem attrahitur; & quidem tanto maiore copia, quanto humor melancholicus crassior est, & ut multum diluatur, necesse habet. Humor tamen ille crassus, multa aqua, seu sero dilutus etiam melancholiz nomine appellari potest: sicut & Hippocrates per aquam proculdubio humorem melancholicum intelligit.

Si quis verò è seroso humore peculiarem, & quartam

Dan. Sennerti Tom. II.

cacochymiz speciem constituere velit, cum eo non contendero. Etenim serosi humoris abundantia etiam sine humore crasso reperiri potest, ut in hydrope, & similibus morbis videre est. Carolo Pisoni equidem religioni est, plenitudinem, seu colluuiem serosam, aut aquam cacochymiam appellare, ea de causa, quod aqua pura puta, quæ non nutrit, succi, sive χυμῶν, alibilis scilicet substantiæ, nomen sibi vindicare non possit. Verum enim verò fallitur. Neque enim serum pura puta aqua est, ut postea dicitur: neque chymi nomen alibili saltem substantiæ competit, sed humorem tam nutriendum corpori aptum, quàm incommodum significat: unde & τὸ εὐχύμῳ & κακοχύμῳ nomina deducta, & cacochymiz nomine vitiosi humores alendo corpori inepti veniunt.

Quid autem serum sit, rectè explicandum est, de quo *Instit. lib. 2. p. 2. c. 7.* dictum. Carolus Piso puram putam aquam, seu aqueam humiditatem, sive cum cibo, & potu ingestam sive chyli partem aqueam serum esse dicit, idque ab ichore discernit, qui scilicet sit cuiusque coloris, & naturæ cum propriis humoribus. Verum etsi quandoque Autores has voces discernant, ut χυμὸς sit vel sanguis crudus & imperfectus, vel tenuior pars massæ sanguineæ corruptæ, & colliquatæ; ὀρρῖον verò seu serum ὀρχυμῶν τρεφῶν: tamen χυμὸς sæpe nomine seri, & serum nomine ichoris appellatur, & frequenter ista duo vocabula sunt synonyma, ut monstrat doctiss. Caspar Hoffmannus, in *Collect. de Ichorib. n. 12. & 13.* Qui idem non malè ichorem in mitem, & acrem distinguit, illumque sanguinem ab ἀραιῶν dilutiorem esse dicit, qualis in hepaticis conspicitur: acrem verò illud tenue, quod ex sanguinis, & humorum seu colliquatione, seu corruptione oritur. Ut ita tria sint, quæ nunc seri, nunc ichoris nomine veniunt: Primum illud aqueum, quod potui, & cibus inest; secundò sanguis aquosior, & dilutior; tertio tenuis humor, sed acrior, qui ex colliquatione, vel corruptione sanguinis, vel etiam ex prauis cibis, & mala coctione provenit.

Verum cum serum illud primum, seu pura pura aqua in corpore solum vix reperiat, neque symptomata, & morbi, quos Eugalenus, & Piso recensent, plurimi à pura puta aqua possint provenire, sed, quod ipse Piso, in *præfatione*, fatetur, serum inter decurrendum per vasa absterget, diluatque, & sibi necessariò immisceat partem aliquam ex iis ichoribus, qui in sanguine redundant, eamque sibi affusam secum deuehat, ac transportet, quocunque fertur: rectissime colluuii, & abundantiz seu serosæ, seu ichorosæ duo genera constituere licet, uti dictum: Vnum mitem, quod est sanguis aqueus, & dilutior; alterum acrem, & salum, quod suam acrimoniam ex humoribus seu colliquatis, seu corruptis, seu quacunque de causa salis, & acribus acquirit. Ut ita serum propriè dictum sit aquosus humor, salsedinis, & acrimoniz particeps; ut pluribus hæc de re, lib. 2. *Instit. part. 2. cap. 7.* dictum.

## CAPUT II.

## De Intemperie Lienis.

His ita de vsu lienis & natura humoris melancholici præmissis, iam ad morbos lienis accedimus. Etsi verò plurimi Medici lienis morbos quasi neglectos reliquerint; tamè multi etiam sunt; & non minora, quam in ipso epate, mala in toto corpore hinc originem habent.

Paritur nimirum lien morbos intemperiei, angustiam vasorum & obstructionem, morbos numeri, figuræ, magnitudinis, inflammationes, scirrhus, vulnera, vlcera. E symptomatibus verò, coctionem, & expulsionem læsam, dolorem, & insuper icteri nigri causa ad eum refertur. Etsi nicterus niger nō lienis propriè, sed totius corporis p. n. affectio, & coloris eius mutatio sit; tamen quia à lienem ortum habet, eius etiam hic mentionem faciemus.

Primo autem morbos intemperiei lienis quod attinet, etsi raro ab autoribus explicantur; tamè non negligendi sunt; cum procul dubio affectionis hypochondriacæ & plurium aliorum morborum origo ab intem-

perie

Quid sit seri & ichor.

An serum & ichor differant.

Serum quatuorplex.

Lien quos morbos patiatur.

Qua symptomata?

Lienis intemperies.

Asellij statentia.

An vasa à lienem prodeuntia nihil è ventriculo trahant?

De natura humoris melancholici.

De cacochymia serosa.

petie lienis pendeat. Lien autem laborat intemperie nunc calida, nunc frigida, nunc humida, nunc sicca, & quidem cum & sine materia; plerumque tamen cum materia. Nam etsi interdum intemperies lienis nuda etiam adesse possit; tamen vix sese prodat, nisi cum materia accedit, & quidem cum lien sanguinem crassorem generet, & excrementum melancholicum ibi proveniat, etiam melancholia & atra bilis plerumque in eo colligitur. Quandoque tamen etiam pituita è cruditate ventriculi genita ad eum transmittitur.

### Causse.

Causse.

Contrahit autem lien intemperiem à causis, à quibus epas intemperiem suam accipit, calefacientibus nimis, frigefacientibus, & humectantibus & siccantibus. Imprimis à cibo & potu & medicamentis hisce qualitatibus præditis, seu intus exhibitis seu extra appositis. Et imprimis, ut modo dictum, intemperie cum humore crasso & feculento, & melancholico atque atro corripitur, ob cibum qui chylum eiusmodi humori generando aptum suppeditat; vel vasorum obstructionem, ob quam non debito modo euacuatur. Si enim cibus ita comparatus sit, ut talem chylum suppeditet, qui plus quam par est, excrementi melancholici contineat, magna excrementi melancholici copia provenit, & plus, quam per vias consuetas euacuari possit. Vel etsi mediocri copia id generetur, si tamen viæ expurgando huic excremento dicatæ non pateant, id in liene subsistit, eique similem intemperiem imprimit.

Quales autem causæ sint, quæ ad excrementi huius generationem faciunt, de scorbutis c. 3. dicemus. Hic ut paucis rem complectar, lieni nocet aer crassus, & qui est circa paludes & stagna, & in locis subterraneis, cibi crassi & feculenti, terrestresque substantiæ, imprimis sale vel aceto conditi & fumo indurati; ut caro bubula vetus, hircina, ceruina, suilla, leporum vetulorum, anserum, anatum, pisces palustres, lacustres, maritimi grandiores, aëre vel fumo exiccati vel sale conditi, legumina, lentes, fabæ, pisca, mylium, panis non bene fermentatus, castanæ, fructus acerbi, cibi dulces, & melle ac saccharo valde conditi. Mustum item & vinum austerrum ac feculentum, ut cerevisiæ similes. Aquæ potus, & præcipue post motum & laborem nimium, imprimis impuræ & non limpidæ vel valde frigidæ, niualis, & quæ tempore æstivo niue refrigerata est. Ebrietas & pula. Animi etiam pathemata, imprimis timor & mœstitia continuata, ut & ira: quod quomodo fiat, consideratione dignum est, qua de re pauca ex Hippocratis

Bilis & infania sedes à Democrito quasita.

epistolis afferre libet. Cum Democritus Philosophus sapientissimus, omnium & imprimis sui oblitus videretur, & vigilans noctu & interdiu, singulæque parva & magna deridens ac pro nihilo reputans vitam traheret, Senatus Populusque Abderitanus, in huius viri salute suam urbem periclitaturam existimans, ad Hippocratem literas dedit, eumque rogavit, ut non solum Democritum, quem mente captum iri metuebant, sed & patriam suo consilio servaret. Venit Abdera Hippocrates, sed, ut ad Damagetum scribit, Democritum offendit non delirantem, sed omnino sapientem & quidem isto modo; Compositæ admodum librum supra genua habebat, & alij quidem utraque ex parte ei adiacebant. Crebra autem animalium cadauera per totum dissecta accumulata erant. Hic autem contemplato studio interdum scriptioni incumberebat, interdum multum subsistens & apud se anxie cogitans quiescebat; deinde non multo post his peractis exurgens deambulabat, & animalium viscera attentè adspiciebat, hisque depositis rursus desidebat. Quem cum Hippocrates allocutus esset, & data acceptæque salute quæsiuisset, quid scriberet: De infania, respondit. Hippocrates cū rursus rogasset, quid de infania scriberet; quidnam verò inquit, aliud, quā quid sit, quomodo hominibus innascatur, & qua ratione alleuetur. Hæc enim, inquit, quæ vides animantia

huius certè gratia refeco, minimè Dei opera odio prosequens, sed bilis naturam & sedem inquirens. Nosti enim, quod hæc ubi redundaret, ut plurimum hominibus infaniæ causa est. In omni quidem natura inest, sed in aliis equidem minus, in aliis copiosius. Huius autem *ἀνελπίστα* morbi existunt, velut materia partim quidem bona, partim verò mala subiecta.

Non verò crediderim, tantum Philosophum tanto animi studio, ut etiam à civibus suis pro infano haberetur, in bilis flauæ naturæ & sedē inquisivisse. Hæc enim omnibus ita obuia est, ut neminem facile latere possit, sed in illius naturæ & sedē, quæ melancholiæ & infaniæ causa est, humoris videlicet melancholici & atrii inquisiuit. Nam hic humor, ut ex Hippocrate modò dictum, est *ὁ ἄνθρωπος καὶ μὲν ὁ δὲ τὸν ἀνθρώπου, ὅτε μὲν φαντασθήναι*; quod tamen explicatione indiget. Etenim sanguis melancholicus & melancholicum & atrii excrementum specie differunt, & ab illo bona, ab hoc mala proficiuntur. Sanguis tamen melancholicus facile in atram bilem degenerat. Melancholicos n. ingeniosos esse, vulgatum est, & omnes, qui ingenio claruerunt, vel in studiis Philosophicis vel in Republica administranda, vel in carmine fingendo, vel in artibus exercendis, melancholicos omnes fuisse docet Aristoteles, *sect. 3. problem. 1.* Quod quomodo accipiendum sit, *lib. 4. Insit. par. 1. sect. 2. c. 2.* dictum. Si verò excrementum melancholicum & humor ater præternaturalisquæ abundet, multorum grauium morborum & symptomatum autor est, & vix alius humor est, qui plures & deteriores morbos ac symptomata exciter.

Ab hoc humore, ut infaniam, ira & iram, quæ furor brevis est, provenire statuimus, nō à bile flava, in vesicula fellis collecta: eoque circa lienem commoto. Cum n. in animi affectibus humores in corde primum agitentur, isque humorum motus arteriis communicetur; Lien verò arteriis plurimis abundet, vesicula fellis autem exiguum cum corde communionē habeat: manifestum est, illam agitationem humorum in animi affectibus magis in liene quam epate fieri. & ille ipse humor, qui in liene quasi feruor est, quod in humoribus reliquis feruorem excitat, si in animi affectibus moueatur, magnam in humoribus agitationem efficit. Et rem ita se habere, quilibet in seipso experiri potest, enim in ira humorum commotio in sinistro latere potius circa lienem, quam in dextro percipitur.

Non tamen solum ex rerum naturalium usu non conueniente lien male affici potest, sed & à corde & epate eius intemperies mutari, & ab iis humores vitiosi ipsi communicari possunt. Etenim cum lien multas arterias habeat, easque omnes à corde oriundas, si sanguis arteriosus se non bene habet, lien inde afficitur, atque hinc evenit, ut modò dictum, ut animi pathemata, imprimis timor, mœror & tristitia ac ira multorum morborum lienis causa esse possint. Epas quoque si non bene se habeat, per ramos venæ portæ facile aliquid mali Lienis communicare potest.

### Signa Diagnostica.

Lien etsi morbos multos pati possit; tamen cum sensu exiguo præditus sit, sæpe diu ibi latent, & demum, ubi iam incrementum sumperunt, & aliæ partes afficiuntur, patefiunt. Quapropter vitile est, signa, quibus Lienis morbi dignoscantur, diligenter perspicere & cognita habere. Idcirco etiam in genere aliquid de Lienis morbis cognoscendis, dicemus.

Cognoscuntur autem rectissime, ut alij affectus, suis causis, quas modò enumerauimus, quæ si præcesserint, & imprimis si in victu errores, à quibus humor melancholicus generari potest, commissi sint, Lienē affici indicio est.

Deinde idem arguunt effectus, ut actiones eius læsæ, de quibus postea in specie dicitur, ut & ea, quæ actiones eius læsas sequi solent, hinc inde in corpore symptomata & morbi.

In specie morbos intemperiei quod attinet, ex causarum, quæ

Quam b. quasitum Democritum

Melancholici ingenio.

Ira causa.

Cur animi pathemata lienis nocent.



quæ præcesserunt, naturâ imprimis ij patefunt. Si enim causa calefaciens præcellerit, similem intemperiem adesse indicio est; si frigida frigidam. Indicant & effectus, qualis sit Intemperies. Nam si Lien sit calidior adest sitis, lingua est sicciore, ardoris & caloris alicuius sensus in sinistro Hypochondrio percipitur; Lien nimis cito cibum & potum attrahit, rubor aliquis & φλόγῳσις, ac calor subito euanesces in facie, & præcipue in maxilla sinistra percipitur: cibi appetitus non est magnus.

Frigidam verò Intemperiem indicant multa murmuræ & rugitus, ructus & vomitus acidi.

Sicca Intemperies cognoscitur ex aliqua sinistri lateris duritie & vrina tenui.

Tandem à iuuantibus & nocentibus de Intemperie Lienis iudicare licet. Nam si calida fuerit Intemperies, à calidioribus cibis & potu, ac motu nimio læditur. Contra si frigida fuerit, frigida lædunt. Qui verò etiam vitiosos humores in liene cumularunt, ij si currant, vel vehementius exerceantur, dolorem sinistri hypochondrij percipiunt. Cumulatur verò plerumque in eo excrementum melancholicum. Qui enim in Liene sanguis crassior generatur, & ibi prouenit excrementum melancholicum, in eo facile cumulatur. Idque cognoscitur ex vrina tenui, si in eo subsistat, crassa verò & feculenta, si cum vrina excernatur. Et tandem incrementum summat, in totum corpus diffunditur, & multa mala generat, vt postea de obstructione Lienis dicetur.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Lienis morbi in initio facile sanatur: Verum si protrahantur, vt inde fiant obstructiones, vel tumores duri, difficulter curantur.

2. E Lienis morbis neglectis grauissima sequuntur mala, scabies, Melancholia, scorbutus, & plurima alia. Est enim viscus hoc etiam publicæ coctionis officina.

3. Lienis intemperies sine materia raro eo deueniunt, vt homini mortem inferant; nisi ita magnæ sint, vt eius actio plenè euertatur, quâ ablatâ vel diminutâ vel depravatâ, humor melancholicus & feculentus cumulatur & grauia inde mala excitantur.

4. Intemperies cum materia grauior est tardius curatur, cum humor melancholicus, qui plerumque peccat in liene, crassus sit, eiusque motus tardus, & inde pertinaces Lienis obstructiones & scirrhi incurabiles excitentur.

### Indicationes.

Indicationes.

Intemperies si sola sit sine materia indicat alterantia contraria; quæ verò cum materia est, simul humoris vitiosi euacuationem postulat; & cum humor Melancholicus plerumque in Liene colligatur, is præparandus & euacuandus est.

### Curatio.

Curatio  
Lienis in ge-  
nere.

In curatione autem Lienis in genere quædam obseruanda. 1. Cum Lien publicum officium gerat, & ipse etiam sanguinem gignat, eius robur est conseruandum, & propterea non nimis & solum relaxantia vsurpanda, sed moderatè adstringentia admiscenda, qualia sunt, absynthium, nardus & similia.

2. Valide adstringentium vsus nimis etiam vitandus: ne humores crassi Lienis impingantur.

3. Dulcia in morbis Lienis nec in cibo nec in potu conueniunt; & spleni ἀφέλιμα τὰ δριμέα & τὰ πικρά: τὰ δὲ γλυκεῖα φλάβει.

4. Nec acetum nec acida Lieni amica sunt & vt Hippocrates, 3. de rat. viñt. in acur. r. 3. o. habet, acida biliosis potius, quam melancholicis conueniunt, & melancholia, dum ab acido fermentatur, multiplicatur. Exaltat enim Melancholiam acetum.

4. Lien exiguum sensum habet, eiusque substantia est durior, & humor, qui in eo generatur, est crassior. Quapropter etiam actia satis, & fortiora medicamenta fert, quam Epar.

5. Cauendum tamen, ne vicinum epar à fortioribus medicamentis aliquid damni patiatur.

6. Quia meatus & vasa satis angusta habet Lien, ne ea obstruantur, omnia ea vitanda, quæ illa obstruere possunt.

7. Euacuatur autem Lien per hæmorrhoides; de quo de aff. hypochondriaca, part. 5. §. 1. cap. 1. dicitur, vomitu, cum per vas breue satis commoda via in ventriculum sit, per aluum, & per vrinas, vt ibidem dicitur, quæ videantur, ne idem bis repetere opus sit.

8. Et hoc notandum, si Lien per consensum à ventriculo, epate, corde, vel toto afficitur, curationem ad ista membra affecta præcipue dirigendam esse, & materiam, quæ ad Lienem confluit, aliò auertendam; & quæ iam influxit euacuandam esse. Et quia interdum à toto materia ad lienem confluit, etiam sanguis quandoque mitti potest. Et miratur Galenus, libro de curandi ratione per sangu. miss. cap. 16. quod antiqui in curando liene sanguinem mittere neglexerint; cum tamen ipse eiusmodi præsidium sæpe tutissimum expertus fuerit.

Medicamenta ergo Lieni accommodata sunt amara & nitrosa & aliquam acerbitem & adstrictionem coniunctam habentia. Qualia sunt

Radices & cortices. tamarisci capparum, scilla, filicis, polypodij, querni, asari, fraxini, raphani rusticani, cichorii, bugloss. scorzonera. Internâ.

Folia; Asplenii, vulgo scolopendrij & ceterach, quod omnibus ferè præfertur, chamæpithyos, chamædryos, agri-monia, centaur. minor, tamarisci, lingua ceruina, nasturtii aquatici, cochlearia, fumaria, bek abûge, absinthii, capill. ♀.

Flores. Genista, cichorii, borraginis.

Semina. Portulaca, viridis, plantaginis, genista, cichorii, passinaca syluestr. vrtice.

Fructus: Cappares.

Gummi; Ammoniacum.

Ex animalibus vt occulta qualitate iuuantia commendantur; Lien asini præparatus ad Drach. j. hadinus, hircinus, bubulus cum liquore conueniente datus. Non tamen quælibet ex his cuilibet morbo Lienis conueniunt. Sed cuilibet sua eligenda remedia, vt iam in specie dicitur.

Et quidem Intemperiem Lienis contrariis emendari notissimum est: at ipsa Intemperies per se purgationem non indicat, & si interdum in nuda intemperie purgantia exhibentur, id ideo fit, ne humores vitiosi è vicinis locis confluant, molemque augeant, vel alium in liene affectum excitent.

Intemperies  
Lienis Curatio.

Verum Intemperies Lienis raro sine materia in eo excitatur, & vix animaduertitur, antequam aliquam materiam sibi adsciscat, quod vbi factum, materia præparanda & per conuenientes vias euacuanda.

Commodissimè autem per hæmorrhoides euacuatur, vt etiam de aff. Hypochondriaca dicitur, si natura vel sponte eas aperiat, aut si hirudines illis applicentur.

Vt autem per aluum euacuatur, prius talis præparatio fieri potest, præcipue si caliditas adsit.

℞. Rad. cichor. polypod. querni an. Vnc. β. cortic. tamarisci, rad. cappar. an. Drach. ij. scolopendr. capill. ♀ an. M. j. flor. genist. borrag. bugloss. an. p. j. sem. portulac. Drach. j. agn. casti Drach. β. passul. Vnc. β. Coq. in aqua simpl.

Colatura dulcoretur pauillo sacchari. Vel addatur syrupi de pomis vel vini simplicis an. q. s.

Vel ℞. Aqua fumar. cichor. an. Vnc. iij. syr. byzant. l. de pomis an. Vnc. j. spiritus vitrioli ℥. j. vj. Misce.

Materia præparata per aluum euacuatur folijs senæ, Epithym. rad. gualapa, helleboro nigro, lapide Lazuli.

E Compositis vtilia sunt, syrup. de pomis Regiæ Sabor. & de pomis cum helleboro, pilul. tartarea, de ammoniaco. Syrupiè succo pomor. purgant. descriptio Cratonis hæc est.

*℞. Succ. pomor. dulc. borrag. meliss. an. ℥b. ℞. flor. borrag. viol. an. P. j. fol. senæ, epithymi, hellebori nigri prepar. an. Vnc. ℞. F. s. a. Syrupus, qui aromatizetur. cinamomi, caryophyll. croci, specierum aromat. rosat. diamosch. dulc. an. scrup. ℞.*

Dof. Vnc. iij. cum mann. Drach. vj. vel Vnc. j. & superbibatur infusculum gallina.

*Pilulas tartareas conficiendi ratio commodior.*

Pilulæ Tartareæ describuntur in pharm. rest. Quercetan. cap. 18. Mihi sic commodius fieri posse videntur.

*℞. Polypod. querni Vnc. ij. cortic. tamarisc. rad. capp. rad. bugloss. an. Vnc. ℞. passul. corinthiac. contusar. Vnc. j. ℞. myrobalan. indar. Vnc. j. flor. genist. M. ℞. sem. aquilegia, genist. an. Drach. ij.*

Infundantur in vase vitreo clauso in suffic. quant. aqua fumaria & scolopendr. raditâ salis ℥ j. Drach. j. Colatura. *℞. ℥b. ij. succi pomor. durat. ℥b. j.*

In iis in balneo Mar. per quattriduum digerantur vase clauso, cremor. *℥ Vnc. j. ℞. fol. senæ Vnc. ij. follicul. sen. Vnc. j. turbit. elect. Drach. vj. rad. gualape Vnc. ℞. hellebori nigri Vnc. j. ℞. myrrh. elect. Vnc. j. flor. cord. an. P. ij. epithym. Drach. vj. macis, cinam. caryophyll. an. Vnc. ℞.* Postea colentur & exprimentur.

Calatura in B. per diem adhuc digeratur, postea quod clarum est effundatur, cui adde aloes preparata Drach. iij. M.

Et coagulentur igne lento, sub finem adde spec. diarrh. abbat. laticifant. Galeni trochisc. de lacca de cappar. an. scrup. ij. croci Drach. j. Cremor. *℥ Vnc. ℞. salis folior. senæ, fraxini an. Drach. ℞. ol. anisi g. vj. citri g. ij. Misce.*

F. Massa. Si liber possunt acui extracto scammonij.

Plura huiusmodi medicamenta proponuntur capite sequente.

Tandem danda opera, vt reliquæ materiæ absumantur, & quod restat, insensibiliter discutiatur, aut sensim cum urina euacuetur.

Vtiles sunt hîc trochisci de capparibus, de Lacca & similes, qui vel in pilulas formari vel in puluerem redigi, & cum conueniente liquore exhiberi possunt.

Non solum autem interna medicamenta, sed & externa applicari possunt. Et quidem in externis medicamentis in interperie calida adhibendis notandum, omnia cum posca conficienda esse, vt facilius penetrent. Imò etiam in aliis Intemperiebus penetrationis gratia acetum admisceatur.

Ad reliquias materiæ absumendas vtilia sunt oleum de capparibus, nardinum, irinum, liliorum alborum, vnguentum, aggrippa, de archanita, emplastrum de Meliloto, diachylum iracutum, de quibus de tumoribus Lienis dicetur. Sunt etiam nonnulli, qui supra sinistrum Hypochondrium cucurbitam cum scarificatione & multâ flammâ applicant, vt de materia tenuius & flatulentum euocetur. Sed tutius est à tali scarificatione abstinere, & digerentibus modò propositis rem peragere.

#### Dieta.

*Dieta.*

Dieta medicamentis respondeat. Et quia plerumque humor Malancholicus abundat, aer crassus fugiendus, & puro ac claro vtendum. A cibis crudis, viscidis, salis, sale ac fumo conditis, vt dulcibus, abstinendum. Vinum sit purum, tenue, clarum, ac non admodum potens, vel cereuisia defecata. Animi affectus moderandi, & imprimis mæstitia, timor, ac ira fugienda, de quibus de scorbutto dicetur.

### C A P V T III.

*De Lienis morbis organicis & præcipue, obstructione.*

*Lienis morbi Organici.*

**V**ariis quoque morbis ex Organicorum numero Lien corripitur, & sæpissimè aliqua vel in figura,

vel magnitudine vel similibus variatio occurrit. Interdum enim bipartitus ferè totus deprehensus est Lien, vt obseruit Riolanus. Idem, vt lib. 2. *Antropogr. cap. 23.* refert. In quodam vidit Lienem exactè quadratum trium palmorum latitudine, & æquali longitudine, crassitie 4. digitos æquantem, & vndiquaque cartilaginosa substantia incrustatum. Geminos Lienes inuentos testatur Aristoteles, lib. 4. de gen. animal. cap. 4. & Gemma, *Cosmocris. lib. 1. cap. 6.* Ttes inuenit Fallopius, vt refert in obseru. *Anatom.* Contrà Lienem interdum planè defuisse obseruauit Hollerius, in obseru. lib. 5. Gibbæ lienis parti adipem instar candidissimi & clarissimi lapidis annatam fuisse obseruauit Vesalius, lib. 15. de corpor. hum. fabr. cap. 9. Lapides in Liene repertos fuisse refert Scholiographus Hollerij ad cap. 48. lib. 1. Fallopius in obseru. *Anatom.* Vesicam aquâ plenam duorum pugnorum magnitudine sub liene inuenit Coiter, vt refert in lib. obseru. *Anatom. & Chirurg.* Nonnunquam situm commutat cum epate, sed prodigiosa, vt refert Aristoteles, *histor. animal. lib. 2. cap. 13.* Ruptis ligamenti etiam visus fuit in muliere ad hypogastrium prolapsus supra vterum, qui per biennium molæ specie medicos fefellit. Tandem fato functâ agrâ tumoris illius causa patefacta fuit aperto cadanere, vt eodem loco Riolanus refert. In nobili viro eodem modo prolapsum Lienem ad hypogastrium annotauit Capreolus.

Verum cum isti morbi partim à prima conformatione sint: partim ita lateant, vt non nisi post mortem deprehendi possint, & omnes incurabiles sint, saltem eorū mentionem fecisse sufficiat. Eos verò qui & signis deprehendi possunt, & curationem aliquam suscipiunt, hic explicandos sumemus. Et primò de obstructione Lienis agemus. Etsi enim angustia vasorum in liene etiam à compressione, quæ fit à tumoribus, fieri possit: tamen de eo postea, vbi de tumoribus Lienis agemus, dicetur.

#### Causæ.

Causæ autem obstructionis vasorum Lienis sunt humores crassi, terrestres ac feculenti, & tartarei, vt hodie appellantur, & imprimis humor melancholicus. Generantur autem tales humores è cibo & potu, qualis capite præcedenti propositus est. Ad cumulandos hosce vitiosos in Liene humores faciunt consuetæ hæmorrhoidum vel mensium euacuationes suppressæ.

Vt autem facilius tales obstructiones excitentur, facit etiam Lienis caliditas, ob quam is chylum nondum satis in ventriculo coctum & elaboratum, vt & potum ad se trahit, de quo Hippocrates, lib. 4. de morbis: dum Lien ægrotat, inquit, vel humores spontè feruntur ad ipsum, vel trahit per venas, quas habet cum epate communes, vt etiam lib. 1. de morbis mulier. docet. Exercitatio quoque vehemens statim à cibo idem præstat, vt & decubitus continuus in latus sinistrum.

#### Signa Diagnostica.

Cognoscuntur Obstructiones Lienis è causis, quæ signa præcellerunt & effectis, iisque, quæ sequuntur. Nam si causæ, quæ antea enumeratæ sunt, præceserint, mali huius suspicionem præbent, quod postea confirmat ea, quæ sequuntur. In principio quidem solum grauitas quædam in sinistro hypochondrio percipitur, postea etiâ dolor aliquis, præsertim in cursu & concitatione ac lingua ambulatione, malo tandem incrementum sumente, cum nec crassior chyli pars ob vias obstructas à liene attrahi, nec melancholicum excrementum per conuenientes vias expurgari possit; & chylus crassior ac feculentus simul ad epat transit, vnde melancholicus sanguis generatur, & excrementum melancholicum ad epat deriuatur, arque hinc in totum corpus diffunditur: vnde totius corporis color floridus & narius in liuidum mutatur.

mutatur, corporis grauitas percipitur, spirandi difficultas excitatur, præsertim post exercitium vehemens, tussis sicca interdum adest, quandoque cordis palpitatio, scabies, affectio hyponchondriaca, canina appetentia & similia mala oriuntur.

Interdum humor ille Melancholicus ad ventriculum effunditur, vnde ructus acidi, humorumque acidorum vomitus sequitur, interdum etiam ad aluum effunditur, vnde diarrhoea & dysenteria excitatur, de quo Hippocrates, 6. aph. 43. qui Lienosi difficultate intestinorum corripiuntur, iis superuenientem dysenteriam longam aqua inter cutem & intestinorum læuitas excipit ac moriuntur. Vrina sæpe sanorum similis est, quæ si æger paulisper mouetur, crassa & obscura redditur, & interdum quasi sanguinea: aluus plerumque est adstrictior, & alia signa, quæ in hyponchriacis & scorbuticis adsunt, conspiciuntur.

### Prognosticæ.

Prognostica.

1. Affectus hic plerumque pertinax est & diuturnus, ob humoris, à quo pender, naturam.

2. In principio hoc malum curatu facilius est: si vero diutius protrahatur, difficilius curatur, & sæpe in scirrhum Lienis abit.

### Indicationes & Curatio.

Indicationes & Curatio.

Obstructio aperitionem indicat: aperitus autem obstructio, si humor, qui eam parit, è vasis illis amoueatur, quod fit per medicamenta attenuantia & incidentia, quibus & postea subiungenda euacuantia.

Medicamenta attenuantia & incidentia.

Vniuersalibus itaque pressis exhibeantur attenuantia & incidentia, non tamen nimium calefacientia, ne humore tenuiore discusso crassior relinquantur, ac malum grauius & pertinacius reddatur. Vtilia hic sunt medicamenta capite antecedenti proposita: vt & tartarum & ex eo parata medicamenta, cremor ☐, spiritus ☐ simplex & compositus, tartarum vitriolatum, medicamenta ex chalybe parata, vt:

℞. Cortic. rad. cappar. tamarisci, an. Vnc. β. rad. aperient. Drach. vj. bugloss. Drach. iij. Chamadr. ceterach, an. M. j. sem. agni casti Drach. j. flor. genista borrag. añ. M. β. Infundantur in vino, vel coq. in aqua pura. Colaturæ ℞. Vnc. x. syrup. borrag. Vnc. ij. oxymel. scillit. Vnc. j. Misce pro tribus dosibus.

Vel ℞. Rad. filicis, polypod. querni, cort. tamar. an Vnc. β. chamadryos M. j. passul. minor. Vnc. j. Coq. in aqua simpli. Colaturæ ℞. Vnc. x. syrupi de scolopendr. Vnc. iij. ☐ Glari scrup. j. Misce. Vel fiat talis syrupus.

℞. Rad. eryng. rubie tinctor. glycyrrh. polypod. querni. cort. tamarisci. rad. cappar. an. Vnc. β. rad. asari Drach. ij. ceterach. chamad. an. M. j. flor. genist. borrag. bugloss. an. M. β. cinamo. cortic. aurant. an. Drach. ij. passul. minor. Vnc. ij.

F. s. a. Syrupus, cuius Vnc. ij. cum aqua fumar. vel alia conueniente vel vino absinthij exhibeantur. Potest etiam oxymel scillitic. vel ☐ Glatus addi.

Efficacissimi etiam in obstructionibus tollendis sunt trochisci de capparibus, vt & trochisci de scolopendr. qui hoc modo parantur:

℞. Scolopendr. seu ceterach, hyssop. prassij fructus tamarisci, cortic. rad. cap. an. Drach. ij. sem. agni casti, ruta, gentiana, aristoloch. rotund. flor. genista an. Drach. j. β. ammoniaci aceto dissoluti. q. s.

F. Trochisci. Si humores calidi admixti sint tales fieri possunt.

℞. Sem. partulac. scarriola, agni casti, fructuum tamarisci, capill. ☐ scolopendr. an. Drach. ij. spec. diatrion. santal. cort. rad. cappar. an. Drach. j. β. Cum oxymel scyllitico vel aqua tamarisci in qua gummi aliquod dissolutum sit. F. Trochisci.

Vel ℞. Trochisc. de capparibus Drach. j. croci ☐ puluer. vel extract. gentian. an. scrup. j. extract. absinth. scrup. β.

Cum oxymel. scillit. F. Pilulæ mediocres.

Vetum cum ista paulò fortiora sint, & pleraque simul Purgantia. vrinam moueant, prius corpus expurgare cōuenit. Post leniter ergo aperientium vsum purgatio instituenda est, vt:

℞. Pil. tartar. scrup. j. extract. scammon. g. iij. F. Pilulæ mediocres.

Vel ℞. Pil. de fumar. ☐ earum an. scrup. j. de ammon. g. vj. extr. hellebor. nigri g. iij. F. Pilulæ mediocres.

℞. Radic. cichor. polypod. quern. filicis cortic. tamarisci an. Vnc. β. scolopendr. chamadryos prassij an. M. j. card. bened. centaurij minor. an. M. β. sem. genist. aquileg. an. Vnc. ij. glycyrrh. Vnc. β. passular. min. Vnc. ij. Coq. in aqua. In colatura infunde sol. sena elect. Vnc. ij. foll. sena Vnc. β. rad. gialap. hellebor. nigr. prapar. ana Drach. β. zingiber, zedoaria, cortic. citri an Drach. ij. flor. cordial. P. iij. Coq. in vase clauso. Colaturæ. Adde sacchar. q. s.

F. s. a. Syrupus liquidior, qui aromatisetur aquæ cinamomi Vnc. β. Dos. Vnc. ij.

Potest etiam euacuatio per vomitum institui, cum re- Vomitus. sta via sit à liene ad ventriculum per vas breue.

Euacuatione peractâ ad extenuantium & incidentium vsum, & præcipue trochiscorum, redeundum, quæ reliquias absument, & simul vrinam mouere possunt, cum lien etiam vtiliter per vrinam euacuetur, vt de affect. hyponchond. dicitur.

Exhiberi quoque potest pro morbi ratione theriacâ cum decocto vel aqua buglossi, quæ etiam vesicas, quæ lieni adnascuntur, absument.

Si his omnibus morbo non satisfiat, acidulas vel thermas æger vsurpet, vel chalybis vsum, qui pertinacissimas etiam lienis obstructions tollit, sese accingat, de quo de affect. hyponchondriaca dicitur, quæ huc transferri possunt.

Tandem etiam roborantia lienem, & quæ reliquias, quæ adsunt, humorum absument, vsurpanda, vt:

℞. Scolopendr. M. ij. hyssopi, chamadryos, roris marini, centaur. minor. an. M. j. cort. tamarisci, ligni sassafras an. Drach. ij. cortic. citri. Vnc. β. cinamom. maces, caryophyll. an. Vnc. ij.

Insuantur sacculo ex serico vel lnteo albo, & affund. vini mensuræ duæ.

Vel ℞. Chamadr. centaur. minor. ap. M. β. cortic. tamarisci Vnc. β. Affunde vini q. s.

Vel ℞. Conseru. borrag. cichor. flor. genist. an. Vnc. j. rad. condit. helenij. cort. citri condit. an. Vnc. β. pulu. cortic. tamarisci, cinamomi an. Drach. j. spica Drach. β. Cum syrupo borrag. F. Electuatum.

Si libet, potest chalybis præparati Vnc. β. addi.

Dum hæc ita exhibentur, topica simul adhibenda Topicis. sunt, vt:

Vt ℞. Rad. alth. cortic. tamarisci an. Vnc. β. scolopendr. marrubij, chamæpith. ruta an. M. j. flor. genist. chamam. sambuci añ. M. β.

Coq. in aqua & aceto, & decoctum cum spongia vel lnteo fomenti loco imponatur. Vel fiat ex iisdem cataplasma.

Laudantur & folia hyoscyami in aceto & oleo de capparibus cocta & fomenti loco imposita.

Post fomentum vnguentum vel emplastrum imponatur. vt:

℞. Flor. genist. M. iij.

Coq. in vase clauso & contundantur. Adde vnguenti dialth. Vnc. iij. ammoniac. aceto dissolut. Vnc. β. Misce.

℞. Flor. genist. Vnc. iij. butyri sine sale, axung. porci an. lb. β. cera parum. F. s. a. Vnguentum.

Vile est & oleum de capparibus, cheirinum, rutaceum, amygdal. amarar. Inprimis lienem extenuat ammoniacum aceto dissolutum.

Vel ℞. Mucilag. rad. alth. sem. lini, fenugrec. an. Vnc. j. vnguent. dialth. adipis gallinae an. Vnc. β. ol. de cappar. rutacei, cheirini an. Vnc. j. aceti rutacei Vnc. ij. Coq. ad acetisumptionem. Adde ammoniaci aceto dissolut. Dr. iij. Misce.

Diatra:

## Diata.

Diata.

Cibi omnes, qui obstructions lienis parere possunt, & supra enumerati sunt, crassi, viscosi, terrestres; pinguis, dulcia, ex lacte, & farina vitandi. Panis sit bene fermentatus. Cappares in frequenti usu sint. Cibi condiantur hyssopo, salvia, rosmarino, cinamomo, croco, sem. fœnic. & anisi; quibus & panis condiri potest. Sinapi etiam utile est, & beta ac raphanus, asparagus, petroselinum, asparagi lupuli salictarii, endiuia, cichorium. Acetum ad cibos condiendos, vel pro intinctu tale parari potest.

*℞. Aceti sextarios duos, summit. tamarisc. fœnic. an. q. v.*

Macerentur per triduum, & acetum colatum vsui seruetur.

Utile etiam est bibere à vase à tamarisco parato. Vel si tale desit, ligni tamarisci aliquid potui imponi debet.

## CAPVT VI.

## De Lienis Magnitudine vitiosa &amp; inflatione.

Lienis magnitudo vitiosa.

Quandoque etiam lienis magnitudo vitatur. Et quidem interdum à prima cōformatione lien magnus est. Interdum postea ob causas morificas talis euadit. Vesalius, lib. 5. de corpor. hum. fabr. cap. 9. refert, se in quodam suspensio, quid candidissimam & glabram cutem habebat, & sanus erat, adeo grandem inuenisse lienem, ut parum epari mole cederet. Scribit etiam Marcellus Donatus, de hist. med. mirab. lib. 6. cap. 8. se in nobili fœmina vidisse lienem adeo magnum, ut vniuersam abdominis spatium occuparet, quæ tamen plures liberos genuit. Columbus, ut lib. 15. Anat. refert, lienes adeo magnos vidit, ut viginti librar. pondus vnusquisque excederet. Refert quoque Schenckius, lib. 1. obs. historiam lienis, qui totum fere abdomen impleuit, ponderis librarum viginti trium.

Refert etiam Guilielmus Fabricius, cent. 2. obs. 45. in fœmina quadam (quæ sibi persuaserat, fœtum mortuum post partum alterius per menses 4. in utero remansisse, atque id eo, quodd in latere sinistro duritiem oblongam, atque ex inferiore parte rotundam percipiebat, caput infanti representantem, quæ ad illa vsque sese extendebat, comprehendebatque simul regionem vmbilici vna cum dextri lateris costis nothis; epar tantæ magnitudinis fuisse repertum, ut lobus stomachum versus sub costis sinistri lateris spurias transgrederetur. Splen quoque immensæ magnitudinis durus & inferiori parte versus illum rotundus, sanguine adusto plenus, hepatis lobo adnatus, conspiciebatur. Venæ eius, cum arteriis mesaraicis pollicis magnitudinem excedebant. Vas vero breue exiguum & obstructum erat.

Contra interdum planè paruus reperitur. Ita scribit Vidus Vidius, lib. 10. de curat. membratim, cap. 10. se vidisse lienem adeo exiguum, ut columbini oui magnitudinem non excederet, adeo durum & compactum ut fere lapidis duritiem imitaretur.

Verum cum talia vitia in prima conformatione contracta emendari non possint, de tribus saltem magnitudinis auctæ vitiiis, quæ curationem suscipiunt, dicemus.

De inflatione, inflammatione, & tumoribus frigidis ac scirrhis. Et primo inflationem quod attinet, cum lien substantiæ sit raræ & spongiosæ, interdum à flatu distenditur, & cum dolore sine vlla grauitate in tumorem tollitur, ac cū manu premitur, murmur intus percipitur.

## Causse.

Causse.

Generantur autem illi flatus ex usu ciborum flatulentorum, castanearum, fabarum, bulborum, mellis &

ciborum dulcium, atque aliorum flatulentorum. Aqua quoque, præsertim frigida, pota ad malum hoc inducendum facit. Humores tamen flatibus generandis apti in primis viis cumulati, etiam sine ciborum flatulentorum usu, malum hoc inducere possunt. Intemperies præterea frigida aëris ad flatus eiusmodi generandos facit.

## Signa Diagnostica.

Tumor & distensio quædam in sinistro hypochondrio percipitur, aque inde ortus dolor aliquis, sed sine vlla grauitatis aut pōderis sensu, ac lien compressus non nihil cedit, & murmur ibi auditur. Quandoque & ructus accidunt. Si à cibis flatulentis malum ortum habeat, id ex relatione ægri cognoscitur. Quod si nil tale præcesserit, ad humores vitiosos antea cumularos mali causa referenda.

## Prognosticum.

Cum flatus sit loco mobilis, facilius, quam alia lienis mala, inflatione eius curatur.

## Indicationes &amp; Curatio.

Flatus discutiendus est, & causa, à qua ille prouenit, tollenda. Euacuationes ergo, si opus sit, præmittendæ, postea flatus discutienda intus & extra adhibenda. Exhiberi etiam potest, decoctum flor. chamamel. veronice, in vino generoso, diacyminum, diaspoliticon, diacaminth. trochisc. de cappar. aqua Zedoara natim.

Vel *℞. Sem. agni casti, ammeos, api, cymini, aristol. rot. centaur. minor. cortic. radic. cappar. tamarisci partes aquales.*

Et cum vino vel aceto in quâ per noctem ammoniacum infusum fuerit. F. Trochisci.

Extra verò instituatursomentatio, ex cort. rad. cappar. flor. tamarisci, fol. ruta, calaminth. flor. chamamel. meliloti, sem. agni casti, anethi, cumini, baccis lauri in aqua & aceto coctis.

Postea instituatursunctio ex oleo rutaceo, irino, laurino, nardino, de capparibus.

Vel *℞. Fol. ruta, absinth. calaminth. an. M. B. rad. aristol. rot. gentian. iridis an. Vnc. B. flor. chamamel. melilot. geniste an. M. B. baccar. lauri Vnc. B.*

Coq. in vase duplici, in vini optimi part. ij. & ol. costini ac anethini p. i. ad vini consumptionem; oleum expressum vsui seruari potest.

Cucurbita quoque lienis regioni apposita flatus in eo discutit.

## CAPVT V.

## De Lienis inflammatione.

Et si lien, utpote qui crassiorem chyli partem attrahit, rarius phlemone corripitur: aliquando tamen hoc accidit, ut ex Galeno 6. de loc. affect. & 13. meth. med. atque ipsa experientia patet. Cum enim venæ arteriæ satis copiosæ in liene inueniantur, si eæ vel obstruantur ab humoribus calidis, vel si quis in regione lienis percussus sit, aut ex lapsu ed loci læsus, aut hæmorrhoides vel menses suppressi regurgitent, inflammatio inde excitari potest. Et eadem causæ, quæ epatis inflammationem, de qua postea dicitur, excitant, fere etiam in liene locum habent. Sanguis autem, qui inflammationem excitat, nunc purus est, nunc bilem, vel, quod plerumque fit, humorem melancholicum admixtum habet, ut Alexand. Trallianus, lib. 8. c. 10. docet.

## Signa Diagnostica.

Cum lien inflammatur, feruor, dolor & tumor in sinistro

Signa.

Prognostic.

Indicationes &amp; Curatio.

Lienis inflammatione.

Signa.



sinistro hypochondrio apparet. Et si vero ten sinister, ut dextro elatior, lien propinquus est; & propterea dolor sit in inflammatione renis sinistri, & inflammatione lienis valde similis est: tamen lien, ubi intumescit, versus anteriora magis protuberat & hominem mediū quasi cingit, & ut Alex. Trallianus habet, non solū ventrem & stomachum, sed etiam dextram hypochondriorum partem lienis tumor interdum occupat, atque aliis etiam signis lienis & renis sinistri inflammatio distinguuntur. Nam liene affecto pulsatio magis percipitur, ob arterias copiosas, quibus lien abundat; & appositae regioni lienis manu palpitatio quaedam percipitur. Febris adest continua, quartanae periodum plerumque obseruans. Difficultas respirandi sequitur ex diaphragmatis compressione. Pedes & genua interdum rubicunda apparent; nares autem & aures ex sanguine pallescunt.

Variant autem signa pro humoris varietate. Nam si sanguis solā copiam peccet, dolor & tensio vehementer vrget, cum magna grauitate. Si bilis admista sit, urinae sunt colorationes, rubrae & acres, sitis vrget, os est amarum cibi fastidium, vigiliae oriuntur, quandoque aegri delirant, febrisque tertio die magis affligit. Si sit admista pituita, color est pallidus, aeger non admodum sitit, dolor est mitior, febrisque quotidie affligit. Si humor melancholicus (quod plerumque fit) admixtus sit, durities maior est, color corporis est nigrior, urina etiam nigricat; adestque mœstitia, & alia humoris melancholici signa. Plura videantur de his apud Alexand. Trallianum, lib. 17. cap. 16.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Inflammatio lienis quidem rarior est: si tamen eueniat, diligenter curanda, cum facile in scirrhum abeat, & multorum malorum causa esse possit.
2. Inflammatio à sanguine minus periculosa est, quam quæ bilem, aut melancholiam admixtam habet.
3. Inflammatio, quæ totum lienem occupat, mala, & quo durior, eò peior est.
4. Inflammationem epatis in lienem conuerti melius est, quam si lienis ad epar conuertatur.
5. Ex nare sinistra sanguinis profluuium vel alui fluxus si in die critico accidunt, & signa coctionis præciserint, bonum.
6. Soluitur lienis inflammatio, vel quia discutitur, vel aliò transfertur, vel hæmorrhagiâ narium aut urinae profluuium aut alui fluxu sanatur, vel in pus mutatur, vel indurefcit.

#### Indicationes.

Indicationes.

Quæ in aliis inflammationibus indicationes dantur, & hic locum habent. Sanguis nimirum à liene reuellendus, & auertendus, repellendus, deriuandus, quod influxit, discutendum, ipsaque intemperies calida alteranda.

#### Curatio.

Curatio.

Statim igitur ab initio vena in sinistro cubitu aperienda. Ipsa etiam vena in talo, præsertim si à suppressâ aliqua sanguinis euacuatione malum ortum habeat, tandem etiam deriuationis gratiâ hæmorrhoides aperiri possunt.

Plurimum saluatellæ sectionem in affectibus lienis, & præcipue eius inflammatione commendant. Verum nōdum monstratum, cur cæteris præferenda sit, de quare de *Febribus*, lib. 2. cap. 20. dictum, quæ huc referantur.

Postquam vena secta est, statim repellens aliquo lienis regioni apponendum, sed non valde frigidum & adstringens: ne humor condensetur, aut lien magis impingatur & is induretur, sed aliquid ex incidentibus admiscendum, quale est acetum. Inungatur quoque & fo-

ueatur lien in principio oleo rosaceo & aceto mistis.

Vel ℥. Ol. rosar. cydonior. an. Vnc. j. vini austeri lb. v. aceti Vnc. j. Et cum lana imponatur.

Postea humores præparandi & euacuandi sunt, ne à vicinis locis ad lienem confluant, de quo antea de intemperie lienis cum materia dictum.

℥. Rad. taraxac. Vnc. j. cichor. polypod. querni an. Vnc. ℥. fumar. scolopendr. an. M. v. flor. borrag. bugloss. an. P. j. passular. Vnc. ℥. Coq. in aqua hordei. Colaturæ ℥. Vnc. ix. Adde oxyfach. simpl. syr byz. ant. simpl. an. Vnc. j. ℥. misce pro tribus dosibus.

Vel ℥. Aq. fumar. cichor. an. Vnc. iij. syr. violar. oxyfach. simpl. fumar. an. Drach. vj. Misce.

Postea purgatio instituatur cum elect. lenit. simpl. vel diacatholico cum syr. rosar. solutiuo.

Vel ℥. Rad. taraxac. Vnc. ℥. endiuia, fumar. flor. cichor. borrag. violar. an. P. j. fol. sene elect. Vnc. ℥. rhubarb. Drach. j. spica Scrup. ℥. cinamom. Drach. ℥. passular. Vnc. ℥. Infund. in aqua simpl. Colaturæ ℥. Vnc. iij. elect. diacathol. vel de succo rosar. Drach. iij. syr. de cichor. cum rhubarb. Drach. vj. cremoris ☿ Scrup. ℥.

Purgatio verò semper pro peccantis humoris natura instituenda, de quo de intemperiebus lienis dictum. A purgatione potus largior non dandus, sed potius sitis ferenda, ne humor ad substantiam epatis feratur.

Deinde imponatur tale cataplasma.

℥. Far. bord. fabar. pulu. rosar. rubr. cham amel. absinth. an. Vnc. ℥. Cum oleo rosar. & exiguo croci. F. Cataplasma.

Et si caliditas maior sit, addatur succus portulacæ.

Hinc, & ubi feruor remisit, resoluentia repellentibus addenda.

Ol. rosar. Vnc. ij. chamamel. lilior. albor. de capparibus an. Vnc. j. Misce.

℥. Flor. chamam. abrotani, meliloti, lilior albor. Coq. ad mollitiem, addatur oleum rosarum & fiat cataplasma.

℥. Farin. bord. fabar. sem. lini, pulu. flor. chamam. absinth. abrotani an. Vnc. ℥. Coq. in f. q. aquæ & aceti. Add. ol. de capparibus Vnc. ij. F. Cataplasma.

Tandem in statu ac declinatione solis resoluentibus vtendum, ceterach. schœnanth. flor. genist. chamamel. meliloti, puleg. absinth. origano. Cauendum autem ne nimis discutientibus tenuior pars discutatur, & crassior relinquantur, ac tumor induretur. Itaque si iudicationis metus sit, id quod cognoscitur ex eo, quod dolor & calor remittunt, durities verò remanet, imò augeatur, tale cataplasma applicetur.

℥. Farin. sem. lini, fenugrac. bord. an. Vnc. j. caricar. aceto macerat. num. vj. adip. anser. ol. lilior. albor. de capparibus an. q. s. F. Cataplasma.

Ad reliquias autem materiæ absorbendas medicamenta de obstructione lienis proposita vsurpanda.

Si tandem, quod tamen rarius accidit, ad suppurationem tendat inflammatio, id quod ex dolore maiori & horrore cognoscitur, & ea præcaueri non potest, adiuuanda, ne plures partes putrescant. Ergo:

℥. Pulu. rad. alth. Vnc. j. farin. bord. sem. lini fenugrac. tritici an. Vnc. ℥. ficum nati. iij. Coq. Add. ol. lilior. albor. Vnc. j. ℥. F. Cataplasma.

Vel imponatur emplastrum diachylon. Post vlceris apertionem id detergendum, & postea consolidandum, ut de inflammatione epatis dictum.

#### Diaeta.

Aeger in aëre temperato degat, & victu qui in aliis Diæt. viscerum inflammationibus conuenit vtatur. Abstinere in principio à vino, in declinatione tamen aquosum concedi potest.

## CAPVT VI.

## De scirrho, &amp; duris lienis tumoribus.

Schirrus lie-  
nis.

Requenter verò lien, vipote qui crassiores sanguinem conficit, & eo nutritur, tumore duro siue scirrho corripitur, & quid id patiuntur, σκληρυνει seu lienosi nominantur. Et si n. σκληρυνει in genere nominari possunt omnes, qui liene laborant: in specie tamen veteres eos lienosos appellarunt, quibus lien à copia humorum melancholicorum & crassorum infartus est, & imprimis, quibus lien ex humorum infartu induruit. Estque scirrhus lienis tumor eius durus, ab humore crasso & indurato ortum habens.

## Causse.

Causse.

Causa autem istius tumoris est, crassus humor in liene cumulus ac retentus & induratus, plerumque melancholicus, quandoque tamen etiam pituitam admixtam habens, & vt chymici hodie appellant vno nomine, tartareus. Melancholicus generatur ob prauum & crassum, ad succum melancholicum generandum aptum cibum; labores, vigilias, curas, quæ spirituosam humorum partem absumere solent, & crassam relinquere, febres ite diuturnas, vel ipsius lienis vitiū, qui ob debilitatē recte concoquere vel crassum expellere nequit. Vnde fit, vt crassi & excrementitij humores in liene subsistant, eum obstruant & tandem tumorem pariant, in eoque indurentur. Pituitosi humores cumulantur in iis, qui è frigidis & diuturnis morbis non integrè euaserunt, qui in palustribus locis degunt, de quibus Hipp. in lib. de aëre, aquis & locis: qui aquas bibunt palustres & stabiles, iis lienēs magni fiunt & pleni, ac ventres duri, quod etiam accidit iis, qui in febribus, vbi sitis vrget, aquam auidius bibunt. Fit autem hic tumor durus, quando tenuiores humorum partes exsiccantur & absumuntur, crassæ verò remanent & indurantur. Mercatus quidem duobus modis duritiem hanc quasi lapideam contrahi statuit, cum scilicet vel tenuior humorum pars exhalat, crassior verò relinquitur; vel dum ipse humor crassior fit & veluti congelatur ob frigiditatem.

Verum non credibile est, in corpore humano tantam posse esse frigiditatem, quæ humorem congelare possit. Itaque vel prima causa solum admittenda, quæ tantò facilius duritiem inducere valet, si ipse humor natura sua crassior est, vel alterum etiam fieri potest, si in ipso humore ad duritiem contrahendam, dispositio concurrat, quæ nil aliud est, quam vis illa lapidescendi humorum tartareo & crasso natia & propria.

## Differentia.

Differentia.

Differunt autem humores, primò; quia alius est incipiens, alius inueteratus; atque ille est cum sensu, hic sine sensu. Secundò quod alius est in toto liene, alius in aliqua eius parte; & aliquando intumescit lien secundum longitudinem, vt teres quasi rediatur, aliquando secundum altitudinem; aliquando totus secundum omnes dimensiones.

## Signa Diagnostica.

Signa.

In tumore duro & scirrho Lienis tactu manifestè tumor & durities Lienis deprehenditur, sicut & Leno ille Cappadox, in Plauti Curculione act. 2. conqueritur:

Nunc iam quasi rona Liene cinctus ambulo,

Geminis in ventre habere videor filios.

Nihil metuo, nisi ne medius disrumpar miser.

Et si inueteratus sit & confirmatus tumor, nullus, etsi digitis fortius comprimatur, dolor percipitur, color in facie est liuidus & quasi plumbeus, & vt ex Hipp. de locis in homine & Galeno 2. de nat. facult. cap. 9. dici solet, quibus corpus floret, his lien diminuitur, & contra, qui-

bus Lien magnus & tumidus est, sis corpus imminuitur, & cacochymicum & malè coloratum redditur. Vnde comparatio illa Lienis fisco Regio olim à Traiano vsurpata profecta est, vt refert Dion, quia sicut cum fisco Regio crescente singulorum priuata opes imminuuntur, sic amplificato Liene priuata opes singularum partium corporis decrescere dicuntur. Vbi tamen notandum, hoc magnitudine Lienis præternaturali solum accipiendum esse. Nam vt supra cap. 3. dictum, inuentus est Lien satis magnus in quibusdam sanis, & qui corpore fuerit florido. Et si officium suum sanguinificationis rectè peragat, corpori reliquo, etsi magnus sit, nihil dāni affert. Verum si præter naturam humoribus vitiosis repletus intumescat, officiū suum facere rectè non potest: vnde vitiosi & melancholici humores circa Lienem primò cumulantur, & deinde in totum corpus diffunduntur, vnde illud floridum & naturalem suum colorem amittit, & bono alimento destitutum contabescit. Adest præter ea quædam spirandi difficultas, & sensus ponderis iugulum sinistrum quasi infra trahentis. Si ventriculus repleatur, potò imprimis aquoso liquore, statim angustia circa lienem percipitur, plerumque etiam pedes inflantur, & vlcera in cruribus curatu difficilia excitantur, & alia sæpe Symptomata accidunt, quæ de scorbutis sunt enumerata.

Etsi verò, vt supra dictum, & tumor flatuosus quandoque Lienem corripiat: tamen ex modo dictis, & supra cap. 3. de inflatione Lienis propofitis signis hæc duo tumorum genera facile discernuntur. Nam in scirrholo tumore maior grauitas, quā in flatuoso. Flatuosus quoque tumor compressus cedit, scirrholus non cedit: flatuosus compressus murmur & sonum edit, qualis in scirrholo non percipitur. Quamuis verò ab humore melancholico plerumque sit hic tumor: si tamen Pituita admixta sit, cognoscitur id ex cachexia pituitosa totius corporis.

## Prognostica.

Prognostica.

1. Quidam splenetici nihil à pharmacorum vsu utilitatis percipiunt, neque à reliqua curatione, quanquam gracilior ipsis splen euadit: sed quæ adhibentur, à magnitudine morbi superantur; progressu verò temporis aliquibus in hydropē morbus degenerat & intereunt; aliquibus splen suppuratur, & vlti restituntur; cum quibusdam verò consenescit durus & magnus existens, & diuturna est affectio, non tamen lethalis, Hipp. lib. de affect. §. 20. Omnis enim scirrhus confirmatus cum lienis, tum aliarum partium, est incurabilis. Nondum verò inueteratus, curari quidem potest, sed difficulter.

2. In Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bonum est, 6. aph. 48.

3. Qui Lienosi difficultate intestinorum corripuntur, eos superueniente longā Dysenteria aqua inter cutē ac leuitas intestinorum excipit, & moriuntur, ibid. aph. 43. Nimirum, vt Galenus explicat, quibus longo tempore lien induruit; iis superueniens dysenteria malum soluit ratione translationis & euacuationis humorum crassorum Melancholicorum qui in Liene infixi erant: si tamen immoderatio sit dysenteria, labefactatis prauorum humorum trāsitu intestinis cum vires ipsorum, tum calidi innati συμψύγία in venis & visceribus perit, vnde Hydrops & Lienteria sequitur.

4. Melancholicum morbum incipientem hæmorrhoids plerumque prohibet, & iam effectum remouet, immoderatum etiam Lienem sanat, Galenus, 6. Epid. com. 6. aph. 8.

In scirrholo Lienis inueterato, si epar non trahatur in consensum, homo diutius superesse potest, scribitque Forestus, se matronam nouisse, quæ 30. annos dolore Lienis laborauit, & tamen consuetas functiones sine dolore obierat.

Indicatio.

## Indicationes.

Indicationes.

Tumor hic, quia durus & frigidus est, postquam toto corpori prospectum, emollientibus & calefacientibus curandus, ut Galenus, 2. ad Glaucon. cap. 4. docet ideoque adhibenda medicamenta, quæ calorem habent rapidum, humiditatemque mediocrem.

Vehementer enim calefacientia & exiccantia tenuioribus partibus discussis, id quod remanet, tanquam lapidosam concretionem relinquunt, teste Galeno 14. meth. med. cap. 4.

## Curatio.

Curatio.

Vniuersalibus igitur, de quibus supra de Intemperibus Lienis dictum, præmissis, ubi curationis spes superest, emollientia, attenuantia & aperientia medicamenta paulò valentiora usurpanda, quæ tamen citra insignem caliditatem id præstent, ne dissipata tenuiore parte crassus humor vehementius aduratur.

Talia sunt amara præcipue, quibus vehiculi loco & penetrationis gratia acetum & oxymel addi potest de quo Galenus, 13. meth. med. cap. 17. & 14. meth. med. cap. 5. & 2. ad Glaucon. cap. 5.

Quibus adhibitis per interualla purgantia intericienda, quæ præcipue vtilia sunt folia senæ, heleborus niger & eius extractum, extractum panchymagogum, quibus chymici & ium dulcem, ut & vitæ gr. aliquot admiscere solent.

Conueniunt ergo hæc ea, quæ supra de obstructione Lienis sunt proposita, quæ etiam incipientes dures Lienis tumores sanant.

Et quidem alia sunt calida, ut chamædrys, chamæpithys, ceterach, thymus, epithymus, fumaria, agnus castus, lupulus, centaur. min, calaminth. rad. aperientes, filicis, cuius radicis magna & peculiaris in affectibus Lienis est efficacia, rad. polypod. sem. genist. cortices & fructus capparum, cortices tamarisci, fraxini, sambuci, scylla, ammoniacum, bdellium, galbanum.

Alia frigida vel temperata, ut cichoracea omnia, sem. 4. frigid. maior. & minor. flor. borragin. bugloss. capill. & lingua ceruina.

E quibus varia sunt medicamenta.

E compositis sunt: syrup. de scolopendr. byzant. f. & compos. syrup. de fumar. cochlear trochisci de capparibus, de eupatorio, de scolopendrio.

Extra applicantur ol. lilior. alb. sambucin. de cappar. amygdal. amar. rutæ. nardinum, vnguent. dialth. Agrippæ, de arantia, empl. diachyl. de meliloto.

Præmissa ergo primarum viarum euacuatione talis potus præparetur.

℞. Radic. aperientium aceto maceratar. an. Drach. ij. cichor. polypod. quern. an. Vnc. β. cortic. rad. cappar. tamarisc. an. Drach. iij. flor. genist. borrag. bugl. an. P. j. sem. anisi, agnicasti, melonum an. Drach. ij. passular. maior. exacinar. Vnc. j. ficuum num. iv.

Coq. in aq. chalybeata. Colaturæ ℞. lb. j. syr. byzant. f. de scolopendr. oxyfacchar. compos. an. Vnc. j.

F. Potus pro 4. dosibus.

Hinc paretur talis purgatio.

℞. Rad. filicis polypod. an. Vnc. β. ceterach. M. j. chamædrys M. β. fol. senæ elect. Vnc. j. β. helebor. nigri præp. Vnc. j. galang. cortic. citri. sem. feniculi an. β. ij.

Infundantur in sufficiente quantitate aquæ simpl.

Colaturæ ℞. Vnc. x. syrup. de scolopendr. de quinque radicibus an. β. j. β.

F. Potus pro 3. vel 4. dosibus.

Vel usurpentur Pilul. ex supra descriptæ.

Vel ℞. Ammoniaci aceto dissoluti & percolati Drach. j. aloës ros. Drach. ij. pil. de tribus Drach. j. salis absinth. fra-xini an. scrup. j. ol. anisi gr. iij.

Dan. Sennerti Tom. II.

F. Massa, detur scrup. i. vel scrup. ii.

Hinc prior aperiens potio repetatur, vel talis exhibetur.

℞. Decocti aperientis maioris Vnc. iij. oxymel. heleborar. Vnc. ij. syrupi de scolopendr. Vnc. j. β. aqu. cinamomi. Drach. ij. spiritus salis scrup. β. vel spir. compos. scrup. j.

Misce pro 3. dosibus.

Vel exhibeatur trochisci de capparibus & scolopendrio supra propositi:

Forestus hoc arcanum sui. Præceptoris Benedicti Faurentini esse scribit:

℞. Rad. filic. Vnc. j. cuscuta Drach. ij.

Coqu. in vini potentis Vnc. viij. ad tertiæ partis consumptionem. Colatura propinetur.

Vel ℞. Conserv. fumar. chamæpithys, cochlear. borrag. bugloss. f. genistæ an. Vnc. j. rad. condit. pimpinell. Vnc. β. trochisc. de capparibus. Drach. j. spec. diarrh. abbat. scrup. j. Cum syrupo byzant. f.

Fiat Electuarium, de quo mane & vesperi detur Vnc. β. vel Dr. vj.

Efficacissimum etiam est remedium decoctum Ligni tamarisci, eo modo paratum & exhibitum, quo decoctura ligni Guaiaci parari & exhiberi solet.

Vt ℞. Rad. vel ligni tamarisci lb. j.

Coqu. ad consumptionem dimidiæ partis, cui & allia lieni accommodata addi possunt.

Efficacius autem erit medicamentum, si in aqua chalybeata coquatur.

Est & valde vtilis Oxyfacchara scillitica hæc:

℞. Cort. rad. cappar. Drach. vj. tamarisc. Vnc. β. spicæ, asari, scænanth. an. Drach. j. scolopendr. sem. anisi, feniculi. cumini, roris marini an. Drach. β.

Infundantur aliquot diebus in aceti scyllitici lb. β. vel suffic. quant. Deinde colentur.

Colaturæ adde sacch. albiss. q. f.

Coqu. ad syrupi consistentiam.

Veteres ut peculiari proprietate iuuans commendauerunt splenem asini sylvestris & equi ac epar lupi, quæ puluerisata dentur ad Drach. j. cum liquore conueniente.

Galenus, 9. de comp. med. secundum loca cap. 2. ut & Aërius ex Asclepiade, qui id primum porcellis per triduum exhibuit, & dissectum postea sine liene inuenisse dixit, hoc repetunt.

℞. Tamarisci Drach. ij. piper. albi spic. nard. ammoniaci thymiamatis scolopendr. an. Drach. j.

Arida tundantur & cribrentur, ammoniacum aceto dissoluatur, reliquisque addatur, & trochisci formantur, quorum dosis Drach. j. cum oxymelite vel aliquo liquore.

Et habet Galenus allegato loco plurima alia ex antiquis medicamenta huic affectui accommodata, quæ ibi videri possunt.

Vtilis est & succus alij sylvestris, cum decocto aliquo splenetico. Radicem quoque filicis peculiari proprietate affectibus Lienis prodesse supra diximus.

Commendatur etiam ad Lienis affectus Galyopsis f. Lamium, cuius puluis cum cibo datur. Celsus, lib. 4. cap. 9. pro minuendo Liene dat ieiuno absynthij decoctum, post cibum verò aquam, in qua candens ferrum subinde est extinctum: ita enim coerceri Lienem, quod animaduersum sit in animalibus quæ apud fabros ferrarios educata exiguos lienes habent. Et omnino ferrum ac chalybs in obstructionibus & tumoribus duris Lienis magnæ efficaciz est, qui ab ipso viscere humores crassos potentet abstergit. Ideoque reliquis medicamentis, quæ vim habent Melancholicos & crassos humores purgandi, & duriem Lienis emolliendi admiscendus de quo de affect. Hypochondriac. dicitur. Exhibetur verò variis modis, ut ibidem dicitur. Potest v. g. eius vncia una cum cinamomi Drach. iij. in vini lb. j. infundi & vinum exhiberi.

MM M m

Vel

Vel 2℥. Rad. polypod. quern. ficilis, corr. rad. cappar. an. Vnc. j. β. ceterach, chamadryos an. M. β. Coq. inf. q. aqu. simpl. Colaturæ 2℥. ℥. j. Mellis vel sacch. Drach. iv. chalybis prepar. Vnc. j. F. Syrupus. Vel paretur tale Electuarium.

2℥. Cortic. tamarisc. rad. cappar. rad. glycyrrh. sem. cruce, agni casti, ceterach, sem. endin. an. Drach. j. croci Drach. β.

Pulueris. subtilissimè; puluerisatis adde chalybis prep. Vnc. ij. Cum melle vel saccharo vel syrupo de scolopendr. F. Electuarium, cuius dosis Vnc. β.

Si libet hoc Electuarium parare ut simul purget :

2℥. Fol. sena elect. Vnc. iij. epithym. polypod. quern. an. Vnc. j. hellebor. nigri Vnc. β. cortic. citri, sem. fenic. caryoph. an. Vnc. flor. borrag. bugloss. genist. an. M. β. Coqu. in f. q. aqua. Colaturæ add. sacch. q. s.

Coqu. ad syrapi consistentiam, cui addantur species modo dicta, & F. Electuarium.

Electuaria etiam tria chalybeata extant apud Vid. Vidium de curatione membratim, lib. 10. cap. 11. quorum præparandi ratio hæc est.

1. 2℥. Pip. zinzib. an. Drach. iij. cardamomi, caryophyllorum, doricorum croci an. Drach. ij. tamaricis rad. capparum an. Vnc. β. sem. anisi basilici. an. Drach. j. marrubij asplenij utriusque in tenuem puluerem redacti an. Vnc. β. scobis chalybis tenuissima preparata ex aceto Vnc. x. mellis despumati lib. iij.

Misceantur omnia simul, antea diligentissimè confusa, conficiatur Electuarium, cuius 4. vel 5. drachmæ per integrum mensem quolibet mane ieiuno stomacho assumendæ.

2. Huic simile est (licet adhuc validius) quod

2℥. Betonic. Vnc. viij. croci Drach. iij. mastiches scobis eboris glycyrrhizæ sem. fenigraci, anisi, feniculi cimini fileris montani melanthij apij, urtica, lactuca, fol. capill. ♀. marrubij asplenij an. Vnc. j. tamaricis sem. portulacæ nuc. moschat. cinamomi, zingib. caryophyll. an. Vnc. β. sem. lini ammoniaci an. Drach. j. eupatorij Vnc. β. spica nardi Drach. ij. scabianth. Drach. j. scobis chalybis tenuissima prep. ℥. j. mell. despumati q. s.

Terantur terenda subtiliss. & cum melle misceantur, & fiat. f. a. Electuarium, eadem ratione, qua præcedens exhibendum.

3. 2℥. Consrad. apij Vnc. j. scolopendr. Vnc. ij. trochisc. de capparib. de agno casto an. Dr. j. β. specier. diarib. abb. diacurcuma an. Drach. ij.

Terantur diligentiss. quæ teri possunt, ac simul misceantur, & cum serapio ex scolopendrio fiat Electuarium, cuius æger capiat quolibet mane quatuor horis ante cibum Drach. iij. vel iij. & superbibat aliquid aqu. cuscute vel scolopendr. aut calamith. vel etiam vini albi odorati, in quo ignita chalybis lamina sæpius fuerint extincta.

Externa medicamenta sint mixta ex emollientibus & digerentibus, vel emollientia digerentia per vices adhibeantur, ne partibus tenuibus discussis & crassis reliquis tumor durior reddatur.

Primò nimirum adhibeantur emollientia, post emollientia vsurpentur digerentia, hinc iterum emollientia, post rursam digerentia.

Emolliunt, Althea, malua, lily radix, sem. lini, carica.

Digerunt hic & attenuant. flores chamamel. melilot. genist. sem. agni casti, cortic. rad. cappar. tamarisc. rad. asari cyclamini, folia ruta, ceterach, sem. sinapi, myrrha, & alia huiusmodi Lienis dicata.

Utilia sunt & ammoniacum, bdellium galbanum, Emplastrum diachylum simplex, Ireatum & compositum de meliloto, oleum lilior. albor. de cappar. amygdal. dulc. & amarar. adipei & medulla. ut :

2℥. Fol. & rad. altheæ, rad. bryonia, cortic. rad. capparum, tamarisc. an. Vnc. j. ceterach, flor. genist. an. M. j. sem. agni casti Vnc. β.

Coqu. in q. s. aquæ & aceti, & decoctum calidum cum

lanâ, aut spongia lienis regioni applicetur.

Forestus, lib. 10. obs. 8. hoc vitur.

2℥. Olei cappar. lil. alb. butyr. sine sale recentis an. Vnc. β. succi bryō cyclam. an. Drach. v. Coqu. ad succorum consumptionem. Postea addantur ammoniaci aceto dissoluti Drach. ij. β. pinguedinis gallina, medulla crurum vituli, æsopi humide an. Vnc. β. pulu. corr. rad. cappar. tamarisc. ceterach, radic. filicis an. Drach. β. semin. geniste, agni casti an. scrup. j. cera parum. F. Vnguentum.

Efficacissimum medicamentum paratur ex succo flor. sambuci misto cum decocto maluæ & oxycrato.

Vel 2℥. Vnguent. dialth. succi summit. sambuci an. Vnc. j. ol. de cappar. Vnc. β. cera parum.

F. Vnguentum.

Vel 2℥. Ol. lilior. albor. amygdal. amarar. de cappar. ruta, chamem. vini albi an. Vnc. iij. pulu. rad. alth. malua, filicis an. Vnc. β.

Coqu. ad vini consumptionem & coleantur cum forti expressione.

Colaturæ adde aceti Vnc. j. β. pulu. rad. cyclam. bryonia, Nicotiana, an. Drach. ij.

Coqu. ad aceti consumptionem, iterumque coleantur & exprimantur. Tandem addatur ammoniaci & bdellij aceto dissoluti, an. Drach. ij. F. Vnguentum.

Vel 2℥. chamamel. Vnc. β. de cappar. Drach. vj. ruta Dr. ij. medulla crurum vituli Dr. iij. croci scrup. β. aceti Drach. ij. cera q. s. F. Vnguentum. Vel applicetur tale cataplasma :

2℥. Sem. malu. alth. fenugr. an. Drach. j. lini Drach. ij. fol. malua, alth. parietar. an. M. j. rad. cucumer. asini, bryonia. an. Vnc. j. beta lilior. albor. an. Vnc. β. scyllam num. j.

Coqu. in aq. chalybeata cum aceti parte sexta. F. Cataplasma, cui si libet, oleum de capparibus addi potest.

Hieronymus Fabricius ab Aquapend. ad induratum lienem hoc cataplasma valdè commendat, quod fit ex duabus partibus ammoniaci aceto dissoluti, una succi Nicotiana, dimidia resina & terebinthina, & succi ebulli cum oleo de capparibus & cera sufficiente quantitate mistis eoque induratos Lienes se curasse refert.

Emplastrum efficacissimum ex cicuta & ammoniaco aceto dissoluto habet Heurnius, meth. ad praxin lib. 2. cap. 10. quod ita paratur :

2℥. Cicuta M. iij. ammoniaci ℥. β.

Infunde aceto acerrimo, dies octo: dein bulliant, dum ammoniacum soluat, hinc per pannum fortem lineum validè exprimantur, iterumque expressus liquor ebulliat quinquies, & adiecta cera, cum oleo amygd. dulc. F. Emplastrum.

Idem quendam hydropicum ex Scirrho Lienis laborantem spongiâ aquâ calcis viuz madida, vsuque eius continuato & hydrope & scirrho Lienis librarum fuisset testatur.

Historia curati in molle quodam Lienis indurati, est apud Trallianum lib. 8. cap. 13. talis.

Cum ad eum venisset miles totam lienis regionem barbaricis ferramentis inustam habens duobus tribusve diebus medicamentis per os datis ipsum peragabat, & deinde diligentem ei curam in singulis convenientibus remediis offerendis adhibebat. In cibo ptisanæ cremorem quotidie porrigebat oxymelite conditum, & pisces saxatiles. Ex avibus autem gallinas, perdices, aliaque concoctu facilia. boni succi & probè macerata. Prohibebat ei quæcunque viscosos & crassos humores generant; similiter & carnes bouillas, suillas, ouillas, caprinas & hædinas: item aues, quæ in aquis palustribus degunt, omnesque pisces palustres & pelagios, præsertim qui duras & grassas, non albas carnes obtinent: ad hæc polypos, mulos, sepias, orphos, ostrea, conchas, bulbos, placentas ex melle & chidro & quæcunque inflant, duræque & crassæ, vel cruda sunt. Vinum improbatum crassum, nigrum, & adstringens: dandum autem est quale Hippocrates præcipit, quod neque crassum, neque

Historia curati Lienis indurati.



neque valde frigidum, neque calidum existat.

Potui verò dabat vinum, in quo capparidis radicem, scolopendrium, & myricæ radicem corticem decoxerat: initio quidem singulas herbas per se exhibebat, deinde ex posca, aut oxymelite, aut solo aceto coctas: interdum etiam in puluerem redactas cum supra dictis liquoribus citra coctionem per interualla dabat, idque non plus, quam duobus vel ternis diebus. Quin & oxymeli purum per totam hyemem propinabat: nonnunquam cum aqua calida, in qua prædictæ herbæ decoctæ fuerant, ante & post cibum, die & noctu, quodcumque volebat æger, potui offerebat.

Postea vere primum ineunte, cum æger multum se recollectisset, fortiora medicamenta exhibebat. Ac mox inter initia veris sanguinem ex brachio sinistro copiose detrahebat & post dies viginti quinque hoc medicamento, quo sequitur, utebatur.

*℞. Spica nardi, cort. rad. cappar. fol. myrice. herba asplenij, squama ferri an. Drach. xvij. myrobal. Drach. x. ammoniaci suffiminis Drach. xvij. polytrichi Drach. vj. stachad. Vnc. β. scolopend. Drach. iij.*

Ex oxymelite fingantur pastilli pendentes singuli drachmam unam, quorum unum oxymelite dilutum potui dabat. Postea verò cum lien probè esset explicatus, medicamenta ad ciendam aluum dabat, ac otiosos humores validioribus, nempe hieræ diacolocynthidos drachmis tribus euacuabat. Inchoante iam æstate non tres dramas, sed quatuor exhibebat, ita ut à prædictis medicamentis nullo die cederet. Vbi sanitati propemodum esset restitutus, cyclamini radice drachmam ex mulla deinceps, semel aut bis, post singulas portiones offerebat.

Antiqui cæteris nil iuuantibus ad vitionem lienis accedebant; sed eam ut crudelem non immeritò improbat Hieronymus Fabricius ab Aquapend. de oper. chirurg. abdom. vbi & aliam chirurgorum quorundam de liene curando opinionem recitat.

Cardanus etiam 8. de rerum varietate cap. 44. & in arte parua, mirabilem lienis duri curandi rationem habet; lienem nimirum scirrhuso linteum vel chartam, & quidem in formam crucis imponit, hinc securim apponit, quam ligneo malleo, vel claua ferrea vel septem ictibus percutit, atque hoc modo lienem durum, cure non diuisa sanari existimat. Verum enim verò sunt hæc rationi nullo modo consona. Refertque allegato loco idem Fabricius, accidisse semel, ut securis acies sub vehementi percussione & chartam & abdomen, & lienem vnico ictu præciderit cum morte ipsius ægri.

#### Diata.

*Diata.* Aër sit purus & temperatus, non crassus, cibi sint boni succi, & vi attenuandi præditi, cuiusmodi plerumque acia sunt, ideoque condiantur thymo, hyssopo, bacis iuniperi, & similibus. A carnibus duris, lacticiis, à caseo veteri, à placentis dulciariis & à dulcibus omnibus, quibus lien facile intumescere solet, à piscibus viscidis æger abstineat, frequenter vtatur capparibus & floribus genistæ aceto conditis: nec bibat mustum, quod lienem inflat; bibat verò vinum mediocris ætatis, non austerum; quod si potentius sit, aqua chalibeata diluatur, vel paretur vinum aut cereuisia medicata à ligno tamarisci, lingua ceruina, ceterach, absinthio, aut bibat æger à poculis à ligno tamarisci paratis. Exerceatur & ambulet ante cibum; curas & animi mororem vitet.

#### Calculi Lienis.

Non solum autem lien indurefcit, sed quandoque etiam lapides à materia tartarea in eo generantur, eodem modo, quo in aliis partibus, quod malum plerumque incurabile est, & non nisi post mortem sectione deprehenditur. Si tamen lapis minus durus est, medicamentis

Dan. Sennertij Tom. II.

hactenus proposita attenuantia & quæ calculum frangunt, vsurpari possunt.

### CAPUT VII.

#### De Lienis Vulneribus.

##### Signa Diagnostica.

Interdum etiam lien vulneratur, cuius equidem vulnus Iris suspicio est, si gladius vel telum è regione lienis abdomen penetrauit. Quia tamen tela talia etsi abdomen penetrant, lienem semper non attingunt, signis aliis præterea opus est. Cognoscitur autem lienem vulneratum esse ex eo, quod sanguis niger è vulnere erumpit, sæpe etiam vomitu vel per aluum eiicitur; plerumque vna dolet ventriculus, sitis excitatur, & dolor ad iugulum vsque ascendit.

##### Prognosticum.

Vulneribus autem ista periculosa, imò sæpe lethalia sunt, si non alia de causa, certè ob sanguinis effusionem cum lien multas arterias & venas habeat. Vnde de periculo vulneris iudicandum è loco, in quem vulnus inflictum. Si enim solum substantia lienis & eius superficies vulnerata est, vulnus tale non necessariò lethale est. Si verò ipsa lienis magna vasa sint vulnerata, vulnus lethale habendum. Plinius quidem, lib. 11. nat. hist. cap. 37. & ex eo alij lienem cursoribus, cum impedimentum iis afferat, eximi posse scribit: verum rectè Cælius Aurelianus lib. 3. chronic. pass. scribit, lienem excindendum vel vitandum esse, voce quidem dictum fuisse, non officio completum. Cum enim tot insignes arterias habeat, id sine periculo fieri non posse, manifestum est.

##### Curatio.

Curantur verò lienis ut aliorum viscerum vulnera. Et quidem naturæ præcipuæ hæc partes sunt. Ut tamen Medicus eam adiuuet, portiones vulnerarias exhibere potest. ut:

*℞. Rad. consolid. maior. Vnc. β. veron. M. j. agrimon. ceterach, hyperici an. M. β. sanicula, pyrola an. P. j. flor. rosar. rubr. M. β. passul. Vnc. j. Coq. in f. q. aquæ in vase clauso, Colatura aromatizetur cinamomi Drach. iij.*

Potest tamen prius, ne affluxus fiat, materiæ ad lienem, clyster iniici.

Interdum in vulneribus lienis pus per vrinam expurgatur, quod si animaduertat Medicus, medicamenta vrinam mouentia, ex radic. feniculi, sem. frigid. 4. maiorib. ciceribus rubris & similibus exhibere potest. Per quas autem vias rectè euacuatio fiat, alij aliter docent. Quidam per ramum splenicum ad venam, alij ad epar, & per epar ad venam cauam, & tandem ad emulgentes pus peruenire statuunt. Verum via hæc nimis longa est, & per multas ambages. Breuior longe via est per celiacam arteriam ad arteriam in quâ terminatur, & hinc ad emulgentes arterias.

### CAPUT VIII.

#### De Vlcere Lienis.

##### Causa.

Post vulnera malè curata interdum vlcus in liene relinquitur; præcipuè verò post tumores & inflammationes lienis vlcera eiusdem sequuntur.

##### Signa Diagnostica.

Præcesserunt vulnera tumores & inflammationes lienis, & sedata inflammatione & symptomatibus, quæ ei coniunguntur, nihilominus dolor in sinistro latere percipitur, præcipuè si homo moueatur & exerceatur, & interdum pus vel vomitu vel per aluum vel per

MMMM

Vulnera li-

signa.

Prognostic.

An lienis exciso una sit

Curatio.

Vlcera lienis.

Causæ.

Signa:

trinum

Calculi Lienis.

vrinam excernitur, nunc purum & coctum, interdum feculentum, nigrum, liuidum ac saniosum, quibusdam etiam integræ lienis particulæ.

### Prognosticum.

*Prognosticū.* Si malum recens sit, curationem suscipit; si diuturnum, incurabile est, & plerumque hominem lenta morte enecat. Refertque Franciscus Rousset, de partu Casareo sect. 4. cap. 5. in quibusdam lienis parenchyma adeo absumptum repertum fuisse, ut sola membrana remanserit, quod sæpe in renibus accidit.

### Curatio.

*Curatio.*

Curationis autem ratio in eo consistit, ut pus expurgetur, & vlcus abstergatur, tandemque consolidetur. Quapropter si pus vomitu vel per aluum eiiciatur, hydromel exhibendum. Si per vrinam, cum eodem hydromelite emulsio ex seminibus quat. frigid. maior. paranda & exhibenda, & radicem asparagi, glycyrrhizæ in hydromelite vel sero lactis coctar. potio exhibenda. Ad consolidandum verò exhibeatur thūs, mastiche, spica cum aqu. mellis, veronicæ, plantaginis, vel harum decoctum capite precedente propositum.

## C A P V T IX.

### De Actione Lienis propria læsa.

*Actio lienis læsa.*

Atque hætenus morbos lienis absoluius, iam de symptomatibus, quæ eidem accidunt, agendum. Et quidem actiones lienis quod attinet, antiqui equidē, ut aliquoties iam dictum, lienis officium id saltem esse putarunt, ut excrementum melancholicum reciperet. Verum non sine causa, & multis rationibus moti rectiores ipsi etiam sanguificandi munus tribuerunt, ut in Institut. & supra cap. 1. id explicatum. Hæc ergo eius actio variis modis lædi potest.

*Quo modo actio lienis lædatur.*

1. Primò enim cum crassiorem chyli partem pro sanguine visceribus in ventre inferiore nutriendis apto generando attrahere debeat. Hæc eius functio læditur, cum vel non attrahit, aut diminutè attrahit, unde crassior chyli pars ad epar transit & sanguis feculentus ac minus laudabilis inde generatur; vel citius ac auidius quàm par est, & quidem chylum ac potum crudum ad se trahit, unde obstructions in eo generantur. Prius accidit, primò vel ob lienis imbecillitatem ex aliqua intemperie, vel ob viarum angustiam, cuius causa est vel compressio à tumore aliquo, vel obstructio à crasso humore aut calculo, quo supra dictum. Posterius enenit, lienque nimis auidè attrahit, ob calidam intemperiem prædictam.

2. Attractio ad lienem chylus in sanguinem sui generis mutari debet, quod non bene fit vel læsa facultate ob eius imbecillitatem, vel ob errorem externum. Prius quod attinet, cum in omni coctione alimentum attenuari & ita præparari debeat, ut corpori alendo aptum sit, si lien est imbecillus, hoc non rectè expeditur, sed sanguis feculentus & crassus inde generatur, qui partibus ventris inferioris, quæ eo nutriuntur, non parum incommodi affert. Ob errorem externum verò actio lienis læditur, cum ob cibos mali succi chylus crassus & humor melancholicus ac tartareo. generando aptus ad lienem transmittitur, è quo sanguinem bonum generari impossibile est. Et plerumque acida cruditas in lienis coctione accidit, & sicut vinum in acetum degenerat, ita etiam cum chylus in liene non bene elaboratur, in acidum humorem vertitur, qui interdum magnà copiam in ventriculum effunditur, & hinc vomitu reicitur, ac dentes acore suo stupidos reddit. De quod etiam dicitur, part. 5. sect. 1. de affect. hypochondr. & sect. 2. de scorbuto cap. 3. & seq. quæ ibi videantur.

3. Cum in omni coctione quædam excrementa pro-

ueniant, in lienis quoque coctione idem euenit, & duo proueniunt, vnum tenuius, serosus scilicet humor, alterum crassum, & propriè melancholicum dictum, quæ per conuenientes vias, partim per aluum, partim per vrinam euacuari debent: quod interdum non fit ob vasorum angustiam, cum vel tumores ea comprimunt, vel humores crassi & viscosi obstruunt.

### Signa Diagnostica.

Ut autem aliæ actiones læsæ, quæ circa viscera nutritioni dicata accidunt, non seipsas manifestant, sed non nisi ex iis, quæ præcesserunt, & præcipè sequuntur, cognoscuntur, idem etiam in lienis actionibus euenit. Primò nimirum si diætæ ea ratio, quam locis modò allegatis proposuimus, præcesserit, lienis actiones inde vitari credibile est. Neque n. errata primæ coctionis corriguntur in secunda.

Deinde verò siue attractio, siue coctio, siue expulsio excrementorum in liene lædatur, varia in corpore incommoda inde percipiuntur. Etenim si chylus primò ille crassior à liene non attrahatur, ad epar cum reliquo transmittitur, & sanguis ex eo feculentus crassus & vitiosus generatur. Qui in venas postea diffusus & in iis putrescens varia mala excitat. Extra verò venas protrusus, si adustus non sit, nec erodens, icterum nigrum, aut certè corporis colorem liuidum ac plumbeum generat. Si verò adustus sit & acris, scabiem, vlcera, cancrum, scorbutum & similes affectus excitat. Si verò nimis auidè & citò cibum & potum lien ad se trahat, cognoscitur id ex vrina post potum nimis citò reiecta, unde obstructions & tumores lienis excitantur.

Si autem significatio in liene non bene perficiatur, sanguis inde crassus atque excrementi melancholici maior copia generatur, unde omnia viscera in ventre inferiore malè nutriuntur & ob excrementi melancholici copiam nausea & vomitus humoris acidi prouenit, vel si retineatur, caninam appetentiam excitat, aut æstu ebulliens & euaporans delirium melancholicum & melancholiam hypochondriacam parit. Si in intestina extrudatur, colicam, & pertinaces ventris dolores, vel alui profluvium & dysenteriam, eamque sæpe lethalem procreat, & alia mala plurima, quæ de scorbuto, & affection. hypochondr. enumerabuntur.

Eadem ferè accidunt, cum excrementum melancholicum per conuenientes vias non euacuatur.

### Curatio.

Cum autem actiones læsæ hæc omnes vel ab errore externo vel à morbis actionem lienis lædentibus oriatur, præter ea, quæ supra de morbis lienis dicta sunt, plura afferre, opus non est, sed tota curandi ratio ex iis, quæ ibi dicta sunt, & de scorbuto & affectione hypochondriaca dicentur, patet.

## C A P V T X.

### De Lienis doloribus.

#### Causa.

Inter actiones lienis læsas est etiam dolor eiusdem, qui, ut alij dolores, oritur à solutione continui, & quidem membranæ, qua lien tegitur. Fit autem solutio continui quando membrana illa distenditur. Quod accidit in inflammatione lienis, eiusdem inflatione, obstructione, & tumoribus, vlcerebus, ut & causis externis, lapsu scilicet & percussione.

### Signa Diagnostica.

Dolor ipse per se manifestus est, & in hypochondrio sinistro percipitur. Quia tamen etiam in musculis, lienis regio

regioni incumbenibus, & peritonæo eò loci, ut & colo intestino, dolor esse potest, qua ratione hi dolores è dolore lienis discernendi sunt, dicendum. Et imprimis cauendum, ne dolores illi punctorij, qui in lateribus, prurumque verò sinistro (Germani *das Milzstechen* nominant, quasi à liene oriantur) percipiuntur, & à peritonæo proueniunt, pro lienis doloribus habeantur. Sæpe enim euenit, & præsertim post cibum sumptum, ut si homo equitet, curru vehatur, vel alio modo corpus vehemens exerceat, dolor quidam punctorius in lateribus, præsertim sinistro, percipiatur. Qui accidit, quod peritonæum eo loci à partibus, quarum tunicis pertinaciter adhæret, trahitur & quasi auellitur, idque fit à flatibus vel etiam humoribus ferosis, qui in hæc spatia peritonæi & musculorum irumpentes membranas distendunt, eo ferè modo, ut in aliis partibus spasmus flatulentus excitatur. Musculorum autem dolor per tactum externum dignoscitur, & si locus extra parum prematur, dolor percipitur, quod in dolore lienis non accidit, qui profundior est; præterea in dolore lienis alia etiam symptomata ut color in corpore mutatus, urina mutata & similia adsunt, quæ non conspiciuntur musculis vel peritonæo affectis. Eodem modo etiam in colico dolore signa doloris colici adsunt, & dolor, qui in colo est, non semper vno loco fixus hæret, sed secundum coli ductum vagatur.

A qua causa etiam dolor lienis proueniat, ex iis, quæ hæcenus de lienis obstructione, inflatione & inflammatione dicta sunt, satis patet. In inflammatione enim dolor non est grauius, ut in obstructione & dolore. In obstructione & tumore exercitium & motus dolorem auget; contra in inflatione dolor motu sedatur, flatibus à motu discussis. In inflammatione adest rugitus murmur & ructus, quæ non percipiuntur in obstructione & tumoribus; præterea in inflammatione febris adest.

#### Prognostica.

Prognostica.

Dolor ex se nihil periculi habet. Cum enim lien non sit exquisiti sensus, & exili saltem membranâ inuestiatur, etiam dolorem magnum non patitur. E causis verò potius, à quibus dolor pendet, periculum æstimandum; cum aliæ sint grauiiores, aliæ leuiiores.

#### Curatio.

Curatio.

Ut in aliis partibus, ita etiam hic dolor tollitur vel causa, à qua pendet, ablata, vel anodynis aut narcoticis. Quomodo causæ ablatione tolli possit, patet ex iis, quæ supra de morborum lienis curatione dicta sunt. Hoc saltem addendum. Si dolor sit à causa externa, ut lapsu, ictu, sæpe necessarium est, ut venæsectio instituatur, vel etiam leuis primariæ viarum euacuatio, ne scilicet sanguis vel alij humores ad lienem dolentem magis confluent. Repellens etiam moderatum lienis regioni applicari potest.

Anodyna quod attinet, vtendum, ut alibi, ita etiam hic *chamæmelo*, *meliloto*, *semine anethi*, *altheæ* & similibus passim notis. Causæ tamen semper ratio etiam habenda, ne augeatur, & propterea in causa calida commodè etiam imponuntur folia salicis vel succus eorum.

Ad narcotica ascendere vix opus est; cum sensu adeo exquisito lien non sit præditus.

### C A P V T XI.

#### De Ictero nigro.

Icterus niger.

Tandem hic etiam icterum nigrum explicare libet. Etsi enim is non lienis propriè, sed totius corporis externi & cutis affectus sit: tamen quia à liene proficiscitur, ut vulgata sententia est, cum hic explicare placet.

Dan. Sennerti Tom. II.

Est autem icterus niger cutis totius corporis in nigrum mutatio.

#### Causa.

Nisi verò icterus à veneno prouenit, quod interdum accidit, ortum eum à liene habere vulgo statuitur. Si enim à liene chylus crassior & melancholicus non attrahitur, in totum corpus diffunditur. Non autem attrahitur vel ob lienis imbecillitatem, vel ob vasorum, quæ à porta ad lienem tendunt, obstructionem.

Secundò virium hoc generari potest, cum excrementum hoc per conuenientes vias non expellitur. Id quod fit, vel ob viarum obstructionem, vel excrementi melancholici copiam, quod cumulatur ob errores in victu, & cibos ad hoc excrementum generandum aptos.

Platerus verò, *tract. 3. lib. 1. c. 1.* aliam de ictero nigro sententiam habet, statuitque, non à liene icterum nigrum proficisci, neque humorem melancholicum causam esse, sed bilem, quæ in vesicula fellis colligitur, & quidem præternaturalem, quæque in venis mesaraicis corrupta est, & viridem vel nigrum colorem ex corruptione acquisiuit. Idque ea de causa, quod in liene eiusmodi bilis nullibi, nec sinus aut vesicula aliqua, in qua recipi deberet, deprehenditur, atque inde ea prodire minime possit, neque etsi adesset, in venam eam deferri posset, quæ nullo ramo in lienem pertingit.

Et omnino sunt hæc non planè de nihilo. Etenim cum humor ater in nullo receptaculo amplo contineatur, sed sensim ut generatur, ita euacuetur, si ut icterus flauus, ita etiam niger hominem subito inuadit, omnino à vesicula fellis, & bile, quæ nigrum istum colorem acquisiuit, icterum nigrum prouenire statuendum est. Interim nec hoc negandum, ex humore etiam atro lienis vitio cumulado, totius corporis colorem mutari posse, etiam si id lentè fiat & sensim; ac consentiunt de eo omnes Medici, de quo etiam infra de *scorbuto*, *part. 5. sect. 2. cap. 1.* dicitur.

Verum Antiqui, præter Hippocratem, *lib. 2. de morb.* & Paul. Aeginet. *lib. 3. c. 49.* hanc humoris nigri per totum corpus suffusionem proprio nomine non appellauerunt, ut etiam Bald. Ronsseus, *de scorb. c. 3.* testatur. Si quis ergo hanc totius corporis externi in nigrum colorem mutationem, & illam, quæ fit à bile corrupta, è vesicula fellis in corpus diffusa, nomine etiam distinguere velit, per me licet. Possent autem istæ opiniones ita etiam conciliari, si statuatur, bilem atram, cum in venis mesaraicis copiosè colligitur, ubi ad epat peruenit, cum bile flaua misceri, & in vesicula fellis colligi, bilisque flauæ colorem nigrum inde mutari, quæ nisi per conuenientes vias euacuari possit, in totum corpus cum sanguine diffundatur, & icterum nigrum pariat.

Etsi enim, quod obicit Platerus, nullus ramus à liene ad venam eam pertingit, tamen in chylis, qui per venam portæ ad epat feruntur, etiam humores prauis circa lienem cumulari ad epat perueniunt, & hinc in totum corpus diffundi posse, manifestum est.

#### Signa Diagnostica.

Cognoscitur hoc malum ex colore nigro, quo totum corpus tingitur.

Causas autem quod attinet, si venenum aliquod corpus infecit, ex relatione ægri vel adstantium cognoscitur. Quod si absit, ab interna causa prouenit. Quæ an in vesicula fellis vel in liene consistat, inquirendum, Si in vesicula fellis, epatis antea affecti, & bilis flauæ corruptæ indicia adsunt. Si à liene, eius quoque affecti notæ aderunt. Et quidem si tumor aliquis, tensio, grauitas aut durities in sinistro hypochondrio percipiatur, ob lienis obstructiones humorem melancholicum à sanguine separari argumento est: si verò nihil tale appareat, frigida intemperies, ob quam liens non attrahit, causa est.

MMM m 3

Progn

## Prognosticum.

## Prognosticum.

Icterus niger flauo semper periculosior est. Siue enim à vesicula fellis proueniat icterus niger, cum tum maior adsit bilis corruptio, maius etiam portenditur; siue sit à liene, etiam difficilior, cæteris paribus, curatur, ob humoris contumaciam, & si diutius durat, nec idoneis remedijs tollitur, tandem hydrops succedit.

## Indicationes &amp; Curatio.

## Indicationes &amp; Curatio.

Si à vesicula fellis & bile flaua corrupta proueniat hoc vitium, curandum ut icterus flauus, nisi quod medicamenta simul humorem melancholicum respicere debent.

Si verò à vitio Lienis proueniat, vel eius Intemperies corrigenda, vel obstructio aperienda, & humor melancholicus euacuandus, ut antea dictum. Et cum viæ, quæ ad epas & Lienem pertingunt, communes sint, nimirum venæ portæ, communis ferè curandi ratio est, in vitio etiam viscere vitium hæreat, modò ad humorem nigrum præcipue cura dirigatur, de qua iam satis de morbis Lienis dictum. Imprimis vtilia sunt hic medicamenta è chalybe parata antea proposita, ut:

*℞. Chalyb. prepar. Vnc. ij. passulæ. minor. Vnc. j. ℞.*

Infundantur per dies tres in aqua cuscute & fumariæ an. ℞. j. in vase clauso. Aqua inde separetur & addatur rad. oxylapath. polypod. q. cortic. rad. capp. an. Vnc. ℞. ceterach. cuscute an. M. ℞. sem. aquileg. genist. an. Drach. j.

Iterum coquantur & sub finem addatur fol. sena Vnc. j. Colaturæ add. syrup. de scolopendr. byz. ant. simpl. an. Vnc. j. sacchar. q. l.

F. Syrupus.

Tandem si materia, quod tamen plerumque fit, quæ in cute est, non sponte euanescat, eâ, quæ in visceribus & venis est, sublata, discutienda est sudorem prouocantibus & diaphoreticis, ut decoct. flor. chamæm. scordij, rad. feniculici, cer. rub. & similibus.

Vtile est quoque balneum aquæ dulcis, in quo sit cocta malua, ruta, beta, parietar. flor. chamæmeli.

Commodum etiam est Balneum siccum seu Laconium, & post balneum corpus abstergere emulsione sem. cannabis. Facies, quæ maxime in conspectum venit, abluenda sæpius decocto illarum plantarum, vel aqua florum fabarum cum vino mixta vel fabarum & lupinorum. Nonnulli tincam piscem per dorsum dissectum applicant abdomini; alij plantis pedum, qui humorem flauum & nigrum ad se trahit.



## LIBRI TERTII

### PARS V.

### DE AFFECTIONE

### Hypochondriaca & Scorbuto.

## SECTIO PRIMA.

## De Hypochondriaca affectione.

## CAPVT I.

## De Natura affectionis hypochondriacæ.

## Natura affectionis hypochondriacæ.

¶ V. M. corpora nostra, ut & aliorum animalium, in perpetuo fluxu sint, alimentis, quibus in dies reficiantur, opus habent. Cum autem nullum alimentum sit, quod totum corpori apponi possit, sed omnia à vitæ modis quid, & quod corpori alendo aptum non est, contineant, et si alia plus, alia minus: quicquid corpori alendo aptum non est, excerni oportet. Fit autem ista inutilium secretio in coctionibus & in ciborum in ali-

mentum mutatione. Vt verò alimenti perfecti elaboratio vnica coctione non absoluitur: ita & excrementa non statim tota, sed sensim separantur. In prima enim coctione illud, quod crassius est, & superficialiter quasi alimento coheret, per aluum excernitur. Hinc chylus ab excremento hoc liberatus in venis mesaraicis primum sanguinis rudimentum suscipit. Ab iis, quod crassius est, lien ad se trahit, & inde sui generis sanguinem paulò crassiores, vicinis tamen paribus alendis idoneum, parat, quod verò seculentum est in hac coctione, & nulli parti alenda aptum, secretum per convenientes vias euacuat. Ex puriore verò chyli parte reliqua epas sanguinem nobiliorem pro totius corporis reliqui nutritione conficit, atque iterum quod excrementitium est in vesiculam fellis & ad renes amandatur, & hinc è corpore excernitur.

Hæc itaque omnia si rectè atque ordine fiunt, omnia etiam in corpore rectè sese habent. Si verò quid peccatur, plurima excrementa circa primæ & secundæ coctionis organa colliguntur, è quibus postea varij morbi excitantur, adeò ut rectè Fernellius, lib. 6. de part. morb. & sympt. c. 7. scripserit; Ego hoc affirmo & profiteor, cholera, melancholia, diarrhœa, dysenteria, cachexia, atrophie, languoris, lentarum, errantiumque febrium, latentium denique morborum causas me his in sedibus plerumque adinuenisse. Et omnino pauci morbi sunt, qui non ex hisce locis habeant originem, ut etiam supra de morbis mesenterij & pancreatis dictum. Etenim vitiosi humores in iis cumulati non semper hic quiescunt & hærent, sed per venas & arterias cum ipsi, tum vapores ab iis eleuati, in totum corpus disperguntur, & varios morbos & symptomata hinc inde excitant.

Et quidem vitiosi humores in hisce locis cumulati aliquando, ubi putrescere incipiunt, per febres abluuntur, aliquando vomitu, & fluxu alui concitato euacuantur; aliquando ibi subsistentes affectionem hypochondriacam dictam excitant. Quæ etsi hoc præsertim seculo malè audiat, & in omnium ore & scriptis sit, & pro communiquadam calamitate, & seminario quodam omnium penè morborum habeatur: tamen nec antiquos latuit. Diocles Carystius, ab Hippocrate famâ & autoritate secundus, & Antigoni Asiæ Regis Medicus, affectionem hanc non obscure descripsit, ut verba eius citat Galenus, 3. de loc. aff. c. 7. Oritur, inquit, aliis à ventriculo morbus, qui ab aliis melancholicus, ab aliis flatuosus nominatur, quem sumto cibo maxime coctus difficili & caustico sputum humidum, idemque multum comitatur, iterum rursus acidissimi, flatu, æstus in hypochondriis, fluctuatio non ilico, sed cum retinuerint: interdum ventriculi quoque vehementes dolores, qui nonnullis ad dorsum usque procedunt, concoctis deinde cibis quiescunt; mox aliis cibis ingestis eadem reuertuntur accidentia, quæ interdum ieiunio, interdum etiam à cena molestant, atque exomunt crudos cibos & phlegmata subanara & calida, adeò ut dentes torpedine afficiantur. Causas verò huius mali his verbis recenset: Flatuosas vocatas affectiones suspicandum est, plus caloris, quam decet, habere in venis, quæ alimentum à ventriculo excipiunt, sanguinemque in ipsis crassorem factum. Quippè constat, has venas obstructas esse vel hoc argumento, quod alimentum corpori non distribuitur, sed ventriculo manet incoctum, cum ipsum meatum prius susciperent, magnamque ipsius partem in iratum vitem excernant, tum quod postero die vomitu reiciatur, vixit non digestis per corpus cibis, sed quo calor id, quod secundum naturam est, excedat, facile intelligitur, tum ab æstu, qui ipsis accidit, tum ab his, quæ ingeruntur: siquidem iuuari videntur à refrigerantibus cibis, qui videlicet calorem refrigerare extinguereque solent. Quibus & aliam causam addit his verbis: Aiunt nonnulli, os ventriculi, quod intestinis continetur, in huiusmodi passionibus inflammari, ac ob inflammationem ipsam & obstrui & prohibere, ne alimenta statuto tempore ad intestina descendant. Quamobrem diutius, quam decet, in ventriculo morantur, & tumores & æstus ac reliqua, quæ prædicta sunt, efficiunt.

Etsi



Etsi verò Galenus, loco allegato, reprehendat Dioclem, quasi præcipua, & quæ melancholicam & flatuosam hypochondriacamque affectionem tanquam caractere designant, metum & mœstiriam, omiserit: tamen forsitan Diocli non propositum fuit, melancholiam hypochondriacam in specie, sed hypochondriacam affectionem in genere describere. Etenim norandum, affectionem hypochondriacam multò latius extendi, quam melancholiam hypochondriacam, atque experientia constat, plurimos hoc malo laborare, qui tamen melancholiâ non afficiuntur. Et sunt non pauci, qui melancholiâ laborant, & tamen hypochondriacâ affectione non detinentur.

Neque hoc malum Hippocrati planè ignotum fuisse, sed sub nomine *ἀναρτία*, id est, morbi resicatorij, 2. de morbis, propositum, aut certè species eius aliqua descripta videtur. *Non in ediam, inquit, non cibum sumtum ferre potest, sed ieiuna quidem viscera rugum edunt, & ventriculi os mouetur, & alia varia vomit, bilem, salinam & scutum, ac post vomitionem aliquantisper melius habere videtur. Vbi autem cibum sumit, ructus ei contingunt, cum rubore incenditur, semper se copiosam alui recreationem deiectionum existimat, cum verò defecerit, flatus infra demittitur, caput dolore vexatur, totum corpus huc & illuc velut aonungi videtur, crura grauantur, debilitantur & minuantur, debilisque euadit.*

Accepit autem affectio hæc nomen à loco affecto, hypochondriis scilicet *ὑποχόνδριον* verò est pars ea corporis, quæ sub nothis costis ad ilia vsque vtrinque protenditur, non solum musculos, sed & interna viscera complectens, sic dicta, quod *τὸ χόνδρον ὑπὸ νεύ*, id est, cartilaginibus notharum costarum subiaceret. Barbari Mirachialem vocant, quod Abdomen Arabibus Mirach sit, vel potius mesenterium. Imò sunt, qui Auicennæ Mirach nihil aliud esse, quam pancreas statuunt. Chynici tartarum hypochondriorum appellant, de quo postea dicitur, Diocles, vt & Aëtius, *εττράβ. 2. ferm. 2. c. 9.* etiam *πᾶσι* quòd sit, affectum flatulentum, seu flatuosum nominant.

Describi verò potest hæc affectio, quod sit colluies vitiosorum humorum, imprimis melancholicorum, sæpe etiam pituitosorum & biliosorum, in venæ portæ, & arteriæ cœliacæ ac mesentericæ ramis, in hypochondriis, præcipuè sinistro, inter ventriculum & lienem, maxime in locis, ubi plures maioresque venæ portæ & arteriæ huic coniunctæ rami sunt, præcipuè ob lasam lienis collationem collectæ, absque putredine, & quæ vapores horum naturam obtinentes, vt & ipsius humoris aliquid ad alias partes transmissa varia symptomata excitant.

## CAPVT II.

### De Loco affecto.

VT autem affectionis huius natura clarior fiat, tria explicanda sunt: 1. *Locum*, in quo vitiosi isti humores continentur; 2. *Humorum natura & causa*, à quibus generantur; 3. *Affectiones* quæ hinc inde in corpore ab iis excitantur.

Primo locum, in quo colluies ista vitiosorum humorum continetur, quod attinet, eum meritò ramos venæ portæ & arteriæ cœliacæ ac mesentericæ esse statuimus. Et quidem si hypochondriacæ affectionis nomen latè extendere libet, omnes morbi, qui partibus in hypochondriis sitis accidunt, affectus hypochondriaci nominari possent: verum cum per hypochondriacam affectionem in salem *πᾶσι* accipiamus, quod Diocles & Aëtius *quòδ sit*, seu flatuosum appellant, peculiaris etiam locus, in quo causa huius mali resideat, quærendus. Equidem, vt postea dicitur, etiam in mesenterio magna vitiosorum humorum colluies, tumores, abscessus, vlcera; atque eadem mala etiam in pancreate reperiri possunt: stagnare etiam humoribus omentum, & flatus in eo concludi, supra dictum & de scorbuta dicitur. Verum-

tamen si vitia ista ita extra vasa consistunt, vt in ea facile effundi, & proinde in corpus hinc inde diffundi non possint, tot symptomatum, quòt in affectione hypochondriacâ animaduertuntur, causæ esse non possunt. Imò plerumque non nisi in mortuis cognoscuntur, cum in partibus ignobilibus consistent. Et observationes Medicorum docent, plurimos, qui talia mesenterij, pancreatis, omenti mala passi sunt, de affectione hypochondriacâ conquestos non esse.

Itaque locus, in quo affectionis hypochondriacæ causa contineatur, talis constituendus, è quo humores hinc inde fluere possint. Atque ipsum statuimus esse ramos venæ portæ, & arteriæ cœliacæ, ac mesentericæ, qui ab Epate & Liene ad ventriculū & vicina loca tendunt & certè ea mesenterij, omenti, & pancreatis loca, è quibus in hæc vasa humores vitiosi facile recutere possunt.

Ex ipso nimirum venæ portæ trunco ventriculus habet ramum vulgò Gastricum dictum, quem Adrianus Spigelius Pyloricum appellat. Postquam verò truncus in duos insignes ramos, alterum sinistram splenicum dictum, alterum dextrum mesentericum nominatum dispescitur; à splenico quidem ramo accipit Gastricum, à quo Coronaria nascitur, gastroepiploidem sinistram; & vas breue aut venosum dictum. A ramo verò mesenterico gastroepiploidem dextram. Arterias autem accipit ventriculus ab arteriæ magnæ ramo cœliaco dicto, quod ad *nothias*, id est, ventriculum ramos transmittit, ramum pyloricum, gastroepiploidem sinistram, & vas breue arteriosum. Ab eadem vena portæ, & arteriæ cœliacæ etiam vasa accipiunt lien, epat, omentum, mesenterium, vt ita facilis inter has partes consensus & humorum communicatio esse possit, vt meritò in ramis portæ & arteriæ cœliacæ maioribus sedem causæ mali hypochondriaci consistere statuendum sit. Cum enim valorum horum officium sit ad ventriculum & vicina partes sanguinem, quo nutriuntur, deferre, & præterea hisce vasis natura abutatur quasi ad humorum vitiosorum è toto corpore expurgationem, siue illa spontè, siue medicamentorum operâ instituat, & ad intestina, quæ inter loca conferentia 1. aphor. 20. nominantur, humores vitiosi peruenire non possint, nisi prius hæc vasa transcant, patet hinc, quicquid superflui & vitiosi in liene, epate, imò toto corpore colligitur, in his locis cumulati posse.

Et imprimis in vase breui, tam venoso, quam arterioso, maximam sæpe vitiosi humoris copiam contineri; & hinc maximum ventriculi & lienis consensum esse, certum est. Id enim satis amplum est, ac sæpe calamit scriptori crassitiem habet, imò vt Iohannes Riolanus, *Anthropographia lib. 2. c. 7.* testatur, in Senatore quodam qui reiectione sanguinis per superiora & inferiora è liene prodeuntis laborauerat, deprehensum est vas breue minimi digiti magnitudine latum & in ventriculum apertum. Et ista omnino via est, per quam hypochondriacis sanguis interdum per vomitum & aluum reieciatur. Ita refert Adrian. Spigelius, *Anat. lib. 6. c. 5.* historiam Cardinalis Cibonis, qui sanguinis vomitu extinctus erat; in cuius cadauere compresso ventriculo viderunt lienem turgescere, rursum liene compresso ad ventriculum copiosum sanguinem per vas breue effundi. Imò per eandem viam humorem instar atramenti nigricantem, qualis etiam in viuente adhuc vomitu reiectus fuerat, in viro nobili effundi, vidimus.

Hisce vasis tamen meritò addimus & omentum, quod venas amplas à venâ portæ habet (superior scilicet eius membrana vtramque Gastroepiploidem, dextram & sinistram; inferior verò dextram epiploidem, & posticam, arterias totidem à ramo cœliaco & mesenterico) & præcipuè in eo cavitatem illam in sinistro hypochondrio sub diaphragmate, è ventriculo, omenti, coli & viscerum connexo ortam, & exitum non habentem sed ita conclusam, vt aquam quoque & flatus continere possit. In hac enim cavitare interdum colliguntur è vicini

Affectio hypochondriaca unde dicta?

Definitio affectionis hypochondriacæ.

Subiectum affectionis hypochondriacæ.

Locus affectus in hypoch. aff.

nis visceribus humores pituitosi, crassi, limosi, serosi, aquosi, melancholici, atri. Imò & flatus, ob quos, si abdomen vel manu comprimitur, vel corpus mouetur, vel diaphragma paulò vehemètius attollitur, sonitus manifestus percipitur. Quod qui patiuntur *εγχεσιμίδες* appellari censent. Verum *εγχεσιμίδες* dicuntur antiquis mulieres illæ Pythiæ, seu vaticinantes, quæ Dæmonem, ex quo responsa ferunt, ventre conceperunt, & tenui voce, ac sono ex ventre edito oracula fundunt, quasi vētriloquæ. Hinc Hippocrates 5. & 7. Epid. hanc vocem iis accommodauit, qui ex pectore similem sonum edunt, de quâ re videatur Scaliger, *exerc. 158. sect. 3.* Anut. Fœsius, in *Oeconomia Hippocratis*. Atque accidit sæpe, vt liē, vel colon vicinū eo nomine incuserur, cum tamen iis saluis in hac cauitate humores vitiosi hæreant.

Nec ignota videtur fuisse Hippocrati hæc cauitas dūm 7. aph. 54. sic scribit: *Quibus inter ventriculum & septum transversum pituita intercluditur, & dolorem affert, inalteratrum ventrem viam non habens, iis per venas & vesicam versa pituita morbi fit solutio.* Atque pertinacissimè in hac cauitate humores sæpè hærent, & frustra purgationibus tentantur, ac non nisi fortioribus vomitoriis, vel thermarum, ac acidularum vsu euacuantur. Ex quâ tamen si quid in venas & arterias regurgitet, mali hypochondriaci id etiam causa dici potest. Aliàs quidem homines diu ventris rugitibus molestari possunt ex hac causa, qui tamen alia, qualia hypochondriaci, symptomata non patiuntur.

Nonnulli etiam membranæ cuiusdam crassioris mentionem faciunt, quæ à iecore ad lienem subtus ventriculum extensa & colo intestino incumbens, post chronicas febres ac melancholicos morbos magnam prauorum humorum copiam contineat, quæ doloribus variis, intestinorum difficultatibus ac vomitionibus continuis causam præbeat. Verum ea procul dubio nihil aliud est, quam omentum, ibi humoribus repletum.

Atque ratione loci, in quo materia affectionis hypochondriacæ causa continetur, differentia quædam affectionis hypochondriacæ constituitur. Præcipua enim differentia est, quod materia hæc nunc in vasis dextri hypochondrii, nunc in sinistri, quòd frequentius accidit, nunc in utroque hypochondrio continetur. Et quidem nunc in vasis tantum extra viscera, nunc verò simul in ipsis visceribus. Mercatus quidem tribus modis affectionem hypochondriacam fieri posse docet, primò obstructis splenis venis ac mesaraicis à iecore in ventriculum aut à mesaræo in splenem, vel in vicinis partibus: Secundo propter Ventriculi frigiditatem, quæ in acorem commutat alimenta: Tertio Ventriculi & iecoris contra operantia, cum Ventriculus frigidus est, & non potest concoquere, iecur verò calidum nimis auidè attrahit alimenta. Verum primus modus saltem perfectam, & vt ipse postea fatetur, legitimam & exquisitam affectionem hypochondriacam excitat, cum in vasis istis humores mali huius causa continentur; etsi obstructionem in iis esse non sit necessarium, vt postea dicetur. Nam, quam secundo loco punit, frigiditas Ventriculi affectionem hypochondriacam non absoluit; cum multi sint, acida cruditate laborantes, qui tamen non sunt hypochondriaci, sed vt affectio hypochondriaca generetur, necesse est, crudos illos humores in venis mesaraicis prius cumulari, atque ibi aduri, vt ipse etiam fatetur. Tertius modus à primo non est diuersus, cum vtrumque viscus & Ventriculus ac Epar ad huius mali generationem suam symbolam conferre possint.

Alij plures etiam affectionibus hypochondriacæ differentias constituunt, mesentericam, quæ fit à vasis mesaraicis inter ventriculum & epar; stomachicam, quæ fit à ventriculo, pyloro, venisque ventriculo coherentibus; epaticam, quæ fit ab epate; splenicam, quæ fit à splene; cardiacam, quæ fit, cum humores adusti & atri in venis & arteriis maioribus aut pericardio cumulantur; hystericam seu vterinam, cum menses aut quæ-

uis vteri purgamenta subsistunt; hæmorrhoidalem quæ fit ab hæmorrhoidibus subsistentibus; phantasticam seu melancholicam, quæ fit ex prædictarum specierum complexu, ex humorum nimirum in sinistro præcipue hypochondrio collectione. Verum hi nomen affectionis hypochondriacæ nimis latè extendere videntur. Nam vt ab vltimâ differentiâ incipiamus, quam phantasticâ, seu melancholicam nominant, non peculiaris ea est differentia; sed accidit quibusdam hoc morbo laborantibus, vt delirēt; quòd fit, cū vapores opaci & tenebricosi ex hypochondriis adscendant, spiritibusque animalibus miscentur, eosque inquinant, vt lib. 1. præl. de melancholia hypochondriaca dictum. Hæmorrhoidalis est differentia à causâ, ob quam sanguis melancholicus in corpore colligitur, neque tamē sola affectio hypochondriaca, sed & alii morbi plures inde ortum habent. Eadem ratio est hystericæ. Cardiacæ verò nullo modo ad hypochondriacam affectionem pertinet; cum cor cum venis & arteriis vicinis non in hypochondriis, sed in thorace situm sit. Et melancholiæ per consensum, quæ sæpè in maniam degenerat, hæc est differentia prius, quàm affectionis hypochondriacæ. Reliquæ differentie à loco, in quo subsistit vitiosi humores peritæ sunt quod scilicet nunc in vasis dextri, nunc sinistri hypochondrii saltē, nunc verò simul etiā in ipso liene & epate cumulantur.

## CAPVT III.

## De Causis Affectionis hypochondriacæ.

SECUNDò autem quæ sit humoris, qui huius mali causa est, natura, & quibus de causis in his locis generetur, nec id satis plenū est. Primò enim ipsum humorem huius mali causam quod attinet, est ille nō vnius generis, sed varius, calidus, biliosus, amarus & adustus, melancholicus, pituitosus, acidus & ponticus; & proinde tum frigida, tum calida intemperiei indicia ad sunt. Ructus n. acidi, fluctuationes, flatus plurimi, coctionis tarditas, plurima sputa, vomitus pituitosi, arguunt humorem frigidum: cerebri verò & cordis affectiones potius ab humore adusto proueniunt, quem & æstus in hypochondriis arguit. Verum cum causæ, quæ ad mali huius generationem faciunt, variæ sint, vt postea dicetur, neque in omnibus corporibus eodem modo sese habeant, non mirum est, etiam varios humores generari.

Chymici dum causam huius mali explicare conantur, tartari nomine eas comprehendunt, atque inde tartarum hypochondriorum hoc malum nominant. Verum plerique quid sibi tartari nomine velint, non satis declarant, cum diuersissimis rebus id tribuant: topis illis, qui dentibus adhærent; humoribus excrementitiis in intestinis, qui dolores, diarrhæas, obstructions, hydroperem excitant; excrementis, quæ à pulmonibus, naribus eiciuntur & per vrinam & sudores excernuntur, imò flatibus & vaporibus, qui palpirationem cordis excitant. Quo modo, cum per tartarum nihil aliud, quam excrementum, quod in qualibet coctione secernitur, intelligere videantur, rein satis non explicant; cum diuersarum partium diuersa sunt excrementa. Cautius ij loquuntur, qui tartarum generari statuunt, cum in humorem mucilaginosum & viscosum spiritus salis incidit, eumque coagulat, tartarumque appellant, mucilaginosum excrementum cibi & potus à spiritu salis coagulatam. Sunt enim pleraque, quæ euomuntur, amara vel salia.

Quapropter non negamus quidē partes quasdam colluiei huic humorū inesse, quas Chymici meritò tartareas appellare possint, crassiores puta, seculentas, lutulentas & fixiores, quæ ad mali huius diuturnitatem faciunt. Nam cum animalia ex plantis alantur; plantæ è terrâ suum alimentum attrahant, hæc autē in se materiæ sal-

Causa affectionis hypochondr.

Tartarum chymicorum quid?

Quomodo generetur?

fuginosæ non parum, mineralesque partes, aut spiritus in se contineat: facile hinc apparet, alimenta, quibus vescimur ἀρετιήδια, ἀλimenta ἢ ἰσχυρά, ut appellat Hippocrates, de prisca Medicina, multa in se continere, quæ cum nullo modo in alimentum corporis abire possint, maturè, ac si fieri possit, mox in primâ coctione secerni debent. Quod nisi fiat, & in primis ubi telinquantur, & ab aliis postea secreta fuerint & per se extiterint, non solum secundum primas qualitates homini nocet, sed & secundum συνάμεισι, ἀρετιήδια ἢ ἰσχυρά, ut ibid. Hipp. nominat, quatenus scilicet amara, salia, acida, aut acerbata sunt, aut similes qualitates habent. Hinc frequens est hypochondriacis, ut amara, salia acida vomant, quibus etiam dentes obstupescant. Atque has ipsas qualitates simul acceptas volumus, cum humoris melancholici vel attri mentionem facimus. His enim eius natura absoluitur, non solum qualitatibus primis.

Atque ob hos ipsos humores feculentos, adustos, fixos, qui mali huius præcipua causa sunt, si quis malum hoc tartarum hypochondriorum appellare velit, per me id sanè licet: modò causæ huius mali proximæ humoris nomen non derogat, neque hoc neget, in hac colluie non solum adesse humores fixos, & qui ad coagulationem tendunt, sed & vaporosos & flatulentos, unde tot cerebri & cordis per consensum affectus in hoc malo excitantur. Verum quæ humorum, qui mali huius causa, diuersitas sit, ex iis, quæ de partibus, in quibus generantur, dicenda iam sunt, magis patebit.

Secundò ergo partes, in quibus generantur humores, huius mali causa, & morbos ac dispositiones earum, ob quam vitiosi humores generantur, quod attinet, nec de eo omnes idem docent. Diocles, ut ex loco supra allegato patet, præcipuam huius mali causam obstructionem venarum mesentericarum & calorem, ea de causa ortum, statuit; quibus ex aliorum sententia addit, oris ventriculi inferioris inflammationem. Et sunt multi, qui in hoc & in aliis morbis nihil, nisi obstructiones accusant. Verum equidem non negamus, in aliquibus vasis humores quasi impactos esse, ita quidem, ut vasa ista veluti varicosa & cancrrosa fieri interdum scribat Mercatus, lib. 1. de cur. morb. int. cap. 17. Etenim si natura vitiosos humores in vena caua per ramos eius in certas partes depellere potest, ut in cruribus varices, in aliis etiã partibus venæ cancrrosæ humore atro turgant: cur non idem in ramis venæ portæ accidere posset? Atque id ubi accidit, malum ferè desperatum est, & medicamentis facile exacerbatur. Interim tamen quod hoc semper fiat, non est necessarium, sed in venis & arteriis multos prauos humores sine obstructione colligi posse, neque hic obstructionem primariam huius mali causam esse, etsi quandoque concurrere possit, vel ex eo patet, quod in hoc morbo manifestus sit ex liene in ventriculum & contra comeatus. Et ipse Galenus, 5. de loc. affect. c. 6. plures ex hypochondriacis splenicis esse, & ex hoc etiam viscere μοχθηδὴν ἰσχυρὰν irruere scribit. Neque ab obstructionibus venarum hoc malum fieri, id satis argumenti est, quod adfert Diocles, quod alimentum corpori non distribuitur, sed in ventriculo maneat incoctum, & postero die vomitu reiiciatur. Nā hoc si fieret, alimentum in toto corpore deesset, neque corpus ita nutriri, quod tamen plerumque fit, posset; sed idèd hoc evenit, quod ea cibi pars, quæ in ventriculo cruda manet, & in pituitam mutatur, à partibus aliis non attrahitur, cum ut alimentum corpori præbeat inepta sit, ut infra dicetur.

Paulus Aegineta, lib. 3. de re medicâ cap. 14. & ipse melancholiam hypochondriacam ex inflammatione circa stomachum oriri scripsit. Verum si inflammationem non veram, sed φλόγωσιν seu calorem, & æstum intelligit, facile tolerari eius sententia potest. Φλεγμονή autem propriè dicta admitti non potest; cum hæc sine febre, quæ in hoc affectu raro apparet, excitari non possit.

Auicennas, lib. 3. fen. 1. tract. 2. cap. 1. & ab epate, & à

liene malo huic materiam subministrari scribit. At enim, esse quosdam, quibus accidit dolor stomachi cum comedunt, & sedatur post concoctionem, & eorum plurimos esse melancholicos, & pati melancholiam hypochondriacam: esse quosdam, quibus accidit dolor in fine spatij comprehensionis cibi, ut loquitur interpres, in stomacho, & horum quibusdam dolorem non sedari, donec euomerunt humorem aceto similem, ex quo ebullit terra, quo vomitu reiecto sedatur dolor. Alios verò esse, quorum dolor sedatur cum descensione cibi, non cum vomitu; & causam quidem primi esse effusionem melancholia ad stomachum; secundi verò esse effusionem bilis ad ipsum ex epate: qui tamen duo humores non mox ledant, quoniam in profundum ventriculi effunduntur, verum cum cibo permiscetur, eo commouentur & ascendunt ad os stomachi, illudque vellicant. Quæ sententia, si rectè explicetur satis commoda est. Etenim ut nec vnus humor, ita nec vna intemperies in hypochondriacâ affectione adest. Ex æstu enim circa præcordia, ex vomitu bilioso & æruginoso, delectatione ex frigidis, calidam intemperiem adesse colligitur: contra flatus, ructus acidi, sputum copiosum, coctionis debilitas, erodorum succorum vomitus, frigidam intemperiem arguere videntur.

Rondeletius, meth. curandi morbos c. 42. Malum hoc ab intemperie sicca cum aliquâ caliditate sine affluxu, sed cum obstructione potius à sanguine crassiore fieri statuit. Cum Rondeletio ferè consentiunt ii, qui in hac affectione ventriculum & intestina calidâ & siccâ intemperie laborare putant, eaque calidiorem & sicciorum chylum producere, venasque etiam mesenterij, intemperie siccâ & calidâ laborare, eamque foueri chylo crasso & coctura calidiore.

Verum, ut, quid nobis hac de re videatur, dicamus, & modum generationis affectionis hypochondriacæ proponamus, primò monendum. Autores, dum in hoc obsecuro, & multis symptomatibus implicato affectu explicando laborant, alios ad alia respexisse, & alios quidem partes tantum, quarum læsione sese maximè prodit, alios eas præcipuè, in quibus mali quasi scaturigo est, considerasse. Ideoque discernendum esse inter partes, quæ per consensum in hoc malo afficiuntur, & inter locum, in quibus materia mali causa primaria generatur & colligitur. Deinde sciendum, etsi ventriculus afficiatur, adint vomitus & alia ventriculi malè affecti indicia: tamen satis multa testantur, istos humores non omnes in ventriculo generari, sed aliunde transmitti. Et licet in ventriculo generentur: tamen saltem symptomatum, quæ circa ventriculum, non verò in genere affectionis hypochondriacæ causam esse; locum verò, ut iam ante dictum, in quo continetur causa huius mali, esse vasa, quæ ad ventriculum à liene & epate tendunt, & præcipuè, quæ à liene, antea dictum. Quibus & maiores venæ portæ ramos, & quæ hos comitantur, arterias, quæ mesenterio & omento inseruntur, addere possumus.

Causam autem generationis horum humorum quod attinet, aliter alij hac de re sentiunt. Humores quidem illos crassos, pituitosos, & sæpe instar glutinis viscidos, qui vomitu reiiciuntur, à ventriculi debilitate generari satis manifestum esse putamus; quæ ex eo præcipuè ortum habet, etsi causa hæc à paucis attenditur, quod ventriculus vitioso sanguine à liene transmissio nutriatur, ut infra in symptomatum explicatione dicetur. Membra enim si vitioso sanguine alantur, bene sese habere, & rectè suum officium exequi non potest. Vasa autè illa inter ventriculum & lienem quod attinet, hoc quidem extra controuersiam est, humores huius mali causam in iis contineri: sed de hoc quæstio est, an suâ, an alteriusvisceris culpa hos humores cumulent hæc vasa. Equidem venæ ipsæ à plurimis accusantur, quod calidâ & siccâ intemperie laborent; neque id negandum. Interim si omnia diligenter perpendamus, animaduertimus, vasa hæc eam ipsam intemperiem à vitiosis, quibus

An ab intemperie sicca?

Generatio affect. hypochondr.

Causa generationis affect. hypochondr.

Causa affect. hypochondr.

An ab obstructionibus venarum fiat affect. hypochondr.

An ex inflammatione circa stomachum?



quibus scarent, humoribus, & vicinis, visceribus malè sese habentibus, accipere.

Alij ventriculum caloris & siccitatis arguunt, vt supra dictum, similemque chylum in eo generari statuunt. Verum tantum abest, vt ventriculus sit calidior & siccior, vt etiam à plerisque frigidior statuatur; id quod ex saluæ copia, ructibus acidis, tardâ & difficili coctione, aliisque ventriculi frigidi signis cognoscitur, & cruditas nidorosa, quod fieri deberet, si intemperie calidâ & siccâ ventriculus laboraret, minus, sed acida potius hypochondriacis familiaris est, ac si quam bilem reiciât, ea non in ventriculo generatur, sed ex vicino epate effunditur. Et ipsi concedunt in hypochondriacis generari chylum crassum & viscosum, qui pituitosus potius est, quam melancholicus, & pituita etiam vomitu reicitur. Neque id ventriculi calorem arguit, quod præcesserunt febres ardentes, vel diurnæ. Nam id non semper accidit; & vbi accidit, febres tales potius calorem ventriculi dissipant, & imminuunt, quam augent. Et omnia alia, quæ pro asserenda ventriculi temperie calidâ, & siccâ afferunt, ea potius, vt etiam Diocles docet, vasis, quæ alimentum ex ventriculo excipiunt, competunt, quam ea à vitiosis humoribus accipiunt.

Atque ita *ἀντιπαξία* potius est inter ventriculum ac venam portæ, ac lienem & epat. Et sunt istæ contrariæ intemperies tam manifestæ, vt plurimi Medici dubitarent, vtram huius mali causam constituere debuerint. Et si quæ est caliditas & siccitas in venæ portæ ramis, quam etiam Diocles agnouit, eam potius acceperunt à liene & sanguine in eo elaborato, & mali si quid patiuntur ventriculus & venæ portæ rami, id acceptum ferunt lieni, qui sanguinem incommodum pro istis nutriendis elaborat, vt postea dicitur. Neque status calidam & siccam intemperiem ventriculi satis arguunt, de quorum generatione postea dicitur. Et quamvis in curatione mali adhibeantur, quæ primas vias detergunt, humectant, & modicè refrigerant: tamen hoc non fit ratione ipsius ventriculi, sed ratione vasorum, quæ sunt inter ventriculum & lienem. Et omnino ista *ἀντιπαξία* viscerum curationem difficilem reddit, dum audacter ventriculum calefacere non licet.

Quapropter si rem hanc hinc inde pensitemus, & humores ipsos, à quibus affectio hypochondriaca provenit, ac causas, quæ præcesserunt, diligenter consideremus, commodissimum videtur statuere, præcipuam, à qua vitiosi humores, proxima huius mali causâ, generantur, causam esse lienem: etsi quandoque & epat non extra culpam sit; Ventriculus verò, etsi quoque ad mali huius generationem facere possit, tamen non causâ proximam esse, sed remotâ, quatenus scilicet chylum prauum suppeditat. Cû enim lien, vt *Institut. l. 1. c. 9.* & supra *par. 4. c. 6.* satis monstratû est, & à doctissimis hodiè Medicis approbatur, etiam sanguificandi organum sit, & crassiorem chyli partem ad se trahat (quod etiam ii concedunt, qui tenuem sanguinem in eo elaborari statuunt) ac sanguinem crassiorem pro alendis in ventre inferiore visceribus, ventriculo, intestinalis, mesenterio, omento elaborat, & ita prima sanguificatio fiat in liene, ac quod impurum adhuc est, in liene, primû, ne ad epat perueniat, separari debeat: non mirum, si vel is debilis sit, & malè sese habeat, vel erratum aliquod in prima coctione commissum sit, quod in secunda hæc corrigi nō potest, vitiosum sanguinem in liene generari. Vt enim alia membra coctioni & officiis publicis destinata, vbi in actionibus suis sine suo frustrantur, vitiosos humores generant: ita idem in liene fieri necessarium est. Et sicut ventriculus frigidus cruditatis acidæ, calidus nidorosæ causa est, epat dum se malè habet, nunc sanguinè biliosum, nunc crudum, nunc aquosum generat: ita etiam lien malè dispositus vitiosum sanguinem generat, & præcipuè in hac affectione acidum. Atque ita in affectione hypochondriaca lien semper laborat. Hinc porro patet, si lien sanguinem pro sui officij ratione

non bonum generet, partes modò enumeratas etiâ bonū nutrimentū ab eo non accipere, & eas ipsas inde debilitari, ac multos vitiosos humores necessariò circa illas partes cumulari; imprimis si per convenientes vias non euacuentur. Etsi enim lien natura sua sanguinem crassiorem generat, atque etiam in eius coctione quædā excrementa proueniunt: tamen ea in homine sano non sunt plura, quàm quæ quotidie per convenientes vias iterū euacuari possint. Si verò plura ea proueniunt, quæ euacuari possint, ad mali huius generationem faciunt.

Sunt quidem nonnulli, qui lienem huius mali causam esse negant, & culpam in hac affectione in eum immerito trāsferri censent. Nituntur autem ea præcipuè ratione, quod lien, vt ex eius tota cōstitutione satis patet, nō melancholici excrementi sit receptaculum, sed sanguinis, & quidem tenuioris officina. Verum in priore equidē, quod scilicet non sit humoris melancholici receptaculum lien, ipsis facillè assentimur.

Deinde lienem sanguinem quendam feruidiorem ex crassiore chyli parte & sanguine arterioso mixtis generare, supra *part. 4. cap. 1.* dictum. Quod vero lien simpliciter tenuiorem sanguinem generet, facillè ipsis assentiri non possumus. Neque enim credibile, intestina & inferioris ventris membra, nobiliore sanguine, quā reliquas corporis partes, ali; & ipsum lienis parenchyma, quod rubore & puritate ab epatis parēchymate multū distat, & quodammodo nigricat, crassiorem etiam sanguinem in eo generari docet. Et quocunque se vertant ii, qui tenuem in liene sanguinē generari statuunt: hoc tamen fateri necesse habent, crassiorem chyli partem ad lienem, antequam ad epat proueniat, deferri; neque monstrare possunt, inde sanguinem in liene nobiliorem, quā in epate generari: vtpote qui, vt dictum, partibus ignobilioribus alendis dicatus est; & ex crassiore materiâ, quam sanguis in epate generatus, constat. Sit sanè, vt multo sero diluatur, non ob id tamen præstantior est: hoc ipsum potius eius crassitiē arguit, quæ, vt diluatur, multo sero opus habet. Vnde ipse etiam Aristoteles nō epati prætulit lienem, sed *ὀδον ἥρας* appellauit. Sit etiâ, vt hoc faceret lien; tamen rectè agens salem id præstaret, vbi scilicet succum aquoso humore dilutum & rectè coctum ad se trahit: vbi verò tenue quod est primò ad se trahit, & forsan etiam reicit, quod per vrinam fieri ipsa experientia testatur, antequam crassior pars succedat, non nisi vitiosum & crassum sanguinē, inde fieri posse, manifestum est. Itaque ipsi concedant necesse est, dū lien aberrat in suo opere, crassum gignere sanguinē, qui multo sero ad motum indiget, quo si destituatur, illudque præposterè aliud repiatur, multorum morborū causâ esse potest. Nemo verò opinor est, qui in lienē bene se habentē & sanū vel affectionis hypochondriacæ vel alterius mali causâ referre velit. Quamvis verò omnia symptomata, quæ hypochondriacis accidunt, proximè ex ipso liene deduci nō possint, sed facillè concedamus, in vasis & locis propositis materiam horum malorum causam hæere: tamen hinc non sequitur, quod liē nihil ad horum generationem faciat: sicut non sequitur, quod sanguificationis organum, licet non sit scabiosum, sanguinem vitiosum non generet. Si enim lien seu suo vitio, seu ob errorem externum, sanguinem excremento melancholico præter naturam scatentem generet, illud in locis modo dictis & in partibus, ad quas nutriendas is mittitur, cumulat. Vnde obseruatum est sæpissime, lienem & vicinas lienis venas nigro humore fuisse oppletas & distentas.

Verum quod Marcellus Donatus, *de hist. med. mirab. lib. 4. c. 8.* optat, id omnibus Medicis, præsertim in Germania optandum est, vt cadauera eorum, qui hoc morbo pereunt, inspiciendi potestas sæpe detur. Ita enim multæ controuersię facillè componi, & multis rectius consuli posset. Sed nescio quæ superstitiō obrinuit, vt piaculum vulgus habeat, cadauera hominum, aliàs vermium escam, anatomiz debite committere; cum tamen

An lien causa sit collectio-  
nis humorum  
vitiator. in  
affect. hypo-  
chondr.

Lien qualem  
sanguinē ge-  
neret?

An lien san-  
guinem te-  
nuiorē gene-  
ret?



men summorum Imperatorum, Regum, & Principum auctoritati id nihil deroger.

Cur lien sanguinem non generet?

Quod autem lien sanguinem bouem non generat, accidit, vel ipsius, vel chyli, quem è ventriculo accipit, vitio. Lienis vitium, quod plerumque prima huius mali causa est, principio est eius intemperies calidior, quam par est; cui sæpe & caliditas epatis accedit. Hinc enim accidit, ut lien, sicut & epar, ob caliditatem cibum & potum sæpe adhuc crudum ad se trahant, & quidem tenuem & aquosam chyli partem maturius, crassam tardius, unde postea crassior vehiculo destituta, in mesaraicis subsistit, atque ibi hærens vltius incrassatur, sæpe etiam adurit, & postea ad lienem petueniens non rectè coquitur.

Reliqua quod attinet, quæ lienis sanguificatione lædunt, & ob quæ is suis actionibus frustratur, quæ omnia erroris externi nomine veniunt, sunt primò cibi prauis succi, difficilis coctionis, & omnia, quæ humorem crudum, crassum, melancholicum generare solent. Quales sunt panis furfuraceus, non bene fermentatus, crusta eius, præcipuè legumina & lacticia, oua indurata & frixa, aues in paludibus & stagnis degentes, carnes ferinæ pleræque bubula, & omnes sale & fumo induratae, pisces palustres & viscosi exsiccati & sale conditi, brastica, & similia, dulcia etiam omnia. Nam τῶν σκληρῶν τὰ μὲν δρυμῶν καὶ τὰ μὲν πικρὰ ἀφέλιμα : τὰ δὲ γλυκῆα βλαβερὰ.

Verantamen intemperies illa calida non semper durat, sed ubi deferbuit, ut fieri solet, siccitas plerumque relinquitur. Imò non solum ad qualitates has respiciendum, sed & modus substantiæ attendendus. Ut enim ubi epar substantiæ suæ modum integrum obtinet, & succulentum, rubicundum ac floridum quasi est, rectè sanguificat: ita & lien, si naturalis illam διαθεσιν & substantiæ modum habeat, rectè etiā sui generis sanguinè generat, si verò sit siccior, durior, aut etiā scirrhusus, officium suum rectè exequi nō potest. Hinc etiam accidit, ut non pueros vel adolescentes hoc malum affligat, sed circa annum ætatis trigessimum plerumque inuadat, ubi iam temperamentum lienis sit siccus, eiusque substantia durior, simulque humores, qui in iuuentute à calore acriore adurantur, postea, ubi calor ille deferbuit, tenuioresque & calidiores partes exhalarunt, crassiores & melancholici fiunt, melancholicusque ex lienis natura tum sanguis generatur.

Cur pueri & adolescentes non affligat aff. hypochondriaca.

Et omnino omnes diætæ errores & τὸ ποικίλον τῆς διαίτης huc pertinet, & ob solos diætæ errores, nullo ante, in ventriculo vel liene, vitio existente hoc malum generari potest. Existimantque præstantissimi Medici, hanc ipsam in diætâ peccandi hodie licentiam, causam esse, cur pauci ab hoc malo immunes sint.

Non solum a cibi prauis chyli vitiosis causa sunt, sed etiam ex bono cibo & potu ventriculus, si vel natura debiliior sit, ut diætæ errores tolerare non possit; vel diætæ erroribus, vel etiam à liene prauum alimentum submittente debilitatus sit, prauum chylum generat; cum membrum, quod prauè nutritur, officium suum rectè exsequi non possit. Quas ob causas omnes ventriculus plerumque cruditis acidæ causâ est, si tamen calidior sit, & cruditatem nidorofam pariat, ea quoque, si sæpius continetur, ad hoc malum generandum facere potest.

Siue igitur ciborum, siue ventriculi vitiosus crudus & vitiosus chylus generetur, ubi ad lienem & epar transiit, propter crassitatem in viâ subsistit, & morâ trahit, flatibus originè præbet, hypochondria distendit, atque ubi calorem concipit, adurit, & vberiore postea melancholico humori materiam suppeditat.

Deinde etiam animi affectus, ira, & præcipuè, ira, & curæ ac mœstitiæ, malo huic causam præbent; ac vulgò etiam notum est, maximè incommodum esse, si quis iratus, vel perterritus edat vel bibat. Et quidem duplici de causâ hoc accidit. Primò enim ab eiusmodi affectibus spiritus, ut omnibus actionibus, ita & coctioni o-

borum necessarij, ad alias partes auocantur. Unde coctio in ventriculo labefactatur, crudusque & prauus chylus inde generatur. Deinde ut in ira bilis commouetur aliisque humoribus permiscetur, eosque corrumpit; ita etiam melancholicum, pituitosum & atrum humorem, si ira & mœror coniungantur, commoueri credibile est; qui cum chylo non benè cocto commiscetur, eumque amplius corrumpunt, unde sanguis laudabilis gigni nequit, sed humor chylo qualitatibus respondens, partim biliosus, partim melancholicus, partim ater gignitur, & hinc rursus pro alendis visceribus infimi ventris transmittitur, & in hypochondriis prauis humores cumulantur. Quibus accidit & hoc, quod in animi affectibus imprimis in arteriis humores mouentur & afficiuntur, cum verò lien arteriis multis abundet, easque quintuplo plures, quam venas obtineat, in animi talibus affectibus, & eius actionem turbare necesse est.

Hisce de causis omnibus ob ventriculi scilicet debilitatè & in victu errores, cum bonus chylus non generatur; vitium hoc coctionis primæ in secundâ non corrigitur; & quod peccatum est, nec in vena porta, nec in liene, nec epate emendatur; imò si hæc viscera non benè sese habeant, in iis amplius corrumpitur.

Deinde cum in ista, quæ in liene fit, sanguificatione etiam sua excrementa generentur, si ea non rectè excernantur, sed in dictis locis cumulentur, ad mali huius generationem plurimum facere possunt. Fit verò hoc, cum ea plura, quam par est, generantur, ut omnia debito modo excerni non possint. Faciunt huc quies & otium, ob quæ multa excrementa in corpore retinentur; imprimis si accedunt medicationes & lucubrationes cerebriores. Unde literati, & ii, qui vitam sedentariam agunt, maximè huic affectui sunt obnoxij.

Imprimis vita sedentaria, ut in genere ad excrementa in corpore retinenda multum facit, ita in specie ad accumulandos in dictis locis humores hosce multum potest. Cum enim glandulæ crebræ in mesenterio & pancreate hac etiam de causâ factæ sint, ne à ventriculo & intestinis repletis, vel corporis inflexione, & abdominis compressione ea vasa comprimantur, & distributio humorum impediatur: certè in vita sedentaria continua, vix fieri potest, quin vasa ista non aliquomodo comprimantur, ut etiam glandulæ istam compressionem satis prohibere non possint. Neque etiam necessarium est, ut in mortuis lien semper vel durus, vel scirrhusus, vel tumidus, vel alio modo ad sensum malè affectus reperiatur, sufficit, si vel eius temperies, ubi occultæ proprietates non sunt excludendæ, vel substantiæ modus sit læsus, ob quæ vitia non recta fiat in eo sanguificatio: quæ tamen sensibus deprehendi non possunt.

Quò faciunt & ipsæ glandulæ, quæ in mesenterio plurimæ sunt. Cum enim glandulæ non solum vasis, quæ per mesenterium plurima disseminantur, fulcimentum & firmamentum sint, sed & obstant, ne vasorum ductus vel à repletis intestinis, vel alia de causâ comprimantur: si ipsa præter modum intumescant, ipsa vasa comprimunt: & imprimis hoc præstare potest glandula illa insignior in centro mesenterij, quæ primæ vasorum distributioni addita est, & qua tumore laborante totius corporis marcorem, ob impeditam chyli distributionem secutam fuisse, obseruatum est.

Tandem etiam suppressæ consuetæ mensium & hæmorrhoidum euacuationes in causâ sunt, ut talia excrementa in primis viis cumulentur. Nam cum per hæmorrhoides naturæ instituto humores melancholici, adulti & salsi purgari soleant, si euacuationes istæ in iis, quibus consuetæ sunt, subsistant, aut si in foeminis sanguis, qui ad uterum descendere debebat, & vitiosus humores, qui cum eo solent excerni, subsistant, in hypochondria decumbunt, & malo huic materiam suppeditant. Et sæpe in foeminis affectiones hypochondriacæ & vterinæ ita similes sunt, ut vix discerni possint, imò interdum coniungantur.

Et nihil est omnino è rebus non naturalibus dictis, in cuius usu si peccetur, ut inde vel *χλωσις* vel *αιμάτωσις* laedatur, quod non etiam ad huius maligenationem facere possit; cum quicquid vitiosum in hisce coctionibus generatur, maximam partem in hisce locis cumulari soleat.

## CAPUT IV.

*Signa Diagnostica & Symptomata, quæ affectionem hypochondriacam comitari solent.*

*Signa Diagnostica & Symptomata, quæ affectionem hypochondriacam comitari solent.*

**T**ertium, quod explicandum iam est sunt Symptomata, quæ in affectione hypochondriaca occurrunt, atque ita vna opera signa diagnostica simul explicabuntur. Etenim, ut de causis, quæ antecesserunt, quæ etiam signorum fontem præbent, nihil amplius dicamus, cum supra explicatae sint, adfunt cruditas & *ἀπεψία* ventriculi, flatus, rugitus ventris, ructus acidi, salivæ multa, alvus est adstrictior, ætus in hypochondriis, lien in quibusdam inflatur & intumescit, urina varia est, nunc tenuis nunc crassa, turbida, feculenta, rubicunda: animi anxietas, arteriarum in sinistro hypochondrio pulsatio, respiratio difficilis cordis palpitatio, pectoris dolor, lassitudo spontanea, dolor crurum, vertigo & oculis obuerfians caligo, aurium sonitus, in quibusdam metus, tristitia, delirium, & alia. Non tamen in omnibus eadem, sicut & in aliis plura, in aliis pauciora apparent.

Primo in plerisque hypochondriacis ventriculus male se habet, & multæ circa eum apparent Symptomata, adeo quidem ut nonnulli interdum hoc modo affecti saltem ventriculo sese male habere putent, eumque solum accusent. Neque mirum, hoc accidere. Longè enim alia est partium, quæ sibi saltem nutriendis laborant, ratio, quàm earum, quæ toti corpori prospiciunt. Nam licet musculo alicui malum nutrimentum apponatur, toti corpori id parum nocet: at si membrum toti corpori inferniens non bene sese habet, toti corpori damnum infertur. Res manifesta est in epate, quod dum sanguinem non bonum generat, cachexiæ, hydropis, scabiei, & aliorum malorum causa est. Idem in ventriculo accidit. Nam si sanguis pro nutritione ventriculi è venæ portæ ramis affluens non bene se habeat, ipse etià malè nutritus debilitatur, & malè coquit, & cibum in alienam ac vitiosam planè substantiam convertit; imò cibos quosdam ex peculiari vitio planè non alterat, ut licet cibi reliqui mutantur, hi tamen postea planè crudi vomitu reiciantur.

Atque ita reciproca quædam malorum generatio est, dum lien prauum sanguinem nutriendo ventriculo suppediat, atque ab eo rursus malum chylum accipit. Nimirum plerique hypochondriaci malè cibos coquunt, & non in chylum bonum, sed in materiam nunc aqueam, acidam, acerbam, ponticam, nunc viscidam mutant, quæ cum nec ab intestinis, nec vasis mesaraicis, utpote ingrata & corpori alendo inepta, attrahatur, atque ita in ventriculo hæreat, nunc sursum repit & linguam acios salinam & humiditatem aqueam copiosa replet, ut continuò ægri salivam & pituitam exspuere cogantur, sæpe etiam vomitu reiciuntur. Antequam verò id fiat, maximam sæpe præcedit in ventriculo humoris huius ebullitio & inde flatuum copia excitatur, qui non solum ventriculum, sed & vicinas partes distendunt, & tantam circa præcordia angustiam atque anxietatem excitant, ut ægri in lipothymiam interdum incendant. Quæ Symptomata non prius cessant, quam quod crassius est vomitu reiciatur, quod verò tenuius & vaporosum, per poros & *ἑσπυον διασπύου* discutitur, quod interdum cum horrore febrili accidit, quem etiam calor quidam sequitur, qui postea sudore euanesceat. Nonnulli quidè hæc omnia idè accidere putant, quod crassiores chyli partes propter obstructionem venarum non possint descendere & distribui. Verum obstructio sæpe nulla adest, & propterea nobis, ut dictum, probabilius videtur, id

idè accidere, quia cibus & potus non in chylum bonum mutatur, sed in materiam alienam & naturæ inutilem convertitur, unde eam reliquæ corporis partes à ventriculo nec attrahere nec recipere cupiunt. Interim tamen hoc hic notandum, cum ægri cum talibus vomitibus continuè sæpè diu viuant (sicut monialem illam, quæ, ut refert Guil. Fabricius *cent. 4. observ. 32.* ab ætatis anno decimo tertio ad quadragesimum quartum singulis diebus materiâ pituitosam, ac instar glutinis viscidam euomit, hypochondriacam fuisse putamus, ut & aliam fæminam novimus, quæ à multis iam annis sæpissimè acida & falsa euomit, ut etiam dentes ipsi stupefiant, interim sua munia sat benè obit,) & excrementa alui etiam reddant, necesse est, aliquid cibi in bonum chylum mutari, idque etiam à natura retineri & attrahi, inde accidit, ut, quod mireris, dum ægri illam pituitosam & aquosam materiâ, in quam cibus corruptus est, vel inter edendum etiam, continuò exspuunt, vel mox post cibum sumptum euomunt, nihilominus cibus modò assumtus non simul reddatur, & euomatur, utpote ex quo natura adhuc aliquid utilis alimenti elaborare conatur.

Moneñdum tamen hoc, ea quæ è ventriculo euomuntur, non omnia in eo generari, sed interdum etiam è liene & locis vicinis transmitti. Ita verò tam acida à quibusdam euomuntur, ut etiam dentes, ut modò dixi, ab iis stupefiant, quæ procul dubio in liene vitiosè coquente generantur; quæ atræ bilis nomine vulgò veniunt, etsi atrum colorem non semper habeant. In quibusdam vitiosi humores per vas breue cum sanguine in ventriculum è liene effunduntur, atque sanguis iste per vomitum postea reicitur, in quibusdam etiam per alium euacuatur.

Flatus deinde huic malo ita sunt familiares, ut ià olim etiam, teste Diocle, flatuosa hæc affectio sit appellata. Cum enim flatus duas habeant causas, calorem imbecillum & materiam humidam, eæ & hic locum habent: Frigus enim nimium cum resolueret materiam non possit, vix illum flatum excitat; sicca etiam materia, utpote non resolubilis, materiam flatibus non præbet. Verum sciendum est, non solum eum calorem dici debilem, qui natura sua talis est, & qui materiam aliàs commodam coquere, vincere & subigere non possit, sed & cum hic intelligendum esse, qui aliàs quidem satis fortis est; aut sæpè naturali maior, non tamen tantus, ut materiâ, quæ vel nimis copiosa est, vel viscida, aut omnino talis, ut resoluta multos vapores excitet, omnem discutere possit. Vtroque modo in hypochondriaca affectione flatus, & inde provenientes ructus, rugitus & murmura generari possunt. Primo enim cum ventriculus & intestina (nam plerumque labes illis communis est) cibum non rectè concoquere possint, multi flatus inde generantur: deinde cum calor in vasis illis, quæ sunt inter ventriculum & lienem, vicinisque in locis sit validior, & materia ibi flatulenta hæreat multa, & quotidie ex coctione ventriculi debili chylus crudus, crassus & flatulentus ad venæ portæ ramos transmittatur, non mirum etiam est, multos flatus inde generari. Vnde rectissime scripsit Fernelius, *lib. 6. de part. morb. ac sympt. cap. 3.* tunc præsertim ructus & flatus generari, cum bilis flava vel atra ventriculo subternitur.

Vbi autem flatus illi hæreant, dubium. Equidem in ventriculo & intestinis etiam flatus eiusmodi hætere non negamus: verum imprimis in sinistro hypochondrio fluctuatio percipitur. Cuius rei causam nonnulli constituant colon intestinum, quod eò loci sit arctius, vbi facilius flatus sedem figere, quam exire possint: tamen quia & inde exitus aliquomodo patet, hic locus esse non potest. Scribit enim Marcellus Donatus, *de historia medicæ, mirab. lib. 4. cap. 8.* se semper obseruasse, quamuis repetitis euacuationibus cætera Symptomata quiescant, nunquam tamen fluctuationem tolli, neque imminui etiam, idque argumento esse, aquositates eiusmodi (ad-

*Flatus & ructus quomodo generantur in Aff. Hypochondr.*

*vbi flatus hæreant.*

do etiam flatus) aliquo loco contineri, à quo nullo pacto possint vel saltem difficile dimoueri. Ipse verò statuit, hunc locum esse inter binas tunicas seu membranas Mesenterij. Calore enim absumpta pinguedine inter binas illas membranas vacuum locum relinqui, qui postmodum paulatim ichoroso humore à venis Mesenterij resudante repleatur, qui compressis intestinis moueatur & hanc fluctuationem edat. Verum si causa esset, hæc absumptio pinguedinis in mesenterio, in omnibus eius partibus æquè hæc fluctuatio perciperetur. At verò in sinistro saltem hypochondrio in vno loco percipitur, & noui quosdam, qui quoties sinistram hypochondrium, & quidem vno saltem in loco comprimerent, sonitus ab adstantibus audiretur.

Vero ergo magis consentaneum est, istos flatus contineri in illa cauitate in sinistro hypochondrio sub diaphragmate, ex ventriculi, omenti, coli & viscerum connexu orta, & exitum non habente, sed ita conclusa, ut aquam & flatus continere possit, ab Hier. Fabr. ab Aquap. in historia seu structura omenti luculenter descripta, de qua supra etiam dictum.

Ventriculi quoque dolores vehementes adsunt, qui nonnullis ad dorsum vsque procedunt, ut ab ægris, imò incautis etiam Medicis, sæpe pro Nephriticis habeantur; concoctis deinde cibis quiescunt, mox aliis cibis ingestis eodem modo reuertuntur, qui interdum ieiunos, interdum etiam à cœna molestant, & non cessant, prius quam ægri euomant cibos crudos & phlegmata subamara & calida & acida, adeò ut dentes stupore inficiantur, ut Diocles, loco apud Galenum antea allegato, habet. Cum enim, ut supra dictum, ventriculi tunica prauis humoribus à liene & epate ed effusis infecta sint, non mirum, si is non bene coquat, cibisque & potus vel crudus vel parum muratus maximas anxietates & dolores excitet. Cum enim in chylum mutatus non sit, ab intestinis nec attrahitur, nec admittitur, in ventriculo moram trahit & in flatus mutatus grauissimorum symptomatum causa est. Ita vir quidam nobilis, horà à cibo sumto quartà, vel quintà, quotidie grauissimos dolores patiebat, qui à ventriculo in dextro latere versus dorsum & scapulas vsque extendebantur. Quà de causa pro Nephritico curatus fuerat, cum simul reddere urinam rubram, crassam, hypochondriacis & scorbuticis familiarem, quæ ubi turbabatur, sedimentum rubrū, instar farinæ vel pulueris laterum, copiosum deponebat, quod pro calculo resolutio male habitum fuerat. Non verò mirum, ventriculum male affectum partes vicinas, imò ipsos renes in consensum trahere. Etenim si renes male affecti ob membranae cõmunionem, ventriculum in consensum trahere possunt: quidni reciproco modo ventriculus dolens renes in consensum trahere possit? Quamprimum verò Nobilis is cibum & potum, qui ita crudus adhuc erat, ut potus odor etiam post horam quintam perciperetur, vomitu reiciebat, confestim dolore & anxietate illa liberabatur & bene se habebat, quasi nihil mali passus esset. Euomebat verò simul pituitam viscidam sibi coherentē spithamæ sæpe longitudine; per aluum verò, quæ, nisi medicamentis irritaretur, nunquā reddebat, eadem sine fecibus etiam reiciebatur, sæpe vloe & sesquialnæ longitudine sibi coherens, ut famulus cum eam aspiceret, serpentem ab hero per aluum deiectum esse exclamaret. Vide etiam supra p. 2. f. 1. c. 5.

Alius adstricta est ob vasorum sæpe, in vtroque latere & vtriusque visceris, Lienis & Epatis, siccitatem, ob quam alui obstructionem & flatus retinentur, qui hypochondria tendunt, & tandem fecibus permixti eas bubuli stercoreis similes reddunt. Accedit hisce & hoc, quod cibis sæpe saltem in pituitam quandam & humorem viscidum & flatuosum mutatur, ut modò dictum, qui cum corpori alendo ineptus sit, in intestinis non promouetur, & ut viscidus & glutinosus pertinacius iis adheret, alui continuo adstrictæ causa est. Neque enim facultas

expultrix humorem tam viscidum, nisi medicamentis adiuuetur, reicere potest. Interdum tamen, si humores aciores reddantur & exasperentur, fluxus alui excitatur, nunc biliosum, nunc melancholicum & nigrum humorem admixtum habens.

Æstus etiam in hypochondriis & quasi inflammatorius quidam affectus molesto ardore & feruore interno, nunc in vno, nunc in vtroque hypochondrio ægros affligere solet, ex humoribus calidis & feruidis eò loci conclusis. Et solet iste calor ac æstus sese magis exferre, ubi vel cibi aut potus caliditate vel aliâ causâ humores agitati fuerint. Solentque tunc calidis vaporibus sursu ascendentibus malæ & tota facies rubescere. Interdum etiam, & quando vapor ex largiore potu præcipue, per corpus vniuersum dispergitur, ephemera febris quasi excitatur, quæ vaporibus illis sudore discussis intra paucas horas euanesceat.

Vrina est nunc tenuis, cum scilicet humores crassi urinæ vias obsident, quæ simul paroxysmi, ob flatuum & materiæ retentionem & caloris augmentum instantis, sunt indicium. Plerumque turbida, crassa, rubra, acris; ob materiæ admixtionem, imò interdum & foetida. Quia verò plerumque cum talibus urinis materia multa adusta salis particeps, quam tartaream appellant, copiose excernitur, accidere solet, ut ubi vrina turbatur, subsideat, vel copiose, instar arenularum rubrarum, maturarum parietibus vndique adhærescat, ægrisque calculi metum, qui tamen sæpe nullus adest, afferat. Et si n. & à renum caliditate sæpe ista sabulosa materia proueniat: tamen & in epate ac venis crassiores & tartareæ sanguinis partes in materiam eiusmodi coagulantur, quæ continuo per urinam redduntur, sine vlla calculi molestia.

Adest etiam anxietas, quæ accidit, non solum dum vapores ad cor ascendunt, idque affligunt, sed & dum ventriculus afficitur. Dum enim cibis semicrudus in eò moram trahit, & in flatus resolvitur, anxietatem ventriculi patit. Si verò ad vasa vicina intemperie calida laborantia peruenit, sit à calore igneo quasi quædam ebullitio, partesque chyli plurimæ in flatum abeunt; qui non solum ventriculum, sed & hypochondria extendunt, & in partibus iis, quæ sensum à nervis sextæ coniugationis accipiunt, angustia ibi producit atque anxietatem, cui sæpe lipothymia accedit. Idque eò facilius accidit, quod ipsa hæc vasa, ut & lien, intempestive, quod tenuius est, ad se primò rapiunt, crassior verò pars chyli seorsim relicta diutius moram in hisce vasis trahens corrumpitur, naturæque aduersam qualitatem accipit & in excrementum potius, quam alimentum abit. Neque hæc symptomata prius cessant, quam natura quod crassum est, vomitu reiecerit; quod verò tenuius est, per poros cutis vel sensibilibiter formâ sudoris, vel insensibilibiter discusserit. Acciditque hoc sæpe cum horore quasi febrili.

Affligit etiam sæpe ægros cordis palpitatio & animi deliquium, quæ sunt partim ob ventriculi consensum, partim quod ab humoribus prauis similes vapores ad cor ascendunt, quos dum cor depellere & à se amoliri conatur, hunc celerem, velocem & inordinatum cordis & artieriarum pulsum excitat. Atque tum plerumque ægri de via desperare & auxilium omni modo postulare solent. Iidem vapores pulsus varij causa sunt.

Pulsatio præterea in sinistro hypochondrio fit ab intemperie calida. Ut enim arteriæ temporum pulsant magis, si corpus vel à vini potu, vel calore Solis incalescat, etiam si calor maior sit in coeliaco ramo, qui in hæc loca distribuitur, fit inde pulsatio; idque præcipue post vehementiorem motum & iram accidit. Ad quam rem etiam faciunt glandulae in mesenterio plurimæ, & præcipue magna illa, quæ in centro eius primæ vasorum distributioni addita est. Cū n. glandularum harum & hic usus sit, ne vasorum ductus comprimantur, si illa multo crasso & melancholico humore turgant, artierias

rias comptinunt, vnde in arteria coeliaca sinistram partem perreptante maior pulsatio excitatur.

Dum autem vapores illi resoluuntur, & per oesophagum vel asperam arteriam ascendunt, palatum, linguam, & os exiccant, & sitim leuem excitant.

Respiratio difficilis sæpe redditur, & quidam dolor & constrictio in pectore persentitur, cum ob nervos musculis pectoris dicatos affectos, ut postea diceretur, cum quia per venas & arterias vapores è materia parua in hypochondriis stabulante in musculorum spatia effunduntur, vicinasque membras afficiunt, ut supra dictum. Quibus accedit & hoc, quod flatus & vapores partim ex crudis humoribus in ventriculo, partim ex pravis humoribus in hypochondriis collectis excitati diaphragma comprimunt.

Dum verò, ut dictum, lien aquosam ac tenuem chyli partem maturius ad se trahit, eam in vapores tenues & acres resoluit, qui ad caput eleuantur, illud replent, cerebrumque perturbant. Et aliàs etiam humores melancholici & adusti in hypochondriorum venis & arteriis hærentes vapores multos de se emittunt, qui ad caput per venas & arterias adicédunt vnde varij affectus ac symptomata in capite ac nervoso genere ortum habent. Etenim dum panniculos cerebri peruadunt, illos lancinant, doloremque excitant, ita ut nonnulli cerebrum è cranio quasi euelli sibi conquerantur: dum cerebrum peruadunt, spiritus perturbant, oculis caliginem suffundunt, aurium tinnitum excitant. Nonnullis vertigo oboritur & caligo oculis obuersatur; aliis aurium sonitus, in nonnullis tristitia, metus, falsa imaginatio & deliria. Melancholica sunt vitio spirituum, qui à vaporibus illis inquinantur, ut lib. 1. *Practica de Melancholia hypochondriaca* dictum. Nonnulli enim continuò sibi ab Apoplexia, alij ab Epilepsia, alij à subita morte metuunt, alij se fascinosos esse credunt, alij alios morbos imaginantur. Hinc nonnulli perpetuà tristitià, alij etiam fletu & eiulatu se macerant.

Tandem verò, sique diu malum duret, in Melancholià abit: sique vapor vel humor cerebro communicatus ut atra bile adusta, maniam excitat. Si vapores sunt acres, Epilepsiam quandoque pariunt. Ita memini, virum hypochondriacum Epilepticum factum, & tandem etià cecè euasisse. Idem antea Somnambulo fuerat. Quandoque etiam malum in Apoplexiam terminatur.

Dum verò nervos vapor ille occupat, prout vim vel narcoticam vel nervos vellicandi habet, symptomata Paralyfi & conuulsioni similia in iis excitat. Hinc si in nervos linguæ feratur, sermonem difficilem reddit, aut musculos laryngis constringit. Si ad nervos thoracem mouentes feratur, difficilem respirationem excitat ut præcordia & thorax quasi constringantur. Si nervos brachiorum & crurum peruadat, membra hæc ad motu pigra reddit & lassitudinem in iis excitat. Ad lassitudinem tamen excitandam etiam facere possunt humores serosi, quando cum sanguine per venas & arterias in ambitu corporis distribuuntur & præcipuè ad crurum musculos descendunt, eosque grauant, ut tendi membra & pondere quasi appenso grauiora putentur. Imò interdum in iisdem partib. dolor excitatur, cum iisdem humores serosi, vel etiam vapores membranæ ac nervis sese insinuant, easque tendunt & vellicant. Ad extremos digitos cum manuum tum pedum tandè delati formicationis sensum, vel stuporem in iis, nunc hoc vel illo excitant.

Vapores iidem cum sint calidi & sicci ac melancholici, spiritus animales perturbant, cerebrum exsiccant, & ita vigilias molestas, aut somnos perturbatos ac insomnia terroris plena pariunt. Imprimis verò vigilie post mediam noctem plerisque molestare solent. Et si enim post cœnam ad mediam noctem aut horam primam noctis satis bene dormiunt: ramen postea euigilant, & alij quidem duabus vel tribus horis vigilant, & de-

dormire incipiunt, alij verò planè iterum dormire non possunt. Quod accidit procul dubio, dum chylus distribuitur, & ad secundam coctionem ac lienem & vicina vasa peruenit. Tum enim humores vitiosi in iis latentes agitantur, & ex agitatissimis vapores eleuantur, qui per venas & arterias ad caput delati vigilias excitant, quæ in nonnullis ad diem usque durant, in quibusdam verò, iis discussis, iterum somnus succedit.

Non tamen ista symptomata omnia in omnibus, sed alia in aliis apparent, nunc pauciora, nunc plura, pro humorum varietate, & prout hæc vel illæ partes magis læduntur. Aliquando enim, ut & antea dictum, nunc in vnius tantum hypochondrii vasis vitiosi humores continentur, nunc in vtriusque; nunc etiam lien, nunc epas, nunc vtrumque viscus simul ab humoribus vitiosis obfidetur. Non verò est de essentia mali hypochondriaci, ut in hypochondriis tensio, durities, dolor, & tumor percipiatur cum plerumque fomes mali saltem in ramis vena portæ & arteriis vicinis hæreat, & inde vapores ad cor & cerebrum transmittantur.

Et si verò hypochondriaca affectione laborantes subinde aliquid mali, de quo conquerantur, habeant: tamen, qui eo grauius laborant, vehementioribus interdum paroxysmis infestantur. Etenim si quacunque de causa, seu interna seu externa, Camarina illa & colluies vitiosorum humorum in hypochondriis mouetur, vapor ille statulentus ex materia commota excitatus nunc ad ventriculum, nunc ad cor, nunc vtrumque viscus viam affectat. Et quidem dum ventriculum petit, eum distendit, ac ructus excitat, & acrimoniâ officium ventriculi afficit, indeque cerebrum in consensum trahit, atque anxietatem lipothymie similem circa præcordia inducit; per gulam verò porro ascendens nervos linguæ afficit, vnde lingua quasi rigere & ad loquendum immobilis reddi incipit, ut de apoplexia sibi ægri metuunt. Eadem de causa nonnulli de obstructione oesophagi & suffocationis periculo conqueruntur, id quod præcipuè cibum sumturis accidit, ut de *Scorbuto* postea, sect. 2. cap. 5. dicitur; ob vapores stipticos & adstringentes ascendentes, & vel oesophagum distendentes ac vicinam arteriam comprimentes, vel musculos laryngis & asperam arteriam contrahentes & strangulantes quasi. Dum per coeliacum arteriæ ramum in arteriam magnam & hinc ad cor ascendit, eius palpitationem & difficilem respirationem ac dolorem in parte pectoris anteriore excitat. Per vtramque verò viam dum ad cerebrum peruenit, spiritus perturbat, & oculis caliginem suffundit. & dum panniculos cerebri peruadit, illos lancinat, ita ut nonnulli cerebrum quasi è cranio sibi euelli conquerantur. Dum porro isti vapores è cerebro secundum ductum neruorum deorsum feruntur, interdum stupor quidam & motus formicans nunc in dextro, nunc in sinistro brachio, nunc in hoc, nunc in illo digito percipitur; ac dum tandem nervos ex osse sacro prodeuntes attingit, atque in iis eundem affectum excitat ægri, ne concidant, metuunt, & locum quieti quærunt. Interim sudore frigido madescunt, tandemque calore cordis sese exferent & vaporibus discussis, ægri ad se redeunt, nec amplius quid mali sentiunt, nisi quod de morbo grauiore, epilepsia, apoplexia & subita morte sibi metuunt, & hac tristitia & metu se continuò macerant.

Atque ex his, quæ hæcenus recensuimus, symptomatibus satis malum hoc cognosci potest, ut signis diagnosticis aliis opus non sit. Signa tamen partium præcipuè affectarum & causarum addere vtile fuerit. Si in ipso liene humor contineatur, tensio & durities in regione lienis percipitur, facies est male colorata. Si in epate contineatur humor, è regione epatis tensio percipitur. Si in vasis solum inter ventriculum lienem & epas, post cibum, & cœnam præcipuè horis circiter 6. vel 7. flatus, rugitus, & dolores percipiuntur, nec tumor vel durities in alterutro vel vtroque latere percipitur. Si etiam ventriculus valdè laboret, è coctionis vitio

Signa partium affectarum.



vitio id cognoscitur. Vterus si malo originem dederit, mensium suppressio adest, & frequens in ventre inferiori rugitus percipitur.

Et quia *ἀντιπαθία* viscerum, ventriculi & epatis, in hoc affectu plerumque adest, & curationem difficilem reddit, eam signis cognitam habere utile est. Iecoris autem intemperies è suis signis cognoscitur, maxillarum rubore, manuum & pedum calore, urina rubore, ac siti. Intemperies verò ventriculi frigida ex cruditate acida cognoscitur; cui si quandoque accedit nidorosa, sit hoc ob epatis calorem, atque hoc non accidit, nisi utraque causa adsit, & tunc adsunt flatus multi, dum calor epatis nimius in crassiores materia agit.

## CAPVT V.

### Prognostica.

Prognostica  
affect. hypo-  
chond.

1. Difficilis omnino hic affectus est, & quo vix alius tanta symptomatum varietate & ægro & Medico plus negotij facessit. Idque cum ipsius humoris ratione, qui contumacissimus est, tum ob viscerum *ἀντιπαθία* & contrariam tum eorum, tum humorum intemperiem. Etenim ventriculus plerumque frigidus est, contra humores in hypochondriis & ipsa vasa, quibus continentur, calida.

2. Quibus accedit, quod malum hoc plerumque in habitum degeneravit. Cum enim prauum alimentum visceribus hisce nutriendis à liene transmittatur, inde illarum dispositionem euerri necesse est.

3. Curationem etiam difficilem reddit, quod materia, quæ sæpissime in cavitatem illa omenti continetur, non facile exitum habet & ibi conclusa detinetur.

4. Tandem cum malum hoc sit pertinax, & quod curatio non semper ex voto succedit, causa non minima est, quod ægri raro in continuandis medicamentis obediunt, plerumque & Medicos sæpe mutant.

5. Lenius malum est, cum in dextro hypochondrio mali causa hæret, & vehementiora habet symptomata: quæ eò sunt grauiora, quod humor magis ad atræ bilis naturam accedit. Et si saltem in vasis, nullo verò in viscere humores contineantur, mitius malum est, cum materia in omenti cavitatem continetur; cum vix purgantibus medicamentis inde exturbari possit.

6. Hæmorrhoides, varices, & sæpe in mulieribus menses malum hypochondriacum solvunt. Si tamen sint moderata; si verò diutius durant, periculum portendunt. Hæmorrhagia quoque naris sinistra interdum prodest.

7. Mares equidem, quam foeminae, facilius hoc malo corripiuntur; cum foeminae humidiores sint, & cum mensibus sæpe prauis humores euacuentur: si tamen eas corripiuntur, difficulter vel raro curantur, cum & causam vehementem præcessisse necessarium fuerit, & plerumque vterini affectus sese huic malo associant, idque grauius reddant.

8. Urina crassior melior est in hoc morbo, quam aquosa & tenuis, quæ crassos humores in corpore detineri arguit. Nigræ quoque urinae sine febre sæpe hunc morbum solvunt.

9. Aluum in hoc morbo laxam habere, bonum; contrarium, malum. Vomitus quoque cum *εὐπορία* sæpe vilis.

10. Verrigo & diurnus capitis dolor in hypochondriacâ affectione in epilepsiam & convulsiones vel cæcitatem, interdum in utrumque abit, nonnunquam in apoplexiam mutatur.

11. Affectio hypochondriaca sæpe quoque scorbutum comitem sibi adsciscit, interdum etiam in hydroperem degenerat.

12. Hypochondriaci sæpe nauseabundi vomentes, assumpta male concoquentes, vel in febres, hæcticæ non absimiles incidentes, tabidi moriuntur.

Dan. Sennerti Tom. II.

## CAPVT VI.

### Indicationes & Curatio.

Indicationes  
& Curatio.

Curationem quod attinet, cum causa, è qua symptomata & mala antea enumerata in hac affectione ortum habent, sit colluvies illa humores vitiosorum in hypochondriorum locis supra explicatis hæres, facile hinc patet, primariam indicationem esse, ut illi humores euacuentur, & vapores, qui ab iis eleuantur, & variorum symptomatum causa sunt, discutiantur. Quod ut commodè fiat, non solum viæ illæ, per quas euacuandi sunt, lenientibus medicamentis expurgandi; sed & cum humores illi crassiores sint, & ob ventriculi coctionem læsam pituitosi & viscerum humores admisceantur, incidentibus, attenuantibus, aperientibus ac detergentibus opus est. Verum cum & humores mali huius præcipua causa sint calidi, & vasa illa, in quibus continentur, sint calidiora & sicciora, quam par est, & inflammatoriam quasi dispositionem habeant, non solum citra insignem calefactionem hæc peragenda, sed & moderatè refrigerantibus & humectantibus, illamque intemperiem corrigentibus opus est. Postea danda opera, ne humores hi vitiosi iterum generentur; & proinde patrum, quarum vitio generati sunt, intemperies & debilitas corrigenda, naturalis verò constitutio cōseruanda & roboranda, atque ita humorum vitiosorum generatio præcauenda. Tandem partes, quæ humores & vapores illos suscipiunt, atque ab eis afficiuntur, roborandæ, & ab insultu humorum & vaporum defendendæ, vaporesque à partibus principibus auertendi, ac symptomata tollenda.

Verum hæc omnia expedire difficilimum est. Etenim cum Indicationes dentur contrariæ, & quidem ventriculus plerumque debilis calida requirat, attenuantia etiam & incidentia, aperientia, ac detergentia medicamenta pleraque calida sint; contra inflammatoria illa vasorum dispositio & humorum calida intemperies refrigerantia requirat: cautè agendum, ne dum vni prædesse studemus, alteri noceamus.

Venæ sectionem quod attinet, tum humores morbi causa in venæ portæ ramis consistent, si ex eodem modo, ut venæ cavae rami, passim in corpore aperiri possent, commodissime per eas cum sanguine vitiosi humores euacuarentur. Verum ea commoditas non datur, nec ullus venæ portæ ramus ad extrema corporis pertingit, nisi hæmorrhoidalis ad intestinum rectum pertingens. Hic ergo si aperiatur, affectum hunc felicissime curat; cum vitiosos humores in venæ portæ ramis collectos euacuet. Verum hoc vix vnquam feliciter accedit, nisi natura sponte hæmorrhoides eas aperiat, aut certè humores eò protrudat, & per eas vitiosos humores euacuare cōsuerit sit. Hoc enim nisi fiat, & externæ hæmorrhoides arte aperiuntur, tunc id, quod Riolanus monet, accedit, & sanguis, qui peccat in venæ portæ, non euacuatur, sed bonus è venæ cava, qui non peccat. Hæmorrhoides verò internæ, modò commodè id fieri possit, etiam in iis aperiiri possunt, quibus nunquam fluxerunt vel tumuerunt, ut latentes in vicinia vitiosi humores per eas euacuentur, & natura sanguinem vitiosum per hanc viam euacuare aduascet, quæ sæpe etiam sponte per hanc viam humores vitiosos in venæ portæ ramis collectos cum ægri comodo euacuare solet.

Cum autem hæmorrhoides duplices sint, internæ, à venæ portæ, & externæ à venæ cava ortæ: non sine causa quaeritur, an utraque, seu à natura seu arte aperta, idem in hypochondriaca affectione commodum præstent. Plerique hæmorrhoides externas, cum à ramo hypogastrico proueniant, parum commodi in hac affectione afferre posse statuunt. Etenim Hieron. Fabricius ab Aquapendente, de operat. chirurg. c. de hæmorrhoidib. in quo prolixè & diligenter ea, quæ de hæmor-

Venæ sectio.

Hæmorrhoides duplices.

rhoidibus dici possunt, explicat, statuit (& res ita se habet) dari duplices hæmorrhoides, alias à vena lienis, alias à vena caua, quarum illas alij internas, has externas nominant. A magno enim venæ portæ ramo, qui ad lienem fertur, quasi ab eius medietate oriri propagationem effatu dignam, & rectâ per mesenterium ad intestinum rectum descendere, eique retro magis versus cecygem inferi, & tandem oris suis in intestini huius finem desinere, atque has esse hæmorrhoides à portæ seu lienis vena scribit. Similiter à venæ cauæ & arteriæ magnæ propaginibus, quæ in magnâ cavitare ab osse sacro & coxendice efformata producuntur duos effatû dignos ramos ad anum seu musculum, intestinum rectum cingentem, sphincterâ dictum, descendere, & vnû in dextra, alterum in sinistra parte, & ita retrò potius & parti posteriori intestini, has verò potius ad latera inferi docet. Atque venas illas è porta antiquis notas, has verò à caua incognitas esse scribit, ea de caussa quòd quod cum hæmorrhoides, quæ à porta proueniunt, sanguinem crassum, nigrum & feculentum euacuent, quæ verò à caua, plerumque tenuiorem & serosiores, antiqui saltem hæmorrhoidum, quæ crassum sanguinem euacuant, morbisque melancholicis & à liene ac vena portæ ortis profunt, mentionem faciant, vt ex Galeno, 3. aph. 4. 6. aph. 11. 12. 21. 47. 48. 2. ad Glauc. 6. epid. comm. 3. & comm. 6. t. 8. videre est. Hieronymum Fabricium sequitur Ioh. Riolanus, *Anthropographia lib. 2. cap. 17.* qui similiter statuit, hæmorrhoidas internas prouenire à ramo venæ portæ hæmorrhoidali, externas verò ab hypogastrico, illasque recti intestini partibus internis inferi, has in partes externas, ani musculos scilicet, disseminari; hæmorrhoidalem portam esse vnicam, sociâque habere arteriam à mesenterica infra ramos producentem; hæmorrhoidalem verò cauæ esse duplicem, vtrinque vnam, & vtramque comitem habere arteriam ab hypogastrica deriuatam: ac proinde per illam portæ cacochymiam, per has venæ cauæ plethoram euacuari. Propterea medicos reprehendit hæmorrhoidibus addictos, quod dum externas hæmorrhoides aperiant, purum ac tenuem sanguinem extrahunt, crassum & impurum intus relinquunt. Atque hoc discrimen iidem antiquis incognitum esse existimat.

Verum enim verò etsi quæ de historia hæmorrhoidum diligenter à doctissimis hisce Viris scripta sunt, verissima esse concedimus, atque hoc etiam admittimus externas non satis commodè aperiri ad humorem melancholicum euacuandum, nisi spontè à natura aperiantur: sunt tamen quædam, quæ in hisce opinionibus desideramus. Sit enim sanè, vt originem externarum hæmorrhoidum à vena caua prouentum antiqui ignorauerint, quod tamen in medio relinquimus: ipsi tamen externas nullo modo ignorare potuerunt, vt pote quas oculis obuias habuerunt, quasque sæpe viderunt.

Ex quo sequitur alterum, per hæmorrhoidas externas etiam atros & alios vitiosos humores, qui circa lienem & epat colliguntur: euacuari. Cum enim antiqui has hæmorrhoidas non ignorauerint, interim affirmet, vt ex locis antea allegatis apparet, per hæmorrhoidas euacuari hepatis materiam feculentam, bilem attram, hæmorrhoidas esse maximum melancholiæ remedium, & ab atra bile vexatis esse bonas, lienem induratum sanare: facile hinc patet, experientiam ipsam eos edocuisse, atros & alios vitiosos humores circa lienem & epat in venæ portæ ramis collectos per eas euacuari. Idque ita se habere quilibet, qui volet, in praxi quotidie obseruare poterit. Si enim in eos, qui ex hæmorrhoidibus commodè percipiunt, inquirat, omnes ferè hypochondriacos esse animaduertet. Si porro quærat, vitæ hæmorrhoides fluant, externæ vel internæ: in plethorâque externas fluere, ægrisque etiam hypochondriacis commodum afferre; internas verò rarius aperiri: & proinde per illas non solum plethorâ, sed & cacochymiam & vitiosos humores euacuari intelliget. Licet ve-

rd etiam interdum tenues quidam humores & sanguis rubicundior per eas euacuari videatur: tamen is non purus est, sed serosus & falsus, ac ichor etiam sine sanguine profuit. Colliguntur verò in venæ portæ ramis non solum humores crassi & nigri, sed etiam sæpe serosi & falsi.

Etsi verò à diuersis venis hæmorrhoides internæ & externæ ortum habeant: tamen quia eidem intestino recto inferuntur, communicatione quandâ horum vasorum esse, & osculis sibi mutuo occurrere, & ex hæmorrhoidibus internis humores vitiosos externis etiam communicari, & per eas effundi, res ipsa, & quæ quotidie circa ægros accidunt, loquitur; cum videamus, affectibus hypochondriacis laborantibus hæmorrhoidas etiam externas plurimum prodesse.

Cæterum reliquos venæ cauæ ramos incidendi est nulla necessitas; nisi forsan plethora simul vrgeat, & magna pars materiæ vitiosæ venæ cauæ iam sit communicata, & circa epat *ελύγῳσι* aliqua adsit. Tùm enim venam in brachio aperire vtile est. Si verò à mensibus suppressis malum originem habeat vel augeatur, venas in pedibus aperire, vt & menstrua prouocare, vtile est. Quod & in iis facere non incommodum erit, quibus hæmorrhoides suppressæ sunt.

Purgationem quod attinet, vt primæ viæ primû euacuentur, primò omnino lenioribus medicamentis vtendum: à purgantibus verò fortioribus abstinendum; cum metuendum sit, ne fortioribus à longinquo & toto corpore vitiosi humores versus primas vias trahantur, & ibi cumulentur, atque à calidioribus & siccis medicamentis vasorum & viscerum intemperies augeatur.

Vtilissimi sunt hunc in finem clysteres leniores, vt & medicamenta lenientia, syr. violarum solutius, mercurialis, aloë, cassia, cui tamen, quia flatulenta est, semen anisi vel species hieræ addendæ sunt, polypodium, folia senæ, Electuarium lenitium, diacatholicum.

Nec inutile fuerit, vomitum mox in principio, sed lenioribus medicamentis, ciere; vt si quid pituitosæ & excrementitiæ materiæ in ventriculo hæreat, reiciatur, ne post aliorum medicamentorum vsum ad penitiores corporis partes deducatur.

Hinc ad præparantia accedendum. Etsi enim humores hi coctionem propriè non requirant, vt pote qui putridi non sunt, nec sanguini in vena caua permixti: præparatione tamen indigent, & crassi ac viscidati attenuandi, incidendi & detergendi atque adusti reperiendi.

Vtiles hic sunt radic. *gramin.* asparagi, borraginis, buglossi, fœniculi, scorzonera, polypodij, glycyrrhizæ, filicis, cichorii, endiniae, capilli veneris, ceterach, lingua ceruina, chamadrys, fumaria, agrimonia, centaurium minus, absinthium, sem genistæ, fœniculi, succus pomorum odoratorum, qui humori melancholico valde aduersatur. Ex his verò nunc mitiora, nunc fortiora eligenda, pro natura humoris, & loco, in quo subsistit. Nam cum ipsi lieni humores impacti sunt, fortioribus medicamentis opus est. Imprimis verò in vsu horû medicamentorum perpendendum, an acida, an verò nidiorosa cruditas plus ægro molesta sit, & ad hoc malum conferat. Etsi enim ex vtraque generari possit: tamen secundum hanc vel illam vt accidentia variant, ita etiâ curandi ratio variat. Etenim in acida cruditate calidioribus vti licet. In nidiorosa verò, & vbi insignis adest *ελύγῳσι* temperatioribus vtendum, cichorio, borragine, quibus aliquid oxymelitis addi potest. De tartaro & medicamentis è tartaro paratis dictum supra, part. 3. cap. 3.

Humoribus præparatis ad purgationem accedendum. Vbi tamen à fortioribus abstinendum, ob causam antea dictam, & ne ventriculus, qui in hypochondriacis ferè debilis est, fortioribus medicamentis purgantibus debilitetur. Et de hac imprimis melancholiæ specie, quæ ex hypochondriis ortum habet, verum esse putamus, quod Crato, *conf.* 24. scribit, se multos melancholicos curasse, licet verè affirmare possit, se nunquâ lapide

Lenientia.

Vomitum.

Præparantia.

Purgantia.

de lazuli vel scammonio vsum fuisse. Talia medicamenta sunt, *polypodium, fumaria, epithymum, sena, radix gualapa, myrobolani Indæ, electuarium diacatholicum, sy. up. de polypod. de pomis Regis Sabor, de epithymo Mesue.* Quibus interdum & helleborum nigru admiscere licet.

Vbi tamen idem, quod de præparantibus dictum, attendendum. Nam si cruditas acida adsit, & humor aliquis pituitosus ac viscidior admisceatur, paulò fortiora & pituitam etiam purgantia, vt agaricum, turbith, spec. diaturbith, episcopi, & similes admiscere licet: eà tamen lege, vt ægri sumto medicamento vltra duas vel tres horas non ieiunent, ne vis fortioris medicamenti vltra epar, & lienem ad remotiores partes penetrer, sed solum id, quod circa ventriculum & epar ac lienem est, euacuet. Si vero nidorosa cruditas præcesserit, lenientibus vtendum, vt manna, syrup. rosar. vel violar. solutiuo, rhabarb. foliis senæ. Et ne calor viscerum purgantium vsu quocunque modo augéatur, vtile est, post sumtum purgans paulò ante cibum haustum bonum feri lactis caprini sumere, quod & purgans abstergit, & calorem illum in visceribus temperat.

Simul tamen in purgantibus exhibendis ad causas generantes vitiosos humores respiciendum. Etenim si crudi, frigidi humores in ventriculo generentur ex solo caloris innati defectu, id quod in literatis & studio nimio deditis ferè accidit, (& tū ructus ac flatus, qui emittuntur, & aciditatis & nidoris expertes sunt) à frequentibus purgationibus abstinendum; cum ab iis calor natius amplius debilitetur: sed calor natius augendus & fouendus, & bona diæta ordinanda. Si verò à causis refrigerantibus ortum habeat malum, humorémque frigidum & acidam cruditatem comitem, frequentius purgandum; neque vna vice facilè vitiosi humores euacuantur. Ita si ex calore viscerum insigniore, humores adusti generati sint, ac ab eo adhuc foueantur, omninò à valentioribus medicamentis, quæ illam intemperiem augent, abstinendum, & leniora potius vsurpanda. Si verò humor crassior sit, & viscerum intemperies calida minor, fortiora tutius vsurpantur.

Et cum, qualiscunque etiam sit humor, viscera siccitate non careant, à valde calefacientibus & siccantibus abstinendum; contra semper vtile est, medicamenta humectantia, & quæ alterandi vim habent; admiscere. Vnde & medicamenta in formâ liquidâ commodius exhibentur. Si tamen ea pilularum formâ exhibere libet, si humidi quid postea bibatur, incommodum hoc præcauetur. Hac ipsa de causa aloës frequentior vsus non satis commodus est, præsertim si copiosius sumatur, ita vt ad vasa illa, calidâ & siccâ intemperie laborantia, & epar penetrare possit. Interim si minore quantitate & paulò ante cibum sumatur aloë & ex ea composita medicamenta, pituitosos humores è ventriculo & intestinis abstergere potest.

Et cum humor huius mali causa pertinax sit, vna vice non tollitur, sed necessarium est, purgationem aliquoties repetere, & per *ἐμψέωσιν* sensim materiam euacuare.

Vtilissimum quoque fuerit alterantia & præparantia purgantibus miscere & inde idonea humori præparando & euacuando medicamenta præparare, eaque sæpius exhibere. Formulas proposuimus lib. I. præf. p. I. c. II. & exstant tales passim plurimæ: inter quas est & decoctum galli veteris, cuius descriptio est in dispensatorio Augustano, & apud Quercetanum, in *pharmac. dogmat. restituent. cap. 8.* item pilulæ tartareæ, & de ammoniaco.

Post omnem purgationem malæ semen leuissimè tritum duarum drachmarum pondere exhibere iubet Aëtius, *tetr. 2. serm. 2. cap. 10.* Humectat enim exsiccata aluum. Ad abstergendum etiam vias primas vtilis est cremor  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$  um Olatum, & alia ex tartaro composita medicamenta.

In malo pertinaci etiam vomitus repetitus non inutilis fuerit. Sæpe enim vomitu eos humores è primis viis reiectos fuisse obseruatum est, qui purgantibus euacuari non potuerunt.

Ratio tamen hic ventriculi habenda. Si enim is sit debilis, vix habent locum vomitoria, & ventriculo ex morbo afflicto ærumnam addere non licet, vt scribit Aëtius, *tetrab. 2. serm. 2. cap. 10.* Propterea etiam à fortioribus vomitoriis ventriculum valde debilitantibus abstinendum.

Si post purgantium vsum medicamentorum reliquæ aliquæ, vel intemperies aliqua supersit, refrigerantia, attenuantia, aperientia, & detergentium vsu eà absumendæ & tollendæ, ac venæ & viscera alteranda.

Huic scopo inseruit imprimis serum lactis caprini, si 14. diebus vel pluribus, cum succo purificato cichorii, fumarie, carduibened. veronic. charnedr. ceterach, vel horum essentis, vt hodie vocant, vel extractis & conseruis vsurpetur. Vtile est & absinthium, centaur. minus & gentiana: cum, vt supra dictum, omnia amara lienis amica sint, sicut dulcia inimica. Vt autem medicamenta ista sine nausea assumantur, extracta in pilul. redigi, conseruæ seorsim vsurpari, & hinc haustus feri lactis caprini sumi potest. Ac si flatulentia feri lactis caprini metuatur, semen coriandri, vel pauxillum ligni sassafras in eo coqui potest. Hoc enim modo quod restat humoris vitiosi in vasis hypochondriorum abstergitur & eluitur, & frigiditate feri lactis caprini caliditas & siccitas eorundem vasorum temperatur, atque ipsis pristina & naturalis temperies restituitur.

Vrinam quoque prouocare per conuenientia medicamenta, quæ tamen non nimis calefaciant & siccant, vtile est. Quamuis enim Hollerius, in *scholio in cap. 40.* nullam viam esse à liene ad renes putet, nisi multiplici tractu in venam cauam regurgitans humor eò perueniat: tamen res longè aliter sese habet, & expedita satis, nec ita longa via est à liene per arteriam celiacam ad arterias emulgentes, & ab his ad renes. Hinc etiam Galenus, 2. ad *Glauc. c. 2.* renes & lienem per vrinas expurgari docet. Testatur id etiam experientia, ac sæpe obseruauimus, ab hypochondriacis & lienosis nigerrimas vrinas, & quidem cum commodo redditas fuisse. Quod etiam Antonius Valerius obseruauit, qui, in *exercit. in modo allegatum caput Hollerij*, refert, se nouisse virum religiosum, cui tetraeter in anno, maximè vere aut autumnò ineuntibus, intumescere lienem, quique dolore hypochondrij tum infestabatur, & subliuidus fiebat toto corpore, tandem verò nigricantibus vrinis attrimento simillimis erumpentibus per quinque aut septem dies pristinam sanitatem recuperabat.

[Prohibet Septalius, *animad. Med. lib. 7. n. 61.* in lienis affectibus per vrinas euacuare. Frustra, inquit, obstructū, aut duritie tentatum lienem curare conantur ij, qui diureticis id aggrediuntur. Cum enim nullus ab hoc viscere ad vias vrinæ sit transitus, Galeno etiam teste, 1. 3. *meth. med. cap. 17.* id frustra tentari coniciendum est, in quo Medicum frustrari sine contingit. Per secessum igitur eà materia euacuanda est. Quod si aliquando aliqui per lotium copiosum curati sunt, vt de Bione scriptum est, 2. *epid. sect. 2.* id vel tanquam rarum & per vias occultas factum recenset Hippocrates, vel sanè aliis adhibitis remediis emollientibus & dissipantibus, & per aluum subducentibus, cum multa sæculenta, per venas superesset materia, quæ foueri & renouari humor ille poterat, per vrinas eà subducta præseruatio potius, quam curatio facta est; quod imitari Medicus poterit, vbi nigras, crassas, sæculentasque vrinas adesse cognouerit. Diureticis enim tū tutè vti poterit, ad antecedentem materiam per eam partē euacuandā. *Hæc Septalius.*

Sed multis modis Vir Clariss. fallitur. Primò quidem, dum nullam à liene ad renes & vesicam viam manifestam esse statuit. Habet enim lien arterias multas, & ferè quintuplo plures, quam venas, quæ cum oriuntur ab arteria celiaca, à celiaca verò facilis sit via ad emulgentes arterias, ex his autem per renes ad vteretres & vesicam: hinc manifestè patet, commodissimè humores è liene per vrinas euacuari posse. Hinc ipse Hippocrates,

Refrigerantia,  
attenuantia  
& aperientia.

Diuretica.

Diuretica re-  
iicit in Lienis  
affectibus Se-  
ptalius.

1. Verum er-  
rat.

*lib. de intern. affect. lienosis diuretica iubet exhibere, & lib. de extern. affect. biliosis qui magnum lienem habent, & prauis ac foetidis coloris sunt, maligna contrahunt vlcera, vrinas mouere iubet. Deinde falsum etiā est, quod saltem praeservationis gratiā, & ad materiam antecedentem in venis contēram diuretica exhibenda censet; cum ipsa experientia constet, humores melancholicos ex ipso liene, & locis circa lienem, per arterias emulgentes, & hinc per vrinas, euacuari. Atque ipse sapissimē vidi vris nigerrimis ab aegris in affectibus lienis emissis, eos conualuisse. de qua re etiam videtur infra sect. 2. cap. 6.]*

Si etiam haemorrhoides vel menses suppressi sint, danda opera, vt conuenientibus medicamentis, de quibus alibi dictum, referentur.

Et si verò quandoque purgantibus & haecenus propositis medicamentis saepe repetitis malum hoc tollitur: tamen si paulò contumacius & diuturnius sit, iis non semper cedit. Vbi ad tria efficacissima remedia tandem confugiendum est, Chalybem, acidulas, & thermas.

*An chalybs in hac Affect. utilis sit.*

Et primò quidem Chalybem quod attinet, statuunt quidem nonnulli, chalybem esse temperatum, alij frigidum. Verum si eius resolutionem spectemus, & effectus attendamus, manifestum euadit, eum calidum & siccissimum esse. Quapropter à nonnullis dubium hinc mouetur, an affectioni hypochondriacae conueniat. Cum enim ea ab humore sicco, & si ater sit succus, etiam calido proueniat, ei domando ineprus videtur chalybs. Præterea etiam vim adstringendi & sistendi aluum habet, de quo supra, p. 2. cap. de Dysenteria quest. 6. dictum. Verum etsi ista ita sese habeant: tamen experientiā diuturnā & multā constat, chalybem ad affectionem hypochondriacam, cachexiam in mulieribus ex mēsum obstructione, aliōsque è pertinacibus lienis & venarum mesaraicarum obstructionibus ortos morbos esse probatū remedium, & meritò ob id magnificandum. Plinius, *natural. histor. l. 34. cap. 15.* inter alia de Chalybis vsu scribit: *Propinatur contra lienis vitia. Absumit enim illa.* Paulus Aegineta, *de remed. lib. 3. cap. 49.* *Aquam, in qua extinctum candens ferrum, epotam spleneticis competere scribit Dioscorides, lib. 5. cap. 53. lienosis auxiliari.* Aëtius, *retrab. 3. serm. 2. cap. 11.* *Lienosis præstantissimum esse remedium, ait, aquam, vinum aut poscam, in quibus ferrum extinctum fuerit per multos dies sumram.* Oribasius, *Synop. lib. 9. cap. 24.* *Cæliaci, & lienosis multum conferre author est.* Rhasis lienis tumoribus utilem esse scribit, quem Serapio, Auicennas, & Halyabbas sequitur. Quæ omnia & posteriores Medici confirmant, & omnes vno ore ferrum & chalybem lienis obstructionibus prodesse testantur. Atque inter eos Iulius Cæsar Claudius, *respons. 29.* scribit: *proprium melancholia hypochondriaca alexipharmacum esse Chalybem; quoniam continuus illius vsus semper felicem finem in aegris sit affectus: siquidem in referendis obstructionibus, in quibus omnis melancholia curanda cardo vertatur, nulli medicamento cedat.* Et de ingressu ad infirm. in appendice sect. 2. scribit, in curatione melancholia hypochondriacæ medicamenta chalybeata sibi nullum par habere. Mercatus etiam, *de morb. mul. l. 1. c. 6.* refert, tantam esse Chalybis naturam & efficaciam, vt magnos etiam lienis & uteri scirrhus persanasse visum sit. Et de intern. morb. curat. l. 1. cap. 17. incredibili efficacia affectioni hypochondriacæ chalybem prodesse, & experimento esse confirmatum, in omnibus ferè affectionibus hypochondriacæ causis vsu chalybis commodum esse, siue in foeminis ex utero, siue in eis, ac viris ex ventriculo, mesenterio, iecore, aut splene obstructis, aut quomodo libet humore obsessis, malum oriatur.

*Quomodo proficit in hoc affectu?*

Qua ratione verò in Dysenteria commodè exhiberi queat chalybs, supra, loco allegato, dictum. De modo autem, quo ferrum & chalybs in hoc affectu proficit, sunt variorum autorum variæ sententiæ. dum alij ponunt partes obstructas permeare & ita ab infarctu liberare, alij abstergerendi & aperiendi, alij & purgandi vim habere statuunt, quos suo loco relinquimus. Omnes tamen

concedunt, quod verum quoque est, non electiue purgando, vt alia purgantia, id, quod præstat, præstare nobis probabile videtur, ferrum & chalybem peculiarem cum humoribus melancholicis, & adustis habere cognationem, atque idcirco eos seu attrahere, seu imbibere, ac cum iis vniri. Et atram bilem, vt & ipsam melancholiam, vitriolatæ naturæ participem aut certè ei cognatam esse, & ferruginei quid sapere, nemo facile negauerit. Quique analogiam Macrocosmi & Microcosmi explicant, scribunt, quod Mars metallicus maioris mundi responderet Marti Microcosmi, eiusque seruitio destineretur, & custos sit valetudinis eius membri, cui coelitus videtur esse destinatus.

Cum verò chalybs naturæ sit metallicæ, & in alimentū conuerti non possit, sit etiā crassioris substantiæ, quam vt in penitiores corporis partes penetrare valeat, natura eum per aluum maturè iterum exturbat, atque ita vnā humor melancholicus cum eo euacuatur. Atque hoc ipsum esse videtur, quod Mercatus, *de reitō presid. vsu lib. 2. c. 7.* scribit, chalybem absterfione humores abradere, ac à parte, cui adhærent, separare & secum deferre. Cum verò Chalybs per aluum deicitur, feces nigrae redduntur, & id nisi fiat, parum felix est vsus chalybis, & ab eo desistendum. Ex quo patet, non saltem ipsum aperire, sed secum etiam vitiosos humores educere. Hinc quoque Autores non semper chalybem subtilissimè præparatum rudiori modo & crassiori parato præferunt, sed monet Mercatus, *de morb. mul. lib. 2. c. 6. ex Aëtio,* chalybem crassiori modo præparatum splene obstructo, humoribus melancholicis & crassioribus abundantibus exhibendum esse, proculdubio, ne penitus in corpus penetraret, sed in primis viis hærens humores illos crassos imbibat, iterumque facilius per aluum descendat. Scribitque idem Mercatus, *loco allegato,* chalybem si nimis exquisitè puluerisetur, & comminatur, vomitum ciere, & aluum turbare: non quidem, vt ille putat, quod in argenti viui naturam abeat, sed quod, quo magis resoluitur, magis in vitrioli naturam abit; vt & de Dysenteria demonstratum, & maiorem vomitum ciendi & aluum turbandi vim acquirit: in crassiore autem substantiā satis quidem vitiosos humores imbibit, verum naturæ non ita molestus est, aluūque non ita turbat. Et licet chalybs calidæ & siccae naturæ sit, atque hoc modo humorem atrum ferociorem reddere videatur: tamen non alterandi causa exhibetur, sed vt obstructiones aperiantur, & humor ater educatur; atque commodum, quod ex eius vsu prouenit, longè maius est, quam incommodum, sicut etiam rhabarbarum in euacuanda bile, elleborus niger in humore melancholico euacuando commodè exhibentur, etsi in primis qualitatibus cum hisce humoribus aliquam conuenientiam habeant.

Fit etiam efficacissimum extractum ex helleboro nigro, si chalybs spiritu vitrioli soluatur, solutioni aqua aliqua splenetica addatur, & liquore illo, vt moris, extractum ex radicibus hellebori nigri paratur.

*Extract. hellebori nigri.*

Ex quo patet, vix locum habere posse, quod Iulius Cæsar Claudius, *loco allegato,* scribit, aurum & argentum eundem vsu pro adimplendis scopis illis, quos adimplemus vsu chalybis habere posse. Sunt enim ista metalla diuersæ naturæ, neque eandem cum hisce humoribus cognationem habent.

Exhibetur autem chalybs variis modis. Alij enim eum saltem limatum subtiliter exhibent; alij calcinatum; alij prius præparatum, quod sit limaturā chalybis in aceto maceratā, hinc siccata & trita Alij ex eo vina chalybeata, syrpos, oxymel, electuaria parant, quorum formulæ apud Mercatum, & Iulium Cæsarem Claudium, *loco allegato,* & alios extant.

*Chalybs quo modo exhibenda?*

Fiunt etiam è chalybe croci & tincturæ, de quibus de constitutione chymia cap. 19. tractatui de cons. & dissens. Chymic. cum Galenic. annexo egimus.

Quocumque autem modo exhibeatur, cum certum sit, vires, quas exserit in hypochondriacis curandis, ab eius



eius sulphure, quo abundat, præcipue pendere, attendendum in præparando & exhibendo hinc chalybe, ne eius sulphur perdatur, quod fit, si vel chalybs crudo valde igne vratur, & vt Chymici loquuntur, reuerberetur; vel et si alio modo solutus sit, si reuerberatione partes eius sulphureæ & volatiles dissipentur, & fixæ salinæ relinquuntur, quæ potius adstringendi, quam aperiendi vim habent.

Datur autem in substantiâ vel in Conseru. rosar. violar. borragin. quæ in hac affectione commodissima est, vel alia conueniente, aut cum syrupo aliquo, vel in pilulas cum syrup. aliquo, aut succo cichorii & agrimonie, redactus. Ne autem ventriculus offendatur, alij caryophyllos, alij cinamomum, alij spec. diarrhod. dimidiam partem, alij conseruam rosarum, cichorii admiscunt. Possunt etiam cum cinamomo & saccharo inde rotulæ, vel orbiculi fieri; si scilicet chalybis præpar. Vnc. ß. cinamomi Drach. ij. sacchar. albiss. Vnc. j. addantur.

Possunt & alia medicamenta scopo Medici inferuentia addi: vt cortic. rad. cappar. tamarisci, fraxini, filicis, fol. chamædryos, ceterach, chamæpityos, flor. genisteæ, & similia.

Antequam verò exhibeatur, primæ viæ euacuandæ sunt. In substantia si detur, mediz ætati exhibeatur Drach. j. Dosis tamen vt Nicolaus Monardes, *dialogo de ferro*, scribit, neque infra binos scrupulos, neque supra drachmam cum semisse esto. Oxy mel & syrupus datur ad Vnc. ij. vel Vnc. iij. Vinum ad Vnc. iij. ad Vnc. vj. Sumto chalybe in substantia hauriendum poculum vini albi, neque nimis tenuis, neque nimis generosi. Abstemiij aquam, in qua cinamomum coctum sit, vel ius galli bibant.

Exhibetur autem chalybs commodissime vere & autumno. Hyems enim frigore, ætas calore obstat.

Sumendus verò Chalybs manè, ieiuno stomacho, & sumto eo æger vna atque altera hora obambulet vel exerceatur, vt facilius medicamentum distribuatur, postea quiescat. Si tamen vires sint debiles, exercitium omitti potest; cum etiam in lecto decumbentes vsu chalybis sanatos fuisse compertum sit. Horis autem à sumto medicamento quatuor elapsis, & cum è ventriculo iam medicamentum descendisse animaduertet, prandium æger sumat. Diæta sit frugalis, & omnino cibis boni succi vtendum. Initio autem sufficit tertio quoque die chalybem sumere: cui si æger postea assuevit, motibusque id postulat, singulis diebus exhiberi debet. Quidam primis diebus eum cum multâ bile & vitiosis humoribus vomitu reiciunt; sed cum commoda & euoela. Imò censet Mercatus, *de morb. mul. lib. 2. c. 6.* iis, quibus mesaræum & venæ ventriculo proximæ obstructæ sunt (aut vitiosis humoribus scatent) primis diebus chalybem admiscendum esse iis, quæ vomitum quoque prouocant. Duobus vel tribus diebus elapsis, vbi chalybi adsueuerint, amplius non vomunt. nonnulli etiam planè non vomunt.

Exhibetur etiam diebus pluribus vel paucioribus, pro ægri & morbi ratione. Aliis enim dies quindecim sufficiunt, aliis etiam 30. necessarij sunt.

Videndum autem, vt chalybs descendat & per aluum euacuetur, quod ex fecibus nigris cognoscitur, quod nisi fiat, quarto die, vel clystere iniecto, vel pilulis ex aloë rosata, vel de tribus, alijs cienda. Non inutile quoque fuerit, post decimum vel duodecimum diem leni purgatione vti, deinde à purgatione biduo quiescere, & hinc ad vsu chalybis redire. Vt verò chalybs facilius descendat, & non retineatur, potest pulueris Dr. ij. addi spec. diarrhod. Abbat. aloës an. Dr. j. & cum syrup. capill. ♀ vel fumariz pilulæ inde formari. Purgantia tamen pro humorum peccantium natura variari possunt. Si enim pituita admisceatur, agaricus & semen carthami; si bilis, rhabarbarum addi potest; melancholia potissimum abundante folia senæ vsurpentur.

Vt chalybis, ita & acidularum & thermarum vsu sæpe malum hypochondriacum, quod purgantibus ex-

pugnari non potuit, curatur. Quæ procul dubio eadem ratione. quâ chalybs, hoc malum tollunt, dum nimirum partes & spiritus minerales, quibus acidulæ & thermæ abundant, secum humores vitiosos è corpore rapiunt, & deferunt. Atque hinc qui acidulas & thermas bibunt, nigra per aluum deiciunt, magna quantitate, qui color non semper ab humoribus attris est sed à ferro & Olo; sicut & vulgo notum est, è Olo, quod idcirco atramentum futorium appellatur, & ferri rubigine tincturas nigras fieri. Cum autem non cuiuslibet facultates, & rationes ferant, vt quasuis acidulas vel thermas adeat, eas quilibet in vsu trahere potest, quas in vicinia ad hunc affectum vtiliores esse, publica famâ & lōgua experientia constat. In Germania commendantur acidulæ Schuualbacenses, Griesbacenses, Egranæ. E thermis Badenses Marchionis, Carolinæ. In Italia Aponenses in agro Patauino Sancti Cassiani & aliæ plurimæ.

Non hic prætereundum videtur, esse quosdam chymicos, qui acidularum compendium quosdam promittunt, & se id, quod acidulæ magna copia potæ præstant, salino quodam puluere paucorum granorum pondere ex hibito, aut liquore exiguo idè effecturos pollicentur: & sui instituti hanc rationem proferunt, quod magna aquæ copia ventriculum offendat, id quod exiguus puluis facere non possit. Verum errant illi, me quidè iudice, sed saluo aliorum iudicio, nō parū. Nam hæc ipsa acidularum & thermarum est prerogatiua, quod etiam in magna copia potæ corpus non offendit, sicut alia medicamenta purgaria, dū mox iterū euacuatur; interim omnia ventris inferioris vasa penetrant, & quicquid ibi vitiosi offendunt, abstergunt & abluunt, quod puluis aliquis salinus granorum non ita multorum pondere exhibitus præstare non potest. Si perpendatur, quantus sit vasorum mesaraicorum numerus, nulla paucorum granorum ad ea est proportio, vt ille in omnia distribui, hærentesque hinc inde humores educere possit. Vt nihil dicam de illa singulari missione à Natura facta, quam Ars imitari non potest; vt & de eo, quod vis thermarum & acidularum non tam in sale quodam fixo consistit, quam in Spiritu volatili, qui facile euanescit.

Simul verò toto curationis tempore leni cum externis tum internis medicamentis prospiciendum. Cum enim, vt supra dictum, ab hoc præcipue mali huius origo pendeat, & nisi is sese bene habeat, nec epati pro sanguine generando idonea materia, nec ventriculo & aliis ventris inferioris visceribus alimentum probum suppeditetur: omnino danda opera, vt saluus conseruetur, aut si à statu naturali lapsus sit, in eum restituatur, quod sit medicamentis, quæ terrenum ipsius humorem leniter emolliunt, attenuant, & detergunt: qualia supra proposita sunt de affectibus lienis.

Habenda quoque aliarum partium, quæ ad mali huius generationem aliquid conferunt, ratio. Ventriculus roborandus iis, quæ calorem eius fouet; concoctionem adiuuant, & flatus discutunt, de quibus in affectionibus ventriculum dictum: quæ ita moderanda, ne nimis calidorum vsu intemperiem, quæ est in vicinis visceribus, augeamus, humoresque amplius exsicceamus & duramus.

Commodum hic est absinthium, quod non solum stomacho & ventri vtile, sed & neque statum in ventre multum fieri permittit, neque aluum exsiccare penitus; & vrinas ciet, & coctionem probè adiuuat, vt scribit Aëtius, *teirab. 2. ferm. 2. cap. 10.* qui etiam huius solius vsu quosdam à melancholia liberatos esse testatur.

Nec negligendum est Epatis. Imprimis vero vbi *apoplexia* est & contraria intemperies viscerum ventriculi scilicet & epatis, cautè agendum, ne dum vni succurrimus, alteri noceamus. Fit autem hoc, dum vel ventriculo sua medicamenta extra, epati intus, aut contra adhibemus; vel alternatim nunc ventriculo, nunc epati prospicimus, prout huius vel illius affectus & sympto-

Dosis chalyb.

Chalybs quædo vsurpanda.

Therma acidula.

inæta magis vel minus vrgent; vel dum medicamenta vtrique visceri conuenientia miscemus. Commodissimum verò semper fuerit, primò ventriculum vel vñritu, vel leni medicamento euacuare: interim extra epati prospicere. Quia tamen humores ex vtriusque visceris intemperie generantur, tandem aduruntur, temperata medicamenta adhibere vtilissimum est, quæ simul aperiant & attenuant, ex cichor. agrimon. fumar. cum oxy-melite & sero lactis.

Cæterum quia & cordi & capiti vapores molesti sunt, qui ex illuue illà humorum in hypochondriis eleuantur, ij à capite & corde auertendi, dissipandi, eorūque prauitas corrigenda. Auertunt à capite & corde vapores extremorum frictiones, lotiones, scarificationes, fonticuli in cistibus excitati. Vapores discutunt, eorūque prauitatem corrigunt, flores borraginis, bugloss. betonicæ, tunicis, melissa, radic. helenij, scorzonæ, sem. coriandri, anisi, zedoaria, ambra, quæ in calore natiuo etiam & spiritibus ac membris principalibus roborandis facile primas tenet; margaritæ, corallia, lapid. pretiosi vsurati, bezoar: quibus plurima medicamenta passim obuia parari possunt. Vulgaria sunt Confectio de hyacintho, Alchermes.

Tandem, quod Aëtius, *tetrab. 2. ferm. 2. cap. 10.* de curatione melancholiæ monet, id in genere de affectione hypochondriaca locum habere potest, nimirum naturæ remissionem interdum dandam, & à medicamentis aliquandiu abstinendum est: cum in curatione videatur affligi, quiete verò inualefcere, & superare morbos iam antea attenuatos, vt obseruatum sit, multos sic ægrotantes tempore curationis nihil commodi percepisse, dimissa verò curatione restitutos fuisse. Quod interdum etiam in thermarum & acidularum vsu euenit.

## CAPVT VII.

## Diæta.

**V**ltimò Diætam quod attinet, si vllò alio in morbo ea exquisita & accurata opus est, in hoc morbo maximè necessaria est: cum à diætæ erroribus originem habeat, & foueatur, ac sine eà parum medicamenta prosint: si verò accurata instituat, non parum ad hunc morbum expugnandum momenti habeat.

Aër ergo sit temperatus & purus: Cibi sint boni succi, facili coctionis, temperati, non calidi, non siccici, non viscidi, lenti, crassi, non acres, cui intemperiem viscerum augere, humores amplius adurere, & meatus obstruere possint. Conueniunt ergo carnes agnina, vitulina, veruecina, bubulæ saltem iuniores & teneræ, non pingues aut frixæ: suillæ verò, hircinæ, caprinæ, bubulæ vetustiores, ceruinæ, anatum, anserum, columbarum & similes duriore noxiæ sunt. A carnibus etiam sale conditis, vel fumo induratis & exsiccatis planè abstinendum. Sal cum densandi, constringendi, & coagulandi vim habeat, facit, vt humores in hypochondriis facilius cumulentur & detineantur. Pedes etiam & viscera animalium in vsu non veniant. Oua tremula non sunt inutilia; nec iuscula gallorum & gallinarum, carnis bubulæ, mediocri tamen quantitate sumta; cum æstus hypochondriorum temperare possint. Nimià verò quantitate sumta fluctuationes pariunt. Lactis vsus non est commodus, vt nec casei. Pisces sint saxatiles & ex puris aquis, funduli, lupi, perca: Carpiones verò, anguillæ, cochleæ, cancri, pisces duri, maritimi plerique, imprimis exsiccati, vt & alij sale conditi, vel fumo indurati nocent. Fructus etiam plerique reiiciendi, cum vtplurimum dulces sint, ac præterea flantenti, & faciliè corruptantur, præter poma Borsdorffiana & similia, passulas, amygdalas, pineas. Cappares quidem laudantur vulgò;

verum rectè vsurpandi. Nam non solum difficilis coctionis sunt, sed & acetum, quo condiuntur, humorem melancholicum fermentat & exaltat. Commodissimè præparantur, si condiantur addita tertia parte passularum Corinthiacarum, sacchari eadem quantitate & momento aceti.

De aceto Autores non consentire videntur. Hippocrates, *3. de rat. in acut. text. 38.* scribit, quod ab aceto τὰ μέλαινα ζυμῶται, καὶ μετατρέσσεται, καὶ πολλαπλασιάζεται: Galen. in *comment.* acetum melancholicis aduersissimum esse addit. Aëtius tamen, *tetrab. 2. ferm. 2. cap. 10.* & Paulus Aegineta ex Posidonio & ex his Donatus Altimarus, *de medendis morbis, cap. 7.* sub ingressum lecti melancholicis acetum acerrimum cochlearis mensuram propinant. Verum non aliter hoc admitti potest, nisi in melancholia, vt vapores, præcipue ex humore adusto ad caput tendentes, supprimantur: non verò simpliciter in affectione hypochondriaca. Alias enim Hippocratis sententia verissima est, acetumque humores melancholicos & lienis ac ventriculi constitutionem vitiosam, ob quam aliàs humores acidi generantur, auget. Si tamen ob vim incidendi cibi admiscere libet, vt & medicamentis, parca manu id fiat: & aliis, quæ lienii profunt, additis.

E leguminibus admitti potest hordeum & auena. E plantis asparagus, cichor. endiuia, petroselinum: reliquæ pleræque parum vtilis, imprimis brassica muria condita. Panis sit è frumento puro, fermentatus & bene coctus.

Circa cibos tamen monendum, vnicè dandam esse operam, ne cruditas vllò modo generetur. Qua in re imprimis ad ventriculum respiciendum, qui in omnibus ac affectione laborantibus non semper eodem modo sese habet; & ob vitiosum, quo nutritur, alimentum nonnullos cibos sæpe peculiariter auersatur. Idèque non semper commodiores sunt cibi tenuiores, & qui faciliè alterantur; cum in iis; quibus cruditas nidorosa familiaris est, tales cibi faciliè corrumpantur, qui propterea iis non sunt exhibendi; sicut contra iis, qui cruditati acidæ sunt obnoxij, cibi frigidi non conueniunt. Imprimis verò ad peculiarem cibi naturam respiciendum. Itaque cibi ij exhibendi, quos ægrum optimè tolerare, concoquere & citra vllam molestiam distribuere animaduertimus. Neque enim tam refert, quàm boni cibi exhibeantur, quamquam bene coquantur: siquidem cibi etiam boni, si non bene coquantur in ventriculo, plus nocent, quam deteriores, si benè coquantur.

Porus sit vinum album tenue, benè maturum, benè defecatum, non austerum, vel quod in lapide calcario, & aliis locis materiam tartaream suppeditantibus crescit. Condiri potest vinum flor. & radic. borraginis, vt & ex aliis plantis huic affectioni conuenientibus supra enumeratis. Nec inuile est vinum absinthites è multo paratum, cui, si libet, pars tertia rad. borrag. vel bugloss. addi potest. Cereuisia, quæ in nostris regionibus vsitata est, sit pura & bene defecata. Hydromeli: è succo pomorum describit Paulus Aegineta, *lib. 7. de re med. cap. 5.* Aëtius, *tetrab. 2. ferm. 3. cap. 1. & 8.* quod etiam pro naturarum & circumstantiarum ratione locum habere potest. Quod verò de cibo monuimus, idem de potu monendum, vt videamus, quem potum sine vlla cruditate ac incommodo æger melius ferat. Aliis enim vinum, aliis cereuisia, & quidem hæc vel illa magis conuenit: ac sæpè obseruatum, nonnullos cibos in hac affectione bene retinere, quam primum verò cereuisiam bibunt, vomere, & post horarum etiam aliquot intervalla cereuisiam parum alteratam reiicere. Circa cibum & potum & hoc monendum, ne nimià varietate peccetur, aut copiâ ventriculus obruat: aut alij cibi assumantur, antequam priores concocti sint, & in ventrem descenderint.

Somnus sit mediocris & tempestiuus, nec statim à cena

Acetum  
conueniat

Circa cibos  
quid notan-  
dum?

Porus.

Hydromeli:  
succo pomorum.

Diæta.

Cibi.

cœna ineatur. Vigiliæ nimis multum hac in affectione nocent. Exercitia & motus corporis si moderatus, vita sedentaria incommoda est. Animi uim intentio & lubricationes, præsertim à cœna, valde in hoc affectu noxiæ. Præcipue verò grauiora animi pathemata, ira & moeror, quæ vel sola affectum hunc producere valent, præsentemque miris modis fouent & augent, vitanda.



## LIBRI TERTII

## PARS V.

## SECTIO SECUNDA.

## De Scorbuto.

## CAPVT I.

## De Scorbuti Nominibus &amp; Natura.

**M**Orbi huius, hoc loco merito tractandi, vulgatum nomen apud Medicos est Scorbutus, seu Schorbutus; mutuata appellatione à Saxoniz inferioris incolis, qui eum *Schorbock*, aut *Scorbuck*, & Hollandis, qui *Sel arbuyck*, ab effectu, cruciatibus scilicet, & torminibus ventris, nominant. Quia tamen non solum venter, sed & aliæ partes in eo afficiuntur, ab iis alia quoque nomina accepit, & *Schurmundi* Danis etiam *Schorbeck*, ab oris vitio, vacillantibus dentibus, & laxis, ac sæpe exulceratis gingiuis; & *Scorbein*, à languidis cruribus, & à blavis glastinis, seu puniceis maculis *Blavuschuyt*, appellatur. Nonnulli (quod cuidam Regnereio Snøy, celebri sui temporis Practico, tribuitur, vt apud Forestum, lib. 10. obs. 11. videre est) à læsis gingiuis, & pedibus Gingipedij nomen (crassa & pingui tinerua, vt Clariss. Salomon Albertus ait) finxerunt.

Quibus nominibus antiquis fuerit appellatus hic morbus, imò an antiquis cognitus fuerit, in controuersiam vocatur. Iunius, in *Nomenclator*. à Marcello, qui Gratiani & Theodosij Imperator. ætate floruit, hoc malum appellari scribit Oscedinem. Etsi verò nonnulli, vt Balduinus Ronseus, lib. de magn. lienib. Hippocrat. cap. 2. hoc malè fieri dicant; cum Oscedo vitium sit apud Gellium, lib. 4. c. 20. quo qui tenentur, sæpius oscitant: tamen cum remedia, quæ Marcellus, de re Medic. cap. 11. contra Oscedinem proponit, non oscitationis vitio sed scorbuto, & gingiuarum exulcerationi conueniant: omnino oris vitium scorbuticis familiare per Oscedinẽ eo loco apud Marcellum intelligi debet. Quod verò Gellius, loc. alleg. describit vitium, ab hoc planè diuersum est, & ita saltem nomine, nullo verò modo re oscedo Gellij & Marcelli conueniunt.

Plinius morbi cuiusdam, quem Stomacacen, & Scelotyrben appellauit, mentionem facit, lib. 25. hist. natur. c. 3. his verbis. *Non bestiarum solum ad nocendum scelera sunt, sed interim aquarum quoque, & locorum. In Germania trans Rhenum castris à Germanico Casare promotis marino tractu fons erat aque dulcis solus, qua pota intra biennium dentes deciderent, compagesque in genibus dissoluerentur, Stomacacen Medici vocarunt, & Scelotyrben, &c.* Atque hunc morbum plerique Medici Scorbutum esse existimant. Quibus & ego assentior, & stomacacen, ac scelotyrben Plinij ipsissimum scorbutum esse puto; cum in iis locis, in quæ Cæsar Germanicus trans Rhenum castra promouit, malum hodie etiam sit frequens, & præcipue in castris, iis maxime in locis, facile contrahi possit. Nomen a, hoc non à Frisiis & Germanis, qui procul dubio Medicis tum temporis doctis, & linguarum peregrinarum peritis destituebantur, huic malo inditum, sed Medici vel Græci, qui apud Romanos erant, vel Latini Græcæ linguæ periti, qui exercitum Romanum se-

quebantur, & symptomatis, quæ maxime in ore, & tibiis apparebant, id finxerunt, & indiderunt, ac *σκαρκάκιον* quasi *σκαρ* & *κίκιον* vel *κίκιον* (Barbari Stomacaxiam nominant) ab oris vitio, quod Germanis etiam *die Mundseule*, & *σκελοτύρβιον*, seu *σκελετύρβιον* (vtrumque nomen apud probatos autores occurrit: prius tamen analogiæ magis conuenit) à tibiis seu crurum læsione appellauit; aut certè antiqua nomina, & iam tum apud Medicos obuia & vsitata iis accommodauerunt. Nam etiam, in lib. de definit. Medicis, qui sub nomin. Galeni circumfertur, scelotyrbes sit mentio. Verum ea scelotyrbe Scorbutus non est, sed paralyseos quædam species, qua qui laborant, rectè incedere nequeunt, sed nunc in læuam, nunc in dextram partem contorquent corpus, interdum crus post se trahunt non secus, ac ad accliuos locos ascendentes faciunt. Quis ergo Græci, vel Romani, quibus primum Scorbutus offerebatur, in eo quoque crurum quandam resolutionem animaduertebant, atque aliud commodius nomen non habebant; propter affinitatem & ipsum scelotyrben nominarunt.

Verum hoc nomen non primum Scorbutus accepit in castris Cæsaris Germanici, quæ trans Rhenum duxerat, vt plerique existimant: verum iam apud Strabonẽ, circa finem lib. 6. Geograph. qui sub Augusto vixit, hæc nomina occurrunt, qui morbum hunc, qui in exercitu Elij Galli, iussu Angusti in Arabiam ducto, exortus est, stomacacen & scelotyrben nominat. Vt ita nomen hoc Medicis Romanis iam notum facilius morbo in castris Germanicis exorto imponi potuerit. Hic non prætereundum, in Strabone non *σκαρκάκιον*, sed *σκαρκάκιον* legi; quam lectionem si quis sequi volet, deriuabitur hoc nomen à *κίκιον*, quod est merda: neque planè inconcinne. Scorbuticis enim, qui hoc vitio oris laborant, os *κίκιον* olet.

Neque hoc hic silentio præterite possum, me dubitare, an Plinius causam, quod militibus dentes deciderint, compagesque in genibus dissoluta esset, in potu aquæ dulcis cuiusdam fontis rectè retulerit. Nam cum hodie omnia illa loca trans Rhenum cognitissima sint; neque tamen quisquam de tali fonte aliquid referat; quod ego sciam; neque Plinius id statim, sed post biennium demum accidisse scribat: credibilis est, id seu ex cibi praua ratione, seu contagio, & genio loci, cui & finitimis hoc malum endemium est, eos hunc morbum contraxisse, qui cum Romanis ignotus, & nouus accideret, in peculiarem etiam causam, & fontis illius aquam retulerunt.

An verò ultra ista tempora notus, & quo nomine expressus fuerit, alij aliter sentiunt. Sunt, qui icterum nigrum antiquorum ab Aegineta, lib. 3. cap. 49. Aræto, de sig. & caus. morb. diutur. lib. 1. cap. 15. descriptum, eundem morbum cum scorbuto esse posse putant; alii id negant. Etsi enim icterus niger quoque à liene ortum habeat: tamen in ictero nigro totius corporis colorem ad nigredinem mutari, idque maxime in oculis animaduerti, nullas verò maculas hinc inde spargi putant; quod non accidit in Scorbuto, in quo quidem etiam color cutis aliquomodo mutatur, verum non ita insigniter præcipue in oculis, vt in ictero nigro, sed potius maculæ quædam hinc inde in cruribus, dorso, & brachiis efflorescunt. Verum enim verò maculæ non in omnibus scorbuticis necessariò apparent: contra rationi consentaneum à nigro humore, qui in totum corpus in scorbuticis diffunditur, totius corporis colorem in nigrum mutari posse non aliter ac in iis, qui aliàs ictero nigro laborant: & experientia id confirmat. Vidi ipse sceminam corporis colore, cum sana esset, florido, cui, cum post quartanam scorbuto laboraret, totius corporis color ita in nigrum mutatus est, vt vix eandem esse cognosceres. Itaque etiam si omnem icterum nigrum antiquorum scorbutum non dixerim: tamen icterum nigrum cum scorbuto coniungi hodie experientia docet; & olim etiam coniungi

Quando hoc nomen accepit.

σκαρκάκιον.

An sit icterus niger.

Scorbuti Nomen.

Gingipedin.

An fuerit antiquis cognitum.

An sit Oscedo.

An Stomacacen & Scelotyrbe.

coniungi potuisse, impossibile non fuit.

An vitiligo  
nigra.

Nonnulli ob colorem hunc, quo scorbuticorum corpus tingitur, etiam *μελανό αλφκ*, seu vitiliginis nigrae nomen scorbuto, ex Galeno, 3. de sympt. caus. c. 3. accommodant. Verum eadem huius ratio est, quæ icteri nigri. Et si enim ab humore melancholico hoc vitium ptoueniat, & cum scorbuto coniungi possit, tamen non necessarium scorbutum coniunctum habere.

An magni  
lienes Hippo-  
cratis.

Langius, lib. 2. epid. 14. & Balduinus Ronsseus in lib. de magn. lien. Hippocr. vt & alij & Medici plurimi ab Hippocrate scorbutum descriptum esse putant, vbi de morbis lienis, & præcipue magnis lienibus agit, de morb. intern. 2. prædict. 2. prognostic. quorum & Cælius Aurelianus, lib. 3. Chronic. cap. 4. Ab iis autem dissentit VVierus, in obseru. de scorbut. qui Hippocratem, in sue lib. 2. prorrhetic. dum de magnis lienibus agit, affine quidem malum scorbuto descriptisse, non tamen ipsum scorbutum putat. Hippocratem enim docere, quod eodem tempore vtrumque symptoma in liene magno non conspiciatur, sed tibiæ ulceræ tum demum ubsequantur, quando humor ille melancholicus & acris non fertur sursum ad gingiuas, vel sanguinis eruptione euacuatur, verum ad tibiæ subsidet, eas exulcerat, & cicatrices nigras relinquit. In scorbuto verò simul gingiuas putrescere, & fœtere, & tibiæ lituris, ac maculis liuescere.

Verum enim verò Langio. & Ronsseo hic assentire malo. Quæ enim Hippocrates de magnis lienibus habet, omnino optime scorbuto quadrant. Ita enim Hippocrates lib. 2. de tñv εν τῷ παθῶν, secundum lienis morbum describit: *ἡ γὰρ οὗτος αἵται. καὶ δὲ καὶ ὁ σπλῆν διδέναι, καὶ πληρὸς ἐστὶ, καὶ δδύναται ἐμπύπτεσθαι τὸν σπλῆνα, ἡδὲ χροὶ τρέπεται, καὶ δρᾶται μέλας, πῶχρος, σιδιουδής, καὶ ἐκ τῆ σόματος* (ita enim legendum, vt ex loco sequenti & ipsa morbi natura patet) *κακὸν ὄζει, καὶ τὰ ἔλλα κακὸν ὄζει, καὶ τὸ ἀπὸ τῶν δδόντων ὁδῶσται, καὶ ἐν τῷ κνημέων ἐλκεα ἐκρήγνυται, οὐκ ἰσχύει ἐπινυκτίδες, τὰ δὲ γῆα κρηβνεται, καὶ ἡ κόπρος ἐχέσσοχαρῆν. Vter inflatur, postea verò etiam lien intumescit, & durus est, ac dolores acuti in splenem incidunt. Color etiam mutatur, & niger conspicitur, pallidus, & qui malicorij speciem referat, & ex ore male olet, & gingiue male olent, eaque dentibus discedunt, & in tibiis ulcera, veluti pustule nocturna, erumpunt, membra verò extenuantur, & sterces per alium non demittitur. Et in fine lib. 2. prorrhetic. ἔλλα δὲ πονηρὰ καὶ σόματα δυσώδεα, οἷσι σπῆντες μεγάλοι. ὁκόσοι δὲ ἔχουσι σπλῆνας μεγάλας, μήτε αἰμοφραγίαι γίνονται, μήτε σόμα δυσώδες, τῆτων αἰ κῆμαι ἔλλα πονηρὰ ἰσχύει καὶ ἔλλα μέλαινα. Quibus lienēs magni sunt, iis gingiua vitiantur & os graue olet: quibus autem lienēs magni sunt, neque sanguinis eruptiones contingunt, neque os graue olet, iis in tibiis mala ulcera habent, & nigras cicatrices. Quæ omnia tam exactè scorbuto quadrant, vt planè ignotus ipsi fuisse non videatur. Et si in Arabia felici, vt antea dictum, & postea dicetur, ex victus ratione hic morbus generari potuit, cur non alicubi etiam in Græcia produci ex simili causa, & Hippocrati innotescere potuerit? Et si forsan eius natura ipsi tam nota non fuit, vt est hodie Medicis iis in locis, quibus scorbutus vernaculus est. Sicut & hodie quandoque Italij, & Gallij, quibus rarior est, offertur; nec tamē semper statim agnoscitur, vel hoc nomine describitur. Exemplum huius rei nobis præbet Medicus doctissimus, Carolus Pifso, in lib. de morb. ex proluvie serosa. qui obser. 74. 75. Monachos quosdam agrotantes describit, & qui passim curandi occurrunt scorbutici, conferat, vix ouum ouo tam simile est, ac morbus ille scorbuto: nec tamen scorbuti nomine à Carolo Pifone describitur, procul dubio quod scorbuti nomen in Lotharingia non satis notum est. Neque necessarium est, quod vult VVierus, vt in magnis lienis semper stomachace cum scelerlybe coniuncta sit; cum sanguis ille impurus scorbuti causa nonnunquam ad superiora solum repat, & gingiuas corrumpat; nonnunquam ad inferiora descen-*

dat, & maculas, ac vlcera in cruribus, ac scelerlyben excitet nonnunquam tanta copia coaceruetur, vt totum corpus occupet, vbi maculae, & lituræ non solum in cruribus, sed & in brachijs, ventre, ac tergo conspiciuntur. Sunt n. vt postea, cap. 5. dicetur mali huius quidam gradus, & pro temporis, ac loci varietate & præcipue secundum causæ copiam vel prauitatem, differentiæ; atque ipsa testatur experientia, nonnullos citra maculas, & lituras in cruribus tantum gingiuas vitiatas, & os graueolens; alios, ore & gingiuis salis, crura maculis & lituris, quandoque & vlceribus fœdata habere, alios vtrumque pati.

Non solum a sub magnis lienibus, sed & in eod. *ἐπὶ τῶν ἐν τῷ παθῶν*, lib. Hippocrates, dum *ἐν τῷ αἵματι* describit, ipsum scorbutum egregiè delineasse videtur. Ita autem Hippocrates: *Μορβὸς περ Ἀυτὸννὺν ἰνκίπῃ, ἰν ἐοκὴ ἡεα ἁκκιδντ. Εξ ορε μάλὲ ολετὰ δὲ δὲντ, καὶ ἀβ τῖς γῖνγῖνα ἁβσcedντ, καὶ ἐκ ναρίβνς σνγνῖς σνῖτ; ἰντὲρδνμ ὁρὸ ἰν crurībνς ὁλερὰ ἐρνμντ, καὶ ἁλῖα ἐμεδγντ, καὶ color niger fit; καὶ cūis tennis.* Verum cum addatur, *περὶ τοῦτῶν καὶ τὰ λαιπῶρ ἐν τῷ σπῆνι*, quod verterunt, ad deambulandum, & laborandum, promptus, atque hæc duo symptomata scorbuticis non conueniant; cum è plurimis vix vnus scorbuto laborans reperitur, qui ad deambulandum, & laborandum promptus sit; ea de causa hanc descriptionem scorbuto conuenientem negant Balduinus Ronsseus, & VVierus.

Verum enim verò cum cætera omnia exactè scorbuto quadrent, id quod additur, *ad deambulandum, & laborandum promptus esse*, nec scorbuto conuenit, nec illi, quem descripsit Hippocrates affectui quadrare videtur. Cum enim vulnera in cruribus habeant, ad ambulandum, & laborandum prompti esse non possunt. Et cum Hippocrates dicat, conuolululum sanguineum cætera quidem eadem, quæ prioribus contingunt, pati, de priori autem conuolululi specie scribit; crura grauiora esse, & si deambulent, tremere, ac si per accliuem locum iter faciant, crebro admodum spirare, & anhelare: certè deambulandum prompti esse non poterunt, qui laborant ileo hæmatite. Ideoque nonnulli in textu negatiuam particulam, *ἢ*, omittam esse, & legendum censent, *καὶ τὰ λαιπῶρ ἐν τῷ σπῆνι καὶ τὰ λαιπῶρ ἐν τῷ σπῆνι*, ad deambulandum, & laborandum minimè promptus; atque ita tota hæc descriptio scorbuticis exactissimè quadrat. Confirmat istud alter locus, in eodem lib. de intern. affect. vbi paulò ante de morbo Regio secundo Hippocrates ita scribit: *ἢ περὶ τοῦτῶν ἐστὶ περὶ τὸ πορεύεσθαι, καὶ φορτῖν, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἀσθενείας αὐτῆς τὰ σκέλεα ὁποφίρεται.* Ita enim legèdum puto. Quomodo enim in hac corporis constitutione, ac vbi præ imbecillitate crura labascunt, æger ad ambulandum promptus, & alacer esse potest? Atque ita legendum esse etiam Celsus, qui fideliter Hippocratis sententias vertit, docet, qui scribit lib. 4. cap. 9. in intenta ambulatione, cursuque dolorem & quandam difficultatem accidere.

Et nomen Ileii tam commodè affectui huic competit, quam nomen *Schorbuck*, quod tormina; seu rupturam ventris significat. Et si enim Ileos plerumque intestini tenuis affectum significat; quandoque tamen etiam de doloribus, & torminibus, quæ in ventre, & secundum hypochondria accidunt, accipitur, vt ex Hippocrate & Galeno, lib. 3. epid. com. 2. c. 6. & 3. aph. 22. & de sympt. differ. cap. 4. videre est. Hæmatites verò ab *αἵματος*, quod est cruento, vel sanguine profluo, dicitur; quod scorbuticis non vno nomine competit: cum sanguinem atrum nonnunquam copiose vomitu, imò interdum per alium, & os reiciant; iisdemque cum sanguis ex naribus fluere soleat, tùm gingiue sint cruentæ, ac vlcera cruenta in tibiis excitentur. Imò quandoque è cruribus sanguis effluit, sicut eius rei raram quidem, sed notatu dignam historiam ante aliquot annos in custode templi ad arcem hinc sita obseruau. Ei scorbuto laboranti, cum delirio leni & non tumultuoso, vena in medio

An ileos hæ-  
matites.



medio ferè crure aperta est, quæ sanguinem satis copiosum per aliquot dies fundebat, ut à chirurgo sisti nõ posset, atque ea de causa in consilium adhibitus sim, etsi vix vestigium, & via manifesta, unde sanguis efflueret, vsui appareret.

Neque etiã aliis Græcis Medicis videtur fuisse planè incognitum hoc malum, quanquam forsã, ut rarius, ita exactè ipsis perspectum non fuerit, & propterea peculiare & vnum nomen ei non indiderint. Certè à scorbuto non procul abfuisse videtur morbus, quem Galen. 2. de natur. human. t. 3. describit: *Qui in Oeno urgente*, inquit, *fama vescebantur leguminibus, cruribus vacillabant; qui verò erua edebant, horum genua dolor infestabat.* Paulus Ægineta, lib. 3. cap. 49. his, quibus lien induratur, os graecolens fieri, gingivas corrodi, & vlcera in cruribus scitaticem non admittentia excitari scribit. Auicennas quoque, lib. 3. sen. 15. tract. 2. cap. 5. satis clarè eundem delineasse videtur, dum ita scribit: *Et quandoque denigratur lingua ex duritie splenis, & sentitur durities eius absque rugiu, cum premitur, nisi aggregetur ei inflatio, & non est cum ea febris inseparabilis, imò quandoque est non secundum ordinem: & quandoque multiplicatur cum ea vlcera crurum, & corroduntur dentes ac gingiva propter grossitudinem sanguinis, qui descendit in vlcera crurum, & corruptionem vaporis, qui descendit in omnes partes gingivarum, & quandoque est in vlceribus crurum crasis eius.* Etsi enim durities lienis in scorbuto necessario semper non adest: tamen ubi reperitur, & quidem cum accidentibus ab Auic. descriptis, scorbutis vix aberit.

Nihilque refert, quod nomen scorbuti apud hos aucthores non exstet. Neque enim de nomine hoc, quod Septentrionalibus hisce regionibus saltem vsitatum fuisse, & esse facilè cõceditur, sed de re, & morbo ipso est quæstio, sub quocunque etiã nomine eum proposuerint. Neque id satis firmum est, quo nonnulli euincere volunt, scorbutum antiquis planè incognitum, quod scilicet nemo veterum macularum mentionem fecerit, quæ sint infallibile scorbuti indicium, ut quando apparent in cruribus, Medicus non dubitet de scorbuto. Etenim non semper apparent maculæ, etiã in iis regionibus, ubi scorbutus familiaris: & variant symptomata pro regionum, & corporum varietate. Neque tamen Hippocrates maculas planè præterisse videtur, cum colorem crurum nigrum fieri dicit, quæ sunt maculæ illæ nigræ.

Est verò scorbutus regionibus Septentrionalibus, & maris Balthici accolis, iisque Germanico Oceano adiacent, & Saxoniz inferiori, Hollandiz, Selandiz, Flandriz, Brabantiz, Daniæ, Sueciz, Noruegiz, Islandiz, Frisiz, VVestphaliz, Pomeraniz, & finitimis populis malum endemium, & vernaculum. Nam cum aëre, & victus ratione ea vtantur, quæ, ut mox dicetur, ad scorbutum generandum est aptissima, non potest non ipsis esse familiare. Germaniz verò superiori, ut & Italiæ, Galliz, ac Hispaniz ferè incognitum. Suspiciatur quidem Platerus, lues hanc, cum sit contagiosa, potuisse ex procul diffitis regionibus, qua per maria nauigantes hi populi nostro seculo ad extremos terræ fines perlustrarunt, ubi fortè familiaris est, contagio per nautas in loca hæc mari vicina primum peruenire, ut lues Indica ab Indis primum in maritima circa Neapolim loca translata toti Europæ innotuit. Verum suspitione hac opus non est; cum non nuper, & ante paucos annos in hisce locis morbus hic innotuerit, sed iam Cæsaris Germanici tempore, & olim, ut etiã ex Olao Magno patet, in iis vigerit; & causas huius mali domi habent hi populi, ut aliunde id transportare opus non fuerit. Neque etiã nauigationes hætenus docuerunt, morbum hunc in diffita aliqua vltra mare regione esse endemium, sicut lues Venerea in India: sed hoc potius obseruatum, cum à nautis ex his locis in alia quandoque transportatum fuisse.

Impossibile tamen non est, in aliis quoque regionibus eum generari, si scilicet locus sit maritimus, & vli-

ginosus, vel alius, ubi rarus salubris aquæ potus, vel aër, aut victus ratio praua causam hæc malo suppeditant. Sicut in Arabia felici olim grassatum fuisse hunc morbum refert Strabo, in fine lib. 16. Geogr. Cum enim sub Augusto Cæsare in Arabiam exercitum Romanum duxisset Ælius Gallus, in ipsa expeditione relinquere cū coactus est in albo Vico, maximo Nabathæorū Emporio, ubi æstatem, & hyemem transigere oportuit, ut rescerentur infirmi. Quandoquidem oris, & crurum vitiiis, quæ *σοματικὴν*, & *σκελετικὴν*, eiusque loci *ἐπιχώρα παθήματα* nominat, exercitus tentabatur, quorum illud circa os, hoc circa crura resolutionem quandam fuisse, ab aquarum & fructuum vsu prouenientem, scribit Strabo. Ita Roderic. à Fonseca, consult. 2. refert, Lusitanis, qui primi Orientalem Indiam nauigando inuenerunt, cum in promontorio quodam aquam fluminis cuiusdam bibissent, gingivas ita intumuisse, ut os eas vix caperet. Nisi forsitan Scorbutum ex victu nautico contraxerunt, qui se promontorio illo primò tumore gingivarum detexit. Ut ita quocunque in loco causa huic malo generando, & præcipuè victus ratio suppetit, ibi generari possit Scorbutus. Sicut & hodie non solum in Germania inferiore, sed & in Misnia, Bohemia, Moravia, Silesia, Borussia, Hassia, & locis finitimis non raro reperitur: Imò quandoque etiã in Italia, Gallia, Lotharingia, & aliis regionibus. ut ex Eugaleno. P. Foresto, Roderico Fonseca, Carolo Pisone videre est: cum nusquam non in diæta peccetur, & τὸ ποικίλον τῆς διαίτης, ut ille ait, ποικίλα νοσήματα pariat, & si ratio diæte sit φαύλη, καὶ φλύαρη, cum alij morbi, tum pro errati ratione etiã Scorbutus generari possit. De Scorbuto in Misnia grassante ita scribit Georg. Fabritius, lib. 2. annot. *Vrbis Misnæ, sub historia anni 1486. grassatus est, inquit, hoc anno nouus & inauditus in his terris morbus quæ hautæ Saxoniz vocant den Scharbock, qui est inflammatio (alij legunt inflatio) in membris partium catenolarum, qui quò celerius adhibetur medicina, eo citius malum restinguitur. Sin mora accedit paulò tardior, sequitur membri affecti mortificatio, quam siderationem, nostri Græci σφάκελον dicunt, vltimum gangrænæ malum. Nam caro ab ossibus defluit & continuæ quoque è lue corrumuntur. Fuit idem morbus contagiosus multorum mortalium graui periculo.*

Neque hic ad aliquam singularem regionis proprietatem ab astris, aut Natura impressam confugere opus est. Sufficiunt causæ illæ, quæ tox enumerabuntur, victus ratio, & similes. Quæ cum maris Balthici accolis, & Germaniz inferioris incolis sint vernaculæ, & omnes in iis concurrant, mirum non est, quod hic morbus iis maximè est familiaris. Aliis verò in locis, quibus Scorbutus ignotus, etsi vna harum causarum competere videatur, alia tamen deest. Veneti quidem in stagnis & paludibus maris Adriatici habitant: venū victu, longè alio, quàm Saxones vtuntur. Tartari quidem, & Arabiz montanæ incolæ, alique multi victu prauo, & inordinato vtuntur: veruntamen non eò, quo maris Balthici, & vicinarum regionum accolæ, quibus carnes sale, & fumo induratz, pisces salsi, vel fumo aut frigore exsiccati victum familiarem præbent, neque aëre simili, neque aquis eiusmodi paludosis vtuntur.

Atque ita Germanici, & Suecici Oceani, Balthicique sinus accolis & finitimis populis Septentrionalibus Endemius quidem est & ἐπιχώρατος hic morbus: aliis verò in locis, ubi rarius, & non ex communi, sed sua cuique, & priuata quadam victus ratione contrahitur, in numerum τῶν σποράδων referri potest.

Imò quandoque inter Epidemios morbos referendus, cum seu ex victu prauo communi, seu ex aëris constitutione humida & vliginosa plurimos simul in eadem regione inuadit, aut multò frequentius, quàm aliàs consuevit, grassatur: id quod Rombert. Dodon. in obs. med. c. 33. anno 1556. apud Brabantos accidisse scribit. Nam cum propter validā famem secalis corrupti ex Bo-

Quandoque  
fit sporadicus

Quandoque  
Epidemius.

russia

An Galeno P.  
Ægineta &  
Auicenna  
sunt cogni-  
ti.

Quibus regio-  
nibus ende-  
mius.

russia aduecti vsus esset, non pauci à Scorbuto malè habere coeperunt. Idem annotauit Forestus, & simile quid anno 1562. accidisse refert, lib. 10. obs. 12.

Morborum & symptomatum in Scorbuto congeries.

Esti autem malum hoc hodie satis cognitum, & plurimis locis familiare quasi est: tamen in quo eius natura consistat, non ita planum est: cum maxima morborum, & symptomatum in eo concurrat congeries. Adest enim sæpe Lienis intemperies, eiusdem, & venarum portæ obstructio; soluta vnitas, & vlcera crurum, magnitudo modò aucta, modò imminuta: symptomata plurima in facultatibus penè omnibus læsis, & qualitatibus mutatis; ipsisque excretis non bene se habentibus. Et tanta omnino morborum, & symptomatum farrago in hoc affectu concurrir, vt vix alius sit tam *πολύμορφος*, & qui sub tot morborum speciebus latitet, ac Medicos, etiam cum cauisse maximè videntur, sæpe decipiat & deludat. Neque enim gingivarum vlcera, & oris fœtor, dentium vacillatio, & crurum maculæ, atque vlcera, vel illa *σχεχούται* statim ac semper apparent, neque vbi apparent, solum conspiciuntur, sed & dolores in cruribus *δυσόχοι*, nausea, ac vomitus, *ἀσπρῖα*, alui nunc constipatio, nunc fluor, & dysenteria, sputum copiosum & perpetuum, dolores vagi, cardialgia, & anxietas, lipothymia, febriū varia genera, deliria, conuulsiones, paralysis, hydrops, arthritidis, pleuritis, erysipelata, varia vlcera, & alia. Non tamen idem morborum, & symptomatum in omnibus concursus, sed in hoc ista, in illo alia; in hoc plura, in alio pauciora apparent; quæ tamen omnia ab vna causa variè disposita, & ad hanc, vel illam partem riente ortum habent. De quibus omnibus præ cæteris diligenter egit Severinus Eugalenus, in suo de Scorbuto tractatu, qui prolixè omnes morbos, & symptomata, quæ Scorbuto coniungi solent, descripsit, & Scorbutum ita depinxit, ac in lucem produxit, vt iam amplius latere facile non possit. Et dicentur de hisce plura postea de signis.

Scorbuti definitio.

Itaque cum ex tam multis, illisque diuersi generis, & diuersas partes occupantibus morbis, & symptomatibus quasi componatur Scorbutus; humoris verò, qui proxima omnium causa est, natura planè cognita non sit, vna, & perfecta definitione naturam eius exprimere si non impossibile, tamen difficile est. Ne tamen sine definitionis luce in hoc tractatu versemur, qualem possumus, afferemus, & ita commodissimè Scorbutum describi posse putamus. Scorbutus est praua & occulta qualitas, seu dispositio, toti corpori, præcipuè verò visceribus nutritioni dicatis impressa, ab humore melancholico crasso, seroso seu ichoroso, peculiari modo corrupto orta; cum spontanea lassitudine, & granitatis, in cruribus præcipuè, sensu, pectoris angustia, & respirationis difficultate, gingivarum corruptione, & oris grauedentia, ac maculis purpureis in cruribus imprimis, aliisque morbis, ac symptomatibus plurimis ab eadem causa pendentibus, coniuncta. Seu, praua quadam corporis nutritio vel cachexia, ab humore melancholico peculiari modo corrupto orta, coniunctam habens crurum debilitatem, maculas, gingivas tumidas & sanguinolentas, dentium laxitatem, & plura alia symptomata.

## C A P V T II.

### De subiecto & causa Scorbuti.

Sed vt ista clariora fiant, & Natura Scorbuti penitus, quantum possibile, cognoscatur, duo inprimis declaranda sunt: Humoris Scorbutum producentis natura, & generationis modus; ac morbi, & symptomata, quæ Scorbutum comitari solent.

Et prius quidem vt rectè expediatur, Natura humoris Scorbutici à prima origine inquirenda.

E cibo in ventriculo chylus fit: chylus in ventriculo elaboratus per venam portæ dictam ad Epas, & Lienem

deducitur, vt ibi in sanguinem totius corporis alimentum conuertatur. In quibus sanè coctionibus si omnia se rectè habeant, id ex totius corporis comodo est. Verum quia plerumque cum ob errata, quæ in victu committuntur, cum ob partium debilitatem coctiones hæ, & quæ iis coniunctæ sunt, excrementorum separationes non rectè perficiuntur, humorum vitiosorum sæpe colluies tanta cumulat, vt à destinatis à Natura receptaculis tota capi non possit. Ac tum humores superflui & vitiosi in partes vicinas, mesenterium & pancreas protruduntur. Partes enim hæ non solum laxiores sunt, sed & plurimas glandulas quarum caro *σπογγώδης* est, & bibula, obtinent, & totius corporis quasi sentinae sunt. Recipit eosdem & Omentum, ac cauitas illa in sinistro hypochondrio sub diaphragmate, ex ventriculi, omenti, coli & viscerum connexu orta, & exitum non habens, sed ita conclusa, vt aquam quoque & flatum continere possit, ab Hier. Fabricio de Aquapendente, in historia seu structura omenti, luculenter descripta, nec Hippocrati ignota, qui 7. Aph. 54. scribit: *Quibus inter ventriculum & septum transversum pituita concluditur, & dolorem adfert, in alterutrum ventrem viam non habens, iis per venas in vesicam versa pituita morbi fit solutio*. Atque hoc in loco vt morbi hypochondriaci sedes sæpe hæret, ita non raro Scorbutus ex illius morbi causa peculiarem corruptionem vlterius sortita inde oritur. Cauitate enim illa natura interdum simul vititur ad recipiendos superfluos humores, pituitosos, crassos, limolos, serosos & aquosos, melancholicos, atros, flatusque etiam. Et quidem ex tribus membris in illam cauitatem excrementa ista transmittuntur, ex liene, epate ventriculo. Ac sæpe in Anatomia obseruatum. marsupium & hanc omenti cauitatem nunc aquoso, nunc atro humore refertam fuisse. Flatum etiam in ea contineri extra dubium est, ob quos, cum abdomen comprimitur, aut venter attollitur vel deprimatur, sonus manifestus percipitur. Nouique studiosum, qui quoties manu sinistrum hypochondrium comprimit, manifestus sonus etiam ab adstantibus percipitur. In his nimirum locis cholerae, melancholice, diarrhoeæ, dysenteriae, cachexiae, atrophiae, languoris, lentarum, errantiumque febrium, latentium denique morborum causas se deprehendisse, rectissimè Fernelius, lib. 6. de part. morb. & sympt. c. 7. scribit. Imò ex vitiosis humoribus in hisce locis cumulat, præter enumerata mala, alia plurima, vt pote scabies, maculæ, vlcera, & tumores varij, arthritidis, paralysis, conuulsiones, ventris tormina, dolores varij, & vagi in corpore ortum habent, vt ferè nihil morborum in corpore sit, quod non ab excrementis in hisce locis cumulatis provenire possit. Cum enim sentina ista corporis plena est, pars vitiosorum humorum non pauca venæ cauæ, & arteriæ magnæ communicatur, per quarum ramos postea in totum corpus distribuitur, & prout constituta, ac disposita est, ac in hanc, vel illam partem à Natura protruditur, nunc hoc, nunc illud mali ac morbi genus excitat. Atque ita rem se habere experientia confirmat, ac in demortuis sæpe (cum in viuentibus causa mali satis deprehendi non potuerit) in mesenterio vlcera sordida & abscessus deprehensi sunt, è quibus nunc febres acutæ, cum sanguinis nigerrimi vomitu, & per aluum excretionem copiosa, cum animi deliquiis; nunc epate, liene, & intestinis saluis ventris tormina intolerabilia, & tandem mors; nunc nausea, vomitus melancholia, cachexia, atrophia; nunc dolores Colicis similes, vrinae purulenta; nunc perpetuæ vigilie lipothymia, sudores frigidi, & similia mala originem habuerunt.

Facit ad istorum in mesenterio vitiosorum humorum coacervationem imprimis Lien, dum suum officium non facit; lienque generationis horum prauorum humorum plerumque præcipua causa est, mesenterium ac vicina loca receptaculum & sedes, ac in hisce locis morborum & symptomatum, quæ scorbutum comitantur, causa querenda est. De quo part. 4. cap. 5. dictum.

Sed

In primis viis colluies vi-

ziosorum humorum malorum morbum causam conueniunt.

In totum corpus per venas & arterias distribuitur.

Cibi in co-  
ctione rare-  
funt & Spi-  
ritualiscunt.

Sed ut ad Scorbuti Naturam explicandam propius accedamus, quænam sit humoris Scorbutum producentis natura, quo in loco, & quomodo generetur, explicandum. Primò autem hoc præsupponendum, coctiones, quibus alimentum corpori nostro alendo idoneum elaboratur, idque ab inutilibus, & excrementitiis partibus secernitur, quadam quasi fermentatione, & *πνεύματός* (liceat hisce vocabulis uti) perfici, quibus, quæ antea erant crassa, & fixa, rarefunt, spiritualiscunt, ut sic dicam, & ut Chymicorum termino utar, volatilia redduntur, perficiuntur, & ab excrementis suis liberantur, ut eo facilius corpori nostro non solum assimilari, eique utile, & purum alimentum suppeditare, sed & spiritibus materiam præbere possint. Apparet hoc etiam in alterationibus fructuum. In maturatione enim, quæ primò erant austera, & acerba, ac omnino fixa, & spirituosi ferè nihil obtinebant, omnia dulcescunt, & partes illæ longè subtiliorem, & spirituosiores, ut sic dicam, naturam induunt, ut ex iis spiritus etiam *φλογος* elici possit, qui ex immaturis non poterat. Muldò verò magis apparet hoc in fermentatione ea, quæ in musto, cereuisia, & succis è piris, & pomis, aliisque fructibus expressis accidit, è quibus ante fermentationem nihil ferè spiritus, post fermentationem verò is satis copiosus elici potest. Eademque omnia ante fermentationem cruda, ac impura, ac proinde minus salubria sunt, facibus nimirum adhuc permixta, & in quibus calori nostro plurimum laborandū est: Vbi autem fermentantur, cum excrementis suis quasi pugnam ineunt, spiritualiscunt, *μπεριζοῦται*, ut Hippocrat. 3. de vict. rat. in acut. l. 38. loquitur, rarefunt, & in maiorem molem attolluntur, atque exaltantur, ac finita fermentatione facibus subsidentibus longè subtiliora, puriora, & spirituosiora redduntur. Idè in pane videre est, qui si fermentetur bene, ipse rarior redditur, atque ad coctionem longè aptior est, quàm non fermentatus. Et quidem cibos, dum coquuntur, & ut alimentum corpori fiant, elaborantur, attenuari, rarefieri, & (liceat sic loqui) spiritualiscere quasi, ita evidens est, ut doctiss. Planerus in eam venerit sententiam, l. 2. meth. med. c. 4. p. 72. cibum, & potum in ventriculo in halitus resolui, qui in venas mesaraicas subeant & inhalent, ibique in speciem sanguinis concretionem quadam mutantur, id quod disputatione quadam peculiari se demonstrasse scribit.

Neque solum aliæ alimenti & porus partes hoc modo raræ & volatiles quasi in corpore nostro redduntur, sed & ipse sal, qui alimentis inest, & cum iis assumitur, ex fixo volatilis, spiritualis quasi, & animalis redditur. Atque his quiuis, qui salem volatilem è cornibus, & ossibus animalium, ex sanguine, & vrina destillando elici vidit, non ita difficulter fidem habebit.

Crassiores  
chylis partes à  
liene attra-  
huntur.

Itaque dum omnia sese rectè in corpore habent, alimenta in ventriculo resolvuntur, partesque ad alendū inutiles secernuntur, & per alium excernuntur: quæ verò ad alendum utiles sunt, propria ventriculi, & intestinorum vi elaborantur, & naturæ humanæ consentaneæ redduntur. Cum verò eam formam, & similitudinem, quam cum corpore alendo habere debent, in ventriculo, & intestinis adipisci non possint, ad iecur, tanquam sanguinis officinam, amplius elaborandæ mittuntur. Ut autem sanguis purior in Hepate elaboretur, crassiores chyli partes, mediante sero copioso, quo diluuntur, & ad fluxum ac motum aptiores redduntur, à liene auertuntur, & attrahuntur; qui tamen & ipse crassum illum chylum pro sanguificandi facultate qua præditus est, quantum potest, elaborat, & in sanguinem sibi, & vicinis partibus utilem, & commodum mutat: quod verò planè corpori alendo inutile est, per destinatas à Natura vias expellit, ut lib. 1. Inst. c. 9. pluribus hac de re egimus.

Generatio-  
nis Scorbuti  
modus.

Atque hæc omnia si rectè, & decenter in corpore perficiantur, homo bene valet: si verò (ut generationis

Dan. Sennerti Tom. I I.

Scorbuti modum breuibus comprehendam) ob viuendi rationem incommodam, & crudum, crassum, ac prauum victum multa alimenta *ἀνενπίθεται, ἀκρίτα, καὶ ἰσχυρά*, ut appellat Hippocrates, tanta copia assumantur, ut à corpore, aliàs etiam sano, & forti, ac vi coëctrice pro viribus in iis conficiendis laborante, omnia satis concoqui, & ab excrementitiis partibus liberari non possint, & chylus multis partibus crassis, ac tartareis, ut à Chymicis appellantur, abundans, ad viscerà secundæ coctioni destinata perueniat, accidit, ut partes illæ crassæ, salisæ, fixæ, nec omnes à liene attrahi, nec satis elaborari possint. Arque ita coctio, & *πνεύματος* illa, qua omnia alimenta fermentari, & quasi spiritualiscere debent, impeditur, & partes cibi crassæ, salisæ, esculentus, & fixus tartareus copiosè cum cibis ingestus crassam suam, & fixam naturam depone-re, ac rarefieri, volatilis, ac animalis reddi, ut debebat, non potest, & partes impuræ, inutiles, ac tartareæ ab utilibus, & puris probè separari nequeunt. Vnde viscerum coctioni secundæ dicatorem facultas tandem oneri & copię humorum istorum crassorum succumbit, paulatimque debilitatur, ac indies ad alimentorum coctionem, & elaborationem ineptior redditur, ut nimiam humorum crassitiem & deficientem *πνεύματος* corrigere non possit. Quod vitium atque id, quod in rarefactione & attenuatione humorum deficit, quomodo vnica voce exprimi possit, non planum est: & proinde de nomine, modò de re constat, cum nemine litigabimus. Remb. Dodonæus, in praxi Med. de mag. lien. & cum eo Cl. Dn. D. Gr. Horstius *μόλυνον* siue cruditatem appellat, & eam proximam huius morbi causam esse dicit.

Sal ergo ille fixus, ac tartareus, & partes chyli crassiores, cum omnes à liene attrahi, & elaborari, atque ab Hepate sine incommodo attrahi non possint, utpote quod subtiliores tantum chyli partes, tanquam sibi familiares, & sanguini bono generando aptiores naturaliter appetit; neque etiam ob copiam, & ineptitudinem à Natura omnes expelli possint; in primis viis hærent, & in venarum mesaraicarum, ac portæ ramis, adeoque ipso mesenterio, pancreate ac omento subsistunt, ac propter causæ, quæ talibus humoribus materiam suppeditare solet, continuationem, quotidie augentur, hisque salis, crassis, & fixis humoribus alij crudi, & vitiosi humores quiuis coniunguntur, & permiscuntur, & ab iis hisce in locis detinentur; atque ita tartareorum, ut Chymici appellant, humorum colluuius in primis viis coacervatur.

Detenti autem hi humores in hisce locis, & hanc quasi corporis sentina diutius, vterius corrumpuntur, & variis hypochondriacis affectibus causam præbent, usque dum tandem prauam, ac contagiosam, & Scorbuto peculiarem dispositionem acquirant. Humores hoc modo corrupti, & Scorbuticam dispositionem adepti, etsi aliquandiu in primis viis delitescant, tamen vbi tandem magna eorum copia coacervatur, adiuuante inprimis, & motum promouente seroso humore, quo diluuntur; ad Hepar deferuntur, eiusque *διυμάτων* sæpe vitiant, & in venas, ac arterias effunduntur, ac cum sanguine permiscuntur, eumque inquinant, & cum eo in varias corporis partes, etiam in musculos, tendines & articulos, diffunduntur, ac varios morbos, & symptomata, pro partium, à quibus recipiuntur, varietate excitant.

Extra enim in habitu corporis extra venas effusi, cū neque corpori assimilari, & apponi, neque exire commode queant, ibi detenti partium nutritionem impediunt, corpus grauant, ac lassum reddunt, vel hinc inde mori dolores vagos excitant. Ad gingiuas falsi huius & corrupti humoris portio missa mollem earum, & teneram carnem in laxum tumorem attollit, tandemque acrimonia sua eas arrodit, vnde pruritus in gingiuis sequitur, earumque caro leui suctione

Morborum  
symptomata  
Scorbuticorum  
generatio.



& attritu sanguinem effundit, flaccescit, exulceratur, ac putrescens à dentibus abscedit, & grauem odorem de se emittit, ipsique dentes vacillant, & ex ore excidunt. Quæ verò pars ad inferiora corporis per venæ cauæ crurales ramos à natura propellitur; per capillares venas, mediante sero, ad superficiem cutis cum sanguine detrusa, maculas nunc rubras, nunc purpureas, aut liuentes excitat, vel ad tendines, & ligamenta, ipsosque musculos delata crurum grauitatem, lassitudinem, & imbecillitatem excitat, & partes has vel laxat, vel ibi diutius hærens à sero, quo diluebatur, deserta, exsiccat, & induratur, vnde tendines rigidi redduntur, cruraque motu priuantur & ambulandi impotentia, paralyses quendam speciem mentiens, excitat. Ad alias quoque partes delata dolores, tumores, erosiones, & sexcenta alia, quæ Engalenus omnia diligenter enumerat, producit, de quibus postea plura dicentur.

*Scorbutica colluuiis ubi generatur.*

*Subiectum scorbuti.*

E quibus etsi colligere facile sit, & quod Scorbuti subiectum, seu locus potius sit, vel sedes materiæ Scorbutum excitantis, & quis humor sit, à quo Scorbutus habet originem, & quomodo generetur: tamen vt Scorbuti natura manifestior fiat, de singulis in specie dicendum. Et primò quidem Scorbuti subiectum quod attinet, dum de subiecto Scorbuti agimus, non intelligimus hîc partes corporis humani, quæ symptomata, & morbos Scorbuticis familiares patiuntur; cum nulla ferè corporis pars sit, quæ non mali aliquid in Scorbutu pati possit; etsi nunc plures, nunc pauciores afficiantur, prout malum vel recens vel antiquum est: sed colluuii illius Scorbuticæ, & humorum vitiosorum, qui symptomatum & morborum in Scorbutu causa sunt, fontem, & sedem inquirimus. Atque subiectum duplex statuimus, fontem, & locum, in quo generatur, & sedem, in qua generata continetur.

Fontem primò huius colluuii quod attinet, hanc nisi è contagio contrahatur, mesenterium, & primas corporis vias, seu venæ portæ ramos, quæ illas perreptant, sedes esse statuimus. Etsi enim rarò accadat, vt sine lienis actione læsa Scorbutus excitetur, & plerumque humorum vicinorum prauorum, & corruptorum contactu & ipse afficiatur, & labem contrahat: tamen quandoque saluus est, & ipse in cadauere Scorbutu extincti aperto omentum quidem totum ferè putridum & corruptum; in liene verò nihil, quod, quantum ad sensum, culpari posset, deprehendi; & in quodam Hollandiæ Præside, Scorbutu laborante, magis Hepar, quàm Lienem affectum fuisse Forestus lib. 20. obseru. 1.1. annotauit. Etenim licet Lien sanus, ac saluus sit: tamen si chylus sæculentus salis, ac tartareis excrementis, & superfluitatibus scatet, lien omnes illas nec attrahere, nec elaborare potest, atque ita in agendo sine suo frustratur ob errorem externum; eodem modo sicut actio ventriculi aliàs bene constituti sæpe læditur, si materia concoquenda aut nimis multa, aut aliena, & vitiosis qualitatibus infecta ipsi offeratur. Si tamen Lien ipse debilis, vel obstructus, vel quocunque modo malè constitutus sit, multò magis in agendo officio suo non satisfacit. Potestque vtrumque fieri, scilicet vel vt primò à crassis humoribus Lien obstruatur, eoque propterea officium suum non faciente, in mesenterio, & primis viis humores Melancholici cumulentur; vel vt primò in venæ portæ ramis ob alimentorum vitium tales humores cumuletur, & deinde lienem obstruant, vel debilitent, qui obstructus, vel debilitatus ad copiam eorum in dictis locis augendam facit, & vt humores vitiosi longè copiosius quàm antea cumulentur, in causa est. Vt ita sedes, & fons primus colluuii Scorbuticæ ex victu contrahatur sit in mesenterio, omento, & primis viis, locisque inter ventriculum, Hepar & Lienem medijs, & vtrique visceri vicinis, supra, descriptis.

Etsi verò hisce locis primam originem debeat colluuiis Scorbutica, & in recenti morbo etiam iis ferè concludatur: tamen si malum iam diutius durauerit, & materia ista vitiosa copiosior sit, non solum hisce locis coercetur, sed per venas, & arterias in totum corpus diffunditur; vnde totum venosum genus, tam venas portæ, quàm cauæ complectens, sedes colluuii scorbuticæ dici potest. Et chylus, dum è ventriculo per loca huiusmodi vitiosis humoribus repleta transit, inquinatur: ipsum præterea hepar & lien à vicina & effluente eiusmodi colluuii; eiusque vaporibus debilitatur. Ista enim praua, & occulta dispositio non intra humores semper se continet, sed vicinis visceribus, tum humorum ipsorum corruptorum contactu, tum vaporibus & fumis eorum imprimitur. Ventriculus quidem sæpe etiam afficitur, & labè à vicinis prauis humoribus contrahitur: ærissime tamen appetitus satis validus, & tantum non integer permanet: & si quæ circa ventriculi actiones apparent symptomata, potius per consensum vicinorum viscerum, quàm per primum ventriculi affectum fiunt. Viscera posteaquam dispositionem illam prauam receperunt, eam rursum alimentis affluentibus & elaborandis imprimunt: sicut idem in lue venerea, & elephantiasi accidere solet. Atque ita cum alimentum corrumpatur, potius morbificæ causæ accedit, eamque auget, quàm vt corpori alimentum præbeat; & hoc modo totum corpus cacochymia scorbutica inficitur. Idque ex sanguine venæ scætæ emissio apparet, qui manifestas corruptionis notas exhibet, & plerumque partes superiore pituita, aut mucone potius flauescere aut virescente, quasi pelle obducitur. Imò vbi per contagium extra admissum contrahitur scorbutus, primò sanguis in vena caua corrumpitur, etsi in primis viis nullum sit vitium.

Secundò causam scorbuti, & eorum, quæ scorbutum laborantibus p. n. accidunt, quod attinet, antecedens equidem causa est humor melancholicus, crudus, simulque ichorosus seu serosus, cui interdum & alij humores crudi & corrupti permiscuntur, id quod vel vrinarum varietas & crebra permutatio ostendit. Vt autem is proximæ causæ naturam hîc induat, peculiarem & huic morbi propriam corruptionem induat, necesse est. Esse melancholicum non solum victus præcedens ratio, quæ ad nullum alium humorem, quàm melancholicum præcreandum inclinat, tum effectus, morbi scilicet, & symptomata, quæ in scorbuticis apparent, pleraque humoris melancholici soboles, testantur, vt postea patebit. Et inesse talem succum sanguini, qui à liene attrahitur, Galenus ex colore, qui quàm hepatis, ipso visu teste, nigricantior est, & sapore acerbis, qui carni etiam elixæ eius inesse deprehenditur, lib. de atra bile c. 6. & 7. rectè demonstrat.

Neque hic assentiri possumus Hieronymo Reusneri, qui, de Scorbutu exerc. 4. prolixè, & operosè probare conatur, scorbutum nullo modo fieri à melancholico & crasso, sed ab aqueo solùm, & tenui humore. Hoc enim eius dogma nullo modo cum iis, quæ de causis scorbuti externis habet, consentit. Etenim si victus rationem, & aërem, ac omnia, quæ ad scorbuti generationem concurrere prolixè docet, diligenter examinemus, omnia ad humoris melancholici, & crassi generationem faciunt.

Nec; tamen hîc per humorè melancholicum glutinosum quid, quod ille, pag. 173. ipsi adscribit, intelligimus, neque id quisquam Medicorum doctiorum asserit, qui feci vini, & amurcæ illum comparant, non glutini, quod & in vrinis sensibus sæpe pater. Etsi nihil prohibeat, quin, vt diximus, humores pituitosi, & vitiosi huic colluuii sese associare possint. Idque sæpe accidere in sanguine, vena aperta emissio, apparet, qui plerumque in scorbuticis quasi glutine albo virescente, vel flauesciente vt modò dictum, obducitur.

Etsi

*vbi continetur colluuiis scorbuticæ.*

*Causa scorbuti est humor melancholicus.*

*Non solum aqueus.*



Et etiam  
crassus est  
sed sero di-  
lutus.

Esti verò humor melancholicus scorbuti causa crassus esse rectè statuitur: tamen non tantum crassus est, sed sero multo dilutus. Neque enim solum crassa, sicut vesicula fellis puram putam, bilem, lien attrahit, sed chyli partem respectu illius, quæ ab hepate attrahitur, crassiorem, quæ tamen aquosa, & potenter materia, ut facilius, quod debet, penetraret, neque obstructions pariat, diluitur. Itaque ut in statu naturali crassior illa chyli pars multa aqua diluitur: ita & in præternaturali idem accidit. Atque ita humor scorbuti causa non solum crassus est, sed & ichore, ac sero multo diluitur, ut sit instar lixiuij, quod ex aqua, & salis, ac feculentis, & adustis partibus constat, ut, lib. 2. Instit. part. 3. cap. 8. docuimus, idque ex præcedente victus ratione, quæ talibus partibus abundat, & effectibus, doloribus vagis, gingivarum, & crurum ulceribus, ac similibus patet, quæ omnia à salis, & serosis humoribus proueniunt.

Humor scor-  
buticus pec-  
uliariter modo  
corruptus est.

Talis cum sit, ut multis serosis partibus diluatur, & instar lixiuij: quod ex sale, terrenis partibus, & aqua constat, sese habeat, facile ad lienem cum chylo penetrare potest. Neque enim, quod modò diximus, & diligenter notandum, sincerus, & solus, sed aliis humoribus mixtus ad lienem peruenit, ideoque etiam ut sincerus & solus ibi deprehendatur, opus non est.

Verum cum in quartanis, hypochondriacis ac melancholicis affectibus, ubi similis causa adesse videtur, non eadem planè symptomata, qualia in scorbuto conspiciuntur, appareant; etsi tandem hi affectus sæpius in scorbutum degenerent: peculiarem *ἀπτον*, & occultam corruptionem, ac deprauationem suscipere necesse est illam humorum melancholicorum, serosorum, ac tartarorum colluuiem, diutius in locis illis detentam, si scorbutum producere debet; quod cum ex aliis symptomatibus, quæ ipsum comitantur, tum & præcipue ex contagio apparet, quod alij morbi melancholici, & hypochondriaci destituuntur, Scorbutus verò præditus est, ut facile aliis communicari possit; quod euidentis peculiaris corruptionis argumentum est. Quod & hoc euincere videtur, quod, ut in Prognosticis dicitur, ubi humor scorbuticus similem hepati, aut lienem, dispositionem impressit, vix vnquam integrè curatur scorbutus: quod indicium est impressionis longè fortioris, quam quæ qualitatibus primis competit, sed talis, quæ venenorum naturam æmularur, quorum impressiones tam fortes sunt, ut dispositiones ab iis relictæ sæpe toto vitæ tempore aboleri non possint. Ideoque à splenis obstructione, & humore melancholico, & atro tantum, ac simpliciter scorbutus deduci non potest; cum multi splenis obstructione laborent, & humore melancholico, vel atro abundant, nec tamen scorbutum afficiantur: imò iis regionibus, quibus humoris attritus ex aëris, qui humores torret, feruore collectio est familiaris, scorbutus sit planè ignotus. Maloque etiam hic fateri, nos in communibus humano generi ignorantia tenebris versari, & corruptionis huius modum non satis explicare; & non nisi ex affectu dignoscere posse, quàm ea, quæ fundamento nullo nituntur, ad ignorantiam nostram palliandam proferre.

Quomodo  
generatur.

Tertiò generationem huius humoris quod attinet, etsi, quæ hic alij tradunt, me non lateat, & alios aliter sentire sciam: tamen paulò altius huius humoris natura inuestiganda, & quomodo generetur, indagandum videtur, quod plurimum ad curationem rectè instituendam facit. Principio autem hic non in qualitatibus primis subsistendum, sed ad illas *διωκτικές*, & *ἀπορροιας* humorum, ab Hippocrate, in lib. de prisc. Medic. propositas recurrendum, & ad ea, quæ Hippocrates, 3. de vict. rat. in acut. t. 38. de acido, amaro, ac fermentatione humorum salorum in corpore nostro tradit, respiciendum videtur.

Diximus a. antea, humorem hunc generari ex defi-

Dan. Sennert. Tom. II.

ciente salis, qui cibis inest, & cum iis assumitur, potusque, ac cibi crassioris coctione & *ἀνυμωσίῃ*. Cum enim natura intendat per coctionem cum primam, tum secundam alimenta assumpta ita attenuare, rarefacere, & omnino præparare, ut corpori nostro affinia, & ei alendo sint vtilia, atque ea de causa in ventriculo ea primum resoluat, ac coquat, & excrementitias partes crassissimas per alium excernat; postea verò chylum ad hepar, tanquam sanguinis, qui totius corporis alimentum, officinam mittat, auersis prius, & attractis à liene crassioribus, & serosis plerisque chyli partibus, ad sanguinis pro liene, & vicinarum partium nutritione generationem destinatis: si hoc non fiat, & vel in prima coctione feculenta ac tartarea omnia, quæ debebant, non secernantur, & ad lienem in maiori copia affluant, quàm ut ab eo omnes attrahi, vel elaborari possint; vel lien seu debilis seu obstructus partes illas chyli feculentas, ut debet, ad se non attrahat: in primis viis, & circa lienem & locis antea dictis, hærent, & hoc modo humor crassus, salsus, fixus, & quæ omnia Chymici vno vocabulo complectuntur, tartareus, multo tamen sero dilutus, coaceruatur, ibique diutius hærens, tandem peculiarem, specificam, & scorbutum propriam corruptionem induit.

Atque rem ita se habere plura sunt, quæ docent. Nam primò si consideremus victum, qui scorbutum generare solet, omnes in eo consentiunt, cibos sale, & fumo induratos scorbutum producendo aptissimos esse, & in maritimis locis, ubi homines non solum aëre crasso, marinis, salis, ac palustribus vaporibus inquinato vtuntur, sed aquas etiam feculentas, & corruptas bibunt, & alimentis in tali aëre crescentibus, ac quæ eiusmodi aquis nutriuntur, vescuntur, hunc morbum familiarem esse. Cum enim cibi eiusmodi sicci, puri, salis, aquisq; feculentis & corruptis, succi humidioris, rarioris, & spirituosius, & qui corpori probum alimentum præbere possit, & ut Chymici non ineptè loquuntur, volatilis, vel parū insit, vel quod in eo fuit, sale, quo cōdiuntur, multo corruptū, aut fumo absumptū, & exsiccatum, aut putredine corruptū sit, ut nihil ferè, nisi partes crassæ, feculentæ, terrestres, excrementitiæ, salsæ, & fixæ plurimæ insint, & omnino, ut Hippocrates. de prisc. Medic. loquitur, *ἀπτον καὶ ἰσχυρόν* in tali cibo abundet, id omne à natura attenuari, rarefieri, volatile, ac spirituosum reddi, & elaborari, ac vinci non potest. Ac proinde ei respondens, & congener cacochymia colligitur, & crassus, feculentus, salsus, ac fixus humor in primis viis coaceruatur.

Deinde curandi ratio, & medicamenta, quæ hunc morbum expugnant, euidenter idem demonstrant. Nam si medicamenta, quæ hunc morbum curare experientia longa docuit, consideremus, non sunt ea quæ uis aperiens, aut humori melancholico simpliciter opposita, sed omnia sale volatili abundant; qualia sunt cochlearia, nasturtium, beccabunga, chelidon. minus, fumaria, raphanus rustic. sinapi, sedum minus, &c. Quæ omnia & gustata, & trita vaporem subtilem, acrem, & citò euanescentem spirant, qui est à sale volatili Chymicis dicto. Nam medicamenta, quæ in aliis quidem affectibus, qui maximam cum scorbutum cognationem habere videntur, profunt, & aliàs aperiendi vim habent: tamen si sale volatili hoc destituantur, in scorbutum curando non sufficiunt: monentque aliquoties non præter rem Seuerinus Eugalenus. doctissimos alias Medicos scorbuticorum curam quidem suscepisse, sed cum illa solum, quæ aliàs in hypochondriacis affectibus usurpari solent, medicamenta adhiberent, nullo ad specificam huius humoris naturam, & corruptionem respectu habito, nihil profecisse; se verò postea idoneis, & appropriatis, ut appellant medicamentis feliciter eosdem sanitati restituisse.

Victus scor-  
buti genera-  
do aptus.

Medicamenta  
scorbutum  
curantia.

*Medicamen-  
ta scorb. scor-  
butum recte  
ut usurpan-  
do.*

Imò illa ipsa medicamenta antiscorbutica, si salem illum volatilem amittant, id quod exsiccatione, & coctura fit sæpe, parum efficacia deprehenduntur: & longè plus virium, & efficacia succis, & conferuis harum plantarum, quàm exsiccatis inest, utpote in quibus partes illæ volatiles ab igne dissipantur, aut cū humido in exsiccatione euanescent. Ideoque sal volatile harum plantarum meritis maximam vim scorbutum curandi adscribimus, utpote quo præsentē & operante malum pellitur, absente non tollitur.

*Occulta vis  
in medica-  
mentis scor-  
buticis.*

Si quis tamen hæc medicamenta etiam occultum quid, quod occultæ, & specificæ humoris corruptioni aduerteretur, habere statuatur, ei non repugnemus. Et videntur inter ista medicamenta quædam præ aliis habere peculiarem prærogativam. Et licet nonnulli apud externos reperiantur, qui putant sine causa à Germanis novum morbi genus hîc afferri, cū ista omnia, quæ scorbuticis accidere dicuntur, symptomata adustæ & ichoribus acerbis contaminatæ melancholiæ adscribi possint: tamen humorem illum melancholicum peculiarem habere corruptionem ex medicamentis, quibus curatur, patet. Cum enim cochlearia, bekabunda, nasturtij genera & sinapi recte usurpentur, omnia acerrima, & pleraque tertium caliditatis gradum attingentia, si ad primas solum qualitates in humore melancholico respiciendum esset, ab istis medicamentis intemperies humoris melancholici potius augetur quàm tolleretur.

Quia verò secundum Hippocratem curatio morbi indicat, & omnis actio est inter contraria, & à contrariis, ut habet Aristoteles, *lib. de gener. c. 7. r. 50. & 51.* & agens, quatenus in patiens agit, ei contrarium est: sequitur, etiam salem volatilem, cuius in curatione scorbuti primæ partes, & vires sunt, in id, quod sub eodem genere proximo est ipsi contrarium, agere. Opponitur autem inter sales fixus volatili. Et cum omne fixum à volatili reddatur volatile, sicut contra volatilia à fixis figuntur, & fixa redduntur, ut Chymicis notum est, & omnibus Physicis (cum ad plurimarum rerum explicationem multum faciat) meritis notum esse debet, ut de *Consens. Chymicor. c. 12. in fine*, dictum est: Fit etiam, ut à plantis, quæ sale isto volatili abundant, humores, qui in sale isto fixo abundant, attenuentur, rarefiant, & ut vno verbo dicam, volatiles reddantur, & à natura facilius loco moveantur, & discutiantur.

*Cruditatis du-  
plex.*

Neque hæc à Galeni & antiquorum doctrina aliena sunt, sed potius eam explicant. Notum enim est ex Galeno, 8. *meth. med. c. 5.* duplicem dari cruditatem, nidorosam & acidam. Acidam esse in quartana & humoribus melancholicis, extra controuersiam esse puto: cum ipse Galenus, 3. *de sympt. causis. cap. 2.* non aliter fieri à vino acetum, quàm à sanguine melancholicam docet, atque ea de causa Hippocrates, 3. *de vit. rat. acut. c. 38.* melancholicis acetum noxium esse, & *ἐναγρὸν μὲν ἀπὸν ὀξὺς* id est, exaltare nigra acetum (ita enim vertendum; non verò, educere nigra, ut de febribus, *lib. 2. cap. 17.* docuimus) scribat. Iam ergo si quomodo acetum à vino generetur explicauerimus, non parum ea res huic materiæ & doctrinæ de morbis hypochondriacis lucem afferet, & quid sit illa deficiens *ἀνευμάτως*, quæque sint prima scorbuti initia, declarabit.

*Aceti gene-  
ratio.*

Et ne ambagibus utamur, acetum à vino fieri spiritus & salis volatilis, quæ in vino sunt, fixatione, ut Chymici loquuntur, putamus. Neque enim spiritus à vino separatione fit acetum: cum à vino, à quo spiritus separatus est, aut quod corruptum est, spiritumque amisit, nullum fiat acetum, sed quod generosius vinum est, eò fortius ex eo fiat acetum: ex vino quoque ex vis immaturis expresso, & quod omni ferè spiritu destituitur, nullum sæpe fiat acetum. Neque solum ex vino, verum etiam ex cereuisia, hydromelite, & fructuum nonnullorum

succis, spiritu abundantibus, atque à quibus spiritus, spiritui vini similis, destillando elici potest, fit acetum: Ex aliis verò, quæ tali spiritu destituuntur, non fit. Sal enim & humor, qui est in talibus, quandoque est fixus, quandoque volatilis. In immaturis, acidis & austerris fructibus fixus est: ubi verò ij maturuerunt, & dulciore sunt, succique inde expressi fermentantur, quæ antea cruda & fixa erant, volatilia fiunt, ut ex iis copiosius spiritus elici possit, ut id de cerasis, bacis sambuci, & similibus notissimum est. Idem spiritus & sal dum in iis rursus figitur, ex iis fit acetum. Et quod per spiritus & salis volatilis fixationem, non verò separationem, fiat acetum ex sequentibus satis patet. Primum quod post destillationem vini nihil vel parum salis in phlegmate deprehenditur; post aceti verò destillationem salis acerrimi plurimum relinquitur. Deinde quod in vini destillatione primum spiritus ascendit, utpote volatilis; phlegma verò post spiritum: in aceto verò primum phlegma destillat, post phlegma demum spiritus acidus, fixior scilicet & ad euaporandum minus aptus iam, quam ipsum phlegma. Nimirum spiritus & sal, qui in vino est volatilis, ad lenem ignem, (quæ natura est volatili Chymicis ita dictorum) euaporat, in alembicum attollitur, & à phlegmate separatur: in aceto verò spiritus & sal, quæ vino volatilia erant, digestionem per lentum calorem quo acetum generatur, fixa iam reddita; non statim à calore eleuantur, & ascendunt, (quæ fixorum natura est) sed ut spiritus aceti ascendat & destillet, maiori calore opus est: imò magna pars salis acidi fixi in phlegmate relinquitur & in altum non eleuatur. Tertio spiritus vini est *φλογος* & facile flammam concipit: aceti verò spiritus nullo modo, sed etiam, ne alia facile accendantur, prohibet.

*Fixi & volatilis.*

Quod ergo in generatione aceti accidit, tale quid etiam in melancholici humoris generatione fieri, & hæc esse prima scorbuti initia, satis probabile est, atque ex iis, quæ modò dicta sunt, patet. Et cum Chymicorum axiomata sit experientia respondens: Omne volatile figi à fixo, & contra fixum reddi volatile à volatili; cibi verò scorbutum generando apti sale fixo plurimo abundant; non mirum est, ab iis etiam volatiles in cibo & potu partes figi, id est impediri, ne rarefiant & attenuentur.

*Melancholici humoris generatio.*

Non tamen ista cruditare, seu *ἀνευμάτως* denegata scorbuti generatio planè absolvitur; cum ea proculdubio aliis morbis melancholicis & hypochondriacis sit communis: sed humor ille crudus porro corrumpitur. Etenim, quod cum ex naturæ operibus plurimis, tum operationibus Chymicis patet, calor nunquam oriosus est, sed in subiectam materiam continuò agit eamque afficit. Ideoque postquam crudi isti humores in primis viis multiplicantur & hærent, ac cum iis aliorum vitiosorum colluies, miscetur, & corporis nostri calor continuò in eos agit; ipsi verò ad alendum corpus inepti sunt, nec in alimentum verti possunt: indies magis corrumpuntur, donec tandem istam specificam & scorbutum propriam corruptionem ac naturam induunt: id quod in aliorum malignorum ac venenatorum humorum in corpore generatione quoque accidere solet, qui, quò diutius in corpore hærent, eò deteriores redduntur.

*Scorbuti generatio.*

[ Sunt quidem nonnulli, qui principia Chymica dicta reiiciunt, atomosque irrident, & ubicunque alicuius effectus in natura causa reddenda est, statim ad qualitates primas confugiunt. Verum non secundum leges demonstrationis, quæ semper cuiusque effectus & accidentis causam proximam requirit. Neque enim corpora naturalia perfecta vel generantur ex elementis proximè, vel resolvuntur in elementa, sed ex mixtis aliis, seu primis, seu secundis, sub vnus formæ dominio in vnâ naturam reductis, constant, sicut & in ea resolvuntur. Equidem corpora talia ex elementis

*De generatione & natura Aceti. Principia Chymica non sunt reiicienda.*

mentis secundum materiam constant, verum non sunt pura elementa, sed præterea à Creatore suas formas habent, quæ sunt rerum & elementorum vincula, & quæ diuersa elementa vniunt, & vnita conseruant. Id quod manifestè in Sale & Sulphure apparet. Salem esse calidum, & ignem continere, certissimum est: is tamen ignis in Sale, præter naturam suam simplicem non est volatilis, neque in altum tendit, sed in subiecta materia fixus & stabilis retinetur. Et si verò multa sunt, quæ principiorum Chymicorum veritatem, & primorum mistorum necessitatem demonstrare possint: tamen eam saltem aceti exemplo declarare, & de aceti generatione & natura aliquid dicere liber; vbi videbitur clarissimè, quàm miserè se torqueant, & quàm frustra laborent, qui, neglectis principiis Chymicis, ex elementis simpliciter generationem aceti deducere conantur; & contra manifestè apparebit, facillimum esse, è principiis Chymicis eam declarare.

De aceti generatione.

Si vlla res est, quæ à Medicis hætenus nondum satis explicata, certè doctrina de generatione & natura aceti ea est. De qua vix aliquid solidi apud eos, qui hætenus de eo scripserunt, occurrit. Et si verò ea de re iam aliquid, & forsitan primus, paulò suprà dixi: tamen omnino operæ pretium fuerit, rem eam paulò prolixius declarare.

Opinio Antiquorum.

Galenus.

Vt verò Antiquorum, & vulgatas opiniones primò recenseam, & monstrem, quàm infeliciter hac in re laborarint multi, & doctrinam istam potius implicarint, quàm explicarint. Galenus 4. de simpl. med. fac. cap. 3. de vini natura, & aceti generatione ita scribit. Vinum, inquit, diximus, vnum quidem in se habere recrementum crassarum partium, vnde, dum temporis spatio secernitur, ferturque deorsum, fax consistit; aliud verò secundum, quod Florem vini vocant, quod dum vinum feruet, supernatat, sed postea ad fæces subsidet; tertium, aqueum, quod toti vino permixtum est, hocque primò potissimum feruet. Quartum præter hoc, est ipsum reuera vinum. Et post, de aceti generatione addit: Vinosa vini partes, dum ipsum in acrum transit, refrigerantur, aqueumque excrementum putrescens, adicititiam caliditatem obtinet, velut cætera omnia, quæ putrescunt. Fitque acrum quiddam ex contrariæ qualitatis partibus compositum. partim refrigerantibus, partim calidis. Et mox acrum lixiuio comparat, quod aqua constat, & salis partibus quas ex cineribus aqua abluir, additque acrum non solum acidum, vt omphacium, sed etiam acrum habere saporem, qui caliditatis index est.

Examinatur.

Verum sit sanè, vt fæces quædam crassæ & subtiliores sint in vino, præterea & aqua: tamen Galenus, quid substantia vini sit, non satis explicat, vt & quid (etiam facibus separatis) aqueum excrementum sit. Neque etiam nullam mentionem facit Galenus tartari, quod tamen à facibus vini, flore vini, quem appellat, & ipsa vini substantia differt, & in vino etiam iam defæcato & transuato doliorum lateribus adhærescit. De aceti verò generatione, vt Galeni Interpretes eam explicant, res eò redit, vt negent, acrum esse vinum putridum; cum acrum à vappa, quod est vinum putridum, multis modis differat, sed dicant esse putredinem saltem secundum partem, quæ saltem aquosiores vini partes putrescant, portio autem vinosa non putrescat, licet ex putrefactione partis aquosæ reddita sit frigidior. Cum autem Galenus, alleg. loc. manifestè dicat, acrum quoque vim aliquam calidam accipere & possidere, firum quendam eâ aquosæ partis putrefactione generari scribunt, qui toti aceti substantiæ commisceatur, & ipsum participem alicuius caloris faciat. Verum hoc modo non obtinent quod volunt, nimirum acrum non esse vinum putrefactum. Nam etiam in putredine secundum partem, putredo toti attribuitur, & non solum parti humidæ. Et proinde si vinum putresceret secundum partem humidam, dum sit ac-

tum, omnino acrum esset vinum putridum. Quid verò sit ille sit, non explicant, nec explicare possunt, & merum ille figmentum est.

Quæ omnia cum animaduerteret Iac. Zabarella, de Zabarel. mist. generat. & interit. lib. 3. postquam, cap. 6. Galeni & Interpretum eius sententiam refutasset, cap. 7. 8. 9. 10. prolixè aceti generationem & naturam tradere conatur. Post longam autem deliberationem in hanc opinionem venit, in vino esse duos calores & duas humiditates, quod & Albert. Magnus in tract. meteoror. c. 10. & 12. statuit: qui tamen calor ille duplex sit, cum Alberto non consentit. Albertus enim dicit, in vino esse duos calores, vnum naturalem, alterum accidentalem, loci vbi creuit vitis, qui infusus sit à calore magno Solis. Verum Zabarella statuit, calorem loci non esse alium à calore naturali. Ipse verò existimat, in quolibet viuentem esse duos calores, vnum animale (etiam in genere dictum) alterum elementarem: illum extingui in morte, hunc post mortem remanere, & aboleri in putredine, quæ mistum corrumpitur. De humido cum Alberto statuit, in mistis corporibus dari duplex humidum, vnum, quod dicitur continuationis, à quo partium coniunctio est, quod ad ipsam misti pertinet essentiam: alterum aquosum nutriendum, quod saltem nutrimentum est, nondum parti ipsi assimilatum & appositum. His fundamentis positis, statuit Zabarella, etiam in vino esse duos calores, hoc est, vnum ex duobus constatum, alterum elementarem, seu temperaturæ, alterum animale, quem vinum, licet non sit animatum, ab anima vitis impressum habeat; item duas humiditates, vinosam scilicet, quæ fiat coniunctio partium; & aquosam, quæ ex alimento contracta, & nondum in vinum conuersa est; quæ aquosa pars, dum vinum coquitur, absumatur, manente vini substantiâ, vnde vinum dulcius reddatur. Ex his præsuppositis fundamentis porò Zabarella de aceti generatione, & quomodo vinum putridum ab aceto differat, ita docet: Acrum inquit fieri per interitum caloris vitalis, manente calore elementari: putridum autem vinum fieri per corruptionem caloris temperaturæ, seu elementaris. Idque eo probare conatur, quod vinum dilutum, quia habet debilem calorem, & plurimum humidæ aquei, faciliè putrescit; cum debilis calor faciliè educatur à calore ambientis: vinum autem generosum, quia fortio rem habet calorem, & minus aquæ humens est, difficilius putrescit, facilius verò acescit. Atque hinc cum Galeno mauult dicere, acrum esse vinum mortuum, quàm putrefactum. Tandem vt Galenum aliquo modo defendat, eum cum sua sententia conciliare conatur, dum scribit, Galeni sententiam tolerari posse, si admittatur putredo secundum aliquam similitudinem, non propriè dicta. In putredine enim educi calorem naturalem, & fieri separationem humidi, & in putredine non immediatè pari humidum à calore ambientis, sed potius pari calorem natium, & educi, deinde caloris illius educationem sequi proprii humidæ dissolutionem; at in generatione aceti non fieri resolutionem humidæ ex vaporazione calidi, nec humidum idèò resolui, quia prius calor vitalis sit corruptus, sed fieri immediatè à calore ambientis. Ab eo enim & euocari immediatè calorem vitalem, & resolui humidum aquosum, & sæpe etiam sine exhalatione caloris vitalis solum humidum aquosum consistui. Quod si contingat, vt simul cum humidæ aquosæ resolutione, vel post illam, calor vitalis quoque exhalet; fieri ex vino acrum. Idèò inter generationem aceti, & putredinem vini hanc ponit differentiam, quod in putredine vini prius educatur calor naturalis, hinc fiat separatio humidæ; in generatione verò aceti non fiat resolutio humidæ ex educatione caloris; sed id immediatè à calore ambientis, & simul calore vitali adiuvante consumatur. Postquam verò vinum exsiccatum est per euocationem humidæ quasi nutriendi, tunc per ex-

Albertus Magnus.



halationem calidi vitalis acetum generari statuit. Hinc porro de aceti qualitatibus ita sentit: acetum esse frigidum & humidum, sed facultate exsiccativum, quia per consumptionem humidi alimentalis redditum sit siccius, quàm vinum.

*Examen argumentorum Zabarella.*

Verùm hæc omnia, quæ prolixè & operosè locis allegatis, affert Zabarella, animum veritatis avidum non satiant, & pleraque ad libitum conficta sunt, nec cum natura vini & aceti consentiunt. Primò enim duplicem calorem quod attinet, equidem, ut postea dicitur, duo corpora calida sunt in vino, quorum quodlibet habet suum calorem, sed vnum corpus calidum, & duos calores statuere, non probabile. Et vitalis calor, quem ille ponit non est, ubi vita non est. Cum verò vinum non vivat, illi calorem vitalem tribuere non possumus. Humidum verò quod attinet, equidem in lignis & plantis, quæ corpora sunt solida, duo sunt humida, vnum, ex quo solida partis substantia constat, quod etiam ex lignis siccissimis elici potest; alterum, quod alimentarium est, & nondum fuit plantæ substantiæ appositum, quale est in lignis & plantis viridibus, & exsiccatione exhalat: at quòd in vino, quod liquor est, talia duo humida dentur, nondum probatum. Et sit sanè, quòd detur tale in vino humidum: tamen, quomodo eius absumptio ad generationem aceti faciat, non docet. Ipsa enim humiditatis illius absumptio ad generationem aceti non sufficit, sed ex eius mente etiam calor ille vitalis euocetur necesse est. Præterea videmus, si vinum destillemus, & acetum destillemus, non minùs phlegmatis, seu aquosi humoris, provenire ab aceto, quàm à vino.

*Sententia Autoris.*

Ideoquæ cum ipse Zabarella huic suæ opinioni diffidat, tandemque concludat, si quis aliquid probabilius inuenerit, se eius sententiæ libenter subscripturnum, tentabimus iam, an vetiorem de origine & natura aceti sententiam inuenire possimus. Principiò autem hoc observandum, generari acetum non tantum è vino, sed & cerevisia, succis pomorum, pirorum, prunorum, cerasorum, hydromelite, succo solarum, terebinthina, & omnino omnibus, quæ spiritum ardentem suppeditant. Quæ verò talem spiritum non suppeditant, ex iis acetum fieri non potest. Insunt autem in spiritu vini, & aliis spiritibus, duæ substantiæ, utraque volatilis; una sulphurea, quæ facillè inflammatur; altera salia, quæ suâ naturâ, si à sulphurea parte separetur, non inflammatur. Esse autem has duas substantias diuersæ naturæ, in vino & spiritu vini, è multis patet. Inflammabilitas est à sulphure, non sale, qui non inflammatur; acrimonia est à sale, non sulphure. Præterea duo contrarij affectus in vino reperiuntur. Primò est in vino, vis narcotica, cerebro & spiritibus animalibus inimica, quæ tota est à sulphure, ut ex aliis etiam narcoticis, opio, hyoscyamo, & similibus patet. Deinde vis narcotin tollendi est in aceto, quæ tota pendet à sale vini acido. Et vim narcoticam vino inesse, non tantum ex eo patet, quòd, qui nimium vini hauriunt, ebrii & torpidi fiunt, sed etiam quòd, qui musti, ut & cerevisiæ, vaporem sulphureum excipiunt naribus, apoplecticorum more concidunt. Quod accidit, quia vapor ille sulphureus, in fermentatione à salis partibus separatus, in cerebrum penetrat, & spiritibus narcotin inducit, & quidem potentiùs, quàm ipse spiritus vini haustus, utpote qui non merè sulphureus est, sed & partes salias, quæ sulphureas temperant, & frangunt, continet. Licet verò hæc duæ substantiæ sint in spiritu vini; ita arctè tamen coherent, ut non facillè separantur; sed cum utraque volatilis sit, simul facillè calore in altum eleuatur, & si sulphurea accendatur, simul sal volatilis evanescit. Hinc accidit, ut non solum omnes spiritus sint inflammabiles, & habeant odorem fragrantem, qui est à sulphure, sed etiam saporem acrem, qui est è sale volatili. Præter istum spiritum volatilem, è sulphurea & salia substantia con-

stantem, in succis illis è quibus fit acetum, est quiddam tartareum, seu sal fixus, aqueo humori permixtus. Vnde etiam ex vino, postquam spiritus vini inde est separatus, sal fixus, seu tartareus parari potest.

Hæc cum sit vini, & aliorum liquorum, è quibus acetum fit, natura, iam porro quomodo ex iis acetum generetur, videndum; quod facillè manifestum fiet, si consideremus, quomodo ille spiritus ardens, imò & succi è quibus spiritus fiunt, ab aceto differant. Spiritus nimirum tales omnes volatiles sunt, & in destillando primò eleuantur; deinde facillè inflammantur & incenduntur, ac oleis sese miscunt. Præterea post destillationem vini, parum salis in phlegmate deprehenditur; at in aceto primò phlegma destillat, post spiritus acidus. Acetum non inflammatur, pinguibus & oleosis non promptè miscetur, sed illa soluit, quæ spiritus vini solvere nequit, terrea & lapidea corpora: tandem etiam post aceti destillationem plurimum salis acerrimi relinquitur.

Ex his de generatione aceti sic statuendum est; in aceti generatione perire; si non ex toto, maximà tamen ex parte, vini partem sulphuream inflammabilem, sale verò volatilem fieri fixum. Ut enim in solutionibus margaritarum, coralliorum, oculorum cancri, imò metallorum, spiritus soluentes corpora illa penetrant, in minimas atomos redigunt, & ita cum iis sese uniunt, ut vnum corpus fiant, ut etiam vnà per chartam bibulam colari possint; si autem ol. tartari, vel vitrioli, vel alius liquor infundatur, cum quo spiritus solvens sese uniat, corpus solutum, à solvente derelictum & liberatum, ad fundum descendit, & præcipitatur: ita etiam, cum spiritus ille inflammabilis à sale volatili separatur, sal ille volatile, propter cognationem naturæ, tartareæ portioni, seu sali tartareo fixo, qui in vino restat, sese miscet, & cum eo vnitus, succum acidum & acrem constituit, non inflammabilem, nec adeò volatilem. Et sic omne acetum constat tartaro vini (eadem ratio est aliorum liquorum, è quibus fit acetum,) cum sale volatili vini mixto, in aqueo humore. Cum autem illud sulphur vini non in momento à vino acedente separari possit, sed in tempore hoc fiat, accidit etiam, ut acetum primò tam acre non sit, postea tamen, nullà re additâ, fiat acerrimum, postquam sulphureæ partes, quæ salis acrimoniam occultant, indies magis ac magis exhalant. Et saporem acidum à sulphure occultatum esse, vel sulphur in melle docet, in quo acerrimus spiritus salis acidus delitescit, ita ut nullo sensu sit perceptibilis. Ut ita acetum sit humor acidus, sale tartari, ac sale volatili vini, in aqua mixtis, constans, per separationem sulphuris à sale volatili generatus. Et quidem ex sulphure vini ab eo separato provenire acetum, inde patet, quòd, ut antea dictum, inflammabilitas in aceto perit, vis calefaciendi, qualis sulphuri competit, non ampliùs adest, sulphureis non vnitur ampliùs, neque ea soluit.

*Aceti quid.*

Quibus autem de causis sulphur illud vini (quod de vino dico, de omnibus liquoribus acedentibus est intelligendum) à vino & sale volatili, qui in vino est, separatur, & quæ causæ remotiores sint generationis aceti, porro explicandum. Fit autem hoc pluribus modis, qui tamen ad duos redigi possunt, nimirum sulphuris volatilis per lentum calorem euocationem, & alia sulphur illud propriâ vi ad se allicientia, ac per acidorum admistionem. Primò nimirum calor blandus sulphur volatile sensim euocat; nimius autem calor, qui vna cum sulphure euocat etiam sale volatilem, acetum non generat. Euocant etiam sulphur hoc alia omnia, quæ ob naturæ cognationem sulphur illud ad se alliciunt, & spiritum suo sulphure ita spoliunt.

*Causa aceti remotiores.*

Secundò acida vino adiecta tartareis vini partibus sese admiscunt & uniunt, & ita tartarum, in vino potentius redditum, sale vini volatilem ad se attrahit, &

*Duo contrarij affectus reperiuntur in vino.*



& se cum eo vnit, qui à sulphure separatus facit, vt id sibi relictum, facilius exhalet.

Problemata.

1.

Ex quibus duabus causis varia problemata solui possunt. I. Cur calor saltem blandus, seu Solis, seu ignis, ad generationem aceti faciat. Nimirum igneæ & sulphureæ atomi, in aëre calido hærentes, in vinum penetrant, & blandâ actione sulphuream illam & inflammabilem vini portionem, ob naturæ cognitionem, sibi vniunt & euocant; vnde falsæ reliquæ volatiles non inflammabiles, sibi relictæ, tartaro & sali fixo, ob naturæ cognitionem, sese vniunt, saporémque dulcem cum acido, omnibus falsis spiritibus communi, commutant,

2.

II. Hinc etiam causa reddi potest, cur vinum coctum, & in loco nimis calido asseruatum in acetum non mutatur, vel tardè admodum mutatur. Accidit id, quia non solum sulphur, sed & sal volatilis, qui in primis naturam aceti constituit, maximâ ex parte separatur.

3.

III. Causa hinc deducitur, cur vinum in vasis semiplenis citius acescat, quàm in repletis. Nimirum aër, sulphureis atomis repletus, maiorem vini partem externâ superficie contingit, quàm in vase ad summum repleto, in quo aër non nisi in orificio, vinum attingit; & sic, in plures vini partes simul agendo, facilius sulphur euocat.

4.

IV. Hinc quoque causa dari potest, cur in vasis acetum continentibus, vel saltem aceto imbutis, vinum facilius acescat, in primis si calor blandus accedat. Nam acetum & acetosæ partes, in vase inhærentes, non solum tartareas vini partes; sed & falsas volatiles aliquas, vt pote cum quibus cognitionem habent, ad se alliciunt, atque iis vniuntur; vnde sulphureæ, præcipuè accedente calore blando, facilius exhalant: atque ita falsæ reliquæ partes cum iis promptius vniuntur, atque in aceti naturam commigrant.

5.

V. Hinc etiam ratio reddi potest eius operationis, quam describit Iohan. Carol. Rosenbergius, *Rhodolog. part. 2. cap. 17.* Si, inquit, in mortario marmoreo, rosarum folia contunderis, succumque expressum & filtratum in B. M. destillaueris ad medietatem vsque, præstantissimam primò aquam acquires. Deinde si alteram restantem medietatem filtraueris, & vitro inditam Soli exposueris ad aliquot septimanas, acetum acquires rosaceum præstantissimum, per se etiam. Melius tamen, addito fermento, acescit liquor. Nimirum quia è destillatione per B. sulphurea partes aliqua cum aqua exstillant, falsæ volatiles quæ remanent, cum sale fixo vnita, acetum faciunt. Rectius tamen res procedit, si fermentum addas. Nam illud facit, vt si quæ partes sulphureæ sunt, etiam in fermentatione separantur.

6.

VI. Nam hinc etiam redditur causa, cur fermentum, vel panis fermentatus, in vinum iniectus faciat, vt illud citius acescat. Nam quia fermentum acidum agit in falsâ, & se cum iis vnit, vnde sulphureæ partes à falsis facilius separantur, & exhalant, falsæ verò volatiles fixis falsis vniuntur, & ita vini in acetum fit mutatio. Cæterum quoddam beneficio fermenti non solum ex fructibus, sed & omnibus penè herbis, spiritus ardens elicitur, fit quia fermentum falsas volatiles partes à reliqua massa separat. Hinc sulphureæ seorsim existentes, accedente destillatione, faciliè à partibus heterogeneis separantur. Nisi tamen iustum tempus obseruetur fermentationis, & destillatio diutius protrahatur, tota massa fermentata acida fit, & nullos spiritus arduos suppeditat; quod cuilibet è destillatione spiritus è baccis sambuci obseruare promptum est. Accidit autem hoc, quoddam acidum non solum falsum separauerit à sulphureo, & sibi vniuerit, sed sulphureæ etiam partes tractu temporis longiore exhalauerint; vnde falsæ reliquæ vnita acetum constituunt. Huius rei etiam fundamentum est, quoddam scemina nostræ, acetum è cereuisia facturæ, cereuisiam recens coctam, adhuc non nihil ca-

lentem accipiant, eique etiam fæces cereuisiæ addant. Tum enim subita fermentatio accidit, & partes sulphureæ exhalant, falsæ verò volatiles cum fixis vniuntur, & acetum constituunt.

7.

VII. Ex his etiam quæ hæcenus dicta sunt, causa dari potest, cur ex musto, nec spiritus vini, nec acetum fiat. Cum enim acetum fiat, quando succus aliquis, sale & sulphure constans, in sua quasi principia resoluitur, ita vt sulphureæ partes deferant sale volatili, qui cum tartaro se vnit, & sic acetum constituit, faciliè hinc licet colligere, mustum nec spiritum ardentem, nec acetum præbere. Nam in musto principia illa omnia, eodem modo quo natura in vna voluit, mixta sunt, sulphurque ibi confusum, & cum reliquis principis adhuc mixtum est; eiusque præsentia aceti generationem maximè impedit: sed si per fermentationem aliqua pars sulphuris separetur, reliqua, quæ cum sale volatili est copulata in vino, leui de causa separari potest: cuius absentia succum relinquit acidum. Sic ex melle non paratur acetum, nisi fermentetur. Nam in melle sulphureæ partes reliquis miscibilibus ita perfectè vnita sunt, vt nec coctio, quæ fit igne intenso, illas separare possit; sed saltem fermentatio id præstat.

8.

VIII. Omnes pulueres, qui vino iniiciuntur, vt acetum facilius & fortius fiat, (vt tartarum, acini vuarum vino perfusi & iterum exsiccati, pyrethrum, & similia) id præstant vel aciditate falsâ & fixâ, sale vini volatili ad se alliciendo, quo à sulphure separato id facilius exhalat; vel quia acridinem salis volatilis vini augment; vnde acetum fit acrius.

Atque hæc de generatione aceti dicta sint. Iam de qualitatibus aceti dicendum, de quibus grauis & intricata apud Medicos occurrit controuersia. Equidè plerique acetum frigidum esse statuunt: idque ex effectu probant; cum non solum externis inflammationibus commodè adhibeatur, sed & febribus biliosis & ardentibus omnibus vtile sit. De quo Galenus, *1. de simpl. med. facult. cap. 19.* Nos, inquit, vt comperiremus aceti potentiam, nobis ipsis illinimus tibias multis in locis thapsiæ: ubi cum inflammari cœpissent, alij parti acetum, alij rosaceum, alij alia frigida applicauimus. Comperimus verò, acetum in refrigerando esse efficacissimum.

De Aceti natura.

An sit frigidum.

Contrà acetum est acre, non solum gustu, sed & odoratu nates vellicat, corallia, margaritas, oculos cancri, & lapides soluit, ita vt Hannibal saxa in Alpibus aceto ruperit: qui ceterè non frigiditatis, sed caliditatis effectus sunt. Galenus, *lib. 1. de simpl. med. fac. cap. 17.*

An calidum.

Sententia Galeni.

etiam hanc quæstionem mouet, & se ab eorum sententia non multum abesse scribit, qui acetum calidum esse scribunt, siquam machinam aut artem inuenire posset, sicut in lacte, diuersarum partium separationis. Et ceterè Antiqui, qui acetum calidum esse statuerunt, non leuibus, vt id crederent, adducti sunt rationibus, quas Galenus *lib. 1. de simpl. med. facult. cap. 20.* recenset. Non enim, inquit, neque acre, neque mordax, neque asperum, neque erodens foret, nisi copiosa illi inesset caliditas. Nam sicut frigidus est, contrahere & refrigerare, ita calidi, secare atque diuidere; id quod in primis acetum efficere valet, quippe quod secat & erodit, non modò animalium corpora, sed & grumos, callos, lapides, fictile, æs, ferrum, plumbum, & tantum non, velut ignis, cuncta peruadit ac penetrat, vt nulla possit substantia penetrationis eius vehementiam aut sustinere, aut illi reluctari ac resistere. Nam subtile haud secus esse, atque ignem, non leui testimonio illi tactum esse, quin & gustantibus ita videri, & per subtilissima vestimenta promptius aquâ perfluere, omniâque exedere. Verum cum rationem & artem, diuersas in aceto partes separandi, quæ Chymicis notissima est, ignoraret Galenus, tandem statuit, quoddam maiore parte frigidius sit, quàm calidiùs, acetum, eorumque sententiam, *alleg. loc. cap. 18.* reprehendit, qui acetum adèd calidum esse pronuntiarent, vt cauterio

Antiquorum.

ipsum assimilauerint. Et cap. 21. scribit, cum vtriusque partis rationes sint probabiles, tum eorum, qui acetum frigidissimum esse demonstrant, tum eorum, qui calidissimum, non paruum indicium esse, ipsum vtriusque esse particeps. Fluctuat tamen adhuc Galenus, additque admodum difficile esse rationi, contrariorum participationem concedere; cum non liceat eius substantiam aut soluere; aut scindere, velut in lacte facimus. Proinde euentius, magisque periculo vacans principium optat assequi.

Tentemus ergo, an verius principium inuepire possimus. Non vero difficile esse putamus, veritatem inuenire, ei qui acetum resolvere, eiusque partes diuersas separare, ex Chymia didicit; quod Galeno ignotum fuit, ideoque in hac controuersia dubium fecit. Principio verò, etsi Galenus putat, vtriusque partis, & eius quæ acetum frigidum, & alterius, quæ calidum esse statuit, rationes probabiles esse, & propterea opinatur, statuendum esse, acetum & caliditatis & frigiditatis particeps esse; tamen ista conclusio firma non est, sed vtriusque partis rationes perpendendæ & conferendæ sunt, & an eiusdem ponderis sint, inquirendum. Vt verò status controuersia rectè formetur, non de hoc quaestio est, an in aceto sint partes quædam aquæ, quas Chymici Phlegma vocant, suâ naturâ frigida; id quod nemo negat: sed de hoc quaestio est, an acetum, quatenus acetum, & propter partes ob quas dicitur acetum, & quas Chymici à phlegmate separare possunt, refrigeret vel calefaciat. Vbi, si quid sentiendum sit, liberè dicendum, rectius Antiquos statuisse censeo, qui acetum calidum potius, quàm frigidum esse statuerunt. Equidem etsi vtriusque partis rationes videantur probabiles; tamen cum vtriusque ab affectibus deductæ sint, si eas diligenter perpendamus, inueniemus, acetum per se calefacere, per accidens verò refrigerare. Et cum illi, qui acetum calidum esse statuunt, eos effectus afferant, qui per se ab aceto proueniunt, eosque calidos: hi autem, qui frigidum, effectus saltem per accidens; acetum per se potius calidum, quàm frigidum esse, statuendum censemus. Etenim omnes isti effectus aceti, acrimoniâ scilicet linguam & nares afficere, omnia potenter corrodere, caliditatis per se effectus sunt, & omnes à sale, qui calidus est, proueniunt. At quod acetum refrigerat, id fit per accidens. Quod cum Galeno & aliis Antiquis, quomodo fiat, ignotum fuerit, iam monstrandum.

Vbi primò hîc præsupponendum, calida corpora post ignem, ceu prima mista calida, esse duplicis generis. Vnum est sulphureæ naturæ, quod est facile inflammabile; cuius generis sunt naphtha, sulphur, pingua olea, & spiritus ardentes; alterum est salinæ naturæ, & fixum, quod licet ignem in se contineat, non tamen inflammatur, sed si is, quæ facile inflammabilia sunt, admiscetur, eorum inflammabilitatem impedit.

Vbi nemo miretur quod dixi, dari corpora ignea calida & fixa; cum aliâ ignis sit levis & volatilis. Etenim sal etsi ignem continet; tamen non purus ignis est, sed quoddam mixtum, in quo ignis abundat, qui tamen à forma salis in corpore hoc fixus detinetur. Formæ enim sunt vincula rerum. Ignis est in auro, quod vel aurum fulminans ostendit; at ibi fixus est. Nam à forma auri ibi detinetur & regitur. Vtriusque generis partes calidæ etsi in corpore humano sint: tamen illæ partes inflammabiles superant & abundant; vnde etiam corpus nostrum est actu calidum. Sunt enim in corpore nostro non solum spiritus & humores, sed & partes pingui & oleosa substantia constantes: quæ omnes de sulphurea participant substantia. Hinc sæpe accidit, vt non solum humores & spiritus in venis, sed & ipsæ partes solidæ, calorem præternaturalem concipiant & inflammentur, & putredo exciteretur, quâ mixtum in sua prin-

cipia resoluitur; quorum primum, & quod reliquis citius auolat, sulphur est, vel substantia sulphurea & volatilis, quam satis scetor ille grauis, qui in sudoribus, & aliis excrementis animaduertitur, indicat. Propter quas partes sulphureas etiam calor præternaturalis maximus, & valde molestus excitatur. Quod vbi accidit, danda opera vt putredo inhibeatur, calor tollatur, & partium sulphurearum inflammatio compescatur & prohibeatur, id quod rectissimè acida faciunt, quæ partibus sulphureis mista, eius inflammationem prohibent.

Rem verò ita se habere, experienciâ constat, & docet id etiam Hippocrates, qui 3. de rat. vi. in acut. 1. 30. scribit, quod acetum τὰς ἀπὸ μέλιτος βλάβας καλύνει, καὶ τὸ ἐν μέλιτι χολῶδες καλῶδες: omnem quæ à melle prouenire potest, noxam impedit, & biliosum in melle castigat: & vt Galenus, in comment. explicat: ἰσχυρὸν ἐστὶ τὸ χολῶδες ἐν αὐτῇ καλῶσαι: τὸτ' ἐστὶ, καθέλκει καὶ ταπεινῶσαι: potens est, biliosum in melle castigare, id est, tollere & comprimere. Quod verò acetum facit in melle, idem in corpore nostro facit, & biliosos humores castigat, id est, ne inflammentur, & ardorem concipiant, præstat. Quomodo (per accidens scilicet, partium nimirum sulphurearum inflammabilitatem tollendo) cum acetum & externas inflammationes compescat, & humorum putredinem atque ardorem sistat, natus inde est iste error de aceti frigiditate: quasi scilicet, sicut aqua & nix suâ innata frigiditate aliis frigus inducunt; ita etiam hoc acetum præstet, & subiectiue sit frigidum; cum tamen id saltem per accidens faciat, & aceti affectus alij clarè indicent, id longè alias, quàm aquam frigidam & niuem, habere qualitates. Et potuissent errorem suum, quo id quod aceto per accidens competit, ei per se tribuunt, vel ex eo cognoscere, quod spiritus vitrioli, sulphuris, nitri, salis, eosdem effectus in bile compescenda, & putredine ac ardore humorum sistendo, idem præstant, quod acetum, qui tamen non frigidi sunt, sed planè ignei & caustici.

Neque est, vt quis cum Iohan. Baptist. Syluatico, Obiectio Syluatici. controuers. 51. dicat, acetum acerrimum si fuerit, excalefacere, quia plures habet partes excalefacientes; si eiusmodi non fuerit, sed simplex quodammodo, refrigerare; quia habet partes copiosas refrigerantes. Hoc Solutio. enim saltem sequitur, acetum acerrimum esse valde calidum, minùs verò acre, quia saltem gradu differt ab acerrimo, non esse frigidum, sed remissiùs calidum. Nam omne acetum, etiam non acerrimum, acre est, vnde, (vt ibid. habet Syluaticus) ita concluditur: Quæcunque acra sunt, ea calida sunt. At omne aceum acre est. Ergò calidum. Idque plurimi Medici nolentes volentes confiteri coguntur. Ita Ludou. Septalius, animadu. med. lib. 2. num. 57. Cauendum esse scribit, ne in oxymelitis compositione acetum acerrimum sumatur. Nam in acutis febribus, in quibus, præter facultatem obstructions tollendi, abstergendi, & incidendi, requiritur etiam humectatio & refrigeratio, acetum potius ficare & excalefacere. Si ergo acerrimum acetum excalefaciat, minùs etiam acre excalefaciet, etsi minùs. Neque enim magis & minùs variant speciem.]

### C A P V T III.

De Causis Scorbui remotis, procalarcticis, & externis.

HÆ cum sint causæ Scorbui proximæ, vt & antecedentis, natura, ac generationis modus, ad eas omnes causæ reliquæ remotiores, euidenter, & extrinsecus aduenientes, quocumque nomine veniât reducendæ sunt, vt potest quæ omnes ad generationem scorbui cacoehymie

Statu quaestio.

Corpora calida sunt duplicia.

Ignis volatilis, & fixus.

Acetum per accidens frigidum facit.

Obiectio Syluatici.

Solutio.

Causa scorbui remotior.

cacochymia faciant. Causæ verò hæc omnes in duas classes redigi possunt. Vel enim humor melancholicus ex diætæ vitio, & rerum non naturalium vitioso usu contrahitur; quo etiam faciunt febres, & viscerum mala dispositio: Vel sanguis in corpore, etsi bonus sit, à contagio scorbutico inquinatur & corrumpitur.

Cibum.

Et primò quidem victus rationem quod attinet, potest in hoc morbo producendo plurimum cibus, qualis iis regionibus, quibus scorbutus domesticus, & vernaculus est, scilicet aquilonarium regionum incolis, maris accolis, nautisque familiaris est. Nimirum caro bubula, caprina, hircina, aprugna, & inprimis salugine & muria aut aceto macerata, & fumo siccata, ac indurata, lardum rancidum, aut crudum denotatum; pisces lacustres, & maritimi, & ipsi cocti difficiles, ac mali succi, & sale, aut muria conditi, vel fumo, aut calore Solis, aut frigore siccati, induratique, quales sunt aselli, passeris, haleces, & huius generis alij; aves in aquis stagnantibus, & locis paludosis degentes, & edulia ex sanguine, carne, & atvina simul mistis, sale conditis, & fumo exsiccatis, quæ farcimina vulgò vocant, & alia sale, atque aceto condita, qualia nautis familiaria sunt. Vtrumque enim horum vim siccandi obtinet. Sal quidem cum fixus sit, si copiosius assumatur, à natura omnis volatilis reddi faciliè non potest, ideòque inprimis viis hæret, & scorbuticæ materiæ congerendæ occasionem præbet. Acetum verò, ut choleræ mors, ita melancholiæ vitæ est; seu, ut Hippocrates, 3. in acut. de vict. rat. 1. 38. habet: *Κι δὲ ὁξὺς ὁξύτατος προχόρδοις μᾶλλον ἢ μελαγχολικοῖς ἐνυμύρεται. Τὰ μὲν δὲ πικρὰ διαλύει, καὶ ἐκφυλάττει μεταρρίζοντα καὶ αὐτὴν. Τὰ δὲ μέλανα ζυμῶται, καὶ μεταρρίζεται, καὶ πολλαπλασιάζεται: ἀναζωὸν δὲ μελάνων ὁξὺς;* quorum sensus hic est: *Acida biliosis potius, quam melancholicis conueniunt. Amara n. dum ab acidis fermentantur, quasi dissoluntur, & in aqueum humorem conuertuntur. Melancholia verò, dum ab acido fermentatur, multiplicatur. Exaltat n. melancholiam acetum.* Faciunt quoque ad mali huius generationem frumentum corruptum, tempore pluuiæ collectum, & non probè asseruatum, panis biscoctus, submucidus, vel ad perennitatem infumatus, nauticus, & præcipuè è frumento corrupto paratus; brassica, cæpe, lentesc, fabæ, & legumina alia, de quibus Galenus, 1. de alim. facult. cap. 16. & 18. 2. de facult. aliment. cap. 44. & in lib. de cibis bon. & mal. succi. 1. præsertim negligentius recondita, & corrupta. Obseruauitque Hippocrates, 16. epid. sect. 4. r. 11. quod in Aeno, qui continenter leguminibus vescerantur, crurum impotentia afflicti fuerint, in eaque perseverauerint; & qui eruo in cibum utebantur, ex genuum dolore laborauerint. Caseus item antiquus. Omnia n. hæc ut pauci sunt alimenti, ita excrementitio humore crasso plurimum abundant. Et in summa omnia huc pertinent, quæ humorem crassum, siccum, & melancholicum generare possunt, quorum longum catalogum recenset Galenus, 3. de loc. affect. cap. 7. Quod ij ipsi, qui à lie-ne solum tenues, & aquosos humores attrahi, & hinc scorbutum generari statuunt, inuiti concedere, & fateri coguntur. Debet verò inter causas externas & internas esse quædam analogia; & internæ ab externis, præcipuè cibus, habent suam originem.

Quamquam verò non semper à cibus crassis, & melancholicis generetur scorbutus: tamen si talis victus ratio continuetur diu: talesque humores diu in corpore hæreant, & ær, ac aliæ causæ accedant, tandem corruptionem scorbuti propriam & specificam induunt.

Talis verò victus ratio cum nautis, iisque, qui mare Balthicum accolunt, vel ei vicini sunt, familiaris, sit, non mirum est, tot scorbuticos ibi reperiri. Nam ut

hac de re Balduinus Ronsseus, qui iis in locis vixit, & Medicum egit, de scorbutico cap. 5. scribit, satis superque notum est, eos cibus nimis quam Melancholici succi vesci. Nam præter aquaticas volucres, quarum apud illos quotidianus usus est, etiam fumum, si dicere liceat, deglutiant, dum bubulas carnes sale prius conditas fumo exponunt, atque easdem usu exigente comedunt, ferculum si quod aliud, melancholico succo materiam suppeditans. Nam etiam si quàm maximè boni succi sit, quod fumo asseruatur, per inflammationem tamen alienam quandam naturam induit, atque innato succo orbem atri humoris causâ efficitur. Aliis tamen quoque in locis scorbutus quandoque generatur, vbi vel annonæ caritate homines ad prauum victum adiguntur, vel etiam quacunque de causâ cruditati vel cacochymia tali causam præbent.

Post cibum proximum locum obtinet potus, & primò aquæ corruptæ, & sæpe verminosæ, quarum in nauibus in dulcium & purarum defectu sæpe necessarius usus est, præsertim in aëre calido, à quo facilius corrumpuntur; item aquæ crassæ, crudæ, impuræ graues, subsalsæ, & quæ ex fontibus, qui ex locis abstrusis, & conclusis, non perspirabilibus, & liberiori aëri, & radiis inaccessis scaturiunt, de quibus Hippocr. lib. de aer. aq. & loc. cap. 3. siue eæ bibantur, siue cibi in iis coquantur, siue cereuisia, aut iuscula ex iis parentur. Referendum huc & vinum, si non probè in vetriculo coquatur, sed acescat, inprimis vbi pendulum sit: & corumpi incipit: Cereuisia item feculenta, ex aquis modo dictis, vel corruptis parata, & quæ vitium aquarum retinet, & præcipuè paucò lupulo condita, & minus rectè cocta est. De tali n. cereuisia, verum est, quod Dioscorid. lib. 2. cap. 80. scribit inflationem parere, & vitiosum succum creare: lupulus verò admistus hoc vitium corrigit, dum abstergit, obstructions aperit, sanguinem mundat, & crassa venarum renunquæ excrementa educit. Malti (Maltz) quoque præparatio, qua, ut Hippocratis vocabulo utar, frumentum ζυμῶται, καὶ μεταρρίζεται, non parum ad digestionem in corpore facilius peragendam disponit, & præparat, dum partes flatulentæ separantur, & partes nutrientes rariore, ac spirituosiores redduntur, & ab excrementitiis partibus aliquo modo liberari incipiunt: Plurimum verò postea in recta cereuisiæ fermentatione situm est, quia ipsa non solum spiritiosa redditur, sed & defecatur, & ab excrementis purgatur: quod nisi fiat, non solum cocti difficilior, & flatulentior cereuisia redditur, sed & faciliè obstructions parit, & feculenta, ac tartarea excrementa multa suppeditat.

Potus.  
Aqua.

Vinum.

Cereuisia.

Tota nimirum, quam modò enumerauimus, victus ratio, ac ciborum & potus materia ita comparata est, ut feculentis, crassis, melancholicis, ac tartareis humoribus in corpore materiam præbeat, & illam, quæ in coctione alimenti fieri debet, ζύμωσις, & μεταρρίσμις, aut περιμάωσις, si ita appellare libet, impediatur. Ex qua quomodo saltem aquosam, ichorosam, & tenuem cacochymiam deducere possit Reusnerus, ipse viderit.

Post cibum, & potum ad scorbutum generandum multum facit Aër, cæli status, regionum situs, & locorum constitutio humida, frigida, crassa, & saluginosa, ac impura. Qualis Aër est Aquilonius, frigidus, humidus, crassus, saluginosus, maris vaporibus, & exhalationibus, quæ ab inquinamentis, ab æstu maris & fluminum inundatione relictis, aut ex locis vliginosis, palustribus, & lacustribus attolluntur, inquinatur, qui inspirando attractus, & per poros cutis intra corpus admissus, sanguinem & spiritus inficit ac inquinat, calorem natium obruit & suffocat, & ad cruditates generandas facit. Augetur hæc constitutio aëris austrino & pluuioso cælo. Et ipsa experientia

Aër.



scientia testatur, locis paludosis, vliginosis, lacustribus, maritimis, Scorbutum maximè familiarem esse, aridis ignotum. Et ea ipsa de causâ accedit, ut in Belgio, & Germania inferiore, vbi eadem omnes victus ratione vtuntur, in quibusdam tamen locis, quàm aliis frequentior, & grauior sit Scorbutus, quæ scilicet magis paludosa, & palustria sunt. Ita Ronseus, ut in epistola ad Hadr. Iunium testatur; obseruauit, in Hollandia multò periculosius & frequentius scorbuto affici illos, qui Alcmariam, Amsterodamum & vicina loca inhabitant; minus verò & rarius qui Goudam & Roterodamum incolunt, quamuis eodem victu vtantur. Et Clariss. Dn. D. Greg. Horstius, in tract. de Scorbut. annotauit in Saxonia veterique Marchia Brandenburgensi in aliis locis malum hoc rarius & leuius, in aliis verò frequentius & periculosius esse, iis scilicet, quæ sunt palustria & vliginosa, quorumque incolæ cereuisiâ minus pura & defecata vtuntur. Excitatur quoque, & fouetur Scorbutus à domiciliis humectis & situ obfistis, subterraneis, frigida & humida murorum exhalatione; atque ea de causâ in carceribus vliginosis detenti sæpe Scorbuto corripiuntur: quod tamen victus ratio praua, & motus priuatio facere potest. Et Olaus Magnus, in sept. gent. histor. lib. 16. cap. 51. scribit, frigida murorum exhalatione morbum hunc foueri, intra tabulata mitescere.

Vere etiam, & Autumno magis affligit, & grauius infestat Scorbutus. Vere quidem, quod humores vitiosi tẽpore hyberno collecti tum fundi, & agitari incipiunt: Autumno verò, quod aëris inæqualitas, & iam incipiens frigiditas humori melancholico generando sit aptissima.

Pulmones in scorbutico non primò afficiuntur.

Atque aeris hæc constitutionem nonnulli inter causas remotas, vel solam vel præcipuam ponunt, statuuntque, Spiritus salinos, & vapores à sulphure suo destitutos iuxta mare ab astris eleuatos, sed non percoctos, à maritimis & nauigantium turba inspirando atrahi, qui attracti pulmonem primò inficiant, inde ipsum Hepar & venam portæ, tandemque lienem, quæ partes tales tartareas impuritates eò deriuatas quasi sibi cognatas ad se recipiunt. Verum, ut aërem talem ad Scorbutum facere non negamus, sed adiuuantem causam esse modò diximus: ita seu vnicam, seu præcipuam causam, esse inficiamur, nec istum generationis Scorbuti modum admittere possumus. Neque enim in Scorbutico, qui sequentissimè ex victu contrahitur, primò pulmones inficiuntur, sed in primis viis humor Scorbuticus primum cumulat. Ac multis locis Scorbutus satis familiaris est, qui à mari salso satis distans; & contra multis in locis maritimis Scorbutus planè incognitus est.

Vita genus, acut. sexus.

Vitæ genus etiam ad Scorbutum generandum conferre potest; nimirum otium, & vitæ genus deses, atque iners, exercitium, & motus intermissus; vnde calor, quo coctio omnis perficitur, debilitatur, & suffocatur, & coctiones, excrementorumque secretiones, & euacuationes non rectè perficiuntur. Hinc ij, qui in otio viuunt, magis Scorbutico obnoxij sunt, quam qui laboribus exercentur, & scemina, viris; vrbani, agricolis.

Euacuatio- num suppressio. Somnus & vigilia.

Vt & euacuationum consuetarum, puta mensium, & hæmorrhoidum præcipuè, suppressio,

Somnus itidem, ac vigilia; ille quidem crudos in corpore succos augendo, teste Galeno, 1. meth. med. c. 3. hæc autem cruditates augendo, & calidum natium absumendo.

Animi pathemata.

Inter animi motus, ut aliàs ad humorem melancholicum generandum multum facit tristitia: ita & hic eundem cumulare, & Scorbutico materiam præbere potest adeò, ut scribat Stæuerin. Eugalenus, p. 3. quos cum crassiore victus ratione diuturnior mœstitia exercuit, de his ægotantibus se constanter semper prædicere

ausum fuisse, eos à scorbutico morbo vel solo, vel aliis permixto teneri.

Faciunt ad Scorbuti generationem sæpe etiam febres; cum per eas humor Melancholicus faciliè cumuletur, ut Galenus, de loc. affect. lib. 3. cap. 7. scribit. Nam humores calore febrili aduruntur, & quod debile quodammodo restinctum est, in atrum humorem vertitur; id quod maximè accedit circa status finem, vbi & continuæ, & intermittentes febres biliosæ in quartanas, & hinc in Scorbutum degenerant. Et præcipuè quartana in scorbutum degenerare solet: nonnunquam tamen & tertianæ diuturnæ. Febres etiam tertianæ, quæ tempore verno incipiunt, & post septimum paroxysmum quotidie infestant, maxima ex parte sunt diuturnæ, & tandem in scorbutum abeunt.

Verum causæ istæ omnes eò facilius, & promptius malum hoc excitant, si viscerum, & inprimis licnis, intemperies, debilitas, vel obstructio adsit, siue natiua, & primigenia, siue ex colluuiæ, & contactu vitiosorum humorum contracta, ob quam humores affluentes, & melancholicam redundantiam sequestrare, elaborare, atque excrementa excludere non potest. Et inprimis magni momenti hic est id *ἰσχυρία*, & peculiaris cuique corpori natura, venarum item in visceribus hisce angustia, ob quam crassi, & feculenti humores facilius in iis hærent.

Et si verò etiam absit viscerum natiua constitutio non recta: tamen si actio vitiosorum humorum diuturnior sit & continua, à violentia eorum viscera diu se defendere non possunt, sed humores prauis, propriam & peculiarem huic malo corruptionis formam adepti, adiacentia & vicina viscera vel sua substantia & contactu, vel fumis deprauant, eorumque naturalem temperiem, & constitutionem corrumpunt, donec eandem labem suscipiant, & infecta, & debilitata alimentis ingestis similem corruptionis formam imprimant, eaque inquinant, & corrumpant.

Quibus causis omnibus tandem meritò Contagium, alterum causarum genus, addimus, quod etiam absentibus causis modò enumeratis, ad scorbutum excitandū satis efficax est, quo vel à patre, vel matre vel vtroque parente malo infecto in sobolem per semen & sanguinem maternum, generationis principia impura & inquinata deriuari, & ita malum hæreditarium, siue *συμφοῖον*, & *συγγενές* excitari, vel è matre, aut nutrice cum lacte instillari, vel alio modo per contactum, & conuersationem pocula scilicet, ægotantium vsu, in bibendo præcipuè, inquinata, oscula etiam, ut nonnullis placet, aut aërem exhalationibus, expirationibus, & foetidis halitibus ægorum infectum inspiratione attractum communicari potest. Quæ ipsa causa non parum facit, quod in Saxonia inferiore Scorbutus tam frequens sit. Nam cum raro fiat, ut inter conuictos plures vnus mensæ omnes à scorbutico immunes sint: nihilominus mos in plerisque locis inualuit, ut pocula sint communia, eaque satis magna, & capacia, in quæ inter bibendum sæpius ab iis, qui gingiuas laxas, cruentas, & os graueolens habent contagium deponitur, & commensalibus faciliè communicatur. Censent etiam nonnulli per Venerem communicari posse scorbutum, si scilicet vir cum femina scorbutica, fluxu albo laborante, concumbat.

Ex halitibus quoque & foetore cadauerum scorbutico extinctorum scorbutus contrahi potest. Cuius rei notabile exemplum obseruauit in viro illo, cuius supra, c. 1. memini, & c. seq. mentio fiet.

Quaratione autem per contagium malum hoc communicetur, equidem non ita planum est. Videtur tamen eadem esse ratio, quæ in lue Venerea. Ut enim illud contagium quidem per diuersas partes corporis admitti

Quomodo per contagium scorbutum communicetur



admitti potest: in corpus tamen admissum sensim in vniuersum sese penetrat, & non solum spiritus, ac humores inquinat, sed & similem dispositionem partibus solidis imprimit: Ita & contagium Scorbuticum siue per saliuam siue per halitum, siue per lac, siue per cutem in corpus admissum sanguinem inficit, ac inquinat, & visceribus nutritioni dicatis similem dispositionem imprimit, & ea debilitat, vt & ipsa postea non sanguinem probum, sed vitiosum, & scorbuticum generent. Et quamuis vnum *μολυσμα* per varias corporis partes admitti potest: tamen non omnibus æquè aduersum est, sed vt omnia venena ac contagij seminaria determinatis in corpore partibus aduersa sunt, alia cordi, alia pulmoni, alia aliis partibus ac præcipuè iis, in quibus generata sunt, atque ex oculis effluentia *μολυσμα* tantum *εμφυσις* inducunt, non phthisin; contra halitus contagiosi phthisicorum pulmoni, non oculis nocent: ita etiam in scorbutico sese res habet. Cum enim illud contagiosum in eo circa lienem generatum sit, ac prauam dispositionem ibi acquisierit, facultati etiam naturali in liene & vicinis partibus maximè aduersatur.

#### CAPVT IV.

##### De Signis Scorbuti, ac de morbis, & Symptomatibus, quæ Scorbutum comitantur.

Scorbutus est farrago plurimorum morborum & symptomatum.

**M**agnam in Scorbutico esse morborum, & symptomatum *συνδρομήν*, & farraginem, supra diximus quæ hic, vt eius effectus, ex quibus cognoscitur, perpendenda. Nèque enim, quod non solum è vulgo homines, sed & Medici interdum, quibus hic morbus parum cognitus est, facere solent, ij saltem Scorbutico laborare dicendi sunt, quibus crura maculis pinguntur, gingivæ corrumuntur, dentes vacillant: Sunt enim hæc iam ingrauescentis tantum mali signa, & homo malum hoc diu circumferre potest, etsi nihil tale appareat. Et non raro accidit, vt homo prius hoc morbo è medio tollatur, quam ipsi gingivæ exulcerentur, aut maculæ in cruribus emergant. Neque eadem, vt supra, cap. I. dictum, in omnibus apparent symptomata. Nonnullis dentes & gingivæ tantum afficiuntur, partibus inferioribus saluis: aliis contrarium euenit. In aliquibus nullæ erumpunt maculæ, aliis tota crura colore violaceo pinguntur, vt tibialia eius coloris superinducta iurates.

Scorbutus in principio diffinitur cognoscitur.

Sunt verò morbi huius quidam quasi gradus. Et quidem vbi adoleuit, facilis cognitu est: in principio verò, quod satis longum plerumque, difficiliter cognoscitur; cum signa eius, vt corporis totius grauitas, & spontanea lassitudo, cum aliis morbis sint communia. Artificiofam tamen coniecturam si Medicus adhibeat, ita planè latere non poterit, quin agnoscat. Si nimirum non ad vnum, vel alterum symptoma tantum respiciat Medicus, sed totam symptomatum & signorum *συνδρομήν* vno intuitu diligentius consideret. Pathognomonicum enim vnum signum aliquod, quod soli, & omni competat, non reperitur, præsertim in initio. Et licet vbi iam incrementum sumpsit, latere non possit, si diligenter in eius naturam inquiratur: tamen sæpissimè alios morbos simulat, incautosque decipit; cum nullus ferè morbus sit, sub quo non latere, aut cui non associari Scorbutus possit, vt ex sequentibus patebit.

Signa scorbutici generantur.

Principio igitur considerandum, si de scorbutico suspicio incidat, an in ea regione viuat æger, cui scorbutus aliàs est familiaris, & omnino an diæta Scorbutico generando apta vsus sit. Vnde Eugalenus scribit, si quos cum crassiore victus ratione diuturnior mœstitia

exercuit, de iis ægrotantibus se constanter semper prædicare ausum fuisse, eos scorbutico vel solo, vel aliis morbis permixto laborare. An parentes habuerit Scorbuticos, an sit splenicus, & morbo aliquo melancholico, & hypochondriaco, quem sequi Scorbutus solet, antea laborauerit, ex quo non satis restitutus fuerit.

Hinc ipsa symptomata præsentia, quæ mox exponuntur, consideranda. In quibus & hoc notandum, quod per quasdam periodos, & circuitum recurrunt, aliàs tertianum, aliàs quartanum, aliàs quintanum, aliàs septenarium; aliquos etiam quotidie, pro humoris ipsius qualitate, & conditione, infestent. Et si in regione aliqua, cui scorbutus familiaris est, occurrat aliquis morbus rarus, aut qui cum descriptione & signis quæ in antiquorum libris exstant, non satis congruit, Scorbutum sub schemate & specie alterius morbi latere, suspicandum, ideoque in eum diligenter inquirendum, & ex causis, quæ præcesserunt, vrina, pulsu, & symptomatibus, an scorbutus adsit, indagandum.

Perpendenda etiam iuuantia. Etenim si medicamenta, quæ aliàs videntur commoda, Scorbutico verò in specie non aduersantur, parum prosint; contra ex vsu medicamentorum huic morbo accommodatorum æger melius sese habeat: & illud scorbuti indicium est; ideoque in illorum medicamentorum vsu persistendum, nec ad alia transeundum, de consilio Hippocratis. 2. aph. § 2.

Pertinet huc & istud, quod interdum vomitus, & alui deiectiones copiosæ, & frequentes accidunt, è quibus tamen nihil leuaminis, vel commodi æger percipit, & anxietas, & symptomata non remittunt.

Incipientem autem scorbutum, eiusque prima quasi rudimenta, ac principia, produnt, lassitudo spontanea in abdomine & cruribus grauitatis sensus, crurum debilitas, ac dolor obtutus, pectoris angustia, ac respiratio difficilis, & anhelatio, quæ tamen à minus attentis non animaduertitur, nisi à validiore corporis motu: homo plerumque præter solitum fit corpulentior, & quasi pinguior, cum viuidi corporis coloris ad liuidum mutatione.

Incipientis scorbuti signa.

Hinc paulò post subsequitur rubedo, & pruritus quidam in gingiuis, facies fit pallida, & ex violaceo nonnihil liuescens; vrina sæpe tenuis est, nunc turbida. Pulsus est paruus, debilis, & inæqualis, ac sæpe vermicularis; vel magnus, & durus absque inflammatione. Quæ si adsint, non leuem de Scorbutico suspensionem faciunt; quæ magis confirmatur, si, vti modò dictum, victus ratio scorbutico generando apta, vel alia causa scorbutum generans præcesserit.

Augmentis sumentis signa.

Malo incrementum sumente symptomata modò dicta augentur, & grauiora redduntur, & alia accidunt, vt iam de Scorbutico amplius dubitare opus non sit. Anhelitus difficultas sæpe ita augetur, vt dum se mouent, & erigunt ægri, aut aliquamdiu erecti sedere conantur, animi deliquio tententur, decumbentes rursus reficiantur, & respirent liberius, ac se melius habere, ac sanos esse dicant. Ventris tormina, ac torsiones accidunt; gingivæ intumescunt, & laxæ ac flaccidæ redduntur, & ad attractum sanguinem serosum effundunt, graueolent, & corrumuntur, & caro ad dentium radices absumitur, dentes vacillant, vt absque negotio & dolore ex alueolis suis eximi possint. Crura ad ambulandum, & corporis onus portandum impotentia fiunt, & quasi Paralyfin quandam patiuntur: Maculæ, ac lituræ variæ, rubræ, purpureæ, fuscæ, non solum in cruribus, sed & in dorso, ac lumbis efflorescunt, & tota crura interdum eiusmodi colore pinguntur. Crura sæpe etiam *αγγωρία* laborant; sæpe intumescunt; & sæpe ita exulcerantur, vt Elephantiasin Arabum æmulentur, cuius rei exemplum

Ingrauescentis signa.

ante paucos annos & hinc vidi. Varices etiam sub lingua (quæ venæ aliâs caninæ dicuntur) & inferioribus labiis visuntur.

Quibus mala alia sæpe accedunt, sensusque grauitatis, dum malum augetur, incrementum sumit, percipiturque in pluribus quarto, in aliquibus tertio, & quibusdam, sed rarius, singulis diebus. Et quidem plerumque sine febre, quandoque tamen etiam cum febre. Febres autem, quæ scorbutum comitantur, non vnius generis, sed variæ omnino sunt, & nonnunquam intermittentiæ, inordinatarum, quotidianarum, tertianarum, quartanarum, quinto, vel sexto die redeuntium, nonnunquam continuarum, imò & malignarum naturam æmulantur. Quibusdam alius toto morbi tempore est adstricta, alij contra ventris fluxu laborant, qui nonnunquam in periculosa, & sæpe lethalem dysenteriam mutatur: sæpe accidit vomitus, vel inanis vomendi conatus, paralytis, motus convulsui, epilepsia, deliria, carus, lethargus, lipothymia, dolores vagi, dentium dolor, pleuritis, dolor articulorum, erysipelata, hydrops, *ἀσπεία*, gangræna; vt ista omnia annotauit, & historiis illustrauit Eugalenus, vt antea diximus.

Rara & nota de scorbuto observationes.

Imò plura adhuc ex eodem humore mala excitari posse, obseruare in praxi promptum est. Et inprimis scabiei sæpe coniungitur Scorbutus, & tunc ex humorum vitiorum ad interiora recursum grauissima symptomata excitantur. Memini Anno Christi 1615. studiosum quendam Sueuum, cum humores tales adustus multos cumulasset & Natura eos ad ambitum corporis protrusisset, scabiesque inde excitata fuisset, iisdem ad interiora recurrentibus subito cæcum euasisse, & per triduum nihil vidisse, nullo extra in occulto apparente vitio, & reliquis sensibus integris. Idem de summa pectoris angustia, & difficili respiratione conquerebatur; vrinæ nigra reddebantur, turbida, ac subrufa, quæ cum quiescerent, superiore parte clara nonnihil euadebant, nigro sedimento subsidente. Per aluum idoneis, & leuibus medicamentis purgatus, ac iis adhibitis, quæ humori huic contraria sunt, simulque per vrinas expellunt, (quod natura vergebat) fumaria, cochlearia, & similibus, intra quadriduum visum recuperauit, & paulò post sanitati restitutus est. Idem quadriennio post eodem ferè morbo correptus est: conquerebatur de pectoris angustia, & difficili respiratione, ac tenebras sæpe oculis offundi referebat. Visu tamen tunc priuatus non est, sed semel circa vesperam Epilepsia correptus, à qua tamen clystere, & aliis medicamentis idoneis adhibitis liberatus est, & paulò post conualuit, atque etiamnum viuuit.

Eodem ferè morbo ante paucos annos corripiebatur puer annor. 12. ex intempestiua contra scabiem inunctione, qui vrinas reddebat nigras, visu priuabatur, & accedente, accedente, ac recurrente sæpe Epilepsia exstinguebatur.

Dolores, ac punctiones pectoris, ac nothas pleuritides ex iisdem humoribus, & scabie intempestiue curata sapius obseruauit; vt & febres tertianas, quartanas, quæ scabie erumpente cessarent facile, eadem euanescente redirent. Obseruauit & hæmorrhagias narium frequentes, & copiosas in Scorbuticis; cruentas alui deiectiones copiosas; sanguinis è vena in cruribus sponte aperta effusionem, Ictericum cum cardialgia, de quibus omnibus postea in specie dicetur.

Obseruauit etiam notatu digna, & rariora in Scorbuticis vir Cl. Dn. D. Döringius, Medicus Vratislaviensis, affinis meus honorandus, Ictericum scilicet, cui successit hydrops Ascites; Asthma; Fauum, qui non tantum vniuersum caput, sed & totam frontem occupauit; Herpetem brachij sinistri; Gangrænam in indice digito; Hæmorrhagias narium frequentes;

Hæmorrhagias è labiis non conspicuo venæ ostio; palpitationem cordis; ardorem, & dolorem intolerabilem in plantis pedum cum maculis sublinidis in cruribus; putrida, & putrida materia ex vtero effluxum. Ita Clariss. Dn. D. Timotheus Vlricus, Medicus Magdeburgensis, amicus meus honorandus, præter genua retracta ad faciem, totumque corpus quasi contractum, obseruauit, carnem in oculis sub palpebris luxuriantem & crescentem, sanguinis colore, oculi albo icteri faciem, palpebris verò iridis colorem referentibus, ex cæruleo, punico, & flauo mixtum: in aliquibus, sed rarius, ad quosuis articulorum motus & inflexiones sonitus exactissimos & manifestos, ac si digiti comprimerentur fortius, vel quales ex contractis ossibus aut nucibus euenire solent: Cuiusdam hydropicæ habitæ, dentes vna nocte omnes vacillare cœpisse, vt vniuersorum casum metueret, qui tamen altero die firmiter alueolis suis hærebant: Nobili cuidam nullas maculas, etiam medicamentorum ope, erupisse, sed sudoriferis adhibitis sparsim musculosas brachiorum partes ardore correptas fuisse, sensu guttularum feruentissimarum aquæ adurentis aspersarum, nullo interim externo apparente vestigio: Viduam quandam in febre continua toto corpore maculis nigris, violis obscurioribus, satis magnis scædatam fuisse, raro aspectu: cui tota facies (albis tantum circa oculos & nasum circulis ac lineis puerilibus digiti crassitie remanentibus,) cum colorem contraxit, quem exactè fuilli petasonis fumo indurati & cocti corium repræsentat; pustulæ insuper elatæ & atræ magnitudinem fabæ æquant in malis sequentes aderant, sanguinem merum aliquatenus nigrum ac ferolum effundentes.

Et omnino tanta est morborum, ac symptomatum varietas in scorbuto, vt non solum è vulgo homines, sed & Medici, quibus hic morbus cognitus non est, eam vix satis mirari queant, & sæpe in eam opinionem veniant, ægros veneno infectos esse.

Neque verò quis miretur, tantam malorum faraginem ab vna causa provenire posse. Nam etiam primò circa lienem præcipue, & intermediis inter hepar, lienem, & ventriculum spatiis hic humor cumuletur: tamen vbi magna huius copia coaceruatur, tandem ad hepar redundat, & in venam cauam, vt & arterias sese penetrat, ac sanguini in iis vasis permisceatur, eumque inquinat & per hæc vasa nunc in hanc, nunc in illam partem, nunc etiam in totum corpus distribuitur & varios affectus in variis partibus excitat. Ad quod non parum facit propria illa, & peculiaris humorum corruptio multifariam nocere prompta.

Inprimis verò ad istam varietatem malorum producendam apta est natura humoris serosi, & salii, qui plures alterationes, mutationes suscipere aptus natus est, vt nunc forma aquæ, nunc vaporis subtilis, & leuis, nunc lapidis siccitatem, crassitiem, & duritiem referat; atque hinc inde facile in omnes corporis partes penetrat, & moueri aptus est. Etenim cum in venis, & arteriis suam sedem habeat, ex eorum vasis maioribus in minora, quorum extremitates in singula membra tam interna, quam externa propagantur, deriuatur, & huc illuc moneri, & in vniuersas corporis, cuius ob hanc vasorum communionem *ἑνότητα* & *ἑνότητα* est, partes fluere, atque ab internis ad externas, ab externis ad internas, è supernis ad infernas, ab infernis ad supernas, à latere ad latus variè moueri potest; id quod sæpe in doloribus corporis vagis animaduertitur. Ad quam motus procliuatatem & illud facit, quod salii, & serosi hi humores non perfectè cum sanguine permisceantur, sed ab eo facile separantur, & reliquo sanguine ita non commoto, quotiescunque effruescunt, vel aliam ad motum occasionem accipiunt, hinc

Multitudinis morborum & symptomatum in scorbuto causa.

Serosus humor ad plurima mala excitanda aptus.

Humor sero-  
sus ner-  
uoso generi  
infestus.

Caput ad se-  
rum reliquū  
corpus distri-  
butionē facit.

hinc inde mouentur, & præcipue si totus sanguis effe-  
uescat, ipsi fluxibilitatem præstant. Quò tandem facit &  
hoc, quod hic humor peculiari modo neruis, & neruoso  
generi infestus est, vnde non tantum conuulsio, para-  
lysis, sed & tot dolores in membranosis partibus oriri  
solent.

Multum etiam ad serosi huius humoris in plurima  
membra distributionem, & deriuationem caput facit.  
Cum enim caput cum intra, tum extra craniū innume-  
rabiles venæ, & arteriæ percurrant, & sanguis quidē, qui  
in iis est, ad nutritionem capitis absumatur. Serum autē,  
quod cum sanguine in hi. ce valis continetur, alendis  
illis partibus aptum non sit, neque tamen per iter, vn-  
de affluxit, facile refluere, neque per cranij densita-  
tem, vt in aliis partibus, excidere sensibilibiter, neque etiā  
insensibilibiter, ob loci teporē & calorem remissiorem,  
discuti possit: cumulatū, & cum loco decliui contineri  
nequeat, ē capite secundum ductum membranarum &  
neruorum interna membra destillat.

Verū vt hæc clariora fiant, de singulis in specie di-  
cemus: cum multa de plurimorum morborum, ac sym-  
ptomatum generatione vtilia cogitanda suppeditent.  
Etiā verò non multum referat, quo ordine ista sympto-  
mata, & morbi proponantur: ea tamen primo loco po-  
nemus, quæ huic malo magis familiaria sunt, nimirum  
lassitudinem spontaneam, grauitatem in cruribus, pe-  
ctoris angustiam, respirationis difficultatem, gingiua-  
rum corruptionem, & oris graueolentiam, maculas in  
cruribus purpureas, vrinas, pullum: Quibus reliqua post-  
ea subiungemus.

Lassitudo  
spontanea &  
grauias cor-  
poris.

Lassitudo primum spontanea, & grauitas corporis,  
præcipue crurum, *νόσος πρῶτης* Galeno, 3. de san-  
tuend. cap. 5. & 2. aph. 5. cum tendi membra, & ponde-  
re quasi appenso grauiora videntur, excitatur, cum hu-  
mores serosi, & vitiosi cum sanguine per venas in am-  
bitum corporis distribuuntur, & ad musculos ipsos pe-  
netrant. Quia verò vt corpus nutrant, ei que assimilē-  
tur, inepti sunt, ibi hærent, & vires grauant, ac hanc la-  
titudinem excitant, ita, vt ægri in principio huius mali  
se languere magis, quam ægrotare conquerantur, cum  
vix sensibili virium decremento, & circa aliquem eui-  
dentem morbum. Sentitur etiam hic grauitatis sensus  
in abdomine, cum ibi, & in primis viis materia primò  
colligatur.

Difficilis re-  
spiratio &  
pectoris an-  
gustia.

Difficilis respiratio, & pectoris angustia frequens hu-  
ius mali symptoma est, quæ plerumque quidem excita-  
tur, cum vapores maligni, & prauī in ventre inferiore,  
præcipue circa lienem, excitari in ventriculo, & circa  
septum transversum procul dubio etiam in canitate il-  
la omenti supra, cap. 2. num. 1. descripta, collecti hærent  
aliquandiu, illiusque liberum morum, qui in respiratio-  
ne necessarius est, impediunt, aut ipsi etiam humores  
vitiosi, lienem, & vicinas partes distendentes, diaphra-  
gma comprimunt: eodem modo, quo hydropici aut  
vterum gestantes, aut alia de causa ventrem turgidum  
habentes difficiliter respirant. Vnde etiam ægri nihil de  
thorace conqueruntur, sed locum affectum, vbi graui-  
tatem sentiunt, & cuius causa cum difficultate respira-  
re coguntur, sub diaphragmate ad ventriculi regionem  
monstrant, teste Eugaleno, p. 10. & ipsa experientia.  
Quo signo etiam hæc scorbuticis familiaris difficilis  
respiratio à respirationis difficultate, quæ causam pri-  
mariam in thorace habet, facile discernitur. Conque-  
runtur etiam ægri magis de angustia (*es seyibnen ban-  
ge, vñ angst*) quàm respirationis difficultate, eamque  
tolli vnice petunt; quæ angustia interdum adeò auge-  
tur, vt liporhymiam minetur, & caligo oculis offun-  
datur, ac nisi tollatur, ægri statim animam reddituri vi-  
deantur. His accedit, quod respirationis hæc difficultas,  
seu potius angustia non est perpetua, neque eadem ve-  
hementia molestat, sed breuibis intervallis vel ces-  
sat, vel remittit, ac postea recurrit, vel augetur. Nulla  
tamen in hac respirationis difficultate, sicut in thora-

cis affectibus adest tussis, stertor, sibilus, orthopnoea, &  
similia. Non crediderim tamen impossibile esse, vapores  
illos prauos, ac malignos etiam per venas, & arterias  
pulmoni, & cordi communicari, arque hinc istam an-  
gustiam excitare posse; quod vel ex eo patet, quod non  
solum per intervalla vaporibus sursum adicendentibus  
oculi obducuntur, & caligant, vt ægri adstantes agno-  
scere non possint, sed etiam liporhymia sæpe accedit.  
Inprimis verò post validum exercitium, & vehementio-  
rem corporis motum malum hoc augetur, humoribus  
in hypochondriis commotis, & aliquomodo excalefa-  
ctis, & vaporibus inde, quasi camarina mora, excitatis.  
Huius angustia meminit Seuerinus Eugalenus, obs. 6.  
7. 8. 11. 18. 19. 20. 37. 40. 48. 69.

Porrò cum natura adhuc causam morbi superat, quàm  
longissimè humorem vitiosum à partibus nobilioribus  
amouere conatur, partim versus superiora, & in gin-  
giuas, partim in pedes; vnde gingivarum rubor, pru-  
ritus, ac putrefactio, & crurum maculae exoriuntur.  
quæ signa vbi apparent, tam certò scorbutum indi-  
cant, vt lippi etiam scorbutum inde agnoscere possint.  
Primò enim ex materiae parte acriore & subtiliore,  
quæ vel à natura sursum mouetur, vel à calore eò  
attollitur, rubor, pruritus & erosio ac putrefactio gin-  
giuarum excitatur. Etenim cum caro gingivarum sit  
mollior, tenera, & laxa, facilius à salis, & serosis  
eiusmodi humoribus afficitur, quàm aliæ partes,  
quarum caro durior est, & solidior. Hinc primum  
in gingiuis rubor, & pruritus excitatur, caro earum  
intumescit, & contrectata sanguinem ichorosum  
fundit, postea flaccescit, intumescit, putrescit, &  
odorem foetidissimum de se exspirat. Inde carne,  
qua dentes regantur, abscedente, prauoque humo-  
re alueolos, & partes, quibus dentes in locis suis  
continentur, occupante, omnibusque hisce partibus  
laxis redditis, dentium compages soluitur, vt vacil-  
lare incipiant, nulloque negotio ex alueolis suis  
eximi possint. Et quidem vt ista dentium vacillatio  
sæpe subito accidit, ita subito etiam euanescit, ob-  
seruatūque, vt supra, dictum, ægris vna nocte  
dentes omnes vacillare cœpisse, vt vniuersorum ca-  
sus metueretur, altero verò statim die rursus firmi-  
ter in alueolis suis hæsisse. Quod procul dubio ob  
varium affluxum & refluxum serosi & scorbutici  
humoris accidit. Dentes ipsi sæpe nigrescunt, &  
quasi siderationem patiuntur, sola tamen superficies,  
tali colore tincta est. Quanquam verò simili vitio  
interdum in lue Venerea os afficiatur: tamen à  
scorbuto id facile discernitur, cum aliis signis hi  
morbi multum diffideant; ac præterea oris hoc vi-  
tium lue Venereæ non sit perpetuum, sed post v-  
sum hydrargyri accidat, cuius vi dum venenatus hu-  
mor serosus per salinationem expurgatur, facies, & os  
simul afficiuntur.

Gingivarum  
oris & den-  
tium vitia.

Quod autem crassum & grauius est, ad crura de-  
cumbit, ibique maculas varias excitat, quæ in prin-  
cipio rubicundæ, illis, quæ à pulicum moribus  
relinquuntur, non absimiles, hinc purpureæ, &  
subliuidæ erumpunt, tandemque ad nigrum colo-  
rem inclinant. Nonnunquam tibiarum magno spatio,  
vel etiam vndique liuidæ, vel cum nigrore, aut li-  
uore purpureæ euadunt. Vnde nonnulli maculas scor-  
buticas distinguunt in amplas, & maiores (Germani  
*Flecke* appellant) & minores pulicum moribus simi-  
les. Videnturque hæ maculae non multum differre  
ab iis, quas Paracelsus, lib. 4. chirurg. von offenen  
Schaden, cap. 16. sub nomine Cancræ describit.  
Vbi hoc notandum, quod scribit, maculas istas si-  
ne exulceratione ad annum 30. vel 40. durare: cui  
experientia respondet. Noui enim in vicinia virum  
hypochondriacum, & arthritidi obnoxium, qui iam  
ab annis 30. crura eiusmodi maculis colorata habet,  
de dolore tamen insigni non conqueritur. Cum enim

Macula.

ferosæ, & ichorosæ in sanguine partes ad corpus alendum inutiles sint, extra venas in cutem à natura protruduntur, & per *ἐκχύμωσιν*, & *νευσώσιν* ὡς βλεβάν, vt Hippocrates, *lib. de fractur. comm. 2.* loquitur, ibi has maculas excitant. Et quidem frequentius hoc accidit in cruribus; cum natura vitiosos humores soleat ad partes ignobiliores, & remotas depellere; quandoque tamen, & vbi maior est eorum copia, & dorso, & in brachiis huiusmodi maculæ conspiciuntur, eæque non solum minores, sed & maiores, de quibus infra. Imò interdum etiam circa pectus, & in collo, & facie efflorescunt, modò euanescentes, modò iterum erumpentes, vt obseruauit Eugalenus, *obseru. 59.* Vidi nuper puerum nobilem biennem, cui primum in præputio hæ maculæ apparuerunt, post menses verò aliquot in toto corpore, imò etiam facie effloruerunt. Hæ lituræ nonnunquam in quâdam quasi squamas resoluntur, quæ à reliqua cute non secus, ac in erysipelate separantur, Salomon Albert. *thes. 119.* Quandoque subitò ante mortem maculæ euanescent, & rursus post mortem efflorescunt, aut quæ pauca & sparsim apparebant, copiosè erumpunt, & continuo liuore tota ferè crura pinguntur.

*Vrina scorbuticorum.*

Vrina quoque non paruam ad demonstrandum scorbutum vim habent, & quandoque solæ ad patefaciendum eum sufficiunt. Sunt autem eæ non vnius generis, sed pro ægri corporis constitutione, & humorum natura varia variæ. In initio quidem, & cum humorum corruptio nondum magna est, vrinae nunc tenues, & citrinæ, materia tartarea in viis subsistente, nunc crassæ, & albæ, conspiciuntur, ex quibus, vt pote cum aliis morbis, in quibus cruditas humorum adest, communibus certè nihil prædici potest. Si verò corruptione humorum incrementum lument, vrinae sint quidem claræ, verum rubræ, & intensæ rubedinis, & ad fuscum declinantis, & cum splendore quodam instar lixiuij claræ appareant, similes iis, quæ in febribus ardentibus, vel quartanis à sudore redduntur, non leue scorbuti argumentum sunt. Et sæpe in talibus vrinis multæ rubræ arenulæ parietibus matulæ adhærent: cum quibus si nulla, aut nullius momenti sitis, putrefactionis, quas vrina exhibet, notis non respondens adfuerit, certissimum scorbuti sunt indicium, & ab humoribus falsis multis admistis originem habent; maximè verò si ab obabulmentibus, & omnia vitæ munia sine offensione administrantibus tales reddantur. Vt enim lixiuij colorem eò magis ad quandam rubedinem vergere videmus, quò plures salis, & adustæ partes ei insunt: ita etiam quò plus falsi, & adusti humoris vrinis admiscetur, eò colorem rubicundiorum acquirunt.

Nonnunquam verò, & frequenter apparent crassæ, rubræ, & vel turbidæ minguntur, vel statim turbantur, quæ aut tales permanent, aut crassum, & rubrum sedimentum, quod farinam laterum refert, ad fundum deponunt, & clarescunt; sæpe etiam multa cruda, & pituitosa excrementa supra istud sedimentum quasi suspensa hærent, eidem tamen non permiscuntur, atque ita totam vrinae partem superiorem turbidam reddunt. Et cum hæ vrinae colore aquæ, vel ignis iterum claræ redduntur: color tamen ex fusco rubescens est, atque instar lixiuij sese habent hæ vrinae. Atque istæ vrinae certum scorbuti signum sunt, si sitis, & oris siccitas adsit modica aut nulla, & quæ modica liquidi assumptione sedetur, febris non adsit, aut nullum typum obleruet, adsit torius corporis languor, & æger paulatim sine euidenti causâ contabescat. Et, vt Galenus scribit, in quorum vrinis maiora putrefactionis indicia adsunt, quàm quæ foris ex calore, & siri apparent, morbo lento existente, & ad nullum veteribus cognitæ febris typum accedente, de his certò tecum statuere potes, ac debes, à scorbuto tales detineri. Causamque huius rei hanc reddit; quod humor melancholicus huius mali causâ putrefactus & accensus suæ quidem putrefa-

ctionis notas in vrina exhibeat, sæpe febribus ardentibus pares, aut non multò dissimiles; sed quia crassus, frigidus, ac terreus sit, neque facile accendatur, neque accensius, vt cæteri humores, vrat; inde etiam labiorum, orisque siccitatem inducere possit, non tamen idem semper bibendi desiderium afferat, neque talem inquietudinem, ac molestiam exciter, ac febris continua, & ardens, vt pote qui fumosis suis vaporibus magis, quam igneo calore, cor ferit. Aliquando crassa, & alba est vrina, quæ statim conturbatur; & licet sæpe plura corpora rotunda & alba, arenarum instar, vel fractæ polentæ similia subsideant, quæ à fundo matulæ nonnisi fortiore matulæ motu eleuantur: tamen clarior vrina non fit, sed turbida permanet substantiâ suâ crassâ matulæ parietibus adhærens, Eugalenus, *pag. 34.* & nec à catharticiis, nec attenuantibus clarescit, & attenuatur, sed magis conturbatur. Eorum, qui intemperantius vixerunt, & crassiore victu vsi sunt, ac curis anguntur, vrinae, vt Eugalenus docet, sunt crassæ, nigræ, turbidæ, quæ vel tales permanent, vel turbidum, ac nigrum sedimentum in fundum deponunt. Cum his vrinis plerumque sitis grauior, & oris ac labiorum siccitas molesta coniungitur, quæ tamen modica liquidi assumptione facillè sedatur, sed non ita multò post recurrit.

Malòque hîc assentiri Eugaleno, qui iis in locis, vbi familiarissimus est scorbutus, Medicinam fecit, præsertim cum experientia idem me edocet, quam Hieronymo Reusnero, qui iis in locis vixit, vbi scorbutus non adeo familiaris, neganti, vrinam in scorbuto esse turbidam, rubicundam, crassam, feculentam, ad modum vini rubri recentis, aut qualis feruente quartana, potissimum à sudore, solet apparere, aut certè rarius hoc euenire concedenti, contrà verò affirmanti, sæpius in scorbuto vrinas tenues, aquosas, subspiceas, subpallidas, sine sedimento, carnis semicrudæ iusculo, vel aquæ bilis mediocri infusione dilutæ similes mingi. Falsæ enim hypothese ista omnia superstruit, nimirum ab aquoso, & tenui humore tantum oriri scorbutum. Contrarium enim experientia docet, & vt diximus, initio quidem tales vrinae minguntur: tamen vix aliquod certum signum scorbuti exhibent. Et ipse concedit vrinam scorbuticorum frequentissimè putere, & fœtere, quod certè vrinis crassis, & turbidis magis, quam tenuibus, aquosis, subspiceis, ipsa experientia teste, conuenit.

Obseruatum quoque est, præcipuè in iis, quibus hæmorrhoides suppressæ malo huic originem dederunt, materiam tartaream, vt appellant, quandoque cum vrina, quæ cum summo dolore, & ardore plerumque guttatim emittitur, copiosè euacuari, eamque turbidam mingi: quæ vbi subsidet, sæpe tertia, vel quarta pars matulæ materia eiusmodi tartarea, mucosa, falsa, nonnunquam nigricante repletur, quæ incautioribus vel calculi, vel exulceratæ vesicæ suspicionem mouet. Solèturque ista materiæ euacuatio inuadere cum horrore quodam, quem calor præter naturam, sub noctem præcipuè, sequitur.

Sæpiissimè variant vrinae, & in eodem ægro sine causa aliqua euidenti permutantur, & hodie turbidæ ac crassæ, postridie aquæ, & tenues, hinc rursus citrinæ, auræ, rubræ, vel crassæ redduntur, sæpe etiam sanorum similes sunt; quod variorum humorum permistorum, & plurium affectionum, quæ nec eandem curationem, neque solutionem & finem habent, indicium est: Solentque tales vrinae tenues sumpris medicamentis antiscorbutis postridie in crassas mutari, crasso sedimento subsidente.

Pulsus est varius, nunc debilis, & inæqualis, ac sæpe vermicularis, vt repere magis, quam pulsare videatur, vt Italum Medicum harum rerum ignarum miraturum scribat Eugalenus, *obseru. 35.* cum tali pulsu hominem non solum viuere, sed & obambulare, &

*Vrina ardens.*

*Pulsus.*



& domi sua officia obire posse; nunc magnus, & durus abique inflammatione. In pulsu etiam hoc notatu dignum in scorbuto accidit, quod in animi deliquio imminente, & summis illis angustiis pulsus maior, ac fortior est, fortiusque ferit digitos, quam reliquo morbi tempore, aut ubi deliquium cessat. Cum enim reliquo morbi tempore pulsus sit parvus, & inæqualis, ubi deliquium animi, & illa anxietas ad præcordia infestat, quæ sæpe tanta est, ut æger statim expiraturus videatur, pulsus fortior est, & magis, quam antè percipitur: proculdubio propter summam eius necessitatem, & quod cor vapores prauos, quibus molestat, expellere conatur. Est verò huius exemplum apud Eugalenum, *obseru. 69.* quale, & simile planè nuper etiam mihi in ægro quodam occurrit.

Præter hæc symptomata adhuc alia multa, ut & morbi quidam scorbuto coniungi solent, alia tamen in his, alia in illis; de quibus etiam dicendum. Et primò quidem actiones læsas quod attinet, varia dolorum genera scorbuticos infestare solent: Inter quæ est satis frequens dolor crurum obtusus, aliquando tensius, plerumque *ὀστέονος*, quod scilicet in profundo, & circa os afficiuntur ægri, qualis etiam in quartanis, & morbo Gallico deprehenditur, & præcipuè sub noctem affligit, ac aded ingrauescit aliquando, ut ne horam in lecto ægri quiescere possint, & crura sibi quasi malleo contundi conquerantur. Excitatur autem, cum serosi humores, vel etiam vapores à capite via declinui descendentes circa ossium membranas hærent, vel etiam è sede colluuii scorbuticæ per venæ cauæ ramos crurales extra venas effunduntur, & crurum musculis, membranis, ac nervis sese insinuant. Suntque ided hi dolores non continui, sed per intervalla affligunt, præcipuè, uti dictum, sub noctem, quod eo tempore humor melancholicus moueri soleat.

Alij de furarum dolore conqueruntur, præcipuè inter eundem, cuius exempla sunt apud Eugalenum, *obseru. 41. 59.*

Non raro dolor excitatur circa talos, & iuncturas, & plantas pedum, qui etiam scorbuti prodromus est, eumque sequuntur maculæ, & gingivarum corruptio. Dolor mordicans est, & ob tenuitatem materiæ quasi penetrare videtur partes, *escheust, vnd sticht drinnen.* post triduum sequuntur maculæ, quas vocant *die Nachtgrieff*, propter vestigia digitorum, quibus quasi prehensi videntur. Silesij *Albsflecke* nominant. Augescere malo augetur cruciatus iste intolerabilis, nec cessat, priusquam maculæ, quæ sæpe dimidium femur occupant, maxima autem ex parte amplitudinem vnius manus æquant, prorumpunt.

Quosdam dolor vexat circa manuum, & digitorum extrema, qui sub noctem, ut & crurum dolor solet, grauior est: alijs post vespèram aduenit, alios post mediam noctem affligit, speciem morbi Gallici præ se ferens. Eugalenus, *p. 18.* Detegit tamen hunc pulsus parvus, & inæqualis, de quo Eugalenus, *obs. 41.*

Quidam continui, & grauius coxendicis doloribus infestantur. Eugalenus, *pag. 141. obs. 13. 14. 15.* Nonnullis genua dolent. Eugalenus, *obs. 41.*

Quidam etiam, Eugaleno, *pag. 82.* teste, grauissimis nuchæ doloribus, illique tensius, & prementibus afficiuntur.

Nonnulli variarum corporis partium vellicationem, & lancinationem percipiunt, & carnes sibi quasi diuelli, & dilacerari conqueruntur, alij tales dolores se percipere dicunt, ac si digitis carnes euellerentur, alij de pungentibus doloribus conqueruntur; alij ne quidem eos explicare possunt. Qui tamen omnes accidunt, cum membranæ partium à serosis humoribus, & acerbis vaporibus vellicantur. Idem dolores varias corporis partes, brachia, dorsum, genua interdum occupant; interdum vagi sunt, & modò hanc, modò illam corporis

partem affligunt. De quo Eugalenus, *pag. 214. obs. 45.*

Est & ventris dolor huic malo familiaris, ut etiam ab eo nomen acceperit, & *Scorbuck*, quasi ventris ruptura nominetur. Tanta verò in scorbuticis ventris tormina, & lancinationes adsunt, ut diuelli sibi, & dilacerari omnia exclament ægri, & præ doloris vehementia, quò se vertant, nesciant, ut hac de re scribit Eugalenus, *obseru. 69.* Imò ut quandoque distentionibus istis & cruciatibus in peritonæi rupturam incidant, ut idem Eugalenus, *pag. 86.* annotauit. Sed vexant hi dolores non continuò, sed per intervalla quædam; estque pulsus plerumque parvus, & inæqualis, ac vrina, qualem in scorbuticis esse suprà diximus, atque aliæ notæ scorbuti adsunt.

Atque cum hisce doloribus scorbuticis cum planè conuenire videantur ea, quæ Carolus Piso in *lib. de morb. à colluuii serosa oris*, habet, & de doloribus ventris inferioris, ac de rebus vtilibus cogitandi & differendi ansam præbeant: ea nullo modo sicco pede hîc prætereunda videntur. Nam cruciatus illi abdominis, quibus, *obseru. 74. 75. & seq.* Monachos quosdam torqueri vidit, planè cum iis, ut suprà dictum, quæ Eugalenus passim de scorbuto tradidit, conueniunt; & euincunt, Septentrionalibus quibusdam locis, scorbutum esse familiarissimum; alibi tamen etiam, ubicunque eadem scilicet causa datur, generari posse. Refert enim, dolores illos cum tali alui stupore coniunctos fuisse, ut nihil prorsus emitterent infernè, atque cum crebris vomitibus, ructibusque, & id genus aliis symptomatibus, & præterea cum febre, eaque mediocri quidem, sed pertinaci coniunctos fuisse. Alios autem hisce ventris doloribus iam liberatos fuisse, sed quosdam ex iis inueterata paralyti emortua penè brachia quasi inutile pondus traxisse; quosdam epilepsiæ insultibus ex intervalla vehementer concussos; nonnullos lethargo, & inuitabili sopore oppressos. Ægros autem illos fuisse fusco corporis colore, squalido, strigolòque corporis habitu, ad calidam, siccam, & atrabilariam constitutionem declinante; vfos fuisse pleno victu, & in otio vixisse; ædesque syluis vndique cinctas, & in loco vliginoso sitas inhabitasse. His addit, dolores hos plerumque febribus, modò tertianis, modò quartanis, modò septenarium circuitum habentibus, modò continuis successisse, quales etiam Eugalenus describit: hisque paralytin sæpius superuenisse; quibusdam quoque aluum longo tempore fluidam fuisse; vrinas varias mutationes suscepisse ex breuibis intervallis, & ex clavis in turbidas, & ex turbidis in perspicuas fuisse mutatas.

Dolores autem hi etsi cognationem aliquam cum dolore Colico, qui à flatibus intestina distendentibus ortui habent, obtinent: tamen multis ab eo differunt. Ille enim non ita pertinax est, & diuturnus, sed soluta aluo, & flatibus exeuntibus, breui euanesce-re solet, dolorèque illi situ intestini coli circumscribuntur, ventèrque solet intumescere, & attolli: Hi verò dolores sæpe satis diuturni sunt, & quandoque ad 40. diem, & ultra extenduntur, dolorque non solum Coli ductu circumscribitur, sed modò illæ abdominis partes, imò sæpe vniuersum abdomen dolore corripitur, ventèrque non attollitur sed deprimatur potius, & cum vmbilico intorsum reuollitur, ut vmbilicus lumbis quasi videatur esse annexus, ventèrque excavatus quali. Distensio etiam potius secundum longitudinem, quam latitudinem percipitur; intestinumque rectum reuollitur sursum, ut non solum exitum fecibus intercludat, sed & aditu glandes, ac clysteres prohibeat, ut nonnisi vi intus adigi possint. Tandem dolores ventris à flatu non in tam grania symptomata, & mala commutantur, sicut dolor ventris scorbuticus.

Qua ratione autem dolores hi generentur, consideratione omnino dignum est. Nam ab intestinorum

Carol. Pisonis  
obseruationes  
ad scorbutum  
referenda.

Doloris ventris  
scorbutici  
à Colico differentia.

De ortu doloris  
ventris  
scorbutici.

non secundum latitudinem, sed potius longitudinem distensione fieri, ex iis, quæ iam diximus, parere videtur. Quomodo autem ista conuulsio, & contractio fiat, porro inquirendum. Duobus autem modis eam fieri posse putamus.

Primus est, quem in *Inst. lib. 2. part. 3. s. 2. c. 5.* proposuimus, quando nimirum materia ista acris, & corrupta per venas melsaraicas, quæ inter duas intestinorum tunicas feruntur, & ad intestinorum cauitates non hiant, mouetur, & inter duas istas intestinorum tunicas effunditur, easque distendit, vellicat, & sæpe etiam conuulsionem, & motum *πρὸς ἀλλήλων* excitat, vel etiam in membranas effunditur, easque distendit: ubi cum exitum non inueniat, non mirum est, dolores hos esse diuturnos, & breuibis intervallis redire tandemque in venas regurgitantem materiam in alias partes effundi, & sæpe Paralyfin excitare.

Alterum modum proponit Carolus Piso, qui putat, materiam hanc non per venas melsaraicas effundi, sed à capite descendere, hosque dolores fieri non tam ob diuulsionem intestinorum propriam, sed partis alicuius communis intestinis cum cæteris omnibus membranis in ventre inferiore contentis, peritonæi puta, quod in mesenterium propagatum omnium omnino viscerum, & partium in ventre inferiore contentarum est commune vinculum, imò communis membrana, quæ eas inuestit, inuoluitque vndique & deinde nerui sextæ coniugationis è thorace egressi, omnibus omnino partibus inferioris ventris sese communicantis, & ad omnes propagines mittentis. Contractis enim, & conuulsis ramis sexti paris, vel peritonæo, adnatas iis partes necessario conuelli, contrahique censet.

Quod ut non negamus, & fieri posse concedimus: ita illud, quod ipse etiam vtrò fateatur, omnino addendum censemus, dolores huiusmodi ventris non solum à conuulsione, & distractione peritonæi, vel ramis nerui sextæ coniugationis fieri posse: sed quascunque partes in ventre inferiore membranosas affectas in sui consensum reliquas in abdomine partes trahere. Id quod in doloribus nephriticis apparet, in quibus & vniuersum peritonæum, cæteræque ei colligatæ partes in consensum trahuntur, & testiculus affecto vtereri directè respondens ita retrahitur, ut in abdomen totus recondatur; & in ani affectibus, & doloribus vesica in consensum & contra trahitur. Itaque materia ista siue ad intestina, siue ad quascunque membranas in ventre inferiore detrudatur, graues dolores excitat; sicut & si ad membranam costas succingentem effundatur, dolores acerbissimos, pleuritidem æmulantes, absque earum tamen partium inflammatione, excitare solet, ut testatur Eugalenus, & ipsa experientia. Sicut verò dolores illos pleuritidi similes non solum quantitas, seu copia humorum, sed potius acrimonia excitat: ita & humor, qui dolores hosce in ventre inferiore parit, non pura puta aqua est, sed salus & acris, ut antea docuimus.

Per quas vias  
humores hi  
ad ventrem  
ferantur.

Per quas autem vias humor hic ad hæc loca feratur, & quomodo dolor hic in Paralyfin degeneret, non ita planum est. Per venas id fieri *l. 2. in Inst. p. 3. s. 2. c. 5.* docuimus atque puto rem satis manifestam esse, & frequentissimè id accidere. Ex colo tamen etiam per melsaricas arterias humor iste regredi potest, & in artèriæ magnæ truncum transferri, atque inde ad lumbales arterias peruenire, quæ non solum sanguine turgescunt vicinos comprimere nervos, sed & aliquid serosi humoris ad eos affundere possunt. Carolus Piso à capite, tanquam feri receptaculo, humorem hunc in inferiora descendere statuit, docetque serum, quod vi caloris febrilis, aut vitalis, sed ab externo, siue ambiente per mutationem constitutionis eius commoti ebulliens sub sudoris, vel vrinæ forma confertim erupturum erat, in caput eleuatum per vasa soporaria ex eorum finibus

extremis exsudare, & effernescere, & partim quidem extorsum, partim introrsum ferri: ac extorsum quidem circa membranas, aut inter eas effusum, irruere, ac impetere vel principium neruorum spinalis medullæ, vel principium sexti, seprimivè parium, atque alterutrum implere, ac distendere copiâ, & feruore, & secum tum nervos appendices, tum verò pariter membranas adnatas; aut feruore deposito descendens, & decurrens fisti in lumbis, atque nervos inferioris ventris, & maxime originem mesenterij, & peritonei opplere, corrugare, & secum reuellere, & distrahere, quæ finibus adnascuntur membra, id est, in quibus terminantur, & implantantur, intestina scilicet, & reliqua in aluo contenta, easque violenta contractione dolorem in iis excitari.

Verum enim verò ut hæc pleraque ita fieri quandoque non negamus, & præcipuè dolores illos vagos, qui in brachiis, lumbis, & aliis externis partibus percipiuntur, ex sero à capite, nocturno præsertim tempore, descendente originem habere concedimus: ita hosce dolores in ventre inferiore semper hoc modo excitari necessarium non putamus. Nam cum hi dolores præcipuè febribus superueniant, ut ipse testatur Carolus Piso, quarum focus in viscerum, partiumque vicinarum vasis hæret: certè ex iis vasis longè propior via est ad intestina, & membranas vicinas. Præterea cum dolores hos non præcedant affectus capitis, Epilepsia, Lethargus, paralytis, sed sequantur eos: credibile est, non ex capite materiam ad ventrem inferiorem descendere, sed potius, si in ventre inferiore exitum non inueniat, ad superiora regurgitare.

Multò minus credibile videtur, quod idem Piso statuit, serum adhuc neruorum principium obsidens per eorum corrugationem longè distans, sed tamen adnatas partes conuellere. Quomodo enim probabile sit, extremos nervos conuelli, ut medij non conuellantur? probabilius mihi videtur, secundum ductum neruorum illam materiam in capite collectam descendere, & vel eos madefaciendo, emolliendo, aut stupefaciendo Paralyfin, vel vellicando dolorem, & conuulsionem excitare. Neque obstat, aut Caroli Pisonis opinionem satis confirmat, quod & capitis affecti signa cum dolore ventris in viuientibus animaduertuntur, & in cadaueribus sero caput ac principium neruorum obsessum deprehensum est. Etenim idem serum in corpore abundans diuersa loca corporis occupare potest. Neque sequitur, si feri in capite abundantis adsint indicia, vel in cadauere id reperiat, quod etiam dolor colicus, qui cum capitis & neruosi generis symptomatibus coniunctus fuerat, ab illo ipso sero prouenerit. Sed facile serum in ventre inferiore simul abundans ibi quoque dolores excitare potest. Præterea serum est mobile, & nunc versus inferiora, nunc versus superiora facile mouetur. Quid enim prohibet, ut eiusdem Caroli Pisonis verbis utar, feri in vasis ebullientis vnam partem quidem rapi in caput, & ibi dolores vel alia symptomata excitare, reliquam ad renes vel etiam ad intestina, & ibi vias, per quas labitur, distendendo, & membranas vicinas in consensum trahendo dolorem excitare?

Quandoque & hypochondriorum nunc vnum, nunc alterum dolore obscuro afficitur à delitescentibus intus flatibus, & exitum non habentibus; qui dolor non vno loco circumscriptus hæret, sed modò in lumbos, & inferiora corporis, modò per vniuersum corpus oberrat.

Excitatur & in lumbis sæpe dolor à sanguine vitioso in venis ed loci contento. Ut enim ex nimia sanguinis abundantia, vel humoribus prauis in vena magna lumbari contentis ante variolarum & morbillorum exortum, in feminis in suppressione mensium, & ante

Dolor hypochondriorum

Lumborum

ante mensum fluxum, in viris in hæmorrhoidum suppressione, dolores in lumbis excitari solent: ita & in hoc malo sanguine vitioso in eadem vena hærente dolores in lumbis excitantur, & homines quasi elumbes redduntur. Quod malum, quia eo affecti vix progredi, & se de loco mouere possunt, Græcis λόρδωσις, Latinis Lumbago appellatur. Poteest tamen & originem habere hoc malum per modum catarrhi à capite per venas in spinalem medullam descendantis, & proinde sæpe à scapulis incipit, & sensim ad lumbos serpit, & interdum etiam ad os coxendicis descendit. Dolorque hic æstate, vt quarrana, est breuior; Autumno longior, & præcipue si vsque ad hyemem extendatur, Et si humor acrior sit, qui à capite defluit non solum in spinam, verum etiam in acrobata ossis coxendicis, tabem dorsalem, & grauissimos dolores, qui nullum requiei tempus concedunt, excitat, ægerque marcescit, & contabescit, lentaque morte encatur.

Lumbago.

Dolores Nephritici.

Dolores quoque Nephritici similes Scorbuticos quandoque infestant, dum materia Scorbutica, circa lienem & vicina loca hærens, per arterias emulgentes confertim ad renes & vias vrinæ tendit; aut dum serum scorbuticum in corpore quacunque de causa congestum, accedente inprimis causa aliqua externa, vt aquilonis flatu, ad maiora vasa, & hinc ad renes confluit, & quicquid ibi vel in viis, fabulosa, arenosa & tartarea vel etiam calculosa materia reperit, secum ad easdem vias rapit. Quæ materia dum in transitu vasa & meatus vrinæ euacuandæ destinatos distendit & vellicat, dolores è regione pubis, circa os sacrum, lumbos, vel etiam vmbilicum sentiuntur, partibus hæc ob communem è peritonæo membranam in consensum tractis. Et tum plerumque vrinæ impensè rubræ aut potius atræ eminguntur, quæque, nisi diligenter considerentur, pro cruentis habentur, & è renibus à calculo præsentente laxis provenire creduntur: cum tamen tales vrinæ turbidæ & ex rubro nigricantes, ac multam tartaream materiam secum vehentes, reddi possint, calculo non præsentè, & sine renum vulnere vel vlcere. Quanquam hoc negandum non sit, si materia talis sæpius ad renes confluat, ibique eius aliquid subsistat, tandem calculum inde generari posse.

Dolor Capiti.

Nonnullos etiam, atque eos præcipue, qui ex hæmorrhoidum suppressione hoc malum contraxerunt, circa vespèram dolor, & calor in capite infestat, ex vaporibus illis ad caput adscendentibus, & tota postea nocte calor quidam præter naturam, instar febrilis, in toto corpore percipitur, qui sudationibus matutinis euanesceat.

Dentium.

Dentium præterea dolor frequens, & præter rationem recurrens, nonnunquam & continuus, hoc malum sæpe comitatur, & non raro Scorbuti præludium est, qui non eodem loco persistit, sed vagus est, interdum dentem nunc hunc, nunc illum relaxat, qui rursus sponte firmantur, dolore, & tumore discussis, vt observauit Eugalenus, obs. 40.

Pleuritis.

Affligit & Scorbuticos interdum Pleuritis quædam falsa, à vera Pleuritide non parum differens. Etsi enim dolor non minus grauis sit, quàm in vera Pleuritide, vt æger, quò se vertat, nesciat, & ne momentum in loco eodem quiescere possit: tamen dolores hi sunt sine omni inflammatione, ortumque habent saltem à vapore acri, vel seroso humore ad membranas externas effuso. Ideoque ægri neque tussunt, neque quid expuunt: nisi quid à capite destillet, dolor quoque non est continuus, sed per intervalla recurrit: pulsus non, vt in vera pleuritide, durus, sed parvus, mollis, & inæqualis est; vrinæ scorbuticorum propriæ; febris etiâ, si coniungatur, non acuta est, vt in vera Pleuritide, sed lenta; cum in vera Pleuritide sit magna, & acuta. Respiratio insuper non admodum læditur.

Dan. Sennert Tom. II.

Eodem modo & Arthritis quædam Scorbutum sæpe comitatur; quæ tamen & ipsa non in vno loco ad morbi solutionem subsistit, sed vaga est, & subinde in aliud atque aliud eiudem, vel etiam oppositi lateris locum transit, præcipue si topica frigida, vel repellentia adhibeantur; ita quidem, vt qui iam integrè sanitati restitutus, & dolore omni liber videbatur, præter spem & improniso iterum dolore, cum &, sine tumore, corripitur: cum Arthritis ab antiquis descripta locum raro mutat, sed ad solutionem vsque membrum, quod primo apprehendit, obsideat. Est etiam huic Arthritidi hoc peculiare, quod plerumque cum leui Paralyfi coniuncta est, ob quam membrum affectum loco mouere non possunt; quæ cum dolore cessat, & cum dolore redit, & in eandem partem, in quam dolor, migrat. Ad sunt præterea alia signa & symptomata scorbutici propria. Ortum autem habet ab humoribus serosis, tenuibus, & acris ad motum promptis, & ad locum mutandum aptis. Exempla sunt apud Eugalenum obs. 10. 11. 12.

Multa etiam symptomata in capite & nervoso genere accidunt, dum materia serosa ebulliens in caput ruit, aut vapores ex materia praua agitata in caput ascendunt, vel nervos & nervosum genus quocunque modo occupant. Hinc enim palaysis, tremor, conuulsiones & conuulsui motus, apoplexia, sopor profundus, deliria accidunt. Et præcipue hoc euenit in principio paroxysmorum in febribus, cum à calore febrili serum efferuescit, & vapores multi è materia agitata in totum corpus distribuuntur, præcipue verò in caput eleuantur: atque hinc etiam cessante febre symptomata ista vel mitigantur vel terminantur.

Primo sæpe crura ad motum impotentia, inepta, ac resoluta redduntur, imò nonnunquam alterutrum latus totum resolui, & subito quasi Paralyfi affici videntur. Sanguis enim ille ichorosus & vitiosus cum & naturaliter deorsum vergat, & à natura ad extrema ac ignobiles corporis partes amandetur, ac præterea ligamenta & tendines ac ossa naturali quadam inclinatione crassiores sanguinem ad se trahant: accidit, vt ligamenta, tendines, & musculorum substantia tali ichoroso sanguine imbuantur, atque inde crura debilia & ad ambulandum imbecillia reddantur, ac malo procedente & ingrauescente tandem resoluuntur, & ad motum impotentia fiant: quod malum σχιζοπρεσ dicunt; quæ species quædam χαλάρωσις est, aut, vt Langius, lib. 1. epist. 42. nominat crurum enervatio. Differt tamen non parum hæc resolutio à Paralyfi vera ab antiquis descripta. Nam primò etsi, vt Eugalenus hac de rescribit, vt in veterum Paralyfi, pedes transferendi, figendique robur, ac firmitas pereat: in plerisque tamen decumbentibus aliquis motus remanet, quo resoluta membra mouere, & ad musculorum capita leuiter ea attrahere conspiciuntur; id quod in Paralyfi antiquorum non accidit. Deinde à Paralyfi antiquorum differt, quod ea permanens, ac continuus affectus est, neque intervallum habet: in Paralyfi verò scorbutica sæpe accidit, vt qui pridè pedem vix loco mouere poterat, cruribus insistat, & leui adminiculo nixus ambulet, paulò post verò omni motu iterum priuetur. Sicut & eo à reliqua Paralyfi differt, quod illa ferè subito inuadit; hæc paulatim verò prius tentat, antequam sedem figit, & nunc partem apprehendit, nunc remittit. Sicut & nonnunquam & momentaneus stupor, ac leuis post somnum resolutio, hanc Paralyfin antecedere solet. Atque in eo quidem cum antiquorum Paralyfi conuenit, quod stuporem imminentis mali quasi initium habet: in eo verò differt, quod stupor hic non ita fixus, & diuturnus est, sicut ille, qui Paralyfin à veteribus descriptam antecedit, sed momentaneus, nunc remittens, nunc subito apprehendens. Accidit huic Paralyfi quandoque etiam Arthritis, & dolor, qui omnis ab

Stupor & paralyfis.

antiquorum Paralyſi abeſſe ſolet. Tandem etiam longè facilius, adhibitis idoneis medicamentis, & ſæpe intra paucos dies hæc reſolutio crurum curatur, cum antiquorum Paralyſis pertinaciſſimus morbus ſit.

*Paralyſis ex Colica ſcorbutica.*

Soler autem Colica quandoque, & dolores ventris grauiſſimi hoc malum præcedere, qui ubi deſinunt, Paralyſis iſta ſuccedit, de quo Eugalen. p. 114. Quas ob cauſas omnes affectionem hanc non tam Paralyſin, quàm paralyticam paſſionem nominandam cenſent. Eugalen. p. 98.

Cauſa autem huius rei eſt, quod in antiquorum Paralyſi cauſa mali in iſtis neruiſ fixius hæret, & pertiniacior eſt; hæc autem à vapore potius, qui ab humoribus corruptis attollitur, aut certè ab humore tenui, ac ichoroſo ortum habet. Atque hæc Paralyſis, vt diximus, non vni tantum membro quandoque accidit, ſed ſæpe alterutrum latuſ totum reſoluitur. Vbi tamen ante perfectam eius inuaſionem aliud arque aliud membrum priuſ tremor, & ſtupor tentat, ſed iſ non conſtans, verum qui ægrum ſubito apprehendit, & ſubito remittit: & poſt apprehenſionem, ac ubi æger iam decumbit, aliæ partes ſponte conualeſcunt, aliæ reſolutæ manent, & indies magis, reſoluuntur, vel etiam ad conuulſionem diſponuntur, & partes quædam, in quarum neruos vaporoſa, vel ichoroſa materia decubuit, iſis contractis, conuelluntur. Quæ omnia magis conſtat antegreſſa victuſ ratio, & vrina, ac pulſuſ Scorbuti propria. Quandoque & totum neruoſum genus ita debilitatur, & ſi curatio vel negligitur, vel non rectè inſtituitur, adeo ad omnem motum impotentia ægri redduntur, vt nec manus ad mouere ori poſſint, ſed ab aliis cibum ingeſtum ſumere neceſſe habeant, & toto vitæ tempore domi claudi deſideant.

Paralyſin hanc antecedere quandoque ſolent, vt poſtea etiam dicitur, tumores quauis parte erumpentes, qui eadem facilitate, qua oriuntur, euaneſcunt, & cum ortuſ ſui principio parti affectæ leuem & momentaneam Paralyſin inferunt, vt teſtatur Eugalen. pag. 109.

Qua ratione autem paralyſis ſcorbutica excitetur, & præcipuè quomodo dolor ventris ſcorbuticus in paralyſin mutetur, variè ab autoribus diſputatur. Hoc quidem verum eſt, & facile concedimus, paralyſin in Scorbuto à materia ad cerebrum, arque inde ad neruoſum genus tranſmiſſa, vt & tremores, conuulſiones ac conuulſiuos motus excitari poſſe. Verum ſi de paralyſi, quæ dolores illoſ ventris in ſcorbuto ſequi ſolet, queratur, non neceſſarium eſſe ſemper, vt materia primùm ex inteſtinis ad cerebrum, & hinc in neruos feratur, ſed propiores vias eſſe putamus, vt in *Inſtitut. lib. 2. part. 3. ſect. 2. cap. 5.* dictum. Hoc ſaltem hiſ addimus, aliam adhuc viam, per quam materia iſta ad ſpinalē medullam deferri, & paralyſin efficere poſſit, monſtrare recentiores Anatomicos, nimirum ramum quendam, qui ab arteria aorta, non longè à ramo meſenterico porrigatur, & ſerpat in ſpinam, cuiusque vertebras. Ab inteſtinis enim per arteriam meſentericam in arteriam aortam, tandemque per ramum hunc in ſpinalē medullam materia tranſferri, Paralyſinque efficere poſteſt.

Neque ab iſta ſententia nos illud dimouet, quod cerebrum motuſ omniſ animalis eſt principium, quodque, ſi per venas vel arterias materia transporteretur, in totum corporis habitum æquabiliter, non tantum ad artium muſculos diſfundi deberet; quodque humoreſ iſti neruiſ communicari non poſſe videntur. Etenim ſolum cerebrum ad motum non ſufficit, ſed nerui & muſculi etiam requiruntur. Deinde etſi materia iſta ſæpe ad varias partes pellitur: tamen à natura ad ignobilioreſ ſolet depelli, & peculiari ter neruoſo generi eam infeſtam eſſe, antea diximus. Sicut & hoc dictum, quod paralyſis iſta non eſt tam contumax, vt vera paralyſis, &

proinde vt iſtis neruiſ inhæreat opus non eſt, ſed ſufficit, ſi tali ichore ſcorbutico ligamenta, tendines & muſculorum ſubſtantia imbuatur, & partes neruoſæ ad motum ineptæ reddantur. Videatur Eugal. *obſeru. 17. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 42. 50.*

Tremorem etiam paralyſin quandoque antecedere modò dictum, & aliàs quoque quàm plurimis ſcorbuticis laborantibus familiarem eſſe ſcribit Eugalenus p. 119.

Conuulſiones præterea ſæpe totius corporis, aut potius conuulſiuus motuſ, & Epilepſia huic malo accidunt, vaporoſa aut ſeroſa materia, quæ ab humore maligno, aut peculiari modo, & ſpecificè corrupto attollitur, ad caput eleuata; quæ diſcuſſa ſæpe quaſdam inducias concedit, paulò poſt ramen iterum collecta & in caput eleuata idem malum excitat. Et hi conuulſiuus motuſ plerumque cum febre coniuncti ſunt, & eadem facilitate, quaprehendunt, remittunt, iterumque recurrunt. Et ſolent iſtas conuulſiones præcedere vel totius corporis conuulſio, vel tremor, vel paralyſis, vel brachia & manus obrigeſcunt quaſi, ſed breui tempore, & ſæpe præter omnem rationem ſubito in alium morbum, cataphoram, paralyſin, modò euaneſcentem, modò præter expectationem redeuntem tranſeunt. Quæ ſigna, in primis verò vrinæ turbidæ, & craſſæ huic malo propriæ, hanc conuulſionem à conuulſione antiquiſ deſcripta diſcernunt. Eugalen. *obſeru. 50. 54. 63. 69.*

Nonnunquam tamen particulares conuulſiones excitantur, vapore iſto prauo peculiarem aliquem muſculum, vel neruum occupante, eumque vel acrimonia, vel peculiari proprietate vellicante. Particulares autem iſtæ conuulſiones nonnunquam abſque febre ſunt, nonnunquam cum febris indiſciis, & nonnunquam poſt grauiſſimos dolores. Accidit interdum & triſtis membrorum omnium iactatio, & conuulſio cum leui reſolutione coniuncta. Pulſuſ in hac aliquando eſt magnuſ, quandoque duruſ, & rurſum paulò poſt mollis, ſemper verò in vno, ac pluribus pulſibus inæqualis, vrinæ inconstantia, vt obſeruat Eugalenus, *obſeru. 58.*

Quandoque membrorum ad mouendum impotentia ita, & quidem paulatim, incrementa ſumit, vt crura planè rigida euadant, tendinibus ad crus mouendum deſtinatis rigidis planè, & duris in poplite euadentibus. Quandoque malum ita inualeſcit, vt ægri nullum amplius membrum, vel articulum habeant, quem extendere poſſint, & quaſi in orbem, vel globum contrahantur: quo morbo nautæ ex longis, & moleſtis peregrinationibus redeuntes affectoſ, & contractoſ (hoc enim nomine potius tum, quam conuulſi, appellari ſolent) vidit Eugalenus, atque iſtud ſæpe ſaris diuernum fuiſſe teſtatur. Idem etiam tali ad poplitem retractionem obſeruauit, *pag. 94. obſeru. 13. 16.* Non credibile verò eſt, illud à vapore ſolum, vel totum neruoſi generis principium, vel partialem aliquem neruum occupante, ſed potius à rigiditate tendinum prouenire. Cum enim, vt ſuprà diximus, tartareuſ ille, qui ſero dilutus, humor etiam neruoſoſ, & tendines occupare ſoleat, ſi aqueuſ ille humor abſumatur, & diſcutiatur, ac craſſas partes deferat, eæ ibi relicte exſiccantur, vnde tendines indurantur, & rigidi redduntur; quod præcipuè in cruribus, & tendinibus cruris contrahentibus in ſcorbuto laborantibus vel tactu deprehendi poſteſt.

Hiſ reſolutionibus, conuulſionibus, & contractionibus accedit quandoque ſymptoma, rariuſ quidem, ſed quod obſeruauit ſemel atque iterum D. Salomon Albertuſ, & deſcripſit, *theſ. 112. de Scorbut.* quod ſcilicet nonnullis cardo opis, in quo gena inferior ſub via audiendi vertitur, non aliter, atque compago genuum obrigeſcit, iſdemque oſ ſtrictius conniunt, quominuſ in rectum queat diſpandi; ſqualido, tærenoque humore

*Tremor.*

*Conuulſio, Conuulſiuus motuſ, Epilepſia.*

*Contractio membrorum.*

*Genarum rigiditas.*



humore in iuncturam illam, & huius vincula, quibus maxilla inferior aurium radicibus affirmata est, quæque motum liberum, & expeditum cardinis modo maxillæ largitur, altius imbibito, atque infarcto. Idque non sine sensu doloris fieri docet, quem ipsa *τὸς* in articulo, & neruaceis corporibus ipsum circumdantibus excitat, quique inter manducandum, & oscitandum exacerbatur.

*Apoplexia.*

Apoplexia quandoque etiam, materia ad caput & cerebrum adscendente, excitatur. Quam apoplexiam etsi se nunquam vidisse scribat Eugalenus, pag. 123, testatur tamen ab amicis observatam fuisse. Et ipse memini, virum illum Nobilem, de quo infra dicitur, cuius gangræna scorbutica digitos pedum apprehenderat, apoplexia ista extinctum fuisse, quod euenturum prædixeram. Videantur etiam de his, quæ in *insit. lib. 2. part. 3. s. 2. cap. 5.* habentur.

*Cæcitas subitanea.*

Cæcitatem subitanæam, cæteris sensibus integris, vapore proculdubio crasso aut humore seroso principium nervorum optico-occupante, in studio quodam excitatam fuisse, supra dixi. Neque enim credibile est, humorem aliquem crassum istam obstructionem parere potuisse. Aliàs tam facile, & citò cæcitas illa non remississet.

*Sopor profundus & vigilie.*

Sopor quoque profundus nonnullos occupat, plerumque cum febre lenta continua, nonnunquam etiam intermittente, à vaporibus ad caput exhalantibus excitatus: sed qui continuus non est, verum cum paroxysmo advenit, eodémque recedente & ipse cessat. Alij contra ob falsos, & acres vapores ad caput adscendentes vigiliis infestantur, & si dormiunt, terrentur.

*Tristitia.*

Ægri sæpe sunt tristes, ob defectum spirituum purorum, ac lucidorum, & abundantiam vaporum melancholicorum, quibus spiritus inquinantur.

*Deliria.*

Ex iisdem vaporibus ad caput eleuatis non rarò deliria excitantur, quæ ut inopinatò inuadunt, ita sæpe facile remittunt: quæ non à talidibus vaporibus, ut in morbis acutis accidit, ortum habent, sed à vaporibus melancholicis, & malignis, spiritus turbantibus, ideòque non cum morbis acutis, sed lentis conjunguntur: quibus signis ab aliis deliriis discernuntur, ut & vrinis scorbuto propriis, crassis, rubris, absque multa siti, pulsu item & victu, quo usus est æger. Quale delirium & hæc aliquando vidi in scorbuto cum paralyti conjuncto, quod fœda crurum scabies, & vlcera præcesserant; ut & in altero, cui venam in crure apertam sanguinem copiosum fudisse, supra cap. 1. dixi; cui & in dorso maculæ efflorescebant, quique malum hoc ex fœtore cadaveris scorbuto extincti contraxerat.

*Memoria lapsa.*

Quod de deliriis dictum, idem de læsa memoria accipiendum. Læditur enim illa quandoque in scorbuto, & iisdem signis cognoscitur.

*Cordis palpitatio.*

Neque cor ab hoc malo semper immune est. Primò enim palpitatio cordis per intervalla recurrens à vaporibus hisce pravis & malignis ad cor exhalantibus interdum excitatur; uti id in quadam fœmina observavit Eugalenus, *observ. 3.* & ipse aliquoties annotavi.

*Lipothymia.*

Lipothymia deinde sæpe hoc malum comitatur, quæ nonnulli, teste Eugaleno, pag. 321. subitò extincti fuerunt, vaporibus hisce ad cor exhalantibus. Vnde lipothymiam pro certo signo habet Eugalenus, adeò, ut scribat, pag. 321. Qui in parvo, quantum ad sensum, morbo, ac febre, à qua decumbentes parum, aut nihil pati videntur, subitò, ac præter rationem animo relinquuntur, aut ad animi deliquium proni sunt, hos scorbuto laborare, certò tibi persuadere debes. Solet autem lipothymia hæc maxime ægros corripere, cum in lecto se erigunt, vel è lecto surgunt; motu procul dubio pravis illis & malignis vaporibus commotis. Estque illa interdum tanta, ut ægri subitò & inopinatò extinguantur; cuius rei notabilia exempla habet Eugalenus, *observ. 38.*

Pluribus quoque accidit, ut de obstructione ventriculi ad os usque instar pali totum œsophagi meatum obferante, & suffocationem minante, graviter conquerantur, uti refert Eugalenus, *observ. 11. 41.* Et id imprimis cibum sumpturis accidit, qui cum primum solum deglutituri sunt, in præsentissimo suffocationis periculo versantur; uti id ipse in duobus viris observavi, quorum alter hoc malo ita periculose affligebatur, ut sæpe affirmaret, se cibum sumpturum non minus metuere, quam eos, quibus carnifex laqueo ad suffocandum paratus adstat. Neque idem liberè, & absque suffocationis periculo cibum capere poterat, antequam dimidium cerevisiæ cantharum exhausisset. Is plerumque, ut suffocationis periculo sese liberaret, januæ parte superiore manibus prehensa, pedibus pendulis totum corpus concutere necesse habebat. Quod proculdubio accidit, vaporibus adstringentibus, & stipticis adscendentibus, & vel œsophagum distendentibus, & vicinam tracheam comprimantibus, vel tale quid inferentibus, quale pyra, & alij fructus austeri solent. Vidi alium, cui loquendi potentia auferretur, nonnullis apoplecticis quid esse existimantibus; cum potius partium linguam mouentium à vapore, vel seroso humore contractio, & quasi quædam convulsio esset; cum æger ipse postea referret, se eò loci dolorem, & contractionem quandam sensisse.

*Siturgula signum morbi.*

Appetitus quidem etiam sæpe in scorbuto deiici solet. Sed habet hoc cum aliis morbis commune, neque ipse peculiare aliquod indicium exhibet. Non rarò tamen etiam appetitus integer est: quod accidit pro diuersa humoris ex hepate, liene ac vicinis partibus in ventriculum confluentis conditione.

*Appetitus deiectio.*

Sitis verò hoc peculiare habet, quod sit nulla, aut nullius momenti, insignis verò corruptionis notas vrinæ exhibeat, præcipue si ab obambulantibus, & omnia vitæ munia sine offensione administrantibus tales reddantur, certissimum signum scorbuti sit, ut hæc de re Eugalenus, pag. 33. scribit.

*Sitit.*

Ructus perperui quandoque hoc malum comitantur, ut Eugalenus, *observ. 2.* docet. Et noui virum, qui hypochondriaca cum non leuibus scorbuti suspicionibus laborabat, qui continua sputatione, & ructibus ita molestabatur, ut sæpe intra horam vnâ arque alteram vel centies ructaret.

*Ructus.*

Quandoque cum hoc morbo conjungitur vomitus, imò humores sæpe, ut in cholera, supra, & infra deiciuntur, cum ventris doloribus, & torminibus: quandoque tamen nihil conatu illo dignum rejicitur, sed potius est inanis vomendi conatus. Talis autem vomitus ab aliis vomitibus dignoscitur, quod, præter alia scorbuti signa, nulla ventriculi grauitas, dolor, intemperies, aut aliud quid eorum, quæ vomitum præcedere solent, antecessit; quòdque æger etiam difficilis coctionis cibos & auidè appetuerit, & facile concoxerit: ac vomitus interdum præter rationem, & spem remittit, rursus tamen, atque ex improviso recurrit: neque ventriculum roborantia medicamenta aliquid auxilij afferunt; cum vi adstringendi materiam circa præcordia detineant, eamque altius imprimant. Et notat hoc etiam Eugalenus, pag. 22. & seqq. vbi pluribus de hoc symptomate agit, quod à lacte, & lacticiis, à quibus aliàs in simili affectione læduntur ægri, sæpe melius hic habeant, quàm ab omnibus ventriculum corroborantibus medicamentis; proculdubio, quod à lacte acrimonia & prauitas humoris ventriculum vellicantis demulceatur, & mitigetur. Eugalenus, *observ. 33. 35. 39. 43. 44. 45. 46. 49.*

*Vomitus & vomendi conatus.*

Est & scorbuticis familiaris copiosa, & continua saliuæ & sputi reiectio; quod generatur cum ex vaporibus, qui ex humoribus in locis ventriculo vicinis hærentibus ad os eleuantur; tum ex cibis maxima sui parte in ventriculo corruptis, & in eandem substantiam mutatis, & secundum ductum membranæ œsophagum

*Sputatio continua & salinatio.*

inuestientis in os euectis ; vnde etiam corpus ob alimentum defectum paulatim extenuatur. Inprimis verò saluationis huius copiosæ causâ est , quod serum & aqua illa , quæ partibus crassis vehiculum præbebat , è liene ad ventriculum effunditur , præcipue quidem per vas breue , sed & alia vicina vasa. Vnde & alij quidam melancholici creatores & saluatores sunt. Et hæc illa est pituita , quam nonnulli in melancholicis ponunt. Eri enim fieri possit quandoque , vt in morbi progressu , ac ventriculo jam valde debilitato , pituita aliqua generetur in ventriculo : tamen illud , quod à plurimis pro pituita habetur in melancholicis , est illa aquosa humoris melancholici pars , quæ è liene in ventriculum effunditur. Annotauit tales sputationis copiosæ historias Eugalenus , 4. p. 205. *observ.* 68. Idemque obseruauit in viro , cuius antea , mentionem feci , qui inter edendum continuò , & copiosissimè exspuebat , & frequentissimè roctabat.

*Alui fluxus.* Nonnunquam alui fluôr , & diarrhœa quædam in scorbuto infestat , qua feces nunc quidem compactæ , sed cogia ingestum cibum excedentes , coloris varij , nunc herbacei , nunc cineritij excernuntur ; nunc liquidæ confertim , & magna copia ejiciuntur. Differt hîc fluxus à lienteria , quod in lienteria cibus crudus , & inconcoctus dejicitur ; à diarrhœa verò vulgari , quod in ea dejiciuntur humores liquidi copiosi , & varij coloris , hic verò vel feces compactæ sunt , sed copia cibum ingestum excedunt , coloris nunc herbacei , nunc cineritij , aut si sint liquidæ , majori quantitate , & magis confertim , quàm in diarrhœa , fluunt , & nocturno ac diurno pariter tempore durant ; cum in diarrhœa dejectiones interdum magis fieri soleant , sicut in viscerum obstructionibus vesperi , & noctu.

Fluxus autem huius causâ plerumque est debilitas hepatis , & venarum , quæ alimentum , vt debent , non attrahunt , quod in primis viis relictum corrumpitur , & cum aliis humoribus miscetur , atque ita per aluum , excernitur. Deinde ipse etiam lien sæpissimè causâ est hujus fluxus , seu , vt Aristoteles , 3. de part. animal. cap. 7. loquitur ( sicut hunc locum corrig'it Cl. D. Hoffmannus , de usu lienis cap. 14. ) δια τὴν ἐν τῷ αὐτῷ πλῆθος τοῦ υἱόγονου , πολλοῖς καὶ κοιλίαι ὑγρὰί γίνονται τοῖς σπληνῶσι , ὡς τὰ σκληρὰ τοῖς λίαν ἐρηκτοῖς , διὰ τὸ ἀντηρισταῖν τοῖς υἱόγονοις : id est , ob humoris , qui ab intestinis ad lienem iuit , ad intestina refluxum , quibusdam aluus humida est. Cum enim lien plurimum aquæ attrahat , eandem ad aluum quandoque remittit , vnde fit aluus fluidior. Quod docet etiam Hippocrates , 6. aph. 43. 48. & 1. de morbis , de leucophlegmatia loquens.

Potest tamen etiam huc facere serosi humoris copia , si accedat aliqua causâ externa eum commouens , qualis est constitutio aëris autumnalis. Frigus enim cum poros cutis denset , facit , vt serum per eos , seu sudoris seu halitus forma , amplius euadere nequeat , & proinde ad intestina , quasi corporis sentinam , confluat. Imò frigus per corporis poros , qui adhuc à constitutione æstiuâ & calore meridiano ac tepore lecti patent , alius sese insinuat , & è vasis extremis serum , quod sanguini exactè commixtum non est , versus maiora vasa repellit. Quod dum per vias , quibus in ambitum corporis fluxit , refluit , & viscera ac ramos meseraicos & gastricos perfluit , quicquid ibi bilis & aliorum excrementorum inuenit , abstergit , ad intestina secum rapit ; vnde dejectiones aquosæ & ex parte biliosæ vel limosæ fiunt.

Nec à verò absonum , eosdem alui fluxus provenire posse à febre , dum scilicet à calore febrili serosus humor effervesceat , neque tamen per poros cutis clausos exhalare vel exsudare potest , vnde ad intestina confluit.

Quacunque autem de causâ , & quocunque modo generetur fluxus alui in scorbuto , hoc peculiare habet , quod adstringentia medicamenta planè noxia in eo

sunt & summam angustiam , spirandi difficultatem , ac animi deliquij & suffocationis periculum inducunt ; cum materiam vitiosam in venis detineant , & in viscera magis impingant.

Sæpe quoque fluxus alui sanguinolenti accedunt , *Alui fluxus sanguinolentus.* dysenteriam æmulantes , qui accidunt , cum sanguis crassus , & feculentus in venis abundans per extremitates earum in intestina desinentes in ea effunditur , & hinc per aluum non excrementis permixtus , sed ab his separatim , & ferè plerumque sine omni dolore , ac torminibus excernitur : qua ratione à dysenteria differt , & alia etiam scorbuti signa , angustiam , difficilem respirationem &c. conjuncta habet. Cuius rei notabile exemplum superiore anno in studioso quodam hîc obseruauimus , qui cum febre continua , & malignam æmulante laboraret , non tamen obscura scorbuti signa haberet , & victus ratione scorbutum generando apta usus esset , urinas scorbuticas , pulsum paruum , ac debilem , summam angustiam , febrem lentam , & malignâ longè diuturniorem , sitim ferè nullam , etsi lingua fissuras etiam contraheret , haberet : in morbi progressu copiosissima sanguinis sinceri per aluum dejectio secuta est ; quæ procul dubio accidit , quod cum natura humorem vitiosum per aluum deicere conaretur , orificiis venarum apertis simul sanguis effluxit , sicut sæpe in hæmorrhagiis narium criticis natura vitiosos humores sine sanguine euacuare non potest. Post hunc sanguinis fluxum indies quidem melius habere cœpit , sed longè tardius , quàm post crises , quæ in acutis , & malignis febribus contingunt , accidere solet. Tandem febre cessante ipsa stomacace scorbutum apertissimè prodidit , quæ febrem hanc cum insignioris fœtore secuta est grauissima ; quæ tamen & ipsa tandem idoneis remediis adhibitis cessauit.

Aluus contrâ in scorbuticis sæpe adstringitur , vt annotauit Eugalenus , pag. 20. & Forestus , lib. 20. *observ.* 11. vt etiam in aliis melancholicis & hypochondriacis fieri solet , qui plerumque sunt alui siccissimæ , vt vix post tertium aut quartum diem semel dejiciant. Cuius rei causâ est , quod aquea illa humiditas , quibus feces dilui debent , aliò , ad lienem scilicet & renes , transferuntur : & melancholici illi ac scorbutici , quibus aluus siccior est , aut plurimum mingunt , aut plurimum sudant , quod aliàs etiam fieri consuevit , vt ex 4. aphor. 83. patet. Quandoque tamen alui illam pertinacem , & quæ sæpe nullis medicamentis cedit , adstrictionem prouenire putamus ab intestinorum reuulsione , & retractione sursum facta , de qua supra , de dolore intestinorum , diximus. Quod vel ex eo patet , quod nullum præsentius hujus doloris , & alui adstrictæ est remedium , quam diuulsionem , & retractionem membranosi generis relaxare , & potenter humectare.

Vt in quartanarum declinatione sudores copiosissimi sunt : ita & in scorbuto sæpe sudores copiosissimi fluunt , qui etiam media hyeme sub leuissimis regumentis erumpunt. Aquosus enim humor , quem lien copiosius attrahit , non solum per urinam , sed & per sudores sæpissime euacuatur : cum sit eadem sudoris & urina materia. Et cum illæ anxietates plurimos affligere soleant , non cessant , nisi vapores illi prauis per sudores discutiantur. Sequiturque plerumque sudores istos copiosos *Alui fluxus.*

Hæmorrhagiæ quandoque etiam in scorbuto accidunt , procul dubio sanguine seroso , & salso , imò prauo , & corrupto naturam ad excretionem stimulante. Et quidem narium hæmorrhagia frequentior esse solet , & sæpe scorbuticos affligere. Rarius est , quod à me obseruatum , supra etiam relatum , venam in crure apertam copiosius sanguinem per aliquot dies fudisse , etsi vix orificij vestigium appareret. Idem in labiis accidisse , obseruauit Clariss. Dn. D. Döringius , vt supra dictum.

*Menses albi,  
semen aquo-  
sum.*

Fœminis menses subsistunt, & pro menstribus fluxu albo, salso, & acri laborant, quo viri facili inficiuntur. Viri etiam ad generandum inepti redduntur; cum semen aquosum, & vitiosum in iis generetur.

*Color faciei.*

Facies fit pallida, & liuida quasi, aut ex pallido in fuscum vergit, & maximè interdum labia, & palpebræ, attestante id Eugaleno, *obseru.* 8. 18. 19. Etenim cum quales sunt humores in corpore, talis sit color in cute, sanguisque in scorbuticis non purus sit, sed nigris, & ichorosis humoribus inquinatus: talem colorem in facie excitari, mirum non est. Nonnunquam tamen, & per intervalla quædam, facies rubore, & colore quodam, sed subito iterum euanescente perfunditur: Germani appellant, *ein fliegende Hitze*, ex vaporibus calidis è colluue humorum, qui in hypochondriis, præcipuè circa hepar, hærent, eleuatis.

*Uteri.*

Quandoque icterus scorbutico coniungitur. Anno superiore oblata est mihi fœmina curanda, quæ febrî continua cum ictero, & grauissima cardialgia laborabat, cuius corporis constitutionem cum diligenter perenderem, subesse ex vrina & angustia pectoris scorbutum suspicatus sum. Neque fefellit me opinio. Paulò post enim maculæ copiosæ in tibiis & pedibus eruperunt. Habuit ille icterus ortum non ex obstructione vesiculæ fellis, sed ex flauo humore in hepate, à colluue scorbutica læso, copiosius genito, & in totum corpus effuso. Quæ facili, atque intra paucos dies curata est, medicamentis antiscorbuticis cum hepaticis moderatè frigidis mistis. Curaui & aliam fœminam, quæ cum quartana laborasset, & scorbuti non leuia indicia haberet, faciei, & corporis totius color, qui in sana erat floridus, in liuidum, & nigrum mutatus est, & non absimilis nigro ictero euasit.

*Odor corporis  
& anhelitus.*

Solet interdum totum corpus odorem grauem, præcipuè sudantibus, spirare. Et halitus oris ferè omnibus scorbuticis fœtet, vt adstantes eum vix ferre possint, & nares auerrere cogantur, vt qui sæpius cum scorbuticis conuersatus est, non leue hinc scorbuti indicium capere queat.

*Horror.*

Horrores præterea frequentes, quos nullus, aut quam minimus calor sequi solet, interdum scorbuticos inuadunt, & eodem die interdum bis, vel etiam sæpius inuadunt. Eugalenus, *obseru.* 1. 48.

*Calor nocturnus.*

Accidit etiam interdum calor p. n. febrî non absimilis, qui nocturno tempore plerumque inuadit sine vllo horrore, frigore, vel rigore, duratque vsque ad tempus matutinum, & plerumque sudore superueniente discutitur. Distinguiturque à febrili calore, tum quod sine rigore, aut frigore inuadit, tum quod certa intervalla more quotidianæ obseruat, nec tamen proprietates quotidianæ habet. Acciditque procul dubio, cum vapores, & serosæ humoris melancholici partes nocturno tempore commouentur. Et frequentissimè accidit, cum chylus in ventriculo elaboratus ad lienem & vicinas melsaraicas defertur.

*Febres.*

Non raro, & fortasse frequentius, quam multi opinantur, febres scorbutico coniunguntur; sicut & quandoque in scorbutum degenerant. Plurimæ enim febres, quæ hic ægros infestant, omnes notas febrium, à Græcis & Arabibus descriptas non obtinent, & proinde suspicionem non leuem de latente scorbutico, vel dispositione ad scorbutum sæpe præbent. Sunt autem febres ex varijs generis. Quandoque enim sunt lentæ, & continuæ; quandoque intermittentes, sed quæ signis & notis intermittentiū febrium ab antiquis descriptarum destituuntur, nisi quod typum quendam quotidianæ, vel tertianæ, vel quartanæ referunt. Quandoque etiam nullum typum obseruant, & interdum bis de die, aliquando ter, quateruè inuadunt; interdum post 3. 4. 5. 6. 7. diem frigore, & horripilationibus quibusdam, vt appellant, ægrum molestant, nullo ferè calore subsequente, vt annotauit Eugalenus, *obseru.* 1. 48. 49. Interdum tamen, eodem teste, pag.

42. æstiuans calor subsequitur, cum multa ad præcordia anxietate conjunctus, non infido mali huius sympromate. Ideoque omnia febrium signa & symptomata diligenter perpendenda, & cum signis febrium ab antiquis descriptarum conferenda, neque febres istæ dierum numero & accessionibus, sed signorum proprietate æstimandæ sunt. Tum enim in frigoris sensu, & duratione, caloris qualitate, & duratione, & superuenientibus raris, ac à veteribus non enumeratis malis & symptomatibus, magna inter has febres, & à veteribus descriptas intermittentes apparebit differentia.

*Febriū scor-  
buticarū ab  
alijs differē-  
tia.*

Nam primò frigoris sensus, præter aliarum febrium morem, satis diu sæpe ad sex vel septem horas extenditur, antequam calor febrilis erumpat.

Deinde pulsus præter rationem febris est rardus, debilis, & inæqualis, in declinatione præcipuè; aliàs circa vigorem magnus, & durus est: vrina, qualem in scorbutico esse diximus. Ideoque si in loco, vbi aliàs scorbutus non rarus est, vel præcedentibus causis scorbutum generare aptis, quis cum vrinis crassis, rubris, & fuscis febricitare cœperit, pluribus subsidentibus in fundo apparentibus, à quibus tamen vrina super eminens nihilo clarior redditur, sed crassa, turbida, & subalbida vel rubra manet, non leuem scorbuti suspicionem suggerit, & non vnus, sed plurium humorum simul corruptorum talis vrina indicium est. Mutationes etiam vinarum variæ latentem scorbutum denotant. Sæpe enim in febribus hisce vrinæ variæ sunt, modò tenues, & citrinæ, modò crassæ, turbidæ, aliquandò rubræ, & post iterum tenues, iterumque crassæ, & conturbatæ. De quibus Galenus, 4. *de rat. vi& in acut.* docet; variam, & facilem vinarum permutationem plures affectiones denotare, quæ nec eandem curationem, nec idem solutionis tempus habent. Cum talibus ergo vrinis si pulsus paruus, debilis, & inæqualis, vel magnus, durus, & ferratilis, absque membranæ alicuius ossibus adhaerentis inflammatione, percipiatur, non leue etiam scorbuticæ febris indicium est.

Præterea initio accessionum plerumque tantæ sunt membranarum, crurum, aliarumque partium vellicationes, vt diuelli, & dilacerari carnes sibi conquerantur. Eugalenus, p. 214. *obseru.* 45. Dolores isti si in pedibus abunt, adsunt tamen in dorso. Ita in quibusdam frigoris sensum, ac si frigida intus ad spinalem medullam effunderetur; in quodam retrò ad dorsum sensum caloris, in anteriore corporis parte sensum frigoris obseruauit Eugalenus, pag. 43.

Rara quoque, & à febribus ab antiquis descriptis, & quæ in locis, vbi scorbutus notus non est, conspiciuntur, planè aliena symptomata in febribus hisce scorbuticis animaduertuntur, motus nimirum conuulsui, lethargus, varij & vagi dolores, & febrium harum in alios morbos præter rationem mutationes.

Frequentissimè autem cum scorbutico coniunguntur febres tertianæ; quæ licet nothæ sint: tamen signa tertianarum ab antiquis descriptarum non habent omnia, sed istis, quibus diximus modò, notis ab iis discrepant; tum etiam hoc, quod siue alternis, siue singulis diebus inuadant, tertianarum simplicium, aut duplicium modo, nullus vel horror, vel rigor, imò sæpe nec frigus vllum in iis sentitur. Inprimis verò vrinis ab alijs tertianis faciliè differunt: quod in veris tertianis febribus vrinæ in initio sunt tenues, citrinæ; & ad monstrandam jam incipientem humorum coctionem nonnunquam nubecula sufficit: in febribus verò hisce scorbuticis vrina crassa est, & diuersarum partium. Et quamuis in tertiana notha etiam vrinæ crassescant, & crassum sedimentum tandem subsideat: tamen id fit in febris declinatione, & coctionem significat; cum in scorbuticis hisce febribus tales vrinæ crassæ in principio appareant, & extremam humorum cruditatem significant. Ita etiam Hippocrates, 2. *prognost.* 27.

& Galenus, 4. aphor. 71. cum urinas rubras cum rubro sedimento ad fundum marulæ subsidente longiores quidem morbos designare, sed sine periculo esse dicit; id saltem de urinis intelligendum, cum sedimento subsidente urina planè clara, & pellucida euadit, & propterea coctionem, & naturæ contra materiam morbosicam victoriam significat: in hisce scorbuticis urinis etsi quid subsideat; rubræ tamen partes crudæ, & inconcoctæ supereminentes urinam turbidam reddunt; Idque summam cruditatem indicat, & morbum, qui non absque periculo est, eiusque incrementum significat: obseruatumque, plures cum talibus urinis scorbuto laborantes præter medicorum expectationem extinctos fuisse. Tertianæ scorbuticæ exempla sunt apud Eugalen. *obseru.* 51. 52. 53. 54. Neque ab hisce febribus discrepare videntur eæ, quas describit Carol. Piso, *de morb. à colluvie serosa, obseru.* 66. 67. 68. 69. Et tales febres scorbuti suspicionem conjunctam habentes sunt plerumque tertianæ, quæ sub tempus verum inuadunt, & post septimum paroxysmum quotidie affligunt: id quod ex pulsu & urina apparet.

Quartanæ ut aliquando in scorbutum degenerare solent: ita sæpe cum eo conjunguntur. Quæ etsi typum quartanarum obseruant: signis tamen aliis plurimis ab iis discrepant. Neque horrore, atque calore quartanæ respondent; sicut nec pulsu, qui etiam in ipso paroxysmi vigore paruitatem, ac inæqualitatem retinet. Et ipsæ urinæ tales, quales scorbuto propriæ, apparent. Vide Eugalen. *obseru.* 56. & Carol. Pisonem, *de morb. à colluv. serosa obseru.* 91. 92. 93. Neque enim febres hæ à Pifone descriptæ Scorbuticis dissimiles sunt.

Quotidiana.

Occurrunt quandoque quotidianæ febres, quæ tamen neque tertianæ duplicis, neque quotidianæ ab antiquis descriptæ notas & symptomata habent. Frigus enim plerumque est lentum, & longum, ad sex, septem, vel plures horas durans, in vigore sitis magna, urinæ variæ, pulsus parvus & inæqualis in accessionis initio & extra accessionem, in vigore magnus & durus. Adest procliuinitas ad lipothymiam, quoties se æger mouet, angustia ad præcordia, & alia scorbuti signa. De quibus Eugalen. *obseru.* 57.

Continua.

Cum verò materia scorbuti causa non semper primis viis coercetur, & includatur, sed non raro in venam cauam, & arteriam magnam effundatur, atque ibi corrumpatur, ac putrescat; id quod sæpe ex sanguine, venæ sectione emissio, apparet, qui liuidus, & viridis quasi conipicitur: etiam febres continuæ excitantur, & scorbuto conjunguntur, quæ tamen & ipsæ ab aliis continuis non parum differunt. Nam febres hæ continuæ scorbuticæ mitiorem calorem habent, & minori cum siti, ac inquietudine sunt conjunctæ; aut si hæc sint grauiora, tamen anxietas per intervalla recurrens, & ad præcordia molesta, & pulsus tardus, ac inæqualis febres has faciliè ab alijs febribus continuis discernit. Quibus si accedant urinæ crassæ & subrubræ, cum crasso, subrubro, ac graui, & inæquali sedimento, & sitis minor sit, quam pro putredinis magnitudine, signum hoc multò firmitus est. Vid. Eugalen. *obseru.* 62. 63.

Frequentissima autem ferè est febris ex continuæ & tertianæ intermittentis typo mista. Neque enim tales febres, etiam hic locorum satis frequentes, tertianæ intermittentes vel puræ vel nothæ sunt; utpote quæ ad puram *anapæsiæ* nunquam deueniunt; neque etiam tertianæ continuæ; cum hæ sine omni frigore, rigore aut horrore exacerbentur; in istis verò vel singulis vel alternis diebus frigus percipiatur, aliæque symptomata conspiciantur, quæ modò enarrauimus, & neque in continuis neque in intermittentibus tertianis apparere solent.

Pestilentes.

Imò interdum & pestilenciales, & malignas febres

hæ scorbuticæ æmulantur, & maculæ illæ purpureæ, & nigrae, sicut & tumores in inguinibus erumpentes, incautis imponunt. Verum qui causas, quæ præcesserunt, & omnia symptomata diligenter considerat, has febres à pestilentibus, & malignis discernit. Nam & symptomata sunt mitiora, & faciliè urina, & pulsus antè descripti à pestilentibus febribus eas discernunt; & sunt diuturniores hæ febres, quam veræ pestilentes, atque accedunt alia signa, quæ scorbuto magis propria sunt, quam pesti, ut nervorum resolutio, & anxietas summa circa præcordia. Quæ etsi in pestilentibus febribus quandoque etiam animaduerratur: tamen non ita, ut in peste, illa est continua, sed interrupta, ob vapores non continuo adscendentes ex hypochondriis. Atque hæ febres quoque non sunt Epidemice, sed Sporadice, & longius, quam pestilentes, extenduntur. Neque mirum est, quod febres scorbuticæ pestilentes æmulantur. Humor enim Melancholicus, præcipuè si putrescat, est pessimus, & varia, pro humorum admixtione, symptomata & morbos inducere solet. De quibus Eugalenus.

[ Duo morborum genera castris familiarissima sunt, febres malignæ, pestilentes, & ipsa pestis, & Scorbutus. Et quidem de peste ac febribus malignis nulum dubium est: faciuntque plurimorum historicorum libri eius rei mentionem; & nomen morborum Castrensis inde sæpe malignæ febres sortitæ sunt: interdum & à loco nomen acceperunt; vnde morbus Vngaricus dictus, qui nihil aliud fuit, quam morbus Castrensis, & febris maligna ac pestilens, in Vngaria in castris orta, & inde per totam Europam penè disseminata. Et in bello isto Bohemico-Germanico vix exercitus fuit, in quo non malignæ & pestilentes febres, imò ipsa pestis grassata fuerit, quæ non modò tot millia militum, sed & rusticorum ac ciuium trucidauit, & pagos ac vrbes incolis spoliauit. Et quid hoc mirum; cum in fame, quæ plerumque castra premit, cibos quosque obuios milites comedant, potu salubri destituantur, cæli & aëris iniurias sustinere necesse habeant. Hinc enim humores corrumpuntur, vnde primò malignæ, deinde pestilentes febres, & tandem ipsa pestis exoritur.

Scorbuti verò, etsi qui morbos Castrenses descripserunt, plerumque mentionem non faciunt: tamen procul dubio non rarus est inter milites: id quod diæta militum ad scorbutum generandum aptissima satis docet: quanquam non semper agnoscitur. Sic & apud Antiquos hoc nomine non obuius, re ipsa tamen non ignotus fuit, ut in *Tract. de Scorb.* diximus. Atque in hac sententia me confirmauit Frider. Vander Mile, in *tract. de morb. Bredan.* qui in ea obsidione duos præcipuè morbos grassatos fuisse scribit, Pestilentiam, & Scorbutum: & anno 1625, 20. Martij, 1628. Scorbuto laborantes milites præfidiarios Bredæ inuentos esse refert. Verum pestilentiam illam & scorbutum, ut morbos distinctos, describit. Ego verò febres malignas & pestilentes cum Scorbuto coniungi posse existimo; atque id me experientia cum aliis, tum hoc anno 1636. docuit. Id quod ab aliis annotatum non memini, nisi quod Seuerinus Eugalenus, *de Scorbuto titul. de febribus pestil.* talium febrium mentionem facit, quas tamen potius ad Scorbutum, quam pestem referre videtur. Ego verò vtrumque morbum coniungi posse puto, neque sine ratione; cum vterque ex eadem ferè causa proueniat, prauis nimirum cibis, & alijs, quæ bellum secum fert, incommodis; quibus deinde & contagium accedit; quòd cum pesti & scorbuto commune sit, vterque morbus per id disseminatur; id quod hoc ipso anno, mense Ianuar. & seqq. hic & in vicinis locis accidit. Cum enim miles fame & frigore, & aëris iniurijs penè enectus, in hoc oppidum & vicina loca in hyberna deduceretur, & magna militum pars ægrotaret, non solum alij milites,

De Febrium  
malignarum  
& Scorbuti  
cõplicatione.  
Morbi duo  
Castris fami-  
liares: Febres  
pestilentes, &  
Scorbutus.

Scorbutus.

Sapissime hi  
morbi cõiun-  
guntur.

sed



sed & ciues, eorumque liberi & familiae, eodem morbo corripiti coeperunt, ut vix domus esset, in qua milites erant, in qua non aegri aliquot decumberent, & plurimi etiam morerentur.

Morbi speciem quod attinet, erat ea febris continua, sine frigore plerumque, sed saltem cum lassitudine inuadens. Quae etsi plurimos enecaret, plerumque tamen terminum acutorum excedebat, & nonnulli circa finem tertiae septimanae moriebantur; eorum vero, qui conualescebant, vix quisquam ante finem tertiae septimanae euadebat: multi etiam ad sextam septimanam decumbebant. Et quod mirum, nonnulli ter, quater, imò pluribus vicibus, cum iam sibi bene valere viderentur, recidiuam pariebantur. Urinae vix in vlllo turbabantur, sed erant rubrae, crassae. Plurimi vigilabant, & delirabant, à quibus pauci euadebant. Indicia scorbuti etiam satis clara erant. Erumpebant enim maculae, non petechiae, sed verè scorbuticae, nonnullis etiam tertia demum septimanæ. Sudores nonnullis erant foetidissimi, ut foetor ab adstantibus vix tolerari potuerit. Et quidem multi sudabant, sed tamen inde non conualescebant; quod non fit in simpliciter acutis. Quidam etiam iuuenis hæmorrhagiam narium patiebatur, & sanguis (quod nunquam aliàs obseruauimus, nec à quoquam obseruatum meminimus) qui è naribus stillabat, erat tam foetidus, ut adstantes odorem vix ferre possent. Et alia etiam apud nonnullos septimam septimanam scorbuti apparebant indicia, ut circa ventriculum & cor angustia, & multæ aquosæ materiae sine tussi exspuitio.

Neque mirum est, talia accidere posse. Non parum enim interest, quomodo corpus, quod febre maligna, per contagium præcipue corripitur, sit dispositum. Nam si corpus antè sit bonæ constitutionis, & humoribus prauis vacet, atque è contagio saltem febrem contrahat, longè alia febris idea erit, quam si corpus antè iam dispositionem scorbuticam habens, eadem corripitur. Cum enim à putredine febrili illi ipsi humores ad scorbutum dispositi exasperentur, accidit ut postea symptomata febris malignæ & scorbuti miscantur, & febre iam maximam ex parte victam, scorbutus remaneat, aut scorbutus etiam febrem prolonget, & ut extra terminum acutarum consuetum protrahatur, faciat.

Non solum autem febribus continuis, sed & intermittentibus, scorbutus quandoque miscetur. Anno 1634. M. Iulio, frequentes satis fuerunt febres tertianæ epidemicae, in primis nothæ, sed mali, præ quam aliæ esse solent, moris, pertinaces, comitatae variis symptomatibus. Erant enim per eas hæmorrhagiæ narium frequentes & copiosæ, angustia pectoris, & summa respirationis, sine vllis affecti thoracis signis, difficultas, vlcera ichorem foetidum fundentia, tubercula pruriginosa alba per totum corpus subito prorumpentia, iterumque disparentia. Urinae erant variae, modò tenues, modò crassæ, modò cum laudabili enazemate, plerumque cum sedimento pulueri laterum simillimo copiosissimo, omnes rubrae. Curaui etiam aliquando Studiosum, febre tertianâ intermittente laborantem, cui omnia, quæ febre tertianæ debentur, medicamenta adhibui, sed frustra. Tandem maculae nigrae in cruribus apparebant, quod cum viderem, medicamenta antiscorbutica admiscui, & febris paulo post cessauit.

Itaque quotiescunque febres seu continuæ, seu intermittentes, symptomata febre illi non propria habent, & curatio ex voto, etiam si omnia exactè fiant, non succedit, diligenter perpendendum, an causæ scorbutum generantes præcesserint, ægetque ad scorbutum dispositus fuerit. Symptomata quoque omnia diligenter consideranda, & an scorbutici aliquid lateat, inuestigandum. Tale enim quid si animaduertatur, antiscorbutica medicamenta medicamentis ad febres de-

stinatis admiscenda, putà succus, conserua, aqua, spiritus, essentia cochlearia, & aliorum antiscorbuticorum medicamentorum, absinthium, mistura simplex. Neque etiam è fraxino medicamenta inutilia sunt.]

Variae quoque tumorum differentiae, materia ad ambitum corporis protrusa, vel ruente excitari solent. Quandoque enim facies intumescere, & inflari subitò solet; qui tamen tumor itidem faciliè euanescit.

Sæpe impetu quodam serosa materia deorsum ruit, quæ cum à calore partium illarum, utpote à fonte caloris remotiorum, debiliore discuti non possit, pedes intumescunt, & tumore œdematoso corripuntur. Quibus humore crasso hypochondria repleta sunt, in iis limosæ ac crassæ humoris huius partes in hisce locis tumorem durum & renitentem efficiunt.

Rusticis, & nautis, ac qui simili iis victus ratione vtuntur, tubercula dura in toto corpore erumpunt, nonnunquam & tumores magni, & profundi cum in inguine, & glandulosis corporis partibus, tum alibi, & in mediis musculorum spatiis, doloris quidem, dum ægri quiescunt, aut crus super scamno, vel puluinari reponit, expertia, inter eundem verò, & cruribus pendentibus grauius ægros excruciantia, tumores Gallicos æmulantia, quæ à materia melancholica, & tartarea, ut Chymici appellant, in ambitum corporis à Natura detrusa, & iis in locis hærente, & indurata proueniunt. Ortum enim habent hi tumores ex humoribus scorbuticis corruptis, dum tenuior pars humorum, à natura ad ambitum corporis depulsa, discutitur, vel à calore febrili absorbitur, crassa verò relinquitur. Discernuntur autem à Gallicis tumoribus, quod in his apertis materia pinguis lardo similis reperitur; quale nihil in tumoribus Scorbuticis apparet: præterea tumores scorbutici sequuntur vitam tristem, & calamitosam; Gallici luxuriosam, ut hac de re scribit Eugalen. pag. 92. num. 18. obseru. 20. Nonnunquam hinc inde subitò in corpore tumores erumpunt, qui eadem facilitate & promptitudine, qua orti sunt, euanescent, & cum ortus sui principio parti affectæ leuem & momentaneam resolutionem inferunt, Paralyfinque antecedere solent. Eugalen. pag. 109. Imò interdum tumores renitentes, duri, subrubri vel nigri & crustosi in inguine & cruribus erumpunt, bubonibus pestilentibus non absimiles, verum signis scorbuti ab iis dissidentes.

Est & scorbutico laborantibus, vel ad scorbutum dispositis satis familiaris illa phlegmones species, quæ, quod rubeo, roseoque colore cutem tingit, vulgo die Rose appellatur, quæque sanguineos non solum, & plethoricos, sed & ab hac constitutione longissime remotos infestat, & nonnullos singulis ferè septimanis, alios singulis mensibus, aliis longiore intervallo, pro causarum, cum internarum tum externarum atque adjuuantium, magnitudine & varietate, cum horrore, magno languore & anxietate, nonnunquam leuibis animi deliquiis, inuadit, & nunc hanc, nunc illam partem, pro ut hæc vel illa imbecillis est, apprehendit; quod indicium est, potius ab humoribus ichorosis peculiari modo corruptis, aut vaporibus ab ejusmodi humoribus corruptis resolutis, quam sanguinis copia prouenire; præsertim cum alia signa, quæ ex vrina, & pulsu, ac morbi hujus motu, & quod faciliè de loco in locum, sicut de arthritide diximus, migrat, consentiunt: sicut etiam horrores aliquot diebus ejus eruptionem præcedere quandoque solent. Eugalen. obseru. 49.

Interdum non solum crura, sed & si morbus protrahatur, venter intumescit, ubi simul Hepar, & Lien plerumque humoribus crassis ita infarciuntur, ut tumor manifestus, & tensio in iis appareat. Id quod non mirum. Nam cum colluies humoris scorbutici præcipue circa Hepar, & Lienem hæreat, cum à substantia, cum à vaporibus eius facultas horum viscerum debilitatur, & praua inde in iis dispositio contrahitur, quam iterum

Tumores faciei.

Pedum.

In inguine & glandulis, in musculis.

Harum à Gallicis tumoribus differentia.

Erysipelas die Rose.

Hydrops.

Morbi species est febris continua.

Signa Scorbuti.

Causa complicationis horum morborum.

Coniungitur & Scorbutus cum febribus intermittens.

Nota.

iterum alimentis elaborandis imprimunt; unde vitio-  
forum humorum, præcipue serosorum, colluuiæ cumu-  
latur, & tandem ad crura descendit; si materia sit copio-  
sior, ut tota ab iis recipi non possit, quod reliquum est,  
intra viscera hæret, & tunc naturæ robore in abdo-  
men protruditur, tunc pondere suo edruit, & ventrem  
in tumorem attollit. Laborant autem hydropici isti  
longe maiore respirandi difficultate, quam alias in  
hydropse fieri solet, nondum scilicet valde tumore  
diaphragma premente, & plerique horum respiratio-  
nem sibi præcludi, & de angustia circa orificium ven-  
triculi conqueruntur. Quæcumque à crassis vaporibus,  
& flatibus proveniat, ut supra dictum, iis discus-  
sis hæc respirandi difficultas, & anxietas remittit,  
quod alias in hydropse fieri non solet, & rursus  
iis collectis redit; ac præcipue post purgantium usum  
difficultas respirandi, & angustia augetur. Et si in  
corporibus plethoricis hoc malum excitetur, facies  
statim liuida apparet, peccantisque humoris indi-  
cium exhibet; tumor quoque multo durior, & ten-  
sior est, quam alias in hydropicis fieri solet, ideoque ne-  
que aliter, neque facile digitorum impressionem admit-  
tit, ut alias in hydropse fieri consuevit, & impressus di-  
gitus in aliquibus nullum, in aliquibus exiguum velli-  
gium relinquit.

Vesica in co-  
te corpora.

Præter hanc hydropis speciem alia adhuc occurrit,  
quam à vesicarum toto corpore, & qualibet ejus par-  
te extuberantium forma, Belgica lingua *Bouckvatter*,  
appellant. Cognoscitur, quod iis præcipue accidit,  
qui victu minus melancholico uti sunt, humoresque  
tenuis, & aquosos cum multis flatibus cumularunt, &  
quod antequam sedem figit certam, aliam atque aliam  
corporis partem momentaneo tumore ac inflatione  
hic morbus attollit & distendit. Quibus verò humo-  
res minus mobiles sunt, pedes primum, postea to-  
tum corpus duro & inæquali tumore paulatim assur-  
git, variis tuberculis, sua subinde quasi cute cir-  
cumscriptis, extra reliquum tumorem exstantibus;  
præcipue quidem in inguine, & scroto, quandoque ta-  
men etiam in brachiis, scapulis, dorso, reliquisque cor-  
poris partibus. Accidit pulsus huic malo proprius, vri-  
næ modò crassæ, rubræ, & liuidæ, modò variæ, & incon-  
stantes, procedente tamen morbo crudæ, & tenuis; præ-  
cesseruntque plerumque alia symptomata, nausea, alui  
dejectiones, languor, oris siccitas perpetua, & alia. Eu-  
galen. p. 152. observ. 20.

Vlcera crura.

Quandoque non solum maculæ in cruribus appa-  
rent, sed & vlcera in iis excitantur, sicca ferè, & neque  
pus neque saniem ex se fundentia, ut rectè Eugalenus  
scribit, à cuius partibus magis est experientia, quam  
Hieronymi Reutneri, qui vlcera scorbutica tenui sanie  
perpetuò madere scribit. Vlcera autem hæc eos magis  
infectant, qui temperamento bilioso sunt. De quo Hip-  
pocrates, lib. de intern. affect. Quicunque, inquit, splenem  
habent magnum, siquidem biliosi sunt, hi mali coloris sunt,  
& malis vlcerebus scatent. Vlcera hæc cum maligna sint,  
ea ad Telephia commodissime referri censet Balduin.  
Ronsseus, de scorbut. cap. 7. Cum enim Telephia dicantur  
ea vlcera, quod in tali vlcere Telephus Mysiæ rex con-  
sensuerit, Aegineta, lib. 4. cap. 46, nomen hoc scorbu-  
ticis vlcerebus non immerito tribui putat. Cum enim  
Telephus omnem operam impenderit, ut pro diuturno  
vlcere aliquod medicamentum reperiret: tandem  
senio confectus reperit herbam, quam sibi cognom-  
inem esse voluit, & ea sanitatem recuperavit:  
censentque viri quidam docti, Telephium esse  
plantam vulgò cochleariam dictam: alij tamen faba-  
riam esse censent, & satis multis probat VVierus, te-  
lephium non esse cochleariam. Verum non multum  
refert, siue Telephia, siue alio nomine appellentur hæc  
vlcera: hoc certum est, maligna, & curatu difficilia es-  
se ob humorem Melancholicum, & prauum. Sine  
causâ verò hoc loco inuehitur in Ronsseum Reutnerus,

Vlcera Tele-  
phia.

Telephium.

qui hæc vlcera maligna esse statuit, quod ab atrabile  
proveniant. Ipse enim nititur falsâ hypothesi, quod  
saltem ab humore aquoso ortum habeant. Etsi enim  
hoc verum sit, quod Melancholia, quæ, ut supra dixi, in  
scorbuto etiam concurrit, non tam adusta sit, ut ea, quæ  
cancrum excitat: tamen humor Melancholicus qui-  
cunque contumax est, neque facile curationi cedit, &  
in scorbuto peculiarem corruptionem ac prauitatem  
fortitus est. Ipse tamen diffiteri non potest, humorem  
salium Scorbuticis vlcerebus inesse. Vlcera hæc inter-  
dum ita gangrænosa fiunt, ut ne quidem ferrum inflit-  
tum, vel admotum pyroticum sentiant. Imò ex tali vl-  
cere crustoso sæpe mortificatio totius cruris aduenire  
potest, nisi maturè crusta à reliquo vlcere separetur. Eu-  
galen. p. 406. observ. 8.

Neque solum crura, sed & alias corporis partes vlce-  
ra hæc interdum occupant. Ita observavit Eugale-  
nus vlcus scorbuticum, quod cum tumore ingenti ad  
Elephantiasin accedente præter dimidiam faciem, &  
magnam cervicis partem, nasum, & labia occupabat.  
Præter dictam faciei inflationem nasus liuidus erat, la-  
bia prætumida, & nigra, oculi prominentes, & fusco co-  
lore palpebræ tinctæ, & variis pustulis variegatæ: hæc  
serpendo quotidie labiis per totam ferè faciem disper-  
gebantur, subjectas carnes exedentes, & circa tempora  
in vlcus nigrum, tetrum, malignum, & glomerosum,  
quod Carcinoma Græci vocant, desinentes.

Refert idem Eugalenus, pag. 221. num. 48. penem  
quandoque exulcerari, cum prava ista materia, dum per  
penem cum serosa sanguinis substantia defertur, inter  
transeundum malignitate & acrimonia sua teneram  
penis carnem erodit.

Penis.

Imò non solum vlcera scorbuticos corripunt, sed &  
grauissimum, etsi vulgo non satis cognitum & rarius,  
malum scorbuto quandoque accedit, mortificatio scili-  
cet, & gangræna vel vnius, vel plurium corporis par-  
tium, præcipue digitorum pedum. Incipit hoc malum  
plerumque circa pedis extremum cum nigris, & purpu-  
reis maculis, & lituris quasi, & hinc paulò post vlcus  
crustosum, & gangrænolum, siccum, neque saniem, ne-  
que pus reddens apparet, digitusque vnus vel alter pe-  
dis emori incipit, & lineæ rubræ, ac purpureæ lituræ su-  
pra juncturam pedis secundum tibiam longitudinem ap-  
parent. Id quod Eugalenus etiam annotauit, atque ego  
ipsemet exempla ejus rei duo vidi, vnum in viro quo-  
dam Nobilissimo, alterum in Pædagogo. Est verò hu-  
jus gangrænæ, ac Sphaceli à gangræna & Sphacelo  
vulgò descriptis magna differentia. Etsi enim in vtra-  
que gangræna pars emoriatur, ac sensum omnem amit-  
tat, ac malum indies latius serpat: tamen non paucis  
discrepant. Gangræna enim illa vulgò nota ferè ex caus-  
sis manifestis & notis ortum habet, & in membro tali  
Sphacelo emortuo foetidus, ac aquosus humor effluit,  
membrum molle, ac putridum redditur, & grauem, ac  
cadauerosum de se foetorem emittit, multumque breui  
tempore serpit, & plerumque hominem citò jugulat.  
Gangræna verò scorbutica ferè sine causâ manifesta  
inuadit, & lentè, ac tardè serpit; ac non nisi longo tem-  
pore hominem jugulat. Nobilis enim ille, cuius mo-  
dò mentionem feci, ultra menses tres; pædagogus  
verò vitrà sex menses cum malo hoc vitam protraxit;  
sicut Eugalenus ad duodecimam hebdomadam malum  
hoc protractum fuisse testatur. Pars planè sicca est,  
nihilquè effluit, & cum corrupta ferro aufertur,  
licet caro rubra offeratur, color tamen ille ruber  
paulò nigrior est, & sequenti die & ipsa planè emor-  
tua deprehenditur: nullus quoque foetor percipi-  
tur. Præterea ubi primò malum vnum saltem pe-  
dem apprehendit, postea, absque omni causâ ma-  
nifesta, in altero etiam crure, & pede maculæ, ac  
lituræ rubræ, vel purpureæ apparere incipiunt, &  
paulò etiam post illius pedis digitus vnus, vel alter li-  
uidus redditur, & planè emoritur; tandemque homo  
plerumque

Gangræna  
scorbutica.

plerumque Apoplexia, quod Nobili illi accidit, vel epilepsia accedente moritur.

Atrophia.

Tandem etiam Atrophia hoc malum interdum sequitur. Quibusdam crura atrophia laborant, & ita gracilia redduntur, ut vix ossibus hærere videantur: Interdum & totum corpus ita emaciatur, ut vix cure, & ossibus homines hæreant, & sceleri formam referant. Quod accidit, quod partes vel etiam totum corpus bono alimento destituitur, & à vitiosis humoribus, qui affluunt, calor natiuus & vis nutritrix partium ita debilitatur, ut nutritionem rectè promouere non possint. Et in principio quidem atrophia accidit, quod ob vitiosum nutrimentum facultas in nutritione frustratur ob errorem externum: vbi verò temporis progressu ipsis partibus ab humoribus continuo affluentibus vitiosa dispositio imprimitur, non aliter ac in leucophlegmatia & scabie praua, læsa etiam facultate nutritio læditur. Et licet à variis etiam causis aliis *atrophia* generari possit, ut ab ulcere pulmonis, aut alicuius alterius visceris abscessu, à febribus, præcipuè hectica: tamen hæc hæ causæ omnes, earumque propria signa absunt; contra pulsus, vrina, aliaque, cum quæ præcesserunt, tùm quæ adsunt, Scorbutum arguunt, quæ hæcenus sæpius sunt enumerata, nec toties repetere opus est: agitque de iis Eugalen. num. 33. p. 159. & seqq. obs. 35. 36. 40. 46. Cor tamen à vaporibus putridis continuo afflictum etiam calorem & siccitatem præter naturam contrahere potest, atque inde tabes & atrophia in toto corpore excitari.

Atque ita morbos, & symptomata, quæ Scorbutum comitari solent, pleraque recensuimus, ductu inprimis Seuerini Eugaleni, qui de hisce omnibus accurate & prolixè egit, & si curationem scorbuti eadem ratione adiecisset, omnibus, qui de scorbutu scripserunt, palmam prætipuisset, & de arte Medica optimè mereri potuisset. Et si autem ex his signis omnia apud nos non ita semper sunt euidentia, ut iis in locis quibus scorbutus quasi patrius & vernaculus est: tamen qui ea, quæ circa ægros etiam in his & vicinis locis fiunt, diligenter considerauerit, istis signis satis sæpe manifestis latentem sub aliis morbis scorbutum, aut certè eius initia deprehendere poterit. Si quis verò est, qui putet, me nimium in recensendis morbis & symptomatibus scorbuticis fuisse, is sciat, me equidem cum iis non facere, quibus nullus ferè morbus offertur, quem non ad scorbutum reducere conentur: interim qui experientiam diligenter consulat, animaduertet & hæc quæ enumerata sunt, & forsan plura cum scorbutu mala coniungi posse.

## CAPUT V.

### Prognostica.

1. IN Prognostico instituendo Medicus cautus sit, & omnes facultates principes earumque læsiones diligenter perpendat. Et si enim pulsus plerumque in hoc morbo valde debilis, languidus & parvus sit, ita quidem, ut medicis morbi huius ignaris mirum videri possit, cum tali pulsu hominem vivere posse: tamen inde mortem prælagire non licet; cum non morbi lethalis, sed morbi peculiari modo facultati vitali aduersantis signum sit. Etenim vitali cordis facultati, ut & nervoso generi, aduersam qualitatem habet colluies scorbutica. Vnde illæ cordis anxietates, conuulsi motus, paralytis, varij dolores, & similes affectus scorbutu tam familiares sunt.

2. Malum hoc in principio ferè curatu facile est, & idoneis medicamentis adhibitis facile cedit; cum vitium saltem in humoribus consistat, nec praua aliqua dispositio visceribus communicata sit, & sæpe sola dia-

ta, ac præcipuè aëris mutatio ad curationem sufficiat.

3. Si verò radices agat, diuturnum malum est, & quod multa curatione indiget, & vix vnquam radicitus tollitur. Nam & humor melancholicus, à quo hic morbus ortum habet, natura sua contumax est ac tardè mouetur, & morbos pertinaces ac diuturnos parit; & postquam humor scorbuticus semel similem Hepati, & Lienis dispositionem impressit, vix ea planè extirpari potest; atque ob eam vel singulis annis, vel longiore interuallo, pro victus ratione, & aliis circumstantiis. malum recurrit, nunc iisdem, nunc aliis stipatum symptomatibus: virique cum eo sæpe in annum nonum, decimum, vel plures; fæminæ in vigesimum vel plures vitam protrahunt; proculdubio ea de causa, quod in fæminis per menses vitiosæ colluiei pars aliqua euacuetur: donec tandem perpetuo languore contabescunt, ægrique, aliis atque aliis symptomatibus subinde superuenientibus, grauiter affecti, & diu afflictī tandem sæpe improviso moriuntur: Sicut in Islandia mensæ affidentes, aut aliud quid agentes repente concidere, & mori quandoque hoc morbo laborantes se ex oculatis, & fide dignis testibus audiuisse, refert Dodonæus, in *prax. Medic.* Humor enim contumax est, & ut non nisi longo tempore in corpore coaceruatur, ita etiam non nisi longo tempore tollitur, & optimis etiam remediis resistit.

4. Qui diætæ se adstringi non patiuntur, quique in assumendis medicamentis difficiles & morosi sunt, raro integrè ab hoc morbo liberantur; ideoque etsi quandoque symptomata demulceantur, & scorbutus aliquomodo deuictus videatur: tamen si æger ab usu medicamentorum desistat, paulò post eadem vehementia morbus recrudescere solet, interdum cum iisdem, interdum cum aliis, sed æquè grauibus symptomatibus.

5. Plerumque scorbutus in cachexiam vel hydropem, nonnunquam & in dysenteriam, sæpissimè verò in tabem & atrophiam transit, & hominem lenta morte iugulat. Cum enim, ut supra dictum, humores scorbutici prauam & similem dispositionem visceribus, inprimis Lienis & Hepati; imprimant, fit, ut læsa horum viscerum facultate sanguificatio lædatur, & serosorum humorum ac flatuum copia producatur: Cum verò vitiosi humoris colluies ad ventrem protruditur, diarrhœam diuturnam, tandemque hydropem inducit. Cum etiam humores prauis circa viscera & inprimis viis collecti cum sanguine misceantur & cum eo in totum corpus distribuuntur: eum ad corpus nutriendum ineptum efficiunt: vitiosique humores cum sua substantia, tùm prauis exhalationibus omnibus corporis partibus similaribus vitiosam dispositionem imprimunt; facultatemque nutrientem lædunt: cor etiā à vaporibus putridis continuo afflictum intemperiem calidam & siccam contrahit, atque inde tabes & atrophia in toto corpore excitatur.

6. Respiratio difficilis, & pectoris angustia periculosum malum est, ob quam, si & Medicus, & adstantes suum officium non faciunt, sæpe ægri syncope præter expectationem pereunt. Si verò Natura fortior morbum diutius tolerare possit, plerumque in hydropem ægri incidunt, præcipuè ii, qui cathartici fortioribus sæpe vtuntur.

7. Crurum maculæ quod magis ad liuidum, & atrum colorem tendunt, eò peiores sunt; & si in vlcera aperta abeant, difficulter ea sanantur. Indicat enim talis color latentem humorem atrum, & malignum, à quo excitata vlcera periculosa sunt, & difficulter curantur.

8. Scorbutus hæreditarius, & à parentibus propagatus, ut & qui à pueris quasi adoleuit, difficulter admodum curatur, & vix vnquam extirpatur, & ferè semper aliquæ eius reliquæ remanent, quæ facili de causa repullulant. Habent enim tales secum congenitam scorbuti causam, & natiuam lienis imbecillitatem,

quæ ope medicamentorum vix vnquam tollitur.

9. Pueris *σκολιόμυς* crebrius, *σκολιόμυς* rarius accidit.

10. Periculosus senes iuuenibus, & mulieres viris laborant, si scorbuto afficiantur. Senes enim calorem debilem habent, & cruditatibus obnoxij sunt; ideoque morbi malitiam facile superare non possunt. Eadem de causa & feminæ magis periclitantur, præsertim eo tempore, quo fluxus mensium cessat, aut ante tempus subsistit; sanguinis motu ad viscera nutritionis conuersio, humoribusque vitiosis, qui cum mensibus euacuari solebant, in corpore retentis, & viscera debilitantibus.

11. Quibus tormina ventris, & circum vmbilicum contorsiones continuæ adsunt, raro euadunt.

12. Tumores in variis corporis partibus subito erumpentes, iterumque euanescentes, paralyfin præfagiunt.

13. Post paralyfin curatam nervi quidam, in quos serosa, vel vaporosa materia decumbit, contrahuntur, & conuulsionem illorum excitant.

14. Conuulsio scorbutica sæpe subito in paralyfin, cataphoram, vel tumorem, nunc euanescentem, nunc rursum emergentem transit, prout materia scorbutica nunc huc, nunc illuc mouetur.

15. Gingiuarum tumor, atque erosio, nisi maturè sanetur, carnem ad ossa vsque absumit, & os tandem dentibus priuat. Quandoque liuor partem oris superiorem, & palati partes penitiores apprehendit, & superuenit putredo palati ac faucium insignis, quod symptoma aliquibus imposuit, ut scorbutum pro lue. Venerea haberent, utpote in qua nihil frequentius accidit, quàm oris fauciumque corruptio, quod malum & plerumque lethale signum est, & caloris natiui extinctionem significat.

16. Vlcera crurum curatu difficilia sunt, & periculo non vacant; cum ab iis totum crus interdum gangræna corripitur, quam tandem sphacelus subsequitur, unde totum corpus in periculum adducitur.

17. Vomitus, & humorum vitiosorum supra & infra rejectio parum ægris prodest, sed potius ventris, & intestinorum doloribus plurimos longiore mora conficit.

18. Febres cum scorbuto non curantur integrè, si scorbuti curatio negligatur. Imò si indicationes, quas febris suppeditat, solum attendantur, æger sæpe non parum læditur. Quæ res ipsa facit, ut febres hodie sæpe tam diuturnæ sint, quod latens sub iis scorbutus non semper attenditur & cognoscitur. Febresque tales diuturniores vires sæpe deiciunt, ægrumque interficiunt, aut alium grauiorem morbum accersunt.

19. In febribus scorbuticis intermittentibus quandoque conuulsui motus, vel carus in singulorum paroxysmorum initio accidunt, qui tamen sponte remittunt.

20. Febres continuæ scorbuticæ, si purgantibus medicamentis initio fortioribus, aut crasso potu, aut medicamentorum calidorum vsu exasperentur, plurimos subito animi deliquio ac suffocatione necant atque occidunt.

21. Tumores crurum cedematosi in hoc morbo diuturniores esse solent, minusque promptè discutiuntur; cum & sanguis crassior sit ratione ad hæc loca tendat, & ob caloris in hisce partibus à fonte caloris vitalis longè distantibus debilitatem discuti non possit.

22. In magnis lienibus sanguis è dextra nare fluens, malum.

23. Cum etiam quandoque liuidæ maculæ in cruribus delitescere, quandoque confertim efflorescere soleant, dubiam hoc naturæ cum morbo pugnam indicat, & vbi morbus iam incrementum sumpsit, vtrumque iam mortis instantis indicium est. Euanescent maculæ, cum calor natiui extinguitur, & qui restat exiguus, ad suum fontem refugit, & cum eo sanguis partes ex-

teriores deserit. Cum verò in morientibus vbertim hæ maculæ efflorescunt, materiæ prauitatis, & copię argumentum est, quæ calore natiui iam succumbente, neque amplius humores regente, iugo quasi excullio, liberè diffunditur.

## C A P V T V I.

### De Curatione Scorbuti in genere.

#### Indicationes.

**C**Um omnia, quæ Scorbuticos infestant, mala & symptomata ab humore melancholico, crudo, seroso, salso, & peculiari modo corrupto originem habeant: danda opera, ut illa eius cruditas & prauitas emendetur medicamentis cum manifesta, tum occulta qualitate eum corrigere valentibus; ipse ex primis viis, vbi præcipua eius sedes, ut & toto corpore; tollatur; obstructions, in liene inprimis; & vicinis venis, aperiatur; praua dispositio viscerum, lienis maxime, emendetur, & defectus ille in cõctione & *συνύστασι* salis, & humorum crassorum corrigatur; ac scorbuticorum eiusmodi humorum crassorum generatio, remouendo causas ad eorum generationem facientes, præcaueatur. Sæu, ut Forestus hac de re loquitur, quatuor intentiones sunt curandi scorbutum; aperiens, euacuatio, alteratio, & confortatio. Nisi enim plenitudo sit amota obstructio aperta, & intemperies ablata, ac lien roboratus, æger nunquam curabitur, & quatuor istis adhibitis infinitos scorbuticos se curasse refert Forestus. Quod verum esse ut facile credimus: ita curationis ab eo institutæ historiæ docent, eum semper talia elegisse vel admiscuisse medicamenta, quæ peculiari vi scorbuto aduersantur. Diæta etiam sit ita comparata, ut ad generationem, & augmentum humoris scorbutici non solum non conferat, sed etiam ei sit contraria.

#### Curatio.

Et primò quidem sanguinis euacuationem quod attinet, si natura eius per hæmorrhoides euacuationem sponte tentaret, id aptissimum esset. Et si per hanc viam natura aliàs vitiosos humores euacuare consuevit, danda est opera omnibus modis, ut hæmorrhoides prouocentur.

Quod si de hæmorrhoidum flux nulla spes sit, & sanguinis sit aliqua abundantia, præsertim si febris coniungatur, primis viis vel clystere, vel leni aliquo medicamento prius euacuatis, vena, si vires id permittunt, aperienda, ut ita vitiosi humores simul euacuentur, & natura reliquos facilius superare possit; sanguisque ventiletur: cum videamus, naturæ ipsius ductu non raro in principio huius morbi sanguinem è naribus effundi.

Aperienda autem vena, vbi opus, in cubito, seu mediana, seu basilica, & quidem lato scalpello, ut monet VVierus, ut non solum tenues sanguinis, sed & crassiores partes euacuentur. Si tamen vires aliquo modo iam sint debiles, latam sectionem dissuadet Forestus, ne multum spirituum exhalet, & vires amplius debilitentur. Plerique sectionem in sinistro brachio instituendam censent. Equidem, ut lib. 5. *Instit. part. 2. §. 1. cap. 17.* dictum, venæ brachii sinistri maiorem aliquam cum liene cognationem non habent, quàm venæ brachii dextri: *τὸ κατ' ἑξῆς* tamen, ob *ἑξῆς*, & *ἑξῆς* illam occultam, & consensum partium dextrarum cum dextris, sinistrarum cum sinistris, etiam hic obseruare forsitan non inutile fuerit. Forestus etiam saluatellæ in sinistra manu apertionem in scorbuto prodesse se experientia didicisse scribit: qua de re experientia consulenda. Nam ratio eius rei nulla reddi potest. Postea, & præcipuè si melancholicus sanguis ad inferiora defluerit, ut non sine causa suadet Ronsseus.



vena popliris, aut malleoli aperiatur, vt materia ibi fixa quoque euacuetur. Et omnino commodum est, vt sanguis peccans non semel, & vna vice detrahatur, nec vna tantum in vna parte venae aperiatur, sed aliquoties id fiat, interiectis intervallis. Ita enim qui per varia corporis loca sparsus est sanguis vitiosus, commodius euacuari potest.

Parcius autem sanguis euacuetur; cum largiorem sanguinis missionem hic morbus respuat, vt Eugalenus scribit.

Si v. morbus iam radices egerit, & sanguinis iam adsit magna corruptio, ac cacochymia cum nulla sanguinis abundantia, eaque ita totum corpus occupauerit, vt iam maculae efflorescant; & alia externa signa in corpore hinc inde appareant, vix venae sectio tentanda, ne puriore, & subtiliore sanguine effluente, & crassiore illo, ac viscido in venis subsistente, vires aegri debilitentur: sed tum potius ad cacochymiae scorbuticae praeparationem, & euacuationem, primis viis tamen & ventre prius euacuatis, accedendum.

Praeparationem ergo, & purgationem quod attinet, cum scorbutus fortia purgantia non ferat, sed iis exasperetur potius, vt aliquoties monet Seuerinus Eugalenus, omnesque eruditi Medici ipsa experientia edocti testantur; neque vna vice humores vitiosi euacuari possint: purgatio per *emmen* rectissime instituitur, ita scilicet, vt materia primum praeparatur, & coquatur, & corruptio, ac putrefactio humorum superetur, & cohibeatur, deinde purgatio lenis instituitur; & cum materia scorbutica non sit eiusdem substantiae, sed ex diuersis humoribus mista, iterum ad praeparationem accedatur, & hinc, si opus sit, medicamentis idoneis humores praeparati rursus euacuentur. Quod nisi obseruetur, & materia adhuc cruda, & specifica humorum corruptione nondum superata, purgantia exhibeantur, materia mota & conturbata anxietates multas parit. Imò obseruatum, non paucos citra purgantium usum conualuisse, vsurpatis medicamentis attenuantibus, incidentibus & peculiari vi scorbuto aduersantibus.

Itaque primò, vt experientissimi medici Salomonis Alberti, antecessoris olim mei, verbis utar, ea vsurpanda medicamenta; quae terreum, & feculentum humorem colliquant, attenuent, incidant, dissipandoque abstergant, vt soluta obstructione, quod crassius est, facilius in alium, corporisque sentinam excidat; quod tenuius, & ferocius, ad vias vrinae deriuetur, & vtrumque adeo, quod vergit natura, per conferentia loca euacuetur. Nam & crassiores saepe huius humoris partes cum vrina excernuntur, & cum aegri commodo vrinae ferè nigrae, & turbidae, quaeque nigrum sedimentum deponunt, emittuntur.

Monendum tamen de istis: Primò ad vniuersalem methodum semper hic respiciendum, & naturam humoris, ac corporis constitutionem considerandam esse. Vbi enim frigidi, & crassi humoris sunt, & in iis, qui in frigido, humido, ac crasso aëre viuunt, attenuantibus, & incidentibus fortioribus vtendum: in aliis mitiora adhibenda.

Deinde si morbus radices altius egerit, & diu iam durauerit; fortioribus remediis, & magis attenuantibus, & internis, quàm externis, sudoriferis, balneis, ac aliis. Tutissimum tamen est, semper à mitioribus incipere, & paulatim ad fortiora progredi. Et si morbus curationi non cedat, & cum laudabilibus vrinis incrementum sumat, signum est, medicamenta debiliora esse, quàm morbi, & causae magnitudo requirit, & propterea ad fortiora progrediendum.

Tertio aperientibus & attenuantibus medicamentis quae in aliis morbis vsurpantur, solis fidendum non esse, sed ea addenda, quae peculiari proprietate huic morbo aduersantur. Non enim est de nihilo, quod aliquoties monet Eugalenus. Medicos aliàs doctos

frustrà in hoc morbo, quem non rectè cognitum habuerant, curando laborasse, qui proculdubio & aperientia ac euacuantia, & alterantia, atque confortantia vsurparunt; sed frustra: cum cacochymiam scorbuticam, cognitam non haberent. Neque enim qualibet aperientia, vel humorem melancholicum alterantia hic sufficiunt, sed semper ea vsurpanda, & admiscenda, quae humoris huius naturam respiciunt. Ideoque etsi quae obstructiones hepatis, lienis, ac vicinorum vasorum aperiunt, & intemperies eorum corrigunt, quaeque in aliis melancholicis affectibus vtilia sunt, & hic locum habeant, vt radices *aperientes*, scorzonera, caryophyllata, helenij, cichorij, polypodij, gentiana, rhapontici, aristolochia rotunda, scilla, cortices tamarisci, capparum, folia chamadryos, chamapithyos, cuscutha, agrimonia, fumaria, hyssopi, lupuli, ceterach, scolopendrij, betonica, origanis, flores genista, cichorij, & fructibus amygdala amara, bacca lauri, iuniperi, & similia: ea tamen quae huius humoris proprium vitium peculiari vi corrigere possunt, semper addenda.

Poterit ergo primò talis portio parari.

℞. Rad. cichor. fœniculi, polypod. q. an. ℥. j. cort. tamarisc. rad. cappar. an. ℥. ℥. cochlear. betabung. fumaria, omnium recent. an. M. j. ceterach. chamadryos, hyssop. capill. veneris, lingua ceruina an. M. ℥. passular. ℥. j. Coq. s. a.

Colaturæ clarificatae ℥. ℥. xx. dulcoretur sacchar. cando, & add. cinamom. ℥. ii.

F. potio pro 4. vel 5. dosibus: vel addatur sacchar. q. s. & fiat syrupus, cuius ℥. j. ℥. detur, cum aq. scolopendr. fumar. cochlear. nasturt. aquatic. betabunga.

Vel ℞. Aq. scolopendr. fumar. chamadr. an. Vnc. iij, syr. de scolopendr. de fumar. byzantin. s. an. ℥. j. spir. vitrioli ℥. ℥.

Fiat potio pro 3. dosibus.

D. Salomon Albertus hoc digestium praescribit.

℞. Passular. minor. succ. acetosa imbutar ℥. j. ℥. rad. polypod. quern. ℥. ℥. asari ℥. ij. bistort. ℥. iij. glycyrryz. oxylapathi an. Drach. ii. cort. rad. cappar. ℥. iij. tamarisci, sem. anisi, fœniculi an. ℥. j. ℥. agni casti ℥. j. urtica ℥. iij. herb. cuscutha, acetosa, capill. veneris, lichen. perrei, ceterach, lingua ceruina an. M. ℥. thymi, epithymi an. P. ij. flor. borrag. bugloss. violar. an. P. j. cinamom. ℥. ij.

Coq. in aq. pura ad lb. j.

In colatura clarificata dissolue sacchar. q. s.

Coq. ad syrupi consistentiam.

Cuius ℥. j. ℥. detur quotidie cum aq. scolopendr. capill. Veneris, lupuli an. ℥. j.

Poterit & spiritus salis, cremor tartari, tartarum vitriolatum vel spiritus tartari compositus, quem vulgo misturam simplicem nominant, in iusculo carnis vel alio conuenienti liquore exhiberi.

Materia hisce vel similibus medicamentis praeparata, & viis apertis, ad purgantia accedendum. Licet etiam praeparantibus quaedam purgantia admiscere, vt aluus non nihil laxetur, & humores ad aluum sensim deducantur. Eligantur autem, vt etiam supra dictum, leniora purgantia; cum fortiorum & vehementiorum purgantium usu, ipsa experientia teste, aegri in hoc morbo in praesentissimum discrimen adducantur & vitae periculum saepe coniciantur. Ideoque confessionem Hamech plerique docti abhorrent. Si tamen infundatur vel coquatur, mitior sit.

Vt ℞. Decoct. fol. sene sec. August. ℥. iv. confect. Hamech. ℥. i. ℥. el. diaphœnic. rosat. Mes. an. ℥. ℥.

Bulliant semel atque iterum, & colentur.

Colaturæ add. manna ℥. ℥. Iterum colentur.

F. haustus.

Vel. Rad. polypod. q. ℥. ℥. cort. rad. cappar. fraxini an. ℥. ij. absinth. centaur. min. chamadr. ceterach. an. M. ℥. thymi, epithymi an. P. j. sem. anisi, fœniculi an. ℥. ℥. hellebor. nigr. prap. fol. senecl. an. ℥. iij. rhabarb. ℥. ij. cinamom. ℥. ℥. conseru. fumar. cochlear. borrag. an. ℥. j. ℥.

Contundenda contundantur, & affundantur aq. vel vini, vel seri lactis lb. ij. ac in vase duplici coq. in baln. per horas ij. Colaturæ exhibeantur ℥.ij. manè, & horis duabus ante cœnam.

Vtile est etiam hoc medicamentum.

℥. Passular. polypod. q. an. ℥. β. iniubar. sebesten. an. num. vj. Coq. in aq.

Colatur. ℥. ℥. viij. In iis infund. fol. sene el. ℥. β. epithym. Cret. ℥. ij. turbit. elect. helleb. nigr. prepar. an. ℥. β. zingib. caryophyll. an. ℥. j.

In colatura dissoluatur mannæ ℥. β.

Iterum coletur.

F. haustus.

Vel parentur talis potio.

℥. Rad. polypod. q. ℥. vj. asari, cort. tamarisc. rad. cappar. an. ℥. ij. chamadr. capill. vener. an. M. j. epithym. ℥. β. flor. borrag. bugloss. cichor. an. ℥. ij. fol. sene el. ℥. j. sem. anisi, fœniculi an. ℥. j. passular. exacinar. ℥. vj.

Infund. in f. q. seri lactis.

In colatur. ℥. vj. dissolu. el. Indi, vel rosat. Mesue, prout humoris natura postulat, ℥. β.

Iterum coletur.

Add. syr. de fumar. compos. vel de cichor. cum rhabarb. ℥. vj. Milce.

F. potio purgans pro 2. dosibus.

℥. Rad. polypod. q. scorzonera an. ℥. β. fumaria, cochlear. an. M. β. sem. endiuia, anisi, fœniculi, carni an. Drach. j. cort. rad. capparum Drach. ij. ceterach. capill. vener. borraginis an. M. β. fol. sene ℥. j. agar. trochiscati ℥. ij. rhabarb. ℥. j. flor. cordialium P. j. spica Indica, cinamom. an. ℥. j. schœnanthi ℥. j.

Coquantur in sero lactis.

Colaturæ ℥. lb. j. Adde syr. de cichor. cum rhabarb. ros. fol. an. ℥. j. succi cochlearia vel scoloryrbici alicuius ℥. j. β. Milce.

Pro duabus vel tribus dosibus.

Vel ℥. Rad. cichor. petroselini, polypod. q. an. ℥. β. cort. tamarisc. rad. cappar. an. Drach. ij. helleb. nigr. prep. ℥. j. β. cochlear. nasturt. aq. becabung. an. M. j. ceterach. agrimon. an. M. β. sem. anisi, fœniculi, agni casti an. ℥. i. passular. ℥. j.

Coq. in f. q. seri lactis caprini.

In colatur. infund. fol. sene el. ℥. j. rhabarb. elect. ℥. j. flor. borrag. bugloss. genista an. P. j. cinamom. caryophyll. an. ℥. β.

Colaturæ ℥. ℥. ix. syr. de fol. sene ℥. j. fumar. comp. ℥. vj. cremor. tartari ℥. j. M.

F. potio pro 3. dosibus.

Vel ℥. Electuar. diacatholic. ℥. j. confect. Hamech. Drach. iiii.

Infund. in decocto, vel aq. becabung. & cochlear. ℥. iiii.

Postea colentur; add. syr. de fol. sene ℥. β.

### Pilula.

℥. Pilular. tartarear. Quercetan. ℥. j.

F. Pilulæ mediocres.

Vel ℥. Pilular. aggregat. ℥. ii. tartarear. ℥. j. Extract. hellebor. nigr. gr. vj.

Fiant pilulæ xxi.

Vel ℥. Pulv. rad. gualapa ℥. β. pilular. tartarear. ℥. i. tartari vitriolati, pulv. sem. sinapi, nasturtij, an. Scrup. sem.

Cum succo absinthij, vel fumar. vel oxymel. scillit.

F. pilulæ, quarum Drach. β. sæpius ante cœnam exhiberi potest.

### Pulveres.

℥. Fol. sene ℥. β. epithymi, cremor. tartari an. ℥. ii. cinamom. caryophyll. galanga, sem. anisi an. ℥. i. diagryd. ℥. β.

F. pulvis: Dos 3. i.

Vel infundantur Vnc. sem. in sero lactis.

Nec incommode exhibetur pulvis lenæ nostræ descriptionis.

℥. Fol. sene el. Vnc. i. sem. cremor. tartari ℥. vi. cinamom. ℥. iiii. caryophyll. galang. an. ℥. β. diagryd. Drach. i.

Possunt quoque huius pulueris Dra. ii. vel iii. pro ratione virium, in f. q. seri lactis per noctem infundi, & colatura manè exhiberi.

Commendatur etiam ad scorbutum extirpandum hic pulvis.

℥. Aloes, croci oriental. an. ℥. ii. myrrha ℥. i. Electuar. de succo rosar. in tabul. ℥. β.

Fiat pulvis, cuius Dra. i. exhibeatur mane, & iterum Dra. i. horis duabus ante cœnam, in lacte caprino aut sero lactis caprini, aut in lacte, in quo nasturtium aquaticum coctum sit. Si propter aloës amaritiam pulvis hic alicui minus arideret, pro tabulis de succo rosar. ipsum electuar. sumatur, & F. pilulæ.

Vel ℥. Fol. sene ℥. β. epithymi, polypod. q. cremor. tartari, rad. rhabarb. monach. an. ℥. β. sem. anisi, fœniculi an. ℥. ii. F. pulvis.

Laudatur & hic pulvis, cum pituitosus humor admixtus est.

℥. Fol. sene, agarici trochisc. croci, epithymi an. ℥. ij.

F. pulvis. Dos 3. i. vel ii.

### Passula purgantes.

Vel parentur hæ passulæ purgantes.

℥. Fol. sene elect. ℥. i. mechoacan. albiss. polypod. q. an. ℥. vi. flor. cordial. an. P. i. cinam. ℥. β. sem. fœniculi ℥. i. glycyrrh. rasa ℥. i. β.

Ebulliant in f. q. aq. vel vini, & macerentur per noctem in infusione.

Colaturæ leniter expressæ. ℥. lb. i. cui adde sacch. alb. ℥. ii. manna ℥. iiii.

Coquantur ad spissitudinem Iulebi cui sub finem adde succi cochlear. ℥. ii.

Rursum semel atque iterum ebulliant.

Tandem add. crem. tartari. ℥. vi. passular. minor. lotar. ℥. x. M.

Et maneant passulæ in infusione, de quibus datur ℥. β. vel i vel Vnc. i. β. pro ætatis & virium ratione. Si opus est, possunt, dum sumuntur, gr. i. vel ii extract. scammonii acui.

### Bolus.

Vel ℥. Electuar. diacatholic. ℥. β. confect. Hamech. ℥. β. pulv. fol. sene, crem. tartari an. ℥. β. vel ℥. i.

Cum saccharo

F. Bolus.

Corpore hoc modo euacuato ad fortiora aperientia, & ea inprimis, quæ morbo huic propria esse diximus, accedendum, & medicamenta, quæ sale volatili abundant, ac humorum cruditatem, & deficientem coctionem, ac fermentationem corrigere, & vt VVierus loquitur, crassos & crudos humores penetrare, eoque subtilis, & tenues reddere, obstructions aperire, & vitiosos humores hinc inde per corpus dispersos discutere, vel per vrinas educere, & peculiarem illam humorum corruptionem impedire possunt, vsurpanda.

Cum enim, vt supra diximus, humor hic ex deficiente coctione & *ανωριότητα* salis, ac ciborum crassorum primam originem habeat, ea semper medicamenta, quæ defectum illum suppleant, & quæ sale volatili abundant, ac humorem istum crassum & fixum, volatilem reddere, & crassis, spirituosam quasi raritatem inducere, ea suo loco mouere, vt ab vilius facilius separari, & ex corpore per conuenientes vias euacuari possint, apta reddere valent, quæque occultū illud

illud vitium, & peculiarem huius humoris corruptionem corrigere valent, vsurpanda.

Medicamenta autem, quæ hæc præstant, sale volatili abundant, & acrimoniam quandam cum amaritie coniunctam habent; atque insuper longa experientia ad hoc malum profligandum plurimum posse, comprobata sunt qualia sunt: *Cochlearia*, quæ faciliè primas inter ista medicamenta tener, & malo huic peculiariter aduersatur, vt longa experientia docuit, siue cruda comedatur, siue cum saccharo in conseruam redigatur, siue succus eius exhibeatur, vel etiam aqua inde destilletur. Sale enim volatili acri, cum amaritudine quadam coniuncto, abundat: vnde aperit, penetrat, crudos illos ac crassos humores volatiles reddit, vt Chymici loquuntur, discutit, per vrinam & sudores expurgat, viscera roborat. Nonnullis Britannica dicta putatur, quod in littore Britanniae opposito copiosè proveniat, vt & in aliis regionibus, quibus hic morbus Endemius. Creatoris enim optimi sapientia factum, vt, vbi ob loci naturam morbi aliqui quasi vernaculi sunt, domestica etiam remedia copiosius crescant. Britannicam primò à Frisiis Romanis militibus monstratam fuisse, refert Plinius. *Nasturtium* eiusque species omnes, & imprimis aquaticum, quod ad hunc morbum inter cætera vtilius est. *Becabunga*, cuius vsum quidem nonnulli, si sola vsurpetur, improbant, metuuntque, ne sua humiditate excrescentiæ lienis potius materiam suppeditet. Verùm etsi hoc ira facillimè metuendum non sit, & sale volatili, quem obtinet, eodem modo, vt alia antiscorbutica medicamenta, in hoc malo efficax sit: tamen hoc etiam fatendum, sale illum volatilem in cochlearia longè esse copiosiorum, quam in becabunga, & becabungam plus humoris aquei obtinere, ideòque ex his duabus plantis mistis optimum, experientia teste, emergit remedium, & cum becabunga minus sit calida, quàm reliquæ illæ plantæ, commodissimè non solum ad ipsum scorbutum, sed etiam vbi febris, ac calor præter naturam adest, exhiberi, eiusque dimidia pars reliquis addi potest. *Raphanus rusticus*, nonnullis Armoetia, *chelidonium minus*, quod à Germanis peculiari nomine *Scorbutyck krentlein* appellatur, sedum minus, quod illecebram vocant, sed cum acrius sit, minus tutum plerisque putatur. Scripsit tamen ad me nuper vir Excell. Dn. D. Ioh. Dieterus, Illustriss. Elect. Brandenburg. Viduæ & Berolinensis Medicus, in Suecia sereniss. Sueciæ Regis Chirurgum sibi retulisse, se in promptu habere pro copiis naualibus in maxima copia Aquam stillatitiam crassulæ minoris, quæ ibi vberimè in superficie rupium serpit, à cuius vfu ægotantes, qui scorbuto, vrgentur, initio valde languerent, tandem tamen mirè conualescerent, & tantam morbi vim potione hac simplici se lenaturum largè promississe. *Nummularia*, *sinapi*, vnde vsum obtinuit, & commodè fit, vt falsis, ac fumo exsiccatis carnibus, & piscibus condimenti loco sinapi apponatur; *raphanus*, *trifolium aquaticum*, *arum*, Ferunt etiam in Norvvegia, prope Bergas, celebre ob pisces venales Emporium, terram quandam rubram, sigillatæ similem effodi, quæ sit certum, & efficax huius morbi remedium.

Alij referunt in eadem Norvvegia ad hunc morbum profligandum felicissimè vsurpari fructum chamærubii cuiusdam, qui sub nomine Chamæmori Norvvegicæ à Carolo Clusio, in historia plantar. rarior. lib. I. cap. 5. describitur. Cum autem quæ hac de re notatu digna sunt, ex epistola D. Heinrichi Hojeri Medici recenseat, ea hic inferere libet: *Ex ipso fructu*, inquit, *Electuarium*, *rudi Minerva*, conficiunt quotannis Norvvegi, atque *Finnmarchij*, in hunc ferme modum. *Baccas in fictili aut aheno per se ad mediocrem consistentiam coquunt*, nullo alio addito liquore: cum enim succi plena sint, molles, alieno humore irrigari non expetunt: quanquam in delicatioribus sunt nonnulli, qui melicrati Fionensis, (quo summè delectantur Dan. Sennerti Tom. I I.

*Septentrionales isti*) aliquid affundunt. Hanc confectioem idoneis vasis exceptam, & ne corrumpatur ab ambiente aere, butyro dissoluto obductam, vsui studiosissimè reseruant: nobile sanè, & probatissimum illis aduersus scorbutum remedium. Etenim non faciliè credas, quæ miracula ista gens sola hac medicinâ faciat quotidie: vt omnino fatendum sit, nihil ad hanc esse vel cochleariam illam, tot encomiis hætenus celebratam, vel becabungam, vel *sympbrium cardaminen* & id genus alia, quibus Germani sese efferunt. Et meritò admiranda singularis Dei benignitas, quod Nordlandia longius ad septentrionem remota, & fœdissimis morbis ob calidæ solique inclementiam miserabiliter scatenti, indigenis remediis prospicere voluerit. Enim verò morborum crudorum, putridorum, melancholicorum mira hic ubique seges. Idcirco necessitas miseros rusticanos varia auxilia edocuit, vt nunc vel in grauissimis casibus pauperculus aliquis accommodatè sibi suisque mederi sciat. Ita nonnulli scorbuticos, quamuis ridiculè, tamen bene, atque vtiliter hunc in modum curant: In vicinam aliquam insulam moris abundantem exponunt, ibidemque solos relictos domum non transferunt, priusquam sanitati sunt restituti. Tunc enim illi, quasi ab omni humanitate exclusi, vita tamen (quod credibile est) cupidi, moris vesci coguntur, siue vt extremo remedio promissam sanitatem recuperare tentent, siue, vt sitim, qua vt plurimum torquentur, extinguant. Dumque hoc ad satietatem agunt, sine dubio intra paucos dies oppidò conualescunt. Hyeme verò, quando id non licet, electuario suo non minus feliciter viuunt, sine certa dosi aut custodia. Alioqui toto curationis tempore nullo alio alimento viuunt. Hætenus Hojerus.

Idem Dn. Doctor Iohan. Dieterus ad me perscripsit, in Finlandia ad morbum hunc siue debellandum siue præcauendum in vfu esse Rangiferorum sanguinem, quem, dum inactantur, manu exceptum hauriunt: An quia hoc animal abundanti passione chamæmori, cuius fertilis, vt fertur, est ista regio, qualitatem huic morbo aduersam sibi conciliat.

Sunt præterea & alia quædam, quæ, etsi cum prioribus æqualem efficaciam non habent, & ipsa tamen ad hoc malum satis vtilia sunt; vt *fumaria*, *absinthium*, idque vulgare potius, quam Romanum, seu *Ponticum*; cum non solum aperiat, & detergat, sed & roboret, *carduus benedictus*, *cuscutha*, *ceterach*, *scolopendrium*, *hyssopus*, *capillæ* *qis*, *chamedrys*, *betonica*, *agrimonia*, *polypod. quernum*, *buglossum*, *borrago*, *radices helenij*, *oxylapathi*, *asari*, *cortic. tamarisci*, *capparum*, *flores & semen geniste*, *flores sambuci*, *sem. agni casti*, *epithymum*: & vbi febris ac calor adest, *cichorium*, *endiuia*, *acetosa*, *acetosella*, *succus citri*, *limonum*, *aurantiorum*: Quorum loco etiam *Spiritus Olib.*, *Oli. sulphuris* exhiberi possunt.

Hoc enim hic omnino etiam notandum, cautione quadam in exhibendis illis antiscorbuticis medicamentis, quæ omnia ferè sunt calida, & acria, opus esse. Nam cum isti humori crudo, & crasso varij alij humores in corpore abundantes admisceri possint, ique sæpe biliosi & calidi, ac humores in hypochondriis detenti efferuescant quasi, & calorem quandam concipiant, cauendum, ne medicamentis nimium calidis malum exasperetur. Itaque non incommode cum sero lactis talia medicamenta exhibentur.

Rectè autem de medicamentis scorbuto propriis movent auctores, in succis maiorem efficaciam esse, quam in decoctis; & testatur id experientia. Cuius rei causa est, quod maximam efficaciam habeant hæc medicamenta à sale volatili, qui coctione dissipatur, vt & in exsiccatione plerumque euanescent: in succis verò, vt & in conseruis, ferè integer manet. Ideo raphanus rusticus in conueniente liquore macerandus, ex cochlearia, nasturtio, becabunga succus exprimendus, vel conseruanda.

Multò minus hic locum habent, aut alijs præferenda sunt, extracta cochleariæ, nasturtij, quæ quidam ne

Admonitio de medicamentis antiscorbuticis.

Extracta in scorbuto an vsurpanda.

non chymici esse videantur, præ aliis commendant. Etsi enim è quibusdam plantis vtilia ad scorbutum extracta parari posse, non negem: tamen ex istis plantis, quarum vis maximè in sale volatili constat, hoc fieri non potest; cum sal iste volatilis cum spiritu vini, vel quocunque alio, qui ad extrahendum adhibetur, liquore sese vniat, & auolet, & corpus ita sale hoc destitutum maxima ex parte inefficax ad hunc morbum curandum relinquatur.

Ex his varia composita parantur, quorum aliqua recensere libet.

### Decocta & potiones.

Pauperibus propinari potest cerenisia, in qua nasturt, aquat, cochlearia & becabunga cocta sint. Vel eadem in lacte coquantur.

Paratu facile, & nullibi ferè deficiens medicamentum est hoc;

℞. Nasturtij aquat. M.iii. & cum haberi potest, acetose minoris in agris nascentis cum toto M.ii.

Concidantur crasso modo, & per noctem macerentur in lactis caprini lb. viii. Postea coquantur ad lb. ii. consumptionem, & colentur. Colaturæ Vnc. vi. bibat æger mane, & horis duabus ante cœnam, & medicamenti huius usum continuet, donec melius se habere animaduertat.

Vel coquatur cochlearia, & becabunga in lacte dulci, si febris absit; vel si febris adsit, in lactis sero, & decoctum exhibeatur, quo solo multos scorbuticos se curasse testatur Eugalenus.

Verum cum, ut supra dictum, plantæ istæ coctionem fortem non ferant, in vase duplici, & clauso coquendæ, aut infundendæ potius, ne sal volatilis, à quo omnis vis, dissipetur, aut, quod commodius videtur, detur succus harum plantarum in lacte, vel sero lactis. Quo modo hisce medicamentis vulgus in Frisia, Hollandia, & aliis locis lacti assuetum, quo acrimonia eorum nonnihil obrunditur, uti solet. Serum tamen lacte commodius est; eum ab eo caseosæ partes, quæ obstructiones parere possunt, separatæ sint. Et testatur Eugalenus, imò ipsa experientia, longè maiorem efficaciam esse in succis, quam in decoctis. Ne verò succi valde ventriculum offendant, aliquid sacchari, & pulueris cinamomi, ac anisi addi potest, atque ea ipsa de causa etiam conseruarum cochleariæ, & similium plantarum vsus commodissimus est.

Vel ℞. Cochlear. nasturt. aquat. part. aq. becabung. dimid. part.

Contundantur in mortario lapideo, & in lacte caprino, vel sero coquantur, Succus tamen præstat, & ob id non magna liquoris copia affundenda.

Commendatur & decoctum absinthii, atque hoc plurimos, qui paralyti scorbutica citra febrem laborant, se sanasse, testatur Eugalenus.

Et omnino *πικρὸν ὑδαρ*, & longo vsu probatum est medicamentum, quod fit è succo cochlear. nasturt. aquat. silybrii cardamin. & becabunga. Exprimitur ex his plantis succus vel per se, vel affuso lacte, & sero lactis, & Vnc. iiii. vel Vnc. vi. exhibentur. Potest etiam aliquid aquæ cinamomi & sacchari albißimi adici.

Vel ℞. Succor. expressor. Vnc. ii. seri lactis caprini Vnc. iii.

Si adsit calor, addatur succus acetosæ.

Vel ℞. Becabung. cochlear. nasturt. aq. an. M. i.

Contundantur, & infundantur in vino Rhenano; postea colentur cum expressione.

In colatura infundatur nodulus sequens.

℞. Sem. nasturt. Vnc. β. cinamom. garyophyll. macis. an. Drach. i.

Detur quotidie haustus.

Vel ℞. Rad. raphani agr. Vnc. i. cochlear. nasturt. aq. becabung. an. M. i. fumaria M. β.

Contusis in mortario marmoreo affunde lactis, vel seri lactis caprini lb. i. β.

Stent in loco calido hor. 12. postea colentur.

Colaturæ add. croci scrup. i. cinamom. Drach. i. sem. vel aqua cinamom. Drach. β. Misc.

Vel pareretur hoc decoctum.

℞. Rad. cichor. fœnicul. raphani rustic. an. Vnc. i. ari præpar. Drach. β. cochlear. nasturt. aq. becabung. an. M. ii. cardui benedict. fumar. centaury. minor. absinth. an. M. β.

In vase clauso coquantur in seri lactis caprini vel vini Rhenani lb. iiii.

Vel ℞. Nasturt. aq. cochlear. an. M. ii. radic. raphan. agrest. Vnc. β. galanga. cinamom. an. Drach. ii.

Conquass. omnia in mortario lapideo, & affusa s. q. seri lactis stent in loco calido per noctem, mane colentur.

Et de talibus potionibus mane, & horis duabus ante cœnam haustus exhibeatur; commodumque est, si æger post haustum matutinum sumptum in lecto sudare possit.

Vel ℞. succi herb. cochlear. nasturt. aquat. an. cochlear. ij. chelid. minor. acetos. an. cochlear. j. absinthij cochl. s.

Misce cum haustu seri lactis, Aq. cinamomi parum.

Vtatur æger quotidie manè superludando per horam, vel quantum vires ferunt.

Vel ℞. Cochlear. M. i. β. acetos. recent. M. j. seri lactis caprini vel vaccini q. s.

Efferueant in vase duplici clauso, & stent infusa, donec refrigerentur.

Colaturæ

℞. Pro singulis dosibus Vnc. iiii. syr. è succo cochlear. Vnc. j. aq. cinamomi Drach. ii.

Misce.

Pro vnica dosi, & sic singulis diebus, quamdiu opus erit.

Vel ℞. Succi sedi medij seu vermicularis. becabunga. nasturtij aq. cochlear. an. Vnc. β. seri lactis caprini. ℥. ii. croci, macis, cardamomi an. scrup. β. aq. cinamomi, Drach. i.

Misce pro haustu.

Vel ℞. Becabungæ, nasturt. aquat. cochlear. ana M. iii.

Contusis adde seminis Eruca, rad. Iridis nostratis hortensis, an. Vnc. β. zingiber. garyophyll. an. Drach. j.

Coq. Cum vini rubri lb. ii.

Colaturæ per aliquot dies mane detur. cyathus vnus, ægerque ad sudorem se componat.

In iis, qui frigidioris sunt constitutionis.

℞. Becabungæ, nasturtij, cochlear. an. M. i. cinamom. galanga, croci an. scrup. ii. spica Indica Drach. β.

Macerentur in vini albi sextariis ij. Factaque leni ebullitione colentur.

Colaturæ manè & vespere haustus sumatur.

Vel ℞. Cochlear. becabung. nasturt. aquat. an. M. j. radic. raphan. agrest. Vnc. iβ.

Contundantur in mortario marmoreo, & affund. lactis caprini q. s. & bene misceantur. Stent in infusione horis xii. postea Coq. horæ semisse in vase duplici.

Colentur, & exhibeatur. Dosis Vnc. vi. mane, & horis duabus ante cœnam.

Si ventriculus sit debilis, aliquid cinamom. vel zingiber. addi potest. Et si corpus sit frigidius & cedematofum, maceratio & coctio in Vino Rhenano fieri potest.

Semen erucæ contusum, & in nodulo ligatum, ac in vino maceratum etiam ad curandum scorbutum vtile est.

Vel ℞. Radic. polypod. q. cichorij an. Vnc. j. raphanici. raphani rustic. an. Vnc. β. radic. ari præpar. 3. ii. nasturt. aquat. fumar. absinth. ceterach. an. M. i.

Coq. in sero lactis in vase duplici, & Colatura saccharo, si placet, dulcoretur.

Vel ℞. sem. erucæ Drach. ii. nasturtij aq. absinth. ana



an. Drach. i. ceterach, M. ii. lingua cernua. M. B. croci scr. i. cinamom. Drach. i.

Affundatur vini q. s.

Nonnulli & cortices radices iuglandis cum nasturtio copiosiore coctas commendant.

Recenset VVierus & alij quædam medicamenta, quæ iis in locis, ubi Scorbutus familiaris est, vulgò usurpari solent. Hoc remedio infinitos curatos scribit:

℞. Absinth. vulgaris, granor. iuniper. contusor. an. M. i. lactis caprini mensur. i. vel lb. iiii.

Coq. ad tertiæ vel quartæ partis consumptionem, post colentur cum forti expressione.

Colatura add. croci Drach. B. vel Drach. i. & semel, atque iterum rursus ebulliant, & denud colentur. Decocti huius haustus repidus ter de die propinetur, mane, hora 3. pomeridiana, & cubitum ituro.

Alij hoc usurpant:

℞. Becabung. nasturt. aq. an. M. iiii.

Contusis adde semin. eruca. radic. iridis celestis ana Vnc. B. zingiber. Drach. ii. piper longi Drach. i.

Postea affunde mensur. dimid. vini rubr. & Colentur. De quo mane detur haustus, ægerque in lecto rectus fudet, idque continetur 9. diebus.

Idem VVierus in Frisia Orientali hunc potum ingratum, & abominabilem in usu esse dicit:

℞. Vini Rhen. mensur. vi. deinde ℞. rad. raphani agr. Vnc. iiii.

Quæ contundantur, & contusis affundatur pars vini, & hora j. macerentur, postea colentur, & Colatura cum vino reliquo misceatur. In huius vini parte aliqua dissolue stercoris taurini, & anserini (pro quibus malum ouillum substituere, quo in sero lactis dissoluto, & colato febris iis in locis, proculdubio scorbuticas, à quibusdam curari audio) ana partem, quæ tres nuces iuglandes æquet: dissolutum coletur cum forti expressione, & Colatura cum reliquo vino misceatur, in quo suspendatur in nodulo hor. 24. pulueris nucis moschat. & garyophyll. an. Drac. ii. Hunc potum, quoties sitit, ægro exhibent, & nullum alium potum præbent. Vbi febris & calor coniunctus est, lac eburyratum, ut appellant, in quo cochlearia & bekabunga cocta sint, vel cum succo earum exhibeatur.

### Syrupi.

Syrupus sceleris Foresti hic est. Recipe succi cochlearia, becabunga ana lb. iiii. sacchar. optimi lb. ii. Coquantur simul, & f. a.

F. Syrupus.

Syrupus cochlearia compositus, Vratisslauiæ vfitatus, & olim à Reipub. illius Medico ordinario, D. Calparo Packischio præscriptus.

℞. Herb. cochlear. nasturt. aq. agrimonia, Siy aquat. asplenij, hemionitid. salvia, capill. q. chamadryos, prassij, fumaria, veronica, pentaphylli, fol. ebuli, an. M. i. sem. anisi, feniculi, nasturtij, apij, petroselinij, pulpa sem. brusci, asparagi, an. Drach. i. melon. Drach. ii. rad. filicis cenanthe, asparagi, pimpinella, borraginis, bugloss. polypod. ruffilaginij, glycyrrh. taraxaci, cortic. radic. sappar. an. Dr. i. B. fol. hepatica, borraginis an. M. B.

F. Horum omnium f. a. decoctio in f. q. Aq. nasturt. aquat. ad remanentiam, Vnc. xl.

Stent in decoctione vsque ad infrigidationem.

Colentur cum forti expressione.

Colatura adde sacch. rub. opt. lb. iiii.

Bulliant lentissimo igne ad spissitudinem Syrupi. Clarificentur & aromatizentur cum subscripto nodulo, qui

℞. Pulv. rhabarb. Drach. iiii. cinam. Drach. i. garyophyll. macis. an. scrup. ii.

### Aqua destillata.

Quibus decocta non arident, iis aqua destillata co-

chlearia, nasturtij aquat. vel aquæ compositæ scorbuticæ exhibeantur. Et semper danda est opera, ut ad talia medicamenta æger fudet.

Aqua scorbutica à Quercetano, cap. 7. Pharmacop. descripta hæc est.

℞. Cort. Capparum, fraxini, tamarisci, rad. polypodij querni an. Vnc. ii. herb. cochlearia, nasturtij aquatici, summitatum melissa, eupatorij Mesua, ceterach, chamadr. chamapir. an. M. ii. sem. feniculi, anisi, cardui benedict. an. Drach. i. sem. flor. genista, centaurij minoris, hyperici, sambuci, epithymi ana P. ii.

Omnia macerentur per tres dies, in aq. fumaria, seri lactis an. lb. iiii. vini albi generosi, lb. iv. oxymelitis scillitici, lb. i.

Dein colentur & exprimantur: expressioni adde trochiscorum de capparibus, dialacca Drach. vi.

Postea destillantur per cineres ad siccitatem. Dosis Vnc. ii. mane tribus horis ante cibum, continuando per aliquot dies secundum morbi magnitudinem.

Aqua scorbutica Tobiz Dorncreilii hæc est.

℞. Rad. raphani sylvestris acerrimi lb. iiii. polypod. querni mundi Vnc. i. B. cort. rad. cappar. Vnc. B. sem. feniculi Vnc. i. cardamomi Vnc. ii. croci Orientalis 3. i.

Radices raphani incidantur in orbiculos tenuissimos; reliqua verò puluerizentur subtilissimè, & simul infundantur in vini Rhenani albi lb. xvi. & stent in infusione in loco calido per octiduum, vase quotidie semel atque iterum agitato.

Deinde adde aqua cochlearia, becabunga, nasturtij aquatici an. lb. i. B. chamadryos vera, fumaria compositi an. lb. i. seri lactis caprini lb. i. B.

Misce & destillantur in balneo Mariæ igne lentissimo.

Nostræ aquæ scorbuticæ hæc est descriptio.

℞. Cortic. tamarisci, fraxini, rad. cappar. rad. polypod. q. aperient. ana Vnc. i. gentiana 3. vi. helenij, ari, cortic. citri, an. 3. B. chamadryos, chamapityos, cardui benedicti an. M. i. trochisc. de absinthio, de capparibus an. Vnc. i. sem. eruca 3. B.

Contundantur. Contusis Adde

Rad. raphan. sylvestr. acerr. lb. i. sem. nasturtij aquat. cochlear. becabung. fumar. an. lb. iiii.

Et cum prioribus contundendo misceantur, & f. a. digerantur, & affusâ vini Rhenan. aq. cuscute. cardui benedict. an. f. q.

Destillantur.

Aqua antiscorbutica Dn. D. Michaelis Döringii Physici Vratisslauiensis.

℞. Herb. cochlearia, nasturtij aq. becabunga nummularia, chelidony minor. (vel in defectu rad. eius) barbarea siue accipitr. an. M. i. flor. cordial. ana Drach. ii. calend. 3. B. rad. gentiana 3. i. sem. calami arom. 3. vi. helenij, ari an. Vnc. sem. cortic. citri siccor. aurant. siccor. ana Drach. iiii. trochisc. de eupator, Drach. vi. sem. cuscute. Vnc. sem. cochlearia, nasturtij aq. anisi, feniculi ana Drach. ii.

Infundantur per triduum in aq. fumaria, cuscute, cardui bened. an. lb. iiii. vini albi generosi lb. ii. aq. nostra melissa comp. lb. B.

F. f. a. in vasis vitreis per B. M. destillatio, suspendendo in alembico nodulum specier. diamb. 3. ii.

Aqua melissæ composita, qua potissimum apud fœminas, ad cor & vterum roborandum, flatus dispellendos, & id genus affectus vitur, hæc est.

℞. Herba melissa vera M. vi. cardui bened. flor. calendule an. M. i. B. cortic. citri siccor. Drach. vi. cinamom. acutiss. 3. B. rad. angelica, calami arom. pimpinella ana Drach. ii. croci integri 3. i.

Infundantur in vini Vngarici opt. quart. iiii. vini destillari rectificari 3. iiii.

Stent in infusione per dies quatuor, quotidie agitando. Postea destillantur per B. M. in vase vitreo.

Alia eiusdem.

℥. *Herba cochlearia*, *becabunga*, *nasturtij aq. fumarie*, *verbena*, *chamapit.* an. M. i. *flor. genista*, *hyperic. borrag.* *bugloss.* an. M. B. *rad. helenij*, *chelidonij major.* (de quo se verè affirmare posse testatur, se eius solius succo expresso cum vino vel cereuisia exhibito apud pauperes semel atque iterum lienem tumentem ac dolentem persanasse) an. Drach. vi. *cortic. citri* ℥. B. *trochisc. de rbabarb.* Drach. v. *sem. cuscute* ℥. i. *anisi*, *feniculi* an. Vnc. sem. *galanga* Drach. vi.

Infundantur per triduum in *aq. fumar. cuscute*, *cardui benedict.* *vini albi generosi*, *maluatici* ana ℥. i. B.

F. s. a. in vasis vitreis destillatio, suspendendo in alembico nodulum ex specierum diambra ℥. ii.

Vel ℥. *Succi sedi med.* ℥. i. *sem. cochlear.* ℥. i. *Vermicularis seu sedi min.* ℥. iii. *anagallid.* *aquat. seu becabung.* *nasturtij aquat.* an. ℥. B. *nummularie* ℥. iii.

Succi hi optimi depurentur per digestionem in balneo roris, deinde digerantur cum *rad. acori vulg.* ℥. iv. benè incis. per duos dies naturales, postea exprimantur. Colentur optimè. Adde sacchari parum vel q. s. Destillentur in balneo vaporoso, vasis bene oclusis, ad consistentiam mellis. Aqua per se seruetur, seorsim etiam extractum. Ex capite mortuo seu herbis residuis sal arte extractus, & ipse seruetur.

Vel ℥. *Rad. scorzonera*, *sarsa parilla* an. ℥. ii. *cort. tamarisci*, *fraxini* an. ℥. i. B. *cochlear. recentis*, *nasturtij aquat.* *becabunga*, *nummularia*, *agerati*, *chamedryos*, *chamapityos*, *cererach*, *melissa* an. M. ii. *sem. cardui Mar.* *aquileg.* *carduib.* an. Vnc. sem. *fenic.* *Scrup. ii. flor. genista*, *hyperici*, *sambuci*, *centaur. minor.* an. M. i.

Infundantur in *seri lactis*, *aq. fumarie vel nasturtij aquat.* *vini albi* an. ℥. iv. Destillentur per cineres. Liqueoris mane Vnc. ii. exhibeantur.

Vel ℥. *Cochlear. nasturt.* *aquat. becabung.* an. M. iv. *nummularia*, *absinth. fumar. scordij*, *persicaria*, *meliss. chamadr.* *chamapit.* M. i. *sarsa parilla*, *ligni guaiaci* ana ℥. iii. *aq. nasturtij aquat.* *agrimon.* *vini albi* ana quantum satur.

Destillentur.

Vel ℥. *nasturt.* *aquat. cochlear.* an. M. iii. *absinth. sedi minoris* an. M. ii. *rad. raphani agrest.* in orbiculos concis. ℥. iv. *scorzonera* ℥. i. *cort. rad. cappar. tamarisci* ana Drach. iij. *sem. fenic.* Drach. vi. *granor. paradisi. cardamomi. croci* an. Drach. i.

Affunde *Rhenani vini* ℥. xvi. *aq. cochl. fumar.* an. ℥. i. *seri caprini* ℥. ii.

Stent in balneo tepido per diem, postea destillentur. Detur destillatum continuis diebus ad Vnc. iii.

Vel ℥. *Cochlear. becabung. nasturt.* *aquat. persicar. nummular.* ana M. i. *chamedryos*, *chamapit. scordij* an. M. sem. *rad. helenij*, *filicis*, *ireos*, *asari*, *scorzonera*, *sarsa parilla* ana Vnc. i. *cort. tamarisci*, *cappar. fraxini* an. Drach. ii. *flor. sambuci*, *borrag.* an. M. i. *gran. iuniperi contusor.* ℥. iii. *cort. citri*, *cinamom.* an. Drach. iii. *croci*, *spica Indica* an. Drach. ii. *sem. eruce*, *urtica*, *fenic.* an. Drach. i. B.

Affunde *aq. bugloss.* *melisse*, *nasturtij aq.* an. part. iij. *succi limonum*, *aceri runc.* *sambuci* an. part. i.

Digerantur diebus aliquot in vase clauso. Postea exprimatur succus: Expressus in B. ad sapæ consistentiam destilletur.

Remanentia affundatur aqua destillata, *oxymel. scillit.* ℥. i. *vini* ℥. iii.

Diebus aliquot digerantur, iterumque destillentur.

### Spiritus.

Efficacior est spiritus harum plantarum, id est, liquor ex viridi planta exstillans, per crebram destillationem ab humore aqueo maxima ex parte separatus, qui totam ferè vim, quæ in magna mole est plantæ, huic affectui conueniens, complectitur. Potest enim ex cochlearia, nasturtio, centaur. minor. aliisque plantis æquè ardens spiritus ac ex vino elici, quod qui non

expertus est, vix credit. Totum autem artificium in fermentatione & digestionem consistit.

### Extracta liquida, seu essentia.

Commendat Ronfseus *absinthij, cochlearie, fumarie, chamadr. tincturam*, aut essentiam, eamque in morbis melancholicis, & qui iam radices multos annos fixerant, plurimum potuisse, se compertum habere scribit; & Nobilem quendam, qui multos annos flaribus hypochondriacis laborasset, ac vere, & autumnovariis, multisque pharmacis se macerasset, tandem sola fumarie, & chamadryos quinta essentia, ut appellat, minimo negotio restitutum fuisse, & hoc ceu domestico, ac familiari medicamento ad annos plus minus 12. ad morbi præcautionem felici successu usum fuisse, refert.

Paratur autem hæc tinctura, ut & lib. 3. *Instit. part. 3. f. 3. cap. 9.* docuimus, si spiritu vini optimo herbæ macerentur, donec tincturam, seu viriditatem herbarum imbibat, deinde reiectis iis herbis, nouisque additis infusio repetatur, idque ter, vel quater, donec spiritus vini tinctura, & essentia plantarum saturatus sit; cuius tincturæ agro manè paruum cochleare propinetur.

His tincturis cognati sunt liquores, quos nonnulli essentias nominant. Ex plantis conuenientibus, cochlearia, fumarie & similibus exprimitur succus, qui in Baln. digeritur, donec sedimentum crassum subsideat, & reliquus succus clarescere & rubescere incipiat. Tum quod clarum est per inclinationem à fecibus separatur, atque iterum digeritur, donec feces nullæ amplius subsideant. Ut diutius asservari possit hic liquor, eius libræ vni sacch. Vnc. iii. addi, & Baln. calore ad syrupi liquidi consistentiam coqui possunt.

### Mixtura.

Potest & ad hoc malum debellandum mixtura talis parari.

℥. *Spirit. tartari compos.* quem vulg. misturam simp. nominant, Vnc. ii. *extr. gran. iuniper.* Drach. ii. *pimpinell. calam. arom.* an. Drach. sem. *croci* *Scrup. B. essentia, spiritus*, vel in defectu, *succi vel syr. cochlearie, nasturtij aq.* an. Drach. ii. *syr. cinamom.* Vnc. sem. *fumarie, acetos. citri* an. Vnc. i.

Misceantur omnia exactè, digerantur, colentur. Dosis à Drach. i. ad Drach. iii.

### Electuaria.

Vel ℥. *Conseru. cochlearie* Drach. ii. *chamadr. acetos. cichorij, rad. condit. helenij* an. Vnc. sem. Cum *syr. acetos. citri*, & *endivia*, vel *byzant.*

F. Electuarium.

Vel ℥. *Conseru. fumar. cochlear.* an. Vnc. i. *absinth. borrag. rad. condit. pimpinella, cichorij* ana Vnc. sem. *spec. diarrhod. abbat. diapliris.* an. Drach. sem.

Cum *syrup. acetos. citri* F. Electuarium.

Vel ℥. *Conseru. cochlearie* ℥. iii. *fumar. flor. genista, borragin. ineliss.* ana Vnc. i. sem. *cortic. citri condit. nucis Indic. condit.* an. ℥. i. *extr. gran. iuniperi.* ℥. ii. *confect. alchem.* ℥. i. Cum *syr. cochlear. vel sceletyrh.*

Fiat Electuarium.

### Pulueres.

In corporibus frigidioribus hic pulvis usurpari potest.

℥. *Cubebar. macis, granor. paradisi.* ana Drach. sem. *sem. eruce*, ℥. iv. *croci* ℥. ii. F. puluis.

Dosis Drach. i. cum *lact. caprini* Vnc. iv. mane & vesperti.

Laudatur & hic pulvis.

℥. *Cina*

*℞. Cinamomi opt. nuc. mosch. sem. nasturt. an. 3. ij. croci*  
Scr. ij.

F. Pulvis.

Dosis 3. j. cum aq. cochlear. vel fumaria, dulcoratis  
syr. fumar. vel cochlear.

Non sine fructu etiam in scorbuto exhibetur pulvis  
ille D. Birckmanni, quem, eiusque vires Quercetan.  
pharmacop. dogm. rest. lib. 1. c. 20. descripsit, qui, si liber,  
additione salis nasturt. cochleariæ, sem. erucæ, croco &  
aliis huic morbo accommodatior reddi potest. Paratur  
autem hoc modo.

*℞. Rad. ari preparat. ut Quercetanus ibi docet*  
Vnc. ij. acori vulg. (forfan acori veri, vulgò calami  
aromatici dicti) pimpinella an. 3. i. oculor. canceri prep.  
3. B. cinamom. 3. iii. salis absinthij, iuniperi an. 3. j. sacch.  
ros. q. s.

F. Pulvis.

Vel *℞. Rad. ari prepar. 3. ij. pimpinella, calami*  
arom. ligni rhodij an. 3. B. nunnular. fdr. genista, sem.  
nasturt. erucæ, fenic. carui an. 3. ii. caryophyll. cubeb.  
zingib. an. 3. i. cinam. 3. ii. salis fraxini, tamarisci ab-  
sintij an. 3. B.

Rotulæ diarrhod. vel diapliris ad pondus omnium.

F. Pulvis.

#### Rotulæ & morsuli.

Rotulæ &  
morsuli.

Possunt ex pulveribus rotulæ & morsuli formari, ad-  
ditis, speciebus diapliris, diarrhod. diatrionfantal. con-  
fect. de hyacintho, cordial. temper. trochisc. de cappari-  
ribus.

Postquam aliquoties hæc medicamenta usurpara-  
uerint, utile est, si morbus non cedit, purgationes su-  
prà præscriptas repetere, præcipuè si alius officium  
non facit, & deinde iterum ad horum medicamento-  
rum usum redire, quæ tum insensibiliter, tum sensibili-  
ter per vrinas, & sudores vitiosorum humorum reli-  
quias euacuare, & discutere valent; qua in re quò  
natura vergat, videndum, eiusque conatui à Medico  
succurrendum, ut mox dicetur.

Acidula.

Non etiam incommodus est usus acidularum, cum  
& illarum potus materiam scorbuticam euacuare, &  
absumere possit, præcipuè ferratarum, cum aliàs cha-  
lybs in obstructionibus lienis summum sit remedium;  
de qua re videatur Epistola Romflei, quam de quæstio-  
ne, An acidulæ scorbuto conueniant, scripsit. Si verò  
fontium acidulorum copia non detur, chalybs præpa-  
ratus, & crocus martis aperiens illorum loco usurpari  
possunt. Vim enim & obstructiones viscerum, præci-  
puè lienis aperiendi, & aluum mouendi in chalybe  
esse, non solum recentiores, Fallopius, Crato, Plate-  
rus, Guiljelmus Fabricius, & alij deprehende-  
runt, sed & iam olim Dioscorides, lib. 5. cap. 50.  
vim aluum mouendi squamæ stomomatis inesse anno-  
tauit.

Chalybs præ-  
paratus.

Vrinæ ci-  
liæ.

Ut reliquæ è corpore exterminentur, videndum,  
quò natura vergat. Quæ circa primas vias & lienem  
est materia, sæpe satis commodè per vrinas, quæ  
crassæ & nigre tum redduntur, euacuatur. Itaque  
si materiam ad vias vrinæ vergere videmus, idoneis  
medicamentis ea adiuvanda, quem in usum pleraque  
medicamenta contra scorbutum pugnancia vtilia  
sunt, & inter ea fumaria. Et omnino diuretica, præ-  
cipuè ex scorbuticis illis, habent magnam vim hunc  
morbum curandi. Vnde Hippocrates, de internis affect.  
lienosis diuretica dare præcipit. Et Galenus, 1. ad. Glau-  
c. cap. 11. in omni quartana iubet uti diureticis, & 2.  
ad Glau. 11. lienem per vrinas purgat, & 7. de simpl.  
med. fac. cappares lienem per vrinas purgare scribit.  
De via ut folliciti & anxii simus, opus non est. Est  
ea satis manifesta & compendiosa per arterias. Habet  
enim lien illas copiosas, per quas breui via ad vias  
vrinarias superflua è liene euacuari possunt. Vallerius,

ad Hollerium lib. 1. cap. 40. recitat historiam religiosi  
cuiusdam, cui ter, aut quater in anno intumescere  
lien, cum dolore eius lateris totiusque abdominis  
tumore incipiente. Hic tandem nigris erumpentibus  
vrinis, atramento similibus per quinque aut septem  
dies continuantibus, pristinam recipere solitus est in-  
columitatem.

Præter alia autem hic etiam vtilia sunt, sem.  
quatuor frigida maiora, eruca, rad. valerianæ,  
cortic. radic. cappar. & tamarisci, leuistic. baccæ  
iuniperi.

Quæ verò in ambitu corporis hærent reliquæ, ex Sudorifera  
cùm sensibiliter tum insensibiliter discutiendæ sunt. & balnea.

Ad eas sensibiliter discutiendas balneum & Laconicū  
institui potest; in aqua autem balnei coquantur folia  
& radices maluæ, brançæ vrsinæ, becabungæ, nasturt.  
aquat. artemisia, flores meliloti, chamæmeli, beto-  
nica, absinth. grana iuniperi, semen lini, baccæ lau-  
ri; ægerque in balneum, vel laconicum descen-  
sus sumat decoctum; vel succum vel aq. acetosæ, beca-  
bungæ, nasturtii, cochleariæ, fumaricæ cum vino, cui  
salis absinthij, vel cardui benedict. Scr. i. addere com-  
modum est: vel sumat rob. sambuci 3. iii. salis absin-  
thij vel carduiben. 3. i. cum aqua fumaricæ, cochlea-  
riæ, nasturtii, carduiben. pimpinellæ; vel pulueris  
pimpinell. Dra. i. cum aq. fumaricæ; vel etiam ali-  
quid theriacæ, aut Mithridatii. Postea decocto her-  
barum modò enumeratarum totum corpus abluatur  
ac herbis ipsis coctis fricetur. Eadem etiam extra bal-  
neum, ut æger in lecto sudet, exhiberi possunt, at-  
que eum in finem usurpari etiam decoctum guaiac.  
sarsæ parillæ, chinæ, & diaphoret. bezoarticum mine-  
rale.

Salomon Albertus ad sudorem ciendum hoc phar-  
macum exhibet.

*℞. Gentiana 3. i. rad. asari 3. B. cinamom. 3. i.*  
piperis, zingiber. an. 3. B. myrrha 3. i. croci  
gr. iii.

Cuius pars vna detur in balneum se demittenti, alte-  
ra è balneo exeunti cum 3. iii. huius potiunculæ.

*℞. Acetosell. becabung. fumaria, nasturt. aq. an.*  
M. sem.

Contusa in mortario marmoreo macerentur in vini  
albi lb. i. Exprimatur succus.

*℞. Gentiana 3. ii. calami aromatic. piperis, zingib. an.*  
3. B. myrrh. rubra 3. B. croci gr. xv.

Detur 3. i. ingredienti balneum, & tantundem egre-  
dienticum liquoris sequentis 3. iii.

*℞. Becabung. sisymbrij cardamines, fumaria, acetosa*  
an. M. i.

Contundantur in mortario lapideo, & cum vini  
Rhenani lb. j. exprimatur succus.

Ad sudorem etiam mistura simpl. exhiberi potest,  
vel aq. theriacalis.

Vel vice Laconici aut balnei in lecto æger stragulis  
opertus sudet, iisdem vel hac potione assumpta.

*℞. Nasturt. aq. becabung. cochlear. an. M. i.*

Contundantur in mortario marmoreo, & succus ex-  
primatur.

Adde piperis longi, zingiber. sem. eruca, sinapis  
an. 3. B.

Affundatur vini sextarius, vel paulò plus. Succo ex-  
pressi calefacti exhibeantur 3. v. mane per dies aliquot.  
Et plerumque plus sudationibus, quam purgationibus,  
ac venæ sectione perficitur.

Si venter, & crura intumuerunt, tale decoctum ad  
sudandum parari potest.

*℞. Absinth. ruta, matricaria, chelidonij min. le-*  
uistici cum toto an. M. ii. flor. chamamel. M. i. sem. eru-  
ca M. i. B. sulphuris 3. i.

Coq. in f. q. vini, quo lapides igniti perfundantur,  
vel fumus membris tumidis excipiat.

Aut si æger ob debilitatem balneum tolerare non  
possit,

possit, paretur hoc decoctum, quo linteamina imbuan-  
tur, iisque calidis corpus sæpius abstergatur.

℞. Ligni guaiaci, cort. berber. sambuci sem. eruce an.  
℔. 8. matricaria ℔. ij. nitri, aluminis an. 3. iij. vini q. s.

Tandem cum à colluvie prauorum humorum eo-  
rumque vaporibus viscera, imprimis lien, hepar, ven-  
tricularius, & ut cor, pulmones, cerebrum labefactari,  
iisque praua dispositio imprimi soleat, necessarium est,  
ut contra has iniurias viscera roborentur, licet pra-  
uitas humorum deuicta sit, humoresque prauis  
corpore exturbati, membris, quæ labefactata & à  
naturali constitutione deiecta sunt, succurratur iis  
remediis, quæ labem impressam eluere, spiritus instau-  
rare, viscerumque tonum restituere valent.

**Roborantia.** In hoc vero negotio expediendo obseruandum, quæ  
pars præcipue in consensum trahatur, quamque in pri-  
mis humores vitiosi occupant; ideoque ex antiscor-  
buticis medicamentis ea eligenda, vel iis admiscen-  
da, quæ viscera, & coctioni publicæ dicatas partes  
roborare valent. Itaque ne nauſea aliqua à medicamē-  
torum vsu concilietur, & ventriculus à vitiosis hu-  
moribus, quos in eum Lien, & vicinæ partes eru-  
tant, & flatibus, ac vaporibus, qui ex aluo, & vicinis  
locis in eum ascendunt, flaccescat, & in suo officio de-  
ficiat, roborandus *absinthio*, cuius vel summitates in  
potu macerandæ, vel conserua exhibenda, *conserua rosar.*  
*f. vel vitriol. myrobal. chebulis condit. zingiber. & cortic.*  
*citri conditis nucē Indica condita, syr. de cinamomo, rob.*  
*inniperi, spec. aromat. rosar. diambra, elixir. proprietat.*

Neque externa negligenda, cerorum stomachale, ol.  
menthæ, mastiches, macis, caryophyll. absinthij,  
balsamum Indicum, sacculi stomachales & si-  
milis.

**Hepar.** Ad hepar roborandum vsurpari possunt, *agrimonia,*  
*ageratum, chamadrys, hepatica, spica nardi, absinthium,*  
*spec. diapliris, electuar. de vino Hollerij, diapassulatū eius-*  
*dem, Aqua hepatica & ex hepate vituli destillate, & ubi*  
*aliquis calor coniungitur, cichorium, spec. diarrhod. dia-*  
*rrionsantal.*

Extra etiam fomenta, linimenta, emplastra ap-  
plicentur, quæ hepar roborant, eiusque tonum con-  
seruant.

**Lienem.** Ad lienem *ceterach, lingua ceruina, chamæpitys, cor-*  
*tic. cappar, tamarisci, syr. de pomis, de fumaris, de scolop-*  
*pend. crocus & tinctura J. extractū splenic. Quercetan.*  
*Aq. splenic. compos. aqua schœnanthi Tabernamontani,*  
*trochisci de cappar. puluis diacappar. Rondeletij, oxymel.*  
*splenic. eiusdem, el. de chalybe.*

Extra etiam conuenientia medicamenta vsurpen-  
tur.

**Cor.** Ad cor roborandum *confectio alchermes, conserua*  
*borraginis, bugloss. fl. tunicis, melissa, cortic. citri condit.*  
*f. citri condit. nux Indica condita, syr. de cortic. citri, tuni-*  
*cis, de cinamom. spec. cordial. temper. confect. de hyacinthos.*  
*el. de gemm. diamarg. quibus omnibus admisceatur*  
*cochlearia.*

Foris, ol. citri, cortic. aurant. benzoes, macis, garyophyll.  
cinamom. balsamum Indic. & idonea vnguenta, linimen-  
ta, ac sacculi.

**Pulmones.** Ad pulmones, *Hyssopus, capill. ♀, radic. helenij, con-*  
*serua ros. veronica, fl. iridis, radic. condit. helenij, spec.*  
*diatreos, rob. inniperi, aqua & extract. pectora-*  
*lia.*

Ex. gr. ad Hepar, & Lienem paretur hoc ele-  
ctuarium.

℞. Conserua cochlearia 3. j. B. chamadrys scordij, ci-  
chorij an. 3. j. rad. condit. helenij 3. B. spec. diarrhod. abb.  
diapliris an. 3. B.

Cum syrup. acetosell. F. Electuarium.

Vel hæ rotulæ parentur:

℞. Spec. diarrhod. abbat. 3. iij. diatrion santal. trochis-  
cor. de cappar. an. 3. j. sacchari in aq. nasturt. & agrimon.  
dissolut. 3. iij. F. Rotulæ.

Lien fomentetur decocto flor. geniste, tamarisc. ru-  
ta, urtica. nasturt. aq. & similia. Postea inungatur tali,  
vel simili vnguento.

℞. Ol. de cappar, rutac. amygdal. amarar. sambucin.  
an. 3. B. succi bryonia, filicis, Nicotiana vera an. 3. vj.

Coq. ad succorum consumptionem.

Add. pulp. subtilis radic. asari, cyclamin. cort. rad. cap-  
par. sem. agni casti an. 3. iij. cere q. s.

F. Linimentum.

Vel paretur cataplasma ex radice bryonia cocta in  
vino ad mollitiem, confusa, & cum farina lupino-  
rum, & hordei, ac oleo de cappar. in formam cata-  
plasmatis mista.

Et si tumor, ac durities aliqua Lienis adsit, debito  
modo curetur.

## CAPVT VII.

De Curatione speciali aliquot affectuum, qui  
Scorbuto coniunguntur.

ET si verò plerumque si legitima, & modò iam præ-  
scripto curatio instituatur, symptomata, ac morbi,  
qui scorbutum comitantur, evanescere soleant sponte,  
idque maxime in scorbuto nondum inueterato accidat:  
si tamen malum radices iam egerit, & humores vitiosi  
partem aliquam altius obsederint, peculiaribus in-  
terdum ad aliquos morbos, ac symptomata profigan-  
da remediis opus est. Ideoque aliquid de quorundam  
affectuum, qui cum scorbuto coniungi solent, curatio-  
ne addemus.

Et quidem generalis lex curandi hosce morbos est, ut  
adhibeantur medicamenta, quæ aliàs morbi isti vel sym-  
ptomata, quando vrgent, postulant: his verò admiscean-  
tur, quæ peculiari vi huic morbo aduersantur. Nullus  
enim morbus, qui cum scorbuto coniungitur, integrè  
curatur, nisi simul scorbutus curetur, & medicamen-  
ta scorbutica admisceantur, testaturque experientia,  
medicos sæpe in tertianis, quartanis, hydrope, ictero  
& aliis morbis, qui latentem scorbutum coniunctum  
habent, curandis frustra laborare iis solum medicamen-  
tis, quibus aliàs ij morbi tolli solent, nisi simul antiscor-  
butica exhibeantur. Hæc autem cum capite præ-  
cedente proposuerimus, illa passim è practicum libris  
pateant, & plura sint, quam ut hic recenseri vel pos-  
sint vel debeant, paucis hæc tractabimus.

De Curanda difficili respiratione & pecto-  
ris angustia.

Difficilem primò respirationem, & angustiam il-  
lam quod attinet, non tollitur illa solum thoracis,  
sed adhibenda sunt, quæ scorbutò inprimis resistunt, &  
inprimis cochlearia. Et cum plerumque febres, ac ob-  
structiones cum ea coniungantur, admiscenda, quæ fe-  
brilem calorem temperant, de quibus postea: aperientia  
item, capill. ♀, cuscuta, ceterach. carduus benedict. fu-  
maria, betonica. Eugalenus species pliris archoatic.  
commendat. Vtilis etiam est confectio alchermes, cro-  
cus & alia cordialia.

De gingiuarum corruptione, dentium  
& oris vitis.

Gingiuarum laxitas, putredo & fætor, quod vitium  
Plinius, & Strabo vno nomine Stomacacen nominant,  
curatur medicamentis abstergentibus, putredinem inhi-  
bentibus, partim adstringentibus, & siccantibus, qua-  
lia sunt *aquilegia*, quæ commune nomen cum hoc  
malo, quod Germanis *Ageley* dicitur, habet, *salum, ros-*  
*marinus, hyssopus, bistorta, balanstia, nux moschata, ra-*  
*sa rubra, equisetum, fol. quercus, cortic. granator.*  
cortic.



*cortic. prunor. syluestr. oxyacantha, berber. sumach. rad. aristoloch. bistorta, myrrha, alumen, vitriolum, mel rosatum, diamorum, mel & oxymel. scilliticum, & qui efficacissimus hic; Spiritus vitrioli: quibus & ex iis aliqua addenda, quæ contra scorbutum peculiarem vim habent, vt cochlear. nasturt. aquat. numularia.*

*Collutiones oris.*

Possunt ergo tales plantæ in vino austero, vel aqua coqui, & decocto mel rosatum, & alumen addi, eoque gingiuarum frequenter abluui.

Vt *℥. Tormentilla, bistorta cum radicib. ana M. i. malicorij. Vnc. i. sumach. Vnc. β.*

Coq. in aq. *℥. ii. ad ℥. i. remanentiam.*

Colaturæ add. *aluminis Drach. ii. mellis optim. ℥. ii. Misce.*

Vel *℥. Cortic. radic. prunor. syluestr. fol. & cortic. berber. an. Vnc. i. fol. rubi M. i. rad. pyrethr. aristoloch. ros. filicis, pentaphyll. an. Vnc. β. thuris Drach. i.*

Coq. in vino, & Aqua: decocto add. *mel. ros. & diamori an. Vnc. i.*

Eoque sæpius os colluatur,

Commendatur etiam hæc, vt vsu probata, oris collutio:

*℥. Fol. nasturt. aq. mentha, satureia, ros. rubr. immatur. an. M. β. sem. aquileg. Drach. ii. balaust. Drach. β.*

Coq. in aqua ferrata.

Colatur. *℥. Vnc. viii. adde alumin. scrup. ii. mell. ros. col. Vnc. β. F. Collutio oris.*

Vel *℥. Cochlearia, sisymb. cardamin. nasturt. aq. rosar. rubr. an. M. i.*

Coq. in aqua ferrata.

Colat. *℥. Vnc. x. add. mell. crudi ℥. vi. alumin. ℥. i.*

F. oris collutio.

Vel *℥. Cortic. prunor. syluestr. Vnc. i. cochlear. nasturt. aq. an. M. i. rosar. rubr. M. β. balaustior. ℥. ii.*

Coq. in *℥. q. aqua chalybeata.*

Colaturæ adde aliquid *aluminis, mell. rosar. colati, & diamori. Misce.*

Vel *℥. Cortic. interior. prunor. syluestr. oxyacantha. rosarum rubr. an. M. i.*

Coq. in aq. *℥. iii. ad ℥. i. β.*

Colatura vsurpetur pro oris collutione.

Vel *℥. Aq. plantagin. prunell. an. Vnc. iii. salvia mellis rosar. colat. an. Vnc. i. spiritus vitrioli scrup. sem.*

M. pro oris collutione.

Rel *℥. Salvia M. β. aristolochia, pyrethri. aluminis an. Drach. ii. camphoræ Drach. β.*

Coq. in vini *℥. i. β. Colentur.*

Vel *℥. Salis, alumin. an. Drach. ii. Aqua ℥. i.*

Coq. parum.

Vel *℥. Balaustior. sumach. rosar. rubr. ana Vnc. β.*

Coq. in aq. *℥. iii. ad ℥. ii. add. mellis rosar. Vnc. ii. alumin. Drach. ii. Misce.*

Vel *℥. Plantaginis cum radic. fol. peruin. aquilegia, cimmarum rubi, sambuci an. M. i. fl. rosar. rubr. balaust. an. Vnc. sem.*

Coq. in aq. & vini rubri adstringent. an. *℥. i. β. ad dimid. part. absorptionem.*

Col. adde mell. ros. Vnc. iii. M.

*Aqua destillata.*

Sæpe sola cochleariæ, aut becabungæ, nasturtij vel Nicotianæ aqua sufficere potest, si iis os colluatur.

Vel *℥. Fol. salvia, betonica, aquilegia an. M. ii. ruta, flor. rosar. rubr. an. M. ii. rad. bistorta, pyrethri, sarsaparilla an. Vnc. sem. ireos Fl. Drach. vi. ligni Rhodij Vnc. β. nucis mosch. cinam. myrrh. mastiches, cortic. citri an. ℥. ii. camphoræ scrup. sem. vini Rhenan. ℥. iii. succi cochlear. nasturtij aq. an. lib. sem.*

Stent per dies 7. in infusione in vase bene clauso, quotidie agitentur, hinc destillantur.

Vtile est & plantas quasdam, vt saluiam, cochleariam, nasturtium, numulariam frequenter masticare, vel iis gingiuas fricare, vel cortices citri succulentos frequenter gingiuis affricare.

*Linimenta.*

Vel *℥. Mellis rosar. col. Vnc. j. oxymel. scillit. Vnc. β. alumin. vsti Drach. sem.*

Misce pro Linimento.

Vel *℥. mel. ros. col. Vnc. i. syr. de ros. siccis Vnc. β. spir. vitriol. q. s. ad gratam aciditatem.*

Misc. & mistis bis de die gingiuarum illinantur.

Vel *℥. alumin. vsti ℥. β. nuc. mosch. num. ii. mell. Vnc. sem.*

Misce super igne.

Vel *℥. Mellis scillit. Vnc. i. spiritus vitrioli q. s. ad aciditatem conciliandam.*

Vel *℥. pulu. rad. bistorta Vnc. β. fol. aquileg. Drach. ii. salis scrup. i.*

Cum diamoro redigantur in formam linimenti.

Efficax est hoc linimentum.

*℥. fl. malua arbor. fol. salvia min. aquileg. an. Drach. β. myrrha, nucis moschat. theriac. an. Drach. i. aluminis vsti scrup. ii.*

Puluerifata subigantur cum melle.

F. Linimentum.

Fortius est hoc, & cōueniens gingiuis putrescentibus:

*℥. Mellis Vnc. ii. aceti vini Vnc. i. fl. aris Drach. i. alumin. scrup. i.*

Coquantur, donec rubefiant. Deinde adde *pulu. salvia, nucis moschat. CC. prapar. an. Drach. sem.*

F. Linimentum.

Potest etiam addi *pulu. sanina.*

Vel fricentur singulis diebus manè, ac vespere gingiuarum sale & aceto, donec sanguis ex gingiuis profluat: aut colluatur os decocto sedi minoris, seu vermicularis.

Vsu longo expertum est hoc Linimentum:

*℥. Pulu. fol. aquileg. mentha crispa, salvia, nuc. mosch. myrrha (quam tamen quidam omittunt) an. Drach. ii. aluminis vsti Vnc. β. (alii Drach. x.) mellis virginiei Vnc. iii. β. vel. q. s.*

Mel calefiat ad ignem & despumetur, deinde calenti pulueres sensim inspergantur & Misc. F. Linimentum. Alii mellis virginiei loco mel rosatum, vel scilliticum, vel etiam oxymel scilliticum sumunt, vel aliquid de melle, vel oxymelite addunt scillitico. Hoc linimento gingiuarum bis, vel ter quotidie illinantur; deinde abluantur vino rubro, vel simplici, vel in quo cochlearia, aut nasturtium infusum fuerit, vel decocto summatum rubi, vel aqua prunellæ, plantagin. rosar. quæ efficaciores erunt, si aliquot guttæ spiritus vitrioli, quot nimirum ad aliquam acetositatem sufficiunt, admisceantur, quod medicamentum valde efficax est in hoc genere.

Alii ouum coquunt ad duritiem, per medium dissecant, vitellumque eximunt, & locum puluere vitrioli replent, ouumque iterum coagmentant, & in loco subterraneo in vitro sepeliunt, vel in vitro suspendunt, vt vitriolum in liquorem per deliquium soluat. Quo liquore si spongiola imbatur, eaque laxæ, & cruentæ gingiuarum fricentur, magnam is ad sanandas eas vim habet.

Vel *℥. Pulu. abrotani, cauda equin. salvia, hyssopi, ruta, boli Armen. alumin. vsti, aquilegia, an. scrup. ii. mellis Vnc. ii.*

F. Linimentum.

Vel *℥. Macis, nucis moschat. an. Drach. ii. myrrha, fol. aquileg. salvia, ruta ana Vnc. sem. alumin. vsti Drach. ii. sem.*

Misceantur cum *℥. q. mellis feruentis, mista & refrigerata*

gerata vsui seruentur. Vngantur hoc linimento bis de die gingiuarum, & postea aqua prunellæ vel plantagin. abluantur.

Vel ℥. Theriac. ℥. ℔. mellis crudi ℥. j. oxymelis. simpl. 3. ij. aluminis vsti 3. ℔. Coquantur, & Misceantur.

### Pulueres & dentifricia.

℥. Salis torrefact. alumin. vsti, testar. cochlear. crematar. cineris sarmentor. vitis. rosar. rubr. radic. bistorta. fol. aquileg. salvia. an. q. s.

F. Puluis, quo dentes fricentur.

Vel ℥. Alumin. vsti 3. ij. salis torrefacti 3. j. balauftior. C. C. vsti prepar. an. 3. ij. macis 3. j. fol. salvia num. iij.

F. Puluis, quo dentes fricentur.

F. cum succo cochlear. aut nasturt. aquat. aut melle an. q. s. F. Mistura.

Aut paretur talis puluis, quo gingiuarum flaccidæ, & sanguinolentæ fricentur:

℥. Salis vsti 3. ℔. balauftior. 3. j. ℔.

F. Puluis.

Vel ℥. Cineris sarmentor. vitis, testarum ostræar. vstarum. part. aq. F. Puluis.

In istorum verò medicamentorum vsu obseruandum, vt id, quod ex laxis, & sanguinolentis gingiuis effluit, & in ore colligitur, continuò expuatur, & excrescat, & non diu in ore retineatur, multò minus deglutatur.

Si putredo sit vehemens, talis oris collutio parari potest:

℥. Rosar. rubr. plantagin. an. M. i. ruta, salvia an. M. ℔. viridis aris 3. j. thuris, mastiches an. Dra. i. ℔. alumin. 3. j.

Concisa & contusa Coquant. in Aq. aceti an. lb. ij. ad dimidia partis consumptionem.

Colaturæ addatur mell. ros. 3. i. M.

F. Collutio oris.

Nonnulli in magna carnis gingiuarum corruptione & putredine manuum opera vtuntur, & carnem corruptam præcidunt. Verum rarò hoc facto opus, cum medicamenta enumerata, præcipuè, quibus alumen & oleum vitrioli adduntur, tam efficacia sint, vt etiam satis scædam Stomacacen emendare possint. In quem vsum etiam inseruit vnguentum Ægyptiacum, magna necessitate id postulante. In extremis casibus, & summa corruptione efficax est hoc medicamentum.

℥. Mercurij sublimati Scrup. ii. Aluminis vsti 3. ij. ℔.

Puluerisata coquantur in aqua plantagin. lb. j. in vitro, in vase duplici. In aqua ista spongiola inungatur, & ea gingiua putrida ac laxa illinantur. Vbi omnino monendum videtur, cum in Germanico libello VVieri de scorbuto in hoc medicamento absolutè legatur Sublimatum, qua voce sine additione posita Chymici & sublimatum intelligunt, non rectè in libellum eius Latinum irrepsisse Arsenicum sublimatum, quod ex libello Latino VVieri in sua scripta alij transtulerunt. Ad vlcera n. maligna & putrida vsurpari cum commodo à Chirurgis & sublimatum notum est: Arsenicum verò sublimatum, præcipuè in vlcerebus oris, longè maiore cum periculo vsurpari, extra dubium, est licet Dioscorid. Euporist. lib. 1. cap. 82. & 83. Arsenico cum charta combusta ad serpentina oris vlcera vtatur.

Quia verò postquam caro putredine absumpta est, dentes carne nudari solent, vt id, quod abest, restituatur, opera danda. Et si verò carnem amissam reparare solius Naturæ opus sit: tamen ars Naturæ subsidio venire potest. In quem vsum hoc habet Sal. Albertus:

℥. Sem. rosar. Drach. j. calam. aromatic. Drach. sem.

F. Puluis, qui dentibus aspergatur.

Vel ℥. Farina crui. fl. rosar. an. Drach. ℔. calam. aromatic. 3. ij. ℔. aluminis scissilis, mannathuris, cyperi an. 3. ℔.

F. Puluis, qui dentibus inspergatur, vel cum melle misceatur, & iis illinatur.

### Faucium exulcerationis.

Si fauces ex vicinæ putredinis contagio lædantur, collutiones parentur ex Aq. cochleariæ, nasturtii, nummulariæ, Nicotianæ, &c.

Vt ℥. Aq. prunella, plantagin. cochlearia an. 3. iii. Nicotiana 3. ii. spir. vitriol. 3. j. mell. ros. col. 3. j. ℔. M.

Eadem medicamenta cum vitiosos succos, quibus dentium radices laxantur, absumant & abstergant, dentes vacillantes firmare, & carnem gingiuarum roborare valent.

### De maculis.

Crurum, vel etiam aliarum partium macula sponte euanescere solent, modò internis prospiciatur. Si tamen & earum causa medicamenta adhibere placet, ad eas tollendas ex resoluentibus, discutientibus, & emollientibus fomenta, & balnea vsurpentur, ex baccis iuniperi, nasturtio, cochlearia, chamamelo, artemisia, absinthio, roremarino, hyssopo, laudula, persicaria, &c. vel aqua cochlearia crura lauentur.

Vt ℥. Baccar. iuniper. contusar. sisympbr. cardamin. nasturtii aquat. cochlear. an. M. ij. fl. chamamel. M. iij. artemisia, betonic. absinthij, rorismarin. maioran. thymi, hyssop. an. M. i.

Coq. in Aq. s. & vapore decocti calidi crura foueantur; Vel decocto spongia madesiat, & calida tibis applicetur.

Vel fiat tale Vnguentum.

℥. Butyri majalis 3. ij. ℔. baccar. iuniper. contusar. 3. vj. vini 3. ii.

Coq. ad vini consumptionem, & colentur. Vel coquatur in lacte nasturtium aq. absinth. & bacc. iuniper. contusæ, & cum lactis illius flore crura, inungantur.

Salom. Albertus hoc parat:

℥. Nasturt. viriusque, cochlear. an. M. ii. chamamel. melilot. alb. an. M. sem. thymi, satureia, pulegi an. M. j. rorismar. M. ℔. rad. dauci 3. ℔. fol. lanri M. i. baccar. iuniper. contusar. 3. j. ℔.

Coq. ad consumptionem tertiar partis, & vapore decocti calidi crura foueantur, vel lintamina, aut spongia decocto calido madida cruribus imponatur.

Nonnulli decocto viminearum genistæ virgarum vtuntur.

Post fomentationem partes maculosæ conuenienti aliquo linimento inungantur.

Vt ℥. nasturtii aquat. becabunga, sisympbr. cardamin. baccar. iuniperi contusar. absinthij an. M. j. Aq. becabunga, chamameli, melilot. nasturti. aq. an. 3. iij. fl. lactis & butyr. recent. insulsi q. s.

Coq. in Balneo & exprimantur, ac pinguedo linimenti loco vsurpetur.

Vel coquatur nasturt. aq. in lacte, & contundatur, ac subigatur in mortario, contuso addatur adeps suillus.

Vel ℥. Butyri majalis insulsi 3. i. comarum. absinth. M. j. Vermicularis P. ii. baccar. iuniperi contusar. 3. ℔. vini Vnc. iii.

Coq. ad vini consumptionem, & colentur, ac pinguedo vnguenti loco vsurpetur.

Vtile quoque fuerit crura sæpius panno, vel linteo calente fricare, vt spiracula cutis aperiantur, & vitiosi humores discutiantur.

*De Doloribus.*

*Dolorum in cruribus.*

Dolores interdum etiam, præcipue in cruribus, ægros cruciant, vt ad eos tollendos Medici operam maximè requirant. Vsurpentur autem ad illos tollendos, præter interna ad scorbutum medicamenta, anodyna, & resoluentia, ac discutientia per sudorem.

Adhibeatur ergo fomentatio, ex decocto alibea, fumar. abrotani, cochlear. becabung. nasturt. pulegij, hyssopi, salvia, artemisia, flor. chamamel. bacc. juniperi. Herbae istae decoquantur, & vapor à decocto partibus dolentibus excipiat, donec sudor erumpat, vel crura linteis duplicatis decocto hoc calido imbutis inuoluantur. Quo modo dolor mitigatur. Nonnunquam tamen solet dolor recrudescere, quod partes frigidae & crassae non plane sint discussae. Ideoque spongia decocto calido madida partes dolentes fouenda, vel cataplasma ex enumeratis modò herbis paratum imponendum. Aut paretur cataplasma ex lacte coagulato (Quarck) flor. chamamel. nasturt. aq. & baccis juniperi in lacte coctis, quod in hisce doloribus mitigandis, ac tollendis efficacissimum est.

A pinguibus verò ante macularum eruptionem abstinendum; cum ab iis dolor exasperari soleat.

Quandoque dolor in plantis pedum, & extremitatibus digitorum excitatur, qui hoc medicamento tollendus:

*℞. Flor. sambuci M. ii.*

Coq. in vino, additis saponis 3. ii. quo pannus imbuatur, & loco dolenti applicetur.

Dolorem ventris quod attinet, qui ventriculum & intestina ac totum sæpe abdomen affligit, regia quidem eum curandi via est, causam ejus tollere, quod quæ ratione fieri debeat, hætenus satis dictum: recteque id fit medicamentis scorbutico aduersantibus; quæ si febris absit, cum vino, vel cum sero lactis, si febris & calor adsit, exhibeantur. In doloribus ventriculi etiam commode vsutur patur elixir proprietatis dictum.

Quia autem sæpe dolor vrget, is mitigandus: quod commodissime fit, si laxantibus conuulsioni & tensioni, quæ proxima ejus causa, hic occurratur.

Itaque clysteres emollientes injiciendi ex iis, qui humectant cum moderato calore. Et cum ob motum *περισπασμὸν* & conuulsionem sæpe nihil infra excernatur, sed omnia sursum tendant, non quæ sensum obtundunt, admiscenda, sed potius quæ excretionem nonnihil stimulant. Ex decocto scilicet anethi, chamameli, alrhææ, fœnugræci cum ol. communi, amygdal. dulc. lini anethino, chamamel. melle rosaceo, fiant clysteres. Extra etiam adhibeantur linimenta ex iisdem oleis, & pinguedinibus, aut cataplasmata ex herbis emollientibus, & flor. chamameli cum iisdem oleis, aut omentum veruecis iisdem oleis imbutum applicetur. Vtilis est infusus seu balneum ex aqua, in qua herbae modò enumeratae coctæ sint.

*De Arthritide.*

*Arthritidi.*

De Arthritidis scorbuticæ curatione refert Eugalenus, pag. 142. se obseruatione comperisse, nonnullos in prima morbi inuasionem solo absinthio in vino, seu cereuisia suspensio feliciter in quotidiano potu vsos fuisse, per semestris vnus spatium vsu eius continuantes. Et quidem solo illius decocto in vino, vel cereuisia, vel aqua facto feliciter se vsu scribit. Si verò cum febre, siti, & obstructionibus manifestis coniuncta fuerit, neque tunc se eius vsu abhorruisse, nisi quod febrem mitigantia, obstructiones fortius aperientia, & quæ scorbutico peculiari proprietate aduersantur, admiscuerit, puta cucurbituram, scolopendrium, cere-rach, betonicam, hyssopum, & si febris patiatur, carduum benedict. raphani, & helenij radices, cochleariam, nasturtium,

*Dan. Sennerti Tom. II.*

Extra cum alia topica in arthritide vsitata adhibentur, tunc etiam radix raphani agrestis comminuta & cocta vtiliter apponitur.

*De stupore, tremore, paralyti, & conuulsione.*

Stupor, tremor, paralyti, conuulsio, membrorum iactatio eandem fere curandi rationem obtinent. Sceletyrbe quidem cum ortum habeat ex vitiosis humoribus, qui sese in tendines, & musculos insinuarunt, quorumque pars crassa, postquam tenuior exhalauit, tendines duos reddit, emollientia, resoluentia & discutientia requirit; quibus ea semper admisceantur, quæ humoris, scorbuti causæ, peculiari vi resistunt, quæque suo sale volatili, quod crassum & fixum, volatile reddere, attenuare, & ad discussionem aptum reddere valent.

Eadem verò etiam, vt assumantur, exhibenda. Et quidem si recens sit, quæ à seroso humore saltem sese in musculos insinuante, ortum habet, tendinibus non induratis, internis adhibitis medicamentis breui, sæpe intra dies 4. vel 5. sine omni topicorum vsu non solum crurum, sed & brachiorum, ac manuum paralyti curatur, vt testatur Eugalenus. Idque ita se habere ipse compertum habeo, cum non paucos tali paralyti scorbutica laborantes, plerumque cum sicca scabie, corpore semel, atque iterum leniter purgato, cochleariæ, & fumaræ inprimis vsu paucis diebus restituerim.

Si verò malum sit diuturnius, vt tendines duri, & rigidi quasi redditi sint, topicis etiam opus est.

In paralyti ergo initiis non admodum grauibusequens profuisse testatur Seuerinus Eugalenus, pag. 70.

*℞. Betonic. M. i. v. granor. juniper. comusor.*

Coq. in aq. lb. viii. ad pulvis modum.

Colentur, & exprimantur, & addantur sacchari lb. ij. iterumque coquantur ad syrupi consistentiam, cui ab igne remoto addantur zingiber. Vnc. ii. mace, calam. aromatic. cubebæ fol. fena an. Vnc. sem.

F. Electuarium, cuius ante, & post cibum cochlear. j. quotidie semel, aut bis sumatur.

Quod si grauius, & pertinacius malum sit propter viscerum obstructions concurrentes, hæc non sufficiunt, sed aperientia, & peculiari vi contra hunc morbum pugnantia admiscenda.

Extra verò adhibeantur fomentationes & lotiones ex aqua siue simplici, siue salia, in qua cocta sint fol. salvia, betonic. artemisia, serpilli, rorismarin. flores sambuci, chamamel. melilori, baccæ juniperi. Nimirum vapore harum herbarum decoctarum crura rigida, vel singulis, vel alternis diebus fomententur, donec bene sudent. Vbi satis sudauerint, ipso decocto pedes, & crura lauentur, ipsisque herbis pedes, crura, ac tendines, & ligamenta rigida fricentur, & postea conueniente vnguento illinantur.

Si tamen adsit durior tumor, emollientia præmittantur, vel admisceantur.

Salomon Albertus tale parat:

*℞. Pulv. flor. chamamel. comarum absinth. an. Drac. iii. rad. bryonia, consolid. major. an. Vnc. sem. farina. iridici, fabarum, orobi an. Drach. iii. medull. panis sili-ginei ex lacte cocti lb. j.*

F. Cataplasma, quod tumori applicetur.

*De contractione & rigiditate membrorum.*

Si genua vel alia membra sunt rigida, & ad motum impotentia, non neglectis medicamentis internis eadē emollientia & discutientia per vices vsurpada. Fouatur nimirum pars affecta decocto lilior. albor. alibea,

R R R malua,

*Stupor, tremor, conuulsio.*

*Rigiditas & contractio membrorum.*

malua, violaria, branca vrsina, sem. lini, fœnigraci, chamamel, ficum aridarum, quibus nasturtium, & becabunga addantur.

Vt ℥. Rad. althœa, malua an. Vnc. j. iridis Vnc. sem. sem. lini, fœnigrac. an. Vnc. i. violaria, flor. chamamel. melilot. an. M. j. absinth. cochlear. becabung. nasturt. aq. an. M. sem. Coq. pro fomento.

Vel ℥. Rad. althœa, Vnc. iii. parietar. cochlear. becabung. nasturt. aq. absinth. flor. chamamel. melilot. an. M. ii. sem. lini, fœnigrac. an. Drach. vi.

Coq. in aqua, cujus vapor calidus crure excipiat.

Vel ℥. Flor. chamamel. melilot. sem. anisi, fœniculi, cumini an. Vnc. i. farina, sem. lini, fœnigrac. an. Drach. ii.

Cum decocto fol. ebuli, artemisia, cochlear.

F. Cataplasma, cui potest addi butyrum recens.

Vel ℥. Rad. althœa, lilior. albor. hermodactylor. an. ℥. B. caricar. pinguium num. vii. flor. meliloti, chamamel. parietar. an. M. j. B. fol. althœa M. j. rosar. rubr. ℥. iii. vermium terrestri prepar. ℥. ii. B. farinatrifici ℥. ii. farin. hordei. Vnc. i. sem. orobi, lentium, fabar. an. Vnc. sem. medulla panis triticea Vnc. j.

Terantur terenda, & Coq. in aq. ad formam pultis.

Add. ol. lilior. albor. chamamel. anethin. rosar. an. ℥. i. cassia ℥. B. medulla crurum bubul. ℥. iii. adipis gallinac. ℥. ii. B. suilli ℥. B. boli Armeni ℥. i. croci Drach. B.

F. Cataplasma.

Post fomenta adhibenda olea, & vnguenta emollientia, ex adipe suillo, humano, pinguedine gallina, butyro recenti, medulla cervi, mucilagin. sem. althœa, cydonior. lini, fœnigraci, vnguento dialthœa; quibus succi cochlear. nasturt. aquat. & aliarum contra scorbutum plantarum, ac grana juniperi admisceri possunt.

Vt ℥. Vnguent. dialthœa Vnc. sem. ol. chamamel. lilior. albor. aneth. an. ℥. ii. granor. juniper. cōtusor. ℥. i. Misc.

F. Vnguentum.

Efficax est hoc vnguentum:

℥. Rad. helenij contusar. ℥. ii. lumbricor. terrest. Vnc. sem. (aliq. Vnc. i. sem. vel ℥. ij.) Coq. in vino maluatico, Deinde add. Ol. lilior. albor. costini an. ℥. i. hyperici ℥. B. terebinth. ℥. ii. vnguent. de bdell. ℥. iii. medull. crurum vitali, cervi an. Drach. ii. cera q. s.

F. Vnguentum.

Salomon Albertus hoc quoque vtitur:

℥. Rad. bryonia, cucumer. asinin. an. ℥. i. lumbricor. terrest. preparat. Drach. iii.

Coq. in hydreleo ad mollitiem, & succus torculari exprimatur, Cui add. ol. lilior. albor. Vnc. sem. lini, chamamelin. an. ℥. i. terebinthina ℥. v. vnguent. de bdellio ℥. iii. succi cochlear. Vnc. i. Colliquantur ad ignem, & cum cera s. q. F. Vnguentum.

Seuerinus Eugalenus commendat vnguentum Valeriolæ, quod habetur, lib. 4. obseru. 4.

℥. Fol. Salvia, majoran. lauri, betonic. rorismarin. primula veris, an. M. j. rad. acori veri, ireos recent. an. Vnc. iii. ol. vulpini, de nucē Indica, rutac. an. ℥. j. terebinthin. ℥. B. vini potentissimi ℥. j. aq. vitæ ℥. B.

Coqu. ad vini consumptionem, & colentur.

Colaturæ adde Sagapeni, opopanax. bdellij an. Drach. ii. castorei ℥. B. macis, nucis moschat. styrac. calamit. benzoes an. ℥. iii. piperis longi, pyrethr. an. ℥. i. axungia cati, serpentis, anser. an. Vnc. i. medull. cruris vaccini Vnc. ii. succi ebulli, salvia, melissa an. Vnc. iv. cera propoleos Vnc. ii.

Misce & cum cera in oleis recensitis liquata s. q.

F. Vnguentum mediocris consistentiæ.

Est & hoc Salomnois Alberti efficax.

℥. Vnguenti dialthœa ℥. i. pinguedin. anserin. porci an. Vnc. sem. medull. crurum vitali Drach. ii. cervi Dra. iii. butyri insulsi, ol. lini an. Vnc. i. flor. lactis agitati in mortario marmoreo Vnc. i. sem. Cum succo nasturt. coq. in vase duplici, addatur cera noua q. s. F. Linimentum.

Vel ℥. Ol. sesamin. amygdalar. dulc. an. ℥. i. medulla crurum bonis, seu castrati, pinguedin. anser. gallin. an. Vnc. sem. vnguent. de bdellio Drach. iii. vitell. onor. ii. croci ℥. ii.

F. Linimentum cum modico ammoniaci in aceto dissoluti.

Eadem medicamenta, quæ modò ad duritiem & rigiditatem genuum sunt proposita, etiam ad rigiditatem genarum & maxillarum vsurpari possunt, scilicet althœa, malua, violaria, radic. lilior. alb. sem. lini, fœnigrac. flor. chamamel. ficus. E quibus fomenta, cataplasmata, olea parari possunt, additis cochlearia & nasturtio.

### De somno nimio.

Cū carus & somnus nimius in hoc morbo plerūque febrem lentam conjunctā habeat, tollitur iis, quæ putredini huic morbo propriæ, febrique aduersantur. Præ cæteris efficax se cōperisse nasturtium aquaticū, quod in claris & limpidis aquis prouenit, scribit Eugalen. p. 20.

### De lipothymia.

In iis, quos lipothymia, & anxietates infestant, hoc imprimis obseruandū, ne loco sæpe moueantur, aut è lecto surgant; cum sæpe deliquia animi, quamprimum in lecto sese erigunt, eos tentare soleant. Deinde cum vaporibus discussis deliquium quidem cessare, sed sæpe finita medicamenti operatione, aut à causâ morbo superata, post tres vel quatuor horas, eadem vehementia anxietas illa, & metus deliquij redire soleat: sæpius eadem die, & vel sexies, vel octies medicamentā ista contra animi deliquia, admistis antiscorbuticis, exhibenda.

### De fœtore anhelitus.

Fœtor anhelitus emendatur putredinem sistentibus, & halitus putridos discurrentibus: conserua nimirū salvia, ruta, anihos, caryophyllis, cinamom. gallia moschata, corric. citri, ligno aloës, rhodio; baccis juniperi. E quibus electuaria, pilulæ, rotulæ, trochisci formari possunt. Vel vsurpetur elixir proprietatis, aut mastigentur radic. ireos Flor. baoca juniperi: Aut colluatur os aq. salvia, rorismarini, mentha cum aceto scillitico.

### De Vomitu.

De vomitu scorbutico annorauit Eugalenus, pag. 25. quod vomentes à lacte & lacticiiniis, à quibus alias ægri, ventriculi & viscerum affectionibus laborantes, læduntur, melius habent, quam à ventriculorum roborantibus & adstringentibus. Adstringentia enim humorem vitiosum altius ventriculo imprimunt: lac verò lenit, & humoris prauitatem demulcet.

### De sputatione nimia.

In sputatione continua monet hoc Eugalenus, pag. 206. cauendum, ne acribus, & calidis medicamentis fluxus materiæ irritetur, & nimia vaporū, fumorumque in cerebrum delatione ac eorundem ibidem concretione, atque ad pectus defluxione malū grauius reddatur.

### De alui fluxu.

In alui fluxu hoc ab adstringentibus abstinendum, quorum vsu ægri in summas angustias & maximam respirandi difficultatem, imò in animi deliquium & suffocationis periculum conjiciuntur, ac tandem in hydropem vel atrophiam incidunt. Cum enim viscera constriquant, venasque constipent, materiam prauam detinent & augent, è qua vapores prauis adscendentes ac superiora petentes enumerata symptomata excitant; & ipsa circa viscera, ac membra nutritioni dicata hærens hepar & lienem debilitat. Sed vsurpanda potius medicamenta, quæ peculiari vi humori vitioso aduersantur: atque vtile est hic etiam absinthium. Nec incommodus est ad diuersionem sudoriferorum



riferorum vsus, si iis cochlearia admisceatur.

Et si autumnalis aëris frigiditas huic fluxui occasio- nem dederit, ab ejus injuria corpus muniatur; ægerque in loco calido quiescat : deinde materia fluens subtra- hatur victus ratione sicca, & ad vias urinæ deriuetur; & partes suscipientes roborentur. Quibus vsibus inseruit vinum absinthites dilutum decocto cichorij. Extra quo- que abdomen inungatur ol. rosaceo, mastichino, absin- thij; vel imponatur emplastrum de crusta panis.

Si à calore serum fundente in principio febrium ta- lis fluxus accidat, etsi symptomaticus sit, tamen cum materiam morbificam imminuat, non statim sistendus, præsertim si natura eum facile ferat: sed ea exhibenda, quæ serum cum bile abstergere, simulque roborare pos- sunt, qualia sunt syr. ros. solut. syr. de cichorio cum rha- barb. ipsumque rhabarbarum; & exhibendum simul ci- chorium & cichoracea.

#### De calore nocturno.

Caloris no-  
cturni.

Quos calor ille nocturnus supra descriptus mole- stat, iis becabunga in majore dosi exhibenda; contra ca- lescentium dolis minuenda. Prodest & lac ebutyra- tum recens. Nonnulli polypodium & grana juniperi contundunt & in aqua coquunt, & colaturam saccha- ro dulcoratam bis de die exhibent. Illinatur etiam dex- trum & sinistrum hypochondrium medicamentis ap- tioribus.

#### De Febris.

Februm.

In febris scorbuticis, vniuersalibus euacuationi- bus præmissis, medicamenta scorbutica cum iis, quæ fe- bris, ejusque causa requirunt, miscenda, corporisque constitutionis, anni temporis, & aliorum, quæ ex gene- rali methodo medendi patent, ratio habenda. Itaque præbenda scorbutica medicamenta moderatè calida, & humorem melancholicum incidentia, ac digerentia, *cuscuta, capill. vener. ceterach, polypod. g.* & pro crassorum humorum incisione, *hyssopus, betonica*, & pro calore fe- brili temperando, *cichorium, endivia, acetosa*, ac cum his miscenda scorbutica medicamenta, prout præsens ægri constitutio id postulat, & nunc de his, nunc de illis plus sumendum. Nam si corpus sit biliosum & bile abundet, plurèque febris tertianæ notæ adsint, pau- ciores scorbuti, major eorum copia, quæ bilem tempe- rant, & humectandi ac refrigerandi vi prædita sunt, su- menda; minore verò quantitate ea, quæ scorbutum spe- ctant, & ex his minus calida eligenda. Itaque tum con- ueniunt becabunga, & acetosa; & in primis earum suc- cus, quibus aliquid cochleariæ addi potest. Si humores sint crassiores, cum urinis crudis vel crassis, sitis magna non adsit, corpusque ipsum sit crassius & melancholico crasso succo abundet, cochlearia vsurpanda, & ea admis- cenda, quæ fortius attenuant, & incidunt, vt cardus benedictus, absinth. radic. helenij.

Si etiam aër, in quo æger degit, sit tenuis ac subti- lis, mirioribus & minus incidentibus ac attenuantibus vtendum: Fortioribus verò in aëre crasso & humido.

Si angustia illæ ad præcordia grauius & frequentius infestent, in ipso quoque paroxysmo medicamenta contra scorbutum & febrem facientia exhibenda.

Si morbus sit diuturnior, & ob accessionum inordi- natum recursum cibandi necessitas medicamentorum exhibitionem impediatur, liberiori aëri, præsertim tem- pore verno, æger committendus, aluique interdum leniter subducenda. Sæpe enim aëris mutatione, præ- ter spem, tales febres euanuisse, obseruatum.

#### De Tumoribus duris.

Tumorum  
duri.

Ad tumores duros fiat cataplasma ex radic. consolida- major, althæa, bryonia, absinthio, chelidon. maj. farina Dan. Sennerti Tom. II.

fabarum aut lupinorum, & medulla panis albi in lacte coctis.

Ad tumorem crurum œdematosum conueniunt fo- menta ex salvia, foliis & flor. sambuci, roremarino, serpil- lo, becabunga, nasturmo aquat. baccis juniperi.

Si quid de frigido & terreno humore quasi concre- tum sit, emollientia & discutientia vsurpanda, quæ su- pra proposita sunt.

Vt *℞. Pulv. rad. bryonia, althæa an. Vnc. sem. flor. chamamel. fumar. absinthij an. Drach. iii. farina fabar. orobi an. Vnc. sem. medulla panis tritic. siligin. an. lb. sem. Cum lacte caprino.*

F. Cataplasma,

#### De Erysipellate.

Erysipelatis curationem de tumoribus proposui- mus: eam vt hic paucis attingamus, naturæ conatus in expellendo humore vitioso promouendus & adju- uandus. Ad quam rem vulgus apud nos, & quidem non infelicer, aqua flor. sambuci vititur. Potest & rob sambuci vsurpari, vel aqua cardui benedicti aut scabio- sæ, iisque addi electuar. vel puluis aliquis bezoarticus, aut terra sigillata, aut grana vj. bezoartici mineralis, & sudor prouocari.

Parti affectæ applicetur pannus lineus imbutus lac- te, quod vocant aureo, (quod paratur ex lixiuio com- muni & oleo sambuci vel rosaceo bene simul agitis, vt lactis colorem acquirant,) iterumque expressus & nonnihil exsiccatus, vel aqua flor. sambuci madefa- ctus & expressus. Pinguia verò & repellentia, & quæ poros cutis obstruunt, ac materiam detinere possunt, vitentur.

Ne malum recurrat, ea vsurpanda, quæ serosi istius humoris generationem & corruptionem ac ebullitio- nem præcauent.

#### De Hydrope.

Hydrops scorbuticus purgationes fortes, maximè à principio, non fert, sed medicamentis incidendi, arte- nuandique vi præditis curatur, quibus admiscenda ea, quæ peculiari vi contra scorbutum valent: quo cu- rationis modo se plures sanasse citra purgantium opem, refert Eugalenus. Sublatis enim obstructio- nibus, venisque reseratis, & vitio humorum Scor- butico propriis medicamentis emendato, sæpe præ- ter opinionem hic tumor euanescit. Quod si non fiat, curato maxima ex parte Scorbuto, tum demum me- dicamentis purgantibus vtendum, & iis præcipuè, quæ humorem Melancholicum purgant. Semper ta- men admiscenda ea, quæ peculiari vi huic morbo ad- uersantur. Si crassior sanguis in venis redundet, aut consueta euacuatio suppressa sit, sanguis pro eius co- pia, & viribus ægri mittendus. Multum verò prodest hæmorrhoidum apertio, quæ sponte facta, nigro sanguine profuso, quosdam ab hoc malo liberauit. Si sponte non aperiuntur, hirudines iis apponi, vel in talo vena aperiri potest. A larga tamen san- guinis missione, præcipuè in locis frigidis, cauèn- dum, vt supra in genere dictum.

Hydrops vesicalis, vt prior hydrops curatur. Quod si præter interna etiam externis opus sit, iis, quæ discutiendi, dissoluendique vim habent, vtendum, *absinthio, ruta, chamamelo, farina lupinorum, fabarum cum oxymelite in cataplasma re- ductis.*

Ad tumores pestilentibus similes Eugalenus, pag. 190. hoc experimentum habet.

*℞. Pulv. absinthij comm. q. s.* qui cum ouis recentibus eadem die exclusis cum albumine vitello & testis contulis ad pulvis consistentiam misceatur & frigide tumoribus applicetur. Idem pag. 408. Cataplasma

R R R r 2 parat

Tumorum  
pestilentibus  
similium.

parat ex chamæmelo, meliloto, parietaria, malua, althæa, mercuriali ad mollitiem coctis, additis farinæ sem. lini, fœnigræci, hordei, cum mell. rosac. & ol. rosac. ℥. q.

Atque si accidat, ut vlcus illud erodatur, & nigrum fiat, quod non sine periculo accidit, cum integram crurum corruptionem & gangrænam inferre possit, statim quod corruptum est, à reliqua cute & carne sana separandum, & vlcus mundandum, consolidandum, more consueto.

### De Vlcerebus.

De Vlcerebus.

Si humores prauis, & acres crura etiam exulcerent, primò videndum, an aliqua adhuc intemperies parti exulceratæ coniuncta sit, aut humorum vitiosorum affluxus vlcus foueat. Tum enim primò humores vitiosi, qui affluunt, è corpore euacuandi, & intemperies partis emendanda. Attendendum quoque hic consilium Hippocratis, cum, *initio lib. de vlcerebus*. suadet, ut ab inueteratis vlcerebus crebrò sanguis effluat, prout oportunitum videbitur, tam ab ipsis vlcerebus, quam à circumstantibus vlcus partibus, tum præcipuè si in crure, aut pedis, vel manus digito vlcus sit, magis, quam in alia corporis parte. Nam exhausto sanguinis affluxu, sicciora, & mitiora euadunt. Eiusmodi enim vlcera præcipuè quidem sanescere prohibet, tum verò reliqua etiam omnia, sanguinis putredo, & quod ex sanguinis mutatione est ortum.

Primò ergò vniuersi corporis ratio habenda est, illudque euacuandum, & partis intemperies postea corrigenda, ac medicamenta, quæ facultatem digerendi habent, ac nonnihil adstringendi, exsiccandi, & extergendi, vsurpanda: non verò asperius tractanda hæc vlcera, sed citra ullam mordicationem, & dolorem sananda. Ideoque quod in aliorum vlcereum curatione obseruatur, & hic obseruandum, ut postquam primum vlcus solutum fuerit, consideretur, quantum humiditatum primum pharmacum ab vlcere defecarit, aut si sordidum fuerit, quantum sordium deterferit; idque tertium, aut quartum experiendum est, donec purum vlcus, & siccum fuerit. Quod ubi animaduertitur, eligendum quidem medicamentum aliud eiusdem generis, sed debilius priore vsurpandum.

Ronsseus ex Auicenna, *lib. 4. fen. 4. tract. 3. cap. 10.* & Tagautio, *lib. 3. cap. 15.* hoc commendat.

℥. Cadmia, alumin. chrysocolle singulor. part. viii. aris flor. viridis aris singulor. part. j. gummi cupressi part. iiii. cera, & olei rosac. an. q. s.

E. Vnguentum.

Sed & vtile est medicamenta scorbutica admiscere.

Fiat ergò vnguentum ex succo cochlearia, absinth. apij cum melle coctis, addito puluere aristolochia, & aluminis.

In vlcerebus minns prauis satis efficax est vnguentum diapompholygos, quo læpissime feliciter vsus sum. Vnguentum è Nicotiana, saccharum n. & cum eo parata linimenta. Nec inutile est emplastrum diapalma. Becabunga solà in cereuisia cocta & bis de die apposita vlcus ingens cruris totam ferè tibiam occupans & ad os vsque profundum, à quodam curatum fuisse, obseruatum est.

Vel paretur vnguentum de apio dictum:

℥. Succ. apij, melissophyll. cochlearia an. Vnc. sem. chelidonia Drach. v. mellis crudi q. s.

Coq. ad justam consistentiam, Addatur aliquid thuris, aloes, myrrhe.

Vel fiat vnguentum ex resina, thure, & oleo rosac.

Commendatur & hoc:

℥. Aq. pilosell. mense Septembri destillat. lb. i. mellis rosati ℥. ii. myrrha, lithargyri an. ℥. i. B. camphore parum.

In Sole, vel calido loco per triduum feruentur. Colaturà crura abluantur.

Vel abluantur vlcera decocto sedi minoris.

Efficacius erit medicamentum, si aliquid cochlear.

vel nascitur addatur. Ita & linimenta efficaciora sunt, si saccharum n. addatur.

Est & vtile vnguentum Montagnanæ de plumbo:

℥. Plumbi vsti Vnc. i. cerussa lota Drach. ii. vitell. onor. ii. lithargyri ℥. sem. olei rosacei ℥. i. sem. myrrhe Drach. ii. cera q. s.

F. Linimentum, quo vlcera prius vino, in quo aristolochia rotunda cocta sit, abluta perungantur.

Si putredo magna sit, aliquid ꝑ præcipitati, vel olei vitrioli addatur, vel vsurpetur aqua illa ex ꝑrio sublimato & alumine, ac aqua plantagin. parata, & supra in Stomacace proposita.

Ad consolidationem tandem vsurpandum Emplastrum diacalcitib. de minio, de tutia.

### De Atrophia.

Cum membrum non tantum riger, sed etiam contabescit, vnguento resumptiuo inungendum est. In vniuersali verò atrophia, ut in scorbuto reliqua curatio instituenda, & bona diæta vtendum. Commendatur hic lac caprinum, inprimis si capra herbis contra scorbutum pugnantibus alatur, aut lacti pauxillum croci, & aliquid mellis, vel sacchari addatur, & vinum Gallicum rubrum, quod plus nutrit, quam Rhenanum.

Summa, ut hæc concludamus, & quidem cum eo, quo cœpimus, generalis lex curandi Scorbutum cum aliis morbis, & symptomatibus copulatum hæc est: ut miscemus cum medicamentis contra morbum illum, vel symptoma directis medicamenta peculiari vi contra scorbutum pugnantia, & quidem ea ratione, ut nunc horum, nunc illorum plus sumamus, prout magis vel scorbutus, vel morbus ille scorbuto conjunctus præualeat.

## CAPVT VIII.

### Diæta.

**M**ltum verò momenti ad scorbutum curandum in diæta ratione situm est. Respondeat autem ea medicamentis, & cacochymia scorbutica aduersetur, ita ut non solum nihil ad scorbuticam cacochymiam generationem faciat, sed etià vitium humorum corrigat, quod alimenta medicamentosa commodissime præstant.

Aër ergo frigidus humidus & impurus, qualem venti Aquilonares & occidentales, ac loca subterranea, conclusa & ventilationi nulli exposita, suppeditant, & qui paludum, stagnantium aquarum, cloacarum aut aliarum rerum putridarum halitibus infectus est, ac proinde humores ac spiritus inquinare, ijsque vitiosâ, quâ obrinet, dispositionem imprimere solet, vitetur. Contrà moderate calidus, siccus, tenuis, purus, parens ac liber eligatur; aut si talis natura non detur, arte concilietur, acenso ligno juniperi, rosimarino, & fumo ex baccis juniperi, lauri, thure, succino, trochiscis, & candelis profumo, & similibus.

In cibo, & potu vitentur omnia, quæ humorem Melancholicum, crassum, & tartareum præbere possunt; carnes nimirum suillæ, & aliæ sale, ac fumo exsiccatæ; crassa, viscida, dura, difficilis coctionis, vetustate exsucca, rancida, lardum rancidum, pisces sale conditi, & fumo exsiccati, & omnes cibi, quos supra ad scorbutum generandum aptos esse diximus. Contrà verò in vsu quotidiano sint cibi boni succi, facili coctionis, attenuandi, incidendi, aperiendi, detergendi que vi præditi, & qui ad coctionem bonam & fermentationem, ac puritatem faciunt, nullo verò modo eam impediunt, & cibos reliquos incrassant. Itaque exhibeatur prisana, iuscula gallinarum, & carnis bubulæ, animalium carnes, & pisces, qui bonum succum præbent, & facile coquantur; vix item passæ. Inprimis commendatur lac caprinum, quod boni succi est, & facile

facile coquitur, aluum quoque nonnihil laxat, & ad benignum hepatis succum vi morbi absumptum instaurandum, viscerumque robur conseruandum aptissimum. Ac multi largo solius lactis usu, in quo nascitur. aq. cochlearia, becabunga cocta fuere, conualuerunt: atque in primis iis id vrile est, qui atrophia laborant, neque euacuationes facile ferunt. Cum enim vnice danda opera sit, vt pro vitioso bonus sanguis substituatur: lac & bonum sanguinem suppediat, & si admisceantur medicamenta scorbutica, praua qualitas simul aboletur. Vtilia quoque sunt poma aurantia, refertque Balduinus Ronsseus, *epist. 2.* se nouisse nonnullos, qui solo eorum vna cum corticibus usu sanitatem recuperant. Cibi condiantur hyssopo, roremarino, thymo, satureia, croco, einamomo, macere: Embainmata fiant è cochlearia, nasturtio, radic. raphani agrest. capparibus sine sale vel à sale ablutis, limonib. malo citrio, acetosa, flor. borraginis, sinapi, quâ in longinquis navigationibus magno cum sanitatis commodo nautæ seletant quam presentissimo prophylactico aduersus hunc morbum muniunt. Sali admisceantur, vel salis loco cum cibis vsurpetur puluis ex sale juniperi, radic. ari, speciebus diapliris archont. aromatici rosati. Granidarum ramen hæc in re etiam habenda est ratio, ne fortui aliquod damnum attrahatur. In febribus vrilis est acetosa, acetosella, trifolium acetosum, quibus aliquid cochleariæ vel nasturtij addi potest. Acida verò, quatenus talia, & in primis acetum simplex, fugiendum; cum coctionem, & rarefactionem alimentorum impediatur, humores figat, melancholiam augeat, & vt Hippocr. 3. de rat. vi. in acut. 1. 38. loquitur, sit ἀναγωγὴν καὶ ἐκδιωκτικήν. Condiretamen interdum acidiusculis cibos licet, vt & dejecta appetentia exciteretur, & putredo humorum inhibeatur, ac calor & feruor humorum temperetur. Dulcium, & sacchari vsus parcus sit; cum glutinosum quiddam, & obstructions pariendi vim habeat. Et de splenicis verum est illud antiquum: Τὸς σπληνικοῖς τὰ μέν ἄριμα, καὶ τὰ πικρὰ ἀρέλκυμα, τὰ δὲ γλυκέα ἐστὶ ἀεὶ. Semper quoque simplicitas ciborum varietati est præferenda; in primis vbi diuersi cibi diuersas obtinent substantias: & τὸ ποικίλον τὴν διαίτην ποικίλα νοσήματα parere supra diximus.

Potus sit vinum bonum, Rhenanum in primis, vel ceruisia tenuior, & bene defecata, ac lupulo satis condita; & quidem cum vinum tum ceruisia, vel simplex vel absinthio, chamædr. lingua ceruina, carduo benedict. hyssopo, veronica, roremarino medicata. Vel paretur tale vinum.

℞. Radic. sarsæ parilla, China, ligni sassafras an. ʒ. ii. radic. rhodia, garyophyllata, scorzonera an. Vnc. i. lingua ceruina, chamædryos, cochlearia, absinthij an. M. ii. cinam. opr. Drach. vi. passular. contusar. lb. j.

Affundantur vini, vel quod commodius, musti amphora dimidia. F. vinum medicatum.

Aut paretur hæc aqua ad vinum diluendum.

℞. Cochlearia rec. M. vj. nasturtij aquat. lingua ceruina an. M. ii. sarsæ parilla Vnc. iii. passul. contusar. lb. sem. succi becabung. lb. vi. acetosa lb. iii.

Destillentur in B. ad vinum diluendum.

Hydropotæ vtantur aqua, in qua ferrum, vel chalybs ignitus aliquoties extinctus sit. Si acidularum copia datur, ex in frequenti usu sint. Caprini etiam lactis, aut si desit, vaccini potus admittitur; cum bene nutriat, & emaciat vrile sit: vel potetur serum lactis, præcipue caprini. Commodior ramen & lactis, & feri vsus est, si nasturtij, vel cochleariæ aliquid in iis coctum, vel conseruæ earum dissolutæ sint.

Corpus moderatè exerceatur, ante cibum: Ambulare enim, vt apud Plautum, in *Curculion. act. 2.* leni optimum est; & exercitium concoquentem calorem exuscitat: contra orium, & quies hoc malum augent.

Somnus, & vigiliæ sint moderatæ. Et somnus quidem ita se habeat, vt ad caloris natiui instauracionem ac tugelam, humorumque crudorum coctionem suffi-

ciat. Sit quoque nocturnus: meridianus tamen iis, qui ob vehementiam dolorum, animi affectus & melancholicas cogitationes noctes infomes transegerunt, concedi potest. Vigiliæ verò calorem & spiritus excitent, non absumant, aut corpus exsiccent, & tabefaciant.

Consuetæ euacuationes non supprimantur. Balneum aquæ dulcis, cum poros cutis laxet, reliquias humorum discutiat, & fordes in ambitu corporis harentes dissipet, si moderatè, & suo tempore vsurpetur, vrile est.

Abstine tandem tristitia, & mœror.

## CAP. V. T. IX.

## De Præseruatione.

Adem, quæ modò proposita est, victus ratione ob-  
Præseruatio  
seruata, qui proni ad scorbutum sunt, vt & alij, eundem præcauere possunt. Nimirum, qui à scorbutico sibi metuunt, victus rationem corporis naturali constitutioni conuenientem, scorbuto verò contrariam, qualis modo descripta est, obseruent.

In eo saltem est differentia, quod eorum, qui scorbutico jam laborant, diætâ ita comparata esse debet, vt scorbutico manifestè sit contraria. In præseruatione verò satis est, si corpori nostro sit similis, & causæ præternaturali moderatè aduersetur.

Et quia omnes errores diætæ semper præcaueri non possunt, si quid humorum vitiosorum cumularum est, verno & autumnali tempore euacuandum. Et quidem in primis autumnò multo maiore cura opus, vt pote qui ad morbos melancholicos generandos aptissimus est. Ideoque humor melancholicus & bilis adusta per æstatem tali vel simili medicamento educenda.

℞. Radic. polypod. q. Vnc. i. buglossa, cic. cichorij an. ʒ. B. ceterach. fumaria, cuscute, capill. ʒ. chamædryos an. M. j. sem. frigid. major. an. Drach. i. flor. borragin. bugloss. genista an. M. B. fol. sene Vnc. ii. sem. rhabarbar. Drac. i. sem. anisi, fenicul. an. Scrup. ii. passul. exac. Vnc. i. Coquat. in Aqua pura. Colatura adde syr. rosar. sol. Vnc. ii. byzant. syr. de pomis, de epithymo an. Vnc. i.

Dentur pro Dosi Vnc. iiii.

In primis verò, qui à scorbutico liber esse cupit, omnes modos, quibus contagij scorbutici seminaria communicari possunt, caueat, pocula cum ægris communia, halitum ex ore foetentem, oscula & similia. Et omnino vapores ex corporibus scorbutico infectis, seu viuentibus, seu mortuis vitandi sunt, cum noxij sint; & idem malum inducere possint. Curauit circa finem Anni 1629. nobilem quandam, qui diu affectione Hypochondriaca laborauerat, tum quartana continua, verè tamen Scorbutica laborantem: cui cum jam quarta morbi septimana syrupus laxatiuus esset exhibitus, aluum cum tanto foetore deiecit, vt alter famulorum in terram concideret, atque ibi per integram horam quasi Apoplecticus jaceret, alter sanissimo capitis dolore eum horrore corripere. Feci quoque supra, cap. 1. & 4. mentionem viri cuiusdam, cui scorbutico correpto inter cætera symptomata suaue delirium accessit, & hæmorrhagia è crure, nullo vestigio post fluxum apparente. Is malum hoc ita contraxerat. Vir quidam, cuius etiam supra facta mentio est, scorbutico extinctus fuerat, cuius cadauer cum è loculo tetrum vaporem exhalaret, rimas loculi obstruendi ei datum erat negotium, in quo expediendo semimortuus concidit, & morbum hunc cum symptomatibus antea enumeratis contraxit.

Ætem quoque viginosum, cibos, & alia, quæ supra inter Causas scorbuti recensuimus, vitet, qui à scorbutico liber esse cupit.

\*\*\*

R R R r 3

LIBRI



## LIBRI TERTII

## PARS VI.

## De Hepatis Morbis ac Symptomatibus.

## SECTIO PRIMA.

## De Morbis Hepatis.

## PROOEMIUM.

**P**ECTE<sup>1</sup> Hippocrates, lib. de alim. τροφήν καὶ τροφῆς εἶδος, μὴ καὶ πολλαί. Alimentum & alimentum species vnum & multæ. Qui locus non saltem cum sensum habere potest, ut sanguinem, qui unus est, totius corporis esse alimentum, ex eo verò quamlibet partem, quod sibi conueniens est, nervos, venas, arterias, musculos, membranam, carnem, cerebrum & reliquas, ut ibid. habet Hippocrates, attrahere dicatur. Verum etiam, ut ibid. subiungit: τροφήν τὸ ἐκ τοῦ σώματος τροφὴν καὶ τὸ οἷον τροφήν, καὶ τὸ μέλλον τροφήν. In alimentorum genere id quod alit, alimentum est, & quod alimento proximum, & quod alimentum futurum est. Ac proinde nisi unus est sanguis, quo corporis nostri partes aluntur: tamen cibi, è quibus fit sanguis, planè multi & varij sunt. Et cum id, quod corporis alimentum futurum est, à corporis nostri substantia multum distet, variis mutationibus opus est, ut in corporis nostri alimentum, & hinc eius substantiam abeat. Hac autem mutatio in una coctione fieri non potest, sed variis opus est. In ventriculo nimirum fit prima cibi coctio seu digestio, quæ cibis, qui etiam homogeneus videbatur, ita resolvitur, ut in heterogeneas partes separari possit. Hinc quod corpori alendo inutile & crassius est, mox in Intestinis separatur, & per anum eicitur. Chylus postea reliquus à vasis mesaraicis ad Hepar transfertur, ut inde purior sanguis totius corporis futurum alimentum gigni possit. Id ut commodius fiat, lien chyli crassiorem partem ad se trahit, & inde sanguinem alendis partibus in ventre inferiore idoneum generat; ex reliqua verò chyli parte puriore sanguis optimus in hepate generatur. Cum autem ista cibi mutationes, & distributiones, quæ sunt in ventriculo, intestinis, mesenterio & liene, maxima & operosissima sint, & plerumque in cibo tantum sit partium inutilium & excrementitiarum, imò etiam plus, quam sanguini bono generando aptarum, facile fieri potest, ut in primis hisce coctionibus & viis aliquid excrementi colligatur, quod in hac corporis quasi sentina cumulatam variorum postea morborum causa existit, quos hactenus explicauimus. Actum enim non solum de morbis & symptomatibus, quæ ventriculo, intestinis, mesenterio, pancreati, omento & lieni accidunt, verum etiam, quia ex eodem fonte & humoribus in hisce partibus genitis & cumulatæ affectio Hypochondriaca & Scorbutus originem habent, de iisdem quoque dictum. Proximum est, ut jam Hepatis, in quo chylus in hisce partibus generatur, & ab excrementis maximam partem liberatus in sanguinem mutatur, morbos, & symptomata, quæ circa sanguificationem accidunt, explicemus. Dicendum ergo erit de hepatis intemperie, obstructione, & eius vasorum apertione, inflatione, inflammatione, & aliis hepatis tumoribus, calculis, vermibus & hydatidibus in eo genitis, vulneribus, ulceribus & sphacelo. De vesicula fellis morbis. Item de sanguificatione laesa & cachexia, de hydropo & eius speciebus, de dolore hepatis & ictero. Quæ jam ordine proponemus.

## CAPUT I.

## De Intemperie Hepatis.

## De Intemperie in genere.

**A**FFICI autem potest hepar omnis generis intemperie, & simplici & composita, & sine materia ac cum materia. Plerumque verò Intemperies Hepatis cum materia est coniuncta; quia breui tempore intemperies calida calidos ac biliosos humores cumulat; frigida crudos, crassos, pituitosos; sicca terrestres; humida tenues & aquosos.

## Causa.

Intemperierum autem causæ sunt cibis & potus, medicamenta & res non naturales dictæ, humores in corpore à naturali temperie & mediocritate recedentes, intemperies insignes partium, quibus per vasa connectitur, aut quibus aliàs vicinum est. Ita in febris, ubi caloris fons præcipue in corde est, hepar quoque incalcescit. Eodem modo ob frigidam intemperiem ventriculi, lienis, pulmonis, renum, diaphragmatis, mesenterij, intestinorum similem intemperiem contrahere potest. Intemperies autem hepatis cum materia excitatur, cum ea in hepate vel ob chyli prauitatem generatur, vel ob expultricis facultatis imbecillitatem aut vasorum angustiam cumulat, vel ab aliis partibus transmittitur, id quod accidit nunc à toto corpore, nunc à certis partibus.

## Signa Diagnostica.

Intemperies hepatis præcipue ex actionis ejus læsione cognoscitur. Quæ autem intemperiei cuiusque signa sint, in specie dicitur.

## Prognostica.

Grauiore est intemperies hepatis, quam ventriculi; quia hepar præstantius est ventriculo, & maiora ex ejus læsione proueniunt incommoda. Remedia quoque propter situm ejus remotiorem ita integris viribus ad ipsum non perueniunt, quemadmodum ad ventriculum. Deinde quia sæpe remedia, quæ ipsi intemperiei profligandæ sunt vtilia, à contraria intemperie ventriculi prohibentur, quibus de causis curatio difficilior redditur.

## Indicationes.

In intemperie hepatis curanda indicatio communis est, alterandum esse per contraria. Remedia ramen interna, quia hepar loco profundiore situm est, quam ventriculus, efficaciora hinc esse debent. Quia etiam membrum principale & nobilius est hepar, ejus crasin & proprietatem naturalem per similia, calorem verò naturalem, ne dissoluatur, per adstringentia mediocriter conseruare oportet.

## Remedia.

Quæ autem medicamenta alterent hepar in specie postea proponuntur. Hic saltem ea recensēbimus, quæ hepatis toti substantia & peculiari proprietate conseruant.

E cibis talia sunt:

Hepata animalium; vituli, gallinarum, anserum; in primis hepar lupi præparatum, cujus puluis cibis & aliis medicamentis admiscendus. Vtiles sunt & passulæ, hepaticæ valde gratæ. E medicamentis; si calidæ intemperiei indicia adsint, peculiari vi hepatis profunt, Cichoracea,



Cichoracea, rosæ, santali species: Si frigida, agrimonia, absinthium.

Adstringentia autem sint moderata, cum hepar obstructionib. facile obnoxium sit.

### De Intemperie calida.

Intemperies  
hepatis cali-  
da.

Calidam intemperiem contrahit hepar primò à partium vicinarum caliditate, sicut in febribus ardentibus hepar à calore cordis & ipsum incalescit, quod & à vicinarum partium erysipelate & inflammatione accideret potest.

Deinde è rebus non naturalibus assumenda, retinenda, expellenda & foris incidentia, quæ calefaciendi vim habent, hepar calefaciunt. Inter ea autem præcipuè alimenta & medicamenta vi calefaciendi prædita hepar calefaciunt, vt nimius vini generosi & aromaticum vsus.

### Signa diagnostica.

Signa.

Calidam intemperiem hepatis indicant 1. Causæ, quæ præcellerunt. 2. Effectus, vt cibi & potissimum carnis inappetentia, deiectiones biliosæ, vomitus bilis, vrina flaua, febris, quæ sæpe coniungitur, pulsus velox, & frequens, mordax in toto, & præcipuè in volis manuum & plantis pedum, calor, color faciei citrinus, corporis totius gracilitas, linguæ alperitas. Iuuant frigida, nocent calida, quemadmodum hæc pleraque explicat Galenus, 6. de loc. aff. c. 7. & 8. de comp. med. sec. loc. cap. 6. Quod si intemperies hepatis calida plurimum excesserit, sequuntur excretiones biliosæ, fœtidæ, sanguinolentæ, & tandem *hæc* hepatis *diapnoë* (corruptio substantiæ hepatis) & carnis hepatis quasi colliquatio, & per cruentam deiectionem excretio.

### Prognosticum.

Prognosticū.

Excessus caloris, nisi summus sit, non ita periculosus est; cum hepatis constitutioni non ita repugnet. Non tamen ita facile curatur, præsertim, vt plerumque contingit, si ventriculus simul sit frigidus, & flatu vel in eo, vel in intestinis adsit. Cum enim quæ ad hepar refrigerandum faciunt medicamenta, prius recipi debeant in ventriculo, hunc prius offendunt, eiusque frigus intendunt.

### Indicationes & Curatio.

Indicationes  
& curatio.

Hepatis intemperies calida refrigerantia indicat, quam si contraxit à vicinis partibus calidis, ex imprimis alterandæ. Earum enim intemperie sublata facile quoque calor hepatis euanescit. Quod etiam faciendum, si intemperiem à calidis humoribus contraxerit.

Si ergo sanguis abundet & calidior sit, & vires, ætas ac cætera permittant, vena apertenda, quæ & sanguinem abundantem euacuat & simul refrigerat.

Medicamen-  
ta hepar re-  
frigerantia.

Medicamenta verò hepar refrigerantia sunt;

Radices: Cichor. taraxac. fragar. acetosa.

Folia: Cichorij, endiuia, scariola, acetos. sonchi, lactuca.

Flores: Rosarum, violarum, ymphæa.

Semina: Frigida maiora (scilicet melon. cucumer. cucurbit. citrulli) minora (lactuca, endiuia, scariola, portulaca) hordei.

Fructus: Fraga, cerasa, ribes, cucumeres, cucurbita & similes.

Ligna: Santali species.

Succi: Citri, ribes, granator. cerasorum, serum lactis.

Et imprimis cichoracea & inrybacea omnia hîc valde profunt, & hepar roborant, & ob amaritudinem abstergunt & aperiunt; nec ventriculum frigidum lædunt.

Vt *℞*. Rad. cichor. *℥*. *℞*. sol. endiu. cichor. an. *M. i.* sem. melon. endiu. an. *℥*. *ii.* passular. mundat. *℥*. *j.*

Coq. in aq. hord. simpl.

Colaturæ *℥*. *℥*. *i.* adde syr. endiuia simpl. *℥*. *ii.* acetos. *℥*. *ii.* Milce pro *℥*. *iii.* vel *℥*. *iv.* dosibus.

Vel *℞*. Aq. hord. cum sacchar. & cinamom. *℥*. *℥*. *ii.* fragor. sine vino, endiuia an. *℥*. *iii.* sem. *℥*. *iv.* frigid. maior. excori. an. Drach. *ij.*

F. Emulsio, cui adde iulebi rosacei *℥*. *i.* Milce.

Vel *℞*. Aq. pura *℥*. *℥*. *ii.* sacch. candi *℥*. *v.*

Bulliant leniter & colentur.

Colaturæ adhuc calidæ adde santal. rubr. Drach. *ii.* citrin. Drach. *i.* sem. flor. rosar. rubr. Drach. *i.* spir. vitrioli Scrup. *℥*.

Stent in infusione recta hor. *v.*

Colentur. Adde iulebi violar. syrupi ribes, succi citri an. *℥*. *vi.* spir. vitriol. *q. s.* ad aliquam acetositatem.

F. Iulebus.

Siliber. possunt aque cinamomi aliquot gutta addi.

Vt *℞*. Conseru. cichor. rosar. violar. an. *℥*. *i.* rad. condit. cichorij Vnc. sem. spec. diarrhod. Abb. Drach. sem. Cum oxy sacchar. *s.*

F. Electuarium.

Extra verò vsurpanda sunt Vnguentum rosarum, refrigerans Galeni, cerorum santalinum, succi & aqua herbarnum hepaticar. frigidarum, vt rosarum, violarum, endiuia, cichorij, scariola, lactuca, item succus cucumeris & cucurbitæ.

E.g. Paretur tale epithema.

*℞*. Succi vel aq. endiu. lactuc. scariola an. *℥*. *iii.* rosar. *℥*. *ii.* spec. diarrhon. santalon. puluer. santali citrini an. *℥*. *℥*. trochisc. de spodio Scrup. *i.* spica Indica Scrup. *℥*. aceti rosarum *℥*. *℥*. *℥*. Milce.

Vel *℞*. Vnguenti refrigerantis Galeni, rosati Mesua an. *℥*. *℥*. puluer. rosar. rubr. santali citrini an. Scrup. *i.* camphora gr. *x.* ol. ros. parum.

F. Vnguentum.

### Diata.

Aër ad frigidum vergat, Cibi refrigerent, sed non obstruant. Vtilis est imprimis ptisana & eius cremor, quæ magis refrigerat, si semina frigida maiora addantur, Vsurpentur etiam lactuca, acetosa, cichorium, intybum. Cibi condiantur succo citri, limon. granat. ribes, cerasor. acetosorum. Potus sit cereuisia tenuis, vel vinum aqua dilutum, vel aqua hordei aut simpl. aut cum iulebo rosar. aut serum lactis. Acidulæ quoque magnam calorem hepatis temperandi vim habent. Vitet æger irâ, & corporis exercitationem nimiam.

### De Hepatis intemperie frigida.

#### Causæ.

Intemperiem hepatis frigidam pariunt vicinorum Hepatis inviscerum frigiditas, vt supra dictum, res non naturales refrigerandi vim habentes, imprimis vsus rerum frigidarum, vt frigida potus, & medicamenta nimis frigida, sanguinis item nimia euacuatio.

### Signa Diagnostica.

Præcellerunt causæ modò dictæ. Plerumque sic satis appetunt cibum ægri; sitis adest nulla, pulsus est parvus, tardus, rarus, totius corporis frigiditas & albedo, excrementa pituitosa, cruda, sæpe liquidiora, non mordicantia, vrinæ albæ, aliæ tenues, aliæ crassæ. Sanguis generatur aquosus & crudus. Quæ refrigerant, nocent, quæ calefaciunt, profunt.

## Prognosticum.

**Prognosticū.** Hepatis frigiditas multo periculosior est, quam caliditas eundem; cum naturæ visceris magis repugnet, & functioni eius, quæ in calore consistit, aduerietur. Ideoque quò maior est frigiditas, eò periculosior est, & præcipue si eò usque progressa sit, ut sanguificationem lædat, & iam cachexiam inducat. Nisi enim maturè ei occurratur, ad hydropem deducit.

## Indicationes &amp; Curatio.

## Indicationes &amp; Curatio.

Intemperies frigida indicat curationem per calida; quæ ut tutò adhiberi queat, si sanguinis aliqua copia adsit, ex suppressione mensium, vena saphenæ primùm apertenda, aut si hæmorrhoides suppressæ sint, ipsæ provocandæ.

## Medicamenta hepatis calefacientia.

Medicamenta autem hepar calefacientia sunt:

Radices, fœniculi, petroselini, apij, pimpinella, acori veri.

Folia, Agrimonia, agerati, cuscute, absinthij, lupuli, chamædryos, betonica, fumaria, sabina, capillorum veneris.

Flores, schœnanthi, sambuci.

Semen, fœniculi, anisi.

Aromata, cinamomum, spica Indica.

Cortices, citri, aurantium.

Et quæ ex his fiunt.

Conseruæ, flor. betonic. salu. fumaria, chamæpithyos, sambuci, absinthij.

Syrupi, de eupatorio, byzantinus, de duabus & quinque radicibus.

Species, dialacca, diacurcuma, diacynamomi.

Trochisci, de rhabbaro, de absinthio, de eupatorio, de lacca.

Vel ℞. Rad. fœnicul. petroselini an. ʒ. ʒ. agrimon. chamædryos, capillor. vener. an. M. i. summitatum lupuli, fumarie an. M. ʒ. sem. fœniculi, anisi an. ʒ. j. Coq. in aq. f.

Colaturæ ℞. ʒ. x. syr. de duabus radicibus ʒ. ii. de eupatorio, oxymel. f. an. ʒ. ʒ.

M. pro tribus dosibus.

Vel ℞. Aq. fœnic. petroselin. agrimon. an. ʒ. iii. syr. de duabus vel quinque radicib. byz. ant. compos. an. ʒ. ʒ.

M. Aromatizentur speciebus diacynamomi vel aromat. rosat.

Vel ℞. Rad. fœnic. petroselin. asparagi an. ʒ. ʒ. agrimonia, capill. vener. marrubij an. M. ʒ. centaur. minor. P. i. schœnanthi, rad. cyperi an. ʒ. ii.

Coq. in aq. simpl.

Colaturæ ℞. lb. ʒ. syr. de duabus radicibus, byz. ant. de eupatorio an. ʒ. i.

F. Potus pro tribus dosibus.

Galenus, 8. de comp. medic. sec. loc. c. 8. ex Archigene hoc refert.

℞. Sem. anisi, apij, fol. asar. absinth. amygdal. amarar. an. Drach. ij.

Reducantur in pastillos, quos ipse amarus nominat. Dos is cum vini diluti ʒ. i. v. si febris absit; febricitantibus cum meligrato. Moderatè calefaciunt & absterunt ac meatus aperiunt. Nam cum intemperie, præsertim frigida, semper ferè obstructions à materia cruda factæ coniunguntur.

Vel ℞. Conseru. anthos, beton. cort. citri condit. an. ʒ. ʒ. hepatis lupi preparati spec. aromat. rosat. diamarg. calid. an. ʒ. i. Cum syr. betonic. vel de eupatorio.

F. Electuarium.

Vel ℞. Pulpa passul. ʒ. i. myrobalan. chebulor. conditor. Dra. ii. spec. arom. rosat. ʒ. i. schœnanthi, puluer. hepatis lupi prep. an. ʒ. ʒ. Cum melle anthosato.

F. Electuarium.

Extra inunctiones fiant vel fortis ex oleo absinthij, nardino, mastiche, macis, caryophyll. ligno aloës, spica, & plantis antè enumeratis, vt.

℞. Ol. absinth. nardin. an. ʒ. ʒ. amygdal. amarar. mastiche. an. Drach. ii. fol. agerati, absinth. schœnanth. an. Scr. i. sem. apij, petroselini an. ʒ. ʒ. cera q. s.

F. Vnguentum.

Vel tale epithema pareretur.

℞. Agrimon. M. i. rad. cyperi Dra. i. sem. fœnicul. anisi, schœnanth. an. ʒ. ʒ.

Coq. in aqua, sub finem affunde vini Drach. iii. aceti Vnc. sem.

Colentur pro epithemate.

Vel ℞. Aq. agrimon. absinth. an. lb. ʒ. vini Cretici Vnc. iii. spec. aromat. rosat. dialacca an. ʒ. i.

F. Epithema.

## Diata.

Aër sit calidior. Cibi boni succi & natura sua calidi, condianturque aromatibus. Potus sit vinum vetus, imprimis Creticum, vt & Hispanicum, ac quod aromatibus conditur & Hippocraticum vocatur, Corpus moderatè exerceatur.

## De Hepatis Intemperie humida.

## Causæ.

Causæ præcipuè sunt alimenta admodum humida, Intemperies medicamenta humectantia, & aquæ dulcis balneum sæpe usurpatum. Intemperies hepatis humida. Causa.

## Signa Diagnostica.

Præcesserunt causæ modò dictæ; nulla adest sitis; pulsus est mollis; sanguis multus & aquosus, excrementa multa liquida, vrina spicæa. Iuuant sicca, lædunt humida. Signa.

## Prognosticum.

Humida intemperies hepatis minus periculosa est; cum hepatis naturali constitutioni minus sit contraria, & curationi minus resistat, modò ea non sit summa, & cum visceris corruptione, aut alia praua qualitate, vel cum summo frigoris excessu. Prognosticū.

## Curatio.

Humida intemperies indicat siccantia, vtiturque Galenus in humida hepatis intemperie adstringentibus cum mistura calefacientium, si frigida qualitas prædominetur; refrigerantium, si calida. Ideoque ex calefacientibus hic conueniunt, absinth. agrimon. mastiche. Ex frigidis rosæ, santalum, spec. diatrion-santalum, diarrhod. Abbat. Arque iisdem etiam extra uti licet. Curatio.

## De Intemperie Hepatis sicca.

## Causæ.

Causæ sunt res omnes non naturales, quæ vim excitandi habent, præcipuè cibus; potus & medicamenta siccantia, vt & inedia. Intemperies hepatis sicca. Causa.

## Signa Diagnostica.

Præcesserunt causæ iam dictæ, adest naturalis ad eam propensio, habitus corporis est gracilis, siccus, durus, venæ sunt duriores, sitis adest assidua; sanguis est paucus, deiectiones alui sunt sicca & dura, Iuuant humectantia, nocent siccantia, Signa.

## Prognostica.

*Prognostica.**Prognostica.*

1. Sicca intemperies hepatis facilè in tabem & marasmus totius corporis transit; cum vniuersum corpus alimento defraudet.

2. Eadem satis periculosa est; cum temperamento hepatis multum repugnet.

3. Si calida intemperies siccitatem coniunctam habeat, difficulter curatur; cum humectantia debilia sint, & siccitas remediis valdè resistat.

*Curatio.**Curatio.*

Sicca intemperies hepatis humectantia indicat. Quapropter profunt syrapi & conseruæ *borrag. bugloss. violar. amygdala dulces, semina melonum, & eorum emulso, passule, succus carniū, vitelli oñorum, aliæque, quæ in intemperie ventriculi sicca sunt proposita,*

Extra applicanda sunt *ol. amygdal. dulc. violar. unguentum dialib. & similia.*

*De Intemperie Hepatis composita.**Causæ.**Intemperies hepatis composita. Causa.*

Intemperies compositæ causas habent compositas modò enumeratas.

*Signa Diagnostica.*

Eadem ex signis complicatis cognoscuntur, vt excrementa loturæ carnis similia humiditatem cum frigiditate vel caliditate coniunctam indicant. Si frigiditas coniuncta sit, refrigerantia alimenta & medicamenta, vel aliæ causæ refrigerantes præcesserunt; profunt ægris calida, deiectiones humidæ sunt, sine mordacitatis sensu, sequitur ferè cachexia & hydrops. Si verò caliditas sit coniuncta, præcesserunt causæ calefacientes; profunt frigida, in excrementis mordacitas & acrimonia percipitur; Progressu morbi deiectiones fiunt biliosæ & foetentes, & tandem atrabilariæ redduntur. Quando sicca intemperies cum actiuis qualitatibus copulatur, excrementa crassiora & sicciora sunt, humida iuant, ac qualitates actiuæ hanc vel illam passiuam frequenter adsciscere solent. Intemperies enim calida paulò post sibi adiungit siccam, frigida humidam.

*Curatio.**Curatio.*

Composita intemperies compositam & duplicem vim habentibus remediis curatur: Calida humida, frigidis siccis; calida sicca, frigidis humectantibus; frigida humida, calefacientibus & siccantibus; frigida sicca, calidis humectantibus, tam in victus ratione, quam medicamentorum loco, seu intrus seu extra adhibitis.

Ideoque quando caliditati iungitur humiditas, conueniunt rosæ, santali species, succus ribes, diatrion santalon, diamargar. frigidum, conseru. rosar. cichorij, quibus C.C. bolus Armenus, terra sigillata addi potest.

Si siccitas coniungatur caliditati, cum sero caprino fiat emulso amygdalar. dulc. Vtile est, si decoctis & aquis refrigerantibus addantur nuclei pini, amyllum, tragacantha.

*De Intemperie Hepatis cum materia.**Intemperies hepatis cum materia.*

Rarò autem Hepatis Intemperies sola diu durat, sed humorem sibi adscicit, vel bilem, vel pituitam, vel melancholiam; sæpe & sanguis abundat. Continetur autem humor vel in substantia seu parenchymate Hepatis; quod si distendat, tumor excitatur; sin erodat, vlcus; vel in vasis, vbi obstructionem seu morbum in via plerumque parit, de quibus postea dicitur. Calida autem Intem-

peries calidos humores, sanguinem & bilem; frigida crudos, crassos, pituitosos; sicca terrestres; humida aquosos cumulat.

*Causæ.*

Intemperies Hepatis cum materia, vt in aliis quoque. *Causa.* partibus, gignitur, quod vel in ipso paulatim humor cumulatur, seu ob expultricis facultatis debilitatem, seu ob vasorum angustiam, seu quod vesicula fellis sanguinem ab humore bilioso non expurgat, vel ab aliis partibus seu toto corpore ad Hepar transmittitur; vel terriò, quod humor in ipso Hepate ob eius intemperiem aut errata in victu cumulatur, vt totus ab expultrice facultate, etiam robusta, expelli non possit.

*Signa diagnostica.*

Intemperies cum materia cognoscitur & ipsa è signis *Signa.* Intemperierum antè enumeratis, quibus ea coniunguntur, quæ materiam præsentem arguunt, ex antecedentibus, præsentibus ac effectis petita. Calidi humoris in Hepate præsentis indicia sunt causæ calidos humores generare valentes, quæ præcesserunt, bilis vomitu vel per aluum reddita, primò tenuis, & pallida, deinde crassa, flaua & foetida, oris amaror, cibi fastidium, sitis vehemens & sæpe febris; iuuant frigida, nocent calida.

Frigidi humoris contraria sunt indicia, præcesserunt causæ, quæ humores frigidos cumulare solent, faciei & totius corporis color est albus, & habitus corporis euadit mollis & humidus, deiectiones sunt pituitosæ, febris nulla adest, nisi ex obstructione humores putrescant, atque tum grauitas in dextro hypochondrio percipitur.

*Prognosticon.*

Intemperies cum materia citius curatur, quam intemperies nuda & sine materia, & quò plus substantiam hepatis labefactat humor, eò morbus periculosior est. *Prognosticon.*

*Indicationes & Curatio.*

Perpendendum autem, an materia aliunde affluat, *Indicationes & curatio.* aut in ipso hepate colligatur. Si aliunde affluit, repellenda, repellenda, & Hepar, ne eam recipiat, roborandum. Materia autem cum intemperie peccans & præsens in hepate conueniente modo euacuanda, & si opus, alteranda, & quidem euacuanda leni medicamento, & per interualla iterato, ob partis affectæ officium & dignitatem. Ipsa verò intemperies alteranda, vt modò dictum. Considerandum autem, quæ præcipuè Hepatis pars laboret, & humorem vitiosum contineat. Nam cauum Hepatis commodius per aluum euacuatur; gibbum per vrinam. Si ramen etiam in gibba hepatis parte magna humorum copia adsit, prius per aluum purgatio instituenda. Itaque si materia aliunde affluat, siue à toto, siue à parte auertenda est ab hepate; quod fit, si sanguis affluat, commodissimè venâ in brachio sectâ: purgationes verò hîc parum commodæ sunt; cum versus Hepar è reliquo corpore humores trahant. Potius tum si materia sit acris & calida, & naturam ad expulsionem irriter, temperanda ea & alteranda iis medicamentis, quæ antea sunt proposita. Reuellunt etiam ab hepate frictiones brachiorum & crurum & cucurbitulæ scapulis cum scarificatione appositæ. Hepar verò roborant, ne affluentem materiam recipiat, & quodammodo repellunt, inunctio regionis Hepatis facta oleo *maistichino, rosaceo, myrtino, absintij, emplastrum diaphanum frigidum, cerotum santalinum, cataplasmata & epithemata ex refrigerantibus & adstringentibus antea propositis applicata.*

*Purgatio an sit comoda.**Reuellentia. Hepar roborantia.*

*Deriuatio.*

Ad Deriuationem autem commodum est venam internam in brachio secare, quæ quidem venæ sectio à principio instituta ab Hepate reuellit, si autem repetatur, etiam deriuat. Possunt etiam hirudines hæmorrhoidibus applicari.

Vbi autem materiæ influxus iam prohibitus est, vel in ipso hepate ob causas supra dictas materia cumulata est, ad ipsius materiæ euacuationem curatio dirigenda. Fit autem illa materiæ euacuatio vel sensibiliter, vel insensibiliter. Sensibiliter euacuant, quæ vel aluum vel urinam mouent,

*Euacuatio.*

Ideoque si calidi, acres & biliosi humores adsint, venæ sectione præmissa, ij euacuandi sunt *syrupo rosarum solutiuo, tamarindis, manna, rhabarb. electuario de succo rosar. rosato Mesue, de psyllio.* Frigidi verò humores euacuandi sunt *melle rosato solutiuo, agarico, electuario diaphenico, Indo & similibus.*

*Diuresis.*

Urinam mouent in causa calida; *sem. 4. frigid. maiora, cum sero lactis, ut & radices graminis.* Fortiora sunt; *Radices asparagi, feniculi, petroselini, brusci, schœnanth. asarum,* quæ in causa frigida locum habent.

*Insensibilis discutiencia.*

Insensibiliter verò discutiunt & reliquias absumunt; *linimenta, unguenta, cataplasmata & emplastra* è discutiendis parata, de quibus postea de obstructione & humoribus hepatis dicitur: Quibus tamen semper aliquid adstringentium addendum, ne tonus hepatis laxetur.

Ne verò noua materia cumuletur, præstat, si prohibeatur primò, ne noua coaceruetur, quod fit, si ea victus ratio instituatur, quæ ad humoris, qui peccat, generationem non facit. Deinde si adsit aliqua Intemperies, ob quam vitiosi humores generantur, vel non rectè expelluntur, si illa tollatur, & tandem si obstructiones adsint, si eas aperiantur.

Aliquot morborum Hepatis ab humoribus facit mentionem Hippocrates libro de internis affectionibus.

## CAPVT II.

## De Obstructione Hepatis &amp; vasorum eius præter naturam apertione.

*Obstructio hepatis.*

Organicos verò morbos Hepatis quod attinet, sunt inter eos primò morbi meatuum. Cum enim hepar per ramos venæ portæ, qui in eius substantiam disperguntur, chylum recipere, & sanguinem genitum per venam cauam in totum corpus distribuere debeat, pateant, quantum satis, hi meatus, necesse est. Quod si non fiat, morbi meatuum oriuntur, qui hinc duplices sunt, obstructio nimirum vasorum in hepate, & nimia eorundum apertio.

Et primò obstructio hepatis satis familiarè malum est, teste Galeno; *de caus. morbor. c. 7. & de diff. morbor. cap. 7.* Nam venæ à portâ exporrectæ transmissis quibusdam osculis cauæ ramis committuntur in ipsa hepatis substantia, vel in ipsam hepatis substantiam terminantur, per quas cum alimentum traduci & disportari oporteat, obstructiones faciliè accidere possunt; cum ob meatuum illorum angustiam, tum ob materiæ transeuntis crassitiem & lentorem; interdum & copiam.

Itaque Hepatis obstructio est angustia vasorum in Hepate alimenti distributionem impediens à materia ipsorum cavitatem implente, producta.

Subiectum est totum Hepar, quod tanquam organum generationis & distributionis sanguinis afficitur; siquidem actio, quæ læditur, totius Hepatis est, ut membri organici. Et si enim obstructio quæ in venulis, aut arteriis per Hepar dispersis est, sit notissima, & vulgò in Medicorum scriptis celebrata; tamen quia & ipsa hepatis substantia suos poros ac meatus habet, non minus ac masculosa in habitu corporis substantia, & illi à

crassiore, feculenta & limosa sanguinis parte continuè præterlabente obstrui & occludi possunt, quibus occlusis nec hepatis calor natiuus ventilari, nec halituosa & tenuiora excrementa euacuari possunt. Atque materia ista per substantiam Hepatis diffusa nisi maturè tollatur, tandem induratur & scirrhum Hepatis generat.

## Causa.

Causa efficiens proxima est materia cavitatem vasorum vel etiam ipsam hepatis substantiam implens. Estque materia hæc interdum humor, interdum stasus, aliquando vtrumque mixtum; interdum & calculus.

*Causa.*

Peccat autem humor vel copia vel qualitate, ut si crassus sit, qualis melancholia, pituita & sanguis, item bilis interdum crassa; aut viscidus, ut pituita, quæ lentorem acquisiuit.

Nonnunquam materia toto genere præter naturam, est, ut sanguis corruptus & putridus. Crassus igitur humor cum calidus, tum frigidus esse potest. Nam & bilis flaua interdum diutius in Hepate hærens crassescit, & perniciosas obstructiones in eo gignit. Imò in calculum interdum degenerat.

Facilius verò generatur obstructio in Hepate à materia etiam non admodum crassa & copiosa, cum vasa eius aut à primo ortu angustiora sunt, aut à stipricorum vsu diuturno talia affecta sunt.

Materia hæc, ut *cap. præced. de Intemp. Hepatis cum materia dictum*, vel in Hepate generatur; vel aliunde ad id confluit. Generatur in Hepate vel ejus sagullate & actione læsa ob Intemperiem præcipuè, vel ob errorem externum, dum etiam Hepati bene constituto chylus vitiosus offertur, è quo bonum sanguinem generare nequit.

Confluunt aliunde humores ad Hepar, vel à toto, dum illud copiosè vel crassè & viscidè materia repletum est; vel à parte aliqua, ut à ventriculo, liene, vtero, vel etiam à capite. Ut autem materia ad Hepar feratur, fit hoc, quia vel ob imbecillitatem materiam faciliè suscipit, vel ob angustiam vasorum faciliè retinet, vel vi caloris attrahit, vel dum medicamenta aperientia & diuretica exhibentur ventriculo crudis humoribus repleto.

Externæ causæ sunt errores in victu, ut si quis cibos copiosos aut crassos, frigidos, adstringentes frequenter ingerat, aut vino dulci crasso, vel saccharo frequentius utatur. Eiusmodi cibos Hepar faciliè obstruentes Galenus enumerat, *1. de med. facult. cap. 4. 5. 6. & 3. eiusdem operis cap. 15.* Accidit hoc quoque, quando quis mox à sumpto cibo exercetur vehementius, aut balneum ingreditur. Tunc enim crudus chylus in exiles hepatis venas rapitur & impellitur,

## Differentia.

Obstructio Hepatis alia maior & pertinacior est, alia minor & mitior. Inuenerata item alia, alia recens. Quædam etiam cum Intemperie est, quæ humorem obstruentem produxit aut fouet, Occupat tandem obstructio partem vel gibbam vel cauam.

*Differentia.*

## Signa Diagnostica.

Ager quandam grauitatem sentit circa Hepatis regionem cum obruto dolore quodam, præsertim si paulò vehementius respirat, aut mox à cibo corpus exerceat, ut ex Galeno colligitur, *2. de loc. affect. cap. 8. & 7. aph. 52.* In accliuu ascensu insueta quadam difficultate spirandi premitur. Totus corporis color, inprimis faciei, mutatur, quia nec generatio nec distributio sanguinis recta fit, ob id & alui deiectiones & liquidiores & copiosiores fiunt: Urinæ imminuuntur, tenuisque excre-

nuntur



nuntur. Facile quoque in obstructione Hepatis febres putridæ accenduntur.

Si obstructio cauum Hepar obsideat, tactu foris nihil percipitur; quia pars in profundo later; & ventriculus magis in consensum trahitur, unde cibi fastidium & sitis iniuncta existit, alui excrementa liquida sunt, quia chylus Hepar non permeat. Si gibbum sit obstructum, abdomen ea regione pressum resistit, & partes respirationi dicatae magis læduntur, inprimis diaphragma. Quæ per aluum excernuntur sæpe sanguinolenta apparent ex rudi mutatione chyli in sanguinem.

Quod ad causarum signa, si obstructio ob vasorum angustiam fiat; facile & frequenter homo in hoc vitium illabatur, præsertim cum angustia est nativa: Quomodo autem angustia & latitudo venarum exploranda sit, docet Galenus, 5. de sanit. tuend. cap. 7. Asciticia angustia est, quæ ex stipticorum longo ac frequenti usu contracta est. Vbi angustia vasorum signa non adsunt, vitio materiae obstructio inducitur, & quod obstruit, humor est, si ponderis sensus magis circa Hepatis regionem percipitur; vapor & flatus, si tensio magis affligit.

Si humor sola quantitate peccat, exsuperantis eius indicia apparebunt. Si viscidus sit, adsunt signa puitæ, frigidi ventriculi, catarrhi. Si crassus seu calidus & biliosus, cum gravitate quidam dolor punctorius quasi coniungitur, qui in frigido humore non animaduertitur. Si materia sit putrida, febrem sociam habet. Si denique nullus error externus præcesserit, ob vitium internum genita est obstructio, quod quale sit, ex iis quæ cap. præced. dicta sunt dignoscere licet.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Obstructio Hepatis malum est non contemnendum, quia plures morbos minatur, potissimum febrem, Hepatis inflammationem, icterum, scirrhum, hydroperem, ut Auicenna recte dixerit, obstructionem matrem esse omnium ægitudinum Hepatis. Si tamen tempestive & recte curetur, citra difficultatem tollitur, dum modò non magna sit & inneterata. Quæ enim inneterata est, non tantum in Hepate sed & in omni membro putrefactionem excitat, febrémque accendit, teste Aetio, tetrah. 2. ferm. 2. cap. 2. & Galenus scribit 8. de comp. med. sec. loc. cap. 6. Obstructionem Hepatis à vitiosis humoribus putrefactio sequitur in calidis in temperaturis breui, in frigidis non citò sed temporis progressu.

2. Hepatis obstructionem comitatur distributionis alimenti impedimentum & plenitudinis collectio in mesaræi simæque visceris partis venis, unde periculum aut inflammationis earum partium, aut putredinis redundantium humorum. Galenus de succ. bon. & vis. c. 2.

3. Obstructio in parte sima seu caua hepatis facilius curatur; quia medicamentorum vis expeditius eò penetrat, & materia obstruens per latiore & commodiorem viam euacuatur.

4. Peior est obstructio, quæ ab humore est, quam quæ à flatu. Quoniam hic propriè discutitur. Periculosa etiam, quæ à materia putrida; si quidem febris coniungitur, quæ vires magis affligit. Minus prava est, quæ ortum habet à materia solùm qualitate peccante, quam simul etiam qualitate, hoc est, ut crassa & lenta sit, quam non rarò scirrhus sequi solet.

#### Indicationes.

Indicationes.

Obstructio apertionem indicat. Et cum obstructio ex eorum numero morborum sit, qui causam continentem & plerumque simul fouentem habent, & partim facta sit, partim fiat, id quod obstructionis factum est, sanare oportet per ea, quæ obstructiones liberant;

quod verò adhuc sit, per illa, quæ materiam obstructionem fouentem tollunt. Prius præstant medicamenta, quæ proximam obstructionis causam tollunt, immuentia scilicet, dum copiosa materia obstructionem excitat, vel incidentia & detergentia, dum viscida est, vel attenuantia, dum crassa, sintque omnia illa hepatica, aut his permixta, ut promptius ad hepar penetrent, idque sua vi roborent. Posterius faciunt euacuantia & reuellentia & quæ causis cum generantibus nouam materiam, tum impellentibus ad Hepar obstitunt & aduersantur. Semper autem totius ratio habeatur & maxime primarum ad hepar viarum, quæ à materia replete liberæ esse debent, ne materia illa vnà cum medicamentis obstructionem soluentibus ad hepar deducatur, atque obstructio augeatur.

#### Curatio.

Curatio.

Si ergo sanguinis abundantia indicia adsint, & cætera consentiunt, dextra basilica aperiatur, aut si malum sit à suppressis mensibus, saphæna, ut sanguis deorsum ab hepate ad vterum trahatur, & ut tutior sit aperiendum vsus, quæ pleraque calida sunt sanguinemque fundendi vim habent.

Medicamenta autem aluum lenientia nota sunt, sicut & medicamenta quemlibet humorem præparantia, eumque è corpore euacuantia & cap. præced. etiam proposita.

Corpore purgato exhibeantur, quæ soluendi obstructiones vim habent. Talia sunt, si obstructio hepatis sit à frigida, crassa, & viscida materia; Radices feniculi, perroselinii, apii, asparagi, brusci, rubia tinctorum, asari, gentiana, scilla.

Folia. Capill. ♀. cuscute, agrimon. agerati, lupuli, origani, marrub. alb. chamædr. absinth. card. benedict.

Semen. feniculi, ammios, dauci, aquilegia, cicer. rubr. amygdala amara.

E quibus decocta parari possunt, additis passulis & cinamomo, vel spica, interdum etiam pauco aceto.

Vtiles sunt syrupi capill. ♀ de duabus & quinque radicibus, oxymelitis genera, exhibita cum convenientibus decoctis vel aquis: trochisc. de rhabarbar. de absinth. de eupat. de lacca. Species, diacurcum, dialacca.

Si à causa calida fiat obstructio, conueniunt Rad. graminis; rad. & fol. cichor. endiuæ, taraxaci, scariolæ, lonchi, lactucæ, acetosæ, sem. 4. frigid. maior. & minor. syrup. de cichor. simpl. & cum rhabarb. de endiu. simpl. & compos. acetos. simpl. & compos. diarrhod. trochisci de camphora, species diarrhod. abbat. diatrion. fantal.

Vbi mixti humores malo huic causam præbent, etiam medicamenta miscenda sunt. In summa Galenus medicamenta ΕΥΠΕΡΙΤΗ & ΕΥΤΡΑΠΗΤΗ, hoc est, obstructionem aperientia & meatus expurgantia vult esse calida & tenuium partium, amara scilicet, quibus adstrictio quædam coniuncta est.

Qua de causa absinthium vulgare valde prodest, ut & Ponticum & abrotanum ac amygdalæ amaræ.

In causa autem frigida tale decoctum paratur.

℞. Rad. 5. aperient. vino macerata. 3. i. asari 3. ii. capill. ♀ cichor. agrimonia an. M. i. chamædryos, summitat. lupuli an. M. ss. sem. anisi, feniculi, ammios an. 3. ii. aquilegia 3. i. cicer. rubr. 3. ss. schœnanth. 3. iiii. passul. mundat. 3. vi. glycyrrh. 3. iii. bacc. iuniperi num. xij.

Coq. in aq. simpl. ad tert. partis consumpt. pro ℥bj.

Colatur. adde syrup. de 5. radic. byzantin. compos. oxymel. simpl. an. 3. j.

Aromatizetur cum speciebus diatrion. fantal. Drach. j.

F. Potus pro tribus vel quatuor dosibus. Si in his mechoacan. Vnc. ss. rhabarb. elect. Drach. ii. spic. gr. xi. cinam. Drach. ss. infusa fuerint, moderatè simul aliquid per aluum educitur.

Syrupus

*Syrupus aperiens noster.*

℞. Rad. aperiens. ℥. i. cichor. pimpinell. an. ℥. β. cortic. frangule sambuci an. ℥. v. herbar. cuscute. capill. ♀. agerati, agrimonie an. M. i. linaria. cardui bened. chamadr. centaure. minor. flor. genist. an. M. β. sem. carthami, genista, aquileg. an. Vnc. β.

Incisa & conquassata infundantur in vase arcte clauso in s. q. aq. s. & aceti scilicet ℥. β. per dies tres in P. M. Postea colentur & addatur succi endiuia fumar. an. ℥. β.

Et iterum addito albumine oui per dies 3. digerantur & colentur. Tandem adde sacchari clarificati, & ad instam consistentiam cocti q. s.

Fiat Syrupus.

*Syrupus de cuscute D. Scholtz.*

℞. Herb. cuscute odor. M. ii. fumaria, scolopendr. oese-rach, hepatica capill. ♀. an. M. β.

Rad. fenic. asparagi, taraxaci an. ℥. iii. cichor. ℥. i. sem. cuscute ℥. vi. fenic. ℥. ii.

Coq. lento igne in s. q. aq. ad consumptionem medietatis. Post horas duas F. fortis expressio.

Cui adde succi endiuia fumarie lupuli an. ℥. β. rhabarb. el. ℥. ii. cinam. el. ℥. β. Coq. s. a. cum s. q. sacch.

F. Syrupus.

Galenus in Euporist. cap. 16.

℞. Sem. anisi apij, rad. asari, amygdal. amarar. fol. absinth. an. Vnc. β.

Formatque trochiscos Dra. i. pondere, exhibetque febricitantibus cum hydromelite, non febricitantibus cum vino diluto.

Vel ℞. amygdal. amarar. mundat. ℥. iβ. sem. cumini, apij an. ℥. β.

Detur cochlear vnum ex vino.

Vel ℞. Baccar. iuniperi Vnc. i. β. semin. eruca Vnc. i. prassij ℥. β.

Excipiantur melle crudo, detur cochlear vnum.

In 8. de Comp. medic. sec. loc. cap. 8. pastillis Hepaticis amaris Asclepiadis vititur. Videantur utrobique plura. Vtilis est & ista aqua aperiens.

℞. Rad. dulc. amar. ℥. iii. summit. lupuli, eupator. an. M. ii. cuscute. hepatic. cichor. cum toto an. M. i. β.

Infundantur in sero lactis ad prominentiam 4. digitor. per dies 3. Hinc destillentur. Dentur Vnc. iii. cum syrup. de quinquerad. Vnc. ii. Galenus ad magnas obstructions Hepatis ex materia admodum crassa vititur corticibus rad. cappar. tamarisc. scolopendrio. Et si obstructio pertinacior sit, etiam ea, quæ ad lienem aliàs utilia sunt, usurpari possunt. Vbi de duritie Lienis suspicio est, addatur passulæ, caricæ, glycyrrh. buglossi, malui, amygdal. dulc.

In calida caussa.

℞. Rad. cichor. graminis an. ℥. β. fol. endiuia. cichor. scar. iol. cuscute, an. M. i. agrimon. absinth. an. p. i. sem. endiu. cichor. melon. an. ℥. ii. fructus alkekengi n. vii. passul. mund. ℥. β. Coq. in s. q. aquæ ad 3. part. consumpt. pro tibi.

Colaturæ addo syr. cichor. simpl. de duabus radicibus, acetosi simpl. an. ℥. j.

Aromatizentur spec. diatrion. santal.

F. Potus pro 3. dosibus.

Vtilis est & hic quoque conferua radic. cichor. recentium coctarum & minutim contusarum, cum s. q. sacch. parata.

Si obstructio pertinacior sit, etiam hic ea, quæ ad humores frigidos utilia sunt, usurpari possunt. Post illorum tamen usum decoctum cichorij sumendum.

In caussa tam calida quam frigida utilia sunt medicamenta e tartaro parata, & tartar. vitriolat. ut & aqua illa e vitriolo & tartaro, quæ descripta est in Inst. p. 1366. In caussa frigida utilis est spiritus vini tartarif. seu essentia tartari.

In omnibus quoque hepatis obstructionibus, præcipue ab humore frigido, utilia sunt medicamenta à chalybe parata, de quibus de obstructione lienis dictum.

Inter reliqua etiam pulvis cachecticus dictus.

℞. Chalyb. prepar. part. j. cassia lign. part. ii. sacchar. albiss. part. iv.

F. Pulvis, cuius mane & vesperi Scr. i. detur.

Vel ℞. Chalyb. prepar. ℥. i. sacch. albiss. in aqua agrimon. dissolut. ℥. β.

F. s. a. Rotulæ, quibus sub finem addatur guttula vna atque altera olei cinamom. vel caryophyl.

Vel ℞. limatura chalyb. q. v. irroretur aqua absinthij, fraxini.

In quibus proprii sales dissoluti sint. Relinque tamdiu, donec contrahat rubiginem.

℞. Huius croci ℥. iii. fecul. ari. ℥. ii. magist. perlar. coral. lor. an. ℥. i. cinamom. Scr. iii. sacch. q. s. ad dulcedinem.

Fiat pulvis. Dos. Dra. j.

Vel ℞. fecul. ari. ocul. cancr. prep. crystall. tartar. an. Drach. i. croci mart. resolut. Drach. sem. salis absinth. cichorij, tartari vitriolati an. Scr. i. cinamom. spec. diatrion. santal. an. Dra. β.

F. Pulvis.

Inter alias autem chalybis præparationes hæc utilis est.

℞. Limatur. chalyb. sulphur. part. equal.

Ponantur in crucibulo in ignem circularem donec sulphur exhalet. Iterum sulphuris partem æqualem adde, quæ in igne planè exhalet, ne sulphuris odor amplius percipiat. Chalybem hunc postea inde sarragini ferreæ & affunde acerrimum ad eminentiam digiti vnus & ponantur super ignem carbonum; semperque agitentur, donec acerrimum exhalet, quod ubi factum, nouum acerrimum affundatur, iterumque igni admoveatur, qui fortissimus adhibeatur, donec materia rubeat, quæ refrigerata subtilissimè puluerifetur.

Diligenter autem attendendum, ut semper iis, quæ obstructions solunt & attenuant, nonnulla adstringentia admisceantur, substantia visceris roboretur, & aperiencia diutius hic detenta efficacius agant. Eiusmodi sunt inter calida absinthium, mentha, inter frigida, rosa, cichor. endiu. Compertum verò est ex nimio & diuturno vsu aperiensium medicamentorum hepar non parum læsum fuisse.

Post vsum aperiensium horum æger per dimidiam horam in dextrum latus decumbat, ut promptius ad venas melaïcas & hepar ferantur.

Extra autem in obstructione à caussa frigida utilis est succus vel decoctum absinthij, fumarie, rad. filicis, sem. securidacæ, cum pauco aceto, si epithematis forma regioni hepatis calefacta imponantur.

Aut ℞. Fol. absinth. abrotan. agrimon. cuscute an. M. i. rad. cyperi Vnc. β. flor. chamemel. M. β. cinamom. spica an. Dra. i. cumini Drach. ii.

Coq. in s. q. vini albi ad tertiæ part. consumptionem. Colatura vsurpetur pro epithemate.

Si eadem medicamenta ad molliriem coquantur & contundantur, & olei amygdal. amarar. sufficiens quantitas addatur, cataplasma formari potest.

Vel paratur tale vnguentum:

℞. Ol. nard. amygdal. amar. ana ℥. β. spic. Indic. Celtic. scænanth. an. ℥. i. cyper. sem. apij an. Scr. β. cera q. s.

F. Vnguentum.

In obstructione à caussa calida.

℞. Aq. cichor. endiu. absinth. an. ℥. iii. aceti vini ℥. β. spec. diarrhod. Abbat. diatrion. santal. an. ℥. ii. spica ℥. i. M.

F. Epithema.

Expeditis obstructionibus intemperies hepatis emendanda est iis medicamentis, quæ cap. præced. sunt proposita, ipsūque hepar roborandum. Ut si obstructio fuerit à caussa frigida, tale paratur Electuarium.

℞. Cons. capill. vener. beton. absinth. an. ℥. i. rhabarb. Scrup. ii. hepatis lupi prepar. Dra. ii. spec. diatrion. santal. an. ℥. ii.

lo aloes 3. i. cinamom 3. i. schœnanth. 3. B. Cum syr de eupator.

F. Electuarium.

Vel 2. Hepat. lupi prepar. 3. B. Mithridat. 3. ii. conseru. absinth. agrimon. an. 3. i. Cum syr de eupator.

F. Electuarium.

Si obstructio sit à causa calida.

2. Conseru. flor. vel rad. cichor. 3. i. B. ros. 3. vi. spec. diarrhod. Abbat. diatrion santal. an. 3. B. Cum syr. de cichor. simpl.

F. Electuarium.

### Diata.

Victus ratio sit attenuans, vt præcipit Galenus, in art. med. cap. 87. & 6. de tuend. san. c. 7. Et si obstructio sit à crassa & viscida materia, non tantum attenuans victus sit, sed & abstergens. Inter abstergentia probatur prisana hordeacea, 1. de rat. vict. in acut. s. 18. quæ distributionem à cauo in gibbum hepatis adiunat. Condiuntur cibi, si febris vel calida intemperies adsit, aceto, aliàs aromatis, sed modicè, aut baccis iuniperi. Pro sunt quoque cappares aceto conditi. Pistacia quoque hepatis aperiunt & roborant. Videntur in cibis omnia crassa, lenta, adstringentia, & edulia è tritico, farina & lacte, ac caseus, præsertim vetus, caro suilla & duræ carnes, ac difficilis coctionis. Item anguilla, aliaque, quæ Galenus enumerat, 5. de tuend. san. c. 7. de succor. bonit. & vitio. c. 4. Nocet quoque vehemens à cibo exercitatio & balneum, & cibi assumptio corpore adhuc ab exercitio præcedente calente. Vbi verò quis post exercitium à cibo dolor & tensionem hepatis sentit, quiescat, & in potu sumat aliquid, quod vrinam cieat, & hepatis obstructione liberet, sicut consilium Galenus, in lib. de salubr. diata aph. 12. & 32. In insculis quoque coq. radic. feniculi, petroselin. asparagi. Copia ferculorum vitetur, & cibus sumatur priore iam concocto. In potu improbantur vina dulcia, crassa, austera & cereuisia crassa. Detur verò prisana hordeacea diluta & hydromel dilutum, vel cereuisia tenuis & bene defecata. Vbi vinum locum habet, sit illud tenue ac vetus.

### De apertione vasorum hepatis.

Apertio va-  
sorum hepa-  
tis.

Contrarium obstructionis hepatis vitium est vasorum eius nimia apertio. Aperiuntur a. hepatis vasa vel à caloris aut humiditatis excessu, à qua præcipue laxatur; vel ab humoribus acerbis, & quibus orificia vasorum patrescunt, aut etiam ipsa vasa eroduntur, vel etiam à sanguinis copia. Pertinent huc & causæ externæ, quæ violentia sua vasa rumpunt & vulnerant.

Cognoscitur autem hoc malum à causis, quæ præcesserunt, in primis verò ex effectis, inter quos præcipue est cruenta alui deiectio, quæ accidit, cum vasa in hepate præter naturam aperta sanguinem continere non valent.

Apertio autem vasorum occlusionem eorundem indicat. Præstat hoc vel obstruendo, vel adstringendo. ad quam res utilia sunt, plantago, bursa pastoris, polygonum, tormetilla, rosa, myrtus, ribes, berberis, absinthium, cydonia, mastiche, terra sigillata, bolus Armenus, spodium, corallia, syrupus de rosis siccis, myrtinus, de ribes, de mentha, de coralliis, trochisci de spodio, de terra sigillata, aquæ ferratæ.

Extra etiam dextro hypochondrio applicentur eadem adstringentia & cataplasmata è pulpa cydoniorum, ros. tubr. absinth. balaustr. & baccis myrti. Fomenta ex iisdem in vino austero coctis, & linimenta & vnguenta ex ol. mastich. myrtin. absinth. cum pulueribus adstringentibus. Emplastrum de mastiche, diaphœnic. frigid. & similia,

Ad hunc locum nonnulli etiam referunt apertionem venarum & illum sanguinis fluxum, qui cuidam, venæ è regione hepatis aperta accidit, & restitente sanguine

Dan. Sennerti Tom. II.

vestigium fluxus non apparuit, vt refert Hollerius, inter rara num. 3. vt & alterius cuiusdam historiam, quam recenset Beniuenius, de abd. morb. & sanat. causis. cap. 4. Hominis nimirum robusti admodum, qui agens annum 36. ætatis conquerebatur sæpenuerò de sanguinis fluxu, quo singulo quoque mense grauiter affligebatur, & rogatus, quâ parte sanguis fluere, id se nescire respondebat. Deposito tamen pallio illa dextra monstrauit. Verum cum in his nullum vestigium nec cicatrix appareret, & Beniuenius se decipi suspicaretur, ille, cum fluxus iste rediret, locum digito contegebat, eoque, accersito Beniuenio amota sanguinem fluere permittebat, qui non secus, ac si incisa vena esset, emanabat, nec prius ille fluor cessabat, quam sanguinis libra emitteretur. Quo euacuato nullus dispicere potuit, vnde euacuatio facta sit, Cuius a. istum hominem Beniuenius sola sanguinis missione ex vena hepatica singulis mensibus instituta & idonea victus ratione.

Verum hæc venarum apertio propriè huius loci non est, neque venæ istæ, quæ apertæ fuerunt, fuerunt ex hepate immediate, sed ex iis, quæ in cutem disperguntur. Idem, sed in aliis partibus bis obseruauit; Primo in scorbutico, cui in crure vena per interualla aperiebatur, & satis largiter sanguis effluebat, nullo postea apparente vestigio. Deinde in fœmina quadam, cui, cum primum esset grauida, sæpius in occipite vena præter aperiebatur, & sanguis cum maximo impetu interdum ad libram vnam effluebat. Cum verò sanguis is non fluere, circa ventriculum & diaphragma dolorem percipiebat, vbi etiam postea tumor obortus est, qui cum ad suppurationem peruenisset, necessario aperiendus fuit. Ipsa verò conualuit.

## CAPVT III.

### De Inflatione Hepatis.

Sunt & alij morbi, qui hepatis, quatenus membrum organicum & certo modo conformatum est, accidunt. Hepar aliquando planè defuisse in Matthia Ortelio, Mercatore Antuerpiensi, refert Schenckius, obseru. lib. 3. sect. 2.

[ Vbi refertur, quod anno Christi 1564. d. 11. Septembris, mortuus sit Matthæus Ortelius, Mercator Antuerpiensis, eiusque corpore aperto nec hepar, nec lien inuentus sit; at substantia intestinorum carnosa prorsus fuerit, & multò solidior, quàm ipsa musculorum caro, vt soliditate cordis carni ferè responderet, & vena caua ex ipsis intestinis suam originem sumperit, eo ferè modo, quo vena portæ in ipsis intestinis solet implantari. Laborauit hic Vir aliquot annis ante hydrope, & sæpe inflammatione & abscessibus intestinorum.

Similem historiam refert Zacutus Lusitanus de Præmed. Adm. lib. 2. obseru. 38. de fœmina quadam, quæ cum ex mensium obstructione tympanite laborasset, & obiisset, corpore aperto hepar nullum inuentum est sed loco eius massa carnea ab hepatis regione usque ad vmbilicum extensa, quæ 36. libras pendebat. ]

Contrà, vt Schenckius ex Gemma refert, hepar duplex inuentum; aliquando repertum globosum & iusto minus, & vna cum diaphragmate ad mammillam usque dextram ascendens; aliquando peritonæo annatum vt Columbus. lib. 15. annotauit. Sed hæc rara sunt, & plerumque à primo ortu contracta, ac vix curationem admittunt. Eos ergo saltem morbos, qui frequentiores sunt, & curationem admittunt, explicabimus, quales sunt magnitudo aucta & tumores hepatis. Inter quos primò est Inflatio, cum sub tunica crassus flatus concluditur, qui hepar inflat, & dolorem in eo excitat.

SSSS

Causa.

Observatio  
Schenckij.

Zacutus  
Lusitanus.

*Causa.**Causa.*

Flatus is interdum à membris vicinis, vel etiam vniuerso corpore & venoso genere in febribus pituitosis & malignis transmittitur; vel à cibis flatulentis, pituitosis & melancholicis suppeditatur; vel ab hepatis imbecillitate generatur.

*Signa Diagnostica.**Signa.*

Cognoscitur hoc malum ex tumore dextri hypochondrij, qui est sine gravitate, sed cum magno dolore qui tamen non est continuus, sed nunc intenditur, nunc remittit; & si locus digitis prematur, tumor cedit nullum tamen murmur percipitur, nec vomicae latentis suspicionem præbet: Corporis & faciei color, ut in aliis hepatis tumoribus, non mutatur: Urina, si febris absit, quod plerumque fit, est alba & spissa.

Verum de hoc hepatis tumore notandum, etsi non impossibile flatum sub tunicam hepar ambiente concludi posse, cum aqua etiam ibi sæpe colligatur; tamen cauendum esse, ne, quod de liene etiam dictum, dolores, qui ex distensione peritonæi & membranarum vicinarum oriuntur, pro doloribus hepatis habeantur. Sæpe enim accidit, præcipue in motu & exercitio vehementi; & in corporibus, qui non sæpe exercentur, vel diu ab exercitiis quieuerunt, ut flatus vel humores ferofi agitati in peritonæi & musculorum ipsi connexorum spatia irrumpant, doloremque in eo punctorium excitent, qui pleuritidem quandoque simulat.

*Prognosticum.**Prognosticum.*

Tumor hic sæpe satis difficulter curatur; cum flatus hic loci non facile discutitur.

*Curatio.**Curatio.*

Malum hoc flatus discutientibus curatur, & eos ab hepate repellentibus. Vtilia proinde hic sunt omnia, quæ in obstructione hepatis ex causa frigida sunt proposita. Præcipue discutientia & digerentia, ut diacyminum, diagalanga. Si pituita adsit crassior, quæ malum foueat, præparanda ea & euacuanda, ut c. 1. & 2. dictum.

Extra etiam fomenta flatus discutientia vtilia sunt, & inter ea etiam milium, ut:

*℞. Flor. chamamel. meliloti an. M. j. absinth. M. ss. sem. anisi, fenugraci, lini an. ℥. ss.*

Coq. pro fomento.

Postea inungatur locus ol. amygdal. amarar. nardin. chamæm. de absinth. de spica.

*Dieta.**Dieta.*

Cibus sit attenuans, non flatulentus. Vinum bibatur meracius & verus.

## CAPVT IV.

*De Hepatis inflammatione.**Hepatis inflammatione.*

Cum hepar ob venarum angustiam obstructioni sit obnoxium, facile inflammatione tentari solet, sanguine in ipsam hepatis substantiam seu parenchyma effuso, unde id intumescere & sanguinem putredinem concipere atque incallescere contingit.

Estque materia tumores hepatis excitans interdum sanguis sincerus, qui inflammationem puram gignit; interdum biliosus, pituitosus, melancholicus humor admisceetur. E quibus tumores præter naturam sui generis existunt. Influit autem sanguis in substantiam

hepatis per modum vel attractionis, ob calorem, vel transmissionis, siue à toto, siue à parte aliqua. Suscipit, hepar ob imbecillitatem vel congenitam vel ab aliis causis accersitam.

Et quidem ad sanguinis attractionem facit medicamentorum calidorum externorum applicatio. Ita refert Guilielmus Fabricius, cent. 2. obs. 46. cuidam interperie frigida ventriculi laboranti emplastrum & vnguenta calida è pipere, cardamomo, oleo caryophyllorum, cinamomi & similibus admota fuisse, atque inde inflammationem hepatis excitatam. Cava enim sui parte à dextra in sinistram vniuersam ferè anteriorem ventriculi regionem integit, ita ut medicamenta calida, quæ corroborandi gratia ventriculo frigidiori admoventur, substantiam hepatis prius attingant antequam ad ventriculum usque perueniant. Idem præstare possunt cucurbitulæ regioni hepatis applicatæ. Cuius rei exemplum habet idem Guilielmus Fabricius, cent. 2. obs. 47. Cum enim cuidam hæmorrhagiæ narium laboranti cucurbitulæ magnæ ad regionem hepatis applicatæ fuissent, sanguis quidem substitit, sed inflammatio hepatis secuta est. Cum enim in magnis hæmorrhagiis sanguis effluere cessat, cucurbitulis affixis facile quidem ad hepar attrahitur, sed ibi retentus inflammationem parit. Ideoque tutius est frigida medicamenta, quæ sanguinem condensant, crassioremque & minus fluidum reddunt, hepatis & lieni applicare.

Afficiunt autem hepar secundum partem vel gibbam vel cauam; ob vicinitatem tamen partium alteram in consensum facile trahit.

*Signa Diagnostica.*

Inflammatio hepatis ab aliis tumoribus, affectionibusque eiusdem his signis discernenda. Sensus grauitatis circa hepatis regionem in dextro hypochondrio percipitur à membranæ, quibus hepar in nonnullis ad costas nothas annectitur: simul mox febris adest, non sequitur, ut in obstructionibus & scirrhis; non tamen statim acuta vel ardens febris est, nisi inflammatio maior fiat. Nam perpetuè inflammationis magnitudinem febris vehementia admodum comitatur. Etsi autem Aëtius docet, febrem adesse acutam, inæqualem quæ plerumque sub noctem exacerbatur: tamen id intelligendum de ea febre, quæ ad incalescentem phlegmonem hepatis accidit. Tussis per intervalla affligit arida, ob vapores, qui ab hepate inflammato ad pulmones eleuantur, & quod feruor hepatis diaphragma comprimit, quam molestiam natura ab organæ respirationis propellere nititur. Difficultas autem spirandi adest, cum ob tumorem hepatis, tum ob febrem quæ maiorem refrigerandi necessitatem affert. Decubitus difficilior est cum in latere dextro, hepate à subiecto ventriculo & intestinis compresso, tum in sinistro, hepate pondere suo suspensio & membranæ eius tensis. Facilior est decubitus supinus. Pulsus, teste Galeno, 4. de causis puls. c. 4. celerior; frequentior, inæqualis est, ob auctam in affectu calido refrigerandi pulsus necessitatem, durus, vibrans.

Ad enumerata signa accedunt, sitis magna ægrum fatigans, & anorexia; Lingua quoque scabra & rubicunda, tandem nigra fit cum quodam lentore. Calor mordax sentitur in toto, ratione febris; quæ si maligna sit, extrema frigescunt. Color totius ad flauum declinat; alius adstringitur, nisi coniuncta sit anæmia hepatis. Ita Galenus scribit, 4. de rat. vi. in acut. text. 17. Quibus hepar phlegmone obsidetur, iis anæmia hæc est, caprarum stercorei similia excernuntur, quando scilicet viscus hoc duntaxat phlegmone afficitur: sin cum phlegmone affuerit anæmia, seu debilitas hepatis, liquida deiciuntur, viscere alimentum ad se attrahente. Hæc Galenus.



Illa verò liquida aliàs biliosa sunt, aliàs, vbi aliqua ab hepate fit chyli attractio, loturæ carnis similia, quod crudus chylus in sanguinem perfectè nō est conuersus. Urinæ crassæ, rubicundæ, turbidæ, paucæ sunt, ob feruorem & æstum hepatis. Vomitus bilis est flauæ & vitellinæ, quæ postea æruginis colorem aliquando refert. Interdum singultus sequitur.

Cæterum discernenda est inflammatio hepatis à vicinarum partium inflammatione. Ac primò si mesenterium inflammatum sit, non apparet coloris in facie & reliquo corpore mutatio; symptomata sunt mitiora, deiectiones alui liquidæ, in quibus primò tenuis & cruda quædam sanies appareret: postea materia quædam magis concocta ad similitudinem puris, præsertim vbi inflammatio salubris est.

Si muscoli abdominis inflammati sint, corporis color etià non mutatur, tumor ad tactū sensim delitescit, ad figuram musculorū extensus, nec rotundus est, instar figuræ gibbi hepatis. Rectorum musculorū tumores oblongi sunt & per totum ventrem extensi, etià vmbilicū comprehendunt. Cæterorum, vtpote profundiorū, tumores difficiliter discernuntur, Cutis supra tumore non sine dolore contrectatur; apprehensa quoque digitis, vt attrahatur, minimè sequitur ob tensionem: Interdum rubicunda apparet, præsertim si affectio in externis musculis hæreat. Quocunque denique æger decumbat, eadem tumoris magnitudo manet; maior verò apparet, vbi hepate affecto decubitus sit in latus sinistrum, minor, corpore in dextrum reclinato, hepate scilicet sub costas nothas cedente. Si transversalis musculus inflammatur, magis læduntur partes profundæ, dolor est vehementior, quàm in aliis musculis: quia ille musculus est membranofus circa finem, & nervos plures mollioresque obtinet, & cū peritonæo aponeurosi cōiungitur.

Et omnino opus est, vt diligenter inflammatio musculorum abdominis ab inflammatione hepatis discernatur, cum incautis ea res non raro imponat, vt inflammationem musculorum abdominis in dextra parte pro hepatis inflammatione habeant. Exemplum videatur, 5. de loc. aff. cap. 7. de Stesiano: Hunc alij Medici curarunt tanquam abscessum habentem in hepate. Galenus, verò negavit abscessum esse in hepate & monstravit eum inter musculos transversos & oblique ascendentes esse. Simile exemplum est apud Francisc. Valeriolam, lib. 4. obs. 5.

Cauendum tamen etiam hîc, ne fallamur, & hepar non inflammatum putemus, si tumor in medio ventre apparet. Quibusdam enim hepar ad medium ventrem extenditur.

Tertio: Si inflammatio pleuram, quâ parte nothas costas dextri hypochondrij illa spectat, prehenderit, dolor vehementior erit, à superioribus quasi suspensus & cum punctiois sensu coniunctus: Difficulterque respirabit, nulla coloris faciei aut corporis fit mutatio, tussis, vehementior, molestiorque est, sed non planè sicca. Verùm cum sputo colorato saltem procedente malo pulsus euidenter durus & ferrinus apparet. Si hepar inflammatum sit, dolor est mitior cum sensu grauitatis, qui tamen exacerbatur, nisi æger supinus iaceat. Color corporis ad flauum accedit, tussicula adest arida, pulsus minus durus, tumor denique aliquis in dextro hypochondrio apparet.

Quod ad signa differentiarum inflammationis hepatis, quando magna illa est, dolor percipitur iuguli quasi ad inferiora tracti, præsertim dum vehementius æger inspirat. Dum enim hepar inflammatum pondere suo diaphragma cui alligatum est deorsum trahit, tensum diaphragma membranam costas succingentem, cui etiam obnascitur, tendit. Vnde dolor tractionis in iugulo sentitur, Galenus etiam fieri putat ob tensionem venæ cauæ sursum ab hepate ascendente, 2. de loc. aff. cap. 7. Tumor tactui, & vbi abdomen gracile est, etiam visui est expositus: Symptomata omnia sunt

Dan. Sennerti Tom. II.

vehementiora; contrarium accidit, vbi malum est mitius.

Quæ pars hepatis affecta sit, sic dignoscitur. In gibba hepatis parte consistit inflammatio, quando decubitus in dextrum latus est difficilior, & dolor pressu exacerbatur, tumorque manifestius apparet, præsertim musculis abdominis emaciatis; partes ad iugulum dextrum deorsum trahi videntur; symptomata denique omnia ad partes thoracis eminentia grauiora sunt, quàm ad intestina & ventriculū. Contrarium fit cauo hepatis inflammato, vbi & anorexia maior erit, & sitis aderit & vomitus materiæ biliosæ.

Qui humor inflammationis in hepate causa sit, ex symptomatum intensione & remissione æstimandū, & imprimis ex febris accessionibus vel exacerbationibus. Etsi enim omnis inflammatio, vt in aliis partibus, ita etiam in hepate sit à sanguine: tamen sanguis is interdum purus est, interdum bilem vel melancholiam admixtam habet, & quidem à sanguine & bile Symptomata vehementiora sunt, & febris plerumque ardens cum siti maxima; ex succo melancholico remissiora sunt, & febris licet sit continua, quasdam tamen pro natura humoris exacerbationes habet. Quanquam & hoc tradit Galenus, 4. de præag. puls. cap. 4. hepar nunquam ferè pituitosam fluxionem admittit, propterea quod compactius sit, & propterea congenita facultate pituitam alteret & immutet.

#### Prognostica.

1. Hepatis inflammatio malum periculosum & ple-  
rūque lethale est: quia pars princeps afficitur, cuius occasione sanguinis generatio & distributio læditur, & hydrops imminet, aut atrophia, vnde in hoc malo vnica salutis spes est virium robur, sicut Galenus, 10. meth. med. cap. 5. docet. Ideoque viribus imbecilli aut senes, aut graciles vel biliosi peribunt, vel in marasimum transibunt, præsertim si ex erysipellate laborant.

2. Quæ in simis aut cauis hepatis partibus Inflammationes accidunt, magis inappetentiam, nauseam, vomitum biliosum, sitim ingentem afferunt; quæ in gibba, maiore inter spirandum dolore laborantem afficiunt magisque tussim excitant, & dolor vsque ad dextræ partis iugulum, adeo vt deorsum trahi videatur, extenditur. Auicennas, 3. can. fen. 14. tract. 3. cap. 1. simpliciter pronunciare viderur, Apostema in gibbo hepatis deterius esse, quàm in cauo: sed explicandum hoc ex Galeno, quod partes thoracis, ideoque nobiliores, in gibbo hepatis patiuntur, vnde difficultas spirandi, tussis & dolor ad iugulum ascendens sequitur. Et per se hepatis gibba pars est nobilior, vbi generatio sanguinis, & huius in totum corpus aduocatio perficitur. Quæ autem caui hepatis inflammationem comitantur symptomata, vt nausea, vomitus, singultus ad ventriculū & intestina magis spectant. Sic Galenus scribit, 6. epid. comm. 2. 1. 14. Hepatis conuexum seu gibbum concauo longè periculosius est; quoniam inter superiores & propinque nobiliores corporis partes reponitur.

3. Tumor in hypochondrio durus & dolens; hoc est, phlegmone seu inflammatio, vt Galenus interpretatur, pessimus est, si verumque hypochondrium occupet. Si verò alterum, minus periculosus est in sinistro. Hippocrates, 1. progn. aph. 29. Nam propter hepar periculosa est inflammatio in dextro hypochondrio. Addit Galenus; in aph. seq. talem tumorem initio mox periculum mortis citò affuturæ significare Hippocrati, si scilicet intimum quid, hoc est, hepar, item ventriculus aut Lien afficiatur. Musculi hypochondriorum inflammati mortem non inferunt, nisi aut insignis sit inflammatio, aut virium debilitas, (morbus enim hic diu sæpe protrahitur & vires valde deiciunt) aut medicus vel æger errorem aliquem committat. Videatur & 6. aph. 7. de doloribus ventris profundis.

4. Inflammatio à sincero sanguine minus periculosa est; deterior à succo bilioso: quia febris ardens accedit, teste Galeno 5. *de loc. affect. cap. 7.* quæ marasimum minatur; postea à succo melancholico, qui facile in scirrhum migrat, vbi res desperata est.

5. Hepate inflammatione laborante superuenit singultus, 5. *aph. 58.* Et in inflammatione Hepatis singultus malum, 7. *aph. 17.* Causa est neruorum hepatis & ventriculi *salvoria*, ob quam hepar inflammatione laborans os ventriculi in consensu trahit. Singultus autem tantum fit, vbi Hepar ad maximam inflammationem peruenit, aliàs minimè, vt Galenus *ibidem* docet. Fieri & singultus tum potest, quando per magnâ hepatis inflammationem aliquid bilis in principium intestinorum confluit, quod in ventriculum infusum eum laceffit & singultum excitat. Quibusdam, teste Galeno, singultus ille accidit ob inflammationis magnitudinem, quo ventriculi os premitur.

6. Hypochondriorum inflammationes si diem vigesimum primum excedunt, & febris perdurat, tumore nō subsidente, in suppurationem vertuntur; præsertim si facultas non est imbecilla. Si cessante febre, pars materiæ crassa & lenta in hepate impingatur, tenuiore consumpta & attenuatâ, scirrhus excitatur.

7. Quibus hepar aut lien inflammatus est, iis plerumque hæmorrhagia narium accidit, (præsertim si 25. annis minores sunt) primis septem diebus, paucis nono & vndecimo, rarissimis decimoquinto: & confert illa hæmorrhagia, si è directo fiat. Hippocrates & Galenus, 1. *progn. ab aph. 31. vsque ad 34.*

8. In Inflammatione hepatis, renum, vésicæ, de crisi maximè indicium sumitur ex vrinis, quæ coctionem materiæ ostendunt. Leues autem hepatis inflammationes, quæ febres acutas coniunctas habent, soluit etiam sanguinis profluuium, sicut & alias in Hypochondriis calidas & acutas inflammationes. Oportet autem per directum fluere sanguinem, ex dextra quidem nare, hepate patiente vel locis in dextro hypochondrio sitis; ex sinistra verò, liene & locis vicinis laborantibus. Præterea sudor *χρῆσός* seu bonus & vtilis, id est, concocta iam materia emanans, omnes, quæ in hypochondriis sunt, inflammationes calidas & acutas iuuat. Cæterū contumax hepatis partes inflammationem patientes tribus præcipue excretionis modis soluntur: hæmorrhagiis è nare dextra, sudoribus bonis & vrinis copiosis. Causæ autem partes excrementis alui biliosis & sudoribus; nonnunquam etiam vomitionibus. Galenus, 3. *de crisi b. c. 3.*

9. Sciās, quod cum apostemati hepatis associatur ventris solutio, est mortale, Auicenn. 3. *canon. fen. 14. rr. 3. cap. 2. in fine.* Ratio est, quia Symptomata sit excretio materiæ prauæ adhuc crudæ & à virtute imbecilla, quæ materiam regere nequit.

10. Pessima signa inflammationis hepatis sunt, febris ardens, sitis inexhausta, lingua scabra, refrigeratio extremorum: cum medium corpus vritur, & ægri pedes subinde nudat; Vomitus item niger vel porraceus; quia magna adustio significatur. Morti proximis venter intumescit, rupto abscessu, & frigidum sudant circa colulum, & faciē: atque animo linquuntur.

11. Cum inflammationem febris ardens & continua comitatur, malum est; quia vehementer inflammatum istud viscus esse significatur. Sicut è contrario, exigua febris de exigua etiam inflammatione indicium facit. Nam, vt Galenus, 2. *prorrhet. aph. 31.* scribit, Inflammationis magnitudinem perpetuò febris ex proportionem consequitur.

12. Quando permutatur apostema calidum ex hepate ad splenem, bonum est; quando verò ex splene ad hepar, malum, Auicenn. 3. *can. fen. 13. rr. 3. c. 1.* Nam vomica hepatis nunquam ferè sanatur, aut si apostema diutius durat, hydropem accersit.

13. Quibus hepar suppuratum vritur, si purum pus

& album effluxerit, euadunt. In tunica enim hepatis pus continetur, sin qualis amurca, intereunt. 7. *aph. 45.* Nam quibus, vt Galenus in *comm.* addit, in tunica pus est, illasâ iecoris substantiâ, omnes seruatur: quibus verò in carnem vsque iecoris corruptio penetrat, ii bona ratione moriuntur. Illud humorem tenuiorem, à quo hepar minus periclitatur, hoc deteriore indicat.

### Indicationes.

Quæ hic agenda sint, facile ex generali de phlegmone curanda doctrina patet; modò simul partis affectus habeatur ratio. In primis autem in principio videndū, ne inflammatio augeatur. Inhibetur verò vacuando & auertendo sanguinem affluentem in aliam partem & adstringendo partem affectam, ne recipiat. Materia ergo fluens & fluxura reuellatur & repellatur. Et quidem si fluxio per modum attractionis fiat, vel dolor mitigetur, vel calor réperetur, prout vsus requirit. Si per modum transmissionis, hepar roboretur, ne materiam suscipiat, & mandanti quoque consularur, ac sanguis affluens aliò reuellatur, quod verò influxit, resoluatur. Tutissimumque est, vt sine suppuratione inflammatio curetur: si tamen suppuratio præcaueri non possit, danda opera, vt quàm citissimè perficiatur, & quantum fieri potest curetur.

### Curatio.

Cum ergo phlegmone hepatis ortum habeat à sanguine, phlebotomia, præmissis clystere, conuenit, euacuationis & diuersionis gratia, & mox quidem inter initia, vt repellentia tutius adhiberi queant, absque scirrhi metu, & postea etiam discutientia, ne horum vsu inflammatio augeatur. Itaque Aëtius, *teirab. l. 2. ferm. 2. c. 3.* primò & secundo die venam secari iubet, sed & septimo, si dolores ex inflammatione virgeant, viresque ferant. Aperitur autem Basilica lateris dextri, & sanguis pro habitu & viribus ægri vna vice extrahitur; aut si vites non admittant, partito. Galenus in maxima inflammatione etiam ad lipothymiam sanguinem educit. In suppressis mensibus vena in talo etiam aperitur. Si vires imbecilles sint, hirudines dextræ basilicæ admoueantur; Hæmorrhoides quoque aperire summopere vtile est. Cucurbitulis quoque cum scarificatione vri licet, post euacuationem totius applicando eas coxis & cruribus reuulsionis causa. Videatur quoque Galenus, 1. 3. *meth. med. c. 11. & 19.*

Quod ad pharmaca, eaque primum aluum lenientia, si gibbum hepatis laboret, aluus lenienda syrup. rosar. & viol. solutio, manna, item cassia, tamarind. quæ tutò mox à phlebotomia exhibentur.

Nam si accidat etiam, vt hæc lenientia ad portas hepatis perueniant, tamen locus inflammationis non irritatur, quia in superiore vel gibba hepatis parte consistit. Sin caua hepatis pars afficiatur, saltem clysteres lenientes vsurpentur, non verò purgantia exhibeantur, ne purgante medicamento per os exhibito materia per locum affectæ parti proximum, hoc est, per mesaraicas affectæ parti proximas ducatur. Talis clyster est:

℞. *Aqu. horæ recent. lb. j. sacch. rubri. ℥. j. ol. viol. rosar. an. ℥. j. b. syr. ros. sol. ℥. ii. vitellum oui vnius. M.*

F. Clyster.

Vbi opus est, cassiæ pro clysteribus extractæ, vel Electuar. lenit simp. ℥. b. adicitur. Cum inflammatio feruidior est, cichorium, lactuca, borrago in aqua hordei coqui possunt.

Deinde præparantia in feruidiori inflammatione sint Cichoræa, &c. quæ ad curandam Intemperiem calidam hepatis sunt proposita. In minus feruida, capilli ♀ & agrimonia addantur. Potius autem huius generis medicamenta decoctorum vel aquarum forma parètur, aut certè syrupi ita temperentur, ne admodum dulces sint.

Indicationes.

Curatio.

Lenientia.

Præparantia.

fiat. Nam dulcibus hepar inflammatum in maiorem molem attollitur, ut rectè Trallianus monet, lib. 5. c. 1.

*Evacuatio.* Postea ubi materia præparata & concocta est, euacuanda, & quidem si gibba hepatis pars inflammata sit, magis conveniunt, quæ urinas ducunt. Cathartica enim hic inutilia sunt, quia aliud locus est euacuationi adeo non conveniens, ut frustrare naturæ opere, inflammatio magis augetur. Lenientia tamen dari possunt etiam paulò validiora, præsertim si natura euacuationem per alium tentaret, sed diminuat. Tunc enim apparentibus signis concoctionis natura adiuuanda esset. Eiusmodi diuretica sunt sem. 4. frigida maior. cuscuth. capill. Q. rad. asparag. graminis, betonicæ fragar. gran. hallicacabi.

Concocta iam materia & phlegmone declinante fortiora addantur, ut sem. apii, fœnicul. petrosel. dauci, rad. valerian. & alia diuretica alibi exposita. Locum etiam hic habet syrup. de endiu. compos. byzant. simpl. & compos. de duabus & quinque radicibus cum decocto plantar. modò enumeratur. Ut:

℞. Rad. asparag. fœnic. an. Vnc. ℥. petrosel. cichorij an. Drach. ii. capill. Q. agrimon. ana M. i. cicer rubr. M℥. sem. 4. frig. maior. an. Drach. ii. passul. Vnc. i.

Coq. in aq. pura ad lb. i.

Colaturæ adde syrup. de 2. radic. Vnc. ii.

In limi vel caui hepatis inflammatione cathartica seu euacuantiæ per alium usurpentur. Galenus, 13. meth. med. cap. 13, vitur vitica & mercuriali, epithymo & polypodio, aliisque alium modicè deicientibus, atque cum his, cum etiam valentioribus audacius vitur in phlegmone remissione, parim in prisana coctis, partim pulveris forma ex pilisana vel aqua propinatis. Etiam clystere ægrum euacuat, inter initia leniore, circa declinationem postea, potissimum si quid scirrhum relictum sit, valentiori, ex hyssopo origan. centauro minor. colocyatide. Nam in principio, cum materia adhuc fluit, purgatio valida exhibita fluxionem magis irritat, & quam diu morbus est crudus, de prava materia nihil educitur; partes autem causæ valentiori pharmaco colliguescunt. Hodie cum inflammatio biliosa ingens sit, uti possumus syrup. rosar. solut. manna, cassia, rhabarbar. electuar. diaprunis seu diacatholico; si pituitosa, sem. cartham. agarie. mechoacanna; si melancholica, fol. senæ. epithymo, polypodio querno, helleboro etiam nigro ad scirrhum hepatis prohibendum. Atque hæc dosi parcione vel maiore exhibentur, prout inflammatio & febris postulat, nobilitasque & præstantia partis affectæ permittit.

Topica quod attinet, statim post venæ sectionem ad ea confugiendum est, non pleno adhuc corpore, ubi copia materię phlegmonem magis contumacem redderet. Primum igitur repellentia conveniunt, quibus quod & adhuc influit aut iam influxit, nondum tantum impactum est, retro pellitur, ne phlegmone augetur; pars etiam inflammata ipsidem refrigeratur & roboratur. Præstant id medicamenta hæc vi adstringendi, quæ meatibus & valis angustioribus reddit, materiam, quæ in ipsis continetur, exprimunt, & in vicinâ deponunt. Et quidem alia frigiditate sua adstringunt & repellunt, nec, ut plus materię affluat, admittunt, ut ol. cydoniorum, myrtin. rosac. succ. & caro cydon. omphac. acernum santal. sumach. myrti & rubi vitisque sylvestris gemmæ, lactuca, endivia, portulaca, plantago, solanum, albumen oui, cerat. santal. vagant. solat. Melares; alia citra refrigerationem id faciunt & adstringunt, ut absinth. nardus, mastiche, & ex his parata olea, nec cupressi, vin. auster. stipitium, schœnanthum, rad. cyperi. His utendum est in inflammatione pituitosa & melancholica, ne scirrhus generetur; illis in feruente & biliosa.

Non autem ad frigida applicentur, nisi sit erysipelas & febris insignis, nec solis repellentibus etiam inter initia utendum est, nisi in erysipelate.

Dan. Serenus Tom. I. l.

In inflammatione verò pituitosa & melancholica opus est admiscere quædam calida relaxantia & resolventia, quæ viam frigidis ad profundiora hepatis aperiant, præsertim cum parenchyma hepatis sit crassius & compactius, quam pulmonis aut cerebri. Itaque oleum de capparibus utile est, & oleum amygdal. amararum, post & mastichinum & chamæmelinum & anethinum cum paucis aceto & vino albo.

℞. Ol. rosar. cydon. an. Vnc. ℥. chamæm. aneth. vel absinth. an. 3. ii. samal. rubr. pulueris 3℥. aceti 3ii. cera q. s. F. Linimentum pro hepatis regione.

Post etiam tale epithema parietur.

℞. Fol. cichor. endiu. an. M. i. flor. rosar. rubr. M. ℥. chamæmel. melilot. absinth. aneth. an. P. i. santal. rubr. 1cr. iii. spica, schœnanth. an. scrup. i.

Coq. in s. q. aq. ad consumpt. tertiar. part. pro lb. i.

Colaturæ adde aceti Vnc. i.

Vtere pro epithemate.

Vel ℞. summis. absinth. abrotan. agrimon. fol. cichor. an. M. ℥. passular. non enucleatar. Vnc. iii.

Coq. in vino austero ad molliorem.

Contusis adde farin. sem. lini fœnigraci an. 3. i. puluer. rad. ireos 3. ii. ol. chamæmel. ros. an. q. l. F. Cataplasma.

Usurpanda verò adstringentia toto curationis tempore etiam in phlegmone declinatione, non quidem ut repellant, sed ut tonum hepatis conferant & roborent. Ac tantum semper resolventium vires adstringentia superare debent, quæ tum phlegmone ipsa à principio recedit. Galenus, 13. meth. med. c. 15. scribit; Theagorem Cynicum Philosophum hepatis inflammatione laborantem necatum fuisse ab Attalo Medico Thessalio, qui ei cataplasmata adhibuit ex solis relaxantibus & dissolventibus confecta, nullis adstringentibus admixtis.

Veruntamen inflammatione augete resolutia seu diaphoretica maiori quantitate reprimantibus miscantur, cuiusmodi mitiora sunt, chamæmelum, anethum, sem. lini, fœnigraci; Valentiora, ol. commune vetus, irinum, decoctum calaminthæ, hyssopi, pulegij & familiæ ipsidem, si inflammatio sit melancholica, adipēs, medullæ & alia emollientia, addantur ad præcauendum scirrhum.

Ideo autem medicamenta mixtæ facultatis esse oportet, quia duæ indicationes concurrunt, una ab ipsa phlegmone sumpta, in qua illo tempore multus sanguis continetur, isque subinde crassior & vehementer impactus; altera ab affecta ipsa parte, id est, hepate, quod mole materię tunc magis pressum diaphragmæ ex se moliri nequit, nisi ab adstringentibus roboratum adiuvetur, ut docet Galenus, 13. meth. med. cap. 16.

Porro si inflammatio inualecat, ut eius suppuratio (quod omni studio præcauendum est, ne vicus ferè immedicabile sequatur) prohiberi nequeat, natura mollientibus & maturantibus adiuuanda est. Talia sunt, oleum commune, adipēs, gallin. anseris, porci, vituli, farin. tritici, butyrum, malv. althæa. E Compositis hydreleum, folia malvæ cocta contusa & cum pingued. porci mixta paribus portionibus; medicamentum ex hydreleum, farina tritici & pane albo modicè coctis paratum, diachylon emollium cum adipe porci vel gallinæ.

Vel Rad. alth. Vnc. i. ℥. fol. malv. flor. chamæm. farin. bord. an. M. i. sem. lini Vnc. ℥.

Coctis iis & contusis adde pingued. gallin. q. s. ad conficiendam cataplasma. Addi etiam possunt caricæ pingues, sem. fœnigraci, rad. cyperi, schœnanth. ol. amygdal. dulc. vitell. ouorum, crocus ad hepatis tonum conservandum, comæ vel summitates absinthij.

Signa inflammationis suppurantis sunt dolor, febris, aliæque symptomata ingrauescentia, rigores nullo ordine invadentes, quos caloris exacerbatio sequitur. Confecto pure omnia illa mitescunt, vires tamen debiliores relinquuntur. Pulsus frequens est, languidus & crebra animi defectio toto vapore puris cor obstruente.

Abcessus denique disruptio si ad intestina fiat, ut solet, dum cauum hepatis afficitur, & materia purulenta perfecte euacuetur, nihil innouandum est, sed solis attemperantibus puris acrimoniam vtendum, ne dysenteria excitetur. Si non perfecta fiat euacuatio, ea adiungetur clystere è cremore hordei cum sacchar. & dum vrget necessitas ad decoctum furfurum & mel rosatum confugiendum. Per os hydromel exhibere licet.

Si rupto ad renes abcessu (dum scilicet gibbum hepatis laborat) pus perfecte ea via euacuetur, mitigantia acrimoniam puris sufficiunt; vt feri caprini tb. j. cum emulsione sem. melonum Vnc. j. si diminutè, mitiora diuretica & acrimonie expertia vsurpentur, vt hydromel cum emulsione sem. 4. frigid. maior. Aut si calor remissior sit, decoct. rad. asparagi vel apii in hydromel. factum. Vtile etiam est decoct. hordei non excorticati cum sem. maluz & saccharo.

Si materia purulenta ad ventriculum regurgitet & æger facillè vomat, natura adiuuanda & materia attemperanda iure pingui vel aqua hordei tepida, mitioribusque aliis. Si ad vomendum sit difficilis, clysteres vsurpandi, vel hydromel detur aut mel rosat. solut.

Interdum fîsâ & exesâ hepatis substantia, membranaque hepar ambiente, pus in abdominis cauitatem excidit; atque tum cum aliis præfidiis discuti aut exhauriri nequeat, veteres ad vitionem & incisionem abdominis accesserunt, ne intentatum quid etiam in hoc periculosissimo malo relinqueretur, quemadmodum ex 7. aphor. 45. patet. Hercules Saxonia etiam cuidam desperato abcessu hepatis laboranti abdomen è iecoris regione nouaculâ aperuit, quo loco tumor eminebat, & magnâ saniei copiâ eductâ hominem, etsi longiori temporis spatio, sanauit. Plerumque tamen æger non euadit, quod pus sua virulentia vicina membra, peritonæum, omentum, intestina corrumpat.

Compertum etiam est in hoc casu pus in abdominis cauitatem effusum, & ab intestinorum substantia imbibitum, ac per aluum euacuatum fuisse. Obseruauit quoque Erasius Bononiæ hepatis abcessu rupto pus tussi fuisse reiectum, de quo lib. 2. dictum. Scribit etiam Desiderius Iacotius, ad Hippocratis Coacas prædict. se bis terve obseruasse post Hepatis inflammationem pus per venas ad furas effusum fuisse, atque ibi magnum dolorem excitasse. Quod etiam Hollerius obseruauit, vt idem refert. Bauhinus etiam refert, Lutetiæ virum quendam cum abcessu hepatis laborasset, mortuum esse, & corpore aperto reperiens venas vsque ad tibiam pure refertas, & sinistram testiculum putridum.

Sæpe etiam ex inflammationis magnitudine gangræna subsequitur, quæ ferè incurabilis. Euasisse tamen quendam, Ioh. Matth. de Gradibus meminit, comm. in 9. Rhafis cap. de dolor. hepatis, vbi signa apostematis hepatis recenset.

Cæterum relictum vlcus difficulter sanatur, aut nullo modo potest sanari, quoniam ob *αἰματὸν* deficientem æger tandem contabescit, cum saniosis & putridis alui deiectionibus, in quibus substantia hepatis corrupti & purulenti nonnunquam apparet.

De abcessu etiam hepatis quædam infra de vlcere Hepatis dicentur,

#### Dieta.

Victu hîc tenui & exquisito opus est, ob nobilitatem partis affectæ, cuius vsus toti animali necessarius est; ita tenui tamen, vt virium simul ratio habeatur. Abstinentum etiam à lentis & crassis cibis, qui materiam in hepate retinent; vtendum verò abstergentibus, sed sine acrimonia & dulcedine: obest igitur mulla. Conuenit autem prisana colata, oxymel item cum aqua mixtū. Virtute debili prisana cum iure pulli paretur, vel carnes contusæ præbeantur. Vbi inflammatio est feruidior, cibis addi potest endiuiâ, cichorium, lactuca,

sem. 4. frigid. maior. cibusque aceto condiantur. Aromata & vinum nocent. Potus sit aqua hordei, quæ refrigerat, abstergit, obstructionesque minuit.

### C A P V T V.

#### De Scirrho Hepatis & aliis hepatis tumoribus.

Inflammati hepatis nonnunquam in scirrhum degenerat, quando tenuibus partibus discussis sanguis *Scirrhus Hepatis* crassescens humoris melancholici naturam induit, aut quando humores nimium refrigerantium vsu crassescunt, & innatus partis calor debilitatur. Frequentius verò obstructionibus hepatis superuenit scirrhus, præsertim contumacibus ac diuturnis. Nam humor primum hepatis venas implet, auctus deinde in omnem visceris substantiam redundat, & temporis successu siccescit, & vi caloris parte tenui dissipata, reliquum indurefcit, verusque scirrhus generatur. Idque facilius accidit, vbi materia illa ad concrefcendum vim insitam habet.

Est igitur scirrhus hepatis tumor in hoc frigidus, durus, indolens, à materia crassa vel viscida, vel vtraque mixta simul procreatus: Atque ita morbus magnitudinis præter naturam auctæ, & intemperiei frigida.

#### Causa.

Generatur scirrhus hepatis à materia crassa vel viscida, vel vtraque mixta, siue collecta sit paulatim in hepate, siue à liene transmissa. Et propterea non solum ex humore melancholico, qui crassus est, sed & pituita, si viscida crassa & lenta est, producitur; nonnunquam & à bilioso crasso humore, qui scirrhus ictero succedit; quandoque & à sanguine, vt modò dictum, cum vel tenuiores eius partes dissipantur, & crassiores relinquuntur, vel dum à nimio refrigerantium & adstringentium vsu sanguis incrassatur, & partis calor natius debilitatur.

#### Signa Diagnostica.

Cognoscitur hic affectus à sensu grauitatis maiore, *Signa* quàm in obstructione, sine febre tamen. Est autem sensus ille in membrana hepar inuestiente. Dolor etiam obscurus sentitur; quia partes vicinæ sensu præditæ à tumore hepatis comprimuntur, corumque unitas quodammodo soluitur. Tumor ille in hepatis regione manifestè durus percipitur, ob duriores scirrhos, quàm phlegmones molem, præsertim cum æger vel erectus manet, vel in latus sinistram decumbit. Progressu temporis tandem aqua intercus, quæ scirrhum hepatis necessariò sequitur, superuenit. Sine febre esse dicitur, ad differentiam inflammationis, à qua febris non abest. Vrina parciore emittitur. Color corporis mutatur in viridescentem maximè pallorem, quod floridus sanguis in hepate malè affecto non generatur. Corpus quoque emaciatur, quia nec *αἰματὸν*, nec sanguinis *ἀνάδοξος* rectè perficitur. Succedit cachexia, & nisi maturè occurratur, tandem hydrops & mors. Æger melius in dextrum latus decumbit; quoniam ipso in sinistram latus reclinato, scirrhosum hepar ventriculum comprimit, tanquam moles quædam ei incumbens, vnde ratione ponderis dolor ventriculi contínuus existit.

Differt tumor scirrhosus ab hepatis inflatione, de qua *Hepatis sim-* supra dictum, & simplici tumore, qui *plex tumor* *sim-* est, vt in fine capitis dicitur. *scirrhus*

#### Prognostica.

1. Scirrhus hepatis ab initio curari potest; confirmatus & exquisitus nunquam. Omnes enim sic affectos *Prognostica.* ex



ex necessitate hydrops inuadit. Pereunt autem quamplurimi tempore longo; quidam etiam breui, quibus alius non deficit, 2. ad Glaucon. cap. 5.

2. Qui scirrhi ad suppurationem perducuntur, facile in cancrum abeunt, nullamque curationem suscipiunt.

### Indicationes.

**Indicationes.** Cum hepar intemperie frigida laboret cum humore crasso & indurato magnitudinem visceris vitante, ipsum calefacere, materiamque impactam euacuare oportet. Materia verò cum crassa sit & dura, & nonnunquam simul viscida, attenuanda est & emollienda, interdum quoque detergenda. Sin solis calefacientibus, exiccantibus, & quidem quæ impensius id faciunt, vtamur, neglectis *μαλακτικαῖς* seu emollientibus, tunc absumptis humiditatibus incurabilis durities ex nimia resiccatione oritur. Emollientia autem addita vtrumque eodem tempore præstant, vt quod concrementum est, & fundant suo moderato calore, & sensim per halitum digerant, quemadmodum de his Galenus, 8. de comp. med. sec. loc. cap. 8. & 14. meth. med. cap. 5. & 5. de simpl. med. fac. cap. 5. docet.

### Curatio.

**Curatio.** Lenientia aluum, vt & præparantia & purgantia humores in hepate ex iis, quæ hætenus, præcipue de obstructione hepatis, dicta sunt, patent. Quod cætera medicamenta ipsum scirrhum soluentia attinet, emollientia illa & incidentia, attenuantia, & moderatè quoque discutientia esse oportet; mixtis tamen, ob hepatis robur seruandum, nonnullis adstringentibus. Nam ex solo emollientium vsu putredinis & cancri; ex solo discutientium, indurationis maioris periculum imminet.

Et quidem si scirrhus hepatis in gibba eius parte consistat, externis potissimum vti conuenit, cuiusmodi Galeno, 2. ad Glaucon. cap. 5. sunt absinthium, nardus Indica & Celtica, crocus, mastiche, vnguētum nardinum, anethinum, gummi ammoniacum, medullæ & adipēs.

**Emollientia & discutientia.** Emolliunt igitur & discutiunt medulla cerui, vituli, adep̃s gallinæ, anseris, bdellium, ammoniac. rad. & fol. althææ, cucumer, agrestis, sem. lini, fœnigræci, ol. amygdal. dulc. lil. albor. chamæmel. emplastrum diachyl. de meliloto. Attenuant calamintha, origanum, serpillum, aromata, myrrha. Roborant absinthium, myrobalani, mastiche. Ideoque emplastro de meliloto & diachylo, aliisque emollientibus, ol. de absinth. vel mastichinum recte permiscetur. Laudatur & lutum thermarum quarundam molliens, digerens & roborans.

Vt ℞. Rad. althææ Vnc. iii. scrophul. an. Vnc. ii. cucumer. asinin. ʒ. i. filicis ʒ. ʒ. fol. agrimon. althææ, absinth. flor. chamam. sumit. anseris an. M. ʒ. sem. fœnigræci. Vnc. ʒ.

Coq. in aqua & aceto pro fomento.

Vel ℞. Rad. alth. Vnc. i. ireos. cortic. intern. virid. sambuc. an. Vnc. ʒ. flor. chamam melilot. sambuc. an. P. i. fol. absinth. M. ʒ. spica viriusque an. Drach. i. ʒ.

Coq. in decocto intestinorum veruecis & vini part. æqual.

Non tamen fatus sunt diu continuandi, ne tonus hepatis laxetur.

Vel ℞. Emplast. diachyli ʒ. Vnc. ii. ammoniaci, bdellij aceto dissolut. an. Drach. ii. pingued. anseris, medull. crurum vituli an. Vnc. ii.

Cum cera ʒ. q.

Fiat Ceratum.

Vel ℞. Ammoniaci aceto dissol. Vnc. ʒ. bdellij ʒ. iii. pulu. rad. filicis, cortic. fraxini an. Drach. i. caricar. ping. num. ii. lumbric. vino lotor. ʒ. vi. mucilag. rad. alth. sem. lini an. Vnc. sem. ol. lil. alb. Drach. vi.

Coq. ad mucilaginis consumptionem.

Adde *cerebinth. resina pini* an. Drach. ii. emplastr. de melilot. diachyli simpl. an. Drach. iii. cera ʒ. ʒ.

F. Ceratum.

Vtilia sunt folia hyoscyami aceto decocta addito ol. amygdal. amarar. cataplasmatibus forma imposita.

Circa externa medicamenta hoc notandum, post vsum emollientium prodesse vaporem ex aceto forti, & aqua vitæ super lapidem molarem aut laterem candentem effusus, vt materia emollita attenuetur & soluiatur; post cuius vsum, iterum ad emollientia & hinc rursus ad resoluentia transeundum est, donec malum, si fieri possit, extirpetur, vt monet Galenus, 14. meth. med. c. 15. Stercus quoque caprinum ad discutiendos tumores scirrhusos valde vtile & efficax est.

Si sinum hepatis sit scirrhus obfessum, malumque externis remediis non cedat, interna remedia adiungenda sunt. Aëtius igitur succum anagallidis, quæ cæruleum florem habet, exiccatum pondere Drach. i. propinat ex hydromelite, eodem modo & pondere sem. vrticæ torrefacto vtitur. Accipit etiam picis siccæ, costi, piperis part. æqual. quibus tusis & cribratis cochlear i. præbet. Idem ex Galeno, 8. de med. sec. loc. cap. 8. medicamenta quædam Asclepiadis, Pasionis & aliorum affert ad inueteratas hepatis affectiones, quæ & tumoribus scirrhusis conueniunt, quæ ibi videantur. Desperatis ammoniaci in puluer. tenuissimè triti cochl. i. & mastich. gr. x. præbet ex hydromelite.

Vel ℞. Ammoniaci part. i. ruta part. ʒ.

Cum syr. de eupatorio.

Fiant pilulæ, quarum dosis est ʒ. i. vel ʒ. iii.

Videatur & apud eundem Aëtium aliud Asclepiadis, quo Philagrius vsus est ad hepatis scirrhum induratum, quod recipit gentianam, chamæpithyn, marrubium, petroselin. scolopendr. & alia, quæ ibi videantur.

Sciendum autem vsum horum medicamentorum per plures dies continuandum esse; quoniam malum diuturnum & contumax est, quod non facile expugnari potest. Hodie etiam parant decoctum sarsæ parillæ cum rad. filicis maior. agrimon. ceterach, cichor. aliisque hepaticis, additis, emolliendi gratiâ, rad. althææ & fol. borraginis. Chalybs etiam, vinum chalybeatum, & alia è chalybe præparata medicamenta vtilia sunt, de quibus in *affectionibus hypochondriacis & scirrhuso* dictum.

### Diata.

Victus ratio sit attenuans, vt in obstructione hepatis. Cibi tamen non nimis parcè præbeantur: Siquidem vires ad diturnum malum tolerandum consistere oportet, vimque habeant nonnihil incidendi & detergendi, cum modico calore & humiditate; crassa verò omnia & viscida vitanda sunt, vt & dulcium frequentior vsus, à quibus aliàs hepatis intumescere solet. Vinum sit tenue, odoratum, clarum, vel cereuisia pura tenuis. Vtiles sunt in condimentis ciborum cappares, Aëtius amygdalas & piper in cibis interdum concedit.

*Tumor hepatis simplex seu ὄγκος ἁπλῶς*.

Est & alius hepatis tumor, qui simplex & ὄγκος ἁπλῶς *Tumor hepatis simplex sine scirrhuso.* nominatur, qui à scirrhuso non patum differt. Hic enim breui tempore nascitur, minus renititur, & ferè tantum ambientem membranam hepatis occupat, plerumque & totum hypochondrium dextrum replet, nulla hepatis circumscripta figura apparente, & digiti manus sub extrema costarum infigi nequeunt. Oritur tumor hic simplex interdum à statu, interdum à cruditate tenui, quam vel immoderatus frigida potus, vel intempestiuus fructuum vsus, vel crapula satietasque nimia peperit, & sensum infert non grauitatis, sed tersionis, interdum à crasso & viscido est humore.

humore, quem hepar validum à se excludens in membranam suam deposuit, quod sæpe post febres diuturnas accidit. Videreturque hic tumor mihi esse affectus, quem mulieres in Silesia & alibi *den Riedikuchen*, rectius *den Riebnkuchen* nominant, quod digiti manuum sub extrema costarum infigi nequeant. Ioh. Langius, lib. 1. epist. 39. *den Fiebertuchen* appellat, qui accidat, si alterantibus frigidis citra euacuationem æger usus fuerit, quæ materiam incrassant.

Curatur autem medicamentis aperientibus, & humores crassos incidentibus, purgantibus, & flatus discurientibus, & ferè ut scirrhus incipiens.

## CAPVT VI.

*De calculis, vermibus, & hydatidibus in hepate natis.*

*Calculi hepatis.*

**N**on solum autem humores in hepate indurantur, sed & quandoque in lapides planè mutantur, & calculi in dissessorum cadaueribus inuenti sunt, ut testatur Fallopius, Columbus, & alii. Ita refert Kentmannus, in libello de calculis, in iuuenis cuiusdam Nobilis hepate tres lapides repertos fuisse, quorum vnus magnitudine dimidium ouum columbinum æquaret. Antonius etiam Beniuenius, ut de abdit. morb. & sanat. causs. cap. 3. refert, in muliere quadam nobili in hepatis membrana parte decliuore plurimos lapides, magnitudine & colore differentes, inuenit. Et Vesalius, in epistola de China ad Ioachimū Relandi, refert se nonnullorum, qui ictero laborauerant, & ab ictero in ascitem delapsi erant, iccinora vidisse adeo dura, & lapillis vndiquaque plena, ut nouacula præscindi non potuerint. Et quendam Belloarmatum Senensem hepar prorsus candicans superficie habuisse, non læue, sed admodum inæquale, & leuibus tuberculis asperatum, anteriorem verò eius partem & vniuersam sinistram ad modum lapidis fuisse induratum. Cælius Rhodiginus, lib. 4. antiq. lect. cap. 17. & Cardanus, de rerum varietate, lib. 8. cap. 14. scribunt, Veneriis in Augustini Ducis ex Barbatica gente corpore aperto lapidem prope cistam felleis, magnitudine grandioris oliuæ, coloris serpentini in nigredinem tendentis inuentum. Lapidem abscessu hepatis redditum vidit Rondeletius, ut refert, cap. 44. meth. curand. morb. Lapidem amygdalæ nucis magnitudine in virginis cuiusdam hepate repertum fuisse, scribit Matthiolus, in Epistola ad Iacobum Cameracensem. Gabriel Fallopius Patavi in iuvene suspensio quinque lapides cicoris magnitudine inuenit, ut refert Dominicus Leonus. Arenulas etiam copiosas, calculos & tophos aliquoties in hepate reperit Felix Platerus.

Causa autem & modus generationis idem, qui in aliis partibus, præcipuè in renibus, de quo suo loco dicitur.

Cognoscuntur autem calculi in hepate difficulter & raro perfecte, nisi post mortem in sectione cadauerum. Suntque ferè signa cum scirrhus hepatis communia. Dolor tamen maior est, si calculus verius membranam tendat, eamque premat & vellicet, isque diuturnus.

Curatio etiam est difficilis calculus in hepate, & si quæ curationis spes superest, ea medicamenta, quæ in scirrhus hepatis & calculo renum vsurpantur, exhiberi possunt.

*Vermes.*

*Vermes in hepate generati.*

VVierus, de prestigiis demonum lib. 4. cap. 16. scribit, filium suum Galenum Monspeffuli in cadauere hydropicæ puellæ inuenisse duos vermes spithamæ longitudine, quorum vnus meatum felleis duodeni inuaserat, occupabatque, alter in ipso hepate gibbum eius oblidebat, capite ambientem visceris membranam attingente, quem eo progressum putat, ob alimenti de-

fectum. D. Caspar Bauhinus, ut Schenckius, in obseru. refert, vidit Æmilium Campolongum, Professore Patavinum, puerum 10. annorum, qui variolis extinctus erat, aperite, aperto cadauere inuenti sunt vermes plurimi in ipsius venæ portæ ramis, & quidem in ipsius hepatis ramis, alii quidem viuentes adhuc, alii verò mortui, qui rubri, & pro ratione loci, in quo continebantur, oblongi erant, satis item magni.

De Causis & generationis modo tres Medicorum recentium fuerunt opiniones. Alii enim existimabant, eos in intestinis genitos fuisse, & ex his per venas mesaraicas in portam, & ex hac in hepatis venas penetrasse. Alii vero putabant, genitos quidem fuisse in hepate, non tamen viuo puero, sed in hepate pueri mortui. Alii tandem in ipso viuentis pueri hepate generatos existimabant, è sanguine pituitæ, permixto. Et quidem vltima opinio maximè rationi consentanea videtur, cum aliàs etiam ex humoribus prauis & corruptis, præcipuè vbi humiditas multa accedit, qualis est in variolis, faciliè vermes generentur, præsertim si vermes loco, in quo hærent, respondeant figura & magnitudine; Si verò vermes maiores sint, non impossibile videtur, eos ex intestinis huc erepsisse. Solent enim vermes sui generis humoribus delectari, alios verò auersari, & si aduersi quid ipsis obuenerit, locum mutare, & per os vel alium erumpere, aut aliò repere. Obseruauit hoc anno 1629. quo variolæ hic populariter grassantur, & multos infantes è medio tollunt, nonnullis quidem infantibus ante variolarum eruptionem; aliis verò postquam eruperunt, & iam suppuratæ fuerunt, vermes spithamæ longitudine, & longiores ex intestinis sponte prorupisse, qui infantes omnes mortui sunt.

Verum vermes hi non faciliè cognoscuntur in viuentibus vllis certis signis. Ideoque de eorum curatione aliquid tradere opus non est. Dicitur verò de vermium curatione suo loco.

*Hydatides Hepatis.*

Vesicas quasdam aqua plenas pellucas hepatis substantiæ, membranæ eius ab humore aquoso distentæ, annatas fuisse, nunc maiores, pugni sc. magnitudine, nunc minores; nunc plures, nunc pauciores, sæpe obseruatum est, non solum in homine, sed & in brutis. Hæ si rumpantur & aqua ex iis in cavitatem abdominis influat, hydropem generari, à plurimis traditur, de quo suo loco dicitur.

Originem habent hæ vesicæ ab humore aquoso & seroso, sanguificatione hepatis læsâ generato, & ex hepatis substantia protruso, & sub membrana eius, quæ densior est, coaceruato. Fernelius quidem lib. 6. de part. morb. & sympt. cap. 8. vesicas has generari statuit, cum hepatis substantia diffinditur, ambiens autem & cingens id membrana integra manet. Verum fissurâ hæc opus non est, sed etiam substantiâ hepatis integrâ manente per eam humor aquosus & serosus exsudare potest, ut in brutis mactatis sæpe animaduertitur. Quæ autem generationis humoris causa sit, postea de sanguificatione læsâ dicitur.

In viuis vix integrè cognoscuntur hæ vesicæ, nisi forsan interdum ex tussi sicca continua, diaphragmate vicino vellicato. Etsi n. hydrops adsit: tamen incertum, an per has vesicas, an per alias vias aqua in abdomen extrillarit.

Curatio ex iis, quæ de hydropse dicuntur, patebit.

## CAPVT VII.

*De Vulneribus Hepatis.*

**P**atitur tandem etiam hepar interdum morbos solutæ vnitatis, & primò quidem sine causa violèta & externa

*Hydatida.*

*vulnera hepatis.*

externa sola humiditatis priuatione rumpi & visceris substantiam siccitate humorisque penuria rimis quibusdam dehiscere, scribit Fernelius, *lib. 6. de part. morb. & sympt. cap. 8.* Verum probabile hoc vix est. Et si enim hepar valde exsiccatum fuisse, animaduersum sit: tamen quia sensum & lentè id fit, sine ruptura accidit, & corpus satis humidum, quale hepar est, ita exsiccare, ut dehiscat, in corpore viuentis, credibile non est. A causis autem violentis & externis hepar interdum rumpitur & vulneratur.

Sunt autem solutæ vnitatis hepatis variæ differentiæ. Aliquando enim hepar telo acuto vulneratur: Aliquando pars aliqua & extremitas hepatis planè abscinditur; Aliquando re obtusa contunditur potius, quàm scinditur: aliquando vulnus est superficialium tantum: aliquando ad profundum penetrat: aliquando saltem substantia hepatis, interdum etiam vasa scinduntur vel rumpuntur; aliquando gibbum, aliquando cauum vulneratur.

### Signa Diagnostica.

**Signa.** Cognoscitur autem vulnus aut contusio primò è causis externis & violentis, quæ præcesserunt, quæ corpus è regione hepatis læserunt, siuè ex scindendo cutem abdominis vique ad hepar penetrarint, siue contundendo saltem id læserint, Deinde ex consequentibus & effectis. Multis sub dextro hypochondrio sanguis profusus apparet: Ad spinam reducta hypochondria: punctio doloresque vsque ad iugulum & scapulam dextram: in ventrem cubandi procliuitas; Interdum vomitus biliosus. Contusio autem hepate vomitus cruentus, vel sanguinis per aluum aut vrinam excretio sequitur; Interdum & hæmorrhagia narium, Dolor in regione hepatis & partibus vicinis percipitur.

### Prognostica.

**Prognostica.** 1. Hepatis vulnera lethalia esse, scribit equidem Hippocrates, *6. aph. 18.* Vulnerato tamen hepate & abscissa aliqua eius parte hominem seruari, tradit Ægineta, *lib. 6. cap. 28.* Et Hispanum iuuenem, cui magna hepatis portiuncula per ilei dextri vulnus erumpebat, sanatum fuisse, refert Gemma Cosmocritic, *lib. 1. cap. 6.* Et nobilem post infictum circa hepatis regionem vulnus, & particulâ ex eius substantia abscissa & extracta sanum euasisse, scribit Bertinus, *lib. 13. medic. cap. 7.* Idem etiam alij obseruauerunt. Ij tamen saltem conualescunt, quibus superficies saltem aut substantia hepatis sine magnorum vasorum læsione vulnerata est. Si enim vas aliquod maius vulneratum sit, æger non euadit, & ob largam sanguinis effusionem homo, antequam vulnus glutinetur, moritur. Et alij quidem vitam nonnihil protrahunt: alij breui interuallo moriuntur. Nam ut refert Hippocrates, *5. epid.* Cuidam iaculo percussio in hepar statim color cadauerum sese sparsit, oculi intro cesserunt, difficultas ferendi ac æstusatio consecuta est, & eadem die vitam cum morte commutauit. Alter puer à mulo in hepate percussus quarto die mortuus est, spiritum densum habebat, nec quicquam intelligebat, & febre tenebatur.

2. Contusio hepatis periculosior est, quàm vulnus, & sæpe in abscessum degenerat.

3. In corpore senili vel cachectico periculosiora sunt hepatis vulnera, quam in iuuenili, sano & robusto.

### Curatio.

**Curatio.** Si in vulnere hepatis sanguinis profluuium metuetur, secanda statim vena, & nisi æger singulis vel alternis diebus laxam semper aluum habeat, iniiciatur clyster è decocto cichorij, plantag. hyperici, rosar. addito oleo myrtino & rosaceo & melle ros. solut. Rhabar-

barum etiam in substantia ad ʒ. ii. vel ʒ. i. exhiberi potest.

Statim verò adstringentia & glutinantia exhibeantur, qualia de sanguinis ipso sunt proposita. Præcipuè hic viles sunt rosæ rubræ siccæ, ʒ. ij. pondere exhibitæ, balauſtia, bolus Armenus; item trochisci de spodio, de rosis, rhabarb. cum decocto cynogloss. vel pentaphyll. aut plantaginis.

Vel ʒ. Conf. rosar. rubr. ʒ. ii. flor. cichor. ʒ. j. veronic. ʒ. ʒ. corall. rubr. prepar. margarit. prepar. boli Armeni an. Scrup. j.

Cum syrupo myrtino vel cichorij fiat Electuarium. Quæ autem intus exhibentur medicamenta, subtilissimè trita esse debent, ut facilius penetrant, quibus aliqui d aromatum, ut spica & similia addantur, ad viscus roborandum & vrinam mouendam,

Ut ʒ. Spec. diarrh. abb. diamarg. frig. arom. ros. an. ʒ. ʒ. dialacca ʒ. j. margar. prepar. ʒ. ʒ. corall. rubr. prepar. ʒ. j. sacch. in aq. ros. dissoluti ʒ. ii. ʒ.

F. rotulæ.

Extra adhibeantur emplastra adstringentia & glutinantia. Hepati etiam, si vulnus pateat, hic puluis inspergi potest.

ʒ. Boli Armeni, terra sigillata an. ʒ. i. flor. ros. rubr. ʒ. j. farina volatil. ʒ. iii. lapid. hamat. ʒ. i.

F. Puluis.

Imponatur etiam aliquod conueniens vnguentum ex terebinth. bolo Armeno & mumia. Postea etiam ex mastiche & thure. Partes verò vicinæ oleo rosaceo & mastichino inungantur.

Vel hepati imponatur tale cataplasma.

ʒ. Violar. cichor. endiu. rec. an. P. iii. agrimonia, summit. anethi, hyperici an. P. ii. pulu. flor. chamamel. melilot. ros. rubr. an. P. i. farin. hord. fabar. an. ʒ. i. ʒ.

Cum vini rubri s. q.

F. Cataplasma.

Adde sub finem ol. rosac. ʒ. i. ʒ.

In contusione hepatis ea cura ferè instituenda, quæ supra de vasorum hepatis apertione proposita est. Primò nimirum, ut sanguinis profusio sistatur, vena in cubito aperienda, & portiones ex adstringentibus exhiberi & similia Cataplasmata vel Emplastra imponi debent.

Ut ʒ. Succini albi, boli Armeni, balauſt. sangu. dracon. lacca, flor. ros. rubr.

F. Puluis, cuius ʒ. i. exhibeatur cum aqua plantag. in qua tragacanth. Drac. ʒ. infusa fuerit.

Cum sanguinis profluuium subsisterit, sanguinem concretum dissoluentia exhibenda, qualia aliàs etiam lapsis ab alto & percussis exhiberi solent, vbi sanguinis concreti suspicio adest. Talia sunt rhabarbarum, rhaponticum, sperma ceti, lacca, mumia, sanguis draconis, oculi cancri, succinum, vermes terrestres, schœnanth. spica, bolus Armenus, terra sigillata, radices rubiæ tinctor. tormentillæ, chærefolium, quæ & sanguinis profluuium sistunt, & sanguinem concretum dissolunt, ac simul glutinant. Exhibenturque ex vino, aceto, vel aqua chærefolij ac tormentillæ aut plantaginis, ut:

ʒ. Rhabarb. Drach. i. ʒ. spica, schœnanth. an. gran. xv. mumia Drach. ʒ.

F. Puluis. Dosis Drac. i.

Vel ʒ. Rhapontic. Drach. ʒ. myrrh. mumia, spermat. ceti, radic. tormentill. oculor. cancri an. Scrup. ʒ.

F. Puluis. Detur in aceto aut aqua chærefolij.

Vel ʒ. Rhabarb. ʒ. ii. mumia ʒ. ʒ. lacca, spermat. ceti an. ʒ. i. boli Armeni ʒ. iii.

F. Puluis. Dos. ʒ. i. vel ʒ. i. ʒ.

Vel ʒ. Rhapontic. rhabarb. an. ʒ. ii. mumia, spermat. ceti, radic. tormentill. caryophyll. an. g. xii.

F. Puluis pro 2. dosibus.

Vel ʒ. Mumia ʒ. iii. spermat. ceti, sangu. dracon. an. ʒ. ʒ. Rhabarb. oculor. ʒ. an. ʒ. i. croci ʒ. ʒ. boli Armeni ʒ. i.

Fiat

# 1042 De Vlceribus & Sphacelo Hepatis.

F. Pulvis, Dosis Drach.j.

Extra verò postea adhibeantur discutientia & simul nonnihil roborantia, vt nardus, schœnanthum, absinthium, crocus, thus, myrrha & similia.

## Diat.

Diat.

Victus sit tenuis, ne sanguinis multitudo generetur, & ij cibi vsurpentur, qui glutinandi vim habent. Oryza, hordeum in iure pedum hœdi, aut detur panatella dicta cum tali iure.

Vinum viretur, bibatur verò aqua, in qua iuiubæ aut semen coriandri coctum sit, addito saccharo rosarum vel cereuisia pura.

## CAPVT VIII.

### De Vlceribus & Sphacelo Hepatis.

#### Causse.

Vlcera Hepatis.  
Causse.

**V**Lcus Hepatis inflammationi potissimum succedit, si illa ad suppurationem perducatur, pure scilicet substantiam hepatis exedente. Aëtius colliquationem hepatis appellari ait; Sed & ab alio succo acri & erodente vlcus hepatis excitari solet, præsertim bilioso per hepar diffuso, qui sensim putrescens malignus & virulentus redditus Parenchyma hepatis corrumpit. Talis succus prauus & erodens alimentorum vitio contrahi potest: quando illa corrupta sunt, aut erodente vi polent. Sæpe ex huc venerea talis virulenta materia in hepate colligitur, Vinum etiam generosum meraciusque diu & liberalius sumptum in hoc malum præcipitat, putridam & lentam quandam saniem in colliquoato quasi hepate congregans. Deprehensum etiam est, vlcus Hepatis eò malignitatis processisse, vt in gangrænam abiret, vnde disruptâ membranâ puris magna copia ex hepate in abdominis capacitatem effusum fuit, valde fœtens, quo & omentum & peritonæum, sæpe etiam intestina corrupta fuerunt. Interdum vomica hepatis existit membranâ ambiente illæsâ, quâ post mortem incisa, corrupta & putrida hepatis substantia effluit, nullo etiam antea tumore apparente.

#### Signa Diagnostica.

Signa.

Quæ signa sint Inflammationis hepatis in abscessum abeuntis & mutati, supra de inflammatione hepatis dictum. Cum verò nonnunquam etiam sine præcedente inflammatione hepar exulceretur, vlcus id non ita facile cognoscitur. Habet tamen & id sua signa: Tussis & vlcerosus dolor in dextro hypochondrio percipitur; æger sensim contabescit & æstus consumitur. Quando vlcus est in cauo hepatis, deiectiones alui purulentæ sunt; Interdum & cruenti quid excernitur, cum dolore intestinorum, ob materiæ acrimoniam, vt dysenteria, esse putetur; cum tamen sensus grauitatis & punctionis circa hepar hæreat; Imò interdum iecori portiunculas per aluum excretas fuisse obseruatum, vt testatur Nicol. Florentinus, *serm. 5. cap. 6. Matth. de grad. in comm. ad c. 7. part. 1. lib. 9. Rhafis. Iulius Alexandrinus, ad cap. 6. lib. 8. Galeni de comp. med. sec. loc. & alij.*

An Hepatis  
& Lienis pa-  
renchyma  
frustillatim  
per aluum  
excerni pos-  
sit.  
De hepato.  
Matth. de  
Gradib.

¶ Extant passim Medicorū obseruationes, quibus traditur, hepatis particulas aliquando per aluum excretas fuisse. Ita Matth. de Gradibus, *ad lib. 9. Rhaf. part. 1. cap. 7.* scribit, se vidisse in scholari Alemanno, post vlcus hepatis, multam quantitatem carnositatis hepatis fuisse excretam, de qua experientiam fecerit, quod vera hepatis substantia fuerit. Cum enim in aqua calida exagitaret virgulâ, remansisse carnositatem hepatis, cum venulis dispersis per eam, & nihilominus curatum fuisse,

Nicolaus Florentinus, *serm. 5. cap. 6.* refert, se vidisse in Andrea de VVechio frustra, ad magnitudinem auellanzæ, circiter centum numero, carnosâ, in similitudinem carnis hepatis, & quoad visum, & quoad tactum, in fluxu ventris egressâ, & mortuum fuisse tertîâ die fluxus, arbitraturque causam eius rei fuisse vlcera in hepate, quibus hepatis aliquot venæ fuerint corrosæ; & per orificia venarum corrosarum hepatis substantiam ad aluum penetrasse.

Iul. Alexandrinus, *in comment. ad cap. 6. lib. 8. de comp. med. sec. loc. Galeni*, testatur, visas sibi cum aliis Medicis aliquando frustillatim eiectas per aluum minutas quasdam particulas hepatis.

Hercules Saxonia quoque duas eiusmodi historias retulit, vnam virginis, annorum quindecim, quæ inflammatione iecoris maximâ vexata, pridie quàm obierit, pus, sanguinem, & iecoris substantiam eiecerit: alteram Tiberij, adolescentis nobilis Patavini, qui & ipse iecoris substantiam per aluum reiecerit, seruatus tamen fuerit.

Lienis verò integras partes quibusdam excretas fuisse, Arctæus *lib. 3. de causse & sign. acutor. cap. 14.* tradit. Quod confirmare videntur duæ sequentes historię, quarum vnam ad me perscripsit Dn D. Ioan. Nesterus, Medicus Rochlizenis, de quodam Verbi diuini ministro, annorum sexaginta, qui ob suppressas hæmorrhoides incidit in vlcus siue fistulam prope anum, quæ cum intempestiuè & imprudenter à Chirurgo consolidata esset, statim vnâ atque alterâ hebdomade elapsa, in acutissimum dolorem ventris inferioris incidit, vt intestina cum alui visceribus è ventre euelli sibi putaret: insequente postea alui fluxu copioso & frequenti, apparentibus inter excreta frustulis quibusdam castaneis maioribus ferè, iisque nigricantibus, quas æger corrupti lienis particulas esse sibi persuadebat, propterea quod dolores illos in sinistro potius, quàm dextro hypochondrio senserit.

Alteram autem historiam ad me perscripsit Dn. D. Martinus VVeissins, Medicus Berolinensis, hoc modo: Vir quidam Consultissimus quinquagenarius, aliquot septimanis conquestus est de appetitu cibi & potus planè prostrato, & doloribus sinistri hypochondrij: cui cum clyster emolliens iniectus esset, excreuit primò cum excrementis, postea etiam sine iis, magnam sanguinis atrii copiam, & multa frustra carniformia solida castaneæ vel iuglandis magnitudine, nullâ aquâ solubilia, & tam multa, vt tres vel quatuor lienes ex iis potuerint componi. Durauit ea excretio totâ eâ die, secundâ & tertîâ planè substitit; quartâ iterum clyster emolliens, & leniter abstergens applicatus, à quo iterum ter fæculentum sanguinem & adustos humores deiecit: sequentibus diebus excrementa planè naturalia fuerunt. Mortuus est 15. morbi die. Corpore apertò repertus est lien primâ facie integer & saluus: dissectâ autem ipsius membranâ, quæ integra erat, tota lienis substantia effluxit instar amurcæ, & facis sanguineæ, paululum fœtens, & adedò totaliter corruptâ, vt ne fibræ quidem visceris apparerent. Præter hæc sub liene conspiciebatur corpus quoddam glandulosum, instar farciminis tenuioris, oblongum, lieni, ventriculo, & duodeno annatum, quasi videas pancreas dilatatum & extensum, pluribus vasibus & ductibus donatum, durum & solidum, non molle. Ipsum verò pancreas nihilominus aderat, dorso firmiter annexum, & vasibus magnis substratum, vt solet.

Verum à nonnullis ista in dubium vocantur. Et quidem nonnulli hepatis particulas reici per aluum posse, concedunt; cum manifestiores ex hepate ad aluum, per venam portæ scilicet, viæ sint; de liene verò id negant: alij vtrumque negant. Et vt de liene credere tale non possint, nonnullos hoc mouet, quod nulli dentur meatus & viæ, per quas transire, & à liene.

N. Florenti-  
tium.

I. Alexan-  
drinus.

Herc. Saxo-  
nia.

De liene.  
Arctæus.

Martin.  
VVeissins.

Quidam de  
hepate con-  
cedunt, liens  
v. negant.



à liene ad aluum descendere tales particulæ possint. Nam præter ramum splenicum, qui portæ ramus est, & vas breue, alij ad lienem ductus nulli sunt; quorum ille, antequam ad lienem ingreditur, aliquot furculos de se mittit, qui venæ gastricæ, & gastrepiploicæ dicuntur: sed ubi iam lienis substantiam attingit, in plurimos dispergitur ramulos, non quidem, ut in hepate, conspicuos, sed adeo tenues & exiles, paucis exceptis, ut iam non vasa, sed fibræ potius videri possint. Impossibile ergo est, frustra tam magna, ut referuntur excreta, per tam angustas vias penetrare posse. Vas verò breue etsi interdum satis amplum est, & nonnunquam aliquid rerum p. n. in se recipit: tamen rarum hoc est, & hic potius eius usus est, ut aliquid è ventriculo in lienem deferatur. Et sit, ut aliquæ lienis particulæ pervas breue, ad ventriculum perveniant, cur non statim per vomitum è ventriculo reiciuntur, sed per rã longas ambages demum per aluum excernuntur: sicut interdum, sanguis niger è liene per hanc viam in ventriculum effusus vomitu reicitur. Neque etiam per venas hæmorrhoidales istæ carneæ quasi particulæ è liene euacuari potuerunt. Venæ enim istæ ad lienem non pertingunt, sed hæmorrhoides internæ à mesenterica sinistra, non à splene prodeunt, & ad recti intestini extremitatem descendunt, sanguinemque sæculentum & crassum ex venis mesenterij accipiunt; hæmorrhoides verò externæ à vena caua prodeunt.

Verum me-  
rid de vero-  
quo dubita-  
tur.

Mihi posterior sententia verisimilior videtur, nimirum neque hepatis, neque lienis substantiam frustillatim per aluum excerni posse, quod viæ sufficientes non dentur à liene ad aluum, ut modò dictum. Et licet darentur; tamen frustra illa ex liene non fuisse ex eo pater, quòd in Iureconsulto illo Berolinensi tam multa fuerunt, ut tres vel quatuor lienés ex iis componi potuissent. Præterea lienis substantia carnosa in sanie, quasi amurca, mutata, in suâ tunicâ inuenta est.

Ex hepate verò etsi facilius sit ad aluum transitus, & ex hepate per aluum multa excerni negandum non sit: tamen cum hepatis, ut & lienis parenchyma extrâ quasi vasis affusum sit, non video, quomodo corpora tam magna & crassa in exilia vasa penetrare potuerint. Et sit sanè, quòd viæ dentur ab hepate & liene per aluum, & quòd ab hepatis & lienis substantiâ aliquid in eas penetrare possit: tamen non video, quomodo siue hepatis, siue lienis substantia ita resoluta potuerit. Dum enim hepatis, vel lienis substantia corrumpitur, non in talia frustra discerpitur, sed in pus mutatur. Neque vnquam observatum, partem aliquam corporis in tales partes resolutam fuisse. Sunt quidem nonnulli in ea sententia, præter illam, quâ hepatis & lienis substantia in pus mutatur, aliàs corruptionis dari formas, ex. gr. si dissoluatur, ut intritum, *vvie ein zerfahrenes*: atque hoc modo lienis substantiam, cum mollis, rara, & spongiosa sit, interdum, vivente adhuc homine absque omni inflammatione (sine quâ nulla in pus mutatio sit, nec fieri potest absque febre) corrumpi posse. Verum quidem affirmantur hæc, sed non probantur vel ratione, vel experientiâ. Neque vnquam observatum est, tali modo, quem ipsi asserunt, partes corporis corruptas fuisse: sed si pars corrumpitur, in pus vel sanie mutatur. Neque solum in inflammationibus, sed & in cancro, œdemate, & ulceribus variis, sanies generatur, etiam sine febre. Et interdum in visceru putredine febris lenta est, ut vix percipiatur. At, quod antea dictum, longè plures fuerunt illæ particulæ, quàm ut vnus lien ipsis materiam dare potuerit.

Sententia  
Auloris.

Sum ergo in ea sententia, frustra illa quasi carnea ab hæmorrhoidibus internis vel mesaraicis fuisse excreta, & fuisse sanguinem incrassatum & condensatum in illis vasis. Quòd verò in aqua dissolui non potuerint, causa etiam dari potest. Cum enim parenchymata illa procul dubio sint valorum opera, & natura

nunquam otiosa sit, si substantia hepatis vel lienis corrumpatur, non mirum est, ex sanguine, qui ad illorum parenchymatum nutritionem affluere debebat, intra vasa cumulado, aliquid conforme, & quod perenchymatis illis aliquo modo simile sit, formari potuisse, & tandem per aluum excerni.]

Quando verò in gibbo vlcus consistit, vrina purulenta apparet, absque signis exulcerationis in vesica & renibus.

Malum, præcipue si sit à succisacribus, sensim serpit viribus ita constantibus, ut æger consueta munia obire possit. Febris in progressu morbi lenta oritur, typum non seruans, quæ tandem in Hecticam definit. Sitis non acius urget, quod calor iam deferbuit, præsertim in hepatis inflammatione. In facie color apparet ictericus, nonnunquam pustulæ parvæ ex humorum adustione in eadem efflorescunt. Ciborum omnium, maximeque carnis, magnum fastidium adest; halitus ex ore teter expirat; tandem frequens animi deliquium accedit.

Loca affecta quod attinet, si vlcus sit in gibba parte, difficilis sanè est respiratio, & dolor septi transversæ, atque affecti hepatis, signa in vrinis apparent. Si in sima, inappetentia magis affligit, nausea, vomitus, oris amaretudo adest, & plerumque, ut dictum, fluxus alui sanguinolentus. Vlcus hepatis & symptomata, quæ illi acciderunt, describit Dodonæus *obs.* 28.

#### Prognostica.

1. Vlcus Hepatis, si exiguum sit & superficiale, & *Prognostica.* inter initia curetur, exitiale est. Nam pars princeps absumpta est: quæ non potest regenerari; & continenti alimentorum alluvione fordescens vlcus non facile sanescit.

2. Ulcera hepatis non, sicut pulmonis, febrem, sed potius hydropem inducere solent.

3. Periculosiores sunt illi abscessus & exulcerationes hepatis, quæ sequuntur inflammationes, quàm qui sine iis incipiunt. Præcipue verò illæ sunt periculosæ, in quibus continetur materia in substantia Hepatis.

4. Qui hepatis abscessu laborantes colorem habent ictericum, febrem continuam, inappetentiam, & nauseam, lethaler decumbunt.

5. Si ex purgatio puris fiat per tussim, ægri febrem moriuntur: Si per vomitum, vrinam vel aluum, minus est periculum; sicut & si materia ad articulos decumbat.

#### Curatio.

Vlcus hoc, ut alia, absterisionem, repletionem & *Curatio.* consolidationem indicat. Itaque si inflammatio præcessit, vena aperienda non est, quia virium imbecillitas eam prohibet: ubi verò ab erodente humore est, si sanguinis abundantis indicia adsint, vena secari potest, ut vlcus ab inflammatione immune seruetur, aliàs euacuatione per cathartica utendum est.

Vlcus autem ipsum quod attinet, remedia ex iis parentur, quæ de curatione ulceris ventriculi tradita sunt; nisi quod maiore dosi illa sunt exhibenda, ob situm hepatis profundioris & quod hepatica hic admiscenda sunt exsiccandi vi prædita. Ad mundificationem ergo ulceris valet prisana hordeacea, serum lactis caprini cum mulsâ vel saccharo, & dum vires admittunt, etiam decoctum Chinæ vel sarsæ parillæ. Post abstergentia conveniunt siccantia, quæ aliàs internis ulceribus & vulneribus utilia sunt, ut Aristolochia rotunda, scabiosa veronica, salvia, radix ireos, spica, schœnanthum, absinthium Aëtius, *tetrab.* 3. *serm.* 2. *cap.* 5. laudat trochiscos cyphoides ad Drach. j.

Utiles sunt & hi Morfuli.

*℞. Spec. arom. res. diarrh. abb. de gemm. frig. an. ʒ. j.*

nuc.

nuc. mosch. maceris, corall. rubr. spody an. 3 j. sacch. candi  
crystall. 3. iij. ʒ. diaphorei. ʒ. j. conseru. rosar. rubr. 3. j.  
bugloss. Vnc. ʒ. sacch. albiss. in aq. rosar. dissoluti  
Vnc. iij. F. Morfuli,

### Sphacelus Hepatis.

Sphacelus  
Hepatis.

Non prætereundus hic est Sphacelus hepatis; cuius exemplum refert Dodonæus, c. 3. *obs. medic.* ubi scribit; Nobilem quendam virum ex animi moerore in melancholiam incidisse. Qui cum monachis quibusdam commissus esset; atque apud eos annos 20, in eodem statu vixisset, tandem de virium debilitate conqueri coepit, atque cibum & potum querere. Nulla aderat febris, sitis nulla, vniuersum corpus frigere videbatur, pedes processu temporis oedematosi facti sunt; Vrina rubicunda erat, veluti si febris ardens aut hepatis inflammatio affuisset, quæ, qualis reddebatur, permanebat, nec ab aëre aut frigore perturbabatur: Malo tandem ingrauescente ad alium cibum sumendum, præter exiguum sorbitionem, adduci non potuit. Ita tandem deficiente naturali facultate, inedia quodammodo consumptus à vitâ migravit. Huius hepar colore vndiquaque nigrius, quam secundum naturam, apparuit, sed tamen minus nigricans, quam pulmonis sphacelo corrupti substantia, impressorum digitorum vestigia ferè retinebat,

### CAPVT IX.

#### De Vesiculæ fellis morbis.

Vesiculæ fel-  
lis morbi.

**Q**uia ipsi hepatis inseritur vesicula fellis, antequam à morbis hepatis abeamus, & ad symptomata, quæ hepatis accidunt, progrediamur, prius de vesiculæ fellis morbis hoc capite agemus.

Vesiculam fellis in quibusdam geminam repertam fuisse obseruatum est. Nec etiam ductus eius semper sunt iidem numero, nec iisdem partibus inseruntur, sed sæpe aliqua hic occurrit varietas.

Eundem folliculum bile omnino exhaustum repertum fuisse, refert Fernelius, *lib. 6. pathol. cap. 5.* Contra Vesalius, in *examine obseruationum Fallopij*, bilis vesiculæ molem duorum pugnorum ob contentam bilem tumidam inuentam fuisse, testatur. Idem, *eodem in loco*, varia, præter naturam in eodem folliculo reperta obseruauit, & se in eo materiam, instar atramenti atram, nunc albicantem, aut fluidam, aut luti modo, aut vnguenti cuiusdam ex farina & melle ac terebinthina parati ritu consistentis substantiam reperisse refert.

Calculi inprimis frequenter in vesicula fellis reperiuntur, cuius rei historias recensent, Fernelius, *lib. 1. Phys. cap. 6. lib. 6. Pathol. cap. 5.* Ioh. Langius, *lib. 2. epist. 37.* Kentmann, *lib. de calcul.* Coiter, in *obs. anat. & chirurg.* Beniuenius, *de abdit. san. caus. c. 94.* Cardanus, *lib. 7. de subtil. & in arte sua parua.* Scholiographus, *ad c. 48. lib. 1. Hollerij Fallopius, in obseruat. & tract. de fossilib. c. 7.* Gemma Cosmoc. *lib. 5. c. 6.* Forestus, *lib. 14. obs. 36 in schol. vt & alij plurimi.* Imò obseruatum in Georgio Boemix rege totam vesiculam felleâ lapide hæmatitæ simili repletam fuisse, vt refert Iacobus Camenicensis, in *epist. ad Matthiol.*

Atque calculi hi inter morbos in numero referuntur, de quo, quid sit sentiendum, in *inst. dictum.*

Iidem, vt & bilis crassa & alia materia, obstructionem & morbos in via in vesicula fellis pariunt; vnde Icterus ortum habet.

Cognoscuntur autem non facillè calculi in vesicula fellis, & nihilominus varia & sæpe graua inducunt symptomata: ita vt etiam peritissimi Medici sæpe dubitent, vnde ea proueniant. Ad sunt sæpe dolores dextri hypochondrij, nausea, vomitus, alui adstrictio, icterus.

Qua ratione autem obstructio vesiculæ fellis curari debeat, etsi huius loci esset dicere: tamen quia inprimis ab ea Icterus oritur, postea de icteri curatione ea de re agemus.

Obseruatum tandem quandoque vesiculam fellis ruptam fuisse, id quod in nobili quodam, qui diurno bilis vomitu vexatus esset, accidisse, & rupturam fellis vesiculæ vomitus causam fuisse, in sectione post obitum deprehensum fuisse, scribit Georgius Berrinus, *Medic. lib. 12. cap. 1.*



## LIBRI TERTII PARS VI.

### SECTIO SECUNDA.

#### DE SYMPTOMATIBVS, quæ Hepati accidunt.

### CAPVT I.

#### De Sanguificatione læsa in genere & Hepatis Imbecillitate.



**V**M hætenus morbos, qui hepar infestare solent, explicauerimus, symptomata, quæ eidem accidunt, iam explicanda sunt. & primū symptomatum actiones læsas quod attinet, cum propria hepatis actio sit *αἱματώσις*, seu sanguificatio, de sanguificatione læsa primò loco dicendum, & primò quidem in genere.

Cum vero sanguificatio læsa proueniat ab imbecillitate hepatis, & sanguificationem læsam sequatur cachexia & Hydrops, ita vt hi affectus sine sanguificatione læsa commodè explicari non possint, eos hoc loco coniungemus. Etsi enim Hydrops propriè sit tumor abdominis ab humore serolo in abdomine collecto, & abdomen in tumorem attollente, isque non solum hepatis, sed & aliarum partium vitio generari possit, vt suo loco dicetur, tamen quia is hydrops, qui à sanguificatione prouenit, & præcipuè hydrops appellatur, sine sanguificationis læsæ causis explicari non potest, commodissimè hoc loco explicatur. Si quæ tamen sunt aliæ etiam causæ, à quibus abdomen intumescere potest, de his suo loco dicetur.

Appellat autem Galenus, 8. *de comp. med. sec. loc. c. 6.* hepatis imbecillitatem *ἡπατικὴν μὲν*, ex recentiorum tū Medicorum sententia, cum veteribus *ἡπατικὴν* dicerentur, qui hepatis inflammatione laborant, sicut qui pleuræ & pulmonis inflammatione, Pleuritici & Peripneumonici. In 5. *de loc. affect. cap. 7.* *ἀνωρίαν* Hepatis vocat, quæ per se & sine phlegmone existit, & *ἀνωρίαν* affectus vel vitium est. Et quanquam actiones hepatis læsæ ab aliis quoque intemperiebus prouenire possint: tamen inprimis à frigida *ἀνωρία* dicta ortum habet; cuius ratione vel attractrix hepatis labefactatur, vel alteratrix, quæ *ἀνωρίαν* appellatur. Quod tamen dictum est, imbecillitatem & *ἀνωρίαν* hepatis ab intemperie eius frigida prouenire, rectè explicandum est. Per intemperiem enim hepatis frigidam hic non quæcunque frigida dispositio sed calidi natui defectus intelligendus est, siue à calore aut euacuatione id dissipante, siue ab extinguente frigiditate proueniat. Hic enim calidi natui defectus proxima imbecillitatis hepatis causa est, & proinde imbecillitas hepatis ab intemperie eiusdem differt. Imbecillitas enim, vt dictum, propriè prouenit à defectu calidi innati, ob quem sanguificationis munus vel aboletur vel imminuitur. Intemperies verò excessum qualitatum significat, quibus præter naturam auctis

auctis & excedentibus non quidem sanguificatio tollitur aut imminuitur, sed sanguis non bonus, verum ei qualitati, quæ excedit, respondens, generatur, calidus nimium, frigidus, humidus aut siccus.

*Causa.*

Sanguificæionis autem læsæ in genere plures causæ esse possunt. Læditur enim sanguificatio vel primario vel secundo. Primario læditur vel læsa facultate vel ob errorem externum. Facultas læditur ob morbos intemperiei, & quidem ab omnibus intemperiebus sanguificatio lædi potest, neque solum à frigore, sed etiam à calore. Nam si adsit calida & sicca intemperies, aduritur quasi chylus & generatur sanguis calidus, siccus, biliosus. De intemperiebus verò hepatis supra dictum.

Erroris verò externi vel obiecti vitio læditur sanguificatio, primò, cum chylus in ventriculo non rectè elaboratur. Nam error, qui in prima coctione, quæ fit in ventriculo, committitur, non corrigitur in secunda, quæ in hepate peragitur. Deinde licet bonus chylus in ventriculo generetur; si tamen vitiosi aliquid ei permiscetur, chylus hoc modo inquinatus bonam sanguini materiam præbere non potest, id quod sæpe accidit, dum in viis, per quas chylus transire debet vitiosi humores stabulantur.

Secundario verò læditur sanguificatio, si attractio, retentio vel expulsio læditur; Attractio læditur ob morbos hepatis, & venarum mēsaricarum obstructions. Retentio læditur in primis ab intemperie Hepatis humida; Item ob vasorum erosionem. Expultrix læditur præsertim ob hepatis frigiditatem & gibbæ hepatis partis obstructionem. Causas autem harum intemperierum supra proposuimus.

#### *Signa Diagnostica.*

*Signa.*

Malè affecti & imbecillis hepatis indicia generatim sumuntur ex urinarum, & excrementorum alui, & coloris in toto consideratione, ita tamen ut ventriculus interea rectè habeat, nec error aliquis in eo commissus sit. Ita efficacissimum laborantis hepatis signum Galenus, 5. de loc. affect. cap. 7. alui excrementa, aut carnis recens mactatæ loturæ, aut feci sanguinis similia; Quorum prius ob hepatis frigiditatem, sanguinem crudum nec perfectè elaboratum relinqui, posterius eundem ob excessum caloris superassari indicat. Vtrumque enim facultatis *αὐτοματὴν* in hepate vitium est, & quando deiectiones illæ sunt frequentes, etiam retentricis. Sicut autem subcruentæ illæ deiectiones alui à frigida hepatis intemperie, præsertim inchoante, & non planè confirmata ortum sumunt; ita à calida eiusmodi inchoante existere aliquando possunt. Nam calidius hepar crudum à ventriculo chylum attrahit, venæque avidè optimam sanguinis partem rapiunt, inde crudius in hepate relictum per aluum expellitur. Sed præter intemperiem in actiuis qualitatibus hepar humiditate & laxitate venarum laborare oportet, præsertim caua parte, qua intestina & mesenterium spectat, ob quam laxitatem cruda & subcruenta illa non retinentur. Quando verò frigiditas aut caliditas hepatis intenditur, deiectiones illæ cessant, materia illa vel non tanta copia amplius attracta, vel eadem magna ex parte consumpta; materia etiam per uniuersum corpus distributa, cachexia vel cutaneus ex auctis humoribus morbus prouenit.

Attamen & hoc monendum, non omnes hepatis affectiones malas à crudis & subcruentis illis deiectionibus initium capere, & proinde alia quoque signa addi posse.

Urina ergo etiam consideranda, eaque quod euident testimonium perhibeat de iis, quæ in hepate & venoso genere fiunt aut continentur, extra omnem controuersiam positum est apud Medicos. Coloris denique in toto corpore mutatio insignis & diutius permanens ma-

lè affecti hepatis indicium est. Quia enim in hepate massa sanguinea inuenitur, quæ toti corpori alimentum præbet, illa à bonitate naturæ suæ deficiente coloris etiam integritatem perdi necesse est; quod ventriculo laborante non facile accidit. Et is color est quasi citrinus vel viridis, sicut pistacia. Signumque hoc sæpe tam certum est, ut aliis opus non sit.

Causæ quoque, quæ præcesserunt, considerari possunt, quæ calidum natium dissipare vel extinguere valent, calidorum scilicet, ut vini meracioris, vel spiritus vini vsus nimius, febris ardens, magnæ sanguinis euacuationes, vsus & potus medicamentorum refrigerantium, & similes.

Signa autem Intemperierum & causarum supra sunt proposita.

#### *Prognostica.*

1. Eriam hepate malè affecto hominem mori contingit, sed ferè longiori temporis spatio, atrophia scilicet. Galenus, 5. de loc. affect. cap. 1. *Prognostica.*

2. Si imbecillitas hepatis ex frigore maior sit, hydrops sequitur, nisi maturè occurratur. Sæpe corrupto in hepate sanguine febris excitari solet, etiam frigida hepatis intemperie. Interdum sanguis ille vltro è naribus profluit, aut ex vtero, aut ex hæmorrhoidibus, natura illum ed ablegante.

3. Quando in hepatis imbecillitate alui excrementa in succum quidem commutata liquida tamen euacuantur, *αὐτὸς* ad hepar imperfecta, vel non omnino contingente, si venter malè affectus non est, attracticem facultatem hepatis debilem esse opinandum est. Si verò loturæ carnis recens mactatæ similia excernuntur, alteratrix & sanguificatrix imbecilla erit.

4. Quibus hepaticis sputum cruentum siue subputridum siue biliosum meracum, statim lethale. Hippocrates, lib. 6. *Conc.* Quod accidit vel ob venarum imbecillitatem, vel quia sanguis acrior redditur, & prauam qualitatem acquirit, ob quam calidi innati substantiam auget, & postea faciliè venarum orificia aperit, aut etiam erumpit & erodit.

#### *Indicationes & Curatio.*

Qua ratione intemperies hepatis & hinc pendens læsa sanguificatio curari possit, supra satis dictum. In imbecillitate verò hepatis ex calidi natiui defectu maxime hepar roborandum, nec tamen immoderatè calefaciendum, etsi affectio sit frigida; sicut nec refrigerandū, etsi à calore principium mali sit, sed ea vsurpanda, quæ modicè saltem calefaciunt. Itaque alimenta medicamentis, & medicamenta alimentis ita misceri & temperari oportet, ut citius in substantiam hepatis conuertantur. Itaque ea eligenda, quæ substantiæ hepatis sunt similia, quibus aliquid admiscendum eorum, quæ intemperiei contractæ sint contraria. *Indicationes & curatio.*

Quapropter hepata animalium hæc sunt vtilia, lupi, vituli, gallinarum, anserum, testiculi gallorum, cochleæ, passulæ, quæ aromatibus, præcipuè cinamomo, condiri possunt. Proinde in prima mensa tale aliquid semper dari oportet, postea ea, quæ æger audius appetit; modò non sint prauæ substantiæ. Videatur Galenus, 8. de comp. med. sec. loc. cap. 8. Etsi verò in omni imbecillitate hepatis calidi natiui sit defectus: videntur tamen à qua causâ ille ortum habeat. Ergo si à calida, vtilia sunt cichoracea omnia, rosæ, item santala; & licet ventriculus sit frigidus, tutus tamen vsus est cichorii ob amaritudinem. In frigida profunt, agri-monia, absinthium, quod biliosos humores in hepate abstergit, simulque id moderatè roborat. Nam adstringentia moderata esse debent; cum hepar obstructionibus faciliè sit obnoxium. Vtile est & rhabarbarum, quod etiam biliosos humores abstergit & moderatè hepar roborat.

TTTt

E.g.

E.g. 2℥. *Nardi celtic*. Drach. vi. *abſinth*. Drach. ii. *cina-*  
*mom*. Drach. β.

F. Pulvis. Et ſi libet, addito *melle*.

F. Electuarium.

Vtile eſt & Electuar. diarrhod. Abbatis, duplicato  
rhabarbaro.

Efficax eſt & hoc Electuarium:

2℥. *Paſſul. Corinth. mundat.* ℥. β.

Coq. in vini veteris ſ. q. & per ſeraceum traiiciantur.

Postea adde *cortic. citri condit.* ℥. i. *ſpec. aromat. roſat.*

*Dra. i. diamargar. frigid.* ℥. ii. *pulu. corall.* *Dra. i. conſeru. ro-*  
*ſar.* ℥. i. *pulu. jecoris lupi prepar.* Drach. iii. *ſantal. omnium*  
Scrup. ij.

Fiat Electuarium, cuius Vnc. ſem. ſumat æger cum  
vino.

Vel 2℥. *Paſſul. mundat.* ℥. iii. *Croci* ℥. β. *calami aromat.*

℥. ii. *bdellij* ℥. i. *ſpic. Celt.* ℥. ii. *terebinth.* ℥. i. *ſchœnanth.* ℥.  
iii. *mellis* ℥. ii. vini q. ſ.

F. Electuarium.

Vtile eſt & medicamentum è ſucco malorum cydo-  
niorum apud Galenum, 6. de tuend. ſanit. in fine.

Vel 2℥. *Hepar vituli* nuper maſtati vnum vel duo,  
cōciſo adde *agrimonia* M. ii. *ſaluia*, *hepatica nobilis* an.  
M. i. *veronic.* M. ii. *cina mom.* ℥. i.

Affunde aqua *agrimon.* & *cichori* q. ſ.

Deſtilla per veſicam. Aut, quod commodius eſt, in  
vaſe claſſo ebulliant, & poſtea liquor percolatus præ-  
beat.

Peculiaris cuiuſdam imbecillitatis hepatis ex calida  
& humida intemperie, quæ quibuſdam locis ſit verna-  
cula & vſu ligni cotonei curetur, facit mentionem *Ioh.*  
*Schenckius* lib. 3. obſ. 14. è *Cyriaco Lucio de ligni cotonei*  
*natura, viribus & vſu.*

## CAPVT II.

### DE CACHEXIA.

*Cachexia.*

Cum hepatis imbecillitas & intemperies frigida ſi  
augeatur, in cachexiam & hydropem degenerare  
ſoleat, hoc loco de iis agere placet. Et primò quidem ca-  
chexiam, ſive malum corporis habitum quod attinet,  
quæ via quaſi eſt ad hydropem ſeu eius initium, vt  
*Paulus Aegineta*, lib. 3. cap. 47. ſcribit; Eſt ea muſcu-  
loſæ carnis & cutis in nutritione vitium, quando par-  
tes hæ à naturali temperamento deficiunt, tertiam co-  
ctionem malè perficiunt, alimentumque omne aquo-  
ſum & corruptum eſt, vnde corporis naturalis color  
mutatur, qui ex albo palleftit, ſeu viſceſcit, & liuidus  
ac plumbeus enadit, ipſumque corpus molle, laxum &  
ſub tumidum redditur, & præcipuè palpebræ oculorum  
& facies inflatur, ac pedes intumeſcunt. Aëtio, *terrab.* 3.  
*ſerm.* 2. & 9. ſit, cum corporis habitus in aquoſitatem di-  
funditur, & vniuerſi corporis moles laxior ſit & mol-  
lior. *Ceſus*, lib. 3. cap. 23. inter tabis ſpecies recenſet,  
quod in hoc affectu vitioſus & improbus ſanguis ab he-  
pate refrigerato gignitur, qui ſanguis corpus vtiliter  
nutrire nequit.

Pars affecta eſt totus corporis habitus, quo nomine  
partes inprimis intelliguntur, quæ primò oculis incur-  
runt, vt cutis & muſculi, eſt & internæ non planè ex-  
cludantur.

Affectus ipſe eſt, cum intemperies corporis frigida  
& humida, tum ſymptoma in qualitate mutata ob  
coloris vitium, & molem corporis mollem ac non-  
nihil tumentem, à quibus equidem actiones cor-  
poris aliæ ferè non læduntur in initio, in mor-  
bi tamen progreſſu actiones plurimæ offenduntur,  
acciditque nauſea, cibi faſtidium, & anhelitus ſit  
difficilis.

*Cauſſa.*

Cauſſa huius mali eſt corruptus & vitioſus ſanguis. *Cauſſa.*  
pituitoſus, plerumque crudus & ſeroſus, cui nonnun-  
quam aliquid bilis aut humoris melancholici permi-  
ſtum eſt, vnde diuerſi colores præter naturam, liuidi,  
aut cum virore albicantes, aut ſimpliciter albi vel palli-  
di, foetidi, oriuntur. Sanguis enim ille quanquam appo-  
ni & quadantenus partibus agglutinari poteſt: tamen  
ob nimiam cruditatem iis perfectè non aſſimilatur, &  
præterea nutritio partium non ſit pura & legitima, ſed  
malum ſi diutius protrahatur, in hydropem anasar-  
cam terminatur. Procreatur ille ſanguis maximè ex par-  
te vitio hepatis aut lienis, nonnunquam & ventricu-  
li, aut etiam cerebri, vt nonnullis videtur. Dum n. he-  
par aut imbecillitate laborat ex intemperie frigida &  
humida, aut obſtructione continua, aut ſcirrho, aut  
impuritate ex humoris corrupti aſſuſione, quo hepa-  
tis ſubſtantia facilè labefactatur, vitioſum & impu-  
rum ſanguinem gigni necelle eſt, qui pro diſſipata  
vtili corporis ſubſtantia inuſiliter reponitur. Idem &  
frigidam & humidam, quæ præditus eſt, intemperiem  
toti corpori imprimit, vnde eius nutritionem vitari  
necelle eſt.

Ad huius vitioſi ſanguinis in hepate generationem  
facit ventriculus, ſi imbecillis ſit, aut prauis alimentis  
& humoribus refertus. Dum n. vitiata his de cauſſis pri-  
ma coctio non corrigitur in ſecunda, etiam praua in to-  
tò corpore ſit nutritio.

Cerebri etiam vitio idem accidere ſtatuitur, quando  
materia frigida pituitoſa extra cranium inter cutem &  
muſculos deſcendens in ſubcutaneis partibus collecta  
tumorem mollem producit, vel è venis capitis & ce-  
rebri in totius ambitum deſluit. Verùm eſt tales ca-  
tarthi à cerebro deſtuentes variorum dolorum in am-  
bitu corporis cauſſa eſſe, & particulares in partibus  
externis tumores excitare poſſunt: tamen quod totum  
corporis habitum occupare poſſint, non eſt credibile.  
Ergo potius ex viſceribus nutritioni dicatis malum  
ortum trahit.

Obſervatione tamen dignum eſt, cachexiam etiam  
originem habuiſſe ex tenui vlcere in calculoſis, quan-  
do purulenta materia propter veterum obſtructionem  
in renes regurgitans & ſanguinem inficiens totum ha-  
bitum corporis inquinauit.

Hinc ad cachexiam inducendam faciunt omnia, quæ-  
cunque hepar inprimis, & habitum corporis refrigerare  
& humectare poſſunt, & in cauſſa ſunt, vt pro ſanguine  
probo frigidus, impurus, & multis excrementis, præ-  
cipuè ſero, abundans generetur, ſive ea cauſſæ ſint in-  
ternæ, ſive externæ. Pertinent huc morbi diuturni, &  
inprimis qui hepar & lienem lædunt, vt febres diu-  
turnæ, hepatis & lienis obſtructiones pertinaces, tu-  
mores duri, ſcirrhoſi, ſuppreſſæ euacuationes menſium  
& hæmorrhoidum, nimia ſanguinis per vulnera, menſes,  
hæmorrhoides, nares; vel alterius materiæ, vt in diar-  
rhœa, dyſenteria, ac colica affectione; longa euacuatio,  
vnde caloris natiui magna ſit in corpore diſſipatio: car-  
ceres & loca ſubterranea, ſi quis diu in eis viuere co-  
gatur.

Corripiuntur maximè hoc malo ſenes ob imbecil-  
litate caloris natiui, & mulieres ob retentionem  
menſium, ſicut & pueri, ob facultatis vitalis imbe-  
cillitatem & ingluuiem ac voracitatem, qua de cauſſa  
facilè in obſtructiones hepatis & lienis incidunt.  
Qui verò in vigore ſunt ætatis, minimè in cache-  
xiam incidunt, niſi magna ſit cauſſæ vehementia, vel  
lue venerea afficiantur, quæ & ipſa inter cauſſas cache-  
xiz numerari poteſt.

*Luos venerea  
cachexia in-  
ducit.*

*Signa diagnōſtica.*

Cognoscitur hoc malum ex colore naturali corporis, *Signa.*  
vt



ut antea diximus, mutato in album, pallefcientem, liuidum, & plumbeum, & corporis habitu subrumido & molli, qui tumor & inflatio quali præcipue circa oculos in facie & genis ac pedibus & manibus conspicitur. Humores enim aquosi & serosi illi grauitate sua ad pedes descendunt, pedesque ac manus à caloris fonte remotiores sunt; facies verò & genæ, ac inprimis palpebræ & circa oculos partes laxiores sunt, & humores serosos facilius recipiunt. Scrotum etiam interdum atque inguina intumescere incipiunt, & tum hydrops in principio est. Ager ad omnes cum corporis tum amimi motus lentus ac tardus est, minus quoque expedite respirat. Et in principio quidem coctiones cibi impediuntur, manente tamen appetitu, postea verò *dropica* accedit, teste Aëtio, corpusque ita imbecillum redditur, ut crura inter eundem vacillent.

Quod ad signa caussarum, si vitio hepatis, lienis aut ventriculi hoc malum accidat, præcesserunt causæ, à quibus partes illæ labefactatæ fuerunt; sin minus, à prauitate alimentorum habent, ob victus rationem prauam, quæ & ipsum ventriculum, hepar & viscera corrumpere solet.

### Prognostica.

*Prognostica.*

1. Cachexia malum non contemnendum est, cum si diutius duret, teste Aëtio, *terrab. 3. ferm. 2. c. 29.* imò ipsa experientia teste, in hydropem, qui Anasarca dicitur, degeneret; ideoque cura maturanda.
2. Curationem tamen admittit, nisi sit à pulmonis hydropem, aut morbo aliquo acuto, aut à præstantioris alicuius visceris apostemate, aut scirrho confirmato, aut alio morbo incurabili.

### Indicationes.

*Indicationes.*

Materia vitiosa euacuanda est. Causa, quæ humorem illum vitiosum & serosum generat, tollenda, ideoque hepar aut viscus aliud materiam generans & suppeditans ab intemperie frigida & humida vindicetur, roboreturque. Si à tumore duro visceris alicuius fiat, is curetur. Si ex suppressione alicuius euacuationis, illa prouocetur. Si ex nimia euacuatione, calidum natium conferuetur, & quod dissipatum est, instauretur. Habitus verò corporis curatur calefaciendo & exiccando, ne materia intro conuersa, viscera & partes nobiliores lædat. Causæ externæ & inprimis habitatio in locis frigidis & humidis, aut subterraneis, tollantur & mutantur.

### Curatio.

*Curatio.*

*Vena sectio.*

Ideoque si hepar refrigeratū sit, ex caloris natui dissipatione, phlebotomia non opus est, cum corpus magis refrigeret. Si verò ex caloris natui suffocatione, ob suppressam aliquam sanguinis euacuationem, seu mensium, seu hæmorrhoidum, sanguis mittendus, ut docet Auicennas, 3. *Can. fen. 14. tr. 4. cap. 10.* & Paulus Aegineta, *lib. 3. c. 47.* sed parè & per vices ad tertium vel quartum diem. Nonnulli quidem in brachiis potius venas aperiendas censent; quod, vbi adhuc, alicuius plethoræ notæ adsunt, ut non planè improbamus: ita eadem indicationi & scopo per venarum in cruribus sectionem satisfieri posse puramus, cum subitæ & confertim facta sanguinis euacuatione hic opus non sit, & venæ hæc apertæ eandem etiam præstare possint, & sanguini suppresso consuetum motum iterum concilient.

Medicamenta verò hic conueniunt, quæ supra de intemperie hepatis frigida & humida proposita sunt, & deinceps de Hydropem Anasarca tradentur, cum quibus affectibus cachexia cognationem habet. Præui tamen humores, qui in corpore redundant, prius euacuandi

*Dan. Sennerti Tom. II.*

sunt, postquam, si opus est, fuerint preparati. Verum non viurpanda fortia purgantia, ne imbecillæ corporis vires amplius prosterantur, & calidum natium debilitetur, sed lenia adhiberi debent & per vices humores expurgari. Et quia inprimis serosi humores hic redundant, euacuari illi & educi debent, tam per aluum, quàm per vrinam ac sudorem, iis medicamentis, quæ postea de Hydropem proponuntur. Vomitus etiam sæpè ad antecedentis causæ sublationem multum potest.

Corpore euacuato ad ventriculum & hepar roborandum & humores abstergendos vtilissimum est absinthium, quocunque modo sumptum.

Vtiles sunt & hæc pilulæ, quæ simul laxant:

*℞. Spec. dialacæ vel diacurcum. Scr. iiii. Rhabarb. elect. mechoacan. an. Dra. i. spec. diarrhod. Abbat. galang. an. Scr. i. Cum s. q. syrapi de absinth.*

F. Pilulæ à Dra. i. xxx. de quibus quarto quoque die 24. sumantur mane ieiuno stomacho.

Vel *℞. Spec. dialacæ, diacurcum. an. 3. ss. Diarrh. abb. 3. i. Cum extract. absinth.*

F. Pilulæ.

Profunt quoque trochisci de absinthio, de rhabarb. de lacca, addito pulu. rhabarb. & agaric. & pauxillo: *spec. diarrhod. Abbat.* qui cum syrupo byzantino vel de eupatorio exhibeantur; aut ex iis fiant pilulæ cum extract. vel succo absinthij; De quibus singulis diebus mane quatuor vel quinque sumantur.

Vtiles etiam sunt species dialacæ & diacurcum.

Commendant nonnulli & hunc puluerem, cuius cochlear i. paulò ante cibum sumatur.

*℞. Intestin. gallinar. cum interna ventriculi tunica à carne separatorum & vino albo ablutorum 3. iiii.*

Comburantur in furno & vino albo & aqua absinthij extinguantur.

Deinde addatur cuilibet Vnciæ cineris, galangæ, cinamom. an. 3. i. croci 3. i. caryoph. 3. ss. hepatis lupi præp. & in puluerem redacti 3. vi. sacchar. rosat. tabulat. 3. i.

F. Puluis.

Est & hic puluis satis efficax, & inde cachecticus dicitur.

*℞. Limatura chalybis q. s.*

Iroretur aqu. absinth. vel fraxini in quibus eorundem puluis est chæcticus. sales dissoluti sint; Relinquatur tamdiu, donec rubiginem contrahat.

*℞. Huius croci 3. iiii. C. C. vsti præp. 3. ss. magisterij corall. perlar. an. 3. i. cinamom. 3. ss. crysall. tartari 3. i. sacchar. q. s. ad dulcedinem.*

F. Puluis, cuius dosis 3. i.

Landatur & hic minus operosus puluis.

*℞. Chalyb. præpar. part. i. cassie lign. part. ii. sacchar. alb. part. iiii.*

F. Puluis, cuius 3. i. bis quotidie detur.

Efficax est & hoc vinum chalybeatum, præcipue in pertinaci viscerum obstructione & mensium suppressione, vnde cachexia ortum habet.

*℞. Limatur. chalyb. 3. iiii. vini albi 3. iiii.*

Infundantur ad dies 8. in vitreo vase bene clauso ad solem vel locum calidum, quotidie aliquoties agitando Huius vini Dentur Vnc. vi. vel Vnc. viii. 4. horis ante prandium, sumptoque eo æger ambulet horas duas, si vires ferant, gressu concitatore. Detur 15. vel 20. diebus. Cum exhibetur, necesse est vas nonnihil agitare, ut substantia ipsius chalybis vino permisceatur. Quoties cyathus vnus effunditur, toties tantundem vini affundatur, donec medietas chalybis assumpra videatur. Post nihil amplius addatur.

Si vitium sit in partibus nutritioni inferuentibus, cauteria, præseruationis ab hydropem gratiâ, in cruribus vtiliter affiguntur, priusquam insigniter ea intumescant.

Si autem à suppressa aliqua consueta euacuatione cachexia ortum habeat, ea omni modo promouenda,

TTT: 2 uenda,

uenda simulque medicamenta cachexiæ inferuentia usurpanda. Itaque hîc valde vriles sunt *pilula primo loco proposita*.

Quando cachexia ab immodica aliqua euacuatione contingit, corpus reficiendum bono alimento, partes refrigeratæ calefaciendæ, & habitus corporis paulatim exsiccandus, heparque inprimis roborandum. Si à lue venerea originem trahat, ei morbo primò occurrendum.

#### Dietæ.

Aëreligatur ad calidum & siccum vergens; viterur humidus, palustris. Cibus, quantum vires ferunt, tenuis sit, (cùm abstinentia hîc multum proffit) ac exiccandi vi præditus, boni succi, facilis concoctionis, qui conditur *cinamomo, caryophyll, croco & similibus*. Minus lautè viuentes homines porro, aliis, si napi, & omnibus, quæ attenuandi vim habent, vrantur. Ab omnibus verò frigidis, crassis, lentis, & qui sunt difficilis concoctionis, æger abstineat, inprimis verò ea vitet, quæ multum aquosi humoris continent, ac propterea aquosum & serolum sanguinem gignunt. Galenus, 1, de aliment, facult. cap. 18. scribit, quibus aquea in carnibus cachexia est, iis lens in cibo vtiliter præbetur. Temperata enim est in caliditate & frigiditate, insigniter autem adstringit & in secundo ordine exiccat. Cæterum aridis & squalentibus, eodem Galeno teste, admodum dampnosè exhibetur. Vinum sit album, tenue, odoratum; aquæ verò potus planè vitandus. Alius sit aperta. Corpus tempestiuè & moderatè exerceatur. Mæror animi vitetur. Somnus non sit nimium longus, nec diuturnus: Venus damnatur. Frictiones siccæ fiant cum lintheis crudis. Paulus vsum aquarum aluminosarum magisque nitrosarum & sulphurearum laudat.

### CAPVT III.

#### De Hydropo à sanguificatione laesa, in genere, & De Ascite.

Hydrops.

Affectus, qui Græcis ὕδρωσις & ὕδρωσις nominatur, & inde Celso, lib. 3. c. 22. morbus hydropicus, Latinis aqua intercus, & aqua inter cutem, Germanis; *die Wasser sucht*, ab aqua nomen accepit, & in genere aquosi & serosi humoris abundantiam & collectionem significat, ob quam corpus vel pars eius præter naturam intumescit. Nomen autem hoc usurpatur vel ut ὕδρωσις, nomine partis addito, ut hydrops capitis, qui vulgo hydrocephalus nominatur, de quo lib. 1. par. 1. c. 28. actum; Hydrops pulmonis & pectoris, de quo lib. 2. dictum; gutturis, cuius iridem lib. 2. mentio facta; Vteri, de quo Hippocrat. 4. de morb. & lib. πρὸς γυναικείων. Aëtius, lib. ult. c. 97. Auicennas, 24. tert. tr. 4. c. 25. Fernellius, lib. 6. de part. morb. & sympt. c. 15, Guiljelmus Fabricius, cent. 2. obseru. 563. brachij, de quo D. Horstius, lib. 7. de hist. mirab. Manus, cuius exempla in duobus iuuenibus vidi: Vel absolute & simpliciter, & totius corporis, aut certe abdominis tumorem ab humore aquoso significat. Verum de particularibus istis aquæ intra partem collectionibus suis locis diximus & dicemus; hoc loco de eo saltem hydropo agemus, cum vel totum abdomen, vel vniuersum corpus à materia serosa & aquosa intumescit.

Hydrops dupliciter consideratur.

Hydrops autem hoc modo sumptus dupliciter consideratur, vel ut tumor abdominis aut totius corporis, & morbus in mala compositione & magnitudine aucta, vel ut symptoma, quod læsam sanguificationem sequitur, qua ratione etiam hoc loco præcipue de hydropo agemus. Cum vere & alij sint abdominis tumores, quibus etiam nomen hydropis tribui solet, de ijs infra suo loco dicemus.

Est autem hydropis huius differentia quædam. Hippocrates, 4. de rat. vict. in acut. c. 3. duas hydropis species recenset, vnâ, quam ὑποσπικνίδιον, alteram quam μετέμεραισιν nominat. Verum Galenus hanc distinctionem, ut insufficientem, ibi reprobans; triplicem hydropem statuit; vnum ἀσκήν, in quo totus venter inferior liquore aquoso & seroso impletur, ut instat ἀσκή seu vtris pleni turgat; alterum τυμπανίτην dictum, in quo locus ille flatu crasso inprimis turgidus redditur, manûque percussus tympani sonum edit, qui Hippocrati, ἔνρος ὑδρωσις; tertium ἀνασπικνίδιον aut λευκοφλεγματίαν, in quo vniuersa corporis moles per carnem & sub carne humore albo & pituitoso suffuso tumida apparet. Aretæus quidem, lib. 2. de caus. morb. diut. cap. 1. inter ἀνασπικνίδιον λευκοφλεγματίαν distinguit, quod hic ex alba pituita, crassa, & frigida in hepate genita, ille ex carni in humorem sanguineum, aquosum, & tenuem resolutione oriatur. Verum ab alijs hi affectus non discernuntur, neque etiam necessaria aliqua, cur id fieri debeat, causa suppetit. Ferè a. hæ materię miscetur, ut raro sit aqua sine flatu, & flatu sine aqua in abdomine; atque ista de causâ forsan Hippocrates vel autor lib. 4. de rat. vict. in acut. sub Tympanite Asciten complexus est. Ex eo tamen, quod abundat, appellatio sumitur, & cum parum flatuum est, Ascites appellatur; cum v. copiosus flatu cum aqua exigua, tympanites. Plerumque tamen aqua abundat. Ideoque si accuratè rem æstimare velimus, rectè scripsit L. Iacchius in 9. Rhafis c. 22. præcipue hydropem dici Asciten, cæteras verò species per huius similitudinem. Et proinde cum si quis absolute hydropicus appellatur, Ascite laborare intelligatur, cum Ascites præcipua sit Hydropis species & dum scriptores absolute Hydropem nominant, hunc ferè intelligant, de eo primo loco dicemus, & quæ in genere de Hydropo dici possunt, in illius tractatione proponemus; postea verò etiam differentias reliquas addemus.

Ascites præcipua est hydropis species.

#### De Hydropis Ascite natura & causis.

Est autem Ascites tumor abdominis, cui & femorum ac pedum, nonnunquam & scroti tumor accedit, ab humore aquoso & seroso in abdominis capacitate collecto ortum habens.

Hydropis Ascite natura.

Subiectum huius tumoris est abdomen præcipue, qua ratione ab aliarum partium, quibus hydropes particulares accidere possunt, tumoribus, eiusmodi tumor differt. Et quidem materia Ascite colligitur in illo spatio, quod est inter peritonæum, omentum & intestina, seu, ut breuiter dicam, in abdominis cavitare, & quidem tantâ copiâ, ut non solum abdomen valde extendat, sed & diaphragma comprimat, imò in thoracis cavitatem transudet, vnde difficultas spirandi, ac assidua tussicula existit, pars etiam aliqua ad crura & pedes descendit, pars scrotum occupat, vnde & hæ partes intumescunt.

Materia Ascite ubi colligitur.

Proxima tumoris huius causa est humor, maximam quidem partem aquosus, & hinc suâ naturâ frigidus, qui tamen multas partes salvas continet, vnde calorem quoque participat, quem etiam contrahit è viscerum vicinia, imò temporis diuturnitate putrescit, quod febris insequens & sitis, à vaporibus salis ac putridis os ventriculi petentibus excitata, ostendit.

Causa.

Accidit tamen, quod hîc non prætereundum, ut interdum aqua non in cavitare abdominis, sed vesicis quibusdam, partibus ventris inferioris intrus adnatæ, includatur, Cuius rei historiam recenset Mauritius Cordæus comm. 5. in lib. 1. de mulier. ubi scribit, Anno 1567. 8. Martij mulierem quandam hydropicam Lutetix mortuam esse, in cuius euiscerato cadauere nulla capacitas, id est, nihil cauum deprehensum fuit, in quo non vesica pendebat loco, illi exactè æqualis & conformis, qui suo ambitu ipsam contineret. Locos autem

Cadaver hydropicum ubi sitis intrusæ.

antem cauos dicit fuisse, non vesicam tantum, renes, vterum, sed & ventriculum, intestina, cor, pericardium & id genus reliqua, è quibus, prout tam intus, quam foris cuique locus obrigisset, cystes pendulæ conspiciantur aqua citrina oppletæ, & sine omni fœtore, etiam post 20. diem. Nec partes supernas exceptas fuisse ad iugulum vsque, sicut neque hepar, neque lienem. Et si quis vniuersas in numerum redegisset, 800. numero superasse scribit. Harum porrò fabrica fuit huiusmodi, vt binæ eas membranæ conficerent, vna candicans interior, altera fuit tunicæ ventriculi similior, tenuior aliquantulum, sed ei concolor, non absimilem historiam recenset Schenckius, lib. 3. obs. excommunicatione D. I. Eichholtz, Anno 1581. fœmina quædam plebeia annorum circiter 40. pro hydropica habita mortua est. Eius cadauer cum aperiretur, aqua nulla in cavitatē abdominis reperiata est, vt nec flatus vllus, sed intestina vnā cum reliquis visceribus angusto spatio contenta apparuerunt. Ipsum verò abdomen à cute ad peritonæum quasi alba pinguedo duntaxat contextum videbatur, nullā musculorum carnē substantia interposita, sed vesiculis crebris maioribus minoribusque aquā limpida refertis inuicem cohærentibus. Cætera à naturali constitutione haud multum variatunt. Omentum tamen perexiguū vix intestina contegebat. Hepar albicans forintecus magnitudine & mollitie sua competentē erat. Quæ proculdubio acciderunt, seroso humore cum sanguine ad capillares venas, quæ visceribus & partibus ventris inferioris inseruntur, delato, ibique exitum quærente, quem cum ob densitatem membranarum non inueniret, vesiculæ hæ fuerunt excitatæ.

Sed hæc rariora sunt; cum verò frequentissimè aqua in abdominis cavitatē contineatur, de causis, loco & modo, quo generatur, & viis, quibus in abdominis cavitatē penetrat, dicendum.

Aqua Hydropicorum vbi generatur.

An in Hepate?

Locus vbi generatur, est officina sanguificationis, aut, vt clarius dicam, locus inter ventriculum & renes, per quos aliàs naturaliter serum euacuari solet. Ibi enim vitiosus sanguis generatur, & serosus humor colligitur, vbi bonus generatur, & serum nondum à sanguine separatū est. Officina autem primæ sanguificationis est hepar, & proinde plerique in hepate primò aquam illam hydropicorum generari statuunt. Et omnino hoc credo esse verum de hydrope Anasarca. In ea enim hydropis specie sanguis frigidior & aquosior generatur, & per omnes venæ canæ ramos distributus, facit, vt tertia coctione frustrata corpus totum tumidum & aqua quasi suffusum reddatur. De hydrope verò Ascite, vt & Tympanite, aliter sentiendum puto. Etsi enim & in his hydropis speciebus hepar tandem afficiatur: tamen non tam ipsum humorem serosum generat, quàm à vicinis partibus accipit, & à circumfuso humore læditur. Quin potius plurimum ad hydropem contrahendum Lienem facere puto qui suo modo etiam sanguinem generat, vt & venas melsaraicas, quæ chylum ad Lienem & hepar denehunt, & sanguinis coctioni suo modo inseruiunt. Et in hydropicis post mortem hepar saluum repertum fuisse, Medicorum observationes docent, sicut ex iisdem constat, lienem malè affectum & scirrhus laborantem hydropi originem dedisse. Docet id expressè Hippocrates lib. 1. & 4. de morb. mulier. Imò melsaraicas etiam non rectè suum officium facientes hydropi causam dare, multa docent, atque inde fit, vt post quartanas & alias febres diuturnas interdum hydrops sequatur. Atque inde proculdubio factum, quod Hippocrates, 2. prorrh. hydropem diuisit in eum, qui est ab hepate, & qui ab Ilibus seu inanibus locis: Incipit, inquit, plerumque hydrops, ab inani parte seu Ilibus, vel ab hepate, Per *κέντρα* intelligit illas partes, quæ extremis costis thoracis subiacent, & tamen ab hepate differunt. Et proculdubio per hydropem ab hepate intellexit Anasarcam, per hydropem ab Ilibus

Asciten & tympaniten. Verum ea de re infra plura, quæst. 1. dicentur, & patebunt etiam ex iis, quæ iam de causis collectionis humoris serosi tradentur.

Iam enim porrò quærendum, ob quam causam hæc in locis humor serosus colligatur: Nos hoc loco eam, quam maximè probabilem putamus, sententiam proponemus, plura postea, quæstione 2. addemus.

Causa collectionis humoris serosi in hydrope.

Primò autem hoc certum est, si serum per renes euacuatur, hydrops non generatur. Nam videmus multos, qui magnam aquæ, cereuisiæ vel vini copiam ingurgitant, & sæpe vno die plus exhauriunt, quam aliquot diebus ab hydropicis bibitur, & tamen nihil mali pati, dummodò aqua per vrinam, vt fieri solet, vel etiam per aluum liquidiorē excernatur. Contrà videmus hydropicos omnes vrinas reddere paucas, & si paulò liberalius bibant, maximè offenduntur. Quod autem ad renes in hydropicis vrina non peruenit, causā non est sola angustia venarum ab hepate ad renes, quæ Erasistrati opinio fuit, quam Galenus, 5. de loc. affect. cap. 7. non immeritò reiecit. Nam si sanguis, qui crassior est, quàm serum, hepar transit, & in venam cauiam ac proinde in totum corpus ad eius nutritionem distribuitur, certè serum, quod tenuius est, vnā etiam penetrare posset.

Neque etiam, quæ vulgata opinio est, ad sanguificationem læsam, ob quam pro bono sanguine in hepate aquosus generetur, in Ascite & Tympanite recurrere licet. Neque enim semper Hepar afficitur, vt dictum antea, & postea, quæst. 1. dicitur, sed sæpe in hydropicis saluum reperitur, etsi morbi progressu ab aqua circumfusa lædi possit. Et si hepar sanguinem aquosum generaret, non tantum abdomen & partes ventris inferioris intumescerent, sed sanguis ille aquosus in vniuersum corpus distribueretur, id quod in Anasarca fieri concedimus.

Quia ergo neque ex sanguificatione læsa, neque ex viarum, quæ ab hepate ad renes sunt, angustia collectionis humoris causam petere licet, & nihilominus hydropici parum mingunt, & id, quod ad renes transire debebat, in abdomine subsistit, causā inter ventriculum, hepar ac lienem quærenda videtur, & res ipsa sæpe docuit, aquā hoc in loco subsistente, vbi auidius pota fuit, hydropem excitatum fuisse.

Ita refert Carolus Piso, adolescentem, cum in tertianā intemperantius bibisset aquam, sub eius declinationem in Asciten incidisse, sed illum vnius tabulæ Diacarthami vsu, aquā in abdomine restitante per aluum confertim redditā, breui sanitati restitutum fuisse. Memini ipsè quoque puellam, cum in febris tertiana vehementer sitiret, integram mensuram cereuisiæ secundariæ vno haustu ebibisse, & inde in hydropem incidisse, quæ tamen gummi guttæ & aliorum serosos humores euacuantium vsu, aquā singulis diebus per aluumeductā, sanata fuit, nullo in hepate vitio remanente, quæ nunc etiam aliquot liberorum mater bene valet. Et sæpe mellores, ac ij, qui in æstu aquam & cereuisiam secundariam auidius bibunt, in hydropem incidunt, aquā in abdomine restitante. Itaque in talibus non euacuatur aqua & serum per renes, quia ad renes non peruenit, sed in ventre & valis melsaraicis subsistit. Si autem porrò quæramus, vbi & qua de causa subsistat, ea quæ de vsu lienis, in Instit. & supra part. 4. cap. 1. dicta sunt, repetenda. Nimirum, vt Hippocrates, lib. 4. de morb. scribit; splen aquam ad se trahit ex ventriculo, & si plus traxerit, quam oportet, homo statim affligitur, & vt apertè & clarissimè hanc rem explicat Aristoteles, lib. 3. de part. animal. cap. 7. Lien humitates superfluas diuertit & attrahit è ventriculo, & concoquere eas potest, vt qui sanguineus est. Quod si plus excrementi sit, parumque caloris habeat lien, corpus præ alimento immodico languescit, & propter confluuium hoc humoris sæpe accidit, vt lienosis ventres

Hydrops à largiore haustu aquæ & cereuisiæ.

Cur serum in ventre subsistat?

Serum non  
omne ad he-  
par & venas  
emulgentes  
desertur.

præduri efficiantur. Etenim serum & aquosi humores omnes, vt *locis allegatis* dictum, non ad intestina & hinc per mesaraicas viâ longâ ad hepar perueniunt, hincque ad venas emulgentes, sed minor eorum pars; maxima verò pars è ventriculo per vas breue à liene attrahitur, & hinc per arteriam splenicam in cœliacam, mox à trunco aortæ arteriæ per emulgentes arterias ad renes deriuatur. Paret id ex eo, quod qui largius bibunt, aquosum quod est in potu, mox iterum emingunt, & qui acidulas vel aquas thermales sæpe ad 9. libras ebibunt, eas mox intra tres horas per vrinam reddunt. Fieri tamen etiam potest, vt pars aliqua humoris serosi in ramo mesenterico & ad portas subsistat. Idcoque hîc hepar & lienem non planè excludimus. Nam si viscera hæc, præcipuè in parte caua, & quæ rami portæ ad eam pertingunt, obstruantur, vel scirrholæ reddantur, serum non admittunt, quod subsistens ibi cumulat, & in vasa restagnat. Vnde scribit Carolus Piso: qui dissectioni demortuorum hydropicorum attenderit, fatebitur vitrò, tumorem aliquem visceris alterutrius ferè vnâ, certè frequentissimam Ascitæ causam esse. Adde præcipuè in hydropc lethali: Sunt enim hi hydropes periculotissimi & ferè incurabiles, cum, vt scribit Hippocrates, 2. *prorrhæcum*, qui ab hydropc contrahitur est, *ὡς ἀλλ' ἄλλο* esse oportet, quod fit, si hepate & liene saluo, vitium saltem est in vasis mesaraicis. Atque ita quod per renes serum non euacuatur in Ascite, causa est, quod in venâ splenicâ præcipuè, vt & mesaraicâ, & forsan etiam in arteriâ splenicâ ramis subsistit, vt & in radicibus earum venarum circa caua viscerum, & ad gibba viscerum non penetrat, nec ad renes peruenire potest.

Cur serum in  
Ascite per re-  
nes non eua-  
cuatur?

Hydropis  
Causa.

Quænam autem causa sit, quod his in locis subsistat serum, porrò inquirendum. Causa autem præcipua est, quod à visceribus, inprimis liene, qui, vt ex Aristotele dictum, humiditates superfluas à ventriculo attrahit, non omne attrahitur. Non attrahit autem lien, vel quia viâ non patent, vel quia facultas attractrix in eo labefactata est, vel quia obruitur nimia humoris attrahendi copia, vel quia plus attrahit, quam iterum euacuare possit. Prima nimirum & ferè frequentissima hydropis causa est obstructio vasorum ad lienem & hepar è ventre inferiore tendentium à crassis & multis humoribus, vel etiam iis induratis, quod in alterutro visceris scirrho accidit. Quo modo sæpe febribus diuturnis succedit hydrops. Deinde læsa attractrice facultate colliguntur humores, serosi in hisce locis, quia vel ipsa attractrix labefactata est, calore innato debilitato, siue per contraria alterantia, id est, insignem refrigerationem à potu aut medicamento frigido, siue humido primigenio, quod caloris natui fundamentum est, absumpto, siue spiritu à calore influente denegato; (Vnde hydropem inducunt aquæ frigidæ, & potius alterius refrigerantis nimius vsus. Dissipato calore & humido radicali absumpto inducunt hydropem febres ardentes & diuturnæ, potus nimius vini potentis, aut spiritus vini, & morbi alij, qui viscerum calorem debilitant & absumunt. Insignes verò sanguinis euacuationes hydropem inducunt, quod spiritus confertim exhauriunt) vel quia plus potius assumitur, quam attrahi possit, id quod euenit, cum quis, præcipuè corpore prius calefacto, potum, & inprimis aquam, auidius ingurgitat, vnde accidit, vt aqua, cum tota attrahi à liene non possit, in vasis ad eum tendentibus subsistat. Quò tandem & ipsum calorem viscerum nimium referre possumus, ob quem ea, & præcipuè lien, plus, quam iterum euacuare & ad renes distribuere possunt, attrahunt.

Causarum harum mentionem facit Hippocrates lib. 1. de morb. mulier. vbi docet, si febris hominem detineat, sitique valida corripuerit & biberit, Lienem, aquam ad

se trahere & intumescere. Deinde etiam sine febre id accidit, si *καύμα* seu incendium in ventre adfuerit, & in siti sibi homo non temperet. Et lib. 4. de morb. in fine scribit Hippocrates, si lien ægrotans (procul dubio intemperie calida laborans) potum ex ventriculo ad se trahit, hydropem sequi, & in venis inferioris ventris aquam coacervari.

Quæ omnia sunt longè probabiliora, quam si statuamus, solum sanguificatione in hepate læsa tantum feri generari. Equidem in Anasarca libenter admitto, chylum in crudiores, & pituitosum sanguinem mutari; at in aquam totus mutari non potest. Neque enim cibibus solidior in aquam mutari potest; Neque serum, quod per vrinas naturaliter excernitur, & in hydropicis præter naturam detinetur, in hepate vel Liene primum generatur, sed è ventriculo transmittitur & attrahitur, estque ille humor, qui bibitur & cibis admiscetur. Vnde etiam obseruatum, quosdam hydropicos omnimoda à potu abstinentia sanitati restitutos fuisse. Et experientia atque ipsa corporis nutritio, & sanguis, qui in venis etiam in hydropicis continetur, docet, chylum non in aquam, sed in sanguinem in ascite mutari, & in hydropicis etiam, quicquid alimentarij est in chylo, ab hepate attrahi & in sanguinem mutari, serosum verò & aqueum in primis viis subsistere. Etsi enim viæ illæ, per quas serum ad lienem transit, non pateant: venæ tamen mesaraicæ patere possunt, vt chylus ad hepar transferatur. Temporis tamen progressu ab aqua circumfusa hepar corrumpi, & sanguificationem lædi, facile concedo; quod etiam accidit, si hepar scirrho detineatur. Vnde etiam tandem superiores corporis partes contabescunt.

Chylus in  
aquam mu-  
tari non potest.

His ita profectis, non difficile est, vias quoque inuenire, per quas serum in abdominis cavitatem perueniat, de quibus tamen non leuis est apud autores controuersia, vt *quest. 3.* dicitur. Breuiter enim statuimus, si serum copiosius in vasis, quæ inter ventriculum, lienem ac hepar sunt, colligatur, id, vasis seu per *διαμήδων*, seu per *ἀναστόμωσιν*, seu per exsionem & erosionem apertis; in abdomen destillare, ibique colligi ac cumulari posse. Quæ viæ etsi in cadaveribus non pateant: tamen in viuientibus satis patulæ sunt, naturaque iis, quoties libet, in *υἰάσασθαι* & *ἐκρίσθαι* humorum feliciter vritur, & ob eas corpus vniuersum *εὐπρεπὲς* est.

Quæ autem viæ illæ sint, apud autores non satis planum est. Hippocrates, 7. *aph.* 55. earum mentionem facit, dum scribit; Quibus hepar aqua repletum in omentum eruperit, his venter aqua repletur, ac moriuntur. Quem aphorismum Galenus quidem ita explicat; Maxime, inquit, hepar obnoxium generandis in ea tunica, quæ ipsum extrinsecus ambit, vesiculis aqua plenis, quas *υδανίδες* appellant Græci; siquidem in iugularis animalibus apparet interdum talibus vesicis repletum. Si quando igitur acciderit, vt tales *υδανίδες* rumpantur in eam peritonæi regionem aqua effunditur; quæ est secundum *ἐντρίπιον*. Verum etsi negari non possit, tales vesiculas aqua plenas in hepate ac liene non raro inueniri, sero, quo abundant, membranam hepar ambientem distendente: tamen nec in omnibus hydropicis tales vesicæ apparent, & in quibus sunt, raro rumpuntur, neque tanta aquæ copia, qualis in hydropicis colligitur, per eas exstillare potest. Neque etiam verbis Hippocratis consentanea est Galeni explicatio; cum Hippocrates non ex hepate in abdominis cavitatem, sed in omentum aquam erumpere scribit. Res verò per se planâ est, & ipsè Hippocrates, 1. de morb. mul. loco sæpe allegato, lucem huic rei affert, dum scribit: Lienem, si ab aqua intumescit, distribuere eam per venas corpori, & maxime in omentum, & loca circa ventrem & crura. Etenim si Hepar aqua repletum fuerit, illa in omnes venæ portæ ramos, quo



quorum inter se continuata est communicatio & confluxus mutuus, redundat; atque ita facile in epiplois seu omenti venas per eum ramum, qui gastroepiploicus à recentioribus appellatur, fluere potest, vel etiam à Liene attrahi & in omentum per vtrumque ramum epiploicum erumpere. Atque ita viâ per quas aqua hydropicorum in venâ portæ ramis & visceribus vicinis collecta in abdominis cavitate perveniunt, sunt rami Epiploici & Gastroepiploici. Hi enim si tanpere humore aquoso & seroso replentur, ut illorum extrema præ copia dehiscant, vel quocunque modo aperiantur, ex apertis & dehiscentibus venarum omenti orificiis guttatim aqua destillat in abdominis cavitatem, atque ibi collecta ventrem in tumorem attollit, & hydropem Asciten generat.

Alij adhuc alias vias addunt. Fernelius equidem, *lib. 6. de part. morb. & sympt. cap. 4.* serum in abdomen effundi statuit, parenchymatis horum viscerum continuitate soluta & fissâ, exesâ, apertâ, ruptâ ac dehiscentē eorum substantiâ. Adrianus Spigelius, *lib. 8. de corp. hum. fabrica* viam antiquis & recentioribus adhuc ignoratam addit, lobum scilicet exiguum in caua hepatis parte juxta portas vocatas situm, qui in ipsam omenti cavitatem totus recondatur, & longè tenuiore membrana, quàm reliquum hepar, tegatur, ut credibile sit, à leui iniuria eum facile perituri in primis cum ipsa substantia mollissima sit, & hoc loco complures venæ caua propagines & ipsæ venæ portæ truncus situs sit, in quibus major serosi humoris copia, quàm in aliis hepatis partibus coaceruari potest.

Platerus aliter quoque hepate malè affecto hydropem excitatum fuisse observavit, in puella quadam, nimirum tumore fungoso hepati annato, è quo humor serosus emanare potuit. Insuper hepate ac liene ulcerato adeo, ut ad ejus superficiem ulcera post inflammationes suppuratas vel tumores in abscessus desinentes aperta, relictaque ibi diu, sæpe purulentas dejectiones mouentia, tandem hydropem effecisse scribit. Refert quoque huc læsiones externas, & præsertim contusiones, & duos ab equo in dextrum latus lapsos præcedentibus aliquandiu hepatis & lienis symptomatibus quibusdam, tandem hydrope correptos ac extinctos fuisse, scribit; idemque à vulnere vlcus relictum & corruptiones ac putredines horum viscerum efficere posse existimat. Et omnino à vasorum, viscera in ventre interiore, mesenterium scilicet, renes, vterum perreptantium, soluta continuitate, iisque seu per *diaphragmā*, seu per *diaphragmā* seu per *diaphragmā* apertis, serum in abdominis cavitatem fundentibus, hydropem generari posse, supra dictum, & infra, *quest. 3.* dicitur.

Verum frequentissima causa proculdubio est primo loco posita. Nam si serum in venâ portæ propaginibus per mesenterium & omentum sparsis copiosius cumuletur, nisi ad intestina defluat, & alui fluxum excitet, ex his venis in abdominis cavitatem destillat. Cum enim vasa ista, quæ in omentum & vicina loca excurrunt, raræ texturæ sint, ac peritonæo tantum vestiantur, facile hinc per eorum orificia in ventrem aqua exsudat & exstillat. Habet enim omentum se peræ instar, quæ portæ caudicem excipit, & in homine pro corporis proportionem maximum est, ac venas innumeras è vena portæ accipit, ut & arterias ex ramo cœliaco & mesenterico. Cumulatur autem ibi, ut supra dictum, si transitus illi è venis splenicis & mesaraicis ad Lienem impediatur. Quod fit præcipuè ob attractionem viscerum læsam, frustratam vel impeditam, ob quam serum, quod partim chylo permixtum, partim ab eo separatum continuò à potu has vias pertransit, ad se, ut par est & naturaliter fieri debet ac solet, non allicit, unde ad renes pervenire non potest. Quod præterea etiam accidit ab obstructione, quæ vel est in ipsis vasis, vel etiam in viscerum substantia, quod in scirrho hepatis & lienis præcipuè evenit.

Utergo ista, quæ hæcenus prolixius de causis hydropis Ascitæ diximus, in pauca contrahamus & causas etiam mediatas & remotas addamus, ubi serum copiosum in ramis venæ portæ subsistit, in omentum transit, per venas peridisperitas quarum orificiis apertis in cavitatem abdominis destillat. Colligitur autem ibi, quia vel à liene non attrahitur, vel quia via non patet.

Hinc causæ mediatæ, & remotæ hydropis sunt, quæcunque vel attractionem seri in visceribus lædunt, aut calidum innatum extinguendo, aut suffocando, aut dissipando, vel obstructionem in vasis & viis illis, per quas transire serum debet, pariunt, vel faciunt, ut viscera serum intempestivè & nimium ad se trahant. Calidum innatum extinguunt Lienis & hepatis refrigeratio à causis externis & internis, ut nimius aquæ vel vini aut cerevisiæ glaciæ refrigeratæ, præcipuè post æstum & corporis motum, è quo corpus incalcescit, potus, alimenta frigida nimia copia sumpta, qualia sunt lactuca, cucumeres, melones, persica & similia, & quæ à Pythagora damnata est Attriplex, quod hunc affectum facere putetur, ut Plinius, *lib. 20. nat. histor. cap. 30.* scribit. Partes etiam vicinæ refrigeratæ & malè dispositæ affectionem suam hepati ac lieni communicare possunt.

Suffocant & corrumpunt calorem nativum consuetæ per hæmorrhoides & menses evacuationes suppresæ, de quò Hippoc. *6. aph. 12. diuturnas curant hæmorrhoides, nisi una quæpiam servetur aperta, periculum aquæ intercurrentem vel tabis impendit.* Sanguis enim ille feculentus & impurus circa hepar & lienem subsistens, aut tumorem in iis excitat, aut copiam prauitatem calorem nativum eius extinguit & corrumpit. Calorem dissipant & absument evacuationes sanguinis nimie per hæmorrhoides, menses & hæmorrhagiam narium; quæquam Galenus in mulieribus ob menses nihil tale evenire scribat, quia ipsis consuetæ sunt, de curand. rat. per. ven. *sect. cap. 19.* febres ardentes, diuturnæ, in primis quartana, lentæ, longæ, hæcticæ, *ῥῆμα* item & æstus in venis mesaraicis, ut & dysenteria & diarrhœa, item podagra, & dolor coxendicum longus; vini generosioris & aromatici, vel Spiritus vini usus, medicamenta item calida & fortia, in primis purgantia.

Obstructionem pariunt, quæcunque crassos, & viscidos humores suppediant; quod pertinent quartanæ longæ, quæ non solum calorem innatum debilitando, sed & periculosas viscerum obstructions relinquentes, imò scirrhus viscerum, hydropem inducunt. Quod referri potest & nimius aquæ confertim haustæ potus, ut totus à liene attrahi non possit, sed necessariò in primis viis subsistat, & cum sibi, tum quotidie affluenti humori seroso aditum ad viscera intercludat.

Tandem ad hydropem excitandam facit *ῥῆμα* illud & æstus in venis illis circa lienem, ob quem ille avidius plus attrahit, quam ut iterum euacuare possit, qui simul sitim excitat, in qua si à bibendo æger sibi non temperet, facile plus bibi quam euacuari potest.

Paracelsicorum de hydropis generatione opinionem quod attinet, saltem illi resolutum causam hydropis statuunt; Verum negandum quidem non est, humorem illum, qui in hydrope abundat, esse salum: Verum hoc falsum est, quod in corpore antea coagulatum illud sal fuerit & postea resolutum. Etenim humor aquosus hic, ut dictum cum cibo & potu ab homine hauritur, & in primis viis cumulatur, ob causas modò dictas, & semper liquidam naturam habuit, nunquam verò in corpore concretus fuit, ut sal resolutus meritò appellari possit.

Circa causas tandem & hoc notandum, quod abdomen in Ascite rarè à sola aqua distenditur, sed plerumque flatûs aliquid illi admiscetur. Qua ratione autem status generentur, dicitur postea de hydropes tympanite.

Paracelsicorum  
de generatio-  
ne hydropis  
opinio.

Abdomen ra-  
rè à solâ  
aqua disten-  
ditur.

*Differentia.**Differentia.*

Ex his, quæ hæcenus de causis hydropis Ascitæ dicta sunt, apparet, non enim ejus esse differentiam. Et enim non temper lienis, nec hepatis, nec vasorum, quæ chylum ad hepar & lienem vehunt, vitio hydropem produci diximus, sed sæpe his omnibus partibus saluis, in aliis partibus, ut in renibus, vtericibus, vesica, testibus muliebribus, in abdomine vase alicubi aperto, & quo serosus humor in abdominis cavitatem destillare potest, hydrops generatur, ut antea dictum.

Causæ continentis etiam quædam est varietas. Plerumque enim aqua illa est pallida & citrina; & urinam refert, unde etiam *das gelbe Wasser* nominant. Carolus Pifo tamen & Marcellus Donatus, de *histor. medic. mirab. lib. 4. c. 1*. luteam & viridem observauit, & Christophorus Guarinonius, *consult. 194*. flauam in nigrum vergentem; Guiljelmus Fabricius, *cent. 2. observ. 57*. loturæ carniū recens maceratum similem; Scholiographus, *ad cap. 39. lib. 1. de intern. morbis Hollerij* planè truentam, & loturæ carniū saturatæ sanguine similem. Præterea aqua hæc nunc majore, nunc minore quantitate abundat, unde abdomen nunc plus, nunc minus intumescit.

Est etiam hydrops à colliuatione seu subitaneus illè hydropis status, cujus Galenus, *3. de sympt. caus. cap. 2.* & Petrus Salius Diuersus, *de affect. part. cap. 9.* mentionem faciunt. Quæ duæ differentię postremæ etsi primariæ non sint, & propterea plurimi nomine hydropis non dignentur; tamen ob particulares, quas habent, causas, & curandi rationem à primaria illa specie, de qua hic agimus, discernendæ sunt. Sunt & accidentales differentię, ut quod nunc venter tantum, nunc cum ventre scrotorum intumescit; nunc aqua saltem venter repletur, nunc simul status adest, unde hydrops Ascites alius est exquisitus, alius minus exquisitus; item alius est cum febre, alius sine febre; alius recens, alius inueteratus; alius per se incipit, alius alteri morbo succedit.

*Signa Diagnostica Hydropis in genere.**Signa hydropis in genere.*

Communis est omni hydropi pedum tumor, teste Hippocrate & Galeno, *2. prognost. 2. & 3.* quia aquosus humor pondere suo deorsum vergit; & pedes loco decliui siti sunt, ac longissimè à corde distant, & suapte naturâ sunt frigidi, ossibusque multis, nervis ac cartilaginibus, pauca verò carne constant. Maxime autem vespere pedes tumēt, & à corporis exercitatione. Adest & spirandi difficultas, & viriolus faciei color. De tumore tamen pedum notandum, in conualescentibus sæpe cum ex acutis, tum ex diuturnis morbis pedes intumescere sine vlllo insigni periculo, modò maturè succurratur. Accidit enim hoc fere à ciborum copia, aut aliqua causâ externa. Nam calor natiuus cum in ventriculo tum in hepate languens, & antecedente morbo labefactus tantum conficere non potest, quantum æger appetit ac assumit, aut etiam quantum corpori alendo opus est. Ideoque in concoctione illa imperfecta vapores crassi excitantur, & crudi ac serosi quid gignitur, quod ad pedes descendit, principio quidem sine insigni periculo, modò victus ratio rectè præscribatur, & calor debilis roboretur: aliàs si nimio cibo viscera continuo onerentur, ac multa cruda ac serosa excrementa cumulentur, hydrops inde generatur.

*Prognostica Hydropis in genere.**Prognostica hydropis in genere.*

1. Hydrops quidem non semper difficilis curatu est, temporis verò progressu augetur vi causarum & symptomatum in singulis hujus mali differentiis. Quæ verò species periculosa sit, de eo autores alij aliter sentiunt. Nos breuiter censemus, anasarcam minus esse pe-

riculosum; cum in eo, ut postea dicetur, virtus minus à naturali statu, quam in aliis hydropis speciebus, recedat, humorque eius continens causâ propius ad sanguinis naturam accedat, quàm aquosus humor in Ascite & status in Tympanite. Præterea Anasarca fit plerumque à crapula, & cibo nimis crasso, ut pueris quandoque accidit, atque exercitio corporis intermisso, quæ causæ minus rebelles sunt. Atque has rationes experientia confirmat, rectèque scribit Leonhard. Iacchimus, in *9. Rhasis*: Ego à iuuentute perpetuò euentus ægrorum omnes observauit, vidique, cæteris paribus, ætate & robore, hydropes, qui Anasarcæ dicuntur, facilius curari. Neque id multum refert, quod plures in Anasarca partes afficiuntur, modò causâ sit talis, ut facile tolli possit. Faltum ergo est, quod scribit Ludovicus Mercatus, Anasarcam & Ascitem ab æquali hepatis vitio provenire, cum, ut antea dictum, & postea *quæst. 1.* dicitur; ab alia causâ ascites, quàm anasarca proveniat. De Tympanite & Ascite res intricatior est. Verum si rem ipsam & causas utriusque hydropis consideremus, tympanitem ascite periculosiorem esse meritò statuimus. Grauiorem enim causam habet tympanites, quàm ascites, ut postea dicetur. Aliàs pro varia circumstantiarum ratione fieri potest, ut ascites tympanite sit grauior. E. g. Si scirrhus conjunctus sit cum hydropē, quicumque etiam sit, curatu non solum est difficilis, sed impossibilis. Ideoque ne fallamur, comparatio semper inter similia faciendâ, & omnes circumstantiæ perpendendæ.

2. Omnis inueteratus hydrops, & qui habitum hepatis jam corrumpit, est periculosus, teste Aërio, ut & qui à scirrho hepatis existit. Facilius curatur, qui ab obstructione & à cibi multitudine, vel à suppressis mensibus ortum habet, & qui à profluvio sanguinis, nisi extrema accesserit refrigeratio.

3. Hydrops à duro lienis tumore minus periculosus est, quàm à duritie hepatis, teste Auicennâ.

4. Difficilior hydrops est, si ex alio morbo corpus labefactum comprehendat. Breui enim homo moritur alio morbo diu afflicto. At ubi etiam alius fluida fuerit, citissime moriuntur, & sentientes & loquentes. Hippocrates, *4. de morb. in fine.*

*Signa Hydropis Ascite.*

In Ascite abdomen paulatim intumescit, hinc & pedes & scrotum: interdum tamen ab inferioribus tumor incipit, æger de latere in latus conuersus murmur & fluctuationem quasi aquæ sentit, tumorque latus, in quod decumbit, sequitur. Magnitudo abdominis maior est; Superiora verò gracilia redduntur & contabescunt, nisi quod ad extremum manus interdum inflantur, cordis & corporis calore paulatim labefactato. Urina pauca & ferè crassa est; quia seri parum ad vias urinæ transit, & paucum illud diutius ibi subsistit. Pulsus, secundum Galenum, *4. de causis pulsuum cap. 24.* est parvus, crebrior, subdurus, cum quadam tensione.

Malo crescente dispnoea plerumque accedit insignis, & tanta, ut ægroti erecti sedere cogantur, ob aquæ copiam diaphragmati incumbentem, præcipue cum æger decumbit: Sitis plerumque ægrum malè cruciat, & quod plus sunt potæ plus sitiuntur aquæ, quod accidit à serosi & salii humoris in abdomine copia, à quo & febris sæpe excitatur continua & lenta. Serosus enim ille humor diutius in abdomine contentus falsedine & acrimonia sua, quam partim ex natura sua habet, partim ex aliorum humorum admistione & corruptione, ob diuturnam in abdomine moram acquirit, viscera, hepar, lienem, renes, intestina, omentum, mesenterium, quæ omnia in aqua illa fœtidâ & cadauerosum quasi odorem spirante natant, corrumpit sensim, & putrefacit, unde in actionibus naturalibus varia symptomata & lentæ febres originem habent.

Causa

Causarum verò signa quod attinet, omnino diligenter considerandum, unde malum originem habeat, non solum prognostici ergo, sed & curationis gratiâ, quæ omnino partem affectam respicere debet. Frustra enim soli hepatis adhibentur medicamenta, cum ab alia parte affecta principium ducit hydrops. Hippocrates, 2. prognost. aph. 2. & 3. & in Coacis lib. 6. s. 2. aph. 27. & 28. sec. distinct. Hollerij, qua ratione hydrops ab hepate & liene discerni possit, docet. Loquitur tamen ibi solum de hydrope, qui morbos acutos & febres arden-tes sequitur. Quibus, inquit, ex ilibus ortum habet hydrops, iis pedes intumescunt, & diuturna alui proflu- uia comitantur, qua neque ventrem inaniant, nec dolores soluant. At quibus ex hepate, tussis facile fit, pedes tu- ment, alui dura reddit, & ea vi, tumores circa ven- trem fiunt, modo sinistra parte, ique rursum quiescunt. Tumor quidem pedum omni hydropi communis est; alui verò siccitas, ut & tussis arida, separat hydropem ab hepate, ab altero, qui est ab ilibus. Nam proprium & peculiare hydropis ex inflammatione & æstu vena- rum & partium in ilibus est alui profluuium perti- nax, quod dolores non soluit, succrescente noua ca- cochymia ob causam pertinacem. Prouenit autem hoc ob imbecillitatem venarum, quæ alimentum ad se trahunt; deinde ob alimenti corruptionem & con- tinuam biliosi excrementi euacuationem, cum à putre- dine, tum æstu intestini jejuni & mesenterij. Quibus accedere potest obstructio ab humoribus putridis vel inflammatione, ob quam distributio alimenti im- peditur. A profluuium tamen nec tumor ventris, nec dolor imminuitur; cum internus calor & intempe- ries hectica permaneat, quæ medicamentis purganti- bus nimis exhibitis non solum imminuitur, sed eo- rum vsu mors ægro sæpe acceleratur. Et quia dia- phragma pars affecta comprimit, tussis illa arida adest.

Si autem hepar calida dispositione affectum hydro- pis causa sit, tussendi cupiditas adest, vel hepate dia- phragma propter tumorem comprimente vel detra- hente propter grauitatem. Alligatur enim hepar fibris quibusdam diaphragmati, quibus deorsum reuulsis vnâ diaphragma detrahitur, unde difficultas spirandi & tus- sicula inanis excitatur. Aliàs etiam tussis in hydrope excitari potest, cum desperato hydropi ea superuenit, materia præ copiâ è ventre inferiore per occultos mea- tus in cavitatem abdominis penetrante. Deinde excre- menta sunt pauca & sicca. Venter enim, ut in progn- osticis dictum, nihil deiecit, nisi dura quædam, & coactus necessitate, & ut in Coacis lib. 7. sect. 2. aph. 6. ait, qui- bus à morbo aliquo hydrops superuenit, iis alui sicca, & stercorei caprino similia egerunt, cum colligatione mucosa & urina non bona. Nam eorum, qui in hoc affectu diu morantur in aluo, pars serosa in abdomen mittitur, re- liqua à caliditate hepatis exurit & induratur. Talia verò excrementa non facile locomouentur & exer- nuntur, nisi medico aliquid moliente & clystere vel- licante.

Verum tutissimum est, in hydrope causas, quæ præ- cesserunt, omnes diligenter considerare, siue sint exter- næ, siue sint morbi & eorum causæ. Etenim si quis aquam frigidam vel alium potum auidius exhausserit, eam in primis viis subsistere & hydropis causam esse credendum. Ita si quis quartana laborauit diuturna, in liene vitium esse, credibile. Scirrhi etiam viscerum suis signis cognoscuntur: sed maturè explorandi, ante- quam venter valde intumescat, & tumor impediatur, ne hypochondria tactu explorare possimus. Ita si quis alios etiam morbos perpendit, quos æger, antequam in hydropem incidit, perpeffus est, facile etiam agnosce- re primariam hydropis causam.

Et ut reliquarum causarum & hinc dependentium hydropum (quos tamen aliàs hinc explicare propositum non est) signa addamus, si à vase visceris alicuius rupto proueniat hydrops, excretio sanguinolenta, vel vomitu-

tus sanguinis præcessit; Si à rene exulcerato sit hy- drops, in vrina aliquid puris interdum apparet, mictio, quam in cæteris causis, longè parciore est, & sæpe par- cissima, præsertim si vterque ren exulceratus sit, cum maxima vrinæ pars in abdomen destillet, minima ad vterque perueniat.

Si ab vterque rupto sit hydrops, ut in calculi à reni- bus exturbatione, dolor insignis ea parte perceptus fuit, & malum hoc tum subito oritur.

Si ab alia parte in abdomine affecta & serum in ejus cavitatem fundente sit hydrops, signa ejus partis affe- ctæ adfunt.

#### Prognostica Ascite.

1. Iuuenes & robusti facilius sanantur, quam senes & qui sunt debiliores, quibusque facultas naturalis læguet. *Prognostica Ascite.*

2. Hydrops facilius curatur in seruis, quam in libe- ris; quia cum desideret famem, sitim & multa alia tæ- dia, longamque patientiam, promptius succurritur his, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi tem- perare non possint, ad salutem perducuntur. Celsus, lib. 3. cap. 22.

3. Omnis hydrops à duritie lienis minus periculo- sus est, quam à duritie hepatis, teste Auicenna, ut ante etiam dictum; quia lien minus princeps membrum est, quam hepar.

4. Omnis hydrops si ex acuto morbo existit, malus est. Non enim sedat febrem, sed dolorem admodum infert, ac mortem. Hippocrates, 2. progn. aph. 1. Id quod accidit, quia viscera absumpto humido radicali frigi- dam & hecticam intemperiem, quæ corrigi non potest, contrahunt.

5. Omnis hydrops grauis est & curatu difficilis, eo- que difficilior, quod magis inueteratus.

6. Quibus hepar aqua refertum erumpit in omen- tum, iis venter aqua impletur & moriuntur. 7. aph. 55. Quo modo id fiat, supra dictum, & quæst. 3. dicitur. Cumque pars hæc imbecillior sit & ignobilior, facile corrumpi potest à serosa illa humiditate. Itaque mors sequitur, accedente ad priorem calamitatem hepatis diu & insigniter affecti nouâ illâ, omenti scilicet cor- ruptione.

7. Neque huic aphorismo contrarius est alius, 14. sect. 6. ubi scribit Hippocrates: Ab aqua inter cutem habito, si aqua, quæ in venis est, in ventrem conflue- rit, morbi sit solutio: quæ sententia etiam in Coacis re- petitur, aphor. 457. in Codice Foesij, seu in 1.6. sect. 2. aph. 32. in Hollerio, dum scribit; incipiente hydrope alui profluuium sine æmilia seu cruditate proueniens mor- bum soluit, & ibidem aph. 61. (Foesij) seu 77. (Hollerij.) His, qui hydropem circa venas collegerunt, erumpente aquâ in ventrem soluitur. In illo enim aphorismo per ventrem intelligitur abdominis cavitatis & capacitas, in qua si aqua retineatur, mors sequitur, etsi non semper, plerumque tamen, præcipue si omentum corrumpatur. In isto verò per ventrem accipitur alui & intestina, per quæ si aqua euacuetur, bonum. Spontanea enim, ideoque utilis est hæc euacuatio, dummodo nullum vi- tium in visceribus relinquatur, ut scirrhus, substantiæ corruptio, ob quam aqua de integro colligitur. Euacua- tio enim quæcunque siue eam ars, siue natura molitur, fieri debet saluis visceribus, & antequam viscera gra- uius læsa sint, & vires morbi diuturnitate fractæ, seu, ut idem in præphet. ait, εὐσπλαγχνος esse oportet, qui ab hydrope seruari debent; aliàs si cum scirrhus vel hepa- tis corruptione adsit alui fluxus, citissime moriuntur Ascitici, secundum Auicennam, & Galenum, 2. ad Glauic. 5. Et idem Auicenn. scribit, constrictio anhelu- tus & solutio vëtris in tribus diebus motrè significat.

Vias autem, per quas hydropicorum aquæ ad aluum feruntur, quod attinet, confluit aqua ad aluum, vel quia falsa humiditas venis adhuc inclusa per aluum ita purgatur,

purgatur, vel aqua in medio peritonæi & intestinorum aut omento collecta exugitur à venis melsaraicis.

8. Qui lienosi Dysenteria corripiuntur, iis dysenteria diutius durante hydrops aut lienteria superuenit, & moriuntur 6. aph. 43. Lienosi autem vocantur, quibus liex longo tempore infarctus copiâ humoris melancholici & flatuum tumet sine scirrho. His enim si dysenteria moderatè accidat, affectio lienis tollitur, materiæ *μεταστέλλεται* & per intestina euacuatione, Vbi verò dysenteria diutius durat & prauis humoris transitu caloris inpati *συμμερίζεται* in intestinis & visceribus perierit, accedentibus nouis morbis moriuntur, & quidem aut hydrope, ab hepatis, lienis & vicinarum partium cum intestinis consensu; aut lienteria, ob labefactata intestina, atque ita fractis diuturnitate plurimum morborum viribus mors sequitur.

9. Quanto lotij minus redditur, tanto deterior est hydrops; quia serum in ventrem confluit & ferè nihil ejus ad renes penetrat. Hinc etiam Hippocrates, in *Coacis aph. 456. sec. distinct. Foesij, seu lib. 6. f. 2. aph. 22. Holler. Hydropico febriculis urinæ pauca turbataque lethale*. Et tum demum secundæ valetudinis spes est, inquit Celsus, lib. 3. cap. 22. cum plus humoris per urinam, (quam idèd, vt & potum metiri oportet) excernitur, quam assumitur. Ideoque an venter assumptis quibuscunque medicamentis decreseat, eum quotidie lino metiri, & qua comprehendit aluum notam imprimere præcipit, postero die videre, si plenius corpus sit, an extenuetur. Id enim quod tenuatur, medicamentum sentit; quod si contrarium eueniat, paribus cæteris, inter mala signa numeratur.

10. Hydropi si tussis superueniat, malum 6. aph. 35, & 7. aph. 47. Cum a. triplici de causâ tussis hydropicis accidere possit, vel ex catarrho, vel ex compressione aut detractione diaphragmatis, vel ex aqua in thoracem penetrante, de vltima hac causâ aphorismus hic accipiendus. Vbi enim aquosa humiditas in tantum creuit, vt in thoracem penetraret, & asperas arterias iam occiperet, & inde tussis superueniat, periculum est, ne haud ita multo post homo suffocetur.

11. Abscessus vel maculæ in cruribus erumpentes lethales. Ita Hippocrates, 7. epid. scribit: *Bion, cum multo tempore aquâ inter cuiem laborasset, multis diebus cibum auersabatur, & urina stillicidio vexabatur, Ad genu sinistrum oborto abscessu & suppuratione factâ mortuus est. Ctesiphon post magnam febrem ardentem aquâ inter cuiem correptus est, & antea cum hydrope & lienis tumore laborasset, valde oppletum est scrotum, crura & abdomen. Sub finem tussis & suffocationes ad noctem contingebant, ex pulmone magis, velut pulmonis vitio laborantibus. Tribus aut quatuor ante mortem diebus rigor, febris corripuerunt, ad femur dextrum parte internâ iuxta venam mediam, qua ab inguine fertur, collectio velut ex igne agresti oborta est, cum rubore aliquantulum linido. Ad noctem oris ventriculi dolor, neque multo post vox defecit, suffocatio cum sterore & mortuus est.*

12. Hydrops, qui leuatus remediis integrè renascitur, desperatus est, in *Coacis aph. 460. f. 36. loco antea allegato*. Cum enim ille tantum hydrops curabilis sit, qui sit sine scirrho viscerum, sine substantiæ eorundem corruptione, sine marasmo & hectica intemperie viscerum, si tale vitium adsit, frustra vel aqua euacuatur vel flatus discutiuntur. Et si verò venter detumescat, & melius æger per aliquod tempus habere videatur, causâ tamen malidurante, recrudescit malum. Et vt multa paucis coplectamur, si æger *εὐσταλαχνοῦς* sit & bonis visceribus ac constantibus viribus, cibum libenter assumat, facili concôquat, nec ab eo ingesto affligetur, bene spiraret, non doleat, tussis absit & sitis, (si non planè, tamen magna ex parte) lingua, ne à somno quidem, quod aliàs fieri solet, inarescat, alius medicamentis celeriter moueatur, extra hanc causam non admodum citata sit, & naturaliter excernat, vrina pro victus ratione

mutationem subeat, lassitudinis expers sit; Si hæc omnia adsint, bene se habet: Si plurima, aliqua conualescentiæ spes est: si nulla, res desperata est.

13. Et vt de reliquis causis quædam addamus, si à renum & vterum vel venarum melsaraicarum, vel vesicæ læsione, disruptione, exesione, exulceratione sit hydrops, plerumque lethalis est.

14. Hydrops à colliuatione difficulter curatur. Cum enim vires omnes exsoluantur, corpusque languescat, à tam magno morbo ægrum seruare difficile est.

### Indicationes.

Ex his cum pateat, non omnes hydropicos posse sanitati restitui, sed eos saltem, qui sunt *εὐσταλαχνοῦς*, eumque tantum hydropem posse curari, qui à causâ, quâ tollere in Medici potestate est, originem habet, Medici est, non omni hydropico salutem promittere. Quis enim humidum natium absumptum, caloremque extinctum vel dissipatum restituet, vel partem scirrhi inueterato obseisam, vel corruptam sanitati reddet, vel pertinaces & inueteratas obstructions liberabit? Ideoque curatio maturè instituenda, & dum adhuc viscera integra sunt, ægrique *εὐσταλαχνοῦς*, & quamprimum signa hydropem minantia apparent, tensio nimirum hypochondriorum sentitur, vrina potus quantitati non responderet, sed parciore, quam par est, redditur, dyspnœa aliqua percipitur & pedes intumescere & cachexia aliqua se prodere incipit. Verum hanc in partem non tam Medicorum, quam ægrorum culpâ peccatur, qui non nisi vbi malum jam incrementum sumpsit, Medici opem implorant. Cum verò nec hi deserendi sint, indicationes, ad quas in curando Medicus respectum habere debet, in promptu sint.

Cum ergo hydropis Ascitæ causâ continens & proxima sit serum in abdominis cavitare collectum, danda opera, vt id omnibus, quibus fieri potest, modis euacuetur: idque quod adhuc in abdomen confluit, aliò auertatur, simulque euacuetur. Deinde vt causâ, ob quam aqua colligitur, tollatur. Quæ quidem indicatio in curatione facile principem locum obtinet. Frustra enim aqua euacuatur, cum causâ, ob quam statim noua colligitur, persistit: Compertumque sæpe est, aquas hydropicorum ferè euacuatas fuisse, morbum tamen de integro rediisse ob causam reliquam.

Atque hæc est maxima causâ, quod pauci hydropici sanitati restituantur; cum plurimi saltem de aqua tollenda sint solliciti, & medicamentis illis fortioribus viscera saltem debilitent. Quæ verò causâ sit, ob quam aqua colligitur, non satis diligenter inquirant, neque illi, vt par est, obuiam eant. Quamuis autem in curatione causæ eo ordine sint tollendæ, quod sese in generatione mutuo consequuntur, atque ita à causâ, ob quam aqua colligitur, ablatione curatio inchoanda videatur, idque omnino imminente hydrope faciendum sit: tamen si hydrops jam confirmatus sit, medicamenta pro causis tollendis necessaria frustra & sine fructu exhibentur, si aqua in abdomine adhuc remaneat, & aqua in abdomine restitans hepar & viscera in dies magis debilitet & corrumpat. Ideo vt aqua collecta primò tollatur, danda opera, nisi, vt dictum, hydrops planè recens aut potius incipiens sit. Tum enim, modò causæ succurratur, natura vitiosos humores absumere & discutere solet. Virium quoque habenda est ratio, vt idoneo victu illæ conseruentur & roborentur.

Et quidem causam conjunctam quod attrinet, eadem illam tollendi in omni Ascite est ratio. Causæ v. ob quam ea colligitur, cum variæ sint, & feri prouentus & collectio à variis causis proueniat, singulis etiam idonea remedia opponenda. Si ab hepate valde intemperato malum hoc proueniat, quod, vbi calido nativo destituitur, vt non bene sanguificat, ita serosum quod est in

Indicationes.

Cum pauci hydropici sanitati restituantur?

id obstat  
plurimè.



in chylo etiam non attrahit, commune hoc est, ut eius calidum nativum conferretur & instauretur; caussis vero, quæ illud quocunque modo absumunt, obuiam eatur: quæ cum diuersæ esse possint, diuersa etiam hic remedia requiruntur. Etenim si hepar, à quacunque etiam causa, nimis refrigeratum sit, calefaciendum. Si vero à caliditate ejus humidum absumatur & calor dissipetur, calefacientia & siccantia non tuta sunt, sed moderatè refrigerantia, aut temperata potius, & omnino calidum nativum absumptum instaurantia adhibenda. Si vero obstructio in caua hepatis parte adsit, ea aperienda. Eadem ratio est, si ob lienis & vasorum ad lienem tendentium, quod frequentissimè fieri puto, vitio hydrops accidar. Nam si constitutio harum partium, earumque temperies & calor destructa sit, ob quam serum, ut debent, ad se non trahunt, naturalis constitutio & temperies hisce partibus reddenda, & si à refrigerantibus calor extinctus sit, calefacientia usurpanda; si vero ab intemperie calida dissipetur, & incendium aut *καύμα* aliquod sit in primis viis, refrigerantia moderatè & humores vitiosos abstergentia adhibenda. Si vero obstructiones adsint, eæ aperiendæ.

## Curatio.

Qua ratione autem ista omnia perfici possint, jam dicendum. Prius tamen in genere monendum est. 1. Cum chronicus hic sit morbus, longiore tempore usurpanda esse remedia, neque ab eorum usu statim desistendum. 2. Varianda tamen esse remedia, ne natura vni assuescat. 3. Interdum etiam temporis spatium aliquod interponendum & à medicamentis cessandum, ut vires, & morbi & medicamentorum multitudine labefactæ, præsertim circa seri euacuationem, recolligantur, ut postea fortius contra morbum pugnare possint. 4. Ad fortiora medicamenta non deveniendum esse, nisi mitiora non profuerint. 5. In forma medicamentorum etiam hoc observandum, ne villo modo ijs quantitatem aquosi humoris augeamus. Ideoque si euacuantia, præcipuè diuretica, exhibeantur formâ potulentâ, neque tamen inde copia urinaugeatur, à potulentorum usu desistendum esse, & forma solida potius medicamenta exhibenda.

Causæ ergo continentis seu humoris aquosi in abdomine collecti, & id distendentis euacuationem quod attinet, sit ea vel sensibiliter, in primis per cathartica & abdominis apertionem, seu *παρακέντησιν*, vel insensibiliter per *αδελον διαπνοήν*. Quanquam enim etiam per vias & sudores sensibiliter materia euacuetur: tamen iis modis potius aqua, quæ in ventrem confluxura est, quam quæ in abdomine continetur, euacuatur. Cathartica cum vel per superiora, vel per inferiora educant, præstat hic aquam per alium, quem vomitum euacuare; quædam tamen, quæ utrumque præstant, non incommoda sunt, quæ postea purgantibus inferemus.

Materiæ vero euacuandæ coctionem expectare vel moliri opus non est, utpote quæ nullam coctionem recipit, & per se satis tenuis & ad fluendum apta est; & propterea potionibus multis coctionem procurantibus exhibitis ventriculus debilitatur, venter repletur & aqua augetur. Si quæ tamen crassior materia circa primas vias hæreat, illa abstergenda & incidenda ac præparata euacuanda: In quem finem exhibita medicamenta aliàs in Hydrope utilia sunt.

Præparant: Radices Graminis, petroselini, asparagi, absinthii, eupatorii, cuscute, capill. ♀. prassium, & ex his composita. E Chymicis, acidum, cremor & crystalli tartari, tartarum vitriolatum.

Purgant; Pilulæ de rhabarb. diacarthamum, diaphænicum & similia.

Quæ autem humorem aquosum purgant; alia simplicia sunt, alia composita, & simplicia quidem alia mitiora, alia vehementiora.

Mitiora sunt *Mechoacanna*, quæ à Drach. j. ad Drach. ii. exhibetur, & interdum vno atque altero grano digrydij acui potest. Datur commodissimè in pulvere cum aliquot granis zingib. Paratur etiam ex ea extractum.

Fortior vero est, & in hydropo efficacissima radix *Gialapa* vel *galapium* dicta, quæ pro Mechoacanna nigra habetur, & extra nigricat, intus rufescit, gustu non est injucunda, fortius tamen & potentius, quàm alba, serofos humores purgat. Datur à Scrupul. i. ad Scrupul. ii.

Efficax est & *Sambucus* & *Ebulus*, præsertim succus eorum: fortior tamen est ebulus.

Datur succus Ebuli è radice vel mediano cortice contuso, & cum aqua hordei vel decocto passularum cum momento cinamomi vel nuc. moschat. ne ventriculo noceat, expressus, non coctus, (coctione enim vis purgandi minuitur, ut rectè Fernellius, lib. 5. meth. med. cap. 12. docet) ab Vnc. i. ad Vnc. sem.

Exprimitur quoque ex acinis baccarum sambuci oleum, ut ex semine lini vel aliis, quod Drach. j. pondere exhibitum potenter purgat.

Paratur etiam è granis ebuli, probè maturis & in vimbra exsiccatis, extractum, quod in Hydrope utile est.

Flores quoque Persicorum sicci & in iusculo cocti, vel M. i. eorum in vino per noctem maceratus aquam educunt. Sic & conserua eorum & syrupus, quorum hic ad Vnc. ii. illa ad Vnc. i. homini robusto exhibetur.

Pertinet huc & Gummi illud Gossæ, seu chittagemu, dictum, quod nonnulli etiam gummi de Peru appellant, cum tamen non ex Peru afferatur, sed Sinarum regione. Gummi quidem vocatur, sed minus propriè; cum potius succus concretus & inspissatus sit plantæ cuiusdam peregrinæ. Nonnulli putant esse succum, cuius mentionem facit Carol. Clusius, lib. 4. exor. cap. 8. num. xj. Alij arbitrantur esse succum è floribus Ricini Indici expressum atque exiccatum, cuius aliàs etiam in hydropicorum aquis educendis insignis usus est. Educit autem egregiè aquas hydropicorum. Vomitus tamen quandoque etiam mouet, verum non semper, præcipuè si macis vel ejus oleum, vel spec. atomat. rosat. aliquid addatur, aut si in marmore cum spiritu salis vel vitrioli teratur & præparetur. Dosis est à gr. v. ad gr. xij.

Exhibetur vero variis modis, vel cum syrupo cinamomi Drach. ii. aut Drac. iii. vel cum conseru. rosat. viol. tunicis Vnc. sem. addita gutta j. olei cinamom. vel cum cremore tartar. Scrup. j. in iusculo carnis, vel cum spec. diambra. aut aromat. rosat. gr. iiii. cum syrupo cinamomi in pilulas formatum.

Ricini etiam illius Indici granis, seu semine vno aut altero excorticato nonnulli hic pro hydragogo hodie vtuntur, quæ quidem grana Tili appellant. Paratur etiam inde extractum.

De Rhabbarbaro controuersia est apud authores, an in hydrope conueniat, de quâ postea questione 4. dicitur. Et verum est, id non tam serofos humores euacuandi vim habere, quàm alia medicamenta hydragoga. Reliquis tamen non sine commodo admiscetur, cum insignem hepar roborandi vim habeat, & in primis usurpandum, cum biliosa colluies in hepate hærens ejus substantiam labefactat, vel etiam in primis viis cumulata est. Quod sit sæpe post icterum diuturnum, & febres longiores, atque alias causas bilem in hepate & venis mesaraicis cumulantes.

Brassica marina, Soldanella vocata robustioribus paulo exhiberi potest, quam aquam ducere salubriter Fernellius, citra molestiam purgare, & præterea hepar roburare Paschalius, aquam ducere copiosè & faciliè, Massarias scribunt. Verum adeo ventri aduersum esse medicamentum tradit Mercatus, ut minus damnum ipsi videatur, carere isto præsidio, quam frui eius malefico effectum, cum & ventrem subuertat, & dysenteriam nonnunquam exciter. Si tamen alia admisceantur, quæ visceræ

Mitiora.  
Mechoacanna.

Gialapa.

Sambucus.  
Ebulus.Oleum è baccis  
sambuci expressum.  
Extr. ebuli.

Flores Persicorum.

Gummi  
Gossæ.

Grana Tili.

An Rhabbarbarum in hydrope conueniat?

Soldanella.

Curatio.

Præparatio.

Prognostica.

Simplicia.

viscera roborant, sine insigni violentia aquas educit. Cujus succus datur à Drach. j. ad Drach. i. sem. in decocto ad Vnc. i. sem.

Quia verò, ut dictum, ventriculo noxia est, addenda necessariò corrigentia; semina odorata, anisi, fœniculi, spica, spec. aromat. rosati, & similia, vt;

℞. Soldanella Vnc. sem. sem. anisi Drach. sem. spica Scrup. sem. Coquantur.

Colaturæ ℞. Vnc. v.

Dulcoretur saccharo,

**Scammonij.** Potest & locum suum habere *Scammonium*, quod etiam si bilem purgat, satis tamen copiosè etiam serofos humores educit. Præparatur variis modis, vt passim notum. Commodissimum est extractum seu resina Scammonij, in Institut. pag. 1390. proposita.

**Fortiora.** Fortiora verò sunt succus *Iridis caelestis*, seu nostratis, *Iridis succus*, qui potenter & copiosè serofos humores euacuat. Datur succus è radice recens expressus ad Vnc. ii. vel iii. vt Institut. lib. 5. par. 3. sect. 1. cap. 5. dictum, cum manna, melle, decocto passularum, & aliis mucilaginosi, vt & tragacantha. Nam per se nimis acris est, & fauces vrit ac vellicat. Erastus quoque cum vitello oui exhibet, & aperto ouo in parte acutior albumen euocat, replèrque locum succo iridis, & cum vitello oui miscet ac calefactum exhibet. Scribit idem Erastus, se curasse aliquando pauperem cum incredili ventris, pudendorum & pedum tumore, alterna succi iridis & absinthij exhibitione, pedum scarificatione, & sudorem prouocantibus balneis, præter suam & aliorum expectationem.

**Conserua.** Paratur etiam ex radice Conseruæ efficacissima, cum f. q. mellis. Vtilis est & aqua è floribus purpureis Iridis data pondere Drach. vj. vel Vnc. i. cum spec. diatrion fantal. Scrup. j. cinamom. gr. vij. vt & fecula radices Iridis.

**Esula.** *Esula*, cujus & radices cortex à gr. v. ad gr. x. & lac à g. ij. ad g. vj. exhibetur. Sed præstat ejus Extractum, de quo in Institut. lib. 5. par. 3. sect. 3. cap. 5. & Quercetanus, in pharmac. restit. cap. 14.

**Gratiola.** *Gratiola* & ipsa aquosos humores educit, sed non sine corporis perturbatione & vomitu. Quapropter, vt ferocia ejus corrigatur, cinamom. sem. anisi, fœniculi & similia addenda. Datur in puluere Scrup. j. in decocto ab Vnc. sem. ad Vnc. j. sed extractum omnia commodius præstat.

**Elaterium.** *Elaterium* seu succus cucumeris asinini tam feliciter aquam, quæ in abdominis cavitatem affluxe, quam vix aliud medicamentum, euacuat. Neque cum tanta molestia & labore, vt plurimi existimant, sicut hâc de re scribit Massarias, qui hoc medicamento supra 30. annos feliciter & frequenter vsus est. Quia tamen aliquid vehementiæ habet, cautè vsurpandum, & in dosi supra gr. vj. non exhibendum. Corrigendumque tragacantha, bdellio, psyllio, cinamomo. Vel miscendum pilulis mitioribus, vt mastichinis, aloephanginis, de rhabarbaro.

**Mexerei folia.** *Mexerei folia* macerata aceto vel cydon. succo dantur formâ pulueris à g. v. ad x. cum mastiche & spica. Infunduntur à Drach. sem. ad Drach. j. Coqu. à Scrup. j. ad Scrupul. ii. in pingui jure, addito saccharo & cinamomo.

**Euphorbium & Sagapenit.** Tandem huc pertinent *Euphorbium* & *Sagapenum*. Illius dosi est à g. ij. ad x. Hujus à Drach. sem. ad Drach. j. non neglectis corrigentibus; cum aliàs vehementiora sint & visceribus inimica.

**Squama aris.** Sunt & ex mineralibus & Chymicè parata medicamenta, quæ aquas Hydropicorum educunt: Vt sunt, *Squama aris* & *as vstum*, quod jam olim quidam vsurparunt, ac Bæsdorpius Carolo V. Hydropico exhibuit, vt refert etiam Forestus, lib. 19. obseru. 37. in Schol. Fiunt inde cum caryophyllis & cinamomo ac melle pilulæ, quæ dantur à Drach. j. ad Drach. j. sem.

*Oleum Antimon.* Flores ♂, pilulæ ex iisdem, de quibus in Institut. *Crocus metallorum*, ♀ dulcis, ♀ visa preparatus & longa digestionē fixior redditus, quo in iis, qui fuerint *ευσπλαγχνος* hydropem curatum fuisse scio cum aliàs, si non ritè præparatus sit, & incidat in viscera debilia, & mortis esse solear, ejusque rei exempla non ignota sunt.

*Arcanum corallinum* Parac. turbit. minerale *Aurum Kegli*: quæ omnia cautè vsurpanda. Et licet pleraque alium & vomitum moueant, in hydropicis tamen minus vomitum cient, sed ferè tantum per alium purgant; ideo proculdubio, quod in tanta aquosi humoris copia ipsæ partes solidæ à medicamentis istis non ita vellicari possint, & quod falsa aqua volatilitatem figit, sicut aliàs videmus, si aliquandiu talia cum sale vel spiritu S. is vel aqua salis digerantur, vim vomitoriam amittere.

Composita autem sunt spec. diacarth. diaturbith. c. rhab. & hiera picra, quibus duobus iunctis (sp. diacarth. & hiera picra) ab hydropis rudimentis plurimos se vindicasse scribit Heurnius, lib. 2. med. prax. cap. 26. Hydragogum eiusdem ibid. Hydragogum minus Fernelij, quod mitius est, & propterea tutius exhibetur; Majus, quod fortius est: Hydragogum Renodai, quod habet lib. 2. antidot. f. 1. cap. 12. Puluis ex Soldanella, in Disp. Norimberg. puluis Magistralis Stockstaldij in August. puluis contra Hydropem Erasti, in Disp. Norimb. puluis Hydragogus, in Pharm. Quercetani cap. 17. puluis Hydragogus Heurnij, loco alleg. pilula de Mezereoe Mesue, de Elaterio, pilula ex Esula Fernelij, pilula de Mechoacan. Renod. lib. 2. antid. f. 4. cap. 18. pilula Hydragoga Quercetani, in Pharm. Quercet. cap. 14. Hydragoga Heurnij & Dorncreilij.

Hollerius sequens medicamentum, quod ex Valefco de Taranta & Gordonio habet, commendat.

℞. Succus cucumeris asinini & rad. ejusdem laureol. ires caelestis, absinthij & eupator. an. Vnc. iii.

Subsideant, & aqua quæ supernatat, abijciatur, crafiori verò parti relictæ inspergatur rhabarb. agaric. an. Vnc. sem. spica nardi, sem. anisi, scariola, portulaca, mastich. tragacanth. salis gemme an. Drach. j. mellis q. s.

In vase vitreo agitentur in Sole, vt fiat massa instar Electuarij. Dosis Drach. j.

Electuarium de Soldanella:

℞. Succus iros nostratis Vnc. xij. galanga, Zedoaria an. Vnc. i. garyophyll. nus. moschat. an. Vnc. sem. soldanella Vnc. iiii. mellis q. s.

F. Electuarium.

Aliud ℞. Gummi amoniaci aceto dissoluti Vnc. i. succi glycyrrhiz. Scrup. iiii. pulu. soldanella Drach. i. caryoph. cinamom. an. Drach. sem. spec. diacurcum. dialacc. an. Scrup. sem. diarrhod. abbat. Scrup. i. rochisc. de rosis, de eupatorio an. Scrup. sem. Cum syrup. de coris. citri q. s.

F. Electuarium.

Electuarium de Soldanella D. Nauj.

℞. Cinam. morsu acuti, sem. anisi, fœniculi, schoenanth. an. Drach. sem.

Coqu. in aqua agrimonia & cuscute Vnc. iij. vel aqu. & vini part. equal. in vase duplici clauso.

Colaturæ adde sacchar. canar. ʒ. iiii.

Pulu. Soldanella recentis subtiliter triti, & cribrati Vnc. sem.

F. Electuarium. Dosis Drach. vj.

Vtilia sunt & vina Medicata. Thomas Erastus, part. 4. Disp. contra Paracels. incredibilem aquæ copiam se aliquando euacuasse scribit solius vini chalybeati, & radicem asari vsu in iis, quos compertum habebat ex diuturna splenis obstructione hydropem contraxisse. Idem & hoc vinum commendat; quod multorum annorum periclitatione cum in seipso tum in aliis præstantissimum comperit doctissimus Medicus Muraltus.

℞. Rad.

℞. Rad. quinque aperient. glycyrrh. rasa cortic. rad. cappar. mediani fraxini an. Vnc. i. rad. irid. recent. calami aromat. cinamomi elect. an. Vnc. sem. capill. ♀. ceterach, folior. tamarisci, flor. cordial. an. M. j. absinthij Pontici, cardui benedicti, hyssopi, prassij an. M. sem. ligni guajaci in scobem redacti lb. j. sacchar. albiss. lb. ij. vini generosi libras ciuiles XL.

Coniiciantur omnia in vasculum, & vinum calefactum affundatur, vase acuratisimè obturato maneat per diem vnum atque alterum.

Ipie verò Erastus tale parat:

℞. Absinth. card. benedict. agrimon. asplenij, erica, verbenae, rad. irid. Florët. cort. rad. cappar. rad. polypod. cichor. apij, fœniculi, an. Vnc. sem. fol. sene elect. Vnc. i. sem. soldanella M. ij. vel M. iii. rad. irid. carul. Vnc. ii. turpetbi Drach. v.

Quibus affunde vini generosi lb. xij. & vase clauso per tridui spatium macerentur.

De tali vino alternis diebus vel tertio quoque die poculum vnum mane exhibet, corpore prius valido aliquo medicamento elaterium accipiente purgato. Diebus intermediis Vnc. ii. vel Vnc. iii. succi ablinthij cum saccharo misti, quoties obstructions viscerum suspēctæ sunt, exhibet. Vel absinthij comas præbet.

Platerus tale vinum parat:

℞. Rad. irid. Vnc. i. sem. cortic. rad. sambuc. & ebuli an. Vnc. i. absinth. sicci Drach. ii. fol. sene elect. Vnc. i. sem. carni Drach. j. vini mensur. i.

Coqu. lento igne in vase duplici. Bibat æger quotidie haustum.

Vel ℞. Rad. quinque aperient. an. Vnc. sem. irid. Vnc. i. asari Drach. ii. cort. rad. sambuc. ebuli, dulc. amar. an. Vnc. i. absinth. sicci z. iii. fol. visci querni Drach. ii. flor. genista Drach. i. sem. fœnic. Drach. ii. petrosel. Drac. j. ebuli Drach. i. sem. hedera Dra. ii. fol. sene elect. Vnc. ii. soldanell. Vnc. sem. rhabarb. elect. Drach. iii. spica, schœnanth. an. Drach. sem. Affund. vini lb. viii.

Bibat de eo æger mane singulis vel alternis diebus. Bauhinus hoc habet.

℞. Summis. absinth. cardui bened. an. P. B. agrimon. chamadr. an. P. i. brassica marina P. sem. fol. sene Vnc. ii. rad. ireos Vnc. i. asari, mechoacan. ononidis an. Vnc. sem. calami aromat. Drach. ii. sem. anisi, fœniculi an. Drac. sem. vini albi lb. viii.

Aliud.

℞. Rad. iridis flor. purpur. Vnc. i. sem. helenij, imperad. an. Vnc. sem. gentiana. aristol. rot. dulc. amar. asari an. Drach. ii. cort. inter. sambuc. ebuli an. Vnc. sem. chamadr. chamapith. an. Drach. iii. soldanella Vnc. i. fol. sene Vnc. i. sem. mechoac. Vnc. sem. rhabarb. Drach. iii. cinam. elect. cortic. citri an. Drach. iii. absinth. Pontic. vulgar. an. M. B.

Omnia concisa & comminuta indantur sacco lino & affundatur vini Rhenani optimi q. s.

### Spiritus Aureus Rulandi.

Commendatur & Spiritus vitæ aureus Rulandi, qui plerisque nihil aliud est, quàm essentia trochisci Alhandal.

Commodior hoc loco videtur hæc esse ejus præparatio.

℞. Rad. esula prep. lb. j. epithymi Vnc. vi. rad. polypod. Vnc. iii. zedoaria, zingib. caryophyll. mastich. an. Vnc. i. cinamomi z. B. passularum min. z. i. sacch. alb. lb. j. sem.

Trita infundantur in vase vitreato, in vini alb. Rhen. & vini Malu. an. lb. iii. sem. add. sp. vitrioli Drac. i. Stent per dies 14. in infus. quotidie agitando, postea destillantur, destillatum fecibus reafundatur, & denuo destilletur idque tertia vice repetatur.

### Spiritus Vini Catharticus alius.

℞. medull. sem. carthami z. i. turpetbi, diagrydij an. z. ii. cinam. zingiber. spec. diamarg. fr. an. z. ... cort. citri sicci. Dan. Sennerti Tom. II.

carnis cydon. an. gr. xv. vel z. i. sacch. candi albi z. ii.

Infund. hor. 24. in sp. vini opt. p. s. (ex g. lb. j) in vase vitreo, circulentur aliquandiu, postea filtrentur per chartam emporericam & feruentur ad vsum. Dosis cochl. j. vel Vnc. j. ante pastum aliquot horis.

Iulebus rosatus hydragogus.

℞. Cort. rad. esula, mechoacan. turbit. elect. scammon. an. Vnc. sem.

F. Cum spiritu vini s. a. Extractio.

Deinde cum sacch. albi in aqua rosar. aliquoties decocti lb. j. F. Iulapium. Possunt & aliquot guttæ olei cinamomi & citri addi. Dosis ab Vnc. sem. ad Vnc. i.

Pilulæ de Mechoacanna D. Andrea Döreri.

℞. Mechoacan. z. B. turbit. opt. z. iii. gummi gotte, sem. ebuli vel sambuci, agarici recent. trochisc. an. z. ii. rad. esula prepar. granor. mastich. an. Drach. i. sene, cinamom. acuti, macis, salis gemma an. Scrup. ii.

Pulueriscentur, & cum vino albo Rhenano fiat massa, quæ siccata teratur & succo radic. iridis denuo coagmentetur, arida rursus teratur, & cum syrapi de spina ceruina q. s. fiat massa vsui reponenda, & addendo olei anisi parum.

Pilulæ de Esula D. Georgij Leuschneri.

℞. Trochisc. de esula z. B. aloës z. vi. mastich. Drach. i. Puluerisata excipiantur melle rosaceo, additis olei destillati garyophyll. gr. vj. F. Massa.

Trochisci autem de Esula sic parantur:

℞. Rad. Esul. minor. recent. q. v. purgentur à sordibus & fibris diligenter, & abluantur aqua simplici, postea macerentur in lacte caprino hor. 24. in loco calido. Lacte remoto affundatur acutum vini acerrimum, in quo per noctem semen anisi crasse contritum maceratum est. Stent ita infusa per biduum. Tandem aceto effuso exsiccentur & subtilissimè pulueriscentur. Puluis incorporetur cum vino & paxillo tragacanth. è quo cum guttis aliquot olei anisi formentur secundum artem trochisci.

### Extractum Hydragogum Rulandi.

℞. Rad. cucumer. asinini, curcum. ireos, absinth. Pontici, soldanell. eupator. an. Vnc. i. sem.

Eliciat cum conueniente menstruo tinctura, Cui adde extract. rhabarb. mechoacan. an. z. i. essentia esula z. B. spec. aromat. rosar. diarrhod. Abbas. diacurcum. an. z. iii. (puto legendum z. iii.) magisterij tartari z. sem.

F. l. a. extractum. Dosis à Drach. sem. ad Scrup. iiiii.

Efficax est & hic puluis.

℞. Rad. gualapa Vnc. sem. mechoacan. brassic. marin. sem. ebuli an. z. iii. gummi gotte z. ij. sem. anisi, cinamomi an. z. i. F. Puluis. Dosis Drach. j. cum vino, Vt iste:

℞. Hermodactyl. z. vi. soldanell. z. iii. schœnanth. z. i. lacca z. iiiii. cinamom. z. v. sem. apij z. i. F. Puluis.

### Morsuli de Mechoacanna.

℞. Pul. mechoacan. z. i. spec. diacitri solut. z. v. caryophyll. z. sem. sacch. in aqu. conueniente dissoluti z. viii.

F. Morsuli. Dosis Drach. iii. vel Vnc. sem.

Chymicorum medicamentorum supra facta est mentio. A Tentzelio valde commendatur, Exeg. chymiat. part. 3. sect. 1. Magisterium Lunæ dejectorium, seu Luna purgans hydragoga, quæ ita paratur.

Fiat primò menstruum tale.

℞. Vitrioli albificati lib. ij. salis nitri resinati lb. j.

Destillantur in aquam fortem. Postea.

℞. Luna per Saturnum purgata & laminata Vnc. i. aqua fortis prædicta q. s.

Soluantur in cineribus, & liquor enader cæruleus. Tunc adde Salis nitri fixi absque additione preparati unciam dimid. vel integram. (Sic enim spiritus nitrales melius refiguntur, & in pristinum corpus redeunt.)

Digere in fimo equino vel balneo per mensem Philosophicum. Postea phlegma in B. M. separa, vt vix tertia pars remaneat. Vtrumque serua diligenter.

V V V V

Tertiam

Tertiam illam partem residuam per cucurbitam latam humiliorem in arena igne secundi gradus destilla, per horas tres quatuorve, (melius id succedit per euaporationem in aperto vase ad notas perfectionis discernendas. Quando enim pars baculo exempta albens fuerit, destillandum est.) Refrigerato & fracto vitro inuenies lunam instar alabastrali, aliquando totam nigram, aliquando supernè candidam stellatamque. Lunam hanc in frustula fractam in suo phlegmate antè abstracto per horas 5. vel 6. in B. M. vel arena infunde, solue, putum ab impuro separa, & in loco frigido crystallos collige. De menstruo reliquo extrahe parum aquæ, iterumque in cellam colloca, & totum illud in crystallos conficies. Crystallus lentè exsicca & bene serua.

Circa vsum tamen horum medicamentorum, vt supra quoque monui, obseruandum, talium medicamentorum vsum non nimis frequentem esse debere; cum visceribus noceant, & facultatem naturalem debilitent. Ideoque Trallianus, lib. 9. cap. 2. ait: Satius est paulatim & tuto euacuare, quam festinando perturbandoque vnà cum morbo ægrum è medio tollere. Quapropter quamuis prædicti Authores præcipiant talia singulis vel alternis diebus esse vsurpanda; tamen diligenter perpèdendum, quid vires ferre possint, & num post eorum vsum *ευωπία* aliqua appareat, & nisi vires talem medicamentorum vsum ferant, per longiora intervalla ea exhibenda.

*Clyster.*

Præter interna medicamenta etiam clysteres vsurpare commodum est, ex mercuriali, beta, parietaria, foliis ebuli, soldanella, centauro minore, sem. carthami, fœniculi, cumini, baccis lauri & similibus, vt:

℞. Fol. mercurialis, beta, soldanella, flor. chamamel. an. M. j. centauro minor, M. β. sem. cartham. ʒ. β. fœniculi, cumini, an. ʒ. ii. baccar. lauri ʒ. β.

Coqu. in aqua simpl. pro ℥b. j.

Colaturæ ℞. ℥b. j. Elect. hydragog. Fernelij vel alferij ʒ. i. ol. sambuc. rutac. an. Vnc. i.

F. Clyster.

Valeriola, lib. 1. obseru. 2. in vrina pueri impuberis modicum fermenti coquere iubet cum anisi, anethi & marathri seminibus, adjecta mellis despumati ʒ. j. pro clystere, quem valde laudat.

Vel ℞. Rad. ebuli ʒ. i. cyclam. ʒ. ii. herb. soldanell. mercurialis, eupatory, Anicenna an. M. j. absinthij, pulegij, flor. chamem. sambuci, genista, an. M. β. sem. anisi, anethi, carni, genista, fœniculi an. ʒ. i. sem.

Coqu. in aqua ad Vnc. x.

In quibus dissolue electuar. diaturbith. cum rhabarb. bened. laxat. an. ʒ. sem. ol. rutac. anethini an. ʒ. i. salis ʒ. i.

F. Clyster.

*Purgantia externa.*

Præterea etiam externa ventri imposita eum laxare & serofos humores educere possunt, quæ tamen præcipuè vsurpantur, cum vel propter vires, vel propter ætatem, vel alias causas aut non possunt aut nolunt ægri purgantia medicamenta assumere. Componunturque talia ex succo rad. iridis, sambuci, cyclaminis, ebuli & similibus. Radices quoque & cortices ebuli contusi & ventri impositi aquam copiosè educunt: item oleum ebuli è semine expressum, quod ita paratur.

℞. Sem. ebuli purgati q. v.

Contundatur in mortario instar pastæ. Deinde in aqua pluuiali per triduum in loco calido maceretur, tum aqua frigida affusa coquatur, & calidum in sacculum linteum indatur, & oleum prælo exprimatur, quo umbilicus illinatur.

Composita vsitata sunt: Vnguentum Agrippæ, de Arthantra & Fernelij de lathyride.

*Vnguentum Umbilicale Andernaci.*

℞. Succo cucumer. asinini, ebuli an. Vnc. iii. ol. sesam. irini an. Vnc. ii. cera parum. F. Vnguentum.

*Aliud Varandai.*

℞. Cucum. agrest. bryon. an. Vnc. j.

Coqu. in oleo communi.

Postea adde pulp. colocynth. agaric. trochiscat. an. Drach. ij. sem. ebuli, scammon. an. Drach. j. ellebori nigri, antimon. an. Scrup. j. cera parum Misce.

Habetur & tale in Instit. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 37. Cataplasma laxatiuum.

℞. Colocynth. sem. cataputij minor. tithymali an. Dr. v. succi cucum. asinini, pulu. hellebori nigri an. ʒ. vi. cort. rad. sambuci, succi rad. ebuli an. Drach. vi. scammon. Drach. v. terebinth. Vnc. iii. Cum mellis f. q.

F. Cataplasma.

Sensibiliter deinde euacuant materiam serosam diuretica, eam tamen potius, quæ ad ventrem confluxura est, & quæ in viis, quæ ad renes sunt, hæret, quam quæ in ventre continetur.

*Diuretica.*

Parantur talia ex petroselino, fœniculo, dauco, asparago, seseli, pulegio, linaria, quæ insigniter aquas per vrinam ducit, radic. vincetoxici, pimpinell. valerian. sem. hyperici, alkekengi, baccis iuniperi, sale genista, absinth. fœnic. gratiol. iuniperi. Inprimis vtile est lignum sassafras, quod præ reliquis diureticis hanc vim à natura obtinuit, vt etiam ventriculi vires conseruet, calidum innatum augeat ac roborer, moderatèque exiccer.

Laudantur & vermes terrestres in puluerem redacti. Drach. j. pondere, vel decocti cum radic. asparagi, fœniculi aut petroselini, quod decoctum supra fidem aquas hydropicorum pellere scribit Smerius, lib. 4. miscellan. Et oleum, quod ex iis paratur, lib. 5. Institut. descriptum.

E compositis verò sunt species diacurcuma, dilacæ, quæ tamen cum valde calefaciunt, vbi conueniant, ex causâ morbi discendum. Trochisci de lacca, de rhabarb. de capparibus; qui dari possunt à Drach. sem. ad Dra. ii. cum liquore conueniente. Vt:

℞. Rad. fœniculi, petroselini, asparag. an. Drach. iii. ebuli, ireos, pimpinell. an. ʒ. ii. fol. beton. cusc. prass. alb. an. M. j. Coqu. in aqua simplici pro ℥b. j.

Colaturæ adde syr. de ʒ. rad. ʒ. ii. oxymel. simpl. ʒ. i.

M. pro tribus dosibus.

Vel ℞. Ligni sassafras ℥b. sem. agrimon. beton. chama-dryos, ceterach. an. M. sem. cortic. rad. fraxini Vnc. i.

Infund. p. diem in f. q. aquæ petrosel.

Postea in vase clauso ebulliant & colentur.

Colaturæ adde aquæ cinamomi & spirit. vitrioli q. f.

Vel ℞. Schœnanth. cinamom. asari, mastich. absinth. sem. fœniculi an. Drach. iii. spica, aristoloch. long. petroselin. an. ʒ. ii. rhabarb. ʒ. i. sem. caryophyll. calam. arom. an. ʒ. i. mellis q. f.

F. Electuarium, cuius dosis Dra. ii. cum aqua graminis vel petroselini.

Vel ℞. Dauic. Cretici, ʒ. ii. cinamom. spica, an. Scrup. pul. sem. F. Puluis.

Efficaciter & hoc vrinam promouet.

℞. Seraminis fabar. M. vj. summit. iuniperi, genist. an. M. ii. sem. matrisylu. M. i. sem.

Comburantur in cinerem, per quem vinum bis teruè coletur, cuius ʒ. v. calidè exhibeantur.

Commendatur & hoc lixiuium Leuiathan Rabbi, quod descripsit Heurnius, lib. 2. meth. med. cap. 6.

℞. Ciner. genista, stipitum fabar. visis albas ferentis an. M. j. vini Rhenani ℥b. iii.

Ter cola per cineres. F. Lixiuum.

Adde nucem moschat. j. & ad pondus eius cinamom. baccas lauri num. vi. cumini Drach. ii. anisi, fœniculi tantundem. sacchar. Vnc. iv. Misce.

Commendatur & lixiuium è cineribus frondium iunip. cum vino albo factum, impositis aromatibus & saccharo.

℞. Aq. petrosel. halicacabi an. ʒ. v. flor. sambuci ʒ. iii. spiritus salis q. f. Misce.

Sæpius



Sæpius autem exhibenda sunt diuretica, non solum ut materiam serosam antecedentem causam per urinam euacuent, sed & viscera ab obstructionibus liberent. Cum enim, ut supra dictum, serosa materia in primis viis subsistens ob obstructionem eorum prima huius mali causa sit, omnino danda opera, ut viæ illæ aperiantur, quibus apertis natura sponte per urinas serosos humores expellit.

*Cantharides.* In casu desperato nonnulli etiam cantharides exhibent, & quidem aliqui integras, cum alas & pedes ventris malignitatem corrigere statuunt. Michaël Paschalius verò, *lib. 1. meth. med. morb. cap. 44.* capita & pedes abscindere jubet, non alas, & quidem auctoritate Hippocratis & Plinij. Verum Hippocrates, *de ras. vict. in acut. circa finem*, in hydrope cantharides tres ablato cujusque capite pedibusque & alis, ex tribus aquæ cyathis exhibet. Quod etiam facit, *lib. 1. de int. affect.* Et Capiuaccius desperatos cantharidum usu restitutos fuisse scribit, atque è Dioscoridis, *lib. 2. cap. 54.* & Galeni, *2. de antidot. cap. 7.* & *1. de simpl. med. fac.* sententia vnam exhibet cum pulvere rutæ, fœniculi aut similis medicamenti Drach. j. & superbibere jubet juris pinguis pulli Vnc. jv. vel Vnc. v.

Commendat idem medicamentum Michaël Paschalius ex Valeſco de Taranta, idque hoc modo exhibet.

*℞. Cantharid. j. absque cap. & ped. 4. sem. frigid. major. mund. an. Vnc. sem. sacch. candi violati Vnc. ii. gummi ceras. aut tragacanth. Drach. vi.*

*F. Pulvis. Dosis Vnc. i.*

*Sudorifera.* Sudoribus quoque aqua euacuatur; Illa tamen potius, quæ carnosus partibus inest, quam quæ in abdomine continetur. Ideoque Platerus, *ir. 3. Pract. monet*, in Ascite per vim sudores elicere incommodum nonnunquam, imò noxium esse, cum sine delectu hoc fiat, ex siccis medicamentis sudoriferis, actualique adhibito calore, ægrique decubitus ob dispnoeam citra suffocationis periculum diutius ferre nequeant; & si in stussa tentetur, admodum debilitetur atque incendatur æger. Quapropter nisi sponte erumpant sudores, & in declinatione morbi crurum tumoris causâ vsurpentur, non temerè ad sudores ægri sunt adigendi; cum serosus humor, non ut in anasarca per superficiem corporis diffusus sit, sed in abdomine contineatur, unde sudorifera non sine magno labore aliquid euacuant, timendumque sit, ne dum ægrum diu balneis immorari oportet, antequam sudoreumpat, vires eius deiciantur. Ideoque hoc auxilium non nisi in iis, qui robusti sunt, vsurpandum.

*Interna.* Sunt autem hydrotica vel Interna, vel Externa. In numero internorum sunt pleræque Diuretica, quibus addi possunt flor. sambuci & ebuli, & ex his parati spiritus, ut & sal ebuli & vincetoxici, decoctum ligni guajaci & sassafras. Decoctum sudoriferum specificum describit. Quercetanus, *cap. 8. Pharm. rest.*

Utilis est & hæc aqua.

*℞. Scobis ligni guajaci lb. ii. rad. helenij Vnc. ii. personata, ireos Florent. an. Vnc. i. flor. chamam. Roman. M. j. succi baccar. ebuli Vnc. iiii. sem. theriaca diateſſaron. Vnc. ii. sem. rob sambuci lb. ii. aq. cinamom. Vnc. i. sem. vini Rhenani antiqui Men f. ii.*

Digerantur hor. 24. in loco calido.

Postea destillantur in cineribus. Dosis Vnc. iv.

*Externa.* Externa, quæ ad ciendos sudores vsurpantur, sunt siccum balneum, Laconicum dictum, cuius structuram, docet Vitruvius, *lib. 5. architet. cap. 5.* Celsus, *lib. 2. cap. 17.* de sudore per siccum calorem eliciendo sic scribit: Siccus calor est & arenæ calidæ, & Laconici & clibani, & quarundam naturalium sudationū, ubi è terra calidus diffusus vapor ædificio includitur, Sicut supra Baias in Myrtilletis habemus: Præter hoc Sole quoque & exercitatione sudor mouetur. Hæc Celsus. Galenus, *de usu respir. cap. 4.* & doliarij vaporarij meminit, quod anti-

*Dan. Sennerti Tom. I l.*

qui, & præsertim Chrysippus Cmidius, in curando hydrope in usu habuerint, quod multò magis, quàm balnea aqueum humorem dissipat, ægrum tamen non ita suffocat, cum frigidum aërem intrò attrahere possit. Commodius tamen est illud vaporarium, quod ex assensibus & tabulis ligneis conficitur, per quod æger caput exeat. Decoctum autem, quod silicibus vel scoriis ferri ignitis infunditur per tritorium, paratur ex radicibus & foliis ebuli, sambuci, absinth. rutæ, lauri foliis, flor. chamam. sambuci & similibus.

Maximum autem ad euacuandam aquam hydropis præsidium est *ὑδρόπικος*, seu apertio abdominis ferro facta ad educendas aquas hydropicorum, cuius & Hippocrates, *lib. πρὶ παθῶν* & *lib. πρὶ τῶν ἐν τῷ πλεονεκτήσει παθῶν* meminit, quæ quomodo fieri debeat, Albucasis docet, *lib. 2. chirurg. c. 54.* dictūq; eade re est *lib. 5. Inst. p. 1. f. 2. c. 7.*

Locum autem hæc habet tantum in Ascite, quando breui tempore ad insignem magnitudinem peruenit, & hydragoga aliæque auxilia non iuuant, viresque adhuc constant; Ideoque etiam Hippocrates, *6. epid. f. 6. ἀνὰ τὴν νύκτα*, statim secare jubet, in eo scilicet, qui sine febre est, sine pulmonis ulcere, sine fluxu alui, corpore non emaciato, ætate florente, & omnino, qui, ut Hippocrates, *in Prorrhetic.* habet, est adhuc *ὑποπλάγος*. Nam si hydrops jam longo tempore sit congestus, vires jam conciderint, & viscera sint debilitata, sicut & in Ascite, qui à scirrhō hepatis aut lienis, aut morbo aliquo acuto extitit, qui per se lethalis esse solet, frustra hoc præsidium tentatur, & anima cum aqua educitur: Sicut id obseruauit Capiuaccius, *lib. 3. Pract. cap. 15.* Ambrosius Paræus, *lib. 7. chirurg. cap. 11.* Henricus Smerius & alij, & ipse etiam.

Esti autem cōpertum est, sanatos fuisse quosdā, quibus aut sectione ab empiricis factā, aut casu vulnerato abdomine, vniuersa aqua simul absque vitæ discrimine effluxit: tamē tutius est, de consilio veterū, sensum aquā illā educere, singulis diebus Vnc. vi. Vnc. viii. vel Vnc. x. pro viriū ratione & tolerātia. Nā aquæ innatantia in abdomine viscera aquā subito euacuatā subito collabuntur, quæ tractis deorsum superioribus & diaphragmate vires antea debilitatas nō parum labefactat, præsertim si scirrhus visceris ab aquosa materia sustentatus jā pōdere suo subsideat, non sine insigni molestia, solētque in tali subita euacuatione etiam aliquid caloris expirare.

De loco, in quo sectio fieri debeat, diximus *allegato loco in Institut.* quæ videantur; & commodissimè, si natura eò inclinēt, sit sectio in umbilico, & natura plerūque ipsa hunc locū eligit, dū umbilicum in amplam & pellucidā vesicā distendit, quæ si vel scapello vel spōte aperiat, aqua magno impetu, si permittatur, effluit. Qui modus cum ita expeditus sit, & à natura ipsa monstratur, si arte procurari posset, magnā curationi spēs afferret. Ferunt Sanctorium Medicum Parauinum id tentare & certo enchirēmate & artificio vasa vmbilicalia ita dilatare posse, ut instrumēto si phūculi formam habente tantū, quātum libet, quotidie sine ægri incōmodo & virium deiectione educere possit. Instrumenta ea depinxit, in *comm. in 1. sen. Anic. tr. 4. c. 1. text. 12. quæst. 71.* Platerus cucurbita vmbilico sæpe admota eum intumescere posse sperat. In votis etiam videtur habuisse hunc modum Guilielmus Fabricius, *cent. 1. obseru. 47.* eò in primis adductus, quod in hydropico demortuo vmbilicalem venam adeò dilatata inuenit, ut facile penna anserina immitti potuerit. Ex eo enim paparet, viam hanc euacuandi aquam hydropicorum esse commodissimam, utpote quam natura non solum ipsa quærit, sed quandoque etiam aperit. Nam etsi vasa vmbilicalia, fœtu in lucem edito, officio suo defuncta coalescant, exiccentur, & in ligamentum quasi abeant: tamen naturalem suam conformationem non planè amittere, sed ex iis venam vmbilicalem & vrachum interdum vel non planè coalescere, vel rursum aperiri, & urinam serosisque alios humores per ea

*παγκύ, πρὸς, οἷον.*

*ubi locū habent?*

*An una vice aqua educenda?*

*Quo in loco fieri debeat?*

*Sæpius aqua extrahendi modus.*

*Plateri.*

*Guil. Fabr.*

euacuari, Medicorum observationes docent. Aquam hydropicorum per umbilicum quandoque sponte euacuari certum est, & habent huius rei exempla tum alij, tum Guilielmus Fabricius, *loc. alleg.* Volcherus Coiter, in *observ.* refert, in virgine quadam Norimbergenſi dissecta inuentam venam umbilicalem sanguinis copiâ turgidam atque extensam. Marcellus Donatus, *de histor. med. mirab. lib. 4. c. 26.* narrat, in vrbe Tridentina, quo tempore Concilium ibi celebrabatur, fuisse mulierem, cui singulis mensibus menstrua ex umbilico profuebant, & præterea viui lumbrici inde erumpebant. Fernellius, *l. 6. de part. morb. & sympt. c. 13.* refert; cuidam annum 30. agenti obstructa vesicæ ceruice urinam affatim, tanquam emictione ex umbilico in multos menses profuxisse, idque citra tumorem, citra vllam in abdomine collectionem. Ipse etiam vidi nobilem quendam Danum, cui serofus quidam humor per anni quadrantem, & interdum satis copiosè, sine tamen vlla valetudinis offensione ( nisi quod interdum de doloribus ventris & præcipuè circa umbilicum conquereretur ) per umbilicum effluebat, quod procul dubio contigebat, vt ex alijs signis cognoscere licebat, ob dispositionem & inclinationem quandam ad hydropem, & serofi humoris in ventre abundantiam, quo vt natura se liberaret, hanc viam euacuandi serî quæsiuit, quod nisi factû, proculdubio in cachexiam vel hydropem incidisset.

Scroti apertio.

Aperiuntur & aliæ partes ad serum euacuandum. Platerus scrotum eligit; cum quo consentit Massarias, qui crurum & ventris scarificationi & abdominis perforationi scroti perforationem præfert, utpote quæ fiat sine vlla molestia & periculo, summo tamen cum ægri emolumento, cuius beneficio in mercatore quodam trium dierum spatio quadraginta quinque libras aquæ cum salute ægri eduxit. Et licet aliquid incommodi accideret, minus tamen esset periculosum, quàm in alijs locis. Ita refert Guilielmus Fabricius, *cent. 1. observ. 48.* cuidam hydropico adeo copiosè in scrotum delapsum esse humorem serofum, & excitata gangræna inde effluxisse, vrâ morbo liberatus sit & diu superuixerit sanus, atque liberos aliquot procreauit. Testes autem natura obduxerat callosâ quidam substantiâ, quæ eos vice scroti obtegebat, & ab externis iniurijs vindicabat. Cum autem scrotum vel vnico saltem vulnere, vel pluribus scarificationibus, vel seracco infixio aperiri possit, Platerus præfert vnicum vulnus satis amplum, cui cannam argenteam imponit, si nimirum scrotum tumidum sit, & natura eò loci aquam detruserit. Aliàs enim scroto vacuo & natura non adminiculante frustra tentatur scroti apertio.

Crurum scarificatio.

Nonnulli scarificationem crurum suadent, cuius quoque Galenus, *lib. 9. de comp. med. sec. loc. cap. 3.* meminit & Aërius *teirab. 3. serm. 2. cap. 30.* ex Asclepiade, Leonide, Hippocrate & Archigene modum administrandi prolixè proponit, quem etiam Instit. *loc. alleg.* inferuimus. Verum etiam hîc cautione & iudicio opus est. Neque enim ea semper bene cedit, sed ob humoris falsi affluxum non raro inflammatio & grauissimi dolores, vt aliquoties obseruauimus, imò quandoque etiam gangræna accedit.

Ex vesicat. tibiis hydrop. appof. gâgræna & mors.

Ideoque vt hîc etiam calumpniam vitet Medicus, id quod accidere potest ob prauitatem affluentis humoris, prædicere debet. & scarificationem ita instituire ac moderari, vt quantum licet, illa symptomata & mala vitetur.

Nimirum in parte carnosâ crurum circa furas scarificationem leniter instituire debet; cum & cuticulâ solum ruptâ aqua effluere soleat, vulneraque infligere satis distantia, serumque, quod exiudat, linteolo molli citra omnem frictionem abstergere, & vnguento albo locis conuenientibus partes munire, & inflammationem prohibere, fasciâsque sæpiſſimè permutare.

Alij cauteria & vesicatoria cum in abdomine, tum in cruribus paulò supra talos applicant. Sed nec hoc satis tutum, & omnino cautione & hîc opus est, vt id fiat

corpore adhuc vegeto, & calore partium nondum destructo, ne vlcera insanabilia, 6. *aphor. 8.* vel gangræna oboriatur. Scribitque Ludouicus Septalius *animadu. medic. lib. 7. num. 56.* quamuis duos hydropo laborantes sanatos viderit, vesicis in cruribus per se excitatis & disruptis, ac multa aqua per eâ partem euacuata, exhibitis postea multis hepar roborantibus; nullû tamè vnquam totis 40. annis, quibus Mediolani Medicinam fecit, curatum se vidisse, cui à medicis vesicatoria cruribus admodum fuere, sed ferè semper gangrænas securas fuisse curatu impossibiles. Cuius rei exemplum habet Guil. Fabricius, *cent. 1. obs. 49.* de vidua quadam sexagenaria, ascite laborante, cui cum imperitus Medicus vesicatoria tibiis imposuisset, tantum iisdem aquæ attraxit, vt inde natiuus calor extinctus sit, & paucis post diebus mulier decesserit.

Cauteria & vesicatoria abdom. & crurib. applit. cauta.

Insensibiliter aquam Hydropicorum euacuant & discutunt. 1. Interna quædam, sudorifera videlicet & medicamenta discutientia, vt decoctum sassafrias, ligni guaiaci, sal absinthij, sales theriacales, antidoti magna, theriaca, Mithridarium, quæ totum corpus mirabiliter penetrant. Maxime verò commendat Mercatus confessionem cyphoidem Andromachi à Galeno, 8. *de comp. med. sec. loc. cap. 7.* descriptam, cuius Drac. j. cum liquore conueniente exhibetur.

Insensibiliter aquam euacuantia. Interna.

Verum talia potius conueniunt, vbi humor in ambitu corporis hæret, quàm cum in cauitate abdominis continetur. Vtiliora sunt, quæ foris applicantur, vt sacculi ex surfuribus, milio, panico, cumino in vino coctis; oleum juniperi, sambucinum, anethiaum, vnguentum de arthanita, Agrippæ, Martiatum, emplastrum Heræ apud Galenum, 2. *de comp. med. sec. loc. cap. 19.* descriptum.

Externa.

Vel *℥. Vngu. de arthanita, Agrippæ. an. Vnc. i. rad. ebuli, asari, bryonia, ireos an. Drach. ij. sulphur vini, stercor. columbini an. Drach. iij. olei scorpion. Drach. vj. urinae pueri impuberis, mellis an. q. s.*

Fiat cataplasma pro toto ventre, ita tamen, ne ventriculum & hepatis regionem attingat.

Vel *℥. Farin. placentior. sem. lini & cannabæ an. Vnc. ij. stercor. columbini Vnc. i.*

Coq. in lixiuio ad pulvis consistentiâ sæpius agitando.

Deinde adde *pulu. sulph. vini Drach. v. alumin. Vnc. sem. salis comm. Drach. v. farina lupin. fenugrac. p. ulu. sem. cumini, anisi, baccar. lauri an. Vnc. sem. olei laurini, anethini q. s. F. Cataplasma.*

Emplastrum Italæ Medicis vsitatum describitur in Dispens. August.

Commendatur & hoc:

*℥. Colophon. Vnc. iij. cera noua Vnc. ij. gummi elem. tacamahac. an. Vnc. i. salis nitri Vnc. i. sulphur. vini 3. vj. pulu. santal. rubr. myrrha rubr. mastich. thuris an. 3. B. ol. laurini Drach. vj. balsami Indici Drach. ij.*

Infund. santal. rubr. in spir. vini horis aliquot. Postea addatur cæteris, & fiat Emplastrum.

Mercatus hoc laudat.

*℥. Terebinth. tb. j. thuris, mastich. myrrh. an. 3. vj. ladan. nuc. mosch. garyophyll. galang. zedair. cubeb. an. Vnc. ii.*

Puluerisanda pulueriscentur. F. Vnguentum, quo venter inungatur.

Vel *℥. flor. fol. & cortic. ebuli, sabine an. M. j. rad. ireos Vnc. i. scylla Vnc. ii. Coqu. in olei laurini tb. iij.*

Vini tb. j. & cum forti expressione colentur.

In colatura dissolue saponis Vnc. iij. F. Linimentum. Galenus, 11. *de simp. med. facult.* cochleas non vstas terit, & vna cum testis ventri hydropicorum imponit.

Antiqui etiam lutum Minerale circa thermas tanquâ cataplasma loco fomenti applicabant. Vtile est hoc.

*℥. Cera, picis arida an. Vnc. iij. alumin. sulph. vini, manna thuris, nitri an. 3. j. B. resina fixa tb. B. olei veteris Vnc. i. aceti q. s. ad dissoluendum arida. M. pro linimeto.*

Celebre & probatum est hoc.

*℥. Stercoris*

*℞. Stercoris columbini in aceto macerati ℥. j. sulph. vi-  
ui Vnc. i. niri Vnc. sem. pulu. rad. helenij, baccar. lauri,  
anethi, flor. chamem. an. Drach. vi. sem. nasturtij 3. ii.*

Coqu. omnia in vino ad iustam crassitiem.

Postea adde mellis Vnc. ii. terebinth. Vnc. i. sem. succi  
ebuli Vnc. ij. irid. Vnc. i. sem. soldanell. Vnc. i. farin. fabar.  
Vnc. ii. Misce.

F. Cataplasma.

Huius generis plura videantur apud Galenum, Mer-  
catum, Platerum, & passim alios Practicos.

Adversus tumorem scroti utilis est euaporatio per  
sellam facta ex decocto flor. chamemel. sambuci, meli-  
lori, absinthij, roris marini, rutæ & similibus; vel adden-  
do farinam fabarum & puluerem cumini & similitum,  
Fiat Cataplasma.

Crura tumida & inflata lauentur aqua marina vel  
falsa, in quacocta sint folia sambuci, baccæ lauri, juni-  
peri, vel lixiuio ex cineribus vitis, in quo ebulus aut  
sambucus cocta sint. Aut spongia eiusmodi decocto  
vel lixiuio vel aqua maceretur, iterumque exsicce-  
tur, & fortiter cum fasciis circa crura ligetur, donec paululum  
detumeant.

Galenus, 2. ad Glaucon. cap. 3. Tumorem pedum in  
Hydropicis, phthificis, cachecticis tollit frictione ex  
oxyrrhodino, aut sale & oleo, aut ex sale iniecto oxyrrhodino.

Forestus hoc Cataplasma commendat.

*℞. Rad. ebuli recent. M. vi. bryon. ℥. j. cortic. exter. sam-  
buc. M. iii. fol. cucum. asinini M. ij. caul. rubr. M. vi. fol. mal-  
ue M. ij. alib. exiccat. M. iii. Coqu. in aqua communi.*

Contundantur addendo Unguenti Agrippa Vnc. iii.  
farin. hordei ℥. sem.

F. Cataplasma, quo crura vsque ad genua inuol-  
uantur.

Verum enim verò intemperie viscerum & causis  
collectionis feri sublatis, & aqua ex abdomine euacua-  
ta, sponge sua tumore hic in cruribus & scroto plerum-  
que euanescit. Vbi exulceratis cruribus de gangræna  
metus est, lauentur illa cum vino decoctionis flor. vn-  
gulæ caballinæ, quibus aliquid mastich. thuris, myrrhæ,  
lithargyr. additur, &c.

Alutia &  
Aperientia.

Interim duplici hæc sunt, non negligenda, sed dili-  
genter diebus, quibus purgantia non exhibentur, alte-  
rantia & viscerum calorem natuum instaurantia ob-  
structionesque aperientia vsurpanda. Si enim hæc vel  
omittantur, vel negligentius vsurpentur, frustra sola  
euacuantia exhibentur. Remanente enim causa colle-  
ctionis serosi humoris breui is colligitur.

Commendatur in hos vsus absinthium, & quæ pa-  
rantur ex eo medicamenta; hepar lupi, extractum hepa-  
tis vituli, aqua ex hepate vituli, agrimonia, alijsque plan-  
tis hepaticis destillata; dialacca, diacurcuma, trochisci de  
lacca, de rhubarb. de absinth. de eupator. confectio cyphoi-  
des à Galeno 8. de comp. med. sec. loc. descripta. Iohan. An-  
glicus, in Practica sua, quæ Rosa Anglica inscribitur,  
Electuarium cubebarum dictum commendat, tanquam  
singulare arcanum, & nemini nisi accepto pretio com-  
municandum, cuius hæc est descriptio:

*℞. Santal. omnium an. Drach. j. spody. rasur ebor. ana  
Drach. i. sem. ocymi, cubebar. an. Vnc. sem. vel Drach. iii.  
sem. 4. frig. major. an. Drach. ii. endiu. portulac. an. Drac. 3.  
ligni aloes, nuc. moschat. an. Vnc. sem. sacch. ℥. j.*

Cum decocto vel aqua endiuia F. Electuarium.

Non multum ab hoc differt compositio Diacubebe  
dicta, quæ nomine Paracelsi circumfertur; quam pro-  
culdubio ab Antiquis Medicis mutuatus est.

*℞. Cubebar. (quos tamen myrrillos Heydelbeer no-  
minat) ocymi caryophyll. an. Vnc. sem. santal. omnium  
an. Vnc. sem. rasur eboris, carabe citrina an. Drac. iii. sem.  
4. frig. major. mundat. ana Drach. j. ligni aloes, nuc. mos-  
chat. an. Drach. iii. Cum syrup. granator. F. Electuarium.*

Ferunt huius solius vsu, præmissis præmittendis, nisi  
viscerum substantia planè sit corrupta, hydropem tolli.

Dan. Sennerti Tom. I I.

Vtile est & hoc.

*℞. Trochisc. de absinth. de eupator. an. 3. i. de rhubarb.  
de lacca an. 3. i. hepat. lupi prapar. 3. 3. spec. diarrhod. ab-  
batis, aromat. rosat. an. 3. i. conseru. flor. sambuci 3. i. Mi-  
thridat. 3. ii. Cum syrupo de eupatorio F. Electuarium.*

Vel *℞. Roob sambuci 3. 3. Mithridatij 3. ii. spec. diar-  
rhod. abbas. 3. 3. magist. perlar. oculor. cancri an. 3. i. Cum  
syrupo de eupatorio F. Electuarium.*

Plurimum etiam hic, præsertim vbi obstructiones  
adsunt, cum à Galenicis, tum à Chymicis laudatur, &  
multum etiam præstat Chalybs rectè præparatus, cuius  
supra iam aliquoties facta est mentio.

Chalybs.

Verum hæc omnia notatu digna sententiâ Alexan-  
dri Tralliani, qui lib. 9. cap. 3. ita scribit, concludere li-  
bet: Omnia, & quæ præcesserunt, mala, & quæ nunc ad-  
sunt, obseruanda puro, ac vbi præsentem intemperiem  
noueris, ita ad curationem audacter accedas, non autem  
vulgarem opinionem sequaris, nempe aqua inter cutem  
laborantes, quouis modo calefaciendos esse.

### De Ascite à colliuatione.

Cum etiam supra hydropis à colliuatione facta sit  
mentio, de eo etiam aliquid hic addere liber. Hydrops  
autem hic subito generatur, & conjunctus est eum fe-  
bre ardente. Periculosus verò omnino est; cum ista col-  
liuatione corpus languescat, & omnes vires collaban-  
tur, quibus prostratis ægrum sanare difficillimum est.

Ascites à  
Colliuatione.

Duo autem in tali hydropse agenda. Calor immode-  
ratus & colliquans alterandus & refrigerandus, & ma-  
teria aquosa cumulata euacuanda. Et primò quidem  
omni conatu Medico opera danda, vt colliuationem  
inhibeat, & causam eius tollat, refrigerantibus scilicet;  
cum in victu, tum in medicamentis exhibitis, tum extra ca-  
taplasmatis, epithematis, inunctionibus refrigerantibus  
thoraci & hepati applicatis; & omnino ea curatio hic  
instituenda, quæ febribus colliquantibus debetur. Aqua,  
verò è colliuatione cumulata euacuanda vel sensibili-  
ter per aluum & vrinam, vel insensibiliter discutienda;  
quod tamen non tentandum, nisi calore febrili prius  
sublato; cum ex istorum remedium vsu calor febrilis  
facile augeri possit.

### Dieta.

Quantum bona victus ratio ad curandum Hydropem  
faciat, præter quotidianam experientiam Celsus, lib. 2.  
cap. 22. ostendit. Qui itaque ex toto sibi temperare ne-  
queunt, ad salutem non perducuntur. Ideoque nò igno-  
bilis Medicus, Chrysippi discipulus, apud Antiochum  
Regem amicum quendam ejus, notæ intemperantiæ  
mediocriter eo morbo implicatū negauit posse sanari,  
cumque alter Medicus Epirotes Philippus ipsum se sa-  
naturum polliceretur, respondit, illum ad morbum ægri  
respicere, se ad animū. Neque enim res fefellit. Ille enim  
cum summā diligentiam non Medici tantum, sed & Re-  
gis custodiretur: tamen malagmata sua deuorando bi-  
bendoque suam vrinam in exitium se præcipitauit.  
Dieta tamen non sit tenuis, sed mediocris & toto mor-  
bi decursu æqualis.

Dieta.

In totā victus ratione ab humido abstinendum. Aër  
igitur eligatur ad calidū vergēs & à naturā suā salubris;  
Viterur humidus, crassus. Somnus sit moderatus, aut  
paulò breuior cōsueti. Multū cōducit morus corporis,  
si modò ab ægro vllō modo iniri possit. Cibus aridior  
sit, coctu tamen & distributu facilis, non viscidus & hu-  
midus qui in aquositate maxima ex parte transit. Ideo-  
que iuscula parçè offerantur, ea tamē nutriētia, nō mul-  
tum aquæ suppediātia, ex iure pulli, caponis, carniū,  
ciceribus rubris, auenā. Panis sit bene fermentatus, à  
furfuribus tamen non planè repurgatus; ita enim ape-  
rit magis & abstergit. Condiatur semine anisi, fœnicu-  
li, carui, cumini, coriandri. Biscoctum Hippocrates  
præfert, lib. de int. affect. modò ægri conçoquere  
valeant.

V V V V

3



valeant. Ex apibus laudantur sylvestres, & præcipue montanæ. Alaudarum esu & visu quendam restitutum se vidisse, testatur Nicolaus Florentinus. Quadrupedum carnes non pingues sint, & asæ potius, quàm elixæ præbeantur. Iecur animalium, præsertim gallinarum, quasi tota substantia vile, plurimi commendant. Condiuntur carnes cinamomo, caryophyllis aniso, scoriculo, petroselino, thymo, bacis juniperi, rusticis etiam allio.

*Hydrops hanc curatur.*

[ ¶ A Fide digno Medico mihi relatum est, Canonicum quendam, ex hydrope periculosè decumbentem, à Medico suo petiisse, ut halecis esum sibi indulgeret. Annuit Medicus, sed hac conditione, ne intra duarum horarum spatium quicquam potulenti post esum halecis assumeret, & integrum halecem, si posset, absumeret. Agrotus parat. Quid sit? Eger tandem ad urinæ emissionem stimulatus, tam largè ipsam profudit, ut per horæ ferè quadrantem nulla mictionis quies interueniret, ipsūque abdomen sensibilibet magis magisque subsidere deprehenderetur. ]

A leguminibus prorsus abstinere æger, olera etiam pleraque, cum mali succi sunt, non conueniunt, ut & fructus crudi. Condimenti tamen loco usurpari possunt asparagi, summit. lupuli, nasturtium aquat, sinapi, cochlearia, chærefolium, gemmæ ex floribus immaturis, genistæ aceto conditæ. E fructibus conueniunt passulæ, amygdalæ amaræ, pistaciæ, pinæ, cappares, oliuæ, In potu aqua vitetur.

Vinum sit album, tenue & diureticum, vel cereuisia bona lupulo condita, & absinthio, agrimon. roremarij. no, saluia, medicata. De quibus tamen non plus bibendum, quàm quantum ad sitim aliquomodo & vitam sustentandum sufficiat. VVierus se ægris suis ultra tb. s. vini qualibet die non permittere stricta lege scribit. Et ut minori molestia hinc obedire queant ægri, commodum esse, si ex vitro angusti oris bibant. Humectatur enim sæpius vini stillantis momento lingua, promptius fallitur sitis, nec ejus copia venter grauiatur. In eundem vsum passulæ & glycyrrhiza viridis mastlicantur. Imò si æger tolerare potest, commodum est, planè à potu abstinere; cum experientia testetur, sanatos fuisse quosdam, qui ab omni potu menses aliquot, imò integrum annum abstinerunt, ut testatur Iacchinus, in 9. *Rhasis* cap. 22. Beniuenius, de *abdit. sanat. caus.* cap. 13. (Anafarcam tamen fuisse existimat. Dodonæus) Alexander Massarias, *lib. 3. cap. 16.* Si tamen sitis valde cruciet, aceto aqua chalybeata diluto os colluere vtile est. Celsus, loco allegato, refert, quod Epicuri discipulus quidam Hydropicus, cum non posset æquo animo sitim ferre, ubi diu abstinuit, bibere solitus est, deinde euomuit. Retentio alui noxia est. Ideoque si ea segnior sit, stimula vel cibus laxantibus vel clysteribus, Animi Affectus moderati sint.

## QUESTIO I.

*An Hydrops Ascites solo hepate læso generetur?*

*An hydrops Ascites solo hepate læso generetur.*

Vulgata equidem & antiqua in scholis Medicorum est sententia, omnem hydropem accidere hepate primario affecto, & proximam ac præcipuam omnis hydropis causam esse *αἰματώσιν*. Hepatis læsam, & quidem ab intemperie ejus frigida. Docuit id Galenus. *lib. 5. de loc. aff. cap. 7. ibid. lib. 7. cap. 1. 6. aph. 12. & 42. 2. Progn. 1. 1. & 2. 4. de prasag. puls. cap. 9.* Galenum sequitur Aui-cennas, *lib. 3. fen. 14. r. 4. cap. 4.* & alij Medici plerique, & adducti sunt in eam sententiam, quod cum hepar officina sanguificationis sit, ibi sanguinem vitiosum generari probabile sit, ubi bonus generatur. Et quia calor innatus hepatis præcipuum sanguificationis instrumentum est, eo læso & hepate refrigerato sanguinè serosum generari, & tandem hydropem induci crediderunt.

Reperiti tamen sunt, præcipue nostro seculo, non pauci Medici, qui à communi ista opinione discesserunt, & quidem primò ea de causa, quod in sectione hydropicorum sæpe hepar saluum inuentum sit. De quo Mauric. Cordus, *comm. 5. in lib. 1. Hippocr. de mul. lib.* scribit; In hac, inquit, Parisiensis Asclepiadarum familia percelebri magnus & frequens est numerus, Medicorum cateruæ vbique sunt multæ atque conuentus; vix verò inter eos vllum reperies, cui non contingerit Hydropicum cadauer aliquod euiscerare. Quid verò in illis commento superiori simile reperies? Integrum est in multis hepar ex omni parte, quibus exortus est hydrops ab aquoso Liene.

Refert quoque Schenckius, *lib. 3. obseru. ex obseruatione.* D. Francisci Tidicæi, quæ historia integrè infra de Tympanite recensetur, Virum quendam sexagenarium, cum diu à flatibus & anhelandi difficultate molestus esset, tandem in Ascitem incidisse, eoque mortuum esse, In cuius cadauere aperto hepar nihil ferè à sana hepatis constitutione differre visum est, neque quicquam in eo vel alio viscere vitij oculis notari potuit.

Quæ confirmare videtur id, quod Ioh. Paschalius, *de med. morb. lib. 1. cap. 34.* refert: Mulierem quandam annos 50, natam laborasse Ascite sex annos, & ex casu in lapidem ventrem eius fuisse vulneratum, per quod vulnus cum subito omnis aquositas euacuata fuerit, incidisse quidem illam in animi deliquium, sed postea in Xenodochio Parauino bonis alimentis assumptis pristinam recuperasse sanitatem. Nam si in muliere quinquagenaria hepar refrigeratum fuisset, ut Ascitem generauerit, certè œconomia illius ira turbata fuisset, ut post aquæ euacuationem tam subito sanitatem recuperare non potuisset. Quibus accedit & illud, quod Beniuenius, Dodonæus & Langius narrant, quodam aquæ potu largissimo ab hydrope sanatos fuisse aperto umbilico. Nam si hepar tam valde refrigeratum fuisset, non tam facile sanitati aqua euacuata restituti fuissent, præcipue post aquæ potum largissimum. Neque in eo effugium parer, quod nonnulli dicunt, hydropem prouenire ab Intemperie hepatis frigida, quæ oculis videri non possit. Etenim hydrops, si ab intemperie hepatis proueniat, non à leui aliqua eius alteratione oritur, sed à calidi natui ejus extinctione vel absumptione, quàm caloris & qualitatum hepatis talis mutatio sequitur, ut hepar malè affectum fuisse etiam oculis pateat, quale tamen nihil in hydropicis demortuis sæpe inuenitur. Deinde hepar saluum esse posse, & nihilominus hominem in hydropem incidere, eo probatur, quod non solum hepar, sed & lien sanguificationis organum sit, & propterea eo læso etiam hydrops oriri possit.

Quod præter experientiam confirmatur autoritate Hippocratis, qui *lib. πρὶ παδῶν* scribit: *πρὶν αὖτ' ὁ σπλὴν ὁ σκλὴνός ἐστιν νοσῶν*: generatur hydrops etiam à splene, cum ægrotauerit. Et *lib. 1. de morb. mulier.* docet, splenem humorem aquosum ad se trahere, ut qui rarus & spongiosus est, & secundum ventriculum situs, generationemque hydropis ex splene eò loci integrè describit. Idem docet, *lib. 4. de morb.*

Neque est, ut quis ad id confugiat, dicatque per consensum lienis hepar malè affici, atque ita hepate affecto, tantum hydropem generari. Præstantissimi enim Medici & inter eos Vesalius, *cap. de liene*, in hydrope lienem vitiosum hepate planè saluo deprehensum fuisse testantur; atque ipse etiam in hydropico quodam & simul, scorbutico, omentum corruptum, lienemque præuè dispositum hepate saluo vidi. Præterea Hippocrates etiam 2. *Progn.* docet; Hydropem aliquando ab hepate, aliquando ab Ilibus oriri, de quo *questione. 2.* dicitur. Allegari etiam hinc solet locus Hippocratis, qui 2. *Prorrh.* scribit; enim qui ab hydrope conualiturus est, *ὁσπαραχχον* esse oportere: cum *εὐσπαραχχον* videatur non esse is, cui hepar malè affectum



etum est. Verum argumentum parum firmum præbere videtur hic locus. Etenim si per τὸ ὑδρωχρον intelligatur omnimoda sanitas viscerum, nullus hydropicus affecto hepate vel liene euaderet; cum tamen experientia contrarium testetur; & frustra ab Hippocrate aliisque Medicis tor præscriberentur medicamenta. Τὸ ὑδρωχρον igitur hic vel ad naturalem statum refertur, quasi dicat Hippocrates, eum qui ab hydropse liberari debet, necessarii robusta viscera habere debere, quæ graviore morbo non succumbant; vel si de statu morbo id accipiendum, τὸ ὑδρωχρον sunt, quorum viscera morbo quidem sunt correpta, nondum tamen scirrhusa, putrida & corrupta, sed talia, ut ad statum naturalem redire possint.

Imò ex aliis quoque partibus hydropem originem ducere posse, nonnulli existimant. Nimirum ex intestinis, si illa perforentur, & homo non statim moriatur, sed humor aquosus in abdominis cavitatem ex iis exstillet, & ventrem in tumorem attollat.

Deinde ex renibus, si nimirum propter obstructionem vel maximam imbecillitatem serum ad se non trahant. Tum enim in corpore retentum facile in ventrem confluere potest. Idem accidit, si renes exulcerentur; observauitque Platerus, ut lib. 3. observ. habet, in quodam Alcitico utrumque renem multis viceribus perforatum fuisse, adnatis hinc inde vesiculis partim ruptis, partim integris, exteriori superficie hinc inde adhærescentibus, unde sanies & serum in abdominis cavitatem liberè exstillavit. Idem etiam post calculi vesicæ incisionem & è vesicæ extractionem fieri potest. Si enim vulnus non rectè consolidetur, sed cuti cicatrix obducatur, interno vulnere adhuc hiante, per id vrina exit & in abdomine cumulatur. Ita si calculus venter transiens magnus & asper eorum membrana impat, cum vrina per viam apertam in cavitatem ventris fluens breui tempore, hepate salvo, hydropem excitare potest.

Ex vtero etiam fieri potest hydrops salvo hepate, referturque passim historia ex Iohan. Heintzio, Medico olim in valle Ioachimica, de ancilla quadam, quæ ob errores in victu commissos in mensium suppressionem incidit, & tandem in tumorem ventris, ut ea de causa male audiret. Bene autem sibi conscia cum de vita desperasset, ut mortuæ corpus secaretur, pro innocentiae testimonio petiit. Secto cadauere & emissa plurima aquæ copiâ viscera omnia salva reperta sunt. Iecur optimè affectum, lien laudandus. Pulmones verò ob aquam, quæ in thorace penetrauerat, dimidia ex parte corrupti, itémque omentum & testes. Hi enim ab utraque parte non solum tumidi ad magnitudinem capitis recens nati infantis, sed & liuidi, fungosi, plurimis vesicis aquosis, quæ maiore ex parte ruptæ fuerant, & in vlcera degenerauerant, reperti sunt, ut proculdubio à testibus, non verò ab hepate aquæ illa copia in abdomen effusa fuerit.

Tandem à colliquatione quandoque fit hydrops, hepate non præcipue affecto, multo minus refrigerato. Eius mentionem facit Hippocrates, qui lib. 1. epid. s. 2. s. 35. & 36. ἐκ τῆς συντήξεως, ex mala colliquatione, viguisse præter dysenteriam, lienteriam, diarrhæam, etiam hydropem scribit. De eodem Galenus, 3. de sympt. caus. cap. 2. Fit interdum quædam ἀναρροήσις colliquatio seu resolutio seu dissolutio, siue quocunque nomine alio appellare libet, aliquando totius corporis, aliquando succorum, qui in venis sunt, duntaxat. Quod autem ex ea colliquatione provenit, aliàs ad ventrem confluit, aliàs ad vrinam, aliàs ad sudores pellitur. Ac succis quidem qui in venis habentur, in serosam saniem solutis, resolutis ad excrementum id contrahendum sunt naturæ, ut sunt, serum quidem à venis expurgant, siue ad venter, autem ad vesicam quotidie mittunt. Vbi autem venter trahere non valent, venæ eiusmodi serum in ventrem mittunt,

aut toti corpori id patientes subitaneos hydropum status inducunt. Facit & huius hydropis mentionem Pereda, in Schol. in Michael. Paschal. meth. med. de hydropse, & Petrus Salius Diuersus, de affect. part. cap. 9. qui refert, se observasse in febribus hac de causa ventrem vno atque altero die ita intumuisse, ac si per menses plures Ascite ægri tales laborassent. Ipse autem distinctione hac controuersiam componi putat, statuitque, tres esse hydropis species, ratione materiæ distinctas; Anasarcam à materia pituitosa & cruda; Ascitem à aqua; Tympanitem à flatu, Hæque hydropis species omnes fieri ex vitio hepatis immediate ex intemperie malè affecti, siue id fiat primariò per propriam passionem, siue per consensum & secundariò. Hæque omnes non subito, sed sensim fieri. Et si verò præterea tumor ventris quandoque ab aqua accidat, cuius Galenus, sympt. caus. s. 2. meminit, qui ab intemperie calida & corporis colliquatione fiat, cum colliquato sanguine & succis, qui in venis sunt, renibus non attrahentibus, subitanei hydropum status fiunt, quales ipse etiam observauit; tamen hydropis speciem esse negat ideo, quia non tam generetur vitio hepatis, quàm ex mala totius intemperie. Deinde quia materia, quæ vi colliquationis gignitur, potius est calida, quam frigida; cum in hoc hydropse omnis materia, quæ vitio hepatis generatur, sit frigida. Terriò, quia verus hydrops sensim generatur; hic verò tumor subito. Verum principium hic petit, cum ideo hunc tumorem verum hydropem esse negat, quia hepatis vitio non generetur: cum hoc ipsum in quæstione sit, an omnis hydrops ex hepate generetur?

Carolus Piso, in lib. de morb. ab illuniæ serosa natæ, Serosi humoris in abdomine collectionis, atque ita hydropis Ascitæ causam statuit expurgationem per renes fieri solitam deficientem & suppressam. Quod autem serosus humor, per renes consueto modo non euacuetur, causam esse dicit, quia aut serum ex prima officina non distribuitur ad secunda viscera, hepar & lienem, sed in mesaraicis restitit, gastricis, epiploicis, aut certè portis, radicibusque earum, & conuexa viscerum non peruadit; aut ubi transgressus est viscera, hæret in stipitibus causæ siue arteriæ siue venæ splenicæ, & hinc inde ram in radicibus eorundem vasorum, quam in ramis emulgentibus, & per corpus renum dispersis, ibique subsistens renes euadere non potest, de qua sententia postea, quæst. 2. plura dicemus.

Cum ergo in re tam seria & tanti momenti Medici discrepent, omnino operæ pretium est, diligenter in veritatis inuestigationem hic incumbere, & rem ipsam omni auctoritate seposita perpendere. Ut verò ab eo, quod apud omnes in confesso est, incipiamus, aquam seu humorem serosum in abdominis cavitatem plerumque collectum, idque distendentem proximam & continentem hydropis Ascitæ causam esse, omnes concedunt. Cuius autem partis vitio aqua colligatur, de eo, ut ex iis, quæ hæcenus dicta sunt, patet, non omnes consentiunt. Plerique euidem hepatis vitio, quod pro sanguine bono & laudabili serosum generet, id fieri statuunt. Verum si non solum auctoritates attendamus, sed quid in ægris quotidie fiat, observemus, omninò concedendum est, quandoque salvo hepate aquam in abdominis cavitatem ita colligi posse, ut inde intumescat, ut supra satis probatum est. Lienem certe salvo hepate malè interdum affici in hydropicis & auctoritas Hippocratis, lib. 2. de muliebribus, supra allegata & observationes doctissimorum Medicorum, restantur.

Neque venæ mesaraicæ, quæ chylum à ventriculo ad hepar & lienem transmittunt, extra culpam semper sunt, ut supra dictum, & quæstione sequenti etiam probabitur. Neque etiam hoc negari potest, renum, vterum, vesicæ & aliarum partium in ventre inferiore vitio aquam in abdomine colligi posse.

Idcoque vt hæc concludamus, hydrops, qui non à priuata alicuius partis, renum, vtererum, vesicæ vitio generatur, sed ex iis partibus, quæ secundæ coctioni inferniunt, in specie & *αἷμα* hydrops appellatur, cū is frequentissimè accidat. Est enim vñitatum, vt de omnibus dicamus, quod frequentius accidit.

Interim non est negandum, etiam aliis de causis, nec organis secundæ coctionis læsis, humorem aquosum & serosum in abdominis capacitare colligi, & inde ventrem intumescere posse, scilicet ex intestinis, renibus exulceratis, vt obseruauit Platerus; item vtereribus à calculis transeuntibus, vel ruptis, vel ita extenuatis, vt serum transsudare possit, vt & vesica vel rupta vel vulnerata, & vulnere malè curato. Nam hæc vata & receptacula sunt sero è corpore euacuando destinata. Si verò alicubi in iis via aperitur, per illa serum & vrinam in abdomen destillare posse, extra controuersiam est. Nonnunquam & à causa aliqua externa & vi illata, venarum inelaraicarum, quæ omentum & mesenterium perreptant, aliqua rumpi & aperiri potest, è qua primò sanguis in ventrem confluit. Si verò vulnus in vlcus conuertatur, serum continuò ex eo in abdominis cauitatem destillare & hydropem excitare potest, quam etiam cruenta deiectio & vomitio aliquando præcedit & purulenta sequitur. Idem à testibus in mulieribus accidere posse, satis docet historia illa & obseruatio Iohan. Heintzj, supra allegata de ancilla hydropica, in qua hepar & lien salui reperti sunt, testes verò valde tumidi & vesicis aqua repletis turgidi aquam in abdomen effuderunt: & notum est, quantum vulnera, quæ articulis & neruosis partibus infliguntur, si non rectè tractentur, ichoris & serosi humoris effundant, parte vulnerata nutrimentum affluens non bene coquente & assimilante, ac humoribus vitiosis è corpore ad locum affectum confluentibus. Idem ergo si accidat in parte aliqua in abdominis cauitate, magnam aquæ & saniei copiam in abdomine colligi posse, manifestum est.

Hi ergo tumores omnes cum etiam ab aqua in abdomine contenta ortum habeant, si re ipsam spectes, aquæ inter cutem & hydropis nomen merentur: quia tamen hi tumores abdominis rariores sunt, nec etiam ab antiquis annotati, atque aliam etiam causam & curandi rationem, quam vulgatus hydrops habet, plerique hydropis nomine eos non dignantur. Verum de nomine hic non litigandum, sed illud potius dispiciendum, à qua causa humoris aquosi in abdomine collectio fiat, vt curatio postea rectè institui possit.

Eadem ratio est hydropis, qui ex colliuatione sanguinis & succorum in venis prouenit. Petrus Salius Diuersus equidem veram hydropis speciem esse negat: ipse tamen caput, in quo de eo tractat, inscripsit, *de hydropse ex colliuatione*: & licet Galenus, 3. de sympt. causis, c. 2. non hydropem, sed *ὁ ὁρδὸς καὶ τὰς αἰτίας* nominat: tamen ipse hydropem *ὁ ὁρδὸς καὶ τὰς αἰτίας* nominat. Et 2. ad Glaucon, c. 3. *ὁ ὁρδὸς καὶ τὰς αἰτίας* & ipse Hippocrates, 1. epid. comm. 2. 36. hydropis nomen tumori *ἐν καὶ τὰς αἰτίας* tribuit.

Hercules Saxonia equidem lib. 3. Pract. c. 22. adhuc aliam, præter hætenus enumeratas, causam addit, & hydropem etiam à sanguine fieri asserit, scribitque fuisse quendam religiosum ad Spiritum Sanctum, qui patiebatur herniam, & cū semel factus esset intestino-rum prolapsus, repente factum esse hydropicum, & eodem etiam die tabidum. Cū verò post 14. dies mortuus esset, inuentus fuisse in ventre 10. vel 14. libras sanguinis: quibus euacuatis venter ita detumuit, vt nulla amplius moles confisteret. Verum enim verò tumor equidem ventris fuit ex sanguine per venam aliquam effuso ortus, sed non hydrops, qui, vt nomen ipsum indicat, tumor est ab aqua ortum habens; parètque tumor ventris latius, quàm hydrops.

## QVÆSTIO II.

*Qua causa prima sit collectionis humoris serosi in Ascite?*

Seposito autem illo hydropse & tumore abdominis, aut quomodocunque appellare libeat, qui ex renibus, vtereribus, vesica, vtero ortum habet, de eo saltem hic quærimus, qui hætenus ab hepate solum prouenire creditus est, & qui *αἷμα* hydrops appellatur, ac frequentior est, quænam sit prima collectionis aquæ in eo causa. De quo Autores etiam non parùm discrepant. Plerique statuunt, sanguificatione in hepate læsa id euenire. Etenim vt in ventriculo accidit, vt is se non rectè habens, vel cibos crudos relinquit, vel eos vario modo corrumpat, vnde etiam vomitus & fluxus alui sæpe sequuntur: ita in hepate idem fieri putant. Dum enim sese rectè non habeat, chylum vel imperfectè elaborari, & crudum ac aquosum sanguinem gigni, statuunt, id quod fit in cachexia & Anasarca, vel corrupti, id quod fiat in Ascite. Etenim generari pro sanguine bono sanguinem prauum, & qui boni sanguinis partem exiguum, multas verò serosas & sanguinolentas partes contineat.

Quæ verò sit dispositio vitiosa in hepate, ob quam sanguis hic vitiosus generatur, itidem non eadem omnium est sententia. Vulgata sententia est, fieri id ab intemperie hepatis frigida. Alij tamen etiam ab intemperie calida id fieri posse, existimant. Scribitque Alexand. Trallianus, lib. 9. cap. 3. non omnes aqua inter cutem laborantes quouis modo calefaciendos esse, & quosdam etiam à refrigeratione adiutos esse. Si nimirum hepar ob caliditatem præter naturam sanguinem bonum non generet. Anicennas, lib. 3. fen. 14. rr. 4. cap. 13. scribit, non attendendum illud esse, quod dicitur, omnem hydropem curari medicamentis calidis. Hoc enim tantum vt plurimum verum esse, & experientia sibi constare, curatum esse hydropem ab intemperie calidà refrigerantibus.

Cardanus quoque, 1. prognost. 2. & in 12. aph. Hippocrat. sect. 1. Hydropem Ascitem & Tympanitem oriri statuit ex intemperie hepatis calida & sicca, idque ideo, quia in hydropse adest sitis, quæ est indicium caliditatis & siccitatis & non tollitur, nisi refrigerantibus & humectantibus, & quod in magna frigiditate hepatis homo non deducitur ad hydropem, sed ad fluxum vrinæ, ad inappetentiam, malum calorem & morbos frigidos alios, & quod è magnis sanguinis effusionibus, quæ contingunt per vulnera, nemo fiat hydropicus, cum tamen ibi fiat summa refrigeratio hepatis: Sed potius in fluxu hæmorrhoidum & mensium ob corruptionem sanguinis. Insuper addit, si adesset frigiditas hepatis in hydropse, medicamentis calidis iuuarentur ægri. Experientiam tamen contrarium restari statuit; cum ab aromatibus omnes lædantur, à malis verò punicis iuuentur, cū corruptioni maxime resistunt, etsi neque vrinam neque aluum mouent. Quapropter ille hydropis curationem instituit per refrigerantia hepar, & ipsum ac renes confortantia & vrinam prouocantia, atque indicium rectæ curationis esse scribit vrinæ attenuationem.

Fernelius, lib. 7. de part. morb. & sympt. cap. 8. causam proximam statuit hepatis siccitatem vehementem, ob quam ceu rimis, sicut in terra sicca accidit, dehiscat & diffindatur, vt serum amplius continere non possit, atque inde causas omnes, quæ hepar vehementer excant, hydropem in eo posse statuit.

Eadem Platerus sententia, qui simul docet, siccitatis huius causam intemperiem potius calidam, quàm frigidam, id quod summa sitis hydropicorum & vrinarum rubedo, aliæque potius caloris, quàm frigoris indicia

*Qua causa prima sit collectio humoris serosi in Ascite?*

*Qualis sit dispositio vitiosa in hepate, ob quam hic vitiosus sanguis generatur?*  
Sec. Trallianum.

Cardanum.

Fernelium.

Platerum.

indicia demonstrant, & quod causæ, quæ hydropem inducunt, potius sint calida, quàm frigida, aromatum & calidorum nimius usus, vini generosi continuatus potus, calida medicamenta, morbi calidi, ut febres ardentes, diurnæ & similes.

Guarini.

Christophorus Guarinonius, *Consil.* 573. Leucophlegmatiam quidem fieri statuit à sanguine imperfecto, & sanguinem rûm esse crudiores ac imperfectum, & pituitæ quasi speciem habere asserit: in Ascite & Tympanite hoc fieri negat, ac tum non sanguinem perfectum & pituitosum abundare, sed aquam aut serum flavum existimat, eumque humorem serosum non provenire ab imperfecta coctione, cum omnis coctio afferat crassitiam & imperfecta imperfectam, nunquam verò tenuitatem: ideoque aquam illam potius à calore colligante & resolvente fieri statuit, materiæ in vapores conversione, qui postea in aquam concrecant. Docet nimirum, chylum, qui in ventriculo è cibis elaboratus est, dum sub venarum torrefaciente calore versatur, in vaporem primum, deinde in aquam mutari, & calidam illam intemperiem non solum esse in hepate, sed etiam in reliquis partibus, per quas transit, quæ chylum in vaporem resoluant, atque sub specie vaporis in abdominis cavitatem excludant, ubi calore amissio in aquam resoluatur: ideoque etiam hydropicis semper iecur siccus & densius est, nunquam mollius, & præterea atro colore præditum, quod malæ nutritionis indicium est, quod cum sit durius, etiam calorem intensiorem retinet, & fortius, quàm par est, in chylum agit, eumque sicut renes, in vapores resolvit & per membranam extrudit. Atque hæc de causâ etiam ascite laborantes parum urinae, eamque valde coloratam excernere scribit, cum parum serosæ materiæ ad renes perveniat, bilis verò multum in hepate generetur. Idque huius rei argumentum esse putat, quod à febribus ardentibus sæpe fiat hydrops, sicut in pituitosis leucophlegmatia & tumores artuum. Et si ab hepatis frigiditate proveniret aqua, cur non potius inde crudus chylus & leucophlegmatia proveniret, quàm Ascites & Tympanites. Ac si à frigiditate hepatis talis sanguis generatur, cur non ille à venis superioribus attrahitur & inde anasarca generatur; cum aliàs sanguis vitiosus in hepate genitus in venam cavam distribui soleat? Nam obstructio venarum, quam nonnulli volunt, in causâ esse non potest. Etenim si sanguis multò crassior, quàm serum, hydropis causâ, ad alias partes nutriendas transire potest, cur non serum tenuius eandem etiam penetraret? Et si in hepate generaretur, cur non potius per proximas & parentes vias euacuaretur, & vel per urinam, vel per alium excerneretur, quàm in abdomen destillaret? Cur autem halitus, inter peritonæum & intestina expressus nunc in aquam, nunc in flatum mutetur, id ex materiæ & efficientis ratione provenire docet. In Ascite enim & efficientis seu caloris, & materiæ, quæ nimis terrestris est, ratione chylum in vaporem converti, qui in aquam mutetur. In Tympanite verò ob calorem magis assantem, & materiam magis terrestrem in fumum, qui in flatum abeat, mutari. Addit is & hoc, si vulgata sententia vera est, nimirum ab hepate refrigerato hydropem fieri, & ascitem ab hepate magis refrigerato, tympanitem à minus refrigerato, sequeretur, quod Ascites esset curatu difficilior, quàm tympanites; cum tamen contrarium quotidiana experientia demonstrat, idque ideo fieri statuit, quoniam morbi ex humore melancholico contracti sint pertinaciores.

Tandem sunt quidam, qui quidem ipsi causam generationis humoris serosi in hepate quærunt, & vitiatam *αιματων* ob frigiditatem esse statuunt, atque in eorum sententiam inclinat, qui à frigiditate vel potius caloris defectu eam provenire existimant, sanguificationem tamen non à nuda intemperie deducunt, sed à calidi nativi & humidi radicalis peculiari in he-

pate defectu & penuria non facile explicabili, & quod non nisi ex effectu deprehendatur vitio, unde etiam hepar eorum, qui hydrope perierunt, minus rubicundum, sed albicans & iusto, siccus apparere, atque calidi nativi hunc defectum tam à causis frigidis id extinguentibus, vel suffocantibus, quàm calidis id dissipantibus & absumentibus, atque in hydropem à causis tam calidis quàm frigidis generari posse statuunt.

Cum ergo in re tam utili & cognitu necessaria Medici ita opinionibus discrepent, omnino in veritatem diligenter inquirere, operæ pretium est; cum nisi de vera causâ & modo collectionis humoris serosi in abdomine constet, curatio recte institui non possit. Idcoque meam sententiam, etsi in Medicorum scholis minus tritam, candidè proponere libet, idque eo libentius, quod eandem sententiam maxima ex parte fouere iam videam Carolum Pisonem, Medicum clarissimum, & in morborum causis inuestigandis diligentissimum.

Authorem.

Primo ergo illud tenendum, autores plerisque hæc mox à ianua aberrare, dum in solo hepate causam collectionis serosi quærunt. Monstratum enim est, quæ *Hydrops sæpe hepate saluo generatur.* *stione præcedente*, sæpe hepate saluo hydropem generari. Et quidem de iis aquæ in abdomine collectionibus, quæ ex intestinis, renibus, vteribus, vesicæ læsis, ex iis hinc aquæ in abdominis cavitatem destillationibus oriuntur, res manifesta est, sed tamen de eo hydrope, qui frequentior est, & citra harum partium vitium, accidit, idem etiam verum est, observatumque, sæpe hydropicis, qui sanguificationis vitio in hunc morbum lapsi crediti sunt, hepar post mortem saluum repertum fuisse, & rationes hoc ipsum suadent. Nam si in hepate serum illud generaretur, cur non à venis attraheretur, & in totum corpus distribueretur, ut in anasarca fieri solet? aut cur non per parentes vias, præcipuè urinam, excerneretur; cum nullum in renibus vitium sæpe deprehendatur in hydropicis? Neque coctione, siue bonâ siue malâ, plus humoris & aquæ ex chylo fieri potest, quàm quantum eius in eo inest, & illa ipsa aqua, quæ sanguini permiscetur, in chylo iam fuit ex cibo potuque relicta, ut esset *δχμια τροφής* & distributioni alimenti interuieret. Ut verò ex chylo corpore composito & heterogeneo aqua saltem fieret, impossibile est: neque in venæ collectione, si in hydropicis ea institueretur, aqua mera, sed sanguis, & sæpe paucò sero dilutus emittitur: & aquam illam hydropicorum non in hepate ex læsa sanguificatione fieri, sed ex cibo & potu assumpto colligi, etiam illud docet, quod quidam à potu omnino abstinentes ab hydrope liberati sunt. Ita refert Plinius, *natural. histor. lib. 7. cap. 18.* Iulium Viatorem, equitem Romanum, voluntate sitim vicisse, cum aquæ subter cutem fusæ morbo laboraret; Et Beniuensis, *de abdit. sanat. & morb. caus. cap. 13.* refert, se rustico cuidam, quem aqua intercus malè habebat, consulenti respondisse, sanari eum non posse, cum morbus iam inueterasset, nisi ultra non bibat, quàm ut vitam sustineat. Rusticum dicto obtemperasse, & per annum nihil bibisse ac sanatum fuisse. Quæ omnia cum ita sese habeant, verò consentaneum non videtur, in ipso hepate serum, proximam hydropis causam generari, sed citra hepar colligi, & aquam in hydropicis cumulari, quod quicquid eius cibo & potui permistum est, ad convenientes euacuationis vias non pervenit, & neque per lienem, neque hepar, ad renes penetrare potest, sed in venis mesaraicis gastricisque & epiploicis citra hepar subsistit. Nam quod Guarinonius non in primis viis hanc aquam colligi, sed chylum in vapores resolui, qui in cavitatem abdominis in vapores concrecant, verò consentaneum non est. Dissectis enim hydropicis ipsa viscera aquâ turgida reperta fuerunt, quæ postea in ventris cavitatem fluxit. Neque etiam semper adest calor torrefaciens. Verum de loco collectionis dicentur plura ob materiæ connexionem *questione seq.*

Causæ



Cur serum in  
primis viis  
subsistat?

Causæ autem, cur in primis viis aqua & serum, quod cibo & potui permixtum est, subsistit, supra explicata sunt. Nimirum non ipse chylus, atque serum in eo sponte vel ad lienem, vel ad hepar & hinc ad renes ruit, sed à partibus istis attrahitur, inferiuntque *diastolæ* & distributioni chyli, ac feri, quod in eo est, duo viscera, hepar & lien, quæ serum in chylo etiam ad se trahunt, & porro ad renes amandant. Maiorem tamen partem feri & aquæ, & quidem per vias propiores è ventriculo lien ad se trahit, & *in quâdam m. p. o. s. c.* humiditates superfluas, ut Aristoteles docet, ad se trahit, ut pluribus in tractatu de Scorbuto monstratum est: reliquum, & quod distributioni chyli ad hepar satis est, cum eo simul ad hepar transit, & officio suo functum, è vena cauâ ab emulgentibus venis attrahitur, & per renes ad vesicam è corpore euacuatur. Ex quo patet, causam hydropis non minus in liene, quàm hepate, imò forsan sæpius, quàm in hepate hæere.

Distributio  
feri quomodo  
impediatur?

Distributio autem isti feri læditur facultate attractrice (imò etiam expultrice) vel læsa, vel impedita, vel ob errorem externum frustratâ. Carolus Piso quidem in ea est sententia, serum ideo in corpus distribui, quia sit confusum sanguini, & per necessariam concomitantiam trahatur. Trahi autem sanguinem propter indigentiam habitu corporis inanito; non verò trahi, ubi nulla est eius indigentia. Ideoque inter hydropis causam etiam refert Plethoram, seu plenitudinem in toto, ob quam & indigentiam nullam attractio in toto & consequenter in visceribus cesset in primis tamen hic eam saltem plethoram admittit, quæ sit ex menstrua purgatione & hæmorrhoidum fluxu suppresso: eam verò plethoram, quæ ab aliis causis sit sanguinem non serosum, sed potius crassum gignere existimat. Serum autem in plethora ea plurimum abundans à reliquo secretum per se exsudare in cavitatem abdominis scribit.

Verum abundantiam sanguinis in toto vix hydropis causam constituendam puto. Etenim etsi facile concedam, illud serum, quod venæ cauæ inest, per necessariam cum sanguine concomitantiam in totum corpus distribui: tamen alio modo sese res habet in prima coctione & chylo, habetque lien facultatem aquosa attrahendi, etiam sine chylo, quod & Hippocrates & Aristoteles docent, & experientia testatur, cum post vinum, vel cerenisiâ, vel alium potum largius haustum, paulò post aqua, quæ in eo est, eadem ferè quantitate, quod etiam in thermis & acidulis accidit, per vrinas excernatur, quod per lienem fieri plerique doctiores Medici concedunt. Ideoque collectio aquæ & feri potius in organis, quæ distributioni chyli inferiunt, quam in venâ cauâ querenda est. Et si collectio feri in vena cauâ ideo facta, quod attractio in habitu corporis cesset, fieret, facile vel per sudores vel per vrinam & consueta viam euacuari posset, ut non opus sit, eam in abdomen regurgitare & penetrare. Quapropter quod distributio feri debito modo non fit, læsa facultate attractrice fit, ideo quod in visceribus, hepate & liene in primis, calor nativus actionum omnium instrumentum deest. Deest autem calor in visceribus, vel quia extinguitur à nimio refrigerantium usu, quæcunque illa sint, seu assumpta seu extra applicata; vel suffocatur, quod fit in plethora, præcipue ex mensium & hæmorrhoidum suppressione, utpote in qua serosi humores unâ cumulantur, & viscerum horum calorem suffocant; vel dissipatur, quod fit ab omnibus, quæ calorem viscerum dissipant & humidum primigenium eorum absumunt & exsiccant, ut febres ardentes, vini potentis usus continuus, medicamenta nimis calida.

Secundò impeditur feri distributio propter valorum angustiam. Etsi enim attractrix salua esse possit, & per se non lædatur: tamen si angustia aliqua sit in vasis, per quæ transit serum, nulla sit attractio, quia non affluit id, quod trahi debet. Angustia autem hæc fit plerum-

que ab obstructione à multis crassis viscidisque humoribus, unde diuturnas & præcipue quartanas febres sæpe sequi solet hydrops. Si quis etiam angustiam à compressione valorum in scirrho viscerum & aliis tumoribus addere velit, cum eo equidem non multum pugnaverim; hoc tamen certum est, in scirrho etiam simul obstructionem adesse, neque humores illos induratos saltem extra vasa, sed etiam in vasis hæere.

Tertiò ob errorem externum feri & aquæ distributio non fit, cum ad lienem præcipue plus eius confluit, quam vel attrahi, vel iterum euacuari possit. Fit hoc, cum lien ipse calidior plus, quam debebat, & avidius humorem aquosum attrahit, vel cum in siti nimia potus nimius hauritur. Ita memini puellam in febre tertiana, cum intensius sitiret, & integrum cantharum cerevisiæ secundariæ vno haustu ebibisset, in hydropem incidisse, quæ tamen aquæ per aluum educatione, in primis Mechoacanæ usu, iterum conualuit. Sic refert etiam Carolus Piso, adolescentem quendam cum in tertiana aquam intemperantius bibisset, sub eius declinatione in Ascitem incidisse, sed illum vnius tabulæ Diacarthami usu, aquâ in abdomine restitante per aluum affatim redditâ, breui restitutum fuisse.

Quamquam verò hic quidam obijciunt, non solum feri in primis viis retentionem, sed sanguificationem læsam causam hydropis esse ideo, quod pauci hydropici, etsi aqua semel sit euacuata, seruentur, sed in idem malum recidunt, quod indicium sit, sanguificationis læsæ, quæ, etsi aqua semel euacuata sit, iterum eam generet: tamen id nostræ sententiæ non officit. Equidem concedimus, paucos hydropicos seruari, & quidem ob calidum nativum & humidum radicale in visceribus absumptum, quæ restituere impossibile est. Fit tamen tum Hydrops non tam ob sanguificationem, quàm attractionem læsam.

Causa re-  
diua in Hy-  
drop.

Quod etiâ accidit, si lien vel hepar inueterato scirrho laborent, ut nec rectè attrahere possint, nec humoribus transitum præbere. Cum verò ista mala inueterata curare impossibile sit, etiam hydrops inde ortus curari non potest. Præterea læditur quidem sanguificatio, unde etiam tandem atrophia partium inferiorum sequitur: sed læsa illa sanguificatio non est causa hydropis, sed potius ab hydrope ortum habet, cum scilicet aqua hepatis & visceribus omnibus in abdomine circumfusa, ea corrumpit.

Atque ex his omnibus, quæ hætenus dicta sunt, patet, vera quidem esse pleraque quæ antiqui de causis hydropis protulerunt, sed iis potius ut causis remotis, quam proximis. Et licet concedatur, ab intemperie viscerum frigida, aut potius calidi nativi & humidi radicalis in iis defectu peculiari, scirrho item & diuturnis obstructionibus ac substantiæ viscerum corruptione hydropem oriri, sicut nec negatur, ab hisce vitiis etiam sanguificationem lædi, quia tamen non solum alteratrix facultas viscerum, sed & attractrix ab iisdem causis læditur, hoc iam in questione est; an serum & aqua, quæ in hydropicis colligitur, alteratricis, seu sanguificationis vitio generetur, an verò potius attractricis culpâ cumuleretur, dum illud, quod aquosum est in potu & cibo, non attrahitur, & per convenientes vias euacuatur, sed mox in primis viis restitatur: quorum hoc probabilius esse, hætenus monstratum est.

Et ut tandem in hac de causis hydropicis disceptatione superioribus aliquid adhuc de Paracelsi & eius sectatorum sententia addamus, eos à sale resolutum hydropem deducere, supra dictum, & quidem plerique proximam hydropis causam statuunt sal aluminosum, quod alij etiam tartarum aluminosum appellant. Resolui autem sal illud ab humore & liquefcere à variis causis statuunt. 1. ab angustia interni cœli microcosmici, seu stellæ hydropicæ & aquosæ, à qua pluvia interna moueatur, quæ saltem attingens illum liquefaciat. 2. à propria

An hydro-  
pis sit à sale re-  
soluto.



propria natura salis, qui natura sua in resolutionem abire aptus natus est. 3. à Diæta aquosa & cibis humectantibus & potu minus conueniente. 4. à similibus morbis, qui talem resolvere possint, de qua re Paracelsus in duobus tractat. de Hydrope, lib. 2. de tartaro tract. 2. c. 6. Scheunemannus, in medicin. reformat. Petrus Seuerinus, in Idea Medicin.

Verum enim verò Primò etsi aqua Hydropicorum falsa sit tamen ex resolutione salis coagulati vel aluminosi eam factam, nunquam probatum. Nam quæ de pluuia illa interna dicuntur, allegorica sunt, & magis Rhetorum, quam Physicorum & Medicorum Scholis apta, in quibus allegoriis ludere non decet. Deinde omnino falsum est, aquam illam ex viscerum sale resoluta factam esse; cum partes ex in hydrope sæpe integræ sint. Et si sal eorum resolveretur: tamen tanta copia aquæ inde colligi non posset. Præterea notum est, saltem non liquefcere & resolui, nisi à partibus oleosis terrenisque, quibus admixtus est, separaretur, quod in hydropicis non accidit. Vnde quæ de causis resolutionis ab iis dicuntur, frustra afferuntur, & partim aliena, partim falsa sunt. Si sal purus alicubi esset in corpore in magna copia, à cibo & potu similibusque causis forsân liquefcere posset: verum cum talis non detur, frustra ista afferuntur.

### QVÆSTIO III.

*Per quas vias aqua Hydropicorum in cavitatem abdominis perueniat?*

Postquam hætenus dictum, quomodo aqua in hydropicis primò circum viscera colligatur, iam porrò quaeritur, per quas vias collecta in abdominis cavitatem perueniat, de qua re inter autores variè disputatur. Hippocrates hac de re aphorismum habet, 7. sect. 55. *Quibus, inquit, iecur aqua refertum in omentum eruperit, his venter aqua repletur, atque moriuntur.* Quem aphorismum ita Galenus explicat: *Maximè, ait, epas obnoxium, generandis in ea tunica, qua extrinsecus ipsum ambit, vesiculis aqua plenis vulgò dictis hydatidibus. Siquidem in ingulatis animalibus apparet, interdum talibus vesiculis refertum. Si ergo acciderit, ut tales vesicula rumpantur, in eam peritonæi regionem aqua effunditur, qua est secundum hypogastrium.* Verum cum dicat Hippocrates, aquam non in abdomen, sed in omentum erumpere, omentum verò solidum sit, sibi que vndique constans & densum, ut nihil in se ex parte alia introlabi & erumpere sinat, præterquam ex liene, illisque partibus; vnde nascitur, aut exedi putat Galenus peritonæum parte illius dextra, quæ iecori propinquat, aut illud, in omentum erumpit, in omenti locum explicandum existimat. Verum verbis Hippocratis vix consentanea est illa Galeni explicatio. Expresè enim Hippocrates loquitur non de aquæ in abdomen, sed in omentum eruptione.

Alij, ut Fernelius, lib. 6. de part. morb. & sympt. cap. 8. eos turpiter hallucinari putant, qui existimant per angustos cæcosque poros serosum humorem transferri in capacitatem abdominis. Nam, inquit, hac ratione peræquè omnes inuaderet & distribuendis humoribus videretur natura inutiliter vias ductusque tam multos destinasse. Adde, quod in iis, quos ex vrina per dies 20. suppressa extinctos nouimus, aquæ nihil deprehensum est per cæcos illos ductus in abdominis spatium defluxisse, quoniam integra nec pertusa sanguinis serique receptacula. Ipse verò putat, visceris substantiam siccitate & humoris penuria, seu nimis quibusdam dehiscere, eorumque ambientem membranam diffingi, ut non amplius serum tenue continere possit, sed id renum more elabi sinat, atque

sensum, quasi ex fissa olla stillare in vacuum abdominis spatium.

Verum enim verò præsupponit hæc Fernelius in omni hydrope hepar affici, quod tamen cum experientia non consentit, & sæpe hepate saluo & nimis talibus non apparentibus, atque int egra hepar ambiente membrana hydrope quoddam mortuos esse compertum est. Neque etiam credibile est, in corpore viuente tantam siccitatem induci posse, ut substantia partis præ ea rumpatur & dehiscat: & licet verum sit, causas calidas, ut vini calidioris nimium potum, calidorum medicamentorum frequentem vsum, & morbos calidos hydropem inducere posse: tamen de eo adhuc quæstio est, quomodo calida ista hydropem inducant. An siccando hepar, ut rumpatur & dehiscat; An verò potius eius calidum natium dissipando & humidum insitum absumendo; quod posterius probabilius est. Et si à dehiscente hepatis substantia hydrops oriretur, omnis hydrops esset incurabilis. Licet enim aqua vel per *πυκνύτην*, vel per purgationem educeretur: tamen tantundem quotidie iterum influeret. Vesicas illas seu hydatides hepatis quod attinet, licet illæ procul dubio etiam in brutis, & aliis animalibus dentur: tamen nec ex illis tantum feri fluere potest, quantum ad hydropem constituendum necessarium est. Et licet in ouibus & aliis brutis frequenter hæ vesicæ conspiciantur: nemo tamen propter eas illa hydrope laborasse deprehendit. Neque quæ contra cæcos illos meatus affert, satis firma sunt. Neque enim si iis apertis hydrops fiat, omnes in hydropem incidere necesse est, cum id non fiat, nisi adsit magna serosi humoris quantitas, qui vel copia vel acrimonia vasorum orificia aperit. Quod verò quidam, qui ex vrina diu suppressa extincti sunt in hydropem non inciderunt, causa est, quod serum iam ultra hepar penetrauerat, non in primis viis, quod in hydropis generatione fieri solet, substitit. In eo tamen assentimur Fernelio, quod non simpliciter ad occultos meatus confugiendum sit. Ipsi enim illi manifesti ductus venarum, quibus sanguis & chylus, ac serum, quod in illis est, defertur, sufficiunt: Si nimirum eorum orificia aperiantur, & humorum aquosum exstillare sinant.

Cum Fernelio consentit Platerus, qui causas, ob quas hepar exiccare & dehiscere possit, recenset. Idem tamen alias etiam plures causas addit, & in abdominis cavitatem serum defluere posse putat, ex hepate & liene exulcerato vel contuso & vulnerato; à renibus item si eorum continuitas soluat; à venarum omentum & mesenterium perreptantium, ut & aliarum partium in ventre inferiore, vterum puta & vesicæ continuitate soluta.

Verum hepatis & lienis vulnera, contusionem & exulcerationem quod attinet, æger prius ex his morbis moreretur, quàm tantum feri per ea efflueret, quantum ad hydropem necessarium est. Reliquas causas quod attinet, omnes ad feri in abdomine collectionem facere posse putamus, sed raræ sunt hæ hydropis species, & propterea eas Medici hydropis Ascitæ nomine non comprehendunt, & aliam etiam curandi rationem, quàm vulgaris hydrops, requirunt.

Adrianus Spigelius, de corp. hum. fabr. lib. 8. c. 6. tres vias agnoscit. Prima est illa Fernelij per membranam hepatis ruptam. Addit tamen, hanc Fernelij opinionem haudquaquam semper veram esse; cum ex iecore aqua etiam sine manifesta continui solutione siue tunice & membranae exterioris, siue etiam ipsius substantiæ effluere possit. Alteram viam ponit venas, quæ per omentum disseminantur, quarum tunicas vel copia dilatat, vel acrimonia exedit.

Tertiam viam aliis ignotam addit, lobum exiguum in caua hepatis parte iuxta portas, qui in ipsam omenti cavitatem totus reconditur, & substantia est mollissima, ac tenera membrana obtegitur, quæ facile rumpi potest.

Verum,

Verum, ut dictum, ipse Spigelius agnoscit, primam viam non semper locum habere. Eadem & ratio est tertia via. Neque enim per lobum illum exsudare potest aqua, nisi ubi in hepate copiosa continetur, quod non semper accidit. Neque experientia probatum, seorsim illam materiam tantum ad lobum illum confluisse, id quod probandum erat: siquidem in morborum causis investigandis videndum quid fiat, non quid forsitan fieri possit. Et si aliquando contingat: tamen ex isto lobo in omentum defluit, & hinc in abdominis cavitatem destillat.

Itaque verbatenus Hippocratis sententiam retinemus, qui in omentum aquam erumpere dixit, & eorum sententiam probabiliorum putamus, qui e venarum portarum propaginibus per omentum sparsis, & præcipue ramo, qui Gastroepiploicus dicitur Recentioribus, in omentum aquam in venarum portarum ramis subsistentem fluere, & hinc vel tunicis earum rarefactis per *σπασμόν* aut osculis illarum patefactis per *άναστομωσιν* aquam in abdominis cavitatem influere statuunt. Si enim, ut *quæst. præced.* dictum, aqua illa, quæ cum cibo & potu hauritur, in primis viis subsistat, eaque neque ad lienem neque ad hepar trahatur, atque hinc ad renes peruenire non possit, cumulat in illis viis, & nisi ad ventrem refluat, in omenti, ut partis laxæ, venas ruit, easque aperit. Aut licet ad lienem perueniat, vel ad cauum hepatis pertingat, inde tamen ad omentum facile peruenit. Et docet idem *alibi* etiam Hippocrates. *libro 4. de morb.* Nam ita scribit: *In ventriculo autem etiam porus feritur, quod cum expletus fuerit, ab eo lien recipit, & ad venas & omentum transmittit.* Et *lib. 1. de morb. mulierum*: Cum febris vehementis hominem detinuerit, neque dimiserit, sititque valde corripuerit, & biberit, quod ad vesicam defertur, per urinam redditur: Lien vero quod reliquum est, ex ventre ad se raptum suscipit, cum sit rarus & spongiæ similis & prope ventrem situs. His ita se habentibus, si neque exsudauit, neque in ventrem dimittatur, ex eo splen attollitur, idque magis, si aqua epota fuerit. At si quis ipsum atterat, mollis est, veluti lanæ tomentum, interdum etiam durus ac renitens. In tumorem autem sublatum & oppletum per venas aquam in corpus transmittit, præcipueque in omentum & partes ventriculi ambientes. Idem in mesenterio accidere, & humores serosi ibidem subsistere possunt, quod Hippocrates etiam concedere videtur, *lib. 4. de morb. mulierum.*

Autoritatibus hæc subscribit ipsa ratio. Cum enim non raro ex subita porus repletionem hydrops fiat, lien vero potulentæ materiæ maximam partem attrahat, in omentum procul dubio ex liene defertur, & deinde in ventrem destillat. Potest tamen idem etiam fieri, si in mesenterio subsistat. In corpore enim ubi in vnaquaque parte plus, quam par sit, aut quam continere possit, humoris cumulat, altera ad alteram transmittit, ut loquitur Hippocrates, *lib. 1. de morb. mulier.* Nulla vero vicinior, & magis commoda pars est, in quam lien, ut & mesenterium se se exonerare possit, quam omentum; vepote quod venas à solâ venâ portarum habet, & superior quidem membrana utramque gastroepiploidem dextram & sinistram inferior autem epiploidem dextram, & posticam; Arterias totidem à coeliaco & mesenterico ramo. Præterea si februm intermissionem & aliorum morborum latentium hic focus est, ut vult Fernelius: credibile etiam, hæc causam hydropsis in primis querendam esse, ut qui febres diuturnas, obstructions pertinaces, cachexiam & alios huiusmodi morbos sequitur. Rationi denique subscribit experientia, quod in dissectis hydropicis omentum plerumque vitiatum deprehenditur. Ita in ancilla illa hydropica, de qua Heintzius, omentum corruptum repertum est, liene & hepate saluo. Columbus autem, *lib. 15. anatomia*, lienem & hepar saluum

reperit in hydropica, in omento vero refertissimum abicessum. Ego quoque in studioso quodam in Noëcomio Academiae Hydropo & Scorburo mortuo hepar & lienem saluum reperi, omentum vero totum penè putredine absumptum. Et talia procul dubio quotidie obseruare est.

Non tamen excludendum hic est Pancreas. Cum enim in sinistra parte prope lienem situm sit, & in medio splenicam venam ad lienem transeuntem, simul & coeliacæ arteriæ sinistrum ramum habeat, facile etiam in eo serosi humores colligi possunt. Scribitque Rondeletius, *cap. 35. Pract.* *Id annotatione dignum est, quod ex frequentis corporum dissectione obseruauimus, omnes hydropicos glandulas mesenterij induratas habere & pancreas similiter.*

Et si verò quis hic obicere posset, quod Hippocrates, *allegato aphorismo 7. sect. 55.* scribat, quod quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, illis ventrem aqua repleri & mori; cum tamen non omnes hydropici moriantur, atque ita non ex omento aqua destillasse videatur: tamen sciendum, non semper aquam ex hepate in omentum deponi, sed etiam ex liene. Deinde non semper, ubi hepar aqua plenum tam in omentum deponit, ægri moriuntur, sed ubi in omentum eruperit. Vox enim *παρὰ* apud Hippocratem, ut etiam Foësius, in *Oeconomia*, monet, semper violentam & periculosa eruptionem significat, ut hoc loco Hepar valde corruptum supponatur, & eruptio ista vltimus naturæ conatus sit.

#### Q V Æ S T I O I V.

##### *An Rhabarbari vsus in curatione Hydropsis utilis sit?*

De Rhabarbari vsu in hydropo Medici dissentiunt. Plurimi equidem id valde commendant, scribitque Guilielmus Placentinus, *c. 120.* Indubitanter credat omnis homo, quod solum cum exhibitione Drach. ii. rhabarbari pulueriari & cribellari exhibiti in aurora mixti cum Vnc. ii. oxymel. compos. & Vnc. iii. vel iiii. decoct. lactucarum, scariolæ & radic. fænicul. multos curauimus. Exhibet autem de tertio in tertium pro vitium ratione. Aliis verò diebus, quibus non datur rhabarbarum, exhibet ante prandium & cœnam Vnc. i. s. oxymel. scillit. vel compos. in aqua decoct. lactucæ, scariol. & rad. fænicul. Quod remedium etiam probat Erasus, quanquam omnes sumptus rhabarbari ferre non possint.

Alexander Massaria v. rhabarbari vsu in hydropo improbat, ideo, quod Galenus scribit, in *libello de med. purg. fac. cap. 2.* medicamenta, quæ flauam & nigram bilem purgant, dare in hydropicis inutile esse: Et quod Rhabarbarum præcipue bilem purgat, quæ aquosum humorem quodammodo coerces. Massariam sequitur Ludouicus Septalius, *med. obseru. lib. 7. num. 54.* eadem ob causas. Verum hic ad hydropsis causam respiciendum. Etenim si hydrops originem habeat à bile, quæ per venas mesaraicas ipsamque hepar dispersa calorem natium viscerum corrumpit, & sæpe etiam, si sit crassior, pertinaces obstructions parit, imò in calculos quandoque degenerat, quod sit sæpe post icterum longum & diuturnam febrem, tunc non incommode rhabarbarum vsurpatur, quod humorem biliosum euacuandi visceraque roborandi vim habet.

Et cum absinthium, quod in hydropo plurimum prodesset omnes concedunt, non paruam cognitionem (et si vis aperiendi in absinthio minor sit) habet. Et ratio illa Massariæ de bile, aquam quodammodo temperante, saltem locum habet, ubi in vena caua illa consistit. Serum verum in abdomine contentum temperare non potest. In aliis verò causis non sine discrimine vsurpandum, sed magis hydragogis supra enumeratis fiden

*An Rhabarbari vsus in Hydropo conueniat? Sententia Placentini.*

*Massaria.*

*Lud. Septalius. Autoris.*

fidendum; et si rhabarbarum roborandi viscera gratia addi possit.

# CAPUT IV.

## De Tympanite.

Tympanites.

**S**ecunda Hydropis species est Tympanites, cui nomen à tympano inditum, cuius sonum refert venter flatibus extensus, si manu percutiatur. Antiquiores ut ipsum ab Ascite seu aquoso hydropis distinguerent, sic cum hydropem nominare consueverunt, 4. aph. 11.

### Causa.

Causa.

Causa proxima & continens est flatus in abdominis cavitate & sæpe etiam intestinis inclusus. Observavit enim Platerus, flatus non solum in abdominis cavitate, sed & intestinis retentos hunc tumorem excitasse, deprehenditque, in quibusdam, qui tympanitici putabantur, post mortem sectis nullum flatum è ventris cauo erupisse, nec ventrem subsedisse, sed intestina, præsertim tenuiora, adeo flatibus distenta & conuoluta profiliisse, ut in eundem ventrem amplius reponi nequirent, mirumque fuerit, quo pacto in ventre adhuc clauso contineri potuerint. Simile quid observavit, Smerius, ut *miscell. lib. 7. ep. 4.* refert, Antuerpiæ in puerpera quadam, quæ durante puerperio, ex animi ægitudine mortua est, in cuius dissecto corpore intra peritonæum extra intestina ne guttula quidem aquæ, nec flatus quioquam inventum, verum vniuersa intestinorum volumina, imò vna ventriculus ipse, flatibus distenta & pellucida & tantum non omnis excrementi vacua visa fuerunt.

Tympanites raro à solo flatu fit.

Raro tamen solus flatus reperitur, sed plerumque aquæ permixtus: prædominatur tamen in tympanite flatus, sicut in ascite aqua, & ab alterutro denominationem tumor accipit. Ita tamen interdum miscentur, ut vtrum ad ascitem, an verò tympanitem hydrops referendus sit, ambigas. Interdum etiam ascitem flatus præcedunt, sicut & tormina circa umbilicum, proculdubio ex flatibus orta, 4. aph. 11. Refertque Schenckius *lib. 3. observ. 126*, ex observ. D. Francisci Tidicæi, virum quendam sexagenarium satis alioquin corpulentum aliquot menses antequam ipsi per aquæ accumulationem in manifestum tumorem attolleretur venter, hoc symptomate infestatum fuisse, quod quotiescunque assidens mensæ cibum sumpturus & iam mandere cibum aggrediens, tanta corripiebatur anhelandi difficultate, ut pro crebritate respirandi suffocationis periculum præ se ferret, ut ex eo cibum semimanlum ex ore reticere subinde cogeretur. Idem in hoc symptoma incurrebat, quotiescunque se ad somnum componens iam obdormiscere inciperet. Ipse verò affirmabat, se eo tempore percipere circa hypochondria palpitationem quandam, atque omnino tale quid, ac si præcordiis aliquid viui animalis subesset. Hic vir tandem ascite periit; Cuius hepar cum aperiretur, illius abdomen, quantum externam eius faciem attinet imò dissectum, nihil ferè à sana hepatis constitutione differre visum fuit, neque quicquam in eo vitij, sicut nec in alio viscere, oculis notari potuit.

Tumor totius corporis historia dicitur.

Cuius symptomatica causa procul dubio fuit flatus in hypochondrio generatus, qui variis modis, ut de scorbutis dictum, respirationem lædere potest, qui postea ascitem tympanitæ mixtum produxit.

Rarum verò est illud, quod idem Smerius, loco allegato, recenset de Tympanite, quem appellat vniuersali, aut potius sarcite flatuoso in iuvene quodam robustissimo Leodiensi, qui cum in conflictu subter axilla dextra ad insertionem musculi brachium ad-

Dan. Sennerti Tom. II.

ducentis vulnus acceperat, quod punctum factum, inter tertiam & quartam costam, quod in pectoris cavitate penetravit, postridie vulneris accepti toto corpore post vnicam noctem maneturgidus apparebat, non solum pectore, sed & dorso, ventre, lumbis, imò scroto quoque, præterea & brachiis, humeris, collo, vultuque, ut ne palpebras quidem deducere posset, quin etiam in vertice ipso, cute vbiq; distenta & tumefacta: tumor erat tensus, & cum dolore non paruo, qui tamen linimentis dissoluentibus corpore inuncto paulò post evanuit. Simile quid, et si in partibus saltem quibusdam anno 1623. mense Iulio observavi hic in studioso quodam, qui vulnus accepit noctu in pectore gladio angusto in dextra parte circa tertiam costam prope alam antè in pectus adacto & in dorso proximè spinam exeunte, ut de læso pulmone nihil dubitandum fuerit, cum etiam spiritus cum sono maximo è vulnere exiret. Huic latus dextrum vsque ad diaphragma & collum etiam circumquaque intumescerebat; qui tumor tamen postea discutientibus cataplasmatibus adhibitis evanuit.

Causam vniuersalis illius tumoris (proculdubio eadem & particularis illius, quem modò recensui, fuit,) refert Smerius in sufflationem pectoris per vulnus axillare obligatū subter cute nocte illa factū, quomodo vesicam recentem & flaccidam inserto calamo à pueris inflari videmus. Cui, modò ista opinio rectè explicetur, assentimur. Etenim pulmo respirationis organum est, per quem & fuliginès è corde expelluntur, & aer attrahitur; Quæ actio, pulmonis substantiā integra & vasis omnibus salvis rectè perficitur; & aeris ille commeatus est ad cor, & fuliginum à corde. Si verò pulmo vulneretur, & simul inter musculos duos vel musculos & cutem aëri via pateat, quod in vtroque vulnere factum, aer, ut debebat, non rectè per os & pulmones ad cor transiret, neque rursus fuliginès è corde rectè ad os, sed aer è vulnere, quasi è folle, in spatium inter cutem & musculos inflatur, & hinc porro in vicinā penetrat. Et si catarrhi ac serosi humores à capite sub cute totū musculolum genus peruenire, & per collam ac dorsum ad crura vsque & pedes penetrare possunt, cur non & aer ac spiritus flauentis idem facere possit? Ac videmus cutem etiam in multis animalibus, ut columbis, dum pro esca parantur, inflari posse. Morbus tamen hic Tympanites, ad quem eum refert Smerius, non est; sed in studioso illo vulnerato fuit dextri lateris inflatio, in altero totius corporis.

Quomodo autem hi flatus in Tympanite generentur, non ita planum est, & alij aliter ea de re sentiunt de quo postea *quest. 1.* dicitur. Nos hoc loco breuiter statuimus, flatum crassum huius hydropis causam esse, qui quomodo generetur, in *Instit. lib. 2. p. 2. c. 7.* dictum. Nimirum duo ad flatum generandos requiruntur Primò materia crassa, & quidem plerumque bilis atra. Cum enim ij, quibus atra bilis ventriculo substrata est, flatibus abundant, & ructus plurimos interdum edant, imò sæpe maxima pars ciborum in flatum commutetur si illi flatus retineantur, abdomen distendunt, & hanc hydropis speciem producere possunt. Neque enim in hepate solum huius morbi causa querenda est, sed sæpe in primis viis; vnde rectè Hippocrates, 4. aph. 11. *Quibus tormina adsunt, & circa umbilicum cruciatus ac lumborum dolor, qui neque medicamento, neque aliter solvuntur, in scilicet hydropem firmantur.*

Deinde causam efficientem quod attinet, equidem, ut in *Instit. loco allegato* dictum, calor debilis dicitur causa flatuum, sed non simpliciter talis, verum ratione materiæ, utpote quam vincere & discutere non valet; imò sæpe præternaturalis & satis magnus est, ac in materiam totam subito & violenter agit, eaque agit, quod in tympanite plerumque fieri existimamus.

Quomodo flatus in Tympanite generentur?

Quomodo calor debilis sit causa flatuum.

namus. Etenim si calor planè debilitatus & infirmus esset, in materiam non ageret, neque flatus excitarentur. Chylus enim, si sub calore blando versatus in venis mesaraicis, primum sanguinis rudimentum accipit, serumque, quod in eo est, cum chylo relinquitur, donec nimirum suo tempore per convenientes vias euacuetur. Si verò nimius & torrefaciens quasi calor ille sit, quod subtile & resolutioni aptum est, statim in vapores & flatus resoluit, qui in abdomen distribuuntur. Hepatis tamen & lienis intemperiem non planè excludimus præcipuè in sima hepatis parte, ubi vena portæ ei inseritur. Nam si & illa sua caliditate & siccitate affluentem chylum non blando calore in sanguinem laudabilem mutet, sed eum torreat quasi, quod in eo subtile & resolutioni aptum est, in flatus resoluitur. Atque ita Ascites & Tympanites differunt ratione materiæ & efficientis. Materia enim in Tympanite est melancholica magis; calor verò torrefaciens & adurens; unde etiam interdum ad remedia frigefaciencia confugiendum est, scribitque Mercurius, si hæc omnia præsidia (calefacientia scilicet) non prosint, utendum esse Hippocratis consilio & prudentia, qui cum multis diebus usus fuisset in hisce doloribus, calefacientibus & nihil commodi inde percepisset, transiit ad frigida magnâ cum utilitate.

Per quam viam flatus in abdominis cavitatem perveniunt?

Per quam autem viam flatus in abdominis cavitatem perveniunt, & ubi hæreant, etiam non ita expeditum est, de quo *quæst.* 2. dicitur. Nos breviter statuimus, partem chyli tenuem & serosam in venis mesaraicis in flatus mutatam vel per orificia venarum mesaraicarum in ipsam intestinorum cavitatem sese insinuare, vel in mesenterium penetrare, atque inter tunicas illas coercitos eos tandem permeare & in abdomen penetrare, vel etiam aliquam humoris serosi partem à calore viscerum circumjacentium in vapores resolui, qui cum exitum non inveniunt, in abdomine cumulantur, idque distendunt.

### Signa Diagnostica.

Signa.

In Tympanite venter digitis percussus sonum instat tympani edit, & moles, abdominis minus gravis, quam in ascite, sentitur. Præcesserunt rugitus ventris & tormina diuturna circa umbilicum, & lumborum dolor; ægro supino iacenti venter distentus ac durus manet, extrema non adeo tument.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Tympanites inter omnes hydropis species periculosissima est, quia plures partes intemperie, eaque sicca & habituali affectæ sunt, & plerumque etiam contrariæ intemperies concurrunt; & quo magis inueteratus est, eò periculosior est.

2. Tympanites, qui fit ab atra bile multa in ventre redundante, ferè lethalis est, & frustra ægro medicamenta adhibentur.

3. In sicco hydropo stillicidium vrinæ malum est, Hippocrates, in *Coac. lib. 2. aph. 19.*

### Indicationes & Curatio.

Indicationes.

Materia, unde flatus eleuantur, euacuanda, & causa, quæ eos atollit, remouenda. Flatus verò, qui iam ventrem distendunt, discutiendi & dissipandi.

Ideoque si pituita adsit, simulque aqua, phlegmogoga & hydragoga exhibenda, ferè ut in Ascite; cum raro tympanites sit sine aqua. Quia tamen flatus prævalent in Tympanite, minus euacuandum, flatus verò discutiencia semper prævalere debent. Quapropter pro materiæ antecedentis, è qua flatus generantur, euacuatione, vsurpanda ea, quæ ad hepatis

obstructiones, ut lienis & venarum mesaraicarum, sunt vitia, & ad inflammationem ventriculi vsurpantur, ut pilulæ de hicta cum agarico, stomachicæ, aggregatiuæ, de rhabarb. & similes.

Vel *℞. Mass. pilul. de hicta cum agarico, turbit. electi, rhabarb. an. ʒ. ii. fol. soldanella ʒ. ʒ. rad. asari ʒ. j. trochisc. alhandal. elaterij, nucus moschat. galange, cinamom. piperis, cubebæ. an. ʒ. ʒ.*

Pulverisanda pulveriscentur & excipiantur omnia succo iridis, & fiat massa, cuius dosis Scrup. ii. vel Drach. j.

Cum oxymel. scillit.

F. Pilulæ mediocres. Plura huius generis purgantia cap. præced. sunt proposita.

Ad flatus discutiendos conveniunt *calamintha, pulegium, hyssopus, thymus, salvia, rosmarinus, feniculum, anisum, cuminum, bacca lauri, & huius generis alia.* Flatus discutiencia. Simplicia.

E compositis: *Species dianis. diacalaminth.* Composita.

Electuar. de baccis lauri.

Utile est & hic pulvis, qui simul concoctionem adiuuat.

*℞. Galang. cinam. an. ʒ. j. ʒ. piper. ʒ. j. cort. citri siccor. ʒ. j. sem. anisi, carui an. ʒ. ii. ligni aloës, nucus mosch. an. ʒ. j. sacch. ros. tabul. ad pondus omnium.*

F. Pulvis.

Utiles quoque sunt clysteres ad discutiendos flatus parati è floribus chamamel. anethi, origani, calamintha, ruta, pulegio, radic. Imperat. helenij. sem. anisi, ruta, cumini, carui, baccis lauri, elect. de baccis lauri, oleo chamamel. anethino, rutaceo, laurino, melle anthosato, quibus & purgantia addi possunt, ut:

*℞. Fol. ruta, flor. chamamel. sambuci, summit. anethi an. M. j. sem. anisi, feniculi, cumini, carui, an. ʒ. ʒ.*

Coqu. in aqua simpl.

Colatura *℞. lb. j. vini maluatici ʒ. iij. benedict. laxativ. ʒ. j. baccis lauri ʒ. ʒ. ol. rutacei, laurini an. ʒ. i.*

F. Clyster.

Extra cucurbitulæ plures sine scarificatione toti ventri, aut una magna cum multa flamma sine scarificatione abdomini post totius euacuationem affigantur. Externa.

Efficax est & emplastrum de baccis lauri.

Utile quoque frictio cum succo allij, vel manibus oleo rutaceo aut laurino inunctis facta, aut allium in vino generoso decoctum ac contusum abdomini applicetur. Quidam vas terreum recens amplum cinere calente replent, & semen dauci, feniculi, cumini inspergunt, & panno lineo coopertum inuersumque ita calidum abdomini imponunt, ut ab ægro perferri potest.

Utiles quoque sunt sacculi ex milio & sale ac fursure torrefactis, & ex semine anisi, dauci, cumini, feniculi, ruta, lauri, pulegij. galange confecti.

Ut *℞. Summitat. anethi, fol. ruta, absinthij, fl. sambuci an. M. j. sem. cumini, carui an. ʒ. ij.*

Coqu. in f. q. vini ad mollietatem.

Contusis adde emplastri de baccis lauri, unguenti Agrippæ an. ʒ. ʒ. ol. anethi, rutacei an. q. s.

F. Cataplasma.

Vel *℞. Stercoris vaccini, caprini an. ʒ. iij. pul. ruta, sem. cumini an. ʒ. ʒ.*

Cum vrina pueri incorporentur additis sulphur. Vnc. iij.

F. Cataplasma.

Vel paretur hoc emplastrum, quod cuti pertinacius adhæret, & satis efficax est.

*℞. Ruta, chamamelij, meliloti, calamintha an. ʒ. ii. sem. carui, feniculi, cumini an. Vnc. j.*

Coqu. omnia in vino & oleo rutaceo vel anethino. Contundantur minutim.

Addatur gummi caranna, cera, an. q. s.

F. Emplastrum.

Cum autem sæpe in hoc affectu coniungatur viscerum intem



intemperies calida, quæ intenditur vsu calidorum medicamentorum flatus discutientium, vtendum, cum minus calidis, & hepatis succurrendum per medicamenta externa; quæ illius calorem temperant. Quam ipsam ob causam, vt etiam vt supra dictum, circa curationem Tympanitis hoc curare iubet Mercatus, si hæc omnia præsidia prodesse non videantur, & ex calidiorum vsu æger nil commodi percipiat, vt transeat ad frigida.

*Diata.*

*Diata.*

Victus ratio omnino flatus sit expers. Potus parsimonia adeo exquisita non est opus. Talis tamen sit potus, qui flatus potius discutiat, quam augeat, & propterea conuenit vinum dilutum ligno sassafras, cortice citri & similibus.

Q V Æ S T I O I.

*Quomodo flatus in Tympanite generentur?*

*Quomodo flatus in Tympanite generentur?*

Quomodo flatus in Tympanite generentur, ob Autorum dissidentes sententias non ita expeditum est. In hoc equidem omnes consentiunt, humorem crassum è primæ coctionis vitio flatibus materiam suppeditare, qui humor vel pituita, acida præsertim vel bilis atra esse potest, quæ in locis ventriculo vicinis collecta humores omnes ferè & cibos in flatus conuertit.

*ibi?*

Verum vbi, & à qua causa materia hæc in flatus vertatur, Autores dissentiant. Qui omnem hydropem hepate affecto fieri statuunt, etiam hic in hepate humorem illum seu chylum non in sanguinem, sed in flatus mutari statuunt. Verum hætenus sæpius dictum, hydropem non semper hepate affecto, sed quandoque eo saluo fieri. Fernelius, lib. 6. de part. morb. & sympt. c. 8. causam huius tumoris statuit esse flatum ex imbecilla coctione & cruditate genitum, in ventriculo aut intestinis cumulatam, quod iam antea docuit Galenus, qui, 3. de sympt. caus. c. 1. scribit, quod vltimus coctionis ventriculi lapsus in lienteriam vel tympanitem finiatur. Fernelium sequitur Platerus, qui docet, cum non alia sint viscera in ventre inferiore, in quibus flatus tam copiose congeri possint, à ventriculo & intestinis eos prodire.

*An in ventriculo & intestinis?*

Verum enim verò rectè opinio ista explicanda est. Neque enim solum ventriculus & intestina flatum horum qui vsque in abdomen penetrant, causa sunt. Etenim, si in ventriculo generarentur, per ructus facillè excludi possent. Neque enim, qui in intestinis generantur, per angustas vias in abdominis cavitatem penetrant; cum satis patens via sit, vt per aluum excludantur. Ideoque quid à Galeno per primæ coctionis vitium intelligendum sit, inquirendum. Præluet autem nobis hic faciem Hippocrates. cum 6. aphor. 1. scribit; *Quibus tormina & circa umbilicum labores & lumborum dolor, qui neque medicamentis, neque aliter soluitur, in hydropem siccam firmanitur.* Etenim si causa huius doloris essent flatus in intestinorum cavitatem, non solum circa umbilicum hærent, sed per intestina vagarentur; neque dolor lumborum esset tantus, neque etiam tam pertinax, vt nullis medicamentis cederet. Ideoque vero magis consentaneum est, statuere eos, inter mesenterij & intestinorum tunicas primò generari plerumque, (et si in cavitatem intestinorum etiam aliqui esse possint.) Cum enim mesenterium ante intestinis tenuibus, in dorso verò lumborum vertebris à quibus nascitur, tanquam in suo centro validissimè annectatur, & torminum circa umbilicum & dolorum in lumbis, qui hydropem siccam præcedere solent causam reddere facillè est. Nimirum cum in primis viis

*An inter mesenterij & intestinorum tunicas?*

id est, in vasis à ventriculo ad cauum hepatis vsque materia cruda & crassa continetur, & præcipue si viæ illæ non satis liberæ sint, calor in eos agens flatus multos excitat.

Quinam autem ille calor sit, & quænam intemperies ac dispositio vitiosa, ob quam chylus ille & materia crassa in flatus mutetur, Autores etiam dissentiant. Plerique intemperiem frigidam esse statuunt, alij calidam esse putant, & hanc ob causam Tympanitem ab ascite differre, & tam difficilis curationis esse, cum causarum contrarietas hic occurrat, & neque sine primæ coctionis vitio, neque sine calore præter naturam hepatis tympanitem fieri existimant. Nam licet ventriculus & intestina ac partes vicinæ frigida sint, modò hepar adhuc bene constitutum & sanum sit; non benequidem coquere hepar statuunt, cum vitiosus chylus in bonum sanguinem mutari non possit, & flatum generare, sed paucissimum, & qui facillè discutiat. Si verò hepatis calor natius debilis sit ob intemperiem præter naturam calidam, plures flatus, qui discuti non possunt, eleuari existimant.

*A quâ intemperie generentur.*

Verum quod hic de calore præter naturam dicitur, id negandum hic planè non puto, & quod supra à Christophoro Guarinonio, consil. 563. de Ascite protuli, id & hic locum habet, nimirum calorem in tympanite torrefacientem potius esse, quam debilem, qui in chylum non blandè agat, eumque quasi foueat, sed subtiliores eius partes in vaporem & flatum resoluat. Concedimus & hoc, calorem illum in hepate, & præcipue eius parte caua, quæ venam portæ excipit, consistere posse, heparque ea parte esse siccior ac densior, nõ molle, vt in sanguineis, & viciis & pinguibus esse solet. Tamen nec mesaraicas venas nec mesenterium excludendum esse puto. Etenim si eæ partes præter naturam sint calidiores & sicciores, chylum, præcipue crudum & crassum, in flatus facillè mutabunt. Quod verò à nonnullis hic prolixè disputatur, an flatus à calore debili vel excedente fiant, ad id respondendum primò, non solum ad agens esse respiciendum, sed etiam ad materiam, quæ vt in flatus transire possit, apta esse debet. Deinde calorem eundem posse dici debilem respectu materiæ, quam totam resolvere non possit; nimium verò respectu partis affectæ, cuius temperiem naturalem excedit.

Q V Æ S T I O II.

*Per quam viam flatus in abdominis cavitatem perueniant?*

Per quam viam in Tympanite flatus in cavitatem abdominis perueniant, Autores quoque discrepant, & vt quisque de generatione flatum sentit, ita suam etià de viam in abdominis cavitatem habet sententiam. Fernelius flatum hunc ex imbecilla coctione & cruditate genitum, cum multus in ventriculo & intestinis cumuletur; & exitum naturalem non reperiatur, impetu viam sibi inuenire & per cæcos tenuisque ductus inter abdominis membranas magnis cruciatibus sese inferre, ac demum vario impulsu in ipsum abdominis spatium penetrare ac deuolui, scribit. Per quas vias & tenues meatus, si eos intelligit, qui in ventriculi & intestinorum tunicis sunt: negat id Platerus; cum etiam tenuissimis membranis facillè coercentur, & humor tenuis facillè transiit, quàm flatus erumpat. Ipse verò in ostiola venarum mesaraicarum flatus in intestinis & ventriculo sese insinuare, atque ex venis mesaraicis, eodem modo sicut serosum humorem, in ventris spatium peruenire statuit, cum is flatus in Tympanite plerumque permixtus sit. Flatus tamen etiam per intestinorum tunicam anteriorem in posteriorem penetrando illic mesenterium, vbi illi conuascitur,

*Per quâ viâ flatus in abdominis cavitatem perueniant? Secundum Fernelium.*

sele ingerere, atque inter illas tunicas coercitos eas tandem permeare & in abdomen penetrare posse non negat. Præter hanc tamen causam collectionis flatuum in abdomine aliam adhuc addit Platerus, nimirum eorundem generationem in ipsa ventris cavitare, quando nimirum humor aquosus in abdominis cavitatem transsudans vel destillans, atque ibi collectus in flatu resoluitur, quod fit ob calorem viscerum internum. Atque in hac sententiâ Plateri nihil desidero nisi quod putat, ex spatio intestinorum flatu per ostiola venarum melsaraicarum in intestina sese insinuare, atque hinc ex venis melsaraicis in cavitatem abdominis penetrare. Neque enim hoc necessarium est, cum flatu in ipsis venis melsaraicis & circa hepar & alibi generari possint.

## CAPUT V.

## De Anasarca.

Anasarca.

Anà λευκοφλεγμα-  
τια δια-  
φέρει?

**A**nasarca quam & *σφοδρὴν* & *λευκοφλεγματίαν* nominant, ita dicitur, quod vniuersa corporis moles per carnem & sub cute humore pituitoso plena tumida & alba appareat. Aræteus tamen, in 2. dicitur, cap. 1. inter anasarcam & *λευκοφλεγματίαν* distinguit, quod hic ex alba pituita, crassa & frigida in hepate genita, ille ex carnis in humorem aquosum & tenuem resolutione oriatur. Verum alij autores distinctionem hanc non attendunt; neque credibile est, ex carnis resolutione, quæ proculdubio à causa calida fieri debet, hanc frigidam morbi speciem provenire posse. Maioris momenti est illa distinctio, quâ vocabulum leucophlegmatiae sumitur nonnunquam pro morbo nimirum de tumore totius corporis ab humore pituitoso, aliquando verò de dispositione, quæ hunc morbum producere solent, & læsa sanguificatione (quo modo de ea hoc loco præcipue agimus,) in qua ob pituitam, quæ in toto corpore cumulari incipit, totum corpus albidum redditur.

Est enim Anasarca seu Leucophlegmatia affectus cachexiæ affinis, differens ab eo solum magnitudine; quoniam frigiditas hepatis & venarum, siue primario siue aliunde acquisita, hic maior est, & materia cruda in venis & habitu corporis copiosior, molesque tota corporis humidior. Præterea, Auicenna teste, alimentum in cachexia agglutinatur quidem, sed non assimilatur; in anasarca verò neque agglutinatur, neque assimilatur. Etsi enim apponatur alimentum: tamen dissimile est, neque assimilari potest, & ita quædā falsa nutritio accidit, nutritioque frustratur ob errorem externū. Nam partium, quæ in ambitu corporis sunt, temperies ex affluente pituitoso & frigido alimento non aliter refrigeratur, atque ex aëre circumfuso iis accidere potest, qui in locis palustribus aut carceribus degunt, atque deinde aut cachectici aut hydropici fiunt, malo cum hepate communicato.

Generatur autem pituitosus ille humor & crudus sanguis primò omnium consensu hepatis vitio & intemperie frigida ob quam pro bono sanguine, pituitosus & crudus generatur & copia pituitosi humoris coaceruatur, quem cum facultas nutritrix non superare possit, fit prava nutritio.

Frigiditas autem illa provenit vel à sanguinis copia, qua gravata facultate naturali & calore oppresso bonus sanguis generari non potest, sed pituitosus & crudus producitur; vel à pituita & crudorum humorum redundantia; qui à causis refrigerantibus internis & externis ortum habent.

Et omnino, ut dictum, easdem causas habet leucophlegmatia, quam cachexia, saltem magnitudine differens; & sæpe feminis ex retentione mensium, ut &

gravidis præcipue si fetus sit debiliior, & alimentum non satis attrahat, accidit. Exemplum habet Hippocrates, 7. epid. in Harpalidæ sorore, cui quatuor aut quinque mensium uterum gestanti pedum tumores aquosi exorti sunt, & oculi in orbem intumescebant, totumque corpus, veluti pituita albâ suffusus, in tumorem subleuabatur. Tussis sicca, erecta cervicis spiratio, eiusmodique anhelatio, interdumque à spiritu suffocabatur, adeo ut perpetuò sedere in lecto cogere, neque decumbere posset, sed si qua somni incideret opinio, eum desidendo caperet. Interdum ex nimio mensium vel hæmorrhoidum fluxu oritur.

Deinde nonnulli statuunt etiam citra hepatis refrigerationem corporis vniuersi habitum ita refrigerari posse; ut bonum quoque alimentum affluens assimilare non possit, sed id potius corrumpat. Externas enim causas in partes externas aliquam intemperiem inducere posse, ut bonum quoque nutrimentum perficere nequeant. Et posse interdum hanc intemperiem frigidam ab vna parte originem sumere, nimirum à pedibus. Hi enim, ut à fonte caloris remotiores, si refrigerentur, & multam pituitam cumulent, idque malum sensim auctum ascendat, tandem corpus totum refrigerari & in consensum trahi posse. Verum si toti corpori talis causa occurrat externa, ut antea etiam dictum, tale quid accidere & bonum alimentum affluens in habitu corporis refrigerato & nimis humectato corrumpi posse concedimus. Ut autem idem ab vna parte saltem refrigerata accidat, non probabile putamus.

Qui Arætei sententiam retinent, interdum humorem hunc ab insigni caliditate corpus ac humores liquefaciente provenire statuunt, si materia propter crassitiam neque in abdomen penetrare, neque per vias vrinæ expelli possit, sed ad partes cutaneas feratur. Verum enimvero, ut supra dictum, verò consentaneum hoc non est. Si quid enim liquefcit, vel per alium vel per vrinas expurgatur, vel per sudores aut insensibilem transpirationem discutitur, neque comperitum est, quoniam ex causa calida in anasarcam incidisse.

## Signa Diagnostica.

In Ascite totum corpus æqualiter quasi intumescit, Signa. maximè tamen in pedibus & tibiis sub noctem, & si corpus digito prematur, vestigium relinquitur, & non detumescit corpus noctu, ut in cachexia, sed tumor plerumque fit maior. Venter non ita inflatur, ut in Ascite, carnes emortuorum similes habet æger, quæ molles, laxæ & pallidæ sunt; vrinæ sunt tenues & albæ; respiratio est difficilis. Febris lenta sæpe accedit.

## Prognostica.

1. Anasarca inter omnes species hydropis minus periculosus est. Etsi enim vitium cum pluribus partibus communicetur: tamen minus habet hoc periculi. Nam humor pituitosus, quo vniuersa corporis moles abundat, initium aliquod coctionis suscipit, propiusque ad sanguinis naturam accedit, quam serosus & aquosus humor in Ascite. Præterea plerumque Anasarca à crapula, atque corporis exercitatione intermissa oritur, quæ causa minus rebellis est, ideoque facilius coctionem admittit per ea, quæ talem humorem absumunt & exsiccant.

2. Si Leucophlegmatia detento fortior Diarrhœa superuenit, morbum soluit. 7. aphor. 29. Oportet autem criticam esse euacuationem, & quæ morbo incipiente fiat, viribusque adhuc integris, & ut copia excreti humoris morbo non impar sit. Si verò ægro debili & viribus insigniter affectis profluuium alui sequatur, & cætera desint, non morbum Diarrhœa tollit, sed ægrum.

3. Hydropes

3. Hydrope detento si aqua è venis in ventrem confluxerit, soluitur morbus, 6. aph. 14.

*Indicationes & Curatio.*

*Indicationes & curatio.*

*Vena scissio.*

In curatione Anasarcae Medicis duo scopi sunt propositi; Primus, vt aquosa materia per carnes sparsa euacuetur & absumatur; Alter, ne noua generetur & affluat; quod fiet, si quæ circa viscera hæret cruda materia euacuetur, & epati sua temperies restituatur & robur. Primò itaque solus anasarca inter hydropis species, vt Galenus, 4. de ration. victus in acutis text. 11. habet, cum incipit, interdum sanguinis detractione eget, quando scilicet ex retentione hæmorrhagiæ vel mensium vel ex alia aliqua causa plethorica ortum habet: Idque ideo, ne frigidioris etiam sanguinis copia calor obruatur & extinguatur, hepatisque intemperies augeatur. Euacuata enim aliqua parte crudorum succorum, qui cum sanguine in venis redundant, & instar viridium lignorum debilem calorem membrorum suffocant, natura eiusmodi onere leuata facilius reliquos humores concoquere potest. Euacuatio ista sanguinis statim in principio instituenda, antequam vniuersus corporis habitus valde inficiatur, & sanguis paucus euacuandus.

Aperiatur autem vena in brachio, si sanguis in toto corpore sit copiosior sine priuata alicuius partis vitio. At si à mensium vel hæmorrhoid. suppressione malum ortum habeat, primo quidem in brachio vena aperienda pro copię sanguinis imminutione; hinc in crure venâ apertâ fluxus iterum concitandus si maior sit sanguinis abundantia; aliàs statim in crure vena aperienda.

Si verò ex alia causa non coniuncta cum sanguinis copia ortum habeat anasarca, omittenda venæ sectio, ne sanguinis detractione corpus vniuersum refrigeretur, & in statum deteriorem coniciatur.

*Emunctoria.*

Sanguine, si opus sit euacuato, materia antecedens euacuanda phlegmagogis, per vomitum & alui deiectiones, vt & diureticis. Et quidem cum in anasarca plerumque crudi humores in ventre, & in primis viis abundant, singulis septimanis bis vomitum medicamento mediocri instituere vtile est.

Primis viis hoc modo euacuat, purgantibus à maioribus venis crudos humores educere conuenit, præmissis præparantibus ex oxymel. simpl. compositis. & scillitico, syrup. de duab. & quinque rad. byzantino, de hyssop. de calamintha cum decocto radic. aperieat. hyssopi, carduibenedict. betonicæ, vel aquis similibus.

Ad purgandum vtilis est Ebulus, mechoacanna, agaricum, turbit, diacarthamum, diaturbith cum rhabarb. elect. Indum, benedicta laxatiu. pilul. de hermodact. &c. Misceatur autem eiusmodi medicamentis aliquid rhabarb. vt vna hepar roboretur. Et sola per aluum purgatione, si in principio & antequam viscera habitualementem intemperiem contraxerint, instituat, multi sanitati restituuntur; cum causa antecedente sublata natura coniunctam interdum sola superet.

Medicamenta autem, quæ menses mouent, si ij suppressi sint, eadem & anasarcae conueniunt, paranturque ex radicibus aperientibus, cuscuta, capill. ♀. eupatorio, chamædry, sambuco, schœnantho, cinamomo & similibus. Si verò à nimio mensium aut hæmorrhoidum fluxu hoc malum accidat, ob quem spiritus dissipantur, & hepar refrigeratur, cautione opus est. Nam quæ sistendis mensibus aut hæmorrhoidibus vtilia sunt, anasarcae nocent: Quæ verò Anasarcae conueniunt, sanguinis fluxum augent. Videndum igitur, ex vtro affectu plus damni impendat. Utendum proinde aperientibus propter Anasarcam; mediocriter verò adstringendi vi præditis propter fluxum sanguinis.

Dan. Sennerti Tom. I I.

Vtilia hinc proinde sunt absinthium, betonica, spica nardi

Materiæ coniunctæ in habitu corporis ratione, vtendum valida frictione cum linteis asperis, aut fricentur partes spongia, aqua salsa, cui sulphuris aliquid additum sit, macerata & expressa. Inprimis verò vtilis sunt thermæ sulphureæ, bituminosæ, vnde Galenus, 1. de simp. med. fac. cap. 7. scribit; Hydropicis aduersus est & porus & lauacrum aquæ dulcis, salæ verò ac nitrosæ, sulphureæ, bituminosæque omnes sanè perutiles. Sudores prouocentur per Laconicum. Antiqui per arenam à Sole vel igne calefactam, fluuiatilem, præsertim autem marinam, sudorem prouocant, in quo ægrum sepeliebant capite exserto & velato, & sudorem è facie semper detergebant. Verum Laconicis idem ferè præstari potest. Probatur & lutum thermarum, præsertim sulphurearum. Sic Galenus, 9. de simpl. med. fac. cap. de thermar. differ. vidit Alexandriæ quosdam Hydropicos Egyptiæ terræ luto vcentes plurimum adiutos fuisse.

Vtilis est & Cataplasmatum applicatio, quale Aëtij ex stercore bubulo resiccato cum posca aut oxymelite sit, adiecta quatta parte sulphuris, aut ex cochleis tritis impositis. Commoda quoque sunt vestimenta suffulta medicamentorum exsiccantium pulvere, vt flor. chamæmel. rutæ, aneth. & similibus. Fermentum quoque multo sale permixtum nonnulli adhibent, aut panem cum pulv. hyssop. aut farina fabar. aqua marina vel alia salsa & melle coctior. cum pari pondere absinthij; Cuius generis plurima apud Aëtium leguntur. Omnia autem impinguantia & resinosa, cum cerata tum malagmata, vitare iubet, vt quæ inflandi, tumoresque intendendi vim habent.

Affidue autem crura, manus, aliàsque tumefactas partes, in Sole aut ad ignem inungat hoc medicamento.

℞. Sulph. vini, thuris, alum. scissil. part. æq.

Contere cum aceto & vttere.

Verula quædam capiebat ranas viuas, quas in olla noua coquebat, superfuso oleo oliuarum, & oleo ventrem inungebat calidè versus inferiora manus ducendo, à stomacho versus inguina; die secundo tumor descendit, vt pedes intumescerent vehementer, tertio die penitus liberata fuit. Forestus, lib. 9. obseru. 31. in schol.

Matth. de gradibus etiam ranas viuas mirabiliter aquas ad se trahere scribit.

Extrahit tandem materiam serosam crurum scarificatione, idque sensim, & sine virium deiectione præstat.

Sunt quoque interna quædam, quæ materiam aquosam & serosam absumunt. Etinacei terrestres caro siccata commendatur ad absumendum humores aquosos. Adhuc efficaciores sunt sales theriacales.

Non negligenda simul sunt hepar roborantia, quæ plerumque etiam vnâ operâ humores per vrinas euacuare possunt, vt decoctum & vinum absinthij & radic. helenij. Hoc enim vinum & crudos humores concoquit, eosque per vrinas purgat, & viscera egregiè roborat. Quod etiam faciunt Dialacca, Diacurcum, trochisci de rhabarb. de absinthio.

*Diata.*

Victus ratio sit exsiccans, calefaciens & attenuans. Ideoque tenuior victus talibus præscribendus; cum inedia humores absumat: & eiusmodi corpora, quæ crudis humoribus abundant, faciliè inediam tolerare possunt. Et ita victus quantitas moderanda, ne vel copia facultatem grauet, & causam morbi augeat, vel paucitate vires deiciat, quæ in morbo diuturno diu durare debent. Carnes assæ potius sint, quam elixæ. Et fere talis victus ratio hic vtilis est, qualis præscribitur illis, qui decoctum ligni bibunt. Imò

XXXx 3 deco

*Friciones.*

*Therma.*

*Laconicum.*

*Cataplasmata.*

*Vestimenta medicamentis suffulta.*

*Crurum Scarificatio.*

*Interna Medicamenta humores aquosos absumunt.*

decoctum ligni Guaiaci vel sassafras in potu præbere utile est. Et omnino parcissime bibendum, ut singulas partes superfluum succum liquent & absumant.

## CAPVT VI.

## De Dolore Hepatis.

Dolor Hepatis.

**D**olore quoque interdum hepar infestatur; Cuius duæ sunt causæ, inflammatio & flatus. De Inflammatione supra dictum, ut hic addere aliquid opus non sit. Interdum etiam usu venit, ut dolor tensius circa hepatis regionem sentiat ex materia crassa & flatulenta inter membranam hepatis & eius substantiam inclusa, ut de inflammatione hepatis dictum; ab inflammatione tamen hepatis discernitur, quod inflammationem hepatis statim febris comitatur, quæ in hoc dolore ferè abest. Dolor in gibbo ad pectus distenditur, in cauo ad ventrem & intestina, & intervalla quædam habet, nec color corporis & faciei, ut in inflammatione fieri consuevit, immutatur. Febris si accedat, flatulentiam illam materiam sæpe resoluit & discutit.

## Curatio.

Curatio.

Vbi igitur dolor insignis fuerit, basilica dextræ lateris aperiri debet, aut diuersionis causa partibus infra hepar cucurbitulæ affigantur. Materia etiam, quæ flatus gignit & fouet, præparata purgantibus euacuetur conuenientibus. Post topicis materia discutitur, ut;

℞. Chamæmeli, summit. anethi, fol. ruta ana M. i. flor. rosar. rubr. M. sem. sem. anisi, faniculi an. Drach. iiii. schœnanth. Drac. ii.

Coqu. in aqu. simpl. ad tertias.

Colatura pro fotu usurpetur. Hinc inunctio fiat oleo de absinthio, amygdalis amaris, rutaceo, oleo de spica.

Simul etiam interna discutientia usurpanda, ut diagalang. diacynamom. cum speciebus diarrhod. abbas mixta, & quæ huius generis sunt alia, non omittis, quæ à proprietate hepatis conducunt.

In Dieta vitentur omnia, quæ flatus generandi vim habent.

Dieta.

Inter hæc Symptomata recenseri quoque posset Fluxus Hepaticus: verum etsi causa eius sit in hepate; tamen quia materia per aluum euacuatur, de eo inter alui fluxus actum.

## CAPVT VII.

## De Ictero.

Icterus.

**T**andem etiam Practici vulgo hic de Ictero agunt. Etsi verò Icterus, sit color totius corporis mutatus, atque ita inter Symptomata corporis superficiei pertineat; tamen cum originem à vesicula fellis habeat, eos imitari, ac hoc loco de Ictero agere libet.

Icterus Græcis nomen accepit siue *σφοδρὸς*, id est, viuerra, quæ sylvestris mustelæ species, cuius oculi eiusmodi colore tincti cernuntur, ut Aretæus, lib. 1. diurn. cap. 15. & Aëtius, tetrab. 3. serm. 2. cap. 17. habet; Siue ab Ictero, aue eius coloris, quæ & Galbulus nominatur, & si spectetur ab Ictericò mori ægro sanato dicitur, ut Plinius, lib. 30. histor. natural. cap. 3. habet. Latinis Regius morbus nominatur, Molliter hic quoniam celsa curatur in aula, ut Q. Sere-nus canit. Quæ ratio tamen parum apta videtur. Malim ergo ita ab auro, metallo regio dictum, statuere, sicut & aurigo ab auri colore dicitur. Nominatur & fellis suffusio.

Est autem color præter naturam totius corporis flauus, viridescens aut nigricans, ab excrementitij & vitiosi humoris eiusdem coloris in cutem effusione ortus, atque ita symptoma in visibili qualitate mutata.

Subiectum eius est totius corporis cutis. Causa proxima humor concolor. Talis enim est totius corporis & partium color, quales humores in eas influunt.

Eius subiectum. Causa.

Humor autem, à quo hic color prouenit, nec vnicus est, nec vnica causam habet. Vnde rectè Galenus, lib. 9. de comp. medic. sec. loca initio eos Medicos rectè facere scribit, qui in describendis medicamentis contra Icterus distinctè explicant, quibusnam ægris singula conueniant; contra verò eos non leuiter errare, qui sine discrimine remedia proferunt; quasi illa Ictero laborantibus conueniant simpliciter, cum certum sit, variis Icteri differentiis varia medicamenta conuenire, & quæ vni profunt alteri nocere.

## Signa diagnostica.

Icterus in genere facilè cognoscitur, præsertim si Signa album oculi inspicatur, & internus maximè angulus, ubi venæ maiusculæ sunt, Ea enim in parte euidens coloris mutatio apparet.

## Differentia.

Vt verò distinctè de Ictero agatur, primò differentia proponendæ sunt, & singularum causæ, signa, curatio postea seorsim proponendæ. Galenus, 5. de loc. affect. cap. 7. causas Icteri quatuor recenset. 1. Hepatis *σφοδρὸς* præter naturam, siue ea sit temperies mutata, siue inflammatio, siue obstructio, siue scirrhus. 2. Ferarum morsum, ob quem sanguis in talem humorem flauum mutatur. 3. *κρίσις*, qua bilis à visceribus in cutem effunditur. 4. In fine capitis addit vesiculæ fellis repletionem tantam, ut prostrata eius virtute expultrice, excerni bilis ex hac in intestina nequeat.

Nos differentias, quæ curationem variant, hoc modo proponemus.

1. Est Icterus flauus, qui fit ab obstructione vesiculæ fellis, vel angustia eius à calculis.
2. A bilis copia; qui tamen Icterus non vnus generis rursus est, sed vel ab hepatis intemperie calida cum vel sine febre, vel ab inflammatione oritur, cum tanta bilis copia est, ut vesicula fellis totam capere nequeat.
3. Est Icterus, qui fit à ferarum venenatarum morsu, vel veneno hausto, cum flauus, tum niger.
4. Niger, qui tribuitur vitio Lienis.

Ratio differentiarum flauis hæc est. Cum ideo flauus Icterus accidat, quia plus flauæ bilis est in corpore, quam par est, euenit hoc, vel quia maiore, quam æquum est, copia generatur bilis & humor flauus in hepate, ob intemperiem eius calidam, aut sine inflammatione aut cum inflammatione, aut cum, aut sine febre: Vel quia, quæ quidem iusta quantitate genita est, debito modo non euacuatur. Quod sit vel ob angustiam meatuum fellis siue exporrectorum in hepar, per quos bilis in vesiculam fellis attrahitur, siue ad duodenum tendentium, unde per aluum expurgatur: vel ob angustiam vesiculæ fellis, quæ suscipere bilem non potest, quia lapides in ea contenti eam angustiores reddunt.

Addunt quidem alii quoque alias causas, nimirum attrahentis expellentisque facultatis in vesicula fellis imbecillitatem, quæ ab intemperie aliqua, præsertim frigida, ortum habeat. Verum non immerito dubitatur, an tanta frigiditas in vesicula fellis, quæ Hepati membro calido adhæret, & humorem calidum in se continet, esse possit, ut ob eam ad extrahendum & expellendum inepta reddi possit. Galenus, 5. de loc. affect. cap. 7. hanc etiam causam addit, quod



quod vesicula fellis aliquando copiâ bilis ita repleatur, ut prostrata vi expultrice ex ea intestina euacuari nequeant. Verum in vesica urinaria, si ultra modum & tempus urina retineatur, hoc quidem accidere solet, an autem in vesicula fellis idem possit accidere, dubitamus. Nam in vesica urinaria id præcipue accidit, cum voluntarie ultra debitum tempus & modum urina retinetur, quod fit beneficio muscoli, qui orificio eius præfectus est, & copiosius ex largiore potu urina affluit; quæ retentio in vesicula fellis locum non habet, cum quod in ea per vnum meatum attrahitur, per alterum, nisi obstructus sit, euacuetur. Atque hæc cum sint Icteri differentie, de singulis seorsim dicendum.

### De Ictero flauo ab obstructione vesiculæ fellis.

*Icterus flauus ab obstructione vesiculæ fellis.* Cum flaua bilis in vesicula fellis ex hepate colligatur, & subinde eius aliquid ad duodenum intestinum mittatur: si meatus siue ex porrecti in hepar, per quos in vesicam fellis bilis allicitur, siue ad duodenum tendentes, per quos in aluum expurgatur, angustiores reddantur aut claudantur, bilis in hepate restitat, & hinc cum sanguine in venam cauam distribuitur, & in totum corpus dispergitur, cutemque colore flauo tingit.

Hæc autem meatuum angustia prouenit vel ab obstructione, quæ accidit interdum à crassa pituita, interdum à bile crassa & copiosa, interdum à calculis, qui sæpe magno numero in dissectis corporibus in vesicula fellis reperti sunt, ut observationes Medicorum docent, quarum aliquas collegit Schenckius, lib. 3. obseru. 37. vel à circumstantium partium compressione, ut scirrho, inflammatione. Nonnunquam etiam vesicula fellis ita lapidibus repletur, ut bilem capere non possit.

### Signa Diagnostica.

*Signa.* Cognoscitur hæc Icteri species non solum ex eo, quod reliquarum causarum signa absunt, sed inprimis, quod feces alui à consueto colore defleunt & albicant, bilis transitu in intestina præcluso, à quo feces alui tingi solent.

Porro autem despiciendum, an vitio Hepatis vel vesiculæ fellis id accidat. Si hepatis vitio id euenit, procul dubio signa affecti Hepatis aderunt, & aliqua tensio aut pondus in dextro hypochondrio percipitur. Si verò abs hoc fuerit, in vesicula fellis causa hæret, & Icterus plerumque repente innadit, aluius ferè pigrior est, urina crassescit, & ex flauo & rubro ferè nigricat, sine virium tamen iacturâ, modò febris planè absit. Nam febrem etiam interdum tali ictero coniungi, non planè impossibile est. Etsi icterus tum diuturnus sit, ac medicamenta satis efficacia & rectè exhibita nihil proficiant, à calculo angustiam vesiculæ fellis prouenire, argumento est.

### Prognostica.

*Prognostica.* 1. Facilius est, si cætera consentiant, Icteri flauo curatio, quàm nigri, cuius causa validius resistit. Et quidem inter icteri flauo species facilius curatur Icterus ab obstructione vesiculæ fellis natus, ut cui interdum vnicum Cholagogum exhibitum satis fuit; quoniam meatus bilis à vesica illa in intestina porrecti intestinis propiores sunt. Vbi tamen obstructio illa à calculis est, vix curationem admittit.

2. Ictero laborantibus si iecur durum fiat, malum, 6. aphor. 42. Et si obstructiones sint pertinaces, & in scirrhum hepatis delinant, hydropis prænuncius est Icterus.

### Indicationes.

Obstructio, siue in Hepate, siue in vesicula fellis sit, *Indicationes.* aperienda, humorque biliosus in corpore hærens euacuandus; solutaque obstructionis signum est, quando feces alui iterum colore flauo tinguntur, & urina illa intensa flauedo ad nigrum vergens remittit. Tandem, si color sponte non euanescat, humor eius causa in cute hærens discutiendus.

### Curatio.

Expediuntur autem hæc per medicamenta aperiencia, quibus & victus respondeat, deinde per euacuantia; quæ commodissimè per vices exhibentur, ac si malum sit contumacius, à leuioribus progrediendum ad fortiora. Et cum aperiencia tuto exhiberi non possint, nisi primæ viæ euacuata sint, ab earum euacuatione incipiendum: Vitales quoque hic sunt clysteres, qui non solum excrementa alui subducunt, sed & naturam stimulant.

Aperientia hæc conueniunt, Rad. cichori, quinque aperiencia dicta, chelidon. maior. curcuma, asari, anchusa aruensis colore rubro, endiu. cusc. quæ vix quicquam hic præstantius, agrimon. marrubium, centaur. minus, chama-drys, absinthium, trochisci de eupator. de lacca; Syrupus endiuæ simpl. & compos. de duabus & quinque radicibus, byzantin. acetos. diarrhod. Syrup. de cichor. cum rhabarb. de eupator. lapis flauus in felle tauri repertus, lumbric. terrest. ad 3. i. cum succo cichori aut melicrato exhibiti.

Ætius coctos & cum myrrha tritos fabæ magnitudine exhibet ex passo aut vino mulso, & ita postero die per urinam icterum profligari scribit. Et plerique à proprietate occulta lumbricos hoc præstare putant: Verum insignis vis aperiendi, quæ iis inest, ad icterum tollendum sufficere videtur. Quidam pro summo remedio asphodeli asparagum ictero laborantibus præbent, teste Galeno, 2. de aliment. facult. cap. 6.

*Quæ vi lumbrici icterum tollant.*

E Chymicis medicamentis vtilia sunt: Tartarum *Chymica.* virriolatum, cremor tartari vino chalybeato dilutus, spiritus salis.

Pueris conuenit præcipue decoctum fragaria cum passulis. Efficacius est, si marrubij M. B. addatur. Conradus Gesnerus ad icterum contumacem commendat radices vrticæ.

℞. Earum lb. i. croci Drach. β.

Contundit diligenter in mortario, & cum vino albo succum extrahit, cuius Vnc. iv. diebus 4. vel 5. continuis exhibuit, ægro in lecto decumbente, stragulis cooperito, ut sudet.

Præstantque aperiencia & hoc commodi, quod pleraque simul urinam mouent, materiâque ad vias urinæ deducunt. *Aperientium vtilitas.*

Purgantia fiant ex manna, rhabarb. scammon. electuar. *Purgantia.* diacatholic. de succo rosarum, de psyllio, hiera-picra, nisi febris adsit, pilul. de rhabarb. aggregati. Vtilia sunt & vomitoria, quibus & corpus euacuatur, & materia commouetur, & ab hypochondiis reuellitur. Exempli gratia.

℞. Rhabarb. elect. Scrup. iiii. cinamom. Scrup. i.

Infund. in f. q. aqu. cusc. & gramin.

Colaturæ express.

℞. Vnc. iiii. Adde marrub. Vnc. i. vel elect. de succo rosar. 3. ii. de psyllio 3. i. syr. byzant. simpl. 3. β.

Hinc ℞. Rad. aperient. Drach. iii. cichor. Vnc. β. sem. melon. excortic. Drach. iii. cicer. rubr. Vnc. sem. cusc. agrimon. an. M. i. marrub. albi M. β. passul. 3. vi. baccar. inniper. num. xx.

Coquantur in aq. simpl.

Colaturæ ℞. lb. j.

Adde syr. byzam. simpl. Vnc. iv.

Misce pro 3. dosibus.

Vel ℞. sem. aquileg. Drac. i. β. croci Scr. β.

XXXX 4

F. Pul.

F. Pulvis, detur in vino.

Vel ꝥ. Sem. aquileg. Drach.ß. pulu. lumbr. terrestr.  
Scrup. i. croci Scrup.ß.

F. Pulvis.

Atque ista medicamenta per intervalla continuentur, si malum contumacius, progrediendo semper à lenioribus ad fortiora; cuius generis multa recenset Galenus, 9. de compos. medic. sec. loca cap. 1. & in Euporist. cap. 16.

Capiuaccius commendat infusionem limaturæ chalybis in vino factæ.

Possunt & purgantia atque aperientia misceri.

ꝥ. Marrubij, cuscute, capill. vener. ana M. i. cicer. rubr. Vnc. ii. rad. petroselin. fragar. ana Vnc.ß. asari ʒ. ii. passular. Vnc. ii.

Coq. in aqua simpl.

In colatura infunde fol. senæ elect. Vnc. ii. agarici albi Vnc.ß. rhabarb. Drach. iii. sem. anisi, fœniculi, geniste ana Drach. ii.

In colatura dissolue manna Vnc. i.ß.

F. Porus pro aliquot dosibus, vel addatur sacchari q. s. F. Syrupus.

### Dieta.

Dieta.

Victus in hac icteri specie fit, attenuans. Vtiles sunt in cibo amygdala amara, quas Galenus ieiunis præbet. Potus sit vinum dilutum aquâ gramin. asparagi aut petroselini.

Vel ꝥ. Cicer. rubr. lbj.ß. rad. asparag. M. i. aq. lb. ix.

Coqu. ad tertiæ partis consumptionem pro potu, qui, si febris adsit, detur mixtus cum vino.

### De Ictero ab hepatis caliditate sine febre.

Icterus ab hepatis caliditate sine febre.

Nonnunquam sine obstructione vesicæ fellis ob solam bilis copiam icterus accidit, etiam sine febre, ubi ob sanguificationis vitium plus bilis in hepate generatur, quam ut naturaliter per consuetas vias excerni possit, cum ob hepatis intemperiem, tum ob errores in dieta, ut nimium calidiorum ciborum, & præsertim eorum, qui in bilem facile corrumpuntur, vsu.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Cognoscitur hic icterus ex eo, quod non solum urina, sed & feces alui croceo colore tinctæ sunt, febrisque adest, pedes & manus calent, & talia calidæ intemperiei hepatis signa adsunt.

### Prognosticum.

Prognosticū.

Minus periculosus est hic icterus, quam qui cum inflammatione & febre coniunctus est.

### Indicationes & Curatio.

Indicationes & Curatio.

Bilis, quæ abundat, & non sufficienter euacuatur, per consuetam viam euacuanda & ad intestina reuocanda. Si tamen aliqua sanguinis copia adsit, venæsectione ea prius tollenda. Et ne ab hepate calido plus bilis generetur, eius intemperies alteranda, ipsumque robotandum. In alterantibus autem hoc observandum, ut non adstringentia adhibeantur. Cum enim probabile sit, in angustis & exilibus venis remanere aliquid bilis, si per fortiter adstringentia ibi impingatur, & non per aperientia abstergetur, facile ibi hærens obstructiones vel inflammationem excitare potest. Conueniant igitur præcipue cichoracea & intyacea, quæ ex superioribus patent, & calidæ intemperiei hepatis debentur.

### De Ictero in febribus acutis critico.

Sæpe etiam accidit, ut à naturâ in febribus biliosis acutis, sæpe etiam malignis, post concoctionem biliosum humorem ad ambitum corporis protrudat, unde color cutis croceus apparet.

### Signa Diagnostica.

Id quod cognoscitur ex eo, quod febris acuta adest, & signa coctionis præcesserunt, & in die critico id accidit, sine hypochondrij duritie. Ac tum & vrina & feces alui naturalem colorem obtinent. Biliosus enim humor ad ambitum corporis à natura protrusus est.

### Prognosticum.

Icterus hic nihil periculi portendit, sed potius morbum soluit, cum fiat naturâ vitiosos humores à visceribus & partibus interioribus ad externas & ignobiliores expellente.

### Indicationes.

Ideoque hic medicamentis vix aliquid agendum, cum, secundum Hippocratem, 1. aphor. 20. τὰ ἀπορροιαὶ καὶ τὰ κρυψαῖα ἀπὸ τῆς ἐξῆς δεκάτης deceat. Aut si opus sit, promouenda expulsio frictionibus, sudoriferis & asperis rerum citrinarum. Febre verò solutâ nullo auxilio opus est, quam quod reliquos humores in cute discutiat, nisi sponte euanescant, de quo postea dicetur.

### De Ictero in febribus symptomatico.

Aliquando verò natura ante coctionem materiæ vel copiâ vel acrimoniâ, aut malignitate stimulata talem expulsionem tentat.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur talis Icterus symptomaticus, quod quidem in febre acuta accidit, sed antequam signa coctionis appareant, & die non critico, & feces alui ac vrina naturalem colorem non planè recuperantur. Neque enim natura satis feliciter talem expulsionem tentat.

### Prognostica.

De Ictero hoc est Aphorismus Hippocratis 62. sect. 4. Quibus per febres Icterus supervenit ante 7. diem, malum. Controuertitur tamen à Medicis, An icterus ante 7. diem in febribus acutis semper malus sit? De quo sciendum, Hippocratis aphorismus, si rectè accipiat, quidem verum esse. Etsi enim talis Icterus non semper lethalis sit, (quod nec Hippocrates dicit) tamen suo modo semper malus & periculosus est. Nam quia ante septimum diem accidit symptomatica illa expulsio, quæ quamuis, ut alibi dictum, interdum ad salutem ægri tendat; tamen per se tam bona non est, quam quæ 7. diebus vel alio critico contingit, cum fiat non simpliciter à robore naturæ, sed à natura ab humoribus vitiosis incitata, & coctione nondum absoluta. Non tamen crisis ita strictè ad 7. diem adstringenda, nec crises tam dierum numero, quam coctione æstimanda. Itaque si maturæ coctionis signa appareant, licet ante 7. diem icterus accidat, pro critico & proinde bono habendus est. Hippocratesque hoc aphorismo saltem critici icteri exemplum proponere voluit, & quidem sub die 7. quod is inter omnes criticos principatum obtineat. Contrà si post septimo accidit icterus, ac nulla coctionis signa præcesserint, icterus non bonus est, quod etiam docet Galenus, 3. epid. comm. 1. aph. 5. dum ait; Ante coctionem materiæ nullum abscessum, ac

ne dum auriginosum vtilem esse; siquidem significat impediri bilem, quo minus ex viscere expurgetur & euacuetur per ventrem, vel propter obstructionem, vel propter inflammationem. Si tamen ea, quæ euacuari debent, euacuentur, & vires ferant, euacuatique humoribus vel planè tollatur morbus, vel imminuatur, etsi symptomaticus sit icterus, suo modo pro bono habendus. Sicut nec icterus, qui die critico accidit, semper bonus est. Atque ipse Hippocrates *aphorismo allegato* excipit icterum cum hypochondrij duritie. Et 6. *aphorif.* 42. scribit: *Ictero laborantibus hepar durum fieri, malum.* Ideo in ictero, qui in febribus accidit, semper videndum, an criticus sit, morbumque tollat, vel leniat; aut si symptomaticus sit, an critici bonitatem æmuletur. Hippocrates tales icteros, qui in febribus symptomaticis accidunt, rigore discernit, 4. *de rat. vict. in acut. aph.* 81. In febre, inquit, *biliosa icterus cum rigore ante 7. diem eueniens, morbum soluit; Si verò absque rigore intempestinè superueniat, pestiferum est.* Soluit enim talis icterus morbum euacuatione & depulsiōne materiæ febrilis sufficiente è visceribus & venis ad cutem, quod rigor indicat. Sin absque rigore fiat, à debilitate naturæ vel ab inflammatione hepatis icterum extitisse, suspicandum est.

#### Indicationes & Curatio.

*Indicationes.* Icterus hic nullam peculiarem curationem, requirit, sed cura ad febrim. dirigenda, quæ ablata & ipse tollitur. Ad hepar tamen, quod bilem generat, in primis respiciendum, bilisque suo tempore, nisi symptomatica euacuatio, quæ crisis naturam æmuletur, accedat, per conuenientes vias euacuanda, & per aluum, & per vrinas.

#### De Ictero ab inflammatione hepatis.

*Icterus ab inflammatione hepatis.* Si Icterus ab inflammatione hepatis proveniat, & causæ & signa inflammati hepatis adsunt, & curatio tota ad inflammationem dirigenda, quæ sublata, & bilis nimia generatione prohibita, postea facile icterus cessat.

#### De Ictero à morfu venenatorum animalium & venenis.

*Icterus à morfu venenatorum animalium.* Tandem quandoque Icterus à morfu venenatorum animalium, vel veneno hausto, quod habet vim sanguinem in humorem flauum corrumpendi, provenit. Ita Galenus, 5. *de loc. affect. cap.* 7. refert, cuidam seruorum Imperialium, cum à vipera esset morsus, vniuersum corporis colorem ita mutatum fuisse, vt porri colorem referret. Et Marcellus Donatus, *de histor. medic. mirab. cap.* 9. ex Auenzoare refert; Azym filium Haly ex potu rei venenatæ ictericum euasisse, vt corporis color esset, sicut cortex citri, simulque appetitum planè amisisset.

*Quo modo venena icterum inducant?* De modo autem, quo venena icterum inducunt, Auctores discrepant. Galenus *loco allegato* à veneno sanguinem corrumpi statuit, & in bilem seu flauum humorem talem verti. Alij putant, malam qualitatem hepatis inprimi, ita vt plurimam bilem generet, quæ postea per vniuersum corpus dispergatur & icterum excitet. Marcellus Donatus, *loco allegato*, non omnes à morfu animalium venenatorum, aut hausto veneno ictericos fieri statuit, sed eos solùm, qui plurimam bile abundant. Insurgere enim facultatem expultricem ad veneni expulsionem, & ita simul bilem, quæ in corpore redundat, expelli, cuius colore superficies corporis tingatur.

Verum consentanea magis vero est sententia Galeni. Est enim proprium venenorum homines corrumpere, & minima portio veneni corpori communicata in-

star fermenti totam massam sanguinis penetrat, eamque corrumpit, quæ corrupta, nunc hic, nunc alius color inducitur pro natura veneni. Neque necessarium est vt prius bilis semper abundet, quæ stimulata expultrice moueatur. Neque etiam credibile, malam qualitatem illam solùm hepatis imprimi, vt multa bilis inde generetur, cum mutatio illa in toto corpore subito fiat, & humor ille flauus vel viridis non propriè bilis sit, sed venenosus & malignus. Non tamè negamus, pro dispositione sanguinis & humorum in corpore corruptionem aliquo modo variari. Neque etiam quod quibusdam videtur, humores flauescerent, viridescerent aut nigricantes, qui icteri huius causæ sunt, solùm ex bile excrementitia naturali corrupta, verùm etiam ex aliis humoribus corruptis ortum habent. Imò credibile est, istum humorem, qui à veneno provenit, non bilem esse, sed ex humorum cum bonorum, tum excrementitiorum corruptione ortum.

#### Signa Diagnostica.

*Signa.* Inquirendum ergò initio, si æger subito toto corpore colore seu flauo, seu virescente, seu nigro (omnes enim hi colores pro venenorum varietate à venenatis causis provenire possunt) tingatur, an à venenato aliquo animali, quod vim habet sanguinem in talem humorem mutandi, morsus sit; aut venenum aliquod similem vim habens sumpserit, id quod vel æger vel adstantes manifestabunt. Et si omnino id lateat, tamen venenum aliis signis, vt subito virium deiectione, lipothymia, syncope, & aliis, quæ venena prodere solent signis sese manifestabit.

#### Prognosticum.

*Prognosticum.* Periculosus est hic Icterus, ob causæ, à qua inductus est, potentiam & malignitatem; cum omnes affectus à venenis inducti periculosi sint. Et quò venenum nocetius est, à quo provenit, eò & periculosior Icterus.

#### Indicationes & Curatio.

*Indicationes & Curatio.* Venenum mox è corpore expellendum & extrahendum, ei que per alexipharmaca resistendum. Itaque si æger venenum hauserit, illudque adhuc in primis viis hæreat, vomitu quamprimum reiciendum. Deinde alexipharmaca exhibenda; & quidem si venenum cognitum habeatur, veneni naturæ speciatim oppositum alexipharmacum exhibendum: si verò incognitum sit, commune aliquod, vt venenum vincatur & expellatur, vt *theriaca, Mithridatium, bezoar, & similia.* Si tamen aliqua manifesta intemperies calida simul à veneno inducta sit, & illi occurrendum, *succo citri, pomor. acerosorum, granatorum, succo & aqua endivia, acetosa, portulacæ, & mucilag. sem. psyllij.* Si autem foris immisum sit per ictum vel morsum animalis venenati; extra ad partem affectam adhibitis remediis extrahendum simulque alexipharmaca exhibenda, & curatio omnino, qualis eiusmodi virulentis vulneribus debetur, instituenda. Ita cum Galenus, *loco allegato*, seruo Imperiali theriacam exhibuisset, quam celerrimè color sec. naturam ei restitutus est. Abinzoar filio Haly bezoar exhibuit cum aqua cucurbitæ. Bezoar quidem ad expellendum venenum, aquam verò cucurbitæ ad reprimendum caliditatem, præter naturam adiunctam, ad quam Rhafes aqu. granatorum, Alzaharaius & Haly Abbas *poma acida & mucilag. psyllij, & trochiscos de camphora* exhibent.

#### De Ictero nigro.

Actum supra de eo, *part. 4. cap.* 11.





Cur serum  
in arteria  
possint  
miseri?

tate non carer. Qui enim ex Gal. 5. de *Vf. part. c. 5.* ideo serum in arteriis conueneri probare conantur, quod arteriæ renibus datæ sunt, ii principium petunt, & incertum per æquæ incertum probant. Nam si venæ emulgentes datæ sunt, vt sanguinem à seroso humore purgent; atque ex venâ cauâ optima sanguinis portio ad dextrum cordis ventriculum fertur, & ex eo demum in sinistro cordis ventriculo sanguis arteriosus elaboratur: Vnde in arteriâ magnâ, quæ ex sinistro ventriculo Cordis non ita longo à renibus intervallo exoritur, copiosissimum illud serum ortum habet?

Cur arteria  
renibus im-  
mittantur.

Et proinde Galeno, loco allegato, quærenti, si non sanguinis in ipsis contenti à sero purgandi gratiâ renibus arteriæ immittantur, quænam alia causâ fuerit, cur eâ magnitudine Natura eas effecerit, ad cavitatemque renum diuisas ipsas, haud secus ac venas, produxerit? responderi potest: factas esse, vt sanguinem arteriolem ad renes ferant, qui in eorum substantia cum sanguine venoso mixtus & alteratus semini generando materiam præbeat.

Rursus quæ sit, quod sapor ac odor ille, qui quidem in animalibus plurimis non castratis per vniuersum corpus diffunditur, maximè tamen in renibus percipitur, & præcipuè in adultis; In nouellorum autem ac teneriorum quadrupedum Renibus, cum nondum sceminas ineunt, non ita percipitur?

Oribasius quoque lib. 6. *Collect. cap. 38.* ex suppressione ac retentione seminis renes malè affectos fuisse deprehendit.

Insuper in Gonorrhœâ medicamenta lumbis ad semen imminuendum atque alterandum applicantur, vt ex Aretæo, lib. 2. *morb. Chronic. cap. 7.* Traillan. lib. 9. *cap. 9.* & aliis passim videre est.

Inter signa etiam renum calidorum Medici recensent propensionem ad libidinem, somnia libidinosa & nocturnas pollutiones; contra frigidorum ad venerem segnitiam. Et seminis qualitates Practici passim ex renum constitutione deducunt, atque si illud calidius, ac acrius sit, etiam ex renum calore fieri docent.

Tandem vasorum, præparantium dictorum, origo idem persuadere videtur. Etenim si simpliciter saltem sanguinem è vena cauâ & arteria aorta ad testiculos deferre deberent, possent deduci è propiore loco, non verò per tam longas ambages, partim ex ipsis emulgentibus, partim propè emulgentes originem sortiri, quod indicio est, vasa ista non simpliciter ex vena cauâ & arteria, sed in ipsis renibus elaboratum aliquid accipere, & ad testiculos deferre.

Atque hæc potissimum rationes sunt, quibus quis adduci posse videtur, vt de vulgata sententiâ de Vfu Renum dubitet. Esi & vt habet Aristoteles, *Metaph. B. cap. 1.* τὸς εὐπαρῆσαι βουλομένοις ἀποδύρεται τὸ διαπορῆσαι αὐτῶς. Est opera pretium aliquid facultatis & cognitionis habere volentibus bene dubitare.

## C A P V T II.

De Renum Intemperie: & primò de calida & sicca.

Causa.

Renum In-  
temperies:  
calida &  
sicca.  
Causa.

Inter morbos autem renum sunt primò intemperies & quidem frequentissima calida & sicca, quæ contrahitur à causis calefacientibus. E calibus causis internæ sunt, vicinarum partium, imprimis hepatis, & venæ atque arteriæ magnæ præter naturam caliditas, materia calida & sicca, siue in renibus sensim cumulata, siue aliunde, præsertim ab hepate & vena cauâ atque arteriis, affluens; quam eò facilius admittunt renes, cum ob causam aliquam facti sunt imbecilliores, & si præterea doleant & incalescant, facilius humores à vicinis partibus attrahunt.

Externæ causæ sunt alimenta, potus & medicamenta calida & sicca, quæ reliquas partes calefaciendi vim habent; imprimis tamen, quæ vim diureticam obtinent decubitus supinus supra lectum & stratum calidum, præcipuè plumeum, & vestimenta circa renes calida; balnei calidi frequens vsus, præcipuè verò motus violentior & magnus spinæ, ac vicinorū musculorum, qualis fit in equitatione, vsus etiam & gestatio longa armat uræ & thoracis ferrei,

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur autem Renum calida intemperies ex causis calefacientibus, cum internis, tum externis, quæ modò enumeratæ sunt, si præcesserint; ex caloris sensu circa Renes, ex vrina, quæ excernitur copiosa, tenuis, sæpe calida & acris, cui pinguedinis aliquid supernatat, sæpe etiam arenulæ & rubrum sabulum in vrinis apparet. Adest propensio ad libidinem, atque accidunt nocturnæ pollutiones, & insomnia libidinosa; corpus extenuatur. Nocent calefacientia, iuuant refrigerantia,

Signa.

### Prognosticum.

Si intemperies ista non sit magna nec inueterata, nõ adeo difficulter curatur, Si verò magna sit & diu durauerit, ac siccitas caliditati coniuncta sit, difficulter curatur.

Prognostic.

### Indicationes & Curatio.

Calida intemperies indicat refrigerantia sicca hume-  
stantia. Refrigerant autem renes viola, rosa, cichorium, endiua, lactuca, portulaca, semperuium, nymphaea, succus citri, limonum, granatorum, fragæ, fructus rubi Idæi, hordeum, melones, cucumeres, semina 4. frigida maiora, scariola, serum lactis, acetum, acidula.

In dicationes  
& Curatio.  
Hepar Re-  
frigerantia.

Equibus varia parantur medicamenta cum interna tum externa.

### Interna.

Conseruæ, syrûpi, aquæ, emulsiones ex supra dictis Interna.  
plantis.

Vt ℞. Aq. fragor. sine vino violar. an. ℥. iii. syrûpi violar. acetosi citri an. ℥. j. spiritus vitrioli. gr. iii.

Misce.

Vel ℞. Sem. 4. frig. maior. an. ℥. j. B. aq. hordei s. fragor. sine vino an. ℥. iii.

F. Emulsio.

Adde iulebi rosar. violar. an. ℥. j. Misce.

### Externa.

Epithemata ex aquis & succis lactucæ, portulacæ, nymphææ, semperuii.

Oleum, rosar. violar. nymphææ.

Vnguentum, rosaceum, refrigerans, Galeni.

Vel ℞. Mucilag. sem. psyll. ℥. B. ol. violar. vngu. refriger. Galeni an. ℥. vj. sacch. ℞. j. cera parum.

F. Linimentum.

Cerorum Santalinum

Folia vitis, lactucæ, nymphææ, salicis, linteis stratis supposita.

Lamina plumbea dorso è regione renum alligata; imprimis verò aquæ dulcis balneum diu continuatum.

Plura de Inflammatione Renum proponuntur.

### Dieta.

In cibis conuenientissima est pusana hordeacea, semina 4. frigida maiora, lactuca, endiua, cichorium, fraga. Cibi condiantur succo citri, granatorum, ribes.

Potus sit aqua hordei, vel tenuior cereuisia.

Si

Si adfit simul bilis, purgetur ea cassiâ, diaprano simplici, electuario, de psyllio, de succo rosarum.

### De Intemperie Renum frigida.

#### Causa.

**Renum Intemperies frigida?**  
**Causa.** Refrigerant Renes vicinarum partium, ut intestinum, hepatis, lienis, refrigeratio humorum frigidorum praesentia; Cibi, potus, medicamenta frigida; Aer, venti, imbres, niues, si dorso occurrant; balnea frigida & renum denudatio.

#### Signa Diagnostica.

**Signa.** Cognoscitur Intemperies Renum frigida à causis refrigerantibus, quæ præcesserunt; urina redditur pauca & tenuis, ac cruda, Appetitus veneris minuitur. Iunant calida, nocent frigida. Si pituita simul adfit, urinae sunt turbidae & crassae, in quibus filamenta quasi alba subsident.

#### Prognosticum.

**Prognosticum.** Si Intemperies Renum sit tanta, ut actio inde debilitetur, atque seri secretio impediatur, periculo non vacat. Ex seroso enim humore in renibus retento sanguis corrumpitur, & homo ad cachexiam & hydropem disponitur.

#### Indicationes & Curatio.

**Indicationes & Curatio.** Intemperies frigida calefacientia indicat, ut in aliis partibus.

Calefaciunt verò Renes: Radices *faniculi, brusci, asparagi, petroselinii, pimpinella, eryngii, satyri,*

*Folia; betonica, agrimonia, calamintha, mentha, salvia, rosmarini, flores laurandula, betonica, Semina cruce, nasturtii, petroselini, faniculi: bacca iuniperi, amygdala amara, nuclei persicorum cicer, aromata; Atque ex his parata varia medicamenta.*

Extra inungitur renum regio, oleo nardino, costino, irino, mentha, quibus spica nardi, caryophylli, maceis addi possunt: Unguento Martiato.

#### Dieta.

**Dieta.** Victus ratio medicamenti respondeat. Quapropter *betonica, salvia, rosmarino, feniculo, aromatibus cibi & potus condiantur.* Si simul adfit pituita, purgetur *agrico, vel cassiâ cum terebinthina, benedicta laxativa, elect. Indo.*

Intemperies humida Renum, quæ actiones lædat, raro datur.

## CAPVT III.

### De Numero Renum mutato, & aliis quibusdam eorum morbis.

**Renum numerus mutatus.** Renes homo, ut & alia animalia, secundum naturam duos habet. Interdum tamen unus defecit, ut habet Aristoteles, 4. de histor. animal. c. 4. Fernelius lib. 4. de part. morbis & symp. cap. 7. Andernacus, lib. 1. Institut. Anat. Vesalius, de corp. hum. fabr. lib. 5. cap. 10. Eustachius, cap. 10. lib. de constit. Renum, Columbus, lib. 15. Anatom.

Contrà renes tres vidit Eustachius, cap. 10. lib. de Renum structura. Quatuor Gemma, lib. 2. Artis cyclonomica, & lib. 1. cosmocritic. c. 6.

**Renis color mutatus.** Mutatur & aliis modis sæpe Renum constitutio, scribitque Eustachius, alleg. libello, se Renes interdum sub-

nigros, subalbidos, substantia modò fragili, & quasi putri, modò densa, dura & arida inuenisse, superficiem verrucosam & innumeris tuberculis scatentem sapius vidisse; quin & sub eorum membrana tantum flatuum collectum, ut videretur à subiecta carne prorsus separata, adeoque turgida & distenta, ut magni tumoris speciem referret.

In vasis quoque emulgentibus sæpe magna accidit varietas. Ambros. Paræus, lib. 2. cap. 25. septem vidit emulgentes venas, totidemque arterias, quatuor à sinistro latere diuersis locis prodeuntes, quarum vltima ab Iliaca manebat, tres à dextro diuersis pariter locis. Columbus, ut lib. 15. Anat. refert, in eodem latere duas, tres, quatuorque & plures emulgentes deprehendit. Geminas emulgentes venas & arterias vidit Andreas Laurentius & alij. Et omnino sæpe in venis emulgentibus & vteribus magna occurrit differentia: eam tamen à naturali constitutione discernere promptum est.

Verùm talia in viuis raro agnoscuntur, neque curari possunt. Quapropter ad alios Renum morbos progredimur.

## CAPVT IV.

### De Vasorum in Renibus Angustia.

**Vasorum in Renibus angustia.** Cum per vasa Renum humores serosi ab emulgentibus attracti ad vteres transmitti debeant, læditur hæc actio, si vasa hæc non satis pateant.

Quod fit vel compressione, vel obstructione. Comprimuntur vasa ab eorum tumoribus, phlegmone, scirrho, ut & à nimia siccitate, dum scilicet ipsa Renum substantia contrahitur & corrugatur, unde vasa comprimuntur.

Frequentissimè verò renes obstruuntur ab humoribus crassis, viscidis, interdum à materia purulenta per renes euacuari solita, à sanguinis grumis, calculis, qui interdum renes obstruunt, ut nullus humor ad vteres & hinc ad vesicam descendat.

Generantur autem isti crassi & viscidi humores ex ciborum similium frequenti usu, præsertim in iis qui frigidiores habent ventriculum, & vitam otiosam ac sedentariam agunt, elapso.

Grumi sanguinis in ipsis Renibus concrevunt à sanguine extra vasa sua, vel ex contusione vel ulcere aperta.

Pus vel in ipsis renibus generatur ob vlcus & abscessum in iis genitum, vel aliunde ad eos confluit, ut ex hepate aut pectore, è quo interdum materia purulenta per renes euacuari solet.

Calculi quomodo generentur, cap. seq.

#### Signa Diagnostica.

Angustia vasorum in renibus ex urinae suppressione, vel paucitate cognoscitur, ita tamen, ut nullum vitium in vesica vel vteribus adfit, & obstructio sit in utroque Rene. Nam si alteruter sit saluus, is reliqui vices supplere potest. Urina retenta tensionis & grauitatis sensus circa lumbos oritur, in vno vel utroque latere, prout vnus vel uterque Ren obstructus est, hypochondria inflantur, & intumescunt, & alia accidunt quæ infra de urinae suppressione enumerabuntur.

Quando id, quod obstruit, circa caput vteris est, dolor per vteris longitudinem versus vesicam se extendit. Et si aliquid cum urina emittitur, notas eius, quod obstruit, exhibet.

Causæ verò suis signis discernendæ sunt. Si inflammatio vel tumor aliquis adfit, latere non potest, sed suis signis se prodit.

Obstructio, & quidem à crassis & viscidis humoribus cogno-

cognoscitur è crassorum, crudorum & viscidorum humorum redundantia, neque adest dolor, ut in calculo, neque febris, ut in inflammatione, & sentitur in renibus & lumbis quædam grauitas.

Sanguinis grum uicissim esse obstructionis Renum cognoscitur à præcedente sanguinis è vasis renum effusione, & tum plerumque sanguinis mictio præcessit, & præcesserunt apertionis vasorum causæ, lapsus, percussio, equitatio, & aliæ apertionis vasorum causæ & signa.

Pus causam esse, colligitur è signis vlcetis vel abscessus in renibus, hepate vel pulmone; solerque tum plerumque puris aliqua pars cum vrina excerni.

Calculi in renibus signa capite sequenti proponuntur.

#### Prognostica.

Prognostica.

I. Si ab inflammatione vel alio tumore sit vasorum in renibus angustia, mali magnitudo ex ipso tumore æstimanda. Eo enim sublato, vasorum angustia cessat, durante durat.

II. Obstructio, quæ sit ab humore crasso & crudo, vel grumo sanguinis, vel pure, nõ ita difficulter curatur.

III. At quæ sit à calculo, plus difficultatis & periculi habet, & plerumque est incurabilis. Licet enim calculus semel loco moueatur, vel tollatur: tamen vel iterum in vasa incidit, & obstructionem parit, vel manente illa dispositione *λοιδοριον* nouus calculus generatur, ut cap. seq. dicitur.

#### Curatio.

Curatio.

Curatio pro causarum diuersitate varia est. Nam si adsit inflammatio, vel alius tumor, curatio instituenda eo modo, quo postea, c. 8. & 9. dicitur.

Si obstructio sit à pituita cruda & crassa, primò statim ea leni medicamento euacuanda. Vtilia sunt tum etiam vomitoria, quæ crudos humores euacuant, & à renibus reuellunt, & parantur ex raphano, floribus genistæ, foliis & radicib. asari. Postea exhibeantur ea, quæ pituitam incidere, detergere, & vrinam mouere possunt. In quem vsum commodissimæ sunt aquæ destillatæ è petroselino, ononide, asparago, alkekengi, capillis ♀, & similibus, syrupus de duab. & quinque radicib. byzantinus, simplex & compositus, de raphano Fernelij, quæ infra de vrinæ suppressione, part. 8. sect. 2. cap. 2. proponuntur. Vtilis est & spiritus salis & vitrioli in liquore aliquo conuenienti vel iusculo galli, in quo radices diureticæ coctæ sint, exhibitus.

Si à grumo sanguinis sit obstructio, exhibeantur ea, quæ grumos sanguinis dissoluere possunt, inprimis oxymel scilliticum cum decocto vel aquis chærefolij, artemisiæ, capillorum veneris, radicum asparagi, exhibitum, mumia item, myrrha, coagulum leporis, oculi cancri & eorum magisterium. Si à pure crassiore, pus abstergentia exhibeantur.

Si à calculo, instituatur curatio, ut cap. seq. dicitur.

### C A P V T V.

#### De Apertione vasorum in Renibus.

Vasorum in renibus apertio.

Contra interdum vasa in renibus, venæ scilicet & arteriæ, præter naturam aperiuntur. Accidit hoc ab intemperie renum calida & humida, quæ laxat & rarefacit vasorum tunicas; Interdum verò à sanguine calidior & tenuiore, humoribus acribus, qui vasorum orificia aperiunt & erodunt: à motu ite magno, quo dorsum & renes incalescunt tandè etià hoc accidit à calculis, asperitate sua orificia vasorum aperiuntibus, & aliis causis vnitatè renū soluentibus, ut lapsu, percussione, & similibus.

Dan. Sennerti Tom. I l.

#### Signa Diagnostica.

Cognoscitur vasorum in renibus apertio ex vrina. Signa. quæ cruenta redditur. Et quidem si parua saltem quantitate sanguis cum vrina reddatur, vas aliquod saltem dilatarum & rarefactum est, è quo sanguis transsudat: Si verò maiori copia excernatur, vas aliquod magnum ruptum esse, manifestum est.

Quæ autem causa apertionis vasorum sit, cognoscitur ex iis, quæ præcesserunt, & ex humorum in corpore abundantia.

#### Prognosticum.

Quantum verò periculi portendat hoc malum, causæ, à qua pendet vasorum apertio, magnitudine æstimandum.

#### Curatio.

Curatur autem apertio vasorum iis, quæ vel adstringunt, vel consolidant, pro causarum ratione. Itaque vtilia sunt *plantago, bursa pastoris, consolida, tormentilla, tragacanthum, bolus Armenus, terra sigillata, corallium, mumia, lapis hamatites.* Curatio.

### C A P V T VI.

#### De Calculo Renum.

ET si in omnibus ferè corporis partibus calculi quædoque generantur, ut alibi dictum: tamen nullibi frequentius, quàm in renibus & vesica gignuntur: atque ibi geniti variorum morborum ac symptomatum causæ existunt. Corpus quidem istud durum, quod cum in renibus, tum in vesica generatur, propriè calculus nominatur & causa morifica est, morbumque in numero aucto secundum Galenum, lib. de differ. morb. cap. 8. morbum item in via seu, angustiam & sæpe solutam vnitatem parit, atque etiam grauissimos dolores & vrinæ suppressionem excitat. Mala tamen hæc omnia quandoque etiam nomine lapidis vel calculi, qui Græcis *λιδιον* est, comprehenduntur; & ipsa præter naturam, quam calculus parit, Græcis *λιδιαν* dicitur. Ideoque frustra laborant illi, qui anxie disputant, an calculus sit morbus, causa vel symptoma, & ad vnum tantum genus cum referre conantur; cum plures res, quæ singulæ diuersas definitiones requirunt, hoc nomine comprehendantur, ut modò dictum, & diuerso respectu variè definiri possit. In renibus appellatione à parte affecta petita, nominatur Nephritis. Cum autem renum & vesicæ calculi eodem modo generentur, & multa communia habeant, ea etiam & præcipue quæ generationem, coniunctim proponemus.

Hoc ergo primum maximè dignum inquisitione est, quomodo cum in renibus, tum in vesica generentur calculi, seu quæ sit eorum & materia & causa efficiens. Diximus autem ea de re pluribus, lib. 1. Instit. part. 2. cap. 9. & in tract. de cons. & diff. Chymic. cum Galen. c. 11. atque in sententia ibi proposita adhuc persistimus, ipsa rerum experientia persuasi, quæ in rebus naturalibus inuestigandis semper maximi momenti habenda est. Docent autem rerum naturalium historia, non solum in thermis lapides & tophos canalibus, per quas aquæ labuntur, accrescere, sed & fontes & fluuios passim reperiri, de quibus verum est, quod de Ciconibus Ouidius scribit,

*Flumen habent Cicones, quod potum saxæ reddit.*

*Viscera, quod totis inducit marmora rebus.*

Imò quod magis admirandum, dari spiritus eiusmodi lapidificos, qui obuia quæque in saxa & lapides conuertunt. Ita refert Auentinus, histor. Bauaric. lib. 7. Anno 1348. ex terræ motu plures, quam 40. rusticos, item

YYY y mulgentes

mulgentes cum vaccis extinctos obriguiffe, & corpora à spiritu terreno in salarias statuas redacta apud Charipos fuisse, quæ quidem simulacra sibi & Cancellario Austriaco conspecta fuerint. Et Philippus Camerarius, in *descript. Ptolem. augment. centur. 2. cap. 70.* ex Cornelio Vitrulio narrat de aura meridionali certis anni temporibus flante in montanis prouincijs Chilenfis in America, cuius quidem afflatu integræ equitum turmæ velut in statuas lapideas repente obriguerint, steterintque in via eo aciei ordine, quo ante metamorphosin adhuc viuæ iter fecerant. Similem huic historiam refert Ortelius; in *descript. Russiæ*, de pecudum gregibus & armentis illico petrefactis. Nimirum sicut in thermis & aquis quibusdam ex materiæ interna dispositione, seu succo lapidescente, seu forma, cuius hoc Scaliger, *exerc. 1. 5.* tribuit, præcipue vbi ea à reliqua aqua maximam partem separatur, & corpus, cui adhæret, nascitur, lapides generantur; ita & in corpore nostro ac præcipue in renibus & vesica ex simili feculenta terrea & salsa materia, vbi subiectum idoneum nata est, calculos generari, & materiam illam feculentam ac tartaream interna vi ad coagulationem tendere & in lapidem concrefcere, vero maxime consentaneum est. De nomine huius materiæ cum nemine litigabimus. Appellatur humor tartareus, terreus, feculentus, saltus, pituitosus, vel nobilis etiam Praxagoræ pituita, quam Scaliger, *exerc. 108. sect. 3.* dum emingeretur, albuminis molliæ emissam vitri duritiæ & splendore, & in lapidem vitreum mutatam vidit. Neque enim semper materia hæc, ex qua calculi in corpore nostro generantur, eiusdem planè naturæ est, neque eandem formam externam habet, & vt lapides non omnes sunt duri, sed & friabiles; ita omnium non planè vna materia est. Hoc modo concedatur, nec pituitam simpliciter, nec feculentum, nec terreum, aut simile quid ad lapidis productionem sufficere; cum talia in multis corporibus reperiuntur copiose, qui tamen calculo non laborant, & in vesicula fellis calculi generentur non ex pituita, sed ex ipsa potius bile, quod lapidum illorum color & natura demonstrat, sed præcipue vim lapidificam & concrefcendi in ipsa materia requiri, quod etiam illa ipsa observatio Scaligeri manifestè docet; cum pituita illa vitrea neque calore, neque frigore neque siccitate vesicæ coagulata fuerit, sed emissæ & excreta spontè in vitream duritiem concreperit. Agnoui hoc proculdubio manifestè Platerus, qui pituitam solam adeo terrestrem illam materiam, vt in lapidem mutetur, conglutinare, aut calorem renum pituitam adeo exsiccare posse, vt in lapidem concrefcatur, negat, sed expresse statuit, acrem & salum, qui terrestritati in sero & vrina permiscetur, atque inest, succum compingere & veluti ferruminare illam materiam.

Interim non negamus, præter innatam illam lapidescendi vim, quæ ipsi inest materiæ, alia etiam quædam, sine quibus concretio illa non fit, vel non facile fit, requiri. Vnde nonnulli efficientium causarum numerum hæc cumulant, & plures generandorum calculorum modos constituunt. Verum cum Philosophi hic distinguendum est inter principale agens, quod nomine generis in specie αἴτιον dicitur, & οὐ-αἴτιον. Αἴτιον enim hic est vis lapidifica, à qua principaliter concretio pendet. Συυαίνα vero sunt, vel sine quibus primarium agens finem suum non assequitur, vel quæ aliquid ad faciliorem concretionem faciunt, quorum plura esse facile concedimus. Et illi ipsi, qui plures causas concretionis lapidum ponunt, & plures concretionis modos, eosque quasi diuersos, tandem tamen non omnes esse eiusdem generis confiteri necesse habent, dum rectè statuunt, aquas illas, in quibus lapides concrefcunt, materiam vliginosam, limosam, lentam, canosam, terream, glareosam, quandoque

falsam, acidam, aut alio secum genere infectam secum ferre, quæ feces locis potissimum siccioribus adhærescant, quod siccitas sine omni calore quandoque sufficiat ad materiam, quæ præterfluxura erat, retinendam: Potissimam verò concretionis causam existere materiam, ex qua fit lapis, qualitatem (à Scaligero formam nominari diximus) quæ suapte natura, vel nullo extrinsecus accedente calore aut frigore, ad concretionem ipsa sibi abunde sufficiat: etsi promptius concrefcatur (adiuantes enim solum causæ sunt calor & frigus) si calor externus aut frigus accesserit. Atque ita vnicum, quantum ad causam principem, generationis calculorum modum statuendum esse censemus; neque adiuuantes causas & συυαίνα pro principalibus habendas. Itaque etsi multæ aliæ aquæ sint, quæ æquè, imò etiam sæpe magis impuræ sunt, quàm illæ, in quibus calculi generantur: tamen non in omnibus lapides concrefcunt, sed in iis saltem, in quibus iste succus lapidescens est. Συυαίνα tamen & adiuuantes causæ etiam cognoscendæ propter curationem. Nam in omni vrina materia ad calculum generandum apta est; id quod vel ex maculis vrinariis, in quibus eiusmodi materia, nisi sæpius mudentur, concrefcit, & sale, qui ex vrina conficitur, apparet: non in omnibus tamen materia illa in calculum coagulatur, sed emingitur & excernitur. Ita etiam videmus, plurimos impune caeco & aliis, qui ad calculum generandum faciunt, cibis vesci, alios verò ab iisdem maxime lædi. Cuius rei causam non tam in materia calculi, quàm in corporis dispositione, quam Fernelius arenosam, calculosamque renum constitutionem appellat, consistere non negamus. Noui enim virum doctum, qui cum à calculo planè liber esset, post quartanam in calculum incidit, tali constitutione renibus induta. Et hinc multi, qui in iuuentute calculo non laborarunt, progressu ætatis calculo renum obnoxij fiunt. Si quis tamen hæc statuere velit, etiam in prima & secunda coctione hæc errorem aliquando concurrere, vt scilicet vbi partes tartareæ ac feculentæ non diligenter & exactè, vt par est, separantur, quæ verò postea ad renes & vesicam prouenerint, atque ibi quacunque de causa substituerint, in lapidem coagulentur, id non planè reiiciendum putamus. Cum enim, vt postea etiam dicetur, stranguria etiā fieri possit oberrones in victu, & primæ aut secundæ coctionis vitium: ad calculi quoque generationem aliquid facere, & calculo materiam suppeditare posse, absurdum non est: cum prioris coctionis vitium non corrigatur in secunda.

Quæ autem causæ sint, quæ calculorum generationem adiuuent, alij aliter sentiunt. Fernelius in genere arenosam, calculosamque renum constitutionem appellat, quæ tamen illa sit, non explicat. Platerus siccitatem solam ponit. Alij plures addunt, etsi eas pro primariis efficientibus ponunt. Primum autem ad calculum generandum facere statuunt plerique calorem exsiccantem renum, cuius etiam nonnulli aliquot gradus constituunt, & declarant hoc exemplo lixiuij, è quo, absumptâ per calorem aquâ, sal coquitur, & aquæ marinæ, quæ etiam calore Solis & ignis in salem coagulatur. Verum exemplum hoc rectè declarandum est. Neque n. quod in salis artificiosa præparatione fit, hoc omne etiam in renibus accidit, nec calore aquea pars planè absumi potest, crassa relicta; cum continuo è corpore serosa materia ad renes deriuetur: multò minus per assationem calculum in renibus gigni credendum est, sicut ex terra lapides coquuntur. Neque enim tantus in corpore nostro calor est, neque ita humidum omne, vt in laterum coctione, in renibus absumi potest. Neque etiam aquæ absumptio principalis coagulationis causâ est in salibus (etsi ad faciliorem coagulationem faciat) cum in ipsa aqua salem concrefcere videamus. Sed cum natura nunquàm sit otiosa, verum



verum excrementa non cruda, sed certo modo elaborata, ut in fecibus alui apparet, è corpore emittat: idem in vrina fieri credendum est, humorumque ferosum, antequam è corpore excernatur, in renibus suo quoque modo alterari & elaborari credendum est. Quod si non rectè fiat, sed quæ coniunctim & mixta excerni debebant, partes tartareæ & feculentæ ab aqueis separentur, & aqueæ per vrinæ excernantur, tartareæ v. & feculentæ hæreant & subsistant in renibus, ob insitam vim lapidescenti in calculum mutantur. Causam vero, ob quam hoc fit, siue quis constitutionem arenosam calculosamque renum cum Fernelio, siue siccitatem cum Platero, siue calorem exsiccantem appellare velit, per me licet. Plus tamen hinc cum Platero malim tribuere siccitati, quam calori; cum senes, in quibus calor minor est, quam in iuuenibus, calculo renum magis sint obnoxij, quam iuuenes, in quibus calor renum maior, & calculi quandoque in iis partibus coagulentur, in quibus calor præter naturam insignis esse non potest, ut in umbilico & alibi. Sufficit siccitas, non ut causa princeps, sed ut adiuuans, ut modò dictum, & idoneum coagulationis subiectum. Si enim materia concretioni apta subiectum idoneum nanciscitur, ei sese agglutinat, & indies incrementum sumit. Qua de causa in aluminis & vitrioli officinis arundines & baculi lignei lixiuio imponuntur, ut facilius concrecant; & tephaceæ & tartareæ materia in ore dentibus adhærescit; & lapidis bezoar primum rudimentum est circa paleam vel simile quid. Et Forestus, lib. 24. in Schol. obseru. 22. ex Alexandro Benedicto refert, virginem quandam è vesica lapidem oui gallinacei, magnitudine eiecisse, in cuius diffracti medio acus crinalis reperta fuit, quam olim deglutiuerat. Hæc ipsa de causa accidit, ut diuretica & calculos frangentia, vehementius siccantia non solum non præseruent à calculo, sed potius dispositionem illam ad calculum generandum aptam in renibus angeant, renes exsiccando. Et qui hanc naturalem ad calculum generandum dispositionem, quocunque modo nominetur, à parentibus est nactus, calculi causam secum circumfert, & vix illa diligentia morbum hunc effugit.

Atque hæc quidem calculorum materia proxima est & generationis modus: Causæ mediata & remota aliæ ad materiam calculi generandam faciunt, aliæ ad dispositionem renum & vesicæ, ob quam calculi facilius concrecant. Materiam diximus esse tartaream, limosam, feculentam, salinam, ferosam, pituitosam, atque aliis etiam nominibus appellari. Huius est in omni vrina aliquid reperiatur, ut id in matulis urinariis apparet; tamen in aliis corporibus plus, in aliis minus cumulat. Ideoque de causa antecedente calculorum, & causis quæ eam suppeditant, dicendum.

Facit primò huc, ut antea dictum, vitiosa in ventriculo coctio. Nam si in hoc cibus non bene coquatur, & excrementa non probè segregentur & excernantur, sanguis inde feculentus generatur; cum coctionis primæ vitium non corrigatur in secunda, serumque etiam impurum ad renes peruenire necesse est. Potest huic & aliquid conferre hepar, si munus suum non probè obeat, & quæ homogenea sunt, non congreget, nec heterogenea separet.

Vitus verò inprimis ratio ad calculum generandum plurimum facit. Primò crapula & cruditates, ac cibi, qui crassum ac lentum succum præbent, acuti item & salsi. Pertinet huc panis non bene fermentatus aut malè coctus & pultis, ac placenta ex tritico, legumina ferè omnia, exceptis ciceribus rubris, lac & lacticia omnia, caseus, de quibus Galenus, 3. de aliment. facult. cap. 15. 16. 17. Pisces omnes grandiores, anguilla item, murenæ, aliæque squammis carentes, etiam viscosi, cancri, ostrea & conchyliæ: Carnes item animalium

crassum & viscidum succum præbentes, ut suilla, bubula & inprimis carnes sale ac fumo induratae, ut & pisces sale conditi vel siccari; è partibus animalium ventriculus, cerebrum, cor, pulmones, splen, intestina. Aues lacustres, anas, anser, oua dura, fructus immaturi, austeri, acerbi, & mespila, pyra, cydonia, castaneæ, fungi item ac tubera, vinum immaturum, austerrum, nigrum, crassum, dulce, inprimis mistum, & id vini genus, quod in locis argillosa tartareâ & calculosa materia abundantibus crecit. Cereuisia recens, feculenta, crassa, aquæ crassæ, palustres, ex niue liquatae, & quæ materiam lapidescentem permistam habent.

Calculosam verò renum constitutionem augent & inducunt, quæ renes exsiccant & debilitant. Hinc accidit, ut omnes, qui cibis modò enumeratis vescuntur, calculo laborent; de quo Galenus, lib. 3. de aliment. fac. cap. 17. ait; Vbi succorum crassities cum calore ardente iungitur, calculi generantur. Et ibidem cap. 16. Calculos solent gignere edulia; crassa & crassi succi, maximè cum homines calidiores iusto fuerint, seu ob naturalem intemperiem, seu ob quandam alium affectum ipsis postea innatum, non tamen pro caloris ratione meatuum transitus latos habeant. Nimirum opus est, ut Platerus ait, ut acris & salsus humor cum terrestri iungatur, & renum siccitas præter naturam vinarumque angustia adsit. Referendus etiam hinc intempestius purgantium & diureticorum medicamentorum vsus, quæ renes exsiccant & calculosam constitutionem iis inducere possunt. Non etiam nihil ad calculi generationem facit immoderatus & intempestius mox à cibo sumpto corporis motus, item equitatio, venus, morulque omnes; qui dorsum præcipuè & renes calefaciunt atque exsiccant.

Astrologi hinc etiam è cælo causas petunt & scribunt, Saturno cum Mercurio in domo octaua in natiuitate diurna significare, quod natus erit calculosus, aut vesicæ morbum patietur.

Pertinet huc & hæreditaria ad calculum generandum dispositio, quam Hercules Saxon. saltem prauam aliquam renum conformationem esse statuit, intemperiem verò esse negat, ea de causa, quod si intemperies esset, ratio nulla dari possit, cur non potius incideret in calculum ætas iuuenilis, quam senilis. Verum ratio hæc sufficiens non est. Dantur enim multæ dispositiones hæreditariæ similarium partium, quæ non mox in infantia & iuuentute, sed progressu ætatis sese exerunt, vbi certis de causis augmentum sumunt, eumque gradum, qui ad morbum aliquem producendum necessarius est, acquirunt; id quod in arthritide manifestum est.

Atque hic causa explicanda est, cur pueri magis calculo vesicæ, adulti verò calculo renum sint obnoxij. Est enim pueri etiam quandoque calculo renum corripantur: tamen id rarissimum est, ut id non nisi semel se vidisse, Cardanus scribat, in comm. aph. 26. sect. 3. Causarum huius rei Galenus, 6. epidem. comm. 3. t. 15. in vrinæ crassitiem refert: Crassitudo, inquit, multa in vesica collecta & in vnum coaceruata, si diu ibidem remanserit, concrescendi, coagmentandique initium capit. Hippocrates in lac præcipuè causam refert. Verum cum & pueri ferè omnes tandem viuendi rationem obtineant, & tam in pueris, quam infantibus multis mingantur vrinæ crassæ, & tamen calculo vesicæ non laborent, causa huius rei inquirenda est, sicut & illius, cur in pueris in renibus calculus non concreseat. Posterioris quidem causa est proculdubio, quod puerorum renes sunt humidiores, & ad detinendam materiam calculi minus apti, atque expultrix vis in iis est fortior: Ob quod accidit, ut materia illa statim per renes transeat, ibique non coaguletur. Ad vesicam verò delata materia cum

à calore eius, ut partis ex sanguis, debili regi non possit, non exacte crassum aquoso permiscetur, sed aquosum excernitur, crassum remanet, & in lapidem compingitur. Contra in adultis ob renum siccitatem & dispositionem statim in renibus in calculum concrevit. Prioris verò causa querenda est, tum in materia tum in vesicæ dispositione diuersa. In materia quidem, quod materia crassa non semper est eiusdem generis. Neque enim crassities sola ad lapidum constitutionem sufficit, sed requiritur in ea vis lapidifica, seu ut Platerus loquitur, succus salis, qui vim compingendi terrestritatem habet. Ideoque quod omnes pueri calculo vesicæ non laborant, causa non est calor exsiccans, ut Mercatus existimat. Neque n. in vesica membranosa & frigida, & quæ semper humore affluente renibus abundat, tantus calor esse potest, qui humidum absumat, ut lapis instat eorum, quæ à calore humidum abluente indurecunt, concrevere queat. Verum probabilius est, id ideo fieri, quod urinæ crassiores infantium aliæ plus, aliæ minus illius salis & lapidescens succi in se continent, seu ex victus ratione, seu ob ventriculi, hepatis, vel renum in coquendo & separando vitium, ob quod materiam sibi subiectam non recte elaborant. Hinc etiam in pueris omnibus urina crassa ardorem urinæ non excitat, non ideo, ut Mercatus vult, quia in aliquibus saltem maior calor adsit, sed quia, ut recte Platerus ait, in illa materia terrestri plus est succi acris & salis. Imò potius frigiditatem vesicæ ad calculum generandum facere, credibile est. Cum enim urina debito modo attrahi non potest, crassum aqueo non permiscetur, sed ad fundum subsidet & vesicæ adhærescit & in lapidem compingitur. Et quamvis caliditatis indicia quædam adsint in urinis puerorum, qui calculo vesicæ obnoxij sunt: tamen ea potius in urina est, quam in vesica. Qua de causa Hippocrates, in lib. de aer. aqu. & loc. interdicat infantibus lac biliosum & feruidum ac vinum. Et in 4. de morbis scribit; Si puer à nutrice lac non purum suxerit, sed biliosum, morbosus fit ac tenuis. Quamprimum autem in vesica rudimentum aliquod calculi cogitur, circa id postea materia noua indies conglobatur, & ut Scaliger, exerc. 115, ait; Quæ forma priorem concretionem generat, eadem adgenerat etiam appendicem ex eadem materia, quam exinde nata est. Et ita ex multis quasi lamellis sæpe lapides coagmentantur.

### Differentia.

**Differentia.** Etsi aliquot differentie sint calculorum desumptæ à figura, quod sunt rotundi, oblongi, leues, asperi, angulares; à colore, quod alij sunt rubri, alij flauj alij cinerei, nigricantes; à duritie, quod alij sunt duri, alij friabiles; à magnitudine, quod alij sunt parui, alij magni; à numero quod modò est vnus, modò plures: tamen præcipua differentia est, quod alius est renum, alius vesicæ. De illius signis & curatione hoc capite agemus, de huius suo loco acturi.

### Signa Diagnostica.

**Signa.** Etsi Johan. Baptista Syluaticus, controuers. 3. 2. prolixè disputat, an calculus in vesica & renibus concretus, certum aliquod, quo cognoscatur, habeat signum, atque pathognomonicum signum habere negat, imò nec Syndromen symptomata pro certo signo admittit: tamen si omnia symptomata diligenter perpendantur, & non ex vno saltem, sed ex omnibus de affectu indicetur, non impossibile esse putamus, in calculi cognitionem venire, doloresque nephriticos ab aliis discernere.

Hippocrates, in lib. de extern. affect. signa calculi renum ita proponit. Quatuor morbi in renibus sunt; à

calculo sequentia patiuntur ægri. Et dolor acutus incidit in renum, & in lumbos, & in testem secundum rectum situm, & frequenter mingit, & adstringitur paulatim, & supprimitur urina, cum urina procedit arena, & ubi per urinæ meatum exit arena, dolorem fortem in meatu exhibet. Libro verò 6. epidem. comm. 1. 1. 6. alia addit; In Rene inquit, dolor grauis, cum cibo impleretur, vomuntque pituitam, cum verò abundauerint; æruginosa, & leuiorres quidem euadunt, liberantur verò, cum cibi euacuati sunt, arenulæque rursus subsident, & cruenta mingunt, stupor femoris è regione positi.

Primum quidem signum dolor suppeditat, qui in lumbis percipitur, modò in rene dextro, modò in sinistro, modò in utroque, prout in vno rene vel utroque calculus fuerit. Atque is infert sensum ponderis grauioris; quia substantia renum lenius expers, & sentiendi vis tantum membranæ inest. Vbi verò ex renibus in vteretres descendunt calculi, dolores augentur; quia distenduntur & lancinantur vteretres, qui densa & crassa membrana constant. Sicur & dolores concitantur, cum calculus in substantia renum genitus è carne in cavitatem renum mouetur, durusque & angulosus lapis partes, per quas transit, lancinat. Nonnunquam calculus ex vteretris, in quem descendere cepit, angusta via in cavitatem renis relabitur, & tum dolor aliquando mitigatur, qui postea, ubi in vteretris caput remeat, redit.

Alterum calculi signum plerumque est urina cruenta; quia calculus cum nunquam ferè planè leuis sit, partes per quas transit, vulnerat. Urinæ præterea circa initium obstructionis pauca, aquosæ minguntur, postea verò eius suppressio sequitur. Vbi verò calculus è renibus fuerit remotus, urina multa turbulenta plerumque prouenit, arenosum sedimentum habens. Si tamen in renum substantia calculus hæreat, neque urinam supprimitur, neque arenas emingi necesse est. Obseruatumque est in multis dissectis calculos repertos fuisse, qui neque arenam minxerunt, neque urinæ suppressionem passi sunt. Et arenulæ quidem, ubi calculus in cavitatem renum est, apparent, verum non contra, ubi arenulæ apparent, ibi calculum adesse pronuntiandum. Ideoque hæc videndum, ne ex arenis solum calculos eos pronunciemus, qui à calculo planè immunes sunt. Sæpe enim multum materiae arenosæ mingitur, & sæpe mox à pueritia ab iis, qui nunquam calculo renum laborarunt, quibusque calculus non facile timendus, qui prouenit ex adustione humorum potius in venis ac hepate & aliis locis, quam à renibus & vesicâ. Accidit quoque hoc sæpe in declinatione febrium cum acutarum, tum diuturnarum. Non difficile est autem arenulas istas ab iis, quæ calculi signa sunt, discernere. Nam arenulæ illæ, quæ calculi signa sunt, non substantiæ urinæ permiscetur exactè, sed in urina subsident, & si digitis comprimantur, non facile comminuuntur; illæ verò, quæ absque calculo adustorum & tartareorum humorum in venis indicium sunt, non subsident, aut certè minima ex parte subsident, sed substantiæ urinæ permiscetur, & postea matulæ urinariæ adhærescunt, instar pulueris etiam ipsi urinæ innatant, & digitis compressæ faciliè comminuuntur. Certius longè signum est calculi, & calculosæ in renibus dispositionis, si calculus è renibus cum urina excreatur.

Stupor crurum etiam est in dolore Nephritico è regione renis affecti, qui in Colico abest; non, ut Galenus, 6. Epidem. com. 1. aph. 6. scribit, ob compressionem venarum, cum stupor non venarum, sed nervorum affectio sit, neque in Nephritide ita venæ & arteriæ repleantur, ut musculos premant: Sed quia vel nervus, qui in crurum musculos distribuitur, à duritie & pondere calculi comprimitur, vel quia musculus, cui ren incumbit, quique cruri flectendo dicatus est, & in cruris partem anteriorem inferitur, comprimitur. Hercules Saxonia equidem & ipse agnoscit à venarum compressio-

ne stuporem hunc fieri non posse, & causam refert in compressionem nervi, quem renum tunica à sexta coniugatione accipit. Verum minus probabilis hæc causa videtur; cum nervus ille cum cruribus nullum consensum habeat.

Testiculus præterea eius lateris, in quo dolor est, retrahitur. Cum enim calculus renes & eius membranam distendat, facile fieri potest, ut etiam vicina vasa, quæ ad testes tendunt, itque inferuntur, retrahantur.

Adest quoque nausea & vomitus, ob connexionem renum cum ventriculo, mediante peritonæo, cuius membranæ utrumque viscus participat; deinde quia bini nervi sextæ coniugationis à stomacho orti in internam renum tunicam implantantur. Ideoque postquam vellicantur & lancinantur nervi & membranæ in ventriculo, per quas cum renibus consensum habet, ad expellendum, quod molestum est, stimulat, & ita is ad vomendum prouocatur.

Confirmant hæc omnia, quæ etiam malum prælagire possunt, causæ, quæ ad generationem calculi faciunt, si præcesserint, ut victus ratio, qualem supra descripsimus & materiam calculo suppeditare diximus. In primis vero si parentes eidem morbo obnoxij fuerint. Adultis quoque & qui in declinante sunt ætate, magis hic morbus accidit, sicut vesicæ calculus pueris frequentior est. Si quoque vrina crassa, turbida est, & diu citra crisin excernatur, & si æger in victus ratione nihil peccet, & postea ex crassa tenuis fiat, calculi futuri prælagium est. Crassa enim vrina, quæ excernitur, materiæ calculo gignendo aptæ præsentiam indicat, tenuis vero post crassam illam retineri & coagulari argumento est; id quod magis confirmatur, si dolor aliquis in renibus sese prodar.

Quia verò dolor Colicus non parum sæpe cum Nephritico cognationem habet, qua ratione ab eo discerni possit, docendum. Nam interdum dolores colici vel à pituita vitrea, vel ab humore acri, vel ab inflammatione orti, ea coli parte, qua iuxta renes voluitur, fixi & stabiles sunt, maxime in latere sinistro, ubi intestinum hoc angustius est, ut tunc dolorem colicum à nephritico discernere non ita facile sit. Deinde tam in colico, quam in nephritico dolore vomitus infestat, quo primum pituitosa, hinc biliosa reiciuntur. Ideoque qua ratione dolores, discerni possint, videntur. Prolixè autem id docet Galenus, 1. de loc. affect. cap. 2. & 3.

*Doloris colici  
& nephritici  
Differentia.*

Duo verò præcipue signa dolorem colicum & nephriticum discernunt; Doloris conditio, & situs loci dolentis. Primum dolor in renibus non ita grauis est, ut colicus: Deinde si dolor sit supra regionem renum, non est nephriticus, sed colicus. Dolor præterea colicus amplior est, & latius extenditur, prout ipsum colon omnium intestinorum amplissimum per regionem abdominis circumuoluitur, & sæpius situm mutat, vagusque est; Nephriticus verò fixus est, renumque regione circumscribitur, & eo loco, in quo calculus hæret, qui ubi mouetur ad vesicam, vterum ductum rectè sequitur. In colicis etiam doloribus murmura & rugitus in intestinis ferè percipiuntur, qui absunt in nephritide. Vrina in nephritide propter obstructionem primo sunt tenues & crudæ, mox cum arenulis vel calculis aut sanguine excernuntur: In dolore verò colico, cum seu bilis ob viam ad intestina interclusam ad renes fertur, seu vesicula fellis quasi conuellitur, vrina in initio rubens & crassa excernitur, alius ferè obstruitur, & quæ excernuntur, flatuosa sunt, & tandem reliqua etiam signa nephritidis, ut stupor cruris è regione loci affecti, in colica absunt.

#### Prognostica.

*Prognostica.*

1. Calculus renum morbus periculosus est; cum mala grauiissima inferat, inflammationem & exulcerationem.

Dan. Sennarti Tom. II.

tionem renum, dolores acerbissimos, cum in vterum delabatur, unde vigilæ, virium dejectio, vrina retentio, febris sæpe, & alia mala ortum habent.

2. Calculus quò maior & asperior est, eò acutiores dolores infert, & si tantæ sit magnitudinis, ut vterum pertransire nequeat, incurabilis plerumque est. Parui verò, rotundi ac leues facilius excernuntur.

3. Si malum hæreditarium sit, difficulter, imò vix unquam curatur.

4. Vitia renum & vesicæ in senibus difficulter curantur. 6. aph. 6.

5. Si dolor nephriticus nullis medicamentis sedetur, mortè minatur, quæ iam in propinquo est, ubi extremities frigida sunt, sudor frigidus faciem occupat.

6. Bonum est, si vrina primum crassa, deinde tenuis & rursus crassa mingatur, ac in fundo arenæ resideant. Lapidem enim resolui indicio est.

7. Calculus renum cum vlcere renum non curatur: Nam quæ lapidem frangunt, vlceri nocent.

8. Arena, quæ difficiliter comminuitur, peior est, cum à duriori materia fiat.

#### Indicationes & Curatio.

Triplex, ut in omni calculo, ita & in renum calculo *Indicationes & Curatio.* scopus propositus est Medico. Primus, ut lapidis, qui generatur, generationem & augmentum inhibeat. Secundus, ut iam genitum è corpore tollat. Tertius, ut doloris vehementiam mitiget.

Primum quod attinet, perficitur hic itidem tribus; *Primus rationis scopus.* materiam calculo generando aptam subtrahendo; Si quid lapidis iam concreuit, illud abstergendo, comminuendo & expellendo, & tandem renum constitutione ad calculum generandum aptam emendando.

Ad primum assequendum rursus duo sunt necessaria: Primum est, ut victus ratio ea instituatur, quæ calculo materiam non suppeditat. Alterum, ut si quæ materia subinde colligatur, è corpore, ne in calculum concreuit, euacuetur. Ideoque & ut primum rectè præstetur, cibi omnes vitandi sunt, quos supra in causis ad calculi generationem facere diximus, ut & cruditates accrapula ac ciborum varietas. Quamuis verò nonnulli cibos crassos ad calculi generationem facere negant: tamen ratio, ut & experientia, contrarium testatur.

Contra cibis vitandum, qui faciles sunt coctionis, parum excrementi suppeditant, attenuandi & incidendi vim habent, præsertim in frigidioribus & obesis. Nam in gracilibus, & adustos humores in corpore habentibus extenuantium vsus tutus non est, sed humectans victus potius requiritur. Vtilis ergo est caro veruicina, vitulina, vitelli ouorum, panis bene coctus & fermentatus, fursuris non planè expers, pisces sint saxatiles, lucius & similes.

E fructibus conueniunt amygdalæ amaræ, pistacia, pineæ, nuclei persicorum, ceraforum, ficus, cicera rubra. Inter herbas conuenit attriplex, malua, cichoriū, petroselinum, asparagus, cuius prima germina in prima mensa sumpta renes ab arenosis impuritatibus egregiè mundant, & in primis chærefolium singulare calculi remedium. Comendantur & fructus Cynosbati, quos non solum hodie Pharmacopolæ saccharo conditos asseruāt, & ex iis Rob parant, sed & matresfamilias siccant, & à siccatis edulium calculosis commodum cum saccharo & cinamomo parant. De herbis verò & oleribus, ut & omnibus cibis diureticam vim habentibus, tenendum, ne vsurpentur, cum primæ viæ impuritatibus sciant, neque etiam cum cibis misceantur, ne cibis crudus, vel eorum excrementa secum deducant, sed solis & ieiunio ventriculo iis vitandum.

Deinde necessarium est, ut subinde materia, quæ etiam in bona diæta quādoque colligitur, & calculo generando apta est, maturè euacuetur, antequam ad renes deducatur.

YYYy 3

Porest



Potest hoc fieri vomitu bis tervē singulis mensibus instituto in iis, qui facile vomunt, vel per purgationem bimestri vel trimestri spatio institutam, ut materia ē primis viis euacuetur. Non autem hīc fortia medicamenta usurpanda, sed leniora, syrup. rosar. solut. cassia, manna, rhabarbarum, terebinthina, præparantibus etiam ad euacuationem necessariis præmissis. In vtrisque verò non solum ad pituitam, sed ad quosvis humores abundantes, & inprimis serosos, salios respiciendum. ut:

℞. Hydromel. Vnc. viii. aqu. asparag. Vnc. ii. syr. de cichor. cum rhabarb. Vnc. i. crystal. tartar. ʒ. ii. vel tartari vitriolat. ʒ. ii.

Misce pro 2. dosibus.

Et cum subinde in dispositis ad calculum aliquid materiæ in renibus hæreat, ne diu in iis moretur, abstergendum id est, potestque vna opera medicamentum & primas vias euacuare & renes abstergere. Ad quam rem inprimis utilis est terebinthina in substantia sumpta, & in bolo vel pilulis, vel in liquore, modo in Institut. l. 5. p. 1. s. 1. c. 2. descripto, exhibita; cum eadem & vim purgandi habeat primas vias & materiam calculo generando aptam subtrahat ac renes abstergat. Et ut vis eius intendatur, alia purgantia admisceri possunt, ut:

℞. Cassia ʒ. ʒ. terebinth. ʒ. ii. Cum pulvere glycyrrhiz. vel cum pulv. glycyrrh. & saccharo

F. Bolus.

Vel ℞. Terebinth. ʒ. ʒ. rhabarb. ʒ. i. cinamom. ʒ. i. pulv. succini, glycyrrh. ceterach. an. ʒ. ʒ.

F. Pilulæ, de quibus singulis septimanis Dra. i. vel ʒ. ii. assumantur.

Vel ℞. Flor. cassia ʒ. i. elect. de succo rosar. ʒ. i. pulv. glycyrrh. ʒ. j. Cum saccharo

F. Bolus.

Vel ℞. Rad. alihæa glycyrrh. polypod. q. an. Vnc. ʒ. petroselin. ʒ. ii. capillor. ♀. veronica an. M. i. sem. carthami, fœnicul. an. ʒ. i.

Coqu. in aqua simpl.

In Colatura infund. fol. sena elect. Vnc. i. rhabarbar. Drach. ii. agaric. trochisc. Drach. i. sem. cinamom. Scrup. ij.

Colaturæ ℞. lbi. quæ diuidatur in partes tres, & cuiuslibet addantur syrupi violar. solut. ʒ. vi. vel ʒ. j.

Vel ℞. Aloes, ʒ. i. rhabarb. elect. agaric. trochisc. an. ʒ. i. ʒ. extr. scammon. gr. xii. cinam. spice, mastich. an. ʒ. ʒ.

Cum terebinth. F. Pilulæ ʒ. i. xx. quæ conpergantur pulvere glycyrrhizæ.

Si sanguis abundat, & is apertâ basilica imminuendus.

Postea (nam nisi euacuaciones generales præcesserint, diuretica & similia medicamenta tutò non adhibentur) accedendum ad ea, quæ lapidem, si fortè eius aliquid concreuit, comminuendi & abstergendi, & omnino generationem eius imminuendi vim habent.

Sunt huius generis multa. Radices saxifragie, pimpinelle, petroselin, fœnicul. lappa maior. filipendul. raphani, cappar.

Folia betonic. capill. ♀. hederæ terrestr. ceterach, cherefol. pariet. veronica.

Flor. genista.

Sem. milij Olia, petroselin. bacca hederæ, cicera rubra, amygdal. amar. nuclei perscor. malor. Armeniac. fructus cynosbati, alkekengi.

Terebinth. succinum.

Succus citri, limonum.

Crystal. tartar. spir. salis, vitrioli.

Sales plantarum supra enumeratarum.

De Terebinthina refert Amatus Lusitanus, cent. 2. curat. 68. monachum quendam, cum articulari morbo simul & nephritico corripui solet, & nullo remediorum genere, frustra quæ multis tentatis conualesceret, tandem monitu Amati assiduo terebinthinæ vlu intra 6. menses liberum à dictis morbis euasisse. Deglutiebat autem singulis diebus terebinthinæ particulam nucis magnitudine saccharo admistam.

Alij valde commendant Decoctum ligni cuiusdam, quod nephriticum dicitur, cuius manè Vnc. v. exhibentur. Lignum Nephriticum.

Ex enumeratis ad calculum præcauendum valde etiam efficax est Hedera terrestris quocunque modo sumpta. Hedera.

Multum etiam ad præcauendum calculum facit, si singulis vel alternis diebus manè amygdal. amaræ. nuclei perscor. vel grana iuniperi matura x. vel xij. comedantur, aut spiritus Olis guttæ aliquot in iusculo vel alio liquore sumantur. Vinum quoque ex fructibus cynosbati paratum calculosis vtile est. Crato valde commendat succum & syrupum de veronica cum aqua eiusdem exhibitum, vel pilul. ex pulvere & succo paratas. Hinc & ad dolores minuendos & materiam abstergendam in familiari vlu habuit hoc medicamentum.

℞. Alihæa ʒ. ii. passular. maior. exacinat. ʒ. iii. veronica, hederæ terrestr. an. p. j.

Coqu. in aqua simpl.

Detur haustus cum saccharo.

Plura huius generis inueniuntur inter ea, quæ infra de medicamentis calculum frangentibus dicentur. Leniora enim ex iis ad rudimenta calculi comminuenda & abstergenda etiam vtilia sunt.

Tandem danda opera, ut renes ad naturalem statum reducantur. Ideoque si hepatis calor in renibus intemperiem calidam & siccam excitauerit, vel sanguinis copia aut suppressio adsit, sanguis debito modo euacuandus. Hinc renum caliditas & siccitas, tum externis, tum internis medicamentis temperanda. Utendum nimirum balneo aquæ dulcis, inungenda regio renum oleo violarum, rosarum, vnguento rosaceo, refrigerante, quibus addantur mucilago sem. psyllij, camphora, vel fouendi renes lacte, succo cucurbitæ, portulacæ, plantaginis vel aquis eiusmodi.

Exhibenda verò aqua fragorum, violar. portulacæ, decoctum hordei, emulsio quatuor sem. frigid. maior. syr. violarum, serum lactis caprini cum saccharo, vel syrupus violarum, & alia, quæ renes refrigerant & humectant. Vtile est & Medicamentum Cratonis, quod fit ex succo portulacæ.

℞. Succo portulacæ inspiss. ʒ. i. gummi Arabici ʒ. ʒ. F. Pilulæ: assumantur hora dimidia ante cœnam corpore prius euacuato.

Si verò calculus genitus sit, ut is tollatur, danda opera. Quod fiet, si viæ per quas transire debet, laxentur, calculus ipse loco moueatur, ac si integer expelli non possit, comminuetur, & frangatur. Secundus Curatiois scopus.

Ut ista autem commodius fieri possint, & prius primæ viæ semper mundandæ sunt, & sanguis quoque si abundet, ac vires ferant, euacuandus, ne renum inflammatio vel febris superueniat. Vnde Hippocrates, 6. epidem. com. 1. aphor. 6. iubet non repleri, iuuenes veratro purgare, poplitem incidere. Neque enim, in quo sæpius à multis peccatur, statim ad diuretica & lithontriba veniendum, quæ vitiosos humores inprimis viis hærentes ad renes deducunt, ipsūque calculum in angustas vrinæ vias præcipitant, detrudunt & impingunt; sed impuritates è primis viis primum tollendæ, & viæ, per quas calculo transeundum, laxiores & lubricæ primum reddendæ sunt.

Ad euacuationem verò sufficiunt leniora, & abstinendum à fortioribus, quæ humores in toto corpore agitare, & ad vias vrinæ deducere possint. Ideoque clysteres ex emollientibus, laxantibus, & anodynīs paratos semper initio inicere vtile est, & ab iis cura calculi merito inchoanda; cum pluribus scopis satisfaciant, primas vias euacuent, vias vrinarias laxent, & dolores sedent. Euacuatio.

Quod si æger clysterem admittere nolit, purgans lenè aliquod exhibeatur.

Ut ℞. Cassia ʒ. vi. rhabarb. ʒ. ii. turbit. elect. ʒ. ʒ. pulv. glycyrrhiz. ʒ. i. Cum saccharo. F. Bolus.

Vel

Calculus  
cōminuentia.

Terebin-  
thina.



Vel ℥. Rad. althæa Drach. ii. cryng. Vnc. sem. glycyrrhiz. Drac. j. flor. chamamel. veronica an. p. i. passular. 3. B. Coqu. in aqu. simpl.

In Colaturâ infunde. fol. sena Drach. iii. rhabar. Scrup. i. turbit. elect. Scrup. sem. ciuamom. schœnanth. sem. fœniculi an. Scrup. sem.

Colaturâ. ℥. Vnc. iii. vel Vnc. iiiii.

Adde Syrup. rosar. vel violar. solut Vnc. i. Misce.

7masidie.

Sanguinis verò euacuationem quod attrinet, si in principio plenitudo sit in corpore toto, vena brachij aperienda. At si plenitudo jam ad partem affectam decubuerit, in poplite vel malleolo deriuationis gratiâ vena aperienda.

His præmissis vias laxant, patientiores & lubricas reddunt, vt calculus cum minore difficultate & dolore excerni possit, tum externa tum interna medicamenta. Inter Externa sunt clysteres, fomenta, linimenta, vnguenta, cataplasmata, emplastra, balnea. E. G.

℥. Rad. althæa 3. i. violar. malua, branca vrsin. parietaria an. M. j. summitar. anethi M. sem. flor. chamamel. p. i. sem. fenugrec. Vnc. sem. Coqu. in aq. simpl.

Colaturâ ℥. lb. j. vel 3. x. ol. violar. 3. ij. cassia 3. j. M. F. Clyster.

Vel foueatur locus vesicæ aqua dulci calida semiple-nâ, aut lacte, vel decocto rad. althæa, malua, violariæ, parietariæ, chamamel. anethi, sem. lini, fœnigræci, vel oleo chamamel. in quo flores genistæ macerati fuerint.

Inungantur Renes oleo amygdalar. dulc. violar. li-lior. albor. pinguedine gallinæ, anseris, butyro recentj, mucilag. sem. althæa, fœnigræci, vnguento Dialthæa.

Insignis etiam efficaciam est, cataplasma ex parietaria & malua coctis & contusis, additis mucilagine sem. fœnigræci, lini, & althæa. Oleum quoque amygdal. dulc. & vnguentum dialthæa cum oleo scorpionum vias laxant.

Efficacissimum verò ad vias laxandas remedium est aquæ dulcis balneum cum herbis, quæ laxandi & emolliendi vim habent, paratum, vt althæa, malua, parietaria, chærefolio, quibus etiam quædam, quæ calculum mouere solent, addere, licet, vt apium, petroselinum cum toto, stramen fabarum & similia,

Inter interna sunt cassia, oleum amygdal. dulc. recens, glycyrrhiza, passula, & inprimis rad. althæa, quæ ad calculum rectè commendantur, non quod calculum frangant & comminuant, sed quod vias, per quas calculo transeundum, laxent & lubricas faciant, vt facilius, & sine minore dolore calculus transire possit. Eum in finem etiam syrupum suum de althæa composuit Fernelius, qui vias lubricat & laxat, simulque renes abstergit. Vt:

℥. Rad. althæa 3. B. Coqu. in aqua simpl.

Colaturâ ℥. 3. iii. vel iiii. Adde mellis, butyri recentis ana Vnc. sem Misce.

Commodum est & hoc Foresti decoctum:

℥. Sem. malua, althæa an. Drach. iii. cicer. rubr. Vnc. iii. sem. 4. frigid. major. an. Drach. ii. hordei Vnc. ii. caricar. pingu. viii. sebesten num. vii. glycyrrhiz. ras. Dra. vj.

Coqu. in aquæ lb. iii. ad dimidiæ partis consumpt.

Contra cal-culum remo-dium.

[¶ Ioan. Zecchius, consult. 17. scribit, aquæ limpida decoctæ tepidæ sex vel septem vncias ante omnem cibû, bis, vel saltem semel in die potas, ad calculum curandum vtilissimas esse. Nihil enim renes adeo à recremētis vacuos & temperatos reddere, & igneum ipsorum calorem extinguere. Et omnino verum est, vim illam lapidificam renum non parum adiuuare calorem renum nimium. Verum cum & siccitas concurret, & videamus tophos in thermis lignis accrescere, malim nō simplicem aquam sumere, quæ forsitan etiam ventriculū offendere posset, sed aliquid etiam, quod renes alterare à substantia posset: id quod ipse etiam habet, consult. 13. dum scribit: Illud nunquam è memoria excidat, nihil præstantius pro arcendis renum calcu-

lis esse, quàm aq. tepidam, velius pulli gallinacei, aut vituli, vel veruecinæ carnis, quinque vel sex vnciarum mensurâ, manè & vespere ante cibum modicè calidum potatum. Liceret tamen eiusmodi iuscula alterare rad. petrosel. recentibus, & althæa, cicer. rubr. malua,]

Lapidis motum adiuuant ea, quæ vrinam mouent, *Calculus momentia.* cum calida, quæ propriè dicuntur diuretica, vt fœniculum, saxifragia, ononis, petroselinum, betonica, baccæ juniperi: tum frigida, vt semen 4. frigid. majora, fraga; tum temperata, vt capill. Vener.

℥. Sem. fœnicul. Drach. sem. scerebinth. Drach. ii. puluer. glycyrrhiz. q. s.

F. Bolus.

Vel fiant ex modò enumeratis decocta, aut exhibeantur aquæ fœniculi, petroselini, saxifrag. & similes.

Extra vlurpetur oleum Scorpionum, Cucurbitæ quoque sub loco calculi in vretetibus hærentis appositæ, ita vt secundum ductum vretetis vna post alteram deorsum versus applicetur, calculum paulatim ad vesicam trahunt. Motus quoque huc facit. Balneum verò aquæ dulcis omne momentum habet. Nam & dolorem lenit, & vias laxat, & calculi motum accelerat. Et facilius totum negotium procedit, si ægro in balneum descensuro puluis aliquis vel aqua, quæ vrinam & lapidem mouere solet, exhibeatur.

Quod si his medicamentis exhibitis calculus loco moueri non possit, quod vel impactus vel infixus sit renibus, vel maior, quàm vt in vretetis penetrare possit, vt comminuetur & frangatur, danda opera, simulque viæ laxiores reddendæ sunt.

Commendantur ad lapidis comminutionem præter *Calculus* supra enumerata, inter simplicia lapis Iudaicus, lapis frangentia. spongia, lyncis, nephriticus, oculi cancri, & eorum solutiones, quæ magisteria vulgo appellantur, lapides in vesica apri vel bouis reperti, lapides percarum, mandibula lucij, sanguinis hirci, lumbrici terrestres, semen petroselini, milij. Spir. salis vitrioli, liquor crytalli.

Inprimis commendatur laps nephriticus, qui non *Lapis nephriticus.* solum exhibitus calculum comminuendi & pellendi vim habet, sed etiam extra corpori applicatus, vt cutem contingat, idem præstare dicitur.

De priore quidem minus dubij est, an verò extra appensus eas, quæ ei attribuuntur, vires habeat, nonnulli dubitant. Videatur ea de re Vnzerus, lib. 1. cap. 24. de Nephritide. & Anshelmus Boërius, de gemmis, p. 126. & 1236. & oleum ex oculis cancri ibidem descriptum.

Inter composita commendantur præcipuè species lithontribi, quarum Drach. j. cum conueniente liquore præbetur; item Electuarium Iustini vulgo dictum.

Hercules Saxonia aquam & puluerem sequentem commendat.

℥. Aqua asparag. criethmi marini sem. fœnicul. syluest. saxifrag. fœnicul. comm. parietar. flor. sambuci an. lb. sem. succi limon. Vnc. iii. nucleor. cerasorum, amygdalar. amarar. nucleor. Persicor. an. Vnc. i. sem.

Infundantur nuclei in vino Maluatico per diem naturalem, postea misceantur & in alembico vitreo destillentur. Dosis Vnc. vi. cum sequenti puluere.

℥. Pulv. cortic. auellana. Vnc. j. lapid. spongia, Iudaici, sem. milij Solis an. Drach. j. bacc. heder. Drach. sem. mandibul. lucij Drach. i. sem.

F. Puluis. cuius dosis Drach. j.

Plura huius generis medicamenta ex medicis penè omnibus descripta cum simplicia tum composita collegit Vnzerus, lib. 2. de Nephritide, quæ ibi videantur.

Felicius autem officium suum exsequuntur ista medicamenta, si exhibeantur ægro in balneo sedenti. Balneo enim viæ laxantur, vt medicamento calculus facilius cedat.

Vnde autem vires horum medicamentorum proueniant, alij aliter sentiunt. Nōnulli ad occultas qualita-

tes confugiunt, alij in calore & vi attenuandi sub-  
stunt. Verum ut ad concretionem maximè facit spiri-  
tus salinus: ita & eundem ac saltem volatilem præcipue  
maximam vim in calculo frangendo habere existimo,  
qui in spiritu vitrioli, fragor, cerafor, nucleis perfic. ma-  
lor. Armeniac, amygdal. amar, manifestè deprehenditur,  
nec etiam lapidibus calculum frangentibus deest.

Tertius ex-  
rationis sep-  
tus.

Dolor si valde urgeat, is etiam leniendus, quod fere  
vna opera præstant ea, quæ vias laxant, ut ol. amygdal.  
dulc. mucilag. sem. alth. psyllij, vnguent. dialth. empla-  
strum diachylon simplex cum oleo scorpionis. Clyste-  
res quoque vtilis sunt, & fomenta ex decocto parietaria,  
maluæ, flor. chamæmel. sem. lini. Prodestque nisi  
dolor remittat, clysterum vsus sæpius repetitus. Lique-  
ris verò non sit magna copia, ne intestina distendantur,  
ac renes comprimantur, atque ita dolores augeantur,  
& ut clyster diutius retineatur.

Applicantur & cataplasmata & fomenta ex medul-  
la panis cum lacte, mucilag. sem. psyllij; althææ, lini  
cum oleo amygdal. dulc.

Cratoni hoc familiare fuit:

℞. Cancros x.

Incidentur per medium & coquantur in lacte. Deinde  
de succis fortiter exprimatur, quo imbuantur medulla  
panis albi Vnc. iiii.

Et addantur vitelli ouorum num. iiii. butyri recentis, ol.  
chamæmel. an. Vnc. i. croci an. v.

Misce in mortario,

F. Cataplasma ad renes.

Addit aliquando etiam oleum amygdal. dulc. & scor-  
pion. an. q. l.

In vsu etiam ei fuit cataplasma de parietaria.

℞. Parietaria M. l. v.

Coqu. in f. q. olei amygdal. dulc. vel lactis, Addantur  
sepe sub cineribus cocta num. iiii. ol. scorpion. Vnc. sem.

F. Cataplasma.

Vel ℞. Vng. dialthææ Vnc. β. ol. lilior. albor. scorpion.  
an. Drach. ii. croci. Scrup. sem. Misce.

Lenit quoque dolorem balneum aquæ dulcis, præ-  
cipue si herbe dolorem lenientes & emollientes in eâ  
coquantur.

Nonnunquam etiam flatuum non parua copia ge-  
neratorum ex agitatione humorum in nephritide adest;  
ideoque tum flatus discutientia clysteribus adden-  
da. Ut:

℞. Rad. alth. Vnc. i. parietar. M. ij. malua, branc. vrsin.  
flor. chamæmel. melilot. an. M. j. sem. fenugrac. Vnc. sem.  
feniculi Drach. ij. caricar. pingv. num. vi.

Coq. Colaturæ ℞. Vnc. x. cassia ʒ. i. ol. rutacei, cheiri-  
ni an. Vnc. sem.

F. Clyster,

Exhibentur verò ad dolorem leniendum syr. papaue-  
ris, ol. amygdal. dulcium recent. Vnc. ii. in iulculo vel vi-  
no calido.

Vel ℞. Rad. alth. Vnc. sem. petroselin. eryngij an. Dra.  
ii. veronica P. j. passular. exacinat. Drach. vj.

Coqu. in aqua simplici,

Colaturæ ℞. Vnc. vi.

Add. ol. amygdal. dulc. vel butyri recent. Vnc. i.

Vel detur Drach. sem. pulueris radic. althææ cum vi-  
no aut liquore conueniente. Quæ medicamenta  
etiam si videantur leuiora, tamen sæpe plus præstant,  
quàm operosa calida & siccantia.

Si dolor valde urgeat, etiam Opiata exhibenda, ut  
theriacæ recent. vel Philonij Drach. sem. aut laudani  
opiat gr. iiii. Non tamen nisi necessitate valde urgente,  
& cum reliqua nihil proficiunt, & cum calculus è reni-  
bus nondum est emorus. Nam vbi calculus jam in vte-  
ribus hæret, nullum aut momentaneum saltem auxi-  
lium præstant opiat. Ut omnino cautè, ut in aliis  
morbis, ita etiam in hoc in opiat exhibendis agen-  
dum. Nam cum acerbissimis doloribus vires dejiciantur  
valde, fieri facillè potest, ut temerario opiatorum

vsu spiritus ante ea valde dissipati sopiantur, & pro  
somno mors ægro concilietur.

## QVÆSTIO.

An cibi crassi, ut & lac, ad calculi genera-  
tionem faciant?

Sunt quidem à recentioribus nonnulli, qui vulga-  
tam Medicorum sententiam, alimentorum crassorum  
viscidorum ac glutinosorum, & in primis lactis & ca-  
sei, vsu improbantium, reprehendunt eâ de caus-  
sâ, quod materia calculi non querenda sit in humore  
lento ac viscido, sed potius in seroso & saluginoso,  
qui parè ejusmodi cibis insit: & quod lac etiam renes  
humeat & refrigerare possit, & butyrum vias laxet  
& dilaret. Verum enimvero etsi crassum, quatenus tale  
solum ad lapidis generationem non sufficit, sed vis la-  
pidifica præterea requiritur: tamen ipsa experientia te-  
statur, non parùm facere ad calculum ejusmodi visci-  
dos cibos. Serum enim per se lapidem non facit, sed si  
vis lapidifica in crassam & viscidam materiam incidat,  
subiectum idoneum nata, id in lapidem coagulat.  
Neque omnibus ejusmodi crassis cibis salus succus  
& vis lapidescendi deest; etsi materiæ crassæ pluri-  
mæ permixtus succus salis non deprehendatur. Et  
quamvis lac per partem butyrosam humectet & mol-  
liet, per aqueam humectet & refrigeret: tamen in  
lacte est caseosa pars multò maxima. Et caseum qui  
ad calculi generationem esse aprissimum negat, eius  
naturam parùm perfectam habet; cum vulgò etiam  
notum sit, glutinum tenacissimum, lapidis amu-  
lum ex caseo fieri posse, præsertim antiquo, in quo  
saluginosus ille & acris succus vel gustu satis depre-  
henditur. Et quamvis nonnulli caseo & similibus  
impunè vescantur, nec nephritide corripiantur: ta-  
men hoc fit vel ob robur ventriculi, & calorem cor-  
poris vegetum, qui laboribus continuis suscitatur,  
vel quod renes minus siccis, & ampliores meatus ha-  
bent. A quorum exemplo immunitatem sibi nullo  
modo polliceri possunt illi, qui ventriculum debi-  
lem habent, aut renes ad calculum generandum dis-  
positos, aut vitam minus negotiosam agunt.

An cibi cras-  
si calculum  
generent?

## CAPVT VII.

De aliis rebus præter naturam in re-  
nibus genitis.

Vermes.

PRÆTER calculos & aliæ res præter naturam in reni-  
bus quandoque generantur. Et primo quidem ver-  
mes. Ita refert Gentilis, lib. 3. fen. 1. tract. 2. cap.  
3. Canon. Auicenna, Nobilem quendam, qui pas-  
sus est quotidianam, cum dolore renum per octo men-  
ses, in conualescentia emisisse cum vrina vermes par-  
uos & latos, accessauisse dolorem. Idemque accidisse,  
testatur Fernellius, lib. 6. de part. morb. & sympt.  
cap. 10. Idem vidit Scholiographus Hollerii, ut scri-  
bit, ad cap. 50. lib. 1. de morbis internis. Idem etiam,  
ibidem ad cap. 54. narrat, in quodam longos vermes,  
præcedente magno dolore renum, per vrinam reie-  
ctos fuisse. Vidus Vidius, de Cur. membratim lib. 10.  
cap. 14. scribit, quendam post longos dolores renum,  
exiguum vermem cum vrina excreuisse, præditum ca-  
pite acuto, corniculato, ventre & dorso latiore, te-  
stulâque subdurâ indurum instar testudinis, nigrum  
ac rubentem tantum circa ventrem. Ipse in cane vi-  
di totam vnus renis substantiam fuisse absumptam  
superfite tantum tunica eam ambiente, quæ tota ver-  
mibus

Vermes in re-  
nibus geniti.

mibus longis instar lumbricorum repleta fuit.

Vix autem cerè cognosci possunt vermes in renibus latentes, nisi simul cum vrina prodeant. Conjecturam tamen & suspicionem aliquam de iis præbent dolor continuus & diuturnus in renibus ac vellicatio.

Tolluntur a. medicamentis ad lumbricos necandos & expellendos idoneis.

### *Pili & filamenta.*

*pili & filamenta.*

Capillos quoque & filamenta quædam in renibus generari observatum. Fecit jam eorum mentionem Hippocrates, dum 4. aph. 76. scribit; Quibus cum vrina crassa exigua caruncula, aut veluti pili exeunt, his à renibus excernuntur; atque hanc affectionem *renis* nominant. Galenus, ut in comm. scribit, refert, se vidisse talia corpora cum vrina excreta, ut dimidium cubitum æquarent. Idem viderunt Brasauolus & Cardanus, ut, in comm. ad dictum aphorismum, referunt. Et Ioubertus, de urinis cap. 20. narrat, rusticum quendam ejusmodi filamenta circiter viginti quinque intra paucos dies eminxisse, quorum nonnulli palmæ longitudinem æquabant. Rarius est, quod VVierus, lib. 3. de præstig. Damon. cap. 15. annotavit, vbirefert, nobilem quandam feminam, quæ cum longo tempore renum calculo afflicta fuisset, post aliquot annos primò quidem aliquandiu lanam tenuem, nonnunquam inuolutam, interdum fila longa, alba, duplicata, &, quod fidem superat, sæpe cum nodo, ac si ad vsum consuendi aptata fuissent, per vrinam excreuisse. Deinde aliquandiu arctius compactam, veluti ochrâ commixtam non tam lanam, quàm membranam lanosam, quali integunt se Bombyces cum lotio reddidisse. Postremò non rarò præter reliqua pilos longitudine vnus digiti, partim vtrinque albos, in medio nigros, partim contra, principio nigros, cætera albos, præterea acutos in vna parte tanquam extremitate, obtusiores in altera, &c.

*Vbi generantur?*

De loco tamen generationis non omnes idem sentiunt. Galenus equidem, allegato loco, in renibus generari scribit: Idem tamen, 6. de loc. aff. cap. 3. cum viderit talia planè exigua excerni, miratur, quomodo in renibus potuerint consistere, & proinde probabilius putat, in venis generari. Actuarius, lib. 1. de caus. urinarum cap. 21. ea, quæ capillis sunt similia, in iis vasis, quæ à Renibus ad vesicam descendunt, generari docet, ac quanta est longitudo valorum illorum, tantam quoque horum corporum esse longitudinem. Quæ sententia quamvis absurda non videtur: tamen etiam in renibus generari non impossibile est, cum etiam ibi materia adesse possit, vbi plures eminguntur, aut longiore tempore, sicut Scholiographus Hollerij, ad cap. 50. lib. 1. de morb. internis, refert, quendam annos plusquam viginti tales vrinas cum capillis eminxisse. Fernelius, lib. 3. de part. morb. ac sympt. cap. 16. talia filamenta in vasis spermaticis, quæ Parastatæ dicuntur, generari statuit, & quidem ex feminis materia, quæ vi morbi sensim defluens calore crassescat, & apparere in iis plurimà, qui foeda gonorrhæa correpti sunt, & in mulieribus, quibus alba menstrua profluunt. Sed hæc non sunt hujus loci.

Generantur autem hi pili ab humore crasso in renibus vel vreteribus siccato, qui producit ex cibo crassi succi. Scribit Galenus, in comm. ad aph. 76. lib. 4. Eum, qui pilos minxerat, toto ferè anno præterito frequentissimè fabam frescam vel calcum tenerum & siccum comedisse, aliòque omnes, quibus talia mejere contigit, crassi succi cibis vfos fuisse. Et si enim Scholiographus Hollerij, loco allegato, quendam plus quàm viginti annis tales capillos cum vrinis ruffis, mediocris consistentiæ, non crassis minxisse scribit: ta-

men & in iis procul dubio tartarea quædam & concretioni apta materia fuit.

Curatur autem *renis* ista, ut Galenus, loc. alleg. docet, medicamentorum attenuantium & incidentium vfu; simulque cum reliqua curatione victu humectante.

## CAPVT VIII.

### *De Renum Inflammatione.*

#### *Causa.*

Inflammationem etiam quandoque renes patiuntur; *Renum inflammatio.* atque ex iisdem causis, è quibus in aliis partibus illa oritur. Nimirum ex sanguinis copioso affluxu, qui *Causa.* vel à vicinis membris, præcipuè hepate, sanguine abundantibus eò transmittitur, vel à renum calore vel dolore aliisque externis iniuriis attrahitur, ut lapsu, ictu supra dorsum & loca renibus vicina, motus etiam partium renibus vicinarum nimius, qualis fit in violenta equitatione & labore vehementi. Sanguinem etiam ad renes commouent medicamenta diuretica corpore pleno exhibita.

#### *Signa Diagnostica.*

In lumbis in renum regione calor, interdum etiam *signa.* rubedo percipitur, dolorque: & is, si in carnosa renum parte sit inflammatio, magis grauis. Si verò partes, in quas arteriæ terminantur, obsidet, pulsans. Arque dolor sæpe ob consensum membranarum secundum ductum vreterum ad vesicam, dorsum, & sursum etiam versus costas nothas extenditur, & ægri neque se erigere, neque incedere possunt; & si sternutatio, vel alia corporis commotio accadat, dolor vehementer exasperatur. Stupor cruris è regione renis inflammati percipitur ob nerui, qui ibi ad crur tendit, compressionem. Externa frigent, & præcipuè pedes. Vrinæ difficultas adest, & sæpe mingere cupiunt, vrinaque in principio est tenuis, in qua nihil subsidet, inflammatione verò augmentum sumente fit rubicundior & crassior. Febris est vehemens ob viciniam venæ cavae. Nonnunquam accidit vomitus bilis ob ventriculum affectum, qui ob communionem membranarum in consensum trahitur. Et si verò intestinum colum, si eo loco inflammetur, quo renibus ab utroque latere connectitur, signa renum inflammationi similia habet: tamen situs renum diuersus has duas affectiones discernit, cum renum dolor ad posteriora & dorsum, ut & vesicam & costas nothas versus sese extendat, coli verò inflammatio & dolor magis versus ventrem. Apparet præterea in coli inflammatione magis mutatio in fecibus alui, quàm in vrina.

#### *Prognostica.*

1. Est a. periculosum malum renum inflammatio, & *Prognostica.* in corporibus macilentis, ac quibus vires defunt, lethale.
2. Renum inflammatio cum febre & delirio lethalis.
3. In renum inflammatione vrina alba, tenuis, aut purulenta absque febris & symptomatum remissione, & crurum ac femorum extenuatione mortem portendit.
4. In renum inflammatione si hæmorrhoides superueniant, bonum.
5. Melius est inflammationem renum insensibiliter discuti quàm suppurari.
6. Inflammatio renum, quæ suppuratur, si abscessu rupto per vias vrinæ pus euacuetur, salutis spem præbet; Si verò per emulgentes ad hepar & intestina viam molietur, periculum non vacat.

## Indicationes &amp; Curatio

Indicationes  
& curatio.

Vt in aliis inflammationibus, ita & hic sanguis ad renes p.n. affluens repellendus, repellendus, ad vicina deriuandus, discutendus, ac si suppuratio prohiberi non possit, ea promouenda, & hinc puris eruptio procuranda, vlcusque curandum.

Venæsect.

Principio ergo reuulsione gratia vena in cubito aperienda. In morbi veno progressu venæ, quæ in poplite sunt, aut malleolis, aperiiri possunt.

Cucurbitula.

Pro venæsectione etiam cucurbitulæ coxis & natis affixæ à regione renis inflammari venæ sectionis vicariæ sunt. Si hæmorrhoides sponte aperirentur, valde commodum esset, quod nisi fiat, hirudines iis applicari possunt. Simul frictiones & ligaturæ extremorum instituendæ.

Si bilis in ventriculo vel in mesaraicis hæreat, ne ad renes rapiatur, euacuanda syrupo rosarum vel violarum soluto, manna, tamarindis, cassia, rhabarbaro, electuario lenitiuo, diaprunis, diacatholico, triphera Persica,

Vel iniiciatur clyster, qui simul dolorem leniendi, & nonnihil refrigerandi vim habeat, ex violaria, malua, althæa, sem lini, fœnugræci, & quatuor frigidis, maioribus, hordeo, electuario lenitiuo, diacarthamo. Minore autem quantitate clysteres iniiciendi, ne renes comprimant, vt diutius retineri possint.

Vt ℥. Parietaria, Malua an. M. j. flor. rosarum rubrar. M. sem. sem. lini Drach. ij. flor. chamamelis P. i. Coq. in aq. bord. simpl.

Colaturæ ℥. Vnc. ix. flor. cassia Vnc. sem. syr. rosar. solutiu Vnc. ii. ol. violarum Vnc. i. sem. vitellum oui vniui. F. Clyster.

Simul exhibenda, quæ feruorem sanguinis mitigant, ejusque ad renes motum & affluxum impediunt. Vrinam verò mouentia planè viranda.

Commodæ hic sunt emulsiones seminum 4. frigidior. major. aquæ, decocta, syrups & conseruæ à violis, rosis, portulaca, lactuca, acetosa, halicacabo.

Extra quoque applicentur, ad dolorem leniendum, calorem temperandum & humorum affluxum prohibendum epithemata à succis vel aquis rosarum, lactuca, portulaca, nymphæa, semperniui, plantaginis, cucurbitæ: aut cataplasmata ex iisdem & farina hordei; aut illinatur oleum rosaceum, nymphæa, violarum; additis succis refrigerantibus modo dictis.

Vt ℥. Aq. rosar. Vnc. iv. lactuca, plantag. nymphæa an. Vnc. ii. aceti rosar. Vnc. i. sem. ol. rosar. Vnc. ii. santali rubri Vnc. i. M. pro Epithemate.

Vel ℥. Ol. rosar. violar. nymphæa an. Vnc. j. Succ. polyg. semperniui, aceti rosar. an. Vnc. i.

Coqu. ad succorum consumptionem, Sub finem adde santal. rubri pulverisati Drach. j. cera parum.

In incremento morbi malua, althæa, sem. lini, fœnigræci, farina fabarum addatur.

In statu eadem vsurpari, & aliquid florum chamamelis addi potest.

Tandem in declinatione resoluentium major pars, minor repellentium & refrigerantium adhibeatur.

Internus Mod.

Interna quoque medicamenta morbo ad declinationem vergente vsurpari possunt ex diureticis mitioribus, quæ humores in renibus ad vias urinæ deducunt, quales sunt syrupus byzantinus simplex, de duabus & quingue radicibus, capillorum Veneris, cum aqua parietaria, capillorum Veneris, fragorum, vel cum decocto radicum asparagi, graminis, fœniculi.

Si tumor discuti non possit, sed ad suppurationem tendat, id quod cognoscitur, quod febris minuitur, tumor tamen & grauitas manet, neque materia per urinam expurgatur, adiuuanda est maturatio exhibitio decocto hordei, seminis althæa, cucumeris, glycyrrhizæ, malua, parietaria, item conserua florum malua: Extra verò imposito cataplasmate ex malua, parietaria, althæa, radicibus althæa, liliorum alborum, fœnigræci, ficubus, coctis

in lacte: vel decoctum ex iis paratum loco clysteris iniiciatur.

Quod si suppuratio facta sit, id quod cognoscitur ex febris & doloris remissione, manente sensu grauitatis & tumore, nec tamen abscessus rumpatur, in potu exhibenda sunt, quæ abscessum rumpere, & pus per urinam euacuare possunt, decoctum scilicet radicum fœniculi, apij, glycyrrhizæ, iridis, capillorum Veneris, origani, pulegij, in aqua mulsa factum.

Abscessu rupto ea exhibenda, quæ pus abstergere, & vlcus consolidare possunt, vt postea capite de vlcere vteretur dicetur.

## Dieta.

Victus sit tenuis, talis tamen, ne renes ex eo incallescant, & vrina acrior reddita renes mordeat. Cibus sit refrigerans & humectans. Propterea utilis est prisana hordeacea, panis cum fuculo gallinæ, in quo lactuca, endiuia, vel acetosa folia ebullierint. Potus sit prisana hordeacea, aqua hordei, in qua glycyrrhiza ebulliat, dulcorata iulepo rosarum vel violarum, vel cereuisia tenuis. Abstinendum à diureticis, præsertim in initio inflammationis, ne materia ad renes rapiatur. Morus virandus, ac quieti indulgendum, clysteribus alius emollienda.

## CAPVT IX.

## De Reliquis Renum tumoribus, &amp; eorundem tabe.

Præter inflammationes & alij tumores in renibus oriuntur. Compertum enim est, in quibusdam, qui calculo renum laborarunt, renem alterutrum totum in pus mutatum, & membrana inclusum fuisse. Aliquando etiam tumores frigidi in renibus oriuntur, qui quidem tarde suppurantur, tandem tamen in pus mutantur, sicut Iohannes Bauhinus in quodam, qui circiter nouem menses affectu Renis sinistri laborauerat, & totus extenuatus fuerat, renem totum consumptum & in pus mutatum fuisse vidit.

Cognoscitur autem hoc malum ex dolore renum & plerumque diurno; puris aliquid cum vrina redditur, & accidit mingendi difficultas. Interdum etiam, si æger in ventrem decumbat, tumor in dorso tactu deprehenditur, fluctuatio quædam puris percipitur, æger etiam plerumque contabescunt, cum vlcus istud conuenientibus remediis sanari non possit.

Petrus Bajerus tamen, Practica lib. 20. cap. 4. sectionem se feliciter tentasse scribit. Cum enim in femina quadam tali tumore laborante chirurgus maturantia vellet applicare, vt in cupum, vt appellat, seu tumorem apostema eleuaretur, ipse ægrum prius moriturum respondit, quàm in cupum apostema eleuaretur; cum amplam in interioribus cauitatem habeat, vt dilateretur. Tandem chirurgus incisionem profundam ratorio, incidendo totum Mirach, fecit, atque inciso panniculo reperta est magna quantitas materiæ, quam paulatim exire permittens curâ diligenti adhibita, gratia Dei, ægrum sanitati restituit.

Scirrho quandoque etiam renes corripuntur & tum moribus duris, id quod plerumque post inflammationem malè curatam accidit, cum partibus tenuibus discussis crassæ relinquuntur: & tum, etiam inflammatione cessante, nihilominus grauitas & pondus, sine dolore tamen ferè, percipitur. Interdum & ex humore crasso in substantiam renis sese insinuante talis tumor generatur.

Vrina in scirrho renum redditur pauca, tenuis & aquosa: cum ob virtutis attractricis imbecillitatem renes munere suo fungi non possint, & ob meatuum renum angustia tenuiores tantum partes excernantur, crassiores verò relinquuntur, quæ sanguinem inquinant, vnde

Diam.

Reliqui tumores renum  
Abscessus.

Inciso tumore renum.

Scirrho renum.



vn de etiam cachexia excitatur. Stupor etiam quidam in coxis & cruribus percipitur.

Est autem scirrhus renum malum plerunque insanabile, quod hominem in cachexiam aut hydropem conicere potest.

Si tamen quædam sanationis spes superfit, emollientia & leniter digerentia adhibenda. Exhibenda ergo iuscula pinguis, decoctum maluæ, althææ, polypodij, seminis fœnigræci, lini; vel in pollinem redacta cum iusculo pingui vel aqua maluæ & althææ exhibenda. Potest etiam aliquid bdellij vel ammoniaci exhiberi.

Extra inungantur genes oleo amygdalar. dulcium, lilior. albor. chamæmeli, lini: vel imponatur cataplasma ex farina sem. lini, fœnigræci, radicib. althææ, floribus chamæmeli cum pinguedine anseris, anatis & similibus, Commodè etiam hisce medicamentis admiscetur bdellium & ammoniacum aceto dissolurum.

### Tabes Renum.

Tabes contra interdum renes corripit, quæ præcipue ex calida & sicca eius intemperie à causis calefacientibus ac siccantibus prouenit.

In principio equidem malum non facile deprehenditur; vbi verò augetur & incrementum sumit, cognoscitur ex læsa renum actione, (quamuis enim ren durior euadat, tamen id tactu non facile deprehenditur) Renes enim serum minus alliciunt: id tamen statim in vesicam descendit, & frequenter per urinam excernitur. Urina est alba, tenuis, & cruda. Appetitus veneris minuitur, ac totum corpus contabescit.

Periculosum autem hoc & difficile malum est, & vix curatur, ac hominem lenta morte enecat.

Si quid tamen tentandum est, humectantia necessaria sunt, & commodissima sunt alimenta boni succi & humectantia, & inprimis lactis vsus continuatus. Vitale etiam est balneum aquæ dulcis repidum, & alia, quæ hecticis præscribi solent.

## C A P V T X.

### De Vulneribus Renum.

**V**ulnerantur interdum & Renes. Cognoscunturque vulnera renum, è loco, cui vulnus inflictum est: Urina supprimitur, vel difficulter redditur, estque cruenta; dolore regione renum percipitur, qui ad inguina vsque extenditur, & si vulnus sit magnum, sanguis aquosus è vulnere egreditur. An verò vulnus tantum superficiem renum attingat, an verò in parte carnosâ sit, an verò in ipsam cavitatem renum penetraverit, hoc modo cognoscitur. Si sanguis multus & urina non egreditur, indicio est, tantum superficiem vel carnosam partis substantiam esse vulneratam. Si verò sanguis multus, & aqua simul è vulnere egrediantur, vulnus ad cavitatem renum penetrare, argumento est.

Sunt autem renum vulnera periculosa & sæpe lethalia, difficulterque sanantur, & non nisi longo tempore, cum continuus humoris, qui per eos transit, affluxus curationem impedire soleat. Minus tamen periculosa sunt renum, quam vesicæ vulnera.

Curationem quod attinet, vniuersalibus præmissis, si vulnus non sit profundum, fortiora glutinantia usurpari possunt, & olea destillata eiusmodi vulneribus accommodata instillari & Emplastrum aliquod glutinans imponi debet. Si verò vulnus in cavitatem renum penetrer, vinum austerum infundendum, in quo radix consolidæ majoris, & polygonum ac glycyrrhiza cocta sint, vel imponendum cataplasma ex dactylis, pane filigineo, acacia, hypocistide, in vino austero decoctis, & postea, quando sanguis non amplius stillat, glutinantia dicta infundenda, extra verò Emplastra glutin-

antia imponenda. Inprimis verò in renum, vt & thoracis aliisque internis vulneribus vitale est vnguentum Sanctum ab insigni effectu ita appellatum Iohannis Andrea à Cruce, quod, *chirurgia lib. 4. tract. 2. in 13. Indicatione*; describitur, estque tale:

*℞. Resina pini recentis clara & odorata Vnc. xij. ol. Vng. sanctum. laurini puri, terebinth. opt. an. Vnc. ii. gummi elemi puri Vnc. ix.*

Primò resina & gummi super lento igne dissoluantur, deinde addatur oleum laurinum & terebinthina, atque ita ebulliant, donec justam crassitiem acquirant, & percolentur.

Exhibenda verò simul primis diebus trochisci de haliacabo, de carabe cum aqua vel decocto plantaginis, equiseti, polygoni, & postea cum consolidatione opus, gummi tragacanthæ, Arabicum, terra sigillata, terebinthina.

Cum verò sæpe in hoc affectu ob sanguinis grumos vesicæ meatus obstruatur, pecten inungatur oleo scorpionum, amygdalar. amararum, vel applicetur Cataplasma ex parietaria, malua, saxifragia.

### Dieta.

Cibus sit boni succi, exhibeaturque emulsio sem. 4. frig. major. cum amylo, prisana, iuscula ex pane albo, oua sorbilia, oryza, iuscula ex auena. Cum potu detur succus Cydoniorum. Vitale est & serum lactis caprinum & aqua hordei, in qua glycyrrhiza, jujubæ, sebesten, semina 4. frig. majora cocta sint. Potus tamen sit paucus, ne multum humoris ad renes affluat. Ager quiescat; si alius sit tardior, clyster ex malua & equiseti cum melle rosato infundendus.

## C A P V T XI.

### De Vlceribus Renum.

**E**xulcerantur quoque interdum Renes, & quidem non superficialiter solum, sed ita toti interdum, vt tota ipsorum substantia absumatur, & nihil amplius de iis, quam membrana ipsos ambiens, relinquatur. Imo & illa ipsa membrana interdum eroditur & perforatur. Quod Platerus vidit in nobili quodam, qui cum hydropse ascite septem mensium spatio laborasset, & post mortem apertus esset, visceraque omnia ventris inferioris salua deprehenderentur, uterque ren multis vlceribus fistulosis perforatus fuit aded amplis, vt digitum singula facile reciperent, adnatis insuper hinc inde renum corpori vesiculis aqua plenis, quæ ex illis scissis profluebat, erosâ simul vndique renum exteriori tunica.

### Causæ.

Exulcerantur autem renes post abscessus non rectè curatos, item post vulnera non rectè curata, aut cum pus vel sanies acris aliunde, vt pulmone vel hepate, per renes fluit, eoque erodit, quod & humores ab aliis partibus affluentes præstare possunt, seu natura sua acres; seu ex putredine & corruptione acrimoniam acquisuerint. Idem præstant calculi, præsertim asperiores, qui renes atterunt, inprimis dum homo ambulat & mouetur, vel dum sponte & naturæ impetu moueri incipiunt. Externæ verò causæ sunt, quæcunque vel contundendo vel rodendo, aut quocunque modo renum continuitatem soluant, vt casus, percussio, vehemens equitatio, medicamenta acria & similia.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur Renum exulceratio ex dolore in lûbis cum

cum grauitate. Vrina tamen sine impedimento redditur; quod non fit in vlceribus vesicæ. Pus vrinae permittitur emittitur, de quo Hippocrates, 4. aph. 75. Si quis sanguinem aut pus meiat, renum aut vesicæ exulceratio significatur. Sæpe etiam particulæ quædam carneæ seu carunculæ excernuntur, de quo Hippocrates 4. aph. 76. Quibus cum vrina crassa exigua caruncula, ac veluti pili exeunt, iis à renibus excernitur. Quod etsi Galenus, in comm. se vidisse negat, alij tamen en obseruauerunt.

Imò obseruauit Hercules Saxonia vniuersam dextri renis carnem ex propria membrana in vesicam secessisse.

Si ab inflammatione præcedente abscessu excitatum fuit vlcus, ejus signa præcesserunt.

Si ab acri & erodente humore fiat vlcus, ex ardore vrinae id cognoscitur; si à calculo aliquo, ejus signa præcesserunt vel adsunt. Si à causis externis, è relatione ægri patet.

### Prognostica.

Prognostica.

I. Etsi renum vlcera minus periculosa sunt, quam vesicæ: tamen & ipsa periculosa sunt, & difficulter curantur; cum continuus humorum excrementitiorum per renes fluxus fiat.

II. Periculosiora sunt renum vlcera, quæ ab erosione sunt, quàm quæ ab aliis causis.

III. Recentia renum vlcera curationem aliquando recipiunt; inueterata verò nunquam, ideoque curatio maturanda.

### Indicationes & Curatio.

Indicationes & Curatio.

Quæ in reliquarum partium vlceribus dantur Indicationes, eæ & hic inueniuntur. Et quidem tota curatio ad duo dirigenda, quorum primum & primo loco agendum est, ne vlcus ab affluentibus humoribus foueatur, vel augeatur, & deterius reddatur. Deinde ut ipsum vlcus curetur.

Primum quod attinet, principio idonea victus ratione, de qua postea, cauendum, ne vitiosi humores in corpore generentur, qui ad renes affectos confluere, malumque augere possint.

Deinde si metus sit, ne ob copiam sanguinis aliquis ad renes confluxus fiat & hinc inflammatio vlceri renum accedat, venæ sectio in brachio instituenda, & si omnino inflammatio accedat, curanda ut antea, cap. 8. dictum.

Humores acres temperantia.

Tertiò si humores aliqui vitiosi cumulati sint, mitigandi, temperandi & euacuandi. Temperantur humores acres vlu remediorum paratorum è violis, malua, nymphæa, feminibus quatuor frigidis majoribus, hordeo, semine papaueris, rosis, glycyrrhiza, passulis & similibus. E quibus syrupi, conferuæ, aquæ, decocta parari possunt.

Purgantia.

Purgantia fortiora hic locum non habent, sed lenientia solum, qualia sunt syrupus rosarum & violarum solutius, cassia cum puluere glycyrrhizæ, electuarium lenitiuum, Diacatholicum. Inprimis verò utilis est Terebinthina cum vitello oui in liquorem redacta, vel cum puluere glycyrrhizæ in bolum formata; cum non solum aluum laxet, sed & vlcus renum absterget ac sanat.

Vlcus detergentia.

Vniuersalibus præmissis ad ipsam vlcis curacionem accedendum, idque primò detergendum potu mulsa, decocto hordei, cicerum, capillorum veneris, hyssopi, agrimoniz, glycyrrhizæ, prisa cum melle, sero lactis caprini, præcipuè si cum eo emulsio è seminibus melonum facta sit: lac asinum & caprinum inprimis vile est, cum parte serosa absterget, caseosa conglutinet, pingui dolorem leniat, bonumque sanguinem, si rectè coquatur, præbeat.

Tandem vbi vlcus jam satis detersum & mundatum fuerit, quod cognoscitur, quia cum vrina pus minore quantitate excernitur, idque album, consistentia æquale, non sordidum, ea, quæ exsiccant, adstringunt, glutinant & consolidant, exhibenda, qualia sunt bolus Armenus, terra sigillata, corallium, radices tormentillæ, plantago, polygonum, equisetum, consolida, spodium, bursa pastoris, trochisci de alkekengi, de spodio, de carabe, de terra sigillata & similia.

Inprimis utilis est hic puluis.

℞. Rad. tormentil. Drach. i. sem. granor. alkekengi Dra. ii. spodij Drach. i. corallor. rubror. equiseti an. Drac. ii. mastich. sang. Draconis. an. Drach. i. sem. sacch. rosati tabulati Vnc. i. sem.

F. puluis qui exhibeatur in aq. plantaginis, equiseti & similibus. Potest & cibus misceri.

Vel ℞. Terra sigillat. boli Armeni, rad. tormentilla, an. Drach. i. mastiches, pragacanth. spodij an. Drach. i. sang. Dracon. Drach. sem. sacch. ros. tabulati. Vnc. sem.

F. Puluis. Dosis Drach. ii.

Utilis est & spiritus terebinth.

Vel ℞. Rad. consolida, tormentilla. an. Vnc. sem. alchimmilla equiseti an. M. sem. flor. rosar. rubr. P. j.

Coq in aq. pura, Colatura dulcoretur saccharo.

Vel ℞. Rad. Chinæ ligni sassafras, rad. tormentilla an. Vnc. sem. flor. rosar. rubr. malua arborea an. M. sem. radic. althææ, glycyrrhizæ an. Vnc. sem. granorum alkekengi M. sem.

Coqu. in decocto cicerum rubrorum. In decocto calido dissolue conf. rosar. Vnc. ii. Coletur.

Vtile est & decoctum ligni guaiaci, præsertim si vlcus ex lue Venerea contractum sit.

Vel ℞. Conf. ros. rubr. Vnc. iii. veronica, tormentilla an. Vnc. i. sem. portulacæ, plantaginis, granor myrti, boli Armeni, terra sigillata, sang. Draconis an. Drach. i. rasur. ebarris, trochisc. alkekengi an. Drach. sem.

Cum syr. de rosis siccis. F. Elect.

### Dieta.

Cibi sint boni succi, facili coctionis, & qui non facile corrumpuntur, ægròque salsa, acris, acetosa, amara, nimis dulcia, pinguis & omnia quæ facile corrumpuntur, sunt vitanda. Conueniunt propterea cremor prisa, auenæ, sorbitiones ex hordeo, amylo. Utilis est & oryza carnes item gallinarum, aularum montanarum, agnina, hædina, amygdalæ dulces, non rancidæ, Commodus etiam est vsus lactis. Vinum sit tenue, vel cereuisia pura. Potus non sit nimis. Omnis motus vehemens, præsertim qui dorsum concutit, ut equitatio, est vitandus. Venus etiam huic morbo inimica est.

## CAPVT XII.

### De Vreterum Morbis.

Vreteres quoque suos morbos & symptomata patiuntur: nimirum exiccantur, contabescunt; morbos in numero & situ patiuntur, angustiores redduntur & obstruuntur, vulnerantur & dolorem patiuntur.

### Causæ.

Causæ autem, à quibus isti morbi & symptomata proficiuntur, ferè à renibus proueniunt, & si renes male afficiantur, vreteres in consensum trahunt. Et enim si renes exiccantur & contabescunt, vreteres ferè etiam in consensum trahuntur.

Purant nonnulli in febribus ardentibus ita eos exicari posse, ut inde mictus impediatur. Verum mihi credibile non videtur, in corpore viuente tantam exiccationem fieri posse.

Nonnunquam

Nonnunquam alter deest, vel alter alieno loco infertur : id quod in Anatomicis sæpe deprehenditur. Contorquentur etiam nonnunquam vretes.

*Obstructio Vreterum.*

*Obstructio Vreterum.*

Frequentissimum verò malum est eorum angustia, quæ etiam ex contusione vel incumbente tumore fieri potest, sed sæpissime accidit ab obstructione, quæ, sit vel à calculo è renibus in eos delapso, vel pituita crassa & viscida, vel grumo sanguinis, vel pure.

Cognoscitur autem hoc malum è signis renum male affectorum. Si enim materia, quæ renes ante afflixit & obstruxit, è renibus in vretes descendat, renes liberantur, & vretes afficiuntur. Atque tum gravitas & dolor, qui in renibus percipiebatur, mitigatur, & contra dolor in vretibus augetur, & sese versus inguina extendit.

Curandi ratio eadem est, quæ renum obstructorum. Medicamenta n. vbi renes penetrarunt, ad vretes perueniunt, eosque obstructione liberant.

Possunt etiam externa medicamenta, quæ vias istas laxant, secundum vretum ductum applicari, ac fomenta ex parietaria, malua, althæa, semine lini, oleo amygdal. dulcium, lilior. albor. vnguento Dialthæa, cum oleo scorpionum parari; balneum item aquæ dulcis è modo dictis plantis vsurpari.

Peculiare verò remedij genus est, quo ex vretibus calculus versus vesicam promoueri potest, nimirum cucurbitulæ sine scarificatione. Hæ enim paulò infra locum dolentem vbi calculus hæret, applicantur, atque secundum ductum vretum infra descendendo affiguntur. Ita enim calculus in vesicam deducitur. Non autem applicandæ sunt cucurbitulæ, dum adhuc in renibus calculus hæret, sed vbi iam vretem ingressus est, ibique hærens dolorem parit,

*Vulnera & Vlcera Vreterum.*

*Vulnera & Vlcera.*

Vretes non solum vt alia viscera interna vulnerari possunt telis externis, sed & à calculo transeunte. Imò etiam planè rumpi vretes, non impossibile est. Licet enim obseruatum, vt Fernel. lib. 6. de part. morb. & sympt. cap. 10. scribat, iis, qui nephriticis doloribus sunt afflueti, vique adeo dilatatum fuisse vretem, vt in eum maior digiti pars immitti posset, & Eustachius, cap. 55. libelli de renibus, testatur, vretem statim ab egressu de renibus latiore redditum, instarque ventriculi seu peræ pastoralis recuruatum magnam lapillorum copiam cōgregasse, quos postea natura cum vrinis expulerit; tamè impossibile non est, si calculus maior & alperior è renibus in vretem excidat, eum planè rumpi posse.

Exulcerantur tandem vretes, nisi vulnera à lapide mox sanentur, quod tamen etiam à pure & sanie aciore fieri potest.

Signa sunt eadem, quæ renum vulneratorum & exulceratorum, nisi quod dolor secundum ductum vretum versus vesicam se extendat.

Curatio etiam eadem est.

*Vreterum Symptomata.*

Vt verò ob renum morbos vrinæ excretio læditur, & quædam symptomata circa eam excitantur: ita idem etiam vretibus læsis fieri potest: Si enim vretes obstruuntur, vrina supprimitur, & præcipue si vterque obstruatur. Si vulnerentur, vrina per vulnus in cavitatem abdominis exstillat; si exulcerentur, dolor in transitu vrinæ excitatur.

Verum symptomatum horum ablatio pendet à morborum, quos modò proposuimus, curatione, & ex iis etiam, quæ supra de symptomatibus renum dicta sunt,

quid agendum sit, patet.



LIBRI TERTII  
PARS VII.

SECTIO SECUNDA.

De Symptomatibus Renum.

CAPVT I.

De Renum imbecillitate, & seri secretionis læsa.

**S**UNT & aliqua symptomata, quæ renibus accidunt, & quidè actiones læsas quod attinet, cum renum actio propria sit, serum ex sanguine attrahere, & hinc ad vretes transmittere, si actio hæc lædatur, vrina nulla vel pauca redditur, & retenta sæpe grauissimum symptomatum, imò mortis causa est, nullo tamen vitio in vesica existente, sed vasorum emulgentium & renum attractrice læsæ,

*Renum imbecillitas & actio læsa.*

*Causa.*

Habet autem actio hæc læsa originem à vasorum emulgentium & renum facultate vel læsa, vel impedita. Facultas læditur ob imbecillitatem vasorum emulgentium vel renum, quæ pendet ab intemperie, inprimis frigida. Impeditur facultas ab obstructione, quæ inprimis fit à calculo: nonnunquam & à pituita crassiore, aut pure crassiore, aut sanguinis grumo.

*Causa.*

*Signa Diagnostica.*

Ipsa autem causa mali semper non facile agnoscitur. Ideoque diligenter considerandum & inquirendum, an in vretibus vel vesica aliquod vitium sit. Quod si nullum deprehendatur, argumento est, in renibus hære. Quod confirmatur, si grauitas aliqua, vel dolor in lumbis deprehenditur, & vrina in venis relicta & ad superiora regurgitans variorum symptomatum causa est, de quibus mox in Prognosticis dicetur.

*Signa.*

Si ab intemperie renum frigida sit imbecillitas eorum, apparebunt signa intemperiei renum supra c. 2. proposita: & ab hac causa non lubitò supprimitur vrina, cum intemperies lubitò induci non possit, sed paulatim vrina supprimitur.

Si ab obstructione fiat, signa supra proposita de obstructione renum, perpendenda, & à quibus causis ea proueniat, inquirendum, de quo supra c. 4. dictum.

*Prognostica.*

1. Malum hoc omnino periculosum est, & sæpe lethale. Si enim diutius serosus humor intra venas retineatur, & sanguini commisceatur, humores corrumpuntur, & putrescunt, ac prauæ febres accenduntur.
2. Et quidem si æger ante septimum iterum mejere incipiat, seruari potest. Quod si ultra hoc spatium retineatur, etsi vrina reddatur, plerumque tamen æger moritur.
3. Retentum in venis serum sæpe per totum corpus distribuitur, & prout in hanc vel illam partem ruit, varia symptomata excitat. Iacobus Carpus, in *Isagoge Anatomica*, quendam ab vrina hoc modo retenta spissatum esse testatur, cui cum cucurbitulas sine scarificatione diuertendi causa apposuerit, eas per poros cutis aquoso humore repletas fuisse, scribit. Et Iacotius, *comm. 1. ad lib. 7. sect. 2. aph. 16. Coasar. Hippocr.* refert, senem quendam ex humore isto cerebrum in confortium trahente in somnum & torporem lethalem incidisse.

*Prognostica.*

incidisse. Extat etiam in *observationibus Schenckij, lib. 3. de Renibus*, Epistola Georgij Tanstetteri Medici Regij, qui refert, Illustrissimi Saxonie Ducis Henrici Filium Seuerinum, annos 12. agentem, post balneum vomitu correptum fuisse, cum dolore vtereris sinistri hypochondrij, urinas verò subinde pauciores reddidisse. Postea subtus umbilicum ad dextram versus pectinem dolere cœpisse, vomitionibus crebris accedentibus, detento lotio, cuius vix ultra sex octo ve guttulas reddebat. Hinc doloribus nihil remittentibus, de præcordiorum quoque dolore conquestum fuisse, & lumbricum trium palmarum longitudine vomitu reiecisit. Tandem & cibos sumptos euomisse, urina sursum regurgitante, & sex octove horis, ante mortem urinam meram colore & odore cuius adstanti agnitam euomisse & postea exspirasse. Corpore aperto meatus urinarij fuerunt salui, nihilque, quod eos obstrueret, compertum; vesica fuit vacua & corrugata, omnisque humoris expers; corporis verò cutis quaque versus dissecta è vestigio aqueum humorem odore & colore exactissime urinam referentem, veluti in hydropicis, ex se mittebat. E quibus omnibus rectè conclusum fuit, omnium horum symptomatum, & tandem mortis etiam. Illustrissimi Principis causam fuisse imbecillitatem & intemperiem vasorum emulgentium, & renum, quorum attractrix labefactata serosum humorem ex reliquo sanguine attrahere non potuit. Vnde factum, ut nihil aquei humoris ad vesicam transmitteretur, eiusdemque pars ad ventriculum transmissa vomitiones excitaret, pars in habitum corporis dispergeretur. Marcellus Donatus etiam, *lib. 4. histor. med. mirab. c. 38.* refert, Priorem quendam Mantuæ urinae suppressione laborasse, eadem procul dubio de causa, cum nihil mali in renum, vterum vel vesicæ regione perciperetur, tandemque corpus uniuersum intumescere cœpisse, cute pellucida apparente mollique, ita ut urinam sub ea contineri, facile videri posset, qui tandem leui continuaque febricula accedente, mortuus est.

#### Curatio.

Curatio.

Curatio causæ ablatione perficitur. Ideoque quænam ea sit, diligenter inuestigandum. Si suppressio urinae sit ab inflammatione, qua ratione ea curanda sit, iam antea dictum, si à calculo, vel crassa pituita, vel grumo sanguinis, vel pure, itidem qua ratione hæc obstructio tollenda sit, antea monstratum. Si ex imbecillitate renum à frigida intemperie contracta, curatio instituenda, ut supra, c. 2. dictum. Iniiciendi nimirum clysteres calefacientes, exhibendæ confectiones aromaticæ: Extra quoque olea, vnguenta & emplastra calefacientia adhibenda.

Vbi tamen serum ob renum imbecillitatem non discernitur, naturæ succurrendum, & medicamentorum ope id à crassioribus succis separandum, ut tenuius factum & aliquo modo erga renes concitatum facilius à renibus, etiam imbecillibus, attrahi possit. Faciunt huc medicamenta diuretica in *Institut. lib. 5. part. 1. sect. 1. c. 13.* proposita, è quibus postea varia alia medicamenta parantur. Vtile est & vinum, in quo radices raphani rustici vel ononidis, vel amygdalæ amaræ contusæ, aut nuclei Persicorum contusi macerati fuerint. Vtiles etiam sunt emulsiones seminum quatuor frigidorum maiorum cum nucleis Persicorum, malorum Armeniacorum, ceratorum & amygdalarum amararum. Vtiles quoque sunt aquæ diureticiæ, quæ passim extant, ut & acidulæ.

Diuretica quando exhibenda.

De diureticis tamen hoc semel monuisse sufficiat, ea non cum cibo, sed hora vna atque altera ante cibum exhibenda esse, cum, si cibus misceantur, chylum crudum è ventriculo ad vias urinae secum rapiant, unde nec ipsum vinum, quod cum cibo bibitur, acidulis diluendum, narratque Gnilhelmus Fabricius, *cent. 3. obs. 72.*

historiam cuiusdam, qui cum acidulas biberet, & confectione seminis anisi, ut vocant, simul ad flatum discutiendos vteretur, ipsum semine anisi cum urina excreuit; & alterius cuiusdam, qui cum in urina retentione gammauros contusos & grana alkekengi confusa ex vino albo sumpsisset, urina ita commota fuit, ut acini granorum alkekengi cum urina excernerentur. Et si verò diuretica medicamenta non tantam vim, ut acidulæ, habent, simile tamen quid præstare possunt.

Vbi vero facultas impeditur in excernenda urina ob vasorum angustiam, curatio instituenda, ut supra *sect. 1. cap. 4. de vasorum in renibus angustia* diximus.

## CAPVT II.

### De Diabete.

Et si Diabetes commodè etiam inter symptomata, *Diabem.* quæ in mictione accidunt, referri possit, tamen quia ab Autoribus plerisque inter renum affectus explicari solet, eum etiam hoc loco proponere libet, inprimis cum hic nullum in vesica sit vitium, sed symptoma hoc vel à renibus, vel aliis partibus superioribus, per quas serum transit, proficiscatur.

*Διαβήτης à διαβαίνω*, id est, transeo, quod scilicet urina unde dicitur citò transeat, nomen habet. Alij *ὁ πάρα τις ἀμύδα*, hydro- *147* pem ad matulam, alij urinae profluuium, alij *διὰ πότον* *ἰσ ὕδατος*, alij *διὰ τὸν οὐλὸν τὸν τῆς διαβήσεως*, à siti vehementi, quam patiuntur ægri, nominant.

Affectus lanè rarus est, quem Galenus bis tantum vidit, ut *6. de loc. affect. c. 3.* refert, scribit etiam Rabbi Moses *part. 8. aphorif.* quod non viderit diabetem in occidente, neque audiuerit à suis Doctoribus, quod eam viderint. Plurimi etiam alij Medici eam non viderunt. Solet autem urina in hoc affectu copiosissime profluere, viditque Scholiographus Hollerij quendam quotidie sex pintas Luterianas eminxisse. Dodonæus, ut *cap. 42. obseru. medicinal.* refert: quendam vidit, qui vno die amplius, quam quadraginta libras urinae reddebat.

Notabilis etiam est historia, quam Marcus Gattinaria, in *9. Rhaf. cap. de cura inuoluntarij exitus urinae*, & Cardanus, *lib. 8. cap. 44. de rerum varietate* referunt, de quadam puella annorum 18. quæ anno Christi 1481. passa est superfluum urinae profluuium ad eam ut singulis diebus urinae libras circiter 36. emingeret, cum ex potu & cibo non plus septem libris assumeret. Cumque hoc 60. diebus perseveraret, emisit ultra cibi & potus quantitatem libras 1740. quod pondus longe excedebat pondus puellæ, etsi tota in urinam fuisset resoluta; cum puella non potuerit excedere pondus 255. librarum, imò nec 150. attingeret. Sanata autem est post duos illos menses à Medico Francisco Busto. Causam huius symptomatis statuerunt Medici fuisse aërem, qui in arteriis vbique continebatur, qui in aquam conuersus fuerit, cui alius aër successerit. Cardanus addit frigidam & humidam aëris intemperiem.

Potus etiam parum vel nihil mutatus redditur. Vnde cum henteria, quæ magnam appetentiam coniunctam habet, diabetem comparant, ut sicut in henteria illa cibi auidè expetuntur, statimque per aluum deiiciuntur: ita renes trahant ab hepate potulenta, & iterum ad vesicam demittant. Verum cum de hoc aliquid dubii occurrat, dicetur de eò infra *quest. 1.*

#### Causæ.

Causam verò huius affectionis reddere difficile, & pauci Autores inveniuntur, qui in ea reddendâ inter se conveniunt. Nos in re obscurâ, saluo cuiusque iudicio, statuimus, proximam huius mali causâ esse facultatem renum retentricem læsam, & quidem ab urinae

Admirandū  
urinae pōdū  
excretum.

Causa.



vrinæ vel copia, vel qualitate. Vrinæ v. copię causam esse calorem viscerum, præcipuè hepatis & lienis, quæ cum potum copiosius attrahunt, tum humores in venis colliquant. Quanquam verò interdum etiam in hydropicis vel in febribus humoriferis copiosius per vrinam euacuatur: tamen diabetes mictio illa copiosa non est, sed critica potius humoris serosi expulsio, quæ postea sponte cessat. Verum de hac controuersia postea prolixius, *questione secundâ*, dicemus.

### Signa Diagnostica.

Affectus hic primò paulatim & insensibiliter crescit, neque æger multum curat, etsi plus mingat, quam consuevit, & ad potum vel aliam causam externam id refert. Sæpe etiam accidit, ut copiosior vrinæ excretio naturæ opus sit, quæ abundantes humores per vrinam expellit. Ut ergo diabetem incipientem ab hisce vrinæ profluuiis discernamus, videndum primò, an causa aliqua externa, ut potus vel similis præcesserit, quæ vrinam copiosam præbere poterat. Si verò naturæ opus sit copiosa mictio, paulo post illa mictio cessat, ægerque inde magnam vtilitatem percipit, morbusque, quo æger laborabat, soluitur, vel imminuitur. Si vero tale nil adsit, profluuium vrinæ id symptomaticum esse, indicio est, ægerque tum sensim ac paulatim semper maiorem vrinæ copiam incipit reddere, ita ut tandem longè potus quantitatem vrinæ quantitas superet. Vrina est tenuis, aquosa, cruda, sine sedimento, in qua progressu temporis tenuia quædam supernatant: adest assidua oris siccitas & sitis, quæ tum à calore præternaturali, tum ab humiditatis nimia euacuatione ortum habent: corpus tandem extenuatur & contabescit: in visceribus æstus & ardor percipitur, & si vrinam aliquandiu contineant ægri, lumbi, coxæ, testes, cum grauitate intumescunt.

### Prognostica.

1. Malum hoc plerunque lethale est, in primis si non mox in principio cognoscatur, eique idoneis remediis occurratur, hominemque ad rabem & mortem tandem deducit.
2. Et præcipuè in senibus vix vnquam curatur.
3. Diabetes etiam post immodicum laborem, post nimium Veneris usum, post febres chronicas plerunque incurabilis est.

### Curatio.

Ut verò in causis explicandis magna occurrit apud Autores dissensio: ita in curatione instituenda magna occurrit varietas & difficultas. Eò tamen res redit, ut ille caloris excessus, qui humores liquat, viscerumque intemperies, quæ facit, ut serum avidius attrahatur, corrigatur, & retentricis robur tam in visceribus, quam in renibus, tum in toto venoso genere confirmetur & augeatur.

Itaque etsi nonnulli hic venæ sectionem suadent: tamen quia vires jam ante dejectæ sunt, & plerunque alius morbus præcessit, huic remedio vix locus est. Eadem ratio est purgantium, & vomitus, quos morbus coniunctus & vires dejectæ vix admittunt. Multo minus sudorifera, quæ nonnulli, ut humores à centro ad ambitum corporis auertantur, adhibenda censent, cura sunt, cum sudorifera cum medicamentis diureticis cognitionem habeant, viscerumque calorem & acrimoniam augeant. Tutius ergò, his omissis, ea saltem, quæ indicationes postulant, adhibere, quæ etiam saltem proponemus, cum illa generalia, si iis opus sit, aliunde nota sint. Parantur autem illa ex adstringentibus & roborantibus, ut rosæ rubris, plantagine, bursa pastoris, consolida, portulaca, coralliis, spodio & similibus. Ut:

*Dan. Sennerti Tom. I I.*

*℞. Rad. consolid. major. plantag. an. Vnc. i. fol. plantag. M. j. flor. ros. rubr. M. sem. balauft. Drach. ii. myrob. cin. tris. Drach. iii. sem. plantag. acerof. portulac. an. Drac. j. Coq. in vini rubr. lb. iv. vase clauso.*

Colaturæ Adde *Mina Cydon. Vnc. iii.*

Vel *℞. Sem. coriandr. plantag. portulac. flor. ros. rubr. an. Vnc. i. corall. rubr. boli Armeni, marg. præp. rad. sormentill. an. Drach. i. nuc. mosch. Scrup. i.*

F. Puluis.

Vel *℞. Conf. ros. rubr. Vnc. ii. C. C. vsti præp. boli Armeni, corall. rubr. præp. an. Drach. j.*

Cum *mina Cydonior.*

F. Electuarium.

Vel *℞. Conf. ros. rubr. antiq. Vnc. iii. spody, corall. rubr. C. C. vsti an. Drach. i. sem. plantag. portulaca an. Dra. sem. mucilag. sem. Cydonior. Vnc. sem. syr. Cydonior. q. s.*

Fiat Electuar.

Posunt etiam exhiberi opiata, ut theriaca recens, Philonium Persicum, requies Nicolai, laudanum opiatum.

Extra hypochondriis, renibus, hepati, lienii, lumbis adhibeantur epithemata, linimenta, vnguenta, cataplasmata refrigerantia & adstringentia ex succo vel aqua plantaginis, portulacæ, lactucæ, semperuiui, vimblici veneris, ceratum santalinum, vnguentum refrigerans Galeni, Comitissæ.

Vel *℞. Ol. ros. myrtini an. Vnc. i. santali albi, rubri. flor. ros. rubr. corall. an. Drach. i. succi plantag. Vnc. i. cera q. s.*

F. Vnguentum.

Vel *℞. Aq. vel succi plantag. acetosæ, rosar. nymphææ an. Vnc. iii. aceti ros. Vnc. i. spec. ceroti santal. Drach. ii. spody, corall. rubr. an. Drach. j. sem. ros. rubr. acetos. plantag. an. Drach. sem. Misce.*

Fiat Epithema.

### QVÆSTIO I.

*An potus immutatus planè per vrinam in diabete reddatur?*

Galenus, 6. de loc. aff. cap. 3. & de crisib. cap. 12. in An potus diabete celeriter id, quod bibitur, per vrinam reddi, & quidem tale, quale bibitur reddi, docet. Idem tradit Alex. Trallianus, lib. 9. cap. 8. Aëtius, ierab. 3. ferm. 3. cap. 2. Aliique Medici plures, sicut in lienteria cibis immutatus statim deicitur: ita in diabete potum immutatum mox excerni tradunt. Amatus Lusitanus etiam, centur. 2. curat. 94. refert, Romanum quendam, qui vini meracioris potui indulgebat, & fœniculi marini dicti, seu Cretani muria conditi largiore victu vsus erat, in diabetem lapsus esse, & quicquid bibeat, statim & quale sumebat, per vrinam reddidisse. Trincauellius etiam, lib. 10. cap. 11. de rat. cur. part. hum. corp. aff. scribit, quendam, febre maligna laborantem, cum nil biberet, nisi aquam gelidam, in diabetem incidisse, ut potus omnino immutatus redderetur, seruans eundem colorem, consistentiam, saporem, atque odorem.

Alij tamen etiam potum mutari scribunt. Ita Dodoneus, obs. cap. 42. in Schol. scribit, potum, qui assumitur, non omnino talè reddi, qualis assumitur, sed in hepate mutatione nonnullâ accipere. Iohânes Baptista Syluaticus, controu. 29. in diabete potum non semper statim, sæpe etiam mutatum, perpetuò tamen auctum, & in maiore quantitate, reddi docet, scribitque interdum potus quantitate esse vncias 25. vrinâ autè emitte ad vncias centum.

Cum ergo alij viderent pro vtraque sententia experientiam pugnare, distinxerunt inter diabetem & vrinæ profluuium: sed sine ratione & exëplo; cum alij Medici sine discrimine hæc vocabula vsurpent. Ideoque in diabete non solum ad potum, sed etiam alia respiciendum. Sunt enim primò diabetæ quidâ gradus. In principio enim, cum vires nondum dejectæ sunt, & vis alte-

Z Z Z Z 2 ratrix

matrix nondum extremè laborat, non mirum est, si potus aliquomodo mutetur: temporis verò progressu, ubi vis alteratrix magis labefactatur, potus planè immutatus excernitur. Deinde potus etiam alius mutatur facilius, alius difficilius. Aquam, cum parum mutari possit, non mirum est, eodè colore & reliquis accidentibus non mutatis, excerni; alij verò potus, qui magis compositi sunt, non ita facillè transeunt, quin aliquam mutationem accipiant. Præterea id, quod in diabete excernitur, non saltem potus est, sed sæpe etiam accedit corporis colliquatio, vnde plus urinae emittitur, quàm potus assumptum est.

## QVÆSTIO II.

### Quanam Diabeta causa sit?

Quam di-  
bete causa  
sit?

Causam Diabete reddere omnino difficile est, ob affectus raritatem, & Medicorum de eius causa dissensum. Vulgata quidem, & quam plerique sequuntur, sententia est, proximam huius mali causam esse renum intemperiem calidam, ob quam illi serum copiosius à venis attrahant, quod cum ob imbecillitatem & copiam retinere non possint, venas rursus à jecore, hoc ex intestinis & ventriculo trahere, vnde orificium ventriculi vellicetur, ac sitis excitetur, qui assumptus mox à venis & renibus attrahatur, atque iterum ad vesicam mittatur.

Verum rectè scribit hîc Fernellius, de part. morb. & sympt. lib. 6. cap. 13. vix aliquem deprehensum esse, qui copiosæ huius mictionis non aliam intus causam haberet. Etenim calidâ intemperie multi laborant, neque tamen diabetem patiuntur. Neque præterea credibile videtur, renum attractricem facultatem tantam esse posse, ut ea etiam ad ventriculū vsque sese extendat, atque inde crudum potum attrahat. Trincauellius, de rat. curand. part. hum. corp. aff. lib. 10. c. 11. in renum imbecillitatem à frigore contractam causam rejicit, probatque id exemplo Nobilissimi cuiusdam Viri, qui cum febre maligna laboraret, atque sitis esset impatiens, aquamque gelidam & in puteo refrigeratam biberet, renes tantam imbecillitatem ex refrigeratione contraxerint, ut potum omnino immutatum redderent. Verum si tale vitium in renibus fuit, quam ob causam tam subito ad renes potus pervenit? Si enim ii refrigerati atque imbecilles redditī fuerunt, attrahere præter modum non potuerunt.

Hæc omnia cum alij Medici docti animadverterent, & in solis renibus causam huius mali invenire non possent, alias causas, sed diuersi diuersas assignarunt. Felix Platerus statuit diabete causam esse serosi humoris aut causæ morbi cum sero subitam & profusam quasi euacuationem, ut vniuersum quasi serum è corpore effluat, atque verum diabetem, in quo subita corporis colliquatio cum calore & siti intolerabili excitata, febris ardenti atque colliquatione accidere, & proinde ut febris hæc rara est, ita rarum & periculosum symptoma ipsi copulatum esse existimat. Si quis tamen etiam citra febrem diabetem fieri statuere velit, ob copiam potus in venis melaericijs diu retenti & coaceruari, posteaque vi naturæ subito ad renes propulsi potius, quàm attracti, & id admittit. Eustach. Rhodius, lib. 2. Pract. cap. 39. præter renum calidiorem intemperiem se experientiæ edoctum aliam causam inuenisse scribit, nimirum jecoris caliditatem atque ventriculi retentionem læsam, atque in testimonium affert exemplum cuiusdam, in quo quæ mingebantur, non solum odore & consistentia assumptæ portioni similia erant, verum etiam feces alui multo vino, quod copiosissime ingurgitauerat, perfusæ erant, cumque non admodum emaciatus fuisset, & auxiliis refrigerantibus potissimum & corroborantibus non multo post tempore à Diabete fuisset vindicatus.

Ioh. Baptista Syluaticus, contron. 31. nouum quid,

quod à nemine in hunc vsque diem animaduersum sit, se allaturum promittit: postea tamen ipse Galenum, 6. de loc. affect. cap. 1. 3. de caus. sympt. cap. 2. Aretæum, lib. 2. de caus. diurn. affect. cap. 2. Actuarium, lib. 1. meth. cap. 11. idem docuisse refert. Statuit verò insignem calidam intemperiem in hepate & toto venoso genere succensam sanguinem fundere, ejusque portionem aliquam in serum mutare. Serum autem hoc ab eximia renum caliditate separari à sanguine & attrahi, quam deinde multitudinem cum illi ferre non possint, ad vesicam quod ruat, impetuosè permittere, quæ pariter cum tantam seri multitudinem ferre non possit, ad eam expellendam insurgere.

Atque his Autoribus posterioribus assentimur in eo, quod non tam in renibus, quàm aliis partibus causa diabetes querenda sit. Sit enim, de quo tamen, ut ex superioribus patet, non immeritò dubitatur, quod renes fortiter attrahant: tamen nisi serum adsit, id attrahere non possunt, & renum fortis attractio seri seu urinae copiam jam præsupponit. Sicut enim, etsi à vesica urina proximè profluit; causa tamen in vesica non residet, ac nisi urina copiosa à renibus ad vesicam mitteretur, copiosa emingi non posset: ita etsi à renibus transmittatur urina, tamen cur copiosa sit, causa non tam in renibus, quàm in aliis partibus querenda videtur.

Causa autem huius symptomatis, si in re obscura aliquid decernendum est, ut Galenus, 3. de caus. sympt. cap. 2. Platerus, Ioh. Baptista Syluaticus dicunt, ἀναστομιών, resolutio & colliquatio quædam est, quæ in venis fit, in toto corpore, ab insigni hepatis & venosi generis caliditate orta. Vnde Rabbi Moses, part. 8. aphor. in Ægypto tales ægros intra decem annos, plus quàm viginti se vidisse scribit, in Occidente verò nullos. Et plerumque febribus ardentibus & malignis malum hoc accedit, atque eà de causâ etiam plerique in diabete refrigerationem & humectationem corporis commendarunt. Quia tamen ipse potus statim, & immutatus plerumque per vesicam in diabete redditur, secundum non absurdè conjungi posse puto imbecillitatem & laxitatem, non quidem ventriculi solum, ut statuit Rhodius, sed partium illarum, quæ aquosum humorem è ventriculo & intestinis ad hepar & lienem ferunt. Hæ enim debito tempore cum cibis, ut ejus sit ὄψα & vehiculum, serum continere debent; quod si non faciant, subito ad renes ruit, atque imbecillitatem hanc à nimio aquæ frigida potu partes illæ contrahere possunt, sicut & illi nobili viro, cuius mentionem facit Trincauellius, accidit. Potest tamen etiam hepatis & lienis calor ad subitam istam seri attractionem aliquid facere. Adeste a. ralem laxitatem in meatibus, per quos serum è corpore elabatur, vel illud testatur, quod Iulius Alexandrinus, in annot. ad c. 14. libell. de substantia facultatum naturali scribit, se duosque alios Medicos in nobilissimi cuiusdam viri Curatione, affectu Diabete similimo laborantis, vidisse rejecta cum urina apij radicum frustula, quadrantis magnitudine nonnulla, quas ille radices Medicis incisis iuculis incoquendas curauerat. Semen etiam Anisi ac grana alkekengi cum urina excreta fuisse, præcedenti capite dictum, & infra cap. 9. dicitur.

## CAPVT III.

### De Doloze Nephritico.

**D**olor tandem quandoque renes vehementissimè affligit, & acerbis ac dilacerans quasi in lumbis è regione renis alterutrius, raro utriusque percipitur.

Dolor Nephriticus.

Causa.

## Causa.

Plerique statuunt dolorem hunc tantum ortum habere vel ab arena & sabulo in renibus collecto, vel à calculo renum substantiam atterente, vel, absumptâ substantiâ Renis, quod interdum accidit, membranam renes ambientem vellicante. Et quidem verum est, à grumo sanguinis, vel pituita crassiore dolorem potius grauantem, quàm vehementem, qui nephriticus appellari solet, excitari: obseruatum tamen etiam est ab acri sanie, vel sero, & omnino humorum acrium confluxu vehementissimos in renibus dolores excitatos fuisse. Ita scribit Desiderius Iacotius, *ad Aph. 47. lib. 6. sect. 2. Coacar. Hippocratis*, in multis post mortem dissectis. Renes integros inuentos fuisse, qui tamen, dum in viuis essent de renum dolore pertinaci conquerebantur; vel ex venis aut pulmonibus eò confluentes acri sanie, vel sero renum vasa distendente: & Hollerius, *comm. ad aph. 11. lib. 6.* refert, se vidisse quendam, qui intolerabili renum cruciatu affligebatur, qui nec phlebotomia, nec purgatione, nec aliis remediis mitigari potuit, nisi hæmorrhoidibus apertis. Simul enim, atque per eas aperta est via, dolor quieuit.

## Signa Diagnostica.

Cognoscitur hic dolor è situ & loco. Etsi enim dolor colicus cum nephritico magnam habeat cognationem: tamen renum dolor fixus est, vno loco è regione renis, & si extendatur, secundum vreteris ductum versus vesicam & inguina extenditur: dolor verò colicus versus ventrem vagatur. Vomitus etiam plerunque molestus est, quo omnia, quæ in ventriculo continentur, & tandem etiam bilis, reicitur, ob membranarum quæ hæc partes coniungunt, communione. Respiratio est parua & cita. Vrina in principio cum difficultate aliqua redditur, & est aquea & cruda; Hinc fit turbida, & aliquando etiam cruenta. Arenulæ interdum in vrina apparent, nunc flauæ nunc rubræ. Decubitus in partem affectam dolorem minuit, in contrariam exasperat.

## Prognosticum.

Vt omnes dolores: ita & hi vires deiciunt. Quid autem de curatione sperandum sit, ex iis, quæ supra de calculo Renum, eorumque exulceratione dicta sunt, patet.

## Curatio.

In curatione ad duò respiciendum, ad causam ipsam doloris, & ad dolorem. Qua ratione calculus, qui plerunque doloris nephritici causa est, tolli possit, supra, *capite 6.* dictum. Hoc tamen etiam obseruandum, si dolor sit vehementissimus, & corpus plethoricum, ac metuendum sit, ne ex sanguinis ad renes affluxu renum inflammatio excitetur, venam in cubito aperiendam esse.

Si à sanie vel sero aut alio humore acri dolor excitetur, is temperandus. In quem vsum commodè exhibetur emulsio seminum quatuor frigidorum maiorum cum aqua hordei, fragorum, maluæ, decocto glycyrrhizæ & similibus.

Ad dolorem leniendum anodyna & quæ vias laxant, vt calculus loco suo moueatur, & in vesicam descendat, vnde omnis dolor subito cessat, vsurpanda. Clysteres emollientes hîc vtilissimi sunt; qui dolorem mitigant, vias laxant, simulque status, qui intestina distendendo, renisque ac vreteres comprimendo, dolorem augere solent, tollunt.

Vt *℞. Radic. alibæ Vnc. i. parietar. violar. althææ, branca vrsina ana M. i. flor. chamamel. summit. anethi ana P. ii. sem. lini, fenugr. an. Vnc. ℥. ss. num. v.*

Dan. Sennerti Tom. II.

Coq. in aq. vel lacte.

Colatur. *℞. Vnc. x. cassia extracta Vnc. i. olei amygd. dulc. lilior. albor. an. Vnc. i. ℥. vitellos oni num. ii.*

F. Clyster.

Propinetur etiam decoctum radicum althææ, glycyrrhizæ, maluæ, parietariæ, & passularum; item emulsio quatuor seminum frigidior. maior. & pauperis.

Extra applicentur focus ex decocto radic. althææ, lilior. alborum, maluæ, parietariæ, branca vrsinæ, floribus chamæmeli, melilori, semine lini, fenugræci; linimenta ex oleo dulci, amygdalar. dulcium, lilior. albor. vnguento althææ, pinguedine gallinæ, anseris, anatis.

Si ista non satisfaciunt, vtilissimum est aquæ dulcis balneum, ex herbis modò enumeratis paratum; idque, si opus, aliquoties repetatur.

Cum verò dolor statim tollatur, si calculus in vesicam descendat, ad id promouendum cucurbitulæ secundum vreterum ductum applicatæ faciunt, de quo supra *cap. 6.* dictum & seq. dicitur.

Reliqua, quæ hac de re dici possunt, supra *capite 6. de calculo Renum* videantur.

Sunt præterea alia symptomata, quæ à Renibus originem habent, vt vrinæ cruenta, purulenta. Verùm quia eadem in mictione, quæ vesicæ propria est, animaduerrantur, postea *de affectibus vesicae* de iisdem agemus.

## LIBRI TERTII PARS VIII.

### De Vesica præter naturam affectibus.

#### PROOEMIUM.

**S**erosus humor equidem postquam à sanguine in renibus separatus est, vsum amplius nullum habet, sed è corpore, vt inutilis, excernendus est. Si tamen id continuo fieret, vt in iis, qui vrina incontinentia laborant, magnâ cum molestia & incommodo id coniunctum foret. Quapropter rerum Creator sapientissimus receptaculum condidit, in quo vrina colligatur, vt collecta postea simul excernatur; quod vesica urinaria dicitur. Quæ, vt plurimum caperet, & rotunda est, & eam substantiam habet, vt extendi & contrahi possit; & ne vrina continuo efflueret, orificio eiu musculum addidit Sphincterem, quò contracto vrina pro nostrò arbitrio retinetur, laxato per meatum urinarum effluit, sicut ista ab Anatomicis pluribus describuntur. Et cum partes omnes benè se habent, & secundum naturam constituta sunt, etiam vrina excretio rectè fit, si verò quid mutatur, ea leditur.

Postquam ergò de Renum & vreterum præter naturam affectionibus diximus, proximum iam est, vt de Vesica præter naturam affectionibus dicamus. Agendum ergò erit hæc in parte huius libri de Vesica intemperie, numero mutato, calculo vermibus, & aliis rebus præter naturam in ea reperiis, distensione, inflammatione, situ mutato, vulneribus, scabie, & ulceribus, morbis meatus urinarum; Symptomatibus item, quæ vesica & in vrina excretionem accidunt: puta de dolore vesicæ, eiusque stupore & resolutione, de vrina suppressione, & imminutâ excretionem, stranguriâ, vrina ardore, mictione inuoluntaria, & vrina incontinentiâ, de vrina colore mutato, & rebus alienis cum vrinâ excretis, ac vrina per aliena loca excretionem.

## SECTIO PRIMA.

## De Vesicæ Morbis.

## CAPVT I.

## De Intemperie &amp; angustia Vesicæ &amp; numero mutato.

Intemperies  
vesicæ.

T primò morbos intemperiei quod attinet, vt aliæ corporis partes omnes eos, quos continent, humores, atque adeo ipsa excrementa, alterandi vim habent: ita etiam procul dubio vesica quem à renibus accipit humorem serosum non solum aliquandiu continet, sed & alteratidque innatâ suâ temperie perficit. Mutatur verò ea interdum præter naturam, & plerunque intemperies hæc est frigida, (Calida enim sine humorum affluxu, qui fit in inflammatione, vix datur.) Excitant autem eam causæ vim refrigerandi habentes, cum internæ tum externæ.

Intemperies frigida cognoscitur ex vrina alba, viscosa, furfuracea, quæ guttatim stillat; atque ex causis, quæ vesicam refrigerandi vim habent, si præcesserint.

Curatur autem medicamentis vesicam calefacientibus, nuce moschata, macere, betonica, glycyrrhiza, bacis iuniperi; Extra illinatur regio vesicæ oleo nardino, anethino, & similibus.

## Vesica Angustia.

Vesica An-  
gustia.

Vesica etiam præter modum naturalem interdum angustior est, facitque eius mentionem Galenus, *art. med. cap. 72.* dum scribit: quidam vesicam contigisse ita expositam ac paruam, vt si quando vrinam tardius excerneret, tumor quidam circumscriptus manifestè cerneretur. Verum talia vitia ab ortu contracta vix arte emendantur.

## Numeri Vitium.

Numerus vo-  
sicæ mutatus.

Numeri etiam vitium quandoque in vesica deprehensum est, & Volcherus Coiter, in *obs. Anat. in virgine* quadam inuenit duas vesicas vrinarias, alteram naturali & sua sede collocatam, alteram ex matricis colli dextro latere prognatam, naturali vesica duplo quasi maiorem, lorii plenissimam.

## CAPVT II.

## De Calculo vesicæ.

Calculus vo-  
sicæ.

Causa.

**C**alculus verò frequentissimum vesicæ malum est, Quæ ratione autem calculus generetur, in genere supra *cap. de calculo Renum* dictum, quæ etiam hic locum habent, atque omnino statuimus, vim quandam lapidificam existere in materia, ob quam ea suapte natura ad concretionem tendit, calorem verò & frigus ad hanc concretionem non sufficere. Calorem enim quod attinet, non est credibile, tantum in vesica calorem esse, qui, vt in renibus, aliquid ad calculum generandum facere possit, ac tanta semper aquæ in vesica copia est, vt exiccationis illa exempla, quæ afferuntur, huc nullo modo quadrent. Alii igitur à frigore vesicæ, seu calore nimis debili hoc fieri statuunt. Quam sententiam vt suo modo non reuicimus; in eo tamen probare non possumus, quod frigus hæc primaria concretionis calculorum causa sit. Neque enim tantum vniquam frigus in vesica dari potest, quod externo frigori congelanti respondeat. Hoc magis credibile est, vrinam in vesica etiam, vt de renibus dixi, aliquam alterationem (neque enim natura vnquam otiosa est) susci-

pere. Si ergo temperies vesicæ non rectè sese habeat, fieri posse putamus, vt quæ vrina clara fieri debebat, partibus omnibus eius exactè mixtis turbida maneat, ac crassiores & tartareæ partes aquosis non exactè permixtæ ad fundum vesicæ subsideant, atque ibi vi insitæ ad coagulationem tendente concrecant & lapidescant. Et omnino hic simile aliquid fieri existimamus, quale sæpe in stranguria accidit, vbi vrina non satis cocta & elaborata turbida est, acrimoniam obtinet, naturamque ad excernendum stimulat. Hoc tamen hic etiam perpendendum, an solius vesicæ vitio hoc fiat, & an talis cruda vrina non etiam renum, imò & hepatis vitio fieri & ad vesicam transmitti possit. Debet enim serosus humor, qui ad vesicam transmittitur, ita dispositus esse, vt partes terræ ac tartareæ cum aquosis exactè permisceantur, & vna è corpore excernantur. Quod si non fiat, & aquosa pars seorsim excernatur, crassa vero subsideat & subsistat, calculus inde generatur. Non negari tamen potest, ad calculi generationem etiam plurimum facere posse vesicæ siccitatem, quæ idoneum calculo subiectum præbet. Neque Galenus frigiditati simpliciter causam concretionis tribuit, sed hoc saltem scribit, in *Epidem. comm. 3. aph. 15.* vrinæ crassitudinem multam in vesica collectam, si diutius intus permanferit, coagmentandi, concrecendique initium capere, & postea quicquid iterum crassum in vesicam delabitur, primo agglutinare, & non frigiditatem causam proximam calculi statuit, sed vrinæ crassitudinem calculorum primam potissimamque causam esse dicit. Et ideo pueros calculis magis esse obnoxios, quia vrinas crassissimas reddunt. Concretionis verò modum eum esse docet, qui lapidum est in aquis calidis nascentium sponte, causamque concretionis præcipuam non temperamentum vesicæ, sed materiæ, è qua fit lapis, qualitatem esse dicit. Cur autem pueri magis calculo vesicæ, adulti verò calculo renum sint obnoxii, supra *allegato loco de calculo renum* dictum.

## Signa Diagnostica.

Hippocrates, 4. *de morb.* quinque signa calculi vesicæ ponit; vbi, *inquit*, calculus in vesica adest, æger, vbi meiere vult, dolore affligitur, & vrina paulatim fluit, sicut in vrinæ stillicidio; & vesicæ inflammatio adest, & vrinam subcruentam, & nonnunquam arenosam emingunt, nonnunquam & lapides paruos cum vrina excernunt. Quibus, in *lib. de aer. aq. & loc.* addit & hæc, quod pueri calculo laborantes fricant & vellcant pudenda, adest præterea penis tensio & ponderis sensus in vesica percipitur, & ægri nullo modo quiescere possunt, sed crebro mouentur & crura alternatim mouent. Anus quoque in consensum trahitur, & tenesmo ægri laborant sæpe. Præterea si calculus grandior sit, explorari potest, immisso in anum digito vel cathetere aut candela cerea in vesicam immissa. Qui tamen posterior modus explorandi semper certus non est, vbi nimirum calculus pituita & corpore q. quodam lubrico inuolutus est, cuius rei historias vide apud Schenckium, *lib. 3. obseru. 269.* Potest & isto modo explorari calculus, si vbi vrina supprimitur, æger supinus locetur & cruribus eleuatis concutatur. Si enim vrinam tunc reddat, signum est, orificium vesicæ à calculo obstructum fuisse, qui eo motu ex eo excussus est.

Exstat de arenulis aphorismus Hippocratis, 79. *sect. 4.* Quibus in vrinis arenosa subsident, his vesicæ calculi laborat. Qui valde interpretes torsit. Nam & renibus laborantibus arenosa subsident, & citra calculum seu renum seu vesicæ arenosa sæpe minguntur, quæ in iecore & venis, aliquando in sanis, aliquando in febrium declinatione generata cum vrinis excernuntur, vt de calculo renum dictum est, scribitque de se Cardanus, in *comment. in alleg. aphor.* qui ibi de calculo videatur.



videatur, sibi iam ab annis 30. primo ruffas, postea etiam albas arenas quotidie & copiose, citra tamen omnem calculi & renum & vesicæ suspicionem, prodixisse, additque vix è decem vnum esse, qui ab hoc vitio (mingendi arenas) immunis sit; cum tamen rari sint, qui renum calculo laborent, rariores qui vesicæ, & contra multi calculo vesicæ laborent, qui nullas arenas emingunt.

Verum si ea, quæ supra diximus, diligenter perpendamus, non difficile erit, sabulosum illud in calculo laborantibus discernere ab eo, quod illi, qui calculo non laborant, emingunt, & aphorismo sua veritas maxima ex parte constare poterit. Dicit enim Hippocrates, quod in calculosis *κατὰ τὴν ὕψος* lapidosa vesicæ arenas subsident, in iis vero, & qui calculo non laborant, sabulosa & arenosa illa non subsident, sed vel maculæ parietibus adhærescunt, vel sedimento vel etiam superficiem urinæ innatant. Neque etiam propriè sunt *κατὰ τὴν ὕψος*, id est, lapidum frustilla & particule, illæ, quæ in iis, qui calculo non laborant, eminguntur, sed friabilia corpuscula tartarea, salis naturam q. referentia.

Rubra etiam plerumque sunt; cum quæ calculi sunt partes plerumque sint albi vel cinerei vel alterius coloris. Præterea in calculo laborantibus urinæ quandoque crassæ, quandoque tenues & aqueæ quasi eminguntur, quod in reliquis non accidit. Arenulæ etiam verè ita dictæ solius vesicæ laborantis indicia non sunt, cum ex calculis renum imminutis vel contritis quoque excerni possint. Ideoque qua ratione discerni possint, videndum. Nonnulli quidem albas ex vesica, rubras ex renibus prodire dicunt. Sed fallax hoc signum. Quapropter alia signa coniungenda. Etenim si ex renibus proveniant, proculdubio signa nephritici morbi aderunt. Si ex vesica solum, illa non aderunt, vixque aberit frequens mingendi desiderium, cum ut ab urina copiosâ natura ad excernendum stimulari solet, ita à calculo præsentem continuo stimulat. Cardanus, loco allegato, eum, qui certus esse velit, an calculo vesicæ laboret, equitare iubet, saltare exercereque paulo vehementius, aut assumere lapidem comminuentia medicamenta, & hinc urinam inspicere. Nam si tribus aut quatuor diebus pulvis appareat, lapis est durus; si lapidum frusta & quasi arena, tophus est; si nihil horum appareat, lapis procul dubio non est.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Calculus vesicæ malum est, quod non facile curatur, & nisi cureretur, periculo non vacat, atque ipsa curatio sæpe periculo non caret.
2. Cum enim duo sint auxilia calculi grandioris, & qui per urinarium meatum expelli nequit, tollendi, eius per medicamenta comminutio, vel sectione vesicæ facta, extractio; prius raro aut nunquam profuisse censet Mercatus, etiam Capiuaccius scribit; fateor me nescire, quæ calculum in vesica frangere queant. Et Erasius, *consil. 26.* persuasum, inquit, habeo, lapidem vesicæ frangi remediis intra corpus assumptis non posse. Experientia tamen testatur, aliquando lapides in vesica medicamentis comminutos fuisse, ut postea dicitur. Et non esse nulla remedia, quæ calculum frangant, patet ex Monarde qui *lib. 3. de simpl. med. ex nouo orbe allat. capite de Cochis* scribit, Cochis apud Indos esse magnæ æstimationis, cum calculos non solum in renibus sed etiam in vesica comminuat. Idemque refert, adolescentem quendam calculo vesicæ laborentem, cum eum ad fontem de Petra cognominatum ablegasset, ibique duos menses substitisset, à calculo liberum rediisse, & omne lutum, quod paulatim eiecerat, denuo in lapideam figuram concretum secum in charta detulisse. Videantur huius generis plura apud Schenckium. *lib. 3. observ. 218.* Verum ta-

men hoc nonnulli esse existimant tantum de eo lapide, qui à renibus in vesicam descenderit, & ibi augmentum sumpserit. Verum rationem diuersitatis & causam nullam video, cur si hic possit medicamentis comminui, ille qui in vesica concreuit, non possit.

3. Lapidis per sectionem extractio etsi lapidem tollat; nonnunquam tamen mortem accelerat, quod periculum veritus Hippocrates, iuramento suos discipulos obstrinxit, ne laborantes lapide secarent, sed expertis huius artis hoc negotium permitterent.

4. Et quidem lapides grandiores non sine periculo extrahuntur, cum extractio conuulsionem accersat, quæ plerique moriuntur. Minores vero vel non apprehenduntur, vel apprehensi effugiunt aut franguntur; Mediocres vero tutius extrahuntur.

5. Nonnunquam calculus vesicæ adhæret, qui ferè incurabilis est, cum etiam sectione sine vesicæ laceratione extrahi non possit.

6. Facilius eiiciuntur & extrahuntur calculi è vesica in mulieribus; quia breuem & amplum habent urinæ meatum.

#### Indicationes & Curatio.

Quæ de calculo renum dicta sunt, etiam hic locum habent. Danda nimirum opera Medico, ut calculi, qui gignitur, generatio & augmentum prohibeatur, calculus iam genitus tollatur, & dolor sedetur.

Prohibetur generatio calculi, si gignendo materia non suppeditetur, victu scilicet recto instituto & euacuationibus necessariis adhibitis, & si quid concreverit, abstergetur, comminuetur, & expellatur.

Generatus vero est comminuendus medicamentis, ut particulatim excernatur, vel opera chirurgica extrahendus.

Victus quidem ratio eadem sit, quæ in calculo renum est proposita. Causa quoque antecedens eodem modo tollenda, ut *ibidem* dictum.

Ut vero calculus, qui generari incipit, maturè tollatur, antequam in lapideam duritiem vel maiorem molem concreverit, danda opera. Quapropter, si ex ardore urinæ cum pituitosis excretis agnoscat, lapidis rudimenta in vesica esse, ad calculi comminutionem statim confugiendum. Et primò quidem incipiendum à mitioribus & hinc ad fortiora adscendendum. Mercatus quatuor classes horum medicamentorum constituit, & in tertia classe recenset ea, quæ improprie lapidem frangere putat, & abstergendo tantum atterendoque superficiem hic prodesse dicit. Et talia docet esse omnia, quæ sua asperitate abstergunt & veluti atterunt. Duo enim corpora aspera simul collisa atteruntur. Atque in hanc classem refert etiam lapidem *spongia, lyncis, cinerem corticum ouorum, lapid. in vesica hominis vel apri, vel vesica felis bonis repertum & similia.* Verum parum probabilis est hæc opinio. Talia enim non integra exhibentur, ut asperitate suâ lapidem in vesica atterere possint, sed in subtilem puluerem comminuta, imò soluta & in magisteria, quæ appellantur redacta, ubi non minus efficacia sunt. Vero magis consentaneum à spiritu salino; qui in iis est, sese in lapidem insinuante, atque ita in minima eum solvente, hoc fieri; eodem modo, quo ab aquis fortibus metalla & mineralia; ab aceto corallia, margaritæ & similia soluntur.

Quæ autem hic medicamenta idonea sint, antea de calculo renum dictum, & plurà etiam postea recensentur.

Calculus vero fractum quod attinet, etsi, ut in prognosticis dictum, medicamentis, quæ eum frangere dicuntur, pauci aliquid tribuunt, & Mercatus etiam scribat, se multis annis experimento fidissimè obseruasse, & à veteribus ac probatissimis huius temporis Medicis obseruatum accepisse, nullum eorum auxiliorum,

Indicationes & Curatio.

Calculus comminuentia.

An medicamenta quædam asperitate sua calculum frangant?

An calculus vesica per medicamenta calculi frangenti tolli possit?

liorum, quæ ad calculum frangendum commendantur, adminiculo sanitati fuisse restitutum, & certum sit, calculum vesicæ longè difficilior comminui & frangi, quàm calculum renum, & eos, qui in magnam duritiem concreuerunt, vix vlllo. odo comminui posse: tamen eos, qui ita duri non sunt, medicamentis quandoque resolui, vt luti vel arenularum formâ excernantur, experientia testatur.

Historias huius rei ab Vinzero, lib. 1. de Nephritide cap. 19. collectas, ex Conrado Gesnero in principio Euonymi, Scaliger. exercit. 344. sect. 8. Monard. lib. 1. simpl. medic. ex nouo orbe allatar. cap. de Cochis. Libau. tom. 1. syntagm. lib. 2. cap. 29. Horat. Aug. tom. 2. lib. 9. epist. 8. hic repetere nolo. Illud saltem referre libet, quid VVilhelmo Laurembergio, Professore Rostochiensis acciderit. Is, vt ipse de se refert, prouecta iam ætate calculo vesicæ obnoxius factus est: eo tamen, Iehouæ auxilio, vi medicamentorum admirabili, & labore molestissimo quidem, attamen indefesso, rursus liberatus est. Cum enim acerbissimum dolorem Nephriticum passus esset, animaduertit, calculum per venterem sinistram in vesicam descendere, & cum grandiusculus esset, in vesica integrum substituisse, illicque affluentium sordium copiâ paulatim adauctum fuisse, spatio 36. septimanarum. Qui cum varias molestias exhiberet, & nucem Ponticam æquare deprehenderetur, ac citra sectionem exire non posse putaretur; ipse vero periculossimo huic auxilio sese subicere nollet, de aliis remedijs cogitare cepit. Primò ergo liquorem illum Nephriticum celeberrimum, magnòque apud principes in pretio & vsu habitum expertus est, qui ita paratur.

℞. Salis tartari albi Vnc. i.

Affund. aq. petroselin. lb. i.

Misce, & per chartam bibulam transcoletur & liquori color croceus corticibus aurantium concilietur. Vsurpauit etiam gemmam illam Indicam, Igiada Hispanis dictam, ad calculum frangendum celeberrimam. Sed vtriusque remedii nullam vim deprehendit. Ergo inter reliqua, quæ ad calculum comminuendum commendantur, pharmacum ex asellis experiri voluit, quo duos adolescentes vesicæ calculo laborantes feliciter sanatos esse Horat. Aug. profiteretur, tom. 2. Epist. Med. lib. 9. his verbis: Ego bis in hunc diem vsus calculum vesicæ fractum vidi, primo casu, mox deliberatione, atque matura consultatione addita. Casus fuit, filium Ianetbi Pontificij Typographi Roma expurgandum suscepimus, vt postea tutior ad ipsam sectionem accederet. Tentauerat enim ante omnia remedium genera, tum à Medicis Venetis, tum Florentinis præscripta. Cum verò nullam vtilitatem subsequi deprehenderet, secari cupidus Sacerdotem iussit accersere, vt si ex sectione moreretur, anima fuisset consultum. Requisitus fuit ex Societate Iesu, qui audita confessione ab agrote, & cognito morbi genere proponit illi pharmacum, vt dicebat, magni vsus, de quo & in seipso & in alijs periculum fecisset. Experiri placuit, neque facti poenituit. Nam qui proximè incidi debebat, liber ab omni calculo nono die fuit. Pharmacum à Iesuita ei datum hoc erat:

℞. Pulu. millepedum præpar. Drach. i. ad summum Scrup. iv. aqua visa Vnc. β.

Juris cicer. rubr. Vnc. ix. vel x.

Capiat horis ante prandium quinque.

Ego verò inuenem annorum 18. calidi & sicci temperamentis totius corporis curaturus duxi imminuendam quantitatem aquæ visæ, & ubi singulis diebus datum alteri fuit antidotum; huius alternis dari iussi, & pro refrigeratione totius corporis aqua fabarum & fragorum an. Vnc. v. propinari intermedio die, cum gutt. vi. olei de chalcantib. & Vnc. i. iulebi violati. Hoc autem modo pharmacum præbebam.

℞. Pulu. asell. præpar. Drach. i. aqua visa

Drach. ii. decoctionis cicer. rubr. Vnc. viii.

Misce.

Capiat horis sex ante cibum.

Hactenus Augenius.

Ad imitationem ergo Augenij, præmissis vniersalibus, & exquisita victus ratione instituta accepit.

Asellor. præpar. Drach. i. spiritus iuniperi Drach. ii. iuris cicer. rubr. Vnc. x.

Quo mane assumpto prima & secunda vice à sumpto medicamento tribus aut quatuor. horis quandam pectoris compressionem percipit, & quasi imminens animi deliquium, vt necesse haberet theriacæ Scrup. i. porioni admiscere. Atque ita remedio hoc totos 15. dies vsus est. Sed toto hoc spatio ne minimum quidem sabuli expurgari reperit. Itaque alia addenda ratus sequenti medicamento vsus est, quod

℞. Asell. præparat. Vnc. ii. lepor. præpar. sanguin. hirci præpar. spongia rosar. syluest. sem. violar. purpurear. an. 3. i. spec. lithonitri Drach. ii. Misce.

F. antidotum.

Huius antidoti accepit Drac. ii. decocti diurectici 3. x. spir. iuniperi Drach. ii.

Quod medicamentum vbi mane hora quinta hausisset, secunda vice post horas plus minus quatuor, sub pubis osse ad regionem ostii vesicæ magnos sentire cepit dolores. Paulò post parum vtinæ profluebat, & cum ea lamellæ exiguæ instar squamæ piscis subtrahæ, quæ licet aliquam visciditatem habere viderentur, ad tactum tamen in sabulum resoluebantur, ita vt manifestò appareret, tunicam vel cruram esse à maiore calculo solutam. Cuius medicamenti vsum cum continuaret, interdum tertio, interdum quarto, nonnunquam quinto die, huiusmodi lamellæ crassiores, & fragmenta sæpe grandiuscula profluxerunt, & præsertim vbi lauacro aquæ dulcis vteretur. Cum verò & à calculo & ab eius fragmentis orificium vesicæ esset sauciatur, ad leniendum dolorem medicamentis vsus est. Atque ita horum medicamentorum vsu 17. septimanarum spatio à calculo isto liberatus est.

Decoctum diurecticum hoc fuit:

℞. Rad. glycyrrh. Drach. vi. alth. gramin. ononid. an. Vnc. β. baccar. halicacabi num. xx. cicer. rubr. Vnc. iii. diurectum. vnar. pass. Vnc. i. sem. 4. frig. maior. an. 3. j. hordei M. ii.

Coq. in aq. alkekengi, ononid. fragor. flor. fabar. an. lb. j. β.

Colaturæ adde syr. de althea Vnc. iii.

Millepedes ita præparantur. ℞. Asellor. vii. lb. ii. Millepedum aut circiter, diligenter abluantur aqua ononidis & à præparatio. sordibus purgentur. Deinde vino Hispanico Petrosimeno dicto inebriantur, eoque sensim effuso coniciantur in ollas vitreas, quantò plures tantò melius, cum in vnâ ollam coniecti citra combustionem vel putrefactionem difficulter exsiccare possint. Hæ ollæ luto diligenter occlusæ in furnum à panis coctione calentem collocantur, vt moderato calore exsiccantur, & in puluerem redigi possint.

Huic pulueri rursus infunditur sensim vinum Hispanicum, quantum imbibere potest, & rursus exsiccatur, istaque imbibitio & exsiccatio tertio repetatur, quarta vice hoc liquore irroretur, qui,

℞. Aq. fragor 3. iii. spir. vitrioli 3. j. β.

Iterum puluis exsicceatur, & tenuissimè contritus in vitro vini seruetur.

Recenset & alia ad calculum frangendum medicamenta Guilielmus Laurembergius, quæ in epistola hac de re ab ipso scripta videantur.

Sunt quidam etiam in ea opinione, quæ à ratione aliena non videtur, aquis per catheterem in vesicam immisiss lapidem frangi posse. Nam cum istæ aquæ nihil alterentur, & virium nihil amittant in transitu, sicut medicamenta, quæ assumuntur, sed rectè in vesicam ad calculum penetrent, vim suam in eum integrè exserere possunt: licetque extra corpus humanum in lapidibus

Historia  
Vilhelm  
Lauremberg.  
à calculo vesicæ liberatus.

Liquor Nephriticus.

Curatio  
calculi vesicæ  
historia  
duæ.

Pharmacum  
ex asellis.

Aqua per  
catheterem  
immissa in  
vesicam an  
calculi frangere possint?

lapidibus è vesica extractis vel excretis, vel aliis dissoluendis prius harum aquarum vires experiri. Cardanus has condiciones in his aquis requirit, vt lapidem attendant, & vt vesicæ sint innoxia. Commendatque ille aquam ex cinere scorpionum, petroselinæ radice, lapidibus cancri, stercore columbino, parietaria, mauultque talem aquam parari ex plurimis simul mistis, quàm ex vno simplici.

Conditio  
harum aquarum.

Sectio vesicæ.

Quod si nullis remediis calculus frangi possit, vel ægro molestia illa & dolores sustinendi, tandemque tamen de vita periclitandum; vel sectâ vesicæ calculus eximendus, quæ ipsa tamen operatio non sine periculo instituitur.

Calculi extractio à vesicâ.

Francisci  
Roussæi  
modi  
extra-  
hendi  
calculi  
vesicæ.

Qua ratione autem calculus è vesica extrahi possit, dictum lib. 5. Institut. part. 1. sect. 2. cap. 13. quæ hic non reperimus. Hoc saltem addimus, alterius adhuc calculum extrahendi modi mentionem facere Franciscum Roussæum, de part. Casar. sect. 3. c. 6. 8. 9. quo contra veterum sententiam non per perinæum, sed per hypogastrium & membranofam vesicæ partem sectio instituitur, quam à Francone quodam, qui eam primus viurpauit, Franconianam appellat.

Parati secandi  
ratio in  
fœminis.

Deinde etiâ peculiaris adhuc secandi rationis in fœminis mentionem facere Paræum lib. 16. c. 47. Imò cum à natura sæpe ad extremitatem meatus vrinarij calculi protrudantur, & quidem sæpe satis grandes, vnde vel artis opera extrahi possunt, vel etiam sponte excidunt, sectione illa in fœminis semper opus non est. Sic anno 1621. hic ab anu quadam lapidem ferè oui gallinacæ magnitudine, è vesica sponte excrementum vidi. Cum enim meatus vrinarius in fœminis amplior sit & breuis, facilius, quàm in viris, per eum expelli vel extrahi potest calculus.

Lapis oui  
gallinacæ  
magnitudine  
à fœmina  
excretus.

Verum qui plura de calculo vesicæ extrahendo cognoscere cupit, legat eruditum & absolutum tractatum de lithotomia vesicæ Guiljelmi Fabritij Hildani, in quo omnia ad hanc operationem necessaria inueniet.

Calculi ab  
orificio vesicæ  
amotio.

Si calculus, cum in vesica hæret, orificium vesicæ obstruat, & retentionis vrinæ causâ sit, æger vel supinus collocandus, & cruribus sublati concutiendus, vt lapis in cavitatem vesicæ recidat, vel cathedere dextrè adhibito à loco illo amoliendus.

Calculi ex  
meatu  
vrinario  
extra-  
ctio.

Quandoque à natura calculus in meatum vrinarium protruditur, vbi ille ob magnitudinem subsistit & hæret; qui qua ratione extrahendus sit, diximus in Institutionibus, loco antea allegato.

### CAPVT III.

De vermibus & aliis præter naturam in vesica natis.

Vermes in  
vesicâ nati.

Non solum autem calculi, sed & vermes in vesica generantur. Ita Aloysius Mundanella, Dialog. 4. scribit, fœminam quandam, quæ interdum maximam vrinæ difficultatem patiebatur, & dolorem, dum mingeret, vehementem, nullo alio morbo aut symptomate affectam tandem vermes sex digitos longos, viuos & rubentes eminxisse, quos ex humore pituitoso in vesica existente generatos fuisse statuit. Sic refert Dodonæus, in annot. ad cap. 77. Beniueny medicinal. obseruat. viro cuidam vermem in vesica existentem multis modis molestum fuisse, quandoque etiam sanguinis mictu prouocato, donec tandem per penis meatum sponte egressus finem doloribus imponeret. Idem ab aliis etiâ obseruatum. Cognoscuntur autem tales vermes vix certo, nisi simul cum vrinâ excernantur.

Tolluntur verò diureticis, quæ pituitam & crassos humores abstergunt, de quibus antea de renibus dictum, admistis medicamentis vermes necantibus.

Cum calculis etiam & arenulis duos vermiculos capite acuto corniculato, ventre & dorso testula inductis

excretos fuisse cum vrina, refert Scholiographus, ad c. 50. libri primi. Hollerij de morb. intern. Sc quæque minxisse vermiculos plures, albos, breues, tenuissimos, qui nec pediculi dimidium æquabāt, diuque viuebant, scribit Cardanus comm. ad aph. 76. sect. 4. Hippocratis. Capillares vermes cum vrina excludos vidit Rondeletius, vt narrat, in histor. Aquatiliæ, capit. de cancro fluminali. At generatius, de cognoscendis morbis, refert se vidisse draconem alatum cum vrina redditum. Ambrosius Paræus, lib. 19. c. 3. scribit, Ludouicum Duretum excreuisse cum vrina post longum morbum animal viuum, colore rubrum, cætera millepedi simile.

Draco alatus  
à vesicâ ex-  
cretus.  
Animal mil-  
lepedi simile.

Generantur & alia varia corpora in vesica, & tandem cum vrina excernuntur. Pituitam viscosam & longam, vt intestinum quoddam referret, concionatorem quendam per vrinæ canalem reddidisse, scribit Andernacus, dialog. de baln. & Cardanus, in com. ad aph. 79. lib. 9. refert, Monachum quendam tantum pituitæ lentæ in matulâ simul concretæ, vt oui anseris magnitudinem superaret, sibi ostendisse, & tamen nunquam calculo laborasse. Hollerius, inter rara, numero secundo, scribit, quendam minxisse multa similia liquidis margaritis, admodum pellucida, alia crassiora, mediocriter cocto albumini oui similia. Iohannes Schenckius tandem, in obs. suis, scribit, se domi asseruare falciculum variorum pilorum, subflauorum, tenerimorum, digiti longitudine, quibus hinc inde accreuit calculosa materia, qualis matulis vrinariis aliâs adhærescere solet, colore & odore propemodum sulphuris, in vesica cuiusdam mulieris Argentinæ natorum & cum intensissimis doloribus excretorum. Scribit etiam Alexander Benedictus, l. 2. cap. 22. Anatomia, aliquibus quædam in vesica concrecere, quæ nihil à conchyliis specie differant. Candelam etiam ceream per vrinarium meatum ad calculum amouendum immittam, nec filo alligatam in ipsam vesicæ cavitatem incidisse, refert Amarus Lusitanus, centur. cur. 20. Fuit in ea extrahenda variè laboratum, ex argento subtiles forcipes immissi ad rostri gruini figuram parati, cathederes etiam varij: Verum nihil profectum, donec tandem chirurgus per anum digitum immitteret, ac paulatim ex vesica candelam ceream comprimendo extra mitteret, eo more, quo lapides ex vesica detrudi solent. Hoc enim adiumento candela cerea inter tractandum liquefacta est, vt ea & ellychnium liberè cum vrina exierit.

Alia corpora  
in vesicâ na-  
ta & inde  
excreta.

Candela in  
vesicâ illapsa.

### CAPVT IV.

De distentione & inflammatione vesicæ ac situ eiusdem mutato.

Distentio vesicæ.

Vesica equidem excipiendæ vrinæ dicata est, habetque eius orificium sphincterem, quo clauditur, ne vrina effluat continuò, sed tùm demum, vbi copia eius cumulata naturam ad excretionem irritat. Interdum tamen accidit, vt dum vel obstructo meatu vrinatio, vel etiam, dum ob negotia aut pudorem & verecundiam ob adstantes, loco ad vrinam idoneam destitutus homo vrinam diutius retinet, supra modum vesicam ea distendat, vnde non solum dolor & molestia in ima ventris sede excitatur, sed & mictio planè impeditur, quod euenit, quia fibræ vesicæ, quas Hieronymus ab Aquapend. inter musculos refert, quarumque officium est, se contrahendo vesicam constringere & vrinam ex ea expellere, nimium distenduntur, vt postmodum se contrahere non possint.

Distentio ve-  
sicæ.

Malumque hoc sæpè satis periculosum est, & inflammatio vesicæ interdum inde excitatur, tandemque mors sequitur. Atque hæc de causâ vir quidam nobilis, Mathematicus celebris cum in conuiuio inter fœminas sederet,

federet, nec præ pudore vrinæ reddendæ gratia surgere vellet, eique vesica ita distenderetur, vt postea urinam non solum reddere non posset, sed & inflammaretur, breui inde mortuus est.

Si quid autem auxilij adhuc affertur potest, id in duobus consistit, primò vt emollientibus & laxantibus extra appositis vesica nimis distenta laxetur; deinde, vt si hoc modo vrina prouocari non possit, cathetere immisso vrina extrahatur. Quod si tentare necessarium est, maturè fiat, antequam inflammatio accedat. Si enim inflammatio iam accesserit, ista operatio nec satis tuta est, neque etiam à periculo omni ægrum liberat.

### Vesica Inflammatio.

#### Causa.

Vt aliæ corporis partes: ita vesica quandoque etiam inflammatione corripitur. Quod fit, sanguine præter modum ad eam confluente. Accidit autem hoc, & sanguis ad vesicam concitatur vel à causis internis, vt percussione, lapsu, equitatione longa & vehementi, vulnere, & cum lapis vesicam lancinat. Internæ verò causæ sunt vel sanguis, vel aliorum humorum abundantia in toto, vel parte aliqua vicina, vt renibus, vtero, quos natura vel sponte, vel dolore ex calculo, aut causa aliqua externâ violenta genito, irritata versus vesicam mittere solet.

#### Signa Diagnostica.

Cognoscitur hoc malum ex tensione, duritie, ardore & dolore, in regione vesicæ & pube; quibus accedit, urinam reddendi impotentia, egerendi conatus ac tenesmus, ano in consensum tracto, aliquando etiam alui suppressio, intestino recto à vesica inflammata compresso. Adest præterea febris, vigilie, delirium, sitis, extremarum partium frigiditas.

#### Prognostica.

I. Inter omnes vesicæ morbos periculosissimus est inflammatio, ac plerunque lethalis, & quidem ferè circa septimum diem, quia febris continua accedit, cum vrinæ & alui retentione: atque quò grauior est febris, eò malum ipsum est periculosius, præsertim si accedunt praua symptomata & inflammatio in gangrenam mutetur.

II. Leuior autem vesicæ inflammatio cum hypostasi in vrina alba & æquali morbum salutare indicat.

III. Inflammatio, quæ est circa vesicæ collum, quod sæpissime accidit, suppuratur; & si abscessus intus rumpatur, melius est; cum pus cum vrinâ euacuari possit.

IV. In pus autem inflammationem mutatam esse indicat febris & doloris remissio: abscessum autem ruptum esse, & quidem intro, ostendit pus cum vrina mixtum.

V. Inflammatio vesicæ sæpe solet repente solui, erysipelate iuxta cutis superficiem oborto; & vrina copiosa emissâ.

#### Indicationes & Curatio.

Vt in aliis inflammationibus sanguis ad vesicam fluens, reuellendus, repellendus, deriuandus, discutendus, dolorque leniendus, & quia vrina plerunque suppressitur, ea promouenda.

Itaq; statim sanguis, si opus sit, mittendus est, venâ in cubito aperta, & pro eius copia & virium ratione euacuandus. Deinde deriuationis gratia vena in poplite, vel talo aperienda, aut cucurbitulæ cum scarificatione

coxis applicandæ. Si verò non adsit magna sanguinis copia, statim vena in poplite vel talo aperiiri potest.

Venâ sectâ refrigerantia & repellentia applicanda. De iis tamen monendum, non diu in eorum vsu insistendum esse. Cum enim vesica membranosa sit, frigidis, quæ neruis & membranis inimica, facile offenditur, & vesica constringitur, atque vrina, quod aliàs in hoc affectu accidit, suppressitur, humorumque discussio prohibetur. Ideoque ad moderatè calida, dolorem lenientia & laxantia maturè accedendum.

Quapropter talis clyster iniici potest.

℞. Maluæ, violar. parietar. lactuc. an. Mi. sem. a. frig. maior. an. Dra. ii. lini Dra. iii.

Coq. in s. q. aq. hordei.

Colat. ℞. ℥. x. cassia extracta ℥. i. ol. violar. ℥. ii.

F. Clyster.

Aut si dolor sit maior,

℞. lactis recent. lbj. succi lactuca vel solani, olei violar. an. ℥. ii. M.

F. Clyster.

Extra ex iisdem fomenta & cataplasmata applicentur.

Et ad dolorem leniendum talis potest fieri fomentatio.

℞. Rad. alib. ℥. i. parietar. maluæ. alib. an. Mi. flor. chamemeli Mß. granor. halicacabi ℥. β.

Coq. in aq. pro fomento.

Post fomentationem locus inungatur sequenti vnguento.

℞. Ol. amygd. dulc. violar. an. ℥. i. mucilag. sem. alib. fœnigraci, lini an. Drach. vi. granor. alkekengi contusor. ℥. iib. cera parum.

F. Vnguentum molle.

Simul exhibeantur, quæ feruorem humorum mitigant, & vrinæ ardorem tollunt, decoctum hordei cum emulsione sem. quatuor frigidior. maiorum, papaueris, tragacanthæ, syrupus violar. nymphææ, de papauere, cum aqua lactuca, porrulacæ, solani, conserua violarum, borraginis, maluæ, species diatræg. frigidi.

Hinc magis discutientia adhibenda, & pubes inungenda oleo rosar. amygd. dulc. chamamelino, & reliquis etiam flores chamemeli & semen lini addenda.

Si tumor ad suppurationem tendat, adhibenda eius maturacionem promouentia ex semine lini, fœnigraci, earicis, adipe gallinaceo. Postea danda opera, vt abscessus rumpatur.

Si inflammatio in tumorem scirrhusum conuersa fuerit, emollienda cassia extracta cum oleo amygd. dulc. & adhibeatur decoctum alibæ, maluæ, florum chamemeli.

Si vrina nullo modo prouocari possit, catheteris vsu educenda, qui quidem affectum non tollit, quia tamen urinam extrahit, ne malum augeatur, præcauet, id quod in fœminis sine periculo fieri potest; in viris vero cautè agendum, ne dum ægrum à periculo liberare conamur, cum in maius coniiciamus.

#### Vesica situs mutatus.

Præterea etiam vesica naturalem situm quandoque mutat. Id quod rarò quidem accidit: obseruauit tamen Platerus in Piscatore quodam, cui factâ rupturâ in inguine vesica in scrotum descenderat, & ibi distenta latebat, vt vrina nec cathetere immisso reddi posset, donec chirurgus inscius vesicam esse, dum sectionem tentat, vesicâ vulneratâ urinam profudit, ægerque statim leuamen, sed summum periculum percepit; à quo tamen liberatus fistulâ illic relictâ per eam postea semper urinam reddidit.



CAPVT V.

De Vesica Vulneribus.

Vesica vul-  
nera.  
Signa.

**S**I Vesica vulnerata sit, cognoscitur id è loco, cui vul-  
nus inflitum est. & dolore circa pubem; vrina sup-  
primitur, vel cum vrina sanguis mingitur, aut ex ipso  
vulnere vrina effluit, ventriculus in consensum trahitur,  
vnde bilis vomitus, aut singultus sequitur.

Prognostica.

Prognostica.

I. Si vesicæ corpus, & pars, quæ nervosa est, vul-  
neratur, insanabile ferè malum est, & inflammatio ac  
conuulsio superuenit, Obseruatum tamen est, etiam ve-  
sicam in fundo vulneratam sanatam fuisse, cuius rei  
exempla habentur in obseruat. Schenckij. Neque enim  
vesica tota nervea est, sed exterior eius membrana car-  
nosior est, vnde Hieron. Fabricius ab Aquap. & Spige-  
lius eam pro musculo vesicæ constrictorio habent. Ra-  
tò tamen integrè sanatur tale vulnus vesicæ, etsi æger  
non moriatur, sed callo inducto fistula manet, per quam  
vrina excernitur.

II. In collo verò vesicæ, quæ pars carnosior est, vul-  
nera lethalia non sunt; id quod calculorum per sectio-  
nem extractio satis docet.

Curatio.

Curatio.

Vulnerum autem vesicæ curatio maturanda, ne in fi-  
stulam degenerent. Ideoque in vulnus glutinantia me-  
dicamenta imponenda, circum circa verò locus inun-  
gendus oleo rosæ, lilior. albor. mastichino, Possunt etiam  
in vulnus iniectiones fieri ex rosæ, radicibus consolide, fo-  
lis myrti, in vino coctis, quibus mel rosatum addatur.  
Æger pauco potu vtatur.

CAPVT VI.

De Vesica Scabie & ulceribus.

Scabies vesicæ.

Scabies Vesi-  
cæ.

**S**cabies vesicæ ex humoribus acris & salsis eius  
superficiem internam quasi erodentibus oritur.

Quod vbi accidit, pruritus in pectine percipitur, vri-  
na graue olet, & fursuraceum sedimentum in fundo re-  
fidet, æger sæpe mingit, & si maius malum sit, interdum  
etiam cruenta.

Malum, si diutius duret, in vlcus mutatur, & in seni-  
bus plerumque incurabile est.

Curatur autem euacuatione humorum acrim &  
salforum factâ syrupo & melle rosatum solutio, man-  
na, cassia.

Deinde medicamentis humores temperantibus ex  
violis, lactuca, seminibus quatuor frigidis maioribus, pa-  
paneris. Fragorum etiam succus cum melle exhiberi po-  
test, item succus baccarum myrti cum vino.

Eadem etiam in vesicam iniicere licet, Extra quoque  
applicentur medicamenta refrigerandi & consolidandi  
vi prædita.

Vlcera Vesicæ.

Causa.

Vlcera Vesi-  
cæ.  
Causa.

Vlcera verò vesicæ quod attinet, in quæ etiam scabië  
vesicæ degenerare diximus, fiunt ab humoribus acris  
vel pure è locis superioribus transeunte, & medicamē-  
tis vesicam exulcerandi vim habentibus, inter quæ sunt

præcipuè cantharides haustæ. Vulgo equidem statuitur  
cantharides non solum haustas, sed & extra capiti, bra-  
chiis, genibus & cruribus applicatas, imò in pera-  
gestatas sanguinis mictionem excitare, cuius rei hi-  
storias ex Montagnanâ, Paschalio, Occone & aliis colle-  
git Schenckius, lib. 3. obseru. Verum etsi centies & sæ-  
pius ceruici, post aures, brachiis cantharides ægris ap-  
plicarim, nunquam tamen tale quid obseruare potui.  
Post inflammationem etiam & abscessum vesicæ malè  
curatum vlcus relinqui solet. Excitatur quoque vesicæ  
vlcera à calculo aspero vesicam lædente, vt & à vasorum  
ruptione & læsione, à percussione, lapsu, & simili vio-  
lencia. Consistit autem vlcus vel in fundo vesicæ vel in  
eius collo.

An canthe-  
rides semper  
vesicam ex-  
ulcerant?

Signa Diagnostica.

Cognoscitur autem vlcus vesicæ è squamulis, quæ  
Græcis ἐστὶν ἰδίς, & pure, quæ cum vrina eminguntur,  
ac graui vrinæ odore, si vlcus sit sordidum: dolor ad-  
est grauis in pectine & pube, quoties ægri mingunt; nō-  
nunquam etiam, & cum vlcus serpit, subcruenta & sa-  
niosa eminguntur. Vrinæ quoque difficultas accedit,  
sæpè & tenesmus & egerendi appetitus, ac membri vi-  
rilis erectio.

Signa.

Cum autem etiam in meatu vrinario & pene vlcus  
esse possit, distinguitur id ex eo, quod si vlcus in pene est,  
pus, & sanies, quæ excernitur, vrinam præuenit, aut sta-  
tim in primo exitu apparet, aut etiam sine vrinâ effluit:  
quæ autem à vesica exulcerata excernuntur, cum vrina  
mixta sunt. Statim tamen seu ramenta, seu pus, quod  
cum vrina in vesicæ vulneribus excernitur, vbi reddita  
est vrina, subsidet. Præterea in meatu vrinarij vlcerebus  
inter mejendum dolor percipitur, id quod in vrinæ vl-  
ceribus non accidit, nisi iuxta collum eius vlcus con-  
sistat. Tum enim mictionis tantum tempore, & vbi  
mingere cœpit, vel cessauit, dolor percipitur. Præterea  
situs doloris discernit, an vlcus sit in collo vesicæ, aut in  
meatu vrinario.

Vesicæ quoque & renum vlcera doloris situs facile  
distinguit. Ita etiam si pus ex liene, hepate, thorace &  
aliis superioribus partibus descendat, dolor vel alia si-  
gna eius loci affecti adsunt.

An autem in fundo vesicæ vlcus consistat, an iuxta  
vrinarium meatum, eo discernitur, quod si in fundo ve-  
sicæ fuerit, dolor circa pubem percipitur; si autem iuxta  
meatum vrinarium, tempore mictionis magis deprehē-  
ditur, vt modò dictum, & inprimis vbi mingere inci-  
piunt & desinunt.

Prognostica.

I. Vlcera vesicæ plerumque incurabilia sunt; quia in  
parte sunt membranosa, & vrina, quæ mordax est, conti-  
nuò illo transitu vellicat, & consolidationem impedit.

II. Periculosiora autem sunt, quæ ex erosione sunt  
orta, quàm quæ ex aliis causis.

III. In senibus etiam, quàm iuuenibus difficilius &  
raro curantur vesicæ vlcera.

IV. Vlcus, quod est à calculo, non curatur, nisi cal-  
culus prius extrahatur.

V. Continuus autem, qui adest, dolor vires deicit,  
vigilias parit, corpus consumit, homòque tandem ad ca-  
chexiam vel atrophiam deducitur.

Indicationes & Curatio.

Vt alia vlcera, ita & vesicæ absterfionem & consoli-  
dationem requirunt, simulque præcauendum, ne vlcus  
irriterur, latiusque serpat: Dolor quoque, qui vrere so-  
let, leniatur, vt & vrinæ ardor ac difficultas.

Indicationes  
& Curatio.

Ideoque danda opera, ne vrina acris generetur, sed  
humorum actimonia temperetur, id quod præstant  
viola,

*viola. radices althæa, iuiuba, sebesten. syrupus violar. de nymphæa, cum aqua lactuca & endivia, emulso amygdalarum dulcium cum seminibus frigidis maioribus & appauere.*

Humores etiam à vesica & renibus diuerrendi, & ad aluum deriuandi, medicamentis, quæ supra de renum vlceribus sunt propofita; inprimis cassia & terebinthina vtilis est.

Commodum est & hoc electuarium.

*℞. Rad. glycyrrhizæ, polypod. q. an. ʒ. β. sem. 4. frigid. maior. an. ʒ. iij. flor. violar. borrag. an. M. β. iuiubar. num. xij. prunor. Damascenorum num. xv. passular. minor. ʒ. j. fol. senæ elect. ʒ. j. β.*

Infundantur in aq. hordei, mane ebulliant & colentur.

Colaturæ adde manna in l. q. decocti solutæ & colatæ ʒ. ii. cassia extractæ ʒ. iij.

Coq. ad Electuarij consistentiam. Dosis ʒ. i.

Ad abstergendum vlcus aqua hordei, mellis vel sacchari, in quibus radices fæniculi aut graminis coctæ sint, dentur.

Vel *℞. Spica ʒ. β. seminis apij ʒ. iij.*

Coq. in aqua, cum colatura fiat è nucleis pini xx. sem. quatuor. frigid. ma. or. ʒ. β. emulso.

Vel *℞. Terebinth. Cypria aqua equiseti lota ʒ. ii. glycyrrhizæ ʒ. iij. trochisc. alkekengi ʒ. j.*

Fiant pilulæ instar cicerum. Dentur tres, & postea bibatur liquor conueniens.

Possunt etiam per catheterem abstergentia in vesicam iniici.

Tandem consolidantia vsurpentur, & quidem exhibeantur medicamenta ex symphyto majore, plantagine, prunella, equisetio, baccis myrti, bolo Armeno, terra sigillata, thure, gummi Arabico, corallis, sanguine Draconis, mastiche, mumia, trochiscis alkekengi.

Vel *℞. Succi plantag. consolidæ majoris an. lb. β. aq. rosar. ʒ. iij. sacchari lb. j.*

Coq. ad iulebi consistentiam.

Vel *℞. Radicum alth. consolid. major. an. ʒ. β. auriculæ muris, equiseti an. M. j. alchimille, symphyti, flor. ros. rubr. an. M. β. granorum halicacabi, glycyrrhizæ, passularum an. ʒ. β. Coq. in aq. s. pro lb. ij.*

Colatura dulcoretur saccharo, & aromatizetur cinamomi ʒ. j.

Vel *℞. conf. rosar. ʒ. j. boli Armeni, terra sigill. mastiches an. ʒ. i. amyli ʒ. ii. syrupi de consolidæ q. l.*

F. Electuar.

Vel *℞. Equiseti ʒ. ii. sem. plantag. mastich. an. ʒ. j. sacch. ros. tabul. ʒ. β.*

F. Puluis. Vel succus equiseti cum vino exhibeatur.

Vel *℞. Terebinth. Cypria aq. plantag. lota. ʒ. j. boli Armeni, trochisc. alkekengi sine opio an. ʒ. β. succi glycyrrhizæ ʒ. ii. gummi tragacanth. ʒ. j.*

Cum succo equiseti fiant pilulæ instar cicerum.

In vesicam verò infundatur per catheterem lac recens mulsum cum mumia, vel mel. rosatum, vel succus equiseti & symphyti maioris.

Trochisci Gordonij, quorum hæc est descriptio, pluribus scopis inferuntur. Vlcus enim mundant, dolorem sedant, & vrinæ ardorem mitigant, simulque conglutinant.

*℞. Sem. 4. frig. maj. papau. albi, malua, berberis, portulaca, cydoniorum, myrtillorum, tragacantha, gummi Arabici, pinearum mundatarum, pistaciorum, sacch. candi, penidi, glycyrrhizæ, hordei mundi, mucilag. psyllij, amygdal. dulc. an. ʒ. ii. boli Armeni, sang. Draconis, spody, rosarum, myrrhe, an. ʒ. j.*

Cum hydromelite fiant Trochisci pondere ʒ. ii. quibus cum vti volueris, dissoluatur vnus in lacte.

Atque hic etiam, quæ per catheterem iniiciuntur, plus prosunt, quam ore sumpta, cum longa à ventriculo ad vesicam via sit, in qua vires medicamenti non parum alterantur.

Extra talis fiat inunctio.

*℞. Olei mastichini, myrtini, cydoniorum an. ʒ. j. Syracis liquida, cera an. ʒ. i. boli Armeni ʒ. ii. Misce.*

Hinc tale imponatur cataplasma.

*℞. Mastich. thuris, terra sigillata, boli Armeni, hypocistid. myrti an. ʒ. ij. farina siliginis ʒ. j. β. ol. rosac. myrtini an. q. l. F. Cataplasma.*

Vlcus, quod est à calculo, non curatur, nisi calculus tollatur, vt supra Progn. 4. dictum: quem tamen extrahere periculosum est propter vlcus, Ideoque si vlcus sit profundum, tutius est saltem emplasticis quibusdam & viscosis vti, vt lapidi quædam leuitas inducatur & vlcus mitigetur, quod fit vsu lactis cum amylo & aliorum viscosorum.

Si vlcus sit à catharidibus, atque id recens, lac copiose exhibendum, vel emulso sem. 4. frig. maior. & papaueris. Postea consolidandum cum tragacantha, bolo Armeno, terra sigillata, corallis. Si iam antiquum sit, vt alia vlcera curandum.

Plura medicamenta ad vesicæ vlcera ex antiquis collecta videantur apud Aëtium, *teirab. 3. serm. 3. cap. 29.* vt & Rondeletium.

Insignem vlcis vesicæ, & quidem curati habet historiam Guilh. Fabricius, *cent. 3. obs. 69.* Fœmina quædam bimestri à partûs tempore continuis ac maximis doloribus è regione vesicæ, & stillicidio vrinæ laborabat, & vrina quoque & quicquid siphone in vesicam infundebatur, per collum vteri statim inuoluntariè effluebat. E quibus fundum vesicæ ad matricis vsque collum exulceratum fuisse, rectè colligebat Fabricius. Pro dolore ergo leniendo iniecit sequens medicamentum.

*℞. Sem. cydoniorum, fenigraci an. ʒ. j.*

Macereantur per horam in lb. j. β. decocti hordei, postea per linteam exprimantur, fiatque mucilago satis liquida, cui add. *ol. amygdal. dulc. ʒ. ij. mel. rosac. colati ʒ. j. M.*

Fiat iniectio. De quâ singulis horis parum tùm in vesicam, tùm in os vteri siphone repidè iniiciebat.

Et quia alius non satis lubrica erat, sequens præscripsit Enema.

*℞. Decocti capitis vitul. & lumbricor. terrest. ʒ. x. vitell. ouor. num. ij. ol. anethini & chamamel. an. ʒ. i.*

Misce fiat Enema.

Pectini verò hunc forum applicuit.

*℞. Radic. althæa ʒ. j. flor. chamamel. fol. malu. violar. an. M. j. sem. cydonior. fenigraci an. ʒ. ij. anisi, fæniculi an. ʒ. j.*

Coq. in aqua, in quâ madefactum linteam reduplicatum (spongia enim propter salsedinem non conuenit) calidè applicetur.

Deinde sequenti linimento ventrem, coxas, & genitalia inungi curauit.

*℞. Ol. amygdal. dulcium, de vitell. ouor. axung. humana an. ʒ. β. ol. lumbricor. aneth. an. ʒ. i. Misce.*

F. Linimentum.

Renes verò sapissimè hoc vnguento inungebantur.

*℞. Ol. rosar. nymph. violacei an. ʒ. j. caphura ʒ. j.*

Cum albumine oui, paucoque aceto rosato, mixtis simul in mortario plumbeo. F. Vnguentum.

Pro cœna sequens amygdalatum exhibuit.

*℞. Amygdal. dulc. sem. 4. frigid. maior. papau. albi an. ʒ. ij. decocti hordei aq. nymph. rosac. an. ʒ. i.*

F. Emulso f. a. Adde aqua cinam. cum vino, bugloss. & borrag. ʒ. i. sacch. perlati ʒ. i. β. Misce.

F. Amygdalatum.

His remediis adhibitis, dolor paulatim remisit, ita vt ea nocte melius quicuerit, quàm antea. Sed quod mirandum, per vlcus, quod in fundo vesicæ erat, infinitos lapillos, confusi pumicis instar, filamentis & membranulis colligatos ac inuolutos in collum matricis excreuit.

Dolore sedato per multos dies sequens decoctum siphone in vesicam & collum matricis iniecit.

*℞. Rad. consolid. maior. ʒ. i. hordei integri M. i. herb. agrimon. veronica, scordij, alchymilla, fænicula, an. M. β.*

Coq. in aqua,

In fbi.colatura di Coluc mell.rosat. ℥.ij.

**Milce.**

**Fiérque inieétio.**

Quâ in velicam injectâ, per collum matricis vnâ cum  
vrinâ statim effluebat. Post iniectionem turundam  
longitudine quatuor digitorum transuersorum, sed  
crassam satis, ex stupis & gossypio concinnatam, in-  
que sequenti collyrio madefactam matricis collo infigi-  
turavit.

℞. Mucilag. sem. cydonior. cum aquâ plantag. extracta  
Vnc. iiii. cornu cerni vsti, lapidû calaminar. iiii. prepara-  
re an. 3. ß. radic. consolida maior. subtiliss. puluerisar. Dra. i.  
Misce.

His breui sic conualuit, vt domesticis negotiis paulatim vacare potuerit. Vrina tamen continuò per collum vteri magnâ sui molestiâ effluebat. Etsi verò talia vlcera, quæ fundum ipsius vesicæ & collum matricis penetrant, vt plurimum incurabilia sint ex sententiâ Hippocratis: suauis tamen Fabritius, vt optimâ victûs ratione vreretur, & ab omnibus iis, quæ urinam reddunt acrem, abstinere, deinde vt per vices corpus expurgaret, quin etiam vt singulis matutinis medicamenta conglutinantia, qualia sunt poriones vulnerariæ, assumeret. Hæc cum religiosè & indefessè ( magna enim in ea erat sanitatis recuperandæ auditas ) per menses aliquot obseruâssent, stillicidium vrinæ per collum vteri paulatim imminutum est, adeò vt partim per collum vesicæ, partim verò per collum vteri efflueret. Illa autem continuò vsa medicamenti conglutinantibus, & per interualla etiam purgantibus, intra menses octo, non sine admiratione omnium eorum, quibus res cognita, planè curata fuit, adeo vt posthac Dei Opt. Max. gratiâ nè guttula quidem vrinæ inuoluntariè efflueret, sed à vesicâ collecta, retenra, & excreta fuerit, non aliter, ac si antea nunquam male affecta fuisset.

### Dieta

Diet.

*Ager fugiat aërem calidum & austrinum, vitet in cibis dulcia, quæ faciliè bilefcunt, amara, falſa, acria, aromatibus condita, acetum acre, non multum edat, & parçè omninò bibat. Cibi ſint boni ſucci, facilis coctio- nis & glutinantes: & inprimis vtile eſt lac, quod & cibi loco eſt, &, ex Aërij ſententia, nulli remedio poſtponendum; cum & alperitatem leniat, partes exulceratas eluat, aliòſque affectus extergat. Vtile eſt & hordeum, oryza lacte cocta, panis ſiligineus. Et omnino cibi tales ſint, qui vtiuſ acrimoniam miti- gant. Ager in lecto decumbat, aut ſaltem quietum ſe contineat.*

*Fistula vesicae.*

**Fistula vesi-**  
**ca.**

**Vulnera & ulcera vesicæ interdum in fistulas abeunt** quæ quomodo curari possint, ex sequentibus duobus exemplis, quæ ex Iohannis Langii, *lib. 3. epist. 5.* breuiter hîc contrahere & proponere libet, patere potest. Curationem autem ille instituit hoc modo.

Primò corpus purgavit hoc medicamento.

℞. Medull. cassia aquâ malua extracta ℥.ss. diaphanici  
Scr. v. rhubarb. ʒ. ss. cinam. gr. v.

Misceantur & conspergantur momento *femini anisi*,  
F. Bolus.

Loco affecto applicauit emplastrum ex *diachyli cum gummi* ʒ.ii.β. *diachyl. mollis*, quod ibid. describitur ʒ.i. & *croc*i Scr.i.

Apertione[m] postea apostematis in loco decliuori  
 23.7 18.11 maturauit; in vulnus verò licinium, ex filamen-  
 tis contortum, ac mixturâ ex oui albumine & vitello,  
 oleoque rosarum delibutum inseruit, ne labra vulneris  
 conglutinantur, & aliquatenus ad ichoris effluuium  
 paterent, eandemque mixturam ad doloris ex incisione  
 mitigationem applicauit, & emplastrum diachylum  
 suum suppuratum obduxit. Cùm ergo pus bonum ef-

*Dan. Sennerti Tom. I I.*

fluere, & dolor omnis euauisset, ac saltem ardor vrinæ reliquus esset, & vrinæ stillicidium superueniret, falsos cibos omnes, & vinum ægro prohibuit, & decocto ex *hordei M. ii. β. glycyrrh. ras. Drach. i. sem. anisi ziib. dactylis incis. num. v. sebesten num. xv. in aq. font.* lbx i. r. parato propinauit, simulque ter quaterve singulo triduo *cerebinth. Cypria aquâ malua lota* ℞. v. in bolo exhibuit, & tertiâ post horâ *cyathū decocti ciccerum* exauriendum dedit. Sequenti triduo manè & vespere *lesquicochlear syr. capill. vener.* ℞. iii. β. *glycyrrh.* ℞. iβ. *mistorum* exhibuit. Quarto die ad *cerebinthina* vltum rediit, cuius vsu effectum, vt ægrotus non amplius ardorem iuxta penis glandem perciperet: vlcus verò sua sponte solo ex *lithargyro diachylo* consolidatum est.

Alteram etiam historiam, eadem epistolâ, recenset, curatæ fistulæ in peritonæo, per quam vrina effluebat.

Vniuersali corporis euacuatione præmissâ, ad humo-  
ris serofi & vrinæ acrimoniam mitigandam pastillos vel  
potius morsulos parauit, & eorum quolibet die binos,  
vnum manè, alterum vesperi exhibuit.

24. *Pincar. aquâ rosar lotar.* Drach. ii. *sem. melon.*  
*Scrup. iv. gummi Arabici, tragacanthæ an.* Scrup. i. *ce-*  
*rasor. rad. glycyrrh. an.* Drach. ß. *cinamom.* Drach. i. *facch.*  
*penid. 3. i. facch. in aq. ros. & malvæ an. f. q. dissolv.* 3. iv. ß.  
 Fiant morisuli, pondere Drach. iß.

Quarto verò quovis die haustum decocti ligni guaiaci Vnc. v. ad sudorem eliciendum, & serum expurgandum exhibuit.

Fistulæ, ad callum fistulæ extendendum, *furculos rad. ellebori nigri* inferuit; qui callum extererent, quos tertio die amovit, & penicilla seu turundas ex *arginis 3. xii. armoniaci 3. iv. aceto acri* exceptis, & in figuram oblongam formatis, vt callus arroderetur indidit. Et vt suppuratione callus colliquesceret, ex *terebinthina & glutino piscium* addito ꝑ *precipitato*, turundas formabat, quas fistulæ indebat, quibus callus 20. horar. spatioliquefcebatur, & cum sanie frustulatum profuebat. Ne verò oscula fistulæ nimis citò coirent, spongix frustula oblonga fili ligatura coarctata fistulæ imposuit, & sinus vlceris subcutaneos forcipe incidit.

Quibus peractis, vt vlcus abstergeretur, sequens linimentum, linamentis discerpris exceptum, manẽ & vesperi, vlcere prius diligenter absterfo, indidit.

4. Mel. ros. z. i. cerebinth. z. v. rad. aristoloch. rotund.  
Scr. i. ireos. myrrh. rubra an. z. β. aruginis d. i. gr. v. seui hir-  
cini Dra. iii. Misce.

Et cum sub sordium lentore caro mollis succrenisset  
quam istud vnguentum abolere non potuit, vlcus &  
præcipitato conspersit, & emplastrum diachylum im-  
posuit. Post horas 40. emplastro & pulvere sublato  
cum vlcus purum reperiret, & caro bona sponte  
pullularet, epuloticum sequens, ob id Langij dictum,  
imposuit.

℥. Terebinthina, cerussa, lii baryri, lapidi calaminaris Epuloticum  
preparati, ol. mastichini an. ʒ. i. picis, colophonia, cera an. Langj.  
Drach. β.

Coq. ignelento ad viscedinis lentorem. Deinde in-  
 sperge *mastiche*, *olibani* an Scr. *iv. corall. rubr.* *z. i. β. thu-*  
*ris z. i. camphoræ* *℞. ii. β.*

Cum pistillo calido exactè coadunentur, & fiat em-  
plastrum.

Atque hoc modo vlcus consolidatum fuit.

C A P V T VII.

*De Morbis meatus urinarij.*

*& primò*

*De sphincteris vesicae refrigeratione, & duplici  
meatu Vrinario.*

**A** Tque hi morbi totam vesicam vel eius orificium  
infestare solent. Sunt & alij, qui meatus vrinarij  
infestare solent. *Sphincteris  
vesicae refri-  
geratio.*  
A A A A a      proprij

A A A A a

proprii sunt. Inter quos est primò sphincteris vesicæ refrigeratio, quæ inducitur à causis externis refrigerantibus, ut aëre frigidiore, sessione super lapide frigido, aquæ frigidae balneo.

Et cognoscitur ex eo, quod actio sphincteris læditur & vrina contineri non potest: Et causæ, quæ sphincterem vesicæ refrigerare possunt, præcesserunt.

Curatur verò, ut aliarum partium paralysis à frigore facta, dicaturque de eo etiam aliquid infra de vrina incontinentia.

Est etiam secundum naturam vnus meatus vrinarius, Guilielmus Fabricius tamen, ut *cent. 1. obseru. 76.* refert, vidit puerum 12. annos natum Colonia Agrippinæ, cui natura duplicem vrinarium ductum dederat, quique per vtrumque vrinam sine vlla difficultate emittebat. Erant a. in loco solito alter super altero siti, tenuissimæque membrana & interstitio distincti: sed interior aliquantulum incuruabatur, ita ut ex eo lotium non rectè, sed nonnihil deorsum fluitaret.

## CAPVT VIII.

### De meatus vrinarij angustia.

Cum tanta vrinæ copia in vesica collecta est, ut naturam ad excrctionem stimulet, laxato sphinctere per meatum vrinarium ea emittitur. Impeditur autem hoc sæpe ob meatus vrinarij angustiam.

#### Causæ.

Angustia hæc fit vel in meatus vrinarij orificio, vel in ipso meatu. Vtrumque verò accidit vel ab obstructione, vel à compressione, vel à constipatione meatus vrinarij. Obstructio sæpissime fit à calculo, qui si magnus sit, in orificium meatus vrinarij prolapsus illud obstruit, vel si paruus sit, in ipsum meatum vrinarium penetrat, eumque obstruit. Idem aliquando præstant sanguinis grumi, pus crassum & viscidum, ut & pituita crassa, viscida, & lenta.

Comprimitur autem nunc à re externa, ut sessione super re durâ; vel interna, ut intestino recto fecibus aut flatibus turgido, partibusque alijs vicinis inflammatis aut turgescens, aut cum ipse penis & collum vesicæ intumescit, vel cum vesicæ ceruix contorquetur, ut interdum, dum vesica in scrotum delabatur, accidit, cuius exemplum habet Platerus.

Constipatur, dum caruncula vel callus, aut verruca in meatu vrinario generatur & excrescit.

#### Signa Diagnostica.

Meatus vrinarij angustia in genere ex vrinæ suppressione cognoscitur. Quæ autem causa angustiae sit, alijs signis discernendum. Si obstructio sit à calculo, eius signa antea tradita sunt. Si à grumo sanguinis, vulnus vel ruptura vasis præcessit, sanguisque antea cum vrina effusus fuit. Pus vrinarium meatum obstruere, colligitur ex eo, quod in vesica vel renibus vlcus fuit, & pus collectum est, vel in parte aliqua superiore, abscessus ruptus, & pus ad vesicam translatus est. Si à pituita crassa & viscida sit obstructio, etiam antea per vrinam euacuatæ est, eiusque redundantis in corpore signa adsunt. Compressio à causis externis ex ægri relatione cognoscitur. Si verò à tumore aliquo partium vicinarum meatus vrinarius comprimatur, & eius notæ latere non possunt. Vesicæ ceruicem contortam esse, è vesicæ ex sede sua prolapsu cognoscitur. Constipatio à caruncula, callo aut verruca in meatu vrinario enata deprehenditur ex præcedentibus vlceris notis, & cathetere in meatum vrinarium immisso exploratur.

#### Prognostica.

1. Malum ipsum, si pertinax sit, & perfecta adsit meatus vrinarij angustia, satis periculolum est; cum vrina diutius in vesica detenta, & cumalata grauiæ symptomata inducere soleat.

2. Curatur autem nunc facilius, nunc difficilius pro causarum angustiam hanc inducentium varietate, quorum alia facilius, alia difficilius tolluntur.

#### Curatio.

Curatio ad causas dirigenda est, quæ proinde pro causarum varietate variè instituenda. Si nimirum à calculo magno orificium vesicæ obstruatur, calculus loco illo amouendus. Ideoque æger supinus collocatus, cruribus eleuatis concutiendus, vel cathetere immisso calculus ab orificio vesicæ amouendus. Si verò calculus parvus aliquoulsque in meatum vrinarium progressus sit, digitis eum parte inferiore comprimere, & calculum vlque ad extremum meatus vrinarij deducere & per eum exprimere oportet. Licet etiam specillum, quod in cochlearis formam in extremo excavatum sit, in meatum vrinarium immittere, ita ut lapidem prætereat & superet, ipsumque suo cauo comprehendat, atque hoc modo comprehensum lapidem ex meatu vrinario extrahat.

Quod si forte ita calculus hæreat, ut digitis loco non moueri nec extrahi possit, partem laxantibus fouere oportet, in ipsum verò meatum calculum frangentia infundere. Quod si nec hoc modo loco moueri possit, ipsum penem secare & meatum vrinarium aperire, ac calculum extrahere necessarium est: Quod quâ ratione fieri debeat, in *Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 14. pag. 1060.* monstratum.

Si à grumis sanguinis meatus vrinarius obstruatur, grumus dissoluendus medicamentis cum internis, tum externis. Exhibendum nimirum *oxymel simplex* vel *scilliticum* cum *decocto thymi & origani*, vel *amaranthi comæ* cum *mulsa*, vel *lixium* cum *symplo de capillis Veneris*. Eadem etiam in meatum vrinarium instillari possunt. Extra verò foueatur meatus vrinarius lixiuo, vel etiam immittatur candela cerea medicamento grumos sanguinis dissolvente madida.

Si obstructio sit à pure vel pituita crassa, vsurpanda sunt attenuantia & incidentia. Extra etiam vtendum fomentis & infussionibus ex *decocto origani, thymi, centaury minoris*, cum *oleo rutaceo*. Quod si non sufficiat, *oleum de scorpionibus*, vel *rutaceum aut nardinum* in ipsum meatum vrinarium iniiciendum. Quæ si nec ipsa satisfaciant, catheter immittendus, & vrinæ exitus promouendus, ac postea attenuantia & incidentia continuanda.

Si angustia sit à compressione, & quidem à causa externa, ea tollenda. Si à tumore interno, is curandus: si ex vesicæ in scrotum delapsu, ea in suum locum restituenda.

Si caruncula, callus, vel verruca in meatu vrinario excrescerit, tollenda, ut cap. seq. dicetur.

## CAPVT IX.

### De Caruncula, callo, & verrucis in meatu vrinario enatis, ut & meatus vrinarij vlceribus.

Aliquando etiam caruncula, callus carnosus, verruca, aut omnino carnosæ excrescentia in meatu vrinario nascitur. Idque plerumque iis accidit; qui gonorrhæa ex morbo venereo & hinc orto vlcere in meatu vrinario laborant. Talia enim vlcera nisi maturè curentur, caro spongiosa in iis excrescit.

#### Signa

Caruncula, callus & verruca meatus vrinarij.

Curatio.

Curatio.

Curatio.

Caruncula, callus & verruca meatus vrinarij.



*Signa Diagnostica.*

Vbi caruncula in vrinario meatu est, nec vrina liberè excernitur, sed difficulter & guttatim, nec semen emittitur, grauissimi dolores coniunguntur. Exploratur quoque caruncula cathetere vel candela cerea in meatum vrinarium immisso. Cum verò etiam à calculo meatus vrinarius obstrui, & vrinæ exitus impediri possit, id hoc modo discernitur. In suppressione vrinæ à caruncula vrina similiter semper profuit; à calculo verò non eodem semper modo, sed aliquando liberè & copiosè redditur, aliquando repente supprimitur, cum ex fundo vesicæ calculus in eius orificium incidit. Cathetere etiam immisso tactu caruncula à calculo discerni potest. Dolor quoque in obstructione à calculo ad vesicæ radicem magis virget.

Ab obstructione etiam à viscidis & crassis humoribus hæc à caruncula angustia discernitur, quod obstructio à crassis & viscidis humoribus maior plerumque est, adeo vt vrina ex toto supprimatur.

*Prognosticum.*

Malum plerumque satis periculosum & diuturnum est.

*Curatio.*

Curatio autem carnem absumentibus & vlcus consolidantibus perficitur, de qua re pluribus agit Amatus Lusitanus, *centur. 4. curat. 19.* refertque Lacunam Romæ edidisse libellū, in quo diuinas penè laudes huic extirpandæ carunculae inuento tribuit, & Autorem eius Philippum quendam facit. Amatus verò hunc id à se accepisse scribit.

Vniuersalia nimirum præmittenda, & corpus euacuandum, atque radicis Chinæ & sarsæ parillæ decoctum exhibendum. Hinc ad topica veniendum. Collyrium autem Philippi illius, cuius mentionem facit Amatus, hoc est:

℞. *Centaur. minor. apij, cauda equinae* an. M. β. *hordei confusi* ℥. j.

Coq. in aq. ℔. ii. ad consumptionem partis dimidiæ.

Decocto colato adde mellis rosati, vel mellis centaurij ℥. ij. & per siphonem iniicito.

Vbi hoc medicamento sex vel octo dierum spatio absumpta caruncula fuerit, sequentibus sex diebus tantū candela sicca immittenda, tandemque vlcus cicatrice claudendum, quod ille Philippus hoc medicamento præstare tentauit.

℞. *Aq. plantag. rosar. an. ℥. iv. feri lactis caprin. ℥. ij. ceruss. ℥. vj.* (forlan ℥. vj.) *aloes, myrrha, marmoris candidissimi, spodij, crysalli* an. ℥. j. β. *camphor. 3. β.*

Arida terantur subtilissimè, cribròque excussa humidis misceantur.

Verum periculosum hoc medicamentum putat esse Amatus, vt quod ex lapidum pulvere fiat, qui in vesicâ immissi difficulter egrediantur, imò grauia symptomata pariant, ut ipse experientia obseruauit, & Mercatorem quendam ex vſu huius medicamenti mortuum esse refert, & propterea monet, ne quid calculosi, arenosi aut lapidosi in fistulam vrinariam immittatur.

Amatus his medicamenti vſus est in viro Nobili:

Emplastrum, quod huius Lernæi & Herculei morbi clauam nominat, quod hymnis multis & laudibus variis decantari mereatur; nec solum huic morbo prædesse scribit, sed varios alios arcere & explodere, polypos videlicet vnicè curare; & extuberantes carnes in aurium meatibus & aliis locis repertas vnicè extirpare & resecare.

℞. *Virid. aris, auripigment. vitriol. alumin. rocha* an. Vnc. ij.

Omnia hæc aceto acerrimo perfusa inter duos porphyrites lapides quàm acuratissimè ducantur, in leuorèque tenuissimum reddantur, & Soli æstuali exponantur: hæc rursus sic exsiccata aceto affuso ducenda sunt & læuiganda, Solique exponenda, quousque puluis subtilissimus euadat, & à medicamentis iis omnis prorsus acrimonia extincta sit, quod opus octo dierum spatio conficies.

Hoc confecto & parato puluere

℞. *Ol. rosacei ℥. i. v. litharg. ℥. ij.*

Ad ignem fiat coctura, quousque emplastri modo corpulenti acquirat consistentiam: tunc ab igne deposito adde prædicti pulueris Vnc. ii. & rudicula vel spatula misce, & ad ignem omnia tractato, quousque medicamentum duriusculum euadat, ita vt si candelæ cereæ, vel plumbeæ virgulæ hæreat, non diffuat, etiam si digitis tractetur. Præter emplastrum hoc cereas candelas numero viginti quoque in promptu habuit, quæ ex alba cera, pauculâ resinâ terebinthinâ adiectâ, paratæ fuerunt, longitudinis duodecim digitorum transversorum, crassitudinis verò prout motus vrinarius ferre videbatur: nec minus ex plūbo tres vel quatuor virgulas habuit, eiusdem longitudinis & crassitudinis, quæ vſurpari possunt candelarum loco, quando carunculae refractariæ sunt. Candelam nimirum ceream vnâ emplastro inunctam in vrinarium meatum immisit, per sex vel octo dies singulis diebus candela innouata & meendi tempore extracta, donec ex candelæ penetratione, caruncularum & humoris putridi excretionem, atque vrinæ libera emissionem carunculas extirpatas esse, deprehendit. Carunculis absumptis per octo dies nihil, nisi candelam crassiusculam siccam absque vllius rei inunctione immisit. Quo tempore elapso ad abstergendum per siphonem immisit sequens medicamentum.

℞. *Hord. non excort. P. ii. rad. aristoloch. rot. ℥. j. β. plantag. P. ii.*

Coq. in aq. ad dimidias.

Colaturæ adde mellis ros. colat. ℥. ii. M.

Quod medicamentum bis terve de die sex continuis diebus per siphonem iniiciatur. Quod si fortioribus opus fuerit, Lanfranci aqua viridi sequenti vſus est.

℞. *Alum. roch. virid. aris* an. ℥. β. *auripigm. ℥. j.*

Coq. in ℔. ii. aq. fontane vel plantag. ad ℔. β. absumptionem & colentur, Colatura camphorâ alterata per siphonem in meatum vrinarium iniiciatur.

Tandem hoc cicatricem inducente medicamento vſus est.

℞. *Cerussa ℥. i. alum. roch. litharg. an. ℥. ii.*

Coq. in aq. caud. equin. ad dimidias, & colentur.

Atque hoc modo intra mensis spatium æger iste perfectè sanatus est.

Curatorem etiam carunculae talis feliciter petactam habet Forestus, lib. 25. obs. 10. eamque prolixè & accuratè describit, quæ cum à Lectore ibi videri possit, operæ pretium esse non puto, eam hîc transcribere.

*Vlcera meatus vrinarij.*

Aliquando etiam exulceratur meatus vrinarius: vlcera meatus vrinarij. cum vlcera ista non solum meatum vrinarium, sed & alias penis partes plerumque occupare solcant, vna opera de iis postea inter morbos partium genitalium in vris agemus.

\*\*\*



# LIBRI TERTII PARS VIII.

## SECTIO SECUNDA.

### De Symptomatibus Vesicæ.

#### CAPVT I.

##### De Doloze Vesicæ, & stupore ac resolutione Sphincteris vesicæ.

Vesicæ sym-  
ptomata.

Cur de dolo-  
ze stupore ac  
resolutione  
primò hic  
agatur?

**A** TQVE hi sunt morbi vesicæ. Symptomata quod attinet, & primò actiones læsas, actio equidem vesicæ propria est, vrinam à renibus acceptam aliquādiu continere, & postea per vrinarium meatum emittere; Sensus verò tactus ipsi cum aliis partibus cōmunis est, & stupor ac paralytis vesicæ cum aliis partibus cōmune symptoma, & proinde de illa actione læsa prius agēdū videbatur: quia tamen dolor, stupor & paralytis inter causas illius actionis læsæ numeratur, de his prius agere liber. Deinde dicemus de vrinæ suppressione, vrinæ imminutione, stranguria, difficultate mictionis & ardore vrinæ, vrinæ præter voluntatē effluio & incontinentia, profluvio nimio & diabete, vrina rubra, cruenta, nigra, purulenta, sabulosa, de rebus alienis cum vrina excretis, de vrinæ per alium & alia loca inconuenienti excretionē.

Vesicæ dolor.

Et primò quidem dolorem vesicæ quod attinet, occupat is vel totam vesicam, vel eius collum & meatum vrinarium. Tota vesica dolet, cum nimium distenditur, ob vrinam in ea præter naturam retentam & cumulatam, de cuius causis postea dicetur. Doler etiam vesica cum inflammatur, vulneratur, exulceratur, de quibus affectibus supra inter morbos vesicæ dictum.

Causa.

Cervicis autem & meatus vrinarij dolor à causis plurimis ortum habet, à calculo nimirum in orificio vesicæ vel in meatu vrinario hærente, ab vlcere, ab vrina acri, de quibus postea de mictione cum dolore, & ardore vrinæ dicetur. Ideoque hic de doloris vesicæ causis, signis & curatione plura asserre opus non est. Petantur ea à locis allegatis.

Sphincteris  
vesicæ stupor.

Cum verò vesicæ musculus, qui Sphincter appellatur, præpositus sit, ne vrina continuò effluat, sed pro arbitrio hominis retineatur, & excernatur, solet hæc eius actio interdum lædi, & sphincter interdum stupore & paralyti affici, ut stimulus illum non sentiat, & vrinam non rectè contineat, sed profluere sinat. Id quod accidit, nervis, qui partim à sexta coniugatione, partim ab illis transmittuntur, qui postremi à spinali medulla ossis originem trahunt, affectis, iisque vel refrigeratis, vel obstructis aut compressis, ut alias de causis stuporis & paralytis diximus.

Curatur etiam, ut aliarum partium stupor & paralytis, fomentis, oleis, vnguentis, emplastris contra paralytin vtitatis, regioni vesicæ admotis.

#### CAPVT II.

##### De Vrina suppressione seu Ischuria, & vrina imminutione seu Dysuria.

**V**RINÆ emissio seu mictio multis modis vitatur. Vel enim planè suppressitur, quod fit in ischuria; vel parcius, quàm par est, redditur, quod fit in Dysuria, quæ mictionis ablatæ aut imminutæ sunt symptomata vel etiam deprauatur, de quo postea.

Et primò vrinæ suppressionem, quæ Græcis *ischuria*, *Vrina sup-  
pressio.* quod attinet, duplici de causa vrina non redditur, vel quia nulla est in vesica, vel licet adsit, reddi non potest, qui affectus proprie *ischuria* appellatur, alter verò improprie. Sunt enim, ut vrinæ excretio rectè fiat, quatuor necessaria, primò ut vrina adsit, quæ naturam ad excretionem stimulet; secundo ut stimulus iste à facultate sentiente, quam obtinet per sextæ coniugationis & alios spinalis medullæ inferioris nervos, percipiatur; tertio ut facultas irritata ad expellendum insurgat, ad quam rem etiam musculi abdominis concurrunt Tandem ut musculus cervicis vesicæ aperiat, & orificium vesicæ pateat.

Duplex.

Ad vrinæ  
excretionem  
quatuor sūt  
necessaria.

Primò ergo si nulla adsit in vesicâ vrina, etiam nulla fit eius excretio, cuius rei exēpla aliquot collegit Marcellus Donatus, de *histor. med. mirab. lib. 3. cap. 28.* Fit autem hoc, cum vrina nulla à renibus & vteribus ad vesicam pervenit. Id verò multis de causis accidit, nimirum vel venarum & arteriarum emulgentium, vel renum, vel vterum vitio. Venarum emulgentium, vitio hoc accidit, cum obstruuntur à pituita crassa, vel cum ipsorum facultas attractrix labefactata est: Renum vitio, cum obstruuntur, in primis à calculo: vterum, cum obstruuntur vel à calculo, vel pituita viscida, vel grumo sanguinis, vel pure. De causis verò harum affectionum supra de renum & vterum morbis dictum, ideoque restat, ut saltem de ea vrinæ suppressione agamus, cum vrina in vesica præsentē, eius suppressionis causa in vesica consistit.

Causa.

Suppressitur autem vrina vel læsa facultate, vel impedita eā propter morbos vesicæ. Læditur facultas vel sentiens, vel expultrix. Sentiens læditur, dum vesica stimulus vrinæ non percipit; quod fit, dum nervi, à quibus vesica sensum habet, afficiuntur: id quod accidit lapsu, ictu, vertebrarum eò loci luxatione, ut Galenus, 1. de *loc. affect. cap. 1.* docet, vulneribus spinalis medullæ, tumoribus, qui nervos ea parte afficiunt Expultrix læditur, quando vel fibræ transversæ vesicæ expulsionem dicatæ læduntur, quod fit, aut ob intemperiem frigidam & humidam, aut dum nimium extenduntur, ut suum tonum & robur amittant, ut postea amplius contrahi non possint, id quod accidit, cum urgentibus negotiis, ut in concionibus, vel senatu, vel convivio vrina nimis diu retinetur & cumulatur, atque inde vesica nimis distenditur, vel dum musculi abdominis, qui vesicæ in expellenda vrina subsidio veniunt, quocunque modo afficiuntur, ut rectè contrahi non possint. Impeditur autem expultrix ob morbos vesicæ & meatus vrinarij, de quibus supra dictum, cum scilicet vesica vel inflammatur, aut orificium eius comprimitur, vel obstruitur à calculo, grumo sanguinis, pituita, pure, vel constipatur; aut dum meatus vrinarius iisdem de causis non patet. Galenus equidem, 1. de *loc. affect. cap. 1. & 3. de sympt. caus. cap. 2.* saltem constipationis & obstructionis cervicis vesicæ ac meatus vrinarij mentionem facit, dum si corpus ipsius cervicis vesicæ in tantum tumorem attollitur, ut meatus inde occupetur, aut aliquid præter naturam, ut caruncula vel callus nascitur, aut re quapiam, ut calculo, grumo sanguinis, pituita, pure obstruitur. Datur tamen adhuc una causa, compressio, dam scilicet tumor extra vesicæ cervicem subsistens eam comprimit, id quod fit, dum aut vterus, aut intestina, aut aliæ vicinæ partes præter naturam intumescunt, vel dum vesicæ è suo loco prolapsa cervix contorquetur & comprimitur. Nonnulli & subsidentiam addunt, dum scilicet cervicis vesicæ musculus quasi conniveat, ex immodica siccitate & inanitione in febribus ardentibus. Verum vix credibile est, in corpore vivente tantam, & præcipuè loco isto humi

Causa.

humiditate perpetua scatente, siccitatem induci posse. Potius, si quid tale in febribus ardentibus accadat, ad facultatem expultricem læsam & imbecillam referendum est. Pertinent huc & vulnera ac fistulæ vesicæ & meatus vrinarij, dum nimirum vrina, quæ per meatum vrinarium egredi debebat, per viam alibi patefactam effluit.

### Signa Diagnostica.

Ipsum Symptoma per se patet: distinguendum vero primò, an vrina supprimatur vitio renum & vterum, & ita non excernatur, quia nulla in vesica adsit; vel vitio vesicæ, dum scilicet vrina, etsi in vesica præsens est, non excernitur. Etenim si vitio renum & vterum hoc accadat, & nulla in vesica vrina adsit, nulla grauitas, nulla tensio, nullus dolor circa pubem percipitur, adsuntque potius renum vel vterum affectionum signa supra proposita. Contra si causa in vesicâ hæreat, atque ea vrina repleta sit, quam excernere possit, tumor & tensio circa vesicam percipitur, ægerque conqueritur, quod etiam si vrinæ reddendæ desiderio teneatur, tamen id præstare non possit, & Medicus etiam, si regionem vesicæ contrectet, & comprimat, tumidam & repletam eam deprehendet, quorum nihil percipitur, si vesica vacua sit.

Quænam autem causa suppressionis sit, porro sic discernitur. Si vesicæ sensus desit, nullus sensus vrinæ aut dolor percipitur, etsi vesica plena & tumida sit, ac vrinæ copia valde distendatur. Si fibræ vesicæ refrigeratæ & humectatæ sint, cognoscitur id ex causis refrigerantibus & humectantibus, quæ præcesserunt, & adsunt signa paralysis vel totius corporis, vel spinalis medullæ, vel aliæ stuporem nervis inducentes causæ. Si eadem fibræ nimis extensæ sint, vrina præter voluntatem ob pudorem vel aliam causam nimis diu retenta fuit. Si vitium sit in musculis abdominis, æger ventrem inferiorem contrahere & comprimere non potest. Morbi verò vesicæ & meatus vrinarij ex signis supra de harum partium morbis propositis cognoscuntur. Præterea ubi meatus vrinarius saluus est & patet, vitiumque solum est in vesica, si vesica manu comprimatur, homoque ita collocetur, ut decliuus sit vesicæ positus, vrina redditur, & catheter sine difficultate immittitur. Si verò vitium sit in meatu vrinario, vesicæ compressione vrina non redditur, & catheter non sine difficultate immittitur, & Chirurgus in immisione aliquam resistantiam sentit. Quæ autem meatus angustia causa sit, Galenus ita discernere docet, 1. de loc. affect. cap. 1. Nulla calculi inquit, notâ præcedente vrinam retentam, si sanguis effluerit, par est, ut grumus fistulam vrina obstruat. At fieri potest, ubi ulcerata est vesica, ut paulatim ut ipsa grumus concreasca, vel non præcedente sanguinis fluore. Accidit etiam, ut sanguis ex renibus per vterum in vesicam defluens, grumum efficiat. Atque in huiusmodi conjecturis magnus est anea fistula usus: haud secus, ac cum vel pus, vel crassum lentumque humorem meatum obstruxisse suspicamur. In huiusmodi vero conjecturam ex præcedentium notitia hoc pacto inducemur. Etenim, siue vesica, siue renes antea affectu aliquo laborauerint, per quem tale, tantumque pus colligi potuerit, ut par sit, ab ipso obstructum fuisse meatum: probabiliter coniciet hanc ob causam vrinam supprimi: aut si etiam in parte aliqua renibus superiore fuerit abscessus, quo eruptio haud absurde pus in renes transsumptum esse putaueris. Quod si nihil huiusmodi præcesserit, vitæ rationem inquirere oportet, an in otio educatus, vel multis cibis crassos viscososque humores generare potentibus fuerit usus. Sic etiam, ubi ob carunculam aliquam ab ulcere innatam vesica cernicem obstructam esse putamus, & ex præcedentibus ulceris notis, & ex eo, quod demissa anea fistula vrina vacuat, intelligere possumus.

Dan. Sennerti Tom. I I.

### Prognostica.

I. Vrinæ suppressio satis periculosum malum est. Neque potest homo cum vrina diu suppressa vivere. Et quidem si non descendit per renes ad vesicam vrina, jecur opprimit, sanguinem inficit & inquinat, ac in totum corpus regurgitat, habitumque corporis aqua, ut in anasarca fieri solet, replet, suffocationis periculum inducit, nonnunquam & cerebro in consensum tracto torporem inducit. Interdum quoque sanguis corrumpitur, & humores putrescunt, unde febres accenduntur, & nisi ante septimum diem mingant, pereunt. Etsi enim postea vrina profluat, tamen ob febrē moriuntur. Eodem etiam modo si vesicæ vitio vrina supprimatur, magnus dolor in vesica excitatur & vrinā ad superiora regurgitante varia mala inducuntur. Nonnunquam vrina ad superiora regurgitans per vmbilicum excernitur. Refert etiam Eustachius Rudius, lib. 2. cap. 53. Monachum quendam ordinis Eremitarum, cui post ischuriam vesica rupta fuit, non multis diebus post per inguina vrinam emisisse, & deinde per femora, nates, vicinaque loca, & ita miseram vitam multis annis protraxisse.

II. Qualis tamen sit futurus mali euentus, è causis quæ id induxerunt, æstimandum. Prout enim causæ vrinæ suppressionis facile vel difficulter amoueri possunt: ita etiam de morbo salutari vel lethali præsagendum. Qui autem cuiuslibet morbi, qui suppressionis vrinæ causa est, sit futurus exitus, è superioribus patet.

III. Grauiissima nimirum & periculosissima est renum & vterum, & quidem vtriusque, quod tamen rarum, obstructio, quam grandiores calculi, pariunt. Paucis enim diebus in hoc modo affectis vrina in totum corpus regurgitat, idque inquinat.

IV. Periculosa etiam est vrinæ suppressio, quæ ob vertebrarum luxationem, aut ictum, aut lapsum, aut vulnus spinalis medullæ accidit; cum plerumque alia graui symptomata conjuncta habeat, & eiusmodi morbos curare sit difficile. Et omnino periculosa est ischuria, quæ à paralysis & affectione neruorum, qui vesicæ inferuntur, provenit.

V. Ischuria à grumoso sanguine proueniens periculosa est. Nam putrescentem sanguinem graui symptomata sequi solent.

VI. Pessima est vrinæ suppressio, quæ à caloris natui extinctione in acutis morbis accidit.

### Indicationes & Curatio.

Curandi ratio dirigenda vel ad causas suppressionis vrinæ, vel ad ipsam vrinæ suppressionem. Quod causarum amotionem attinet, patet ea ex iis, quæ antea de morbis renum, vterum, & vesicæ dicta sunt. Hoc saltem addimus, si à vesicæ imbecillitate & stupore sit vrinæ suppressio, calor eius fouendus & sensus excitandus. Quapropter & glandes aciores & clysteres ano iniiciendi, qui ob vicinitatem & membranarum communionem, quam habet intestinum rectum cum vesica, sensum vesicæ stupidum ad protrudendam vrinam excitat.

Ipsam verò vrinæ suppressionem quod attinet, etsi causa statim tolli non possit, tamen danda opera, ut vrina prouocetur. Nonnunquam tamen vnâ operâ simul causa tollitur, si non planè ex vesica, à meatu tamen vrinario amouetur. Itaque manu vesicam musculoque abdominis comprimere oportet, atque interea anhelitum suppressere, ut etiam diaphragmatis ope vesica comprimatur, & vrina, quæ subsistit, exprimatur. Quo modo nisi vrina exeat, ad catheterem tanquā sacram anchoram confugiendum, qui in meatum vrinarium immittendus, quo & ea, quæ orificium vesicæ obstruunt, remoueantur & vrina extrahatur. Dum tamen vrina propter inflammationem

supprimatur, omnino vitandus catheter, ne dolore excitato inflammatio augeatur. Imò præstat prius candelam ceream oleo amygdalarum dulcium illitam immittere. Insuper vtile fuerit, candelam ceream tenuissimam melle rosaceo illitam in meatum urinariam immittere, aut per syringam liquorem aliquem conuenientem, oxymelite scillitico dilutum, vel aquam mulsam, in qua pulegium, calamintha, ruta, castoreum cocta sint, infundere. Extra verò vesicæ regio fouenda decocto earundem plantarum, & abrotani, anethi, chamameli, vel etiam dimidiæ horæ spatio æger in balneo ex decocto harum plantarum parato umbilicotenus desideat. Post foram pecten; pubes & perinæum inungenda oleo scorpionum, irino, costino, nardino, rutaceo. In tali etiam vrinæ suppressione non multum bibendum, & vitanda omnia, quæ vrinam mouent, ne copia eius augeatur, & vesica nimium distendatur. Vbi à nimia vesicæ extensione vrinæ suppressio orta est, pubes & perinæum fouenda decocto parietaria, anethi, florum chamameli, meliloti, sem. lini, fanigraci.

Vel ℞. Vnguenti dialth. ol. scorpion, amygd. amarar. an. ʒ. j. terebinth. buriyri recens an. ʒ. ʒ. croci ʒ. j.

Misce.

F. Linimentum.

### CAPVT III.

#### De Diminuta Vrinæ excretionē.

Diminuta  
vrina excre-  
tio.

**V**rinæ excretio diminuta fit duobus modis, vel cū paucior, quam par est, & in minori quantitate vrinæ excernitur, vel quia per longiora, quàm fieri solet, interualla emittitur. De priore prius.

#### Causa.

Causa.

Equidem vrina, quàm pro ratione potus paucior, interdum redditur, vbi natura per crisin humores serofos ad ambitum corporis mittit, & sudore excitato per cutem euacuat, vel etiam dum aluus est liquidior & serofus & aquei humoris aliquid per aluum simul euacuat. Verum ista vrinæ paucitas adhuc symptomatum genus, de quo hoc capite agimus, non referendum, cum post breue temporis spatium homo ad consuetum vrinæ modum redire soleat. Sed de ea solum vrinæ imminutione agemus, quæ renum vel vesicæ vitio accidit. Causæ autem vrinæ imminutæ sunt eadem, quæ modo capite præcedente de vrinæ suppressione sunt propositæ, saltem minus validæ & imbecilliores; quæ etiam iisdem signis innotescunt.

#### Prognostica.

Prognostica.

I. Vrinæ difficultas minus periculosum malum est, quàm integra eius suppressio. Cum enim pars aliqua vrinæ reddatur, non tam grapia inducit symptomata. Causæ quoque quia non sunt potentes, facilius tolluntur.

II. Vrinæ difficultas quæ sine dolore, vel cum minori dolore est, minus est periculosa, quàm quæ cum dolore, aut magno dolore coniuncta est.

III. Vrinæ difficultas in febribus ardentibus & malignis superueniens mala est; quia non solum vesicam, sed totum nervosum genus affici, indicio est.

#### Curatio.

Curatio.

Tollitur hoc malum causis, à quibus pendent, sublati: quæ quomodo tolli debeant, è cap. præcedente patet. Ad symptoma tamen mitigandum fomentis,

cataplasmatibus, vnguentisque laxantibus vtendum ex mentha, chamæmelo, malua, parietaria, violis, semine fanigraci.

#### Tarditas Vrina.

**Q**uod vrina tardius redditur, causa est. vel quia in minori copia in vesica colligitur, vel quia vesicæ sensus hebes & obtusus est, vt nisi ab vrina vel acri vel copiosa, ad quam colligendam, longius tempus requiritur, irriteretur, stimulum non sentiat.

Tarditas  
Vrina.

Malum ipsum per se patet, quia homo longiore, quàm alias fieri solet in homine sano, temporis spatium vrinam non reddit. Causæ verò ex iis, quæ cap. præcedente dicta sunt, manifestæ sunt.

Qualem etiam euentum malum sit habiturum, ex iisdem patet, & non ita difficulter curatur; modò non in perfectam vrinæ suppressionem transeat.

Curatur verò causis, à quibus pender, sublati; quod quomodo fieri debeat, etiam è capite præcedenti innotescit. Si vrinæ minor copia ad vesicam mittatur, per medicamenta diuretica miriora ad vesicam concitanda. Si sensus hebes sit, expultrix stimulanda, & causa sensus stupidi tollenda, vt antea dictum.

### CAPVT IV.

#### De Stranguria.

**P**ræter hætenus enumerata circa vrinæ emissionem symptomata, mictionem scilicet ablaram & imminutam, alia adhuc contingunt symptomata, quæ ad actionem deprauatam commodè referuntur, suntque ea varia, & deprauatur vrinæ excretio vel ratione modi excretionis, vel quantitatis, vel substantiæ, vel loci, de quibus ordine agendum, & ita de stranguria, ardore vrinæ, & cum dolore eius excretionē, de inuoluntaria vrinæ excretionē, de vrinæ rubra, cruenta, nigra, & rebus alienis cum vrinæ excretionē, de vrinæ per aliena loca excretionē dicendum.

Stranguria.

Et primò Stranguria, à ἡν ἡν ἡν, hoc est gutta dicta, seu vrinæ stillicidium est talis vrinæ reddendæ deprauatio, cum vrina guttatim saltem redditur, & nihilominus continua ad mingendum est stimulatio cum dolore.

#### Causa.

Causa proxima stranguriæ est vrinæ acrimonia, quæ naturam quidem continuè ad excretionem stimulat, quia tamen natura dolorem percipiens in excernendo subsistit, vrina guttatim & stillatim redditur. Est autem vrina acris vel per se, quæ etiam vesicam optimè & naturaliter constitutam vellicare potest, vel per accidens. Non tamen quæuis acrimonia cum per se vrina talis est, id præstat, sed peculiaris quædam, cum scilicet vrina cruda & nondum cocta ad vesicam peruenerit. Habetque stranguria quandam similitudinem cum lienteria. Nam sicut ibi alimenta nondum probè cocta per aluum statim deiciuntur: ita etiam potulenta materia nondum satis alterata citius, quam par est, ad vesicam detruditur. Hinc sæpe illi, qui post balneum porum frigidum bibunt, stranguriâ corripuntur. Alia tamen etiam vrinæ admixta eam acriorem reddere possunt. Deinde vrina per se quidem non est acrior, quam par est: respectu tamen vesicæ est talis, cum scilicet ea præter naturam in affecta est, vt ab vrina faciliè irritari possit. Accidit autem hoc, cum vesica excoriata vel exulcerata est. Tum enim à miri etiam vrina (quæ tamen omnis ob falsi humoris admixtionem aliquam acrimoniam habet) irritari potest. A sola verò vesicæ imbecillitate



imbecillitate stranguriam excitari posse, vix crediderim, ut postea in questione dicitur. Estque stranguria tenelmo similis, & sicut magnus & continuus in tenelmo excernendi conatus est, parum tamen per alium excernitur: ita in stranguria facultas expultrix vesicæ ad crebram mictionem stimulat, non tamen multa vrina, sed guttatim excernitur; & procul dubio ut in tenelmo sphincter ani afficitur, ita etiam in stranguria sphincterem vesicæ affici necesse est à re aliqua molesta eam stimulante, & sicut tenelmo accidit, dum causa stimulans pertinaciter sphincteri ani adheret, quæ vel est humor pertinaciter intestini recti extremitati adherens, vel vicinæ alicuius partis affectus, sphincterem ani continuo vellicans; ita procul dubio etiam stranguriæ proxima causa est, vel humor fixæ & pertinaciter sphincteri vesicæ adherens, eamque vellicans, vel etiam calculus aut partium vicinarum affectus, & tumores, qui vesicæ orificium in consensum trahere, & vellicare possunt, de quo Hippocrates, 5. aphor. 58. Ad recti intestini & vteri inflammationem, purulentosque renes vrinæ stillicidium provenit. Quod de vtero idem Hippocrates etiam habet, 1. de morb. muliebr. & de natur. mulier. inquit, In procidentia vteri τὸ ἔργον εἶναι, καὶ ὁ λίσσος, καὶ δὲ δυνάμει. Ideoque non quivis humor acris stranguriam parit, sed talis, qui lentorem quandam habet, ob quem pertinaciter vesicæ orificio adheret. Deinde calculus eodem modo circa orificium vesicæ stimulat. Tertio partium vicinarum affectus, ut & intestini recti vterique inflammationes. Humores autem hi plerumque aliunde ad vesicam transmittuntur: sicut & pus à renibus ad vesicam transmissum eam stimulare potest. Hinc frequens stranguriæ apud nos causa est cereuisia cruda & non defecata hausta, quæ cum commode coqui non possit, & præterea vim humores fermentandi aliumque laxandi habeat, si ad renes citò deferatur, cruda ita ad vesicam fertur, atque eam stimulat, & præcipue hoc iis accidit, qui vinum saltem bibere assueti sunt. Idem accidit humoribus acris & salsis è venis ad renes transmissis, quos & ventriculus & cerebrum ac totum corpus suppeditare potest. Ita refert Dodonæus, obseru. 48. quendam senem octuagenarium, cum vinum Rhenanum etiam in exigua quantitate biberet, statim stranguriam passum fuisse, ab aliis verò vinis, ut Gallico & Hispanico non fuisse læsum. Cui profuit ex ouorum testis in cinerè redactis, & vino Rhenano permixtis, lixiuium. Istud enim vinum, cum sit tenuium partium, citissime ad vesicam descendit & faciliè crudos viscidósque humores secum ducit, quales in viis vrinariis hærentes stillicidij vrinæ causæ esse potuerunt; quibus deinde per lixiuium incisis, & expurgatis liberior factus est vrinæ transitus.

Qua ratione autem intemperies frigida stranguriam pariat, nondum explicatum. Existimo autem ab ea non proximè, sed mediare, & quatenus ad vrinam talem generandam facit, stranguriam parere. Etenim cum vesica etiam vim habeat vrinam, quam continet; in suo statu naturali conservandi, si præter naturam frigidior reddatur, vrina in ea quasi corrumpitur, atque ita hanc qualitatē, qua orificium vesicæ stimulare possit, induit.

#### Signa diagnostica.

Malum ipsum per se faciliè cognoscitur. Conqueruntur enim ægri, se continuo ferè ad mingendum irritari, & parum mingere, doloremque assiduo molestum esse, etiam si non mingant.

Quæ autem causa stillicidij vrinæ sit, signis discernendum. Quærendum nimirum, an causa sit in vrina, an in vesica. In vrina causam hære, cognoscitur ex eo, quod nulla signa adsunt, quæ vesicam vel per se affici, vel à vicina aliqua parte in consensum trahi indicant: Contra adsunt signa humorum acrium, præces-

seruntque vsus alimentorum vel medicamentorum acrium, saliorum. Inprimis si hausta sit cereuisia recens & non defecata: Si adsit viscerum intemperies calida, ob quam acres & salii humores generantur, aut febris putrida, vel hepatis aut renum abcessus, ac vrinæ etiam humorum talium acrium, vel puris speciem præ se ferunt: & ægri ex iis, quæ lenia & dulcia sunt, acresque humores temperant, alleviationem percipiunt, contra à calidis & acris offenduntur. Si vesicæ vitio stranguria fiat, cognoscitur id è signis vesicæ affectæ, quod scilicet vel calculus vel excoriatio, vel vlcus adsit. Si ob frigidam intemperiem accidat stranguria, vrina ferè cruda & alba mingitur. Si verò partis alicuius vicinæ consensu vesica afficiatur, ejus affectæ signa adsunt.

#### Prognostica.

1. Malum equidem hoc per se periculosum non est: molestiam tamen, & sæpe diuturnam, & quæ ægros, præcipue senes, ad mortem vsque comitatur, excitat.

2. Si humor acris, qui stranguriam parit, diu in vesica retineatur, aut sæpe per eam transeat, eam interdum exulcerat.

3. Stranguria, quæ est ab vrinæ vitio, facilius curatur, quàm quæ est à vesicæ morbo, præcipue in senibus.

4. Quod à partium vicinarum consensu oritur vrinæ stillicidium, non diu durare solet. Si tamen sit ab vlcere partis alicuius vicinæ, raro curari solet.

5. Quibus ex stranguria ileos superuenit, hi septem diebus moriuntur, nisi febre superueniente vrina satis fluxerit. 6. aph. 44. Qui aphorismus etiam in Coacis extat. Non autem intelligendus est ileus, qui est ab inflammatione. Febris enim talem ileum, qui antè est cum febre, non soluit, sed exasperat: led perileum (quem etiam, 2. epid. sect. 6. λειμώδης, mollem appellat, & in eo vinum frigidum meracum multum exhibere jubet) intelligit hic obstructionem intestini tenuis à crudis & crassis humoribus provenientem. Si enim stranguria non sit à phlegmone & vlcere vesicæ, sed crasso & viscido humore, collo vesicæ adherente, si pars ejus humoris ad intestina tenuia etiam effundatur, & ea vel obstruendo, vel flatu pariendo, excrementis transitum prohibeat, si superueniens febris humores attenuet, ut per meatum vrinarium liberè & copiosè effluere possint, soluitur & stranguria & ileos ille.

#### Curatio.

Curatio pro causarum ratione instituenda. Itaque si ab vrina mordaci & humoribus acris sit stranguria, vniuersales purgationes lenes instituendæ, *syrupo ros. solut. manna, habarb. elect. diaprunis, diasebesten, lemnino simplici, diacatholico*. Inprimis verò utilis est hîc *cassia*; ut & Galenus, 5. de tuend. sanit. cap. 9. testatur, *terebinthina*, quæ non solum aluum soluit, atque acres humores à viis vrinariis auertit, verum etiam renes & vesicam abstergit.

Deinde humores acres temperandi sunt *syrupo rosarum, violarum, de nymphæa, de papauere, de endivia, de jujubis, de glycyrrhiza, cum decocto hordei, jujubarum, passularum, glycyrrhizæ, vel aquis endivia, lactuca, violarum, nymphæa, aut sero lactis, cum emulsione sem. 4. frig. majorum*.

Vel 2℥. Rad. malvæ, glycyrrh. rasæ an. Vnc. sem. sem. 4. frig. major. an. Drach. iii. papau. albi Drach. ii.

Coq. in f. q. aq. hord.

Colaturæ adde syr. violar. de glycyrrhiza, jujubini an. Vnc. sem. trochisc. alkekengi sine opio 3. j.

Misce.

Forestus, lib. 25. obseru. 3. refert, quendam pharmacopæum, cum aliquando stranguriam pateretur, ex largiori potu vini, sumpsisse aquam rotaceam cum albumine oui conuassato mistam, & ad medium scutellæ

ebibisse, quo seipsum, tum alios curauit: Senem verò quendam stranguria laborantem flores chamæmeli in lacte bubulo coxisse, & decocto feliciter vsum esse. Ipse Forestus, cum stranguria tribus integris septimanis laborasset, vt *ibidem obseru.* 4. refert, & frustra multa, cum à se; tum ab aliis præscripta medicamenta vsurpasset, tandem solo decocto folior. maluæ cum syrupo violar. vsus est, eoque à stranguria liberatus, quo modo & postea alios curauit. Præterea etiam habenda est ratio viscerum, ob quorum intemperiem humores acres generantur, puta ventriculi, hepatis, renum. Ideoque si ea sit calidior & siccior, corrigenda modo supra proposito.

Vtiles hinc sunt & acidulæ, quæ non solum humores acres per aluum, vrinam, & sudores educunt, sed & intemperiem viscerum temperant.

Extra verò ad temperandum humorum acrimoniam & viscerum calorem multum prodest balneum aquæ dulcis manente prandium vsurpatum, & infusus in decocto violarum, nymphææ, lactucæ, maluæ, solani, ac linimenta & vnguenta supra *de intemperie* renum calida & sicca proposita, renum, pubis & perinæi regioni illita.

Licet & per siphonem emulsionem quatuor seminum frigidorum maiorum, vel decoctum seminis maluæ cum aqua violarum, nymphææ aut simili, acrimoniam humorum temperante in vesicam iniicere.

Eadem ferè curandi ratio est, si pituita salsa vrinæ admisceatur, eamque acriorem reddat. Pituita enim eiusmodi sæpius per purgantia, sed initia euacuanda, ad quam rem inprimis utilis est terebinthina. Temperat etiam acrimoniam humoris serum lactis caprinum cum syrupo rosarum & violarum propinatum.

Danda simul opera, vt si ab vrinæ acrimonia stranguria ortum habeat, æger subinde mingat, ne si diutius vrina in vesica contineatur, eam exulceret, in quem finem aqua dulcis calida butyro recenti parum salso condita exhiberi potest.

Si pus ab hepate vel rehibus, vel aliunde ad vesicam transmissum stranguriæ causa sit, detergentia medicamenta vsurganda, vt serum lactis cum saccharo rosarum & alia, quæ ad vlcera illarum partium supra sunt proposita.

Si à cereuisia recenti & non satis defecata sit stranguria, nonnulli solum seuum candelæ vmbilico inungunt. Commoda est & nux moschata sumpta. Alij cochlear oxymelitis exhibent. Alij decoctum foliorum ribes nigræ. Utilis est & potus vini Hispanici vel maluatij.

Si verò non vrinæ causa, sed ob vesicæ morbos accidat stranguria, curatio ad eos morbos dirigenda, & vlcus modo supra proposita curandum, lapis remouendus, aliæque vesicæ vitia conuenienti modo corrigenda.

Si à vesicæ refrigeratione ortum habet stranguria, calefacientia adhibenda, diagalanga, theriaca, Mithridatium, aurea Alexandrina. Extra verò pecten inungendus oleo rutaceo, vel emplastrum ex mastiche, thure, caryophyllis, cinamomo, ruta, absinthio, mentha, ac styrace calamita imponendum.

Si per consensum vicinarum partium excitetur stranguria, illarum partium morbi conueniente modo curandi, & inprimis hic sunt utilia fomenta, infusus, & alia topica, quæ simul dolorem mitigant.

#### *Diata.*

Inprimis verò in stranguria curanda multum valet diætæ ratio. Et quidem si ab vrinæ acrimonia fiat stranguria, plus ferè potest in ea mitiganda diætæ, quàm medicamenta, si nimirum exhibeantur alimenta, quæ nullo modo ad generationem acrium & salforum humorum faciunt, sed eos potius temperant, ac mitigant. Utilis inprimis hic est prisana hordeacea & lac; modò

corpus ita sit dispositum, ne in ventriculo corrumpatur; vt & cremor & cibi ex amygdalis dulcibus non rancidis parati, oua item recentia, carnes boni succi & facili coctionis. Potus sit vinum album, dulce, non tamen potens, vel decoctum hordei, glycyrrhizæ, passularum. Vitanda inedia. Res quoque reliquæ non naturales ita sint comparatæ, vt acrimoniam humorum temperent, & ad earum collectionem non faciant. Ideoque alius semper aperta seruanda. Ita & animi affectus nimij vitandi: Vt & laboriosa exercitatio, vigiliæ nimix, & omnia, quæ acrimoniam humorum intendere possunt. Si ab aliis causis stranguria proueniat, diætæ medicamentis supra propositis respondeat.

#### QVÆSTIO.

*An stranguria etiam à frigidityte & imbecillitate vesicæ excitetur?*

Plurimi quidem etiam inter stranguriæ causas referunt vesicæ imbecillitatem, ob quam etiam ab exigua vrinæ copia molestiam percipiat, & vt se ea liberet, frequenter ejus expulsionem tentet. Eamque imbecillitatem ab intemperie frigida deducunt, in quam facile delabantur senes, quibus propterea etiam ista affectio sit familiaris, sæpe tamen vno vini haustu curretur. Verum enim verò facile quidem concedo, ab intemperie frigida stranguriam excitari posse, & senibus esse familiarem. Verum hoc in quæstione est, quæ ratione frigiditytas stranguriam inducat, an imbecillitatem vesicæ inducendo, & retentionem lædendo, an vero alio modo. Ab imbecillitate vesicæ fieri stranguriam credibile non est. Fieret inde potius vrinæ profluuium, non verò vrina guttatim, & quidem cum dolore, emitteretur. Eustachius Rhudius equidem, vt doloris etiam hic causam reddat, statuit, inæqualem intemperiem, & quidem non solum frigidam, sed & alias, duplici modo ad stranguriam inducendam concurrere, primò vt inæqualem, eaque ratione esse dolorificam, cum vesica membranosa sit; deinde quatenus vesicam imbecillam reddat, & ita naturam ad crebram excretionem stimulet. Verum si ab intemperie esset iste dolor, in tota vesica perciperetur, quod non accidit in stranguria. Magis vero consentaneum est, cum omnes partes, etiam quæ excrementa continent, peculiarem vim ea suo modo alterandi habeant, etiam vesicam vrinam aliquo modo alterare calore suo infuso: qui, si debilitetur à frigore, vrina vitiosam qualitatem induit, quæ vesicam postea stimulat, & dolorem in ea excitat.

*An stranguria à frigidityte vesicæ excitetur?*

#### CAPVT V.

*De Dysuria & vrina ardore.*

Cognatus affectus stranguriæ est Dysuria, vrinæ difficultas, seu mictio cum dolore: & quidem ita cognatus, vt qua ratione mictio cum dolore, seu vrinæ difficultas à stranguriâ & cognatis affectibus differat, pauci satis clarè explicant. Equidem vrinæ difficultas, seu dysuria etiam sæpe sumitur pro mictione imminuta, de qua supra egimus, cum vrina vel parior, vel tardius, quàm par est, redditur: verum illa necessariò non habet dolorem conjunctum. Ideoque hic saltem dysuriam pro actione deprauata sumimus, & mictione cum dolore: Arque ita clarissimè hæc distingui posse putamus, si mictio imminuta à deprauata distinguatur; etsi interdum vtraque conjungatur. Primo enim interdum vrina paucior, quàm par est, redditur, quæ mictio imminuta est; potestque esse cum dolore, vel sine dolore. Stranguria verò duobus modis vitiosa est, quod scilicet vrina continuò, sed guttatim saltem redditur, & quod simul dolor adest. Difficultas verò

*Ardor vrinæ.*

verò vrina, de qua hoc capite agimus, & à mictione imminuta & à stranguria differt: à mictione imminuta quod ea in eo consistit, quod vrina paucior, quàm par est, redditur, dolorem verò necessario coniunctum non habet: In vrina vero difficultate non necessario pauca fluit vrina, dolor verò semper est coniunctus. A stranguria verò, quod quidem etiam dolor adest, sed vrina non guttatim fluit, verum sine interruptione & sæpe in debita quantitate. Atque hoc vitium Medici posteriores plurimi etiam ardorem vrinae vocant, cum inter mingendum tantus dolor percipiatur, ac si res ardens vel ignis per meatum vrinae transiret, siue vrina copiose fluat, siue non copiose. Si verò saltem cum difficultate vrina reddatur, sine dolore, ad caput 3. & mictionem imminutam pertinet. Si quis tamen ardorem vrinae & dysuriam seu difficultatem vrinae discernere velit, erit differentia saltem secundum magis & minus, quod scilicet in ardore vrinae dolor est magnus, ut ardere quasi æger videatur.

#### Causæ.

Causæ autem dysuria & ardoris vrinae sunt omnes, quæcunque continuitatem colli vesicæ aut meatus urinarii soluere, seu dolorem inter mingendum excitare possunt, Accidit hoc cum vrina acris est per se vel per humorum acrium admixtionem. Inprimis verò hoc evenit, si ipse meatus urinarius sit exulceratus. Tum enim vrina etiam non admodum acris dolorem & ardorem in eo excitare potest. Hinc ardor vrinae accidit, cum bilis vel pituita salsa vel humores adusti, vel pus vrinae admiscetur, vel cum cibi acres, vel medicamenta, inprimis purgantia sunt assumpta, ut & venena, quæ vesicam exulcerandi vim habent, inter quæ præcipue sunt cantharides; quæ peculiarem vesicam lædendi potestatem obtinent. Idem quoque Mercurius præcipitatus præstare potest, de quo historiam habet Forestus, lib. 25. observ. 37. Sæpe etiam materia alba & lactea, quasi cum vrina copiose emittitur, & mictionem ardentem, & quidem sæpe tanta copia excernitur, ut vbi subsidet, dimidia pars matulae repleatur; & talis vrinae mictio sæpe satis diu continuatur.

De eius generatione alios aliter sentire novi; ac scio, quosdam eam pro pure in renibus genito habuisse. Verum si toti renes in pus resoluerebantur, non posset tanta eius copia, quanta interdum aliquot septimanas singulis diebus excernitur, inde suppeditari.

Ego in ea sum sententia, provenire illam materiam à cruditate & vitiata concoctione primo quidem ventriculi, deinde etiam, cum error coctionis primæ non possit corrigi in secunda, hepatis, qua chylus, & postea etiam sanguis crudus relinquitur, neque à partibus falsis & tartareis, quæ in prima coctione separari debent, mundatur, quæ postea à renibus attractæ, & ad vesicam transmissæ dolorem inter mingendum pariunt, & præcipue in fine coctionis, dum aliquid eius materiae collo vesicæ & extremitati meatus urinarii adhærescit, pertinacius. Arque in eâ sententiam eo sum adductus, quod vir quidam Doctus, qui per aliquot septimanas ardore vrinae laborabat, & vrinam quidem, satis copiosam, sed tali materia alba ita refertam, ut dimidium vrinæ occuparet, emingebat cum maximo dolore, & variis adhibitis remediis nihil leuaminis sentiebat, tandem solius vini maluatici potu curatus fuit.

Calculus quoque in vesica latens vbi inter mingendum ceruici vesicæ alliditur, dolorem inter mingendum excitat.

Tandem etiam à semine in masculis ardor vrinae excitari potest, cum illud vel loco, in quo continetur, motum, verum non eiactum, sed in ductu, per quem eiici debet, hærens, acrimoniam acquirit, meatumque nonnihil atrodit, vel cum corrumpitur & malignam

qualitatem acquirit, id quod in lue venerea accidit.

Verum hic inquirendum, quod ab Autoribus præteriri video, quæ fiat, quod vrina, quæ cum dolore emittitur, nunc copiose, nunc parce & stillatim, quod fit in stranguria, saltem emittitur, & quæ ardoris vrinae & stranguriæ, ratione causæ sit differentia. Memini enim non solum virum illum, cuius modo mentionem feci, sed & alios quosdam vrinam satis copiose cum summo dolore emisisse.

Ego in ea sum sententia, differentiam esse præcipuam in loco affecto, atque in stranguria, & cum vrina stillatim excernitur, sphincterem præcipue affici, qui ab acrimonia vrinae stimulatus, sese quidem aperit, ut vrina emittatur, molestiam tamen & dolorem inter mingendum percipiens, ut eam effugiat, sese constringit, continuo tamen iterum laceratus iterum laxatur, atque ita vrina sæpe, sed guttatim exstillat. Vbi verò causa hæret in meatu urinario, vrina quidem liberè transit, & satis copiose redditur, sed cum dolore.

Pertinet ad causas mictionis cum dolore coniunctæ & inflammatio partium vesicæ. quæ licet continuum dolorem coniunctum habet, is tamen exacerbarur, vbi vesica ad vrinam emittendam contrahitur, & ab vrina exitum quærente inflammatio comprimitur.

#### Signa Diagnostica.

Ipse dolor ab ægro facile percipitur, qui etiam de eo conqueritur. Causæ vero signis discernendæ sunt. Patient autem ferè ex iis, quæ hæcenus dicta sunt, & inflammationis vesicæ, vlcus, calculi signa antea sunt proposita, & vrinae prauæ qualitates, ut & pus vel semen corruptum facile innotescunt.

#### Prognostica.

1. Ipsum malum quidem per se non lethale est, cum molestia tamen coniunctum, & pro diuersitate causarum nunc facilius nunc difficilior curatur.
2. Ardor vrinae si diu durat, vesicam tandem, eiusque collum exulcerat.
3. In senibus decrepitis difficulter curatur.
4. Si accidat, quod sæpe fit, simul vrinae suppressio, malum redditur periculosius.
5. Qui à veneno est vrinae ardor, raro curatur.

#### Curatio.

Tota autem huius mali curatio in causæ amotione consistit, quæ qua ratione institui debeat, ex antecedentibus patet. Ad materiae euacuationem etiam hæc potiuncula commoda est.

℞. Sebesten, iuinbar an. num. x. sol. malua M.℞.

Coq. in aq. hordei simplici.

In colatur. ℞. q. dissolue cassia extracta 3. x.

Adde syr. violarum 3. ℞. M.

Ipsum tamen symptoma quod attinet, si dolor sit vehemens & vires deiciat, dolorem lenientia sunt usurpanda, & quidem quæ exhibentur, simul causæ resistere plerunque possunt, ut syrupus violarum, decoctum malua, althæa, iuinbarum, sebesten, glycyrrhiza, seminum 4. frigid. maiorum, amygdalar. dulcium, & harum emissiones, quibus, si ardor sit vehementior, semina papau. albi, hyoscyami, grana & trochiscos alkekengi addere licet.

℞. Sem. psylli 3. vi. cydonior. 3. iii. quatuor frigid. an. 3. ii. papau. albi 3. i. ℞.

Conquassentur, & cum aqua malua extrahatur mucilago, quæ cum aqua hordei exhibeatur, vel etiam in meatum urinarium iniiciatur.

Vel ℞. Sem. quatuor frig. maior. mundat. an. 3. ℞. gumi Arabici, tragacanth. an. 3. j. ℞. sem. portulaca, papau. albi

Ardor vrinae & stranguriæ differentia ratione causæ?

Partium vesicæ inflammatio.

Prognostica.

Curatio.

Causæ.

Materia alba & lactea ardorem vrinae excitans.

Quomodo generetur? An sit pus?

Autoris sententia.

albi an. ʒ. iij. *santali rubri* ʒ. jß. *sem. hyoscyami albi* ʒ. j.

Cum *mucilagine sem. psyllij* fiant trochisci drachmæ vnius pondere. Datur vnus mane & ante cœnam.

Vel ʒ. *Grana sebesten.* num. x.

Infundantur in aq. destillata solani & mane exhibeantur. Vtilis est & contra ardorem vrinæ aqua florum fabarum ʒ. viij. mensurâ hausta.

Extra vero vsurpanda oleum amygdalar. dulcium, violarum, nymphæ, papaueris, quibus pubes & perinæum iungenda. Vel fiat fotus & infusus ex decocto malua, althæe, parietaria, florum chamameli, capitum papaueris, vel etiam ex hisce medicamentis parati clysteres in anū iniiciantur. In meatum vrinarium etiam infundatur lac recens multum vel oleum ex amygdalis dulcibus recens expressum, vt & emulsio seminum melonum, papaueris. Si dolor valde vrgeat, etiam ad narcotica, vt *theriacam recentem*, & *Laudanum Opiatum* accedere licet.

Si à veneno sumpto sit ardor vrinæ, sicut Monachis illis apud Leonellum Fauentinum, *Prætic. Medicinal. cap. 70.* accidit, qui ranas comederant, exhibeatur *cassia extracta* ʒ. j. in aqua malua dissoluta. Postea exhibeantur aqua malua ʒ. x. cum iulebi violarum ʒ. iij. Verum periculosum hoc malum est, ideoque simul alexipharmaca exhibenda.

Si à cantharidibus sit ardor vrinæ, hæc exhibendum, *mucilagine sem. malua, althæe, cydoniar. psyllij, emulsionem sem. papau. lactuca, & frigidior. maior. grana haliacabi, gummi Arabicū, tragacantha, syr. violar. nymphæ, papaueris.*

## CAPVT VI.

### De Mictione Inuoluntaria & vrina incontinentia.

Mictio inuoluntaria.

Duplex.

**A**D deprauatam mictionem pertinet & ea vrinæ excretio, cum homini præter voluntatem non opportuno loco & tempore expectato vrina effluit; id quod dupliciter fieri potest, vel vigilantibus, cum præter voluntatem, & facultate expultrice ferè non, aut parum concurrente, vrina sponte effluit, vt homo id ferè non animaduertat, id quod apoplecticis, paralyticis & aliis quibusdam accidit; vel dormientibus in quibus etsi quoque nescientibus vrina profluat, tamè tum desiderium mingendi concurrat, & proculdubio imaginationi offertur stimulus ille vrinæ; in hoc saltem vitium est, quod homo tum in somno ita sese moderari & facultati motrici imperare non potest, vt vrinam loco & tempori magis conuenienti retineat. Qui duo affectus vt sunt distincti: ita etiam distinctas quasdam causas habent.

#### Causa.

Causa.

Causa nimirum inuoluntarij vrinæ proflui, quod & vigilantibus & dormientibus accidit, est vitium sphincteris vesicæ, qui relaxatus & imbecillis redditus est, vt sese contrahere nequeat, & orificium vesicæ claudere, vnde vrinæ exitus ferè semper patet, & inuitis etiam ac nescientibus effluit. Neque enim aliam vrinam retinendi facultatem habet vesica, quam hunc orificio præpositum musculus, qui id claudit, & vrinam retinet, donec ex arbitrio hominis laxetur.

Quænam autem sit causa imbecillitatis & resolutionis sphincteris vesicæ supra cap. primo dictum. Solet tamen etiam vrina interdum præter voluntatem reddi, cum abdominis musculi valde conuellantur, vt vrina ob eorum constrictionem, ventrisque compressionem ex vesica quasi propellatur. Ob eandem ferè causam etiam interdum grauidis in vltimis mensibus vrinæ incontinentia accidit, vt & iis, qui tumorem habent supra vesicam, idque ideo procul dubio,

quia musculus vesicæ ab vtero factu distento, vel tumore comprimitur & vellicatur.

Vbi hoc occurrit dubium, quomodo ex eadem causa & vrinæ incontinentia & suppressio fieri possit. Scribit enim Hippocrates, in *Coacis*: quibus incogitantanter vrina procidit, & pudenda retrahuntur, de spe depositi sunt. Et ibidem; ex refrigeratione intercipio vrinæ pessima. Verum sciendum, dum vrina ex refrigeratione supprimitur, solum facultatem sentientem affici, ita vt, vrinæ stimulum non percipiat: si verò non solum sensus afficitur, sed & facultas motrix ita impeditur, vt musculus contrahere non possit, sit inuoluntarium vrinæ profluuium.

Si verò per somnum saltem hoc fiat, per vigilias verò nil tale obseruetur, equidem & tum in musculo illo vesicæ orificium claudentis aliqua est imbecillitas à frigida & humida intemperie proueniens, sed non tanta vt homo, si velit, vrinam continere non possit: ideoque ad imbecillitatem somnus profundior accedat, necesse est, & quasi quædam negligentia, & homo per somnum ab vrina stimulatus non cogitet, lectum vrinæ reddendæ commodum locum non esse. Vbi enim vrinæ ea copia in vesica collecta est quæ hominem seu copia seu qualitate stimulare ad excernendum possit, si homo profundius dormiat, & ad imaginationem irritationis sensus perueniat, facultas expultrix, nisi à ratione expulsio impediatur, ad expellendum insurgit, & præcipue si sphincter sit debilis, vrina profluit. Quod multum etiam facit consuetudo, ob quam causam infantes noctu sæpius lectum commingendo huic intemperstiuæ mictioni quasi assuescunt, vt postea etiam adultis familiaris maneat.

Nonnulli non solum labefactatam facultatem causam incontinentiæ vrinæ ponunt, sed & coactam, dum scilicet vrina sui copia vel imperu in musculus vesicæ agat, eumque comprimat sua grauitate, & ad apertionem quasi cogat, quamuis voluntas non vocet ad illam, Verum hæc causa commodius refertur ad objectum & nimiam stimulationem. Vrina enim copiosa ideo statim excernitur, quia facultatem expultricem irritat, neque accidit hoc sine voluntatis imperio.

#### Signa Diagnostica.

Affectus hic ipse per se satis notus est: causæ verò ex signa egri relatione, & iis quæ præcesserunt, facile innotescunt.

#### Prognostica.

I. Vrinx præter voluntatem profluuium, quod accidit vigilantibus, nunc facilius, nunc difficilius curatur pro causarum, à quibus illud pender, grauitate. Etenim quod à musculo vesicæ ab externa causa refrigerato accidit, non ita difficulter curatur. Et omnino si cerebro & spinali medulla sese recte habente accidit vrinæ profluuium, de salute & restitutione non desperandum. Quod vero spinali medulla affecta vel vesicæ musculo vulnerato accidit, difficilius curatur, imò plerunque incurabile est.

II. Vrinx verò incontinentia, quæ infantibus & pueris accidit, plerunque etiam sine medicamentis ætatis progressu corrigitur; cum non solum corpus siccius euadat, & musculi robustiores fiant, sed etiam verecundiæ & pudoris magis rationem habeant. Et propterea inter dormiendum magis cauti & solliciti sint.

III. Nonnullos tamen, etiam adultos, ac inprimis si poculis dediti sunt, hoc vitium ad mortem vsque comitatur.

#### Indicationes & Curatio.

Curatio in eo potissimū consistit, vt morbus & causa, ob

Quomodo  
vrina conti-  
nentia &  
suppressio ex  
eade causa  
fiat?

Prognostica.

Indicationes  
& Curatio.



ob quam sphincter laxatur, tollatur. Quapropter si musculus ceruicis vesicæ resolutus sit, ei malo occurrendum, ut supra capite primo dictum, & qualitas, quæ resolutionis causa est, per contraria medicamenta corrigenda.

Interalia autem remedia commendatur Diacyminum, thus è vino potum, calamintha & mentha cum vino ante cœnam pota, guttur galli, gallinæ, vel caponis tostum cum aqua vel vino, de quo Solenander, *sextione 4. consil.* 11. proponit medicamentum paratu facile, quo ipse in artis operibus felicissimum Virum cum iuramento prosperè in hoc affectu Romæ usum obseruauit Doctorem Gisbertum Hollandum Medicum. Is accipiebat guttur galli, vrebat, ut non consumptum, sed tostum exiccatumque reri posset, exhibebat puluisculum sub noctem ante cœnam cum vino rubello adstringente, aut haustu dilutissimæ poscæ, idque aliquot diebus reiterabat. Quod remedium, siue manifesta siue occulta qualitate id præstet, procul dubio huic malo succurrit musculus vesicæ roborando. Laudantur & testiculi leporis combusti.

Vel *℥. Thuris, mastich. corallior. rubr. spodij an. Drac. ii. cubebæ. caryophyll. macis, cardamomi, cyperi, piperis longi, zingib. guttur. gallinac. an. Drach. i.*

F. Puluis, qui vel solus sumatur, vel ex eo cum miua cydon. fiat Electuarium, aut cum *sacch. albo* Rotulæ.

Vel *℥. guttur. gallinac. tosti Vnc. sem. cineris erinacei Drach. iii. agrimon. Vnc. sem. thur. Drach. ii.*

F. Puluis, cuius Drach. i. exhibeatur hora vna ante cibum cum vino albo vel jure gallinæ.

Vel *℥. Ocul. cancri, nucleor. persicor. flor. hyperici, vesic. apri an. Drach. ii.*

F. Puluis,

Vel *℥. Vesica apri tosti & puluerisati, guttur. gallinac. gummi Arabici an. Drach. j. rad. pimpinella macis an. Drach. sem.*

F. Puluis,

Extra vero pecten & perinæum foveatur spongiâ imbutâ decocto folior. menthæ, absinthij, rosar. rubrar. balauitior in vino parato, aut fiat ex his plantis balneum. Vtiles etiam sunt thermæ sulphureæ & aluminosæ, vel inungatur locus oleo absinthij, mastichino, menthæ, nardino, aut applicetur cataplasma è plantis modo enumeratis paratum. Vel imponatur hoc cerotum.

*℥. Thuris Vnc. i. ladani mastiches, spodij cupular. glandium an. Drach. iii. ligni aloes, cinamomi an. Dra. i. styrac. calamit. Drach. ii. succi mentha Vnc. iv. cera q. s.*

F. f. a. Emplastrum.

¶ [Iuencula quædam, ut refert Henr. ab Heer, *obs.* 14. cui in primo partu obstetrix inepta vesicam lacerauerat, in vrinæ incontinentiam incidit. E cujus continuâ destillatione labia pudendi & nares exulceratæ sunt, torque ibi verrucæ natæ, ut vix duabus manibus capi potuissent. Verrucas istas curauit & abstulit magmate illo ex antimonio crudo & mercurio sublimato, æqualibus partibus mixtis, è quo butyrum antimonij destillari solet. Ne verò effluxus vrinæ continuus curationi obstaret, siphonem argenteum vesicæ immissit, & parti quatuor digitis latis exstanti lagenam, quæ vrinam exciperet, alligauit. Mulier hæc iterum grauida feliciter peperit. Tandem etiam ab vrinæ incontinentiâ liberata est consilio Cingari, sacculo collo appenso, in quo erat puluis bufonis viui in noua olla vsti. Expertus est idem remedium Henr. ab Heer, in quodam Mercatore Leodiensi, qui ob malè extractum calculum vesicæ etiam vrinæ incontinentiâ laborabat, & res feliciter successit, & hic quoque ab vrinæ incontinentiâ liberatus est. Cuilibet illud medicamentum experiri licet, ut ex pluribus obseruationibus de veritate constet.]

In specie autem ij, qui noctu in lectum mingunt, vesperi parum bibant, & imprimis à vino diuretico ab-

stineant, ut & omnibus aliis cibis, potu, & medicamentis, quæ vrinam ad vesicam faciliè mouent, ne facultas expultrix irritetur.

Et si verò inter symptomata ista, quæ circa mictionem accidunt, rarus ille affectus Diabetes dictus referri possit: tamen cum à plerisque Medicis inter affectus renum recenseri soleat, neque etiam vesica quicquam mali in eo patiatur, supra inter affectus renum *part. 7. sect. 2. cap. 2.* cum explicauimus.

## CAPVT VII.

## De Vrinarubra, cruenta &amp; nigra.

EMingitur etiam sæpè vrina colore præter naturali prædita. De coloribus autem istis ex professo de *sa p. m.* Vrini Medici tractant, quos & ego secutus in Institut. *lib. 3. part. 1. sect. 3. cap. 2. & 5.* de iis egi.

## Vrina Rubra.

Vt autem ea, quæ de vrina rubra in *inst.* dixi hîc non reperam, saltem de eâ vrinâ rubrâ hîc aliquid addendum, quæ à cruditate fit, de qua pauci scripserunt. Facit autem ejus mentionem Galenus, 1. ad *Glauc. cap. 7.* dum signa quotidianæ febris recenset, vrinasque in quotidianis vel albas & tenues, vel crassas & turbulentas, vel rubras esse scribit. Notatu verò dignū est, quod de vrina rubra monet Dodonæus, in *obs. medic. cap. 31.* vbi docet, vrinas rubras mingi non solum in morbis calidis, ut febribus ardentibus, & tertianis, partiumque internarum inflammationibus, sed non raro jecinore ac ventriculo per diuturnos & longos morbos cum refrigeratione debilitatis. Referetque historiam viri quinquagenarij, qui à Quartanâ, quâ menses quatuor aut quinque laborauerat, in Lienteriam incidit, & cruda deiecit, ac nullo febrili calore restante vrina admodum rubebat: se verò nulla harum habitâ ratione, sed ad cruditatem respicientem, ut consuleret ventriculo & jecinori, per præsentem quartanam debilitato, victus rationem calefacientem & resiccantem instituisse, vinumque exhibuisse generosissimum ac potens, quale Hispanum. E medicamentis vero diagalanges, diatrion pipereon, & ejus generis similia, quibus tantum profecit, ut concocta apparerent excrementa, & vrinæ color remitteretur, ac similis sanorum redderetur. Cum verò æger jam sanum se esse existimans secretò cereuisiam bibisset, mox vrinæ color iterum in ruborem multum intentus, manifestè ostendit, ex ventriculi cruditate & refrigeratione vrinam quandoque tingi, ac valde rubicundam reddi. Cum ergo à cereuisia abstineret, vrinæ mox iterum sanorum similes euaserunt.

De hoc etsi pauci Medici aliquid monuerint; tamen in praxi sæpè id obseruare in promptu est, in iis, qui ex quartanis conualescunt, & præcipuè qui ad scorbutum dispositi sunt. Quamprimum enim pisces, vel alium cibum crudiores & coctu difficilem sumunt, mox vrinæ rubræ & quasi splendentes apparent, victus verò ratione in meliorem mutata, ad naturalem colorem redeunt.

Quænam verò causa huius coloris sit, rationem reddere difficile est. Neque enim est cruentus color, sed talis, qualis in febribus ardentibus apparere solet. Neque tamen à bile, quæ tunc non abundat, sed potius à crasso & crudo humore provenit. Si quod mihi videtur, dicendum, puto id, quod in Institut. *loc. alleg.* dictum, etiam hîc locum habere posse, nimirum non solum à bile vrinam tingi colore aureo, sed & à sale ruffo, sicut lixiuium à sale impuro tingi videmus, ut coloris ruffi appareat. Et, ut Chymicorum vocabulis & stylo hæc de re loquar, si vetriculus ipse bene sese habeat, nec error aliquis externus objecti ratione accidat, partes sulphureæ & tartareæ crassiores in vetriculo & intestinis

sepa

Curatio verrucarum & vrinæ incontinentiæ, Henr. ab Heer.

separantur, & per alium excreantur, unde chylus fit purior, ut postea in hepate partes ejusmodi tartareas & sulphureas, quæ urinam tingere possunt, separari opus non sit. Si verò ventriculus sit debilis, & imprimis si ventriculo debili talis cibus offeratur, quem satis coquere & elaborare non possit, non rectè fit partium excrementitiarum in ventriculo separatio, sed chylus impurus & feculentus generatur, qui ad hepar delatus, multa talia excrementa suppeditat, quæ ubi à sanguine separantur, & ad renes feruntur, urinam tali colore ruffo tingunt. Imò in scorbuticis vrina sæpe non solum rubra est & splendet, verum etiam, ubi turbatur, rubrum sedimentum, & pulueri laterum simile quid subsidet.

Tale ergo si quid in vrinis appareat, non statim calor hepatis, vel febris aliqua accusanda, sed diligenter omnia perpendenda. Et si nulla calor vel febris adsint indicia, ad ventriculum respiciendum, & an is sit debilis, vel cibus coctu difficilis assumptus sit, considerandum. Ac si tale quid animaduertatur, ventriculus calefaciendus, cibique & potus frigidus cum calido permittendus, & pro cerevisia vinum bibendum, ut supra ex Beniuenio dictum.

### Vrina Cruenta.

*Cruenta.*

Vrina cruenta fit à sanguinis è vasculis suis elapsi admixtione. Verum causæ, ob quas è vasculis suis sanguis effluit, multæ sunt; neque etiam semper ex vno loco effluit. Potest enim è renibus effluere; potest à partibus aliis, ut hepate, ad renes mitti; potest etià è vasculis infra renes, vteribus scilicet, vesica, membrisque genitalibus effluere.

Primo enim in renibus potest aliqua vena aperiri, vase aliquo à vehementi corporis motu, ut equitatione, casu, saltu, aut ponderis grauioris elevatione aut gestatione rupto; vel osculis vasculorum in renibus laxioribus, ipsisque renibus debilioribus redditus. Imò nonnunquam natura sanguinem in corpore abundantem per hæc loca expellit. Ita refert Aretæus, *lib. 2. morb. diuturn. cap. 3.* nonnullos per circuitus quosdam sanguinem mingere, & si nihil sanguinis effluerit, capitis dolore vexari, oculorum aciem hebetari, tenebras iis obuersari, vertiginem pati; inde alios in comitalem morbum incidere, alios aquæ inrer cutem simile quid pati, alios morbo atræ bilis aut neruorum resolutione tentari. Ab actuum etiam ciborum usu renum vasa interdum aperiantur, sicut Matthæus de gradibus, *ad nonum Rhaf. lib. 2. cap. 18.* refert, iuuenem quendam post allij esum largum, multum sanguinis emixisse.

Secundo sanguis iste, qui emingitur, non proximè à renibus prouenit, sed ab hepate, eoque vel imbecillo, ut sanguinem retinere, sibi que assimilare nequeat, vel etiam sanguine grauato, vel vase ejus aliquo quacunque de causa aperto.

Tertio idem accidere potest, si vtereres à calculis transeuntibus vulnerentur, seu vesica & pudendæ partes vulnerentur, exulcerentur, vel corum vasa laxentur, sicut post nimiam Venerem interdum vrina cruenta emingi solet.

### Signa Diagnostica.

*Signa.*

Si à sanguine tingatur vrina, non splendet, habetque colorem, qualis aqua ferè, in qua recens mactatorum animalium caro abluirur.

Cuius autem partis, renumne, aut alterius vas aperitum sit, & qua de causa, signis discernendum, idque facile cognoscitur, si symptomata præsentia, & causas, quæ præcesserunt, consideremus. Si enim nulla renum affectorum signa adsint, contra in aliis partibus dolor, grauitas, vel alia symptomata percipiuntur, iis affectis urinam cruentam reddi indicio est, & contra si partes omnes reliquæ sint saluæ & in renibus aliquis morbus

deprehendatur, ab iis prouenire urinam cruentam, colligendum. Vas ruptum esse, ex eo colligitur, quod sanguis copiosus, isque purus & floridus redditur, & quod equitatio diuturna ac vehemens, vel alius motus violentus, ictus, lapsus ab alto, saltus, ponderis grauis eleuatio, aut gestatio, vel vulnus præcessit, percipiturque dolor in parte affecta. Idem accidit, sanguisque floridus excrenitur, si ab humore acri vas aliquod erosum est. Discernitur tamen à priori causa, quod sanguis minore copia excrenitur, & præsertim in initio, ubi planè exigua copia emingitur, postea verò aucta erosione majore copia. Quod si à *diarrhoea* & rarefactis saltem venarum tunicis sanguis emingitur, vrina leuiter colore rubro tincta est. Reliqua signa ex iis, quæ quæ supra de renum morbis dicta sunt, patent.

### Prognostica.

I. Si vrina cruenta per *diarrhoeam* & rarefactionem venarum in renibus emingitur, malum minus periculosum est, & adstringentibus medicamentis adhibitis facile curatur, præcipue si malum adhuc recens sit. Sicut & ea, quæ ab erosione mictio accidit, periculo vacat, si sit recens.

*Prognostica.*

II. Si verò malum jam inueteratum sit, metuumdum, ne æger contabescat, vel hepatis calore debilitato æger in cachexiam vel hydropem incidat.

III. Si copiose sanguis emingatur, metuumdum est, ne in vesica subsistens periculosam urinæ suppressionem, vel putrescens & prauam qualitatem induens alia praua symptomata exciter.

IV. Si ex pudendis sanguis effluat, minore cum periculo coniunctum est.

V. Si ex vesica vulnerata sanguis profluat, periculosum malum est, ut supra dictum.

### Curatio.

Curatio ad causam, à qua symptoma hoc pendet, dirigenda. Nimirum si vasa sint laxata, adstringenda; si erosa, occludenda; si rupta, consolidanda, siue id factum sit in renibus, siue in aliis partibus. Si sanguinis copia malo originem dederit, sanguis detrahendus.

*Curatio.*

Principio ergo si vel à sanguinis copia malum ortum habeat, vel vas aliquod amplum ruptum vel erosum est, vena in cubito aperienda.

Medicamenta quod attinet, ea cum in relaxatione tum in erosione vel ruptione vasculorum sint adstringentia, vimque condensandi, obturandi, & consolidandi habentia. Exhibeantur ergo medicamenta è rosis rubris, myrto, plantagine, consolidida, bursa pastoris, equiseti, polygono, acacia, hypocistide, millefolio flore albo, quod hic vtilissimum est; Terrâ sigillatâ, bolo Armeno, lapide hæmatite, coralliis, trochiscis de spodio, terrâ sigillatâ, trochiscis Gordonij.

Extra applicetur Unguentum Comitisæ, Emplastrum Diaphænicum frigidum, contra rupturam, atque alia è modò dictis medicamentis parata.

Si à vesica sanguis excrenatur, vel pudendis, eadem medicamenta exhibentur, simulque in vesicâ iniiciuntur.

Ad sanguinem autem concretum in vesica dissoluendum exhibeatur oxymel cum decocto radic. rubiæ tincto, asparagi, vel mumia in iis dissolutâ, Eadem in vesicam iniiciantur.

### Diata.

Cibi sint boni succi & adstringentibus mixti & conditi, vel etiam viscosi & glutinosi. Vinum sit rubrum, austerum, aqua chalybeatâ temperatum. Abstineat verò æger à cibo & potu ac medicamentis acris, diureticis, aperientibus. Venus vitetur, motus item nimis corporis, & in quiete æger detineatur.

*Diata.*

*Vrina*

*Vrina nigra.**Nigra.*

Vrinae nigrae in Instit. loco allegato tres causas esse diximus, nimirum humorem melancholicum urinae admixtum, bilem atram, & caloris natui in venis extinctionem. Ad primam causam referri etiam possunt medicamenta humorem melancholicum in liene mouentia, & per urinam euacuanda, cuius exemplum habet Actuarius, de iudiciis urinarum, lib. 2. cap. 20. Et Cta-to, in Consil. medic. à Scholtzio collectis, Consil. 174. scribit, se dedisse laboranti ictero nigro lapidem bezoar, ægrumque minxisse tam nigra, quam atramentum est, meliusque habuisse. Ipse etiam sæpe ab ægris scabie, hypochondriacâ affectione & aliis melancholicis morbis laborantibus urinam nigram sine damno, imò cum commodo emissam vidi. Et notatu dignum est, quod Antonius Valletius, in exercit. ad cap. 40. Hollerij de morbis internis, scribit de quodam Viro religioso, cui ter aut quater in anno, maxime vere & autumnò ineuntibus, lien intumescerebat, cum dolore hypochondrij sinistri, ac subliuidus toto corpore fiebat, sensimque deterius habebat, sed tandem urinis nigricantibus emissis per quinque aut septem dies pristinam sanitatem recuperabat, idque ipsi per annos vndecim aut quindecim accidisse scribit. Ita etiam refert Valeriolâ, in comm. ad lib. de constit. artis med. Galeni, quendam cum lienis apostemate laboraret, planeque moribundus haberetur, crisi sub vigesimum diem factâ, admirandam urinarum nigrarum, atramenti instar, copiam ad libras 12. excreuisse. Idemque in Quartâ etiam sæpius obseruauit; quod & ab aliis factum.

Itaque si ex humoris nigri admistione urina nigra fiat, euacuatio humoris nigri promouenda; quam ad rem imprimis utilis est fumaria, & alia diuretica simul humori melancholico dicata.

Quod verò Hippocrates urinas nigras lethalis morbi indicium esse scribit, & intelligendæ sunt, quæ à caloris natui vengores & extinctione proueniunt.

## CAPVT IX.

*De Rebus alienis per vesicam excretis.*

Vesica equidem urinae excernendæ saltem dicata est. Interdum tamen accidit, ut etiam res aliæ præter naturam ex ea excernantur. De sabulo, & calculo iam antea dictum est. Vermiculos etiam & alia animalcula ex ea eiecta fuisse, supra à Cardano, comm. ad aph. 76. lib. 4. Scoliographo, ad cap. 30. lib. 1. Hollerij de morbis internis, Montano, lib. 4. cap. 10. Anasceus morborum, Paræo, lib. 19. cap. 3. dictum. Membranulas nerueas multiformes ab urinae detentione cum sanie sine foetore & febre emictas vidit. Fumanellus, ut refert, cap. 4. tract. de morbis in viis urinae. Andernacus Dial. primo de balneis & aquis medicat. scribit, concionatorem quendam pituitam quandam adedò viscosam & longam, ut intestinum quoddam videretur, per vesicæ canalem reddidisse, antea miris doloribus excruciatum. Piscium vesiculis similia corpuscula cum urina excreta fuisse, vidit Marcellus Donatus, ut de hist. med. mirab. lib. 4. c. 29. refert, & quendam incredibili quantitate multis mensibus pituitam lentam corruptam eminxisse, aliamque cum intolerabili cruciatu aliquot diebus pituitæ partes, veluti crytalli aut gelatinæ globulos, pellucidas eminxisse, Scholiographus, ad cap. 30. lib. 1. Hollerij de morbis internis refert. Frustula etiam radicum apij, semina item anisi & alkekengi cum urina eiecta fuisse, supra de Diabete dictum. Fungi frustula per vesicam reiecta scribit Nicolaus Florentinus, serm. 4. tract. 4. cap. 29. & Alex. Benedictus, lib. 3. Anat. cap. 13. Pilos quoque cum urina reiectos fuisse, supra dictum.

Et rei huius etiam notabilem historiam refert Guil-

Dan. Semmeri Tom. III.

Fabritio, quam Cl. Dn. D. Gregorius Hostius, sectioni quinta Epistolar. Medicarum inseruit. Fuit nimirum fœmina quædam Bernensis, quæ octennium dolore ventris & lumborum correpta urinam nunc sanguinolentam, nunc purulentam & turbidam, pilis plurimis rufis & oblongis refertam non sine dolore maximo quotidie excernebat. Quæ curata fuit ab eodem Fabritio clystere sequente iniecto tertio vel quarto quoque die.

℞. Rad. alb. malua an. Vnc. ij. melissa, artemis. origani, malua, althæa, an. M. ij. flor. sambuci, meliloti, chamameli, an. M. j. sem. anisi, carvi, fœselidis an. Drach. ij. fœnugraci, lini an. Vnc. j.

Incidentur & manipuli duo coquantur in aq. fbj. ad remanentiam fbj. in quâ dissolue.

Bened. laxat. Drach. iij. olei aneth. chamamel. an. Vnc. j. buryri recent. Vnc. j. b. vitellos ouor. ij. F. Clyster.

Corpus per interualla euacuauit sequenti potiuncula.

℞. Rad. fœnicul. cicbor. polypod. an. Drach. ij. herbar. scabiosa, melissa an. Pj. cuscute, flor. cordial. genista Hispanica an. Pj. sem. fœsel. fol. sena an. Drach. j. b.

Coq. ad remanentiam Vnc. ij.

In quibus dissolue bened. laxat. Drach. j. b. diacarthami Drach. j. syr. laxarij compositi cum rhabarb. agarico & sena Vnc. b. aq. cinamom. Drach. iij.

Misce.

Fiat Potio.

Renes sequenti linimento inunxit.

℞. Vng. rosar. Vnc. ij. ol. amygd. dulc. lilior. alb. an. Vnc. j. Misce.

Ex prædictis radicibus, herbis, floribus & seminibus pro Enemate præparatis etiam sacculos parauit, quos aquâ coctos ventri & perinæ applicandos curauit. Plura hæc de re vide in eadem Epistolar. D. Horstij sectione.

Guilielmus Fabricius, cent. 4. obs. 3. refert, grauidam quandam corpus quoddam membranofum ex vesica ad pugni magnitudinem, molle tamen & lubricum, & quod in maximas & tenuissimas membranas extendi poterat, excreuisse.

Quod si tale quid accidat, ad morbos & causam, à quibus generantur, respiciendum, & corporis euacuatione præmissâ ea exhibenda, quæ humores vitiosos & similia in vesica abstergunt, & urinam mouent.

Fernelius quoque, lib. 6. patholog. c. 11. scribit, abscessum ani etiam visum esse, interdum in vesicâ penetrat, ac tunc iniectione crepitum è pudendo, perinde, atque è podice, atque etiam fecis nonnihil urinae permixtum prorupisse. Cuius rei etiam alia duo exempla recenset Schenckius, lib. 4. obseru. 22. Quidam enim cum laborasset vlcere fistuloso ani, eoque admodum calloso, & vlcere penis sanioso simul teneretur, ex eodem penè crepitum veluti ventris cum foetore emittebat. Alij verò tubicini ob virulentam ex lue Venerea stranguriam intempestiue suppressam exulceratio suborita est, & eoque progressa, ut, vitiatis circumstitis partibus, tandem etiam anum & vesicam eroderit, quò factum, ut ventris crepitus per penem etiam emiserit. Sicut & obseru. seq. aliquot exempla eorum, qui clauso ano nati per penem excrementa alui eiecerunt, recenset. Ita etiam refert Guilielmus Fabricius, cent. 1. obs. 75. fœminam quandam Geneuensem filium peperisse, qui, clauso ano, excrementa per ductum urinarium, simul & urinam excernebat. Verum cum tandem excrementa indurescerent, nec per ductum illum angustum amplius permeare possent, inflatus est venter, exorta est febris, aliæque symptomata, ita ut decimo septimo ætatis die è vita discesserit. Aperto cadauere inuentum est intestinum rectum ad natum fundo vesicæ.

Crepitus per vesicam excreti.

Fecis.

## CAPVT X.


## De vrina per aliena loca excretionem.

Vrina excretio  
per aliena  
loca.

Tandem ad symptomata, quae circa vrinae emissionem contingunt, pertinet vrinae per aliena loca excretio. Infantem annos duos natum vidit Amatus Lusitanus, vt cent. 2. cap. 21. refert, cui ab ortu glans perforata non fuit, nec vestigium aliquod in ea, vbi foramen esse debebat, apparebat, qui tamen ad radicem penis prope testiculos foramen habuit, per quod lotium non guttatim fluebat, sed directè emanabat. Platerus, in obs. pag. 792. refert nobilem quendam Capitaneum præter foramen in glandis media anteriore sede secundum naturam formatum aliud quoque subius, circa glandis radicem & præputij exortum ab ortu habuisse, per quod micturo vrina deorsum ferebatur, ita vt, nisi caueret, se commacularet, & semē quoque per idem emittebat. Puellā quoque, ex loco, qui est infra pectinē, paulum supra vuluam vrinam reddidisse, nullis interim apparentibus signis atque indiciis, vnde illa naturaliter profluere deberet, scribit Antonius Beniuenius, cap. 90. de abd. morb. & sanat. caus. & cap. 7. refert cuiusdam Pauli Bonini filium, qui glande colis clausa natus paulo in eam meatu patefacto vrinam reddidisse. Cuidam obstructa vesicæ ceruice vrina affatim, tanquam emictione, ex vmbilico in multos menses profluxit, idque circa tumorem, citrà vllam aquae in abdomine collectionē, & citrà valetudinis offensam, vt scribit Fernellius, lib. 6. de part. morb. & symptom. cap. 13. Causa huius rei fuit, quod recens in lucem edito male vinctus vmbilicus nunquam coaleuit, atque hinc semper non nihil stillauit. Puellam etiam quandam, cui cum suppressa fuisset vrina per multos dies, tandem eam per vmbilicum profudisse, Bartholomæus Cabrolus vidit. Vesicæ abscessum per perinæum erupisse, è quo vrina reddebatur, scribit Fernellius, loco allegato. Dodonæus, vt ad cap. 78. Beniuenij de abd. sanat. & morb. caus. refert, vidit per foramen in perinæo ab vlcere ceruicis vesicæ nato vrinam excerni. Vrinae per sinistrae natis vlcus transudantis historiam ex D. Iacobo Suterio refert Schenckius, in obseru. Militem per femur, vesica ea in parte sclopeto vulnerata, vrinam emisisse, scribit Fallopius, de vulneribus capitis, cap. 12. Puerum quendam duodecimum annum agentem, cum vrinam septimo iam die non redderet, propterea quod concretum quid ex pituita & sanguine vrinae ipsius canaliculos obstruxerat, eam tandem ex ano euacuasse, Antonius Beniuenius, de abd. morb. caus. & sanat. cap. 7. narrat. Vrinam per vulnus circa sedem inflictum excretam fuisse scribit Galenus, de loc. affect. cap. 1. Et talia exempla alia plurima passim occurrunt. Illud verò præ cæteris notabile est, quod annotauit Platerus, lib. 3. obs. pag. 735. Puellæ cuidam annos natae tredecim, cum aliquandiu copiosè minxisset, vrinam subito suppressam esse, atque tunc aquam ferofam ex aure dextra adeo affatim cœpisse effluere, vt vna vice mensuræ duæ sæpe emanarint, idque dies aliquot. Huic Medicus quidam diuretica exhibuit, atque simul etiam terebinthinam, post cuius vsum plus quam quaterdecies minxit, sed subito iterum vrina restricta aquaque illa ex aure denuo fluere cœpit, vt spat. 24. horarum mensuras aliquot excreuerit. Puella interim, vt scribit, bene habita, de nullo alio affectu conquerabatur. Cum capiti applicarentur oxyrrhodina ad repulsionem, & lotiones fierent pedum, ac iterum terebinthinam sumpsisset, denuo vrinam reddidit, primò magna copia, remittente aurium hoc fluxu, postmodum verò naturaliter, nec quicquam mali inde passa est.

Verum talia symptomata cum vel morbos à primo

ortu contractos, vel alios incurabiles sequantur, de ratione ea tollēdi dicere aliquid opus nō est. Quā ratione tamen Iohannes Langius fistulam in perinæo, par quam vrina reddita fuit, curauerit, supra de fistulis vesicae dictum.



## LIBRI TERTII

## PARS IX.

DE MEMBRORVM GENITALIVM  
in viris præter naturam affectionibus.

## P R O O E M I V M.

**Q**UOD homo sit mortalis, neque indiuidua perpetua durent; & nihilominus rerum Conditor sapientissimus species conservari & perpetuas esse iusserit, ita vt in locum vnus decedens alius succedat: per generationem, vt alia animalia, ita etiam hominem conservari voluit, & propterea ipsi peculiaria organa dedit, in quibus semē, futuri fœtus materia, generetur, conservetur, ac retineatur, tandemque cum appetitu & voluptate maximā in actu veneris emitatur, & a fœmina utero suscipiatur, & in eo ex semine viriusque parentis mixto fœtus formetur, ac suo tempore in lucem edatur. Organa autem generationis sua habet vir & fœmina. De fœminarū generationis organis, & morbis ac symptomatibus quæ iis accidunt, agemus de morbis mulierum. Hoc loco saltem de affectionibus præter naturam, quæ membris genitalibus in masculis accidunt, agemus. Sunt autem generationis organa in viris duorum generum, vnum genus ad seminis generationem & conservatorem facit, alterum ad eius eiectionem. In priori genere sunt testes, & ipsi adiectæ partes, in altero penis seu membrum virile. Vasa generationi & conservationi seminis dicata sunt vasa preparantia, vena scilicet duæ & totidem arteria, Parastæ dictata, vasa testibus incumbentia, testes, vasa deferentia, vesiculae seminales, & prostata seu glandulae seminales. An verò testes, an alia vasa semen generent, nonnulli in dubium vocant; & contra vulgatam opinionem testibus vim seminis generandi derogant, quod Physicis discutendum relinquimus. Hoc saltem non prætereundum censemus, Recentiores, qui testes semen generare negant, eā etiam ratione vri, quod in testibus semen non reperiatur. Verum ratio hac non magni momenti est. Neque enim omnia, quæ in viuente sunt, etiam in cadauere remanent, vt conspici possint. In viuente verò testibus semen contineri, obseruauit Dodonæus, vt cap. 39. Obseru. Medic. refert. Cum enim cuidam testiculus eximeretur, & calens adhuc medius divideretur, ex ipsius centro semen erupit. Cum verò testes vel intemperie, vel aliis morbis vix affici possint, quin parastæ, & vicina partes simul afficiantur, de morbis membrorum genitalium in viris seminis generationi inferuentium acturi, partes eas communi testium nomine complectemur: Cum etiam medicamenta hisce partibus non separatim adhiberi possint, sed ob vicinitatem & connexionem omnes simul ab iis afficiantur. Si qui tamen proprii morbi hic occurrant, eorum etiam in specie mentionem faciemus. Habent enim & hac corporis partes suam naturalem constitutionem, & non minora sapientia & omnipotentia Diuina in his partibus, quàm aliis, apparent indicia. Nam licet pudenda hæc partes dicantur, & tanquam obscæna tegantur: tamen vt rectè B. Ignatius, ad Philippenses, scribit, tunc demum aliquid est obscænum, cum per scelus illud polluiuntur: cum verò omne abest peccatum, nihil turpe censendum est; nihil mali eorum, quæ facta sunt, sed omnia valde bona. Et Augustinus hæc de re contra Iulianum capite 16. scribit, Genitalia



nitalia membra à Deo condita esse honesta & decora, sed per peccatum facta esse inhonesta, adeo ut iam tegantur. Ideoque ea hic non ut peccatis contaminata, sed ut a Creatore sapientissimo artificiosissime condita considerabimus, & quot modis à naturali illa constitutione deflectant, videbimus. Ac primò agemus de morbis testium, & scroti, deinde de morbis penis seu membri genitalis, tandem de symptomatibus, quæ circa generationem, & membris genitalibus accidunt.

## SECTIO PRIMA.

### De Morbis partium genitalium in viris, & primo de testium morbis.

## CAPUT I.

### De Testium intemperie.

Testium in-  
temperies.

**T**estes in Viris variis morbis corripuntur, intemperiei, interdum deficiunt, interdum abundant, interdum calculi in illis reperiuntur, interdum peccant magnitudine, patiunturque inflammationem, & tumoribus ac apostematibus corripuntur; retrahuntur versus abdomèn, vulnerantur, exulcerantur, cancro corripuntur, de quibus ordine dicemus.

### Causæ.

Causæ.

Et primò quidem testes sæpe morbis intemperiei laborant, & potissimum frigida, atque eadem simul etiam vasa præparantia corripuntur. Internæ causæ sunt partium internarum, ut cordis, hepatis, renum intemperies. Partes enim hæ cum sanguinem & humores ad vasa genitalia & testes mittant, si intemperie aliquâ laborant, faciliè eam testibus communicant. Externæ causæ sunt aer, imprimis frigidus, qui testes faciliè afficere potest. Cibus etiam & potus, ut & medicamenta, quæ excessum aliquem qualitatum habent. Vasa etiam spermatica alterant, & præcipuè calefaciunt, decubitus supinus, præsertim in lecto plurimis referto, equestratio nimia, gestatio onerum.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Cognoscuntur autem intemperies testium primò à causis, quæ præcesserunt, seu calefaciendi, seu refrigerandi, seu siccandi, seu humectandi vim habentibus. Qualis enim causa præcessit, talem intemperiem inductam esse verisimile est. Postea ex effectis. Si enim testes & vasa seminalia sunt calida, adest propensio in venerem, & semen multum ac calidum generatur, testes ipsi sunt calidi, & venæ circa eos multo sanguine refertæ.

Si testes & vasa spermatica sunt frigida, exigua adest propensio in venerem, ac si intemperies sit magna, etiam nulla; adest corporis quædam inertia, testes sunt frigidi, semen est paucum, aquosum & crudum, & cum exigua vel nulla voluptate emittitur. Præcesserunt causæ refrigerantes, vel etiam immodica & intempestiva Venus. Hinc qui ætate nondam maturâ veneri indulgent, eorum calor nativus exhauritur, & partes genitales frigidiores redduntur, ut postea in prima senectute statim steriles reddantur.

Si Humida testium sit intemperies, laxitas in iis apparet, & semen nimis celeriter emittunt, à coitu tamen minus læduntur, quam qui siccam intemperiem eorum habent.

Dan. Sennerti Tom. II.

In sicca enim intemperie testium hæc omnia sunt contraria.

Et quia ad intemperiem testium cognoscendam maximè facit naturalis testium intemperies; cum partes eâ intemperie faciliè corripiantur, ad quam naturalem inclinationem habent: signa intemperiei testium è Galeno subiungere libet. Ita autem ille; *Artis medic. cap. 45. & seqq.* Temperaturarum verò; air, testiculorum calida quidem ad venerem proclivis, & masculorum generatrix, & fœcunda, celeritèrque genitales partes obsepit pilis, simul autem circumiacentes attingit partes. Frigidior verò contraria efficit. Et humida quidem multo & humido semine abundat; sicca paucum, & modicè crassum generat semen; calidior verò & siccior, & crassissimum semen habet, & fœcundissima, ac celerrimè ab initio protinus ad coitum animal excitat, & his genitales partes citissimè hispidæ fiunt, atque omnes, quæ circumstant, supra quidem usque ad regiones, quæ ad umbilicum sunt, infra vero usque ad media femora. Petulca igitur est & ad libidinem prona huiusmodi temperatura, statim verò satiatur & offenditur. Si autem humiditas caliditati coniungatur, hirsuti quidem tales minus, plus verò semine abundant, non tamen plus cæteris appetunt, sed minori detrimento præter modum veneris indulgent. Quod si satis excreuerint & caliditas & humiditas, non sine detrimento à veneris abstinent. Si verò frigidiorē & humidiorē temperiem testiculi habuerint, partes circumpositæ glabræ sunt, & tardè rem venerem exercere incipiunt, neque prout ad actum huiusmodi sunt, aquosum verò & tenue ipsis semen, & parum fœcundum, & fœminaturni generatium, vel omnino non generans. Frigidior verò & siccior temperatura similis quidem in reliquis est ante dictæ, crassius verò in ipsa semen existit, atque omnino paucum.

### Prognostica.

1. Intemperies equidem testium ex se mortem non inferunt; cum etiam citra hominis interitum exscindi possint: ad generationem tamen multum faciunt, & alia incommoda afferunt. Frigiditas enim & siccitas testium sterilitatis causa est, caliditas verò cum ad venerem nimis stimulet, à bonis meditationibus animum abstrahit, & vel infelicitis vitæ, vel intempestivæ senectutis causa est.

Prognostica.

2. Corripitur autem facilius caloris excessus, quàm frigoris, qui & plus damni affert, & caloris nativus defectus difficulter curatur.

### Indicationes & Curatio.

Intemperies calida testium medicamentis refrigerantibus curatur, cum internis tum externis. Exhibenda medicamenta è lactuca, violis, rosis, nymphæ, endiviæ, portulacæ, papaveris, sem. frig. maj. Syrupi scilicet conseruæ aquæ, emulsionis ex his paratæ.

Indicationes  
& Curatio.

Extra scrotum & partes vicinæ foveantur aqua vel succo lactucæ, endiv. violar. umbil. Ven. portulacæ vel inungantur ol. rosar. violar. nymphæ, ung. rosar. vel imponantur folia recentia violar. nymph. viticis & viris.

Dieta medicamentis respondeat. Aer sit frigidior; cibus ac potus frigidus, prisana nimirum, & alij cibi condiantur lactucæ, endiv. cichor. aceto, succo citri, limoni, granat. Abstinentium à vino aut nonnisi δαλρυορδρον vel aqua dilutum bibendum.

Frigida intemperies testium curatur calidis internis & externis. Interna sunt Betonica, calamintha, maiorana, leuisticum, salvia, radices asparagi, eryngij, petroselin, feniculi, dauci, sem. anis. fœnic. eruca, napi, vrtice, cicer. rub. pistacia, nuclei pini, nox mosch. Indica, caryophylli, sinamomum, piper,

BBBBB 2

cubeba

# 1120 De Testium numero vitioso, &c.

cubeba & ex his parata medicamenta. Inter quæ sunt *speo. aromat. rosat. caryophyllat. diasatyr. diambra, diamoschum dulce.*

Externa medicamenta ex iisdem parantur, & propter ea testes fouendi sunt decocto modò enumeratarum plantarum facto in vino generoso vel Hippoeratico, vel inungendi *ol. nard. costin. nno. mosch. caryophyll. macis, cinnam. de piper. de formic. ex pistaceis. moscho, ambra, zibetho,* quod & solum illitum testes potenter calefacit.

Victus ratio sit calida, Aer sit calidus, testésque à frigore externo pannis, pellibus, aliisque tegumentis defendantur. Cibi sint boni succi & multi nutritiui, moderatè calidi & humidi, oua forbilia, carnes boni succi. Si sint medicamentosi, testibus familiares & amici sint, quales sunt fœnic. anethum, apium, ciceres rubri, bulbi, cepæ, rad. napi: & quidem herbæ commodius virides adhuc vsutpantur; siccæ enim plus quàm oportet calefaciunt & siccant. In secundâ mensâ dentur pineæ, pistacia, auellana. Corpus moderatè exerceatur.

Si humida vel sicca intemperies in testibus deprehendatur, corrigitur ea medicamentis humectantibus & siccantibus, qualia è calefacientibus & frigefacientibus modò propositis facillè eligi possunt.

## CAPVT II.

### De Testium numero vitioso, & calculis in iis repertis.

**T**ESTES numero duo sunt secundum naturam, unde etiam *Sidymos* dicuntur. Aliquando tamen nulli, aliquando pauciores, aliquando plures reperiuntur. Qui testiculis carent, Eunuchi dicuntur: quorum alij ita nati sunt, alij excisione testium tales facti, & quidem alij in pueritia statim, alij grandiores iam facti.

Aliqui vnum saltem testiculum habent, & quidem alij ita nati sunt, aliis alter excisione ademptus est, id quod interdum in hernia fieri solet.

Contra compertum, quosdam tres testiculos habuisse, idque nonnullis familiis proprium est, & singularis libidinis argumentum. Agathocles, Siciliæ Tyrannus, à Timæo *τεσπυς* dictus est, vt refert Cæl. Rhodigin. *antiqu. lect. lib. 24. cap. 4.* Idem scribit, *ibidem*, Bergomi in familia illustri Coleonum multos habere tres testiculos, & Franc. Philolpho totidem fuisse; & Fernelius, *lib. 1. patholog. cap. 8.* refert, se nouisse tertium testiculum omnibus quibusdam familiis superabundasse. Tertium etiam testiculum in quodam libidinis immoderatæ obseruauit Montuus, vt *cap. 37. som. 4. Anasce. morbor.* scribit: & in puero Typographi cuiusdam tertium testiculum se vidisse refert Scholiographus, *ad cap. 62. lib. 1. de morb. intern. Hollerij*; & Forestus, vt *lib. 27. obs. 15. in scholio* refert, nouit ciuem Anuerpianum, qui tres testiculos habebat & valde luxuriosus erat.

Talia autem vitia ipsis sensibus patent. Et quidem testium defectus virilitatem masculis adimit: vnum tamen testem habentes generasse, compertum; qui verò tres testiculos habent, libidinosi sunt. Et cum vitia hæc vel ab ipsa natura proueniant, vel arte inducta sint, curationem non suscipiunt, aut ea non necessaria est.

### Lapides in testibus.

**T**OPHOS in testiculis interdum reperiri scribit Paulus Aegineta, *lib. 6. cap. 63.* Et Monspelij in cadaueris cuiusdam dissectione testiculos lapillis plenos inuentos fuisse Gesnerus, *de fossil. lib. cap. 11.* scribit. Reperit quoque Fel. Platerus lapidem in testibus, vt alij quidam, quorum obseruationes collegit Schenckius, *lib. 4. obseruationum.* Generantur autem tales calculi procul dubio,

cum serum impurum, & calculo generando aptum sanguini, qui seminis materia futurus est, permiscetur, & cum eo ad testes deferretur, ibique in lapidem coagulat.

## CAPVT III.

### De Testium magnitudine vitiosa, inflammatione & tumoribus aliis.

**T**ESTICULOS & mammas aliis virosque, aliis alterutrum duntaxat immodicè increuisse refert Galenus, *lib. de diff. morb. cap. 9.* Quod vitium si naturale sit, corrigi vix potest. Si tamen testium nimis incrementum magnitudine minuere velimus, epithemata imponantur ex succo vel aqua plantaginis, rosæ. semperuiui, cydoniorum, aceto rosæ.

Contra interdum præter naturam testes planè contabescunt, cuius rei exemplum affert Vidus Vidius, *lib. 11. de curat. membrat. cap. 1.* de monacho quodam in agro Barcinonensi, cuius testes, etsi in adolescentia moderatam magnitudinem à natura essent adepti, nihilominus processu temporis, ob votum castitatis inuolubiliter ab eo multis annis obseruatum ferè penitus contabuerant, vasæque spermatica eiusdem adeo exaruerant, vt cum eius cadauer post mortem secaretur, exsiccatorum neruorum seu durorum ligamentorum potius imaginem præferent.

### Inflammatio testium.

Præter naturam verò testes variis modis intumescunt; inflammantur enim: & aliis tumoribus corripiuntur.

### Causæ.

Et primò inflammationem quod attinet, testes, vt alia corporis partes, interdum inflammantur, sanguine ad eos præter naturam confluente: id quod accidit, vel sponte eò ruente sanguine, vel ex percussione aut collisione, equitatione dura, aut ab alia causâ externâ sanguinem attrahere potente eò attracto. Et quidem testes nunc soli inflammantur, nunc simul scrotum, de cuius inflammatione postea dicetur.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur autem inflammatio testium, quod testis, quam secundum naturam, est tumidior & durior, dolor in eo percipitur, & præcipuè si digitis prematur, adest rubor atque calor. Quæ omnino, si scrotum simul inflammatur, sunt manifestiora. Febris etiam plerumque adest.

### Prognosticum.

Malum hoc est non contemnendum; cum testes non ad speciei conseruationem sint necessarij, iisque valde læsis facultas generatrix lædi solet, sed etiam interdum gangræna succedere solet. Plerumque tamen ea scrotum facilius, quàm testes corripit.

### Indicationes & Curatio.

Testium inflammatio secundum communes aliarum partium inflammationis curandi leges & ipsa curanda. Nimirum sanguis, qui ad ipsos præter naturam fluit, repellendus, interceptendus, reuellendus; deinde qui influxit discutendus, aut si suppuratio prohiberi non possit, ea promouenda.

Principio ergo statim sanguinis vena in cubito secta reuel

reuellendus. Postea etiam venæ, quæ in poplite vel malleolo est partis affectæ, aperienda.

Licet quoque post venæsectionem altero die cucurbitulas cum scarificatione coxis ad deriuationem imponere.

Si etiam alij humores, præcipuè biliosi, in corpore peccant, qui forsân fluxui sanguinis occasionem præbent, & ij euacuandi.

Simul statim repellentia adhibenda, testésque inuoluendi cataplasinate, ex farina hordei, fabar. pulu. rosar. rubr. mirryll. balauft. coctis in vino rubro vel aq. chalyb. addito ol. ros. & myrtillorum.

Vel epithema imponatur ex succo vel aqua rosar. plantaginis, mucilag. sem. psyllij, cydonior. cum aqua rosar. extractâ, cum ol. rosac. & cerussa mixtis.

Quæcumque autem medicamenta testibus applicentur, ligatura semper versus superiora tendat, vt testes minus dependeant. Ita enim fluxus ad locum affectum minus fiet.

Ad intercipiendum verò sanguinis fluxum ad latus pubis, vbi venæ & arteriæ ex abdomine ad testes & scrotum tendunt, intercipiens & defensuum medicamentum imponendum, ex far. hord. rosar. rubr. bolo mastiche cum aqua rosar. & albumine oui; vel vnguentum Comitissæ, vel emplastrum ad herniam.

Temporis progressu repellentibus ad dolorem leniendum admisceantur digerentia, fiantque linimenta ex ol. rosac. vnguento popul. dialthæa, & ol. chamæmelino.

Tandem ad digerendam materiam vsurpetur sem. lini, fœnigræc. flor. chamæmeli, meliloti, vt ex aliarum inflammationum curatione notum est.

Ad testium inflammationes etiam commendatur verbenæ recta in ol. cocta, vini particula adiecta. Laudatur & cataplasma ex fabâ Ægyptia decorticata cocta & cum melle mixta. Vt alterum ex pane cum ol. & aqua, interdum etiam cum mulla paratum. Vtile etiam est diachylum cum ol. ros. subactum.

Aëtius hoc ceratum commendat.

℞. Cera, resina pini, ol. aneth. narcisci an. Vnc. x. Cymini, fimi asini pilas iij.

Fimum asini torrefactum cribrato cyminumque admisceto, deinde cera liquefacta & alia admisceantur.

Si dolor valde vrgeat, leniendus refrigerantibus & laxantibus.

Vt ℞. Malu. violaria, solani an. M. j. fursur. pug. ij.

Coquantur & parti applicentur.

Vel ℞. far. hord. Vnc. ij. sem. lini, fœnigræci an. Vnc. j. malua, bisnau. ad mollitiem coctar. an. M. s. pingued. porci, ol. viol. an. q. s.

F. Cataplasma.

Si hæc non sufficiant, cataplasmate ex foliis hyoscyami coctis & contusis vtendum.

Si inflammatio in suppurationem conuertatur, ea adiuuanda, & abscessus maturus manus operâ aperiendus, tandemque mundandus ac consolidandus aliorum tumorum more.

#### Inflatio testium.

Inflatio testium. Testes etiam aliquando intumescunt, & inflantur sine febre, statibus crassis eos distendentibus.

Curatur autem inflatio testium per medicamenta flatu discutientia. Applicetur ergo testibus fimus columbinus cum far. fabar. & axung. porcina cum vino mixtis. Nonnulli folia hyoscyami ad inflationem testium & simul dolorem sedandum commendant. Alij origanum in aceto vel vino coctum & contusum, vel decoctum eius fomenti loco vsurpant.

Vel ℞. Pulu. rad. althæa, Vnc. s. far. fab. sem. lini, fœnigræci an. Vnc. j. cumini Vnc. s.

Coq. in vino & addito ol. aneth.

F. Cataplasma.

Vel ℞. Pulu. flor. chamæmel. meliloti, far. fab. an. Dr. vj. Dan. Semertt Tom. II.

stercor. caprimi. bacc. laur. an. Vnc. s.

Cum vino & ol. aneth.

Misce.

F. Cataplasma.

Vel ℞. fursur. tritici cribrati M. ij. far. fabar. Vnc. j. s. pulu. sem. cumini Vnc. s.

Cum vino dulci & ol. aneth.

F. Cataplasma.

#### Tumores duri, frigidi & scirrhi testium.

Non solum autem inflantur testes, sed & aliis tumoribus corripuntur, iisque etiam sæpe scirrhis. Quod accidit, vbi humores in inflammatione non discutuntur, neque etiam in pus mutantur, sed in testibus hærent, atque ibi indurantur; aut etiam aliàs frigidi & crassi humores ad testes fluunt, ibique indurantur.

Cognoscitur hic tumor & visu & tactu, estque sine dolore, vel cum exiguo; ac sine calore & febre.

Testium autem tales tumores difficulter curantur. Pars enim hæc laxa est, & faciliè excrementa suscipit, & recepta retinet in inuolucris illis, quibus testes teguntur.

Curantur verò, vniuersalibus præmissis, hi duri testium tumores emollientibus & discutientibus. Taliæ sunt; rad. althæa, farina sem. lini, tritici, passula. Commendatur & rad. lactucæ ex mulso cocta, aut cum farin. hord. & sem. lini ac fœnigræci mista. Vtile est etiam ol. amygd. amarar. irinum, anethinum. vng. dialthæa, Martiatum, emplastr. diachyl. simpl. & comp.

Vel ℞. far. fabar. Vnc. j. sem. lini Drach. ij. empl. diachyl. simpl. Vnc. j. ol. melilot. Vnc. j. s. aneth. chamæmel. hyoscyam. an. Vnc. j. sem. cumini Drach. j.

Coq. ad consist. ceroti mollior.

Vel ℞. fol. oaulium. hyoscyami an. M. j. ficus num. v.

Coq. ad mollitiem, & per setaceum traiciantur, quibus adde

Far. fabar. sem. lini, fœnigræci, pulu. flor. chamæmel. chamæmel. an. Vnc. s. adipis rennæ capræ q. s.

F. Cataplasma.

Vel ℞. rad. mandrag. recent. lb. s. hyoscyam. & alkekengi an. M. j.

Coq. in sapa ad mollitiem, & per setaceum traiciantur, quibus adde opopanax, Vnc. j. cera parum.

Misce ad formam emplastri.

Vel ℞. Emplast. diachyl. simpl. & cum gummi an. Vnc. j. ammoniaci vel bdellij Vnc. s.

Quibus addere licet quoque semen & folia hyoscyami. Efficacissimum est hoc.

℞. rad. Althæa, hyoscyami, balikacabi an. M. j. rad. mandrag. recent. lb. s.

Coq. in l. q. sapæ & contundantur ac per cribrum traiciantur.

Postea adde opopanax, bdellij, ammoniaci in vino liquor. an. Drach. vj. styracis Drach. iij.

Atque addito ol. melino F. Cataplasma, aut cera, emplastrum; quo medicamento, nisi scirrhus testium emolliatur & discutiat, frustra alia tentantur.

Si in pus talis tumor mutetur, pus non diu in teste relinquendum, ne eius substantiam corrumpat & vlcus insanabile vel gangrænâ exciter. Ideoque commodissimum est, testem tum excindere.

Sunt & alij testium tumores, de quibus postea, cap. 7. inter herniæ species dicetur.

## CAPVT IV.

### De Situ testium mutato.

Testes etiam situm quandoque quasi mutant, & nimis penduli fiunt: quod fit interdum ex nimia equitatione, interdum ex natatione in aquâ frigida, interdum

Situs testium mutatus.

ex materia frigida ligamenta, à quibus pendent, seu cremasteres laxante; quod accidit in morbis grauioribus & virium debilitate; ac testes penduli virium debilius sunt indicium.

Corpus. si opus sit, conueniente modo purgandum, & postea exsiccantia calida, si ab humoribus frigidis sit laxatio, non solum testibus & pubi, sed & ossi sacro imponenda, ex saluia, betonica, maiorana, primula veris & similibus.

Interdum contra testes versus abdomen tetrahuntur, vt bubonocelen quasi mentiantur. Interdum etiam planè in abdomine reconditi sunt. Idque nonnullis naturale est & nullo modo curari potest.

Interdum quoque accidit hoc ab inflammatione ligamentorum aut distensione neruorum, quod vbi euenit, emollientia & laxantia vsurpentur.

## CAPVT V.

De Vulneribus, Vlcerebus, Cancro & gangrana testium.

## Vulnera testium.

Testium vulnera.

Vulnerantur interdum testes: quod sanè periculo non vacat ob graua, quæ subsequi solent, symptomata. Ita refert Matthæus Glandorpius, in speculo chirurgico, obseru. 37. Iuueni cuidam dextrum testiculum frameâ transactum fuisse, vt in maximam auctus fuerit molem, & dolor ac deliria successerint.

Eadem curandi indicationes & leges habent testium, vt aliarum partium, vulnera.

Iuuenis cuius modò facta est mentio, curatus fuit, vena tali incisâ (potest etiam primum in brachio, si opus sit, vena aperiri) & clystere iniecto, testiculus etiam, vt & totum scrotum cum pene & pectine, inunctus fuit oleo rosaceo, & impositum cataplasma digerens ac roborans, adhibitumque emplastrum diapalma.

## Vlcera testium.

Testium vlcera.

Interdum post inflammationem relinquitur vlcus in testibus: nonnunquam & scroti vlcera testibus communicantur.

Sunt autem hæc vlcera valde periculosa, vt pote in loco humido, & sæpe in cancerum abeunt, aut in gangranam terminantur.

Vt verò, si possibile sit, rectè curentur, primò corpus conuenienti modo purgandum: deinde vlcus mundandum vnguento Apostolorum, adiecto vnguento Aegyptiaco. Lauandum etiam vlcus decocto rosar. balaustior. myrrillor. cum modico thuris in aq. plantag. & vino rubr. facto.

Deinde ℞. Tutia prepar. minij, plumbi vsti, amimonij an. Drach. ij.

Cum ol. myrtin. & cera

Fiat Vnguentum.

Vel vsurpetur istud Gordonij.

℞. Litharg. ceruss. cadmia, acacia, cortic. granat. sang. dracon. tutia an. Drach. ij. aloës, sarcocolla, thuris, aluminis an. Drach. j.

Puluerisatis adde cera & ol. q. s.

Fiat vnguentum.

Vt postea vlcus catne claudatur,

℞. Aloës hepaticæ, sarcocolla, anethi combusti, thuris, sap. hematita an. Drach. ij. alumin. vsti, flor. aris an. Drach. ss.

Cum ol. rosar.

F. Vnguentum.

Cicatrix tandem inducatur vnguento de minio, vel alio conueniente emplastro.

## Cancer testium.

Vlcera testium in cancerum sæpe abeunt. Habet eius rei historiam VVierus, in obseruat. talem. Iuuenis quidam Nobilissimus cum ex intempestiua Venere & assiduâ equitatione testium debilitatem contraxisset, & præterea lue Venerea laborasset, in herniam varicosam & sinistri scroti tumorem incidit. Quam cum chirurgi emollientibus curare tentarent, paucorum mensium spatio supra testem leue tuberculum, rubore aliquo tinctum, apparere cœpit, quo aperto nihil effluxit, nec vllum latentis in eo humoris indicium apparuit. In medicamentis ergo, quæ emollient, putrefacerent ac pus generarent, perseueratum est; donec se ostentaret latens cancer, qui breui tanto furore efferbuit, vt ater teretrimo cum foetore & frequenti sanguinis fluxu tumoris multam partem depasceretur atque exederet, ægròque tandem mortem afferret. Qui ante mortem valde deplorauit, quod VVieri consilio non esset obsecutus, qui suaserat, vt ab emollientibus, quibus cancer exasperatur, abstineret, & potius per leniter refrigerantia & exsiccantia incrementum mali prohiberet.

Cancer.

## Gangrana testium.

Tandem etiam testes ex inflammatione & vlcerebus planè corrumpuntur, & gangranam contrahunt. quod malum ferè lethale est, cuiusque rei exemplum habet Forestus, lib. 27. obs. 6.

Gangrana.

## CAPVT VI.

## De Scroti morbis.

Scrotum, quod est testium receptaculum & externum stregumentum, & ipsum aliquos morbos patitur; præcipue verò inflammatur, vulneratur, excoriatur & exulceratur, ac gangranam corripitur.

Scroti morbi.

## Inflammatiō Scroti.

Inflammatione interdum corripitur scrotum, & quidem nunc solum, testibus saluis, sæpiissime testibus simul inflammatis.

Causæ inflammationis sunt eadem, quæ in testiculorum inflammatione sunt propositæ. Nonnunquam tamen etiam in febribus; & præcipue malignis, inflammatio testium succedit, naturâ vitiosos humores ed trudente.

Inflammatiō autem hæc facile patet. Scrotum in tumorem attollitur, adest durities, rubor & calor, dolor lancinans, qui leui contactu exasperatur, febris plerumque comes est.

Inflammatiō scroti periculo non vacat. Cum enim sit in loco humido, facile in gangranam mutatur, vt postea dicetur.

Curandi ratio est eadem, quæ testium inflammationum.

## Vulnera Scroti.

Vulneratur etiam scrotum. Et si solum, testibus saluis, vulneretur, facile, vt alia vulnera, curatur. Si verò testes simul lædantur, curandum vulnus, vt cap. præcedente dictum.

Vulnera.

## Excoriatio Scroti.

Excoriatur interdum scrotum epidormide etosâ, quod infantibus sæpe accidit à lotio. Idem tamen & adultis ex eadem causa euenit, si vrinam in lectum emittant.

Excoriatio.

Curatur



Curatur in infantibus pompholygis seu nihili albi aspersione & linteis mundis ac siccis sæpe appositis.

Vel ℞. Vng. de ceruss. Vnc. ℞. litharg. Drach. j. ol. rosac. parum.

F. Vnguentum.

Vel myrtus arida subtilissimè trita & cribrata, adie- & o thure vel myrrha aut lapid. calaminari, aspergatur.

### Vlcera Scroti.

Exulceratur quoque scrotum, ab affluxu humorum acrium, vel post inflammationem; & quidem vel so- lum, vel cum testiculis.

Curatur autem iisdem remediis, quibus testium vlcera.

### Gangrena Scroti.

Post inflammationem quoque interdum gangrænâ corripitur scrotum. Ita memini anno 1603, hîc ciui cuidam, qui febre maligna laborabat, subitò materiam ad scrotum detrusam fuisse, atque hinc eius inflam- mationem excitatam, eamque vnica die in gangrænâ mutatam, totumque scrotum vsque ad abdomen eâ correptum fuisse: quod cum Cheirurgus sectione de- meret, testiculi nudi conspiciebantur: qui tamen ido- neis medicamentis adhibitis & gangræna sedata, car- ne à vicino abdomine succrescente obducebantur, vt testiculus vterque vna carne obductus pomi figuram referret. Vir hic diu vixit & senex euasit. Similem hi- storiam ex D. Petro Holzheimerio refert Glandorpius, in Speculo Cheirurg. obseru. 38.

Gangræna hæc non ita periculosa est, vt aliarum partium. Idoneis enim, quæ ad grāngrænā solent, adhibitis medicamentis, natura ipsa circa abdomen putridum à sano separar, & quod corruptum est, facile à cheirurgo demi potest.

## CAPVT VII.

### De Hernia & Scroti tumoribus.

Hernia  
Scroti.

INsignis verò scroti morbus est, qui ab intestinis lomentoque ex abdomine in scrotum delapso, vel fla- tu aut aqua in eo collecta, vel etiam carnea quasi mas- sa in eo genita excitatur, scrotumque inde in tumorem attollitur. Tumores hos pro diuersitate causarum, Græ- ci, vt postea diceretur, nominibus distinguunt. Latini autem indecoro, sed communi herniæ nomine appel- lant, vt scribit Celsus, lib. 7. cap. 19. Herniæ enim Sabi- norum lingua Saxa dicuntur: quod nomen præculdu- bio ideo hisce tumoribus scroti tribuitur, quod instar saxi duri sint. Et si verò de Hernia propriè dicta supra, part. 2. cap. 6. vbi de situ intestinorum mutato tractau- imus, egerimus: tamen hîc de eādē, vt morbus & tu- mor est scroti proprius, etiam agendum. Ea tamen, quæ loco allegato dicta sunt, hic non repetemus. Equidem herniæ propriæ dictæ nomen præcipue εντεροκήλη, & επιπλοκήλη, de quibus loco allegato actum, comperis. Verumtamen aliis etiam scroti tumoribus idem tribui- tur, & herniæ nomine etiam comprehenditur πνευμα- τοκήλη, hernia ventosa, υδροκήλη, hernia aquosa, σαρ- κοκήλη, hernia carnosa, κυρσοκήλη, hernia varicosa. Et si enim κήλη apud Veteres omnis tumor, quacunque parte esset, diceretur: postea tamen in specie vsurpari cœpit de scroti tumoribus modò dictis. Cum autem, vt dictum, de enterocèle & epiplocèle supra actum sit: restat iam, vt hic agamus de hernia ventosa, aquosa, carnosa & varicosa.

### De πνευματοκήλη seu hernia ventosa.

Pneumatocèle.

Πνευματοκήλη seu hernia ventosa aut flatuosa est

tumor flatulentus in scroto; & solet aliquando cum hydrocele, aliquando etiam sine eâ inuadere.

### Causæ.

Causa eius continens sunt flatus; qui vel à vicinis intestinis & abdomine transmittuntur, vel ob debilem partis calorem in eo colliguntur; & omnia quæ ad fla- tus generandos faciunt, quæ alibi sunt explicata, etiam hic locum habent. Estque hoc malum pectis satis fa- miliare.

Causa.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur pneumatocèle, quod scrotum, & inter- dum etiam vnâ testes, valdè distenduntur sine ponde- re & gravitate, flatusque, si manibus scrotum premi- tur, deprehenditur, & de loco in locum mouetur cum sono.

Signa.

### Prognosticum.

Leuissima autem & curatu facilima est inter reli- quas hæc herniæ species; cum flatus facilius, quàm aliorum tumorum in scroto causæ, tollantur.

Prognosticū.

### Indicationes & Curatio.

Curatur verò, vniuersalibus præmissis, & materia vnde flatus generantur, euacuata, flatus discutientibus remediis, iisdemque, quibus in colica à flatu vitimur, nim. flor. chamæmel, meliloti, ruta sem. cymini, carui, anethi, milij, bacc. lapri.

Indicationes  
& Curatio.

Corpore ergo euacuato talis clyster iniciatur, præ- cipue si flatus ex abdomine suppeditantur.

℞. Ruta M. ℞. flor. chamæmel, melilot. sem. anethi an. M. ℞. carv. cymini, lini an. Drach. ij.

Coq. Colat. ℞. ℞. electuar. bened. laxat. Drach. j. de bacc. laur. Vnc. ℞. ol. rutac. aneth. an. Vnc. jss.

F. Clyster.

Deinde ventri toti imponatur sacculus ex floribus chamæmeli, meliloti, sem. milij, cymini, carui, anethi.

Exhibeantur etiam flatus discutientia, galanga, cy- minum, caryophylli, theriaca, Mithridatium, aqua ze- doariæ, flor. chamæmeli & alia, quæ in colica flatulen- ta exhiberi solent.

Ipsi verò scroto talis forus adhibeatur.

℞. Origani, calaminph. ruta, flor. chamæmel, melilot. an. M. j. sem. carui, cumin. anethi an. Drach. ij.

Coquantur in vino pro fotu.

Postea inungatur scrotum ol. ruta, chamæmel, anethino, cheirino, laurino, costino, sambucino.

Vel imponatur cataplasma ex farina fabarum, lupi- norum, sem. cymini carui, flor. chamæmel, meliloti.

Vel ℞. Fimi vaccini ℞. sulph. vini, sem. cumini an. Vnc. ij.

Misce & cum s. q. melli & ol. anethin.

Fiat cataplasma.

Vel imponatur emplastr. è bacc. lauri vel meliloti.

In pueris autem & tenellis corporibus olea dicta sufficiunt cum aliquot guttis, aquæ vitæ; vel emplastra in olei dissoluantur.

Abstinentum à cibis omnibus, è quibus flatus gene- rantur.

### De Hydrocele, seu hernia aquosa.

Hydrocele est tumor scroti ab aqua in eo collecta; & accidit hîc tumor frequentius cum hydrope Ascite, aliquando etiam sine eo. Colligitur autem aqua vel in- ter erythroidem tunicam, & darton dictam tunicam, vel extra ipsam, inter eam & pelliculas adiacentes, vel in propria pellicula continetur, atque hoc genus her- niam in tunica superagnata vocamus. Aliquando verò

Hydrocele.

duplex hernia oboritur, cum materia aquosa & intra tunicam darton dictam, & in superagnata consistit, vt Aëtius, *teirab. 4. serm. 2. cap. 22.* scribit. Et quidem aliquando solum aqua scrotum distenditur, aliquando etiam flatus coniunguntur, vt in hydrope quoque fieri solet. Interdum etiam carnosa quædam substantia circa vasa spermatica concreta aqua tecta latet, quæ, scroto aperto, paulo post in cancerum malignum degenerat, cuius rei duo exempla recenset Guilielmus Fabricius, *cent. 4. observ. 65. & 67.* Vbi enim serosus humor acris est, venas capillares membranasque leuiter erodit, hinc pars illa sanguinis, quæ paulatim exsudat, in carnem concreuit, reliquum vero, quo serosum est, scrotum ita extendit, vt caro tactu explorari non possit. Idem etiam, *observ. 65.* refert, iuuenem sibi oblatum fuisse, quem cum ipse, & alij Medici ac chirurgi solum aquosa hernia laborare putarent, nihilominus cum caustico scrotum aperuisset, præter aquam etiam carnem quandam & induratum materiam circa vasa spermatica inuenta fuisse. Et si verò metueret, ne cancer suboriretur, tamen cum perpenderet ætatem iuuenilem, constitutionem corporis aliàs optimam & sanam, leniter emollientia & discutientia applicauit, è quorum usu cum malum non ingrauescere, sed potius duritiem decrescere videret, ad fortiora peruenit, & ita malum curauit.

### Causa.

Causa.

Aqua autem hæc rarò in ipso scroto generatur, sed ex abdomine affluit, in quo iis de causis, quæ in hydrope sunt expositæ, colligitur. Et licet interdum nondum hydrops adsit: tamen aliquid aquæ in abdominis cavitatem colligitur, quæ sensim in scrotum descendit; etsi tanta eius copia nondum sit, vt ventrem totum in tumorem attollere possit. Nonnulli quidem statuunt, si hydrops nondum coniungatur, destillare serosum eiusmodi excrementum in scrotum è vasis vrinariis illud ad vesicam deferentibus, si in earum tunicis raritas aliqua, vel à naturæ primordiis facta sit, vel processu temporis ob vim actioris vrinæ superuenerit, ob quam aliquæ eius guttæ assidue transsudent, quæ facile sibi aditum parare possint ob suam tenuitatem & loci propinquitatem ad testes & scrotum. Verum tunicæ illorum vasorum satis sunt densæ, vt non sit credibile, vrinam per illas transsudare posse.

Vero magis consentaneum est, si accadat hydrocele sine hydrope, aliquid humoris aquosi in abdomine cumulari, & hinc ad scrotum mitti, vel etiam à rene, vt mox dicetur, descendere, vel in ipso scroto ob partium imbecillitatem, imprimis accedente causa externa, vt percussione vel compressione, humorem aquosum colligi, præcipue si sanguis ille, qui per vasa spermatica ad testes deferretur, sit aquosior.

Tumor autem nunc totum scrotum, nunc dextram vel sinistram eius partem occupat. Et quidem cum scrotum vno saltem latere intumescit, citra externam causam, humor non est in scroto, sed in membrana erythroide testem continente. Et tunc nunquam dexter testis intumescit, sed saltem sinister, idque ob renem sinistrum male affectum accidit. Cum enim sinistræ partis seminalis vena non ex caua, veluti dextra, oriatur, sed ab emulgente sinistri renis procedat, si ren sinister male affectus sit, nec officio suo rectè fungatur, pars vrinæ cum per renem male affectum descendere non possit, per seminalem venam in tunicam erythroide delabitur, & tantus tumor interdum excitatur, qui etiam caput humanum sæpe æquat.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Tumor ipse oculis patet. Esse a. eum ab aqua, à fluctuatione, quæ, dum tumor premitur, animaduertitur,

cognoscitur. Præterea scrotum lucidum quasi apparet & præcipue si candela ei opponatur, ægerque de pondere & gravitate conqueritur: neque etiam tumor per compressionem in abdomen recedit, vt in hernia ab intestinorum prolapsu fieri solet, sed semper ferè eiusdem magnitudinis apparet. Vbi testes soli intumescunt, scrotum adhuc rugosum aliquo modo apparet; quod non accidit, vbi aqua inter scrotum præcipue continetur.

Quo in loco verò, & inter quam tunicam humor aquosus contineatur, sic cognoscitur. Si inter erythroide tunicam contineatur, tumor erit rotundus, paulo longior, oui instar, testiculusque ibi visui & tactui occultatur, scrotumque ipsum albidius est, & nihil aut parum intenditur. Si extra erythroide tunicam sub darto lateat humor, testiculus tactui occurrit, scrotum magis intenditur. Si verò in superagnata tunica humor hæreat, tumor vndique conglobatus alterius testiculi imaginem refert.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Malum hoc pro causarum varietate nunc magis nunc minus periculosum est. Quæ enim cum hydrope coniungitur hydrocele, non curatur, nisi hydrope prius curatâ, & eius causa ablata. Nam licet aqua semel vel discutiat, vel scroto apertione euacuetur: tamen noua rursus affluit. Si verò causa aquam generans minus grauis sit, facilius curatur.

2. Qui à causa externa est scroto tumor, non ita difficulter curatur.

3. Is, qui est in sinistro teste à sinistri renis vitio ortus, difficulter curatur, & non nisi rene curato, quod sæpe impossibile est: & temporis progressu ab acrimonia humoris substantia testis corrumpitur, & immedicabile vlcus excitatur. Licet etiam testis sectione auferri possit, & ita tumor tolli: tamen postea humor, qui antea in testem descendebat, in corpore hæret & alia mala excitat. Ita refert Dodonæus, *obs. 39.* Anglum quandam in grauissimum testis sinistri dolorem incidisse, qui nullis remediis leuari poterat. Cum verò vltimum remedium videretur sectio & testis ablatio, ea Antuerpiæ instituta est. quæ cum perageretur, hydrocele latuisse deprehensum, cum copiosa in secantis faciem aqua exsiliet. Curatus verò & sanatus à vulnere paulo post de lumborum dolore & gravitate conqueri coepit, in pube etiam circa cicatricem dolor cum tumore successit, & aliis accedentibus symptomatibus mors secuta Corpore aperto deprehensus ren sinister admodum, ac iusta quantitate maior, & substantia interiore haud parenchymatis colorem referens, sed candida, concreto ac indurato puri similis. E quâ observatione apparet, causam tumoris aquosi testiculi sinistri fuisse renem sinistram male affectum; Symptomatum verò superuenientium & mortis subsequenter testis exsectionem. Cum enim teste ablato serosus ille humor ad testem confluere amplius non posset, in corpore relictus symptomatum variorum & mortis causa fuit.

### Indicationes & Curatio.

Indicationes & Curatio.

Curatio duobus perficitur, primò vt aquosi humoris generatio, & affluxus prohibeatur; deinde is, qui iam præsens est, in scroto euacuetur.

Quapropter si simul hydrops coniunctus est, curatio ad eum præcipue dirigenda, & aquosi humoris generatio prohibenda: quod etiam faciendum, si sine hydrope, aqua in abdomine colligatur. Si verò sinistri testis vitium, sine hydrope tumoris causa sit, ad sinistram renem curatio est imprimis dirigenda. Et omnino cautè agendum, si hernia sit in sinistro teste, ne malo curato grauiora eueniant symptomata. Itaque si vitium aliquod insigne sit in rene, vel planè à curatione

ne abstinendum, vel scrotum tantum in inferiori parte incidendum, ut serosus ille humor effluat. Imò interdum singulis annis id facere opus est. Ita refert Guilielmus Fabricius, *cent. 4. obs. 66.* Ioh. Griffonium Chirurgum Viro cuidam sexagenario propter herniam aquosam singulis annis scrotum parte inferiore perforasse, & serosum humorem euacuasse, ac postea vlcus ad cicatricem perduxisse, atque hominem istum ad summam senectutem peruenisse. Si verò in rene vitium non fuerit, & defluxum planè impedire libuerit, incisio in superiore parte scroti propè inguina facienda, ut non solum serosus humor euacuetur, sed prohibeatur etiam, ne rursus noua aqua in scrotum defluat, quod cicatrix in erythroide facta impedit. Cuius curationis exemplum *ibidem* habet Fabricius. Cum n. Vir quidam quadragenarius herniâ aquosâ in parte sinistra laboraret, corpore prius purgato, egroque in sellâ collocato, scrotum in superiore parte vsque ad tunicam erythroidem incidit, ipsumque ex anteriore parte ab ipsa membranâ aliquantum separauit, & acu incuruatâ ac filo reduplicato vniuersam hanc tunicam (præter vasa seminalia) apprehendit, & modiocriter constrinxit atque ligauit. Postea ex inferiore parte ligaturæ membranam iam antè dictam secundum longitudinem incidit, & aquæ libras aliquot, sed paulatim, extraxit, deinde turundam satis longam albumine oui madefactam ad latus testiculi & inferiorem partem scroti versus infixit, & inguina ac ventrem infimum oleo rosaceo inunxit, & hapsum cannabis, vitello atque albumine oui cum paucâ aquâ rosacâ conuassato madefactum applicuit.

Postero die hoc digestiuium apposuit.

℞. *Terebinth. lota* Drach. ij. *cera noua* Vnc. β. *gummi elemi* Drach. j. *ol. rosac. amygd. dulc.* an. Vnc. β. *de vitellis ouor.* Drach. ij.

Dissoluatur *gummi* lenissimo igne cum *oleis, terebinthina*, & *cera* separatim cum *pauillo olei* liquefactis & additis, fiat vnguentum: tum admisce *vitellum oui vniuersi, croci* Scrup. β.

Neque processum hunc, antequam vulnus probè esset digestum, mutauit. Tunc puluerem mundificatiuum vlceri & turundis quotidie inspergit, & vlcus per duos menses apertum tenuit, & corpus per interualla purgavit, vulnusque cicatrice obduxit. Ab eo tempo vir ille benè valuit, optimam tamen victus rationem obseruauit, & singulis annis aliquoties corpus purgavit.

Ipsam vero aquam in scroto contentam quod attinet, euacuatur ea vel insensibiliter, vel sensibiliter scroti apertione. Insensibiliter euacuatur per discutientia, de herniâ statulentâ proposita, quæ tamen hic potentiora esse debent.

Qualia sunt, *farina fabarum, bacca lauri, flores chamemeli, meliloti, sem. dauci, fœnigraci, agni casti, cumini, carui, pulegium, calamintha, ruta, organum, sulphur, nitrum, ammoniacum.*

E quibus sunt *fomenta, cataplasmata, inunctiones, emplastra.*

Vel ℞. *Calamintha, origani, ruta, flor. chamemel. meliloti* an. Mj. *sem. dauci, carui cumini, viticis* an. Vnc. β.

Contusa crasso modo coq. in aqua f. q. ad tertiæ partis consumptionem.

Vel ℞. *sem. cumini* Vnc. ij. *bacc. laur.* Vnc. ij. *salis* Vnc. jβ. *sulph.* Drach. j.

Coq. in lixiuio ad tert. part. consumpt.

Colatura spongia imbuatur, qua scrotum foueatur. Post forum imponatur hoc cataplasma.

℞. *far. fabar. Vnc. iij. sem. lini fœnigraci. pulv. flor. chamem. melilot.* an. Vnc. j. *cumini* Vnc. β.

F. Cataplasma, cui, si libet, *ol. chamemel, & rutac.* addatur.

Vel ℞. *Cochlear. cum testis contusar. Ziv. bacc. laur. sulph.* an. Vnc. ij. Cum f. q. lixiui.

F. Cataplasma.

Vel ℞. *far. fabar. Vnc. iij. pulv. flor. chamemeli* Vnc. jβ. *sem. cumini, sulph. an. Vnc. j. sterc. caprini* tβ. β.

Cum lixiuio fiat cataplasma.

Vel ℞. *Ol. irini, rutac. laurini* an. Vnc. iβ. *bdellij vino soluti* Vnc. β. *sulph. vini* Drach. ij. *sterc. caprini. q. s.*

F. Linimentum.

Vtile est etiam vnguentum Agrippæ & Arregon.

Vel fiat tale emplastrum.

℞. *cera tβj. terebinth. Vnc. iβ. bdellij, ammoniaci* an. Vnc. ij. Misce.

F. Emplastrum.

Quod si insensibiliter aqua discuti non possit, sensibiliter euacuanda scroto aperto. Aperitur autem scrotum scalpello: quod quidem præsidium, si intra scrotum saltem aqua contineatur, satis tutum & efficax est: si verò intra proprias testium tunicas delitescat, minus tutum & efficax. Chirurgiam autem hanc integrè describit Paulus Aegineta, *lib. 6. c. 62.* Aëtius, *terrab. 4. ferm. 2. cap. 22.* Celsus, *lib. 7. cap. 18.* qui ibi videantur.

Potest etiam scrotum cauterio seu actuali seu potenciali aperiri.

Si cum hernia aquosa caro aliqua circa testiculum concreuit, cautè curatio instituenda, cum facile malum in cancerum abire soleat. Cuius rei exemplum habet Dodonæus, *in observ. cap. 40.* Vir enim quidam generosus, cum hydrocele parte sinistra aliquoties laborasset, aperiri scalpello tumorem sibi permisit. Effluxit citò omnis humor, tumor quoque subsedit. Sed cum testis ipse omnino esset corruptus, vicinas partes facile infecit. Subsecuta mox scroti vniuersi, ac etiam penis, cum tumore & ingenti dolore, gangræna, & tandem mors. Ideoque consultissimum est, scrotum incidere, ac testiculum & quicquid circa ipsum concretum est, separare atque excindere, dummodò id fieri radicitus possit. Si enim scirrhus illa materia processum iam occupat, & abdomini adhæret, frustra curatio instituitur. Si verò materia maligna non sit, ut curari possit, emollientibus id præstandum, ut supra ex Guil. Fabricio, *cent. 4. obs. 66.* dictum.

Ita etiam si testiculus ex aqua corruptus sit, quod ex foetore & prauo colore aquæ cognoscitur, testis extrahendus est, ut in hernia fieri solet.

Recentiores hic adhuc vnam herniæ speciem addunt, quam humoralem vocant, eamque ab omnibus humoribus, excepta bile, provenire statuunt. Verum si à sanguine sit hic tumor, & quidem cum inflammatione, pertinet ad inflammationem scroti & testium, de qua supra dictum: aut si ex eo caro quædam concreuit, pertinet ad sarcocelam, de qua mox dicetur: si ab aqua est, est hydrocele: si ab humore aliquo crasso, & indurato, ad tumores frigidos & scirrhum testium pertinet, de quibus supra diximus.

Hernia humoralis.

### De Sarcocèle seu hernia carnosâ.

Aliquando etiam quiddam carnosum in scroto nascitur, testibusque adnascitur, & scrotum in tumorem attollit, qui sarcocèle seu hernia carnosâ appellatur.

Sarcocèle.

### Causæ.

Generatur autem hæc hernia ex sanguine impuriore ad testes & scrotum copiosius affluente, ibique in substantiam carni similem mutato. Huic autem sanguinis affluxui occasionem præbent, hernia intestinalis, ictus, percussio, lapsus, sectio ramicis non rectè instituta. Ut enim in arteriis, si cortex externus vulneretur vel contundatur, ex affluente alimento nodi fieri solent: ita etiam si membranz vasorum rumpantur, vel contundantur, ut quidem sanguis non copiosius effluat, sed alimentum affluens sensim exstillet, ex eo talis caro à natura, quæ nunquam otiosa est, produci solet: Vbi tamen ipsa natura sæpe simul data via cum bono alimento

Causæ.

alimento vitiosos aliquos humores extrudit, eosque in talem luxuriantem carnem conuertit. Aliquando etiam materia hæc planè induratur & in scirrhum conuertitur.

Quæritur autem hic non sine causa, cur hernia carnosa plerunque in dextro testiculo fiat, sicut aquosa in sinistro. Scribit enim Guil. Fabricius, *cent. 4. observ. 64.* se vnicum tantum herniâ carnosâ ex sinistra parte laborantem vidisse, reliquas omnes in dextra parte fuisse. Causa huius rei mihi videtur hæc, quod vas præparans seu vena seminalis dextri testiculi ab ipsa vena caua, sinistra verò ab emulgente oritur. Etenim si sanguinem natura ad testes depellere velit, rectissime id fit per dextram venam seminalem, quæ ab ipsa vena caua oritur, sicut contra serosi humores facilius ad sinistram testem detruduntur per venam seminalem ab emulgente oriundam.

### Signa Diagnostica.

Tumor in scroto est durus, sine inguinis tumore, sensum auctus; quo modo ab hernia intestinali differt, quæ mollior & subitò oboritur. Si tumor sit durus & scirrhusus, nec dolor nec calor adest; si verò tumor sit malignus, dolor punctorius percipitur.

Videndum tamen diligenter, ne hydrocele vel alius testiculi tumor pro carnosa hernia habeatur, quod interdum accidit, si aqua profundius lateat, & extra, etsi candela adhibeatur, nulla sui signa exhibeat. Tale exemplum habet Forestus, *lib. 27. obs. 25. in Scholio*, de quodam viro, qui testem vnâ cum scroto in modum scirrhi paulatim in maiorem modum auctum, & durum per quinque annos habebat, ut omnes sarcocoelem esse putarent. Postea tamen cum emollientia & maturantia applicarentur, tumor mollior euasit, & factò abscessu magna aquæ copia, quæ intus latuerat, cum impetu quodam erupit, unde scrotum & testiculus detumuit, ægerque sanus euasit.

### Prognosticum.

Difficiliter hic tumor curatur, præcipuè si sit inueteratus, & plerunque non nisi chirurgiâ, qua vna testis tollitur.

### Indicationes & Curatio.

Vniuersalibus præmissis, curandi via duplex est, nimirum ut vel per reprimentia tumoris incrementum inhibeatur, & per exsiccantia tumor absumatur; vel, si hæc non profunt, chirurgiâ caro illa, quæ præter naturam excreuit, tollatur. Nonnulli quidem etiam hic maturantia adhibere iubent. Verum cum non scirrhus sit, sed caro, quod excreuit, emolliiri non potest; & si emollientia adhibeantur, caro magis excreuit.

Possunt tamen etiam interna medicamenta, ad absumendam sarcocoelem vsurpari. Ita scribit Matthiæolus, *in Dioscoridem, lib. 3. cap. 18.* se nouisse quendam, qui ononidis radicis puluere duntaxat pluribus mensibus sumpto, carnosum ramicem absumpsit, & sanatus est; licet à Medicis nullo alio medicamento, quàm sola sectione vitioneque hunc curari posse, statutum esset.

Externa medicamenta quod attinet, sequentia à Medicis tribus Delphensibus pro Doctore Iohanne Heutero, anno 1529. præscripta fuisse, scribit Forestus, *lib. 27. observ. 23. in scholio.*

*℞. Maluarum, parietaria, flor. chamameli, meliloti an. Mj. extremitat. absinthij p. j.*

*Coq. in aqua ad mollietatem exprimantur & contundantur contusis, adde far. fabar. orobi an. Vnc. iij. sem. lini, pulv. cumini an. Vnc. j. vini Rhenani succ. caulium, mellis an. q. s.*

Coquantur ad formam cataplasmatidis.

*Item ℞. rosar. cum capribus, myrtill. sumach, balustiorum, cortic. granator. mucum cupressi an. Drach. ij. acacie, aluminis an. Drach. j.*

*Coq. in aqua fabrorum, pro tibi. Adde aceti Vnc. ij.*

*Item ℞. Præfij, ruta, flor. chamamel. meliloti an. M. j. maluar. parietar. an. Mj. sine extremitat. absinthij an. pug. j.*

*Coq. in aq. ad mollietatem, & contundantur optimè; Adde farine fabar. orobi ana. Vnc. ij. pulv. cumini, nucum cupressi an. Vnc. j. stercor. ouilli lb. s. lixiuij comm. succi caulium, mellis q. s.*

*Coq. ad formam cataplasmatidis.*

Alia etiam medicamenta; quibus Hispanum quendam septuagenarium ab hernia quadam carnosa magnitudine capitis infantis liberatum scribit, *ibidem* videantur.

Si verò medicamentis malum curari non possit, & moles tumoris ægro molesta sit, sectione tollendus, & eute in inguine aperta euulsisque vasis seminariis cum illius loci teste, ligatisque simul vasis sub ligatura, caro amputanda. Minus periculi est si non in inguine, sed scroti latere tumente sectio fiat, & testis cum carne illi adnata per vulnus extrahatur.

### Cirsocele, seu Hernia Varicosa.

Si verò vasa, quæ testiculos nutriunt, varicum more dilatentur, & tumorem in scroto efficiant, Cirsocele, seu Hernia variosa nominatur.

### Causa.

Causa huius tumoris ferè est humor melancholicus ad scrotum, & imprimis vasa, quæ testes nutriunt, effusus; quod accidit interdum in fine morborum ab humore melancholico ortorum: & aliàs etiam humor melancholicus in corpore cumulat ad hæc loca transponi interdum solet.

### Signa Diagnostica.

Cognoscitur hoc malum, quod tumor est minor, & quidem circa ea vasa, quæ testiculo alimentum præbent, ac cum pars affecta tangitur, apprehenduntur illa vasa quasi funiculi, tumorque est aliquantum obliquus, & racematim ac vix in modum quasi conglomeratus, cum testiculi relaxatione. Cæteris quoque temporibus, & præsertim vere ac autumno, ac cum intestina à flatibus distenduntur, aut pedes refrigerantur, dolor comitatur hanc Herniam, cum scilicet vasa illa distenduntur.

### Prognosticum.

Malum hoc, ut alij ab humore melancholico orti tumores, curatu sat difficile est.

### Curatio.

Vniuersalibus præmissis, & humore melancholico expurgato, Curatio, ut in tumoribus melancholicis, instituenda. Et quidem nonnulli hanc Herniam sectione curant. Verum hæc cura quædam incommoda & pericula coniuncta habet. Nam sine testis læsione vix fieri potest. Quapropter præstat prius medicamenta exsiccantia experiri, simulque testes semper in fascia & subligaculo suspensos gestare. Medicamenta autem illa sint balustia, cortices granatorum, rosæ rubræ, bolus Armenus, nuces cupressi & similia. Testaturque Fallopius, quendam eò solum curatum fuisse, quod testes per duos menses in fascia suspensos gestarit, & singulis diebus aquam è nucibus cupressi in vase duplici destillatam adhibuerit, eaque scrotum humectarit, atque per se exiccati permiserit.

Alij emollientibus & discutientibus curam moliantur,

Cur hernia carnosa plerunque in dextro testiculo fiat; & aquosa in sinistro.

Signa.

Prognosticum.

Indicationes & Curatio.

Externa.



tur, & propterea vſurpant balneum ſemicupium ex decocto rad. alth. ſem. lini, ſefami & ſimilium; ac poſtea inungunt locum oleo ſefamino, amygd. dulcium cum bdellio, idque diebus octo continuant. Deinde adhibent balneum ex lixiuio, in quo cocti ſunt flores chamamelis & ſemen ſœnigraci. Tandem applicant hoc cataplaſma.

℞. Rad. ſcrophul. bryon. an. lb̄ss.

Coq ad molliorem.

Contuſis adde pulu. flor. chamamel. meliloti, ſem. anethi an. Vnc. j. farina orobi Vnc. ij. ſurfuris Vnc. iij. croci Dr. ſs. ol. amygd. dulc. & lilior. albor. an. q. ſ.

F. Cataplaſma.

### Lapides in ſcroto.

Lapides ſcro-

Tandem inter morbos ſcroti non prætereundi lapides, qui aliquando, etſi raro, in ſcroto reperiuntur. Ita Iacobus Moccus refert, citante Schenckio, lib. 4. obſeru. Monſpelij quendam ſcroto præputium habuiſſe, tandemque ex putredine ruptum apertumque fuiſſe, lapidemque inde in quinque partes diffractum exciſiſſe. Qui lapis p. culdubio in ſcroto primariò generatus fuit. Aliquando verò in eo ex veſicæ ſectione & calculi ex ea extractione minus rectè inſtituta generantur, cuius exemplum ex obſ. D. Ioachimi Camerarij, ibidem, recenſet Schenckius. Cum enim iuueni cuidam lapis ex veſicæ ſectione extractus eſſet, & lithotomus minus peritus tantum reſpexiſſet ad externum vulnus, neglecto altero ad collum veſicæ, id in fiſtulam degenerauit. Ex ſordibus ergo & ſabuloſa materia circa collum veſicæ, & in ipſo ſcroto collecta, tandem lapilli plurimi concreuerunt, ac ſcroto intumuit, vt pro herniſo illum omnes haberent. Natura tandem exitum quærente fiſtula ſuppurata aperta fuit. & lapides paulatim protrui ad viginti tres circiter. At cum tumor & dolor non decreſcerent, ſed & iſchuria periculoliſſima ſuperueniret, ſectio inſtituta fuit, atque exempli lapilli centum & quinquaginta duo, quorum duo grandiores lupinos referebant magnitudine & figura. Fiſtula deinde mundata fuit, & topicis conuenientibus magna diligentia adhibitis ſpatio vnus menſis æger ille valetudinem ſatis tolerabilem eſt aſſecutus.

## CAPVT VIII.

### De Penis morbis.

Et primo de Meatus in pene vitiis, de penis diſtortione, inflatione, & inflammatione.

Penis morbi.

Meatus vitia.

Penis ſeu membri virilis præcipuus vſus eſt, vt per id vrina euacuetur, & ſemen virile in vterum ſceminæ iniiciatur. Quos vſus vt rectè præſtare poſſit, ſuam naturalem conſtitutionem habet, ab Anatomicis deſcriptam, quæ tamen variis modis læditur. De meatus huius, quatenus vrinæ emittendæ inferuit, anguſtia ſupra, part. 8. ſect. 1. cap. 7. 8. dictum. De glande verò imperforata in ſpecie poſtea cap. 10. dicemus.

Contra obſeruatum à Veſalio, lib. 5. de corp. humani ſub. cap. 14. quendam in glandis apice (& præcui dubio etiam in toto pene) duos obtinuiſſe meatus, vnum ſceminæ, alterum vrinæ paratum. Platerus etiam, vt lib. 3. obſ. refert, obſeruauit. Nobilem quendam, præter foramen in media glandis ſede aliud quoque ſubtus, circa glandis radicem & præputij exortum ab ortu habuiſſe, per quod & vrina & ſemen quoque emittebatur. Tale vitium etſi ſit ab ortu, ſpes tamen curationis ſuper eſt, ſi foraminis labia vtrinque abradantur, & vulnus poſtea curretur, vt foramen hoc claudatur.

Numerum poſtea quod attinet, Penem quendam duplicem habuiſſe, Doct. Ioh. Iacob. VVeckerus Bononiæ in Anatomia publica vidit, vt Schenckius, lib. 4. obſ. 8. refert. Quosdam etiam membrum virile nimis breue habuiſſe obſeruatum eſt. vt & quosdam ſine membro virili natos. Quidam etiam id ſectione amiſerunt.

Præterea diſtorquetur nonnunquam & inflatur penis, interdum quoque inflammatur, tubercula meatus anguſtiam patitur, vulneratur, exulceratur, fiſtulis corripitur, gangrænam patitur: præputium interdum clauditur, interdum retrahitur, vt reduci non poſſit, interdum planè de eſt, de quibus iam agendum. Hoc prius in genere monendum, his morbis, qui poſt ortum contrahuntur, magis iuuenes, quam ſenes eſſe obnoxios, ſunt enim iuuenes ſalaciores & ad venerem procliuiores, & hinc ſæpe varios morbos contrahunt. Humores etiam ſunt in iuuenibus calidiores & æcriores, qui ſi ad membra genitalia commoueantur, varios morbos procreant.

### Diſtortio membri virilis.

De numero mutato & breuitate vt aliquid amplius, præter ea, quæ modo dicta ſunt, addatur, opus non eſt, cum vitia iſta ſint incurabilia. Diſtorquetur verò interdum penem, vt generationi minus aptus ſit, comperitum. Ita ſcribit Hollerius, comm. ad aph. 63. lib. 5. Vidimus, inquit, qui membro ita oborto non poterat gignere, quod ſemen ſemper hæſitaret in ceruice vteri. Huic paratus eſt canaliculus plumbeus, vel argenteus accommodatus craſſitudini ipſius penis, in quem immiſſo, pene circumpoſita & alligata ſunt ciſtellæ, ita vt tandem figuram membri ſi naturalem recuperaret, & genuerit. Et peculiariſ penis diſtortionis mentionem facit Iulius Cæſar Arantius, de tumoribus præter naturam cap. 50. de quâ ipſius verba referre libet. Veneri nimirum additis rarum affectionis genus, antiquis ignotum, quod ſpeciei propagandæ aduerſatur, interdum accedit. Etenim genitale diſtenditur, ac ſpiritu turgens vtiſ cum doloris ſenſu diſtorquetur, quò ſit, vt ſemen in vterum rectè eiaculari nequeat. De hoc morbi genere neminem reperi, qui ita pertractari, vt verum affectus cauſam nubiſſe videatur: appellant tamen nodum penis. Nam etſi de miſſo & flaccido genitali nihil percipiatur incommodi, particulam tamè pertractanti parua quidam tumor faba vel glandula ſpeciem referens percipitur. Huic affectui pleroſque vidi, cauſa ignaros, emollientia adhibuiſſe, quod arbitrarentur, ſe duriuſculam illam ſubſtantiam quaſi humore affuſo imbutam, diſcutere poſſe. Sed tantum abſiit, vt id præſtarent quod etiam quotidie in deterius lapſi fuerint: nam arietini cornu in modum, in illud latius, quò tuberculum eſt, mentula reſſectitur. Sed age cauſam pateſciamus: primum tamen in memoriam euocare oportet, genitale viri nihil aliud eſſe, quam duo ligamenta à pubis eſſe exorta, rotunda, atque intus arundinis in modum caua, fungoſa tamen, & rarâ ſubſtantia prædita, quæ ſpiritu influente turgent. Qui verò Veneri nimis indulgent, frequenterque & diu, in mulierculis placeant, diſtendunt ſunt genitalia, in hoc malum incidunt. Etenim ſpiritus ille incluſus in aliquam alterius ligamenti conuicam partem impetum faciens, eius particulam ita impellit, vt eam relaxet, ac protuberare faciat, quò ſit, vt quantum latitudini affectæ particulæ adiciatur, tantum longitudini detrahatur. Quod verò protuberat mentula, id ex propria natura ligamenti, non autem ob noui humoris affluum accidit, vt morbus in figura, non in magnitudine conſiſtus ſit. Satis igitur ex iam dictis conſtare videtur, quod emollientia adhibentes à ratione recedant, & affectum quotidie augeant, cum laxatum compingi & roborari poſtulet. Conueniunt igitur, quæ procidenti umbilico atque hernis deſcripta ſunt, ſortis præterea, ex vino aſtremo, nigro in quo gallæ abſinthium, myrtilli, balauſtia, ſumach & eius generis effuerint. Commoneſcendi ſunt interim agri, vt à veneris abſtineant, vel parcè vtantur, vſquequo affecta particulæ conſrmetur.

Numerus vitiis.

Diſtortio penis.

Nodus penis.

# 1128 De Tuberculis & verrucis penis.

confirmetur. Sed hac ad noui affectus cognitionem & curationem dicta sint satis, si mihi ad hunc usum probata medicamenta adiecero.

℞. Aq. nucum pini, nucum cupressi, omphacii, aqua myrtill. an. Vnc. iij. M.

Et ex his tepidis lintea madefiant, genitaléque obuoluntur.

Aliod.

℞. Cort. myrobalanor. citrinor. myrobal. chebul. an. Vnc. s. nuc. cupressi num. xv. pini num. iij. ros. rubr. p. j. absinth. Pontici M. j. gallarum, granarum myrti, sem. sumach. an. Vnc. j.

Contundantur, incidantur, macerenturque omnia in vino nigro austero & aqua nucum pini, ac destillentur per balneam, egredieturque aqua magna virtutis ad constringendum. Hac decoctione repida madentia lintea adhibeantur: predicto enim affectui curando apertissima est, admirabilique ad precauendum à lue. Mentrea facultate pollet, si quis imbuta lintea inter glandem & præputium contineat, & eadem aqua interdum mentulam lauerit. Est enim quasi antidotus, quæ prohibetur ne ob infecta mulieris congressum, quod longo usu compertum est, venenosa morbi malitia concipiatur. Hæc ille.

## Inflatio penis.

Inflatio penis.

Inflatur & intumescit interdum penis, & quidem nonnunquam à flatulento spiritu, de quo infra de priapismo dicemus; nonnunquam ab humore calido, de quo mox, de inflammatione penis agemus: nonnunquam à flatu frigido, vel etiam humore aquoso, id quod hydropicis accidit.

Malum hoc visui pater. Causæ verò ex iis, quæ præcesserunt, & symptomatibus, quæ adsunt, faciliè cognoscuntur.

Quid autem periculi habeat colis inflatio, in priapismo, & inflammatione penis suo loco postea dicetur. Quæ autem sit ab humore aquoso in hydropicis, impedit quidem aliquomodo vrinæ excretionem aliàs per se nihil periculi affert.

Curatur medicamentis exiccantibus & discutientibus, qualia in pneumatocele & hydrocele & inflatione testium proposuimus. Fouendus nimirum penis mentha, chamæmelo, absinthio, anetho, semine lini, feniculi, rutæ, & similibus, quæ vel in aqua coquantur, & duplicatis pannis imponantur, vel in cataplasmatibus formam redigantur & applicentur. Gordonius absinthium, fursur & pedem columbinum coquit in vino, & contrita imponit. Bertruttius adhibet hoc cataplasma.

℞. Stercoris columbini, flor. chamæm. rutæ viridis, sem. lini, anethi an. P. j. fermenti P. s. nitri vel saponis quattam pattem.

Si tamen dolor, calor vel inflammatio adsit, eiusmodi calida non conueniunt.

## Inflammatiō penis.

Inflammatiō penis.

Inflammat quandoque penis, sanguine præter naturam & modum ad eum confluente. Qui sanguinis affluxus, sed rarius, interdum accidit, natura viuos humores cum sanguine eò protrudente; plerumque verò à causis externis, nimia Venere, concubitu cum muliere, cuius uterus est immundus & aeribus humoribus repletus, à casu, percussione, vulnere.

Malum ipsum per se patet: adest tumor, rubor, ardor, dolor, sæpe etiam febris.

Estque malum hoc satis periculosum, cum membrum hoc sit exquisito sensu præditum, & ad id propterea humores faciliè confluant.

Curatur verò, ut aliæ inflammationes curari solent. In principio ergo instituenda venæsectio, & si opus sit, etiam purgatio. Simul statim in principio repellentia applicentur; in augmento, addantur resolutentia, quæ

in statu augeantur, & tandem sola applicentur. Possunt nimirum in principio applicari farina hordei, rosæ rubræ, folia hyoscyami vel epithematis, vel cataplasmatibus formâ. In augmento addantur folia althææ, maluæ, flores chamæmeli: in statu iidem flores & semen fœnugræci ac lini, oleum commune, chamæmelinum, lilior. alborum.

## CAPVT IX.

### De Tuberculis & verrucis penis.

VAtia etiam tubercula in pene & præcipuè in meatu eius oriuntur, de quibus supra, p. 8. scilicet. i. cap. 9. dictum. Faciunt autem hîc nonnulli peculiaris tumoris mentioem, ganglij scilicet, tractatque de eo Forestus, lib. 26. obs. qui fuerit in quodam Harlemensi, duritie scilicet quasi scirrhusâ, non solum glandem occupans, verum etiam neruum ipsius dorsî priapi. Verum cum ganglium definiat Paulus Aegineta, lib. 4. cap. 16. & lib. 6. cap. 39. Aëtius, tetrab. 2. serm. 3. cap. 83. quod sit nerui nodosa concretio, ac tumor ex ictu aut labore proueniens, scribatque ganglium accidere partibus motui dicatis, præcipuè manuum iuncturis ac talo, vero consentaneum non videtur, verum ganglium fuisse illum tumorem à Foresto descriptum, sed potius aliam carnosam excreseciam. Et proinde cum ipse Forestus malum illud pro incurabili habeat, & quæ in genere de ganglio proponi solent, in doctrina de tumoribus explicanda sint, hîc de ganglio nihil addimus. Et si quæ talia tubercula curandi spes est, iis medicamentis, quæ supra loco allegato proposita sunt, instituat curatio.

Tubercula & verruca penis.

Excreseciæ etiam quædam carneæ, molles, & fungosæ, ab aliquibus myrmeciarum & tymorum nomine indigitaræ circa glandis carnem, & sub ipso præputio extuberant, continuò madent, malè olent, ac indies augentur atque adeo sæpè excresecunt, ut glandem tegere præputium nequeat, iisque, qui morbo Gallico laborant, familiares.

Verruca penis.

Hæc ut tollantur, filo serico singulæ circa basin comprehendendæ & vinciendæ sunt, donec basi constricta, & alimento denegato tandem decidunt. Carunculâ delapsâ alumine locus inspergendus, & linteam aquâ rosacæ, cui aliquid tutiæ præparatæ admixtum sit, madidum superponendum, Forfice etiam caruncula abscindi potest.

Verrucâ summo balani, quæ tandem in fungum cancrum degenerauit, historiam notatu dignam habet Guilhelmus Fabricius, cent. 3. obseru. 88. quæ talis est. Faber quidam ferrarius à teneris annis verrucam in summitate glandis habuit, lentis magnitudinem vix excedentem, ex quâ ante coniugium nihil doloris sensit, in matrimonio verò in coitu summum dolorem percepit, ita ut per tredecim annos ab vxore abstineret, progressu temporis verruca in monstrosum cancrum, magnitudinē infantis recenter nati capiti nihil cendentem degenerauit, & penis in massam carnis inæqualem, linidam transformatus fuit, foetor talis adfuit, ut familiares & amici consortium ipsius ferre nequuerint. Vlcera etiam non pauca, è quibus vrina hinc inde effluebat, hunc fungum cancrum ambiebant. Morbi tamen pene desperati curam suscepit Guilhelmus Fabricius. Corpore conuenienter euacuato (formulæ allegato loco videatur) & venæsectione prius institutâ, membrum virile usque abdomen præscidit, & mox puluerem suum ad sanguinem sistendum stuppis albumine oui madefactis applicauit, ac linteis duplicatis, & oxycrato imbutis inguina & scrotum inuoluit, fasciisque colligauit, ministrosque constituit, qui per vices manu oxycrato madefactâ stuppas cum puluere continuò continerent, ne sanguis erumperet.

erumperet. Cauterium enim actuale in hoc casu periculosum putat, cum quod meatum urinarium obstruat, tum etiam viscerum & vicinarum partium inflammationem pariat. Et omnino in abscissione membri virilis, ubi ea opus, danda opera ne nimia fiat sanguinis profusio, ac inde æger de vita periclitetur, cuius rei duo exempla, *ibidem observ.* 89. refert idem Fabricius. Sequenti die digestivum imposuit, ac ventrem circumiacentesque partes oleo rosarum & myrtillorum inunxit, idemque defensivum imo ventri applicavit, vulnusque more solito curavit, ut æger plenissime convalderet. Pro penè autem & urinæ canali ipsi instrumentum peni simile applicavit, cuius figura *ibidem* videatur.

Mentula quoque monstrosa historiam habet Philippus Honschetterus, *observ. medic.* Decad. 6. casu 8. hæc. Consistentis Vir ætatis, habitus crassi, sed cacochymici, tuber facie monstravit in Nosocomio monstrosam mentulam, verrucis prægnantem innumeris, acinos botrys adglomeratione æmulantes. Pars quædam tumida, renitens, cuti concolor, instar globi rotunda. Abdomini adhærebat, quæ capiti modò nati infantis magnitudine respondebat, hæc carebat verrucis. Colēs ad stuporem magnus, tumidus, longitudo cum scroto circiter vlnæ Augustanæ. Præputium retroactum circa glandis radicem, nescio quem tumorem crista dedit, qui copiosis, subfuscis verrucis luxurians glandem instar collatis moderni, quod ex multiplici panno ad fimbriam flocculis ornato, conficitur, ambiuit. Glans tuberosa, & vesicam quasi sublata palmâ fuit longior, & pugno maior, ob ligamentum aliquo modo retracta, quam verrucæ obtegabat copiosissimæ, quales in collo gallorum Indicorum conspiciuntur, cum furor eos agitat. Reliqua *ibid.* videantur.

## CAPVT X.

### De Glande imperforata.

Accidit etiam interdum, ut meatus ille per semen elici debet, non pateat, vel angustior reddatur, compertum enim, quosdam glande non perforata genitos fuisse, quos Græci *ὑποπλάγιος* appellant, de quibus etiam Paulus Aegineta, *lib. 6. cap. 54.* agit, eiusque exempla aliquot collegit Schenckius, *lib. 5. observ.* Quia verò hæc affectio hoc incommodi affert, ut neque mingere in partem anteriorem possint, nisi valde ad pectinem membrum reflexerint, neque liberos generare; cum semen ipsos in directum ejaculari in vterum non contingat, curatione opus est. Et quidem ista glandis clausura ita plerumque comparata est, ut negotio non ita difficili aperiri possit, de qua agit Aegineta, *loco allegato*: interdum verò ita facta, ut vestigium nullum appareat, ubi foramen esse debebat, & propterea nec arte aperiri possit. Quod ubi accidit, natura plerumque viam sibi aperit, sicut id paulò infra glandem cuidam factum scribit Benivenius, *de abd. san. & morb. causis*, c. 7. & Amatus Lusitanus, *cent. 1. curat.* 23. refert, infanti cuidam, cui nec foraminis vestigium in glande apparebat, ad radicem penis propè testiculos foramen fuisse, per quod urina non guttatim fluebat, sed directò emanabat.

Si verò foraminis vestigium appareat, id clausum aperiri debet hoc modo. Locus, ubi foramen esse debet, ferro acuto incidatur ad quantitatem foraminis naturalis, donec ad apertum virgæ canalem perveniatur. Nonnulli quidem perforationem ferro candente fieri volunt, sed periculo id non vacat, & per ferrum acutum apertio tutior est. Foramine facto canula plumbea, vel argentea indenda est, quæ primò oleo rosaceo, hinc linimento cicatricem inducente illinatur, eaque tam diu utendum, donec cuticula urinæ viæ inducatur.

## CAPVT XI.

### De vulneribus, ulceribus, fistulis & gangrana penis.

Vulnerari interdum etiam penem contingit. Quod si fiat, id periculo non vacat, cum insignis hæmorrhagia, inflammatio, dolor, ac alia periculosa symptomata, imò interdum mors subsequi soleat.

Curatio autem hæc, ut in aliis vulneribus, præcipue partium membranarum, instituenda. Utile est hæc medicamentum, quo componitur ex lithargyro, cerussa lota, myrrha, sarcocolla, tutia præparata, tragacantha. E quibus vel fiat pulvis, qui vulneri tepido vino eloto, & deficcato aspergatur, vel cum oleo rosaceo vnguentum fiat, quod imponatur.

### Ulcera, fistula, & gangrana penis.

Exulceratur interdum quoque penis; idque accidit plerumque, dum inflammatio & apostema in vlcus transit. Nonnunquam tamen eiusmodi vlcera etiâ fiunt à causa primitiva, vulnere nimirum malè curatò, percussione, attritu, Venere cum immunda scemina, ac contagio. Interdum quoque quandoque ex causa antecedente, ac materia spermatica corrupta, & inter caput virgæ ac præputium retenta, ut & aliis pravis humoribus ibidem collectis. Atque ista vlcera interdum in cancerum degenerant, interdum in sphacelum, ut vel tota virga, vel eius pars perdat.

Sunt autem ista vlcera varia, alia externa, alia interna. Atque alia sunt in ipsa virga, alia in glande, alia in præputio. Alia etiam penetrant, ut tam externæ, quam internæ partes exulcerentur, & vlcus ab externa parte usque ad urinarium meatum penetrat. Alia sunt recentia, alia antiqua, sordida & maligna.

### Signa Diagnostica.

Si vlcera exterua sint, visui patent: si interna, ex dolore, dum urina transit, & pure ante urinam exeunte cognoscuntur.

### Prognostica.

1. Vlcera penis periculosa sunt, utpote in loco calido & humido, & facile putrefactioni obnoxio, unde serpunt, & difficulter curantur, cum urina per meatum penis effluens curationem impediatur. Præterea pars ipsa sensu exquisito prædita est.
2. Et sunt illa deteriora, quæ sunt in radice virgæ, cum sint in loco humidior.
3. Vlcera, quæ à lue venerea in his partibus excitantur, non curantur, nisi morbo illò prius curato, cum ab eius malignitate foueantur.
4. Aliquando hæc vlcera in cancerum abeunt, vel etiam gangrænam inducunt, ut totum membrum virile abscindere opus sit, cuius rei exempla habet Valescus de Taranta, Guilielmus Fabricius, & alij etiam auctores.

### Curatio.

Ut omnium partium vlcera abstersione & exiccatione indigent, ita etiam hæc, & quidem vehementer exiccantibus ut Paulus Aegineta *lib. 3. c. 59.* docet. In recentibus vlceribus aloë commoda est, si arida in pulverem redacta applicetur. Mitissima est, efficax tamen, pompholyx. Fortiora sunt, charta combusta, anethum vstum, cucurbita vsta. Plura talia medicamenta habet



# 1130. De vuln. vlc. fistul. & gangræna penis.

Actius, *tetrab.* 4. *serm.* 2. *cap.* 16. 17. & 18.

Si glandis regio exulcerata sit, nullum medicamentum emolliens locum habet, sed omnia siccantia sint, sint oportet. In principio ergo mundetur vlcus aquâ rosarum & plantaginis, vel hydromelite, vel aquâ, in quâ alumen dissolutum sit: deinde vino, in quâ folia rubri, myrti, plantaginis, nuces cupressi, balauſtia, alumen cocta sint, quô panni linei imbuti glandi imponantur, & præputium semper mundetur. Hinc vsurpandum vnguentum album camphoratum, diapompholygos, tutia, & alia ex aloë, lythargyro, cerussa, corticibus pini, & similibus composita medicamenta. Utile est & saccharum Saturni.

Vt *℞. Litharg. Vnc. β. plumbi vsti loti Drach. iij. tutia præp. Drach. ij. aloës Drach. j. cortic. pini siccator. Scrup. iv. lapid. hamat. Drach. j. sem. anethi combusti, cucurbitæ sicca vsta an. Scrup. ij. ol. rosacei Drach. iij. cera q. f.*

Fiat vnguentum.

Si verò vlcera antiqua, sordida, & putrida sint, abluantur hydromelite cum alumine. Potest etiam aliquid spiritus vini, qui à putredine valde præseruat, addi.

Vel *℞. Vini albi Vnc. vj. aq. plantag. rosar. an. Vnc. ij. flor. aris. Drach. β. aluminis vsti Drach. j.*

Misce & parum ebulliant.

Utile etiam vnguentum Ægyptiacum & Apostolorum, vt & aqua in Institut. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 13.

Vel rasura telæ veteris melle rosaceo illinatur, & puluis aristolochiæ rotundæ inspergatur atque imponatur.

Si vlcera sint vitulenta, præcipitato cum alimento conueniente mixto vtendum; non tamen in eius vsu diu persistendum, sed quando quod callosum & vitulentum absumentum est, fouenda pars decocto maluæ, althææ, sem. lini, & medicamentum digestium idoneum vlceri imponendum, donec, quod corruptum est, separetur, de qua re plura de curat. luis Venereæ dicenda.

Interdum accidit, vt vlcus sit circa glandem & inter præputium ac propter penis tumorem videri non possit. Tunc vinum melle rosaceo mixtum vel aqua viridis supra proposita iniiciatur. Si verò penis & præputium ita intumuerint, vt nihil iniici possit, cataplasma hoc vel simile imponatur.

*℞. Flor. chamem. melilot. rosar. farina sem. fenugrec. an. q. v.*

Coq. in aq. & lixiuio.

F. Cataplasma.

Quod si nec hoc modo pars exulcerata detumescat, & dolor perseueret, & vlcus serpat, præputium secundum longitudinem incidendum, vt vlcus mundari, & conuenienti modo curari possit.

Si gangrænæ periculum immincat, circa vlcus & penem defensiuum imponendum, & affecta pars scarificanda, atque alia pro gangrænæ curatione necessaria medicamenta applicanda quorum antea facta est mentio, vt vnguentum Ægyptiacum, Apostolorum, viridis, vel etiam hoc.

*℞. Terebinth. in aqua tragopogi lata Drach. vi. mellis rosati colati, syr. de ros. sicci an. Drach. ij. sang. Dragon. Drach. β. myrrh. Scrup. j. vnguenti Ægyptiaci Scrup. ij. Misce.*

Si gangræna & sphacelus penem corruperit, tutissimum est, id, quod corruptum est, vel etiam, si opus sit, totum penem abscindere, & medicamenta postea, quæ in aliarum partium gangræna & sphacelo adhibentur, vsurpare. Exemplum huius rei habet Forestus, lib. 26. *observ.* 6. de quodam, cui penis post inflammationem ita putrefactus fuit, vt cataplasmati adhærens exciderit, & putrefactio etiam scrotum occuparit, ægro nihilominus idoneis medicamentis, quæ vlcus sanarint, adhibitis, testibusque noua carne obductis, viuo manente, & ex ventre per foramen saltem vrinam emitrente: & simile exemplum etiam antea è Guilhelmo Fabricio, *cent.* 3. *obs.* 88. retulimus.

## Vlcus in meatu penis.

Interdum verò vlcera in ipso meatu penis generantur, & quidem ex tuberculo seu apostemate intus oborto, vel ex semine acri & vitulento vt in gonorrhæa vitulenta accidere solet, vel ex vrina acri, vel ex calculis asperis & angulosis, qui in transitu meatum hunc lædunt.

Cognoscuntur autem talia vlcera præcipue è dolore, qui inter meiendum percipitur, & ex pure, quod ante vrinam excernitur. Penis interdum tensus & tumidus est. Discernitur verò hoc vlcus ab vlcerebus vesicæ, quod in vesicæ vlcerebus pus vrinæ miscetur, & squamulæ quædam cum vrina excernuntur, ac ipsa vrina foetet.

Curantur autem talia vlcera facilius in iuuenibus. Verum curatio maturanda. Nisi enim maturè curentur, carunculæ in meatu vrinario gignuntur, quæ vrinæ emissionem impediunt. In senibus verò raro aut nunquam talia vlcera curationem suscipiunt.

Curatio vt rectè peragatur, victus ratio ea instituenda, quæ humorum acrimoniam obrundet, & propterea utilis est prisana hordeacea cum amygdalis dulcibus, & seminibus frigidis maioribus. Vitanda vero acria, salsa, acetosa, diuretica.

Deinde corpus à vitiosis humoribus mundandum, humoresque acres temperandi.

Topica quod attinet, vlcus abstergentia & glutinantia per siphonem iniicienda, nimirum aqua plantag. equiseti, myrtillorum, vel succi harum plantarum, vel trochisci alkekengi cum aq. rosar. equiseti.

Vnguentum Petri Bajeti, quo quidam habens penem cancrum sanatus fuit, est hoc.

*℞. Succi extremitatum rubi, succi extremitatum fruticis rosar. aceti an. Vnc. ij. thuris mastiches an. Drach. iij. lithargyr. aur. Vnc. j. vini Maluat. Vnc. vj. succi sempernini Vnc. iij. aque vite Vnc. iv. virid. aris Drach. iij. vitrioli, alum. vsti an. Drach. iij. camphor. Drach. j. ol. ros. Vnc. vj.*

Puluerisatis puluerisandis subtilissimè, & cribratis coq. omnia lento igne, exceptâ camphorâ, quæ in fine addatur, vsque ad consumptionem succorum, Addatur cera & fiat Vnguentum.

Vel *℞. Vini albi lb. j. aq. rosar. plantag. an. Vnc. iij. alum. vsti Drach. iij. virid. aris Drach. j. camphor. Scrup. j.*

Misce.

Vel *℞. Spuma argenti, ceruss. tutia præp. an. Drach. j. sacch. candi Vnc. β. camphor. Scrup. β. aq. rosar. plantag. an. Vnc. iv. Misce.*

Fortius est, si addatur aluminis Drach. j.

Ad cicatricem tandem inducendam utile est hoc.

*℞. Aq. plantag. rosar. an. Vnc. iv. trochisc. albor. Rhasis Vnc. β. boli Armen. Drach. β. Misce.*

## C A P V T XII.

### De Præputij morbis.

#### Phimosis

PRÆTER penis morbos hætenus enumeratos etiam quidam peculiare præputij morbi sunt, inter quæ primò phimosis, eaque, vt Paulus Ægineta, lib. 6. cap. 55. docet, duplex. Quandoque enim præputium ita integit glandem, vt rursus detrahi, & glans detegi non possit, vnde seminis eiectio interdum impeditur, & viri steriles efficiuntur, quod vitium in specie phimosis appellatur. Quandoque verò abductum amplius induci non potest, quæ species propriè megaphimosis nominatur. Prima differentia, vt ibidem docet Ægineta, fit vel à primâ conformatione & natiuitate, vel ab vlcere malè curato, & cicatricem, vel ob carnis accretionem; secunda verò à Venere nimia, vt & in puendorum inflammationibus, aut quando aliàs violentè

Gangræna penis.

Vlcus in meatu penis.

Topica.

Præputij morbi. Phimosis.



violenter præputium retrahitur, vt intumescat; vnde reduci non potest. Primam quidem Aegineta per chirurgiam curat, vt allegato loco videre est, modusque operandi hic est: Vniuersali corporis euacuatione præmissâ, linea recta per superiorem mediumque præputij partem atramento ita noranda est, vt vasa grandiora vitentur. Hinc curuo instrumeto inter glandem & præputium insinuato cutis secundum rectam lineam vno ductu discindenda, ita vt interna & externa cutis sibi respondeant, & par sit vtriusque sectio, neque minor, quam ex vsu sit. Sectione factâ sanguinis fluxus siccis linimentis comprimatur, hinc linteum oui albumine & aqua rosacea madidum imponatur, ægerque per triduum quiescat, & curatio, vt in vulneribus solet, perficiatur.

Si callosum sit præputium, vt non amplius detegi possit glans, Fallopius, de morbo Gallico, cap. 84. sine sectione malum curat hoc modo. Sumit fistulam paruum ex plumbo, & imponit in foramen, vt æger per eam mingat; interim præputium oleo amygdal. dulcium, vel pinguedine gallinæ inungit. Secundo die imponit paulo maiorem fistulam. Tertiò adhuc maiorem, & hoc modo progreditur deinceps, donec possit glans detegi & calus emolliatur.

De præputio à natiuitate prægrandi obseruationem à D. Casparo VVolfio communicatam habet Schenckius, lib. 5. obs. Refert etiam Guilhelmus Fabricius, cent. 4. obseru. 81. iuueni cuidam 22. annorum ætatis ab ipsa natiuitate præputium præter modum propendisse. Ita enim versus anteriorem partem contortum erat, vt effluente vrina ipsa sursum versus abdomen efflueret. Hinc vesicam commodè, & sine madefactione vestimentorum nunquam exonerare potuit, nisi solutis ligulis ad latrinas se conferret. Quod vitium quomodo curatum fuerit, ibid. videatur.

Idem, cent. 5. obs. 55. quadragenarium quendam curauit, qui laborauerat à multis annis defluxione quadam humorum ad penem & præputium per certa interualla cum febre, & aliis symptomatibus.

In initio etsi malum corpore purgato & applicato medicamento discutiente facile cederet: progressu tamen temporis morbus contumacior factus frequentius ipsum inuasit, & difficilior curari potuit. Nonnunquam enim talis durities in pene, & præcipue in præputio remansit, vt spatium duorum mensium illud retrò glandem retrahi non posset. Tandem ubi corpore expurgato & emollientibus ac resoluentibus adhibitis tumor omnis euauisset, suasset, vt semel in mense, aut singulis sex septimanis semel infusum sex granorum croci metallorum in vino sumeret. Loco affecto sacculum adstringentem & roborantem ex radicibus tormentillæ, bistortæ, plantag. balaustij, nucibus cupressi, rosæ & similibus in aquâ coctum, primò quidem per integrum mensem manè & vespere applicuit, postea verò ter aut quater in hebdomade. Atque hac methodo sanatus est.

Alterâ differentia non ita difficulter curatur, si statim membrum in lac tepidum immittatur, deinde cataplasma ex emollientibus & leuiter discutientibus imponatur: quibus si non cedat, fortius emollientia adhibenda ex ammoniaco, bdellio, & similibus. Si verò malum inueteratum fuerit, & præputium quasi occaluerit, incurabile euadit.

De paraphimosis historiam, eiusque curationem etiam habet Guil. Fabricius, cent. 5. obseru. 56. Sponso cuidam iuueni, qui antea venerem nunquam exercuerat, ex nimia violètia frænum abruptum, & præputium retractorum fuit detrufum, vt maximus dolor, & tumor totius membri virilis inde sequeretur. Victus ratione tenui & refrigerante præscriptâ, corpus cholagogis medicamentis expurgauit, & venam in brachio aperuit, regionemque renum vnguento refrigerante bis de die inungere iussit, loco verò affecto sequens cataplasma applicauit.

Dan. Sennerti Tom. II.

℞. farin. bord. Vnc. iij. pulu. rosar. myrtill. an. Drach. ij. balaust. nuc. cupress. an. Drach. j.

Coq. in aq. plantag. & rosarum, ac pauco aceto, fiat cataplasma, addendo vitell. oui vnus.

Cum autem appetitus veneris curationi obesset, corpus iterum cholagogis purgauit, & lumbos seqq. oleis inunxit.

℞. olei violac. nymph. rosar. an. Vnc. j. olei hyoscyami per express. Drach. ij. camphorâ dissolutâ in aceto rosar. scrup. ij.

Misce.

Cubitum verò ituro dosin laudani opiatu exhibuit. Quæ medicamenta cum aliquandiu continuasset, malum curatum est.

Si verò Phimosis aut Paraphimosis sit ex impuro congressu, repellentibus & refrigerantibus locus non est. Materia enim maligna ad viscera repelleretur. Quomodo autem phimosis & paraphimosis ex impuro coitu contracta curanda sit, docet ibidem Fabricius, obs. 57. prolixè, qui ibidem videatur.

Nonnunquam ipsos etiam infantes, imò lactentes hoc malum corripit, vt etiam idem Fabricius, obs. seq. 58. docet, dum ex prauâ victus ratione nutriticis humor actis ad genitalia decumbit, ibique pruritus excitat, vnde affluxus humorum excitatur in præputium, vt mirum in modum extendatur, nonnunquam etiam inflammatur. Quod si accidat, victus tenuis & refrigerans nutritici præscribendus, corpus eius conuenienti modo euacuandum. Si verò infans ablactatus fuerit, ipse syrupo rosarum solutio purgandus. Hinc applicandum hoc cataplasma.

℞. Medull. panis albi Vnc. iij. pulu. rosar. rubr. balaustior. an. Vnc. ij. croci scrup. j. butyri recentis Vnc. j.

Coq. in lacte vaccino, & addito vitello oui vnus

f. Cataplasma.

Si verò malum contumacius fuerit, applicetur sequens cataplasma.

℞. farin. fabar. Vnc. ij. pulu. summit. absinth. flor. chamem. sambuci an. Drach. iij. pulu. far. sem. fenigraci Drach. ij. cumini Drach. iij.

Coq. in vino rubro austero in formam cataplasmaticis.

Pertinet & huc membranulæ freni dictæ cum glande coalitus, si nimirum inferiori glandis parti iuxta foramen frenum arctè & longiori, quam par est, spatio connectatur, vnde erecto genitali eius extremitas distorquetur, vt rectè semen eici nequeat; acciditque hoc vel à prima conformatione & natiuitate, vel ab vlceris malè curato.

Quod si accidat, inuertendum præputium & frænum incidendum, diligentèrque præcauendum, ne venæ vel arteriæ lædantur. Hinc extendendum præputium quousque est necessarium, & linteum albumine oui madefactum, hinc digestiuium, & emplastrum aliquod siccans inter præputium & glandem imponendum, ne iterum conglutinentur.

Coalitus tamen præputij & glandis non solum circa frænum, sed & alibi fieri potest.

Siue autem solum frænum, siue præputium glandi connectatur, in dissectione danda opera, vt solum frænum, aut caro, quæ coaluerunt, secetur, non verò glans aut præputium secando lædatur; præcipue si coalitus hic sit in infima parte balani. Si enim glans eo loci lædatur, meatus vrinarius perfoditur, atque inde facile fistula fieri potest, è quâ postea vrina, vt & semen effluere potest. Si tamen aliter fieri non possit, potius aliquid de præputio, quam de glande abscindendum; cum licet præputium dissecetur, non adeo magnum incommodum inde oriatur. Etsi verò Paulus Aegineta, lib. 6. cap. 56. contrarium statuât, & potius aliquid de glande, quam de præputio abscindendum doceat; tamen id intelligendum est, quando coalitus præputij & glandis est vel in parte superiore vel ad latera, non verò ad frænum, in parte inferiore.

CCCCC 2

vbi

# 1132 De Hermaphrodit. & sexus mutatione.

ubi ductus urinaris tenui membranâ investitur.

## Præputium curtum.

Præputium  
curtum.

Quandoque etiam præputium curtum est, ut glandem totam tegere nequeat. Aliqui ad cutis huius elongationem duplicem chirurgiæ modum excogitarunt. Verum cum istud vitium neque alicui actioni officiat, neque decorem vitiet, vix operæ pretium est, ut huius chirurgiæ tormentum ea de causâ quis sustineat, ut Paulus Ægineta, lib. 6. cap. 53. scribit.

## De Circumcidendis.

Circumci-  
dendi.

Facit circumcisionis mentionem idem Paulus Ægineta, lib. 6. cap. 57. non verò eius, quæ religionis more sit, sed eius quando ex pudendi affectione præputium nigrescit. Oportet itaque totum id, quod denigratum est in agris, in orbem dividere: postea verò squama aris cum melle utendum est, aut etiam malicorio & eruo, ad modum eorum, quæ linamentis excepta induntur. Si verò sanguis eruperit, lunatis cauteriis utendum est ad utramque rem conferentibus, ipsam inquam sanguinis eruptionem, & vulnus depascendo proserpens: si verò tota glans aliquando fuerit consumpta, plumbeo canali in meatum indito, urinam per ipsum reddere iubebimus.

## Fissura Præputij.

Fissura  
Præputij.

Finditur tandem etiam, & quasi rimas agit, præputium: quod si accidat, resina fricta cum oleo rosaceo miscenda ad vnguenti consistentiam, addito visello oui, idque imponendum.

Vel 2c. Olei rosac. Vnc. j. B. amyli, thuris an. Vnc. B. Misce.

## C A P V T XIII.

### De Hermaphroditis & sexus mutatione.

Hermaphro-  
ditæ.

Hoc loco non prætereunda videntur, quæ de Hermaphroditis, quibus à Mercurio & Venere nomen inditum (Mercurius enim Hermes est, Venus Aphrodite) seu Androgynis, & sexus apud Autores occurrunt. Et si enim vitia ista à prima conformatione contracta incurabilia ferè sint: tamen Medico cognita esse ea, convenit.

Inuentos autem fuisse Hermaphroditas, id est, homines, qui utrumque sexum virilem & muliebre præ se tulerunt passim ex historiis patet, quarum plurimas collegerunt Iulius Obsequens & Lycosthenes, alique, qui de prodigiis & monstris scripserunt. Digerunt autem Autores Hermaphroditas in quasdam classes, eorumque quatuor constituunt differentias. Prima est, cum virilis sexus prævalet, & perfectus est, in perinaeo autem excisa tantum in vulvæ formam rima est, ea tamen minimè peruvia, & ex qua neque urina, neque semen prodit. Secunda est, cum muliebre membrum integrum & perfectum est, supra verò ad os pestinis carnea quædam substantia penis similitudinem habens adnata est, urinam tamen aut semen non fundens, scroto etiam & testibus carens. Tertia est, cum utriusque quidem sexus expressa adest imago, inefficax tamen ad generationem, & alterutrâ saltem mictioni inserviente. Quarta eorum, qui utroque sexu valent, & maris ac feminae munus obeunt, & utriusque sexus genitalia perfecta habent.

Verum rectè hic Aristoteles, 4. de gener. animal. cap. scribit: quibus gemina habere genitalia accidit, alterum feminae, iis semper alterum ratum, alterum irri-

tum redditur, cum per alimentum subinde delitescat, quoniam præter naturam est. Neque historiæ facile aliud docent. Vnde etiam scribit Constantius Varolius, lib. 4. Anat. cap. 4. impossibile esse, utrumque sexum reuera in vno individuo reperiri. Et si inveniuntur, mulieres, quæ utrumque sexum habere putentur, esse nympham in eam molem auctam, ut membrum virile referat, esse tamen imperforatam. Si verò genitalia interna spectentur, esse muliebria, & nihil monstruosum intus reperiri, id quod sæpè annotavit. Si verò inuenti sint, qui muliebria etiam habere putati sint, fuisse tantum aliquam in pudendo fissuram, quæ tamen non penetraverit, nec membrum virile admiserit; quale quid quoque habet Columbus, lib. 15. Scribit etiam Hieronymus Fabricius ab Aquap. de Operat. Chirurg. cap. de Hermaphroditis, se observasse in viro inter anum & testes statim sub testibus præter sua genitalia membra conformata quoque fuisse labia vulvæ, sine tamè aliqua cavitatē. In mulieribus verò observasse nympham productam fuisse nunc ad duos, nunc ad tres digitos, quæ tamen fuerit flaccida, neque erigebatur; plura se non observasse. Et si inuenta fuerint feminae, quæ in utroque coitu, & cum femina & cum masculo voluptatem perciperent, hoc saltem factum putat Varolius vi seminis ad uterum emissi, quatenus feminae fuit. Si qui verò sunt reperti, qui utrumque sexum habere visi sunt, utrumque habuerunt imperfectum, qualia exempla refert Columbus, lib. 15. Anatomi. Primum est de feminâ Æthiopica, quam viventem vidit, cui uterque sexus imperfectus contigerat, penisque minimi digiti longitudinem crassitiemque non excedebat, vulvæ autem foramen adeo angustum erat, ut minimi digiti apicem vix intromitteret. Alterum cuiusdam, quam mortuam secuit. Cum enim in Anatomia generationis vasa accuratè peruestigaret, & vasa seminaria, testesque consideraret, tandem hoc compertit, vasa quidem præparantia ab aliarum feminarum præparantibus vasis non differre, sed deferentia differre. Non bipartita erant, & ex binis quaterna natura genuerat, ex quibus duo, quæ etiam maiora erant, ad matricis concavum destinabantur, reliqua duo ad penis radicem, qui glandularum parastatarum expers erat. Uterus, nec non uteri cervix à cæterarum feminarum matrice colloque nihil distaret. Peni scrotum contiguum non erat, imo ferè scroto prorsus carebat, & duobus musculis præditus erat huius feminæ penis, non quatuor, præterea tenui pelle integebatur, nullumque aderat præputium. Et habentur exempla etiam alia apud Autores, in quibus uterque sexus conspicuus quidem, imperfectus tamen fuit.

Ob quam autem causam nascantur Hermaphroditæ, sanè obscurum, atque alijs, ut Astrologi, in cælum, & stellæ Mercurij ac Veneris, certum coitum, causam referunt; sed minus rectè, cum sub eodem posito, quo Hermaphroditæ nascuntur, alij etiam nascantur, qui Hermaphroditæ non sunt; alij in vtericellas, quæ Antiquorum quorundam, sed falsa fuit opinio: alij in tempus conceptionis, qui gigni Hermaphroditas statuunt, si conceptio fiat, fluentibus adhuc mensibus; quæ si causa esset, multò præcul dubio frequentiores generarentur Hermaphroditæ. Alij id semini adscribunt, qui putant, cum pro seminis qualitate & quantitate nunc viri, nunc feminae gignantur, si in seminibus dissimilitudo fuerit, & alterum maxima ex parte forte fuerit, alterum verò maxima ex parte debile, quantitate tamen pari, Hermaphroditas fieri, qui tamen ob alterius semen, vel feminae, vel viri naturam expressius imitentur.

Verum enim verò cum partium corporis nostri delineatio & formatio facultati formatrici primò attribuenda sit, & tales enormes ac monstruosæ quasi in corpore mutationes errori formatricis adscribantur, & hic ad eam meritò recurrendam censemus. Ideoque probabile esse puto, statuere, si facultas formatrix masculinum

masculum formare intendat & propositum habeat, atque fortè tum aliquid obiciatur, quod imaginationi membri genitalis fœmini speciem fortius imprimat, facultatem formatricem in opere suo quasi turbati, & sexum masculinum nonnihil obliterari, ipsique aliquid, quod fœminæ genitale membrum referat, addi; contrariumque accidere, si facultas formatrix fœminam formare intendat, imaginationique tum fortiter virilis membri imago imprimatur.

Ex quibus facile iudicare est, quid de iis iudicandum sit, qui sexum mutasse perhibentur. Non enim est de nihilo, quosdam Viros euasisse, qui à primo ortu fœminæ habitæ fuerunt, testanturque id historiarum multæ antiquiores & recentiores. Viros verò in fœminas mutatas fuisse, certò compertum non habetur. Neque id facile fieri potest, ob causas, quæ postea proponuntur, Plinius, lib. 7. nat. histor. cap. 4. scribit; Ex fœminis, mutari in mares, non est fabulosum. Inuenimus in Annalibus P. Licinio Crasso & C. Cassio Magno Coss. Cassinij puerum factum ex virgine. Idem, ibidem. Licinius Mutianus prodidit visum à se Argis Arescuntem, cui nomen Arescusa fuisset, nupsisse etiam, mox barbam & virilitatem prouenisse, uxoremque duxisse. Eiusdemque fortis & Smirnæ puerum à se visum, & in Africâ se visum, & in Africâ se vidisse mutatum in matrem nuptiarum die L. Cossitium Disritanum. Lilius etiam, l. 4. secundi Belli Punici narrat, Quinto Fabio Maximo, & Marco Claudio Marcello Coss. virum ex muliere Spoleti factum. Refert quoque Amatus Lusitanus, in oppido Esqueria in Lusitania puellam quandam nobilem, cum ad ætatem peruenisset, in qua mulieres menstrua primum emittere solent, vice mensium priapum eiecisse, & sic ex fœmina factum esse masculum, qui etiam postea uxorem duxerit. Et tales historias plures collegit Schenckius, lib. 4. obs. & Marcellus Donatus, de hist. med. mirab. lib. 6. cap. 2.

Causam huius rei quod attinet, prolixè ea de re agit Marcellus Donatus, loco allegato. Ut breuiter hæc de re aliquid dicamus, cum in Hermaphroditis sexus vterque perfectus esse nō possit, sed vnus superet, vel vterque sit imperfectus, sequitur hinc, masculos omnes illos fuisse, qui pro fœminis habiti sunt, & in viros abiisse dicuntur. Et licet aliquam fissuram habuerint, quâ etiam virile membrum aliquomodo admittere potuerint, vterum tamen non habuisse, sed virilia genitalia intus latuisse, & postea vel naturæ conatu, vel accedente aliquo motu violento prodiiisse; sicut etiam dentes quosdam quibusdam iam adulta ætate prodiiisse, obseruatum est. Docet id etiam Catdanus, de rerum Variet. lib. 8. Nascuntur, inquit, pueri, contracto genitali membro, obductaque membrana, quasi sinu quodam, atque in eo foramine angusto, ob quod puellam existimant, qui non attrectauerint. Aliis autem sponte, vbi penis erigitur, adolescentiæ initio, fracta membranâ penis erumpit: pluribus in conatu viri, dum cum sponsa rem habere se putat, fractâ membranâ & attritu erecto pene masculus prodit. Idque confirmare videtur historia, quam refert Albertus, lib. 18. de anim. tract. 2. cap. 3. In quodam, inquit, nostri temporis nato testiculi intra pellem contenti erant superius, ita quod prominentiæ eorum representabant duo labia vulvæ, & fissura videbatur esse in medio clausa per pellem, habilitaretur ad coitum. Incisione factâ profolierunt testiculi. & virga, & postea duxit uxorem, ex qua plures genuit filios.

Id verò omnem fidem superat, quod Iouianus Pontanus, lib. 10. de rebus calesib. & alij referunt, mulierem, cum prius filium peperisset, virilem sexum adeptam fuisse. Forfan enim, vt supra ex Varolio diximus, solum nympha in tantum aucta fuit, vt membrum virile referret.

\*\*\*\*\*

## LIBRI TERTII PARS IX.

### SECTIO SECVNDA.

#### DE SYMPTOMATIBVS, quæ genitalibus & circa generationem in Viris accidunt.

##### CAPVT I.

De Lasa generatione, seu sterilitate in viris, & primò de Lasa seminis generatione.

De generationem hominis marem & fœminam concurrere, nec solum marem, nec solam fœminam generare, notissimum est. Vnde etiâ Aristoteles ex Empedocle scribit, i. de gener. Animal. cap. 18. maris ac fœminæ quasi symbolum esse, totum verò à neutro proficisci. Maris autem in generâdo partes consistunt in fœcundi seminis generatione, eiusque in vterû fœmininû conueniente modo in actu venereo immisione. Hæc ergo si rectè se habeant, & semen fœcundum in Viro in organis seminis generationi dicatis generetur, idque in vterum rectè immittatur, fœtus inde generatur: modò etiam in fœminâ omnia rectè sese habeant. Nam etsi Virile semen fœcundum sit, & rectè in vterum imittatur: tamen si vterus sese, & quæ in fœminâ ad generationem necessaria sunt, non rectè sese habeant, generatio nulla perficitur, & fœminæ steriles sunt.

Lasa seminis generatio.

##### Causæ.

Si verò, quæ in viro ad generationem requiruntur, non rectè sese habeant, & generatio non fit, & sterilitas ratione Viri accidit. Cum autem vt modò dictum, duo in Viro ad generationem requirantur, seminis fœcundi generatio, ac eiusdem in vterum fœminæ in actu venereo immissio, sterilitatis etiam causæ in Viris in hisce duobus quærendæ, quæ iam explicabimus.

Causæ.

Semen fœcundum, hominis materia futurum, est id, quod idoneum est, vt cum eo anima propagetur. Vnde ab Epicuro, vt est apud Plutarchum, de placit. Philos. lib. 5. cap. 3. ψυχῆς καὶ σώματος ἁρμόσπασμα, aliquid à corpore & anima decusum nominatur.

Semen autem (fœcundum intelligo; cum quod infœcundum est, saltem æquiocè dicatur semen) vt generentur, duo requiruntur, materia & causa efficiens. Materia est optima sanguinis, præcipuè arteriosi pars, & spiritus vitalis, quæ duo in vasis seminis generationi dicatis miscentur, & in seminis formam mutantur & elaborantur. Vnde accidit, vt cum id, quod optimum in homine est, in semen absumatur & in actu venereo euacuetur, Vir maximè ex venerè, & præcipuè nimia, & intempestiuâ, debilitetur. Et cum animâ in corde radiceretur, vt Philosophi loquuntur, & spiritus vitalis, quod calor insitus omnium partium fouetur, in corde generetur, hinc à toto semen defluere dicitur; etsi alij etiam aliter id explicant.

Causa autem efficiens est facultas insita partibus genitalibus (testes ne an parastatæ primas partes hîc habeant, non disputo, cum id ad curationem instituendâ non multum faciat) vasis nimirum præparantibus, testibus & parastatis, sanguinem & spiritus in substantiam hanc, quæ semen dicitur, myrandi, & ob id σπέρμα ζοοποιτικὸν nominatur, quæ officium hoc patitur illarum calore innato perficit. Atque vis ea & calor in-

natus tantus est in partibus genitalibus, & præcipue testibus, ut vim quandam in totum corpus diffundat, idque ita alteret, ut carnes, imò excreta quandam qualitatem hisce partibus respondentem accipiant; unde etiam, quando semen in masculis generari incipit, sit vocis mutatio in homine, & carnes animalium odorem quandam grauem & saporem inde accipiunt, qui in castratis aut veneri nondum idoneis non apparet. Ac si testes in castratione excendantur, non solum vis semen generandi, sed & virilitas planè tollitur, ac in toto corpore insignis fit mutatio, atque omne corporis robur imminuitur, castratique glabri non modò mento, sed & toto corpore euadunt, paruas, ut foeminae, venas habent, nullà libidine amplius tentantur. Ex quibus apparet, insignem testibus vim insitam esse, quā non solum sanguinem & spiritus in semen mutant, sed & totum corpus afficiunt, quā de causā etiam à Medicis inter corporis partes principes numerantur.

Ut ergo semen foecundum generatur, cum & materia, è quā producitur, conueniens est, & calor insitus partium genitalium rectè sese habet: ita contrā semen infœcundum fit, dum alterum horum non bene constitutum est, & malè se habet: atque ita, quod semen infœcundum generatur, causā vel in materia, vel in calore insito, & temperamento testium ac partium genitalium vitiatò querenda est, læditurque seminis generatio vel ob errorem externum, seu vitium obiecti & materiae, vel ob læsam testium & partium semini generando dicatarum facultatem.

Materiae, unde semen generari debet, seu obiecti vitium est vel in quantitate, vel in qualitate. In quantitate, cum sanguis & spiritus, è quibus semen generatur, deficient, vel non in iusta quantitate suppetunt. Ut verò de statu naturali, in quo & in pueris & in senibus materia ista idonea deficit, nihil dicamus, sed saltem de iis, quibus præter naturam seminis materia deest, deficit materia seminis primò vel ob res præternaturales, ut post magnos morbos, totum corpus vel partes principes exsiccentes, & horum alimentum absumentes, ut sunt febres, atrophia, & similes: vel ob res non naturales, ut ieiunium & inedia, vigiliās, cibos pauci alimenti, nimia exercitia & motus corporis; quò & semen extinguentia medicamenta referri possunt. Deinde etsi materia seminis non planè deficit, tamen semen non generatur, si ad testes non mittatur, sed ab aliis partibus attrahatur, id quod non solum accidit in puerili ætate, in quā totum alimentum in corporis augmentum absumitur, sed etiam in pinguibus & obesīs, in quibus omne alimentum in substantiam corporis mutatur, & in pinguedinem abit, unde etiam Aristoteles, 1. de gen. anim. cap. 18. carnosos & obesos minus semen emittere, & rem veneream minus expetere, scribit. Et Plinius, nat. hist. lib. 11. cap. 37. Steriliora, inquit, cuncta pingua, & in maribus, & in feminis. Sic quidem castrata animalia pingua sunt, quia materia seminis in pinguedinem abit. Imprimis verò cordis, quod spiritus vitales, præcipuam seminis materiam, suppeditat, morbi, & præcipue eius frigiditas & siccitas seminis generationi obsunt; unde qui frigidum & siccum cor habent, steriles sunt, & qui morore diuturno afficiuntur, semen foecundum non generant.

Vitium verò materiae, è qua semen generatur, in qualitate est, cum materia quidem semini generando suppeditatur, sed ea minus commoda, & conueniens ad semen foecundum generandum, dum scilicet ea vel nimis calida, frigida, humida & sicca est, vel alio modo sese minus rectè habet, id quod accidit, dum partes corporis præcipue intemperatae sunt, aut dum vitiosi humores qualescunque etiam sanguini permiscuntur, eumque inquinant, id quod in variis morbis, & omnis generis cacheriā euenire solet. Unde molæ, abortus, foetus languidi, non solum ab vteri & foeminarum vitio sunt, sed & ob semen vitile vitiosum.

Læsa autem facultate testium & partium genitalium seminis foecundi generatio impeditur, dum vis partium genitalium, alteratrix præcipue, seu coëctrix, læditur ab intemperie frigida & humida. Calor enim testibus & genitalibus insitus præcipuum facultatis *σπερματοποιητικῆς* instrumentum est. Hic ergo si se rectè non habeat, semen foecundum non generatur. Est autem ista intemperies vel nativa, vel à causis p.n. induta, ut causis externis, tumoribus testium, præcipue aquosis, testium & scroti abscessibus, quæ testes refrigerant, eorumque calidum innatum debilitant. Testes etiam debiles, & hinc homines steriles fiunt, si à prima iuuentute nimis libidini sese dedat, aut cum valedudinariā congregiantur, aut à magnis exercitiis vel sanguinis missione, aut purgatione Veneri indulgeant. Nonnulli quidem testium caliditatem & siccitatem sterilitatis causam statuunt, utpote à qua semen quasi aduratur, & ariditate concresecat. Verum credibile non est, tātum in testibus extra corpus pendulis calorem esse posse. Vnguenta etiam mercurialia genitalibus illita Venerem tollunt, sicut eius rei historiam ex *observat. D. Jacobi Oesbei Schenckius, lib. 4. observ.* habet, cuiusdam, qui pudenda ad pediculos eius loci necados vnguento, ex argento viuo confecto, aliquoties illeuisset, sensu membrum virile frigidum ac torpidum, & ad Venerem planè ineptum. Verum postea spicæ oleo ad illinendum vsus, & pediculos illos fugauit, & genitalem vim brevī tempore recepit.

Pertinet huic & conformationis quoddam vitium, quando scilicet vasa semen vel deferentia, vel generantia deficient, aut non rectè & conueniente loco inferuntur, præsertim in utroque latere, quod interdum in Anatomia deprehensum.

Incantamenti etiam & maleficii virilitatem extinguere non fabulosum est, ut rectè Fernelius, *lib. 6. de part. morb. & symp. cap. 13.* Alexander Benedictus, *lib. 24. de mendicis cap. 14.* aliique docent. Hoc mirum est, quod scribit Baptista Codronchius, *lib. 3. cap. 6. de morb. venefic. & veneficiis*, veneficio mutone hominem priuari posse, ex multi historiis patere, & rectè statuit, non reuera Dæmonem vel veneficos virile membrum auferre posse, sed præstigiis Dæmonum id ita apparere.

Multo verò magis steriles redduntur homines, si ipsis testes excendantur. Etsi enim libidine aliquā tententur, tamen vel semen non effundunt, vel sterile, ut *quæst. 2.* dicitur.

### Signa Diagnostica.

Ipsium virium ex relatione ægri patet. Causæ autem *signa* ex modò dictis innotescunt, quæ cum variæ sint, signis discernendæ. Et quidem ut de morbis & vitiis vel totius corporis vel partium præcipuarum, ob quæ idonea semini materia non communicatur, vel etsi ea suppetat, in alios vsus, ut corporis nutritionem, absumatur, iam non dicamus, cum ea è suis locis pateant, saltem de signis, quibus testium, & partium seminis generationi dicatarum morbi cognoscuntur, agemus. Si vitium aliquod sit à primo orru, id in omni ætate fuit observatum; si postea contractum, aliquando id vitium non fuit deprehensum. Si adsit testium intemperies, ea è signis intemperierum testium supra enumeratis, patet. Nimirum in frigida intemperie vel nullus vel exiguus Veneris appetitus, & libido percipitur, pulsus est parvus, corporis quædam gravitas adest & pigrities, & totius quoque corporis, ac præcipuarum partium intemperies ad frigidum declinat, & dum semen emittunt, exiguum vel nullam voluptatem percipiunt, semenque ipsis est crudum, aquosum & liquidum. Præcesserunt causæ refrigerantes, vel etiam nimis & intempestius coitus. Qui enim nondum *æetate*



etate matura se Veneri dedunt, cum calorem innatum intempestiue exhauriant, testes ac partes principes refrigerantur, inde postea etate adulta nimis mature ad Venerem inepti redduntur. Et si accedat humida intemperies, semen ad leuem mulieris attractionem emittunt, & postea amplius coire non possunt; cum partes, quibus semen continetur, omnes laxæ sunt. Reliqua supra videantur de intemperie testium.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Et si sterilitas & læsa seminis generatio potius speciei propagationi obesse, quam indiuiduo nocere videatur: tamen & indiuiduo non raro aliquid incommodi affert; cum sæpe gonorrhœa hinc excitetur, quæ corporis extenuationem & tabem inducit.

2. Causam ipsam quod attinet, quid intemperies testium & alij morbi periculi portendant, ex iis, quæ supra de intemperie testium dicta sunt, patet. Quæ malâ et si per se vitæ periculum non minantur: cum testes etiam sine vitæ periculo excindi possint: quia tamen alia praua symptomata inducere valent, secundæ valitudini obesse possunt.

3. Ab ipso ortu Eunuchi & impotentes arte Medicæ curari non possunt.

### Indicationes & Curatio.

Indicationes & Curatio.

Curatio tota ad causas dirigenda. Itaque si vitio aliquo totius corporis, vel membri alicuius principalis semen non generetur, illud curandum; si intemperies, vel alius morbus testium adsit, corrigendus per medicamenta supra s. i. cap. i. & seqq. proposita, & quæ simul peculiari proprietate testibus amica sunt: & imprimis hinc ea eligenda & exhibenda, quæ semen copiosum generant, simplicia & composita.

Semen generantia modicâ.

Simplicia. Silyrium.

Simplicia sunt: Radices *saryri* & imprimis maioris, seu testiculi canini maioris, qui *cynosorchis* appellatur, & quidem testiculus maior, non verò minor, qui tantum abest, ut Venerem excitet, ut potius eam reprimat; *cinaro*, *bulbique* alij etiam: radices *eryngij*, *asparagi*, *napi*, *pastinacæ*, *rappæ*, *allij*, *cœpæ*.

Semen *erucæ*, *fraxini*, *lini*, *ciceris*, *fabæ*.

Fructus, *amygdala dulces*, *nucæ pineæ*, *pistaciæ*, *castanæ*, *dactyli*.

Aromata, *cubebæ*, quatum maximum ad Venerem excitandam apud Indos vsum esse, Garcias ab Horto refert, *caryophylli*, *galangæ*, *zingiber viride*, vel recens conditum.

Carnes *scinci*, præcipue circa renes, testes *vulpes sicci* *eriti*, *cerui pudendum exsiccatum*.

Ex animalibus *ostrea* & *concha*.

### Composita.

Composita.

*Diasaryrion*, *diambra*, *diamoschum*, dulce.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. condit. *saryri* Vnc. ij. *eryngij* Vnc. j. *amygdal. dulc. pinear. pistacior.* an. Vnc.  $\beta$ . *sem. erucæ*, *piperis*, *Cinamomi*, *rasuræ priapi cerui* an. Drach. ij. *specier. diambra*. Drach. j. *sacch. q. s.*

Fiant Morsuli.

Vel cum syrupo *conseruat. zingib. in china conditi* Elect.

Vel  $\mathcal{L}$ . Testium gallor. exsiccat. Vnc. j. *galang. cubebæ.* an. Drach. j.  $\beta$ . *sacch. ad pondus omnium.*

F. Pulvis, cuius detur Drach. j.

Cum vino dulci.

Vel  $\mathcal{L}$ . *sem. erucæ*, *rasuræ priapi cerui*, *testiculor. galli* an. Drach. j. *galang. pip. longi* an. Drach.  $\beta$ . *zingib. cinam.* an. Scrup. j.

Fiat pulvis, cuius Drach.  $\beta$ . vel Drach. j. cubitum ituro detur cum ovo *forbili* & vino dulci.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. condit. *saryri*, *eryngij* an. Vnc. j. *nucleor. pini*, *pistacior. auellanae*, *torrefactar.* an.  $\mathcal{Z}$ . ij. *pulpa dactylor.* lb.  $\beta$ . *sem. erucæ*, *fraxini* an. Drach. ij. *pip. longi*, *albi*, *cardamom. galangæ* an. Vnc. j. *medull. nucis Indicæ* Vnc.  $\beta$ .

Cum *sacch. fiant* Morsuli.

Vel  $\mathcal{L}$ . *sem. erucæ* Drach. j. *urticæ*, *anisi*, *feniculi*, *fraxini* an. Drach.  $\beta$ . *nucleor. pini*, *amygd. dulc.* an. Vnc.  $\beta$ . *cubebæ*, *cardamomi* an. Drach.  $\beta$ . *rasura genitilis cerui*, *rad. condit. saryri* an. Vnc.  $\beta$ . *specier. diamosch. diambra* an.  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . *sacch. in aq. meliss. q. s. dissoluti.*

Fiant Morsuli.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Pinear. pistacior.* an. Vnc.  $\beta$ . *zingiberis in China conditi*, *rad. saryri* an. Drach. ij. *carnis scinci marini* Drach. ij. *moschi gran.* iij. *ambra gr.* j. *sacch. q. s.*

Fiant Morsuli.

Vel  $\mathcal{L}$ . *Nuc. mosch. cubebæ.* an. Drach. j. *zingib. Dr.  $\beta$ . sem. nastureij hortensis*, *erucæ*, *anisi* an. Dr.  $\mathcal{Z}$ . *rad. condit. saryri*. Vnc.  $\beta$ . *pinear. pistacior. amygd. dulc.* an. Drach. ij. *diasaryri*. Vnc.  $\beta$ .

Cum syrupo de corticibus citri & conseruationis *zingib.*

Fiat Electuarium, de quo sumantur Drach. ij.

Vel  $\mathcal{L}$ . Rad. *saryri* Vnc. ij. *nucleor. pini*, *pistacior.* an. Vnc. ij. *amygd. dulcium* Vnc. j. *testicul. galli num. x.* *testicul. arietis dextrum exsiccatum num. j.* *limatur. priapi cerui* Vnc.  $\beta$ . *sem. erucæ*, *pastinacæ*, *sileris montani* an. Drach. ij. *spec. diamoschi dulcis*, *diagalangæ*, *cubebæ*, *caryophyllor. cinamom.* an. Drach. j.

Cum syr. *conseruat. calami aromat.* & *rad. eryngij*.

Ad Venerem augendam. *Henric. ab Heer. obseru. Medic. oppido rarar. g.* hoc habet: Ineunte vere, vel medio autumno, aut exeunte, hoc est, floribus, foliisque vel nondum natis, vel deciduis, radices *saryri* collectas aquæ puræ iniice, duobus, quibus constant, orbiculis diuulsis; quotquot aquæ innatauerint, ut inutiles abijce; quæ fundum petierint, contunde in mortario marmoreo, pilo ligneo, sensim micam panis albißimi & recentissimi addendo; & propter lentoris dilutionem affunde spirit. vini Maluatic. irrorando paulatim suauissimè. Postea optimè mixta pone in cucurbita cum alembico cæco, clausâquæ digere in balneo per sex septimanas. Tum prælo exprime. Expressum iterum per mensem digere in cucurbita. Innabit liquor rubini æmulus. Hunc inclinando cautè collige, abiectisque focibus, cuique libræ dimid. adde magister. margarit.  $\mathcal{Z}$   $\beta$ . ol. *nuc. moschat. anisi*, *cinamomi*, an.  $\mathcal{Z}$   $\beta$ . Dos. ad xx. gut. in vino, iusculo, vel conserua cor roborante.]

Plura videantur apud Aëtium, *tetrab. 3. ferm. 3. cap. 35.* *Auicennam, fen. 23. cap. 16. & seqq.*

Extra etiam testes, perinæum & lumbi conuenientibus medicamentis inungantur, ut oleo *lilior. albor. mastichino*, aut cui radices *narcissi*, *pyrethrum*, *semen urticæ*, *piper*, & *semilia* mista sint.

Vel  $\mathcal{L}$ . Ol. de *piperib. nuc. moschat.* an. Vnc. ij. *euphorbij* Vnc. j. *Misce.*

Vel  $\mathcal{L}$ . Ol. *nuc. mosch. express.* Vnc.  $\beta$ . de *piperib.* Drach. ij. *spicæ*, *caryophyll.* an. Scrup.  $\beta$ . *mosch. gr.* iv.

*Misce.*

### Dieta.

Dieta medicamentis respondeat. Aer sit temperatus. *Dieta.* Panis sit ex optimo frumento, & imprimis tritico. Cibi etiam alij, qui ad semen copiosum generandum faciunt, ut *oryza*, *amygdalæ*, *pinæ*, *oua forbilia*; & quidam non sine causâ vitellum oui recentis cum vino & paucò oleo *amygdal. dulciorum* recenti haustum ad Venerem augendam valdè commendant, vtilisque etiam est cibus ex ouis, & vino paratus ac *cinamomo*, *croco*, & *saccharo* conditus. Carnes *vitulinæ*, *hœdinæ*, *veruecinæ*, *gallarum*, *perdicum*, *phasianorum*, *pullorum columbarum*, & imprimis *gallorum* & *passerum* testiculi. Et quantus ad Venerem impetus ac salacitas ex esu testiculorum gallorum cum melle & aromatibus excitata fuerit in nobili quodam, docet *Amarus Lusitanus, cent. 2. cur. 81. in Schol.* Ex piscibus edantur optimæ notæ, aromatibus ac vino conditi, *ostrea* item & *testudines*. Nec inutiles sunt, *ficus*, *pisa*, *fabæ*, *ciceres*, *castanæ*, *nucæ auellanae*, *dactyli*, *allium*, *cæpe*,

Ad augendam Venerem Mumia Silyrii.

cæpe, radices asparagi, pastinacæ, carottæ, cinaræ capita. Cibi etiam condiantur aromatibus, fœniculo, satureia.

Vel paretur hic intinctus, præcipuè ad pisces.

*℞. Galangæ, piperis longi, cinamomi, maceris, zingiberis, cardamomi, nuc. mosch. an. Drach. ij. croci scrup. j. nucleor. pini, pistacior. auellana. an. Drach. iij.*

Cum vino vel sapa. F. intinctus.

Somnus sit longior, & in mollibus lectis. Vita sit hilaritati dedita. Curæ verò & tristitia remoueat. Ebrietas vitetur, ut & cibi refrigerantes, lactuca, papauer, balnei vsus nimius, frequens Venus, sanguinis missio larga & sæpe repetita, purgationes frequentes.

## QVÆSTIO I.

*Quæ causâ sit, cur Scythæ steriles fiant?*

*Cur Scythæ steriles sint?*

Immodicam sanguinis euacuationem ad sterilitatem facere vero consentaneum est: unde hoc loco disputant Auctores de causâ, cur Scythæ steriles fiant. De iis enim scribit Hippocrates, lib. de aëre, aquis & locis. *Quâ in re*, inquit, *medicantur sibi ipsi hoc modo. A principio morbi utrinque venam retrò aures incidunt: sanguine multo promanante somnus eos corripit præ imbecillitate.* Et paulò post: *At mihi sanè videntur, eâ medicatione se ipsos perdere. Vena enim retrò aures sunt, quas si quis secet, sterilitatem infert iis, quibus secantur.* Et lib. de genitura. *Quibuscumque vena post aures secta sunt, hi coeunt quidem, & genituram emittunt, verum modicam, debilem & infœcundam. Maxima siquidem pars seminis è capite secundum aures in spinalem medullam fertur. Ipse autem meatu sectioni cicatrice inducta consolidatus est.*

*An materia seminis è cerebro communicetur testibus?*

Verum enim verò nullus manifestus ductus est, è quo materia seminis è cerebro testibus communicetur. Et proinde Hippocrates quidem excusandus, quod veram causam sterilitatis Scytharum non attigit, dum semen à capite iuxta aures in spinalem medullam defluisse, ipsique transitum cicatrice vulnere inductâ denegari putat, quod eius tempore Anatomia non satis exulta fuit. Interim hoc non negandum, cerebrum cum partibus genitalibus magnam habere cognationem, atque ipse Aristoteles etiam scribit, 2. de gen. anim. cap. 7. quod semen habeat quippiam cum cerebro commune. *Sedes enim*, inquit, *oculorum maximè omnium capitis locorum seminalis est, quod sola ipsa per coitum Venerem maxime immutetur, & usu immodico rei Veneræ oculi aperti langueant & subsideant.* Ideoque etsi iis me non oppono, qui statuunt, præcipuam sterilitatis causam in Scythas pendere ab ingenti frigidityte & impotentia, quâ totum corpus ex copiosa sanguinis profusione afficitur, (scribit enim Hippocrates, eos ex venis post aures incisis tantum sanguinis extrahere, donec eos somnus præ imbecillitate corripit) atque in rei huius probationem & id afferunt, quod ij ad Venerem impotentes & steriles reddantur, qui vstiones plurimas & fonticulos diu manantes habent, vel diuturnum in aliqua parte ex morbosa occasione fluxum sortiuntur; quam causam etiam Hippocrates attingit, dum Scythas etiam eâ de causâ steriles esse scribit, quod humorum detractiones ex perustione cauteriorum semper habent: tamen cum sanguis ex quacumque etiam parte detrahi possit, neque omnes, qui fonticulos habent, steriles sint; Hippocrates autem expressè scribat, quod venæ post aures sectæ sterilitatem inferant iis, quibus secantur: si res ita sese habet, aliâ causâ querenda est. Hippocratis equidem ratio, qua statuit id fieri ob transitum semini denegatum, locum non habet, sed verior petenda ex cerebri cum partibus genitalibus consensu. Est enim procul dubio magnus cerebri cum partibus genitalibus consensus, ut modò ex Aristotele dictum, & res ipsa probat, vix aliquam partem magis lædi à nimia Venere, quàm cerebrum. Consensus

autem procul dubio sit per nervos, quorum duos magnitudine eximios habent ab ossis sacri medullâ prognatos, quorum qui maior est, ab ossibus pubis ad penis radicem per mediam bifurcationem ascendens inde ad musculos, totum penis corpus & glandem disseminatur, atque ipse penis constat duobus nervosis corporibus intus raris & spongiæ similibus, ex minimarum arteriarum, venarumque & procul dubio etiam nervorum surculis quàm tenuissimis inter se complicatis. Quæ substantia rara & spongiosa cum ad Venerem homo stimuletur, spiritibus non solum vitalibus inflatur & intumescit, ut penis rigidus planè fiat, sed procul dubio spiritus animales copiose ed effunduntur, unde ille Veneris appetitus est, & in coitu voluptas insignis, & sensus exquisitissimus, quem Iulius Cæsar Scaliger, exerc. 286. sextum sensum constituit, & ibid. docet, spiritum ipsum facere sensum illius delectationis, quam etiam, qui multum coiere ita, ut non amplius emittant semen, percipiunt irritò coitu. Titillari verò etiam à spiritu solo, ait Aristoteles, 30. sect. problem. Ideoque etsi cerebrum semen testibus non communicat: Spiritus tamen partibus genitalibus tribuit, & proinde potest ad cerebri debilitatem etiam facere aliquid spirituum vitalium cum semine euacuatio. Cum n. spiritibus animalibus generandis vitales ut materia, necessarii sint, si cum semine diffundantur, in cerebro deficiunt.

Quæ cum ita sese habeant, si Hippocratis hypothesis vera est, quod scilicet ex venarum post aures sectione Scythæ steriles fiant, id accidit ex immodicâ cerebri à nimia sanguinis effusione, refrigeratione.

## QVÆSTIO II.

*An Eunuchi generent?*

Sunt quidam è recentioribus, inter quos Bartholomæus Cabrolus, & Adrianus Spigelius, qui testibus vim *σπερματογονικὴν* denegant, atque pro suæ sententiæ probatione & id afferunt, quod Eunuchi, & qui testibus destituuntur, nihilominus coeant, & generent. Refert n. Cabrolus, quendam, cum vim Virgini fecisset, atque ea de causâ suspensus esset, eum secareretur, sine testibus tam exterius quàm interius inuentum fuisse. Deinde quod iuuenis quidam annos 22. natus instabilis seu sine testibus natus matrimonium inierit, & filios generauerit. Præterea Smetius refert, in Miscellaneis pag. 525. quendam Maniacum, qui ambos testiculos sibi ipsi extraxisset, ubi menti sanæ restitutus fuit, vxori maritale debitum cum seminis profusione soluisse. Eunuchos etiam coire, etiam coire, certum est, ut Iulius Cæsar Scalig. exerc. 144. sect. 3. 172. sect. 2. & 175. sect. 3. docet.

*An Eunuchi generent? An testes vim σπερματογονικὴν habeant?*

Verum enim verò equidem quæstionem illam, an semen in testibus generetur, hîc perfectè discutiendam non suscipio. Hoc tamen cerrum esse puto, ea, quæ ex Cabrolus & aliis pro sententiâ negante antea allata sunt, id non satis probare. Sit enim, ut Eunuchi coeant: tamen non generant, & vel semen nullum emittunt, id non fœcundum est. Cum enim reliqua vasa spermatica in iis relinqui potuerint, humor quidam seminalis, qui partes genitales titillet, sed non fœcundus, in iis generari potuit. Scortator verò ille suspensus apud Cabrolum etsi testes non habuit, analogum tamen quid habere potuit. Solet enim natura sæpe vnus partis defectum aliâ compensare, sicut & epar quibusdam, aliis aliâs partes defuisse, obseruatum. Neque etiam probat Cabrolus, quod semen fœcundum habuerit, etsi coiuerit, quod & Eunuchi, ut dictum, faciunt. Iuuenem verò illum, qui sine testibus, vxore ductâ, liberos procreauit, quod attinet, etsi foris pendentes testes non habuit: intus tamen latentes habere potuit.

## CAPVT II.

De lasâ penis erectione & seminis  
eiaculatione.

Lasâ penis  
erectio, &  
seminis eia-  
culatione.

**A**lterum, quod generationem impedit, est, si seminis eiectio & immisio in uterum foeminae non recte fiat; quod multis de causis accidit. Cum enim ad rectam seminis in uterum eiaculationem requiratur, ut penis erigatur, & distendatur, ac sufficiente temporis spatio talis maneat; ut meatus, per quem semen emittitur, pateat, ut penis recte conformatus sit, & sit neque nimis longus, neque nimis brevis; sit rectus, non curvus, aut tortuosus; & praeterea etiam hoc necessarium sit, ut semen virile & foemininum eodem tempore emittatur: si quid in his desit, aut vitii sit, seminis in uterum immisio, & quae hinc sit, conceptio, impeditur.

Primo enim cum necessarium sit, ut si semen virile in uterum muliebrem mitti debet, membrum virile rigidum sit; neque tamen commodum fuisset, si membrum hoc perpetuo rigidum esset, Creator Sapientissimus id ita formavit, ut flaccidum quidem maxima ex parte esset, cum tamen opus est, rigidum fieri posset. Quapropter eius substantiam spongiosam, raram, & porosam effecit, ut influente spiritu distendi posset. Dum enim obiectum foemininum pulchrum sensibus offertur, imagine eius phantasia oblata appetitus concupiscentia & libido excitatur, & à corde spiritus vitales copiose ad membrum genitale mittuntur per arterias insignes, quae radici penis inseruntur, & per totam eius substantiam usque ad glandem extremam propagantur, unde qui flaccidus antea erit penis subito intumescit & rigescit. Galenus equidem, *6. de loc. affect. cap. ult.* pluribus hac de re disputat, & statuit, postquam penis fuerit extensus, sequi ex arteriis spiritum, ut pulmo thoracem, ob eam, quam habet ad ipsius motum sequelam. Verum utrumque falsum. Pulmonem non dilatari, ut repleatur, sed repleri, ut dilatetur, in *Institut. lib. 1. cap. 11.* probatum. Eadem ratio est spongiosae penis substantia, quae distenditur, quia spirituosâ substantia per seipsam influente intumescit utris instar, non verò repletur, quia dilatatur, instar folium. Neque enim causa, quâ dilatetur, datur. Deinde inuult Galenus hanc actionem ad nervos, quam ad arterias referre. Verum ut non negamus, aliquid etiam spiritus animalis influere, cum tanta sit in venere delectatio; distensionem tamen illam penis à spiritu natuoso & vitali potius, quam animali provenire, probabilius est; cum nullibi videamus, ullam partem à spiritu animali ita distendi; contra animaduertamus, membrum virile erectum & rigidum, si timor & terror aliquis improvisè superueniat, statim flaccescere, spiritibus vitalibus ad cor reuocatis. Neque etiam datur contraria facultas penem constringendi, sed ob solam spirituum dissipationem subsidet. Neque absurdum est, quod Galenus putat, arterias hasce peni insertas aliam habere facultatem praeter eam, quam alibi in toto corpore habent. Obtenent enim arteriae penis peculiarem conformationem, & mirifice per totam penis substantiam sunt dispersae, ut ita à dextra ad sinistram, & à sinistra in dextram partem diffundantur, ac praeterea eà in parte, qua penis radici sunt insertae, quamplurimis foraminibus sunt pertusae. Et videmus etiam in aliis partibus, ubi incaluerint, venas & arterias intumescere. Musculos tamen etiam penis habet, qui quidem non ad distensionem, sed ad erectionem eius faciunt. Ista autem erectio pluribus modis laeditur. Vel enim erectio membri virilis planè aufertur, vel imminuitur, vel deprauatur, aut intenditur, dum homini inuito etigitur.

Causae.

Priores duae laesiones, quae secundum magis & minus differunt, ac de quibus hoc capite agendum, impotentiae virilis nomine veniunt. Pertinet quidem huc etiam vitium, quando membrum virile vel deest, siue à primo ortu, siue postea amputatum sit, vel mutilatum, & aliquâ parte abscissum est, ut ad coitum sit inutile. Verum quia vitia ista incurabilia sunt, de reliquis dicemus.

Habet autem praeter dicta vitilis impotentia triplicem causam, excitaturque vel quia semen deficit, vel quia penis spiritibus destituitur, vel quia muscoli penem attolentes paralyti afficiuntur.

Semen primo quod attinet, si illud desit, vel nimis paucum sit, vel etiam crudum, naturam ad excretionem non stimulat, unde etiam nullus spiritus vitalis sit confluxus, neque virilis membri erectio. Atque ita seminis ita virium duplici ratione generationi obest, & sterilitatem efficit in Viris; cum quia deest idonea faui generando materia, tum quia ad venerem stimulus deest. De seminis autem defectu *cap. precedente* dictum. Et si omnino desit semen, sit ablata eius emissio; si ex parte, imminuta. Dum autem semen planè deficit non vitio ætatis, sed vitio aliquo praeter naturam, etiam penis erectio ferè ablata est. Aliquando tamen accidit, ut penis erigatur, semen tamen non emittatur. Ita refert Foresterus, *lib. 26. observ. 18. in Schol.* iuvenem quendam rarioris & siccioris temperaturæ, cum nuper duxisset vi-duam, sibi conquestum esse (ut & alios non paucos) se cum coitu uteretur, pene licet optimè extento & rigido, semen tamen emittere non posse.

Spiritus autem, qui membrum virile inflat, defectus, etiam in causa est, ut membrum virile non erigatur. Creditum quidem hactenus à multis, à flatu membrum virile erigi, sed male; cum spiritus vitalis id potius praestet. Postquam enim semen in vasis suis turgere, atque moveri & exitum quaerere incipit, & à natura ad excretionem stimulat, ea spiritum vitalem ad membrum genitale mittit, unde fungosa & porosa penis substantia repletur, & distenditur. Spiritus autem hic deficit, vel quia paucus in corpore generatur, vel quia alio auocatur, vel quia à penis substantia non recipitur. Non generatur spiritus satis copiosus praecipue ob cordis frigiditatem & siccitatem, unde iuris consulti eos, qui ad Venerem impotentes sunt, Frigidos appellant. Alio auocatur in diuturnis & assiduis meditationibus; in timore & terrore, unde scortatores & adulteri saepe semen profundere non possunt, quia aliorum adventum timent. Imò si in ipsa Venere rei alicuius tristis, horrendae atque abominabilis cogitatio Viro incidat, animo deiecit, & appetitus rei venereae concidit. Idem verecundia praestare potest, ut & nimia letitia.

Influxus autem spirituum impeditur, si membrum refrigeratum sit, aut insensibile & stupidum factum iis de causis, quae stuporem inducere solent, aut incantamentis etiam tale redditum; ut nec titillationem, nec stimulum seminis sentiat.

Paralysis in pene excitatur iis de causis quae de Paralyti alibi sunt expositae.

Possunt huc referri etiam incantationes & maleficia: Reliquorum vitiorum, quae in actu venereo contingunt, causas quod attinet, cum non solum necessarium sit, ut penis rigeat, ac distendatur, sed etiam, ut talis ad consummationem actus Venerei permaneat; vitij huius eadem causae in spiritibus, de quibus modò dictum, quaerendae, acciduntque id, cum spiritus, qui penem distendunt, ob paucitatem ante consummationem actus venerei deficiunt.

Praeterea requiritur, ut penis ad seminis intromissionem sit recte conformatus & dispositus, non nimis brevis, neque nimis exilis, neque etiam nimis crassus. Si penis



penis nimis sit brevis, semen etiam non eo usque, quod debet, eicitur, in uterum scilicet, qui est seminis receptaculum, sed in collum uteri saltem, ubi corrumpitur, & effluit, atque ita conceptio impeditur. Si sit nimis crassus, à foemina non admitti, vel non sine dolore admitti potest. Tale si quid accidat, coitus impeditur. Habent autem ista vitia à primâ conformatione suam originem.

In super necessarium est, ut ipsum semen sese rectè habeat, ac debito tempore, & simul cum muliebri semine emittatur. Seminis autem emissio non penis, sed testium & vasorum genitalium propria est; penis verò solum viam præbet. Recto autem tempore semen excernitur, si non nimis tenue vel aqueum est. Tale enim si sit, antequam expultrix id expellat, excidere & effluere solet. Quod etiam accidit, si vasa, quibus continetur, nimis laxa sint.

Via quoque, per quas semen excernitur, rectè sese habere debent, & necessarium est, ut nulla neque in seminariis viis, quæ à testibus usque ad penis radicem feruntur, neque in ipso pene adsit angustia. Hæc enim si adsit, seminis emissio impeditur.

Si angustia sit in vasis deferentibus, sit ea ab obstructione propter crassam & viscidam materiam, propter tubercula, ulcera; & tunc seminis emissio aufertur potius, quam imminuitur: si verò angustia aliqua sit in pene, eiectio seminis potius imminuitur, quam aufertur, & semen cum difficultate ac paulatim exit. Accidit autem hæc angustia propter tuberculum potissimum in meatu penis enatum.

Pertinet huc & conformationis quodam vitium, cum scilicet in pene præter foramen in glande, aliud adhuc foramen vel à natura patefactum est, cuius exemplum habet Platerus, *lib. 6. obs. pag. 782.* vel per fistulam illic genitam excitatur, per quod semen ad latera penis effluit, & non in uterum eicitur.

Si penis obliquus & tortuosus sit, tardè semen, & non rectè intrò eicitur. Tortuositas autem penis est vel nativa, quæ sit propter ligamenti, seu fræni brevitatem, quod, dum præputium glandi nimis connectitur, accidit, ut si penis extendatur, curvus maneat. Aque hic, ut Galenus, *de morbi diff. cap. 7.* scribit, immodicus pudendorum nexus impedit, quod minus procul & directo tramite in mulieris uterum semen immittatur, ob meatus inuersionem; vel adscititia, quæ sit propter tumorem, quem penis nodum appellant, in quo quamvis pene flaccido nihil incommodi percipit æger, eum tamen prementi parvus quidam tumor glandulæ speciem referens percipitur. Generatur autem, cum homo nimis Veneri indulget. Tunc enim spiritus ille inclusus in diu distento pene in aliquam eius partem impetum faciens eam ita distendit & laxat, ut aliquid eius protruberet, eodem modo, ut in aneurismate. Tandem etiam circa vasa generationi seminis dicata interdum error qui à natura committitur, dum scilicet vasa vel semen generantia, vel deferentia deficiunt, aut non recto loco inferuntur, id quod interdum factum esse, in Anatomia compertum est.

Quod verò involuntariam seminis emissionem attingit, de eâ postea de gonorrhœa dicetur.

#### Signa Diagnostica.

Signa.

Vitium ipsum ægri, vel, quod sæpe accidit, uxores patefaciunt. Quæ autem causa sit, à Medico signis inuestigandum. Si ob seminis inopidam id accidat, è signis capit. *preced.* propositis id patet, & homo nullo fere Veneris stimulo, vel libidine tentatur. Et si ex testium & vasorum genitalium frigiditate malum hoc fiat, semen quidem eicitur, sed fluidum nimis hoc est, & aqueum, & interdum sponte exit sine voluptaris sensu. Si etiam causa aliqua præcesserit, quæ quocunque etiam modo membra genitalia lædere possit, ut si æger

in aëre frigido versatus fuerit, & per loca frigida iter fecerit, si fuerit lapsus, vulneratus, & ab ea læsione ad Venerem impotentiam senserit, id ex ægri relatione patet. Si spiritus vitalis deficit, è cordis & reliqui corporis constitutione id patet, & membrum vix ac cum maximâ difficultate erigitur. Si verò ad genitalia non ferantur spiritus, propter intentas & continuas meditationes, aut alias externas vel evidentes causas, id ex relatione ægri innotescit. Si paralysis membri genitalis adsit, id flaccidum manet, neque villo modo, etsi veneris desiderium adsit, erigitur, & semen quandoque per somnum sine veneris cupiditate effluit.

Qui verò semen in vasis genitalibus habent, sed propter vasorum angustiam eicere non possunt, libidine & Veneris stimulo quidem tentantur, sed semen non emittunt, aut nisi cum maxima difficultate emittunt. Quenam autem causa sit angustia, ex iis, quæ præcesserunt, vel adsunt, cognoscitur. Si tumor aliquis circa vasa genitalia percipitur, ab illo constipari hæc vasa indicio est. Si vlcus fuit in radice penis, post cicatricem obductam vasa hæc coaluisse argumento est. Si penis incurvus sit, ex relatione & inspectione cognoscitur. Vitia conformationis, ubi scilicet vasa vel semen generantia, vel deferentia deficiunt aut non recto loco inferuntur, id in viventibus vix certò cognoscitur: si tamen genitalia aliàs sunt perfecta, & nulla alia causa nota præcesserit, interim æger ad venerem ineptus sit, talem aliquam vitiosam conformationem adesse suspicari licet. Si ab incantatione vel maleficiis malum hoc ortum habeat, homo antea ad venerem satis aptus fuit, neque vlla causa manifesta præcessit, quæ id ipsi, & præcipue subito inducere potuerit.

#### Prognostica.

1. Laesa penis erectio iis, qui in coniugio viuunt, liberosque generare cupiunt, valde molestum est, & foeminis etiam plerumque maximè exosum. *Prognostica.*

2. Si ex laesa seminis generatione proveniat membri genitalis ignavia, quid prædicendum sit, è capit. *precedent.* patet. Penis autem intemperies, quæ ab ætate senili est, curari vix potest. Ætati tamen huic vitium hoc non incommodum est. Nulli enim ætati magis, quàm senili, Venus nocet. Quæ verò ab aliis causis originem habet intemperies, curari potest.

3. Si seminis ejaculatio ab aliis morbis impediatur, ex morbo, unde illud vitium pendet, malum æstimandum. Exempli gratia si penis sit brevis vel natura, vel amputatus, seu ex toto, seu ex parte, malum incurabile est. Si sit incurvus ob fræni nexum arctiorem, malum curabile est. Ita etiam de aliis statuendum. Si adhuc aliud præter illud naturale in pene foramen sit, adjectum venerem quidem obeundum nihil impedimenti affert, sed conceptioni obest; cum semen non per naturale foramen in uterum, sed per præternaturale aliò effluat.

#### Indicationes & Curatio.

Laesam penis erectionem quod attingit, si à semine deficiente, vel intemperie membri genitalis proveniat, intemperies illa frigida calidis medicatis curanda. Medicamenta autem ad hanc rem utilia supra, *sect. 1. cap. 1. & cap. precedente* sunt proposita. Extra quoque testes & membrum vitile inungantur oleis & vnguentis ibi propositis, ut oleo, in quo radix narcisci, semen utricæ, pyrethrum & similia cocta sint.

*℞. Olei castani, de nuc. Indica an. Vnc. j. euphorbij Drach. ij. mosch. scrup. j. alipta mosch. Drach. ib. cera q. s. F. Vnguentum.*

Si semen rectè in uteri foramen non possit immitti, ob fræni brevitatem, vel connexionem, vel præputium clausum, quomodo vitia illa corrigi possint, supra dictum.

Indicationes  
& Curatio.



Si nodus in pene sit, neque emollientibus, neque discutientibus vtendum; cum ab his medicamentis via illa & cavitates magis dilatetur, sed potius adstringentibus vtendum. Ideoque fomento è vino nigro, in quo absinthium, myrtilli, balauftia, & similia adstringentia cocta sint, vtendum.

Vel ℞. Aq. nucum pini, nuc. cupressi, myrtillorum an. Vnc. ij.

Misceantur, & lintamine aqua hac madefacto genitalia obuoluantur.

Vel ℞. Cortic. myrob. citrin. chebul. an. Vnc. s. cupress. num. xv. pini num. iij. ros. rubr. p. j. absinth. Pontici M. j. granor. myrti, gallarum, sem. sumach. an. Vnc. j.

Contundantur & affusa aqua nuc. pini destillentur.

Si aliud, præter illud naturale, quod in glande est, foramen sit in pene, per quod semen effluat, foraminis illius præternaturalis labia, abradenda, & postea, tanquam nouum vulnus foret, illud curandum & occludendum, vt semen per naturale foramen eiciatur.

Si semen nimis cito effundatur ob viarum laxitatem, balneis & fomentis siccantibus vtendum, vbi imprimis viles sunt thermæ sulphuræ.

Si semen nimis sit aquosum & tenue, incrassandum, partium genitalium calor augendus, vt supra dictum.

### CAPVT III.

#### De Salacitate, Satyriasi & Priapismo.

Salacitas.

Contrarium impotentia ad rem veneream vitium est Salacitas, seu nimia in Venerem propensio, & admodum vehemens veneris desiderium, quod interdum eo vsque progreditur, vt in furorem quasi abeat, de quo supra, lib. i. part. 2. cap. 10. dictum.

Satyriasis & priapismus.

Pertinet huc & Satyriasis & Priapismus. Satyriasis nimirum, à Satyris nominata, qui semper ad libidinem proni dicuntur, & pene erecto pinguntur, perpetua in libidinem propensio est, & coeundi appetitus cum penis erectione. Priapismus vero dictus à Priapo, qui Gentilibus horrorem & agrorum custos erat, & pudendo semper exporrecto sculpebatur (vnde etiam membrum virile priapi nomen accepit) est membri virilis in longum & latum extensio. Hæc tamen est inter Satyriasin & Priapismum differentia, quod in Satyriasi adest maxima rei veneræ appetentia, in Priapismo vero citra rei veneræ appetentiam sit in vita penis erectio, pudendumque conuulsionis ac tetani modo distenditur, vnde dolor quoque coniunctus est: & in Satyriasi re veneræ peracta penis detumescit, in Priapismo vero post coitum etiam penis erectus & tensus manet.

#### Causæ.

Causæ.

Causæ autem salacitatis est vel nimia seminis copia, vel eius acrimonia, vel commotio. Semen copiosius generatur ob sanguinis abundantiam, & imprimis vasorum semini generando dicorum calorem nimium, ob quem & sanguinem copiosius attrahunt, & in semen mutant.

Si vero ad seminis copiam accedat eiusdem caliditas, & acrimonia, maior adhuc sit salacitas, & homines valde libidinosi redduntur. Potest tamen etiam semen non copiosum acre fieri. Fit vero semen calidius & acrius à cibis calidis & aromatibus nimium conditis, vt & à medicamentis & cibis acerbis, ac ad Venerem accendendam vtilibus. Humores etiam acres semini permixti id acrius reddunt. Huc pertinet & medicamentorum purgantium vsus, qui interdum venerem stimulat, præsertim si iis atomata multa misceantur. Ita refert Platerus, obs. lib. 1. Virum quendam multos annos viduum & continentissimum, cum eum leuiter purgare vellet, ac pilulas aromaticas ei exhi-

buisset, sequenti mane ad se venisse, ac secum expositulasse, quod cum decipere voluerit, cum nullam ab illis senserit, per alium euacuationem, sed pruritum & stimulum solum Venerem, à quo tota nocte fuerit diuexatus. Idemque alij etiam cuidam accidisse refert: ac præterea narrat, alium quendam, sumto cathartico, cum illud adhuc operatur, ita ad venerem stimulatam fuisse, vt uxorem adstantem compresserit, atque inde valde debilitatus fuerit.

Tandem etiam semen in suis vesiculis motum, veluti agitatam, atque exitum quærens pruritum excitat.

Satyriasis vero & Priapismi causas quod attinet, excitantur ista vitia à spiritu vitali ac flatuoso, penis corpus implente & distendente. Sed quia Satyriasis sit, cum veneris appetitus; Priapismus vero etiam sine eo; differentia hæc procul dubio est, quod in Satyriasi semine turgidum & acre hunc spiritus vitalis affluxum excitat, aut spiritus vitalis affluens simul semen commouet. Id quod accidit, cum arteriarum ora nimium patent vel cum lumbi & renes incalescunt, ex decubitu supino in culcitris plumbeis vel aliis de causis, vt cinctura lumborum diuturna in iis, qui ei non sunt assueti, iis item, qui diu à venere abstinerunt, interim sanguine abundant, nec exercitiis eum imminuunt; vt & iis, qui medicamentis venerem irritantibus vsi sunt. Galenus quidem, 6. de loc. aff. cap. ult. & alij addunt flatuosum spiritum, in substantia penis spongiosa ortum, & generatum ab humore viscido & crasso cum debili calore. Sed probabilius est, aliunde illum spiritum flatuosum affluere. Si vero sine seminis commotione à dolore vel alia de causa spiritus vitalis vel flatus in substantiam penis irrumpat, & penis præter naturam intumescat, sit inde Priapismus.

#### Signa Diagnostica.

Signa.

Ipsa salacitas per se patet, & ex ægri relatione cognoscitur: quamvis raro id homines patefaciant. Satyriasis vero & Priapismus, quia ipsi ægro molesti, & sæpe cum dolore coninncti sunt, Medicis aperiri solent. Quæ si ab externa causa originem habeant, vt à decubitu supino & lumborum calefactione, à Venere intermissa, vel nimia, à cibis vel medicamentis venerem irritantibus, id ex ægri relatione Medico patet. Quæ si sint, à causa interna, vt plurimo semine, sanguine copioso & crasso id accidere, probabile est, quorum etiam signa apparebunt. Soletque vbi crassus flatus adest, etiam palpitatio quædam in pene percipi. Si dilatio arteriarum sit in causa, vel seminis copiosi & calidi ad sunt indicia, vel calidiorum renum, vel Venus nimia præcessit.

#### Prognostica.

Prognostica.

1. Salacitas non solum torum corpus enervat & debilitat, sed etiam, vt Seneca, de breuitate vite, scribit, in Venerem & libidinem projectorum inhonestas habes est; & nulli turpius occupati sunt, nisi qui nulli rei, nisi vino & libidini, vacant.

2. Priapismus & Satyriasis sæpe dolorem inferre solent, qualem patiuntur, qui tetano corripiuntur, aut aliis membris conuellantur. Vnde perseverans aut apostema aut spasmus, aut mortem superueniente indicat. Et quidam conuulsi celeriter intereunt, ac morituri venter inflatur, & frigidum sudorem emittunt.

#### Indicationes & Curatio.

Indicationes & Curatio.

Salacitas, quæ in coniugio viuentibus & multo magis, non coniugatis noxia est, curatur, si nimius seminis prouentus prohibeatur, illiusque, vt & sanguinis calor temperetur. Itaque si nimia adsit sanguinis copia, is venâ sectâ imminuendus.

Si humores acres adsint, qui semini permisti id acre reddunt, ij temperandi & euacuandi.

Ne autem seminis nimia copia generetur, atque feruor eius extinguatur, exhibenda refrigerantia & semen absummentia. Talia sunt: *viser*, inde *agnus castus* dictus, cuius folia, flores & semen vsurpantur, *lactuca*, *nymphaea portulaca*, *plantago*, *umbilicus Veneris*, *succus mali citri*, *mentha*, quæ peculiari proprietate semen extinguit, vt supra lib. 1. p. 2. cap. 1. dictum. Semen *cannabis*, *anethum*, *corallia*, *crystallus*. E quibus nunc calida, nunc frigida, pro corporis & humorum dispositione eligenda. Camphoram etiam plerique Venere extinguere putant, quia sit frigida & sicca. Verum monendum, eam non esse frigidam & siccam, sed calidam, quod vel sapor eius & inflammabilitas testantur; & Venere extinguere Iulius Cæsar Scaliger, exerc. 104. f. 8. negat. Et si quid hic præstat, non frigiditate præstat, sed quia valde siccat.

Vt *℞. Conferu. mentha, flor. nymphaeae an. Vnc. j. b. canth. lactuc. conditor. Vnc. j. sem. viticis Drach. ij. corallior. Dr. j. Cum syrupo nymphaeae F. Electuarium.*

Vel *℞. folior. mentha. Drach. ij. flor. nymphaeae. Dr. j. sem. viticis Drach. j. b. cannabis, crystalli præp. corallior. rubr. præp. an. Drach. f. f. Puluis.*

Vel cum saccharo Rotulae.

Vel *℞. succi lactucæ, portulacæ, an. Vnc. ij. mentha Vnc. j. aq. rosar. Vnc. j. b. sacch. q. f.*

Coq. ad syrapi consistentiam.

Aqua castitatis & alia in hunc vsum medicamenta supra lib. 1. loco allegato descripta sunt. Et plura etiam infra cap. 5. de pollutione nocturna, proponuntur.

Extra eadem, & præterea folia salicis, viticis, plantag. semperuiui adhibentur genitalibus, lumbis, imo & pedibus. Nimirum ex dictis plantis fiant fomenta vel lotiones, quibus & acetum addi potest, vel aquæ destillatæ & succi harum plantarum istis partibus applicentur.

Vel *℞. ol. nymphaeae Vnc. ij. succi lactucæ Vnc. j. b. sem. viticis Drach. ij.*

Coq. ad succi consumptionem & colentur, & addito momento cere F. Vnguentum.

Vel Vnguentum refrigerans Galeni, aut Ceratum santalinum, aut alia eiusmodi lumbis apponantur, aut lamina plumbea perforata è regione gestetur.

Vltimum verò salacitatis remedium est castratio, & quosdam ob castitatis zelum seipsos castrasse, imò colem cum testibus abscidisse, compertum est. Cuius rei historiam de quodam Monacho habet Beniueniùs, de abd. sanat. & morb. causis, cap. 68. qui, vt loquitur, ob zelum castitatis, sed indiscretum, ac minime secundum Dei rationabile obsequium, colem sibi, & quidem puberens prorsus absciderat, cum tamen Deus, Deut. 23. mandauerit, ne eunuchus attritis vei amputatis testiculis Ecclesiam Dei ingrediatur. Turcæ etiam iam olim & hodie iis, quos Gynæceis præficiunt, non solum testiculos excindunt, sed & interdum totum membrum virile abscindunt.

#### Diæta.

Ieiunium salacitatem compescit, & abstinencia ab aromatibus, cibis calidioribus & acribus, item vino. Legitimum coniugium quoque ad libidinem vitandam certum & à Deo concessum remedium est, & ex consilio Apostoli melius est nubere, quàm vri. Ager non cubet in mollibus è plumis stratis, verùm subternat folia salicis, & imprimis viticis seu agni casti. Hinc mulieres Athenis in Thesmophoris seu Sactis Cereris, hæc sibi substernebant, vt sacrorum tempore castæ manerent. Supinus etiam decubitus est noxius; cum inde vasa in dorso incalescant, & sanguis ac spiritus copiosus ad pudenda feratur.

Eadem ferè Satyriasis & Priapismi curandi ratio est.

Nimirum à venæsectione & purgatione curatio inchoanda, & imprimis, si sanguis abundet, propter dolo-rem & inflammationem prohibendam vena in cubito secanda. Exhibenda quoque Veneri resistentia modò propolita.

Postea ad topica accedendum, & parti affectæ refrigerantia medicamenta imponenda, quæ & causam mali tollunt, & arteriarum ora constringunt, ac flatuum materiam reprimere ac repellere possunt. Eadem & lumbis applicanda. Imponatur nimirum ceratum ex rosaceo aqua frigida imbutum.

Vel *℞. Ol. rosar. Vnc. j. b. succi solani, sempervini, portulacæ an. Drach. f. spuma argenti, cerussa an. Drach. ij. aceti parum, cere q. f.*

Fiat vnguentum.

Postea aliquid chamæmeli addi potest.

Si ab abstinencia Veneris malum sit, legitimo coitu vtendum semel, postea verò à Venere, imaginationibus Veneris, & quæ libidinem excitare valêt, abstinendum.

## C A P V T I V.

### De Gonorrhæa & Seminis profluvio.

*Γονόρροια* equidem omne seminis profluvium significat, cuius variae sunt differentiae: Vfus tamen obtinuit, vt pro eo saltem seminis effluxu accipiatur, qui inuitis accidit, & sine membri virilis tensione, ac turgentia, & vt Celsus, lib. 4. cap. 31. habet, sine Venere, sine nocturnis imaginationibus.

#### Causæ.

Cum autem retentricis officium sit, semen tamdiu retinere, donec in actu Venereo in vterum foeminae iniiciatur, si id intempestiue & præter naturam contingat, facultate retentrice læsa id accidit. Læditur autem facultas, vel quia ipsa labefactatur, & languida redditur, vel quia obiecti vitio turbatur. Labefactatur propter intemperiem humidam & frigidam, quæ ex similium humorum affluxu, vel causis externis vi humectandi & laxandi præditis contrahitur, quales sunt largus vsus piscium, fructuum crudorum, balnei frequens vsus, natatio in aqua frigida, sessio super lapide frigido. Quod facit etiam intempestiua & nimia Venus, ob quam partes hæc debilitantur, vt postea affluentes humores facillè suscipiant. Ad imbecillitatem hanc pertinet & laxitas vasorum seminalium, quando scilicet folliculi semen continentes, vasæque illud deferentia nimium ampliata & laxata sunt. Quæ laxitas cum ab humoribus, tum à nimia Venere ortum habet, per quam vesiculæ seminis toties inanitæ, iterumque replentur istam laxitatem acquirunt. Obiecti vitio læditur retentio, dum illud rectè sese non habet, vel in quantitate, vel in qualitate. In quantitate vitium est, dum semen copiosius est, vel ex intermissa Venere, vel ex ciborum bene nutritivum nimio vsu. In qualitate vitium est in ea vel manifesta, vel occulta. Manifesta est, dum semen est vel calidius, vel mordacius, ex sanguine simili, & ob epar ac renes calidos, ac cibos tales genitum, vel frigidus & crudum, atque aquosius, ob testium frigiditatem, aut similem epatis intemperiem, aut etiam assumptorum humiditatem & frigiditatem, & cum vitiosi humores in corpore abundantes ipsi semini admiscuntur. Occulta qualitas est, dum semen corrumpitur, & maligna aliquâ qualitate inficitur. In hisce tamen seminis vitiis, ob quam retentrix læditur, hæc differentia est, quod, dum semen est aquosius & frigidius, retentrix primò & per se læditur, etsi expultrix non irritatur: in reliquis vitiis, dum semen vel quantitate, vel caliditate & acrimonia, vel malignitate & virulentia peccat, expultrix primariò læditur, secundariò verò retentrix. Dum enim expultrix facultas vitio obiecti irritata

Semen absummentia.

Topica.

Gonorrhæa.

Causæ.

Castratio.

Diæta.

irritata ad expulsiōem insurgit, retentrix ei cedere cogitur: de quo Galenus, 6. de loc. aff. cap. ult.

Aliquando etiam ex conuulsione gonorrhœa accidit, quod epilepticis sæpe euenit, qui in paroxysmo semen effundunt, quæ causa proculdubio ad retentionem læsam ob expultricem irritatam referri debet. In violenta enim ista corporis totius concussione vasa spermatica simul concussa semen, præsertim si abundet, excutunt. Atque hac ratione potius ut semen conuulsis interdum profluat, accidere putat Platerus, quàm musculorum occasione, qui vas spermaticis præficiuntur. Nam etsi hi muscoli in ipso actu Venereo leuiter vasa deferentia dilatando pleniorē eius excretionem adiuuant: hoc tamē non prius, quàm semen iam ē vasculis suis excidens per hosce ductus fertur, facere docet. Et eā de causā conuulsos etiam hos musculos ad excretionem hanc nihil facere, sed motum illum inordinatum semen ē suis receptaculis propellere statuit.

An autem omnes, quæ hactenus propositæ sunt causæ, gonorrhœam propriè dictam constituent, & an omne, quod per meatum seminis, & ē locis, in quibus semen generatur ac continetur, effluit, seminis nomine dignandum, de eo postea in quæstione dicetur.

### Signa Diagnostica.

Signa.

Gonorrhœa ipsa per se patet, & ex relatione ægri cognoscitur. Accedunt tamē quædam alia symptomata. Quibusdam enim vniuersum corpus, ac præcipuè circa lumbos gracilescit, ægrique toto corpore debiles, graciles, ac pallidi fiunt, oculique caui euadunt.

Causarum signa quod attinet, si ex læsa facultate gonorrhœa accidat, causæ refrigerantes & humectantes, testesque ac vasa seminalia debilitantes præcesserunt. Si vitium sit in obiecto, atque semen sit nimis aquosum & crudum, visuique id patet, exitque id sine sensu & delectatione, & signa cruditatis in testibus vel epate ac renibus adsunt, & semen sæpe ad mulieris contactum saltem exit, sine aliqua, vel saltem exigua voluptate ægri, ut antea in genere dictum, colorem viuidum amittunt, ac languidi fiunt, & corpus sensim contabescit, doloremque circa lumbos percipiunt. Si semen sit acre, priapismus ferè coniungitur, vel dolor, & adsunt signa testium, epatis vel renum calidiorum, ægrique calidis cibis, potu, medicamentis vsus est. Si semen sit virulentum & malignum, lues Venerea, vel elephantiasis adest, quæ suis signis cognoscuntur, semenque est foetidum & cum dolore excernitur. Et quidem in gonorrhœa Gallica initio id, quod exit, album ac subcitrinum est, & sine sensu vigilanti & dormienti effluit. Temporis verò progressu fit liuidum, foetidum, acre, quod meatum penis exulcerat, unde dolor, & dysuria sequitur, & sæpe, dum vrina exit, rigor quidam percipitur, & in vicinis dolor.

### Prognostica.

Prognostica.

1. Gonorrhœa non solum turpe, sed & periculosum malum est; cum non solum sæpe generationem impediatur, sed &, si diu durer, homo contabescat, ac tandem moriatur.
2. Gonorrhœa, quæ sit à facultate retentrice labefacta, facilius curatur, modò sit recens. Si enim malum sit inueteratum, curatio difficilior redditur.
3. Gonorrhœa, quæ sit à semine crudo & aquoso, non ita facile curatur, cum intemperiem illam in partibus genitalibus frigidam tollere non ita facile sit.
4. Quæ à lue venerea est gonorrhœa, sensibus non nisi cum morte terminatur. In iuuenibus verò difficulter, & non nisi longiore temporis spatio curatur.
5. Quæ ab Elephantiasi est gonorrhœa, curatio impossibilis.

### Indicationes.

Indicationes.

Si gonorrhœa sit à facultatis retentricis imbecillitate, siccantibus & adstringentibus vtendum: quæ pro causarum ratione nunc sint calefacientia, nunc refrigerantia. Vbi attendendum, si ex longa iam seminis euacuatione corpus sit refrigeratum, humorque multus aquosus & frigidus genitus, etsi à causā calefaciente & laxante malum initium traxerit, calefacientibus & siccantibus cum aliquā adstrictione vtendum esse, & curationem ferè instituendam, qualis mulierum albo fluxui conuenit. Si semen sit tenue & aquosum, coctio seminis medicamentis calefacientibus, simulque adstringentibus adiuuanda. Si sit calidum & acre, refrigerandum & temperandum. Si sit virulentum, alexipharmacis morbo illi contrarius curatio peragenda. Atque hinc hoc diligenter attendendum, ne prius adstringentibus medicamentis vtamur, antequam malignitas morbi venerei extincta sit. Solet enim natura cum virulento semine materiam vitiosam & malignam euacuare, & quamdiu hoc accidit, grauissima symptomata præcauentur. Si verò adstringentibus, antequam malignitas victa sit, humor vitiosus intempestivè in corpore detineatur, dolores artuum, vlcera varia, & alia praua symptomata suboriri solent. Vbi verò morbus causā mali princeps victus fuerit, tunc adstringentibus vtendum, quæ potius calefacientia, quàm frigefacientia esse debent, cum diuturno fluxu partes genitales valde refrigeratæ & debilitatæ sint.

### Curatio.

Curatio.

Vniuersalibus, quibus opus, præmissis, si gonorrhœa fiat ob imbecillitatem facultatis retentricis, medicamenta vsurpanda, quæ humiditatem absument, & laxitatem adstringunt. Et quidem si coniungatur caliditas, paranda medicamenta ē rosæ, coralliis, C. C. sumach. balaustris, hypocistide, corticibus granatorum, terra sigillata & similibus. E quibus interna & externa medicamenta parantur.

Exhibeatur ergo hoc Electuarium.

℞. Conf. ros. rubr. Vnc. ij. corall. rub. præp. C. C. præp. an. Scrup. j. balaustris. Scrup. ij.

Misce.

Extra verò vsurpetur hoc vnguentum.

℞. Ol. rosar. mastichin. myrtini an. Vnc. j. pulu. balaustris. Drach. β. cera parum.

Fiat Vnguentum.

Si verò frigiditas coniungatur, medicamenta ē mastiche, thure, mentha, spica, & similibus parentur, & genitalia inungantur oleo mentha, mastichino, absinthij.

Vt ℞. Ol. Mastich. lentiscini an. Vnc. j. β. succi menthae Drach. v. spica Drach. β. cera q. s. F. Vnguentum.

Imprimis verò hinc viles sunt thermæ adstringendi vi præditæ, vel balnea artificialia, quæ harum vim æmulantur.

Si semen sit calidum & acre, vniuersalia præmittantur, & sanguis, si opus sit, minuatur, ac humores biliosi euacuentur rhabarbaro, myrobalanis, bilisque remporetur. Hinc intus & extra vtendum medicamentis refrigerantibus, patatis ē rosæ, lactuca, cichorio & similibus.

Vt ℞. Sem. a. frig. maior. Drach. iij. portulacæ, lactucæ an. Drach. j. flor. ros. rubr. Drach. j. β. nymphae Drach. β. gammi tragacanthæ Drach. j.

Fiat Puluis.

Extra verò non solum partes genitales, sed etiam spina & lumbi inungantur vnguentis refrigerantibus, aut applicentur Cerota refrigerantia.

Vt ℞. Ceroti santali, ol. nymph. vng. Comitiss. succi solani an. Vnc. j. camphor. Scrup. β.

Misce.

# 1042 De Gonorrhœa & seminis proluuio.

Vel ℥. Ol. rosac. myrtini an. Vnc. j. mucilag. sem. spyllij cydonior. aqua rosac. extracta an. Drach. ij. pulu. santal. albi, rubri, acacie an. Drach. s. camphor. Scrup. s.

Misce.

Si semen sit tenue & aquosum, siccantibus roborantibus vtendum, quæ vim coctricem testium & partium genitalium adiuvant, aquositatem seminis corrigunt, & simul exiccant, vt speciebus aromatici rosati, syrupo mentha.

Vt ℥. Mentha, absinth. Rem. an. M. j. sem. agni casti, baccar. myrti, flor. ros. rubr. an. Drach. ij.

Coq. in vino rubro & dulcorentur saccharo.

Vel ℥. Conf. ros. antiq. Vnc. j. s. succini, corall. rubr. præp. an. Drach. i. caryoph. macis, thuris an. Scrup. j.

Cum syrupo myrtino.

Fiat Electuarium.

Vel ℥. Mastich. thuris an. Drach. j. succini Drach. s. sem. coriandri Drach. ij. viticis, fol. ment. an. Drach. s. sacch. ros. tab. Vnc. j. F. Pulvis.

Victus etiam ratio conueniens obseruetur, & æger frequenter comedat oryzam cum lacte coctam.

An semper  
verum semen  
effluat in go-  
norrhœa?

Circa curationem autem gonorrhœa, quæ ex semine aquoso & tenui fieri dicitur, diligenter obseruandum, an verum sit semen, quod effluit, etsi aquosius, dilutius & crudius; an verò, quod Langius monet, vt postea, in quest. dicetur, humores corrupti & vitiosi, qui in corpore cumulati ad partes genitales confluant, & per meatum, per quem aliàs semen eiicitur, excernantur, sicut interdum vitiosi humores in corpore cumulati per vterum & menses albos dictos euacuari solent. Si enim sit semen naturale aquosius solum, omnino, vt modò dictum, is vtendum, quæ semen incrassant, stabile reddunt, & detinent. Si verò vitiosorum humorum colluies per penem euacuatur, nullo modo incrassantibus & adstringentibus vtendum, sed euacuantibus & cacochymiam corrigentibus, & bonâ diætâ. Scribitque Langius, loco allegato; Ausim deierare, solis purgationibus, ac sobriâ victus ratione plures sanitati restitui. Et omnino ita se res habet cum affectus non tollatur, nisi causâ sublatâ. Scribitque etiam Rondelerius, meth. curand. morb. cap. 57. gonorrhœa difficulter curatur, nisi causâ cognoscatur, additque, se nouisse nobilem quendam, qui ab abscessu frigido renum diu hoc morbo laborauerat, & multò semper habuerat deterius, cum semen extinguentibus frigidis vel calidis vteretur; se verò instituisse contrariam victus rationem, & iussisse, vt biberet vinum generosum, & vesceretur alimentis optimis exiccantibus, & non flatulentis, quo modo curatus est. Et omnino non semper causâ gonorrhœæ huiusmodi in membris genitalibus hæret, sed interdum etiam in aliis partibus vel toto corpore, vnde, loco allegato; Rondelerius ea quoque exhibere iubet, quæ ventriculi cruditatem corrigant.

Si semen in ipso actu Venereo nimis citò eiiciatur, atque inde, quod fieri solet, conceptus impediatur, cum id à semine nimis fluido, partibusque semen continentibus nimis laxis fieri soleat, curatio eodem modo instituenda, vt iam de curatione gonorrhœæ à partium genitalium imbecillitate, & semine nimis fluido, dictum.

Si semen sit corruptum & virulentum, adstringentibus omnino abstinendum. Si enim retineatur, partes erodit & exulcerat. Sed siccantibus, quæ simul putredini resistunt, vtendum, acerosâ, theriacâ, Mithridatiô, & præcipuè ad morbum illum, à quo illa virulentia pendet, respiciendum, & curatio ad eum dirigenda.

Imprimis verò vitiosi humores expurgandi. Habetq; exemplum Forestus lib. 26 obseru. 16. de quodam iuvene gonorrhœa & testiculi ac genu inflatione non sine suspitione luis Venereæ laborante, quem purgantibus hisce curauit, vt ad decoctum ligni accedere opus non fuerit.

℥. Rad. Helenij, fœniculi, apij, cichorii, bugloss. an. Vnc. j. fumar. M. ij. borrag. violar. scolopend. capill. Vener. summit. lupuli, herba paralyf. an. P. j. chamæpityos, chamedryos, stæchad. an. Vnc. s. sem. fœniculi Drach. iij. citri Drach. ij. Omnia infund. per diem & noctem in s. q. aqua pluvialis & fumaris.

Quibus postea addantur myrobal chebul. Indor. citrinor. an. Vnc. s. follicul. sene, epithymi, polypod. q. s. glycyrrhiza an. Vnc. j. cortic. hellebori nigri Drach. ij. rhubarb. Drach. s. schœnanthi Scrup. j.

Postea coquantur & colentur.

Fiat potus longus pro lb. ij. Addendo syr. infusion. rosar. Vnc. j. de fumar. Vnc. s. sacch. q. s. ad dulcedinem.

Si tamen ista purgantia sola non iuvant, ad decoctum ligni & alia huic morbo propria medicamenta accedendum.

Vniuersalibus præmissis exhibeatur hic pulvis.

℥. Succini albi, testar. ouor. pullis exchusis, pellicular. interior ventriculi gallinar. præp. sem. granator. an. Drach. iij. Corall. rub. præp. C. C. vsti præp. an. Vnc. j. cinam. Drach. ij. manus Christi perlæ. ad pondus omnium.

Fiat pulvis.

Vel ℥. Gummi Arabici, tragacantha, succini mumia, boli Armeni, mandibular. lucij, pellicul. intern. ventric. gallinar. cristar. galli, testar. ouor. an. Drach. s. sem. lactuce Dr. j.

Cum syrupo de ros. siccis.

Fiant pilulæ, de quibus per multos dies Scrup. j. vel Drach. s. sumatur.

Nonnulli etiam scribunt, gonorrhœam hanc virulentam multos curasse lixivio è cantibus fabarum in cineres redactis parato ad Vnc. iv. singulis diebus exhibitio.

Fontis etiam quidam & acidulæ gonorrhœam hanc leniunt. Ita scribit Dodonæus, obscap. 41. Generosum quendam Virum cum decem & octo annis huiusmodi seminis profluuio laborasset, nec vllum medicamento-rum præscriptorum vsum fructum consequeretur, ad fontem haud procul Leodio, qui creditur esse, quem Plinius, nat. hist. l. 3 c. 11. in Tongris esse scribit, profectus est, quo ubi aliquot diebus vsus esset, dolores valde remissi sunt. Maluin tamen non perfectè curatum est, sed domum reuersus omnino peius habuit, & tandem vitam cum morte commutauit, vt ibid. docet Dodonæus.

Gonorrhœam  
sistentia,

Acidula.

## QVÆSTIO.

An nomen Gonorrhœæ omnibus, quæ vulgò recensentur, differentiis, aquè propriè competat?

De Differentiis Gonorrhœæ occurrit aliqua contro- uersa, & à vulgata sententia non nihil dissentit Ioh. Langius, lib. 2. epist. 5. Statit enim gonorrhœam ita dictam aliud, quam seminis & nominis etymologia declarat, esse profluuium, & non parùm à vero naturalis ac prolifici seminis effluuio quasdam gonorrhœæ differentias dissidere. Ideoque triplicem differentiam statuit, quam nec Galenò, nec aliis nostri sæculi Medicis satis perspectam putat. Primò enim docet esse homines, qui renum epatis, ac vasorum seminalium calore, corpore plerumque hirsuto ac succi pleno, semen genitale copiosum ac calidum coacervant, quos non rarò per nocturna insomnia, cum renes ac lumbi supino decubitu incallescunt, aut illis decora amicæ facies interdum visa noctu obuersatur, vel attentæ rei Venereæ cogitatio ad seminis excretionem laceffit & proritat, quod plerique tam confestim effundunt, vt etiam stragula polluant. Atque hanc primam gonorrhœæ speciem id est, semine, & profluio, & ob insomnia dicitur rectè appellari docet.

An nomen  
gonorrhœæ  
omnibus dif-  
ferentiis com-  
petat?

Triplex go-  
norrhœa dif-  
ferentia.

Secundam gonorrhœæ speciem produci scribit ex putrilagine phlegmatis vel falsi, vel etiam crudi copia, quæ non rarò cum momento genitura permisceatur, ac præcipuè



præcipue à cerebro per spinam dorsæ, lumbos, & renes, & etiam ab epate per venas & neruos ad genitalia tendentes deferatur, è quibus per penem non sine eius exco-riatione sensim destillet. Huiusque gonorrhœæ fo-mentum esse statuit sanguinem crudum, ac impuris hu-moribus permixtum, quorum colluuius non, vt alij cen-sent, ad vesicam, sed ad pudenda defluat, ac per meatum spermatis in penem excernatur. Atque hoc profluuium etiam mulieribus accidere & menstrua pituitosa appel-lari scribit. Non enim esse humorem, qui in hac gonor-rhœæ specie excernitur, verum semen; idque vel ex eo patere putat, quod ex tantilli seminis excretionem tanta virium & spirituum copia dissipatur, & vniuersi corporis robur labefactatur, cum contra huius humoris ex-cretio annum, imò quinquennium illafo vitali robore durare possit. Præterea genituræ semen excretum artis frigore liquefcit; at istud vt viscus lentescit, vestibulusque tenaciter adhæret, ac, non raro, vt putridum, malè olet.

Tertiam gonorrhœæ speciem ponit eam, quæ est ex lue Venerea, quæ ob id fœda & virulenta appellatur, in quâ principio vigilandi pariter ac dormiendi virus al-bum, aut subcitrinum è vasis seminalibus sine sensu de-stillat, ac non raro penis canalem exest, atque id, quod effluit, malè olet, ardoremque Dysuriæ similem in mi-ctione & vlcera in pene excitat.

Atque has gonorrhœæ differentias etiam curatione differre statuit, in primâ enim, quæ refrigerant, ad-stringunt, & sperma exiccant, sunt salutaria: quæ in secunda differentiâ planè sunt noxia & perniciofa, vt-pote quæ non adstrictoria & incrassantia requirit, sed humorem corruptum euacuantia, & sobriam dietam, per quam meliores humores generantur, in tertiâ verò differentia curationem lue Venereæ propriam requiri per decoctum ligni & Mercurium.

Et omnino verum est, quod à Langio monetur, go-norrhœæ nomen omnibus, quæ vulgò recensentur, differentiis non æquè competere. Prima enim illa dif-ferentia, quæ ex seminis calidi copia provenit, & vulgò pollutio nocturna appellatur, de quâ cap. seq. dicetur, propriè gonorrhœa appellatur. In hac enim gonorrhœa semen propriè dictum & fœcundum effluit.

De secunda verò differentia, quam ponit Langius, controuersia est, & non sine causa quatitur, an non & in hac differentia quod effluit, semen appellari pos-sit, aut an non aliquam differentiam omiserit. Primò enim omisisse videtur illam speciem, quæ ab imbecil-litate vasorum spermaticorum est, quæ tamen nullo modo omittenda videtur. Si enim vasa seminalia sint debilia, & ipsum semen non bene coquatur, crudum manet, nec bene retinetur, sed cum ob facultatis re-tentricis debilitatem, tum quia ipsum tenue & crudum est, facile excidit, nulla etiam vel exigua præcedentæ irritatione, sicut Fernelius, 6. de part. morb. & sympt. cap. 14. quendam solâ clysteris perfusione atque in anum immissione semen emisisse, scribit. Deinde in eo, quod aquositatem seminis ab excrementis pituitosis & serosis permixtis provenire statuit, plane à Langio dissentit Platerus, qui statuit, licet sanguis crudus & pituitosus in corpore abundet, semper tamen eius puriorem par-tem ad seminis generationem attrahi.

Verum enim verò si quod mihi videtur, dicendum, nec vasorum imbecillitas omittenda, quod à Langio fa-ctum, nec humores serosi & vitiosi cum semine permi-stio neganda videtur, quod facit Platerus. Etenim cum aliæ corporis partes imbecillæ non solum alimentum suum non bene coquant, sed etiam, si publicum munus habent, id non benè perficiant, vt in ventriculo & epate videre est: cur idem etiam in testibus non acci-dere possit? Deinde nec hoc negandum videtur, si san-guis in corpore sit impurus, etiam semen impurum in corpore inde generari. Et si enim verum sit, testes, vt & mammae, puriorem sanguinem ad se trahere; ta-

Dan. Sennertii Tom. II.

men si magna sit cacoehymia, fieri vix potest, vt non aliquid etiam ad testes deriuetur. Sicut videmus, fœ-minas morbo aliquo laborantes etiam impurum lac in mammis generare. Præterea natura sæpe assuescit humores vitiosos ad aliquam partem, præcipue debi-lem, mittere, idque etiam in testibus fieri, impossibile non est, imò fieri experientia testatur. Habent etiam humores vitiosi interdum ad peculiare partes suam inclinationem, quod & hic accidere potest, & præci-pue in gonorrhœa ex lue Venerea, virus istud partibus genitalibus infestum est.

## CAPUT V.

### De Pollutione nocturnâ.

Imprimis verò Gonorrhœæ nomen ei propriè com-petit seminis profluuium, quod noctu dormientibus accidit, & propterea Pollutio nocturna appellatur, cum homo noctu dormiens inscius semen emittit, & vt Ho-ratius ait, *nocturnam vestem maculat, ventremque supinum*. Accidit tamen idem etiam interdum de die. Ita refert Leonellus, se nouisse rusticum quendam iuuenem, qui ex sola inspectione mulieris incurrebat pollutionem etiam de die. Et quidem plerumque cum penis tensione & imaginatione quadam in somno semen profunditur. Nonnullis tamen etiam nullâ imaginatione præce-dente citra sensum semen profluit.

Pollutio No-cturna.

### Causæ.

Causa proxima huius mali est irritatio facultatis expultricis. Irritatur autem à semine, quod plerumque copiosius est. Semen autem copiosius generant cibi po-tiusque multi alimentum nimia copia, & hinc genita boni & multi sanguinis in corpore redundantia, otium ve-nus intermissa. Mouetur verò semen imaginatione de rebus Venereis; & cum imaginatio in somno à ratione non ita gubernetur, vt in vigiliis, facultatem expultri-cem facile stimulat.

Causa.

Deinde etiam semen mouet decubitus supinus, ob quem renes & vasa in dorso incalescunt. Hinc accidit, vt pollutio nocturna adolescentibus maximè accadat. Habent enim calorem vegetum, spiritus mobiles, poros laxiores, & de rebus venereis frequentem & intentam imaginationem, & errores in dieta, quibus etiam semen agitur, & stimuli ad libidinem coaceruantur, com-mittunt. Refert etiam Fernelius, lib. 6. de part. morb. & sympt. cap. 4. quendam solâ clysteris perfusione semen emittere consuevisse.

### Signa Diagnostica.

Malum ipsum ex relatione ægri cognosci potest. Et signa differt nocturna pollutio à gonorrhœa, cap. præced. pro-posita, quod in eâ etiam de die semen effluit, id quod in pollutione nocturna ferè saltem noctu euenit.

Signa.

### Prognostica.

1. Malus corporis habitus est, vt scribit Aëtius, eo-rum, qui semen multum ac calidum generant, quod eos ad excretionem stimulat. Si enim sæpius id accidar, ex-solutionem oris ventriculi, & totius corporis patiuntur, debilesque fiunt, & graciles ac pallidi, oculisque cœca-uos habent. Quod si à Venere abstineant, propterea quod ita afficiuntur, capite discruciantur, itémque stomacho, & æstu, fastidioque anguntur, nihilque magnopere ex continentia iuuantur. Contingit enim iis per som-num semen profundentibus similia perpeti incommo-da, qualia coeundo perpessi fuissent; & imprimis, si frequenter coitu id malum contraxerint. Ita refert Platerus, lib. 3. obs. quendam ex frequenti supra modum

Prognostica.

# 144 De sympt.in coitu & semin.emiss.accid.

veneris vſu ed redactum fuiſſe, vt cum poſtea ſibi temperaret, pollutionibus nocturnis diurniſque vexaretur, admodumque debilitaretur.

2. Pollutio nocturna, quæ in principio morbi accidit, materiæ copiam & morbum diuturnum ſignificat.

## Indicationes & Curatio.

Indicationes  
& Curatio.

Cum vitium hoc à ſeminis copia nimia, & eius per ſomnum agitatione accidat, danda opera, ne nimia ſeminis copia generetur, atque id per ſomnum non moueatur.

Non generatur ſeminis nimia copia, ſi æger abſtineat à cibis ſemen copioſum generantibus, quales ſunt: nuclei pini, bulbi, piſtacia, faba, cicer, rapa, eruca: vt & à vino, præſertim generoſo. Vtatur contra cibis refrigerantibus & adſtringentibus. Si etiam corpus ſit plethoricum, ſanguis venæſectione detrahi poteſt.

Vt ſemen non commoueatur, vitentur de die imaginationes de rebus venereis, & abſtineat homo à cibis, quæ ſemen irritant. Scribit enim Bruerynus, lib. 8. de re cibis. cap. 43. ſe nouiſſe quendam, qui cum ſiſymbrio liberaliter veſceretur, genituram per ſomnum effundebat. Cebet æger ſuper foliis ſalicis, viticis, lactucæ, floribus nymphææ, roſar, violarum. Decubitus verò in ſomno ſupinum vitet.

Medicamenta  
ſem. minuen-  
tia.

Medicamenta vim ſiccandi, adſtringendi & ſemen minuendi habeant, qualia ſupra, cap. 3. de ſalacitate, ſunt propoſita. De quibus Galenus 5. de ſimpl. med. fac. cap. 23. Quæ refrigerare apta ſunt nata, tum cæulia, tum medicamenta, ſemen cogentia, incrassantia & ſtabile reddentia, vim habent ipſum ſupprimentem, non autem corrumpentem, nempe lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones, cucumeres: porro quæ reſiſcant, proſuſ ne eſſe quidem ſemen permittunt, ſi calida ſint natura, veluti ruta; ſi autem non calefaciunt, multò minus, aut nymphaea.

Vt ℥. ſem. portulacæ, agni caſti an. Drach. ſ. plantag. ruta an. Drach. j. conſ. roſ. rubr. Vnc. ij.

Cum ſyrupo myrtino.

F. Eleſtuarium.

Vel ℥. ſem. agni caſti, coriandri præp. an. Dr. ij. plantag. ruta, folior. mentha an. Dr. j. ſuccini, corallior. an. Drach. ſ. maſtiche ſcrup. ij.

Fiat pulvis, cuius doſis Drach. j.

Addi poteſt, ſi liber, ſaccharum roſatum tabulatum.

Syrupus Donati ab Alto mari talis eſt:

℥. Sanguinariæ, acetofellæ, plantag. an. M. j. portulacæ, capreolorum vitis, umbilici veneris, ſummitat. rubi an. M. j. ſ. myrtilorum, ſem. coriandri præp. papau. albi an. Vnc. ſ. fol. lactucæ, flor. nymphaeæ, borrag. violar. an. M. ſ. folior. ruta, viticis, mentha, calamintus ſiccorum ana Drach. ij.

Coq. in aqua ſ. q.

Colaturæ ℥. lb. iij. ſucci roſar. rubr. granatorum, pomorum acidorum an. lb. ſ. aceti parum, ſacch. q. ſ.

F. Syrupus, de quo exhibeantur ſingulis diebus Vnc. ij. vel Vnc. iij.

Vel fiant tales trochiſci.

℥. ſem. ruta, agni caſti, portulacæ, plantag. papau. albi an. ſcrup. j. cannab. coriandr. præp. corall. rubr. præp. mentha an. ſcrup. ſ. ſacch. in aq. roſ. diſſoluti q. ſ.

F. Rotulæ.

Extra verò ſequentia applicentur.

℥. farin. gland. q. v. oui album. in aq. roſ. conquaſſat. q. ſ.

Fiat Cataplaſma peſtini & lumbis imponendum.

Vel ſuccus ſemperuiui, nymphaeæ, ſolani, umbilici veneris, polygoni, portulacæ, genitalibus imponatur. Lumbis quoque applicetur lamina plumbea perforata.

Vel ℥. olei roſar. nymph. myrtini an. Vnc. j. mucilag. ſem. pſyllij, cydonior. aqua roſarum extracta an. Vnc. ſ. pulu. folior. ruta, agni caſti, mentha an. Dr. ſ. corallior. ſancali rubri an. Dr. j. ſucci plantag. portulacæ, ſemperuiui an. Vnc. j. ſ. cera q. ſ.

F. Vnguentum.

Si rigido pene fiat ſeminis profluuium, ea, quæ de priapiſmo ſunt propoſita, vſurpanda, & imprimis ſi à fla-

tuoso ſpiritu affectio originem habeat, lentium decoctum vtile eſt, quod præter id, quod ſemen extinguit, etiam membri lentiginem remittere valet.

## C A P V T VI.

### De Symptomatibus quibusdam in coitu & ſeminis emiſſione accidentibus.

**R** Ara etiam & admiranda quædam ſymptomata in coitu accidunt, qualia recenſet Marcellus Donatus, de hiſt. med. mirab. lib. 4. cap. 18. Refert enim, Franciſcum Valerium, Medicum ſibi retuliſſe, iuuenem quendam in venereo congreſſu cum muliere ſemen emittere non potuiſſe, quamvis in ſomno id aliàs excerneret. Idque & alteri cuidam Viro accidiſſe, ſe teſtari poſſe, ſcribit. Cuius ſymptomatis cauſam reddere non ita facile eſt. Quamvis enim Valerius in verecundiam, vel fortem quandam imaginationem cauſam reiiciebat: neutrum tamen ſibi ſatisfacere, & rectè ſcribit Donatus. Nam qui verecundantur, vel timent, ij potius à penis erectione prohibentur, quàm à ſeminis excretionem. Fortis verò imaginatio etiam nimis remota cauſa videtur. Vero magis conſentanea eſt cauſa, quam aſſert Aërius, ſetrab. 3. ſerm. 3. cap. ult. dum ſimilem hiſtoriam à Rufo recenſet. Adoleſcens, inquit, miniſter domeſticus, conſeſſus eſt, ſe quando cum muliere rem haberet, ſemen effundere non poſſe, cum verò dormiret, plurimum ei ſemen prodire. Viſum itaque mihi eſt, vaſa eius ſeminarum propter multam cum frigidityte humiditatem caleſcere non poſſe, propterea, quod caliditas in coeundo ad corporis ſuperficiem diſſunderetur, in ſomnis verò amplius caleſceret. Quare hunc ipſum infernas partes exercere iuſſi, atque id maxime per equitationem. Caſtoreum etiam præbui, & dietam omnem calidam & ſiccam inſtitui. Aliam etiam non minus admiratione dignam, ſed & ridiculam hiſtoriam, ibid. recenſet idem Aërius: Adoleſcens, inquit, nos acceſſit, & ſe vehementer coitum appetere conſeſſus eſt. Verum ubi commiſceretur, ſemen emittere non poſſe, ſed flatus plurimos ſibi per ſedem erumpere. In hoc itaque coniecturam feci, ſeminarium vaſorum ſiccitatem aſeſſe, quod ipſa etiam adepta ſaniras demonſtravit. Nam poſtquam ipſe humida & bona diætâ vſus eſt, ſemen emiſit. Similem hiſtoriam habet Amatus Luſitanus cent. 9. cur. 95. iuuenis cuiuſdam Dalmatæ. quem moeſtum & triſtem ad ſe veniſſe ſcribit, & retuliſſe, cum coiret cum muliere, nullum emittere ſemen, ſed potius ventris crepitum. Ipſe autem Amatus cum vitij huius cauſam putaret multam pituitam craſſam in inteſtino inferiore hærentem, cuius præſentiâ vaſa ſeminalia frigida & coarctata eſſent, ipſa verò motu & caliditate diſſoluta in flatus verteretur, curationem hoc modo inſtituit. Ordinatâ victus ratione calidâ ex cibis multi & boni ſucci, ac potu vini generoſi, humores pituitoſos præparauit & purgavit. Poſtea vt imum ventrem & inguina, ac inter anum & pudendum hoc vnguento illiniret, iuſſit.

℥. pip. alb. nigri, longi an. Drach. j. ſ. ſem. eruca, vrtica, nigella an. Drach. ſ. pyrethri ſcrup. j.

Ol. liliorum, In quo iniectæ ſunt eruca herbarum aut pinus vermes tres vel quatuor, Vnc. ij. olei de caſtor. Vnc. ſ. cera q. ſ.

Mane verò & horâ coitus Vnc. ſ. vel Drach. vj. ſequentiſ Eleſtuary exhibuit, & vt poſt hauſtum vini maluatici ſumeret, iuſſit.

℥. Diaſatyr. Vnc. ij. diagalang. Drach. ij. ſpec. diamb. diamofchi an. ſcrup. ij. raſura pudendi cerui aridi Drach. ſ. nuc. pinear. piſtaciæ. amygd. dulc. an. Vnc. ſ. carnis ſcinci Drach. ij. ſem. eruca, vrtica, naſturtij an. ſcrup. j. peſtiſculi capi cocti Vnc. iij.

Terenda terantur, & cum melle optimo F. Eleſtuarium.

Quibus

Symptomata  
in coitu.

Syrupus Do-  
nati ab Alto  
mari.

Quibus medicamentis intra mensem convaluit.

Accidit præterea & aliud in coitu vitium, cuius Mar-  
thæus de gradibus, *consil.* 3. inentionem facit, de quo-  
dam, qui cum volebat coire, illi membrum non erige-  
batur, sed semen emittebat. Quod vitium procul debio  
ex nimia vasorum semen continentium laxitate proue-  
nit, contracta ex nimio Veneris vsu, aut diuturna go-  
norrhœa. Statim enim ac se tales ad coitum accingunt,  
& imaginatio excitatur, semen emittitur, nec tamen  
membrum virile erigitur, ob paucitatem spirituum ni-  
mia Venere aut diuturna gonorrhœa dissipatorum.

Tandem etiam aliud adhuc vitium recenset Auicennas, *fen. 20. rer. tract. 1. cap. 20.* cuius exemplum habet Alexander Benedictus, *lib. 24. part. 29. cap. 27.* quod iis accidit, qui corpore sunt molliore, & habitu corporis resolubili, multumque in coitus actu delectantur. Hi enim si coeant frequenter, accidit quandoque, ut una cum semine feces per aluum emittant. Nam cum multi spiritus excernantur, corpusque inde resoluatur, fit, ut partes vicinæ spiritibus destituantur, sicque laxato musculo intestini recti feces emittantur.

C A P V T VII.

*De Rebus alienis per penem excretis.*

Res alia per  
penem excre-  
ta.

**D**Vo meatus in pene sunt usus; vnus est, vt per  
Deum vrina ex vesicâ euacuetur, alter, vt per eun-  
dem semen excernatur. Accidit tamen, vt præter na-  
turam etiam aliæ res per eum excernantur. De rebus  
alienis è vesica per eum excretis dictum est supra,  
*part. 7. sect. 2. cap. 9.* De iis, quæ è vasis genitalibus &  
aliunde, quàm è vesica, per eum excernuntur, *hoc capite*  
*agemus.*

**Banghis.**

Primò sanguis interdum per penem excernitur, non tamen ex vesica. Ita refert Fernelius, *lib. 6. pathol. cap. 14.* se quendam vidisse, qui longa Gonorrhœæ consuetudine per insomnia, atque etiam cogitatione solâ purum sanguinem, non minore voluptate, quàm semen, effuderit. Et aliàs etiam observatum, in coitu, præsertim nimio, sanguinem loco seminis eiectum fuisse, refertque Scholiographus *ad cap. 52. lib. 1. de morb. int. Hollerij*, se vidisse, qui à coitu multum sanguinem effuderit, quique non facile reprimeretur, laxatis nimium vasis, & imbecillioribus redditis. Et Hollerius, *ad aphor. 78. lib. 4.* scribit, se vidisse duos adolescentes, qui per immoderatam Venerem purum sanguinem per penem reddebant.

Causa huius mali est apertio osculorum venarum spermaticarum, quæ semen ex sanguine elaborant. Si enim brevi temporis spatio coitus sæpius repetatur, vasa semen elaboratum continentia ita exhauriuntur, ut per venarum spermaticarum oscula suctione hac dilatata semen ex ipsis adhuc imperfectum, vel sanguinem etiam ipsum attrahant, & in coitu effundant.

Curatur hoc malum rectissime abſtinentia à Venere, & adſtringentibus, quæ laxitatem vaſorum ſpermaticorum corrigunt, cap. ſ. propoſitis, adhibitis.

Ephebum quendam Athenis serpentem pusillum, pilosum, & pluribus pedibus statim ambulans, multo cum semine eiecisse, Plutarchus, *lib. 8. Sympos. probl. 9.* refert.

CAPVT VIII.

De Testium & penis dolore, ac Scroti & præputij  
pruritu.

*Testium Dolor.*

*Tellium do-*  
*lor.*

**T**estes quandoque dolore corripuntur: id quod accidit præcipue in inflammatione: interdum tamen

*Dan. Sennerti Tom. II.*

etiam à frigiditate, & aëre frigido : interdum ab ulcere, interdum à causa externa, aut contusione, & vulnere.

Quæ autem inter has causas locum habeat, ex iis, quæ præcesserunt, & adfunt, facîle cognoscitur.

Curatio pro diuersitate caussarum diuerso modo instituenda. Si inflammatio adsit, curanda, vt supra dictum. Si adsit intemperies frigida, vel inflatio, etiam curanda, vt supra *sect. 1. cap. 1. de testium intemp. frig. & inflatione* dictum. Si percussi sint testes, statim, si vehemens sit dolor, sanguinem mittere oportet: imponenda verò, quæ affluxum humorum prohibent, vt *viola, roseæ, nymphaea* & similia. Deinde quæ discutiunt & dolorem leniunt, vt *anethum, chamæmelum, folia hyoscyami* cum *farinâ fabarum* in lacte cocta.

*Penis dolor.*

## Penis dölör.

Penis verò dolor ex iisdem ferè causis excitatur, nimium ex inflatione, percussione, vulnere, vlcere, venere nimia.

Curatio ex iis, quæ supra de penis inflatione, inflammatione, vulnere, vlcere dicta sunt, pater.

Ad dolorem autem leniendum vtile est fomentum ex decocto malua, albae, sem. lini, anethi, florib. chamæmeli, meliloti, vel cataplasma ex iisdem paratum. Vel medulla panis albi in lacte coquatur, & adiectis vitellis ovorum atque oleo rosaceo, croci atque opy, si dolor sit vehementior, exigua quantitate F. Cataplasma.

Vel folia hyoscyami foliis caulium involuta coquantur  
sub cineribus, & caulium foliis abiectis imponantur.

*Pruritus Scroti & praputij.*

Tandem etiam interdum scabies & pruritus scroti accedit, cum humores acres ad superficiem eius feruntur, eamque vel exulcerant, vel rodunt, & squamulas quasdam gignunt.

Pruritus  
scroti & pra-  
putij.

Univerſalibus præmiſſis, ea, quæ in aliarum partium  
pruritu ſunt vtilia, etiam hîc locum habent. Nimirum  
quæ abſtergunt ſuperficiem ſeroti, ſimûlque dolorem  
mitigant. Præſtant hoc *farina fabarum Egyptiacarum*,  
item *erni farina & ſeſami cum melle ſubſta*. Vel foueatur  
ſcrutûm *decocto folior. ebuli*, vel *folia cocta* imponantur  
aut abluantur *decocto folior. ſalinæ*.

Vnguentum Bayri, quod hic commendatur, hoc est.

Unguentum  
Bayri.

℥. Cerussa Drach.vj. sulphur. citrini Dr.ij. opij Dr. j.

Terantur in *aceto*, & *aqua*, & locus eo imungatur.

**Foresti hoc est:**

℞. albi camphorat. Vnc. j. diapompholyg. Vnc. ℞. liobarg. Foresti:  
auri, argenti an. Drach. ℞. serre sigillate Drach. j. creta alba  
scrup. iij. ℞. & sublimati scrup. j.

**Foresti:**

Misc. diligenter in mortario plumbeo, pistillo plumbeo in formam vnguenti.

Extremum remedium est *sal ammoniacus* cum aceto  
mixtus.

Præputij præritura tollit lentis decoctum cum cortici-  
bus mali granati.



## LIBRI TERTII

PARS X. & ULTIMA.

DE VMBILICI ET  
abdominis p.n. affectionibus.

PRO O E M I V M.

**P**OST QUA M haftenus affectus p. n. qui  
partibus in abdomine contentis accidunt, absolui-  
mus: restat, ut quosdam affectus, qui externis abdominis  
partibus, ac toti abdomini contingunt, proponamus.  
Atque ita in hac ultima huius libri parte agendum  
DDDDd 3 erit

erit de vmbilici apertione, & rerum variarum per eum excretionem, de eius prominentia, procidentia, excrescentia, tumoribus, inflammatione, abscessu, vulnere, vermibus & lapidibus in eo natis; de laxatione & ruptura peritonaei; de musculorum abdominis inflammatione; de spasmis & tumore abdominis.

## CAPVT I.

De vmbilici apertione, & per eum variarum rerum excretionem.

**V**asa vmbilicalia, foetu in lucem edito, cum eum vsum; quem foetu adhuc in utero latente habent, de quo de foetus formatione dicitur, amplius non habeant, flaccescunt, & in ligamenta ac funiculos quasi abeunt, & locus, ubi coeunt, vmbilicus vocatur, centrum totius corporis. Solent autem vmbilicus & ista vasa suos morbos pati, & ex vmbilici & vasorum vmbilicalium in adultis morbis graues affectus oriri, non quidem ob ipsa vasa, quae vix aliquem sensum habent, sed ob viscera nutritioni dicata, quibus suos affectus communicant. Hinc etiam ἐπομάλια medicamenta ad purgandum vmbilico apponuntur, & status discutientia cauo vmbilici applicantur; cum per hanc partem celerrime eorum vis intestinis & visceribus communicetur. Scribit etiam Clarissimus Riolanus, lib. 2. Antropogr. cap. 12. inter tormenta, quibus veritas reis extorqueretur, illud solenne esse, frigidam vmbilico affundere, quo nullum grauius excogitari possit supplicium.

Primo interdum infantibus vmbilicus, nisi recte ligetur, sanguinem fundit. Ita Philippus Hechstetterus, Decad. 2. obs. Med. casu 9. refert historiam pueri sanguinem ob non rite ligatum vmbilicum copiose fundentis. Verum procul dubio ligaturae minus convenienti copia & acrimonia sanguinis accessit, cum puer hic, postquam adoleuit, mox ab aetatis anno nono copiosae & enormi haemorrhagiae fuerit obnoxius. Danda ergo obstetricibus opera, ut vmbilicus recte ligeretur; cum nisi id fiat, magna incommoda, imò mortem interdum afferre soleant. Sic Guilhelmus Fabricius, cent. 1. obseru. 52. scribit, duobus infantibus Coloniae id accidisse, quorum vires naturales, vitalesque ex eiusmodi haemorrhagia adeo fuerunt exhaustae, ut nullo modo refici potuerint, donec tandem languidi è vitâ decesserint.

Etsi verò in adultis omnem cauitatem amisisse, & planè in funiculum coaluisse, videantur haec vasa: conformationem tamen suam non planè amisisse, patet non solum ex eo, quod, ut modò dictum, extra applicatorum vis visceribus per vmbilicum faciliè communicatur, verum etiam ex eo, quòd interdum iterum & praecipue venae vmbilicales, aperiuntur, & varias res effundunt. Ita Philippus Hechstetterus, ibid. casu 8. refert, puellam nobilem 12. annorum ab incunabulis habuisse vmbilicum, qui sanguinis gutta leuiter indusum seu linteum proximum commacularet, sine vllâ aliâ noxâ, nisi quòd color ei pallidus fuit. Sanguinis verò eam paucitatem fuisse, ut non transsudaret superstratum etiam tenue linteum. Praeter succum autem & folia plantaginis vmbilico nihil admoit, sed naturae rem cominist, cum temporis tractu omnia in corpore robustiora fiant, & solidescant; quod & factum.

Refert quoque Guilhelmus Fabricius, cent. 3. obseru. 37. Danieli Schertlego, Pharmacopæo Solodurensi, homini pituitoso, obeso, 36. annum aetatis agenti, cum aetate supra modum incaluisset, apertum fuisse vmbilicum, ita ut ad lb. j. sanguinis effunderet, qui tamen per se, & nullo adhibito remedio subsistit. Medici vocati medicamenta, quae sanguinis fetuorem

compescunt, exhibuerunt, & extra applicauerunt, sed sine fructu. Altero enim die & subsequentibus usque ad vndecimum ex vmbilico quotidie bis sanguis, non quidem guttatim. neque in parua quantitate, sed cum impetu & copiose erupit. Foramen aded erat angustum, ut vix lentem excipere posset: certis autem horis, nimirum praecise inter septimam & octauam matutinam, & inter secundam ac tertiam pomeridianam haemorrhagia illa accidebat, ut plurimum quoque hoc tempore singulis diebus semel haemorrhagiam narium patiebatur. Etsi verò Chirurgi & Medici plurima tentarint, sanguinem tamen sistere nunquam potuerunt, sed sponte ac per se subsistit, & isto vndecim dierum spatio ad libras usque 27. sanguinis emanauit. Elapsa vndecimâ die vlcus vmbilici accreuit, ex quo, loco sanguinis, materia purulenta, per menses aliquot exstillauit, paulatim tamen iterum coaluit. Constitutio corporis fuit phlegmatica cum obstructionibus viscerum per aliquot annos, humoresque serosi venam vmbilicalem paulatim dilatârunt, tandemque vna cum sanguine per vmbilicum eruperunt. Sequenti aetate iterum aliquoties haemorrhagiam vmbilici passus est, postea acidulis Griesbacenlibus usus est cum maximo fructu.

Non verò tantum sanguis, sed & aqua ac serum interdum via hoc loco patefacta per vmbilicum effluit. Ita refert Antonius Beniuenius, de abd. sanat. & morb. caus. cap. 12. puerum quendam hydropicum Medicorum auxilio destitutum temerariam ac fortuitam libertatem vendicasse: liberaliore quippe, & quantum poterat, aqua epotâ, in vltimum se mortis discrimen praecipitauit. Verum repente soluta vmbilici vnitatem tanto impetu aqua inde profluere coepit, ut supra ventrem tres cubitos ascenderet; quo sanè vitam finiuisset, nisi circumstantes opposita manu aquam fluere non permisissent. Hinc Medico accersito, & aqua paulatim educta, ac curioso victu, & ceteris, quae ad rem faciunt, iniunctis, breui tempore in pristinam reductus est sanitatem. Andreas Laurentius etiam, lib. 6. Anat. quest. 9. scribit, se vidisse Monspelij Hydropicum, cui noctu nil tale opinanti sponte solutus est vmbilicus, & maxima aquae copia effluxit. Et Guilhelmus Fabricius, cent. 1. obseru. 47. refert, Virum quendam quadragenarium ex febre tertiana, eaque diuturnâ curatum in Asciten incidisse, tandemque vmbilicum, qui ad oui anserini magnitudinem aquae plenus propendebat, sponte sua ruptam esse, atque inde per trimestre maximam copiam serosi humoris effluxisse. Dedit autem operam Fabricius, ut humor paulatim fluere, imposito vmbilico linteamine duplicato, & fascia inuoluto, ne ex intempestiua euacuatione aquae vires agro antea debiles labefactarentur, & prosternerentur. Sic diuino fauore venter paulatim subsedit, ut tandem plenissime conualuerit, & per annos aliquot sanus vixerit. Verum cum postea pleuritide correptus obiisset, & cadaver eius aperiret Fabricius, inuenit venam vmbilicalem adeo dilatatam, ut facile penna anseris per eam immitti potuisset.

Idem Cent. 2. obseru. 58. meminit puellae tres menses natæ, cui, cum per multos dies malè habuisset, ac dies noctesque grauiter eiulasset, tandem venter intumuit, cum manifestâ duritie circa vmbilici ac epatis regionem. Cui cum primò cataplasma anodynum, simulque syrupum aperientem lambendum exhibuisset, ac tandem, cum tumor ac tensio circa vmbilici epatisque regionem accresceret, & pus subesse manifestò appareret, cataplasma sequens è farina tritici Vnc. j. sem. lini, sanigraci an. Drach. j. fermenti, axung. porci, vng. basilici an. Vnc. ss. ficuum Vnc. j. ss.

Cum decocto radicum alibæ paratum applicuisset per aliquot dies, vmbilicus paulatim in tumorem eleuatus est, eoque rupto multum humoris serosi ac puris spatio quatuor hebdomadam continuò exstillauit, sympto

Vmbilici apertio.

Frigida vmbilico affusa, vermentum grauiussum.

Sanguinem fundens vmbilicus.

Aqua & serum per vmbilicum excreta.



lymptomata remiserunt, ac puella continuato *syrupo*, & matre per interualla *syrupo ros. solutio composito cum rhubarb. agarico & senâ*, expurgato conualuit. Quæ observatio docet, aquam istam in vmbilici apertione non solum ex cavitare abdominis, sed & ex ipso epate per venam vmbilicalem effluxisse.

Atque ex relatione Doctoris Abelis Roscij *ibidem* refert, puellam annos decem natam Ascite laborantem, & penè desparatam solum à parentibus & domesticis domi relictam, sitis acerbissimæ impatientem, se à lectulo in solum deiecis, & fontem, qui non procul distabat, pedibus manibusque repentem periisse, ac aquâ purissimâ gelidâque iteratis vicibus sitim suam explere tentasse. Cum verò aquâ ad anhelitus ferè suppressionem repleta domum repetere non valeret, ilico iuxta fontem decumbenti vmbilicus ruptus est, & sponte ex eo copiosa aqua prorupit. Puella tandem à parentibus semianimis domum & in lectum deportata paulò post leuibis adhibitis remediis conualuit.

Tandem etiam feces alui per vmbilicum erupisse compertum est. Refert enim Cardanus, *lib. 18. de subtilitat.* puero cuidam octo annorum, cum inter pectinem & vmbilicum abscessu laborasset, & is ad maximum vicus peruenisset, etiam feces per vmbilicum excreuisse, seruatum tamen miserè vixisse. Et Alexander Benedictus, *pract. lib. 20. cap. 54.* narrat, puero cuidam Veneto ex intestino ventris abscessu, cum febre acutissimâ, intestina perforata fuisse, ut per vmbilicum magnâ excrementorum pars singulis diebus emitteretur, puerûque nihilominus sano similem per domum ambulasse. Et Guilhelmus Fabricius, *cent. 1. obs. 51.* refert, adolescentem duodecim annos natum tumore insigni duro ac dolorifico musculorum rectorum abdominis ad vmbilicum laborasse, ruptoque tumore excrementa per quatuor aut quinque hebdomadas per hanc viam, nihil verò per intestina excretum, tandemque puerum mortuum fuisse.

## CAPVT II.

## De Hernia vmbilicali.

Hernia vmbilicalis.

Varia deinde tumorum genera patitur vmbilicus, & sæpè supra modum prominet, qui tumores, etsi à variis causis ortum habent, ut mox dicetur, omnes tamen herniæ vmbilicalis, & vmbilici procidentia à Græcis *ἐμφαλὴ* & *ὀμφαλονίη* nomine appellari solent.

## Causæ.

Causæ.

Causa verò, ob quam vmbilicus prominenter rediit, est vel humor emolliens & laxans, vel pondus grauius & distendens, vel etiam rumpens. Cum n. ab his ligamentis firmetur vmbilicus, si rumpantur, quod interdum accidit, vmbilicus partium incumbentium pondere grauius cedit & laxatur.

Causæ autem, quæ vmbilicum in tumorem attollunt, sunt varæ. Primò enim fit vmbilici prominentia ab intestini vel omenti procidentia; secundò à flatu vmbilicum extendente; tertio ab aquâ; quartò à carne ibi excrecente: qui tumores etiam diuersis nominibus ab Autoribus appellantur. Qui enim ab intestinis tumor est, cum *ἐντερόμφαλον* appellant: qui ab omento *ἐπιπλόφαλον*: qui ab aqua, *ὕδρὸμφαλον*: qui à flatu, *πνευματόμφαλον*: qui à carne *σαρκόμφαλον*.

## Intestinorum &amp; omenti in vmbilicum procidentia.

Intestinorum &amp; omenti in

Primò interdum intestina vel omentum è sua sede elapsa vmbilicum in tumorem attollunt. Quod accidit,

cum peritonæum è loci vel laxatur, vel rumpitur; idque multis de causis, vel ob percussione, casum, saltum, ponderis grauis eleuationem, partum difficilem, equitationem, flatum in abdomine contentos, vociferationem & cantum, ploratum in infantibus, risum.

Solent autem tumores hi præter modum interdum incrementum, refertque Forestus, *lib. 27. obs. 30.* mulierem quandam septuagenariam vltra annos viginti rupta vmbilici affectam omphalocolem duo capita humana fere excedentem habuisse. Scribit etiam Guilhelmus Fabricius, *cent. 2. obs. 63.* foeminam quandam quinquagenariam robustam & obesam in difficili partu relaxatione vmbilici protraxisse, è qua procidente omento tantus tumor exortus, ut magnitudine vterum, qui foetum maturum gestat, æquaret, ventre nihilominus suam seruante proportionem. Extuberantia verò illa vmbilici, veluti ingens saccus propendebat, ut manum ferè inter ventrem & saccum istum facile imponere posset, interim sua negotia domestica, ut sana administrabat.

## Signa Diagnostica.

Si tumor hic sit ab intestinis, non admodum durus est, neque etiam mollis planè, & retento spiritu incrementum, ubi æger supinus decumbit, intestina plerunque cum strepitu & rugitu in suum locum regrediuntur, atque ita tumore subsidet.

Signa.

Si ab omento sit tumor, eadem ferè signa habet, quæ tumor ab intestinis. Hoc tamen ipsi proprium est, quod tumor ab vna parte est mollior, & ad basin latus, in verticem angustus. Adest omnis dolor. Et cum tumor digitis premitur, omentum in suum locum redit, & tumor subsidet.

Si tumor ab intestinis & omento simul sit, signa mixta adfunt. Et in tumoribus ab hisce causis excitatis, ut & in eo, qui à flatu excitatur, tumor totius corporis cuti concolor est.

## Prognostica.

1. Tumor vmbilici ab intestino vel omento elapso quò recentior est, & minor, ac in molliore corpore, èd facilius curatur: quò antiquior, maior, & in corpore duriore, èd periculosior, & curatu difficilior est. Et propterea in pueris ob corporis molliem tumores hi, qui à peritonæi rupta fiunt, facilius, & medicamentis curantur: in adultis verò non nisi manus operâ cum peritonæum scissum & ruptum in his non coalescat.

Prognostica.

2. Malum tamen hoc non est contemnendum. Quandoque enim ileos lethalis illi superuenire solet. Sic narrat Forestus, *lib. 27. obs. 30.* duas mulieres, quæ ex omphalo laborant, in ileum incidisse, ut stercora per os reicerent, atque ideo etiam obiisse.

## Indicationes.

Indicationes.

Si tumor vmbilici sit ab intestinis vel omento, ob peritonæi rupturam vel laxationem, intestinum vel omentum primò in locum suum reponendum; deinde si peritonæum sit laxatum, illud adstringendum, si ruptum, consolidandum. Atque ut vtrumque facilius fiat, omnes causæ, quæ laxationem vel rupturam peritonæi excitare possunt, & supra sunt propositæ, vitandæ.

## Curatio.

Corpore purgato medicamenta adstringentia & consolidantia exhibenda, quæ supra de hernia intestinorum part. 2. sect. 1. cap. 6. sunt proposita, ex sanicula, consolidida, ophioglossa, perfoliata, herniaria, rosis, caudâ equinâ, polygono, plantagine, myrto & similibus, quæ in vino

Curatio.

rubro coquenda sunt, & colatura saccharo dulcoranda, atque singulis diebus mane Vnc. ij. vel 3 iij. exhibenda.

Vel 2℥. Pulv. rad. consolid. maioris, sanicula, ophioglossi, an. Drach. jß. mastiches, corall. rubr. boli Armeni an. Drach. j. conf. ros. rubr. antiq. Vnc. j. cinam. Drach. 5. Cum syrupo myrtino Fiat Electuar.

Topica.

Topica simul conuenientia parti affectæ, intestinis vel omento prius in locum suum repositis, imponenda.

Ex omphal. cura Foresti.

In recenti exomphalo infantium nuper natorum Forestus quatuor rotulas ad formam stufari seu nummi parui rotundos è corio rubro conficit, oxycroceo obductas, easque sindone rubro cooperit, vel etiam sine sindone vitur. Vnam autem rotulam per quatuor pluresve dies, antequam eam amoueret, affixam manere permittit. Deinde aliam apposit. Magistrum vero Iohannem Tiengium Medicum percelebrem Ambrodelodamensem accepisse scribit petias tres ex panno lineo, primam magnitudinis denarij, secundam ad magnitudinem quadrantis, & tertiam ad magnitudinem medij stufari, inungendo primò oleo olivarum, & ita rotulam vnam ponendo super aliam, & vltimò imponendo emplastrum glutinans, quale ibi describitur, alutæ inductum. Inungebat autem singulis tribus diebus semel, postea sex dierum spatium, & vmbilicum diligenter ligabat, ne exire posset, idque continuauit ad perfectam curationem.

Vel 2℥. Picis naualis, mastiches an. Vnc. 5. sarcocolla, hypocistidis, sang. Dracon. aloës, thuris an. Drach. ij. pulv. rad. consolid. maior. Drach. iij. visci querni Drach. ij. terebinthine, cere ana q. s.

Fiat emplastrum.

Vel 2℥. Pulv. rad. consolid. sang. Draconis an. Vnc. 5. mastich. Vnc. j. thuris, boli Armeni, nucum cupressi an. Vnc. 5. picis naualis Vnc. vj. terebinth. q. s.

Terebinthina & pix naualis liquefiant, & ab igne remotis pulueres inspergantur, & bene misceantur. Fiat emplastrum.

Dietæ.

Simul dietæ recta ratio obseruanda. Aëris frigida intemperies, & ventus vitandi. A cibi flatulentis abstinentiendum, aliis lubrica seruanda. Vociferatio, cantus, fletus, ponderum grauium eleuatio, & omnis motus nimis vitandus.

Chirurgia.

Si hoc modo ruptura non consolidetur, ad incisionem & chirurgiam confugiebant Antiqui, quæ tamen, vt Celsus ait, non infantibus competit, sed adultioribus, & iis, qui bono corporis habitu sunt præditi. Quæ ratione a. ista operatio fieri debeat, Paulus Aegineta, lib. 6. cap. 51. & Celsus, lib. 7. c. 14. tradunt.

Verum rectè censet hic Hieronymus Fabricius ab Aquapend. de operat. chirurg. Chirurgiam hanc non ita tutam esse. Ideoque ille medicamentis & vinculo vri mauult, quibus si non planè sanatur malum, in meliorem tamen statum adducitur. Parat nimum cingulum ex linteo, quo abdomen cingat stringatque, & ea parte, qua vmbilicus est, puluinar duriusculum obtineat, in cuius centro sit globulus ex adstricto linteo, qui in vmbilici dilatationem sese insinuet, & intret ita, ne omentum vel intestina exire permittat. Prius verò vmbilico apponit sequens ceratum.

2℥. Boli Armeni, sang. draconis, mastiches, sarcocolla an. Drach. j. bilingua, regula pulueris an. Drach. iij. resina pini Vnc. jß. oui albuminis, cera an. q. s.

Fiat Ceratum.

Si verò nullo modo prolapsa intestina vel omentum reponi possint, & nihilominus ægro, dum propter pondus superiores partes deorsum trahunt, magnam molestiam creant, fasciâ continenda est pars prolapsa, qualem describit & depingit Guilhelmus Fabricius, cent. 3. obseru. 64. Parandus nimirum ex tela triplici thorax, ita tamen, vt ultra costas nothas non descendat. Thoraci isti in dorso è regione homoplatarum ex vitro-

que latere fascia duos digitos transuersos lata vndique perforata annectenda est; istis præterea fasciis paruis fasciæ magna sacculata beneficio lororum annectenda est, quæ eleuari, & laxari secundum necessitatem & voluntatem ægri beneficio lororum & foraminum potest.

### De Hernia vmbilicali Aquosa.

Interdum verò vmbilicus ab aqua in tumorem attollitur, qui Græcis ὁ δρημαλῶ appellatur.

Hernia vmbilicali aquosa.

#### Causæ.

Causa huius tumoris est vmbilici relaxatio. Fit autem illa ab humore aquoso in abdomine, præcipue inter peritonæum & abdominis cutem collecto, nonnunquam etiam per venam vmbilicalem laxatam affluente.

Causa.

Causæ autem collectionis humoris possunt esse omnes eæ, quæ in hydrope sunt explicatæ. In infantibus verò causa interdum est lac nimis serosum.

#### Signa Diagnostica.

Tumor hic laxus est, & si prematur, quædam aquæ fluctuatio percipitur, & ad digitorum compressionem nec minuitur, neque augetur, & candela apposita limpidus & perspicuus apparer.

Signa.

#### Prognostica.

In infantibus tumor talis est sine periculo, & facile curatur, atque bona Dieta nutriticis plerumque emendatur. In adultis verò, & cum aliis morbis, vt hydrope, coniunctus, periculo non caret.

Prognostica.

#### Indicationes & Curatio.

Aquosi humoris prouentus præcauendus, & quæ in vmbilico collecta est aqua tollenda. Ideoque si in infante hoc accidat, nutritici talis dieta imperanda, quæ lac minus serosum generet; si adultis, etiam collectio serosi humoris præcauenda, & si quis collectus sit, conueniente modo euacuandus, vt in hydrope dictum.

Indicatio & Curatio.

Topica quod attinet, ea vlturpanda, quæ aquam exsiccandi, & discutiendi vim habent, qualia in hernia aquosa sunt proposita, & ab Aetio, tetrah. 4. serm. 4. cap. 76. descripta. In pueris vtile est cataplasma ex arnoglossa, & lentibus simul coctis paratum.

In alijs 2℥. farine lupin. Vnc. j. pulv. ros. rubr. flor. chamem. an. Vnc. 5. boli Arm. Drach. ij.

Cum vino F. Cataplasma.

Si medicamentis tumor non cesset, sectio instituenda, vt Paulus Aegineta, lib. 6. cap. 51. tradit. Nimirum luxata sectio facienda, & aqua paulatim extrahenda: postea pars deliganda, carne replenda, & cicatrix induenda, & pars sequenti vel similia decocto calefaciente & adstringente roboranda.

Vt 2℥. origani, pulegij, betonica, salvia, anethi, flor. chamemeli, ros. rubr. balaustior. baccar. myrti, nuc. cupressi q. s.

Coq. in vino austero, & spongia decocto isto imbuita vmbilicus foueatur.

Plura videantur de Hernia aquosa.

### De Hernia Vmbilicali Flatulenta.

#### Causæ.

Hernia vmbilicalis flatulenta fit, quando flatus vmbilicum distendunt. Accidit autem hoc, cum flatus multi in abdomine collecti vmbilicum extra pellunt; id quod euenit aliquando in tympanite.

Hernia vmbilicali flatulenta.

Signa

*Signa Diagnostica.*

Signa.

Tumor hic mollis est, & digitis cedit, sed statim redit, ac percussus sonitum quasi edit, ac ægro supino iacente eadem figura manet.

*Prognosticum.*

Prognosticū.

Tumor flatulentus umbilici difficulter sanatur: imò, ut Celsus, lib. 7. cap. 14. scribit, quod ex spiritu vitium est, medicamentum non admittit: quia causam plerumque in visceribus latentem & fouentem habet. Interdum tamen discutientibus tollitur; & sæpe infantibus accidit, in quibus non difficulter curatur, cum nullum viscerum insigne vitium intus lateat.

*Indicationes & Curatio.*Indicationes  
& Curatio.

Flatus tumoris causa discutiendus est iis medicamentis, quæ in hernia flatulenta sunt proposita, decoctis, fomentis vel sacculis è floribus chamæmeli, ruta, calaminta, semine milij, cumini, fæniculi, anisi, carui, ammeos, fursure.

Si tamen interdum aliquod viscerum vitium sit, quod flatus suppeditat, illud prius curandum.

*Hernia Umbilici carnosæ.*

Hernia Umbilici carnosæ.

Denique interdum caro excrescens umbilicum in tumorem attollit. Eadem autem generationis causas habet, quæ in Sarcocèle sunt expositæ.

Cognoscitur autem hic tumor, quod sit durior, & prementi digito non cedit, & siue æger supinus iaceat, siue stet, siue ambulet, semper idem apparet.

Caro hæc vel medicamento caustico vel ferro auferenda, & vulnus postea curandum: si tamen caro sit canerosa. Nam si in canerum degeneret, malum ferè incurabile est.

Exemplum talis curationis habet Beniuenius, de abd. sanat. & morb. caus. cap. 6. Pueri cuiusdam octimestri umbilicus digitis quatuor excreuerat ad penis similitudinem. Hunc cum plures Medici inuississent, ex his alij intestinum eò erupisse iudicabant, alij omentum, alij humorem, Beniuenius verò carnem in loco increuisse dicebat: cui sententiæ cum pater inhæsisset, puerum curandum suscepit Beniuenius, & carnem vincere coepit, & singulis diebus arctius deligare, nec prius desistere, quam ea ipsa præmorta penitus exciderit, ac puer subinde integram valetudinem recuperauerit. Similem historiam habet Guil. Fabricius, cent. 5. obseru. 62. Patrius quidam Bernensis, Vir robustus 25. annorum ætatis excrecentiam fungosam umbilici, quæ sex mensium spatio paulatim ex ipso umbilico sine vlla externa causa prouenerat, habuit, quæ, cum eam primum vidit Fabricius, magnitudine nucem iuglandem superabat, & colore erat liuido ac fusco instar cancri, substantiâ mediocriter dura & carnea, atque instar casei putridi foetente, in principio sine vlllo dolore. Venâ secta & corpore conuenienter purgato, fungo huic sequens medicamentum applicauit.

℞. Aq. rosar. plantag. carduibened. an. Vnc. j. ranar. Vnc. ij. sem. cydon. contusi Vnc. ʒ.

Infundantur & postea exprimantur, addanturque rutia præp. plumbi Fernelij præp. C. C. vsti, lapid. calaminaris, cinerum ranarum, gammarorum ana scrup. ij.

Misceantur, & linteis mollibus bis terve de die tepidè applicentur.

Quod medicamentum cum bona victus ratione cum per menses fere duos vsurpasset, & omnia ad vorum succedere videret, constituit excrecentiam illam filo aquâ Mercurij insuccato ligare, sed quia propter obesitatem ægri fungus ille inter musculos veluti abscon-

ditus iacebat, instrumentum quod eà de causa speculum umbilici appellat, excogitauit, cuius figura ibidem depicta extat, cuius beneficio musculi deprimerentur, ut totus fungus in conspectum veniret. Instrumentum hoc fuit ex catillo stanneo, cuius fundum excidit, & ex utraque parte fasciam oblongam alligauit, eamque in dorso tam stricte ligauit, ut catillus musculos reprimere posset, imò etiam ministro præcepit, ut speculum introrsum ambabus manibus intruderet. Hoc modo cum totus fungus in conspectum venisset, animaduertit, non vnum, quemadmodum primò intuitu apparebat, sed tres distinctos esse fungos. Hoc modo, & huius instrumenti beneficio fungi radici filum iniecit, illumque quantum fieri potuit constrinxit. Quia autem propter ingentes dolores, imò lipothymias, quæ protinus ex arcta ligatura superueniebant, primâ die radicem fungi non satis arcte ligare posset, sequentibus diebus tertio quoque die filum non nihil, prout æger ferre potuit, constrinxit. Interim quæ dolorem leniunt, fungo apposuit, linteum quin etiam reduplicatum decocto herbarum adstringentium, veluti plantag. geranei, equiseti, rosarum, scrophulariæ, & huiusmodi cum pauco aceto madefactum applicuit. Et cum propter dolorem & lipothymiam omnes simul ligare non posset, primâ vice duos tantum filo prehendit, quibus ablatis tertium quoque eodem modo aggressus est. Post casum fungorum puluerem ex topico supra proposito cum pauxillo alum. vsti inspersit, & idem illud medicamentum applicuit. Atque hoc modo æger sanatus est. Monet autem hic Fabricius, ut tria sunt vasa umbilicalia, ita etiam tres fuisse fungos, eosque separatos, & tam ex corde, quam ex epate originem habuisse.

## CAPVT III.

*De Umbilici inflammatione, abscessu, & ulcere.**Inflammatio.*

Non solum autem tumores modò propositos umbilicus patitur, sed etiam quandoque inflammatur, à calido sanguine eò confluente: id quod accidit, vel à percussione, aut lapsu, aut sectione, ob quam venæ & arteriæ in umbilico rumpuntur, aut laxantur, ut sanguinem effundant, vel cum is à dolore attrahitur. Et accidit sæpe inflammatio umbilici infantibus, cum is præciditur, aut perperam ligatur. Cui quoque occasionem præbet ploratus & eiulatus infantium. Sæpe etiam istud accidit propter affluxum materiæ serosæ ad hunc locum. Cum enim natura, foetu in utero existente, humorem serosum in hunc locum mittere solebat, eiusmodi operis nondum oblita interdum eundem humorem ad hunc locum mittit, unde dolor excitatur, & inflammatio.

Tumor hic est durus, rubeus, calorque & pulsus in loco affecto percipitur, absuntque signa intestini vel omenti prolapsi, vel flatus, vel aquæ, vel carnis excrecentiæ.

Inflammatio autem hæc sæpe periculosa est. Si enim in abscessum abeat, atque hic rumpatur, intestina prociidunt, & infantes moriuntur.

Ut autem curetur, imprimis danda opera, ut dolor leniatur; deinde ut affluxus humorum præcaueatur; tertio ut quod influxit, discutatur & digeratur.

Medicamenta ex aliarum partium inflammationibus nota sunt. Auicennas hoc vitur.

℞. Spica Celtica Vnc. ʒ. terebinth. Vnc. ij.

Misce & cum oleo sesamino vel amygd. dulcium in formam Vnguenti redigantur atque imponantur.

Poreff

# 1050 De vermibus & lapidibus vmbilici.

Potest etiam *Cerussa & lithargyrum* cum oleo *sesamino* & *terebinthina* in formam Unguenti redigi & imponi.

Alia quoque medicamenta, quæ testium & mammatum inflammationibus vtilia sunt, hic locum habent.

## Abscessus & Vlcera.

Vmbilici abscessus & Vlcera?

Ex Inflammatione Vmbilici sæpe abscessus fiunt, qui, ut iam dictum, in infantibus satis periculosi sunt. Si in adultis, quod interdum accidit, tales abscessus generentur, aperiendi sunt, & ut alia vlcera curandi. Plerumque autem talia vlcera lethalia sunt; cum in abdomen penetrant, & vicina intestina tenuia putredine inficiant & corrumpant.

## CAPVT IV.

### De Vermibus & lapidibus in vmbilico genitis.

#### Vermes in Vmbilico.

Vermes in vmbilico generari, quos *den Nabelwurm*, oder *Geitzwurm* appellant, à multis equidè pro fabuloso habetur: à plurimis tamè refertur, confirmatque id *αὐτόπτης* & oculatus testis D. Ioh. Georgius Brenggerus, Medicus Cauffbyrensis, in *Epistola obs. D. Philippi Hæchstetteri Decadi 6. annexa*, dum scribit, fuisse puellam semestrem, quæ hoc affectu laborabat, quæ valdè inquieta erat, cum febriculâ quâdam inordinatâ. In quâ cum pharimaca parum proficerent, mater eius nobilis fœmina, suspicata esse vermem in vmbilico, ei imposuit vnum è pisciculis, quos fundulos vulgò vocant, viuum, fasciisque alligauit quotidie semel, & per horas 24. ita relinquebat. Vermis autem ita depascebatur pisciculum semper relictis officulis, ac mox subducebat se iterum in venam illam. Accidit autem post 8. vel 10. dies, ut fasciæ prædictæ laxatæ nonnihil deorsum delatæ ab vmbilico recedentes pisciculum secum traherent: hinc vermis escam insectus ex vmbilico totus excidit, & regressum in vas vmbilicale inuenire non potuit, & sic extra corpus per ventrem infantis extensus mortuus repertus fuit, semipedali longitudine, figura terete, latiuscula, pellicula non tenui ac leui, qualis lumbricorum esse solet, sed duriuscula, seu subcrustaceâ, colore pallido ex luteo albicante.

Similem planè historiam recenset Vir Clarissimus, Dn. Doct. Rupertus Sultzbergerus, Medicinæ in Academia Lipsiensi Professor, amicus meus honorandus, in *disput. de vermibus in homine*, in hunc modum: Infans. Nobilissimi & strenui Viri Dn. Georgij Ernesti à VVeissenbach filiolus semestris aliquot dies noctesque totus inquietus & vagiens, osculo quasi purpurascens, capitulum huc illuc misere iactabat, deiectiones erant virides vel cineritiæ, instar pulmenti è carne concisâ crassæ: frustra tentis quibusdam remediis fundulus ad vmbilicum infantis applicatur, qui elapsis duabus horis conspicitur in latere illo, quo vmbilico alligabatur, foramine pisii magnitudine excavatus. Eo abiecto alter apponitur fundulus, qui per noctem integram ad vmbilicum ita relictus mane parte illâ, quæ cutem infantis contingebat, totus consumtus visitur, eique nihil præter σκῆλετον superesse. His cognitis putamen nucis auellanae dimidiatæ massula quadâ ex puluere vitri cum melle subactâ, addito tantillo herbæ sabinæ repletur, & infantis vmbilico applicatur per noctem. Manè iterum bona ipsius quantitas consumta conspicitur: repletur denuò & apponitur, donec tertia vice ab vmbilico remotum integrum, nihilque exesum conspicitur: tunc exhibito per superiora cornu ceruipio cum aquâ tanaceti, atque explorasis

sedulò visisque alui excrementis summè tunc foetentibus reperitur vermis in fasciis vel potius exuuiæ eius spithamæ ferè longitudine, capitulo abrupto, quantitate lentis minoris, forma ferè maioris muscæ, duriusculo tamen & iuxta vtrumque oculum proboscide satis conspicua ornatum, quod reseruaturn adhuc monstratur. Vermis hoc excluso omnia symptomata remiserunt, & infans plenissimè conualuit.

Hinc vulgò & nostris fœminis vñtatum est, si infantes inquieti sint, plorent, labia purpurascant, caput hinc inde iactent, nec alterius morbi adsint indicia, vermem in vmbilico latere suspicantur, idque ut explorent, fundulum viuum vmbilico applicant, qui si atrodatur, vermem reuera latitare existimant, quem ut necent, puluere vitri Venetiani subtilissimo cum pane & melle mixto (alij etiam puluerem sabinæ addunt) putamen dimidium nucis iuglandis replent, idque vmbilico ad necandum vermem imponunt.

#### Lapides in Vmbilico.

Lapides in Vmbilico repertos fuisse, obseruaturn est, testaturque id Autor definitionum Medicarum, & hunc affectum *σαρκομαλον* appellari scribit, ac Columbus, lib. 15. *Anat.* idem confirmat, ut & Marcellus Donatus, de *histor. med. mirab.* lib. 4. cap. 30.

Lapides Vmbilici.

## CAPVT V.

### De Vulneribus vmbilici & vasorum eius abruptione.

Tandem etiam vulneratur quandoque vmbilicus, cuius vulnera satis lethalia sunt, cum intestina vicina, & ventriculus facillè simul vulnerari possit, & intestina facillè procidere. Et refert Guilh. Fabricius, cent. 1. obs. 53, adolescentem quendam post vulnus exiguum inter vmbilicum & costas mendosas acie gladij ipsi inflictum, mox humi procubuisse, & quamprimum expirasse. Cadauere dissecto interiora omnia illæsa inuenta sunt, præter vmbilicalem venam, quæ plane abscissa fuit, causamque mortis subitæ fuisse putat Fabricius, quod ligamento hoc, in quod vena vmbilicalis abit, Hepar ab vmbilico alligatur, quo abscisso pars sursum retrahatur, & diaphragma adeò comprimatur, ut homo neque expirare neque inspirare possit, imò suffocetur illico. Hinc Scaliger *exerc. 246. sect. 2.* scribit, apud Egyptios Grassatores & Rebelles pro supplicio viuos exui corio. Eos ita demum magno cum cruciatu vivere, si carnifex vmbilicum ferro non attingat, eo tacto illico expirare. Ioh. Riolanus tamen *Anthropog. lib. 2. cap. 12.* non putat, tantam eorum esse necessitatem, ut vno rupto, vel omnibus incisis hominem interiri necesse sit, aut deterius vivere, dyspnœâ fatigatum. Nam venæ vmbilicalis defectum supplere ligamentum illud xyphoidi affixum. Scribitque se vidisse in Æthiopica muliere saltatrice agilissima venam vmbilicalem abruptam, & inter epatis fissuram reuulsam, atque arefactam, quæ sine vllo vitæ iucommodo, aut respirationis impedimento vivebat. Quin etiam in pluribus mulieribus, quæ sæpius vtero gestarunt, vasa tria vmbilicalia inferiora deprehendi abrupta, nec ad vmbilicalem peruenientia, quorum adminiculo carere potest vesica duplicato peritouæo in homine solo suspensa & inclusa.

Vulnera Vmbilici.



CAPVT VI.

De Peritonæi Morbis.

Peritonæi  
Morb.

**P**ERITONÆUM quoque aliquos morbos patitur, & interdum præter naturam laxatur, rumpitur, vulneratur. De eius laxatione & ruptura, quæ in inguinibus scroto, ut & umbilico accidit, suis locis iam dictum. Et Antiqui quidem varias hæc Chirurgias proponunt, ut apud Celsum videre est: verum quia illæ admodum difficiles sunt, malunt plerique ægri, & tutius etiam est, affectus eiusmodi gestare, & fasciis lenire, quam eiusmodi chirurgiæ se subiicere. Interdum tamen & in aliis præter inguina, & umbilicum locis laxatur & rumpitur. Ita refert Marcellus Donatus *hisor. med mirab. lib. 4. cap. 3.* Perillustrem fæminam, cum disrupto peritonæo supra umbilicum in violento pæctu per multos annos nulla deligatione aliove præsidio adhibito rupturam tulisset, eam indies ita dilatatam fuisse, ut intestina, præsertim gracilia, laborentur, ita ut cibariorum in ventriculo confectorum distributio per illa minime fieri posset, sed natura grauata, tertio, quarto vel quinto quoque die prout magis vel minus cibum ingerebat, per vomitum esculenta & porulenta semi cocta reie-  
cisse. Noctu tamen, cum cubaret, ut plurimum ex situ adiuta intestina retrocessisse, tandemque subortis doloribus, & materia plurimâ, flatibus tumentibus intestinis per rupturam elapsis suborta inflammatione, disruptaque tunica intestinali, nec non & ventris cutis, prolabente pure, biduo, vitam cum morte commutasse. Vidi ipse etiam fæminam, quæ ex peritonæi ruptura tumorem quatuor ab umbilico digitis in latere habebat, & Platerus *lib. 3. obs.* narrat, Mercatori cuidam, cui taurus, impetu facto, cornibus abdomen in latere circa umbilicum perfoderat, post conualescentiam, exiguum tumorem rupto illic peritonæo remansisse: quem cum negligeret, tandem sensim è peritonæi cauitate emergentibus intestinis tumorem in itro mensum excreuisse, ipsumque & febre acuta, & stercoris euomitione adeo periculosè & extremè laborare cœpisse, ut de illius salute pene desperaretur. Ad sectionem tamen, reponendaque intestina, tanquam extremum remedium confugit Platerus, quâ in cutis illius loci tentatâ, & foramine peritonæi rupti, licet difficulter digito inuestigato & inuento sensim intrusit intestina, ut æger mox sanitati restitutus fuerit, qui tamen tumorem postea vinculis coercuit.

Nodus autem curandi idem est, qui in cura Herniæ umbilicalis propositus est. Antiqui quidem, ut apud Celsum videre est, & modò dictum, varias chirurgias instituebant: verum quia plerunque ægri eiusmodi chirurgiis iisque satis molestis & operosis raro se committunt, sua sorte contenti fasciis commodis adhibitis vitam prodeant, oportet. Et quia huiusmodi procidentia raro in ventrem retrudi possunt, aut si retrudantur, difficulter tamen retinentur, maximasque molestias ægro pariunt, tum propter pondus superiores partes secum deorsum trahunt, fasciam quandam sacculatam excogitant Fabritius *cent. 3. obs. 3. 64.* quâ extuberantia illa tam commodè sursum retrahitur, atque subleuatur, ut nullam ferè molestiam atque incommodum pariat.

Vulneratur tandem etiam peritonæum: sed quia vulnerari non potest, nisi cutis simul & musculi abdominis vulnerentur, de vulneribus peritonæi vnâ operâ, de vulnerib. abdom., dicetur.

CAPVT VII.

De Musculorum abdominis inflammatione, & abscessibus.

Musculorum  
Abdominis  
inflammatio.

**I**mprimis verò notatu digna est inter morbos abdominis musculorum eius inflammatio: & ab epatis inflammatione, quàm non raro præ se fert, diligenter distinguenda: cum etiam ipsi medici hæc in re fallantur. Ita Galenus, *5. de loc. affect. cap. 7.* refert, Stesianum quendam quasi, abscessum in Epate habentem ab aliis Medicis curatum fuisse: id quod Galenus negauit, & monstrauit abscessum esse inter musculos transuersos & obliquos abdominis. Sic Valeriola, *lib. 4. obs. 5.* narrat, fæminam quandam ingenti hypochondrij dextri dolore cum tumore insigni & circumscripto affectam, ac spirandi difficultate laborantem à Medico, ut phlegmone epatis affectam curatam fuisse, quàm postea ipse inflammatione musculorum abdominis laborare agnouit.

Signa Diagnostica.

Equidem signorum quædam hæc occurrunt affinitas: Signa. tamen etiam signa sunt, quibus discernuntur. Inflammationis Epatis signa supra, *part. 4. sect. cap. 6.* enumerata sunt. Si verò muscoli abdominis inflammantur, corporis color, ut in inflammatione Epatis, non ita mutatur, tumor ad figuram musculorum extenditur, nec rotundus est, ut in inflammatione epatis. Et quidem testorum musculorum abdominis tumores oblongi sunt, & per totum ventrem extenduntur. Cutis supra tumorem non sine dolore contrectatur, apprehensa quoque digitis, ut attrahatur, minime sequitur ob tensionem. Interdum rubedo apparet, præsertim si affectio in externis musculis hæreat. Quocunque denique modo æger decumbat, eadem tumoris magnitudo manet, nec, sicut in Epate, dum decubitus fit in latus sinistrum, tumor maior apparet, & contra minor corpore in dextrum reclinato. Si transuersi muscoli inflammantur, magis afficiuntur partes profundæ, dolorque est vehementior, quàm in aliis musculis; cum illi musculi sint membranosi circa finem, & nervos plures mollioresque obtineant, & cum peritonæo aponeurosi coniungantur.

Et quidem non mirum est, interdum hosce musculos inflammari, cum insignia vasa obtineant, alia adscendentia. Adscendunt enim ab inferioribus venæ & arteriæ epigastricæ; descendunt à parte superiore venæ & arteriæ mammarie, & per anastomoses circa regionem umbilico adiacentem coniunguntur.

Curatio.

Curatio talis qualem inflammationes aliæ requirunt, & hæc instituenda. Ideoque hæc curationem à Valeriolâ loco allegato descriptam exempli loco proponam. Curatio.

Cum mulier plethorica esset, Valeriola ad plethoram minuendam, & humioris ad partem affectam decumbere parati reuulsionem venæ internæ in cubitu dextri brachij sectionem, præmisso lene clystere, instituit, & vncias sedecim sanguinis detraxit; cum magnus esset sanguinis confluxus, & plenior corporis habitus, ipsaque ægra valido robore prædita.

Cum à sanguinis missione & dolor minueretur, & tumor detumescere videretur, apozema sequens exhibuit.

*℞. Borræg. bugloss. vtriusque cichor. acetosa omnium cum radicibus an. M. j. agrimon. lupuli, fumaria, lapathi acuti, capillor. Veneris, ceterach. hyssopi, fæniculi, melissa an. M. ss. sem. melonum cum cortice contus. Vnc. ss. acetosa, endiuia, portulaca an. Drach. j. petroselin. apii an. Scrup. ij.*

*Charum*

# 122 De Musculor. abdominis inflammatione.

*zuarum passerum num. xx. prunor. dulc. num. xij. glycyrrhiza rase Drach. vj. polypod. q. Vnc. β. flor. cordial. thymi an. P. ij.*

Coq. in aq. hordei recenti ad lb. ij. & colentur. In colatura dissolue *syndinia compositi, de duab. radicib. capillor. Vener. an. Vnc. iij. sacch. q. s.*

Fiat syrupus, pro quatuor dosibus matutinis, qui aromatizetur.

*Cinam. santali citrini an. Drach. j.*

Finito syrupo & coctione in vrina apparente sequens cholagogum & phlegmagogum exhibuit.

*℞. Agarici albi Drach. ij. rhabarb. electi Drach. j. β. zingib. schœnanthi, mastich. cinam. an. Scrup. β. Infund. in aq. endiu. bugloss. hyssopi, cum pauco mellis rosati. Per noctem. Colaturæ adde Elect. ros. Mes. diaphœnici an. Dr. ij. syr. ros. solut. Vnc. j. Misce.*

Cum decocto præcedentis apozematis

F. Potio.

Sequenti die clysterē ablutium ex decocto hordei, furfurum & seminum lini ac melonum, adiecto diacatholico & oleo violarum ac melle rosato applicari iussit.

Et quoniam tumor in musculis rectis abdominis, qui epati incumbunt, consistebat, eratque in parte durities, emollientibus, ac leuiter roborantibus ob epar vicinum utebatur. Fovebat nimirum partem hoc decocto.

*℞. Malua, althæa cum radicibus an. M. j. rad. bryonia M. β. absinth. M. j. origani M. β. sem. lini, fenigraci an. Vnc. ij. anisi, anethi an. Vnc. β. flor. chamam. meliloti, rorismarin. an. P. j.*

Coq. in 2. partib. aquæ & tertia vini potentis, & decoctum linteaminibus parti affectæ ante cibum applicetur.

Mox à fotu sequenti vnguento pars inungebatur.

*℞. Ung. dialth. Vnc. iv. emplast. Filij Zacharia Vnc. ij. cera propoleos, fecis olei de lilio an. Vnc. j. pingued. anat. gallina an. Drach. vj. ammoniaci sapâ dissoluti, bdellij mastiches an. Scrup. iv. styrac. calam. benzoes, rad. irid. florens. an. Drach. j.*

Misce & cum pauca cera, oleo irino liquata, fiat Vnguentum.

Vbi diebus duodecim his esset topicis vsa, tumor plane aboleri & tumor sedari cœpit. Quia tamen ventris tumor adhuc persistabat, ad corpus purgandum primò exhibuit pilulas ex *Hiera simplici, agarico trochiscato, rhabarbaro*, cum puluere sene præparate adiecto mastiche & granis aliquot diagyridii, interdum etiam syrupum ex decocto antecedente paratum adiiciendo folior. & folliculor. sene Vnc. ij.

*Medic. carthami Vnc. j. epithymi Drach. vj. rhabarb. Vnc. β. sacch. q. s.*

Quem decimo quoque die exhibuit.

Tandem decocti china parati è *rad. china Vnc. j. β. in aq. lb. ij. vsque ad dimidias coctæ, Vnc. viij. ad sudorem conciliandum exhibuit.*

Ventri etiam admouit Emplastrum ex *stercore bubulo & caprillo in aceto feruēfactis & cum cumini, anisi, & anethi seminibus*, ac terebinthina mixtis paratum.

Notandum autem de hac curatione, non fuisse puram inflammationem, sed crassum & glutinosum succum fuisse admixtum. Et solent plerunque hi tumores, etsi inflammatorij sint, esse diuturniores, quod aliquoties obseruavi.

Et cum hi tumores plerunque loco profundiore sint siti, si in abscessum mutantur, non facile is ad exteriora aperitur, sed sæpè chirurgi opera requiritur, cuius rei exemplum habet Franciscus Roussetus, de partu *Casar. sect. 3. cap. 2.* vbi refert illustrem quandam foeminam habuisse abscessum, qui ortum ducebat iuxta principiū musculi recti dextri lateris supra vmbilicum digitis tribus, loco fundo ventriculi vicino, iuxta epati regionem, & post multos diuersos & chronicos sibi inuicem succedentes morbos natura vitiosos humores in hunc

locum detrudente ortus erat. Abscessu aperto incredibilis & tanta puris copia summo cum impetu prodiit, vt vsque ad pedes lecti proflueret, & quidem vltra sesquimensis spatium copiosissime effluxit per vulnus, quod cauterio actuali excitatum fuit. Similem historiā habet Dodonæus, *obseru. medic. cap. 29.* de quodam Scribâ, qui cum dextri lateris cum febris dolore correptus esset, iuxta ac paulo infra costas nothas, Medicumque accersiuisset, qui ipsum vt pleuriticum curauerat, atque inde peius haberet, Dodonæum vocauit, qui exhibitio primū leni purgante cataplasma emolliens applicauit, ac tumore emollito tandem sectionem instituit, & cum ex abscessu copiosum pus effluxisset, æger adhibitis vlceri idoneis remediis conualuit.

Memini etiam ante annos circiter 20. vicini mei Victoris vxorem simili tumore ad ipsam ferè ventriculi regionem laborasse, qui cum in tantam magnitudinem excreuisset, vt ferè duos pugnos æquaret, sectione, cum aperiri curauit. Ex abscessu verò maxima, & quidem primo aliquot librarum puris copia effluxit, cum tanto foetore, vt nec ego, nec chirurgus foetorem ferè possemus, sed ex hypocausto succedere necesse habuerimus. Fluxitque pus postea aliquot diebus, & ægra idoneis vlceri curando medicamentis adhibitis conualuit, quæ annis aliquot post peste extincta est.

Guilhelmus Fabricius etiam *Cent. 2. obseru. 38.* refert, virum quendam quadragenarium & robustum dolore maximo dextri lateris ad finem costarum notharum laborantem, ad se Lausannam venisse. Cum verò nullus tumor appareret, sed saltē dolor cum febricula adesset, atque purgantia, fomentationes, cataplasmata, inunctiones, discutientia, resoluentia, & anodyna per aliquot dies applicarentur sine fructu, nihilominus dolor punctorius & pulsatorius citra regionem epati & peritonæum persisteret, etsi in cute nihil appareret, dolore locum affectum monstrante sectio facta est. Qua peracta pus copiose effluxit. Neque diu post febris, dolor, lipothymia paulò cessarunt. Vlcus tamen propter puris copiam, quæ effluxit, per aliquot menses apertum seruatum fuit. Et optima victus ratione obseruata, & corpore per interualla expurgato, & eate ac partibus nobilibus roboratis, æger sanatus fuit.

Et omnino si pus collectum esse animaduertatur, maturè abscessus aperiendus, ne nimia puris copia colligatur, quæ postea vel peritonæum penetret, & in cavitatem abdominis defluat, aut postea sine vitæ periculo euacuari non possit: cuius rei historiā habet Guilhelmus Fabricius, *cent. 2. obseru. 39.* de quodam Viro quadragenario, qui in dextro hypochondrio abscessum immensæ magnitudinis habebat, vt cutis totius ferè lateris ab illi ossē vsque ad costas veras lineamque albam & spinam dorsi puris plena & eleuata esset, cum dolore continuo & magno lipothymia, nausea, appetitus & virium prostratione. Vocatus Fabricius ob periculi magnitudinē tumorem aperire recusauit, quod cum postea barbitonfor quidam fecisset, & vomica aperuisset, maxima puris copia inde effluxit, & dolor quidem aliquomodo imminutus est, sed intra biduum æger exspirauit. Vnde monet Fabricius, vt iuniores chirurgi in magnis abscessibus aperiendis cauti sint, & materiam non confertim, sed sensim & per vices euacuent.

Interdum tamen tumores hi discutiuntur, si non sint inflammatorij. Ita scribit Marcellus Donatus, *de hist. medic. mirab. lib. 1. cap. 6.* quendam pannorum Textorem senem tumorem indolentem ad tactum supra penem in pube sponte natum habuisse, panis crassitiem æquantē, nullo alio modo ægrum afficientem, quàm quod per initia ægrè vrinam reddebat, quæ progrediente morbo, & augeſcente tumore quoque suppressa est: sed discutientibus medicamentis ventoso tumore resoluta vrinam libetè excreuit, & sanitati momentaneo auxilio statim redditus, qui prius animam emissurus crederetur.

## CAPVT VIII.

## De Spasmo Abdominis.

Spasmus ab-  
dominis.

**R**ari affectus mentionem facit Clariss. D. Philippus Hechstetterus, obs. Decad. 5. cas. 1. nimirum spasmi abdominis, dum refert, Iesuitam quandam, habitus siccioris, corporis hirsuti, temperamenti melancholici, ætatis consistentis, passum esse affectiones spasmodicas abdominis, quarum exortus à musculis abdominis, & finis in diaphragmate & thoracis musculis fuit. Conuulsus quasi thorax spiritum difficilem, sublimem & anhelosum dedit. Aberrabat nonnihil in paroxysmo mens, cum diaphragmati noxa esset, cui cerebrum netuum implantat. Rugitus & murmura in ventre, flatuum copia, hypochondrii passio diuturnior, & inuoluntaria feminis excretio. Cuius affectionis causa proculdubio fuit flatus vel serosus humor, qui ex hypochondriis ac mesenterio per arterias mesaraicas (hanc enim puto esse commodissimam ex hypochondriis in hæc loca viam) inter peritonæum & musculorum abdominis spatium erupit, membranasque ac tendines & fibras musculorum vellicans hanc affectionem excitauit, imò etiam per easdem arterias ad diaphragma & musculos pectoris ascendit. Pectoris enim maximus cum hæmorrhoidali arteria consensus est; cum truncus, ex quo oritur, à corde descendens in primò statim exortu intestinales ramos propaget.

Similem morbum describit Heurnius, de morb. capit. cap. 15. Cum medicinam, inquit, Patauij discebam, vidi adolescentem, cuius intestina totumque abdomen conuellebantur, testelque & vasa spermatica sub osse pubis abscondebantur, rugitus aderat, & tensio hypochondriorum. Frigida huic erat temperies, & ventriculus frigidus erat cum ardore, anhelosus erat à diaphragmate oppresso, ac mente in paroxysmo exuebatur. Præceptores mei adhibebant flatus discutiencia, & eos attenuantia, ac ea, quæ euincere potuerunt materiam frigidam, eam coquendo ac putgando, & corroborabant tantum intestina. Primùm iniectus est clyster ex decocto anethi cum Hiera, melle rosato, & oleo chamæmeli, & deinde decocto agrimonie & petroselini præparabatur, & postea pilulis aureis, aloephanginis purgabatur. Foris oleo rutæ & castoreo inungebatur. Interdum accipiebat vnam pilulam ex castoreo cum syrupo betonicæ, bibebat vinum saluiatum, & ex betonica. Dianifum illi in deliciis erat. Fricabantur crura. Hæc Heurnius.

Cum ergo huius mali causa in hypochondriis hæreat, rectè conclusum, Iesuitam illū euacuandum esse melanagogis & phlegmagogis, & flatus discutiencia exhibenda, ob saburram in intestinis venis mesenterij, & primis viis hærentem: Musculosa verò & nervosa corpora oleis anodinis & flatus discutièntibus demulcenda, ac eorum contractionem mitigandam esse, & reliqua, vt in affect. Hypochondriacâ, peragenda.

## CAPVT IX.

## De Abdominis tumoribus.

Tumores ab-  
dominis.

**I**ntumescit etiam præter naturam abdomen, cum eius cauitas interna vel flatu, vel humore, vel alia re id distendente in tumorem attollitur. Id quod accidit secundum naturam in grauidis, præter naturam verò in mola, falsa grauidatione, vt appellant, in ascite, tympanite, dum vermes in intestinis hærent, eaque in tumorem attollunt. Intumescit etiam quandoque venter, si tumores scirrholi in mesenterio vel omêto sint geniti, qui si plures sint, ventrem distendant atque attollunt, non secus ac in hydropicis & grauidis fieri solet, vnde ægri pro hydropicis vel grauidis falso habentur.

Observatio  
eiusdem tu-

[Rarum & notatu dignum est, ingentem tumorem ventris à materia non in cauitate abdominis, sed inter

Dan. Sennerti, Tom. I I.

peritonæum & musculos abdominis conclusâ ortum fuisse. Fœminæ nimirum cuidam, Mercatoris Dresdensis vxori, ætatis consistentis, venter sensim intumescere cœpit, & intra quatuor annorum spatium in maximam molem, vt in hydropicis fieri solet, excreuit, vt ipse mense Ianuar. anni 1632. vidi. Ipsa tamē vsque ad modò nominatum tempus lecto non decubuit, sed negotia sua domi & foris satis expediuit, benè comedit, & cætera rectè valuit, & vix ante mortem sex aut octo mensibus lecto decumbere coacta est. Medicorum de hoc tumore variæ fuerunt sententiæ. Alij enim hydropem verum, alij hydropem vteri, alij glandularum mesenterij tumorem esse putauerunt. Omnes tamen suspensos & dubios habuit illud, quod, vt dixi, adhuc ambulare potuit, cætera non admodum malè valere visa est. Ante obitum tribus septimanis dextrum crus aliquot locis exulcerari cœpit, & ex vlcerebus nigra ac fœtida materia cum magno dolore copiosè effluxit. Postquam mortua esset, cutis abdominis in latere sinistro prope vmbilicum sectione aperta est, è qua, cum tamen perforatum nondum esset peritonæum, magna corrupti & putridi humoris (non aquæ citrinæ, vt in hydropicis fieri solet, sed materiæ fæculentæ) absque insigni fœtore, copia, ad quadraginta ferè mensuras, quarum singulæ 3xxxij. capiunt, effluxit. Quæ effusâ, & musculis abdominis sectis atque apertis, deprehensum est, humorem illum fæculentum inter peritonæum, (quod à musculis separatum, nulloque in loco musculis adhærere repertum est) & musculos abdominis totum contentum fuisse. Intta verò peritonæum & intestina nihil planè eiusmodi humoris fuit. In musculis abscessus multi satis insignis magnitudinis, numero 26. minoribus non numeratis, quorum maximus trium pugnorum magnitudinem æquabat ferè, reperti sunt. Abscessus tamen vel vlcus in cute nullum fuit, sed omnes abscessus in musculis internis versus peritonæum excepto vno, qui in ipso peritonæo materiâ quadam citrinâ repletus visus est. Materia in illis contenta varij coloris erat, alba, citrina, nigricans, mucosa, arenosa, & scirrholosa. Lien primo intuitu saluus & intactus videbatur, sed incisione factâ, totus putrilaginosus deprehensus est. Iecur in quibusdam tantum partibus durum & scirrholosum, maximâ ex parte sanum & saluum erat. In renibus & vtero nulla labe, testiculus dexter planè absumptus, & in materiam putridam tunicâ contentam conuersus erat. In vesicula fellis lapis, ouum columbinum minus magnitudine æquans, inclusus erat.

mors inter  
peritonæum &  
musculos ab-  
dominis.

Observaui etiam sæpius aliàs in abdominis musculis tumores abscessusque generatos fuisse, qui à nonnullis pro viscerum internorum tumoribus habiti & curati fuerunt. Et modum etiam generationis horum tumorum inuenire, non ita difficile est. Cum enim vasa multa, ad nutritionem musculorum abdominis comparata, extra peritonæum sint, facillè humores excrementitij per eos ad hæc loca deponi possunt.]

Observatio  
de abscessibus  
in musculis  
abdominis.

A qua causa autē mola & falsa grauidatio proueniât, quomodo agnoscantur, & curentur, de morb. mulierum dicetur.

Mola.

Quomodo hydrops generetur, & curetur, suo loco dictum.

Hydrops.

Qua ratione vermes & alia in intestinis latentia cognoscenda & tollenda sint itidem suo loco dictum.

Vermes inte-  
stinalior.

Qua ratione quoque illi scirrhi mesenterij & omêti generentur, de illarum partium affectionibus dictum.

Non esse autem tumorem illum ex scirrhis multis hydropem, vel mulieres non esse grauidas, cognoscitur ex inæquali tumoris durtie, & ex tumoris diuturnitate & longâ perseuerantiâ; cum obseruatum sit, nonnullos sine partium aliarum in ventre inferiore insigni aliquo incommodo ad finem vitæ vsque eiusmodi tumorem gessisse. Quomodo autem hi tumores curandi sint, modo curationem suscipiant, de affect. p. n. mesent. & omen. dictu.

E E E E CAPVT

## CAPVT X.

## De Abdominis vulneribus.

**H**Oc loco non prætereunda abdominis vulnera. Abdomen autem vt aliarum corporis partes, cute tegitur: à cute, vt Galenus, 6. meth. med. cap. 4. docet, medio circiter loco neruea tenuitas musculorum, quàm *σπερματικὴ* Græci vocant, gemina tenditur, membranarum ritu, quæ adeò coheret ac tenues sunt vt difficile sit eos separare: post hos deinceps sunt muscoli, sub musculis peritonæum, à quo proxime omnes partes ventris inferioris concluduntur & continentur.

## Differentia.

## Differentia.

Hinc ergò vulnerum abdominis differentia constituitur. Aliæ enim in ipsam cavitatem abdominis penetrant, vbi scilicet simul peritonæum perforatum est; Aliæ non penetrant, dum nimirum peritonæum integrum est. In vulneribus, quæ penetrant, vel aliquid ex visceribus, per vulnus excidit, vt omentum, vel intestinum, vel nihil excidit. Præterea in vulnere penetrante vel viscus aliquod læsum est, vel viscera omnia salua remanserunt.

## Signa Diagnostica.

## Signa.

An vulnus penetret in abdominis cavitatem, vel non penetret, stylo immisso cognoscitur. Si enim profundius is penetret, peritonæum vulneratum esse, & vulnus in ipsam abdominis cavitatem penetrare indicio est: Cauendum tamen hîc, ne vulnus obliquum sit, & ita stylus immissus inter cutem & musculos, vel peritonæum & musculos longo ductu progrediatur. Vt ergò certi simus, an vulnus penetret, vel saltem obliquum sit, vinum vel alius liquor in vulnus infundendum. Si enim vulnus penetrans sit, liquor in cavitatem abdominis defluit, & non regurgitat per orificium. Si verò vulnus saltem obliquum sit, non verò penetrans, liquor per orificium vulneris regurgitat. Præterea cum accidere possit, vt etsi vulnus penetrans sit stylus tamen profundius non penetret, quia viscus aliquod subiacens foramen claudit, aut vulnus obliquum est, & tunc commodissime vinum infunditur, vt de vulneris conditione certi simus.

An vero viscus aliquod vnum vel plura etiam læsa sint cognoscitur ex ipso viscere per vulnus sese exerente, & ex signis læso cuique visceri propriis, quæ si absint, nullum viscus læsum esse, indicio est.

## Prognostica.

## Prognostica.

1. Vulnera abdominis magis periculosa sunt, quæ sunt in medio abdominis, quam quæ ad latera sunt, ob aponeurosin & partem membranosa eius loci, cuius vulnus per se magis periculosum est, quàm in parte carnosa, & sudorem non facile admittit; atque in hac parte etiam intestina facile excidunt, & suo loco ægrè continentur; cum muscoli recti, qui ea continent ac contrahunt, læsa sint.

2. Magnum vulnus ita periculosum est, quod intestina facile excidunt, quæ difficulter postea suo loco restituntur. Angusta tamen etiam vulnera, si intestina excidant, periculo non vacant. Nisi enim quod excidit, statim in suum locum reponatur, intumescit & inflatur, vt postea per angustum foramen suo loco restitui nequeat. Minus ergò periculosa sunt vulnera, quæ nec nimis angusta sunt.

3. Si intestina vel omentum per vulnus excidat, nisi citò imponatur, inflatur & intumescit, vt postea reponi non possit, unde ab aëre externo alteratur & cor-

rumpitur & malum sæpè lethale euadit.

## Indicationes &amp; Curatio.

Abdominis vulnera non penetrantia eandem curandi rationem habent, quàm aliarum partium carnosarum vulnera. De deligatione tamen obseruandum, vt fascia sit longa & lata, & deligatio fiat incipiendo à parte vulnere opposita, & ducendo reuoluendoque duo capita supra vulnus in formam crucis, eademque ducendo reuoluendoque quoties opus.

Penetrantia verò vulnera, in quibus nullum ex visceribus in abdomine contentis læsum est, curantur etiã vt aliarum partium vulnera; nisi quod in sutura aliquid peculiare obseruandum. Primò enim si intestinum vel omentum prolapsum sit, primò illa reponenda. Si vulnus magnum sit vt intestina per id reponi possint, minister manibus suis totum vulnus extra apprehendere, atque intestina intus reprimere debet, & constringere, ac exiguum semper suendi prænudare. Si verò vulnus paruum sit, vt & intestinum iam inflatum, vt reponi per vulnus angustum non possit, intestina ab aëre alterata spongiâ molli vino calèti madida & expressâ calefacienda; vel animalia viuientia per medium dissecta calentia adhuc intestina applicanda. Quod si nec hoc modo inflatio cesserit, & intestinum reponi nondum possit, vulnus tantum ampliandum, quantum ad intestinorum repositionem opus est. Accommodatum ad hanc sectionem instrumentum est, quod Græci *Συγγύροτον*, id est, ad fistulas incidendas aptum, appellant. Situs autem ægri talis sit vt caueatur, ne quod excidit, ab aliis intestinis grauetur. Itaque si in dextro latere vulnus sit, corpus in sinistram inclinetur, si in sinistro, in dextrum, ita vt vulnerata pars semper altiore locum occupet.

Si intestina vel omentum non sint prolapsa, vel iam in locum suum reposita, Prima cura iam esse debet, vt vlcus conueniente modo suatur. Tres autem suturæ faciendæ modos proposuit Galenus, 6. meth. med. cap. 1.

Primus est, si cutem primò traicias atque acum extra introsum adigas, quæ vbi cutem & musculum totum transierit, peritonæo, quod ei subiectum, præterito per reliquum peritonæum eam ab interno extrosum trahas atque inde per reliquum abdomen ab interno extra transmittas: quod vbi transieris, rursus ab interno introsum idem abdomen est perforandum, atque vbi ad peritonæum, quod illi subest, perueneris, illud iterum prætereundum atque contrarium ab interno extrosum perforandum, vnaque cum eo totum ipsi vicinum abdomen. Deinde ab hoc rursus incidendum, atque id cum contrario peritonæo consuendum, ac rursus, vicina cute transmissâ, iterum ab ea parte acus introsum est iniicienda, consuendumque abdomen id cum contrario peritonæo, etiam ibi vicina cute transmissâ. Atque hæc iterum iterumque faciendæ, donec totum vulnus confutum fuerit. Intervallum inter suturas quod attinet, breuissimum equidem ad viscera in abdomine continenda aptissimum est: verum ad firmitatem breuitas parum tuta. Quare excessus utrobique vitandus & medicritas eligenda.

Secundus modus consuit peritonæum cum peritonæo, & musculos cum musculis, atque ita perficitur. Primùm cutis perforanda, & ab exteriori parte introsum acus adigenda. Vbi verò ad peritonæum ventum est, eo intacto relicto, & acu ad sinistram manum reuocata rursus ex aduersa parte ab externo introsum utrumque peritonæi labium est perforandum, & acu iterum ad dextram manum reuocata ab interno extrosum abdomen traiciendum, sicque subinde pergendum, consuendo peritonæum cum peritonæo, & musculos cum musculis.

Terminus modus ille est, quo vulgò ferè in aliis partibus vtuntur, & sit acu vno ictu & impulsu transmissa per

Indicationes & Curatio.

Modus deligandi vulnera Abdominis.

Sutura faciendæ in abdomine modus triplex.



per quatuor labia, scilicet peritonzi & abdominis, quoties opus est.

Et si verò Galenus, & alij etiam futuram primam secundæ, & secundam tertiæ præferunt: tamen non sine causa monet Hieronymus Fabricius ab Aquap. *de operat. chirurg.* quod sæpenuerò ratio vulneris, aut magnitudo, aut temporis angustia non patitur artificiosâ semper vti futurâ, sed opus est communi modo quatuor labia simul consuere. Præcipit & hoc, vt siue hæc siue illâ utamur, perpetuò tamen in subsidium suturarum glutinum applicemus; quia huiusmodi suture in abdomine statim & faciliè rumpuntur, cum propter morum abdominis ferè continuum, qui & in excernendis fecibus, & in respiratione necessarius est, tum quia abdomen subindè modò cibus & excrementis impletur, modò inedia attenuatur, tum tertio propter flatum, qui continuò in abdomine vulnerato excitantur, idque distendunt.

## CAPVT XL

*De fistulis & vstionibus Abdominis.**Fistula Abdominis.*

IN abdomine etiam interdum fistulæ, præcipuè super Ipubis latera, fiunt, cum in eum locum humores facilius decumbant, at ibi hæreant. Idque accidit post vulnera, abscessus, ac vlcera. Ac corrumpuntur sæpe, putredine inficiuntur, ac corroduntur simul intestina, vt per fistulam etiam feces alui egressas fuisse, comperum sit, cuius rei exempla supra. *part. 2. sect. 2. cap. 9.* allegata sunt.

Curatu autem difficiles sunt istæ fistulæ, præcipuè si intestina simul affecta sint. Se tamen ista vitia omnia & curasse, & curata vidisse, scribit Hier. Fabric. ab Aquap. *de operat. chirurg.* Veruntamen non manu, non ferro non igne, non aliis medicamentis eiusmodi abdominis & intestinorum fistulas se sanasse scribit, sed solis aquis thermalibus, aut Montis ægrotorum, aut Aponitanis, per insectiones manè & vespere in iis factas, ita vt aqua aut per cannulam immissam in cavitatem abdominis ingrederetur, intestinorumque erosiones sua substantia pertingeret, & attingendo exiccaret, purgaret, impleteret, tandemque cicatricem induceret. Et in thermarum defectu etiam sulphur, alumen, & salem in aquâ liquare & decoquere ac insectiones moliri vti-  
e censet.

Fistulæ verò abdominis externæ non aliter, quàm incisione, sanantur; & quidem si fistula vn. an orificium habeat, vtendum est Syringotomo ex altera extremitate acuto; vt finis fistulæ perforetur, & totus fistulæ meatus dissecetur, atque aperiat. Si verò fistula plura orificia habeat, syringotomo vtendum ex altera parte obruso, & exiguum globulum præfixum habente, quo etiam tota fistula aperiri potest. Eadem tamen aperiatio etiam fieri potest cultro siue scapello longo, & manubriolum similiter longum habente, qui culter ex vna tantum parte aciem habeat, in extremitate paulum intus recuruatam, exteriorem verò partem retusam obtineat, ad cuius cuspidem ex cera globulum infixum esse oportet, quo intus per totum fistulæ ductum sine obstaculo demittatur.

*Abdominis Vstiones.*Abdominis  
Vstiones.

Tandem hanc de abdominis morbis tractationem concludere libet vstionibus illis, quas in abdomine, hepatis, lienis, & ventriculi causa Antiqui instituebant, vt ex Paulo Ægineta, *cap. 47. 48. 49.* & Albucasi, *lib. 1. cap. 28. 29. 30. 31.* patet. Verum in desuetudinem istæ operationes venire; cum non saltem dolorosæ valde sint, & ab ægris vix tolerentur, & id, quorum causa ab Antiquis instituebantur, vix præstent. Duabus enim de causis istas vstiones instituebant, vt nimirum vel intemperiem frigidam & humidam subiectorum viscerum emendarent, vel vt vitiosos humores ex iis euacuant, quorum tamen neutrum commodè præstant. Primum enim quod attinet, non consultum est intemperies longâ alteratione contractas tam subito corrigere; cum facile contraria intemperies induci possit. Præterea exiguum ferramentum intemperiem per totam hepatis substantiam diffusam emendare non potest. Et habentur medicamenta satis idonea, quæ intemperiem hanc viscerum emendare possunt. Alterum quod attinet, etiam si vitiosa materia in visceribus subsit: tamen quia viscera peritonæo non sunt contigua, per vlcus ferro inductum materia effluere non potest. Et in specie quod vomicas hepatis & lienis attinet, quas Antiqui per vstionem abdominis euacuare volunt, rectè de iis scribit Hieron. Fabric. ab Aquap. *de operat. chirurg.* ferramento candente, acuto inurere cutem & subiectos musculos, & peritonæum, & penetrare vsque ad icteris vomicam, & ipsam quoque adurere, nihil aliud mihi videtur esse, quàm hominem penè mortuum occidere, laudatque non immeritò Præceptoris sui Nicolai Nouocomensis Medici Veneti sententiam, qui in desperatis casibus dicere solebat, *Satius esse sinere patientem mori, quàm occidere.*



## CONCLUSIO.

**H**ABES ita, Lector beneuole, libris hisce tribus comprehensa ea, quæ Practici vulgo libris suis eradere solent: sed, ut spero, plenius. Dedi enim operam, ne facile aliquem alicuius momenti morbum vel symptoma omitterem. Ideoque etsi omnia pro tua expectatione, vel etiam meo voto elaborare non potuerim: tamen id me puto effecisse, ut iam Locos communes habeas, in quos omnia, quæ vel Autorum lectio, vel praxis atque experientia quotidiana suppeditabit, referre possis. Atque ita meos defectus supplere tua fuerit industria.

Quia autem Practici plerique in suis libris agunt de Arthritide, neque ea ad eos, qui restant, libros ita commodè referri posse videbatur, Appendicis loco tractatum de Arthritide in præcedentibus editionibus subungere volui: quod tamen in nouissimâ hac, certis aliquot de causis mutandum duxi, illumque tractatum quinto potius Practica libro assignandum. Quæ omnia ut boni consulas, & sicubi lapsus fuero, beneuolè ignoscas, oro. Errare aliquando, accidit omnibus ante me hominibus, & procul dubio omnibus post me accidet. Cur ergo ego me humanâ sorte exemptum cupiam? Aut tu id, quod supra vires humanas est, à me postules?

Sequetur iam, si DEVS volet, & vitam ac vires mihi concesserit, Liber de morbis Mulierum.

NON NOBIS VERO, SED NOMINI TVO,  
DOMINE, SIT GLORIA.





# INDEX RERVM

## Et Verborum II. Tomi.

<b>A</b>	
<b>ABDOMEN</b> in ascite raro à sola aqua distenditur. pag. 1051	
Abdominis tumores. 1063	
Abdominis vulnera. 1064. differentia. ibid. signa. ibid. Prognostica. ibid. Indicationes. ibid. Curatio ibid.	
Abdominis fistulæ. 1065	
Abdominis vitiones. ibid.	
<i>Abscessus</i> in intestinis à dysenteria differentia. 907	
<i>Absinthij</i> vsus in febris. 105	
<i>Absinthij</i> in melancholiâ hypochondriaca vtilitas. 404	
<i>Abstemy</i> cur vocentur. 817	
<i>Abstinencia</i> longa, causæ aliorum auctorum, causa vera. 815. 816	
<i>Aceti</i> generatio. 989	
Acetum ad pestem præseruandam. 163	
Acetum humori melancholico generando aptissimum. 109	
Acetum cur topicis admiscendum 263 siccatur & vigilas inducit, 264. an sinapisinis admiscendum. 294. eius in affectibus soporiferis vsus, 351. ebrietatis remedium, ibid. an melancholicis vtile sit, 300. eius & acidorum vsus in neuorum affectibus parcus esse debet. 453	
<i>Acida</i> vt acida non adstringunt. 68	
<i>Acida</i> narcoticorum vim infringunt. 353. 507	
<i>Acidularum</i> in affectibus hypochondriacis vsus. 404	
<i>Actio</i> contagij vnde. 151	
Actionis fundamentum in contrarietate consistit. ibid.	
Actionum in febre lætio, naturalium, vitalium, animalium. ibid.	
<i>Acus</i> deglutitæ & per vrinam redditæ. 952	
<i>Aedes</i> infectæ quomodo mundandæ, 156. quomodo an satis mundatæ explorandum. 157	
<i>Ægilops</i> quid, 569. fistula lachrymalis quid, causæ, differentia, ibid. signa diagnostica, ibid. prognostica, indicationes, curatio. 570 & seqq.	
<i>Ægyptiorum</i> secretum ad tertianas, nothas & quotidianas. 105	
<i>Ær</i> ad deferendum contagij semina aptus. 149	
<i>Ær</i> in febris qualis esse debeat. 55	
<i>Ær</i> an pestilens euadat, 140. quibus modis pestilentia causa, ibid. an putredine, 141. quomodo putrescat, 142. calidus & humidus quomodo pestem inducat, 141. infestus quomodo mundandus. 162	
<i>Ær</i> scorbutico generando aptus. 993	
<i>Ær</i> calidus vt corrigendus, 265. frigidus vt calefaciendus. 270	
<i>Æris</i> squama. 1056	
<i>Es</i> vltum. ibid.	
<i>Agaricus</i> vim alexiteriam obtinet. 421	
<i>Alexipharmaca</i> simplicia. 165	
<i>Alexipharmaca</i> in peste necessaria, quem in finem exhibeantur. 135. an omnibus conueniant eadem, calida cautè exhibenda, non exhibenda pueris & gravidis, aceto prius præparanda, acidis corrigenda, temperata magis accommodata. 174	
<i>Alexipharmaca</i> interdum mutanda, ibid. sæpius exhibenda, 175. an cum purgantibus miscenda. ibid.	
<i>Alexipharmacorum</i> in dysenteria vsus. 913	
<i>Αλύν</i> & <i>άλυσμ</i> quid. 845	
<i>Alimentum</i> duplex. 49	
<i>Alimenta</i> cur necessaria sint. 815	
<i>Allium</i> an in peste conueniat. 161	
<i>Alui</i> fluxus & differentia. 889	
<i>Alui</i> fluxus in scorbutico. 1004 curatio. 1022	
<i>Alui</i> adstrictio in scorbutico. 1004	
<i>Alui</i> retentio, causæ, signa, prognostica, indicationes, curatio. 888 & 889	
<i>Amantibus</i> nullus pulsus proprius. 390	
<i>Αμαύρωσις</i> quid. 578	
<i>Αμβλυωπία</i> quid. 578	
<i>Ambra</i> insigniter cerebrum roborat. 509	
<i>Amentes</i> & stolidi qui dicantur. 366	
<i>Amor</i> insanus vnde dicatur. 388. eius causæ. 389. signa diagnostica. 390. prognosticum, curatio, 391. si ex seminis abundantia & Veneris appetitu ortum habeat, quomodo curatio instituenda, cura eiusdem si ex phileris, diæta. 391	
<i>Amuleta</i> ex arsenico, mercurio & aliis, 164. qua vi agant, & an satis tuta. 165	
<i>Amuleta</i> in conuulsionibus 468. num in epilepsia prosint. 497. contra dolorem capitis. 532. contra epilepsiam. 483. contra incubum, 472. contra hæmorrhagiam narium. 613. contra spasmodum. 467	
<i>Anasarca</i> , signa, diagnostica, 1072. indicationes, curatio, diæta. 1073	
<i>Anasarca</i> an à <i>λενιφλεγμάλια</i> differat. 1072	
<i>An</i> è pestilenti putredine animalia generantur. 149	
<i>Anchilops</i> . 569	
<i>Angina</i> . 655	
<i>Angina</i> exquisita, eius causæ, differentia, signa, prognostica, indicationes, curatio, diæta, 655. & seqq.	
<i>Angina</i> notha, eius signa & curatio. 666	
<i>Angina</i> à melancholia. ibid.	
<i>Angina</i> epidemica. 656	
<i>Anginæ</i> è vertebrarum colli luxatione curatio. 666	
<i>Angulorum</i> oculorum vitia. 534	
<i>Angustia</i> in neruis quot modis fiat. 449	
<i>Anhelitus</i> in scorbuticis. 1005	
<i>Ani</i> coalitus. 854	
<i>Ani</i> procidentia, causæ, signa prognostica, indicationes, & curatio. 867	
<i>Ani</i> inflammatio, causæ, signa, prognostica, curatio. 869	
<i>Ani</i> tumorum quatuor genera, signa, prognostica, curatio. 870	
<i>Ani</i> Rhagades, differentia, causæ, signa, prognosticum, curatio. 870	
<i>Ani</i> vlcera, causæ, signa, prognosticum & curatio. 871	
<i>Ani</i> fistulæ, differentia, signa, prognostica. 872 curatio. 872	
<i>Ani</i> paralysis & stupor, causæ, curatio. 935	
<i>Ani</i> pruritus, causæ, curatio. ibid.	
<i>Ani</i> dolor, & eius causæ, prognosticum & curatio. ibid.	
<i>Animalia</i> in ventriculum irrepisse quomodo cognoscantur. E E E E c 3	

# Index Rerum,

scatur, curatio.	802	<i>Aqua</i> potus in febribus an conueniat, 53. an in febribus ardentibus. 69. in hectica. 104. in ea exhibenda quæ obseruanda. 54. eam exhibendi modus. ibid.	
<i>Animalia</i> in ventriculo genita quomodo exturbanda. 803		<i>Aquæ</i> frigida intempestiua potionis incommoda. 17. coctioni resistit, hypochondria inflat. 62	
<i>Animalia</i> viua cur secuerint veteres.	942	<i>Aquæ</i> frigida potus in intermittentibus non conuenit, 54. in synochis putridis, 62. aquæ electio, 50. correctio. ibid.	
<i>Annata</i> oculi tunica pustula.	555	<i>Aqua</i> mulsa. ibid.	
<i>Anni</i> tempus lumbricis generandis idoneum.	859	<i>Aqua</i> D. Doringij ad hydropem pectoris. 728	
<i>Anni</i> tempus generationi scorbuti conueniens.	994	<i>Aqua</i> pectoralis calida Dorncrelij. 755	
<i>Anodyna</i> in ophthalmia,	548	<i>Aqua</i> vitæ alba Dresdensis. 778	
<i>Anodynorum</i> vsus in dysenteria.	807	<i>Aqua</i> catarrhalis. 754	
<i>Anodynorum</i> vsus in dysenteria.	914	<i>Aquæ</i> cordiales compositæ variæ. 771. & seqq.	
<i>Anorexia</i> 805. causæ, prognostica, curatio, 806. diæta. 808		<i>Aquæ</i> pectorales, in illarum compositione quid obseruandum. 683	
<i>Antipeptica</i> medicamenta simplicia. 481. composita ibid.		<i>Aqua</i> quâ ratione vorax sit. 75	
<i>Antidotus</i> conuulsiva Nortbergens.	480	<i>Aqua</i> frigida cautè ad sitim sedandam est exhibenda. 826	
<i>Antidotus</i> è cancris fluuiatilibus aduersus morsum caninis rabidi.	419	<i>Aquarum</i> thermalium in dysenteria vsus. 920	
<i>Antimonium</i> an in apoplexia locum habeat.	502	<i>Aqua</i> quomodo sit scorbuti causa. 993	
<i>Antimonij</i> oleum, flores, pilula.	1056	<i>Aqua</i> in ascite an vna vice educenda. 1058	
<i>Aphæria</i> quid.	473	<i>Aqua</i> ad vlcera narium & oris. 604	
<i>Aperientia</i> & detergentia medicamenta cur in febribus omnibus vtilissima.	45	<i>Aquæ</i> antepilepticæ. 483. aliæ ibid. alia D. Casp. Dornauij. ibid.	
<i>Aphoris</i> 22. sect. 1. explicatio.		<i>Aquæ</i> apoplecticæ. 506	
<i>Aphtha</i> , vide <i>oris vlcera</i> .		<i>Aqu.</i> apoplectica d. n. ibid. D. Sigismund. Kolreuter, 506	
<i>Aquaria</i> quid.	500	<i>Aquæ</i> apoplecticæ num statim in principio conueniant. 514	
<i>Apium</i> an epilepticis noxium.	496	<i>Aqua</i> articularis, 456. alia, D. Kolreuter, ibid. alia D. Brambachij. ibid.	
<i>Apophlegmatismi</i> in affectibus capitis frigid. 292. cautè vsurpandi in iis, qui defluxionibus ad pectus sunt obnoxij. ibid.		<i>Aqua</i> carbunculi. 304	
<i>Apoplecticarum</i> aquarum vsus in paroxys. n. 506. in apoplectico paroxysmo num vomitoria sint exhibenda. 514		<i>Aquæ</i> cephalicæ frigida, 262. calida. 267. humectantes, 272. aq. cephalica Langij. 266. externa, 294. Theriacalis Quercetan. 267	
<i>Apoplectici</i> ante triduum non sepeliendi.	502	<i>Aquæ</i> & spiritus ad vulnera capitis, Ioh. de Vigo, & Iacob. Carpenf. 324	
<i>Apoplexiæ</i> nomen. 50. definitio, causæ. differentia, 501. differentia. 502. à cognatis affectibus, signa diagnostica in genere, ibid. signa causatum, 503. prognostica, ibid. curatio in genere 504. venæsectio an, quando, qua in parte instituenda. 505		<i>Aqua</i> flor. cichorij ophthalmica. 547. fragorum ophthalmica, ibid. viridis. 559	
<i>Apoplexiæ</i> pituitosæ curatio. 505. in hac cerebrum roborantia medicamenta interna. 507. externa. ibid. diæta. 508		<i>Aqua</i> hirundinum composita, 467. dulcis, acida. ibid. alia. 482. aq. hirundinum Kolreuteri. ibid.	
<i>Apoplexiæ</i> à sanguine ortæ curatio. 508. à vapore narcotico. 508. à causis externis & violentis. ibid.		<i>Aqua</i> infusionis laudulæ Augustin. Schurffi. 267	
<i>Apoplexia</i> imminens signa. 509. præseruatio ab apoplexia, ibid. in quibus consistat. ibid. in apoplexia sanguinea abstinendum ab aquis apoplecticis. ibid.		<i>Aquæ</i> narcoticæ. 344	
<i>Apoplexia</i> an à sola intemperie cerebri excitari possit. 510. an sit morbus hæreditarius, 510. an à consumptione spirituum animalium omnimoda fieri possit. 511. quæ sit causa proxima. ibid.		<i>Aqua</i> ophthalmica D. Andr. Doreri, 582. Imperator. Maximilian. 581. alia ex epate hirci. ibid.	
<i>Apoplexia</i> in paralyin mutata cur nihilominus sensus interni torpidi, præsertim in senibus, maneant. 512		<i>Aqua</i> picarum composita. 483. alia. 485	
<i>Apoplexia</i> an à spiritu ☉ lato exhalationes ad caput adscendentes coagulante producat, 512. pueri cur raro apoplexiâ corripiuntur. 513		<i>Aqua</i> pæoniæ composita, alias <i>Fluszwasser</i> dicta. 483	
<i>Apoplexiam</i> an vapor narcoticus excitare possit. 513. an vapores sola commotione humorum excrementiorum in capite collectorum, apoplexiam excitent. 513. in apoplexia cur principio neruorum affecto interni sensus lædantur, 512. num purgantia in apoplexiâ exhibenda, 513. repellentia num conueniant. ibid.		<i>Aqua</i> roris majalis subtilior reliqua aqua. 402	
<i>Appetentia</i> nimia, causæ, signa, prognostica, curatio, 820. & seqq.		<i>Aqua</i> Saluiæ composita. 455	
<i>Appetentiæ</i> caninæ & lubini differentia.	818	<i>Aqua</i> Sapientia dicta. 370	
<i>Appetitus</i> deiectionis differentia.	806	<i>Aqua</i> Sapphirina. 582	
<i>Appetitus</i> defectio in scorbuto.	1003	<i>Aqua</i> Socialis dicta. 568	
<i>Apoplexia</i> scorbutica.	ibid.	<i>Aqua</i> visum fortificans. 582	
<i>Appetendo</i> corporis ad suscipiendam febrem.	7	<i>Aqua</i> vitæ rubra Elector Saxon. dicta. 361. quæ aliæ preciosissima. 335	
<i>Apræsentia</i> quid.	82	<i>Aqua</i> in hydrocephalo quo in loco captis contineatur. 339	
		<i>Aquam</i> è capite quæ euacuant. 339	
		<i>Aqua</i> calcis vitæ in hydrocephalo. 340	
		<i>Aqua</i> feruens quare in gyrum moueatur. 364	
		<i>Ardentes</i> febres. 62	
		<i>Argenti</i> viuis vis. 165	
		<i>Argentum</i> viuum num in lumbricis vsurpandum. 861	
		<i>Argentum</i> viuum quomodo in colica vsurpandum. 882	
		<i>Aromatum</i> vsus nimius in melancholia hypochondriaca noxius. 405	
		<i>Arteria</i> an in affectibus capitis à sanguine secanda, 276	
		286. earum apertio aliquando prodest. 359	
		<i>Arteriarum</i>	



# & Verborum.

Arteriarum melaraicarum vsus.	944
Arteriaca medicamenta.	673
<i>Asari.</i>	
in quartana vsus.	115
<i>Ascite</i> natura; causæ. 1048. differentiæ, signa. 1052. prognostica. 1053. indicationes. 1054. curatio. 1055	
<i>Ascite</i> materia vbi colligatur.	1048
<i>Ascites</i> à colliquatione, diætâ.	1061
<i>Ascites</i> an solo hepate læso generetur. 1062. quæ causâ prima sit serosi humoris in ascite. 1064. qualis sit in ascite dispositio ob quam vitiosus sanguis generatur.	ibid.
<i>Aspera</i> arteriæ angustia, eius causâ, signa, prognostica, curatio.	673
<i>Asperæ</i> arteriæ asperitas, eius signa & curatio. 672. & seq.	
<i>Asperæ</i> arteriæ intemperies.	ibid.
<i>Asperæ</i> arteriæ vulnera & vlcera, causâ, signa, prognostica, curatio.	ibid.
<i>Asperarum</i> arteriarum angustia, causâ, signa, prognostica. 681. indicationes, curatio secundum causarum diuersitatem varia. 682. diætâ.	684
<i>Asthma</i> , eius causâ. 738. differentiæ. 739. signa, causarum signa, prognostica. 740. Indicationes, curatio tempore paroxysmi, extra paroxysmum. 741. diætâ.	744
<i>Asthmatis</i> à tuberculo, calculo, vel grauedine curatio.	ibid.
<i>Astrologorum</i> de peste prædictiones.	140
<i>Astorum</i> concentus & chorea Pythagor.	ibid.
<i>Aspidæ</i> quid.	857
<i>Astrum</i> bilem in capite quæ præparant. 301. eandem è capite quæ purgant. ibid. purgantibus semper admiscenda humectantia.	ibid.
<i>Atrophia</i> in scorbuto. 1009. curatio.	1024
<i>Auditus</i> debilitas an sit causâ tinnitus.	594
<i>Auditus</i> grauis. ibid. causâ. ibid. causarum signa. 595. prognostica. ibid. indicationes. 596. curatio. ibid. diætâ.	ibid.
<i>Auditus</i> instrumentum proximum.	597
<i>Auditorij</i> meatus morbi.	598
<i>Aura</i> & halitus venenati.	143
<i>Auribus</i> immissa cerebrum calefaciunt.	270
<i>Auribus</i> aqua illapsa quomodo educenda.	593
<i>Aurium</i> dolor, causâ. 600. signa diagnostica. ibid. causarum, prognostica. 601. indicationes & curatio. ibid.	
<i>Aurium</i> doloris causâ an sola intemperies calida esse possit.	600
<i>Aurium</i> excrementa p.n. & fluxus. 601. curatio.	602
<i>Aurium</i> fætor.	592
<i>Aurium</i> inflammatio, causâ, signa diagnostica, prognostica. 590. indicationes & curatio.	ibid.
<i>Aurium</i> intemperies cum bile. 588. causâ, signa diagnostica, curatio.	589
<i>Aurium</i> intemperies frigida & humida cum pituita.	588
<i>Aurium</i> intemperies frigida sine materia.	ibid.
<i>Aurium</i> membranæ morbi.	598
<i>Aurium</i> sonitus diurni causâ.	595
<i>Aurium</i> sonitus, tinnitus, & sibilus an differant.	594
<i>Aurium</i> tinnitus quid. ibid. subiectum, causâ proxima. ibid. an eius causâ sit sensus acumen. ibid. differentiæ, signa diagnostica. 595. prognostica. ibid. indicationes & curatio. 596. diætâ.	ibid.
<i>Aurium</i> vlcera, causâ. 591. differentiæ, signa diagnostica, prognostica. ibid. indicationes & curatio.	502
<i>Aurium</i> vlcera antiqua. ibid. horum curatio.	ibid.
<i>Aurium</i> vlcus fistulosum.	ibid.
<i>Aurium</i> vulnera.	593

in Auribus excrefcentis carnis remedia.	592
in Aurium curatione regulæ obseruandæ.	600
Aurum ignitum in potu extinguendum.	ibid.
Aurum vitæ.	1057

## B

<b>B</b> <i>Albi</i> cur alui profluuiò maximè corripiantur.	902
<i>Balburies.</i>	618
<i>Balneum</i> an in hydrophobia conueniat.	420
<i>Balneum</i> an in ophthalmia vtile sit.	556
<i>Balneæ</i> artificialia in Paralyfi.	457
<i>Balneum</i> an conueniat in Ephemera. 14. an in ardentib. 66. aqu. frigidæ an in Synochis putridis.	62
<i>Balnearum</i> mentio apud antiquos patres.	129
<i>Balneum</i> Egyptiorum è lacte dulci tepido.	129
<i>Balsama</i> apoplectica.	507. 510
<i>Balsamum</i> antiparalyticum Guidon. de Cauliaco.	457
<i>Balsamum</i> artificiale ad vulnera cerebri.	328
<i>Balsama</i> cephalica calida.	269
<i>Balsamum</i> somniferum.	346
<i>Bilis</i> quomodo concoquenda.	44
<i>Bilis</i> & insanix sedes à Democrito quæ sita.	954
<i>Bilem</i> in capite præparantia. 287. purgantia. 288. particulariter euacuantia.	ibid.
<i>Blasias.</i> 968. causâ.	ibid.
<i>Boli</i> pituitam è capite purgantes.	290
<i>Botallus</i> in sanguine emittendo audacissimus. 31. eius opinio reiicitur.	33
<i>Bronchocele</i> , eius curatio.	671
<i>Bubones</i> an pestis signum perpetuum. 154. an omnes sint pestilentes.	ibid.
<i>Bubonum</i> curatio per vesicantia. 176. scarificatio. ibid. maturantia. ibid. an semper maturatio in iis expectanda. ibid. non in omnibus infectis apparent.	155
<i>Bufois</i> siccati vsus.	178
<i>Bulimus</i> quid. 818. causâ. 819. curatio.	820
<i>Buxi</i> folia in mania.	411

## C

<b>C</b> <i>Achexia</i> , causâ, signa. 1046. prognostica, indicationes, curatio. 1047. diætâ.	1048
<i>Cachecticus</i> pulvis.	1047
<i>Cacochymia</i> an venæ sectione tollatur.	31
<i>Cæcias</i> subitanea in scorbuto.	1003
<i>Cæpa</i> an in peste conueniant.	162
<i>Calculi</i> in pulmone geniti. 689. eorum causâ, signa, prognostica & curatio.	690
<i>Calculi</i> hepatis.	1040
<i>Calculus</i> renum, causâ. 1081. differentiæ, signa. 1084. prognostica, indicationes & curatio.	1085
<i>Calculus</i> vesicæ, causâ. signa. 1098. signa, prognostica, indicationes & curatio, an per medicamenta calculum frangentia tolli possit.	1099
<i>Calculi</i> è vesica extractio.	1101
<i>Calculus</i> vesicæ extrahendi modus Francisc. Ronsser.	ibid.
<i>Calculus</i> oui gallinacæ magnitudine à scemina quadam excretus.	ibid.
<i>Calculos</i> quandoquæ in capite nasci.	308
<i>Calidi</i> natiui & præternatur. differentiæ.	2
<i>Calidum</i> innatum qua ratione febris subiectum.	5
<i>Caligo</i> oculorum.	578
<i>Calor</i> febrilis quis. 5. à febre differt. 6. quâdo καλαρχέειν, quando καὶ ἐν partibus inesse dicatur.	4
<i>Calores</i> specie distincti an in febricitantibus sepe riantur.	2
<i>Calor</i> nocturnus in scorbuto. 1009. eius curatio.	1023

# Index Rerum,

- Cela* viua aqua perfusa loca infecta mundat. 156
- Camphora* & *Camphorata* medicamenta quibus non conueniunt. 174
- Camphora* in peste reliquorum medicamentorum vehiculum. 175
- Camphoræ* temperamentum. 266. per accidens refrigerat, vigilias excitat, caput grauat. *ibid.* in capitis affectibus biliosis cautè vsurpanda. 288
- Candela* sebacea vomitu reiecta. 874
- Candel.* pro fumo in peste. 164
- Cancro* pro phthisicis quomodo toquendi. 130
- Canes* frequentius quam alia animalia in rabiem agi. 416. rabidi quibus signis dignoscendi. 417
- Cantharides.* 1058
- Cantharides* in palpitatione cordis vesicatoriis non admisceantur. 776
- Caput* ad feri in reliquum corpus distributionem facit. 997
- in Capitis curatione quæ obseruanda. 261
- Capitis consensus cum ventriculo. 278. vnde ille. 537. cum vtero. *ibid.* cum intestinis, liene, renibus. 278. diaphragmate, partibus externis. *ibid.*
- Capitis per consensum ventriculi affecti curandi ratio. 279
- Capitis dolor. 530. causæ. *ibid.* quandoque vermes & calculi eius causæ. *ibid.* differentiæ. 531. signa diagnostica. *ibid.* signa doloris à vermibus. *ibid.* signa doloris capitis ex vrina. *ibid.*
- Capitis dolor per essentiam. 530. huius signa. 531. prognostica. 532. indicationes, curatio. *ibid.* diætæ. 533. per consensum. *ibid.* signa. 534
- Capitis doloris curatio ab intemperie. 533. à calore Solis, à casu vel percussione. *ibid.* ab ebrietate. 533. à vermibus. *ibid.*
- Capitis dolor si à ventriculo, in anteriore, si ab vtero, in posteriore parte magis percipitur. 530
- Capitis figura optima quæ. 304. vitiosa. *ibid.* vitiosæ causæ, signa diagnostica, prognostica, indicationes & curatio. 305
- Capitis magnitudo vitiosa. 309
- Capitis vulnus nullum contemnendum. 312
- Capitis vulnera patente membranâ quomodo curanda. 324
- Caput* ad feri distributionem in totum corpus multum facit. 516
- Caput* calefacientia fortiora tutius in intemperie cum materia, quam in nuda adhibentur. 266
- Caput* ab odoribus repletum quomodo curandum. 282. à vaporibus metallicis affectum quibus curetur. 283
- Caput* & *Cor* roborantia in melancholia. 261. eidem nocentia. 299
- Caput* quomodo cum omnibus ferè partibus consensum habeat. 530
- Caput* quot modis euacuetur. 275. commodius per palatum quam per nares. *ibid.* euacuantia. 291. calefacientia & roborantia. 294
- Carbunculus* quid. 906
- Carbunculi* non pestilentes. 154. pestilentes. *ibid.* sunt omnes maligni. *ibid.* non in omnibus infectis apparent. 155. Curatio. 176
- Cardialgia* in febribus. 215
- Cardui* benedict. pulu. Extract. ☉, aq. Syrup. vsus in quartanâ & aliis febribus longis. 115
- Carin* nomen, definitio, causa proxima. 498. differentiæ, signa diagnostica, signa causarum. 499. prognostica. *ibid.* indicationes, curatio. *ibid.* diætæ. 500
- Carnes* febricitantibus an conueniant. 50
- Caruncula* in pulmonibus genitæ. 690. earundem curatio. *ibid.*
- Castorei* in conuulsionibus vsus externus & internus. 467. 468. purgantibus in conuulsionibus admiscendum. 467. efficax & potens est in calefaciendo cerebro. 266
- Catalepsis.* 473. definitio. *ibid.* causæ. *ibid.* signa diagnostica, prognostica. 474. 475. indicationes, curatio, diætæ. *ibid.* in ea an spiritus illi, qui sensui & motui inserviunt, an verò qui sensibus internis, an verò omnes spiritus animales congelentur. 472
- Cataphora,* vide *Coma.*
- Cataracta.* 564
- Catarrhus* quid. 516. eius nomen bifariam sumitur. *ibid.* generaliter & specialiter acceptus quid. *ibid.* causa eius proxima. 517. huius qualis materia, quibus de causis generetur. *ibid.* vnde moueatur. *ibid.* ad quas partes fluat. 518. per quas vias. *ibid.* eius differentiæ. *ibid.* signa diagnostica. *ibid.* prognostica. 519. indicationes & curatio. *ibid.* in catarrho partem primariò affectam inuestigandi ratio. 518
- Catarrhi calidi* curatio. 520. in catarrho calido an cerota & emplastra è simo columbino & thapsiâ conueniant. 522
- Catarrhi frigidi* curatio. 520. in præparantibus & purgantibus quæ obseruanda. *ibid.* particulariter euacuantia an tutò in omnibus catharris adhiberi possint, & quid in eorum vsu notandum. *ibid.*
- Catarrhum* cum imperu fluentem sistendi ratio. 522. increfcentibus quando vtendum. *ibid.* partes eum suscipientes quomodo roborandæ. 524. partium catarrho materiam suppeditantium quomodo habenda ratio. *ibid.*
- Catarrhi suffocatiui* curatio. *ibid.*
- Catarrhi epidemij* historia. 209
- Catarrhi cum sputo sanguinis* curatio. 689
- Catarrhorum septem differentiæ.* 730
- Caus.* *ibid.* Curatio. 210
- Causus* seu febris ardens. 62
- Causi* nomen quot modis vsurpatur. 63
- Causus* propriè dictus duplex. *ibid.*
- Causi* signa. 63. Prognostica. *ibid.* Curatio. *ibid.* Agyptior. ad causos medicamentum. 68
- Cauteria* futuræ coronali an applicanda. 277. quo in loco applicanda pro reuulsione à capite. 279. eorum in melancholia vsus. 302. in apoplexia. 507
- Cephalæa* & hemicrania. 533. causæ, curatio. 534
- Cerebrum* tripliciter consideratur. 366. facillè noxam percipit. 263. ei tutius calefacientia quam refrigerantia adhibentur. 265. in eius morbis calidis faccharo albißimo vtendum. 264. ad actiones suas principes exercendas certum caliditatis & humiditatis gradum requirit. 366. occultæ qualitates ipsi non denegandæ. *ibid.* qualis eius requiratur constitutio ad operationes mentis. *ibid.* in apoplexiâ quæ illud roborant. 506
- Cerebri p.n.* affecti signa. 261. an per se, an per consensum afficiatur. 274. signa à statu affecti. 275. ab humore affecti. *ibid.* à ventriculo per consensum affecti. 278. ab vtero, hepate. *ibid.* liene, corde, pulmone. 279
- Cerebri excrementa.* 514. 526. horum qualis sit materia. 514. à quibus causis generentur. *ibid.* per quas loca euacuentur. *ibid.* quas affectiones patiant. *ibid.*
- Cerebri cocti canis* vsus in mania. 412
- Cerebri gallinarum* in vulneribus capitis vsus. 328
- Cerebri leporis* in Paralyfi vsus. 455
- Cerebri commotio.* 309. eius causæ. 310. signa diagnostica. 309. prognostica. *ibid.* indicationes, curatio. 310. diætæ. *ibid.*
- Cerebri meatuum angustia,* causæ. 305. 306. signa diagnostica. 306. prognostica. *ibid.* eius curatio à vapore. *ibid.* à carbonum fumis. 307. à pituita, à sanguine, à craniij compressione. *ibid.*
- Cerebri vulnera* an omnia sint lethalia. 327
- Cereuisia* quomodo scorbuti causa sit. 993
- Cereuisia* an & qualis in febribus conueniat. 54
- Cerota*

# & Verborum.

<i>Cerota &amp; emplastra cephalica.</i>	264	<i>Colica Austriz, Morauiz &amp; Franconiz familiaris.</i>	884
<i>Cerorum Montagnanz. 521. Vigonis 312. eiusdem de minio.</i>	ibid.	<i>Colica ab inflammatione intestinorum, signa, prognostica, indicationes, curatio.</i>	885
<i>Chalybis in obstructionibus hypocondriorum vsus.</i>	404	<i>Colicus dolor fit plerumque in sinistro latere.</i>	886
<i>Chatabitum.</i>	379	<i>Colicus dolor &amp; arthritidis per quas vias in se inuicem transmutentur.</i>	945
<i>Chorea S. Viti. 423. eius causa humor malignus tarantula veneno similis.</i>	ibid.	<i>Colicus dolor cur in paralyfim mutetur.</i>	945
<i>Cibi exhibendi quantitas. 51. qualitas. 52. tempus. ibid. an in ipso Paroxysmo cibum exhibere liceat.</i>	53	<i>Colliquatio quid.</i>	207
<i>Cibi hecicis saepius exhibendi.</i>	130	<i>Colliquatio pestilentibus febribus familiaris.</i>	207
<i>Cibi insalubres an ægro concedendi.</i>	117	<i>Colliquatiuz febres.</i>	ibi.
<i>Cibi prauis an ad febrium malignarum generationem faciant.</i>	183	<i>Collyria, 548. in his quid obseruandum, 553. Foresti, 554. Palmarij.</i>	568
<i>Cibi &amp; potus dysenteriam excitantes vt &amp; fructus autumnales.</i>	904	<i>Color faciei in scorbuticis.</i>	1005
<i>Cibi ad calculum generandum apti.</i>	1083	<i>Coma &amp; cataphora. 352. nomen. ibid. definitio, causae, ibid. signa diagnostica, prognostica, ibid. 353. &amp; indicationes curatio.</i>	353
<i>Cibi in coctione rarefunt &amp; spiritualescunt.</i>	985	<i>Coma vigil. 413. eius natura, differentiae causae, 424. signa diagnostica, prognostica, indicationes &amp; curatio.</i>	424
<i>Cibi scorbutico generando apti.</i>	993	<i>Communicantes febres.</i>	118
<i>Cibi crassi an calculum generent.</i>	1088	<i>Comitat. febres quæ, an absque putredine oriantur, 77. curatio.</i>	79
<i>Ciliorum mollities, 542. causa, curatio.</i>	ibid.	<i>Composita febres.</i>	117
<i>Ciliorum paralyticis 541. causae, curatio.</i>	ibid.	<i>Compositarum febrium signa, curatio.</i>	119
<i>Ciliorum vitia, 541. pediculi, 541. causae, ibid. prognosticum, curatio.</i>	541	<i>Compositionis modi.</i>	118
<i>Circumcidendi.</i>	1132	<i>Compressio meatuum cerebri eiusque causae.</i>	306
<i>Cirfocele.</i>	1126	<i>Confectio capitalis D. Gaspar. Kegleri.</i>	360
<i>Chalybis vsus in affectione hypochondriaca 978. dosis, quando vsurpandus.</i>	979	<i>Confectio anacardina ad roborandam memoriam caute exhibenda.</i>	369
<i>Chalybs in obstructione hepatis quomodo præparandus.</i>	1032	<i>Confectio Hamech in melancholia non satis commoda.</i>	394
<i>Χολδαΐδς quid.</i>	873	<i>Confectio Alkermes magnam efficaciam cor roborandi &amp; exhilarandi obtinet.</i>	396
<i>Chyli crassiores partes à liene attrahuntur.</i>	985	<i>Conformatio capitis vitiosa ingenio &amp; memoriæ obest.</i>	269
<i>Clysteribus quando &amp; qualibus vtendum.</i>	292	<i>Confusa febres vnde &amp; an dentur, differunt à nothis: ibid.</i>	ibid.
<i>Clysteres &amp; suppositoria vomitu reiecta.</i>	873	<i>Congelatio à frigore hyberno diuersa à catalepsi.</i>	474
<i>Clysteres acres in apoplexiâ, 504. non solum ex prunis viis euacuant, sed &amp; à membris principalibus &amp; cerebro humores versus inferiora trahunt.</i>	289	<i>Conserua cephalicæ calidæ, 268. refrigerantes. 263. humectantes.</i>	272
<i>Coactern. febres.</i>	118	<i>Constrictio pororum cutis quomodo febris causa.</i>	7
<i>Cochlea in hecicâ febri quomodo vsurpand.</i>	130	<i>Contagium quid significet, vnde dictum. 145. eius definitiones variæ, authoris definitio. 146. quomodo similis affectionis productio fit.</i>	ibid.
<i>Cochlearum in hydrocephalo vsus.</i>	340	<i>Contagij vis etiam in minima mole ibid. seminium. 147. etiam in fomite vias suas retinet.</i>	149
<i>Coctio humorum quid. 43. non in omnium morborum principio necessaria. 43. solius naturæ opus. 44. à digestionem an differat. 45. in intermittentibus qualis esse debeat. 46. Medici in coctione humorum officium. 44. concoquentia seu digestiua medicamenta. ibid.</i>	ibid.	<i>Contagij differentia.</i>	152
<i>Coctionis primæ errata non corrigi in secunda.</i>	398	<i>Contagium immediatum, mediatum.</i>	ibid.
<i>Cœcitas &amp; visus debilitas, 578. causae. 579. signa causarum, 581. prognostica, curatio.</i>	581	<i>Contagium an sit de pestis essentia, 138. an aliquandiu dillescere in homine possit.</i>	150
<i>Cœcitas ex scabie, affectu hypochondriaco.</i>	579	<i>Contagij semina an vestibus sine noxa circumferri possint, ibid. an in muris, parietibus, monetâ delitescant.</i>	149
<i>Calum an pestis causa. 142. à cœlo tam corruptio, quam generatio provenit.</i>	ibid.	<i>Contagium cur consanguineis magis infestum 152. peculiarem corporis dispositionem requirit, in quod ea consistat.</i>	151
<i>Cœliaca affectio, causae, 890. signa, Prognostica, curatio.</i>	891	<i>Contagium quomodo sit scorbuti causa.</i>	994
<i>Colicus dolor intestinorum, causae, 876. subiectum, differentia, signa, prognostica, 877. indicationes, curatio.</i>	878	<i>Contagiosum quid.</i>	146
<i>Colici &amp; nephritici doloris discrimen.</i>	877 & 1085	<i>Contagiosæ materiæ origo. ibid. ad contagium quæ requirantur, ibid. vtum corpora viuientia an vêtus cadaueta magis contagiosa sint.</i>	148
<i>Colico dolori vteri dolor est cognatus.</i>	877	<i>Contagiosi morbi an magis maligni, an solum putredine generentur, non tam putredine, quam fermentatione generantur, 147. quæ vi agent, quomodo disseminantur.</i>	148
<i>Colica à flatibus &amp; excrementis ferentis, signa, prognostica, indicationes, curatio, dieta, 879 &amp; seqq.</i>	ibid.	<i>Continuarum &amp; intermittentium febrium materia non multum differt.</i>	84
<i>Colica ab intestinorum contorsione, conuolutione, &amp; compressione.</i>	880	<i>Contin. periodic. febres. 65. earum causa, an in primis viis consistere possit, signa. 66. differentia à continetibus &amp; intermittetibus.</i>	ibid.
<i>Colica à vermibus.</i>	882	<i>Constituitatis &amp; periodorum causa.</i>	ibid.
<i>Colica ab humoribus crassis &amp; viscidis, signa. ibid. prognosticum, indicationes, curatio, dieta, 883.</i>	883		
<i>Colica ab humore acro &amp; scorbutico, signa, prognostica, indicationes &amp; curatio, 884. dieta.</i>	884		

## Index Rerum,

<i>Contractio</i> membrorum in scorbuto.	1002	<i>Costarum</i> luxatio. ibid. eius symptomata & curatio. ibid.	
<i>Contraffissura</i> cranij. 316. 329. quo loco fiat. ibid. signa.		<i>Costarum</i> fractura. ibid. eius signa. ibid. prognostica.	
317. prognostica. 319. curatio.	321	curatio. ibid. diætā.	733
<i>Contrarietas</i> inter res naturales est. non simpliciter mala.		<i>Costarum</i> numerus vitiat. ibid. tumor.	ibid.
142		<i>Coryl. foetid.</i> vsus.	178
<i>Contusio</i> capitis. 311. causæ. prognostica. indicationes		<i>Cranij</i> vulnera sine meningum & cerebri læsione.	
& curatio.	ibid.	314	
<i>Contusio</i> capitis puerorum. 312. cranij. 315. eius spe-		<i>Cranij</i> fractura cute integrā manente. 325. an in ea cu-	
cies.	ibid.	tis secunda.	331
<i>Convuls.</i> an aqua frigida perfundendi.	467	<i>Cranij</i> caries. 333. signa diagnostica. prognosticum.	
<i>Convulsio</i> & distentio non differunt.	461	curatio.	ibid.
<i>Convulsio</i> & motus convulsiui differunt.	ibid.	<i>Cranio</i> denudato quæ medicamenta imponenda. 314.	
<i>Convulsiui</i> motus in epilepsiā quis author.	494	pinguia non imponenda.	322
<i>Convalescentes</i> vt regendi. ad plenam satietatem edere		<i>Cranium</i> in fracturis quomodo radendum. 322. quo-	
non debent.	70	modo aperiendum. 323. quo in loco aperiendum.	
<i>Convulsio</i> scorbutica.	1002	ibid. quando aperiendum. ibid. fissum an statim &	
<i>Cor</i> an in peste per consensum saltem pariat. 133. ca-		semper radendum.	330
loris febrilis fons.	5	<i>Crapula</i> & ebrietas maximæ ingenij & memoriæ pestes.	
<i>Cordis</i> leporini in quartana vsus.	116	368	
<i>Cordis</i> palpitatio in scorbuto.	1003	<i>Cremoris</i> ex auena vsus in febribus.	50
<i>Cor</i> refrigerantia medicamenta. 763. interna. ibid. ex-		<i>Croci</i> ♂ in dysenteria vsus.	930
terna.	ibid.	<i>Crocus</i> metallorum.	1056
<i>Cordis</i> intemperies calida. ibid. eius causæ. ibid. signa.		<i>Cruditas</i> quid. 40. est duplex. in febribus est velut quæ-	
prognostica & curatio. ibid. diætā.	770	dam humorum ebullitio.	44
<i>Cordis</i> intemperies frigida. 763. eius causæ. signa. cu-		<i>Crudi</i> humores tantum in venis consistunt.	40
ratio.	ibid.	<i>Cruditatis</i> nidorose & acidæ remedia.	280
<i>Cordis</i> intemperies humida. 765. eius causæ. signa. &		<i>Crystallini</i> humoris vitia. 534. 572. eius effluxus. 572.	
curatio.	ibid.	situs mutatus. 573. soluta continuitas.	ibid.
<i>Cordis</i> intemperies sicca. eius causæ. signa. & curatio.		<i>Crystallinus</i> humor an tenuior fieri possit. ibid. an	
ibid.		maior vel minor.	ibid.
<i>Cordis</i> motus an pendeat à facultate animali.	773	<i>Crystalli</i> vsus.	68
<i>Cordis</i> palpitatio. 766. eius definitio. 767. causæ. ibid.		<i>Cucurbitula</i> in affectibus capitis cui loco applicandæ.	
differentiæ. signa. 768. prognostica. indicationes. ibid.		286. in apoplexia quibus partibus applicandæ. 505.	
diætā.	770	earum cum scarificatione vsus in convulsione. 466. in	
<i>Cordis</i> palpitationis à flatu & vapore curatio.	769	apoplexia.	505
<i>Cordis</i> palpitationis ab humore curatio.	ibid.	<i>Cur</i> pueri magis calculo vesicæ. adulti verò calculo re-	
<i>Cordis</i> palpitationis ab humoribus aliunde transmissis		num sint obnoxij.	1083
curatio.	770		
<i>Cordis</i> palpitatio à vermibus. ibid. à spirituum defectu.			
ibid. calor nimio febrili.	ibid.		
<i>Cordis</i> substantiæ morbi.	765		
<i>Cordis</i> Tabes. 766. situs mutatus. ibid. vulnera. ibid.			
apostemata & vlcera.	ibid.		
<i>Cordis</i> ventriculi sinistri defectus.	765		
<i>Cor</i> hirsutum.	ibid.		
<i>Cor</i> molestantes causæ.	667		
<i>Cor</i> calefacientia medicamenta. 763. interna. simplicia			
composita. ibid. & seqq. externa simplicia. 764. com-			
posita.	ibid.		
<i>Coriandrum</i> an ad supprimendos vapores è ventriculo			
adscendentes vsurpandum.	283		
<i>Corneæ</i> tunicæ vitia. 534. cancer. 558. causæ. signa dia-			
gnostica. ibid. prognosticum. curatio.	ibid.		
<i>Corneæ</i> colores vitiosi. leucoma seu albugo. causæ. 554.			
differentiæ. signa diagnostica. prognostica. ibid. indi-			
cationes. curatio. 555. topica.	ibid.		
<i>Corneæ</i> & annatæ pustulæ. ibid. causæ. 556. signa dia-			
gnostica. prognostica. indicationes. ibid. curatio. to-			
pica. ibid. diætā.	ibid.		
<i>Corneæ</i> pustula ab vne procidentia quomodo discern-			
natur.	556		
<i>Corneæ</i> & annatæ vlcera. 557. causæ. differentiæ. ibid.			
signa diagnostica. prognostica. indicationes ibid. cu-			
ratio. ibid. diætā. 558. sub corneâ pus. 561. causæ. signa			
diagnostica. curatio.	ibid.		
<i>Corneæ</i> crassities. 554. causæ. signa diagnostica. pro-			
gnostica. curatio.	ibid.		
<i>Corneæ</i> vsus.	ibid.		
<i>Cornu</i> cetui vltum an nullarum virium.	189		
<i>Cornua</i> in dorso.	732		
<i>Cortic.</i> sambuci & fraxini vsus in peste.	174		
<i>Coryza</i> quid.	516		



# & Verborum.

*stica.* 635. indicationes & curatio. *ibid.* *diæta.* 636  
*Dentium* dolorem à proprietate *sistentia.* 637  
*Dentium* elongatio. 632  
*Dentium* fistulæ. 631  
*Dentium* imminutio. 632  
*Dentium* mobilitas & vacillatio, eius causa interna, externa, violentia, & curatio. *ibid.*  
*Dentium* numerus auctus. 634  
*Dentium* situs vitiat. *ibid.*  
*Dentium* fordes ac tophi. 635  
*Dentium* stridor, eius causa, prognostica, curatio. 639.  
 & seq.  
*Dentium* structura fucata. *ibid.*  
*Dentium* stupor, eius causa, curatio. 639  
*Dentium* vsus. 630  
*Dentium* ultra 63. annum ætatis renatorum historia. *ibid.*  
*Depressio* cranij sine fractura. 310. causæ, signa, curatio. *ibid.* cum fractura. 316  
*Derivantia* materiam è capite. 279  
*Dens* an sine causis secundis pestem inducat. 139  
*Diabolus* melancholiæ se admiscens quibus cognoscendus. 393  
*Diabutyrum* Bened. Victor. Faurentini. 743  
*Diabetes.* 1094. causa. 1096. signa, prognostica, curatio. 1095. urinæ admirandum pondus à quodam Diabete laborante excretum. *ibid.*  
*Diacydonium* purgans in mania. 411  
*Diæta* quid, eius in febribus necessitas. 49  
*Diaphores.* in febrib. malign. 187  
*Diaphragmatis* vulnera an sint sanabilia. 703  
*Diaphragmatis* inflammatio, eius signa, prognostica, & curatio. 702  
*Diaphragmatis* tumores frigidi, signa, prognostica & curatio. *ibid.* *diæta.* 703  
*Diaphragmatis* vulnerati in studioso Liuono VVittebergæ historia. 703  
*Diaprun.* lenit. commodiss. in acutis febribus. 67  
*Diarrhœa,* causæ, signa, prognostica, indicationes. 894. curatio. 895  
*Diarrhœa* à toto cum febre prognostica, curatio. 896  
*Diarrhœa* à toto sine febre. 897. signa, prognostica, indicationes, curatio. 898  
*Diarrhœa* ab humore seroso quomodo producat. *ibid.*  
*Diarrhœa* à ventriculo, signa, prognostica, curatio. 899  
*Diarrhœa* à vermibus. *ibid.*  
*Diarrhœa* ab hepate & bilioso humore, signa, prognosticum, indicationes, curatio. 900  
*Diarrhœa* à liene & humore melancholico, signa, prognostica, curatio, *diæta.* 901  
*Diarrhœa* ab utero. *ibid.*  
*Diarrhœa* à cerebro. *ibid.*  
*Diarrhœa* infantum, quibus dentes erumpunt. 902  
*Diarrhœa* ab hypercatharsi & veneno sumpto. *ibid.*  
*Διάσενος ἢ καρδιακός.* 845  
*Diastord.* Fracastor. vires & vsus. 174  
*Diatrion* pipereon an conueniat in eruditatē. 15  
*Differentia* inter famem & cardialgiam. 847  
*Differentia* inter dolorem lienis & renis sinistri. 959  
*Differentia* doloris ventris scorbutici à colico. 999  
*Difficilis* respiratio & pectoris Angustia in scorbuto. 997  
*Diuretica* in dysenteria quæ exhibenda. 913  
*Diuretica* in hydropse pectoris vtilia sunt. 727  
*Diuretica* an in melancholia hypochondriaca conueniant. 408  
*Dolor,* eius subiectum. 527. quomodo sit deprauata actio. *ibid.* causa proxima. 528. causæ mediata. *ibid.* differentia. *ibid.* signa diagnostica. 529. indicationes & curatio. *ibid.* per anodyna, narcotica.

*ibid.* Num omnis intemperies dolorem inducat. 528.  
 qui dolores periculosiores. 531  
*Dolor* oculorum. 560. cum mitigantia. 561  
*Dolor* infantium dentientium. 638  
*Dolores* varij in scorbuto. 999  
*Dolor* ventris scorbuticus quomodo generetur. *ibid.* curatio. 1021  
*Dolores* hepatis, curatio, *diæta.* 1074  
*Dolor* Nephriticus. 1001. & 1096. causæ, signa, prognosticum, curatio. 1097  
*Dracunculi,* eorum causa, signa, curatio. 731  
*Dulcia* ad vermes generandos an faciant. 859  
*Dulcia* faciliè in bilem mutantur. 287. lien non faciliè conueniunt. 402  
*Duramater* quandoque aperienda. 323. quo loco, quo tempore aperienda. *ibid.* in eius corruptione quæ vsurpanda. 326. eius contusio. 327. vulnera. *ibid.* huic denudatæ an siccantia, an verò humectantia medicamenta imponenda. 330  
*Dysenteria* nomen. 859. definitio. 902. subiectum seu pars affecta, causa proxima. 903. Modus generationis. 903. causæ antecedentes & remotæ. *ibid.* vt vuarum esus, potus musti, cibi prauis & insoliti, pharmacæ venenata, Aqua per canales plumbeos fluens, acetum in vase plumbeo asseruat. *ibid.* Hydragryum, ær. 905. astorum influxus. *ibid.* Occultæ qualitates, chymicorum causæ, contagium. 906  
*Dysenteria* gradus & differentia. *ibid.* signa. *ibid.* prognostica. 907. indicationes, curatio. 910  
*Dysenteria* vt simulari possit. 908  
*Dysenteria* à medicamento purgante & veneno curatio. 912. *diæta.* 923  
*Dysuria,* vide *urina ardor.*

## E

**E** *Brietas.* 376. præseruatio ab eâ. *ibid.* eius curatio. *ibid.*  
*Ebrii* & furiosi cur res geminatē videant. 584  
*Ectasis* quid. 475  
*Εκλυσις* differt à *λεποθυρία* & *λεποφονία.* 772  
*Εκρῶσις.* 538  
*Electuaria* ad confortationem neruorum post morbos diuturnos. 442  
*Electuaria* cephalica calida. 268. Langij. *ibid.* humectantia. 272  
*Electuaria* cerebrum roborantia in apoplexia pituitosa. 509  
*Electuar.* antiphalangium contra morsum tarantulæ. 423  
*Elect.* de chalybe D. Kolreuteri. 404  
*Electuarium* epilepticum Cratonis. 484. Montagnanæ. *ibid.* Nicolai Florentin. *ibid.*  
*Electuarium* Humaim. 575  
*Elect.* Mesue ad spiritus multiplicandos, & confortandos. 304  
*Electuar.* opiatum Plateri. 246  
*Electuarium* Bertrucij confortans cor in omni causa. 765  
*Elixir* pestilentielle Crolli. 169  
*Ελμινθες* quid. 856  
*Embrochæ* in intemperie cerebri humida. 271  
*Εμπεροδότης.* 461  
*Emplastrum* de pelle Atictina Arnoldi de villa noua. 865  
*Emplastri* ex telis araneæ vires in tertianâ. 106  
*Emplastr.* de fuligine ad carbuncul. 177  
*Emplastræ* & cerota cephalica cal. 270  
*Emplastrum* in lethargo & caro à somno excitans. 294  
*Emplastrum* è gummi hederæ. 316  
*Emplastrum* Helidæi, quod mirum in modum humiditatem in contusionibus discutit. 312  
 Emplastrum

# Index Rerum,

- Emplastrum cephalicum.* 324. de Betonica. *ibid.* Guilhi. Fabric. *ibid.* Francisc. Arcei. *ibid.* Iſſs cephalicum. 331. in vigiliis nimis ad ſomnum inducendum. 344. præſeruans ab apoplexiâ. 509
- Empyema.* 723. eius cauſa, differentiæ, ſigna. *ibid.* prognosticum, curatio. *ibid.* diætâ. 724
- Emulſiones cephalicæ humectantes.* 272
- Encanthis & carnis lachrymalis incrementum.* 571. *Encanthis* quid. ſigna, prognostica, curatio. *ibid.*
- Epar* in tertianâ intermittente quomodo curandum. 105. per topica. *ibid.*
- Epatis intemperies, cauſæ, ſigna, prognostica, indicationes, remedia.* 1026
- Epatis intemperies calida, cauſæ ſigna, prognosticum, indicationes & curatio. ibid.* diætâ. 1027
- Epatis inflammatio, cauſæ, ſigna. ibid.* prognostica. 1035. indicationes, curatio. 1036. diætâ. 1038
- Epatis ſcirrhus, cauſæ, ſigna, prognostica. ibid.* diætâ. 1039
- Epatis tumor ſimplex, ſeu*  $\delta\lambda\kappa\theta\epsilon\varsigma$  *ἀνευκρίπτu.* *ibid.*
- Epatis vulnera, 1040. ſigna, prognostica, curatio. 1041. diætâ.* 1042
- Epatis vlcera, cauſæ, ſigna. ibid.* prognostica, curatio. 1043
- Epatis ſphacelus.* 1044
- Epatis intemperies frigida, cauſæ, ſigna, 1027. prognosticum, indicationes, curatio, diætâ.* 1028
- Epatis intemperies humida, cauſæ, ſigna, prognosticum, curatio.* *ibid.*
- Epatis intemperies ſicca, cauſæ, ſigna. ibid.* prognosticum, curatio. 1029
- Epatis intemperies compoſita, cauſæ, ſigna, curatio. ibid.*
- Epatis intemperies cum materia, cauſæ, ſigna, prognosticum, indicationes & curatio.* *ibid.*
- Epatis obſtructio, cauſæ, differentiæ, ſigna. 1030. prognostica, indicationes, curatio. 1031. diætâ.* 1033
- Epatis vaſorum apertio.* *ibid.*
- Epatis inflatio. ibid.* cauſæ, ſigna, prognosticum, curatio, diætâ. 1034
- Epatis in catarrho vt habenda ratio.* 524
- Epatis ranarum præparatio.* 481
- Ephemer. febris natura, 11. definitio. ibid.* cauſa continens. *ibid.* cauſæ euidentēs. *ibid.* à putridâ & heſtica differ. *ibid.* ſigna communia. 12. ſigna cauſarum. 13. ſigna in aliam febrem degenerantis. *ibid.* prognostica. *ibid.* indicationes. *ibid.* curatio. *ibid.* & ſeqq.
- Ephemera an à ſero ſanguinis, an à ſpirituum incenſione.* 55
- Ephemera ex putredine ſpirituum an detur. 11. an omnis à cauſa euidente incipiat. 181. Peſtilens an detur. 182. peſtilentis ſigna.* 183
- Ephemera plurium dierum.* 15
- Epiala febris. 74. à Galeno inter continuas reſertur. ibid.* à Platero ad intermittentes ref. 75. rara eſt, & vix talis ad finem perdurat. *ibid.*
- Epialæ cauſæ. 74. Cur calor & frigus ſimul percipiuntur. ibid.* curatio. 75
- Epidemium eſſe an ad peſtis eſſentiam pertineat. 132. an epidemium & contagioſum differant. ibid.* an morbus actu vel potentiâ dicatur epidemicus. 132
- Epilepſia interdum per conſenſum oritur.* 133
- Epilepſia vnde dicta, & quæ habeat ſynonyma. 475. definitio. ibid.* ſubiectum. 492. cauſa proxima. *ibid.* quænam huius cauſæ ſpecifica proprietates. 493. cauſæ. 475. differentiæ. 476. ſigna diagnostica, epilepſiæ imminentis, & præſentis. 476. prognostica. *ibid.* indicationes. 477. cura in paroxyſmo. *ibid.* medicamenta externa. *ibid.* interna. 478. cura poſt paroxyſmum. 479. venæſectio quando adhibenda, quando omittenda. *ibid.* diætâ. 486
- in *Epilepſia præparantia humorem pituitoſum. 479. melancholicum. ibid.* bilioſum. *ibid.* purgantia humo-
- rem pituitoſum. *ibid.* mixtos. 480
- in *Epilepſia præparantia, alterantia, itémque purgantia ſæpius repetenda.* 481
- in *Epilepſia ſudorifera. ibid.* capitis particulares euacuationes per errhina, apophlegmatismoſ. 485. gargarismoſ, cauteria. *ibid.*
- in *Epilepſia cerebrum roborantia.* *ibid.*
- Epilepſia per primarium cerebri affectum. 486. huius ſigna diagnostica, prognostica, curatio.* *ibid.*
- Epilepſia per conſenſum ventriculi, huius ſigna diagnostica. 487. curatio.* *ibid.*
- Epilepſia ab vtero, huius ſigna diagnostica. 488. curatio. ibid.* medicamenta ſuaueolentia in hac non exhibenda. *ibid.*
- Epilepſia à vermibus, huius ſigna & curatio.* *ibid.*
- Epilepſia à partibus externis, cauſæ, ſigna diagnostica. 489. curatio in paroxyſmo, extra paroxyſmum. 489*
- Epilepſia per conſenſum vbi de mali fonte non conſtat. 490. huius prognostica, curatio.* *ibid.*
- Epilepticorum infantium curatio in paroxyſmo. ibid.* extra paroxyſmum. *ibid.*
- Epilepticorum lactentium per conſenſum ventriculi curatio.* 491
- Epilepticorum infantium ablactatorum curatio. ibid.* diætâ. 492
- in *Epilepticorum paroxyſmo quid agendum. 477. an ſanguis in eo mittendus. 495. num extra eum. ibid.* quæ vena aperienda. *ibid.* num vomitus conueniat. *ibid.*
- Epiphora quid 587. differentiæ, cauſæ. ſigna diagnostica, prognostica. ibid.* indicationes, curatio. *ibid.* *ἐπιρροια* quid. 87
- Epistola Tychonis Brahe ad Rudolph. II. Imp. de Alexandr. pharm.* 173, 174
- Epithemata vti capiti applicanda.* 268
- Epithemâ ex cineribus & aceto Auicenn.* 269
- Errhina ſunt duplicia. 276. quando abſtinendum ab iis. ibid.* quæ in eorum uſu obſeruanda. *ibid.* & ſurpanda tempore matutino, ventriculo ieiuino. 292. eorum materia. *ibid.* fortiora in catarrho vitanda. *ibid.* in apoplexia pituitoſa. 510. in ophthalmia an conueniant. 547
- Erysipelas. 79. cur roſa dicatur. ibid.* prouenit à ſanguinis tenuioris putrefactione & corruptione. *ibid.* quofnam vt plurimum infeſter. 80. quando vel quo ætatis anno. *ibid.* à verâ inflammatione differt. *ibid.* noſtris regionibus valde familiaris. *ibid.*
- Erysipelas præſupponit hepar calidum & nonnihil humidum. ibid.* eius prognostica. *ibid.* curatio. *ibid.* per venæ ſectionem. *ibid.* purgationem. *ibid.* ſudorifera. *ibid.* Topica valde refrigerare non debent. 81. diætâ. 81. præſeruatio. 82
- Erysipelas in ſcorbuto. 1007. curatio.* 1023
- Eucnatio ſanguinis in ſcorbuto per hæmorrhoides & venæ ſectionem.* 1010
- Exanthemata an in omnibus peſte infectis appareant. 154*
- Exanthematum genus duplex.* 190
- Excreta præter naturam è ventriculo.* 850
- Excreſcentia carnoſa in corde reperta.* 766
- Exitus longæ abſtinentiæ triplex.* 817
- Ἐξουαλ quid.* 863
- Expulſio humorum triplex: Critica, Symptomatica, Media.* 200
- Expulſiones Symptomaticæ an omnes vitioſæ. ibid.*
- Extracta contra peſtem vtiliter aceto parantur.* 170
- Extractum ebuli.* 1055
- Extractum ellebori nigri.* 396
- Extracti hellebori nigri uſus in affectione hyponchondriaca.* 978

& Verborum.

## F

<b>F</b> ames epidemiaz.	818
Famem compescencia.	820
Fascias in hernia parandi ratio.	865
Fastidium certorum ciborum.	817. causæ, curatio.
818	
Febris nomen.1. Natura. ibid. Subiectum.3. Caus.5. & seqq. Definitio.1. Different.4. Differentiarum exempla.	8
Febris an sit conuersio naturæ caliditatis in igneam. 2. an sit intemperies calida & sicca. 3. an alia pro morbo, alia pro symptomate habenda.	10
Febris magna & parua.8.mordax & mitis.ibid. E'x luxu.9. ex luxu.ibid.primaria & Symptomatica.	10
Febris maligna cum spasmo. 208.Eius causa.209.Historia & curatio.	211
Febris quid indicet.	110
Febrilis mater different.	55
Febris in peste.	180
Febres scorbutici, causæ.	994
Febres quomodo vigilias inducant. 348. num in paralyti accendere liceat. 458.num pro spasmo curando excitandæ.	469
Febris catarrhalis.	518
Febres scorbuticæ. 1005. curatio.	1023
Februm signa ex hora inuasionis.	107
Febrifuga specifica.	95
Fecum alui reiectio per os, per vmbilicum, per alia loca diuersa.	933
Fel Carpionis in rosâ vsurp.	82
Ficus insigniter ad ambitum corporis pellunt.	216
Ficus quid.	870
Ficum in variolis vsus.	216
Fissura cranij. 314. eius causæ. ibid. differentia. ibid. quomodo exploranda. 317. fissura in qua externa solum lamina, internâ integra manente, quomodo curanda.	324
Fistula lachrymalis. 569. causæ. ibid. 216. ibid.	
Fistulæ ex ægilope curatio.	570
Fistulæ in intestinum rectum penetrantis curatio.	872
Flatus discutientia.	797
Flatus & ructus quomodo generentur in affectione hypochondriaca.	972
Flatuum & vaporum differentia. 281. eorum generatio, causæ, & signa. 282. per quas vias ad caput ascendant, prognosticum, indicationes. ibid. curatio. ibid. quibus medicamentis discutiendi. 283. diætæ.	ibid.
Fluxus alui citrinus pro fistula habitus.	871
Fluxus chylosus quid, signa, prognostica, curatio.	895
Fluxus colliquatiuus, signa, prognostica, curatio, diætæ.	897
Fluxus alui sanguineus, causæ.	930
Fluxus sanguinis à copia eius, signa, prognostica, curatio, diætæ.	932
Fluxus hepaticus ibid. signa, prognostica, curatio, diætæ.	932
Fluxus hepaticus legitimus.	932
Fluxus hepaticus spurius.	ibid.
Fœmina grauida obcæcata.	574
Fœminæ fortiora purgantia non fecunt.	407
Fœtor an in putredine adsit.	27
Fœtores an in peste viles.	174
Fomenta accessionis februm initio imposita.	42
Fonticuli in morbis capitis vbi & quando excitandi.	276
Fractura cranij, earumque differentia. 315. causæ. 317. signa diagnostica. ibid. prognostica, curatio.	321
à Fractura cranij quæ pericula immineant.	322

Dan. Sennerti. Tom. II.

**Fractura crurij cum meningum & cerebri læsione.**

326  
*Freni coarctatus.* 1131  
*Frigus* num saltem densando nervos paralyfin inducat. 1131  
 460  
*Frontis vulnera* an sint luenda. 329  
*Frontis siccitas* in hecticis vnde. 127  
*Fructus* an febricitantibus conueniant. 51  
*Fungi cerebri.* 332. eius subiectum. *ibid.* signa diagnostica, prognostica, indicationes & curatio. 333;  
 334  
*Furor veterinus.* 413. causæ, signa, curatio. *ibid.* diæta. *ibid.*

## G

<b>G</b> <i>Aleata</i> passio & ouum quid Arabibus.	530
<i>Gallatura</i> efficacia in affectibus oculorum.	559
<i>Ganglium</i> quid.	1128
<i>Gangrena</i> scorbutica.	1008
<i>Gargarismi</i> & collutiones oris. 293. catarrhum interci- pientes.	523
<i>Genarum</i> rigiditas in scorbuto.	1002
<i>Genista</i> vires. 102. vsus in quartana.	116
<i>Gentiana</i> radicis vsus in quartana; succus, aqua, extra- ctum eiusdem.	113
<i>Gibbostas</i> , eius species.	728
<i>Ginguiarum</i> , oris & dentium vitia in scorbuto. 997. co- ruradem curatio.	1018
<i>Gingiuæ</i> carne denudatæ.	641
<i>Gingiuæ</i> excrecentes & laxæ.	ibid.
<i>Ginguiarum</i> epulis.	643
<i>Ginguiarum</i> imminutio mobilitatis dentium causa. 633	
<i>Ginguiarum</i> inflammatio, eius signa, prognostica, cura- tio.	642
<i>Glans</i> imperforata.	1129
<i>Glaucoma</i> . 573. causæ, signa diagnostica, prognostica. ibid.	
<i>Gonorrhæa</i> , causæ. 1140. signa, prognostica, indicationes. curatio.	1141
<i>Grana</i> tilli.	1055
<i>Grandines</i> in pulmone geniti, illorum causæ, signa, pro- gnostica, curatio.	642
<i>Grauidarum</i> medicamenta in peste.	169
<i>Grumos</i> sanguinis in pectore resoluentia medicamenta quo tempore sint exhibenda.	687. & seq.
<i>Gummi</i> elemi utilitas.	324
<i>Gurgulionis</i> inflammatio & exulceratio, eius causæ, signa, prognostica, curatio, dicta.	650
<i>Gurgulionis</i> laxatio, eius curatio.	648
<i>Gustus</i> læsio. 617. causæ, signa diagnostica. ibid. pro- gnostica, curatio. 618. læditur seruat motu linguæ. 618	
<i>Gutta</i> serena. 574. causæ, signa diagnostica, prognosti- ca. ibid. curatio.	ibid.
<i>Guttur</i> illapsa vt eximenda.	654

## H

**H**æmorrhagia futuræ signa. 932  
*Hæmorrhoidum* prouocatio in omnibus capitibus morbi utilis. 285. earum fluxus multum ad melancholiam curandam prodest. 401  
*Hæmorrhoides* tutius hirudinibus, quam scalpello aperiuntur. 36. commodè etiam chalybe & aloë. 115  
*Hæmorrhoides* quid. 937. differentiæ. 937. causæ, signa, prognostica. ibid. & seq. indicationes, curatio. 938. diæta. 940  
*Hæmorrhoides* cœcæ & apertæ. 937  
*Hæmorrhoidum* quinque differentiæ secundum Galen. ibid.

# Index Rerum ,

Hæmorrhoides ad quam rerum p.n. classem referendæ.

937

Hæmorrhoidum fluxus quibus regionibus magis sit familiaris. ibid.

Hæmorrhoidum fluxus cui sexui potissimū accidat. ibid.

Hæmorrhoidum sectio & vñtio an tuta sit. 940

Hæmorrhagia narium in scorbuto. 1004

Hæmorrhagica. 625

Hæstica febris vnde dicta. 123

Hæstic. causæ. 124. generationis modus duplex. ibid. differentia. 125. gradus seu tempora. ibid. signa generalia. 126. signa incipientis, quæ cognitu difficilis, curatu facilis. 127. signa secundi gradus. ibid. tertij gradus. ibid. prognostica. 128. indicationes. ibid.

Hæsticæ curatio per assumenda. ibid. externa 129. Baln. aqua dulcis secundum Galenum. ibid. secundum Arab. quorum modus commodior. ibid. indicationes post balneum spin. dorsi, Topice Card. hepatis. 130. ibid. & seqq.

Hæsticæ cum putrida intermittente signa. 128. cum continua signa. ibid. curatio. 131

Hæstica cum tabe, sine tabe. ibid.

Hæsticæ pestilentes an dentur. 181. earum signa. 184

Hæstica facilius inuadit calidiores & sicciores. 124

Hæstica an habeat species. 125. an à causa euidenti, siue ephemera induci possit. 124. an à putrida, hac simul permanente, prouenire possit. 128

Helleborismus Marthiloli. 395

Helleborus niger qui in nostris regionibus crescit, non tam vehemens, vt qui in calidis regionibus. ibid. quomodo præparandus. ibid. rite præparatus tunc in melancholiâ adhibetur. ibid. & intus & extra vtiliter vsurpatur. 413

Hernia quid, diuisio, causæ. 863. signa, prognostica, indicationes & curatio. 864

Herniaria aliàs holleriana dicta. 866

Hernia ventosa seu πνευματοκήλη. 1125. causæ, signa, prognostica, indicationes & curatio. ibid.

Hernia aquosa seu hydrocele. ibid. causæ, signa, prognostica, indicationes & curatio. 1124

Hernia humoralis. 1125

Hernia carnosa seu sarcocoele, causæ, ibid. signa, prognosticum, indicationes & curatio. 1126

Hernia carnosa cur plerumque in dextro testiculo fiat & aquosa in sinistro. ibid.

Hernia varicosa seu circoscele, causæ, signa, prognosticum, curatio. ibid.

Hernia umbilicalis, causæ, signa, prognostica, indicationes, curatio. 1027. diætâ, chirurgia. 1028

Hernia umbilicalis aquosa, causæ, signa, prognostica, indicationes & curatio. ibid.

Hernia umbilici flatulenta. ibid. causæ, signa, prognosticum, indicationes & curatio. 1149

Hernia umbilici carnosa. ibid.

Hermaphrodita, differentia, causæ. 1132

Hiera in doloribus ventriculi vsus. 848

Hippocratis in colica remedium per intestinorum inflationem. 876

Hippocratis τὸ θεῖον in morbis explicatur. 141

Hirudines in hæmorrhoidibus applicandi locus. 938. ibid. modus. 939

Hirundinum pulvis contra anginam. 666

Horroris causa. 92

Horrid. febres. 119

Horror & rigor vehementiâ saltem & magnitudine differunt. 436. quomodo ad facultatis animalis & motus deprauati symptomata referantur. ibid. causa proxima. ibid. subiectum. ibid.

Humoris aquei vitia. 535. 572. eius crassities quid, causæ, signa diagnostica, curatio, quantitas aucta, immutata. ibid. effusio. ibid. signa diagnostica, prognostica, curatio. ibid. obscuratio. ibid. causæ, signa, curatio. ibid.

Humor aqueus an tenuis fieri possit. 570. an nimis augeri

possit.

ibid.

Humorem melancholicum præparantia. 298. euacuantiâ. ibid. ad eius generationem quæ faciant. ibid.

Humores in capite quomodo euacuandi. 276. quomodo dis cerebrum afficiant. 274

Humores num in nervos sese insinuate possint. 352

Humorum differentia, vnde petendæ, natural. præternat. 26

Humorum ad putredinem dispositio. 23

Humorum præparatio. 45

Humores certis periodis mouentur. 90

Humores febrem generantes. 25. an putrescant. 19. an diuersi ad diuersas febres requirantur. 25

Humores copiosi an in principio purgandi. 42. in partem principem irruentes. 41. an tenues. 43

Humorum pleuritidem patientium signa. 706

Humorales febres an omnes ex putredine oriantur. 21

Humoralis pestilentis signa. 153

Humoris in animalibus dispositio, vt igne non absumatur. 816

Humorum dysenteriam excitantium natura. 903

Humores arte expurgati per venas mesentericas ad intestina conflunt. 244

Humoris melancholici natura. 953

Humor scorbuticus peculiari modo est corruptus. 987

Humor scorbuticus nervoso generi infestus. 997

Hyaides epatis. 1040

Hydrocephalon. 338. causæ. ibid. frequentius infantibus, quam adultis obtingit. 339. signa diagnostica. ibid. prognostica, indicationes, curatio. ibid.

Hydrophobia. 415. causæ. 416. signa diagnostica. ibid. prognostica, indicationes. 417. curatio. 418. antidota interna. 419. balneum an conueniat. 420. venæsectio an conueniat. ibid. purgantia medicamenta an conueniant. 422

Hydrargyrum quomodo tremoris causa. 444

Hydrophobia quid. 824. causa. 825

Hydrophobia & rabies canina differunt. ibid.

Hydrops scorbuticus. 1007. curatio. 1023

Hydrops. 1048. differentia. ibid. causæ. ibid. signa. 1052. prognostica. 1053

Hydrops dupliciter consideratur. 1048

Hydropis species præcipua ascites. ibid.

Hydropicum cadauer vesicis intus oppletum. ibid.

Hydrops pectoris. 726. eius causæ. 717. differentia, signa prognostica, curatio. ibid. diætâ. 728

Hydrops pulmonis. 691

Hydropis generatio secundum Paracellsum. 1051

Hydropicorum pauci cur sanentur. 1054

Hypochondriaca affectionis natura. 966. vnde dicta, definitio, locus affectus. 967. differentia, causæ. 968. signa. 972. prognost. indicationes & curatio. 975. diætâ. 980

Hydrops gutturis. 672

Hydrops per pudenda euacuatus. 1060

Hydrops ex intestinis ortus, ex renibus, ex vesica, ex vtero, hepate saluo. 1063

Hydrops à colliquatione. ibid.

Hydrops sæpe hepate saluo generatur. 1065

Hydrops an sit à sale resolutio. 1066

Hydropicorum aqua num in hepate generetur. 1049

Hydrops à largiore haustu aquæ & cereuisiæ. ibid.

Hydropicis serum non omne ad epar & venas emulgentes defert. 1050

Hydroticum aduersus epilepsiam Quercerani. 481

Hypochondriaca affectio latius patet quàm melancholia hypochondriaca. 1397

Hypochondriacæ affectionis signa ex Galeno. 399

Hypopium. 561. causæ, signa, curatio. 561

Hyssopi facultas. 560

I

Ichor quid, duplex. 953

Icterus vnde dictus. 1074

Icterus



# & Verborum.

<i>Icterus</i> quid, subiectum, causæ, signa, differentia. <i>ibid.</i>	signa diagnostica, prognostica, indicatio, curatio. <i>ibid.</i>
<i>Icterus</i> flauus ab obstructione vesiculæ fellis, signa, prognostica, indicationes & curatio. 1075. diætâ. 1076	<i>ibid.</i>
<i>Icterus</i> ab epatis caliditate sine febris, signa, prognosticum, indicationes & curatio. <i>ibid.</i>	<i>Intemperies cerebri</i> sicca. 273. signa diagnostica, prognosticum, indicatio. <i>ibid.</i> curatio. <i>ibid.</i> diætâ. <i>ibid.</i>
<i>Icterus</i> in febribus acutis criticus, signa, prognosticum, indicationes. <i>ibid.</i>	<i>Intemperies cerebri</i> compositæ sine materia, signa, curatio. <i>ibid.</i>
<i>Icterus</i> in febribus symptomaticus, signa, prognostica. <i>ibid.</i> indicationes & curatio. 1077	<i>Intemperies cerebri</i> cum materia. 274. causæ, signa diagnostica. <i>ibid.</i> curatio. 275
<i>Icterus</i> in febribus acutis ante 7. diem an sit malus. 1076	<i>Intemperies cerebri</i> cum materia per consensum. 274. signa diagnostica, prognosticum, indicationes & curatio. 278
<i>Icterus</i> ab inflammatione epatis. 1077	<i>Intemperies capitis</i> cum vapore & flatu. 281. causæ, signa diagnostica. <i>ibid.</i> prognosticum, indicationes. 282. curatio. <i>ibid.</i> diætâ. 283
<i>Icterus</i> à morfu venenato & venenis, signa, prognosticum, indicationes & curatio. <i>ibid.</i>	<i>Intemperies capitis</i> à vento quibus curetur. 282
<i>Icterus</i> quomodo venena inducant. <i>ibid.</i>	<i>Intemperies cerebri</i> cum sanguine. 283. causæ. <i>ibid.</i> signa diagnostica. <i>ibid.</i> prognosticum, indicationes. 284. curatio. <i>ibid.</i> diætâ. 285
<i>Icterus</i> niger quid, causæ, signa. 965. prognosticum, indicationes & curatio. 966	<i>Intemperies cerebri</i> cum bile. 287. causæ, signa. <i>ibid.</i> indicationes, curatio. <i>ibid.</i> diætâ, an in hac discutientia & resoluentia locum habeant. 289
<i>Icterus</i> in scorburicis. 1005	<i>Intemperies cerebri</i> cum pituitâ, causæ, signa diagnostica. <i>ibid.</i> prognostica, indicationes, auxilia & curatio. <i>ibid.</i> diætâ. <i>ibid.</i>
<i>Ictericus</i> an visus deprauetur. 555	<i>Intemperies cerebri</i> cum humore seroso. 295. causæ, 296. signa diagnostica, indicationes, curatio. <i>ibid.</i> diætâ. 297
<i>Ictigatio</i> quid. 435	<i>Intemperies cerebri</i> cum humore melancholico. <i>ibid.</i> causæ, signa diagnostica. <i>ibid.</i> prognostica, indicationes, curatio. <i>ibid.</i> diætâ. 298. 299
<i>Ileus</i> quid, causæ. 873. signa, prognostica. 874. indicationes, curatio. 875	<i>Intemperies cerebri</i> cum bile atra. 300. causæ. <i>ibid.</i> signa diagnostica, prognostica, indicationes. <i>ibid.</i> curatio. 301. diætâ. 302
<i>Ilei</i> & colicæ differentia. 874	<i>Instrumentum</i> quo antiqui infantibus medicamenta infundebant. 862
<i>Ileus</i> ab inflammatione, signa, prognostica, indicationes & curatio. <i>ibid.</i>	<i>Intermittentes</i> febres, quas antiqui, quas recentiores dixerint. 82
<i>Ileus</i> ab aliis tumoribus, & ab exulceratione, signa, prognostica, curatio. 876	<i>Intermittentes</i> duplices, ac triplices. <i>ibid.</i> & seqq.
<i>Ileus</i> à fecibus induratis, signa, prognostica, curatio. <i>ibid.</i>	<i>Intermittentium</i> & continuarum discrimen. 84
<i>Ilei</i> nouum genus. <i>ibid.</i>	<i>Intermittentium</i> focus, vbi sit secundum Galen. Trallian. Auic. 82. & seq. Fernel. 83. Altimar. <i>ibid.</i> Simon. <i>ibid.</i> Plater. <i>ibid.</i> Auger. <i>ibid.</i> Herc. Saxon. <i>ibid.</i> Iul. Cæsar. Claudin. 84. Authore. <i>ibid.</i>
<i>Iliacus</i> dolor. <i>ibid.</i>	in <i>Intermittentibus</i> triplex materię febrilis locus considerandus. <i>ibid.</i>
<i>Imaginatio</i> quomodo pestem inducat. 145	<i>Intermittentium</i> generatio. <i>ibid.</i> illarum causa non tantum in primis viis hæret. 86
<i>Implicite</i> febres. 118	<i>Intermittentium</i> causæ remotiores. 85
In colica à fecibus induratis per superiora non exhibenda purgantia. 882	<i>Intermissionis</i> causa. 82
<i>Incubi</i> variae appellationes. 469. definitio. <i>ibid.</i> causa. 470. differentia, signa diagnostica, prognostica. 471. indicationes, curatio. 472. diætâ. <i>ibid.</i>	<i>Intermittentium</i> differentia. 93. ad 96. è Chymicorum principiis vt eruenda. 93. signa. 97. an semper cum rigore & horrore inuadant. 98. curatio generalis. 99
<i>Incubi</i> ab epilepsia differentia. 471	<i>Intermittens</i> pituitosa an detur. 93
in <i>Incubo</i> cerebrum afficitur. <i>ibid.</i>	<i>Intestinorum</i> intemperies frigida, causæ, signa, prognosticum, curatio, diætâ. 85. 1
<i>Indi</i> nicotiana famem, sitimque solantur. 817	<i>Intestinorum</i> intemperies calida, causæ, signa, curatio. <i>ib.</i>
<i>Infantibus</i> qualia medicamenta contra pestem conueniant. 169	<i>Intestinorum</i> intemperies humida, causæ, signa, curatio, diætâ. <i>ibid.</i>
<i>Inflamabilem</i> differentia. 816	<i>Intestinorum</i> intemperies sicca, causæ, signa, curatio. <i>ib.</i>
<i>Inflammati</i> quomodo colicam excitet. 885	<i>Intestinorum</i> intemperies cum materia. 852. signa, prognostica, curatio. <i>ibid.</i>
<i>Inflammati</i> cerebri & meningum. 333. causæ. <i>ibid.</i> differentia. <i>ibid.</i> signa inflammationis membranarum. <i>ibid.</i> cerebri. 334. prognostica. 335. indicationes, curatio. 336. diætâ. 338	<i>Intestinorum</i> inflammatio, causæ, signa, prognostica, indicationes, curatio. 853. diætâ. 854
In inflammatione cerebri quæ vena & quando aperienda. 336. quantum sanguinis euacuandum. <i>ibid.</i> an electiue purgantia conueniant. <i>ibid.</i> repellentia qualia conueniant, & an tepida vel frigida sint adhibenda. 337. somnum conciliantia. <i>ibid.</i> discutientia. <i>ibid.</i>	<i>Intestinorum</i> angustia, causæ. <i>ibid.</i> signa, prognostica, indicationes, curatio. 855
<i>Ingenia</i> secundum regiones & temperamentorum varietates variant. 366	<i>Intestinorum</i> coactio. 854
In lumbricis teretibus clysteres non conueniunt. 862	<i>Intestinorum</i> læuitas. 856
<i>Inquietudo</i> . 435. causæ, signa diagnostica, prognostica. <i>ibid.</i> curatio. 436	<i>Intestinorum</i> magnitudo aucta. <i>ibid.</i>
In sanis nil præter sanguinem in venis continetur, in ægrotis contra. 88	<i>Intestinorum</i> situs mutatus. 863
<i>Insomnia</i> immoderata. 354. causæ. 355. signa diagnostica, prognostica, indicationes, curatio. <i>ibid.</i>	<i>Intestinorum</i> conuolutio. <i>ibid.</i>
<i>Intemperies</i> capitis sine materia. 262. causæ, signa, curatio. <i>ibid.</i> an & quare in eâ purgandum. <i>ibid.</i>	<i>Intestinorum</i> vulnera, causæ, signa, prognostica, indicationes & curatio. 868
<i>Intemperies</i> cerebri calida sine materia, causæ, signa diagnostica. <i>ibid.</i> prognostica, indicationes. <i>ibid.</i> curatio. <i>ibid.</i> diætâ. 263	<i>Intestina</i> vulnerata consuendi modus. <i>ibid.</i>
<i>Intemperies</i> cerebri frigida sine materia, causæ. 266. signa diagnostica, prognostica, indicationes. <i>ibid.</i> curatio. <i>ibid.</i> diætâ. 270	
<i>Intemperies</i> cerebri humida sine materia. 271. causæ,	

# Index Rerum,

Intestinorum vlcera.	869	Lapis Bezoar an in peste utilis. 172. cur non semper	
Intestinorum sphacelus.	ibid.	opratum effectum præster.	ibid.
Intestinorum cancer.	ibid.	Lapides in ventriculo geniti.	803
Intestini recti morbi.	ibid.	Lapides in intestinis reperti.	856
Intestinorum tenuium affectorum signa.	908	Lapides in scroto.	1127
Intestini ieiuni affecti signa.	ibid.	Lapides in ymbilico.	1060
Intestinorum crassorum affectorum signa.	ibid.	Lapis nephriticus.	1087
Intestinorum & omenti in vmbilicum procidentia.	1057	Lapis Lazuli habet vim purgandi & segregandi à san-	
Interrigo quid, curatio.	872	guine vapores melancholicos.	395
Inunctiones ad somnum conciliandum. 293. palati, pe-		Λαγυρ. soliquia.	665. 668
dum & manuum ad calefaciendum caput.	270	Lassitudo spontanea & gravitas corporis in scorbuticis.	997
Ira causæ.	954	Lassitudo quid. 433. eius differentia. ibid. lassitudo	
Isis, splendores circa oculum. 583. causæ.	584	spontanea, exsiccatiua quid. ibid. vlcerosa. ibid. caus-	
Ischuria, vide urina suppressio.		sa. ibid. Tensiva quid, eius causæ. ibid. Phlegmono-	
Iulebus in febribus.	54	des, eiusque causæ. ibid. exsiccatiuæ causæ. ibid. gra-	
Iuglandis radic. vsus in quartana.	114	cilitatis. ibid. signa diagnostica, prognostica. ibid.	
Iura instaurantia heceticis vtilia.	130	indicationes, curatio lassitudinis spontaneæ. 434. in	
Inscula febricitantibus conuenientia.	52	vlcerosa purgatione; in tensiva sanguinis missione,	
Ius galli decrepiti purgans.	745	in phlegmonodi utroque auxilio opus.	ibid.
Iuuenibus cur phthisis familiaris.	695	Lassitudinis ex labore curatio.	ibid.
		Laudanum opiatum descript. nost. 345. D. Andr. Doreri.	
		ibid.	
		Lema seu fordes oculorum. 586. causæ, curatio.	ibid.
		Lenientia quando exhibenda.	852
		Lenientia medicamenta in putridarum initiis necessa-	
		ria. 36. Illorum vsus conualescentibus non sit ni-	
		mium frequens.	70
		Lenta febris. 77. à materia intra vasa putrescente. ibid.	
		visceris alicuius putredine. 78. rerum toto genere	
		p.n. in corpore putredine. ibid. eius signa. 78. difficul-	
		ter cognoscitur. ibid. curatio.	79
		Lentium vires in variolis.	197
		Lethargus quid. 427. est affectus inter coma vigil &	
		carum mediæ naturæ. ibid. non est primarius cerebri	
		affectus, fit à vapore narcotico, est symptoma febris	
		continua lentæ. 428. est duplex. ibid. eius causæ	
		& locus affectus. 429. signa diagnostica. ibid. à co-	
		gnatis affectibus distinguenda. ibid. prognostica.	
		ibid. indicationes, curatio. 430. an vena, & quæ se-	
		canda. ibid. purgatio qualis instituenda. ibid. pur-	
		gantia qualia esse debeant. ibid. repellentia quomo-	
		do adhibenda. ibid. quibus è somno excitandus	
		æger. ibid. suffitus an conueniat. 431. materiæ mor-	
		bificæ præparatio qualis esse debeat. ibid. euacuatio	
		per vrinam quando conueniat. ibid. sudoris prouo-	
		catio aliquando utilis. ibid. ad caput particulariter	
		purgandum qualia conueniant. ibid. in vesicatorium	
		applicatione quæ obseruanda. 432. capitis roboratio	
		quibus perficienda. ibid. diæta.	ibid.
		Lien humoris melancholici sedes.	398
		Lienis cura in tertiana.	106
		Lienis vsus secundum Carol. Pison. Casp. Asell.	952
		Lien aquosa attrahit etiam crassa.	ibid.
		Lien est mixtum quiddam ex quatuor diuersis substan-	
		tiis.	ibid.
		Lien non est officina sanguinis arteriosi.	ibid.
		Lien non solum venosum, sed & arteriosum attrahit.	
		953	
		Lien quos morbos patitur, quæ symptomata.	ibid.
		Lienis intemperies. ibid. causæ, signa. 954. prognostica,	
		indicationes, curatio. 955. diæta.	956
		Lienis obstructions, causæ, signa. ibid. prognostica, in-	
		dicationes & curatio. 957. diæta.	958
		Lienis magnitudo vitiosa.	ibid.
		Lienis inflatio, causa, signa. ibid. prognosticum, indica-	
		tiones & curatio.	ibid.
		Lienis inflammatio, signa, prognosticum, indicationes,	
		curatio, diæta.	959
		Lienis scirrhus, causæ, differentia, signa, prognostica.	
		960. indicationes, curatio. 961. diæta.	963
		Lienis calculi.	ibid.
		Lienis vulnera, signa, prognosticum, curatio.	ibid.
		Lienis	

## K

K	Καρδιασμός quid.	845
	Keneia quid.	857
	Κήλη quid.	863

## L

L	Labia curra curandi ratio duplex.	625
	Labia leporina. ibid. illorum curatio.	ibid.
	Labia liuida.	ibid.
	Labiorum fissuræ, eorum causæ, differentia, signa, pro-	
	gnostica, indicationes, curatio.	623. 624
	Labiorum inflammatio. 623. cancer. ibid. eius curandi	
	ratio peculiaris.	ibid.
	Labiorum peruersio, eius causa.	626
	Labiorum tremor.	625
	Labiorum tumor natiuus. ibid. à venenis, durus.	623
	Labiorum tumores aridi.	ibid.
	Labiorum vlcera. 624. causæ, signa, prognostica, & cu-	
	ratio. ibid. diæta.	ibid.
	Labiorum vsus.	622
	Labiorum vulnera.	625
	Lac tribus substantiis constat.	927
	Lactis præparandi modi.	928
	Lac heceticis vtilissimum.	130
	Lactis in ventriculo coagulatio quomodo præcauenda.	
	ibid.	
	Lactis serum an in febribus conueniat.	ibid.
	Lac caput replet. 262. facile corrumpitur.	ibid.
	Λαδερβαλμον, causæ. 539. signa prognostica, curatio.	
	ibid.	
	Lachryma sanguinea. 588. causæ, curatio.	ibid.
	Lactea venæ quando & quomodo inuentæ. 942. modus	
	illas inquirendi. ibid. cur ita diæta. ibid. earum à re-	
	liquis vasis mesaraicis discrimen. ibid. cur tandiu	
	latuerint. ibid. Erasistrato notæ fuerunt.	ibid.
	Lactes quid.	ibid.
	Lactearum venarum succus cur moriente animali eua-	
	nescat.	ibid.
	Lactearum venarum structura & in primis valvula.	
	943	
	Lactea venæ quomodo ab aliis venis & arteriis diffe-	
	rant. ibid. ad quæ intestina magis tendant.	ibid.
	Lactearum venarum origo & insertio in intestina. ibid.	
	progressus. ibid. actio.	ibid.
	Lactearum venarum utilitas in indaganda sanguinis ge-	
	neratione & aliis dubiis decidendis.	ibid.
	Lactea vasa quibus dubiis adhuc inuoluta.	944
	Lanium pulmonis arteriarum angustia eius causæ, signa,	
	prognostica, indicationes & curatio.	684. 685

# & Verborum.

Lienis vlcera,causæ,signa. ibid. prognosticum, curatio.

964

Lienis actio læsa,differentiæ,signa,curatio. ibid.

Lienis dolores,causæ, signa. ibid. prognostica, curatio.

965

*Lienosi* qui dicti. 1054

*Lienteria* à facultate expultrice irritata, signa, prognostica, indicationes, curatio, diætæ. 893

*Lienteria* & cœliaca affectio quomodo differant 889

*Lienteria* quid,causæ. 890. signa, prognostica, curatio. 891

*Lienteria* cur dysenterię superueniat. 890

*Lienteria* & dysenteria maximè fiunt autumnò. 891

*Lienteria* à retentrice labefactata, signa, prognostica, indicationes, curatio, diætæ. 892

*Ligatura* arcta fluxiones arcer. 311

*Lily* conuallij radix puluerisata sternutationem ciet. 291

*Lingua* adstrictio. 617. curatio. ibid.

*Lingua* calculi. 616

*Lingua* magnitudo nimia, tumor, causæ. 615. signa diagnostica, prognostica, curatio. ibid.

*Lingua* motus læsus. 618. causæ. ibid. differentiæ. ibid. motus abolitus. ibid. deprauatus. ibid. signa diagnostica, curatio. ibid. topica. 619

*Lingua* scabrities, asperitas. 615. causæ. ibid. curatio. ibid.

*Lingua* tumor canerosus. 616. inflammatio. ibid. tumor. à veneno. ibid.

*Lingua* vñus. 615

*Lingua* vulneta. 616. curatio. ibid.

*Lingua* vitia. 615. 616

*Lingua* ariditas in febribus. 214

*Linimentum* ad febres ardentes. 64

*Linimenta* cephalica, frigida. 264. calida, humectantia. 272

*Linimentum* extrahens sanie & materiam sub cranio. 326

*Lipothymia* & syncope quomodo differant. 773

*Lipothymia* an sit affectus cerebri. ibid. an in ea spiritus animales potissimum afficiantur. ibid.

*Lipothymia*, vide syncope. 772

*Lipothymia* in scorbutò. 1003. eius curatio. 1022

*Lipothymia* in febribus ardentibus. 216

*Lipyriæ* febris. 77

*Liquor* nephriticus. 1100

*Lixiua* in intemperie cerebri sicca non vsurpanda. 272

*Locus* peste infectus mutandus. 157

*Lotiones* extremorum in intemperie capitis calida. 265

*Lucerna* antiquorum post aliquot sæcula repertæ. 816

*Lucomoria* populorum historia. 809

*Lumbago* quid. 1001

*Lumbago*. 730. eius curatio. 731

*Lumbrici* in intestinis geniti. 856

*Lumbricorum* genera tria. 857

*Lumbrici* cucurbitini an dentur. ibid.

*Lumbricus* latus an sit animal. ibid.

*Lumbrici* lati duo genera. ibid.

*Lumbricorum* materia. 858

*Lumbrici* lati generatio. 859

*Lumbrici* geniti an alios rursus generent. ibid.

*Lumbrici* intestina & ventriculum perforare possunt. ibid.

*Lumbrici*, qua vi icterum tollant. 1075

*Luna* purgans hydragoga. 1057

*Lunæ* in morbis cerebri vis. 274

*Lunatica* passio ex vermibus in pericardio orta. 762

*Lupi* conspectus vitiata vocis causa. 750

*Lycanthropia*. 415. eius differentiæ. ibid.

*Dan. Semeriti. Tom. I I*

M

**M**acula scorbuticæ. 997. earum curatio. 1020

*Magnetis* Arsenicalis præparatio. 178

*Malignus* morbus quis. 180

*Maligna* febris quotuplex. ibid.

*Malignarum* febrium natura. ibid. sunt valdè fraudulentæ. 182. aliquando intermittentes. ibid. plerunque tertian. typum obseruantes. ibid. sæpè Epidemix. ibid.

*Malignarum* causæ. 183. non semper ex morbo corporis apparatu ortum habent, sed à causa aliqua communi. ibid. In omnibus datur aliqua putredo, seu corruptio. 181

*Malignarum* signa ex symptomatum vehementia. 184. pulsu. ibid. vrinâ. ibid. calore. ibid. facie. ibid. actionibus læsis. ibid. excretis. 185. qualitat. mutat. ibid. prognostica. ibid. indicationes. ibid. curatio per purgation. ibid. Venæ section. 187. Sudorif. 185. Alterantia & præparantia. 189. Cucurbitulas & vesicatoria. 188. Diuretica. ibid. Topica. ibid. Diætæ. ibid.

*Mania*. 408. quomodo à melancholia differat. ibid. in ea simul cor affici. ibid. causæ. 409. differentiæ. ibid. signa diagnostica. 410. admirandum maniacarum robur vnde dependeat. ibid. signa manix instantis. 410. prognostica. ibid. indicationes & curatio. 411. curatio à sanguinis euacuatione inchoanda. ibid. quæ venæ aperiendæ, præparantia qualia esse debeant. ibid. purgantia qualia conueniant. ibid. cerebrum & cor confortanda. ibid. somnus omnibus modis conciliandus. 412. Empirica quædam & specifica. ibid. Topica, & quæ circa eorum vsum obseruanda. 413. cauteria futuræ coronali applicata hinc vtilia. ibid.

*Maniacarum* peregrinis linguis loqui non posse. 414. idem quomodo tam diu viuere possint. 415

*Marasmus* quid. 125. Plures morbos consequitur. ibid.

*Mastach* Tutcarum quid sit. 377

*Maxilla* inferior capiti adnata. 643

*Maxillæ* cum capite connexio. 643

*Maxillæ* fractura. 644

*Maxillæ* fractura oris torturæ causa. 627

*Maxillæ* inferioris immobilitas, signa & curatio eius. 644

*Maxillæ* inferioris iunctura soluta. 643. eius prognostica. ibid. curatio. ibid.

*Maxillatum* fungi. 643

*Maillarum* luxatio. ibid. eius signa, prognostica. ibid. curatio. ibid.

*Maxillarum* syderatio. ibid.

*Meatus* vrinarius duplex. 1106

*Meatus* vrinarij angustia, causæ, signa, prognosticum, curatio. ibid.

*Meatus* vrinarij. caruncula, callus & verrucæ. ibid. signa, prognosticum, curatio. 1107

*Meatus* vrinarij vlcera. ibid.

*Meatus* & cavitates in cerebro. 305. earum obstructio, eiusque causæ. 306

*Mediastini* inflammatio. 701. eius causæ, signa, prognostica, curatio. ibid. diætæ. 702

*Medicamenta* ventriculum calefacientia interna. 788. externa. 789

*Medicamenta* ventriculum refrigerantia interna, & externa. 790

*Medicamenta* ad vomitum vtilia. 840

*Medicamenta* intestina calefacientia, refrigerantia, exsiccantia, humectantia. 851

*Medicamenta* lenientia quomodo differant à purgantibus. 852

*Medicamentorum* lenientium inter se inuicem differentia. ibid.

FFFFF 3

Medica

# Index Rerum,

- Medicamenta externa contra febres. 48. an & quando febrem tollere possint. 116. Externa in quartana. *ibid.*  
 Medicamenta feces delicientia. *ibid.*  
 Medicamenta euacuancia pituitam. *ibid.* bilem. *ibid.* melancholiam. *ibid.* serofos humores. *ibid.* modus exhibendi. *ibid.*  
 Medicamenta intestina roborantia. 853  
 Medicamenta materiam ex intestinis repellentia. *ibid.*  
 Medicamenta deriuantia. *ibid.*  
 Medicamenta euacuancia sensibilibiter & insensibilibiter. *ibid.*  
 Medicamenta vermes necantia. 861  
 Medicamenta in hernia vsurpanda externa. 865. interna. *ibid.*  
 Medicamenta dolorem colicum occultâ proprietate lenientia. 879  
 Medicamenta in fluxu colliquatiuo exhibenda interna & externa. 897  
 Medicamenta humorem melancholicum purgantia. 901  
 Medicamentorum purgantium vsus in dysenteria. 911  
 Medicamenta composita in dysenteria exhibenda. 912  
 Medicamenta fluxum sistentia dysentericis quando propinanda. 915  
 Medicamentorum fluxum sedantium differentia. 916  
 Medicamenta fluxum sistentia composita. 917  
 Medicamenta lieni accommodata interna. 955. externa. 956  
 Medicamenta scorbutum curantia. 987  
 Medicamenta antiscorbutica recentia vsurpanda sunt, sunt occultæ qualitat. 988  
 Medicamenta præparantia in scorbutu qualia. 1011  
 Medicamenta antiscorbutica. 1012  
 Medicamenta epatis specifica. 1026  
 Medicamenta epar refrigerantia. 1027. calefacientia. 1028  
 Medicamenta sudorifera. 1059  
 Medicamenta insensibilibiter aquam euacuancia. 1060  
 Medicamenta alterantia & aperientia. 1061  
 Medicamenta flatus discutientia. 1070  
 Medicamenta calculum imminuentia. 1086. mouentia, frangentia. 1087  
 Medicamenta quædam an asperitate sua calculum frangant. 1099  
 Medicamenta semen generantia, simplicia & composita. 1135  
 Medicamenta gonorrhœam sistentia. 1052  
 Medicamenta semen minuentia. 1144  
 Medicamenta albuginem oculi colorantia. 555  
 Medicamenta antepileptica interna, simplicia. 481. composita. 482. externa. 484  
 Medicamenta caput calefacientia, simplicia interna, externa, composita interna. 266. externa. 268  
 Medicamenta caput refrigerantia simplicia interna. 263. externa. *ibid.* composita interna. 264. externa. *ibid.*  
 Medicamenta cerebrum humectantia interna. 273. externa. *ibid.* composita. *ibid.*  
 Medicamenta memoriâ & ingenium conseruantia & confortantia. 369  
 Medicamenta dolorem oculorum mitigantia. 559  
 Medicamenta externa ophthalmica simplicia, composita. 581. interna. *ibid.*  
 Medicamenta glutinantia. 612  
 Medicamenta hypnotica. 532  
 Medicamenta ophthalmica extergentia. 542. 567. cicatricem oculi emollientia. 553. abstergentia. 554  
 Medicamenta ophthalmica qualia esse debeant. 545  
 Medicamenta sanguinis fluxum sistentia interna, externa. 912  
 Medicamenta spiritus opticos confortantia. 575  
 Melancholia in genere, nomen. 382. definitio. *ibid.* ab aliis deliriis quomodo differat. *ibid.* magna melancholicorum varietas. 383. cor etiam in ea afficitur. *ibid.* causæ, quomodo timorem & mœstitiâ inducat. *ibid.* differentia. 384. signa diagnostica. 385. prognostica. *ibid.* curatio. *ibid.* medicamentis semper admiscenda cordialia, diætâ. 385. 386  
 Melancholia quæ sit cerebro primariò affecto. *ibid.* causæ. *ibid.* signa diagnostica, prognostica, indicationes, curatio. 387. diætâ. 388  
 Melancholica cerebri dispositio non in qualitatibus primis solum consistit. 386  
 Melancholia errabunda, Kutubuth Arabibus dicta. 407. causæ, signa diagnostica, curatio. *ibid.*  
 Melancholia attonita. *ibid.* causæ, signa diagnostica, curatio. *ibid.*  
 Melancholia ex vtero. 405. causæ. *ibid.* signa diagnostica, prognostica, indicationes, curatio, quæ vena aperienda. 406. cor & cerebrum simul confortanda. 410  
 Melancholia hypochondriaca. 397. causæ, subiectum. 398. per quam viam vapores ad caput ferantur. *ibid.* causæ antecedentes quæ. *ibid.* causæ, remotæ & procatartica. *ibid.* signa diagnostica. 399. prognostica, indicationes. 400. curatio. *ibid.* vitanda medicamenta purgantia validiora & à partibus remotioribus trahentia. *ibid.* sanguis an euacuandus, & per quas vias. 401. vomitoria nonnunquam in principio non inutilia. *ibid.* humorem melancholicum præparantia, in hypochondr. qualia esse debeant. *ibid.* ab initio fortiora urinam mouentia non vsurpanda. *ibid.* vt & valde calida. *ibid.* purgantia debent esse mitiora. 404. topica qualia conueniant. *ibid.* balneum aquæ dulc. post purgationem non inutile. *ibid.* ad corroboranda viscera quæ adhibenda. *ibid.* diætâ. 405  
 Melancholia per consensum cordis & totius. 392. causæ. *ibid.* signa diagnostica. *ibid.* prognostica, indicationes. 393. curatio. *ibid.* venæsectio an, & quando conueniat. *ibid.* quæ vena secanda. *ibid.* præparantia. *ibid.* purgantia quando mitiora, quando vehementiora vsurpanda. 394. circa purgationem quæ obseruanda. *ibid.* balneum imprimis vtile. 396. diætâ. 397  
 Melancholiam præparantia. 45  
 Melancholicus humor non vnius generis est. 109. quinam melanch. *ibid.*  
 Melancholicus sanguis & melancholicum excrementum specie differunt. 954  
 Melancholici ingeniosi. *ibid.*  
 Melancholici humoris generatio. 888  
 Memoria læsa in scorbuto. 1003  
 Memoria deprauari non potest. 365. læsa memoria plerumque stoliditatis causa. *ibid.* læsa memoriâ læditur & phantasia & ratiocinatio. 365. memoriæ læsæ exempla. 366. causæ. *ibid.* ad memoriâ quæ cerebri constitutio aptissima. 367. non fieri per modum impressionis. *ibid.* læsæ memoriæ signa. *ibid.* prognostica, indicationes, curatio. 368. purgantia. 369. alterantia & roborantia interna. 269. externa. 371. diætâ. 372  
 Memoria in maniacis maximâ ex parte seruat. 408  
 Menses vomitu reiecit. 850  
 Mentula monstrosa. 1129  
 Mercurius dulcis, vitæ. 1056  
 Mesaraica vasa quotuplicia. 942  
 Mesenterium vnde dictum. *ibid.*  
 Mesenterium multis morbis est obnoxium. 944. cur Me-  
 dicorum dicatur nutricula. *ibid.*  
 Mesenterij morbi obscuri & antiquis ferè ignoti. *ibid.*  
 Mesenterij intemperies. *ibid.* curatio. 945  
 Mesenterij vasorum angustia & obstructio. *ibid.* eius causæ. *ibid.* signa, prognostica, curatio. *ibid.* per aperi-  
 entia. *ibid.* hæmorrhoides, purgantia, vomitoria, diuretica. 946. chalybem, acidulas. *ibid.*  
 Mesenterij inflammatio. *ibid.* causæ. *ibid.* signa, prognostica. 947. indicationes, curatio, diætâ. *ibid.*  
 Mesenterij tumores, abscessus, suppuratio & corruptio, causæ. 947. signa. 948. prognostica. 949  
 Mesenterium infinitis ferè abscessibus refertum. *ibid.*  
 Mesenterij



# & Verborum.

Mesenterij lapides, abscessus, gangrena.	948
Mesenterij symptomata, dolor, 949. signa, prognostica, curatio 950. per clyster. vomitor. externa & anodyna.	ibid.
Mezerii folia.	1056
Mitio inuoluntaria, causa, signa, prognostica, indicationes, & curatio.	1114
Millepedum preparatio.	1100
Miserere mei quid.	873
Modiolo non nisi summâ necessitate urgente utendum.	323
Modus deligandi vulnera abdominis.	1154
Modus suturæ faciendæ in abdomine triplex.	ibid.
Mola.	1153
Morbi intemperiei capitis, signa, curatio.	261
Morbi conformationis in capite, 304. causæ, signa diagnostica, prognostica, indicatio & curatio.	305
Morbi meatuum & cauitatum cerebri, 305. causæ, ibid. signa diagnostica, 306. prognostica, curatio.	ibid.
Morbi numeri in capite, 307. 308. signa diagnostica, indicationes ibid. curatio.	ibid.
Morbi magnitudinis in capite.	309
Morbi solutæ unitatis, 311. causæ, prognostica, indicationes, curatio.	ibid.
Morbi venenati & maligni, & tota substantia cerebro contrarij.	302
Morbi per crisin facti citius curantur.	410
Moschus in hysteriis vitandus.	270
Motus impotentia, 445. latius patet quàm paralysis, ibid. causæ, signa, 446. prognostica. ibid. curatio eius quæ sit à musculorum refrigeratione, ibid. ab exsiccatione. ibid. curatio ex duris tumoribus & ligamentorum vitij.	447
Motus veluti fibrans ventriculi.	827
Mucronata cartilaginis prolapsus 733. eius causæ manifestæ, obscuræ, ibid. symptomata ac signa. ibid. prognostica. ibid. curatio.	735
Mucronatæ cartilaginis prolapsus an sit morbus fictitius, 734. qualis sit morbus, ibid. huius morbi nomen & natura, 733. quæ partes in hoc morbo afficiantur.	ibid.
Mulsum cephalicum.	267
Multitudinis morborum & symptomatum in scorbuto causæ.	996
Musculorum abdominis inflammatio, signa, curatio.	1061
Musculi oculis cur dati.	575
Musculorum oculi vitia, 535. 576. paralysis, conuulsio. ibid.	ibid.
Musica in Tarantatis vis.	423
Musci quid.	563
Musculorum quid.	562
Myrobalani humorum ad caput motum impediunt & caput roborant.	321
Muscia.	579
Musci.	564

## N

Napi feminis vsus in variolis, 197. in petechialibus febribus.	200
Narcotica an ad inhibendum paroxysmum exhibenda.	116
Narcotica in appetentia nimia cautè vsutpanda.	820
Narcotica in qua colica conueniant, 878. tribus modis hic vsutpantur.	879
Narcotica in dysenteria quando exhibenda.	914
Narcotica & Hypnotica, 345. interna, 345. externa, 346. in qua parte capitis applicanda, 332. quo tempore exhibenda, 347. quâ vi somnum conciliant, 350. spiritus sopiunt, 512. apoplexiam inducere possunt. ibid. noxa ab illis inducta vt corrigenda, 348. eorum	

vim quæ infringant.	353
Narium angustia, causæ, 606. curatio.	ibid.
Narium cancer, signa, curatio, 604. doloris cum vlcibus curatio.	ibid.
Narium fætor, causa, signa diagnostica, 608. prognostica, indicationes, curatio.	ibid.
Narium hæmorrhagia, ibid. causæ, 609. differentia, signa diagnostica, ibid. futuræ indicia, ibid. indicationes. curatio, 611. diætæ, 613. in huius curatione canones obseruandi.	611
Narium Polypus, 604. causæ, differentia, prognostica, 605. indicationes, curatio ibid. per chirurgiam, per medicamenta. ibid. topica.	ibid.
Narium sarcoma.	604
Narium vlcera, 602. causæ, differentia, ibid. signa diagnostica, prognost. indicat. curatio, 603. vlcis corrosiui curatio, 603. diætæ.	604
Narium vsus.	602
Narium vulnera.	606
Nausea quid, causæ, 536. signa, 537. prognostica, 538. indicationes, curatio.	539
Nervi auditorij morbi.	597
Nervi omnes à cerebro & spinali medulla oriuntur.	306
Nervi optici affecti signa.	579
Nervorum opticorum vitia, 535. 574. angustia, causæ, signa diagnostica, prognostica. ibid. curatio, 574. contorsio ibid. vulnera.	ibid.
Nervorum opticorum coniunctionis quæ sit causa, 584. eorum siccitas an sit causa læsæ visionis.	579
Nictatio oculorum vnde proueniat.	435
Nitrum etiam crudum potentissimum ad febres expugnandas, 46. in febribus biliosis præstantissimum	68.
Nocturna lucubrationes memoriæ obsunt.	372
Noduli odorati calidi, 270. in vigiliis nimis, 347. pro sistendis catarrhis.	523
Nodus penis.	1127
Nomina quotidianæ, tertianæ, &c. non constituunt febrium differentias, sed humores.	9
Nucis moschata in Erysipelate vsus.	80
Nux moschata non tantum ob manifestas, sed & occultas qualitates memoriam confortat.	369
Nutricum ineuria in infantibus fasciis constringendis.	728
Nyctalopia quid 579. causæ. ibid. prognostica.	581

## O

O Banditus, causæ.	597
Oblacati ex suffusione cur splendorem ac lumen sese videre interdum existiment.	584
Obscura desipientiæ quæ Hippocrati dicantur.	335
Obstructio meatuum cerebri, eius causæ.	306
Obstructio nervorum quomodo fiat.	449
Obstructio sola ad generationem vitiosorum humorum non sufficit.	471
Obstructiones aperientia medicamenta.	45
Odontalgia, seu forceps dentarius plumbeus in templo Apollinis suspensus.	632
Oculi atrophica, 576. causæ, signa diagnostica, prognostica, curatio.	ibid.
Oculi defectus.	576
Oculi morbi quotuplices.	534
Oculi partes duplices.	ibid.
Oculi totius morbi.	ibid.
Oculi τράχης : χήμωνι.	544
Oculis illapso quomodo eximenda.	543
Oculis peculiari vi nocentia.	550
Oculorum curandorum regulæ generales.	546
Oculorum dolor, 560. causæ. ibid. signa diagnostica, prognostica, curatio.	561

# Index Rerum,

- Oculorum suggillatio, causæ, differentiæ, signa diagnostica, prognosticum, curatio. 559. 560
- Oculorum symptomata. 535
- Oculorum vulnera. 558
- Oculus leporinus. 539
- Oculus variis morbis obnoxius. 533
- Odoramenta caput refrigerantia, 265. moderatè, & non, nisi purgato corpore, vsurpanda in catarrhis sistendis. 521
- Odorata spiritus reficiunt. 265 & 295
- Odorifera an tempore pestis conueniant. 163
- Oesophagi morbi. 780
- Oesophagi intemperies, ibid. prognost. indicationes & curatio. 781
- Oesophagi tumores, signa, prognost. indicationes, curatio. ibid.
- Oesophagi angustia, causæ, signa, prognost. curatio. 782
- Oesophagi relaxatio, causæ, curatio. 783
- Oesophagi vulnera, signa, prognost. curatio. ibid.
- Oesophagi vlcera, signa, prognost. curatio. 784
- Oleum scorpionum Matthioli ad pestem. 163
- Oleum viperarum magni Ducis Hetruriz. ibid.
- Oleum citri in palpitatione cordis valde vtile. 769
- Oleum lini in pleuritide epidemia, aluum mouens. 711
- Oleum hyperici Solenandri. 866
- Oleum è baccis Sambuci expressum. 1055
- Oleacephalica refrigerantia. 264. calida. 267. humectantia. 272
- Olei chamæmelini vires. 265
- Olei è vitellis ouorum in membranis cerebri putrescentibus vsus. 326
- Oleis destillatis calidis cera admiscenda. 508
- Oleum ad grauitatem auditus Brunneri, 600. Nauij, ib.
- Oleum flor. cichorij. 547
- Ol. florum cyani ophthalmicum. ibid.
- Ol. Hispanum ad vulnera breuissimo tempore sananda. 328
- Olfactus læsio, 606. aboliti causæ. 607. imminuti, deprauati causæ, ibid. signa diagnostica, prognostica, 607. indicationes, curatio. 607
- Omenti morbis. 951
- Omenti pars quænam vitiosos humores potissimum suscipit. ibid.
- Omenti tumores. ibid.
- Omentum peritonæo annexum, situs mutatus, putredo, vulnera. ibid.
- Omnes diu abstinentes humore melancholico ferè abundarunt. 817
- Omnes partes molesta à se expellunt, sed diuerso modo. 832. aliàs. 532
- Ομφαλοκήλη quid. 863
- Ophthalmia, 543. causæ. 544. differentiæ. ibid. quædam periodica, contagiosa, 545. signa diagnostica, signa causarum, ibid. temporum morbi, ibid. prognostica. ibid. indicationes, curatio. ibid.
- Ophthalmiæ leuioris à causis externis curatio. 546. ab apum & vesparum ictu, ibid. ab ictu & casu, ibid. à cantharidum, erucarum, & formicarum contactu. 547
- Ophthalmiæ veræ curatio, venæ sectione. ibid. præparantibus medicamentis, 547. purgantibus, particularibus euacuationibus, ibid. topicis. ibid. errhinum conueniant, ibid. diætæ. 550
- Ophthalmia sicca. 551. differentiæ, causæ, curatio. ib.
- Opiata in ophthalmia non, nisi summâ vigente necessitate, adhibenda. 548. moderatè quoque in oculorum dolore vsurpanda, 559. 560. in dolore aurium quando & quomodo adhibenda. 601
- in Opij & opiatorum vsu quæ obseruanda. 347. si vires valde debiles, non exhibenda. ibid. frequens eorum vsus fugiendus, ibid. infantibus & pueris parçè admodum exhibenda. ibid. memoriam & ingenium læbefactant, ibid. non in principio, aut instante crisi exhibenda. ibid. in phrenitide cautè iis vtendum. 380. tutius clysteribus permiscetur. ibid.
- Opium est calidum. 351. cerebro & neruis nocet. 532. quomodo corrigendum. 351
- Οπισθοτόρον. 464
- Opobalsami vis & vsus. 168
- Oris apertio læsa, eius causæ, signa, & curatio. 626
- Oris distortio, causæ remotæ, signa, prognostica & curatio, 627. diætæ. 629
- Oris foetor, eius causa, signa, prognost. curatio. 648
- Oris hiatus, eius causæ, prognostica, & curatio. 626
- Oris inflammatio, eius signa, curatio. 644. & seqq.
- Oris peruersio ex resolutione neruorum. 644 & seq.
- Oris vlcera & ἄφθα. 647. eorum causæ, differentiæ, signa, prognostica, indicationes, curatio, diætæ, ibid.
- Oris collutiones in intemperie capitis calida. 265
- Orthopnoea. 738
- Oscedo quid. 981
- Oscitatio, eius signa, prognostica curatio. 626
- Oscitatio. 434
- Ossa in vulneribus capitis quando & quomodo extrahenda. 323
- Ossa in pulmonibus genita. 689
- Ossis palati corruptio. 647
- Ossiculum triangulare in cranio humano. 496
- Ouorum testæ ad oculorum vnguem. 532
- Oua an febricitantibus conueniant. 50
- Oua in dorso. 732
- Oxymel. 45
- Oxymel helleboratum Gesneri. 114
- Oxymelitis vsus in synochia. 62
- Oxyrrhodina in intemperie capitis cal. 264. quando plus, quando minus aceti iis admiscendum. ibid. vtilia sunt in omnibus capitis affectibus, 279. quæ in iis notanda. ibid.
- Ozæna quid. 603. causæ. ibid.

## P

- P**Alpebrarum asperitas. 535. callositas. ibid. cancer. 538 curatio. ibid. coalitus. 540. causæ, prognostica. ibid. curatio. 540. combustio. ibid. densitas. 536. grando. 538. hordeolum. 538. excindendi modus. 538. hydatides. 536. curatio. ibid. inflammatio. 535. instabilitas illarum, 543. causæ. ibid. curatio. 543. inuersio & contractio. 539. lithiasis, 543. motus læsus, 538. nodi & excrecentiæ. 538. pilorum defluuium, 542. causæ curatio, ibid. scabies. 536. τριχόμα, 535. τριχίασις, 541. causæ. ibid. prognostica. curatio. ibid. tumor. 535. verrucæ. 537. vulnera. 542
- Palpebrarum vsus. 535
- Palpitatio ventriculi. 827
- Pancreatis vsus nobilior. 943 & 950
- Pancreatis vsus vulgaris. 950
- Pancreas lienis vicarium viscus. ibid.
- Pancreatis morbi & symptomata, curatio, tumores & abscessus. 951
- Paracelsorum opinio de febris natura examinatur. 4
- Paras an per nares vaporem pestilentem hauserit. 133
- Pandiculatio. 434. causæ. 434. prognostica & curatio. 435
- Paralysis 447. paralysis & stupor in quibus differant. ibid. definitio. 447. differentiæ. 448. causæ. ibi. causa proxima spirituum animalium defectus, ib. paralysis ab intemperie frigida & humida. ib. à vi narcotica. 449. scorbutica vnde proueniat, ib. à neruorum angustia. ib. à soluta vnitæte. ib. causæ euidentes & procatartica quæ, quæ disponentes, signa diagnostica. 450. locus affectus quomodo cognoscendus. 451. causarum

# & Verborum.

- rum signa. 451. prognost. ibid. indicationes. 452.  
curatio paralytis pituitosæ. ib. vena quando in ea a-  
perienda. ibid. lenientia & purgantia mitiora. ibid.  
vomitoria. ibid. præparantia quando vsurpanda. 453.  
purgantia fortiora. ib. particulares capitis euacua-  
tiones. 454. sudorifera ibid. nervos roborantia. 455.  
topica. 456. diæta. 458. à causis euidentibus curat. 459  
*Paralytis* causa qui humores esse possint. 460. quot mo-  
dis excitari possit. - ibid.  
*Paralytis* ex humore tenui, ex colica, scorbuto curatio.  
458  
in *Paralyti* an sudorifera exhibenda. 461  
*Παραλύσις* quid. 1130  
*Paralytis* scorbuticæ. 1001. quomodo exciteretur. 1002  
*Paralytis* & conuulsio in tortura oris interdum iun-  
guntur. 627  
*Paralytis* in inflammatione pulmonis. 678  
*Παραπνευμονίς* quid, vbi locum habeat, quo in loco  
fieri debeat. 1059  
*Paraphrenitis* 176. causæ. signa diagnostica, prognosti-  
cum, curatio. 276  
*Pars* demorsa ab animali rabido an statim amputanda.  
418  
*Paroxysmus* in quartana non impedire. liceat. 116  
*Paroxysmi* die an liceat purgare. 103  
*Paroxysmus* venæ sectionem proximè sequens cur sit  
grauissimus. 101  
*Paroxysmorum* intermittentibus causa, ordo, 87. 92.  
anticipatio & postpositio, longitudo & breuitas.  
ibid.  
*Partes* solidæ ex quibus componuntur. 125  
*Pastinaca* marinæ radius dentes excidere facit.  
638  
*Pectoris* cum hæmorrhoidali arteria consensus. 945  
*Pectoris* dolor, 757. eius signa, prognost. & curatio.  
758  
*Pediculi* in dorso. 732  
*Pedum* lotiones in vigiliis nimis. 347  
*Penis* morbi, eius meatus vitia, eius numerus vitiat.  
1127  
*Penis* distortio. ibid.  
*Penis* inflatio. 1128  
*Penis* inflammatio. ibid.  
*Penis* tubercula & verruæ. ibid.  
*Penis* vulnera. 1129  
*Penis* vlcera, fistulæ, 1129. gangræna, differentiæ, signa,  
prognosticæ, curatio. ibid.  
*Penis* erectio læsa, causæ 1137. signa, prognostica, in-  
dicationes & curatio. 1138  
*Penis* dolor. 1055  
*Penis* exulceratio in scorbuto. 1008  
*Pericardij* aqua aucta, vel deficiens. 761  
*Pericardij* corruptio. ibid.  
*Pericardij* defectus. ibid.  
*Pericardij* putredo, tumores, vulnera. ibid.  
*Pericranium* per futuras duræ meningi adnæscitur. 313.  
in vulneribus capitis quando incidendum. ibid. in  
pueris non facillè secandum. ibid. eius sectio quando  
tentanda. 321  
*Periodorum* in febribus causæ secundum Astrologos,  
Galenum. Sanctos, Plater. Authorem. 287. & seq.  
*Periodorum* an ratio reddi possit ex partium dispositio-  
ne, an ex humorum natura, an ex putredine, an ex  
occulta proprietate, 88. controuersie explicatio.  
90  
*Periodos* humorum negantium sententia. 89  
*Periodi* humoribus respondent. 91  
*Peritonæi* morbi. 1061  
*Pestis* nomen quid significet. 132  
*Pestis* an certum & vnum morbi genus sit. ibid. cur tot  
& tam varios secum trahat morbos & symptomata.  
ibid.  
*Pestis*, seu pestilentie natura, 131. variæ de ea authorum  
sententiæ 132. an in putredine consistat, ibid. an fe-  
brem semper habeat coniunctam, 135. an febres eæ,  
quæ cum peste coniunguntur, omnes sint synoch:  
136.  
*Pestis* definitio. 138  
*Pestis* cordis morbus, 133. perniciosiss. ibid. contagiosiss.  
137. cur alias partes lædat. 134. an possit esse mor-  
bus Endemius 137. cur in Turcia tam familiaris  
137. an bis hominem corripere possit. 152  
*Pestis* est contagiosa. 145. Vires subito prosternit. ibid.  
Antiquorum an fuerit contagiosa. 137. cum peste in-  
fectis cur quidam innoxie conuersentur. 152  
*Pestis* Generatio. 138. an omnis sit contagiosa. 137. an sit  
peculiare morbi genus. 179  
*Pestis* cerebri & vicinis membris primùm infectis  
num detur. 153  
*Pestis* cur non omnia animalia simul inuadat. 135  
*Pestis* crudelissimæ historiæ. 137  
*Pestis* & Pestilentis febris discrimen secundum Anton.  
Port. 179. Mercat. 179. Authorem. 180  
*Pestilentium* & malignar. febrium discrimen. 180  
*Pestis* causæ. 139. An Deus sine causis secundis quan-  
doque pestem inducat. ibid. Plateri de pestis origi-  
ne opinio. 140. à sagâ defunctâ induct. historia.  
seqq.  
*Pestis* imminentis signa. 153 & seqq.  
*Præseruatio* à peste in quibus consistat. 156. ab alexi-  
pharmacis potiss. dependet. 157. quomodo instituen-  
da est per purgationem. 157. Venæ sectionem. 161.  
fontanell. 162. Diætam. 161  
*Pestis* præsentis signa. 154. ex animalis & naturalis fa-  
cultatis læsione. 155. urinâ ib. sudore. ibid. alui deie-  
ctione. 155. qualitate corporis mutatâ. ibid.  
*Pestis* in vno saltem latentis signa obscuriora. 155. in  
mortuis signa. ibid.  
*Pestis* Prognosticæ. 156. curatio per Purgationem. 170.  
Venæ sect. ibid. tutissima per alexipharmaca & su-  
dorifera. 172. externa. 174  
*Pesti* incipienti quomodo occurrendum. 156  
*Pestilens* & Epidemium differunt. 326  
*Pestilentis* veneni natura & vis secund. Fracastorem,  
Augen. Minadoüm. Port. Massar. 136. secundum Au-  
thorem. 136  
*Pestilens* venenum an omne septicum 137. totum ex  
corruptione aliarum rerum oritur. 344. modò viper.  
ac diptadis, modò cicutæ ac napelli vires imitatur.  
137. naturam eius specificam nemo satis explicauit.  
138  
*Pestilentes* febres plerumque pestem præcedunt. 446.  
omnes sunt continuæ. 182. earum causæ. 183. signa.  
ibid. Prognostica. 185. Curatio. ibid.  
*Pestilentes* febres sine peste. 179  
*Peteche*. quomodo ab aliis maculis discernendæ. 199  
vnde oriuntur. ibid. generationis modus. ibid. raro  
per modum Crisis erumpunt. 200. materia in venis  
latente nihil tollunt. 200  
*Petechiales* febres. 199. an antiquis cognit. ibid. earum  
different. 200. & signa ibid. per aluum lenientia. ib.  
venæsect. ibid. sudorifera 201. medicamenta exter-  
na ibid. vesicator. ibid. quid agendum in alui fluxu  
cum petechiis. ibid.  
*Petechiales* febres an peculiarem curandi rationem re-  
quirant. 200  
*Παράδωξις* quid. 818  
*Phantasia* & ratiocinatio quotupliciter lædantur. 365. à  
quibus causis lædantur. 366. à primo ortu si lædan-  
tur, plerumque non curantur. ibid.  
*Philtra* vnde dicantur. 389. quid sint, an amorem indu-  
cere valeant. 390  
*Phimosi* quid. 1130  
*Phlegma* quid significet Hippocrati. 941  
*Phlogismus* in intemperie capitis frigidâ sine materia.  
270. catarrho suffocatio. 524  
*Phrenitis*

# Index Rerum ,

<i>Phrenitis</i> 378. quid sit. ibid. causa proxima. 379. differentia, phrenitis <i>δορυβάδης, ἀσαφὴς</i> . ibid. signa, ibid. quibus ab aliis affectibus dignoscitur 380. prognostica. ibid. curatio. 381. diæta. 555	<i>Πτερυγιον.</i> 551. & 552
<i>Phyllophaga</i> pustula corneæ. 555. causæ, ibid. signa diagnostica, prognostica, indicationes. 556. curatio. ibid.	<i>Πτερυγίσις</i> , causæ, 542. curatio. ibid.
<i>Phthisis</i> definitio, eius subiectum, 694. causæ ibid. differentia, signa incipientis 695. perfectæ. 696. prognostic. ibid. indicationes, curatio 697. diæta. 699	<i>Prisana</i> quid. 49
<i>Pica</i> quid, quomodo differat à malacia. 821	<i>Prisana</i> in febribus utilitas, Manardi eam improbantis refutatio. ibid. & 50
<i>Picæ</i> subiectum siue sedes propria ibid. causæ, signa, prognost. curatio, diæta. 823	<i>Prisana</i> . cremor. 50
<i>Πικρόχολοι</i> qui. 847	<i>Prisana</i> , eius causæ, signa, prognostic. curatio. 629 & seqq.
<i>Pili</i> in ventriculo geniti. 803	<i>Pulmones</i> in scorbuto non primò afficiuntur. 994
<i>Pili</i> & filamenta in renibus genita. 1089	<i>Pulmonis</i> vasorum apertio quot modis fiat. 686. eius signa, prognostica, indicationes, curatio, diæta. 686. & seqq.
<i>Pila</i> è succino manibus gestata & naribus admota caput roborat. 296	<i>Pulmo</i> quando euacuetur. 675
<i>Pilei</i> in intemperie capitis frigida. 270. in humida. 271	<i>Pulmo</i> repletus. 682
<i>Pilorum</i> è palpebris defluuium. 542. curatio. 542	<i>Pulmonis</i> cancer. 700
<i>Pilula</i> an commodius è capite, quàm alia medicamenta euacuent. 276. ad caput purgandum quando exhibendæ. 522	<i>Pulmonis</i> hydarides. 692
<i>Pilulæ</i> catarrhum interceptantes. 522	<i>Pulmonis</i> inflammatio. eius causæ, ibid. differentia. 676. signa. ibid. prognost. indic. & curatio. 677. diæta. ibid. & seqq.
<i>Pilulæ</i> narcoticæ Plateri. 344. Dorncreilij. 344	<i>Pulmonis</i> intemperies eius causæ, signa, prognostica, indicationes, & curatio. 5. diæta. 674
<i>Pilulæ</i> pituitam è capite purgantes. 290. purgantes in melancholia hypochondriaca Plateri. 403	<i>Pulmonis</i> morbi in numero deficiente. 690
<i>Pilulæ</i> tartaræ. 956	<i>Pulmonis</i> sphacelus. 700
<i>Pisces</i> an febricitantibus conueniant. 50	<i>Pulmonis</i> tubercula cruda & suppurata. causa ibid. signa, prognostica & curatio. 690. 691
<i>Pituitam</i> in capite præparantia. 290. putgantia. 290	<i>Pulmonis</i> vlcæris causæ proximæ 201. mediæ. 695. & seqq. signa. ibid. prognostica. 206. curatio 697. diæta. 699
<i>Pituita</i> in intestinis collecta. 856	<i>Pulmonum</i> vlcera peculiaria. 700
<i>Plantag.</i> radic. vires in quartan. 115	<i>Pulmonum</i> cum latere coalitus, eius causæ, signa, prognost. curatio. 692
<i>Plateri</i> noua opinio de singultu. 832. aliàs 532	<i>Pulmones</i> refrigerantia. 675. calefacientia. 676. siccantia ibid. humectantia. ibid.
<i>Pleuritis</i> scorbuticos affligens. 1001	<i>Pulmonum</i> vulnera. 692. signa vasorum pulmonis vulnerat. 693. signa carnis pulmon. vulneratæ ibid. prognostica. ibid. indicationes & curatio. ibid. diæta. 694
<i>Pleuritis</i> , angina & peripneumonia epidemia. 211	<i>Pulmonis</i> vulnerati historia. 693
<i>Pleuritis</i> , eius causa proxima, remotæ differentia, signa, tempora, signa differentiatum, prognost. indicat. curatio, diæta. 703 & seqq.	<i>Pulmonis</i> planè consumpti historia. 692
<i>Pleuritis</i> veræ, nothæ. ibid.	<i>Pulsus</i> & respirationis differentia. 12. & seqq.
<i>Pleuritidi</i> veræ & nothæ differentia. 705	<i>Pulsus</i> in scorbuto qualis. 998
<i>Pleuritidis</i> & peripneumoniz differentia. ibid.	<i>Pulsus</i> febris quis. 8
<i>Pleuritidis</i> à diaphragmatis inflammatione discrimen. ibid.	<i>Pulsus</i> in peste. 154
<i>Pleuritidis</i> ab epatis inflammatione differentia. ibid.	<i>Pulueris</i> bombardici vires in peste. 163
<i>Pleuritidis</i> salutaris terminatio, signa salutis in pleuritide, signa mortis. 707	<i>Pulueres</i> capiti inspergendi pro sistendis catarrhis. 485.
in Pleuritide ante annum 14. vena non secanda. 708	<i>Pulueres</i> cephalici frigidi. 265. calidi, 268. exsiccantes, 272. pituitam purgantes. 291
<i>Pleuriticorum</i> victus à veteribus accuratè præscriptus, 714	<i>Pulueres</i> ophthalmici non diu in oculo detinendi. 554
<i>Pæonia</i> radix quando colligenda. 481	<i>Pulueres</i> præseruantes ab apoplexia. 362
<i>Poma</i> odorata in intemperie capitis calida. 265. in frigida. 269. somnifera. 347	<i>Pulis</i> ad hæmorrhagiam narium D. Caspat. Kegleri, 611. alius D. Dorreri. 612
<i>Pollutio</i> nocturna, causæ, signa, prognostica 7053. indicationes & curatio. 1144	<i>Pulueres</i> contra vertiginem. 358
<i>Potiones</i> purgantes in melancholia hypochondriaca. 402	<i>Pulis</i> è Nicotiana. 292. ex cinnabari natua. 299. Guainerij. 360
<i>Potiones</i> vulnerariæ in capitis vulneribus. 328	<i>Pulis</i> Natcoticus. 344. purgans in melancholia hypochondriaca. 403
<i>Potus</i> in febribus. 53. modus in potu in continuis obseruandus. ibid.	<i>Pulis</i> Trithemij. 371
<i>Potus</i> ex branca vrsinâ. 70	<i>Pupilla</i> vitia. 534
<i>Potus</i> scorbuto generando aptus. 993	<i>Pupillæ</i> angustia. 564. causæ, signa diagnostica. ibid. prognostica, curatio. 564
<i>Præputij</i> morbi. 1130	<i>Pupillæ</i> dilatatio. 562. causæ, 563. differentia, signa diagnostica, prognostica, indicationes, curatio, 563
<i>Præputium</i> curtum. 1132	<i>Pupillæ</i> dilatationis num siccitas sit causa. 563
<i>Præputij</i> fissura. ibid.	<i>Purgantia</i> non attrahendo, sed humores fermentando, & naturam stimulando euacuant. 276. an post cœnam conueniant. ibid.
<i>Priapismus</i> , causæ, signa, prognost. indicationes & curatio 1139. diæta. 1140	<i>Purgantia</i> duplicia. 36
<i>Πρόπρωσις</i> tunica <i>πρωονδύς</i> . 562	<i>Purgantia</i> propriè dicta quo morbi tempore exhibenda. 37. an in augmento febrium, an in statu. 43. an & in quorum morborum principio secundum Capivacc. & Capritium. 38. Radium, Roboret, Saxoni ibid.
<i>Prospectus</i> ab alto & in profundum cur vertiginem exciter. 365	
<i>Pruritus</i> carunculæ lachrymalis. 571	
<i>Ψωροδαλμία</i> seu ophthalmia sicca. 552	
<i>Pruritus</i> scroti & præputij. 1045	
<i>Præmica</i> quæ dicantur. 292	



# & Verborum.

ibid. mercurialem. Altim. sodoc. Lommium. Author.  
 39  
 Purgatio in quibus morbis per vires instituenda. 72  
 Purgationis intempestivæ incommoda. 38  
*Pur* per aluum deiectum. cur à partibus remotis per aluum excernatur. 934  
 Pus an interdum per hæmorrhoides euacuetur. 941  
 Pus in empyemate sensim euacuandum. 725  
*Pustul.* circa labia crumpentes remissionem febriæ nunciant. 96  
*Putredinis* vocabulum ab antiquis vt usurpatum. 19  
 Putredinis definitio Aristot. Galenica, ibid. differentia 20. modus. ibid.  
 Putredo secundum partem. ibid.  
 Putredo secundum totum. ibid.  
 Putredo an sit naturalis. ibid.  
 Putredinis vocabuli vsus apud antiquos. 22  
 Putridæ febres non omnes ab obstructione. 23. varietas, 27. caus. 25. oritur. à solo calore humido. 134  
 Putredo humorum in febribus qualis, an sit nuda alteratio. an pariat febres pestilentes. 20. an semper accidat humoribus in loco proprio contentis, 21. an semper ab obstructione sit in febribus 22. Quid indicet. 29. quibus medicam. inhibeat. 87  
 Putridorum occurfus & vicinia quomodo febris causa. 25  
 Putrid. febr. definitio. differentia, causa efficiens. ibid. primaria, 27. signa ex calore ibid. vrina. 28. pulsu ib. indicatio. 29  
 Putrid. malign. & contagios. 27  
 Putrid. contin. primar. symptomatic. ibid.  
 Putridarum febrium causa proxima vbi contineatur, 86. earum ab Ephemeris discrimen. ibid.  
 Pyrethri radicum efficacia singularis in epilepsia. 481

## Q

**Q**ua vena in scorbutu aperienda. 1010  
*Qualitates* occultæ num tantum corpora proxima afficiant. 497  
 Qualitatis ciborum ratio est habenda. 1830  
*Quandiu* homo inedia tolerare possit. 809  
*Quartan.* febris causa. 109  
 Quartanæ autumnu frequentiores. 109  
 Quartan. & aliæ diutur. febres plerumque circa æquinoctia & solstitia incipiunt & desinunt. 93  
 Quartana continua, eius signa, prognostic. & curatio. 75. Diata. 76  
 Quartan. intermitt. causa proxima. 109. remota, signa ex modo inuasionis, calore, pulsu & vrina. 110. prognost. indicationes, curatio, per aluum purgantia. 111. hæmorrhoid. apertion. venæ secti. 112. alterantia, 113. præparantia & concoquentia vomitoria, discutientia, & sudorifera, 115. appropriat. robor. 116. diata. 117  
 Quartana duplex, triplex, eius curatio. 123  
 Quartana biliosa sanguinea dicta qualis sit. 109  
 Quartan. toti ferè German. Epidemiæ historia. 110  
 Quartan. num bis hominem inuadat. 110. ea laborantes raro peste corripiuntur. 342  
*Quintan.* febres an dentur. 93. earum causa. 228. cura. 94  
 Quotidian. exquisit. rar. 72  
 Quotidiana continua. 71. eius signa ibid. quomodo ab hecticâ discernenda. ibid. prognost. ibid. curatio. ibid. per aluum laxantia. 72. venæsectio. ibid. coquentia & alterantia purgantia. 73 Diuretica. ib. sudorifera. ibid. confortant. ib. Diata. ibid.  
 Quotidiana intermit. an derur. 107. eius caus. ib. signa, ib. ex inuasionē. 107. calore. ibid. vrina. ibid. pulsu & paroxysmo. 108. prognost. ibid. curatio per venæ sectionem & vomitoria. ibid. præparantia. putgan-

ria, Diu. & sudorifera.  
 Quotidian. intermitt. noth. signa.  
 Quotidiana duplex.

108. 109  
 108  
 123

## R

**R**abidi cur aquam abhorreant. 417  
*Rabies* 415. causæ. 416. signa diagnostica. ibid. signa rabiei incipientis. 417. iam. factæ. ibid. prognostica, ibid. indicationes, curatio, 418. rabiei imminētis curatio & per totum annum præseruatio. 420  
 Rabiei ab esu animalium rabidorum. histor. 149  
 Ranar. viridium in hecticâ vtilit. 130  
 Ranula sub lingua causæ. 616. curatio. 617  
 Ranuncul. carpo allig. in quartan. 116  
*Raporum* decoctum ad quartanas. 114  
*Raucedo* vide vocis vitia.  
 Raucedinis à catarrho curatio à pure 750. à causis externis. ibid. & seqq. 78  
 Recidiva in febribus vnde. 78  
*Reclinando* quid. 709  
 Refrigeratio intestinorum quomodo colicam excitet. 886  
 Refrigerantia cautè cerebro adhibenda, 263. an in principio aliquam adstringendi vim habeant. ib. posteriori capitis parti applicata. nervos lædunt. 263. stuporem quæ inducunt, in capitis affectibus, nisi dolor aut vigilæ urgeant, non usurpanda. ibid.  
*Regum* galliæ in curandis strumis vis. 671  
 Renum vsus secundum plerosque. secundum sacras litteras. 1678  
 Renes an præter expurgationem seri alium adhuc vsum habeant. ibid.  
 Renes habent peculiare parenchyma. ib.  
 Renes cur arteriæ immittantur. 1079  
 Renum intemperies calida & sicca, causæ, signa, prognost. indicationes, curatio, & diata. ibid.  
 Renes refrigerantia medicamenta. ibid.  
 Renum intemperies frigida, causæ, signa, prognost. indicationes curatio. & diata. 1080  
 Renum numerus mutatus. ibid.  
 color mutatus. ibid.  
 substantia. ibid.  
 alij morbi. ibid.  
 Renum inflammatio, & causæ, signa, prognost. 1089. indicationes curatio. & diata. 1090  
 Renum tumores reliqui. ibid.  
 abscessus. ibid.  
 tumoris incisio. ibid.  
 scirrhus. ibid.  
 Renum tabes. 1091  
 Renum vulnera ib. diata. ibid.  
 Renum vlcera. ib. causæ ib. signa, ibid. prognost. indication. curatio & diata. 1092  
 Renum imbecillitas & actio læsa, causæ, sign. progn. 1093. curatio. 1094  
*Repellentia* an locum habeant in vertigine per consensum partium inferiorum, 365. quando sola quando cum digerentibus adhibenda. 279  
 Res cur alieno colore tinctæ appareant, cur inuerset: ibid. cur perforatæ. 184  
 Res alienæ deglutitæ. 785  
 Res alienæ per aluum excretæ. 933  
 Res alienæ per penem excretæ. 1055  
 Res alienæ per vesicam excretæ. 1117  
 Res variæ per vmbilicum excretæ. 1036  
 Res p.n. in ventriculo repertæ. 856. 801. signa, prognost. 860. curatio. 861  
 Res monstrosæ vomitu reiectæ. 850  
 Res p.n. in intestinis repertæ. 856  
 Res in suo loco an putrescant. 29  
*Respiratio* quomodo lædatur. 736

Respiratio

# Index Rerum,

Respiratio laesa in genere 736. causae.	737	an sit Oscedo. ibid. An. Stomacace & Scelotyrbe.	
Respirationis difficilis & pectoris angustiae in scorbuto curatio.	1018	ibid. Quando hoc nomen acceperit ibid. An sit icterus niger. ibid. an vitiligo nigra. 982. an ileos haematites, an graecis medicis fuerit incognitus. 983. subiectum & causa 984. modus generationis.	985
Respiratio cur in apoplecticis seruetur.	501	Scorbuticorum morborum & symptomatum generatio.	ibid.
<i>Ρευμα</i> quid.	515	Scorbuti subiecto quid denotetur.	986
<i>Rhabarbarum</i> quomodo in dysenteria exhibendum.	911	Scorbuti subiectum duplex.	ibid.
Rigiditatis & contractionis membrorum in scorbuto curatio.	1021	Scorbuti fons, seu locus generationis.	ibid.
Rigoris caus. 78. quomodo fiat.	92	Scorbuti causa non est humor melancholicus solum crassus, sed sero dilutus peculiari modo corruptus.	ibid.
Rigorem mitigantia medicament.	116	Scorbuti causae remotae, procatarticae & externae.	992
Rigoris in semitertianâ causa.	120	Scorbuti signa ac morbi & symptomata quae scorbutum comitantur.	995
Rigor. 436. eius subiectum, generationis modus, 437. causa proxima, 436. refrigeratio in rigore quomodo se habeat, 439. eius causae remotae & mediatæ internae, ibid. externae, ibid. signa diagnostica ib. prognostica. curatio.	438	Scorbutus in principio difficulter cognoscitur.	ibid.
<i>Rob sambuci</i> cum aceto Theriacali ad pestem.	174	Scorbuti signa generalia.	ibid.
<i>Rosar.</i> aqua an vtiliter ante Paroxysmum febrilem bibatur.	115	Scorbuti incipientis signa, augmentum sumentis vt & ingrauescentis signa.	ib.
<i>Rorblauff.</i> qualis sit morbus.	79	Scorbuti prognostica. 1009. indicationes, curatio. 1010. diæta 1024. præseru.	1025
<i>Rorula</i> & morfuli cephalici calidi, 268. contra epilepsiam.	484	<i>Scotoma</i> quid. 556. scotoma qui patiuntur, omnes vertigine laborant.	ibid.
<i>r'væ</i> quid, 569. causae signa diagnost. prognost. indicat. curat.	571	Scroti apertio.	1060
<i>Rubeola, Rossalia</i> vide <i>Variol.</i>		Scroti morbi.	1122
<i>Rubigo</i> quid.	906	Inflammatio.	ibid.
<i>Rustatio</i> quid 836. aliàs 536. soli homini accidit. ib. causae, signa ib. prognostica curatio.	ibid.	Vulnera.	ibid.
Ructus in scorbuto.	1003	Excoriatio.	ibid.
<i>Ruminatio</i> quid.	828	Vlcera.	ibid.
		Gangraena.	ibid.
S		<i>Sebel oculi</i> quid 553. differentiae, causae, signa diagnostica, prognostica, curatio. ibid. præsidia topica, chirurgica. ibid. diæta.	554
<i>Sabare.</i>	379	<i>Seclio</i> in hydrocephalo.	340
<i>Sal Ammoniac.</i> sublimat. ad quar.	116	Sedes fracturae cranij species. 316. eius differentiae. 317. accidit semper cum cutis & pericranij vulnere.	316
<i>Salacitas</i> & satyriasis. causae, signa, prognostica, indicationes, & curatio 1139. diæta.	1140	<i>Seminis</i> generatio laesa. 1133. causae, signa 1134. prognostica. indicationes, & curatio. 1135. diæta.	ibid.
<i>Salina</i> defectus 630. signa, prognostica & curatio.	ibid.	Semi tertianarum febrium origo & causae.	946
Saliuae & sputi differentia.	629	Semina calida in febrib. cautè vsurpanda.	102
Saliuae generatio, vsus.	ibid.	Semitertiana febris. 106. unde dict. 119. qualis febris ibid. quot modis fiat. ibid. differt à Tertiana notha. ib. ex. quotidiana continua & tertiana intermittente componitur. ibid. eius causa. 121. signa, prognost. ib. curatio. 122. diæta.	ibid.
<i>Saluarell.</i> in quarranâ & affectibus lienis Sectio an utilis.	112.	<i>Senes</i> ad ratiocinandum & memorandum cur minus apti.	367
<i>Sanguificatio</i> laesa. 1044. causae, signa, prognostica, indicationes & curatio.	1045	<i>Seprana</i> febres an dentur. 93. à quo humore fiant.	ibid.
Sanguinis fluxus è dentibus.	640	<i>Seri</i> in capite collectionis causae, 295. serum non est pura aqua. ibid. duo eius genera. ibid. ibid. eius natura. ibid. quomodo variorum affectuum causa sit, ibid. eius generatio. 296. serosum humorem quae euacuant, ad eius euacuationem nullâ præparatione opus.	ibid.
labiis.	626	<i>Seri lactis</i> caprini in melancholia hypochondriaca vsus. 403. in maiori copia ad assumendum. ibid. in mania vtilissimum.	420
gingiuis.	641	<i>Sermonis vitia</i> vide <i>vocis vitia</i> , an omnis sermo vox sit.	748
Sanguis an ad animi deliquium in vllâ febre mittendus. 17. sanguinis euacuationem quid indicet. 31. an sola plethora.	33	Sermonis vitati causa.	750
Sanguinis abundantia in corpore quando.	79	<i>Serosa</i> cacochymia.	953
Sanguis quando & cur non semper in tertianâ mittendus.	101	Serum quid & quoduplex.	ibid.
Sanguinem ad caput fluentem quae repellant.	283	Serum propriè dictum.	ibid.
Sanguinis humani vsus num conueniat in epilepsia.	497	Serum lactis præstantissimum ad febres biliosas.	68
<i>Sarcocoele</i> vide <i>hernia carnosâ.</i>		<i>Setaceum.</i>	276
<i>Sarcocollæ</i> nutritio.	549	<i>Sexus</i> mutatio.	1132
<i>Schvachheit</i> qualis sit morbus.	770	<i>Siccatorius</i> morbus.	944
<i>Scabiei</i> palpebrarum medicamenta.	536		
Scabie erumpente febres soluuntur.	87		
<i>Scammon.</i> ad 3. ii. item ad 3. i. innoxie à quodam deuoratum.	152		
Scarificatio & cucurbitul. scarificat. differunt.	36		
<i>Σκελοτύρβη</i> quid.	1001		
<i>Σκληροφαλμία</i> .	551		
<i>Σκύβαλα</i> quid.	855		
<i>Scorbuti</i> nomina, an fuerit antiquis cognitus, an sit icterus niger.	981		
Scorbuti generatio. 106. curatio.	116		
Scorbuti nomina. 982. an fuerit antiquis cognitus. ib.			

# & Verborum.

<i>Siccitas</i> an de essentia febris.	3	<i>Spiritus vini</i> in vulneribus capitis utilitas.	331
<i>Sieff.</i> de thure Rhasis.	553	<i>Spirituum animalium</i> generatio, naturalis constitutio;	
<i>Signa</i> temporum dysenteriaz.	908	vitia, 302. eorum defectus. 303. agitatio, curatio.	
<i>Sinapi</i> vsus in apoplexia pituitosa. 506. Sinapismi.	294	303. torpor & narcosis vnde.	502
<i>Singultus</i> in febribus.	215	<i>Spirituum optictorum</i> agitatio, 574. causæ, ibid. differt	
<i>Singultus</i> ad facultatis expultricis irritatæ symptomata		à vera vertigine.	ibid.
refertur. 831. Singultus quid. ibid. causæ. 832. signa,		<i>Spirituum optictorum</i> vitia. 535. 574. crassities, ibid.	
prognostica. 833. indicat. curatio. 834. diætæ. 835.		causæ, ibid. defectus, 575. vitia. 527. 574. eorum vi-	
Singulti sedes. 832. Singultus & vomitus differunt.		tia an perspicillorum vsu corrigi possint.	575
832. aliàs. 532		<i>Splendoris</i> oculis obuersantis causæ.	880
<i>Siriassis</i> quid. 311. Sirsis calida.	379	<i>Sputatio</i> & saluatio continua in scorbuto, 1003. eius	
<i>Siris</i> deficiens quid, causa, signa, prognost. curatio.	824	curatio.	1022
<i>Sitis</i> nimia quid 825. causæ signa prognostica curatio,		<i>Sputum sanguinis</i> 759. causæ ibid. differentia. ibid. si-	
826. diætæ.	827	gna ibid. prognost. 760. indic. & curat. ib. diætæ. 761	
<i>Sitis</i> in scorbuto.	1003	<i>Sput.</i> sanguinis in muliere à Galeno curati historia. ib.	
<i>Sitis</i> in febribus.	214	<i>Σταφύλιον</i> quid.	562
<i>Smaragdi</i> in peste vsus.	162	<i>Sternutatio</i> , huius commoda. 614. incommoda, causæ;	
<i>Smegmata</i> cephalica calida.	269	signa, prognostica; indicatio, curatio.	560. 614
<i>Somni</i> finis & utilitas. 341. proxima causa. 342. quotu-		<i>Stillicidium sanguinis</i> quid significet.	610
plex, 352. quot modis concilietur.	343	<i>Stœchados</i> Arabica vires.	266
<i>Somnum</i> conciliantia medicamenta interna. 343. ex-		<i>Stomacace</i> & scelotyrbæ quid.	981
terna.	344	<i>Strabismus</i> causæ, 577. differentia, signa diagnostica,	
<i>Somnus</i> melancholicis remedium optimum.	385	578. prognostica. curatio.	ibid.
<i>Somnus</i> p.n.	352	<i>Strangulatio</i> 747. eius causæ ibi. progn. ib. curatio. 748	
<i>Somnia</i> naturalia.	354	<i>Strangulati</i> laqueo quomodo curandi.	ibid.
<i>Somnus</i> in febribus putridis multum utilis 55. profun-		<i>Stranguria</i> vnde dicta, causæ, 1110. signa, prognostica,	
dus in febribus.	213	curatio. 1111. diætæ.	1112
<i>Somni</i> nimij in scorbuto curatio.	1022	<i>Stranguria</i> an à frigiditate & imbecillitate vesicæ ex-	
<i>Somnia</i> naturalia.	354	citetur.	ibid.
<i>Somnambuli</i> qui, 425. à qua causa ad motum inciten-		<i>Strangulationis</i> metus in scorbuto.	1003
tur, ibid. eorum natura & constitutio qualis. 426.		<i>Strumæ</i> in gutture causæ ibid. signa, prognostica, cu-	
causa proxima. ibid. Lunam hoc malum excitare		ratio.	668
posse, ibid. signa diagnostica. 427. prognostica. indi-		<i>Stupidi</i> qui dicantur & Stupiditas, quid, 366. stultitia &	
cationes, ibid. diætæ.	427	stupiditas quomodo differant ibid. stupidos & stoli-	
<i>Somnambuli</i> in loco periculoso constituti inclamandi		lidos nonnullos per morbum ingenium acquisuisse:	
& excitandi non sunt.	427	366. stoliditatis & stupiditatis causæ.	167
<i>Sopor</i> grauis atque Ecstasicus. Vide <i>coma vigil.</i>	21	<i>Stupor</i> quid 526. eius causæ. 526. differentia, signa	
<i>Spasmi</i> à paralyti differentia.	465	diagnostica, prognostica, curatio.	527
<i>Spasmus</i> & spasma differunt.	461	<i>Stuporis</i> à spiritu vini & inebriatione curatio.	509
<i>Spasmus</i> quid, ibid. causa proxima. 462. definitio. ibi.		<i>Subintrantes</i> febres.	118
subiectum, ibid. differentia, 464. signa diagnostica.		<i>Sudorifera</i> medicamenta. 47. sine sudore vix vlla fe-	
ibid. prognostica. 465. curatio. 466. eiusdem per pri-		bris finitur. ib. sudoris in peste modus 175. inter su-	
marium membri affectum curatio. ibid. diætæ. 468.		dandum quomodo tractandus æger 175. quomodo	
per consensum.	ibid.	post sudorem.	ibid.
<i>Spasmus</i> & paralytis interdum coniunguntur.	462	<i>Sudoris</i> Anglici ortus & historia. 207. natura, ibid. cau-	
<i>in Spasmo</i> quæ causa musculos contrahat. 462. pars		sæ, ibid. curatio.	208
contracta cur immobilis maneat, in conuulsu vero		<i>Sudores</i> in morbis à serosis humoribus vtilissimi.	296
motu agitur, 463. cur sensus in eo integri ma-		<i>Sudorifera</i> quomodo in paralyti adhibenda.	457
neant, in conuulsu vero motibus lædantur.	463	<i>Sudor</i> copiosus in scorbuto.	1004
<i>Spasmus</i> cur inflammationi coniungatur quandoq;	463	<i>Sudorifera</i> in dysenteria exhibenda.	913
<i>Spasmus</i> flatulentus.	ibid.	<i>Suffitus</i> in intemp. capitis frigida. 270. in catarrhis st-	
<i>Spasmus</i> proportionatus & impropportionatus ad ma-		tendis.	523
teriam.	464	<i>Suffocatio</i> , vide <i>Strangulatio</i> .	
<i>Spasmus</i> quomodo à cholericâ passione excitetur. 464.		<i>Suffocatio</i> spontanea serui Barbari.	736
quomodo ab elleboro & aliis medicamentis fortiter		<i>Suffocati</i> ex vaporibus seu fumis vt curandi. 748. ex	
purgantibus. ibid. quomodo à frigore.	464	ex submersione in aquam ibi. à fungis venenatis. ibid.	
<i>Spasmus</i> Cynicus.	629	<i>Suffusio</i> vera quid, 565. notha, subiectum, caus. ibid. diff.	
<i>Spasmus</i> Cynicus ex abscisso furunculo ortus.	ib.	ib. signa diagn. incipientis augescens, perfectæ, signa	
<i>Species</i> Oconis.	375	loci suffusionis. progn. 566. indicat. curat. veræ suffu-	
<i>Sphincteris</i> vesicæ refrigeratio.	1105	sionis. 567. per medicam. intern. ib. externa reuell. 567.	
<i>Spinæ</i> dorsii contusio. 730. fractura. ibid. vulnera.	ib.	discut. exterg. ib. fomenta, 567. chirurg. 568. diætæ. ib.	
<i>Spir.</i> ☉li veneris an in imbecillitate ventriculi conue-		<i>Sulphuris</i> Lunæ præparatio.	432
niat.	830	<i>Sutura</i> in vulneribus capitis non facile instituenda. 314	
<i>Spir.</i> mastiches ventriculum roborant.	ibid.	<i>Sutura</i> capitis tres, 305. earum defectus, 306. quibus ex	
<i>Spiritus</i> ☉ & vitriol. in quotidiana continua. 73. ter-		causis disunguntur.	311
tiana.	102	<i>Σύνωσις</i> palpebrarum.	536
<i>Spiritus</i> vitriol. utilitas in peste. 170. febrib. malignis.		<i>Sycoses</i> quid.	870
189. eius vsus qui prohibeant.	ibid.	<i>Symptomata</i> retentionis deprauatæ in ventriculo, cura-	
<i>Spir.</i> vitæ aureus Rulandi.	1057	tio eorumdem 827. Symptomata, quæ accidunt in	
<i>Spiritu</i> animale dari eumque diuersum à vitali. 511		coitu. 1144. Symptomata febrium quomodo tollen-	
<i>Spiritus</i> animalis in cerebro duplex.	373	da. 212. Symptomatic. febres. 76. earum differentia.	
<i>Spiritus</i> animales roborantia & augentia.	303	ib. & seq. à primariis differim. ib. pleræque quæ vulgo	
<i>Spiritus</i> euphragiae compositus.	582	tales habentur, & ipsæ sunt prim. ib. à comitatis qui-	
<i>Spiritus</i> opticos confortantia.	575	busnam signis discernenda. 78. prognost. curatio. 79	



# Index Rerum,

<i>Syncope</i> vox an Hippocrati in usu fuerit.	772	<i>fera</i> .ibid. appropriata.	103
<i>Syncope</i> definitio. 773. causæ ibid. differentiæ, signa.		<i>Tertiana</i> notha. 97. caus. ibid. signa. 98. curatio. 99. 100	
774. prognostica ibid. indicationes & curatio. ibid.		<i>Tertian</i> . notha paroxysmi an intra 12. horas terminari possint.	98
<i>Syncope</i> à cognatis affectibus differentia. ibi.		<i>Tertiana</i> quomodo fiat perniciosa.	99
<i>Synopalis</i> febr. humerosa ad pituitosas pertinet. 75. curatio. ib. Diæta. ibid.		<i>Tertiana</i> duplex. 123. triplex. eius curatio. 123.	
<i>Synocha</i> sine putredine inflatuos. dicuntur. 16. non generantur sine sanguinis abundantia. ib. eorum causæ. ibid. definitio. ibid. different. signa prognost. ib.		<i>Testium</i> intemperies, causæ, signa, prognostica, indicationes & curatio. 1119. diæta. ibid.	
curatio. 17		<i>Testium</i> numerus vitiat, lapides in iis. 1120	
<i>Synocha</i> biliosa. 18		<i>Testium</i> magnitudo vitiosa. ibid.	
<i>Synocha</i> putrida. 58. an è vasis determinatis fieri possint. 58. eat. caus. ib. & seqq. diff. 59. signa. 60. Prognost. 61. curatio per victum. ibid. venæsect. ibid. purgant. ibid. Alterantia. ibid.		<i>Testium</i> tabes. ibid.	
<i>Syrup</i> . de succo acerositatis citri. Limon. non adstringunt. 68. in continuis biliosis valde utilis. 68		<i>Testium</i> inflammatio, causæ, signa prognostica indicationes & curatio. ibid.	
<i>Syr. Regis</i> Sabor. ad quartan. 114		<i>Testium</i> inflatio. 1121. vulnera. 1122. vlcera ibid. cancer. ibid. gangræna. ibid.	
<i>Syrup</i> . violar. in febre ardente & vbi alius laxior solus non dandus. 67		<i>Testium</i> dolor. 1055	
<i>Syrupi</i> & potiones refrigerantes in febribus & doloribus capitis non nimis parcè exhibendi. 263		<i>Tetrav</i> . 464	
<i>Syrupi</i> cephalici calidi. 268. refrigerantes. 263. humectantes. 272		<i>Theriaca</i> Hippocratis. 87. in comate non vitendum. 353	
<i>Syrupus</i> de sua Arthetica. 453		<i>Theriac</i> . vis in peste. 168. vnde dependeat. 166	
<i>Syrupus</i> papaveris infantibus sæpius exhibitus ingenium ac memoriam eorum hebetat. 348		<i>Theriaca</i> cur hodie non easdem vires quas olim habeat. 166	
<i>Syrupus</i> purgans Donati Antonij ab Altomari in melancholia hypochondrica. 402		<i>Theriaca</i> Germanor. Tabernæmont. 168	
<i>Syrup</i> . Stoechad. Arabicæ omnibus frigidis cerebri ac neruorum affectibus utilis. 267. à principio non exhibendus 290		<i>Thermæ</i> in paralyfi quales eligendæ. 451. sulphureæ caput calefaciunt. 269. eorum in melanchol. hypochondriaca usus. 404	
<i>Syrupus</i> Victor. Fauentin. ad memoriam confortandam. 370		<i>Thoracis</i> fistulæ. illarum differentiæ ibid. signa, prognostica ibid. curatio. 722	
<i>Syrupus</i> de helenio Augenij. 742		<i>Thoracis</i> vulnera duplicia. 721	
<i>Syrupus</i> de erysimo Lobelij. 751		<i>Thoracis</i> vulnerum penetrantium signa ibid. prognost. ibid. curatio. diæta. 722	
<i>Syrupus</i> catarrhalis Kegleri. 754		<i>Thymi</i> quid. 870	
		<i>Tinctura</i> cephalicæ calidæ. 268	
		<i>Tinctura</i> antiparalytica. 455	
		<i>Tonsillarum</i> inflammatio & vlcera, causæ, signa, prognostica, curatio. diæta. 652	
		<i>Topica</i> refrigerantia in ardentibus continuis vix ante statum; in intermittentibus in vigore paroxysmi conueniunt. 69. actu calida potius, quàm frigida applicanda. ibid.	
		<i>Topica</i> in dysenteria utilia. 920	
		<i>Topica</i> calida in intemperie capitis calida an conueniant. 266	
		<i>Topica</i> cephalica calida. 293	
		<i>Topica</i> in principio ophthalmiæ qualia applicanda. 549. quo tempore. 549	
		<i>Topicis</i> in conuulsionibus anodyna admiscenda. 467	
		<i>Tophi</i> & lapides per aluum excreti, vt & ossa ac casei concreti. 934	
		<i>Tráxoma</i> palpebrarum. 751	
		<i>Tragæa</i> granorum actes quid. 917	
		<i>Transpiratio</i> prohibita an semper ad febris generationem necessaria. 24	
		<i>Tremor</i> in scorbuto. 1002	
		<i>Tremor</i> veluti quidam ventriculi. 827	
		<i>Tremoris</i> , stuporis, & paralyseos in scorbuto curatio. 1021	
		<i>Tremor</i> quale symptoma. 438. quid eius essentiam constituat. ibid. à paralyfi & conuulsione quibus differat. 439. à palpitatione & rigore. ibid. causæ. ibid. proxima vbi hæreat. ibid. differentiæ, signa diagnostica, prognostica. 440. indicationes, curatio. 441. curatio tremoris à spirituum absorptione & dissolutione. à causæ frig. & hum. neruos lædente. ibid. sanguinis euacuatio quando conueniat. ibid. corroborantia. ibid. topica. 442. curatio tremoris à maligna, venenata, ac narcotica causâ. ibid. diæta. ibid.	
		<i>Tremor</i> an ab errore externo possit prouenire. 444	
		<i>Tremoris</i> proxima causa an sit vna. 443	
		<i>Tremoris</i> vox an quoque pro rigore accipiatur. ibid.	
		<i>Tristitia</i> in scorbuto. 1003	
		<i>Tumores</i> scorbutici, eorum à gallicis tumoribus differentia. 1007. eorum curatio. 1023	
		<i>Tumoris</i> totius corporis in tympanite historię duæ. 1069	
			<b>Tumores</b>



# & Verborum.

<b>Tumores cerebri.</b>	333	<b>ca, curatio. ibid. diætā.</b>	793
<b>Tunica annatæ vitæ.</b>	534	<b>Ventriculi intemperies compositz, signa, prognostica, curatio.</b>	ibid.
<b>Tunicæ aranæ vitæ, causâ, 568. curatio.</b>	539	<b>Ventriculi intemperies cum materia, signa prognostica, indicationes, curatio.</b>	794
<b>Tunicæ vucæ vitæ.</b>	534	<b>Ventriculi intemperies cum bile, causâ, signa, curatio. ibid. diætā.</b>	795
<b>Tūloris palpebrarum.</b>	536	<b>Ventriculi intemperies cum pituita. ibid. causâ, signa. ibid. prognostica, curatio, diætā.</b>	796
<b>Turbith Paracelsi minerale.</b>	1056	<b>Verbena in morbis capitis à materia frigida multum prodest. *</b>	293
<b>Tussis definitio. 751. causâ. ibid. differentiz. 752. signa. 753. prognostica. ibid. indicationes, 754. diætā.</b>	756	<b>Verben. succus ad quartanas utilis.</b>	116
<b>Tussis quatenus talis curatio.</b>	754	<b>Vermes per aluum excreti, vt &amp; lacertæ, anguilla viua, scarabæi.</b>	934
<b>Tussis à catarrho curatio. ibid. à materia calida tenui &amp; acri. ibid. ab humore pituitoso. 755. à reliquis causis.</b>	756	<b>Vermes epatis.</b>	1040
<b>Tussis epidem. historia.</b>	209	<b>Vermes in vesica nati.</b>	1101
<b>Typhodes febris.</b>	77	<b>Vermes in umbilico geniti.</b>	1060
<b>Tympanites, causâ. ibid. signa, prognostica, indicationes, &amp; curatio. 1070. diætā.</b>	1071	<b>Vermes in pulmonibus geniti. 689. causâ. 690. curatio. ibid.</b>	
<b>Tympanites raro fit à solo flatu, 1069. quomodo hi generentur in tympanite. 1071. vbi generentur, an inter mesenterij &amp; intestinorum tunicas generentur, per quam viam in abdominis cavitatem perueniant. ibid. quomodo calor debilis sit eorumdem causa.</b>	1069	<b>Vermes dorsi.</b>	731
<b>V</b>		<b>Vermes in pericardio. 762. signa, &amp; curatio.</b>	ibid.
<b>Variolarum signa. 194. prognostica. 195. indicationes. 196. curatio per venæ sectionem, purgationem. ibid. Expellentia, Refrigerantia, Partes internas &amp; externas roborantia. 197. diætā.</b>	198	<b>Vermes in capite. 307. eorum causâ, signa diagnostica, prognostica, indicationes. 308. curatio.</b>	ibid.
<b>Variol. an aperiend. vt sanand. 198. earum vestigia vt tollenda.</b>	199	<b>Vermes in auribus. 593. causâ, signa diagnostica, curatio. ibid. quâ ratione eximendi.</b>	593
<b>Variol. an semper coniunctâ habeant febrē, qualem. 192</b>		<b>Vermis ex angulo oculi erumpens.</b>	588
<b>Variol. &amp; morbilli quando epidemij, quando sporadici, cur aliâ citius, aliâ tardius inuadant. 190. aliquando pestilentem naturam induunt, &amp; sunt pestis nūcij. ib.</b>		<b>Verruca in gutture &amp; lingua.</b>	648
<b>Variol. 190. an antiquis notæ fuerint. ibid. vnde dictâ. ib. earum causâ internâ secundum Arab. 191. Gentil. 192. Fernel. ibid. Mercurial. ibid. Author. ibid. omnes proximè per modum quemdam crisis proueniūt. 192. fiunt ab humore planè excrementitio.</b>	195	<b>Vertebra prima capiti adnata.</b>	732
<b>Vasa &amp; viæ multræ, quæ in demorruis occlusæ cernuntur, in viucentibus patent &amp; amplæ sunt.</b>	952	<b>Vertebræ primæ luxatio.</b>	728
<b>Venæ sectio tutissimum pleuritidis auxilium. 708. an purgationi in pleuritide sit præferenda.</b>	ibid.	<b>Vertebrarum ceruicis luxatio. ibid. earundem subluxatio.</b>	ibid.
<b>Venæ sectionem quid indicet. 31. quæ permittant. 34. quæ corpora facilius ferant, an pueri eam ferant, an grauid. an vires debiles, circa eam quæ attendenda. 35. post eam quid agendum, an dormire liceat.</b>	36	<b>Vertebrarum dorsi luxatio. ibid. eius differentiz. ibid. causâ externâ. ibid. internâ. 729. signa. ibid. prognosticum, curatio.</b>	ibid.
<b>Venæ sectio an in cacochymia utilis. 32. in febribus quando locum habeat, quando refrigerationis gratia adhibenda. 33. quando repetenda, quo morbi tempore instituenda. 35. qua hora.</b>	36	<b>Vertebrarum quassatio. 728. eius curatio.</b>	ibid.
<b>Venæ sectionis vicar. euacuationes.</b>	35	<b>Vertigo. 356. definitio. ibid. quæ actiones in ea lædantur. ibid. locus affectus. 357. causâ. ibid. vertigine qui facile corripantur. ibid. differentiz. ibid. signa, prognostica, indicationes, cura in paroxysmo. 358. an vena secanda, præseruatio. ibid. diætā. ibid. Vertigo à flatibus, causâ. 359. signa, prognostica, indicationes auxilia. ibid. Vertigo à meatuum cerebri angustia, causâ. 263. signa, prognostica, curatio. 263, 264. Vertigo à spirituum ex causis euidentibus agitatione, causâ. ibid. signa, prognostica, curatio. ibid. an sine vapore excitari possit. 264. Vertigo per consensum. 362. causâ, signa, ibid. prognostica, indicationes, curatio. ibid. in vertigine per consensum venæ in cruribus aperiendæ. ibid. curatio vertiginis à ventriculo. ibid. ab epate, liene, vtero toto.</b>	ibid.
<b>Venæ pedis quando aperiendæ, quando brachij &amp; manus.</b>	36	<b>Vesica scorbuticæ in toto corpore. 1008. Vesiculæ fellis morbi. 1044 Vesicæ intemperies. 1098. Vesicæ angustia. ibid. Vesicæ numerus mutatus. ibid. Vesicæ varia excreta. 1101. Vesicæ distentio. ibid. Vesicæ inflammatio, causâ, signa, prognostica, indicationes &amp; curatio. 1102. Vesicæ situs mutatus. ibid. Vesicæ vulnera, signa, prognostica, curatio. 1103. Vesicæ scabies. ibid. Vesicæ vlcera, causâ. ibid. signa, prognost. indicationes &amp; curatio. ibid. diætā. 1105. Vesicam an semper exulcerent cantharides. 1103. Vesicæ fistulæ. 1105. Vesicæ symptomata. 1108. Vesicæ dolor, causâ. ibid. Vesicæ sphincteris stupor. ibid. Vesicantia diè critico non applicanda, vesicatoria in peste.</b>	177
<b>Vena inter pollicem &amp; indicem an secanda in affectibus capitis.</b>	284	<b>Victus communis prauus an pestis causa.</b>	143
<b>Venas narium an scalpello vel hirudinibus aperire liceat.</b>	286	<b>Vigilia in febribus quomodo tollendæ. 212. Vigiliæ. 341. earum incommoda. ibid. causâ. 352. differentiz, signa diagnostica. ibid. prognostica. ibid. indicationes. 343. curatio. ibid. diætā. 348. Vigiliæ ab animi affectibus. 350. prognostica. ibid. curatio. ibid.</b>	
<b>Venena cerebro aduersa.</b>	302	<b>Vigiliæ à dolore, pectoris angustia, ac sensuum externorum obiectis. ibid. Vigiliæ à vaporibus calidis, siccis, acribus &amp; acidis, causâ, signa diagnostica, prognostica, indicationes, curatio. 349. Vigiliæ ex caliditate &amp; siccitate cerebri. 348. curatio.</b>	ibid.
<b>Venenum à rabidis animalibus quomodo homini communicetur. 416. diu latere potest in corpore. ibid. à quibus excitetur. 416. an in corpore humano generari possit. ibid. quâ vi agat.</b>	420		
<b>Venenorum varia genera.</b>	138		
<b>Venenorum assumptorum curatio. 42. ictu &amp; morfu animalium illatorum curatio.</b>	ibid.		
<b>Veneficia an pestem inducant.</b>	144		
<b>Venerem extinguentia.</b>	392. 1413		
<b>Ventriculi intemperies, causâ. 786. differentiz, signa, prognostica, indicationes, curatio, diætā.</b>	787		
<b>Ventriculi intemperies frigida. ibid. signa, prognostica, curatio. 788 diætā.</b>	789		
<b>Ventriculi intemperies calida, causâ, signa, prognostica, indicationes. curatio. 790. diætā.</b>	791		
<b>Ventriculi intemperies humida, causâ, signa, prognosti-</b>			



# Index Rerum, & Verborum.

- Vigilia* nimia ob vaporum spiritus sopientium defectum. 348. causa, ibid. signa diagnostica, prognostica, indicationes, curatio. ibid. *Vigiliarum* diurnarum historia. 343. *Vigilia* senum difficile curantur. 349
- Vina* medicata & clarea cephal. cal. 267. *Vini* potus num vini noxam pellat. 533. *Vinum* in melancholia quando & quale concedendum, 118. in ophthalmia an conueniat. 550. *Vinum* Euphrasii. 582
- Vinum* ophthalmicum. ibid. *Vinum* purgans Zvvingeri in melancholia hypochondriaca. 402. *Vinum* an febricitantibus conueniat, an hecticis. 55
- Viper* ad Theriac. confectionem necessar. diu ignot. cur Theriacae. admisceantur. earum caro qua vi agat, an venenos. venenum in qua parte hareat. 166. & seq.
- Virium* imbecillitas. 770. eius causa, signa, prognostica, indicationes & curatio. 772. diæta. ibid.
- Viscerum* dispositio qualis scorbuto generando conueniat. 994
- Viso* rerum rectarum pro curis. 584. causa, ibid. alieno colore prædictarum. ibid. causa, ibid. rerum absentium. ibid. immobilium pro mobilibus. 585. *Visio* geminata. 583. causa. ibid.
- Visus* deprauatio. ibid. signa diagnostica. 585. *Visus* hebetudo. 578. *Visus* quomodo lædatur in angustia pupillæ. 564
- Vita* genus quodnam scorbuti causa. ibid.
- Vitæ* humoris vitia. 535. morbi. 573. obscuritas, situs mutatus. ibid. causa, signa diagnostica. ibid. curatio. ibid. *Vitreus* humor à naturali constitutione deflectens num possit immediate visionem lædere, an verò saltem, quia nocet crystallino. ibid.
- Vlceris* in dysenteria constitutio quomodo cognoscatur. 908. *Vlcera* crurum in scorbuto. 1008. *Vlcera* telephæa unde nomen adepta sint. 1008. *Vlcerum* scorbuticorum curatio. 1024. *Vlcus* in meatu penis. 1130. curatio. ibid.
- Vmbilici* apertio. 1056. *Vmbilicus* sanguinem fundens. ibid. *Vmbilici* inflammatio. 1149. *Vmbilici* abscessus & vlcera. 1060. *Vmbilici* vulnera. ibid.
- Vnde* humorum copia in cholera proueniat. 842
- Vngaricus* morbus. 202. an nouus ibid. cur vermis cerebri dictus, 204. origo natura. 202. causa, signa, historia, prognostica. 203. & 204. indicationes, curatio per aluum lenientia, vomitoria, venæsectionem. 205. cucurbitul. sudorifera, diuretica, externa, diætam. 206
- Vnguentum* sanctum. 1091. *Vnguenta* cephalica calida. 267. frigida. 264. *Vnguentum* ad corroborandum memoriam. 570. *Vnguentum* anserinum. 455
- Vnguentum* cephalicum Conciliatoris. 324. Guilh. Fabricij. ibid. *Vnguentum* de Sapone Ioh. Cratonis ad Paralyfin. 455. *Vnguis* oculi. 551. causa. ibid. signa diagnostica, prognostica, indicationes. ibid. curatio. 552. abscondendi modi. ibid. diæta. ibid.
- Vnicornu* in peste vsus. 173
- Vocis* vitia, differentia illorum, causa. 748. signa. 750. prognostica, curatio. ibid.
- Vox* animalibus cur data. 748. *Vox* obtusa. 749. *Vox* rauca. ibid. eius causa, curatio. 740
- Vide *Raucedo*.
- Vox* tremula, abrupta, clangosa, tarda. ibid.
- Vomit* in febribus. 215. *Vomit* quid, causa. 8, 6. alias 536. differentia, signa. 837. alias 537. prognostica. 838. alias 538. indicationes, curatio. 839. alias 539. diæta. 841. *Vomit* sanguis. 840. *Vomit* in dysenteria quando exhibenda. 913. *Vomit* & vomendi conatus in scorbuto. 1003. curatio. 1022
- Vomit* quando in biliosis capitis affectibus exhibenda. 288. *Vomit* non, nisi materia sit fluitans, & nausæam excitet, in affectibus capitis ciendus. 290
- Vomitu* nonnunquam excrementitij humores circa ventriculum & loca vicina hærentes excutuntur, qui purgantibus per aluum euacuari non possint. 401
- Vredo* quid. 906. symptoma. 1093
- Vrina* scorbuticorum. 998. *Vrinæ* suppressio, causa. 1108. signa, prognostica, indicationes & curatio. 1109. ad eius excretionem quatuor necessaria. 1108
- Vrinæ* excretio diminuta, causa, prognostica, curatio. 1110. *Vrinæ* tarditas, curatio. ibid. *Vrinæ* ardor. 1112. causa, signa, prognostica, curatio. 1113
- Vrinæ* ardor quomodo generetur. ibid. *Vrinæ* ardoris stranguriæ differentia ratione causa. ibid.
- Vrinæ* continentia & suppressio quomodo ex eadem causa fiat. 1114. *Vrinæ* colorata. 1115. *Vrina* rubra. ibid. *Vrina* cruenta, causa, signa, prognostica, curatio, diæta. 1116. *Vrina* nigra. 1117
- Vrinæ* excretio per aliena loca. 1118. *Vrinam* cientia. 288. *Vrinæ* suppressioni in phrenitide quomodo succurrendum. 381
- Vua* procidentia, causa, differentia, signa diagnostica, prognostica. 562. curatio. ibid.
- Vulnera* à ferarum vel hominis etiam moribus inflata, quomodo tractanda. 323
- Vulnera* duræ meningis quomodo cutanda. 326. tenuis, & cerebri. ibid.
- Vulnera* in syncipite ac bregmate valde periculosa, minus in occipite. 319. in temporibus cur tam periculosa. ibid.
- in *Vulneribus* capitis magnis euacuatio necessaria. 321
- in *Vulneribus* capitis non facile futura instituenda. 313
- in *Vulneribus* cerebri omnia oleaginosa, vinctuosa, & pingua fugienda. 327
- in *Vulneribus* à telo venenato inflatis alexipharmacis opus. 314
- Vulnus* capitis simplex, sine contusione. 313. signa diagnostica, prognostica. ibid. curatio. ibid. cum pericranij læsione. ibid. cum partium externarum contusione. 314. cum cranij sine meningum & cerebri læsione. 315

X

*Ξηροφθαρμία*. 551

Y

*Υπέρχυμα*. 564  
*Υπέρχυμα* & *γλαύκωμα* differunt. 565

F I N I S.